

Linear Algebra homework2.5

1. 求 A,B,C 的逆矩阵.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

4. 通过下式来证明 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ 是不可逆的.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

5. 求 $U^2 = I$ 的 U, U 具有上三角形式 (不是对角线), 其中 $U = U^{-1}$.

6. (a) 如果 A 是可逆的且 $AB=AC$, 证明 $B=C$.

(b) 如果 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 找出两个不同的矩阵使得 $AB=AC$.

7. 如果 A 的第一行加第二行等于第三行, 表明 A 不可逆.

- (a) 解释为什么 $Ax = (0, 0, 1)$ 没有解.
(b) (b_1, b_2, b_3) 取哪些值可使得 $Ax = b$ 有解?
(c) 在消元的过程中, 第 3 行会发生什么变化?

8. 如果 A 的第一列加第二列等于第三列, 则表明 A 不可逆.

- (a) 求出一个非零解 x , 使得 $Ax = 0$. 矩阵 A

为 3 乘 3 阶矩阵.

- (b) 消元时满足第 1 列 + 第 2 列 = 第 3 列. 解释为什么没有第三个轴元.

10. 求出下列矩阵的逆矩阵.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & 6 \end{bmatrix}$$

11. (a) 求出使得 $A+B$ 不可逆的可逆矩阵 A,B.
(b) 求奇异矩阵 A 和 B, 使 $A+B$ 是可逆的.

12. 如果 $C=AB$ 是可逆的, (A,B 都是方阵) 且 A 是可逆的. 找到 A^{-1} , 它可由 C^{-1} 和 B 得到.

13. 如果三个方阵的乘积 $M = ABC$ 是可逆的, 那么 B 也是可逆的.(A,C 也一样). 找到 B^{-1} , 它由 M^{-1}, A, C 得到.

14. 如果将 A 的第一行加到第二行得到 B, 怎样由 A^{-1} 得到 B^{-1} ?

请注意顺序. 即 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \end{bmatrix}$ 的逆矩阵为 _.

15. 证明有一列为 0 的矩阵不可逆.

17. (a) 哪个 3 乘 3 阶的矩阵 E 有以下三步的效果?
用第二行减去第一行, 再用第三行减去第一行, 然后用第三行减去第二行.

- (b) 哪个矩阵 L 有以下效果? 用第二行加到第三行, 再将第一行加到第三行, 然后第一行加到第

二行.

18. 如果 B 是 A^2 的逆矩阵, 证明 AB 是 A 的逆矩阵.

22-28 题是运用高斯-约当方法计算 A^{-1}

22. 当把 A 变为 I 的时候, I 就变成了 A^{-1} . (通过行变换):

$$[A \ I] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [A \ I] = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 9 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

23. A 与 I 为 3 乘 3 的矩阵, 将 $[A \ I]$ 化成 $[I \ A^{-1}]$.

$$[A \ I] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

24. 对 $[U \ I]$ 运用高斯-约当消去法找到上三角矩阵 U^{-1} .

$$UU^{-1} = I, \quad \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

26. 通过 E_{21}, E_{12}, D^{-1} , 将 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ 化为单位阵,

E_{21}, E_{12}, D^{-1} 是哪些矩阵? 并求出 A^{-1} . 其中 $D^{-1}E_{12}E_{21} = A^{-1}$

28. 使用高斯-约当和行变换求出 A^{-1} .

$$[A \ I] = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

29. 判断对错 (如果错误举出反例, 如果正确给出原因).

- (a) 有一行全为 0 的 4 乘 4 阶矩阵不可逆.
(b) 主对角线上都是 1 的矩阵是可逆的
(c) 如果 A 是可逆的, 那么 A^{-1}, A^2 也是可逆的.

30. 当 $a \neq 0, a \neq b$ 时, 证明 A 是可逆的 (找出轴元或者 A^{-1}). 给出 c 的三个不同取值使得 C 不可逆:

$$A = \begin{bmatrix} a & b & b \\ a & a & b \\ a & a & a \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & c & c \\ c & c & c \\ 8 & 7 & c \end{bmatrix}$$

32. 假设矩阵 P, Q, I 有相同的行, 但是行的顺序不同. 他们叫作置换矩阵. 通过求解 $(P - Q)x = 0$ 来证明 $P - Q$ 是奇异的.

33. 找出并检查这些矩阵的逆 (假设它们存在):

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ C & I \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & I \\ I & D \end{bmatrix}$$