



概率论与数理统计

教师：杜亚星



第三十一讲 方差的性质



方差的性质：

1. 设 c 是常数，则 $D(c) = 0$.
2. 设 X 是随机变量， c 是常数，则有 $D(cX) = c^2 D(X)$.
特例： $D(-X) = D(X)$
3. 设 X, Y 是两个随机变量，则有
$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2 \cdot tail,$$

其中， $tail = E \{ [X - E(X)][Y - E(Y)] \}$.
特别，若 X, Y 相互独立，则有 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$.

综合上述三项, 设 X, Y 相互独立, a, b, c 是常数,

则
$$D(aX + bY + c) = a^2 D(X) + b^2 D(Y).$$

(特例: $D(X + c) = D(X)$.)

推广到任意有限个独立随机变量线性组合的情况

$$D(c_0 + \sum_{i=1}^n c_i X_i) = \sum_{i=1}^n c_i^2 D(X_i)$$

其中 $X_i, i = 1, 2, \dots, n$, 相互独立.

4. $D(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = c) = 1$ 且 $c = E(X)$.

证明:

$$1. D(c) = E \{ [c - E(c)]^2 \} = E \{ [c - c]^2 \} = 0.$$

$$\begin{aligned} 2. D(cX) &= E[(cX)^2] - [E(cX)]^2 \\ &= E(c^2 X^2) - [cE(X)]^2 \\ &= c^2 E(X^2) - c^2 [E(X)]^2 \\ &= c^2 \{ E(X^2) - [E(X)]^2 \} \\ &= c^2 D(X). \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 3. D(X+Y) &= E \left\{ [(X+Y) - E(X+Y)]^2 \right\} \\ &= E \left\{ [(X+Y) - (E(X) + E(Y))]^2 \right\} = E \left\{ [(X - E(X)) + (Y - E(Y))]^2 \right\} \\ &= E \left\{ [X - E(X)]^2 \right\} + E \left\{ [Y - E(Y)]^2 \right\} + 2E \left\{ [X - E(X)][Y - E(Y)] \right\} \\ &= D(X) + D(Y) + 2E \left\{ [X - E(X)][Y - E(Y)] \right\}. \end{aligned}$$

当 X, Y 相互独立时, $X - E(X)$ 与 $Y - E(Y)$ 相互独立

故 $E \left\{ [X - E(X)][Y - E(Y)] \right\} = E[X - E(X)]E[Y - E(Y)] = 0$

所以 $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$.

例1: 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $D(X)$.

解: 类似二项分布期望的求法, 引入随机变量

$$X_k = \begin{cases} 1, & A \text{ 在第 } k \text{ 次试验发生}; \quad k=1, \\ 0, & A \text{ 在第 } k \text{ 次试验不发生}, \quad 2, \cdots n. \end{cases}$$

于是 X_1, X_2, \cdots, X_n 相互独立, 服从同一(0-1)分布, 参数均为 p ,

$$\text{且 } X = \sum_{i=1}^n X_i \text{ 故 } D(X) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p)$$

$$\text{即 } E(X) = np, \quad D(X) = np(1-p).$$

例2: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$.

解: 令 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 Z 服从标准正态分布, $E(Z) = 0$,

且 Z 的概率密度为: $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$

$$\begin{aligned} \text{那么 } D(Z) &= E(Z^2) - 0 = \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} z e^{-\frac{z^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 1 \end{aligned}$$

此时 $X = \mu + \sigma Z$, 故 $D(X) = D(\mu + \sigma Z) = D(\sigma Z) = \sigma^2 D(Z) = \sigma^2$.

即正态分布的两个参数 μ , σ^2 分别是该分布的数学期望和方差.



性质： n 个独立的正态随机变量的线性组合仍服从正态分布。

若 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i=1, 2, \dots, n$, 且相互独立, 则它们的线性组合:

$$\begin{aligned} & c_0 + c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_n X_n \\ & \sim N(c_0 + c_1 \mu_1 + \dots + c_n \mu_n, \quad c_1^2 \sigma_1^2 + c_2^2 \sigma_2^2 + \dots + c_n^2 \sigma_n^2), \end{aligned}$$

期望 方差

其中 c_1, c_2, \dots, c_n 是不全为0的常数。

如： $X \sim N(1, 3)$, $Y \sim N(2, 4)$, 且 X, Y 相互独立,

$$Z_1 = 2X - 3Y \sim ? \qquad Z_1 \sim N(-4, 48)$$

$$Z_2 = 2X - 3Y + 4 \sim ? \qquad Z_2 \sim N(0, 48)$$

$$\begin{aligned} E(2X - 3Y) &= E(2X) + E(-3Y) = 2E(X) - 3E(Y) = 2 \times 1 - 3 \times 2 = -4 \\ D(2X - 3Y) &= D(2X) + D(-3Y) = 2^2 D(X) + (-3)^2 D(Y) = 2^2 \\ &\times 3 + (-3)^2 \times 4 = 48 \end{aligned}$$



例3: 设活塞的直径(以厘米计) $X \sim N(22.40, 0.03^2)$, 汽缸的直径,
 $Y \sim N(22.50, 0.04^2)$, X, Y 相互独立. 现任取一只活塞和一只汽缸,
求活塞能装入汽缸的概率.

解: 按题意需求 $P(X \leq Y) = P(X - Y \leq 0)$

由于 $X - Y \sim N(-0.10, 0.05^2)$

故有 $P(X \leq Y) = P(X - Y \leq 0)$

$$= \Phi\left(\frac{0 - (-0.10)}{0.05}\right) = \Phi(2) = 0.9772.$$




例4: 设随机变量 X 具有数学期望 $E(X)=\mu$, 方差 $D(X)=\sigma^2 \neq 0$,

记 $X^* = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 称 X^* 为 X 的**标准化变量**.

证明: $E(X^*)=0$, $D(X^*)=1$.

证明:

$$\begin{aligned} E(X^*) &= E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma} E(X-\mu) = \frac{1}{\sigma} [E(X) - \mu] = 0 \\ D(X^*) &= E(X^{*2}) - [E(X^*)]^2 = E(X^{*2}) - 0 \\ &= E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2\right] = E\left[\frac{(X-\mu)^2}{\sigma^2}\right] = \frac{1}{\sigma^2} E[(X-\mu)^2] \\ &= \frac{D(X)}{\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1 \end{aligned}$$



THE END