



合肥工业大学  
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

## 复变函数与积分变换

---

张神星 (合肥工业大学)

办公室: 翡翠科教楼 B1810 东

Email: [zhangshenxing@hfut.edu.cn](mailto:zhangshenxing@hfut.edu.cn)

课件地址: <https://zhangshenxing.github.io>

## 第五章 留数

### ① 留数

### ② 留数的应用

## 第一节 留数

- 留数定理
- 留数的计算方法
- 在  $\infty$  的留数

**定义.** 设  $z_0$  为  $f(z)$  的孤立奇点,  $f(z)$  在它的某个去心邻域内的洛朗展开为

$$f(z) = \cdots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots .$$

**定义.** 设  $z_0$  为  $f(z)$  的孤立奇点,  $f(z)$  在它的某个去心邻域内的洛朗展开为

$$f(z) = \cdots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots .$$

称

$$\text{Res}[f(z), z_0] := c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$$

为函数  $f(z)$  在  $z_0$  的留数, 其中  $C$  为该去心邻域中绕  $z_0$  的一条闭路.

在它的某个去心邻域内的洛朗展开为

$$= \frac{1}{z_0} + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots .$$

$$= c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) \, dz$$

取心邻域中绕  $z_0$  的一条闭路.


计算积分.

**复变函数积分计算方法 III: 留数定理.** 若  $f(z)$  在闭路  $C$  上解析, 在  $C$  内部的奇点为  $z_1, z_2, \dots, z_n$ , 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

**证明.** 由复合闭路定理,

$$\begin{aligned}\oint_C f(z) \, dz &= \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) \, dz \\ &= 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].\end{aligned}$$













若  $z_0$  为  $f(z)$  的本性奇点, 一般只能从定义计算.





若  $z_0$  为  $f(z)$  的本性奇点, 一般只能从定义计算.

例.  $f(z) = z^4 \sin \frac{1}{z}$ . 由于

$$f(z) = z^4 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{-2n-1}}{(2n+1)!} = z^3 - \frac{z}{3!} + \frac{1}{5!z} + \dots$$

因此

$$\text{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{120}.$$



设  $z_0$  为  $f(z)$  的极点.

设  $z_0$  为  $f(z)$  的极点.

**留数计算公式 I.** 若  $z_0$  是  $\leq m$  阶极点或可去奇点, 那么

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)]^{(m-1)}.$$

设  $z_0$  为  $f(z)$  的极点.

**留数计算公式 I.** 若  $z_0$  是  $\leq m$  阶极点或可去奇点, 那么

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)]^{(m-1)}.$$

**留数计算公式 II.** 若  $z_0$  是一阶极点或可去奇点, 那么

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z).$$





证明. 设

$$\begin{aligned}f(z) &= c_{-m}(z - z_0)^{-m} + \cdots + c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 + \cdots, \\g(z) &= c_{-m} + \cdots + c_{-1}(z - z_0)^{m-1} + c_0(z - z_0)^m + \cdots,\end{aligned}$$

则  $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$ . 由泰勒展开系数与函数导数的关系可知

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = c_{-1} = \frac{1}{(m-1)!} g^{(m-1)}(z_0).$$



### 典型例题：留数的计算

**例.** 求  $\text{Res} \left[ \frac{e^z}{z^n}, 0 \right]$ .

### 典型例题：留数的计算

**例.** 求  $\text{Res} \left[ \frac{e^z}{z^n}, 0 \right]$ .

**解答.** 显然 0 是  $n$  阶极点,



### 典型例题：留数的计算

例. 求  $\text{Res} \left[ \frac{e^z}{z^n}, 0 \right]$ .

**解答.** 显然 0 是  $n$  阶极点,

$$\text{Res} \left[ \frac{e^z}{z^n}, 0 \right] = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} (e^z)^{(n-1)}$$

**例.** 求  $\text{Res} \left[ \frac{e^z}{z^n}, 0 \right]$ .

**解答.** 显然 0 是  $n$  阶极点,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left[\frac{e^z}{z^n}, 0\right] &= \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} (e^z)^{(n-1)} \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} e^z = \frac{1}{(n-1)!}.\end{aligned}$$

### 典型例题：留数的计算

例. 求  $\operatorname{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right]$ .

### 典型例题：留数的计算

例. 求  $\operatorname{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right]$ .

**解答.** 因为  $z=0$  是  $z-\sin z$  的三阶零点,

### 典型例题：留数的计算

**例.** 求  $\text{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right]$ .

**解答.** 因为  $z=0$  是  $z-\sin z$  的三阶零点, 所以是  $\frac{z-\sin z}{z^6}$  的三阶极点.

### 典型例题：留数的计算

**例.** 求  $\text{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right]$ .

**解答.** 因为  $z=0$  是  $z-\sin z$  的三阶零点, 所以是  $\frac{z-\sin z}{z^6}$  的三阶极点. 若用公式

$$\operatorname{Res}\left[\frac{z - \sin z}{z^6}, 0\right] = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{z - \sin z}{z^3}\right)''$$

计算会很繁琐.

### 典型例题：留数的计算

**例.** 求  $\text{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right]$ .

**解答.** 因为  $z=0$  是  $z-\sin z$  的三阶零点, 所以是  $\frac{z-\sin z}{z^6}$  的三阶极点. 若用公式

$$\operatorname{Res}\left[\frac{z - \sin z}{z^6}, 0\right] = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{z - \sin z}{z^3}\right)''$$

计算会很繁琐.

$$\text{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right] = \frac{1}{5!} \lim_{z \rightarrow 0} (z - \sin z)^{(5)}$$

### 典型例题：留数的计算

**例.** 求  $\text{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right]$ .

**解答.** 因为  $z=0$  是  $z-\sin z$  的三阶零点, 所以是  $\frac{z-\sin z}{z^6}$  的三阶极点. 若用公式

$$\operatorname{Res}\left[\frac{z - \sin z}{z^6}, 0\right] = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{z - \sin z}{z^3}\right)''$$

计算会很繁琐.

$$\operatorname{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right] = \frac{1}{5!} \lim_{z \rightarrow 0} (z - \sin z)^{(5)} = \frac{1}{5!} \lim_{z \rightarrow 0} (-\cos z) = -\frac{1}{120}.$$



### 典型例题：留数的计算

**例.** 求  $\text{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right]$ .

**解答.** 因为  $z=0$  是  $z-\sin z$  的三阶零点, 所以是  $\frac{z-\sin z}{z^6}$  的三阶极点. 若用公式

$$\operatorname{Res}\left[\frac{z - \sin z}{z^6}, 0\right] = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{z - \sin z}{z^3}\right)''$$

计算会很繁琐.

$$\operatorname{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right] = \frac{1}{5!} \lim_{z \rightarrow 0} (z - \sin z)^{(5)} = \frac{1}{5!} \lim_{z \rightarrow 0} (-\cos z) = -\frac{1}{120}.$$

**练习.** 求  $\text{Res} \left[ \frac{e^z - 1}{z^5}, 0 \right] = \underline{\hspace{2cm}}$ .

## 典型例题: 留数的计算

例. 求  $\text{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right]$ .

解答. 因为  $z = 0$  是  $z - \sin z$  的三阶零点, 所以是  $\frac{z - \sin z}{z^6}$  的三阶极点. 若用公式

$$\text{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right] = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \left( \frac{z - \sin z}{z^3} \right)''$$

计算会很繁琐.

$$\text{Res} \left[ \frac{z - \sin z}{z^6}, 0 \right] = \frac{1}{5!} \lim_{z \rightarrow 0} (z - \sin z)^{(5)} = \frac{1}{5!} \lim_{z \rightarrow 0} (-\cos z) = -\frac{1}{120}.$$

练习. 求  $\text{Res} \left[ \frac{e^z - 1}{z^5}, 0 \right] = \underline{1/24}$ .

**留数计算公式 III.** 设  $P(z), Q(z)$  在  $z_0$  解析且  $z_0$  是  $Q$  的一阶零点, 则

$$\operatorname{Res} \left[ \frac{P(z)}{Q(z)}, z_0 \right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

**留数计算公式 III.** 设  $P(z), Q(z)$  在  $z_0$  解析且  $z_0$  是  $Q$  的一阶零点, 则

$$\operatorname{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, z_0\right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

**证明.** 不难看出  $z_0$  是  $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$  的一阶极点或可去奇点.

**留数计算公式 III.** 设  $P(z), Q(z)$  在  $z_0$  解析且  $z_0$  是  $Q$  的一阶零点, 则

$$\operatorname{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, z_0\right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

**证明.** 不难看出  $z_0$  是  $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$  的一阶极点或可去奇点. 因此

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$$



**留数计算公式 III.** 设  $P(z), Q(z)$  在  $z_0$  解析且  $z_0$  是  $Q$  的一阶零点, 则

$$\operatorname{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, z_0\right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

**证明.** 不难看出  $z_0$  是  $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$  的一阶极点或可去奇点. 因此

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), z_0] &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}} \end{aligned}$$



**留数计算公式 III.** 设  $P(z), Q(z)$  在  $z_0$  解析且  $z_0$  是  $Q$  的一阶零点, 则

$$\operatorname{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, z_0\right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

**证明.** 不难看出  $z_0$  是  $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$  的一阶极点或可去奇点. 因此

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), z_0] &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}} = \frac{P(z_0)}{\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}. \end{aligned}$$



## 典型例题：留数的计算

例. 求  $\text{Res} \left[ \frac{z}{z^8 - 1}, \frac{1+i}{\sqrt{2}} \right]$ .



### 典型例题：留数的计算

例. 求  $\text{Res} \left[ \frac{z}{z^8 - 1}, \frac{1 + i}{\sqrt{2}} \right]$ .

**解答.** 由于  $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$  是分母的 1 阶零点,

## 典型例题：留数的计算

例. 求  $\text{Res} \left[ \frac{z}{z^8 - 1}, \frac{1+i}{\sqrt{2}} \right]$ .

解答. 由于  $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$  是分母的 1 阶零点, 因此

$$\text{Res} \left[ \frac{z}{z^8 - 1}, \frac{1+i}{\sqrt{2}} \right] = \frac{z}{(z^8 - 1)'} \Big|_{z=\frac{1+i}{\sqrt{2}}} = \frac{z}{8z^7} \Big|_{z=\frac{1+i}{\sqrt{2}}} = \frac{i}{8}.$$

## 例题：留数的应用

例. 计算积分  $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$ .

### 例题：留数的应用

**例.** 计算积分  $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$ .

**解答.**  $f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)^2}$  在  $|z| < 2$  内有奇点  $z = 0, 1$ .

## 例题: 留数的应用

例. 计算积分  $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$ .

解答.  $f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)^2}$  在  $|z| < 2$  内有奇点  $z = 0, 1$ .

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z}{(z-1)^2} = 1,$$

## 例题: 留数的应用

例. 计算积分  $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$ .

解答.  $f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)^2}$  在  $|z| < 2$  内有奇点  $z = 0, 1$ .

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z}{(z-1)^2} = 1,$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \left( \frac{e^z}{z} \right)' = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^z(z-1)}{z^2} = 0,$$

### 例题：留数的应用

**例.** 计算积分  $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$ .

**解答.**  $f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)^2}$  在  $|z| < 2$  内有奇点  $z = 0, 1$ .

$$\text{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z}{(z-1)^2} = 1,$$

$$\text{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \left( \frac{e^z}{z} \right)' = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^z(z-1)}{z^2} = 0,$$

$$\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz = 2\pi i [\text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f(z), 1]] = 2\pi i.$$

$+\infty$  内解析, 且洛朗展开为

$$c_{-1}z^{-1} + c_0 + c_1z + \cdots$$

$$-c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_-} f(z) \, dz$$

该圆环域中绕 0 的一条闭路.

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	





由于

$$f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2} = \cdots + \frac{c_1}{z^3} + \frac{c_0}{z^2} + \frac{c_{-1}}{z} + c_{-2} + \cdots$$

因此有

### 留数计算公式 IV.

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right].$$

( $z$ ) 在扩充复平面内各奇点处的留数之和为 0.

**定理.** 若  $f(z)$  只有有限个奇点, 那么  $f(z)$  在扩充复平面内各奇点处的留数之和为 0.

**证明.** 设闭路  $C$  内部包含除  $\infty$  外所有奇点  $z_1, \dots, z_n$ .

**定理.** 若  $f(z)$  只有有限个奇点, 那么  $f(z)$  在扩充复平面内各奇点处的留数之和为 0.

**证明.** 设闭路  $C$  内部包含除  $\infty$  外所有奇点  $z_1, \dots, z_n$ . 由留数定理

$$-\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k].$$

$$-\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) \, dz = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

**定理.** 若  $f(z)$  只有有限个奇点, 那么  $f(z)$  在扩充复平面内各奇点处的留数之和为 0.

**证明.** 设闭路  $C$  内部包含除  $\infty$  外所有奇点  $z_1, \dots, z_n$ . 由留数定理

$$-\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) \, dz = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

故  $\sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] + \operatorname{Res}[f(z), \infty] = 0$ . □

$$-\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) \, dz = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

$$\text{故 } \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] + \operatorname{Res}[f(z), \infty] = 0.$$



### 例题：留数的应用

**例.** 求  $\oint_{|z|=2} f(z) dz$ , 其中  $f(z) = \frac{\sin(1/z)}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$ .

### 例题：留数的应用

**例.** 求  $\oint_{|z|=2} f(z) dz$ , 其中  $f(z) = \frac{\sin(1/z)}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$ .

$f(z)$  在  $|z| < 2$  内有奇点  $1, -i, 0$ ,



### 例题：留数的应用

**例.** 求  $\oint_{|z|=2} f(z) dz$ , 其中  $f(z) = \frac{\sin(1/z)}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$ .

$f(z)$  在  $|z| < 2$  内有奇点  $1, -i, 0$ , 其中  $0$  是本性奇点, 它的留数不易求得. 而  $-i$  是  $10$  阶极点, 它的留数也难以计算.

### 例题：留数的应用

例. 求  $\oint_{|z|=2} f(z) dz$ , 其中  $f(z) = \frac{\sin(1/z)}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$ .

$f(z)$  在  $|z| < 2$  内有奇点  $1, -i, 0$ , 其中  $0$  是本性奇点, 它的留数不易求得. 而  $-i$  是  $10$  阶极点, 它的留数也难以计算. 因此我们将问题转化为计算闭路  $C$  外部的奇点处留数.

### 例题：留数的应用

**例.** 求  $\oint_{|z|=2} f(z) dz$ , 其中  $f(z) = \frac{\sin(1/z)}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$ .

$f(z)$  在  $|z| < 2$  内有奇点  $1, -i, 0$ , 其中  $0$  是本性奇点, 它的留数不易求得. 而  $-i$  是  $10$  阶极点, 它的留数也难以计算. 因此我们将问题转化为计算闭路  $C$  外部的奇点处留数.

**解答.**  $f(z)$  在  $|z| > 2$  内只有奇点  $3, \infty$ .

### 例题：留数的应用

例. 求  $\oint_{|z|=2} f(z) dz$ , 其中  $f(z) = \frac{\sin(1/z)}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$ .

$f(z)$  在  $|z| < 2$  内有奇点  $1, -i, 0$ , 其中  $0$  是本性奇点, 它的留数不易求得. 而  $-i$  是  $10$  阶极点, 它的留数也难以计算. 因此我们将问题转化为计算闭路  $C$  外部的奇点处留数.

**解答.**  $f(z)$  在  $|z| > 2$  内只有奇点  $3, \infty$ .

$$\text{Res}[f(z), 3] = \lim_{z \rightarrow 3} (z - 3)f(z) = \frac{1}{2(3 + i)^{10}} \sin \frac{1}{3}.$$

### 例题：留数的应用

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), \infty] &= -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2}, 0\right] \\ &= -\operatorname{Res}\left[\frac{z^{10}\sin z}{(1+iz)^{10}(1-z)(1-3z)}, 0\right] = 0.\end{aligned}$$

### 例题：留数的应用

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), \infty] &= -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2}, 0\right] \\ &= -\operatorname{Res}\left[\frac{z^{10}\sin z}{(1+iz)^{10}(1-z)(1-3z)}, 0\right] = 0.\end{aligned}$$

$$\oint_{|z|=2} f(z) \, dz = 2\pi i [\text{Res}[f(z), -i] + \text{Res}[f(z), 1] + \text{Res}[f(z), 0]]$$

### 例题：留数的应用

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), \infty] &= -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2}, 0\right] \\ &= -\operatorname{Res}\left[\frac{z^{10}\sin z}{(1+iz)^{10}(1-z)(1-3z)}, 0\right] = 0.\end{aligned}$$


$$\oint_{|z|=2} f(z) \, dz = 2\pi i [\operatorname{Res}[f(z), -i] + \operatorname{Res}[f(z), 1] + \operatorname{Res}[f(z), 0]] \\ = -2\pi i [\operatorname{Res}[f(z), 3] + \operatorname{Res}[f(z), \infty]] = -\frac{\pi i}{(3+i)^{10}} \sin \frac{1}{3}.$$







若  $f(z)$  包含  $|z|, \bar{z}$ , 可先尝试通过  $C$  的方程将这些换成  $z$  的表达式


### 定积分 $\int_C f(z) dz$ 的计算









## 积分的计算方法汇总






## 积分的计算方法汇总




## 积分的计算方法汇总





## 积分的计算方法汇总



## 第二节 留数的应用

- 正弦余弦的有理函数的积分
- 有理函数的广义积分
- 有理函数与三角函数之积的广义积分
- 含幂函数的积分
- 含对数函数的积分

本节中我们将对若干种在实变中难以计算的定积分和广义积分使用复变函数和留数的技巧进行计算.

本节中我们将对若干种在实变中难以计算的定积分和广义积分使用复变函数和留数的技巧进行计算. 相应计算公式会在考试中按需提供.

本节中我们将对若干种在实变中难以计算的定积分和广义积分使用复变函数和留数的技巧进行计算. 相应计算公式会在考试中按需提供.

考虑  $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ , 其中  $R$  是一个有理函数.

本节中我们将对若干种在实变中难以计算的定积分和广义积分使用复变函数和留数的技巧进行计算. 相应计算公式会在考试中按需提供.

考虑  $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ , 其中  $R$  是一个有理函数. 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,

本节中我们将对若干种在实变中难以计算的定积分和广义积分使用复变函数和留数的技巧进行计算. 相应计算公式会在考试中按需提供.

考虑  $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ , 其中  $R$  是一个有理函数. 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

本节中我们将对若干种在实变中难以计算的定积分和广义积分使用复变函数和留数的技巧进行计算. 相应计算公式会在考试中按需提供.

考虑  $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ , 其中  $R$  是一个有理函数. 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right) \frac{1}{iz} dz.$$



本节中我们将对若干种在实变中难以计算的定积分和广义积分使用复变函数和留数的技巧进行计算. 相应计算公式会在考试中按需提供.

考虑  $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ , 其中  $R$  是一个有理函数. 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right) \frac{1}{iz} dz.$$

由于被积函数是一个有理函数, 它的积分可以由  $|z| < 1$  内奇点留数得到.

## 例题：三角函数的有理函数的积分

例. 求  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta.$

## 例题: 三角函数的有理函数的积分

例. 求  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta.$

解答. 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,

## 例题: 三角函数的有理函数的积分

例. 求  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta$ .

解答. 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

## 例题: 三角函数的有理函数的积分

例. 求  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta$ .

解答. 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{-4z^2} \cdot \frac{1}{5 - 3 \frac{z^2 + 1}{2z}} \cdot \frac{dz}{iz} = -\frac{i}{6} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(z - 3)(z - \frac{1}{3})} dz.$$

## 例题: 三角函数的有理函数的积分

例. 求  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta$ .

解答. 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{-4z^2} \cdot \frac{1}{5 - 3 \frac{z^2 + 1}{2z}} \cdot \frac{dz}{iz} = -\frac{i}{6} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(z - 3)(z - \frac{1}{3})} dz.$$

设  $f(z) = \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(z - 3)(z - \frac{1}{3})},$

## 例题: 三角函数的有理函数的积分

例. 求  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta$ .

解答. 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{-4z^2} \cdot \frac{1}{5 - 3 \frac{z^2 + 1}{2z}} \cdot \frac{dz}{iz} = -\frac{i}{6} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(z - 3)(z - \frac{1}{3})} dz.$$

设  $f(z) = \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(z - 3)(z - \frac{1}{3})}$ , 则  $\text{Res}[f(z), 0] = \frac{10}{3}, \text{Res}[f(z), \frac{1}{3}] = -\frac{8}{3},$

## 例题: 三角函数的有理函数的积分

例. 求  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta$ .

解答. 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{-4z^2} \cdot \frac{1}{5 - 3 \frac{z^2 + 1}{2z}} \cdot \frac{dz}{iz} = -\frac{i}{6} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(z - 3)(z - \frac{1}{3})} dz.$$

设  $f(z) = \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(z - 3)(z - \frac{1}{3})}$ , 则  $\text{Res}[f(z), 0] = \frac{10}{3}, \text{Res}[f(z), \frac{1}{3}] = -\frac{8}{3},$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5 - 3 \cos \theta} d\theta = -\frac{i}{6} \cdot 2\pi i \left[ \text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f(z), \frac{1}{3}] \right] = \frac{2\pi}{9}.$$



## 有理函数的广义积分


考虑  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ , 其中  $f(x)$  是一个有理函数, 分母比分子至少高 2 次, 且分母没有实根.

## 有理函数的广义积分

考虑  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ , 其中  $f(x)$  是一个有理函数, 分母比分子至少高 2 次, 且分母没有实根. 我们先考虑  $\int_{-r}^r f(x) dx$ .

## 有理函数的广义积分


考虑  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ , 其中  $f(x)$  是一个有理函数, 分母比分子至少高 2 次, 且分母没有实根. 我们先考虑  $\int_{-r}^r f(x) dx$ . 设  $C = C_r + [-r, r]$  如下图所示, 使得上半平面内  $f(z)$  的奇点均在  $C$  内,



## 有理函数的广义积分

考虑  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ , 其中  $f(x)$  是一个有理函数, 分母比分子至少高 2 次, 且分母没有实根. 我们先考虑  $\int_{-r}^r f(x) dx$ . 设  $C = C_r + [-r, r]$  如下图所示, 使得上半平面内  $f(z)$  的奇点均在  $C$  内, 则

$$2\pi i \sum_{\text{Im } a > 0} \text{Res}[f(z), a] = \oint_C f(z) dz = \int_{-r}^r f(x) dx + \int_{C_r} f(z) dz.$$



由于  $P(x)$  分母次数比分子至少高 2 次,

由于  $P(x)$  分母次数比分子至少高 2 次, 当  $r \rightarrow +\infty$  时,

$$\left| \int_{C_r} f(z) dz \right| \leq \pi r \max_{|z|=r} |f(z)| = \pi \max_{|z|=r} |zf(z)| \rightarrow 0.$$

由于  $P(x)$  分母次数比分子至少高 2 次, 当  $r \rightarrow +\infty$  时,

$$\left| \int_{C_r} f(z) dz \right| \leq \pi r \max_{|z|=r} |f(z)| = \pi \max_{|z|=r} |zf(z)| \rightarrow 0.$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a > 0} \operatorname{Res}[R(z), a].$$

由于  $P(x)$  分母次数比分子至少高 2 次, 当  $r \rightarrow +\infty$  时,

$$\left| \int_{C_r} f(z) dz \right| \leq \pi r \max_{|z|=r} |f(z)| = \pi \max_{|z|=r} |zf(z)| \rightarrow 0.$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a > 0} \operatorname{Res}[R(z), a].$$

这里, 由于积分收敛, 因此广义积分值和其柯西主值

$$\text{P. V.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{-r}^r f(x) dx$$

相等.



## 例题：有理函数的广义积分

例. 求  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3}, a > 0.$

### 例题：有理函数的广义积分

**例.** 求  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3}, a > 0.$

**解答.**  $f(z) = \frac{1}{(z^2 + a^2)^3}$  在上半平面内的奇点为  $ai$ .

## 例题: 有理函数的广义积分

例. 求  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3}, a > 0.$

解答.  $f(z) = \frac{1}{(z^2 + a^2)^3}$  在上半平面内的奇点为  $ai$ .

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), ai] &= \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow ai} \left[ \frac{1}{(z + ai)^3} \right]'' \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow ai} \frac{12}{(z + ai)^5} = \frac{3}{16a^5 i},\end{aligned}$$

### 例题：有理函数的广义积分

例. 求  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3}, a > 0.$

**解答.**  $f(z) = \frac{1}{(z^2 + a^2)^3}$  在上半平面内的奇点为  $ai$ .

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), ai] &= \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow ai} \left[ \frac{1}{(z + ai)^3} \right]'' \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow ai} \frac{12}{(z + ai)^5} = \frac{3}{16a^5 i},\end{aligned}$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3} = 2\pi i \text{Res}[f(z), ai] = \frac{3\pi}{8a^5}.$$

考虑  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \lambda x \, dx, \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \lambda x \, dx$ , 其中  $f(x)$  是一个有理函数, 分母比分子至少高 2 次, 且分母没有实根.

考虑  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \lambda x \, dx$ ,  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \lambda x \, dx$ , 其中  $f(x)$  是一个有理函数, 分母比分子至少高 2 次, 且分母没有实根. 和前一种情形类似, 我们有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\lambda x} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } a > 0} \text{Res}[f(z)e^{i\lambda z}, a],$$

考虑  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \lambda x \, dx$ ,  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \lambda x \, dx$ , 其中  $f(x)$  是一个有理函数, 分母比分子至少高 2 次, 且分母没有实根. 和前一种情形类似, 我们有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\lambda x} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } a > 0} \text{Res}[f(z)e^{i\lambda z}, a],$$

因此所求积分分别为它的实部和虚部.

### 例题: 有理函数与正弦、余弦之积的广义积分

例. 求  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{(x^2 + a^2)^2}, a > 0.$



## 例题：有理函数与正弦、余弦之积的广义积分

例. 求  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{(x^2 + a^2)^2}, a > 0.$

解答.  $f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)^2}$  在上半平面内的奇点为  $ai$ ,

## 例题：有理函数与正弦、余弦之积的广义积分

例. 求  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{(x^2 + a^2)^2}, a > 0.$

解答.  $f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)^2}$  在上半平面内的奇点为  $ai$ ,

$$\operatorname{Res}[f(z), ai] = \lim_{z \rightarrow ai} \left[ \frac{e^{iz}}{(z + ai)^2} \right]' = -\frac{e^{-a}(a + 1)i}{4a^3}.$$

## 例题: 有理函数与正弦、余弦之积的广义积分

例. 求  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{(x^2 + a^2)^2}, a > 0.$

解答.  $f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)^2}$  在上半平面内的奇点为  $ai$ ,

$$\operatorname{Res}[f(z), ai] = \lim_{z \rightarrow ai} \left[ \frac{e^{iz}}{(z + ai)^2} \right]' = -\frac{e^{-a}(a + 1)i}{4a^3}.$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix} \, dx}{(x^2 + a^2)^2} = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), ai] = \frac{\pi e^{-a}(a + 1)}{2a^3},$$

## 例题: 有理函数与正弦、余弦之积的广义积分

例. 求  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{(x^2 + a^2)^2}, a > 0.$

解答.  $f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)^2}$  在上半平面内的奇点为  $ai$ ,

$$\operatorname{Res}[f(z), ai] = \lim_{z \rightarrow ai} \left[ \frac{e^{iz}}{(z + ai)^2} \right]' = -\frac{e^{-a}(a + 1)i}{4a^3}.$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix} \, dx}{(x^2 + a^2)^2} = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), ai] = \frac{\pi e^{-a}(a + 1)}{2a^3},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{\pi e^{-a}(a + 1)}{2a^3}.$$

**定理.** 设实数  $p$  不是整数,  $f(x)$  是一个有理函数, 分母没有正实根, 且满足

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{p+1} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^{p+1} f(x) = 0,$$

**定理.** 设实数  $p$  不是整数,  $f(x)$  是一个有理函数, 分母没有正实根, 且满足

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{p+1} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^{p+1} f(x) = 0,$$

则

$$\int_0^{+\infty} f(x)x^p \, dx = -\frac{\pi}{\sin p\pi} \sum_a \operatorname{Res}[e^{p \ln(-z)} f(z), a],$$

其中  $a$  取遍  $f(z)$  的非零奇点.

### 例题：含幂函数的积分

例. 计算  $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{x(x+1)} dx, 0 < p < 1.$

## 例题：含幂函数的积分

例. 计算  $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{x(x+1)} dx, 0 < p < 1.$

解答. 设

$$f(z) = \frac{e^{p \ln(-z)}}{z(z+1)},$$



### 例题：含幂函数的积分

例. 计算  $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{x(x+1)} dx, 0 < p < 1.$

解答. 设

$$f(z) = \frac{e^{p \ln(-z)}}{z(z+1)},$$

则  $f(z)$  在正实轴和零以外的奇点为  $a = -1$ , 且

$$\text{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{e^{p \ln(-z)}}{z} = -e^{p \ln 1} = -1.$$

### 例题：含幂函数的积分

例. 计算  $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{x(x+1)} dx, 0 < p < 1.$

解答. 设

$$f(z) = \frac{e^{p \ln(-z)}}{z(z+1)},$$

则  $f(z)$  在正实轴和零以外的奇点为  $a = -1$ , 且

$$\text{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{e^{p \ln(-z)}}{z} = -e^{p \ln 1} = -1.$$

因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{x(x+1)} dx = \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

**定理.** 设  $f(x)$  是一个有理函数, 分母没有正实根, 且分母至少比分子高 2 次, 则

$$\int_0^{+\infty} f(x) \ln x \, dx = -\frac{1}{2} \sum_a \operatorname{Res}[\ln^2(-z) f(z), a],$$

其中  $a$  取遍  $f(z)$  的奇点.

### 例题：含对数函数的积分

例. 计算  $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 - 2x + 2} dx$ .

## 例题：含对数函数的积分

例. 计算  $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 - 2x + 2} dx$ .

解答. 设

$$f(z) = \frac{\ln^2(-z)}{z^2 - 2z + 2},$$

## 例题: 含对数函数的积分

例. 计算  $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 - 2x + 2} dx$ .

解答. 设

$$f(z) = \frac{\ln^2(-z)}{z^2 - 2z + 2},$$

则  $f(z)$  在正实轴和零以外的奇点为  $1 \pm i$ , 且

$$\operatorname{Res}[f(z), 1+i] = \lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{\ln^2(-z)}{z - (1-i)} = \frac{1}{2i} \left( \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{3\pi i}{4} \right)^2,$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 1-i] = \lim_{z \rightarrow 1-i} \frac{\ln^2(-z)}{z - (1+i)} = -\frac{1}{2i} \left( \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{3\pi i}{4} \right)^2.$$

## 例题：含对数函数的积分

由于二者互为共轭, 二者之和为

$$2 \operatorname{Re} \left( \frac{1}{2i} \left( \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{3\pi i}{4} \right)^2 \right) = -\frac{3\pi}{4} \ln 2.$$

因此

$$I = \frac{3\pi}{8} \ln 2.$$