

第三章（求解线性方程组的迭代方法部分）习题

1、设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 10 & a & 0 \\ c & 10 & c \\ 0 & a & 5 \end{pmatrix}, \quad \det A \neq 0,$$

用 a, c 表示出解方程组 $Ax = b$ 的 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法收敛的充要条件.

2、设 A 是一个对称正定矩阵, 将 A 分解为 $A = D - L - U = D(I - \tilde{L} - \tilde{U})$. 定义一种两步（正反G-S）迭代法:

$$\begin{aligned} (D - L)x^{(k+\frac{1}{2})} &= Ux^{(k)} + b, \\ (D - U)x^{(k+1)} &= Lx^{(k+\frac{1}{2})} + b. \end{aligned}$$

(1) 证明将上述迭代公式可合并写成 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + g$ 的形式, 其中

$$\begin{aligned} B &= (I - \tilde{U})^{-1} (I - \tilde{L})^{-1} \tilde{L}\tilde{U}, \\ g &= (I - \tilde{U})^{-1} (I - \tilde{L})^{-1} D^{-1}b. \end{aligned}$$

(2) 证明迭代矩阵 B 的特征值为非负实数。

(3) 证明 $\rho(B) < 1$, 即该迭代法收敛。

3、假设 A 是一个严格对角占优的矩阵, 且 $0 < \omega \leq 1$. 证明 SOR 方法求解 $Ax = b$ 一定收敛.

4、设 A 为对称正定矩阵, 证明在用共轭梯度法求解 $Ax = b$ 中, 一定有 $\mathcal{F}(x^{(k+1)}) \leq \mathcal{F}(x^{(k)})$, 且残差 $r^{(k)} \neq 0$ 时, 上述不等式为严格不等号, 这里

$$\mathcal{F}(x) = \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x).$$