

(A)
R
0
0.5
1
头
中间
次
次尾
尾
D=0.1
D=0.2
D=0.3
D=0.5
D=0.7
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
质量份额 p
酯类
酸类
呋喃类
醇类
缩醛类
早馏出型
醛酮类
萜类/降异戊二烯
晚馏出型
(B)
Spearman ρ(D, R) = 0.43
n = 96
β-大马士酮
1-辛烯-3-醇
乙酸苯乙酯
己酸乙酯
辛酸
苯乙醇
乙酸
2,3-丁二酮
丁酸异戊酯
酒心收集区间（50–400 mL）
早馏出型
晚馏出型
实心：馏出液候选物
酒心占比 R
分段近似馏出重心 D（馏出体积分数）
(C)
AUC = 0.47，P = 0.66
酒心占比 R
早馏出型
(72)
晚馏出型
(24)
(D)
AUC = 1.00，P < 0.001
馏出重心 D
早馏出型
(72)
晚馏出型
(24)
(E)
Kruskal–Wallis P = 0.34
酒心占比 R
酯类
醇类
醛酮类
酸类
缩醛类
萜类
呋喃类
(F)
|ΔR| > 5 个百分点：16/96
中位 |ΔR| = 1.35 个百分点
R（S1：稀释未回算情景）
R（S0：表列浓度）