

(A)
r = -0.72（186 组合）
受体内 r = -0.89 至 -0.81
Vina 对接评分（kcal/mol）
配体重原子数
OR1A1
OR1A2
OR1D2
OR1G1
OR2W1
OR51E2
(B)
校正评分 ~ z(TPSA) + z(芳香环)
z(TPSA)
z(芳香环)
标准化系数（kcal/mol 每 SD）
(C)
辛酸异戊酯
丁二酸二乙酯
乙缩醛
β-大马士酮
2-甲基萘
芳香环 0
芳香环 1
芳香环 2
早馏出型
晚馏出型
重原子数校正评分（6 受体均值）
TPSA（Å²）
(D)
早馏出型
晚馏出型
ρ = −0.06
95% CI −0.44 至 0.32
n = 30
校正评分（6 受体均值）
馏出重心 D（实测）
(E)
偏相关控制 TPSA、芳香环与重原子数
D：边际 ρ
R：边际 ρ
D：偏 ρ
R：偏 ρ
Spearman ρ（与校正评分）
(F)
逐一剔除配体（31 次）的影响范围
ρ（TPSA，校正评分）
(G)
OR1A2–乙酸异戊酯（−5.54 kcal/mol）
Ile181
Tyr258
Ile105
Val203
Thr254
Phe206
Asp180
His159
Gly202
(H)
OR1A2–β-大马士酮（−8.63 kcal/mol）
Asp180
Tyr178
Met104
Ala108
Lys109
碳氢键（C–H…O）
π–σ 作用
π–烷基作用
烷基疏水作用
范德华作用