

头孢吡肟

作用功效

头孢吡肟为广谱第四代头孢菌素，通过抑制细菌细胞壁的生物合成而达到杀菌作用。

头孢吡肟可以用来治疗哪些疾病？

本品可用于治疗成人和2月龄至16岁儿童由敏感细菌引起的中重度感染，包括：下呼吸道感染（肺炎和支气管炎）、单纯性下尿道感染和复杂性尿路感染（包括肾盂肾炎）、非复杂性皮肤及皮肤软组织感染、复杂性腹腔内感染（包括腹膜炎及胆道感染）、妇产科感染、败血症、以及中性粒细胞减少伴发热患者的经验治疗。也可用于儿童细菌性脑脊髓膜炎。

怀疑有细菌感染时应进行细菌培养和药敏试验，但是因为头孢吡肟是一革兰阳性和革兰阴性菌的广谱杀菌剂，故在药敏试验结果揭晓前可开始头孢吡肟单药治疗。对疑有厌氧菌混合感染时，建议合用其他抗厌氧菌药物，如甲硝唑进行初始治疗，一旦细菌培养和药敏试验结果揭晓，应及时调整治疗方案。

用前须知

用药前请咨询医生，切勿自行随意使用。

哪些人严禁使用头孢吡肟？

本品禁用于对头孢吡肟或L-精氨酸、头孢菌素类药物、青霉素或其他 β -内酰胺类抗生素有即刻过敏反应的病人。

哪些人需要谨慎使用头孢吡肟？

- 有胃肠道疾患，尤其是肠炎患者应谨慎处方头孢吡肟。

酚磺乙胺

作用功效

本品为促凝血药，用于防治各种手术前后的出血，也可用于血小板功能不良、血管脆性增加而引起的出血，亦可用于呕血、尿血等。

用于防治各种手术前后的出血，也可用于血小板功能不良、血管脆性增加而引起的出血，亦可用于呕血、尿血等。

酚磺乙胺可以用来治疗哪些疾病？

用于预防和治疗外科手术出血过多、血小板减少性紫癜或过敏性紫癜以及其他原因引起的出血，如脑出血、胃肠道出血、泌尿道出血，眼底出血、齿龈出血、鼻出血和皮肤出血等。

酚磺乙胺可以用来缓解哪些症状？

可用于缓解手术前后出血以及血小板功能不良、血管脆性增加等引起的出血症状。

酚磺乙胺常与哪些药物一起使用？

本品与其他类型止血药（如氨甲苯酸、维生素K等）合用，可增强止血效果。

用前须知

对于有血栓栓塞性疾病或有此病史者、肾功能不全者慎用，

本品过敏者及妊娠期妇女禁用。

法莫替丁

作用功效

法莫替丁，H2受体拮抗药，主要用于治疗消化性溃疡、出血性胃炎引起的上消化道出血、卓-艾（Zollinger-Ellison）氏综合征。此外还可预防侵袭性应激反应引起的上消化道出血及麻醉前给药预防吸入性肺炎等。

法莫替丁可以用来治疗哪些疾病？

- 因消化性溃疡、急性应激性溃疡、出血性胃炎引起的上消化道出血。
 - 卓-艾（Zollinger-Ellison）氏综合征。
 - 消化性溃疡（胃、十二指肠溃疡）、急性胃黏膜病变、反流性食管炎以及胃泌素瘤。
-

法莫替丁还有什么其他用途？

- 用于预防侵袭性应激反应（如脑血管障碍、头部外伤、多脏器衰竭、大面积烧伤等）引起的上消化道出血。
 - 麻醉前给药预防吸入性肺炎。
-

用前须知

- 使用本药后会隐藏胃癌症状，须在排除胃癌诊断后方可使用。
- 连续服用本品不超过7天。

硫普罗宁

作用功效

硫普罗宁为一种新型含游离巯基的甘氨酸衍生物。能赋活代谢酶，并能和阻碍HS-酶活性的有毒物质相螯合，因而有解毒作用，可以升高白细胞并加速肝细胞的恢复，降低骨髓染色体畸变率和皮肤溃疡的发生。

硫普罗宁可以用来治疗哪些疾病？

硫普罗宁可以用于治疗病毒性肝炎，酒精性肝炎，药物性肝炎，重金属中毒性肝炎，脂肪肝及肝硬化早期治疗。对老年性早期白内障和玻璃体浑浊有显著治疗作用。有抗炎抗过敏作用，对皮炎、湿疹、痤疮及荨麻疹有较好疗效。还可以预防和治疗泌尿系统胱氨酸结石。

硫普罗宁可以用来缓解哪些症状？

硫普罗宁可降低放疗、化疗的毒副作用，升高白细胞并加速肝细胞的恢复，降低骨髓染色体畸变率和皮肤溃疡的发生。

碳酸氢钠注射液

作用功效

碳酸氢钠注射液是一种水、电解质及酸碱平衡调节药，可以中和体内的过多氢离子，用于纠正酸中毒、碱化尿液、制酸等。

碳酸氢钠注射液可以用来治疗哪些疾病？

- 代谢性酸中毒：碳酸氢钠注射液用于治疗轻至中度代谢性酸中毒，以口服为宜；重度代谢性酸中毒则应静脉滴注，如严重肾脏病、循环衰竭、心肺复苏、体外循环及严重的原发性乳酸性酸中毒、糖尿病酮症酸中毒等。
- 碱化尿液：碳酸氢钠注射液可用于尿酸性肾结石的预防，减少磺胺类药物的肾毒性，及急性溶血防止血红蛋白沉积在肾小管。
- 制酸：治疗胃酸过多引起的症状。
- 其他：静脉滴注对某些药物中毒有非特异性的治疗作用，如巴比妥类、水杨酸类药物及甲醇等中毒。

碳酸氢钠注射液可以用来缓解哪些症状？

碳酸氢钠注射液可以缓解各种由于体内氢离子过多引起的症状：酸中毒、胃酸过多、酸性药物中毒后引起的血液pH值酸化。

维奈克拉

作用功效

维奈克拉是选择性的、口服可吸收的BCL-2（一种抗凋亡蛋白）小分子抑制剂，通过直接与BCL-2蛋白结合，取代促凋亡蛋白与BCL-2蛋白的结合，帮助恢复凋亡过程，常用于治疗急性髓系白血病。

主治疾病

本品帮助细胞恢复凋亡过程，与阿扎胞苷联合用于治疗因合并症不适合接受强诱导化疗，或者年龄75岁及以上的新诊断的成人急性髓系白血病患者。

适用症状

发热、骨痛、嗜睡和疲劳、气短、面色苍白、频繁感染、容易瘀伤、异常出血，如经常鼻出血和牙龈出血。

奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊

奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊

健康知识科普
西药 处方药 医保乙类

- 功能主治
- 用法用量
- 用前须知
- 注意事项
- 更多信息

功能主治

奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊用于成年患者，预防高度致吐性化疗引起的急性和延迟性恶心和呕吐。预防中度致吐性化疗引起的急性和延迟性恶心和呕吐。
奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊由奈妥匹坦、帕洛诺司琼两种药物组成，奈妥匹坦是一种人体P物质/神经激肽1(NK1)受体的选择性拮抗剂。帕洛诺司琼是一种5-HT3受体拮抗剂，它与该受体的结合力强，服用本品后可预防高度或中度致吐性化疗引起的恶心呕吐症

收起

泊沙康唑口服混悬液

泊沙康唑口服混悬液

健康知识科普
西药 处方药 医保乙类

功能主治 用法用量 用前须知 注意事项 更多信息

功能主治

泊沙康唑口服混悬液属于西药，可用于预防侵袭性曲霉菌和念珠菌感染，治疗口咽念珠菌病，具体如下：

- 预防侵袭性曲霉菌和念珠菌感染：本品适用于13岁和13岁以上因重度免疫缺陷而导致这些感染风险增加的患者，例如接受造血干细胞移植(HSCT)后发生移植物抗宿主病(GVHD)的患者，或化疗导致长时间中性粒细胞减少症的血液系统恶性肿瘤患者。
- 治疗口咽念珠菌病，包括伊曲康唑和/或氟康唑难治性口咽念珠菌病。

收起