
A3: FR/ABF Ibar_F ratio vs λ and the preregistered contrasts
L = log(Ibar_F^FR / Ibar_F^ABF) per seed; seeds coupled across λ; paired seed bootstrap
N = 512: FR/ABF ratio per cell (< 1: FR better)
N = 128: FR/ABF ratio per cell (< 1: FR better)
Ibar_F^FR / Ibar_F^ABF (exp median L)
1.25
1.11
1
0.9
0.8
0.67
2
1.5
1
0.67
1
4
16
128
transverse mobility λ
N = 512: E1 / E2 (Holm over N) and trends T1-T3
N = 128: E1 / E2 (Holm over N) and trends T1-T3
contrast
E1 λ16 vs λ1
Holm p 0.0004, n 32
E2 λ128 vs λ1
Holm p 0.0004, n 32
T1 λ4 vs λ1
p 0.0002, n 32
p 0.3, n 32
T2 λ16 vs λ4
p 0.0002, n 32
T3 λ128 vs λ16
p 0.43, n 32
p 0.086, n 32
0.5
0.67
0.8
0.9
1
1.11
1.25
R (< 1: FR relatively better at λ_a)
exp(median L), 95 % CI
E1 / E2: 95 % CI (thick), 97.5 % CI (thin)
T1-T3: 95 % CI (unadjusted)
equivalence band [0.90, 1.11]