

Arctic sea-ice-area change (CDR years 131–140 − 1pctCO$_2$ years 1–10)

(a) ACCESS-ESM1-5




Arctic total (45°–90°N) = -1.41 × 10^6 km^2

(b) CanESM5




Arctic total (45°–90°N) = -3.30 × 10^6 km^2

(c) CESM2




Arctic total (45°–90°N) = +0.33 × 10^6 km^2

(d) CNRM-ESM2-1




Arctic total (45°–90°N) = -0.20 × 10^6 km^2

(e) GFDL-ESM4




Arctic total (45°–90°N) = -0.49 × 10^6 km^2

(f) MIROC-ES2L




Arctic total (45°–90°N) = -0.72 × 10^6 km^2

(g) UKESM1-0-LL




Arctic total (45°–90°N) = -3.88 × 10^6 km^2

(h) CAS-ESM2-0



Arctic total (45°–90°N) = -2.07 × 10^6 km^2

(i) NorESM2-LM



Arctic total (45°–90°N) = +0.29 × 10^6 km^2

Central Arctic (CA; 70–90°N)
North Atlantic (NA; 60°W–30°E, south of 70°N)
North Pacific (NP; 120°E–150°W, south of 70°N)
Observed climatology (SIC = 15%)
Raw 1pctCO$_2$ initial (SIC = 15%)
Raw CDR final (SIC = 15%)

