

Arctic bias-corrected annual-mean sea-ice-area change (CDR years 131–140 − 1pctCO$_2$ years 1–10)

(a) ACCESS-ESM1-5




Total (CA+NA+NP) = -1.18 × 10^6 km^2

(b) CanESM5




Total (CA+NA+NP) = -2.28 × 10^6 km^2

(c) CESM2




Total (CA+NA+NP) = +0.23 × 10^6 km^2

(d) CNRM-ESM2-1




Total (CA+NA+NP) = -0.62 × 10^6 km^2

(e) GFDL-ESM4




Total (CA+NA+NP) = -0.61 × 10^6 km^2

(f) MIROC-ES2L




Total (CA+NA+NP) = -0.91 × 10^6 km^2

(g) UKESM1-0-LL




Total (CA+NA+NP) = -3.50 × 10^6 km^2

(h) CAS-ESM2-0



Total (CA+NA+NP) = -1.98 × 10^6 km^2

(i) NorESM2-LM



Total (CA+NA+NP) = +0.26 × 10^6 km^2

Central Arctic (CA; 70–90°N)
North Atlantic (NA; 60°W–30°E, south of 70°N)
North Pacific (NP; 120°E–150°W, south of 70°N)
Observed climatology (SIC = 15%)
Bias-corrected 1pctCO$_2$ early (SIC = 15%)
Bias-corrected CDR later (SIC = 15%)

