

ВНИМАНИЕ! Без ответа на контрольный вопрос работа не засчитывается!

ФИО	Группа	1	2	3	4	5	Σ	Оценка	Подпись

Вариант 1

Контрольный вопрос: Основная теорема вычислительной математики (формулировка)

1. (7) Для линейного уравнения теплопроводности решается смешанная задача:


$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(x, 0) = 0, \quad u(0, t) = t^2, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(1, t) = 0. \end{cases}$$

Используется метод прямых. Производная по пространству представляется в виде второй разности, затем получившаяся система ОДУ решается методом Рунге-Кутты «3/8». Предложить аппроксимацию второго порядка для правого граничного условия. При каких шагах τ метод устойчив?

2. (4) Дана задача Коши для уравнения переноса:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - 2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \\ u(x, 0) = \phi(x). \end{cases}$$

Построить разностную схему максимального порядка аппроксимации на предложенном шаблоне (см. Рис.). Исследовать схему на устойчивость по спектральному признаку.



3. (3) Для решения начально-краевой задачи

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad x \in [0, 1], \quad t \in [0, T], \\ u(x, 0) = 0, \quad u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = t^2, \end{cases}$$

используется разностная схема

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^{n-1}}{2\tau} - 2 \frac{u_{m+1}^{n+1} - 2u_m^{n+1} + u_{m-1}^{n+1}}{h^2} - 2 \frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2} = 0.$$

Исследовать ее на аппроксимацию и устойчивость по спектральному признаку фон Неймана.

4. (6) Дана система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{\partial v}{\partial x} + 2 \frac{\partial w}{\partial x} = 0, & 0 \leq t \leq 1, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + 2 \frac{\partial v}{\partial x} - 3 \frac{\partial w}{\partial x} = 0, & 0 \leq x \leq 1. \\ \frac{\partial w}{\partial t} - 4 \frac{\partial v}{\partial x} - 2 \frac{\partial w}{\partial x} = 0. \end{cases}$$


а) $u(t, 1) = \psi_1(t)$, $v(t, 1) = \psi_2(t)$, $w(t, 1) = \psi_3(t)$;

б) $u(t, 1) + v(t, 1) = \psi_1(t)$, $w(t, 1) = \psi_2(t)$;


в) $u(t, 0) = \psi_1(t)$, $w(t, 0) = \psi_2(t)$, $v(t, 1) = \psi_3(t)$;

г) $u(t, 0) = \psi_1(t)$, $u(t, 1) - v(t, 1) = \psi_2(t)$, $u(t, 0) + 2w(t, 0) = \psi_3(t)$.

Записать систему в инвариантах Римана, предложить разностную схему на шаблонах «кабаре» (см. рис.). Пусть заданы начальные условия: $u(0, x) = \phi_0(x)$, $v(0, x) = \phi_1(x)$, $w(0, x) = \phi_3(x)$. Какие из приведённых граничных соответствуют корректной постановке смешанной задачи?



5. (3) Уравнения Пуассона $\Delta u = f(x, y)$ решается в области $\Omega = \{-1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$ с граничными условиями $u|_{\partial\Omega} = 0$. Предложить аппроксимирующую уравнение разностную схему на указанном шаблоне. Какой порядок аппроксимации у этой схемы?



ВНИМАНИЕ! Без ответа на контрольный вопрос работа не засчитывается!

ФИО	Группа	1	2	3	4	5	Σ	Оценка	Подпись

Вариант 2

Контрольный вопрос: Определение аппроксимации разностной схемы.

1. (4) Построить функцию устойчивости для метода Розенброка

$$\begin{aligned}(E - \tau\gamma J)k_1 &= f(t_n, y^n), \\ (E - \tau\gamma J)k_2 &= f(t_n + c\tau, y^n + \tau dk_1), \\ y^{n+1} &= y^n + \frac{1}{2}(k_1 + k_2),\end{aligned}$$

где J -матрица Якоби. Параметры метода:

$$\gamma = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}, \quad c = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}, \quad d = -\sqrt{2}.$$

2. (6) Для уравнения Хопфа $u'_t + uu'_x = 0$ построить консервативный вариант схемы Лакса-Вендроффа.

3. (3) Для решения начально-краевой задачи

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - 6\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in [0, 1], \quad t \in [0, T], \\ u(x, 0) = 0, \quad u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = t^2, \end{cases}$$

используется разностная схема

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^{n-1}}{2\tau} - 6\frac{u_{m+2}^n + 4u_{m+1}^n - 10u_m^n + 4u_{m-1}^n + u_{m-2}^n}{4h^2} = 0.$$

Исследовать ее на аппроксимацию и устойчивость по спектральному признаку фон Неймана.

4. (6) Дана система уравнений:


$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - 2\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} = f(t, x), & 0 \leq t \leq 1, \\ \frac{\partial v}{\partial t} - 2\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial w}{\partial x} = g(t, x), & 0 \leq x \leq 1. \\ \frac{\partial w}{\partial t} - 2\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial x} - 4\frac{\partial w}{\partial x} = h(t, x). \end{cases}$$

а) $u(t, 0) = \psi_1(t)$, $v(t, 1) = \psi_2(t)$, $w(t, 1) = \psi_3(t)$;

б) $u(t, 1) = \psi_1(t)$, $v(t, 1) = \psi_2(t)$;

в) $v(t, 1) = \psi_1(t)$, $u(t, 1) = \psi_2(t)$, $w(t, 1) = \psi_3(t)$;

г) $u(t, 0) = \psi_1(t)$, $v(t, 0) = \psi_2(t)$, $w(t, 0) = \psi_3(t)$.



Записать систему в инвариантах Римана, предложить разностную схему на шаблонах «левый уголок» и «правый уголок» (см. рис.). Пусть заданы начальные условия: $u(0, x) = \phi_0(x)$, $v(0, x) = \phi_1(x)$, $w(0, x) = \phi_3(x)$. Какие из приведённых граничных соответствуют корректной постановке смешанной задачи?

5. (4) Дана краевая задача для уравнения Лапласа:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x, 0) = 2, \quad u(1, y) = 2y, \quad u(x, 1) = 2x - x^2 + 1, \quad u(0, y) = 2y - 1. \end{cases}$$

Для численного решения задачи используется разностная схема, построенная на шаблоне «крест». Найти собственные числа и собственные функции разностного оператора Лапласа. Предложить разностные отношения со вторым порядком аппроксимации для граничных условий.

ВНИМАНИЕ! Без ответа на контрольный вопрос работа не засчитывается!

ФИО	Группа	1	2	3	4	5	Σ	Оценка	Подпись

Вариант 3

Контрольный вопрос: Спектральный признак устойчивости (формулировка).

1. (4) Построить функцию устойчивости для метода Розенброка

$$\begin{aligned}(E - \tau\gamma J)k_1 &= f(t_n, y^n), \\ (E - \tau\gamma J)k_2 &= f(t_n + c\tau, y^n + \tau dk_1), \\ y^{n+1} &= y^n + \frac{1}{2}(k_1 + k_2),\end{aligned}$$


где J -матрица Якоби. Параметры метода:

$$\gamma = \frac{3 - \sqrt{3}}{6}, \quad c = \frac{3 + \sqrt{3}}{6}, \quad d = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

2. (4) Дана задача Коши для уравнения переноса:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - 2\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \\ u(x, 0) = \phi(x). \end{cases}$$

Построить разностную схему второго порядка аппроксимации на предложенном шаблоне (см. Рис.). Исследовать схему на устойчивость по спектральному признаку.



3. (7) Для решения начально-краевой задачи

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} u^2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0, & x \in [0, 1], \quad t \in [0, T], \\ u(x, 0) = 0, \quad u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = \sqrt[3]{t}, \end{cases}$$

используется разностная схема


$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^{n-1}}{2\tau} - \frac{1}{h} \left(\left(\frac{u_{m+1}^n + u_m^n}{2} \right)^2 \frac{u_{m+1}^n - u_m^n}{h} - \left(\frac{u_m^n + u_{m-1}^n}{2} \right)^2 \frac{u_m^n - u_{m-1}^n}{h} \right) = 0.$$

Исследовать ее на устойчивость по принципу замороженных коэффициентов.

4. (6) Дана система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial w}{\partial x} = 0, & 0 \leq t \leq 1, \\ \frac{\partial v}{\partial t} - 3\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} + 3\frac{\partial w}{\partial x} = 0, & 0 \leq x \leq 1. \\ \frac{\partial w}{\partial t} + 3\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial w}{\partial x} = 0. \end{cases}$$

- а) $u(t, 1) = \psi_1(t)$, $v(t, 1) = \psi_2(t)$, $w(t, 1) = \psi_3(t)$;
б) $u(t, 0) = \psi_1(t)$, $v(t, 1) = \psi_2(t)$, $w(t, 1) = \psi_3(t)$;
в) $u(t, 0) = \psi_1(t)$, $v(t, 0) = \psi_2(t)$, $w(t, 1) = \psi_3(t)$;
г) $v(t, 0) = \psi_1(t)$, $w(t, 1) = \psi_2(t)$.



Записать систему в инвариантах Римана, предложить разностную схему на шаблонах, показанных на рисунке. Пусть заданы начальные условия: $u(0, x) = \phi_0(x)$, $v(0, x) = \phi_1(x)$, $w(0, x) = \phi_3(x)$. Какие из приведённых граничных соответствуют корректной постановке смешанной задачи?

5. (4) Дана краевая задача для уравнения Лапласа:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \\ u(x, 0) = x, \quad u(x, 1) = \frac{x^2}{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(0, y) = 1 - y, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(1, y) = 1. \end{cases}$$

Для численного решения задачи используется разностная схема, построенная на шаблоне «крест». Найти собственные числа и собственные функции разностного оператора Лапласа. Предложить разностные отношения со вторым порядком для аппроксимации граничных условий.