

Outline

向量组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$

S

4.0 引言

方程 $A \cdot k = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = 0$

有非零的解

解不唯一

$|A| = 0$ ($\text{rank}(A) < n$)

线性相关

$\exists k_1, \dots, k_n$ 不全为 0

s.t. $k_1 \alpha_1 + \dots + k_n \alpha_n = 0$

几何

$\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 落在同一个 $(n-1)$ 维...

4.1 消元法

线性无关

$k_1 \alpha_1 + \dots + k_n \alpha_n = 0$

只有零解 ($k_i = 0 \forall i$)

4.2 n 维向量空间

线性空间的基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$

不大: $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 线性无关

不: $\forall \alpha$ 都能被 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 线性表示

e.g. \mathbb{R}^n 中的 (e_1, \dots, e_n)

$= \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

坐标跟随基的变换而变化

4.4 \mathbb{R}^n 的基, 向量在基下的坐标

$\vec{P} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

$\beta_i = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix} \parallel (\beta_1, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$

4.5 向量组的秩

极大线性无关组 (S, \leq)

a 在 (S, \leq) 是极大 if 由 $b \in S$
s.t. $a < b$
 $\hookrightarrow \begin{cases} a \leq b \\ a \neq b \end{cases}$

定义 5.1 (极大线性无关组)


我们称向量组中的一个线性无关的子向量组是 **极大的**, 如果不存在真包含这个子向量组的线性无关向量组.

例如 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 是 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} (m \leq n)$ 的一个极大线性无关组, 那么再添加一个向量 α' , 有

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha'\}$$

必然线性相关.

e.g. \mathbb{R}^n 中 $\{e_1, \dots, e_n\}$
基为极大线性无关 in $\{\alpha \in \mathbb{R}^n\}$



极大线性无关组的意义

定理 5.1

任意向量组都等价与它里面的一个极大线性无关组.

两个向量组等价 当且仅当 它们可以相互线性表示

Pf: 记向量组为 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ (\Leftrightarrow 它们张成相同的线性子空间)

取一个极大线性无关组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ ($m \leq n$)

• α 可以线性表示 α_i . ✓

• $\alpha_1, \dots, \alpha_m$

假设 α_i ($m < i \leq n$) 不能被 α_i 线性表示

$\Rightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_i\}$ 线性无关

$\neq \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$

与 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 极大... 矛盾. 并.

线性无关与秩

定理 5.2


考虑向量组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 可被 $\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$ 线性表出. 如果 $r > s$, 那么 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 线性相关.

几何: $\{\alpha \dots\}$ 可被 $\{\beta \dots\}$ 线性表出

\Leftrightarrow “ $\{\alpha \dots\}$ 张成子空间” 落在 “ $\{\beta \dots\}$ 张成子空间”

$(\{\alpha \dots\} \sim \{\beta \dots\})$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{span}\{\alpha\} \subseteq \text{span}\{\beta\} \\ \text{span}\{\alpha\} \supseteq \text{span}\{\beta\} \end{cases} \Leftrightarrow \text{span}\{\alpha\} = \text{span}\{\beta\}$$



Pf: $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 线性无关

$$\Leftrightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix} = 0$$

有非零解.

$\therefore \alpha_i$ 可被 $\{\beta\}$ 线性表出

$$\text{i.e. } \alpha_i = (\beta_1, \dots, \beta_s) \begin{pmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{is} \end{pmatrix}$$

$$\therefore (\beta_1, \dots, \beta_s) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rs} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \overbrace{\square}^s & \overbrace{\square}^{r-s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix} = 0$$

$\therefore \exists$ 非零解 (k_1, \dots, k_r)

#

推论 5.1 & 5.2

Thm 5.2 $r > s \Rightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 线性相关
 $r \leq s \Leftarrow$ - - - 无

定理 5.2 的逆否命题:

推论 5.1

考虑向量组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 可被 $\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$ 线性表出. 如果 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 线性无关, 那么 $r \leq s$.

推论 5.2

在 \mathbb{R}^n 中, $m > n$ 个向量必然线性相关.

取 $\{\beta_1, \dots, \beta_n\} = \{e_1, \dots, e_n\}$

向量组的秩

向量组的“秩”不依赖于极大线性无关组的选取:

推论 5.3

一个向量组的极大线性无关组都含有相同数量的向量.

PP. $\{\alpha\}$ 与 $\{\beta\}$ 都是某一个向量组的极大线性无关组.

$\therefore \{\alpha\}$ 可被 $\{\beta\}$ 线性表出

+ $\{\alpha\}$ 线性无关

$\Rightarrow \#\{\alpha\} \leq \#\{\beta\}$

$\therefore - - \geq \quad \#$

向量组的秩

定义 5.2

一个向量组的 **秩** 是指它的极大线性无关组所含向量的个数.


推论 5.4

等价矩阵具有相等的秩.
向量组

(类 Cor 5.3)

行秩 & 列秩

定义
对矩阵



The diagram shows a matrix A with elements $a_{i,j}$. Red horizontal ovals group the rows into vectors $\alpha_1, \dots, \alpha_m$. Blue vertical ovals group the columns into vectors β_1, \dots, β_n . The matrix is equated to the set of column vectors $(\beta_1, \dots, \beta_n)$.

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

记

$$\alpha_i = (a_{i,1}, \dots, a_{i,n}), \quad i = 1, \dots, m$$

$$\beta_j = (b_{1,j}, \dots, b_{m,j})^T, \quad j = 1, \dots, n$$

分别称 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 与 $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 为 A 的 **行向量** 与 **列向量**. 分别称 m 和 n 为 A 的 **行秩** 和 **列秩**.

例题 5.1

例题 5.1

求下列矩阵的行秩和列秩

$$\begin{array}{c} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{array} \begin{array}{c} \beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \beta_4 \\ \left(\begin{array}{cccc} \textcircled{1} & 1 & 3 & 1 \\ 0 & \textcircled{2} & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}.$$

行秩 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
且极大

\Rightarrow 行秩 = 3

列秩 $\beta_1, \beta_2, \beta_4$ 线性无关
极大

\Rightarrow 列秩 = 3

定理 5.3

定理 5.3

行秩 = 秩 = 列秩

$$\rightarrow \text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$$

仅考虑“行秩 = 秩” (Why?)

仅需证明初等行变换也不改变行秩: 变换前后的向量组等价.

初等行变换

① 行交换: 不改变向量组的秩.

② 数乘行: $\{\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_n\}$
 \downarrow
 $\{k\alpha_1, \dots, k\alpha_i, \dots, k\alpha_n\}$

③ 行加行: $\{\alpha_1, \dots, \alpha_i, \alpha_j, \dots, \alpha_n\}$
 \downarrow
 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_i, \alpha_j + \alpha_i, \dots, \alpha_n\}$



定理 5.4

$$AB = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \left[\begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{12} \\ \vdots \\ b_{n2} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} b_{1s} \\ \vdots \\ b_{ns} \end{pmatrix} \right] \quad \left| \quad \begin{array}{l} C = A \cdot B \\ \Downarrow \\ (\gamma_1, \dots, \gamma_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \\ \Updownarrow \\ \{\gamma_j\} \text{ 可被 } \{\alpha_i\} \text{ 线性表示} \\ \text{(i.e. } B \text{).} \end{array} \right.$$

定理 5.4

$$C = [\gamma_1, \dots, \gamma_s]$$

设 A, B 分别为 $m \times n, n \times s$ 矩阵, 则

$$C = A \cdot B$$

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

$$\begin{array}{l} \Downarrow \\ \text{span}\{\gamma_j\} \subseteq \text{span}\{\alpha_i\} \\ \Downarrow \\ \dim \text{span}\{\gamma_j\} \leq \dim \text{span}\{\alpha_i\} \\ \Updownarrow \\ \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A). \end{array}$$

仅证 $r(AB) \leq r(A)$. 记 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$,
 $AB = (\gamma_1, \dots, \gamma_s)$, 则

$$\gamma_j = \alpha_1 b_{1j} + \cdots + \alpha_n b_{nj}.$$

可见 $\{\gamma_j\}$ 可被 $\{\alpha_i\}$ 线性表示. 所以

$$r(AB) \leq r(A).$$

推论 5.5 & 5.6

推论 5.5

$$r(A_1 \dots A_t) \leq \min_{i=1, \dots, t} r(A_i).$$

例题 5.6

设 A 为 $m \times n$ 矩阵. 如果 P 和 Q 分别为 $m \times m$ 和 $n \times n$ 的可逆矩阵, 那么任意向量的坐标是唯一确定

$$r(PA) = r(A) = r(AQ).$$

Outline

4.0 引言

4.1 消元法

4.2 n 维向量空间

4.3 向量组的线性相关性

4.4 \mathbb{R}^n 的基, 向量在基下的坐标

4.5 向量组的秩

回顾

考虑 A 的列向量 α_j , i.e.

$$A = (\alpha_1 \dots, \alpha_n).$$

那么方程组 $Ax = b$ 可以记为

$$(\alpha_1 \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{b}$$

i.e.

$$x_1 \alpha_1 + \dots x_n \alpha_n = \mathbf{b}.$$

定理 6.1

定理 6.1

方程 $Ax = b$ 有解, 当且仅当, 向量 b 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示.

分情况: b 是否为 0?

$$\begin{aligned} A \cdot x &= b \\ \text{"} \\ (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= b. \end{aligned}$$

齐次方程的解

性质 6.1 & 6.2

$(V; +, \cdot)$

↳ 封闭, 单位元, 逆元 ...

齐次方程组 $Ax = 0$ 的解集

Kernel

$$\text{Ker}(A) := \{x \mid Ax = 0\}$$

关于加法和数乘封闭:

- ▶ $x_1 + x_2 \in \text{Ker}(A)$ if $x_1, x_2 \in \text{Ker}(A)$
- ▶ $kx \in \text{Ker}(A)$ if $k \in F$ and $x \in \text{Ker}(A)$


可见, 解集 $\text{Ker}(A)$ 是一个向量空间.

基础解系

由上述性质 6.1 & 6.2 可知, 如果解集 $\text{Ker}(A)$ 包含一个非零元 $x \neq 0$, 那么它含有无限个非零元 kx ($k \in F$).

Q: $\text{Ker}(A)$ 是否有限维? 存在有限 x_1, \dots, x_n , s.t.

$$\text{Ker}(A) := \{k_1x_1 + \dots + k_nx_n\}.$$



基础解析

定义 6.1

称 $Ax = 0$ 的解 η_1, \dots, η_m 为该方程组的一个 **基础解系**, 如果

- ▶ (线性无关) η_1, \dots, η_m 线性无关
- ▶ (极大) 任一解都可由 η_1, \dots, η_m 线性表示

齐次方程的一个基础解系, 其实就是解集 $\text{Ker}(A)$ 的一个极大线性无关组.

定理 6.2

定理 6.2

若 $Ax = 0$ 有非零解, 则

- ▶ 方程组有基础解系
- ▶ 基础解系所含解的个数为 $n - r(A)$

$A \cdot x = 0$
高元法.

$\left(\begin{array}{c|c} \text{阶梯形} & \begin{matrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{matrix} \end{array} \right)$

\downarrow

$\left(\begin{array}{cc|c} \boxed{A^{(n \times r)}} & \boxed{A^{(n \times (n-r))}} & \begin{matrix} a \\ \vdots \\ e \end{matrix} \end{array} \right) \xrightarrow{\text{方程}} \left(A^{(n \times r)} \quad A^{(n \times (n-r))} \right) \begin{pmatrix} x^{(r)} \\ x^{(n-r)} \end{pmatrix} = 0$

\triangleleft

$A^{(n \times r)} \cdot x^{(r)} + A^{(n \times (n-r))} \cdot x^{(n-r)} = 0$

\uparrow

$A^{(n \times r)} \cdot x^{(r)} = -A^{(n \times (n-r))} \cdot x^{(n-r)}$

\uparrow

$x^{(r)} = (A^{(n \times r)})^{-1} \cdot (-A^{(n \times (n-r))} \cdot x^{(n-r)})$

定理 6.2 证明

仅考虑阶梯化后的 A , 那么 $Ax = 0$ 可写为

$$(A^{(r \times r)} \mid A^{(r \times (n-r))}) \left(\begin{array}{c} X^{(r)} \\ X^{(n-r)} \end{array} \right) = \mathbf{0}$$

或

$$A^{(r \times r)} X^{(r)} = -A^{(r \times (n-r))} X^{(n-r)},$$

其中 $X^{(n-r)}$ 是 $(n-r)$ 个自由未知量. 对 $i = 1, \dots, n-r$, 记

- ▶ $e_i^{(n-r)}$ 为 \mathbb{R}^{n-r} 的第 i 个单位向量.
- ▶ $e_i^{(r)} := -(A^{(r \times r)})^{-1} (A^{r \times (n-r)} e_i^{(n-r)})$.
- ▶ $\eta_i = \begin{pmatrix} e_i^{(r)} \\ e_i^{(n-r)} \end{pmatrix}$

定理 6.2 证明

要证 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 为 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 仅需证

- ▶ 线性相关: 由 $\{e_i^{(n-r)}\}$ 的线性无关可得
- ▶ 极大:

对于任意一个解 $\eta = (c_1, \dots, c_n)$, 要证

$$\eta = c_1 \eta_1 + \dots + c_{n-r} \eta_{n-r}.$$

记 $\eta = (\eta^{(r)}, \eta^{(n-r)})^T$. 显然

$\eta^{(n-r)} = c_1 e_1^{(n-r)} + \dots + c_{n-r} e_{n-r}^{(n-r)}$, 剩下证

$$\eta^{(r)} = c_1 e_1^{(r)} + \dots + c_{n-r} e_{n-r}^{(r)}.$$

验证左右都是以下方程的解

$$A^{(r \times r)} X^{(r)} = -A^{(r \times (n-r))} (c_1 e_1^{(n-r)} + \dots + c_{n-r} e_{n-r}^{(n-r)}).$$

求基础解系过程

上述给出了基础解系的求法:

1. 阶梯化 $A = (A^{(r \times r)} A^{(r \times (n-r))})$
2. 取自由未知量中的一组基 $\{e_1^{(n-r)}, \dots, e_{n-r}^{(n-r)}\}$
3. 求解 $e_i^{(r)} := -(A^{(r \times r)})^{-1}(A^{r \times (n-r)} e_i^{(n-r)})$
4. 组装 $\eta_i = \begin{pmatrix} e_i^{(r)} \\ e_i^{(n-r)} \end{pmatrix}$

通解

定义 6.2 (通解)

对于

- ▶ 齐次方程组的一个基础解系 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$
- ▶ 任意 c_1, \dots, c_{n-r}

我们称

$$\eta = c_1\eta_1 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r}$$

为方程组的 **通解** (或 **一般解**).

通解 vs 特解

性质 6.3

如果 γ_1, γ_2 为 $Ax = b$ 的解, 那么 $\gamma_1 - \gamma_2$ 为 $Ax = 0$ 的解.

性质 6.4

如果

- ▶ γ 为 $Ax = b$ 的解
- ▶ η 为 $Ax = 0$ 的解

那么 $\gamma + \eta$ 是 $Ax = b$ 的解.

定理 6.3

定理 6.3

取 $Ax = b$ 的一个解 γ_0 . 方程的所有解形如

$$\gamma = \gamma_0 + \eta$$

其中 η 为方程组通解.

我们通常称 γ_0 为方程组的 **特解**.

定理 6.4

结合定理 6.3 与通解的“分解”，我们有方程组的解的线性表示：

定理 6.4

方程组 $Ax = b$ 的解有线性表示

$$\gamma = \gamma_0 + k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r}$$

其中

- ▶ γ_0 为 $Ax = b$ 的一个特解
- ▶ $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 为 $Ax = 0$ 的一个基础解系

例题 6.1

旧题 (例题 1.2) 新解

例题 6.1

解下列增广矩阵对应的方程

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ & 1 & -1 & -1 & -5 & -4 \end{pmatrix}$$

例题 6.2

例题 6.2

解下列增广矩阵对应的方程

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$