

Outline

4.0 引言

4.1 消元法

4.2 n 维向量空间

4.3 向量组的线性相关性

4.4 \mathbb{R}^n 的基, 向量在基下的坐标

4.5 向量组的秩

回顾

考虑 A 的列向量 α_j , i.e.

$$A = (\alpha_1 \dots, \alpha_n).$$

那么方程组 $Ax = b$ 可以记为

$$(\alpha_1 \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{b}$$

i.e.

$$x_1 \alpha_1 + \dots x_n \alpha_n = \mathbf{b}.$$

定理 6.1

定理 6.1

方程 $Ax = b$ 有解, 当且仅当, 向量 b 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示.

分情况: b 是否为 0?

$$\begin{aligned} A \cdot x &= b \\ \text{"} \\ (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= b. \end{aligned}$$

齐次方程的解

性质 6.1 & 6.2

$(V; +, \cdot)$

↳ 封闭, 单位元, 逆元 ...

齐次方程组 $Ax = 0$ 的解集

Kernel

$$\text{Ker}(A) := \{x \mid Ax = 0\}$$

关于加法和数乘封闭:

- ▶ $x_1 + x_2 \in \text{Ker}(A)$ if $x_1, x_2 \in \text{Ker}(A)$
- ▶ $kx \in \text{Ker}(A)$ if $k \in F$ and $x \in \text{Ker}(A)$


可见, 解集 $\text{Ker}(A)$ 是一个向量空间.

基础解系

由上述性质 6.1 & 6.2 可知, 如果解集 $\text{Ker}(A)$ 包含一个非零元 $x \neq 0$, 那么它含有无限个非零元 kx ($k \in F$).

Q: $\text{Ker}(A)$ 是否有限维? 存在有限 x_1, \dots, x_n , s.t.

$$\text{Ker}(A) := \{k_1 x_1 + \dots + k_n x_n\}.$$



基础解析

定义 6.1

称 $Ax = 0$ 的解 η_1, \dots, η_m 为该方程组的一个 **基础解系**, 如果

- ▶ (线性无关) η_1, \dots, η_m 线性无关
- ▶ (极大) 任一解都可由 η_1, \dots, η_m 线性表示

齐次方程的一个基础解系, 其实就是解集 $\text{Ker}(A)$ 的一个极大线性无关组.

定理 6.2

定理 6.2

$Ax=0$ 的解集

$$\text{Ker} A = \{x \mid Ax=0\}$$

线性子空间 \rightarrow 极大线性无关组

若 $Ax=0$ 有非零解, 则 \rightarrow 秩 (..... 向量个数)

- ▶ 方程组有基础解系
- ▶ 基础解系所含解的个数为 $n - r(A)$

$$A \cdot x = 0$$

高元法

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$r \left\{ \left(\begin{array}{cc|c} \square & \square & 0 \\ \square & \square & \vdots \\ \square & \square & 0 \end{array} \right) \right.$$

$A^{(nr)}$ $A^{(n(n-r))}$

方程

$$\left(A^{(nr)} \quad A^{(n(n-r))} \right) \begin{pmatrix} x^{(r)} \\ x^{(n-r)} \end{pmatrix} = 0$$

$$x^{(n)} = \left(A^{(nr)} \right)^{-1} \cdot \left(-A^{(n(n-r))} x^{(n-r)} \right)$$

$$A^{(nr)} x^{(r)} = -A^{(n(n-r))} x^{(n-r)}$$

$$A^{(nr)} x^{(r)} + A^{(n(n-r))} x^{(n-r)} = 0$$

$$\begin{pmatrix} x^{(r)} \\ x^{(n-r)} \end{pmatrix} = 0$$

定理 6.2 证明

仅考虑阶梯化后的 A , 那么 $Ax = 0$ 可写为

$$(A^{(r \times r)} | A^{(r \times (n-r))}) \left(\begin{array}{c} X^{(r)} \\ \hline X^{(n-r)} \end{array} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ \hline x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

或

$$A^{(r \times r)} X^{(r)} = -A^{(r \times (n-r))} X^{(n-r)},$$

其中 $X^{(n-r)}$ 是 $(n-r)$ 个自由未知量. 对 $i = 1, \dots, n-r$, 记 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

▶ $e_i^{(n-r)}$ 为 \mathbb{R}^{n-r} 的第 i 个单位向量.

▶ $e_i^{(r)} := -(A^{(r \times r)})^{-1} (A^{(r \times (n-r))} e_i^{(n-r)}).$

▶ $\eta_i = \begin{pmatrix} e_i^{(r)} \\ e_i^{(n-r)} \end{pmatrix}$

定理 6.2 证明

要证 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 为 $Ax=0$ 的一个基础解系, 仅
需证

- ▶ 线性~~相~~无关: 由 $\{e_i^{(n-r)}\}$ 的线性无关可得
- ▶ 极大:

对于任意一个解 $\eta = (c_1, \dots, c_n)$, 要证

$$\eta = c_1\eta_1 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r}.$$


记 $\eta = (\eta^{(r)}, \eta^{(n-r)})^T$. 显然

$\eta^{(n-r)} = c_1 e_1^{(n-r)} + \dots + c_{n-r} e_{n-r}^{(n-r)}$, 剩下证

$$\eta^{(r)} = c_1 e_1^{(r)} + \dots + c_{n-r} e_{n-r}^{(r)}.$$

验证左右都是以下方程的解

$$A^{(r \times r)} X^{(r)} = -A^{(r \times (n-r))} (c_1 e_1^{(n-r)} + \dots + c_{n-r} e_{n-r}^{(n-r)}).$$



求基础解系过程

上述给出了基础解系的求法:

1. 阶梯化 $A = (A^{(r \times r)} A^{(r \times (n-r))})$
2. 取自由未知量中的一组基 $\{e_1^{(n-r)}, \dots, e_{n-r}^{(n-r)}\}$
3. 求解 $e_i^{(r)} := -(A^{(r \times r)})^{-1}(A^{r \times (n-r)} e_i^{(n-r)})$
4. 组装 $\eta_i = \begin{pmatrix} e_i^{(r)} \\ e_i^{(n-r)} \end{pmatrix}$

通解

定义 6.2 (通解)

对于

- ▶ 齐次方程组的一个基础解系 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$
- ▶ 任意 c_1, \dots, c_{n-r}

我们称

$$\eta = c_1\eta_1 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r}$$

为方程组的 **通解** (或 **一般解**).

通解 vs 特解

性质 6.3

如果 γ_1, γ_2 为 $Ax = b$ 的解, 那么 $\gamma_1 - \gamma_2$ 为 $Ax = 0$ 的解. $A(\gamma_1 - \gamma_2) = A\gamma_1 - A\gamma_2 = b - b = 0.$

性质 6.4

如果

- ▶ γ 为 $Ax = b$ 的解
- ▶ η 为 $Ax = 0$ 的解

那么 $\gamma + \eta$ 是 $Ax = b$ 的解.

定理 6.3

定理 6.3

取 $Ax = b$ 的一个解 γ_0 . 方程的所有解形如

$$\gamma = \gamma_0 + \eta$$

其中 η 为方程组通解.

我们通常称 γ_0 为方程组的 **特解**.


定理 6.4

结合定理 6.3 与通解的“分解”，我们有方程组的解的线性表示：
 $Ax = 0$

定理 6.4


方程组 $Ax = b$ 的解有线性表示

$$\gamma = \gamma_0 + \underbrace{k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r}}_{\eta}$$



其中

- ▶ γ_0 为 $Ax = b$ 的一个特解
- ▶ $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 为 $Ax = 0$ 的一个基础解系



例题 6.1

旧题 (例题 1.2) 新解

例题 6.1

解下列增广矩阵对应的方程

$$2 \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -5 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} \right.$$

$$e_1^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow e_1^{(2)} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{特解 } \gamma_0 = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$e_2^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow e_2^{(2)} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \eta_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{一般解 } \gamma = \gamma_0 + k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + k_3 \eta_3$$

$$e_3^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow e_3^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

例题 6.2

例题 6.2

解下列增广矩阵对应的方程

① 求基础解系

(i.e. 求 $Ax=0$)

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ & & & & \\ & & & 1 & -2 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\leadsto r(A)=2, n-r(A)=4-2=2$

\leadsto 取 $e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$Ax=0$ 基础解系

$\leadsto \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

② 求一个特解

$$\gamma_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

以 x_1, x_3 为自由。

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma = \gamma_0 + k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2$$