

一般式方程

任意平面均可通过点法式方程表示. 整理平面的点法式方程

$$\text{记 } \vec{n} = (A, B, C) = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$$

$$P_0 = (x_0, y_0, z_0), P = (x, y, z)$$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{P_0P} = (A, B, C) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其中 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$, 称这个方程为该平面的 **一般式方程**.

一般式方程确定平面

反过来, 对于不全为零的 A, B, C , 任意方程

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

均表示一个平面.

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0.$$


• 法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$

$$\frac{-D}{A+B+C}$$

$$\frac{-D}{A+B+C}$$

$$\frac{-D}{A+B+C}$$

• 过点 $P_0 = (-\frac{D}{A+B+C}, -\frac{D}{A+B+C}, -\frac{D}{A+B+C})$



特殊情形

考虑 $Ax + By + Cz + D = 0$:

▶ $D = 0$ 齐次. π 过 $(0, 0, 0)$.

▶ $D \neq 0$ 不过.


- ▶ A, B, C 均为零 \emptyset
- ▶ A, B, C 只有一个零
- ▶ A, B, C 只有两个零
- ▶ A, B, C 均不为零: 不特殊

若 $A=0$

$$\Rightarrow \vec{n} = (0, B, C)$$

$$\Rightarrow \vec{n} \perp \vec{i}$$

$\Rightarrow \pi$ 有一个方向
平行于 \vec{i}



若 $A=0, B=0$


$$\Rightarrow \vec{n} = (0, 0, C)$$

$$\Rightarrow \vec{n} \parallel \vec{k}$$

$$\Rightarrow \pi \text{ 有一个方向} \parallel \vec{i}$$

$$\text{另一个方向} \parallel \vec{j}$$

$$\Rightarrow \pi \parallel xOy$$



例题 3.2

例题 3.2

求平面方程满足

- ▶ 过 $P(1, 0, 0)$ 和 $Q(0, 0, 1)$
- ▶ 平行于 y 轴

解: 点法式 = 点 + 法
(P, Q) ($\vec{n} = ?$)

平面向量 \vec{PQ}, \vec{j}

记法向量 $\vec{n} = \vec{j} \times \vec{PQ}$

$$= (0, 1, 0) \times (-1, 0, 1)$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i} + \vec{k} = (1, 0, 1).$$

利用点法式, π 上所有点满足.


$$\vec{n} \cdot \vec{PP'} = 0$$

$$\text{i.e. } (1, 0, 1) \cdot (x-1, y, z) = 0$$

$$\Rightarrow x + z - 1 = 0$$

≠.

截距式方程



定义 (截距)

一个平面 π 在 x 轴 (y 轴, z 轴) 的 **截距** 是指平面 π 与该轴的横 (纵, 竖) 坐标.

定义 (截距式方程)

记平面 π 在 x 轴, y 轴, z 轴的截距分别为 a, b, c . 假设 a, b, c 均不为零. 则平面 π 上的点的坐标满足

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

这称为平面 π 的 **截距式方程**.

$f(x, y, z) = 0$. 满足.

• f 是线性的

• 过

$$\begin{cases} (a, 0, 0) \\ (0, b, 0) \\ (0, 0, c) \end{cases}$$

一般 vs 截距

截距 \Rightarrow 一般:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

$$\Rightarrow (bc)x + (ac)y + (ab)z + (-abc) = 0$$

一般 \Rightarrow 截距 (要求 $D \neq 0$): ↖ $D=0 \Rightarrow \pi$ 过 $(0,0,0)$

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x}{-D/A} + \frac{y}{-D/B} + \frac{z}{-D/C} = 1$$

截距为零时


考虑平面 π 的截距 $a = 0$. 可见 π 过 $(0, 0, 0)$. 则截距 $b = c = 0$.

此时 π 的点法式为

$$\mathbf{n} \cdot (p_x, p_y, p_z) = 0.$$

π 的法向量 $\overrightarrow{P_0P} = (x-0, y-0, z-0)$
 $= (x, y, z)$

点法式方程 $Ax + By + Cz = 0.$






截距为“无穷”时

截距 $a = \infty$: 平面 π 平行于 x 轴. 此时的截距式方程为

$$\frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

$$\pi_n: \frac{x}{a_n} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

" \rightarrow " π : $0 + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$




三点式方程

取不共线的三点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = 1, 2, 3$.

如果平面 π 经过上述三点, 则平面 π 上的任意一点 $P(x, y, z)$ 均满足: 向量 $\overrightarrow{P_1P}$, $\overrightarrow{P_2P}$, $\overrightarrow{P_3P}$ 共面. 可见, 它们的混合积为零, i.e. $(\overrightarrow{P_1P}, \overrightarrow{P_2P}, \overrightarrow{P_3P}) = 0$

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x - x_2 & y - y_2 & z - z_2 \\ x - x_3 & y - y_3 & z - z_3 \end{vmatrix} = 0.$$

称上述方程为平面 π 的 三点式方程.



截距转三点

平面 π 的截距 a, b, c 当且仅当 π 经过 $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$, $(0, 0, c)$.

关系

考虑两个平面

▶ $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$

▶ 法向量 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$

▶ $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

▶ 法向量 $\mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$

之间的关系:

关系 (续)

- 平行 $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$: 存在 $\lambda \neq 0$ 使得 $\mathbf{n}_1 = \lambda \mathbf{n}_2$. 有

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \lambda.$$

- 重合: π_1 和 π_2 有相同的解. 注意到平面 π_1 方程可表为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$\lambda(A_2x + B_2y + C_2z) + D_1 = 0.$$

有

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2} = \lambda.$$

- 不平行: 相交

例题 3.3

例题 3.3

求平面 π_1 满足

- ▶ 过 $P(1, 1, -1)$
- ▶ 平行与 $\pi_2 : 3x + y + 2z = 1$

解：点法式 = 点 + 法
(P) $\vec{n} = \vec{n}_2 = (3, 1, 2)$

π 上点满足

$$3 \times (x-1) + 1 \times (y-1) + 2 \times (z-(-1)) = 0.$$

#

例题 3.3 解 1

解 1

平面 π_1 与 π_2 平行当且仅当 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$.

例题 3.3 解 2

解 2

注意到 π_1 和 π_2 的法向量相同, 再利用点法式.

例题 3.4

例题 3.4

求平面满足

▶ 过 $P(-1, 0, 1)$

▶ 经过线^l: 该线落在以下两个平面上:

$$\pi_1 \triangleright x + 3y - z = 0$$

$$\pi_2 \triangleright x - y + z + 1 = 0$$

解

线 l 上点满足

$$\begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2x + 2y + 1 = 0$$

① 三式:

线 l 过 $(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$

$(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$

+ $P = (-1, 0, 1)$

② 点法式

记 \vec{n}_i 为 π_i 的法向量

$\Rightarrow \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ 是 l 的切向量

Outline

3.0 引言

3.1 向量的线性运算

3.2 向量的内积, 外积与混合积


3.3 空间平面及其方程

3.4 空间直线及其方程

方向向量

定义 (方向向量)

对于直线 l , l 的 **方向向量** 是指任一与 l 平行的非零向量. 直线 l 的 **方向数** 是指它的方向向量的三个坐标.




点向式方程

给定

- ▶ 一个点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$
- ▶ 一个向量 $\mathbf{v} = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j} + v_z\mathbf{k}$

存在唯一一条直线 l

- ▶ 经过 P_0
- ▶ 以 \mathbf{v} 为方向向量




特殊点向式

如果 v_x, v_y, v_z 均不为零, 那么

$$\begin{aligned} & P(x, y, z) \text{ 在直线 } l \text{ 上} \\ \Leftrightarrow & \overrightarrow{P_0P} \parallel \mathbf{v} \\ \Leftrightarrow & \frac{x - x_0}{v_x} = \frac{y - y_0}{v_y} = \frac{z - z_0}{v_z}. \end{aligned}$$

称这为直线的 **点向式方程** (或 **对称式方程**).

$$\text{直线} = \{ P_0 + \vec{v} \cdot t \mid t \in \mathbb{R} \}$$



一般点向式


考虑 v_x, v_y, v_z 存在零的情况.

假设 $v_z = 0$, 则

$\Rightarrow \vec{v}$ 在 xoy 平面

$\Rightarrow \vec{v} \perp \vec{k}$

$$\begin{cases} \frac{x-x_0}{v_x} = \frac{y-y_0}{v_y} \\ z = z_0 \end{cases}$$




假设 $v_y = 0$ 且 $v_z = 0$, 则

$\Rightarrow \vec{v} = (x, 0, 0)$

$\Rightarrow \vec{v} \parallel \vec{i}$

$$\begin{cases} y = y_0 \\ z = z_0 \end{cases}$$




两点式方程

给定两个点 $P_0(x_0, y_0, z_0) \neq P_1(x_1, y_1, z_1)$, 存在唯一一条直线 l 经过 P_0 和 P_1 .

将 $\mathbf{v} = \overrightarrow{P_0P_1}$ 代入点向式方程, 得

$$\begin{aligned} & P(x, y, z) \text{ 在直线 } l \text{ 上} \\ \Leftrightarrow & \overrightarrow{P_0P_1} \parallel \overrightarrow{P_0P} \\ \Leftrightarrow & \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}. \end{aligned}$$



称这为直线的 **两点式方程**.

参数方程

给定

- ▶ 一个点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$
- ▶ 一个向量 $\mathbf{v} = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j} + v_z\mathbf{k}$

利用时间参数 $t \in \mathbb{R}$, 直线 l 上的点满足方程

$$\underline{P = P_0 + \mathbf{v}t.}$$


即

$$\begin{cases} x = x_0 + v_x t \\ y = y_0 + v_y t \\ z = z_0 + v_z t \end{cases}$$

称这为直线的 **参数方程**.

例题 4.2

~~定义 (方向向量)~~

求以下直线与平面的交点

► 直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-3}$ \leadsto 方向向量 $= (2, 0, -3)$

► 平面 $2x - y + z = 4$ 过点 $(1, 2, 3)$

直线 $(1, 2, 3) + (2, 0, -3)t$

解: P 为直线 l 与平面 π 的交点

$$\begin{cases} P \in l \Leftrightarrow P \text{ 满足 } l \text{ 的方程} \\ \pi \Leftrightarrow \pi \end{cases}$$

P 同时满足

$$\begin{cases} 2x - y + z = 4 \\ x = 1 + 2t \\ y = 2 \\ z = 3 - 3t \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2(1+2t) - 2 + (3-3t) = 4.$$

$$\Rightarrow t = ?$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = ?$$

井

一般式方程

任意一条直线 l , 选择不重合的两个平面 π_1 和 π_2 经过 l :

▶ $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$

▶ $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

其中, $A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2$ (因为相交且不重合). 即 l 上的点 $P(x, y, z)$ 满足

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

称为直线的 **一般式方程**.

例题 4.3

例题 4.3

将以下直线的一般式方程化为对称式 (点法式):

$$\begin{cases} x - y + z = 0 & (\pi_1) \\ x + y - 2z = 0 & (\pi_2) \end{cases}$$

解: 直线 l 过 P_0 , 切向量 \vec{v}

$$\vec{v} \perp \vec{n}_1, \vec{v} \perp \vec{n}_2$$

$$\Rightarrow \vec{v} \parallel \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

不妨取 $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

$$= (1, -1, 1) \times (1, 1, -2)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

不妨取 P_0 满足

$$\pi_1 + \pi_2: 2x - z = 0$$

$$P_0 = (1, 3, 2)$$

\Rightarrow 点法式可得

井