

习题 34

► 灭蚊器 10 个：次品 3 个，正品 7 个。

► 售出 2 个后，从剩余中随机抽取 1 个

问：在“抽取的为正品”的条件下，“已售出为一正一次”的概率是多少？

解：方法一：
 $B_i = \{\text{售出 2 个后，剩余正品 } i \text{ 个}\}$

$$P(B_7) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2}, \quad P(B_6) = \frac{C_3^1 \cdot C_7^1}{C_{10}^2}, \quad P(B_5) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2}$$

$A = \{\dots, \text{随机取得正品}\}$

$$P(A|B_i) = \frac{i}{8}$$

$$\Rightarrow P(A \cap B_i) = P(B_i) \cdot P(A|B_i)$$

$$\Rightarrow P(B_i|A) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B_i)}{\sum_{i=5}^7 P(A \cap B_i)} = \dots$$

方法二：不放回取 3 个灭蚊器

$A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取正品}\}$

$$\text{要求 } P(A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2 | A_3) = \frac{P(A_1 \bar{A}_2 A_3 \cup \bar{A}_1 A_2 A_3)}{P(A_3)} = \frac{P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3)}{P(A_3)}$$

习题 36

袋中有球：红 $\times a$ ；白 $\times b$ ；黑 $\times c$ 。

每次有放回地取球 1 个，并再放入同色的球 d 个。

记 $A_k = \{\text{第 } k \text{ 次取得红球}\}$ 。求： $P(A_1|A_k)$ 。

解：由 35 题得 $P(A_k) = \frac{a}{a+b+c}$

取 $k=2$ ，要求 $P(A_1|A_2) = \frac{P(A_1, A_2)}{P(A_2)} = \frac{a+d}{a+d+b+c} \cdot \frac{P(A_1)}{P(A_2)}$

$$\boxed{\begin{aligned} P(A_1, A_2) &= P(A_2|A_1) \cdot P(A_1) \\ &= \frac{a+d}{a+d+b+c} \cdot P(A_1) \end{aligned}}$$

$$= \frac{a+d}{a+d+b+c}$$

考察一般的 k 。

第 k 次	1	2	3	...	k
红	a	$a+d$?
非红	$b+c$	$b+c$?

$$P(A_k|A_1) = P((k-1)\text{次取红球} \mid \begin{matrix} \text{红} = a+d \\ \text{非红} = b+c \end{matrix})$$

$$= \frac{a+d}{a+d+b+c}$$


$$\begin{aligned} P(A_1|A_k) &= \frac{P(A_k|A_1) \cdot P(A_1)}{P(A_k)} = P(A_k|A_1) \\ &= \frac{a+d}{a+d+b+c} \end{aligned}$$

附加题 2.1

两盒火柴，每盒 n 根。每次随机选一盒火柴，从中用掉一根。

求：用完一盒时，另一盒剩下 r 根的概率？

解：




附加题 2.2 ? (Q: 只考虑前 $2n-r$?)

两盒火柴，每盒 n 根。每次随机在所有火柴中选一根用掉

求：用完一盒时，另一盒剩下 r 根的概率？

解：



$$\frac{C_{2n-r-1}^{n-1}}{C_{2n}^{n-1}} \cdot \left(\frac{2}{r+1} \right)$$

$$|\Omega| = C_{2n}^n$$

$$A = A_1 \cup A_2 = 2 \cdot C_{2n-r-1}^{n-1}$$

选 n 根甲

回顾

• 二项分布

- n 次独立同分布 (= 值) 试验

P : 成立概率.

- $X = \{ \text{成立次数} \}$

- $P(X=k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$.

• 泊松分布

- 单位时间内, 事件发生的次数为 λ . eg. 1 d 卖 3 个包子

$n=24: 1 \text{ h} \cdots \frac{1}{8} \cdots$

- $X = \{ \text{单位时间内事件发生的次数} \}$

- $P_n(X=k) = C_n^k \cdot p_n^k \cdot p_n^{n-k}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(X=k) = \frac{1}{k!} e^{-\lambda} \cdot \lambda^k. \quad (\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot p_n)$$

- Q: $Y = \{ \text{两次事件之间的时间间隔} \}$

几何分布

定义随机试验, 是一次的做伯努利试验, 直到第一次成功为止, 记录所做的伯努利试验次数.

设每次独立试验成功的概率为 p , 记首次成功的时候做的伯努利试验的次数为 X , 那么 $X = k$ 代表事件

$A = \{\text{第} 1, 2, \dots, k-1 \text{次试验都是失败的, 第} k \text{次试验是成功的}\}$

则有

$$P(A) = P_{\text{geom}}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$$

称 X 服从 **几何分布**, 记作 $X \sim \text{Geo}(p)$.

例 2.2.6

设一个地下采矿点有 5 个可以上升到地面的通道, 如果事故发生, 只有一个通道可以逃生, 且由于没有照明, 所以遇险者 **每次** 只能 **随意** 的在 5 个通道中选择一个, 若发现该通道不通, 则需要返回原点再 **随意** 的选择一个. 求

- ▶ 第三次才选择正确的通道的概率 $(\frac{4}{5})^2 \cdot \frac{1}{5}$.
- ▶ 选择成功时已经选择其他错误的通道次数不大于 6 次的概率

$$\begin{aligned} P(X \leq 7) &= P(X=1) + P(X=2) + \dots + P(X=6) + P(X=7) \\ &= \sum_{i=1}^7 (1-p)^{i-1} \cdot p \end{aligned}$$

例 2.2.6

解：定义随机变量 X 为选择正确时总共选择的次数, 那么 $X \sim \text{Geo}(\frac{1}{5})$

- ▶ 第三次才选择正确的概率

$$P_{\text{Geo}}(X = 3) = \left(\frac{4}{5}\right)^2 \frac{1}{5}$$

- ▶ 选择正确前选择其他通道的次数不大于 6

$$P_{\text{Geo}}(X \leq 7) = \sum_{k=1}^7 \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1} \frac{1}{5}$$

几何分布的“无记忆性”

几何分布具有“无记忆性”，也就是说当前 k 次试验都不成功时，第 $k + n$ 次试验首次成功与 k 的大小无关，即

$$P(X = k + n \mid X > k) = P(X = n)$$

几何分布的“无记忆性”

证明

$$\begin{aligned}P(X = k + n | X > k) &= \frac{P((X = k + n) \cap (X > k))}{P(X > k)} \\&= \frac{P(X = k + n)}{1 - P(X \leq k)} \\&= \frac{(1 - p)^{n+k-1} p}{(1 - p)^k} \\&= (1 - p)^{n-1} p = P(X = n)\end{aligned}$$

作为练习, 请大家验证

$$P(X > k + n | X > k) = P(X > n)$$

课堂练习

袋中有 m 个白球, n 个黑球, 现有放回的摸球, 直到摸到白球停止, 请问已知摸球的次数大于 3, 那么在第 5 次后停止的概率.

$X = \{\text{拿到白球时, 已经拿球次数}\}$

$$P(X=5 | X>3) = P(X=2) = \frac{n}{m+n} \cdot \frac{m}{m+n}$$

Outline

2.0 引言

2.1 随机变量

2.2 一维离散型随机变量

2.3 一维连续型随机变量

2.4 一维随机变量的分布

一维连续型随机变量

若随机变量的可能取值充满 \mathbb{R} 上的一个区间 (a, b) , 则称其为 **连续随机变量**.

请思考下面的问题:

- ▶ 计算质量密度为 $\rho(x)$ 的一维杆的一个端点到杆上某个指定点的质量
- ▶ 在 $[a, b]$ 区间随机的投点, 求落点位置 X 的分布函数

一维连续型随机变量的定义

定义 2.3.1

设 (Ω, \mathcal{F}, P) 为概率空间, X 为其上的随机变量, F_X 为 X 的分布函数. 如果存在 **非负可积** 的函数 f_X , 使得

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

那么称 X 为 **连续型随机变量**, 称 $f_X(x)$ 为 X 的 **分布密度函数**.

分布密度函数与分布函数

由 Newton-Leibniz 公式, 在 $f_X(x)$ 的连续点上, 有

$$f_X(x) = F'_X(x) = \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = f_X(x) - \underbrace{f_X(-\infty)}_0$$

- ▶ 若 $f_X(x)$ 是 X 的分布密度函数, 那么
 - ▶ $f_X(x) \geq 0, \forall x \in (-\infty, \infty)$
 - ▶ $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$
- ▶ 若定义在 $(-\infty, \infty)$ 上的函数 f 满足上面的两点, 那么令


$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, x \in (-\infty, \infty)$$

那么 $F(x)$ 一定是某随机变量的分布函数.

分布密度函数与分布函数

显然的

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$



$$P(X = a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} P(a - h < X \leq a)$$


$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{a-h}^a f_X(x) dx = 0$$

上面的式子表明连续型随机变量取任意的单点值的概率为零, 换句话说, 连续型随机变量的分布特性不能通过列举它取单点值的概率表示.

分布密度函数与分布函数

根据 Riemann 积分的性质, 存在 $\eta \in (m, M)$, 其中 $m = \min_{[x-\Delta x, x+\Delta x]} f_X(x)$, $M = \max_{[x-\Delta x, x+\Delta x]} f_X(x)$ 使得


$$\begin{aligned}\eta \Delta x &= \int_{x-\Delta x}^{x+\Delta x} f_X(t) dt = F_X(x + \Delta x) - F_X(x - \Delta x) \\ &= P(x - \Delta x < X \leq x + \Delta x)\end{aligned}$$



说明连续型随机变量在密度函数取值大的点附近取值的概率也较大.

均匀分布


如果连续型随机变量 X 的分布密度函数为



$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{当 } x \in [a, b] \\ 0, & \text{当 } x \notin [a, b] \end{cases}$$

则称 X 服从 $[a, b]$ 上的 **均匀分布**, 记为 $X \sim U[a, b]$, 其分布函数为

uniform



$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & \text{当 } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{当 } a \leq x \leq b \\ 1, & \text{当 } x > b \end{cases}$$

课堂练习

- ▶ 设随机变量 $X \sim U[0, 10]$, 对 X 进行 4 次独立观测, 求至少有 3 次观测值大于 5 的概率.
- ▶ 在 $[0, 1]$ 上任取一点记为 X , 求 $P(X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8} \geq 0)$

1. 解: $A = \{\text{观测值} > 5\} = \frac{1}{2}$.

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$
$$= 1 - F_X(5) = \frac{10-5}{10-0} = \frac{1}{2}.$$


$Y = \{A \text{ 发生的次数}\}$

$$P(Y \geq 3) = P(Y=3) + P(Y=4)$$
$$= C_4^3 \cdot P(A)^3 \cdot P(\bar{A}) + C_4^4 \cdot P(A)^4 \cdot P(\bar{A})^0$$

2. $X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8} \geq 0$

$$\Leftrightarrow (X - \frac{1}{4})(X - \frac{1}{2}) \geq 0$$
$$\Leftrightarrow \{X \leq \frac{1}{4}\} \cup \{X \geq \frac{1}{2}\}$$
$$\Leftrightarrow X \sim U[0, 1].$$

或 $P(X \leq \frac{1}{4}) + P(X \geq \frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$



#