结果与讨论（第三至第五阶段归档版）

本文件从完整论文初稿第3—5章逐字提取，保留原图表、内部数据来源编码及全稿参考文献编号。文末附全稿参考文献清单以便与完整初稿对应；完整方法与其余章节见《完整论文初稿》。计算方法、能量参考、部分单位及强重排候选性质的待核实限定继续有效。

3 HOCl–碳(0)体系的几何结构、能量及竞争规律

3.1 体系对应与中心碳静电环境

依据编号对照表，当前数据由28个母体标签及其H端、Cl端记录构成，共56条构型记录。结构、能量、NBO、AIM、EDA与NOCV各表按体系名称连接后，均覆盖相同的56个名称，未发现命名重复、缺项或额外构型。这里的H端与Cl端沿用原数据的取向标签，不预先等同于普通氢键和普通卤键。完整配体组成、中心碳原子编号及优化后连接方式仍为【待补充】，因而名称对应不能替代分子结构对应。尤其“CSNHCme不在研究范围内”与“SCNHCme被保留”的命名关系，应在结构表中明确，而不能自行将二者合并或增补。[D01]

MEP表中，24个体系的数值位于标为“Vs,min(C), kcal/mol”的B列，另4个只在C列“Vsurfs,min”填写。B列中CO为+5.521087、CS为+0.024254，NHCme为−36.437157，SPh2为−43.907279，说明所记录的中心碳附近静电指标随母体标签明显变化。但是，C列未说明是否采用同一等密度面、同一取点区域和同一单位，因此N2CS、SCCAACme、SCNHCme和SCPPh3的C列值不与B列拼接。补图S2仅展示24个B列有效点，并在图注中列明排除原因。[D02]

单体静电指标可以为接近方向提供初始线索，但不能独立决定两端竞争。CAACmeSPh2与N2CAACme的B列数值分别为−28.710342和−28.591889，接近程度较高，而其H减Cl的Eb差分别为−12.260855和−0.873322 kcal/mol。另一方面，SPh2具有上述更负的MEP值，其Eb却仅以0.166745 kcal/mol的表列差偏向Cl端。这些反例说明，一个单体静态极值不足以同时描述两种结合端的轨道匹配、形变和整体接触环境；它们并不证明静电作用不重要，也不能据此将差异唯一归因于另一分项。[D02,D04] 相关文献对碳(0)中心的研究同样表明，接近的静电势可以对应明显不同的结合强度，但该认识的迁移仍应限定于实际模型。[4]

3.2 HOCl内部键响应与构型差异

几何数据采用表列游离HOCl的O—H=0.97950、O—Cl=1.71675为差量基准。56条构型的Δr(O—H)和Δr(O—Cl)均可由相应内部键长减去该基准复算，公式缓存与独立复算一致。图3-4以H端Δr(O—H)及Cl端Δr(O—Cl)分别展示两类取向的内部键响应，不将不同原子对的距离直接解释为同一成键尺度。当前单位和基准理论水平仍为【待核实】，正文和图轴保留“原表距离单位未注明”的限定。[D03]

以CO为参照，H端的C···H距离为2.11684，O—H为0.98984，较表列单体伸长0.01034；Cl端的C···Cl为2.87467，O—Cl为1.73130，伸长0.01455。与强重排候选相比，这一对构型的HOCl内部键变化较小，可以作为低响应参照，但不能仅凭较长接触或较小伸长认定其全部相互作用均为纯静电或完全非共价。[D03] 以同一母体的两个取向分别考察被扰动内部键，比将所有接触距离放在一个强度排序中更有明确的结构意义。

三个H端构型呈现明显不同的响应：H-CAACmeSPh2、H-NHCme和H-NHCmeSPh2的C—H距离分别为1.12139、1.15136和1.11974，而O—H分别达到1.73117、1.64089和1.75861，较单体基准伸长0.75167、0.66139和0.77911。这里描述的是C—H距离在当前H端样本中较短，以及O—H相对已列单体基准伸长，并没有同一体系反应前C—H键可供讨论其“缩短量”。图3-4将三者单独标记，并保留完整范围及其余体系的局部视图，避免极端点掩盖其他结构响应。[D03,D14]

Cl端也出现连续变化。Cl-NHCme的C—Cl和O—Cl分别为2.04473和2.04933，O—Cl相对单体伸长0.33258；该构型的两个距离接近，提示需同时考察新旧接触的电子结构。由于C与O具有不同的共价环境，等距离并不是氯转移的普遍分界。图5-1采用C···H与O—H、C···Cl与O—Cl的成对几何散点进行筛查，属于由真实表列数据绘制的指标图，并非优化结构或反应路径图。[D03,D15]




图3-4 HOCl内部键长响应（F2）。(a)全部28条H端Δr(O—H)；(b)其余25条H端记录的局部视图，三个优先候选仍完整保留在(a)，不将其余记录自动称为弱作用；(c)全部28条Cl端Δr(O—Cl)。差量由结构数据!E2:F57分别减去E59=0.97950、F59=1.71675复算。来源单位未注明，图轴保留原表距离单位；三H候选及Cl-NHCme单独标记。图示内部键响应，不能凭几何独自确定质子/氯完整转移。

3.3 两端结合能比较及能量指标引起的排序变化

为使符号保持一致，定义δb=Eb(H端)−Eb(Cl端)，δint=Eint(H端)−Eint(Cl端)。负值表示H端相应表列值更低，正值表示Cl端更低。图3-5并列展示两端Eb及两种差量。按Eb比较，28对中H端较低22对、Cl端较低6对；Cl端较低的名称为CAACme、CAACmePPh3、NHCmeCAACme、NHCmePPh3、PPh3SPh2和SPh2。若改按Eint，则H端较低13对、Cl端较低15对。两种指标对同一配对矩阵给出了不同的总体排序，说明“相互作用较强”与“净结合数值较低”不能在文字中混用。[D04]

9对体系发生排序反转，分别为N2CAACme、N2NHCme、N2PPh3、N2SPh2、OCSPh2、PPh3、SCN-HCme、SCPPh3和SCSPh2，且均为Eint的Cl端更低、Eb的H端更低。例如N2CAACme的δint为+1.590 kcal/mol，δb为−0.873322 kcal/mol；PPh3的两个差量分别为+6.200和−0.096009 kcal/mol。前者表明不同能量口径可能改变相对次序，后者还提示，即便Eint有较大的端间差异，Eb差也可能接近零，不能仅据Eint讨论最终取向选择。[D05]

为分析差异来源，本文另列g=Eb−Eint，但在能量定义未确认前，只称其为“表列差量”。代数上必有δb−δint=g(H端)−g(Cl端)。对N2CAACme，g(H端)=2.341227、g(Cl端)=4.804549 kcal/mol，二者之差为−2.463322 kcal/mol，恰对应排序改变所需的差额。若Eint和Eb分别对应统一冻结单体与孤立优化单体参考，且校正方式一致，这一差额可解释为两端形变代价的不同；若两列还存在BSSE、热修正或方法差别，则不能将其全部归为形变能。因此，该分析目前建立的是可复算的能量关系，尚未证明形变是全部反转的唯一原因。[D05] 文献中对相互作用能和结合能的明确区分支持这一核查方向，而不能替代本研究的实际公式。[4]

整个矩阵中，δb从CAACmeSPh2的−12.260855至NHCmeCAACme的+2.522590 kcal/mol，显示不同配体标签对应的端间差别并非只改变强弱，也可能改变符号。然而，CAACme、SPh2和PPh3的δb分别仅为+0.221028、+0.166745和−0.096009 kcal/mol。文件没有提供方法误差、零点能、构象或溶剂敏感性评估，这些小差值只能报告原符号与数值，不能表述为稳健的选择性，更不宜据此估计溶液中两构型比例。图中没有为这些点添加未经计算的误差棒。[D04,D17]

近零结合还需与“存在接触”区分。Cl-CS的Eint和Eb分别为+0.38和+0.445532 kcal/mol；Cl-OCCS则为−0.02和+0.172565 kcal/mol。后一例说明，即使某一相互作用指标略负，也不保证以另一参考态计算的结合量为负。当前信息不足以把正Eb归因于某个具体校正或断言结构不存在；频率表记录的无虚频也不等于该结构相对于孤立单体必然具有负结合能。[D06]




图3-5 28对体系的两端Eb与竞争差量（F1）。(a)表列H端与Cl端Eb配对；(b)δb=Eb(H)−Eb(Cl)；(c)δint=Eint(H)−Eint(Cl)。来源为HOClxlsx.xlsx的bess!B2:C29、F2:G29及编号对照。负差表示H端表列值较低，正差表示Cl端较低。阴影标记9对排序反转；(a)菱形标记三个H端候选及Cl-NHCme。(b)(c)采用标明的symlog坐标，±1以内线性，刻度仍为实际kcal/mol，不能按线段长度直接比较能量倍数。参考态及BSSE/ZPE未核实，图示不等于有限温度热力学或动力学偏好。

表3-1

编号/体系	Eb(H)	Eb(Cl)	δb	δint	Eb表内低值端
L1 CAACme	-5.333835	-5.554863	0.221028	8.870000	Cl
L2 CAACmePPh3	-10.868285	-12.393322	1.525038	9.130000	Cl
L3 CAACmeSPh2	-23.192770	-10.931914	-12.260855	-86.280000	H
L4 CO	-0.602410	-0.174448	-0.427962	-1.020000	H
L5 CS	-0.144327	0.445532	-0.589859	-0.620000	H
L6 N2	-4.105210	-3.087788	-1.017422	-0.780000	H

编号/体系	Eb(H)	Eb(Cl)	δb	δint	Eb表内低值端
L7 N2CAACme	-10.048773	-9.175451	-0.873322	1.590000	H
L8 N2CO	-2.409638	-1.719377	-0.690261	-0.810000	H
L9 N2CS	-0.740462	-0.453941	-0.286521	-0.460000	H
L10 N2NHCme	-11.268963	-10.344484	-0.924479	2.880000	H
L11 N2PPh3	-10.110441	-9.851907	-0.258534	3.120000	H
L12 N2SPh2	-10.505772	-9.382530	-1.123243	1.760000	H
L13 NHCme	-22.471133	-20.394000	-2.077133	-52.280000	H
L14 NHCme-CAACme	-14.363076	-16.885667	2.522590	8.960000	Cl
L15 NHCmePPh3	-14.135290	-15.840172	1.704882	4.430000	Cl
L16 NHCmeSPh2	-23.622488	-19.573543	-4.048946	-73.510000	H
L17 OCCAACme	-8.201556	-6.475903	-1.725652	-0.360000	H
L18 OCCS	-0.078439	0.172565	-0.251004	-0.440000	H
L19 OCNHCme	-9.324171	-7.437249	-1.886923	-0.050000	H
L20 OCPPh3	-8.545431	-6.888805	-1.656626	-0.150000	H
L21 OCSPh2	-9.336721	-7.963102	-1.373619	1.450000	H
L22 PPh3	-10.867218	-10.771209	-0.096009	6.200000	H
L23 PPh3SPh2	-13.372238	-14.473895	1.101657	7.330000	Cl
L24 SCCAACme	-5.210216	-3.764432	-1.445783	-0.090000	H
L25 SCNHCme	-6.883785	-5.609939	-1.273845	1.360000	H
L26 SCPPh3	-6.493712	-5.396586	-1.097126	1.030000	H
L27 SCSPh2	-7.870858	-7.290411	-0.580447	3.740000	H
L28 SPh2	-13.832830	-13.999575	0.166745	5.870000	Cl

能量单位kcal/mol，差量统一H减Cl。来源：HOClxlsx.xlsx的bess列B/C/F/G及编号对照；逐值见D04/D05。参考态、BSSE和ZPE待核实。

3.4 按名称对应的配体系列及几何—能量关系

几何变化与能量差可以相互提供线索，但两者回答的问题不同。内部O—H或O—Cl伸长反映表列终态中相应键的结构响应；Eb与Eint则还涉及参考态及整个复合物的能量。不能将H端C⋯H与Cl端C⋯Cl距离直接

混入同一经验回归，因为原子种类、轨道和参照长度均不同。图3-4与图5-1分端作图，并在本文中保留候选类别，而不使用全样本单一直线支持统一成键模型。

按名称对应的N2、OC和SC系列能够提供比单点排序更有结构的比较。在共同另一名称组分为CAACme、NHCme、PPh3和SPh2时，共有四组三元系列；各组两端Eb均沿N2→OC→SC的名称顺序变得较不负，而12对的Eb都以H端较低。这里的“系列”只表示数据标签对应，完整结构仍待核对，不能把它当作已经控制其他条件的单配体替换实验。整体结合幅度随名称系列变化，而端间差的方向保持相同，说明“整体更易结合”和“更偏向某一端”是两个需要分别讨论的结果。[D16]

以CAACme对应组为例，N2CAACme、OCCAACme和SCCAACme的H端Eb分别为−10.048773、−8.201556和−5.210216 kcal/mol，C···H分别为1.73914、1.82451和1.95226，CT表值分别为0.11301、0.08287和0.04883。这组记录中，更负的Eb、较短接触与较大CT呈相同的组内排序，可作为几何与电子响应相互呼应的例子。但Cl端并不保证各指标同序，例如N2SPh2、OCSPh2和SCSPh2的C···Cl为2.22756、2.29370和2.24013，CT为0.26800、0.25746和0.26336，后两者不再沿相同方向变化。[D16]

这些成组结果的适用范围是限定的：H端某些系列中观察到的一致排序，不足以建立整个样本的普遍关系，更不能把CT变化指定为距离变化的原因。配体几何、接近方向、孤立单体的电子和形变状态可能同时改变。对SCNHCme，还存在EDA与bess总量不一致，不能将其用于未经限定的分项机制归因。因而本文先报告成组对应和反例，未进行将所有端、所有候选混合的统计拟合。

三个H端强重排候选尤其说明这一必要性。它们的Eint分别为−108.73、−92.54和−110.48 kcal/mol，Eb则为−23.192770、−22.471133和−23.622488 kcal/mol，Eb−Eint达到85.537230、70.068867和86.857512 kcal/mol。如此大的表列差量，应首先引导检查冻结片段、优化单体及其校正口径，而不能简单写成“氢键比其他体系强数倍”。即使后续确认该差量主要来自形变，其物理意义也是相互作用吸引与重组代价的共同作用，并非一种可忽略代价的额外稳定化。[D14]

结合图3-5和结构响应，下一步机制分析应集中于两个问题：一是为何部分构型具有更负Eint却没有更低Eb；二是为何部分H端终态表现出明显O—H伸长。前者需要EDA与能量参考态相结合，后者需要几何和电子结构的对应证据。二者可能有关，但目前不能把“更大形变”“更强极化”和“已经发生转移”写成同义结论。

4 电子结构与稳定化来源

4.1 NBO供受体通道及表列CT

NBO主表所列H端受体均为O—H的BD*，Cl端均为O—Cl的BD*，与两种取向可能扰动的内部键一致。该结果在轨道标签层面支持分别考察向O—H和O—Cl反键轨道的电子给予，但主供体并不全部是中心碳孤对电子：56条中37条写为LP、19条写为BD；分端为H端LP17/BD11，Cl端LP20/BD8。H-CAACme和Cl-CAACme均以BD(2) C23—C36为主供体，H-CO则为LP(1) C4。因而正文采用“占据供体轨道向相应反键轨道的作用”，保留实际LP或BD归属，不将局域化得到的成键轨道改写为不存在的LP(C)。[D07]

这种区分对于碳(0)体系具有具体意义。相关文献以C(NHCMe)2为例指出，前线轨道具有两类供电子特征，而NBO局域化仍可给出弯曲C=C=C的双键描述；不同表象并不意味着可以在记录中互换LP和BD。[4] 目前缺少本研究完整轨道、自然占据、Fock矩阵元和能隙，尚不能据一条主通道确定所有体系的电子给予方式完全相同，也不能将配体对中心碳的影响压缩为单个孤对电子能量的变化。

H-CO的最大E(2)=10.21 kcal/mol，而其Eb为−0.602410 kcal/mol，二者数值和定义显然不同。三个H端候选的最大E(2)分别为606.65、539.62和630.08 kcal/mol，Cl-NHCme亦达到259.29 kcal/mol。这些数值可以提示强供受体混合与二阶微扰解释的适用性需要复核，却不能作为真实键能直接相加。目标通道E(2)求和同样不是总相互作用能；当前缺少筛选规则，不能据求和大于某阈值定义成键类型。[D07,D14]次卤酸—含氮碱的研究也指出，NBO供受体作用能可能明显大于净相互作用能，排斥等作用必须共同考虑。[1]

表列CT提供了另一组有意义的反例。28对中26对的Cl端CT数值更大，但这26对中有20对仍是H端Eb更低；仅CAACmeSPh2和NHCmeSPh2表现H端CT大于Cl端。以CO为例，Cl端CT为0.036044、H端为0.01745，而H端Eb更低；NHCme也表现Cl端CT=0.51867大于H端0.47638，但Eb仍以H端较低。这些结果否定了“表列CT更大必然对应更低Eb”的简单排序规则。CT尚未明确电荷方案、片段和正方向，本文不补写电子单位，也不将该反例理解为电荷转移与稳定化毫无联系。[D08]

4.2 AIM/QTAIM与WBI的对应证据

AIM表为每条构型提供ρ、H和$\nabla^2\rho$，但没有BCP坐标、原子对和单位。为避免预设，以下称“表列局部拓扑指标”，不直接把每个数都认定为指定C⋯H或C⋯Cl接触的BCP。H端有6条$\nabla^2\rho$为负，分别为CAACmePPh3、CAACmeSPh2、NHCme、NHCmeCAACme、NHCmePPh3和NHCmeSPh2；Cl端28条均为正。三个优先强重排候选只是H端负值集合的一部分，因此负拉普拉斯不能单独用作质子转移筛选标准。[D09]

以H-NHCmeCAACme和H-NHCmePPh3为例，表列$\nabla^2\rho$分别为−0.04069、−0.062028，O—H为1.11930、1.14020，与H-NHCme的1.64089存在明显差别。它们可能属于不同程度的增强作用或重排，但现有数据不足以根据拉普拉斯同号就归为相同终态。相反，H-NHCme与Cl-NHCme的表列H均负，$\nabla^2\rho$却异号，也不宜将这种差异直接写成一端共价、另一端非共价。应在BCP身份确认后，将各指标与新旧键的完整拓扑共同分析。[D09,D16]

WBI本应为新旧键对应关系提供独立补充，但现表仅H-CO填写C—H、C—Cl、O—H、O—Cl四个值，依次为0.0287、0.0031、0.7414、1.0041。该组数据可用于描述H-CO在当前键级方案下的局部对照，不能推及其余55条，更不能用缺失值0代替。对三个H端候选及Cl-NHCme，WBI均为【待补充】。因此，本文不绘制全体系WBI趋势图，也不把缺失的键级证据写成已完成验证。[D10]

4.3 EDA分项抵消与净能量

当前EDA表列ES、EX、REP、POL、ECORR及总量E。五分项均保留后，以Σ5=ES+EX+REP+POL+ECORR进行复算。55条记录与表列总量的差在0.02以内，只有H-N2NHCme的五项和为−13.88而总量为−13.70，差0.18。另有Cl-NHCmeSPh2和Cl-SCNHCme的EDA总量分别为−36.89和−9.99，与bess的−36.97和−10.49不同。补图S1将表内闭合与跨表差异分开显示。这里0.03和0.01仅为显示到两位小数时的舍入审计界限，不是方法误差或显著性阈值；没有调整任何原值来消除差异。[D11]

图4-8选择CO、N2CAACme、PPh3、NHCme和CAACmeSPh2各两端，保留全部五项并独立标出总量。所选样本包含低响应参照、排序反转及强H端候选，目的是比较吸引与排斥抵消，而非以最大负项给作用“定性”。例如H-NHCme的ES=−82.17、EX=−196.71、REP=+367.13、POL=−203.66、ECORR=+22.87，五项和为−92.54，表列总量−92.55 kcal/mol；Cl-NHCme相应为

−96.81、−174.21、+360.20、−106.30、−23.14，总量−40.26。H端更负的POL与Cl端更负的ES、ECORR同时存在，说明净差异来自多项变化，不能从其中一项的大小独自推出完整结合偏好。[D12]

进一步以H端减Cl端的分项差比较NHCme，可得到ΔES=+14.64、ΔEX=−22.50、ΔREP=+6.93、ΔPOL=−97.36和ΔECORR=+46.01 kcal/mol。按当前列名和同单位假设，POL差是所列分项中幅度最大的H端有利变化，但ES、REP和ECORR的差同时抵消了它的一部分；五个差量合计−52.28，与bess中两端Eint的差相同。该算术分解比单看“POL最负”更直接地呈现竞争：它说明某一局域分项的优势需要在其余项共同变化后才转化为净相互作用差，也不等于Eb具有同样大的端间差。[D12]

PPh3则可说明EDA如何与Eb分开解释。其H端EDA总量为−16.15、Cl端为−22.35 kcal/mol，与表列Eint的Cl端更低一致；但两端Eb分别为−10.867218和−10.771209，差值符号反向且很小。因此，解释EDA各分项更有利，只是在相应片段与几何参考下说明净相互作用的变化，仍需结合Eb及其参考条件才能讨论结合后的构型排序。对反转体系而言，不能仅展示一个Cl端负项更大的柱图，就据此宣布卤键构型更稳定。[D05,D12]

三个H端候选的ECORR分别为+39.44、+22.87和+41.54，明确不能将整列统一当作吸引项。原表没有给出ECORR的具体方法定义，因此正文不将其改称纯色散，也不把正值解释为“色散排斥”。EX与REP在该表分列，不能省去EX后仍称完整分解；两者是否可组合为特定方法中的交换排斥，需完整GKS-EDA定义确认。ETS-NOCV的轨道项可能包含电荷转移和极化，与本表POL也不是可逐项替代的量。[D11,D12] 不同分解框架回答的物理问题存在交集，但分项命名和片段参考必须分别保持。[4]

图4-8只作平衡终态的分项比较，不声称解释了方向性或形成路径。已有二维能量分解研究表明，净吸引的主要来源与线性构型偏好的主要来源可以不同，且不同平衡距离会影响分项绝对值。[3] 本研究没有相应角度—距离扫描，因此将静电、极化和排斥的变化视为受限机制线索，而不据终态柱图建立单一因果链。相对贡献百分比也暂不绘制，因为ECORR有正有负且方法定义未明，分母选择会显著改变所谓贡献率。




图4-8 代表体系的完整EDA分项与总量（F3）。CO、N2CAACme、PPh3、NHCme和CAACmeSPh2各H/Cl两端，以ES、EX、REP、POL、ECORR原列名正负堆叠，菱形为表列EDA总量。来源为EDA!B5:G5/B33:G33、B8:G8/B36:G36、B23:G23/B51:G51、B14:G14/B42:G42、B4:G4/B32:G32。仅ES列头明确kcal/mol，本图其余分项暂按同单位展示并待核实；各子图使用独立且明示的纵轴尺度，不跨面板按柱高比较。保留正ECORR，不把它改称纯色散；全部分项参与抵消，不计算未定义贡献百分比。该图不能单独解释方向性或Eb排序。

表4-3

构型	ES	EX	REP	POL	ECORR	表列E
H-CO	-3.50	-9.38	16.92	-3.18	-2.47	-1.61
Cl-CO	-4.17	-11.81	21.59	-0.82	-5.38	-0.59
H-N2CAACme	-22.05	-40.76	74.57	-18.49	-5.65	-12.39
Cl-N2CAACme	-40.89	-83.71	165.53	-33.04	-21.87	-13.98
H-PPh3	-30.74	-60.37	109.09	-28.43	-5.70	-16.15
Cl-PPh3	-57.33	-117.36	230.41	-55.46	-22.61	-22.35
H-NHCme	-82.17	-196.71	367.13	-203.66	22.87	-92.55
Cl-NHCme	-96.81	-174.21	360.20	-106.30	-23.14	-40.26
H-CAACmeSPh2	-95.63	-231.17	429.72	-251.09	39.44	-108.73
Cl-CAACmeSPh2	-55.69	-111.18	220.70	-52.30	-23.98	-22.45

保留EDA全部原列。仅ES列头明示kcal/mol，其余同单位暂作审阅图假设；不把ECORR改称纯色散。来源D12。

4.4 NOCV字段的现有信息与分析边界

NOCV表目前仅提供标为Energy的单一数值字段，分别列出两端记录，没有单位、轨道对编号、特征值、分通道能或形变密度。H-NHCme与Cl-NHCme分别为−115.80和−70.63，H-CAACmeSPh2与H-NHCmeSPh2分别为−139.37和−140.10。它们可以作为待核实字段保存在总表中，但尚不能称为总相互作用能、总轨道能或某个主导通道能，更不能与POL、E(2)或Eb直接相加比较。[D13]

因此，本文不绘制推测性的NOCV等值面，也不凭NBO通道标签反向生成NOCV轨道图。最小补充需求是确认该字段含义及计算层级，并优先取得CO、NHCme两端的通道能、特征值和真实形变密度。在相同几何及片段参考下，才可检验电子耗尽/积累方向是否与NBO识别的O—H或O—Cl反键给予一致。缺少这些数据不会推翻已核算的能量排序，却限制了对轨道空间机制的表述深度。

4.5 多方法之间的一致与不一致

当前可建立的共同线索是：取向标签与NBO受体键相符；三个H端候选同时具有较短C—H、较长O—H及很大E(2)，并伴随不同于低响应参照的局部拓扑指标。然而，“方向相符”不等于已实现全部方法的一致验证。CT并不与Eb一一同序，拉普拉斯负值也不限于三个候选，WBI和NOCV空间证据仍缺。不同工具分别描述几何、局域轨道、密度拓扑或能量分解，其量纲和参照不同，允许存在不同的排序。

特别需要复核H-CAACmeSPh2的ρ=0.1299。H-NHCmeSPh2的ρ=0.2595，约为前者两倍，而两者C—H为1.12139与1.11974，H为−0.25209与−0.25150，$\nabla^2\rho$为−0.86575与−0.85970，均相近。这一可疑跨体系差异既可能涉及BCP选取、导出或录入，也不能排除真实电子结构差别。由于缺少原始BCP身份，本文保留两值，将其列作核查点，不以猜测数字修正，也不选择性忽略它来宣称证据完全一致。[D09,D14]

5 强相互作用候选中的质子重新定位与C—Cl成键证据

5.1 分层讨论的依据

本文采用“低响应参照—其他待分类记录—优先强重排候选”的工作性分层，目的在于组织证据而非建立普遍成键阈值。H-CO可作为较小内部键响应的参照；H-CAACmeSPh2、H-NHCme和H-NHCmeSPh2因几何与多项电子指标共同异常而优先单列；Cl-NHCme作为Cl端重点个案。其余记录不能仅因未进入上述名单就被全部称为弱作用。图5-1展示分端几何筛查，表5-1汇集代表性证据，并把未提供的新旧键WBI和内部键BCP明确列为空缺。[D03,D09,D10,D14,D15]

这一分层避免将可能偏离普通微扰图景的记录并入同一经验趋势。卡宾氢键研究中，带有显著离子对特征的样本也曾被从普通亲核性拟合中分离讨论。[10] 该方法可作为处理异常的参考，但卡宾不等于碳(0)化合物，也不存在可直接搬用的通用距离或能量分界。现有分类最终仍需本体系原始几何和成对成键指标支持。




图5-1 新旧接触的分端几何筛查（F4）。(a)28条H端r(C—H)对r(O—H)；(b)28条Cl端r(C—Cl)对r(O—Cl)，来源结构数据!C2:F57。菱形突出H-CAACmeSPh2、H-NHCme、H-NHCmeSPh2及Cl-NHCme，方形为两端CO参照。距离保留原表数值，单位与原子号待核；不同面板比较不同原子对，不建立通用等距离转移阈值。此图为表列几何的真实数据图，不是优化分子结构图、NOCV图或反应路径；候选分类尚需新旧键配对电子结构证据。

表5-1

构型	C—H或C—Cl	O—H或O—Cl	表列ρ	表列$\nabla^2\rho$	E(2)最大	新旧键WBI
H-CO	2.11684	0.98984	0.021310	0.047310	10.21	H-CO已有，见正文
Cl-CO	2.87467	1.73130	0.016140	0.049100	7.72	【待补充】
H-NHCme	1.15136	1.64089	0.239700	-0.745800	539.62	【待补充】
Cl-NHCme	2.04473	2.04933	0.108080	0.053840	259.29	【待补充】
H-CAACmeSPh2	1.12139	1.73117	0.129900	-0.865750	606.65	【待补充】
Cl-CAACmeSPh2	2.22059	1.93115	0.074110	0.093470	37.53	【待补充】
H-NHCmeSPh2	1.11974	1.75861	0.259500	-0.859700	630.08	【待补充】
Cl-NHCmeSPh2	2.06895	2.02260	0.102510	0.069420	197.58	【待补充】

几何和拓扑字段的单位及BCP原子对待核实，E(2)为kcal/mol；缺失WBI不填0。来源D03/D09/D10/D14/D15。

5.2 H端：质子向碳侧偏移的静态迹象

对三个H端候选，质子相对C与O的位置是首要几何信息。在当前表列终态中，其C—H约1.12—1.15，而O—H约1.64—1.76，后者相对游离基准明显伸长；与CO等低响应样本相比，质子明显更靠近中心碳一侧。三个体系还同时具有较大表列CT、数百kcal/mol的E(2)及负的局部H和$\nabla^2\rho$。这些证据共同支持将其描述为“质子重新定位或质子转移样结构候选”，比将其直接纳入普通弱氢键更符合现有记录。[D14]

但上述判断仍有清晰边界。当前没有完整坐标供核对全部连接方式，没有新C—H与残余O—H的成对WBI、BCP及自然占据，也没有与孤立质子化母体/去质子化片段的一致参考比较。极大的二阶微扰能本身还需要检查局域Lewis结构和供受体能隙。因而尚不能确定三者分别属于高度共享质子、离子对或其他强混合终态，更不能只因O—H较长就写成已经获得完整质子转移产物。H-CAACmeSPh2的ρ异常也使其拓扑证据必须单独保留核查。

能量方面，三个候选虽然具有很负Eint，但Eb的幅度明显较小，说明必须把强吸引与参考态代价共同讨论。若后续确认Eb−Eint主要是形变，结构重排可能与较大的几何准备代价相联系；现阶段这仍是条件解释，而不是已经分离得到的变形机制。优化终态本身也不能说明转移如何发生。只有要讨论路径和势垒时，才需沿O—H与C—H坐标进行适量扫描，并对相关过渡态和连接关系作验证；本文不根据端点虚构势垒或速率。

5.3 Cl端：新旧接触同步响应及文献对照

Cl-NHCme的C—Cl=2.04473、O—Cl=2.04933，O—Cl相对单体伸长0.33258；表列ρ=0.10808、H=−0.03745、$\nabla^2\rho$=+0.05384，CT=0.51867，主导E(2)=259.29 kcal/mol。几何与电子指标共同提示Cl端存在较强接触和明显内部键扰动，但当前只能确认表列信息的对应关系，BCP原子对和CT定义仍需核实。尤其其O—Cl的内部BCP和WBI未提供，不能仅由外部接触数据量化新旧键强弱的转移。[D15]

上传文献中，C(NHCMe)2与ClOH的相应构型给出C···Cl=2.040 Å、O—Cl=2.049 Å，相互作用能−40.24、结合能−20.39 kcal/mol，并结合内部与外部BCP和参考结构讨论显著卤素位移。[4] 本研究Cl-NHCme的数值与其接近，可以作为受限对照；但本研究完整组成仍需结构确认，其几何单位与方法也不能由接近程度反推。文献值不填入本研究缺失列，尤其不能将文献O—Cl的ρ当作本研究已有内部键证据。

目前适合的结论是：Cl-NHCme应列为强Cl端作用及氯转移样结构的重点候选，现有资料尚不足以确定完整氯转移或新的成键形式。相似的限制也适用于其他Cl端组合体系。强卤键、三中心成键和卤素转移之间的关系需要具体参考态和完整电子结构支持，相关评述提供了概念框架，也涉及整体中性的卤素(I)配合物；本研究HOCl复合物是否适合三中心四电子描述，仍需明确的片段参照与对应成键证据，不能仅凭两段距离接近确定。[11] 如欲讨论氯转移路径，应补充连接端点的势能证据，而不是将静态两距离接近作为反应机制。

5.4 配体组合与异常响应的比较

配体组合比较首先显示“含某一配体就必然偏某一端”的规则并不成立。NHCme的δb为−2.077133 kcal/ mol， NHCmeCAACme 和 NHCmePPh3 分 别 为 +2.522590、+1.704882， 而 NHCmeSPh2 又 为 −4.048946。相应H端O—H分别为1.64089、1.11930、1.14020和1.75861，说明表列能量符号改变并不总伴随同一方向或相同程度的几何响应。该比较支持组合环境与两端竞争相关，但完整分子组成未确认前，不能将其简单写成单一取代基效应或定量电子效应。[D16]

CAACme与CAACmeSPh2的对照同样具有启发性。两者δb分别为+0.221028和−12.260855，H端Δr(O—H)分别为0.04602和0.75167，前者较小、后者进入优先强重排候选范围。与此相对，N2CAACme的H端Δr(O—H)=0.05895，虽然其MEP与CAACmeSPh2相近，却没有相同程度的内部键伸长。可能同时参与的因素包括中心碳供电子轨道、配体构型和位阻环境，但当前没有固定几何下的控制比较，无法将差异唯一归于其中之一。[D02,D16]

因此，现有资料支持的研究认识有三个层次：数据直接支持两种能量指标存在不同的配对排序、配体标签对应不同的内部键响应，以及少数H端记录具有联合异常；受条件约束的解释是形变代价与分项抵消可能影响净结合竞争；需要进一步验证的假设是部分终态已进入质子或氯转移、离子对或新共价成键区域。优先补充同几何原始能量、异常行EDA、新旧键WBI/BCP和少数NOCV通道，即可针对这些具体疑问增加证据，无需先扩展至全部无关计算。

参考文献

[1] ALKORTA I, BLANCO F, SOLIMANNEJAD M, et al. Competition of hydrogen bonds and halogen bonds in complexes of hypohalous acids with nitrogenated bases[J]. The Journal of Physical Chemistry A, 2008, 112: 10856–10863. DOI: 10.1021/jp806101t.

[2] LI Q Z, ZHU H J, ZHUO H Y, et al. Complexes between hypohalous acids and phosphine derivatives. Pnicogen bond versus halogen bond versus hydrogen bond[J/OL]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014[2026-10-18]. DOI: 10.1016/j.saa.2014.05.001. https://doi.org/10.1016/j.saa.2014.05.001.

[3] HERRMANN B, SVATUNEK D. Directionality of halogen-bonds: insights from 2D energy decomposition analysis[J]. Chemistry – An Asian Journal, 2024, 19: e202301106. DOI: 10.1002/asia.202301106.

[4] LI S H, ZHOU H Y, LI Q Z, et al. Strong interactions between carbones and halogen atomic centers[J]. Chemical Science, 2026, 17: 14950–14962. DOI: 10.1039/d6sc02210c.

[5] AWWADI F F, TAHER D, HADDAD S F, et al. Competition between hydrogen and halogen bonding interactions: theoretical and crystallographic studies[J]. Crystal Growth & Design, 2014, 14: 1961–1971. DOI: 10.1021/cg500094b.

[6] PERERA M D, DESPER J, SINHA A S, et al. Impact and importance of electrostatic potential calculations for predicting structural patterns of hydrogen and halogen bonding[J]. CrystEngComm, 2016, 18: 8631–8636. DOI: 10.1039/c6ce02089e.

[7] ABEYSEKERA A M, AVERKIEV B B, SINHA A S, et al. Establishing halogen-bond preferences in molecules with multiple acceptor sites[J/OL]. ChemPlusChem, 2021, 86[2026-10-18]. DOI: 10.1002/cplu.202100102. https://doi.org/10.1002/cplu.202100102.

[8] PORTELA S, FERNÁNDEZ I. Nature of the hydrogen bond enhanced halogen bond[J]. Molecules, 2021, 26: 1885. DOI: 10.3390/molecules26071885.

[9] AN X L, ZHUO H Y, WANG Y Y, et al. Competition between hydrogen bonds and halogen bonds in complexes of formamidine and hypohalous acids[J]. Journal of Molecular Modeling, 2013, 19: 4529–4535. DOI: 10.1007/s00894-013-1969-7.

[10] ALKORTA I, LEGON A. Simple carbenes as hydrogen bond acceptors: ab initio determination of nucleophilicities and reduced nucleophilicities[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2025, 27: 942–950. DOI: 10.1039/d4cp03894k.

[11] WIESKE L H E, ERDÉLYI M. Halogen bonds of halogen(I) ions—Where are we and where to go?[J]. Journal of the American Chemical Society, 2024, 146: 3–18. DOI: 10.1021/jacs.3c11449.