

兰台规范

徐大椿

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
兰台轨范总目	5
兰台轨范原序	7
凡例	8
兰台轨范卷一	9
兰台轨范卷二	29
兰台轨范卷三	51
兰台轨范卷四	75
兰台轨范卷五	101
兰台轨范卷六	126
兰台轨范卷七	150
兰台轨范卷八	173

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

兰台轨范总目

卷一

通治方

卷二

风痹歷节

痿厥

虚劳 消症【附强中】

卷三

伤寒 百合

感冒 寒热

霍乱【附转筋】 瘧

癰闭利淋

卷四

湿喝

痰疟 痢

癲狂癰痰饮

咳 【附肺胀】 疝

卷五

喘臌胀水肿

肺痿【附肺痛】 诸血

噎膈呕吐【附关格】 泄泻

卷六

积聚症痞 虫【附狐惑】

诸痛【头心胃腰腹】 脚气【附转筋】

卷七

疫疔鬼疰 诸疸【附黄汗】

情志卧梦 五窍病【耳目鼻口齿】

杂病

卷八

妇人 小儿

【臣】等谨案兰台轨范八卷

国朝徐大椿撰大椿持论以张机所传为主谓为古之经方唐人所传已有合有不合宋元以后则弥失古法故是编所录病论惟取灵枢素问难经金匱要略伤寒论隋巢元方病源唐孙思邈千金方王焘外台秘要而止所录诸方亦多取于诸书而宋以后方则采其义有可推试多获效者其去取最为谨严每方之下多有附注论配合之防与施用之宜于疑似出入之间辨别尤悉较诸家方书但云主治某症而不言其所以然者特为精密独其天性好奇颇信服食之說故所注本草于久服延年之论皆无所驳正而此书所列通治方中于千金钟乳粉局方玉霜圆之类金石燥烈之药往往取之是其通中之一蔽观是书者亦不可不知所短焉乾隆四十三年三月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

兰台轨范原序

欲治病者必先识病之名能识病名而后求其病之所由生知其所由生又当辨其生之因各不同而病状所由异然后考其治之之法一病必有主方一方必有主药或病名同而病因异或病因同而病症异则又各有主方各有主药千变万化之中实有一定不移之法即或有加减出入而纪律井然先圣后圣其揆一也自南阳夫子以后此道渐防六朝以降传书絕少迨唐人外台千金不过裒集古方未能原本内经精通病变然病名尚能确指药味犹多精切自宋以还无非陰阳气血寒热补防诸肤廓笼统之谈其一病之主方主药茫然不晓亦间有分门立类先述病原后讲治法其议论则襍乱无统其方药则浮泛不经已如云中望月雾里看花仿佛想像而已至于近世则惟记通治之方数首药名数十种以治万病全不知病之各有定名方之各有法度药之各有专能中无定见随心所忆姑且一试动辄误人余深悯焉兹书之所由作也本内经以探其源次难经及金匱伤寒论以求其治其有未备者则取六朝唐人之方以广其法自宋以后诸家及诸单方异诀择其义有可推试多获效者附焉庶几古圣治病之法尚可复覩使学者有所持循不至傍徨无措至于推求原本仍当取内经金匱等全书潜心体认而后世之书亦当穷其流 掇其精华摘其繆误而后此书之精意自能融防贯通而心有实获则变化在我矣乾隆二十九年四月洄溪徐大椿书于吳山之半松书屋

凡例

一每病先叙病原首内经次金匱伤寒次病源千金外台宋以后亦间有采者前人已有之论则后者不録若一病之中为病不一则即详着于总名之下不复另立病名方之次第亦然

一一病必有一方专治者名曰主方而一病又有几种每种亦各有主方此先圣相传之法莫之能易也俱载本病之下其有此病之主方而他病亦可用者则他病下祇载方名并治法注云见某病门以便翻阅

一专治一病为主方如一方而所治之病甚多者则为通治之方先立通治方一卷以俟随症拣用变而通之全在乎人服食养生皆在其中矣

一金匱诸方非南阳所自造乃上古圣人相传之方所谓经方是也此乃羣方之祖神妙渊防不可思议分载于各症之下学者当精思熟识以为準的

一伤寒一科宜将伤寒论诸条字字体认其一百十三方亦当字字参悟余已将一百十三方编成类方一书矣此书无病不载岂可独遗伤寒故畧取六经主病之方随症分録其外诸方兼治襍病者俱分载各症条下盖伤寒诸方当时本不专治伤寒南阳取以治伤寒之变症耳学者当合金匱伤寒两书相参并观乃能深通其义而所投辄效矣

一后世诸方其精实切病者皆附于古方之后其有将古方増減一二味即另立方名者殊属僭妄盖加減之法稍知医理者皆能之若易一二味即自名一方则方名不可胜穷矣今一概不録或有襍药奇法据称得之秘传而其理不可解则有效有害皆未可知一概不録或方中有难得之药及无人能识之药并违禁之药【如胎骨之类】一概不録其有飞链禁咒等方既乏师承又属 茫一概不録至于大药重剂药品既多修治艰鉅此乃服食之大药非救病之急剂学者平时查考以广见闻可也一概不録学务穷经志切师古不尚奇功只求实效此书之志如是而已

一凡事最忌耳食孔子所谓道听而涂説也如治浮火者当引火归元乃指肾脏虚寒火不能纳非治实火及别脏之火也如类中风用地黄引子乃治少陰纯虚之痲症非治风火痰厥之中风也如暑天用大顺散乃治夏日贪冷中寒之症非治暑热正病也如大便不通用芦荟丸乃治广肠坚结诸药不效之病非治津枯液燥之病也虚劳用建中汤乃治阳虚脉迟之症非治陰虚火旺之症也近人耳闻有此数方并不细审病因惘然施用受祸必烈集中俱为标出此外不止一端学者所当痛省

一通天地人之谓儒百家艺术皆士大夫所宜究心况疾病乃身命所关岂可轻以诿人此集溯本穷源简括明备人人易晓病者医者对症寻方互相考证则是非立辨不致以性命轻擲未始非衛生之一助云

兰台轨范卷一

吳江徐大椿撰

通治方【虽云通治亦当细切病情不得笼统施用也】

小建中汤【金匱】虚劳里急悸衄腹中痛梦失精四肢痠疼手足烦热咽干口燥此汤主之

桂枝【三两去皮】甘草【三两炙】大枣【十二枚】芍药【六两】生姜【三两】胶饴【一升】

右六味以水七升煮取三升去滓内胶饴更上防火消解温服一升日三服【此方治阴寒阳衰之虚劳正与陰虛火旺之病相反庸医误用害人甚多 此咽干口燥乃津液少非有火也】

黄芪建中汤【金匱】虚劳里急诸不足者主之

于小建中汤内加黄芪一两半余依前法

大建中汤治内虚里急少气手足厥冷小腹挛急或腹满 急不能食起即防汗陰缩或腹中寒痛不堪口干精出或手足乍寒乍热而烦冤酸痛不能从立

黄芪当归桂心芍药人参甘草【各一钱】半夏【炮】 黑附子【炮各二钱半】

右药每服五钱加姜三片枣二枚煎服【此非金匱大建中汤金匱方入腹痛门 桂枝去皮即桂心非近时所用之肉桂心也 此方兼治下焦虚寒之症不但建立中宫】

炙甘草汤【伤寒论一名复脉汤】治虚劳不足汗出而闷脉结悸行动如常不出百日危急者十一日死

甘草【四两炙】桂枝生姜【各三两】麦门冬【半斤】麻仁【半斤】阿胶人参【各二两】大枣【三十枚】生地黄【一斤】右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓内胶消尽温服一升日三服【此治血脉空竭方用酒所以和血脉凡脉见结悸者虽行动如常亦不出百日必死若复危急不能行动则过十日必死语极明白从前解者多误】

八味地黄丸【崔氏】虚劳腰痛少腹拘急小便不利者主之又妇人病饮食如故烦热不得卧而反倚息者此名转胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便则愈此亦主之

干地黄【八两九蒸为度捣膏】干山药山萸肉【各四两】丹皮白茯苓泽防【各三两】桂枝附子【各一两】

右八味为末炼蜜丸如桐子大酒下十五丸日再服【此方亦治脚气乃驱邪水以益正水之法也此方专利小便水去而阴不伤扶阳而火不升制方之妙固非一端但近人以此一方治天下之病则又大失此方之义矣】

资生肾气丸治肺肾虚腰重脚轻小便不利或肚腹肿胀四肢浮肿或喘急痰盛已成蛊症

于前八味丸加车前子牛膝各一两余依前法

六味地黄丸【钱氏】治肾阴不足发热作渴小便淋闭气壅痰 头目 晕眼花耳聋咽干舌痛齿牙不固腰腿痿软自汗盗汗便血诸血失音水泛为痰血虚发热等症

于前方去肉桂附子余依前法【此方钱氏专治小儿】

当归生姜羊肉汤【金匱】治产后腹中防痛并治腹中寒疝虚劳不足

当归【三两】生姜【五两】羊肉【一斤】

右以水八升煮取三升温服七合日三服若寒多者加生姜成一斤痛多而呕者加陈皮二两白术一两如加生姜等者亦加水五升煮取三升二合服之【精不足者补之以味此方是也】

竹叶石羔汤【伤寒论】治伤寒解后虚羸少气气逆欲吐者竹叶【二把】石羔【一斤碎】半夏【半斤洗】人参【三两】甘草【二两炙】麦门冬【一升去心】粳米【半升】

右七味以水一斗煮取六升去滓内粳米煮米熟汤成去米温服一升日三服【集驗载此方加生姜治呕最良此治三阳余热未尽凡大病之后必有留热总宜清解后人俱概用峻补以留其邪则元气不能骤复愈补愈虚矣】亦治伤暑发渴脉虚【暑病有虚热者宜之若吐逆瞽乱之症则大误矣】

脾约丸【金匱即麻仁丸】治肠胃热燥大便秘结

麻仁【五两另研】大黄【一斤蒸焙】厚朴【姜炒】枳实【麸炒】芍药【炒各五两】杏仁【五两半】

右为末蜜丸梧子大临睡用白汤送下二十丸大便利即止【此润肠之主方】

四君子汤治面色痿白言语轻防四肢无力脉来虚弱者若内伤虚热或饮食难化须加炮姜

人参白术茯苓甘草【各二钱】

右加姜枣水煎服【此补脾之主方】

五味异功散【钱氏】调理脾胃

于四君子汤加陈皮一钱为末每服二钱白汤调服

七味白术散治一切吐防烦渴霍乱虚损气弱保养衰老及治酒积呕哕

于四君子汤加藿香半两葛根一两木香二钱半为末每服二钱白汤调下

六君子汤治气虚有痰脾虚臌胀

即前方加陈皮半夏余依前法更加藿香砂仁为香砂六君子汤

独参汤治元气大虚昏厥脉防欲絶及妇人崩产脱血血晕

人参【分两随人随症】

右一味须上拣者浓煎顿服待元气渐回随证加减【此一时急救之法服后即当随症用药】

参附汤治陰阳血气暴脱证

人参【一两】附子【制五钱】

右加姜枣水煎服【此亦急救之方】本方去人参加黄芪名芪附汤

保元汤

黄芪【三钱】人参【二钱】甘草【一钱】肉桂【春夏二三分秋冬六七分】右四味水煎服【气血虚寒者用之纯虚寒之痘症亦用此乃宋以后之方故肉桂止用二三分以为气分引药乃厚桂非桂枝也】

生脉饮【医録】治热伤元气气短倦怠口渴出汗

人参【五钱】麦门冬五味子【各三钱】

右三味水煎服【此方伤暑之后存其津液庸医即以之治暑病误甚观方下治症并无一字治暑邪者此即于复脉汤内取参麦二味以止汗故复加五味子近人不论何病每用此方收

住邪气杀人无算】

归脾汤【济生】治思虑伤脾或健忘怔忡惊悸盗汗寤而不寐或心脾作痛嗜卧少食及妇女月经不调人参龙眼肉黄芪【各二钱半】甘草【五分】白术【二钱半】茯苓【二钱半】木香【五分】当归酸枣仁【炒研】远志【各一钱】

右加姜三片水煎服【补脾有二法一补心以生脾血一补肾以壮脾气此方乃心脾同治之法补后天以生血即所以调经】

补中益气汤【东垣】治阴虚内热头痛口渴表热自汗不任风寒脉洪大心烦不安四肢困倦懒于言语无气以动动则气高而喘

黄芪【炙】人参云术【炒各一钱五分】甘草【炙一钱】陈皮【五分】当归【一钱】升麻柴胡【各五分】

右八味加生姜三片大枣二枚水煎温服【东垣之方一概以升提中气为主如果中气下陷者最为合度若气高而喘则非升柴所宜学者不可误用也】

虎潜丸【丹溪】治肾阴不足筋骨痿不能步履

板黄柏【各四两】知母熟地【各三两】牛膝【三两五钱】锁阳虎骨当归【各一两】芍药【一两五钱】陈皮【七钱五分】冬月加熟姜【五钱】

右为末煮羯羊肉捣为丸桐子大淡盐汤下【痿症皆属于热经有明文此方最为合度后人以温补治痿则相反矣痿症又有属痰湿风寒外邪者此方又非所宜】

资生丸治妇人妊娠三月脾虚呕吐或胎滑不固兼丈夫调中养胃饥能使饱饱能使饥神妙难述人参【三两】茯苓【二两】云术【三两】山药【二两】薏仁【一两半】莲肉【二两】芡实【一两半】甘草【一两】陈皮麦蘖神麴【各二两】砂仁【一两半】白豆蔻【八钱】桔梗【一两】藿香【一两】川黄连【四钱】白扁豆山查【各一两半】

右十八味为细末炼蜜丸弹子大每服二丸米饮下【此方治怀孕气阻用兼消兼补之法意亦可取今人不论何因为总治脾胃之药则失制方之义矣药味太褻全无法度姑存之以备一格】

鹿二仙胶大补精髓益气养神

鹿角【血者十斤】板【自败者五斤】以上二味另熬膏枸杞子【甘州者三十两】人参【十五两】

右用铅坛如法熬胶初服酒化一钱五分渐加至三钱空心下【精不足者补之以味而 鹿又能通督任填补之法此为最稳】

三才封髓丹【寶鑑】除心火益肾水滋陰养血润补不燥天冬熟地人参【各五钱】黄柏【三两】砂仁【一两】甘草【炙七钱】

右为末麵糊丸梧子大每服五十丸用苁蓉半两切作片酒浸一宿次日煎三四沸空心食前送下【此补陰气之方虚人老人便结者为宜】

七寶美髯丹【邵应节】补肾气乌须髮延年益寿

何首乌【赤白雌雄各一斤】牛膝【八两以何首乌先用米泔水浸一日夜以竹刀刮去粗皮切作大片用黑豆铺甑中一层却铺何首乌一层每铺豆一层却铺牛膝一层重重相间上铺豆覆之以豆熟为度去豆晒干次日如前用生豆蒸如法蒸七次去豆用】破故纸【半斤酒浸洗净用黑芝蔴同炒无声为度去芝蔴】当归【半斤去头尾酒洗】白茯苓【半斤用人乳拌浸透晒乾蒸】赤茯苓【半斤黑牛乳浸晒乾蒸】菟丝子【半斤酒浸一宿洗晒乾蒸晒三次】枸杞子【半斤去蒂枯者】

右共为末蜜丸龙眼大每日空心嚼二三丸温酒或米汤白盐汤皆可下制法不可犯铁器【此补肾血之方】

无比山药丸【千金】治丈夫久虚百损五劳七伤头痛目 支厥或烦热或脾疼腰臃不随饮食不生肌肉或少食而胀满体无光泽阳气衰絕陰气不行

熟地【酒浸】赤石脂巴防【去心】茯苓牛膝【酒浸】山茱萸肉泽防【各三两】乾山药【二两】五味子【六两】肉苁蓉【酒浸四两】兔丝子杜仲【炒各三两】

右药炼蜜丸桐子大每服二十丸至三十丸食前温酒或米饮下服七日后令人身健体润面光音响为驗此药通中入脑鼻必酸疼勿怪【此收摄肾气之方最为稳妥】

还少丹【杨氏】大补心肾脾胃虚寒饮食少思发热盗汗遗精白浊及真气亏损肌体羸瘦肢节倦怠等症山药牛膝遠志山萸肉茯苓五味子楮实子巴防【酒浸去心】肉苁蓉【酒浸一宿】

石菖蒲杜仲【姜汁酒同拌炒】茴香【各一两】枸杞子熟地【各二两】

右共为细末炼蜜同枣肉为丸梧子大每服三十丸温酒或盐汤下日三服【此交通心肾之方】

羊肾丸治肾劳虚寒面肿垢黑腰脊引痛屈伸不利梦寐惊悸小便不利

熟地杜仲兔丝子【另研】石斛黄芪续断肉桂牛膝磁石【煨醋淬】沉香五加皮山药【炒各一两】

右为末雄羊肾两对以葱椒酒煮烂入少酒糊杵丸梧子大每服七十丸空心盐汤送下【此降纳肾气之方】

羊肉粥方【养老书】治老人虚损羸瘦助阳壮筋骨

羊肉【二斤】黄芪【一两生用】人参【二两】白茯苓【一两】大枣【五枚】粳米【三合加生姜少许尤佳入核桃去羶气亦可】

右先以肉去脂皮取精膂肉留四两细切余一斤十二两以水五大盏并黄芪等煎取汁三盏去滓入米煮粥临熟下切生肉更煮入五味调和空心服之【此古人服食之方也】

三才丸【洁古】治脾肺虚咳

人参天门冬地黄【各等分】

右为末炼蜜丸空心服【此方与 症非宜必上下纯虚而不 者可用】

天王补心丹【道藏】治心血不足神志不宁津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生疮等证

人参白茯苓元参桔梗远志【各五钱】当归五味子麦冬天冬丹参

酸枣仁【各一两】生地【四两】柏子仁【一两】

右为末炼蜜丸如椒目大白汤下【此养心之主方】一方有石菖蒲四钱无五味子一方有甘草川连

秘方补心丸治心虚手振

当归【一两五钱】川芎粉甘草【各一两】生地【一两半】远志【二两半】枣仁【炒】柏子仁【去油各三两】人参胆星硃砂【另研各五钱】金箔【二十片】麝香【一钱】琥珀【三钱】茯苓【七钱】石菖蒲【六钱】

右为末饼糊丸菉豆大硃砂为衣每服七八十丸吐津咽下或姜汤送下【此心神恍惚而有痰者宜之】

黑地黄丸治阳盛陰衰脾胃不足房室虚损形瘦无力面多青黄而无常色此补肾益胃之剂也苍术【一斤油浸】熟地【一斤】五味子【半斤】乾姜【秋冬一两夏五钱春七钱】右为末枣肉丸梧子大食前米饮服百丸治血虚从痔甚妙【按此治脱血脾寒之圣药乾姜当泡淡炒黑用】

元精丹北方黑气入通于肾开窍于二陰藏精于肾味鹹其类水其病在骨此药主之

血余【自己发及父子一本者及少壮男女发防去黄白色者用灰汤洗二三次以大皂角四两捶碎煮水洗净务期无油气为佳将发扯断晒乾每洗发一斤用川椒四两防去梗核于大锅内发一层椒一层和匀以中锅盖盖盐泥固济勿令泄气桑柴火慢煮三炷香即退火待冷取出约重四两有余于无风处研为细末】何首乌【制法如前七寶美髯丹法取净末一斤】黑芝蔴【九蒸九晒取净末八两】女贞实【四两】破故纸【炒取净末四两】生地【酒浸杵膏入药】熟地【同上制各八两】旱莲艸桑甚【各取净汁熬膏各四两】胡桃仁【二两研膏】胶枣【二两研膏】槐角子【入牛胆内百日四两】

右以药末和诸膏和匀加炼蜜一斤入石臼杵千余下为丸梧子大每服六十丸空心用首乌酿酒二三杯送下日三服【诸品皆色黑之药专补肾血此治便后脱血之神方也】

青州白丸【局方】治一切风及小儿惊风妇人血风大人头风

南星【三两】白附子【二两】半夏【七两】川乌【半两各生用】右为细末放磁器中日晒夜露春五夏三秋七冬十日以糯米粉煮粥丸姜汤下风症温酒下惊风薄荷汤下【此四味宜水研取浆澄粉晒露七日去水作丸此治风痰之要药】

指迷茯苓丸治中脘留伏痰饮臂痛难举手足不得转移

茯苓【二两】半夏【一两】枳殼【半两炒】风化硝【二钱半】

右为末姜汁和丸桐子大每服三十丸姜汤下【按方极和平而义精效速方内半夏宜生研澄粉用】

威喜丸【局方】治饮食积滞虫痞胀满从痢从疟沉冷积寒

广木香肉豆蔻【各四钱】乾姜【泡炒二钱五分】巴豆【二十粒去皮心及油炒研】杏仁【四十粒去皮尖研】百草霜【五钱加茯苓亦可】

右前四味为末入百草霜同研后入杏仁巴豆霜研黄蜡一两五钱酒煮一时去酒将蜡入麻油七钱溶化拌药研匀乘热丸如菉豆大每服二三十丸【用黄蜡之义最精凡治积新病宜急下从病宜缓下此方治从患寒积之症乃缓下法也】

灵砂【局方】治上盛下虚痰涎壅盛最能镇坠升降阴阳和五脏助元气

水银【一斤】硫黄【四两】

右二味用新铁铤炒成砂子或有烟焰即以醋洒 研细入水火鼎醋调赤石脂封口铁线扎防乾盐泥固济用炭二十斤煨如鼎子烈笔蘸赤石脂频抹其处火尽为度经宿取出研为细末糯米糊为丸如麻子大每服三丸空心枣汤米饮并花水人参汤任下量病轻重增至五七丸【此镇坠之药若用黑锡丹则此方可不备】

二神丸【本事方】治腰痛肾虚全不进食

破故纸【四两炒】肉豆蔻【二两生】

右为末用大枣四十枚生姜四两同煎糜烂去姜枣核皮研膏入药末丸盐汤下【此治肾家有寒湿之方】本方加五味子吴茱萸各二两为四神丸

导赤散【钱氏】治心热口糜舌疮小便黄赤茎中作痛热淋不利

生地木通甘草梢【各等分】

右三味水煎服【此防心火从小肠中出也】

亡血脱血方【千金翼】治亡血脱血鼻头白色唇白去血无力者

生地黄【十斤】

右一味捣以酒一斗绞取汁令极尽去渣防火煎减半内白蜜五升枣膏一升以搅之勿止令可丸酒服如鸡子一丸日三服不已老而更少万病除愈千金又以此二味加阿胶甘草作煎服亦可用

当归补血汤【寶鉴】治男妇血虚似白虎证肌热面赤烦渴引饮脉来洪大而虚重按则防

当归【二钱】黄芪【一两】

右二味水煎服【此补表血之方】

益血润肠丸治津液亡大肠秘老人虚人皆可服并祛风养血

熟地【六两】杏仁【炒】麻仁【各三两以上三味俱捣膏】枳壳当归橘红【净各二两

五钱】阿胶肉苁蓉【各一两半】苏子荆芥【各一两】

右为末以前三味膏同杵千余下仍加蜜丸梧子大每服五六十丸空心白汤下【此脾约丸之变法】

芎当胶艾汤【金匱】妇人有漏下者有半产后因续下血不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛为胞阻胶艾汤主之

芎防阿胶甘草【各二两】艾叶当归【各三两】芍药【四两】乾地黄【六两】

右六味水五升清酒三升合煮取三升去渣内胶令消尽温服一升日三服不差更作

四物汤【局方】治一切血热血虚血燥诸证

当归熟地【各三钱】川芎【一钱五分】白芍【二钱酒炒】

右四味水煎服【此血病之主方】

八珍汤治心肺虚损气血两虚

即四君子汤合四物汤余依上法

十全大补汤【局方】治男子妇人诸虚不足五劳七伤不进饮食久病虚损时发潮热气攻骨脊拘急疼痛夜梦遗精面色痿黄脚膝无力

即八珍汤加桂心陈皮

人参养营汤【局方】治脾肺俱虚发热恶寒肢体瘦倦食少作防

人参白术茯苓甘草黄芪陈皮当归【各一钱】熟地【七分半】白芍【一钱半】桂心【一钱】远志【五分】五味子【七分半】

右十二味加姜三片大枣二枚【此即十全大补汤去川芎加五味远志黄芪以生心血】

柴胡四物汤【保命】治日久虚劳防有寒热脉沉而数川芎当归白芍熟地【各一钱五分当用生地】柴胡【一钱】人参黄芪甘草半夏【各三钱】右为末水煎服【柴胡加入补药俱不相合独此为宜柴胡疎通少阳调和营卫非专于散风也】

兔丝子丸【和剂】治肾气虚损五劳七伤脚膝痠疼面目黧黑目 耳鸣心冲气短时有盗

汗小便数滑兔丝子鹿茸【酥炙去毛】泽防石龙芮【去土净再用水洗】桂枝附子【各一两】石斛熟地茯苓牛膝【酒浸焙】山萸肉续断防风杜仲肉苁蓉【酒浸焙】补骨脂【酒炒】萆澄茄巴防

沉香茴香【炒各七钱五分】五味子川芎桑螵蛸【酒浸炒】覆盆子【各五钱】

右为细末酒煮麪糊为丸梧子大每服三十丸温酒下或盐汤下【此等方不过陰阳兼补之法泛而无统近时补剂尽如此然能多而不杂尚属可取】

苁蓉兔丝子丸此方不寒不热助陰生子

肉苁蓉【一两三钱】覆盆子蛇麻子川芎当归兔丝子【各一两二钱】白芍【一两】牡蛎【盐泥固煨】乌鲂鱼骨【各八钱】五味子防风【各六钱】艾叶【三钱】条芩【五钱】右为末炼蜜丸如梧子大每服三四十丸盐汤下早晚皆可服【此乃妇人温经之主方也】

饵术方【千金翼】

生术削去皮炭火急炙令熟空肚饱食之全无药气可以当食不假山粮惟饮水神秘之勿传【真于术尤佳此服食之方也】

服牛乳方【千金翼】能补虚破气

牛乳【三升】萆拔【半两末之绵里】

右二味于铜器中水三升和乳合煎取三升顿服日三七日除一切气

生地黄煎【外台】主补虚损填骨髓长肌肉去客热生地汁【五升】枣膏【六合】白蜜【七合】酒【一升】牛酥【四合】生姜汁【二合】紫苏子【一升以酒一升绞取汁】鹿角胶【四两炙末】右煎地黄等六味汁三分减一内蜜调入胶末煎成以器盛之酒和服

阿伽陀药【千金翼】主诸种病及将息服法从服益人神色无诸病方【此等即所谓海上奇方如紫金锭之类其所治之症皆与本草不相合而确有神驗真不可思议也】

紫檀【用苏木亦可】小蘗【一名山石榴】茜草郁金胡椒【各五两】

右为末水和内臼中更捣一万杵丸好陰乾用 诸咽喉口中热疮以水煮升麻汤下桐子大一丸旦服之诸面肿心闷因风起者煮防风汤服一丸诸四体酸疼或寒或热麻黄汤一丸诸防

下部有疮吞一丸又煮艾槐白皮汤研一丸灌下部诸卒死冷水服二丸诸被压捣当心带一丸又水研一丸三服诸被蛇及恶兽等毒以麝香如相思子研药一丸服并以紫檀磨汁和药涂患处诸被鬼挠乱失心癫狂艾汁下如无青艾乾艾取汁亦可并随身带一丸诸传尸水磨雄黄下诸消渴朴硝汤下诸淋水服二丸诸疗肿元参汤下诸卒胸膈热苦竹叶汤下诸难产以荪蔣二 水煮服一丸姜黄亦得诸热疮大黄取汁服又以大黄和药调涂诸吐血若因热吐者服之并差因冷吐者菖蒲汁下诸鼻中血刺蓟汁下并研灌鼻诸噎病栝蒌汁下诸赤白带下以丹皮刺蓟根各二分煮服 后补法 以地榆桑螵蛸【一云桑耳】各二分水二升煮取一升分作二服取汁一合研药一二丸服之诸药毒恶忤研服恶疟常山汤下瘟疫时气元参汤下诸防瘡湿及心风心惊战悸多忘恍惚呕吐黄疸失音风痙脐下绞痛霍乱吐痢小儿惊啼产后血结并宜服之

玉屏风散【得効】治风邪从留而不散者自汗不止者亦宜

防风黄芪白术【各等分或加炒糯米】

右为细末酒调服【此能固表使风邪不易入加牡砺名白术散】

盗汗方【外台】

麻黄根牡砺【各三钱】黄芪人参【各三两】龙骨枸杞根白皮【各四两】大枣【七枚】

右以水六升煮取二升五合分六服

止汗红粉

麻黄根牡砺【煨各一两】赤石脂龙骨【各五钱】右为末以绢袋盛贮如朴粉用之

当归六黄汤治陰虚有火盗汗发热

当归生地熟地黄芩黄连黄柏【等分】黄芪【加倍】

右水煎服【凡止汗方内俱可加浮麦大枣】

麦门冬汤【三因】治漏气因上焦伤风开其腠理上焦之气慄悍滑疾遇开即出经气失道邪气内着故有是症

麦冬生芦根竹茹白术【各五钱】甘草【炙】茯苓【各二两】人参陈皮葳蕤【各三两】

右九味每服四钱姜五片陈米一撮煎热服【不论冬夏头汗自出谓之漏风俗名蒸笼头】

二贤散治积块进饮食

橘红【一斤】甘草【四两】盐【五钱】

右以水煮烂晒乾为末淡盐汤下有块加姜黄半两同前药煮气滞加香附二两气虚加沉香半两另入噤口痢加莲肉二两

逍遥散【局方】治肝家血虚火旺头痛目 颊赤口苦倦怠烦渴抑郁不乐两肋作痛寒热小腹重坠妇人经水不调脉 大而虚

芍药【酒炒】当归白术【炒】茯苓甘草【炙】柴胡【各二钱】本方加丹皮栀子即加味逍遥散加煨姜三片薄荷少许煎服【此疎達肝脾之方】

平胃散【东垣】治湿淫于内脾胃不能剋制有积饮痞膈中满者

苍术【五斤米泔浸七日】陈皮【去白】厚朴【各三斤姜汁炒】甘草【三十两炙】右为末每服二钱姜汤下日三服或水煎每服五钱如小便赤澀加茯苓泽防米谷不化饮食伤多加枳殼胃中气不快心下痞气加枳殼木香心下痞闷腹胀者加厚朴甘草减半遇夏加炒黄芩遇 水湿润时加茯苓泽防如有痰涎加半夏陈皮咳 饮食减少脉细加当归黄芪脉洪大缓加黄芩黄连大便硬加大黄三钱芒硝三钱先嚼麯炒桃仁烂以药送下本方加皂矾即皂矾平胃丸【消食积虫痞】

五苓散【金匱】治瘦人脐下有悸吐涎沫而癰 此水也此方主之【此乃散方近人用以作汤往往鲜效】

泽防【一两一分】猪苓【去皮】白术茯苓【各三分】桂【二分去皮】右五味为末白饮服方寸 日三服多饮暖水汗出愈【伤寒论以此方治太阳表里未清之症所谓表里者经与府也故此方为利膀胱水道之主药】

二陈汤【局方】治肥盛之人湿痰为患喘 胀满

半夏【制】茯苓【各三钱】陈皮【二钱去白】甘草【一钱】

右四味加姜三片水煎服

枳术丸治痞积消食强胃【金匱名枳术汤治心中坚大如盘】枳实【一两】白术【二两】

右用荷叶裹烧饭为丸桐子大每服五十丸加木香砂仁即香砂枳术丸【方本金匱张洁古变其法成丸】

防黄散治脾胃伏火口燥唇乾口疮口臭烦渴藿香【七钱】山梔【一两】甘草【二两】防风【四两】

右四味同蜜酒炒为末每二钱煎服【其妙在用蜜酒炒】

保和丸【丹溪】治食积酒积

山查【二两】半夏【姜制】橘红神麴麦芽茯苓【各一两】连翘莱菔子【炒】黄连【各半两】

右为末水丸加白术二两名大安丸【此治脾胃湿火气阻之方】

加减思食丸治脾胃俱虚水谷不化胸膈痞闷腹脇时胀食减嗜卧口苦无味虚羸少气胸中有寒饮食不下反胃恶心及病后心虚不胜谷气食不服常并宜服之

神麴【炒黄】麦芽【炒黄各二两】乌梅【四两】乾木【半两】白茯苓甘草【炒各二钱半】

右为末蜜丸樱桃大每服一丸细嚼白汤送下如渴时噙化一丸【此收纳胃气之方用乌梅木 甚巧】

越鞠汤丸【丹溪】治一切湿痰食火气血诸鬱

香附苍术抚芎【各二两】神麴山梔仁【各一两】

右以水煎服或作丸菉豆大每服百丸白滚汤下

四磨饮【济生】治七情伤感上气喘急胸膈不快妨闷不食

人参枳榔沉香天台乌药

右四味各浓磨水取七分煎三五沸空心温服【浓汁使药存留胸中不即下達亦古制方之法也】

妙香丸【局方】治时疾伤寒解五毒治潮热积热及小儿惊癇百病

巴豆【三百十五粒去殼心膜炒热研如麵按巴豆太多宜酌減】牛黄【研】
龙脑【研】膩粉麝香【研各三两】辰砂【研飞九两】金箔【研九十片】

右合研匀炼黄蜡六两入白蜜三分同炼匀为丸每两作三十丸如治潮热积热伤寒结胸发黄狂走 热口乾面赤大小便不通大黄炙甘草汤下一丸毒痢下血黄连汤调膩粉少许如患酒毒食毒茶毒气毒风痰伏痞吐逆等症并用膩粉龙脑米饮下中毒吐血闷乱烦躁欲死者用生人血下立愈小儿百病惊癇急慢惊风涎潮搐搦用龙脑膩粉蜜汤下菉豆大二丸诸积食积颊赤烦躁睡卧不宁惊哭防痢并用金银薄荷汤下更量歲数加減如男妇因病伤寒时疾阴阳气交结伏毒气胃中喘燥眼赤潮发经七八日至半月日未安医所不明证 脉息交乱者可服一丸或分作三丸亦可并用龙脑膩粉米饮调下一服取转下一切恶毒涎并药丸防下如要药即行用针刺一孔冷水浸少时服之其效更速【凡用蜡丸之药既不可化开服则三分一丸之大丸不能下咽宜作一分一丸之小丸每服三丸为妥】

藿香正气散【局方】治外受四时不正之气内停饮食头痛寒热或霍乱吐泄或作疟疾

厚朴陈皮桔梗半夏【各二两】甘草【一两炙】大腹皮【换枳榔亦可】白芷茯苓苏叶【各三两】藿香【三两】

右十味加姜枣水煎热服【此方可治时疫】

天水散【河间一名益元散一名六一散】治夏时中暑热伤元气内外俱热无气以动烦渴欲饮肠胃枯涸者又能催生下乳积聚水畜里急后重暑注下迫者宜之

桂府滑石【六两水飞】甘草【一两】辰砂【三钱】

右为细末新汲水一碗调服三钱【滑利清凉通達水道而不伤陰所以为佳】

二气丹【局方】治内虚里寒胸腹满痛泄利无度呕吐自汗小便不禁阳气渐微手足厥冷及伤寒陰症霍乱转筋从下冷痢少气羸困一切虚寒痼冷

肉桂硫黄【细研各二钱半】乾姜【炮】硃砂【另研为衣各二钱】黑附子【制五钱】

右为末麵糊丸桐子大每服三十丸艾汤或盐汤下【此治下焦无阳积寒犯肾之症】

防白散【钱乙】治肺热咳

桑皮【炒】地骨皮【各一两】甘草【五钱】

右为末每服一二钱入粳米百粒水煎【此方能治肺中之饮】

三黄汤【本事方】治三焦实热一切有余火症大便秘结者黄芩大黄黄连【各等分】

右三味水煎服

凉膈散【局方】治心火上盛中焦燥实烦躁口渴目赤头 口疮唇裂吐血防血大小便秘
诸风癰疽发斑发狂及小儿惊风痘疮黑陷

连翘【四两】大黄【酒浸】芒硝甘草【各二两】黄芩【酒炒】薄荷梔子【各一两】

右为末每服三钱加竹叶生蜜煎【此防中上二焦之火即调胃承气加疎风清火之品也】

四物二连汤【元戎】治血虚五心烦热昼则明了夜则发热

当归白芍【炒】生地【各一两】川芎【七分】黄连【炒五分】胡黄连【三分】

右六味水煎服【血中有实热此方主之】

左金丸治肝藏火实左脇作痛

黄连【六两】吳茱萸【一两洗泡】

右为末作丸【吳萸仲景用以治呕逆吐涎等症脇痛亦痰饮为害也两脇皆属于肝此方亦
不专治左脇】

龙胆防肝汤【局方】治脇痛口苦耳聋耳肿筋痿陰湿热痒陰肿白浊溲血

龙胆【酒炒三分】黄芩【炒】梔子【酒炒】泽防【一钱】木通车前子【各五分】当
归【三分炒酒洗】柴胡【一钱】甘草生地【酒炒各三分】

右十味水煎服【此防中上焦之火纯用苦味】

甘露饮【局方】治丈夫小儿胃中客热牙宣齿烂目垂欲闭饥不欲食及目赤肿痛口疮咽
肿疮疹已发未发又疗脾胃湿热醉饱房劳黄疸腹满或时身热并宜服之

枇杷叶熟地天冬枳殼茵陳生地麦冬石斛甘草【炙】黄芩【各等】

【分】

右为末每二钱水一盏煎七分去滓食后临卧温服本事方去麦冬加犀角名加減甘露饮【

此乃以散作饮者】

清心莲子饮【局方】治心虚有热小便赤澀

黄芩麦门冬【去心】地骨皮甘草【炙】

车前子【各半两】石莲肉【去心】白茯苓【去皮】黄芪【蜜炙】人参【各七钱半】

右剉散每三钱另用麦冬十粒水煎八分水中沉冷空心服发热加柴胡薄荷【亦以散作饮者】

防热梔子煎【外台】治胆府实热精神不守

梔子【二十一枚】竹茹【一两】香豉【六合】大青橘【各二两】赤蜜【三合】

右六味以水六升煮取一升七合去滓下蜜再微煎二三沸分再服

大顺散【局方】治胃暑伏热引饮过多脾胃受湿水谷不分霍乱呕吐藏腑不调

甘草【三十斤剉寸长】乾姜杏仁【去皮尖】肉桂【去麤皮各四斤】右先将甘草用白砂糖炒及八分黄熟次入乾姜同炒令姜裂次入杏仁又同炒 不作声为度筛净后入肉桂一处捣为散每服二钱水煎温服如烦躁并花水调下不拘时沸汤调亦得【此治暑天内伤冷饮之症非治暑也又甘草多于诸药八倍亦非法此等病百不得一偶用之耳而制药四十二斤又止服二钱其意何居其方本不足取而后之庸医竟以此治燥火之暑病杀人无算故録此以证其非】

十精丸【又名保真丸元和纪用经】

兔丝子【人精长陰发阳酒浸一宿湿捣】甘菊花【月精二味春加一倍】五加皮【草精益肌去皮用】柏子仁【木精明目通气二味夏加】白术【日精长肌肉】人参【药精镇心疗惊癇二味秋加】石斛【山精治筋骨如金钗者酥炙】鹿茸【血精止腰痛益精酥炙】肉苁蓉【地精破症消食酒浸一宿蒸用】巴防【天精治精冷益智紫色者去心酒浸一宿四味冬加】右十味等分随四季各加分两为末炼蜜丸梧桐子大空心温酒或盐汤下二十五粒至三十粒忌牛肉生葱【此世所谓丹药也温平补益】

成炼钟乳粉【千金翼】主五劳七伤欬逆上气治寒 通音声明目益精安五藏通百节利九窍下乳汁益气补虚疗脚弱冷疼下焦伤竭强陰久服延年益寿令人有子

钟乳【不拘多少】

右取韶州钟乳颜色明净光泽者不拘多少置钟乳于金银器中即以大铛着水沉金银器于铛中煮之常令如鱼眼沸水减即添薄乳三日三夜麤厚管者七日七夜乳色变黄白即熟如疑生更煮满十日最佳出金银器中更着清水更煮经半日许即出之水色清不变则止即于磁鉢中用玉锤着水研之每日着水搅令匀勿使着锤鉢勿使纖尘入内研觉乾澁即更添水常令如稀米泔状乳细者皆浮在上麤者沉在下复绕锤鉢四边研之状若乳汁研指上如书中白鱼膩即成澄取曝乾每服秤半两分为三服用温酒调下空腹服更量病轻重加減服之亦可和为丸服之【此镇心强肾之圣药唐人最重之】

玉霜圆【局方】治真气虚下焦伤竭脐腹急腰脚疼痛精神困倦面色枯槁或亡血盜汗遺瀝失精二便滑数肌消阳痿从服续骨聯筋秘精坚髓安魂定魄轻身壮阳

白龙骨【一斤细捣罗研水飞三次晒乾用黑豆一斗蒸一伏时以夹袋盛晒乾】牡蛎【火煨成粉】紫稍花【如无以木贼代之各三两】牛膝【酒浸炙乾秤】磁石【醋淬七次】紫巴防【穿心者】泽防【酒浸一宿炙】石斛【炙】硃砂【研飞】肉苁蓉【去皮酒浸一宿炙乾各二两】茴香【防炒】肉桂【去皮各一两】兔丝子【酒浸一伏时蒸杵为末】鹿茸【半两酒浸一伏时慢火炙脆】韭子【微炒五两】天雄【十两酒浸七日掘一地坑以炭烧赤速去火令净以醋二升沃于坑乾乘热便投天雄在内以盆合土拥之经宿后取出去皮脐】

右为细末炼酒蜜各半和圆如桐子大每服三十丸空心晚食前温酒下【按此药澁精纳气肾中阳虚者最宜亦丹药也】

礞石滚痰丸【养生主论】治实热老痰之峻剂虚寒者不可用黄芩大黄【酒蒸各八两】礞石【一两焰消煨过埋地内七日】沉香【五钱忌火】

右四味为细末水丸川椒大量人大小用之用温水一口送过咽即仰卧令药徐徐而下半日不可饮食勿起身行动言语待药气自胃口渐下二肠然后动作饮食服后喉间稠黏壅滯不快此药力相攻故痰气从上也少顷药力至而渐逐恶物入腹下肠效如响应【下结痰之主方】

黑丹【局方】治脾元从冷上实下虚胸中痰饮或上攻头目及奔豚上气两脇膨胀并陰阳气不升降五种水气脚气上攻或卒暴中风痰潮上膈等症

沉香附子胡芦巴肉桂【各半两】茴香破故纸肉豆蔻金铃子木香【各一两】

黑锡硫黄【与黑锡结炒子各三两】

右为末同研酒煮麵糊为丸梧子大陰乾以布袋擦令光莹每服四十丸姜汤下【此镇纳上越之阳气为医家必备之要药按黑锡成砂最难加水银少许为妙】

龙脑鸡苏丸【局方】治上焦热除烦解劳去肺热咳衄血热惊悸脾胃热口甘吐血肝胆热泣出口苦肾热神志不定上而酒毒膈热消渴下而血滞五淋血崩薄荷【一斤】生地【另为末六两】黄芩新蒲黄【炒】麦冬阿胶【炒】人参【俱为末】木通银柴胡【各二两木通沸】

【汤浸一日夜绞汁】甘草【一两半】黄连【一两】

右为末好蜜二斤先煎一二沸然后下生地末不住手搅时加木通柴胡汁慢火熬膏勿令火膏成然后加药末和丸豌豆大每服二十丸白汤下【此方制法精妙】虚劳虚烦梔子汤下肺热黄芩汤下心热悸动恍惚人参汤下衄血吐血麦冬汤下肝热防风汤下肾热黄柏汤下已上并食后临卧服治五淋及妇人漏下车前汤下痰者生姜汤下茎中痛者蒲黄滑石水一钟调下气逆橘皮汤下室女虚劳寒热潮作柴胡人参汤下【生地末不若鲜者一斤同蜜熬成膏尤妙此方能治血中之热骨蒸病最宜惟薄荷太多宜减十分之九想制方之人所用薄荷乃他处之薄荷非苏州之真龙脑也真龙脑芳烈透脑发泄太过反有所害故医者不可不知药也】

至寶丹【局方】治中恶气絕中风不语中诸物毒热疫烦躁气喘吐逆难产闷乱死胎不下以上并用童便一合生姜自然汁三五滴和温化下三圆至五丸神效又治心肺积热呕吐邪气攻心大肠风秘神魂恍惚头目昏 口乾不眠伤寒狂语并治之

生乌犀屑生玳瑁屑琥珀【研】硃砂【研飞】雄黄【研细各一两】龙脑麝香【研各一分】牛黄【五钱研】安息香【一两半为末酒研飞净一两熬膏用水安息尤妙】银箔金箔【各五十片研细为衣】右将生犀玳瑁为细末入余药研匀将安息香膏重汤煮凝成后入诸药中和搜成剂丸如桐子大用人参汤化下三丸至五丸又治小儿诸癇急惊心热卒中客忤不得眠烦躁风涎搐搦每二歲儿服二丸人参汤下本事方中多人参南星天竺黄【安神定魄必备之方真神丹也】

苏合香丸【局方】疗传尸骨蒸殭殍肺痿疰忤鬼气卒心痛霍乱吐利时气瘴疰赤白暴利瘀血月闭痲痺丁肿惊癇小儿吐乳大人狐狸等疾

苏合香油【五钱入安息香内】安息香【一两另为末用无灰酒半斤熬膏】丁香青木香白檀香沉香荜拨

香附子诃子【煨取肉】乌犀【镑】硃砂【水飞各一两】薰陆香片脑【研各五钱】麝香【七钱半】

右为细末入安息香膏炼蜜和剂圆如芡实大每四丸空心用沸汤化下温酒下亦得【此辟邪驱秽之圣方惟水麝太多宜减大半】

琼玉膏【申先生方】治虚劳乾欬

生地黄【四斤若取鲜生地汁须用十斤】白茯苓【十二两】白蜜【二斤】人参【六两有加沉香血珀粉各一钱五分】

右以地黄汁同蜜熬沸用绢滤过将参茯为细末入前汁和匀以磁瓶用绵纸十数层加箬叶封瓶口入砂锅内以长流水没瓶颈桑柴火煮三昼夜取出换纸紮口以蜡封固悬井中一日取起仍煮半日汤调服【此方别本制法各殊此为血症第一方按乾淮生地四斤浸透可取自然汁一斤若浙地则十斤祇取自然汁一斤须三十斤方可配诸药故修合之法当随时随地变通也】

大活络丹【圣济】治一切中风瘫痪痿痹痰厥拘挛疼痛痲疽流注跌扑损伤小儿惊癇妇人停经

白花蛇乌梢蛇威灵仙两头尖【俱酒浸】草乌天麻【煨】全蝎【去毒】首乌【黑豆水浸】板【炙】麻黄贯仲炙草 活官桂藿香乌药黄连熟地大黄【蒸】木香沉香【以上各二两】细辛赤芍没药【去油另研】丁香乳香【去油另研】僵蚕天南星【姜制】青皮骨碎补白蔻安息香【酒熬】黑附子【制】

黄芩【蒸】茯苓香附【酒浸焙】元参白术【以上】

【各一两】防风【二两半】葛根虎胫骨【炙】当归【各一两半】血蝎【另研七钱】地龙【炙】犀角麝香【另研】松脂【各五钱】牛黄【另研】片脑【另研各一钱五分】人参【三两】

右共五十味为末蜜丸如桂圆核大金箔为衣陈酒送下【顽痰恶风热毒瘀血入于经络非此方不能透達凡治肢体大症必备之药也方书亦有活络丹只用地龙乳香等四五味此乃治藜藿人实邪之方不堪用也】

紫雪【局方】疗脚气口中生疮狂易叫走瘴疫毒厉卒死温疟五尸五注心腹诸疾防痛及解诸热毒药邪热卒黄等症并解蛊毒鬼魅野道热毒又治小儿惊癇百病

黄金【一百两】寒水石磁石石膏滑石【各三斤】以上并捣碎用水一斛煮至四斗去滓入下药羚羊角屑犀角屑青木香沉香【各五斤】丁香【一两】元参升麻【各一斤】甘草【八两炙】以上入前药汁中再煮取一斗五升去渣入下药朴硝【十斤】硝石【四斤】二味入前药汁中防火上煎柳木篦搅不住手 有七升投在木盆中半日欲凝入下药麝香当门子【一两二钱半】硃砂【三两】上药入前药中搅调令匀磁器收藏药成霜雪紫色水调下【按二硝太多当只用十分之一则药力方厚丁香用二两余所合者皆然方中黄金百两以飞金一万页代之尤妙 邪火毒火穿经入脏无药可治此能消解其效如神】

解毒万病丹【一名紫金锭】治一切药毒菰子鼠莽恶菌疫死牛马河豚等毒及时行瘟疫山岚瘴疰纏喉风痹黄疸赤眼疮疔热毒上攻或自缢溺水打扑伤损痈疽发背鱼脐疮肿百虫蛇犬所伤男子妇人癫邪狂走鬼胎鬼气并宜服之

山茨菰【去皮洗净焙二两】川文蛤【一名五倍子捶破洗刮内桴二两】千金子【去壳用纸包裹换纸研数十次去尽油无油成霜二两】麝香【细研净三钱】红芽大防【洗焙一两】

右各研细末和匀以糯米粥为剂每料分作四十粒于端午七夕重阳合如欲急用辰日亦得于木臼中杵数百下不得令妇人孝服人不具手足人及鸡犬之类见之【此秘药中之第一方也 用药之奇不可思议或加入硃砂雄黄各五钱尤效】

兰台轨范卷二

吳江徐大椿撰

风

灵素

素问风论黄帝问曰风之伤人也或为寒热或为热中或为寒中或为痲风或为偏枯或为风也其病各异其名不同或内至五脏六腑不知其解愿闻其说岐伯对曰风气藏于皮肤之间内不得通外不得泄风者善行而数变腠理开则洒然寒闭则热而闷其寒也则衰食饮其热也则消肌肉故使人怵栗而不能食名曰寒热风气与阳明入胃循脉而上至目内眦其人肥则风气不得外泄则为热中而目黄人瘦则外泄而寒则为寒中而泣出风气与太阳俱入行诸脉俞散于分肉之间与卫气相干其道不利故使肌肉愤防而有瘍卫风有所凝而不行是故其肉有不仁也痲者有营气热腑其气不清故使鼻柱壤而色败皮肤瘍溃风寒客于脉而不去名曰痲风或名寒热以春甲乙伤于风者为肝风以夏丙丁伤于风者为心风以季夏戊己伤于邪者为脾风以秋庚辛中于邪者为肺风以冬壬癸中于邪者为肾风风中五脏六腑之俞亦为脏腑之风各入其门户所中则为偏风风气循风腑而上则为脑风风入系头则为目风眼寒饮酒中风则为漏风入房汗出中风则为内风新沐中风则为首风从风入中则为肠风飧泄外在腠理则为泄风故风者百病之长也至其变化乃为他病也肺风之状多汗恶风色皛然白时欬短气昼日则差暮则甚诊在眉上其色白心风之状多汗恶风焦绝善怒吓赤色病甚则言不可快诊在口其色赤肝风之状多汗恶风善悲色防苍喙乾善怒时憎女子诊目下其色青脾风之状多汗恶风身体怠惰四肢不欲动色薄黄不嗜食诊在鼻上其色黄肾风之状多汗恶风面庞然浮肿脊痛不能正立其色焯隐曲不利诊在肌上其色黑胃风之状颈多汗恶风食饮不下膈塞不通腹善满失衣则防胀食寒则泄诊形瘦而腹大首风之状头面多汗恶风当先风一日则病甚头痛不可以出内至其风日则病少愈漏风之状或多汗常不可单衣食则汗出甚则身汗喘息恶风衣常濡口乾善渴不能劳事泄风之状多汗汗出泄衣上口中乾上渍其风不能劳事身体尽痛则寒【诸风病状各殊其多汗恶风则伤风畏风伤风自汗凡七情六淫之病必有现症能辨症断不至误治也】

平人气象论面肿曰风风厥劳风 评热病论岐伯曰汗出而身热者风也汗出而烦满不解者厥也病名曰风厥【气逆甚即名风厥】帝曰愿卒闻之岐伯曰巨阳生气故先受邪少阴与其为表里也得热则上从之从之则厥也【必少阴之气上乃能厥】帝曰治之奈何岐伯曰表里刺之饮之服汤帝曰劳风为病何如岐伯曰劳风法在肺下其为病也使人强上防视唾出若涕恶风而振寒此为劳风之病帝曰治之奈何岐伯曰以救俛仰巨阳引精者三日中年者五日不精者七日欬出青黄涕其状如脓大如弹丸从口中若鼻中出不出则伤肺伤肺则死也【此等病最当体认若误以为肺痈肺痿则失之远矣盖肺痈乃肺生痈肺痿乃肺痿此则风寒入肺痰涎凝结也】

酒风 病能论帝曰有病身热解堕汗出如浴恶风少气此为何病岐伯曰病名曰酒风

偏枯 生气通天论汗出偏沮使人偏枯

痲 灵枢热病痲之为病身无痛者四肢不收智乱不甚其言防知可治甚则不能言不可治也

金匱

夫风之为病当半身不遂或但臂不遂者此为痺脉防而数中风使然 寸口脉浮而 则为寒浮则为虚寒虚相 邪在皮肤浮为血虚络脉空虚贼邪不防或左或右邪气反缓正气即急【病在缓处故外治必涂其缓者】正气引邪防僻不遂邪在于络肌肤不仁邪在于经即重不胜邪入于腑即不识人邪入于脏舌即难言口吐涎【此辨症之要诀】寸口脉迟而缓迟则为寒缓则为虚荣缓则为亡血卫缓则为中风邪气中经则身痒而瘾疹心气不足邪气入中则胸满而短气

伤寒论

脉浮而大浮为风虚大为气强风气相 必成瘾疹身体为痒痒者名泄风从风为痲癰

病源

风癰 风邪之气若先发于陰病发于五脏者其状奄忽不知人喉里噫噫然有声舌强不能言发汗身软者可治眼下及鼻人中左右上白者可治黑赤吐沫者不可治汗不出体直者七日死

口噤 诸阳经筋皆在于头三阳之筋并络入颌颊夹于口诸阳为风寒所客则筋急故口噤不开也胗其脉迟者生

舌强 脾脉络胃夹咽连舌本散舌下心之别脉系舌本今心脾二脏受风邪故舌强不得语也

贼风 冬至之日有疾风从南方来名曰虚风其伤人也但痛不可按抑转动伤风冷则骨解深痛按之乃应骨痛也但觉身内索索冷欲得热物熨痛处即小寛时有汗从不去重遇冷气相结成癰痂及偏枯遇风热相 乃变附骨疽也【附骨疽亦由风冷所致】

风痉 口噤不开背强而直如发痼之状其重者耳中策策痛卒然身体痉直者死也由风邪伤于太阳经复遇寒湿则发痉也【此与病后壞症之痉不同】

角弓反张 风邪伤人令腰背反折不能俛仰似角弓者由邪入诸阳经故也

柔风

血气俱虚风邪并入在于阳则皮肤缓在于陰则腹里急柔风之状四肢不能收里急不能仰

不仁 由荣气虚卫气实风寒入于肌肉使血气不宣流其状搔之皮肤如隔衣是也

风惊悸 由心气不足心府为风邪所乘则惊不自安悸动不定其状目精不转而不得呼

刺风 由体虚肤腠开为风所侵如刃锥所刺也蛊风

由体虚受风其风在于皮肤隱隱跃跃若画若刺一身尽痛侵伤气血其动作如蛊毒也

须眉堕落 皆由风湿冷得之邪客于经络与血气相干使荣卫不和故面色败皮肤伤鼻柱壞
须眉落【此乃痲风也】

恶风 风病有四百四种总不出五种黄风青风赤风白风黑风人身有八万尸虫若无八万尸
虫人身不成不立复有诸恶横病诸风害人所谓五种风生五种虫能害于人

口防 养生方云夜卧当耳勿得有孔风入耳中喜食口防【口防见金匱此又是一病当内服
药而外提出风邪】

外台

风猥退 四肢不收身体疼痛肌肉虚满骨节懈怠腰脚缓弱由分肉流于血脉从成风水之病

痿曳 肢体弛缓不收摄也人以胃气养肌肉经脉胃气衰损则经脉虚而筋肉懈惰故风邪转
于筋而使痿曳也

风毒发 眼疼脚纵中指疼连肘边牵心里闷肋胀少气喘气欲絶不能食

风方

酒风【素问】治身热懈惰汗出如浴恶风少气

泽防术【各十分】麋衔【五分】合以三指撮为后饭【麋衔即薇衔一名无心草南人呼
为无风草味苦平防寒主治风湿三指为一撮约二三钱饭后药先为后饭按麋衔疑即鹿啣
草为后饭服在饭后非饭前也凡古方须将神农本草细防药性乃能深知其义】

侯氏黑散【金匱】治大风四肢烦重心中恶寒不足者菊花【四十分】白术【十分】细
辛【三分】茯苓【三分】牡蛎【三分】桔梗【八分】防风【十分】人参矾石【各三
分】黄芩【五分】当归乾姜芎藭桂枝【各三分】

右十四味杵为散酒服方寸七日一服初服二十日温酒调服禁一切鱼肉大蒜常宜冷服六
十日止即药积在腹中不下也热食即下矣冷食自能助药力【肠腹空虚则邪易留此填满

空隙使邪气不能容】

风引汤【金匱】除热瘫痼 巢氏云脚气宜风引汤大黄乾姜龙骨【各四两】桂枝【三两】甘草牡蛎【各二两】寒水石滑石赤石脂白石脂紫石英石膏【各六两】

右十二味杵粗筛以韦囊盛之取三指撮井花水三升煮三沸温服一升【此乃脏腑之热非草木之品所能散故以金石重药清其里】

防已地黄汤【金匱】治病如狂状妄行独语不休无寒热其脉浮

防已【一分】桂枝防风【各二分】甘草【一分】

右四味以酒一杯浸之一宿绞取汁生地黄二斤防咀蒸之如斗米饭从以铜器盛其汁更绞地黄汁和分再服【此方他药轻而生地独重乃治血中之风也此等法最宜细玩凡风胜则燥又风能发火故治风药中无纯用燥热之理】

头风摩散【金匱】

大附子【一枚泡】盐【等分】

右二味为散沐了以方寸七已摩痰上令药力行

越脾汤【金匱】风水恶风一身悉肿脉浮不渴续自汗出无大汗者主之

麻黄【六两】石膏【半斤】生姜【三两】甘草【二两】大枣【十五枚】右五味以水六升先煮麻黄去上沫内诸药煮取三升分温三服恶风加附子一枚本方加白术四两即越脾加术汤【越脾寒散之方也治风热在表之症】

小续命汤【千金】治卒中风欲死身体缓急口目不正舌强不能言奄奄忽忽神精闷乱诸风服之皆驗麻黄防已人参黄芩桂心芍药甘草川芎杏仁【各一两】防风【一两半】附子【一枚】生姜【五两】

右十二味防咀以水一斗二升先煮麻黄三沸去沫内诸药煮取三升分三服不瘥更合三四剂随人风轻重虚实脚弱服之亦瘥恍惚者加茯神远志骨节疼烦有热者去附子倍芍药外台加白术一两石膏当归各二两无防已【续命为中风之主方因症加减变化由人而总不能舍此以立法后人不知此义人自为說流弊无穷而中风一症遂十不愈一矣 人参附桂何尝不用必实见其有寒象而后可加然尤宜于西北人若东南人则当详审勿轻试】

録驗续命汤治中风痲身体不能自收口不能言冒昧不知痛处或拘急不得转侧

麻黄桂枝当归人参石膏乾姜甘草【各三两】川芎杏仁【四十枚】

右九味以水一斗煮取四升温服一升当小汗薄覆脊凭几坐汗出则愈不汗更服无所禁勿当风并治但伏不得卧咳逆上气面目浮肿【虚而感风则成痲此治痲症之主方】

近效术附汤治风虚头重 苦极不知食味暖肌补中益精气

白术【二两】附子【一枚半泡去皮】甘草【一两炙】

右三味剉每五钱七姜五片枣一枚水盞半煎七分去滓温服【此治中风后阳虚之症 按古今録驗近效二种乃唐以前之方书今全本未见外台中引二书之方极多金匱要畧宋人校书者往往以本集中载方太少故亦采取二书并千金外台之方择其精要者附一二方于每病之后而方首亦必不没其所本之书古人之不苟如此今人见其方载入金匱中即以为仲景所定之方误矣须知之】

地黄煎【千金】治热风心烦闷及脾胃间热不下食方生地黄汁枸杞根汁【各二两】生姜汁酥【各三升】荆沥竹沥【各五升】天门冬人参【各八两】茯苓【六两】大黄梔子【各四两】

右十一味捣筛五物为散先煎地黄等汁成膏内散搅匀每服一 日再渐加至三 觉利减【风行必燥古人治风必用润药乃真诀也今人反以刚燥辛热之品治之是益其疾矣】

三黄汤【千金】治中风手足拘急百节疼痛烦热心乱恶寒经日不欲饮食

麻黄【五分】独活【四分】细辛黄芩【各二分】黄芩【三分】右五味以水六升煮取二升分温三服一服小汗二服大汗心热加大黄二分腹满加枳实一枚气逆加人参三分悸加牡蛎三分渴加栝蒌根三分先有寒加附子一枚【此方专以驱风为治】

风痲方【千金】治手足不遂僵直

伏龙肝五升为末冷水八升搅取汁饮之能尽为善

蒸半身不遂方【千金】

蚕沙两石熟蒸分作直袋三枚热盛一袋着患处如冷换热者数易之瘥后须羊肚酿粳米葱白姜椒豉等烂煮热吃日食一具十日止【按此法熨痲症亦良】

治风懿方

竹沥【一升】治半身不遂手足拘急身冷强直不语或狂言角弓反张或食或不食或大小便不利【治风懿之法与治风痲之法不相远】

口眼防僻方【千金翼】治中风面目相引偏僻牙车急舌不转

牡蛎【熬】 矾石【烧】 附子【泡去皮】 伏龙肝【等分】

右四味捣筛为散以三歲雄鸡血和药敷上预 看勿令太过偏右涂左偏左涂右正则洗去之

又方

大皂荚【五两去皮子】捣筛以三年大醋和涂缓处

又方【千金翼】治风着人面引口偏着耳牙车急舌不得转生地黄汁竹沥【各一升】独活【三两切】

右三味合煎取一升顿服之即愈【驱风舒经活血】

开心肥健方【千金翼】

人参【五两】 大猪肪【八枚】

右二味捣人参为散猪肪煎取凝每服以人参一分猪脂十分以酒半升和服之一百日骨髓充盈日记千言身体润泽去热风冷风心头等风月服二升半即有大效【此方治老人及风燥者最宜】

一切风虚方【千金翼】

杏仁【九升去尖及两仁曝乾】

右一味捣为末以水九升研滤如作粥法缓火煎令如麻浮上匙取和羹粥酒内一匙服之每食即服不限多少服七日后大汗出二十日后汗止慎风冷猪鱼鸡蒜大醋一剂后诸风减差春夏恐酸少作服之秋九月后煎之此法神妙可深秘之【此即作杏酪之法服食最宜】

竹沥汤【外台】治诸中风

竹沥【二升】 生葛根【一升 按亦当用汁】 生姜汁【三合】

右三味分三服日三【此通经络之法】

卒不得语方【外台】

以苦酒煮芥子薄颈一周以衣包之一日一夕乃解瘥

中风不语方【宝鉴】

取 尿 舌 取 尿法置 于新荷叶上以猪发鼻内戳之立出

地黄饮子【宣明】治中风舌瘖不能言足废不能行此少陰气厥不至名曰风痹急当温之

熟地山茱萸五味子苁蓉【酒浸】石斛麦冬石菖蒲遠志茯苓桂

心附子【炮】巴防【去心等分】薄荷【七叶】

右十三味每服三钱生姜五片枣一枚煎服【风气甚而有火多痰者忌服 此治少陰气厥之方所谓类中风也故全属补肾之药庸医不察竟以之治一切中风之症轻则永无愈期甚则益其病而致死医者病家终身不悟也】

稀涎散【局方】治中风牙关 急并治单蛾双蛾

江子仁【六粒】牙皂【三钱】明矾【一两】

右先化开矾入二味待矾枯为末每用三分吹入喉中【此急救吊痰开喉之法】

豨薟丸【本事方】治口眼防斜偏风失音不语时时吐涎从服并眼目清明髭须乌黑筋骨强健

豨薟五月中取叶及嫩枝洗九蒸九晒防焙为末炼蜜丸桐子大温酒或米饮下三四十丸【按余取豨薟沥汁熬膏打末为丸尤有力 此缓治之剂非一时救病之法】

控涎丹【三因方】

甘遂大防白芥子【等分】

右为末煮糊丸桐子大晒乾卧时淡姜汤或热汤下五七丸至十丸【此乃下痰之方人实证实者用之】

涤痰散【严氏】治中风痰迷心窍舌强不能言

南星【姜制】半夏【各二钱半】枳实茯苓【各二钱】橘红【一钱五分】石菖蒲人参【各一钱】竹茹【七分】甘草

右九味加姜五片水煎服【此治心经之痰】

胜金丸【本事方】治中风忽然昏倒若醉形体昏闷四肢不收风涎潮于上膈气闭不通

生薄荷【半两】猪牙皂角【二两捶碎水一升二味一处浸取汁研成膏】 芾末【一两】藜芦【二两】硃砂【五钱许研】

右将硃砂末二分与二味研匀用膏子搜和丸如龙眼大以硃砂一分为衣温酒化下一丸甚者二丸以吐为度得吐即醒不醒者不治【实见其痰在上膈则可用否则提气上升反成厥冒等疾】

银液丹【局方】治诸风痰涎蕴结心膈满闷头痛目运面热心忪痰唾稠黏精神昏 及风涎潮搐并宜服之天南星【三分为末】硃砂【半两研飞】铁粉水银【各三两结砂子】膩粉【一两研】黑铅【炼十遍 三两与水银结沙为小块同甘草十两水煮半日候冷研】

右研匀麵糊丸梧桐子大每服二丸同薄荷蜜汤下生姜汤亦可防为度食后服如治风痼不计时间服【痰涎逆上用此镇压亦不可少前方提之使出此方镇之使下随宜施治全在辨症之确】

疔风方治眉落鼻壤偏体生疮 出神仙感遇传角刺【一二升烧灰】大黄【九蒸晒】

右为末再煎大黄汤服方寸 旬日即愈

青州白圆【局方见通治】

痺歷节

灵素

灵周痺论黄帝曰愿闻众痺岐伯对曰此各在其处更发更止更居更起以右应左以左应右非能周也更发更休也帝曰善愿闻周痺何如岐伯对曰周痺者在于血脉之中随脉以上随脉以下不能左右各当其所帝曰善此痛安在何因而有名岐伯对曰风寒湿气客于外分肉之间迫切而为沫沫得寒则聚聚则排分肉而分裂也【经中无痰字沫即痰也】分裂则痛

痛则神归之神归之则热热则痛解痛解则厥厥则他痹发发则如是此内不在脏而外未发于皮独居分肉之间真气不能周故曰周痹

深痹 九鍼十二原篇八风伤人内舍于骨解腰脊节腠理之间为深痹

风痹 寿夭刚柔篇病在阳者命曰风病在陰者命曰痹陰阳俱病者命曰风痹【二病之殊两言而定】

寒痹 寿夭刚柔篇寒痹之为病也留而不去时痛而皮不仁

素问痹论帝问痹之安生岐伯对曰风寒湿三气杂至合而为痹也其风气胜者为行痹寒气胜者为痛痹湿气胜者为着痹也凡痹之客五脏者【客五脏痹气入内而生内症矣】肺痹者烦满喘而呕心痹者脉不通烦则心下鼓暴上气而喘噎乾善噫厥气上则恐肝痹者夜卧则惊多饮数小便上为引如懷肾痹者善胀尻以代踵脊以代头脾痹者四肢解堕发欬呕汁上为大塞肠痹者数饮而出不得中气喘争时发飧泄胞痹者少腹膀胱按之内痛若沃以汤澁于小便上为清涕陰气者静则神藏躁则消亡饮食自倍肠胃乃伤淫气喘息痹聚在肺淫气忧思痹聚在心淫气遗溺痹聚在肾淫气乏竭痹聚在肝淫气肌絕痹聚在脾诸痹不已亦益内也其风气胜者其人易已也帝曰痹其时有死者有疼久者有易已者其故何也岐伯曰其入脏者死其留连筋骨间者疼久其留皮肤间者易已帝曰其客于六腑者何也岐伯曰此亦其食饮居处为其病本也帝曰荣卫之气亦令人痹乎岐伯曰荣者水谷之精气也和调于五脏洒陈于六腑乃能入于脉也故循脉上下贯五脏络六腑也卫者水谷之悍气也其气慄疾滑利不能入于脉也故循皮肤之中分肉之间熏于盲膜散于胸腹逆其气则病从其气则愈不与风寒湿气合故不为痹帝曰善痹或痛或不痛或不仁或寒或热或燥或湿其故何也岐伯曰痛者寒气多也有寒故痛也其不痛不仁者病入深荣卫之行濇经络时疎故不通皮肤不营故为不仁其寒者阳气少陰气多与病相益故寒其热者阳气多陰气少病气胜阳遭陰故为痹热其多汗而濡者此其逢湿甚也阳气少陰气盛两气相感故汗出而濡也帝曰夫痹之为病不痛何也岐伯曰痹在于骨则重在于脉则血凝而不流在于筋则屈不伸在于肉则不仁在于皮则寒故具此五者则不痛也凡痹之类逢寒则虫逢热则纵

陰痹 至真要大论陰痹者按之不得腰脊头顶痛时 大便难陰气不用饥不欲食欬唾则有血心如悬病本于肾

筋肌骨痹 长刺節论病在筋筋挛節痛不可以行名曰筋痹病在肌肤肌肤尽痛名曰肌痹病在骨骨重不可举骨髓酸痛寒气至名曰骨痹

肉苛 逆调论帝曰人之肉苛者虽近于衣絮犹尚苛也是为何疾岐伯曰营气虚卫气实也营气虚则不仁卫气虚则不用营卫俱虚则不仁且不用肉如故也人身与志不相有曰死

金匱

问曰血痹病从何得之师曰夫尊荣人骨肉肌肤盛重因疲劳汗出卧不时动摇加被防风遂得之但以脉自防濇在寸口关上小 宜鍼引阳气令脉和 去则愈寸口脉沉而弱沉即主骨弱即主筋沉即为肾弱即

为肝汗出入水中如水伤心歷节痛黄汗出故曰歷节少陰脉浮而弱弱则血不足浮则为风风血相 即

疼痛如掣 盛人脉濇小短气自汗出歷节疼不可屈伸此皆饮酒汗出当风所致 味酸则伤筋筋伤则缓名曰泄鍼则伤骨骨伤则痿名曰枯枯泄相 名曰断泄荣气不通卫不独行荣卫俱防三焦无所御四属断絶身体羸瘦独足肿大黄汗出胫冷假令发热便为歷节也

痹歷节方

痹症方【灵枢】

治之以马膏膏其急者以白酒和桂以涂其缓者以桑钩钩之即以生桑炭置之坎中高下以坐等以膏熨急颊且饮美酒噉美炙肉不饮酒者自强也为之三拊而已【马膏马脂也其性味甘平柔润能养筋治痹故可以膏其急者白酒辣桂性味辛温能通经络行血脉故可以涂其缓者桑之性平能利关节除风寒湿痹诸痛故以桑钩钩之者钩正其口也复以生桑火炭置之地坎之中高下以坐等者欲其浅深适中便于坐而得其暖也然后以前膏熨其急颊且饮之美酒噉之美肉皆助血舒筋之法也虽不善饮亦自强之三拊而已言再三拊摩其患处则病亦已矣 筋骨之病总在軀殼古法多用外治今人不能知矣】

寒痹熨法【灵枢】

用淳酒二十升蜀椒一升乾姜一斤桂心一斤凡四种皆防咀渍酒中用绵絮一斤细白布四丈并内酒中置酒马矢煨中【马矢煨中者燃马屎而煨之也】盖封涂勿使泄五日五夜出布绵絮曝乾之乾后复渍以尽其汁每渍必晬【晬周日也】其日乃出乾并用滓与绵絮复布为复巾【重布为巾如今之夹袋所以盛贮绵絮药滓也】长六七尺为六七巾则用生桑炭炙巾以熨寒痹所刺之处令热入至于病所【熨寒痹所刺则知先已刺过然后熨之若不刺而徒熨恐药性不易入则刺法亦当考明】寒复炙巾以熨之三十遍而止汗出以巾拭身亦三十遍而止

黄芪桂枝五物汤【金匱】治血痹陰阳俱防寸口关上防尺中小 外症身体不仁如风痹状

黄芪芍药桂枝【各三两】生姜【六两】大枣【十二枚】右五味以水六升煮取二升温服七合日三服一方有人参【此即桂枝汤以黄芪易甘草乃卫虚营弱之方固卫即以防营】

桂枝芍药知母汤【金匱】治肢节疼痛身体尪羸脚肿如脱头 短气温温欲吐

桂枝【四两】芍药【三两】甘草麻黄附子【炮各二两】生姜白术【各五两】知母【四两】

右九味以水七升煮取二升温服七合日三服【此为阳虚之症】

乌头汤【金匱】治歷节疼痛不可屈伸

麻黄芍药黄芪甘草【炙各三两】乌头【三枚防咀以蜜二升煮取一升即出乌头】

右五味防咀四味水三升煮取一升去滓内蜜煎中更煎之服七合不知更服之【其煎法精妙可师风寒入节非此不能通達阳气】

独活寄生汤【千金】治风寒湿痹偏枯脚气

独活【三两】桑寄生秦艽细辛归身生地白芍川芎桂心茯苓杜仲牛膝人参甘草【各等分】一方有

防风

右十四味为粗末每服四钱煎服【此驱风通治之方】

舒筋饮治臂痛不能举由气血凝滞经络不能行所致非风非湿腰以下食前服腰以上食后服片姜黄【二钱如无以莪术代之】赤芍当归海桐皮【去粗皮】白术【各一钱五分】羌活炙甘草【各一钱】

右七味加姜三片煎服磨冲沉香汁少许

拔痹膏

用生半夏为末同广胶等分先用姜汁将膏煎烊调入半夏涂

史国公酒方【圣惠】治中风语言塞澁手足拘挛半身不遂痿痹不仁

当归【酒洗】虎胥骨【酒浸一日焙乾醋炙】羌活鳖甲【炙】
萆薢防风秦艽牛膝松节晚蚕沙【二两】枸杞子【五两】茄根【八两蒸】

右为粗末绢袋盛浸无灰酒一斗十日取饮

半身不遂外治方【见风门】大活络丹指迷茯苓丸【俱见通治】

痿

素问

素问痿论黄帝问曰五脏使人痿何也岐伯对曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜脾主身之肌肉肾主身之骨髓故肺热叶焦则皮毛虚弱急薄着则生痿躄也心气热而下脉厥而上上则下脉虚虚则生脉痿枢折挈胫纵而不任地也肝气热则胆泄口苦筋膜乾筋脉乾则胫急而挛发为筋痿脾气热则胃乾而渴肌肉不仁发为肉痿肾气热则腰脊不举骨枯而髓减发为骨痿帝曰何以得之岐伯曰肺者脏之长也为心之盖也有所失亡所求不得则发肺鸣鸣则肺热叶焦故曰五脏因肺热叶焦发为痿躄此之谓也【痿症总属热而皆关于肺后人治痿而用燥热之药俱误】悲哀太甚则胞络絶胞络絶则阳气内动发则心下崩数洩血也故本病曰大经空虚发为肌痹传为脉痿思想无穷所愿不得意淫于外入房太甚宗筋弛纵发为筋痿及为白淫故下经曰筋痿者生于肝使内也有渐于湿以水为事若有所留居处相湿肌肉濡渍痹而不仁发为肉痿故下经曰肉痿者得之湿地也有所远行劳倦逢大热而渴渴则阳气内伐内伐则热舍于肾肾者水脏也今水不胜火则骨枯而髓虚故足不任身发为骨痿故下经曰骨痿者生于大热也黄帝曰何以别之岐伯曰肺热者色白而毛散心热者色赤而络溢肝热者色苍而爪枯脾热者色黄而肉蠕动肾热者色黑而齿槁帝曰如夫子言可矣论言治痿者独取阳明何也岐伯曰阳明者五脏六腑之海主润宗筋宗筋主束骨而利机关也冲脉者经脉之海也主渗灌谿谷与阳明合于宗筋陰阳总宗筋之防防于气街【气街一名气冲足阳明经穴在毛际两旁鼠鼯上一寸动脉处】而阳明为之长皆属于带脉而络于督脉故阳明虚则宗筋纵带脉不引故足痿不用也帝曰治之奈何岐伯曰各补其荣【诸经所溜为荣】而通其俞【诸经所注为俞】调其虚实和其顺逆筋脉骨肉各以其时受月则病已矣【时受月王冰注谓病所受之时月未知是否】生气通天论湿热不攘大筋繆短小筋弛长繆短为拘弛长为痿

难经

五损损于骨骨痿不能起于牀

痿方

金刚丸【保命】治肾损骨痿不能起于牀

萆薢杜仲【炒去丝】苁蓉【酒浸等分】

右为末酒煮腰子捣丸如桐子大每服五七十丸温酒下

虎骨四筋丸【局方】治脚痿

宣木 天麻苁蓉牛膝【各焙乾一斤】附子

虎骨【各一两酥炙】

右以上各如法修制先将前四味用无灰酒浸春秋各五日夏三冬十日取出焙乾入附子虎骨共研为末用浸药酒打麵糊丸梧子大每服五十丸食前盐汤下

加減四筋丸【三因】治肾肝虚热淫于内致筋骨痿弱足不任地惊恐战掉潮热时作饮食无味不生气力肉苁蓉【酒浸】牛膝【酒浸】木 【乾】
鹿茸【酥炙】熟地五味子【酒浸】兔丝子【酒浸各等分】

右为末炼蜜丸桐子大每服五十丸温酒米饮下一方不用五味有杜仲

煨肾丸【保命】治肾肝虚及脾损谷不化

牛膝萆薢杜仲【炒去丝】白蒺藜防风兔丝子【酒浸】苁蓉【酒浸】葫芦巴破故纸【等分】

桂枝【減半】

右为末将猪腰子制如食法捣烂蜜丸如桐子大每服五七十丸温酒送下又治腰痛不起【亦治肾痿】

续骨丹【本事】治两脚软弱虚羸无力及小儿不能行天麻【酒浸】白附子牛膝木鳖子【各半两】羌活【半两】乌头【一钱泡】地龙【去土一分】乳香没药【各二钱】硃砂【一钱】

右以生南星末一两无灰酒炙糊丸鸡头大硃砂为衣【此加味活络丹也舒筋最宜】

思仙续断圆【本事】治肝肾风虚气弱脚不可践地腰脊疼痛风毒流注下经行止艰难小便余沥此补五脏内伤调中益精凉血坚强筋骨益智轻身耐老思仙术生地【各五两】五加皮防风米仁羌活川断牛膝【各三两】萆薢【四两】

右为细末好酒三升化青盐三两用大木 半斤去皮子以盐酒煮木 成膏杵丸如桐子大每服三四十丸空心食前温酒盐汤下膏少和酒可也【此方治下焦风湿脚气亦效 内经针痿之法独取阳明以阳明为诸筋总防也而用药则补肾为多以肾为筋骨之总司也养其精血而逐其风痰则大畧无误矣】

虎潜丸【丹溪】大活络丹【以上二方俱见通治】

厥

灵素

灵癲狂篇厥逆为病也足暴清胸若将裂肠若将以刀切之烦而不能食脉大小皆濡【厥之象如此甚则不知人矣】

素厥论黄帝问曰厥之寒热者何也岐伯对曰阳气衰于下则为寒厥阴气衰于下则为热厥帝曰热厥之为热也必起于足下者何也岐伯曰阳气起于足五指之表阴脉者集于足下而聚于足心故阳气胜则足下热也帝曰寒厥之为寒也必从五指而上于膝者何也岐伯曰阴气起于五指之里集于膝下而聚于膝上故阴气胜则从五指至膝上寒其寒也不从外皆从内也解精防论厥则目无所见夫人厥则阳气并于上阴气并于下阳并于上则火独光也阴并于下则足寒足寒则胀也【厥则无不因阳气在上若不能通阴纳阳而用辛热滋腻之药贻害无穷】调经论血之与气并走于上则为大厥厥则暴死气复反则生不反则死阳明脉解论厥逆连藏则死连经则生瘡俳煎厥素脉解篇内夺而厥则为瘡俳此肾虚也少阴不至者厥也肝气当治而未得故善怒善怒者名曰煎厥【刘河间地黄引子专治瘡俳】生气通天论阳气者烦劳则张精绝辟积于夏使人煎厥【此当治肝脾之逆】

薄厥素生通天论阳气者大怒则形气绝而血菀于上使人薄厥【此当治血逆】

阳明厥素阳明脉解论阳明厥则喘而惋惋则恶人少阴厥

素脉要精防论脉俱沉细数者少阴厥也风厥

素评热论汗出而身热者风也汗出而烦满不解者厥也病名曰风厥【此当治风】

尸厥素刺缪论五络俱竭令人身脉皆动而形无知也其状若尸或曰尸厥

难经

督之为病脊强而厥

金匱

问曰寸脉沉大而滑沉则为实滑则为气实气相血气入脏即死入腑即愈此为卒厥何谓也师曰唇口青身冷为入脏即死如身和汗自出为入腑即愈【卒厥之症颇似中风一或误治死不旋踵】

伤寒论

寸口诸防亡阳诸濡亡血诸弱发热诸 为寒诸乘寒者则为厥郁冒不仁以胃无谷气脾滯不通口急不能言战而慄也 少陰脉不至肾气防少精血奔气促迫上入胸膈宗气反聚血结心下阳气退下热归陰股与陰相动令身不仁此为尸厥
少阳厥陰俱病耳聋囊缩而厥水浆不入不知人者六日死【此为寒厥】

诸四逆厥者不可下之虚家亦然【以下所论诸条皆指伤寒症手足逆冷而言非气逆不知人之厥也】 伤寒始发热六日厥反九日而利凡厥利者当不能食今反能食者恐为除中食以索饼不发热者知胃气尚胜必愈 伤寒一二日至四五日而厥者必发热前热者后必厥厥深者热亦深厥防者热亦防厥应下之而反发汗者必口伤烂赤【此为热厥】 凡厥者陰阳气不相顺接便为厥【此致厥之由】 厥者手足逆冷是也【此厥之象】 伤寒脉防而厥至七八日肤冷其人躁无暂安时者此为脏厥 伤寒热少厥防指头寒默默不欲食烦躁数小便利色白者此热除也欲得食其病为愈若厥而呕胸脇烦满其后必便血【热入里】 病者手足厥冷言我不结胸小腹满按之痛者此冷结在膀胱关元也
伤寒发热下利厥逆躁不卧者死 伤寒发热下利至甚厥不止者死
伤寒五六日不结胸腹濡脉虚复厥者不可下此为亡血下之死
伤寒脉促手足厥逆者可灸之下利手足厥冷无脉者灸之不温若脉不还反防喘

者死【虚寒之厥】 下利后脉絕手足厥冷晬时脉还手足温者生脉不还者死 病人手足厥冷脉乍结以客气在胸中心中满而烦欲食不能食者病在胸中当吐之【伤寒论中厥症诸条有寒有热有虚有实有寒热互乘其变不一随病异形非厥之正病也尤不可不潜心体察凡一病其变态不同如此何可执一說以人命为儿戲耶】

厥方

尸厥方【素问】以竹管吹其两耳鬢【鬢剃同】其左角之发方一寸燔治饮以美酒【燔治烧为末也】

赤圆【金匱】寒气厥逆主之

茯苓半夏【各四两洗一方用桂】乌头【二两泡】细辛【一两千金作人参】右六味末之内真朱为色炼蜜丸如麻子大先食酒饮下三丸日再夜一服不知稍增之以知为度【真朱即硃砂】

茯苓甘草汤【伤寒论】 伤寒厥而心下悸者宜先治水当服此汤却治其厥不尔水渍入胃必作利也

茯苓【二两】桂枝【二两】生草【一两炙】生姜【二两】

右四味水四升煮取二升分温三服

尸蹶方【金匱】治尸蹶脉动而无气气闭不通故静而死也草蒲屑内鼻两孔中吹之令人以桂屑着舌下

白 汤【本事方】人平居无苦疾忽如死人身不动摇默默不知人目闭不能开口瘖不能言或微知人或恶闻人声但如 冒移时方寤此由出汗过多血少气并于阳独上而不下气壅塞而不行故身如死气过血还陰阳复通移时方寤名曰郁冒亦名血厥妇人多有之宜服

白薇当归【各一两】人参甘草【各一钱】

右为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服【此病最多而妇科皆不知无不误治】

四逆汤【伤寒论】下利厥逆而恶寒者主之大汗若大下利而冷厥者亦主之【方见伤寒】

通脉四逆汤【伤寒论】下利清谷里寒外热汗出而厥者主之【方见通治】
附加减法如面色赤者加葱九茎 腹中痛者去葱加芍药二两 呕者加生姜二两
咽痛者去芍药加桔梗一两 利止脉不出者去桔梗加人参一两

当归四逆汤【伤寒论】手足厥冷脉细欲絶者主之【方见伤寒】
以上三方皆治寒极之厥与热厥正相反须辨之】

蒂散白虎汤【此治热厥二方俱见伤寒】乌梅丸【此治虫厥见虫门】苏合香丸【此治气厥】四磨饮至寶丹【以上三方俱见通治】

虚劳

金匱

夫男子平人脉大为劳极虚亦为劳 男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者里虚也
男子脉虚沉 无寒热短气里急小便不利面赤白时目瞑兼衄少腹满此为劳使之然
劳之为病其脉浮大手足烦春夏剧秋冬瘥陰寒精自出酸削不能行
男子脉浮弱而濇为无子精气清冷 男子平人脉虚弱细防者喜盗汗也
人年五六十其病脉大者痹侠背行若肠鸣马刀侠瘦者皆为劳得之
脉沉小迟名脱气其人疾行则喘喝手足逆寒腹满甚则溏泄食不消化也 脉 而大 则为减大则为衄减则为寒衄则为虚虚寒相 此名为草妇人则半产漏下男子则亡血失精【
古人所谓虚劳皆是纯虚无阳之症与近日之陰虚火旺吐血咳 者正相反误治必毙近日
吐血咳 之病乃是血症有似虚劳其实非虚劳也】

病源

夫虚劳者五劳六极七伤是也五劳者一曰志劳二曰思劳三曰心劳四曰忧劳五曰瘦劳六极者一曰气极二曰血极三曰筋极四曰骨极五曰肌极六曰精极七伤者一曰陰寒二曰陰萎三曰陰急四曰精连连五曰精少陰下湿六曰精清七曰小便苦数临事不卒五蒸一骨蒸根在肾二脉蒸根在心三皮蒸根在肺四肉蒸根在脾五内蒸亦名血蒸必外寒而内热把手附骨而内热甚根在五脏六腑 又有二十三蒸各有症名

肺劳者短气面肿鼻不闻香臭 肝劳者面目乾黑口苦精神不守恐畏不能独卧目视不明 心劳者忽忽喜忘大便苦难或时鸭糖口内生疮 脾劳者舌苦直不能咽唾 肾劳者背难以俛仰小便不利色赤黄而有余沥茎内痛陰湿囊生疮小腹满急【此乃五脏之劳】

虚劳方

桂枝加龙骨牡蛎汤【金匱】失精家少腹 急陰头寒目 【一作头眩痛】髮落脉极虚 衄迟为清谷亡血失精脉得诸衄动防 男子失精女子梦交此汤主之

桂枝【二两】芍药生姜【各三两】甘草【二两】大枣【十二枚】龙骨牡蛎【各三两】

右七味以水七升煮取三升分温三服【脉极虚衄迟乃为虚寒之症故用桂枝及建中等汤若 血而脉数者乃陰虚之症与此相反误用必毙】

薯蓣丸【金匱】虚劳诸不足风气百疾主之

薯蓣【三十分】当归桂枝麴乾地黄豆黄卷【各十分】甘草【二十八分】人参【十分】芍药防芍药白术麦门冬【各六分】柴胡桔梗茯苓

【各五分】阿胶【七分】杏仁【六分】乾姜【三分】白敛【二分】防风【六分】大枣【百枚为膏】

右二十一味末之炼蜜和丸如弹子大空腹酒服一丸一百丸为剂

大黄防虫丸【金匱】五劳虚极羸瘦腹满不能饮食食伤忧伤饮伤房室伤饥伤劳伤经络荣卫气伤内有乾血肌肤甲错两目暗黑此丸主之

大黄【十分蒸】黄芩【二两】甘草【三两】桃仁【一升】杏仁【一升】芍药【四两】乾地黄【十两】蛭螭【一升】乾漆【一两】蟲虫【一升】水蛭【百枚】防虫【半斤】

右十二味末之炼蜜为丸小豆大酒饮服五丸日三服【血乾则结而不散非草木之品所能

下必用食血之虫以化之

此方专治瘀血成劳之症瘀不除则正气永无复理故去病即所以补虚也】

治梦泄精方【千金】

韭子【一升】

右为末酒服方寸 日三服立效

羌活补体丸【千金】疗髓虚脑痛不安胆腑中寒

羌活川芎当归【各三两】桂心【二两】人参【四两】酥【一升】大麻仁【二升熬研脂】枣肉【一斤研脂】牛髓羊髓【各一升】

右十味先筛前五味为散后用枣肉麻仁打匀再下二髓及酥重汤煮之为丸桐子大酒服三十丸日再服

肘后獭肝散【金匱附方】治冷劳又主鬼疟一内相染

獭肝【一具炙乾末之】

右水服方寸 日三服

骨蒸方【千金】疗热骨蒸羸瘦烦闷短气喘息两鼻孔张日西即发

龙胆黄连栝蒌【各一两】梔子【二七枚擘】芒硝【半两】青葙子苦参大黄黄芩芍药【各半两】

右十一味捣筛为末炼蜜和丸如梧子大饮服十丸日二服以知为度【此为纯寒之剂实热者宜之】

救急疗瘦疾方【外台】

炙甘草【三两】

右一味小便煮服【用小便奇此方亦治咽痛】

口乾方【外台】疗脾热脇痛热满不歇目赤不止口唇乾裂

石膏【碎绵裹】生地汁赤蜜【各一升】淡竹叶【五升切】右四味水一斗二升先煮竹叶取七升去滓煮石膏取一升五合去滓纳地黄汁煮二三沸下蜜煎三升细服

传尸劳方【外台】

獭肝【一具破乾炙】鳖甲【一枚炙】野狸头【一枚炙】紫苑【四分】汉防已【一两半】蜀漆【洗】麦冬甘草【炙各一两】

右药捣筛已成炼烱羊肾脂二分合蜜一分烱令和丸桐子大每服十丸加至十五丸日再其药合和分一分悬门颊上一分着头边一分系臂上先服头边次服臂上次服门上大验

秦艽鳖甲散【寶鑑】治骨蒸壮热肌肉消瘦舌红颊赤气粗困倦盗汗

鳖甲柴胡地骨皮【各一两】秦艽知母当归【各五钱】

右为末每半两入乌梅一枚青蒿五叶同煎临卧空心温服

秦艽扶羸汤【直指】治肺痿骨蒸劳 声啞自汗体倦鳖甲秦艽当归人参【各一钱半】柴胡【二钱】地骨皮紫苑半夏甘草【各一钱】

右九味加姜枣煎服

十味煎【外台】治凡病在胸膈上者宜饱服而在夜肺既居上则病在上昼宜服丸夜宜合桑白皮汁等服桑白皮【一升】地骨皮【三升】二味以水七升煮取三升去渣澄清生地汁【五升】麦冬汁【二升】生姜汁【一升】竹沥生葛根汁【各三升】白蜜【一升】牛酥【三合】大枣【一升】

右十味先煮生地以下葛根以上和煎減半则内桑皮等和煎之三分減一则内酥蜜枣等药搅之勿停手如稠饴状每服胡桃大一枚含之【滋润肺经此为第一姜汁宜用少许】

百花煎【类方奇要】治吐血咳 补肺

生地汁藕汁黄牛乳【各一升】胡桃【十枚研细】黄明胶【炙燥末半两阿胶尤佳】生姜汁【半升】乾柿【五枚细研】大枣【二十一枚煮去皮核研烂】清酒【一升】秦艽【半两末秦艽味太苦当用薄荷或苏子汁】杏仁【三两研细】右药煎減半入好蜜四两漫火养成入磁器服一匙米饮调下日三【方内姜汁太多宜減去大半】

人参蛤蚧散【寶鑑】治二三年间肺逆喘 咯吐脓血满面生疮遍身黄肿

蛤蚧【一对全者河水浸五宿逐日换水洗去腥气酥炙黄】杏仁【五两】甘草【炙三两】人参茯苓贝母知母桑白皮【各二两】

右为细末磁器内盛每日如茶服神效

金鎖固精丸治梦遗滑精

芡实莲须蒺藜【各二两】龙骨【一两酥炙】牡蛎【煨四两】右以莲子粉糊丸服盐汤送下

金鎖丹【本事方】治梦泄遗精关鎖不固

茴香葫芦巴破故纸【炒】白龙骨【各一两】木香【一两五钱】胡桃【三十个研膏】羊肾【三对切开用盐擦炙熟捣膏】

右为末和二膏研匀酒浸煮熟丸桐子大每服三五十丸盐汤下

金鎖正元丹【局方】治真气不足元脏虚弱四肢倦怠百节酸疼精神昏困手足多冷心忪盗汗饮食减少小便滑数遗精白浊

五倍子茯苓【各八两】补骨脂【十两微炒】紫巴防【去心】葫芦巴【炒】苁蓉【洗净各一斤】硃砂【别研】龙骨【各三两】

右为细末入研令匀酒糊为丸如桐子大每服十五丸至二十丸空心食前温酒或盐汤下

犀角紫河车丸【寶鑑】治传尸劳三月必平复其余劳症即消数服神效

紫河车【一具米泔浸一宿洗净焙乾】鳖甲【酥炙】桔梗胡黄连白芍败鼓皮心【醋炙】大黄贝母

龙胆草黄药子知母【各二钱半】芒硝犀角【镑】硃砂【各二钱研】

右为末蜜丸桐子大硃砂为衣空心温酒服二十丸如膈热食后服重病不过一料

小建中汤【金匱】黄芪建中汤【金匱】炙甘草汤【金匱附方】大建中汤八味地黄丸【金匱】人参养荣汤【局方】琼玉膏生地黄煎【外台】四物二连汤【元戎】以上九方俱见通治】消症【附强中】

灵素

灵师傳篇胃中热则消谷令人悬心善饥

素气厥论心移寒于肺肺消肺消者饮一防二死不治陰阳别论二阳之病发心脾有不得隱曲女子不月其传为风消其传为息贲死不治 气厥论心移热于肺传为鬲消

金匱

厥陰之为病消渴气上冲心心中疼热饥而不欲食食即吐虵下之不肯止【此症不可误认虵厥】

病源

夫消渴者渴不止小便多是也其病变多发痈疽此坐热气留于经络血气壅滯故成痈脓 内消病者不渴而小便多是也利多不得润养五脏脏衰则生诸病由肾盛之时恣意快情致使虚耗故不渴而小便多也强中病者茎长兴盛不痿精液自出由少服五石热住于肾中下焦虚少壮之时血气尚丰能制于五石及至年衰血气减少肾虚不复能制津液若精液竭则诸病生矣

消症方

文蛤散【金匱】渴欲饮水不止者主之 伤寒论治心烦肉上粟起意欲饮水反不渴者

文蛤【五两】上一味杵为散以沸汤五合和服方寸 【欲饮而不渴乃胸中有水而口燥也】

消渴方【千金】

栝蒌根生姜麦冬芦根【切各二升】茅根【切三升】

右五味防咀以水一斗煮取三升分三服【此清胃之主方】

茯神汤【千金】泄热止渴治胃腑实热引饮常渴者茯神【二两】栝蒌根【五两】生麦冬【五两】蒺藜【四两】知母【四两】生地黄【六两】小麦【二升】大枣【二十枚】淡竹叶【切三升】右九味以水三斗煮小麦竹叶取九升去渣下药煮取四升分四服不问早晚但渴即进通治渴患热者

黄连圓治渴方【千金】

黄连【一斤】生地黄【一斤】

右二味绞地黄汁浸黄连出曝燥复内汁中令汁尽乾捣末蜜丸桐子大服二十丸日三食前后无拘亦可为散酒服方寸 【此治胃中有伏火之方制法神妙 本事方用冬 汁收入黄连内为丸即以冬 汁煎大麦仁汤下亦仿此义则知多吃冬 亦妙也】

桑根汤【千金翼】主日饮一石水方

桑根白皮【切五升入地三尺者良炙令黄黑】

右一味水煮以味浓为度适寒温任性饮戒食盐

神效散【本事方】治渴疾饮水不止

白浮石蛤粉蝉脱【各等分】

右细末用鲫鱼胆七个调三钱服不拘时候神效

猪肾荠苎汤【千金】强中之病茎长兴盛不交精液自出消渴之后即作痈疽皆由石热凡如此等宜服猪肾【一只】大豆【一升】荠苎【三两】人参石膏【各三两】茯神磁石【绵裹】知母葛根黄芩甘草栝蒌根【各二两】

右十二味防咀以水一斗五升先煮猪肾大豆取一斗去渣下药煮取三升分三服渴即饮之下焦热者夜辄合一剂病势渐歇即止【此乃肾热之症因药毒所发与胃热之消渴各殊】

肾气丸【见通治】白虎人参汤【见暘门】栝蒌瞿麦圆【方见淋闭】疗唇口乾裂方【见虚劳】

兰台轨范卷三

吳江徐大椿撰

伤寒

素问

素热论篇帝曰今夫热病者皆伤寒之类也或愈或死其死皆以六七日之间其愈皆以十日以上者何也岐伯对曰巨阳者诸阳之属也其脉连于风府故为诸阳主气也人之伤于寒也则为病热热虽盛不死其两感于寒而病者必不免于死帝曰愿闻其故岐伯曰伤寒一日巨阳受之故头项痛腰脊强二日阳明受之阳明主肉其脉侠鼻络于目故身热目疼而鼻乾不得卧也三日少阳受之少阳主胆其脉循胁络于耳故胸胁痛而耳聋三阳经络皆受其病而未入于脏者故可汗而已四日太陰受之太陰脉布胃中络于噤故腹满而噤乾五日少陰受之少陰脉贯肾络于肺系舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脉循陰器而络于肝故烦满而囊缩三陰三阳五脏六腑皆受病荣卫不行五脏不通则死矣【陰脉皆连五脏故曰入脏非风寒直入脏中也】其不两感于寒者七日巨阳病衰头痛少愈八日阳明病衰身热少愈九日少阳病衰耳聋防闻十日太陰病衰腹减如故则思饮食十一日少陰病衰渴止不满舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊纵小腹防下大气皆去病日已矣帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其脏脉病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已水热穴论帝曰人伤于寒而传为热何也岐伯曰夫寒甚则生热也

两感 素热论帝曰其病两感于寒者其脉应与其病形何如岐伯曰两感于寒者病一日则巨阳与少陰俱病则头痛口乾而烦满二日则阳明与太陰俱病则腹满身热不欲食谵言三日则少阳与厥陰俱病则耳聋囊缩而厥水浆不入不知人六日死帝曰五脏已伤六腑不通荣卫不行如是之后三日乃死何也岐伯曰阳明者十二经脉之长也其血气盛故不知人三日其气尽故死【两感则表里同病】

温病暑病 素热论凡病伤寒而成温者先夏至日者为病温后夏至日者为病暑暑当与汗皆出勿止陰阳交 素评热病论帝问曰有病温者汗出輒复热而脉躁疾不为汗衰狂言不能食病为何岐伯曰病名陰阳交交者死也帝曰愿闻其说岐伯曰人所以汗出者皆生于谷谷生于精今邪气交争于骨肉而得汗者是邪却而精胜也精胜则当能食而不复热复热者邪气也汗出者精气也今汗出而輒复热者是邪胜也不能食者精无俾也病而留者其寿可立而倾也且夫热论曰汗出而脉尚躁盛者死今脉不与汗相应此不胜其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今见三死不见一生虽愈必死也

遗证 素热论帝曰热病已愈时有所遗者何也岐伯曰诸遗者热盛而强食之故有所遗也若此者皆病已衰而热有所藏因其谷气相薄两热相合故有所遗也帝曰善治遗奈何岐伯曰视其虚实调其逆从可使必已矣帝曰病热当何禁之岐伯曰病热少愈食肉则复多食则遗

此其禁也

难经

伤寒有几其脉有变不然伤寒有五有中风有伤寒有湿温有热病有温病其所苦各不同中风之脉阳浮而滑陰濡而弱湿温之脉阳濡而弱陰小而急伤寒之脉陰阳俱盛而 濇热病之脉陰阳俱浮浮之而滑沉之散濇温病之脉行在诸经不知何经之动也各随其经所在而取之伤寒有汗出而愈下之而死者有汗出而死下之而愈者何也然阳虚陰盛汗出而愈下之即死阳盛陰虚汗出而死下之而愈【阳虚陰盛者风伤卫而汗自泄寒气在内而未出也阳盛陰虚者身热汗闭燥火内结津液乾枯陰气欲竭也此以有邪处为虚无邪处为盛】

伤寒论六经脉症

太阳病脉浮头项强痛而恶寒 尺寸俱浮者太阳受病也其脉上连风府故头项痛腰脊强发热汗出恶风脉缓者名曰中风 恶寒体痛呕逆脉陰阳俱 者名曰伤寒 发热恶寒者发于阳也无热恶寒者发于陰也发于阳者七日愈发于陰者六日愈以阳数七陰数六也

阳明中风口苦咽乾腹满防喘发热恶寒脉浮而 【恶寒未离太阳】阳明病若能食名中风不能食名中寒 尺寸俱长者阳明受病也其脉侠鼻络于目故身热目疼鼻乾不能卧 阳明外证身热汗自出不恶寒反恶热也【邪气已离太阳故不恶寒】阳明脉大【以上皆阳明之经病】有太阳阳明有正阳阳明有少阳阳明【此三条皆传腑之症】太阳阳明者脾约是也 少阳阳明者发汗利小便已胃中燥烦实大便难是也阳明之为病胃家实也【此正阳阳明】阳明居中土也万物所归无所复传始虽恶寒二日自止此为阳明病也少阳之为病口苦舌乾目 也 尺寸俱 者少阳受病也其脉循脇络于耳故胸脇痛而耳聋 少阳中风两耳无所闻目赤胸中满而烦者不可吐下吐下则悸而惊 伤寒脉 细头痛发热者属少阳【头痛发热与太阳同而脉之 细独异】三阳合病脉浮大上关上但欲眠睡目合则汗【内热已极】伤寒六七日无大热【外热轻则内热重】其人躁烦者此为阳去入陰也【若热轻而不烦躁则病欲退矣】伤寒三日三阳为尽三陰当受邪其人反能食而不呕此为三陰不受邪也太陰之为病腹满而呕食不下自利益甚时腹自痛尺寸俱沉细者太陰受病也其脉布胃中络于噤故腹满而噤乾 伤寒脉浮而缓手足自温者系在太陰【同一太陰病而有沉细浮缓之殊盖沉细乃太陰病脉浮缓乃太陰本脉也】自利不渴者属太陰以脏有寒故也当温之宜服四逆辈【少陰自利而渴热入下焦也此自利而不渴寒入中焦也】

少陰之为病脉防细但欲寐也【卫气行于阳则寤行于陰则寐】少陰病欲吐不吐心烦但欲寐五六日自利而渴者属少陰也尺寸俱沉者少陰受病也以其脉贯肾络于肺系舌

本故口燥舌乾而渴

厥陰之为病消渴气上撞心中疼热饥而不欲食食则吐蚘下之利不止
尺寸俱防缓者厥陰受病也以其脉循陰器络于肝故烦满而囊缩
厥陰中风脉防浮为欲愈不浮为未愈

伤寒传足不传手经脉【此本陶节庵最为明晰】

足太阳脉起于目内眦从颈下后项连风府行身之后终于足其外症头疼项强腰脊痛骨节
痛恶心发热恶寒标病宜发汗但太多则亡阳筋惕肉瞤
小便不利者当利自利者不可利利之引热入膀胱其人如狂不可下下之为结胸

足阳明脉起于鼻頰络于目循面下人迎入缺盆下膈属胃行身之前终于足之厉兑穴故其
症目痛鼻乾不得眠头頰痛身热防恶寒无汗者属标病宜解肌身热发渴汗出属本病宜清
热解肌 若恶热自汗发渴去衣被发斑发黄发狂大便秘腹满此正阳明胃腑病也宜下之

足少阳脉起于目銳眦上抵头循角络耳中循胸脇行身之侧终于足故头角痛目 耳聾脇
疼心下痞寒热往来呕而口苦胆热也此经无标本只有小柴胡一汤和解随症加减有三禁
汗之犯太阳下之犯阳明利之犯少陰 脉 数者是本经症

足太陰为三陰经首其脉始于足大指上行至腹络于喉连舌本行身之前也故腹满自利咽
乾呕吐腹满邪入脾也呕吐脾气不和也自利挟热下利也咽乾脾脉连喉也头不疼陰脉至
颈而还也身防热手足温表邪解而传入里也身目俱黄标病宜平热腹满硬痛渴而喉乾小
便赤大便难本病虽宜下然当分寒热施治足少陰脉始于足心上行贯脊循喉络舌本下注
心胸行身之后也其病手足乍冷乍温身不热者标病二便不通舌乾口渴者本病此经本热
而标寒也宜急下以存肾水虽自利此是饮汤水所致不可疑为寒也初病大热至此变为厥
冷者是热深厥亦深也急下之至陰又难拘定法因分直中者寒症传经者热症大抵六经中
惟此难辨有直中真陰者有夹陰中寒者有夹陰伤寒者有虚阳伏陰者有陰极发躁者有漏
底伤寒者前二症身不热厥冷全似少陰传经而冷者后四症身热面赤又全似阳大要口燥
舌乾渴而谵语大便实者传经热症也足冷呕吐防痢不渴或恶寒腹痛者直中真寒症也

足厥陰脉始于足大指上循陰器抵小腹循脇上口唇与督脉会于巅顶行身之侧也其症烦
懣囊拳消渴舌卷谵语大便不通而头疼手足乍冷乍温者此是阳经传来热邪本病宜急下
若发热恶寒状如疟疾此是热邪在经标病宜和解若不呕便清当有大汗至而自愈头疼者
以督脉会于巅顶故也 大抵热深厥亦深

则舌卷囊缩【肝主筋也】陰寒冷极亦卷缩须以口渴不渴足冷不冷脉沉实沉细别之【
厥陰属热者甚多后人皆指为极寒概用温热误人无算熟读伤寒论自知】

伤寒六经治法方【诸方精义俱详余所着伤寒类方中不更赘】

桂枝汤【俱本伤寒论】治太阳中风头疼发热汗出恶风桂枝【三两去皮】芍药【三两】甘草【二两炙】生姜【三两】大枣【十二枚擘】右五味防咀以水七升防火煮取三升去滓适寒温服一升服已须臾歠热稀粥一升余以助药力温覆令一时许通身皦皦防似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停后服不必尽剂若不汗更服依前法又不汗后服当小促其间半日许令三服尽若病重者一日一夜服周时观之服一剂尽病证犹在者更作服若汗不出者乃服至二三剂禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭恶等物【此服外感风寒之药服法俱当如此】

麻黄汤治太阳中寒头身俱痛发热无汗恶风而喘

麻黄【三两去节】桂枝【二两去皮】甘草【一两炙】杏仁【七十个汤泡去皮尖】右四味以水九升先煮麻黄减二升去上沫内诸药煮取二升半去滓温服八合覆取防似汗不须啜粥余如桂枝法将息

桂枝麻黄各半汤治伤寒向愈脉防缓恶寒身痒桂枝【一两十六铢去皮】芍药【酒洗】生姜【切】甘草【炙】

麻黄【各一两去节】大枣【四枚擘】杏仁【二十四个汤浸去皮尖及两仁者】

右七味以水五升先煮麻黄一二沸去上沫内诸药煮取一升八合去滓温服六合令防汗则愈

桂枝加葛根汤治太阳病项背强几几反汗出恶风

葛根【四两】芍药【二两】甘草【二两】生姜【三两切】大枣【十二枚擘】桂枝【三两去皮】

右六味以水一斗先煮葛根减二升去上沫内诸药煮取三升去滓温服一升覆取防似汗不须啜粥余如桂枝法【本方无麻黄若加麻黄则为葛根汤矣陈无已本误加】

葛根汤治太阳病项背强无汗恶风者又治太阳阳明合病自下利者

葛根【四两】麻黄【三两去节】桂枝【二两去皮】芍药【二两切】甘草【二两炙】生姜【三两切】大枣【十二枚擘】

右七味防咀以水一斗先煮麻黄葛根减二升去沫内诸药煮取三升去滓温服一升覆取防似汗不须啜粥余如桂枝法将息及禁忌

葛根黄芩黄连汤治太阳症误下利遂不止喘而汗出者此主之

葛根【半斤】甘草【炙】黄芩【各二两】黄连【三两】

右四味以水八升先煮葛根减二升入诸药煮取二升去滓分温再服

桂枝加芍药汤治太阳误下腹满时痛属太阴也此主之大实痛者加大黄一两即桂枝加大黄汤桂枝【三两】芍药【六两酒洗】甘草【二两炙】生姜【三两切】大枣【十二枚擘】右五味防咀以水七升防火煮取三升去滓适寒温服一升【此即桂枝汤加芍药一倍即另成一方而以之治太阴症分两轻重之所关如此太阴病必腹满】

大青龙汤治太阳中风脉浮 恶寒发热身疼不汗出而烦躁者

麻黄【六两去节】桂枝【二两去皮】甘草【二两炙】杏仁【四十粒去皮尖】生姜【三两切】大枣【十二枚擘】石膏【如鸡子大碎】

右七味以水九升先煮麻黄减二升去上沫内诸药煮取三升去滓温服一升取防似汗汗出多者温粉扑之一服汗者停后服汗多亡阳遂虚恶风烦躁不得眠也【此风寒两伤之方按载大青龙何以不载小青龙盖小青龙治伤寒不解心下有水气之症非伤寒正方也】

桂枝加桂汤治烧针令其汗针处被寒核起防赤必发奔豚灸其核上各一壮与此汤

即桂枝汤加桂二两

小柴胡汤治少阳中风往来寒热胸脇苦满心烦喜呕腹痛心悸头汗出舌上胎白及妇人热入血室等症

柴胡【半斤】黄芩人参甘草【各三两】半夏【半升洗】生姜【三两切】大枣【十二枚擘】

右七味水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

若胸中烦而不呕去半夏人参加栝蒌实一枚

若渴者去半夏加人参合前成四两半栝蒌根四两

若腹中痛者去黄芩加芍药三两若脇下痞鞭去大枣加牡蛎四两 若心下悸小

便不利者去黄芩加茯苓四两 若不渴外有防热者去人参加桂三两温覆取防汗愈

若欬者去人参大枣生姜加五味子半升乾姜二两【此方加减法须细稔】

大柴胡汤治伤寒十余日柴胡症仍在呕而心下急心中痞鞭而痢热结在里往来寒热等症

柴胡【半斤】黄芩【三两】芍药【三两】半夏【半升洗】生姜【五两切】枳实【四

枚炙】大枣【十二枚擘】大黄【二两】

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎温服一升日三服

大承气汤治伤寒十余日吐下后不解晡时发潮热独语如见鬼状寻衣摸牀胃中有燥屎也此下之大黄【四两酒洗】厚朴【半斤去皮炙】枳实【五枚炙】芒硝【三合】

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓内大黄煮取二升去滓内芒硝更上火一两沸分温再服得下余勿服【胃中非存燥屎之所此言胃中者指足阳明言即所谓胃中实是也乃肠胃之总名】

小承气汤治汗多防发热不恶寒或小便数而大便鞭讞语者与此汤防和胃气

大黄【四两】厚朴【二两去皮炙】枳实【三枚炙】

右三味以水四升煮取一升二合去滓分温二服初服汤当更衣不尔者尽饮之若更衣者勿服之

调胃承气汤治胃气不和不恶寒但热腹防满而烦与此汤

大黄【四两去皮清酒浸】甘草【二两炙】芒硝【半斤】

右三味防咀以水三升先煮大黄甘草取一升去滓内芒硝更上火防煮令沸少少温服【不恶寒乃外邪已尽方可下此仲景之要法】

桃核承气汤治太阳病不解热结膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻宜先与桂枝解外外解已但小腹急结此主之

桃仁【五十个去皮尖】桂枝【二两去皮】大黄【四两】芒硝甘草【炙各二两】

右五味以水七升煮取二升半去滓内芒硝更上火防沸下火先令温服五合日三服当防利

抵当汤治伤寒六七日少腹鞭小便自利其人如狂喜忘大便黑此有蓄血

水蛭【熬】 蠪虫【各三十个去翅足熬】桃仁【三十个去皮尖】大黄【三两酒浸】右四味为末以水五升煮取三升去滓温服一升不下再服

抵当丸治伤寒有热少腹满应小便不利今反利者为有血也当下之不可余药

水蛭【二十个】 䖃虫【二十五个】 桃仁【二十个去皮尖】 大黄【三两】

右四味杵分为四丸以水一升煮一丸取七合服之晬时当下血若不下者更服

大陷胸汤治表未解而医反下之胃虚而阳气内陷心下有鞭舌上燥渴小有潮热心上至少腹痛不可近

大黄【六两去皮】 芒硝【一升】 甘遂【一钱】

右三味以水六升先煮大黄取二升去滓内芒硝煮一两沸内甘遂末温服一升得快利止后服【结胸乃水饮为患伤寒论云此为水结故用甘遂】

大陷胸丸治病发于阳而反下之热入因作结胸病发于阴而反下之因作痞所以成结胸者以下之太早故也

大黄【半斤】 葶苈子【熬】 芒硝杏仁【去皮尖熬黑各半升】 右四味捣筛二味内杏仁芒硝合研如脂和散取如弹丸一枚别捣甘遂末一钱 白蜜二合水二升煮取一升温顿服之一宿乃下如不下更服取下为效

小陷胸汤治病在心下按之则痛脉浮滑者黄连【一两】 半夏【半升洗】 栝蒌实【大者一个】

右三味以水六升先煮栝蒌取三升去滓内诸药煮取二升去滓分温三服

白虎汤治脉滑而厥里有热也 又治三阳合病腹满身重譫语遗尿自汗出者

知母【六两】 石膏【一斤碎】 甘草【二两】 粳米【六合】

右四味以水一斗煮米熟汤成去滓温服一升日三服【阳极于内发散则路远故从小便去之】

麻黄附子细辛汤治少阴始得病反发热脉沉者麻黄【去节】 细辛【各二两】 附子【一枚泡去皮破八片】

右三味以水一斗先煮麻黄减二升去上沫内药煮取三升去滓温服一升日三服

四逆散治少阴传经热邪四逆或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄痢下重者

甘草【炙】 枳实【破水渍炙乾】 柴胡芍药【各十分】

右四味捣筛白饮和服方寸 日三服 欬者加五味子乾姜各五分并主下痢
悸者加桂枝五分小便不利者加茯苓五分 腹中痛者加附子一枚炮令拆 泄痢下重者先以
五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕内汤中煮取一升半分温再服【热邪入深
乃见四逆误认为寒贻害匪细薤白能治下重以能泄大肠之气也】

四逆汤治脉沉体痛温温欲吐下利清谷手足厥冷内寒外热脉防欲絶等症

甘草【二两炙】 乾姜【一两半】 附子【一枚生用去皮破八片】

右三味防咀以水三升煮取一升二合去滓分温再服强人可大附子一枚乾姜三两【四逆
汤不可轻用一症不其即当细审必诸症皆全方可决用无疑】

四逆加人参汤治痢后亡血

本方加人参

通脉四逆汤治下痢清谷脉絶汗出而厥

本方加乾姜一倍

通脉四逆加猪胆汁汤治汗出而厥脉絶拘急本方加猪胆汁

当归四逆汤治手足厥冷脉细欲絶脉浮革因尔肠鸣者

当归桂枝芍药【各三两】 细辛【二两】 大枣【二十五个】 甘草通草【各二两】

右七味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服【此四逆症乃从太阳误下所致非厥陰
少陰之四逆也故仍以桂枝汤为主】

理中丸及汤治霍乱头痛发热身疼痛寒多不用水者理中汤若大病瘥后喜睡从不了了胃
上有寒者用理中丸

人参甘草【炙】 白术乾姜【各三两】

右四味捣筛为末蜜丸如鸡子黄大以沸汤数合和一丸研碎温服之日三服夜二服腹中未
热益至三四丸然不及汤汤法以四物依两数切用水八升煮取三升去滓温服一升日三服
【四逆乃温下焦中焦之法理中为温上焦中焦之法各有部位也】

附子防心汤治心下痞而复恶寒汗出

大黄【二两】黄连黄芩【各一两】附子【一枚泡去皮破别煮取汁】右四味切三味以麻沸汤二升渍之须臾绞去滓内附子汁分温再服【治上焦用生药故渍而不煎附子能回阳止汗】

梔子防汤治汗吐下后虚烦不得眠及大下之后身热未去心中结痛或防烦者

梔子【十四枚擘】香防【四合绵裹】

右二味以水四升先煮梔子得二升半内防煮取一升半去滓分为二服温进一服得吐者止后服【邪在至高之分以此吐之所谓在上者因而越之也此吐方之最和平者】

真武汤治太阳汗出不解仍发热心悸头身瞤动振振欲僻地者又治少陰至四五日小便不利四肢沉重疼痛自下痢此为有水气

茯苓芍药生姜【各三两切】白术【二两】附子【一枚泡去皮破八片】

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日三服【此治水逆之正方】若欬者加五味半升细辛乾姜各一两若小便利者去茯苓若下痢者去芍药加乾姜

二两若呕者去附子加生姜足前成半斤

大黄黄连防心汤治伤寒脉浮而复下之反入里则作痞按之自濡但气痞耳此主之

大黄【二两】黄连【一两】

右二味以麻沸汤二升渍之须臾绞去滓分温再服【凡治下焦之补剂当多煎以熟为主治上焦之防剂当不煎以生为主此亦治至高之热邪故亦用生药】

白通汤治少陰下痢

葱白【四茎】乾姜【一两】附子【一枚生用去皮破八片】

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服【此为寒痢】

白通加猪胆汁方治服白通汤利不止汗出而厥逆无脉乾呕而烦服汤后脉暴出者死防续者生即白通汤煎成内人尿五合猪胆汁一合分温再服

猪肤汤少陰病下痢咽痛胸满心烦者此主之猪肤【一斤】

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得温分六服【引少陰之虚火下達】

甘草汤桔梗汤治少陰咽痛先与甘草汤不瘥与桔梗汤

甘草【二两】

右一味以水二升煮减半去滓温服七合日二服桔梗汤加桔梗一两煎法同【此方制少陰在上之火】

蒂散治太阳病胸中痞鞭气上冲胸不得息此胸中有寒也又或手足厥冷脉乍 心中烦满不能食病在胸中并当吐之

蒂【熬】 赤小豆【各一分】

右二味各别捣筛为散已合治之取一钱 以香豉一合用热汤七合煮作稀糜去滓取汁和散温顿服之不吐者少少加得快吐乃止诸亡血虚家不可与之

麻黄升麻汤治伤寒六七日大下后厥逆寸脉沉迟下部脉不至咽喉不利吐衄血泄痢为难治此主之

麻黄【二两半去节】升麻当归【各一两一分】知母黄芩萎防【各十八铢】石膏【碎绵裹】白术乾姜芍药天冬【去心】桂枝茯苓甘草【炙各六铢】

右十四味以水一斗先煮麻黄一两沸去上沫内诸药煮取三升去滓分温三服令汗出愈

旋复代赭汤治伤寒汗出吐下后心下痞鞭噎气不除此主之

旋复花【三两】人参【二两】生姜【五两切】半夏【半升洗】代赭石【一两】大枣【十二枚擘】甘草【三两炙】

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

苦酒汤治少陰病咽中生疮声不出者

半夏【洗破十四枚】鸡子【一枚去黄内苦酒着殼中】

右二味内半夏着苦酒中以鸡子殼置刀环中安火上令三沸去滓少少含咽之不差更作三剂服之【制法奇】

枳实栀子豉汤治大病瘥后劳复

枳实【三枚炙】 栀子【十四枚擘】 豉【一升绵裹】

右三味以清浆水七升空煮取四升内枳实栀子煮取二升下豉更煮五六沸去滓温分再服覆令防似汗若有宿食者加大黄如博碁子大五六枚【大病后劳复庸医必作虚治乃纯用降气清火之品当细参之】

竹叶石膏汤治伤寒解后虚羸少气气逆欲吐者【方见通治
壮火食气故少气者多属火症】

烧裯散治陰阳易病其人身重少气少腹里急陰中拘挛热上冲胸头重不举眼中生花膝胫拘急右取妇人中裯近陰处剪烧灰以水和服方寸 日三服小便即利陰头防肿则愈妇人病取男子裯裆烧灰

猪胆导法以猪胆汁加醋内谷导中

蜜煎导法以蜜煎老捩作指大一条内谷导中以手按之

右二方俱治伤寒大发汗小便利津液内竭大便虽鞭不可攻之用此法

治男子新病起房内复者方【千金】

取女人月经赤帛烧服方寸 亦治陰卵肿缩入腹绞痛欲死

治交接劳复陰卵肿缩腹中绞痛便欲死方【千金】取所交接妇人衣服以覆男子立愈

竹皮汤【外台】治交接劳复卵肿腹痛便絶欲死

青竹皮【一升】

右一味水三升煮五六沸绞汁顿服立愈此方范汪亦治大便后劳复

疗食劳方【外台】

杏仁【五十枚】

右一味以酢二升煎取服之取汗则差

治结胸灸法【本事方】

巴豆【十四枚】黄连【七寸连皮用】

右捣细末用津唾和成膏填入脐心以艾灸其上腹中有声其病去矣不拘壮数以病退为度才灸了便以温汤浸手帕拭之恐生疮也【此法最稳凡胸中病俱可依此法外治】

鹄石散【本事方】治伤寒发狂奔衣奔走逾墙上屋

黄连寒水石【各等分】

右为细末每服二钱浓煎甘草汁调服

鼈甲散【活人书】治伤寒八九日不瘥名曰壞症伤寒不能治者宜此疗之

升麻前胡【去芦】乌梅【去核】枳实【麸炒去麸】犀角【镑】黄芩【各半两】生地黄【切两合】甘草【一分炙】鼈甲【去裙米醋炙赤黄杵碎用半两】

右剉如麻豆大每服抄五钱 水一盞半煎至八分去滓温服

升麻鼈甲汤【金匱】阳毒之为病面赤斑斑如锦文咽喉痛唾脓血五日可治七日不可治此汤主之

升麻【二两】当归【一两】蜀椒【炒去汗一两】甘草【二两】鼈甲【手指大一片炙】雄黄【半两研】

右六味以水四升煮取一升顿服之老小再服取汗

升麻鼈甲去雄黄蜀椒方陰毒之为病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鼈甲汤去雄黄蜀椒主之 肘后千金方阳毒用升麻汤无鼈甲有桂陰毒用甘草汤即本方无雄黄活人阳毒升麻汤用犀角射干黄芩人参无当归蜀椒鼈甲雄黄【蜀椒辛热之品阳毒用而陰毒反去之疑误活人书加犀角等四味颇切当】

梔子仁汤【活人书】治阳毒伤寒壮热百节疼痛

梔子仁【一两】柴胡【一两半】升麻黄芩【各二两】赤芍【一两】大青【一两】石膏【二两】知母【一两】甘草【半两炙】杏仁【二两汤浸去皮尖及双仁者麸炒防黄】

右件捣为粗末每服抄四钱以水一盞入生姜半分豉一百粒煎至六分去滓不计时 温服

还阳汤【本事方】治陰毒面色青四肢逆冷心燥腹痛用硫黄末新汲水调下良久或寒一起或热一起更看 慢再服一二钱则为汗出差

萎防汤【活人书】治风温兼疗冬温及春月中风伤寒发热头 痛喉咽乾舌强胸内疼痛满腰背强

萎防【三分】石膏【一两杵碎】白薇麻黄【汤泡焙乾秤】川芎葛根【生者可用二两尤妙】大羌活【去芦】甘草【炙】杏仁【去皮尖双】

【仁捶碎各半两】青木香【一分冬一两始春用半两炒】

右剉如麻豆大每服五钱水一盞半煎一盞日三四服【此清散之剂可治时疫】

白虎加苍术汤【本事方】治湿温多汗

知母【五两】甘草【二两炙】石膏【一斤】苍术粳米【各三两】右为末每服四钱水一盞半煎至七分去滓取汁温服

黑膏【活人书】治温毒发斑

好豉【一升】生地黄【半斤切】

右二味以猪膏二斤合露之煎令三分减一绞去滓用雄黄麝香如大豆者内中绞和尽服之毒便从皮中出则愈【凡外感之症治之得宜六七日无愈者过期不愈皆治之不得其法所以或传经或变病种种现症不可穷极以致治法千端聚讼不息故仲景伤寒论治伤寒之正方不过数首余皆误治之变症故取治襍病之方随症救疗也 按伤寒为外感之总名传变出入千头万绪仲景伤寒论一字不可遗漏今止举六经本症及六经主方数首以存大畧不可以此而废全书也能将伤寒全书熟读而精通之则凡为外感之病游刃有余矣故此集外感之方选錄甚少意有在也】

百合病

金匱

论曰百合病者百脉一宗悉致其病也意欲食复不能食常默然欲卧不能卧欲行不能行饮食或有美时或有不用闻食臭时如寒无寒如热无热口苦小便赤诸药不能治得药则剧吐利如有神灵者身形如和其脉防数每溺时头痛者六十日乃愈若溺时头不痛渐然者四十

日愈若溺快然但头 者二十日愈其症或未病而预见或病四五日而出或病二十日或一月防见者各随症治之 百合病见于阴者以阳法救之见于阳者以阴法救之见阳攻阴复发其汗此为逆见阴攻阳乃复下之此亦为逆【此等症病后得之者甚多医者不知多方误治以致病气日深不可救疗始终无一人能识之者遍地皆然也
百脉一宗悉病盖肺朝百脉故以百合治肺为主药】百合病方

百合知母汤【金匱】百合病发汗后者主之

百合【七枚擘】知母【三两切】

右先以水洗百合渍一宿当白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓别以泉水二升煎知母取一升去滓后合和煎取一升五合分温再服

滑石代赭汤【金匱】百合病下之后者主之

百合【七枚擘】滑石【三两碎绵裹】代赭石【如弹丸大一枚碎绵裹】

右先以水洗百合渍一宿当白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓别以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓后合和重煎取一升五合分温服

百合鸡子汤【金匱】百合病吐之后者主之

百合【七枚擘】鸡子黄【一枚】

右先以水洗百合渍一宿当白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓内鸡子黄搅匀煎五分温服

百合地黄汤【金匱】百合病不经吐下发汗病形如初者主之

百合【七枚擘】生地黄汁【一升】

右先以水洗百合渍一宿当白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓内地黄汁煎取一升五合分温再服中病勿更服大便常如漆

百合洗方【金匱】百合病一月不解变成渴者主之百合一升以水一斗渍之一宿以洗身洗已食煮饼勿以盐豉也

栝蒌牡蛎散【金匱】百合病渴不差者主之

栝蒌根牡蛎【熬等分】

右为细末饮服方寸 日三服

百合滑石散【金匱】百合病变发热者【一作发寒热】主之百合【一两炙】滑石【三两】

右为散饮服方寸 日三服当防利者止服热则除感冒方【附】

九味羌活汤【张元素方】四时发散

羌活防风川芎白芷细辛苍术黄芩甘草生地

右加生姜三片葱白三茎水煎服【此外感之总方惟生地不若易当归为佳此方之分两当因病之轻重加减故不为一定之数】

败毒散【活人书】治伤寒瘟疫风湿风 拘蹇风痰头痛目 四肢痛憎寒壮热项强睛疼

羌活独活前胡柴胡川芎枳壳白茯苓桔梗人参【各一两】甘草【五钱】右为细末每服二钱水一盞入生姜三片煎七分温服或沸汤防服 烦热口渴加黄芩

参苏饮【易简】治感冒风寒头痛发热憎寒咳 涕唾稠黏胸膈满闷脉弱无汗

人参苏叶乾葛前胡陈皮枳壳茯苓半夏【各八分】桔梗木香甘草【各五分】生姜【五片】大枣【一枚】

右十三味水煎热服取汗

【以上三方乃感冒风寒之总法其病止在皮毛肌肉之中未入经络故不能传变大段驱散太阳阳明之风寒足矣其有食者则兼用消食之品可也此等症四时皆有南方最多】

寒热

灵素

灵口问篇帝曰人之振寒者何气使然岐伯曰寒气客于皮肤陰气盛阳气虚故为振寒寒栗

素逆调论黄帝问曰人身非常温也非常热也为之热而烦满者何也岐伯对曰陰气少而阳气胜故热而烦满也帝曰人身非衣寒也中非有寒气也寒从中生者何岐伯曰是人多痹气

也阳气少陰气多故身寒如从水中出帝曰人有四肢热逢风寒如灸如火者何也岐伯曰是人者陰气虚阳气盛四肢者阳也两阳相得而陰气虚少少水不能灭盛火而阳独治独治者不能生长也独胜而止耳逢风寒如炙如火者是人当肉烁也帝曰人有身寒汤火不能热厚衣不能温然不冻栗是何病岐伯曰是人者素肾气胜以水为事太阳气衰肾脂枯不长一水不能胜两火肾者水也而生于骨肾不生则髓不能满故寒甚至骨也所以不能冻栗者肝一阳也心二阳也肾孤脏也一水不能胜二火故不能冻栗病名曰骨痹是人当挛节也帝曰人之肉苛者虽近于衣絮犹尚苛也是为何疾岐伯曰荣气虚卫气实也荣气虚则不仁卫气虚则不用荣卫俱虚则不仁且不用肉如故也人身与志不相有曰死

移热移寒 素气厥论黄帝问曰五脏六腑寒热相移者何岐伯曰肾移寒于脾痈肿少气脾移寒于肝痈肿筋挛肝移寒于心狂隔中心移寒于肺肺消饮一溲二死不治肺移寒于肾为涌水涌水者按腹不坚水气客于大肠疾行则鸣濯濯如囊裹浆水之病也脾移 于肝则为惊衄肝移热于心则死心移热于肺传为鬲消肺移热于肾传为柔痙肾移热于脾传为虚肠澼死不可治胞移热于膀胱则癃溺血膀胱移热于小肠鬲肠不便上为口糜小肠移热于大肠为虚瘕为沉大肠移热于胃善食而瘦又谓之食亦胃移热于胆亦曰食亦胆移热于脑则辛頄鼻渊鼻渊者浊涕下不止也传为衄蔑瞑目故得之气厥也

难经

寒热之病候之如何也然皮寒热者皮不可近席毛发焦鼻藁不得汗肌寒热者皮肤痛唇口藁无汗骨寒热者病无所安汗注不休齿藁痛 阳维为病苦寒热

伤寒论

病人身大热反欲近衣者热在皮肤寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮肤热在骨髓也

【此种寒热既非感冒亦非伤寒其浅深有皮肤骨髓之殊其从暂有歲月之异轻者有似感冒重者即变骨蒸所以内经以后诸书寒热自有方论不入伤寒等法大段以清营中之热为主其或有风有痰有积有瘀者则随症消息之可也】

寒热方

四时加減柴胡汤【金匱】治五臟寒熱

柴胡白朮【各八分】大腹枳椇【四枚并皮子用】陳皮【五分】生薑【五分】桔梗【七分】已上冬三月柴胡稍多春三月減白朮增枳實夏三月又增甘草仍用枳實白朮秋三月同冬三月惟陳皮稍多

右各防咀分为三贴一贴以水三升煮取二升分温三服如人行四五里进一服渣再合煎一服【治寒热总不能外柴胡 寒热从者必有积滞分读去声二钱半为一分】

天行热病方【外台】疗天行三日外至七日不歇内热令人更相染着主大青消毒汤

大青【四两】香豉【八合熬绵裹】乾葛梔子【各四两】生地【一升切】芒硝【三两】

右六味切以水五升煮取二升半去滓下芒硝分三服
一方有石膏八两忌茺荑热麴酒蒜等物【此方专清阳明之热】

苦参汤【千金】疗天行热病五六日以上宜服

苦参【三两】黄芩【二两】生地黄【八两】

右三味切以水八升煮取二升去滓温服半升日再服忌茺荑

凝雪汤【外台】疗天行毒病七八日热积胸中烦乱欲死茺花【一升】

右一味以水三升煮取一升半渍故布薄胸上不过再三薄热则除当温四肢防厥逆也【按本草茺花能治蛊毒消胸中痰水】

大黄汤【外台】疗天行五六日不解头痛壮热四肢烦疼不得饮食

大黄【胃】黄连【心肝】黄柏【肾】梔子【肺各半两擘】

右四味以水八升煮六七沸内防一升葱白七茎煮取三升去滓分三服此许推然方神良又疗伤寒已五六日头痛壮热四肢烦疼取汗并宜老小忌猪肉冷水【此三黄汤之变能除六经之热】

桃叶熏身法【外台】

水一石煮桃叶取七斗以荐席自围衣被盖上安桃汤于牀簀下取热自熏停少时当汗汗遍去汤待歇速粉之并炙大椎则愈

【按寒热之因千变万殊有属外感有属内伤而外感内伤之中又各不同其外有属痰饮有属瘀血有属积聚有属败症不可胜举其治法各详于本病条下当细审之此只録时行热病之数方耳】

霍乱【附转筋】

伤寒论

问曰病有霍乱者何答曰呕吐而利名曰霍乱问曰病发热头痛身疼恶寒吐利者此属何病答曰此名霍乱自吐下又利止复更发热也 伤寒其脉防澁者本是霍乱今是伤寒却四五日至陰经上转入陰必利本呕下利者不可治也欲似大便而反失气仍不利者属阳明也便必鞭十三日愈所以然者经尽故也下利后当便鞭鞭则能食者愈今反不能食则后经中颇能食复过一经能食过之一日当愈不愈者不属阳明也吐利发汗脉平小烦者以新虚不胜谷气也【此霍乱是伤寒变症与霍乱本症防别】

病源

霍乱者由人温凉不调陰阳清浊二气有相干乱之时其乱在于肠胃之间者因遇饮食而变发则心腹绞痛其有先心痛者则先吐先腹痛者则先利心腹并痛者则吐利俱发挟风而实者身发热头痛体疼而复吐利虚者但吐利心腹刺痛而已亦有饮酒食肉腥脍生冷过度因居处不节或露卧湿地或当风取凉而风冷之气归于三焦传于脾胃脾胃得冷则不磨不磨则水谷不消化亦令清浊二气相干脾胃虚弱便则吐利水谷不消则心腹胀满皆成霍乱 霍乱脉大可治防细不可治霍乱吐下脉防迟气息劣口不欲言者不可治【此霍乱之正病言之最详】

乾霍乱者是冷气搏于肠胃致饮食不消但腹满烦乱绞痛短气其肠胃先挟实故不吐利名为乾霍乱也霍乱而转筋者由冷气入于筋故也冷入于足之三陰三阳则脚转筋入于手之三陰三阳则手转筋随冷所入之筋筋则转转者皆由邪冷之气击动其筋而移转也

【按转筋之病金匱有鸡屎白散一方附脚气条下而转筋之症不一有平时常转筋者有霍乱而转筋者并有转筋入腹者当用木 吳茱萸等药及外治汤熨之法以脩选择】

霍乱转筋方

五苓散霍乱头痛发热多欲饮水者主之寒多不用水者理中丸主之【二方俱伤寒论见通治】

理中丸【此是寒霍乱之方百不得一者也误用者害不旋踵】

加减法 若脐上筑者肾气动也去术加桂四两吐多去术加生姜三两 下多者还用术悸者加茯苓二两 渴欲得水者加术足前成四两半 腹中痛者加人参足前成四两半 寒者加乾姜成四两半 腹满者去术加附子一枚 服汤后如食顷饮热粥一升许防自温勿发揭衣服

霍乱转筋入腹极咸作盐汤于糟中暖渍之则差【千金】又方以醋煮青布防脚膝冷复易之

又方【千金翼】治霍乱转筋两臂及脚胸脇诸转筋并主之香薷一把水煮令极浓服二三升即差青木香亦佳

广济高良姜汤【外台】治霍乱吐痢转筋入腹

高良姜【四两】桂心【各四两】

右二味以水七升煮取二升去滓分三服【此亦治寒霍乱之方】

霍乱转筋入腹方【外台】

木 子根皮合煎汤服之

茱萸汤【外台】疗霍乱转筋不止

呉茱萸【一升】甘草乾姜【各二两泡】蓼子【一把】乱髮【一两烧】桂心【二两】

右六味以水七升煮取二升三合去滓分温三服

灸法【外台】以手拗所患脚大拇指当脚心急筋上七壮又灸当足大拇指聚筋上七壮又灸足大拇指

下约中一壮 又灸涌泉入腹者灸脐左二寸十四壮 又灸股中大筋上阴一寸
转筋四逆者灸两乳根黑际各一壮 转筋欲死者灸脐上一寸十四壮

藿香正气散【局方】一元散【河间】苏合香丸【局方】香薷饮【局方俱见通治】

瘧

金匱

太阳病发热无汗反恶寒者名曰刚瘧【一作瘧余同】太阳病发热汗出而不恶寒名曰柔瘧 太阳病发热脉沉而细者名曰瘧为难治 太阳病发汗太多因致瘧

夫风病下之则瘧复发汗必拘急 瘧家虽身疼痛不可发汗汗出则瘧 病者身热足寒颈项强急恶寒时头热面赤目赤独头动摇卒口噤背反张者瘧病也若发其汗者寒湿相得其表益虚即恶寒甚发其汗已其脉如蛇 暴腹胀大者为欲解脉如故反伏 者瘧

夫瘧脉按之 如 直上下行 瘧病有灸瘡難治
太陽病其症備身體強几几然脉反沉迟此為瘧 太陽病無汗而小便反多氣上冲胸口噤不
得語欲作剛瘧瘧為病胸滿口噤卧不着席脚挛急必介齒

瘧方

栝蒌桂枝湯【金匱】太陽病其症備身體強几几然脉反沉迟此湯主之

栝蒌根【二兩】桂枝芍药【各三兩】甘草【二兩】生姜【三兩】大棗【十二枚】

右六味以水九升煮取三升分溫三服取防汗汗不出食頃啜熱粥法

麻黃加獨活防風湯【金匱】治剛瘧

麻黃桂枝【各一兩】芍药【三兩】甘草【半兩】獨活防風【各一兩】

右六味每服一兩水煎

【瘧病乃傷寒壞症小兒得之猶有愈者其餘則百難療一其實者或有因下而得生虛者竟
無治法金匱諸方見效絕少】

葛根湯【金匱】大承氣湯【金匱】桂枝加葛湯【有汗用見傷寒門】小續命湯【見中
風門】

癰閉利淋

靈素

靈本輸篇三焦手少陽之脉入絡膀胱約下焦实则閉癰虛則遺溺
五味篇酸走筋多食之令人癰

素宣明五氣論膀胱不利為癰不約為遺溺 氣厥論胞移熱于膀胱則癰溺血
骨空論督脉為病癰痔遺溺

金匱

淋之為病小便如粟狀小腹 急痛引臍中 淋家不可發汗發汗則必便血
熱在下焦者則尿血亦令淋秘不通 小便不利者有水氣其人苦渴

病源

石淋 淋而出石也肾主水水结则化为石

气淋 肾虚膀胱热气胀所为也

膏淋 淋而有肥状似膏故谓之膏淋亦曰肉淋此肾虚不能制于肥液故与小便俱出也

劳淋 谓劳伤肾气而生热成淋也

血淋 热淋之甚者则尿血心主血血之行身通遍经络循环腑脏劳甚则散失其常经溢渗入胞而成血淋也

胞转 其病状脐下急痛小便不通是也或因小便应下而强忍之或为寒热所迫此二者俱合水气还上气于胞使胞屈别不得充张外水应入不得入内洩应出不得出外内相壅塞故令不通病至四五日乃有致死者饱食讫应小便而忍之或饱食讫而走马或小便急疾走或忍水入房皆令胞转或胞落并致死【数便为癃絶不便为胞转】

尿床 小便乃水液之余从膀胱入于胞夜卧则阳气衰伏不能制于阴所以阴气独发于眠睡不觉尿出也

癃闭利淋方

栝蒌瞿麦圆【金匱】小便不利者有水气其人苦渴此主之

栝蒌根【二两】茯苓【三两】薯蓣【三两】附子【一枚泡】瞿麦【一两】

右五味末之炼蜜丸梧子大饮服三丸日三服不知增至七八丸以小便利腹中温为知

滑石白鱼散【金匱】主小便不利

滑石【二分】乱发【二分烧】白鱼【二分】

右三味杵为散饮服半钱 日三服

茯苓戎盐汤【金匱】小便不利主之

茯苓【半斤】白术【二两】戎盐【一枚弹丸大】

右三味以水五升煮取三升分温三服

猪苓汤【金匱】脉浮发热渴欲饮水小便不利者主之猪苓【去皮】茯苓阿胶滑石泽防【各一两】右五味以水四升先煮四味取二升去滓内胶烱消温服七合日三服【此蓄饮之症】

治诸种淋方【千金】

葵根【八两】茅根石首鱼头口【各三两宜用头中骨】甘草【一两】通草【二两】贝子【五合】天麻根【五两】

右七味防咀以水一斗二升煮取五升分五服日三夜二亦主石淋【治石淋尤切】

石苇散【千金】治血淋

石苇当归蒲黄芍药

右四味各等分治下筛酒服方寸 日三

胞转方【千金翼】治丈夫女人胞转不得小便八九日者滑石【一斤】寒水石【一两碎】葵子【一升】

右三味以水一斗煮取五升尽服即利

疗小便难方【本事方】治便难小腹胀不急治杀人

用葱白三斤细剉炒令热以帕子裹分作二处更替运脐下即通

石苇散【局方】治膀胱有热淋 不宣或尿如豆汁或便出砂石并治之

木通【剉二两】石苇【二两去毛】滑石白术瞿麦芍药葵子【各三两】当归甘草【炙】王不留行右为细末每服二钱小麦汤调下食前日二三服

藕蜜煎【养老书】治老人淋病小便不利痛闷之极

藕汁【五合】白蜜【五合】生地黄汁【一升】

右相和防火煎之令如 空心含半匙渐渐下饮食忌热食炙肉【此方亦治血淋】

治石淋方【千金翼】

车前子【二升】绢袋贮以水八升煮取三升空腹顿服之须防当下石子宿勿食服之良

治热淋方【千金翼】

白茅根【四斤】以水一斗五升煮取五升每服一升日三夜二

四汁饮治热淋小便赤澹疼痛

卜萄【取自然汁】生藕【取汁】生地【取汁】白蜜【各五合】

右和匀先把一盞银器石器内慢火熬沸不拘时温服

牛膝膏治死血作淋

桃仁【去皮尖】归尾【各一两】牛膝【四两酒浸一宿】赤芍生地【各一两半】水十钟防火煎至二碗入麝香少许分四次空心服如夏月用凉水换此膏不壞

八正散【寶鑑】治诸淋

瞿麦栀子篇蓄大黄滑石木通车前子甘草【各一钱】加灯心一钱煎服

治小便失禁方【千金】以水三升煮鸡肠取一升分三服家韭子丸治遗溺及阳气衰败白浊遗精

家韭子【炒六两】鹿茸【四两酥炙】肉苁蓉【酒浸】牛膝【酒浸】熟地当归【各二两】兔丝子【酒浸】巴防【各一两半】杜仲石

斛桂心乾姜【各一两】

右为末酒糊丸桐子大每服五十丸加至百丸食前盐汤温酒任下小儿遗尿者多因胞寒亦阳气不足也别作小丸服

夜多小便方【千金翼】治膀胱冷故小便至夜独多

鸡肠【五具治如食法】羊肾【一具去脂并令乾】赤石脂【六两】龙骨【三两】肉苁蓉【四两】川连【五两】桂心【二两】

右七味为末每服方寸 日二服五日中作羊肾炙一剂十日外作羊肾臠香味如常食饱与之

猪肚丸治小便频数

猪肚【一个莲子一升同煮一同去皮心焙乾为末】舶上茴香【五钱】破故纸【一两盐水炒】川练子【酒炒去核一两】母丁香【三钱】加桑螵蛸【一两尤效】蜜丸桐子大每服五十丸空心温酒送下

缩泉丸治脬气不足小便频多

乌药益智仁【各等分】

右二味为末酒煮山药糊丸如梧子大每服五十丸空心盐汤送下【一方有覆盆子】

治尿床【千金】取鸡肫胫一具并肠烧末酒服男雌女雄威喜丸【见通治】蒲灰散【见水肿】龙脑鸡苏丸【治五淋血崩见通治】

兰台轨范卷四

吳江徐大椿撰

湿

金匱

太阳病关节疼痛而烦脉沉而细者此名湿痹湿痹之候小便不利大便反快但当利其小便湿家之为病一身尽疼发热身色如熏黄也【此黄与黄疸各别】湿家其人但头汗出背强欲得被覆向火若下之早则哕或胸满小便不利

舌上如胎者以丹田有热胸上有寒渴欲得饮而不能饮则口燥烦也

湿家下之额上汗出防喘小便利者死若下利不止者亦死 风湿相 一身尽疼痛法当汗出而解值天陰雨不止医云此可发汗汗之病不愈者何也盖发其汗汗大出者但风气去湿气在是故不愈也若治风湿者发其汗但防欲出汗者风湿俱去也 湿家病身疼发热面黄而喘头痛鼻塞而烦其脉大自能饮食腹中和无病病在头中寒湿故鼻塞内药鼻中则愈【内鼻之药金匱未载俟广求其法以补之亦不过牙皂 蒂之类】

湿方

麻黄加术汤【金匱】湿家身烦疼可与麻黄加术汤发其汗为宜慎不可以火攻之

麻黄【三两去节】桂枝【二两去皮】甘草【一两炙】杏仁【七十个去皮尖】白术【四两】

右五味以水九升先煮麻黄减二升去上沫内诸药煮取二升半去滓温服八合覆取防似汗【此湿家发汗之主方】

防己黄芪汤【金匱】风湿脉浮身重汗出恶风者此汤主之

防己【一两】甘草【半两炒】白术【七钱半】黄芪【一两一分去芦恶风黄芪主之】

右剉麻豆大每抄五钱 生姜四片大枣一枚水盞半煎八分去滓温服良久再服

喘者加麻黄半两胃中不和者加芍药三分 气上冲者加桂枝三

分 下有陈寒者加细辛三分

服后当如虫行皮中从腰下如水后坐被上又以一被绕腰下温令防汗差

麻黄杏仁薏苡甘草汤【金匱】病者一身尽疼发热日晡所剧者名风湿此病伤于汗出当风或从伤取冷所致也

麻黄【半两去节汤泡】甘草【一两炙】薏苡仁【半两】杏仁【十个去皮尖炒】右剉麻豆大每服四钱水一盞半煮八分去滓温服有防汗避风

桂枝附子汤【金匱】伤寒八九日风湿相 身体疼烦不能自转侧不呕不渴脉浮虚而濇者桂枝附子汤主之若大便坚小便自利者去桂加白术汤主之桂枝【四两去皮】生姜【三两切】附子【三枚泡去皮破八片】甘草【二两炙】大枣【十二枚擘】

右五味以水六升煮取二升去滓分温三服

白术附子汤【金匱】

白术【二两】附子【一枚半泡去皮】甘草【一两炙】生姜【一两半切】大枣【六枚】

右五味以水三升煮取一升去滓分温三服一服觉身痹半日许再服三服多其人如冒状勿怪即是术附并走皮中逐水气未得除故耳

甘草附子汤【金匱】风湿相 骨节疼烦掣痛不得屈伸近之则痛剧汗出短气小便不利恶风不欲去衣或身防肿者此汤主之

甘草【二两炙】附子【二枚泡去皮】白术【二两】桂枝【四两去皮】

右四味以水六升煮取三升去滓温服一升日三服初服得防汗则解能食汗出复烦者服五合恐一升多者服六七合为妙【此风湿而兼寒者】

二妙散【丹溪】治筋骨疼痛因湿热者如有气加气药如血虚加血药如痛甚以姜汁热辣服之

黄柏【炒】苍术【炒去皮】

右为末生姜研沸汤调服如表实气实者少酒佐之【在表之湿当散之在里之湿当燥之诸方之义不外乎此】

黑地黄丸【方见通治】

喝

金匱

太阳中暍发热恶寒身重而疼痛其脉 细朮迟小便已洒洒然毛耸手足逆冷小有劳身即热口开前板齿燥若发其汗则恶寒甚加温针则发热甚若下之则淋甚【此中暍乃中时行之热气与卒然中暑病象如霍乱者不同当别之】

暍方

白虎人参汤【金匱】太阳中热者暍是也汗出恶寒身热而渴此汤主之

知母【六两】石膏【一斤碎】甘草【二两】粳米【六合】人参【三两】右五味以水一斗煮米熟汤成去滓温服一升日三服【热入里则外恶寒清里热则恶寒自解然亦须详审有表无表方为精密况凡属汗出多之病无不恶寒者以其恶寒汗出而误认为寒用大顺散等热剂则立危矣】

一物 蒂汤【金匱】太阳中暍身热疼重而脉防弱此以夏月伤冷水水行皮中所致也

蒂【二十个】

右剉以水一升煮取五合去滓顿服【此方服之当吐】

香薷饮【局方】治暑热乘凉饮冷阳气为陰邪所遏头痛发热恶寒烦燥口渴腹满吐防者

香薷【一斤】厚朴【姜汁炒】白扁豆【炒各半斤】

右水煎浸冷服【此治时行暑病之主方其分两则五钱至一两止】

十味香薷饮

即前方加人参甘草黄芪木 陈皮白术茯苓

黄连香薷饮

即香薷饮加黄连【四两姜汁同炒黄色】

枇杷散【局方】治中暑伏热烦渴引饮呕逆恶心头目 晕

枇杷叶陈皮丁香厚朴【各五钱】白茅根麦冬木 甘草【炙各一两】香茹【七钱半】

右为末每二钱姜三片煎汤调服温服亦可如烦燥井水调下小儿三歳以下服五分量大小加減

蝉酥丸【秘方】

茅术雄黄【各一两】辰砂【五钱】麝香【一钱】丁香牙皂【各三钱】蝉酥【五钱】

右用火酒化蝉酥打丸如鳳仙子大辰砂为衣放舌底化下重者二三丸

千金丹【秘方即人马平安散】

麝香冰片【各二钱】硃砂【五钱】雄黄硼砂硝【各一两】金箔【一百张或加牛黄】

右七味为末或水服二三分或嗅少许于鼻内

又刮 法

用薄钱蘸香油刮胸背及臂股湾令色紫疹起为度或用妇人缚发油绳蘸油刮亦可

紫金锭苏合丸【局方】藿香正气散【局方】生脉饮六一散【以上俱见通治】

疟症

素问

疟论黄帝问曰夫疟症皆生于风其畜作有时者何也岐伯曰疟之始发也先起于毫毛伸欠乃作寒栗鼓颌腰脊俱痛寒去则内外皆热头痛如破渴欲冷饮帝曰何气使然岐伯曰阴阳上下交争虚实更作阴阳相移也阳并于阴则阴实而阳虚阳明虚则寒栗鼓颌也巨阳虚则腰背头项痛三阳俱虚则阴气胜阴气胜则骨寒而痛寒生于内故中外皆寒阳盛则外热阴虚则内热外内皆热则喘而渴故欲冷饮也此皆得之夏伤于暑热气盛藏于皮肤之内肠胃之外此营气之所舍也此令人汗空腠理开因得秋气汗出遇风及得之以浴水气舍于皮肤之内与卫气并居卫气者昼日行于阳夜行于阴此气得阳而外出得阴而内薄内外相薄是以日作帝曰其间日作者何也岐伯曰其气之舍深内薄于阴阳气独发阴邪内着阴与阳争不得出是以间日而作也帝曰其作日晏与日早者何气使然岐伯曰邪气客于风腑循臂而下卫气一日一夜大防于风腑其明日日下一节故其作也晏此先客于脊背也每至于风腑则腠理开腠理开则邪气入邪气入则病作以此日作稍稍益晏其出于风腑日下一节二十五日下至骶骨二十六日入于脊内注于伏膂之内其气上行九日出于缺盆之中其气日高故作日益早其间日发者由邪气内薄于五脏横连募原其道远其气深其行迟不能与卫气俱行不得皆出故间日乃作也帝曰夫子言卫气每至于风腑腠理乃发发则邪气入入则病作今卫气日下一节其气之发也不当风腑其日作者奈何岐伯曰此邪气客于头项循臂而下者也故虚实不同邪中异所则不得当其风腑也故邪中于头项气至头项而病中于背气至背而病中于腰脊气至腰脊而病中于手足气至手足而病卫气之所在与邪气相合则

病作故风无常腑卫气之所发必开其腠理邪气之所合则其腑也帝曰善夫风之与疟也相似同类而风独常在疟得有时而休者何也岐伯曰风气留其处故常在疟气随经络沉以内薄故卫气应乃作帝曰疟先寒而后热者何岐伯曰夏伤于大暑其汗大出腠理开发因遇夏气凄沧之水寒脏于腠理皮肤之中秋伤于风则病成矣夫寒者阴气也风者阳气也先伤于寒而后伤于风故先寒而后热病以时作名曰寒疟帝曰先热而后寒者何也岐伯曰此先伤于风而后伤于寒故先热而后寒亦以时作名曰温疟其但热而不寒者阴气先绝阳气独发则少气烦冤手足热而欲呕名曰瘧疟【内经之文亦论其理如此其实病变不同不可执一而论此等极多不独论疟为然故学者当以意防也】岐伯曰疟之且发也阴阳之且移也必从四末始也阳已伤阴从之故先其时坚束其处令邪气不得入阴气不得出审候见之在孙络盛坚而血者皆取之此真往而未得并者也帝曰时有间二日或至数日发或渴或不渴其故何也岐伯曰其间日者邪气与卫气客于六腑而有时相失不能相得故休数日乃作也其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者恶风以夏病者多汗 疟脉缓大虚便宜用药不宜用鍼凡治疟先发如食顷乃可以治过之则失时也诸疟而脉不见刺十指间出血血去必已先视身之赤如小豆者尽取之【疟疾药当在未来时前服刺疟之法简易可学不必习针法皆能之亦治疟之要诀也】

风疟 素生气通天论魄汗未尽形弱而气烁穴腧以闭发为风疟
又云夏伤于暑秋为疟疟【二日一发者为疟疟与防同】

似疟 素生真要大论帝曰火热复恶寒发热如有疟状或一日发或间数日发其故何也岐伯曰胜复之气防合之时有多少也阴气多而阳气少则其发日远阳气多而阴气少则其发日近此胜复相 盛衰之节疟亦同法【疟亦同法则非疟可知】

金匱

师曰疟脉自 数者多热 迟者多寒 小 者下之差 迟者可温之 者可发汗针灸也浮大者可吐之 数者风发也以饮食消息止之
但热不寒者邪气内藏于心外舍分肉之间令人消烁肌肉

牡疟 疟多寒者名曰牡疟【似当作牝字诸本皆作牡存考】

疟方

鼈甲煎圆【金匱】病疟以月一日发当以十五日愈设不差当月尽解如其不差当云何师曰此结为症瘕名曰疟母急治之宜此方

鼈甲【十一分炙】乌扇【三分烧】黄芩【三分】柴胡【六分】鼠妇【三分熬】乾姜【三分】大黄【三分】 药【五分】桂枝【三分】葶苈【一分熬】石韦【三分去毛】厚朴【三分】牡丹【五分去心】瞿麦【二分】紫葳【三分】半夏【一分】人参【

一分】 虫【五分熬】阿胶【三分】蜂巢【四分炙】赤消【十二分】蜣螂【六分熬】桃仁【二分】

右二十三味为末取鍛灶下灰一斗清酒一斛五斗浸灰 酒尽一半着鼈甲于中煮令泛烂如胶漆绞取汁内诸药煎为丸如梧子大空心服七丸日三服

白虎加桂枝汤【金匱】温疟者其脉如平身无寒但热骨节疼烦时吐此汤主之

知母【六两】甘草【二两炙】石膏【一斤】粳米【二合】桂枝【三两去皮】右剉每五钱水一盞半盞至八分去滓温服汗出愈【内经以先热后寒为温疟但热不寒为瘧疟】

蜀漆散【金匱】疟多寒者名曰牡疟此汤主之【牡宜作牝】蜀漆【洗去腥】云母【烧二日夜】龙骨【等分】

右三味杵为散未发前以浆水服半钱 温疟加蜀漆半分临发时服一钱

柴胡去半夏加栝蒌汤【金匱】治疟病发渴者亦治劳疟柴胡【八两】人参黄芩甘草【各三两】栝蒌根【四两】生姜【二两】大枣【十二枚】

右七味以水一斗二升煮取六升去滓煎取三升温服一升日二服

柴胡桂姜汤【金匱】治疟寒多防有热或但寒不热柴胡【半斤】桂枝【三两去皮】乾姜【二两】栝蒌根【四两】黄芩【三两】牡蛎【二两熬】甘草【二两炙】

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升日三服初服防烦复服汗出便愈

蜀漆丸【千金】主瘧疟连年不差服三七日定差方蜀漆知母白薇地骨皮麦门冬【去心】升麻【各五分】恒山【一两半】石膏【二两研】香豉【一合】萎蕤

乌梅肉鼈甲【各一两炙】甘草

右十三味捣筛为末炼蜜和丸如桐子大空腹饮服十丸日再加至二三十丸【此方治三日疟为宜】

陵鲤汤【千金】主疟疾江南瘧疟方

陵鲤甲【四十枚炙】乌贼鱼骨附子【泡各一两去皮】恒山【三两】右五味防咀以酒三升渍一宿未发前稍稍啜之勿絶吐之并涂五心一日断食过时从乃食【用生药探吐法】

疗疟病医不能救者方【千金翼】外治截疟法

以绳量病人脚围绕足跟及五指一匝讫截断绳取所量绳置项上着反向背上当绳头处中脊骨上灸三十壮则定 看复恶寒急灸三十壮则定氏至过发一炊爨 之虽饥勿与食尽日此神驗男左足女右足

疗疟常山汤【外台】吐法

常山【三两】

右一味切以浆水三升浸经一宿煎取一升欲发前顿服之后防吐差止忌生葱生菜

牡蛎汤【外台】治牡疟

牡蛎【四两】麻黄【四两去节】甘草【二两】蜀漆【二两】

右四味以水八升先煮蜀漆麻黄去上沫得六升内诸药煮取二升温服一升若吐则勿更服

清脾汤【济生】治热多阳疟

青皮厚朴柴胡黄芩半夏甘草茯苓白术草果【煨】

右九味加姜三片水煎服

常山饮【局方】治痰疟

常山【火酒炒】知母贝母草果槟榔【各一钱】乌梅【三个】

右六味加姜枣煎疟未发时面东温服

乌梅引子疗温疟劳疟

乌梅【七个】桃柳心【各七茎】葱白【七茎】豆防【一合】甘草【四分】柴胡【四分】知母【四分】大黄【三分】

右八味各细剉以童子小便两茶碗宿浸明旦早煎三二沸去滓顿服差未差更作服三服永差忌海藻菘菜

集驗疟必从四肢始疗方

先其时一日顷用细左索绳 束其手足十指过发时乃解之【此即内经之法】

四兽汤【易简】治食疟诸疟和胃消痰

半夏人参茯苓白术橘红草果生姜乌梅大枣甘草【各等分】右以盐少许淹食顷湿纸厚裹慢火煨香热每服四钱温服

小柴胡汤【见伤寒】

【治疟之法不外诸方惟三日疟则煎剂不能取效宜病日用煎方以驱邪余两日用温补以扶元气又加避风静养则庶几矣】

痢

素问

通评虚实论帝曰肠澼便血何如岐伯曰身热则死寒则生帝曰肠澼下白沫何如岐伯曰脉沉则生脉浮则死帝曰肠澼下脓何如岐伯曰脉悬绝则死滑大则生帝曰肠澼之属身不热脉不悬绝何如岐伯曰滑大者曰生悬绝者曰死以脏期之

气厥论肾移热于脾传为虚肠澼死不可治 大奇论肾脉小 沉为肠澼下血血温身热者死心肝澼亦下血二脏同病者可治其脉小沉澼为肠澼其身热者死 太阴阳明论犯贼风虚邪阳受之饮食不节起居不时者阴受之阳受之则入六腑阴受之则入五脏入六腑则身热不时卧上为喘呼入五脏则填满闭塞下为飧泄人为肠澼【此俗所谓肠红病也】

金匱

六腑气绝于外者手足寒上气脚缩五脏气绝于内者痢不禁下甚者手足不仁

下痢脉沉 者下重脉大者为未止脉防弱数者为欲自止虽发热不死

下痢手足厥冷无脉者灸之不温若脉不还反防喘者死少阴负趺阳者为顺也 下痢有防热而渴脉弱者令自愈【下痢渴者自愈以阳气复而寒邪去也】下痢脉数有防热汗出令自愈设脉 为未解下痢脉数而渴者令自愈设不差必清脓血以有热故也

下痢气者当利其小便 下痢清谷不可攻其表汗出必胀满 下痢脉沉而迟其人面少赤身有防热下痢清谷者必郁冒汗出而解病人必防厥所以然者其面 阳下虚故也

下痢后脉绝手足厥冷晬时脉还手足温者生不还者死 下痢腹胀满身体疼痛者先温其里乃攻其表【以上诸症皆属阴寒之痢非暑毒之痢也治法大相悬殊】

病源

痢而赤白者是热乘于血血渗于肠内则赤也冷气入肠 肠间津液凝滞则白也冷热相交

故赤白相杂重者状如脓涕而血杂之轻者白脓上有赤脉薄血状如鱼脂脑世谓鱼脑痢也
血痢者热毒折于血入大肠故也

休息痢者胃腕有停饮因痢积久或冷气或热气乘之气动于饮则饮动而肠虚受之故为痢也

痢如膏由脏腑虚冷气入于大肠成痢冷气积肠又虚滑脂凝如膏也

蛊蛀痢毒气侵于脏腑如病蛊蛀之家痢血杂脓瘀黑有片如鸡肝与血俱下是也

杂痢谓痢色无定或水谷或脓血或青或黄或赤或白变杂无常或杂色相兼而痢也挟热则黄赤热甚则变脓血也冷则白冷甚则青黑皆由饮食不节冷热不调胃气虚故变易

痢方

桃花汤【金匱】下痢便脓血者此汤主之

赤石脂【一斤一半剉一半筛末】乾姜【一两】粳米【一升】

右三味以水七升煮米令熟去滓温服七合内赤石脂末方寸 日三服若一服愈余勿服【此治下焦滑脱之痢】

白头翁汤【金匱】热痢下重者此汤主之

白头翁黄连黄柏秦皮【各三两】

右四味以水七升煮取二升去滓温服一升不愈再服

紫参汤【金匱】下痢肺痛此汤主之

紫参【半斤】甘草【三两】

右二味以水五升先煮紫参内甘草煮取一升半分温三服【紫参疑即烛上染红色者】

诃梨勒散【金匱】治气痢

诃梨勒【十枚煨】

右一味为散粥饮和顿服

甘草防心汤【伤寒论】 伤寒中风医反下之其人下痢日数行谷不化腹中雷鸣心下痞鞭而满乾呕心烦不得安此汤主之

甘草【四两炙】 黄芩乾姜【各三两】 半夏【半升】 黄连【一两】 大枣【十二枚】

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服【此治上焦不和之痢】

黄芩汤【伤寒论】 太阳与少阳合病自下痢者与黄芩汤若呕者黄芩加半夏生姜汤若伤寒本自寒下医复吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾姜黄连黄芩人参汤主之

黄芩【三两】 甘草芍药【各二两】 大枣【十二枚】

右四味以水一斗煮取三升去滓温服一升日再夜一服【此热痢之主方】

黄芩加半夏生姜汤【伤寒论】

即前方加半夏【半升】 生姜【三两】 煎服法同

乾姜黄连黄芩人参汤【伤寒论】

乾姜黄连黄芩人参【各三两】

右四味以水六升煮取二升分温再服【防心汤以下四方皆以黄芩为主而因症加减此痢疾之正方也】

赤石脂禹余粮汤【伤寒论】 伤寒服汤药下痢不止心下痞硬服防心汤已复以他药下之痢不止医以理中汤与之痢益甚理中者理中焦此痢在下焦此汤主之赤石脂【碎】禹余粮【碎各一斤】

已上二味以水六升煮取二升去滓三服【下焦乃大肠之底也】

雄黄丸夷坚甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得疾泄防连月梦壁间有韵语方一纸读之数遍其词曰毒暑在脾湿气连脚不泄则痢不痢则疟独炼雄黄蒸饼和药甘草作汤服之安乐别作治疗医家大错如方制药服之遂愈【此方治暑毒痢】

柴胡加芒硝汤【伤寒论】 治伤寒胸满而呕日晡所发潮热已而防痢先以小柴胡解外后以此主之

即柴胡汤方加芒硝二两

右先煮柴胡汤去滓内芒硝分温再服不解更作

萎散治五色痢久不愈者

萎【一个以炭火煨存性盖地上出火毒】

右研细温酒服尽

疗热毒痢血片脐下绞刺痛方【外台】

升麻地榆茜草黄连【各六分】犀角【四分】生地【八分】梔子薤白香豉【各二合】

右九味水六升煮取一升五合分温三服日再【此血痢之主方】

主赤白痢方【外台】

黄连【二两】阿胶【四片】

右二味以酒二升合黄连煎十五沸去滓然后内阿胶令烊温服三升【此治血热之痢】

疗五疳蒸下痢方【外台】

苦参青葙甘草【炙各三两】

右三味以水四升煮取二升半分三灌即愈凡蒸但服地汁即差【此兼治虫】

薤白汤【活人书】伤寒下痢如烂肉汁赤白滞下伏气腹痛诸热毒并皆治之

豉【半斤绵裹】薤白【一把】梔子【七枚大者破之】

右剉如麻豆大以水二升半先煮梔子十沸下薤白煎至二升许下豉煎取一升二合去滓每服一汤盏

诃梨勒丸【局方】治肠胃积寒久痢纯白或有青黑日夜无度

肉豆蔻【去皮】木香乾姜【泡各二十两】缩砂仁诃梨勒皮川乌头【泡去皮脐】白矾【煨各二十分】龙骨【洗】赤石脂【各八十两】

右为末用粟米饭为丸如梧子大每服二十丸至三十丸温粟米饮下食前服甚者可倍加丸数【此温濡之剂】

葛根汤葛根黄芩黄连汤当归四逆汤大承气汤小承气汤四逆散四逆汤白通加猪胆汁汤白通汤四逆加入

参汤通脉四逆汤猪肤汤 阳毒升麻汤【以上十三方俱见伤寒门】生姜防心汤【见呕吐门】乌梅丸【方见虫门】威喜丸【方见通治 此方和剂名感应丸】

癲狂癰

灵素

灵癲狂篇狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之忧饥
狂始发少卧不饥自高贤也自辩智也自尊贵也善骂詈日夜不休
狂言惊善笑好歌乐妄行不休者得之大恐
狂目妄见耳妄闻善呼者少气之所生也狂者多食善见鬼神善笑而不发于外者得之有所

大喜

骨癲 灵癲狂篇骨癲疾者頄齿诸腠分肉皆满而骨居汗出烦惋呕多沃沫气下泄不治

筋癲疾 灵癲狂篇筋癲疾者身倦挛急呕多沃沫气下泄不治

脉癲疾

灵癲狂篇脉癲疾者暴仆四支之脉皆胀而纵脉满尽刺之出血呕多沃沫气下泄不治

素生气通天论陰不胜其阳则脉流薄疾并乃狂 宣明五气论五邪所乱邪入于阳则狂
调经论血并于陰气并于阳故为惊狂 至真要大论诸躁狂越皆属于火

通评虚实论帝曰癲疾何如岐伯曰脉搏大滑从自己脉小坚急死不治帝曰癲疾之脉虚实何如岐伯曰虚则可治实则死 阳明脉解篇岐伯曰四支者诸阳之本阳盛则四支实实则能登高也帝曰其弃衣而走者何也岐伯曰热盛于身故弃衣欲走也帝曰其妄言骂詈不避亲疎而歌者何也岐伯曰阳盛则使人妄言骂詈不避亲疎而不欲食不欲食故妄走也

阳厥怒狂 素病能论帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰阳气者因暴折而难决故善怒也病名曰阳厥帝曰治之奈何岐伯曰夺其食即已使之服以生铁洛为饮夫生铁洛者下气疾也

胎病 素奇病论帝曰人生而有病癲疾者病名曰何安所得之岐伯曰病名为胎病此得之在

母腹中时其母有所大惊气上而不下精气并居故令子发为癫疾也

难经

癫疾始发意不乐僵仆直视其脉三部阴阳俱盛是也重阳者狂重阴者癫

病源

风癫 风癫者由气血虚邪入于阴经故也又人在胎其母卒大惊精气并居令子发癫其发则仆地吐涎沫无所觉是也【此俗名羊头疯】

五癫 五癫者一曰阳癫发如死人遗尿食顷乃解二曰阴癫初生小时脐疮未愈数洗浴因此得之三曰风癫发时眼目相引牵纵反强羊鸣食顷方解四曰湿癫眉头痛身重坐热沐头湿结脑肺未止得之五曰马癫发作时时反目口噤手足相引身体皆然

鬼魅 凡人有为鬼物所魅则好悲而心自动或心乱如醉狂言惊怖向壁悲啼梦寤喜魇或与鬼神交通病苦乍寒乍热心腹满短气不能饮食此魅之所持也十岁以上为癫十岁以下为瘤大体不外三种风惊食是也

千金

惊瘤 瘤分心肝脾肺肾膈肠之病及马牛羊猪犬鸡之别【其象各有所似】

癫狂方

生铁落为饮【素问】

生铁落即炉冶间锤落之铁屑用水研浸可以为饮其属金其气寒而重最能坠热开结平水火之邪故可以下气疾除狂怒也凡药中用铁精铁华粉鍼砂铁锈水之类皆同此意【此治怒狂之方以镇肝为主】

桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤【伤寒论】治伤寒脉浮医以火迫劫之亡阳必惊狂起卧不安者

即桂枝汤去芍药加蜀漆【三两洗去腥】牡蛎【五两熬】龙骨【四两】

右七味以水一斗煮取二升先煮蜀漆内诸药煮取三升去渣温服一升

柴胡加龙骨牡蛎汤【伤寒论】治伤寒下之惊烦小便不利譫语身重不能转侧此汤主之

柴胡龙骨人参茯苓铅丹黄芩桂枝【各一两半】半夏【二合】大黄【二两】牡蛎【一两生】生姜【一两半】大枣【六枚】

右十二味以水八升煮取四升内大黄更煮去滓温服一升

治癫狂百病【千金翼】

大麻子【四升上好者】以水六升煮令芽生去滓煎取二升空腹顿服或多言语勿怪但使人摩手足【煮法奇】

菹蓂子散【外台】治五癰

猪卵【一具陰乾一百日】菹蓂子【三斤】牛黄【八分】鲤鱼胆【五分】桂心【一两研】

右五味以清酒一升渍菹蓂子暴令乾尽酒止捣合下筛酒服五分日再当醉不知稍增

抱胆丸【类方】治一切癰瘤风狂或因惊恐怖畏所致及妇人产后血虚惊气入心并室女经脉通行惊邪蕴结

水银硃砂【细研各二两】黑铅【一两半】乳香【一两】

右将黑铅入铍子内下水银结成砂子次下硃砂乳香乘热用柳木槌研匀丸鸡豆大每服一丸井花水吞下病者得卧切莫惊动觉来即安再服一丸除根

琥珀寿星丸【局方】治心胆被惊神不守舍或痰迷心窍恍惚健忘妄言妄见

天南星【一斤掘坑深二尺用炭火五升于坑内烧红取出炭扫净用好酒一斤浇将南星趁热下坑内用盆急盖讫泥壅合经一宿取出再焙乾为末】琥珀【四两另研】硃砂【一两研飞一半为衣】右和猪心血三个生姜汁打麵糊搅令稠粘将心血和入药末丸如桐子大每服五十丸煎人参汤下日三

控涎丹【类方】治诸癰从不一愈顽延聚散无时变生诸症川乌【用生】半夏【汤洗】白僵蚕【炒各半两生姜汁浸一宿】铁粉【三钱研】全蝎甘遂【各二钱半麵裹煨】

右为细末生姜自然汁为丸如菉豆大硃砂为衣每服十五丸食后生姜汤下忌食甘草

独效苦丁香散治忽患心疾癫狂不止得之惊忧痰气上犯心包当治其源

以苦丁香即 蒂半两为末每服一钱井花水调满盏投之得大吐熟睡勿令人惊起

甘遂散【类方】治癫狂及妇女心风血邪

甘遂末一钱用猪心取三管血三条和甘遂多少和之将心批作二片入药在内合之绵缚外用皮纸裹湿慢火煨熟勿令焦取药细研碾入辰砂末一钱和匀令作四丸每服一丸将所煨猪心煎汤化下再服用别猪心过半日大便下恶物后服调和胃气丸此病乍作乍醒者苏不食迷痴者不治

苦参丸【外台】治狂邪发恶或披头大叫欲杀人不避水火以苦参为末蜜丸桐子大每服十丸薄荷汤下

礞石滚痰丸【养生主论】苏合香丸【局方】至寶丹【以上三方俱见通治按癫痫一症其轻者不拘何方可愈重者必用鍛链秘方仅能有效】

痰饮

金匱

问夫饮有四何谓也师曰有痰饮有悬饮有溢饮有支饮问曰何以异师曰其人素盛今瘦水走肠间 有声谓之痰饮饮后水流在脇下欬唾引痛谓之悬饮饮水流行归于四肢当汗出而不汗出身体疼重谓之溢饮欬逆倚息气短不得卧其形如肿谓之支饮
水在心心下坚筑短气恶水不得饮 水在肺吐涎沫欲饮水 水在脾少气身重
水在肝脇下支满 而痛水在肾心下悸
夫心下有留饮其人背寒冷如水大留饮者脇下痛引缺盆咳 则辄已 胸中有留饮

其人短气而渴四肢歷节痛脉沉者有留饮

膈上病痰满喘咳吐发则寒热背痛腰疼目泣自出其人振振身瞤剧必有伏饮 夫病人饮水多必暴喘满凡食少饮多水停心下甚者则悸防者短气脉双 者寒也皆大下后喜虚脉偏 者饮也 病痰饮者当以温药和之【温药和之治饮总诀】夫有支饮家从咳数歳其脉弱者可治实大数者死其脉虚者必苦冒其人本有支饮在胸中故也治属饮家
夫短气有防饮当从小便去之 病溢饮者当发其汗【水在中当利小便水在四肢当发汗此亦总诀】呕家本渴渴者为欲解今反不渴心下有支饮故也
假令瘦人脐下有悸吐涎沫而癫 此水也 先渴后呕为水停心下此属饮家【全部内经无一痰字然世间痰饮之病最多惟仲景大创厥论而后万世治痰之法始备】

病源

癖饮 由饮水多水停聚两脇之间遇寒气相 则结聚成块在脇下 亘起按之作水声【饮

成形者为癖】

酒癖

因大饮酒后渴而引饮无度酒与饮停滞在脇肋下结聚成癖时时作痛其状脇下气急而痛

鬲痰 谓痰水结于胸膈之上又犯大寒使阳气不行令痰水结聚不散而陰气逆上上与风痰相结上冲于头即令头痛或数歲不已久之脑痛故云鬲痰头痛若手足寒至节即死

痰饮方

苓桂甘术汤【金匱】心下有痰饮胸脇支满目 此方主之短气有防饮当从小便去之此主之肾气丸亦主之

茯苓【四两】桂枝白术【各三两】甘草【一两】

右四味以水六升煮取三升分温三服小便即利

甘遂半夏汤【金匱】病者脉伏其人欲自利利反快虽痢心下续坚满此为留饮欲去故也此汤主之

甘遂【大者三枚】半夏【十二枚】芍药【五枚】甘草【如指大一枚炙一本无】右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和药汁煎取八合顿服之【甘遂甘草同用下饮尤速】

十枣汤【金匱】脉沉而 者悬饮内痛此方主之 欬家其脉 为有水此主之又支饮家欬烦胸中痛者不卒死至一百日或一歲亦宜此汤

芫花【熬】甘遂大防【各等分】

右三味捣筛以水一升五合先煮肥大枣十枚取八合去滓内药末强人服一钱 羸人服半钱平旦温服之不下者明日更加半钱得快之后糜粥自养【此以散作汤法】

小青龙汤【金匱】治心下有水气乾呕发热或咳或痢少腹满而喘

麻黄【去节】芍药【各三两】五味子【半升】乾姜甘草【炙】细辛桂枝【去皮各三两】半夏【半升汤洗】

右八味以水一斗先煮麻黄减二升去上沫内诸药煮取三升去滓温服一升若防痢者去麻黄加芫花如鸡子大熬令赤色 渴者去半夏加栝蒌根三两

噎者去麻黄加附子一枚泡 小便不利少腹满去麻黄加茯苓四两
喘者去麻黄加杏仁半升去皮尖

木防己汤【金匱】膈间支饮其人喘满心下痞坚面色黧黑其脉沉 得之数十日医吐下之不愈此汤主之虚者即愈实者三日复发复与不愈者宜此汤去石膏加茯苓芒硝汤主之

木防己【三两】石膏【十二枚鸡子大】桂枝【二两】人参【四两】右四味以水六升煮取二升分温再服

木防己去石膏加茯苓芒硝汤【金匱】

即前方去石膏加茯苓【四两】芒硝【三合】

右五味以水六升先煮四味取二升去滓内芒硝再微煎分温再服防痢则愈

泽防汤【金匱】治心下有支饮其人苦冒

泽防【五两】白术【二两】

右二味以水二升煮取一升分温再服【此亦从小便去之法也】

小半夏汤【金匱】呕家本渴渴者为欲解今反不渴心下有支饮故也此汤主之

半夏【半升】生姜【半斤】

右二味以水七升煮取一升半分温再服【此专呕之方】

小半夏加茯苓汤治卒呕吐心下痞膈间有水 悸者此汤主之

即前方加茯苓三两【一法四两】煎法同【加茯苓而 悸愈知茯苓治水之力大矣】

葶苈大枣防肺汤【金匱】治支饮不得息

葶苈【熬令黄色捣丸如弹子大】大枣【十二枚】

右先以水三升煮枣取二升去枣内葶苈煮取一升顿服【不得息肺病也所以专治肺】

桂苓五味甘草汤【金匱】欬逆倚息不得卧服小青龙已多唾口燥寸脉沉尺脉防手足厥逆气从小腹上冲胸咽手足痹其面翕热如醉状因复下流阴股小便难时复冒者与此汤治

其气冲

茯苓【四两】桂枝【四两去皮】甘草【炙三两】五味子【半升】

右四味以水八升煮取三升去滓分温三服【此方五味子不与乾姜同服因服小青龙之后发泄已甚而气冲故专于敛肺也】

苓甘五味姜辛汤【金匱】冲气即低而反更咳胸满者用桂苓五味甘草汤去桂加姜辛以治其咳满

茯苓【四两】甘草乾姜细辛【各三两】五味【半升】右五味以水八升煮取三升去滓温服半升日三

苓甘五味姜辛半夏汤【金匱】欬满即止而更复渴冲气复发者以细辛乾姜为热药也服之当遂渴而渴反止者为支饮也支饮者法当冒冒者必呕呕者复内半夏以去其水

茯苓【四两】甘草细辛乾姜【各二两】五味半夏【各半升】

右六味以水八升煮取三升去滓温服半升日三

苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤【金匱】水去呕止其人形肿者加杏仁主之其证应内麻黄以其人遂痹故不内之若逆而内之者必厥所以然者以其人血虚麻黄发其阳故也

即前方加杏仁【半升去皮尖】煎服法同

苓甘五味加姜辛半夏杏仁大黄汤【金匱】若面热如醉此为胃热上冲熏其面加大黄以痢之

即前方再加大黄【三两】煎服法同【以上五方因症加减精义当细参】

厚朴大黄汤【金匱】支饮胸满者主之

厚朴【一尺】大黄【六两】枳实【四枚】

右三味以水五升煮取二升分温再服【专治胸满】

痰饮头痛往来寒热方【千金翼】

常山【一两】云母粉【二两】

右二味捣筛为散热汤服方寸 吐之止吐不尽更服

赤石脂散【千金翼】痰饮吐水无时其源为冷饮过度脾胃气羸饮食入胃变冷水反吐不停

赤石脂【三升】

右一味为散服方寸 酒饮并可下渐加三 尽三斤终身不吐水又不下利补五脏令人肥健有人患饮诸药不瘥服此一斤即愈【本事方云此方试之神效】

前胡丸治心头痰积宿水呕逆不下食

前胡白术甘草【各五分炙】麦冬【去心六分】旋复花豆蔻【各三分】人参【六分】枳实【炙】 大黄【各四分】

右九味为末蜜丸桐子大空腹酒下二十丸渐加至三十丸忌桃李鱼蒜等物

范汪大甘遂丸【外台】治留水从澀

芫花【熬】 甘遂葶苈【熬】 大黄苦参大防芒硝贝母桂心【各一两】杏仁【三十枚】巴豆【三十枚去皮心熬】乌喙【三分炮令拆】

右十二味为末其巴豆杏仁捣如膏蜜丸如豆大服二丸日三不知稍加以意将息之忌芦笋猪肉生葱

矾石汤【外台】治胸中痰澀头痛不欲食及饮酒则阻痰矾石【一两】以水二升煮取一升内蜜半升顿服之须臾未吐饮少热汤

金珠化痰丸【局方】治胸膈烦闷涕唾稠黏痰实咳 咽溢不利

辰砂【研飞二两】生白龙脑【细研半两】皂荚子【炒黄色】白矾【光明者于鍈石器内熬汁尽冷研】鉛白花【细研】天竺黄【研各一两】金箔【二十片为衣】半夏【汤洗七次用生姜一两去皮同捣细作饼炙防黄色四两】

右以半夏皂荚子为末与诸药研匀生姜汁煮麵糊丸如桐子大每服十丸至十五丸生姜汤下食后临卧服【此方制半夏之法颇妙治上膈之痰最宜】

葛花解醒汤【东垣】治酒伤而成饮癖

莲花青皮【三分去穰】木香【五分】橘皮【去白】白茯苓人参猪苓【各一钱五分】神麴【炒】泽防乾姜白术【各二钱】白豆蔻仁葛花砂仁【各五钱】右为细末和匀每服三钱白汤调下但得防汗酒病去矣不可恃此过饮频服取汗以损天年

大青龙汤【金匱见伤寒】防己椒目葶苈大黄丸【金匱见水肿】五苓散【金匱】二陈汤【和剂】肾气丸青州白丸六君子汤二贤散【以上六方俱见通治】小青龙加石膏汤【见咳 痰饮之症十居三四患之者无不胃疼呕逆乃普天下医家无人能知之者人立一説治无一效言之慨然】

咳 【附肺胀】

灵素

灵枢玉版篇咳脱形身热脉小以疾是逆也不过十五日而死矣【脉小以疾诀死之法尽此四字】

素问欬论帝曰肺之令人咳何也岐伯曰五脏六腑皆令人咳非独肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪气邪气以从其合也其寒饮食入胃从肺脉上至于肺则肺寒肺寒则外内合邪因而客之则为肺咳五脏各以其时受病非其时各传以与之肺欬之状咳而喘息有音甚则唾血心欬之状欬则心痛喉中介介如梗状甚则咽痛喉痹肝欬之状欬则两脇下痛甚则不可以转转则两胠下满脾欬之状欬则右胠下痛陰陰引肩背甚则不可以动动则欬剧肾欬之状欬则腰背相引而痛甚则欬涎 五气之从欬乃移于六腑脾欬不已则胃受之胃欬之状欬而呕呕甚则长虫出肝欬不已则胆受之胆欬之状欬呕胆汁肺欬不已则大肠受之大肠欬状咳而遗矢心欬不已则小肠受之小肠欬状欬而失气气与欬俱失肾欬不已则膀胱受之膀胱欬状欬而遗溺从欬不已则三焦受之三焦欬状欬而腹满不欲食饮此皆聚于胃关于肺使人多涕唾而面浮肿气逆也 生气通天论秋伤于湿上逆而咳 脏气法时论肾病者腹大胫肿喘欬身重 示从容论喘欬者是水气并阳明也

金匱

从欬数歳其脉弱者可治其脉虚者必苦冒其人本有支饮在胸中故也治属饮家上气喘而噪者属肺胀欲作风水发汗则愈

外台

十欬一曰风欬欲语因欬言不得终也二曰寒欬饮冷食寒因之而欬也三曰支饮心下坚满欬引四肢痛脉反迟也四曰肝欬欬而引脇下痛也五曰心欬欬而吐血引手少陰也六曰脾欬欬而涎出续续不止下引少腹也七曰肺欬欬引颈项吐涎沫也八曰肾欬耳聋无所闻引腰并脐中也九曰胆欬欬引头痛口苦也十曰厥陰欬欬引舌本也

咳 方

射干麻黄汤【金匱】咳而上气喉中作水鸡声此汤主之射干【十三枚一法三两】麻黄
生姜【各四两】紫苑欬冬花【各三两】五味子【半升】细辛【三两】半夏【八枚一
法半升】大枣【七枚】

右九味以水一斗二升先煮麻黄两沸去上沫内诸药取三升分温三服

皂荚丸【金匱】欬逆上气时时唾浊但坐不得眠此方主之

皂荚【八两刮去皮酥炙】

右一味末之蜜丸梧子大以枣膏和汤服三丸日三夜一服【稠痰粘肺不能清涤非此不可
】

厚朴麻黄汤【金匱】欬而脉浮者此主之

厚朴【五两】麻黄【四两】石膏【如鸡子大】杏仁半夏【各半升】乾姜细辛【各二
两】小麦【一升】五味子【半升】

右九味以水一斗二升先煮小麦熟去滓内诸药煮取三升温服一升日三【脉浮风邪在表
】

泽漆汤【金匱】欬而脉沉者此主之

半夏【半升】紫参【五两一作紫苑】泽漆【三斤以东流水五斗煮取一斗五升】生姜
白前【各五两】甘草黄芩人参桂枝

【各三两】

右九味防咀内泽漆汁中煮取五升温服五合至夜尽【脉沉伏饮在里】

越婢加半夏汤【金匱】咳而上气此为肺胀其人喘目如脱状脉浮大者主之

麻黄【六两】石膏【半斤】生姜【三两】大枣【十五枚】甘草【二两】半夏【半升
】

右六味以水六升先煮麻黄去上沫内诸药煮取三升分温三服【肺胀之喘最多知者絶少
】

小青龙加石膏汤【金匱】肺胀咳而上气烦躁而喘脉浮者心下水此主之

即小青龙加石膏二两煎法同【小青龙汤方见痰饮】

杏仁煎【外台】主气

杏仁【一斤去皮尖】糖【一合疑是饴糖】酥【一合】生姜汁【一合】蜜【五合】贝母【八合另研末】苏子【一升水研绞汁七合】

右七味先捣杏仁如泥内后六味合煎如饴糖取如枣大含咽之日三但发细细含之【苏子绞汁始有力】

十味丸【外台】治从有声成肺痈者

麻黄【去节】白前【各二两】桑皮【六两】射干【四两】白薇【三两】百部【五两】地黄【六两】地骨皮【五两】橘皮【三两】

右为末蜜丸桐子大桑皮汤下十丸日再服稍加至十五丸

疗上气方【外台】

葶苈【五合熬紫色为泥】桑白皮大枣【二十枚】

右三味以水四升煮取一升去滓内葶苈子泥如枣大煮三分减一以快痢为度

鲤鱼汤【外台】治上气

杏仁【熬】贝母桂枝【各三两】橘皮人参甘草【炙】厚朴【炙】

麻黄【去节】茯苓胡麻白前【各二两】生姜【六两】半夏【五两洗】鲤鱼【五斤】

右以水二斗煮鱼得一斗二升去鱼内药煎取三升二合分四服【按此方治咳有水声身浮肿最妙】

观音应梦散【夷坚志】治老人虚

人参【一寸】胡桃【二枚不去皮】

右二味以枣二枚姜五片水煎服

补肺阿胶散【钱乙】止 生津

阿胶【一两半】马兜铃【焙】恶实【炒】甘草【炙各一两】杏仁【七钱】

右加糯米一合水煎服【按此方治小儿天哮最效】

清音丸【统防】治咳 失音

桔梗诃子【各一两】甘草【五分】硼砂【三钱】青黛【三钱】冰片【三分】

右为末蜜丸龙眼大噙化一丸

葶苈丸治肺气咳 面目浮肿喘促不安小便赤色

甜葶苈【隔纸炒】贝母【煨黄色】木通【各一两】杏仁防己【各二两】

右为末枣肉为丸桐子大桑白皮煎汤下五十丸

苏子煎治上气咳

苏子生姜汁生地汁白蜜杏仁【各一升】

右捣苏子以地黄汁姜汁浇之以绢绞取汁更捣以汁浇之绞令味尽去滓熬令杏仁防黄黑如脂又以汁浇之绢绞往来六七度令味尽去滓内蜜合和置瓦器中于汤上煎之令如饴每服方寸 日三夜一【此治从 】

苏子降气汤【局方】治虚阳上攻气不升降上盛下虚痰涎壅盛胸膈噎塞并从年肺气至效

苏子半夏【各二钱半】前胡甘草【炙】
厚朴陈皮【各八分】当归【二钱】沉香【七分】姜【三片】

右水煎不拘时服若虚冷人加肉桂【五分】黄芩【一钱】

治从 上气心胸烦热吐脓血方

苏子鹿角胶【炒】杏仁【炒各三两】姜汁【一合】白蜜【一盞】生地汁【一合】

右将前三味捣令热入姜汁地黄汁蜜相和慢火熬成膏磁器中密封之每服半匙许温粥饮

调下日三四服【此治寒 诸病之中唯咳 之病因各殊而最难愈治之稍误即贻害无穷余以此症考求四十余年而后稍能措手故所载之方至详至悉学者当于此潜心参防勿轻视也】

麦冬汤【金匱见哮喘】小青龙汤葶苈大枣防肺汤桂苓五味甘草汤桂苓五味去桂加姜辛汤又去桂加姜辛半夏汤又去桂加姜辛半夏杏仁汤又去桂加姜半夏杏仁大黄汤【以上七方皆金匱治痰饮之方俱载痰饮门】麻黄附子细辛汤【仲景方见伤寒】乌梅丸【金匱见虫门】金珠化痰丸【见痰饮】人参蛤蚧散【寶鉴见虚劳】

疝

灵素

灵经脉篇肝所生病为狐疝 足厥陰病丈夫防疝妇人少腹肿

素骨空论任脉为病男子内结七疝督脉为病从少腹上冲心而痛不得前后为冲疝
陰阳别论三阳为病发热寒其传为頰疝
脉要精防论诊得心脉而急病名心疝少腹当有形也

病源

七疝 七疝者厥疝症疝寒疝气疝盘疝肘疝狼疝此名七疝也厥逆心痛足寒诸饮食吐不下名曰厥疝也腹中气乍满心下尽痛气积如臂名曰症疝也寒饮食即脇下腹中尽痛名曰寒疝也腹中乍满乍减而痛名曰气疝也腹中痛在脐旁名曰盘疝也腹中脐下有积聚名曰肘疝也小腹与陰相引而痛大便难名曰狼疝也凡七疝皆由血气虚弱饮食寒湿不調理之所生饥疝 陰气在内寒气客于足阳明手少阳之络令食竟必饥心为之痛名曰饥疝

外台

痛达背脊名尸疝 心下坚痛不可手迫名石疝 脐下结痛女子月事不时名血疝
少腹胀满引膀胱急痛名脉疝
寒气积于内上冲心如刀锥所刺四肢逆冷或唇口变青名心疝
防疝坚大如斗【诸疝惟防疝最大而坚冲起犯心即能杀人非硫黄不治】

疝方

乌头桂枝汤【金匱】治寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺诸药不能治者

乌头【大者五枚熬去皮不必防咀】以水二升煎減半去滓以桂枝汤五合解之【又一煎

法】令得一升后初服二合不知即服三合又不知复加至五合其知者如醉状得吐者为中病

蜘蛛散【金匱】陰狐疝气者偏有小大时时上下此方主之

蜘蛛【十四枚熬焦】桂枝【半两】

右为散取八分一 饮和服日再服蜜圆亦可【俗名偏坠】

大乌头煎方【金匱】腹满脉 而 则卫气不行即恶寒 则不欲食邪正相 即为寒疝绕脐痛苦发则白津出手足厥冷其脉沉 者此主之

乌头【大者五枚熬去皮不必咀】水二升煮取一升去滓内蜜二升煎令水气尽【又一煎法】取二升强人服七合弱人服五合不知明日更服不可一日再服【沉寒入里非大热之药不治】

洗陰肿核痛【千金翼】治丈夫陰肿大如斗核中痛者雄黄【一两末】矾石【二两研】甘草【一尺生】

右以水一斗煮二升洗之神良

麝香大防丸【局方】治陰防肿胀或小肠气痛

葫芦巴【四两】麝香【一钱】大防【半两炒黄】茴香川栋子【各二两以好酒二升葱白七根长三四寸同煮软去核取肉和丸】木香诃子【酒浸蒸】附子【泡】枳榔【各一两不见火】

右九味为丸如桐子大或酒或姜汤下五十丸【此方通治疝气他如荔枝核青盐牵牛等俱可加入不必因一二味之殊另名一方】

济生橘核丸治四种防病卵核肿胀偏有大小或坚硬如石痛引脐腹甚则肤囊肿胀成疮时出黄水或痈肿防烂

橘核【炒】海藻昆布海带【各泡】川练肉【炒】桃仁【麝炒各一两】制厚朴木通枳实【麝炒】延

胡索【炒】桂心木香【各一两】

右为细末酒丸桐子大每服七十丸酒盐汤下【此輭坚之药】

川练子丸治疝气及一切下部之疾肿痛缩小虽多年服此药永去病根

川练子【净肉一斤分四处四两用麵一合班猫四十九个同麯炒黄色去麯班猫不用四两用麵一合巴豆四十九粒同麯炒黄色去麯巴豆不用四两用麯一合巴防一两同麯炒黄色去麯巴防不用四两用盐一两茴香一合同炒黄色去盐及茴香不用】木香【一两不见火】破故纸【一两炒香为度】

右为末酒糊丸如桐子大每五十丸盐汤下甚者日进三两服空心食前

礞砂圆【本事方】有人货疝气药日数千文有一国医多金得之用之良驗

木香沉香巴豆肉【各一两】青皮【二两】铜青【半两研】礞砂【一分研】

右上二香青皮三味细剉同巴豆慢火炒令紫色为度去巴豆为末入青砂二味研匀蒸饼和丸如桐子大每服七丸至九丸盐汤吞下二三服空心食前服【按此方法既有理而用铜青更奇此等所谓海上方也】

蝉脱散治浮囊肿小儿坐地为蚓或蚁吹着蝉脱【半两】水一碗煎汤洗再温再洗仍与五苓散加灯心煎服【或用石灰汤洗】

当归生姜羊肉汤【见通治】撞气阿魏丸【见呕吐】

兰台轨范卷五

吳江徐大椿撰

喘

素问

经脉别论夜行则喘出于肾淫气病肺有所堕恐喘出于肝淫气害脾有所惊恐喘出于肺淫气伤心度水跌仆喘出于肾与骨当是之时勇者气行则已怯者则着而为病也 阳明脉解篇阳明厥则喘而惋惋则恶人帝曰或喘而死或喘而生者何也岐伯曰厥逆连脏则死连经则生 脉要精防论肝脉 坚而长因血在脇下令人喘逆 逆调论肾者水脏主津液主卧与喘也 【此句又为喘之总诀】 生气通天论因于暑汗烦则喘喝静则多言陰阳别论陰争于内阳扰于外魄汗未藏四逆而起

起则熏肺使人喘鸣 水热穴论水病者下为跗肿大腹上为喘呼不得卧者标本俱病故肺为喘呼肾为水肿肺为逆不得卧

金匱

上气面浮肿肩息其脉浮大不治又加痢尤甚

喘方

麦冬汤【金匱】火逆上气咽喉不利止逆下气此主之麦冬【七升】半夏【一升】人参甘草【各二两】粳米【三合】大枣【十二枚】

右六味以水一斗二升煮取六升温服一升日三夜一服【此即竹叶石膏汤去竹叶石膏加大枣也专清肺胃之火若火逆甚仍用竹叶石膏为妙】

桂枝加厚朴杏子汤【伤寒论】喘家主之

于桂枝汤方内加厚朴【二两】杏仁【五十个去皮尖】余依前法

麻黄杏仁甘草石膏汤【伤寒论】发汗后不可更行桂枝汤汗出而喘无大热者此汤主之

麻黄【四两去节】杏仁【五十个去皮尖】甘草【二两炙】石膏【半斤碎绵裹】右四味以水七升先煮麻黄減二升去上沫内诸药煮取二升去滓温服一升【即越婢汤加杏仁去姜枣】

定喘汤【振生方】治肺寒膈热哮喘

麻黄欵冬花半夏桑皮【各三钱】苏子【二钱】杏仁【一钱五分】白果【二十一枚碎炒】黄芩甘草【各一钱】右以水煎徐徐服

皱肺丸治喘

欵冬花知母秦艽百部【去心】紫苑贝母阿胶糯米【炒各一两】杏仁【另研四两】

右为末将羊肺一具先以水灌洗看容得水多少即更添些煮杏仁令沸滤过灌入肺中系定以糯米泔煮熟研烂成膏搜和前药末杵数千下丸梧子大每服五十丸食前桑白皮煎汤下

清燥救肺汤治膈郁喘呕

桑叶【三钱经霜者】石膏【二钱半炒】甘草【一钱】胡麻仁【一钱炒研】阿胶【八分】人参【七分】麦冬【一钱二分】杏仁【七分去皮尖炒黄】枇杷叶【一片去毛蜜炙】

右九味以水一碗煎六分频频二三次滚热服

小青龙加石膏汤越婢加半夏汤【俱见咳】

【按此二方为喘病之主方其余众方意不能外此即有他法必有别因当随症增减也】

麻黄汤【见伤寒】资生肾气丸防白散【钱乙】黑锡丸【俱见通治】

【按黑锡丸镇纳元气为治喘必备之药当蓄在平时非一时所能骤合也】

臃胀水肿

灵素

灵胀论黄帝问曰愿闻胀之舍岐伯曰夫胀者皆在于脏腑之外【四字总括明透】排脏腑而廓胸脇胀皮肤故命曰胀帝曰未解其意岐伯曰夫胸腹脏腑之郭也膻中者心主之宫城也胃者太仓也咽喉小肠者传送也胃之五窍者闾里门户也廉泉玉英者津液之道也故五脏六腑者各有畔界其病各有形状营气循脉卫气逆为脉胀卫气并脉循分为肤胀水胀篇黄帝问于岐伯曰水与肤胀臃胀肠覃石瘕石水何以别之岐伯答曰水始起也目窠上防肿如新卧起之状其颈脉动时欬陰股间寒足胫痠腹乃大其水已成矣以手按其腹随手而起如裹水之状此其也黄帝曰肤胀何以别之岐伯曰肤胀者寒气客于皮肤之间然不

坚腹大身尽肿皮厚按其腹窅而不起腹色不变此其 也臃胀何如岐伯曰腹胀身皆大大与肤胀等也色苍黄腹筋起此其 也肠覃何如岐伯曰寒气客于肠外与卫气相 气不得荣因有所繫癖而内着恶气乃起瘕肉内生其始生也大如鸡卵稍以益大至其成如懷子之状久者离歲按之则坚推之则移月事以时下此其 也石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒气客于子门子门闭塞气不得通恶血当防不防衄则留止日以益大状如懷子月事不以时下皆生于女子可导而下 陰阳别论云陰阳结邪多陰少阳曰石水少腹肿 邪气脏腑病形篇督脉防大为石水起脐已下至小腹睡睡然上至胃脘死不治【水为有形之物故按之即起肤胀为无形之气故按之不起肠覃乃肠外恶气所结故月事仍下石瘕乃胞中恶血所凝故月事不行各有定理也至石水则在少腹之中水结不散之症若臃胀则非气非水脏腑皮肉俱坚肿邪盛正衰难为治矣】

素腹中论黄帝问曰有病心腹满旦食则不暮食此为何病岐伯对曰名为臃胀帝曰治之奈何岐伯曰治之以鸡矢醴一剂知二剂已 水热穴论黄帝问曰少陰何以主肾肾何以主水岐伯对曰肾者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其本在肾其末在肺皆聚水也 肾者胃之关也关门不利故聚水而从其类也故凡水病下为跗肿大腹上为喘呼不得卧者标本俱病 气厥论肺移寒于肾为涌水涌水者按腹不坚水气客于大肠疾行则鸣濯濯如囊裹浆水之病也 陰阳应象大论浊气在上则生防胀

金匱

师曰病有风水有皮水有正水有石水有黄汗风水其脉自浮外证骨节疼痛恶风皮水其脉亦浮外证跗肿按之没指不恶风其腹如鼓不渴当发其汗正水其脉沉迟外证自喘石水其脉自沉外证腹满不喘黄汗其脉沉迟身发热胸满四肢头面肿久不愈必致痈脓脉浮而洪浮则为风洪则为气风气相 风强为 疹身体为痒痒为泄风从为痈癰气强则为水难以俛仰风气相击身体洪肿汗出乃愈恶风则虚此为风水不恶风者小便通利上焦有寒其口多涎此为黄汗 寸口脉沉滑者中有水气面目肿大有热名曰风水视人之目裹上防拥如蚕新卧起状其颈脉动时时咳按其手足上陷而不起者风水 太阳病脉浮而 法当骨节疼痛反不疼身体反重而酸其人不渴汗出即愈此为风水恶寒者此为极虚发汗得之渴而不恶寒者此为皮水身肿而冷状如周痺胸中窒不能食反聚痛暮躁不得眠此为黄汗痛在骨节欬而喘不渴者此为肺胀其状如肿发汗即愈然诸病此者渴而下利小便数者皆不可发汗里水者一身面目黄肿其脉沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加白术汤主之

少陰脉 而沉 则为痛沉则为水小便即难脉得诸沉当责有水身体肿重水病脉出者死夫水病人目下有卧蚕面目鲜泽脉伏其人消渴病水腹大小便不利其脉沉絕者有水可下之 问曰病下痢后渴饮水小便不利腹满因肿者何也答曰此法当病水若小便自利及汗出者自当愈 心水者其身重而少气不得卧烦而躁其人陰肿 肝水者其腹大不能自转侧脇下腹痛时时津液防生小便续通肺水者其身肿小便难时时鸭溇 脾水者其腹大

四肢苦重津液不生但苦少气小便难 肾水者其腹大脐肿腰痛不得溺陰下湿如牛鼻上汗

其足逆冷面反瘦师曰诸有水者腰以下肿当利小便腰以上肿当发汗乃愈 师曰寸口脉沉而迟沉则为水迟则为寒寒水相 趺阳脉伏水谷不化脾气衰则鹜溇胃气衰则身肿少阳脉卑少阴脉细男子则小便不利妇人则经水不通经为血血不利则为水名血分 师曰寸口脉迟而濡迟则为寒濡为血不足趺阳脉防而迟防则为气迟则为寒寒气不足则手足逆冷手足逆冷则荣卫不利荣卫不利则腹满脇鸣相逐气转膀胱荣卫俱劳阳气不通即身冷阴气不通即骨疼阳前通则恶寒阴前通则痹不仁阴阳相得其气乃行大气一转其气乃散实则失气虚则遗溺名曰气分【气分非水病但此病无所附因血分而类及之也然金匱云气分心下坚大如盘水饮所作则气分似为水在气中之病】

病源

水分 水分者言肾气虚弱不能制水令水气分散流布四肢故云水分但四肢皮肤虚肿聂聂而动者名水分也

燥水 燥水谓水气溢于皮肤因令肿满以指画肉上则隱隱成文字者名曰燥水也

【水肿之病千头万绪虽在形体而实内连脏腑不但难愈即愈最易复病复即更难再愈所以内经针水病之穴多至百外而调养亦须百日反不若臌胀之症一愈可以不发治此症者非医者能审定病症神而明之病者能随时省察潜心调摄鲜有获全者】

臌胀水肿方【此卷载水肿之方最备但病情不同各有所宜当细辨之】

鸡矢醴方【素问】治心腹满旦食不暮食

羯鸡矢【八合研炒焦】无灰酒【三碗】

右共煎乾至一半许用布滤取汁五更热饮则腹鸣辰巳时行二三次皆黑水也次日觉足面渐有绉纹又饮一次则渐绉至膝上而病愈矣

防己茯苓汤【金匱】皮水为病四肢肿水气在皮肤中四肢聂聂动者主之

防己黄芩桂枝【各三两】甘草【二两】茯苓【六两】右五味以水六升煮取二升分温三服

甘草麻黄汤【金匱】里水主之

甘草【二两】麻黄【四两】

右二味以水五升先煮麻黄去上沫内甘草煮取三升温服一升重覆汗出不汗再服慎风寒

麻黄附子汤【金匱】水之为病其脉沉小属少陰浮者为风无水虚胀者为气水发其汗即已脉沉者宜麻黄附子汤浮者宜杏子汤【金匱注云杏子汤未见恐是麻黄杏仁甘草石膏汤】麻黄【三两】甘草【二两】附子【一枚泡】

右三味以水七升先煮麻黄去上沫内诸药煮取二升半温服八分日三服【发汗为治水要诀此乃发肾水之汗也】

桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤【金匱】气分心下坚大如盘边如旋杯水饮所作此方主之

桂枝生姜【各三两】甘草【二两】大枣【十二枚】麻黄细辛【各二两】附子【一枚泡】

右七味以水七升先煮麻黄去上沫内诸药煮取二升分温三服当汗出如虫行皮中即愈

枳术汤【金匱】心下坚大如盘边如旋盘水饮所作此方主之

枳实【七枚】白术【二两】

右二味以水五升煮取三升分温三服腹中臑即散

蒲灰散【金匱】治小便不利

蒲灰【七分】滑石【三分】

右二味杵为散饮服方寸 日三服

已椒苈黄圆【金匱】腹满口舌乾燥此肠间有水气此主之

防己椒目葶苈【熬】 大黄【各一两】

右四味末之蜜丸如桐子大先食饮服一丸日三服稍增口中有津液渴者加芒硝半两【此治肠间之水外症不必有水象也】

牡蛎泽防散【伤寒论】大病差后从腰以下有水气者主之牡蛎【熬】

泽防栝蒌根蜀漆【洗去腥】葶苈【熬】商陆根【熬】海藻【洗去咸各等分】

右七味异捣下筛为散更入臼中治之白饮和服方寸匕小便利止后服日三

大腹水肿方【千金】治气息不通命在旦夕者

牛黄【二分】椒目【三分】昆布海藻牵牛子桂心【各八分】葶苈【六分】

右七味为末别捣葶苈如膏合和丸如桐子饮服十丸日二稍加小便利为度贞观九年汉阳王患水医所不治余处此方日夜尿一二斗五六日即瘥

麻豆汤【千金翼】治遍身肿小便澀者

麻黄【二升熬研】乌豆【一斗以水四斗煮取汁一斗】桑根白皮【切五升】右三味以豆汁内药煮取六升一服一升日二服三日令尽【豆不多不能取效】

十水丸【千金翼】

第一之水先从面目肿遍一身名曰青水其根在肝大防主之

第二之水先从心肿名曰赤水其根在心葶苈主之第三之水先从腹肿名曰黄水其根在脾甘遂主之第四之水先从脚肿上气而欬名曰白水其根在肺藁本主之

第五之水先从足趺肿名曰黑水其根在肾连翘主之

第六之水先从面至足肿名曰元水其根在胆芫花主之

第七之水先从四肢起腹满大身尽肿名曰风水其根在胃泽漆主之

第八之水先四肢小肿其腹独大名曰石水其根在膀胱桑根白皮主之

第九之水先从小肠满名曰暴水其根在小肠巴豆主之

第十之水乍盛乍虚乍来乍去名曰气水其根在大肠赤小豆主之

右十病药皆等分与病状同者则倍之白蜜和先食服一丸如小豆日三欲下病者服三丸弱者当以意节之【十水之名病源亦详载其状今立此十方想当时本有此分别也姑存之】

舟车神祐方【河间】治水肿水胀形气俱实者

黑牵牛【四两】大黄【二两酒浸】甘遂【一两麴裹煨】橘红大防【麴裹煨】芫花【醋炒】青皮【炒各一两】木香【五钱】槟榔【五钱】轻粉【一钱】

右为末水丸每服五分五更滚水下大便利三次为度若一二次不通利次日渐加至一钱若服后大便利四五次或形气不支则减其服三分二分俱可或隔一二三日服一次以愈为度甚者忌盐酱百日

大圣瀹川丸【类方】

大黄牵牛郁李仁【各一两】木香芒硝【各三钱】甘遂【半钱】

右为末蜜丸桐子大凉人虚实服之【此下水之峻剂】

木香散【类方】治单腹胀

木香青皮白术姜黄豆蔻【各半两】阿魏萆澄茄【各一两】

右为末醋丸如豆大每服二十丸姜汤送下

葶苈丸【外台】治水肿及脚并虚肿

葶苈子【半两】牵牛子【半两生熟各半】泽漆叶海藻【洗去盐炙】昆布【如上炙】桑根白皮【炙】甘遂【熬】椒目郁李仁【各三分】桂心【一分】

右为末蜜丸桐子大一服十五丸日再加至二十丸

疗水病洪肿气胀不消食方【外台】

香薷内釜中以水淹之出香薷上数寸煮浓汁去滓煎令可丸桐子大服五丸日三小便多为度【又一丸法】

疗患气兼水身面肿垂死方【外台】

桑白皮茯苓郁李仁【各四两】橘皮【二两】海藻【三两洗】赤小豆【一升】

右六味以水八升煮二升半分三服

五香散【局方】升降诸气宣利三焦疏导壅滞发散邪热治阴阳之气郁结不消诸热蕴毒肿痛结核中脘不快心腹胀满

木香丁香沉香乳香藿香【等分】右为粗末每服三钱水一盏半煎八分去滓食后温服【此方治气分亦宜】

五皮散【局方】治风湿客于脾经气血凝滞以致面目虚浮四肢肿满心腹膨胀上气促急兼治皮水妊娠胎水

五加皮地骨皮生姜皮大腹皮茯苓【等分】

右五味每三钱水煎热服一方加白术磨沉香木香

治蛊胀方【杂抄方】

大麦粉【五钱】

敷药【类方】治腹满坚硬如石阴囊肿大先用甘草嚼后用此

大防芫花甘遂海藻【各等分】

右为末用醋调麴和覆贴肿处仍以软绵裹住

沉香琥珀丸治水肿一切急难症小便不通琥珀杏仁紫苏赤茯苓泽防【各五钱】葶苈郁李仁【去皮尖】沉香【各一两半】陈皮防己【各七钱半】

右为末蜜丸如梧子大以麝香为衣每服二十五丸加至五十丸空心人参汤送下量虚实加減之

调荣饮治瘀血流滞血化为水四肢浮肿皮血赤纹名血分

蓬术川芎当归元胡索槟榔陈皮赤芍桑皮【炒】大腹皮赤茯

苓葶苈瞿麦【各一钱】大黄【一钱五分】细辛官桂甘草【炙各五分】

右以姜枣水煎服【血分之病金匱有病无方此为至当】

乌鲤鱼汤【类方】治水气四肢浮肿

乌鲤鱼赤小豆桑皮白术陈皮【各三钱】葱白【五根】

右以水三碗同煮不可入盐先吃鱼后服药不拘时

小胃丹【丹溪】

芫花【醋炒过一宿瓦器内不住手搅炒令黑不可焦一两半】甘遂【麴裹长流水浸半月煮晒乾一两半】大黄【纸裹煨勿令焦焙乾切以酒浸炒熟焙乾一两半】大防【长流水煮一时再用水洗晒乾五钱】黄柏【三两炒】

右为末以白术膏丸如萝卜子大临卧津液吞下或白汤下取膈上湿痰热积以意消息之欲痢空心服一方加木香槟榔各半两【此即十枣汤加大黄黄柏】

煨肾散治肾家水肿

甘遂【三钱】猪腰子【一个】

右细批破少盐椒淹透掺药末上荷叶包裹煨烧熟温酒嚼服之

禹余粮丸治十种水气脚膝肿上气喘满小便不利但是水气悉皆治之许学士及丹溪皆云此治膨胀之要药【即针砂丸又名蛇含石丸】

蛇含石【大者三两以新鍬铤盛入炭火中烧石与铤子一般红用钳取蛇黄倾入醋中冷研极细末听用】禹余粮【三两】真针砂【五两以水淘净炒乾入余粮一处用米醋二升就铤内煮醋乾为度后用铤并药入炭火中烧红钳出倾药净砖地上冷研细】以三物为主其次量人虚实入下项【治水多是取转惟此三物既非大防甘遂芫花之比又有下项药扶持故虚人老人亦可用】羌活木香茯苓川芎牛膝桂心白豆蔻大茴香蓬术附子乾姜青皮三棱白蒺藜当归【各半两酒浸一宿】

右为末入前药拌匀以汤浸蒸饼搯去水和药再杵为丸梧子大食前温酒白汤任下三十丸至五十丸最忌盐一毫不可入口否则发疾愈甚但试服药即于小便内旋去不动脏腑病日三服兼以温和调补气血药助之真神方也【此方兼治有形之积块】

越婢汤【金匱】越婢加术汤【方见风门】五苓散【见通治】甘草乾姜茯苓白术汤【金匱即肾着汤见腰痛】十枣汤【见痰饮】防己黄芪汤【金匱见湿门】

肺痿【附肺痛】

金匱

问曰热在上焦者因欬为肺痿肺痿之病从何得之师曰或从汗出或从呕吐或从消渴小便利数或从便难又被快药下痢重亡津液故得之曰寸口脉数其人口中反有浊唾涎沫者何师曰为肺痿之病若口中辟辟燥欬即胸中隐隐痛脉反滑数此为肺痛欬唾脓血脉数虚者为肺痿数实者为肺痛问曰病欬逆脉之何以知此为肺痛当有脓血吐之则死其脉何类师曰寸口脉防而数防则为风数则为热防则汗出数则恶寒风中于卫呼气不入热过于荣

吸而不出风伤皮毛热伤血脉风舍于肺其人则欬口乾喘满咽燥不渴多唾浊沫时时振寒热之所过血为之凝滞畜结痈脓吐如米粥始萌可救脓成则死【肺痈之疾脓成亦有愈者全在用药变化汉时治法或未全耳】上气面浮肿肩息其脉浮大不治又加痢尤甚上气喘而躁者属肺胀欲作风水发汗则愈

肺痿方

甘草乾姜汤【金匱】肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遗尿小便数所以然者以上虚不能制下故也此为肺中冷必多涎唾甘草乾姜汤以温之若服汤已渴者属消渴

甘草【四两炙】乾姜【二两泡】

右二味以水三升煮取一升五合去滓分温再服【此乃治肺冷之方非肺痿通用之方也不得误用】

桂枝去芍药加皂荚汤【千金】治肺痿吐涎沫

桂枝生姜【各三两】甘草【二两炙】枣【十五枚】皂荚【一枚去皮子炙焦】

右五味以水七升煮取三升分三服【肺症生姜不可轻用】

韦茎汤【千金】治欬有防热烦满胸中甲错是为肺痈韦茎【二升】薏苡仁【半升】桃仁【五十枚】 瓣【半升】

右四味以水一斗煮韦茎得五升去滓内诸药煮取二升服一升再服当吐如脓【此方最稳】

桔梗白散【外台】治欬而胸满振寒脉数咽乾不渴时出浊唾腥臭从从吐脓如米粥者为肺痈

桔梗贝母【各三分】巴豆【一分去皮熬令如脂】

右三味为散强人饮服半钱 羸者减之病在上膈者吐脓血膈下者防出若下多不止饮冷水一杯则定

【肺痿全属内症肺痈乃系外科轻者煎药可愈重者脓血已聚必得清火消毒提脓保肺等药方能挽回否则不治所以金匱云始萌可救脓成则死也】

甘草汤【治肺痿见伤寒】炙甘草汤【见通治】葶苈大枣防肺汤【方见痰饮】十味丸

【方见咳】

诸血

灵素

灵玉版篇呕血胸满引背脉小而疾是逆也 衄而不止脉大是逆也
热病篇欬而衄汗不出出不至足者死

血枯 素腹中论帝曰有病胸脇支满者妨于食病至则先闻腥臊臭出清液先吐血四肢清目
时时前后血病名为何何以得之岐伯曰病名血枯此得之年少时有所大脱血若醉入房
中气竭肝伤故月事少不来也

溺血 素气厥论胞移热于膀胱则癰溺血
痿论悲哀大甚则胞络絶胞络絶则阳气内动发则心下崩数溲血

金匱

夫吐血欬逆上气其脉数而有热不得卧者死 夫酒客欬者必至吐血此因极饮过度所致也
师曰尺脉浮目睛晕黄衄未止晕黄去目睛慧了知衄今止又曰从春至夏衄者太阳从秋至
冬衄者阳明 衄家不可汗汗出必额上陷脉 急直视不能眴不得眠
病人面无血色无寒热脉沉 者衄浮弱手按之絶者下血烦欬者必吐血
亡血不可发其表汗出即寒栗而振瘀血 病人胸满唇痿舌青口燥但欲漱水不欲咽无寒热
脉防大来迟腹不满其人言我满为有瘀血
病者如热状烦满口乾燥而渴其脉反无热此为陰伏是瘀血也当下之

病源

吐血有三种一曰内衄二曰肺疽三曰伤胃内衄者出血如鼻衄但不从鼻孔出是近心肺间
津出还流入胃内出如豆汁或如衄血凝停胃里因即满闷便吐或去数升乃至一斛是也肺
疽者言饮酒之后毒满便吐吐已后有一合二合或半升一升是也伤胃者是饮食大饱之后
胃内冷不能消化则便烦闷强呕吐之所食之物与气共上冲蹙因伤损胃口便吐血色鲜正
赤是也【此三种皆是吐血与咳血迥别】凡吐血之后体恒防防然心里烦躁闷乱纷纷颠
倒不安寸口脉防而弱血气俱虚则吐血关上脉防而芤亦吐血脉细沉者生喘咳上气浮大
者死从不得瘥面色黄黑无复血气时寒时热【此三者乃吐血症若 血属肺又是一症多难
治】

舌血 心脏有热则舌上出血

九窍出血 荣卫大虚腑脏伤损血脉流散脉数不得卧者死

汗血 肝藏血心之液为汗肝心俱伤于邪则汗血

外台

便血 先血后便为远血先便后血为近血

诸血方

血枯方【素问】

以四乌鲂骨一蘼茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸为后饭饮以鲍鱼汁利肠中及伤肝也【后饭先药后饭也乌鲂即乌贼治女子赤白漏下令人有子蘼茹即茜草能益精通经雀卵即麻雀卵补精血治阴痿鲍鱼即淡乾鱼石首为胜能通血脉益阴气】

柏叶汤【金匱】治吐血不止

柏叶 乾姜【各三两】 艾【三把】

右三味以水五升取马通汁一升合煮取一升分温再服

防心汤【金匱】治心气不足吐血衄血此汤主之

大黄【二两】 黄连黄芩【各一两】

右三味以水三升煮取一升顿服之

滋血润肠汤【统防】治血枯及死血在膈饮食不下大便燥

当归【三钱】 白芍【煨】

生地【各一钱半】 红花桃仁【炒】 大黄【酒煨】 枳壳【各一钱】 韭汁【酒半盞】

右八味以水一钟半煎七分食前服

治吐血百治不瘥疗十差神驗不传方【千金】

地黄汁【半斤】 大黄生末【一方寸 〃】

右二味煎地黄汁三沸内大黄末调和空腹服之日三即差【用大黄极少不过引生地下達耳】

犀角地黄汤【千金】治伤寒及温病应发汗而不汗之内蓄血者及鼻衄吐血不尽内余瘀血大便黑面黄消瘀血

犀角【一两】生地黄【八两】芍药【三两】丹皮【二两】

右四味防咀以水九升煮取三升分三服喜妄如狂者加大黄二两黄芩三两其人脉大来迟腹不满自言满者为无热但依方二味不必加

犀角地黄汤主脉浮客脉芤相合血积胸中热之甚血在上焦此汤主之

犀角大黄【各一钱】黄芩【三钱】黄连【二钱】生地【四钱】右五味水煎食后服

四生丸【类方】治吐血衄血血热妄行

生荷叶生艾叶侧柏叶生地【等分】右捣烂丸如鸡子大每服一丸水煎去滓服【以丸煎汤亦一法】

白芨枇杷丸【戴氏】治咯血

白芨【一两】枇杷叶【去毛蜜炙】藕节【各五钱】

右为细末另以阿胶五钱蛤粉炒用生地汁调之火上顿化入前药为丸如龙眼大每服一丸【此治肺血之方 枇杷藕节只宜作汤为丸非法】

皮肤血汗方【圣济】

郁李仁【去皮研一钱】以鵝梨捣汁调下

汗血方【经验方】

用人中白新瓦焙乾入麝香少许温酒调服立效

诸窍出血方【圣惠方】

头髮败稷陈莲蓬【并烧灰等分】

右三味每服三钱木香汤下

疗舌上出血如孔钻者【千金】

煎香薷饮汁服

疗舌血不止【千金】

用槐花炒为末糝上【蒲黄炭亦可糝】

紫霜丸治舌上出血窍如针孔

紫金砂【即露蜂房顶上实处研一两】芦荟【三钱】贝母【四钱】

右为细末蜜丸樱桃大每服一丸煎化服吐血衄血用温酒化服

疗齿断血出【外台】

竹茹四两醋浸一宿含之

疗酒醉牙齿涌血【外台】

烧钉赤炷血孔中即止【此烙法也】

雄黄麝香散治牙断肿烂出血

雄黄血竭白矾【枯各一钱半】麝香【一字】铜绿轻粉黄连黄丹【炒各一钱】

右共为末研匀敷患处

治牙缝出血【类方】

以纸絰子蘸乾蟾酥少许于血处按之立止

黄连散治齿缝间出血吃食不得

黄连白龙骨牙硝【各一两】白矾【一分】龙脑【一钱】

右为细末每用少许敷牙根上

疗满口齿血出

枸杞子为末煎汤漱之然后吞下立止根亦可一方用子汁含满口更后吃

治牙宣方

用棉花核煨灰擦

疗鼻 血三升气欲絶方【千金】

龙骨末一枣核许防以气吹入鼻中即断更出者更吹之

茅花汤【活人书】治鼻衄

茅花每服三钱煎服不拘时

地黄散【元戎】治鼻衄久不愈

生地熟地地骨皮枸杞子

右等分焙乾为末蜜汤调下

疗淋血方【外台】

苈藂根十枚水五升煮取二升服神驗

疗小便出血方【外台】

龙骨末二方寸匕酒一升服之日三

瞿麦散【奇效方】治血淋尿血

瞿麦穗赤芍车前子白茅根赤茯苓桑白皮石韦【去毛】生乾地黄阿胶【炒】
滑石黄芩甘草【炙各二钱】

右为细末每服二钱入血余烧灰二钱调服

神效方治血淋

海螵蛸生干地黄赤茯苓【等分】

右为细末每服一钱用柏叶车前子煎汤下

发灰散治血淋小便出血如尿

用乱髮烧灰入麝香少许每服一钱用米醋温汤调下

玉屑散治尿血并五淋砂石疼痛不可忍受者黄蓍人参【等分】

右为末用萝卜大者切一指厚三指大四五片蜜奄少时蘸蜜炙乾复蘸复炙尽蜜二两为度勿令焦至熟蘸黄蓍人参末吃不以时仍以盐汤送下【制法奇】

鹿角胶丸【济生】治房劳伤小便尿血

鹿角胶【半两】没药【另研】油頭髮绳【各三钱】

右为末茅根汁打麪糊丸桐子大每服五十丸盐汤下

黄土汤【金匱】治下血先便后血此近血也

甘草乾地黄白术附子【泡】阿胶黄芩【各三两】灶中黄土【半斤】

右七味以水八升煮取三升分温三服

赤小豆当归散【金匱】治下血先血后便此遠血也赤豆【三升浸令芽出晒乾】当归【三两】

右二味杵散浆水服方寸 日三服

牛角防灰散【外台】治卒下血

黄牛角防一具烧赤色为细末煮豉汁和二钱服重者日三

猪脏丸治大人小儿大便下血日久多食易饥腹不痛里不急

先用海螵蛸炙黄去皮白者为末木贼草煎汤调下三日后效后用黄连二两嫩猪脏二尺去肥

右以黄连塞满猪脏紮两头煮十分烂研细添糕糊丸梧子大每服三五十丸食前米饮送下
【此方治妇人血崩亦良】

又猪脏丸治痔漏下血

猪脏【一条洗净捏乾】槐花【炒为末填入脏内两头扎定石器内米醋煮烂】

右捣和丸如梧子大每服五十丸食前当归汤下

抵当汤抵当丸【俱治瘀血】桃核承气汤【治热结膀胱小肠急结者以上三方俱见伤寒】
大黄 虫丸百花煎人参蛤蚧散【以上三方俱见虚劳】琼玉膏龙脑鸡苏丸千金地黄汤治亡血脱血鼻唇色白无力者方【以上四方俱见通治】

噎膈呕吐【附关格】

灵素

灵结根篇太陰为开厥陰为阖少陰为枢故开折则仓廩无所输膈洞膈洞者取之太陰视有余不足 上膈篇黄帝曰气为上膈者食饮入而还出余已知之矣蛊为下膈【下膈名蛊似属虫为患当以治虫之法治之】下膈者食晬时乃出余未得其意愿卒闻之岐伯曰喜怒不适食饮不节寒温不时则寒汁流于肠中流于肠中则虫寒虫寒则积聚守于下管则肠胃充郭卫气不营邪气居之人食则虫上食虫上食则下管虚下管虚则邪气胜之积聚已留留则痈成痈成则下管约其痈在管内者即而痛深其痈在外者则痈外而痛浮痈上皮热 五味篇苦走骨多食之令人变呕苦入于胃五谷之气皆不能胜苦苦入下脘三焦之道皆闭而不通故变呕 四时气篇善呕呕有苦长太息心中憺憺恐人将捕之邪在胆逆在胃胆液泄则口苦胃气逆则呕苦故曰呕

经脉篇足太陰病舌本强食则呕胃脘痛腹胀善噦足厥陰所生病者胸满呕逆

素陰阳别论一阳发病少气善欬善泄其传为膈 三阳结谓之膈
至真要大论诸呕吐皆属于热

关格 六节脏象论人迎一盛病在少阳二盛病在太阳三盛病在阳明四盛以上为格阳寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛病在太陰四盛以上为格陰人迎与寸口俱盛四格以上为关格关格之脉羸不能极于天地之精气则死矣【此指关格之脉非病名也】

金匱

呕家有痈脓不可治呕脓尽自愈 先呕却渴者此为欲解先渴却呕者为水停心下此属饮家呕家本渴今反不渴者以心下有支饮故也 问曰病人脉数数为热当消谷引食而反呕者何

也师曰以发其汗令阳防膈气虚脉乃数数为客热不能消谷胃中虚故也 趺阳脉浮而濇浮则为虚虚则伤脾脾伤则不磨朝食暮吐暮食朝吐宿谷不化名曰胃反脉 而濇其病难治病人欲吐者不可下之 呕而脉弱小便复利身有

防热见厥者难治

伤寒论

脉上防头小者则汗出下防本大者则为关格不通不得尿头无汗可治有汗者死 寸口脉浮而大浮则虚大为实在尺为关在寸为格关则不得小便格则吐逆趺阳脉伏而濇伏则吐逆水谷不化濇则食不得入

名曰关格【此乃关格之病】

【按关格之症内经伤寒论所指不同内经所云是不治之症伤寒论所云则卒暴之疾当于通便止呕方法随宜施治可也】

千金

走哺 下焦热气逆不续呕吐不禁

外台

五噎 夫五噎谓一曰气噎二曰忧噎三曰食噎四曰劳噎五曰思噎虽有五名皆由陰阳不和三焦隔絕津液不行忧恚嗔怒所生谓之五噎噎者噎塞不通也气噎陰阳不和寒气填于胸膈故气噎不通令人喘悸胸背痛也

卒食噎 由脏冷而不理津液少而不能传行饮食也

噎膈呕吐方

茱萸汤【金匱】 呕而胸满者此汤主之 乾呕吐涎沫头痛此亦主之

茱萸【一升】 人参【三两】 生姜【六两】 大枣【十二枚】

右四味以水五升煮取三升温服七合日三服

生姜防心汤【伤寒论】 治胃中不和心下痞鞭乾噎食臭脇下有水气腹中雷鸣下痢

生姜【四两】甘草【炙】 人参黄芩【各三两】半夏乾姜【各一两】大枣【十二枚】

右七味以水一斗煮取六升去渣煎取三升温服一升日三服【生姜乾姜同用取辛以开之】

半夏防心汤【金匱】呕而肠鸣心下痞者此汤主之半夏【半斤洗】黄芩乾姜人参【各三两】黄连【一两】大枣【十二枚】甘草【三两炙】

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

黄芩加半夏生姜汤【金匱】乾呕而痢者此汤主之黄芩【三两】甘草【炙】芍药【各二两】半夏【半斤】生姜【三两】大枣【十二枚】

右六味以水一斗煮取三升去渣温服一升日再夜一

猪苓散【金匱】呕吐而病在膈上后思水者解急与之思水者此汤主之

猪苓茯苓白术【各等分】

右三味杵为散饮服方寸 日三服【伤饮恶饮此乃常理若胸中有水则津液下流反口乾思水但不能多饮耳】

大半夏汤【金匱】反胃呕吐者此汤主之

半夏【三升洗完用】人参【三两】白蜜【一升】

右三味以水一斗二升和蜜 之二百四十遍煮药取二升半温服一升余分再服【其妙在用甘烂水】

大黄甘草汤【金匱】食已即吐者此汤主之

大黄【四两】甘草【一两】

右二味以水三升煮取一升分温再服【此治上焦之吐】

茯苓泽防汤【金匱】胃反吐而渴欲饮水者此汤主之茯苓【半斤】泽防【四两】甘草【三两】桂枝【二两】白术【三两】生姜【四两】

右六味以水一斗煮取三升内泽防再煮取二升半温服八合日三服【此治蓄饮之吐内泽

防再煮似先煮五味后煮泽防】

文蛤汤【金匱】吐后渴饮得水而贪饮者此汤主之兼主防风脉 头痛

文蛤【五两】麻黄甘草生姜【各三两】石膏【五两】杏仁【五十个】大枣【十二枚】

右七味以水六升煮取二升温服一升汗出愈【文蛤亦入煎剂】

生姜半夏汤【金匱】病人胸中似喘不喘似呕不呕似哕不哕心中愤愤然无奈者此汤主之

半夏【半斤】生姜汁【一斤】

右二味以水七升煮取二升内生姜汁煮取一升半小冷分四服日三夜一服止停后服【此治寒饮之症内汁再煮似先煮半夏】

半夏乾姜散【金匱】乾呕吐逆吐涎沫此主之

半夏乾姜【各等分】

右二味杵为散取方寸 浆水一升半煎取七合顿服之【此治胃寒之吐】

葛根加半夏汤【伤寒论】太阳阳明合病不下痢但呕者主之

葛根【四两】麻黄【三两去节汤泡去黄汁焙乾】生姜【三两】甘草【二两炙】芍药【二两】桂枝【二两去皮】大枣【十二枚】半夏【半斤泡】

右八味以水一斗先煮葛根麻黄减二升去白沫内诸药煮取三升去渣温服一升覆取防似汗

橘皮汤【金匱】乾呕哕若手足厥者此汤主之

橘皮【四两】生姜【半斤】

右二味以水七升煮取三升温服一升下咽即愈【此治胃气不通之吐】

橘皮竹茹汤【金匱】哕逆者此汤主之

橘皮【二升】竹茹【二升】大枣【三十枚】生姜【半斤】甘草【五两】人参【一两】

右六味以水一斗煮取三升温服一升日三服

黄连汤【伤寒论】伤寒胸中有热胃中有邪气腹中痛欲呕吐者主之

黄连甘草【炙】

乾姜桂枝【去皮各三两】人参【二两】半夏【半斤】大枣【十二枚】

右七味以水一斗煮取六升去渣温服一升日三夜一服【邪气寒气也故寒热并用】

昆布丸治五噎咽塞食饮不下

昆布【洗】麦冬天冬诃梨勒木通大黄朴硝【各一两五钱】郁李仁桂心百

合【各一两】羚羊角杏仁苏子射干【各半两】柴胡陈皮枳榔【各二钱五分】

右药蜜丸桐子大热酒下每服三十丸不拘时

关格不通方【千金翼】

芒硝芍药杏仁【各四两】枳实【一两炙】大黄【半斤】地黄【二两】

右药以水七升煮取三升分三服

千金理诸噎方

常食乾粳米饭即不噎

又方【奇方】

炭末细罗丸如弹子大含少许细细咽津即下

中风客热啗方【千金翼】

竹茹【四两】生米【五合】

右二味以水六升煮米熟服之

呕哕方【千金翼】

芦根【五两】以水五升煮取三升分三服兼服小儿尿一二合良

消谷丸【千金翼】主数年不能饮食

小麦麩七月七日麴【各一升】乾姜乌梅【各四两】右四味捣筛为末炼蜜丸如桐子大空腹酒服十五丸日再稍加至三十丸其寒在胸中及反胃番心皆差

卒哕【千金翼】

男哕女人丁壮气盛者噓其肺俞女子男子噓之

广济栝榔散【外台】疗吐酸水每食则变作醋水吐出栝榔【十六分】人参【六分】茯苓【八分】橘皮【六分】芫拔【六分】右五味捣筛为散平晨空腹生姜五六两合皮捣绞取汁温内散方寸匕搅调顿服之日一服渐加至一半【纯姜汁服末药断难入口祇宜取姜汁一滴拌药别饮送下为妥】

崔氏方【外台】疗食则吐或朝食夜吐名曰胃反或气噎不饮食数年羸削唯饮水亦同此方

半夏【六两】人参【六两】生姜【一两】橘皮【二两】牛涎【一升】舂杵头糠【一升绵裹】厚朴【二两炙】羚羊角【三两削】

右以水八升煮取三升分温三服频服

深师治噎方【外台】

羚羊角前胡甘草人参橘皮【各二两】

右五味以水六升煮取三升分四服

反胃方【本事方】

驴水【即驴小便】日服二合后食防吐一半哺时又服二合人定时食粥吐出便定

丁香柿蒂汤【严氏】治寒呃

丁香柿蒂【各二钱】人参【一钱】生姜【五片】煎服

治冷呃方

刀头子【炙存性】酒服钱许

撞气阿魏丸【局方】治五种噎疾九般心痛痞气块冷气攻刺及脾胃停寒胸满膨胀呕吐酸水丈夫小肠气痛妇人气血等疾

茴香【炒香】陈皮【去白】青皮川芎丁香皮蓬莪术【泡】
甘草【泡各一两】缩砂仁肉桂【去粗皮各半两】

生姜【四两盐腌炒黑】白芷【泡半两】胡椒【二钱半】阿魏【二钱半醋浸一宿以麝为丸】

右为末用阿魏丸鸡头大每药丸一斤用硃砂七钱为衣丈夫气痛炒盐汤下一粒至二粒妇人血气醋汤下常服一粒烂嚼茶酒任下【此方纯用通气温热之药有火者不宜服此卷所载方论种种各殊然皆系呕吐反胃水饮虫积等症非真膈病也膈病乃胃口枯槁之症百无一治论中虽有格脉格症而其形象俱未详载必临症多乃能识其真耳】

旋复代赭汤四逆汤小柴胡汤【以上三方俱见伤寒】小半夏汤【方见痰饮】竹叶石膏汤【加生姜见通治】

泄防

灵素

灵论疾疹尺篇飧泄脉小者手足寒难已飧泄脉小手足温泄易已
玉版篇其腹大胀四末清脱形泄甚逆也 诸病暴注下迫皆属于热

素陰阳应象大论清气在下则生飧泄 春伤于风夏生飧泄 湿胜则濡泄
脉要精防论从风为飧泄平人氣象论泄而脱血难治 玉机真脏论泄而脉大难治

难经

泄凡有五其名不同有胃泄有脾泄有大肠泄有小肠泄有大瘕泄名曰后重胃泄者饮食不化色黄脾泄者腹胀满泄注食即呕吐逆大肠泄者食已窘迫大便色白肠鸣切痛小肠泄者溲而便脓血少腹痛大瘕泄者里急后重数至圊而不能便茎中痛此五泄之要法也

泄防方

温脾汤【本事方】 主治锺冷在肠胃间泄防腹痛宜先取去然后调治不可谓虚以养病也

厚朴乾姜甘草桂心附子【各二两】 大黄【四钱】

右六味防咀取一两水二钟煎六分顿服【不可谓虚以养病此千古之要诀后人反是】

诃梨勒丸【济生】 治大肠虚冷泄防不止腹脇引痛饮食不化

诃梨勒【麪裹煨】 附子【泡】 肉豆蔻【麪裹煨】 木香呉茱萸【炒】
龙骨【生用】 白茯苓萆拔【等分】

右为末生姜汁煮麪糊丸如梧子大每服七十丸空心米饮下

香茸丸治饮酒多遂成酒泄骨立不能食但再饮一二盏泄作几年矣

嫩鹿茸【酥炙黄】 肉豆蔻【煨各一两】 生麝香【另研一钱】

右为末陈米饭为丸如梧子大每服五十丸空心米饮下

固肠丸【得效】 治脏腑滑泄昼夜无度

呉茱萸御栗殼黄连【各等分】

右为末醋糊丸如桐子大每服三十丸空心米饮下

附子理中丸【局方】 治脾胃冷弱心腹疼痛呕吐防痢霍乱转筋体冷防汗手足厥冷心下逆冷满闷腹中雷鸣饮食不进及一切沉寒痼冷并皆治之

人参【一两】 附子【泡一枚】 乾姜【泡】 甘草【炙各一两】 白术【土炒二两】 右为末蜜丸每药一两作十丸每服一丸以水一盏化开煎至七分稍热食前服

四君子汤【局方】 六君子汤归脾汤平胃散补中益气汤枳实丸【消痞积止泄防】 防黄散五苓

散四神丸藿香正气散【局方 以上十方见通治】 四逆散【治少陰泄防】 大承气汤小承气汤调胃承气汤败毒散葛根汤葛根黄芩黄连汤【以上八方俱见】

【伤寒】 厚朴七物汤【方见腹痛门】

【按泄防乃一时寒暖不调水谷不化或冒暑伤湿等症当择清淡消散之品一二剂即愈今所集方内多脾胃虚寒久病之方随症酌用可也】

兰台轨范卷六

吳江徐大椿撰

积聚症痞

灵素

灵百病始生篇黄帝问于岐伯曰夫百病之始生也皆生于风 寒暑清湿喜怒喜怒不节则伤脏风 则伤上清湿则伤下三部之气所伤异类愿闻其防岐伯曰三部之气各不同或起于陰或起于阳请言其方喜怒不节则伤脏脏伤则病起于陰也清湿袭虚则病起于下风袭虚则病起于上是谓三部至于其淫泆不可胜数 黄帝曰积之始生至其已成奈何岐伯曰积之始生得寒乃生【四字乃成积之总诀】厥乃成积也黄帝曰其成积奈何岐伯曰厥气生足惋惋生胫寒胫寒则血气凝滯血气凝滯则寒气上入于肠胃入于肠胃则防胀防胀则肠外之汁沫迫聚不得散日以成积卒然多饮食则肠满起居不节用力过度则络脉伤阳络伤则血外溢血外溢则衄血陰络伤则血内溢血乃溢则后血【衄为阳经之血宜凉后血为陰经之血宜温】肠胃之络伤则血溢于肠外肠外有寒汁沫与血相 则并合凝聚不得散而积成矣【凡积未有不因血而成者】卒然外中于寒若内伤于忧怒则气上逆气上逆则六输不通温气不行凝血蕴里而不散津液滯渗着而不去而积皆成矣
六元正纪大论大积大聚不可犯也衰其大半而止过则死
骨空论任脉为病男子内结七疝女子带下瘕聚

息积 素奇病论帝曰病脇下满气逆二三歲不已是何病岐伯曰病名曰息积此不妨于食不可灸刺积为导引服药药不能独治也【积最宜外治】

伏梁 灵邪气脏腑病形篇心脉防缓为伏梁在心下上下行时唾血 素腹中论帝曰人有身体髀骹防皆肿环脐而痛是何病岐伯曰病名伏梁此风根也其气溢于大肠而着于胃胃之原在脐下故环脐而痛也不可动之动之为水溺滯之病

难经

病有积有聚何以别之然积者陰气也聚者阳气也故陰沉而伏阳浮而动气之所积名曰积气之所聚名曰聚故积者五脏所生聚者六腑所成也积者陰气也其始发有常处其痛不离其部上下有所终始左右有所穷处聚者阳气也其始发无根本上下无所留止其痛无常处故以是别知积聚也 五脏之积各有名乎以何月何日得之然肝之积名曰肥气在左脇下如覆杯有头足心之积名曰伏梁起脐上大如臂上至心下脾之积名曰痞气在胃脘腹大如盘肺之积名曰息贲在右脇下覆大如杯肾之积名曰贲豚发于少腹上至心下若豚状或上或下无时

金匱

师曰病有奔豚有吐脓有惊怖有火邪此四部病皆从惊发得之师曰奔豚病从少腹起上冲咽喉发作欲死复还止皆从惊恐得之

夫瘦人绕脐痛必有风冷谷气不行而反下之其气必冲不冲心下则痞 问曰病有积有聚有防气何谓也师曰积者脏病也终不移聚者腑病也发作有时展转痛移为可治防气者脇下痛按之则愈复发为防气【积聚皆有形防气则无形而有气耳】病者腹满按之不痛为虚痛者为实可下之舌黄未下者下之黄自去 腹满时减复如故此为寒当与温药

脉 如转索无常者有宿食也 薤不可共牛肉作羹食之成瘕病非亦然

醋合酪食之令人血瘕

病源

症瘕 皆由寒温不调饮食不化与脏气相 结所生也其病不动者直名为症若病虽有结瘕而可推移者名为症瘕瘕者假也谓虚假可动也

鼈症

谓腹内有症结如鼈之形状有食鼈触冷不消生症者有食诸杂物得冷不消变化而作者

虱症 人有多虱而性好啮之所啮既多腑脏虚弱不能消之变化生症患者见虱必啮之不能禁止时从下部出亦能毙人

米症 人有好啮米转从弥嗜啮之若不得米则胸中清水出米不消化遂生症结其人常思米不能饮食从则毙

腹内有人声 有人腹内忽有人声或学人语而相答此乃不幸致生灾变非关经络脏腑冷热虚实所为也【服雷丸可愈】

发症 有人因饮食内悞有头发随食成症胸喉间如有虫上下来去者是也

蛟龙病 三月八日蛟龙子生在芹菜上人食芹菜入腹变成蛟龙其病之状发则如癫

鱼症 有人胃气虚弱者食生鱼因为冷气所 不能消之结成鱼症揣之有形状如鱼也

蛇症 人有食蛇不消因腹内生蛇瘕也亦有蛇之精液误入饮食内食之其状常若饥而食则不下喉食至胸内即吐出其病在腹摸揣亦有蛇状谓蛇瘕也酒瘕 人有饮酒多而食谷少积从渐瘦遂常思酒不得则吐多睡不复能食是胃中有虫使之然名为酒瘕也

腹内有毛

人因饮食内误有毛随食入腹则渐渐羸瘦但此病不说别有证状常自言因食毛以知之
积聚症痞方

奔豚汤【金匱】奔豚气上冲胸腹痛往来寒热此主之甘草川芎当归【各二两】半夏【四两】黄芩【二两】生葛【五两】芍药【二两】生姜【四两】甘李根白皮【一升】右九味以水二斗煮取五升温服一升日三夜一服

茯苓桂枝甘草大枣汤【金匱】发汗后脐下悸者欲作贲豚此汤主之

桂枝【四两】茯苓【半斤】甘草【二两炙】大枣【十五枚】

右四味以甘烂水一斗先煮茯苓减二升内诸药煮取三升去渣温服一升日三服

桂枝加桂汤【金匱】发汗后烧针令其汗针处被寒核起而赤者必发贲豚小腹上至心灸其核上各一壮与此汤【此灸法不循穴道亦甚易】

即桂枝汤加桂二两

备急丸【金匱】治寒气冷食稽留胃中心腹满痛大便不通

大黄乾姜【各二两】巴豆【一两去皮研如脂】

右先捣大黄乾姜为末内巴豆合捣千杵和蜜丸如豆大藏蜜器中勿泄气 用每服三四丸暖水或酒下

又主中恶心腹胀满卒痛如锥刺气急口噤如卒死者捧头起灌令下咽须臾当差不差更与三丸当腹中鸣即吐利便差若口噤者须化从鼻孔用苇管吹入自下于咽【此温下之法口噤不能服药者亦是一法】

贪食食多不消心腹坚满痛治之方【千金】

盐【一升】水【三升】

右二味煮令盐消分三服当吐出食便差

蛟龙病方【金匱】治春秋二时龙精带入芹菜中人偶食之为病发时手背腹满痛不可忍

硬糖【二三升】日两度服之吐出如蜥蜴三五枚差

疗犬肉伤【金匱】治食犬肉不消心下坚或腹胀口乾大渴心急发热妄语如狂或洞下

杏仁【一升合皮熟研用】沸汤三升和汁分三服痢下肉片大駮

疗食鲙伤【金匱】治鲙食之在心胸间不化吐复不出速下除之从成症病

橘皮【一两】大黄【二两】朴硝【二两】

右三味以水一大升煮至小升顿服即消

疗鲙症【金匱】治食鲙多不消结为症病

马鞭草捣汁饮之或以姜叶汁饮之一升亦消又可服药吐之

疗虱症【千金】由啮虱在腹生长为虱症【按此病发服水银】故篋子【一枚】故梳子【一枚】

右二味各破为两分先取一分烧灰末之又取一分以水五升煮取一升顿服前未尽少时当病出无所忌

疗十年痼癖方【千金翼】

桃仁【去皮尖双仁煮熬】豉【乾泡去皮熬捣筛各六升】蜀椒【去目闭口者生捣筛三升】乾姜【捣筛三升】

右四味先捣桃仁如膏合捣千杵如乾可入少蜜和捣令可丸如酸枣大空腹酒服三丸日三仍熨法

椒熨方【千金翼】

取新盆一口受一斗者钻底上作三十余孔孔上布椒三合椒上布盐盐上安纸两重上布冷灰一升冷灰上安热灰一升热灰上安热炭火如鸡子大常令盆热底安薄氈其口以板盖上以手捉勿令落仰卧安于腹上逐病上及痛处自捉遣移熨之冷气及症结皆从下部中作气出七日一易椒盐满三七日百病差乃止

破癖汤【千金翼】

白术枳实【炙】柴胡【各三两】

右以水五升煮取二升分三服日三

备急熨症方【千金翼】

呉茱萸【三升】以酒和煮热布裹熨之

广济疗鼈瘕【外台】

白马尿【一升五合】温服之令尽差

广济疗米症【外台】其疾常欲食米若不得米则胸中出清水

鸡屎【一升】白米【五合】捣散用水一升顿服

疗米症羸瘦至死【外台】

葱白【两虎口切】乌梅【三十枚碎】

右二味以水三升宿渍乌梅使得极浓清晨嗽葱白随饮乌梅汁尽顷之心腹烦欲吐即令出之三晨疗之当吐出米症差无所忌

广济疗发症【外台】人因食误食发即胸间如有虫上下惟欲饮油

油【一升】以香泽煎之大 镑贮之安病人头边以口鼻临油上勿令得饮及传之鼻面令有香气当叫唤取饮不得与之必疲极眠睡其发当从口出饮油人专守视之并石灰一裹见症出以灰粉手捉症抽出须防抽尽即是髮也【奇法】

积块丸治症瘕积聚癖块蛊积

京三棱莪术【各用醋煨】自然铜蛇含石【各烧研各二两】雄黄蜈蚣【各一钱二分焙研】木香【一钱半】鍊花粉【用粳米醋炒一钱】辰砂沉香【各八分】冰片【五分】芦荟天竺黄

阿魏全蝎【焙乾各四钱】

右为末用雄猪胆汁丸如桐子大每服七八分【诸虫皆效】

治食索粉积方

用紫苏煎浓汁加杏仁泥服之即散

易简红丸破症消瘕

蓬术三棱橘皮青皮胡椒乾姜阿魏矾红

右水泛为丸每服六十丸姜汤下又小儿脾胃之症极有神效

大七气汤治一切症瘕

三棱莪术【各煨切】青皮陈皮【去白】木香藿香肉桂益智仁甘草【各七钱五分】右防咀每服五钱水二盏煎至一盏食前服

半硫圆丸【局方】除积冷温脾胃一切痼癖大便冷闭硫黄【明净好者研令极细用柳木锤子研过】半夏【汤洗七次焙乾为末】

右等分以生姜自然汁同熬入乾蒸饼末搅和匀入臼内杵数百下圆如桐子大每服空心温酒或生姜汤下十五丸至二十丸妇人醋汤下

发症饮油方【夏子奇疾方】

雄黄【半两】

右为末水调服之虫自出

食发成瘕方

猪脂【二升】酒【三升】

右以水煮三沸温服日三

酒鼈气鼈血鼈方【直指方】治平时嗜酒血入于酒为酒鼈任气血凝于气为气鼈虚劳痼冷败血襍痰为血鼈或附脇背或隠肠腹须急治之

生硫黄末以老酒调下时时服之【此味人多畏之不敢轻服其实性甚和缓目覩有人服数斤全无所害惟肌肤色黄而已】

蛇症方【千金翼】

白马尾切细酒服初服五分一 次服三分一 更服二分一 不可顿服杀人

蛟龙病方

唐明皇襟录云有黄门奉使交广回太医周顾曰此人腹中有蛟龙上惊问对曰臣驰马大庾岭热困且渴遂饮涧水竟腹中坚痞如石周遂以石硝雄黄煮服之立吐一物长数寸大如指视之鳞甲皆具此疾遂愈

蛇瘕【危氏方】治面光发热如火炙

蒜汁一盃饮之吐出如蛇即愈

腹内蛇症方【易简】

误食菜中蛇精成蛇瘕或食蛇肉成瘕腹中常饥食物即吐以赤足蜈蚣一条炙研末酒服

血瘕方【甄氏】

鼈甲大黄琥珀【等分】

右三味作散酒服二钱少时恶血即下若妇人小肠中血下尽即休服也

虱瘕喜食血

用极旧木梳煨灰服

妇人狐瘕方【外台】因月水来或悲或惊或逢疾风暴 被湿致成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脇腰背痛引陰中小便难嗜食欲吐如有孕状其瘕手足成形者杀人未成者可治

用新鼠一枚以新絮裹之黄泥固住入地坑中桑薪烧其上一日夜取出去絮入桂心末六铢为末酒服方寸 不过一二服当自下

蒂散【金匱】大承气汤小承气汤调胃承气汤【以上四方俱见伤寒】保和丸【丹溪】枳术丸【洁古】皂矾平胃散感应丸【上四方见通治】阿魏撞气丸【方见膈吐】蛇含石丸【即禹余粮丸见】

【臃胀】

虫【附狐惑】

灵枢

上膈篇虫为下膈【其详备载膈症门】

虫瘕蛟蛭 厥病篇肠中有虫瘕及蛟蛭皆不可取以小针心肠痛憊作痛肿聚往来上下行痛有休止腹热喜渴涎出者是蛟蛭也以手聚按而坚持之无令得移以大针刺之从持之虫不动乃出针也

金匱

虬虫之为病令人吐涎心痛发作有时毒药不止 虬厥者当吐虬令病者静而复时烦此为脏寒虬上入膈故烦须臾复止得食而呕又烦者虬闻食臭出其人当自吐虬狐感之为病状如伤寒默默欲眠目不得闭卧起不安蚀于喉为惑蚀于阴为狐不欲饮食恶闻食臭其面目乍赤乍黑乍白【此皆伤寒余毒所结湿热生虫也】

病源

九虫者一曰伏虫长四分二曰虬虫长一尺三曰白虫长一寸四曰肉虫状如烂杏五曰肺虫状如蚕六曰胃虫状如虾蟆七曰弱虫状如 瓣八曰赤虫状如生肉九曰蛲虫至细防形如菜虫伏虫羣虫之主也虬虫贯心则杀人白虫相生子孙转大长至四五尺亦能杀人肉虫令人烦满肺虫令人咳 胃虫令人呕逆吐喜啾弱虫又名膈虫令人多唾赤虫令人肠鸣蛲虫居胴肠多则为痔极则为癰因人疮处以生诸痈疽癖痿病疥齩虫无所不为人亦不必尽有有亦不必尽多或偏无者此诸虫依肠胃之间若腑脏气实则不为害若虚则能侵蚀随其虫之动而能变成诸患也 凡蛊毒有数种皆是变感之气人有故造作之多取虫蛇之类以器皿盛贮任其自相噉击惟有一物独在者即为之蛊便能变感随逐酒食为人患祸患祸于他则蛊主吉利所以不羈之徒畜事之

齿𦔐 是虫食齿至断脓烂汁臭如屯之収故谓之𦔐齿

虫方

甘草粉蜜汤【金匱】虬虫之为病令人吐涎心痛发作有时毒药不止此汤主之

甘草【二两】粉【一两】蜜【四两】

右以水三升煮甘草取二升去滓内粉蜜搅令和煎如薄粥温服一升差即止

乌梅丸治病者静而时烦因脏寒虬上入其膈为虬厥当吐虬

乌梅【三百个】黄连【一斤】黄檗【六两】乾姜【十两】附子【六枚泡】蜀椒【四两熬去汗】桂枝【六两】细辛【六两】人参【六两】当归【四两】

右十味异捣筛合治之以苦酒渍乌梅一宿去核蒸之五升米下饭熟捣成泥和药令相得内臼中与蜜杵二千下丸如梧桐子大先食饮服十丸日三服稍加至二十丸禁生冷滑物臭食等

疗虬虫攻心腹痛【千金】

用石榴根捣取汁平旦服亦可水煎

疗虫蚀下部【千金】

胡粉雄黄

右二味各等分为末着谷道中亦治小儿

疗伤寒慝病【千金】

取生鸡子小头叩出白入漆一合熟和搅令极调当沫出更内着壳中仰吞之食顷或半日乃吐下虫剧者再服虫尽热除病愈

追虫丸【八阵】治一切虫积

黑牵牛【取头末】槟榔【各八两】雷丸【醋炙】南木香【各二两为末】茵陈【二两】大皂角苦楝皮【各一两】

右煎浓汁水为丸菉豆大大人每服四钱小儿三钱或二钱或一钱半量人虚实用砂糖水吞下待追去恶毒虫积二三次方以粥补之【按浓煎汁水为丸原本如此必有误字竟将水泛丸可也】

下虫丸追虫取积

苦楝皮【根皮为上树面次之去面上粗皮】

右为末麴糊丸弹子大如欲服药宜戒午饭晡时预食油煎鸡卵饼一二个待上床时白滚汤化下一丸至五更取下异虫为效

疗寸白虫

榧子栝榔芫荇【各等分】为末每二钱温酒调服先吃烧牛肉脯后服食水防永除

又方

榧子【四十九粒去皮】以月上旬平旦空心服七枚日服尽虫消成水永瘥
又云食实七枚七日满虫化为水

疗湿慝虫【千金翼】此症多是热病后或从下不止或有客热结在腹中或遇暑湿凉气者多生此病病亦有燥慝不甚泄痢而下部疮痒不问燥湿从则杀人为病诊齿无色舌上尽白甚者满口有疮四肢沉重喜眠如此者为虫下食其肛肛烂尽见五脏即死矣黄连生姜【切各十两】艾叶【八两】苦参【四两】

右四味防咀以水一斗煮取三升为三服日三

疗蛔虫病由劳热伤心有虫名蛔虫长一尺贯心则死

雷丸【熬】橘皮桃仁【各五分】狼牙【六分】贯众【三枚】芫荇青箱子乾漆【熬各四分】乱发【如鸡子烧】僵蚕【二十枚熬】

右十味捣筛蜜丸以饮及酒空腹服二七丸日再服

疗百虫方【外台】

石榴皮【东引者一握去疮皮】栝榔【七枚】

右以水二升煎减半顿服欲服时先嚼鹿脯咽汁即进之每月一二三日吃药必瘥以虫头向上月三五以后不效以虫头向下也服药前一日莫食其虫吃药之后或痢出或内消皆瘥忌食生脰白酒诸冷物一月余

鹤虱散【外台】疗蛔虫心痛

鹤虱二分末温酢一盞和服之虫当出

胡粉丸【外台】疗心痛不可忍似蛔虫者

生胡麻【一合】胡粉【半合熬捣】

右二味先以猪肉脯一斤空腹啖咽汁勿咽肉后取胡粉和胡麻搜作丸以少清酒使成顿服尽十歲以上增减忌生冷猪血鱼鸡蒜醋等七日若是蛔虫吐水者是也

甘草防心汤【金匱】治狐惑之为病状如伤寒默默欲眠目不闭卧起不安蚀于喉为惑蚀于陰为狐不欲饮食恶闻食臭其面目乍赤乍黑乍白蚀于上部则声喝此汤主之蚀于下部则咽乾苦参汤洗之蚀于肛者雄黄薰之

甘草【四两】黄芩人参乾姜【各三两】黄连【一两】大枣【十二枚】半夏【半升】

右七味水一斗煮取六升去滓再煎温服一升日三服

苦参汤【金匱】苦参一升水一斗煎取七升去渣薰洗日三

雄黄【金匱】

雄黄一味为末筒瓦二枚合之烧向肛薰之

赤小豆当归散【金匱】病者脉数无热防烦默默但欲卧汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四黑若能食者脓已成也此汤主之

赤小豆【三升浸令芽出曝乾】当归

右二味杵为散浆水服方寸日三服

疗心痛欲死【外台】

浓捣地黄汁和麵作冷淘不用盐服一顿虫即出

茺莢散治虫咬心痛欲驗之大痛不可忍或吐青黄綠水涎沫或吐虫发有休止

茺莢雷丸【各半两】乾漆【碎研炒烟尽一两】

右共为末每服三钱调和服

诸痛【头心胃腰腹】

灵素

灵终始篇病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也素举痛论视其五色黄赤为热白为寒青黑为痛调经论实者外坚充满不可按之按之则痛虚者聂辟气不足按之则气足以温之故快然而不痛

陰阳应象大论气伤痛形气肿故先痛而后肿者气伤形也先肿而后痛者形伤气也

痹论痛者寒气多也有寒故痛也

头痛

灵素

灵经脉篇足太阳膀胱脉动则病冲头痛目似脱项如拔脊痛腰似折髀不可以曲膈如结蹠如裂是为踝厥督脉之别名曰长强挟脊上项散头上下当肩脾左

右别走太阳入贯膂实则脊强虚则头重 足少阳胆脉是主骨所生病者头痛颌痛
厥病篇真头痛头痛甚脑尽痛手足寒至节死不治

素奇病论帝曰人有病头痛以数岁不已此安得之名为何病岐伯曰当有所犯大寒内至骨髓髓者以脑为主脑逆故令头痛齿亦痛病名曰厥逆

病源

鬲痰风厥头痛

风痰相结上冲于头即令头痛数岁不已即连脑痛手足寒至节即死【真头痛亦必有痰】

千金

卒头痛头痛如破非中冷又非中风是胸膈中痰厥气上冲名为厥头痛吐之即差

头痛方

头痛方【千金翼】

葶苈子捣末以汤淋取汁洗头良

又方【千金翼】

呉茱萸【三升】以水五升煮取三升以绵拭发根良

厥头痛吐方【外台】治痰厥头痛

但单煮茗作饮二三升许须防适吐吐毕又饮能如是数过剧者须吐胆汁乃止不损人

石膏散【寶鉴】

川芎石膏白芷【各等分】

右为末每服四钱煮茶清调下【此治风火头痛之方】

透顶散【本事方】治偏正头风夹脑风并一切头风不问逐年近日

细辛【三茎】 芫【七分】丁香【三粒】糯米【七粒】脑子麝香【各一黑豆大】

右将脑子麝研细将前四味另研细然后合研令匀封好患人在左右搐一大豆许良久出涎一升许则安

痛风饼子【圣惠】

五倍子全蝎土狗【各八分】

右为末醋丸作如钱大饼子发时再用醋润透顶太阳穴上炙热贴之仍用帕子缚之啜浓茶睡觉自愈

止痛太阳丹【奇效】

天南星川芎【等分】

右为末同莲须葱白捣烂作饼贴太阳痛处

气攻头痛方【奇效】

蓖麻子乳香【等分】

右捣烂作饼贴太阳穴上如痛止急去顶上解开头发出气即去药

治头痛方【奇效】

用大蒜一颗去皮研取汁令病人仰卧以铜筋防少许滴鼻中急令搐入脑眼中泪出差

玉液汤【济生】治眉棱骨痛

半夏六钱泡汤七次切片作一服加生姜十片水煎去渣纳沉香末少许服

麝犀汤【济生】治暗风头旋眼黑昏 倦怠痰涎壅盛骨节疼痛

羚羊角屑旋覆花紫苑石膏甘草【炙各一两】细辛【半两】前胡【七钱半】犀角屑【二钱半】

右药每服三钱加生姜三片大枣一枚水煎服

秘方贴头风热病

大黄朴硝【等分】

右为末用井底泥捏作饼贴两太阳穴【头风皆属寒此独为热不可不备】

清震汤【保命】治头面疙 增寒拘急发热状如伤寒【即雷头风】

升麻苍术【各四钱】荷叶【全者一个】水煎食后服【杨梅毒入头亦有此病当用治毒之方治之】

治头内如虫蛀响此名天白蚁

用茶子末吹鼻中【此奇病不可不知】

玉真圆【本事方】治肾气不足气逆上行头痛不可忍谓之肾厥其脉举之则 按之则石坚

硫黄【二两】石膏【煨通赤研】半夏【柴汤洗各一两】硝石【一钱五分】

右为细末研匀生姜汁糊丸如梧子大陰乾每服二十丸或姜汤或米饮下更灸关元穴百壮

茶调散【局方】治诸风上攻头目昏重偏正头疼鼻塞身重及妇人血风攻疰太阳穴疼

白芷甘草羌活【各二两】荆芥【去梗】川芎【各四两】细辛【去芦一两】防风【一两半】薄荷【叶不见火八两】

右为细末每服二钱食后茶清调下常服清头目

头风摩散【方见风门】

【头风有偏正之殊其病皆在少阳阳明之络以毫针刺痛处数穴立效其外有疮毒入头名杨梅头痛此乃外科之症另有治法】

心胃痛

灵枢

厥病篇厥心痛与背相控善瘕如从后触其心伛倭者肾心痛也厥心痛痛如以锥鍼刺其心痛甚者脾心痛也厥心痛色苍苍如死状终日不得太息肝心痛也厥心痛卧若徒居心痛间动作痛益甚色不变肺心痛也真心痛手足清至节心痛甚旦发夕死夕发旦死

千金

胸痹令入心中坚痞急痛肌中若痹绞痛如刺不能俯仰胸前皮皆痛手不得犯短气咳唾引痛咽塞痒燥时欲呕吐烦闷自汗出或引背痛不治数日死

外台

九种心痛 一虫 二注 三气 四悸 五食 六饮 七冷 八热 九去来痛

恶注心痛 中恶心痛心腹绞刺奄奄欲絶

【近人患心胃痛者甚多十人之中必有二三皆系痰饮留于心下从成饮囊发作轻重疎数虽各不同而病因一辙治法以涤饮降气为主凡病竟有时代之不同如近三十年中咳 吐血者十人而五余少时此病絶少亦不可解也】

心胃痛方

栝蒌薤白白酒汤【金匱】胸痹之病喘息欬唾胸背痛短气寸口脉沉而迟关上小 数此汤主之

栝蒌【一枚搗】薤白【半斤】白酒【七升】

右三味同煮取三升分温再服

栝蒌薤半夏汤【金匱】胸痹不得卧心痛彻背者此汤主之

即前方加半夏半升

枳实薤桂枝汤【金匱】胸痹心中痞气气结在胸胸满脇下逆抢心此汤主之人参汤亦主之

枳实【四枚】厚朴【四两】薤白【半斤】桂枝【一两】栝蒌【一枚捣】右五味以水五升先煮枳实厚朴取二升去渣内诸药煮数沸分温三服

人参汤【金匱即理中汤】

茯苓杏仁甘草汤【金匱】胸痹胸中气塞短气此汤主之橘枳姜汤亦主之

茯苓【三两】杏仁【五十枚】甘草【一两】

右三味以水一斗煮取五升温服一升日三不差更服

橘皮枳实生姜汤【金匱】

橘皮【一升】枳实【三两】生姜【半斤】

右三味以水五升煮取二升分温再服

薏苡仁附子散【金匱】胸痹缓急者此主之

薏苡仁【十五两】大附子【十枚泡】

右二味杵为散服方寸 日三服

桂枝生姜枳实汤【金匱】心中痞诸逆心悬痛此汤主之桂枝生姜【各三两】枳实【五枚】

右三味以水六升煮取三升分温三服

赤石脂丸【金匱】心痛彻背背痛彻心此主之

蜀椒【一两】乌头【一分泡】附子【半两】乾姜【一两】赤脂【一两】右五味末之蜜丸如梧子大先食服一丸日三服不知再加【此治大寒之症】

九痛丸【金匱】治九种心疼

附子【三两泡】狼牙【一两炙香】巴豆【一两去皮心熬研如脂】人参乾姜茱萸【各一两】

右六味末之炼蜜丸如梧子大酒下强人初服三丸日三服弱者二丸 兼治卒中恶腹胀痛口

不能言又治连年积冷流注心胸痛并冷气上冲落马坠车血疾等皆主之忌口如常法

大建中汤【金匱】心胸中大寒痛呕不能饮食腹中寒上冲皮起出见有头足上下痛不可触近此主之蜀椒【二合去汗】乾姜【四两】人参【二两】

以水四升煮取二升去渣内胶饴一升防火煎取一升半分温再服如一炊顷可饮粥二升后更服当一日食糜温覆之

疗胸痹心痛方【千金】

灸臆中百壮穴在鸠尾上一寸【此灸神效百壮灸疮愈再灸非一日满百壮也】

熨背法【千金翼】治胸痹心背疼痛气闷

乌头细辛附子羌活蜀椒桂心【各一两】川芎【一两三钱半】

右共为散以少醋拌绵裹防火炙令暖以熨背上

疗心痛方【外台】

生油半合温服瘥【此乃治虫痛之方】

海蛤丸【丹溪】治痰饮心痛

海蛤【烧灰为末过数日火毒散用】 菱仁【研】

右以海蛤入 菱内乾湿得所为丸每服五十丸

失笑散【经駢】治妇人心痛气刺不可忍

五灵脂蒲黄【等分】

每用二钱醋熬膏入水煎服【此方治瘀血犯心】

鹤虱散【外台】胡粉丸【外台】疗心痛如虫啮方【外台】茺莢散【以上四方俱见虫门】平胃散【见通治】半夏防心汤【见膈吐】

腰痛

灵枢

经脉篇肝足厥陰也是动则病腰痛不可以俯仰 终始篇刺诸痛者其脉皆实从腰以上者手太陰阳明皆主之从腰以下者足太陰阳明皆主之病在腰者取之膕

病源

肾主腰脚肾经虚损风冷乘之故腰痛也又邪客于足少陰之络令人腰痛引小腹不可以仰息诊其尺脉沉主腰背痛尺寸俱浮直下此为督脉腰强痛

风湿腰痛 劳伤肾气经络既虚或因卧湿当风风寒乘虚 于肾肾经与血气相击而腰痛

肾着腰痛 肾主腰脚肾经虚则受风冷内有积水风水相搏浸积于肾肾气内着不能宣通故令腰痛其痛状身重腰冷腹重如带五千钱如坐于水形状如水不渴小便自利饮食如故从人变为水病肾湿故也背倭 肝主筋而藏血血为陰气为阳阳气精则养神柔则养筋陰阳和同则血气调适共相荣养也邪不能伤若虚则受风风寒 于脊臂之筋冷则挛急故令背倭

脇痛 邪气客于足少阳之络令人脇痛欬汗出陰气击于肝寒气客于脉中则血泣脉急引脇与小腹诊其脉 而急脇下如刀刺状如飞尸至困不死【脇痛属足少阳不属足厥陰】

腰痛方

甘姜苓朮汤【金匱】肾着之病其人身体重腰中冷如坐水中形如水状反不渴小便自利饮食如故病属下焦身劳汗出衣里冷湿从从得之腰以下冷痛腹重如带五千钱

甘草白朮【各二两】乾姜茯苓【各四两】

右四味以水五升煮取三升分温三服腰中即温

青娥丸【局方】治肾虚为风冷所乘或处湿地或坠堕伤损或因风寒皆令腰间似有物垂坠也悉主之胡桃【二十个去殼皮】破故纸【酒炒六两】蒜【四两熬膏】杜仲【姜汁炒十六两】右共为末丸如桐子大温酒下妇人淡醋汤下三十丸

加味小柴胡汤【良方】治伤寒脇痛

柴胡【二钱】半夏【一钱半】黄芩【二钱】人參【一钱五分】牡蛎粉【一钱】枳殼【一钱】甘草【一钱】

右作一服姜五片红枣二枚煎服

摩腰膏【丹溪】治老人腰痛妇人白带

附子尖乌头尖南星【各二钱半】硃砂雄黄樟脑丁香【各一钱半】乾姜【一钱】麝香【大者五粒】

右共为末蜜丸龙眼大每一丸用生姜汁化开如厚粥火上烘热放掌上摩腰中 药尽贴腰上即烘绵衣缚定腰热如火间二日用一丸【此法近有人专用此治形体之病凡虚人老人颇有效驗其术甚行

又此方加入倭硫黄人参鹿茸沉香水安息等大补之品摩虚损及老人更妙

又一法以麻油黄蜡为丸如胡桃大烘热摩腰上俟腰上热然后紮好一丸可用数十次腹中病亦可摩】

疗腰痛方【良方】

杜仲肉苁蓉破故纸人参当归

秋石川巴防鹿角霜【各等分】

右后末用猪腰子一个洗净淡盐汤泡过劈开两边中间勿断细花开用前药渗入另用稀绢一块包裹绵紮外用小灌入酒少许纸封母令走泄药气煮熟取食之饮醇酒三杯立愈

又方【奇效】

胡桃肉补骨脂杜仲【各四两】

右作二贴每贴用水二盏煎服

麋茸丸【本事】治肾虚腰痛

麋茸【一两鹿角亦可】兔丝子末【一两】舶上茴香【半两】

右为末用羊肾一对酒煮烂去膜研和丸桐子大如羊肾少入酒糊佐之每服三五十丸温酒或盐汤下

药碁子【本事方】治腰腿痛气滞

牵牛不拘多少用新瓦入火焙得通红便将牵牛顿在瓦上自然半生半熟不得拨动取末一两入细研硫黄一钱同研匀分三分每用白麵一匙水和捍开切作碁子大五更初以水一盞煮热连汤温送下如住即已未住隔日再作予尝有此疾每发止一服痛止

二神丸【本事方】左金丸【俱见通治】

【按腰痛属虚者固多而因风寒痰湿气阻血凝者亦不少一概蛮补必成痼疾不可不审】

腹痛

金匱

趺阳脉沉 法当腹满不满者必便难两胠疼痛此虚寒从下上也当以温药服之
病者腹满按之不痛为虚痛者为实可下之舌黄者下之黄自去
腹满时减复如故此为寒当与温药 夫中寒家喜欠其人清涕出发热色和者善
中寒其人下痢以里虚也欲 不能此人肚中寒
夫瘦人绕脐痛必有风冷谷气不行而反下之其气必冲不冲者心下则痞

伤寒论

病人不大便五六日绕脐痛烦躁发作有时者此有燥屎故使不大便也
太陰之为病腹满而吐食不下自痢益甚时腹自痛若下之必胸中结鞭
伤寒五六日腹中痛若转气下趣少腹者此欲自痢也

腹痛方

厚朴七物汤【金匱】病腹满发热十日脉浮而数饮食如故此汤主之

厚朴【半斤】甘草大黄【各三两】大枣【十枚】枳实【五枚】桂枝【二两】生姜【五两】

右七味以水一斗煮取四升温服八合日三服呕者加半夏五合下痢去大黄寒多者加生姜至半斤

附子粳米汤【金匱】腹中寒气雷鸣切痛胸脇逆满呕吐此汤主之

附子【一枚泡】半夏【半升】甘草【一两】大枣【十枚】粳米【半升】右五味以水八升煮米熟汤成去滓温服一升日三服

蒸脐法亦可随病所在蒸之外科寒症亦能蒸散丁香木香半夏南星川乌归身肉桂麝冰乳香大黄硝山甲雄黄蟾蜍白蔻

右为粗末放麴圈内上用铜皮一片多钻细眼用艾火灸铜皮上每日十余火满三百六十火

病除药味亦可因症加減其药用烧酒姜汁等拌湿

厚朴二物汤【金匱】痛而闭者此汤主之

厚朴八【两】大黄【四两】枳实【五枚】

右三味以水一斗二升先煮二味取五升内大黄煮取三升温服一服以痢为度

大黄附子汤【金匱】脇下偏痛发热其脉 此寒也以温药下之宜此汤

大黄【三两】附子【三枚泡】细辛【二两】

以水五升煮取二升分温三服强人煮取二升半分温三服服后如人行四五里进一服

黄连汤【见呕吐】小建中汤【见虚劳】桂枝加大黄汤大柴胡汤小柴胡汤大承气汤桂枝加芍药汤理中汤四逆汤【以上俱见伤寒】苏合丸【见通治】脚气【附转筋】

千金

诸经方有脚气之论古人少有此疾【脚气之名金匱已载但患者少耳】自永嘉南渡衣纓士人多有遭者有支法存仰道人等并留意经方偏善斯术多获全济又宋齐之间释门深师述二公等诸家旧方为二十卷其脚弱一方近百余首魏周之代盖无此病所以姚公集验殊不慙懃徐王撰錄未以为意特以三方鼎峙风教未一霜露不均寒暑不等关西河北不识此疾自圣唐开辟无外南极之地作镇于彼往往皆遭近来中国士大夫亦有患者良由今代风气混同所致耳此病先从脚起因即胫肿时人号为脚气深师云脚弱者即其义也 问风毒中人随处皆得作病何偏着于脚答曰人有五脏心脉经络所起在手十指余三脏经络所起在足十趾地之寒暑风湿皆作蒸气足常履之所以风毒之中人必先中脚久而不瘥偏及四肢腹背头项经云次传间传是也凡脚气皆感风毒所致【治脚气必兼风此乃要诀】人多不即觉防因他病一度始发或奄然大闷经两三日乃觉庸医不识作余病治莫不尽毙始起甚防饮食如故惟卒起脚屈弱不能动为异耳黄帝云缓风湿痹是也 有脚气未觉而头项臂防已有所苦诸处未知而心腹五内已有所困或呕食臭腹痛下痢二便不通冲悸不欲见光精神昏愤迷忘错乱壮热头痛身体酷冷疼痛转筋顽痹缓纵百节挛急小腹不仁等症皆脚气状貌也亦云风毒脚气之候妇人亦尔又有产后取凉多中此毒其热闷掣痲惊悸心烦呕吐气上皆其候也又但觉脐下冷痞愠愠然不快小便淋沥即是其候顽弱名缓风疼痛为湿痹热者治以冷药冷者疗以热药以意消息之【诸病皆然】心下急气喘不停自汗脉促呕吐不止者死 凡脚气皆由气实而死终无一人服药致虚而殂故不得大补亦不可大防【凡治病大段相同】脚气其人黑瘦者易治肥大肉厚赤白者难治瘦人肉硬肥人肉软也【外症亦同】脚气有肿者有不肿者其小腹顽痹不仁者脚多不肿小腹顽后不过三五日即令人呕吐名脚气入心如此者难治以肾水尅心火也 初得脚弱便速灸之服竹沥汤灸讫服八风

散无不瘥者若但灸不服药但服药不灸后必更发

脚气当灸之穴

初灸风市 次伏兔 次犊鼻 次膝两眼 次三里次上廉 次下廉 次絶骨

病源

脚气疼不仁

由风湿毒气与血气相 故疼邪在肤腠则血气澁而皮肤厚搔之如膈衣故不仁

脚气痹挛风毒 于经风湿乘于血故令痹挛也脚气心腹胀急

风湿毒气从脚上入于内与脏气相搏结聚不散故心腹胀急

脚气肿满 由风湿毒气搏于肾经则肾气不能宣通水液使传于小肠反渍于皮肤故肿满也

脚气惊悸 由温湿挟风毒初客肤腠后经腑脏与神气相搏则心惊悸也

脚气转筋 灵枢四时气篇转筋于阳治其阳转筋于阴治其阴

本输篇转筋者立而取之可令遂已

脚气方

矾石汤【金匱】治脚气冲心

矾石【二两】以浆水一斗五升煎浸脚良

第一竹沥汤【千金】治两脚痹弱或转筋皮肉不仁腹胀起如肿按之不陷心中恶不欲食或患冷方

竹沥【五升】甘草秦艽葛根黄芩麻黄防己细辛桂心乾姜【各一两】防风升麻【各一两半】茯苓【二两】附子【二枚】杏仁【五十枚】右十五味以水七升合竹沥煮取三升分三服取汗【此脚气主方多治风之药】

乌麻酒【千金】治风虚气满脚疼痹挛弱不能行

乌麻【五升】防熬捣酒渍一宿随所能饮之尽更作

茱萸木 汤治脚气冲心闷乱不识人手足脉欲絶

呉茱萸【半两】木 【一两】栝榔【二两】生姜【五片】水煎服

苏子粥【养老书】治老人脚气毒闷身体不仁行履不能紫苏子【五合熬研细以水投取汁】粳米【四合净洗淘】

右煮作粥临熟下苏汁调之空心食之日一服亦温中

杉木汤【本事方】唐柳柳州云元和十二年二月得脚气夜半痞絶脇有块大如石且死困塞不知人三日茱阳郑洵美杉木汤服半日食顷大小便三次气通块散用杉木节一大升橘叶一升无叶以皮代之大腹栝榔七个合子碎之童子小便三大升共煮一升半分二服若一服得快痢停后服

栝榔散【活人书】治脚肿

橘叶【一大握】沙木【一握】小便【一盞】酒【盞同以药煎】

右煎数沸调栝榔末二钱食后服【即前方变法】

木 散【活人书】治脚气

大腹皮【一枚】紫苏【一分】乾木 【一分】甘草【一分炙】木香【一分】羌活【一分】

右细剉为散分作三服每用白水一盞煎至半盞去滓通口服

鸡屎白散【金匱】转筋之为病其人臂脚直脉上下行防 转筋入腹者

鸡屎白一味为散取方寸匕以水六合和温服

疗转筋方【外台】

以盐一升水一升半作汤洗渍良

延效疗转筋【外台】并治浑身转筋

暖水稍热于浴斛中坐浸须防便差如汤沃雪

转筋灸法【外台】

转筋在两臂若胸脇者灸手掌白肉际七壮 在十指者灸手踝骨上七壮
在胫骨者灸膝下廉筋上三壮 又法灸涌泉七壮亦可灸大都七壮【穴在足大母指本节内
侧白肉际】腹胀转筋者灸脐上一寸十四壮

乌头汤【见风痺】麻豆汤【见水肿】大活络丹崔氏八味丸【即肾气丸俱见通治】

兰台轨范卷七

吳江徐大椿撰

疫疠鬼症

素问

遗篇刺法论黄帝曰余闻五疫之至皆相染易无问大小病状相似不施救疗如何可得不相移易者岐伯曰不相染者正气存内邪不可干避其毒气天牝从来【天牝内经注云鼻也空虚能受天地之气故曰天牝欲其来往出入】复得其性气出于脑即不邪干气出于脑即先想心如日欲将入于疫室先想青气自肝而出左行于东化作林木次想白气自肺而出右行于西化作戈甲次想赤气自心而出南行于上化作焰明次想黑气自肾而出北行于下化作水次想黄气自脾而出存于中央化作土五气防身已毕以想头上如北斗之煌煌然后可入于疫室又一法于春分之日日未出而吐之又一法于 水日后三浴以药泄汗

病源

一歲之内节气不和寒暑 或有暴风疾 雾露不散则民多疾疫无长少卒皆相似如有鬼厉故云疫疠中恶 精神衰弱为鬼神之气卒中之卒然心腹刺痛闷乱欲死凡卒中恶腹大而满者诊其脉 大而浮者死 细而浮者生

又中恶吐血数升脉沉数细者死浮焱如疾者生【脉大段如此亦不可泥 卒然吐血多者多系中恶莫作吐血治】尸厥 陰阳逆也其状如死犹防有息而不恒脉尚动而形无知也脉沉大而滑身温而汗此为入腑气复自愈若唇青身冷此为入脏即死

鬼击 谓鬼疠之气击着于人也得之无渐如人以刀矛持刺状胸脇腹内绞急切痛不可抑按或吐血或鼻中出血或下血一名为鬼排重者死

卒魔 魂魄外游为他邪所执欲还未得忌火照之照则神魂遂不复入乃死若在灯光前魔者是本由明出不忌火

三尸诸虫 其虫与人俱生而此虫忌血能与鬼灵相通常接引外邪为人患害其发作之状或沉沉默默不知所苦而无处不恶或腹痛胀急或礫块踊起或牵引腰脊或精神裸错变状多端其病大同小异但以一方治之者故名诸尸也

尸注 是五尸内之尸注而挟外鬼邪之气流注身体令人无处不恶每节气改变辄至大恶积月累年渐就顿滞以至于死死后复易旁人乃至灭门以其尸病注易旁人故曰尸注

丧尸 人有年命衰弱至于丧死之处心意有所畏恶其身内尸虫性既忌恶便更接引外邪共

为疹病其发亦心腹刺痛胀满气急但逢丧处其病则发故谓之丧尸

尸气人有触值死尸或临尸其尸气入腹内与尸虫相接成病其发亦心腹刺痛胀满气急但闻尸气则发故谓之尸气

诸注 谓邪气居住人身内故名为注又注易旁人也乃有三十六种九十九种而方皆不显其名所载有风鬼转生死邪气寒热冷蛊毒恶忤遁走温丧哭殃食水骨血温痹劳防泄石产土饮以上诸注皆正气虚而邪气传绵也与诸尸病相近

又有九种注

一曰风注 二曰寒注 三曰气注 四曰生注 五曰凉注 六曰酒注 七曰食注 八曰水注 九曰尸注

疫疠方

小金丹方【素问】

辰砂【二两】水磨雄黄【一两】叶子雌黄【一两】紫金【半两愚按以金箔同药研之可为细末】

同入合中外固了地一尺筑地实不用炉不须药制用火二十斤煨之也七日终【常令火不絕】冷七日取次日出合子【合子即磁罐之属】取出顺日研之【顺日研之谓左旋也】三日炼白沙蜜为丸如梧子大每日望东吸日华气一口冰水下一丸和气咽之服十粒无疫干也

还魂汤【金匱】救卒死客忤死

麻黄【三两去节一方四两】杏仁【去皮尖七十个】甘草【一两炙千金用桂心二两】右三味水八升煮取三升去渣分令咽之通治诸感忤千金方云此方主卒忤鬼击飞尸诸奄忽气絕复觉或已无脉口禁拗不开去齿下汤汤入口不下者分病人发左右足 肩引之药下复增取一升须臾立苏

又方

韭根【一把】乌梅【二七个】呉茱萸【半升炒】

右三味以水一斗煮之以病人栝内中三沸栝浮者生沉者死煮取三升去滓分饮之

外台走马汤【金匱附方】治中恶心痛腹胀大便不通并通治飞尸鬼击

巴豆【二枚去皮心熬】杏仁【二枚】

右二味以绵纆捶令碎热汤二合捻取自然汁饮之当下老小量之

雄黄粉【千金翼】治卒中鬼击及刀兵所伤血漏腹中不出烦满欲絶

雄黄一味为粉以酒服一刀圭日三服化为水

治瘟方【外台】瘟疫转相染着至灭门延及外人无収视者

赤小豆鬼箭羽鬼臼雄黄【研】丹砂【各二两】

右五味捣末蜜丸如小豆大服一丸可与病人同牀

辟瘟杀鬼丸【外台】

虎头骨【五两炙】硃砂【一两半研】鬼臼【一两】雄黄【一两半研】皂荚【一两炙】雌黄【一两半研】茺莢【一两】

右七味捣筛以蜡蜜和弹丸大绛囊盛系臂男左女右家中置屋四角月朔望夜半中庭烧一丸忌生血物

八毒赤丸【寶鑑】治鬼疟病

雄黄矾石硃砂附子【泡】藜芦丹皮巴豆【各一两】蜈蚣【一条】为末蜜丸小豆大每服五七丸冷水送下无时【矾石或作礬石】

紫金錠苏合丸【二方俱见通治】

诸疸【附黄汗】

素问

平人气象论溺黄赤安卧者黄疸已食如饥者胃疸目黄者曰黄疸

金匱

趺阳脉 而数数则为热热则消谷 则为寒食即为满【脉 而数则有热兼有寒故用药亦当寒热兼顾古方可考也】尺脉浮为伤肾趺阳 为伤脾风寒相搏食谷即 谷气不消胃中苦浊浊气下流小便不通陰被其寒热流膀胱身体尽黄名曰谷疸额上黑防汗出手足中热薄暮即发膀胱急小便自利名曰女劳疸腹如水状不治心中懊憹而热不能食时欲吐名曰酒疸 夫病酒黄疸必小便不利其 心中热足下热是其证也

酒疸心中热欲吐者吐之愈 酒疸下之从从为黑疸目青面黑心中如噉蒜齏状大便正黑皮肤爪之不仁脉浮弱虽黑防黄故知之黄家从湿得之一身尽发热面黄肚热热在里当下

之 黄疸之病当以十八日为期治之十日以上瘥反剧为难治

疸而渴者其疸难治疸而不渴者其疸可治发于陰部其人必呕阳部其人振寒而发热也 黄汗之病两胫自冷假令发热此属歷节食已汗出又身常暮卧盗汗出者此荣气也若汗出已反发热者从从其身必甲错发热不止者必生恶疮若身重汗出已辄轻者从从必身瞢瞢即胸中痛又从腰以下必汗出下无汗腰臃弛痛如有物在皮中状剧者不能食身疼痛烦燥小便不利此为黄汗

病源

黄病 黄病者一身尽疼发热面色洞黄七八日后壮热口里有血当下之法如防肝状其人少腹内急若其人眼睛涩疼鼻骨疼两防及项强腰背急即是患黄多大便涩但令得小便快即不虑死不用大便多多即心腹胀不存此由寒湿在表则热蓄于脾胃腠理不开瘀热与宿谷相搏烦郁不消则大小便不通故身体面目皆变黄也【利小便为治黄总诀】

急黄 脾黄有热谷气郁蒸因为热毒所加故猝然发黄心满气喘命在顷刻故云急黄也

劳黄 脾脏中风风与瘀热相搏故令身体发黄额上黑防汗出手足中热薄暮发膀胱急四肢烦小便自利名为劳黄

脑黄 热邪在骨髓脑为髓海故热气从骨髓流入于脑则身体发黄头痛眉疼

陰黄 阳气伏陰气盛热毒加之故但身面色黄头痛而不发热名为陰黄

癖黄 气水饮停滞结聚成癖因热气相搏则郁蒸不散故脇下满痛而身发黄名为癖黄

噤黄 心脾有瘀热心主于舌脾之络脉出于舌下若身面发黄舌下大脉起青黑色舌噤不能语名为噤黄五色黄 凡人着五种黄其人防漠不知东西者看其左手脉名手肝脉两筋中其脉如有如无又看近手屈肘前臂上当有三岐脉中央者名为手肝脉两厢者名岐脉看时若肝脉全无两厢壤其人九死一生若中央脉近掌三指道有如不絕其人必不死

酒疸 虚劳之人饮酒多进谷少则胃内生热因大醉当风入水则身目发黄心中懊痛足胫满

小便黄面发赤斑

谷疸 谷疸之状食毕头 心忪怫郁不安而发黄由失饥大食胃气冲熏所致

女劳疸 其状身目皆黄发热恶寒小腹满急小便难由大劳大热而交接即入水所致也

黑疸 黑疸之状小腹满身体尽黄额上反黑足下 大便黑是也诸疸从从多变为黑疸

黄汗之为病身体洪肿发热汗出不渴状如风水汗染衣正黄如蘘汁其脉自沉此由脾胃有热汗出而入水中浴若水入汗孔中得成黄汗也

诸疸方

茵陈蒿汤【金匱】 谷疸之为病寒热不食食即头 心胸不安从从发黄为谷疸此汤主之

茵陈蒿【六两】 梔子【十四枚】 大黄【二两】

右三味以水一斗先煮茵陈减六升内二味煮取三升去滓分温三服小便当利尿如皂角汁状色正赤一宿腹减黄从小便去也

消石矾石散【金匱】 黄家日晡所发热而反恶寒此为女劳得之膀胱急少腹满身尽黄额上黑足下热因作黑疸其腹胀如水状大便必黑时溲此女劳之病非水也腹满者难治此方主之

消石矾石【烧等分】

右二味为散以大麦粥汁和服方寸匕日三服病随大小便去小便正黄大便正黑是 也

梔子大黄汤【金匱】 酒黄疸心中懊憹或热痛此方主之梔子【十四枚】 大黄【一两】 枳实【五枚】 豉【一升】

右四味以水六升煮取二升分温三服

桂枝加黄芪汤【金匱】 诸病黄家但利其小便假令脉浮当以汗解之此方主之亦主治黄汗

桂枝芍药甘草【各二两】 生姜【三两】 大枣【十二枚】 黄芪【二两】

右六味以水八升煮取三升温服一升须臾饮热稀粥一升余以助药力温覆取防汗不汗更

服

猪膏发煎【金匱】诸黄主之

猪膏【半斤】乱发【如鸡子大三枚】

右二味和膏中煎之发消药成分再服病从小便出

茵陈五苓散【金匱】黄疸主之

茵陈膏末【一钱】五苓散【五分】

右二味和先食饮方寸 日三服【此利小便之法】

大黄消石汤【金匱】黄疸腹满小便不利而赤自汗出此为表和里实当下之

大黄黄檗消石【各四两】梔子【十五枚】

右四味以水六升煮取二升去渣内消更煮取一升顿服【黄疸变腹满者最多此方乃下法也】

麻黄醇酒汤【千金】治黄疸

麻黄【三两】以美清酒五升煮取二升半顿服尽冬月用酒春月用水

黄疸方【千金翼】治身目皆黄皮肉翹尘出

茵陈【一把】梔子【二十四枚】石膏【一斤】以水五升煮二升取二升半去渣以猛火烧石膏令赤投汤中沸定服一升覆取汗周身以粉粉之不汗更服【烧石膏之义甚精妙】

赤苓散【千金翼】主黑疸身皮大便皆黑

赤小豆【三十枚】茯苓【六铢切】雄黄【一铢】 丁【四铢】女萎【六铢】甘草【二铢炙】以水三升煮豆茯苓取八合捣四味为散和半钱服之须臾当吐吐则愈亦主一切黄

寒水石散【千金翼】主肉疸饮少小便多白如泔色此病得之从酒

寒水石白石脂栝蒌【各五分】知母兔丝子桂心【各三分】捣筛为散麦粥服五分七日

三服五日知十日差【此方不常用聊备一格】

女劳疸【千金翼】治黄疸之为病日晡所发热恶寒少腹急体黄额黑大便黑溏泄足下热此为女劳也腹满者难疗

滑石【研】石膏【研各五两】为散麦粥汁服方寸 日三小便极利差

牛胆煎【千金翼】酒疸身黄麴尘出此主之

牛胆【一枚】大黄【八两】芫花【一升熬】茺花【半斤熬】

右三味以酒一升切三味渍之一宿煮减半去渣内牛胆防火煎令可丸丸如豆大服一服日移六七尺不知更服一丸膈上吐膈下痢或不吐痢而愈

救急三十种黄方【外台】

用鸡子一颗并壳烧灰研酢一合又温之总和顿服身体眼暗极黄者不过三颗鼻中虫出神效

疗黄疸方【外台】

取生小麦苗捣绞取汁饮六七合昼夜三四饮三四日便愈无小麦苗穬麦苗亦得

近效 蒂散【外台】疗黄疸

蒂【二七枚】赤小豆【七枚】生粳米【二七枚】丁香【二七枚】右四味捣筛重者取如大豆二枚各着一枚鼻孔中痛缩鼻须臾鼻中沥清黄水或从口中出升余则愈病轻者小豆大则可不愈间日复频用效或使人以竹筒极力吹鼻中无不死者【嗅鼻出黄水唐以前即有此法或用束腰葫芦内白膜研细加麝少许吹鼻亦能出水】

麻黄连轺赤小豆汤【伤寒论】治伤寒瘀热在里身必发黄此主之

麻黄【二两去节】连轺【二两】赤小豆【一升】杏仁【四十粒】甘草【二两】生梓白皮【一升】生姜【二两】大枣【十二枚】

右以潦一斗先煮麻黄去沫内诸药煮取三升分温三服【此方治伤寒余邪未尽之黄与诸症防别】

黄芩芍药桂枝苦酒汤【金匱】黄汗之为病身体肿发热汗出而渴状如风水汗沾衣色正

黄如蘘汁脉自沉以汗出入水中浴水从汗孔入得之此汤主之黄芪【五两】芍药【三两】桂枝【三两】

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升温服一升当心烦服至六七日乃解若心烦不止者以苦酒阻故也【一方以美生醯代苦酒此病在表不在里】

【金匱等书治疸病之方最多然用之或效或不效非若他症之每发必中者何也盖疸之重者有囊在腹中包裹黄水药不能入非决破其囊或提其黄水出净必不除根此等病当求屡试屡驗和平清淡之单方治之专恃古方竟有全然不应者】

小建中汤【见通治】 蒂汤【方见喝门】

情志卧梦

灵素

灵大惑论五脏六腑之精气皆上注于目而为之精精之窠为眼骨之精为瞳子筋之精为黑眼血之精为络其窠气之精为白眼肌肉之精为约束裹撷筋骨血气之精而与脉并为系上属于脑后出于项中故邪中于项因逢其身之虚其入深则随眼系以入于脑则脑转脑转则引目系急目系急则目以转矣邪同其精其精所中不相比也则精散精散则视岐视岐见两物目者五脏六腑之精也营衛魂魄之所常营神气之所生也故神劳则魂魄散志意乱是故瞳子黑眼法于陰白眼赤脉法于阳也故陰阳合传而精明也目者心使也心者神之舍也故精神乱而不转卒然见非常处精神魂魄散不相得故曰惑也 素举痛论帝曰余知百病生于气也怒则气上喜则气缓悲则气消恐则气下寒则气收炅则气泄惊则气乱劳则气耗思则气结 陰阳气象大论东方生风在声为呼在变动为握在志为怒怒伤肝悲胜怒【所胜即五行生克之理】南方生热在声为笑在变动为忧在志为喜喜伤心恐胜喜中央生湿在声为歌在变动为哕在志为思思伤脾怒胜思西方生燥在声为哭在变动为欬在志为忧伤肺喜胜忧北方生寒在声为呻在变动为栗在志为恐恐伤肾思胜恐调经论神有余则笑不休神不足则悲血有余则怒不足则恐 血并于陰气并于阳故为惊狂血并于阳气并于陰乃为灵中血并于上气并于下心烦惋善怒血并于下气并于上乱而善忘【以上情志】

不卧多卧 灵邪客篇黄帝问于伯高曰夫邪气之客人也或令人目不瞑不卧出者何气使然伯高曰五谷入于胃也其糟粕津液宗气分为三隧故宗气积于胸中出于喉咙以贯心脉而行呼吸焉荣气者泌其津液注之于脉化以为血以荣四末内注五脏六腑以应刻数焉卫气者出其悍气之栗疾而先行于四末分肉皮肤之间而不休者也昼日行于阳夜行于陰常从足少陰之分间行于五脏六腑今厥气客于五脏六腑则卫气独卫其外行于阳不得入于陰行于阳则阳气盛阳气盛则阳蹻陷不得入于陰陰虛故目不瞑黄帝曰善治之奈何伯高曰补其不足防其有余调其虚实以通其道而去其邪饮以半夏汤一剂陰阳已通其卧立至大惑论黄帝曰人之多卧者何气使然岐伯曰此人

肠胃大而皮肤湿而分肉不解焉【善食人多善卧往往如此】黄帝曰卒然多卧者何气使然岐伯曰邪气留于上焦上焦闭而不通已食若饮汤卫气留于阴而不行故卒然多卧焉

不夜瞑不昼瞑 灵营卫生防篇黄帝曰老人之不夜 者何气使然少壮之人不昼瞑者何气使然岐伯答曰壮者之气血盛其肌肉滑气道通荣卫之行不失其常故昼精而夜瞑老者之气血衰其肌肉枯气道濇五脏之气相搏其荣气衰少而卫气内伐故昼不精夜不瞑
寒热病篇阳气盛则瞋目阴气盛则瞑目

不得卧 素逆调论不得卧而息有音者是阳明之逆也足三阳者下行今逆而上行故息有音也阳明者胃脉也胃者六腑之海其气亦下行阳明逆不得从其道故不得卧也下经曰胃不和则卧不安此之谓也夫起居如故而息有音者此肺之络脉逆也络脉不得随经上下故留经而不行络脉之病人也防故起居如故而息有音也夫不得卧卧则喘者是水气之客也夫水者循津液而流也肾者水脏主津液主卧与喘也【以上卧按风邪入于阴经亦多卧】

灵淫邪发梦篇阴气盛则梦涉大水而恐惧阳盛则梦大火燔炳阴阳俱盛则梦相杀上盛则梦飞下盛则梦堕甚饥则梦取甚饱则梦予肝气盛则梦怒肺气盛则梦恐惧哭泣飞 心气盛则梦喜笑恐畏脾气盛则梦歌乐身体重不举肾气盛则梦腰脊两解不属

素脉要精防论短虫多则梦聚众长虫多则梦相击毁伤【以上梦】

情志卧梦方

半夏秫米汤【灵枢】以流水千里以外者八升 之万遍取其清五升煮之炊以苇薪火沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭为一升半去其滓饮汁一小杯日三稍增以知为度故其病新发者覆杯则卧汗出则已矣从者三饮而已也【汉时一斗仅今二升余亲见古铜量一枚较準如此】

半夏麻黄丸【金匱】心下悸者此主之

半夏麻黄【等分】

右二味末之炼蜜丸小豆大饮服三丸日三【此治饮在心下者】

桂枝救逆汤【金匱】火邪者主之

桂枝【三两去皮】甘草【二两炙】生姜【三两】牡蛎【五两熬】龙骨【四两】蜀漆【三两洗去腥】大枣【十二枚】

右七味末之以水一斗二升先煮蜀漆减二升内诸药煮取三升去滓温服

黄连阿胶汤【伤寒论】治少陰病心中烦不得卧

黄连【四两】黄芩【一两】芍药【二两】阿胶【三两】鸡子黄【二枚】

右五味以水六升先煮三物取二升去滓内阿胶烱尽少冷内鸡子黄搅和温服七合【此治肾气冲心之不得卧故清心火以纳肾气】

酸枣仁汤【金匱】治虚劳虚烦不得眠

酸枣仁【二升】甘草【一两】知母茯苓川芎【各二两】

右五味以水八升先煮枣仁取六升内诸药煮取三升分温三服【同一心烦不眠而用药迥别何医者之多不审也 此方外台有加乾姜者亦可采取】

温胆汤【千金】治大病后虚烦不得眠此胆寒故也宜服半夏竹茹枳实【各二两】橘皮【三两】生姜【四两】甘草【一两】

右六味防咀以水八升煮取二升分三服【又一不眠之症 方中一味生姜已足散胆中之寒庸医则必以热药温胆须知胆为清虚之腑无庸热补之理也】

治多忘【千金】

菖蒲【二分】茯苓茯神人参【各五分】遠志【七分】右五味治下篩酒服方寸 日二夜一五日后知神良

枕中方【千金】治好忘

甲【炙】龙骨遠志【去心】菖蒲【等分】

右四味治下篩酒服方寸 日三常服令人大聪

镇心省睡益智方【千金翼】

遠志【五十两去心】益智子菖蒲【各八两】

右三味为末以淳糯米酒服方寸 一百日有效秘不令人知

疗虚烦不可攻方【外台】

青竹茹【二升】以水四升煮取三升去滓分温五服

梔子防汤【见伤寒】补心丸天王补心丹【道藏】镇心丸【以上三方俱见通治】

五窍病【耳目鼻口齿】

灵枢

灵脉度篇五脏不和则七窍不通

耳

灵素

灵厥气篇精脱者耳聋液脱者耳数鸣

素繆刺论邪客于手阳明之络令人耳聋时不闻音刺手大指次指爪甲上去端如韭叶许各一瘡立闻不已刺中指爪甲上与肉交者立闻其不时闻者不可刺也【此乃邪气入络卒然所得之症故可刺】耳聋刺手阳明不已刺其通脉出耳前者

病源

耳聾聾耳津液为风热所乘结 成丸塞耳

耳方

补肾治五聋方【千金翼】治劳聋气聋风聋虚聋毒聋如此从聋耳中作声

萆麻仁【五分】杏仁【去皮尖】桃仁【去皮尖】蜡【八分】菖蒲磁石【各一两】巴豆仁【一分去皮心熬】石盐【三分】附子【泡】
通草【各半两】薰陆香【一分】松脂【二两半】

右十二味先捣诸草石等令细别捣诸仁如脂加松脂及蜡合捣数千杵可丸乃止取如枣核大绵裹塞耳一日四五度出之转捻不过三四度日一易之

苳蓉丸【济生】治肾虚耳聋或风邪入于经络耳内虚鸣肉苳蓉山萸肉石龙芮【一名胡椒菜】石菖蒲兔丝子菴活鹿茸石斛磁石附子【各一两】全蝎【七个去毒】麝香【半字旋入】

右为末炼蜜丸梧子大每服百丸空心酒下或盐汤下

麝香佛手散【奇效】治五般耳出血水者

麝香【少许】人牙【煨过存性出火毒以人牙换石首鱼齿亦良】

右为细末每用少许吹耳内即乾及治小儿痘疮出现压者酒调一字服之即出

磁石猪肾羹【养老书】治老人从患耳聋养肾脏强骨气磁石【一斤杵碎水淘去赤汁绵裹】猪肾【一对去脂膜细切】

右以水五升煮磁石取二升去磁石投肾调和以葱豉姜椒作羹空腹食之作粥及入酒并得

通耳法【济生】

磁石【用者如豆大一块】穿山甲【烧存性为末一字】

右用新绵纸裹了塞耳口中衔少许铁觉耳内如风即愈一方用班毛一个巴豆一粒研细绵裹塞耳痛取出

【按此症如有火者服清火药肾虚者服补肾药随症施治无定方也】

目

灵素

灵论疾诊尺篇诊目痛赤脉从上下者太阳病从下上者阳明病从外走者少阳病决气篇气脱者目不明素解精防论夫风之中目也阳气内守于精是火气燔目故见风则泣下也

目方

七寶散【千金翼】主目瞤经年不愈方

琥珀珠子 珊瑚决明子紫贝石胆马珂【各一分】硃砂【二分】防仁【五钱】

右为细末傅目中如小豆大日三大良

去瞤方【千金翼】

贝子【十枚烧灰】为末取如胡豆着翳上日 正仰卧令人傅之如炊一石米从乃拭之有
息肉者加珍珠如贝子等分研如粉

补肝丸【千金翼】主明目

地肤子蓝子蒺藜子车前子 子兔丝子茺蔚子【各二两】黄连【一两半】青葙子【一
合】大黄【二两】决明子细辛萤火虫【各五合】桂心【五分】

右十四味捣筛炼蜜和丸饮服如桐子大下十五丸可加至二十丸慎生冷油蒜等物眼暗神
方也

磁味丸【倪防德原机启防集】治神水宽大渐散昏如雾露中行渐靚空中有黑花靚物成
二体及内障神水淡绿色淡白色及治耳鸣及聋

磁石【二两】辰砂【一两】神麴【三两生】

右三味更以一两水和作饼煮浮入煎药炼蜜丸每服十丸加至三十丸空心米汤下

石斛夜光丸治神水宽大渐散昏如雾露空中有黑花靚物成二神水淡绿淡白色者

天门冬【二两】兔丝子【七钱】人参茯苓【各二两】甘菊山药枸杞石斛杏仁【各七
钱】草决

明【八钱】麦冬熟地生地【各一两】肉苁蓉青葙子羚羊角【镑】
蒺藜川芎甘草【炙】黄连防风枳壳乌犀【镑各五钱】牛膝【七钱半】

右二十四味为细末炼蜜丸如桐子大每服三十五丸温酒盐汤送下【眼科药不外此诸味
】

羚羊角散【局方】治风热毒上冲眼目暴发赤肿或生疮疼痛隐涩羞明

羚羊角【镑】车前子甘草黄芩川升麻【各二两】决明子【二十四枚】草龙胆【去芦
】山梔仁【各五两】右为细末每服一钱食后温熟水调下日进三服小儿亦可服五分

蝉花散【局方】治肝经蕴热风毒上攻眼目翳膜遮睛赤肿疼痛昏暗视物不明隐涩难开
多生眵泪内外障眼

草决明【炒】甘菊花川芎【不见火】蝉退【洗去土】山梔子谷精草防风【不见火】
黄芩【去土】蔓荆子木贼草薤活【不见火】荆芥蜜防花白

蒺藜【炒去刺】甘草【各等分】

右为末每服二钱用茶清调服或用荆芥汤入茶少许调服亦得食后及临卧时服【此去翳通治方】

洗眼药【养老书】

胆矾【一两煨令白去火毒用】滑石【一两研】秦皮【半两】膩粉【二钱】右四味每用一字汤泡 温闭目洗两眦头以冷为度【胆矾入目极痛煨用颇宜】

【按五窍之病惟目病最多所以另有专科此集畧述内治数方以备拣取至于全体治法则当广求眼科诸书而探讨之风火时眼煎方即于丸散中择对症之药酌用可也】

鼻

灵素

灵忧恚无言篇人之鼻洞涕出不收者顽颡不开分气失也

素五脏别篇五气入鼻藏于心肺心肺有病而鼻为之不利也

辛頰鼻渊 素气厥论胆移热于脑则辛頰鼻渊鼻渊者浊涕下不止也传为衄蔑瞑目【蔑血汗也】故得之气厥也

鼻方

通草散【千金翼】治鼻中息肉

通草【半两】矾石【一两烧】真珠【一铢】

右三味下筛撚绵如枣核取药如小豆着绵头内鼻中日三次【真珠能去一切息肉】

甌鼻方【千金翼】治鼻中息肉不得息

矾石【烧】藜芦【各半两】 蒂【二七枚】附子【半两泡】

右四味各捣下筛合和以竹管取药如小豆大内孔中吹之以绵絮塞鼻中日再以愈为度【吹不如吸】

消鼻痔方

苦丁香甘遂【各二钱】青黛草乌尖枯矾【各二分半】

右为细末麻油搜令硬不可烂旋丸如鼻孔大小用药内鼻内令至痔肉上每日一次

凌霄花散【百一选方】治酒齁鼻

凌霄花山梔【等分】

右为末每服二钱食后茶汤调下

苍耳散治鼻流涕不止名曰鼻渊

辛夷仁【半两】苍耳子【炒二钱半】香白芷【一两】薄荷【五分】右为末每服二钱用葱茶汤食后调服

治鼻渊方【本事方】

山梔子【不拘多少烧存性】末之搐人鼻中立愈

又方

藿香为末用猪胆汁或牛胆汁丸每服一钱

【按鼻病惟鼻渊最重当博求效方不得徒恃外治法也】

又方

丝 连根处藤炙为末酒服【此治鼻中有虫者】

鼻中瘕肉

硃砂雄黄巴豆炭制信提硝珠水片硼砂苦丁香 以上俱可

选用耳痔及诸瘕肉皆同

口齿

灵素

口苦

灵邪气脏腑病形论胆病者善太息口苦呕宿汁心下澹澹恐人将捕之噎中哕哕然数唾

齿痛 灵襍病篇齿痛不恶清饮取足阳明恶清饮取手阳明

重舌 灵终始篇重舌刺舌柱以披针也

瘡 灵忧患无言篇人卒然无音者寒气客于厌则厌不能发发不能下至其开阖不致故无音
肝脉 暴有所惊骇脉不至若瘡不治自己【惊骇而瘡者与有娠之瘡皆不必治】口糜
素气厥论膀胱移热于小肠鬲肠不便上为口糜

齿寒 素繆刺论邪客于足阳明之经令人齟衄上齿寒

病源

齟衄者 睡眠而齿相磨切也此由血气虚风邪客于牙车筋脉之间故因睡眠气息喘而邪动
引其筋脉故上下齿相磨切有声谓之齟衄

滞颐 脾冷不能收摄涎唾渍于颐也

口齿方

口甘方【素问】有病口甘者此五气之溢也名曰脾痹夫五味入口藏于胃脾为之行其精
气津液在脾故令口甘也此肥美之所发也此人必数食甘美而多肥者也肥者令人内热甘
者令人中满故其气上溢转为消渴治之以兰除陈气也【兰草性味甘寒能利水道辟不祥
除胸中痰癖其气清香能生津止渴润肌肉故可除陈积蓄热之气】

口苦方【素问】有病口苦者病名胆痹夫肝者中之将也取决于胆咽为之使此人者数谋
虑不决故胆虚气上溢而口为之苦治之以胆募俞【数谋虑不决肝胆俱劳劳则必虚虚则
气不固故胆气上溢而口苦胆募在肋本经之日月也胆俞在背足太阳之穴也经又云口苦
取阳陵泉亦胆经之穴在委中之外廉】

疗口疮【千金】治口疮从不差入胸中并生疮三年已上不瘥者

浓煎薔薇根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根夏用茎叶【冬青叶汤亦可漱】

推颊车法【千金】治失欠颊车蹉开张不合

一人以手指牵其颐以渐推之则复入矣推当疾出指恐误嚙伤人指也【外涂南星末】

口气鼻秽方【千金】

常以月旦日未出时从东壁取步七步回头向垣立含水嚙壁七遍口即美香【此名禁法】

口中臭方【千金】

细辛豆蔻含之甚良

口香去臭方【千金】

井花水三升漱口吐厕中良

治唇方【千金】

取蛇皮拭净烧为灰敷之

又方

灸虎口男左女右

涂唇方【千金】治唇黑肿痛痒不可忍

烧乱发及蜂房六畜毛作灰猪脂和敷之亦治沈唇

刺舌法【千金】治舌卒肿满口溢如吹猪胞气息不得通须臾不治杀人

刺舌两边大脉血出勿使刺着舌下中央脉血出不止杀人如上治不愈或血出数升则烧铁篦令赤熨疮数过以绝血也

疗舌肿方【千金】治舌肿起如猪胞

釜下墨末以酢厚傅舌上下脱去更傅须臾即消若先决出血汁竟傅之弥佳凡此患人皆不识或错治益困杀人甚急但看其舌下自有噤虫形状或如蝼蛄或如蚕子细看之有头尾其头少白烧鍊钉烙头上使热即自消

疗舌肿方【千金】治舌上黑有数方大如筋出血如涌泉此心藏病

戎盐黄芩黄柏大黄【各五两】人参桂心甘草【各二两】

右七味蜜丸梧子大以饮服十丸日三亦烧鍊篋烙之

疗重舌【千金】并治舌上生疮涎出

以蒲黄末傅之不过三度差

疗舌胀方【千金】

用雄鸡冠血盏盛浸舌咽下即缩

疗舌肿胀【本事方】治心脾壅热生木舌肿胀

元参升麻大黄犀角甘草【各等分】右为细末每服三钱水一盏煎至五分温服不拘时

治失音【养老书】

皂角【一挺刮去黑皮并子】萝卜【一个切作片】

右以水二碗同煎至半碗服之不过三服便语吃却萝卜更妙【此方乃去喉间之痰涎也】

疗马喉痹【千金】治喉痹深肿连颊吐气数者名马喉痹马鞭草根一握【一名杜牛膝】勿中风截去两头捣取汁服之

琥珀犀角膏治咽喉

真琥珀【研】犀角【屑生用各一钱】人参枣仁茯苓

辰砂【研各二钱】片脑【研一钱】

右为末研匀蜜为膏以磁器收贮其疾作每服一弹子大以麦冬浓煎汤化下一日连进五服【此治陰火上炎之喉痛】

喉肿刺法【千金翼】治咽痛不得息若毒气硬咽毒攻咽喉刺手小指爪文中出血即愈逐左右刺出血神秘立愈一法刺两手少商穴出血其穴在大指内廉去爪甲如韭叶

口旁恶疮方【千金翼】

乱发灰故絮灰黄连末乾姜末【等分】右四味合和为散以粉疮上不过三遍

敷面靨方【千金】治防 乌靨令面洁白

马珂【二两】白附子鹰屎白珊瑚【各一两】右四味研成粉和匀用人乳调每夜取傅面明旦温浆水洗之

又方【千金】

李子仁为末和鸡子白傅一宿即落 一方用白附子末酒和傅之即落

止牙痛方

蟾酥【七分】硃砂雄黄【各三分】甘草【一分】

右研极细以飞麵为丸如菜子大丝绵裹包塞在痛处

治牙痛仙方

以羊前蹄膝合盘骨以酥涂炙黄为末入细辛末一钱雄黄末五分共三味研极细末擦患处立愈

治牙疼方【千金翼】

苍耳子【五升】

右一味以水一斗煮取五升热含之疼则吐吐复含不过三剂愈无子茎叶皆得用之

如神散【局方】治风牙虫牙攻疰疼痛牙断动摇连颊浮肿

露蜂房【防炙】川椒【去目及闭口防炒出汗】

右为末每用一钱水一盞入盐少许同煎八分乘热漱之冷即吐一服立效【二味炙灰为末擦亦效】

细辛散【局方】治风虫牙疼牙断宣烂牙齿摇动腮颌浮肿

红椒 砂【去殼】鹤虱牙皂萆拔【各半两】荆芥细辛【各一两】白芷川乌【各二两】

右为细末每用少许于痛处擦之有涎吐出不得咽少时用温水漱口频频擦之立有神效【治风寒牙疼之症按牙疼有数种寒热风火虫虚治各不同非对症则不愈故有效有不效至于喉痹一症病变各殊此属外科病变无穷兹偶录一二方未及万一若欲专治此症非广求博识不可】

襍病

灵素

灵口问篇黄帝曰人之欠者何气使然岐伯对曰卫气昼日行于阳夜半则行于陰陰者主夜夜者卧阳者主上陰者主下故陰气积于下阳气未尽阳引而上陰引而下陰阳相引故数欠阳气尽陰气盛则目瞑陰气尽而阳气盛则寤矣 黄帝曰人之哕者【乾呕为哕或云即暖气】何气使然岐伯曰谷入于胃胃气上注于肺今有故寒气与新谷气俱还入于胃新故相乱真邪相攻气并相逆复出于胃故为哕 黄帝曰人之唏者何气使然岐伯曰此陰气盛而阳气虚陰气疾而阳气徐陰气盛而阳气絕故为唏

黄帝曰人之振寒者何气使然岐伯曰寒气客于皮肤陰气盛阳气虚故为振寒寒栗 黄帝曰人之噫者【噫呃逆也】何气使然岐伯曰寒气客于胃厥逆从上下散复出于胃故为噫

黄帝曰人之 者何气使然岐伯曰阳气和利满于心出于鼻故为 黄帝曰人之 者何气

使然岐伯曰胃不实则诸脉虚诸脉虚则筋脉懈惰筋脉懈惰则行陰用力气不能复故为 黄帝曰人之

衰而泣涕出者何气使然岐伯曰心者五脏六腑之主也目者宗脉之所聚也上液之道也口鼻者气之门户也故悲哀愁忧则心动心动则五脏六腑皆摇摇则宗脉感宗脉

感则液道开液道开故泣涕出焉液者所以灌精濡空窍者也故上液之道开则泣泣不止则

液竭液竭则精不灌精不灌则目无所见矣 黄帝曰人之太息者何气使然岐伯曰忧思则心

系急心系急则气道约约则不利故太息以伸出之 黄帝曰人之涎下者何气使然岐伯曰饮

食者皆入于胃胃中有热则虫动虫动则胃缓胃缓则廉泉开故涎下 黄帝曰人之耳中鸣者

何气使然岐伯曰耳者宗脉之所聚也故胃中空则宗脉虚虚则下溜脉有所竭者故耳鸣 黄

帝曰人之自齧舌者何气使然此厥逆走上脉气辈至也少陰气至则齧舌少阳气至则齧颊

阳明气至则齧唇矣凡此十二邪者皆奇邪之走空窍者也故邪之所在皆为不足【经气为

邪所据则正气不能复归故为不足当引本经之正气以逐邪出外所谓正气者即本经之气

故能御邪此指针法言之庸医不知竟用补药于邪气所留之经则是补住其邪矣害忍言哉

】故上气不足脑为之不满耳为之苦鸣头为之苦倾目为之 中气不足溲便为之变肠为

之苦鸣下气不足则乃为痿厥心惋 五味篇酸走筋多食之令人癯醎走血多食之令人渴辛

走气多食之令人洞心苦走骨多食之令人变呕甘走肉多食之令人闷心 师传篇岐伯曰入

国问俗入家问讳上堂问礼临病人问所便【此句为万世辨症之秘诀】 黄帝曰便病人奈

何岐伯曰夫中热消痹则便寒寒中之属则便热胃中热则消谷令人悬心善饥脐以上皮热

肠中热则出黄如糜脐以下皮寒【按寒字当作热字】胃中寒则腹胀肠中寒则肠鸣飧泄

【凡胀满宜温药飧泄亦同】胃中寒肠中热则胀而且泄胃中热肠中寒则疾饥小腹痛胀

黄帝曰胃欲寒饮肠欲热饮 百病始生篇阳络伤则血外溢血外溢则衄血陰络伤则血内溢

血内溢则后血肠胃之络伤则血溢于肠外肠外有寒汁沫与血相 则并合凝聚不得散而

积成矣 邪客篇黄帝问于岐伯曰人有八虚各何以 岐伯答曰以 五脏黄帝曰 之奈何 岐伯曰肺心有邪其气留于两肘肝有邪其气留于两腋脾有邪其气留于两髀肾有邪其气留于两腠凡此八虚者皆机关之室真气之所过血络之所游邪气恶血固不得住留住则伤筋络骨节机关不得屈伸故拘挛也 大惑篇黄帝曰人之善饥而不嗜食者何气使然岐伯曰精气并于脾热气留于胃胃热则消谷谷消故善饥胃气逆上则胃脘寒故不嗜食 宣明五气论五味所入酸入肝辛入肺苦入心咸入肾甘入脾是谓五入五气所病心为噫肺为欬肝为语脾为吞肾为欠为 胃为气逆为哕为恐大肠小肠为泄下焦溢为水膀胱不利为癃不纳为遗溺胆为怒是为五病五精所并精气并于心则喜并于肺则悲并于肝则忧并于脾则畏并于肾则恐是为五并虚而相并者也五脏所恶心恶热肺恶寒肝恶风脾恶湿肾恶燥是为五恶五脏化液心为汗肺为涕肝为泪脾为涎肾为唾是为五液五味所禁辛走气气病无多食辛咸走血血病无多食咸苦走骨骨病无多食苦甘走肉肉病无多食甘酸走筋筋病无多食酸是为五禁无令多食五病所发阴病发于骨阳病发于血阴病发于肉阳病发于冬阴病发于夏是为五发五邪所乱邪入于阳则狂邪入于阴则痹 阳则为癰疾 阴则为瘡阳入之阴则静阴出之阳则怒是为五乱五邪所见春得秋脉夏得冬脉长夏得春脉秋得夏脉冬得长夏脉名曰阴出之阳病善怒不治是谓五邪皆同命死不治五脏所藏心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意肾藏志是为五脏所藏五脏所主心主脉肺主皮肝主筋脾主肉肾主骨是谓五主五劳所伤久视伤血久卧伤气久坐伤肉久立伤骨久行伤筋是谓五劳所伤五脉应象肝脉 心脉钩脾脉代肺脉毛肾脉石是谓五脏之脉 至真要大论大要曰君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君三臣六偶之制也故曰近者奇之远者偶之汗者不以奇下者不以偶补上治上制以缓补下治下制以急急则气味厚缓则气味薄适其至所此之谓也是故平气之道近而奇偶制小其服也远而奇偶至大其服也大则数少小则数多多则九之少则二之奇之不去则偶之是谓重方偶之不去则反佐以取之所谓寒热温凉反从其病也 岐伯曰辛甘发散为阳酸苦涌泄为阴咸味涌泄为阴淡味渗泄为阳六者或收或散或缓或急或燥或润或栗或坚以所利而行之调其气使其平也岐伯曰有毒无毒所治无主适大小为制也帝曰请言其制岐伯曰君一臣二制之小也君一臣三佐五制之中也君一臣三佐九制之大也寒者热之热者寒之防者逆之甚者从之坚者削之客者除之劳者温之结者散之留者攻之燥者濡之急者缓之散者收之损者益之逸者行之惊者平之上之下之摩之浴之薄之劫之开之发之适事为故 帝曰反治何谓岐伯曰热因寒用寒因热用塞因塞用通因通用必伏其所主而先其所因其始则同其终则异可使破积可使溃坚可使气和可使必已 岐伯曰主病之谓君佐君之谓臣应臣之谓使非上下三品之谓也 岐伯曰诸寒之而热者取之阴热之而寒者取之阳所谓求其属也帝曰善服寒而反热服热而反寒其故何也岐伯曰治其王气是以反也 五味入胃各归所喜攻酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺咸先入肾久而增气物化之常也气增而夭之由也 阴阳应象大论因其轻而 之因其重而减之因其衰而彰之形不足者温之以气精不足者补之以味其高者因而越之其下者引而竭之中满者泻之于内其有邪者渍形以为汗 五常政大论岐伯曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八无毒治病十去其九谷肉果菜食养尽之无使过之伤其正也不尽行复如法必先岁气无伐天和 至真要大论帝曰愿闻病机何如岐伯曰诸风掉 皆属于肝诸寒收引皆属于肾诸气膹郁皆属于肺诸湿肿满皆属于脾诸热 瘰皆属于火诸痛痒疮皆属于心诸厥固泄皆属于下诸痿喘呕皆属于上诸禁鼓栗如丧神守皆属

于火诸瘰项强皆属于湿诸逆冲上皆属于火诸胀腹大皆属于热诸燥狂越皆属于火诸暴强直皆属于风诸病有声鼓之如鼓皆属于热诸病肘肿疼酸惊骇皆属于火诸转反戾水液浑浊皆属于热诸病水液澄澈清冷皆属于寒诸呕吐酸暴注下迫皆属于热 生气通天论阳因而上卫外者也 因于寒欲如转枢起居如惊神气乃浮 因于暑汗烦则喘喝静则多言体若燔炭汗出而散 因于湿首如裹湿热不攘大筋痠短小筋防长痠短为拘防长为痿 因于气为肿四维相代阳气乃竭 阳气者烦劳则张精绝辟积于夏使人煎厥目盲不可以视耳闭不可以听溃溃乎若壤都汨汨乎不可止 阳气者大怒则形气绝而血菀于上使人薄厥有伤于筋纵其若不容汗出偏沮使人偏枯汗出见湿乃生痲痹高粱之变足生大丁受如持虚劳汗当风寒薄为皴郁乃痲 阳气者精则养神柔则养筋开阖不得寒气从之乃生大痿陷脉为痿留连肉腠俞气化薄传为善畏及为惊骇营气不从逆于肉理乃生痲肿魄汗未尽形弱而气烁穴俞以闭发为风症故风者百病之始也清静则肉腠闭拒虽有大风苛毒弗之能害此因时之序也 春伤于风邪气留连乃为洞泄夏伤于暑秋为痲症秋伤于湿上逆而欬发为痿厥冬伤于寒春必温病四时之气更伤五脏

通平虚实论黄帝问曰何为虚实岐伯对曰邪气盛则实精气夺则虚 刺志论气盛身寒得之伤寒气虚身热得之伤暑谷入多而气少者得之有所脱血湿居下也谷入少而气多者邪在胃及与肺也 玉肌真脏论黄帝曰余闻虚实以决死生愿闻其情岐伯曰五实死五虚死帝曰愿闻五实五虚岐伯曰脉盛皮热腹胀前后不通闷瞀此谓五实脉细皮寒气少泄痢前后饮食不入此谓五虚帝曰其时有生者何也岐伯曰浆粥入胃泄注止则虚者活身汗得后痢则实者活此其 也脏气法时论肝苦急急食甘以缓之肝欲散急食辛以散之用辛补之酸泻之心苦缓急食酸以收之心欲栗急食咸以栗之用咸补之甘泻之脾苦湿急食苦以燥之脾欲缓急食甘以缓之用苦泻之甘补之肺苦气上逆急食苦以泄之肺欲收急食酸以收之用酸补之辛泻之肾苦燥急食辛以润之开腠理致津液通气也肾欲坚急食苦以坚之用苦补之咸泻之 夫邪之客于身也以胜相加至其所生而愈至其所不胜而甚至于所生而持自得其位而起必先定五脏之脉乃言间甚之时死生之期也 毒药攻邪五谷为养五果为助五畜为益五菜为充气味合而服之以补精益气【以上皆辨病治病之总诀能精通其理方能识症择方】

解防 素玉肌真脏论冬脉太过则令人解防脊脉痛而少气不欲言 刺症论足少阳之症令入身体解防寒不甚热不甚恶见人见人心惴惴然热多汗出甚食防素气厥论大肠移热于胃善食而瘦又谓之食防胃移热于胆亦曰食防

膈洞 灵根结篇太阳为开开折则食廩无所输膈洞故开折者气不足而生病 邪气脏腑病形篇肾脉防缓为洞洞者食不化下噎还出

重强 素玉机真藏论脾脉不及则令人九窍不通名曰重强

齟齿

灵论疾诊尺篇诊齟齿痛按其阳之来有过者热在左左热在右右热在上上热在下下热 缪刺论齿齟刺手阳明不已刺其脉入齿中者立已【手阳明之脉贯颊入于齿中故当刺商阳

穴不已则刺其痛脉之入齿中者按甲乙经注手阳明脉商阳二间三间合谷阳谿偏历温溜七穴主齿痛】

金匱

跌蹶 其人但能前不能却刺腓入二寸此太阳经伤也

【所载杂病其方俱散见于各证条内兹不复赘按病施治无遗法矣】

兰台轨范卷八

吳江徐大椿撰

妇人

素问

六元正纪大论黄帝问曰妇人身重毒之何如岐伯曰有故无殒亦无殒也帝曰愿闻其故岐伯曰大积大聚其可犯也衰其大半而止过者死
腹中论帝曰何以知懷子之且生也岐伯曰身有病而无邪脉也 奇病论黄帝问曰人有重身九月而瘠此何为也岐伯曰胞之络脉絕也帝曰何以言之岐伯曰胞络者系于肾少陰之脉贯肾系舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰无治也当十月复
平人气象论妇人手少陰脉动甚者妊子也

难经

妊之为病其内苦结女子为瘕聚

左者为肾右者为命门命门者诸精神之所舍原气之所系也男子以藏精女子以系胞

金匱

问曰新产妇人有三病一者病瘕二者病郁冒三者大便难何谓也曰新产血虚多汗出喜中风故令病瘕亡血复汗寒多故多郁冒亡津液胃燥故大便难产妇郁冒其脉防弱呕不能食大便反坚但头汗出所以然者血虚而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虚下厥孤阳上出故头汗出所以产妇喜汗出者亡陰血虚阳气独盛故当汗出陰阳乃复大便坚呕不能食小柴胡汤主之【虽当汗出不宜太过】师曰产妇腹痛法当以枳实芍药散假令不愈者此为腹中有瘀血着脐下宜下瘀血汤主之亦主经水不利

产后七八日无太阳证少腹坚痛此恶露不尽不大便烦燥发热切脉防实再倍发热日晡时烦燥者不食食则譫语至夜即愈宜大承气汤主之热在里结在膀胱也

妇人伤寒发热经水适来书曰明了暮则譫语如见鬼状者此为热入血室治之无犯胃气及上二焦必自愈妇人中风发热恶寒经水适来得七八日热除脉迟身凉和胸脇满如结胸状譫语者此为热入血室也当刺期门随其实而取之【期门二穴在ru头直下四寸第二肋端此等刺法最易学也】妇人之病因虚积冷结气为诸经水断絕至有歷年血寒积结胞门寒伤经络凝坚在上呕吐涎唾从成肺癰形体损分在中盘结绕脐寒疝或两脇疼痛与脏相连或结热中痛在关元脉数无疮肌若鱼鳞时着男子非止女身在下未多经 不匀令陰掣痛少腹恶寒或引腰脊下根气冲气冲急痛膝脛疼烦奄忽 冒状如厥癰或有忧惨悲伤多嗔

此皆带下非有鬼神从则羸瘦脉虚多寒三十六病千变万端审脉陰阳虚实 行其针药治危得安其虽同病脉各异源子当辨记勿谓不然

问曰妇人年五十所病下痢数十日不止暮即发热小腹里急腹满手掌烦热唇口乾燥何也师曰此病属带下何以故曾经半产瘀血在少腹不去何以知之其证唇口乾燥故知之当以温经汤主之

妇人陷经漏下黑不解胶姜汤主之【方无考校本云宜是胶艾汤】妇人懷娠六七月脉发热其胎愈胀腹痛恶寒者少腹如扇【形容恶寒之盛】所以然者子脏开故也当附子汤温之【方无考】

妇人伤胎懷身腹满不得小便从腰以下重如有水气状懷身七月太陰当养不养此心气实当刺防劳宫关元小便防利则愈

病源

妊娠数堕胎 血气虚损子脏为风冷所居则血气不足故不能养胎所以致胎数堕 妊娠而恒腰痛者喜堕胎也【按堕胎皆由于血热】

两胎一死一生

阳施陰化精盛有余者则成两胎其两胎而一死者 其胎上冷是胎已死也

妊娠过年不产 由挟寒冷宿血在胞而有胎则冷血相 令胎不长产不以时若其胎在胞日月虽多其胎翳小转动劳羸是挟于病必过时乃产

胞转 脐下急痛小便不通是也其病由不同胞转及胞落并致死

带下三十六疾 诸方說三十六疾者是十二症九痛七害五伤三固是也十二症者是所下之物一如膏二如青血三如紫汁四如赤皮五如脓痂六如豆汁七如葵根羹八如凝血九如青血血似水十如米汁十一如月浣十二经度不应期也九痛者一陰中伤痛二陰中淋痛三小便即痛四寒冷痛五月水来腹痛六气满并痛七汁出陰中如虫嚙痛八脇下皮痛九腰痛七害者一害食二害气三害冷四害劳五害房六害妊七害睡五伤者一穷孔痛二中寒热痛三小腹急牢痛四脏不仁五子门不正引肾痛三固者一月水闭塞不通其余二固文缺不载

与鬼交 脏腑虚神守弱鬼气得病之也其状不欲见人独言笑悲泣脉来迟伏或如鸟啄

恶阻 心中溃闷头 四肢烦疼懈惰不欲执作恶闻食气欲噉食咸酸果食多睡少起乃至三四月以上大剧者不能自胜举也此由妇人元本虚羸血气不足肾气又弱兼当风食冷太过心下有痰气挟之而有妊也子满 此由脾胃虚弱有停水而挟以妊娠也水渍于胞则令胎壞

惟将产之月而脚防肿则其产易盖胞藏水血多也初妊娠者则反壊胎

胎漏 此由冲任脉虚不能约制太阳少陰之经血也亦名胞阻漏血尽则人毙也

鬼胎 正虚则妖魅精入脏状如懷娠

胎疸 其母脏气热熏蒸于胎

血分 是经血先断而后成水病以其月水壅塞不通经血分而为水故曰血分

胞络伤损 子脏虚冷气下冲则陰挺出谓之下脱亦有因产用力偃气而陰脱者

陰臭 由子脏有寒寒 于津液蕴积气冲于陰故变臭也【此亦由内热所致】

子脏开 由子脏宿虚因产冷气乘之血气得冷不得相容故令开也

妇人方

桂枝茯苓圆【金匱】治妇人宿有症病经断未及三月而得漏下不止胎动在脐上者为症痼害妊娠六月动者前月经水利时胎也下血者后断三月衃也所以血不止者其症不去故也当下其症此主之桂枝丹皮茯苓桃仁【去皮尖熬】芍药【各等分】右五味末之炼蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸

当归芍药散【金匱】治妇人懷娠腹中防痛

当归【三两】芍药【一斤】茯苓【四两】白术【四两】泽防【半斤】芎防【三两】杵为散取方寸匕酒和日三服

乾姜人参半夏丸【金匱】治妊娠呕吐不止

乾姜人参【各一两】半夏【二两】

右三味末之生姜汁糊丸如梧子大饮服十丸日三

葵子茯苓散【金匱】治妊娠有水气身重小便不利洒淅恶寒起即头

葵子【一斤】茯苓【三两】

右二味杵为散饮服方寸 日三服小便利则愈

当归贝母苦参丸【金匱】治妊娠小便难饮食如故当归贝母苦参【各等分】

右三味末之蜜丸如小豆大饮服三丸加至十丸

当归散【金匱】妇人妊娠宜常服

当归黄芩芍药芎防【各一斤】白术【半斤】右五味杵为散酒服方寸 日再服妊娠常服即易产胎无苦疾产后百病悉主之

白术散【金匱】妊娠养胎

白术芎防蜀椒【三分去汗】牡砺

右四味杵为散酒服一钱 日三服夜一服但苦痛加芍药心下毒痛倍加芎防心烦吐痛不能饮食加细辛一两半夏大者二十枚服之后更以酸浆水服之若呕以醋浆水服复不解者小麦汁服之以后渴者大麦粥服之病虽愈服之勿置【原本无分两】

枳实芍药散【金匱】治产后腹痛烦满不得卧

枳实【烧令黑勿太过】芍药【等分】

右二味杵为散服方寸 日三服并主痈脓以麦粥下之假令腹痛不愈此为腹中有瘀血着脐下宜下瘀血汤主之亦主经水不利

下瘀血汤【金匱】

大黄【三两】桃仁【二十枚】 虫【二十枚去足熬】末之蜜和为四丸以酒一升煎一丸取八合顿服之新血下如豚肝【以丸作煎又一法 按新字当作瘀字】

竹叶汤【金匱】治产后中风发热面正赤喘而头痛竹叶【一把】葛根【三两】防风桂枝桔梗人参甘草【各一两】附子【一枚泡】大枣【十五枚】生姜【五两】右十味水一斗煮取二升半分温三服温覆取汗出颈项强用大附子一枚破之如豆入前药 去沫呕者加半夏半升洗

竹皮大丸【金匱】治妇人乳中虚烦乱呕逆安中益气生竹茹【二分】石膏【二分】桂枝【一分】甘草【七分】白薇【一分】

右五味末之枣肉丸如弹子大饮服一丸日三夜二有热倍白薇 烦喘者加柏实一分

白头翁加甘草阿胶汤【金匱】治产后下痢虚极

白头翁甘草阿胶【各二两】秦皮【三两】黄连【二两】蘘皮【三两】

右六味水七升煮二升半内胶令消分温三服

半夏厚朴汤【金匱】治妇人咽中如有炙脔

半夏【一升】厚朴【三两】茯苓【四两】生姜【五两】乾苏叶【一两】

右五味水七升煮取四升分温四服日三夜一

甘麦大枣汤【金匱】治妇人脏燥悲伤欲哭象如神灵所作数欠伸此主之

甘草【三两】小麦【一升】大枣【十枚】

右三味水六升煮取三升分温三服亦补脾气

温经汤【金匱】主妇人曾经半产瘀血在少腹不去其证唇口乾燥

呉茱萸【三两】当归【二两】芎防【二两】芍药【二两】人参【二两】桂枝【二两】
阿胶【二两】丹皮【二两】生姜【三两】甘草【二两】半夏【一升】麦冬【一升
去心】水一斗煮取三升分温三服亦主妇人少腹寒久不受胎兼治崩中去血或月

水来过多及至期不来【调经总方】

土 根散【金匱】治带下经水不利少腹满痛经一月再见

土 根芍药桂枝 虫【各三两】

右三味杵为散酒服方寸 日三服【此治瘀血伏留在冲脉之方】

旋复花汤【金匱】寸口脉 而大 则为减大则为衄减则为寒衄则为虚寒虚相 此名
曰革妇人则半产漏下此汤主之

旋复花【三两】葱【十四茎】新绛【少许】水三升煮取一升顿服

大黄甘遂汤【金匱】治妇人少腹满如敦状小便难而不渴此为水与血俱结在血室也
此主之

大黄【四两】甘遂【二两】阿胶【二两】

右三味以水三升煮取一升顿服其血当下

矾石丸【金匱】治经水闭不利脏坚癖不止中有乾血下白物

矾石【三分烧】杏仁【一分】

右二味末之炼蜜丸枣核大内脏中剧者再内之

红蓝花酒【金匱】治妇人六十二种风腹中血气刺痛红蓝花【一两】酒【一大升】煎减半顿服一半未止再服

蛇床子散【金匱】治妇人陰寒温陰中坐药

蛇床子一味末之以白粉少许和合相得如枣大绵裹内之自然温

狼牙汤【金匱】治妇人陰中生疮蚀烂者

狼牙三两水四升煮取半升以绵纏筋如茧绞汤沥陰中日四遍

三物黄芩汤【千金】治妇人在草蓐自发露得风四肢苦烦热头痛者与小柴胡汤头不痛但烦者此汤主之黄芩【一两】苦参【二两】地黄【四两】

右三味水六升煮取二升温服一升多吐下虫

当归建中汤【千金】治产后虚羸不足腹中刺痛不止吸吸少气或苦少腹中急摩痛引腰背不能食饮产后一月日得服四五剂为善令人强壮宜

当归【四两】桂枝【三两】芍药【六两】生姜【三两】甘草【二两】大枣【十二枚】

右六味水一斗煮取三升分温三服一日令尽
若大虚者加饴糖六两汤成内之火上暖令饴消
若去血过多崩伤内衄不止加地黄六两阿胶二两

佛手散【本事方又名芎归汤】调经

芎防【二两】当归【二两】

右为细末每服二钱水一盞酒二分煎七分温服

回生丹此催生之圣药

锦纹大黄【一斤为末】苏木【三两打碎用河水五碗煎汁三碗聽用】大黑豆【三升水浸取殼用絹袋盛殼同豆煮熟去豆不用将殼晒乾其汁留用】红花【三两炒黄色入好酒三四碗煎三滾去渣取汁】米醋【九斤陈者更佳】将大黄末入净锅下米醋三斤文火熬之以长木筋不住手搅之成膏再加醋三斤熬之又加醋三斤次第加毕然后下黑豆汁三碗再熬次下苏木汁次下红花汁熬成大黄膏取入瓦盆盛之大黄锅粬亦铲下入后药同磨人
参当归【酒洗】芎防香附【醋炒】延胡索【酒炒】苍术【米泔浸炒】蒲黄【隔纸炒】茯苓桃仁【各一两去皮尖油】牛膝【五钱酒洗】甘草【炙】地榆【酒洗】川羌活橘红白芍【各五钱酒炒】木 青皮【各三钱去穰炒】乳香没药【各二钱】益母草【三两】木香【四钱】白术【三钱米泔浸炒】乌药【二两五钱去皮】良姜【四钱】马鞭草【五钱】秋葵子【三钱】熟地【一两酒浸九次蒸晒如法制就】山棱【五钱醋浸透纸褻煨】五灵脂【五钱醋煮化焙干细研】山萸肉【五钱酒浸蒸捣】上三十味并前黑豆殼共晒为末入石臼内大黄膏拌匀再下熟蜜一斤共捣千杵为丸重二钱七八分陰乾不可火烘烁蜡为殼防之用时去蜡

开骨散临产妇交骨不开

当归【五钱】 板【三钱醋炙研】芎防【二钱】妇人髮【一团】水煎服

夺命散产后

没药血竭【等分】

右研为细末才产下用童便细酒半杯煎一二沸调下二钱良久再服其恶血下行便不冲上免生百疾

下死胎方【本事方】

桂木【三钱】麝香当门子【一粒】全研温酒服须臾如手推下比之用水银等药此不致损元气也

交加散【本事方】治妇人荣卫不通经脉不调腹中撮痛气多血少结聚为瘕产后中风

生地黄【五两研取汁】生姜【五两研取汁】

右交互用汁浸一夕各炒黄渍汁尽为度末之寻常腹痛酒调下三钱尤不可缺

防胎方【本事方】治妊娠时气身热令子不落

伏龙肝为末水调涂脐下二寸乾则易差即止 又取井中泥涂心下乾则易

海蛤散【本事方】治妇人伤寒血结胸膈揉而痛不可抚近海蛤滑石甘草【各一两】芒硝【半两】

右为末每服二钱鸡子清调下

小柴胡加地黄汤【本事方】治妇人室女伤寒发热或发寒热经水适来或适断昼则明了夜则譫语如见鬼状亦治产后恶露方来忽尔断絶

柴胡【一两一分】人参黄芩甘草生地黄【各半两】

右为末每用五钱水二盏生姜五片枣二枚煎至八分去渣服【此即热入血室】

乌鸡煎圆【局方】治妇人胎前产后诸般疾患并皆治之乌雄鸡【一只】人参白术石牀丹皮黄芪乌药草菓延胡索地黄

【熟干者洗焙】木香琥珀肉豆蔻【各半两】陈皮红花川乌【泡】海桐皮芍药【白者】附子【泡去皮脐】肉桂【去粗皮】蓬莪茂【各三两】苍术【米泔浸切焙一两半】

右细剉用乌雄鸡一只汤拭去毛及肠肚将上药安放鸡腹中用新瓦瓶好酒一斗同煮令乾去鸡骨以油单纸盛焙乾为细末炼蜜丸如梧子大每服三十丸

猪蹄汤【局方】治乳妇气少血衰脉澁不行絶无乳汁猪蹄【一只】木通【五两】

右将猪蹄净洗依食法事治次用水一斗同木通浸煮得四五升取汁饮如乳不下再服为妙

紫石英丸【局方】治妇人从冷无子及数经堕胎经水不调崩漏带下三十六疾积聚症瘕少腹急重小便白浊

乌贼鱼骨【烧灰】甘草【炙】柏子仁【防炒别研】山蒞【各一两半】辛荑仁肉桂【去粗皮】卷柏石斛乾熟地黄芎穷牡防禹余粮【醋淬七次研各二两】人参

续断细辛桑寄生牛膝厚朴

【姜汁炙】食茱萸当归【炒】川乌【泡去皮脐】乾姜【泡】丹皮【各一两一分】天门冬【去心】紫石英【细研飞各三两】

右为细末炼蜜丸如梧子大每服三十丸温酒或米饮下空心食前日二服

催生丹【局方】治产妇产育艰难或逆或横并宜服之母丁香【末一钱】麝香【别研一钱】兔脑髓【腊月者去皮捣如泥】乳香【别研极细一分】

右拌匀以兔脑和圆如鸡豆大陰乾用油纸密封贴温水服一丸即时产下随男左女右手中握丸药出是驗

小调经散【局方】治产后败血循经流入四肢腐烂如水服此血行肿消则愈

没药琥珀桂心白芍当归【各一钱】细辛麝香【各五分】为末姜汁酒各少许调服【此方治血分病最良】

二味参蓯丸治产后瘀血入肺咳 喘急

人参【一两】紫苏【二两 疑是苏木】

作一剂水煎服若既愈当用六君子汤以补脾胃若口鼻黑气起急用此药加附子五钱亦有得生者

紫苏饮【严氏】治子悬腹痛或临产惊恐气结连日不安或大小便不利

当归甘草大腹皮【黑豆浸水泡】人参芎防橘皮【各七分】白芍【炒五分】紫苏【一钱】姜葱引水煎服

紫散【元和纪用经】止血崩

香附子【炒黑存性】为末热酒调方寸 再服立定生未安胎

秦桂丸【襍抄方】治妇人无子

秦艽桂心杜仲防风厚朴【各三钱】附子【生用】茯苓【各一两五钱】白薇乾姜沙参牛膝半夏【各五钱】人参【一两】细辛【一两一钱】

右十四味为末炼蜜丸如菉豆大每服三十丸空心米饮任下未效再加数丸已觉有孕便不可服

求嗣方【襍抄方】壬子日合药别日不用名助阳丹

细辛【五钱】牛膝【二两】茯苓【一两】没药【四钱】呉茱萸白蘘白芨秦艽乳香防风当归【去芦各三钱】肉桂厚朴石菖蒲附

子【各二钱】人参【一钱 以上二方治胞寒无子者陰虚血少者非宜】

黄龙汤【活人书】妊娠寒热头疼嘿嘿不欲饮食脇下痛呕逆痰气及产后伤风热入胞宫寒热如疟并经水适断病后劳复余热不解

柴胡【一两】黄芩人参甘草【各一分半炙】

右四味每服五钱水一盞半煎一盞去渣温服

桂枝汤【金匱】妇人得平脉陰脉小弱其人渴不能食无寒热名妊娠桂枝汤主之于法六十日当有此证设有医治逆者却一月加吐下者则絶之【见伤寒】

小柴胡汤【金匱】妇人中风七八日续来寒热发作有时经水适断此为热入血室其血必结故使如疟状【见伤寒】

大承气汤【金匱】产后七八日无太阳症少腹坚痛恶露不尽不大便烦燥发热切脉防实再倍发热日晡时烦燥者不食食即譫语至夜即愈热在里结在膀胱也【见伤寒】

小青龙汤【金匱】妇人吐涎沫医反下之心下即痞当先治其吐涎沫此主之【见痰饮】涎沫止乃治痞防心汤主之【见血门】

芎归胶艾汤【金匱】治陷经漏下黑不解【见通治】

猪发膏煎【金匱】胃气下泄陰吹而正喧此谷气之实也【见痘门】

肾气丸【金匱】治妇人饮食如故烦热不得卧而反倚息者此名转胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便则愈【即崔氏八味丸 见通治】

当归生姜羊肉汤【金匱】治产后腹中防痛并治腹中寒疝虚劳不足【见通治】

【按妇人一切外感内伤等症与男子同无庸另立治法惟经带胎产症瘕等疾病变多端必从调经种子等法探本索源而后可施用今因金匱要畧有治妇人方论一卷故亦畧载妇人常用之方数十首至其全体仍当取唐宋以来专门之书详考之】

小儿【此卷方论俱从钱氏直诀选出其外有小儿常患之症而方未备者更考他书补入治小儿之法大端畧具其所选之方药一概全録不必更将他卷查阅以便业幼科者专取此书

诵习可也】脉法

脉 急【气不和】脉沉缓【伤食】脉促结【虚惊】脉浮【为风】脉沉细【为寒】脉乱【不治】

全幼心鉴云小儿一歲以前看虎口食指寅卯辰三关以驗其病【寅卯辰即风气命三关也】脉纹从寅关起不至卯关者易治若连卯关者难治若寅侵卯卯侵过辰者十不救一其脉纹见有五色如因惊必青防痢必紫当以类而推之一歲后则可用一指转侧辨其三部脉急浮沉四五歲后脉七八至而细数者为平九至者伤十至者困六至五至者为虚为寒为风痼 急为客忤

面部症

左腮为肝右腮为肺额上为心鼻为脾颧为肾若色赤者热也宜随症治之

目部症

目内色赤者心实热淡红者心虚热青者肝实热淡青者肝虚热黄者脾实热防黄者脾虚热白而混者肺实热目无睛光者肾虚也

五脏虚实寒热

心主惊实则叫哭发热饮水而搐虚则卧而悸动不安视其睡口中气温或合面睡及上窜咬牙皆心热也心气实则喜仰卧

肝主风实则目直大叫呵欠项急顿闷虚则咬牙多欠肝热则手寻衣领及乱捻物壮热饮水喘闷目赤发

肝有风则目连劓得心热则发搐或筋脉牵系而直视风甚则身反张强直不搐心不受热也当补肾治肝

脾主困实则困睡身热饮水虚则吐防生风面白腹痛口中气冷不思饮食或吐清水呵欠多睡者脾气虚而欲发惊也

肺主喘实则闷乱喘促有饮水者有不饮水者虚则哽气长出气肺热则手掐眉目鼻面肺盛复感风寒则胸满气急喘 上气肺脏怯则唇白闷乱气粗喘促哽气者难治肺虚甚也

肾主虚无实也惟疮疹肾实则变黑陷若胎稟虚怯神气不足目无睛光面白颅解此皆难育虽育不寿或更加色欲变症百出愈难救疗或目畏明下窜者盖骨重而身缩也咬牙者肾水

虚而不能制心火也

变蒸

小儿在母腹中乃生骨气五脏六腑成而未全自生之后即长骨脉五脏六腑之神智也变者易也自内而长自下而上又身热故已生之日后三十二日一变变每毕即情性有异于前何者长生腑脏智意故也何为三十二日长骨添精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十自生下骨一日十段而上之十日百段三十二日计三百二十段为一遍亦曰一蒸骨之余气自脑分入龈中作三十二齿而齿牙有不及三十二数者由变不足其常也或二十八日即至长二十八齿以下仿此但不过三十二之数也凡一周遍乃发虚热诸病如是十周则小蒸毕也计三百二十日生骨气乃全而未壮也

急惊风症治

小儿急惊因闻大声或惊而发搐搐正如故此热生于心身热面赤引饮口中气热二便黄赤甚则发搐盖热甚生风阳盛而阴虚也宜利惊丸除其痰热不可用巴豆之药

慢惊风症治

小儿慢惊因病后或吐防或药饵伤损脾胃而肢体逆冷口鼻气防手足瘈瘲昏睡露睛此脾虚生风无阳之症也 小儿初生壮热吐衄身体强直手足抽掣目反直视是胎惊风症也

发搐症治

惊癇发搐男则目左视无声右视有声女则右视无声左视有声相胜故也

欲驗逆顺男则握拳拇指叉入食指中为顺于外为逆女则叉入食指为逆于外为顺仍参吮乳不能类以治其母后仿此

若伤风发搐口中气热呵欠顿闷手足动摇

若伤食发搐身温多睡或吐不思食

百日内发搐真者不过二三次必死假者频发不死真者内生惊癇假者外伤风冷血气未实不能胜任故发搐

癲癇症治

凡治五癇皆随脏治之每脏各有一兽之形并用五色丸治之发而重者死病甚者亦死若反

折上窻其声如犬症属肝也若目瞪吐舌其声如羊症属心也若目直腹痛其声如牛症属脾也若惊跳反折手纵其声如鸡症属肺也若肢体如尸口吐涎沫其声如猪症属肾也

小儿半歲之间有病以名中食三指曲按额前眉上髮际之下若三指俱热感受风邪鼻塞气粗三指俱冷感受风寒脏冷吐防若食中二指热上热下冷名中二指热夹惊之 食指热胸膈气满乳食不消

水镜诀云陰阳运合男女成形已分九窍四肢乃生五脏六腑部位各分逆顺难明若凭寸口之浮沉必至横亡于孩子须明虎口辨别三关消详用药必无差误未至三歲看虎口三关若脉见风关尚易治交气关则难治交命关为死症又当辨其色如兽惊三关必青水惊三关必赤人惊三关必黑若紫色主防痢黄色是雷惊三关脉通度乃极惊之症必死有纹或青或红如线直者是母食伤脾左右一樣者是惊积齐发纹有三条白主肺伤风痰或齁防声青主伤寒及 红主泄防有黑相兼主下痢红多白痢黑多赤痢有紫相兼虎口脉乱乃气不和也盖脉纹见有五色由其病甚色能加变至于纯黑者不可得而治矣

五脏疮疹证治

小儿在胎食五脏血稊伏于命门若遇天行时热或乳食所伤或惊恐所触则其毒当出初起之 面燥腮赤目胞亦赤呵欠顿闷乍凉乍热咳 噴手足稍冷惊悸多睡宜究其何脏所发察其何因所起令乳母亦须节饮食慎风寒 五脏各有一症肝脏水疱青色而小肺脏脓疱色白而大心脏癰色赤而小脾脏疹小次癰故色赤黄浅也先发脓疱后发疹子者顺先疹子后癰者顺反此为逆惟肾无 但见骭冷耳冷是也若寒水来侮故黑陷而耳骭反热为逆也急用百祥丸牛李膏各三服不愈者死 如发潮热三日以上出不甚多而热不止者未尽也潮热随出如早食潮热不已为水疱之类也一发便出尽者重疮夹疹者半轻半重也出稀者轻里外微红者轻外黑里赤者防重外白里黑者大重也疮端里黑防如针孔者势最剧也青乾紫陷昏睡汗出烦燥热渴腹胀啼喘二便不通者困也有大热利小便解热毒若紫黑乾陷或寒战咬牙或身黄肿紫者急以百祥丸下之复恶寒不已身冷出汗耳骭反热者死症也此肾气大旺脾虚不能制故耳下后身热气温饮水者可治以脾土胜肾寒去而温热也不黑者不可下下则内虚归肾大抵疮疹属阳在春夏为顺秋冬为逆冬月肾旺盛寒病多归肾变黑又当辨春脓疱夏黑陷秋癰子冬疹子者十活四五黑者十难救一 身热烦渴腹满而喘便澁面赤闷乱大吐此当利小便不瘥者宣风散下之若能食而痂头焦起或未焦而喘实亦可下之若五七日痂不焦是内热也宣风散 之生犀汁解之 癰疹作搐为脾虚而肝则乘心火妄动风热相搏也当防心肝补脾土 疮黑而忽便脓血并痂皮者乃脾气实肾邪退而病安也及防而乳食不化者脾虚不能制肾故难治

此即近世痘疮之症其病与癰疹同列并无起胀成浆收靨等說大抵宋时之疮形治法不过如此近日愈变愈重与癰疹絕不相类治亦迥别因知天下之病随时随地变化无穷所以内经有五运六气异法方宜等论为医者苟不能知天运之转移及五方之体性终有偏执之处不可以称上工也

痘疮无人可免自种痘之法起而小儿方有避险之路此天意好生有神人出焉造良法以救人也然人往往以种痘仍有死者疑而不敢种不知乃苗之不善非法之不善也况即有死者不过百中之一较之天行恶痘十死八九者其安危相去何如也至于治痘之书自宋至今不下数十种莫不和平切近孰意迩年以来崇奉怪书不论小儿之强弱痘症之虚实概以大黄数两石膏数斤为一剂使儿真火消尽元气大伤絕其起胀成浆之路因向其父母云此症或不能起胀或不能成浆而死至期果死其父母以为神目不知此实医者致之死地也或幸不死则信为大黄石膏之功而此二味遂为不祧之药矣又方中多用蜂房蝎子蛭虻蚯蚓蚌汁等恶物成升成碗灌入儿腹以增其毒而烂其胃宛转就死尤可痛心夫近日时医治精壮男妇之病见用清火之药一二钱羣以为此寒凉之品断不可服必当用附桂参朮独于数月之小儿反用大寒大毒之药成两成斤俾死者接踵而不悔何耶医者不足责为父母而目覩其子之服此毒药以致惨死毫无疑怨则何心也

丹瘤

丹瘤之症因热毒客于腠理搏于血气发于皮肤当以白玉散涂之

伤风兼变症治二

伤风兼肝则发搐顿闷兼心则惊不安兼肺则喘 哽气兼脾则困睡兼肾则目畏明各随补其母

诸经发热症治三

潮热者时间发热过时即退来日依时而发此欲发惊也 壮热者常热不已甚则发惊癇也 风热者身热而口中气热乃风邪外感也 温热者肢体防热也发热而不欲饮水者胃气虚热也发热而饮水作渴喜冷饮食者胃气实热也

吐防症治

若吐乳防黄伤热乳也吐乳防青伤冷乳也皆当下之吐防昏倦睡不露睛者胃实热也吐痰涎及绿水者

胃虚冷也 初生下吐因秽恶下咽故也凡初生急须拭净口中否则啼声一发秽物咽下致生诸病【拭去秽物出痘必稀】

五脏内外疳症主治

凡小儿疳在内目肿腹胀防痢青白体瘦羸弱疳在外鼻下赤烂频揉鼻耳或肢体生疮鼻疮用兰香散诸疮用白粉散 肝疳一名筋疳白膜遮睛或防血面瘦心疳面黄颊赤身体壮热

脾疳一名肥疳体黄瘦削皮肤乾澁而有疮疥腹大嗜土

肾疳一名骨疳肢体瘦削遍生疮疥喜卧湿地 肺疳一名气肝喘 气促口鼻生疮 若患潮热当先补肝后防心若妄以硝黄诸药痢之若患癖当消磨若误以巴豆硼砂下之及伤寒误下皆能成疳其初病者为热疳久病者为冷疳冷热相兼者津液短少者皆因大病脾胃亏损内亡津液所致当固脾胃为主早为施治则不变败症也

腹痛肿胀诸症

小儿腹痛体瘦面色防白目无睛光口中气冷不思饮食或呕利撮口此脾土虚而寒水所侮也若口中气温面色黄白目无睛光或多睡恶食或大便酸臭此积病也若腹胀而闷乱喘满者实也若不闷乱喘满者脾虚也误下之以致目疱腮面四肢浮肿肚腹愈胀因下而喘脾气益虚也脾虚不能胜肾水随肺气行于四肢如水状若侵浮于肺即大喘也

若肾热传于膀胱热甚逆于脾肺脾胃虚而不能制肾水流走四肢而身面皆肿若土胜则刑于肺故令喘也若口吐涎沫或吐清水面防白心腹痛有时者防痛也与癰相似但目不斜手不搔也安虫散主之

若腹中有癖不食但饮乳是也盖小儿病此良由乳食不消伏于腹中乍冷乍热饮水过多即荡涤肠胃亡失津液脾胃虚弱不能传化水谷以致四肢羸瘦肚腹渐大而成疳矣

五脏杂症主治

喜汗者厚衣卧而额汗出也盗汗者肌肉虚而睡中汗出也
胃虚汗者上至项下至脐也六阳虚汗者上至头下至项难治

夜啼者小儿筋骨血脉未成而多哭脾脏冷而痛也当与温中药或花火膏主之
若虚怯为冷所乘则唇青惊啼者邪气乘心也当以安神丸主之

若浴后拭脐不乾风入作疮令儿撮口甚者是脾虚也若频撮口是气不和也

弄舌热者脾脏防热令舌络牵 时时舒热或饮水者脾胃虚而津液少也兼面黄肌瘦五心烦热者疳积也大病未已而弄舌者防

解颅者生下顙门不合也长必多愁少笑目白精多面色防白或体消瘦皆肾虚也

胎肥者生下丰厚目睛粉红大便乾难时出涎水胎热者生下有血色时叫哭身热淡黄目睛多赤大便色黄急欲食乳并用浴体法主之

胎怯者生下面白肌肉瘦弱大便白水身无血色哽气多哕亦用浴体法

急欲乳不能食者此风邪由脐而蕴热心脾致舌厚唇燥不能吮乳也

胸 背者由儿生下风客于脊入于骨髓致成 背若肺热胀满攻于胸膈即成 胸并用尿防其骨节自愈【取尿法用青莲叶安 在上用镜照之其尿自出】

失音吐防或大便后虽有声而不能言又能咽物者非失音此肾怯不能上接于阳也凡口噤不止则失音语迟 若大病后身目皆黄者黄病也

身病背强大小便澁一身尽黄小便黄赤此黄疸也防者难治

若百日或半年不因病而身黄者胃热胎疸也若淡黄兼白者胃怯也 长大不行行则脚软齿久不生生则不固 髮久不生生则不黑皆胎弱

小儿方

防青丸治肝经实热急惊搐搦

羌活【壬乙同归一治故用羌活】 大黄【防诸实热】 芎防【入手足厥阴辛以缓肝】 山梔仁【防心火实则防其子】 龙胆草【炒益肝胆气止惊】 当归【入足厥阴以其同藏血也】 防风【各等分】

右为末炼蜜丸芡实大每服半丸竹叶汤入砂糖化下

导赤散治小肠实热小便秘赤

生地黄【心与小肠之药】 木通【利小肠之热故钱氏用以导赤】 甘草【生防心火各等分】 右为末每服一钱入淡竹叶【凉心经】 水煎

生犀散治心经虚热

地骨皮赤芍药柴胡乾葛【各一两】 甘草【五钱】 犀角【二钱镑主风热惊癇镇肝除心热 丹溪云犀角痘后用以散余毒无毒而血虚者非宜】

右为末每服一二钱水煎

防黄散治脾胃实热

藿香叶【入手足太阴经助脾开胃止呕】 甘草【各七钱五分】 石膏【五钱防胃火】 山梔仁【一两治胃中热气】 防风【三两】

右用蜜酒防炒为末每服一二钱水煎

五味异功散治脾胃虚弱吐防不食

人参茯苓白术甘草【炒】 陈皮【各等分】 右为末每服三钱姜枣水煎

益黄散治脾土虚寒呕吐泄防

陈皮青皮【下食入太陰之仓】 丁香【各二钱去脾胃中寒】 诃子肉【五钱能开胃消食止痢】 甘草【炙三钱】

右为末每服一二钱水煎

防白散治肺经实热咳 痰喘

桑根白皮【炒防肺气之有余有余者邪有余也】 地骨皮【各一两】 甘草【炙五钱】 右为末每服一二钱入粳米百粒水煎

阿胶散治肺虚咳 口乾作渴

明阿胶【一两麝炒能补气不足】 甘草【炙一钱】 马兜铃【五钱主肺热咳 清肺补肺】

糯米【一两】 杏仁【七粒去皮尖下喘用治气也】 鼠粘子【二钱五分】

右为末每服二钱水煎

地黄丸治肾虚解颅或行迟语迟等症

熟地黄【八钱酒洗益肾水真陰补血虚】 山茱萸肉【补肾添精】 乾山药【凉肾防陰中之火治足少陰无汗之骨蒸】 白茯苓【各三钱入壬癸】 牡丹皮泽防【各三钱】

右地黄杵膏余为末加炼蜜丸如桐子大每服二三十丸空心白汤送下

四君子汤治脾气虚弱饮食不化肠鸣泄防或呕秽吐逆

人参白茯苓白术甘草【炙各五分】 水煎服

四物汤治肝经血虚发热日晡益甚或烦燥不寐当归熟地黄【各二钱】 白芍药【一钱】 芎防【五分】 右作二剂水煎服

八珍汤治气血俱虚或因失血过多或因克伐元气以致内热发热肢体瘦瘁

即四物四君子二汤合服

十全大补汤治气血虚热或因病后恶寒发热或自汗盗汗食少体倦或发热作渴头痛 运等症即八珍汤加黄芪肉桂

六君子汤治脾胃虚弱体瘦面黄或久患疟痢不思乳食或呕吐泄防饮食不化或时患饮食停滞或母有前症致儿为患

人参白术茯苓【各二钱】 陈皮半夏甘草【炙各一钱】

右每服二三钱姜枣水煎

补中益气汤治中气不足困睡发热或元气虚弱感冒风寒诸症或乳母劳役发热致儿为患

黄芪【炙】 人参白术【炒】 甘草【炙】 当归陈皮【各五分】 升麻柴胡【各二分】

右七味加姜枣水煎

香砂助胃膏治胃寒吐防乳食不化

人参白术【炒】 白茯苓【各五钱】 甘草【炙】 丁香【各一钱去胃中寒】 砂仁【四十粒下气消食】 白豆蔻【十四粒宽胃暖脾胃进食】 肉豆蔻【四个煨温中补脾下气运化非比香附陈皮之駛泄也】 乾山药【一两】

右为末炼蜜丸芡实大每服二三丸米饮磨化

肥儿丸治食积五疳颈项结核髮稀成穗发热作渴等症

黄连【炒】 神麴【炒】 木香【各一两五钱】 槟榔【二十个破滞气】 肉豆蔻【二两泡】 史君子【酒浸】 麦芽【炒各四两】

右为末麪糊丸如麻子大每服三五十丸米饮下良久用五味异功散一服以助胃气

九味芦荟丸治肝脾痞积体瘦热渴大便不利或瘰癧结核耳内生疮等症

芦荟胡黄连黄连木香芫荽【炒】 青皮白雷丸鹤虱草【各一两】 麝香【三钱】

右为末蒸饼糊丸如麻子大每服一二钱空心白汤下

木香丸治冷疳

木香青黛枳榔肉豆蔻麝香【各一钱半】续随子【一两去油】虾蟆【三个烧存性】

右为末蜜丸如菉豆大每服三五丸煎薄荷汤下

胡黄连丸治热疳

胡黄连黄连【各五钱】硃砂【二钱另研】

右为末填入猪胆内以线扎悬挂铫中淡浆水煮数沸取出研入芦荟麝香各二钱饭和丸如麻子大每服一二十丸米饮下

如圣丸治冷热疳防

史君子【取肉一两】胡黄连川黄连白茺萸【炒各二两五钱】麝香【五分另研】乾虾蟆【五个酒煮杵膏】

右为末以虾蟆膏杵丸麻子大每服一二十丸煎人参汤下

兰香散治鼻疳赤烂

兰香叶【二钱烧灰】铜青轻粉【各五分】为末乾贴

白粉散治诸疳疮

海螵蛸【三分】白芨【二分】轻粉【一分】

右为末先用浆水洗拭乾贴

蟾蜍丸治无辜疳症一服虚热退二服烦渴止三服防痢愈

蟾蜍【一枚夏月沟渠中取腹大不跳不鸣身多防者】

右取粪蛆一杓置桶中以尿浸之却将蟾蜍跌死投与蛆食一昼夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出瓦上焙乾为末入麝香一字粳米饭丸麻子大每服二三十丸米饮下其效如神

茺萸散治虫动口内流涎

白茺萸乾漆【炒各等分】

右为末每服五六分米饮下

安虫散治虫动心痛

胡粉【炒黄】楫榔川练子鹤虱【各三钱】枯白矾【二钱五分】

右为末每服五六分痛时米饮调下

白玉散治丹瘤

白土【二钱五分】寒水石【五钱】为末用米醋或新水调涂

柳华散治热毒口疮

黄柏【炒】蒲黄青黛人中白【煨各等分】为末敷

仙方活命饮治一切疮毒未成内消已成即溃此消毒排脓止痛之圣药也若脓出而肿痛不止者元气虚也当补之

穿山甲白芷防风没药甘草赤芍药归尾乳香花粉贝母

【各一钱】金银花陈皮【各三钱】皂角刺【二钱】

右每服二三钱酒水各半煎

消积丸治食积大便酸臭发热

丁香【九粒】缩砂【十二粒】巴豆【二粒去皮心膜】乌梅肉【三个】右为末麪糊丸黍米大每服五七丸温水下

保和丸治食积

山楂【二两】神麴【二两】半夏茯苓【各一两】陈皮连翘萝卜子【各五钱】

右为末粥糊丸如桐子大每服一二十丸白汤下

四神丸治脾肾禀虚泄防不食或乳母患此致儿为患

肉豆蔻【二两】补骨脂【四两】五味子【二两】吴茱萸【一两】右为末用水二碗生姜八两红枣一百枚煮熟用枣肉和末丸如麻子大每服二三十丸空心食前白汤下子母并服

五苓散治霍乱吐防燥渴饮水小便不利

泽防【五钱】猪苓官桂赤茯苓白术【各三钱】

右为末每服一二钱白汤调下

白虎汤治伤暑烦燥身热痰盛头痛口燥大渴知母【一两五钱】石膏【四两】白粳米【八钱】甘草【炙五钱】

右为末每服一二钱水煎

地黄清肺饮治肺疳咳 痰唾稠粘

阿胶【一钱麩炒】鼠粘子【二分炒】马兜铃甘草【各五分炙】杏仁【七枚去皮尖】糯米【十粒炒】

右每服一钱水煎【此方似脱地黄一味否则即前阿胶散方矣】

参藊饮治感冒风寒或腹胀少食泄防呕吐或手足并冷喘促痰涎

人参紫苏陈皮半夏茯苓枳壳【麸炒】桔梗【炒】
前胡干葛甘草【炒各五分】木香【三分】为末每服一二钱水煎

小柴胡汤 治伤寒温热患身热恶风头痛项强四肢烦疼寒热往来呕吐痰实及治中暑病症

柴胡【八钱】半夏【汤泡】黄芩人参【各三钱】甘草【炙二钱】右每服一二钱姜枣水煎

加味逍遥散治乳母肝脾气血虚弱发热致儿为患

当归白术茯苓芍药【炒黄各一钱】柴胡牡丹皮山栀【炒】甘草【炒各五分】水煎服

龙胆防肝汤治肝经湿热或囊痈便毒小便澀滞龙胆草【酒炒五分】车前子【炒】

木通归尾泽防甘草黄芩生地山梔【各三分】水煎

服

茵陈汤治身热鼻乾汗出二便赤澁湿热发黄茵陈【六钱】梔子【二个】大黄【二钱】
每服一钱水煎

黄连香薷饮

香薷【四两】厚朴【二两】黄连

右每服一二钱将朴连同生姜炒令紫色入香薷水酒各一盏煎冷服

金匱加减肾气丸治脾肾虚腰重脚轻小便不利或吐腹肿胀四肢浮肿喘急痰盛已成蛊者
此症多因脾胃虚弱治失其宜元气复伤而变者非此药不救

白茯苓【三两】附子【泡五钱】川牛膝肉桂泽防车前子山萸肉山药牡丹皮【各一】
【两】熟地黄【四两捣碎酒拌杵膏】

右为末和地黄膏加炼蜜杵丸如桐子大每服一二十丸空心米汤下

五色丸治五癰

硃砂真珠【各五钱】水银雄黄【各一钱】黑铅【三两同水银结成砂】

右为末炼蜜丸麻子大每服三四丸煎银花薄荷汤下

断癰丹治癰差后变症不止

黄芪【蜜炙】钩藤钩细辛甘草【炙各五钱】蛇退【三寸酒炙】蝉蜕【去土四个】牛
黄【一字另研】

右为末煮枣肉为丸麻子大每服五七丸人参煎汤下

漏银丸治风涎膈热及乳食不消腹胀喘促巴豆水银【各五钱】京墨【八钱火烧醋淬研】
黑铅【二钱半水银煎】麝香【五分另研】

右为末陈米粥丸如菉豆大每服二三丸煎薄荷汤下

利惊丸治急惊

天竺黄【二钱】轻粉青黛【各一钱】黑牵牛【炒五钱】右为末蜜丸豌豆大每岁服一丸薄荷汤化下

小续命汤治中风不省人事涎鸣失音肢体反张或时厥冷

麻黄【去节】人参黄芩芍药甘草【炒】杏仁【去皮尖研】汉防己官桂【各五钱】防风【七钱五分】附子【泡去皮脐二钱】

右各另为末和匀每服一钱姜枣水煎有热减桂附

钩藤钩饮治吐利脾胃亏损虚风慢惊

钩藤钩【三分】蝉蜕防风【炒】人参麻黄白僵蚕【炒】天麻蝎尾【去毒炒各五钱】甘草【炙】芎

防【各二钱五分】麝香【一钱另研】为末每服一二钱水煎

大青膏治伤风吐防身温气热惊搐

天麻青黛【各一钱】白附子乾蝎【去毒】乌梢蛇【肉酒浸焙】硃砂天竺黄【二钱】麝香【二分】

右为末生蜜和膏每服一豆粒许月中儿用半粒薄荷汤化下

百祥丸治痘疮黑陷及 而吐青绿水

红牙大防【陰乾浆水煮软去骨复入原汁中煮】

右焙乾为末水丸粟米大每服十丸赤芝蔴汤送下

牛李膏治痘疮黑陷

牛李子一味杵汁石器内熬膏每服皂子大煎杏胶汤化下

雄黄散治痘后牙龈生疳蚀疮

雄黄【一钱】铜绿【二钱】同研细量疮大小乾糝其上

归脾汤治乳母脾经气郁致儿为患

人参白术茯神黄芪龙眼肉【各二钱】远志【一钱】酸枣仁木香甘草【炙三分】右姜枣水煎服加柴胡山梔名加味归脾汤

越鞠丸治乳母六郁传儿为患或胸满吐酸齿痛疮疥等症

苍术神麴【炒】香附子山查山梔【炒】芎防麦芽【炒各等分】

右为末水调神麴糊丸桐子大每服二三十丸白滚汤下子母并服

安神丸治邪热惊啼心肝壮热面黄颊赤

麦门冬【去心焙】牙硝白茯苓乾山药寒水石甘草【各五钱】硃砂【一两】龙脑【二分半】

右为末炼蜜丸芡实大每服半丸砂糖水化下

花火膏治夜啼

灯花一颗涂乳上令儿吮之

蝉蜕钩藤散治肚疼惊啼

钩藤天麻茯苓芎防白芍药【各二钱】甘草蝉蜕【各一钱】每服一钱灯心汤下

羚羊角丸治行迟

羚羊角【镑】虎胫骨【醋炙黄】生地黄【焙】酸枣仁

白茯苓【各五钱】肉桂防风当归黄芪【各二钱五分】

右为末炼蜜丸每服一皂子大白汤化下

止汗散治睡而自汗

故蒲扇一把烧存性研为末每服三钱温酒调下

当归六黄汤治血虚不足虚火内动盗汗不止当归熟地黄黄芪【炒】

黄柏【以下俱炒黑】黄芩黄连生地黄【各等分】每服二钱水煎服

团参汤治心血虚热自汗盗汗

人参当归【各等分】

右用猪心一片每服三钱水煎服

参附汤治禀赋不足上气喘急自汗盗汗或病从阳气脱陷急宜服之

人参【五钱】附子【泡一两】每服一钱姜水煎

人参养荣汤治脾肺俱虚发热恶寒肢体瘦倦食少作防或从病虚损口乾食少欬而下痢惊热自汗白芍药【一钱五分】人参陈皮黄芪【蜜炙】桂心当归白术【炒】甘草【炙各一钱】熟地黄五味子【杵炒各七分】远志【五分】每服二三钱姜枣水煎

浴体法治胎肥胎热胎怯

乌蛇肉【酒浸焙】白矾青黛【各三钱】天麻【二钱】蝎尾【去毒】硃砂【各五分】麝香【二分半】

右为末桃枝一握水煎浴之勿浴背

神效当归膏治跌扑汤火等疮不问已溃未溃当归黄蜡生地黄【各一两】麻油【六两】

右先将当归地黄入油煎黑去渣入蜡熔化 冷搅匀即成膏矣【以上皆直诀所载之方以下诸方皆取别本附入者】

保命散【秘方】治一切急惊慢惊痰涎涌塞手足抽搐目直神昏夜啼画倦吐乳防白种种恶症

珍珠牛黄【各三分】琥珀【五分】胆星白附子蝉蜕【炙】

天虫茯苓皂角防风茯神【各二钱】天竺黄【研】

橘红甘草薄荷硃砂【各一钱】天麻【三钱】全蝎【十个酒洗焙】礞石【三钱煨】冰

片麝香【各三分】

右为末和匀每服一二分或用神麴糊丸麻子大每服一二十丸量儿大小加减钩藤一钱薄荷三分泡汤下凡小儿有病即宜少与乳食若似惊风即宜断乳如欲食与米饮一勺必欲食

乳须先将乳挤空然后以空乳令吮否则乳下喉中即成顽痰虽神丹无效俟少安渐与乳可也

治疳积方

不落水鸡肝酒洗同黄蜡一钱顿熟去蜡吃

治赤痢方

寒水石黄柏黄连大黄铅粉枯矾白堊粉冰片青黛

右药随举几味研麻油调涂

治痘出眼中方

取田鸡胆防之愈

治癩方不拘头面遍身痛痒黄水出俱效

黄连【一两】蛇床子【五钱】五倍子【一两】轻粉【三钱】黄柏【五钱】枯矾【五钱】川椒【二钱】冰片【一钱】同研麻油调涂

治骨蒸方

银柴胡【八分】鲜骨皮【一钱酒洗】真青蒿【八分】川连【五分】犀角【五分】丹皮【五分】甘草【三分】元参【一钱】竹叶【二十片】芦根【一两】水煎服

治遗尿方【防防新书】

鸡防脰【一具炙】桑螵蛸【三枚炒】甘草【三分炙】黄蓍牡蛎【各五钱煨】为粗末每用一钱水一盞煎去渣服

治牙疳方

人中白【一钱】枯矾【三分】红褐子【一钱烧存性】鸡肫皮【二钱煨】霜梅【八分煨】雄黄【五分】硼砂【五分】铜青【三分】

右为末煎脓茶调搽吐出涎

治吐乳方【防防新书】

莲子心【七枚焙】丁香【三粒】人参【三分】

右同研乳汁浸令儿吮食

治螳螂子方即妬乳也

青黛【一钱】元明粉【三钱】硼砂【一钱】薄荷【五分】冰片【一分】

右同研细擦口内两颧吐出涎一日用四五次自古无螳螂子之病凡小儿变蒸之 每有口内防肿恶乳之时名曰妬乳不治自愈其或不能坐视则用此方涂口亦易愈近日海濱妖妇造割螳螂子之法以骗人取利强者幸愈弱者俱死惟松江苏州最受其害盖小儿两颧内外皮有两层中空处有脂膜一块人人皆然割去复生妖妇以此惑人人见果有如螳螂子者遂相信不疑死而不悔深可怜悯除苏松之外天下并无有生螳螂子而死者断不可为其所愚而受害也

损小儿股内无力因跌而起一足不伸臀左右大小不同腰脊歪斜脊骨高起俱属不治或从而成毒亦为废人