

绩效产宝

咎殷

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
卷上	5
卷中	12
卷下	19

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

卷上

妊娠安胎方论第一〔凡十一道〕

疗妊娠三四个月，腹痛，时时下血。续断〔八分〕、艾叶〔六分炒〕、当归〔六分〕、竹茹〔四分〕、干地黄〔六分〕、阿胶〔四分炙〕、鸡苏〔四分〕，右以水一升，煎取六合，去滓，空心再服，隔日更服。治妊娠六七个月，忽胎动下血，肠痛不可忍。芎藭〔八分〕、桑寄生〔四分〕、当归〔十二分〕，右以水一升，煎取八合，下清酒半升，同煎取九合，分作三服，如人行五六里，再温服。治妊娠下血，时时漏血，血尽子死。生地黄汁〔三合〕、清酒〔三合〕，右相和，煎三四沸，空腹分温，温服。治妊娠心头烦懣，两胁胀，不下食。槟榔〔三个〕、人参〔四分〕、柴胡〔五分〕、枳壳〔四分炙〕、肉豆蔻〔二分〕、生姜〔二分〕、桑寄生〔四分〕，右以水二升，煎取六合，分温三服。治妊娠身伤寒，头痛壮热，肢节烦痛。前胡〔六分〕、石膏〔十二分〕、大青〔四分〕、子苓〔五分〕、知母〔四分〕、山梔〔四分〕、葱白〔七茎〕、甜竹茹〔三分〕，右以水二升，煎取八合，食后分温三服。治妊娠胎动腰痛，及下血，安胎。当归〔四分〕、芎藭〔四分〕、葱白〔二七茎〕、艾叶〔二分〕、茅根〔六分〕、鹿角胶〔六分炙为末〕，右以水二升，煎取八合，空心热吃三服。治妊娠损动，安胎。鲤鱼〔一斤〕、粳米〔一升〕，右作羹食之佳。治妊娠呕吐不食，兼吐痰水。生芦根〔十分〕、橘皮〔四分〕、生姜〔六分〕、槟榔〔二分〕，右以水二升，煎取七合，空腹热服。治妊娠胁满腹胀，心胸烦，见即吐，渐加羸瘦。赤茯苓〔四分〕、前胡〔四分〕、小半夏〔四分汤洗〕、生姜〔三分〕、白朮〔一分〕、大腹子〔五个〕、麦门冬〔六分去心〕、槟榔〔五枚〕、紫苏〔四分〕，右水二升，煎取八合，空心分温三服。治妊娠常苦烦闷，此是子烦，宜服此方。茯苓〔八分〕、防风〔六分〕、知母〔六分〕、竹沥〔三合温用〕、生门冬〔十二分〕，右水二升，煎取七合，下竹沥后作两服。治妊娠胎动不安，烦闷。当归〔四分〕、芎藭〔三分〕、阿胶〔二分炙临时入〕、葱白〔十四茎〕、豉〔八合〕、桑寄生〔四分〕，右水二升，煎取八合，下阿胶，空腹分两服。

妊娠食诸物忌方论第二〔凡五道〕

食鸡肉与糯米共食，令子生白虫。食鲤鱼柔鸡子，令子多疳。食羊肝，令子多厄。食鸭子，令子倒生。食兔肉犬肉，令子缺唇无音声。

益气滑胎令易产方论第三〔凡一道〕

润胎益气，令子易生，诃子丸。槟榔〔八分〕、芎藭〔二分〕、吴茱萸〔三分〕、诃子皮〔三分蒸〕，右为细末，炼蜜为丸，如绿豆大，空心酒下十九丸，自七八个月，服至分解。

妊娠恶阻吐不食方论第四〔凡四道〕

论曰：夫阻病之候，心中溃溃，头旋眼眩，四肢沉重懈怠，恶闻食气，好吃酸咸果实。多卧少起，三月四月多呕逆，肢节不得自举者，以此治之。人参〔八分〕、厚朴〔六分炙〕、茯苓〔十三分〕、葛根〔八分〕、白朮〔十二分〕、橘皮〔六分〕、生姜〔十一分切〕，右水七升，煮二合，分温三服，忌桃李醋等物。治妊娠三四月，呕吐恶闻食气。橘皮、青竹茹、生姜、茯苓、白朮〔各二两〕，右水六升，煎二升，分温三服，忌同前。治妊娠薤病，心中溃闷，见食呕吐，憎闻食气，肢节烦疼，身体沉重，多卧嗜睡黄瘦方。人参〔八分〕、橘皮〔八分〕、茯苓〔十二分〕、生姜〔十二分〕、甘草〔十二分〕、大枣〔十二枚〕、生麦门冬子〔十二分去心〕，右水五升，煎取二升，分温三服，忌菰菜醋等。凡妊娠恶食者，以所思食，任意食之，必愈。

胎动不安方论第五〔凡十八道〕

论曰：安胎有二法，因母病以动胎，但疗母疾，其胎自安，又缘胎有不坚，故致动以病母，但疗胎则母瘥，其理甚效，不可违也，胎不动，不知子死生者，但看母唇口青者，儿死母活，口中青沫出者，子母俱死，口舌赤青沫者，母死子活也。疗胎数落而不结实，或冷或热。甘草〔三两〕、黄耆、人参、白朮、芎藭、干地黄、吴茱萸〔各二两〕，右为末，空腹酒调二钱，忌菰菜醋等物。治胎动不安。好银〔煮取水〕。右着葱白，作羹食之佳。治胎动下血，心腹绞痛，儿在腹死活未分，服此药死即下，活即安，极妙。当归〔三两〕、芎藭〔六两〕，右水四升，酒三升，煮取三升，为三服。治妊娠三二月，及七八月，胎动不安，或腰肚痛，有血下。芎藭、当归各四两、艾叶〔二两〕、甘草〔一两〕、阿胶〔二两炙〕，右水五升，煮取二升，分温三服〔古方无艾叶〕。治妊娠抢心，下血不止，腰腹痛不可忍。上银〔一斤水一斗煎取七升〕、芎藭〔四两〕、当归〔四两〕、阿胶〔三两〕、生地黄〔五两〕，右以前银水煮取二升，分三服。治妊娠无故胎动不安，腹内绞痛。葱白〔切一升〕、阿胶〔三两炙〕、当归〔四两〕、川芎〔四两〕、桑寄生，右取银水七升，煮药取二升半，分三服。治妊娠五六月，胎犹不安，不常处。白朮〔三两〕、厚朴〔二两〕、旋覆花〔一两〕、黄芩〔二两〕、茯苓〔三两〕、生姜〔二两〕、枳壳〔二两〕、芍药〔二两炙令黄色〕，右以水七升，煮取二升半，食后分温五服。治胎动不安。熟艾〔二两〕、葱白〔切一升〕、阿胶〔二两炙〕，右以水四升，煮取一升半，分温两服。又方芎藭〔二两〕、葱白〔切一升〕，右水七升，煮取二升半，分温三服。治妊娠冷热，腹内不调，致胎不安。当归〔三两〕、干姜〔三两〕、芎藭〔四两〕、艾叶〔二两〕，右水四升，煎取二升，分为四服。治妊娠经八九个月，或胎动不安，因用力劳乏，心腹痛，面目青，冷汗出，气息欲绝，由劳动惊胎之所致。钓藤〔二两〕、伏神〔二两〕、人参〔二两〕、当归〔二两〕、桔梗〔三两〕、寄生〔一两〕，右水五升，煎取二升，分为三服，忌猪肉菰菜，若烦热加石膏五两，临月加桂心二两。治妊娠因夫所动困绝。右取竹沥，饮一升，立愈。

疗妊娠被惊恼，胎向下不安，小腹痛连腰，下血。当归、芎藭各八分、阿胶〔六分炙〕、人参〔六分〕、艾叶〔四分〕、大枣〔十二枚〕、茯苓〔十分〕，右水四升，煮取二升，分为三服。治堕胎忽倒地，举动擎促损腹中不安，及子死腹中不出。芎藭〔一两〕右为末，服寸匕，须臾三服，立出。治胎动冲心，烦闷欲死，安胎止痛。甘草〔炙〕、当归、芎藭、人参、阿胶〔各二两〕、葱白〔切一升〕，右以水七升，煎取二升，分为三服。疗妊娠忽黄汁下如胶，或如小豆汁。粳米〔五升〕、黄耆〔五两〕，右以水七升，煎取二升，分为四服。治妊娠胎动欲落，肚痛不可忍。上银〔一斤〕、茅根〔去黑皮切二升〕，右以水九升，煮银取二升，入清酒一升，同煎茅根取一二升，分为三服，立安。疗妊娠腹内冷痛，忽胎动。薤白〔切一升〕、当归〔四两〕，右以水五升，煎取二升，作三服。

妊娠漏胞下血方论第六〔凡五道〕

疗漏胎下血不止，胞干即死，宜急治之。生干地黄〔为细末〕，右酒服方寸匕，日三服，夜一服，即愈。治妊娠下血不止，及腹内冷者。生地黄、干姜，右两味等分，同煎服。治妊娠无故，卒下血不绝。阿胶〔三两炙〕，右清酒一升半，煎取一升，顿服。又方生地黄〔八两〕，右捣碎，以酒浸，绞去滓，分两服，以止为度。疗妊娠下血如月信来，若胞干则损子伤母。干地黄〔五两〕、干姜〔五两〕，右以水六升，煎取二升，下蜜少许，更煎两沸，分二服。

妊娠心腹腰痛方论第七〔凡十一道〕

治妊娠二三月，腹痛腰痛。当归〔三两〕、阿胶〔炙〕、甘草〔各二两〕、葱白〔切一升〕，右水七升，煮取二升，分三服，忌猪肉菰菜醋等物。治妊娠三五月已来，忽心腹绞痛。大枣〔十四枚烧令焦〕，右取小便调服之。治妊娠心腹痛不可忍。盐〔一斤烧令赤〕，右以两指取一撮，酒调服之。治妊娠遍身痛，或冲心欲死，不能饮食。白朮〔五两〕、黄芩〔二两〕、芍药〔四两炙令黄〕，右以水六升，煮取二升半，为三服，缘胎有水致痛，兼易产。治妊娠卒心痛，气欲绝。芎藭、当归、茯苓各三两、厚朴〔三两炙〕，右水六升，煎取二升，分为两服，忌食如前。治妊娠腰背痛，反复不得。鹿角〔一枚长五六寸烧令赤酒中淬之冷又烧之更淬以角碎为度〕，右取酒饮之，作散服，鹿角亦得。疗妊娠先患冷气，忽冲心腹，痛如刀刺。芎藭、人参、茯苓、吴茱萸、桔梗、当归各三两、厚朴〔炙〕、芍药〔炙〕各二两，右水九升，煎取三升，分三服，气下即瘥。治妊娠患腹痛，并胎动不安。葱白〔切一升〕、人参、厚朴〔炙〕、阿胶〔炙〕、芎藭各二两、当归〔三两〕，右水七升，煎取三升，分作三服。治妊娠疼痛不可忍，或连胯痛。先服此散。杜仲〔四两〕、五加皮、阿胶〔炙〕、狗脊、防风、川芎、细辛、芍药各三两、萆薢〔三两〕、杏仁〔八十枚去尖〕，右水九升，煮取二升，去滓，下胶，作三服。治妊娠三两月，腰痛不可忍者。先服前散后服此丸续断、杜仲各十分、芎藭〔三两〕、独活〔三两〕、狗脊、五加皮、萆薢、芍药、薯药、诃子已上各八两，右为末，蜜和为丸

，梧桐大，空心，酒下四十九丸，日再服。治触动胎，以致腰痛背痛。杜仲、五加皮、当归、芍药〔炙〕、芎藭、人参、萆薢各三两，右以水七升，煎取二升半，分温三服。

妊娠伤寒热病防损胎方论第八〔凡五道〕

论曰：非即之气，伤折产妇，热毒之气，侵损胞胎，遂有堕胎漏血，俱害子母之命。治妊娠伤寒，骨节疼痛，壮热，不急治，则胎落。葱白〔切一升〕、前胡、葛根、石膏各十分、青黛六分、升麻〔八分〕、梔子仁〔十二分〕，右以水七升，煮取二升半，分三服。治妊娠头痛壮热，呕吐不下食，心烦热。青竹茹、葛根、知母各三两、芦根〔一升〕、生麦门冬〔四两去心〕，右水七升，煎取三升，分三服。治妊娠时气头痛，腰背强，壮热。升麻、黛青、前胡、黄芩、山梔各二两、葛根〔三两〕、石膏〔八分〕，右水五升，煎取三升半，分为三服。治妊娠六七月，伤寒热入腹，大小便秘结不通，蒸热。前胡〔十分〕、大黄、石膏各二十分、梔子仁〔十枚〕、知母、黄芩、茯苓、生姜〔各八分〕，右水八升，煎取二升半，后下大黄，更煎三五沸，分作三服。治妊娠伤寒，苦热不止，身上斑出，忽赤忽黑，小便如赤血，气欲绝，胎欲落。梔子仁、升麻〔各四两〕、黛青〔二两〕、石膏〔八两碎〕、葱白〔切一升〕、生地黄〔二十分〕、黄芩〔三两〕，右水九升，煎取三升，作三服，忌热物。

妊娠患淋小便不利方论第九〔凡二道〕

治妊娠患淋，小便涩不利，小腹水道热痛。冬葵子〔一升〕、芍药〔二两炙〕、黄芩、茯苓、车钱子〔各三两〕，右以水七升，煎取二升，分温三服。

妊娠下痢黄水赤白方论第十〔凡七道〕

论曰：妊娠下痢，皆因误食生冷肥腻，冷即色白，热即黄赤，气不和，赤白相兼，搅刺疼痛，脾胃不调之所致也。治妊娠患痢脓血，状如鱼髓，小腹绞痛难忍。薤白〔切一升〕、地榆、醋榴皮、黄连各三两、阿胶〔二两炙〕，右水七升，煎取二升半，分三服，忌生冷肥腻。治妊娠痢白脓，腹内冷。干姜〔四两〕、赤石脂〔六两〕、粳米〔一升炒令黄色〕，右水七升，煎取二升，分三服，忌如前。疗妊娠腹痛，下痢不止。黄连、石榴皮、当归〔各三两〕、阿胶〔二两炙〕、艾〔一两半〕，右水六升，煎至二升，分为三服，忌如前。疗妊娠下痢，腹内痛，脓血不止。黄连〔八分〕、厚朴〔炙〕、阿胶〔炙〕、当归〔各六分〕、艾叶、黄柏〔各四分〕、干姜〔五分〕，右为末，空心，米饮调下一匙，日进三服。疗妊娠膝下刺痛，大便白，昼夜三五十行。根黄〔厚者涂蜜炙令焦〕、大蒜〔炮令烂熟〕，右大蒜去皮，研如膏，和根黄末为丸，如梧桐子大，空心粥饮下三十丸，日进三服妙。疗妊娠痢，黄水不绝。厚朴〔三两炙〕、黄连〔二两〕、豆蔻〔五枚连皮〕，右水二升，煮取

一升，频服，忌如前。治妊娠忽被惊奔走，堕胎，下血不止兼痛。干地黄〔四两〕、当归、艾叶各二两、阿胶〔炙〕、芎藭各三两，右水七升，煮取二升半，分作三服，痛加杜仲、五加皮各三两。

治妊娠水气身肿腹胀方论第十一〔凡四道〕

论曰：脏气本弱，因产重虚，土不克水，血散入四肢，遂致腹胀，手足面目皆浮肿，小便秘涩。治妊娠身肿有水气，心腹胀满，小便少。茯苓〔四两〕、杏仁〔尖去〕、槟榔〔三两〕、旋覆花、郁李仁各一两，右水六升，煮取二升，分温温服，小便通即瘥。治妊娠四肢皮肉拘急及肿。桑白皮〔切二升〕、樟桂根〔一两〕、赤小豆〔二升〕，右水一斗二升，煮二味，取七升，下小豆，煮令熟，先食豆，候渴即饮其汁，小便利即瘥。治妊娠遍身洪肿方。葶苈子〔十分〕、白朮〔二十分〕、茯苓〔二两〕、桑白皮〔二两〕、郁李仁〔八分〕，右水六升，煎取二升，作两服，小便利即瘥。又方泽泻〔三两〕、葶苈子〔三两〕、白朮〔六两〕、枳壳〔炙〕、茯苓〔各六两〕，右制度服，食如前。

妊娠千金易产方论第十二〔凡六道〕

论曰：夫妇人特将产至重者，胞衣也，凡胞衣不出者，世谓之息胞，由产时用力过度，已产而体已疲顿，不能更用气，经停之间，而外冷气乘之，则血涩逆否，故令胞衣不出，则不得断脐沐浴，冷气伤儿则成病也。旧方胞衣不损儿者，依法截脐。而以物系其带一头，所有产时看生人，不用意谨护，而率挽胞系断其胞，上掩心而夭命也，凡欲产时，必先脱常所著衣裳，以笼神验。胞衣不出血灶下土〔一大寸研碎〕，右用好醋调令相和，内于脐中，续取生干草汤三四合服。又方槐子〔十四枚〕、蒲黄〔一合〕，右酒煎温服，须臾未效，更进一服。又方生地黄汁〔五合〕、生姜汁〔半大合〕，右煎三四沸，顿服之。又方槐子〔槐枝切一升最好〕、瞿麦〔八分〕、牛膝〔八分〕、通草〔十二分〕、白榆〔切一大升〕、冬麦仁〔一大升研〕，右水五升，煎二大升，去滓，下麻仁，分三服。小品颜服散，令易产，母疾病，未生一月已前，预服，过三十日，行步不觉儿生。甘草〔八分〕、粳米〔一合〕、大豆黄〔炒〕、黄芩、干姜、桂心、吴茱萸、冬麦仁〔研如泥〕各二分，右为末，空腹暖酒，服方寸匕，忌生冷肥腻。又易产方飞生鸟〔一只烧〕、槐子〔十四枚〕、故箭羽〔十四片烧〕，右为末，蜜为丸，大觉痛，服三十丸，未产须臾再服之。

治产难诸疾方论第十三〔凡十二道〕

易产方榆白皮〔十四分〕、通草〔十二分〕、葵子〔三合〕、滑石、瞿麦〔各八分〕，右水二升，煎取八合，分温三服。又方羚羊角〔一枚烧刮取末〕，右以酒调方寸匕服。又方滑石〔八分〕、葵子〔一合〕、榆皮〔十二分〕、牛膝〔六分〕，右

水一升八合，煎取六合，再服。又方含醋嚔面，闷即嚔之。又方吞槐子七枚，即下。又方吞鸡子白两枚即产。又方两手各把一石燕，立产。又方兔皮和毛〔烧灰研〕，右以酒调两钱匕即产，衣不下，服之即下。又方大麻根三茎，右水一升，煎取半升，顿服立产，衣不下，服之即下。又方弓弩弦烧灰，右为末，酒调方寸匕，服之即下。又方铜弩牙，右烧赤，投于醋三合内，良久顿服，立产。又方麝香〔一钱〕，右研水调服之，立产。

难产死生方论第十四〔凡八道〕

疗胎死腹中不出，母气欲绝。水银〔二两〕，右顿吞之，儿立出。治产横倒不出。右令夫唾口中二七遍，立出。疗产经数日不出，或子死腹。瞿麦〔六两〕、通草〔三两〕、桂心〔三两〕、榆白皮〔切一升〕，右水九升，煎取三升，分三服。又方瞿麦，右水煮取浓汁，服之佳。疗子死腹中不出。伏龙珠〔为末三钱〕，右酒调服之，土当儿顶上戴出妙。又方朱砂〔一两〕，右水煎数沸，然后取酒和服之。又方水银〔二两〕，右水煮二三十沸，服之立产。滑胎易产。白蜜、苦酒、猪脂〔各一升〕，右相和，煎三四沸，临腹痛时，以热酒调下三四钱匕，不过五六服即出。

难产令易产方论第十五〔凡七道〕

论曰：夫难产者，内宜用药，外宜用法，盖多门救疗，以取其安也，疗产难坐草数日，困乏不能生，此为母先有病，经络俱闭所然。赤小豆〔二升〕、胶〔三升〕，右水九升，煎令熟，去豆内胶，烱令清服之，须臾更一服。又方右令夫从外含水，吐着产妇口中，即出。疗难产，疑胎在腹已死。当归〔四分〕、芎藭〔六分〕，右水六升，煎取二升，分作两服，便安胎，死即出，酒煎亦得，神验。治难产困乏腹痛，有所见，儿及衣不出。蒺藜子〔四两〕、贝母〔四两〕，右为末，每服一匙，酒调服之，时再服，以出为度，熟水调下，亦得。治难产箭〔一只烧为末〕，右以水调服之。又方鳖甲〔烧为末〕，右服方寸匕立出，未生更服。治疗落胎腹痛。芍药、当归、牛膝、瞿麦〔各五分〕、桂心、芎藭〔各四分〕，右以水一升七合，煎取八合，空心温服。

胎死胞衣不出方论第十六〔凡十八道〕

疗妊娠经五六月，胎死腹中，或胞衣不出。生地黄〔五两〕、牛膝、朴硝〔各八分〕、桂心、芎藭、大黄各〔六分〕、蒲黄〔五分〕，右水二升，煎取八合，入蒲黄，空心作二服。疗子死腹中不出。雄鸡粪〔二十一枚〕，右水二升，煎取五合，以米作粥食，胎即出。治妊娠经六七月，子死腹中不出。黑豆三合，右醋一升，煎取八合，空心，分温三服。治子死腹中，母闷绝。水银〔十二分〕，右取井底土，如鸡子黄，水研服之。又方赤小豆，右生吞七枚出，若是女，即二七枚出。经效理胎衣不出令烂。牛膝、瞿麦〔各四两〕、滑石〔研八分〕、当归〔二两〕、通草〔六

两〕、葵子〔一升〕，右方五升，煎取二升，分三服，温服。又方灶突土三撮，右和暖水服之。崔氏治胎胞不出。大豆〔一升〕，右苦酒五升，煮取三升，分为三服。又方右吞鸡子两三只，解发刺喉中令呕，若因热，以水煮蝼蛄一枚，三四沸，泻口中汁下，即出。又方大麦、小麦、小豆，右等分相和，煮取浓汁，饮之出。又方赤朱〔一两〕，右研为粉，以苦酒和服之，即出。又方皂荚，右为末，着鼻中两度，自出。疗胞衣久不出，腹满即杀人，服此方即烂。桂心、牛膝、通草各三两、滑石〔二两〕、葵子〔一升〕、瞿麦〔四两〕，右水九升，煎取三升，分三服，甚效。又方瞿麦〔四两〕、桂心〔三两〕、通草〔三两〕、牛膝〔五两〕、葵子〔一升〕，右水三升，煎取一升半，分为三服。又方真珠〔一两〕，右研细，苦酒调服之。又方洗儿水，右取半碗，服之即出。治胞衣不出。牛膝〔八两〕、葵子〔二升〕，右水七升，煮取三升，分三服。胞衣半出半不出，或子死腹中，着脊不下，数日不产，血气上冲。牛膝〔六两〕、葵子〔一升〕、榆白皮〔四两〕、地黄汁〔八合〕，右水九升，煎取三升，分三服即出。

卷中

产后心惊中风方论第十七〔凡七道〕

论曰：产后心闷气绝，眼张口噤，通身强直，腰背反偃，状如痼疾，心忪惊悸，言语错乱，皆是宿有风毒，因产心气虚弱，风因产发成风症。防风、当归、茯苓、汉防己、麻黄〔去节各八分〕、秦艽、人参、芎藭、独活、白鲜皮、甘草〔炙〕、白微各六分、石膏〔十二分〕、竹沥〔二升〕，右水七升，先煮麻黄掠去沫下诸药，入竹沥，煎取二升半，去滓，三服，忌菰菜猪肉生冷。疗产后狂语，志意不定，精神昏乱，心气虚，风邪所致。茯苓、干地黄〔各十二分〕、远志〔十分〕、白微、龙齿〔各十分〕、甘草〔炙〕、人参、防风、独活〔各八分〕，右以银一大斤，水一斗五升，煎取七升，下诸药，煎取三升，分温三服，忌如前。疗产后心虚，忪悸不定，乱语谬说，精神恍惚不定，当由心虚所致。人参、甘草〔炙〕、芍药、当归、生姜〔各八分〕、远志、茯苓〔各十分〕、桂心〔六分〕、门冬〔去心〕、大枣〔各十二分〕，右水八升，煎取三升，去滓，分温三服。疗产后心气虚损，卒惊强语，或歌哭嗔笑，性气不定。上银〔一斤〕、桂心、甘草〔各六分〕、细辛〔四分〕、人参、生姜、远志、茯神〔各八分〕、生地黄〔二十分〕、龙骨〔一分〕、大枣〔一枚〕，右水八升，煮银取一升半，入诸药煎，分三服，温温进。疗产后多虚弱羸瘦，苦大汗痢，皆至于死，此重虚故，故患中风谬语，昏闷不知人者。人参、茯苓、羌活、桂心、大枣、远志〔各十分〕、竹沥〔一升半〕，右水六升，煮取三升，下竹沥，更煎取二升，分为三服。疗产后身忽痉，口噤面青，手脚强急。右竹沥二升，饮之最佳。产后恶寒壮热，一夜三五度发恶语，口中疮生，时时干呕，困乏欲绝。人参、独活、白鲜皮、葛根、防风、青竹茹、远志各六分、茯神〔八分〕、白敛〔十分〕、玄参〔十二分〕、竹沥〔二升半〕，右银一斤水，一斗五升，煎取七升，下诸药，重煎取三升，分温三服，忌鱼酒面等物。

产后余血奔心烦闷方论第十八〔凡十五道〕

论曰：余血奔心，盖是分娩不了解，便与童子小便并扞心下，及卧太早，兼食不相宜之物所致，但能依方疗之，无不瘥可。疗产后心中虚热烦闷，气欲绝。大枣〔十二分〕、茯苓〔十二分〕、生姜〔八分〕、甘草〔五分〕、竹沥〔一升〕、人参〔六分发热方用〕、粳米〔若食小加三合〕、生麦门冬〔二十分〕，右水六升，煎取三升，方下竹沥，更煎取二分，分温三服。余产后余血不尽奔冲，心烦闷腹痛。生地黄、芎藭〔各三两〕、枳壳〔炒〕、芍药〔各三两〕，右捣筛为末，酒服方寸匕，日进二服。又方生藕〔研汁〕，右饮二升甚效。又方清酒〔一升〕、生地黄汁〔一升〕，右相和，煎一沸，分为两服。疗产后腹内块痛不止。芎藭、当归、芍药、干姜〔各二两〕，右捣罗为末，酒调方寸匕，日三服。疗产后下血不尽，腹内坚痛不可忍。当归、芍药、桂心各三两、桃仁〔一百二十枚〕，右水六升，煮取二升，分温二服，如未瘥，加大黄三两。疗产后血结下不尽，腹绞痛不止。大黄〔别浸〕

、当归、干地黄各十分、芎藭、芍药、桂心〔各八分〕、甘草炙、黄芩〔各六分〕、桃仁〔四十九枚〕，右水七升，煮取二升半，下大黄，更煎三沸，分为三服。疗先患冷气，因产后发腹痛。芎藭、桂心、当归、茺蔚、茯苓、芍药、甘草〔各六分〕、桃仁〔十分去尖〕，右水七升，煮取二升，分三服。治产后心腹切痛，不能食，乏气忽热。当归、芎藭、黄芩、人参、甘草、芍药、防风、生姜〔各三分〕、桃仁〔八十枚〕，右水七升，煮取二升，下大黄，更煎三沸，分作三服。疗产后血不尽，腹中除痛无计。青木香、当归、牛膝、芎藭、黄耆、芍药〔各八分〕、大黄〔十三分浸〕、芒硝〔十二分〕，右水七升，煎取二升，后下大黄，更煎三沸，分三服。疗产后血下不止，虚羸迨死。蒲黄〔二两〕，右水二升，煎取八合，顿服。疗产后血泄不止，无禁度。干地黄末，右酒服匙头，日三四服。疗产后余血攻心，或下血不止，心闷面青，冷气欲绝。羊血，右以一盞顿服，如不定，更服立效。疗气痛欲死。槐鸡〔半两〕，右为末，用酒浓煎，顿服立愈。疗产后余血作痛兼块者。桂心、姜黄，右等分为末，酒服方寸匕，血下尽妙。

产后渴不止方论第十九〔凡二道〕

疗产后渴不止，饮水，小便数多。土瓜根、栝蒌根、人参、甘草、牡蛎粉〔各二两〕、大枣〔十二枚〕，右水九升，煮取三升，分温三服。疗产后大渴不止。芦根〔切一升〕、栝蒌〔三两〕、人参、甘草、茯苓各三两、大枣〔十二枚〕、生麦门冬〔四两〕，右水九升，煮取三升，分为三服，顿服，四剂即瘥，忌菰菜。

产后淋病诸方论第二十〔凡六道〕

论曰：产后患淋，因虚损后有热气客于胞中，内虚则起数，热则小便涩痛，故谓之淋，又有因产损血气，血气虚则挟热，热搏于血，血即流渗于胞中，故血随小便出为血淋者，如雨之淋也。疗产后淋病小便涩痛或血淋者。瞿麦、黄芩、冬葵子各二两、通草〔三两〕、大枣〔十二枚〕，右水七升，煮取二升半，分作两服。疗产后血淋。车前子、瞿麦各四两、黄芩〔三两〕、郁金〔一两末〕，右水六升，取二升，下郁金末分三服。广济疗产后卒患淋穴便涩痛及血淋。冬葵子〔三合〕、石苇〔二两炙去毛〕、通草、黄芩、滑石、茯苓〔各三两〕，右水二升，煎取一升，下滑石空心服。集验疗产患淋小便痛。石苇〔炙去毛〕、黄芩〔各二两〕、通草、芍药、甘草、冬葵子〔各三两〕、榆白皮〔五合〕，右水二升，煎取一升，空心温温服。经效疗产后气淋热淋。贝齿〔两枚烧作末〕、葵子〔二两〕、石膏〔五两〕、阳石末三两，右水二升，煎取一升，下两般末空心服。疗产后淋小便痛及血淋。黄芩〔五两〕、瞿麦〔二两〕、车前子〔二两〕、通草〔三两〕、冬葵子〔二合〕、鲤鱼齿〔一百枚为末〕，右水二升，煎取一升，入齿末，空心分两服。

产后虚羸下痢方论第二十一〔凡三道〕

论曰：产后本虚患痢，更加羸弱，饮食不进，便痢无常，赤白不定，盖因饮食伤于生冷之致。疗产后虚羸，下痢脓血腹痛。黄连、芍药、甘草、当归、干姜、人参〔各八分〕、艾叶〔三分〕，右水七升，煮取二升，分为三服，忌猪鹿肉。疗产后痢不禁止，因乏气欲绝，无问赤白水穀。黄连、厚朴各三两、芍药、黄柏〔各二两〕，右水六升，煮取二升，分为二服。疗产痢赤白，心腹绞痛羸困。地榆、石榴皮、黄连各三两、当归〔二两〕、薤白〔切一升〕，右水七升，煮取二升半，分为三服。

产腰痛羸瘦补益玉门不闭方论第二十二

疗产后少气，困乏虚烦。人参〔十二分〕、甘草、桂心、茯苓、芍药〔各八分〕、生地黄、生麦门冬〔各十二分〕，右水九升煮取二升，分温三服。疗产后喘乏气羸，腺内绞痛，血汗出。黄耆、人参、茯苓、甘草、当归、芎藭五味子、白朮〔各八分〕、泽兰叶、橘皮各六分、诃子、麦门冬〔各十二分〕、桂心、干地黄〔各十二分〕，右捣罗为散，炼蜜和丸，如梧桐子，空心酒下三十丸，日再服。疗产后风虚，羸弱劳瘦，不生肌肉。黄耆、当归、芍药、人参〔各二两〕、桂心、甘草〔炙〕、芎藭、生姜各八分、大枣〔十二枚〕，右水七升，煮取三升，分温三服。疗产后虚劳，骨节疼痛，头疼汗不出。当归、人参、生姜各二分、黄耆〔三两〕、豉〔五合〕、粳米〔三合〕、猪肾〔一对切〕、薤白〔切三合〕，右水一斗五升，先煮猪肾取六升，后下诸药，煎至二升，分为三服。又方猪肾一对，右入葱豉作臠，如常食之。疗产大虚，心腹急痛，血气上抢心，气息乏补益方。黄耆、白朮、当归、甘草〔炙〕、人参各二两、生姜〔四两〕、白羊肉，右水一斗九升，煮肉取五升，后下诸药更煎取三升为三服。疗产后阴肿，下脱肉，出玉门不闭。石灰〔一斤炒令色黄〕，右水二升，投灰中，停冷澄清，重烧以浸玉门，斯须平后如故。

产后中风方论第二十三〔凡十五道〕

论曰：产后中风，由产伤动血气，劳损脏腑，未平复起，早劳动，气虚而风邪气乘之，故中风，风邪冷气，客于皮肤经络，但疼痹羸乏，不任少气，若又筋脉挟寒则婢急喎僻，挟温则弛纵缓弱，若入诸藏，恍惚惊悸，随其所伤脏腑经络而生病。疗产后中风口噤，不任大小独活汤。独活〔四分〕、干姜〔六分〕、甘草〔二分〕、生姜〔六分〕，右水二大升，煎取一大升，分为两服。小品大豆汤，主产后中风困笃，或背强口噤，或但烦躁，或头身皆重，或身痒，剧者呕吐直视，此皆虚冷中风直饵此。大豆〔三升炒令极熟〕，右以铜器盛清酒五升沃之，密封良久，去豆分为三服，服了覆衣取微汗，身才润即愈，产后皆宜服，一则防风，二乃消血。张仲文疗产后中风受寒，遍身冷直，口噤不识人等方。白朮〔四两〕，右酒三升，煎取一升，顿服之效。千金鸡粪酒，疗产后中风，及男子诸中风，并产后百疾神效方。乌鸡粪〔三升〕、大豆〔二升〕，右先炒豆令声绝，次炒鸡粪令黄，以酒一升，先淋鸡粪，取汁淋大豆，每服一升。重者凡四五日，服之极妙。经效疗产后风虚头痛，

语言时僻。干葛、防风、茯苓、麦门冬〔各八分〕、芍药、芩〔各六分〕、犀角〔四分〕、甘草〔三分炙〕，右水二升，煎取七合，分为两服。疗产后中风心忪悸，或志意不定恍惚，言语错乱方。人参〔六分〕、茯苓、麦门冬、羚羊角〔各八分〕、黄芩白鲜皮、甘草〔各四两〕、石膏〔十二分〕，淡竹沥〔两大合〕，右水二大升，煎取七合，煎取七合，下竹沥分为三服。疗产后中风，身背拘急如束，并渴。芎藭、芍药、羌活、羚羊角、酸枣仁〔各四两〕、桑白皮〔六分〕、防风〔五分〕，右水四升，煎取二升，分温三服。疗产后中风，四肢拘束筋节掣痛，不得转侧，角弓反张。麻黄〔八分去节〕、生姜、桂心、白朮各四分、防风、芍药〔各六分〕、芎藭〔五分〕、甜竹沥〔二合〕，右水三升，先煎麻黄掠去沫，下诸药煎取七合，方下竹沥，更煎三沸，食后分三服，取微汗为度。疗产后中风，血气不散，邪气入藏，狂言妄语，精神错乱，腰痛骨疼。麻黄、茯苓各八分、防风、白鲜皮〔各六分〕、杏仁、当归、桂心〔各四分〕、芍药、独活〔各五分〕，右水二升五合，煎取九合，空腹热服。疗产后中风，身体疼痛，四肢痿弱不遂，羌活汤。羌活、芍药、黄耆〔各六分〕、干葛、麻黄、干地黄〔各八分〕、甘草、桂心〔各四分〕，右水二升，先煎麻黄去沫，后下诸药，取八合，食后热服，覆衣出汗愈。疗产后中风，烦渴。红花子〔五合微热研碎〕，右水一升，煎一匙头，取七合，徐徐呷之。疗产后中风，口噤四肢顽痹不仁，或如角弓张。羌活、防风〔各三两〕、大豆〔一升炒令皮拆〕，右酒五升，先浸两味，经宿，将炒豆热投酒中，搅匀，密封一日，以汤煮瓶良久，服八合，覆衣取汗急速，且以豆淋，服羌活、防风亦佳。疗产后中风，腰背强直，时时反张名风痉。防风、葛根、芎藭、干地黄〔各八分〕、麻黄〔去节〕、甘草、桂心、独活、汉防己〔各六两〕、杏仁〔五枚去尖〕，右水八升，煮麻黄去沫，后下诸药，煎取三升，分温三服。疗产后中风口噤，溃闷不能言，身体痉直。羌活、防风、秦艽、桂心、甘草、葛根〔各三分〕、生姜〔八分〕、附子〔一只炮〕、杏仁〔八十枚去尖〕、麻黄〔十分去筛〕，右水九升，先煮麻黄去沫，后下诸药，取二升，分为三服。疗产后中风口噤，拘急困笃，腰背强直时反张。大豆〔二升炒令声绝〕，右清酒六升投之，煮三四沸，去滓饮之，令微醉，如汗出瘥，切勿触风，如已成风者，加鸡粪白和豆炒，同吃，兼饮竹沥佳。

产后余血上抢心痛方论第二十四〔凡六道〕

论曰：夫产后血上抢心，由产后气虚挟宿冷，冷搏于血，则凝结不消，气逆上者，则血随上冲击而心痛也，凡产后余血不尽，得冷则结，与气相搏则痛困，重遏于寒，血结尤甚。干地黄、当归、独活、吴茱萸、芍药、干姜、甘草〔各三两〕、细辛〔一两〕，右水三升，煎取一升，空心分三服，忌生冷。经效疗产后气虚，冷搏于血，血气结滞，上冲心满胀，当归汤。当归、桂心、芎藭、橘皮、生姜、吴茱萸各二两、芍药〔三两〕，右水三升，煮取一升，空心服。千金治产后内虚，寒气入腹，腹中绞痛，下赤白痢，妄言见鬼，羊肉汤。甘草炙、当归、芍药〔各一两〕、肥羊肉〔一斤去脂〕，右水六升，先煮肉取二升，去肉入诸药，更煎取一升，分作两服。千金翼茱萸酒，论心腹内外痛。吴茱萸〔十二分〕，右酒二大升，煎取一升，

空心分两服。必效疗腹中绞刺痛方。羌活〔二大两〕，右酒二升，煎取一升，去滓，分为两服。千金治产后渴少气。麦门冬、淡竹叶〔各十二分〕、大枣〔七枚〕、生姜、甘草、人参〔各六分〕、小麦〔五合〕，右水二升半，煎取一大升，去滓分两服。

产后汗不止方论第二十五〔凡五道〕

论曰：产后汗不止，夫汗由阴虚而得，又加之里虚表实，阳气发于外，故汗出为阴虚，是令汗出，为阴气虚弱未平复也，凡产后皆血气虚，故多汗，因遇风邪，则变为疾也。千金治产后风虚，汗出不止，小便难，四肢微急，难以屈伸。大枣〔十二枚〕、附子、桂心〔各四两〕、芍药〔八分〕、生姜〔六分〕，右水三升，煎取七合，空腹分为两服，忌猪肉冷水生葱等物。经效疗产后汗不止。黄耆〔十二分〕、白朮、牡蛎、茯苓、防风、干地黄、麦门冬各八分、大枣〔七枚〕，右水二升，煎取七合，空心分为两服。千金治产后余疾，腹中绞痛，不下食，瘦乏。当归、黄耆、芍药〔各六分〕、干地黄、白朮〔各八分〕、桂心、甘草〔各四分〕、大枣〔十四枚〕，右水二升，煎取八合，空心作两大服，忌生葱。

产后冷热痢方论第二十六〔凡二道〕

疗产后骤血不止，续命汤。白蜜〔一匙头〕、生姜〔一片〕，右同煎候蜜色赤，投童子小便一升，去姜，更煎两沸，分为三服，顿服之。广济治产后腹痛气胀，胁下闷，不下食，兼微痢。茯苓、人参、当归、甘草〔各六分〕、生姜、陈橘皮〔各四分〕、厚朴〔八分炙〕，右水二升，煎取七合，空心分为两服，忌如前。

产后虚羸方论第二十七〔凡三道〕

论曰：产后虚羸者，因产损伤脏腑，劳侵气血，轻者将养满日即瘥，重者日月虽满，气血犹不调和，故患虚羸也。广济治产后风虚冷气，腹肚不调，补益悦泽。泽兰、桂心、远志、厚朴〔炙〕、石斛、白芷、续断、防风、干姜〔各三分〕、芎藭、白朮、柏子仁、黄耆〔各四分〕、甘草、当归〔各五分〕、赤石脂、干地黄〔各六分〕、人参〔三分〕，右捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心酒下五十丸，忌如前。桃仁煎，疗产后百病，及诸气，补益悦泽。桃仁〔一千二百枚去皮尖炒熟研如膏〕，右酒一斗五升，研滤三四遍，如作麦粥法，以极细为佳，内长颈小瓶中，密封头，内汤中，煮一日一夜，使瓶口常出汤上，勿令没，熟后以酒服一合，日再服。千金增减泽兰丸，疗产后百病，治血补虚劳。泽兰、防风、甘草、当归、芎藭〔各七分〕、干姜、麦门冬〔各八分〕、附子、白朮、桂心、细辛〔各四分〕、柏子仁、干地黄、石斛〔各六分〕、人参、牛膝〔各五分〕、厚朴、叶本〔各二分〕，右为末，蜜丸，梧桐子大，空心酒下二十丸，忌如前。

产后烦渴方论第二十八〔凡二道〕

经效理产后血气心烦渴。紫葛〔三大两〕，右水二升，煎取一升，去滓，呷之效。集验疗产后心烦渴。瓜蒌根、人参、甘草炙各六两、麦门冬〔二分〕、大枣〔七枚〕、生地黄〔十二分〕，右水二大升，煎取八合，食后分为两服。

产后烦闷虚热方论第二十九〔凡六道〕

论曰：产后烦闷虚热，夫产即脏腑劳伤，血气伤而风邪乘之，搏于血，使气不宣，而痞涩则生热，或肢节烦疼口干，但因生热，其烦闷由产后血气虚弱未复，而气逆乘之，故烦闷也，其气故令胁满，妨不下食。生地黄汁〔一升〕、当归〔一两半〕、清酒〔五升〕、生姜汁〔三合〕、童子小便〔二升〕，右相和合煎三四沸，分温四服，中间药消进食，食消更进药。经效理血气烦闷，胁肋胀满及痛。芍药、蒲黄、延胡索各四分、当归〔六分〕、荷叶蒂三枚炙，右水二升，煎七合，后入蒲黄，空心服两服。又方生藕，右取汁，煎两沸，饮两服效。集验疗产后血气烦闷。酒〔二合〕、生地黄汁〔一升〕，右相和，煎一两沸，分为两服，立效。千金疗产后血气喘，心烦闷不解。淡竹叶、麦门冬、小麦、茯苓〔各二分〕、甘草、生姜〔各一两〕、大枣〔七枚〕，心悸，加人参二两食少，加粳米〔二合〕，右水二升，煎取七合，食后分为两服。疗产后血下不尽，烦闷腹痛。羚羊角〔炭火上烧作胶二两古方烧作灰〕、芍药〔二两炒黄〕、枳壳〔二两炒令焦黄色〕，右捣罗为散，水调方寸匕，服之。

产后血瘀方论第三十〔凡四道〕

论曰：产后血断，由新产之后，有血气相搏，谓之瘀，瘀者，假也，谓其痛浮走无定，缘内宿有冷血气，不治，至产血下即少，故成此疾也。童子小便〔三升〕、生藕汁〔一大升〕、地黄汁〔一升〕、生姜汁〔三升〕，右先煎三味，合三分，减二次，下姜汁，慢火煎如稀饧，每取一合，暖酒调服。疗血瘀痛，脐下胀，不下食。当归〔八分〕、桂心、芍药、蒲黄、麟竭〔各六分〕、延胡索〔四分〕，右为散，空心温酒调下两钱匕。千金疗血瘀。干地黄〔一两〕、乌贼鱼骨〔二两〕，右为散，空腹温酒下两钱匕。又方铁秤锤〔烧赤〕，右以酒一升淬之，分为两服。

产后余疾痢脓血方论第三十一〔凡八道〕

论曰：产后余病，由产劳伤脏腑不足，日月未满，起早劳动，虚损不补，为所伤冷，气力瘦乏，若风冷入于胃，胃伤虚冷，则血即变白脓，脓血相杂，冷热不调，为滞痢也。深师方。黄连〔六两〕、乌梅〔三两〕、干姜〔二两〕，右为末，炼蜜为丸，如桐梧子大，空心米饮下三十丸，忌如前。广济疗产后赤白痢，脐腹绞痛。当归、黄连〔各八两〕、艾叶、地榆、甘草〔炙〕、龙骨、厚朴、黄芩、干姜各六两

，右水二大升，煎取七合，空心分两服。经效疗产后赤白痢，脐下气痛。厚朴〔八分〕、当归、枳壳、诃子〔各六分〕、甘草〔五分〕、肉豆蔻〔五枚〕、薤切〔三合〕，右水一升，煎取九合，空心分为三服。张仲文疗产后赤白痢，腹中绞痛。黄连、阿胶〔炙〕、蒲黄〔各一两〕、梔子仁、当归黄芩，右为散，空腹米饮下方寸匕，日两服。救急疗产后赤白痢，腹中绞痛。芍药、阿胶、艾叶〔各二两〕、干地黄、甘草、当归各三两，右水一升，煎取八合，空心分两服。必效疗产后赤白痢，腹中绞痛，不下食。当归、石榴皮、地榆〔各二两〕、白芨荷、黄连〔各十二两〕、黄柏〔一分〕、犀角〔四两〕、黄芩、枳壳、甘草、升麻〔各六分〕、茜根〔八分〕、粳米〔二合〕、薤白〔切一升〕，右为末蜜丸，如梧桐子大，空心米饮下二十丸。疗产后血痢，小便不通，脐腹痛。生马齿菜，右捣取汁三大合，煎一沸，下蜜一合调，顿服。千金疗产后水痢，霍乱下痢无度。白石脂、干姜〔各十二分〕，右为散，面粥为丸，梧桐子大，空心米饮下三十丸。

产后小便赤方论第三十二〔凡二道〕

论曰：产后小便数，此由胞内宿有冷，因产后冷发动，冷气入腹，虚弱不能制，其小便即数，有遗尿者，由产用气，伤于膀胱，而冷气入于胞，胞囊决漏，不禁小便，故令遗失，多因产难之所致。广济疗产后小便不禁。鸡屎〔烧作灰〕，右研细，空腹酒服方寸匕。千金翼疗产后小便数及遗尿。桑螵蛸〔三十枚炒〕、鹿茸〔炙〕、黄耆〔各三两〕、赤石脂、厚朴〔炙〕、牡蛎〔各二两〕，右捣罗为末，空心米饮下方寸匕，忌冷茶毒等物。

卷下

产后小便遗血方论三十三〔凡四道〕

疗产后大小便利血。车前子、黄芩、蒲黄、干地黄、牡蛎、芍药〔各六分〕，右为散，空心，米饮服方寸匕，忌面蒜。崔氏疗产后血气渗入大小肠。车前草汁〔一升〕、蜜〔一大合〕，右相和，煎取一沸，分为两服。又小便利血。乱发烧灰研如粉，右米饮服方寸匕。古今经验疗产后劳伤热，大小便赤涩。鸡苏〔一分〕、通草〔十分〕、冬葵子〔三合〕、芍药、滑石、芒硝各八分、生地黄〔十二分〕，右水三升，煮取八合，下芒硝，空心分三服。

产后大小便不通方论第三十四〔凡四道〕

论曰：产后大小便不通，肠胃本挟于热，因产大小便血俱下，津液竭燥，肠胃痞涩，热气结于肠胃，故不通也。集验疗产后津液竭燥，大小便不通。芍药、大黄、枳壳、麻仁研〔各二两〕，右为末，炼蜜和丸，梧桐子大，空心，熟水下二十丸，渐加之，以利为度。经效疗大便不通，热气结于肠胃。大黄〔二两〕、芒硝〔一两〕，右水一大升，煎取六合，下芒硝，空心，作两服。古今录验疗产后大便不通。黄芩、芒硝〔各六分〕、大黄、芍药、杏仁〔去皮尖研如膏各八分〕，右为末，蜜丸，梧桐子大，空心，煎水下十五丸，渐加，以利为度。千金疗产后热结，大便不通。蜜〔五合火煎令强以水投中良久取出〕，右捻如拇指大，长二寸，内下部即通。

产后寒热方论第三十五〔凡四道〕

论曰：产后寒热，因产劳伤血气，使阴阳不和，反相乘克，阳胜则热，阴胜则寒，阴阳相激，故发寒热，又产余血亦令人寒热，其腹时痛则是也。疗产后虚弱喘乏，作寒热，状如疟，名为蓐劳。猪肾〔一具切去膜〕、豉〔五合绵裹〕、白梁〔二合〕、瘤白切〔一升〕、人参、当归〔各一两〕，右水二升，煎取八合，分为两服。经效疗产后虚烦头痛，气短欲死，心乱不解。淡竹茹、干葛〔各八分〕、甘草〔六分〕、麦门冬子〔三合〕、小麦〔二合〕、石膏〔十二分〕，右水二升，煎取八合，食后分为两服。疗产后虚热烦痛。干地黄、牡蛎、茯苓〔各八分〕、芍药〔十二分〕、黄芩、桂心各六分，右水二升，煎取一升，分为两服。

产后咳嗽方论第三十六〔凡三道〕

论曰：喘嗽肺脏微寒，即成喘嗽，又因产后气虚，风寒伤于肺，故令咳嗽。集验疗产后风伤寒，咳嗽多疾，唾粘。甘草、桔梗〔各六分〕、款冬花〔四分〕、生麦门冬〔各十二分〕、葱白〔一握〕、豉〔二合旧方不葱白与豉〕，右水二升，煎取八合，食后，良久两服。经效疗咳嗽多痰，唾粘气急。前胡、五味子、紫菀、贝母〔

各六分〕、桑白皮、茯苓〔各八分〕、淡竹叶〔二十片〕，右水二升，煎取八合，食后分为两服。疗产后咳嗽气喘。百部根、桔梗各六分、桑白皮〔十二分〕、干百合、赤茯苓各八分，右水二升，煎取七合，食后，分两服。

产后气痢方论三十七〔凡六道〕

论曰：妊娠之时，脾胃气挟于冷，大肠气虚，因产后转加虚损，或误食生冷酒面，便成痢疾，赤白气不和，赤黄胃热，或青色极冷也。疗产后气痢不止。青木香〔三分〕、诃子皮〔八分酥炙令黄〕，右为散，空心，米饮调方寸匕，服之。疗产后赤白痢疾。黄连〔八分〕、阿胶〔炙六分〕、赤茯苓、当归、黄檗〔各四分〕、干姜〔三分〕，右为末蜜丸，如梧桐子大，空心，粥饮二十丸。疗产后水痢。枳壳〔四分〕、厚朴〔炙〕、茯苓、黄连各六分、当归〔三分〕，右水一升，煎取八合，空心，分为三服。又方黄连〔六分〕、乌梅肉〔五分〕、石榴皮、当归、赤石脂〔各四分〕、干姜〔三分〕，右为末蜜丸，梧桐子大，空心，米饮下三十丸。疗产后下痢，赤白有血。赤石脂、黄连、地榆〔各六分〕、当归〔四分〕、干姜、甘草〔各三分〕、厚朴〔十二分〕、薤白〔七茎〕，右水二升，煎取八合，空心，分两服。疗产后血痢不止。臭樗根〔六分〕，右为末，水和丸，如枣核大，面杵作馄饨，每度煮二七个，热吞之。

产后血晕闷绝方论第三十八〔凡十道〕

论曰：产后血晕者，其状心烦，气欲绝是也，亦有用心过多而晕，亦有下血极少亦晕，若下血多晕者，但烦而已，下血少而气逆者，则血随气上撩，心下满急，此二者难并为晕，而症状各异，当问其产妇血下多少即知，须速投方药，若不急疗，即危其命也，凡晕者，热血气乘虚奔逆上所致也，但才分解了，烧秤锤江石令赤，置器中，向产母床前帐里投醋淬之，得醋气可除血晕之法也，十日内时时作，此法不妨晕者，如日月之有晕也。经效产后虚闷，汗出不识人。鸡子〔三个〕，右打破吞之便醒，不醒者，可灌童子小便，入腹即醒，若久不醒，忽时时发者。此为有风，因产血气暴风虚风行脉中，若虚去血多者，尤甚也。产后血气暴虚，汗出。淡竹叶，右煎汤三合，微温服之，须臾再服。又方马齿菜〔叶研取汁三大合如无用干者亦得〕，右煎一沸，投蜜一匙，令匀顿服。广济疗产后血晕，心闷不识人，神言鬼语，气息欲绝。芍药、甘草〔各一两〕、生地黄汁〔一升〕，丹参〔四分〕、生姜汁、蜜〔各一合〕，右水二升，煎取八合，下地黄、姜、蜜汁，分两服。疗产后恶露不多，下腹绞痛。大黄〔八分〕、牛膝〔六分〕、芍药、蒲黄〔各四分〕、牡丹皮、当归〔各二分〕，右为末，空心暖酒，服方寸匕。救急疗产后血不尽，疼闷心痛。荷叶〔炒令香〕，右为散，煎水调方寸匕，服。疗初平安血气烦闷。童子小便〔五合〕、生地黄汁〔三合〕，右煎三沸，温再服。疗产后血晕虚闷。蒲黄〔四分〕、紫葛、芍药〔各八分〕、红蓝花〔十二分〕，右水二升，煎取七合，入生地黄汁二合，更煎三五沸，每服三合。产后血晕，心闷乱恍惚如见鬼。生益母草〔汁三合〕

根亦得〕、地黄汁〔二合〕、小便〔一合〕、鸡子〔三枚取清〕，右煎三四沸，后入鸡子清，匀搅，作一服。产后血晕，狂语不识人，狂乱。童子小便〔五合〕、地黄汁〔一合〕、赤马通〔七枝〕、红雪〔八分〕，右以上二味，浸马通绞去滓，下红雪，温两服。

产后乳无汁方论第三十九〔凡五道〕

论曰：气血虚弱，经络不调所致也，乳汁勿投于地，虫蚁食之，令乳无汁，可卧东壁上佳。疗产后乳无汁。土瓜根、漏芦〔各三两〕、甘草〔二两〕、通草〔四两〕，右水八升，煎取两升，分温三服，忌如常法。又方土瓜根，右为末，酒调两钱匕，日进二三服效。又方母猪蹄〔二枚切〕、通草〔六两〕，右以绵裹，煮作羹食之，最好。又方漏芦、通草、土瓜根〔各三两〕、甘草、桂心〔各一两〕，右为散，饮服方寸匕，日进三服。又方栝楼末，右以井花水，服方寸匕，日二服，夜流出。

产后乳结痈方论第四十〔凡十九道〕

论曰：产后宜裂去乳汁，不宜蓄积，不出恶汁，内引瘀热，则结硬坚肿，牵急疼痛，或渴思饮，其奶手近不得，若成脓者名妬乳，乃急于痈，宜服连翘汤，利下热毒，外以赤小豆末，水调涂之，便愈，忽数，担去乳汁，忽小孩手匀动之，忽大人含水啍之，得汁吐之，其汁状如脓，若产后不曾乳儿，蓄积乳汁，亦结成痈。产后妬乳并痈。连翘子、升麻、芒硝〔各十分〕、玄参、芍药、白敛、汉防己、夜干〔各八分〕、大黄〔十二分〕、甘草〔六分〕、杏仁〔八十枚去尖〕，右水九升，煎取三升，下大黄，次下硝，分三服。又方右熟捣傅肿上，日三度易之，并叶煎汁饮之，亦佳，食之亦得，妬乳及痈并差。又方地黄，右取汁，涂熟即差。疗乳肿。右以马溺涂之，立愈。疗妇人发乳，丈夫发背，烂生脓血后，虚成气疾。黄耆、地黄、麦门冬、升麻、人参、茯苓〔各三两〕、当归、芍药、远志、甘草〔各一两〕、大枣〔十枚〕，右水二升，煮取一升，分温两服。疗乳头裂破。右以丁香为末，傅之立愈。疗妬乳及痈。葵茎及子，右捣筛为散，服方寸匕即愈。又方鸡屎，右为末，服方寸匕，须臾三服愈。又方皂荚〔十条〕，右以酒一升，揉取汁，硝石半两，煎成膏傅之。疗诸痈不散，已成脓，惧针，令自决破下。右取白鸡内翅，及第一翎各一茎，烧末服之，即决。又方取雄雀粪白者研涂上，干即易之。疗乳痈初得令消。赤小豆、莽草，右等分为末，苦酒和傅之愈。疗发背乳痈，四肢虚热大渴。竹叶〔切三升以水一斗二升煮取九升〕、生地黄〔六两〕、黄芩、芍药、人参、知母、甘草〔各二两〕、升麻、黄耆、麦门冬、栝楼〔各三两〕、大枣〔十二枚〕，右以竹叶汁煮取三升，渴则饮之。疗乳肿方。升麻、白敛、大黄〔各三两〕、黄芩、芒硝〔各二两〕，右水二升，煎取一升，下硝，分为两服，后以绵温药贴肿上，日夜勿停即差。又方黄檗〔一分末〕、鸡子白，右调和匀涂之，干则易，立愈。又方苕根，右捣傅之愈。又方鹿角，右于石上磨取浊汁涂上，干则易之。又方鹿角，右烧作灰，以酒调涂之立愈。又方粳米粉〔炒令黑〕，右以鸡子白和如泥，以涂帛上贴之。

，穿帛作穴，以泄痈毒气，易之效。

产后乳汁自出方论第四十一〔凡三道〕论曰：产后乳汁自出，盖是身虚所致，宜服补药以止之，若乳多温满急痛者，温熨之。疗乳痈始作。大黄、樗实〔各三两〕、芍药〔六分〕、马蹄〔炙六分〕。

经效产宝续编

周颙传授济急方论〔凡四道〕

颙尝见人传经效诸方，自曾修合，实有有大功，遂编于卷末，普用传授，以济急难，治产后血晕血气，及滞血不散，便成症瘕兼泻，面色黄肿，呕逆恶心，头痛目眩，口吐清水，四肢弱，五脏虚怯，常日睡多，吃食减少，渐觉羸瘦，年久变为劳疾，如此所患，偏宜服饵胜金丸。泽兰〔四两〕、当归、芍药、芫荇、甘草、芎藭〔各六分〕、干姜、桂心〔各三分半〕、石膏、桔梗、细辛、茺莢、柏子仁、防风、厚朴、乌头、白微、枳壳、南椒、金钗石斛、石颌、蒲黄、茯苓〔各三分〕、白朮、白芷、人参、叶本、青木香〔各一分〕，右二十八味，并州土分两差，杵罗为末，炼蜜为丸，弹子大，有所患，热酒研一丸，入口便愈，忌腥膩热面豉汁生葱冷水果子等，若死胎不下，胎衣在腹，并以炒盐酒研服，未退再服。治产后诸疾，圣散子。泽兰〔九分〕、石膏〔八分如粉〕、芎藭、当归、芫荇、芍药、甘草〔各七分〕、干姜、桂心〔各五分〕、细辛、卷柏〔去土〕、柏子仁、茺莢、防风〔去芦头〕、南椒〔出汗〕、厚朴〔姜汗炙〕、茯苓〔各四分〕、白芷、白朮、人参、丹参、叶本、五味子、黄耆〔各三分〕、乌头〔炮〕、白微〔各二分〕，右捣罗为散，以新瓦器密封，毋令失气，每服以热酒调下两钱匕，忌如常。神效治产后一切，黑散子。鲤鱼皮〔三两烧灰〕、芍药、蒲黄〔各二两〕、当归、没药、桂心、好墨、卷柏、青木香、麝香〔各一两〕、銚墨〔半两〕、丈夫发〔灰半两〕，右一十二味，捣罗为散，以新瓷器盛，密封勿令失气，每产后以好酒调下一钱，如血晕冲心，下血不尽，脐下搅刺，疼痛不可忍，块血症疾甚，日加两服，不拘时候服，忌冷物果子粘食。神效疗妊娠十个月内不安，至临分解时，并宜服，此保生丸。金钗石斛、贝母〔去心〕、黄芩、明净石膏细研如粉、桂心、乌头卷、秦椒〔去目炒〕、蜀椒〔去目炒〕、甘草〔炙〕、糯米〔炒已上各二两〕，右并须州上者，如法修合为散，炼蜜丸，如弹子大，或有妊娠诸疾，吃食减少，及气喘疾痛，面目痿黄，身体羸瘦，四肢无力，手脚浮肿，始脏不安，并以枣汤研一丸，空心服之，忌腥膩果子粘食杂物冷肉等。

濮阳李师圣施郭稽中论〔二十一证方十六道〕

第一论，热病死胎腹中者如何？

答曰：母患热疾，至六七日，以致藏府热极，蒸煮其胎，是以致死，缘儿死身冷，不能自出，但服黑神散暖其胎，须臾胎气温暖，儿即自出，何以知其死，看产妇舌色青者，是其验，宜以黑神散主之。雄黑豆〔小者是炒去黑皮用二两〕、当归、芍药、甘草炙、干姜、蒲黄〔用安石器内炒赤色〕、肉桂、熟地黄〔温洗〕，右等分，焙干为末，每服二钱，空心温酒调下，若三十岁已上，生产少者，不用桂、姜，却以炒生姜、红花各二两。

第二论，胎衣不下者如何？

答曰：母生子了，血流入衣中，为血所胀，遂不能下，若治之稍缓，则满腹中上冲，心胸疼痛，喘急难治，但服夺命丹，速去衣中血，血散胀消，胎衣自下，而无所患矣，夺命丹。附子〔半两炮去皮脐〕、牡丹皮〔一两〕、干漆〔一分研碎炒令烟出〕，右为末，用酃醕一升，大黄末一两，热成膏，和药丸如菉豆大，温酒送下五七丸，不计时候。

第三论，难产者如何？

答曰：胎侧则成形块者，呼为儿枕，子欲生时，枕破败血裹其子，故难产，但服胜金散治之，逐其败血，儿即自生，若横生逆生皆治之。麝香〔一钱〕、盐豉〔一两用旧青布裹火烧令通红急以乳槌研为细末〕，右为末，取秤锤烧红，以酒淬之，每服调一钱。

第四论，闷绝不知人事者如何？

答曰：产后血气暴，未得安静，血随气上攻，迷乱心神，眼前生花极甚者，令人闷绝，不知人事，口噤神昏气冷，医者不识，呼为暗风，若如此治之，必难愈，宜服清魂散。泽兰叶〔一分〕、人参〔一钱〕、荆芥穗〔一两〕、芎〔半两〕、甘草〔二分炙〕，右为末，每服一钱，热汤半盏，入温酒半盏，调匀急灌之，药下便愈。

第五论，口干痞闷者如何？

答曰：产宫胃太虚，血气未定，食面太早，胃不能消化，面毒结聚于胃脘，上熏胸中，是以口干烦闷，心下痞闷，医者不识，认为胸膈壅滞，以药下之，万不能一，但服眼儿现丸。姜黄、京三棱〔炮〕、毕澄茄、人参、陈皮〔去白〕、高良姜、蓬莪朮，右等分为末，用细切萝卜，慢火煮令烂研细，将余汁煮面糊为丸，菉豆大每服十丸，萝卜汤下，不拘时候。

第六论，产后乍寒乍热如何？

答曰：阴阳不和，败血不散，皆作乍寒乍热，产后血气虚损，阴阳不和，阴胜则乍寒，阳胜则乍热，阴阳相乘则或热，若因产劳伤脏腑，血弱不能宽越，故败血不散，入肺即热，入脾即寒，医人若作寒症疾治之，则谬矣，阴阳不和，宜服增减四物汤，败血不散，宜服夺命丹。又问二者何以别之。答曰：时有刺痛者，败血也，但寒热无他证者，阴阳不和也，增减四物汤。当归、芍药、芎、人参、干姜〔炮裂各二两〕、甘草〔四两炙〕，右为末，每服二钱，水一盞，生姜五片，同煎至六分，去滓，微热服，不计时候。

第七论，产后四肢虚肿者如何？

答曰：产后败血乘，停积于五脏，循经流入四肢，留淫入深，回还不得，腐坏如水，故令四肢面目浮肿，医者不辨，作气治之，凡水气多用导水药极虚之，夫产后既虚，又以药虚之，是重虚也，但服调经散，血行肿消，则病自愈。没药〔一钱研〕、琥珀〔一钱研〕、桂〔去粗皮半钱〕、芍药〔一钱〕、当归〔一钱〕、麝〔半钱〕、细辛〔半钱〕，右为末，每服半钱，生姜汁温酒各少许，调匀服之。

第八论，产后不语者如何？

答曰：人心有七孔三毛，产后血流气弱，多致停积，败血闭于心窍，神志不能明了，又心气通于舌，心气闭则舌亦强矣，故令不语，但服七珍散。人参、石菖蒲、川芎、熟地黄各一两、细辛〔一钱〕、防风〔半两〕、朱砂〔半两研〕，右为末，每服一钱，薄荷汤调下，不拘时候。

第九论，

产后乍见鬼神者如何？答曰：心主身之血脉，因产伤耗血脉心气，则虚血停积，上干于心受触激，遂生烦燥，坐卧不安，乍见鬼神，言语颠错，医者不识，呼为风邪，如此治之，必不能愈，但服调经散，加生龙脑一捻，得睡即安，调经散方在第七论中。

第十论，产后腹痛又泻痢者如何？

答曰：产后肠胃虚怯，寒邪易侵，若未满月，饮冷当风，则寒邪乘虚进袭，留于胸腹，散于腹胁，故腹痛作阵，或如锥刀所刺，流入大肠，水谷不化，洞泄肠鸣，或下赤白，腹胁填胀，或走痛不定，急服调中汤立愈，医者若以为积滞取之，则祸不旋踵矣。高良姜、当归、桂去皮、芍药、附子〔炮去皮脐〕、川芎〔各一两〕、甘草〔半两炙〕，右为粗末，每服三钱，水三盞，煎至一盞，去滓，热服。

第十一论，产后遍身疼痛者如何？

答曰：产后百节开张，血脉流走，遇气弱则经络分肉之间，血多留滞，累日不散，则骨节不利，筋脉引急，故腰背转侧不得，手足摇动不得，更身热疼痛，医者以为伤寒治之，若出汗则筋脉动惕，手足厥冷，变生他病，但服趁痛丸以墨涂之。牛膝、当归、桂去皮、白朮、黄耆〔各半两〕、薤白〔一分〕、独活〔半两〕、生姜〔半两〕、甘草〔一钱炙〕，右为粗末，每服半两，水五盏，煎至二盏，去滓，热服一盏。

第十二论，产后大便秘涩者如何？

答曰：产卧水血俱下，肠胃虚竭，津液不足，故大便秘涩，若过五六日，腹中闷痛者，乃有燥粪在脏腑，以其干涩，不能出耳，宜服麻仁丸，更以津润之，若误以为热而投寒药，则阳消阴长，变动百生，性命危矣，麻仁丸。麻仁〔研〕、枳壳〔炒〕、人参、大黄〔各半两〕，右为末，炼蜜丸，梧桐子大，空心，温汤下二十丸，未通加丸数。

第十三论，产后血崩者何？

答曰：产卧耗伤经络，未得平复，而劳役损动，致血暴崩下，淋漓不止，或因咸酸不节，伤蠹营卫，气衰血弱，亦变崩中，若小腹满痛，肝经已坏为难治，急服固经丸以止之。艾叶、补骨脂炒、木贼草、赤石脂〔各半两〕、附子〔三枚炮去皮脐〕，右为末，陈米饮和丸梧桐子大，食前温酒下二十丸，米饮亦得。

第十四论，产后腹胀闷满呕吐不定者何？

答曰：血散于脾胃，脾受之，不能运化精微而成腹胀，胃受之，则不得受纳水谷而生吐逆，医者不识，若以寻常治胀止吐药疗之，病与药不相干，转更伤动正气，疾愈难治，但服抵胜汤必瘥。赤芍药、半夏〔汤洗七次〕、人参、陈皮〔各二钱〕、泽兰〔二钱〕、甘草〔炙一钱〕、生姜〔半两〕，右为粗末，水二盏，煎至一盏，去滓，微热服，分为三服。

第十五论，产后口鼻黑气起及鼻衄如何？

答曰：阳明者，经络之海，起于鼻交颊中，还出侠口，交人中之左右，是盖因夫产后气消血散，荣卫不理，散乱入诸经络，回还不得，致令口鼻黑气起，及变鼻衄，此缘产后诸虚热变生此疾，不可治也，名曰脾绝肺散。

第十六论，喉中气急喘者如何。

答曰：荣者血也，卫者气也，荣行脉中，卫行脉外，相随上下，谓之荣卫，因产后

下血过多，荣卫暴竭，气无所生，独聚于肺中，故令喘也，此名孤阳绝阴为难治，若恶露不快，败血停凝，上熏于肺，亦令喘息，可服夺命丹，方见前第二论中。

第十七论，产后中风者如何？

答曰：产后五七日内，强力下床，或一月之内，伤于房室，或怀忧悲怒，扰荡泄和气，或因着灸惊惕，脏腑得疾之初，眼涩口噤，肌肉相搐，腰脊筋急强直者，不可治，此乃人作，非偶尔中风所得也。

第十八论，产后心痛者如何？

答曰：心者血脉之主，人有挟宿寒，因产大虚，寒转于血，血凝滞不得消散，其气逆上，冲击于心经，故心痛，宜以大蜜汤，治寒则去，血脉温则经络通，心痛自止，若误以为有所伤治之，则虚极而寒益甚矣，心络寒甚，传心之正经，则变成心痛者，朝发则夕死，是药不可轻用也。干地黄、当归、独活、吴茱萸、芍药、干姜〔炮〕、甘草〔炙各一两〕、细辛〔半两〕、桂〔一两去粗皮〕、少叶〔一两远志叶是也〕，右为粗末，每服半两，用水三大盏，煎取一盏，去滓，微热。

第十九论，产后热闷气上转为脚气者如何？

答曰：产后卧血虚生，热复因春夏取凉过多，地之蒸湿，因足履之，所以着成脚气，其状热闷掣废，惊悸心烦，呕吐气上，皆其候也，服小续命汤，三二剂必愈，若误以败血药攻之，则血去而病益增矣。人参、黄芩、官桂〔去皮〕、白朮、防己、麻黄〔去节〕、川芎、芍药、甘草〔各一两〕、生姜〔五两〕、防风〔两半〕、附子〔一枚去皮〕，右为末，每服半两，用水五盏，煎去滓，温服。

第二十论，产后出汗多而变痉风如何？

答曰：产后血虚，内理不密，故多汗，因遇风邪转之，则变痉风也，痉者口噤不开，背强而直，如发痫状，摇头马鸣，身反折，须臾十发，息如绝，宜速斡开口，灌小续命汤，稍暖即出汗如雨，手拭不及者不治。

第二十一论，产后下血过多虚极热生风如何？

答曰：妇人以劳血为主，因产血下太多，气无所主，唇青肉冷，汗出，目瞑，神昏，命在须臾，此皆虚热非风也，可服济危上丹，若以风药治之，则误人矣。乳香〔研〕、石灵脂、留黄〔研〕、陈皮〔去白〕、桑寄生、真阿胶炙烱炒成米子、太阴玄精石研，右将上四件，同研匀，石器内微火上炒动，勿令焦着，炒了再研细，后入余药末，用地黄汁煮糊为丸，菉豆大，每服酒下二十丸，当归酒尤佳。

产后十八论方〔凡九道〕

一曰：产后因热病，胎死腹内者如何？答曰：因母患热病，经六七月间，藏府热，遂煮其胎热是致死，故知之，缘死即身热痛，只因沫出，爪甲指黑，四肢逆冷，但服乌金散，其胎即下。二曰：产难者如何？答曰：其胎以或成形，为食实物后，十月足日，食有余，遂有成块，呼为儿枕，欲生块破，遂血裹其子，故难产，但服乌金散，解其败血即自生，或横生逆生不下，并宜服之。三曰：产后衣不下者如何？答曰：母生子了，产后血入衣中，被衣所胀，故当难下，但服乌金散，去其衣中血即下，如带断亦同。四曰：血晕者如何？答曰：产后三日，起坐不得，眼生花，即运走五脏，流入汗血，医人不识，呼为暗风，但可服乌金散。五曰：口干心闷者如何？答曰：产后七日已来，血气未尽，盖为母食面，结盛心上，是以烦躁干渴，医人不识，将谓膈不利壅滞所致，乌金散立效。六曰：乍寒乍热者如何？答曰：产后虚羸，败血入于肺脏，即热即寒，医人不识，呼为疟疾误矣，宜服乌金散立效。七曰：产后虚肿者如何？答曰：血败于五脏，流入四肢，即还不得，遂成脓血，医人不识，呼为水气血气，何以知之，若水气喘而小肠涩，血气伤而四肢塞，但服乌金散，姜酒调下，须臾服朱砂丸，令泻下毒物即愈。八曰：乍见鬼神者如何？答曰：败血流入于心，心不受触，遂被心热，极躁三两日，言语颠狂，医人不识，呼为风邪太误，宜服乌金散疗之。九曰：产后月内不语如何？答曰：人心有孔，孔内有毛，产后败血闭毛，故不语也，宜服乌金散。十曰：腹内疼痛，兼泻痢者如何？答曰：产后未满月饮冷水，与血相聚，大肠水谷不化，或腹胀痛，急服乌金散，更加服气药、止泻药。十一曰：产后遍身疼痛者如何？答曰：产后百节开张，败血走流诸处，留停日久，不散结聚，成此疼痛，宜服乌金散有效。十二曰：产后血崩者如何？答曰：产后恶血败露自下未止间，早先治之，及食咸酸之，遍体无血色，腹痛难治，肝家欲作发寒热作闷，宜乌金散，须臾服朱砂丸。十三曰：产后血气不通咳嗽者如何？答曰：产后咳嗽，多以食热面壅结，或热病，或有气块，发时冲心痛，气急咳嗽，四寒热，心闷口干，或时烦躁，睡梦惊悸，气虚，肢体无力，宜服乌金散。十四曰：产后乍寒乍热，心痛，月候不来如何？答曰：败血冲心，痛遶脐腹，面色无采，纵然得效，暂时痊愈，不过三两日又发，服乌金散大效。十五曰：产后腹胀满，呕逆不定者如何？答曰：败血停于脾胃，食充胃，胃充气，既不安即吐逆，冲腹胀，急服乌金散，次服朱砂丸，三两日，炒生姜一钱，醋汤下七丸，立效。十六曰：产后口鼻黑气，及鼻衄者如何？答曰：败血入脏腑，头目却还不得，口干舌焦，鼻黑起，是产后变作此候，名曰败肺，此不可治疗。十七曰：产后喉中气喘急者何如？答曰：产后败血不尽，冷恶死血上冲心，过于心即转于喉，喉中即喘，医人不识，认作风涎，十死不治。十八曰：产后中风者如何？答曰：产后七日，无故下床，一月之内，伤于房室，或因着热，有惊脏腑，风中之物，眼涩腰疼，似角弓之反张，牙关闭，急宜治之，亦非风疾所致也。乌金散干地黄〔熟水浸〕、肉桂〔去皮〕、蒲黄纸裹炒已上各二两、黑豆〔炒尽烟为炭秤二两〕、当归〔洗〕、芍药、甘草〔炙〕、白姜炮已上各一两，右为末，空心，日午夜中，热酒下二钱匕，忌生冷一切毒物。朱砂丸，治产后因寒瘀积，结成诸疾。黑附子〔炮皮脐半两〕、肉

桂〔半两去皮〕、白姜〔半两炒〕、川巴豆〔一钱醋浸煮去皮研〕，右细研面糊为丸，麻子大，每服三丸，至五丸，冷茶下，服之取泻为度。治产后胎衣不下。鸡子白〔一个〕、滑石末〔二钱〕，右滩头急流水，调下立出。治孕妇伤寒。柴胡、前胡、川芎、川当归、地黄、人参、芍药、粉草，右等分为末，每服两钱，枣四枚，姜钱三片，同煎服，要出汗加葱。治孕妇伤寒涎嗽。知母、杏仁〔去皮尖炒〕、天门冬〔去心〕、桑白皮，右等分为粗末，煎去滓服。治妇人带下。黄君正方茅花〔一握炒〕、桐炭〔三寸〕、嫩莲叶〔三个〕、甘草叶，右为末。