

玉机微义

徐彦纯

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	4
提要	6
原序	7
卷一	8
卷二	23
卷三	26
卷四	30
卷五	45
卷六	62
卷七	70
卷八	80
卷九	97
卷十	119
卷十一	131
卷十二	139
卷十三	148
卷十四	152
卷十五	170
卷十六	197
卷十七	208
卷十八	220
卷十九	238
卷二十	251
卷二十一	262
卷二十二	269
卷二十三	278
卷二十四	287
卷二十五	298
卷二十六	305
卷二十七	314
卷二十八	320
卷二十九	330
卷三十	343
卷三十一	351
卷三十二	358
卷三十三	364

卷三十四		371
卷三十五		381
卷三十六		386
卷三十七		392
卷三十八		398
卷三十九		401
卷四十		405
卷四十一		411
卷四十二		419
卷四十三		424
卷四十四		431
卷四十五		436
卷四十六		444
卷四十七		450
卷四十八		453
卷四十九		456
卷五十		486

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

钦定四库全书 子部五

玉机微义 医家类

提要

【臣】等谨案玉机微义五十卷明徐用诚撰刘纯续增用诚字彦纯会稽人纯字宗厚咸宁人用诚原本名医学折衷分中风痿伤风痰饮滞下泄泻痢头痛头眩欬逆痞满吐酸瘕疔风痼破伤风损伤十七类纯以其条例未备又益以欬 热火暑湿燥寒疮疡气血内伤虚损积聚消渴水气脚气诸疝反胃胀满喉痹淋闷眼目牙齿腰痛腹痛心痛癰疹黄疸霍乱厥痹妇人小儿三十三类始改今名仍於目錄各注续添字以相辨识或於用诚原本十七类中有所附论亦注续添字以别之是二人相继而成本书可据明史艺文志惟着刘纯之名盖失考也其书虽皆采掇诸家旧论旧方而各附案多所订正非餽飭抄撮者可比嘉靖庚寅延平黄焯刻於永州首载杨士奇序知二人皆明初人士奇序谓二人皆私淑朱震亨今观其书信然又谓北方张元素再传李杲三传王好古南方朱震亨得私淑焉则於宗派源流殊为舛迂张李王之学皆以理脾为宗朱氏之学则以补陰为主去河间一派稍近而去洁古东垣海藏一派稍远遗书具存可以覆按王禕青岩丛錄曰李氏弟子多在中州独刘氏传之荆山浮图师师至江南传之宋中人罗知悌南方之医皆宗之云云其宗派授受亦极明白士奇合而一之误之甚矣乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

原序

玉机微义原序

此编辑於会稽徐彦纯吴陵刘宗厚续有增益皆明於医者凡五十卷门分类集於论病因证治条理粲然既详备矣夫医家神农轩岐伊尹及秦越人张仲景之书万世所宗不可易也历晋唐宋代有明者近代张元素起北方盖得神授深造阃奥再传李明之二传王好古南方朱彦修得私淑焉遂为医家之正派彦纯宗厚又私淑彦修者也论者谓元素医家之王道盖王道以养民为本元素之法厚脾土为要此知本之务也是编主素难金匱及元素一派之旨若诸家治法不倍此者亦旁采而附益之虽中医执此施治可以成功如病者有能知之亦必不为庸医所误其所济利岂小补哉东里杨士奇

卷一

钦定四库全书

玉机微义卷一 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

中风门

中风叙论之始

内经曰风之伤人也或为寒热或为寒中或为热中或为偏枯风善行而数变至其变化乃为他病历陈五脏与胃之伤及风病名皆多汗而恶风【详见本文】

按风论发明风邪系外感之病有内外脏腑虚实寒热之不同别无瘫痪痿弱卒中不省僵仆喎邪挛缩眩运语澹不语之文後世始与痿证混殽矣

要略云风之为病当半身不遂经络空虚贼邪不泻或左或右邪气反缓正气即急正气引邪喎僻不遂邪在於络肌肤不仁在经即重不胜邪入腑则不识人入脏即难言口吐涎

千金云岐伯中风大法有四一曰偏枯半身不遂二曰风痲於身无痛四肢不收三曰风懿奄忽不知人四曰风痺诸痺类风状

按後世编集中风方治皆祖要略巢氏千金之论但不当以外中风邪立名而与内脏痿证袞同出治此千古之弊也

中风脉法

要略云脉微而数中风使然又云头痛脉滑者中风风脉虚弱也又寸口脉浮而紧寸口脉缓而迟皆曰中风也

脉经云浮而大者风又浮而缓皮肤不仁风寒入肌肉又滑而浮散者瘫痪风又诊人被风不仁痿躄其脉虚者生紧急疾者死

中风不治证

髮直吐沫摇头上窜直视口开手撒眼合遗尿不知人或面赤如粧或头面青黑汗缀如珠声如鼾睡皆不可治

风分在脏在腑之异

病机机要云风本为热热胜则风动宜以静胜其燥是养血也治须少汗亦宜少下多汗则虚其卫多下则损其荣宜治在经虽有汗下之戒而有中脏中腑之分中腑者多着四肢有表证而脉浮恶风寒拘急不仁中脏者多滞九窍唇缓失音耳聋鼻塞目瞽大便结秘中腑者宜汗之中脏者宜下之表里已和宜治之在经当以大约养之

发明云中血脉则口眼喎斜中腑则支节废中脏则性命危三治各不同中血脉外有六经之形证则从小续命加减中腑内有便溺之阻隔宜三化汤等通利之外无六经之形证内无便溺之阻隔宜养血通气大秦芎汤羌活愈风汤主之

按此分在表在里在经之三证立汗下调养之三法可谓开後世之盲聋但所用诸方学者宜详审之治风不可下论

发明云治风当通因通用惟宜宣发以散之不可便以苦寒之药妄下龙麝朱砂牛黄诸镇坠之药泻之按此言风本外邪惟宜宣散此风在表之时也如伤寒中风传入於胃亦未尝不可下论中便字妄字可见其意便者有早与急之义妄者谓有不当下之义治风不可利小便

如小便少不可以药利之既以自汗则津液外亡小便自少若利之使荣卫枯竭无以制火烦热愈甚当俟热退汗止小便自行也兼此证乃阳明经大忌利小便

湿病似中风论

元戎云酒湿之为病亦能作痹证口眼喎斜半身不遂浑似中风舌强不正当泻湿毒不可作风病治之而汗也衍义论甚当易简所言与此相同

按此则知口眼喎邪半身不遂之病岂止风之一端而已况六气皆能中人其证亦有纵急搐搦不知人等证不可不以脉证分别

中风先调气说

严用和云人之元气强壮荣卫和平腠理致密外邪焉能为害或因七情饮食劳役致真气先虚荣卫空疎邪气乘虚而入故致此疾若内因七情而得者法当调气不当治风外因六淫而得者亦当先调气後依所感六气治之此良法也宜八味顺气散

按此说真气先虚荣卫空疎邪气乘虚而入扩前人所未发但既曰虚矣邪又入矣补虚散邪理所当然而止曰调者意其谓因病而气壅不通调其通畅条达则真气自复邪气自行之义惜乎不能详也况中风治法岂止一端而已

气中论

许学士云世言气中者虽不见於方书然暴怒伤陰暴喜伤阳忧愁不已气多厥逆往往得此疾便觉涎潮昏塞牙关紧急若便作中风用药多致杀人惟宜苏合香丸灌之便醒然後随寒热虚实而调之无不愈者经云无故而瘖脉不至不治自己谓气暴逆也气复则已审如是虽不服药自可

按气中之说即七情内火之动气厥逆由其本虚故也用苏合香丸通行经络其决烈之性如摧枯拉朽恐血气虚者非所宜也後云不治自复之意盖倣用药之失实胜误於庸医之手也

四肢不举有虚有实

病机云四肢不举俗曰瘫痪经谓土太过则令人四肢不举此真膏粱之疾非肝肾经虚其治泻令气弱阳虚土平而愈三化汤调胃承气汤选而用之若脾虚亦令人四肢不举其治可补十全散加減四物去邪留正按四肢不举世俗皆以为中风病此云脾土太过不及皆能致之其可一槩用药乎

论风非外来乃本气病

发明曰经云阳之气以天地之疾风名之此中风者非外来风邪乃本气病也凡人年逾四旬气衰之际或因忧喜忿怒伤其气者多有此疾壮岁之时无有也若肥盛则间有之亦是形盛气衰而如此治法当和脏腑通经络便是治风然亦有贼风袭虚伤之者也治法轻重有三见前分在经在腑在脏之异

按此云本气自病乃与刘河间论内热所生相合但彼云热而此云虚虚之与热并行而不相悖也风本於热论

河间曰风病多因热甚俗云风者言末而忘其本也所以中风有瘫痪者非谓肝木之风实甚而卒中之也亦非外中於风良由将息失宜而心火暴甚肾水虚衰不能制之则陰虚阳实而热气拂郁心神昏冒筋骨不用而卒倒无知也多因喜怒悲忧恐五志过极而卒中者皆为热甚故也若微则但僵仆气流通筋脉不挛缓者发过如故或热气太甚郁滞不通陰气暴絕阳气後竭而死痰涎者由热甚则水化制火而生偏枯者由经络一侧得通否者痺而瘫痪也口噤筋急者由风热太甚以胜水湿又津液滞于胸膈以为痰涎则筋太燥然燥金主於收敛劲切故也或筋反缓者乃燥之甚血液衰少也诸筋挛易愈诸筋痿难复以见燥之微甚也

治风用汗吐下三法

子和云诸风掉眩皆属肝木掉摇眩运目喎筋急手搐瘈瘲皆厥陰肝木之用也经云风淫所胜平以辛凉世何以热药治风邪予治惊风癇病屡用汗吐下三法随治愈木郁达之者吐之

令其条达也汗者风随汗出也下者推陈致新也失音闷乱口眼喎斜可用三圣散吐之如牙关紧急鼻内灌之吐出涎口自开也次用通圣散凉膈散大人参半夏丸甘露饮除热养液之寒药排而用之

按此法的系邪气卒中痰涎壅盛实热者可用否则不敢轻易也

论中风不当与痿证同治

丹溪曰今世所谓风病大率与诸痿证袞同论治良由局方多以治风之药通治痿也古圣论风痿各有条目源流不同治法亦异夫风病外感善行数变其病多实发表行滞有何不可局方治风之外又历述神魂恍惚起便须人手足不随神志昏愤瘫痪痿痹曳手足筋衰眩运倒仆半身不遂脚膝软弱四肢无力颤掉拘挛不语语澁诸痿等证悉皆治之不思诸痿皆起於肺热传入五脏散为诸证其昏惑瘈瘲瞽闷瞽昧暴病郁冒蒙昧暴瘖瘈昧皆属於火曰四肢不举舌本强足痿不收痰涎有声皆属於土悉是湿热之病当作诸痿论治若以外感风邪治之宁免虚虚实实之祸乎若夫岐伯仲景孙思邈之言风大意似指外之感刘河间之言风明指内伤热证实与痿证所言诸痿生於热相合外感之邪有寒热虚实而挟寒者多内热之伤皆是虚证无寒可散无热当作实可泻

谨按中风之病古方冠诸方首以其为人之大病也夫风乃六淫中之一天之邪气自外而入者也古人用药皆是发散表邪通行经络之剂以其自表而入亦当自表而出也至於东垣分在经在腑在脏而有汗下调养之法可谓详备精密则又通表里中三法而治矣若刘河间以为热甚制金不能平木或湿土过甚反兼木化皆非外中於风乃因内热而生迥出前古之论我先师丹溪先生谓数千年得经意者河间一人耳由是观之若病从外邪而得元气壮实者当从古方发散之例但用药不宜小续命汤须分所挟有寒热温凉之异受邪有脏腑经络之殊若病因内热而生者当从刘河间之论但有用药不宜如子和专以吐汗下为法盖病邪有虚有实难一槩论又况痿病实与内热所生相同医者须宜识此或问外邪之感与内热之伤何者为多也丹溪曰西北气寒为风所中诚有之矣东南气温而地多湿有风病者非风也皆湿生痰痰生热热生风也经曰亢则害承迺制是也治痿之法详见痿条此不赘及

内因似中风论【续添】

卢砥镜曰经云神伤於思虑则内脱意伤於忧愁则肢废魂伤於悲哀则筋挛魄伤於喜乐则皮槁志伤於盛怒则腰脊难以俛仰也何侍郎有女适夫夫早世女患十指拳挛掌垂莫举肤体疮疡粟粟然汤剂杂进饮食顿减几於半载适与诊之则非风也正乃忧愁悲哀所致耳病属内因於是料内因药仍以鹿角胶辈多用麝香熬膏贴痿垂处渐得掌能举指能伸病渐近安谨按经云风之伤人也为病善行而数变变至他证之类故为治不得其病情者往往或以风为他证或以他证为风皆不免乎得失之诮惟近代河间东垣丹溪诸先生者出始论他证之非中风治法当异此又卢氏治例可谓深达病情之机者即河间所论五志过极为病之例非真中风也而王安道又曰人有卒暴僵仆或偏枯或四肢不举或不知人或死或不死者世

以中风呼之而方书亦以中风治之因尝考诸内经论风为诸证其卒暴僵仆不知人四肢不举者并无所论止有偏枯一语而已及观千金方则皆引岐伯之旨金匱要略具脉证邪在络在经入腑入脏之异由是观之则卒暴僵仆不知人偏枯四肢不举等证固为因风而致者矣乃用大小续命西州续命排风八风等诸汤散治之及近代河间东垣丹溪三子者出所论始与昔人有异河间主于火东垣主于气丹溪主于湿反以风为虚象而大异于昔人矣吁昔人之与三子者果孰是与果孰非与若以三子为是则三子未出之前固有从昔人而治愈者矣以昔人为是则三子已出之後亦有从三子而治愈者矣故不善读其书者往往不得其奥以余观之昔人与三子之论皆不可偏废但三子以类乎中风之病视为中风而立论故使後人狐疑而不能决殊不知因於风者真中风也因火因气因于湿者类中风而非中风也三子所论者自是因火因气因湿而为暴病暴死之证与风何相干哉如内经所谓三陰三阳发病为偏枯痿易四肢不举亦未尝必因於风而後然也夫风火气湿之殊望闻问切之间岂无所辨乎辨之为风则从昔人以治辨之为火气湿则从三子以治如此庶乎析理明而用法当矣惟其以因火因气因湿之证强引风而合论之所以真伪不分名实相紊若以因火因气因湿证分而出之则真中风病彰矣所谓西北有中风东南无中风者其然与否与斯辨诸子所论名实相紊而不明真中风之异可谓精切又何疑丹溪东南无中风之语哉夫风者天地之大气也五运之造化四时之正令耳上下八方无所不至者且人在气中形虚者即感之伤之中之有轻重不同实八风虚实之异耳矧有痿湿火热痰气虚诸证而似中风故古今治例不一是以徐先生折衷诸经之旨辨已上诸证不得与中风同治又岂惟三子所论哉然王氏以扩充其例因有是辨亦不害其为叮咛也余尝居凉州即汉之武威郡也其地高阜四时多风少雨土艺粟麦引泉灌溉天气常寒人之气实腠密每见中风或暴死者有之盖折风燥烈之甚也时洪武乙亥秋八月大风起自西北时甘州城外路死者数人余亦始悟经谓西北之折风伤人至病暴死之旨不诬丹溪之言有所本也人盖不经其所虽审经意故莫不有疑者也吁医之不明运气造化地理病机之微而欲行通变之法者难矣哉中风治法

发表之剂

金匱续命汤【千金名西州续命】治中风痲身不收口不能言冒昧不知痛处拘急不能转侧

麻黄【三两去节】 桂枝【去皮】 当归人参 石膏【碎绵裹】 炙甘草【各二两】

川芎【一两】 杏仁【去皮尖十四枚】 乾姜【二两】

右咀水煎

按心肺脾胃肝之药也又太阳经血气药也

千金大续命汤比前方无人参有黄芩荆沥【元戎作竹?】局方小续命汤【出千金】治卒暴中风不省人事半身不遂口眼喎斜手足战掉语言蹇澀神清气乱及治诸风【云云】

防己 肉桂【去粗皮】 杏仁【去皮尖炒黄】 黄芩 白芍 甘草【煨】 川芎

麻黄【去节】 人参【去芦各一两】 防风【两半】 附子【炮去皮脐半两】

右为粗末每三钱姜五片枣一枚煎

按心肺脾胃肝三焦命门药也

古今录验有白术无杏仁 救急无芎藭杏仁只十味 延年无防风
机要春夏加石膏知母秋冬加桂附 药

易老六经加减法【详见本方】

麻黄续命汤 桂枝续命汤 白虎续命汤 葛根续命汤 附子续命汤 羌活连翘续命汤

按续命汤治太阳外感风邪之药然外感挟寒者多故用桂枝等辈千金等方所收此类之药甚多无分经络不辨虚实寒热所谓虽多亦奚以为易老分六经庶乎活法也

丹溪曰局方比要略少当归石膏多防风附子防己果与仲景意合否也仲景谓汗出则止药局方则曰久服差又曰治诸风似皆非仲景意然麻黄防己可久服乎诸风可通治乎

局方排风汤治风虚冷湿邪气入脏狂言妄语精神错乱及五脏风发等证【详见本方】

白藓皮 当归【酒浸】 肉桂 白芍 杏仁 甘草【炒】 防风 芎藭 白术【各二两】 独活 麻黄【去根节】 茯苓【各三两】

右粗末每服三钱姜四片水煎

丹溪曰此云治邪气入脏而又曰风发又似有内出之意夫病既在五脏道远而所感深用麻黄以发其表宁不犯诛伐无过之戒乎

按此与小续命相类而无所发明因世俗用之故收入其余雷同发散风寒者并略去

宝监秦艽升麻汤治风寒客手足阳明经口眼喎斜恶风寒四肢拘急脉浮紧

升麻 乾葛 甘草 芍药 人参【各半两】 秦艽 白芷 防风 桂枝【各三钱】

右咀每一两连须葱白二根同煎

按此治风寒外入阳明经即小续命之变法也古人续命虽有加减之不同大抵多因太阳一经之药今特留此方以见风邪所伤有六经之异也

宝监不换金丹退风散热

羌活 川芎 白附子 乌头 藿香叶 蝎稍【各半两】 荆芥穗 天麻炙甘草
僵蚕【各一两】 薄荷【三两】 防风【一两】

右为末炼蜜丸弹子大每一丸细嚼茶酒任下涂咽喉处亦可

按古方治风解表多兼用热剂至守真开发凉剂始行然此等方极多姑存此以见意若防风通圣散治风热虽佳则又表里之剂也

攻里之剂

机要三化汤中风外有六经之形证先以加减续命汤治之内有便溺之阻隔者此方主之

厚朴 大黄 枳实 羌活【各八分】

右剉每服一两水煎

此治风邪入里之下药也即伤寒用承气之意非内实者不可

子和搜风丸治风热上攻眼昏耳鸣鼻塞头痛眩运痰逆涎嗽心腹痞痛大小便结滞

人参 茯苓 天南星 薄荷【各半两】 乾生姜 寒水石 生白?【各一两】

蛤粉 黄芩 大黄【各一两】 滑石 牵牛【各四两】 藿香【一分】 半夏【一两】

右为末水丸小豆大生姜汤下日三

按此方名为搜风其实乃下实热痰之药

发表攻里之剂

宣明防风通圣散治一切风热

防风 川芎 当归 芍药 大黄 芒硝 连翘 薄荷 麻黄【各半两】 甘草【二两】 石膏
桔梗 黄芩【各一两】 滑石【三两】 白术 山梔 荆芥穗【各半两】

一方去芒硝加牛膝人参半夏

右咀末生姜煎

按此乃肺脾膀胱胃肝心经之药也又表里血气之药也海藏云防风麻黄汗剂也大黄芒硝下剂也栀子滑石利小便也发表攻里合而并进故治杂病则佳治伤寒伤风有失仲景云发表攻里本自不同在大定间此药盛行於世而多效何哉当时虽市井之徒口腹备衣着全但志乐而形不苦然是凉亦多效而少失变乱之际蠶盐糟糠有所不充加以天地肃杀之运敢用凉药如平泰之世耶故多失而少效有如仲景用桂枝当汉之末也韩祗和戒桂枝当宋之隆时时世之异不可不知

川芎石膏汤治风热

防风通圣散去朴硝麻黄加人参寒水石甘菊砂仁

右为末水煎

按此乃通圣散加减药法刘张此等方极多兹不详录

调血养血诸剂

机要大秦艽汤治中风外无六经之形证内无便溺之阻隔知是血弱不能养於筋手足不能运口强不能语言宜养血而筋自荣也

秦艽石膏【各二两】甘草川芎当归芍药羌活独活防风黄芩白芷生地黄熟地黄白茯苓白术【各一两】细辛【半两】春夏加知母一两

右剉每服一两水煎天陰雨加生姜七片

羌活愈风汤疗肾肝虚筋骨弱语言难精神昏愦此药安心养神调陰阳无偏胜治中风内外无邪服此药以行中道

羌活甘草【炙】防风蔓荆子川芎熟地黄细辛枳殼人参麻黄甘菊薄荷枸杞当归知母地骨皮黄芪独活白芷杜仲秦艽柴胡半夏前胡厚朴防己【各二两】白茯苓黄芩芍药【各三两】桂【一两】生地黄石膏苍术【各四两】天陰雨加生姜

右每服一两水煎如微汗加麻黄如通利加大黄更有四时加减法

就以此汤咽下四白丹清肺养魄二丹元安神定志和血是动以安神静以清肺

天麻丸治风因热而生热胜则动宜以静胜其躁是养血也此药行荣卫壮筋骨

天麻 牛膝【各六两同酒浸三日焙乾】 萆薢【另研细】 玄参【各六两】 附子【一两炮】 杜仲【七两】 羌活【十四两或十五两】
生地黄【一斤】 当归【十两】 一方有独活五两去肾间风

右为细末蜜丸桐子大常服五七十丸病大至百丸空心食前温酒或白汤下良久则食服药半月後觉壅塞以七宣丸疎之

按己上三方东垣云调经养血安神之剂然风而挟虚理宜补养仲景治风虚脚气用八味丸略露端绪而世人莫能扩充之也局方骨碎补丸治肝肾风虚换腿丸治足三阴经虚專用疎通燥疾之药既失之矣此三方较之局方虽优亦所得不偿所失也何以为然秦艽汤愈风汤虽皆有补血之药而行经散风之剂居其大半将何以养血而益筋骨也天麻丸养血壮筋骨庶几近理

理气之剂

局方乌药顺气散治风气攻注四支骨节疼痛遍身顽麻及疔瘫痪语言蹇澁脚气步履艰难脚膝痿弱麻黄 陈皮 乌药【去木各二两】 白僵蚕【去丝髻炒】
乾姜【炮半两】 川芎枳殼【麸炒】 甘草【炒】 白芷 桔梗【各一两】

右为细末每服三钱水一盞生姜三片枣一枚煎服按严氏调气之设或出於此也太陰阳明气药也药性主治恐未必然

严氏八味顺气散

白术 白茯苓 青皮 香白芷 陈皮 乌药 人参【各一两】 甘草【炙半两】

右为末每服三钱水煎

按严氏谓真气虚而得此疾法当调气故用此药补虚行气虽此论迴出前人其用药则未也何者四君子补脾胃中气药也更用白芷去手阳明经风乌药通肾胃间气陈皮理肺气青皮泄肝气若风果在手阳明经而肝肺肾胃之气实者可用但人身经有十二皆能中邪五脏之气互有胜负此方安能尽其变乎又况真气先虚之人亦难用此也

理血之剂

良方治风六合汤治风虚眩运 机要同四物四两

秦艽一作防风 羌活

右粗末水煎服

愈风汤疗产後中风口噤手足痠痿如角弓状亦治血晕四支强直

荆芥【略炒为末】

右每服三钱豆淋酒调下用童便亦可其效如神

治妇人产後中风口吐涎手足痠痿

当归 荆芥【等分】

右为细末每服二分水一盏酒少许煎七分灌下之咽即醒

按风本阳邪故内经曰阳受风气又曰贼风虚邪者阳受之所以诸方皆用气分之药多血分之药少惟此二方以产後得疾多因血虚故专用行血之药通关透肌骨之剂

局方至宝丹疗卒中急风不语中恶气絶又疗心肺积热及小儿诸瘤急惊心热【详见本方】

安息香一两半为末以无灰酒搅澄飞过滤去砂石约取净数一两慢火熬成膏子

生乌犀角 生玳瑁屑 琥珀 朱砂雄黄【各一两】 龙脑 麝【各一分】 牛黄【半两】 银箔金箔【各五十片一半为衣】

右将生犀玳瑁为细末入余药研匀将安息香膏重汤煮凝成後入诸药和搜成剂入不津器中盛并旋丸如桐子大

牛黄清心丸治诸风痲痺不随语言蹇澁心怔健忘恍惚去来头目眩冒胸中烦郁痰涎壅塞精神昏愤【云云】

牛黄【一两二钱】 龙脑 麝香羚羊角末【各一两】 当归 防风黄芩 白术 麦门冬 白芍【各两半】 柴胡 桔梗 白茯苓 杏仁芎藭【各一两二钱半】 肉桂 大豆卷阿胶【各一两七钱半】 蒲黄 人参

神麴【各二两半】 雄黄【八钱】

甘草【五两】 白敛【七钱半】 乾姜【七钱半】 犀角末【二两】

乾山药【七两】金箔【一千二百片内四百片为衣】大枣【一百核蒸熟去皮核研烂成膏】

右为细末炼蜜与枣膏丸每两作一十丸用金箔为衣每服一丸温水化下食远服【详见本方】

发明云凡用丹剂者为风入骨髓不能得出故用龙麝牛雄犀珀珠金皆入骨髓透肌肤之剂使风邪得以外出也若中血脉中腑之病初不宜用龙麝牛黄恐引风入骨髓如油入麪莫之能出若中脏痰涎昏冒烦热者宜用之下痰镇坠清神

治痰通经诸方

局方青州白丸子治半身不遂口眼喎斜痰涎壅塞手足顽麻

半夏【七两水洗过生用】南星【三两生用】

川乌头【半两去皮脐生用】白附子【一两生用】

右制度丸法见局方

三生饮治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂并痰厥气厥

南星【一两生用】川乌【去皮生用】

附子【去皮生用各半两】木香【二钱半】

右每服五钱水二盏姜十片煎八分服

按中风之病多因痰得已上二方乃行经治寒痰之药也相类之方极多兹不再录

局方省风汤治中风口噤口眼喎斜筋脉挛急抽掣疼痛风盛痰实

防风南星【生用各四两】黄芩半夏【水浸洗生用】甘草【生用各二两】

右生姜煎汤滓每半两

按此治风痰挟热之药也

济生导痰汤治痰涎壅盛或胃膈留饮痞塞【方见痰门】按此治痰泄痞之药世俗用之者

衆姑存之

千金地黄煎治热风心烦闷及脾胃间热不下食生地黄汁 枸杞子汁【各二升】
生姜汁酥【各三升】 天门冬 人参【各半斤】 茯苓【六两】 荆沥【五升】 大黄
梔子【各四两】 竹沥【五升】

右十一味以五物为细末先煎地黄等汁成煎内药末调服方寸日再渐加至三以利为度

竹沥汤治四肢不收心神恍惚不知人不能言

竹沥【二升】 生葛汁【一升】 生姜汁【三合】

右三味相和温暖分三服

荆沥汤凡患风人多热常宜服此

荆沥 竹沥 生姜汁【各五合】

右三味相和温暖为一服

三因小竹沥汤治中风涎潮谵语昏塞四肢纵缓秦艽【去苗】 防风【去芦】
附子【炮去皮脐】

独活【各一钱】

右咀以水四盏煎至二盏入生地黄汁淡竹沥各半 再煎去滓分四服无时

丹溪曰竹沥本草言大寒其意以与石膏芩连同类而诸方治产後胎前诸病及金疮口噤与
血虚自汗消渴尿多皆是陰虚之病无不用之何世俗因其大寒二字弃而不用内经云陰虚
则发热夫寒而能补正与病对竹沥味甘性缓能除陰虚之有大热者大寒言其功也非以气
言也又况假火而成何寒之有按竹沥等方兼大黄附子者分寒热之异用兼荆沥者视痰气
之虚实葛汁秦艽独活地黄门冬等又随经而用也不可不知

杂方

衍义治风涎潮塞气不通

皂角【炙一两】 白?【生半两】 轻粉【半钱】

右末水调一二钱灌之须臾吐涎用?者分膈下涎也

易简稀涎散治中风四肢不收涎潮膈塞气闭不通

晋?【二两】猪牙皂角

右为细末每服一钱至二钱温水调下

宝监分涎散治中风涎潮作声不得口噤手足搐搦

藿香 乾蝎 白附 南星朱砂 膩粉 粉霜【各二两】

右研和匀每服一钱至二钱薄荷汤调下未吐利再服

千金藁耳散治诸风

右以藁耳叶曝燥为末酒调服方寸匕日三若吐逆者蜜和为丸服十丸准前汁一方寸匕日三

济生稀荳丸

右以稀荳草五月五日六月六日采叶九蒸九曝凡蒸用酒蜜酒晒乾为末蜜丸桐子大空心酒下百丸

圣惠方治中风口喎

巴豆七个去皮烂研如左喎涂右手心右涂左仍以煖水一 安向手心须臾便正洗去药频抽掣手中指

宣明防风天麻散治风麻痹走注肢节疼痛中风偏枯或暴瘖不语内外风热壅滞解昏眩西北方人多用之与後方同

防风 川芎 天麻 白芷小川乌 白附子 荆芥穗 当归甘草 羌活【各半两】滑石【二两】

右为末热酒化蜜少许调半钱加至一钱觉药力运行微麻为度或蜜丸弹大热酒化下一丸或半丸白汤化下亦得

经验如圣散治中风身体麻木走动眩运头疼牙关紧急手足搐搦涎潮闷乱及破伤风一切证

苍术【一斤】 川芎【八两】 细辛【四两】 防风白芷【八两】 草乌【四两】
川乌【五两】 天麻【二两】

右为末每服半钱或一钱温酒调下茶清亦得如风狗蛇蝎等所伤先用浆水口含洗净用此
贴上仍服之至效金疮血出不止贴上立定

灸法

风中脉则口眼喎斜 中腑则肢体废 中脏则性命危
凡治莫如以上发表调气血治痰诸法然此可扶持疾病若要收全功火艾为良也

灸风中脉口眼喎斜

听会二穴在耳前?者中张口得之有穴动脉应手颊车二穴在耳下二韭叶?者宛宛中开口
得之地仓二穴在横口吻旁四分外近下有脉微动者是凡喎向右者为左边脉中风而缓也
宜灸左喎?中二七壮

喎向左者为右边脉中风而缓也宜灸右喎?中二七壮

灸风中腑手足不遂等疾

百会一穴在顶中央旋毛中

肩髃二穴在肩端两骨间?者宛宛中举臂取之曲池二穴在肘外辅骨屈肘曲骨中以手拱胷
取之纹头陷中是

风市二穴在膝外两筋间平立舒下两手着腿当中指头者宛宛中

足三里二穴在膝下三寸胫骨外大筋内筋骨之间陷者宛宛中举足取之

絶骨二穴在足外踝上三寸动脉中

凡觉手足痹或不仁或痛良久乃已此将中腑之候宜灸此七穴病在左则灸右在右则灸左

灸风中脏气塞涎上不语昏危者下火立效

百会一穴如前

风池二穴在颞颥後髮际?中

大椎一穴在项後第一顙上?者是

肩井二穴在肩上?罃缺盆上大骨前一寸半以三指按之当其中指下陷者中举臂取之

曲池二穴如前

间使二穴在掌後三寸两筋间?中

足三里二穴如前

凡觉心中愤乱神思不怡或手足麻痹此将中脏之候不问是风与气可速灸此七穴但依次第灸之各五七壮日别灸之随年壮止如素有风人尤宜留意此灸法可保无虞此法能灸猝死经云凡人风发强忍怕痛不肯灸忽然猝死谓是何病风入脏故也

玉机微义卷一

卷二

钦定四库全书

玉机微义卷二 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

痿证门

诸痿因肺热相传

内经曰肺热叶焦五脏因而受之发为痿蹙心气热生脉痿故胫纵不任地肝气热为筋痿故宗筋弛纵脾气热生肉痿故痺而不任肾气热生骨痿故足不任身然治痿独取阳明阳明者五脏六腑之海主润宗筋宗筋主束骨而利机关也云云故阳明虚则宗筋纵带脉不引故足痿不用也【详见本文】

痿因内脏不足所致

陈无择云人身有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以成其形内则有肝心脾肺肾以主之若随情妄用喜怒劳逸致内脏精血虚耗使皮血筋骨肉痿弱无力以运动故致痿蹙状与柔风脚气相类柔风脚气皆外所因痿则内脏不足之所致也

痿因血少

原病式曰病痿皆属肺金大抵肺主气病则其气牖郁至於手足痿弱不能收持由肺金本燥燥则血液衰少不能营养百骸故也

治痿与治痺不同

张子和曰痿因肺热相传四脏其脉多浮而大今人便作寒湿脚气治之骤用燥药针艾汤蒸痿弱转甚此证与治痺颇异风寒湿痺犹可蒸汤燔灸惟痿因热而成若作寒治是杀之也

治痿大法

丹溪曰内经痿论肺热叶焦五脏因而受之发为痿蹙又曰诸痿皆属於土指病之本在肺也又曰昏惑又曰瘈瘲曰瞽闷曰瞽昧曰暴病皆属於火又曰四支不举曰舌本强曰足痿不收曰痰涎有声皆属於土又礼记注曰鱼肉天产也以养阳作阳德以为倦怠悉是湿热之病当

作诸痿治之何局方治风之方兼治痿者十居八九不思诸痿皆起於肺热传入五脏散为诸证大抵只宜补养若以外感风邪治之宁免实实虚虚之祸乎或曰诸风掉眩皆属於肝诸暴强直皆属於风至於振掉不能久立善暴僵仆皆以木病风者木之气何为皆属於火曰舌本强痰涎有声何为皆属於土痿论未尝言及而吾子合火土二家之病而又与倦怠并言总作诸痿治之何也予曰按原病式曰风病多因热甚俗云风者言末而忘其本也所以中风而有瘫痪诸证者热甚故也又病源曰脾之脉连舌本散舌下今脾湿受邪故舌强又河间曰胃膈热甚火气炎上故津液涌而为痰涎潮上因甚稠粘难出故作声也一以属脾一以属胃热谓之属火与上不亦宜乎或曰内经治痿之法独取阳明何也曰诸痿生於肺热只此一句便见治法大意经曰东方实西方虚泻南方补北方此固是就生剋言补泻而大经大法不外於此五行之中惟火有二肾虽有两水惟其一阳常有余陰常不足故经曰一水不能胜二火理之必然金体燥而居上主气畏火者也土性湿而居中主四支畏本者也火性炎上若嗜欲无节则水失所养火寡于畏而侮所胜肺得火邪而热矣木性刚急肺受邪热则金失所养木寡于畏而侮所胜脾得木邪而伤矣肺热则不能营摄一身脾伤则四支不能为用而诸痿之病作泻南方则肺金清而东方不实何脾伤之有补北方则心火降而西方不虚何肺热之有故阳明实则宗筋润能束骨而利机关矣治痿之法无出於此骆龙吉亦曰风火相炽当滋肾水东垣先生取黄柏为君黄芪等补药为辅佐而无一定之方有兼痰积者有湿多者有热多者有湿热相半者有狭寒者临病制方其善於治痿乎虽然药中肯綮矣若将理失宜圣医不治也但是患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也

谨按五痿等证内经特立篇目所论至详後代诸方独於此证槩多缺略考其由皆因混入中风条内故也丹溪先生痛千古之弊悯世之罹此疾者多误于庸医之手故叮咛告戒极其明白有志之士必当於此究心焉若夫陈无择谓痿因内脏不足所致诚得之矣然痿之所不足者乃陰也血也而诸方悉是补阳补气之剂能免实实虚虚之患乎且无择以二因立方可谓诸方之冠其余此证犹且未明况求之於他者乎

痿证治法

杂方

东垣清燥汤治湿热成痿以燥金受湿热之邪是絕寒水生化之源絕则肾亏痿厥之病大作腰以下痿软瘫痪不能动

黄芪【一钱半】 苍术【一钱】 白术 橘皮 泽泻【各半钱】 五味子【九个】 人参 白茯苓 升麻【各三分】 麦门冬 当归身 生地黄 麴末 酒黄柏 猪苓【各二分】 柴胡 黄连 甘草【炙各一分】

右咀每半两水煎空心热服

健步丸治膝中无力屈伸不得腰背腿脚沉重行步艰难

羌活 柴胡 炒滑石 甘草【炙】 瓜蒌根【酒洗各半钱】 防风【三钱】
泽泻【三钱】 酒苦参 川乌【各一钱】 肉桂【半钱】 酒防己【一两】

右为细末酒糊为丸桐子大七十丸空心煎愈风汤送下

三因加味四斤丸治肾脏肝虚热淫于内致筋骨痿弱不能胜持

苁蓉【酒浸】 牛膝【酒浸】 天麻 乾木瓜 鹿茸【燎去毛切酥炙】
兔丝子【酒浸软另研细】 熟地黄 五味子【酒浸各一分】

右为末蜜丸桐子大五十丸温酒米饮下食前按此方云热淫于内而用温补何也然陰血衰弱血不养筋筋缓不能自胜持阳燥热淫于内故用此养阳滋陰陰实则水升火降矣

玉机微义卷二

卷三

钦定四库全书

玉机微义卷三 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

伤风门

叙风之为病

内经曰风为百病之长又曰风胜则动又曰贼虚邪者阳受之又曰伤於风者上先受之

按风本阳邪故善动善变甚伤於阳者所以各从其类也

脉经云脉浮而大者风

伤寒论云太阳病脉浮而缓者名曰中风又云太阳中风阳浮而陰弱

论伤风与伤寒六经转变相同

陈无择云经曰春伤於风乃四时之序也或表中风在经络中循经流注以日传变与伤寒无异但寒泣血故无汗恶寒风散气故有汗恶风为不同仲景太阳经分伤寒伤风不同而後人纂集者不分门类但以伤寒暑湿时气疫疹凡太阳病皆谓之伤寒今别立伤风一门且依先哲以太阳经为始分注六经学者当自知按此分伤风六经用药可谓发诸家之未备在足太阳膀胱经用桂枝汤足阳明胃经用杏子汤足少阳胆经用柴胡加桂汤足太陰脾经用桂枝芍药汤足少陰肾经用桂附汤足厥陰肝经用八物汤其方以桂枝汤三味加以各经之药皆是辛温解散之剂然既云与伤寒转变相似此六方亦可以尽其变也学者当求仲景之法以调治之可也今不载其方【详见本文】

谨按伤风一证仲景与伤寒同论其药虽有麻黄桂枝之分至於传变之後亦未尝悉分之也诸家之论皆与感冒四气并中风条内衮同出治惟陈无择别立伤风一方在四淫之首且依伤寒以太阳为始分注六经可谓详密但以风本外邪诸方例用解表发表而治然受病之源亦有不同者且风为天地浩荡之气四时八风之变未尝无也然人亦未尝悉伤之也间有受伤者皆因不能法道清静腠理不密表上阳虚之所致也内经曰清静则内腠闭拒虽有大风苛毒弗之能害是也又有内挟痰热其气拂郁风邪易於外束者若表虚受风专用发表之药必致汗多亡阳之证若内挟痰热而受风者亦宜内外交治不可专於解表也或曰此云表虚

与成无已注伤寒中风表虚同与予曰不同也彼以太阳中风而於有汗无汗分虚实实者加麻黄虚者加葛根俱解表也此云表虚者当固守卫气而散风者也

伤风治法

辛温解表之剂

仲景桂枝汤治太阳经伤风自汗

桂枝 芍药【各三两】 甘草【一两】

右咀生姜三片枣一枚煎

按此发散足太阳经风邪之药也

局方神术散治伤风头痛鼻塞声重

苍术【五两】 藁本 白芷 细辛羌活 川芎 甘草【炙各一两】

右为末三钱水一盏姜三片葱三寸煎伤风鼻塞葱茶调下

按此足太阳少陰手阳明经药也

辛平解表之剂

消风百解散治头疼发热欬嗽鼻塞声重

荆芥 白芷 陈皮 麻黄苍术 甘草

右咀姜三片葱白三根煎

按此手太陰阳明经药也

川芎茶调散治诸风上攻头目昏疼鼻塞声重

薄荷【八两】 荆芥 川芎【各四两】 羌活白芷
甘草【各二两】 防风【一两半】 细辛【一两】

右为末每服二钱食後茶调下

按此足太阳少阴手太阴阳明厥阴经药也

消风散治诸风上攻头目昏眩项背拘急鼻塞声重及皮肤顽麻瘙痒瘾疹妇人血风

荆穗 甘草【炙】 陈皮【去白】 厚朴【各半两】 白僵蚕 人参 茯苓 防风 芎藭 藿叶
蝉蜕【去土炒】 羌活【各二两】

右为末每服二钱荆芥茶清调下疮癣温酒调下

金沸草散治肺经受风头目昏疼咳嗽声重涕唾稠粘荆芥穗【四两】 前胡【三两】
旋覆花【三两】 麻黄【三两】 甘草【炙】 赤芍 半夏【各一两】

右咀姜三片枣一枚煎服活人书减麻黄赤芍加细辛赤茯苓

按此手足太阴经药出阳明旋覆代赭石例解利痰饮之药也

辛凉解表之剂

柴胡升麻汤治头痛壮热恶风体疼鼻塞咽乾痰盛欬嗽涕唾稠粘

柴胡 前胡 黄芩【各六两半】

荆芥【七两半】 赤芍 石膏【各十两】 升麻【五两】 桑白皮 乾葛

右咀姜三片?十粒水煎

按此足少阳阳明经药也

辛凉解表攻里之剂

钱氏大青膏发散风邪

天麻【一钱】 麝【一字匕】

白附子末【生用一钱半】 朱砂【研一字】 青黛【研一钱】 天竺黄【一字?】

蝎尾【去毒生半钱】 乌梢蛇肉【半钱】

右同再研细生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子大月中儿粳米大大人弹子大同牛黄膏
温薄荷水化下一处服之

宣明防风通圣散 方见中风门

谨按伤风诸方俱是解表之剂盖以风从外入之邪也其所挟有寒热温凉之不同故此分辛温辛平辛凉之异然风虽外邪传变入里亦宜随证施治钱仲阳论伤风当发散者用大青膏解不散有下证者用大黄丸可谓得仲景之奥矣诸方於此俱未曾论及也又前论表虚受风与内挟痰热之方亦未详备学者当自求之所谓大黄丸亦附於後

大黄 黄芩

二味各等分水丸

玉机微义卷三

卷四

钦定四库全书

玉机微义卷四 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

痰饮门

痰饮脉法

要略云脉双弦者寒也皆大下後善虚脉偏弦者饮也肺饮不弦但苦喘气短
又云脉浮而细滑者伤饮脉弦数有寒饮冬夏难治
脉沉而弦者悬饮内痛其人短气四支历节痛脉沉者有留饮

陈无择云饮脉皆弦微沉滑 或云左右关脉大者膈上有痰也可吐之

病人百药不效关上脉伏而大者痰也眼皮及眼下如灰烟黑者痰也

仲景四饮

要略云四饮者悬饮留饮支饮痰饮是也其人素盛今瘦水走肠间沥沥有声谓之痰饮饮後
水流在脇下欬唾引痛谓之悬饮饮水流於四支当汗出而不汗身体重痛谓之溢饮欬逆倚
息短气不得卧其形如肿谓之支饮又有留饮者背寒如手大或短气而渴四支历节疼脇下
痛引缺盆欬嗽则转甚又有伏饮者膈满呕吐喘咳发则寒热腰背痛目泪出其人振振恶寒
身瞤惕病溢饮者当发其汗悬饮者法当下之痰饮者当以温药和之

按古方谓四饮生六证者即四饮加伏饮留饮也或云五饮者即留饮伏饮合为一证也三因
为痰饮用温药从小便去之支饮则随证汗下以补四饮之治法愚尝观仲景治饮诸方之意
在表者汗之在里者下之挟湿则分利之寒热温凉随其所属以治之何必拘此四证

痰分三因

陈无择云人之有痰饮者由荣卫不清气血浊败凝结而成也内则七情汨乱脏气不行郁而
生涎涎结为饮为内所因外则六淫侵冒玄府不通当汗不泄蓄而为饮为外所因或饮食过
伤色慾无度运动失宜津液不行聚为痰饮属不内外因其为病也为喘为欬为呕为泄为眩
晕嘈烦忪悸愆寒热疼痛肿满挛癖癰闭痞鬲如风如癰未有不由痰饮所致

按此分三因为病之状至为切当而其论中所引三因之药有外因而用里药者有内因而用表药者其意详见方後论中

论治痰理气之论

严氏云人之气道贵乎顺顺则津液流通决无痰饮之患古方治饮用汗下温利之法愚见不若以顺气为先分导次之气顺则津液流通痰饮运下自小便中出矣按严氏谓气顺则痰自下之说盖以人之七情郁结气滞生涎聚为痰饮治者能使气道通利则痰自降下也然有病人元有痰积其气因痰而结滞者岂但理气而痰能自行耶必先逐去痰结则滞气自行岂可专主一说又云人身无倒上之痰天下无逆流之水此乃齐东之语夫水性润下搏而跃之则可使过颚痰性顺下被火泛上亦可至巅今庸医莫察其义又每口诵以语人良可悲夫

论痰为诸病

王隐君论云痰证古今未详方书虽有五饮痰诸饮之异而莫知其为病之源或头风眩目运耳鸣或口眼蠕动眉棱耳轮俱痒或痛或四支游风肿硬而似疼非疼或为齿颊痒痛牙齿浮而痛痒不一或噫气吞酸心下嘈杂或痛或哕或咽嗑不利咯之不出咽之不下其痰似墨有如破絮挑胶蛭肉之状或心下如停冰铁心气冷痛或梦寐奇怪之状或足腕酸软腰肾骨节卒痛或四支筋骨疼痛难名并无常所乃至手麻臂疼状若风湿或脊上每日一条如线之寒起者或浑身习习如卧芒刺者或眼粘湿痒口糜舌烂喉痹等证或遶项结核状若瘰 或胸腹间如有二气交纽噎塞烦闷有如烟火上冲头面烘热或为矢志颠狂或中风瘫痪或劳瘵荏苒之疾或风毒脚气或心下怔忡如畏人捕或喘 呕吐或呕冷涎绿水黑汁甚为肺痛肠毒便脓挛跛盖内外为病百般皆痰所致其状不同难以尽述盖津液既凝为痰不复周润三焦故口燥咽乾大便秘面如枯骨毛髮焦槁妇人则因此月水不通若能逐去败痰自然服饵有效余尝用一药即袞痰丸以愈诸疾不可胜数矣今特相传於世云

脉经云病人一臂不遂时复移在一臂其脉沉细非风也必有饮在上焦

活人书云中脘有痰亦令人憎寒发热恶风自汗胸膈痞满有类伤寒但头不痛项不强为异

按所叙病证患者十居八九足见痰之为病诚多也何则人血气流行无一息间断才有壅滞津液凝闭郁而成热痰遂生焉人於六淫七情饮食起居之际岂能一一中节而无所壅滞乎故余特叙脉经活人二条以证隐君之说有所本也但所制袞痰丸一方难以通治诸疾

论饮专主於湿

原病式曰积饮留饮积蓄而不散也水得於燥则消散得湿则不消以为积饮土湿主痞故也

论痰证有五

子和云凡人病痰者有五一日风痰二曰热痰三曰湿痰四曰酒痰五曰食痰盖风痰者形寒饮冷热痰者火盛制金湿痰者停饮不散酒痰食痰者饮食过伤所致按痰乃积饮所化故原病式列於太陰湿土之条又子和有五痰之说盖其实一出於湿而所挟所因有五者之异故王隐君之方书论痰有五曰风痰寒痰热痰气痰味痰夫味痰者因饮食酒醪厚味而然也气痰者因事逆意而然也热痰者因饮食辛辣炙煨重厚服而然也寒痰者因冒寒凉而然也风痰者因感风而发或风热拂郁而然也此皆素抱痰气因风寒气热味而作非别有此五种之痰也愚谓治法当以痰为本以所挟之气为标也

论痰清浊

王隐君云论痰清白者为寒黄而浊者为热殊不知始则清白久则黄浊清白稀薄渍於上黄浊稠粘凝於下嗽而易出者清而白也欬而不能出则黄浊结滞者也若咯唾日久湿热所郁上下凝结皆无清白者也甚至带血血败则黑痰为关格异病人所不识又清白者气味淡日久者渐成恶味酸辣腥臊焦苦不一

按此以痰之新久分清浊可谓得病机之情矣当去水温补转剧论

子和云留饮一证也古人有四饮五饮之分皆观病之形状而定名也予论饮之所得其来有五有愤郁而得之者有因乏而得之者有思虑而得之者有痛饮而得之者有热而伤冷得之者饮证虽多其因无出於此夫水陰物也但积水则生湿停酒则发燥久则成痰在左脇者同肥气在右脇者同息贍入肺则多嗽入大肠则为泻入肾则为涌水在太阳则为支饮皆由气逆而得之故在上则面浮在下则浮肿在中者支满痞膈痰逆在阳不去者久则化气在陰不去者久则成形今之用方者例以饮为寒积皆用温热之剂以补之燥之水湿未除反增心火况留饮无补法气方补则转增岂知内经所谓留者攻之也且白术参苓服之尚加闭塞况燔针艾火其痞可知前人处五饮丸用矾石巴豆乌附虽是下攻终同燥热今刘河间以十枣汤加大黄牵牛制三花神佑丸新得之疾服之气流饮去而愈昔有病数年不愈予诊之左手皆微小右手皆滑而大微小为寒滑大为燥以瓜蒂散涌其寒痰数升汗出如沃次以导水丸禹功散去肠中燥垢亦数升其人半愈然後以痰剂流湿降火开其胃口不踰月而差

按此论饮乃水湿所为发为诸证不宜温补可谓详明但专以三花神佑丸为说则失之太峻也【详见总论中】

论局方用热药治诸气痰饮呕吐膈噎之误

丹溪曰夫气之初病也其端甚微或因饮食不谨或外触风两寒暑或内感七情或食味过厚偏助阳气蘊为膈热或资稟充实表密无汗津液不行清浊相干气为之病或痞或痛或不思食或噫腐气或吞酸或嘈杂或膨满不求病原便认为寒遽以辛香燥热之剂投之数贴时暂得快以为神方厚味仍前不节七情又复相仍旧病被劫暂开浊液易於攢聚或半月或一月前证复作如此延蔓自气成积自积成痰此为痰为饮为吞酸之由也良工未遇谬药又行痰

挟瘀血遂成窠囊此为痞为痛为呕以为噎膈反胃之次第也饮食汤液滞泥不行渗道蹇濇大便或秘或溏下失传化中焦愈停医者不察犹执为冷翻思前药随手得失至此宾主皆恨药欠燥热颀俟久服可以温脾壮胃消积行气以冀一旦豁然之效不思胃为水穀之海多血多气脾为消化之器气清和则健而运行不息今久得香热之味偏助气血沸腾其始也胃液凝聚其久也脾气耗散传化渐迟医者又曰虚而积寒非寻常草木可疗径以乌附助佐丹剂专意服之积而久也血液俱耗胃脘乾槁遂成噎膈亦曰反胃仲景论饮有六分别五脏诸证可表者汗之可下者利之滞者导之郁者扬之热者清之寒者温之偏热偏寒者反佐而行之挟湿者淡以渗之挟虚者补而养之治法至矣第恨医者不善处治病者不守禁忌遂使药助病邪展转深痼去生渐远深可哀悯按此论呕吐痞满噎腐吞酸噎膈反胃致病之由皆以气之初病误服燥热结为痰饮所致故列於痰饮门中而於彼诸证内不详载宜於此通考焉

谨按痰之为病仲景论四饮六证无择叙内外三因俱为切当盖四饮则叙因痰而显诸证者三因则论其因有所伤而生痰者也唯王隐君论人之诸疾者悉出於痰此发前人所未论可谓深识痰之情状而得其奥者矣制袞痰丸一方总治斯疾固为简便较之仲景三因有表里内外而分汗下温利之法则疎濶矣况又有虚实寒热之不同者哉夫痰病之原有因热而生痰者亦有因痰而生热者有因风寒暑湿而得者有因惊而得者有因气而得者有因酒饮而得者有因食积而得者有脾虚不能运化而生者若热痰则多烦热风痰多成瘫痪奇证冷痰多成骨痹湿痰多倦怠软弱惊痰多成心痛癫疾饮痰多成脇痛臂痛食积痰多成癖块痞满其为病状种种难名王隐君论中颇为详尽学者但察其病形脉证则知所挟之邪随其表里上下虚实以治也若夫子和谓饮无补法必当去水故用吐汗下之三法治人常愈又论热药治痰之误固为精切亦有挟寒挟虚之证不可不论夫久痰凝结胶固不通状若寒凝不用温药引导必有拒格之患况有风寒外束痰气内郁者不用温散亦何以开郁行滞也又有血气亏乏之人痰客中焦闭塞清道以致四支百骸发为诸病理宜导去痰滞必当补接兼行又难拘於子和之三法也大凡病久淹延卒不便死者多因食积痰饮所致何以然盖胃气亦赖痰积所养饮食虽少胃气卒不便虚故也亦有治痰用峻利过多则脾气愈虚津液不运痰反又生而愈盛法当补脾胃清中气则痰自然运下此乃治本之法世谓医中之王道者正此类也论痰证有似邪祟【详见补虚门】

痰饮治法

解表之剂

仲景大青龙汤

小青龙汤并治溢饮者当发其汗二方并见伤寒门按二方太阳经发散风寒之药辛温之剂也小青龙用乾姜细辛半夏以治水气盖伤寒表未解心下有水饮水寒相搏乃为喘欬诸证故用此发汗散水金匱要略借为治饮之方也

三因参苏饮治痰积停积胸膈中脘闭呕逆痰涎眩暈嘈烦或头痛发热状如伤寒【方见局

方】

按此出少阳柴胡例药治感冒异气挟痰饮之病本方云前胡葛根但能解肌枳壳橘红辈自能宽中快膈毋以性凉为疑愚观药性非凉亦是辛平之剂

局方金沸草散治风化痰除头项强寒热欬嗽

旋覆花 荆芥 麻黄【去节】 前胡【各一两】 甘草【炙】 赤 半夏【制各三钱】

右咀姜枣煎 活人金沸草散去麻黄赤 加茯苓细辛

按此出阳明旋覆花代赭石例解利治痰之药也局方气味辛平活人则辛温

攻下之剂

金匱十枣汤治悬饮内痛

芫花【熬】 甘遂 大戟【各等分】

右捣筛以水一升半煮大枣十枚至八合去粗内药末强人一钱匕羸人半钱平旦服之不下更加半钱快下後以糜粥自养

按此出少阴水气例药芫花之辛以散饮二物之苦以泄水甘遂直达水气所结之处乃泄水之圣药性有毒不可轻用下同

三因控涎丹凡人忽患胸背手足颈项腰胯隐痛不忍筋骨牵引钩痛时时走易不定乃是痰涎在心膈上下变为此疾或手足冷痺气脉不通误认瘫痪非也甘遂【去心】

紫大戟【去皮】 真白芥子【各等分】

右为末糊丸桐子大晒乾食後临卧淡姜汤或熟水下五七丸至十丸痰猛加丸数

一方妙应丸亦只上三味

惊痰加朱砂 痛者加全蝎

酒痰加雄黄全蝎 臂痺加木鳖子【去油殼】 惊气成块者加穿山甲鳖甲玄胡索蓬术

热痰加盆硝 寒痰加丁香胡椒桂

宣明三花神佑丸

十枣汤加牵牛大黄轻粉【详见下剂】

按以上二方仍十枣汤加减法也并出少陰水气例前方去芫花加白芥子本草主上气发汗胸膈痰冷盖胸有痰非此不达此方加牵牛大黄大泻血气之湿热而轻粉又去涎积也虚家不可轻用

金匱厚朴大黄汤治支饮脇满者

厚朴【一尺】 大黄【六两】 枳实【四枚】

右水五升煮二升温服

按此即小承气汤阳明可下例药也

王隐君袞痰丸

括曰甌里翻身甲挂金于今头戴草堂深相逢二八求斤正硝煨青礞倍若沉十七两中零半两水丸桐子意常斟千般怪证如神效水泻双身却不任按此以大黄黄芩为君大泻阳明湿热之药礞石以坠痰沉香则引诸气上而至天下而及泉为使也有实热者可用

脾胃论蠲饮枳实丸逐饮消痰导滞清膈

枳实 半夏 陈皮【去皮各二两】 黑牵牛【半斤取末二两】

右末水煮麴糊丸桐子大每五十丸姜汤下

瑞竹堂方神仙坠痰丸

皂角不蛀者【去皮弦酥炙黄色去子净一两六钱】 黑牵牛【一斤取头末四两】 生白矾【一两二钱】

右为细末清水丸桐子大每五十丸空心温酒下

宝监大利膈丸风痰实满喘嗽风气上攻

黑牵牛【四两生用】 半夏 皂角青皮【各二两】 槐角【一两炒】 木香【半两】
加?榔大黄【各五钱】

右为细末姜汁糊丸桐子大食後姜汤下五十丸

涤痰丸治三焦气塞下痰饮酒食

黑牵牛【二两炒取末】 木香?榔青皮 陈皮 三棱 大黄【煨】 枳殼 半夏【各一两】

右末糊丸桐子大每服五十丸食後姜汤下

按以上四方所用牵牛皂角木香?榔者并出厥陰例药也牵牛以大黄引之则入血以诸气药引之则入气本泻气中湿热之药大能脱人元气用者戒之

透罗丹治痰实欬嗽胸膈不利

皂角【酥炙去皮弦一两】 黑牵牛【微炒一两】 杏仁【麯炒黄去皮尖一钱】 巴豆【去油另研一钱】 半夏【一两】 大黄【一两纸裹水浸慢火焙乾】

右为细末生姜自然汁为丸桐子大食後姜汤下三十丸

按此仲景备急丸加减法也破坚积结聚寒热兼用之药也

三因破饮丸治五饮停蓄结为症癖支满胸脇抢心疼痛

毕拔 丁香 胡椒 砂仁 青皮 乌梅肉 巴豆【去皮】 木香 蝎稍【各等分】

右以青皮同巴豆浆水浸一宿次日漉出同炒橘皮焦去巴豆将所浸水淹乌梅肉炊一熟饭细研为膏如菉豆大每服五十丸临卧姜汤下津咽亦得按此破坚积寒癖大热之药也

局方妙香丸治一切久远沉积

巴豆 膩粉 硃砂 朱砂

牛黄 水银 脑麝

右分两修制见本方

按此用巴豆?砂削坚破癖加以脑麝等辛香飞窜通达五脏入骨透肌之药也

钱氏白饼子

巴豆【二卜四个去皮膜水一斗煮水尽为度】半夏【汤浸七次焙为末】轻粉滑石天南星【各一钱】

右研匀巴豆後入衆药以糯米饭为丸小豆大捻作饼子煎葱白汤下

按此钱氏用治小儿风痰惊涎癲癇惊搐下痰之药也以上所用巴豆等方盖以痰饮癖积结聚坚固非此不能除故易老号斩关夺门之将然大宜详审不可轻用

古方巴豆加減寒热温凉五色佐使之药甚多用之各随其宜【并见元戎】

吐剂

仲景瓜蒂散

子和三圣散【并见吐剂】

稀涎散

猪牙皂角 礞石 晋矾 藜芦

元戎胜金丸

薄荷 瓜蒂 藜芦 朱砂猪牙皂角

按以上用瓜蒂药并出三阳可吐药例古今吐法以病在头或在胸中但在上焦者皆可用也在经络者亦可用吐法中就有发散之义焉诸亡血虚家不可用此

分利之剂

仲景五苓散治瘦人脐下悸吐涎沫而癲眩者水也【方见湿门】

治湿和中之剂

金匱苓桂术甘汤治心下有痰饮胸脇支满目眩茯苓【四两】桂枝白术【各二两】甘草【二两】

右水六升煮取三升三服小便即利

按此太阳经药也

茯苓汤治胸中有痰饮自吐出水後心胸间虚气满不能食消痰气令能食

茯苓 人参 白术【各三两】 枳实【二两】 橘皮【二两半】 生姜【四两】

右水六升煮取一升八合分温三服

按此足太陰阳明经药也

枳术汤治心中坚大如盘水饮所作【方见水气门】按此足太陰阳明经药也

泽泻汤治心下有支饮其人苦眩冒

泽泻【五两】 白术【二两】

右以水二升煮取一升分温再服

按此足太陰阳明太阳少陰经药也

小半夏汤治心下水支饮呕吐不渴

半夏【一升】 生姜【半斤】

右以水七升煮取一升半分温再服

按此足太陰阳明经药也

小半夏加茯苓汤治卒呕吐心下痞隔间有水眩悸者三因名半夏汤

半夏【一升】 生姜【半斤】 茯苓【三两】

右同煎服如前

按此足太陰阳明太阳手太陰经药也

按以上诸方并出太陰痰饮例药也白术除湿益燥和中益气半夏治寒痰和胃胜湿茯苓泽泻逐水利小便上下分消其湿也

局方橘皮半夏方【方见本方】

局方二陈汤治痰饮为患呕吐恶心头眩心悸等证【方见本方】

桔梗半夏汤治胸痞痰涎不利气逆呕哕

桔梗 半夏 陈皮

右等分细末生姜水煎姜糊丸亦可加枳实减半名桔梗汤

严氏导痰汤治一切痰饮头目眩晕或痰饮留积不散【方见本方】

右剉姜煎

按以上所用橘半等乃足太陰阳明经药也出太陰呕哕例

许学士神术丸治痰饮

茅山苍术【一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾为末】生油麻【半两水二盞研细取浆】

大枣【十五个煮取肉研旋入麻浆拌和药】

右末为丸桐子大日晒乾每服五七十丸温酒空心下

按此足阳明太陰经药治湿发散之药也

仁斋加味二陈汤治痰攻眼肿痛并酒家手臂痛重成麻痹

二陈汤中加苍术片子姜黄制枳殼各少许

芎夏汤逐水利饮

二陈汤加川芎白术青皮枳殼

右剉姜五片煎盖川芎半夏能逐水也

按此二方乃二陈汤加苍术川芎等药是亦治湿帶表之药也

治风痰之剂

局方青州白丸子【方见小儿门】

按此足太陰经药出厥陰例治风痰行经通痹之热药也

局方玉壶丸

南星 半夏 天麻 白麴

辰砂化痰丸

南星 半夏 辰砂 白矾

右主治修制并见本方

易老水煮金花丸治风痰脉弦欬嗽

南星 半夏【各一两生用】 天麻【五钱】 白麴【三两】 雄黄【一钱】
寒水石【一两烧存性】

右为细末滴水为丸小豆大每服五七十丸至百丸煎浆水沸下药煮浮为度漉出淡浆水浸
另用生姜汤下或通圣加半夏局方川芎丸防风丸皆可用也按以上三方并出太陰呕哕例
治痰挟风之凉药也

良方天南星丸治妇人风疾

半夏麴【一两】 天南星【一两炮】 晋矾【半两枯】

白附子【炮】 皂角仁【炒黄各一两】

按此足太陰厥陰经药也

热痰之剂

仲景小?胸汤

半夏 黄连 括萎实

右先以水二 煎括萎实至一 半下诸药煎八分温服未利再服

严氏半夏丸治肺热痰嗽

瓜蒌仁【另研】半夏【汤洗焙各一两】

右件和匀姜汁打糊丸

按此小?胸加减法也

机要小黄丸治热痰

人参 黄芩 南星 半夏生姜

右姜汁糊为丸 一方南星半夏黄芩只三味

宣明茯苓半夏汤治风热痰涎

二陈汤中加黄芩

按此手足太陰经药也

人参半夏丸化痰治涎止欬定嗽诸痰不可尽述人参 茯苓 南星【各半两】半夏乾生姜
生白矾 寒水石【各一两】

薄荷叶【半两】蛤粉【二两】藿香叶【一分】

一法加黄连【半两】黄栢【二两】

右为末麴糊丸如小豆姜汤下二三十丸食後治寒痰之剂

深师消饮丸治停饮胸满呕逆腹中水声不思饮食白术【二两】枳实【炒】
乾姜【各七钱】茯苓【半两】

右细末蜜丸桐子大温水下三十丸

宝监温胃化痰丸治膈内有寒脾胃伤饮胸膈不快痰涎不已

陈皮 乾姜 白术【各一两】半夏【三两】

右为末姜汁糊丸桐子大姜汤下二十丸

局方温中化痰丸治停痰留饮

青皮 良姜 乾姜 陈皮

右主治修合见本方

局方丁香五套丸治脾胃虚弱不能宣行水谷故为痰饮结聚胸膈呕吐不食【方见本方】

按以上诸方乃温胃燥湿治寒痰温里之药也若久痰凝滞内蕴湿热悞服燥热多成吞酸膈噎等病用者审之

发明半夏温肺汤治中脘痰水冷氣心下汪洋嘈杂多唾清水脇胀不食此胃虚冷所致其脉沉弦细迟旋覆花 细辛 桂心 人参甘草 陈皮 桔梗 芍药半夏【各半两】 赤茯苓【三分】

右咀四钱姜七片煎

丁香半夏丸治心下停饮冷痰

诃榔【三分】 丁香 半夏【各一两】 细辛乾姜 人参【各半两】

右细末姜汁糊为丸每服三十丸姜汤下

机要姜桂丸治寒痰

南星 半夏 官桂【各一两】

右细末糊丸桐子大每服五七十丸姜汤下

按以上三方治寒燥痰温中散表寒之药也

理气之剂

局方四七汤治七情气鬱结聚痰涎状如破絮或如梅核在咽喉之间咯不出咽不下并治中脘痞满痰涎壅盛上气喘急

紫苏叶【二两】 厚朴【三两】 茯苓【四两】 半夏【五两】

右剉生姜枣煎服

百一选方三仙丸治中脘气滞痰涎不利

南星 半夏【各五两用姜汁作麴】 香附【五两】

右末糊丸桐子大每服四十丸姜汤下

机要去香附加橘皮名玉粉丸治气痰

指迷茯苓丸治中脘留伏痰饮臂痛难举

半夏【二两】 茯苓【一两】 枳壳【炒半两】

风化硝【二钱半】

右末姜汁糊丸姜汤下三十丸

按以上三方用南星半夏所以胜痰而兼用诸气药即严氏顺气则痰自下之意然紫苏枳壳肺气药也厚朴脾胃气药也香附肝气药也随脏气而用不可不分

降气坠痰温补之剂

局方苏子降气汤治虚阳上攻气不升降上盛下虚痰涎壅盛

俞山人降气汤治同前

黑锡丹治痰气壅盛上盛下虚心火炎炽肾水枯竭灵砂丹治上盛下虚痰涎壅盛此药最能鎮坠升降陰阳【四方并见本方】

按以上诸方并系类聚温热之药而出证皆云治上盛下虚气不升降夫所谓盛者即心火之炎虚者即肾水之弱火炎水弱则有升无降故津液涌而为痰涎於上今以金石丹药湿热香燥之药而欲补下焦之虚如抱薪救火尔若以为下焦阳虚而议治者亦非也夫阳火之虚则陰水必盛痰涎津液自然随气而降又何必用此药也

金匱肾气丸治短气有微饮当从小便去之【方见补虚门】按仲景以肾虚有饮故用此补肾逐水以其中有泽泻茯苓故也而严氏以此方治肾虚寒而不能摄养肾水使邪水溢上多吐痰唾夫肾既虚寒则阳火必盛未审所錄摄养肾水者何物耶夫肾水乃天一所生人之根蒂痰涎乃津液败浊而成岂可直指肾水不摄而邪水溢上耶若云肾水虚弱陰亏难降使津液败浊而为痰水故用此药於义则明白矣

谨按痰病多生於湿故古方多用南星半夏之类然亦有所挟之邪故药有风寒暑湿之异又人身体段有上下表里故在表者汗之在里者下之在上者涌之在下者分利之治饮之法可

谓详矣或曰陈无择以大小青龙五苓承气为外因参苓八味参苏为内因十枣葶苈大小半夏控涎破饮为不内外因今吾子所编诸方意不侔此何也予曰大小青龙外因之表药五苓承气外因之里药也参苓八味内因之里药参苏饮内因之表药也十枣葶苈控涎破饮不内外因之下药也大小半夏不内外因和中药也彼以三因立论故叙药止以所因为主而不分其表里内外之异今予以表里内外分类诸方则难拘其所因也

玉机微义卷四

卷五

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷五 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

滞下门

肠澼生死脉法

内经曰肠澼便血身热则死寒则生肠澼下白沫脉沉则生浮则死肠澼之属身不热脉不悬絶滑大者生悬澹者死以脏期之又曰阴阳虚肠澼死又曰泄而脱血脉实皆曰难治

按此云生死亦是大槩言之必须更兼证以详审之下同

脉经云肠澼下脓血脉沉小流连者生数疾且大有热者死又肠澼筋挛其脉小细安静者生浮大紧者死严氏云凡下利之脉微小者生浮洪者难治肠澼下脓血者脉宜滑大若弦急者死

仲景治痢大法

下痢脉沉弦者下重脉大者为未止脉微弱数者为欲自止虽发热不死下痢手足厥冷无脉者灸之不温若脉不还反微喘者死

下痢有微热而渴脉弱者令自愈下痢脉数有微热汗出令自愈设脉紧为未解

下痢脉数而渴者令自愈设不差必清脓血以有热故也下痢反弦发热身汗者自愈

下痢气蔽者当利其

小便 下痢腹胀满身体疼痛先温其里乃攻其表温里宜四逆攻表宜桂枝汤

下痢脉滑而数者有宿食也当下之

下痢脉迟而滑者实也痢为未止急下之下痢脉反滑当有所去下之安

下痢不欲食有宿食者当下之 下痢腹满痛为寒实当下之 下痢腹坚者当下之

下痢谵语有燥屎当下之 下痢三部脉皆平按之心下坚急下之

下痢已差至其时复发者此为下未尽更下之安

下痢脉大浮弦下之当自愈风寒下痢者不可下下後心下坚痛脉迟此为寒宜

温之下痢脉浮大此为虚强下之故也设脉浮革者因而肠鸣当温之
下痢脉迟紧痛未欲止当温之下痢心痛急当救里可与理中四逆附子辈
下痢大孔痛宜温之

按丹溪曰仲景治痢可下者十法可温者五法或解表或利小便或待其自己区别易治难治
不治之证至为详密但与泄痢衮同立论而未分今载於滯下门内故於泻痢条内不载宜於
此通考焉

东垣治痢法

病机机要云後重则宜下腹痛则宜和身重则除湿脉弦则去风脓血稠粘以重剂竭之身冷
自汗以毒药温之风邪内缩宜汗之鹜溏为利当温之又云在外者发之在里者下之在上者
涌之在下者竭之身表热者内疏之小便濇分利之又曰盛者和之去者送之至者止之兵法
曰避其锐气击其惰归此之谓也

秘藏云假令伤寒饮食?胀满而传殄泄者宜温热之剂以消导之伤湿热之物而成脓血者宜
苦寒之剂以內疏之风邪下?者升举之湿气内胜者分利之里急者下之後重者调之腹痛者
和之洞泄肠鸣无力不及拈衣其脉弦细而弱者温之收之脓血稠粘至圉而不能使其脉洪
大而有力者寒之下之

按此分风寒湿热表里温补寒下等治至为切当学者尤宜熟玩但其里急後重腹痛之义未
详今别论於左

太陰受湿传肾为脓血痢

机要云有太陰经受湿而为水泄虚滑身重微满不和谷味久则防变而为脓血脾经传肾谓
之贼邪故难愈者若先利而後滑谓之微邪故易痊此皆脾土受湿之所为也

再有风寒二证在泄痢条下

论风寒暑湿皆能作痢

陈无择云滯下之证内经所载血溢血泄血便注下古方则有清脓血近世呼为痢疾其实一
也多由脾胃不和饮食过度停积於肠胃不能剋化又为风寒暑湿之气干之故为此疾伤热
则赤伤冷则白伤风则纯下清血伤湿则下如豆汁冷热交并赤白兼下治法当先用通利之
药疎涤脏腑

严氏云以巴豆等剂推其积热後辨以冷热风湿之证用药调治热赤者清之冷白者温之伤
风而下清血者则祛逐之伤湿而下豆汁者分利之冷热相并温凉以调之仍须先调胃气切

不可骤用罌粟诃子之药止之澁之使停滯不泄多致危殆

按赤白分冷热之说河间论之甚详其云风下清血湿下豆羹汁者盖谓风喜伤肝肝主血故下清血者为风也湿喜伤脾胃为五谷之海无物不受常兼四脏盖豆汁之色如五色之相杂故下豆羹汁者为湿也又云治法当先通利此迎而夺之之义若有虚者亦宜审之使果有积滯在肠胃者方所当通利然严氏谓巴豆等药使用之於伤冷物则可若用之於热者为害非轻又云风则祛逐所谓祛逐者果何法何药与若以邪气当祛逐则岂独於风而寒湿热为不可耶此又失於明白

论滯下分三因

陈无择云古方风停肤腠下瘀血或下鲜血湿毒下如豆羹汁皆外所因之明文也古方有五泄因脏气郁结随其所发使利脓血作青黄赤白黑色一一不同即内所因也又饮食冷热酒醴醢醢纵情恣慾房室致伤精血肠胃粘滯久积冷热遂成毒痢皆不内外因治之先推其岁运以平其外察其郁结以调其内审其所伤以治不内外条然明白不致妄投也

按此所分三因治法其理甚当但外因六淫所伤者古方用药则多有之内因脏气郁结与夫饮食房劳而得者诸方则未之见也凡三因所伤皆能干犯肠胃而为痢今陈无择立论有三因之分而用药无三因之别此又所当分而治者失於开示焉

时疫作痢

大全良方云有一方一家之内上下传染长幼相似是疫毒痢也治法虽当察运气之相胜亦不可狎泥当先察其虚实冷热首用败毒散加人参甘草陈皮随证用之

按时疫作痢岁常有之其谓当察其运气之相胜与病冷热虚实之不同诚为确论盖欲学者知五运六气有太过不及胜负之不同以分风寒暑湿燥火为病而平治之也然首专用败毒散之义何其自狎泥也

论食毒作痢

陈无择云饮服冷热酒醴醢醢肠胃粘滯久积冷热遂成毒痢

严用和云或有饮服冷酒寒物房室劳伤精血而成久毒痢则宜化毒以保卫之

按人之饮食过伤恣食辛热寒冷之物皆能致伤肠胃肠胃一伤不能运化传送遂蓄积停滯而为痢经日饮食不节起居不时者陰受之陰受之则入五脏满闭塞下为飧泄久为肠澼是也治法当先消化食毒或可攻伐然後随寒热温凉以调之此二论本诸内经而世所未言者也

论里急後重

病机云里急後重脉大而洪实为里热甚而闭是有物结坠也若脉浮大甚不宜下虽里急後重而脉沉细弱者谓寒在内而气散也可温养自愈里急後重闭者大肠经气不宣通也宜加?榔木香宣通其气原病式云下迫後重里急窘迫急痛也火性急速而能燥物故也按里急者窘迫急痛是也後重者大肠坠重而下也夫里急後重其证不一有因火热者所谓火性急速而能燥物是也有因气滞此大肠经气壅而不宣通也有因积滞壅盛者是有物结坠也有气虚者此大肠气降而不能升也有血虚者所谓虚坐努责是也治法火热者寒之清之气滞者调之积滞者去之虚而降者升之举之血虚者补之各察其所因也切观前论未为详尽

论泄痢而呕

病机云如痢或泄而呕者胃中气不和也上焦不和治以生姜橘皮中焦不和治以芍药当归桂茯苓下焦不和而寒治以轻热甚以重热药

按此云泄痢而呕谓胃气不和所致盖亦有胃中火逆冲上而呕者有胃虚而呕者有积滞毒气上攻而呕者有陰虚而呕者岂可一於胃气之不和而不他及耶

论泄痢腹痛

机要云腹痛者和之如发热恶寒腹不痛药加黄芩为主腹痛甚者加当归倍芍药

按泄痢腹痛其证甚多皆因内气郁结不行所致理宜行气散郁为先然亦有挟寒有挟火热者有因积滞者有血虚者又宜随证处治为当也今机要云和之一字总言之耳盖加当归倍芍药之法惟血虚可用

论禁口痢

百一选方云禁口痢是毒气上冲心肺所致用石莲肉以通心气

按痢而能食知胃未病也若脾胃湿热之毒薰蒸清道而上以致胃口闭塞而成禁口之证理宜除胃口之邪热而此云毒气上冲心肺其毒不知指何者之邪然亦有脾胃虚而得者亦有误服利剂药毒犯胃者又有服瀉热之剂太早而邪气闭遏於胃口者必当求责

论下痢吃逆

丹溪曰吃病气自下冲上属火之象古方悉以胃弱言之殊不知胃弱者陰弱也虚之甚也滞下之久多见此证乃因久下而陰虚也【详见吃逆本门】

辨痢色分五脏

原病式曰泻白为寒青黄红赤黑皆为热也盖泻白者肺之色也由寒水制火不能平金则金肺自甚故色白也痢色青者肝木之气由火甚制金不能平木故色青也或言痢色青为寒者误也仲景少阴病下痢清水色纯青热在里也大承气汤下之及小儿热甚急惊痢色多青为热明矣痢色黄者由火甚则水必衰而脾土自旺故色黄也痢色红为热心火之色也或赤热深甚也至若痢色黑亦言热者由火热亢甚则反兼水化制之故色黑也故伤寒阳明病【云云】法当大承气下之大便不黑者难【恐作易】治诸痢同法

按世人多以泻痢之青白黑三色为寒黄赤二色为热今观河间分五脏之论焕然耳目而知世人之非也或曰内经视络脉之色曰寒多则凝泣凝泣则青黑热多则淖泽淖泽则黄赤又曰黄赤则热多白则寒世俗之论岂非本於此与愚曰内经论经脉之常色心赤肺白肝青脾黄肾黑也阴络之色应其经但阳络之色随四时而行应无常色遇天气之寒则经络凝泣故其色多青黑遇天气之热则经络淖溢故其色多黄赤此盖因外气之寒热而浮络相应而然凡人之在冬月炎天与夫久坐远行其面色相应亦皆然非痢色之出於脏腑随内气所感而生也况滞下之证多因湿热所致内经曰肺热者色白而毛败心热者色赤而经络溢肝热者色苍而爪枯脾热者色黄而肉蠕动肾热者色黑而齿槁此虽论痿亦可见五脏之内热皆能显此五色今滞下之论五色意实相同然此不可与浮络之因外气相应者同语也

辨赤白分冷热之误

原病式曰或言下痢白为寒者误也若果为寒则不能消谷何由反化为脓也所谓下痢谷反为脓血如世之谷肉果菜湿热甚则自化腐烂溃发化为脓血也其热为赤热属心火故也其湿为黄湿属脾土故也燥郁为白属肺金也经曰诸气愤郁皆属於肺谓燥金之化也然诸泻痢皆兼於湿今反言气燥者谓湿热甚於肠胃之内而肠胃拂郁结而又湿至於否以致气液不得宣通因以成肠胃之燥使烦渴不止也假如下痢赤白俗言寒热相兼其说尤误岂知水火阴阳寒热者犹权衡也一高则必一下一盛则必一衰岂能寒热俱甚於肠胃而同为痢乎如热疮疡而出白脓者岂可以白为寒与其在皮肤之分属金故色白也次在血脉之分属心火故为血也在肌肉属脾土故作黄脓在筋部属肝木故其脓色带苍深至骨属肾水故紫黑血出也各随五脏之部而见五色是其标也本则一出於热但分浅深而已大法下迫窘痛後重里急小便赤澀皆属燥热而下痢白者必多有之然则为热明矣

按河间谓赤白不当分冷热乃属肺金心火之化又谓五色各属五脏本则一出於热其论至当但世患此疾者赤白居多今既以不当分冷热为治若专以辛苦寒退热此则治本之法所谓心火肺金之化者抑有别与盖心主血肺主气白属肺金此气受病也赤属心火此血受病也赤白相杂血气俱受病也知此则肝青脾黄肾黑之说亦可得而互明矣

论热药治痢之误

原病式云或曰白痢既为热病何故服辛热之药亦有愈者耶盖辛热之药能开发肠胃郁结使气液宣流通湿润燥气和而已盖病微者可愈甚者郁结不开其病转加而死矣凡治热甚吐泻亦然夫治诸痢者莫若以辛苦寒药治之或微加辛热佐之则可盖辛能发散开通郁结苦能燥湿寒能胜热使气宣平而已如钱氏香连丸之类是也故治诸痢者黄连黄芩为君以其至苦大寒正主湿热之病乃若世传辛热金石毒药治诸吐泻下痢或有愈者以其善开郁结故也然虽亦有验者或不中效反更加害

按治痢用辛苦寒之剂开郁燥湿胜热三法俱备世之用辛热金石毒药者诚非也然亦有久痢肠胃虚滑者亦当求责

治痢通因通用之法

子和云夫下痢脓血腹痛不止可用调胃承气汤加姜枣煎更下藏用丸泻訖以五苓益元散调下又一男子泻痢不止如倾不敢冷坐诸医皆以为寒治延二十载两手寸脉皆滑余不以为寒所以寒者水也以茶调散涌寒水五七升又以无忧散泄积水数十行乃通因通用之法也次以淡剂利水道

按此用吐下以治痢本内经通因通用之说使肠胃虚滑者其可下乎中气虚弱者其可吐乎今云可下者谓有积滞在肠胃壅不通者也可吐者谓有痰饮在膈上气不能降以致大肠不能收敛者也

丹溪曰积湿成痰在肺中宜大肠之不固也清其源则流自清矣正是此意

论局方用热药澁药之非

丹溪曰泄痢一证局方用锤乳健脾丸朝真丹诃黎勒丸大温脾丸等药皆用热药为主治澁药为佐使当为肠虚感寒而成滑者设也彼泻痢者将无热证耶将无积滞耶内经曰痢有脓血多属滞下夫泻痢证其类尤多先贤曰湿多成泄此确论也然有挟风者固不可得而同矣况风与湿之外又有杂合受邪似难例用澁热之药局方出证有兼治里急者有兼治後重者有兼治里急後重者此岂非滞下病乎今泻痢与滞下衮同论治实实虚虚之患将不俟终日矣经曰暴注下迫皆属於热又曰暴注皆属火又曰下痢清白属於寒属火热者二属水寒者一泻痢一证似乎属热者多属寒者少局方专以澁热为用若用之於下痢清白为寒者或可矣所谓下迫者即里急後重之谓也其病属火相火所为其毒甚於热矣投以澁药非杀而何

滞下亦有挟虚挟寒

丹溪曰或问河间之言滞下似无挟虚挟寒者乎否乎予曰泄痢之病水谷或化或不化并无努责惟觉困倦若滞下则不然或脓或血或脓血相杂或肠垢或无糟粕或糟粕相混虽有痛不痛大痛之异然皆里急後重逼迫恼人似乎皆热证实证也予近年涉历亦有大虚大寒者

不可不知敢笔其略以备采覽予从叔年踰五十夏间患滯下病腹微痛所下褐色後重頻并谷食大減时有微热察其脉皆弦而澁似数而稍长却喜不甚浮大两手相等视其神气大減予曰此滯下忧虑所致心血亏脾气弱耳遂以参术为君当归陈皮为臣川芎炒芍药茯苓为佐使时暄热甚加少黄连两月而安姝长官年三十余奉养厚者夏秋间患滯下腹大痛有人教服单煮乾姜与一贴则痛定少顷又作又与之定由是服乾姜至三斤八日视之左脉弦而稍大似数右脉弦而大稍減亦似数重取之似紧予曰此必醉饱後吃寒凉太过而当作虚寒治之因其多服乾姜遂教用四物汤去地黄加人参白术陈皮酒红花茯苓桃仁煎入生姜汁饮之至一月而安金氏妇年近四十秋初尚热患滯下腹但隐痛夜重於昼全不得睡食亦稍減口乾不饮已得治痢灵砂二贴矣予观之两手脉皆澁且不匀神思倦甚饮食全減因与四物汤倍加白术以陈皮佐之与十数贴而安此三病者若因其逼迫而用峻剂岂不悞人

按滯下之证古人多与泄泻同论至三因方始能另立条目盖实有不同夫病有从外感而得者须分六气之异外既受伤肠胃郁结遂成赤白等证当随其寒热温凉以调之有因脏气发动干犯肠胃而得者须察其何臟相乘以平治之又有因饮食失节而得者则又审其何物所伤以消剋之世之感此疾者其因诚不越乎是三者但其受病之後肠胃拂郁脓血稠粘里急後重诸方虽有寒热虚实之论刘河间则以为一出於热然考之内经似亦热多而寒少也我丹溪先生则以为亦有挟虚挟寒之证深戒学者须宜识此世之局方不辨三因专用澁热之药其失甚矣至河间立说专用苦寒疎下之药则亦未甚为当何则盖病有虚实治有先後若病气暴至元气壮实积滯胶固须宜下之病久气脱肠胃虚滑不禁者亦宜温之澁之大抵治痢当从仲景河间之法可温则温可下则下或解表或利小便或待其自己刘河间分别在表在里挟风挟热挟寒等证後之作者无越於斯但气血一条未尝表出立论其於芍药汤下有曰行血则便自愈调气则後重除盖谓洩便脓血血之滯也故曰行血自愈奔迫後重气之实也故曰调气自除诚哉是言但脓血赤白亦有气病血病之分後重里急亦有气实血虚之异学者又不可不察详见前论

滯下治法

治热之剂

仲景白头翁汤治热痢重下者

白头翁【二两】 黄连【三两】 黄栢【三两】 秦皮【三两】

右四味以水七升煮取二升去粗服一升不愈再服按此治痢在下焦肾虚有热也经云肾欲坚故用纯苦之剂以坚之出太陰例药也以其下痢属太陰故也

机要黄芩芍药汤治泄痢腹痛或後重身热久不愈脉洪疾及下痢脓血稠粘

黄芩 芍药【各二两】 甘草【五钱】

右咀每服半两水一 半煎一 温服

按此手足太陰经之药也仲景用芍药甘草汤以复其陰酸以收之甘以缓之酸甘相合以补陰血也芍药白者补赤者泻出太阳芍药甘草例

大黄汤治泄痢久不愈脓血稠粘里急後重日夜无度

大黄【一两】

右细剉好酒二大 同浸半日许再同煎至一 半去大黄将酒分为二服顿服之痢止一服如未止再服取利为度後服芍药汤以和之利止再服黄芩芍药汤彻其毒也

按此乃阳明调荡涤邪热之药用酒煎者欲其上至顶颠外彻皮毛也

芍药汤下血调气经曰澀而便脓血知气行而血止也行血则便自愈调气则後重除

芍药【一两】 当归 黄连【各半两】 檳榔木香【各二钱】 桂【二钱半】 大黄【三钱】
黄芩【半两】 甘草【二钱炙】

右咀每服半两水煎食後温服清如利不减加大黄按此行血调气不热之药也大凡用药之杂与品味之多者难以细分经络当观其大体如何此则太阳桂枝例药也

白术黄芩汤服前药痢虽除更宜此调和

白术【一两】 黄芩【七钱】 甘草【三钱】

右咀匀作三服水煎服清

按此去湿热和中活血之药也

钱氏芍药藥皮丸

芍药 黄栢【各等分】

右为末水丸

守真芍药藥皮丸治一切湿热恶痢

芍药 黄栢【各一两】 黄连【半两】 当归【半两】

右为末水丸如小豆大

按此二方补陰降火下焦之药也出太阳例

局方黄连阿胶丸治冷热不调赤白下痢

阿胶【炒二两】 黄连【三两】 茯苓【二两】

右水熬阿胶膏漉和二末为丸米饮服

按此补虚退热除湿之药也出太阳例海藏云以上苦寒之剂元病不经内伤冷物者宜察亦当审人之虚实及以脉别之

治寒之剂

局方桃花丸治冷痢腹痛下如鱼脑白物

赤石脂【煨】 乾姜【炮各等分】

右为末蒸饼糊丸米饮下三四十丸日三服

按此出阳明例药方

丹溪曰桃花丸即要略桃花汤也仲景以治便脓血用赤石脂丸者乾姜粳米同煮作汤一饮病安便止後药意谓病下焦血虚且寒非乾姜之温石脂之澁且重不能止血粳米味甘引入肠胃不使重澁之体少有凝滯药行易散余毒亦无局方不知深意改为丸药剂以麴糊日与三服果能与仲景之意合否也

严氏当归丸治冷留肠胃下痢纯白腹痛

当归【酒洗】 芍药 附子【炮去皮脐】

白术 乾姜【炮】 厚朴 阿胶【各一两】 乌梅肉【二两】 蛤粉【炒各一两】

右为细末醋糊丸桐子大每服五十丸米饮送下

局方诃藜勒散治肠胃虚弱泄利水谷渐成痢疾

青皮【去穰】 肉豆蔻【麴裹煨】 肉桂【五钱】 附子【炮去皮脐一两】

诃子仁【各四两】

右为末每服三钱姜三片煎服

按局方以白痢为寒多用辛热燥毒之药若用之於下痢清谷肠虚感寒者或可矣若脓血稠粘属火之证用之非杀而何但感寒之证吾恐什百而一二也冷热之剂

古方驻车丸治冷热下痢肠滑赤白

黄连【六两】 乾姜 当归【各二两】 阿胶

右先以醋煮胶令消入前三药和匀衆手丸桐子大米饮下

局方香连丸治冷热不调下痢赤白脓血相杂里急後重

黄连【去芦二十两用吴茱萸十两同炒令赤色去茱萸不用】 木香【四两八钱不见火】

右为细末醋糊丸桐子大每服二十丸空心米饮下按此出太陰例药也

戊巳丸治胃经受热泄痢不止

黄连 吴茱萸【去梗炒】 白芍【各五两】

右为细末麴糊丸桐子大每服三十丸米饮下按此出厥陰已寒例以上三方出证治冷热下痢盖冷热异气水火相反岂能同在肠胃为病耶论中辨之详矣但其制方亦有暗合妙理惜乎世人莫知其深意也三方皆以黄连苦寒之药为君正治湿热之气佐以辛苦温药所以开郁行滯气血宣通病亦自己乾姜木香茱萸三者各随经合宜而用要在学者临机应变又不可拘执於此也

治风之剂

机要防风芍药汤治泄痢飧泄身热脉弦腹痛而渴及头痛而微汗

苍术防风汤治泄痢脉弦头痛

良方神术散治春伤於风夏必飧泄【以上三方并见泄泻门】 澹寮方仓廩汤治下痢头痛心烦不食

局方败毒散四钱加陈仓米百粒姜枣煎服

按此乃发散风寒之剂出太阳例药也

治热之剂

机要白术 药汤治脾经受湿水泄注下苍术芍药汤同

仲景五苓散

宣明益元散【以上四方并见泄泻门】

治暑之剂

局方黄连香薷饮治感暑下痢鲜血【方见暑门】

按此解散暑热心肺药也出太阴厚朴例

宣明桂苓甘露饮

子和桂苓甘露饮【方并见暑剂】

按此三方解表利小便大泻湿热气分药也太阳经药也

攻下之剂

仲景大承气汤【方见下剂】

按此泄热荡涤肠胃之剂痞满燥实四证者可用出阳明例药也

宣明玄青丸治下痢势恶频并窘迫或久不愈诸药不能止须可下之以开除湿热痞闷积滞

黄连 黄栢 大黄

甘遂芫花【醋拌炒】大戟【各半两】牵牛【四两取末二两】轻粉【二钱】

青黛【一两】

右为末匀水丸小豆大初服十丸每服加十丸日三以快利为度

机要厚朴枳实汤治虚滑久不愈多传变为痢先以此汤防其传变

厚朴【一两】枳实【炒一两】诃子皮【一两半生熟】黄连 甘草【炙】

大黄【各三钱】 木香【半两】

右为末每服三五钱水煎服

按以上三方逐积去热之药也 大黄泻血也 牵牛泻气也 甘遂大戟芫花泄水也 厚朴枳壳泄痞满也 各随其病所宜选而用之

局方苏感丸去脏腑有积下痢

以苏合香丸与感应丸二药和匀如粟米大每服五丸淡姜汤空心下

按局方之学多以此治痢去积故录於此然二药之类聚温热用於伤寒伤冷之物者则可有热之人积滞虽去热毒必行其害何可胜言哉

本事方灵砂丹治一切积痢

硃砂 朱砂【并研细各二钱半】

右用黄蜡半两巴豆三七粒去壳皮膜同於银石器内重汤煮一伏时候巴豆紫色为度去二七粒止将一七粒与前药同研极匀溶蜡和药旋丸菉豆大每服三丸至五丸水泻生姜汤下白痢艾汤下赤白痢乌梅汤下空心服

丹溪曰仲景治痢之法下者率用承气加减何尝以砒巴豆丹礞决烈燥毒之剂盖大黄之寒其性善走佐以厚朴之温善行滞气缓以甘草之甘饮以汤液灌涤肠胃滋润轻快无所留滞积行即止此砒丹巴礞热毒类聚成丸其气凶暴其体重燥积垢虽行毒气未歇借使有愈疾之功其肠胃清淳之气能免旁损暗伤之患乎

消积之剂

脾胃论圣饼子治泻痢赤白脐腹撮痛久不愈

黄丹【二钱】 定粉【三钱】 蜜陀僧【二钱】

舶上硫黄【三钱】 轻粉【少许】

右为细末入白麴四钱滴水和如指尖大捻作饼子陰乾食前浆水磨化服之大便黑色为妙

元戎圣功丸专治血痢

膩粉【三钱匕】 定粉【二钱匕】 一法加蛤粉

右研匀水浸蒸饼丸菉豆大艾汤下

止澁之剂

仲景桃花汤治下痢便脓血

赤石脂【一斤半剉一半末】 乾姜【一两】 粳米【一升】

右三味以水七升煮米令熟去滓温七合内赤石脂末方寸匕日三服若一服愈勿再服

按此方出手阳明例药也但赤治丙而白治庚也

严氏禹余粮丸治肠胃虚寒滑泄不禁

禹余粮石【煨】 赤石脂【煨】 龙骨 毕拔乾姜【炮】

诃子【麴裹煨】 肉豆蔻【麴裹煨】

附子【炮去皮脐各等分】

右为末醋糊丸桐子大每服七十丸空心米饮下

局方真人养脏汤治冷热不调下痢赤白里急後重腹痛脱肛

罌粟殼【去蒂盖蜜炙三两六钱】 人参当归【各六钱】 肉桂【八钱】

诃子皮【一两二钱】

木香【二两四钱】 肉豆蔻【麴裹煨半两】

白芍【一两六钱】 生甘草【一两八钱】 白术【六钱】

右咀每服四钱水煎服脏寒加附子

水煮木香丸治一切下痢赤白脓血相杂里急後重罌粟殼【去穰一两四钱】

青皮【去白二两八钱】

甘草【二两四钱】 当归【洗去芦六两】 诃子【炮去核八两】 木香【不见火六两】

右为末蜜丸如弹子大每服一丸水八分盏煎化温服

秘藏诃子散治肠胃虚寒泄泻米谷不化肠鸣腹痛脱肛及作脓血日夜无度

御米穀【去蒂盖蜜炒半两】诃子【煨去核七分】乾姜【炮六分】橘皮【半钱】

右为细末分作二服水煎和滓热服空心下

十剂云澁可以去脱以米穀之酸微澁上收固气去脱主用为君以诃子皮之微酸上收固血治其形脱橘皮微苦温益真气升阳为之使以乾姜大辛热除寒为臣亦为主治也

按以上诸方皆行温热之药固气止血紧澁肠胃当为肠虚感寒而成滑者设也且滞下之证多属於热兼有积滞局方一门专主澁热似难例用

宣明香连丸

木香 诃子肉【麴煨】黄连【炒各半两】龙骨【一钱】

右为细末饮丸黍米大每服二十丸米饮汤下

机要诃子散治泄痢腹痛渐以泄下微少宜此止之法云大势已去而宜止之

诃子皮【一两半生半熟】木香【半两】黄连【三钱】甘草【炙三钱】

右为细末每服二钱以白术芍药汤下如止之不已宜归而送之加厚朴一两竭其邪气也

脾胃论诃藜勒丸治休息痢日夜无度腥臭不可近脐腹撮痛

椿根白皮 诃子肉【半两】母丁香【三十个】

右为细末醋糊为丸如桐子大每服五十丸温米饮下

按以上诸方用温凉之药以上痢较之局方专用澁热则变法矣夫脱则用澁理所当然脱而挟寒温之热之可也脱而挟热凉而澁之可也寒热各随所宜而用似难偏执一说

宣明三圣散治产後下血痢不止

乌鱼骨 烧绵灰 血余灰【各等分】

右细末每服一钱煎石榴皮汤调下热服

按此专主止血之剂

收敛之剂

严氏乌梅丸治热留肠胃下痢纯血脐腹?痛

乌梅肉【二两】当归 枳壳【各一两】黄连【二两】

右为细末醋糊丸桐子大每服七十丸食前米饮下

元戎乌梅散治下痢津少大渴引饮不休

乌梅【焙乾半两】茯苓【一两】木瓜【一两】一法加桂三钱半

右咀每服五钱生姜三片煎

按仲景乌梅丸治伤寒吐蚘後人用治下痢此皆酸收之义出太阳桂苓例药也

血剂

局方胃风汤治风冷乘虚入客肠胃水谷不化泄泻注下及肠胃湿毒如下豆汁或下瘀血日夜无度人参 白茯苓 芎藭 桂

当归 白芍 白术【各等分】

右粗散每服二钱入粟米数粒同煎食前服

按此方名为治风而实非治风乃补血和血益胃气之药下血痢而挟虚者实可倚仗出太阳桂苓例药也

良方加味四物汤治血痢

四物加阿胶艾叶

保命集一方四物内加槐花黄连御米壳等分

按此补血温血之药出厥陰例药也

宣明白术汤治孕妇痢脓血

白术 黄芩 当归【各等分】

右为末每服三二钱水煎食前服

补剂

良方十全大补汤治一切妇人病痢四十日诸药不愈六脉沉弱大凡痢脉宜沉宜弱但服此药而愈【方见补剂】右姜枣煎成加白蜜半匙再煎数沸服

良方治妊娠下痢腹痛小便澀

糯米【一合】 当归【炒】 黄芪【各一两】

右细切和匀水煎服

按此二方不分经络补血之剂今人治痢而用此者盖鲜矣殊不知血气虚脱之人与夫胎前产後之证此法不可无也故特立条目以表章之

杂方

良方治疫毒痢败毒散多加人参甘草陈皮姜枣煎服按此方详见论中

严氏茜根丸治一切毒痢及蛊注利血下如鸡肝心烦腹痛

茜根【洗】 川升麻 犀角 地榆 当归 黄连 枳壳 白芍

右等分为末醋煮米糊为丸如桐子大每服七十丸空心米饮下

按此方消化死血解饮食毒之药

百一选方治禁口痢

石莲去壳留心并肉碾为细末每二钱陈皮饮调下此是毒气上冲心肺借此以通心气便觉思食

澹寮方治禁口痢毒气上冲心肺者

败毒散【四钱】陈仓米【一百粒】

姜三片枣一枚煎

右方治脾胃虚弱禁口痢用山药一味剉如小豆大一半银器内炒熟一半生用同为末米饮调下按禁口痢古人论之者少故留此三方以备急然石莲之通心气败毒散散表邪山药之补脾胃果能开胃口而进食乎

导气汤治下痢脓血里急後重腹疼作渴日夜无度黄连 黄芩 大黄 白 当归 木香 ?榔

右?咀水煎

此方即前芍药汤加减桂甘草二味今人多如此用故收入

玉机微义卷五

卷六

钦定四库全书

玉机微义卷六 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

泄泻门 此门宜与滞下看

泻痢生死脉法

内经云脉细皮寒少气泄利前後饮食不入是谓五虚死其浆粥入胃泄注止则虚者活

脉经云泄注脉缓时小结者生浮大数者死又洞泄食不化不得留下脓血脉微小连者生紧急者死

脉诀云下利微小即为生脉大浮洪无差日

仲景治利大法

东垣治利大法 按此并见滞下门

泻分寒热

病机机要云藏府泻利其证多种大抵从风湿热论是知寒少热多寒则不能久也故曰暴泻非阳久泻非阴大便完谷下有寒有热热者脉疾身多动音声响亮暴注下迫此阳也寒者脉沉而细身不动作目睛不了了饮食不下鼻准气息者姜附汤主之若身重四肢不举术附汤主之

按此以泻之久暴分阴阳正如伤寒之病始为寒而终则传变而为热也然亦必以脉证参订焉

原病式曰泻白为寒青黄红赤黑皆以为热也大抵泻利小便清白不洽为寒赤色者为热又完谷不化而色不变其利脾气虚弱畏冷小便清白不澁身凉不渴脉迟细而微者寒也谷虽不化而色变非白烦渴小便赤澁者热证也凡谷消化无问色及他证便为热也寒泄而谷消化者未之有也或火性急速传化失常谷虽不化而殄泄者亦有之矣仲景云邪热不杀谷然热得湿则殄泄也

论泻痢有湿有热有风有寒

机要云有太陰经受湿而为水泄虚滑身重微满不知谷味久则防变而为脓血脾经传肾谓之贼邪故难愈若先利而後滑谓之微邪故易痊此皆脾土受湿之所为也

有厥陰经下痢不止其脉沉而迟手足厥逆涕唾脓血此难治宜麻黄汤小续命汗之此有表邪缩於内当泻表邪而愈

有暴下无声身冷自汗小便自利大便不禁气难布息脉微呕吐急以重药温之浆水散是也

论暴注属火

子和云夫暴注泻水不已内经曰注下也注下水利也暴速甚者属火宜用水调桂苓甘露饮五苓散或以长流水煎放冷服凉膈通圣亦能治之慎不可骤用粟壳乾姜豆蔻之类纵泻止亦转生他疾止可分陰阳利水道而已

按以上所论辨寒热风湿火等证所以明六淫之邪皆能为泻为注者亦当各随所淫之邪分而治之可也

论胃气下降为飧泄

机要云夫脾胃同湿土之化主腐熟水谷胃气和平饮食入胃精气则输於脾土归於肺行於百脉而成荣卫若饮食一伤起居不时损其胃气则上升精华之气反下降是为飧泄久则太陰转少陰而为肠澼

论春伤於风夏必飧泄

机要云春宜缓形形缓动则肝木乃荣反静密则是行秋令金能制木风内脏夏至则火盛而金去独火木旺而脾土损矣轻则飧泄脉泄谷不化重则下痢脓血稠粘良方云经云春伤於风夏必飧泄盖风喜伤肝春时木旺不受邪反移气尅於脾土脾既受尅不能运化因成积滞夏秋之间再感暑湿风冷之气发动而成痢也

论飧泄属风宜汗

子和云飧泄不止完谷不出发汗可也桂枝麻黄汤主之此证以风为根盖风随汗出也

按飧泄证机要谓胃气下流及春行秋令良方谓春木旺移气尅脾二论虽殊要之皆因风木传变而脾土受邪尔子和谓风随汗解此论固是然亦须随其传变而治不可执此一法也

泻分三因

三因严氏云泄泻一证经中所谓洞泄飧泄溏泄溢泄濡泄米谷注下是也所因有内外不内外差殊耳经云春伤於风夏必飧泄又云湿胜则濡泄寒甚则为泄暑热盛之亦为泄至於七情感动臟气不平亦致溏泄其如饮食不节过食生冷而成泄泻者乃脾胃有伤也但停滞泄泻一证直须积滞已消然後用以断下药今人往往便固止之多成痢疾者矣治法先理中焦次分利水谷治中不效然後断下

按此三因所分甚详但外所淫者既六而立方止有其二内之七情为证而又不详及於治法

治泻痢用吐下汗三法

子和云一僧臟腑不调三年不效此洞泄也以谋虑不决而成肝主谋虑甚则乘脾脾湿不流乃上涌痰涎半盆又以丹车丸瀦川散下数行仍使澡浴出汗自尔日胜一日常以胃风汤白术散调养之

按子和为治大率多用此三法洞泄一证纵其果有积滞郁结之甚元气壮实者亦不宜骤用此三法况有积滞虽甚而元气尤虚者哉设使果当用此三法者亦当如仲景察证以辨其吐汗下者有不可下之殊况仲景治痢又有合下合温之法焉此得非孟浪乎

丹溪论局方用热药瀦药治痢之误

按此见滞下门

谨按泄泻一证古方率以为肠胃虚寒与风冷乘之为论故多行瀦热之剂彼泻痢者岂无积滞岂无热证乎今观病机机要所论有属寒属风湿属火之证此因於外而伤者也又云厥陰经动并胃气下降为泻痢三因所言七情感动臟气不平亦致溏泄此则因於内而伤者也外则当调六气内则当平五脏况又有饮食所伤肠胃停滞所致者治法各不同也然更有因胃气下流而泄者在法则当升举因风而成飧泄者则当解散因痰积於上焦以致大肠之不固而泄者又当去上焦之痰而不治其泻因脾胃气虚而泄者又当补中益气使胃气升腾而泻自止盖各求其本而治可也

泄泻治法

治湿之剂

机要白术芍药汤治太陰脾经受湿水泄注下体重微满困弱无力不欲饮食暴泄无数水谷不化宜此汤和之身重暴下是大势来亦宜和也

白术 芍药【各一两】 甘草【五钱】

右剉每服一两水煎

治湿泻茯苓汤又治食泻湿热

白术 茯苓【各七钱半】

右咀每服一两水煎食前服 一方有芍药三味等分名白术散

按以上三方和中除湿足太陰阳明经药也白术之甘入胃而除脾胃之湿芍药之酸澁除胃中之湿热四支困茯苓利水道而除湿此三味泄痢须用之药也

苍术芍药汤如前证

苍术【二两】 芍药【一两】 黄芩【半两】

右剉每服一两加淡味桂半钱煎服清

按此解散湿热上中二焦之剂太陰经的药也

良方胃苓汤治夏秋之间脾胃伤冷水谷不分泄泻不止

五苓散 平胃散

右和合姜枣煎空心服

按此乃表里除湿之剂东垣所谓上下分消其湿是也太阳太陰经药也出阳明饮痞例

仲景五苓散

宣明益元散【方并见湿剂】

按以上二方除湿利小便之剂太阳经的药也治风之剂

机要防风芍药汤治泄痢殄泄身热脉弦腹痛而得及头痛微汗

防风 芍药 黄芩【各一两】

右咀每服半两水煎服清

按此治风辛凉之剂太陰太阳经药也

苍术防风汤治泄痢脉弦头微痛

苍术【二两】 防风【一两】

一方苍术四两麻黄一两防风五钱姜七片煎

按此足太陰阳明经药也

良方神术散治春伤於风夏必殄泄

苍术【一斤】 藁本 川芎【各六两】 羌活【四两】 粉草 细辛【一两六钱】

右粗末每服三钱姜三片煎要出汗加葱白

按以上三方治风胜湿辛温之剂此则太阳经药也

局方胃气汤治大人小儿风冷乘虚入客肠胃水谷不化泄泻注下【方见滯下门】

按此方名曰治风其实和血之药也

治热之剂

局方戊巳丸治脾胃湿热泄痢不止【方见滯下门】按泄泻局方多以为寒至刘张始言有属热属火之证故诸方中治热泻之方甚少然仲景治伤寒挟热下痢用葛根黄芩黄连汤但人未之思耳

治暑之剂

局方来复丹治伏暑泄泻如水【方见本方】

易简云硝石性寒佐以陈皮其性疎快硫黄且能利人若作煖药以止泻误矣盖由啖食生冷或冒暑热之气中脘闭结挥霍变乱此药通利三焦分理陰阳服之甚验

按此出厥陰硫黄例药也

香薷饮治伏暑吐泻【方见暑剂】

按此治暑之表药也肺脾经药也出太陰厚朴例

宣明桂苓甘露饮治饮水不消呕吐泄痢或下痢赤白【方见暑剂】

按五苓散益元散加寒水石解利湿热太阳经药也治寒之剂

机要浆水散治暴泻如水周身汗出一身尽冷脉微而弱气少不能语甚者加吐此为急病

半夏【一两汤洗】 附子【半两泡】 桂【五钱】 甘草【炙五钱】 良姜【二钱半】 乾姜【一作乾生姜五钱】

右为细末每服三五钱浆水二 煎至半 和滓热服

白术汤

白术 芍药 甘草【炙各三钱】

乾姜【半两炮】

右如前服甚者去乾姜加附子三钱谓辛能发散也

局方理中汤治脏腑停寒泄泻不已【方见寒剂】

按此出厥陰已寒例药也以上用姜附之药皆为暴泻气脱如五虚等证救急之剂所谓暴泻非阳者也然有属火者亦当求责

治风寒湿之剂

本事麴蘖丸治中风或中风湿臟腑滑泻

川芎 附子【炮】 神麴 白术【等分】

右为细末麴糊丸桐子大每服三五十丸温米饮下此药亦治殭泄

按此出太陰例药也

止瀉之剂【按诸方论并见滯下門】

去积之剂

本事温脾汤治痼冷在肠胃间泄泻腹痛宜先取去然後调治不可畏虚以养病也

厚朴 乾姜 甘草

桂心附子【生各二两】大黄【生四钱碎切汤一 渍半日搗去滓煎汤时和滓下】

右细剉水二升半煎八合後下大黄汁再煎六合去滓服

按泄痢腹痛其证多种有积滞者固宜取去岂但痼冷一端而已须详证虚实寒热随其所宜以调之升发之剂

东垣升阳除湿汤自下而上者引而竭之

升麻 柴胡 防风 神麴 泽泻 猪苓【各半两】陈皮【三钱】 苍术【一两】 大麦蘖麪 甘草【炙各三钱】如胃寒肠鸣加益智仁半夏各半钱姜枣同煎非肠鸣不得而用之

右作一服水煎早饭後热服之

升阳除湿防风汤如大便闭塞或里急後重数至圊而不能便或有白脓或血慎勿利之利之则必致重病及郁结而不通也以此汤举其阳则陰气自降矣苍术【泔浸去皮乾淨四两】防风【二钱】 白术 白茯苓 白芍药【各一钱】

右咀除苍术另作片子水一碗半煎至二 内诸药同煎至一大 热服食前

按饮食入胃气上升输精心肺然後下降若脾胃有伤不能上升反下流肾肝而成泄痢者法宜填补中气升之举之不可疎下此东垣发前人所未论也调补脾胃之剂

钱氏白术散治小儿泄泻胃热烦渴不问陰阳并宜服之

人参 白茯苓 白术 木香 甘草 藿香【各一两】 乾姜【按中论即是葛根】

右为末水煎

按此太陰经四君子例药也治小儿阳明本虚陰阳不和吐泻亡津液烦热口乾以参术甘草甘温补胃和中木香藿香辛温芳香可以助脾茯苓甘平分陰阳导水湿葛根甘平倍於衆药其气轻浮鼓舞胃气上行津液又解风肌热治脾胃虚弱泄泻之胜药也

易简白术汤治证同前

前方藿香改黄芩是也

秘藏黄芩补胃汤治一日大便三四次溏而不多有时泄腹中鸣

黄芩 当归身 柴胡 益智仁 陈皮【各三钱】 甘草【炙二钱】 升麻【六分】
红花【少许】

右咀作一服水煎食前服

补肾之剂

机要肉豆蔻丸治肾泄久不愈脉沉细无力者效

破故纸【炒】 肉豆蔻【麴裹煨各等分】

右为末枣肉为丸桐子大饮汤下空心本事方破故纸四两肉豆蔻二两名二神丸治脾肾虚弱

本事五味子散治肾泄

五味子【二两】 吴茱萸【半两细粒绿色者】

右二味炒香熟为度细末每服二钱陈米饮下有一亲识每五更初晓时必溏泄一次此名肾泄服此而愈

局方金锁正元丹治肾虚泄泻小便频数虚冷之证五倍子
茯苓【各八两】 朱砂【别研三两】

龙骨【煨三两】 紫巴戟【去心一斤】

补骨脂【酒浸炒十两】 肉苁蓉【洗焙】

葫芦巴【焙各一斤】

右为末入研药令匀酒糊丸桐子大每服三十丸空心温酒盐汤任下

玉机微义卷六

卷七

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷七 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

疟门

内经叙疟

内经云夏伤於暑秋必痎疟又云先寒後热者名曰寒疟先热而後寒名曰温疟其但热而不寒者名曰瘧疟按内经论疟谓陰阳相并之虚实发为寒热历叙四时及六经五脏与胃之疟以至连日间日发之蚤晏最为详尽学者必通考全文以熟玩之

疟脉

略要云师曰疟脉自弦弦数者多热弦迟者多寒弦小紧者下之差弦迟者可温之弦紧者可发汗针灸也浮大者可吐之弦数者风发也以饮食消息止之

脉经云疟脉自弦微则为虚代散则死

疟备三因

陈无择云夫疟备三因外则感四气内则动七情饮食饥饱房室劳逸皆能致之经所谓夏伤暑秋痎疟者此则因时而叙耳不可专以此论外所因证有寒疟有温疟有瘧疟并同素问有湿疟者寒热身重骨节烦疼胀满自汗善呕因汗出复浴湿舍皮肤及冒雨湿有牝疟者寒多不热但惨戚 栗病以时作此则多感陰湿阳不能制陰也五种疟疾以外感风寒暑湿与卫气相并而成除瘧疟独热温疟先热牝疟无热外诸疟皆先寒後热内所因证病者以蓄怒伤肝气郁所致名曰肝疟以喜伤心心气耗散所致名曰心疟以思伤脾气郁涎结所致名曰脾疟以忧伤肺肺气凝痰所致名曰肺疟以失志伤肾所致名曰肾疟所致之证不同素问此五种疟疾以感气不和郁结痰饮所致不内外因有疫疟者一岁之间长幼相似有鬼疟者梦寐不祥多生恐怖有瘧疟者乍热乍寒乍有乍无南方多病有胃疟者饮食饥饱伤胃而成世谓食疟有劳疟者经年不差前後复发微劳不任亦有数年不差结成症癖在腹脇名曰老疟亦曰母疟已上诸证各有方治宜推而用之按无择有七情感动郁气成疟之论可谓发千古之

未发但所集随证施治之方皆是温热脾胃之剂止有四兽饮云治五脏气虚结聚涎饮夫以各脏君臣之药补虚泻实之法各各不同岂可以一方通治七情之症哉岂欲学者自求之与嗟夫医之为学宋三百年钱仲阳之下一人而已其集方者尚如是欲使人据证捡方乌可得也

论痰能致疟

严用和云素问谓疟生於风又夏伤於暑此四时之气也或乘凉饮冷当风卧湿饥饱失时致脾胃不和痰积中脘遂成此疾所谓无痰不成疟一日一发易治间日一发难愈三日一发者尤其难愈

按此谓胃气不和痰积中脘而成疟则自内而生病於外也与素问风暑外伤虽异然外既受伤则内气必鬱亦生痰此自外而生病於内也疟而挟痰诚有之矣其引以无痰不成疟之一句则失之偏也其用药治法亦且未详

疟分三阳三陰浅深之异

病机机要云经曰夏伤於暑秋必痎疟伤之浅者近而暴伤之重者远而为痎痎者久疟也是知夏伤暑气闭而不能发泄於外邪气内行至秋而为疟也有中三阳者有中三陰者其证各殊同伤寒也在太阳经谓之寒疟治多汗之在阳明经谓之热疟治多下之在少阳经谓之风疟治多和之此三阳受病谓之暴疟发在夏至後处暑前此乃伤之浅者近而暴也在陰经则不分三经总谓之湿疟当从太陰经论之发在处暑後冬至前此乃伤之重者远而为痎痎者老也居西方宜毒药疗之

按此分风暑所伤有陰阳浅深之异发前人所未论也

详见後论中

疟非脾寒及鬼食辨【後添论断】

子和云内经既以夏伤於暑而为疟何世医皆以脾寒治之用姜附硫黄之类甚者归之?恠良可笑耶又或因夏月饮食生冷之类指为食疟此又非也岂知内经之论则不然皆夏伤於暑遇秋风寒而後作也邪热浅则连日邪热深则间日并入於里则寒并入於表则热若此论则了不相干於脾也治平之时其民夷静虽用砒石辰砂有毒之药以热治热亦能取效扰攘之时其民劳苦内火与外火俱动以热攻热转为吐血泻血疮疡呕吐之疾岂与夷静之人同治哉余尝用张长沙汗吐下三法愈疟病极大忌错作脾寒治之

按此云无脾寒及鬼疟皆是得之於暑又谓平治与扰攘之时治疟不同皆确论也然食疟则世亦有之者然观其用药以白虎加人参汤小柴胡五苓桂苓甘露之类则调之也甚者脏用

承气大柴胡下之更不愈以常山散吐之悉是寒药降火之剂盖以疟从火之化也又有谓治刳瘵贫贱之人与富贵膏粱不同之论固是然仍用温脾散辰砂丹劫药贫贱之人岂与治平时人同欤贫贱者脾胃虚寒其可用劫剂欤此恐非出於子和之笔也学者试思之

或问俗以疟为脾寒何也曰此亦有理天地之间惟吴楚闽广人患此至多为阳气之所盛处其地卑湿长夏之时人多患喝疟霍乱泻痢伤湿热也本暑盛阳极人伏阴在内脾困体倦腠理开发或因纳凉於水阁木阴及泉水澡浴而微寒客於肌肉之间经所谓遇夏气凄怆之小寒迫之是也或劳役饥饱内伤而即病作故指肌肉属脾发则多恶寒战栗乃谓之脾寒尔实由风寒湿喝之邪郁於腠理夏时毛窍疎通而不为病至秋气敛之际表邪不能发越故进退不已往来寒热病势如凌虐人之状所以名疟即四时之伤寒故十二经皆能为病古方治法多兼於理内伤取效脾胃和而精气疎通阴阳和解诸邪悉散此实非脾病也但病气随经升降其发早暮日次不等内经具病例已详季世以发表解肌温经散寒等法亦未尝执於燥脾劫剂也又曰既疟本夏伤於暑为病世有不服药饵或人与符呪厌之亦止何也曰此夏时天地气交百物生发湿热熏蒸禽虫吐毒之际人因暑热汗出神气虚耗感得时间乖戾之气为病故与厌之亦止若移精变气之谓也然古人称疟不得为脾寒者正恐人专於温脾之说不明造化之源而失病机气宜之要故也

疟症

丹溪曰内经谓夏伤於暑至秋为疟又曰疟症皆生於风疟症老症也以其隔两日一作纏綿未去前贤或用峻剂恐其稟受怯弱与居养所移者所宜始悟常山乌梅砒母劫剂或误投之轻病为重重者危矣夫三日一作者陰经受病也作於子午卯酉少陰疟也作於寅申巳亥厥陰疟也作於辰戌丑未日太陰疟也疟得於暑当汗而解或因取凉太过汗郁成痰其初感也弱者即病胃气强者伏而不动至於再感复因内伤其病乃作宜其难差夫感暑与风皆外邪也非汗多不解来求治者皆已经试劫剂胃气重伤似难速愈必先与参术等补剂加減以取汗得汗而虚又行补养下体属陰最难得汗补药力得汗出至足方是佳兆又有感病极深邪气必自脏传出至腑其发无时若发於午之後寅之前者血受病也为难愈须渐渐?蚤方是佳兆故治此病者春夏易秋冬难大忌饱食以汗之难易为优劣也金宪詹公春得疟症累试劫药绵延至冬来求治予知其久得汗惟胃气未完非补不可一味白术末之粥丸与二斤尽药大汗而安如此者多但略有加減不必尽述按内经以疟从风寒暑而得之乃天之邪气所伤当以汗解仲景河间悉用发表之药但以寒热多少分经络而治然亦有三陰三阳之异也盖伤在阳者迟而暴伤在陰者远而深在气则发之早在血则发之晏浅则日作深则间之此虽分在陰在阳是乃浅深之谓皆当从汗而解也机要谓在三阳经其汗下和解同伤寒治外邪解而内未已者以蚤晚分气血而用大柴胡大承气桃仁承气下之久疟胸中郁郁欲吐而不能吐当以藜芦散雄黄散吐之此为暴病而气实者设也我丹溪先生论邪气深入陰分血分而成久疟者当用升发之药自脏而出之於腑然後自表作汗而解若用下药则邪气愈陷下而难出也又久疟之人正气虚者不可用劫药损其胃气劫之数次不愈者病若不变必待春来气升疟气随升发之气而出方已遇此者当以补之一妇人久痢一子亦痢死哭甚数日後痢止疟作医与四兽饮之类凡两月召予视之一日五六作汗如雨无休歇不能起卧食少懒

语脉微数予以痢後无陰悲哀伤气又进湿热之药助起旺火正气愈虚汗既大出无邪可治陰虚阳散将在旦夕岂小剂之所能补今用人参二两白术二两芍药一两黄芪半两甘草少许作一服浓煎一鍾日服四五次两日寒热止又二妇同病疟一者面光泽予以湿在气分非汗不解两发汗出而愈一者面赤黑色予以暑伤血分用四物汤加辛苦寒之剂二日发唇疮而愈临病处治其可执一乎前论又有食疟痰疟疫疟瘴疟者其方皆未备学者又当随证而思其所以治之也

疟门治法

解表之剂

仲景白虎加桂枝汤治温疟

知母【六两】 甘草【二两炙】 石膏【斤碎】 桂枝【三两】 粳米【六合】

右咀以水一斗二升煮米熟去滓煎至三升温服一升日三服汗出愈

按此太阳阳明经药也

柴胡桂姜汤治寒多微有热或但寒不热名曰牝疟柴胡【八两】 桂枝 黄芩【各二两】 括萎根【四两】 牡蛎 甘草【炙】 乾姜【各二两】

右咀水煎服一升日三初烦汗出愈

按此少阳太阳经药也

机要桂枝羌活汤治疟处暑以前发头项痛脉浮恶风有汗

桂枝 羌活 防风 甘草【各半两】

右为粗末每服半两水一 半煎至一 温服清迎发而服之如吐加半夏麴

麻黄羌活汤治证如前恶风无汗

麻黄【去节】 羌活 防风 甘草【各半两】

右如前服加法同

按以上二方太阳经药也

治疟病身热目痛热多寒少脉长先以大柴胡下之微利为度後余热不尽者当服白芷汤以尽其邪

白芷【一两】 知母【一两七钱】 石膏【四两】

右粗末依前服

按此阳明经药也

桂枝芍药汤治疟寒热大作不论先後此太阳阳明合病也谓之大争寒热作则必战经曰热胜而动也发热则必汗泄经曰汗出不愈知内热也阳盛陰虚之证当内实外虚不治恐久而传陰经也此汤主之

桂【三钱】 黄芩 知母

石膏 芍药【各一两】

右粗末每服五钱加至一两水煎

按此太阳阳明经药也

桂枝黄芩汤如服前药转大者知三阳合病也宜此和之

柴胡【一两二】 钱 黄芩 人参

甘草【各四钱半】 半夏【四钱】 石膏

知母【各五钱】 桂枝【二钱】

右为粗末依前服之前服此药已如外邪已罢内邪未已再服下药从卯至午发者宜大柴胡下之从午至酉发者知其邪气在内也宜大承气下之从酉至子发者或至寅发者知其邪气在血也宜桃仁承气下之微利後更以小柴胡彻其邪气可也

按此太阳阳明少阳经药也以上诸方并系发风寒暑热之气自外而入中於三阳之经者也

桂枝石膏汤治疟无他证隔日发先寒後热寒少热多

桂枝【五钱】 石膏【一两半】

知母【一两半】 黄芩【一两】

右为粗末分三服水煎服

按此太阳阳明经药也治隔日发则邪气所舍深者也

麻黄黄芩汤治疟发如前证而夜发者

麻黄【一两去节】 甘草【炙三钱】 桃仁【三十个去皮尖】

桂【二钱】 黄芩【五钱】

右为细末依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血骤则肝气燥经所谓肝苦急急食甘以缓之故桃仁散血缓肝谓邪气深远而入血故夜发乃阴经有邪此汤发散血中风寒之剂

按此治风暑深入阴分而夜发乃血受病邪气所舍尤深者也麻黄桂枝桃仁等乃太阳经血药也非三阴经药也

温热燥脾之剂

宝监交解饮子治痰疟辟瘴气

肉豆? 草豆?【各二个麪裹煨热一个生用】 厚朴【二寸半生半姜汁制】
大甘草【二寸生炒各半】 生姜【二块一生一湿纸煨熟】

右等分银石器内水煎发日空心服未愈再服必效

局方常山饮治疟疾发散不愈渐成劳瘵

知母 川常山 草果【各二斤】

良姜【二十两】 甘草【炙一斤】 乌梅【去核一斤】

右咀姜五片枣一枚水煎温服

易简七宝饮治一切疟疾或先寒後热或先热後寒不问鬼疟食疟

常山 厚朴 青皮 陈皮 甘草 槟榔 草果仁【等分】

右咀每服半两於未发隔夜用水一碗酒一 煎至一大 滤出露一宿再将滓如前煎另放亦露一宿来日当发之蚤荡温面东先服头药少歇再服药粗大有神效

人参养胃汤治外感风寒内伤生冷四时温疫或饮食伤脾发为痃疟【方见局方】

平胃散加人参茯苓半夏草果藿香生姜乌梅煎

按此平胃散加减法也出太陰厚朴例以上诸方悉是温脾燥烈之药盖认此疾为脾寒故也然人用之亦或有效遂指为治疟之良方殊不知偶值病者陰阳相并脾气郁结暂得温散则气易行浊液凝痰中脘闭塞因得燥热亦以暂开所以气通而疾止内经所谓勇者气行则已 是也此古人为病气浅而厚质者设也若中气虚弱之人内有郁火之证复用燥热愈劫愈虚咎将谁执

严氏清脾汤治瘧疟脉来弦数但热不寒或热多寒少口苦咽乾大小赤澁

青皮 厚朴 白术 草果柴胡 茯苓 半夏 黄芩甘草【炙等分】

右咀姜五片煎

按此小柴胡汤加减也治口苦咽乾大小赤澁则是内热之证用柴胡黄芩所以泻少阳之热乃前方温脾之一变也方名清脾其义可知然後以草果等药寒热兼用则是未能免俗也

三因四兽饮治五脏气虚七情兼并结聚涎饮与卫气相搏发为疟疾兼治瘧疟

半夏 茯苓 人参 草果陈皮 甘草 乌梅肉 白术【各等分】

右咀同枣姜等分以盐少许淹食须厚皮纸裹煨令香熟焙乾每服半两水煎未发前并进三服

按此四君子加减也出太陰药例

七枣汤治五脏气虚陰阳相胜乍为痃疟不问寒热先後并治

附子【一枚炮以盐水浸再炮如此七次去皮脐】

右剉水一碗姜七片枣七个煎至八分当发日空心温服

按陈无择谓七情感动郁气成疟故此二方以治五脏气虚结聚涎饮等证未审孰为补虚孰为散结郁孰为导痰学者宜自详之

消痞之剂

仲景鳖甲煎丸治痞不差结为痞瘕名曰痞母【方见金匱】

严氏鳖甲饮子治痞久不愈腹中结块名曰痞母鳖甲【醋炙】 白术 黄芪 草果 槟榔 芎藭 橘红 白芍 甘草【炙】 厚朴【等分】

右咀生姜七片枣一枚乌梅少许煎

按痞多成癖於左脇之下名曰痞母乃肝之积也痞属少阳病少阳东方之气故同归於肝又况久痞病在血分血亦属肝所主也当以鳖甲君佐使之药随证虚实用之不必泥此也

消食之剂

三因红丸子专治食痞

蓬术 三棱【各二两醋煮一伏时】

胡椒【一两】 青皮【三两炒】 阿魏【一分醋化】

右为末别研苍术末用阿魏醋米糊为丸桐子大炒土朱为衣每服五十至百丸

按此出厥陰南星半夏例消积滯通郁气之温药也食痞既因饮食而得亦当随其所伤而治之

吐痞之剂

子和常山散吐痞

常山【二两水煮晒乾】

右水煎空心服

机要梨芦散 雄黄散【方并见吐剂】

按痞因外感病属上焦又胸膈多结聚痰涎故用吐法以取效然常山砒霜之类发吐取涎纵使获安脾胃不能不损能用无毒之药以取效者为佳

宝监温脾散治痞疾寒热发歇多时不差

紫河车 菉豆【各一两】 甘草【半两】

生砒【一两半另研子和作钱半】

右为末与砒一处研匀每服半钱新汲水少许调下须於发日隔夜夜深服药忌荤酒瓜果生冷鱼腥肉物三日孕妇勿服但至心合此药与人并不吐此虽有砒一味河车甘草菉豆三味性凉解得新水亦解得

一剪金治疟疾乃是圣药也

信豆硫黄各等分

右作一处乳鉢内杵为末用绯绢子捻药一捻在绢上裹如豆大细丝牢纏定讫剪下每服一丸星宿全用新汲水送下空心服母令人知或先一日夜服之

辰砂丹治疟

朱砂【一两五钱入药中留五钱为衣】 信

雄黄【各五钱另研】

右为末入白麝六钱研匀滴水丸如菉豆大朱砂为衣星宿全时用无根水吞下

宣明辟邪丹治岚瘴鬼疟食疟

菉豆 雄黑豆【各四十九个】 信砒【半钱另研】 朱砂【二粒】 黄丹【一钱为衣】

右为末同入乳鉢内滴水为丸分作三十粒每服一粒用东南桃心取七枝研汁将井花水於发日蚤辰日欲出未出向日吞之醋汤亦得

三因红散子

黄丹【炒色变】

右入建茶合和二钱?白汤调下或温酒调下一方用蒜不以多少杵黄丹丸鸡头大每服一丸临晨面东新水下

按疟丹多用砒霜大毒之药本草主诸疟风痰在胸膈可作吐药盖以其性之至燥大能燥痰也黄丹本草能主惊癇癰疾除热下气亦是胜痰去积之药大抵疟丹虽有燥痰之功大伤胃

气脾胃虚者切宜戒之

谨按治疟之方风暑外伤者解表之药机要详矣疟疟之治宜从丹溪所论陈无择论湿疟有术附汤此不详载又机要有中三阴经之论而治法用药虽有疟疟入血之一方然亦失於详悉严氏谓疟生於痰三因疫疟食疟瘴疟七情感动等疟而诸方未有可取况亦多所缺略窃观其意盖以脾湿燥热之方可以兼治诸疟故不详述此缺略之所由也学者知其名识其意苟能思之则可得而施治矣又何必待其详也哉

玉机微义卷七

卷八

钦定四库全书

玉机微义卷八 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

欬 门

诸经叙欬

内经曰五脏六腑皆令人欬非独肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪气邪气以从其合也五脏之欬久乃移於六腑

本文腑脏欬状见後汤液方下

按欬论五脏六腑千金方又引心主欬然则十二经皆有欬证也

千金方曰论云有风欬有寒欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有肾欬有胆欬有厥陰欬有肢欬十欬之异欲语因欬言不得竟谓之风欬饮冷食寒因之而欬谓之寒欬心下坚满欬则支痛其脉反迟谓之肢欬欬则引胁下痛谓之肝欬欬而唾血引手少陰谓之心欬欬而涎出续续不止引少腹谓之脾欬欬引颈项而唾涎沫谓之肺欬欬则耳无所闻引腰并脐中谓之肾欬欬而引头痛口苦谓之胆欬欬而引舌本谓之厥陰欬风欬者不下之寒欬肢欬肝欬刺足太冲心欬刺手神门脾欬刺足太白肺欬刺手太泉肾欬刺足太谿胆欬刺足阳陵泉厥陰欬刺手太陵

按此论五脏洎风寒肢胆厥陰经为十欬其引现证与经论脏腑欬证皆稍异详肢欬即气与支饮证也经有三焦欬而无心主此有心主而无三焦然已发其秘矣惜乎胃大小肠膀胱欬及针治皆略之不议脉法

脉经曰关上脉微为欬肺脉微急为欬而唾血 欬而脉弦濇为少血
脉紧者肺寒双弦者寒浮紧者虚寒 脉浮而缓伤风 脉细伤湿 数则为热沉数者为实热
脉弦为水偏弦为饮脉沉为留饮 洪滑多痰 欬脉浮直者生浮软者生

欬证死脉

欬而脉紧者 小沉伏匿者 欬而羸瘦脉形坚大者欬而脱形发热脉小坚急者

肌瘦下脱形热不去

欬而呕腹胀且泄其脉弦急者皆死不治

论欬与 本一证

子和曰内经陰阳应象论云秋伤於湿冬生欬嗽五脏生成篇云欬嗽上气诊要经终篇云春刺秋分环为欬嗽示从容篇云欬嗽烦冤者肾气之逆也此四篇中连言欬嗽其余篇中止言欬而不言嗽如生气通天论云秋伤於湿上逆而欬与大象论文义同而无嗽字乃知欬即嗽明矣

谨按欬与嗽本两字义内经已作一证连言之愚详大抵欬者气动也阳也嗽者兼血也陰也况是证其本虽殊其标则一故世俗不以为疑唯洁古发内经微旨其义见下

病机机要云欬谓无痰而有声肺气伤而不清也嗽谓无声而有痰脾湿动而为痰也咳嗽谓有声有痰也因伤肺气动於湿因欬而有嗽也夏月嗽而发热者谓之热痰嗽小柴胡四两加石膏一两知母半两用之冬月嗽而发寒热谓之寒嗽小青龙加杏仁服之蜜煎生姜汤蜜煎橘皮汤烧生姜胡桃皆治无痰而嗽者此乃大例更当随时随证加減之痰而能食者大承气微下之痰而不能食者厚朴汤主之

论嗽分六气母拘於寒

子和曰素问言皮毛者肺之合也邪因而客之则为肺欬後人见是断嗽为寒更不参较他篇岂知六气皆能为嗽然可以辨其六者之状 风乘肺者日夜无度汗出头痛痰涎不利

热乘肺者急喘而嗽面赤潮热手足寒乳子亦多有之

寒乘肺者欬喘上壅涕唾出血甚者七窍血溢

燥乘肺者气壅不利百节内痛头面汗出寒热往来皮肤乾燥细疮燥痒大便秘澁涕唾稠粘寒乘肺者或因形寒饮冷冬月坐卧湿地或胃冷风寒秋冬水中感之嗽急而喘此非六气之云乎

按此只述六气为病故其论中集司天胜复为欬之略但无湿乘肺式方治则又有之式盖脱简尔然丹溪先生论欬有因劳因痰因肺胀因食积作痰发热致嗽或嗽而声嘶者此因血虚受热所致皆内因病本之不同如伤寒小青龙汤治例为水饮与表寒相合而欬真武汤所主为水饮与里寒相合而欬伤寒中风往来寒热胸满心烦喜呕而欬加减小柴胡主之为阳邪传肺加味四逆散主陰邪传里而欬者此皆外因传变之例岂可枚举但欬证之标一人故不历求其本也观子和之论然亦啓其微尔

论欬分三因

陈无择云伤风欬者憎寒壮热自汗恶风口乾烦燥伤寒欬者憎寒发热无汗恶寒烦躁不渴伤暑欬者烦热引饮口渴或吐涎沫声嘶咯血伤湿欬者骨节烦疼四肢重着洒淅此属外因五脏欬而不已则六腑受之者此属内因如欬而发作寒热引腰背痛或喘满此因房劳伤肾或中满腹胀抢心痛不欲食此因饥饱伤脾或欬而左脇偏疼引小腹并膝腕疼此因疲极伤肝或吐白涎口渴声嘶此因呼叫伤肺或欬而烦热自汗咽乾咯血此因劳神伤心并属不内外因也假如尺脉浮濇而数则知伤肾右关脉濡则知饮食伤脾左关脉弦短则知疲极伤肝不应人迎气口者即是不内外因也严氏云欬嗽始关於肺终则聚於胃使人多涕唾而面浮肿气逆也治法当审脉证三因若外因邪气止当发散又须原其虚实冷热若内因七情则随其部经在与气口脉相应浮紧为虚寒洪滑为多痰当以顺气为先下痰次之有停饮而欬又须消化之切不可用乌梅栗殼澁酸之药其寒邪未除亦不可使用补药尤忌忧思过度房室劳伤遂成瘵疾矣

按此论欬证备三因可谓详悉但外因现证与前子和论六气异者此盖言邪气外感非乘客於肺之比也惜乎诸因方治未备所论脉证治法极闢其微至禁不可使用澁补甚得大法之要大抵此证其原实多故不可使用澁之补之也然不能忌忧思戒房室而性躁及脱营之人皆所难疗

论湿痰主嗽

洁古曰嗽者秋伤於湿积於脾经曰秋伤於湿冬必欬嗽大抵素秋之气宜清而肃反动之则气必上冲而为欬嗽甚则动於湿而为痰也是知脾无留湿虽伤肺气不为痰也有痰者寒少热多各随五脏而治之假令湿在肝经谓之风痰湿在心经谓之热痰湿在脾经谓之湿痰湿在肺经谓之气痰湿在肾经谓之寒痰宜随证而治之欬而无痰者以辛甘润其肺欬而嗽者治痰为先故以南星半夏胜其痰而欬嗽自愈枳殼陈皮利其气而痰自下

按此论欬因湿在於经致痰为欬五脏亦皆有之可谓发内经之秘矣然至气郁津液不降或停水饮所致或肾气虚弱火炎水涸津液涌而为痰涎於上此气饮及真脏为病非诸经之留湿致病也故易老云半夏止能泄痰之标而不能治痰之本是矣详已上所言枳殼等利气下痰恐非易老语也

论痰饮治欬【详见痰饮门】

论嗽发蚤晏病本不同

丹溪曰上半日嗽者属胃中有火午後嗽者属陰虛五更嗽多者此胃中有食积至此时滯肺气不利诸邪或痰皆然春是春升之气或外感夏是火炎上最重秋是湿热伤肺冬是风寒外来也

论乾欬嗽治法

原病式曰人瘦者腠理疎通而多汗泄血液衰少而为燥热故多为劳嗽之疾也

丹溪曰欬而无痰者此系火郁之证乃痰郁火邪在中用苦梗以开之下用补陰降火不已则成劳此证不得志者有之

谨按欬无痰者本肺气伤而不清欬久则痰郁於中不能上出故当用药以开提之实者宣法亦可施也凡嗽久亦有痰中兼血者或带血丝者燥热血少者皆当取其化源故曰滋陰降火燥热劳嗽是宜合而论治

论欬为肺痿

金匱方论曰热在上焦者因欬为肺痿得之或从汗出或从呕吐或从消渴小便利数或从便难又被快药下利重亡津液故寸口脉数其人欬口中反有浊唾涎沫者为肺痿之病若口中辟辟燥欬即胸中隐隐痛脉反滑数此为肺痈欬唾脓血脉数虚者为肺痿数实者为肺痈

按此言肺痿属热如欬久肺□声哑声嘶咯血此属陰虛火热甚是也本论治肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遗尿小便数以上虚不能制下故也此为肺中冷必眩多涎唾用炙甘草乾姜此属寒也肺痿涎唾多心中温液温液者用炙甘草汤此补虚劳也亦与补陰虛火热不同是皆宜分治故肺痿又有寒热之异也

欬嗽治法

治风之剂

局方消风百解散治欬嗽声重身热头疼

按此手太陰阳明药也

金沸草散治欬因感风寒头痛声重【方并见伤风门】按此手足太陰药也

败毒散治痰嗽身热鼻塞

柴胡 前胡 羌活 独活 桔梗 枳殼 茯苓 甘草 人参 川芎【各等分】

右?咀水煎每一两或半两

按此足太阳少阳手太陰药也

表里气血之剂

子和搜风丸【方见中风门】

按此手足太陰阳明足太阳药也

按以上诸方并出太阳解表例但此丸下湿热痰之剂也实亦汗下之异

治寒之剂

小青龙汤治感风寒表不解而欬心下有水气或喘

方见痰饮门

金匱方治欬而脉浮去芍加厚朴杏仁石膏小麦

简易九宝汤治欬而身热发喘恶寒

麻黄 薄荷 陈皮 桂心 紫苏 杏仁 甘草 桑白皮 大腹皮【各等分】

右?咀入葱姜煎

按此手太陰足太阳药也

散风寒下气之剂

人参杏子汤止嗽散风寒逐痰饮

人参 半夏 茯苓 白芍 桂枝 乾姜 细辛 甘草【各一钱】 五味子【半钱】 杏仁【一钱】

右?咀入姜煎

按此手足太陰足太阳少陰药也

半夏温肺汤止嗽喘治虚寒【方见痰饮门】

局方华盖散治感寒而嗽胸满声重

苏子 陈皮 赤茯苓 桑白皮 麻黄【各一两】 甘草【十两】

右?咀入姜煎

按此手太陰之本药也

气分之剂

金匱射干麻黄汤治欬而上气喉中水鸡声

射干 细辛 紫苑 欵冬花【各一钱半】 麻黄 生姜【各二钱】

半夏【二钱半】 五味子【一钱】 大枣【二个】

右?咀水煎作一服

按此足太阳例药也

按以上诸方并足太阳解表例兼逐饮降痰下气之法不同况寒证亦有轻重用者自宜取择

治暑之剂

人参白虎汤治欬而身热脉虚发渴

东垣清暑益气汤治中暑身热自汗欬而脉虚

局方黄连香薷饮治暑热乘肺欬而脉洪

【方并见暑门】

按暑嗽亦自病本不一姑録此三方可见治例轻重亦殊如消暑丸亦其法也【方见暑门】

治湿之剂

五苓散治欬而烦脉紧而细

按此足太阳药解表之剂也

十枣汤治欬而脉弦有水气者【方并见痰饮门】

按此足少陰例下剂也

白术汤治欬而脉细

白术 白茯苓 半夏【各等分】

右?咀每服一两姜煎或为末每半两煎取清汁调神麴末二钱顿服之 一方加黄芩等分

按此足阳明太陰药也

白术木香散治喘嗽肿满欲变水气者

白术 猪苓 甘草 泽泻 茯苓【各半两】 木香
槟榔【各三钱】 陈皮【二两】 桂枝【二钱】 滑石【三两】

右为末每服五钱入姜煎

按此足太阳手太陰药也以上三方并太阳例但加半夏为治痰加姜桂兼散寒温胃加木香
槟榔为兼下气尔

机要欬气丸治欬久痰喘肺气浮肿

青皮 陈皮 槟榔 木香 杏仁【炒】 郁李仁 白茯苓 泽泻 当归【各一两】 马兜零
苦葶苈【各三两】 人参 防己【各五钱】 牵牛头末【一两半】

右为末姜汁糊丸桐子大每三十丸至五六十丸煎水下

按此手足太陰气血之药也

治燥之剂

千金五味子汤治欬嗽不已皮肤乾燥唾中有血胸脇疼痛

五味子 桔梗 紫苑 甘草 续断【各二钱】 竹茹【三钱】
赤小豆【一撮】 生地黄 桑白皮【各半两】

右?咀作二服水煎

按此手足太陰药也

气血之剂

子和神功丸

大黄【煨】 诃子 麻子仁【另研】

人参【各一两】

右为末入麻仁研匀炼蜜丸桐子大每三二十丸温水下

按此手足太陰阳明药也丹溪曰诃子治肺气因火伤极遂郁遏胀满取其味酸苦有收斂降火之功若佐以海粉香附瓜蒌青黛半夏麴治嗽非止澁之药也

治火之剂

黄连解毒汤治欬而脉洪喘急

梔子仁汤治热躁而欬

麦门冬汤治火热乘肺欬唾有血【方并见火门】

治热之剂

仲景加减小柴胡汤治欬而寒热往来

柴胡 半夏 黄芩 甘草 乾姜 五味子

右?咀水煎

地骨皮散

知母 柴胡 甘草 人参 地骨皮 茯苓 半夏

右?咀入姜煎

按此二方足少阳例药也

海藏紫苑散治欬中有血虚劳肺痿

人参 紫苑 知母 贝母 桔梗 甘草 五味子 茯苓 阿胶

右?咀水煎

人参蛤蚧散治三二年肺气上喘欬嗽脓血满面生疮蛤蚧【一对全者河水浸五日每换水洗酥炙黄】杏仁【去皮尖】甘草【各五两】人参

茯苓 贝母 知母

桑白皮【各二两】

右为末磁器内盛每日热茶清点服

按以上二方手太陰之的药也或曰欬之病本不同何用药往往必於肺然欬者因声名病也故多本於肺经云肺象金坚劲扣之有声邪击於肺故为欬也且肺为腑脏之华盖主於气生皮毛朝百脉布化精气者也或一脏一脉不利或九气所动或天之六气所感或水谷寒热内因所动则肺亦病矣故欬证虽曰病本不同是以治例往往相类但病有轻重所兼之殊方亦奇偶温凉之异尔

宣明知母茯苓汤治欬嗽不已往来寒热自汗肺痿

甘草 茯苓【各一两】 知母

五味子 人参 薄荷

半夏 柴胡 白术

欬冬花 桔梗 麦門冬

黄芩【各半两】 川芎【二钱】 阿胶【三钱】

右?咀每一两入姜煎

按此足少阳例药也

手足太陰之剂

东垣加減泻白散治陰气在下阳气在上欬嗽呕吐喘急

桑白皮【一两】 地骨皮【七钱】 甘草

陈皮 青皮 五味子

人参【各五钱】 白茯苓【三钱】

右?咀每服半两水煎入粳米二十粒

宝监加減泻白散治欬而口乾烦热胸膈不利气喘促桑白皮【一两】 地骨皮 知母 陈皮 桔梗【各五钱】 青皮 细黄芩 甘草【炙各三钱】

右?咀每服五钱水煎食後温服

按此一方手太陰气分药也宝监曰华陀云盛则为喘减则为枯活人云发喘者气有余也凡看文字须要会得本意盛而为喘者非肺气盛也喘为气有余者亦非肺气有余也气盛当认作气衰有余当认作不足肺气果盛为有余当清肃下行而不喘以其火入於肺衰与不足而为喘焉故言盛者非言肺气盛也言肺中之火盛也言有余者非言肺气有余也言肺中之火有余也故泻肺以苦寒之剂非泻肺也泻肺中之火实补肺也用者不可不知然已上一方略有加減不同故两存之

局方欬冬花散止嗽祛痰散风热

知母 桑白皮 欬冬花 麻黄阿胶 贝母 杏仁 甘草半夏

右?咀入姜煎

按此手太陰之药出足太阳麻黄例兼发表也然治风与寒皆宜解表但亦有可下者如伤风有下证同况欬证多兼痰饮宜後滚痰小胃选用

金匱泽漆汤治欬而脉沉

小柴胡内減柴胡加紫参白前【各五钱】

桂枝【三钱】 泽漆【三合另煮】

右九味?咀内泽漆汁中煮取温服

按此出太阳解肌例然未至为肺痿药也

理气之剂

三因参苏饮治欬嗽发热

局方四七汤治欬而痰涎在喉噤间不下

二陈汤治欬而胸膈不利

苏子降气汤治痰嗽喘促气不升降【方并见痰饮门】东垣加减三奇汤治欬嗽上气喘促胸膈不利

桔梗 陈皮 甘草 青皮 人参 紫苏 桑白皮【各五钱】半夏【七钱】杏仁【三钱】五味子【四钱】

右?咀每六七钱入姜煎

济生橘苏饮

前方减桔梗青皮人参加贝母白术

宝监人参欬花膏治肺胃虚寒久嗽不已咽膈满闷欬嗽痰涎劳嗽

欬冬花 人参 五味子【各八钱】紫苑

桑白皮【各一两】杏仁【八钱】木香 槟榔 苏叶 半夏【汤泡数次各五钱】

右?成膏入炼蜜丸如鸡头大每一丸食後细嚼淡姜汤下

按以上三方理气导痰之剂也皆本手太陰例比之前四方此则兼有滋补之意又当随脏气而用之可也

收斂之剂

局方人参清肺汤治喘嗽胸满烦热声瘖自汗

地骨皮 知母 杏仁 人参 甘草 阿胶 桑白皮 乌梅 栗殼【各等分】

右?咀水煎

按此以甘寒降火兼酸收辛金之散凉而澁之也

人参定喘汤治欬而上喘

人参 麻黄 半夏 阿胶甘草 桑白皮 五味子【各一两半】 粟殼【二两】

右?咀入姜煎每半两或一两

按此以辛散之甘缓之酸收之本於寒邪者可用

宣明宁神散治欬嗽多年不已常自汗服药不效者

粟殼【一两醋炒】 乌梅【半两】

右为末每二三钱沸汤调下

按此劫剂也非虚脱者勿用故上澁之药似难例使滋陰之剂

金匱肾气丸治肾陰虚弱津液不降败浊为痰致欬逆者

方见补虚门 按此论见痰饮门

良方补肺汤治劳嗽

桑白皮 熟地黄【各二两】 人参 紫苑黄芩 川五味子【各一两】

右为末每二钱水煎入蜜少许服

按此二方少陰例药也然劳嗽诸方如前治热之剂皆可选用但因劳而嗽则非嗽为本也良方劫劳散例是矣故补剂不复具例

治邪注之剂

深师四满丸治五嗽一上气嗽二饮嗽三鰯嗽四冷嗽五邪嗽

乾姜 桂心 踯躅花 芎藭紫苑 芫花根皮【各二分】 蜈蚣【一条去头足炙】 细辛 甘草【炙】 鬼督邮 人参 半夏【各一分】

右为末炼蜜丸如大豆许每五丸米饮下日三未效加至七八丸忌羊肉饴葱生菜

按此太阳例药邪谓邪恶鬼注之疾故立是方如千金方谓梦与鬼交及饮食者用通气丸全

以蜈蚣是也盖曾有如是而治愈者矣姑存之以备其旨但今人罕能识矧治疗乎且云通疗五嗽恐未必然也如鰥嗽以臭而名之病体岂无热与湿热乎

治痰诸方

青州白丸子

水煮金花丸治嗽而脉弦面青四肢满便溺秘多怒按此治风痰之剂也

王隐君滚痰丸

机要小黄丸治嗽而脉洪面赤烦热心痛口乾

按此治热痰之剂也

局方温中丸

机要姜桂丸治嗽而脉沉面色黧黑小便急痛足寒而逆

按此治寒痰之剂也 【已上方并见痰饮门】

白术丸治嗽而脉缓面黄肢体沉重嗜卧不收腹胀食不消

南星 半夏【各制一两】 白术【一两半】

为细末浸汤蒸饼为丸桐子大每五六十丸姜汤下按此治湿痰之剂也

玉粉丸治嗽而脉澁面白气上喘促洒淅寒热悲愁不乐

南星 半夏【各制一两】 陈皮【一两】

右末浸蒸饼丸桐子大每三四十丸人参姜汤下按此治气痰之剂也

瑞竹堂化痰丸顺气快脾化痰消食

半夏 南星【去皮】 白矾 皂角【切】 生姜【各一斤】

右用水煮至南星无白点为度去皂筴不用姜切同晒乾

陈皮 青皮【去穰】 紫苏子【炒】 萝卜子【炒别研】 杏仁【去皮尖炒研】 葛根
神麴【炒】

麦蘖【炒】 唐球子 香附子【各一两合前四味一处碾为末】

右浸蒸饼为丸如桐子大每服五七十丸临卧食後茶酒任下

按此治食痰之剂也

丹溪小胃丹治膈上热痰湿痰肩膊疼痛

甘遂【水湿麴裹再浸半日】 大戟【长流水煮一时再水洗】
芫花【醋拌匀过一宿瓦上微炒焦各半两】 黄柏【三两炒】
大黄【纸裹湿灰内煨再切酒浸炒一两半】

右为末粥丸麻子大每二三十丸津唾下

按此治湿热之剂也

干縉汤

太半夏【七个泡切】 皂荚【去皮一寸】 甘草【炙一寸】

右?咀入姜三大片煎服

按此治风湿之剂也

导痰汤

半夏【四两】 南星 枳实 赤茯苓陈皮【各一两】 甘草【半两】

右?咀每服一两入姜煎

按此理气导痰之剂也然诸饮致欬导痰治积诸方详见痰饮门兹不备录

腑脏汤液诸方

小柴胡汤治肝脏发欬两脇下痛甚则不可以辗转则两脇下满【方见热门】

黄芩加半夏生姜汤治胆腑发欬呕苦水若胆汁黄芩 生姜【各三钱】 甘草【炙】
芍药【各一钱】 大枣【二个】 半夏【半合】

右?咀水煎

桔梗汤治心脏发欬欬而喉中如梗状甚则咽肿喉痹

苦梗【三钱】 甘草【六钱】

右?咀水煎

芍药甘草汤治小肠腑发欬欬而失气

芍药 甘草【炙各四钱】

右?咀水煎

升麻汤治脾脏发欬欬而右脇下痛痛引肩背甚则不可以动

升麻 白芍 甘草【各二钱】

葛根【三钱】

右?咀水煎

乌梅丸治胃腑发欬欬而呕呕甚则长虫出

乌梅【三十个】 细辛 附子 桂枝

人参 黄柏【各六钱】 乾姜【一两】 黄连【一

两半】 当归 蜀椒【各四钱】

右酒浸乌梅一宿去核蒸之与米饭捣如泥和诸药末相得加蜜丸桐子大每三十丸白汤下

麻黄汤治肺脏发欬欬而喘息有声甚则吐血

麻黄【三钱】 桂枝【二钱】 甘草【一钱】 杏仁【二十个】

右?咀水煎

赤石脂禹余粮汤治大肠腑发欬欬而遗尿

赤石脂 禹余粮【各二两并打碎】

右水煎服

麻黄附子细辛汤治肾脏发欬欬则腰背相引而痛甚则欬涎

麻黄 细辛【各二钱】 附子【一钱】

右?咀水煎

茯苓甘草汤治膀胱腑发欬欬而遗溺

茯苓【二钱】 桂枝【二钱半】 生姜【五大片】

甘草【炙一钱】

右?咀水煎

异功散治久欬不已三焦受之其状欬而腹满不欲饮食此皆聚於胃关於肺使人多涕唾而面浮肿气逆也

人参 茯苓 白术 甘草 陈皮【等分】

右?咀或为末每服二三钱入姜枣煎服

谨按已上诸方并伤寒例药也故存之以备其旨然欬证以三因论之则一脏一腑病机亦非止於寒也熏法

治久嗽风入肺者用鹅管石雄黄郁金欬冬花碾末和艾中以生姜一片留舌上灸之以烟入喉中为度如作筒子卷药烧烟吸之亦妙

灸法

千金方云欬者灸两乳下黑白际各数十壮即差 又以蒲当ru头周匝围身令前後正中当脊骨灸十壮上气欬嗽短气气满食不下灸肺募五十壮

上气欬逆短气风劳百病灸肩井二百壮 上气欬逆短气胸满多唾唾恶冷痰灸肺俞五十壮

玉机微义卷八

卷九

钦定四库全书

玉机微义卷九 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

热门【发热附】

内经叙热为诸证

诸病喘呕吐酸暴注下迫转筋小便浑浊腹胀大鼓之有声如鼓痈疽疡疹瘤气结核吐下霍乱瞽郁肿胀鼻塞衄血溢血泄淋閼身热恶寒战栗惊惑悲笑谵妄衄蔑血污皆属於热

按此病机皆内经气交变论五常政论至真要论等文河间刘守真撮而为六气为病今但以身热发热分例如已下经言有诸病本之不同故兹病机不复参附一一见各类云余证仿此

叙陰阳虚盛为热

经曰夫热病者皆伤寒之类也 阳胜则热 陰虚则内热 阳盛则外热内外皆热则喘而渴故欲冷饮也阳盛则身热腠理闭喘粗为之俛仰汗不出而热齿

乾以烦冤腹满死能冬不能夏 有四肢热逢风寒如炙於火者是人陰气虚阳气盛也 人身非常热也为之热而烦满者陰气少而阳气胜故热而烦满也 三阳之病发寒热病热而有所痛者是三阳之动也

脉法

内经曰大热病气热脉满是谓重实尺寸脉俱虚是谓重虚

粗大者陰不足阳有余为热中也王注云粗大谓脉洪大也脉洪为热脉缓而滑脉尺粗常热者皆热中也阳气有余为身热无汗脉反濇者为太过血少陰虚也谨按经曰脉至而从按之不鼓诸阳皆然王注云病热而脉数按之不鼓动乃寒盛格阳而致之非热也形证是寒按之而脉气鼓击於指下盛者此为热

盛拒陰而生病非寒也

又曰推而内之外而不内身有热也伤寒论曰寸口脉微为阳不足陰气上入阳中则洒淅恶寒尺脉弱为陰不足阳气下陷入陰中则发热也与难经言覆溢相乘及六难浮损沉实义皆诊法之至要於热证大宜谙识

难经曰热病之脉陰阳俱浮浮之而滑沉之散濇脉经曰弦数多热 数为热极数脉为虚为热数洪热烦 脉来如悬鉤而浮为热 滑数心下结热盛紧而数寒热俱发 沉细滑疾者热脉盛滑紧者病在外热 脉沉而紧上焦有热下寒脉浮紧且滑直者外热内冷内不通寸口脉浮大而疾者名曰阳中之阳病苦烦满身热头痛腹中热寸口脉实热在脾肺数为吐为热在胃口 关脉滑数胃中有客热 缓而滑为热中牢脉为脾胃盛热 尺脉实为身热心痛数为脐下热痛浮为下热风凡脉洪大伤寒热病也谨按经曰脉浮紧发热为伤寒卒病脉浮而大者风脉浮数无热者为风 脉浮如数而有热者气也皆与热证脉相类

脉经曰热病脉小或细喘逆不得大小便腹大而胀汗出而厥逆泄注脉大小不调皆难治热病已得汗而脉尚躁盛此陰脉之极也死 热病不得汗而脉躁盛者此阳脉之极也死脉浮而濇濇而身有热者死

论热在气在血之分

东垣曰昼则发热夜则安静是阳气自旺於阳分也昼则安静夜则发热烦躁是阳气下陷入陰中也名曰热入血室昼则发热烦躁夜则安静是重阳无陰也当亟泻其阳峻补其陰

论五脏有邪身热各异

以手扪摸有三法以轻手扪之则热重按之则不热是热在皮毛血脉也重按之至筋骨之分则热蒸手极甚轻手则不热是邪在筋骨之间也轻手扪之不热重力以按之不热不轻不重按之而热是在筋骨之上皮毛血脉之下乃热在肌肉也

肺热者轻手乃得微按全无日西热甚乃皮毛之热其证必见喘咳寒热轻者泻白散重者凉膈散地骨散心热者微按至皮肤之下肌肉之上轻手乃得微按至皮毛之下则热少加力按之则全不热是热在血脉也其证烦心心痛掌中热而?以黄连泻心汤导赤散朱砂安神丸

脾热者轻手扪之不热重按至筋骨又不热不轻不重在轻手重手其间热在肌肉遇夜尤甚其证必怠惰嗜卧四肢不收无气以动泻黄散

肝热者重按之肌肉之下至骨之上乃肝之热寅卯间尤甚其脉弦四肢满闷便难转筋多怒多惊四支困热筋痿不能起於床泻青丸柴胡饮子

肾热者轻手重手俱不热如重手按至骨分其热蒸手如火其人骨苏苏如虫蚀其骨困热不

任亦不能起於床滋腎丸主之

按此手太陰少陰足太陰厥陰少陰本病为皮毛肌肉骨分热也然面热者足阳明口中热如胶足少陰口热舌乾足少陰耳肌热若寒手太阳掌中热手厥陰少陰太陰足下热而痛足少陰足外热足少阳身热肤痛手少陰身前热足阳明洒淅寒热手太陰肩上热肩似拔手太阳中

热而喘足少陰肩背热及足小指外廉胫踝後皆热足太阳一身尽热狂而妄闻妄见妄言足阳明热而筋纵缓不收陰痿足阳明厥陰手少陰与前

热在气血之分皆诸经现证腑脏陰阳是动所生之本病也

论表里热

病机机要云有表而热者谓之表热无表而热者谓之里热有暴热而为热者乃久不宣通而致也有服温药而为热者有恶寒战栗热者治法小热之气凉以和之大热之气寒以取之甚热之气以汗发之发之不尽则逆制之制之不尽求其属以衰之苦者治脏脏属陰而居内辛者治腑腑属阳而在外故内者下之外者发之又宜养血益陰其热自愈

按此但总言表里之意而未分所受标本之源然合前後诸论观之则其病机着矣

论杂病陰阳虚实寒热与伤寒不同

内经曰陰虚生内热者因有所劳倦形气衰少谷气上盛上焦不行下脘不通胃气热热气熏胸中故内热阳盛则外热者因上焦不通利则皮肤致密腠理闭塞玄府不通卫气不得泄故外热阳虚则外寒陰盛则内寒【见寒门】

谨按赵嗣真曰素问论陰阳虚实四证者杂病也难经六难之文论脉也外台所述之文论伤寒表里也但仲景所主陰阳虚盛之意理实奥焉经云邪气盛则实精气夺则虚因正气先虚以致邪气客之而为盛实於是阳虚陰盛陰虚阳盛二证之别如活人书却将素问所论杂病陰阳虚盛四证合而引证仲景伤寒二证之法又改阳盛外热作内热陰盛内寒作外寒所论初未尝合因拓仲景所主陰阳虚盛之理而详说之盖盛者指邪气而言虚者指正气而言陰阳虚盛邪正消长之机且正气在人阳主表而陰主里邪气中人表为陰而里为阳若夫表之真阳先虚故陰邪乘阳而盛实表受邪者阳虚也脉浮紧者陰邪盛於外也是谓阳虚陰盛所以桂枝麻黄辛甘之温剂汗之则陰邪消温之则真阳长使邪去正安故愈又若里之真气先虚故阳邪入陰而盛实里受邪者陰虚也脉沉实者阳邪盛於里也是谓陰虚阳盛所以用承气酸苦之寒剂下之则阳邪消寒之则真陰长邪去正安故愈如其不然阳盛而用桂枝下咽即毙陰盛而用承气入胃以亡是皆盛盛虚虚而致邪失正也以是知仲景所主阳虚陰盛陰虚阳盛二证之意深盖指一为表证一为里之邪正消长而言非兼言表和里病里和表病

而谓之陰阳虚盛也况和者无病处也虚者受病处也斯论可谓得仲景之心法然陰虚生内热详东垣丹溪之说则又有陰虚外热之证阳胜外热考之河间往往有阳胜内热之例是皆原其病机也然经言者内因证也本病也河间东垣丹溪言者极变之证也标病也所谓亢则害承乃制之例又按仲景论陰阳相搏名曰动阳动为阳虚虚则汗出陰动为陰虚虚则发热如不汗出发热而反形冷恶寒者三焦伤也或病因医所误汗下之致恶寒发热者一为陰阳不和一为陰阳陷下致病若此诸例岂止陰阳虚实而已但所因不同极变之异尔

论杂证发热恶寒与伤寒不同

许学士曰仲景云假令寸口脉微名曰阳不足陰气上入阳中则洒淅恶寒也尺脉弱名曰陰不足阳气下陷入陰中则发热也此谓元受病而然也又云阳微则恶寒陰弱则发热此医发其汗使阳气微又大下之令陰气弱此谓医所病而然也大抵陰不足阳往从之故阳内陷则发热阳不足陰往乘之故陰上入阳中则恶寒陰阳不归其分故寒热交争是以发热而恶寒也原病式曰身热恶寒热在表也邪热在表而浅邪畏其正故病热而反恶寒也或言恶寒为寒在表或言身热恶寒为热在皮肤寒在骨髓者皆误也仲景法曰无阳病寒不可发汗又言身热恶寒麻黄汤汗之汗泄热去身凉即愈然则岂有寒者欤大法烦躁多渴欲寒恶热为病热也亦有亢则害承乃制之则病热甚而反觉其冷者也虽觉其冷而病为热实非寒也其病热郁甚而反恶寒得寒转甚而得煖少愈者谓煖则腠理疎通而阳气得散怫热少退故少愈也其寒则腠理固密阳气怫郁而热转甚故病加尔上下中外周身皆然俗因之妄谓寒病误以热药投之为害多矣

又曰陰胜则寒阳胜则热者谓里气与邪热并之於表则为阳胜而发热也表气与邪热并之於里则为陰胜而寒栗也由表气虚而里热亢则害承乃制故反战栗也大抵本热非病寒也或伤寒病寒热往来者邪热在表而浅邪恶其正故恶寒也邪热在里而深邪甚无畏物畏其极故不恶寒而反恶热也表里进退不已故为寒热往来也此气不并於表里故异於疟而寒热微也按此数论并言杂病陰阳相乘及火热盛反兼水化为病亢则害承乃制之例但河间所引伤寒身热寒热与仲景及明理论义不相合详赵氏曰明理论云往来寒热者邪正分争也邪气之入也正气不与之争则但热而无寒若邪正分争於是寒热作矣盖以寒邪为陰热邪为阳里分为陰表分为阳邪之客於表也为寒邪与阳争则为寒矣邪之入於里也为热邪与陰争则为热矣若邪在半表半里之间外与阳争而为寒内与陰争而为热表里之不拘内外之无定由是寒热且往且来曰有至於三五甚者则十数发也若以陰阳相胜阳不足则先寒後热陰不足则先热後寒此特论杂病陰阳二气自相乘胜然也非可以语伤寒斯论为甚精切深合仲景之意盖不唯释疑於活人书而已可与前篇兼看

又按河间言恶寒为寒在表或身热恶寒为热在皮肤寒在骨髓者皆误也而活人书亦以此为表里言之故赵氏曰详仲景论止分皮肤骨髓而不曰表里者盖以皮脉肉筋骨五者素问以为五脏之合主於外而充於身者也惟曰脏曰腑方可言里可见皮肤即骨髓之上外部浮浅之分骨髓即皮肤之下外部深沉之分与经络属表脏腑属里之例不同况仲景出此证於太阳篇首其为表证明矣是知虚弱素寒之人感邪发热热邪浮浅不胜沉寒故外怯而欲得

近衣此所谓热在皮肤寒在骨髓药用辛温至於壮盛素热之人或酒客辈感邪之初寒未变热陰邪闭於伏热陰凝於外热郁於内故内烦而不欲近衣此所为寒在皮肤热在骨髓药用辛凉必矣一发之余表解正和此仲景不言之妙若以皮肤为表骨髓为里则麻黄汤证骨节疼痛其可名为有表复有里之证耶然仲景伤寒一书人但知为方家之祖而未解作秦汉文字观故於大经大法之意反有疑似而後世赖其余泽者往往类辑伤寒方论其间失其本义及穿凿者亦有之矧以杂病为论但引其例乎兹赵氏释疑可谓得其旨趣且黄帝针经有论皮寒热肌寒热骨寒热等例如此则仲景所论分邪在皮肤骨髓之殊虽欲以尽证例之变盖自有所本云恶寒非寒恶热非热论

丹溪曰经云恶寒战栗者皆属於热又云禁栗如丧神守皆属於火恶寒者虽当炎月若遇风霜重绵在身自觉凛凛战栗禁栗动摇之貌如丧神守恶寒之甚原病式曰病热甚而反觉其寒此为病热实非寒也或曰往往见有得热药而少愈者何也予曰病热之人其气炎上郁为痰饮抑遏清道陰气不升病热尤甚积痰得热亦为暂退热势助邪其病益深或曰寒势如此谁敢以寒凉与之非杀而何予曰古人遇战栗之证有以大承气汤下燥粪而愈者恶寒战栗明是热证但有虚实之分耳经曰陰虛则发热夫阳在外为陰之卫陰在内为阳之守精神外驰嗜欲无节陰气耗散阳无所附遂致浮散於肌表之间而恶热也实非有热当作陰虛治之而用补养之法可也或曰恶寒非寒宜用寒药恶热非热宜用补药甚骇耳目明示我治之之法可乎予曰进士周本道年逾三十得恶寒病服附子百数而病甚求予治诊其脉弦而似缓予以江茶入姜汁香油些小吐痰一升许病减大半又与防风通圣散去硝黄加地黄当归百余贴而安周甚喜予曰未也燥热已多血伤亦深须食淡以养胃内观以养神则水可生火可降也不从吾言附毒必发彼勇於仕进一切务外不守戒忌予曰若多与补血凉药亦可稍安内外不静肾水不生附毒必发病安之後官於婺城巡夜冒寒非附子不可以疗而性怕生姜只得以猪腰作片煮附子与三贴而安予曰可急归知其附毒易发彼以为迂半年後果发背而死又司丞叔平生脚自踝以下常觉热冬不可加绵於上常自言曰我资稟壮不怕冷予曰此足三陰之虛宜蚤断慾事以补养陰血庶乎可免笑而不答年才五十患痿半年而死观此二人治法或可知矣或曰伤寒病恶寒恶热者亦若是耶予曰若病伤寒者自外入内先贤言之详矣愚奚庸贅

谨按东垣曰发热恶热大渴不止烦躁肌热不欲近衣其脉洪大按之无力者或无目痛鼻乾者非白虎汤证也此血虛发躁当以当归补血汤主之又有火郁而热者如不能食而热自汗气短者虛也以甘寒之剂泻热补气非如能食而热口舌乾燥大便难者以辛苦大寒之剂下之泻热补水之比当细分之不可槩论与以上皆宜参考如言烦躁虛烦亦与实烦不同如伤寒烦者为真阳内郁陰中伏阳之证与陰虛躁热病本亦异

虚中有热宜灸论

卫生宝鉴云奥屯周卿之子年二十三病发热肌热消瘦四支困倦嗜卧盗汗大便溏多不思饮食肠鸣舌不知味懒於言语时来时去近半载其脉浮数按之无力正应脉诀云脏中积冷荣中热欲得精要补虚先灸中脘引清气上行肥腠理又灸气海穴乃生发元气滋荣百脉灸

三里助胃气撒上热使下於陰分以甘寒之剂泻热火佐以甘温养其中气又食粳米羊肉之类固其胃气以慎言语节饮食至数月病减得平复

按此证治乃阳虚而胃气不足陰阳不升降致发热者宜灸之以助阳药以甘寒泻血中之大热又非止陰虚之例也

论骨蒸劳热用吐下法

子和曰皮肤枯乾痰涎稠粘四肢疼痛面赤唇乾烦躁睡卧不宁或时喘咳饮食少味困弱无力虚汗黄瘦等证先以茶调散轻涌讫次以导水禹功轻泻三两行後服柴胡饮子桂苓甘露饮搜风丸白术调中汤人参散之类量虚实用之如咯血吐血便血此亡血也并不宜吐吐则神昏不可峻服热药大忌灸?酒麪宜食蔬菜冰水凉物亦慎不可过忌则胃口闭形瘦脉大乃死候也诸劳仿此

谨按一切病候必凭脉验证施治则自切当也详已上劳热未必不兼陰阳两虚湿热自甚或陰虚或劳伤形气或脾胃虚损为热之证吐去痰涎及开提郁陷之气次以调养之法治之犹可若便利与禹功导水重峻之剂吾恐实实虚虚不善用而药之太多致杀人且如积热畜热有余之证非汗吐下法则不能已者不善用而药之不及亦致悞人矣当必凭脉验证施治庶不致药有太过不及之失

论虚热发汗之误

东垣曰仲景论内外不足发热自汗之证大禁发汗若饮食劳倦杂病发热自汗表虚之证认作有余便用麻黄发之汗大出则表益虚也

谨按仲景论伤寒分例不可发汗者三十余条至一证有二禁者若寒热有血弱气虚者也况杂病乎然误则致逆为祸至速所谓一逆尚引日再逆促命期矣

论陰盛格阳身热治例

东垣云冯内翰之侄栎同病伤寒目赤而烦渴脉息七八至按之不鼓击经曰脉至而从按之不鼓诸阳皆然此陰盛格阳於外非热也与姜附之剂汗出而愈【详见试效方】

按此与王海藏治狂言发斑身热脉沉细陰证例同东垣又有治脚膝痿弱下尻臀皆冷陰汗臊臭精滑不固脉沉数有力为火郁於内逼陰向外为阳盛拒陰用苦寒药下之者此水火微兆之微脉证治例之妙王太仆曰纪於水火余气可知因并録之以劝论诸发热病本不同

此事难知曰一身尽热先太阳也从外而之内者先无形也为外伤

谨按仲景论伤寒证例三陰俱有发热但微甚不同赵氏曰论中三阳皆有发热如少陰二证外又有吐利手足不逆冷反发热者不死少陰病一身手足尽热以热在膀胱必便血少陰病四逆散中用柴胡亦有治发热意又厥陰病先厥後发热而利者必自止下利脉数有微热汗出今欲愈面赤身微热为郁冒呕而发热小柴胡与夫太陰病中风四肢烦疼是三陰皆有发热明矣但寒伤陰经发热则为逆

手足不和两脇俱热如火先少阳也从内而之外者先有形也为内伤

内经曰人数醉若饱以入房气聚於脾中不得散酒气与谷气相薄热盛於中故热遍於身内热而溺赤也饮食不节起居不时者陰受之入六腑则身热不得卧上为喘呼

活人书曰伤食令人头痛脉数发热但左手人迎脉平和身不疼痛是也

难知曰脉人迎气口俱紧盛或举按皆实大发热而恶寒腹不和而口液此内外俱伤也

按已上辨内伤外感【详见内伤门】

内经曰身热脉弦数战栗而不恶寒者瘧症也

要略曰发热身疼而身如熏黄者湿也 一身尽疼发热日晡所剧者此名风湿 汗出而身热者风也活人书云中脘有痰令人增寒发热恶风自汗寸口脉浮胸痞满有类伤寒但头不痛项不强为异

孙尚云虚烦与伤寒相似身热脉不浮紧不恶寒但热而烦或不烦头不痛 脚气为病大便坚脚膝肿痛两胫或有肿满或枯细者方其发时亦有发热增寒呕恶似伤寒证也

难经曰发热恶寒脉来浮数者温病也身热头疼自汗多眠阳脉浮滑陰脉濡弱者风温也

伤寒论曰脉虚身热得之伤暑

东垣云四肢发热者或口乾舌乾咽乾盖心生火小肠生热火热来乘主位乃湿热相合故烦躁闷乱也四肢者脾土也火乘之故四肢发热也
或身体沉重走注疼痛盖湿热相抟而风热郁而不得伸也

谨按诸病表热有相类则脉气病本之不同也因类已上诸例是故仲景论伤寒卒病发热而恶寒者发於阳也其脉浮紧而濇为风寒客於荣卫之中也分六经传变脉证至二百余例有因坏悞所致及温疟风温瘟疫等证皆冬伤於寒发为诸脉证之变此伤寒论之所以作也河间刘守真论热病因阳气怫郁而为热或郁结转甚而恶寒所谓亢则害承乃制阳极反似陰与伤寒皆相类此原病式之所以作也东垣李明之论内伤脾胃之证始得之多气高而喘身

热而烦其脉洪大而头痛或渴不止其皮肤不任风寒而生寒热与外感伤寒多相似此脾胃论之所以作也斯三君子之论本推明内经病机之旨条热证标本之不同勿视此以为彼也然学者不审其义而各为专门是以丹溪朱先生曰学先仲景书者以伤寒为主恐悞内伤作外感先东垣书者以胃气为主恐悞外感为内伤先河间书者以热为主恐悞以寒为热不若先主於内经则自然活泼泼地盖内经之义则精而博者也然则微三君子之论又何由知经义之积隐乎但不审其义而各为专门者视此以为彼悞人多矣吁丹溪之旨微哉切观仲景之法必凭脉验证施治变化无穷深合内经之旨如寒邪在表以辛温之药汗之在里以辛热之药温之传变在半表里者以甘寒之药和解之传变入里者以苦寒之药下之凉剂亦未尝委而不用也大抵固凭脉验证以自通变不可执论专方如此矧人身之病有水火徵兆之微若王太仆曰热来复去昼见夜伏夜发昼见时节而动是无火也是例固河间论亢则害承乃制病式亦庶几矣丹溪更有论陰阳为恶寒非寒恶热非热者因人身之病水火徵兆幽显莫测先哲推论亦且至矣然仲景论伤寒脉法亦未尝不引杂病河间论热证脉法而且未详学者能本仲景参叔和脉法自辨内伤外感之分殊如王海藏曰仲景言弦濇为陰叔和言弦濇为阳虽有陰阳之别则不离诸数为热诸迟为寒仲景叔和言本两途非相违背合而论之皆是也仲景所言伤寒自外从气而入以弦脉为陰邪从外入先太阳也叔和所言杂病自内从血而出以弦脉为阳病自内生先少阳也如此则形证有相类脉气病本之不同学者审是则自然通变不致视此以为彼拘於执论专方而已也

热证治法

发表之剂

易简参苏饮治感冒发热头痛或因痰饮凝积为热状似伤寒者

前胡 人参 紫苏 乾葛 半夏 茯苓【各三分】 枳殼 陈皮

甘草 桔梗 木香【各半钱】

右?咀生姜五片水煎服

人参败毒散【方见欬門】

按此二方足少阳柴胡例药

参苏饮解见痰饮門

局方柴胡升麻汤治发热头痛恶风体疼鼻塞咽乾痰盛

方见伤风門

按此足少阳阳明手太阴药也

葛根解肌汤治发热恶寒头痛项强伤寒温病

葛根【四钱】 桂【一钱】 黄芩 甘草 白芍【各二钱】 麻黄【三钱】

右?咀入姜枣煎

按此足太阳阳明太阴药也

知母葛根汤治身热头痛风温温毒证

知母【一钱半】 葛根【四钱】 石膏【三钱】 甘草

木香 升麻 黄芩 南星

人参 防风 杏仁 川芎 羌活【各一钱】 萎蕤【二钱半】 麻黄【二钱】

右?咀作二服入姜煎

按此足太阳阳明手太阴药也以上三方并足太阳例

河间六神通解散治发热头痛发渴身疼脉洪无汗麻黄【二钱】 甘草【三钱】 石膏 滑石 黄芩【各四钱】 苍术【八钱】

右?咀入姜葱煎

按此足三阳手足太阴药也出太阳例

易老九味羌活汤治发热恶寒无汗或自汗头痛项强或伤风见寒脉伤寒见风脉并宜服之

羌活 防风 苍术【各一钱半】

川芎 白芷 生地黄

黄芩 甘草 细辛【一钱】

右?咀水煎

按此足太阳阳明三陰药也

易老云经曰有汗不得服麻黄无汗不得服桂枝若差失则其变不可胜言故立此法使不犯三阳禁忌为解利神方非独治杂病药也

谨按仲景论伤寒发表药分六经及解肌可刺诸法盖恐药致悞变逆慎之至也今集已上诸方皆伤寒表药之变法宜详审脉证而择用之然易老九味河间通解意虽不同务在药证相对名实相符方可行之否则犯禁致逆及失其立法之意也是以许文正公曰近世论医有主河间刘氏者有主易老张氏者张氏用药依准四时陰阳升降而增损之正内经四气调神之义医而不知此妄行也刘氏用药务在推陈致新不使少有怫郁正造化新新不停之义医而不知此无术也然而主张氏者或未尽张氏之妙则瞑眩之剂终莫敢投至失几後时而不救者多矣主刘氏者或未悉刘氏之蘊则刼效目前陰损正气遗祸於後日者多矣能用二家之长而无二家之弊则治庶几乎於此二方制法可见大抵学者当於经论中求之知其所主不可偏执於一家而已

攻里之剂

宣明三乙承气汤治脏腑积热痞满燥实坚胀

甘草 枳实 厚朴 大黄 芒硝

右?咀入姜煎

按此足阳明例药也发明曰汉张仲景作伤寒论为邪自外入传於胃者谓之入腑腑之为言聚也胃为水谷之海荣卫之源水谷会聚变化而为荣卫邪气入胃则胃中之气菹滯糟粕秘结而为实实则泻之人所共知如缓急轻重之剂则临时消息焉不恶寒反恶热发渴谵语腹满而喘手足濇然汗出者急下之宜大承气汤如邪气未深恐有燥屎少服小承气汤试之腹中转失气者有燥屎也乃可攻之不转失气者初硬後溏尚未可攻攻之则腹满不能食若腹满不通与小承气汤微和胃气勿令大泄如发汗後不恶寒但热者胃实也当和胃气调胃承气汤主之成无已云大热结实者与大承气汤小热微结者与小承气汤以热不太甚故於大承气汤中去芒硝又以结不至坚故减厚朴枳实也如不至大坚满邪热甚而须攻下者亦未可投大承气汤必以轻缓之剂攻之於大承气汤减厚朴枳实加甘草乃轻缓之剂以调胃也设若大承气反用调胃治之则邪气不服小承气证反用大承气下之则过伤正气而腹满不能食故有勿大泄之戒此仲景所以分治之未尝越圣人制度後之医者以此三药合而为一且云通治三药之证及无问伤寒杂证内外一切所伤若依此说与仲景之方甚相违背及失轩岐缓急之旨由是红紫眩乱迷惑世人一唱百和使病者暗受其弊将何诉哉倘有仁心审是者当於内经仲景方中求之贵使药证相对以圣贤之心为心则方之真伪自可得而知矣

当归承气汤治燥热里热火郁为病或皮肤枯燥或咽乾鼻乾或便溺结闷通宜用此

当归 大黄【各四钱】 甘草 芒硝【各三钱】

右?咀入姜煎

按此足太陰厥陰阳明药也凡血证下药详见仲景抵当诸汤例兹不备録但此与前方可见有气血之分

发表攻里之剂

宣明双解散治一切风热积热

益元散 防风通圣散【各一两】

右每三五钱入葱白盐?五十粒姜三片煎服按此足太阳阳明少陰厥陰手足太陰药也治风热郁热甚捷但本论云治风寒暑湿饥饱劳役内外诸邪所伤无问杂病便可通解然斯意混同主治而寒湿何以得散内伤不足之证何以抵受邪实实虚虚不无致逆故潘思敬云是仲景调胃承气汤後人一变加连翘栀子薄荷黄芩谓之凉膈至河间又一变於凉膈中加防风川芎当归芍药麻黄石膏桔梗滑石荆芥白术谓之防风通圣古之复方也今复之又复制法盖可知矣而学者识之

大柴胡汤治伤寒杂证发热脉沉实弦数热日数多或有表复有里脉洪头痛而谵妄或湿热自利表里证已急宜此下之

柴胡【四钱】 黄芩 芍药【各一钱半】 半夏【一钱二分】 枳实【二钱】
大黄【二钱半】

右?咀入姜枣煎

按此足少阳阳明太陰厥陰药也出太阳例

清气之剂

局方人参白虎汤治气热心烦发渴

石膏【四钱】 知母【一钱半】 甘草【一钱】 人参【半钱】

右?咀入粳米一合煎

按此足阳明少陰手太陰药也

清心莲子饮治发热口乾小便白浊夜则安静昼则发热

黄芩 麦门冬 地骨皮 车前子 甘草【各三钱半】 莲肉 茯苓 黄芪 柴胡 人参【各二钱半】

右?咀水煎

按此足少阳少陰手足太陰药也

宣明柴胡饮子解一切肌热蒸热积热或汗後余热脉洪实弦数

黄芩 甘草 大黄 芍药 柴胡 人参 当归【各二钱半】

右?咀入姜煎

按此足少阳例又表里血药也宝监附於气分热例下今姑从之学者宜取择焉

机要云若肤如火燎而热以手取之不甚热为肺热目睛赤烦燥或引饮黄芩一味主之昼则行阳二十五度此言气分热也

凉血之剂

清凉饮子治大人小儿血脉壅实脏腑生热面赤烦渴睡卧不宁

大黄 芍药 当归 甘草【各等分】

右?咀水煎

按此足太陰厥陰之的药也

元戎四物二连汤治血虚虚劳发热五心烦热昼则明了夜则发热

当归 生地黄 白芍 川芎 黄连 胡黄连

右?咀水煎服

按此足太陰厥陰手少陰经药也

机要云若夜发热主行陰夜则行陰二十五度若脇肋热或一身尽热或日晡肌热者皆血病也宜以上方及桃仁承气选而用之

清气凉血之剂

局方洗心散治风壅壮热头目昏痛热气上冲口苦唇焦咽喉肿痛心神烦燥多渴五心烦热小便赤澀大便秘滞

大黄【煨】 甘草 当归 芍药 麻黄 荆芥穗【各六钱】 白术【五钱】

右为末每服二三钱生姜薄荷汤煎服

按此足太阳阳明厥阴手足太阴经药也今人多用之故收入然以白术合大黄入心故名洗心而从以麻黄荆芥亦是表里药

甘露饮治男子妇人小儿烦热胃中客热口臭齿龈烦渴咽疮等证

熟地黄 生地黄 枇杷叶 山茵陈 天门冬 麦门冬 枳壳 黄芩 石斛 甘草【各等分】

右为末每服二钱水煎服

按此足阳明手太阴少阴经药也

龙脑鸡苏丸除烦热郁热肺热欬嗽鼻衄吐血血崩下血热淋消渴惊悸解酒毒胃热口臭口苦开心明目薄荷叶【一两六钱】 生地黄【六钱】 麦门冬【四钱】

蒲黄【炒】 阿胶【炒各二钱】 黄芪【一钱】

人参 木通【各二钱】 银州柴胡【同木通浸二日取汁入膏】 甘草【一钱半】

右为末用蜜三两二钱炼过後下地黄末木通柴胡汁熬成膏丸桐子大每二十丸嚼破汤下

按此三焦药也

安神清镇诸方

局方至宝丹【方见中风门】

按此气血之药通关透肌骨之剂也

东垣朱砂安神丸治心神烦乱怔忡兀兀欲吐气乱而热似懊憹状

黄连【一钱半】 生地黄 当归身 甘草【炙各半钱】 朱砂【一钱别研】

右为末蒸饼丸黍米大每十丸或十五二十丸唾津下

按此二方血分药也

牛黄膏治热入血室发狂不认人者

牛黄【二钱半】 朱砂 蔚金【各三钱】

脑子 甘草【各一钱】 牡丹皮【二钱】

右为细末炼蜜丸皂子大新水化下

钱氏安神丸治热渴心闷脉实颊赤口燥

麦门冬 马牙硝 白茯苓 山药 寒水石【各半两】 朱砂【一两】 甘草【半两】
龙脑【一字】

右为末炼蜜丸鸡头大每服半丸或一丸沙糖水化下

按此气分药也

泻诸经实热方

局方凉膈散治上焦积热烦躁多渴面赤面热头昏咽燥喉咽肿痛口疮便溺赤澁狂言谵妄
睡卧不安并宜服之

大黄 朴硝 甘草【各二两】 连翘【四两】

栀子仁 黄芩 薄荷叶【各一两】

右为末每服二钱竹叶蜜些小煎服

按此手太陰少陰足太陰阳明药也轻者宜用桔梗汤母犯下二焦也余仿此【桔梗汤见喉痹门】

调胃承气汤治中焦实热胃热实而不满

大黄【一两】 甘草【二钱半】 芒硝【四钱半】

右?咀水煎

按此足阳明经药也轻者宜用前胡散

八正散治下焦积热二便闭澀多渴咽乾口热生疮肿痛淋血

大黄 瞿麦 木通 滑石 扁竹 车前子 山梔 甘草【各等分】

右为末每服二钱水煎入灯心

按此足太阳阳明经药也轻者宜用导赤散

钱氏泻青丸治肝经郁热

当归 龙胆草 川芎 山梔 大黄 羌活 防风

右为末蜜丸鸡头子大每一二丸

泻心汤治心热

黄连【一两】

右为末水调二三分量病人大小与之

泻黄散治脾热口臭咽乾

藿香叶【七钱】 山梔【一两】 石膏【半两】 甘草【三

两】 防风【四两】

右为末同蜜酒拌微炒香每服一钱

泻白散治肺热

桑白皮 地骨皮【各一两】 甘草【半两】

右为末每服二三钱

东垣滋肾丸治肾热

黄柏【三钱】 知母【二钱】 桂【一分半】

右为末熟水丸桐子大每七八十丸至百丸食前百沸汤下

按此五脏药例也

半夏汤治胆腑实热精神不守热泄病

半夏 宿姜【各三钱】 黄芩

远志茯苓【各二钱】 生地黄【五钱】 秫米【数合】 酸枣仁【一合】

右?咀长流水煎

导赤散治小肠实热小便赤澀而渴

生地黄 木通 甘草【各等分】

右末入竹叶同煎

前胡散治胃气实热唇口乾裂中心热躁大便秘结非时烦渴睡中口内生涎

大黄【半两】 桔梗 枳殼 前胡杏仁【各一钱】 葛根【二钱】

右为末每二钱入姜煎

泻白汤治大肠实热腹胀不通侠脐痛食不化喘不能久立口生疮

橘皮 淡竹茹 黄芩 梔子仁 蘘皮【炙各半两】 茯苓 芒硝【各一两】 生地黄【三两】

右剉每四钱入姜枣煎空心服

赤茯苓汤治膀胱实热腹胀小便不通口苦舌乾咽肿不利

赤茯苓 猪苓 葵子 枳实 瞿麦 木通 黄芩 车前子 滑石 甘草【各等分】

右?咀入姜煎食前服

按以上诸方出五脏治要例

治虚热升阳之剂

小柴胡汤治潮热身热默默不欲饮食或呕或渴或利或欬

人参 半夏 生甘草 黄芩【各二

钱】柴胡【四钱】生姜【五片】枣【二枚】

右?咀水煎

按此足少阳药也出太阳例主虚劳烦热能引清气上行阳道在经主气在脏主血故更能入血室也

东垣升阳益胃汤治肺之脾胃虚怠惰嗜卧四肢不收身体沉重口乾食无味大便不调小便频数食少食不消洒淅恶寒而或微热

【方见内伤门】

按此手太陰足阳明太陰之药欲升浮中焦下陷之气故加太阳诸经药也

补中益气汤治形神劳役或饮食失节劳倦虚损身热而烦脉洪大而虚头痛或恶寒而渴自汗无力气高而喘

黄芪【一钱半】人参 甘草【炙各一钱】白术当归身 柴胡 升麻 陈皮【各半钱】

右?咀水煎

按此手足太陰少阳经药表里气血之剂也

【加減见内伤门】

谨按发明曰经云治热以寒温而行之治寒以热凉而行之治温以清冷而行之治清以温热而行之夫治热以寒温而行之者有三皆同大热在身止用黄芪人参甘草此三味者皆甘温虽表里皆热躁发於内扪之肌热於外能和之汗自出而解矣此温能除大热之至理也热极生风乃左迁入地补母以虚其子使天道右迁顺行诸病得天令行而必愈二也况大热在上其大寒必伏於内温能退寒以助地气地气者在人乃胃之生气使真气旺三也此与热因寒用寒因热用必伏其所主而先其所因治法理同而证不同学者最宜深玩

治虚热滋陰之剂

杨氏秦艽扶羸汤治肺痿骨蒸成劳或嗽或寒或热声啞不出体虚自汗四肢怠惰

柴胡【二钱】 人参 鳖甲【炙】 秦艽当归 地骨皮【各一钱半】 半夏
紫苑甘草【各一钱】

右?咀水煎

按此足少阳例药又气血之剂也

局方当归补血汤治肌热躁热目赤面红烦渴引饮昼夜不息其脉洪大而虚重按全无此脉
虚血虚也若悞服白虎汤必死宜此主之

黄芪 当归

右?咀水煎

按此足三陰经药也

十味人参散治虚热潮热身体倦怠

柴胡 甘草 人参 茯苓半夏 白术 黄芩 当归白芍 葛根【等分】

右?咀入姜煎

按此足少阳阳明太陰经药也

瑞竹堂柴胡梅连散治骨蒸劳热久而不痊三服除根其效如神及五劳七伤虚弱皆治

胡黄连 柴胡 前胡 乌梅【各三钱】

右?咀每二钱童便一盞猪胝一枚猪脊髓一条韭根白半钱同煎至七分去粗温服不拘时

按此足少阳厥陰手少陰太陰经药也出少阳例亦是劫剂

元戎五蒸汤治骨蒸劳热自汗

甘草 人参 知母 黄芩【各二钱】 茯苓 熟地黄

葛根【各三钱】石膏【半两】竹叶【二十片】

右?咀作一服入粳米一合煎加減见本论

按此足阳明手太陰手足少陰经药也已上并气血之剂

升阳滋陰之剂

局方十全大补汤治诸虚不足五劳七伤不进饮食久病虚损时发潮热者

白茯苓 人参 当归 白术

黄芪 川芎 肉桂 白芍【炒】熟地黄 甘草【等分】

右?咀每服一两入姜枣水煎

按此手足三陰气血药也

人参养荣汤治久病虚损口乾食少欬而下利心惊悸热而自汗

前方減芎加陈皮五味远志

右?咀入姜枣煎

按此手足太陰药气血之剂也

黄芪鳖甲散治男女虚热身瘦五心烦热四肢怠惰欬咽乾自汗食少

人参 肉桂 桔梗【各一钱半】生地黄半夏 紫苑 知母 白芍 黄芪 甘草
桑白皮【各二钱半】天门冬 鳖甲【各五钱】秦艽 茯苓地骨皮 柴胡【各三钱】

右?咀入姜煎每服一两卫生宝监減桂芍地骨皮人参黄芪散

按此手太陰例药气血之剂然气乱於胸中为清浊相干者须加气药以理之又不必拘此如气液衰陰血竭古方有兼用乌梅蛤蚧猪肾脊髓人尿等物皆其法也

治风热之剂

川芎石膏汤

【方见中风门】

仙术芍散治风热燥热

防风通圣中加菊花藿香砂仁减麻黄芒硝

右为末每服一二钱

按此足太阳阳明三阴经药也

寒热之剂

柴胡姜桂汤治寒热自汗

柴胡【四钱】 桂枝 黄芩 乾姜

甘草 牡蛎【各一钱半】 瓜蒌根【二钱】

右?咀水煎

按此少阳例药也

桂枝麻黄各半汤治发热恶寒便清不渴脉浮紧而濇

【方见伤寒例】

阳旦汤治身热恶寒头痛脉洪盛自汗

桂枝汤加黄芩一两

按此并太阳例药

暑热之剂

局方黄连香薷饮

按此手太阴少阴药也

东垣清暑益气汤【方并见暑门】

按此手足太陰少陰足阳明药也

湿热之剂

五苓散【方见湿门】

东垣清燥汤【方见痿门】

按此手足太陰气血之剂也出太阳例

火热之剂

黄连解毒汤

按此手足太阳阳明少陰手太陰药也

当归龙胆丸【方并见火门】

按此足阳明厥陰手足太陰少陰药也

风湿热之剂

东垣羌活汤治身重或眩运麻木小便澀大便不调下焦痿软不能行止

羌活 防风 柴胡【各一钱】 藁本独活 茯苓 泽泻 猪苓黄芩 甘草【炙】 陈皮 黄柏黄连
苍术 升麻 川芎【各半钱】

右?咀水煎

按此疎风胜湿升阳之剂也出太阳茯苓泽泻例治食热之剂

千金紫丸治饮食伤先寒後热

拔萃妙香丸【方见风癰门】

丹溪越鞠丸治食郁

苍术 神麴 香附 山查醋炒鉞砂 抚芎【等分】

右为末糊丸後加減法为六郁例并附於左

气郁

香附 苍术 抚芎

血郁

【见血门】

湿郁

【见湿门】

痰郁

海石 香附 瓜蒌仁 南星

热郁

香附 抚芎 青黛 苍术

按食伤发热诸例宜於内伤门选用

玉机微义卷九

卷十

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷十 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

火门

内经叙火为诸证

诸热瞀瘵暴瘡冒昧躁扰狂越骂詈惊骇肘肿疼酸气逆冲上禁栗如丧神守噤呕疮疡喉痹
耳鸣及聋呕涌溢食不下目昧不明暴注瞶瘵暴病暴死皆属于火

论相火动为诸证

丹溪曰太极动而生阳静而生阴阳动而变阴静而合而生水火木金土各一其性惟火有二
曰君火人火也曰相火天火也火内阴而外阳主乎动者也故凡动皆属火以名而言形质相
生配於五行故谓之君以位而言生於虚无守位禀命因动而见故谓之相天主生物故恒於
动人有此生亦恒於动其所以恒於动者皆相火助之为也见於天者出於龙雷则木之气出
於海则水之气也具於人者寄於肝肾一部肝属木而肾属水也胆者肝之腑膀胱者肾之腑
心胞络者肾之配三焦以焦言而下焦司肝肾之分皆阴而下者也天非此火不能生物人非
此火不能有生天之火虽出於木水而皆本乎地故雷非伏龙非蟄海非附地则不能鸣不能
飞不能波也鸣也飞也波也动而为火者也肾肝之阴悉其相火人而同乎天也或曰相火天
人所同何东垣为元气之贼又曰火与元气不相两立一胜则一负然则如之何则可使之无
胜负乎曰周子曰神发知矣五性感动而万事出有知之後五者之性为物所感不能不动谓
之动者即内经五火也相火易起五性厥阳之火相扇则妄动矣火起於妄变化莫测无时不
有煎熬真阴阴虚则病阴绝则死君火之气经以暑与热言之相火之气经以火言之盖表其
暴悍酷烈有甚於君火者也故曰相火元气之贼周子又曰圣人定之以中正仁义而主静朱
子亦曰必使道心常为一身之主而人心每听命焉此善处乎火者人心听命於道心而又能
主之以静彼五火将寂然不作而相火者惟有裨补造化而为生不息之运用尔何贼之有
或曰内经相火注言少阴少阳矣未曾言及厥阴太阳而吾子言之何也曰足太阳少阴东垣
尝言之矣治以炒栝取其味辛能泻水中之火是也戴人亦言胆与三焦寻火治肝和胞络都
无异此历指龙雷之火也予亦备述天人之火皆生於动如上文所云者实推广二公之意或
曰内经言火者不一往往於六气中见之言脏腑者未之见也二公岂他有所据耶子能为我

言之乎经曰百病皆生於风寒暑湿燥火之动而为变者岐伯历举病机一十九条而属火者五此非相火为病之出於脏腑者乎考之内经少阳病为瘕瘕太阳病时眩仆少阴病瞽暴?鬱冒不知人非诸热瞽瘕之属火者乎少阳病恶寒鼓栗胆病振寒少阴病洒淅恶寒振栗厥阴病洒淅振寒非诸振鼓栗如丧神守之属火者乎少阳呕逆厥气上行膀胱病冲头痛太阳病厥气上冲胸少腹控臑引腰脊上冲心少阴病气上冲胸呕逆非诸逆冲上之属火者乎少阳病谵妄太阳病谵妄膀胱病狂颠疾非诸躁狂越之属火者乎少阳病肘肿善惊少阴病瞽热以酸肘肿不能久立非诸病肘肿痛酸惊骇之属火者乎又原病式曰诸风掉眩属於肝火之动也诸气愤鬱病痿属於肝火之升也诸湿肿满属於脾火之胜也诸痛痒疮疡属於心火之用也是皆火之为病出於脏腑者然也注文未之发尔以陈无择之通達且以暖炽论君火日用之火言相火而又不曾深及宜乎後人之不无聒聒也悲夫

论火岂君相五志俱有

原病式曰五脏之志过度则劳伤本脏凡五志所伤皆热也所谓阳动阴静故形神劳则躁不宁静则清平也是故上善若水下愚若火如卒暴僵仆多因五志七情过度而卒病也故喜为心火之志病笑者火之甚也五志过极皆为火也

谨按或曰火之为病其害甚大其变甚速其势甚彰其死甚暴何者盖能燔灼焚焰飞走狂越消烁於物莫能御之游行乎三焦虚实之两途曰君火也犹人火也曰相火也犹龙火也火性不妄动能不违於道常以禀位听命运造化生存之机矣夫人在气交之中多动少静欲不妄动其可得乎故凡动者皆属火化火一妄行元气受伤势不两立偏胜则病移害他经事非细故动之极也病则死矣经所谓一水不胜二火之火出於天造君相之外又有厥阳脏腑之火根於五志之内六欲七情激之其火随起盖大怒则火起于肝醉饱则火起于胃房劳则火起于肾悲哀动中则火起于肺心为君主自焚则死矣丹溪又啓火出五脏主病曰诸风掉眩属肝火动之类经所谓水不胜五火之火出自人为又考内经病机一十九条内举属火者五诸热瞽瘕皆属於火之类而河间又广其说火之致病者甚多深契内经之意曰诸病喘呕吐酸【云云见热门】此皆少阴君火之热乃真心小肠之气所为也若瞽瘕暴痞冒昧【云云见前】此皆少阳相火之热乃心包络三焦之气所为也是皆火之变见为诸病也为脉虚则浮大实则洪数药之所主各因其属君火者心火也可以湿伏可以水灭可以直折惟黄连之属可以制之相火者龙火也不可以水湿折之从其性而伏之惟黄柏之属可以降之噫泻火之法岂止如此虚实多端不可不察以脏气司之如黄连泻心火黄芩泻肺火芍药泻脾火柴胡泻肝火知母泻肾火此皆苦寒之味能泻有余之火耳若饮食劳倦内伤元气火不两立为阳虚之病以甘温之剂除之如黄芪人参甘草之属若阴微阳强相火炽盛以乘阴位日渐煎熬为血虚之病以甘寒之剂降之如当归地黄之属若心火亢极鬱热内实为阳强之病以鹹冷之剂折之如大黄朴硝之属若肾水受伤其阴失守无根之火为阴虚之病以壮水之剂制之如生地黄玄参之属若右肾命门火衰为阳脱之病以温热之剂济之如附子乾姜之属若胃虚过食冷物抑遏阳气於脾土为火鬱之病以升散之剂发之如升麻葛根之属不明诸此之类而求火之为病施治何所依据故於诸经集略其说备处方之用庶免实实虚虚之祸也

又按火热之极者经曰壮火散气壮火之气衰故有阳极似阴之证河间治身冷唯心胸微暖昏冒不知人事不能言脉微而欲绝者用凉膈散养阴以退阳此因病阳厥而尚不下所致身冷脉微而似阴证亢则害承乃制极变病例也然人火龙火治法与论唯太仆河间丹溪之意已详其未悉之旨今辑于左王安道曰予读内经六微旨论至于亢则害承乃制喟然叹曰至矣哉其造化之枢纽乎王太仆发之於前刘河间阐之於後圣人之蕴殆靡遗矣然学者尚不能释然得不犹有未悉之旨也欤谨按经帝曰愿闻地理之应六节气位何如岐伯曰【云云】尝观夫阴阳五行之在天地间也高者抑之下者举之强者折之弱者济之盖莫或使然而自不能不然也不如是则高者愈高下者愈下强者愈强弱者愈弱而乖乱之弊日已极矣天地岂能位乎虽然高也下也强与弱也亦莫或使然而自不能不然也故易也者造化之不可常也惟其不可常故神化莫能以测莫测故不息也可常则息矣亢则害承乃制者其莫或使然而自不能不然也欤夫太仆河间已发挥者兹不赘及其未息之旨请推而陈之夫自显明之右止君火治之十五句言六节所治之位也自相火之行下止阴精承之十二句言地理之应乎岁气也亢则害承乃制二句言抑其过也制生则化止生化大病四句言有制之常与无制之变也承犹随也然不曰随而曰承者以下言之则有上奉之象故曰承虽谓之承而有防之之义存焉亢者过极也害者害物也制者克胜之也然所承也其不亢则随之而已故虽承而不见既亢则克胜以平之承斯见矣然而迎之不知其所来迹之不知其所止固若有不可必者然可必者常存乎杳冥恍惚之中而莫之或欺之

河间曰已亢过极则反似胜己之化似也者其可以形质求哉故後篇厥阴所至为风生终为肃少阴所至为热生终为寒之类其为风生为热生者亢也其为肃为寒者制也又水发而为雹雪土发而飘骤之类其水发土发者亢也其雹雪飘骤者制也若然者盖造化之常不能以无亢亦不能以无制焉耳夫前後二篇所主虽有岁气运气之殊然亢则害承乃制之道盖无往而不然也惟其无往而不然故求之於人则五脏更相平也一脏不平所不胜平之五脏更相平非不亢而防之乎一脏不平所不胜平之非既亢而克胜之乎姑以心火而言其不亢则肾水虽心火之所畏亦不过防之而已一或有亢即起而克胜之矣余脏皆然制生则化当作制则生化盖传写之误而释之读之者不觉求之不通遂并遗四句而弗取殊不知上二句止言亢而害承而制耳此四句乃害与制之外之余意也苟或遗之则无以见经旨之周悉矣制则生化正与下文害则败乱相对辞理俱顺不劳曲说而自通制则生化者言有所致则六气不至与亢而为平平则万物生生而变化无穷矣化为生之盛故生先於化也外列盛衰者言六气分布主治迭为盛衰昭然可见故曰外列害则败乱生化大病者言既亢为害而无所制则败坏乖乱之政行矣败坏乖乱之政行则其变极矣其灾甚矣万物其有不病者乎生化指所生所化者言谓万物也以变极而灾甚故曰大病上生化以造化之用言下生化以万物言以人论之制则生化犹元气周流滋营一身凡五脏六腑四肢百骸九窍皆藉焉以为动静云为之主生化大病犹邪气恣横正气耗散凡五脏六腑四肢百骸九窍举不能遂其运用之常也或以害为自害或以承为承袭或以生为自无而有化为自有而无或以二生化为一意或以大病为喻造化之机息此数者皆非也且夫人之气也固亦有亢而自制者苟亢而不能自制则汤液鍼石导引之法以为之助若天地之气其亢而自制者固复於平亢而不制者其孰助哉虽然造化之道苟变至於极则亦终必自反而复其常矣学者能本之太仆河间而参之此论则造化枢纽之详亦庶矣乎

气属阳动作火论

详见气门

论阴虚火动

详见熱門

论积温畜热成火宜汗吐下法

子和曰李屏山素饮酒一日得病医用酒蒸丸热後目覩天地但见红色遂成龙火卒不能救棠溪李济之常病目及居省掾每服补肝散以致睛胀但见窗檻横排几至丧明令涌泄五七次继服凉剂方始如故丹霞朱僧氏代章宗出家既病三阳畜热常居静室不敢见明明则头疼如锥每置水於顶上不能解其热历诸医莫能辩其病後治之七日而愈其法用汗吐下三法而已後用凉物清鎮之平复如故

谨按已上病例非汗吐下法则不能已人惟陰平阳秘神气以宁盖昧者徇情纵慾因致积热之证非一朝一夕故也治当如此其为治不能究其源委岂得不遂致误人者哉今以积热沉寒论附錄于左王安道曰人之所藉以生者气也气者何陰阳是也夫阴与阳可以和而平可以乖而否善摄与否吉凶於是乎定夫惟摄之不能以皆善也故偏寒偏热之病始莫逃於乖否之余矣虽然寒也热也苟未至於甚粗工为之而不难设热积而寒沈良工犹弗能以为计况其下乎奈之何俗尚顛蒙恪恃方药愈投愈盛迷不之反岂知端本澄源中含至理执其枢要衆妙俱呈且以积热言之始而凉和次而寒取寒取不愈则因热而从之从之不愈则技穷矣由是苦寒频岁而弗停又以沉寒言之始而温和次而热取热取不愈则因寒而从之从之不愈则技穷矣由是辛热比年而弗止叹夫苦寒益深而积热弥炽辛热太过而沉寒愈滋苟非大圣慈仁明垂枢要生也孰从而全之经曰诸寒之而热者取之阴热之而寒者取之阳所谓求其属也属也者其枢要之所存乎斯旨也王太仆知之故曰益火之原以消阴翳壮水之主以制阳光又曰取心者不必齐以热取肾者不必齐以寒但益心之阳寒亦通行强肾之阴热之犹可吁混乎千言万语之间殆犹和璧之在璞也夫寒之而热者徒知以寒治热而不知热之不衰者由乎真水之不足也热之而寒者徒知以热治寒而不知寒之不衰者由乎真火之不足也不知真水火不足泛以寒热药治之非惟脏腑习熟药反见化於其病而有者弗去无者复至矣故取之阴所以益肾水之不足而使其制夫心火之有余取之阳所以益心火之不足而使其胜夫肾水之有余也其指水火也属犹主也谓心肾也求其属者言水火不足而求之於心肾也火之原者阳气之根即心是也水之主者阴气之根即肾是也非谓火为心而原为肝水为肾而主为肺也寒亦益心热亦强肾此太仆之至理於矩準绳之外而非迂生曲士之可以跂及矣

火证治法

吐剂

仲景瓜蒂散

子和三圣散

元戎胜金丸

方并见痰饮门

按贾元良曰宣剂者涌吐是也以君召臣曰宣言以上召下之义也俚人以泻为宣非也古曰春宣五脏之积滞仲景大法春则人病在头故宜吐之南地人服屠苏自下而上是也下攻者非也然一切风热积热或火炽者其证寸口脉滑而有力胸中实满烦惋气上而不化面赤痰盛骂詈惊骇等证并宜吐之但已上诸方恐非所宜义见痰饮门

升散之剂

东垣泻阴火升阳汤治肌热烦热面赤食少喘欬痰盛脉右关缓弱或弦或浮数

羌活 甘草【炙】 黄芪 苍术【各一两】 升麻【八钱】 柴胡【一两半】 人参 黄芩【各七钱】 黄连【半两酒炒】 石膏【半两秋深勿用】

右?咀每服一两或半两水煎

按此发脾胃火邪之剂又心胆肝肺膀胱药也泻阴火升发阳气荣养气血也

升阳散火汤治男子妇人四肢发热肌热筋痹热骨髓中热发困热如燎扪之烙手此病多因血虚而得之或胃虚过食冷物抑遏阳气於脾土火鬱则发之升麻 葛根 独活

羌活【各半两】 防风【二钱半】 柴胡【八钱】

甘草【炙三钱】 人参 白芍【各半两】 甘草【生二钱】

右?咀每服半两或一两水煎稍热服

按此胃胆脾肺膀胱经药也

千金麦门冬汤治诸病後火热乘肺欬唾有血胸脇胀满上气羸瘦五心烦热渴而烦闷

麦门冬 桑白皮 生地黄【各一两】 半夏 紫苑 桔梗 淡竹茹 麻黄【各七钱半】 五味子 甘草【各半两】

右?咀每服五钱或一两入姜煎

按此心肺药也然麻黄恐非病後所宜

拔萃方地骨皮散治浑身壮热脉长而滑阳毒火炽发渴

地骨皮 茯苓【各半两】 柴胡 黄芩 生地黄 知母【各一两】 石膏【二两】
羌活麻黄【各七钱半有汗并去之】

右?咀每服一两入姜煎

按此肝心脾肺肾药又表里气血之剂也云岐子曰在五脏之标本者皆可用

梔子仁汤治发热潮热发狂烦躁面赤咽痛

梔子仁 赤芍 大青 知母【各一钱】 升麻 黄芩
石膏【各二钱】 杏仁【二钱】 柴胡【二钱半】 甘草【二钱】 豉【百粒】

右?咀水煎

按此脾肺肝胆胃经药也

阳毒升麻汤治伤寒杂病汗吐下後变成阳毒发狂谵妄喉痛下利

升麻【五钱】 犀角 射干 黄芩 人参 甘草【各二钱半】

右?咀水煎

按此升散肺胃火热药也

葛根橘皮汤治诸热证温毒成?或欬或心闷或呕葛根【三钱】 橘皮 杏仁 知母 黄芩 麻黄
甘草【各二钱】

右?咀入姜煎

按此肺胃膀胱经药也

谨按古方治火升散之剂其例少得姑采已上诸方以备其旨

折制之剂

局方凉膈散

按此泻脾胃肺心主胆三焦大肠火热药也

调胃承气汤

按此泻胃火之药也

当归承气汤

方并见热门

按此泻脾胃肝火之药也

麦门冬散治丈夫妇人蕴积邪热心胸烦闷咽乾口燥睡卧不安或大小肠不利口舌生疮

芒硝【一两】 麦门冬【三钱】 小草 黄连 升麻 犀角屑 甘草【炙】 黄芩 枳壳
大青【各半两】

右为末每三钱水煎

按此泻心肺肝胃火热之剂与已上诸方皆咸寒之药经云火淫于内治以咸寒而为正治然亦有气血上下之分也用者自宜取择

黄连解毒汤治一切火热毒狂躁烦心口燥咽乾热势之甚者及吐下後热不解而脉洪喘急
郑声目赤睛疼燥渴

黄连 黄柏 大梔子 黄芩【各等分】

右?咀水煎

按此太仓公火剂汤也泻心肺肾膀胱大小肠胃火之药

真珠散治男女五脏积热毒气上攻心胸烦闷口乾舌燥精神恍惚闷乱坐卧不安

琥珀 真珠粉 天花粉 铁粉

朱砂 生甘草 寒水石【煨】 牙硝 大黄【各等分】

右为细末每一钱竹叶汤调下

按此泻心肾胃火之剂镇坠药也

宣明大金花丸治中外诸热寝汗咬牙睡语惊悸溺血淋閼欬血衄血瘦弱头痛并骨蒸肺痿劳 去大黄加梔子名梔子金花丸

黄连 黄柏 黄芩 大黄【各等分】

右为末滴水丸小豆大每二三十丸新水下

按此解毒汤之变法也出阳明例但云治瘦弱头痛已下诸证犹宜详审用之

当归龙胆丸治肾水阴虚风热蕴积时发惊悸筋惕搐搦神志不宁荣卫壅滞头目昏眩肌肉
瞤瘕胸膈咽嗌不利肠胃燥澁躁扰狂越骂詈惊骇火热等证当归 草龙胆 大梔子
黄连黄柏 黄芩【各一两】 大黄 芦荟青黛【各半两】 木香【一钱】 麝【半钱】

右为末炼蜜丸如小豆大姜汤下三二十丸

按此泻心肝脾肺肾胃火之药也

神芎丸治一切热证常服保养除痰饮消酒食清头目利咽膈能令遍身结滞宣通气利而愈
神强体健耐伤省病

大黄 黄芩【各二两】 牵牛 滑石【各四两】 黄连 薄荷 川芎【各半两】

右为末水丸如小豆大温水下十丸至十五二十丸按此泻肝心脾胃肺膀胱火热之剂又气
血药也下湿热导滞甚捷但云常服神强体健省病与前方云治肾水阴虚虚损者恐未必然

升散折制之剂

宣明防风通圣散

川芎石膏汤

方并见中风门

局方红雪通中散治烦热躁热毒热喉闭狂躁胃烂发斑酒毒

麝香【半两】 朱砂【一两】 川朴硝【十斤】 羚羊角屑黄芩 升麻【各三两】 赤芍
竹叶枳壳 人参 木香 榔甘草【各二两】 葛根 大青 蓝叶梔子 桑白皮
木通【各一两半】 苏木【六两】

右件药制合见局方

按此表里气血之药也

紫雪治内外烦热不解口中生疮狂易叫走解诸热毒药毒邪热小儿惊癇百病

黄金【百两】 寒水石 磁石 石膏滑石【各三斤打碎】

以上用水一石煮至四斗去渣入下项

甘草【炙八两】 羚羊角屑 犀角屑 青木香沉香【各五两】 丁香【一两】 升麻
玄参【并剉细各一斤】

以上再煮至一斗五升入下项

硝石【四升芒硝亦得每升得七两七钱半】 朴硝【十斤提净者】

以上入前药汁中微火煎柳枝不住手搅候有七升投放水盆中半日欲凝入下项药搅令匀

朱砂【研三两】 麝香当门子【一两二钱半】

右药成霜雪紫色每服一钱或二钱冷水调下大人小儿临时以意加減并食後服

按此心脾肺肾胃经药也

千金黑奴丸治火热阳毒发狂发斑烦躁大渴倍常黄芩 釜底煤 芒硝 竈突墨梁上尘
小麦奴 麻黄 大黄【各一两】

右为末炼蜜丸如弹大新汲水化服不定再服半丸饮水尽足当发寒寒已汗出乃差未汗再
服半丸不大渴者不可与

按此出阳明药例取诸火化者为从治之意又表里之剂也

滋陰壯水之劑

拔萃六味地黄丸治腎氣虛久新憔悴寢汗發熱五臟齊損瘦弱虛煩骨蒸下血

丹溪大補丸降陰火補腎水

補陰丸降陰火治煩渴骨熱補腎水真陰不足

並見補虛門

按此三方足少陰藥下二方入陰中至陰之劑經云壯水之主以制陽光所謂求其屬也

局方玄參湯治腎臟實熱心胸煩滿耳聽無聲腰背俯仰強痛口乾溺赤

生地黄 玄參 五加皮 黃芩 赤茯苓 通草 石菖蒲 甘草【炙】 羚羊角屑 麥門冬【各等分】

右?咀水煎

按此滋腎通心氣血之藥也

從治之劑

丹溪左金丸瀉肝火行濕為熱甚反佐開痞結治肝邪

黃連【六兩】 吳茱萸【一兩】

右為末粥糊丸

局方溫膽湯治膽虛痰熱驚悸不眠

半夏 竹茹 枳實【各二兩】 陳皮 生薑【四兩】 甘草【二兩】

右?咀水煎每服一兩

治要茯苓散治心實熱口乾煩渴眠臥不安

茯神 麥門冬【各一兩半】 通草【一兩二錢半】 知母【一兩】 紫苑 桂心【各七錢半】 升麻【一兩二錢半】 淡竹茹【半兩】 大棗【十二枚】 赤石脂【一兩七錢半】

右?咀每服一两并花水煎

茱萸散治小肠虚热或酒後频吃冷水等物其病脐下结块连外肾俱肿者

吴茱萸【二钱半】川芎【半两】木通【四钱】半夏【一钱】

右?咀每三四钱入葱煎服

泻热汤治脾脏热面黄目赤季脇痛满

半夏 母姜【各八两】枳实 梔子茯苓 芒硝【各三两】细辛【五两】
白术杏仁【各四两】生地黄 淡竹叶【各一升】

右?咀每服一两或两半水煎後下硝温服

桂苓甘露饮治胃受湿热头疼身热烦渴吐泻口乾

方见热门

橘皮汤治肺热气欬息喘奔

橘皮 麻黄【各三两】紫苏 柴胡【各二两】宿姜 杏仁【各四两】石膏【八两】

右?咀每服一两水煎

生姜泄肠汤治大肠实热腹胀不通口舌生疮

生姜 橘皮 竹茹 黄芩梔子仁 白术【各三两】桂心【一两】
茯苓芒硝【各二两】生地黄【十两】

右?咀入大枣煎每服一两

金匱肾气丸治肾经虚热

方见补虚门

五苓散治发热而渴小便不利烦躁头痛

方见泄泻门

按内经注曰若调寒热之逆冷热必行则热物冷服下咽之後冷体既消热性便发由是病气随愈矣已上诸方皆从其气以去拒格之热可临证选用求其意例也

玉机微义卷十

卷十一

钦定四库全书

玉机微义卷十一 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

暑门

诸经叙暑热脉证

内经曰夏至日後病热为暑暑当与汗皆出勿止
因於暑汗烦则喘渴静则多言体若燔炭汗出而散 脉虚身热得之伤暑

难经曰伤暑得之为正邪火自病也当恶臭其病身热而烦心痛其脉浮大而散

伤寒论曰太阳中热者喝是也其人汗出恶寒身热而渴也太阳中喝者身热疼重而脉微弱此亦夏月伤冷水水行皮中所致也 太阳中喝者发热恶寒身重而疼痛其脉弦细芤迟小便已洒洒然毛耸手足逆冷小有劳身即热口开前板齿燥若发汗则恶寒甚加温针则发热甚数下之则淋甚

谨按许学士云伤暑其脉弦细芤迟何也内经曰寒伤形热伤气盖伤气而不伤形则气消而脉虚弱所谓弦细芤迟皆虚脉也仲景以弦为阴而朱肱亦曰中暑脉细弱则皆虚脉也可知矣

论中暑中热受病不同

洁古曰静而得之为中暑动而得之为中热中暑者阴证中热者阳证

东垣曰暑热之时无病之人或避暑热纳凉於深堂大厦得之者名曰中暑其病必头痛恶寒身形拘急肢节疼痛而烦心肌肤火热无汗为房室之阴寒所遏使周身阳气不得伸越多以大顺散热药主之是也若行人或农夫於日中劳役得之者名曰中热其病必苦头痛发躁热恶热扪之肌肤大热必大渴引饮汗大泄无气以动乃为天热外伤肺气苍术白虎汤凉剂主之按此论中暑即仲景所谓喝是也此只作暑热分之可见有阴阳二证受病不同然夏月受病有陰寒所遏使周身阳气不得伸越以大顺散主之者为中暑盖当暑月名之犹冬月发热为伤寒也但中热治例虽云用苍术白虎汤而又处清暑益气之法况大顺散一方是仲景太阳例药然东垣施用凉不如此必有若益气汤证例发挥??者惜乎无传故使後人不能无疑

也详後所论矧中暑证亦有於劳役动而得之中热证亦有於避暑静而得之大抵因人元气虚实不同故所受亦异为治岂得而无变法哉论暑伤五脏为证不同

陈无择曰暑热喜归心心中之使人噎闷昏不知人入肝则眩晕顽痹入脾则昏睡不觉入肺则喘满痿躄入肾则消渴凡中喝死治之切不得用冷唯宜温养得冷则死道途中无汤即以热土熨脐中仍使更溺槩可见矣凡觉中暑急嚼生姜一大块水送下如已迷闷嚼大蒜一大瓣水送下如不能嚼水研灌之立醒

谨按暑喝之证变异不等亦岂止归五脏也冷热当凭脉证用之盖人之形气有虚实所感有轻重轻则後时而发至秋成疟痢是也重则即时发者如已上之证至有轻变重重变轻亦自感有浅深传有兼并尔况人之形志苦乐不一岂得无变异乎大抵四时之证皆然

论暑热伤气为痿厥诸证

东垣曰夫脾胃虚弱必上焦之气不足遇夏天热盛损伤元气怠惰嗜卧四肢不收精神不足两脚痿软遇早晚寒厥日高之後阳气将旺复热如火乃阴阳气血俱不足也或四肢困倦精神短少懒於动作胸满气促肢节沉疼或气高而喘身热而烦心下膨痞小便黄而少大便溏而频或利出黄糜或如泔色或渴或不渴不思饮食自汗体重或汗少者血先病而气不病也其脉中得洪缓若湿气相搏必加之以迟迟病虽互换少差其天暑湿令则一也宜以清燥之剂治之或有所远行劳倦逢大热而渴渴则阳气内伐内伐则热舍于肾肾者水脏也今水不能胜火则骨枯髓虚足不任身发为骨痿者生於火热也此湿热成痿令人骨乏无力或热厥而阴虚或寒厥而气虚厥者四肢如在火中为热厥四肢寒冷者为寒厥寒厥则腹中有寒热厥则腹中有热为脾主四肢故也

按此论暑热证候即同冬月伤寒传变为证之不一也彼为寒邪伤形此则暑热伤气若真气元气虚甚受病忽有於一时不救者与伤寒阴毒顷刻害人实同故东垣啓是病例大开後人之盲瞶矣学者当审究其机宜与痿门兼看

论暑为疟痢

详见疟门滞下门

论暑为吐泻霍乱

详见本门

论中暑宜补真气

东垣曰夫脾胃虚弱遇六七月间河涨霖雨诸物皆润人汗沾衣身重短气甚则四肢痿软行

步不正脚欹眼黑此肾水与膀胱俱竭之状也当急救之滋肺气以补水之上源又使庚大肠不受邪热不令汗大泄也汗泄甚则止津液七神无所依津液相成神乃自生津者庚大肠所主三伏之义庚金受囚木无可制故风湿相搏骨节烦疼一身尽痛亢则害承乃制是也五月常服五味子是泻丙火补庚大肠益五脏之元气壬膀胱之寒已绝于己癸肾水已绝于午今更逢湿旺助热为邪西方北方之寒清绝矣圣人立法夏月宜补者补天元真气非补热火也今人夏食寒是也为热伤元气以人参麦门冬五味子生脉 者元气也

谨按王太仆曰苍天布气尚不越於五行人在气中岂不应乎天道然为医者不审阴阳消长升降浮沉之理将何所据焉故丹溪先生有夏月伏阴在内论深明东垣未悉之旨因附于左宜参考焉

丹溪曰天地以一元之气化生万物根於中者曰神机根於外者曰气立万物天地同此一气人灵於物形肖天地参而为三者以其得气之正而通之故天地之气升人之气亦升天地之气浮人之气亦浮降亦降沉亦沉人与天地同一橐龠也子月一阳生寅月三阳生此气之升也已月六阳生阳尽出地之上矣此气之浮也人之腹属地气於此时浮於肌表散於皮毛腹中之阳虚矣经曰夏月经满气溢入孙络受血皮肤充实长夏经络皆盛内溢肌中又曰夏气在孙络长夏气在肌肉所以表实者里必虚世言夏月伏阴在内此阴字有虚之义若作阴冷看其误甚矣或曰以手扪腹明知其冷而何前人治暑病有用玉龙丹大顺散桂苓丸单煮良姜与缩脾饮用草果等皆行温热之剂何吾子不思之甚也予曰经言春夏养阳王太仆谓春食凉夏食寒所以养阳也其意可见矣若夫凉台水馆大扇风车阴木寒泉水果冰雪寒凉之伤自内及外不用温热病何由安详玩其意实非为内伏阴冷而用之也前哲又谓升降浮沉则顺之寒热温凉则逆之若谓夏月火令之时妄投温热宁免实实虚虚之患乎或曰已月纯阳於理或通五月一阴六月二阴阴气既动岂无阴冷曰此阴之初动於地下也四阳浮於地上燔灼焚炎流金烁石何冷之有孙真人生脉散令人夏月服之非虚而何论暑火证治大法

贾元良曰暑者相火行令也夏月人感之自口齿而入伤心包络之经其脉虚外证头疼口乾面垢自汗倦怠少气或背寒恶热气甚者迷闷不省而为霍乱吐利痰滞呕逆腹痛泻痢下血发黄生斑皆是其证甚者火热制金不能平木搖撼不省人事其脉虚浮一曰浮者风也虚者暑也俗名暑风证者皆是相火甚而行令也先以温水化苏合香丸次进黄连香薷饮加羌活只用双解加香薷尤良大抵治暑之法清心利小便甚好若自汗甚者不可利小便宜白虎汤清解之次分表里治之如在表头疼恶寒双解散加香薷及二香散十味香薷散之类解之如在半表半里泄泻烦渴饮水吐逆五苓散治之热甚烦渴者益元散清之若表解里热甚宜半夏解毒汤下神芎丸酒蒸黄连丸等或人平生素弱及老人冒暑脉微下痢渴而喜温或厥冷不省人事宜竹叶石膏汤加熟附半个冷饮次以来复丹五苓散治之凡夏月暑证不可服诸热燥剂致斑毒发黄小水不通闷乱而死矣

按此言治暑之法可谓详备然云暑风相火为病而先用苏合香丸至用双解皆当审谛脉证施治不可少有差失详苏合香但可用於阴寒所遏或内伤生冷太过及气中或中恶者此等又不可谓之暑风相火之证矣盖暑证有阴阳二者不同治法寒热霄壤之隔学者慎之

暑证治法

清暑之剂

局方香薷饮治一切暑热腹痛霍乱吐利烦心等证香薷【一斤】 厚朴【制】
白扁豆【各半斤】

右?咀每服三四钱水煎

按此手足太阴药也世俗用於暑月中煎饮然气虚者不可过多盖厚朴乃泄气下气药也虽活人书用後方亦只是治暑火清心而已故例不可不分

黄连香薷饮

香薷【一斤】 厚朴【制半斤】 黄连【四两】

右?咀每二三钱水煎

按此手太阴少阴药也

益气之剂

局方人参白虎汤治暑热发渴脉虚

人参【一钱半】 知母【二钱】 石膏【半两】 甘草【一钱】

右?咀入粳米一合水煎

按此手太阴足阳明药也出太阳例

竹叶石膏汤

石膏【一两】 半夏【二钱半】 甘草 人参【各二钱】 麦门冬【半两】 竹叶

右?咀入生姜煎

按此足阳明手足太阴经药也

东垣人参益气汤治暑热伤气四肢困倦嗜卧两手指麻木

黄芩【八钱】 甘草【七钱内炙二钱】 人参【半两】 升麻【二钱】 白芍【三钱】
五味子【百四十个】 柴胡【二钱半】

右?咀分作四服

按此手足太阴足阳明少阳经药也

清暑益气之剂

宣明益元散

方见泄泻门

按此足太阳足三阴经药也

选方十味香薷散治伏暑身体倦怠神昏头重吐利香薷【一两】 人参 陈皮 白术茯苓
黄芩 木瓜 厚朴扁豆 甘草【各半两】

右?咀水煎每服一两

按此手足太阴经药也

东垣清暑益气汤治长夏湿热蒸人人感之四肢困倦精神少懒於动作胸满气促支节疼或
气高而喘身热而烦心下膨闷小便黄而数大便溏而频或痢或渴不思饮食自汗体重

黄芩 升麻 苍术【各一钱】 人参白术 神麴 陈皮【各半钱】 甘草【炙】 黄柏 麦门冬
当归【各三分】 葛根【二分】 五味子【九个】 泽泻【半钱】 青皮【二分】

右?咀水煎

按此手足太阴少阴足阳明经药也仲景太阳中暍证例禁汗下温针无治法宜是汤主之所谓发千古之秘也

温散之剂

五苓散治暑湿为病发热头疼烦躁而渴

方见泄泻门

桂苓丸治冒暑烦渴饮水过多心腹胀满小便赤少

肉桂【去皮】 茯苓【各一两】

右为末蜜丸每两作十丸每细嚼一丸白汤下按已上足太阳例药也

缩脾饮解伏热除烦渴消暑毒止吐泻霍乱

砂仁 草果 乌梅肉 甘草【炙各四两】 扁豆【炒】 乾葛【各二两】

右?咀每服四钱水煎冷服

按此手足太阴少阴足阳明经药也

消暑十全饮

香薷 扁豆 厚朴 甘草 紫苏 白术 茯苓 藿香 木瓜 檀香

右?咀水煎

按此手足太阴之剂气药也然已上二方今世俗多用姑存之以备取择

消毒丸治伤暑发热头疼

半夏 甘草 茯苓【各半斤】

右为末生姜汁作薄糊丸如梧桐子大每五十丸水下

易简方以好醋煮半夏姜汁作糊丸

按此足三阳少阴手太阴经药也

大顺散治冒暑伏热引饮过多脾胃受湿水谷不分清浊相干阴阳气逆霍乱呕吐脏腑不调

甘草 乾姜 杏仁【去皮尖】 桂【去皮】

右先将甘草用白砂炒次入姜却下杏仁炒过筛去沙净合桂为末每服二三钱汤点服

按此太阳例药

冷香饮子治伤暑喝霍乱腹痛烦燥脉沉微或伏

方见霍乱门

来复丹治伏暑泄泻身热脉弱

硝石【一两同硫黄火上微炒用柳条搅结砂子不可大】

太阴玄精石【研】舶上硫黄【各一两】五灵脂【去砂石】青皮 陈皮【各二两】

右为末和匀好醋糊为丸菟豆大每服二十丸空心米饮下

按此出厥阴例药也通利三焦分理阴阳温胃开结治挥霍变乱神志昏愤元气下?者甚捷然病因暑火湿热者勿用

治湿热之剂

子和桂苓甘露饮治伏暑发渴脉虚

桂 人参 藿香 茯苓白术 甘草 葛根 泽泻石膏 寒水石【各一两】滑石【二两】木香【一钱】

右为末每服三钱白汤调下

宣明桂苓甘露饮

茯苓 泽泻【各一两】石膏 寒水石【二两】

滑石【四两】白术 桂 猪苓【各半两】

右为末每服二三钱温汤调下

局方辰砂五苓散治伏暑烦渴头疼身重泄泻

本方加辰砂

右为末每二三钱或水或汤调下

按此三方并太阳经药然有温散淡渗解表不同也治火之剂

黄连解毒汤治暑热证脉洪实而渴

大金花丸治一切火热暑证

神芎丸治一切湿热内甚火暑之实者

方并见火门

玉机微义卷十一

卷十二

钦定四库全书

玉机微义卷十二 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

湿门

内经叙湿为诸证

经曰诸湿肿满皆属脾土 湿胜则濡泻 地之湿气感则害人皮肉筋脉

原病式曰诸痉强直积饮痞膈中满霍乱吐下体重附肿肉如泥按之不起皆属于湿

脉法

脉经曰脉沉而缓沉而细微缓者皆中湿 脉浮风湿脉大或浮虚而濡者皆寒湿
脉来滑疾身热烦喘

胸满口燥发黄者湿热 脉洪而缓阴阳两虚湿热自甚 脉洪而动湿热为痛也

论湿为痿为痹为痛为肿所挟寒热不同

内经曰因於湿首如裹湿热不攘大筋腰短小筋弛长腰短为拘弛长为痿因於气为肿四维相代阳气乃竭按丹溪曰湿者土之浊气首为诸阳之会其位高其气清其体虚故聪明系焉浊气熏蒸清道不通沉重不利似乎有物蒙之失而不治湿鬱为热热留不去大筋腰短者热伤血不能养筋故为拘挛小筋弛长湿伤筋不能束骨故为痿弱因於湿首如裹各三字为句湿热不攘以下各四字为句文整而意明第四章因於气为肿下文不叙恐有脱简然王注曰素常气疾湿热加之气湿热争故为肿也邪气渐盛正气渐微阳气衰少致邪代正气不宣通故四维发肿诸阳受气於四肢也但今人见膝间关节肿疼全以为风治者多悞矣

风寒湿三气杂至合而为痹也湿气甚者为着痹也其多汗而濡者阳气少阴气盛也伤於寒湿肌肤尽痛名曰肌痹

谨按湿证挟寒内甚则腹痛下利外甚则四肢沉重疼痛或肌肉濡溃痹而不仁也挟风多外甚而身重痛汗出挟热内甚则泻痢外甚则或痛或热或肿发黄如此等证虽内伤外感不同

况有错杂之邪合至当论其先後多少分治可也

寒湿之中人也皮肤不收肌肉坚紧荣血泣卫气去故曰虚虚者聂辟气不足按之则气足以温之故快然而不痛

按东垣曰此清虚之地气伤人也必从足始故地之湿气感则害人皮肉筋脉夫百病之变皆生於风雨寒暑及饮食居处陰阳喜怒针经解云若身形不虚外邪不能伤也

要略曰太阳病关节疼痛而烦脉沉而细者此名中湿亦曰湿痹其候小便不利大便反快但当利其小便一身尽痛发热日晡所剧者此名风湿此病伤於汗出当风或久伤冷所致也风湿脉浮身重汗出恶风风湿相搏身体疼烦不能转侧不呕不渴脉虚浮而濇风湿相搏骨节疼烦掣痛不得屈伸近之则痛剧汗

出短气小便不利恶风不欲去衣或身微肿也

按以上论风湿寒湿之异

湿家之为病一身尽疼发热身色如熏黄也 湿家病身疼发热面黄而喘头痛鼻塞而烦其脉大自能饮食腹中和无病病在头中寒湿故鼻塞内药鼻中则愈按以上前一病本湿热证例而论不言热无治法当分出之湿家者唯东南方湿热证多丹溪曰湿热相火为病十居八九东垣有湿热证例详见热门论中湿为脾虚所致

陈无择曰脾虚多中湿故曰湿流关节中之多使人?胀四肢关节疼痛而烦久则浮肿喘满昏不知人挟风则眩暈呕哕兼寒则挛拳掣痛治之不得猛发汗及灼艾泄泻惟利小便为佳也

谨按脾虚中湿内因多中满痞膈泻痢外感多为痿痹肘肿疼痛等证盖脾主肌肉尔况有挟风寒暑热不一详前人以挟风与湿在表者宜解肌兼寒与在半表里者宜温散宜渗泄唯湿热在里宜下里虚者宜分消实脾土为上外感非脾虚宜汗之灸之要在适中病情也

论湿生痰饮

详见痰饮门

论湿为泻痢欬症等证

详见泄泻滞下等门

论湿病似中风

详见中风门

论湿为脚气

详见脚气门

治湿大法

贾真孙曰湿为土气火热能生湿土故夏热则万物湿润秋凉则万物乾燥湿病本不自生因热而怫鬱不能宣行水道故停滯而生湿也况脾土脆弱之人易为感冒岂必水不流而後为湿哉人只知风寒之威严不知暑湿之炎暄感人於冥冥之中也病式云诸痉强直积饮等证皆属於湿或附肿体寒而有水气里必小便赤少不通或渴是蓄热入里极深非病寒也大抵治法宜理脾清热利小便为上故治湿不利小便非其治也宜桂苓甘露木香葶苈木通治之守真师曰葶苈木香散下神芎丸此药下水湿消肿胀利小便理脾胃无出乎此也腹胀脚肿甚者舟车丸下之湿热内深发黄茵陈汤下之或佐以防己黄芪一身尽肿痛或无汗是湿流关节邪气在表宜五苓散加官桂苍术微汗之不可大汗若自汗出多热燥津液内水不利切勿利之重损津液也宜防风白术甘草汤主之其湿证有二湿热证多湿寒证少当以脉证明辨之如脉滑数小便赤澀引饮为湿热证若小便自利清白大便溏痢身疼自汗为寒湿证治之宜五苓散加生附苍术木瓜主之

湿证治法

解表之剂

金匱防己黄芪汤治风湿脉浮身重汗出恶风或痛防己【一两】
甘草【炙半两】白术【七钱半】黄芪【一两一钱】

右?咀每服一两入姜枣煎喘者加麻黄胃气不和加芍药气上冲加桂枝下有寒加细辛按湿胜身重阳微中风则汗出恶风故用黄芪炙草实表防己白术胜湿也足三陰例药

桂枝附子汤治风湿相搏身体疼烦不能自侧不呕不渴脉浮虚而濇者此汤主之

桂枝【八钱】生姜【六钱】附子【二钱】甘草【炙四钱】

右?咀入大枣作二次煎若小便自利者去桂加白术汤主之服後其人如冒状勿怪

甘草附子汤治风湿相搏骨节疼烦掣痛不得屈伸近之则痛剧汗出短气小便不利恶风不欲去衣或身微肿痛者

甘草【炙四钱】 附子【三钱】 白术【四钱】 桂枝【八钱】

右?咀水煎 金匱減桂枝加生姜大枣名白术附子汤

按此一方足太阳例药解肌之剂也

麻黄加术汤治湿胜身烦疼

麻黄【六钱】 桂枝【四钱】 甘草【炙二钱】 杏仁【二十五个】 白术【八钱】

右?咀水煎取微汗金匱減桂术加薏苡仁名麻黄杏仁薏苡甘草汤治湿胜身疼日晡所剧者

按此太阳发表例药已上诸方治风寒湿之剂

元戎加味五苓散治湿胜身痛小便不利体重发渴

本方加羌活

按此太阳解表渗利之剂治风湿寒湿药也

局方五积散治外感风寒冒寒湿身体重痛 见本方按海藏云麻黄桂芍甘草即麻黄桂枝各半汤也苍术甘草陈皮厚朴即平胃散也枳壳桔梗陈皮茯苓半夏即桔梗半夏等汤也又川芎当归治血兼乾姜厚朴散气此数药相合为解表温中泄湿之剂去痰消痞调经之方虽为内寒外感表里之分之所制实非仲景表里麻黄桂枝姜附之的方也主於积冷呕泄时疫项背拘急加葱白豆豉厥逆加吴茱萸寒热欬逆加枣妇人难产加醋始知用之非一途也惟知活法者其择之

东垣羌活汤治湿热自甚身重或眩晕麻木小便澀赤下焦痿弱无力行步不正

方见热门

按此胜湿升阳之剂也出太阳茯苓泽泻例

温散之剂

真武汤治寒少甚腹痛下痢四肢沉重

附子汤

方并见寒门

按此少陰例药也

局方渗湿汤治寒湿所伤身重腰冷如坐水中小便或澁大便溏泄皆坐卧湿地或陰雨所袭之也

苍术 白术 甘草【各一两】 乾姜 茯苓【各二两】 陈皮 丁香【各二钱半】

右?咀每四钱入枣煎

按此足阳明太陰药也温中胜湿之剂

治热散鬱之剂

茵陈五苓散治湿热胜发热黄疸

茵陈蒿【十分】 五苓散【五分】

右二物和匀水煎服

宣明桂苓甘露饮治湿热内甚烦渴泻痢小便澁大便急痛霍乱吐下头痛口乾

方见暑门

大橘皮汤治湿热内甚心腹胀满小便不利大便滑泄橘皮【一两半】 木香【一钱】 滑石【六两】 ?榔【三钱】 茯苓【一两】 猪苓 泽泻 白术

桂枝【各半两】 甘草【二钱】

右?咀每服六七钱入姜煎

葶苈木香散治湿热内外余热水肿腹胀小便赤澁大便泄

葶苈 茯苓 猪苓 白术【各一两】 木香【半钱】 泽泻 木通 甘草【各半两】 桂枝【半两】 滑石【三两】

右为末每三钱白汤调下

按以上诸方出太阳例药也河间曰若小便不得通利而反转泄者乃湿热痞闷极深而攻之不开是能反为注泄此正气已衰而多难救慎不可与此也然当滋其化源

东垣清燥汤治表里有湿热痿厥瘫痪不能行走或足踝膝上皆肿痛口乾溼痢

方见痿门

按陰阳两虚湿热甚者不可缺此

当归拈痛汤

方见疮疡门

按此治湿热盛实之剂

宣剂

瓜蒂散治中寒湿头痛面黄鼻塞烦而脉大

瓜蒂【一味为末】

右以些小於鼻内吹之其水自下

按湿盛致痰液留膈上肩背重痛麻痹者宜此吐之出足太阳例药也

攻下之剂

宣明三花神佑丸治一切水湿肿病大腹实胀喘满

方见痰饮门

舟车丸

大黄【二两】 甘遂 大戟 芫花青皮 陈皮 牵牛【头末四两】 木香【半两】

右为末水丸如桐子大每六七十丸白汤下随证临时加减

濬川散

大黄【煨二两】郁李仁【二两】芒硝【半两】甘遂【一两制】牵牛【头末四两】

右为末 汤调下半钱空心临卧随证加减服

导水丸治湿热内鬱胸膈痞闷齁衄口舌生疮咽喉不利牙疳齿蚀口臭或遍身生湿疮乾疥睡语咬牙惊惕怔忡大小便滯澁风热酒毒蘊热等证

大黄 黄芩【各二两】牵牛【头末】滑石【各四两】

右为末水丸如梧子大每四五十丸煎水下随证临时加减

按以上诸方出阳明例药也又气血之剂湿热甚者非此不能除但中病者即止虚弱者慎之故守真亦云凡正气已衰者不可与葶苈木香散况以上诸药乎

禹功散

方见疝气门

除湿丹治诸湿客搏腰膝重痛足胫浮肿筋脉紧急津液凝澁便溺不利

诃榔 甘遂 葳灵仙 赤芍 泽泻 葶苈【各二两】乳香 没药【各一两】牵牛【半两】大戟【炒三两】陈皮【四两】

右为末糊丸桐子大每五十丸至七十丸温水下按此出太阳例药诸湿鬱滯於表里重痛沉着非此不除

东垣海金沙散治脾湿太过通身肿满喘不得卧及腹胀如鼓

牵牛【一两半微炒】甘遂【半两】白术【一两】海金沙【三钱】

右为末每二钱煎倒流水调下得利止後服

圣灵丹治脾肺有湿喘满肿盛小便赤澁

苦葶苈【四两炒】茯苓【寒食面包煨】木香诃榔 汉防己 木通 人参【各二钱半】

右为末枣肉丸梧子大每三十丸棗白皮汤下

续随子丸治肺经有湿通身虚肿满闷不快或欬或喘人参 汉防己 赤茯苓【如工煨】诃榔

木香【各半两】 葶苈【四两炒】 续随子【一两】 海金沙【半两】

右为末枣肉丸梧子大每三十丸棗白皮汤下按此三方并太阳例药当较其轻重选使可也
升散渗利之剂

机要白术芍药汤

白术汤

茯苓汤

东垣升阳除湿汤

升阳除湿防风汤

方并见泄泻门

导滞通经汤治脾湿有余气不宣通面目手足肿注闷而痛陈五苓内减猪苓桂加木香陈皮

右?咀每服五钱水煎

局方五苓散

白术 猪苓 茯苓【各两半】 桂【一两】 泽泻【二两半】

右为末每服三二钱热汤调下

按已上诸方并太阳例药宜随证选用

平胃散

苍术【八两】 陈皮【五两】 甘草【炒三两】 厚朴【五两】

右为末每三钱姜枣煎或盐汤点服

对金饮子治脾胃受湿腹胀米谷不化饮食不进身体沉重肢节酸疼皮肤微肿

平胃散【一两】 棗白皮【炒一两】

右为末每三二钱入姜煎服

按此二方足太陰阳明手太陰药也

丹溪越鞠丸治湿鬱

苍术 抚芎 白芷

玉机微义卷十二

卷十三

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷十三 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

燥门【结燥附】

内经论燥为诸证

诸澁枯涸乾劲皴揭皆属於燥

按此河间论治已详然当分大便閼结或消渴之类为里证皮肤燥澁乾疥瓜枯之类为表证而於阳结陰结气盛血少痰鬱风热可得而悉

燥本风热论

原病式云经曰风热火同阳也寒燥湿同陰也又燥湿小异也然燥金虽属秋陰而異于寒湿故反同其风热也故火热胜金衰而风生则风能胜湿热能耗液而反寒阳实陰虚则风热胜于水湿而为燥也凡人风病多因热甚而风燥者为其兼化以热为其主也然阳实陰虚而风热太甚以胜水湿因而成燥肝主于筋而风气自甚又燥热加之液还聚於胸膈则筋太燥也燥金主於收斂劲切紧濇故为病筋脉劲强紧急而口噤也或病燥热太甚而脾胃乾涸成消渴者或风热燥甚怫鬱在表而里气平者善伸数欠筋脉拘急或时恶寒或筋惕而搐脉浮数而弦也风热燥并鬱甚于里故烦满而或閼结也及风痼之发作者由热甚而风燥为其兼化涎溢胸膈燥烁而瘈瘲昏冒僵仆也凡此诸证皆由热甚而生风燥各有异者由风热燥各微甚不等故也所谓中风或筋缓者因其风热胜湿而为燥乃燥之甚也然筋缓不收而痿痹故诸瘖鬱病痿皆属金肺乃燥之化也如秋深燥甚则草木痿落而不收病之象也是以手得血而能握足得血而能步夫燥之为病者血液衰少也而又气血不能通畅故病然也

论燥热胜陰

见消渴门

论结燥病本不同

东垣曰金匱真言论云北方黑色入通於肾开窍於二陰藏精於肾又云肾主大便大便难取足少陰夫肾主五液津液润则大便如常若饥饱劳逸损伤胃气及食辛热味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液亏少故大便结燥然结燥之病不一有热燥有风燥有阳结有陰结又有年老气虚津液不足而结者治法云肾恶燥急食辛以润之结者散之如少陰不得大便以辛润之太陰不得大便以苦泻之阳结者散之陰结者热之仲景云小便利大便硬不可攻下以脾约丸润之食伤太陰腹满食不化腹响然不能大便者以苦药泻之大抵津液耗少而燥者以辛润之有物而结者当下之若不究其源一槩用巴豆牵牛之类下之损其津液燥结愈甚有复下复结极则以至引导於下而不能通者遂成不救之证可不慎哉

按此只是论结燥言里证也河间所论则兼表里而言之矣犹宜以燥热胜陰相火论诸篇兼看

燥证治法

治风之剂

机要大秦艽汤治血弱陰虚不能养筋筋燥而手足不能运动指爪乾燥属风热甚者

方见中风门

按此散风热养血之剂太阳例药也

麻仁丸

郁李仁 麻子仁【各一两另研】 大黄【二两半以一半炒】 山药 防风 枳殼【炒各七钱半】 榔【半两】 羌活 木香【各五钱半】

右为细末炼蜜丸梧子大每三二丸温水下

按此手足阳明足太阳经药表里之剂气分药也

东垣润肠丸治脾胃中伏火大便秘澁或乾燥秘塞不通全不思食乃风结秘血结秘皆令秘塞也以润燥和血疏风自然通矣

麻子仁 桃仁【各一两去皮尖另研】 羌活 当归尾 大黄【煨各半两】 皂角仁 秦艽【各五钱】

右除另研外为细末五上火炼蜜丸如桐子大每三五十丸食前白汤下又有润燥丸一方於本方加郁李仁防风是也

按此足太陰手足阳明表里药也

治热之剂

宣明当归龙胆丸

方见火门

清凉饮子

方见热门

和血润下之剂

东垣导滯通幽汤治大便难幽門不通上冲吸門不开噎塞不便燥闭气不得下治在幽門以辛润之当归 升麻 桃仁【各一钱另研】生地黄熟地黄【各半钱】红花炙甘草【各三分】

右件作一服水煎调?榔细末半钱服加大黄名当归润燥汤

元戎四物汤治臟结秘澁者

当归 熟地黄 川芎 白芍药 大黄【煨】 桃仁【各等分】

右?咀水煎或为丸服亦得

按此手足厥陰经药也

子和脾约丸

麻仁【一两二钱半】枳实【炒】 厚朴芍药【各二两】 大黄【四两蒸】杏仁【去皮尖炒一两二钱】

右为末炼蜜丸梧子大每三二十丸温水下

润体丸

郁李仁 大黄 桂心 黑牵牛 当归 黄柏【各半两】轻粉【少许】

右为末水丸如梧子大每三四十丸温水下

按已上二方一气分药一血分药也二方故所主不同然气血不能宣通者非此莫能疗而气虚津液不足者慎之

神功丸

方见欬门

按此手足太陰药也气分之剂

滋陰之剂

拔萃六味地黄丸治下焦燥热小便澀而数

丹溪大补丸治陰虚燥热

方见火门

玉机微义卷十三

卷十四

钦定四库全书

玉机微义卷十四 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

寒门

内经叙寒气为痛为积为呕为泄

举痛论云寒气入经而稽泣经脉不行客於脉外则血少客於脉中则气不通故卒然而痛重中於寒则痛久矣

寒气客於小肠募原之间络血之中血泣不得注於大经血气稽留不得行故宿昔而成积寒气客於肠胃厥逆上出故痛而呕也 寒气客於小肠小肠不得成聚故腹痛後泄矣

谨按篇中具寒气客於诸脉及相引腹股等为痛甚详宜玩本文为积

又详见积聚门

论寒为症瘕坚痞厥逆诸证

原病式曰诸病上下所出水液澄彻清冷下痢清白吐痢腥秽食已不饥坚痞腹满急痛症瘕?疝屈伸不便厥逆禁固皆属於寒

论寒为滞下泄泻欬嗽诸证

详见滞下等门

按已上诸论病机多属内中於寒口食生冷所致皆非外感证也因兹所类但以伤寒外感分例然已上病机亦有标本不同故不复参附详见各门

脉法

难经曰伤寒之脉陰阳俱盛而紧濇

伤寒论曰脉陰阳俱紧者名曰伤寒 寸口脉浮而紧浮则为风紧则为寒 浮濇而紧为伤寒

谨按伤寒脉及六经传变本论已详兹不备録惟许学士百证歌第一篇甚得旨要但其中二句讹舛如脉浮而缓风伤荣浮紧兼濇寒伤卫正与仲景脉理差别此非许学士之不精盖亦後人传写之误也许学士云仲景言脉大浮数动滑此名阳也沉濇弱弦微此名陰也脉诀以动脉为陰弦为阳何也大抵此兼衆脉而合言之也唯伤寒如此杂病各见一脉仲景之意若曰浮大者阳也兼之以动滑数之类安得不为阳沉细者陰也兼之以濇弦数之类安得不为陰故仲景论动脉则曰阳动则汗出陰动则发热数脉见于关上上下无头尾如豆大厥厥动摇名曰动也又结胸证云脉浮而动浮则为风动则为痛故兼数与浮而言动脉则阳脉阳病也宜矣仲景论弦者状如弓弦按之不移弦则为減又曰支饮急弦又少陰证云手足寒脉弦迟故此兼迟而言弦则为陰证脉也宜矣故仲景伤寒脉不可与杂病脉同日而语也今阳证往往浮大而厥厥动摇其沈细而弦者必陰证也何疑之有哉故知治伤寒当以仲景脉法为本

脉经曰迟紧为寒 寒则紧弦 濇迟沈细为寒 脉小实而紧者病在内冷 脉沈而细下焦有寒 脉累累而贯珠不前至有风寒在大肠 脉细小紧急病速进在中寒为疝瘕 寸口脉迟上焦有寒脉紧寒之实也关脉迟胃中寒尺脉迟濇寒在下焦 弦小者寒癖迟而缓微而紧皆有寒也

论伤寒中寒受病不同

丹溪曰仲景论伤寒矣而未及乎中寒先哲治胃大寒而昏用附子理中而安其议药则得之矣曰伤曰中未闻有议其异同之者因思伤寒有即病有不即病必大发热邪循经而入以渐而深中寒则仓卒感受其病即发而暴伤寒之人因其旧有鬱热风寒外来肌腠自密鬱发为热其初也用麻黄桂枝发表而安以病体不甚虚也中寒之人乘其肤腠踈豁一身受邪难分经络无热可发温补自解此胃气之大虚也伤寒热虽甚不死中寒若不急治去生甚远其虚实盖可见矣

谨按仲景论伤寒至三陰病例可汗外感也韩祇和例温中即中寒也张洁古三陰可下王海藏例可补皆言内伤也但韩氏不直指中寒而就於陰证立便例例可温中之法与仲景三陰病论证不同乃别立方意指中寒而未甚莹故丹溪先生重明此意然皆宜详玩临证合宜处治也

论陰阳虚盛恶寒与伤寒不同

内经曰阳虚则外寒者阳受气於上焦以温皮肤分肉之间令寒气在外则上焦不通上焦不通则寒气独留於外故寒栗 陰盛则内寒者因厥气上逆寒气积於胸中而不泻不泻则温气去寒独留则血凝泣凝则脉不通其脉盛大以澁故中寒

按此言陰阳虚盛为寒本七情所动之致义见调经论篇皆与伤寒中寒受病不同者也

东垣曰夜则恶寒昼则安静是陰血自旺於陰分也夜则恶寒昼则恶寒是重陰无阳也当亟泻其陰峻补其阳 夜则安静昼则恶寒是陰气上溢於阳中也按此亦陰盛所致之本病非感寒外因也伤寒外因三阳恶寒皆表邪未解太陰手足自温故不恶寒少陰厥陰手足厥逆而恶寒者陰盛然也与此稍异论陰毒

王海藏云陰毒本因肾气虚寒因慾事或食生冷物而後傍风内既伏陰外又伤寒或先感外寒而後伏陰内外皆陰则阳气不守遂发陰毒身重眼睛疼身体倦怠而甚热四肢厥逆冷额上及手背冷汗不止或多烦渴精神恍惚如有所失三二日间或可起行不甚觉重诊之则六脉沈细而疾尺部短小寸口或无若服凉药则渴转甚躁转急有此证者急服还阳退陰之药则安惟补虚和气而已宜服正元散之类陰证不宜发汗如气正脉大身热未差用药发汗无妨 或寸口小而尺脉微大亦同积陰感於下则微阳消於上故其候沈重四肢逆冷腹痛转甚或喉不利或心下胀满结硬躁渴虚汗不止或时狂言爪甲面色青黑六脉沈细而一息七至以来有此证者速宜於气海关元二穴灸三二百壮以手足和暖为効仍服金液丹来复丹之类随证治之按此言阳气不守或积陰感於下微阳消於上遂为陰毒与活人书论陰毒为陰气独盛阳气暴絕者殊有发明矣但言不守与消之义而又不若赵氏释活人书云陰气极盛阳气极微为陰毒阳气极盛陰气极微为阳毒庶不为竭絕之证义尤明白陰盛格阳脉附见熱門

论诸证寒热似伤寒

详见熱門

谨按世传以寒痰脚气食积劳烦四证为似伤寒然以形证较之亦岂止四证而已故集证论

详见熱門

论伤寒传变

此事难知云足太阳为巨阳为老阳又为诸阳之首故多传变尔太阳传阳明谓之微邪是水传土也又谓之循经得度传太阳传少阳谓之越经传太阳传太陰谓之误下传太阳传少陰谓之表里传变之邪太阳为甚复传少陰水胜火火胜水此南北二方之变顷刻之间其害人也甚於太阳多矣若辨之不早必成不救之疾况乱投汤药者乎太阳传厥陰谓之首尾传厥陰与督脉上行与太阳相接又名巡经得度传灾变至重不为不多矣

按此可谓发仲景之心法矣赵氏亦曰伤寒六经传变或虚或实或冷或热无非邪气之所为也有次第传经之阳邪有直入本经之陰邪有下後内?之邪皆不可不辨也然成无已引华陀云伤寒一日在皮二日在肤三日在肌四日在胸五日在腹六日入胃即传里也与成所论七日不解为再经二七日不解为过经皆大约也故一无治例惟六经传变为的故太阳传变居多者因其初感邪气乘虚而入则传也有三五日止在本经或十数日不传者有之有传过一

经而不再传者亦有之有悞服药而致传变者多矣大抵邪在阳经则易治传入陰分则危殆盖阳微陰盛正虚邪实矣况悞下内?汗虚别经者则坏异倾危可立待也学者慎之

论伤寒只传足经不传手经

发明曰伤寒受病之由皆出热论一篇而已皆传足经不传手经何也盖伤寒病冬月得之足太阳膀胱经为首次至足厥陰肝经为尾此病惟伤北方与东方反戌土上有足阳明胃湿之专位兼丑上有足太陰脾土之专位盖足之六经皆在东北之方经云冬伤於寒即发者为伤寒春发为温病夏发为温疫为病最重此之谓也仲景云无奇经则无伤寒缘奇经皆附足六经不附手经寒邪只伤足经者为有奇经故也长夏为大热病者夏火既王火之方与秋之分皆手经居之水方与春之分皆足经不足及夏火王客邪助于手经则不足者愈不足矣故所用之药皆泄有余而非足经药何者泄有余则不足者补矣此伤寒只先足经而不言手经也大大意如此至於传手经者亦有之矣

论伤寒传手经

此事难知曰伤寒传至五六日间渐变神昏不语或睡中独语一二句目赤唇焦舌乾不饮水稀粥与之则咽终日不与则不思六脉细数而不洪大心下不痞腹中不满大小便如常或传至十日以来形貌如醉人虚见神昏不已多用承气汤下之则误矣盖不知此热传手少陰心经也然而又未知自何经而来答曰本太阳经伤风风为阳邪阳邪伤卫陰血自燥热畜膀胱壬病逆传於丙丙丁兄妹由是传心心火自上迫而熏肺所以神昏也谓肺为清虚之藏内有火邪致令神昏宜梔子黄芩黄连汤若脉在丙者导赤散脉在丁者泻心汤若误用凉膈散乃气中之血药也在左手寸脉沈滑有力者则可用之或用犀角地黄汤近於是也本方所说若无犀角以升麻代之是阳明经药也此解阳明经血中热药若脉浮沈俱有力者是丙丁中俱有热也可以导赤泻心各半服之则宜矣此证膀胱传丙足传手经也下传上也丙传丁也表传里也壬传丁者艮传离也越经传也又谓腑传脏也活人云伤寒只传足经不传手经此言不尽意也有从足经而传手经者何以知之经云传寒或止传一经或间传三经不可一途而取之但凭其脉与外证治之此活法也与食则咽者邪不在胃也不与则不思者以其神昏故热邪既不在胃误与承气汤下之其死也必矣

谨按伤寒本只传足经已上又例传手经之义可谓发病机之秘矣盖只是邪蘊日久因足经实手经虚故冤热尔有因汗下差悞而传有因七情或劳倦等而致者有之大抵传于经必有所因所以古人有救逆复脉等法岂但切中病情实啓後人之意例尔论伤寒陰分发热为反用温汗法

赵嗣真曰详仲景论发汗汤剂各分轻重不同如麻黄桂枝青龙各半越婢等汤各有等差至於少陰发汗二汤虽同用麻黄附子亦自有轻重加減之别故以加细辛为重加甘草为轻辛散甘缓之义也其第一证以少陰本无热此发热故曰反也盖发热为邪在表而当汗又兼脉沈属陰而当温故以附子温经麻黄散寒而热须汗解故加细辛是汗剂之重者第一证既无

里寒之可温又无里热之可下求其所用麻黄附子之意则是脉亦沈方可名曰少陰病身亦发热方可行发表药又得之二三日病气尚浅比之前证亦稍轻故不重言脉证而但曰微发汗所以去细辛加甘草是汗剂之轻者向使脉不沈身不热又无他证则是无病人也又何药焉仲景本分作两证以别汗剂之轻重活人书却於第二证中除去无证两字改作常见少陰热阳证者所谓少陰热阳证如经云心中烦不得卧或咽疮声不出者或欬而呕渴或口燥咽乾或腹胀不大便数证皆是也夫岂麻黄附子甘草汤发汗剂所可治耶抑又有闻焉麻黄附子细辛汤为治少陰病之脉沈反发热者固也而仲景又有四逆汤治太阳病之发热反脉沈者均谓之反也仲景云病发热头疼脉反沈若不差身体头疼痛者当救其里宜四逆汤此证出太阳篇又云少阴病始得之反发热脉沈者麻黄附子细辛汤此证出少陰篇切详太阳病发热头痛法当脉浮今反沈少陰脉沈法当无热今反热仲景於此两证各言反者谓反常也盖是太阳病脉似少陰少陰病证似太阳所以谓之反而治之异也今深究其旨均是脉沈发热以其有头痛故为太阳病阳证当脉浮今反不能浮者以里虚久寒正气里微所致又身体疼痛故宜救里使正气内强逼邪出外而乾姜生附亦能出汗而解假使里不虚寒则当见脉浮而正属太阳麻黄汤证也均是脉沈发热以其无头痛故名少陰病陰病当无热今反寒邪在表未传在里但皮腠鬱闭而为热而在里无病故用麻黄细辛以发表邪之热附子以温少陰之经假使寒邪入里则外必无热当见吐利厥逆等证而属正少陰四逆汤证也由此观之表邪浮浅发热之反犹轻正气衰微脉沈之反为重此四逆汤为剂不为不重於麻黄附子细辛汤也又可见熟附配麻黄发中有补生附配乾姜补中有发仲景之旨微矣嗟夫常病用常法夫谁不知设有证变者或脉变者往往疑似参差亦欲以常法例治之惑矣如仲景所论太阳少陰两证脉沈发热虽同而受病与用药自别此实证治之奇异医法之玄微故并及之

谨按伤寒六经证仲景例表里六经药矣而又於每经表药中分脉证轻重而用药如此实万世无穷之惠也然历世而下得此意例之妙者能几人哉但近世习俗不求其意托时世风土之异或例用气药以治伤寒表邪逆悞多矣况里证乎论见後发表诸方下

论伤寒两感

王海藏曰天之邪气感则害人五脏以是知内外两感脏腑俱病欲表之则有里欲下之则有表表里既不能一治故云两感者不治然所禀有虚实所感有浅深虚而感之深者必死实而感之浅者犹可治治之而不救者有矣未有不治而获生者矣余尝用大羌活汤间有生者十得二三故立此以待好生君子用之

按本方治法见後

赵嗣真曰仲景论两感为必死之证而复以治有先後发表攻里之说继之者盖不忍坐视而欲觐其万一之可活也活人书云宜救里以四逆汤後救表以桂枝汤殊不知仲景云太阳与少陰俱病则头痛为太阳邪盛於表口乾而渴为少陰邪盛於里也阳明与太陰俱病则身热谵语为阳明邪盛於表不欲食腹满为太陰邪盛於里也少阳与厥陰俱病则耳聋为少阳邪盛於表囊缩而厥为厥陰邪盛於里也三阳之头痛身热耳聋救表已自不可三陰之腹满口

乾渴缩囊而厥不下可乎活人书引下痢身疼痛虚寒救里之例而欲施於烦渴腹满谵语囊缩热实之证然乎否乎盖仲景所谓发表者葛根麻黄是也所谓攻里者调胃承气是也活人书所谓救里则是四逆救表则是桂枝今以救为攻岂不相背若用四逆汤是以火济火而腹满谵语?缩等证何由而除脏腑何由而通荣卫何由而行而六日死者可立而待也吁两感虽为不治之证矣然用药之法助正除邪虚实虚补不足损有余之理学者不可不素有一定之法於胸中也

伤寒合病并病论

赵嗣真曰愚尝疑合病与并病之为难明也久矣因姑释之盖合病者二阳经或三阳经同受病病之不传者也并病者一阳经先病又过一经病之传者也且如太阳阳明并病一证若并而未尽是传未过尚有表证仲景所谓太阳证不罢面色赤阳气怫鬱在表不得越烦躁短气是也犹当汗之以各半汤若并之已尽是为传过仲景所谓太阳证罢潮热手足汗出大便硬而谵语者是也法当下之以承气汤是知传则入腑不传则不入腑所以仲景论太阳阳明合病止出三证如前於太阳阳明并病则言其有传受如此也又三阳经互相合病皆曰下利仲景於太阳阳明合病则主以葛根汤太阳少阳合病主以黄芩汤少阳阳明合病主以承气汤至於太阳少阳并病其证头项强痛眩暈如结胸心下痞鞭当刺大椎肺俞肝俞不可汗下太阳阳明并病已见上论但三阳合病仲景无背恶寒语句虽别有口燥渴心烦背微恶寒者乃属太阳证而非三阳合病也三阳若与三陰合病即是两感所以三陰无合病例也按三阳合病证治见伤寒论阳明例篇

伤寒变温热病论

赵嗣真曰按仲景论谓冬月冒寒伏藏於肌肤而未即病因春温气所变则为热夫变者改易之义也至此则伏寒各随春夏之气改变为温为热既变之後不得复言其为寒也所以仲景云温病不恶寒者其理可见矣活人书却於温病曰阳热未盛为寒所制岂有伏寒既已变而为温尚可言寒能制其阳热耶又於热病曰阳热已盛寒不能制亦不当复言其为寒也盖是春夏阳热已变其伏寒即非有寒不能制其阳热尔外有寒能折阳气者乃是时行寒疫仲景所谓春分以後秋分节前天有暴寒为时行寒疫也三月四月其时阳气尚弱为寒所折病热则轻五月六月阳气已盛为寒所折病热则重七月八月阳气已衰为寒所折病热亦微是知时行寒疫与温热二病所论阳气盛衰时月则同至於论暴寒之寒与伏寒已变之寒自是相违名不正则言不顺矣仲景又云其病与温及暑病相似但治有殊者要在辨其病源寒热温三者之殊则用药冷热之品味判然矣

谨按王安道伤寒立法考曰读仲景书当求其立法之意不然则疑信相杂未免通此而碍彼也夫伤寒有即病者则为伤寒不即病者则谓之温与暑焉其类虽殊其所受之源则不殊也夫仲景之书三陰经寒证居热证十之七八彼不即病之温暑但一於热耳何由而为寒哉就三陰寒证而详味之然後知予言之不妄或谓三陰经寒证本是杂病为王叔和增入其中又或谓其证之寒盖由寒药误治而致若此者非也夫叔和之增入者辨脉平脉与可汗可下等

诸篇而已其六经病篇必非叔和所能赞辞也但厥陰经中下痢呕哕诸条却是叔和因其有厥逆而附遂并无厥逆而同类者亦附之耳至若以药误治而成变证则为太阳为多纵使三陰证亦或有寒药误治而变寒者然岂应如是之衆乎夫惟後人以仲景书通为伤寒温暑者设遂致诸温剂皆疑之而不敢用韩祗和虽觉桂枝汤之难用但谓今昔之世不同然未悟仲景书本为即病之伤寒设也且其着微旨一书又纯以温暑作伤寒立论而即病之伤寒反不言及此已是舍本从未全不能窥仲景藩篱又以夏至前胸膈闷呕逆气塞肠鸣腹痛身体拘急手足逆冷等证视为伤寒谓与仲景三陰证脉理同而证不同遂别立温中法以治以予观之其胸膈满闷呕逆气塞等证既与仲景所叙三陰证不同则是内伤杂病岂温暑病乎况仲景所叙三陰证求对於春夏温暑之病不亦悞乎虽然祗和时内伤之理未明而又适当温暑病作之际其为感也固宜若非内伤杂病则不止暴寒所中之病也且但曰寒而当温然未尝求其所以为寒之故也能求其故则知温暑本无寒证其为寒证者皆内伤杂病与暴寒所中也至於刘守真出亦以温暑作伤寒立论而遗即病之伤寒其所处辛凉解散之剂固为昧者有中风伤寒错治之失而立盖亦不无桂枝麻黄难用之惑也既於此则无由悟夫仲景立桂枝麻黄汤之有所主用桂枝麻黄汤之有其时矣故原病式曰夏热用桂枝麻黄之类热药发表须加寒药不然则热甚发黄或出斑矣殊不知仲景主桂枝麻黄汤本不欲用於夏月之时矣苟悟夫桂枝麻黄本非温暑之剂则羣疑冰泮矣何也夫寒之初客於表也开腠理鬱阳气而为热故非辛温之药不能开腠理以泄其热此麻黄汤之所由立也至於风邪伤表虽反疎腠理而不闭然邪既客表则表之正气受伤而不能流通故亦发热也必以辛甘温之药发其邪则邪去而腠理自密矣此桂枝汤之所由立也其所以不加寒药者盖由寒风在表又当天令寒冷之时而无所避故也後人不知仲景立法之意故有惑於桂枝麻黄之热有犯於春夏之司气而不敢用於是有须加寒药之论夫欲加寒药於桂枝麻黄之中此乃不悟其所以然故如此耳若仲景为温暑立方必不如此必别有法但惜其遗帙不传致使後人有多岐之患若知仲景伤寒论专为即病伤寒作则知麻黄桂枝所宜用之故除传经热病之外其直伤陰经与太阳不鬱热即传陰经诸寒证皆有所归着而不复疑为药寒误下而生矣若春夏有恶风恶寒有汗无汗之证盖春夏暴中风寒之新病非冬时受伤过时而发者不然则或是温暑将发而复感於风寒或因感风寒而动乎久鬱之热遂发温暑也仲景曰太阳证发热而渴不恶寒者为温病观此则知温病不当恶寒而当渴其恶寒而不渴者非温病矣仲景虽不言暑病然暑病与温病同但复过一时而加重於温病矣其不恶寒而渴则无异也春夏虽有恶寒恶风表证其桂枝麻黄二汤终难轻用勿泥於发表不远热之语也於是而用辛凉解散庶为得宜苟不慎而槩用之诚不能免夫狂躁斑黄衄血之变而亦无功也虽或者行桂枝麻黄於春夏而效乃是因其辛散之力而偶中於万一断不可视为常道而守之後人以通解散百解散之类不问四时中风伤寒一例施之虽非至正之道然较之不慎而轻用麻黄桂枝以致变者则反庶几矣若夫仲景於三陰经每用温药亦由病之所必须与用之有其时耳若槩以三陰寒证视为杂病而外之得无负於仲景济人利物之至仁而误後世乎自先觉不示伤寒温暑异治之端绪但一以寒凉为主而诸温热之剂悉在所略致使後之学者视仲景书欲仗焉而不敢以终决欲弃焉则犹以为立法之祖而不能外也能明夫仲景本为即病者设法则桂枝麻黄未必难用诸温热之剂未必可略矣若谓仲景法不独为即病者设则凡时行及寒疫温症风温等证亦通似伤寒六经病诸方治之乎故仲景曰冬温之毒与伤寒大异为治不同又曰寒疫与温病及暑病相似但治有殊耳是知温暑及时行寒疫温症风温等病必别有治

法今不见者亡之也观其所谓为治不同所谓温疟风温温毒温疫脉之变证方治如说之语岂非有法而亡之乎决不可以伤寒六经病诸方通治也夫素问谓人伤於寒为病热者言常而不言变也仲景谓或寒或热而不一者备常与变而弗遗也仲景槩言古人之所未言大有功於古人者虽欲偏废可乎

按右说与前论互有发明皆甚有功於仲景矣然伤寒卒病与夫时行寒疫但在脉证相符而治之何以能致变逆也夫审伤寒杂病脉异则所用辛温辛凉之剂判然矣大抵於既传之後变异多端岂无实肖杂证者故仲景叔和论次虽例有混淆而证因标本不同治则权变不一证例多同而治疗有殊故不能不使人致疑也人能求其意合而归一以观之则证例自定证定则治法不差矣但要经论熟读玩味有疑处兼看别书如赵氏为活人书释疑曰活人书之可疑者甚多仲景论亦有可疑者如白虎汤仲景既云表不解者不可与而白虎加人参汤证一曰恶风一曰恶寒岂非表不解而复用白虎何耶盖恶风曰微则但见於背而不至甚於恶风曰时时则时或乍寒而不常是表证已轻非若前证脉浮发热无汗全不解者加之太热大渴所以用白虎而无疑也又曰仲景论太阳病得之八九日如症状发热恶寒热多寒少其人不呕清便欲自可一日二三度发脉微缓者为欲愈若脉微而恶寒者此陰阳俱虚不可更发汗更下更吐也面色反有热色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黄各半汤仲景之意盖以得病八九日如症状发热恶寒热多寒少十六字为自初至今之证以下文乃是已後拟病防变之辞当分作三截看若其人不呕清便欲自可一日二三度发脉浮缓为欲愈此一节乃里和无病而脉微者邪气微缓也陰阳同等脉证皆向安之兆可不大汗而欲自愈若脉微而恶寒者此陰阳俱虚不可更发汗更下更吐之此节宜温之若面色反有热色者未欲解也以其不能得少汗出身必痒宜各半汤此一节必待汗而後愈也活人书不详文意却将其人不呕清便欲自可九字本是欲愈之证反以他证各半汤汗之又将不可汗吐下证及各半汤证语句并脱略而不言取此证而用彼药汗其所不当汗何也若是可见仲景文法多如此学者必须反复详玩熟观其意其例自见则治不差矣故赵氏尝曰仲景之书一字不同则治法霄壤读之者可不於片言只字以求其意欤幸相与勉焉

论伤寒杂病分二科

王海藏云世之治伤寒有法疗杂病有方是则是矣然犹未也吾谓治杂病亦有法疗伤寒亦有方方即法也法即方也岂有异乎要当全识部分经络表里脏腑岂有二哉以其後世才智之不及古也所以分伤寒杂病为二门故有长於此而短於彼者亦有长於彼而短於此者逮夫国家取士分科为七宜乎愈学而愈陋愈专而愈粗也试以伤寒杂病二科论之伤寒从外而之内者法当先治外而後治内杂病从内而之外者法当先治内而後治外至於中外不相及则治主病其方法一也亦何必分之谓二哉大抵杂病之外不离乎表伤寒之内不离乎里表则汗里则下中则和不易之法也剂之寒热温凉在其中矣余风产二条目疾疮肿小儿等科各自专门无怪其工之陋且粗也是以知证不知脉知药不知源是岂真知而全识哉耳熟目厌习坏多经涉久误合则病愈不契则疾甚所尝见所尝闻者粗有晓会其所未尝见未尝闻者则有所不知也此继述而不及剗物者远矣呜呼天之所锡其智识有限量故耶哀哉庸夫以衣食迫以口舌争视学业如仇讐专妬忌为能干悞人性命恬不知恤甘为忍人不顾陰

理其教之有所失耶时世之有所俾然耶抑疾者之不幸而有所自致耶

谨按汉张仲景推充内经伤寒脉证论例立法虽因证传变而不离即病之伤寒也至宋之季有托时世之异乃别立方用参苏藿香正气之类而遗即病之伤寒使世俗因之往往失仲景意况与杂病分二科专伤寒者尚不能备晓其通变主杂病者而不能遍识其仿佛宜乎其教之乖悞为疾之不幸使人不能无憾恨也噫仲景推充内经大法可谓无穷之惠人犹不知其例三百余法备即病伤寒之传变宋医所论为时气变法非真伤寒也故其方不多且病从外而之内者不离乎风寒暑湿其间传变者余伤寒皆轻从内而之外者不离乎内伤七情其间坏异者非伤寒之重故有轻重不同因分二科大抵学者要於诊候之际辨内外之感伤寒表里之轻重杂病伤寒脉证所异伤寒杂病治法不殊不殊者杂病之外不离乎表伤寒之内不离乎里所异者伤寒从外而之内杂病从内而之外外感法仲景内伤法东垣六气推充乎刘张杂病融会乎诸氏万法归吾一心一心贯乎万法不致得此而失彼为二科之分遗乎世之讥诮也

寒证治法

发表之剂

麻黄汤治伤寒恶风寒发热身疼无汗

麻黄【六钱】 桂枝【四钱】 甘草【炙二钱】 杏仁【二十个】

右?咀水煎如法服

按此太阳经药也

葛根汤治伤寒恶寒项背强几几无汗恶风或下利葛根【四钱】 麻黄
生姜【各三钱】 桂枝芍药【各二钱】 甘草【炙二钱】 大枣【三枚】

右?咀水煎如法服之

按此出太阳例阳明药也

柴胡桂枝汤治伤寒发热潮热脉弦自汗或渴或利桂枝【二钱】 黄芩 人参
白芍【各一钱半】 甘草【炙一钱】 半夏【一钱】 生姜【一钱】
柴胡【四钱】 大枣【二枚】

右?咀水煎服

按此出太阳例少阳经药也

桂枝汤治伤风寒发热自汗鼻鸣乾呕者

桂枝 白芍 生姜【各三钱】 甘草【炙二钱】 大枣【二枚】

右?咀水煎如法服

按此出太阳例太陰经药也

麻黄附子细辛汤治感寒脉沈或微细反发热或但欲寐者

麻黄 细辛【各四钱】 附子【炮二钱半】

右?咀水煎

按此少陰经药也

当归四逆汤治感寒手足厥冷脉细欲絶者

当归 桂枝 白芍 细辛【各三钱】 大枣【三枚】 甘草【炙】 通草【各二钱】

右?咀水煎

按此厥陰经药也已上六经治寒之例随脉证加减变法自有仲景论例兹不详录

桂枝麻黄各半汤治伤寒见风脉发热自汗或无汗桂枝【二钱】 白芍 生姜
甘草【炙】 麻黄【各一钱半】 大枣【二枚】 杏仁【十二个】

右?咀水煎

按此足太阳手足太陰手少陰经药出太阳例治风寒之剂也夫仲景论已上六经药然其中有发表解肌温经不同盖风寒有浅深荣卫有虚实故也学者审此则用药汤液之源可得而悉又表里变悞详见小儿门葛根升麻汤下

谨按伤寒与夫时行寒疫皆宜从仲景已上法然立春已後立秋已前非有时行暴寒而致病者宜从韩祗和法较脉证治之元戎云韩氏十四药以经络求之各有部分轻重缓急自有所宜运气加临各极其当因时在其中矣不必分至之远近寒暑之盛衰而谓之因时也但方世俗罕用今附入湿门

海藏云韩氏微旨可汗一篇有和解因时法言伤寒之脉头小尾大伤风之脉头大尾小李思训保命新书亦分寸尺与韩氏同非若前人总言尺寸脉俱浮而紧尺寸脉俱浮而缓紧则为伤寒无汗缓则为伤风自汗又有伤寒有汗者有伤风无汗者脉亦互差与证不同前人已尽之矣惟韩李所言头小尾大即为伤寒尾小头大即为伤风也人病间有脉证只显于尺寸者故韩李述为和解因时法也又恐後人疑其不与前圣合遂于本方药内又立加減数条亦不越前人之意何其当哉兼二公者当宋之盛时故又戒桂枝麻黄不可轻用改用石膏升麻葛根柴胡之平剂当时则可非百代常行时世迁移之活法也可汗一篇若从汤液随证应见自有定规虽明哲不可踰

易简参苏饮治感冒风邪发热头疼痰欬

方见热门

局方十神汤治时气瘟疫两感风寒

川芎 甘草 麻黄【各四钱】 乾葛【一两四钱】 紫苏 升麻 白芍 白芷 陈皮 香附【各四钱】

右?咀入姜煎每服半两或一两

藿香正气散治伤寒头痛增寒壮热

大腹皮 白芷 茯苓 紫苏 藿香【各三钱】 厚朴【制】 白术 陈皮 苦梗 半夏【各二钱】 甘草【炙二钱半】

右?咀每五钱入姜枣煎

按已上三方今世俗多用之治伤寒故收入然伤寒之病表里六经仲景言在三陰则可汗传三陰则宜下此大略言之尔於阳明则又可下少陰则又可汗一经病则有一经表里药病居太阳所禁居多在少阳有三禁阳明有二禁三陰非胃实不可下之类并病用刺法是各有其故者盖恐反致逆而成坏证之戒也至宋之时治伤寒者有变仲景法制已上诸方缘其承平日久民食用之志乐形逸病居疑似之间本因气逸经滯乃用其法然其间岂全舍仲景之法哉金时刘守真制防风通圣散亦是变法义见中风例中当遇是证则必施是治可也然於伤寒不辨邪於某经深求仲景意例当汗之可设妄以此施治则先虚正气逆其经络得汗不解复不求经救逆乱投汤剂其致危殆也必矣是则宋医处方皆平人气而不平时气因於人用药而不先乎时因於时用药而不先乎人其理得於人事天和之中其意得於不传之妙离经取法固不离於经专方治病固不可以专於方然亦未易可为格例也以待後之明者而正之

温中之剂

真武汤治伤寒腹痛小便不利四肢沉重疼痛下痢茯苓 白芍
生姜【各三钱】白术【二钱】附子【一钱半】

右?咀水煎

附子汤治感寒身体痛手足寒骨节疼恶寒脉沈弱附子 人参【各二钱】茯苓
白芍【各二钱】白术【四钱】

右?咀水煎

按此二方少陰例药也治寒湿之剂

理中汤

人参 白术 乾姜 甘草【炙各等分】

右?咀水煎

韩氏温中汤

丁香 厚朴【各一两】乾姜 白术 陈皮 丁香【各二钱】

右为末每服二钱入葱白荆芥穗煎

按韩祗和云凡病人两手脉沈迟或紧皆是胃中寒也若寸脉短小及力小於关尺者此陰盛
阳虚也或胸膈满闷腹中胀满身体拘急手足逆冷急宜温之然寒盛体虚者宜从少陰例此
止可作温中药姑存之

海藏黄芪汤

人参 黄芪 茯苓 白术 白芍【各一两】甘草【炙七钱半】乾姜 陈皮 藿香【各半两】

右?咀入生姜煎

按已上三方出理中例法也

宝监铁刷汤治寒积上焦呕吐不止痰饮胸膈不快食不下

半夏【四钱】 草豆蔻 丁香 乾姜【炮】 诃子皮【各三钱】 生姜【一两】

右散作三服水煎

附子理中丸治中焦有寒腹痛或感寒头痛发热恶寒腹痛不饮水

理中汤【三两】 附子【一枚】

右为末蜜丸如鸡黄大每一丸温汤化下

元戎苦楝丸治下焦有寒积小腹急痛奔豚等证川苦楝 茴香

附子【各一两三味酒煮乾再焙】 玄胡【半两】 全蝎【十八个炒】 丁香【十八个】

右为末酒糊丸梧子大每五十丸食前当归汤下按已上诸方治寒积或食寒物等致者虽分三焦等用则不离乎温中法也然寒冷之物停蓄於中则当温剂下之者又不必拘此如气分寒宜仲景桂枝附子汤选用血分寒宜当归四逆汤之类要在临时通变可也

发表温中之剂

小青龙汤治感寒发热头疼脉沈细或呕或欬或利或噎或小便不利少腹满或喘

麻黄 白芍 乾姜 甘草【炙】 细辛 桂枝【各二钱】 五味子

半夏【各一钱半】 附子【炮二钱脉浮不用】

右㕮咀水煎

海藏肉桂散治伤寒服冷药过度心腹胀满四肢逆冷昏沈不识人变为陰毒恶证

肉桂【三钱】 白芍 陈皮 前胡 当归 附子【炮】 人参【各一两】 白术 木香 厚朴【炒】

良姜【各三钱】 吴茱萸【半两】

右为粗末每服五钱入枣三枚水煎

天雄散治陰毒伤寒身重背强腹中痞痛咽喉不利毒气攻心心下坚强短气呕逆唇青面黑四肢厥逆其脉沈细而厥

天雄【一两炮去皮】 麻黄 当归 白术 半夏【各半两】 川椒【一钱】 肉桂

厚朴【各一两】 生姜 陈皮【各二钱】

右为粗末每五钱入生姜枣煎取汗

按已上二方表里气血药也出太阳例兼看後两感法

发表攻下之剂

桂枝加大黄汤治寒邪传里为大满大实痛关脉实者桂枝 生姜【各三钱】白芍【四钱】甘草【二钱半炙】大黄【一钱】大枣【二枚】

右?咀水煎

按此太阳例药也邪虽已传寒未变热故用此攻下然既传之後邪已变热而用和解下热诸法则不用温剂矣故大柴胡等汤详见热门及本论例兹不备录

和解之剂

柴胡姜桂汤治寒热自汗

方见热门

小柴胡汤治伤寒潮热而呕

按此并少阳例药也

黄连汤治伤寒胸中有热胃中有邪气腹痛欲呕吐者黄连 甘草【炙】乾姜 桂枝【各二钱】人参 半夏【各一钱半】大枣【二枚】

右?咀水煎

按此出太阳例药也与已上三方解表里中上陰阳交错之剂伤寒论此法甚多宜随证选用

解两感之剂

海藏大羌活汤

羌活 独活 防己 防风 黄芩 黄连 苍术 白术 甘草【炙】 川芎 细辛【各三钱】知母 生地黄【各一两】

右?咀每半两水煎热服未解再服一二剂若有余证并依仲景法

按此出太阳例药也然伤寒两感亦有兼风兼湿不同或表里俱虚俱实之异保命集云两感可治者感异气也使表中於风内伤於寒可治者宜加味小青龙汤表热内寒宜和解之此方宜治表中於风内有热者则表湿里寒表寒里湿表里证俱见者宜扩充也大抵两感多表里俱虚是以易老曰当切脉逆从知其吉凶两感之邪三陰三阳皆有之脉从阳可治从陰难治阳生陰死之谓也

陰毒外接法

回生神膏治陰毒伤寒

牡蛎 炼粉 乾姜【等分】

右为末男病用女唾调手内擦热紧掩二卵上得汗出愈女病用男唾调掩二乳取汗

代灸涂脐膏

附子 马蔺子 蛇床子 木香肉桂 吴茱萸

右六味等分为末用白麪相和生姜汁泔成膏纸上圆三寸许贴脐下关元气海自晚至晓贴之

陰毒伤寒四肢逆者

吴茱萸【不拘多少】

右为末温酒和匀生绢袋盛之热熨脚心令通畅愈若以为汤煎洗接四肢亦可

灰包熨法治下焦积寒冷上焦阳盛更难投温药者用灰二三升许入好醋拌和乾湿得所铤内炒令灰热以帛包裹置脐下熨之频换灰包令常热以腹不满痛为度如得利三两行或小便行或微似有汗此陰气外出也

灸法【附灸法论】

气海穴在脐下一寸五分治陰厥脉微絕者

石关一穴在脐下二寸

关元一穴在脐下三寸治脏结不可攻者及陰汗不止腹胀肠鸣面黑指甲青者宜灸百壮

阳陵泉二穴在膝下一寸洁古曰烦满囊缩宜灸此太谿二穴在足内踝後跟骨上动脉?中灸七壮治少陰吐利手足不冷反热脉不至者

按伤寒灸穴详见资生经故不备錄大抵不可刺者宜灸之一则沈寒痼冷二则无脉知阳絶也三则腹皮急而阳?也舍此三者余皆不可灸盖恐致逆也今附灸法于左

医学发明曰鍼经云?下则灸之天地间无他惟陰与阳二气而已阳在外在上陰在内在下今言陷下者阳气下?入陰血之中是陰反居其上而覆其阳脉证俱见寒在外者则灸之异法方宜论云北方之人宜灸炳也为冬寒大旺伏阳在内皆宜灸之以至理论则肾主脏藏阳气在内冬三月主闭藏是也若太过则病固宜灸炳此阳明?入陰水之中是也难经云热病在内取会之气穴为阳?入陰中取阳气通天之窍穴以火引火而导之此宜灸炳也若将有病者一槩灸之岂不误哉仲景云微数之脉慎不可灸因火为邪则为烦逆迫虚逐实血散脉中火气虽微内攻有力焦骨伤筋血难复也又云脉浮宜以汗解用火灸之邪无从出因火而盛病从腰以下必重而痺名火逆也脉浮热甚而灸之此为实实而虚治因火而动必咽燥唾血又云身之穴三百六十有五其三十穴灸之有害七十九穴刺之为灾并中髓也仲景伤寒例

按明堂鍼经各条下所说禁忌明矣内经云脉之所见邪之所在脉沈者邪气在内脉浮者邪气在表世医只知脉之说不知病证之禁忌若表见寒证身汗出身常清数栗而寒不渴欲覆厚衣常恶寒手足厥皮肤乾枯其脉必沈细而迟但有一二证皆宜灸之阳气下?故也若身热恶热时见燥作或面赤面黄咽乾噤乾口乾舌上黄赤渴咽噤痛皆热在外也但有一二证皆不宜灸其脉必浮数或但数而不浮不可灸灸之灾害立生若有鼻不闻香臭鼻流清涕眼睑时痒或欠或嚏恶寒其脉必沈是脉证相应也或轻手得弦紧者是陰伏其阳也虽面赤宜灸之不可拘於面赤色而禁之也

附虚寒温经诸方

补肝散治肝脏气虚视物不明两脇胀满筋脉拘急面色青小腹痛

山茱萸 当归 五味子 山药黄蓯 川芎 木瓜 【各半两】 乾地黄白术 【各一钱】 独活 酸枣仁 【各四铢】

右末每二钱七以水煎入枣一枚

茯神汤治胆气虚冷头痛目眩心神恐畏不能独处胸中满闷

茯神 酸枣仁 【炒去殼】 黄蓯 白芍五味子 柏子仁 【各一两】 桂心 熟地黄人参 甘草 【各半两】

右?咀每四钱半入姜煎

补心丸治本脏虚冷善恐怖如魘状及女人产後中寒腹痛月水不调

当归 川芎 白芍 甘草 附子 防风 桂心 细辛 乾姜 蜀椒 厚朴 半夏 大黄
猪苓【各一两】 茯苓 远志【各二两】

右末蜜丸如梧子大酒服五七丸日三加至十丸

椒附丸治小肠虚冷小腹疼小便频而清白

椒红【炒】 桑螵蛸【炙】 龙骨 山茱萸 附子【炮】 鹿茸【酒蒸焙】

右等分为末酒糊丸梧子大每六十丸空心盐汤下

?榔散治脾寒饮食不消劳倦气胀噫满忧恚不乐?榔【八个】 人参 茯苓 陈麴 麦蘖
吴茱萸 厚朴 白术【各二两】 陈皮【一两半】

右末食後酒服方寸匕日二次

进食散治胃气虚冷或食生冷或饮食不节胸膈痞塞腹胀怠惰不思食恶心溏泄

半夏麴 肉豆?【煨】 草果仁 高良姜 麦蘖【炒】 附子【炮】 丁香 厚朴 陈皮 人参 青皮
甘草【炙半两】

右?咀每四钱入姜枣煎

白石英汤治肺气虚弱恶寒欬嗽鼻流清涕喘息气微者

白石英 细辛 五味子 陈皮 鍾乳粉 阿胶 蛤粉 桂心 人参
甘草【炙各五钱】 紫苑【一两】

右?咀每四钱入姜煎

诃梨勒丸治大肠虚冷肠鸣泄泻腹脇气痛饮食不化诃子 附子 肉豆? 木香 吴茱萸 龙骨
茯苓 毕拔【各二钱】

右末姜汁糊丸梧子大每四五十丸空心米汤下

十补丸治肾脏虚弱面色黎黑足冷足肿耳鸣耳聋肢体羸瘦足膝软弱小便不利或多或少
腰脊疼痛附子【炮】 五味子【各一两】 山茱萸 肉 山药 牡丹皮 鹿茸【制】 桂心

茯苓泽泻【各一两】

右为末炼蜜丸梧子大每六七十丸空心盐汤下

萆子丸治膀胱虚冷小便白浊滑数日夜无度

赤石脂【煨】 萆子【炒】 牛膝【酒浸】 牡蛎【煨】 附子【炮】
覆盆子【酒浸】 桑螵蛸 鹿茸【制】 龙骨
肉苁蓉【各一两】 鸡胝胫【烧灰】 沉香【各五钱】

右为末酒糊丸梧子大每六七十丸空心盐汤下按已上诸方并出五脏治要例

玉机微义卷十四

卷十五

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷十五 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

疮疡门

内经论疮疡之因

生气通天论云膏粱之变足生大丁又云营气不从逆於肉理乃生痈肿

陰阳应象论云地之湿气感则害人皮肉筋脉

脉要精微论云诸痈肿筋挛骨病痛者此寒气之肿八风之变也

至真大要论云诸痛痒疮疡皆属心火

河间原疮疡之病

原病式云诸痛痒疮疡皆属心火者盖人近火气者微热则痒热甚则痛附近则灼而为疮皆火之用也或痒痛如针轻刺者犹飞迸火星灼之然也痒者美疾也故火旺于夏而万物蕃鲜荣美也炙之以火渍之以汤而痒转甚者微热之所使也因而痒去者热令皮肤纵缓腠理开通阳气得泄热散而去故也或夏热皮肤痒而以冷水沃之不去者寒能收斂腠理闭密阳气鬱结不能散越怫热内作故也痒得爬而解者爬为火化微则亦能令痒甚则痒去者爬令皮肤辛辣而属金化辛能散故金化见则火力分而解矣或云痛为实痒为虚者非谓虚为寒也正谓热之微甚也或疑疮疡皆属火热而反腐出脓水者何也犹谷肉果菜热极则腐烂而溃为污水也溃而腐烂者水之化也所谓五行之理过极则胜己者反来制之故火热过极则反兼水化又如盐能固物令不腐烂者咸寒水化制其火热使不过极故得久固也万物皆然

痈浅而大也经曰热胜血则为痈也三因方曰痈者壅也疽深而恶也三因方曰疽者沮也疔者节也

疡有头小疮也

浮小癰 也

瘤气赤瘤丹熿热胜气也火之色也

结核火气热甚则鬱结坚硬如果中核也不必溃发但令热气散则自消也

疮疡脉证

身重脉缓湿胜除湿 身热脉大心燥时肿乍来乍去遂热 诸痛眩晕动摇脉弦去风
气滯气滞乾燥亡津液脉濡泻气补血 寒胜则浮食不入便溺多恶寒脉紧细宜泻寒水

丹溪论相火能动为诸病疮疡亦然

详见火证门

痈疽当分经络论

丹溪云六阳经六陰经有多气少血者有多血少气者有多气多血者不可一槩论也少阳经多气少血理宜预防肌肉难长驱毒利药亦难轻用予从叔多虑神劳年近五十左膊外侧红肿如栗予曰勿轻视且先与人参浓汤得数升乃佳与数贴而止旬余值大风拔木疮上起一红线遶背抵右肋予曰大料人参汤加芎术补剂与之两月而安李兄年三十连得忧患且好色又作劳左腿外侧臃生红肿如栗一医与承气两贴下之矣又一医教与解毒下之予视之脉大实後果死或曰生臀痈者何如予曰臀在少腹之後居其下此陰中之陰也其道远其位僻虽太阳多血气运虽及血亦罕来中年後生者须预补之若无积补之功其祸多在疮成痈之後或半年以来乃病粗工不察或致失手慎之戒之病机机要云瘰癧者结核是也或在耳後或在耳前或在耳下连及颐颌或在颈下连缺盆皆谓瘰癧或在胸及胸之侧或在两脇皆谓之马刀手足少阳主之按此谓分经用药则不致有犯禁坏逆之失也然手少阳三焦少陰心太陰肺足少阳胆少陰肾太陰脾多气少血手厥陰心包络太阳小肠足太阳膀胱厥陰肝多血少气手阳明大腸足阳明胃多气多血也故不可一槩论治况已上病例不系膏粱丹毒火热之变因虚劳气郁所致止宜补形气调经脉其疮当自消散盖不待汗之下之而已也其不详脉证经络受病之异者下之先犯病禁经禁故致失手如此丹溪又曰才得肿痛参之脉证但有虚弱便与滋补血气无亏可保终吉若用寻常驱热拔毒及气药虚虚之祸如指诸掌且夫火热为病亦有微甚所谓君火相火是也疮疡所发而有痈疽疔瘰癧轻重浅深或止发於一经或兼二经者止当求责於一二经则不可干扰余经也若东垣处方用药是矣矧有兼风兼湿兼痰兼气兼血兼陰虚等证者病本不同治当求责前论虽略比之世俗外科等书图人形疮樣而不分经络者此则大有径庭矣

治疮大要三法

病机机要云疮疡者火之属须分内外以治其本若其脉沉实当先疎其内以絶其源也其脉浮大当先托里恐邪气入内也有内外之中者邪气至盛遏絶经络故发痈肿此因失托里及失疎通又失和荣卫也治疮之大要须明托里疎通荣卫之三法内之外者其脉沉实发热烦躁外无焮赤痛深於内其邪气深矣故疎通脏腑以絶其源外之内者其脉浮数焮肿在外形证外显恐邪气极而内行故先托里也内外之中者外无焮恶之气内亦脏腑宣通知其在经当和荣卫也用此三法之後虽未差必无变证亦可使邪气峻减而易愈

疮宜发汗论

内经云汗之则疮已东垣云东南二方者在人则为丙小肠热甲胆风小肠与胆皆居其下其性炎上其疮外有六经之形证内无便溺之阻隔饮食如故清便自调知不在里非疽疮也止痈疔也小则为疔大则为痈其邪所受於下风湿之地气自外而来侵加於身者也经云荣气不从逆於肉理乃生痈肿诸痛痒疮皆属心火此疮自外而入是丙小肠左迁入於胆作痛而非痒也此二方皆主血血为病必痛此元气不足营气逆行其疮初出未有传变在於肌肉之上皮毛之间只於风热六经所行经络地分出矣宜泻其风湿热医者只知陰覆其阳则汗也此宜发汗者乃湿热郁其手足少阳致血脉凝逆使荣卫周身元气消弱也其风热郁滯於下其面色必赫赤而肿微黯色东方清埋没之色也风木之性上冲顔必忿色其人多怒其疮之色亦赫赤肿硬微带黯色其疮之形势亦奋然高起结硬而作痛也其脉止在左手左手主表左寸外洪缓左关洪缓而弦是客邪在於血脉之上皮肤之间宜急发其汗而通其荣卫则邪气去矣以托里荣卫汤主之

谨按前论大要三法即此疮宜汗之及先托里恐邪气入内言外因也宜先疎内以絶其源言内因也当和荣卫谓不内外因之证也故疮之发於皮表者因大略言汗其汗下和之间然亦有外治之次第焉如郭氏治验云一妇人五十九岁右耳下天容穴间患一疔疮其头黑黯四边泡起黄水时流浑身麻木发热谵语时时昏沉六脉浮洪用乌金散汗之就以鉋针先刺疮心不痛周遭再刺十余下紫黑血出方知疼痛就将寸金錠子絛入疮内外用提丁錠子放於疮上膏药贴护次日汗後精神微爽却用破棺丹下之病即定其疔溃动後用守效散贴涂红玉錠子絛之八日其疔自出矣兹所谓审脉证汗下之间外治次第如此殊胜不察脉证但见发热谵语便投凉剂与下或兼以香窜之药遂致悞人者远矣

疮辨五善七恶

外科精要云热发於皮肤之间浮肿根小至大不过三二寸者为疔六腑积热腾出於外肌肉之间其发暴盛肿皮光软侵展广大为痈五脏风毒积热攻焮肉骨风毒猛暴初生一如?蕾形自焦枯触之应者乃疽也夫五善七恶者动息自宁饮食知味一善也便利调匀二善也脓清肿消不臭三善也神采精明语声清爽四善也体气和平五善也烦躁时嗽腹痛渴甚或泄痢无度小便如淋一恶也脓血大泄肿焮尤甚脓色败臭痛不可近者二恶也喘促短气恍惚嗜卧三恶也目视不正黑睛紧小白睛青赤瞳子上看者四恶也肩背不便四肢沉重五恶也饮食不下服药而呕食不知味六恶也声嘶色败鼻青赤面目四肢浮肿七恶也五善见三则差

七恶见四则危然则病有源同七恶者乃皮紧急而知善也病有源同五善者乃皮缓虚而知恶也知是者岂凡医之所知哉

此事难知论中定痈疽死之地分

一伏菟 二腓膕 三背 四五脏俞

五项上 六脑 七髭 八髻

九颐

谨按素问灵枢诸篇具疮疡之由生死之要针治之法甚详宜翫本文大抵已上所言地分皆脉络所会内系腑脏然患者得而早言医者审证按法治之则皆为不死矣设不早治治不对证虽发於不死之地分乃恐亦致死矣

论疮疡攻补法

元戎云?脉为痿留连肉腠营气不从逆於肉理乃生痈肿荣逆血郁血郁则热聚为脓正理论曰热之所过则为痈肿营气不从亦有不热者乎答曰膏粱之变芳草之美金石之过气血不盛荣卫之气充满而抑遏不能行故闭塞血气腐而为痈也当泄之以夺盛热之气若其人饮食疎精神衰气血弱肌肉消薄荣卫之气短促而滯滞故寒薄腠理闭郁而为痈肿也当补之以接虚怯之气亦当以脉浮沉别之既得盛衰泄之则连翘大黄补之则内托之类是也

按此辨疮疡因热因寒及气血郁而成当攻补之法不同宜与前後诸篇兼看殆无余蕴矣但世俗昧此理而云是疮不是疮且服五香连翘汤然或中或否致悞者多盖不审形气虚实疮毒浅深发表攻里所因不同故也今以丹溪先生外科精要发挥诸法之义附于後方例之下庶学者幸有所监焉

论疮疡宜灸

元戎云疮疡自外而入者不宜灸自内而出者宜灸外入者托之而不内内出者接之而令外故经云?者灸之灸而不痛痛而後止其灸灸而不痛者先及其溃所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而後止其灸灸而痛者先及其未溃所以痛而次及将溃所以不痛也

按此亦约法也因以东垣等法附于左宜参用之

凡人初觉发背欲结未结赤热肿痛先以湿纸覆其上立视候之其纸先乾处即是结痈头也取大蒜切成片如当三钱厚薄安於头上用大艾炷灸之三壮即换一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛时方住最要早觉早灸为上一日三日十灸十活三日四日六七活五六日三四活

过七日则不可灸矣若有十数头作一处生者即用大蒜研成膏作薄饼铺头上聚艾於蒜饼上烧之亦能活也若背上初发赤肿一片中间有一片黄粟米头子便用独蒜切去两头取中间半寸厚薄正安於疮上着艾灸十四壮多至四十九壮

按此谓痈疽所发宜灸之也然诸疮患久成漏者常有脓水不絶其脓不臭内无歹肉尤宜用附子浸透切作大片厚三二分於疮上着艾灸之仍服内托之药隔三二日再灸之不五七次自然肌肉长满矣至有脓水恶物渐溃根深者郭氏治用白麝硫黄大蒜三物一处捣烂看疮大小捻作饼子厚约三分於疮上用艾炷灸二十一壮一灸一易後隔四五日方用翠霞锭子并信效锭子互相用之絀入疮内歹肉尽去好肉长平然後贴收斂之药内服应病之剂调理即瘥矣盖不止宜灸於疮之始发也大抵始发宜灸要汗下补养之药对证至灸冷疮亦须内托之药切当设有反逆不唯不愈恐致转生他病之患也疮分三因

陈无择云发背痈疽者该三因而有之论曰痈疽瘰癧不问虚实寒热皆由气郁而成经亦云气宿於经络与血俱滯而不行壅结为痈疽不言热之所作而後成痈者此乃内因喜怒忧思有所郁而成也身有热被风冷搏之血脉凝泣不行热气壅结而成亦有陰虚阳气凑袭寒化为热热成则肉腐为脓者此亦外因寒热风湿所伤而成也又服丹石及灸?酒麪温床厚被所致又尽力房室精虚气节所致者此乃因不内外所伤而成也故知三因备矣

按此所分三因虽备但未具疮疡之邪在经在表在里之异故其治法亦不能详备也

论陰滯阳则生痈阳滯陰则生疽

丹溪曰精要云阳滯於陰脉浮洪弦数陰滯於阳脉沉细弱濇阳滯以寒治之陰滯以热治之切详其意阳滯陰滯当作热治寒治求之寒热固可作陰阳论於陰於阳分明是於气於血他无可言也热滯於气固无寒滯耶寒滯於血固无热滯耶何寒不能伤气热不能伤血耶以予观之气为阳行脉外血为陰行脉内相并分????周流循环一身无停止谓之脉一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息共得六寸一身通行八十一丈得热则行速而太过得寒则行迟而不及五味之偏七情之厚过气为滯津液稠厚积而久也为饮为痰渗入脉内血为所乱因而凝浊运行涸泣或为沸腾此陰滯於阳也正血滯於气也气病今入或以药助邪病上生病血之病日增溢出脉外坠道隘塞升降有妨运化失令此阳滯於陰也正气滯於血也病分寒热者当是稟受之素偏虚邪之杂合岂可以阳为热陰为寒耶浮洪弦数气病之脉也岂可遽此作热论沉细弱濇血病之脉岂可遽此作寒论此万病之根本岂止疥癬疮疡痈疽而已幸相评其是否

明疮疡之本末

东垣曰生气通天论云营气不从逆於肉理乃生痈肿又云膏粱之变足生大丁受如持虚陰阳应象论云地之湿气感则害人皮肉筋脉是言湿气外伤则营气不行荣卫者皆营气之所经营也营气者胃气也运气也荣气为本本逆不行为湿气所坏而为疮疡也膏粱之变亦是

言厚滋味过度而使营气逆行凝於经络为疮疡也此邪不在表亦不在里惟在其经中道病也已上内经所说俱言因营气逆而作也遍看诸疮疡论中多言二热相?热化为脓者有只言热化为脓者又言湿气主疮寒化为热而为脓者此皆疮疽之源也宜於所见部分用引经药并兼见证中分陰证阳证先泻营气是其本本逆助火湿热相合败坏肌肉而为脓血者此治次也宜远取诸物以比之一岁之中大热无过夏当时诸物皆不坏烂坏烂者交秋湿令大行之际也近取诸身热病在身止显热而不败坏肌肉此理明矣标本不得邪气不服言一而知百者可以为上工矣

营气不从逆於肉理乃生疮痈且营气者胃气也饮食入於胃先输於脾而朝於肺肺朝百脉次及皮毛先行阳道下归五臟六腑而气口成寸矣今富贵之人不知其节以饮食肥醴之类杂以厚味日久太过其气味俱厚之物乃阳中之阳不能走空窍先行阳道反行陰道逆於肉理则湿气大胜则子能令母实火乃大旺热湿既盛必来尅肾若杂以不顺又损其真水肾既受邪积久水乏水乏则从湿热之化而上行其疮多出背出脑此为大丁之最重者也若毒气行於肺或脾胃之部分毒之次也若出於他经又其次也湿热之毒所止处无不溃烂故经言膏粱之变足生大丁受如持虚如持虚器以受物物无不受治大丁之法必当泻其营气以标本言之先受病为本非若寒之剂为主为君不能除其若楚疼痛也诸疮疡有痛往往多以乳香没药杂以芳香之药止之必无少减之理若使经络流通臟腑中去其壅滯必无痛矣苦寒之剂除其疼痛药下於咽则痛立已此神品药也

疮疡食肉乃自弃也疮疡者乃营气而作也今反补之而自弃何异虽用药施治而不能愈地之湿气自外而入内者疮疔当先服药而用鍼如疮疔小不欲饮药或婴儿之疮先当温衣覆盖令其凝泣壅滯血脉温和则出血立已者不如此血脉凝滯便针则邪毒不泻反伤良肉又益其疮势也疮疡及诸病面赤虽伏大热禁不得攻里为阳气怫郁邪气在经宜发表以去之故曰火郁则发之虽大便数日不见宜多攻其表以发散阳气少加润燥之药以润之如见风脉风证只可用发表风药便可以通利得大便行也若只乾燥秘澁尤宜润之慎不可下也疮疡郁冒俗呼昏迷是也宜汗之则愈验疮名色治之当从素问鍼经圣济總錄易老疮论及诸家治疮用药法度此为紧要临病之际宜详审焉谨按圣济總錄能悉诸疮之名色但其用药则多主寒凉而无通变之法惟已上易老东垣等言深撷鍼经之大法陈脉病治例之要学者能熟此等议论则临证处方便自胸中了然明白

论肠痈

陈无择云痈疽初无定处随其所发即命名在外则为发背发脑在内则为肠痈内痈心痈肺痈脐痈等证得其法则生失其法则死外证易识内证难明不可不备述也肠痈为病身甲错腹皮急按之濡如肿状腹无聚积身无热脉数此为肠内有脓久积陰冷所成也故金匱有用附子温之小腹痛痞按之状如淋小便自调发热身无汗复恶寒其脉迟紧者脓未成可下之当有血洪数者脓已成不可下此以内结热所成也故金匱有用大黄利之甚者腹胀大转侧闻水声或遶脐生疮或脓从脐出或大便出脓血不治必死其如五内生疮亦止分利陰阳而已不比外痈须依四节八事之次第也脉经引官羽林妇病医诊之其脉滑而数滑则为实数

则为热滑则为荣数则为卫卫数下降荣滑上升荣卫相干血为浊败少腹痞坚小便或澁或时汗出或复恶寒脓为已成设脉迟紧即为瘀血血下即愈更内经所载有息积病此见有得之二三年遍身微肿续乃大肠与脐连日出脓遂致不救此亦肠痈之类也不可不一审按此言内痈肠痈等候语约而精脉经与此大同小异宜并详审可也

疮疡治法

纯早年居淮南於陈复初契家斋堂得东垣郭文才甫家传疮科心要二卷持行四方按法每择用之多获奇效故不敢湮没其道因取东垣先生诸试效法杂以古今名方於下每附丹溪先生外科精要发挥之旨以为通变之义亦学者之一助云辛凉发散之剂

东垣黄连消毒散治痈疽发於脑项或背太阳经分肿势外散热毒焮发麻木不痛者宜先灸之或痛而发热并宜服此

黄连【制】 羌活【各一钱】 黄芩 黄栢【各半钱酒制】 生地黄 知母【制】 独活 防风 当归尾 连翘【各四分】 藁本 防己 桔梗【各半钱】 黄芩 苏木 陈皮 泽泻【各二分】 人参 甘草【各三分】

右?咀水煎

按元好问记云素饮酒於九月中患脑之下项之上出小疮後数日脑项麻木肿势外焮痈医遂处五香连翘至八日不下而云不可速疗十八日得脓俟脓出用药或砭刺三月乃可平四月如故予记医经凡疮见脓九死一生果如医言则当有束手待毙之悔矣乃请明之诊视且谓膏粱之变不当投五香五香已无及当先用火攻之策然後用药以大艾炷如两核许者攻之至百壮乃痛觉次为处方云是足太阳膀胱之经其病逆当反治脉中得弦紧按之洪大而数又且有力必当仗其所主而先其所因其始则同其终则异可使破积可使溃坚可使气和可使必已必先岁气无伐天和以时言之可收不可汗经与病禁下法当结者散之醎以?之然寒受邪而禁醎诸苦寒为君为用甘寒为佐酒热为因用为使以辛温和血大辛以解结为臣三辛三甘益元气而和血脉淡渗以导酒湿扶持秋令以益气泻火以入本经之药和血且为引用既以通经为主用君以黄芩连栢生地黄知母酒制之本经羌活独活防风藁本防己当归连翘以解结黄芩人参甘草配诸苦寒者三之一多则滋营气补土也生甘草泻肾之火补下焦元气人参橘皮以补胃苏木当归尾去恶血生地黄补血酒制防己除膀胱留热泽泻助秋去酒之湿热凡此诸药必得桔梗为舟楫乃不下沉投剂之後疽当不痛不拆食进体健如言服之投床大鼾日出乃寤以手扪疮肿减七八至疮痂斂都十四日而已世医用技岂无取效者至於治效之外乃能历数体中不言之秘平生所见惟明之一人而已 详见试效方

内托羌活汤治足太阳经中左右尺脉俱紧按之无力尻臀生痛坚硬肿痛大作

羌活 黄栢【酒制各二钱】 防风 藁本 当归尾【各一钱】 肉桂【三分】 连翘

甘草【炙】 苍术 陈皮【各半钱】 黄芪【一钱半】

右?咀水酒各半煎食前温服取汗

白芷升麻汤治手阳明经分臂上生痛左右寸部脉皆短中得之俱弦按之洪缓有力此得之八风之变者也

白芷【一钱半】 升麻 桔梗【各一钱】 甘草【炙半钱】 黄芪
黄芩【酒制各四钱】 生黄芩【三钱】 红花【半钱】

右?咀作二服每水酒各半煎食後温服

内托黄芪柴胡汤治疮生腿内近膝股或痛或附骨痛初起肿痛势大此足大陰厥陰之分脉细而弦按之洪缓有力

黄芪【二钱】 柴胡【一钱】 羌活【半钱】 连翘【一钱半】 肉桂【三分】
土瓜根【酒制一钱】 生地黄【二分】 黄柏【二分】 当归尾【七分】

右?咀作一服水二分酒一分煎食前服

内托黄芪酒煎汤治疮生腿外侧或因寒湿得附骨痛於足少阳经分微侵足阳明经坚硬漫肿行步作痛或不能行

柴胡【一钱半】 连翘 肉桂 大力子【炒各一钱】

黄芪 当归尾【各二钱】 黄栢【半钱】 升麻【七分】 炙甘草【半钱】

右?咀水酒各半煎食前服

按已上诸方有脉病证治之例立方之旨皆东垣试效法也学者识之则临病处方当有所据矣

当归拈痛汤治一切风湿热毒浸淫疮疡下注湿毒脚膝生疮赤肿里外臃疮脓水不絶或痒或痛脉沉紧实数动滑者并宜服之

羌活【半两】 人参 苦参【酒制】 升麻 葛根 苍术【各二钱】 炙甘草
黄芩【酒制】 茵陈叶【酒炒各半两】 防风 当归身 知母【酒制】 泽泻
猪苓【各三钱】 白术【一钱半】

右?咀每服一两水煎空心服临睡再服之

按此足太阳阳明三陰药也东垣本处为治脚气湿热之剂然世人用治已上诸疮甚验故録之

内托升麻汤治妇人两乳间出黑头疮疮顶?下作黑眼子其脉弦洪按之细小宜服之并乳痈初起亦治升麻 葛根 连翘【各一钱半】肉桂【三分】黄芪【一钱】当归身【钱】黍粘子【半钱】黄栢【二分】炙甘草【一钱】

右?咀作一服水二分酒一分同煎食後服

按此足阳明厥陰药也

散肿溃坚汤治马刀疮结硬块子坚如石者在耳下至缺盆中或至肩上或入脇下皆手足少阳经中及瘰癧遍於頰或至颊车坚硬如石在足阳明经中所出或二证疮已破流脓水并皆治之

柴胡【四钱】升麻【三分】
草龙胆【半两酒制炒】黄芩【八钱二半酒炒】炙甘草【三钱】桔梗【半两】
连翘【三钱】瓜蒌根【半两酒制】当归尾
白芍【各二钱】黄栢【酒制去皮】知母【酒制各半两】葛根【二钱】黄连【一钱】
京三棱【酒制微炒】广术【制如上各三钱】昆布【净半两】

右件?咀每服六钱或七钱水二盏八分先浸多半日煎至一盏去粗热服於卧处身脚在高处头低垂每含一口作十次咽服毕依常安卧取药在膈上停蓄故也另攪半料作极细末炼蜜为丸如菉豆大每服百丸或百五十丸用此汤一口送下食後服之药多少量病人虚实应服药皆效此例

升麻调经汤治頰下或至颊瘰癧此证出足阳明胃之经中来也若疮深远隐曲肉底是足少陰肾中来也乃戊传癸肾是夫胃传妻俱作块子坚硬大小不等并皆治之或作丸服亦得

升麻【八钱】葛根【五钱】草龙胆【酒制炒】黄芩【酒制各半两】

当归尾【三钱】桔梗 连翘【各半两】芍药【三钱】

黄栢【酒炒一钱】知母【酒炒一两】黄连 广术【酒炒】甘草【炙】
京三棱【酒炒各半两】生黄芩【四钱】

右件另秤一半作末蜜为丸如菉豆大每服百丸或百五十丸一半多作?咀每服秤半两若能

食便硬可旋加至七八钱服如溃坚汤法此制之缓也

连翘散坚汤治耳下至缺盆或至肩上生疮坚硬如石动之无根名曰马刀从手足少阳经中来也或生两脇或已流脓作疮未破皆治之

柴胡【一两二钱】连翘

当归尾【酒制】芍药生黄芩【各半两】炙甘草【三钱】土瓜根【酒炒】

草龙胆【酒制四次各一两】苍术【二钱】

黄芩【酒炒二次二钱】黄连【酒炒二次二钱】广术

京三棱【细切各半两同广术酒制一次微炒乾】

右件另秤一半蜜丸如菉豆大如上法服?咀和匀每服半两服如上法亦缓治之

按已上三方本於经分用药溃坚散郁之剂也

消肿汤治马刀疮

柴胡【二钱】连翘【三钱】当归尾甘草【各一钱】

生黄芩【二钱】红花【少许】黄连 黍粘子【炒各

半钱】瓜蒌根 黄芪【各一钱半】

右件每服半两或一两水煎热服食後

按此足少阳例药也

柴胡通经汤治小儿项侧有疮坚而不溃名曰马刀柴胡 连翘 当归尾 黄芩生甘草 黍粘子 桔梗 京三棱【各二分】红花【少许】 黄连【五分】

右?咀作一服水煎稍热服

按此手少陰太陰足少阳厥陰药也东垣诸法类此者甚多兹不详録郭氏亦有治癰癤数方本攻里内消之剂故附于後杂方内

郭氏升麻牛蒡子散治时毒疮疹脉浮洪在表者疮发於头面胸膈之际

升麻 牛蒡子 甘草 桔梗葛根 玄参 麻黄【各一钱】连翘【二钱】

右?咀姜三片水二盞作一服

中和汤治时毒脉弦洪在半表里者

菖蒲 牛蒡子 羌活 川芎 防风 漏芦 荆芥 麦门冬 前胡 甘草

右?咀每服一两水煎

按此并出足太阳阳明例药也

机要方治结核耳前後或耳下颌下有者皆瘰癧也桑椹二斗极熟黑色者以布裂取自然汁砂器内文武火慢熬成薄膏子每日白汤点一匙食後日三服辛平发散之剂

良方升麻和气饮治疮肿疖疥痒痛

甘草 陈皮【各一两半】 芍药【七钱半】 大黄【半两煨】 乾葛 苍术 桔梗
升麻【各一两】 当归 半夏 茯苓 白芷【各二钱】 乾姜
枳殼【各半钱三因方有厚朴半钱】

右?咀每服一两水煎

按此手足太陰阳明经药也五积散加减法世俗多用之故收入盖欲燥脾胃胜湿和气为治疮之剂然临证而不通变恐未合宜也

当归饮子治疮疥风癬湿毒燥痒疮

当归 白芍 川芎 生地黄 白蒺? 防风 荆芥【各一两】 何首乌 黄芪 甘草【各半两】

右?咀每服一两水煎或为末每服一二钱亦得按此疎风热之剂手足三陰药也血虚者不可缺此

圣济總錄金鍼散治发背诸疮肿

皂角针春取一半新采一半黑者

右一味不拘多少晒乾为末食後酒调二三钱服按丹溪曰此药治痈疽已破未破皆用直?领到溃处意谓当入羣队中用也

辛温发散之剂

局方托里十补散

黄芪 人参 当归【各二钱】 厚朴 桔梗 川芎 防风 桂心 甘草 白芷【各一钱】

右?咀水煎

谨按卫生宝监曰诸痛痒疮疡皆属心火言其常也如疮盛形羸邪高痛下始热终寒此反常也固当察时下之宜而权治故曰经者常也法者用也医者意也随其宜而治之可收十全之功矣故此方用之於痈疽初发或已发或内托然疮证脉缓澁或身倦恶寒热少脉弦或紧细者宜用之散风寒助阳之剂也表里气血之药若施之於积热焮毒更不分经络时宜不能不无悞也丹溪曰精要谓排脓内补十宣散治未成者速散已成者速溃诚哉是言也若用之於些小痈疽与冬月时令尽用内托之功若於冬月肿疡用之亦可转重就轻移深於浅若溃疡於夏月用之其桂朴之温散佐以防风白芷吾恐虽有参芪难为倚仗比见世人用此者不分痈疽冬夏无经络无前後如盲人骑瞎马半夜临深池危哉

十六味流气饮治无名恶肿痈疽等证

川芎 当归 芍药 防风 人参 木香 黄芪 官桂 桔梗 白芷?榔 厚朴 乌药 甘草 紫苏 枳壳

右?咀水煎

按此表里气血药也复以疎风助阳之剂世俗多用之故收入非脉之洪缓沉迟紧细者不宜用此每见外科诸家载此往往不分经络脉证不具时宜但云化毒消肿有云不退者加以补气血之药盖又使人不能无疑也用者当触类而长之可矣

郭氏神效乌金散治痈疽疔肿时毒附骨疽诸恶疮等证若疮黑?如石坚四肢冷脉细或时昏冒谵语循衣烦渴危笃者服此汗之疮起

苍耳头【五月五日午时收】 小草乌头 火麻头【火日收采】 木贼【去节】 虾蟇头 桦皮节【酥炙】 麻黄【去根节】

右晒乾各等分同入磁器内盐泥固济炭火内从早煨至申分如黑煤色为度碾为末每服二钱病重者三钱用热酒调下未汗再一服如汗乾却服解毒疎利之药如修合此药必选天晴好日於静室中勿令鸡犬猫畜及陰人见也又名首功玄黑散

夺命丹治诸般肿毒疔疽恶疮

蟾酥 轻粉【各半钱】 朱砂【三钱】 白矾【枯】 寒水石 铜绿【各一钱】 蜗牛【二十一个别研】 乳香 没药 麝香【一钱】

右件为细末将蜗牛别研一处丸如丸不就用好酒糊和丸如菉豆大每服一丸生葱三五茎嚼极烂吐于手心包药在内热酒和葱送下如重车行五七里汗出为效重者再服一二丸

蟾酥丸治疗黄一切恶疮

川乌 莲花蕊 朱砂【各一钱半】 乳香

没药【各二钱】 轻粉 蟾酥【各一钱】 麝香【半钱】

右为细末糊丸菉豆大每服一丸病重者二丸依前法服取汗

按已上三方郭氏称为首药皆主乎发散散出太阳例後二方出少陰例然皆劫剂也智者当较轻重陰阳之分取择用之

东垣托里荣卫汤治证见前疮宜发汗论

黄芪 红花 桂枝【各五钱】 苍术【三钱】

柴胡 连翘【各二钱】 羌活 防风 当归身 炙甘草 黄芩【各一钱半】 人参【一钱】

右?咀每服一两水酒各半煎

按此足三阳太陰经药出桂枝例表里气血之剂也辛热发散之剂

托里温中汤治疮为寒变而内?者脓出清解皮肤凉心下痞满肠鸣切痛大便微溏食则呕气短吃逆不絶不得安卧时发昏愤

羌活【三钱】 附子【炮去皮四钱】 乾姜【炮三钱】 益智仁 丁香 沉香 木香 茴香 陈皮【各一钱】 炙甘草【二钱】

右?咀作一服水三盏生姜五片煎服

卫生宝监曰经云寒淫于内治以辛热佐以苦温以姜附大辛热温中外发阳气自里之表以为君羌活苦辛温透关节炙甘草温补脾胃行经络通血脉胃寒则呕吐吃逆不下食益智丁沉大辛热以散寒为佐疮气内攻气聚而为满木香陈皮苦辛温治痞散满为使按此手足太阳阳明三陰经药也

辛凉攻里之剂

机要内疎黄连汤治疮皮色肿硬发热而呕大便闭脉洪实者

黄连 芍药 当归 㯽榔木香 黄芩 梔子 薄荷 桔梗 甘草【各一两】连翘【二两】
大黄【二两半】

右㯽咀每服一两入姜煎

按此本黄连汤加大黄手足少阳足阳明太陰手三陰之药也丹溪曰精要以大黄治痈疽之要药以其宣热拔毒第二论曰疮始作皆须以大黄等药极转利之又排日不废继又自言患痈疽者每有泻泄皆是恶候此又不能无疑者也借曰前说用大黄恐因病体实而大腑秘结有积热沉痼之疾者发也止可破结导滞推令转动而已岂可谓极转利之而且排日不废若利下之後又与利药恐非防微杜渐之意疮之始作即周礼肿疡之时也肿在肌肉若非大满大实坚之证自当行仲景发表之法借五香汤为例散之於外何必遽以峻下之药夺其里自取其祸切详河间谓地之湿气感则害人皮肉筋脉其在外盛而内行其脉沉实当先疎其内以絶其源又谓呕哕心逆发热而烦脉沉而实硬肿发闷皮肉不变色根深而大病在内脏腑秘结当急疎利之宜黄连汤先服一二贴次加大黄未效再加二钱以利为度如有热证只与黄连汤无热证少煎内托复煎散时时呷之如此则内外皆通血气流行彼加大黄者自因体实而腑秘也未当如此之多

圣济射干散治痈疽发背诸疮肿痛脉洪实数者射干 犀角 升麻 玄参 黄芩 麦门冬
大黄【各一两】山梔【半两】

右㯽咀每服五钱加竹叶芒硝一钱以利为度按此足阳明手太陰经药也

托里散治一切恶疮发背丁疽便毒始发脉洪弦实数肿甚欲作脓者三服消尽

大黄 牡蛎 瓜蒌根 皂角针 朴硝 连翘【各三钱】当归 金银花【各一两】

赤芍 黄芩【各二钱】

右为粗末每半两水酒各半煎服

按此足厥陰太陰阳明经药也

破棺丹治诸热肿一切风热疮证发热多汗大渴便闭谵语结阳之证

大黄【二两半半生半熟】 芒硝 甘草【各二两】

右为末炼蜜丸弹子大每服半丸病重一丸至二丸食後童便入酒半盏化服之或白汤合酒

化服按此仲景正阳阳明经药也

泻心汤治疮毒痈肿发躁烦渴脉实洪数者

大黄【四两】 黄连 山梔 漏芦

泽兰 连翘 黄芩 苏木【各二两】 犀角【一两】

右?咀每服三五钱水煎服

按此手少阴太阴少阳药也出足阳明例

辛平攻里之剂

郭氏瑞效丸治肠痈胃痈内积兼男子妇人积聚证当归 京三棱 ?榔

木鳖子 川山甲【炒各一两】 牡蛎【为末炒山甲都用】

连翘 枳壳【炒各一两半】 砂【焙】 琥珀【各一两】 巴豆【二十一粒去油】

麝香【少许】

右为末酒糊丸桐子大每服十丸至二三十丸温酒下临卧再服如利动脏腑减丸数大小便有脓血出者却用别药调治之

万灵夺命丹郭氏又名延寿济世膏 如意金丹广效保命丹 朱砂备急膏
三教济世膏仙授灵宝膏 圣僧慈救膏盖实一药也

治一切疮肿疔疽初起脉沉实及服汗药後毒气在里不尽者宜此下之

朱砂 盐花【各二钱半】 雄黄 明矾【生用】 枫香【各二钱】 黄丹 赤石脂

琥珀轻粉【各一钱半】 麝香 片脑【各一钱】 巴豆【去壳水煮十沸】

蓖麻【另研各四十九粒】

右为末用巴豆蓖麻子膏和药为丸如和不就加炼蜜就成膏收磁器内如用时旋丸如鸡头大每服一丸井花水下或汤亦得忌热物半日大人小儿以意加减与服

谨按郭氏用药格式云凡人患一切疮肿若脉在表者先服首功玄黑散或夺命丹蟾酥丸之类选用汗之继服广效保命膏或化毒凉剂下之若脉在里者便只服延寿济世膏或破棺丹下之病属里不必汗之故也如有头疮疽就使用朱砂备急膏一丸如黄豆大安於疮头上却用软粘膏药盖护之其疮必破如疮晕紫黑色外用宣毒散周围敷住毒气如疮晕赤红色用水澄膏敷之次日用紧峻碧云锭子开了疮口次用紧缓碧霞锭子去其歹肉稍净却用缓

慢碧玉錠子生肌搥名青金錠子不拘日数直待歹肉去净单用膏药贴之候脓水尽肌肉平方许贴生好肌歛口之药若依此法免教人受刀剪针烙之苦如是无头痛肿待脓成用针刺破方依法收功也愚详疮之汗後或始有头痛疽便是药後施錠子虽有次第然病体亦有积热或风毒气郁等证若待开溃次第用药及无头痛肿待脓成用法而又不及东垣法之通变神速也如疮溃动或结歹肉疔疽坚硬却次第用外治之法方可

辛热发表攻里之剂

飞龙夺命丹治一切疔疮恶肿痈疽初发或发而黑?毒气内?者

天南星 雄黄 巴豆【各一钱】硃砂黄丹 信石 乳香【各半钱】斑猫【十六个去翅足】麝【少许】

右为末取蟾酥和为丸如黄黍米大每服十一二丸或十四五丸看疮上下食前後以好酒送下量人虚实与之忌油腻鱼肉荤物七日

按此方世俗多用之故收入然香窜燥毒之剂盖无经不至者故能宣泄备汗吐下三法病因食一切禽畜毒发所致及疮脉沉紧细数毒蘊在里并湿毒用之神效但世人多不分此更不审疮之大热大渴毒气熅发而脉浮洪在表及膏粱积热之人未宜轻举况有以半夏代雄黄殊不知雄黄治诸疮及百节中大风中恶者之意此与郭氏二方皆手少陰例药兹则表里法也

辛平发表攻里之剂

五香连翘汤治诸疮肿初觉一二日便厥逆喉咽塞发寒热

沉香 木香 麝香 连翘射干 升麻 丁香 独活桑寄生 炙甘草【各一两】大黄【一两半】木通乳香【各二两】

右?咀每服五钱水一盞半煎七分温服取利按丹溪曰精要第一论云不问痈疽疮疖虚实冷热先与内托散五香连翘汤沉麝汤等诸方不冷不热不问老幼少壮陰阳虚实冷热多服为妙夫痈疽疮疖脏腑陰阳有浅深虚实冷热用药有补泻温凉老幼少壮其稟受厚薄形志苦乐随年岁而增损奈何欲以不冷不热四五方而通治之又以多服为妙此不能无疑也学者当审经络察病机而处治大抵岂可仗此为通治之法

辛凉发表攻里之剂

千金漏芦汤治积热丹毒无名恶肿脉洪实弦滑发热烦热者

漏芦 麻黄 升麻 赤芍 黄芩 甘草 白歛 白芨 枳殼【各四两】 大黄【十二两】

右?咀每服一两入姜煎

按此出阳明例药也驱积热蘊於表里之剂

防风通圣散

方见中风门

按此表里气血之药也治一切风毒积热疮肿脉候弦洪实数浮紧气血盛实者不可缺此见近有秘传外科家方以是药加人参赤茯苓黄芪苍术金银花名消肿托里散虽以参芪为主复云人参无亦可盖使人不能无疑而难用也且临证加减须较表里之法如表证多者当从此方以辛甘为主散之也里证多者方可从变故此分辛温辛平辛凉之异

内托之剂

机要内托复煎散托里健胃

地骨皮 黄芩 茯苓 白芍 人参 黄芪 白术 桂

甘草 防己 当归【各一两】 防风

右?咀先以苍术一斤水五升煎至三升去术入前十二味再煎至三四盏取清汁分三四次终日饮之又煎苍术查为汤去查依前又煎前十二味查分饮之

五香汤治毒气入腹托里若有异证於内加减

丁香 木香 沉香 乳香【各一两】 麝【三钱】

右为末水煎空心服若呕者去麝加藿香一两渴者加参一两

按丹溪曰或问内托之法古人有行之者乎曰河间治肿焮于外根盘不深形证在表其脉多浮病在皮肉非气盛则必侵于内急须内托以救其里宜复煎散除湿散郁使胃气和平如或未已再煎半料饮之如大便秘及烦热少服黄连汤如微利及烦热已退却与复煎散半两如此使荣卫俱行邪气不能内伤也然世俗多用十补散论已见前

圣济托里汤治诸疔肿发背曾经汗下毒气投心迷闷呕吐而痛可服二三次又名内托散

乳香【明者一两】真菉豆粉【四两一方止用二两】

右二味合匀每服一钱或二钱甘草煎汤调下按丹溪曰精要谓内托散一日至三日之内进十数服防毒气攻冲脏腑名护心散切详菉豆解丹毒又言治石毒味甘入阳明性寒能补为君以乳香去恶肿入少阴性温善窜为佐甘草性缓解五金八石及百药毒为使想此方专为服丹石而发疽者设不因丹石而发疽恐非必用之剂又次与五香连翘汤射干散散结气消瘀血夫善於驱逐以五般香窜佐之与漏芦汤相间大黄为佐虽各有黄芪漏芦甘草之补果能免驱逐之祸乎况大黄入阳明太阳性走而不守泻诸实热以其峻捷有将军之名痈疽因积毒在脏腑非一朝一夕发於外宜以标重为治当先助气壮胃使根本坚固而行经活血为佐参以经络时令使毒气外发此正仲景解表用麻黄桂枝之意治施之早可以内消此乃内托之本意与夫年老者病深者证备者体虚者菉豆虽补将有不胜重任之患矣尝治一妇人年将七十形实性急而好酒脑生疽才五日脉紧急且濇急用大黄酒煨细切酒拌炒为末又酒拌人参炒入姜煎调一钱重又两时再与得睡而上半身汗睡觉病已失此亦内托之意又一男子年五十余形实色黑背生红肿及胛骨下痛其脉浮数而洪紧食亦呕正冬月与麻黄桂枝汤加酒黄栢生附瓜蒌子甘草节羌活青皮人参黄芩半夏生姜六贴而消此非内托之意欤如此者非一不敢悉具

郭氏定疼托里散治一切疮肿疼痛不可忍如少壮气实先用疎利後服此药

栗殼【去蒂炒三两】当归 白芍 川芎【各半两】乳香 没药 桂【各三钱】

右?咀每服五钱水煎

乳香止痛散治一切疮肿疼痛不止

栗殼【六两制】白芷【三两】炙甘草 陈皮【各二两】乳香
没药【各一两】丁香【半两】

右?咀每服三钱水一盞半煎

按丹溪曰精要第十三论云初觉则宣热拔毒既溃则排脓止痛岂疮之初作无痛耶已溃之後痛又甚耶每见疮之作也先发为肿气血郁积蒸肉为脓故其痛多少疮之始作时也脓溃之後肿退肌寛痛必渐减而反痛者此为虚也宜补之亦有秽气所触者宜和解之亦有风寒逼者宜温散之审此则已上二方因有所取择矣

东垣黄芪人参汤治诸疮破後食少无睡及有虚热并秽气所触者

人参 麦门冬 陈皮 白术 苍术【各半钱】黄芪【一钱】
黄栢【四分炒】升麻【六分】当归身【半钱】炒麴【三分】

炙甘草【半钱】 五味子【九个】

右?咀作一服水煎

按此手足太陰例药也

圣济竹叶黄芪汤通治疗肿诸疮发热而渴

淡竹叶【二两】 生地黄【八两】 麦门冬 黄芪当归 川芎 甘草 黄芩芍药 人参 半夏
石膏【各二两】

右?咀每服一两水煎

按此于少陰太陰足阳明药也

托里黄芪汤治诸疮发渴脉虚

绵黄芪【一两】 炙甘草【一钱】

右?咀水煎

东垣圣愈汤治诸疮血出多而心烦不安不得眠睡此亡血也

熟地黄 生地黄 川芎 人参【各半钱】 当归身 黄芪【各一钱】

右?咀水煎

按已上二方手足太陰之剂一气分一血分药也

内补黄芪汤治诸疮肿发背已破後虚弱无力体倦?言语食无味少睡脉濡自汗口乾并宜服之

黄芪 麦门冬【各一两】 熟地黄 人参茯苓 炙甘草【各三钱】 白芍 川芎官桂 远志
当归【各半两】

右?咀或为末每服三钱入姜枣煎

按此手太陰例药也补气血滋陰助阳之剂

圣济透脓散治诸般痈疮及贴骨痈不破者宜此不用针刀

大蚕茧儿一个烧灰酒调服即透切不可用两三个恐疮口亦作两三孔也

按疮肿有於皮肉厚处发者此法恐不能及用者审之

外治之剂

郭氏青金錠子

铜緑【三钱】 青?胆?轻粉砒霜 白丁香 苦葶?【各一钱】 脑子麝香【各少许】

右将葶?研细次下余药同研极细打稠糊为錠子或炼蜜加白芨末一钱为錠如麻黄粗细二三寸长看疮口深浅紵入疼者可治不疼难治

第一般紧峻碧云錠子砒霜生开疮口用

第二般紧缓碧霞錠子砒霜煨去死肉用

第三般缓慢碧玉錠子去砒加枯?生好肉用

翠霞錠子治年深冷痲日久恶疮有歹肉用之

铜緑 寒水石【煨】 滑石【各三钱】 明?膩粉 砒霜 云母石【研如粉各一钱二分半】

右研细末糊为錠子如麻黄粗细长短不拘量疮口深浅紵之如修合此候天色晴明则可

信效錠子治一切恶疮

红娘子 黄丹 砒霜 鷹屎土硝 白芨【各一钱半】 铜緑【二钱半】 脑子麝香【各少许】

右研细末厮儿乳汁和为錠子用中病即止

寸金錠子治疗毒恶疮

朱砂【二钱】 黄丹 明?【枯】 砒霜轻粉 花碱 白芨【各一钱半】 蟾酥脑子 麝香【少许】

右研极细末稠糊和为錠子用之

红玉錠子去歹肉生肌用

乾胭脂 白?【枯各三钱】轻粉 砒霜黄丹 脑子 麝香【少许】

右研极细末稠糊和錠子用之

提丁錠子 又名透肉錠子治疗疮危笃发昏兼治瘰?

雄黄 朱砂【各二钱】青盐 砒霜【生】白丁香 轻粉 斑猫【去翅足各一钱半】蟾酥
麝香【各一钱】黄蜡 蓖麻子【三七粒】

右为细末於银器内或磁器内先将蜡溶开和前药丸如桐子大捻作饼子用针刺破疗疮放
一饼於疮头上又刺四边五七下恶血出为妙却用软膏药贴之立验内服首功玄黑散或蟾
酥丸

翠青錠子 又名善效錠子治脑疽发背恶疮并溃烂追脓水长肌

铜青【四钱】明?【枯】韶粉 乳香【另研】青黛【各一钱半】白歛
轻粉【各一钱】麝【半钱】杏仁【三七粒另研去皮尖】
如有死肉加白丁香【一钱半】

右研细末稠糊为錠子或糯米饭和亦得看浅深紕之直至疮平复尤可用之大有神效如前
数方不可多用谓犯生砒也此药无毒恐病家猜疑是毒药请口内尝之为凭也

搜脓錠子先用追蚀等錠子蚀去歹肉恶物止有脓水皆宜用之

自然铜 川芎 白芷【各半两】黄连 白歛【各二钱半】木香【一钱半】麝香【少许】

右为极细末糯米饭和为錠子用之或作散末乾上亦佳

守效散点疗疮恶肉

砒【生】白丁香 松香 轻粉 川乌 生?【各一钱】蜈蚣【一条焙】

右为极细末鉋针刺破疮口令血出唾津调药贴之疮上其根自溃

时效针头散追蚀恶疮歹肉兼治瘰?

赤石脂【半两】乳香 白丁香【各二钱】砒【生】黄丹【各一钱】轻粉 麝【各半钱】

蜈蚣【一条焙乾】

右为极细末掺於疮口歹肉自去矣若动刀针其疮虽可有瘢

神圣换肌散去癰?頑疮

白殭蚕【二钱】白?【一钱半】砒【生】斑猫【去翅足】草乌头
青黛【各一钱】麝【少许】

右研极细末乾掺些小於疮口内用膏药盖护其恶肉化为脓水

雄黄散治痈疽发背紫晕疼痛不止

粟米小粉【三两炒】草乌 南星 络石 百合【各一两】白芨【二两】乳香 没药 雄黄
黄丹【各半两】

右极细末温水调敷之

水澄膏治风热肿毒赤红色攻焮疼痛不止

白芨 白歛【四钱】郁金【一对】大黄 黄栢 黄药子 榆皮【各七钱半】乳香 没药
雄黄【各半两】

右细末用新汲水一碗药末不以多少澄於水内药定去水敷於肿处上用白纸封之用鸡翎
掠水湿润

金黄散治热毒丹流游走不定疼痛不止

寒水石【二两】郁金【一对】蓝实 大黄 黄栢 黄连 景天【各一两】

右细末用鸡子清调敷水亦可

乳香散治诸疔浸蚀日久不愈下注廉疮内外踝生疮頑疮等证

枯? 白胶香 赤石脂【各半两】黄丹 乳香 没药【各二钱】轻粉【二钱】

右细末加麝些小如疮湿乾上乾则香油调敷之

轻粉散治下注疔疮蚀臭腐烂疼痛不可忍者

黄栢【蜜炙】 蜜陀僧 黄丹 高末茶乳香【各三钱】 轻粉【一钱半】 麝【少许】

右末用葱汤洗疮後次贴此药兼治小儿疳疮

奇功散治癰?马刀顽恶等疮

野粪尖【乾一两】 蜜陀僧 无名异【各半两】 皂角乳香 没药【各三钱】

右粪用盐泥封固炭火烧之去泥取出同药五味研为末加麝香少许用清油调匀漫敷上湿即乾掺其功神妙

立应散治金疮血出不止并诸疮久不生肌

寒水石【一两半煨】 花蘘石 龙骨
黄丹没药【各半两】 黄药子【七钱半】 一方加白芨乳香轻粉

右为细末如一切金刃刀镰伤者用药敷上绢帛扎之不作脓血疮脓水乾贴生肌定疼【已上并郭氏方】

祛风散治一切风毒肿痛

天南星【二两】 白?草乌【各半两】

右为末酒调敷生姜汁亦可

圣济方治疗疮

?娘【心腹下肉稍白者】

右捕取不以多少贴疮上半日许未可再上之血尽根出神效

走马散围一切恶疮诸肿神效

大黄【三两】 黄栢 当归 白芨赤小豆 黄芩【各二两】 荆芥穗 半夏【各一两半】 白芷 白歛 南星【各一两】 檀香雄黄【各三钱】 乳香【七钱】 没药【五钱】
红花【一两】

右为细末以水调敷如疮色黯姜汁调疮未成脓者好米醋调敷

乳香善应膏治一切肿毒恶疮

大黄 黄芩 赤芍 杏仁【各一两】 当归【七钱半】 川山甲
猪牙皂角【各二钱半】 木鳖子【三钱】 乳香
没药【各半两】 血竭轻粉【各二钱半】 黄丹【七两】 香油【一筋】

右除黄丹乳没血轻五味外其余剉於油内浸十余日砂锅内?药色微黑用槐柳条搅之?去粗物净用油入丹?成膏滴水中不散然後入乳香等四味搅匀为度摊纸上贴疮

至宝玉连膏治一切疮肿

黄连【二两】 黄柏 黄芩 大黄 生地黄 赤芍 川椒 杏仁

白芷 桂 猪牙皂角 当归尾【各半两】 葱白【七根】 净髮【一拳大】

槐柳榆栎桤栢桃枝条各三钱已上用真香油二斤春浸五日夏三秋七冬十日如上法?微焦黑?去粗入松香四两黄丹碾筛净十两用药油?成膏滴入水中不散然後入下项药

乳香 没药 朴硝 龙骨 枯? 血竭【各半两】 轻粉 胆?麝香【各二钱】 共为细末入膏内

右用净磁器盛顿旋摊纸上贴

收敛之剂

生肌散

白? 枯? 榔【各一两】 蜜陀僧【一钱半】 黄丹 血竭【各一钱】 轻粉【半钱】

红玉散

软石膏【半两煨】 黄丹【一钱半炒】

完肌散

定粉 枯? 黄连 乳香 龙骨【各二钱】 黄丹 轻粉【各一钱】

右各料为极细末贴疮口生肌长肉看轻重选用之杂方

脂调散治疥疮脓窠疮神效

蛇床子【二两】?茹草乌 花椒苦参 荆芥【各一两】 雄黄 硫黄?【各半两】

右为细末猪脂调搽

羌活散治顽癣疥?风疮成片流黄水久不差者羌活 独活 明? 硫黄狼毒 白鲜皮 白附子
蛇床子【各一两】 轻粉 黄丹

右细末香油调成膏搽之

雄黄散治癣

桤皮 剪草【各一两】?
白芨【各半两】 雄黄【二钱半】 斑猫【七个去翅足】 草乌头尖【四个】

右为末水调敷津唾亦可

枫实膏治风疮燥痒癣疥

大枫子肉【半两】 轻粉 枯?【各些小】

右捣为膏擦疮上

一上散治风痒裂折燥疮

苦参【一两】 白芷 焰硝
枯?【各半两】 荆芥穗【三钱】 寒水石【二两煨】 白芨【三钱】

右为末油调搽

圣济乌蛇丸治一切风癣多年不效者

乌蛇【酒浸去骨】 天麻【各二两】 槐花【半斤】
附子【小便浸宿】 白附子【炮各一两】 全蝎【炒】 僵蚕【炒】
羌活乳香【各一两半】 苦参【十两】

右为细末生姜汁和蜜各一斤?成膏入药和为丸桐子大每三四十丸空心温酒下夜荆芥汤下

宣风换肌散治一切风癣疥疮疙瘩风疮

炙甘草 黄芩 当归【各一两】 黄连黄芩【各酒浸炒】 大力子【炒】 防风 白芷 荆芥穗 川芎 乌蛇肉【各半两】 羌活 苍术 何首乌【各三钱】 全蝎【十个炒】

右为细末酒调服茶清亦可下二钱

东垣内托升麻汤治妇人乳中结核

瓜蒌仁【三钱】 连翘【二钱】 甘草节 青皮【各一钱】

右作一服水煎食後细细呷之

连翘饮子治乳痈

青皮 瓜蒌仁 桃仁 橘叶 川芎 连翘 甘草节 皂角针【各等分】

右?咀每服七八钱水煎食後细细呷之

已破者加参芪当归

未破者加柴胡

消毒饮治便毒初发三四日可消

皂角针 金银花 防风 当归 大黄 甘草节 瓜蒌仁【各等分】

右?咀水酒各半煎食前温服仍频提掣顶中髮立效

下疳疮洗药

黄连 黄柏 当归 白芷 独活 防风 朴硝 荆芥

右等分水煎入钱五十文乌梅五个盐一匙同煎温洗日五七次用下药敷

木香 ?榔 黄连 铜青 轻粉 枯? 蜈蚣 麝【各等分】

右为极细末洗後至夜敷上

法制灵鸡弹治瘰?马刀腋下生者

斑猫【七个去头翹足】

右将鸡子一个顶上敲开些小入药在内纸封固了於饭上蒸熟取出去殼切开去药五更空心
和米饭嚼服候小便通如米泔水状如脂即验也如大小便不通却服琥珀散三二贴催之
然後常服後二药犹佳

妙灵散服前药後却将此散与连翹丸相间常服疮愈方止

木香【三钱】 沉香【二钱】 牛膝 何首乌当归 螻蛄
桑寄生【各一两】 海藻【二两】 青葙子 昆布 海带 甘草节【各半两】

右末每服三二钱食後温酒调下

内消连翹丸

连翹【三两】 射干 白芨 夏枯草土瓜 漏芦 沙参 泽兰胡桃仁【各一两半】

右末入桃仁研匀酒糊丸桐子大每服三五十丸空心食前盐酒下

琥珀散治诸般疮疖表里有热小便赤澀

白茯苓 黄芩 茵陈 紫草瞿麦 茅根 石韦 乌药琥珀 连翹 车前子

右各等分为极细末每二三钱灯心汤调下无时

圣济總錄治漆疮诸方

生柳叶【三斤冬用皮】煎汤适寒温洗之

芒硝【五两】汤化浸洗之猪膏一味?去滓停冷涂贴之生螃蟹一味取黄涂傅日三五次

荷叶燥者【一斤】煮水洗之以贯衆末掺之乾则油和涂

鸡子黄涂疮上乾则易之不过三次 黄栌木煎汤频洗之 一方谷精草煎汤洗甚速

经验方治腿膝生疮有脓治金刃伤亦妙五倍子细碾掺之

玉机微义卷十五

卷十六

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷十六 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

气证门

内经叙诸气动为病

陰阳应象论云喜怒伤气寒暑伤形暴怒伤陰暴喜伤阳厥气上行满脉去形喜怒不节寒暑过度生乃不固故重陰必阳重阳必陰

玉机真藏论云忧喜悲恐怒令不得以其次故令人有大病矣因而喜大虚则肾气乘矣忧则心气乘矣怒则肝气乘矣悲则肺气乘矣恐则脾气乘矣

举痛论云百病生於气也怒则气上喜则气缓悲则气消恐则气下寒则气收炅则气泄惊则气乱劳则气耗思则气结九气不同为病【详见本文】

脉法

经曰脉滑者多血少气 澁者少血多气 大者血气俱多 脉来大而坚者血气俱实 小者血气俱少 脉来细而缓者血气俱虚 代者气衰 细者气少 浮而絶者气辟 大而滑中有短气 尺脉澁而坚为血实气虚 尺脉细而微者血气俱不足【云云见本文】刘立之脉理玄要曰下手脉沉便知是气沉极则伏濇弱难治其或沉滑气兼痰饮

论九气动为诸证

子和云夫天地之气常则安变则病而况人禀天地之气五运迭侵於外七情交战於中是以圣人啬气如持至宝庸人投物而反伤大和此轩岐所以论诸痛皆因於气百病皆生於气遂有九气不同之说气本一也因所触而为九怒喜悲恐寒暑惊思劳也其言曰怒则气逆甚则呕血及殄泄故气逆上矣王太仆曰怒则阳气逆上而肝木乘脾故甚则呕血及殄泄也喜则气和志達荣卫通利故气缓矣悲则心系急肺布叶举而上焦不通荣卫不散热气在中故气消矣恐则精却却则上焦闭闭则气还还则下焦胀故气不行矣太仆云恐则伤精却上而不

下流下焦陰气亦回还而不散故聚而胀也然上焦固禁下焦气还故气下行也寒则腠理闭气不行故气收矣太仆云身凉则卫气沉故皮肤文理及渗泄之处皆闭密而气不流行卫气收斂于中而不散也灵则腠理开荣卫通汗大出故气泄矣太仆云人在阳则舒在陰则惨故热则肤腠开发荣卫大通津液而汗大出也惊则心无所依神无所归虑无所定故气乱矣劳则喘息汗出内外皆越故气耗矣太仆云疲劳役则气奔速故喘息气奔速则阳外发故汗出内外皆踰越於常纪故气耗损也思则心有所存神有所归正气留而不行故气结矣太仆云系心不散故气亦停留此素问之论九气其变甚详其理甚明然论九气所感之疾则略惟论呕血及飧泄余皆不言惟灵枢论思虑悲哀喜乐愁忧盛怒恐惧而言其病曰思虑而伤神神伤则恐惧自失破?脱肉毛瘁色夭死于冬脾忧愁而不解则伤意意伤则恍乱四肢不举毛瘁色夭死于春肝悲哀动中则伤魂魂伤则狂忘不精不正当人陰而挛筋两脇不举毛瘁色夭死于秋肺喜乐无极则伤魄魄伤则狂狂者意不存人毛革焦毛瘁色夭死于夏肾盛怒而不止则伤志志伤则喜忘其前腰脊不可俯仰屈伸毛瘁色夭死于季夏恐惧不解则伤精精伤则骨痿厥精时自下是故五脏主藏精者也不可伤伤则失守而陰虚虚则无气无气则死矣灵枢论神意魂魄志精所主之病然无寒暑惊劳四证余以是推而广之怒气所至为呕血为飧泄为煎厥为薄厥为阳厥为胸满脇痛食则气逆而不下为喘渴烦心为焮瘡为肥气为日暴盲耳暴闭筋纵发於外为疽痈喜气所至为笑不休为毛革焦为肉病为阳气不收甚则为狂悲气所至为陰缩为筋挛为肌脾为脉痿男为数洩血女为血崩为酸鼻辛頰为目昏为少气不能报息为泣则臂麻恐气所至为破?脱肉为骨酸痿厥为暴下渌水为面热肤急为陰痿为惧而脱颐惊气所至为潮涎为目眚为口喏为痴癰为不省人为僵仆久则为 痺劳气所至为咽噎病为喘促为嗽血为腰痛骨痿为肺鸣为高骨坏为陰痿为唾血为冥视为耳闭男为少精女为不月衰甚则溃溃乎若坏都汨汨乎不可止思气所至为不眠为嗜卧为昏瞽为中痞三焦闭塞为咽噎不利为胆瘴呕苦为筋痿为白淫为得後与气快然如衰为不嗜食寒气所至为上下所出水液【云云见寒门】灵气所至为喘呕吐酸暴注下迫【云云见火门】凡此九者内经有治法但以五行相胜之理治之夫怒伤肝肝属木怒则气并於肝而脾土受邪木太过则肝亦自病喜伤心心属火喜则气并於心而肺金受邪火太过则心亦自病悲伤肺肺属金悲则气并於肺而肝木受邪金太过则肺亦自病恐伤肾肾属水恐则气并於肾而心火受邪水太过则肾亦自病思伤脾脾属土思则气并於脾而肾水受邪土太过则脾亦自病寒伤形形属陰寒胜热则阳受病寒太过则陰亦自病灵伤气气属阳热胜寒则陰受病热太过则阳亦自病凡此七者更相为治故悲可以治怒以怵恻苦楚之言感之喜可以治悲以谑浪?狎之言娱之恐可以治喜以迫遽死亡之言怖之怒可以治思以污辱欺罔之言触之思可以治恐以虑彼忘此之言夺之凡此五者必诡诈譎恠无所不至然後可以动人耳目易人视听若胸中无材器之人亦不能以此五法也灵可以治寒寒可以治灵逸可以治劳习可以治惊经曰惊者平之平谓平常也夫惊以其忽然而遇之也使习见习闻则不惊矣此九者内经自有是理庸工废而不行今代刘河间治五志独得言外之意【云云见後】昔余治一书生劳苦太过大便秘结燥欬逆上气时喝喝然有音唾呕鲜血以苦剂解毒汤加木香汉防己煎服时时啜之复以木香?榔丸泄其逆气不月余而痊余又尝以巫跃妓抵以治人之悲结者又尝以鍼下之时使杂舞忽鼓笛应之以治人之忧而心痛者余尝击拍门窗使其声不絕以治因惊而畏响魂气飞扬者尝治一妇人久思而不眠余日醉而不问妇果呵怒是夜困睡又尝以酸枣仁丸治人多忧者然惟劳而气耗恐而气夺者为难治喜者少病百脉舒和故也又

闻庄先生者治喜乐之极而病者庄切其脉为之失声佯曰吾取药去数日更不来病者悲泣辞其亲友曰吾不久矣庄知其将愈慰之诘其故庄引素问曰惧胜喜可谓得玄关者也

按此论九气所动病机至为详悉然七情诸证局方多用气药论治固然但不分其夹热兼痰虚实之例而於寒热二证亦似谓备於九气兼用气药而治之其弊甚矣且夫七情诸证有乘逆厥中之殊人有苦乐安扰之异是以先哲就用五志相胜之理治之药之於伤寒温暑自有其例也後世俗不能本此恃之於药而相胜之理不行况其药不热即峻虚虚实实不无差悞故河间戴人者出论已上病机究所至之因以平火为主兼五志相胜之理或音乐抵戏甚至诡诈谲怪诸法为治应变亦已至矣我东垣丹溪先生更论诸气为病有郁痞逆滞不同随证用药有寒热温凉之异如劳气者宜补中益气滋陰助阳或兼所挟之邪论治深备先哲旨趣惜乎其道皆不能大行于世者由局方障之也

气中似风证论

详见中风门

理气宜导痰论

详见痰饮门

气属阳动作火论

原病式曰气为阳而主轻微诸所动乱劳伤乃为阳火之化神狂气乱而为病热者多矣子和云河间治五志独得言外之意凡见喜怒悲恐思之证皆以平心火为主至于劳者伤於动动便属阳惊者骇于心心便属火二者亦以平心火为主今之医者不達此旨遂有寒凉之谤

谨按或云扞卫冲和不息之谓气扰乱妄动变常之谓火当其和平之时外护其表复行於里周流一身循环无端出入升降继而有常源出中焦總統於肺气曷尝病於人也及其七情之交攻五志之间发乖戾失常清者遽变之为浊行者抑遏而反止表失卫护而不和内失健悍而少降营运渐远肺失主持妄动不已五志厥阳之火起於马上燔於肺气乃病焉何者气本属阳反胜则为火矣河间有曰五志过极皆为火也何後世不本此议而一槩类聚香辛燥热之剂气作寒治所据何理且言指迷七气汤制作者其皆用青皮陈皮三棱蓬术益智官桂甘草遂为平和可以常用通治七情所伤混同一意未喻某药以治某气已下诸方尤有甚焉者兹不复叙况所起之情各各不同且夫经言九气之变未尝略而不详如怒则气上等证其言治法高者抑之下者举之寒者热之热者寒之惊者平之劳者温之结者散之喜者以恐胜之悲者以喜胜之九气之治各有分别何尝混作寒论而类以香热之药通言而治诸气岂理之谓欤若香辛燥热之剂但可劫滯气冲快於一时以其气久抑滯借此暂行开发之意药中不佐制伏所起之气服甚则增炽郁火蒸熏气液而自成积积滋长而成痰一饮下膈气乃氤氲清虚之象若雾露之着物虽滯易散内挟痰积开而复结服之日久安有气实而不动气动而

不散者乎此皆人所受悞之由习俗已久相沿而化卒莫能救升发大过香辛散气燥热伤气真气耗散浊气上腾犹曰肾虚不能摄气归原遂与苏子降气汤四磨汤下黑锡丹养气丹镇坠上升之气且硫黄黑锡佐以香热又无补养之性藉此果能生气而补肾乎请熟详之夫湿痰甚者亦或当之初服未显增变由喜坠而愈进形质弱者何以收救不悟肺受火炎子气亦弱降令不行火无以制相扇而动本势空虚命絕如缕积而至深丹毒济大一旦火气狂散喘息奔急而死吁以有形丹石丸药重坠无形之气将何抵受随而降之乎譬以石投水水故未尝沉也岂不死欤丹溪有曰上升之气自肝而出中挟相火其热为甚自觉其冷非真冷也火极似水积热之甚阳亢陰微故有此证认假作真似是之祸可胜言哉内经虽云百病皆生於气以正气受邪之不一也今七情伤气郁结不舒痞闷壅塞发为诸病当详所起之因滞於何经上下部分脏气之不同随经用药有寒热温凉之同异若枳殼利肺气多服损胸中至高之气青皮泻肝气多服损真气与夫木香之行中下焦气香附之快滞气陈皮之泄逆气紫苏之散表气厚朴之泻卫气?榔之泻至高之气藿香之馨香上行胃气沉香之升降真气脑麝之散真气若此之类气实所宜其中有行散者有损泄者其过剂乎用之能却气之标而不能制气之本岂可又佐以燥热之药以火济火混同谓治诸气使之常服多服可乎气之与火一理而已动静之变反化为二气作火论治与病情相得丹溪发挥论之冷生气者出於高阳生之谬言也身非自受寒气口食寒物而是论寒者吾恐十之无一二也

论局方用热药治诸气之误

丹溪曰治气一门有曰治一切气冷气滞气逆气上气用安息香丸丁沉香丸大沉香丸苏子丸匀气散如神丸集香丸白沉香散煨姜丸盐煎散七气散温白丸生气汤悉用热药夫天地周流於人之一身以为生者气也阳往则陰来陰往则阳来一升一降无有穷也苟内不伤於七情外不感於六淫其为气也何病之有今日滞气逆气上气皆是肺受火邪气得炎上之化有升无降熏蒸清道甚而至於上焦不纳中焦不化下焦不渗遂展转传变为呕为吐为膈为噎为痰为饮为翻冒为吞酸夫治寒以热治热以寒此正治之法也治热用热治寒用寒此反佐之法也详味前方既非正治又非反佐此愚之所以不能无疑也观其微意可表者汗之可下者利之滞者导之郁者扬之热者清之寒者温之偏寒偏热者反佐而行之挟湿者淡以渗之挟虚者补而养之何尝例用辛香燥热之剂以火济火实实虚虚咎将谁执

论气无补法之误

丹溪曰气无补法俗论也痞闷壅塞似难於补不思正气虚者由七情内伤六淫外侵饮食不节房劳致虚脾土之陰受伤转运之官失职胃虽受谷不能运化故阳升陰降而成天地不交之否清浊相混邪何由行此等理宜补养却厚味断妄想远音乐无有不安

谨按气者本腑脏天真之原也虚由七情及劳伤等因所致则正气原气不足也故宜补之则气实气化病邪渐除经曰虚则补之是也此补者补其不足也非为病邪?下腑脏精气已惫天真元气已絕而施补乎此等非虚也非不足也无补之法必矣大抵世俗拘此止谓治病攻邪不审补虚养正之理实实虚虚悞人生命盖不思之甚矣

气证治法

升散之剂

局方七气汤治七情之气郁结于中心腹绞痛

人参 甘草【炙】 肉桂【各一钱半】 半夏【一钱】

右?咀水煎服

按此出太阳例寒则气收宜辛散之甘缓之治气虚寒郁药也

盐煎散治一切冷气攻冲胸脇刺痛不已及脾胃虚冷呕吐泄泻

砂仁 甘草【炙】 茯苓 草果 肉豆蔻 川芎 茴香【炒】 澄茄 麦藁 诃榔 良姜
枳壳 厚朴【炒】 陈皮 羌活 苍术【各等分】

右?咀每服四五钱入盐些小煎

按此足太阳阳明太阴经药也

木香流气饮治诸气痞塞不通胸膈膨胀面目虚浮四肢肿满

半夏 厚朴 青皮 紫苏 香附子 甘草【各一钱】 陈皮【二钱】 桂

莪术 丁皮 大腹皮 诃榔 麦门冬 木香 草果【各六分】 木通【八分】 藿香
白芷【各四分】 茯苓 白术 木瓜 人参 石菖蒲

右?咀每服四五钱入姜枣煎

按此太阳例药与已上方世俗多用之故收入然类以香燥非寒者气实者不可用

秘传降气汤治上盛下虚气不升降头目昏眩痰实呕逆胸膈不快

骨碎补 诃子 草果 五加皮 半夏 桔梗【各半钱】 桑白皮【二钱】 地骨皮 枳壳 陈皮 柴胡
甘草【各一钱】

右制服见局方

按此出少阳例然怒则气上惊则气乱意例宜求诸此

易简参苏饮

方见热门

谨按天地六气并人之气分为病治例亦详见各门故当分治也

东垣升阳顺气汤治七情所伤及劳役饮食不节满闷短气

升麻 柴胡 陈皮【各一钱】 半夏人参【各钱】 黄芪【四钱】 甘草
黄栢【各半钱】 当归【一钱】 草豆蔻【二钱】 神麴【炒一钱半】

右?咀每服半两入姜煎

按此补剂也然恐则气下宜求诸此

攻下之剂

戴人木香?榔丸散滞气胸腹胀满实痞气结痛木香?榔 青皮 陈皮 广术 枳壳 黄连
黄栢 大黄【各半两】 牵牛 香附【各二两】

右为末水丸梧子大每服五六十丸煎水下量虚实与之

按此阳明例药下热之剂也

局方神保丸治诸积气为痛

乾蝎【七个】 木香 胡椒【各二钱半】 巴豆【十个去心皮别研取霜】

右为末和匀汤化蒸饼丸如麻子大朱砂为衣每五十丸随病气例汤下

按此太阳例药下寒之剂也

导气丸宣壅导气除胀满利大腸

大黄【四两煨】 胡椒【四十九粒】 青皮 陈皮 蝎稍【炒】 茴香【炒】 乾姜【炮】
甘草【炙各一两】 阿魏【半钱用麴和炒】 黑牵牛【取头末二两】

右为末水丸

御院方木香顺气丸治诸气不和

方见积聚门

按已上二方手足太陰足厥陰阳明经药导滯之剂也

调理之剂

局方沉香降气汤治陰阳壅滯气不升降胸膈痞闷噫醋吞酸

沉香【四钱】 砂仁【半两】 甘草【炙一两二钱】 香附子【四两】

右为末每二钱入盐少许汤调下

分心气饮治一切气留滯於胸膈之间不能流畅以致痞闷噎塞

木香 丁皮【各二钱】 人参 麦門冬 大腹皮 大腹子 栝白皮 草果 桔梗 厚朴
白术【各半两】 香附子 藿香 陈皮 紫苏【各一两半】 甘草【炙一两】

右?咀每三钱入姜枣煎

按此二方手足太陰阳明足少陰经药也

大七气汤治喜怒不节忧思兼并多生悲恐致脏气不平心腹胀满

半夏 白茯苓【四钱】 厚朴【炒三钱】 紫苏【三钱】

右剉入姜煎服

按此足阳明手足太陰经药也

紫沉通气汤治三焦气滯不能宣通腹脇胀大便滯紫苏 枳殼【炒】 陈皮 茯苓

甘草 ?榔【各一两】 沉香 木香

麦門冬 五味子 栝白皮 黄芪

乾生姜 薄荷 枳实 荆芥穗【各半两】

右?咀每半两水煎服

按此手太陰之剂也世俗调理之剂而多杂峻削之药故并略去然此方有发散意而不大燥烈姑存之用者自宜损益按经云气血弱者不可服枳实以其损气也气血盛者不可服丁香以其益气也於调理不可不分

东垣木香顺气汤治浊气在上则生?胀

方见胀满门

按此亦七情所致浊陰之气不降而为?胀也故出阳明承气例然七气之方先哲亦未见分其异者盖气之厥逆收缓久而郁变病机不同而亦不可不本其所因而治之也

补养之剂

东垣补中益气汤治喜怒忧恐损伤元气劳倦体怠

方见热门

调中益气汤

方见内伤门

按此二方治劳则气耗宜益之也出少阳例

清暑益气汤治暑伤元气食少体倦

方见暑门

按此所谓炅则气泄宜益之也

局方养气丹

养正丹

方见和剂

按已上方治元阳亏损气短身羸气不升降食少脉弱陰阳之气下?者甚捷然不可尽剂也论见补虚门

消导之剂

局方异香散治胃气不和腹脇膨胀饮食难化一切冷气结聚

石莲肉【一两】 莪术 三棱 益智仁甘草【炙各六两】 青皮 陈皮 厚朴【炙各二两】

右为末每服三二钱姜枣煎服

按本方云治肾气不和肾字为胃字之悞尔出阳明例药

御院方助气丸

方见积聚门

分气丸治胸膈气痞痰实不化并宜服之

砂仁 青皮 陈皮 白豆?三棱【炮】 莪术【煨】 澄茄 萝卜子【炒】 枳实 木香【各一两】 黑牵牛【炒二两取头末】

右为末湖丸如梧子大每五十丸姜汤下

按已上诸方治气积痞之剂非调理比也宜分虚实寒热用之又皆气中之血药也

治痰之剂

二陈汤

桔梗半夏汤

四七汤

并见痰饮门

苏子降气汤

方见欬门

按此诸方散郁和中之药也

理血之剂

本事方槐角散

济生归脾汤

拔萃门冬饮子

并见血证门

按气病血从已见前论故録已上方以备其例用者自宜推格之

宣剂

稀涎散

元戎胜金丸

并见痰饮门

谨按诸气郁或七情所滞最宜宣导正木郁達之之意也大抵是证中夹火热者多已上诸方恐未合宜用者自临时通变可也

通关窍之剂

局方苏合香丸治气中或卒暴气逆心痛鬼魅恶气沉香 麝香 诃子 丁香 青木香 安息香 香附 荜拨 白术 白檀 【各二两】 薰陆香 苏合油 龙脑 【各一两】 朱砂 乌犀角 【各制】

右为末入研极匀用安息膏并炼蜜丸如梧子大温水化四丸

按此足手太阳足阳明手足太陰足三陰药也杂方

严氏四磨汤治七情伤感上气喘息妨闷不食

人参 枳 榔 沉香 天台乌药

右四味各浓磨水和作七分煎三五沸温服

绀珠正气天香汤治一切上气湊心心胸筑痛

方见妇人门

玉机微义卷十六

卷十七

钦定四库全书

玉机微义卷十七 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

血证门

诸经叙血证所因

内经厥论云阳明厥逆喘欬身热善惊衄吐血 温淫汗出衄
生气通天论云阳气者大怒则形气绝而血菀於上

气厥论云脾移热於肝则为惊衄胞移热於膀胱则癰溺血
举痛论云怒则气逆甚则呕血故气上矣 阴阳别论云结阴者便血【云云见下】 鍼经云厥
气生足惋惋生胫寒後则血【云云见积聚门】 脉经云下血先见血後见便此近血也先见
便後见血此远血也

脉法

内经云脉来悬钩为衄血常脉脉至而搏血衄身热者死 肠癖下脓血脉弦绝则死滑大则生
血温身热者死 脉经曰脉得诸澁濡弱为亡血

脉来轻轻在肌肉尺中自浮目睛晕黄衄必未止 太阳脉大而浮必衄吐血
病人面无血色无寒热脉沈沈弦衄也脉浮弱手按之绝者下血 脉芤为失血
澁为少血尺脉滑而疾为血虚
脉弦而紧脇痛脏伤有瘀血吐血唾血脉滑小弱者生实大者死 唾血脉紧强

者死滑者生 肾脉小搏沈为肠癖下血心肝癖亦下血

论血证分三因

陈无择云衄者因伤风寒暑湿流传经络涌泄于清气道中而致者皆外所因积怒伤肝积忧
伤肺烦思伤脾失志阳肾暴喜伤心皆能动血随气上溢清气道中而致者属内因饮酒过多
啖炙搏辛热或坠堕车马伤损致者为不内外因吐血者或因四气伤于外七情动于内及饮
食房劳坠闪伤损致荣血留聚膈间满则吐溢世谓妄行或吐瘀血此名内伤 便血或清或浊
或鲜或黑或在便前便後或与泄物并下此由内外有所感伤疑停在胃随气下通亦妄行之

类 尿血因心肾气结所致或忧劳房室过度此得之虚寒不可专以血得热而淖
二者皆致尿血与淋不同

谨按衄血下血伤寒邪气壅迫於经而致者故有之杂证见者多火热所致或吐溢於空窍皆
五志所动或阴分郁热或内外有所伤而成有寒邪者少如尿血因房劳者实由精气滑脱阴
虚火动荣血妄行尔已上论为虚寒恐未必然也若便血清者属荣虚有热浊属热与湿色鲜
者属火黑者火极与泄物并下属有积或络脉伤也并宜分治

论下血为内伤络脉所致

详见积聚门

论呕唾血溢为气逆所致

东垣曰经云怒气逆甚则呕血暴瘁内逆肝肺相搏血溢鼻口取天府穴又足少陰肾之脉从
肾上贯肝入肺中循喉咙其病则饥不欲食面黑如地色咳唾则有血夫气者阳也血者陰也
气主响之血主濡之今血妄行上出於鼻口者皆气逆也故经言阳明厥逆怒则气逆暴瘁内
逆者是也谨按悲气劳气等皆能致血证详见气门但怒气致血证者则暴甚故经曰抑怒以
全陰者是矣否则五志之火动甚火载血上错经妄行也

论衄吐血泄为火热所致

原病式曰衄者阳热怫郁干於足阳明而上热则血妄行鼻衄也 血溢者上出也心养於血故
热甚则血有余而妄行或谓呕吐紫凝血为寒者误也此非冷凝由热甚销烁以为稠浊而热
甚则水化制之故赤兼黑而为紫也 血泄热客下焦而大小便血也 衄蔑血污血出也污者浊
也心火热极则血有余热气上甚则为血溢热势亢极则燥而污浊害承乃制则色兼黑而为
紫也

论衄血下血为伤寒所致

成无已曰伤寒衄者为邪气不得发散壅盛於经逼迫於血则因致衄也桂枝汤麻黄汤治衄
者非治衄也即是发散经中邪气尔至畜血者血在下焦结聚而不行畜积而不散者是也血
菀於上而吐血者谓之薄厥留於下而瘀者谓之畜血此由太阳随经瘀热在里血为热所搏
结而不行畜於下焦之所致经曰太阳病七八日表证仍在脉微而沈反不结胸其人如狂者
以热在下焦少腹当鞭满小便自利者下血乃愈

伤寒例少阴证下利便脓血者桃花汤以固脱散寒补正

许氏治少陰误汗衄血及脐中出血用姜附汤治少阴之本

阴证略例治三焦出血色紫不鲜此重沓寒湿化毒凝泣浸渍而成治要用黑锡丹【见直指方】

按所论已上证皆寒邪之变病也至又有甚者如论云服桂枝汤吐血其後必吐衄血又厥阴证伤寒六七日大下後寸脉沈而迟手足厥冷下部脉不至咽喉不利唾衄血泄利不止者为难治宜麻黄升麻汤火邪亦咽燥唾血阳毒亦吐血皆变证之极者也非衄证之比大抵伤寒畜血下血为传变故下血衄血身凉乃愈其不传变入里邪气不得发散逼迫於血因致妄行於下者为逆下血必多不能止为难治也论结阴便血

卫生宝鉴云真定史十年四十二形体本瘦秋时因勉强饮酸酒数杯少时腹痛次传下利无度待十余日便後见血或红或紫腹鸣时痛诸医以为血热用芍药柏皮丸治之未效仍不欲食食则呕酸形体愈瘦面色青黄不泽心下痞恶冷物口乾时有烦燥不得安卧诊时脉弦细而微迟手足稍冷经曰结阴者便血一升再结二升三结三升又邪在五脏则阴脉不和阴脉不和则血留之结阴之病阴气内结不得外行无所禀渗入肠间故便血也外灸中脘三里气海等穴内服平胃地榆汤而愈

按此治例实内伤法也宜与积聚门叙积之始兼看血属阴难成易亏论

丹溪曰经云人年至四十阴气自半而起居衰矣又曰男子六十四而精绝女子四十九而经断夫以阴气之成止供给二十年之运用已先亏矣人之情欲无涯此难成易亏之阴气若之何而可以纵欲也

谨按或曰经云荣者水谷之精也和调五脏洒陈於六腑乃能入於脉也源源而来生化於脾总统於心藏受於肝宣布於肺施泄於肾灌溉一身目得之而能视耳得之而能听手得之而能握足得之而能步脏得之而能液腑得之而能气是以出入升降濡润宣通者由此使然也注之於脉少则濡充则实常以饮食日滋故能阳生阴长取汁变化而赤为血也生化旺则诸经恃此而长养衰耗竭则百脉由此而空虚可不谨养哉故曰血者神气也持之则存失之则亡是知血盛则形盛血弱则形衰神静则阴生形役则阳亢阳盛则阴必衰又何言阳旺而生阴血也盖谓血气之常阴从乎阳随气运行於内苟无阴以羁束则气何以树立故其致病也易调治也难以其比阳常亏而又损之则阳易亢阴易乏之论可以见矣诸经有云阳道实阴道虚阴道常乏阳常有余阴常不足以人之生也年至十四经行至四十九而经断可见阴血之难成易亏如此阴气一伤所变之证妄行於上则吐衄衰涸於外则虚劳忘反於下则便红稍热膀胱则癃闭溺血渗透肠间则为肠风阴虚阳搏则为崩中湿蒸热瘀则为滞下热极腐化则为衄血火极似水血色紫黑热胜於阴发为疮疡湿滞於血则为痛痒癰疹皮肤则为冷痹畜之在上则人喜忘畜之在下则人喜狂堕恐跌仆则瘀恶内凝若分部位身半以上同天之阳身半以下同地之阴此特举其所显之证者治血必血属之药欲求血药其四物之谓乎河间谓随证辅佐谓之六合汤者详言之矣余故陈其气味专司之要不可不察夫川芎血中气药也通肝经性味辛散能行血滞於气也地黄血中血药也通肾经性味甘寒能生真阴之虚也当归分二治血中主药也通肝经性味辛温全用能活血各归其经也芍

药阴分药也通脾经性味酸寒能和血治虚腹痛也若求阴药之属必於此而取则焉脾胃论有云若善治者随经损益摘其一二味之所宜为主治可也此特论血病而求血药之属者也若气虚血弱又当从长沙血虚以人参补之阳旺则生阴血也若四物者独能生血分受伤为气不虚也辅佐之属若桃仁红花苏木血竭牡丹皮者血滞所宜蒲黄阿胶地榆百草霜棕榈灰者血崩所宜乳香没药五灵脂凌霄花者血痛所宜苧蓉琐肠牛膝枸杞子益母草夏枯草败龟板者血虚所宜乳酪血液之物血燥所宜乾姜桂者血寒所宜生地黄苦参血热所宜特取其正治大略耳以能触类而长可谓应无穷之变矣

论治血证大法

东垣曰伤寒家衄血者仲景言不可发汗盖为脉微也若浮紧者麻黄汤浮缓者桂枝汤脉已微者二药俱不可用宜黄芩芍药汤主之杂病见血多责其热如衄血出於肺以犀角升麻梔子黄芩芍药生地黄紫参丹参阿胶之类主之咯唾血者出於肾以天门冬麦门冬贝母知母桔梗百部黄柏远志熟地黄之类主之痰涎血者出於脾葛根黄芪黄连芍药当归甘草沉香之类主之呕吐血出於胃也实者犀角地黄汤主之虚者小建中汤加黄连主之血证上行或唾或呕或吐皆逆也若变而下行为恶痢者顺也血上行为逆其治难下行为顺其治易故仲景云畜血证下血者当自愈也与此意同若无病之人忽然下痢其病进也今病血证上行而复下行恶痢者其邪欲去是知吉也经曰诸见血身热脉大者难治是火邪胜也身凉脉静者易治是正气复也故脉诀云鼻衄吐血沈细宜忽然浮大即倾危此之谓也

血证治法

妇室经血诸证详见妇人门

治风之剂

败毒散治风热流入大肠经下血不止若因酒毒加黄连

方见欬门

按此出少阳例表里药也

本事方槐花散治肠风脏毒下血

槐花【炒】 柏叶【杵】 荆芥穗 枳壳【等分】

右为末每服二钱空心米饮送下

拔萃方结阴丹治肠风下血脏毒下血

枳殼【炒】 葳灵仙 黄芩 陈皮 椿根 何首乌 荆芥穗【等分】

右为末酒糊丸桐子大每五七十丸米饮下入醋少许

按此二方手太阴阳明药也

济生加減四物汤治肠风下血不止

侧柏叶 生地黄 当归 川芎【各一两】 枳殼 荆芥穗 槐花【炒】 甘草【各半两炙】

右咀每四钱入乌梅姜同煎

按此手足厥阴太阴药也大抵此药主补血凉血而以风为虚象者盖非风客於肠间也

东垣黄芩芍药汤治衄多岁面黄眼澁多眵手麻黄芩【三两】 甘草【炙二两】 升麻 葛根芍药【各一两】 羌活【半两】

右?咀每三钱水煎温服

按此手足太阴阳明药也然血虚久则阳分亦虚矣故血不足则麻木阴虚火动变证百出亦实非风也此出升阳滋阴例

治寒之剂

东垣麻黄桂枝汤治感寒发衄脉微弱者

麻黄 黄芩 白芍 甘草【各一钱】 桂枝 当归【各半钱】 人参【一分】 麦门冬【三分】 五味子【五个】

右?咀作一服水煎

按此太阳例药也伤寒论有例兹不详录

济生断红丸治脏腑虚寒下血不止面色痿黄羸瘦侧柏叶【炒】 川续断【酒浸】 鹿茸【醋煮】 附子【炮】 黄芩 阿胶【炒】 当归【各一两】 白矾【枯一两】

右为末醋煮米糊丸如梧子大每七十丸空心米饮送下

按此厥阴例药也

宝监平胃地榆汤治结阴便血

白术 陈皮 茯苓 厚朴

葛根【各半钱】地榆【七分】乾姜【五分】炙甘草当归 炒麴 白芍
人参益智仁【各三分】苍术 升麻 附子【炮各一钱】

右?咀作一服水煎加姜枣

按此少阴例药也

治暑之剂

局方黄连香薷饮治伏暑纯下鲜血

方见暑门

按此手少阴足太阴药心主血脾裹血也

枇杷叶散治水毒攻心呕吐鲜血

香薷【二钱】厚朴【一钱半】甘草【炙】麦门冬乾木瓜 白茅根【各一钱】枇杷叶
陈皮丁香【各半钱】

右细末每二钱入姜煎

按此手足太阴经药中热者慎之

治湿之剂

胃风汤治风湿乘虚入於肠胃下瘀血者

方见滞下门

拔萃升阳和血汤治肠癖下血作派其血唧出有力而远射四散如筛春二月中下二行腹中
大作痛乃阳明气冲热毒所作也当去湿毒和血而愈

生地黄 牡丹皮 生甘草【各半钱】炙甘草 黄芩【各一钱】当归身 熟地黄 苍术 秦艽 肉桂【各三分】陈皮【二分】升麻【七分】芍药【一钱半】

右?咀作一服水煎

当归和血散治肠癖湿毒下血

槐花 青皮【各六分】当归身 升麻【各二钱】川芎【四分】荆芥穗 熟地黄 白术【各六分】

右为末每服三二钱米饮调下

按此诸方疎风胜湿药也然湿热者多宜从滞下法择用

治热之剂

局方龙脑鸡苏丸治膈热欬嗽或吐血衄血

方见热门

甘露饮治男女血妄流溢或吐或咯衄血齿龈臭出血并治之

方见热门

简易选奇黄芩散治欬血成劳

黄芩 麦门冬 熟地黄 桔梗 白芍【各半两】甘草【四钱】

右?咀每服半两水煎

按此手太阴足少阴药也

济生犀角地黄汤治郁热不解干经络随气涌泄为衄血或清道闭塞流入胃脘吐出清血如鼻衄吐血不尽余血停留致面色痿黄大便黑者并宜服

犀角 生地黄 白芍 牡丹皮【等分】

右?咀每四钱水煎

按此足太阴药也

良方四生丸凡吐衄血阳乘於阴血热妄行宜此生荷叶 生艾叶 生柏叶 生地黄【等分】

右烂研丸如鸡子大每一丸水煎服或用盐汤化下

河间生地黄散治郁热衄血咯血吐血

枸杞 柴胡 黄连 地骨皮 天门冬 白芍 甘草 黄芩 黄蓍 生地黄 熟地黄【等分】

右?咀水煎服下血者加地榆

按此二方手足少阴太阴药也

局方槐角丸治五种肠风下血痔瘻脱肛下血并宜服之

槐角【炒一两】地榆 黄芩 当归 防风 枳壳【麩炒各半斤】

右为末酒糊丸如梧子大每三四十丸空心米饮下按此虽有治风例而性味辛苦寒故从热剂少阳药也

秘方枳壳汤治便血下血

枳壳【一两麩炒】黄连【一两以槐花四两同炒去花不用】

右二味水煎取浓食前温服

按此又气例药也

治火之剂

黄连解毒汤

大金花丸

方并见火门

理气之剂

三因茯苓补心汤治心气虚耗不能藏血以致面色黄瘁五心烦热欬嗽唾血

半夏 前胡 紫苏 茯苓 人参 枳壳【炒】 桔梗
甘草 乾葛【各半两】 当归【一两三钱】 川芎【三分】
陈皮 白芍【各二两】 熟地黄【一两半】

右?咀每半两入姜枣煎

本事槐角散治肠胃不调胀满下血

苍术 厚朴 陈皮 当归 枳壳【各一两】 槐角【二两】 甘草 乌梅【各半两】

右?咀每五钱水煎服

按已上又气血药也然三因方虽云补剂而杂以发表之药姑存之收入此理气例

补剂

济生鸡苏散治劳伤肺经唾内有血咽喉不利

鸡苏叶 黄芪 生地黄 阿胶【炒】 贝母 白茅根【各一两】 桔梗 麦门冬 蒲黄
甘草【各半两炒】

右?咀每四五钱入姜煎

归脾汤治思虑伤脾不能统摄心血以此致妄行或吐血下血

白术 茯神 黄芪 龙眼肉 酸枣仁【各一两】 人参 木香【各半两】 甘草【炙二钱半】

右?咀每四五钱入枣姜煎

东垣麦门冬饮子治吐血久不愈者

五味子【十个】 麦门冬【去心】 黄芪【各一钱】 当归身 人参 生地黄【各半钱】

右?咀水煎服

金匱赤豆当归散治先血後粪此近血也

赤豆【浸出芽】当归

右二味为散浆水调服

三因伏龙肝汤治先粪後血此远血也

伏龙肝【半斤】甘草【炙】白朮 阿胶黄芩 熟地黄【各三两】

右?咀每四五钱水煎服

发灰散治小便尿血或便前便後亦远近之谓也

发灰

右一味每二钱以米醋二合汤少许服并花水调亦得

玉屑膏治尿血

黄芪 人参【等分】

右为末用萝卜大者切一指厚四五片蜜淹少时蘸蜜炙乾尽蜜二两为度勿令焦药末吃
不以时仍以盐汤送下

按已上诸方平补药也然病体亦有寒热气积等因不同用者自宜求责

止澁之剂

三因龙骨散治衄过多

龙骨不以多少研为末以少许吹入鼻中凡九窍出血皆可用

御药院方麝香散治衄不止

白矾【枯】 龙骨【粘舌者各另研半两】 麝香【半字】

右拌匀每先将冷水洗净鼻内然後用药吹入孔内或以湿纸蘸入尤妙

济生乌梅丸治便血不止

乌梅三两烧存性为末用好米醋打糊丸如梧子大每七十丸米饮下

经验方治泻血

百药煎一两【半两烧为灰】

右和饭丸如梧子大每三四十丸空心米饮下或作末服三二钱

又方乾柿烧灰饮调下二三钱

杂方

试效方治吐血不止以三棱针於气冲出血立愈鼻衄不止或素有热而暴作诸药无验者

以纸一张作八牒或十牒於极冷水内湿过置项中不止仍以热熨斗於湿纸上熨之立止

灸法

便血不止宜灸等穴

劳宫【手厥阴经】

太白【足太阴经】

会阳【足太阳经】

三里【足阳明经】

按血证宜灸等穴详见资生等经兹不备录然火热脉盛实者非所宜也

通利之剂

拔萃犀角地黄汤治热郁血结上焦寸脉芤

犀角 生地黄【二两】 黄芩【一两半】 黄连【一两】 大黄【半两】

右?咀每两水煎食後服之

桃仁承气汤治血结胸中心下手不可近为中焦畜血无寒热胸满嗽水不欲咽喜妄昏迷其

人如狂桃仁【半两】 大黄【一两】 甘草【二钱半】 桂

芒硝【各三钱】

右?咀每两入姜煎服

抵当汤治下部畜血即脐下手不可近或其人发狂少腹满硬小便自利大便反黑如狂者在中发狂者在下也

大黄 水蛭【炒各半两】 ?虫【三钱去翅足】 桃仁【三钱】

右制每五钱水煎服如作丸炼蜜和

当归导滞汤治跌搏堕击损伤血滞於中

大黄 当归【等分】

右?咀每一两或半两水煎服

按已上血滞证诸方也盖畜血有上中下之分故药亦随而轻重之也至血热血积阴虚等证例见各门兹不详录

解郁之剂

丹溪越鞠丸治血郁

桃仁 香附子 红花 抚芎青黛【等分】

右为末糊丸每四五十丸食前服

玉机微义卷十七

卷十八

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷十八 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

内伤门

按此一门东垣先生内外伤辨法也议论方制精备故不取他书但其间不系内伤法皆节而不录内论暑证者附入暑门

辨脉法

古人以脉上辨内外伤於人迎气口人迎脉大於气口为外伤气口脉大於人迎为内伤此辨固是但其说有所未尽耳外感风寒皆有余之证是从前客邪来也其病必见於左手左手主表乃行阳二十五度内伤饮食及饮食不节劳役所伤皆不足之病也必见於右手右手主里乃行阴二十五度故外感寒邪则独左手人迎脉浮紧按之洪大紧者急甚於弦是足太阳寒水之脉按之洪大而有力中见手少阴心火之脉丁与壬合内显洪大乃伤寒脉也若外感风邪则人迎脉缓而大或大於气口一倍或两倍三倍内伤饮食则右寸气口脉大於人迎一倍伤之重者过在少阴则两倍太阴则三倍此内伤饮食之脉若饮食不节劳役过甚则心脉变见於气口是心火刑肺其肝木挟心火之势亦来薄肺经云侮所不胜寡於畏者是也故气口脉急大而数时一代而澹也澹者肺之本脉大者元气不相接脾胃不及之脉洪大而数者心脉刑肺也急者肝木挟心火而反尅肺金也若不甚劳役惟右关脾脉大而数谓独大於五脉数中显缓时一代也如饮食不节寒暑失所则先右关胃脉损弱甚则隐而不见惟内显脾脉之大数微缓时一代也宿食不消则独右关脉沈而滑经云脉滑者有宿食也

辨内伤诸证与外感不同

甚哉阴阳之证不可不详也遍观内经中所说变化百病其源皆由喜怒过度饮食失节寒温不适劳役所伤而然夫元气谷气营气清气卫气生发诸阳上升之气此六者皆饮食入胃谷气上行胃气之异名其实一也既脾胃有伤则中气不足中气不足则六腑阳气皆絶於外故经言五脏之气已絶於外者是六腑之元气病也气伤脏乃病脏病则形乃应是五脏六腑真气皆不足也惟陰火独旺上乘阳分故荣卫失守诸病生焉其中变化皆由中气不足乃生发耳後有脾胃已受劳役之疾饮食又复失节耽病日久事息心安饱食太甚病乃大作槩其外

伤风寒六淫客邪皆有余之病当泻不当补饮食失节中气不足之病当补不当泻举世医者皆以饮食失节劳役所伤中气不足当补之证认作外感风寒有余客邪之病重泻其表使荣卫之气外绝其死只在旬日之间所谓差之毫厘谬以千里可不详辨乎按阴阳应象论云天之邪气感则害人五脏是八益之邪乃风邪伤人筋骨风从上受之风伤筋寒伤骨盖有形质之物受病也系在下焦肝肾是也肝肾者地之气难经解云肝肾之气已绝於内以其肝主筋骨肾主骨故风邪感人则筋骨疼痛筋骨之绝则肝肾之本亦绝矣乃有余之证也又云水谷之寒热感则害人六腑是七损之病乃内伤饮食也黄帝针经解云适饮食不节劳役所伤湿从下受之谓脾胃之气不足而反下行极则冲脉之火逆而上是无形质之元气受病也系在上焦心肺是也心肺者天之气故难经解云心肺之气已绝於外以其心主荣肺主卫荣者血也脉者血之府神之所居也卫者元气也神之别行卫护周身在於皮毛之间者肺绝故皮毛先绝神无所依故内伤饮食则亦恶风寒是荣卫失守皮肤间无阳以滋养不能任风寒也皮毛之绝则心肺之本亦绝矣盖胃气不升元气不生无以滋养心肺乃不足之证也谓受病之人饮食失节劳役所伤因而饱食内伤者极多外伤者间而有之世俗不知往往将元气不足之证便作外伤风寒表实之证而反泻心肺是重绝其表也安得不死乎古人所谓实实虚虚医杀之耳若曰不然请以众人之耳目闻见者证之向者壬辰改元京师戒严迨三月受敌者凡半月围解之后都人之不受病者万无一二既而病死者继踵不绝都门十有二所每日各门所送多者二千少不下一千似此者几三月此百万人岂俱感风寒外伤者耶大抵人在围城中饮食不节乃劳役所伤不待言而知由其朝饥暮饱起居不时寒温失所动经两三月胃气亏乏久矣一旦饱食太过感而伤人而又调治失宜其死也无疑矣非惟大梁为然远在真佑兴定间如东平如太原如凤翔解围之后病伤死无不然者余在大梁凡所亲见有发表者有以巴豆推之者有以承气汤下之者俄而变结胸发黄又以陷胸汤丸及茵陈汤下之无不死者盖初非伤寒以调治差互变而似真伤寒之证皆药之罪也往者不可追来者犹可及辄以平生已试之效着内外伤辨论一篇推明前哲之余论历举近世之变故庶几同志者审其或中触类而长之免后人无横天耳僭易之罪将何所逃乎

右辨阴证阳证

外伤寒邪之证与饮食失节劳役形质之病及内伤饮食俱有寒热举世尽将内伤饮食失节劳役不足之病作外伤寒邪有余表实之证反泻其表枉死者岂胜言哉皆由不别其寒热耳今细为分解之外伤寒邪发热恶寒寒热并作其热也翕翕发热又为之拂拂发热发於皮毛之上如羽毛之拂明其热在表也是寒邪犯高之高者也皮肤毛腠阳之分也是卫之元气所滋养之分也以寒邪乘之郁遏阳分阳不得伸故发热也其面赤鼻气拥塞不通心中烦闷稍以袒露其皮肤已不能禁其寒矣其表上虚热止此而已其恶寒也虽重衣下幕逼近烈火终不能御其寒一时一日增加愈甚必待传入里作下证乃罢其寒热齐作无有间断也其内伤饮食不节或劳役所伤亦有头痛项强腰痛与太阳表证微有相似余皆不同论中已辨之矣内伤不足之病表上无阳不能御风寒也此则常常有之其躁热发於肾间者间而有之与外中寒邪略不相似其恶风寒也盖脾胃不足营气下流而乘肾肝此痿厥气逆之渐也若脾气平常饮食入胃其营气上行以舒於心肺以滋养上焦之皮肤腠理之元气也既下流其心肺无所禀受皮肤间无阳失其荣卫之外护故阳分皮毛之间虚弱但见风见寒或居阴寒处无

日阳处便恶之也此常常有之无间断者也但避风寒及温暖处或添衣盖温养其皮肤所恶风寒便不见矣是热也非表伤寒邪皮毛发热也乃肾间受脾下流之湿气闭塞其下致阴火上冲作蒸蒸而燥热上彻头项傍彻皮肤浑身躁热作须待袒衣露居近寒凉处即已或热极而汗出亦解彼外伤恶寒发热岂有汗出者乎若得汗则病愈矣以此辨之岂不如黑白之易见乎当内虚而伤之者躁热也或因口吸风寒之气郁其阴火使咽膈不通其吸入之气欲入为膈上冲脉之火所拒使气不得入其胸中之气为外风寒所遏而不得伸令人口开目瞪极则声发於外气不得上下塞於咽中而气欲绝或又因啜因噎因吐而躁热发必有所因方见此证其表虚恶风寒之证复见矣表虚之弱为阴火所乘躁发须臾而过其表虚无阳不任风寒复见矣是表虚无阳常常有之其躁热则间而有之此二者不齐作躁作寒已寒作躁已非如外伤之寒热齐作无有间断也百病俱有身热又为之肌热又为之皮肤间热以手扪之方知者是也乃肌体有形之热也亦须皆待阴阳既和汗出则愈矣慎不可於此上辨之以其虚实内外病皆有之故难辨耳只依先说病人自觉发热恶寒之热及躁作之热上辨之为准则矣

右辨寒热

外感八风之邪乃有余证也内伤饮食不节劳役所伤皆不足之病也其内伤亦恶风自汗若在温暖无风处则不恶矣与外伤鼻流清涕头痛自汗颇相似分之特异耳外感风邪其恶风自汗头痛鼻流清涕常常有之一日一时增加愈甚直至传入里作下证乃罢语声重浊高厉有力鼻息拥塞不通能饮食腹中和口知味大小便如常筋骨疼痛不能动摇便着牀枕非扶不起其内伤与饮食不节劳役所伤然亦恶风居露地中遇大漫风起却不恶也惟门窗隙中些小贼风来必大恶也与伤风伤寒俱不同矣况鼻流清涕头痛自汗间而有之鼻中气短少气不足以息语则气短而怯弱妨食或食不下或不饮食三者互有之腹中不和或腹中急而不能伸口不知五谷之味小便频数而不渴初劳役得病食少小便赤黄大便常难或秘或结或虚坐只见些小白脓时有下气或泄黄如糜或溏泄色白或结而不通若心下痞或胸中闭塞如刀剌之痛二者亦互作不并出也有时胃脘当心而痛上支两脇痛必脐下相火之势如巨川之水不可遏而上行使阳明之经逆行乱於胸中其气无止息甚则高喘热伤元气令四支不收无气以动而懒倦嗜卧其外感风寒俱无此证故易分别耳

右辨外感八风之邪或有饮食劳役所伤之重者三二日间特与外伤风者相似其余证有特异者若不将两证重别分解犹恐将内伤不足之证误作有余外感风邪虽词理有重复处但欲病者易辨医者易治耳

内伤及劳役饮食不节病手心热手背不热外伤风寒则手背热手心不热此辨至甚皎然

右辨手背手心

若饮食劳役所伤其外证之显必在口必口失味必失谷味必腹中不和必不欲言纵勉强对答声必怯弱口沃沫多唾鼻中清涕或有或无即陰证也外伤风寒则其外证必显在鼻鼻气

不利声浊不清其言壅盛有力而口中必和伤寒则面赤鼻塞塞而乾伤风则鼻流清涕而已内经云鼻者肺之候肺气通於天外伤风寒则鼻为之不利口者坤土也脾气通於口饮食失节劳役所得口不知谷味亦不知五味又云伤食恶食伤食明矣

右辨鼻口

外伤风寒者故其气壅盛而有余内伤饮食劳役者其口鼻中皆气短促不足以息何以分之盖外伤风寒者心肺元气初无减损又添邪气助之使鼻气拥塞不利面赤不通其鼻中气不能出并从口出但发一言必前轻而後重其言高其声壮厉而有力伤寒则鼻乾无涕面拥色赤其言前轻後重其声壮厉而有力者乃有余之验也伤风则决然鼻流清涕其声哑其言响如从瓮中出亦前轻而後重高揭而有力皆气盛有余之验也内伤食劳役者心肺之气先损为热既伤气四肢无力以动故口鼻中皆短气少气上喘懒语人有所问十不欲对其一纵勉强答之其气亦怯其气亦低是其气短少不足之验也明白如此虽妇人女子亦能辨之岂有医者反不能辨之乎

右辨气少气盛

内证头痛有时而作有时而止外证头痛常常有之直须传里实方罢此又内外证之不同也

右辨头痛

内伤等病是心肺之气已絶於外必怠惰嗜卧四肢沈困不收此乃热伤元气脾主四肢既为热所乘无气以动经云热伤气又云热则骨消筋缓此之谓也若外伤风寒是肾肝之气已絶於内肾主骨为寒肝主筋为风自古肾肝之病同一治以其递相维持也故经言胆主骨膀胱主筋是也或中风或伤寒得病之日便着牀枕非扶不起筋骨为之疼痛不能动摇乃形质之伤经云寒伤形又云寒则筋挛骨痛此之谓也

右辨筋骨四肢

外感风寒之邪三日已外谷消水去邪气传里始有渴也内伤饮食失节劳役久病者必不渴是邪气在血脉中有湿故不渴也初劳役形质饮食失节伤之重者必有渴以其心火炽上尅於肺金故渴也又当以此辨之虽渴欲饮水者当徐徐少与之不可纵意而饮恐水多峻下则胃气愈弱轻则为胀重则传变诸疾必反复闷乱百脉不安夜加增剧不得安卧不可不预度也右辨渴与不渴

仲景伤寒论中风能食伤寒亦能食二者皆口中和而不恶食若劳役所伤及饮食失节寒温不适三者俱恶食口不知五味亦不知五谷之味只此一辨足以分内外有余不足二证也伤寒证虽亦能食而不恶食口中和知五味亦知谷味盖无内证则心气和脾气通知五谷之味矣

右辨外伤不恶食若劳役饮食失节寒温不适三者皆恶食论饮食劳倦为胃气不足所致

古者至人穷陰阳之化究生死之际所着内经悉言人以胃气为本盖人受水谷之气以生所谓清气营气卫气春升之气皆胃气之别称也夫胃为水谷之海饮食入胃游溢精气上输於脾脾气散精上归於肺通调水道下输膀胱水精四布五经并行合於四时五脏陰阳揆度以为常也苟饮食失节寒温不适则脾肾乃伤喜怒忧恐劳役过度而损耗元气既脾胃虚弱元气不足而心火独盛心火者陰火也起於下焦其系系於心心不主令相火代之相火下伤包络之火元气之贼也火与元气不两立一胜则一负脾胃气虚则下流於肾肝陰火得以乘其土位故脾胃之证始得之则气高而喘身热而烦其脉洪大而头痛或渴不止皮肤不任风寒而生寒热盖陰火上冲则气高而喘身烦热为头痛为渴而脉洪大脾胃之气下流谷气不得升是生长之令不行无阳以护其荣卫不任风寒乃生风热皆脾胃之气不足所致也然而与外感风寒之证形颇同而理异内伤脾胃乃伤其气外感风寒乃伤其形伤外为有余有余者泻之伤内为不足不足者补之治之下之吐之克之之类皆泻也温之和之调之养之之类皆补也内伤不足之病苟认作外感有余之病而反泻之则虚其虚也难经云实实虚虚损不足而益有余如此死者医杀之耳惟当以甘温之剂补其中升其阳甘寒以泻其火则愈内经曰劳者温之损者温之盖温能除大热大忌苦寒泻胃土耳今立补中益气汤主之

论劳役伤与内伤外感不同

或因劳役肾间阴火沸腾事闲之际於阴凉处解脱衣裳更有新沐浴於背阴处坐卧其阴火下行还归肾间皮肤腠理极虚无阳为寒凉所遏表虚不任其风寒自认外感风寒求医解表以重絕元气取祸如反掌苟幸而免者致虚劳气血皆弱其表虚之人为风寒所遏亦是虚邪犯表始病一二日之间特与外中贼邪有余之证颇相似处故致疑惑请医者只於气少气盛上辨之其外伤贼邪必语声高厉而有力若是劳役所伤饮食不节表虚不足之病必短气气促懒语其声因弱而无力至易见也

右辨劳役受病表虚不作表实治之

复有一等乘天气大热之时在於路途中劳形得之或在田野间劳形得之更或有身体薄弱食少劳役过甚又有修善常斋之人胃气久虚而因劳役得之者皆与阳明中热白虎汤证相似必肌体扪摸之壮热必躁热闷乱大恶热渴而饮水以劳役过甚之故亦身疼痛始受病之时特与中热外得有余之病相似若悞与白虎汤旬日必死此证脾胃大虚元气不足鼻口中气皆短促而上喘至日转以後是阳明得时之际病必少减若是外中热之病必到日晡之际大作谵语其热增加大渴饮水烦闷不止其劳役不足者皆无此证尤易为分解若有难决疑似之证必当待一二日而求医治疗必不至错误矣

右辨中热颇相似

论饮食自倍肠胃乃伤分而治之

痹论云陰气者静则神藏躁则消亡饮食自倍肠胃乃伤此混言之也分之为二饮也食也又经云因而大饮则气逆因饱食筋脉横解则肠癖为痔饮者无形之气伤之则宜发汗利小便使上下分消其湿解醒汤五苓散之类主之食者有形之物伤之则宜损其谷其次莫若消导丁香烂饭丸枳术丸之类主之稍重则攻化三棱消积丸木香见睨丸之类主之尤重则或吐或下瓜蒂散备急丸之类主之以平为期盖脾已伤又以药伤使营运之气减削食愈难消故至真要论云大毒治病十去其六小毒治病十去其七无毒治病十去其八常毒治病十去其九谷肉果菜食养尽之无使过之伤其正也不尽行复如法圣人垂此严戒是为万世福如能慎言语节饮食所谓治未病也

谨按王安道曰劳倦伤饮食伤二者虽俱为内伤然不可混而为一难经所谓饮食劳倦则伤脾者盖为脾主饮食而四肢亦属脾故饮食失节劳役四肢皆能伤於脾尔非谓二者同类而无辨也夫劳倦伤饮食伤虽与风寒暑湿有余之病不同然饮食伤又与劳倦伤不同劳倦伤诚不足矣饮食伤尤当於不足之中分其有余不足何也盖饥饿不饮食与饮食太过虽皆失节然必明其有两者之分方尽其理节也者何也无不及无太过之中道也夫饥饿不饮食者胃气空虚此为不足固失节也饮食自倍而停滞者胃气受伤此不足之中兼有余亦失节也以受伤言则不足以停滞言则有余矣惟其不足故补益惟其有余故消导亦有物滞气伤必补益消导兼行者亦有物暂滞而气不甚伤宜消导独行不须补益者亦有既停滞而复自化不须消导但当补益或亦不须补益者洁古东垣枳术丸之类虽曰消导固有补益之意存乎其间其它如木香分气丸导气枳实丸大枳壳丸之类虽无补益然施之於物暂滞气不甚伤者岂不可哉但不宜视为通行之药尔且所滞之物非枳术丸之力所能去者亦安可泥於消导而弗知变乎故备急丸煮黄丸瓜蒂散等之推逐者洁古东垣亦未尝委之而弗用也故善用兵者攻亦当守亦当不善者则宜攻而守宜守而攻其败也非兵之罪用兵者之罪可观乎此则知消导补益推逐之理矣斯论本已上所辨又推广之因取参附以备其旨又曰经云有所劳倦形气衰少谷气不盛上焦不行下脘不通胃气热热气熏胸中故内热嗟夫此内伤之说之原乎请释其义如左夫人身之阴阳有以表里言者有以上下之分言者有以升降呼吸之气言者余如动静语默起居之类甚多不必悉举此所谓阴虚之阴其所指与数者皆不同盖劳动之过则阳和之气皆亢极而化为火矣况水谷之味又少入是故阳愈盛阴愈衰也此阴虚之阴盖指身中之阴气与水谷之味耳或以下焦阴分为言或以肾水真阴为言皆非也夫有所劳倦者过动属火也形气衰少者壮火食气也谷气不盛者劳伤元气则少食而气衰也上焦不行者清阳不升也下脘不通者浊阴不降也夫胃受水谷故清阳升而浊阴降以传化出入滋荣一身也今胃不能纳而谷气衰少则清无升浊无降矣故曰上焦不行下脘不通然非谓絕不行不通也但比之平常无病时则谓之不行不通耳上不行下不通则郁矣郁则少火皆成壮火而胃居上焦下脘两者之间故胃气热热则上炎故熏胸中而为内热也斯东垣所谓劳伤形体所谓饮食失节而致热者此言正与调经论篇之旨相合宜引此段经文於内外伤辨以为之主今特采附并外伤内伤所受经旨异同论录于左

客或难予曰素问阴阳应象论云天之邪气感则害人五脏水谷之寒热感则害於六腑太阳阳明论云犯贼风虚邪者阳受之食饮不节起居不时者阴受之阳受之则入六腑阴受则入五脏两说正相反愿闻其解余复之曰此所谓似反而不反者也夫感天之邪气犯贼风虚邪

外伤有余之病也感水谷寒热食饮不节内伤不足之病也二者之伤脏腑皆尝受之但随其所从所发之处而为病耳不可以此两说之异而致疑盖并行不相悖也读者当合而观之其旨斯尽若曰不然请以诸处所论证之金匱真言论曰风触五脏邪气发病八正神明论曰夫八正之虚邪以身之虚而逢天之虚两虚相感其气至骨入则伤五脏灵枢经曰五脏之中风又曰东风伤人内舍於肝南风伤人内舍於心西南风伤人内舍於脾西风伤人内舍於肺北风伤人内舍於肾观乎此则天之邪气固伤五脏矣灵枢又曰邪之中人也无有常中於阴则溜於腑又曰虚邪之中人也始从皮肤以入其传自络脉而经而输而伏冲之脉以至於肠胃又曰东北风伤人内舍於大肠西北风伤人内舍於小肠东南风伤人内舍於胃观乎此则天之邪气岂不伤六腑乎素问曰饮食自倍肠胃乃伤观乎此则水谷寒热固伤六腑矣灵枢又曰形寒饮冷则伤肺难经曰饮食劳倦则伤脾观乎此则水谷寒热岂不伤五脏乎至於地之湿气亦未必专害皮肉筋脉而不能害脏腑邪气水谷亦未必专害脏腑而不能害皮肉筋脉也但以邪气无形脏主藏精气故以类相从而多伤脏水谷有形腑主传化物故因其所由而多伤腑湿气浸润其性缓慢其入人也以渐其始也自足故从下而上从浅而深而多伤於皮肉筋脉耳孰谓湿气全无及於脏腑之理哉至若起居不时一语盖劳役所伤之病不系上文异同之义故不及之论酒饮伤

夫酒者大热有毒气味俱阳乃无形之物也若伤之止当发散汗出则愈矣此最妙法其次莫如利小便二者乃上下分消其湿何酒病之有今之酒病者往往服酒蒸丸大热之药下之又有用牵牛大黄下之者是无形元气受病反下有形阴血乖悞甚矣酒性大热已伤元气而复重泻之况亦损肾水真阴及有形阴血俱为不足如此则阴血已虚真水愈弱阳毒之热大旺反增其阴火是谓元气消亡七神何依折人长命不然则虚损之病成矣金匱要略云酒疸下之久久为黑疸慎不可犯此戒不若令上下分消其湿解醒汤主之

谨按酒者是有形之物即水饮同体也今言无形元气受病不得伤於有形阴血者盖谓酒者湿热之物入胃则脏气俱热逐气升降之际而半有消耗之矣至伤於肠胃则升之不散降之不下郁於气分无形之地位故言无形之物非若水饮然体全降於肠胃中也若今人之饮醇酒则便少此其可验是以伤则宜汗之泄之不得用重峻下剂盖此等药不能入气分反伤有形阴血尔但斯意隐然使人不能无疑故或有辨之者兹不复具然昔人有用下剂者盖或有酒饮伤积日久而汗之泄之不能愈则重峻下剂而或可哉故用者自宜对证详审勿以辞害意可也论伤食宜吐

解云盛食填塞於胸中为之窒塞两手寸脉当主事两尺脉不见其理安在胸中有食故以吐出之食者物也物者坤土也是足太阴之号也胸中者肺也为物所伤肺者手太阴金也金主杀伐也与坤土俱在於上而旺於天金能剋木故肝木生发之气伏於地下非木郁而何吐去上焦阴土之物木得舒畅则郁结去矣食塞於上脉絶於下若不明天地之道无由达此至理水火者阴阳之徵兆天地之别名也故曰独阳不生独阴不长天之用在於地下则万物生长矣地之用在於天上则万物收藏矣此乃天地交而万物通矣此天地相根之道也故阳火之根本於地下阴水之源本於天上故曰水出高原故人五脏主有形之物物者阴也阴者水也右三部脉主之偏见於寸口食塞在上是絶五脏之源源絶则水不下流两尺竭絶此其理也

何疑之有

论内伤饮食用药所宜所禁

内伤饮食付药者受药者皆以为琐末细事是以所当重者为轻利害非细殊不思胃气者营气也卫气也谷气也清气也资少阳生发之气也人之真气衰旺皆在饮食入胃胃和则谷气上升谷气者升腾之气也乃足手少阳元气始发生长万化之别名也饮食一伤若消导药的对其所伤之物既消则胃气愈旺五谷之精华上腾乃清气为天者也精气神气皆强盛也七神卫护生气不乏增益大旺气血周流则百病不能侵虽有大风苛毒弗能害也此一药之用其利博哉易水张先生尝戒不可用峻利食药食药下咽未至药丸施化其标皮之力始开便言空快也所伤之物已去若更待一两时辰许药尽化开其峻药必有情性病去之後脾胃安得不损乎脾胃既损是真气元气败坏促人之寿常时用枳术丸一药消化胃中所伤下胃不能即去须待一两时辰许食则消化是先补而後化其所伤则不峻利矣因用荷叶烧饭为丸荷叶一物中央空虚象震卦之体震者动也人感之生足少阳甲胆也甲胆者风也生化万物之根蒂也左传云履端於始序则不愆人之饮食入胃营气上行即少阳甲胆之气也其手少阳三焦经人之元气也手足经同法便是少阳元气生发也胃气谷气元气甲胆上升之气一也异名虽多止是胃气上升者也若内伤脾胃以辛热之物酒肉之类自觉不快觅药於医者此风习以为常医者亦不问所伤付之以集香丸巴豆大热药之类下之大便下则物去遗留食之热性药之热性重伤元气七神不炽经云热伤气正谓此也其人必无气以动而热困四肢不举传变诸疾不可胜数使人真气自此衰矣若伤生冷硬物世医或用大黄牵牛二味大寒药投之物随药下所伤去矣遗留食之寒性药之寒性重泻其阳阳去则皮肤筋肉血脉无所依倚便为虚损之证论言及此令人寒心夫辛辣气薄之药无故不可乱服非止牵牛而已至人要大论云五味入口各先逐其所喜攻攻者克似泻也辛味下咽先攻泻肺之正气正气者真气元气也其牵牛之辛辣猛烈夺人尤甚饮食所伤脾胃受邪当以苦味泄其肠胃可也肺与元气何罪之有夫牵牛不可用者有五此其一也况胃主血为物所伤物者有形之物也皆血病血病泻气此其二也且饮食伤於中焦止合克化消导其食重泻上焦肺中已虚之气此其三也食伤肠胃当塞因塞用又寒因寒用枳实大黄苦寒之物以治有形是也反以辛辣牵牛散泻真气犯大禁四也殊不知针经有云外来客邪风寒伤人五脏若误泻胃气必死误补亦死其死也无气以动故静若内伤肠胃反泻五脏必死误补亦死其死也阴气有余故躁今内伤肠胃是谓六腑不足之病及泻上焦虚无肺气肺者五脏之一数也为牵牛之类朝损暮损其元气消耗此乃暗折人壽数犯大禁五也良可哀叹又曰胃恶热而喜清大肠恶清冷而喜热两者不和何以调之岐伯曰调此者饮食衣服亦欲适寒温寒无凄怆暑无出汗饮食热无灼灼寒无滄滄寒温中适故气将持乃不致邪僻详见本经是必有因用岂可用俱寒俱热之食药致损者与内经云内伤者其气口脉反大於人迎一倍二倍三倍分经用药又曰上部有脉下部无脉其人当吐不吐者死如但食不纳恶心欲吐者不问一倍二倍不当正以瓜蒂散吐之但以指或以物探去之若所伤之物去不尽者更诊其脉问其所伤以食药去之以应塞因塞用又谓之寒因寒用泄而下降乃应太阴之用其中更加升发之药令其元气上升塞因塞用因曲而为之直何为曲内伤胃气是也何为直而升发胃气是也因治其饮食之内伤而使生气增益胃气完复此乃因曲而为之直也若依分经用药其所伤之物寒热温凉生

硬柔软所伤不一难立定法只随所伤之物不同各立治法临时加減用之其药又当问病人从来稟气盛衰所伤寒物热物是喜食而食之耶不可服破气药若乘饥困而食之耶当益胃气或为人所勉强食之宜损血而益气也诊其脉候伤在何脏方可与对病之药岂可妄溲天真生气以轻丧身宝乎且如先食热而不伤继之以寒物因後食致前食亦不消化而伤者当问热食寒食孰多孰少斟酌与药无不当矣喻如伤热物二分寒物一分则当用寒药二分热药一分相合而与之则荣卫之气必得周流更有或先饮酒而後伤寒冷之食及伤热食冷水与冰如此不等皆当验其节次所伤之物约量寒热之剂分数各各对证而与之无不取验内伤治法

消导之剂

洁古枳术丸治痞消食强胃

枳实【麩炒一两】白术【二两】

右同为细末荷叶裹饭烧为丸如桐子大每五十丸多用白汤送下

按论云用术者本意不取其食速化但久令人胃气强食不复伤也

丁香烂饭丸治饮食所伤

丁香皮 甘草【炙各二钱】砂仁 益智仁甘松【各三钱】丁香 京三棱【炮】木香广术【炮各一钱】香附子【半两】

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大每三十丸白汤下或细嚼亦可不拘时候

按此寒湿胜者最宜用之

东垣橘皮枳术丸治老幼元气虚弱饮食不消或脏腑不调心下痞闷

橘皮 枳实【各一两】白术【二两】

右为细末荷叶烧饭为丸如桐子大每五十丸温水送下食远服

按此内伤用药之大法所贵服之强人胃气令益厚虽猛食多食而不伤此能用食药者也

麴蘖枳术丸治为人所勉强食之破心腹满闷不快白术【二两】枳实【炒】神麴【炒】麦蘖【麩炒各一两】

右为细末荷叶烧饭丸如桐子大每五十丸温水下

木香枳术丸破滞气消饮食开胃进食

木香 枳实【炒各一两】 白术【二两】

右制服如前

木香化滞汤治内忧气食湿麪结於中脘腹皮底彻痛心下痞满不思饮食食之不散常常痞气

木香 红花【各三钱】 橘皮 当归梢【各二钱】 柴胡【四钱】 草豆?
甘草【炙各半两】 半夏【一两】 枳实【炒二钱】

右剉如麻豆大每服三五钱入姜煎食远服

半夏枳术丸治因食冷内伤

半夏【汤洗焙】 枳实【炒各一两】 白术【二两】

右为细末荷叶烧饭为丸如菉豆大每五六十丸温水下如食伤寒热不调每服加二黄丸十粒

草豆?丸治秋冬伤寒冷物胃脘当心而痛上支两脇膈咽不通

草豆?【麪裹煨一两】 神麪【炒半两】 白术【一两】 橘皮 乾生姜
青皮【各二钱】 黄芩麦蘖 半夏 炒盐【各半两】 枳实【炒一两】

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大每服五十丸白汤下量所伤多少加减服之

按论云如冬月用别作一药不用黄芩岁火不及又伤冷物加以温剂是其治也然有热物伤者从权以寒药治之随时之宜不可不知也

除湿益气丸治伤湿麪心腹满闷肢体沉重

枳实【麸炒】 白术
黄芩【各一两】 萝卜子【炒熟去气半两】 神麪【炒一两】 红花【三钱】

右为细末荷叶烧饭为丸如菉豆大每五六十丸白汤下

二黄丸治伤热食痞闷兀兀欲吐烦乱不安

黄芩【二两】 黄连【酒浸一两】 升麻 柴胡【各三钱】 甘草【一钱】
枳实【半两炒】

右为极细末汤浸蒸饼丸如菉豆大每五七十丸白汤下

白朮丸治伤豆粉湿麪油腻之物

白朮 半夏【汤洗】 神麪【炒】 枳实【炒各一两】 橘皮【七钱】 黄芩【半两】
白矾【枯三钱】

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大一倍每五十丸白汤下量所伤加減服

论曰素食者多用乾姜故加黄芩以泻之按已上诸方并宜随寒热所用出太阴例

葛花解酲汤

白豆? 砂仁 葛花【各半两】 木香【半钱】 青皮【三钱】 陈皮 白茯苓
猪苓 人参【各一钱半】 白朮 神麪【炒】 泽泻 乾生姜【各二钱】

右为细末和匀每三钱白汤调下但得微汗酒病去矣论云此盖不得已用之岂可恃赖日日
饮酒是方气味辛辣偶因酒病服之则不损元气何者敌酒病故也若频服之损人天年也

除湿散治伤马乳并牛羊骆水一切冷病

车前子【炒】
泽泻【各半两】 神麪【炒一两】 半夏【汤泡七次】 乾生姜【各三钱】 红花
甘草【炙各二钱】 茯苓【七钱】

右为细末每三钱匕白汤调食前服

五苓散

方见湿门

按以上三方并太阳例药妙利之剂也

三棱消积丸治伤生冷硬物不能消化心腹满闷丁皮 益智仁【各三钱】 陈皮

青皮【各五钱】茴香【炒半两】炒麴 广术【炮】 京三棱【炮各七钱】
巴豆【和米炒去米五钱】

右为细末醋糊丸如桐子大每十丸至二十丸温姜汤下食前服

备急大黄丸疗心腹诸卒暴百病

大黄 乾姜 巴豆【去皮各一两】

右须精择好药捣罗蜜和更捣一千杵丸如小豆大每三丸大小量之若中恶客忤心腹胀满卒痛如锥刀刺痛气急口噤尸卒死者以煖水若酒服之或不下捧头起下咽须臾未差更与三丸以腹中鸣转即吐下便愈若口已噤亦须折齿嚙之令入尤妙忌芦笋猪肉冷水肥膩易水张先生又名独行丸乃急剂也

海藏神应丸治因一切冷物冷水及潼乳酪水腹痛肠鸣米谷不化

巴豆 杏仁 乾姜 百草霜【各半两】 丁香 木香【各二钱】 黄蜡【一两】

右先将黄蜡用好醋煮去粗将巴豆杏仁同炒黑烟尽研如泥将蜡再上火入小油半两溶开入在杏仁等泥子内同搅旋下丁香木香等药末研匀搓作挺子油纸裹了旋丸每用三五十丸温米饮下食前服吐剂

瓜蒂散

方见痰饮门

按论云若不两尺脉絶无不宜使用此药恐损元气令人胃气不复若止是胸中窒塞闷乱不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐则已如食不去用此药去之

补益之剂

补中益气汤

方见热门

按立方本指云夫脾胃虚者因饮食劳倦心火亢甚而乘其土位其次肺气受邪须用黄芪最多人参甘草次之脾胃一虚肺气先绝故用黄芪以益皮毛而闭腠理不令自汗上喘气短损其元气人参以补之心火乘脾炙甘草之甘温以泻火热而补脾胃中元气若脾胃急痛腹中急缩者宜多用之经云急者缓之白术苦甘温除胃中热利腰脐间血胃中清气在下升麻柴

胡以引之引黄芪甘草甘温之气味上升能补卫气之散解而实其表也又缓带脉之缩急二味苦平味之薄者阴中之阳引清气上升也气乱於胸中为清浊相干用陈皮以理之又能助阳气之升以散滞气助诸甘辛为用也脾胃气虚不能升浮为阴火伤其生发之气荣血大亏营气不荣阴火炽盛是血中伏火日渐煎熬血气日减心主血血减则心无所养致使心乱而烦病名曰忤忤者心惑而烦闷不安也故加辛甘微温之剂生阳气阳旺则能生阴血更以当归和之少加黄栢以救肾水能泻阴中之伏火如烦不止少加生地黄补肾水水旺而心火自降如气浮心乱以朱砂安神丸镇固之则愈

安神丸

方见热门

头痛加蔓荆子三分痛甚加川芎五分顶痛脑痛加藁本五分细辛三分诸头痛并用此四味头痛有痰沈重懒倦者乃太阴厥头痛加半夏半钱姜三分耳鸣目黄颊颌肿颈肩膈肘臂外後廉痛面赤脉洪大者以羌活一钱防风七分甘草五分藁本七分通其经血加黄芩三分黄连三分消其肿人参五分黄芪七分益元气而泻火邪

噤痛颌肿脉洪大面赤加黄芩三分桔梗七分甘草三分口乾噤乾者加葛根五分升引胃气上行以润之心下痞夯闷者加芍药黄连各一钱如痞腹胀加枳实三分厚朴七分木香三分砂仁三分如天寒少加乾姜

心下痞觉中寒加附子黄连各一钱不能食而心下痞加生姜陈皮各一钱能食而心下痞加黄连半钱枳实三分脉缓有痰而痞加半夏黄连各一钱腹中痛加白芍半钱甘草三分如恶寒觉冷痛加中桂半钱夏月腹中痛不恶寒不恶热者加黄芩五分芍药一钱甘草五分以治时热也

腹痛在寒凉时加半夏益智豆?之类

脇下痛或缩急俱加柴胡

脐下痛加真熟地黄半钱有寒者加肉桂半钱

升阳散火汤

方见火门

当归补血汤

方见热门

升阳顺气汤治因饮食不节劳役所伤腹脇满闷短气遇春则口无味遇夏虽热犹寒饥常如饱不喜食冷升麻柴胡【各一钱】黄芪【一两】

半夏【三钱】甘草【炙半钱】陈皮【一钱】人参【三钱】

神麴【炒一钱】当归身【一钱】黄柏【半钱】草豆蔻仁【二钱】

右?咀每三钱或半两水煎入生姜三片

按论云脾胃不足之证须用升麻柴胡苦平味之薄者阴中之阳引脾胃中清气行於阳道及诸经生发阴阳之气以滋春气之和也又引黄芪参草甘温之气味上行充实腠理使阳气得卫外而为固也凡治脾胃之药多以升阳补气名之者此也

升阳补气汤治饮食不时饥饱劳役胃气不足脾气下溜气短无力不能寒热早饭罢转增昏闷须要眠睡怠惰四肢不收懒倦动作及五心烦热

升麻羌活独活防风白芍泽泻

甘草【炙各一钱】厚朴【半钱制】柴胡【二钱半】生地黄【一钱半】

右为粗末每五钱水煎入姜三片枣二枚如腹胀及窄狭加厚朴腹中似硬加砂仁三分

按此用升浮扶持胃气抑肝清脾药也

参术调中汤泻热补气止嗽定喘和脾胃进饮食黄芪【四分】桑白皮【五分】人参

甘草【炙】白茯苓【各三分】五味子【二十个】白术【三分】地骨皮麦门冬

陈皮【各二分】青皮【一分】

右?咀作一服水煎大温服早饭後忌多言语劳役按论云内经曰火位之主其泻以甘以黄芪甘温泻热补气桑白皮苦微寒泻肺火定喘故以为君肺欲收急食酸以收之以五味之酸收耗散之气止咳嗽脾胃不足以甘补之白术人参炙甘草苦甘温补脾缓中为臣地骨皮苦微寒善解肌热茯苓甘平降肺火麦门冬甘微寒保肺气为佐青陈皮苦辛温散胸中滞气为使也

升阳益胃汤治脾胃虚则怠惰嗜卧四肢不收时值秋燥令行湿热少退体重节痛口乾舌乾饮食无味大便不调小便频数食不消兼见肺病洒淅恶寒惨惨不乐面色恶而不和乃阳气不伸故也当以升阳益胃名之

羌活独活防风【各半两以秋旺故以辛温泻之】柴胡白术

茯苓【渴者勿用】泽泻【各三钱】黄芪【二两】人参半夏

甘草【炙各一两】黄连【一钱】陈皮【四钱】白芍【五钱何故秋旺用参术芍药之类反补旺脾胃虚则肺俱受邪故因时而补易为力也】

右?咀每服三钱水煎入姜枣温服早饭后或加至半两服药后如小便罢而病加剧是不宜利小便当少去茯苓泽泻若喜食初二日不可饱食恐胃再伤以药力尚少胃气不得转运升发也须薄味之食或美食助其药力益外浮之气而滋其胃气慎不可淡食以损力而助邪气之降沈也可以小役形体使胃与药得转运升发慎勿大劳役使气复苦脾胃得安静为佳若胃气稍强少食果以助谷药之力经云五谷为养五果为助者也

双和散补血益气治虚劳少力

黄芪 川芎 当归 熟地黄【各一两】 官桂 甘草【炙各七钱半】 白芍【二两半】

右为粗末每四钱入姜枣水四盏煎温服

论云治大疾之后虚劳气乏者以此调治不热不冷温而有余

调中益气汤夫脉弦洪缓而沈按之中之下得一澁其证四肢满闭肢节烦疼难以屈伸身体沈重烦心不安忽肥忽瘦四肢懒倦口失滋味大小便清利而数或上饮下便或大便澁滞不行一二日一见夏月飧泄米谷不化或便后见血见白脓胸满短气咽膈不通安卧嗜睡无力不思饮食

升麻【二分】 黄芪【一钱】 甘草【半钱】 苍术【四分】 木香【一分】
人参【五分】 柴胡 橘皮【各二分】

右?咀作一服水煎食前热服

如时显热躁是下元阴火蒸蒸发也加生地黄黄柏如大便虚坐不得或大便了而不了腹常逼迫血虚血澁也加当归身

白术和胃丸治病久不能食而脏腑或结或澹此胃气虚弱也常服则和中理气消痰去湿和脾胃进饮食厚朴【制】 半夏【各一两】 白术【一两二钱】 陈皮【八钱】 槟榔 枳实【各二钱半】 木香【一钱】 人参【七钱】 甘草【炙三钱】

右为细末生姜汁浸蒸饼为丸如桐子大每三十丸温水送下食远服之

宽中进食丸滋形气美饮食

神麴【炒五钱】 甘草【炙一钱】 木香【五分】 草豆?仁【五钱】
枳实【炒四钱】 半夏【七钱】 人参【一钱】 乾生姜【一钱】 青皮【一钱】 陈皮 白术 白茯苓 泽泻【各二钱】 猪苓【一钱】 砂仁【一钱半】 大麦芽【一两】

右为细末汤浸蒸饼为丸如桐子大每三四十丸温米饮下食远服之

厚朴温中汤治脾胃虚寒心腹胀满及秋冬客寒犯胃时作疼痛

厚朴【制】 陈皮【各一两】 茯苓 草豆蔻甘草【炙】 木香【各半两】 乾姜【二钱】

右为粗末每五钱入姜煎食前服

论云戊火已衰不能运化又加客寒聚为满痛散以辛热佐以苦甘以淡泄之气温胃和痛自止矣按此三方又消导之剂也

益胃散治服寒药过多或脾胃虚弱胃脘痛【又名温胃汤】 白豆蔻 姜黄 乾生姜【各三钱】 泽泻砂仁 甘草 人参 厚朴 陈皮 黄芪【各七钱】 益智仁【六钱】

右为细末每服三钱水煎温服如脉弦恶寒腹痛乃中气弱也以仲景小建中加黄芪钱氏异攻散加芍药选而用之

沉香温胃丸治中焦气弱脾胃受寒饮食不美气不调和脏腑积冷心腹疼痛大便滑泄腹中雷鸣霍乱吐泻手足厥逆大便利无度又治下焦阳虚脐腹冷痛及疗伤寒阴湿形气沈困自汗

沉香 甘草【炙】 良姜 当归 吴茱萸 人参 木香 茯苓 白术 白芍【各半两】 附子【炮】 巴戟【酒浸】 乾姜【炮】 茴香【各一两】 官桂【七钱】 丁香【二钱】

右为细末用好醋打麪糊为丸如桐子大每五七十丸热米饮空心下日二服忌一切生冷物

按此治肾之脾胃虚寒药也论云凡脾胃之证调治差悞或妄下之未传寒中复遇时寒则四肢厥逆而心胃绞痛冷汗出举痛论云寒气客於五脏厥逆上泄阳气未入故卒然痛死不知人气复则生矣夫六气之胜皆能为病惟寒毒最重阴主杀故也圣人以辛热散之复其阳气故曰寒邪客之得炁则痛立止此之谓也

神圣复气汤治气乘冬足太阳寒气足少阴肾水子能令母实手太阴肺实反来侮土火木受邪腰背胸膈闭塞疼痛善嚏口中涎目泣鼻流涕不止或息肉不闻香臭欬嗽痰沫上热如火下寒如水头作阵痛目中流火视物不明耳鸣耳韵头并口鼻或恶风寒喜日阳夜卧不安常觉痰塞膈咽不通口失味两脇缩急而痛牙齿动摇不能嚼物陰汗前陰冷行步欹侧起居艰难掌中寒风痹麻木小便数而昼多夜频而欠气短喘渴少气不足以息卒遗失无度妇人白带阴hu中痛牵心而痛面如赭色食少大便不调烦心霍乱逆气里急而腹皮色白後出余气复不能努或肠鸣膝下筋急肩甲大痛此皆寒水木复火土之讎也

乾姜【炮三分】半夏【汤洗七分】柴胡【一钱】藁本【八分】防风人参
郁李仁【研各半钱】升麻【七分】附子【炮二分】当归身【六分】羌活【一钱】
甘草【八分】白葵花【五朵去心】

右?咀都作一服水五 煎至二 入

黄芪【一钱】陈皮【五分】草豆?【麪裹煨一钱在内煎至一 再入下项药】

黄柏【酒浸】黄连【酒洗】枳殼生地黄【各三分】

已上四味预一日别用新水浸又以

华细辛【二分】川芎蔓荆子【各三分】

预一日用新水半大 分作二处浸此三味并黄柏等煎正药作一大 不去粗入此浸者药
再上火煎至一大 去粗空心稍热服又能治咬颊咬唇咬舌舌根强硬等证如神宜食肉汤
不宜食肉不助经络中火邪也大抵肾与膀胱经中有寒元气不足者皆宜服之神验於月生
月满时隔三五日一服如病急不拘时分

益胃汤治头闷劳动则微痛不喜饮食四肢怠堕躁热气短口不知味肠鸣大便微溏黄色身
体昏闷口乾不喜食冷

黄芪【半钱】甘草【二分】黄芩【三分】当归【半钱】苍术【一钱半】陈皮
升麻【各五分】柴胡人参白术益智仁【各三分】半夏【二分】

右?咀作一服水煎食前稍热服忌生冷硬物酒湿麪

强胃汤治因饮食劳倦所伤腹脇满闷短气遇春口淡无味遇夏虽热而恶寒常如饱不喜食
冷物

前方减黄芩苍白术益智加草豆?黄柏麪生姜

论曰治法已验者可以意求其的触类而长之则不可胜用矣予病脾胃久衰视听半失此阴
乘阳而上气短精神不足且脉弦皆阳气衰弱伏匿於阴中故耳癸卯岁六七月间霖雨阴寒
踰月不止时人多病泻痢乃湿多成五泄故也一日体重肢节疼痛大便泄并下者三而小便
闭塞默思内经有云在下者引而竭之是先利小便也又治诸泻小便不利者先分利之治湿
不利小便非其治也法当淡渗之剂意圣人之法虽布在方策其不尽者以意求之今客邪寒
湿之胜自外入里而甚暴若以淡渗之剂利之病虽即已是降之又降复益其阴而重竭其阳
也则阳气愈削而精神愈短阴重强而阳重衰也兹以升阳之药是为宜尔羌活独活升麻各

一钱防风半钱炙甘草半钱一剂乃愈大法云寒湿之胜助风以平之又曰下者举之此得阳气升腾故愈是因曲而为之直也夫圣人之法可以类推举一则知百矣

杂方

拔萃槟榔丸治伤食心腹膨胀

槟榔【二钱半】 陈皮【一两】 木香【二钱半】 牵牛【头末半两】 枳实【半两】

右为细末醋糊丸桐子大米饮下二三十丸

千金紫丸治食瘤

赤石脂 代赭石【各一钱】 巴豆【三十个另研】 杏仁【五个另研成膏】

右以杏仁膏相和杵二千下入蜜些小丸麻子大三十日儿一丸乳下

丹溪越鞠丸治食郁

方见热门

玉机微义卷十八

卷十九

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷十九 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

虚损门

脉法

脉经曰脉来奕者为虚 缓者为虚 微则为虚 弱为虚 濡为虚 弦为中虚
脉来细而微者血气俱虚 脉小者血气俱少

内经曰脉虚气虚尺虚是谓重虚所谓气虚者言无常也尺虚者行步惛然脉虚者不象阴也
如此者滑则生濇则死

要略曰脉芤为虚 脉沈小迟者脱气

虚损脉证

难经曰至脉从下上损脉从上下也一损损於皮毛皮聚而毛落二损损於血脉血脉虚少不能荣於五脏六腑三损损於肌肉肌肉消瘦饮食不能为肌肤四损损於筋筋缓不能自收持五损损於骨骨痿不能起於牀反此者至脉之病也从上下者骨痿不能起於牀者死从下上者皮聚而毛落者死然治损之法损其肺者益其气损其心者调其荣卫损其脾者调其饮食适其寒温损其肝者缓其中损其肾者益其精

病机机要论曰虚损之疾寒热因虚而感也感寒则损阳阳虚则阴盛自上而下治之宜以辛甘淡过于胃则不可治也感热则损阴阴虚则阳盛故损自下而上治之宜以苦酸鹹过于脾则不可治也自上而损者一损损於肺皮聚而毛落二损损於心血脉虚少不能荣於脏腑妇人月水不通三损损於胃饮食不为肌肤自下而损者一损损于肾骨痿不能起于牀二损损于肝筋缓不能自收持三损损于脾饮食不能消剋论曰心肺损而色蔽肾肺损而形痿谷不能化而脾损感此病者皆损之病也渐渍之深皆虚劳之疾也

谨按难经论损脉证者谓因劳损其形体血脉脏腑内外因也故治法宜调养之已上论者谓

因虚外感也然伤寒中暑初感必先足太阳今归之於手太阴足少阴者盖肺主皮毛肾主骨尔若此则因虚外感不独伤於足经也但足经伤寒有传变恐不可作损证论乎

论虚为阴气不足

丹溪曰人受天地之气以生天之阳气为气地之阴气为血故气常有余血常不足何以言之天地为万物父母天大也为阳而运於地之外地居天之中为阴天之大气举之日实也属阳而运於月之外月缺也属阴稟日之光以为明故人身之阴阳其消长亦视月之盈亏焉夫人之生也男子十六岁而精通女子十四岁而经行是有形之後犹有待於乳哺水谷之养阴气始成而可与阳气为配以能成人而为人父母古人必待三十二十而後嫁娶可见阴气之难於成而古人之善於保养也钱仲阳肾有补无泻正是此意又按礼记注曰惟五十然後养阴者有以加内经曰年至四十阴气自半而起居衰矣又曰男子六十四而精绝女子四十九而经断夫以阴气之成止供给得三十年之运用已先亏矣人之情欲无涯此难成易亏之阴气若之何而可以纵欲也经曰阳者天气也主外阴者地气也主内故阳道实阴道虚非吾之过论也或曰仰观俯察乎天地日月既若是之不同何寒暑温凉之见於四时者又如此之相等而无降杀也曰动极复静静极复动犹人之嘘吸也寒者吸之极气之沈也热者嘘之极气之浮也温者嘘之微气之升也凉者吸之微气之降也一嘘一吸所乘之机有以使之宜其相等而无降杀此以流行之用而言前以大小虚实言者盖其对待之体也或曰远取诸天地日月近取诸男女之身曰有余曰不足吾知之矣人在气交之中今欲顺阴阳之理而为摄养之法如之何则可曰主闭藏者肾也司疏泄者肝也二脏皆有相火而其系上属於心心君火也为物所感则易於动心动则相火翕然而随虽不交会亦暗流而渗漏矣所以圣贤只是教人收心养性其旨深矣天地以五行更迭衰旺而成四时人之五脏六腑亦应之而衰旺四月属巳五月属午为火火旺火为肺金之夫火旺则金衰六月属未为土土旺土为水之夫土旺则水衰况肾水常藉肺金为母以补助其不足故内经谆谆然资其化源也古人以夏月必独宿而淡味兢兢业业於爱谨保养金水二脏正嫌火土之旺尔内经又曰藏精者春不病温十月属亥十一月属子正大气潜伏闭藏以养其本然之真而为来春升动发生之本若於此时不恣欲以自戕至春升之际根本壮实气不轻浮焉有温热之病夫夏月火土之旺冬月大气之伏此论一年之虚耳若上弦前下弦後月廓空亦为一月之虚大风大雾虹电飞雹暴寒暴热日月薄蚀忧愁忿怒惊恐悲哀醉饱劳倦谋虑勤动又皆为一日之虚若病患初退疮痍正作尤不止於一日之虚今人多有春末夏初患头痛脚软食少体热仲景论春夏剧秋冬差而脉弦大者正世俗谓注夏病也若犯此四者之虚似难免此夫当壮年便有老态仰事俯育一切隳废兴言至此深可惊惧古人谓不见可欲使心不乱夫以温柔之感於体声音之感於耳顔色之感於目馨香之感於鼻谁是铁心汉不为动善养生者於此五个月出居於外苟值一月之虚一日之虚亦宜暂远帷薄久自珍重保全天和庶可以资助化源水得所养阴无亏必与阳齐平然後阳得所附而无飞越之尤遂成天地交之泰何病之可言愿相与遵守期无负敬身之教幸甚

谨按人身肖天地一气实同阳有余阴不足而常若是此其道也故有起居不时七情六慾而增虚极者多在阴尔但世俗不审此理往往补阳是以先生论此诚千古不传之妙实啓後人

之盲瞶也且於内经谓以身之虚而逢天之虚两虚相感其气至骨入则伤五脏二候救之弗能伤也旨趣为明白养生者最宜玩味

论虚为劳倦所伤

东垣曰经云阴虚生内热【云云见热门】又云劳则气耗劳则喘且汗出内外皆越故气耗矣夫喜怒不节起居不时有所劳伤皆损其气气衰则火旺火旺则乘其脾土脾主四肢故困热无气以动懒於言语动作喘乏表热自汗心烦不安当病之时宜安心静坐以养其气以甘寒泻其火热以酸味收其散气以甘温补其中气经言劳者温之损者温之者是也要略云平人脉大为劳以黄芪建中汤治之之意也

谨按丹溪先生曰治病之方先顾原气盖谓诸病多因虚致故也是以劳倦之证其因甚多东垣丹溪论治详矣然比之虚损证不同有因病致虚者如伤寒暑饮食後或久病所致之类是也因虚致损者如病後形瘁痿弱劳瘵之类是也此则虚损皆与劳倦不同大抵因病致虚则为轻盖病势尚浅原气未虚也至病初愈而复劳或复饮食劳倦或房劳七情六慾阳瘁阴弱加至羸损此因虚致损则为重病势已过原气已索故也愚谓此当分治如因病致虚及劳倦不足与已下诸证兼虚者宜从东垣丹溪之论治之因虚致损者又当於东垣丹溪论治而推充行之可也

论虚证为痿

详见痿门

论虚证发热

详见热门

论虚证恶寒

详见寒门

论虚证为溲痢

详见滞下门

论虚证似中风

详见中风门

论虚为头痛头眩

详见各门

论虚证夹痰有似邪祟

丹溪曰血气者身之神也神既衰乏邪因而入理或有之若夫血气俱亏痰客中焦妨碍升降不得运用以致十二宫各失其职视听言动皆有虚妄以邪治之焉能愈病宪幙傅兄之子年十七暑月因劳而渴恣饮梅浆又连得大惊三四次妄言妄见病似邪鬼两脉皆虚弦而沈数予曰数为有热虚弦是大惊又酸浆停於中脘补虚清热导去痰滞病乃可安与参术陈皮茯苓连等浓作汤入竹沥姜汁与淡旬未效衆皆尤药之未对予知其虚之未回痰之未导仍与前药加荆沥又旬余而安外弟一日醉饱後乱言妄见且言伊兄生前事甚的乃叔叱之曰食鱼肉与酒大过痰所为耳灌盐汤一大碗吐痰一升许汗因大作困睡一宵而安又金氏妇壮年暑月赴筵回乃姑询其座次失序自愧因成病言语失伦其中又时间一句曰奴奴不是两脉皆弦而数予曰非鬼神乃病也但与补脾导痰清热数日自安其弟不信以数巫者喷水而呪之旬余而死或曰病无鬼以邪治之何至於死曰暑月赴筵外境蒸热辛辣适口内境郁热而况旧有积痰加之愧闷其痰与热何可云喻今乃惊以法尺是惊其神而血不宁也喷以法水是冷密其肌汗不得泄也汗不得泄则热内燔血不得宁则阴消而阳不能独立也不死何俟或曰外台秘要有禁呪一科庸可废乎予曰移精变气乃小术耳可治小病若内有虚邪外有实邪自有定法符何能也惟符水可治膈上热痰一呷凉冷岂不清快若内伤而虚与冬令严寒符水入口必冰胃而死斯言也可与识者道

论原气陷下因虚所致

内经曰感虚乃陷下也

谨按针经曰陷下则灸之夫病有邪气陷下正气陷下者也然经谓邪气陷下者是经虚气少邪入故曰感虚乃陷下也故诸邪陷下在经者宜灸之正气陷下者若东垣所谓饮食劳倦内伤元气胃脘之阳不能升举并心肺之气陷入於中焦药以扶持元气胃气是也然用药亦有轻重轻者用升浮之剂如补中益气汤益胃升阳汤之类是也重者宜用劫剂来复丹灵砂丹之类是也况诸邪陷下宜灸之证亦有标本不同论见寒门方後

论精气夺则虚【夺谓精气减少如夺去也出内经通评虚实论】

谨按人禀冲和之气而生身有三曰元精曰元气曰元神者本身中之真精真气真脉也夫精乃腑脏之真非荣血之比故曰天癸气乃腑脏之大经为动静之主故曰神机脉为天真委和之一气经谓其名有三曰命之本气之神形之道其机运升降皆随气而动因血而荣精气资始相生不失以养一身为人之司命形质之体用也至若精不足则气失资化气不足则血失所营血不足则气无所附天真散乱则气血精神无所禀命矣是以相生长养之道精化气气

生神而皆禀乎身中腑脏之真也夫气血从乎荣卫荣卫又宗乎经隧荣卫者精气之化为先天清浊之始经隧者胃之水谷气化此经隧不能不生荣卫荣卫不能不散而养经脉经脉不能不顺而资天真为生养涵容造化形质理之然也凡人之视听言动壮寿皆此理之常也疾病盲瞶关格夭折皆此理之失也故有精神气血不足则病真脉散乱则死者皆由平日摄养之过与不及动止之不踰常度也经云出入废则神机化灭升降息则气立孤危然房劳甚则精血竭而神无所依气无所附则忽致暴绝也窃尝第究先哲经义济生微旨益气之补肺补精之滋肾皆滋其化源也盖人之精血而常不足加之数夺其真资化失则荣气乃虚虚则卫气不固精亦滑夺肾气竭而阴微不能与胃气上升以接清阳之气故病多头重或痛气弱而食少元气下陷脉即微弱外散欲绝而虚洪或见损脉此实元精不足之所致非有外感贼邪之病也

论形气不足有余用补泻法

东垣曰黄帝云形气之逆顺奈何岐伯曰形气不足病气有余是邪胜也急泻之形气有余病气不足急补之形气不足病气不足此阴阳俱不足也不可刺之刺之重不足重不足则阴阳俱竭血气皆尽五脏空虚筋骨髓枯老者绝灭壮者不复矣形气有余病气有余此谓阴阳俱有余也急泻其邪调其虚实故曰有余者泻之不足者补之此之谓也

按释云圣人垂慈仁之心已详矣不合立言诚恐市井庄农山野间不知文理故以俚语开解之云但病来潮作之时病气精神增添者是为病气有余乃邪气胜也急泻之以寒凉酸苦之剂若病来潮作之时神气困弱者为病气不足乃真气不足也急补之以辛甘温热之剂不问形气有余并不足只取病气有余不足也不足者补之有余者泻之

夫形气者气谓口鼻中喘息也形谓皮肉筋骨血脉也形胜者为有余消瘦者为不足其气者审口鼻中气劳役如故为气有余也若喘息气促气短或不足以息者为不足故曰形气也乃人之身形中气血也当补当泻令不在此只在病势潮作之时病气增加者是邪气胜也急当泻之如潮作之时精神困弱语言无力及懒语者是真气不足急当补之若病人形气不足病来潮作之时病气亦不足此乃阴阳俱不足也禁用针宜补之以甘药不可以尽剂不已脐下一寸五分气海穴取之

论无病好补之误

子和曰人之好补者有无病而补有有病而补或咨之庸医或问诸游客庸医以要用相求故所论者轻轻之则草木而已草木则苁蓉牛膝巴戟兔丝之类游客以好名自高故所论者重重之则金石而已金石则丹砂起石硫黄之类吾不知此为补也而补何脏乎以为补心耶而心为丁火其经则手少阴热则疮疡之类生矣以为补肝耶肝为乙木其经则足厥阴热则掉眩之类生矣脾为已土而经则足太阴以热补之则病肿满肺为辛金而经则手太阴以热补之病愤郁心不可补肝不可补脾不可补肺不可补莫非为补肾乎人皆知肾为癸水而不知其经则子午君火焉补肾之火火得热而益炽补肾之水水得热而益涸既炽其火又涸其水

上接于心之丁火火独用事肝不得以制脾土肺金不得以制肝木五脏之极传而之六腑六腑之极遍而之三焦则百病交起万疾俱生小不足言大则可惧不宜则中不中则暴瘥而死矣以为无病而补之者所得也且如有病而补之者呕而补吐而补泄而补痢而补疟而补欬而补劳而补产而补呕吐则和胃丸丁沈煎泻痢豆?丸御米穀散欬嗽则宁神散劳不桂附则山药产不乌金则黑神吾不知此为补果何意耶殊不知呕得热而愈酸吐得热而愈暴泄得热而清浊不分痢得热而休息继至疟得热而进不能退欬得热而湿不能除劳得热而火益烦产得热而血愈崩盖如是而死者八九生者一二死者枉生者幸幸而一生憔悴之态人之所不堪大抵有余者损之不足者补之是则补之义也阳有余而阴不足则当损阳而补阴阴有余而阳不足则当损阴而补阳热则芒硝大黄损阳而补阴也寒则乾姜附子损阴而补阳也岂可以热药云乎哉而寒药亦有补之义也经曰因其盛而减之因其衰而彰之此之谓也

谨按仲景论伤寒脉结代为血气虚衰不能相续而用炙甘草汤实补虚之法也殊无常补之例後世俗往往例用常补故子和极论其弊善莫大矣但所言大黄芒硝损阳而补阴是指仲景所谓阴阳虚盛之意非补不足之法也学者当审东垣丹溪之论则可以扩充矣

又曰人知补之为利而不知补之为害也论补者盖有六法平补峻补温补寒补筋力之补房室之补以人参黄芪之类为平补以附子硫黄之类为峻补以豆?官桂之类为温补以天门冬五加皮之类为寒补以巴戟苁蓉之类为筋力之补以石燕海马起石丹砂之类为房室之补此六者近代之所谓补者也若施之治病非徒功效疎阔至其害不可胜言难经言东方实西方虚泻南方补北方此言肝木实而肺金虚泻心火补肾水也以此论之前所谓六补者了不相涉试举补之所以为害者皆温补之罪也内经虽言形不足者温之以气精不足者补之以味气属阳天之所以食人者血属阴地之所以食人者戒乎偏胜非便以温为热也又若经曰损者补之劳者温之此温乃温存之温也岂以温为热哉又如虚则补其母实则泻其子者此欲权衡之得其平也又乌在燔针壮火炼石烧砒硫姜乌附然後为补哉所谓平补者使阴阳两停是已奈时人往往恶寒喜温甘受酷烈之毒虽死而不悔也可胜叹哉

宝监曰谚云无病服药如壁里安柱此无稽之说为害甚大夫天之生物五味备焉食之以调五脏过则生疾至於五谷为养五果为助五畜为益五菜为充气味合而食之补精补气倘用之不时食之不节犹或生疾况药乃攻邪之物无病而可服哉圣济经云彼修真者弊於补养轻饵金石药阳剂刚胜病起则天癸竭而荣涸阴剂柔胜病生则真火微而卫散一味偏胜一脏偏伤安得不病唐孙思邈言药势有所偏助令人脏气不平裴潏谏宪宗曰夫药以攻疾非朝夕常用之物况金石性酷烈有毒又加炼以火气非人五脏所能禁至於张皐谏穆宗也亦谓神虑清则血气和嗜慾多而疾疢作夫药以攻疾无疾不可饵也故昌黎伯铭李子之墓曰余不知服食说起自何世杀人不可计而世慕尚之益至此其惑也今直取目见亲与之游而以药败者六七公以为世诫今复取目见者三四人皆无故求生之祥病反生焉或至丧身壁里安柱果何如哉且夫高堂大厦梁栋安基址固坏涂毁墜柱於壁中甚不近人情洁古老人云无病服药乃无事生事此诚不易之论人之养身幸而五脏安泰六腑和平谨於摄生春夏奉以养生之道秋冬奉以收藏之理饮食有节起居有常少思寡欲恬澹虚无精神内守不药之药也噫前人既往不可咎矣後人其监焉

谨按近世俗谓壁里安柱为安鼠安鼠则必致穿坏垣壁矣此无病服药致无事生事斯为近理然亦必古人之深戒也後世俗因为柱字之语讹尔不然则因有所化之矣

论局方用诸热药补虚之失

丹溪曰虚者补而养之局方何例用辛香燥热之剂以火济火不无实实虚虚之祸若曰兔丝子丸之治肾虚金钗石斛丸之治气不足茴香丸之治脏虚冷玉霜丸之治气虚养正丹之治诸虚朴附丸之治脾虚弱按气丹之治真元虚四神丹之治五脏虚苁蓉大补丸之治元脏虚锤乳白泽丸之治诸虚三健汤之治气不足甚者内聚丹剂悉曰补脾胃补肾补五脏补真气而方各条下曰口苦面黄曰气促喘急口淡曰舌澁曰噫酸曰舌乾曰溺数曰水道澁痛曰唇口乾燥等证悉是明具热论如何类聚燥热而谓可以健脾温胃而滋肾补气乎又骨碎补丸治肝肾风虚乳香宣经丸治体虚换腿丸治足三阴经虚或因感风而虚或因虚而感寒既曰体虚肝肾虚足三阴经虚病非轻小理宜补养而自然铜半夏威灵仙荆芥地龙川楝乌药防风牵牛灵脂草乌羌活石南天麻南星槟榔等疎通燥疾之药俱补剂之大半果何以补虚乎地仙丹既曰补肾而滋补之药与僭燥走窜之药相半用之肾恶燥而谓可以补肾乎借曰足少阴经非附子辈不能自达八味丸仲景肾经药也八两地黄以一两附子佐之观此则是非可得而定矣

虚损治法

调理之剂

金匱桂枝加龙骨牡蛎汤治诸脉𦐇动微紧男子失精女人梦交

桂枝 白芍 生姜【各三钱】 甘草【一钱】 大枣【一枚】 龙骨 牡蛎【各三钱】

右?咀水煎食前服

小建中汤治虚劳里急悸衄腹中痛失精四肢酸疼手足烦热咽乾口燥

桂枝 甘草【炙各三钱】 大枣【二枚】 白芍 生姜【二钱】 阿胶【炒一合】

右?咀水煎

黄芪建中汤治虚劳里急诸不足

前方加黄芪【二钱】

炙甘草汤治虚劳不足汗出而闷脉结悸行动如常不出百日危急者十一日死

甘草【二钱炙】桂枝 生姜【各一钱半】麦门冬【一合】麻子仁【一合】人参
阿胶【各一钱】大枣【二枚】生地黄【三钱】

右?咀水煎入酒些小日作三四料服

局方人参养荣汤

方见热门

按已上诸方并太阳例药也

十味人参散

人参黄芪散

东垣补中益气汤

方并见热门

益胃升阳汤血脱益气古圣人之法也先补胃气以助生发之气故曰阳生阴长诸甘药为之
先务举世皆以为补气殊不知甘能生血此阳生阴长之理故先理胃气人之身内谷为宝

前方加炒麴【一钱半】生黄芩【泻盛暑之伏庚金肺逆每服少许秋凉去之】

右?咀水煎

按已上诸方并少阳例药也东垣云表虚用桂枝黄芪里虚用人参芍药已上方有兼用者治
表里俱虚也然观其法有辛温甘温甘寒主治之别苦寒酸苦之佐升降奇耦之意皆异者盖
虚中有兼寒兼热或气虚血虚阴阳气血俱不足或阴虚阳虚虚脱与夫胃气下陷精神不足
等因不同故也用者当细分之补气之剂

严氏芪附汤治气虚阳弱虚汗不止肢体倦怠

黄芪【蜜炙】附子【炮等分】

右咀每四钱加生姜煎

参附汤治真阳不足上气喘急自汗盗汗气短头晕

人参【半两】 附子【炮去皮脐一两】

右咀分作三服加生姜煎

按此二方少阴例药也

四君子汤治肺损皮聚而毛落宜此益气

人参 白术 茯苓 甘草【炙】

右?咀水煎服

济生茯神汤治脉虚极或欬则心痛喉中介或肿茯神 人参 远志 通草

麦门冬 黄芪 桔梗 甘草【等分】

右?咀每半两入姜煎

瑞竹堂补气汤治气虚脉浮而软怔忡无力自汗黄芪【三两蜜水拌炒】 人参
甘草【炙各半两】 麦门冬【去心】 桔梗【炒各一两】

右?咀每四钱水煎入姜三片三因方名润神散按此三方手太阴少阴药也

补血之剂

四物汤滋荣血不足

方见妇人门

当归补血汤

方见热门

按此二方滋荣气药也

丹溪大补丸降阴火补肾水

黄柏【炒褐色】 知母【酒浸炒各四两】 熟地黄【酒

蒸】败龟板【酥炙黄为末各六两】

右为末猪脊髓和炼蜜丸如桐子大每七十丸空心淡盐汤送下

补阴丸

黄柏【半斤盐酒炒】知母【酒浸炒】熟地黄【各三两】败龟板【四两酒浸炙】
白芍【炒】陈皮牛膝【各二两】琐阳当归【各一两半】虎骨【一两酒浸酥炙】

右为末酒煮羊肉丸如桐子大每五六十丸盐汤下冬加乾姜半两

按此二方滋阳之药也

补气血之剂

局方十全大补汤治心肺损及胃损饮食不为肌肤

方见热门

十四味建中汤治荣卫失调血气不足劳损形体瘦弱短气嗜卧

当归 白芍 白术 麦门冬 黄芪 甘草【炙】 苁蓉 人参 川芎 官桂 半夏
熟地黄 茯苓【各半钱】 附子【三分】

右?咀作一服入姜枣煎食前服

按此并手足三阴药也

养气丹治诸虚百损真阳不固上实下虚气不升降一切体弱气虚之人

禹余粮石 紫石英 赤石脂 代赭石 磁石 已上各煅法见局方

附子【二两】 肉苁蓉【一两半】 当归 茴香 破故纸 木香 肉桂 巴戟 肉豆? 丁香 山药
鹿茸 白茯苓 沉香 远志【并制】 乳香 五灵脂 没药 朱砂
阳起石【煅】 锤乳粉【并别研各一两】

右同碾为细末糯米粉糊为丸

按此固滑脱镇虚逆复阳助阴药也出太阳例古方类此者甚多姑存此一法如真气结薄气

不升降阴寒湿胜胃冷肝虚者非此药不可盖宜重剂劫之是也然有阴阳两虚湿热自甚元气下陷津液涸竭气血无所滋养浊阴下溜虚火上乘惟宜调之补之以轻清之剂者此方安能尽其变乎用者自宜详审

金匱肾气丸治形体瘦弱无力多困肾气久虚久新憔悴寝汗发热五脏齐损瘦弱下血

乾山药 山茱萸肉【各四两】 泽泻牡丹皮 白茯苓【各三两】 熟地黄【八两】

右为末炼蜜丸如梧子大每五六十丸空心温水下

拔萃三才封髓丹降心火益肾水

天门冬 熟地黄

人参【各半两】 黄柏【炒三两】 砂仁【一两半】 甘草【七钱半炙一方无】

右为细末水糊丸梧子大每五十丸用苁蓉半两切作片子酒一大盏浸一宿次日煎三四沸去滓空心送丸下 除前三味五脏治要作风髓丹

按此二方足少阴手太阴药也

机要八物汤治心肺虚损皮聚而毛落血脉虚损妇人月水愆期宜益气和血

四君子合四物汤

按此手足太阴少阴药也

补虚损壮筋骨之剂

金匱崔氏八味丸治肾虚气乏下元冷惫腹脐疼痛夜多旋溺脚膝缓弱肢体倦怠面皮痿黄或黧黑及虚劳不足渴欲饮水腰重疼痛小腹急痛小便不利并宜服之

前肾气丸加桂心【一两】 附子【炮一两】

右为细末炼蜜丸如桐子大每五七十丸温酒送下盐汤亦得空心食前妇人淡醋汤下

局方西川石刻安肾丸治真气虚惫脚膝弱缓夜梦遗精小便滑数而清

青盐【四两】 鹿茸【炙】 柏子仁【净】 石斛附子 川乌【炮】 巴戟【去心】
肉桂兔丝子 苁蓉 韭子 葫芦巴杜仲 破故纸【炒】 石枣 远志赤石脂 茯苓 茯神

茴香【炒各一两】 苍术 川楝 川椒 山药【各四两】

右为末山药酒糊丸如梧子大每七八十丸空心盐汤下

无比山药丸治诸虚百损五劳七伤肌体消瘦肤燥脉弱

赤石脂 茯神【各一两】 山药【三两】 苁蓉【四两酒浸】 巴戟 牛膝【酒浸】 泽泻
山茱萸肉【各一两】 五味子【二两】 杜仲 兔丝子 熟地黄【各三两】

右石臼内杵为末炼蜜丸梧子大每四五十丸空心温酒下

杨氏还少丹大补真气虚损肌体瘦弱

肉苁蓉 远志 茴香 巴戟 山药 枸杞子 熟地黄 石菖蒲 山茱萸 牛膝 杜仲 楮实子 五味子
白茯苓

右石臼内捣为末炼蜜丸如梧子大每五十丸空心温酒送下

机要牛膝丸治肾肝损骨痿不能起于牀宜益精筋缓不能自收持宜缓中此丸主之

牛膝【酒浸】 萆薢 杜仲【炒】 苁蓉【酒浸】 兔丝子 防风 葫芦巴【炒】 桂
【减半】 补骨脂 沙苑蒺藜

右等分为细末酒煮猪腰子为丸每五七十丸空心温酒下

按此用防风以升发肝气非补肝也

地黄丸治阳盛阴虚肝肾不足房室虚损形瘦无力面多青黄而无常色宜此养荣血肾气

苍术【泔浸】 熟地黄【各一斤】 乾姜【春七钱夏半两秋七钱冬一两】

右石臼杵为末蒸枣肉为丸桐子大每五七十丸至百丸诸饮下若加五味子为肾气丸述类
像形神品药也

按已上诸方少阴例药也盖谓肾为真水有补无泻故古人立肾气丸法後世俗因之以补阳
然阳虚者亦有之但不可例为常补尔

谨按虚损之证其源虽多莫不因胃气元气不足致气虚血虚阴阳俱虚或房劳精竭荣卫弱
而腑脏气痿不能输养为疲极甚者变为劳瘵之疾但世俗处治昧此病机源委例用香燥或

金石之剂往往悞人惟有宋钱仲阳建五脏虚方迥出前人之论我丹溪先生发挥局方之失示用补端绪言东垣所谓饮食劳倦内伤元气则胃脘之阳不能升举并心肺之气陷入於中焦而用补中益气治之此实前人之所无也然天不足於西北地不满於东南天阳而地阴西北之人阳气易降东南之人阴气易升苟不知此而徒取其法则於气之降者固可以获效而於气之升者亦从而用之吾恐反增其病矣意此不可恃为通行之法云人之虚者多是阴不足邵子谓天地自相依附天依形地附气其形也有涯其气也无涯人之形质有涯者也天癸絶後则形衰矣苟不益阴以内守则阳亦无得以发扬为健运之能是天失所依也而为飘散飞荡如丧家之狗耳阳既飘散则地愈失所附也形气不相依附则死矣人其补养残衰伤朽之质又何云哉斯论虚衰与东垣制法虽证不同实本乎内经阴精所奉其人壽阳精所降其人夭之旨盖谓人之寿夭比之经论南北二方亦自微甚不等升阳之例当为活法滋阴之剂义亦是焉必求的在之虚合病机而行其法如此与世俗不明造化之理槩用温补者天地悬隔故於诸书补剂而不详录学者审是则思过半矣

玉机微义卷十九

卷二十

钦定四库全书

玉机微义卷二十 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

积聚门

诸经叙积之始

黄帝针经百病始生第三云积者盖厥气生足惋惋生胫寒胫寒则血脉凝滯凝滯则寒气上入於肠胃入於肠胃则?胀?胀则肠外之汁沫迫聚不得散日以成积卒然多饮食则肠满起居不节用力过度则络脉伤阳络伤则血外溢血外溢则衄血陰络伤则血内溢血内溢则後血肠胃之络伤则血溢於肠外有寒汁沫与血相搏则并合凝聚不得散而成积矣或外中於寒内伤於忧怒则气上逆气上逆则六输不通温气不行凝血蘊裏不散津液凝滯渗着而不去而成积矣

难经曰肝之积名曰肥气【见後方下云云】以季夏戊己日得之何以言之肺病传於肝肝当传脾脾季夏适王王者不受邪肝复欲还肺肺不肯受故留结为积故知肥气以季夏戊己日得之心之积名曰伏梁【云云】脾之积名曰痞气【云云】肺之积名曰息贲【云云】肾之积名曰奔豚【云云并见本文】

按滑氏本义曰越人之意盖以五行之道推其理势之所有者演而成文耳初不必论其情感亦不必论其还不还与其必然否也读者但以所胜传不胜及王者不受邪遂留结为积观之则不以辞害志而思过半矣

谨按越人论五脏积传受之本病也然针经又主络脉伤及饮食七情所致而论之可谓详悉然今较之积聚因饮食伤及七情而成者多且三因方於五积无主治引经况他书乎故具法不取今以东垣方附于後

脉法

脉经曰脉来细而附骨者积也寸口积在胸中微出寸口积在喉中关上积在脐傍上关上积在心下微下关积在少腹尺积在气街脉出在右积在右脉出在左积在左脉两出积在中央各以其部处之脉来小沈而实者胃中有积聚不食食即吐肺积脉浮而毛按之辟易心积脉沈而芤上下无常处肝积脉弦而细肾积脉沈而急脉沈重而中散者因寒食成症

脉左转而沈重者气症阳在胸中右转出不至寸口者内有肉症也

论积聚症瘕不同

难经曰积者陰气也聚者阳气也故陰沈而伏阳浮而动气之所积名曰积气之所聚名曰聚故积者五脏所生聚者六腑所成也积者陰气也其始发有常处其痛不离其部上下有所终始左右有所穷处聚者阳气也其始发无根本上下无所留止其痛无常处谓之聚故以是别知积聚也

原病式曰症者腹中坚硬按之应手然水体柔顺而今反坚硬如地者亢则害承乃制也瘕者中虽硬而忽聚忽散无其常故其病未及症也经曰血不流而滞故血内凝而为瘕也小肠移热於大肠乃为瘕瘕大肠移热於小肠谓两热相搏则血溢而为伏瘕血溢不利月事沈滞而不行故云为瘕瘕为瘕与伏同传写误尔谨按积者实停蓄之总名症者有所成而名之亦皆积尔瘕者血病也似不可言为聚聚者阳气也然大小肠移热为瘕如此则亦聚尔但前人施治亦未见有分其异同者唯丹溪先生曰积块在中为痰饮在左为血积在右为食积气不能作块成聚块乃有形之物痰与食积死血尔此深得病情之旨学者可因此例而求诸

论积聚分三因

陈无择云症瘕属肝部积聚属肺部夫症者坚也瘕者假也假物而成形然七症八瘕之名经论亦不详出虽有蛟蛇鼃肉发蝨米等七证初非定名偶因食物相感而致患尔若妇人症瘕则由内外不内外因动伤五脏气血而成古人谓为瘕疾以蛟蛇等为生瘕然亦不必泥此并属血病蛇髮等事皆出偶然但饮食间误中之留聚假血而成自有活性亦犹永徽中僧病噎者腹中有一物其状如鱼即生瘕也

按此论积聚等属脏部盖分气血尔亦不必拘此然生瘕亦有外因而成者如昔之徐之才治取蛤精疾生於足间者若此陈於三因何不之及

论妇人肠覃石瘕之积

水胀篇曰石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒气客于子门子门闭塞气不通恶血当泻不泻衃以留止日以益大状如怀子月事不以时下皆生於女子可导而下宝鉴曰夫膀胱为津液之腑气化则能出矣今寒客於子门则必气塞不通血壅不流而衃以止之结硬如石是名石瘕也此气先病而血後病故月事不来则可宣导而下出者也故难经云任之为病其内苦结男子为七疝女子为瘕聚此之谓也非大辛之药不能已可服见睨丹

肠覃何如岐伯曰寒气客於肠外与胃相搏不得荣因有所系瘕而内着恶气乃起瘕肉乃生其始生者大如鸡卵稍以益大至其成如怀子之状久者离岁按之则坚推之则移月事以时下此其候也夫肠者大肠也覃者延也大肠以传道为事乃肺之腑肺主卫卫为气气得灵则

泄寒则凝今寒客於大肠故卫气不荣有所系止而结瘕在内贴者其延久不已是名肠覃也气散则清气聚则浊结为瘕聚所以恶气发起瘕肉乃生小渐益大至期而?其腹则如怀子状也此气病而血未病故月水不断以时下本非妊娠可以此为辨矣

按此谓石瘕为血壅不流故月事不来肠覃为清气聚而浊结成瘕故血未病月水不断而知此二积之异然亦有诸积所致或有病痈脓而似此二证者不可不察也

论五积六聚治同?断

子和曰且积之成也或因暴喜怒悲思恐之气或伤五味之食或停温凉寒热之饮或受六气之邪其初甚微可呼吸按导而去之不幸遇庸医强补而留之留而不去遂成五积夫肥气者不独气有余也其中亦有血矣盖肝藏血故也伏梁者火之?也以热药散之则益甚以火炙之则弥聚况伏梁证有二名同而实异不可不详焉其一上下左右皆有根在肠胃之外有大脓血此伏梁义同肠痛其二身体髀股胛背肿环脐而痛是即风根不可动动则为水溺瀦之病此二者内经虽言不可动止谓不可大下非谓全不可下恐病去而有害痞气者举世皆言寒则痞内经以为湿则痞虽因饮冷而得其阳气为湿所畜以热攻之则不散以寒攻之则湿去而寒退矣息贲者喘息愤而上行也此旧说也余以谓贲者贲门也手太陰之筋结胸里故贯合贲下抵季脇其痛支转筋痛甚则成息贲手心主结於贲其病胸痛息贲又云肺下则居贲迫肝善脇下痛肝高则上支贲门脇悦为息贲若是言之是积气於贲而不散此灵枢说五脏处言此贲自是多故予发之贲豚者贲与奔同铜人言或因读书得之未必皆然也肾主骨此积最深难察大忌吐涌以其在下止宜下之故予尝以独圣散吐肥气掇以木架必燠室中吐兼汗也肝之积便言风也吐出数升後必有血一二滴勿疑病当然也续以磨积之药调之尝治伏梁先以茶调散吐之兼汗以禹功导水夺之继之以降火之药调之又尝治痞气万举万全先以瓜蒂散吐其酸苦黄胶腥腐之物三二升次以导水禹功下二三十行末以五苓淡剂等药调之又尝治息贲用瓜蒂散不计四时置燠室中更以火一炉以助其汗吐汗下三法齐行此病不可逗遛久则伤人又尝治贲豚以导水通经三日一下之一月十下前後百行次用治血化气磨积之药调之此积虽不伤人亦与人偕老若六聚之物在腑属阳而无形亦无定法仿此而行之何难之有

按此论五积之异同可谓极备病情之要积为鬱而用吐法更甚得古人之妙矣但每吐後继之以禹功导水之剂则不可为例矧古人施吐必本积因而用药如徐文伯以油为宫人吐发瘕楮澄以蒜为李道念吐鸡子积甄权以雄黄为人吐发瘕成蛇者盖所因不同而用药殊也大抵禹功五苓之剂十下百行等法用於湿热盛实及体厚者则可设有陰虚气痿积聚实而血气弱者岂可例用乎

论痰饮积主於湿

详见痰饮门

论治积大法

许学士云大抵治积或以所恶者攻之或以所喜者诱之则易愈如硃砂水银治肉积神麴麦蘖治酒积水蛭虫治血积木香槟榔治气积牵牛甘遂治水积雄黄膩粉治涎积礞石巴豆治食积各从其类也若用羣队之药分其药势则难取效须要认得分明是何积聚兼见何证然後增减斟量使之不尔反有所损要在临时通变也

谨按诸积有不因气动而成者如偶有所食或误吞钱物之类是也因气动而成者如七情所致或饮食劳倦或五脏传受之类是也故所积之物不一气血之聚有殊或成蛊瘤生瘕之类难测故须是认得分明是何积聚用药宜各从其类然亦要看元气虚实或攻取峻削或养正渐除可也不尔则岂但有损而已

论养正积自除

卫生宝鉴曰洁古云养正积自除譬如满座皆君子纵有一小人自无容地而出令其真气胃气强积自消矣洁古之言岂欺我哉内经曰大积大聚衰其大半而止满实中有积气大毒之剂尚不可过况虚中有积者乎此乃治积之一端也邪正虚实宜详审焉

按或云积非下之不可今言养正而後积除将以待正气而除乎将以待药力而除乎然人之有积则皆为身中之邪气若君子座中之有小人也惟其调正气则真气运行不失其常而积自除夫君子衆而正直在位其小人自然退避矣不然则正气虚而真气乖致积增膜膈胃乱真正气絶而死矣亦若小人得志则政乱法坏而君子有所不能制焉且夫养正者非为饮食起居之间也盖积既成矣形渐悴矣必用调养使荣卫充实而积自除余有坚而不去者方可亟下之此先补後攻期于邪去正复而後已然除之不以渐则必有颠覆之害矣若昔之武氏斷丧唐宗几於改物尚赖狄张诸公匡扶之力渐除党与兴复丕祚惜乎中宗不鉴前轍之失而留三思至致韦氏之祸其犹积余之尚在者而不亟下之更不慎守禁戒遂纵口嗜慾病证复起而不可制其有不丧身者未之有也

积聚治法

五脏积方

东垣肥气丸治肝之积在左脇下如覆杯有头足久不愈令人发欬逆?症连岁不已

厚朴【半两】 黄连【七钱】 柴胡【二两】
椒【四钱】 巴豆霜【五分】 川乌头【炮去皮一钱二分】 乾姜【炮半钱】 人参【二钱半】 白茯苓【一钱半】 昆布【二钱半】 甘草【炙三钱】 广术【炮二钱半】 皂角【去皮弦煨一钱半】

右件除茯苓皂角豆霜另末外为极细末和匀炼蜜为丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸渐渐加至大便微溏再从二丸加服周而复始积减太半勿服

伏梁丸治心之积起脐上大如臂上至心下久不愈令人烦心

黄连【一两半】厚朴【制】人参【各半两】黄芩【三钱】乾姜 菖蒲
巴豆霜【各五分】桂【一钱】红豆【二分】川乌头【五分炮】茯神
丹参【炒各一钱】

右件除巴豆霜外为细末另研豆霜旋旋入末炼蜜为丸如桐子大服如上法淡黄连汤下

痞气丸治脾之积在胃脘覆大如盘久不愈令人四肢不收发黄疸饮食不为肌肤

厚朴【四钱半】黄连【八钱】吴茱萸【三钱】黄芩【二钱】白茯苓 泽泻 人参【各一钱】川乌头【炮】川椒【炒各半钱】白术【二分】巴豆霜【四分】桂【四分】茵陈【酒炒】乾姜【泡】砂仁【各一钱半】

右件除豆霜另研茯苓另末旋入外同为细末炼蜜为丸如桐子大淡甘草汤下服如上法

息贲丸治肺之积在右脇下覆大如杯久不已令人洒淅寒热喘欬发肺壅

厚朴【制八钱】黄连【炒一两三钱】乾姜【泡】白茯苓 川椒【炒】
紫苑【各一钱半】桂 川乌头【炮】

桔梗 白豆? 陈皮

京三棱 天门冬【各一钱】巴豆霜【四分】人参【二钱】青皮【五分】

右件除茯苓巴豆霜旋入外为末炼蜜丸如桐子大以淡姜汤送下服如上法已上四方秋冬加厚朴减黄连四分之一

奔豚丸治肾之积发於小腹上至心下若豚状或下或上无时久不已令人喘逆骨痿少气及治男子内结七疝女人瘕聚滞下

厚朴【制七钱】黄连【五钱】白茯苓 泽泻 菖蒲【各二钱】川乌头 丁香【半钱】
桂【二分】巴豆霜【四分】全蝎 附子
独活【各一钱】玄胡索【一钱半】苦楝【酒煮三钱】

右除巴豆霜茯苓另为末旋入外为细末炼蜜丸如桐子大淡盐汤下服如上法

按已上诸方宜随证加減用之所谓益元气泄陰火破滯气削其坚也

吐剂

瓜蒂散

方见痰饮门

按吐法意略具前宜兼看各门吐例

倒仓法

丹溪曰人之七情厚味停痰瘀血互相糾纏日积月深?结成聚甚者如桃核之穰诸般奇形之虫成於中形於外发为瘫痪为劳瘵为蛊胀为癰疾为无名奇病宜行此法

用黄牡牛肉择肥者买一二十斤长流水煮糜爛融入汤中为液以布濾出粗滓取淨汁再入锅文武火熬成琥珀色则成矣每饮一鍾少时又饮如此者积十数鍾寒月则重汤温而饮之病在上者欲其吐多病在下者欲其利多病在中者欲其吐利俱多全在活法而为缓急多寡也须晴明日早於一室明快不通风处以安病人视所出之物可尽病根则止吐利後或渴不得与汤水其小便必长取以饮病者名曰轮回酒与一二椀非惟可以止渴抑且可涤濯余垢睡一二日觉饥甚乃与粥淡食之待三日後始与少菜羹自养半月觉精神焕发形体轻健沈痼悉除其後須五年忌牛肉

消导之剂

御药院方助气丸治三焦痞闭胸膈满闷气不流通蘊结成积痞癖气块并皆治之

京三棱 莪术【各炮二斤】 青皮 陈皮【并去白】 白术【各十五两】 ?榔 枳殼 木香【各十两】

右为末糊丸如梧子大每五十丸煎水下

按此治诸气积药也然世俗治积之方多兼气药欲其气化而积易散殊不知气虚者何以抵受中夹热者岂不助火反伤气耶故用者宜分虚实寒热选使况此方杂削气之药过半而云助气恐未必然也

三因散聚汤治久气积聚状如症瘕随气上下发作有时心腹绞痛攻刺腰脇小腹?胀大小便不利

半夏 槟榔 当归【各三分】 陈皮杏仁【去皮尖炒】 桂【各二两】 茯苓 甘草【炙】

附子【炮】 川芎 枳壳【炒】 厚朴【制】 吴茱萸【汤泡洗各一两】

大黄【大便利去之】

右?咀每服四钱水煎

济生大七气汤治积聚状如症瘕随气上下发作有时心腹?痛上气窒塞小腹胀满

桔梗 肉桂 藿香叶 甘草【炙】 青皮【各二分】 益智仁 京三棱 陈皮 蓬术
香附子【炒各一两半】

右?咀每服五钱水煎

按此二方治聚之剂也然聚瘕用汤荡涤之意亦要随脏气虚实寒热而增损之可也

东垣草豆?丸治酒积或伤寒冷物胃脘痛咽膈不通草豆?【煨】 白术【各一两】 大麦蘖
神麴【各炒】 黄芩 半夏【各半两】 枳实【炒二两】 炒盐【半钱】

陈皮 青皮 乾生姜【各二钱】

右为极细末汤浸蒸饼丸如菉豆大每服百丸煎水下

按此治酒积饮积药也入气血之分

广术溃坚汤治有积块坚硬如石形如胛大令人坐卧不安中满腹胀

方见腹胀门

宝鉴香壳丸破痰癖消症块及冷积

木香 丁香【各五钱】 京三棱【剉酒浸一宿】 青皮 广术【剉酒浸一宿用去皮巴豆三十
粒同炒巴豆黄色】 枳壳【炒】 川楝子 茴香【炒各一两】

右末醋糊丸如梧子大朱砂为衣每服二十丸姜盐汤下

按此治气积寒积之剂下焦药也

丹溪阿魏丸治肉积

连翹【半两】 糖球子【一两】 黄连【六钱半】

阿魏【一两醋煮作糊】

右为末用阿魏糊丸如梧子大每二三十丸白汤下

保和丸治食积

糖球子【三两】 半夏 茯苓【各一两】 神麴【二两】 陈皮 连翹 萝卜子【各半两】

右为末粥糊丸如梧子大每三四十丸白汤下按此二方食积药也又此方治痰积饮积之剂丹溪曰脾虚者须以补脾药下之切不可独用虚虚之祸疾如反掌盖慎之也气实新病宜於攻下诸方选用又不必拘此

宣明三棱汤治症瘕痞聚不散坚满痞膈食不下腹胀

蓬术 当归【各半两】 京三棱【二两】 白术【一两】 槟榔 木香【各三分】

右为末每三钱沸汤调下

按此治症瘕之剂气血药也然瘕者虽硬而忽聚散即聚也属阳气也经云血不流而寒薄故血内凝而瘕盖又属血尔固当兼治之此方亦可以推其变从虚实加减而轻重之可也

谨按针经备陰络伤汁血相搏并合成积或脏气传受及子和论七情为?皆元气自病不系伤诸饮食致者当先调理不可妄下故已上五脏方消导法宜选用气虚弱甚者又宜消息此养正积自除之意若伤诸饮食致者元气未病初非下之削之不可然治之不早元气日减正气日偷方用下削而能获安者实侥幸焉至是者亦宜上法先补後攻可也医反是之多致悞尔若积鬱在身形气饮食如常者则已下削坚之方或吐或下的在选用衰其太半宜渐除之否则失机後时而不救者多矣然有除之未尽元气未复而使内纵口味?七情病遂复起者亦不鲜矣呜呼世道不古人之不谨致积又不能归罪於已安心调理卒致殒没不得以尽其天年者固不足惜然医之不能精明其道悞人生命者岂无所报耶削坚之剂

杨氏木香槟榔煎丸治脾积气块腹脇走痛口吐清水肉豆?【五枚】 木香 肉桂【各一两】 槟榔【七枚】 乾漆【半两炒令烟尽】 硃砂【半两另研】 胡椒【四十九粒】

右为末次入硃砂和匀炼蜜丸如梧子大每七丸橘皮汤下

按此治肉积寒积药也入气血之分

局方丁香脾积丸治诸般食积气滞胸胀满心腹刺痛丁香 木香 巴豆
高良姜【醋煮各半两】莪术【一两】 三棱【二两】 青皮【一两】
皂角【三大挺烧】

右入百草霜三匙同碾细为末糊丸如麻子大每十丸至二十丸

按此治寒冷食积药也

邓山房感应丸治食积化宿滞

黑角沈香 檀香 丁香 木香 陈皮 青皮 黄连 砂仁

香附子 半夏 三棱

蓬术【煨各一两为细末】肥乌梅【百钱重】巴豆【三百粒肥白者去衣膜心】

右用磁器一只盛巴豆上以梅肉盖之却用米醋浸过与梅肉平於甑坐蒸至极熟以巴豆红色为度却搗二件如泥用糯米饭和前药匀捣千百下丸如萝卜子大每十丸汤下

按此下气积食积药也

宣明积气丹治一切新久沈积气块面黄黑瘦症瘕积聚口吐酸水

槟榔【二个】 芫花 京三棱 黄连 牛膝 樟柳根【各一两】 肉豆蔻【二个】 硃砂【二钱】

青皮 陈皮 石菖蒲【各三钱】 大戟

大黄 甘遂 白牵牛 乾姜 青礞石 乾漆【各半两】 蓬术【一两】 巴豆 木香【各二钱半】

右为末醋糊为丸如桐子大每服一丸临卧烧枣汤下量病人虚实加减与服

按此下饮积气积肉积水积药也

本事硃砂丸治一切积聚痰饮心脇引痛

硃砂 三棱 乾姜 白芷 巴豆【去油各半两】 大黄

乾漆【各一两】 槟榔 肉豆蔻【各一个】 木香 青皮 胡椒【各一分】

右为末酹醋二升煮巴豆五七沸复下三棱 大黄末同煎五七沸入硃砂煎成膏却入别药和匀杵丸如菉豆大每五丸姜汤下

按此下肉积气积例药因其中用白芷为散水行气故更言治痰饮也

破积导饮丸治积块坚硬饮食不消心下痞闷

木香 槟榔 陈皮 青皮 枳壳【炒】 枳实【炒】 广术【炮】 三棱【炮】 半夏
神麴【炒】 麦蘖 乾生姜 茯苓 泽泻
甘草【炙各半两】 牵牛【头末六钱】 巴豆【三十粒去皮心油】

右细末入巴豆霜令匀姜汁糊丸梧子大每三十丸温姜汤下

按此治饮积酒积气积药也然世俗方类此者甚多大抵多合以热剂不能以尽病情之变唯
此方庶几用者自宜取择

三因破饮丸

方见痰饮门

曦露丸治伤寒於内气凝不流结於肠外久为症瘕时作疼痛腰不得伸

广术 三棱【各酒浸一两】 乾漆【炒五钱】 茴香【炒】

青皮 雄黄 穿山甲【炮各三钱】 硃砂【四钱研】 轻粉【一钱】
川乌【五钱炮】 麝香【半钱】 巴豆【三十粒去壳同三棱术炒黄色去巴豆不用】

右细末和匀姜汁糊丸梧子大每三二十丸温姜汤下空心服

按此治肠覃寒积之剂也

宝鉴见睨丹治妇人石瘕状如怀子者

附子【四钱炮】 鬼箭羽 紫石英【各三钱】 泽泻 肉桂 玄胡 木香【各二钱】
血竭【一钱半】 水蛭【一钱炒烟尽】 槟榔【二钱半】
桃仁【炒三十个】 三棱【五钱】 大黄【二钱同三棱酒浸一宿焙】

右各研匀酒糊丸梧子大每三十丸食前用盐汤或酒下

按此治血积药也

温白丸治心腹绞痛久症癖块大如杯碗十种水病八种痞塞九种心痛

紫苑 吴茱萸 菖蒲 柴胡

桔梗 厚朴【制】 皂角【去皮子弦】 茯苓

黄连 桂 川椒【炒去目】

乾姜【炮】 巴豆【去心膜油】 人参【各半两】 川乌【炮去皮脐二两半】

右末入巴豆研令匀蜜丸梧子大每三丸生姜汤下按此治食积寒积药也

经验方塌肿神应丸治诸肿虫毒肚胀如鼓脾癖症瘕气块上喘气急欬嗽倚息不得睡服药不效者

三棱 莪术 青皮 陈皮 乾漆【烧各一两】 芫花【七钱半】 大戟【三钱】

硃砂巴豆霜【各一钱】

右前药和一处用好米醋一大碗慢火上煮醋乾为度取出晒乾碾为末醋和作丸如梧子大每四五十丸生姜汤下五更服随用椒目六两萝卜子半斤炒香熟用手帕盛於患处熨如冷再炒熨至再三大小便行後才住熨以温稀粥补之

按此治症瘕之剂饮积气积水积血积药也

圣散子治远年积块

硃砂【六两】 川大黄【八两】 大麦蘖【六两】 乾漆【烧过】 篇蓄 茴香【炒】 瞿麦 槟榔【各一两】 如妇人乾血气加穿山甲【二两炮】

右末每五钱温酒调下仰卧此药只在心头至明大便如烂鱼小便赤为验取出并无毒性小儿用一钱量大小与之

按此气血药也

谨按治积之方气实者故宜峻削故古方多相类近世又多用推逐之剂如剪红丸蜡丸去积亦是一法但不分气血虫物诸积之异人之虚实不同往往悞人故皆不録其或可吐者宜从子和之法气虚羸弱者观东垣诸方已啓其微用者当自求其意而为通变可也

玉机微义卷二十

卷二十一

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷二十一 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

消渴门

诸经论消渴脉证所因

内经阴阳别论曰二阳结谓之消脉要精微论曰瘵成为消中

按东垣曰二阳者阳明也手阳明大肠主津病消则目黄口乾是津不足也足阳明胃主血热则消谷善饥血中伏火乃血不足也结者津液不足结而不润皆燥热为病也此因数食甘美而多肥故其气上溢转为消渴治之以兰除陈气也不可服膏粱芳^甘石药其气慄悍能助燥热也

调经论曰心移热於肺传为膈消也 凡治消瘵仆系偏枯痿厥气满发逆肥贵人则膏粱之疾也岐伯曰脉实病久可治脉弦小病久不可治後分为三消高消者舌上赤裂大渴引饮

脉经云紧数相搏则为消渴 脉软散者当病消渴

论消渴为三焦受病

病机云消渴之疾三焦受病也上消者肺也多饮水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦也治宜流湿以润其燥消中者胃也渴而饮食多小便赤黄热能消谷知其热在中焦也宜下之

消肾者初发而为膏淋谓淋下如膏油之状至病成面色黧黑形瘦而耳焦小便浊而有脂液治法宜养血以肃清分其清浊而自愈也

论消中三证之异

陈无择云消渴属心故烦心致心火散漫渴而引饮诸脉软散皆气实血虚也消中属脾瘵热

减则为消中消中复有三有因寒中陰胜阳?久必为热中经云脉洪大陰不足阳有余则为热中多食数溺为消中陰狂兴盛不交精泄则为强中至病强中不亦危矣消肾属肾盛壮之时不谨而纵慾房劳年长肾衰多服金石真气既丧口乾精溢自泄不饮而利经云肾实则消不渴而小便自利名曰肾消亦曰内消

论三消之疾燥热胜陰

河间曰三消之疾本湿寒之陰气极衰燥热之阳气太甚皆因乎饮食服饵失节肠胃乾涸而气液不得宣平或耗乱精神过违其度或因大病陰气损而血液衰虚阳气悍而燥热?甚或因久嗜咸物恣食炙?饮食过度亦有年少服金石丸散积久实热结於下焦虚热血气不能制湿热燥甚於肾故渴而引饮若饮水多而小便多者名曰消渴若饮食多而不甚渴小便数而消瘦者名曰消中若渴而饮水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰肾消此三消者其燥热同也夫经中有言心肺气厥而渴者有言肝痹而渴者有言脾热而渴者有言肾热而渴者有言胃与大肠结热而渴者有言脾痹而渴者有言小肠痹热而渴者有因病疰而渴者有因肥甘美食而渴者有因醉饱入房而渴者有因远行劳倦遇大热而渴者有因伤害胃乾而渴者有因病风而渴者虽五脏之部分不同而病之所遇各异其为燥热亡液一也

谨按先生三消之论始言天地六气五味以配养人身六位五脏而究乎万物之源终引内经论渴诸证以辨乎世方热药之误比物立象反覆详明非深达陰阳造化之机者孰能如是哉夫治此疾者补肾水陰寒之虚而泻心火阳热之实除肠胃燥热之甚济身津液之衰使道路散而不结津液生而不枯气血利而不澁则病日已矣岂不以滋润之剂养陰以制燥滋水而充液哉何故世论消渴者多不知其意谓因下部肾水虚不能制其上焦心火使上实热而多烦渴下虚冷而小便若更服寒药则元气转虚而下部肾水转衰则上焦心火尤难治也但以暖药补养元气若下部肾水得实而胜退上焦心火则自然渴止小便如常而病愈也吁若此未明陰阳虚实之道也夫肾水属陰而本寒虚则为热心火属阳而本热虚则为寒若肾水陰虚则心火阳实是谓阳实陰虚而上下俱热矣以彼之言但见消渴数洩妄言为下部寒尔岂知肠胃燥热拂?使之然也且夫寒物属陰能养水而泻心热物属阳能养火而耗水令肾水既不胜心火则上下俱热奈何以热药养肾水欲令胜心火岂不閤哉彼不谓水气实者必能制火虚则不能制火故阳实陰虚而热燥其液小便淋而常少陰实阳虚不能制水小便利而常多此又不知消渴小便多者盖燥热太甚而三焦肠胃之腠理拂?结滯致密壅塞而水液不能渗泄浸润於外以养乎百体故肠胃之外燥热大甚虽多饮水入於肠胃之内终不能浸润於外故渴不止而小便多水液既不能渗泄浸润於外则陰燥竭而无以自养故久而多变於聋盲疮疡痲痺之类而危殆其为燥热伤陰也明矣

论治消渴大法

东垣曰膈消者以白虎加人参汤治之中消者善食而瘦自汗大便硬小便数叔和云口乾饮水多食饥虚痺成消中者调胃承气三黄丸治之下消者烦燥引饮耳轮焦乾小便如膏叔和云焦烦水易亏此肾消也六味地黄丸治之总録所谓末传能食者必发脑疽背疮不能食者

必传中满鼓胀皆谓不治之证洁古老人分而治之能食而渴者白虎加人参汤不能食而渴者钱氏方白术散倍加葛根治之上中既平不复传下消矣前人用药厥有旨哉或曰末传疮疽者何也此火邪胜也其疮痛甚而不溃或赤水者是也经云有形而不痛阳之类也急攻其阳无攻其阴治在下焦元气得强者生失强者死末传中满者何也以寒治热虽方士不能废其绳墨而更其道也然脏腑有远近心肺位近宜制小其服肾肝位远宜制大其服皆适其至所为故如过与不及皆诛罚无过之地也如高消中消制之太急速过病所久而成中满之病正谓上热未除中寒复生者也非药之罪失其缓急之制也处方之治宜加意焉按已上所论三消传变可谓发病机之旨比与陈氏三因论消中复有三证皆病传所异大抵末传发疮疽者为传外发胀满强中为传内亢极之甚也但三因所出治强中一方然未见其肯綮今姑存之以备其旨且传胀满皆不治之证况强中乎

消渴治法

治热之剂

局方清心莲子饮

调胃承气汤治消中热在胃而能饮食小便赤黄

方并见热门

三因真珠丸治心虚烦闷积热烦渴口乾舌燥引饮无度小便或利或不利

知母【一两一分】黄连 苦参 玄参 鉄粉 牡蛎【各一两】朱砂【二两】
麦门冬【去心】天花粉【各半两】金箔 银箔【二百片】

右为末炼蜜入生瓜蒌汁少许丸如梧子大用金银箔为衣每二三十丸先用瓜蒌根汁下一服次用麦门冬熟水下病退日二服

按此心胃经药也已上三方有轻重之殊宜选使治燥之剂

东垣当归润燥汤治消渴舌上白乾燥唇乾口乾眼澁黑处见浮云大便闭澁乾燥结硬喜温饮陰头短缩升麻【一钱半】柴胡【七分】甘草【六分半一半生】细辛【一分】杏仁【六个】红花【少许】小椒【三个】生地黄【三分】黄柏 知母 石膏 桃仁 麻仁 防风 荆芥穗 当归身【各一钱】

右?咀作一服水煎

清凉饮子治消中能食而瘦口乾舌乾自汗大便结燥小便频数

羌活 柴胡 炙甘草 知母【酒制】 黄芪 黄芩【酒制各一钱】 生甘草 汉防己
生地黄【酒制各半钱】 红花【少许】 桃仁【五个】 杏仁【十个】 升麻【四分】
防风【五分】 石膏 黄柏 草龙胆【制各一钱半】 当归身【六分】

右?咀作一服水煎入酒些小此方减黄芪黄芩防风草龙胆加麻黄根三分黄连八分名地黄
饮子按已上脾心肝肾药也

清气之剂

局方人参白虎汤治高消上焦燥渴不欲多食

方见热门

东垣兰香饮子治渴饮水极甚善食而瘦自汗大便结燥小便频数

石膏【三钱】 知母【酒制一钱】 生甘草 防风【各一钱】 炙甘草 人参 兰香 连翘

白豆?仁 桔梗 升麻【各五分】 半夏【二分】

右为细末汤浸蒸饼和匀成剂捻作薄片子日中晒半乾碎如粉每服二钱食後淡生姜汤下

按已上二方主上中二消之剂肺胃经药也

滋陰之剂

丹溪补陰丸

方见补虚门

局方加減八味丸治肾虚消渴引饮

金匱肾气丸減附子加五味子

右服如本方法要略治男子消渴小便反多仍用本方

简易地黄饮子治消渴咽乾面赤烦躁

人参 生地黄 熟地黄 黄芪 天门冬 麦门冬【去心】 泽泻
石斛 枇杷叶【去毛炒】 枳殼【炒】 甘草【炒各等分】

右?咀每三钱水煎服

按此心肾脾肺药也已上三方主下消之剂

朱砂黄连丸治心虚蕴热或因饮酒过多发为消渴朱砂【一两】 宣连【三两】
生地黄【二两】

右为末炼蜜丸如梧子大每四五十丸灯心枣汤送下

按此心脾药也上消之例

清气滋阴之剂

局方黄芩六一汤治男女诸虚不足胸中烦悸时常消渴或先渴而後发疮或病诸疮而後渴者并宜服方见前

按此肺肾脾三焦命门之剂也

东垣生津甘露饮子治高消大渴饮水无度舌上赤澁上下齿皆麻舌根强硬肿痛食不下腹时胀痛浑身色黄目白睛黄甚则四肢痿弱无力面尘脱色脇下急痛善嚏善怒健忘臀腰背寒两尻冷甚

石膏【一钱二分】 人参 炙甘草【各一钱】 白葵【半钱】 麦门冬 兰香
当归身【各半钱】 桔梗【三钱】 生甘草 山梔
芩澄茄【各一钱】 藿香【二分】 全蝎【二个】 升麻 知母【酒制各二钱】

黄连 木香 柴胡【各三分】 白芷 白豆? 连翘 姜黄【各一钱】
黄柏【酒拌】 杏仁【各一钱半】

右为细末汤浸蒸饼和匀摊薄晒乾杵细食後每二钱抄於掌中以舌砥之随津唾下或导以白汤少许按此肺胃心肾药也东垣曰此制之缓也不惟不成中满亦不传下消矣三消皆可用

宣明麦门冬饮子治膈消胸满烦心津液乾少短气多为消渴

知母 甘草【炒】 瓜蒌 人参 五味子 生地黄 葛根 茯神 麦门冬【去心各等分】

右?咀每五钱入竹叶十四片煎

按此肺肾脾胃药也

杂方

宝鉴麦门冬汤治消渴日夜饮水不止饮下即洩麦门冬【去心】黄连 冬瓜【各二两】

右?咀每五钱水煎服如无乾者用新者一枚重三斤去皮穰分作十二片为十二服每服一片日三次

酒蒸黄连丸治消渴饮水无度至二三升小便五七十次发热瘦弱口乾食已如饥此名消瘴今用味苦无毒除热正气消渴厚肠消渴之人脾胃恶湿黄连为对

黄连净半斤酒一升汤重蒸伏时晒乾用

右末滴水丸梧子大每五十丸食前温水下

仁斋加味钱氏白术散治消渴不能食

木香 五味子 柴胡【各三分】 藿香【一钱】 乾葛【二钱】 白茯苓 甘草【炙】
白术 人参 枳壳【炒各半钱】

右?咀作一服水煎

宣明大黄甘草饮子治男女一切消渴不能止者大豆【五升煮三沸去苦水】 大黄【一两半】 甘草【四两】

右三味用井水一桶同煮软盛放冷令病人食豆渴饮汁无时候食尽病不尽再如前服不三次愈矣

三因石子荠苎汤治强中多因耽嗜色慾及快意饮食或服丹真气既脱烦渴引水饮食倍常陰气常兴不交精出故虚热注於下焦最为难治

荠苎 石膏【各三两】 人参 茯神

瓜蒌根 磁石【煅淬】 知母 乾葛

黄芩 甘草【各二两】

右剉每水三盞腰子一个去脂膜黑豆一合煮至盞半去腰子大豆入药四钱煎服

秘方用紫背浮萍捣汁每顿服半盏效

丹溪方

黄连末 天花粉末 生地黄汁 生藕汁

右二物汁为膏入上药搜和入牛乳佐以姜汁和蜜汤为膏徐徐留於舌上以白汤少许送下

机要方无天花粉有牛乳汁二汁熬膏和末为丸桐子大每二十丸少呷温水下日进十服

玉机微义卷二十一

卷二十二

钦定四库全书

玉机微义卷二十二 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

水气门

诸经叙水气为病所因

内经曰肾者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其本在肾其末在肺皆积水也帝曰肾何以能聚水而生病岐伯曰肾者胃之关也关门不利故聚水而从其类也上下溢於皮肤故为跗肿跗肿者聚水而生病也故水病下为跗肿大腹上为喘呼不得卧者标本俱病故肺为喘呼肾为水肿肺为逆不得卧

下焦溢为水王注曰下焦为分注之所气窒不泻则溢而为水

肺移寒於肾名曰涌水【云云证见後葶苈丸方下】诸有水气者微肿先见於目下也

针经曰水始起也目窠上微肿如新卧起之状其颈脉动时欬陰股间寒足颈肿腹乃大其水已成矣以手按其腹随手而起如裹水之状此其候也 肢胫者人之管以趋翔也茎垂者身中之机陰精之候津液之道也故饮食不节喜怒不时津液内溢乃下流於辜血道不通日大不休俛仰不便趋翔不能此病荣然有水不上不下也

谨按内经论诸水气皆诸脏本病也针经所引则又主饮食及七情等因皆能致之可见病机之微矣但有湿肿气肿初皆颇相似然以手按之成凹不即起者湿也湿与水有微甚之意况有气肿及诸水形证不同要在临证详审也

脉经叙诸水脉证

病有风水有皮水有正水有石水 寸口脉沈滑者中有水气面目肿大有热或身体反重而酸或恶风一身悉肿脉浮不渴续自汗出而无大热者皆为风水 皮水其脉亦浮外证跗肿按之没指不恶风其腹如鼓不渴当发其汗皮水之为病四肢肿水气在皮肤中四肢聂聂动者防己茯苓汤主之 正水其脉沈迟外证自喘 石水其脉自沈外证腹满不喘

黄汗风水其脉自浮外证骨节疼痛恶风 心水者其身重而少气不得卧烦而燥其陰大肿肝水者其腹大不能自转侧脇下腹中痛时时津液生小便续通

肺水者其身肿小便难时时鸭溇 脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少气小便难

肾水者其腹大脐肿腰痛不得溺陰下湿如牛鼻上汗其足逆冷面又瘦

里水者一身面目黄肿其脉沈小便不利故令病水也 诸有水者腰以下肿当利小便腰以上肿当发汗乃愈按已上论五脏所主见证与诸经论根本不同详见後神金散下宜并详审

论生死脉法

水病脉洪大者可治微细者不可治水病胀闭其脉浮大软者生沈细虚小者死水病腹大如鼓脉实者生虚者死

论水气生於湿热

原病式曰或云水肿者由脾虚而不能制其肾水则水气妄行而脾主四肢故水气游走四肢身面俱肿者似是而实非也夫治水肿腹胀以辛苦寒药为君而大利其大小便也经曰中满者治之于内然则岂为脾土之虚也此说正与素问相反经曰诸湿肿满皆属脾土又曰太陰所主肘肿又曰湿胜则濡泄甚则水闭肘肿皆所谓太陰脾土湿气之实甚也又经曰诸腹胀大皆属于热又云诸肘肿疼酸皆属于火又曰热胜则肘肿皆所谓心火实热而妄得言脾虚不能制肾水之实甚乎故诸水肿者湿热之相兼也如六月湿热太甚而庶物隆盛水肿之象明可见矣故古人制以辛苦寒药治之盖以辛散结而苦燥湿以寒除热而随其利湿去结散热退气和而已所以妄谓脾虚不能制其肾水者但谓数下致之又多水液故也岂知巴豆热毒耗损肾水陰气则心火及脾土自甚湿热相搏则怫?痞膈小便不利而水肿也更宜下之者以其辛苦寒药能除湿热怫?痞膈故也若夫世传银粉之药以治水肿而愈者以其善开怫?痞膈故也慎不可过度而加害尔况银粉亦能伤牙齿者谓毒气感於肠胃而精神气血水谷能胜其毒故毒气循经上行而至齿龈嫩薄之分则为害也上下齿缝者手足阳明之经也凡用此药先当固济尔或云陰水徧身而又恶寒止是寒者非也

丹溪曰诸气膈?皆屬於肺者诸湿肿满皆屬於脾诸腹胀大皆屬於热盖湿者土之气土者火之子故湿病每生於热热气亦能自湿者子气感母湿之变也凡病肿皆以治肿为主所挟不同治法亦异卢砥镜治水胀辨以隶於肾肝胃三经而不及脾下文继以肺金盛生水水液妄行之说岂理也哉夫脾土受病肺为之子焉有自盛而生水者哉若为肿之水果生於肺金之清气则滋长肾陰奉行降令为生化之源何病肿之有今渗透经络注流溪谷皆浊腐之气窒碍津液久久灌入隧道血亦化水而欲藉脾土以制之导肾气以利之不思脾病则肝木来侮子气益衰木寡於畏脾欲不病不可得矣治法宜清心经之火补养脾土全运化之职肺气下降渗道开通败浊之气其稍清者复回而为气为血为津液其败浊之甚者在为上为汗在下为溺以渐而分消矣卢不明言而更曰制水燥水得非白圭以邻国为壑乎

谨按河间论水气主於脾土湿甚为病盖言有余证也但脾虚受湿或湿热自甚不足所致者为甚多故以丹溪之论并及之观者当自审察然脉经论热甚金衰金弃土母而归水水藏火神土亡其子其气衰微水为洋溢浸渍为池走击皮肤面目浮肿归於四肢愚医见水直往下之虚脾空胃水逐居之【云云见本文】此实诸脏之本病也夫水为物元土为物母然物元物母为病则真气危矣故不得妄下之也由是观之则水气之病始非气?饮食湿热诸证所致

者禁不得妄下盖恐真脏为病也是以丹溪宣明肺肾脾之意深备此理

论诸证似水气

发明曰夫脚气之疾实水湿之所为也【云云见湿门】河间曰结阳病主四肢胫肿四肢热胜则肿【云云】

论湿证似水气

详见湿门

谨按湿者水气之渐也故治有轻重所殊尔

论水气缪刺法

内经曰经脉满则络脉溢络脉溢则缪刺之以调其络脉使形容如旧而不肿故曰缪刺其处以复其形也谨按缪刺谓不分隧穴而刺之也故此水热穴论无刺水穴分大法水溢於表或腹胀或四肢虽肿而气稍实脉浮洪者宜行此至病气孤危脉微弱而四肢水气盛实者今人往往缪刺之祸不旋踵盖不审经言脉满络溢宜缪刺之理也

论水气证治大法

内经曰不从毫毛病生於内者陰气内盛阳气竭絕不得入於腹中故言五脏阳以竭也津液者水也充廓皮中陰畜於内水气胀满上攻於肺肺气孤危魄者肺神肾为水害子不救母故云其魄独居也夫陰精损削於内阳气耗减於外则三焦闭溢水道不通水满皮肤身体否肿故云形不可与衣相保也凡此之类皆四肢脉数急而内鼓动於肺中也肺动者谓气急而欬也如是者皆水气格拒於腹膜之内浮肿施张於身形之外欲穷标本其可得乎平治权衡谓察脉浮沈也脉浮为在表脉沈为在里在里者泄之在表者汗之故云开鬼门洁净府也去宛陈莖谓去积久之水物犹如草莖之不可久留於身中也

谨按经论水气证治至为机密故云开鬼门洁净府然鬼门者犹幽玄之谓有毛窍而不见其开阖邪气感入邪与正相搏毛窍闭塞而寒热作为病客於表故宜发汗遣邪气以开鬼门也此亦发汗之别称泄诸病在表之通例也净府者谓膀胱内无入孔而外有出窍为清淨津液之府冯肾气藏气化水谷之精而渗入腠中气约成溺出也夫肾主下焦司开阖关窍二陰肺脾之气通调水道下输膀胱气化水行而自清淨否则便澁或浊或淋为水气溢於腠理为肤肿诸病若宛屈陈莖壅滯於身中当泄去是物而淨洁宜此二法在表者汗之在里者泄之权衡於治也虽然经云水病本之於肺肾二经而古今方论并不以治水独泻肾气为说者何盖肾陰奉行降令为生化之源而常不足至陰精损削於内生气不能运化至为臑肿其气索矣况肺弱而母气孤危者故东垣曰若治以甘淡渗泄阳药独阳无陰其欲化得乎此深撷已上

治例之妙也如积饮留饮伤脾若土之於雨中则为泥矣或因七情所致手足太陰俱病身面浮肿似水气者用燥脾导气之剂即愈一则若泥土之得和风暖日水湿去而阳化自然万物生长一则肺气开泄渗道通利水气不濡於脾矣此正诸湿肿满皆属脾土诸气膹?皆屬於肺而与陰阳为病水气机之不同故亦不待开鬼门洁净府而已也水气治法

发表之剂

金匱越脾汤治风水恶风一身悉肿脉浮不渴续自汗出无大热

麻黄【四钱】石膏【四钱半】生姜【二钱】大枣【二枚】甘草【二钱】

右?咀水煎作一服恶风加附子古今錄验加白术

防己茯苓汤治皮水为病四肢肿水气在皮肤中四肢聂聂动者

防己 黄芪 桂枝【各三钱】茯苓【六钱】甘草【二钱】

右?咀作一服水煎

越脾加术汤治里水 前越脾汤加白术【四钱】

甘草麻黄汤治里水济生云治水肿从腰已上俱肿宜此汗之

甘草【半两】麻黄【一两】

右?咀水煎作一服

麻黄附子汤治水之为病其脉沈小属少陰

麻黄【三钱】甘草 附子【各二钱】

右?咀水煎

黄芪芍药桂枝苦酒汤治黄汗之为病身体肿发热汗出而渴状如风水脉自沈

黄芪【五钱】芍药 桂枝【各三钱】

右?咀水煎入苦酒相和作一服

按已上诸方并足太阳例药也

攻里之剂

仲景十枣汤治水气四肢浮肿上气喘急大小便不通三因方作丸

三花神佑丸

方并见痰饮门

按此并少阴例药也义见痰饮例中

局方神助散治十种水气面目四肢浮肿以手按之随手而起欬喘急不得安卧小便赤澀大便不利椒目【一两半】泽泻 黑牵牛末【各一两】猪苓【二两】葶苈【三两】

右为末每服三钱葱白三茎水煎入酒调服

按此太阴例药也

宣明导水丸治湿热肿满

方见湿门

按此阳明例药也

濬川散

方见湿门

大戟散治水肿腹大如鼓或遍身皆肿

大戟 白牵牛末 木香【等分】

右为细末每服三钱以猪腰子一对批开掺药在内烧熟空心食之如食左腰子左臂塌消右消右如肿不尽於腹边涂甘遂末饮甘草水少许其肿尽去按此并出厥阴例药也

葶苈丸治涌水证如溢囊裹里浆或偏身肿满按腹不坚疾行则濯濯有声或喘欬不定

葶苈【炒】 泽泻 椒目 桑白皮杏仁【炒】 木猪苓【各半两】

右为末炼蜜为丸如梧子大每二三十丸葱白汤下不拘时以利为度

雄黄神金散

雄黄 葶苈【一两糯米和炒熟去米不用】泽泻 椒目【減半】 大戟 巴戟 茯苓
芫花【醋浸一日炒】 甘遂桑白皮【各一两】

右为末空心用井花水调下每一钱加至五钱以利为度忌盐醋生冷油腻之物从脚肿加葶苈

肚肿加椒目 从陰肿加泽泻

面肿加桑白皮 从四肢肿加茯苓从心肿根在助加雄黄
从肢肿根在脾加甘遂从口肿根在小肠加巴戟
从腰肿根在肾加大戟从膝肿根在肝加芫花

按此并太阳例药也宣明论此类方甚多宜选用之

东垣续随子丸治肺经有湿通身虚肿

方见湿门

按此手太陰药也出太阳例

三因消肿丸治水肿喘满小便不利

滑石 木通 白术 黑牵牛【炒】 通脱木 茯苓 茯神 半夏陈皮【各一钱】 木香 瞿麦穗
丁香【各半钱】

右为末酒糊丸梧子大每五十丸灯心麦门冬汤下按此太阳例药也已上诸方世俗多用之
故收入然行者宜斟量其证轻重深浅寒热选使则不致少有差失也

渗泄之剂

五苓散

方见湿门

按此太阳经表之里药也

宣明葶苈木香散

方见湿门

按此太阳手足二经药又表里药也

大橘皮汤治湿热内甚心腹胀水肿小便不利大便滑泄

方见湿门

按此太阳药又气分药也

澹寮五皮散治面目虚浮四肢肿满心腹胀上气喘急陈皮 桑白皮 生姜皮 大腹皮茯苓皮

右?咀每服半两水煎服

按此手足太陰药也出太阳例

拔萃楮实子丸治水气鼓胀洁净府

白丁香【一两】 茯苓【二两】 楮实【一斗五升熬膏】

右为末用膏子为丸梧子大服至小便清利及腹胀消为度後服中治调养药

按此足太阳少陰药也

机要茯苓汤治泄泻後通身肿或肘肿或水气者

方见泄泻门

按此足太阳阳明药也

燥湿之剂

局方平胃散治脾经受湿泄而肘肿

苍术 厚朴 陈皮 甘草【炙】

按此足阳明太陰药也

胃苓汤治脾胃湿胜伤冷泄泻浮肿如水气者

方见泄泻门

按此足太阳太阴药也

济生实脾散治阴水发肿用此先实脾土

厚朴【姜制】 白术 木瓜 木香 乾姜【炮各一两】 草果仁 大腹子 附子 白茯苓
甘草【炙各半两】

右?咀每四钱入姜枣水煎服

按此手足太阳足三阴药也

三因复元丹治脾肾俱虚发为水肿四肢虚浮心腹坚胀小便不通两目下肿

附子【炮二两】 木香 茴香【炒】 川椒【炒】 独活 厚朴 白术 陈皮 吴茱萸【炒】
桂枝【各一两】 泽泻【一两半】 肉苁【煨】 槟榔【各半两】

右为末糊丸如梧子大每五十丸紫苏汤下

按此太阳例药也然脾为太阴肾为少阴阴气既虚故不能化而此药恐不合是理但宜与脾
肾受寒湿为病则可故已上诸方从燥湿例庶名实不紊若前云渗泄者渗为利毛窍泄为利
水窍也

消导之剂

金匱枳术汤

枳实【半两】 白术【二两】

右二味以水五升煮取三升分温三服

杨氏消肿丸治水气腹胀头面四肢阴囊皆肿喘急欬 睡卧不安小便赤澁

淡豉【二两】 巴豆【一两水半升煮去油】 京三棱【泡】 大戟 杏仁【烧存性各半两】
五灵脂【一分】

右为末以生麴和杵千百下丸如菉豆大每五十丸煎桑皮白汤下

东垣中满分消丸治水气热胀

方见痞胀门

温白丸治十种水病

方见积聚门

按已上诸方并太阳例药有轻重不同宜随证选用调理之剂

三因当归散水肿之疾多由肾水不能摄养心火心火遂不能滋养脾土故土制水水气盈溢气脉闭塞渗透经络发为浮肿之疾

木香 赤茯苓 当归 桂

木通 赤芍 牡丹皮 槟榔

陈皮 白术

右等分?咀每半两入紫苏五叶木瓜一片煎服

济生加味肾气丸治肾脾虚损腰重脚肿小便不利白茯苓【三两】 附子【半两】 泽泻 桂

川牛膝 车前子 山药 山茱萸牡丹皮【各一两】 熟地黄【四两】

右为末炼蜜丸如梧子大每七十丸空心米饮下按此二方并出太阳例丹溪曰治水肿脾胃虚者宜行湿利小便使脾气得实则自能健运自能升降运动其枢机则水自行非五苓之行水也切不可下盖慎之也然虽无所出之法学者观此例则思过半矣杂方

严氏涂脐膏治水肿小便絶少

地龙 猪苓【去皮】 针砂【各一两】

右为细末搗葱涎调成膏敷脐中约一寸高阔绢帛束之以小便为度日两易

玉机微义卷二十二

卷二十三

钦定四库全书

玉机微义卷二十三 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

脚气门

辨南方脚气所得之由

孙真人云凡四时之中皆不得久坐久立湿冷之地亦不得因酒醉汗出脱衣跣足当风取凉皆成脚气若暑月久坐久立湿冷之地者则湿热之气蒸人经络病发必热而四肢酸疼烦闷若寒月久坐久立湿冷之地者则湿冷之气上入经络病发则四肢皆酷冷转筋世有勤工力学之士久坐久立于湿地冷风来入经络不觉成病也若欲使之不成病者初觉则灸所觉处二三十壮则愈不复发热黄帝云当风取凉醉以入房能成此疾也

东垣云千金外台总录所录皆谓南方卑湿雾露所聚之地其民腠理疎阳气不能外固因而履之则清湿袭虚病起于下此由血气衰弱受清湿之邪气与血并行於肤腠邪气盛正气少故血气滯滯则痺虚则弱故令痺弱也後人名曰脚气针经云有道以来有道以去治之多以灸炳为佳以导引湿气外出及饮醪醴以通经散邪所制之方寒药少热药多用麻黄川乌姜附之属内经云湿淫于内以苦发之麻黄苦温发之者也川乌辛热走而不能守通行经络姜附辛甘大热助阳退陰亦散清湿之邪又察足之三陰三阳是何经络所起以引用药为主治复审六气中何气客之治以佐使之药孙真人云医者意也随时增损物无定方真知言哉

辨北方脚气所得之由

发明曰异法方宜论云北方者其地高陵居风寒水冽其俗饮潼酪而肉食凡饮潼酪者以饮多速饮为能经云因而大饮则气逆又云食入於陰长气於阳今乃反行陰道是为逆也夫乳酪醇酒者湿热之物饮之属也加以奉养太过亦滋其湿水性润下气不能响故下疰於足胫积久而成肿满疼痛此饮食下流之所致也通评虚实论云谷入多而气少湿居下也况潼酪醇酒之湿热甚於谷者也至真要大论云太陰之胜火气内菀流散于外足胫浮肿饮发於中肘肿于下此之谓也故饮入於胃游溢精气上输于脾脾气散精上归于肺通调水道下输膀胱水精四布五经并行合於四时五脏陰阳揆度以为常也若饮食自倍脾胃乃伤则胃气不能施行脾气不能四布故下流乘其肝肾湿流於足胫加之房事不节阳尽陰盛遂成脚气孙真人云古人少有此疾自永嘉南渡衣冠之人多有之亦此意也按此言北方脚气为脾之湿气下乘加之房事不节而致当作内因处治可谓发病机之秘然南方是证亦莫不为下虚邪

气乘之故也以陈无择所论外感当分风湿寒热内脏虚实所因为治迥出千金之文何此理又不复具焉盖北方此证殊少耳学者审是则又知南方脚气有全非外因者焉於紫苏子等汤例可见

论脚气脉证

严氏曰古无脚气之说内经名厥两汉间名缓风宋齐之後谓之脚气名虽不同其实一也初得不觉因他病乃始发或奄然大闷经三两日方觉之先从脚起或缓弱疼痛或行起忽倒或两胫肿满或足膝枯细或心中忪悸或小腹不仁或举体转筋或见食吐逆恶闻食气或胸满气急或遍体酸疼此其候之不同也其脉浮而弦者起於风濡而弱者起於湿洪而数者起於热迟而濡者起於寒夫脚气皆由肾虚而生然妇人亦病脚气者必因血海虚乘七情遂成斯疾兼今妇人病此者衆则知妇人以血海虚而得之与男子肾虚类矣男女用药固无异但兼以治忧悲药无不效也须量人盛衰微加滋补不然则气血日衰必使年年遇蒸热而作理之必然

陈无择曰脚气不专主一气亦不专在一经故与中风寒暑湿为异耳兼有所杂生诸病未易分别须寻三陰三阳病所在後察脉虚实为治自汗走疰为风胜无汗药急掣痛为寒胜肿满重着为湿胜烦渴热积为暑胜四气兼中者但推其多者为胜分其表里以施治也脉浮为风紧为寒缓细为湿洪数为热见於诸阳在外宜发散沈而弦者亦为风沈而紧者为寒沈细为湿沈数为热见诸陰在内宜温利之若大虚气之间作补汤随病冷热而用之千金方论但备诸证不说陰阳经络所受从何为治

按已上所言脉证但备四气而已至於肿焮发疮泡为湿热热毒之胜肿而重者有湿痰胜或肿或消兼气不升降诸例皆所未详陈云六经证见後各方下论脚气主於水湿

发明曰夫脚气之疾实水湿之所为也盖湿之害人皮肉筋脉而属于下然亦有二焉一则自外而感一则自内而致其治法自应不同故详析而论之其为病也有证而无名脚气之称自晋苏敬始而关中河朔无有也惟南方地下水寒其清湿之气中於人必自足始故经曰清湿袭虚则病起於下或者难曰今兹北方其地则风土高寒其人则腠理致密而复多此疾者岂是地之湿气感之而为邪答曰南方之疾自外而感者也北方之疾自内而致者也【二论见前】其自外而入者止於下胫肿而痛自内而致者乃或至于手节也经曰足胫肿曰水太陰所至为胛肿此但言其自外者也所治之法前人方论备矣自内而致者治法则未有也

谨按前论南北二方脚气之由已颇详尽而发明更具此者大抵言是证主於水湿而成故重宣此义合前二论之旨也自内致者古无其法然观东垣所出数方则意例兼备之矣

论江东岭南瘴毒为脚气

发明曰内经论南方者其地下水土弱雾露之所聚也江东岭南大率如此春夏之交山川蒸

菟风湿毒气为甚足或感之遂成瘴毒脚气其候则脚先屈弱渐至痹疼胫微肿小腹不仁头痛烦心痰壅逆脯作寒热便澼不通甚者攻心而势迫治之诚不可缓支法存所以留意经方偏善此术者岂非江东岭表此疾得之多欤谨按南方温热多陰雨土湿之气因热蒸菟人肤腠故疎豁体虚者多感此疾及有远行足热乃过溪涧为水寒所伤而致者至其传变为证不一况瘴毒乎然近江东证多主於水湿亦有夹风夹寒者其发时则或肿或痛湿热胜者成水泡疮或成赤肿丹毒或如疝气攻上引下皆宜详悉分治

论脚气似伤寒

详见热门病本不同例下

论南方脚气病禁

外台秘要云第一忌嗔嗔则心烦烦则脚气发又禁大语大语则伤肺肺伤亦发动又不得露足当风入水以冷水洗足两脚胫尤不宜冷虽暑月常须着绵袴至冬寒倍令两胫温暖微汗大佳依此将息气渐薄损每至寅丑日割手足甲割少侵肉去气夏时腠理开不宜当风卧睡睡觉令人按按勿令邪气稽留数劳动关节常令通畅此并养生之要拒风邪之法也寻常有力每食後行三五百步疲倦便止脚中恶气随即下散虽浮肿气不能上也

发明云第一凡酒及潼酪勿使过度过则损伤脾胃下疰於足胫肘肿遂成脚气第二慾不可纵嗜欲则脚气发凡饮食之後宜缓行如上法经云逸者行之又云病在脾忌温食饱食湿地濡衣

论脚气疎下

杨太受云脚气之疾自古皆尚疎下为疾壅故也然不可太过太过则损伤脾胃使营运之气不能上行反下注为脚气也又不可不及不及则使气壅不得消散今立三方于後详虚实而用之

按三方医学发明谓导滞汤导引丸除湿丹例是也然亦大略言尔如脚气在表在气血之分而疎下之法可例用乎

论脚气洗渫

活人书云凡脚气服补药及用汤渫洗者皆医之大禁也发明谓此为南方外感湿气乘虚袭入为肿痛而言非为北方内受湿气注下肿痛而言也盖湿气不能外达宜淋渫开导泄越其邪也

论脚气宜砭刺

杨太受云脚气是为壅疾治当以宣通之剂使气不能成壅也壅既成而盛者砭恶血而去其重势经曰畜则肿热砭射之也後以药治之

脚气治法

发表之剂

三因麻黄左经汤治风寒暑湿流注足太阳经腰足挛痹关节重痛增寒发热无汗恶寒或自汗恶风头疼麻黄 乾葛 细辛 白术

茯苓 防己 桂 羌活 甘草 防风

右?咀每半两入姜枣煎服

按此出太阳例治风寒湿之药也

半夏左经汤治足少阳经为风寒暑湿流注发热腰脇疼痛头目眩晕呕吐不食热闷烦心腿痹缓纵不随半夏 乾葛 细辛 白术 麦门冬 茯苓 桂枝 防风 乾姜 黄芩 小草 甘草【炙】 柴胡

右?咀每半两入姜枣煎热闷加竹沥喘急加杏仁桑白皮

按此出少阳例解风寒湿热错杂之邪药也

六物附子汤治四气流注於足太陰经骨节烦疼四肢拘急自汗短气小便不利手足或时浮肿

附子 桂 防己【各四钱】 白术 茯苓【各三钱】 甘草【炙二钱】

右?咀每半两入姜煎

按此出少陰例治寒湿之药也

局方换腿丸治足三陰经为风寒暑湿之气所乘发为挛痹缓纵上攻胸脇肩背下注脚膝疼痛足心发热行步艰辛

薏苡仁 南星 石楠叶 石斛 槟榔 萆薢 川牛膝【酒浸】 羌活 防风 木瓜【各四两】 黄芪 当归 天麻 续断【各一两】

右为末酒糊丸如梧子大每五十丸盐汤下

按此出厥陰例疎风胜湿药也

五积散

方见湿門

按此出太阳例治风寒湿之剂气血药也

东垣当归拈痛汤治湿热为病肢节烦疼肩背沈重胸膈不利兼遍身疼痛下注手足足胫肿痛不可忍者方见疮瘍門

按此出太阳例治湿热之药也

攻里之剂

宣明导水丸治脚气胛肿疼痛或发热湿热盛者按此出阳明例治湿热之药也

除湿丹

方并见湿門

按此出太阳例治湿透机关药也

谨按脚气多系湿热为病世人用已上方每效故收入然下之法详见前疎下论但下後便要收拾如渗之清之升之之法是已学者宜扩充焉

发表攻里之剂

三因大黄左经汤治四气流注足阳明经使腰脚赤肿痛不可行大小便秘或恶闻食气喘满自汗

细辛 茯苓 羌活 大黄【煨】 甘草【炙】 前胡 枳殼 厚朴【制】 黄芩 杏仁【等分】

右?咀每半两入姜枣煎

按此出阳明例治湿热疎风导气药也

加味败毒散治足三阳经受热毒气流注脚踝上焮赤肿痛寒热如疟自汗恶风或无汗恶寒

羌活 独活 前胡 柴胡 枳壳 桔梗 甘草 人参 茯苓 川芎 大黄 苍术 【等分】

右?咀每半两入姜煎

按此出少阳例治风湿热气血药也

东垣羌活导滞汤治脚气初发一身尽痛或肢节肿痛便溺阻隔先以此药导之後用当归拈痛汤

羌活 独活 【各半两】 防己 当归 【各三钱】 大黄 【酒湿煨一两】 枳实 【炒二钱】

右?咀每五钱或七钱水煎服

按此出阳明例治风热之药也

理气之剂

济生槟榔汤治一切脚痛顺气防壅

槟榔 香附子 陈皮 紫苏叶 木瓜 五加皮 甘草 【炙各一两】

右?咀每四钱或半两入姜煎

大腹皮散治诸脚气肿痛小便不利

槟榔 荆芥穗 乌药 陈皮

紫苏叶 【各一两】 萝卜子 【炒半两】 沉香

桑白皮 枳壳 【炒各一两半】 大腹皮 【三两】 木瓜 【二两半】 紫苏子 【炒】

右?咀每半两入姜煎

澹寮方治脚气入腹冲心疼痛肿满大小便秘

沉香 木香 羌活 白芍

槟榔 【各五钱】 甘草 抚芎 青皮 枳壳 【各二钱】 紫苏叶 木瓜 【各一钱半】

苏子【六钱】

右?咀每半两入姜煎

按已上三方因於气滯气壅者可用故收入然不可防壅而服大抵因气者宜取择焉

理血之剂

金匱八味丸治足少陰经脚气入腹腹胀疼痛上气喘急肾经虚寒所致也此证最急以肾乘心水剋火死不旋踵

方见补虚门

按此治陰虚挟寒湿之药也

三因神应养真丹治足厥陰经为四气进袭左癱右痪痰涎半身不遂手足顽麻语言蹇澁脚膝荣气凝滯遍身疼痛

四物内加羌活天麻

右为末蜜丸鸡子大每丸木瓜兔丝子浸酒下按此治血虚挟风湿之剂也

加味四斤丸治足痿无力脚膝疼酸

方见痿

按此治血虚挟风热之剂也

理气血之剂

三因紫苏子汤治脚弱上气陰阳交错清浊不分上重下虚中满喘急呕吐自汗无复纪律

紫苏子【微炒】半夏【各五两】前胡厚朴【制】甘草【炙】当归【各二两】桂心
陈皮【各三两】

右?咀每四钱入枣姜煎服

按此出少阳例血虚气逆者可用

通关透肌骨之剂

三因胜骏丸治元气不足为寒湿之气所袭腰足挛拳脚面连指走痛无定筋脉不伸行步不随常服益真气壮筋骨

附子【一个炮】当归【酒浸一宿】天麻牛膝【酒浸】木香酸枣仁【炒】熟地黄防风【各二两】木瓜【四两】羌活乳香【半两】麝香【二钱】全蝎【炒】没药甘草【炙各一两】

右为末用生地黄三斤研如泥入无灰酒四升煮烂如膏以前药和匀杵令坚每两作十丸每丸细嚼临睡酒下如冬月无地黄炼蜜为丸如梧子大每五十丸服

按此治血虚而风寒湿胜药也气血之剂

疎风养血之剂

独活寄生汤治肝肾虚弱风湿内攻两胫缓纵挛痛痹弱足膝挛重

方见腰疼门

消导之剂

东垣开结导引丸治饮食不消心下痞闷

白术陈皮泽泻茯苓神麴【炒】麦蘖麴半夏【各一两】青皮乾生姜【各半两】枳实【炒】巴豆霜【各一钱半】

右为末汤浸蒸饼丸梧子大每四五十丸或七十丸温水下

按此治内伤饮食脾胃营运之气有亏不能上升下注为脚气故用此导饮行水化脾气也出太阳例然亦有致肿於身腰已上及面者意见水肿论平治法下

杂洗

洗药导气除湿汤

葳灵仙防风荆芥地骨皮当归升麻白芍朔藿叶

右等分剉水二斗煮一斗五升去粗热淋洗无时候

敷药

白芷 苍术 羌活【各半两】

细辛【二钱半】

右为末生姜汁调敷患处

玉机微义卷二十三

卷二十四

钦定四库全书

玉机微义卷二十四 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

诸疝门 【小肠气附】

诸经叙疝脉证

内经曰厥阴脉滑则病狐疝少阴脉滑则病肺风疝太阴脉滑则病脾风疝阳明脉滑则病心风疝太阳脉浮则病肾风疝少阳脉浮则病肝风疝

针经曰心脉微滑为心疝引脐少腹鸣肝脉滑甚为?疝肾脉滑甚为癰?

按发明云夫滑脉关已上见者为大热盖阳与阳并也故大热脉滑尺部见为大寒生?疝滑脉者命门包络之名也为丙丁火并於下盖丙丁不胜壬癸从寒水之化也故生?疝然滑属阴脉也病自内因寒亦与已上证同

难经曰任之为病其内苦结男子为七疝

按滑氏本义曰任脉起胞门行腹故病苦内结男为七疝女为瘕聚也

脉经曰肾脉大急沉为肾疝 肝脉大急沉为肝疝心脉搏滑急为心疝 肺脉沉搏为肺疝 三阴急为脾疝三阴脾脉也 寸口脉弦而紧弦紧相搏则为寒疝 趺阳脉虚迟为寒疝寒疝绕脐痛若发则白汗出手足厥寒

诸经叙小肠气

内经曰小腹控睾引腰脊上冲心唾出清水及为哆噫甚则入心善忘善悲甲乙经曰邪在小肠也小肠病者小腹痛引腰脊贯肝肺其经虚不足则风冷乘间而入邪气既入则冷之证上冲肝肺客冷散於胸结於脐控引睾丸上而不下痛而入腹甚则冲於心胸盖其经络所系属也后玄子曰控引也睾丸阴丸也

谨按寒邪始客於小肠因经络并於厥阴故下控引睾丸为痛虽亦如疝然止言小肠气所以古人治法往往相类但自有所兼之证殊尔

论疝气属寒

原病式曰?疝少腹控卵肿急绞痛也寒主拘缩故也寒极而土化制之故肿满也经言丈夫?疝谓阴器连少腹急痛也故言妇人少腹肿皆肝足厥阴之脉也经注曰寒气聚而为疝也又按经言五脏皆主疝但脉急也注言脉急者寒之象也然寒则脉当短小而迟今言急者非急数而洪也由紧脉主痛急为痛甚病寒虽急亦短小也所以有痛而脉紧急者脉为心之所养也凡六气为痛则心神不宁而紧急不得舒缓故脉亦从之而见也欲知何气为其病者适其紧急相兼之脉而可知也如紧急洪数则为热痛之类也又经言脾传之肾病名曰疝瘕少腹烦冤而痛出白蛊注言少腹痛洩出白液也一作客热内结销烁脂肉如蛊之食故名白蛊也然经之复言热为疝瘕则亦不可止言为寒当以脉证别之

论疝气属湿热

丹溪曰疝痛之甚者睾丸连小腹急痛也或有形或无形或有声或无声自素问以下皆以为寒盖经络得寒收引不行所以作痛世有得寒而无疝者又必有说以通之可也予屡踢水徒涉不曾病此以予素无热也因而思此病始於湿热在经郁遏至久又感外寒湿热被郁而作痛若只作寒论恐为未备或曰此证多客厥阴一经湿热之积何由而致予曰夫劳则火起於筋醉饱则火起於胃房劳则火起於肾大怒则火起於本经火郁之久湿气便盛浊液凝聚并入血隧流於厥阴肝属木性速急火性暴为寒束宜其痛甚而暴也愚见古方以乌头栀子等分作汤用之其效亦速後因此方随形证加减无有不应当又须分湿热多少而治之但肿多为湿?是也却有水气而肿又有挟虚而发者当以参术为君而佐以疎导诊其脉沉紧而豁大者是也若不补剂而行决裂之法祸不旋踵

论疝证有寒有热

发明曰经云三阳为病发寒热下为壅肿及为痿厥?其传为索泽其传为?疝夫热在外寒在内则累垂此九夏之气也寒在外热在内则卵缩此三冬之气也足太阳膀胱之脉逆上迎手太阳小肠之脉下行至足厥阴肝之脉不得伸其任脉并厥阴之脉逆则如巨川之水致阳气下坠是风寒湿热下出囊中致两睾肿大谓之曰疝太甚则为?足厥阴肝之脉与大肠膀胱寒水之脉同至前阴之末伤寒家说足厥阴肝经为病烦满囊缩急下之宜大承气汤以泻大热灵枢经云足厥阴肝经筋中以为寒则筋挛卵缩为大寒前说囊缩为大热此说为大寒此说囊缩垂睾下引?疝脚气为大寒风湿盛下垂为寒与上二说不同

按释云以平康不病之人论之夏暑大热囊卵累垂冬天大寒急缩收上与前三说又不同何也是相乖耶不相乖耶荅曰伤寒家囊卵缩大热在内宜承气汤急下之与经筋说囊卵缩大寒在外亦是热在内与伤寒家同故再引平康之人以证之冬天阳气在内阴气在外人亦应之故寒在外则皮急皮急则囊缩夏月阴气在内阳气在外人亦应之故热在外则皮缓皮缓则囊垂此?疝之象也三说文殊皆一理也用药者详而审之故已上三论各有所主兼此考订则脉证阴阳寒热虚实之异判然矣

论疝分三因

陈无择曰经云七疝诸疝等更不见名状但出寒疝?疝而已唯太奇论列五脏脉为五疝【云云见前】大抵血因寒泣则为瘕气因寒聚则为疝但五脏脉理不同不可不辨且肾脉本沉心脉本滑受寒则急於理乃是肝脉本弦肺脉本濇并谓之沉未为了义又脾不出本脉但云急为疝亦文义之缺也凡云急者紧也紧为寒亦可类推且贼风入腹亦为疝冒暑履湿皆能为疝当随四气【改易急字】风则浮弦暑则洪数湿则缓细於理明要知疝虽兼脏气皆外所因也寒泣风散暑郁湿着绞刺击搏无有定处仓卒之际痛不堪忍世人称为横弦竖弦膀胱小肠气贼风入腹等名义不同证状则一按此辨脉证之异颇详但温寒散风利暑燥湿之方未积备然陈氏具此意盖欲学者自扩充尔

论疝气不宜预补

许学士云大抵此疾因虚得之不可以虚而骤补经云邪之所凑其气必虚留而不去其病则实故必先涤所畜之热然後补是以诸方多借巴豆气者盖谓此也谨按疝证虽始为因虚而得必邪实迫痛而未下故当先泻而後补也至有虚甚迫痛上为吐逆或下有遗精者此邪实正虚之甚矣此欲不补可乎但恐补之则无益泻之则正气转陷幸而获生者鲜矣论疝本肝经宜通勿塞

子和曰疝有七前人论者甚多非灵枢素问铜人之论余皆不取非余好异也但要穷其原耳俗工不识因立谬名或曰膀胱或曰肾俞或曰小肠气立名既谬并丧其实何哉盖医者既断为膀胱肾俞小肠气必曰虚寒所致其药之用也不附子乌头则乾姜官桂之类饵之曾无殊效浸成大错曾无觉者岂知诸疝皆归肝经其奈庸流归之小肠膀胱夫膀胱水府专司渗泄小肠水道专主通流肾为少阴总统二水人之小溲自胃入小肠渗入膀胱膀胱者脬囊也气化则水出茎端此常道也及其为疝乃属足厥阴肝经盖环阴器而上入小肠者足厥阴肝经也夫肝肾皆属于下与冲任督相附然灵枢经言足厥阴肝经病则有遗溺癃闭狐疝主肾与膀胱小肠三经则不言疝是受疝之处乃肝之部分也且内经男子宗筋为束骨之会也而肝主筋辜者囊中之丸虽主外肾非厥阴环而引之与玉茎无由伸缩在女子则为篡户其内外为二其一曰廷孔其二曰竅漏此是厥阴与冲任督之所会也灵枢言足厥阴之经筋聚于阴器其病伤於寒则阴缩入伤於热则纵挺不收治在行卧渍阴器故阳明与太阴厥阴之筋皆会于阴器惟厥阴主筋故为疝者必本之厥阴灵枢又言足厥阴之别名曰蠡沟去内踝五寸别走少阳循胫上辜结於茎其病气逆辜肿卒疝实则挺长虚则暴痒取之所别矣岂非厥阴为受病之处耶灵枢又言邪在小肠连辜系属于肾贯肝络肺心系气盛厥逆上冲肠胃燔肝散於胃结於脐故取之胃原以散之刺太阴以平之取厥阴以下之取巨虚下廉以去之按其所遇之经以调之此其初虽言邪在小肠至其治法必曰取厥阴以下之乃知诸疝关于厥阴可以无疑以脉考之素问论六疝虽见於他脉中皆言风疝者足厥阴肝经之气也灵枢亦云三脏脉之疝皆以滑为疝也三阴急为疝三阳急为瘕王太仆云太阳受寒血凝为瘕太阴受寒气聚为疝此言太阴受寒传之肝经也可以温药逐之不可以温药补之若补之者是欲病去而强挽留之也历考素问三阳为病发寒热其传为?疝此亦言膀胱非受病之处必传於厥

陰部分然後为疝也又言病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒言脉急者曰疝瘕少腹痛凡言少腹者岂非厥陰之部分耶又言脾风传胃名曰疝瘕此谓非肝木不能为风气名曰厥疝盖脾土虚而不能制水又为肝木所凌也又言督脉为冲疝盖厥陰与冲任督俱会於前陰也岂不明哉又尝遍阅铜人俞穴亦相表里惟厥陰言疝独多为疝之主也其它经穴虽亦治疝终非受疝之地但与足厥陰相连耳如运气或在泉寒胜木气挛缩禁於此经或司天燥胜木气抑郁於此经或忿怒悲哀忧抑顿结於此经或药淋外固闭尾缩精壅於此经其病差别如此且夫遗溺闭癃陰痿瘰疬精滑白淫皆男子之疝也不可妄归之肾冷血涸不月月罢腰膝上热足躄噤乾癃闭少腹有块或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不谓七疝而谓之瘕若年少而得之不计男子妇人皆无子故隐蔽委曲之事了不干脬肾小肠之事乃足厥陰肝经之职也奈俗方止言脬肾小肠殊不言肝木一句惑人甚矣且肝经乙木也木属东方为心火之母也凡疝者非肝木受邪则肝木自甚也不可便言虚而补之难经所谓东方实西方虚泻南方补北方此言泻火木自平金自清水自王也七疝下去其病之後可调则调可补则补各量病势勿拘俗法经所谓陰盛而腹胀不通者?癃疝也不可不下

七疝名状

寒疝其状囊冷结硬如石陰莖不举或控辜丸而痛得於坐卧湿地或寒月涉水或置雨雪或坐卧砖石或风冷处使内过劳宜以温剂下之久而无子

水疝其状肾囊肿痛陰汗时出或囊肿而状如水晶或囊痒而操其黄水或少腹中按之作水声得於饮水醉酒使内过劳汗出而遇风寒湿之气聚於囊中故水多令人为卒疝宜以逐水之剂下之有漏针去水者人多不得其法

筋疝其状陰莖肿胀或溃或脓或痛而里急筋缩或莖中痛痛极则痒或挺纵不收或白物如精随洩而下久而得於房室劳伤及邪术所使宜以降心之剂下之血疝其状如黄瓜在少腹两傍横骨两端约中俗云便痛得於重感春夏大燠劳於使内气血流溢渗入脬囊留而不去结成痛肿脓少血多宜以和血之剂下之气疝其状上连肾区下及陰囊或因号哭忿怒则气郁之而胀怒哭号罢则气散者是也有一治法以针出气而愈者然针有得失宜以散气之药下之或小儿亦有此疾俗曰偏气得於父已年老或年少多病陰痿精怯强力入房因而有子胎中病也此疝不治惟筑宾一穴言之

狐疝其状如瓦卧则入小腹行立则出小腹入囊中狐则昼出穴而溺夜则入穴而不溺此疝出入上下往来正与狐相类也亦与气疝大同小异今人带钩铃是也宜以逐气流经之药下之

?疝其状陰囊肿缢如升如斗不痒不痛是也得之地气卑湿所生故江淮之间湫溏之处多感此疾宜以去湿之药下之女子陰户突出虽亦此类乃热则不禁固也不可便谓虚寒而澁之燥之补之本名曰瘕宜以苦下之以苦坚之按已上所论病本经络之原至为详尽但七疝名固不同治法当异然俱用攻下之法愚窃疑马虽仲阳亦曰肝为相火有泻无补丹溪有曰肝

只是有余肾只是不足夫厥陰一经受疝宜通勿塞固宜亦当视其浅深而行之可也况有邪气止客於膀胱小肠之经者若干於少陰肾经则宜通勿塞之法可例用乎诸疝治法

治寒之剂

金匱乌头桂枝汤治寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺诸药不能治者

乌头【蜜一筋煎減半去滓三个】

桂枝【汤煎解蜜半两】

右每服三合不知二合其知者如醉状得吐者为中病也若自汗出脉沉弦者止用乌头煎

按此用桂枝因身疼痛兼表有寒也太阳例药

三因大乌头桂枝汤治风寒疝气腹中刺痛手足不仁身体拘急不得转侧或致陰缩

大乌头【五个去皮尖蜜煎过洗切】 桂心白芍【各三钱】 甘草【一钱】

右?咀每四钱入姜枣煎

补肾汤治寒疝入腹小腹疼痛时复泄泻胸膈痞塞人参 茯苓 黄芪

附子【炮】 白术【各一两】 沉香【四钱】 木瓜【一两半】 羌活【半两】 甘草【炙】
川芎【各二钱】 紫苏【三钱】

右?咀每三四钱入姜枣煎

局方夺命丹治远年日近小肠疝气偏坠搔痒脐下撮痛以致闷乱及外肾肿硬日渐滋长陰间湿痒抓成疮

吴茱萸【淨一筋四两用酒醋汤童便各浸过一宿焙乾】 泽泻【二两】

右为细末酒煮麪糊丸如梧子大每五十丸空心盐汤下

茱萸内消丸治肾经虚弱膀胱为邪气所搏结成寒疝陰?偏大

山茱萸【去核】 陈皮 吴茱萸 马蔺花木香 肉桂 山药 川楝子 青皮 茴香

右为末酒糊丸如梧子大每五十丸空心温酒送下

百一选方十补丸治小肠寒疝

附子【一两用防风一两剉盐四两黑豆一合同炒取附子去皮尖用】葫芦巴 木香 巴戟肉
川楝肉 官桂 玄胡

萆澄茄 舶上茴香 破故纸【炒各一两】

右为末糯米粉酒打糊丸梧子大朱砂为衣每五十丸空心酒下

葫芦巴丸治小肠气蟠肠气奔豚疝气偏坠陰肿小腹有形如卵上下来去痛不可忍或绞结
遶脐攻刺呕吐者

葫芦巴【炒一筋】大巴戟【炒六两】川楝子【炒一筋二两】吴茱萸【汤洗七次炒十
两】川乌【炮去皮六两】茴香【二十两炒】

右末酒糊丸梧子大每十五至二十丸空心温酒下按此与前方加減不同故两存之

宝监沉香桂附丸治中气虚弱其脾胃虚寒脏腑积冷心腹疼痛手足厥逆冷便利无度七疝
引痛不可忍喜热熨少缓者

沉香 附子【炮】川乌【炮】乾姜【炮】良姜 官桂
吴茱萸【汤炮去苦水】茴香【炒各一两】

右为末好醋煮糊丸梧子大每五十丸至七八十丸空心米饮下

按已上诸方并太阳例药然初感寒邪所至或素虚寒之人宜此劫之皆可但久病者多有湿
热寒湿血虚等证之变而用者自宜详审

治湿之剂

元戎加味五苓散治疝气卒痛小便澀

本方加川楝【一分】

右为末空心米饮调下一二钱

按此渗泄之剂也

攻下之剂

局方三白散治膀胱蕴热湿热相乘阴囊肿胀大小便不利

白牵牛【二两】桑白皮【炒】木通白术陈皮【各半两】

右末每二钱姜汤调下空心服

复元通气散

舶上茴香川山甲【蛤粉炒各二两】陈皮牵牛末【炒】玄胡
甘草【炒各一两】木香【一两半】

右细末每一大钱热酒食前调下

戴人禹功散

黑牵牛【头末四两】茴香【炒一两】

右为末以生姜自然汁调一二钱临睡服或加白术一两

宝监控引辜丸治小肠病结上而不下痛引心臆茴香川楝实【各炒】石茺萸
陈皮马蔺花【醋炒各一两】芫花【醋炒半两】

右为末醋糊丸梧子大每十丸至二十丸空心温酒送下

茴香楝实丸治阴疝痛不可忍及小肠气痛

川楝【炒】茴香【炒】山茺萸石茺萸吴茺萸青皮陈皮
芫花【醋炒】马蔺花【各等分】

右为末醋糊丸梧子大每二十丸温酒送下食前服

天台乌药散治小肠疝气牵引脐腹疼痛

乌药木香茴香【炒】青皮

良姜【炒各半两】槟榔【二个】川楝【十个】巴豆【七十粒】

右先以巴豆微打破同川楝麩炒黑去麩及巴豆不用外余药同末酒调下一钱甚者姜酒亦得

按已上诸方并下气之药也治寒之例宜随轻重取择

湿热之剂

济生葵子汤治膀胱实热腹胀小便不通口舌乾燥赤茯苓 猪苓 葵子 枳实

瞿麦 木通 黄芩 车前子滑石 甘草【等分】

右?咀每半两入姜煎空心服

按此八正散加減法也永类铃方例为治疝之剂颇有理故收入

子和导水丸

方见湿门

按此阳明例药也然湿热郁结於下焦非此莫能疗气血皆可用

冷热之剂

宝监蒺藜汤治陰疝疼痛

蒺藜【去刺】 附子【炮】 梔子【去皮各半两】

右为末每三钱水煎食前温服

丹溪方定疝气疼痛速效

枳殼 山梔子 唐球子

吴茱萸【皆炒过】 荔枝核

右为末用长流水调下一二钱空心服

又方治阳明受湿热传入太阳恶寒发热小腹连毛际结核闷痛不可忍

梔子【炒】 桃仁【炒】 枳殼【炒】

唐球子【等分】

右为末於砂鉢内入姜汁用水一鍾蕩起煎热服按已上太阳例药也

理气之剂

局方蟠葱散治寒疝气疝冲心疼痛

玄胡 苍术 甘草【各半筋】 茯苓蓬术 三棱 青皮【六两】 丁皮

砂仁 槟榔【各四两】 桂 乾姜【二两】

右为末每服二钱入连须葱一茎水煎空心服

盐煎散治冷疝寒气卒痛

草果 砂仁 槟榔 厚朴

肉豆蔻 羌活 苍术 陈皮

萆澄茄 枳殼 良姜 茯苓

茴香 大麦蘖 川芎 甘草【各二两】

右?咀或散每半两水煎入盐少许

按此二方并燥脾导气之药劫剂也世俗多用之故收入

宝监川苦楝散治小肠气痛不可忍

广木香 茴香【盐一捻炒去盐各一两】

大川楝子【一两剉用巴豆十粒破皮同炒黄去巴豆】

右为细末每二钱温酒一盞空心调下

按此导手太阳寒气之药较之前二方治疝此殊有理

理血之剂

金匱当归生姜羊肉汤治寒疝腹中痛及脇痛里急

当归【三两】 生姜【五两】 羊肉【一筋】

右三味以水八升煮取三升温服七合日三若寒多加生姜呕者加陈皮二两白术一两

蜘蛛散治陰狐疝气偏有大小时时上下

蜘蛛【十四枚?焦】 桂枝【半两】

右二味为散取八分匕饮和服日再服蜜丸亦可

三因失笑散治小肠气痛

五灵脂 蒲黄【等分】

右为末每二钱先用醋一合熬成膏水一盏煎理气血之剂

本事方立效散

川芎 川楝子 青皮

舶上茴香 牵牛【炒】 桃仁【各一两】

右为末每二钱无灰酒一盏煎食前温服

三因葱白散治一切冷疝疼痛

川芎 当归 枳殼【炒】 厚朴【炒】 官桂 青皮 乾姜 茴香【炒】 茯苓 川楝子
麦蘖【炒】 神麴【炒】 三棱【炮】 莪术【煨】 熟地黄 白芍 木香 人参【各一两】

右?咀每三钱葱白二寸盐少许水煎空心服

东垣丁香楝实丸治男子七疝痛不可忍妇人瘕聚带下皆任脉所主陰经也乃肾肝受病故
治同法当归 附子【炮】 茴香【炒】 川楝【各一两】

右剉细用好酒三升同煮尽为度焙乾作细末每药末一两入

丁香 木香【各半钱】 玄胡索【五钱】 全蝎【十三个】

右为末入在前药末内拌匀酒糊丸梧子大每三十丸加至百丸空心温酒送下

按已上方与前理血之剂并厥陰例药也然诸经论疝主於风盖指厥陰风木之气尔故疝病则多痛痛亦木气之实即风象也但古今方多主寒主气论治然行者不察气寒浅深之异以分治则不能不无差悞也观东垣之法庶几近理大抵亦不可视为常例盖肾恶燥恐久则反增其势矣

熨法 严氏云盐半筋炒极热以故帛包熨痛处

一法用葱白泥一握置脐中上用熨斗熨之或上置艾灼之妙

玉机微义卷二十四

卷二十五

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷二十五 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

反胃门 【噎膈同附】

反胃脉法

难经云脉格则吐逆 见淋闾门

脉经云紧而滑者吐逆小弱而濡胃反

千金云寸紧尺濡其人胸满不能食而吐吐止者为下之故不能食设言未止者此为胃反故尺为微濡

叙吐脉证

金匱云病人脉数数为热当消谷引饮而反吐者以发其汗令阳微膈气虚脉乃数数为客热不能消谷胃中虚冷故也脉弦者虚也胃气无余朝食暮吐变为胃反寒在於上医反下之今脉反弦故名曰虚

趺阳脉浮而濡浮则为虚濡则伤脾脾伤则不磨朝食暮吐暮食朝吐宿谷不化名曰胃反脉紧而濡其病难治

论膈噎治病之因

丹溪云胃为水谷之海脾为消化之器清和则健而运行世人以痰饮呕吐诸气多服香热之药偏助气血沸腾其始也胃液凝聚其久也脾气耗败传化渐迟又以乌附丹剂服之积久血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水饮可行食物难入间或可入入亦不多名之曰噎其槁在下与胃为近食虽可入难尽入胃良久复出名之曰膈亦曰反胃大便秘小若羊屎然名虽不同病出一体或曰千金治噎膈反胃未尝废姜桂等药何吾子之多言也予曰气之郁滞久留清道非借香热不足以行然悉有大黄石膏竹茹芒硝泽泻前胡朴硝茯苓黄芩芦根瓜

萎等药为之佐使其始则同其终则异也病邪易伏其病自安

论五噎五膈

严氏云【三因同】五噎五膈者由喜怒不常七情伤於脾胃郁而生痰痰与气搏升而不降饮食不下盖气留於咽嗌者则成五噎结於胸膈者为五膈五噎之名忧思劳食气也五膈之名忧恚寒热气也其病令人胸膈痞闷呕逆噎塞妨碍饮食治法调顺陰阳化痰下气陰阳平匀气顺痰下则病无由而作矣

按膈噎之证皆由气聚成积自积成痰痰积之久血液俱病以其为病在咽在膈故前人立膈噎二者之名三因方又分五噎五膈病状徒有其名为治则一而已故不叙焉又严氏为化痰下气之说夫气之不下痰之不化必有为病之因苟不治其本而专以香燥之药治其标痰气何由而自下也

论三阳结为膈病

子和云内经曰三阳结谓之膈三阳者大小肠膀胱也结谓热结也小肠热结则血脉燥大肠热结则不圉膀胱热结则津液涸三阳既结则前後闭澹下既不通必反上行所以噎食不下纵下而复出也此阳火不下推而上行也故经曰少阳所至为呕涌溢食不下此理明矣後世强分为十膈五噎其????既多其惑滋甚人之溢食初未遽然也或伤酒食或胃热欲吐或胃风欲吐医者不察本原投下香桂胡椒丁香之属设如伤酒伤食正可攻逐岂可言虚便将热补素热之人三阳必结食必上潮医氏犹云胃寒不纳燔针灼艾三阳转结岁月弥深遂成噎病世传五噎寬中散有姜有桂十膈散有附有乌其可用乎今代刘河间治膈气噎食承气三汤独超近代用药之时更详轻重假如闭久宜先润养小着汤丸累累加之关扃自透其或咽噎上阻痰涎微用酸苦涌出因而治下药势易行设或不行蜜盐下导结散阳消饮食自下莫将巴豆耗却天真

按此论三阳结为膈病力开世俗言胃冷用热药之误可谓明矣但用药专指承气而言则失之太峻盖此药有实热者可用之其有脾胃衰虚并血液枯竭之人皆在所禁也

论噎为诸气所致

鍼经曰怒气所至食则气逆而不下劳气所至为咽噎病为喘促思气所至为中痞三焦闭塞为咽噎不利

论噎塞由陰中伏阳所致

发明曰噎者六腑之所生阳也气也塞者五脏之所生陰也血也二者皆由陰中伏阳而作也

谨按噎为七情所发或因三焦传化失常所致此即主於气也或血液所亏胃脘乾槁或血积所致即皆因於血也塞由填塞不通之义故发明有治幽门不通噎塞不便通幽汤例盖阳无陰不能施化陰之失位而阳伏其中传化不变而反上行矣然人有所击扑坠跌内致血瘀忽即吐而食不能纳此由气血俱伤所可见也大抵始由气致者初当从气治之由血致者当从血治之岂可类用香热之剂反耗气血耶但世俗拘泥不能究乎病情遂成危证也悲夫治吐分三焦法

病机云治吐有三气积寒也皆从三焦论之上焦吐者皆从於气气者天之阳也其脉浮而洪其证食已暴吐渴於饮水火便燥结气上冲胸发痛其治当降气和中中焦吐者皆从於积有陰有阳食与气相假为积而痛其脉浮而匿其证或先痛而後吐或先吐而後痛治法当以小毒药去其积槟榔木香行其气下焦吐者皆从於寒地道也其脉沉而迟其证朝食暮吐暮食朝吐小便清大便秘而不通治法当以毒药通其闭塞温其寒气大便渐通复以中焦药和之不令大便秘结而自愈也

按此分三法治吐以上焦为阳阳主热下焦为陰陰主寒中焦为寒热相半之分有陰而有阳此亦大略之法耳盖以其在上者则食已而暴吐在下者则食久而始吐久暴之间所以为寒热之别难专以上下为寒热之别也王冰曰食不得入是有火也食入反出是无火也与此同意又原病式曰呕涌溢食不下火气炎上胃膈热甚则传化失常故也

论治噎之法并治验

丹溪曰或云胃脘乾槁其治可得用乎予曰古方用人参以补肺御米以解毒竹沥以清痰乾姜以养血粟米以实胃蜜以润燥正是此意张鸡峯亦曰噎当是神思间病惟内观自养可以治之此言深中病情治法亦为近理夫噎病生於血乾夫血陰气也陰主静内外而静则脏腑之火不起而金水二气大胜陰血自生肠胃津润传化合宜何噎之有因触类而长之曾制一方治一中年妇人以四物汤加和白陈皮去皮留尖桃仁生甘草酒红花浓煎入驴尿饮以防其或生虫也与数十贴而安又台州一匠者年仅三十勤於工作而有艾妻且喜酒面白其脉濇重则大而无令谢去工作卧於牛家取新温牛乳细细呷之每顿尽一杯一昼夜可五七次尽却食物以渐而至八九次半月大便润月余而安或口乾盖酒毒未解间饮甘蔗汁少许或又曰古方治膈噎未有不寒者何也予曰古人着方必为当时抱病设也其证实因於寒故用之得效非以为定式也但今人为染此病率因痰气久得医药传变而成其为无寒也明矣

谨按反胃之证其始也或由饮食不节痰饮停滯或因七情过用脾胃内虚而作古方不察病因悉指为寒用香燥大热之药治之夫此药止能逐寒邪行滯气其於饮食痰积岂能祛逐七情之火反有所炽脾胃之陰反有所耗是以药助病邪日以深痼其中病情丹溪先生言之详矣夫治此疾也咽噤闭塞胸膈痞闷似属气滯然有服耗气药过多中气不运而致者当补气而自运大便燥结而羊矢似属血热然服通利药过多致血液耗竭而愈结者当补血润血而自行有因火逆冲上食不得入其脉洪大有力而数者或痰饮阻滯而脉结濇者当清痰泄热

其火自降有因脾胃阳火亦衰其脉沉细而微者当以辛香之药温其气仍以益陰养胃为之主非如局方之惟务燥烈也若夫不守戒忌厚味房劳之人及年高无血者皆不能疗也

反胃治法

和中利痰散气之剂

金匱大半夏汤治胃反呕吐者千金云治反胃不受食食入即吐

半夏【二升】 人参【三两】 白蜜【一升】

千金有白术生姜

右以水一斗二升和蜜扬之二百四十遍煮药取一升半温服一升後再服

茯苓泽泻汤治胃反吐而渴欲饮水者

茯苓【半筋】 泽泻【四两】 甘草 桂枝【各二两】 白术【三两】 生姜【四两】

右水一斗煮取三升内泽泻再煮取二升半温服八合日三外台有小麦一升

按已上二方兼出太陰呕吐啰例药也

病机和中桔梗汤治上焦气热上冲食已暴吐脉浮而洪

桔梗【一两半】 半夏麴【二两】 陈皮【去白】

枳实【炒】 白茯苓【各一两】 白术【一两半】 厚朴【一两姜制】 煮法如前

右?咀每服一两取清温调木香散二钱隔夜空服三服之後气渐下吐渐止然後去木香等末每料中加芍药二两黄芪一两半服之病愈即已如大便燥硬食不尽下以大承气汤去硝微下之少利为度再服前药补之

木香散方槟榔木香各等分为末

按此太陰阳明经药也

治风木之剂

病机青镇丸治上焦吐头发痛有汗脉弦

柴胡【二两】 黄芩【七钱半】 甘草【半两】 青黛【二钱半】 人参【半钱】

右为细末姜汁浸蒸饼为丸如桐子大每服五十丸生姜汤下食後服

按此少阳经药也

金花丸治吐食而脉弦者由肝乘於脾而吐宜治风安脾

半夏【一两】 槟榔【二钱】 雄黄【二钱半】

右细末如上法丸姜汤下从少至多渐次服之按此厥陰例药也青镇丸治肝火之药金花丸治风痰乘於脾胃之药故总入风木之剂

治热踈下之剂

金匱大黄甘草汤治食已即吐者

大黄【四两】 甘草【一两】

右水三升煮取一升分温再服

按此出太陰呕吐哕例药也

病机荆黄汤治暴吐者上焦热气所冲也脉浮而洪荆芥穗【一两】 人参【五钱】
甘草【二钱半】 大黄【三钱】

右粗末都作一服水煎去滓调槟榔散二钱空心服

槟榔散方槟榔二钱木香一钱半轻粉少许为丸亦可按此厥陰阳明太阳经药也

发明人参利膈丸治胸中不利痰嗽喘满利脾胃壅滯治膈气圣药

木香 槟榔【七钱半】 人参 当归 藿香【一两】 甘草
枳实【各一两】 大黄【酒浸】 厚朴【制二两】

右为末滴水丸桐子大温水送下

按此太陰阳明经药也

治寒之剂

病机紫沉丸治中焦吐食由食积与寒气相假故吐而痛

半夏麴 代赭石 砂仁【各五钱】 杏仁沉香 木香 白术【各一钱】 乌梅肉丁香
槟榔【各二钱】 橘皮【二钱】 肉果巴豆霜【各半钱另研】

右为末入巴豆霜令匀醋糊为丸如黍米大每服五十丸食後柿霜汤下吐愈则止

按此太陰阳明经药也

厚朴丸主翻胃吐逆饮食噎塞气上冲心腹中结疾厚朴
黄连【二两半】 吴茱萸【汤洗七次】

紫苑 菖蒲 柴胡 桔梗

茯苓 皂角【炙】 桂【刮】 乾姜【炮】

巴豆霜【另研】 蜀椒【炒出汁】 人参【各半两】

川乌头【炮去皮脐二两半】

右为细末入巴豆霜匀炼蜜为剂旋丸桐子大每服三丸渐次加之以利为度姜汤下春夏加
黄连二两秋冬加厚朴二两

按此太陰阳明厥陰经药也

理气之剂

严氏五噎散治五噎食不下呕哕痰多咽喉噎塞人参 半夏 桔梗【炒】 白豆蔻木香
枳头糠 白术 毕澄茄沉香 枇杷叶 乾生姜【各一两】 甘草【炙半两】

右细末每服二钱入生姜七片煎服

五膈散治五膈胸膈痞闷诸气结聚肋脇胀满痰逆恶心

枳殼【炒】 木香 青皮 大腹子白术 半夏麴【炒】 丁香 天南星乾姜【炒】
麦蘖【炒】 草果仁【各一两】 甘草【炙半两】

右细末每服二钱水煎入姜

局方五膈宽中散治七情四气伤于脾胃以致胸膈痞满停痰气逆遂成五膈之病

青皮 陈皮

丁香【各四两】厚朴【制一筋】甘草【炙五两】白豆蔻【一两】香附子【炒】
砂仁木香【各三两】

右为末每服二钱姜盐汤点服

按已上三方并太阴阳明经药也

谨按反胃诸方古方悉是香燥大热之药皆不足为法今姑存其一二至於丹溪所言补血益
陰润燥和胃调中等药虽无其方自宜随证用之观其立论则思过半矣

杂方

烧针丸

方见小儿门

玉机微义卷二十五

卷二十六

钦定四库全书

玉机微义卷二十六 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

胀满门

诸经叙胀所因

鍼经曰夫胀者皆在于脏腑之外排脏腑而廓胸脇胀皮肤故命曰胀或厥气在下荣卫留止寒气逆上真邪相攻两气相搏乃合为胀也

按论中备五脏六腑发胀为诸证宜玩本文

内经曰诸腹胀大皆属於热 腹满?胀支鬲脇脇下厥上冒过在太陰阳明乃寒湿郁遏也

原病式曰腹胀大鼓之如鼓气为阳阳为热气甚则如是也

脉法

针经曰其脉大坚以濇者胀也

脉经曰关上脉虚即胀内 迟而滑者胀 脉盛而紧者胀

严氏曰胀脉浮者易治虚者为难

论胀分三因

陈无择云脏气不平胜乘相因为病如怒伤肝肝剋脾脾气不正必胀於胃名曰胜剋怒乘肺肺气不传必胀於大肠名曰乘剋忧思结聚本脏气郁皆内所因或冒寒暑风湿随经络传至阳明致胀者属外因饮食饥饱生冷甜膩聚结不散或作胚块膨胀满闷属不内外因也

按此论肝木胜乘脾肺为胀满即东垣所谓脾胃之上不足火木大胜致胀也此不言火况怒伤肝者岂无火动耶所出大半夏汤以桂附中加参归以调血气言其脉弦迟恐非肝气剋脾脏闭腑郁病也论腹胀属湿

内经云太陰所至为畜满又云太陰所至为中满霍乱吐下又云诸湿肿满皆属脾土

按发明辨云脾为陰中之太陰又云脾为陰中之极陰乃为坤元亘古不迁之土天为阳也火也地为陰也水也在人则为脾同陰水之化脾有余则腹胀食不化故无阳则不能化五谷脾盛乃大寒为胀满故脉经云胃中寒则胀满大抵此病皆水气寒湿为之也治宜大辛热之剂如土久於雨水中则为泥矣岂能生化万物必待和风暖日湿去阳生自然长生矣脾湿有余无阳则不能化五谷所以宜辛热治之必愈然亦有轻重

论腹胀有热有寒属外感

东垣曰经云诸腹胀大属热此乃八益之邪有余之证自天外而入感风寒之邪传入于里寒变为热作胃实日晡潮热大渴引饮谵语是太阳阳明併病大实大满者大承气汤下之少阳阳明微满实者小承气汤下之五常正大论云下之则胀已是也假令痃疟为胀满亦有寒胀热胀是天之邪气伤暑而得之不即时发至秋暑气衰絕而疟病作矣知其寒也局方交加饮子是也岂不闻素问及灵枢经中说内虚不足中寒湿令人中满及五脏六腑俱有胀满更以胀家寒热多少较之胃中寒则胀满陰阳应象论云浊气在上则生?胀针经云胀取三阳三阳者足太阳膀胱寒水为胀与通评虚实论中说腹暴满按之不下取太阳经者胃之募正同五脏生成论云腹满?胀【云云见前】胃中寒湿菀遏故也脉经所谓胃中寒则胀满也又厥论云太陰之厥则腹满?胀後不利不欲食食则呕不得卧按所说寒胀多如此汤液醪醴论中说中满治法当开鬼门谓发汗也洁净府利小便也又云中满者泻之於内谓脾胃有病当今上下分消其气下焦如渌气血自然分化不待泄滓秽如或大实大满大小便不利从权以寒热药下之

论腹胀属内伤所致

东垣曰或伤酒湿麪及味厚之物膏粱之人或食已便卧使湿热之气不得施化致令腹胀满此亦是热胀调经篇云因饮食劳倦损伤脾胃始受热中末传寒中皆由脾胃之气虚弱不能运化精微而致水谷聚而不散而成胀满此寒湿郁遏而胀也醪醴论中治法谓先泻其血络後调其真经气血平阳布神清此治之正也或曰诸腹胀大皆属於热者何也此乃病机总辞假令外伤风寒有余之邪自表传里寒变为热而作胃实腹满仲景以承气汤治之亦有膏粱之人湿热郁於内而成胀满者此热胀之谓也大抵寒胀多而热胀少治之者宜详辨之

论鼓胀属湿热

丹溪曰心肺阳也居上肾肝陰也居下脾居中亦陰也属土经曰饮食入胃游溢精气上输於脾脾气散精上归於肺通调水道下输膀胱水精四布五经并行是脾具坤静之德而有乾健之运故能使心肺之阳降肾肝之陰升而成天地交之泰是为一平人今也七情内伤六淫外侵饮食不节房劳致虚脾土之陰受伤转运之官失职胃虽受谷不能运化故阳升陰降而成天地不交之否清浊相混隧道壅塞郁而为热热留为湿湿热相生遂成胀满经曰鼓胀是也

以其外虽坚满中空无物有似於鼓胶固难治又名曰蛊若虫侵蚀之义理宜补脾又须养肺金以制木使脾无贼邪之患滋肾以制火使肺气得清却厚味断妄想远音乐无有不安医者不察急於作效病者苦於胀急喜行利药以求通快不知觉寛得一日半日其肿愈甚病邪甚矣真气伤矣古方惟禹余粮丸又名石中黄丸又名紫金丸制肝补脾殊为切当亦须随证加减用之予友俞仁叔连得家难年近五十得此疾自制禹余粮丸服之其脉弦濇而数予曰此丸新制煅炼之火邪尚存温热之药太多宜自加减不可执方俞笑曰此方不可加减服之一月口鼻见血色黑骨立而死又杨兄年近五十性嗜酒病疰半年患胀诊其脉弦而濇重则大疰未愈手足瘦而腹大如蜘蛛状予教以参术为君当归川芎芍药为臣黄连陈皮茯苓厚朴为佐生甘草些小作浓汤饮之一日定三次彼亦严守戒忌一月後疰愈又半年小便长而胀愈中间须稍有加减大意只是补气行湿又陈氏年四十余性嗜酒大便时见血春间患胀色黑而腹大形如鬼状脉数而濇重似弱以四物汤加连芩木通白术陈皮厚朴生甘草作汤与之一月而安一补气一补血余药大率相出入皆获安或曰气无补法今何补气而获安予曰气无补法俗论也痞闷壅塞似难於补不思正气虚者不能自运经曰壮者气行则愈弱者则着而成病若不补气邪何由行或曰子之药审矣何効之迟也病者将厌子之迂而求速效矣予曰此病之起或三五年或十余年根深势笃难求速効知王道者能治此病或曰胀病将终不利耶予曰灼知其不虚病浅胃壮积滞不痼而又有可下之证矣

按此论七情内伤六淫外侵致胀合东垣所谓八益之邪有余之证自外入也内伤劳倦虚损脾胃等致不足之证自内生也可见虚实之殊寒热病机互有则用药当有所据矣

论胀为诸气所致

详见气证门

论胀为诸积所致

陈无择云五积久而必心腹胀满但内所因不待成积即致也亦当随其脏气而平治之

谨按胀满属寒或内伤或诸气或因病数服通利药脾胃虚而致者为甚多属湿热者少至积成者亦甚有之但古方多不分治如禹余粮丸类燥热气血之剂於内郁之火岂得不反有所助耶夫治是疾遇大实满燥实痞闭气滞或始由内伤脉洪实者非下之不可然有服下剂过多或泻痢後所至或素脾胃虚弱不能运化而成者皆宜补脾行湿盖此际正气已衰矣况积而胀乎故云平治之又如血畜血瘀致者当从血药治之寒者热之热者寒之结者散之清浊混者分消之或升降其气或消导皆宜适事为故可也

论浊气在上则生?胀

内经云清气在下则生飧泄浊气在上则生?胀此陰阳反作病之逆从也发明曰夫?胀者以寒热温凉论之此何胀也曰此饮食失节为胀乃受病之始也湿热亦能为胀右关脉洪缓而

沉弦脉浮於上是风湿热三气相合而为病也是脾胃之令不行陰火亢甚乘於脾胃盛则左迂而阳道不行是六腑之气已絶於外大盛能令母实风气外絶风气外絶者是谷气入胃清气营气不行便是风气也异呼同类即胃气者是也经云虚则兼其所胜土不胜者肝之邪也是脾胃之土不足火木大胜者也经云浊陰出下窍浊陰走五脏浊陰归六腑浊陰归地此平康不病之常道反此则为胀也经云饮食不节起居不时者陰受之陰受之则入五脏入五脏则满闭塞调经论云下脘不通则胃气热热气熏胸中故内热下脘者幽門也人身之中上下有七冲門皆下冲上也幽門上冲吸門吸門者会厌也冲其吸入之气不得下归於肾肝为陰火动相拒故咽膈不通致浊陰之气不得下降而大便乾燥不行胃之湿与客陰之火俱在其中则腹胀作矣治在幽門使幽門通利泄其陰火润其燥血生益新血幽門通利则大便不闭吸門亦不受邪其膈咽得通?胀腹满俱去矣是浊陰得下归地矣故经曰中满者泻之於内此法是也

论下之则胀已

发明曰西北二方地形高寒经曰陰者其精奉於上其寒在外故曰寒则气浮知陰之寒凉西北二方之气为主用也异法方宜论云北方之人脏寒生满病亦谓适寒凉者胀皆秋冬之气也在人则为肺肾冬天之时寒凉在外六阳在於坤土之中坤土者人之脾胃也五脏之病外寒则必内热脉经所谓五脏脉小皆为消瘴之病消瘴者消谷善饥北方之地无不能食者此也陰胜阳虚下之则愈正谓此也病机云诸腹胀大皆屬於热下之则胀已此理悉矣

谨按胀主下之一法亦大略言尔故出方宜之论若泛用之多往往腹胀是失运化之职也然是证虽主於下盖病因寒热积湿气血机本不同於治可不为分例云

胀满治法

调理之剂

局方紫沉通气汤治三焦气滯不能宣通腹胀便滯

方见气证門

济生紫苏子汤治忧思多度致伤脾胃心腹胀满喘促烦闷肠鸣气走漉漉有声大小便不利脉虚紧而濇苏子【一两】 大腹皮 草果仁 半夏

厚朴【制】 木香 陈皮 木通

白术 枳实 人参 甘草【各半两】

右?咀每四钱入姜枣煎

按此二方手足太陰之剂也

三因大半夏汤治肝气不平胜尅於脾脾郁不行结聚涎沫闭於脏气腑气不舒胃则胀满其脉弦迟故知中虚胃冷胀满服此可下气进食

半夏【洗】 桂心【各五钱】 附子 人参

甘草【炙】 厚朴【制】 当归 茯苓

枳实【炒各三钱】 川椒【炒八十粒】

右剉每四大钱入姜枣煎

禹余粮丸治中满气胀喘满及水气胀

蛇含石【三两煨】 真针砂【五两】 禹余粮【三两同上砂炒】

已上三物为主其次量人虚实入下项药

木香 牛膝 蓬术【炮】 白蒺藜 桂心 川芎 白豆蔻 茴香【炒】 三棱 羌活 茯苓 乾姜

青皮 陈皮 附子【炮】 当归【各半两】

右为末拌匀以汤浸蒸饼去水捣匀丸如梧子大每五十丸空心温酒下

按此治寒胀消积药也气血之剂陰阳之气下陷者可用故存之与前方并足太陰例

东垣木香顺气汤治浊气在上则生?胀

木香【三分】 厚朴【四分】 青皮 陈皮

益智仁 茯苓 泽泻 乾生姜 半夏 吴茱萸【汤洗各二分】 当归【五分】 升麻 柴胡【各一分】 草豆蔻【煨三分】 苍术【三分】

右?咀水煎

按此足太阳阳明厥陰药也

木香塌气丸治中焦腹胀

萝卜子【炒】 陈皮【去白各五钱】 胡椒 草豆蔻【煨】 木香
青皮【各三钱】 蝎梢【去毒二钱半】

右为细末水糊为丸梧子大每三十丸温米饮下忌服油腻白粥百日量人大小与服陰囊肿
用青盐乾姜白麪为末水调贴之

中满分消汤治中满寒胀寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥逆食入反出下虚中满腹中
寒心下痞下焦躁寒沉厥奔豚不收并宜服之

益智仁 半夏 茯苓 木香

升麻【各三分】 吴茱萸 草豆蔻 黄芪【各五分】 川乌头 泽泻 人参 青皮

当归 生姜 麻黄 柴胡

乾姜 黄连 毕澄茄

黄栢【各二分为热因寒用】

右?咀只作一服水煎

按此二方治寒胀之剂也

广茂溃坚汤治中满腹胀内有积块坚硬如石令人坐卧不安大小便澁滯上气喘促通身虚
肿

厚朴 黄芩 益智仁 草豆蔻 当归【各五钱】 黄连【六钱】 半夏【七钱】 广茂升麻 红花
吴茱萸【各二钱】 甘草【生】 柴胡 泽泻 神麴
青皮 陈皮【各三钱】 渴者加乾葛【四钱】

右?咀每七八钱水煎食前温服

中满分消丸治中满鼓胀气胀水气胀大热胀

黄芩 黄连 枳实【炒】

半夏【制各五钱】 姜黄 白术 人参 甘草【炙】 猪苓【各一钱】 生乾姜
白茯苓 砂仁【各一钱】 厚朴【一两】 知母【四钱】 泽泻 陈皮【各三钱】

右为细末水浸蒸饼为丸梧子大每百丸焙热白汤下食後寒因热用故焙服

按此并治热胀之剂也又湿热之药

攻下之剂

三因七物厚朴汤治腹满发热脉浮数饮食如故胀满者为热胀

厚朴【炒一两】甘草【炙】 大黄【煨各三钱】

枳实【炒半两】桂心【一分】

右为末每四大钱入姜枣煎呕者加半夏

按此治热之剂阳明例药也

简易是斋推气丸治三焦痞塞气不升降腹胀

槟榔 陈皮 黄芩 大黄枳实 黑牵牛【等分】

右为末炼蜜丸梧子大每五七十丸临睡汤下量虚实与服

杨氏消胀丸

木香 黑牵牛 萝卜子【炒】 槟榔

右等分为末水糊丸梧子大每三十丸

宣明肉豆蔻丸治食痼腹胀如鼓不食者病可下肉豆蔻 槟榔 轻粉【各一钱】

黑牵牛【一两半服头末】

右为末糊为丸如菉豆大每服十丸二三十丸煎连翘汤下食後日三服

按此并气分药也

鸡屎醴散治心腹胀满旦食不能暮食致令胃逆鼓胀证

大黄 桃仁 鸡屎醴【乾者等分】

右为末每一二钱水煎入姜食前服

按此血分药也

东垣沉香海金砂丸治一切积聚脾湿肿胀肚大青筋羸瘦

海金砂【一钱半】沉香【二钱】牵牛末【一两】轻粉【一钱】

右为末独蒜如泥为丸如梧子大每三十丸煎白沸灯心通草汤量虚实与服

海金砂散治脾湿太过腹胀如鼓

方见湿门

按此二方治湿之剂也

沉香交泰丸治浊气在上干扰清阳之气菀而不伸以为?胀

沉香 白术 当归【各三钱】厚朴【制五钱】枳实【炒】 吴茱萸【洗】 白茯苓
泽泻 陈皮 青皮 木香【各二钱】

大黄【酒浸一两】

右为末汤浸蒸饼为丸梧子大每五十加至七十丸温汤送下

按此分消之剂也 气血之药

三花神佑丸治一切肿病大腹实胀喘满

方见湿门

按此治湿热之药也

治积聚之剂

澹寮三棱煎丸治心腹坚胀脇下紧硬胸中痞塞喘满京三棱【半筋为末以酒三升银器内
熬成膏】青皮 萝卜子【炒】 神麴【炒各二两】麦蘖【炒三两】?砂【一两】
乾漆【炒】 杏仁【炒各半两】

右为末以膏子丸如梧子大每三十丸食後温米饮下

导气丸治诸气痞塞关膈不通腹胀如鼓大便虚秘青皮【用水蛭炒】莪术【蟲虫炒】三棱【乾漆炒】槟榔【斑猫炒】茺莢【牵牛炒】乾姜【礞砂炒】附子【盐炒】赤芍【川椒炒】胡椒【茴香炒】石菖蒲【桃仁炒】

右各剉与所同炒药熟去水蛭等不用只以青皮等十件为末酒糊为丸如梧子大每五丸至七丸空心紫苏汤下

塌肿神应丸治诸蛊毒腹胀

方见积聚门

按此并治积聚导气散郁之剂也又能入血分谨按已上攻治诸方皆有轻重所宜之制宜对证选用不得少差致有实实虚虚之失也发明曰禁服论云约方犹约囊也囊满弗约则输泄方成弗约则神与气俱未滿而知约之可以为工不可以为天下师此圣人所以退太过而进不及以平为期也大凡气味者有毒无毒固宜常制矣是以大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八无毒治病十去其九余以谷肉果菜食养尽之至如君一臣二奇之制也君二臣四耦之制也近而奇耦制小其服远而奇耦制大其服大则数少小则数多矣多则九之少则二之补上治上制以缓补下治下制以急急则气味厚缓则气味薄下不以耦汗不以奇随其邪之所在高下浅深轻重虚实影响无间万举万全是谓中行故可为师也假如病大而汤剂小则邪气少屈而药力已乏欲不复治其可得乎犹一杯之水救一车薪之火竟不能灭是谓不及故不可为师而可以为工矣小而汤剂大则邪服已尽而药有余力欲不伤正何所容哉犹火炎崑冈玉石俱焚莫之能止是谓太过此又不可以为工是乃粗医也三者之论惟中而已过与不及皆为偏废然而太过尤甚於不及何以明之盖失之於姑息邪复胜正者止於劳而无益犹可勉而适中或失於苛暴则正气被伤因而羸瘠者有之危殆者有之灭亡者有之非徒无益而又害之此所谓尤甚也可不戒哉尝见仲景之书於承气条下攻里则曰若更衣止後服於桂枝汤後发表乃云粳粳微汗益佳不可令如水淋漓本乎轩岐之微旨有所得耳

玉机微义卷二十六

卷二十七

钦定四库全书

玉机微义卷二十七 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

喉痹门

论喉痹为火热所致

原病式曰喉痹痹不仁也俗作闭犹闭塞也火主肿胀故热客上焦而咽噤肿胀也

子和曰内经云一陰一阳结谓之喉痹王太仆曰一陰者手少陰君火心主之脉气也一阳者手少阳相火三焦之脉气也二脉并络於喉气热则内结结甚则肿胀肿胀甚则痹痹甚而不通则死矣夫推原十二经惟足太阳别下项其余皆凑于喉咙然内经何为独言一陰一阳结为喉痹盖君相二火独胜则热结正络故痛且速也予谓一言可了者火是也故十二经中言噤乾噤痛咽肿颌肿舌本强皆君火为之也惟喉痹急速相火所为也夫君火者犹人火也相火者犹龙火也人火焚木其势缓龙火焚木其势速内经之言喉痹则咽与舌其两间耳然其病同於火故不分也後之医者各详其状强立八名曰单乳蛾双乳蛾单闭喉双闭喉子舌胀木舌胀纏喉风走马喉闭热气上行故传於喉之两傍近外肿作以其形似是谓乳蛾一为单一为双也其比乳蛾差小者名闭喉热结於舌下复生一小舌子名曰子舌胀热结於舌中舌为之肿名曰木舌胀木者强而不柔和也热结於咽喉肿遶於外且麻且痒肿而大者名曰纏喉风喉痹暴发暴死者名曰走马喉痹此八种之名虽详若不归之火则相去远矣其微者可以咸?之而大者以辛散之今之医者皆有其药也如薄荷乌头殭蚕白矾朴硝铜碌之类也至於走马喉痹何待此乎其生死人反掌之间耳其最不误人者无如砭针出血血出则病已易曰血去惕出良以此夫昔予治一妇人木舌胀其舌满口诸医不愈令以?针小而锐者砭之五七度肿减三日方平计所出血几至盈斗又治一男子纏喉风肿表里皆作药不能下予以凉药灌於鼻中下十余行外以拔毒散傅之阳起石烧赤与伏龙肝各等分细末之日以新水扫百遍三日热始退肿始消又尝治一贵妇喉痹盖龙火也虽用凉剂而不可使冷服为龙火宣以火逐之火者烹饪之火是也乃使爆於烈日之中登于高堂之上令侍婢携火炉坐药铍于上使药常极热不至大沸通口时时呬之百余次龙火自散此法以热行寒不为热病扞格故也大抵治喉痹用针出血最为上策但人畏针委曲旁求瞬息丧命凡用针而有针创者宜捣生姜一块调以热白汤时时呬之则创口易合铜人中亦有灸法然痛微者可用病速者恐迟则杀人故治喉痹之火与救火同不容少待内经火郁发之发谓发汗然咽喉中岂能发汗故出血者乃发汗之一端也後之君子毋执小方而曰吾药不动脏腑又妙於出血若幸遇小疾而获效不幸遇大病而死矣毋遗後悔可也

论喉痹为伤寒所致

龐氏曰经云伏气之病古方谓之肾伤寒谓非时有暴寒中人伏毒气於少陰经始衰不病旬月乃发脉微弱法当咽痛以伤寒非喉痹之病次必下痢

谨按少陰伤寒一二日病乃不自太阳传也因是经不足而卒中寒寒邪抑郁内格阳气为热上行於咽门经会之处寒热相搏而痛或成喉痹为医不察脉证虚实即用寒凉之剂攻治卒致殒没而患者自谓其分呜呼冤哉殊不察少陰病咽痛及生疮不能言声不出者药用甘苦辛温制其标病以通咽噤至若伤寒伏气内发咽痛兼下利清谷里寒外热面赤脉微弱者用辛热之药攻其本病以顺陰阳利止则水升火降而咽痛自无也此非杂病一陰一阳结为喉痹之比不可妄施针砭及寒凉之药且夫火热之动为病急速子和论治已详然伤寒伏气为病咽痛或肿本陰寒厥甚逼热上行其喉为痹逼热下行必便脓血此标热而本寒也仲景自有治例故子和略之不一议若是则火热喉痹肿甚者急用药吹点或刺少商合谷丰隆涌泉关冲等穴以解脉络之结轻者内与甘辛凉剂降火制其标本亦不可使用苦寒之药攻治倘有内寒格热为病吾恐反增其势矣

论喉痹为痰饮所致

详见痰饮门

论喉痹为气逆所致

详见气门

论喉痹为风燥所因

陈无择云风燥皆使喉痹咽肿则不能吞乾则不能咽多因饮啖辛热或复呕吐咯伤致咽系乾枯之所为也与喉门自别又有悬门暴肿闭塞喉咙亦如喉闭但悬壅在上腭俗谓莺翁又谓之鹅聚俗语声讹不可不备识

喉痹治法

点吹药

济生二圣散治纏喉风急喉痹

鸭嘴胆矾【二钱半】 白僵蚕【炒去丝嘴半两】

右为末每用少许以竹管吹入喉中

白矾散治急喉闭

白矾【一钱】 巴豆【二个去殼作六瓣】

右将矾於铤内慢火熬化为水置巴豆其内候乾去巴豆取矾研为末每用少许吹入喉中立愈

杨氏一字散治时气纏喉风渐入咽塞水谷不下牙关紧急不省人事者

雄黄【研】 蝎梢 白矾【枯】 藜芦猪牙皂角【炙各等分】

右为末每用一豆大鼻内?之立效

三因玉钥匙治风热喉闭及纏喉风

焰硝【一两半】 硼砂【半两】 白僵蚕【一钱】 脑子【一字】

右研匀以竹管吹半钱许入喉中立愈或加雄黄二钱名金钥匙

宣剂

三因解毒雄黄丸治纏喉风及喉痹卒然仆倒失音不出声或牙关紧急者

雄黄【一两】 巴豆【去油十四个】 郁金【一钱】

右研醋糊丸菉豆大热茶清下七丸吐出顽涎即苏省未吐再服至如死者亦以物斡开口灌之下咽无有不活者吐泄些小不妨

丹溪方用射干汁和逆流水吐之 用桐油以鹅翎蘸探吐之 用灯火油脚吐之

治热之剂

局方龙脑鸡苏丸治上焦热咽肿噤痛

方见热门

澹寮牛蒡子散治风热上壅咽喉肿痛或生乳蛾牛蒡子【研】 玄参 升麻 桔梗犀角 黄芩 木通 甘草【各等分】

右?咀每半两水煎入生姜二片

拔萃桔梗汤治热肿喉痹

桔梗 甘草 连翘 栀子 薄荷 黄芩

右为?咀入竹叶煎

百一选方治咽喉肿闭

山豆根洗净新汲水浸少时

右以一块入口中含之咽下苦汁未愈再用

治火之剂

局方碧雪

凉膈散

方并见火门 绦雪见下

御药院麝香朱砂丸治咽喉肿闭或作疮或舌根肿痛者

马牙硝【生用七钱】 铅白霜【三钱】 硼砂【三两】 龙脑【三钱】
寒水石【烧一筋】 麝香【二钱】 朱砂【一两半】 甘草【十两熬膏】

右研极细用膏子和丸如桐子大朱砂为衣每含化一二丸一法减铅霜麝甘草只五味名绦雪散

龙麝聚圣丹治心脾客热毒气攻冲咽喉肿赤疼痛或成喉痹或结硬不消愈而复发经久不差或舌本肿胀满口生疮

川芎【一两】 生地黄 犀角屑

羚羊角屑 南琥珀 南玄参 连翘【各半两】 人参 赤茯苓 马牙硝
脑子 麝香【各三钱】 桔梗 升麻

铅白霜【研各半两】 朱砂

牛黄【各研二钱】南硼砂【研一两】金箔【五十片】

右为末炼蜜丸每两作十丸金箔为衣以薄荷汤化下或细嚼或含化之

按已上诸方有轻重之分宜随证选用

治风之剂

局方如圣胜金锭子治咽喉急闭腮颌肿痛并单蛾双乳蛾结喉重舌木舌并皆治之

硫黄【细研】川芎 藜茶 薄荷叶川乌【炮】硝石 生地黄【各等分】

右为末生葱汁搜和为锭每服先用新汲水灌嗽次嚼薄荷五七叶却用药一锭同嚼极烂以井花水咽下甚者连进三服并含之即安

本事方利膈汤治脾肺有热虚烦上壅咽喉疮肿薄荷叶 荆芥穗 防风 桔梗人参 牛蒡子【炒】甘草【各等分】

右?咀每半两食後水煎服

治寒之剂

仲景半夏汤治伤寒寒相搏咽痛或声不出者

半夏 桂枝 甘草【炙等分】

右?咀每七八钱或半两水煎放冷细细咽之按本论咽中伤生疮不能言声不出者少陰证用苦酒汤或桔梗等方皆可选用

三因蜜附子治腑寒咽闭吞吐不利

大附子【一个去皮脐切作大片蜜涂炙令黄】

右每含咽津甘味尽更以附片涂蜜炙用

治痰之剂

王隐君礞石滚痰丸治痰热咽噎肿痛不利

桔梗半夏汤治痰气不降咽肿欲成喉痹者

方并见痰饮门

三因玉粉丸治寒痰壅结咽喉不利语声不出者

半夏【洗五钱】草乌【一字炒】桂【一字】

右末生姜自然汁浸蒸饼丸如鸡头大每大人一丸至夜含化多年不愈亦有效针经中说寒气客於会厌卒然如哑此药主之

玉机微义卷二十七

卷二十八

钦定四库全书

玉机微义卷二十八 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

淋閼门 【小便不禁附 胞痹附】

淋閼脉证

脉经曰少陰脉数妇人则陰中生疮男子则气淋
热结下焦则令人淋閼不通淋之为病小便数如粟状小腹弦急痛引脐中

论淋证主热

原病式曰淋小便澁痛也热客膀胱郁不能渗泄故也或曰小便澁而不通者为热遗尿不禁者为冷岂知热甚客于肾部干於足厥陰之经廷孔郁结极甚而气血不能宣通则痿痹而神无所用故液渗入膀胱而旋溺遗失不能收禁也经云目得血而能视脏得血而能液腑得血而能气夫血随气运气血宣行则其中神自清利而应机能为用矣又灵枢经曰肾主二陰然水衰虚而怫热客其部分二陰郁结则痿痹而神无所用故溲便遗失而不能禁止然则热证明矣是故世传方论虽曰冷淋复用榆皮黄芩瞿麦茯苓通草鸡苏郁李仁梔子之类寒药治之而已其说虽妄其方乃是由不明气运变化之机宜乎认是而非也或谓患淋而服茴香益智滑石醇酒温药而愈者然则非冷欤不知此皆利小便之要药也盖醇酒益智之性虽热而茴香之性温滑石之性寒所以能开发郁结使气液宣通热散而愈也按此只是论热因处治然宝监曰小便不利其治有三不可槩论津液偏渗於肠胃大便泄泻而小便澁少者宜分利而已热传下焦津液则热热而不行者必渗泄则愈脾胃气澁不能通调水道下输膀胱而化者故可顺气令施化而出矣可见非止於热因也况有标本不同有论见後大抵三因谓大率有五者总病机言也以气为本者气行而水自化也亦气血之谓然有得之於胎气者丹溪云郑宪使子年十六生七个月後得淋病五七日必一作其发则大痛水道下如漆和粟者一盞方定脉之轻则濇重则弦视其形瘦而长色青如苍意其必因其父服下部药遗热在胎留於子之命门而然遂以紫雪和黄栢末丸梧子大晒及乾热汤下百丸半日又下二百丸食物压之又半日痛大作连腰腹水道乃行下漆和粟者梔许痛減十之八後张子中与陈皮一两桔梗木通各半两又下一合许而安父得燥热尚能病子况母得之者乎书此以证东垣红丝瘤之事【云云见妇人门】论淋澁主寒

宝监曰痹论云胞痹者小腹膀胱按之内痛若沃以汤澁於小便上为清涕夫膀胱为州都之

官津液藏焉气化则能出焉今风寒湿邪客於胞中则气不能化出故胞满而水道不通其证小腹膀胱按之内痛若沃以汤澁於小便以足太阳经其直行者上交额上入络脑气下灌於鼻窍则为清涕也

按此则知淋閼有寒热之殊宜参脉理分治

论淋閼分三因

陈无择云淋古谓之癰名称不同也癰者罢也淋者滴也古方皆云心肾气郁致小肠膀胱不利复有冷淋湿淋热淋等属外所因既言心肾气郁与夫惊思恐忧即内所因况饮啖冷热房室劳役及乘急忍溺多致此病岂非不内外因也大率有五曰冷曰热曰膏曰血曰石五种不同皆以气为本

严氏曰五淋气石血膏劳是也气淋为病小便澁常有余沥石淋茎中痛尿不得卒出膏淋尿似膏出劳淋劳倦即发痛引气冲血淋遇热即发甚则溺血候其鼻头色黄者小便难也大抵此证多由心肾不交积蕴热毒或酒後房劳服食热燥七情郁结所致癰闭淋閼为病皆一类也

按此云五淋名各不同故两存之然石淋世俗又名沙石淋子和曰世人多为服金石燥热之剂得之常见农家有此证岂是服金石之人也大抵是膀胱畜热而成此疾如汤瓶久在火中煮瓶底白碱而不能去沙石淋之证与此理同其论最为得矣内经云少腹热洩出白液亦甚似之也

论小便不利气病血病之异

发明曰难经云脉有关有格何谓也然关则不得小便格则吐逆关者甚热之气格者甚寒之气是关无出之由故曰关格无入之理故曰格也按寒在胸中遏絕不入热在下焦填塞不便内经曰人迎大四倍於气口名曰格气口大四倍於人迎名曰关关则不得小便格则吐逆夫小便者是足太阳膀胱所主长生於申申者西方金也故金能生水金者肺也肺中伏热水不能出是絕小便之源也人辅相天地膀胱之源自头项下至於足故曰阳中之陰如渴而小便不通者不得降是也故圣人立法皆用清燥金之正化气薄之药茯苓猪苓泽泻琥珀灯心通草车钱子瞿麦篇竹之类皆为渗淡之药能泻肺火而清肺金滋水之化源也若热在下焦是絕其流而溺不泄也须用气味俱厚陰中之陰药治之长安王善夫病小便不通渐成中满腹大坚硬如石壅塞之极腿脚坚胀裂裂出黄水双睛凸出昼夜不得眠饮食不下痛苦不可名状伊戚赵谦甫诣予求治视归从夜至旦耿耿不寐究记素问有云无陰则阳无以生无阳则陰无以化又云膀胱者州都之官津液藏焉气化则能出矣此病小便癰闭是无陰而阳气不化也凡利小便之药皆淡味渗泄为阳止是气药阳中之陰非北方寒水陰中之陰所化者也此乃奉养太过膏粱积热损北方之陰肾水不足膀胱肾之室久而乾涸小便不化火又逆上而为呕哕非膈上所生也独为关非格病也洁古云热在下焦填塞不便是治关格之法今

病者内关外格之病悉具死在旦夕但治下焦可愈随处以禀北方寒水所化大苦寒之味者黄栢知母桂为引用丸如桐子大沸汤下二百丸少时来报服药须臾如刀刺前陰火烧之痛溺如瀑泉涌出卧具皆湿床下成流顾盼之间肿胀消散予惊喜曰大哉圣人之言岂可不遍览而执一者也其证小便闭塞而不渴时见躁者是也凡诸病居下焦皆不渴也二者之病一居上焦在气分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有湿故不渴也二者之殊至易分别耳

谨按或问肝主小便淋洩今治法主肾何也然大凡病便数者多肾经气虚而然淋閼者有标本之分气热郁结则膀胱津溢主约不利为本病小腹痛不得便下焦气脉实而不利是客约不行为标病伤寒变极者遗洩直视是少陰肾先絕也故此三经干於下部为病非独肝也或脾肺之气不能通调水道下输膀胱清气不降皆能为癰閼肾气虚而浊气不升虚热干於厥陰之络陰廷痿痺而神无所用乃旋溺频数人老年来多有此患矣肾虚极则水涸火炽真气散而死也或曰若久寡居之人病便数者岂肾气虚之不为约乎然是金为火铄土为水濡腑脏兼体相资之道失湿热甚而经脉纵缓亦成斯疾也观先哲用肾气丸等以收精气之虚脱为养气滋肾伐火导水使机关利而脾土健实之意是焉若全指为虚寒处治者是则一槩论也

论小便不禁或癰为下焦虚实不同

内经曰胞移热於膀胱则癰溺血膀胱不利为癰不约为遗溺注曰膀胱为津液之腑水注由之然足三焦脉实约下焦而不通则不得小便足三焦脉虚不约下焦则遗溺也灵枢经曰足三焦者太阳之别也并太阳之正入络膀胱约下焦实则闭癰虚则遗溺

王海藏曰因有卢氏医镜见姜附石脂朱砂丹一药味数分两皆同惟丹砂一味用伏火者及治病有差所治者小便数而不禁怔忡多忘魔梦不已之不同耳其不同者审而详之乃得此之治决不差耳泛举之言肾主大便肝主小便淋洩难经云小肠为赤肠是面赤色及便溺赤色者皆出心与小肠南方赤色显於外也经言下焦如渎者正谓大小便也大便为陰为有形乃下焦之下者也肾脏为病主大便不言大肠者明矣子行父之道小便为气所化乃下焦之高者也谓肝主小便淋洩亦是子行父道为腑病诸气化者皆腑诸有形血化者皆脏病所主此腑言膀胱病此二证俱在下焦则同药有形无形及在脏在腑有殊俱是丹田衰惫不言心火者以其相火化行君之令故也细分之则膀胱壬水胜丙小肠者是不传陰则陰不病何为有形病此为陰之体也为腑之用也天地陰阳反为体用以斯可见是明五脏者为六腑所用六腑者为五脏所用明矣是有形皆为传陰也夫小便不禁是膀胱不约为遗溺此不传陰也是丹田胞络受寒为壬所尅大抵诸腑皆盛有形物有形病皆在腑责其所来皆在脏也用伏火朱砂者去其寒邪耳治法同者以其俱在下焦补诸无形同在胞络耳以其胞与肾相对有时相连故也肾主大便肝主小便所治安得不殊

按此论遗溺为经虚之本病也然亦有悞服凉剂太过而致者如东垣曰立夏前悞用白虎汤过多致遗溺者宜温药升阳以解之是也故用药者当审诛罚无过之戒

谨按丹溪先生曰淋证多主於气虚亦有死血作淋者小便不通实热者当利之因气者宜吐之以提其气气升则水自下盖气承载其水也痰多者用二陈汤先服後吐痰气闭塞者二陈加木通香附探吐一男子病小便不通医用利药而加剧先生曰此积痰病也积痰在肺肺为上焦膀胱为下焦上焦闭则下焦塞譬如滴水之器必上窍通而後下窍之水出焉乃以法大吐之吐已病如失然此可见癰淋又不独主於经病也

淋閼治法【小便不禁附】

治淋澁之剂

金匱肾气丸治肾虚小便淋澁及妇人子淋

方见补虚门

钱氏导赤散治心经蘊热小便赤澁或成淋痛

方见热门

局方五淋散治膀胱有热水道不通淋澁不出或尿如豆汁或成沙石或如膏或热拂便血

赤茯苓【六钱】赤芍 山栀子【各二钱】

当归 甘草【各五钱】

右?咀每半两入灯心水煎

本事火府丹治小便赤少及五淋澁痛

木通 黄芩【各一两】生地黄【二两】

右为末炼蜜丸如梧子大每五十丸木通汤下

济生小蓟饮子治下焦结热尿血成淋

生地黄 小蓟根 通草 滑石 山栀子 蒲黄【炒】 淡竹叶 当归 藕节 甘草

右等分为?咀每半两水煎空心服

琥珀散治五淋澁痛小便脓血

琥珀 海金砂 没药 蒲黄【各研】

右各一两和匀每三钱食前煎萱草根汤调下日二服

按已上诸方并血分药也

局方八正散治小便热淋澀痛

清心莲子饮治小便浊或澀

方并见热门

立効散治下焦热结小便黄赤淋閼疼痛或有血出瞿麦穗【一两】甘草【三分】
山梔【炒去皮半两】

右为末每五钱入葱白灯心姜煎食前时时服

济生地肤子散治诸病後体虚触热热结下焦遂成淋病小便赤澀数起少出

猪苓 地肤子 知母 黄芩 海藻 通草 瞿麦 枳实【炒】 升麻 葵子

右?咀每半两水煎入姜

按已上方又气中之血药也

海金砂散治小便淋沥及下焦湿热气不施化或五种淋疾癰闭不通

海金砂【研】 木通 瞿麦穗 滑石通草【各半两】 杏仁【去皮尖一两】

右为末每五钱水煎入灯心二十根

宝监茯苓琥珀汤治小便数而欠淋澀脉沉缓时时带数

五苓散加琥珀【半两】 滑石【七分】 甘草【三分】

右细末每五钱长流水煎服食前

按以上方并气分药也

局方石苇散治膀胱有热水道不通淋沥不出脐腹急痛蓄作有时劳倦即发或尿如豆汁或出沙石芍药 白术 滑石 葵子当归 瞿麦【各三钱】石苇 木通【各二钱】甘草 王不留行

右为末每二钱空心小麦汤调下

按此血中之气药也与已上并治热之剂

三因生附散治淋而脉沉微小便秘澁数起不通窍中痛

附子 滑石【各半两】瞿麦 木通半夏【各一两半】

右为末每二钱入姜三片灯心二十茎蜜半匙水煎食前服

按此治窍之剂也

治癰閼之剂

东垣滋肾丸治下焦陰虚脚膝无力陰汗陰痿足热不履地不渴而小便闭

黄栢【酒洗焙】知母【酒洗焙各一两】肉桂【二钱】

右为末水丸如桐子大每服百丸加至二百丸煎百沸汤送下

白花散治小便不通膀胱蘊热

朴硝

右为末每二钱煎茴香汤调下食前服

按已上并血分药也

清肺散治渴而小便閼或黄或澁

五苓散加琥珀【半钱】灯心【一分】木通【七分】通草【一分】
车前子【炒一分】瞿麦【半钱】篇蓄【七分】

右为细末每五钱水煎食前服作汤亦可

红朮散治小便不通止喘

红朮黍根【一两】 篇蓄【一两半】

灯草【一百根三寸长】

右?咀每五钱长流水煎服

按已上并气分药也

黄芩清肺饮治肺燥而小便不通

黄芩【一钱】 梔子【三个打破】

右?咀长流水煎服不利加盐?二十粒

滋陰化气汤治因服热药过多小便不利诸药不效或脐下闷痛难忍

黄连 黄栢【各炒】 甘草【炙等分】

右?咀每五钱水煎食前服如不通加知母

按此二方助陰药也

治胞痹之剂

千金方茯苓丸治胞痹小便内痛

赤茯苓 防风 细辛 白朮附子【炮】 泽泻 官桂【各半两】 天花粉紫苑 牛膝【酒浸】
黄芪 芍药甘草【炙各三分】 生地黄 山茱萸 山药独活 半夏【各一分】

右末蜜丸梧子大每十丸温酒送下食前服

巴戟丸治胞痹脐腹痛小便不利

巴戟【去心一两半】 槲螬蛸【麩炒黑】

远志【去心】 山芋 生地黄 附子【炮】 续断 肉苁蓉【酒浸各一两】 杜仲【炒】 石斛
鹿茸【酥炙】 龙骨 五味子兔丝子【酒浸】 山茱萸 桂【各二分】

右十六味细末蜜丸梧子大每三十丸空心酒下

肾沥汤治胞痹小腹急小便不利

麦门冬 木通 桔梗 桑白皮 杜仲【炒】 犀角屑 五加皮【各一两】 赤芍【五钱】

右?咀每五钱水煎加羊肾一个竹沥少许

宣明肾着汤治胞痹证小腹膀胱按之内痛若沃以汤澁於小便上为清涕不止者

赤茯苓 白术【各四两】 甘草【炙三两】 乾姜【炮二两】

右为末每五钱水煎温服日三

按此四方当分寒热之异选使然肠痹亦有腹痛飧泄小便秘澁者宣明论有证治例详见本论又可见小便不利非止胞痹为患也

治淋沥不禁之剂

局方二气丹治内虚里寒膀胱积冷阳渐微小便不禁

硫黄研 肉桂【各一分】 乾姜【炮】

朱砂【为衣各二钱】 附子【一枚大者炮去皮脐为末半两】

右为末糊丸如梧子大每五十丸盐汤下食前服

姜附赤石脂朱砂丹治小便数而不禁怔忡多忘魔梦不已

附子【生】 乾姜【各半两】 赤石脂【一两半水飞】 朱砂【一两研】

右为细末酒糊为丸如菉豆大每十五至二三十丸大便有病米饮下小便不禁茯苓汤下

按此二方助阳之剂也

御药院方秘元丹治内虚里寒自汗时出小便不禁白龙骨【三两】 诃子【十个】
砂仁【一两】 灵砂【二两】

右为末煮糯米粥丸如梧子大每五十丸空心盐酒下

按此固阳之剂也

济生兔丝子丸治小便多或致失禁

兔丝子【二两】牡蛎【煨】附子【炮】五味子鹿茸【酒炙各一两】
苁蓉【酒浸二两】

鸡?胫【炙乾】桑螵蛸【酒炙各半两】

右为末酒糊丸如梧子大每七十丸空心盐汤温酒任下

三因家韭子丸治下元虚冷小便不禁或成白浊家韭子【六两炒】鹿茸【四两酥炙】苁蓉【酒浸】牛膝熟地黄当归【各二两】巴戟【去心】

兔丝子【酒浸各一两半】杜仲石斛桂心乾姜【炮各一两】

右为末酒糊丸如梧子大每百丸空心汤酒任下按此一方助阳滋陰之剂也

茯苓丸治心肾俱虚神志不守小便淋沥不禁

赤茯苓白茯苓【等分】

右为末以新汲水按洗澄去新沫控乾别取熟地黄汁与好酒同於银石器内熬成膏搜和丸如弹子大空心盐酒嚼下一丸

按此滋陰固真之剂也

杂方

澹寮桑螵蛸散治小便频数或如稠米泔色

桑螵蛸【盐水炙】远志菖蒲【盐炙】龙骨人参茯神当归

鳖甲【醋炙各等分】

右为末每二钱临卧人参汤调服

五子丸治小便频数时有白浊

兔丝子【酒蒸】家韭子【炒】益智仁茴香【炒】蛇床子【去皮炒等分】

右为末酒糊丸如桐子大每七十丸米饮盐汤任下

治小便不通诸药无效或转胞至死此法用之便自出用猪尿胞一个底头出个小窍儿着翎筒通过放在窍内根底细线系定翎筒口子细杖子堵定上用黄蜡封尿胞口头吹满气七分系定了再用手捻定翎筒根头放了黄蜡堵塞其翎筒放在小便头放开翎筒根头手其气透里自然小便即出大有神效

灸小便淋澁法炒盐不以多少热填满病人脐中是神阙穴也却用筋头大艾炷灸七壮良验或灸三阴交穴

一法小水閼澁以猪胆连汁笼住小便少时汁入自出妇人用药末贮袋子安入阴户中必通

玉机微义卷二十八

卷二十九

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷二十九 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

眼目门

论目为血脉之宗

内经曰诸脉者皆属于目目得血而能视针经曰五脏六腑精气皆上注於目而为之精精之窠为眼骨之精为黑眼血之精为络其窠气之精为白眼肌肉之精则为约束里擗筋骨血气之精而与脉并为系上属于脑後出於项中故邪中於项因逢其身之虚其入深则随眼系入於脑则脑转脑转则引目系急目系急则目眩以转矣邪中其精其精所中不相比也则精散精散则视岐故见两物目者五脏六腑之精荣卫之所常营也神气之所主也故神劳则魄散志意乱是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉发於阳故陰阳合传而为精明也目者心之使也心者神之舍也故神精乱而不转卒然见非常之处精神散不相得故曰惑也东垣曰夫十二经脉三百六十五络其血气皆上走於面而走空窍其清阳气上散於目而为精其气走於耳而为听因心烦事冗饮食失节劳役过度致脾胃虚弱心火大盛则百脉沸腾血脉逆行邪害空窍失明则日月不明矣夫五脏六腑之精气皆禀受於脾上贯於目脾者诸陰之首也目者血脉之宗也故脾虚则五脏之精气皆失所司不能归明於目矣心者君火也主人之神宜静而安相火化行其令相火者包络也主百脉皆荣於目既劳役运动势乃妄行又因邪气所并而损血脉故诸病生焉凡医者不理脾胃及养血安神治标不治本是不明正理也

按此论目为腑脏血脉精气之宗至为详悉岂但世俗拘之於五轮八廓而已也

论目昏赤肿翳膜皆属于

原病式曰目昧不明目赤肿痛翳膜皆疡皆为热也及目膜俗谓之眼黑亦为热也或平白目无所见者热气郁之甚也或言目昧为肝肾虚冷者误也是以妄谓肝生於目肾主瞳子故妄言目昧为虚而冷也然肾水冬陰也虚则当热肝木春阳也虚则当冷肾陰肝阳岂能同虚而为冷者欤或通言肝肾之中陰实阳虚而无由目昧也俗妄谓肝肾之气衰少而不能至於目也不知经言热甚目瞑眼黑也岂由寒乎又如仲景言伤寒病热极则不识人乃目盲也正理论曰由热甚怫郁於目而致之然也若目无所见耳无所闻悉由热气怫郁玄府闭塞而致气

液血脉荣卫精神不能升降出入故也各随郁结微甚而有病之轻重也故知热郁於目无所见也故目微昏者至近则转难辨物由目之玄府闭小也隔縑视物之象也或视如蝇翼者玄府有所闭合者也或目昏而见黑花者由热气甚而发之於目亢则害承乃制而反出其泣气液昧之以其至近故虽微而亦见如黑花也及冲风泣而目暗者由热甚而水化制之也故经言厥则目无所见夫人厥则阳气并於上陰气并於下阳并於上则火独光也陰气并於下则足陰足陰则胀也夫一水不能胜五火故目眦而盲是以冲风泣下而不止夫风之中於目也阳气内守於睛是火气燔目故见风泣下

按此论热甚怫郁陰阳并厥玄府闭密致目病之由为详盖一主於火热之化也若由饮食辛热七情所动六气淫郁气血虚实则东垣子和陈无择辈论亦已详然亦有痰热湿热与夫服食金石燥热之药致者或久病後荣卫虚弱肝气肾陰不足或元气精气虚衰及脱营为病皆有虚热实热之殊并宜分治论眼证分表里治

机要曰在腑则为表当除风散热在脏则为里宜养血安神暴发者为表而易治久病者在里而难愈论目疾宜出血最急

子和曰圣人虽言目得血而能视然血亦有太过不及也太过则目壅塞而发痛不及则目耗竭而失明故年少之人多太过年老之人多不及但年少之人则无不及年老之人其间犹有太过者不可不察也夫目之内皆太阳经之所起血多气少目之锐眦少阳经也血少气多目之上纲太阳经也亦血多气少目之下纲阳明经也血气俱多然阳明经起於目两旁交頰之中与太阳少阳俱会于目惟足厥陰经连於目系而已故血太过者太阳阳明之实也血不及者厥陰之虚也故出血者宜太阳阳明盖此二经血多故也少阳一经不宜出血血少故也刺太阳阳明出血则目愈明刺少阳出血则目愈昏要知无使太过不及以血养目而已凡血之为物太多则濫太少则枯人热则血行疾而多寒则血行迟而少此常理也目者肝之外候也肝主目在五行属木虽木之为物太茂则蔽密太衰则枯瘁矣夫目之五轮乃五脏六腑之精华宗脉之所聚其白人属肺金肉轮属脾土赤脉属心火黑水神光属肾水兼属肝木此世俗皆知之矣及有目疾则不知病之理岂知目不因火则不病何以言之白轮变赤火乘肺也肉轮赤肿火乘脾也黑水神光被翳火乘肝与肾也赤脉贯目火自甚也能治火者一句可了故内经曰热胜则肿凡目暴赤肿起羞明隐澁泪出不止暴寒目瞤皆太热之所为也治火之法在药则咸寒吐之下之在针则神庭上星顙会前顶百会血之翳者可使立退痛者可使立已昧者可使立明肿者可使立消惟小儿不可刺顙会为肉分浅薄恐伤其骨然小儿水在上火在下故目明老人火在上水不足故目昏内经曰血实者宜决之又经曰虚者补之实者泻之如雀目不能夜视及内障暴怒大忧之所致也皆肝主目血少禁出血止宜补肝养肾至於暴赤肿痛皆宜以针刺前五穴出血而已次调盐油以涂髮根甚者虽至于再至于三可也量其病势以平为期

按此谓目疾出血最急於初起热痛暴发或久病郁甚非三棱针宣泄不可然年高之人及久病虚损并气郁者宜从毫针补泻之则可故知子和亦大略言尔於少阳一经不宜出血无使太过不及以血养目而已斯意可见

论内障外障

龙木论曰眼疾有七十二般内障二十三候外障四十九候病状一一不同据其疾状认识既不差错治疗必有所凭

谨按诸候详见本论然内障为黑水神光昏翳外障则有翳膜者是今论中虽具诸候而所用药多本风热故并略去然内障有因於痰热气郁血热阳陷陰虚脱荣所致种种病因皆略之不议况外障之翳有起於内眦外眦睛上睛下睛中当视其翳色从何经而来如东垣治例魏邦彦夫人目翳从下而上病自阳明来也綠非五色之正殆肺肾合而为病也乃就画家以墨调膩粉合成色谛视之与翳色同矣肺肾为病者无疑乃泻肺肾之邪而以入阳明之药为之使既效而他日复病作者三其所从来之经与翳色各异因询此必经络不调目病未已问之果然如所论治之疾遂不作若此凭其色究其所兼所本之因处治而不愈者盖邪蘊日久而实元气陰气不足所致也当以王道论治庶可但世俗不能守此理遂致失明者多矣悲夫

论瞳子散大

东垣曰瞳子散大者由食辛热之物太甚故也所谓辛主散热则助火上乘於脑中其精故散精散则视物亦散大也夫精明者所以视万物者也今视物不真则精衰矣盖火之与气势不两立故经曰壮火食气壮火散气手少陰足厥陰所主风热连目系邪入中人各从其类故循此道而来攻头目肿闷而瞳子散大皆血虚陰弱故也当除风热凉血益血以收耗散之气则愈矣

论倒睫赤烂

东垣曰夫眼生倒睫拳毛者两目紧急皮缩之所致也盖内复热致陰气外行当去其内热并火邪眼皮缓则眼毛立出翳膜亦退用手法攀出内脸向外速以三棱针出血以左手爪甲迎其针锋立愈

目眶岁久赤烂俗呼为赤睛是也当以三棱针刺目眶外以泻湿热而愈

按已上所论可谓深达病情然是证亦多是血热陰虚火动所致盖血所以滋经脉养毛髮者也故当外治以泻其瘀热内治以杜絕其源可也

论目不能远视为陰气不足

东垣曰能远视不能近视者阳气不足陰气有余也乃气虚而血盛也血盛者陰火有余气虚者气弱也此老人桑榆之象也能近视不能远视者阳气有余陰气不足也乃血虚气盛血虚气盛者皆火有余元气不足火者元气谷气真气之贼也元气来也徐而和细细如线邪气来也紧而强如巨川之水不可遏

谨按阳气者犹日火也陰气者金水也先儒所谓金水内明而外暗日火内暗而外明者也然人目眼备脏腑五行精华相资而神明故能视即此理之常也虽经曰目得血而能视殊不知血得气为水火之交而能神明之也否则陰虚不能视远阳乏不能视近是为老人桑榆之渐然学者於目病能求诸此则思过半矣

论目疾分三因

陈无择云病者喜怒不节忧思兼并致脏气不平郁而生涎随气上厥逢脑之虚侵淫眼系注於目轻则昏澁重则障翳眵泪努肉白膜瞖睛皆内所因或数冒风寒不避暑湿邪中於项乘虚循系以入於脑故生外翳医论中所谓青风緑风紫风黑风赤风白风白翳黄翳等随八风所中变生诸证皆外所因或嗜慾不节饮食无时生食五辛热啖炙?驰骋田猎冒涉烟尘劳动外情表明之本皆不内外因治之

按论中所言致证之因至为详悉惜乎其方多本於风热及水脏阳虚处治而未备学者当自为通变矣论偷针眼

巢氏曰凡眼内眦头忽结成疱三五日间便生浓汁世呼为偷针此由热气客在眦间热转於津液所成但其势轻者小小结聚汁溃热歇乃瘥

谨按世传眼眦初生小疱视其背上即有细红点如疮以针刺破眼时即瘥故名偷针实解太阳经结热也人每试之有验然巢氏但具所因而不更分经络其诸名实所过者多矣

眼目治法

治风之剂

局方蜜蒙花散治风气攻注两眼昏暗眵泪羞明并暴赤肿

羌活 白蒺?【炒】 木贼 蜜蒙花石决明【各一两】 菊花【二两】

右为末每服二钱茶清食後调下

三因羌活散治风毒上攻眼目昏澁翳膜生疮及偏正头疼目小黑花累累者

羌活 川芎 天麻 青皮旋覆花 南星【炮】 藁本【各一两】

右为末每服二钱水煎入姜三片薄荷七叶

按已上并足太阳厥陰药也

东垣明目细辛汤治两目发赤微痛羞明畏日怯风寒怕火眼睫成纽眵糊多癰澁而难开眉攢肿闷鼻塞涕唾稠粘大便秘澁

麻黄 羌活【各三钱】 防风【二钱】 藁本白茯苓 当归尾【各一钱】 川芎 细辛 蔓荆子【各半钱】 荆芥穗【一钱半】 生地黄【一钱酒制】 椒【八个】 桃仁【二十个】 红花【少许】

右?咀分作四服每服水煎食後热服

按此足太阳厥陰手少陰药也

机要四物龙胆汤治目赤暴发云翳疼痛不可忍四物汤【各半两】 羌活 防风【各三钱】 防己 龙胆草【各二钱】

右?咀作数服水煎

按此足厥陰太陰太阳药也

防风饮子治拳毛倒睫

黄芪 甘草 人参【各一钱】 葛根【半钱】 防风 细辛叶 蔓荆子【各半钱】 当归【七分半】

右?咀作一服水煎食後服

按此足太阳阳明手足太陰药也

治热之剂

局方洗心散

方见热门

济生羊肝丸治肝经有热目赤睛疼视物昏澁

羊肝【一具生用局方用白羊肝】 黄连【去须为末】

右先将羊肝去筋膜於沙盆内捣烂入连末杵和丸如梧子大每五十丸用熟水送下

按此手少陰足太陰厥陰药也

东垣泻热黄连汤治眼暴发赤肿疼痛

黄芩【酒制炒】黄连【同上制】草龙胆 生地黄【各一两】升麻【半两】
柴胡【一两】

右?咀每四钱水煎去滓於日午前飯後热服按此手少陰太陰足阳明少阳少陰药也

治风热之剂

局方明目流气饮治风热上攻眼目视物不明常见黑花当风多泪隐澁难开

大黄【煨】牛蒡子【炒】川芎菊花白蒺?【炒】细辛 防风 玄参山梔 黄芩
甘草【炙】蔓荆子荆芥 木贼【各一两】草决明【一两半】苍术【泔浸炒二两】

右为末每二钱临卧用温酒调下

按此手足三陰足阳明太陰药也

洗肝散治风毒上攻暴作赤目肿痛难开隐澁眵泪薄荷叶 当归 羌活 防风

山梔仁 甘草 大黄 川芎【各二两】

右为末每二钱食後煎水调下

按此足太阳厥陰手足太陰药也

钱氏泻青丸治目暴发赤肿疼痛

方见热门

按此足太阳少阳太陰厥陰药也

东垣连翹饮子治目中溜火恶日与火癰澁小角紧久视昏花迎风有泪

蔓荆子 生甘草 连翹【各三分】柴胡【二分】黄芩【酒制半钱】生地黄 当归
红葵花人参【各三分】黄芪 防风 羌活【各半钱】升麻【一钱】

右?咀作一服水煎食後热服

按此足三阳少陰厥陰药也

治湿热之剂

神芎丸治湿热内甚目赤肿或白睛黄色

方见火門

按此足阳明厥陰药也

东垣龙胆饮子治肝眼流脓生疳翳湿热为病

黄芩【炒】 青蛤粉 羌活 草龙胆【各三钱】 麻黄【一钱半】 蛇退皮 谷精草
川郁金炙甘草【各半钱】 升麻【二钱】

右细末每二钱食後茶调服

按此足太阳阳明手足太陰药也已上六方宜随表里而轻重之亦不可例用

理血之剂

局方明目地黄丸治男女肝肾俱虚风邪所乘热气上攻目翳遮睛目澁多泪

牛膝【酒浸三两】 石斛 枳殼【炒】
杏仁【去皮炒】 防风【各四两】 生熟地黄【各一斤】

右为末炼蜜丸如梧子大每三十丸食前盐汤下按此出太阳例又气药也

简易加减驻景丸治肝肾气虚两目昏暗视物不明车前子【炒二两】 熟地黄
当归【各五两】 楮实子 川椒【炒各一两】 五味子
枸杞子【各二两】 兔丝子【酒制半斤】

右为末蜜和丸如梧子大每三十丸食前温酒下谨按肝为相火有泻无补况陰水虚而阳火
实病目者多故此二方盖补肝之陰虚也颇有理故收入

地芝丸治目不能远视能近视或亦妨近视

生地黄【焙乾】 天门冬【去心各四两】 枳殼【二两炒】 甘菊花【二两】

右为细末炼蜜为丸如桐子大茶清送下百丸食後理气之剂

局方定志丸治眼不能近视反能远视者

白茯苓 人参【各三两】 远志【去心】 菖蒲【各二两】

右为细末炼蜜丸如梧子大以朱砂为衣每服七丸至二三十丸温米饮下食後日三服

按已上二方手太陰少陰药也

济生栞白皮散治肺气壅塞毒气上攻眼目白睛肿胀日夜疼痛

玄参 栞白皮 枳殼【炒】 升麻杏仁【炒】 旋复花 防风 赤芍黄芩 甘菊花 甘草【炙】
甜葶苈【炒各一两】

右?咀每半两入姜三片煎

按此又治风热之剂也出太阳例

养阳之剂

东垣神效黄芪汤治浑身麻木不仁或头面或手或腿脚麻木不仁两目紧急缩小及羞明畏
日或视物无力

黄芪【二两】 人参【八钱】 炙甘草【一两】 蔓荆子【三钱】 白芍【一两】
陈皮【半两】

右?咀每五钱水煎临卧热服

益气聪明汤治饮食不节劳役形体脾胃不足得内障耳鸣或多年目昏暗视物不能此药能
令人目广大久服无内外障耳鸣耳聋之患

黄芪 甘草 人参【各半两】 升麻葛根【各三钱】 蔓荆子【一钱半】 芍药
黄柏【酒炒各一钱】

右?咀每服三钱水煎临睡热服近五更再服之得肿更妙如烦闷或有热渐加黄柏春夏加之
盛暑夏月倍之若此一味多则不效

人参补胃汤治劳役所伤饮食不节内障昏暗

前黄芪汤减陈皮芪再减半加黄栢【一两酒拌透】

右?咀每服三四钱水煎食远稍热服後两目广大视物如童时觉两脚踏地不知高下盖冬天多服升阳药故也病减住服

按已上手足太陰少陰药也

滋陰之剂

东垣连栢益陰丸

羌活 独活 甘草 当归尾【制】 防风
五味子【各半两】 石决明【烧三钱】 草决明 细黄芩 黄栢 知母
黄连【酒拌炒各一两】

右件为细末炼蜜为丸如菉豆大每服五十丸渐加至百丸食远茶清送下常多服补阳汤少服此丸

滋陰肾气丸此壮水之主以镇阳光

熟地黄【三两】 牡丹皮【半两】 生地黄【四两】 泽泻 茯苓【各二两半】 当归尾
山茱萸 柴胡 五味子 乾山药【各半两】

右件於石臼中杵为细末炼蜜丸如桐子大每服五七十丸盐汤空心服

按已上并少陰药也

养阳滋陰之剂

局方菊睛丸治肝肾不足眼目昏暗常见黑花多泪枸杞子【三两】 苁蓉【酒浸炒】 巴戟
【去心各一两】 甘菊花【四两】

右为末炼蜜丸如梧子大每五十丸温酒盐汤食远任下

东垣滋陰地黄丸治眼目瞳子散大於黄睛视物无的或卒然见非常之处

熟地黄【一两】 生地黄【一两半】 柴胡【八钱】 天门冬 炙甘草 枳殼【各三钱】 人参

地骨皮【各二

钱】 黄连 五味子【各三钱】 黄芩【半两】 当归身【半两酒拌焙】

右件为细末炼蜜为丸如菉豆大每百丸温茶清送下日进二次忌辛辣生冷之物

按此二方足少陰之剂也前方主右肾此方主左肾之药故亦异尔

补阳汤治阳不胜其陰乃陰盛阳虚则九窍不通青白翳见於大眦及足太阳少陰经中郁遏足厥陰肝经气不得上通於目故青白翳内阻也当於太阳少陰经中九原之下以益肝中阳气冲天上行此乃先补其阳後於足太阳太陰标中【标者头也】泻足厥陰肝经火下伏於阳中乃次治也内经云陰盛阳虚则当先补其阳後泻其陰是也每日清晨服补阳汤临卧服益陰丸若天色变饮食不调俱不得服

羌活 独活 甘草 人参 熟地黄 黄芩 白术【各一两】 泽泻 陈皮【各半两】 生地黄 白茯苓 知母【炒各三钱】 柴胡【三两】 防风 白芍【各半两】 肉桂【一钱】 当归身【酒制三钱】

右同为粗末每服半两水煎空心服之

冲和养胃汤治内障眼得之脾胃元气衰弱心火与三焦俱盛饮食失节形体劳役心不得休息故上为此疾服之神效

柴胡【七钱】 防风【半两】 羌活 炙甘草 黄芩【各一两半】 当归【制】 白术 升麻 人参 葛根【各一两】 白芍【六钱】 白茯苓【三钱】 乾姜【一钱】 五味子【二钱】 黄芩 黄连【各七钱】

右?咀每五六钱水煎食远稍热服

按已上足三阳手足太陰药也

治障翳诸方

龙木论还睛丸治眼内赤澁有花或黑或白或红皆因肝脏积热肺受风邪初患之时宜令针治诸穴内服此

人参 桔梗 黄芩 熟地黄 防风 羌蔚子 车前子 知母【各二两】 细辛 五味子【各二两半】 玄参【半两】

右为末炼蜜丸如梧子大空心茶下十丸

按本论治内障诸方与此相类者甚多姑存此法

局方蝉花无比散治大人小儿风毒伤肝或为气攻一切眼目昏暗渐生翳膜及久患头风牵搐两眼渐渐细小连眶赤烂

茯苓 甘草【炙】 防风【各四两】 石决明【盐水煮研如粉】 川芎 羌活
当归【各三两】 赤芍【十两炒】 蒺藜【炒半斤】 蝉退【二两】
苍术【十二两】 蛇蛻【一两】

右为末每三钱食後米泔调茶清亦得

按此足三阳太陰厥陰药也

蝉花散治肝经蕴热毒气上攻眼目赤肿多泪羞明一切风热昏翳

穀精草 菊花 蝉蛻 羌活 甘草【炙】 白蒺藜【炒】 草决明 防风 山梔 川芎 蜜蒙花
木贼 荆芥穗 黄芩 蔓荆子

右为末每二钱食後茶清调下

按此足太阳少阳厥陰手太陰药也

本事方羊肝丸

兔肝子 车前子 麦门冬 决明子 茯苓 五味子 枸杞子 茺蔚子 苦葶苈 薤仁 地肤子 泽泻 防风
黄芩 杏仁【炒】 细辛 桂心
青箱子【各一两】 熟地黄【一两半】 白羯羊肝【只用于肝一片薄切新瓦上炒乾】

右为细末炼蜜为丸如梧子大每服三四十丸温水下日三次

按此足太阳少陰手太陰少陰药也

秘方拨云退翳丸 皇统年间医官刘昌祖传于世瓜蒌根 枳实 甘草【炙】
蔓荆子【焙】 薄荷【各五钱】 川芎 木贼【浸一宿焙】 蜜蒙花 荆芥穗 地骨皮 羌活
白蒺藜 甘菊花【各一两】 蛇退 黄连【各三钱】 川椒【七钱半炒去目】
当归【一两半酒浸焙乾】 蝉退【三钱】

右为细末炼蜜丸每两作十丸每服一丸食後临卧日进三服翳者米泔水下睛暗当归汤下内障木香汤下

按此足太阳厥陰手少陰药也然翳膜之疾有气血虚实或夹痰热七情六淫或陰火动湿热致者种种不同皆宜求责但已上法不能以尽病情之变学者宜扩充焉

点洗诸方

局方汤泡散治肝经风热上壅眼目赤澁睛疼多泪

赤芍 当归 黄连【等分】

右为末每二钱汤顿调热洗日三五次御药院方加荆芥

三因立胜散治风热攻眼隐澁羞明肿痛

黄连 秦皮 防风 黄芩【等分】

右?咀水煎热用新羊毫笔蘸刷洗眼

金露膏除昏退翳截定疼

蕤仁【槌碎】 黄丹【各一两】 黄连【半两】 蜜【六两】

右先将黄丹炒令紫色入蜜搅匀下长流水四升以嫩柳枝五七茎一把定搅之次下蕤仁候滚十数沸又下黄连用柳枝不住手搅?至升七八合罩篱内倾药在纸上慢慢滴之勿令尘污如有瘀肉加?砂末一钱上火上慢开入前膏子内用

龙木论云患伤寒热病後切不可点恐损眼也斯言可以为药禁云

宝监春雪膏治风热上攻眼目昏暗痒痛癢澁难开多眵泪羞明疼痛或生翳膜

黄连【四两剉用童便二升浸一宿去连用淬甘石】 南芦甘石【十二两淬便汁浸】 好黄丹【六两水飞】?砂【一钱细研水调在盏内顿乾为度】

乳香 乌鱼骨【烧存性】 当归【各三钱】 麝香轻粉【各少许】 白丁香【半钱】

右各研另贮先用好蜜一斤四两炼去蜡却下甘石末不住手搅次下丹次下诸药末不住手搅至紫金色不粘手为度搓作铤子每用一粒新水磨化时时点之忌酒湿麪荞麦之类

拔萃方?药治偏头疼眼疾

苍耳头 薄荷叶 盆硝 石膏【各一钱乱文者】 乳香 华细辛 贯芎【各半钱】

右为极细末早午夕三时?鼻

宝监方无苍耳乳香细辛有荆芥桔梗

蟾光膏治远年病日不通道路退去云膜须用十二月开成日合

白砂蜜【四两用隔年葱一根去须皮切短与蜜同?去白膜要候葱熟为度以绵滤净纸取蜡面】 黄丹 蜜陀僧【各水飞三钱生用】 芦甘石【火煨五钱水飞】

已上三味研极细倾入前蜜中桃柳无节者各一枝搅匀

当归 赤芍 杏仁【汤泡去皮尖各五钱】 黄连【去芦净二两】 川芎【半两】 秦皮 诃子皮 防风 石膏 玄精石 井泉石 无名异 玄参 代赭石 石决明

已上十味各三钱?咀用雪水或长流水五升於银器内?至二升滤去滓净再熬至一升倾入前药蜜内银器内慢火?紫金色时再下後药勿令过火乳香 没药 琥珀 朱砂 蕤仁【各三钱】

已上五味先乾研极细入蕤仁研细水飞澄清极细才倾入前药一同复?以筋点药於水中不散为度勿令过与不及取下於土中埋七日取出置於银器或磁器中如法收贮便再添入後细药以桃柳枝搅匀

南鹏砂 玳珠 珊瑚枝 龙脑【各一钱】 麝香【半钱】

右五味研极细入药中封定如有取不尽药用净水斟酌洗渲?过另放洗眼或膏子稠了倾些小调解灸雀目疳眼法

宝监云小儿雀目夜不见物灸手大指甲後一寸内廉横文头白肉际灸一炷如小麦大

小儿疳眼灸合谷二穴各一壮炷如小麦大在手大指次指两骨间陷者中

按灸法详见资生等经兹不备录

玉机微义卷二十九

卷三十

钦定四库全书

玉机微义卷三十 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

牙齿门

论牙齿诸痛所因

东垣曰夫齿者肾之标口者脾之窍诸经多有会於口者其牙齿是也手足阳明之所过上斷隶於坤土乃足阳明胃之脉贯络也止而不动下斷嚼物动而不休手阳明大肠之脉所贯络也手阳明恶寒饮而喜热足阳明喜寒饮而恶热其病不一牙者肾之标亦喜寒寒者坚牢为病不同热甚则齿动斷断袒脱作痛不已故所治疗不同也有恶寒作痛者有恶热而作痛者有恶寒又恶热而作痛者有恶寒饮少热饮多而作痛者有恶热饮少寒饮多而作痛者有牙齿动摇而作痛者有齿袒而为痛者有齿斷为疳所蚀缺少血出为痛者有齿斷肿起为痛者有脾胃中有风邪但觉风而作痛者又有牙上多为虫所蚀其齿缺少而色变为虫牙痛者有胃中气少不能於寒袒露其齿作痛者有牙齿疼痛而秽臭之气不可近者痛既不一岂可一药而尽之哉按此论齿恶寒热等作痛本手足阳明动摇斷脱本足少陰故此三经所主为多然齿袒虫疳湿热斷肿血出作痛痛而秽臭者皆胃热火盛所致亦有诸经错杂之邪与夫外因者故已上病机现证甚详学者宜究其机而处治焉论牙痛分三因

陈无择云齿为关门肾之荣骨之余也肾衰则齿豁精固则齿坚又大肠支脉在牙斷主灌注於牙大肠壅则齿为之浮大肠虚则齿露挟风则攻目头面疳?则齲脱为痔皆气郁而生诸证不同治之

谨按头面外冒风寒或口吸寒冷致牙痛者皆外因也实热或陰虚火动骨蒸所致气郁血热虫疳皆内因也硬物所支打击等致皆不内外所因也故诸证不同治之陈止言经病而不具三因者恐傳梓时脱简尔论齿痛为风热湿热所致

东垣曰刘经历之内年三十余病齿痛不可忍须骑马外行口吸凉风则痛止至家则其痛复作家人以为崇神祷於巫师而不能愈病乃湿热为邪也足阳明多血多气加以膏粱之味助其湿热故为此病因立一方不须骑马常令风寒之气生於齿间以黄连胡桐泪之苦寒新薄荷叶荆芥穗之辛凉四味相合而作风寒之气治其湿热为主以新升麻之苦平行阳明经为使牙齿骨之余以羊?骨灰补之为佐麝香少许入肉为引用为细末擦之痛乃減半又以调胃承气汤去硝加黄连以治其本服之下三两行其痛良愈遂不复作

按此论实热例而合辛凉风剂盖风能胜湿苦以泄热也今世俗有以大戟芫花小麦椒细辛苍耳?汤热 而牙痛立止者正同此例大抵人之牙齿致病实多内则气郁血热骨蒸等因外则咀炙热受寒冰醎酸辛辣之味适口岂不渍搏耶且如以醋沃石则石为苏况人之骨余者乎然虽经络之喜寒热气不同所受病异者则岂全在标尔

牙齿治法

治风之剂

局方细辛散治风蛀牙疼腮颌浮肿

荆芥穗 细辛【各一两】 砂仁【半两】 白芷红椒 草乌【各二两】 鹤虱
牙皂角毕拨【各半两】

右为末每少少许频擦患处有涎吐之仍用水灌嗽按此手阳明足少阴厥阴药也

三因玉池散治风蛀牙疼肿痒动摇牙龈溃烂宣露出血口气

地骨皮 白芷 升麻 防风

细辛 川芎 槐花 当归

藁本 甘草【等分】

右为末每用一字揩之痛甚取二钱水盏半黑豆半合姜三片煎嗽

按此手足阳明厥阴药也

百一选方治风牙疼

白芷【一两】 朱砂【一分】

右为末炼蜜丸樱桃大每一丸擦牙上

按此手阳明之的药也

御药院方独活散治风毒牙疼牙根肿痛

川芎 独活 羌活 防风【各半两】 细辛 荆芥 薄荷 生地黄【各二钱】

右?咀每三钱水煎漱咽

按此足太阳厥陰少陰药也

元戎立效散治牙疼

小椒 露蜂房 青盐【等分】

右为细末煎数沸热 即止

按此足少陰药也

东垣羌活散治风寒寒湿犯脑项筋急牙齿动摇肉斷袒脱疼痛苦楚

麻黄【去节三两】羌活【一钱半】柴胡【半两】

升麻苍术【各半两】草豆蔻【一钱】防风【三分半】藁本【三分】细辛【少许】

当归身【六分】白芷 桂【各三分】羊胫骨灰【二钱半】

右为末先以温水漱过擦之

按此足三阳太陰药也

治寒之剂

御药院方丁香散治牙齿

丁香 毕拔 蝎梢 大椒【等分】

右为末每少许擦於患处

按此足阳明太陰药也

萆薢散搐药

萆薢 良姜 胡椒 细辛【等分】

右为末每少许温水随痛处鼻内搐

按此足少陰太陰药也

东垣白芷散治大寒犯脑牙齿疼痛

麻黄 草豆蔻【各一钱半】 黄芪 升麻【各二钱】 吴茱萸
白芷【各四分】 当归【一钱】
藁本【三分】 熟地黄【一钱】 桂枝【二分半】 羌活【八分】

右为末先用温水漱净以药擦之

按此手足阳明太阳厥陰药也

治风热之剂

元戎胡桐泪散治足阳明经虚风热所袭流传牙齿攻注牙齦则致肿结妨闷甚者与齦间津液相搏化为浓汁宜用此药

胡桐泪 石胆矾 黄矾 芦荟 升麻【各半两】 麝香 乱髮灰【各一钱】 朱砂 细辛 当归身 川芎 牛膝【各二钱半】

右为末先以甘草汤漱口後用药少许傅之以常用少许擦牙去风热消肿化毒牢固永无牙宣疳血之病按此足阳明厥陰药也

犀角升麻汤治阳明经受风热口唇颊车连牙肿痛犀角【七钱半】 升麻【五钱】 防风 羌活【各三钱半】 川芎 白芷 白附子 黄芩【各二钱半】 甘草【一钱半】

右?咀水煎服

按此手足阳明太阳药也

治寒热之剂

东垣当归龙胆散治寒热停牙痛

麻黄 升麻 黄连 龙胆草 草豆蔻【各一钱】 白芷 当归尾 骨灰【各半钱】 生地黄【五分】

右件为末擦之

按此太阳阳明少陰厥陰药也

益智仁律散治寒热牙疼

草豆蔻【二钱二分】木律【二分】熟地黄
益智仁骨灰【各钱半】升麻【一钱半】黄连 当归【各四分】

右为末乾擦之如寒多不用木律

按此足阳明厥陰药也

麝香散治热多寒少牙露根肉斷脱血出齿动欲落大作疼痛妨食凉少忤热多

麻黄根【一分】草豆? 黄连【各一钱半】升麻【一钱】益智仁【二分半】当归
生地黄 汉防己【酒制】人参【各三分】熟地黄【二分】骨灰【二钱】麝【少许】

右为抹擦之

按此足阳明太陰药也

攻下之剂

元戎调胃丸治齿痛血出不止

右以谓胃承气汤为末蜜丸服

升麻丸治阳有热攻注牙齿肿痛脉洪大而实

细辛 升麻 防己 羌活 牵牛 大黄

右等分炼蜜丸桐子大每二十丸温水临睡服按此二方阳明例药也论云病源有手阳明之支脉入於齿齿是骨之所终髓之所养若风冷客於经络伤於骨髓冷气入齿根则齿痛或胃与大肠俱热大便秘结经络壅滯而齿斷痛者治法不同也清胃凉血之剂

东垣清胃散治因服热药使上下牙疼不可忍引头脑满面发热大痛喜寒恶热

生地黄【二分酒制】升麻【一钱】牡丹皮【半钱】当归【三分】黄连【三分】

右作末为一服水煎冷服

神功丸治多食肉人口臭不可近牙齿疳蚀牙斷肉将脱齿落血不止

黄连【酒制】 砂仁【各半两】 生地黄 甘草【各三钱】 藿香叶 木香 当归身
兰香叶【如无藿香叶代之各一钱】 升麻【二钱】

右为末汤浸蒸饼丸如菉豆大每服百丸至二百丸白汤食远服

按此二方并阳明例药也

治虫之剂

秘方马夜眼烧存性为末敷上立愈

瑞竹堂方治虫牙疼

天仙子不以多少烧烟用竹筒抵牙引烟燻之其虫即死

谨按牙龈生虫乃阳胃土湿热甚而生也学者宜治其本补剂

金匱八味丸治肾虚牙痛

方见补虚门

三因安肾丸治虚壅牙齿疼痛浮肿

方见腰痛门

按此二方并少陰例药也

取牙药

本事方取牙落不犯手

草乌 毕拔【各两半】 川椒 细辛【各三两】

右为末每少许揩在患处其牙自落

谨按牙齿动摇多因阳明风热或湿热疳蚀牙龈坦露故久则动摇脱之渐也然亦宜求其本而治其内坚药擦其外庶或有可安之意否则一以动摇取之非也况此药太躁恐非所宜姑采之以备其例尔坚牙药

圣济总录方治牙齿动摇

黑锡半斤大锅内化成汁入桑条灰柳木槌研合成砂以熟绢罗为末每日早晨揩牙温水漱
在盂内以水洗眼能明目黑须鬓

食疗云治牙动及血?并差其齿坚牢

皂角【二锭】 盐【半两】

右烧令赤细研夜夜用擦牙齿一月

西岳华峯方

猪牙皂角及生姜 西国升麻熟地黄

木律旱莲槐角子 细辛荷叶要相当【荷叶取心】 青盐等分同烧煨 研细将来用最良

揩牙牢牙髭髮黑 谁知世上有仙方

元戒麝香间玉散

酸石榴皮 诃子【各二两】 升麻 绿矾【枯】 何首乌 青盐 百药煎
五倍子没石子【各两半】 白茯苓【一两】 石胆矾 细辛【各半两】 荷叶灰 白檀 川芎
白芷甘松 茯苓 茴香 藿香叶猪牙皂角【灰】 木鳖子【各二钱】 毕拔
青黛【各一钱半】 麝香【一钱】 脑子【半钱】

右为末用药後茶清漱又方无脑子加沉香二钱

瑞竹堂方痰?散治打动牙齿

痰?根一味烧灰贴动处

东垣白牙散

升麻【一钱】 骨灰【二钱】 白芷【七分】 石膏【一钱半】 麝香【少许】

右为末先以温水漱擦之

按齿者骨之余精气所养然无病不可常擦盖精气肾气反有所恶耳昔人有以苦参揩牙久

病腰者肾受伤也此其铎焉已上方宜随证选用

严氏香盐散常用牢牙去风冷蛀齲宣露一切齿疾大香附子【炒令极黑三两】
青盐【半两另研】

右为细末如常法擦用

玉机微义卷三十

卷三十一

钦定四库全书

玉机微义卷三十一 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

腰痛门

内经叙诸经腰痛

经曰足太阳脉令人腰痛引项脊尻背如重状
少阳令人腰痛如以针刺其皮中循循然不可以俯仰不可以顾
阳明令人腰痛不可以顾顾如有见者善悲足少阴令人腰痛痛引脊内廉
厥阴之脉令人腰痛腰中如张弓弩弦 太阴腰痛下如有横木居其中甚则遗洩

按本论备言诸经及奇经同阴解脉等为痛并刺法甚详宜玩本文

又曰太阳所至为腰痛巨阳虚则腰背头项痛是动则项如拔挟脊痛腰似折髀不可以曲
腰者肾之腑转摇不能肾将败矣

脉经曰凡有所用力举重若入房过度汗出如浴水则伤肾肾胀者腹满引背央央然腰髀痛
肾着之为病从腰以下冷腰重如带五千钱

按此云用力已下为内伤肾着是外因也

脉法

脉经曰尺脉沉腰背痛腰痛时时失精饮食减少其脉洪滑而迟此为可治

刘三点曰腰痛之脉皆沉而弦沉弦而紧者为寒沉弦而浮者为风沉弦而濡细者为湿沉弦
而实者为闪肭

论腰痛为虚宜补

东垣曰太阳气虚则邪客之痛病生矣夫邪者是风热寒湿燥皆能为病大抵寒湿多而风热
少然有房室劳伤肾虚腰痛者是阳气虚弱不能运动故也阳之不足宜补阳如膏粱之人久

服阳药醉以入房损其真陰肾气热则腰脊痛而不能举久则髓减骨枯骨枯发为骨痿陰之不足宜补陰

论腰痛宜刺

经云腰痛上寒不可顾取足太阳阳明 腰痛上热取足厥陰不可以俛仰取足少阳东垣云盖足之三阳从头走足足三陰从足入腹经所过处皆能为痛治之者当审其何经所过分野循其空穴而刺之审其寒热而药之假令足太阳令人腰痛引项脊尻背如重状刺其郄中太阳二经出血余皆仿此

按本篇论刺法甚详宜玩本文然太阳腰痛刺委中出血效速王注经中更言灸疑误灸者宜肾俞腰俞穴论腰痛宜下

子和云腰者肾之腑为大关节血气不行则沉痛不能转侧世人多服补肾药鲜有效者惟用牵牛甘遂等药大泻其湿其痛自可

按此论治只是谓气郁气挫经壅血瘀及湿热甚者宜行此法至於气血不足肾虚之类皆未宜轻举宜以脉体别之丹溪有曰腰痛脉大者肾虚脉濡者瘀血有湿热成痰者不可不辨

论腰痛分三因

陈无择云六经腰痛皆外因大抵太阳少陰多中寒少阳厥陰多中风热太陰阳明多燥湿以类推之失志伤肾郁怒伤肝忧思伤脾皆致腰痛者以肝肾同系脾胃表里脾滯胃闭最致腰痛其证虚羸不足面目?黑远行久立力不能尽失志所为也腹急脇胀目视??所祈不得意淫於外宗筋?纵及为白淫鬱怒所为也肌肉濡渍痺而不仁饮食不化肠胃胀满闭坠腰脇忧思所为也此属内因肾着腰痛腰冷如水身重不渴小便自利饮食如故腰以下冷重如带五千钱因作劳汗出衣里冷湿久久得之肾腰伛僂肿重引季脇痛因於坠堕恶血流滯及房劳疲力耗竭精气致腰疼痛此属不内外因补泻施治

按此所论病机甚详惜乎方治所略今聊具其例一二于左学者自宜推格

腰痛治法

治风之剂

小续命汤治因风腰痛【方见中风门三因方加桃仁炒】三因独活寄生汤治肾虚卧冷湿当风所得

独活【三两】 桑寄生 杜仲【炒】 细辛牛膝 秦艽 茯苓 白芍桂心 川芎 防风

甘草【炙】人参 熟地黄 当归【各等分】

右?咀每四钱水煎空心服

按此足少陰厥陰药也

牛膝酒治伤风毒腰痛

牛膝 川芎 羌活 地骨皮 五加皮 薏苡仁【各一两】 生地黄
甘草【各十两】 海桐皮【二两】 杜仲【一两】

右?咀帛裹入无灰酒浸各二七日夏三五日每服一盃日三五次

按此足太阳少陰药也

治寒湿之剂

济生术附汤治湿伤肾经腰重冷痛小便自利

附子 白术【各一两】 杜仲【炒半两】

右?咀每四钱入姜煎

三因肾着汤治肾虚为病身重腰冷如水洗状不渴小便自利食如故腰以下冷痛如带五千钱

茯苓 白术【各四两】 乾姜 甘草【炙各二两】

右?咀每四钱水煎空心冷服本方姜苓各四两按此二方足少陰药也

治风寒湿之剂

局方五积散治感寒湿脾胃气闭腰痛【方见湿门三因方加桃仁】 东垣川芎肉桂汤治冬月露卧感寒湿腰痛用此代针羌活【一钱半】 柴胡 肉桂 桃仁 当归尾 苍术 甘草【炙】 川芎【各一钱】 独活 麴【炒各半钱】 汉防己【酒制】 防风【各三分】

右?咀作一服好酒三盞煎至一盞食前暖处温服

麻黄苍术汤治寒湿所客身体沉重腰痛面色痿黄麻黄 泽泻 白茯苓

炒麴陈皮【各一钱】 苍术【二钱】 杏仁【十个】 桂枝草豆蔻 半夏
猪苓【各半钱】 黄芩【三分】 甘草【炙二钱】

右?咀作一服水煎食前温服

按此足太阳少陰药也

治湿热之剂

东垣独活汤治因劳役湿热自甚腰痛如折沉重如山羌活 防风 独活 桂

大黄【煨】 泽泻【各三钱】 甘草【炙二钱】 当归连翘【各半两】 防己
黄柏【各酒制一两】 桃仁【三十个】

右?咀每半两酒水各半盏煎空心热服

按此足太阳少陰表里药也

苍术汤治湿热腰腿疼痛

苍术【三钱】 柴胡【二钱】 黄柏 防风【各一钱】

右作一服水煎空心温服

健步丸治下虚湿热腰腿疼痛【方见痿门】

谨按腰痛亦有内因寒热致者详见妇人门师尼寡妇之治论中宜随证为治故其例不复具也

攻下之剂

三因熟大黄汤治坠堕闪肭腰痛不能屈伸

大黄【炒】 生姜【各半两】

右?咀水浸一宿五更去滓顿服之

按此阳明例药也

子和益肾散

甘遂

右为末每三钱獐猪腰子细批开以盐椒等物淹透烂切掺药在内荷叶裹烧熟酒送嚼下

按此足少阴例药也

理气之剂

局方小七香丸治郁怒忧思或因闪挫颠扑一切气滞腰痛

丁香 香附 甘草【各一两二钱】 蓬术砂仁【各二钱】 甘松【八钱】 益智仁【六钱】

右为末水浸蒸饼丸菉豆大每三二十丸米饮下

易简枳壳汤治腰背气动发痛

枳壳【五两】 甘草

右为末葱白汤调下一二钱服讫即卧少时

按已上并太阴例药也

理血之剂

元戎加味四物汤治瘀血腰痛

本方加桃仁红花

按此厥阴例药也

东垣地龙散治打扑伤损从高坠下恶血在太阳经中令人腰脊或胫膂臂痛股中痛不可忍
鼻塞不通中桂【四分】 桃仁【六个】 羌活【二钱】

独活黄柏【各一钱】 麻黄【半钱】 当归【一分】 地龙【四分】 甘草【一钱】
苏木【六分】

右?咀每五钱水煎服

按此出太阳例药也

通关节之剂

济生庵?九治坠堕闪肭血气疑滞腰痛

庵?子【半两】没药 乳香【各二钱半】补骨脂【炒】

蕨灵仙 杜仲【炒】 桂 当归【各半两】

右为末酒糊丸如桐子大每七十丸空心温酒盐汤任下

东垣趁痛丸治打扑闪损腰痛不可忍

白蒺藜子【炒黄】 白粟米【炒】 乳香 没药【各一钱】 乌梅【一个】

右为末蒸饼为丸如弹子大每服一丸细嚼用温酒空心下

按此出厥陰例药也

补剂

局方青娥丸治肾虚腰痛或风寒乘之血气相搏为痛杜仲【姜炒一斤】 破故纸【炒八两】 胡桃【二十个】

右为末蒜四两为膏和丸如梧子大每三十丸空心温酒送下一法酒糊丸不用蒜

黄芪建中汤治男女诸虚不足身重短气腰背强痛

方见补虚门

三因安肾丸治肾虚腰痛

破故纸【炒】 胡芦巴【炒】 茴香【炒】

川楝子【炒】 续断【炒各三两】 桃仁【炒】 杏仁【炒】 山药茯苓【各二两】

右为末蜜丸梧子大每五十丸空心盐汤下

百一选方补髓丹治老人虚弱肾伤腰痛不可屈伸杜仲【炒】

破故纸【各十两用芝麻五两同研以芝麻黑色无声为度筛去芝麻不用】
鹿茸【一两燎去毛酒浸炙】没药【一两另研】

右为末和匀用胡桃三十个浸去皮杵为膏入麪少许煮糊丸如梧子大每百丸温酒盐汤任下

摩腰膏治伤寒湿腰痛

附尖 乌头尖 南星【各二钱半】砂姜【一钱】雄黄 樟脑
丁香【各一钱半】麝香【五粒】

右末炼蜜为膏姜汁化如弹大放掌中火上烘热摩之

按此法是代灸之意灸者宜肾俞二穴腰俞一穴见资生经

玉机微义卷三十一

卷三十二

钦定四库全书

玉机微义卷三十二 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

腹痛门

内经叙腹痛所因

举痛论云寒气入经而稽迟泣而不行客於脉外则血少客於脉中则气不通故卒然而痛其痛或卒然而止者或痛甚不可按或按之痛止或按之无益或喘动应手者或脇肋与少腹相引而痛者或腹痛引陰股者或卒然痛死不知人少间复生者或痛而呕者或腹痛而後泄者或痛而闭不通者各不同形

按本论具已上病形异候皆寒气所因甚详宜玩本文唯痛而闭不通为热气留於小肠肠中痛痺热焦渴则坚乾不得出为热痛此述病机寒热皆能为痛也盖寒痛者多热痛者少

脉法

脉经曰脉细小紧急病速进在中腹中刺痛 陰弦则腹痛 弦急小腹痛 尺脉紧脐下痛 尺脉伏小腹痛症疝 尺脉实小腹痛当利之 心腹痛痛不得息脉细小迟者生坚大疾者死 腹痛脉反浮大而长者死伤寒论曰伤寒脉阳溢陰弦腹中急痛里有虚寒

论伤寒腹痛

成无已云陰寒为邪者则腹满而吐食不下自利益甚腹自痛太陰证也发汗不解医反下之因而腹满时痛者属太阳也桂枝加芍药汤主之大实痛者桂枝加大黄汤主之

东垣曰腹中诸痛皆因劳役过甚饮食失节中气不足寒邪乘虚而入客之故卒然而作大痛经言得灵则止灵者热也以热治寒治之正也然腹痛有部分脏位有高下治之者宜分之

按已上脉证言诸虚痛矣然邪传入里热结下焦实满血结硬痛皆实痛也脉经云腹满按之不痛为虚痛者为实此述病机虚实之异又兼部分高下言也论腹痛为陰毒所致

详见寒门

论腹痛属热

原病式曰热郁于内而腹满坚结痛者不可言为寒也按丹溪曰腹痛有积热者或死血食积湿痰皆能作痛脉弦者食脉滑者痰清痰多作腹痛宜分治之详已上盖言寒热之分故此论及已後病例皆不之及

论腹痛属血

成无已曰邪气聚於下焦则津液不得通血气不得行或溺或血留滞於下是生胀满而鞭痛也若从心下至少腹皆鞭满而痛者是邪实也须大?胃汤下之若但少腹鞭满而痛小便利者则是畜血之证小便不利者则是溺澀之证

论腹痛为疝所致

见疝门

论腹痛为泻痢

详见滞下等门

论腹痛为积聚所致

见积聚门

论腹痛为肠痛所致

见疮疡门

论治腹痛大法

此事难知曰伤寒中脘痛太陰也理中建中黄芩汤之类脐腹痛少陰也四逆真武附子汤之类少腹痛厥陰也重则正阳回阳丹之类轻则用当归四逆汤太陰连少陰痛甚者当变下利不止 杂证而痛四物苦楝汤酒煮当归丸之类夏月腹痛肌热恶热脉洪疾手太陰足阳明主之黄芩芍药汤秋腹痛肌寒恶寒脉沉疾足太陰足少陰主之桂枝芍药汤四时腹痛芍药甘草汤主之

按此治法本伤寒与夫寒疝时行治例也然学者观已上诸病机则脉治思过半矣

腹痛治法

温散之剂

桂枝加芍药汤治腹满时痛脉弱

按此太陰例药也

理中丸治霍乱头疼身寒腹痛

方并见寒门

小建中汤治伤寒阳脉濡陰脉弦腹中急痛者

方见补虚门

按已上太阳例药也

真武汤治腹痛下利四肢沉重

方见寒门

四逆汤治伤寒下利腹痛四肢逆冷

甘草【二钱】 附子【数大片】 乾姜【三钱】

右?咀水煎服

霹雳散治腹痛脉欲絶

附子一枚炮取出用冷灰培之取半两入真腊茶一大钱同研细分二服每水煎临熟入蜜半匙候温冷服

桃花汤治腹痛下利脓血小便不利

赤石脂【一两】 乾姜【一钱】 粳米【一合】

右末水煎服

按已上少陰例药也

当归四逆汤治伤寒小腹急痛

方见寒门

按此厥陰例药也

疎下之剂

仲景桂枝加大黄汤治腹满时痛烦躁

桂枝 生姜【各三钱】 芍药【六钱】 大黄【一钱】 甘草【二钱】 大枣【二枚】

右?咀水煎

大陷胷汤治潮热烦渴从心下至少腹硬满而痛不可近

大黄【六钱】 芒硝【一合】 甘遂【一分】

右先煮大黄去滓内硝再煮後下甘遂末温服按已上太阳例药也

大承气汤治关脉实腹满大便秘按之痛或绕脐痛大黄 厚朴 枳实 芒硝

右?咀水煎

按此阳明例药也

和解之剂

黄连汤治胷中有热胃中有邪气腹中痛欲呕吐者用此升降陰阳

黄连 甘草【炙】 乾姜 桂枝【各三钱】 人参【二钱】 半夏【半合】

右?咀水煎入大枣二枚

芍药甘草汤

白芍药 甘草【炙】

右等分?咀水煎入生姜

元戎云腹痛脉弦伤气用本药 脉洪伤金加黄芩脉缓伤水加桂枝 脉濡伤血加当归
脉迟伤火加乾姜

按已上并太阳例药也

加减小柴胡汤治寒热脉弦腹中痛

本方去黄芩加芍药

四逆散治寒邪变热传里小便不利腹中痛或泄利甘草【炙】 枳实【炒】 柴胡 芍药

右等分每半两水煎

黄芩芍药汤治腹痛脉洪

黄芩 白芍 甘草

右?咀水煎加生姜

按已上并少阳例药也

杂方

元戎四物苦楝汤治脐下虚冷腹痛

四物汤【四两】 玄胡 苦楝【各一两炒】

右?咀水煎服每服一两

酒煮当归丸治小腹下痛

当归【一两】 茴香【半两】 附子 良姜【各七钱】

右四味酒煮乾再焙

炒黄盐 丁香【各半两】 全蝎【二钱】 柴胡【二钱】 升麻
木香【各一钱】 苦楝【半钱】 甘草【炙半钱】 玄胡【四钱】

右酒煮糊丸梧子大每二三十丸空心白汤下

增损当归丸治三陰受邪心腹?痛

四物汤【半两】防风独活全蝎【各五钱】续断茴香【各一两】苦楝
玄胡【各七钱】木香丁香【各二钱半】

右末酒糊丸梧子大每四五十丸白汤下

苦楝丸治奔豚小腹痛

苦楝 茴香 附子

右三味酒煮焙乾末之每两入玄胡半两全蝎炒丁香各十八个为末酒糊丸桐子大每五十
丸食前温酒下

熨法 见寒门

回阳丹治陰毒

牡蛎【烧】 不灰木【烧】 良姜【炒】 川乌【炮】 白芍【各一钱】 麝【少许】

右细末每用一钱男病用女唾津调涂外肾女病用男唾调涂乳上

谨按已前诸方皆伤寒例法也余属血属积聚属疝等因作痛方例见各门兹不备录

玉机微义卷三十二

卷三十三

钦定四库全书

玉机微义卷三十三 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

心痛门 【胃脘痛附】

诸经叙心痛所因

内经曰五脏卒痛何气使然曰寒气客於背俞之脉则血脉泣脉泣则血虚血虚则痛其俞注於心故相引而痛按之则热气至则痛止矣重感於寒则痛久矣

鍼经曰足太陰之脉其支者复从胃别上鬲注心中是动则病舌木强食则呕胃脘痛腹胀善噎心下急痛 胃病者腹?胀胃脘当心而痛上支两脇鬲咽不通

厥心痛者乃寒邪客於心包络也

真心痛者寒邪伤其君也手足青至节甚则旦发夕死夕发旦死

脉经曰愁忧思虑则伤心伤心则苦惊喜忘善怒心伤者其人劳倦即头面赤而下重心中痛彻背其脉弦此心脏伤所致也 诸虫痛者如心腹痛懊憹发作肿聚往来上下行痛有休作心腹中热善渴涎出面色乍青乍白乍赤呕吐清水者虵咬也以手紧按而坚持之无令得移以针刺之久持之虫不动乃出针也

脉法

脉经曰脉陰弦为心痛 心脉微急为痛微大为心痹引背短而数心痛 濇则心痛

脉浮大弦长者死沉细者生论心痛有热厥寒厥不同

病机机要曰诸心痛者皆少陰厥陰气上冲也有热厥心痛者身热足寒痛甚则烦躁而吐额自汗出知为热也其脉浮大而洪当灸太谿及崑仑谓表里俱泻之是谓热病汗不出引热下利表汗通身而出者愈也灸毕服金铃子散则愈痛止服枳术丸去其余邪也有大实心中痛者因气而食卒然发痛大便或秘久而注闷心胸高起按之愈痛不能饮食急以煮黄丸利之利後以藁本汤去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身冷汗出便溺清利或大便利而不渴气微力弱急以术附汤温之寒厥暴痛非久病也朝发暮死急当救之是知久病无寒暴病非热也按此论寒厥热厥与夫大实心痛及治法已详然亦有病久气血虚损及素作劳羸弱之人患心痛者皆虚痛也故钱氏曰心虚者炒盐补之观图经衍义中具蛎治心痛则蛎粉与盐

实得之矣但世俗莫知其妙而先哲不言此例者欲人自求之尔

论心痛分三因

陈无择云十二经络外感六淫则其气闭塞鬱于中焦气与邪争发为疼痛足厥陰心痛两脇急引小腹连陰股相引痛手心主痛彻背心烦掌中热咽乾目黄赤协满足太陰心痛腹胀满瀼瀼然大便不利膈闭咽塞手太陰心痛短气不足以息季脇空痛遗失无度胸满烦心足少陰心痛烦剧面黑心悬若饥胸满腰脊痛背输诸经心痛心与背相引心痛彻背背痛彻心诸腑心痛难以俯仰小腹上冲卒不知人呕吐泄泻此皆诸经诸俞诸腑涉邪所致病属外所因若五脏内动汨以七情则其气痞结聚于中脘气与血搏发为疼痛肝心痛者色苍苍如死状终日不得安息真心痛者【云云见前】脾心痛者如针锥刺其心腹蘊蘊然气满肺心痛者若从心间起动作痛益甚色不变肾心痛者与背相引善噤如物从後触其心身伛偻胃心痛者腹胀满不下食食则不消皆脏气不平喜怒忧郁所致属内因饮食劳逸触忤非类使脏气不平痞膈于中食饮遁注变乱肠胃发为疼痛或饮啖生冷果实中寒不能消散结而为积遇食还发名积心痛及其脏寒生虺致心痛者所谓九种心痛曰饮曰食曰风曰冷曰热曰悸曰虫曰疰曰去来痛者除风热冷属外所因余皆不内外更妇人恶血入心脾经发作疼痛尤甚於诸痛更有卒中客忤鬼击尸疰使人心痛亦属不内外因

按此具三因病机甚详但欠诸经病及九痛治例欲人自扩充尔然脏病连心心病连脏及胃脘病结胃之不同久新淫郁之异随其所甚者为疗故宜其无所定之法也矧有七情九种之致者丹溪先生亦曰凡心膈之痛须分久新若明知身受寒气口食寒物而病於初得之时当用温散或温利之药若其病得之稍久则成郁矣郁则蒸热热久必生火原病式中备言之矣若欲行温利温散宁无助火添病耶由是古方中多以山梔为热药之乡导则邪易伏病易退然向安之後若纵恣口味病必复作凡治此病必要先问平日起居何如假如心痛有因平日喜食热物以致死血留於胃口作痛者用桃仁承气汤下之若此等例皆前人所未举也学者识之

心痛治法

治寒之剂

金匱赤石脂丸治心痛彻背背痛彻心

乌头【一分炮】附子【半两炮】蜀椒 乾姜赤石脂【各一两】

右末密丸如梧子大食後汤下一丸日三服

九痛丸治九种心痛兼卒中恶腹胀痛

附子【三钱炮】生狼牙【二钱炙】巴豆【一钱去皮心熬研如脂】人参 乾姜 吴茱萸【各一钱】

右六味为末炼蜜丸梧子大酒下强者初服三丸

三因仓卒散治气自腰腹间攻心挛急痛不可忍腹中冷白汗如洗手足冷

山梔【四十九个连皮烧半过】附子【一个炮去皮脐】

右为末每二钱酒一盏入盐少许煎温服

元戎术附汤治寒厥暴痛脉微气弱

甘草【炙一两】白术【四两】附子【炮去皮脐切片一两半】

右?咀每三钱入姜枣煎服

宣明神砂一粒丹治一切厥心痛

附子【炮】郁金 姜红【各半两】

右为末醋麝糊丸如酸枣大以朱砂为衣每服一丸男子酒下妇人醋汤下

按已上出少陰例药也

机要藁本汤治大实心痛大便已利宜此服之

藁本【半两】苍术【一两】

右为粗末水煎服

按此足太陰太阳药也

东垣麻黄豆蔻丸治客寒犯心胃大痛不可忍

麻黄【不去节一钱】草豆蔻【五钱】益智仁【八分】炒麴【二钱】升麻 半夏 麦藁砂仁 黄芩 白术 陈皮 柴胡炙甘草 吴茱萸 当归身【各半钱】木香 青皮 厚朴 毕澄茄【各四分】苏木【三分】红花【二分】

右为末汤浸蒸饼为丸如桐子大每三十丸温水下或细嚼按此出太阳例又气血之剂也
治热之剂

大陷胸汤治热结胸中脉沉而紧心下痛按之石硬

大黄【六钱】 芒硝【半合】 甘遂【一分】

右先煮大黄後下硝遂末取温服

按此阳明例药也

机要金铃子散治热厥心痛或发或止久不愈者

金铃子 玄胡【各一两】

右为末每服二三钱酒调下温汤亦得

瑞竹堂方应痛丸治心气痛不可忍者

好茶末【四两】 拣乳香【二两】

右为末用腊月兔血和丸如鸡头大每服一丸温醋汤下按此二方少陰经药也

调血之剂

元戎四神汤治妇人血虚心腹?痛

本方减地黄加乾姜

济生愈痛散治急心痛胃脘痛

五灵脂 玄胡索【炒】 莪术 良姜

当归

右等分为末每一钱热醋汤调下不拘时候服

钱观文方治心脾疼

当归【八两】 白术【一分】

右为末沸汤点服一二钱

丹溪方治死血胃脘痛者

玄胡【一两半】 桂 滑石 红花红麴【各半两】 桃仁【三十个】

右为末汤浸蒸饼丸

按已上并厥陰例药也治血虚血实例各不同宜选用理气之剂

局方苏合香丸治疰忤鬼气卒心痛

方见气门

按此厥陰例药也然世俗多用蟠?散

方见疝门宜较轻重选使

元戎立应散治心腹急痛

香附子【炒】 良姜【等分】

右细末每二钱汤点服

济生加味七气汤治七气为病及外感风寒为心痛

半夏【五两】 桂 玄胡【炒各一两】 人参甘草【各半两】 乳香【三钱】

右?咀每四钱入姜煎

按已上太陰例药也

理气调血之剂

杨氏方郤痛散治心气冷痛不可忍

五灵脂 蒲黄【炒一两半】 当归 桂

石菖蒲 木香 胡椒【各一两】 川乌【炮七钱半】

右?咀每四钱入盐醋少许煎

按此出厥陰例药也

百一选方手拈散治心脾疼

草果 玄胡 五灵脂 没药

右等分每三钱温酒调下

宣明没药散治一切心肚疼痛不可忍者

没药 乳香【各三钱】 穿山甲【炙五钱】 木鳖子【四钱】

右为末每半钱至一钱酒大半盏同煎温服

消导之剂

元戎厚朴丸治大实心痛

方见积聚门

百一选方姜橘丸治中酒恶心心脾痛呕逆

生姜【一斤青盐一两淹一宿】 青皮 砂仁 木香【各三分】 莪术【一两】 甘草【炙】
陈皮【一两半】

右末炼蜜丸杵千下丸如樱桃大每丸盐汤下

易简感应丸治酒积食积痰积为患心腹?痛

丁香 木香 豆蔻 乾姜 巴豆 杏仁 百草霜

右用见成丸子半两入巴豆十个去殼研成膏用乌梅三个蒸过去肉三件一处研令极匀丸
如菉豆大每三五丸温水下

丹溪方治痰饮积胃脘痛

螺蛳殼【墻上年久者烧】 滑石【炒】 苍术山梔 香附 南星【各一两】 枳殼青皮 木香
半夏 砂仁【各半两】

右为末生姜汁浸蒸饼丸如菉豆大每三四十丸姜汤下春加川芎夏加黄连秋加芍药冬加
吴茱萸半两按已上出太陰例药也

治虫之剂

三因集效丸治脏腑虚弱或多食甘肥致蛰动作心腹绞痛

木香 鹤虱【炒】 槟榔 诃子【煨去核】 茺莢【炒】 附子【炮】
乾姜【炒各七钱半】 大黄【一两半炒】

右为末密丸如梧子大每三十丸食前橘皮汤下妇人醋汤下

按此阳明例药也姑录此以备其例

杂方

衍义方铜青一味淡醋汤调些小服之

集录方荔枝核一味烧存性为末用醋汤调下一钱失笑散治心腹痛百药不效

五灵脂 蒲黄【等分】

右为末先以酃醕调二钱熬成膏入水一盞食前温服

玉机微义卷三十三

卷三十四

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷三十四 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

头痛门

论厥头痛真头痛

灵枢云厥头痛取足六经手少阴真头痛头痛其脑尽痛手足寒至节死不治【详见厥病篇】

难经云手三阳之脉受风寒伏留而不去则名厥头痛入连在脑者名真头痛

按灵枢有厥头痛之名而不指何邪为病至难经始言风寒伏留不去而三因严氏论云气血俱虚风寒暑湿之气所侵传於阳经伏留不去名曰厥头痛盖厥者逆也逆壅而冲於头也痛引脑巅至泥丸宫者名真头痛非药之能愈夕发旦死旦发夕死则根气先绝也斯言得之矣

头痛脉法

内经云寸口脉中短者曰头痛

脉经云阳弦则头痛又云寸口脉浮中风发热头痛脉紧头痛是伤寒脉紧上寸口者风头痛

脉诀云头痛短澁应须死浮滑风痰皆易除

伤寒头痛

活人书云头痛者阳证也太阳证头痛发热恶寒无汗麻黄汤有汗桂枝汤若已发汗未发汗头痛如破者连须白汤不止者葛根白汤阳明证头痛不恶寒反恶热胃实也调胃承气汤少阳头痛小柴胡汤太阴少阴并无头痛之证仲景只有厥阴一证吴茱萸汤按伤寒以足三阳经上行至头并厥阴与督脉会于巅故止言四经头痛若杂病所感者诸经皆能头痛也活人用白汤以通上下之阳气也

诸经内外头痛用药法

太阳头痛恶风寒川芎 少阳头痛往来寒热脉弦柴胡 阳明头痛自汗发热恶热白芷
太陰头痛体重痰实腹痛半夏 少陰头痛三陰三阳经不流行而足寒逆为寒厥头痛细辛 厥
陰头痛项痛脉微浮缓欲入太阳其疾痊然亦当用川芎【宝监作藁本一作吴茱萸】 气虚
头痛黄芪 血虚头痛当归【宝监作川芎下同】 诸气血俱虚头痛黄芪当归
伤寒太阳头痛麻黄汤桂枝汤 阳明头痛白虎汤 少阳头痛柴胡汤
太陰头痛脉浮桂枝汤脉沉理中汤 少陰头痛脉沉微热麻黄附子细辛汤
厥陰头痛外伤本经桂枝麻黄各半汤 呕而微吐水吴茱萸汤

按此与後论重出者衆然中间药味略有不同故两存之

东垣头痛论

金匱真言论云东风生於春病在肝俞在头项故春气者病在头又诸阳会於头面如足太阳之脉病冲头痛足少阳之脉病头角颌痛夫风从上受之风寒伤上邪从外入客於经络令人振寒头痛身重恶寒治在风池风府调其陰阳不足则补有余则泻汗之则愈此伤寒头痛也头痛耳鸣九窍不利者肠胃之所生乃气虚头痛也心烦头痛者病在膈中过在手巨阳少陰乃湿热头痛也如气上不下头痛巅疾者下虚上实也过在足少陰巨阳甚则入肾寒湿头痛也如头半寒痛者先取手少阳阳明後取足少阳阳明此偏头痛也有真头痛甚则脑尽痛手足寒至节者死不治有厥逆头痛者所犯大寒内至骨髓髓者以脑为主脑逆故令头痛齿亦痛凡头痛者木也风则温也治以辛凉秋剋春之意故头痛皆以风药治之者总其大体而言之高巅之上惟风可到故味之薄者陰中之阳乃自地升天者也然有三陰三阳之异故太阳头痛脉浮紧恶风寒川芎羌活独活麻黄之类为主少阳经头痛脉弦细往来寒热柴胡为主阳明头痛身热目疼鼻乾恶寒发热恶热其脉浮缓而长升麻汤或石膏白芷为主太陰头痛必有痰体重或腹痛为痰癖其脉沉缓苍术半夏南星为主少陰经头痛三陰三阳经不流行而足寒气逆为寒厥其脉沉细麻黄附子细辛汤为主厥陰头痛项痛或痰吐涎沫厥冷其脉浮缓吴茱萸汤主之诸血虚头痛当归川芎为主诸气虚头痛人参黄芪为主为主者主治也兼见何证以佐使药治之此立方之大法也气血俱虚头痛者於调中益气汤中少加川芎蔓荆子细辛其效如神半夏白术天麻汤治痰厥头痛药也青空膏乃风湿热头痛药也羌活附子汤厥逆头痛药也如湿气在头者以苦吐之不可执方而治

按此论头痛至为详悉首言伤寒内伤头痛历引内经以明湿热寒湿偏头痛真头痛厥逆头痛等证细分六经用药之法後世无以加矣

论三阳受病头痛

子和云头痛不止乃三阳受病也三阳分部分头与项痛者足太阳经也攢竹痛俗呼为眉虎骨痛者是也额角上痛俗呼为偏头痛者足少阳经也如痛久不已则令人丧目以三阳受病

皆胸膈有宿疾之致然也先以茶调散吐之吐讫可服川芎薄荷辛凉清上之药叔和云寸脉急而头痛是也

按此云头痛乃三阳受病皆胸膈有痰之致乃指病之壅郁於上而言也内经云春气者病在头盖天气在上知病气亦升於上也吐之所以宣达在上之邪仲景云大法春宜吐是也此亦治头痛之一法但不可专执於此

论头痛属火热之病

子和云丹阳僧病头热痛不散见明以布圍其巔上置冰於其中日易数次戴人曰此三阳畜热故也乃置炭火於煖室中出汗涌吐三法并行七日而愈

一妇人偏头痛五七年大便结燥两目赤肿眩运世之头风药无不服其头上针艾数千百矣一日戴人诊其脉急数而有力风热之甚也此头角痛是三焦相火之经乃阳明燥金胜也燥金胜乘肝则肝气郁肝气郁则气血壅气血壅则上下不通故燥结於里寻至失明治以大承气汤令河水煎二两加芒硝一两煎成顿令分二五服下泄如汤二十余行次服七宣丸神功丸以润之蒺藜葵菜猪羊血以滑之三剂之外目豁首轻燥泽结释而愈

按此所治之疾既已多年不解岂非风湿热三气郁滞胶固而然哉故其所施之法虽峻而於中病之情则得也又论头风之甚者久则目昏偏头风者少阳相火也久则目束小大便秘澁皆宜出血而大下之出血之义是即开郁解表也

谨按头痛之证其原甚多东垣之论可谓详矣然自外而致者有风寒暑湿之异若仲景之伤寒东垣分六经之类皆是也自内而致者有气血痰饮五脏气郁之异东垣论气虚血虚痰厥头痛之类皆是也大抵四淫皆外邪随其风寒湿热多少而治於外也气血痰饮五脏之证皆内邪亦宜随其血气痰饮七情内火分虚实寒热而调其内以治於外也然气血虚而用补宜东垣之论若三因等方用附子以治气虚此则从阳虚立意非人身平和之血气也若夫久年偏正头风者多因内挟痰涎风火郁遏经络气血壅滞之证然亦有血虚者须宜分别以治之

头痛治法

治风之剂

局方川芎茶调散治头风上攻偏正头痛

方见伤风门

秘藏彻清膏

川芎 薄荷叶【各三分】 藁本【一钱】 甘草【生半钱】 炙甘草【半钱】 蔓荆子 细辛【各一分】

右为末每二钱茶清下食後服

按此手足少阳厥陰太阳少陰经药也

元戎治三阳头痛

羌活 防风 荆芥 升麻

葛根 白芷 石膏 柴胡 川芎 芍药 细辛 白【连须】

若陰证头痛只用温中药足矣如理中姜附辈此则专治三阳头痛也

治风寒之剂

仲景麻黄汤治太阳伤寒头痛无汗

桂枝汤治太阳伤风头痛有汗

二方并见伤寒门

局方如圣饼子治风寒伏留阳经气厥痰饮头痛防风 天麻【各半两】 南星 乾姜 川芎 甘草【炙各一两】 半夏【半两】 川乌【去皮一两】

右细末蒸饼糊丸捻作饼子每五饼同荆芥穗细嚼茶清下

按此足三阳经药也

秘藏羌活附子汤治冬月大寒犯脑令人脑痛齿亦痛名曰脑风

麻黄【不去节】 黑附子 防风 白芷 白僵蚕 黄栢【各二分】 羌活 苍术【各半钱】 升麻【二分】 黄芪【一分】 甘草【二分】 佛耳草【三分无寒嗽去之】

右?咀水煎服

按此手足太阳阳明太陰经药也

宝监川芎神功散治风热上攻偏正头痛

川芎 川乌 白芷 南星 麻黄【各半两】 甘草【一分】

右为末每服三钱姜水煎服

按此手足少阳厥阴手阳明太阴经药也

三因芎辛汤治伤风寒生冷及气虚痰厥头疼如破兼眩暈呕吐

附子【去皮脐生用】 乌头【生】 天南星 乾姜

甘草【炙】 川芎 细辛【各等分】

右剉散每四钱姜五片茶芽少许煎服

按此足少阳经药也

严氏小芎辛汤治风寒在脑或感邪湿头重头疼眩暈呕吐川芎【一两】 细辛 白术
甘草【炙各半钱】

右?咀每四钱生姜五片茶芽少许煎服

局方加減三五七散治风寒入脑阳虚头痛

山茱萸【去核三斤】 细辛【一斤半】 乾姜【炮三斤】 防风【四斤】 附子【三十五只
炮去皮脐】 茯苓【去皮三斤】

右为末每二钱温酒调下

按已上二方亦足少阴经药也

治风热之剂

秘藏青空膏治偏头疼年深不愈者及疗风湿热头痛上壅损目

羌活 防风【各一两】 柴胡【七钱】 川芎【五钱】 甘草【炙一两半】
黄连【炒一两】 细挺子黄芩【三两一半酒洗一半炒】

右为末每服二钱匕热茶调如膏抄在口内少用白汤送下如苦头痛加细辛二分如太陰脉缓有痰减去羌活防风川芎甘草加半夏【一两半】如偏头痛服之不愈减羌活防风川芎一半加柴胡一倍如阳明头痛只与白虎汤中加白芷

按此足三阳经药也

川芎散治头目不清利

川芎【三分】羌活防风藁本升麻甘草【各一钱】柴胡【七分】
黄芩【炒四钱半】黄连【四钱半酒洗】生地黄【一钱】

右为末每服一二钱茶清调下

按此亦三阳经药也

细辛散治偏正头疼

细辛【二分】川芎【七分】柴胡【二钱】
黄芩【二钱一半酒洗一半炒】瓦粉【二钱】
炙甘草【一钱半】黄连【七分】芍药【半钱】

右?咀每服三钱煎服

按此少阳少陰太陰经药也

宝监石膏散治头疼

川芎石膏白芷【等分】

右为末每服四钱热茶清调下

按此阳明少阳经药也已上东垣治风热头痛诸方多不同者以其有脏腑经络之异也今不详载其方然有用羌活防风川芎柴胡升麻藁本细辛之异者行各经也有用黄芩黄连黄柏知母石膏生地黄之异者分各脏泻火也用泽泻茯苓者导湿也又使邪气自天而降也用黄芪者补气行气也各随病而增损之意不可拘执也

治湿之剂

三因芎术汤治湿着头重眩晕痛极

川芎 白术 附子【生去皮尖各半两】 桂心 甘草【各一分】

右?咀每服四钱姜七片枣一枚同煎食前服按此足少陰经药也治寒湿之药有热者不治痰厥头痛之剂

秘藏半夏白术天麻汤治素有脾胃之证时显烦燥大便不利又出入为寒气所郁闷乱大作火郁不伸故也医疑有热服疎风丸下之元证不减复添呕逆食不能停痰唾稠粘涌出不止眼澁头旋恶心烦闷气短促上喘无气力目不敢开如在风云中头苦痛如裂身重如山四肢厥冷是胃气已损复下两次重虚脾胃病名曰痰厥头痛

半夏【一钱半】 白术 炒麴【各一钱】 天麻

黄芪 人参 苍术 陈皮

泽泻 茯苓【各半钱】 大麦麴【一钱半】 乾姜【三分】 黄柏【二分】

此头痛苦甚为足太陰痰厥头痛非半夏不能疗目黑头旋风虚内作非天麻不能除【详见试效方】

家珎水煮金花丸治头痛每发时两颊青黄眩晕目不欲开懒欲言语身重兀兀欲吐数日方过此厥陰太陰合而为病名曰风痰服此药更灸侠谿二穴不旬日愈

局方玉壶丸加雄黄白术以治风湿

按此出太陰呕啰例治风痰之药也

严氏三生丸治痰厥头痛

半夏 白附子 南星【各一分】

右为细末生姜自然汁浸蒸饼为丸菉豆大每服四十丸食後姜汤下

按此药出厥陰南星半夏例亦治风痰之药也

宝监茯苓半夏汤治风热痰逆呕吐头痛

大半夏【三枚】 赤茯苓【一分】 黄芩 甘草 陈皮【各二分】

右剉姜三片煎

按此手足太陰经药治痰挟热之药也其治痰挟寒之药与治风寒之剂相类者采之

补气之剂

宝监顺气和中汤治年高气弱清气不能上升头面昏闷本无表邪因发汗数次清阳之气愈虚故苦头痛恶风不喜饮食气短脉弱弦细而微宜升阳气黄芩【一钱半】人参【一钱】白术 陈皮当归 白芍【五分】甘草【七分】升麻柴胡【各三分】川芎 细辛 蔓荆子【各二分】

右剉作一服水煎食後服

按此即补中益气汤加減法也内伤头痛本方加蔓荆子三分痛甚加川芎二分项痛脑痛加藁本二分若苦头痛者加细辛二分诸头痛并用此四味足矣若头上有热则此不能治当以清空之剂

补血之剂

机要四物汤治头疼

四物汤中倍加川芎

元戎古方治头痛欲裂

当归【二两酒一升煮取六合】

按此二方并出厥陰例药也

搐药

本事方治八般头风

草乌尖 细辛【等分】

黄丹【少许】为末搐入鼻中立効

秘方治头痛不可忍

玄胡【七枚】猪牙皂角【肥实者二个】青黛【二钱】

右为末水丸成小饼子如杏仁大用时令病者仰卧以水化开用竹管送入男左女右鼻中觉药至喉少酸令病者坐却令咬定铜钱一个於当门齿当见涎出成盆即愈

三因搐鼻药

荜拨 良姜【各一分】 白芷【一钱】 细辛【半钱】

右为末每服一小字先含水一口分搐鼻内吐水即止

秘藏搐鼻郁金散治风热头痛

石膏 芒硝 白芷【各二钱】 郁金【一钱】 薄荷【三分】

右为末极细口含水鼻内搐之

按此阳明经药也

太阳经嚏药

防风【二分】 羌活【二分】 红豆【二个】

右为末鼻内搐之

元戎搐药瓜蒂散治偏头痛久不愈服药及针灸不效者以其湿气在头也

瓜蒂一味为末少许吹鼻中清水徐徐出一昼夜湿尽病止为度

按此已上搐药元戎云亦吐之义也经云湿气在上以苦吐之故邪在胸中服之邪在头目搐之皆吐之属也张子和点目出泪搐鼻流涕口含漉涎皆以同乎吐也

贴药

前本事方或三因药为末和?白捣泥为膏贴两额上

杂方

严氏?附丸治元气虚壅上攻头痛

附子【一只炮去皮脐】

右为末?涎为丸桐子大空心茶清下

玉真丸治肾厥头痛不可忍其脉举之则弦按之则坚生硫黄【二两另研】石膏【硬者】半夏【汤洗十次】硝石【另研各一两】

右为末研匀用生姜自然汁煮糊为丸桐子大每服四十丸食前米饮下

按头痛古人多从风而议治故其药虽有辛平辛凉辛温辛热之殊大抵皆於解散之中分所挟之寒热耳至於伤寒头痛仲景论中亦详兹不详载但内因痰厥气虚血虚头痛之类东垣虽有论有方学者亦宜随病审机而用药亦难拘於所录之方以尽其变也又严氏治气虚头痛用附子治肾厥头痛用硫黄等药本出三因之论其义皆未切当今姑存之以备其说耳

玉机微义卷三十四

卷三十五

钦定四库全书

玉机微义卷三十五 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

头眩门

论头眩属肝虚

内经云徇蒙招尤目瞑耳聋下实上虚过在足少阳厥陰甚则入肝

按许学士云上虚者肝虚也攻肝虚则头晕徇蒙者如以物蒙其首招摇不定目眩耳聋皆晕之状也故肝厥头晕治宜钩藤散【方见後】

论眩晕属肝木风火之证

原病式曰诸风掉眩皆属肝木风主动故也所谓风气甚而头目眩晕者由风木旺必是金衰不能制木而木复生火风皆属阳阳主乎动两动相搏则为之旋转故火本动也焰得风则自然旋转也

论伤寒头眩属虚

成无已云伤寒头眩责其虚也起则头眩与眩冒者皆发汗吐下後所致是知阳虚也故针经曰上虚则眩然风家亦多有眩者风主动故尔

论眩晕分内外所因等证

严用和云眩晕之证经虽云皆属於肝风上攻所致然体虚之人外感六淫内伤七情皆能眩晕当以脉证别之风则脉浮有汗项强不仁寒则脉紧无汗筋挛掣痛暑则脉虚烦闷湿则脉细沉重吐逆及其七情所感遂使脏气不平郁而生涎结而为饮随气上逆令人眩晕眉棱骨痛眼不可开寸脉多沉此为异耳若疲劳过度下虚上实金疮吐衄便利及妇人崩伤产後去血过多皆令人眩晕当随其所因而治之

按此所分四气痰饮亡血等证可谓亲切但其所集之方则欠发明学者当自求之

论头风眩晕有饮宜吐

子和云大风头风眩晕手足麻痹胃脘发痛皆风寒湿三气杂至合而为痹也在上谓之停饮可用独圣散吐之吐讫後服清上辛凉之药

按此法施於胸膈痰涎闭塞多年眩晕不已血气充实之人其效甚捷

谨按眩晕一证人皆称为上盛下虚所致而不明言其所以然之故盖所谓虚者血与气也所谓实者痰涎风火也原病之由有气虚者乃清气不能上升或汗多亡阳而致当升阳补气有血虚者乃因亡血过多阳无所附而然当益陰补血此皆不足之证也有因痰涎郁遏者宜开痰导郁重则吐下有因风火所动者宜清上降火若因外感而得者严氏虽分四气之异皆当散邪为主此皆有余之证也世有所谓气不归元而用丹药镇坠沉香降气之法盖香窜散气丹药助火其不归之气岂能因此而复耶内经所谓治病必求其本气之不归求其本而用药则善矣头眩治法

治风之剂

本事川芎散治风眩头晕

山茱萸【一两】山药 甘菊花 人参茯神 小川芎【各半两】

右为末每服二钱酒调下

按此名治风眩而用药带补肝之意若因风而头眩者分其所挟寒热而用辛温辛凉之剂可也若因肝虚而病者此药虽近理亦难执此而用

治风寒之剂

严氏三五七散治阳虚风寒入脑头痛目眩耳鸣天雄【炮去皮】细辛【各三两】山茱萸 乾姜【炮各五两】防风 山药【炒各七两】

右为末每服二钱温酒调下

按此治上焦阳虚发散风寒之药也若果有风寒所伤而头眩者但用辛温辛热之剂解散可也何必拘此

治湿之剂

严氏芎术汤治冒雨中湿眩晕呕逆头重不食

川芎 半夏 白朮【各一两】 甘草【炙半两】

右?咀每服四钱姜七片煎

按此和中散湿之药也亦可治痰

治湿之剂

子和芎黄汤治头目眩暈

大黄 荆芥 川芎 防风【各等分】

右为粗末大作剂料水煎去滓服以利为度

按此泻上焦风热之药也若果有风热头眩如防风通圣之类皆可选拣而用

治痰之剂

严氏玉液汤治七情感动气郁生涎随气上逆头目眩暈心嘈忪悸眉棱骨痛

大半夏【汤洗七次】

右每服四钱水煎生姜十片煎入沉香水一呷温服风痰眩暈者宜青州白丸子选用

直指二陈汤治因气郁痰眩暈

二陈加乾生姜煎服

按此二方去痰和中之平剂足太陰阳明经药也若痰气甚者如吐下之法皆可施自宜随证而用去痰和中瑞竹堂化痰丸亦妙【方见效门】

治血虚头眩之剂

严氏芎藭汤治一切失血过多眩暈不苏

芎藭 当归【酒浸各等分】

右?咀每服四钱水煎服

良方治风六合汤治风虚眩晕

四物汤加秦艽羌活【详见中风门】

按已上二方皆补血和血之药并出厥陰例然芎归补血之阳而四物则陰阳俱补秦艽羌活可为佐使不宜等分而用

治气虚头眩之剂

直指香橘饮治气虚眩晕

木香 白术 半夏麴 橘皮 白茯苓 砂仁【各半两】 甘草【炙】 丁香【各一分】

右剉每服三钱姜五片煎吞苏合香丸本方加芎归各三分官桂半两治血虚眩晕

按直指方云淫慾过度肾家不能纳气归元使诸气逆奔而上此眩晕出於气虚也吐衄崩漏肝家不能收摄荣气使诸血失道妄行此眩晕生於血虚也夫既曰肾家不能纳气使气奔上而用此香散辛热之药此药果能降气乎又曰气虚此药果能补气乎又曰血虚加芎归官桂夫血虚用芎归则可矣所加官桂与丁香木香等药纵使血有虚寒亦难例用若血虚有热者其害将何如哉孟子所谓尽信书则不如无书者正此类也

治下虚头眩之剂

局方黑锡丹治陰阳不升降上盛下虚头目眩晕养正丹治虚风头旋吐涎不已此药升降陰阳

二方并见局方以乳香泡汤送下

顺气散治体虚痰盛气不顺头目眩晕

南星【一两炮】 川乌 附子【各半两】 木香【二钱半】

右每服三钱姜十片煎

严氏沉香磁石丸治上盛下虚头目眩晕耳鸣耳聋沉香【半两另研】 磁石【火煨醋淬七次研】 胡芦巴【炒】 川巴戟【去心】 阳起石【煨】 附子【炮】 椒红【炒】 山茱萸肉 山药【炒各一两】 青盐【另研】 甘菊花 蔓荆子【各半两】

右为细末酒煮米糊丸梧子大每七十丸空心盐汤下

按已上诸方皆是温热金石镇坠之药虽能补下焦之阳虚然金石体质虽重必候火煨而成佐以燥热之药多致飞越之亢况眩晕多有属风属火之证用者宜致思焉

杂方

本事钩藤散治肝厥头晕清头目

钩藤 陈皮 半夏 麦门冬 茯苓 茯神 人参 甘菊花 防风【各半两】 甘草【一分】
石膏【一两】

右?咀每四钱姜七片煎

按前许学士所论近是则此方用药其义未详谨按头晕诸方用药俱未切当直指香橘饮之说尤为背理大抵外邪之感理宜解表但随其风寒暑湿以治痰涎内蓄者必当清痰为先气虚者宜补气如东垣之法血虚者宜补血如四物增损之类若肾虚而气不降者又当益阴而补肾若专执前药岂能中其肯綮耶

玉机微义卷三十五

卷三十六

钦定四库全书

玉机微义卷三十六 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

欬逆门

叙欬逆为病

内经云岁金太过欬逆金郁之发欬逆少陰二气欬逆按内经所言欬逆者止此他书惟伤寒论欬逆脉散者死又金匱治欬逆上气诸方而已似皆指肺金及火为病也活人书谓欬逆证为极恶仲景所不载孙真人云徧寻方论无此名遂断欬逆为哕证而灵枢云哕者穀入於胃胃气上注於肺故寒气与新穀气俱入於胃新故相乱真邪相攻气并相逆复出於胃故为哕注云哕气忤也忤偶敌也保命集又以欬逆为噫噫气者胸中气不交也少陰经至胸中交於厥陰水火相传而有声灵枢云噫者寒气客於胃厥逆从下上复出於胃故为噫注云噫象火焰随焰出心不受邪故噫出之愚谓二说各有其义未知是否而难知力辨朱氏之非其论见後论伤寒欬逆有寒有热

活人书云欬逆者仲景所谓哕是也胃寒所生伤寒本虚攻其热必哕又云伤寒大吐下之极虚後极汗出者因得哕所以然者胃中寒冷故也橘皮乾姜汤羌活附子散半夏生姜汤退陰散主之不差者灸乳下必愈然亦有阳证者欬逆者有潮热时时哕小柴胡汤橘皮竹茹汤又云伤寒哕而腹满视其前後何部不利利之愈按活人书以欬逆为哕故今从而以仲景言哕者入於欬逆之门纵使仲景言哕非此证而活人论证用药则是欬逆而非呕哕大抵欬逆者多由汗下之後胃虚而作活人以虚作寒治故用诸温热之药然亦有虚而有热者有实而有热者所引橘皮竹茹汤未能详尽也欬逆分陰阳证

略例云阳证欬逆者胃热失下也陰消将尽阳逆上行使陰不内也为之恶候或兼以舌拈语言不正而反昏胃与咽痛者少陰也速下之宜大承气汤若阳极脉微将尽者不宜下宜泻心汤养陰退阳而已凉膈芒硝清肺亦可陰证者内已伏陰陰气太甚肾水擅权肝气不生胃火已病丁火又消所有游行相火寒邪迫而率集於胸中亦欲尽也故令人发热大渴引饮并去盖覆病人独觉热也他人按之身体皆寒此火即无根之火也故用丁香乾姜之类温胃其火自下欬逆乃止非如阳证以凉膈泻心汤退心火陰气乃生且陰证欬逆从呕哕而生胃寒呕哕不已阳逆继之也按欬逆本由陰气已虚阳火暴甚直冲而上出於胃入於肺而作声东垣用凉药者所以泻热降火也若夫所谓陰证欬逆者盖以陰气先消阳火亦竭浮於胸中亦欲散也故不宜用寒而反以温药养胃留其阳气胃气一和阳生则陰长之说也而此略例以阳

证为失下用承气泻心二药分便秘便软用之则可矣以陰证为陰气太甚肾水擅权寒邪迫火而上愚谓肾陰若盛则火自不妄动矣其所谓寒邪者未审其指受外寒耶内寒耶还只是虚耶姑俟明哲

又案张子和云火欲上行为寒邪所遏寒不胜火故作声此则是上寒遏下热与外寒郁内热之义同亦与前说不同

辨欬逆与哕不同

难知云夫欬逆证活人断为哕逆其说似是而非盖哕者乾呕也若有物直出则为吐也呕物旋出则为哕也呕无物出则为哕也欬逆者或水渍於肺而心痞或连续不已而气逆或喜笑过多而气噎或咽饮而错喉而气抢或急食乾物而气塞皆能作欬逆之声连续不絕俗谓之吃忒是也大抵欬逆者不顺之义吃忒者差错之义二者皆气不得下为火热托之而使上至咽喉中噎而止也人或以纸捻鼻而止或诈冤盗贼因恐而止或鼻热闻食香调气而止皆抑之骇之而使气下也千金以欬逆上气者为病肺脉散者死是心火刑於肺金也是以李氏称易老云欬逆者火热奔急上行而肺金不内何其当哉故便秘者大承气汤下之便软者泻心汤主之朱氏断为胃寒并阳证二法用药治哕虽胜大抵其哕之意止是气逆上行似欬逆耳即非仲景所谓欬逆之本证也尽哕者出声也哕出其气哕声尽然後吸欬逆者入声也抑气不出逆声尽然後呼也出入呼吸其大不同兼呕哕者本於胃欬逆者本於肺何其难辨哉

欬逆哕分手足经标本辨

难知云活人以欬逆为哕谓若可下之宜调胃承气汤是邪气在胃故断之为哕是则然矣抑不思欬逆者是足阳明失下传手太陰活人但言其火之本不言其火之标炎上至极高之分而欬逆也合而观之哕与欬逆同一热也分而言之哕为本为胆为胃为中欬逆为标为心为肺为上若标病应见止当治标不必名哕若言作哕使後人只见胆胃本而不见心肺标也此一说又足经甲戌而传手经丁辛也

按海藏论欬逆与哕二者不同谓其声有出入之异脏腑有肺胃标本之殊其说尤长但欬逆与哕其气皆自下而上呕哕则直出於口欬逆则至咽膈吃忒而中止然後出也实非有出入之异

论杂病欬逆皆由病後胃虚所生

三因云欬逆之病古人以为哕耳多因吐利之後胃中虚寒遂成此疾亦有胃中虚膈上热哕至八九声相连收气不回者大抵伤寒久病後老人虚人及妇人产後多有此证者皆病深之候也亦有哕而心下痞悸者有痰水所为别无恶候者是

论吃逆病由陰虚火上亦有暴病属实者附

丹溪云吃病者气逆也气自脐下直冲上出於口而作声之名也书曰火炎上内经曰诸逆冲上皆属於火古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陈皮等剂治之未审孰为降火孰为补虚人之陰气依胃为养胃土伤损则木气侮之矣此土败木贼也陰为火所乘不得内守木挟相火乘之故直冲清道而上言胃弱者陰弱也虚之甚也病人见此似为危证然亦有实者不可不知赵立道年近五十质弱而多怒七月炎暑大饥索饭其家不能急具因大怒两日後得滞下病口渴自以冷水调生蜜饮之甚快滞下亦渐缓如此者五七日召予视脉稍大不数遂令止蜜水渴时且令以人参白术煎汤调益元散与之滞下亦渐收七八日後觉倦甚发吃予知其因下久而陰虚也令其守前药然滞下尚未止又以炼蜜饮之如此者三吃犹未止衆皆尤药之未当将以姜附饮之予曰补药无速效附子非补陰者服之必死衆曰冷水饮多得无寒乎予曰炎暑如此陰凉非寒勿多疑待以日数力到当自止又四日而吃止滞下亦安又陈泽仁年近七十厚味之人也有久喘病而作止不常新秋患滞下食大减至五七日後吃作召予视脉皆大豁衆以为难予曰形瘦者尚可为以人参白术汤下大补丸以补血至七日而安此二人者虚之为也又一女子年踰笄性躁味厚暑月因大怒而吃作每作则举身跳动神昏不知问之乃知暴病视其形气俱实遂以人参芦汤饮一椀大吐顽痰数椀大汗昏睡一日而安人参入手太陰补阳中之陰者也芦则反耳大泻手太陰之阳女子暴怒气上肝主怒肺主气经曰怒则气逆气因怒逆肝脉乘火侮肺故吃大作而神昏参芦喜吐痰尽气降而火衰金气复位胃气得和而解矣

谨按欬逆一证古方悉作胃寒所致俱用丁香柿蒂姜附等药然此证有虚有实有火不可专作寒论盖伤寒发汗吐下之後与滞下日久及妇人产後而有此者皆陰大虚之为也若平人食入太速而气噎或饮水喜笑错喉而气抢或因痰水停膈心下或因暴怒气逆痰厥或伤寒热病失下而有此者则皆属实也夫水性润下火气炎上今其气自下冲上而作声非火而何大抵治法虚则补之补中须分寒热如因汗吐下误服寒凉过剂当以温而补之如脾胃陰虚火逆冲上当以平而补之挟热者凉而补之若夫实者如伤寒失下地道不通因而欬逆当以寒下之如痰饮停蓄心下或暴怒气逆痰厥此等必形气俱实别无恶候皆当随其邪之所在而涌之泄之清之利之也世医凡遇此疾首以丁香柿蒂为言殊不知此药不能补虚不能降火不能清气利痰唯有温暖助火而已岂宜总治斯疾乎

欬逆治法

治热之剂

活人橘皮竹茹汤治哕逆严氏治吐利後胃虚膈热而欬逆

橘皮【一升】 竹茹【一升半】 甘草【二两炙】 人参【半两】 枣子【三十个】
生姜【半两】

右剉以水一斗煮取三升去滓温服一升日三服按此出太陰呕哕例药也姜枣参橘亦是温药故三因云此治胃中虚冷但以此药比之姜桂丁香则性平故从严氏入治热之剂

小柴胡汤治阳证欬逆

难知大承气汤治欬逆大便秘者

二方并见寒门

泻心汤治欬逆大便软利者

方见心下痞门

治寒之剂

半夏生姜汤治嘔欲死

半夏【洗一两一钱】 生姜【二两切】

右水二盏煎八分分作二服

橘皮乾姜汤治嘔

橘皮 通草 乾姜 桂心 甘草【炙各二两】 人参【一两】

右剉每服四钱水煎温服日三次

按已上二方并太陰嘔嘔例药也

三因丁香散治欬逆

丁香 柿蒂【各一钱】 甘草【炙】 良姜【各半钱】

右爲末热汤点二钱乘热服不拘时

严氏柿蒂汤治胸满欬逆不止

柿蒂 丁香【各一两】

右?咀四钱姜五片煎家珍有人参一味宝监有青陈皮二味并各等分爲末水煎服

按已上二方并太陰阳明经药也

活人羌活附子散治欬逆严氏治吐利後胃寒欬逆羌活 附子【炮】
茴香【微炒各半两】木香乾姜【各一枣许大】

右细末每服一钱水一盞塩一捻同煎热服

三因方木香作丁香

按此太阳少陰太陰经药也

本事方治陰毒欬逆

川乌头 乾姜【炮】 附子【炮】 肉桂芍药 甘草【炙】 半夏 吴茱萸 陈皮 大黄

右等分爲细末每服一钱姜五片煎去浊查取清热服

按此三陰经药也

补虚之剂

宝监炙甘草汤治许伯威中气本弱病伤寒八九日医见其热甚以凉药下之又食梨三枚痛
伤脾胃四肢冷时发昏愦其脉动而中止有时自还乃结脉也心亦悸动吃逆不絶色变青黄
精神减少目不欲开蜷卧恶人语以此药治之

甘草【炙】 生姜 桂枝 人参生地黄 阿胶 麦门冬 麻子仁大枣

成无已云补可以去弱人参大枣之甘以补不足之气桂枝生姜之辛以益正气五脏痿弱荣
卫涸流湿剂所以润之麻仁阿胶麦门冬地黄之甘润经益血复脉通心也加以人参桂枝急
扶正气生地黄減半恐伤阳气剉一两服之其证減半再服而安

按此心肺药也

谨按欬逆诸方古方唯有治寒之剂至於补虚降火养陰之药及治痰气厥逆之法皆未详也
学者自宜随证用之

灸法

严氏云欬逆治法妇人屈ru头向下尽处骨间是穴丈夫及乳小者以一指爲率正男左女右
与乳相直间?中动脉处是穴艾炷如小豆许灸三壮

玉机微义卷三十六

卷三十七

钦定四库全书

玉机微义卷三十七 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

心下痞满门

论痞为湿土之病

内经云备化之纪其病痞又云太陰所至为积饮痞膈按原病式云痞与否同不通泰也谓精神荣卫血气津液出入流行之纹理闭塞而为痞也

论伤寒心下痞

成无已云伤寒心下满者不经下後则有吐下之殊若下後则有结胸痞气之别经曰病人手足厥冷脉乍紧邪结在胸中心满而烦当吐之又云脉浮而大心下反硬有热属脏者攻之此二者不经汗下而心下满或吐之或下之随其邪气之高下要在泄其邪也又邪气在表未应下而强下之邪气乘虚结於心下实者硬满而痛为结胸虚者满而不痛为虚痞盖结胸是实邪大?胸汤主之痞是虚邪须诸泻心汤散可也

论痞为痰饮及诸气所致

详见各门

论伤寒杂病痞皆血证

秘藏云内经曰备化之纪其病痞又曰太陰所致为积饮痞膈太陰者湿土也主壅塞乃土来心下为痞满也伤寒下之太早亦为痞乃因寒伤荣血心主血邪入於本故为心下痞仲景泻心汤数方皆用黄连以泻心下之土邪至於酒积杂病下之太过亦作痞满皆血证也盖下多则亡陰亡陰者即损脾胃谓脾胃水谷之陰亡也故胸中之气以其血虚而下?於心之分故致心下痞上宜理脾胃以血药治之若全用气药导之则其痞益甚而复下之气愈下降必变为中满鼓胀非其治也又有虚实之殊如实痞大便秘厚朴枳实主之虚痞大便利芍药陈皮主之饮食所伤而为痞满者当用药消导其胸中窒塞欲吐者则宜吐之

难知云伤寒痞者从血中来从外之内从无形杂病痞者亦从血中来从内之外从有形故无

形以苦泄之有形以辛散之

按痞之凝滯闭塞人皆知气之不运也独东垣指以血病言之谓下多则亡陰而损血此前人之未论也世有用气药治痞而不效者盖不知此理故也论诸泻心汤用药寒热不同

保命集云三陰三阳之标本治各不同有用寒药而为热痞大黄黄连之类也有用寒热药者陰与阳不和而痞大黄黄连加附子之类也有用辛热药多而寒药少者陰盛阳虚而痞半夏甘草生姜泻心三方之类泻心汤者非泻心火之热泻心下之痞也通而论之其药阳多而陰少盖病发於陰而得之有大黄黄连泻心汤独为陰心下痞而脉疾一证桂枝後用从太阳浮弱所变余皆陰阳杂用

论痞为热证

直格云伤寒里之陰分已受热邪是病发於陰也或热微下证未全误下之早则里热除去表热乘虚入里而作痞也故仲景攻痞多用大黄黄连黄芩寒药尔後或加附子乾姜之类者是以辛热佐其寒药欲令开发痞之怫热结滯也非攻寒耳

按前保命集论泻心汤分陰阳寒热多少而用药可谓详切矣而此论则专主於热二者似乎不同要之各有所当盖直格是言其受病之本保命集是论其用药之标若以为痞有陰寒之证耶则仲景泻心五方何皆用黄芩黄连之药若以为痞无陰阳之异耶何泻心汤又有兼用乾姜附子半夏生姜之类者也一言其本一论其标而已

谨按痞之为病由陰伏阳蓄气与血不运而成处心下位中央?满痞塞皆土之病也与胀满有轻重之分痞则内觉痞闷而外无胀急之形胀满则外亦有形也前人所论皆指误下而致之盖误下则里气虚故伤寒之表邪乘虚入於心下杂病则所受之邪气亦蓄於心下因致痞也亦有不因误下而得之如中气虚弱不能运化精微为痞者有饮食痰积不能施化为痞者有湿热太甚土乘心下为痞者故古方治痞用黄连黄芩枳实之苦以泄之厚朴生姜半夏之辛以散之人参白术之甘苦温以补之茯苓泽泻之淡以渗之随其病之所在以调之也既痞同湿治惟宜上下分消其气如果有内实之证庶可略与疎导世人苦於痞塞喜行利药以求速效暂时通快痞若再作益以滋甚是皆不察夫所谓下多亡陰之意也心下痞满治法

治热之剂

仲景大黄黄连泻心汤治心下痞按之濡其脉关上浮者或寸沉关浮而有热者

大黄【二两】 黄连【一两】

右剉以麻沸汤二升渍之须臾绞去滓分温再服按此手少陰经药也出阳明例成无已云大黄黄连以导泻心下之虚热以麻沸汤渍服者取其气薄而泄虚热也

又按活人云伊尹汤液论大黄黄连黄芩汤共三味今监本无黄芩脱落之也又保命集无黄芩却加甘草【一两】

散寒泄热之剂

仲景附子泻心汤治心下痞而复恶寒汗出脉沉迟也大黄【二两】 黄连 黄芩【各一两】

附子【一枚炮去皮别煮】

右剉以麻沸汤二升渍之须臾绞去滓内附子汁分温再服

半夏泻心汤治汗下後身寒痞满而呕食饮不下脉微按之不痛非柴胡证

半夏【半升洗】 黄芩 乾姜 人参【各三两】 黄连【一两】

大枣【十二枚】 甘草【二两炙】

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升温服一升日三服

生姜泻心汤治汗下後胃中不利乾噎食臭自利肠鸣脇下有水气而心下痞满

比半夏泻心汤加生姜【四两】 减乾姜作【一两】

甘草泻心汤治下之後腹中雷鸣心下痞硬再下之痞益甚此非结热以胃中虚客气上逆也

比半夏泻心汤无人参加甘草作【四两】

按以上诸泻心汤元戎云手少阴药也以其心下痞故入阳明例况服梔子黄芩黄连黄柏大黄为上下通经之剂安得不例阳明乎

秘藏大消痞丸治一切心下痞闷及积年久不愈者黄连【炒】 黄芩【各六钱】 姜黄 白术【各一钱】 炙甘草 砂仁 乾生姜

神麴【炒各一钱】 人参【二钱】 枳实【炒五钱】 橘皮【二钱】 泽泻【三钱】 厚朴【炒三钱】 猪苓【一钱半】 半夏【四钱】

右同为细末水浸蒸饼丸桐子大每五十丸至百丸白汤下

枳实消痞丸治右关脉浮弦心下虚痞恶食懒倦开胃进食

枳实 黄连【各五钱】 乾生姜【二钱】

半夏麴【三钱】 厚朴【炙四钱】 人参【三钱】 白术【三钱】 炙甘草【二钱】 茯苓
大麦麴【各二钱】

右同为细末水浸蒸饼为丸每三五十丸温水下按以上二方并半夏泻心汤加减法也内有
枳术汤四君子五苓平胃等利湿消痞补虚之药也

温中散饮之剂

宝监枳实理中丸治中脘痞滞气不宣通积寒停饮食不化

人参 乾姜【炮】 白术 枳实 甘草【炙各一两】

右为细末炼蜜为丸如鸡子黄大每服一丸细嚼白汤下或沸汤化服活人有茯苓

深师消饮丸治停饮心下痞

方见痰饮门

按已上二方并出阳明饮痞例

理气之剂

活人桔梗枳壳汤治伤寒痞气胸满欲绝

桔梗 枳壳【去穰炒各三两】

右剉水二盏煎至一盏去滓分作二服

按此手太阴经药也出少阴枳壳例活人云审知是痞先用汤尤妙缘枳桔行气下膈先用之
无不验也海藏云活人用此非治痞也审知错下必成痞是气将?於胸中故先用此使不至於
痞也若已成痞而用则失之晚胸中之气反痞矣先之一字预早之意也先用此若不应後当
以仲景痞药治之若执此治痞其害深矣

宣明?榔散治伤寒阴证下後成痞满而不痛按之软虚

?榔 枳壳【等分】

右为末每服三钱煎黄连汤调下

宝监三脘痞气丸治三焦痞滞水饮停积脇下虚满

木香 白豆蔻 青皮【炒】

京三棱【炮各一两】?榔【半两】半夏【汤洗七次】大腹子 陈皮【各二两】砂仁 沉香【各半两】

右为末麪糊为丸桐子大每服三十丸加至六十丸食後陈皮汤下

按此出太陰调气例药也

秘藏木香消痞丸治因忧气结中脘腹皮厚微痛心下痞满不思饮食

木香【半两】柴胡【四钱】橘皮【三钱】
甘草【炙】半夏【各一两】乾姜【半两】当归尾【一钱】红花【半钱】

右为细末水浸蒸饼丸服之

补虚之剂

加味补中益气汤治内伤心下痞

方见内伤门

脉缓有痰而痞加半夏黄连

脉弦四肢满闭便难而心下痞加柴胡黄连甘草大便秘燥加黄连桃仁少加大黄归身

心下痞夯闷者加白芍黄连

心下痞腹胀加五味子白芍砂仁如天寒少加乾姜或中桂

心下痞中寒者加附子黄连

心下痞呕逆者加黄连生姜陈皮如冬月加黄连少入丁香藿香叶

能食而心下痞加黄连半钱枳实三钱如不能食心下痞者勿加止依方服之

食已心下痞别服橘皮枳术丸

按难知云中满者勿食甘不满者当食之如自觉满而外无胀急之形乃痞也是不满也当以甘而撑柱之又太阳病下之腹满时痛为脾桂枝加芍药汤满木也为甘所主故用芍药之酸克其满酸凉除满急收能除甘所主甘温生满缓散能除酸所主也谨按痞证有气不运化及阴虚损血者前论已详故收入此补虚之剂但世俗不明此理往往例用峻快药下之复痞或致危笃者多矣

玉机微义卷三十七

卷三十八

钦定四库全书

玉机微义卷三十八 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

吐酸门 【吞酸附】

论吐酸属热

内经云诸呕吐酸皆属於热又云少阳之胜呕酸原病式云酸者肝木之味也由火胜制金不能平木则肝木自甚故为酸也如饮食热则易於酸矣是以肝热则口酸也或言为寒者但谓伤生硬冷物而喜噫醋吞酸故俗医主於温和脾胃岂知人之伤於寒也则为病热盖寒伤皮毛则腠理闭塞阳气怫鬱而为热故伤寒热在表以麻黄汤热药发散使腠理开通汗泄热退而愈也凡内伤冷物者或即陰胜阳而为病寒或寒热相搏而致肠胃阳气怫鬱而为热亦有内伤冷物而反病热得汗泄身凉而愈也或微而吐为中酸俗谓之醋心法宜温药散之亦犹解表之义若久喜酸不已则不宜温之宜以寒药下之後以凉药调之结散热去则气和也所以中酸不宜食粘滑油腻者谓能令气鬱不通畅也宜食粝食菜蔬能令气通利也

论杂病吐酸与病机外邪不同

发明云病机诸呕吐酸皆属於热此上焦受外来客邪也胃气不受外邪故呕仲景以生姜半夏治之以杂病论之呕吐酸水者甚则酸水浸其心不任其苦其次则吐出酸水令上下牙酸澁不能相对以大辛热药疗之必减吐酸水呕出也酸味者收气也西方肺金旺也寒水乃金之子子能令母实故用大酖热之剂泻其子以辛热为之佐而泻肺之实以病机作热攻之误矣盖杂病醋心浊气不降欲为中满寒药岂能治之乎

按吐酸原病式为热而此作寒论治者盖东垣以内伤不足之病未传寒中浊气不降不宜用寒药治疗乃指为寒却以素问病机之说作外感客邪论与诸腹胀大论分寒热胀义相同以下文丹溪之论观之其说方备

辩素问东垣论酸不同

丹溪云或曰吐酸素问明以为热东垣又言为寒何也予曰吐酸与吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平时津液随上升之气鬱积而成鬱积之久湿中生热故从火化遂作酸味非热而何其有鬱积之久不能自涌而出伏於肺胃之间咯不得上咽不得下肌表得风寒则内热愈鬱

而酸味刺心肌表温煖腠理开发或得香热汤丸津液得行亦可暂解非寒而何素问言热者言其本也东垣言寒者言其末也但东垣不言外得风寒而作收气立说欲泻肺金之实又谓寒药不可治酸而用安胃汤加减二陈汤俱犯丁香且无治湿热鬱结之法为未合经意予尝治吞酸用黄连茺莢各炒随时令迭其佐使苍术茯苓为辅佐汤浸炊饼为小丸吞之仍教以粝食蔬菜自养则病易安

谨按吐酸一证以病机言之则属於热以脏腑论之则脾胃受病以内邪言之则痰饮宿食之所为故治法热者寒之脾恶湿以苦燥之有痰饮者清之散之分利之有宿食者消之导之驱逐之局方不察斯故以噫醋吞酸醋心吐酸水之证并入於诸气门中率用温热之药岂吐酸专主於寒而无他证也故此一门以叙河间东垣丹溪之论其病源治法无余蕴矣吐酸治法

治寒温胃之剂

发明藿香安胃散治脾胃虚弱不进饮食呕吐不待腐熟

藿香 丁香 人参【各二钱半】 陈皮【五钱】

右为细末每服二钱水煎入生姜

按此手太陰足阳明太陰经药也

加减二陈汤治痰饮为患呕吐头眩心悸或因食生冷脾胃不和

丁香【一两】 半夏 陈皮【各五两】 茯苓【三两】 甘草【一两半】

右?咀四钱水煎入生姜煎服

按此出太陰呕哕例药也

三因麴末丸治中脘宿食留饮酸蜚心痛口吐清水神?【炒三两】 苍术【泔浸三宿洗净日乾炒一两半】 陈皮【一两】

右为末生姜汁别煮神麴糊为丸姜汤送下

按此足阳明足太陰经药也

谨按吐酸诸方前人作寒药治之甚多兹不详载至於治热之药前人既以斯证为寒所以絶无其方也若夫消痰去食解外寒治鬱热之法又当随证用焉

玉机微义卷三十八

卷三十九

钦定四库全书

玉机微义卷三十九 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

瘧門

论瘧病属湿强直属风

内经曰诸瘧项强皆属於湿王注太阳伤湿又云诸暴强直皆属於风王注阳内鬱而陰行於外

按内经言瘧肺肾太阳督脉与夫六气皆能为之大抵专生於湿故原病式云诸瘧强直筋劲强直而不柔和也土主安静故也陰瘧曰柔瘧阳瘧曰刚瘧亢则害承乃制故湿过极反兼风化制之然兼化者虚象实非风也又云诸暴强直皆属於风谓筋劲强有力不柔和也然燥金主於紧斂短缩劲急风木为病反见燥金之化由亢则害承乃制也又况风能胜湿而为燥也愚谓土性安静木性动摇瘧病强直而安静故主於湿风病强直而搖擗故属於风况土气之下木气乘之故瘧之强直有似於风又木气之下金气乘之金之紧斂劲切与土相近故风之强直有似於湿二者有本化有虚象不可不察也

又按病机治瘧治风之法云诸瘧项强皆属於湿寒湿同性水火同居故足太阳属水而位下所以湿可伤也其脉下项故主项强太阳表中风加以湿客於经中内挟寒湿则筋脉抽急故瘧项强而不柔和当详有汗无汗治以流湿祛风缓发表而愈也强直属风乃厥陰风木势甚而成千金以强直为风治以泻火补金木能自平矣愚谓此言瘧病项强以外感风寒湿气者言之也风病强直以风木自病者言也论伤寒刚柔二瘧

仲景云太阳病发热无汗而反恶寒名曰刚瘧太阳病发热汗出而不恶寒名曰柔瘧病身热足寒颈项强急恶寒时头热面赤独头动摇卒口噤背反张者瘧病也若发其汗寒湿相得其表益虚即恶寒甚

按活人云太阳经先因伤风又感寒湿而致然也古人谓之瘧又作瘧瘧者强直也古人以强直为瘧外证与伤寒相似但其脉沉迟弦细而项背反张强硬如发痼状为异耳察其有汗无汗以分刚柔二瘧无汗葛根汤主之有汗桂枝加瓜蒌汤主之刚瘧胸满口噤脚挛急咬齿当行大承气汤愚谓刚瘧柔瘧并属太阳至於项强口噤一证例太阳兼阳明也因有阳明故不宜发汗而有用大承气汤法者难知云伤寒瘧证五种皆属太阳余经不言圣人之大意也若

头低视下手足牵引肘膝相拘阳明瘧也若一目或左或右邪视并一手一足搐搦者少阳瘧也汗之止之和之下之各随其经可使必已盖谓此也

论致瘧病因

仲景云太阳病发汗太多因致瘧 风病下之则瘧复发汗必拘急 瘧家虽身疼痛不可发汗汗出则瘧按此谓发汗下之而致瘧则不专於风寒湿之外传矣是又因坏证而成也发汗下之太过皆亡津液损血之所由也

瘧病脉法

脉经云太阳病发热脉沉而细者名曰瘧为难治 夫瘧脉按之紧如弦直上下行 瘧家其脉伏坚直上下腹暴胀大为欲解脉反伏弦者瘧 瘧病发其汗已

其脉澹澹如蛇

按瘧证属风寒湿所伤有汗者脉必浮缓无汗者脉必浮紧若其脉沉细者湿所伤也坚直上下行皆紧之象也发汗已如蛇亡津液而无胃气之象也

论陰阳瘧

活人书云陰阳二瘧者阳瘧属刚瘧陰瘧属柔瘧以附子散桂心白术汤附子防风散八物白术汤可选而用之

按仲景论刚柔二瘧并属太阳活人论陰阳二瘧既以阳瘧属刚瘧陰瘧属柔瘧而乃以术附姜桂诸热药治陰瘧则是以陰专为寒治矣恐非至当之论姑伺明哲其方兹不载详见本论

论风搐反张有风火之证

子和书云吕君玉妻年三十病风搐目眩角弓反张数日不食诸医皆作惊风暗风风癇治之以南星雄黄乌附用之不効戴人曰诸风掉眩皆属肝木阳主动陰主静由火盛制金不能平木肝木茂而自病先涌风痰二三升次以寒剂下之又以?针刺百会穴出血二盃立愈

按风搐本与瘧证不同而瘧证属湿土极必兼风木动摇之化风搐属木木极必见金燥紧斂之形要之亦可同论故取此条以证瘧病不专於风寒湿之外至亦有风火热之内作者也

论瘧证属内虚所致

三因方云夫人之筋各随经络结束於身血气内虚外为风寒湿热之所中则瘧以风散气故

有汗而不恶寒曰柔瘧寒泣血故无汗而恶寒曰刚瘧原其所因多由亡血筋无所营故邪得以袭之所以伤寒汗下过多与夫病疮人及产後致斯疾者槩可见矣诊其脉皆沉伏弦紧但阳缓陰急则久久拘挛陰缓阳急则反张强直二证各异不可不别

按伤寒言瘧专主外邪为病陈无择发明血气内虚一节实与仲景所言汗下过多者相合可谓善矣惜乎用药未能详明也又言陰缓阳急则太阳瘧也阳缓陰急则阳明瘧也

论产後发瘧

郭稽中云产後汗出多而变瘧者由产後血虚肉理不密故多汗因遇风邪搏之则变瘧宜灌小续命汤稍缓即汗出如雨手拭不及不可治也

按此既云产後则血气本虚矣汗出既多则卫气亦虚纵有风邪乘之小续命用麻黄辈其可服乎况有虚象而实非风者哉陈无择虽尝论其失所用大豆紫汤大圣散亦未尽善也

谨按伤寒瘧病活人以太阳中风又感寒湿而致则专於外邪所伤然仲景亦有汗下过多之戒则又出於坏证所成矣盖外邪所伤者通宜解散仲景言刚柔活人分陰阳难知论经络等诸方详矣至於治坏证补虚救失之法诸方则亡也又千金谓温病热入肾中亦为瘧小儿病癰热盛亦为瘧若此治法俱未之见也况此二者之外又有血气本虚之人如产後汗出多而变瘧者或因七情怒气而发瘧者或因湿热内盛痰涎壅遏经络而作瘧者治各不同也大抵伤寒有外邪之可解宜用风药发散风寒又风药亦能胜湿耳至於邪热入肾亦非风药之所能疗也其内证作瘧本无外邪前人岂仍用风药处治惟宜补虚降火敦土平木清痰去湿随证而用不可不察也瘧证治法

解散之剂

金匱括萎桂枝汤治太阳病其证备身体强几几然脉反沉迟此为瘧病

括萎根 甘草【炙各二两】 桂枝 芍药 生姜【各三两】 大枣【十二枚】

右六味以水九升煮取三升分温三服取微汗汗不出食顷啜热粥发之

按此出太阳例药也

葛根汤治太阳病无汗而小便反少气上冲胸口禁不得语欲作刚瘧

方见伤寒门

海藏神术汤治刚瘧

加羌活 独活 麻黄

白术汤治柔痉

加桂心 黄芪 白术

活人举卿举败散治新产血虚痉者汗後中风发搐亦然荆芥穗不以多少微炒为末大豆黄卷熟以酒沃之去黄卷取汁调细末三五钱和查饮之其效如神一方只以好酒调服

按此太阳厥陰经药也按本草荆芥能发汗破结气下瘀血除风湿痹亦是攻邪之药若血气果虚之人亦非所宜也

攻下之剂

金匱大承气汤治痉为强脑满口禁卧不着席脚挛急必齮齿可与

见本方

按此阳明经药也阳明摠宗筋以风寒湿热之邪入於胃津液不行宗筋无所养故急宜用此汤下湿热行津液宣明云痉病目置口禁背强如弓卧摇动手足搐搦通宜三一承气汤下之亦此意也然非察证之明的有内实热者不可轻用

去风养血之剂

难知防风当归散治发汗过多发热头面摇卒口禁背反张者宜去风养血

防风 当归 川芎 地黄【各一两】

右剉每服一两水煎服

谨按痉证发汗过多与夫血气内虚之人自当随证用药古方於此等处多缺略姑叙此方以见意尔至於发散风寒行经之药甚多及活人治陰痉诸温药难知分经络用药兹并不载用究本书

玉机微义卷三十九

卷四十

钦定四库全书

玉机微义卷四十 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

疔风门

叙疔风为病

内经曰风气与太阳行诸脉俞散於分肉之间与卫气相干其道不利故使肌肉胝而有疡卫气有所凝而不行故其肉有不仁也疔者有荣卫热腑其气不清故使鼻柱坏而色败皮肤疡溃风寒客於脉而不去名曰疔风

疔风治法

内经云病大风骨节重须眉堕名曰大风刺肌肉间故汗出百日王注泄卫气之怫热刺骨髓汗出百日泄荣气之怫热凡一百日须眉生而止针怫热屏退陰气内复故多汗出须眉生也灵枢云疔风者数刺其肿上已刺以锐针针其处按出其恶气肿尽乃止常食方食勿食他食以犯其病

论疔风属肺生?属木皆血热之病

病机云内经云脉风成为疔俗云癩病也先桦皮散从少至多服五七日灸承浆穴七壮灸疮轻再灸疮愈三灸之後服二圣散泄热祛血中之风邪戒房室三年病愈药灸同止述类象形此治肺风之法也然此疾非止肺脏有之以其病发於鼻俗呼为肺风也鼻肿準赤胀大而为疮乃血随气化也气既不施则血为之聚血既聚则使肉烂而生?也生?者厥陰主之厥陰为风木主生五?盖三焦相火热甚而制金金衰故木来尅侮宜泻火热利风之剂?自不生也故此疾血热明矣当以药缓疎泄之煎局方升麻汤下钱氏泻青丸余病各随经治

按疔风皮毛血脉先受病二者属荣卫所主故言肺风至於内坏生?又阳明厥陰所属故其用药皆疎泄肺气祛逐血分之邪热其灸承浆一穴乃阳明任脉之会所以宣通血脉以散风也

论癩风宜汗宜下宜出血

子和书云内经论癩针二百日眉毛再生针同发汗也但无药者用针一汗可抵千针故高供

奉尝采萍治瘫痪风出汗张主簿病癰十余年戴人曰足有汗者可治之当发汗其汗出当臭其涎当腥乃置燠室中以三圣散吐之汗出周身如卧水中其汗果臭痰皆腥如鱼涎足心微有汗次以舟车丸瀦川散下五七行如此数次乃瘳又一人病风面黑爬搔不已眉毛脱落到其面大出血如墨刺三次血变色每刺自额至颐排针上下俱刺每隔日一刺至二十余日方已

按此论内经用针同发汗至於出血亦同汗也但病证在经在表故宜针宜汗有恶血留滞故宜出血或於肿上或於委中皆可也又肠胃有秽恶?积故宜下大抵皆宣泄表里血气邪热之毒也

论痲风所因

三因之经所载痲风即风论所谓恶疾是也虽名曰风未必皆因风大率多嗜慾劳动气血热发汗泄不避邪风冷湿使淫气与卫气相干致肌肉皮肤疡溃鼻梁塌坏千金所谓自作不仁极猥之业虽有悔言而无悔心良得其情然亦有传染者原其所因皆不内外涉外所因而成也治之须推其所因凡因风寒湿热兼劳役饮食与夫传染颖然不同若例以泻风药治之则失矣按此云虽名曰风未必皆因风此论固善盖此疾多由嗜慾饮食积毒之所致因其病证秽恶可畏又不可不谓之风也若夫传染之说世或有之虽因其一家血脉饮食居处气味之相传者本无内热积毒亦不能染也

论大风有上下之分

丹溪云大风病是受得天地间杀物之风古人谓之痲风以其酷烈暴悍可畏尔人得之者须分在上在下夫在上者以醉仙散取臭涎恶血於齿缝中出在下者以通天再造散取恶物陈於谷道中出所出虽有上下道路之异然皆不外乎阳明一经治此病者须知此意看其疮瘡与疮上先见者上体多者在上也下先见者下体多者在下也上下同得者在上後在下也阳明经胃与大肠也无物不受此风之入人也气受之则在上多血受之则在下多血气俱受者甚重自非医者有神病者有鉄心罕有免者夫或从上或从下以渐而来者皆可治病人见其病势之缓多忽之虽按此法施治病已全然脱体若不能絶味絶色後必发再发则终於不救矣某曾治五人矣中间唯一妇人得免以其贫甚无物可吃也余四人三两年後皆再发孙真人曰吾尝治四五百人终无一人免於死非孙真人之不能治也盖无一人能守禁忌耳此一妇治本病外又是千余贴加減四物汤半年之上方得月经行而十分安全

谨按痲风古方谓之大风恶疾以其疮痍荼毒脓汁淋漓眉鬢墮落手足指脱顽痺痛痒鼻塌眼烂齿豁唇揭病势之可畏耳若专以房劳嗜慾饮食积毒之所致何为遽至於是故丹溪先生亦谓之受得杀毒之风也盖其风毒之伤与夫内毒所致人皆安得而知之及其病证显露方始归咎於此其於外受之风内积之毒岂可得而分治之也故内经刺肌肉刺骨髓以泄荣卫之怫热灵枢以锐针刺肿上按出恶气恶血子和用汗吐下出血之法河间用疎风泄热之剂俱不分病之所因随其病之所在以调之也至於丹溪分在上在下气血受病多少其用药

取涎下毒虽皆前人之法亦可谓深得病情而善用其法者矣学者宜细观之若夫用药之外守禁忌谨调养清心寡慾独淡内观又在乎人而不在于医也孙真人戒之深矣其可忽乎

疔风治法

驱风之剂

局方桦皮散治肺脏风毒遍身疮疥及癰疹瘙痒治之成疮又治面上风刺及粉刺

桦皮【四两烧灰】荆芥穗【二两】甘草【炙半两】

杏仁【二两去皮尖用水一碗於银铤子内熬候水减半取出放令乾】枳殼【四两去穰用炭火烧存性取出於湿纸上令冷】

右除杏仁外余药为末将杏仁另研令细次入诸药细合匀磁盒内放之

按此太陰阳明经药出厥陰例

家珍凌霄散治疔风

蝉退 地龙【炒】 白僵蚕

全蝎【各七个】凌霄花【半两】

右为细末每服二钱酒调下於浴室内常在汤中住一时许服药效

元戎治风疾癰病遍身生疮

天麻【七钱半】荆芥【二钱半】薄荷【二钱半】

白花蛇【四两酒浸】

右为末好酒二升蜜四两石器中熬成膏子每服一盞温服日三煎饼压下急於煖处令汗出十日效按此已上二方厥陰例药也

子和治风疥癬及癰

浮萍【一两】荆芥 川芎 甘草 麻黄【各半两】或加芍药当归

右为末每服一两水一碗入葱白豆豉同煎至一半无时服汗出为度

宝监换肌散治大风疾年深久不愈以至面毛脱落鼻梁崩坏不致踰月取效如神

白花蛇 黑花蛇【各三两并酒浸一夕】

地龙【去土三两】当归 细辛 白芷天麻【各一两】蔓荆子 威灵仙 木贼荆芥穗 甘菊花
苦参 紫参沙参 沙苑蒺藜 不灰木 赤芍炙甘草 九节菖蒲 天门冬 寒风草何首乌
胡麻子【炒】 草乌头【去皮脐】

苍术【泔浸去皮】川芎 木鳖子【已上各二两】

右同为细末每服五钱温酒调下食後酒多为妙按此出少陰诸风例药也

去风养血之剂

易老祛风丸治疥癩经曰脉风成病即癩也

黄芪 枳殼 防风 芍药甘草 熟地黄 生地黄 地骨皮枸杞子

右九味木杵臼为细末炼蜜为丸桐子大白汤下五十丸

按此出少陰诸风例药也

东坡四神丹医未有专此四味者久服可愈大风疾羌活 玄参 熟地黄 当归

按此出少陰肾气例药也

破血泻热补气之剂

补气泻营汤治段库使病疔风满面连颈极痒眉毛已脱须用热水沃之稍缓每昼夜须数次
或砭刺亦缓予记内经云疔者荣卫热附治者以锐针刺其肿处按出其恶气肿尽乃止如以
药治当破恶血去热升阳去痒泻荣运辛温散之甘温补之行阳明经泻心火补肺气乃治之
正也

升麻 连翘【各六钱】苏木 当归黄连 黄芪 全蝎 地龙【各三分】生地黄
黄芩【生各四分】人参【二分】

甘草【一分半】桔梗【半钱】桃仁【三个】

麝香【少许】胡桐泪【一分】蠹?【去翅足炒三个】

水蛭【炒令烟尽三个】白豆?【二分】

右件除连翘另剉胡桐泪研白豆?为细末二味另放麝香蠹?水蛭三味为细末另放都作一服水二盏煎入酒一盏至一盏六分入连翘煎去滓再入豆?二味并麝香等三味再熬至七分稍热服早饭後忌酒麪及生冷硬物

取涎之剂

宝监醉仙散治大风疾遍身瘾疹瘙痒麻木

胡麻子 牛蒡子 枸杞子

蔓荆子【各一两同炒】白蒺? 苦参瓜蒌根 防风【各半两】

右为细末每十五钱末入轻粉一钱拌匀每服一钱茶调下晨午夕各一服後五七日先於牙缝内出臭黄涎浑身疼痛昏闷如醉次後利下脓血恶臭气病根乃去

按丹溪方轻粉二钱药八味各半两前四味为粗末炒紫色为度云须量人大小虚实与之证候重而急者须先以再造散下之候补养得还复与此药服此药须断塩酱醋诸般鱼肉椒料果实煨烧炙博等止可淡粥及煮熟时菜亦须淡食茄亦不可食惟诸般蛇以淡酒蒸熟食之可以助药

攻下之剂

病机二圣散治大风痲疾

大黄【半两】 皂角刺【三钱烧灰】

右将皂角刺一二个烧灰研细煎大黄半两汤调下二钱早服桦皮散中煎升麻汤下泻青丸晚服二圣散此数等药皆为缓疎泄血中风热也

三因通天再造散治大风恶疾

麝金【半钱】 大黄【一两炮】 白牵牛【六钱半生半炒】 皂角刺【一两经年黑大者】

右为末每服五钱日未出面东以无灰酒调下按已上二方并厥陰例药也

杂方

元戎生眉散

栝寄生 南星 半夏 没药【各一钱】

右为细末生姜自然汁调成膏子先用自然铜擦过次以此涂之

子和一方半夏生用羊粪烧焦各等分为末生姜汁调涂

漂洗药

何首乌 荆芥 防风 马鞭草蔓荆子

右为粗末每二两水一斗煎十数沸得药力无风处漂洗

本事方萆麻法治疔风十指挛曲节间疼不可忍渐至断落

萆麻【去皮】 黄连【剉各二两】

右以小瓶入水一升同浸春夏三日秋冬五日後用萆麻子一粒擘破面赤以浸药水吞下平旦服渐加至四五粒微利不妨水少更添水忌动风物累用得效

按宝监以此二味用银石器着水大碗煮水尽即添熬三日二夜取出只用萆麻陰乾切作四段计五粒二十段作一服荆芥汤下用治诸瘤病

玉机微义卷四十

卷四十一

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷四十一 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

风癇门

叙癇病之始

灵枢云暴挛癇眩足不任身取天柱【天柱穴足太阳也】又云癲癇瘈瘲不知所苦两蹠之下男阳女陰

按洁古云昼发灸阳蹠夜发灸陰蹠各二七壮阳蹠起於跟中循外踝上行入风池【申脉穴也】陰蹠亦起於跟中循内踝上行至咽喉交贯冲脉【照海穴也】又按内经言癲而不言癇古方以癲癇或并言或言风癲或言风癇或言癲狂所指不一盖癇病归於五脏癲病属之於心故今以风癇另立一门而癲狂合为一门也又癇与瘈略相类而实不同其病发身软时醒者谓之癇也身强直反张如弓不时醒者谓之瘈也癇病随其痰之潮作故有时而醒瘈病比癇为甚而有挟虚者故因其昏冒而遂致亡者多矣论癇病所因

三因云夫癲癇病皆由惊动使脏气不平郁而生涎闭塞诸经厥而乃成或在母胎中受惊或幼小感风寒暑湿或饮食不节逆於脏气而成盖忤气得之外惊恐得之内饮食属不内外三因不同忤气则一

按此所论三因固皆切当但胎内受惊与饮食作癇者多而外感者间而有之

论三癇

千金方云小儿之癇有三风癇惊癇食癇也风癇缘衣暖汗出风因入也初时先屈指如数乃作惊癇起於惊怖大啼乃作食癇其先不哺乳吐而变热後发然风癇惊癇时时有之十儿之中未有一二凡是先寒後热热者皆食癇也惊癇皆按图灸之风癇当与猪心汤食癇当下乃愈紫霜丸佳

按此论三癇盖有三因之分风癇属外因惊癇属内因食癇属不内外因也

论五癇

三因云古方有三癇五脏癇六畜癇等名证不同难於备载别錄有五癇之证一曰马癇作马嘶鸣以马属在午手少陰君火主之故其病生於心二曰羊癇作羊叫声以羊属未足太陰湿土主之应乎脾三曰鸡癇作鸡叫声以鸡属酉足阳明燥金主之应乎胃四曰猪癇作猪叫声以猪属亥手厥陰心包主之应乎右肾五曰牛癇作牛吼声以牛属丑手太陰湿土主之应乎肺此五癇应乎五畜五畜应乎五脏者也发则旋晕颠倒口眼相引目睛上摇手足搐搦背脊强直食顷乃苏各随所感施以治法

钱氏云凡治五癇皆随脏治之每脏各有一兽犬癇反折上窜犬叫肝也羊癇目瞪吐舌羊叫心也牛癇目直视腹满牛叫脾也鸡癇惊跳反折手纵鸡叫肺也猪癇如尸吐沫猪叫肾也五癇重者死病後甚者亦死轻者五色丸主之

按千金方叙六畜癇曰马曰牛曰羊曰猪曰犬曰鸡并不以六畜分属五脏今三因所引五癇无犬癇一证钱氏叙五癇一证无马癇一证二书以五兽分配五脏各各不同俱不知所由然也三因虽有马无犬癇及五脏有胃无肾之说亦难据凭无所载焉论癇有陰阳

千金方云病先身热掣瘈惊啼叫唤而後发癇脉浮者为阳癇病在六腑外在肌肤犹易治也病先身冷不惊掣不啼呼而病发时脉沉者为陰癇病在五脏内在骨髓难治也

按此论癇之陰阳後世有认为寒热者误也盖此疾皆以痰热所作而得其伤於阳分在表而浅则曰阳癇故云易治其伤於陰分入里而深则曰陰癇故云难治所论陰阳者乃表里脏腑浅深之谓非寒热之谓也

论癇证由热

原病式云风癇之发作者由热甚而风燥为其兼化涎溢胸膈燥烁而气瘖昏冒僵仆也

治癇用吐下之法

子和书云夫癇病不至目瞪如愚者用三圣散投之更用火盆於暖室中令汗吐下三法并行次服通圣散百余日则愈矣至於目瞪如愚者不可治内经曰神不守谓神乱也大凡此疾乃肝经有热吐後可服泻青丸下之按癇病多由风痰胶固胸膈上下故大法先宜吐之吐後可用清热之药如东垣安神丸守真龙会丸之类皆可服不独通圣散也痰实在里不解宜导痰清热亦不独泻青丸也

癇分脉药寒温不同

难知云治洪长伏三脉风癇惊癇发狂恶人与火灸第三第九椎服局方妙香丸以针投眼子

透冷水内浸少时服之如本方法治弦细缓三脉诸癇似狂李和南五生丸

按此以脉之陰阳虚实分而用药可谓善矣但癇病出於风热痰之所致而其药有寒热之异者由其标本虚实传变之不同故也

谨按癇病古方或云风癇或云惊癇或云癲癇由此疾与中风颠狂急慢惊相类故命名不同也原其所由或在母腹中受惊或因闻大惊而得盖小儿神气尚弱惊则神不守舍舍空则痰涎归之或饮食失节脾胃有伤积为痰饮以致痰迷心窍而作者治法必当寻火寻痰而论前人多用镇坠清心之药固可以治热可以清痰若有顽痰胶固者此药未易驱逐在上者必先用吐吐後方宜服此更有痰实在里者亦须下之随病轻重而用也或曰癇有陰阳何也予曰此与急慢惊者可同论也阳癇不因吐下由其有痰有热客於心胃之间因闻大惊而作若热盛虽不闻惊亦自作也宜用寒药以攻治之陰癇亦本於痰热所作医以寒凉攻下太过损伤脾胃变而成陰宜用温平补胃燥痰之药治之若曰不因坏证而有陰阳之分则是指痰热所客表里脏腑浅深而言癇病岂本自有陰寒者哉

风癇治法

清心安神之剂

宝监龙脑安神丸治男女五般癲癇无问远近发作无时

茯神【三两】 人参 地骨皮 甘草麦门冬 桑白皮【各二两】 马牙硝【二钱】

龙脑 麝香【各三钱】 牛黄【半两】 朱砂【二钱】 乌犀【一两】 金箔【三十五片】

右为细末炼蜜为丸如弹子大金箔为衣如风癇病冬月温水化下夏月凉水化下不以时二三岁者日进二服小儿一丸分二服虚劳发热咳嗽新汲水化下

按此手少陰太陰经药也出厥陰例

神应丹治诸癇

辰砂【不以多少研】

右以猪心血和之得所以蒸饼裹剂蒸熟取出就丸如桐子大每服一丸食後临卧煎人参汤下

按此手少陰经药也出厥陰朱砂例

坠痰清神之剂

钱氏五色丸

朱砂【半两研】 水银【一分】 雄黄【一两熬】

真珠末【一两研】 铅【三两同水银熬】

右炼蜜丸如麻子大每服三四丸煎金银薄荷汤下

三因六环丹治风痫失性颠倒欲死或作五畜等声掣纵吐沫久而方苏

雄黄 雌黄 未鑽真珠【各一两】 铅【二两熬成屑】 丹砂【半两】 水银【一两半】

右研令极匀蜜丸桐子大每服三丸至五丸姜枣汤下须捣二三万杵乃可丸

？丹治五癇五癰无问陰阳冷热

號丹 晋？【各一两】

右用塶凿一窠可容二两许先安丹在下次安？在上以炭五斤煨令炭尽取出细研以不经水猪心血为丸如菉豆大每服十丸至二十丸橘皮汤下

元戎二白丸

白？【一块约一两】

右用生蒸饼裹剂蒸熟去皮可丸入轻粉一字或半钱量虚实加减丸桐子大每服二三十丸生姜汤下小儿丸小些

子和朱砂滚涎散治五癰

朱砂 白？【生用】 赤石脂

硝石【各等分】

右为细末研蒜膏为丸如菉豆大每服三十丸食後荆芥汤下

宝监琥珀壽星丸

天南星【一斤掘坑用火煨烧坑红出炭净入好酒一升泼火穴中放入南星盖穴勿令通气过一宿取出焙末入】珠子【四两】朱砂【二两半为衣】

右以猪心血打姜糊丸如桐子大每服五十丸煎人参汤送下空心日三服

按已上六方虽俱手少阴经药并出厥阴例

治痰温热之剂

李和南五生丸治痼有神治阴脉弦细缓者

南星 半夏 川乌

白附子【各一两】大豆【去皮一两】

右为细末滴水为丸每服三丸至五丸不过七丸姜汤下

元戎小灵宝丹

附子【炮一两】天麻 全蝎 白僵蚕【炒】藿香叶 南星【炮】白附子【炮各半两】

右细末酒糊丸桐子大温酒下一十五丸

按已上二方并出厥阴风痼例药也

吐剂

局方碧霞丹治痰涎壅塞牙关紧急心神迷闷目睛上视五种痼疾时作搐搦

石礞【研九度飞十两】附子尖

乌头尖 蝎梢【各七十个】

右为末入石礞令匀麝糊丸如鸡豆每服用薄荷汁半盏化下一丸更以酒半合温服之须臾吐出痰涎然後随证治之如口禁斡开灌之

子和三圣散

方见吐剂

治痰攻下之剂

严氏控涎丸治诸瘤久不愈顽涎散聚无时

川乌【生】半夏【各半两】鉄粉【三钱】甘遂【二钱半】殭蚕【不炒生姜汁浸一宿半两】全蝎【去尖七个】

右为细末生姜自然汁成薄糊丸如菉豆大朱砂为衣每服十五丸食後姜汤下忌甘草

按此厥陰例药也

三因控涎丹

方见痰饮门

钱氏白饼子

方见痰饮门

千金紫丸治食瘤先寒後热方

方见内伤门

拔萃妙香丸治时疾伤寒解五毒潮热积热及小儿惊百病

辰砂【研九两】牛黄【半两】金箔【九十片研】

龙脑 膩粉 麝香【研各七钱半】巴豆【三百十五个去皮心研去油】

右合研匀炼蜜去蜡净入沙蜜白者七钱半同炼匀为丸每两作三十丸米饮调下

按海藏云此治脉洪长大有力内热者无力内寒五生丸主之治小儿每一丸分十五粒每服二丸蜜水下出厥陰风瘤例药也已上五方有寒热温凉之异用者随证择焉

平肝泻火之剂

宣明当归龙胆丸治肾水陰虚风热蘊积时发惊悸筋脉搐搦暗风瘤病

方见诸火门

千金龙胆汤治婴儿出腹血脉盛实寒热温壮四肢惊掣发热并诸惊痫方

龙胆 鈎藤皮 柴胡 黄芩 桂枝 芍药 茯苓【一作茯神】

甘草【各六铢】 螳螂【二枚】 大黄【一两】

右?咀以水一升煮取五合为剂服之

按此少阳厥陰经药也

钱氏泻青丸

方见小儿门

通解风热之剂

宣明防风通圣散亦治风痼

方见中风门

救坏证之剂

宝监沉香天麻汤治一小儿四岁因长老摩顶受记僧人念呪恐惧发搐痰涎有声目多白睛强项背一时许方醒後每见皂衣人即发多服犀朱脑麝镇坠之药已四年余此证尚在又添行步动作神思如痴诊其脉沉弦而急针经云心脉满大痼瘕筋挛病久气弱多服镇坠寒凉之剂复损正气致添动作如痴先灸两躄各二七壮次服此药

又肝脉小急盖小儿神气尚弱因而被惊神思无依又动於肝肝主筋故痼瘕筋挛

沉香 益智仁 川乌【各二钱】 天麻 防风 半夏

附子【炮各三钱】 羌活【五钱】 独活【四钱】 甘草 当归 殭蚕【各一钱半】

经云恐则气下精怯而上焦闭以羌活独活苦温引气上行又入太阳为引用故以为君天麻防风辛温以散之当归甘草辛甘温以补气血之不足又养胃气故以为臣附子川乌益智大辛温行阳退陰又治客寒伤胃肾主五液入脾为涎以生姜半夏燥湿化痰沉香辛温体重气清去怯安神故以为使

右剉每服五钱水二盞生姜三片煎至一盞去滓温服食前三剂而愈

按痢证本从热治然亦有坏证而成陰者如钱仲阳所治王氏子吐泻诸医药下之至虚变慢惊手足痿痹而身冷医复与八正散钱曰不能食而胃中虚若利大小便即死久则脾肾俱虚当身冷而闭目必用益黄散史君子丸补脾遂能饮食後又不语钱以地黄丸补肾一月而安皆此意也此方用大热之药乃从权以救前治之失非常治之道也

玉机微义卷四十一

卷四十二

钦定四库全书

玉机微义卷四十二 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

破伤风门

论破伤风表里中治法

病机云破伤风者同伤寒证治通於表里分别陰阳有在表有在里有在半表半里者在里宜下在表宜汗在表里之间宜和解不可过其治也故表脉浮而无力者太阳也脉长而有力者阳明也脉浮而弦小者少阳也若明此三法而施治不中病者鲜矣

原病式云夫破伤中风之由者因疮热甚鬱结而荣卫不得宣通怫热因之徧体故多白痂是时疮口闭塞气难通泄热甚则生风也不已则表传於里亦犹触冒伤寒怫热鬱甚不解则表传於里者也但有风热微甚兼化故殊异矣大法破伤中风风热燥甚怫鬱在表而里气尚平者善伸数欠筋脉拘急或时恶寒或筋惕而搐脉浮数而弦也宜以辛热治风之药开冲结滞而愈犹伤寒表热怫鬱而以麻黄汤辛热发散者也凡用辛热开冲风热结滞宜以寒药佐之则良免致药中病而风热转甚也如治伤寒发热用麻黄桂枝加黄芩石膏知母之类是也若世以甘草滑石葱豉寒药发散甚妙若表不已渐伤入里里又未太甚而脉在肌肉者宜以退风热开结滞之寒药调之或微加治风辛热亦得犹伤寒在半表半里而以小柴胡和解之也若里热已甚而舌强口禁项背反张惊搐惕搦涎唾稠粘胸腹满塞而或便溺闭结或时汗出脉洪数而弦也然汗出者由风热鬱甚於里而表热稍罢则腠理疎泄而心火热甚故汗出也法宜除风散结寒药下之後以退风热开结滞之寒药调之而热退结散则风自愈矣凡治此亦宜按摩导引及以药斡开牙关勿令口禁使粥药得下也按此论表里中脉病证治至为详尽前人所未论也论破伤风所因不同

病机云破伤风者有因卒暴伤损风袭之间传播经络至使寒热更作身体反张口禁不开甚者邪气入脏有因诸疮不瘥荣卫虚肌肉不生疮眼不合风邪亦能外入於疮为破伤风之候有诸疮不瘥举世皆言着灸为上是谓热疮而不知火热客毒逐经诸变不可胜数微则发热甚则生风而搐或角弓反张口禁目斜亦有破伤不灸而病此者因疮着白痂疮口闭塞气难通泄故阳热易为鬱结热甚则生风也

按此论所因有四二者因疮口入风似属外因一者因灸逐热似属不内外因一者因疮口闭塞内热生风似属内因也

谨按破伤风证古方药论甚少岂非以此疾与中风同论故不另立条目也唯河间论伤寒表里中三法同治用药甚详其言病因有因外伤於风有因灸及内热所作者然与中风相似也但中风之人尚可淹延岁月而破伤风者犯之多致不救盖中风有在经在腑在脏之异独入脏者最难治破伤风或始而出血过多或疮早闭合瘀血停滞俱是血受病血属阴五脏之所主故此风所伤始虽在表随即必传入脏故多死也又此病或疮口坦露不避风寒而无所伤或疮口闭合密避风邪而反病此或病已十分安全而忽有此大抵皆由内气虚而有鬱热者得之若内气壮实而无鬱热者虽伤而无所害也

破伤风治法

治表之剂

病机羌活防风汤治邪初在表

羌活 防风 甘草 川芎 藁本 当归 芍药【各四两】 地榆 细辛【各二两】

右?咀每五钱水煎热服无时热则加大黄黄芩【各二两】

防风汤治破伤风同伤寒表证未传入里急宜服之防风 羌活 独活 川芎【等分】

右?咀每五钱水煎服宜调蜈蚣散大效

按已上二方并三阳经药也

蜈蚣散

蜈蚣【一对】 鳔【三钱】

右为细末用防风汤调下如表解不已觉转入里常服左龙丸【即後江鳔丸四味是也】

蜈蚣散治里和至愈可服

蜈蚣【一对】 鳔【五钱】

左盘龙【五钱炒烟尽野鸽粪是也】

右为细末每服一钱清酒调下治里至愈可服但有里证不可服次当下之用蜈蚣散四钱巴豆霜半钱烧饭为丸如菉豆大每服一丸加至六七丸清酒调蜈蚣散少许送下宣利为度

发表雄黄散里和至愈可服

雄黄【一钱】 防风【二钱】 草乌【一钱】

右为细末每服一字温酒调下

天麻雄黄散治表

天南星【三钱】 半夏 天麻【各五钱】 雄黄【二钱半】

右为细末每服一钱温酒调下如有涎加大黄为下药

三因防风散治风入疮口项强牙关紧急欲死又名玉真散

防风 天南星【炮各等分】

右为末每服三钱童子小便一大盏煎七分热服

香胶散治破伤风口禁直强

鱼胶【烧七分存性】

右研细入麝香少许每服二钱酒调下不饮米汤下一方以苏木煎汤下

元戎治破伤风欲死者

川乌 南星 半夏【并生】

天麻【去芦各等分】

右为细末每服一钱豆淋酒调下稍温服次以酒一二盏投之

治破伤风

蝎稍七条为细末热酒调下

按此已上八方并厥陰例药也

治半表半里之剂

病机羌活汤治半在表半在里

羌活 菊花 麻黄 川芎石膏 防风 前胡 黄芩细辛 甘草 枳壳
白茯苓蔓荆子【各一两】薄荷 白芷【各半两】

右?咀每服五钱水煎入生姜五片热服日二三次按此三阳经药也

地榆防风散治破伤风半在表半在里头微汗身无汗不可发汗宜表里治之

地丁草 马齿苋 地榆 防风【各等分】

右为细末每服三钱温米汤调下

治里之剂

病机大芎黄汤治破伤风脏腑小便赤自汗不止者川芎 羌活 黄芩 大黄【各一两】

右?咀五七钱水煎温服脏腑和为度

按此三阳经药此自汗乃里实也如阳明病汗多急下之

江鲮丸治破伤风惊而发搐脏腑秘澁知病在里可用此下之

江鲮【剉烧半两】野鸽粪【半两炒】雄黄【一钱】

白僵蚕【半两】蜈蚣【一对炙】天麻【一两】

只用前四味名左龙丸

右为细末分作三分将二分烧饭为丸桐子大朱砂为衣将一分入巴豆霜一钱用和亦以烧饭为丸如桐子大不用朱砂为衣每服朱砂为衣二十丸入巴豆药一丸第二服二丸加至利为度再服朱砂为衣药病愈即止

按此厥陰例药也

治汗之剂

病机白术防风汤治服发表药过有自汗者

白术 黄芩【各一两】 防风【二两】

右?咀每服五七钱水煎温服无时脏腑和而自汗者可服此药若脏腑秘小便赤自汗者无寒也宜速下之用大芎黄汤

按此手少阳足阳明太阴太阳经药也

白术汤治破伤风大汗不止筋挛搐搦

白术 葛根【各一两】 升麻 黄芩【各半两】 芍药【二两】 甘草【二钱半】

右?咀每服一钱水煎温服无时

按此阳明太阴经药也

理血之剂

养血当归地黄散治病日久气血渐虚邪气入胃养血为度

当归 地黄 芍药 川芎 藁本 防风 白芷【各一两】 细辛

右?咀水煎服

按此厥阴四物例药也

杂方

如圣散

方见中风门

一方本药内加两头尖二两

玉机微义卷四十二

卷四十三

钦定四库全书

玉机微义卷四十三 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

损伤门

叙堕坠为病

内经云人有所堕坠恶血留内腹中胀满不得前後先饮利药此上伤厥陰之脉下伤少陰之络刺足内踝下然骨之前出血刺足肘上动脉不已刺三毛各一疔见血立已左刺右右刺左

灵枢云有所堕坠恶血留於内若有所大怒气上而不下积於脇下则伤肝又中风及有所击打若醉入房汗出当风则伤脾又头痛不可取於脇者有所击堕恶血恶血在於内若内伤痛不已可侧刺不可远取之也按发明经云夫从高坠下恶血留於内不分十二经络圣人俱作风中肝经留於脇下以中风疗之血者皆肝之所主恶血必归於肝不问何经之伤必留於脇下盖肝主血故也痛甚则必有自汗但人汗出皆为风证诸痛皆属於肝木况败血凝滞从其所属入於肝也从高堕下逆其所行之血气非肝而何以破血行经药治之

伤损脉法

内经云肝脉搏坚而长色不青当病堕若搏因血在脇下令人呕逆

金匱云寸口脉浮微而澁然当亡血若汗出设不汗出者当身有疮被刀斧所伤亡血故也

脉经云金疮出血太多其脉虚细者生数实大者死金疮出血脉沉小者生浮大者死

砍疮出血一二石脉来大者二十日死

砍刺出血不止者其脉止脉来大者七日死滑细者生

从高颠仆内有血腹胀满其脉坚强者生小弱者死按破伤有瘀血在内脉坚强实则生虚小弱者死若亡血过多脉虚细小者生浮大数实者死皆为脉病不相应故也

论伤损宜下

子和云诸落马坠井打扑伤损闪肭损折杖疮肿发焮痛不止者可峻下二三十行痛止肿消宜以通经散导水丸等药或加汤剂泻之後服和血消肿散毒之药按子和於堕车落马杖疮闪肭者俱用峻下其有心恙牙关禁急者云是惊涎堵塞於上俱用三圣散先吐後下其法虽峻然果有惊涎瘀血停留於内焮痛肿胀发於外者亦奏捷功但於出血过多老弱之人脉虚大者亦当求责

谨按打扑金刃损伤是不因气动而病生於外外受有形之物所伤乃血肉筋骨受病非如六淫七情为病有在气在血之分也所以损伤一证专从血论但须分其有瘀血停积而亡血过多之证盖打扑坠堕皮不破而内损者必有瘀血若金刃伤皮出血或致亡血过多二者不可同法而治有瘀血者宜攻利之若亡血者兼补而行之又察其所伤有上下轻重浅深之异经络气血多少之殊唯宜先逐瘀血通经络和血止痛然後调气养血补益胃气无不效也顷见围城中军士被伤不问头面手足胸背轻重医者例以大黄等药利之後大黄缺少甚者遂以巴豆代之以以为不於初时泻去毒气後则多致危殆至於略伤手指亦悉以药利之殊不知大黄之药惟与有瘀血者相宜其有亡血过多元气胃气虚弱之人不可服也其巴豆大热有毒止能破坚逐积用於此疾尤非切当所以有服下药過後其脉愈见坚大医者不察又以为瘀血未尽而後下之因而夭折人命可不慎欤

损伤治法

攻下瘀血之剂

金匱治马坠及一切筋骨损方

大黄【一两切浸成汤下】 緋帛【如手大烧灰】

乱发【如鸡子大烧灰】 炊单布【一尺烧灰】

败蒲【一把三寸】 桃仁【四十九个去皮尖熬】 甘草【如中指节炙剉】

右七味以童子小便量多少煎汤成内酒一大盏次下大黄去滓分温三服先剉败蒲席半领煎汤浴衣被处斯须通利数行痛楚立差

发明复元活血汤治从高堕下恶血留於脇下疼痛不可忍

柴胡【五钱】 当归【六钱】 甘草【二钱】

穿山甲【炮二钱】 大黄【酒浸一两】

桃仁【去皮尖五十个】 红花 瓜蒌根【各二钱】

右件桃仁研烂余药剉如麻豆大每服一两水二盏半酒半盏煎至七分去滓食前大温服以利为度得利後痛或不尽服乳香神应散灵枢云坠堕恶血留於脇下则伤肝肝胆之经行於脇下属厥陰少阳宜以柴胡为引用为君以当归活血脉又急者痛也以甘草缓其急亦能生新血阳生陰长故也为臣穿山甲瓜蒌根桃仁红花破血润血为之佐大黄酒制以荡涤败血为之使

当归导气散治损伤瘀血大便不通红肿暗青疼痛昏闷畜血内壅欲死

大黄【一两】 当归【三钱】 麝香【少许】

右三味除麝香另研外为极细末入麝香合匀每服三钱热酒一盏调下食前内瘀血去或骨节伤折疼痛接骨紫金丹治之

三因鸡鸣散治从高坠下及木石所压凡是损伤瘀血凝滞疼痛欲死兼以此药推陈致新神效

大黄【一两酒浸】 杏仁【三七粒去皮尖】

右研细酒一碗煎至六分去滓鸡鸣时服至晚取下瘀血即愈若便觉气絶取药不及急擘开口以热小便嚙之

按已上四方虽皆荡逐恶血之药前三方所以治血在肝经血分者也後一方所以治血在肺经气分者也当以脉之浮沉表里别之又海藏云若登高坠下撞打及伤心腹胸中积血不散以上中下三焦部分分之以易老犀角地黄汤桃仁承气抵当汤丸之类下之亦有以小便同煎治之者更有内加生地黄当归煎服者亦有加大黄者惟智者能择之

破血止痛行经之剂

秘藏破血散治乘马损伤跌其脊骨恶血流於脇下其痛苦楚不能转侧

羌活 防风 桂【各一钱】 柴胡连翘 当归稍
水蛭【炒烟尽研各二钱】 麝香【少许另研】 一方有苏木【一钱半】

右件分作二服每服二大盏酒水一盏除水蛭麝香外另研如泥煎余药一大盏去滓上火令稍热调二味饥服之按此太阳阳明少阳经药也

地龙散治腰脊痛或打扑损伤从高坠下恶血留在太阳经中令人腰脊或胫膕臂腰中痛不可忍

中桂 地龙【各四分】 黄栢 甘草【各一钱】 羌活【二钱】 苏木【六分】
麻黄【半钱】 桃仁【六个】 当归梢【一分】

右?咀每服五钱水二盏煎一盏去滓温服

按此足太阳经药也

发明乳香神应散治从高坠下疼痛不可忍及腹中疼痛

雄黑豆 桑白皮 乳香 没药独科栗子【各一两】 破故纸【炒二两】

右为末每服五钱醋一盏沙石器内煎至六分入麝香少许温服宝监有当归【一两】 水蛭【炒半两】

圣灵丹治一切打扑折伤疼痛不可忍者

乳香【五钱】

乌梅【去核五个】 白米【一捻秘藏作粟】 莒葵子【一盏炒黄二两八钱】

右为细末炼蜜丸弹子大每服一丸细嚼热酒送下一伏时痛不止 服

按此二方少陰经药也

三因加味芎藭汤治打伤败血入胃呕吐黑血

川芎 当归 白芍

百合【浸半日】 荆芥穗【各等分】

右剉每服四钱水酒各半煎

元戎加味四物汤治虚人损伤不禁下之者

四物汤加穿山甲煎服

按已上二方厥陰例药通前六方皆温平之剂

局方花蘂石散治金刃伤及打扑损伤猫狗咬伤或至死者急於伤处擦药其血化为黄水如
内损血入脏腑煎童子小便入酒少许调一钱服之立效

妇人产後恶血奔心胎衣不下以小便调一钱取下恶物立效

硫黄【明净者四两】 花蘂石【一斤】

右二味粗末拌令匀用纸筋和胶泥固济丸罐子一个入药在内密泥封口了焙乾安在四方磚上上画八卦五行字用炭一秤围烧自己午时从下生火直至经宿火尽又经宿已冷取研极细磁盒内盛按此厥陰硫黄例药也海藏云有用此药以童便煎服或酒调服之者与寒药正分陰阳不可不辨也

补损当归散治坠马落车伤腕折臂疼痛服此药疼痛即止筋骨即当相连

泽兰【炒】 附子【炮各一钱】 当归【炒】 甘草【炙】 蜀椒【炒】
桂心【各五分】 芎藭【炒六分】

右为细末每服二钱温酒调服日三忌生葱猪肉冷水生菓

按此少陰厥陰经药也已上二方皆温热之剂接骨之剂

发明紫金丹定痛接骨

川乌【炮】 草乌【炮各一两】 灵脂【去土半钱】 木鳖子【去殼】 黑牵牛【生】
骨碎补 威灵仙 金毛狗脊 防风 自然铜【淬七次】

地龙【去土】 乌药 青皮 陈皮

茴香【各半钱】 禹余粮【淬四两】 没药 红药子 麝香【各二钱半】

右细末醋糊为丸如梧子大每服十丸至二十丸温酒送下病上食後病下食前

元戎接骨丹

没药 乳香 当归 川椒 自然铜【醋淬】 赤芍 骨碎补【炙】 败龟【炙】 虎骨
白芷【各等分】 千金藤【郁李仁是也各等分】 又方加龙骨 川芎

右细末化蜡半两丸如弹子大每服一丸好酒半升化开煎用东南柳枝搅散热服

经验方治打顛折骨损断服此药自顶心寻病至下遇受病处则飒飒有声觉药力习习往来则愈

自然铜【煅醋淬七次一两】川乌【去皮尖】松明节乳香 血竭【三钱】
龙骨【半两生】地龙【半两】水蛭【炒半两】没药 苏木
降真香土狗【十个油浸焙乾】

右为末每服五钱无灰酒调下病在上食後在下食前

按已上三方并出少陰折伤例药也其用毒药以行诸经亦是瘀血已去者方可用丹溪云世以自然铜为接骨药然此等方尽多大抵在补气补血补土俗工惟在速効以罔利迎合病人之意而铜非煅不可服若新出火者其火毒金毒相扇挟香挟药毒虽有接伤之功而燥散之祸甚於刀劍戒之

杂方

机要刀箭药止血定痛没药散

定粉 风化灰【各一两】 乳香【半钱另研】

枯?【三钱另研】 没药【一字另研】

右件各研为细末同和匀再研掺用之

本事地黄散治金疮止血除疼痛辟风续筋骨生肌肉地黄苗 地松 青蒿
苍耳苗生艾汁【三合】赤芍【各五两入水取汁】 石灰【三分】

右五月五七月七午时修合以前药汁拌石灰陰乾入黄丹三两更杵罗细丸金疮出血用药封包不可动十日差无脓肿

经验方治打扑损筋伤骨折吕显谟传

黄栢【一两】 半夏【半两】

右为细末每用半两生姜自然汁调如稀糊傅用纸花贴如乾再傅骨折先以绢帛封缚次用沙木扎定良久痛止即痒觉热乃是血活筋骨复旧轻者三五日重者不过旬月

又方治打扑损肿痛不止

生姜自然汁米醋牛皮胶同熬溶入马屁勃末不以多少调如膏以纸摊传肿处

治刀伤斧斫

五倍子一味为末乾贴神效

桑叶陰乾为末乾贴如无旋熨乾末贴之妙

玉机微义卷四十三

卷四十四

钦定四库全书

玉机微义卷四十四 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

疹门

论疹证治

洁古云疹之病其为证各异疮发焮肿於外者属少阳三焦相火也谓之小红靨行皮肤之中不出者属少阴君火也谓之疹凡显证若自吐泻者慎勿乱治而多吉谓邪气上下皆出也疹并出小儿难禁是以别生他证也首尾不可下大抵安里之药多发表之药少秘则微疎之令邪气不壅并而能作番次使儿易禁也身温暖者顺身凉者逆

按此是例阳证发宜与小儿门论兼看证治论伤寒发有阴阳不同

略例曰阳证发有四有伤寒发有时气发有热病发有温毒发班班如锦文或发之面部或之胸背或发之四末色红赤者胃热也紫黑为胃烂也一则下之早一则下之晚乃外感热病而发也当服玄参升麻白虎等药

谨按四气发温毒为至重暑证亦发固有轻重之殊见面部者传手经也难知云戌助少阴心火入于手太阴肺也背多者足太阳胸属足阳明四末属脾与心也

阴证发亦出背胸又出手足亦稀少而微红若作热证投之凉剂大悞矣此无根失守之火聚於胸中上熏肺传於皮肤而为班点但如蚊蚋蚤虱咬形状而非锦文也调中温胃加以茴香芍药以大建中之类其火自下自退可谓治本而不治标也

谨按证固有阴阳轻重之现证矣阳证大率用托里清热化凉血阴证止用调中温胃其自消病体自定非若疮成脓疱也虽轻重俱从火化大抵急则治标缓则治本

论中寒发

略例云完颜小将军病寒热间作有三五点鼻中微血出两手脉沈澹胸膈四肢按之殊无大热此内伤寒也问之因暑卧殿角伤风又渴饮水酪水此外感者轻内伤者重从内病俱为阴也故先衄後显内阴寒热间作脾亦有之非往来少阳之寒热也与调中汤数服而愈

论伤寒治误发?

陈无择云伤寒发?者盖不当下而下之热则乘虚入胃当下而失下则胃热不得泄二者皆能发?其状如锦绣赤者易治黑者难治盖热毒入胃深也

按此谓?主於胃因下早下晚之失而生至如阳证悞用热剂而发?或温毒便发?者皆宜从脉求其本也仲景云寸脉浮滑者可用瓜蒂散吐之是热毒蕴於胸膈也又非在胃及虚火之比大抵黑者热极亢则害承乃制也

论瘾疹

陈无择云世医论瘾疹无不谓是皮肤间风然既分冷热冷热即寒暑之证又有因浴出凑风冷而得之者岂非温也则知四气备矣经分诸疮实热则痛虚寒则痒又阳明主肌肉属胃与大肠亦有冷热分痛痒不可不审世人呼白者为婆膜赤者为血风名义混殽当以理晓察内外随证治之

谨按瘾疹多属脾隐隐然在皮肤之间故言瘾疹也发则多痒或不仁者是兼风兼湿之殊色红者兼火化也

瘾疹治法

升散之剂

元戎葛根橘皮汤治?在肌 冬温始发肌中?烂欬而心闷但呕清汁

葛根 橘皮 杏仁 知母黄芩 麻黄 甘草

右等分水煎服

按此足阳明太阳药也

阳毒升麻汤?在面伤寒一二日或吐下後变成阳毒腰背痛烦闷不安面赤狂言见鬼下痢脉浮大咽痛升麻【五钱】 犀角 射干 黄芩人参 甘草【各二钱半】

右?咀水煎取饮半盏刻许再进温覆手足得汗出解

玄参升麻汤?在身治汗下吐後毒不散表虚里实发於外甚则烦躁谵妄

玄参 升麻 甘草【等分】

右?咀水煎服

按已上足阳明药也

阳毒梔子汤治伤寒壮热百节疼痛而发?

升麻 梔子仁 黄芩 芍药石膏 知母 杏仁 柴胡甘草

右粗末每五钱入姜五片?百粒煎服

按此足阳明少阳药也

消毒犀角饮子治?及癰疹

牛蒡子【六钱】 荆芥 防风【各二钱】 甘草【一钱】

右?咀水煎

按此手太陰药也

解毒防风汤治?及癰疹痒痛

防风【一两】 地骨皮 黄芪 芍药荆芥 枳殼 牛蒡子【各半两】

右为粗末每四五钱水煎服

按此手足太陰药也已上诸方本於阳证者宜选用之

升麻葛根汤

陰毒升麻鳖甲汤治陰?

升麻【三两】 当归 甘草【各二两】 蜀椒【一两】 鳖甲【炙】 雄黄【半两研】

右为末每服五钱水煎服

按此【阙】

三因加味羌活散治感四时所传肌肤发为癰疹增寒壮热

羌活 前胡【各一两】 人参 桔梗 甘草 枳壳 川芎 天麻 茯苓【各半两】 蝉蜕 薄荷【各三钱】

右?咀捣为末每服二大钱姜三片煎服

按此足太阳手太阴少阴药也

调中汤治内伤外感而发阴?

苍术【一钱半】 陈皮【一钱】 砂仁 藿香 芍药【炒】 甘草【炙】 桔梗 半夏 白芷 羌活 枳壳【各一钱】 川芎【半钱】 麻黄 桂枝【各半钱】

右?咀姜三片水煎服

按此足太阳太阴手阳明太阴药也已上诸方本於阴证者宜选用之

和解之剂

化?汤治伤寒汗吐下後?发脉虚

白虎汤加人参守真类粹再加白术

右?咀时时煎服之

下剂

当归丸治伤寒?见无大热脉虚秘闷

当归【半两】 甘草【一分】 黄连

大黄【各二钱半】

右先将当归熬膏子入药末三味为丸渐加至利为度

凉血之剂

黑膏治温毒发?

生地黄【半斤】 好?【一升】

右二味以猪膏二斤合煎之至浓汁用雄黄麝香如大豆大内中搅和每服用弹子大汤化服未效再服之

大青四物汤

大青【四两】 阿胶 甘草【各一两】？【八合】

右?咀每服五钱水煎服之

玉机微义卷四十四

卷四十五

钦定四库全书

玉机微义卷四十五 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

黄疸门 【发黄附】

诸经叙黄疸脉证

内经曰溺黄赤安卧者黄疸

要略曰寸口脉浮而缓浮则为风缓则为痹痹非中风四肢苦烦脾色必黄瘀热以行 尺脉浮为伤肾跌阳脉紧为伤脾风寒相搏食谷即眩谷食不消胃中苦浊浊气下流小便不通陰被其寒热流膀胱身体尽黄名曰谷疸

额上黑微汗出手足中热薄暮即发膀胱急小便不利名曰女劳疸
腹如水状心中懊憹而热不能食时欲吐名曰酒疸多不治

脉经曰脉沈渴欲饮水小便不利者皆发黄凡黄候其寸口脉近掌无脉口鼻冷并不可治

论五疸

陈无择云古方叙五种黄者其实一病立名异耳如黄汗者以胃为脾表属阳明阳明蓄热喜自汗汗出因入水中热必鬱故汗黄也其後身体肿发热不渴状如风水汗出染衣色正黄如栢汗

黄疸者由暴热用冷水洗浴热留胃中所致其候身面眼悉黄如金色小便如煮蘖汁

谷疸者夫由肌发热大食伤胃气冲鬱所致其候食则腹满眩晕谷气不消 【云云见前】

酒疸由大醉当风入水所致唯酒变证最多热毒流於清气道中则眼黄鼻齕

女劳疸由大热交接竟入水水流湿入於脾因肾气虚甚以所胜尅入致肾气上行故有额黑身黄之证其间兼渴与腹胀者并难治发於陰必呕发於阳则振寒面微热虽本於胃气鬱发土色上行然发於脾则为内疸发於肾则为黑疸若所论因外则风寒暑湿内则喜怒忧惊酒食房劳三因悉备世医独严於伤寒论中不亦濫矣

按已上五疸与前要略所具不同宜兼考之陈氏治例未能以尽其变推其病体究治大抵已上五疸形证已具无所隐兼证者黄汗黄疸谷疸诚以元气脾胃之气为主而治之形气谷气稍实者则可得而复矣酒疸则元气胃气殊已伤甚形气孤危谷气与药杂进能有断厚味而守药得复生者则几希矣女劳疸则陰阳之气虚竭甚者为难治陈云世医独严於伤寒而不及此此则亦非伤寒家法所可髣髴施也论伤寒阳证发黄

保命集云凡发黄有六有畜血发黄邪热传於太阳之本小便先淋而黄其人暴狂内有血也为太阳发黄本病也湿热发黄太陰并阳明之本为小便不利风湿热发黄并少阳也寒湿发黄太陰并少阳也结胸发黄下之早附太阳也痞气发黄附太陰也凡六者各随脉证标本而治之大抵发黄从太陰阳明而论脾胃皆土也故见黄色当从其脾病色黄土气化湿非湿毒何能发黄也

论陰证发黄

韩祗和云病人三五日服下药太过虚其脾胃亡其津液渴饮水浆脾土为陰湿加之与邪热相会发黄此陰黄也当以温药治之如两手脉沈细迟肢体逆冷皮肤有粟起或呕吐舌上有胎遍身发黄烦躁欲於泥水中卧小便赤少皆陰候也故陰黄多以热汤温之或汤渍布搭其胸腹或以汤盛瓢中坐於脐下熨之其病愈者曾治赵显宗病伤寒至六七日因服下药太过致发黄其脉沈细迟无力皮肤凉发躁欲於泥中卧喘呕小便赤澀先投茵陈橘皮汤喘呕止次服小茵陈汤半剂脉微出不欲於泥中卧次日又服茵陈附子汤半剂四肢发热小便二三升当日中大汗而愈似此治愈者不一一录凡伤寒病黄每遇太阳或太陰司天岁若下之太过往往变成陰黄盖辰戌太阳寒水司天水来犯土丑未太陰湿土司天土气不足即脾胃虚弱亦水来侵犯多变此证也

按已上论伤寒陰阳二证发黄殆无余蘊大抵本形气虚实受证不同用药有汗下温之禁非若杂病之比也我丹溪先生谓发黄如?麴相似湿热有微甚及兼热兼寒瘀血所因不同故治例不可不分论内伤发黄

略例云内感伤寒劳役形体饮食失节中州变寒之病生黄非伤寒坏之而得只用建中理中大建中足矣不必用茵陈也

按此言内伤不足故宜补益惟其有余新病必须消导之久病从谷疸施治可也

论发黄治例

难知云色如熏黄乃湿病也一身尽痛色如橘子黄乃黄病也一身不痛

乾黄燥也小便自利四肢不沈重渴而引饮者栀子蘗皮汤

湿黄脾也小便不利四肢沈重似渴不欲饮者茵陈汤

若大便自利而黄者茵陈栀子黄连三物汤往来寒热一身尽黄者小柴胡加栀子汤

按一身尽痛而黄者湿胜在表也不痛者病在里也乾燥者热胜也故後证皆有表里之分殊东垣云伤寒当汗不汗即生黄邪在表者宜急汗之在表之里宜渗利之在半表里宜和解之在里者宜急下之若已上诸证及略例云男黄小便自利当与虚劳小建中汤若黄色不变欲自利腹满而喘不可除热除热必哕小半夏汤皆不必拘於茵陈也

黄疸治法

升散之剂

金匱桂枝加黄芪汤治黄汗身肿汗出出已辄轻轻久必身瞶胸中痛腰以下无汗腰臑?痛如有物在皮中剧者不能食烦躁小便不利

桂枝 芍药【各三钱】 甘草【二钱】 黄芪【五钱】

右水煎入姜枣服後仍饮热粥助药力

麻黄连翘赤小豆汤治身热不去瘀热在里发黄小便微利

麻黄 连翘【各一两】 赤小豆

右?咀作一服水煎

局方茵陈五苓散治伤寒或伏暑发黄小便不利烦渴

本方五分加茵陈一分

韩氏茵陈茯苓汤治发黄脉沈细数四肢冷小便濇烦躁而渴

茯苓 桂枝 猪苓【各一两】 滑石【一两半】 茵陈【一两】

右为末每服半两水煎服如脉未出加当归

按已上方并太阳例药也

攻下之剂

金匱栀子大黄汤治酒疸心中懊憹或热痛

栀子【十四枚】 大黄【一两】 枳实【五枚】 ?【一升】

右水煎至二升分温三服

大黄硝石汤治黄疸腹满小便不利而赤自汗此表和里实

大黄 黄柏 硝石【各四两】

梔子【十五枚】

右水煎服如前法

硝石?石散治女劳疸身黄额黑日晡发热恶寒膀胱急小腹满足下热因作黑疸其腹满如水状大便必黑时溲此女劳之病非水也

硝石?石【各烧等分】

右二味为散以大麦粥汁和服二钱曰三重衣覆取汗随大小便去小便黄大便黑是其候也

半夏汤治酒疸身黄无热言不了了腹满欲呕心烦足热或症瘕心中懊憹其脉沈弦或紧细

半夏 茯苓 白术【各三两】 前胡枳实【炒】 甘草 大戟【炒各二两】

黄芩 茵陈 当归【各两】

右?咀每服四钱水煎入姜三片空心服

茵陈蒿汤治身热鼻乾汗出阳上奔小便赤而不利湿热发黄

茵陈蒿【六两】 梔子【十四个】 大黄【二两】

右三味每服一两半水煎服

难知茵陈大黄汤治伤寒大热发黄面目悉黄小便赤茵陈蒿 梔子 柴胡 柏皮黄芩 升麻 大黄【炒各一两】

龙胆草【半两】

右为粗末每服五钱水煎服

抵当汤治太阳伤寒头痛身热法当汗解反利小便热瘀在内则身黄脉沈少腹硬小便自利

其人如狂者下焦有血也宜此汤主之

水蛭 ䷩虫【各十个】 大黄【一两】

桃仁【十二个】

右剉作一服水煎食前服

按已上并阳明经药也抵当汤厥陰药轻者桃仁承气汤主之

和解之剂

小柴胡加梔子汤

按此手太陰足少阳药也

治热和中之剂

梔子柏皮汤治身热不去大便利而烦热身黄者梔子 柏皮 黄连【各等分】

右?咀每服一两水煎服

宝监茯苓渗湿汤治黄疸寒热呕吐而渴欲饮冷身体面目黄小便不利不得安卧不思食

白茯苓【五分】 泽泻【三分】 茵陈【六分】 猪苓【二钱】 生黄芩 黄连 梔子
防己白术 苍术 陈皮 青皮枳实【各二分】

右?咀作一服水煎空心服酒疸兼作丸子服之按此并太阳例药

温中之剂

金匱小半夏汤治黄疸小便色不异欲利腹满而喘

半夏【汤泡七次】

右?咀每服三五钱水煎入姜十片

韩氏茵陈橘皮汤治身黄脉沈细数热而手足寒喘呕烦躁不渴者

茵陈 橘皮 生姜【各一两】 白术【一分】 半夏 茯苓【各半两】

右为末水四升煮取二升放温分作四服

按此并足阳明太陰药也

小茵陈汤治发黄脉沈细迟四肢及遍身冷

附子【一个八片】 甘草【炙一两】 茵陈【二两】

右为粗末用水二升煮一升温作三服

茵陈四逆汤治发黄脉沈细迟肢体逆冷腰已上自汗

甘草【炙一两】 乾姜【炮一两半】

附子【一个作八片】 茵陈【二两】

右为粗末分作四贴水煎服

茵陈附子汤治服四逆汤身冷汗不止者

附子【二个各作八片】 乾姜【炮二两半】

茵陈【一两半】

右为粗末水煎分作三服

按已上并少陰经药也

茵陈茱萸汤治服茵陈附子汤证未退及脉伏者吴茱萸【一两】 当归【三分】

附子【二个作八片】 木通【一两】 乾姜【炮】 茵陈【各一两半】

右为粗末分作二服水煎

按此足少陰厥陰药也

吐下之剂

三因苦参散治湿热内甚小便赤澁大便时秘食饮不妨服诸药不除因为久黄

苦参 黄连 瓜蒂 黄柏 大黄【各一分】 葶苈【半两】

右为末每服一大钱饮调下当吐利随时消息加减与之服

按此出太阳阳明例药也

调理之剂

当归白术汤治酒疸发黄结饮癖在心胸间坚满骨肉沈重逆害饮食小便赤黄此因内虚饮食生冷脾胃痰结所致其脉弦澹

白术 茯苓【各三两】 当归 黄芩 茵陈【各一两】 前胡 枳实【炒】 甘草【炙】

杏仁【炒各二两】 半夏【一两半】

右?咀每服四五钱入姜煎

小建中汤

养荣汤治五疸脚弱心忪口淡耳鸣微寒发热气急小便白浊当作虚劳治之

方并见虚损门

消食之剂

三因红丸子治穀疸发黄

方见霍乱门用生姜甘草汤下

宝监枣?丸治食劳目黄身黄者

皂?【不以多少沙锅内木炭烧通红赤用米醋内点之】

右为末枣肉丸桐子大每服二三十丸食後用生姜汤下

取黄水法

瓜蒂散

瓜蒂【二钱】 母丁香【一钱】 黍米【四十九个】

赤小豆【半钱】

右为极细末每夜於鼻内?之取下黄水内服凉剂

三因如神散治酒毒不散发黄久久浸渍流入清气道中宜此内鼻中取黄水

苦瓠子【去皮】 苦葫芦子【去皮三七个】

黄黍米【三百粒】 安息香【二皂子大】

右为末以一字搐入鼻中滴出黄水一升忌勿吹吹或过多即以黍穰烧灰麝香末各少许吹鼻内立止

玉机微义卷四十五

卷四十六

[子部,医家类,玉机微义]

钦定四库全书

玉机微义卷四十六 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

霍乱门

内经叙霍乱所因

经曰岁土不及风乃大行【云云】民病飧泄霍乱体重腹痛筋骨繇并

按此言土运不及木乃太过木乘土而为病宜详玩本文

论霍乱脉证

内经曰脉伏者霍乱

伤寒论曰病呕吐而利名曰霍乱或发热头痛身疼恶寒吐利或自吐下又利止复更发热也皆是霍乱证伤寒其脉微澁者本是霍乱今是伤寒却四五日至阴经上转入阴必利本呕下利者不可治也

保命集云伤寒霍乱转筋身热脉长阳明本病也脾胃受湿热中焦气滞或因冷饮或伤冷水或感湿气冷热不调水火相干阴阳相?上下相离荣卫不能相维故转筋挛痛经络乱行暴热吐泻中焦胃气所主也谨按伤寒传变为霍乱者殊少惟夏秋之间暄热人胜理?感风湿喝之气而生此证多有阴阳虚实不同脉来浮洪者可治微而迟气少不语者为难治论霍乱分三因

陈无择曰霍乱者心腹卒痛呕吐下利增寒壮热头痛眩晕先心痛则先吐先腹痛则先利心腹俱痛吐利并作甚则转筋入腹则毙霍乱恶证无越於斯盖阴阳反戾清浊相干阳气暴升阴气顿坠阴阳痞隔上下奔逸治之惟宜温煖更详别三因以调之外因诸风则恶风有汗伤寒则恶寒无汗胃湿则重着伤暑则热烦内因九气所致鬱聚痰涎饮痞膈不通遂致满闷随其胜复必作吐利或诸饱食脰炙恣飧乳酪水脯寒浆旨酒胃既?胀脾脏停凝必内鬱发遂成吐利当从不内外因也

按此具霍乱三因稍备但立方未能以尽其变学者自宜推格

论霍乱转筋

陈氏曰转筋者以阳明养宗筋属胃与大腸今暴吐下津液顿亡外感四气内积七情饮食甜膩攻闭诸脉枯削於筋宗筋失养必致挛缩甚则卵缩舌卷为难治按此言霍乱者多转筋大抵冷热不调陰阳相?故筋挛痛甚者遍体转筋此实陰阳之气反戾风寒乘之筋失气血所荣而为挛缩急痛也

论乾霍乱

陈氏曰乾霍乱者忽然心腹胀满绞刺疼痛蛊毒烦冤欲吐不吐欲利不利状若神灵所附顷刻之间便致闷絕亦涉三因或脏虚或腸胃素厚故吐利不行

按此谓人腸胃素厚形气实者故感四气则吐利不行而乾挥霍撩乱也大抵热胜痰鬱则闷乱湿胜饮鬱则吐下形气虚者祸不旋踵严氏谓胃中诸食结而不消陰阳二气拥而反戾挥霍之间变成吐利然饮食致者亦有有余不足如饮食自倍外感湿喝而乾霍乱者宜吐之或下之过伤者宜消导之痰者刼之寒者温之热者清之要在适事为故也

论霍乱烦渴

陈氏曰烦渴者以陰阳反戾清浊相干水与穀并小便秘澁既走津液肾必枯燥引水自救烦渴必矣

按吐利必竭况肾水竭者乎与水者唯宜温煖热甚者天水輩以甘缓火也

霍乱治例

保命集云霍乱阳明证宜和中平胃建中輩或四君子汤脉浮自汗四君子加桂主之脉浮无汗四君子加麻黄

吐利转筋脇下痛脉弦者木剋土也故痛甚平胃加木瓜五钱或建中加柴胡木瓜

吐利转筋腹中痛体重脉沈而细者四君子加白芍良姜

吐利四肢拘急脉沈而迟此少陰霍乱四君子加姜附厚朴

吐利四肢厥冷脉微缓属厥陰建中加归附 吐利头痛而身热热多欲饮水者五苓寒多不用水者理中丸主之元戎云太陰证霍乱者理中加橘红名治中汤 若吐下心腹作痛手足逆冷理中去白术加熟附名四顺汤若吐利後转筋者理中加火煨石膏一两

霍乱治法

和中之剂

四君子汤

平胃散

建中汤并治证见前

方见虚损门

治寒之剂

机要浆水散治暴泄如水周身汗出尽冷脉弱不能语言甚者加吐

半夏【二钱】 附子 乾生姜 炙甘草 桂【各半钱】 良姜【三分半】

右为末作一服浆水煎服之

姜附汤治霍乱转筋手足厥冷汗呕逆多

乾姜【一两】 附子【一个生用】

通脉四逆汤治霍乱多寒身冷脉絶

吴茱萸【三两炒】 附子【炮一两】 桂心 通草 细辛 白芍

甘草【炙各半两】 当归【三钱】

右?咀每服四钱水酒各半加生姜煎

理中汤治过食生冷遂成霍乱吐下胀满食不消心腹痛

方见寒门加橘皮名橘皮治中汤

严氏曰若脐上筑动者肾气动也去术加桂吐多者去术加生姜半夏利多者仍用术心悸者加茯苓腹痛者加乾姜腹满者去术加附子厚朴

治湿之剂

三因茯苓泽泻汤治霍乱吐利後烦渴饮水

五苓减猪苓加甘草

按此太阳例药也

治暑之剂

局方五苓散治霍乱头痛吐下烦渴

方见湿门

严氏水浸丹治伏暑伤冷冷热不调口乾烦渴

黄丹【一两一分炒】 巴豆【二十五个去皮心】

右同研匀用黄蜡作汁为丸如梧子大每服五丸以水浸少顷别以新汲水吞下

按此劫剂也

加味香薷饮治伏暑吐利不止烦闷多渴

本方加?榔 黄连

右?咀每服五钱水酒各半煎服

冷香饮子治伏暑吐利烦燥

草薢仁【三两】 附子 橘红【各一两】 甘草【半两】

右?咀每服一两入姜煎水旋冷服

按已上并太阳例药也有寒热陰阳不同要在脉证相符而行也

温经之剂

三因木瓜汤治霍乱吐下举体转筋入腹则闷絕

乾木瓜【一两】 吴茱萸【半两】 茴香

炙甘草【各二钱】

右?咀每服四大钱入姜三片苏叶十片煎

按此阳明例药也大抵转筋亦有所兼之证不同用者自宜推格

坠痰温补之剂

三因胃气丸治忧思过度脾气闭聚结痰饮留滞肠胃气?於陰凝之於阳陰阳反戾吐利交作四肢厥冷头目晕眩或复发热

硫黄【不以多少入猪脏内缚定头米泔酒童便各一碗煮乾一半取出洗去秽晒乾秤十两用】半夏【洗去滑五两】人参白茯苓【各一两】石膏

右为末生姜汁浸炊饼为丸每五十丸至百丸空心食前米汤下

理气温中之剂

三因七气汤治七气发?致脏气刑剋陰阳反戾变成吐利交作寒热眩晕痞满咽塞

半夏【五钱】厚朴桂心【各三钱】茯苓

白芍紫苏橘皮【各二钱】人参【一钱】

右?咀每服四五钱入姜枣煎

诃子散治心脾冷痛霍乱吐利如神

诃子甘草【炙】厚朴【制】乾姜

草果陈皮良姜茯苓

神麴【炒】麴【各等分】

右为末每服二钱入盐些小水煎服

按已上并足阳明经药也

消食之剂

三因红丸子治脾胃虚冷饮食失节宿食留饮聚癖肠胃或因食不调冲胃寒湿忽作霍乱吐利并作心腹绞痛

蓬术 三棱【各二两同用米醋炙一伏时】胡椒【一两】青皮【三两炒】阿魏【一分】

右为末化阿魏入陈米粉为丸如梧子大朱砂为衣每服百丸至二百丸不拘时生姜甘草汤下

杂方

严氏洗法治霍乱转筋

蓼一把去两头水三升煮二升放温熏洗

渍法治霍乱转筋入腹

盐多用煎汤於槽中暖渍之

三因吐法治乾霍乱蛊毒宿食不消积冷心腹烦满鬼气极咸盐汤三升热饮一升刺口令吐宿食便尽不吐更服吐讫复饮三吐乃止此法大胜诸治俗人以为田舍浅近鄙而不用守死而已凡有此证即先用之元戎云吐定用理中汤

灸法治霍乱已死腹中有暖气者 盐内脐中灸二七壮

玉机微义卷四十六

卷四十七

钦定四库全书

玉机微义卷四十七 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

厥门

内经论厥证所因

论曰阳气衰於下则为寒厥陰气衰於下则为热厥人质壮以秋冬夺於所用下气上争不能复精气溢下邪气因从之而上也气因於中由阳气衰不能渗营其经络阳气曰损陰气独在故手足为之寒厥也陰气衰於下则为热厥由醉饱入房内亡精气中虚热入肾气日衰阳盛陰虚故手足为之热也陰气盛於上则下虚下虚则腹胀满腹满则下气重而邪气逆逆则阳气乱阳气乱则令人暴不知人或至半日远一日乃知人也名曰尸厥

按本论叙六经厥状与六经厥逆甚详宜玩本文大抵六经之厥阳证至为?仆为颠疾为妄见陰证至为?胀大小便不利或呕或心痛之类皆素多痰气因虚所乘之为病也惟有轻重之殊尔如成无已注伤寒论云厥者手足冷也四逆者四肢不温也邪在三阳则手足必热传到三陰则手足厥冷厥者逆也而有陰阳之殊热极而成厥逆者阳极似陰也寒极而成厥逆者独陰无阳也

论卒厥脉法

脉经曰脉至如喘名曰气厥气厥者不知与人言金匱方论曰寸脉沈大而滑沈则为实滑则为气实气相搏血气入脏唇口青身冷即死如身和汗自出为入腑即愈此为卒厥

按腑者为传道出内之所其气通故入腑即愈也论诸厥证寒热不同

陈无择曰经论粗分六经殊不出寒热二证所因欲求备治当历明之寒厥则因多慾而夺其精故致阳衰陰盛热厥则因醉饱入房精虚则热入故致陰虚阳盛考其厥因多以不胜乘其所胜气不得行遂致厥逆如肾移寒於脾则水乘於土水既不行乃成寒厥如心移热於肾则火乘於水水既不行乃成热厥六经皆然可次第论也尸厥亦然正由脏气相刑或与外邪相忤则气遏不行闭於经络诸脉匿伏昏不知人唯当随其脏气而通之寒则热热则寒闭则通经中以数醉为热厥之因学者不可拘此盖伤寒温病皆有热厥仲景所谓热深厥深经意以酒能发百脉热故举此以为例耳寒厥者初得之四肢冷脉沈微而不数多恶寒引衣自覆下

利清穀外证多惺惺热厥者初得之必发热头疼脉虽沈伏按之必数其人或畏热喜冷扬手掉足烦躁不眠大小便秘赤外证多昏冒伤寒亦然

谨按寒热发厥固宜随其陰阳胜负为治如其厥逆者不外乎伤寒寒热二证求陰阳厥逆之浅深余寒热厥证是沈寒积热发厥至若陰阳竭闭尸厥卒厥又非已上寒热厥证之比也陈论虽稍闚其颐何治例殊未少具尔

论寒热厥证宜吐下

子和曰【云云】

谨按厥证寒热亦有陰阳虚实不同如形气稍实者宜从子和之法吐下之虚甚者惟宜随其所因而调理之可也陈氏论脏气相刑或与外邪相忤气遏不行闭经络脉伏昏不知人至为尸厥今世俗多作风治鲜不致毙如传引华陀治虢太子尸厥为阳脉下坠陰脉上争会气闭而不通上有絕阳之络下有破陰之纽破陰絕阳之色已发脉乱故形静如死状此与经言陰阳之气盛衰为厥之旨甚微後人安能得证治之彷彿乎而以陰阳证治之可验者较之若伤寒手足厥逆昏不知人邪正已极温下之间稍或迟缓祸不旋踵或汗不解暴衄不知人而厥或杂病得吐衄血而厥不知人者一二日或三日必间间则为愈矣盖陰气尚实必身不热热则不厥厥则为血温身热主死矣暴气厥而形实者七情所致痰饮内鬱而厥必半日或一二时必间形虚而气逆甚者多致不救此又可见气血为厥陰阳暴逆之甚也故不可断作风治

厥证治法

通关窍之剂

苏合香丸治卒暴厥不知人未辯风痰气厥宜与此膏化浓汤灌之惺後却议脉证用药

吐剂

瓜蒂散

方见痰饮门口噤者或先用搐鼻药

升发之剂

三因追魂汤治卒厥暴死及主客忤鬼击飞尸气絕不觉口噤

麻黄汤 方见寒门

右?咀水煎灌之不下者分病人髮左右捉搦按肩引之令服取效千金方加桂

按此治感中邪气之剂也

治寒之剂

四逆汤治寒厥表热里寒下利清穀食入则吐脉沈伏手足冷

方见寒门

按此治寒热之剂并出寒暑例然内因气血之剂详见各门宜对证选用兹不详录

治热之剂

白虎汤治热厥腹满身重难以转侧面垢谵语遗溺手足厥冷自汗脉沈滑 方见暑门

玉机微义卷四十七

卷四十八

钦定四库全书

玉机微义卷四十八 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

痹证门

内经叙痹

经曰风寒湿三气杂至合而为痹其风气胜者为行痹寒气胜者为痛痹湿气胜者为着痹以冬遇此为骨痹以夏遇此为筋痹以夏遇此为脉痹以至陰遇此为肌痹以秋遇此为皮痹

按本论备五脏等痹甚详宜玩本文

脉法

脉经曰脉澁而紧痹病

论痹证所因不同

陈无择曰虽三气合痹其用不同三气袭人经络入於筋脉皮肉肌骨久而不已则入五脏烦满喘而呕者是痹客於肺烦心上气噎乾恐噫厥胀满者是痹客於心多饮数小便小腹痛如怀妊夜卧则惊者是痹客於肝善胀尻以代肿脊以代头者是痹客於肾四肢?墮发欬呕沫上为大寒者是痹客於脾又有肠痹胞痹及六腑各有俞风寒湿所中治之随其腑俞以施针灸之法仍服逐三气发散等药则病自愈大抵痹之为病寒多则痛风多则行湿多则着在骨则重而不举在脉则血凝不流在筋则屈而不伸在肉则不仁在脾则寒逢寒则急逢热则纵又有血痹以类相从外有支饮作痹谨按痹之为证有筋挛不伸肌肉不仁者与风证絕相似故世俗多类於风痿痹证通治此千古之弊也徐先生已於卷首分出痿证一门大抵固当分其所因风则阳受之痹感风寒湿之气则陰受之为病多重痛沈着患者难易得去如钱仲阳为宋之一代明医自患周痹止能移於手足为之偏废不能尽去可见其为难治也况今世俗多类於风证通治宜乎不能得其病情也

论痹因虚所致

严氏曰痹证因体虚腠理空?受之而成逢寒则急逢热则纵随所受邪气而生证也诊其脉大

而濇为痹脉来急亦为痹脉濇而紧者亦为痹又有风血痹陰邪入於血经故也

谨按人感三气为痹者正因形虚血虚尔但有在肌皮血脉浅深之异故入脏者死虽陈氏具经论颇详而其方未能以尽其变学者自宜充扩也

痹证治法

温经胜湿之剂

三因附子汤治风寒湿痹骨节疼痛皮肤不仁肌肉重着四肢缓纵

附子【生】 白芍 桂心 甘草 白茯苓 人参【各三分】 白术【一两】

右?咀每服四钱水煎服

按此太阳例药温中解表之剂

疎风养血之剂

三因黄芪五物汤治人骨弱肌重因疲劳汗出卧不时动摇加以微风遂作血痹脉当陰阳俱微尺中少紧身体如风痹状

黄芪 芍药 桂心【等分】

右?咀每服四五钱入姜枣煎

严氏蠲痹汤治身体烦疼项背拘急或痛或重举动艰难手足冷痹腰腿沈重筋脉无力

当归 芍药 黄芪 片子姜黄

羌活【各一两半】 甘草【炙半两】

右?咀每服四五钱入姜枣煎

黄芪酒治风湿痹身体顽麻皮肤瘙痒筋脉挛急言语蹇澁手足不遂时觉不仁

黄芪 防风 桂 天麻 萆? 石斛 虎骨【炙】 白芍 当归 云母粉 白术 茵芋 叶木香 仙灵脾 甘草 川续断

右剉如麻豆大以生绢袋盛好酒一斗浸之春五夏三秋七冬十日每服一盞温服之不拘时

防风汤治血痹皮肤不仁

防风【二两】 川独活 川当归 赤茯苓秦艽 赤芍 黄芩【各一两】 桂心杏仁
甘草【炙各半两】

右?咀每四五钱入姜煎

独活寄生汤治肝肾虚弱感风湿致痹两胫缓纵痹弱不仁

方见脚气门

谨按已上方多太阳例药也大抵痹证有兼风兼湿寒热独胜腑脏所受不同用者自宜扩充然此证因虚而感既着体不去须制对证药日夜饮之虽留连不愈能守病禁不令入脏庶可扶持也如钱仲阳取茯苓其大逾斗者以法噉之閱月乃尽由此虽偏废而气骨坚悍如无疾者壽八十二而终惜乎其方无传

治痰饮之剂

茯苓汤治支饮手足麻痹多唾眩冒

半夏 赤茯苓 橘红【各一两】 枳实桔梗 甘草【各半两】

右?咀每服四五钱入姜七片水煎

按此言支饮能为痹证即饮能为脚气证是也大抵因虚而传注邪客日久荣卫壅?多致湿热经缓不能自收持如逢热则纵也已上方未能尽其例用者自宜通变也

玉机微义卷四十八

卷四十九

钦定四库全书

玉机微义卷四十九 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

妇人门

论经闭不行

内经阴阳别论云二阳之病发心脾有不得隐曲女子不月其传为风消为息贲者死不治东垣曰妇人脾胃久虚或形羸气血俱衰而致经水断绝不行或病中消胃热善食渐瘦津液不生夫经者血脉津液所化津液既绝为热所烁肌肉消瘦时见渴躁血海枯竭病名曰血枯经绝宜泻胃之燥热补益气血经自行矣此证或经适行而有子子不安为胎病者有矣或心包脉洪数燥作时见大便秘澁小便虽清不利而经水闭绝不行此乃血海乾枯宜调血脉除包络中火邪而经自行矣内经所谓小肠移热於大肠为瘕瘕为沉月澁不利则月事沈滞而不利故云为瘕瘕为沈也或因劳心心火上行月事不来安心补血泻火经自行矣故内经云月事不来者胞脉闭也胞脉者属心而络於胞中令气上迫肺心气不得下故月事不来也曾治验裴泽之夫人病寒热而月事不至者数年矣已加喘 医者率以蛤蚧桂附等投之曰不然夫人病阴为阳所搏温剂太过故无益而反害投以凉血和血之药则经行矣已而果然

要略曰妇人之病因虚积冷结气为证经水断绝至有历年血寒积结胞门寒伤经络凝坚在上呕吐涎唾久成肺癰形体损分在中盘结绕脐寒疝或两脇疼痛与脏相连或结热中痛在关元脉数无疮经候不匀冷阴掣痛少腹恶寒或引腰脊下根气街【云云】

谨按良方言妇人月水不通由劳伤血气致令体虚受风寒邪气客於胞内损冲任之脉并手太阳少阴二经致胞络内血绝不通如已上病机皆略之不议且血病经闭又岂止手太阳少阴二经耶然亦有不因寒热或痰饮积聚疝瘕所致如七情所动其为气病血从一也况阴道常虚不足者实多宜翫血证门血属阴难成易亏论及後丹溪先生等说

论经水不调或紫或黑

丹溪曰经水者阴血也阴必从阳故其色红禀火色也血为气之配气热则热气寒则寒气升则升气降则降气凝则凝气滞则滞气清则清气浊则浊上应於月其行有常名之曰经为气之配因气而行成块者气之凝也将行而痛者气之滞也来後作痛者气血俱虚也色淡者亦虚也而有水混之也错经妄行者气之乱也紫者气之热也黑者热之甚也今人但见其紫者

黑者作痛者成块者率指为风冷乘之而行温热之剂祸不旋踵矣良由病源论月水之病皆曰风冷乘之宜其相习而成俗也或曰黑者北方水之色也紫者黑之渐也非冷而何予曰经云亢则害承乃制热甚者必兼水化所以热则紫甚则黑也况妇人性执而鄙嗜欲加倍脏腑厥阳之火无日不起非热而何若曰风冷必须外得设或有之吾恐千百而一二也

按此论经病甚详大抵不得率指为风冷所乘者此由良方所言世俗往往因之悞人故戒慎之也然冷证外邪初感入经必痛或不痛者久则郁而变热矣且寒则凝既行而紫黑故非寒也

论经漏不止

内经阴阳别论云阴虚阳搏谓之崩东垣曰妇人脾胃虚损致命门脉沈细而数疾或沈弦而洪大有力寸关脉亦然皆由脾胃有亏下於肾与相火相合湿热下迫经漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白带者脉必弦细寒作於中中有赤带者其脉洪数疾热明矣必腰痛或脐下痛临经欲行先见寒热往来两脇急缩兼脾胃证出见或四肢困热心烦不得眠卧心下急宜大补脾胃而升举血气可一服而愈或人故贵脱势人事少或先富後贫心气不足其火大炽旺於血脉之中又致脾胃饮食失节火乘其中形质肌肉容顔似不病者此心病者不行於诊故脾胃饮食不调其证显矣而经水不时而下或适来适断暴下不止治当先说恶死之言劝谕令拒死而心不动以大补气血之药举养脾胃微加镇坠心火之药治其心补陰泻阳经自止矣痿论云悲哀太甚则胞络絶则阳气内动发则心下崩数溲血也故本病曰大经空虚发则肌痹传为脉痿此之谓也

良方论曰妇人崩中由脏腑伤损冲任血气俱虚故也冲任为经脉之海血气之行外循经络内荣脏腑若无伤损则陰阳和平而气血调适若劳动过多致脏腑俱伤而冲任之气虚不能约制其经血故忽然暴下或由陰阳相搏为热所乘攻伤冲任血得热则流散甚者至於昏闷其脉数疾小为顺大甚者逆

按此备言经脉致病之因本於脏腑伤损合前东垣所论极言因热因虚或悲哀七情等所致病机殆无余蕴矣

脉法

脉经曰尺脉滑血气实妇人经脉不利

少陰脉弱而微微则少血少陰脉滑而数者陰中则生疮寸口脉浮而弱浮则为虚弱则无血脉来至状如琴弦若少腹痛主月水不利孔窍生疮肝弦沈主月水不利腰腹痛

尺脉来而断絶者月水不利

寸关调如故而尺脉絶不至者月水不利当患小腹引腰痛气滯上攻胸臆也经不通绕脐寒疝痛其脉沈紧此由寒气客於血室血凝不行结积血为气所冲新血与故血相搏故痛

漏血下赤白脉迟者脉小虚滑者生急疾者大紧实数者死暴崩下血寸口脉微迟尺脉微弦

微迟为寒在上焦但吐尔今尺脉微弦如此即小腹痛引腰脊痛者必下血也寸口弦而大弦则为减大则为衄减则为寒衄则为虚寒虚相搏脉则为革妇人则半产漏下尺脉急而弦大风邪入少阴之经女子漏白下赤漏下赤白日久下血数斗脉急疾者死迟者生尺寸脉虚者漏血漏血脉浮不可治也

论赤白带下

机要云赤者热入小肠白者热入大肠其本实热冤结於脉不散故为赤白带下也冤屈也结也屈滞而病热不散先以十枣汤下之後服苦练丸大玄胡散调下之热去湿除病自除也

按此止是论有余之证也论见下

良方论云带下起於风气寒热之所伤或产後早起不避风邪风邪之气入於胞门或中经脉流转脏腑而发下血名为带下若伤足厥阴肝之经其色青如泥伤手少阴心之经其色赤如红津伤手太阴肺之经其色白形如涕伤足太阴脾之经则其色黄如烂爪伤足少阴肾之经则色黑如衄血此其因也

按此言风气寒热之所伤诸脏致证似言外邪大抵此证多有本於陰虚阳竭荣气不升经脉凝泣卫气下陷精气累滞於下焦奇经之分蕴积而成其病或醉饱房劳服食燥剂所致也白物如涕之状故言带者亦病形也经云带脉为病而得名而白者属气赤属血东垣举脉诀云崩中日久为白带漏下多时骨木枯言崩中者始病血崩久则血少复亡其阳故白滑之物下流不止此可见未得全拘於带脉矣详病亦有湿痰流注於下焦或肾肝陰淫之湿胜或因惊恐而木乘土位浊液下流或思慕为筋痿内经所谓二阳之证发心脾是也或余经湿热屈滞於少腹小腹之下而病本殊则皆为气血虚损荣卫之精气累滞而成其病标一也前人立论殆尽病机则治法无定若戴人以带下得两手脉俱滑大而有力乃上用宣去痰饮下以导水丸泄湿热继以淡剂渗之此为泻实也如其诸脉微细或沈紧而澁按之空虚或洪大而澁按之无力正为元气不足陰虚筋痿虚极中寒等证东垣有补阳调经固真等例乃兼责虚也丹溪先生治因湿痰下注用海石南星椿根皮之类较之前人下之而复吐以提其气或发中兼补补中兼利燥中兼升发润中益气温而兼收澁之例不同盖病机有轻重浅深之异尔

论师尼寡妇异乎妻妾之治

宝监曰宋褚澄疗师尼寡妇别制方盖有为也此二种寡居独陰无阳慾心萌而多不遂是以陰阳交争乍寒乍热全类温症久则为劳史记仓公传载济北王侍人韩女病腰背痛寒热衆医多以为寒热仓公曰病得之欲男子不可得也何以知诊得其脉肝脉弦出寸口是以知之盖男子以精为主妇人以血为主男子精盛以思室女人血盛以怀胎也如厥陰脉弦出寸口又上鱼际则陰盛可知故知褚氏之言有谓矣

论胎产诸证

病机机要云治胎产之病从厥陰经论之无犯胃气及上二焦为之三禁不可汗不可下不可利小便发汗者同伤寒下早之证利大便则脉数而已动於脾利小便则内亡津液胃中枯燥制药之法能不犯三禁则荣卫自和而寒热止矣如发渴而白虎气弱则黄芩血刺痛而用当归腹中痛而加之芍药大抵产病天行从增损柴胡杂证从增损四物宜详察脉证而用之

谨按已上云胎产禁例大抵主於元气本病为要至於病体所因不同学者又必当处於权变也且胎前之证良方悉具但每证治例殊少如胎漏胎痛子烦子肿等证出方皆是治本病之例设所因不同或有所兼之证如胎漏下血亦有气虚血热腹痛亦有湿热者或形志苦乐不一七情所动气动血病胎气即损虽治例未能以尽其变然欲学者临证自推充而行之尔今於诸证未能一一悉具聊以证治数例附於後云

胎自堕论

丹溪曰阳施陰化胎孕乃成血气虚乏不足荣养其胎则堕譬如枝枯则果落藤痿则花坠又有劳恐伤情内火便动亦能堕胎譬如风撼其木人折其枝也火能消物造化自然病源乃谓风冷伤於子脏而堕此未得病情者也予见贾氏妇但有孕至三个月左右必堕诊其脉左手大而无力量重则濡知其血虚也以其壮年只补中气使血自荣时正初夏教以浓煎白术汤下黄芩末一钱与数十贴得保全而生因而思之堕於内热而虚者於理为多曰热曰虚盖孕至三月上属相火所以易堕不然何以黄芩熟艾阿胶等为安胎妙药耶

难产论

丹溪曰世之难产者往往见於郁闷安佚之人富贵奉养之家若贫贱者鲜有之古方止有瘦胎饮一论而其方为湖阳公主作也恐非至到之言盖用之者其难自若予族妹苦於难产遇胎则触而去之予甚悯焉视其形肥而勤於女工知其气虚久坐气不运而愈弱儿在胞胎因母气虚不能自运耳当补其母之气则儿健易产令其有孕至五六月来告遂於大全良方紫苏饮加补气药与之数十贴因得男甚快因以此方随母之性禀与时令加减服者无不应用临蓐时腹不觉痛产母亦无病因名方曰达生散云

论局方胎产用药之误

丹溪曰或问妇人一门无非经候胎产用药温热於理颇通吾子其妄言乎予曰妇人以血为主血属陰易於亏欠非善於调摄者不能保全也余方是否若神仙聚宝丹则有不能忘言者其方治血海虚寒虚热盗汗理宜补养琥珀之燥麝香之散可以用乎面色痿黄肢体浮肿理宜导湿乳香没药自可治血可以用乎胎前产後虚实不同逐败养新攻补杂病积块坚症赤白崩漏宜於彼者必妨於此而欲以一方通治乎世人以其品贵名雅又喜其常服可以安神去邪令人有子殊不知积温成热香窜散气服者无不被祸自非五脏能言医者终不觉及至变生他证悖理肉汁发陰经之火易成内伤之病先哲具有训戒或以羊鸡浓汁作糜而又常服当归丸当归建中汤四圣理中丸虽是滋补悉犯桂附乾姜僭热之剂脏腑无寒何处消

受若夫儿之初生母腹顿寛便啖鸡子且吃火盐不思鸡子难化火盐发热展转为病医者不识委指他病率尔用药宁不误人予每见产妇之无疾者必教以却去黑神散与夫鸡子火盐诸般肉食且与白粥将理间以些小石首鳶鱼令甘淡食之至半月以後与少肉虽鸡子亦须豁开煮之大能养胃却痰彼当富贵之家骄恣之妇率有白带头风气痛膈满痰逆口乾经事不调髮脱体热皆是阳胜陰虚之病天生血气本自和平日胜日虚又焉知此等谬妄有以啓之耶

论妇人服热剂求子之误

丹溪曰无子之因多起於父气之不足岂可独归罪於母血之虚寒况母之血病奚止虚与寒而已哉然古方治妇人无子惟秦桂丸一方其性热其辞确今之欲得子者率皆服之无疑夫求子於陰血何至轻用热剂耶或曰春气温和则物生冬气寒凜则物消不假热剂何由子脏得煖而成胎予曰诗言妇人和平则乐有子和则血气不争平则陰阳不乖今得此丸经血必转紫黑渐成衰少或先或後始则饮食骤进久则口苦舌乾陰阳不平血气不和焉能成胎纵使有成子亦多病以其能损真陰也郑宪史子生七个月得淋【云云见淋閤门】谨按妇人无子多因经血不调或陰虚血少积聚痰气嗜慾等致种种不同奚止虚与寒而已然经寒者亦有之但不可例为常法尔是以先生论此戒後人不得病机之的者斯药勿妄行也况无子之因亦岂止於妇室者如东垣云李和叔问中年以来得一子至一岁之後身生红丝瘤不救後三四子至一二岁皆病瘤而死何缘至此疾翌日思之谓曰汝乃肾中伏火精气中多有红丝以气相传生子故有此疾俗名胎瘤是也汝试视之果如其言遂以滋肾丸数服以泻肾中火邪补真陰不足忌酒辛热之物其妻与六味地黄丸以养陰血受胎五月之後以黄芩白术二味作散啖五七服後生子至三岁前证不复作今已年壮噫合观先生已上所论则其旨深矣

妇人治法

调经之剂

局方四物汤治冲任虚损月水不调脐腹?痛

当归 川芎 白芍药

熟地黄【各等分】

右?咀每半两水煎服

按此手足太陰厥陰药也

逍遥散治血虚烦热月水不调脐腹胀痛痰 潮热甘草【炙半两】当归 茯苓 白芍白术

柴胡【各一两】

右?咀每半两入姜薄荷叶煎服

按此足三阳三陰药也散血中湿热之剂

胶艾汤治劳伤血气冲任虚损月水过多淋漓不断阿胶【炒】 川芎 甘草【炙各二两】

当归 艾叶【炒各三两】 熟地黄白芍【各四两】

右?咀每半两水煎

按此温经补血之药也厥陰例

良方温经汤治妇人血海虚寒月水不利

当归 川芎 芍药 桂心牡丹皮 莪术【各半两】 人参 甘草牛膝【各一两】

右?咀每五钱水煎服

姜黄散治血脏久冷月水不调脐腹刺痛

当归 牡丹皮 延胡【各二两】 芍药【三两】 川芎 红花 桂心

莪术【各一两】 川姜黄【四两】

右为末每一钱水煎服酒同煎

按此二方通经之剂破血之药非止於温经也脏冷气血滯者可用姑存之

加减四物汤

经候微少渐渐不通手足烦疼渐瘦生潮热脉微数本方去地黄川芎加泽兰叶三倍甘草半分

经候过多本方去熟地黄加生地黄

经行身热脉数头昏本方加柴胡黄芩各半两经行微少或胀或疼四肢疼痛加延胡没药白芷与本方等淡醋汤调下末子

经候不调心腹?痛只用芎归二味名君臣散

鹿茸丸治冲任虚损又为风寒所乘尺脉微小甚者可灸关元穴

鹿茸【炙】 赤石脂 禹余粮【各一两】

续断【二两】 栝叶 附子【炮】 熟地黄当归【酒浸】 艾叶

右为末酒糊丸梧子大每五十丸空心温酒下按此足少阴厥阴药也今人多用之故收入治血虚湿胜带下甚捷

元戎加味四物汤

气充经脉故月事频并脐下多痛本方加芍药经欲行脐腹绞痛本方加玄胡?榔苦楝木香经水过多本方加黄芩白术

经水澁少本方加葵花红花

经水适来适断或有往来寒热宜先服小柴胡去寒热後以物汤和之

丹溪加味四物汤

经候过而作疼血气俱虚也宜本方对四君子汤服之

经候将来作痛者血实也本方加桃仁黄连香附经水不及期血热也本方加黄连

过期血少也本方加参术带痰加半夏陈皮

过期紫黑有块者血热也必作痛本方加香附黄连过期而淡色者痰多也芎归二味合二陈汤服紫色成块者热也本方加黄连柴胡

肥人不及日数而多痰者多血虚有热本方加香附南星半夏黄连白术

瘦人血枯经闭者本方加桃仁红花或越鞠丸【方见血门】

简易当归散治经候不匀或三四月不行或一月再至或妇人天癸过期经脉不调

当归 川芎 白芍 黄芩白术【各半两】 山茱萸肉【一两半】

右为末每二钱空心温酒调下日三次

按此足厥陰少陰药也

宝监生地黄丸治妇人血实厥陰脉弦而长病恶风体倦乍寒乍热面赤心忪或时自汗如伤寒状宜服抑陰药

生地黄 柴胡 秦艽 黄芩【各半

两】 芍药【一两】

右末蜜丸梧子大每三十丸乌梅汤吞下日三次按此手足少陰太陰足太阳药也

谨按已上诸方皆调理法也然血分成水气肠覃等证详见各门兹不备录大抵经病实者破之结者散之虚者补之要在适事为故也

理气之剂

澹寮煮附丸治经候不调血气刺痛腹脇膨胀头晕恶心崩漏带下并宜服之

香附子【擦其皮不以多少米醋浸一日用瓦铤煮冷醋尽】

右醋糊为丸梧子大日乾每五十丸淡醋汤下一方香附一斤艾叶四两当归二两制同名艾附丸

严氏抑气散治妇人气盛於血变生诸证头晕膈满香附【四两】 茯神 甘草【炙各一两】

陈皮【二两】

右为末每二钱食前沸汤调下

按此方主於气煮附丸则气中之血药也然气郁甚者宜於气证门选用不必拘此

东垣益胃升阳汤治妇人经候不调或血脱後脉弱食少水泄日三二行

黄芪【二钱】 人参 甘草【炙】 当归身 陈皮【各一钱】 白术【三钱】 升麻

柴胡【各半钱】 炒麴【一钱半】 黄芩【半钱秋去之】

右?咀每半两水煎腹痛加芍药

补中益气汤治妇人室女经候不调脉微食少体倦或热

方见热门

按此二方气血之药血脱益气之大法也

绀珠正气天香汤治妇人一切气气上凑心心胃攻筑脇肋刺痛月水不调

台乌药【二钱】香附子【八钱】陈皮

苏叶【各一钱】乾姜【半钱】

右?咀每七八钱水煎服

谨按妇人经病多有因於七情六郁致者故集已上例以备其义大抵气行不失其常则经血亦行也通经之剂

良方通经丸治妇人室女经候不通脐腹疼痛或成血瘕

川椒【炒】蓬术 乾漆【炒】

当归【一钱半】青皮 乾姜 大黄桃仁【炒】川乌 桂心【各一钱】

右为末将一半用米醋熬成膏和余药成剂臼中杵之丸如梧子大陰乾每三五十丸醋汤下

严氏方无川乌有红花

加味四物汤【严氏名六合汤】治妇室经事不行腹中结块疼痛腰痛

本方加桂蓬术【各等分】

右?咀每四钱水煎服

红花当归散治妇人血脏虚竭或积瘀血经候不行时作腹痛腰胯重疼小腹坚硬及室女经不通

红花 当归尾 紫葳 牛膝

甘草 苏木【剉各三两】 白芷

桂心【各一两半】 赤芍【九两】

刘寄奴【五两】

右为细末空心热酒调三钱一名凌霄花散

桂枝桃仁汤治经不通绕脐寒疝痛其脉沈紧此由寒客於血室血凝不行

桂枝 芍药 生地黄【各二两】

桃仁【五十个】 甘草【一两】

右为粗末每服五钱水煎入姜枣

地黄通经丸治经不行结积成块脐下如覆杯

熟地黄【三两】 ??【去头足炒】

水蛭【糯米炒】 桃仁【各五十个】

右为细末炼蜜丸如梧子大空心温酒下五丸未知加至七丸

严氏琥珀散治妇人室女月事凝滞腹脇胀痛及血逆攻心眩晕不省

刘寄奴 牡丹皮 熟地黄 玄胡索 乌药 赤芍 莪术 三棱 当归 桂心【各一两】

右用前五味用乌豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆烂为度焙乾入後五味同为细末
每服二钱用温酒调服空心食前

戴人玉烛散治经候不通腹胀或痛

四物汤对调胃承气汤

右?咀水煎服

按已上诸方并出厥陰例药也然有本於气虚气郁血虚痰积等因不同宜於前调经理气诸
方内选用治崩漏之剂

生地黄散治经漏下血脉虚洪经水紫黑

方见血证门

简易黄芩汤治崩中下血阳乘陰经水沸溢

黄芩 不以多少

右为末每一二钱烧秤鎚淬酒调下

按此二方治热之剂也

一法用此味治天癸当住每月却行或过多不止出瑞竹堂方名芩心丸

伏龙肝散治气血劳伤冲任经虚血非时崩下脐腹冷痛脉迟弱食少或赤白带下

伏龙肝 赤石脂 麦门冬【各一两】

甘草【炙半两】 川芎【三两】 当归

乾姜【七钱半】 桂【半两】 艾叶【三两】

熟地黄【二两】

右件为粗末每四钱入枣煎

按此治寒例药补血固虚之剂也

备金散治妇室血崩不止

香附子【四两炒】 当归尾【一两二钱】 五灵脂【一两炒】

右为末每五钱淡醋汤调空心食前服一方只用香附一味

澹寮茯苓补心汤治妇人亡血过多或气逆心闷

四物汤【一分半】 参苏饮【三分】

右?咀入姜煎

按已上方理气补荣之剂也

良方缩砂散治血崩

新缩砂不以多少瓦上炒香为细末米饮调下三钱

五灵脂散治血山崩不止

灵脂十两水煎去滓澄清再煎成膏入神麴二两和丸如梧子大每三二十丸温酒下

荆芥散治崩中不止

用此一味於麻油灯上烧焦为末每三钱童便调下

瑞竹堂方蒲黄散治崩中不能止

破故纸 蒲黄 千古石灰【各等分炒过】

右为末每二三钱淡酒或淡醋汤调下

按已上诸方皆劫剂也

东垣升麻除湿汤治妇人女子漏下恶血月事不调或暴崩不止多下水浆之物皆由饮食失节或劳伤形体或素有心气不足因饮食劳倦致令心火乘脾其脉缓而弦急按之洪大皆脾土受邪也

柴胡 羌活 苍术

黄芪【各一钱半】 防风 甘草【炙】 升麻

藁本【各一钱】 蔓荆子【七分】 独活 当归【各半钱】

右?咀作一服水煎食前服

凉血地黄汤治妇人血崩是肾水陰虚不能镇守胞络相火故血走而崩也

生地黄【半钱】 黄连 羌活 柴胡 防风【各二分】 黄栢 知母 升麻 藁本 细辛

川芎【各二分】 甘草【一钱】 荆芥穗 蔓荆子

黄芩【各一分】 当归【半钱】 红花【少许】

右?咀作一服水煎

按已上二方升剂也经漏不止气血下陷非此不能治

当归芍药汤治妇人经脉漏下不止其色鲜红或先因劳役脾胃虚损气短气逆自汗不止身热食懒大便或泄体倦无力

黄芪【一钱半】白术 苍术 当归身白芍【各一钱】熟地黄【半钱】甘草【炙】

生地黄【各三分】 陈皮【半钱】 柴胡【二分】

右?咀作一服水煎

按此补剂也

治带下之剂

千金方治带下脉数者

枸杞根【一两】生地黄【五两】

右二味酒煮一升至三合作一服

按此治热例药也

元戎六合汤治妇人赤白带下脉沈微腹痛或陰中痛

四物汤【四两】桂 附子【炒五钱】

右?咀每五钱水煎食前服

按此治寒之剂也

宣明导水丸治湿热郁於下焦之分赤白带下不止躁热烦渴

方见湿门

按此治湿热之药下剂也

严氏当归煎丸治赤白带下腹内疼痛不饮食羸瘦当归 赤芍【炒】 牡蛎【煨】
熟地黄阿胶【炒】 白芍【炒】 续断【酒浸各一两】 地榆【五钱】

右为末醋糊丸梧子大每五十丸空心米饮下按此治血虚之剂润燥药也

良方白芷散治赤白带下

白芷【一两】 海螵蛸【二个烧】 胎髮【一团煨】

右为细末空心温酒调下二钱

伏龙肝散治妇人赤白带下久患不差肌瘦黄瘁多困乏力

棕榈【不以多少烧灰火然急以盆盖荫】

伏龙肝【於锅竈直下取炒令烟尽】

屋梁上尘【悬长者如无竈头虚空中有炒令烟尽】

右三味等分碾和令停入龙脑麝香各少许每服二钱温酒调下淡醋汤亦可患十年者半月可安按已上方皆刳剂也

益母草散治赤白恶露下不止

益母草开花时采陰乾为细末空心温酒调二钱日三服

东垣固真丸治白带久不止脐腹冷痛陰中亦然白石脂【一钱火烧赤】
乾姜【炮四钱】 黄栢【酒制】 白芍【各一钱】 白龙骨【二钱】 柴胡【一钱】

当归身【二钱】

右除石脂龙骨另研外同为细末水煮糊丸如桐子大每十丸食前煎水下

按此寒热之剂又止澁药也

桂附汤治白带腥臭多悲不乐大寒

肉桂【一钱】 附子【三钱】 黄栢 知母甘草【炙】
升麻【各半钱】 黄芪【一钱半】 人参【七分】

右?咀作一服水煎食前服

按此补阳气极虚用黄栢等为引用又升降陰阳药也

补经固真汤治白帶下流不止始病崩中日久血少复亡其阳故白滑之物不止也

柴胡 甘草 郁李仁【研】

黄芩【各一钱】 乾姜【二钱】 橘皮【半钱】 人参【二钱】 白葵花【去萼一朵】

右?咀水煎空心服

按此补例药也

卫生汤治帶下不止脉微弱腹痛

白芍【炒】 当归【各二两】 黄芩【三两】 甘草【一两】

右?咀或末每五钱水煎空心服下苦楝丸三十粒按此补血之剂也

苦楝丸治赤白帶下

苦楝【碎酒浸】 茴香【炒】 当归【各等分】

右为末酒糊丸桐子大每五十丸空心酒下

按此谓邪入小肠故用此燥丙药也

酒煮当归丸治?疝白帶下注脚气腰已下如在冰雪中以火焙乾厚衣盖其上犹寒冷不任寒之极者面白如枯鱼之象肌肉瘦削小便不止与白帶常流不禁病甚者

当归【一两】 茴香【半两】 良姜

附子【炮各七钱】

已上四味?咀以好酒一升半煮至乾再焙乾炒黄盐 全蝎【各三钱】 丁香 苦楝

甘草【炙各半钱】 柴胡【二钱】 升麻木香【各一钱】 玄胡索【四钱】

右与前同为细末酒煮糊为丸如梧子大每五七十丸空心淡醋汤下忌酒湿麪油腻物

按此升阳胜湿之剂气血药也

升阳燥湿汤治白帶下陰户痛控心急痛身黄皮缓身重如山陰中如水

防风 良姜 乾姜 郁李仁

甘草【各一钱】柴胡【一钱三分】橘皮黄芩【各半钱】白葵花【七朶】

右?咀分作二服水煎空心服

按此升散之剂也

坐药胜陰丹

三柰子 川乌头 大椒【各半钱】柴胡羌活【各二分】全蝎【三个】 蒜【七分】

甘松【二分】破故纸【八分与蒜同煮】 升麻

枯矾【各二分】麝香【少许】

右为细末炼蜜丸如弹子大绵裹留系在外纳丸药於陰户内

按此劫药也

灸法

气海一穴在脐下一寸五分主月事不调帶下崩中因产恶露不止绕脐?痛灸五壮

帶脉二穴在季脇下一寸八分陷者宛宛中灸七壮主妇人月水不调及闭不通赤白帶下气
转运背引痛不可忍

血海二穴在膝腓上内廉白肉际二寸中治女子漏下恶血月事不调逆气腹胀灸三壮

陰谷二穴在膝内辅骨後大筋下小筋上按之应手屈膝取之治妇人漏血不止腹胀满不得
息小便黄如蛊膝如锥不得屈伸小腹引痛灸三壮

关元一穴在脐下四寸主妇人帶下瘕聚因产恶露不止断产下经冷可灸百壮

安胎之剂

金匱方当归散妊娠宜常服之

当归 黄芩 白芍

川芎【各一两】 白术【半两】

右五味为末酒饮调服方寸匕日二次

按此方养血清热之剂也瘦人血少有热胎动不安数曾半产者难产者皆宜服之以清其源而无後患也

千金茯苓半夏汤治妊娠恶阻心闷吐逆头眩四肢怠惰烦疼痰逆呕吐恶寒自汗黄瘦

半夏【泡七次炒黄】 茯苓

熟地黄【各三两】 橘红 细辛

人参 芍药 紫苏

川芎【各二两】 苦梗 甘草【各半两】

右?咀每四钱水煎空心服

局方参橘散治妊娠三月恶阻吐逆不食或心虚烦闷

橘皮 茯苓【各一两】 麦门冬

白术 厚朴【制】 甘草【炙各半两】

右?咀每四钱入姜竹茹煎一方加人参名竹茹汤良方名人参橘皮汤

良方胶艾汤治妊娠或因顿仆胎动不安腰腹疼痛或胎上抢心或去血腹痛

胶【一斤炙】 艾叶【数茎】 指迷方加秦艽

右二味以水五升煮取二升分三服

阿胶散【严氏方作胶艾汤】不问妊娠月数深浅或顿仆或因毒药胎动不安腰痛腹满抢心短气

熟地黄 艾叶 白芍 川芎 黄芩 阿胶 当归

甘草【炙各一两】

右?咀每四钱入姜枣煎金匱方无黄芩

佛手散治妊娠伤胎下血

当归【三钱】 川芎【二钱】

右?咀水煎食前服

安胎散治妊娠自高坠下或为重物所压触动胎气腹痛下血胃虚呕逆并宜服之

缩砂【不以多少炒过】

右为末每二钱用酒调服艾盐汤亦可

简易方知母饮治妊娠心脾壅热咽膈渴苦烦闷多惊赤茯苓 黄芩
黄芩【各三两】 知母 麦门冬 甘草【各二两】

右?咀每四钱入桑白皮熟时再入竹沥些小服

竹叶汤治妊娠心惊胆怯终日烦闷名曰子烦

白茯苓【四两】 防风 麦门冬

黄芩【各三两】

右?咀每四钱入竹叶五片水煎外台方有竹沥二合无叶一方有黄芩知母

拔萃方枳殼汤治胎漏下血或因事下血

枳殼【炒】 黄芩【各半两】 白术【一两】

右为末每一钱白汤调下宣明方无枳殼

二黄散治胎漏下血

生地黄 熟地黄

右为末煎白术枳殼汤调下二钱或钱半

按良方论云妇人有子之後血畜以养胎矣岂可复能散动耶所以然者有娠而月信每至是亦未必因血盛也若谓荣经有风则经血喜动以其风胜则可此例可见胎漏之因非止一端也治者宜扩充焉

地黄当归汤治胎痛

当归【一两】 熟地黄【二两】

右为末每半两水煎良方等分为末蜜丸名内补丸许学士云大率妇人妊娠唯在抑阳助陰盖此等药甚多然胎前药唯恶羣队若陰阳交错别生他病唯是枳殼散所以抑阳四物汤所以助陰故尔然枳殼散差寒若单服之恐有胎寒腹痛之疾以内补丸佐之则阳不至强陰不至弱陰阳调停有益胎嗣此前人未尝论及也愚详陰阳调停不若不服为愈

全生方白术散治妊娠面目虚浮肢体肿如水气名曰子肿

白术【一两】 生姜皮 大腹皮 陈皮 白茯苓【各半两】

右为末每二钱米饮调下指迷方有桑白皮无术

李氏天仙藤散治妊娠自三月成胎之後两足自脚面渐肿腿膝以来行步艰辛以至喘闷饮食不美状似水气至於脚指间有黄水出者名曰子气

天仙藤【洗略炒】 香附子【炒】 陈皮 甘草 乌药【等分】

右为末每服三钱水煎入姜三片木瓜三片紫苏三叶同煎空心食前服日三次肿消止药

按此二方治证例相类故并录之

严氏紫苏饮治胎气不和凑上心腹胀满疼痛谓之子悬

大腹皮 川芎 白芍 陈皮 苏叶 当归【各一两】 人参

甘草【各半两】

右?咀每四钱入姜葱煎

安荣散治妊娠小便澁少遂成淋澁名曰子淋

麦门冬 通草 滑石【各三钱】 当归灯心 甘草【各半两】 人参

细辛【各一两】

右为细末每二钱煎麦门冬汤调下

羚羊角散治妊娠中风头项强直筋脉挛急言语蹇澁痰涎不利或时发搐不省人事名曰子癰

羚羊角【镑】 川独活 酸枣仁【炒】

五加皮【各半钱】 薏苡仁 防风当归 川芎 茯神

杏仁【各四分】 木香 甘草【各二分半】

右?咀每五钱入姜煎

八味丸治妊娠小便不通名曰转胞亦治子淋

方见补虚门

丹溪参术散治妊娠转胞

四物汤加人参 白术 半夏【制】 陈皮 甘草

右?咀入生姜煎空心服

按丹溪曰转胞之病胎妇之稟受弱者忧闷多者性急躁者食味厚者庸或有之古方皆用滑利药鲜有应效因思胞不自转为胎所压展在一边胞系了戾不通耳胎若举起居於其中胞系自疏水道自利然胎之坠下必有其由近吴宅宠人患此两脉似澹重则弦左稍和予曰此得之忧患澹为血少气多则胎气弱而不能举弦为有饮血少则胎弱气多有饮中焦不清而隘则胞知所避而就下乃以已上药与服随以指探喉中吐出药汁候少顷气定又与之次早亦然至八贴安此法恐偶中耳後又治数人亦效未知果何如耶

仲景云妇人本肌肥盛头举自满今反羸瘦头举中空胞系了戾亦多致此病但利小便则愈

宜服肾气丸以中有茯苓故也地黄为君功在补胞若头举等语其义未详恐有能知之者

按已上安胎诸法皆气血本病之药故非辛热苦寒之剂盖产前当清热养血也然有外感风寒内伤生冷以辛热散之温之大积大聚以药衰其大半而止经曰妇人重身毒之何如岐伯曰有故无殒故无殒也斯法亦不为本病之谓也故妊娠诸证例药详见大全良方兹不备录

束胎丸 第八个月服之

黄芩【炒夏一两春秋七钱半冬半两】
白术【二两】茯苓【七钱半】陈皮【三两忌火】

右为末粥为丸桐子大每三四十丸空心白汤下

达生散【又名束胎散】

大腹皮【三钱】人参
陈皮【各半钱】白术白芍【各一钱】甘草【炙二钱】紫苏叶茎【半钱】

当归尾【一钱】或加枳壳缩砂

右?咀作一服入青葱五叶黄杨脑七个煎服於八九个月服十数贴甚得力或夏加黄芩春加芎冬依正方或有别证以意消息

又方於第九个月服

黄芩【怯弱人減半】白术【一两】滑石枳壳【各七钱半】

右为末粥丸如桐子大每服三十丸空心热汤下按世俗妇室妊娠鲜有服束胎药者盖局方良方诸法未能以尽其妙用者多辄动娠故率不敢行然丹溪先生因制已上诸方以备世俗取择实好生君子之一端也

滑胎易产药

枳壳散治妊娠胎肥壅隘难产临月服之

粉草【一两炙】商州枳壳【二两炒】

右为细末百沸汤点二钱空心日三服

一方枳殼【六两】甘草【一两】

一方有糯米半升淘控乾同炒为末

温隐居加当归木香各等分

又法张氏方治妊娠胎肥动止艰辛临月服之缩胎易产治气宽膈

枳殼【五两】甘草【一两半】香附子【二两炒】

右为细末姜汤点服

神寢丸滑胎易产入月服之

通明乳香【半两】枳殼【一两】

右为末炼蜜丸梧子大空心酒下三十丸

陆氏名寢生丸乳香只一分

保气散安胎易产或居处失宜偶然顿仆胎动胎痛漏胎下血兼服佛手散

香附子【四两】山药【二两】缩砂【一两】木香【四钱】粉草【一两】益智仁
紫苏【各半两】

右为细末白汤点二钱入月服之

益元散入月服之滑胎易产

方见前

产间药

施氏催生如意散临产腰疼方可服之

人参乳香【各一钱末】辰砂【半钱】

右三味一处研临产急用鸡清一个调药末再用生姜汁调冷服如横生倒产即时端顺而生

催生佛手散

方见前

严氏无忧散治胎肥气逆或人瘦血少胎弱临蓐难产者便产须知名保生无忧散

当归 川芎 白芍【各一两】

枳壳【炒五钱】 乳香【三钱】 木香【一钱半】

血余灰【二钱】 甘草

右为末每二钱水煎服

简易集效黑散子催生兼治横生逆产

百草霜 白芷末【等分】

右和匀每二钱童便并好醋调稀更以沸汤调下

局方催生丹治产妇生理不顺产育艰难或横或逆并宜治之

十二月?脑髓【去皮膜研如泥】

乳香【另研细如泥】 母丁香【二钱半】

麝香【另研五分半】

右三味和匀以兔脑和丸如鸡头大陰乾油纸裹每一丸温水下即产儿手中握出

良方催生乳香膏 名如神开骨膏 又名乳珠丹一法滴乳为末猪心血为丸五月五日午时合

右如桐子大朱砂为衣每一粒面东酒吞下未下再服如胎乾者先与四物汤

秘方益母丸专治横生逆产难产并安胎顺气神效益母草五月采陰乾石臼捣为末炼蜜丸如弹子大每一丸或二丸临产以童便和温酒送下气不顺木香参汤送下或作小丸吞服亦可

独圣散

黄葵子炒七十粒 研烂酒服济君急若也临危难产时 免得全家俱哭泣

小品疗横生倒产手足先出方

用粗针刺儿手足入二分许儿得痛惊转即缩自当回顺而生

一法盐涂儿足底又可急搔爪之并以盐摩产妇腹上即产

机要半夏汤治胎衣不下或子死腹中或子冲上而昏闷或血暴下及胎乾不能产者

半夏麴【一两半】 桂【七钱半】

桃仁【三十个炒】 大黄【半两】

右为细末先服四物汤三两次服此生姜同煎

良方治死胎不下其证产母舌青黑及胎上冷者子已死或指甲青舌青胀闷甚者口中作屎臭先以平胃散一贴作两服每服酒水各一盏同煎至一盏却投朴硝半两研细再煎数沸温服胎化血水而下

鹿角散治因热病胎死腹中

鹿角屑【一两】

右水煎入葱白五茎?半合丹溪云烧过治产後血晕

当归汤治子死不下

川当归【三两】 川芎【二两】

右为末水酒各半调下四钱未下再服

一方只用川芎末酒煎服

香桂散下死胎

麝香【半钱】 桂心【三钱为末】

右和匀只得一服温酒调下

一方朴硝末【二钱】温童便调下

必效方牛膝汤治胎衣不出腹脐坚胀急痛即杀人服此胞即烂下死胎

牛膝 瞿麦【各四两】当归【三两】通草【六两】滑石【八两】葵子【五两】

右切细以水九升煮取三升分三服

宣明硃砂散治胎死腹中不下

硃砂【研细】当归【各一两】

右二味研极细只分作二服温酒调下如重车行五里不下再服

局方至宝丹

见本方

花蕊石散治胎死腹中及胎衣不下

花蕊石【一斤】上色硫黄【四两】

右二味相拌匀炼制见良方

黑龙丹治产後一切血疾产难胎衣不下危急恶疾垂死者但灌得下无不全活

当归 五灵脂 川芎 良姜 熟地黄

各一两剉以沙合盛赤石脂泥封纸筋盐泥固济炭火十斤煨令通赤去火候冷取开看成黑糟色取细研却入後药

百草霜【五两】硫黄 乳香【各一钱半】

花蕊石 琥珀【各一钱】

右五味并细研与前药再研如法修制和匀以米醋煮麪糊丸如弹子大每服一丸炭火烧令通赤投於生姜自然汁与童便入酒漉出控乾研细只此酒下一方取死胎用乌鸡一只去毛细切水煎三二升汤通手用衣帛蘸摩脐下胎自出

产後杂方

局方芎归汤治产後去血过多晕烦不省

当归 芎藭【等分】

右?咀每半两水煎服腹疼加桂名桂香散一名琥珀散治腹中痛急自汗头眩少气加羊肉名羊肉汤

黑神散治产後恶露不尽胎衣不下血气攻心及腹痛不止

黑豆【炒半升】 熟地黄 当归 肉桂 乾姜 甘草 白芍

蒲黄【各四两】

生地黄【局方良方俱无此味便产须知有之】

右为末每二钱酒童便各半调服一名乌金散按此手少陰足厥陰太陰阳明表里血药也立方大意见前丹溪之论矣今人以为治产後百病率用之故收入然用者自宜通变

人参当归散治产後去血过多血虚则陰虚陰虚则内热心烦短气自汗头痛

熟地黄 人参 当归 桂

麦门冬【各一两】 白芍【二两炒】

右?咀每五钱入竹叶生姜煎

当归黄芪汤治产後失血多腰疼身热自汗

当归【三两】 黄芪【二两】 白芍【一两半炒】

右?咀每五钱入姜煎

失笑散治产後心腹绞痛欲死及儿枕痛

蒲黄【炒】 五灵脂【各等分】

右为末醋调二钱熬成膏汤化服之

一法治小儿枕痛各单服

经验方三圣散治儿枕痛

当归 桂 玄胡索

右等分为细末每服二钱热酒或童便调下

严氏清魂散治产後血晕昏不知人更宜取漆器於床前烧薰之频置醋炭更服此药

泽兰叶 人参【各一两】 荆芥穗【四两】

甘草【炙八钱】 川芎【二两】

右为末每二钱热汤温酒各半盏调下

抵圣汤治产後血气伤於脾胃腹脇满闷呕逆恶心赤芍 半夏 泽兰叶
陈皮 人参【各二钱】 甘草【炙一钱】

右?咀作一服入生姜煎

当归羊肉汤治产後发热自汗肢体疼痛名曰蓐劳当归 人参【各七钱】 黄芪【一两】
生姜【半两】

右?咀用羊肉一斤煮清汁五大盏去肉入前药煎四盏去粗作六服

良方茯苓散治产後心虚怔忡不定言语错乱

人参 甘草 山药

当归【各一钱】 生姜 远志 茯苓

桂心 麦门冬【各半钱】 大枣

右?咀水煎

机要增损柴胡汤治产後经水适断感於异证手足搐搦咬牙昏冒

柴胡【八钱】 黄芩【四钱半】 人参【三钱】

甘草【炒四钱】石膏【四钱】知母【三钱】黄芪【五钱】半夏【三钱】

右为粗末每半两入姜枣煎

血风汤治产诸风痿挛无力

秦艽羌活防风白芷川芎芍药白术当归地黄茯苓半夏黄芪【等分】

右为末一半为丸炼蜜桐子大一半为散温酒送下五七十丸

愈风散治产後中风口噤牙关紧急手足痿痹如角弓状

荆芥穗【略炒为末】

右每三钱豆淋酒调下童便亦可一方加当归谨按产後多有血病神强痿痹而似中风者宜用此药通血脉而清神或加当归者为然非外因例药也是以姑録此一法义见後丹溪论

独行散治产後血晕昏迷

五灵脂【炒】

右为末水酒童便调下一二钱

当归散治产後气血俱虚无大补恐增客热宜服此去恶露

当归白 川芎

黄芩【各一两】白术【半两】

右为细末温童便调下二钱

黄芪汤治产後汗不止因陰虚而得

黄芪【二钱】白术防风熟地黄牡蛎【煨】白茯苓麦门冬

甘草【炙各半钱】

右?咀每半两入枣煎

加減四物湯治產後陰虛發熱或日間明了暮則發熱增寒

當歸 川芎 生地黃 柴胡

右等分每四五錢水煎

瑞竹堂方治產後血塊腹痛

京芎【炒】 當歸【炒】 熟地黃

白 【炒各半兩】 蒲黃【炒二分】

右同為細末每服二錢空心溫酒調下

丹溪參朮膏治產後胞損成淋瀝証

人參【二錢半】 白朮【二錢】 桃仁

陳皮【各一】 錢黃芪【一錢半】 茯苓【一錢】

甘草【炙半錢】

右?咀水煎豬羊胞後入藥作一服

丹溪曰嘗見尿胞因收生不謹以致破損而得淋瀝証有徐氏婦於壯年得此因思肌肉破傷在外者且可補完胞雖在腹恐亦可治診其脈虛甚因悟曰難產之人多是氣虛難產之後血氣尤虛因用峻補以參朮膏煎以豬羊胞極飢時與之每劑用一两至一月而愈恐是氣血驟長其胞可完若稍遲緩恐難成功

嚴氏趨痛散治產後血滯筋脈拘攣腰背強直遍身疼痛

當歸 桂 白朮 牛膝 甘草【各三】 錢黃芪 獨活

生薑【各半兩】

右?咀每半兩水煎

按此手足三陰藥出大陽例治表之劑也然惡露不盡絞痛不止宜良方芎歸湯散治里之劑以黃芩桃仁等藥下之血畜經絡成血塊宜沒藥丸以?蟲水蛭等藥逐之皆變法也茲不詳錄

故已上诸方皆调理之剂余有异证详见大全良方

谨按产後血滯於经多成痈肿或有致不救者盖气血虚损逆之甚也大抵此兼陰虛火动凡辛温之剂宜慎之矧产後用药有三禁我丹溪先生谓产後如无恶阻当大补气血虽有杂证以末治之如中风切不可作风治与小续命汤必先补气血然後治痰当以左右手之脉分其气血多少而治如发热恶寒皆是气血左手脉不足用补血药多於补气药右手脉不足用补气药多於补血药恶寒发热腹痛者当去恶血以求通变之意也

玉机微义卷四十九

卷五十

钦定四库全书

玉机微义卷五十 明 徐用诚 原辑

刘 纯 续增

小儿门

论色脉法

脉经曰小儿四五岁脉呼吸八至细数者吉 小儿脉呼吸八至者平九至者伤十至者困
诊小儿脉法多雀鬪要以三部脉为主若紧为风痼沈者乳不消弦急者客忤气 小儿是其日
数应变蒸之时身热而脉乱汗不出不欲食食辄吐哕者脉乱无苦也小儿脉沈而数者骨间
有热欲以腹按冷清也 小儿大便赤青瓣殄泄脉小手足寒难已脉小手足温易已
小儿病困汗出如珠着身不流者死 小儿病其头毛皆上逆者必死耳间青脉起者瘕痛
小儿病而颧限其口唇乾目皮反口中气出冷手足四垂其卧如缚掌中冷皆死不治

脉诀启蒙曰凡诊小儿脉当大指按三部一息六七至为平和八九至为发热五至为内寒弦
脉为风痼沈缓为伤食促急为虚惊弦急为气不和沈细为冷浮为风大小不调为鬼祟浮大
数为风热伏结为物聚单细为疳癆风肠痛多喘呕而脉洪为有虫浮而迟潮热者胃寒也

按此本钱氏脉法也颇详

虎口脉歌曰紫风红伤寒青惊白色疳黑时因中恶黄即困脾端

按全婴等书云小儿三岁已前虎口第二指上寅卯关有脉纹见者可验病状男左女右视之
脉纹从寅关起不至卯关者病易治若连於卯关者有病难治如寅连卯卯侵过辰关者十难
救一若脉纹小或短者病易治也宜参视之

钱氏曰面上证左腮为肝右腮为肺额上为心鼻为脾颧为肾赤者热也随证治之 目内证赤
者心热导赤散主之淡红者心虚热生犀散主之青者肝热泻青丸主之浅淡者补之黄者脾
热泻黄散主之无精光者肾虚地黄丸主之洁古曰青是腹痛桂 药洁古曰肝病面白
肺病面赤 脾病面青 肾病面黄 心病面黑若肝病惊搐而又加面白痰涎喘急之类此皆难
治余皆仿此推之叔和云春得秋脉定知死亦此意也按钱氏云者本病也洁古则兼胜已制
化言之故後五脏形证不容不辩也

论五脏形证虚实所主

钱氏曰肝主风实则目直大叫呵欠项急顿闷 虚则咬牙多欠气热则外生气温则内生 肝热手寻衣领及乱捻物泻青丸主之壮热饮水喘闷泻白散主之肝有风目连眦不搐得心热则搐治肝泻青丸治心导赤散

风甚身反张直不搐心不受热也当补肾治肝肝有热目直视不搐得心热则搐治与有风同凡

病或新或久皆引肝风风动而止於头目目属肝风入於目上下左右如风吹不轻不重儿不能任故目运眦也若热入目牵其筋脉两眦俱紧不能转视故目直也若得心热则搐以其子母俱有实热风火相搏故也

洁古曰肝主谋勇热则寻衣捻物目连眦直视不能转视或极则身反强直折皆风热也目者肝之窍属木木性急故如是

钱氏曰心主惊实则叫哭发热饮水而搐 虚则困卧悸动不安 心病多叫哭手足动摇惊悸心气热则心胷亦热欲言不能而有就凉之意故合面卧

心热视其睡口中气温或合面睡及上窜摇头咬牙皆心热也导赤散主之
心实则气上下澹合卧则气不得通故喜仰卧则气得上下通也泻心汤主之

钱氏曰脾主困病则困睡泄泻不思食 实则困睡身热饮水虚则吐泻生风

肺主喘实则闷乱喘促有饮水者有不饮水者 虚则哽气长出气 肺热手搯眉目鼻面

肺盛复有风冷胸满短气气急喘嗽上气当先散肺後散风冷肺只伤寒则不胸满

肺虚热唇深红色治之散虚热

肺脏怯唇白色当补若闷乱气麤喘促哽气者难治肺虚损故也 脾肺病久则虚而唇白脾者肺之母也母子皆虚不能相营故名曰怯肺主唇白白而泽者吉如枯骨者死

洁古曰肺主气燥热则壮热饮水喘闷鼻乾燥手扞眉面泻白散

胸满短气气急喘 上气皆是肺气有余复感风邪之所伤谓之微邪先泻而复发散之

钱氏曰肾主虚无实也惟疮疹肾实则黑? 肾虚儿本虚怯由胎气不成则神不足目中白睛多其颅即解【自开也】面色?白此皆难养纵长不过八八之数若恣色慾多不及四旬而亡或有因病而致肾虚者非也又肾气不足则下窜盖骨重惟欲坠下而缩身也肾水陰也肾虚则畏明宜补之

洁古曰下窜者肾气不足两足热不喜衣覆足然此者脐以下皆肾之所主缘心气下行於肾部也此乃肾不足而心有余宜地黄丸

论五脏相胜虚实之邪

钱氏曰五脏相胜轻重肝脏病见秋木旺肝强胜肺也宜补肺泻肝轻者肝病退重者唇白而死

肺病见春金旺肺胜肝当泻肺轻者肺病退重者目淡青必发惊更有赤者当搐为肝怯当目淡青色也心病见冬火旺心强胜肾当补肾治心轻者病退重者下窜不语肾怯虚也

肾病见夏水胜火肾胜心也当治肾轻者病退重者悸动当搐也

脾病见四旁皆仿此治之顺者易治逆者难治脾怯当面目赤黄五脏相反随证治之

又曰如肺病又见肝证咬牙多呵欠者易治肝虚不能胜肺故也若目直大叫哭项急烦闷者难治盖肺病久则虚冷肝强实而反胜肺也视病之新久虚实虚则补母实则泻子

洁古曰肝胜肺则肝病身热发搐又见肺虚喘而气短病见於申酉戌时是肝真强也内经曰受所制而不能制谓之真强法当补脾肺而後泻肝导赤散泻黄散肺胜肝则肺病喘嗽气盛见於寅卯辰时木之位又以见肝怯少力正为鬼贼所尅法当补肝泻肺若肺病嗽久虚羸无实不得泻肺只宜用地黄丸补之不可服泻白散何谓也经云虚则补实则泻之

按此谓五脏相胜病机不离五行生尅制化之理者盖小儿初在襁褓未有七情六慾只是形体脆弱血气未定腑脏精神未完所以有脏气虚实胜乘之病但世俗不审此理往往遇是率指为外感内伤而用药致枉死者多矣悲夫矧钱论脱略幸而洁古补之今特参附诚所谓无穷之惠也

洁古曰五脏子母虚实鬼贼微正若不達旨意不易得而入焉

在前者为实邪

子能令母实拒鬼贼不敢伤於母其子又引母所尅者妻相助故曰实邪也

在後者为虚邪

母引子之鬼贼至由此母能使子虚也内经曰子能令母实母能令子虚此之谓也

妻来乘夫为微邪

夫来乘妻为贼邪

法当泻鬼补本脏

本脏自病为正邪

法当虚则补之实则泻之内经曰滋苗者必固其根伐下者必枯其上逆其根则伐其本伐其本则败其真矣按此以五行生尅之道论也义见难经五十难及後五脏治要论宜参考之

心主热自病或大热泻心汤主之

实则烦热黄连泻心汤主之

虚则惊悸生犀散主之

肺乘心微邪

喘而壮热泻白散

肝乘心虚邪

风热煎大羌汤下大青丸

脾乘心实邪

泄泻身热泻黄散

肾乘心贼邪

恐怖恶寒安神丸

按乘者犹乘车之乘也大抵五脏之病相乘伏匿隐显莫测已上但言本病乘胜之道故以五脏治要附于左宜参考焉凡心脏得病必先调其肝肾两脏肾者心之鬼肝气通则心气和肝气滞则心气乏此心病先求於肝清其源也五脏受病必传其所胜水能胜火则肾之受邪必传於心故先治其肾逐其邪也故其退肾也益肝气两方或诊其脉肝肾两脏俱和而心自生疾然後察其心家虚实治之

肺主燥自病则喘嗽燥则润之

实则喘而气盛泻白散

虚则喘而少气先益黄散而後阿胶散

心乘肺贼邪

热而喘 先地黄丸中导赤散後阿胶散

肝乘肺微邪

恶风眩冒昏愤 羌活散

肾乘肺实邪

增寒 清利百部丸

脾乘肺虚邪

体重吐痰泄泻 人参白术散

凡肺之得疾必先观心之虚实若心火炎盛铄金即当先抑心气後吃肺药若心气和即更看脾脉若脾气虚冷即不能相生而肺家生气不足则风邪易感故患肺寒者皆脾虚得之若脾气盛实则亦痞隔中焦而大肠与肺表里不能相通夫中焦热隔则肺大肠不通其毒热之气必上蒸於肺而生疾故患肺热者多脾实得之心气盛泻之脾气虚者益之脾气实者通之然後随其肺之寒热以治之故有抑心气益脾气通脾气三药若诊其脉气心脾两脏俱和而肺自生疾则但察肺家虚实而治之

肝主风自病则风搐拘急肝苦急急食甘以缓之佐以酸苦以辛散之

实则风搐力大泻青丸

虚则风搐力少地黄丸

心乘肝实邪

壮热而搐利惊丸凉惊丸主之

肺乘肝贼邪

气盛则前晨呵欠微搐法当泻肺先补本脏补肝地黄丸主之泻肺泻白散主之

脾乘肝微邪

多睡体重搐先当定搐泻青丸主之搐止再见後证则别立法治之

肾乘肝虚邪

增寒呵欠搐羌活膏

凡肝得病必先察其肺肾两脏根其病之所起然後复其肝家本脏之虚实方可治疗然肾者肝之母金者木之贼今肝之得病若非肾水之不能相生必是肺金之鬼来相攻击不得不详审而求之故其来在肺先治其肺攻其鬼也其来在肾先补其肾滋其根也然後审其肝家本脏之虚实而寒温之

脾主湿自病则泄泻多睡体重昏倦脾苦湿急食苦以燥之

实则泄泻赤黄睡不露睛泻黄散

虚则泄泻白色睡露睛白术散

肝乘脾贼邪

风泻而呕茯苓半夏汤主之

心乘脾虚邪

壮热体重而泻羌活黄芩苍术甘草汤主之

肺乘脾实邪

能食不大便而呕 煎槟榔大黄汤下葶苈丸

肾乘脾微邪

恶寒泄理中丸之类

凡脾之得病必先察其肝心两脏之虚实根其源之所起然後救疗盖肝是脾之鬼心是脾之母肝气盛则鬼胜心气亏则脾家生气不足盛者抑之则退亏者益之则不乏故有抑肝气益心气两药诊其脉肝心两脏俱和则是脾自生疾察其虚实而治

肾主寒自病则足胫寒而逆人之五脏惟肾无实小儿疮疹变黑?则是肾实水尅退心火是以水能制火也

心乘肾微邪

内热不恶寒桂枝丸

肺乘肾虚邪

喘 皮澁寒百部丸

肝乘肾实邪

拘急气搐身寒理中丸

脾乘肾贼邪

体重泄泻身寒理中丸

本脏虚弱是自己正令不行乃鬼贼之所尅害当补本脏之正气假令肺病喘嗽时於初春见之法当补肾见於夏救肺见於秋泻肺见於冬补心泻本脏乃名寒嗽大抵五脏各至本位即气盛不可更补到所尅位不可更泻五行之间惟肾之一脏母盛而子反受邪而物之性有不可一槩论者肺肾是也何则肺属金射於皮毛所主者气肾属水主於骨髓所藏者精气之轻浮能上而不能下精之沈重能下而不能上此物性之然今肺之盛盖热之作也气得热而上蒸则肺不能下生於肾而肾受邪矣急食凉药解之使脏气温和自能下生於肾此肾之病必先求之於肺若肺脏安和而肾忽然受病者不过脾之湿相刑於肾而生疾所以有解肺热去脾邪两药若脾肺两脏俱和而肾自生疾亦察其本脏而治之

论外感风寒

钱氏曰伤风贪睡口中气热呵欠顿闷当发散与大青膏解不散有下证当下大黄丸大饮水不止善食者可微下余不可下也

伤风手足冷脾脏怯也当先和脾後发散和解伤风自利脾虚怯也

伤风腹胀脾虚也补脾必不喘後发散仍补脾去胀蹋气丸

伤风兼脏兼心则惊悸兼肺则闷乱喘息哽气长出气 兼肾则畏明各随补母脏虚见故也肝外感风呵欠顿闷口中气热当发散若能食饮水不止当微下之余不可下谨按伤风亦有六经不止详见伤风门

洁古曰小儿外伤於风秋冬用温热药春夏用凉寒药若大热饮水能食不大便用大黄丸作散子服之如身表无大热而小便不利是为有湿热结膀胱仍用胜湿药白术茯苓之类利小便则其热自退如清便自调慎不可妄下恐外热逐於内而变结胸危证多矣

又曰伤寒依四时陰阳升降顺刚柔而施治气升则顺发之气收则下之有汗发热恶风脉浮缓者风伤卫桂枝汤无汗发热恶寒不当风而自增寒脉浮紧者寒伤荣麻黄汤有汗发热恶风脉浮紧无汗恶寒脉浮缓谓之荣卫俱伤青龙汤桂枝麻黄各半汤无汗发热不恶风寒脉沈洪者可下之更详认其厥与不厥量寒热浅深而治之有汗四肢厥脉沈微者名陰厥四逆汤无汗四肢厥脉沈滑者名阳厥大承气汤加膩粉如四肢不厥身热内外皆阳不动凉药三五服下之

论诸热证病本不同

全婴方论曰夫潮热者发歇有时或血气盛实脏腑生热或伤寒时疫触受邪气陰阳相胜也惊热颠叫恍惚夜热夕发旦止 余热者寒邪未尽或传经之遗热也 食热者肚背先热 疳热者骨蒸盗汗 壮热一向不止钱氏云不已甚则发惊癇也

烦热心躁不安喘鼈甚则发癇也

积热颊赤口疮下盛则腰腿痛肿表里实则身热便澁虚则汗下後仍热也

风热汗出身热呵欠面赤

虚热困倦少力其有久 久泻久痢久血久疟以致诸疾之後成者皆虚热也 客热来去不定为阳邪干於心也心受邪则热形於额故先起头面身热多惊由真气虚而邪气胜也 癖热涎

饮水由乳食不消伏结於中致成癖块也或痰 而惊或呕逆不定日中噤煎夜则啼叫乍热乍凉如潮热也 寒热者如疟状陰阳相胜也先寒而後热阳不足先热而後寒陰不足寒多而热少陰胜阳也热多而寒少阳胜陰也寒热相半陰阳交攻也

血热者每日已午间发热遇夜则凉 疹热耳鼻尖冷

钱氏曰胎热者生下有血气时叫哭身热如淡茶色目赤大便赤黄粪稠急食乳浴法主之

按已上辩诸证可谓详悉但血热证东垣谓夜则发热昼则明了此血热也盖昼阳夜陰也食热者手心热暖气吐乳呕吐者多宜随证推格兼玩本文论变蒸身热

全婴方论曰夫变蒸者以长气血也变者上气蒸者体热变蒸有轻重轻者体热虚惊耳冷微汗唇中白泡状如珠子重者寒热脉乱腹痛啼叫不能乳食辄吐覘其轻者三日重者五日古法以黑散子紫丸子主之其有不热不惊或无证候暗变者多矣盖受胎气壮实故也按本论注云尝考钱氏与宝监论变蒸互说差殊钱氏云一变肾二变膀胱三变心四变小肠五变肝六变胆七变肺八变大肠九变脾十变胃故称水数一先变也宝监云初变肝二变肺三变心四变脾五变肾二者所论皆五行颠倒相生者却逢相尅相尅者又逢相生大抵陰阳造化相生者顺相尅者逆变蒸者是长养血气滋荣五脏相生之法此理昭然相生者有母子之道相尅者有夫妇之义相生所以相继相尅所以相治原夫胎者得水火既济陰阳造化五行相治而成形故始於肾气之初生也小儿变蒸者当陰阳升降从五脏相继而成人故始於肝之初变也虽二说互有所长大抵小儿所禀胎气壮怯不同况所变之证不一古方用已上二药非本病通变法也故不錄

论伤寒疮疹同异

钱氏曰伤寒男体重面黄女面赤喘急憎寒口中气热呵欠顿闷项急也疮疹则腮赤躁多喷嚏动昏倦四肢冷伤寒当发散之治疹行温平有大热者解毒余见前说洁古曰凡伤风则皮澁拘急鼻塞疹则睡中发惊悸呵欠嚏喷是为易识矣

论急慢惊风

钱氏曰急惊因闻大声或大惊而发搐发过则如故此无陰也当下利惊丸主之此证本因热生於心身热面赤引饮口中气热大小便黄赤剧则搐也盖热甚则风生风属肝此阳盛陰虚也故利惊丸主之以除其痰热不可与巴豆及温药大下之恐搐虚热不消也小儿热痰客于心胃因闻声非常则动而惊搐矣若热极虽不闻声及惊亦自发搐慢惊因病後或吐泻脾胃虚损遍身冷口鼻气出亦冷手足时瘈瘲昏睡露睛此无阳也瓜蒌汤主之凡急慢惊陰阳异证切宜辨而治之急惊合凉泻慢惊合温补如不分别则误甚矣

阎孝忠曰急慢惊风古人无之惟曰陰阳癇阳动而速故阳病曰急惊陰静而缓故陰病曰慢惊此陰阳虚实寒热之别治之不可误也急惊犹有热热即生风又或因惊而发则目为连劄涎潮搐搦身体口中气皆热及其发定或睡起即了了如故此急惊证也当其搐热渐减食与镇心退热药候定以药即下其痰热心神安寧即愈慢惊得大病之余吐泻之後或悞取转泄致脾胃虚损风邪乘之似搐而不甚搐似睡而不似睡四肢与口中气皆冷睡露睛或胃痛而啼哭如鸦声此则危证脾胃虚损故也

洁古曰急惊阳证也俱腑受病尔小儿客痰热於心膈是少阳相火旺经云热则生风因闻大声而作盖谓东方震卦得火气而发搐火本不动得风而动当用利惊丸导赤散泻青丸地黄丸主之搐止服安神丸慢惊陰证也俱脏受病尔盖小儿吐泻病久脾胃虚损若不早治则成慢惊名曰瘈瘲似搐而不甚搐也因脾胃虚损故大便不聚当去脾间风先以宣风散导之後用史君子丸益黄散则其利自止既已失治则脾肺俱虚致被肝木所乘是为慢惊也当用温补羌活膏

全婴方云惊证因风则目青面红发搐因惊其病在心忽然叫声发搐因食则其证噎吐气即发搐皆阳癇也肺胃经虚则生粘痰痰者肺胃所出也痰则凝滯在於咽喉如牵锯之声时复瘈瘲或因吐泻所致脾虚则肺亦虚涎痰流溢其证亦然皆陰癇也身热脉浮精神恍惚或吐或泻不思乳食发搐即是半陰半阳合病身凉脉沈精神倦怠不吐不泻又能乳食发搐者亦是半陰半阳合病正如伤寒半是表半是里也亦有急惊凉泻而不愈或与吐下药太过变为慢惊慢惊温补而不愈变为急惊互相更变者多矣

按已上诸家所论殆尽证治之要矣但钱云慢惊用栝蒌汤恐传写误耳大抵惊主风木甲木属阳腑病故急易治乙木属陰脏病故慢难治如大人惊恐即後泄盖甲木尅戊土也况小儿五脏之气未实神气未完而自病乎证非病後及吐泻脾胃虚损得者中有夹火夹热夹痰夹

食病因不同至风邪内?入腑入脏亦与外中风相似故治此者当本钱氏虚实补泻法则不致犯禁之悞药有太过不及之失

论发搐有风有热有痰有食补泻不同

惊癇发搐钱氏曰男发搐目左视无声右视有声女发搐目右视无声左视有声相胜故也
洁古曰男为木左视木位右视金位相擊则有声男反右视女反左视亦皆有声

早晨发搐钱氏曰因潮热寅卯辰时身体壮热上视手足动摇口内生热涎项颈急此肝旺当
补肾治肝也洁古曰潮热於寅卯辰木之位是肝旺也当补水以制心火泻肝木以止其搐

日午发搐钱氏曰因潮热巳午未时发搐心神惊悸目上视白睛赤色牙关紧口内涎手足动
摇此心旺也当补肝治心

洁古曰巳午未火之位而发潮搐者心热也导赤散及凉惊丸

日晚发搐钱氏曰因潮热申酉戌时不甚搐而喘目微邪视身体似热睡露睛手足冷大便淡
黄水是肺旺当补脾治心肝

洁古曰肺之位而肝强法当补脾恐被木之贼所尅害先泻心肝以剋其势泻心导赤散泻肝
泻青丸而後补脾益黄散

夜间发搐钱氏曰亥子丑时不甚搐而卧不稳身体温壮目睛紧斜视喉中有痰大便银褐色
乳食不消多睡不省补脾治心导赤凉惊主之

洁古曰皆因大病之後脾胃虚损多有此疾法当补脾凉心

伤寒後发搐钱氏曰伤风後得之口中气出热呵火顿闷手足动摇当发散大青膏主之小儿
本怯者多此病也

洁古云因伤风而得已上证者同大人伤风寒之类当辨有汗无汗阴阳二证用大青膏仲景
小续命之类开发则愈

伤食後发搐钱氏曰因食得之身体温多睡多睡或吐不思食而发搐当先定搐搐退白饼子
下之後与安神丸洁古曰伤食发搐谓不因他病忽然而搐此因饮食过度致损脾胃故见多
睡或吐不思饮食脾胃既虚引肝风则发搐当先定其搐加羌活防风煎下泻青丸後用白饼
子下其食渐渐用调中丸异功散养其气

百日内搐钱氏曰真者不过三两次必死假者发频不为重真者内生惊癇假者外伤风冷盖

血气未实不能胜任乃发搐也欲知假者口中气出热也治之可发散大青膏及用涂 浴体法

钱氏曰惟?疹能作搐风火相争故也治当泻心肝补母

杂病目赤兼青者欲发搐 咬牙甚者发搐

全婴方曰凡身体壮热耳轮鼻尖及手足稍俱冷忽发搐者此非惊是豆搐也 夫惊搐有陰阳两证陰者拇指在内阳者拇指在外阳拳者顺陰拳逆也凡目鲜目眨目白目青目斜目翳目转目瞪声焦声嘎声颤声轻呃口弄舌卷舌露筋噓气哽气噎气撮唇噎乳噎食忽然定睛吐涎吐沫拘颈仰身摇头擦面藏头畏明手挛手颤脚弯不伸忽撩忽乱恍惚精神失张失志眠睡不宁睡中喜笑困戛齿龈心烦躁热啼哭咬人面脸弄色或红或青伸舒用力微微作声有已上证候惊搐先证也预防之驱风膏琥珀散更择对证药

阎孝忠曰似搐而不甚搐此名瘈瘲

按此所论诸脏旺实或伤风因食所致发搐旺者当泻实补虚伤风者当发散食宜下之此则与因惊发搐所异也大抵惊病发搐多自外感自内因者如吐泻後脾虚所致或热极生风之类是也余证发搐已上亦备所因不同但世俗罕能分於临证用药不无实实虚虚之失反为害耶

论咳嗽

钱氏曰 者肺感微寒八九月间肺气大旺病 者其病必实非久病也其证面赤痰盛身热法当以葶苈丸下之若久者不可下也十一十二月 者乃伤风咳也风从背脊第三椎肺俞穴入也以麻黄汤汗之有热证面赤饮水涎热咽喉不利者宜兼甘桔汤治之若五七日之间其证身热痰盛唾粘者以漏银丸下之有肺盛者咳而後喘面肿欲饮水有不饮水者其身即热以泻白散泻之若伤风咳 五七日无热证而但 者亦葶苈丸主之後用化痰药有肺虚者咳而哽气时时长出气喉中有声此久病也以阿胶散补之痰盛者先实脾後以漏银丸微下之涎退即补肺如上法有 而吐水或青绿水者以百祥丸下之有 而吐痰涎乳食者以白饼子下之有 而咳脓血者乃肺热食後服甘桔汤久 者肺亡津液阿胶散补之咳而痰实不甚喘而面赤时饮水者可漏银丸下之治 大法盛即下之久即补之更量虚实以意增损

按此论小儿欬证既有外感内因之殊虚实之异治法外此宜与欬门诸方约之

论吐泻有伤乳食有风有热有寒有虚

钱氏曰吐乳泻黄伤热乳也吐乳泻青伤冷乳也有初生三日内或至十日吐泻壮热不思食

大便乳不消或白色是停食当下之後和胃下用白饼子或食乳不消身温凉不思乳大便青白色此上实下虚也更有兼见证吐泻因伤风得之身温乍凉乍热睡多气鼾大便黄白色呕吐乳食不消时咳 更有五脏兼见证当煎入脏君臣药先大青膏後服益黄散如先曾下或无下证慎不可下也此乃脾肺受寒不能入食也 伤风吐泻身热多睡能食乳饮水不止吐痰大便黄水此为胃虚热渴吐泻也当生胃中津液以止其渴止後用发散药止渴多服白术散发散大青膏 伤风吐泻身凉吐沫泻青白色闷乱不渴哽气长出气睡露睛此伤风任冉轻怯因成吐泻当补脾後发散此二证多病於春冬也 吐泻於五月二十五日以後身壮热此热也小儿脏腑十分中九分热也或因伤热乳食吐乳不消泻深黄色玉露散主之 六月十五日以後吐泻身温似热脏腑六分热四分冷也吐呕乳食不消泻白黄色似渴或食乳或不食乳食前少服益黄散食後多服玉露散七月七日以後吐泻身温凉三分热七分冷也不能

食乳多似睡闷乱哽气长出气睡露睛唇白多眵欲大便不渴食前多服益黄散食後少服玉露散 八月十五日以後吐泻身冷无阳也不能食乳乾呕泻青褐水当补脾益黄散主之不可下也虚羸脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐泻後脾胃尚弱不能传化谷气也有冷者时时下利唇口青白有热者温状身热肌肉微黄此冷热虚羸也冷者木香丸主之夏月不可服如有证则少服之热者胡黄连丸主之冬月不可服如有证则少服之

洁古曰夏月心火用事治吐泻不可用温暖药秋用温药秋深用煖药更有五脏兼见证如有风泻防风羌活有热泻黄芩大黄 有寒泻附子 有湿泻白术茯

苓 有肺泻 药桂 定喘荆芥人参如甚加槟榔木香大便不通则加大黄更详看病新旧新则止之久则肠风之患宜推陈致新法当宣风散导过以用入脏君臣药调之益黄散

凡大泻引饮者其病不以新久皆宜服白术散痢病亦同身热吐泻咳 是风木入於脾母虚其子亦弱法当煎槟榔豆?汤下大青膏後服益黄散

身热吐泻大渴大便必少是热入膀胱亡失津液此为大逆是陰阳相乘也五苓散主之身凉吐泻不渴则知为寒泻当补之煎附子桂枝汤下大青膏 陰阳相乘肝入于胃故发热而呕当服白术散後煎槟榔木香汤下大青膏 阎孝忠曰凡小儿吐泻当温补之予每用理中丸以温其中以五苓散导其逆连与数服兼用异功散等温药调理之往往便愈若已虚损当速生其胃气宜与其四味理中丸并研金液丹末煎生姜米饮调灌之惟多服乃效候胃气已生手足渐暖陰退阳回然犹瘕瘕即减金液丹二分增青州白丸子一二分兼用异功散羌活膏温白丸鈎藤饮子之类调理至安依此治之仍频与粥虽至危者往往死中得生十救八九金液丹治小儿吐泻虚极最妙沈存中良方论金液丹云亲见小儿吐利剧气已絕服之复活者数人真不妄也须多服方验按此证钱论伤乳食所致分冷热伤风辨兼见证明寒热因而治可谓究其绪矣阎主温中兼用金液丹之类盖是治寒证湿证及升提下?之法至洁古更分时令备兼见证而用药治法殆无余蘊但吐泻止作一证然有吐而不泻泻而不吐则当别议若吐而不泻伤冷者宜温胃泻而不吐伤冷而脉微者宜灸之亦不可不分盖病本之不一也

论疳证虚实

钱氏曰疳者皆脾胃病亡津液之所作也【云云】疳在内目肿腹胀利色无常或沫青白渐瘦弱此冷证也 疳在外鼻不赤烂自揉鼻头上有疮不着痂渐遶耳生疮治鼻疮烂兰香散诸疮白粉散治之五脏疳筋疳骨疳【形证详见本论】

洁古曰疳者小儿病癖或久吐泻医者妄投转过之药小儿易为虚实致之胃虚而亡失津液内发虚热外消肌肉一脏虚则诸脏皆弱其病目胞肿胀利色无常渐加瘦瘁久不痊可是肠胃有风积法当用宣风散导之後各依本脏补其母

大抵小儿疳病肌羸血气不足同大人痼瘵之疾按疳证惟钱氏论中最详 宜玩本文

论腹痛所因

钱氏曰积痛口中气温面黄白目无精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者当磨积宜消积丸甚者当白饼子下之後和胃 虫痛面?白心腹痛口中沫及清水出发痛有时安虫散主之小儿本怯者多此病积痛食痛虚痛大同小异惟虫痛当口淡而沫自出

按小儿腹痛亦有伤冷食乳物及湿热欲作痢而痛或发痧疼痛者皆宜详悉

论小儿癖积

钱氏曰腹中有癖不食但饮乳是也当渐用白饼子下之小儿病癖由乳食不消伏在腹中乍凉乍热饮水或喘 与潮热相类不早治必成疳以其有癖则令儿不食致脾胃虚而发热故引饮水过多即荡涤脾胃亡失津液脾胃不能传化水谷其脉沈细益不食脾胃虚衰四肢不举诸邪遂生羸瘦而成疳矣

论痘疮轻重

钱氏曰凡痘疹一发便出尽者必重也疮夹疹者半轻半重也出稀者轻里外肥红者轻外黑里赤者微重也外白里黑者大重也疮端里黑点如针孔者势剧也青乾紫?睡昏汁出不止烦躁热渴腹胀啼喘大小便不通者困也凡痘疹当乳母慎口味凡饥及风寒归肾变黑难治也有大热当利小便有小热宜解毒若黑紫乾?者百祥丸下之不黑者慎勿下看时月轻重大抵疮疹属阳出则春夏为顺秋冬逆冬月肾旺又盛寒病多归肾变黑又当辨春脓疱夏黑?秋?冬疹亦不顺也黑者无问何时十难救一其候寒战噤牙或身黄肿紫宜急以百祥丸下之复恶寒不已身冷出汗耳聩反热者死肾气大旺也下後身热饮水可治脾旺胜肾寒去而温热也 先发脓疱後发疹子者顺後发?子者逆先发水疱後发疹子者逆 先发脓疱後发水泡多

者顺少者逆 先水泡後?子多者逆少者顺 先疹子後?子者顺 凡痘疹只出一般者善

洁古曰一发便密如针头形势重者合轻其表而凉其内连翘升麻汤若?已发密重微喘饮水

者有热证则去风药微下之若出不快清便自调知其表不在里当微发散用升麻葛根汤若青乾黑身不大热大小便澁则是热在内煎大黄汤下宣风散若身表大热表证未罢不可下若疹已出见小热小便不利当利之已发後有余毒未散复有身热疮肿之类当用茶粉下解毒丸疮疹已出後有声音者乃形病气不病也疮疹未出先声音不出者乃形不病而气病也若疮疹出而声音不出者是形气俱病也当清其肺气当用八风汤并凉膈散去硝黄亦可

论痘疮用热药之悞

丹溪曰读前人之书当知其立言之意苟不知其意求适於用不可得也痘疮之论钱氏为详历举源流明经络分表里虚实开其治法证以论辨深得着书垂教之体使後人如求方圓於矩较平直於準绳引而伸之触类而长之可谓无穷之应用也今人不知致病之因不求立方之意仓卒一试设有不应并其书而弃之近因局方之学行素问之道不明类皆喜温而恶凉喜补而恶解利忽得陈氏方论遂以为钱氏不及也虽然陈氏亦可谓善求病情者大率归重於太陰一經盖以手太陰属肺主皮毛足太陰属脾主手足肺金恶寒而易於外感脾土恶湿而无物不受观其用丁香官桂所以治肺之寒用附木半夏所以治脾之湿也使脾与肺果有寒与湿而兼有虚也中病则已何伤之有今徒见其出迟者身热者泄利者惊悸者气急者渴思饮者例与木香散异功散者间有偶中之効不思一偏之祸若钱氏方固未尝废细辛丁香白术参芪辈率有监制辅佐之药但有寒凉者多而补助一法略尔端绪痴人不可说梦钱氏之虑深矣亦将俟達者推充而用之夫渴者用温药痒塌者用补药自陈氏发之迴出前輩然其多用燥热或未适中恐其立方之际必有挟寒而痘者余尝会诸家之粹而用之聊陈一二从子六七岁时出痘身热微渴自利或欲用木香散加丁香十粒煎予观其出迟固因其自利而气弱察其所下皆臭滯因热蒸而下恐未必寒急止之已投一贴矣与黄连解毒汤加白术近十贴以解之利止痘出其後肌常微热手足生痛又与凉剂补一月安一人年七十岁发热而昏倦其脉大而似数与参芪归术陈皮大料浓汤饮之二十贴痘出又二十贴脓胞成身无全肤或欲用陈氏本方与之予曰但虚无寒也又与前方至六十贴而安至正甲申春邑间痘疮不越一家率与陈氏方童幼死者百余虽曰天数吾恐人事亦或未之尽也

谨按钱氏论痘疮形色轻重困剧而用药已具其端绪矣至洁古又辨所兼之证及候音声察形气为病而处治治法可谓详悉但世俗不深求其意反有疑似丹溪先生所以言之谍谍也大抵世俗喜温而恶凉将钱氏之法不去推充至多疑似如云不可妄下盖妄之一字戒慎之意当有可下之理也若疮疹初发有因里实而出不快渴而脉数便秘烦躁不下可乎有将悞之际里实而渴便秘身热不下可乎或云首尾俱不可下或指为上吐下泻不可下皆非也但自病体虚实不等时令中治法之异要当适中病情尔故钱氏云看时月此句关系甚妙如冬月盛寒便难例用凉剂且小儿痘疮本五脏之毒所发非止属诸痛痒疮皆出心火之比故陈氏方一出亦多获效今人用钱氏方亦有致悞者盖不善用其法之过非制法者之过也宜求乎立方本旨矧岁气时临灾眚浅深不同小儿体有虚实之异用药不可轻举详洁古以微下法中佐以风剂是兼升发之意亦慎之也何热剂与香窜之药岂可例用乎然有毒入关窍肌骨间邪气下用此而获生者或有之恐千百而一二也

论疹证治

王海藏云夫疹之为病皆由于子在母腹中时浸渍食母血秽蕴而成毒皆太陰湿土壅滯君相二火之所作也因小儿真气既盛正气又旺邪无所容或因天寒伤表或伤里由是而生焉治当外者外治内者内治中外皆和其疹自出至於恶寒者发之表大热者夺之渴者清之秘者通利之惊者安之泄者分之不可执一大抵伤寒同治随经用药最为高论假如五日以里诸病与疹不能别辨者不可疑似必须发之但各从其所伤应见治之皆不妨出若强发之其变不可胜数矣前人言首尾俱不可下者何也曰首不可下者为疹未显於表下则邪气不得伸越此脉证有表而无里故禁首不可下也尾不可下者为毒已显於外内无根蒂大便不实无一切里证下之则气逆故禁尾不可下也又言温煖不令通风若已出身热天暄何必盖覆不使之通风乎後人执此二句不知天令人事通变致悞者多大抵以脉为主浮中沈之诊平举按之候察其虚实定其中外则可以万全矣

论未显疹证所用之药

外伤升麻汤 内伤枳实丸 大便结者枳术丸 伤冷者温之神应丸 恶寒者发之防风苍术汤 表大热者夺之此表者通言三阳也 夫阳盛则气必上行言夺者治之不令上行也 大便秘结者下之桃仁承气四顺饮 柴胡饮 选用察其在气在血 渴者清之大渴者白虎汤 小渴者凉膈散 小便不通者利之导赤散八正散之类 当求上下三焦何经而用药 惊者分轻重安之 泄者察寒热分之

已显疹证所用之药

出不快化毒汤 出太多犀角地黄汤 地骨皮鼠粘子汤 咽不利桔梗甘草粘子汤 烦者桔梗甘草梔子汤

肺不利紫草甘草枳殼汤

太阳出不快荆芥甘草防风汤

阳明出不快升麻加紫草汤

少阳出不快连翘防风汤

四肢出不快防风 药甘草汤

小儿治法

治风之剂

小续命汤【一名寛筋汤】治小儿吐泻之後因虚生风痲痺神昏涎盛不利

麻黄【去节半两】防风【一分半】 药 附子人参 川芎 白术
防己【各一两】黄芩【一分】桂枝 甘草【各半两】

右为粗末每三岁一钱水煎入姜枣有汗者去麻黄

钱氏大青膏治小儿热盛生风欲为惊搐血气未实不能胜邪故发搐也大小便依度口中气
热当发之天麻末【一钱】白附子【一钱半】蝎梢【半钱】朱砂【一字】

麝【一字】乌蛇肉【酒浸焙乾半钱】青黛【一钱】天竺黄【一字】

右同为末生蜜和成膏每服半皂子大月中儿粳米大

天麻防风丸【见後】

按已上三方风自内因者宜此汗之可见里之表证与外因不同矧有惊风痰热食热等类者
临证并宜选择

驱风膏

浮青丸加辰砂蝎尾

按此表里药也

浴体法

天麻末【二钱】蝎尾 朱砂【各半钱】乌蛇肉【酒浸

为末】白矾【各三钱】麝【一字】青黛【三钱】

右同研匀每三钱水煎入桃枝一握并叶五七枝温洗之勿浴背

涂 法

麝【一字】蝎尾【半钱】薄荷叶【半钱】蜈蚣末牛黄末 青黛末【各一字】

右研匀熟枣肉剂为膏新绵上涂匀贴 上四方可出一指许火上炙手频熨百日里外儿用此法谨按世俗周岁上下小儿诸风搐证用浴体搯洗法得汗立效殊胜火灸盖艾有悞加於风热阳瘤也慎之

局方败毒散治小儿伤风身热鼻塞

方见热门

拔萃防风苍术汤治小儿邪热在表恶风风寒所伤防风【半两】 苍术石膏【各一两】甘草【炙半两】川芎 黄芩【各二钱半】

右为粗末每二钱入姜薄荷叶煎

升麻黄芩汤治小儿中风身热头项强自汗表不和也升麻 葛根 黄芩芍药【各五钱半】甘草【二钱半】

右?咀每二钱水煎

按此二方阳明经药也

大羌活汤治风热

方见寒门

钱氏塌气丸治脾风腹胀

胡椒【一两】 蝎尾【半两】

右糊丸粟米大每五七丸至一二十丸

按此宣风补脾药也

羌活膏

见後惊剂

全婴方加减惺惺散治小儿伤风风热及伤寒鼻塞发热惊悸头痛咳 时行风热

苍术 川芎 细辛 羌活防风 白芷 天花粉 甘草赤芍 桔梗 麻黄 荆芥当归 薄荷

右等分水煎一钱入姜

按此太阳例药也

已上诸方宜随诸经轻重选用

僵蚕散治小儿中风不语失音关鬲不通精神昏愤

僵蚕【半两】 羌活【一两】 麝【半钱】

右为末二岁半钱姜汁少许调和汤浸服又以菖蒲末於舌根上频用之

桂菖散治小儿急中风失音不语

桂心【一两】 石菖蒲【一分】

右为末三岁一钱水煎服若大病後不语者用猪胆汁调下未语再服

按此二方出太阳例可见中风伤风例不同故録之治寒之剂

仲景桂枝汤治感冒风寒身热恶寒自汗

麻黄汤治冒风寒身热鼻塞寒栗无汗

桂枝麻黄各半汤

小青龙汤治感风寒脉缓发热腹痛或利

理中汤治感寒腹痛

方并见寒门

谨按世俗治伤寒多不本仲景初法矧小儿乎惟近代郑友端集全婴方於伤寒多采其例言桂枝汤自西北二方居人四时行之无不验江淮间惟冬及春可行之自春末及夏以前桂枝证加黄芩一分谓之阳旦汤夏至以後有桂枝可加知母石膏各半两或加升麻一分若病人素虚寒者正用古方不在加减也可谓得其旨趣故兹寒例与夫变证法并见本论今不详録但以变法一二附于左

葛根升麻汤

方见升麻汤

右?咀水煎

按此方阳明药也世俗用治小儿伤风及发?疮疑似之间者皆用之故收入然亦须审谛而行之可也故王海藏云活人言伤寒头痛如破者连须葱白汤次又不已者葛根升麻汤恐太阳流入阳明用断其路故以此汤主之地黄汤内如无犀角以升麻代之是知阳明药非太阳药也人或初病太阳证便与此汤是遗太阳不惟遗经反引太阳邪气入阳明不能解也其变可胜言哉故不可不慎之况小几乎

麻黄黄芩汤治小儿伤寒头痛身壮热无汗鼻塞目澁小便清者知不在里可汗之

麻黄【三钱】 赤 黄芩【各一钱半】 甘草【炙】 桂枝【各半钱】

右为粗末水煎

按此太阳例药也

惺惺散治伤寒时气风热痰壅欬 气不和

桔梗 细辛 人参 甘草【炙】 白茯苓 白术 瓜蒌根【各一两】

右为末每二钱水煎入薄荷五叶一方加防风川芎各一分

按此少陰例药也

东垣麻黄升麻汤治小儿寒鬱而喘喉鸣脐中鸣腹满鼻流清涕脉沈急而数

麻黄 草薢?【各一钱半】 益智仁【一分半】 厚朴 吴茱萸【各二分】 甘草【一分】
当归尾 升麻麴末 苏木【各半分】 柴胡 黄芩【各一分】 红花【少许】 蝎【二个】

右?咀作二服水煎稍热服

按此太阳例药也然有所兼之证故用是变法随证加减之也

治热之剂

钱氏泻青丸治肝热搐搦脉洪实

当归 龙胆 山梔 川芎 大黄 羌活 防风

右等分蜜丸鸡头大每服一丸

按此泻乙木之陰火药也治风热表里之剂

泻心汤治心经实热

按此泻丁火药也

泻黄散治脾热目黄口不能吮乳

按已上治已土湿热之药风胜湿甘寒泻火也与已上并治实热之剂

泻白散治肺热目黄口不能吮乳喘

按此泻肺邪之有余补辛金之不足也

导赤散治内热小便赤黄心躁睡语

按此治丙火药也

安神丸治邪热惊悸面黄颊赤

按此治心肺胃热气分药也清镇之剂

已上方并见热门

地黄丸治疳热肾虚泻血失音身瘦目翳生疥解 不合长大不行可服取效

方见补虚门

按此治癸水不足药也

地骨皮散治小儿肌热

白虎汤治小儿发热而渴

方并见热门

生犀散治小儿肌热

生犀 地骨皮 赤芍 柴胡 葛根 甘草

右?咀水煎

按此少阳阳明药也

鳖甲饮治小儿骨热潮热盗汗

鳖甲【炙】 地骨皮 秦艽 柴胡 枳壳【炒】 知母 当归【等分】

右?咀三岁一钱水煎加桃柳枝各三寸乌梅一个按此少阳厥阴药也 气血之剂

镇心丸治内热生惊痰盛

甜硝【一两】 人参【一两】 甘草【炙】 寒水石【烧一

两半】 山药 茯苓【各二两】 朱砂【一两】 脑麝【各一钱】

右为末蜜丸鸡头要红入麝脂 量儿大小与服按此手太阴少阴足阳明太阳药也

化毒丹治心胃内热惊悸

生熟地黄【各五两】 天门冬 麦门冬【去心焙各三两】 玄参【二两】 甘草【炙】
甜硝【各二两】 青黛【一两半】

右为末入硝炼蜜丸如鸡头大每半丸或一丸水下按此手足太阴少阴药也

甘露饮子治心胃热咽痛口苦生疮上攻牙龈肿

方见热门

大黄丸

方见伤风门

绦雪丹治小儿诸热阳盛发狂躁不安目赤烦渴

芒硝【一两】 朱砂【一两】

右为末浸蒸饼为丸鸡头大三岁儿一丸沙糖水化下无时

按已上二方阳明例药也

易老羌活黄芩苍术甘草汤治壮热体重而泻

羌活 黄芩 苍术 甘草

右等分?咀水煎服

按此太阳阳明药也

陈氏人参清膈散治小儿潮热自汗骨蒸

人参 柴胡 当归 药知母 桑白皮 白术 黄芪 紫苑 地骨皮 茯苓
甘草 桔梗【各一两】 黄芩【半两】 石膏 滑石【各半两】

右为粗末每三钱水煎入姜

按此手足太陰足少阳厥陰阳明药也虚热烦热气血皆可用

谨按已上诸方姑随轻重例因举其槩至於食热痰热惊热等候宜于後方内选用

治湿热攻下之剂

钱氏牛黄夺命散治小儿肺胀喘满胸高气急两脇扇动?下鼻张闷乱 渴声嘎痰涎潮塞俗
谓之马脾风者

黑白牵牛【各一两半一半炒】 大黄 槟榔【各一两】

右为末三岁儿每服二钱冷温水调下涎多加膩粉少许无时

通膈丸

大黄 牵牛 木通【等分】

右为细末水丸粟米大每三五十丸量大小虚实与服

按已上二方阳明例药也

治惊之剂 宜与风痼门兼看

钱氏凉惊丸

草龙胆 防风 青黛【各三钱】 钩藤【二钱】 牛黄 麝【各一字】 黄连【五分】
龙脑【一字】

右糊丸粟米大每三五丸金银汤下

按此治风热之剂也

局方天麻防风丸治小儿惊风身热喘鼈多睡惊悸手足搐搦精神昏愤

天麻 防风 人参【各一两】 蝎尾【炒半两】 甘草 朱砂 雄黄【各二钱半】 牛黄
麝【各一钱】 僵蚕【炒半两】

右为末炼蜜丸樱桃大朱砂为衣每一丸薄荷汤化下

按此治风痼通关窍药也

三因方治阳痼惊风热证面赤身热发搐直视牙紧朱砂【一钱】 膩粉 麝【半钱】
芦会白附子 甘草【各二钱】 胡黄连【一钱】 蝎梢【七个】 僵蚕【七个】
金箔【七片】 赤脚蜈蚣【一条炙】

右为末二岁已上服半钱金箔薄荷汤下

按此治风热痰之剂透关通经络药也

全婴方睡红散治小儿急慢惊风手足搐搦目瞪神昏牛黄 硼砂 脑子 真珠

水银【砂子各半钱】 青黛 蝎尾【炒】 京墨【烧】 南星
半夏【同上姜制一夕】 蛇含石【淬各一钱】 金银箔【各十片】

麝香【一字】 乌蛇尾【并项下七寸并酒浸一宿取出去皮骨炙一钱】

右为末三岁一字薄荷汤下

按此治风热痰药通关透肌骨之剂也非风邪下?者不可轻用

东垣朱砂安神丸

方见热门

按此宁心清神凉血之剂也

谢氏夺命丹治急惊不省人事眼定不动牙关不开唇白并黑者

南星 半夏【各四钱为末并以生姜汁和作饼子晒乾】

真珠【新白者二钱】巴豆【去油淨一钱】朱砂【四钱】金箔银箔【各十片】轻粉麝【各半钱】

右九味各为末和匀飞罗麪打糊为丸如黍米大每一岁儿一丸灯心汤下

比金丸治小儿风热丹毒急慢哑惊

前夺命丹中减去金银箔加真麝金末三钱丸如上法

利惊丸

前比金丸中去麝金加脑子半钱白颈蚯蚓一条用刀截断首尾两头齐跳者用之去土秤二钱丸服如上法

按此三方导痰药也白饼子加減法

按已上诸方治阳癇之药不问急慢但系阳证诸热者宜随表里轻重择用之

钱氏温惊丸

天南星【为末入腊月牛胆中百日陰乾为末四两】朱砂【一钱】天竺黄【一两】
坯子麝脂

片脑【各一钱】

右用牛胆汁和丸鸡头大每一丸小者半丸沙糖水化下

羌活膏治脾胃虚肝气热盛生风或吐泻後成慢惊者

羌活 川芎 人参 白附子 赤茯苓【各半两】 天麻【一两】 僵蚕【炒】
乾蝎【炒】 白花蛇【酒浸焙各一分】 川附子【炮】 防风 麻黄【各三钱】 肉豆?
母丁香 藿香叶 沉香 木香【各式钱】 轻粉【一字】
真珠末 牛黄【各一钱半】 龙脑【半字】 麝【一钱】
雄黄 辰砂【各一分已上七味各另研】

右为细末熟蜜剂旋丸大豆大每服一二丸食前薄荷汤或麦门冬汤下

三因方治陰癇慢惊

黑附子【剉去皮】 南星【生】 半夏【各二钱】

白附子【一钱半】

右研细并花水浸七日每日换水浸控乾入朱砂二钱麝一钱拌匀每服一字薄荷汤下量大
小与服或丸如粟米大每二十丸薄荷汤下此白丸子方也因分两不同故两存之

经验方保生錠子治急慢惊风

蛇含石【四两火煨醋淬十数次研为极细末】 南星【一两先泡细切再炒】 白附子【去
皮一两】 朱砂【三钱另研极细】 麝【一钱】

右为细末用糯米粉煮作饼捣和前药令匀作錠子临用薄荷汤浓磨汁服一二口

全婴方麝香饼治小儿急慢惊风进退不定荏苒经日乍静乍动呕吐痰涎潮搐甚者宜此

麝香 蝎尾【去毒】 蜈蚣【二条酒浸酥炙】 南星【炮】 川乌【炮】
白花蛇【酒浸一夕去骨皮焙已上各半

两】 乳香 鉄粉 朱砂 牛黄【各一钱】

右为末酒煮糊丸如鸡头大拈作饼子三岁儿一饼用薄荷汤下

按此厥陰例药也非风在关窍肯紧者不可用义见中风门通关透骨例

全蝎散治小儿急慢惊风潮作不定心肺中风

蛇头【一个酒浸】蜈蚣【一条酥炙】蝎【一钱】
草乌【一个去皮尖】麻黄【去节一钱】朱砂【一钱】脑麝【各一字】

右为末一岁一字薄荷汤下

夺命散治小儿急慢惊风诸药无効者一服见効白附子 黑附子【炮】南星【炮】
天麻防风 半夏【炮】麻黄【去节】朱砂蝎【新薄荷叶裹姜汁蘸炙三两次各一钱】

右入麝香半钱为末三岁半钱薄荷姜汁更入酒些小热汤共调下

按此二方太阳例药也

钩藤饮子治吐利脾胃气弱虚风慢惊

钩藤【三分】蝉壳 防风 人参麻黄【去节】僵蚕【炒】天麻
蝎尾【炒各半两】甘草【炙】川芎【各一分】麝【一钱另研】

右同为细末每服二钱水煎量多少与之寒多者加附子半钱

按此升阳越脾气药也

宁心膏治小儿精神不定恍惚不寧恐畏多哭惊魇人参 白术 白茯苓 茯神山药 羌活
甘草【炙各一钱】朱砂【一钱】脑麝【各一字】

右为末炼蜜丸如鸡头大二岁一丸薄荷汤化下按此养气?风清神之药也

宝监天麻散治小儿急慢惊风其效如神

半夏【七钱】天麻【二钱半】甘草【炙】白茯苓白术【各三钱】

右水一盞入磁器内煮水乾将生姜三钱同煮候乾为末每服一钱半姜枣汤调下

按此温脾养胃之剂非止於?风胜痰药也大抵小儿血气未充体虚者多或因病後致者宜与
此调理而不为峻剂下?转成坏证者此三方则庶几矣谨按已上诸方治陰癰不问急慢惊但
系陰证宜随表里轻重选用则半陰半阳慢脾之法例在其中矣

经验方嚏惊开关散牙关紧急者用之?鼻并擦牙蜈蚣【一条炙】直僵蚕【炒】
南星【各一钱】麝【一字】猪牙皂角【一定略烧存性】

右各为末研极细少许搐鼻如欲擦牙者用生姜汁蘸药擦牙上

全婴方探生散治小儿急慢惊风诸药无效者吹鼻定死生

没药?黄【各一钱】 乳香【半钱】 麝【一字】

右为末少许吹鼻如眼泪鼻涕俱出者可治

按此二方捷嚏药也

吐风散治小儿急中风口噤不开不省人事

全蝎【一个炒】 瓜蒂【十个炒】 赤小豆【三十粒】

右为末一岁一字温米饮调下未吐再服

碧云散治小儿急风卒中涎潮气粗不省人事

石礞【四钱】 轻粉【一钱】

右为末每一字薄荷汤下酒少许同调下良久先吐後利

一方以铜青为末醋糊丸如鸡头大每一丸薄荷汤磨下须臾吐涎似胶以手拽出神效

天霜散治小儿急中卒风并急惊口噤搦搐涎盛昏塞不语

辰砂 粉霜 轻粉 南星【炮各半两】 蝎尾 白附子 藿香叶【各一钱】

右为末一岁半字薄荷汤调下茶亦得未吐再服按已上三方宣剂也宜选用然此方吐中兼汗下也

钱氏利惊丸治小儿急惊风涎盛发热潮搐

青黛 轻粉【各一钱】 牵牛【半两】 天竺黄【二钱】

右为末白糊丸如小豆大二十丸薄荷汤下

按此下湿热痰之剂也

全婴驱风膏治小儿肝风筋脉拘急面红目青眼上惊搐及胎风

辰砂 蝎尾 当归 龙胆草 川芎 山梔 大黄 羌活

防风 甘草【各一钱】

右为末入麝香一字炼沙糖丸如鸡头大三岁一丸薄荷竹叶蜜汤化下

按此下风热之剂也

珍珠丸治小儿急慢惊风发搐涎潮壮热及痰嗽壅塞白附子 滑石
巴豆【十五个去油】轻粉

南星【各一钱】

右为末糊丸如小豆大三岁一二丸葱白汤下按此下食痰导滞之剂也白饼子加减法

通关散治小儿惊风已退声不能言

右以南星大者炮为末三岁一钱猪胆汁调下咽入喉中便能言

灸惊风法【附脐风撮口法】

宝监云小儿急惊风灸前顶一穴在百会前一寸若不愈须灸两眉头及人中一穴各三壮如小麦大

小儿慢惊风灸尺泽穴各七壮在肘中横纹上动脉中炷如小麦大

初生小儿脐风撮口诸药不效者取然谷穴在内踝前踝骨下?中可灸三壮针入三分不宜见血立效

小儿癫痫瘈瘲脊强互相引灸长强穴二十壮在脊骶端跌地取之乃得

小儿癫痫惊风目眩灸神庭一穴七壮在鼻直上入发际五分小儿风痫者先屈手指如数物乃发也灸鼻柱入发际宛宛中灸三壮如小麦大

小儿惊痫先啼怖啼叫乃发也灸顶上旋毛中三壮及耳後青脉旺如小麦大

治痰涎之剂

青州白丸子

南星【三两】 半夏【七两】 白附子【二两】 川乌【半两各生用】

右为末绢袋盛井水摆尽为度别换水浸三五日晒乾糯米粉丸

按此治寒痰风痰药也

抱龙丸治风痰壅盛惊搐昏睡

雄黄 辰砂 天竺黄【各四钱】 麝香【一钱】 牛胆南星【八钱入腊月牛胆中陰乾百日内用如无生者水浸二日焙用】

右为末煮甘草糊丸如皂子大三岁一丸量大小与服薄荷汤下

按此治风痰热痰药也

宣风散

诃榔【二个】 陈皮 甘草【各半两】 牵牛【四两半生半熟】

右为末每一钱量大小与服汤调下

按此下湿痰之剂也

褊银丸治风涎膈实上热及乳食不消胀气喘

巴豆【半两去油研】 好墨【八钱烧醋碎】 水银【半两】
黑铅【一钱半与水银结砂子】 麝香【半钱别研】

右将巴豆末并墨再研和匀入砂子等陈米粥和丸如菉豆大捻作饼子一岁一丸薄荷汤下

按此下食痰癖积药也

谨按小儿多痰热宜用抱龙丸与化毒丹等兼服故兹例不多录

治内伤及癖积之剂

钱氏白饼子治腹中有癖但饮乳 而吐痰涎

方见痰饮门

按此下痰积食积药也义见痰饮门

消积丸

丁香【九个】 砂仁【十二个】 巴豆【二个去油】 乌梅肉【三个】

右为末麪糊丸黍米大三岁已上三五丸已下三二丸温水下

消坚丸消乳癖及下交你又治痰热膈实取积

硃砂末 巴豆【去油净】 轻粉【各一钱】 水银砂子【两皂子大】 黄明胶末【五钱】

右同研匀入麪糊丸如麻子大倒流水下一岁儿一丸食後服

按此二方有寒热轻重之分宜选用後法同

宝监三棱煎丸治小儿饮食过多痞闷疼痛宿食不化久而成癖

广术【黑角者】 荆三棱【二味湿纸裹煨为末各一两】 大黄【去皮八两】

右将大黄为末石器内以好醋浸令透慢火熬成膏和二药为丸麻子大或菉豆大每一二十丸食後温水下

鳖甲猪肚丸治癖发热

鳖甲【九肋者七钱醋煮黄色】 青蒿 黄连【各七钱】 青皮 枳实【炒】
木香【各半两】 柴胡【一两】

右细末獐猪肚一个去脂贮药蒸熟同和梧子大每一三十丸食後人参汤下

广术化癖丸治乳食不消心腹饱胀壮热喘麤呕吐痰逆食症乳癖

代赭石【醋淬】 当归 朱砂【研】 枳殼【炒】 广术【炮】
荆山棱【炮各半两】 木香【一两】 麝香 巴豆【去油各一分】

右末研匀糊丸如麻子大每一岁儿二丸米饮下灸癖积法

宝监云治小儿癖气久不瘥中脘一穴章门二穴在大横外直脐季脇端侧卧屈上足举臂取之各灸七壮脐後脊中灸二七壮

治小儿脇下满泻利体重四肢不收痙癖积聚腹痛不嗜食寒热取脾俞二穴在第一颺下两旁相去各一寸五分可灸七壮又治腹胀黄疸可灸三壮

治泻痢之剂

钱氏白术散

藿香叶 白术 木香 白茯苓甘草 人参【各一钱】 乾葛【二钱】

右为末每一钱至二钱水煎服

异功散

四君子汤加陈皮一方只用参术甘草三味名温中汤

按此二方补脾汤加减法也

益黄散

陈皮【一两】 青皮 诃子肉 甘草【炙】 丁香【二钱】

右为细末每二钱水煎服

没石子丸

木香 黄连【各二分】 没石子【一个】 豆蔻仁【二个】 诃子肉【三个】

右为末饭丸麻子大米饮下十五丸量大小与之按此二方兼止瀉药也

五苓散治泻而渴

方见湿门

羌活膏治小儿泄泻发搐

方见前

温白丸治小儿脾气虚困泄泻瘦弱冷疳洞利或惊天麻【半两】 僵蚕【炒】 白附子 乾蝎南星【浸各一钱】

右为末浸寒食麪为丸如菉豆大每五七丸至二三十丸姜汤下仍於寒食麪内养七日取出

回生散治小儿吐泻

大南星【八九钱已上者】

右用地坑子一个深三寸烧赤入好酒半盏下南星却用炭火三两条盖候南星微裂取出剉再炒放冷为细末每半钱或一字浓煎生姜防风汤调下按此二方升肺脾之气药也

金液丹治吐利日久脾胃虚损手足厥逆神昏睡多露睛口鼻气冷欲成慢惊或身冷脉微自汗小便不禁舶上硫黄十两去砂石为末砂合子盛八分满水和赤石脂封缝塩泥固济晒乾再入水罐内泥固济火煨过候冷

右於乳鉢内研为细末水浸蒸饼丸桐子大或如菉豆大每五十丸至百丸米饮下

按此厥陰例药也

玉露散治伤热吐泻黄色

寒水石 石膏【坚白者各半两】 生甘草【一分】

右同为细末每服半钱或一钱温汤调下

按此阳明例药也

豆蔻香连丸治泄泻腹痛肠鸣

黄连【三分炒】 肉豆蔻 木香【各一分】

右为细末粟米饭丸米粒大每服十丸至二三十丸日夜各四五服米饮下

二圣丸治小儿脏腑或泻或好久不愈

黄连 黄栢【去皮各一两】

右为末入猪胆内煮熟丸如菉豆大每二三十丸米饮下

按此解毒汤变法也与前方不同宜选用

羌活黄芩苍术甘草汤治壮热体重而泻

方见前

茯苓半夏汤治风泻而呕

方见痰饮门

东垣升阳益胃汤

方见补虚门

汤氏助胃膏治小儿气虚乳食不进腹痛泄泻肠鸣陈皮 山药【各四两】甘草【炙】
砂仁白茯苓 藿香 桂【各二两】 肉果人参 木香 丁香 白豆蔻【各一两】

右为末炼蜜丸和成膏每服鸡头大量大小与之按此出太阳例冬月时令中药

局方水浸丹治伏暑伤冷冷热不调霍乱吐利烦渴巴豆【大者二十五个去皮研细去油尽】
黄丹【一两炒】

右研匀用黄蜡熔汁为丸如梧子大每一丸以水浸少顷别以新水吞之量大小与服

按此足阳明药也

小香连丸治热痢腹痛

木香 诃子【各一分】 黄连【半两】

右为末饭和丸菉豆大米饮下十丸至二三十丸频服之

胃风汤

方见泄泻门

全婴方诃梔散治小儿纯下血痢腹痛

诃子【半两烧去核】 梔子仁【一钱半】

右为末三岁半钱米汤调下食前

按此治热之剂也

桃花丸治小儿赤白痢腹痛

赤石脂 川乾姜【炮等分】

右为末糊丸如小豆大三岁三十丸米汤下

按此治寒之剂也

瀉腸丸治小儿下痢赤白後重频并

龙骨 海螵蛸 诃子【炮去核等分】

右为末糊丸如小豆大三岁三十丸米汤下

按此止瀉之剂也

东垣厚肠丸治小儿乳食不能尅化或生腹胀瘦弱痢泻无常色

橘皮【三分】 大麦麩【半钱】 半夏【三分】 枳实【半钱】 苍术【三分】
青皮【二分】 人参【三分】 厚朴【二分】 麴末【半钱】

右为细末煮糊为丸如麻子大每二十丸温水下食前

按此足阳明太陰药也

按已上诸方姑备其例宜兼看泻痢二门而分治之治咳 之剂

麻黄汤治伤风咳嗽喘急无汗

方见寒门

按此治风寒之剂也

败毒散治时气咳

方见前

按此治风温之剂也

紫苑散治小儿咳 上气喉中水鸡之声

射干 紫苑 款冬花【各三钱】 麻黄【四钱】 细辛【二钱】 半夏【一钱】
五味子【六钱】

右?咀三岁儿一钱水煎入姜枣少许

百部饮治小儿喘 日夜不得睡目鲜如突出之状百部 生姜【各八钱】 细辛
甘草【各三钱】 贝母 白术 五味子【各二钱】 桂心【四钱】 麻黄【二钱】

右?咀三岁儿一钱水煎

按此二方太阳例药宜分轻重选用

紫苏子散治小儿欬逆上气因乳哺无度内挟风冷伤肺气或啼未定与乳乳与气相逆不得
下

苏子 诃子 萝卜子 杏仁【炒】 木香 人参【各二钱】 青皮 甘草【各一钱半】

右为末每一钱水煎入姜量大小与服

按此下气导痰药也

葶苈丸治乳食冲肺咳嗽面赤痰喘

甜葶苈【隔纸炒】 黑牵牛【炒】 汉防己 杏仁【炒各一钱】

右为末入杏仁泥取蒸陈枣肉和再捣为丸如麻子大每五丸至七丸生姜汤下

按此下湿之剂也

全婴方雄朱丸治小儿咳嗽有痰潮热

雄黄【一钱半】 巴豆【七粒】 半夏【半两】

右为末糊丸小豆大一岁二丸姜汤下

按此导风痰湿痰乳癖药也

润肺散治小儿涎 不已气急烦渴

麻黄【二钱】 甘草【一钱】 人参 知母【各二钱半】 陈皮【一分】 桔梗 阿胶【炒】
百部【各半钱】

右为末三岁一钱水煎

按此手太陰足太阳药也

人参丸治小儿欬嗽有痰气急恶心

人参 半夏 白术 川姜 南星【炮】

右等分为末姜糊丸小豆大三十丸姜汤下

按此手足太陰药也

参杏膏治小儿久新咳 气急恶心有痰咯血

人参 阿胶 杏仁【炒】 款冬花 五味子 甘草 诃子 贝母

右等分为末炼蜜丸鸡头大三岁儿一丸白汤下

补肺散治小儿久患欬嗽气急有痰

阿胶 糯米【各一两】 马兜铃 甘草【各半两】 杏仁【七十粒】 大力子【一分】

右?咀三岁儿一钱水煎服

按此二方手太陰之的药也

泻肺散治小儿肺气热盛而欬

方见热门泻白散

治呕吐之剂

茯苓半夏汤

方见前泻剂

回生散治小儿吐泻

方见前

异功散

方见前泻剂

藿香散治脾胃虚有热面赤呕哕

麦门冬 半夏 甘草【炙】 石膏【各半两】 藿香【一分】

右为末每半钱至一钱水煎入姜

全婴方消食丸治小儿生冷伤脾腹痛恶心

即局方小七香丸

拔萃定吐紫金核

半夏末【制】 人参 白术 木香

丁香 藿香【各二钱半】

右为末稀糊为丸如李核大後用沈香朱砂各一钱研匀为衣陰乾每一丸枣汤磨下

谢氏烧针丸专主吐逆

府丹不拘多少

右件研极细去皮小枣肉和剂为鸡头大每用针签於灯上烧灰为末乳汁下一丸

按此亦劫剂也已上方唯藿香散出阳明例药余温剂宜随轻重选择出理中例

治疳之剂

钱氏木香丸治小儿疳瘦腹大

木香 青黛 檳榔 豆蔻【各一分】 麝香【一钱半】 续随子【一两】 虾蟇【三个烧存性】

右为末蜜丸菉豆大每三五丸至一二十丸薄荷汤下

按此手足太陰药也

六味地黄丸治小儿疳瘦不行解顙骨热

方见补虚门

全婴方芦荟丸治小儿疳气腹急骨热

芦荟 木香 檳榔【各一分】 黄连【一两】 芫荇【去皮】 青皮
陈皮【各半两】 巴豆【三七粒同上四味炒黄去豆】 虾蟇【酒浸炙黄去骨一两】

右为末猪胆丸小豆大三岁三十丸米汤下

按此手少陰手足太陰药也

蒸鸡丸治小儿疳癆骨蒸潮热盗汗瘦弱腹急面黄食不生肌肉

黄连【二两】 柴胡【一两】 芫荇 鹤虱【各半两】 秦艽 知母 紫芩
史君子【去殼炒各一两】

右为末黄雄鸡一只重一斤笼之专以大麻子饲之五日後去毛及肠肚净入前末子以綫縫之取小甌子先以黑豆铺甌底三寸安鸡四旁及上黑豆盖之早蒸至晚取肉研和硬入酒糊丸如小豆大二岁二十丸加減与之米饮下忌猪肉

按此手少陰足少阳药也

肥儿丸截疳杀?治腹胀消食

史君子【肉】 萝卜子【各二两】 小红枣【肉一两】 糖球子【末】 飞罗麪【各二两】

右取好黄土和作一炉墩子内底下萝卜片铺一层次将史君子肉铺在当中次又铺萝卜一

层上安枣肉盖於上以泥封固其外以炭火煨至内三物熟烂了取出以飞麪球子末和匀丸如麻子大量儿大小与服米饮下

按此足阳明太阳药也

五疳消食丸消疳杀?退热磨积进食

史君子【肉炒】 麦蘖【炒】 陈皮

麦麴【炒】 茺菑 草龙胆

黄连【炒】 糖球子【等分】

右为细末陈米饭为丸如黍米大每十丸米饮下按此手少陰太陰药也然疳证自有虚实积热等致不同已上诸方未能以尽其变学者自宜推格治之治疮疹之剂

升麻汤治小儿疮疹未出发热

升麻 葛根 芍药 甘草

右?咀水煎

按此足太阳阳明药也

钱氏四圣散治疮疹出不快

紫草 木通 甘草【炙】 枳殼【炒】

右等分为粗末每一钱水煎服陈氏加黄芩

按此足阳明手太陰药也

调肝散治疮疹大盛宜服此令疮不入眼

生犀【二钱半】 龙胆草【一钱】 黄芩【半两】

大黄【二钱】 桑白皮【半两炒】 鈎藤子【各一钱】 石膏【半两】 麻黄瓜蒌 甘草

右为粗末每二钱水煎服食後

按此手太陰足阳明药也内外实者非此不可

化毒汤治豆疮已出不快

紫草茸 升麻 甘草【炙等分】

右?咀入粳米五十粒水煎

按此足阳明药也

鼠黏子汤治豆疮欲出未能得透皮肤热眼赤心烦咽嗑不利

鼠黏子【炒四钱】 荆芥穗【二钱】 甘草【一钱】 防风【半钱】

右为细末沸汤点服去防风名消毒散

按此太阳少阳药首论温平者此也

活血散治豆疮出不快

白 药【炒一钱】

右为末酒调服腹痛温热水调下

按此正的太陰药也海藏云张和之治四肢出不快加防风大效

犀角地黄汤治疮疹出太盛便血或鼻衄

犀角【一两】 生地黄【二两】 赤 芍【三分】 牡丹皮【一两】

右?咀三岁儿一二钱水煎服

按此足太陰少陰手太陰药也

葛根麦门冬散治小儿热毒班疮出多心神烦闷葛根 麦门冬【各三钱】 人参【二钱】
石膏【半两】 升麻 甘草 茯苓【各二钱】 赤 芍【一钱】

右?咀每三钱水煎服

按此足阳明手太陰药也

连翹散治疮痘发热

连翹 防风 梔子 甘草

右为末水煎

按此治热在外而不厥少阳药也

如圣饮子治疮疹毒攻咽嗑肿痛

桔梗 甘草 鼠黏子【炒各一两】 麦门冬【半两】

右为末竹叶同煎二三钱

按此手太陰少陰药也

解毒防风汤

防风 地骨皮 黄芪 药

荆芥 枳殼 鼠黏子【各半两】

右为粗末每服四五钱水煎

按此手足太陰药也

真牙汤治?疮黑陷者

人牙二枚烧存性入麝香少许

右为末用紫草升麻汤调下

御药院方无价散治?疮不出黑陷欲死者

人猫猪犬粪腊月内烧为灰

右为末每一字蜜汤调服量大小与之

按此二方劫剂也

当归丸治疮疹能食而大便秘

当归【半两】 甘草【一钱】 黄连 大黄【各二钱半】

右将归熬膏子入下三味末为丸渐加服至利为度按此足阳明厥陰药也

枣变百祥丸

红牙大戟【去骨一两】 青州枣【去核三十个】

右用水一碗同煎至水尽为度去大戟不用将枣焙乾可和作剂从少至多服至利为度

按此足少陰药也

陈氏异功散治小儿痘疮欲靨之际头温足指冷或腹胀泻渴气促或身不壮热闷乱不寧卧则哽气烦渴咬牙

木香【三钱半】 官桂【二钱】 当归【三钱半】 人参【二钱半】 茯苓【二钱】 陈皮
厚朴【二钱半】 白术【二钱】 半夏【一钱半】 丁香
肉豆蔻【二钱半】 附子【一钱半】

右为粗末每二三钱水煎入姜枣

按此足太阳少陰厥陰手足太陰药也

谨按已上疮疹诸方有升散补脾凉血泻火清神攻下温中补劫之法不同学者自宜取择

局方凉膈散治疮痘已出发热作渴脉实闷乱便实者

方见火门

谨按疮疡已发有寒热温凉不同形气虚盛之异已上二方宜对脉证选用有起死回生之効也足阳明药

地骨皮鼠黏子汤 本方加地骨皮

桔梗甘草鼠黏子汤

桔梗甘草栀子汤

防风 药甘草汤 并三味治证见前

升麻加紫草汤

升麻汤加紫草

荆芥甘草防风汤

三味治证见前

紫草甘草枳殼汤

四圣散減木通

连翹防风汤

前连翹散減栀子

并治证见前论

玉机微义卷五十