

先醒斋广笔 记

繆希雍

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
先醒斋广笔记自序	6
先醒斋广笔记卷一	7
先醒斋广笔记卷二	27
先醒斋广笔记卷三	55
先醒斋广笔记卷四	89

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案先醒斋广笔记四卷明缪希雍撰希雍字仲醇常熟人明史方技传附见李时珍传中天启中王绍徽作 将録以东林诸人分配水浒传一百八人姓名称希雍为神医安道全以精于医理故也是编初名先醒斋笔记乃长兴丁元荐取希雍所用之方裒为一编希雍又增益羣方兼采本草常用之药增至四百余品又增入伤寒温病时疫治法故曰广笔记希雍与张介宾同时介宾守法度而希雍颇能变化介賓尚温补而希雍颇用寒凉亦若易水河间各为门径实各有所得力朱国祯涌幢小品记天启辛酉国祯患膈病上下如分两截中痛甚不能支希雍至用苏子五钱即止是亦足见其技之工矣乾隆四十五年九月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

先醒斋广笔记自序

予既不事王侯独全微尚幽栖自遂远于尘累以保天年然无功及物亦岂道人之懷乎于是搜辑医方精求药道用存利济随所试效病家藏之好事者抄録转相授受复多获验先是长兴丁客部长孺手集予方一册命之曰先醒斋笔记梓行于世板留岩邑未便流通交游中多索此书者卒无以应予适旅泊金沙文学庄君敛之时时过从请增益羣方兼采本草常用之药增至四百余品详其修事又增入伤寒温病时疫治法要防并属其季君 之鏤板流行传之远迩庶穷乡僻邑舟次旅邸偶乏明医俾病者按方施治以瘳疾苦则是书或有补于世也夫敛之曰善时天啓二年歲次壬戌仲冬既望东吴繆希雍自序

先醒斋广笔记卷一

明 繆希雍 撰

中风

治法大畧

凡言中风有真假内外之别差之毫厘谬以千里何者西北土地高寒风气刚猛真气空虚之人猝为所中中脏者死中腑者成废人中经络者可调理而瘳治之之道先以解散风邪为急次则补养气血此真中外来风邪之候也其药以小续命汤桂枝麻黄生熟附子羌独活防风白芷南星甘草之属为本若大江已南之东西两浙七闽百粤两川滇南鬼方荆 梁三州之域天地之风气既殊人之所禀亦异其地絕无刚猛之风而多湿热之气质多柔脆往往多热多痰真陰既 内热弥甚煎熬津液凝结为痰壅塞气道不得通利热极生风亦致猝然僵仆类中风证或不省人事或言语謇澁或口眼歪斜或半身不遂其将发也外必先显内热之候或口干舌苦或大便闭澁小便短赤此其验也刘河间所谓此证全是将息失宜水不制火丹溪所谓湿热相火中痰中气是也此即内虚暗风确系陰阳两虚而陰虚者为多与外来风邪迥别法当清热顺气开痰以救其标次当治本陰虚则益血阳虚则补气气血两虚则气血兼补久以持之设若误用治真中风药如前种种风燥之剂则轻变为重重则必死祸福反掌不可不察也初清热则天门冬麦门冬甘菊花白 药白茯苓括萎根童便顺气则紫苏子枇杷叶橘红郁金开痰则贝母白芥子竹沥荆沥括萎仁次治本益陰则天门冬甘菊花懷生地当归身白芍药枸杞子麦门冬五味子牛膝人乳白胶黄柏白蒺藜之属补阳则人参黄蓍鹿茸大枣

乙卯春正月三日予忽患口角歪斜右目及右耳根俱痛右颊浮肿仲淳曰此内热生风及痰也治痰先清火清火先养陰最忌燥剂

真苏子【三钱】广橘红【三钱】括萎根【三钱】贝母【四钱】天门冬【三钱】麦门冬【五钱】白芍药【四钱】甘草【七分】鲜沙参【三钱】明天麻【一钱】甘菊花【三钱】连翹【二钱】河水二钟半煎一钟加竹沥童便各一杯霞天胶四五钱饥时服日二剂初四至初九日加懷生地黄【三钱】初十加牛膝【四钱】黄柏【二钱】十三日去连翹加石斛【三钱五分】五味子【七分】白藕荳【二钱】干葛【八分】十八日去连翹天麻干葛白藕荳加莲肉【四十粒】

正月廿二日定方 初日进二剂后每日一剂

天门冬【三钱】麦门冬【五钱】生地黄【五钱】白芍药【四钱】牛膝【酒蒸五钱】炙甘草【一钱】贝母【二钱】括萎根【二钱】莲肉【四十粒】酸枣仁【六钱】真苏子【二钱】黄柏【一钱五分】甘菊花【二钱五分】鲜沙参【三钱】广橘红【二钱】

五味子【八分】河水三钟煎一钟饥时服

二月十二日定方

天门冬【三钱】麦门冬【五钱】真苏子【二钱五分】广橘红【二钱五分】白茯苓【三钱】贝母【三钱】黄柏【一钱五分】括萎根【二钱】五味子【七分】鲜沙参【三钱】参【二钱】甘菊花【二钱五分】甘草【一钱五分】酸枣仁【五钱】生地黄【四钱】白芍药【四钱】牛膝【五钱】莲肉【六十粒】十日后去括萎根三月廿八日去参加石斛【三钱】至五月尽病始全愈【前方中曾加参二钱服二剂反觉浮火上升即去之】

丸方

胡麻仁【三觔即黑芝麻】桑叶【酒拌蒸晒三觔】何首乌【三觔九蒸九晒人乳拌至一倍两倍】苍术【二觔米泔浸洗净刮去皮拌黑豆蒸又拌蜜酒蒸又拌人乳蒸凡三次蒸时须烘晒极干气方透】牛膝【如法二觔】甘菊花【二觔】怀生地【三觔】天门冬【去心酒蒸二觔】柏子仁【二觔】黄檗【一觔】枸杞子【二觔】

又丸方【先时合成病中仲淳以为可服日进两许百日后方易前丸】

人参【去芦人乳浸饭上蒸切片烘干十两】五味子【去枯者打碎蜜蒸烘干十两】山茱萸肉【八两】沙苑蒺藜【一半炒为末一半打糊和药十二两】川巴防天【如法去骨以甘菊花枸杞子同酒浸蒸晒干八两】莲须【金黄色者良六两】枸杞子【去枯者及蒂人乳润过烘干十二两】川牛膝【去芦酒蒸十两】天门冬【六两】莲肉【去心每粒分作五六块瓦器内炒焦黄忌铁十二两】白茯苓【如法人乳拌晒八两】黄柏【蜜炙四两】砂仁【炒二两】怀生地【十二两】鹿角霜【酥拌炒研如飞麴十二两】鹿茸【六两火燎去毛切片酥炙】菟丝子末【八两】加甘菊花【六两】炼蜜同蒺藜糊和丸如梧子大每六钱空心饥时各一服淡盐汤吞

治右半身不遂【右属气虚】

白蒺藜【炒去刺】甘菊花 何首乌【如法】黄蓍【蜜炙】天门冬【去心】麦门冬【去心】人参【去芦】漆叶【酒拌九蒸九晒各一觔】白茯苓【水澄】白芍药【酒炒】牛膝【去芦酒蒸各十二两】川续断【十两】橘红【八两】炼蜜丸梧子大空心白汤下忌食白菜菹牛肉牛乳

若在左者属血虚宜加当归身熟地黄鹿角胶柏子仁【各觔许】杜仲【八两酥炙】如火盛多痰肺经有热者去人参加青蒿子鳖甲【各十二两】如左右臂俱转掉不便者亦用此方

王宇泰治臧位宇气虚痰多脾胃有湿晚年半身不遂神效

人参【一觔】半夏麴【二觔姜汁竹沥制】白术【半觔】牛膝【一觔】天门冬【一觔】懷生地【一觔】用长流水煎成膏再入鹿角胶【一觔】虎骨胶【一觔】霞天胶【一觔】河间府梨膏【一觔】炼蜜【二觔】各制膏和匀重汤煮一日夜出火气每空心临卧取半酒杯以竹沥梨汁各二杯人乳桑沥各一杯和匀重汤顿热调服

寒

伤寒时地议并六经治法

夫伤寒者大病也时者圣人所不能违者也以关乎死生之大病而药不从时顾不殆哉仲景医门之圣也其立法造论后之明师如华佗孙思邈辈莫不宗之汉末去古未远风气犹厚形多壮伟气尚敦彪其药大都为感邪即病而设况南北地殊厚薄不侔故其意可师也其法不可改也循至今时千有余年风气浇矣人物脆矣况在荆扬交广梁益之地与北土全别故其药则有时而可改非违仲景也实师其意变而通之以从时也如是则法不终穷矣故作斯议备列其方稍为损益以从时地俾后之医师知所适从庶几患斯疾者可免于夭枉尔

辨验外感真伪法

凡外感必头疼其疼也不间昼夜探其舌本必从喉咙内干出于外多兼烦躁不烦躁者即轻证也不头疼而发热不发热而头疼头虽疼而有时暂止口虽干而舌本不燥骨虽疼而头不疼虽渴而不欲引饮至夜或偶得寐遇食不好亦不恶居处虽若怔怯而神气安静凡若此者皆非伤寒也

三阳治法总要

太阳病 其证发热恶寒恶风头痛项强腰脊强遍身骨痛脉虽浮洪而不数多不传经烦躁脉数急者是欲传经宜先发汗以解表邪 其药以羌活汤为主羌活三钱前胡二钱甘草八分葛根二钱生姜三片枣二枚杏仁九粒【去皮尖研烂】水煎服秋深冬月应用此方亦可量加紫苏葱白如冬月天气严寒感邪即病服此药不得汗本方加麻黄一钱生姜四片共前七片得汗勿再服如病人自觉烦躁喜就清凉不喜就热兼口渴是即

欲传入阳明也若外证头疼遍身骨疼不解或带口渴鼻干目疼不得卧即系太阳阳明证羌活汤中加石膏知母麦冬大剂与之得汗即解 如自汗烦躁头疼遍身骨疼不解者羌活一钱桂枝七分石膏一两二钱麦冬六钱知母三钱竹叶一百二十片白芍药二钱甘草八分 如冬月即病太阳证恶寒畏风头疼遍身骨疼自汗不渴宜用桂枝八分 药二钱甘草一钱大枣二枚生姜一片 太阳病不解热结膀胱其人如狂血自下者愈其外证不解者不可下当先解表表证罢少腹急结者乃可下之桃仁承气汤无蓄血证大承气汤正阳阳明病正阳阳明者

胃家实是也 其证不大便自汗潮热口渴咽干鼻干呕或干呕目眴眴不得眠畏人声畏木声畏火不恶寒反恶热或先恶寒不从旋发热甚则谵语狂乱循衣摸床脉洪大而长宜急解其表用竹叶石膏汤大剂与之不呕无汗与葛根汤亦湏大剂若表证已罢脉缓小便利是病解矣 若表证罢后邪结于里大便闭小便短赤宜用调胃承气汤或小承气汤下之下后按其腹中不作痛而和病即已解如作痛是燥粪未尽也再用前药下之以腹中和二便通利为度

阳明病不能食若其人本虚勿轻议下

阳明病头 欬而咽痛者用葛根甘草桔梗麦冬四味浓煎数数与之 阳明病无汗小便不利心中懊憹者当发黄急用梔子麦冬淡豆豉大剂浓煎与之如已见身黄急加茵陈为君主之 阳明病衄血此缘失于发汗宜用荆芥二钱葛根三钱麦冬五钱牡丹皮一钱五分蒲黄二钱茅根二两侧柏叶二钱生地黄三钱浓煎与之兼饮童便 阳明病心下硬满者此邪未入于腹中慎勿下之用竹叶石膏汤加括萎一个捣碎桔梗二钱黄连一钱 阳明病邪结于里汗出身重短气腹满而喘潮热手足濇然汗出者此大便已鞭也六七日已来宜下之用小承气汤不行换大承气汤勿大其剂若大便不鞭者慎勿轻下 阳明病发汗不解腹满急者亟下之 伤寒六七日目中不了了睛不和无表证大便难宜承气汤下之

阳明病下之早外有热手足温不结胃心中懊憹不能食但头汗出梔子豉汤主之

阳明病发潮热大便溏胸满不去者与 小柴胡汤去人参加括萎黄连 阳明病自汗出或发汗后小便利津液内竭大便虽硬不可攻之须俟其自大便用蜜导或胆导法通之

大下后六七日不大便烦不解腹满痛本有宿食宜再用承气汤下之 食谷欲呕属阳明非少阳也胸中烦热者竹茹汤主之竹茹三钱麦冬五钱枇杷叶三大片芦根三两内无热证者小便利口不渴此为阳明虚也吴茱萸汤主之吴茱萸二钱人参三钱生姜一钱五分大枣三枚水煎日三服 凡阳明病多汗津液外出胃中燥大便必鞭鞭则谵语以小承气汤下之若一服谵语止者勿再服 阳明谵语发潮热脉滑而数者小承气汤主之服药后腹中转气者更与一服若不转气者勿更与之若服药后次日不大便脉反微濇者里虚也为难治勿复议下 阳明病下血谵语者此为热入血室汗止在头用荆芥三钱葛根三钱黄芩一钱五分麦冬五钱牡丹一钱五分生蒲黄二钱浓煎以童便对饮之 阳明病脉浮 咽燥口苦腹满而喘发热汗出恶热身重若下之则胃中空虚客气动膈心中懊憹舌上有胎者梔子豉汤主之

若渴欲饮水舌燥者白虎汤加人参主之 若脉浮发热口渴小便不利者猪苓汤主之

阳明病协热下利者宜六一散心下痞者以黄连括萎汤调服之

脉浮迟表热里寒下利清谷者四逆汤主之附子干姜甘草 趺阳脉浮而濇小便数大便鞭其脾为约麻子仁丸主之麻仁十二两芍药四两枳实四两大黄八两厚朴三两杏仁六两蜜丸如梧子大每用十丸日三服 阳明实则譫语虚则郑声郑声者重语也直视譫语喘满者死下利者亦死发汗多若重发其汗譫语脉短者死脉和者不死

若吐若下后不解不大便五六日或至十余日日晡时发潮热不恶寒独语如见鬼状若剧者发则不识人循衣妄撮惕而不安微喘直视脉 者生濇者死【濇者阳证见陰脉也】微者但发热譫语者大承气汤下之利勿再服 阳明病发狂奔衣而走登高而歌此阳明实也以承气汤亟下之如便不结者大剂白虎汤灌之石膏四两麦冬二两知母一两五钱加大青一两甘草七钱 太阳阳明病协热下利者宜六一散以黄连煎汤调服之 太阳阳明并病六七日表证仍在其人发狂者以热在下焦少腹当硬满小便自利下其血乃愈当用桃仁承气汤又二

阳并病太阳证罢潮热汗出大便难讞语者宜

大承气汤

少阳病其证口苦咽干往来寒热脇满痛胸满或痛耳聋脉弦细头痛发热者属少阳少阳不可发汗发汗则讞语胃和者当自愈不和者则烦而悸伤寒三日少阳脉小者欲已也凡太阳病不解传入少阳者脇下鞭满干呕不能食往来寒热未经吐下脉沉者与小柴胡汤柴胡二钱四分人参九分黄芩九分甘草九分半夏一钱五分生姜九分大枣二枚水煎温服日三加减法若胸中烦而不呕去半夏人参加枳实一枚若脇下痞鞭去大枣加牡蛎二钱半若渴者去半夏加人参枳实芍药根若腹中痛者去黄芩加芍药三钱若心下悸小便不利者去黄芩加茯苓二钱若不渴外有微热者去人参加桂一钱【夏勿用】温覆取微汗愈若欬者去人参大枣加五味子一钱少佐以干姜

阳明少阳并病必下利脉滑而数有宿食也当承气汤下之

若已吐下发汗温针讞语柴胡汤证罢此为坏病知犯何逆以法治之三阳合病脉浮大见关上但欲睡眠目合则汗药用百合一两麦门冬五钱炙甘草一钱知母二钱竹叶五十片枳实二钱鳖甲如法三钱白芍药二钱三阳合病腹满身重讞语遗尿白虎汤加百合主之

伤寒六七日无大热其人烦躁者此为阳去入阴故也

伤寒三日三阳为尽三阴当受邪其人反能食而不呕此为三阴不受邪也

三阴治法总要

三阴病其证有二一者病发于三阳不时解表以致邪热传入于里虽云阴分病属于热粪结宜下腹满不可按宜下有燥粪协热下利宜下腹痛下利宜芍药黄芩炙甘草以和之如便脓血即加滑石黄连佐以升麻干葛如邪虽入里粪犹未结宜清其热渴者用白虎汤竹叶石膏汤不渴或心下痞者宜黄连黄芩芍药枳实麦冬枳实芍药以清之或邪未结于下焦少腹不坚痛而误用芒硝以伐真阴洞泄不已元气将脱宜用人参白术炙甘草大枣干姜芍药大剂与之不止佐以升麻升麻葛根柴胡之类

若从无阳邪表证从不头疼发热寒邪直中阴经此必元气素虚之人或在极北高寒之地始有是证法宜温补以接其阳附子人参干姜官桂大剂与之阳回寒退即以平补之剂调之勿过用桂附以防其毒

三阴各经见证悉从仲景伤寒论法治之如少阴咽痛咽中生疮声不出用苦酒汤到咽即效故知古人立法非今人可及也

春温夏热病大法

冬伤于寒至春变为温病大都头疼发热或渴或不渴三阳证俱然亦间有先微寒后即发热

者大抵发热其常也药用辛温佐以辛寒以解表邪太阳宜羌活汤阳明宜白虎汤无汗不呕者间用葛根汤少阳往来寒热等证不可汗吐下宜和解小柴胡汤渴者去半夏加栝蒌根耳聋热盛去人参加麦冬知母栝蒌根渴亦加之至夏变为热病其表证大约与春温同但热比于温则邪气更烈耳解表用白虎汤竹叶石膏汤有太阳证则加羌活有少阳证则加柴胡黄芩如发斑白虎汤竹叶石膏汤加 参梔子桔梗鼠粘连翘大青小青青黛大剂与之二证若大便秘宜按之其邪已结于内便鞭宜察邪结中焦小承气汤调胃承气下之邪结下焦少腹坚痛始用大承气汤下之

伤寒瘟疫其不可治及难治者皆属下元虚

伤寒瘟疫三阳证中往往多带阳明者以手阳明经属大肠与肺为表里同开窍于鼻足阳明经属胃与脾为表里同开窍于口凡邪气之入必从口鼻故兼阳明证者独多

邪在三阳法宜速逐迟则胃烂发斑或传入于里则属三阴邪热炽者令阴水枯竭于法不治矣此治之后时之过也

近代医师鹵莽既不明伤寒治法又不识杂证类伤寒往往妄投汗下之药以致虚人元气变证丛生元气本虚之人未有不因之而毙者矣戒之哉汗下之药焉可尝试也

时气伤寒 除阴症不可服

苦参【一两】水酒各一碗煎八分重者水醋各半服之一汗而愈不论伤寒从近立效本草云天行尤良

史鹤亭太史丁亥春患瘟疫头痛身热口渴吐白沫昼夜不休斃师误谓太史初罢官归妄投解郁行气药不效又投以四物汤益甚诸斃谢去谓公必死遣使迎仲淳至病二十余日矣家人具以前方告仲淳曰误也瘟疫者非时不正伤寒之谓发于春故谓瘟疫不解表又不下使热邪弥留肠胃间幸元气未尽故不死亟索淡豆豉【约二合许炒香】麦门冬【两许】知母【数钱】石膏【两许】一剂大汗而解时大便尚未通太史问故仲淳曰昨汗如雨邪尽矣第从病津液未回故大便不通此肠胃燥非有邪也令日食甘蔗二三株兼多饮麦门冬汤不三日去燥粪六十余块而愈

章衡阳铨部患热病病在阳明头痛壮热渴甚且呕鼻干燥不得眠诊其脉洪大而实仲淳故问斃师斃师曰阳明证也曰然问所投药曰葛根汤仲淳曰非也曰葛根汤非阳明经药乎曰阳明之药表剂有二一为葛根汤一为白虎汤不呕吐而解表用葛根汤今吐甚是阳明之气逆升也葛根升散故用之不宜白虎汤硬石膏知母甘草加麦门冬竹叶名竹叶石膏汤石膏辛能解肌镇坠能下胃家痰热肌解热散则不呕而烦躁壮热皆解矣遂用大剂竹叶石膏汤疏方与之且戒其仲君曰王翦取荆非六十万人不可李信二十万足矣临别去嘱曰斯时投药五鼓瘥天明投药朝瘥已而果然或谓呕甚不用半夏何也仲淳曰半夏有三禁渴家汗

家血家是也病人渴甚而呕是阳明热邪炽盛劫其津液故渴邪火上升故呕半夏辛苦温而燥有毒定非所宜又疑其不用甘草何也曰呕家忌甘仲景法也高存之隣人卖腐者伤寒发叻两日夜不省人事其子乞方仲淳问曰汝父当时曾头疼身热乎曰然曰曾服汗药乎曰未也曾吐下乎曰未也仲淳因索伤寒书检之其方类用干姜柿蒂丁香及附子等温热之药未条仅载白虎汤一方仲淳思之曰伤寒头痛身热口渴本属阳明热邪传里故身凉发叻未经汗吐下邪何从而出第其人年老多作劳故于白虎汤加人参【三钱】二剂立起

于润父夫人娠九月患伤寒阳明证头疼壮热渴甚舌上黑胎有刺势甚危仲淳投竹叶石膏汤索白药子【豎马病者】不得即以井底泥涂脐上干则易之一日夜尽石膏十五两五钱病瘳越六日产一女母子并无恙

存之一家人妇伤寒来乞方仲淳已疏方与之矣见其人少年问曰若曾病此乎曰然曰愈几日而妻病曰八九日日曾有房欲否曰无之仲淳故曰若有房欲此方能杀人也其人即置方不取遂以裨裆雄鼠粪麦冬韭白柴胡二剂势定更用竹皮汤二三剂全愈

姚平子伤寒头疼身热舌上胎胸膈饱闷三四日热不解奄奄气似不属者一豎以其体素弱病从虚甚意欲投参少许仲淳叱曰参一片入口死矣亟以大黄【一两】瓜蒌【二枚】连子切片黄连枳实下之主人惊疑不得已减大黄之半二剂便通热立解遂愈

张太学璇浦内人患热入血室发狂欲杀人白下医以伤寒治之煎药未服陈锡 邀仲淳往诊仲淳云不可服其药投一剂而安先与童便继与凉血行血安心神药遂定

翁文学具茨感冒壮热舌生黑胎烦渴势甚剧时稽勲诸昆仲环视挥涕羣医束手仲淳以大剂白虎汤一剂立苏或问仲淳治伤寒有秘法乎仲淳云熟读仲景书即秘法也【白虎汤中曾加人参三钱】

四明虞吉卿因三十外出疹不忌猪肉兼之好饮作泄八载矣忽患伤寒头痛如裂满面发赤舌生黑胎烦躁口渴时发谵语两眼不合者七日洞泄如注较前益无度其尊人虞仰韶年八十二矣客寓庄斂之处方得长郎凶问懷抱甚恶膝下止此一子坐待其毙肠为寸裂斂之向余曰此兄不禄仰韶必继之即不死八十二老人挟重赀而听其扶櫟东归余心安乎万一有此惟有亲送至鄞耳余闻其语为之惻然急往诊其脉洪大而数为疏竹叶石膏汤方因其有腹泻之病石膏止用一两病初不减此兄素不谨良一友疑其虚也云宜用肉桂附子斂之以其言来告余曰诚有是理但余前者按脉似非此证岂不数日脉顿变耶复往视其脉仍洪大而数余曰此时一投桂附即发狂登屋必不揀矣一照前方但加石膏至二两斂之曰得毋与泄泻有妨乎余曰热邪作祟此客病也不治立殆渠泄泻已八年非暴病也治病须先太甚急治其邪徐并其夙恙除之急进一剂夜卧遂安即省人事再剂而前恶证顿去不数剂霍然但泻未止耳余为疏脾肾双补丸方更加黄连干葛升麻以痧痢法治之不一月泻竟止八载沉痾霍然【阙】失仰韶耄矣别余归老拜谢垂涕谓父子得以【阙】皆余赐也

庄敛之一庄仆因受寒发热头痛如裂两目俱痛浑身骨内疼痛下元尤甚状如刀割不可堪忍口渴甚大便日解一次胸膈饱胀不得眠已待毙矣敛之以其证来告为疏一方干葛【三钱】石膏【一两半】麦门冬【八钱】知母【三钱半】羌活【二钱半】大括萎【半个连子打碎】枳壳【一钱】桔梗【一钱】竹叶【一百片】河水煎服四剂而平此太阳阳明病也贫人素多作劳故下体疼痛尤甚以羌活去太阳之邪石膏竹叶干葛知母麦门冬解阳明之热括萎枳壳桔梗疏利胸膈之留邪故遂愈

一奴伤寒热解后复下血不止主人以痢药投之更甚仲淳云此伤寒失汗之余症也用地榆麦门冬知母竹叶以代仲景诸血证药遂愈

常熟吴见吴在京邸时有小青衣患伤寒愈而复复而愈愈而再复不知其几赵文肃公谓仲淳曰此非兄不能救他人亦不肯往仲淳亟驰诊之病人面色黄白六脉微弱大便不通胸中不快亦不思食曰此为伤寒百合坏证之余邪且退矣胸中不快虚而气壅非实邪也不大便者从病津液枯气弱不能送也投以人参【五钱】麦门冬【两许】枳壳【炒八钱】尽剂立解而瘥

庄敛之一仆因伤寒后劳复发热头痛腹内作泻势甚危急余为疏方山梔仁【四钱】枳实【二钱】豆防【一两】川黄连【二钱】干葛【三钱】调六一散五钱服二剂热退泻止头痛亦愈但不思饮食为去山梔枳实黄连加鳖甲【四钱】炙甘草【二钱半】麦门冬【五钱】不数剂而愈

梁谿一男子素虚春中感冒头痛肌痛发热羌活【二钱】麦门冬【三钱】炙甘草【一钱】紫苏【一钱五分】北细辛【七分】前胡【一钱五分】次日头痛止热未退口渴仲淳用芍药五味子人曰风邪未退遽用酸敛何也曰因人而施尔一杯即愈麦门冬【三钱】甘草【一钱】括萎根【二钱五分】干葛【一钱五分】桑白皮【三钱】桔梗【一钱】白芍药【一钱】五味子【五分】

从祖近湖公少年因房劳食犬肉伤寒诸豎以其虚也攻补兼施至发狂登屋奔走呼号日夜令壮夫防守者几月余急走使延朱远斋远斋先命煎人参膏二觔以待用润字号丸药数钱下之去黑粪无筭势遂定奄奄一息隣于死矣徐以参膏灌之至百二十日全瘳

治伤风后耳聋 仲淳定

甘菊花【二钱】石菖蒲【忌铁一钱】柴胡【六分】括萎根【二钱】贝母【去心二钱】前胡【一钱】甘草【六分】北细辛【四分】苏梗【一钱】桑白皮【忌铁二钱】加竹沥一杯不拘时服

赵和斋年六十患外感予以他事请见延至中堂云偶因劳倦体疲正欲求教予为之诊视细按其六部并察其形神谓云翁病属外邪非劳发也须着意珍重时葛存诚在坐予私谓云此

病是极重外感邪气有内陷之兆恐难挽回别去三日大雨中复来邀防则神气已脱脉无伦次问其所服何药云石膏汤予云病证固重服药又差无汗发热非阳明症何得用石膏此太阳症未经发汗邪气传里里虚水涸不胜邪热真气已脱必不可救时犹以予言为妄不两日而毙矣

魏季尝室产后饮食不节复感风寒遂致发热谵语喘咳气逆恶露绝不至势甚急迫予谓此症俱系外来客邪尚属可救设正气虚脱现诸症者必无幸矣何以见之以脉气浮大有力故也用大剂疏风消食之药二剂便霍然先是有用白术归芎等补药几为所悞【二条附】暑

治伤暑

高存之次郎童时夏月身热十昼夜止饮白汤诸医汗之不解以麻仁丸下之热如故惶急中仲淳忽至诊曰此伤暑也白虎汤是其本方因误汗下虚甚加人参【三钱】一剂微汗瞑少顷热解又疏一方防其疟仍用人参【二钱】兼健脾清暑导滞之剂未几症作如方饮之症止痢又作存之不得已于生脉散中加益元散饮之儿疳羸甚诸暨曰数日后死矣举家惶急禳祷纷纭仲淳复自松陵来存之语之故仲淳曰生脉益元散得之矣不诊而谛视儿问糜甘否曰甘大呼曰病去矣存之且喜且讶儿旦夕虞不保兄言何易也仲淳曰视儿目光炯炯且饮食味甘是精神已王胃气转矣寻果脱然起臧玉涵子歳半盛夏咳 七日因浴受惊又伤食大热倦顿三日不敢与药目翳唇皴舌干谋之仲淳曰此暑病也当与白虎汤玉涵曰腹泻石膏无害乎曰先以天水散探之服二钱少顷药夹痰而吐微汗身凉黄昏复热又以天水散二钱不效仲淳曰其为暑症无疑当以白虎汤加人参因儿患肺热且止仲淳再诊之曰暑邪客于皮肤分肉有热无寒是为痒症断当用白虎汤连服二剂不效鼻露眼开口不纳气势甚危叩仲淳曰此正气不足胜邪也偶思刺症论有云凡症先时一食顷乃可治过时则失之也又云无刺熛熛之热无刺浑浑之脉无刺漉漉之汗意者服药不得时耶将前药并剂煎露一宿鸡鸣温服之病顿失更不须调理精神渐复经年无病以此知仲淳察病望气灵心慧眼又知服药贵及时当早服晚投当晚服早投当热而温当温而热均失之也 此玉涵自定案

任邱裴在涧弃家逃禅持戒茹素遍遊五岳足迹几满天下偶客金坛寓西禅寺僧舍酷暑中坐卧小楼日持準提咒三千念佛号三万忽患头痛如斧劈身热发躁口干日饮冷水斗余渴犹未解自分必死庄斂之怜其旅病时过视疾一日急走仓头召斂之永诀以所携书画玩器尽授斂之泣而言曰兄其为我收藏吾死后切勿用世俗礼葬我惟以两缸盛吾尸其中以三尺地埋之耳斂之涕泗填胸束手无防余时将游梁谿阳羡间斂之命余仆克勤相追归视其脉知系受暑为疏竹叶石膏汤方斂之如方制药躬为煎服不二剂发热口渴俱止几十剂病始退旋加健脾药十余帖而安

伤暑霍乱神方 包瑞溪学宪传仲淳累验

丝瓜叶【一片】白霜梅肉【一枚】并核中仁同研极烂新汲水调服入口立瘥

又方 马铭鞠传

用粟米连壳捣碎煎汤温服下口立愈屡试神效

又方 梁谿顾圣符传

取藊豆叶捣汁一碗饮之立愈

又方

高存之家仆妇患此仲淳以砂仁【一两炒研】盐【一撮】沸汤调冷定服一剂愈伤冷物者加吴茱萸【四钱】

又方

用青蒿嫩叶手揉如豆大井水吞下数枚立愈

治中暑昏 烦闷欲死

挖地深尺余取黄土以新汲水调化饮一二瓯立愈

又方

取田中泥浆涂脐上令壮者溺其上并溺口中得咽立起

治中暑大小便不通

用田螺三枚捣烂入青盐三分摊成膏贴在脐下一寸即愈

疟

如发热口渴先服此方一二剂

麦门冬【五钱】知母【蜜炙二钱五分】硬石膏【研细五钱】竹叶【三十片】粳米【一撮】煎八分不拘时服

治热多作吐头痛口渴无汗或汗少

白茯苓【三钱】橘红【二钱】山楂肉【二钱】竹茹【二钱】知母【蜜炙二钱】麦门

冬【四钱】硬石膏【研细五钱】

治寒多热少无汗

干姜【一钱生用】柴胡【一钱五分】当归广皮吴茱萸白术【土炒各三钱】如吐呕而寒甚者此方去柴胡当归加人参【二钱】半夏【姜汁炒一钱】如泻去当归加茯苓【二钱】如有食脾胃不健第二方去当归加白豆蔻末【七分】如寒热相半及先寒后热者第二方加黄芩【一钱】如汗多加白芍药【酒炒三钱】黄耆【蜜炙三钱】去柴胡如伤食必恶食第二方加山查【五钱】白豆蔻末【七分】神麴【炒二钱】厚朴【姜汁炒一钱】如渴甚者不可用半夏当用第一方加天花粉【二钱】倍用麦门冬知母须三四剂方可换健脾胃药或兼用健脾胃药如白茯苓白术广陈皮白芍药人参白豆蔻山查等剂是也如寒甚只用第二方加人参【五钱】生姜【五片】如寒热俱甚久不止者前方中去白术干姜加鳖甲【醋炙研极细二钱】地骨皮【二钱】麦门冬【五钱】牛膝【五钱】

太阳经症头痛遍身骨痛项脊觉强主方如渴则兼阳明矣

活【二钱此系太阳主药】前胡【一钱五分】猪苓【一钱】泽泻【炒一钱】陈皮【二钱】恶寒加姜皮甚则加桂枝渴则加干葛渴甚汗多加麦门冬知母竹叶白术从病用黄耆虚甚加人参

治秋深寒热甚而汗多者

人参白虎汤中加桂枝素有血证及咳者勿用参桂阳明经症热甚渴甚烦躁恶人声恶心不眠主方

硬石膏【研细】麦门冬【各五钱加至一两五钱】知母【去皮蜜炙三钱加至一两】竹叶【四十片加至一百片】粳米【一撮】水三大碗煎一碗不拘时服如症初发汗未大透本方加干葛【三钱】痰多本方加括萎根【三钱】橘红【三钱】竹沥【一杯】如呕本方去竹叶换竹茹【三钱】橘红【三钱】汗多本方去干葛加人参【三钱元气虚倍之】白术【三钱】如兼恶寒甚指爪色黯本方加桂枝【一钱五分】头痛骨痛又兼前症此太阳阳明也本方加活【二钱】如在秋末冬初又兼恶寒加桂枝【一钱】每日下午别服开胃健脾消食消痰兼除寒热症邪药一剂方具于后

麦门冬【五钱】鳖甲【三钱加至一两】广橘红人参【各三钱加至五钱素有肺火者勿用】白豆蔻仁【四分加至七分】白茯苓【三钱】乌梅肉【一枚】白术【二钱加至四钱胃热及肺火咳勿用】牛膝【酒洗二钱加至八钱】水三钟煎一钟研入白豆蔻末乘

热服如热甚而呕加木瓜【三钱】枇杷叶【三大片】竹茹【二钱】如虚寒胃弱有痰有湿因而呕者加半夏【矾汤泡一钱加至三钱姜汁十匙加至半杯渴而便燥者勿用】

少阳经症往来寒热相等口苦而呕或兼耳聋胃脇痛主方

小柴胡汤【柴胡黄芩半夏甘草人参】

鳖甲【三钱至七钱】牛膝橘红【各三钱至五钱】如恶食本方加枳实【炒一钱】白荳防【五分】如有肺火本方去人参半夏加麦门冬【五钱】牛膝鳖甲

橘红如故如爪黯便燥及痰盛方中去半夏加当归【三钱】竹沥【一大杯】

恶寒甚本方加桂枝【一钱至二钱】生姜皮【一钱至三钱】如兼阳明渴欲引饮此少阳阳明也本方去半夏加石膏【八钱】麦门冬【五钱】竹叶【三十片】每日下午别服开胃健脾消食消痰兼除寒热症邪等药如前方

太陰脾症寒从中起寒甚而后热呕甚呕已乃衰主方

桂枝【二钱】人参【三钱】白芍药【酒炒三钱】姜皮【三钱】水二钟煎一钟空心饥时各一服再煎五六分下午别服开胃健脾消食消痰兼除寒热症邪药如前方

少陰经症恶寒心烦而渴小便艰澀无汗躁欲去衣或手足冷或欲饮水或咽痛主方

鳖甲牛膝【各三钱至七钱】知母【二钱至五钱】桂枝【一钱至二钱】细辛【五分】橘红【三钱】白茯苓【三钱】猪苓【一钱】泽泻【一钱】人参【三钱有肺火勿用】姜皮【一钱至三钱】水二钟煎八分空腹饥时各一服如寒甚倍人参姜皮如热甚倍鳖甲牛膝加乌梅肉有痰加竹沥下午别服开胃健脾消食消痰除寒热药大暑如前方厥陰经症色苍苍然善太息不乐主方

桂枝【一钱至三钱】柴胡【一钱至三钱】鳖甲【二钱至四钱】当归【三钱至五钱】橘红【二钱至三钱】牛膝【二钱至五钱】何首乌【五钱】水三碗煎一碗空心饥时服便燥及昏晕欲死本方加麦门冬竹沥下午别服开胃健脾消食消痰除热药如前方如有肺火及内热去桂枝加知母【三钱】

治阳分间日症寒热俱甚烦躁舌胎

硬石膏【三钱】知母【五钱】麦门冬【一两五钱】竹叶【一百片】括萎根【六钱】贝母【五钱】广陈皮【三钱】发日加人参【五钱有肺热者勿用】姜皮【一钱】隔夜煎成露一宿五更服

治隔一日一发先热后寒热少寒多午时发头疼筋骨痛唇燥口干恶心无汗后半夜凉天明

头痛止

活【二钱头不痛即去之】干葛【二钱五分】陈皮【三钱】麦门冬【五钱】知母【二钱】生姜皮【二钱】炙甘草【五分】何首乌【五钱】水二钟煎八分露一宿天明温服

治胎前疟热多口渴方

黄芩【酒炒二钱】柴胡【一钱】硬石膏【五钱至二两】麦门冬【去心五钱至一两】知母【去皮蜜炙忌铁二钱至四五钱】广橘红【二钱至三钱】白茯苓【三钱】竹叶【五十片至一百片】
胃虚加人参【二钱至三五钱】河水二碗煎八分饥时服发日五更温服滓再煎六分并进如热甚寒亦甚本方加生姜皮【二钱至四钱】白术【三钱】

治胎前疟寒甚不渴少汗方

人参生姜皮【各五钱至一两】广橘红【去白二钱至四钱】河水二碗煎八分五更温服再煎五六分并进寒甚者阳气虚而下陷也益阳气则寒自止邪自散矣故应多服人参如汗多并加黄耆【五六钱】

治产后疟主方

当归【三钱至五钱】柴胡【一钱】鳖甲【四钱至七钱】牛膝【一两】白茯苓【三钱】广橘红【三钱】生姜皮【一钱至二钱】干姜【炒黑四分至六七分】水二钟煎八分露一宿五更温服如渴加麦门冬【六钱】竹叶【五十片青蒿三五钱去生姜皮干姜】
如渴甚更加知母【三钱】括萎根【三钱】痰多并加贝母【四钱】
如脾胃弱加人参【三钱至一两】元气虚亦如之有肺热者去人参加白芍药【四钱】
如汗多加黄耆【二钱至五钱】寒甚加桂枝【七分至一钱二分】干姜【炒黑七分】如恶露未尽亦如之并加益母草【五钱】黑豆【炒一两】苏木【五钱打碎别以绵裹入药煎】热多加青蒿三四钱

治三日疟寒多

当归【酒洗二钱五分】桂枝【一钱五分】干姜【二钱】广陈皮【五钱】何首乌【洗净切片五钱】人参【三钱至一两】

治三日疟寒热俱甚或早晏不齐作止不一

鳖甲 牛膝 何首乌 广橘红 麦门冬【各五钱】知母【三钱】桂枝【一钱五分】姜皮【

三钱无汗倍之】乌梅【一枚】干葛【三钱汗多或呕去之无汗倍之】水三钟煎一钟露一宿发日五更温服查再煎七分余日空心饥时服
如渴加石膏【一两】竹叶【五十片】渴止去之气虚加人参【五钱】
如汗多加黄耆【三钱】兼便燥加归身

【五钱】不思食及食难化加人参【五钱】白豆蔻仁【七分】厚朴【一钱五分】如泄去石膏知母竹叶倍白术加茯苓【三钱】车前子【二钱】肉豆蔻【一钱】泽泻【一钱】痰多加竹沥一大杯

治三日疟热多渴甚

鳖甲牛膝何首乌麦门冬【各五钱加至两二钱】知母【四钱加至七钱】橘红【五钱】石膏【八钱加至三两】竹叶【三十片至百片】水三大碗煎一碗露一宿发日五更温服如恶食加青皮【醋炒一钱五分】白豆蔻仁【七分】
无汗或有汗而少加干葛【四钱】汗多本方加人参白术气虚倍加人参
如呕本方加竹茹乌梅便燥加当归
得汗渴止去石膏干葛下午别服开胃健脾消食消痰药如前法

治三日疟寒多热少汗少或无汗

人参白术【各五钱至一两】橘红【四钱至六钱】桂枝【二钱至三钱】姜皮【五钱至一两】白豆蔻仁【七分】水三碗煎一碗露一宿发日五更温服渣再煎七分连进不拘时空心饥时服

治三日疟陰分【黄氏姑服之立起】

何首乌【一两】牛膝【一两】当归【五钱便燥用胃弱勿用】鳖甲【醋炙一两】广橘红【三钱】水三钟煎一钟空心服立愈虚极者加人参【一两】

治三日疟

人参【一两】生姜皮【五钱】水二钟煎八分空心服于中父病疟初服此不效仲淳坚持此方加参至【三两】生姜皮【至一两五钱】二服即起

治疟邪未尽而痢作者先服此方二三剂

鳖甲【三钱】广陈皮【去白三钱】白茯苓【三钱】柴胡【一钱】白芍药【三钱】干葛【一钱】如恶寒寒热交作加柴胡【二钱】生姜皮【一钱】
如渴去姜皮加寒水石【七钱】滑石【四钱】

如无汗加干葛【二钱至三四钱】可服参者加参【三钱】

次服方【服之滞下必止】

干葛【二钱五分】升麻【醋炒七分】莲肉【去心四十粒炒】炙甘草【一钱】乌梅肉【二枚】广橘红【三钱】白藕豆【炒二钱】鳖甲【二钱】白茯苓【二钱】白芍药【酒炒三钱】黄芩【阙炒一钱五分】川黄连【土炒二钱加至三钱】河水二钟半煎八分调水飞过滑石末【四钱】兼吞滞下丸二三服送以葛根汤或莲子汤亦佳如腹痛以炒砂仁三四钱浓汤吞滞下丸

治从症不已似劳证

当归【酒洗五钱便燥者用】牛膝【酒浸五钱】鳖甲【三钱】何首乌【白采鲜者五钱】广橘红【三钱】生姜皮【二钱五分】柴胡【一钱五分已上二味热多无汗者用有汗则去之】贝母【三钱】水三钟煎一钟加竹沥一大杯发日五更时服隔夜先煎露一宿临服时再重汤顿温盖症者暑气为病也暑得露即解世鲜知者

防症方【夏秋不辍必无症矣】

何首乌【十二两】真茅山苍术【十两】半夏【六两】橘红【八两】人参【四两】白茯苓【八两】藿香叶【三两】白豆蔻仁【一两五钱】为细末米粉糊加姜汁丸如菉豆大每五钱下午及临卧白汤吞

仲淳年十七时为症所苦凡汤液丸饮巫祝靡不备尝终无裨于病徧检方书迺知症之为病暑邪所致也经曰夏伤于暑秋必痎症遂从暑治不旬日瘳后数以意消息散邪之外专养胃气痰多者消痰气虚者补气血虚者益血又分臟腑经络各从其类以施向导即经年不愈者竟霍然起矣

沈少卿中丞请告时苦症仲淳往诊之惫甚曰再一发死矣先生何方立止之仲淳曰何言之易也疏三方作五剂一日夜饮尽次早症止先二剂清暑用大剂竹叶石膏汤加桂枝以其渴而多汗也次二剂健脾去积滞用橘红白豆蔻白术茯苓谷蘖乌梅白藕豆山查麦芽最后一剂人参【一两】生姜皮【一两】水煎露一宿五更温服尽剂而效

顾伯钦患症仲淳之门人疏方以白虎汤加人参一两一庸工云岂有用参至两数者乎改用清脾饮二十余剂而症不止体羸弱仲淳至笑曰此虚甚非参不可吾徒不谬也投以大剂参芪一剂而瘥

人参【一两】黄芪【蜜炙一两】知母【蜜炙五钱】陈皮【二钱】干葛【二钱】甘草【八分】石膏【五钱】

庄敛之妾患疟寒少热甚汗少头痛不嗜饮食余为诊脉洪数而实用麦门冬【五钱】知母【三钱五分】石膏【一两五钱】竹叶【六十片】粳米【一撮】橘红【二钱】牛膝【一两】干葛【三钱】白茯苓【三钱】白扁豆【三钱】三剂不应忽一日凡寒热者再昏迷沉困不省人事势甚危急敛之过余云恐是虚弱前方石膏知母竹叶似近寒凉非其治也余亦心疑为去石膏等而加人参二钱已别矣余追想前脉的非属虚急令人往视令其将参煎好勿轻与服待按脉加斟酌焉次早往视其脉洪数如初急止人参勿服惟仍用前方而加石膏至二两何首乌五钱令其日进二剂疟遂止

庄敛之前患疟妾越一载忽头痛如裂心内杂乱不清喉作痛失音舌破咳 有痰胸膈饱胀恶心不思饮食如此者四日矣日渐增剧陡发寒热如疟状寒少热多热后频出汗方解平时有心口痛证并作下元无力如脚气状敛之疑为伤寒余曰此受暑之证即前年所患疟而势加剧耳法当先去其标令以石膏【二两】麦门冬【五钱】知母【三钱】橘红【二钱半】牛膝【五钱】鳖甲【四钱】竹叶【一百五十片】贝母【三钱】括萎根【三钱】河水煎服三四剂心内清头疼喉痛失音舌破饱胀寒热俱愈但恶心不思食如故而心口痛下元无力不减余为去石膏知母竹叶鳖甲贝母括萎根而加延胡索【二钱】五灵脂【七分】生蒲黄【一钱五分】薏苡仁【八钱】木瓜【二钱】石斛【三钱】白扁豆【三钱】白芍药【三钱】竹茹【二钱】枇杷叶【三大片】炙甘草【四分】几十剂而愈

高存之甥女嫁后患胎疟从不止仲淳云病在阴分以人参【五钱】牛膝【一两】兼健脾清暑一剂而止

章衡阳子室患疟后失音寒热愈甚告急仲淳仲淳云此必疟时不遇明眼人妄投半夏故也投以大剂麦门冬 白茯苓 炙甘草 鳖甲 知母 贝母数剂瘳

治停食发疟

梁溪王兴甫偶食牛肉觉不快后遂发疟饮食渐减至食不下咽已而水饮亦不下白汤过喉间呕出作碧色药不受小便一滴如赤茶大便闭诸医束手仲淳忽至视之令仰卧以指按至心口下偏右大叫因询得其由用丸药一服至喉辄不呕水道渐通次日下黑物数块如铁丸药用矾红和平胃散作末枣肉和丸白汤下三钱其病如失再以人参【五钱】麦门冬【五钱】橘红【三钱】白芍药【三钱】水煎服四日起

【阙】丸方

【阙】虫【煨存性研极细一两半】广橘红【十两五钱】射干【晒干一两阙】人参【八钱】肉桂【去皮六钱】干漆【煨烟起存性研如飞尘五钱】为极细末醋煮稀糯糊和丸如梧子大每四钱空心淡盐汤下痢

滞下如金丸【滞下俗呼痢疾】

真川黄连【真姜汁浸隔土如法炒九次不拘觔两】细末姜汁和水跌丸如梧子大贮磁器中封固如胃弱以莲子四十粒橘红【二钱】人参【二钱】升麻【醋炒七分】煎汤吞四钱腹痛以白芍药【三钱】炙甘草【一钱】黄檗【一钱】升麻【醋炒七分】煎汤吞四钱已后各条加減皆以丸药四钱为率里急甚以白芍药【三钱】炙甘草【一钱】当归【二钱】升麻【醋炒七分】煎汤吞四钱

后重甚加防榔【一钱五分】枳殼【一钱】木香汁【七匙】调入

口渴及发热调滑石末【三钱】去木香

小便赤澁短少或不利加滑石末【三钱】调入各症汤中吞药

赤多加乌梅肉【二钱】山查肉【三钱】红麴【二钱】兼里急用当归等加入如前方白多加吴茱萸【汤泡一次七分】黄芩【酒炒一钱五分】恶心欲吐即噤口痢多加人参石莲肉绿色升麻【醋炒可用至八分或一钱】白藕豆【炒三钱】白芍药【酒炒三钱】从痢不止加肉豆蔻【一钱】莲肉【去心炒黄三钱】砂仁【炒一钱五分】人参【三钱】白藕豆【炒去殼二钱】炙甘草【一钱】橘红【二钱】白芍药【酒炒三钱】白茯苓【二钱】细末炼蜜丸如梧子大每服三钱米汤下若积滞未尽加滑石末【三钱】每服四钱白汤吞水泻无积滞者用人参橘红炒砂仁汤吞三钱

凡治滞下非元气壮实多噉能食之人慎勿轻用大黄巴豆牵牛甘遂大防等下药凡产后滞下积滞虽多腹痛虽极不可用大黄等药行之致伤胃气遂不可救但用人参白芍药当归红麴升麻【醋炒】益母草加炙甘草一倍滑石末四五钱足矣若恶露未尽兼用乳香没药【各七分五厘】炒砂仁末【一钱】从之自愈血虚可加阿胶【二钱蛤粉炒】凡胎前滞下宜用黄芩黄连白芍药炙甘草橘红赤麴枳殼莲肉【炒】畧用升麻未滿七月勿用滑石证急者必须用之不拘此例防心夺命丹【治虚弱人患痢及痢从脾胃虚者】

肉豆蔻【一两五钱】白芍药【酒炒六两】炙甘草【一两】广橘红【三两】白藕豆【炒三两】滑石【六两】赤麴【炒研四两】莲肉【去心炒焦黄五两】绿色升麻【醋炒二两五钱】川黄连【切片拌好酒同吴茱萸浸二宿瓦上炒干分开连萸各贮净黄连三两白痢加茱萸一两】细末炼蜜丸如菉豆大每服三钱白汤吞如噤口痢并虚弱人即以前方中去豆蔻另用人参三钱煎浓汤吞

加味滞下丸

川黄连【白痢如前法赤痢用湿槐花炒去槐花八两】白芍药【酒浸切片炒五两】乌梅肉【二两】滑石【水飞如法六两】炙甘草【二两】升麻【绿色者醋炒三两】莲肉【去心炒如法六两】白藕豆【炒去殼三两】红麴【簸净炒五两】干葛【二两】为细末蜜丸每五钱白汤吞饥时服证重者日三服

又滞下丸

川黄连【如法制一觔】滑石末【八两】防榔【四两】炙甘草【三两】木香【为末和水隔汤燂二两五钱】枳殼【炒五两】白芍药【酒炒五两】细末荷叶汤稍加姜汁糊成

丸如菉豆大每服三四钱乌梅汤吞 若加吴茱萸白藕豆陈皮各三两治白痢作四样一无木香一无防榔枳壳一加当归一加吴茱萸白藕豆橘红去防榔枳壳燥热烦渴恶心者勿用木香 元气虚弱者勿用防榔枳壳 积滞多而后重者用防榔枳壳里急色赤者用当归惟恶心呕吐及不思食者勿用 久痢加肉豆蔻

治血痢痛甚汤液【仲淳传自包瑞溪学宪试之神效】

白芍药【酒炒五钱此一味仲淳加入者】枳壳【槐花同炒去槐花五钱】升麻【醋炒七分】真川黄连【姜汁炒五钱】滑石末【三钱】乳香没药【各七分五厘】山查肉【三钱】甘草【五分】

治噤痢神效

绿色升麻【醋炒一钱】人参【三钱】莲肉【去心炒焦黄三十枚】水一钟煎半钟饮之蜜和为丸更妙每四钱一服白汤吞

治久痢红中兼有青色白痰间发热

真川黄连【槐花炒一钱五分】白芍药【酒炒二钱】广陈皮【三钱】人参【一钱】莲肉【炒十二枚】肉豆蔻【八分】炙甘草【五分】山查肉【二钱】绿升麻【醋炒五分】砂仁【炒一钱】滑石末【二钱五分】调服

治噤口痢吐不纳药者

人参【一两】川黄连【姜汁制五钱】石莲子【炒去心五钱】水二钟煎八分小杯缓服之吐止痢亦止

大黄丸【痢初起壮实者可用胃弱者禁施】

川大黄【切片蜜蒸一觔】白芍药【酒浸切片炒六两】甘草【炙三两】防榔【四两】木香【切片不见火为末一两】枳壳【炒四两】细末炼蜜同水煎木香和捣为丸如菉豆大白菜菹汤吞三钱重者五钱以行两三次腹中爽快为度胃气虚极之人勿轻用之积滞重而元气虚者以人参汤吞 孕妇以人参缩砂汤吞行后另用人参丸补之

予家夏秋患此甚众辄依前方疗之岁为常并以应里中之索方者一一神验黄聚川年兄太夫人年八十余偶患痢胃膈胀绝粒数日予以升麻人参黄连莲肉方授之参至一两诸子骇甚再问予予曰迟则不救矣一剂啜粥再剂腹中响一泄痢即止今年九十余尚健也陈赤石督学因校士过劳感暑遂滞下纯血医皆难之陈刺史曰此非缪仲淳莫能疗也使者旁午得之吴门一日夜驰至武林仲淳诊得其所由遂用人参【五钱】升麻【七分】炙甘草【一

钱五分】乌梅【二枚】红麴【一钱五分】川黄连【三钱】白芍药【二钱】莲肉【四十粒】煎调滑石末【五钱】二剂而愈督学曰痢止矣心摇摇不能阅卷奈何仲淳曰此劳心太过暑因客之故尔加竹叶干葛酸枣仁一剂遂平

姚公远防子病痢一医误下之遂下纯血气喘身热不思食仲淳偶至亟以人参【四五钱】石莲子白芍药升麻橘红草石蚕白藕豆滑石末炙甘草投以一剂喘平血止又数剂痢止仲淳临别嘱公远曰儿百日内不出痘则生以下多元气未复故也未几即痘果殇

家弟稚端防病痢甚日夜数十次服数剂即愈

人参【三钱】吴茱萸【滚汤泡七次一钱】川黄连【姜汁炒一钱】后二味饭锅上蒸水煎至八分温服如不受以药一匙间米汤一匙渐渐饮之胃气渐复如头痛发热前方中加寒水石【六钱即硬石膏】干葛【一钱】别调六一散四钱冷水服

庚子秋华氏妹归宁忽痢日夜几百行身热发呕一呕数十声不絶吴医争欲下之且曰补即死矣时仲淳以先王母病留湖滨怜其促治后事甚亟曰既已知危何不以药试之服如金丸因思饮予固守仲淳前方以人参【五钱】炒黄连白藕豆升麻滑石炙甘草橘红再进如金丸二剂势稍定更数服愈华水部至今感服

友人虞元静房中人方孕五月患滞下腹痛日不下数次为定此方甫服一钟觉药行至腹即解一次痛亦随已滞下全愈

川黄连【四钱】白芍药【三钱】黄芩【三钱】白藕豆【二钱】莲肉【四十粒】橘红【一钱半】枳壳【三钱】红麴【二钱】干葛【一钱半】升麻【五分】炙甘草【一钱】乌梅肉【一枚】

治毒痢及发疹时疹毒下利方

鲜金银藤【即忍冬藤】数两煎浓汁三大碗入地榆【五钱】川黄连【槐花湿拌炒四钱】黄檗【二钱】黄芩【二钱】白芍药【酒炒三钱】炙甘草【二钱】升麻【绿色者醋炒六分】同煎至一碗调水飞过滑石末五钱不拘时服

治湿热腹痛

一少年贵介暑月出外饮食失宜兼以暑热遂患滞下途次无药病偶自止归家腹痛不已遍尝诸医之药药入口痛愈甚亦不思食仲淳视之曰此湿热尔其父曰医亦以湿热治之而转剧仲淳曰投何药曰苍术黄连厚朴枳壳陈皮等仲淳曰误也术性温而燥善闭气故滞下家忌之郎君阴虚人也尤非所宜更以滑石一两为细末以牡丹皮汁煮之别以白芍药【酒炒五钱】炙甘草【二钱】炒黑干姜【五分】水煎调滑石末服之须臾小便如注痛立止

秦公蕃病痢医误投澁剂一服痢止湿热无自而出遍攻肢体骨节间以致项强目赤肩臂腕膝足胫俱发肿痛甚不能转侧仲淳疏方寄之用白芍药石斛牛膝木瓜黄檗薏苡仁炙甘草车前子茯苓痛虽止尚不能转侧更用蒺藜菊花何首乌胡麻黄檗炙甘草复逾年愈其始病时一医稍投参术痛极欲死此系本证陰虚有火又加湿热暑湿交攻故现此证名痢风陰虚火多故不受补又不宜燥惟微寒清平之剂调之从之自愈凡治滞下与大肠滑泄自利不止不同滑泄自利不止有可澁之道故古人有间用罌粟殼及诃利勒以止其滑泄若夫滞下本属湿热滯滯不行法宜疏利药忌兜澁大肠者肺之腑也大肠既有湿热留滯则肺家亦必有热肺乃华盖之藏经曰脾气散精上归于肺通调水道下于膀胱是肺气喜通利恶闭澁故古人药性中每云通肺气其意槩可见已倘误用罌粟殼诃利勒使湿热无所宣泄肺气不得下行非惟滞下增剧湿热熏蒸上干乎肺则胀闷气逆不得眠不思食诸证至矣又有从 不愈緣于肺虚有火法当清肺润肺忌用澁 闭气之药设若误用粟殼诃子俾火壅于肺不得下降若兼参术半夏即死不旋踵矣世医往往蹈此覆辙相寻卒无悟者聊为论著敢告方来

已上症痢二门诸方皆仲淳斟酌所定因证加減与时消息可谓详且尽矣然不尽用方书所载投之辄效百不爽一盖独开门户者也

外有时行疫痢一证三十年前间或有之今则往往夏末秋初沿门阖境患此其证大都发热头疼口渴烦躁下痢溺澁甚者一日夜行百次或兼发斑疹势甚危迫世医妄指为漏底殊不知此是时气使然因世人稟赋渐薄积感湿蒸厉气所致治法当清热解毒表散为急如升麻葛根柴胡黄连黄芩之类或热甚渴甚前药中可加寒水石更有别证以意加減切忌下行破气收澁如大黄芒硝防榔枳实乌梅粟殼等犯此者多致不救【上一条附】

先醒斋广笔记卷二

明 繆希雍 撰

脾胃

黄病有积神方【一平头试之神验】

苍术【炒】厚朴【姜汁炒】橘红 甘草 山楂肉 白茯苓 麦芽【各二两】防榔【一两】
绿矾【火煅研细一两五钱】为末枣肉丸如梧子大每服一钱白汤吞日三服凡服矾者忌
食荞麦河豚犯之即死

治老人伤冷食及难化之物

生姜或紫苏煎汤置浴锅内令病者乘热浸汤内以热手揉心胃肚腹气通食化矣

又方

蕲艾灸胃脘并肚气从口鼻出立愈

治胃脘痛属火证者【一女婢患此数十年一剂良已】

橘红 淡豆豉 山梔仁【炒黑各三钱】生姜【五片】枳壳【一钱】水一钟半煎七分服

又治胃脘痛 仲淳疗瑀母方

橘红【二钱】白豆蔻仁【五分】香附【童便炒忌铁研细三钱】延胡索【醋煮切片粒
粒金黄色者良二钱五分】白芍药【酒炒四钱】甘草【四分炙】白茯苓【三钱】白木
香【五分磨汁入煎药肉】紫苏子【研二钱】紫苏梗【二钱】河水二钟煎一钟不拘时
服【豆蔻仁口嚼之下药】

又方 口渴肩骨疼酸痛不能饮食者神效

真紫苏子【隔纸焙研细】橘红 白茯苓【各三钱】竹茹【二钱】白芍药【酒炒四钱】
木 香【忌铁三钱】石斛【酒蒸三钱】酸枣仁【炒爆研四钱】麦门冬【五钱】甘草【
五分】白豆蔻仁【四分先嚼下】饥时服

治胃中有痰欲吐 陈潜斋传

广橘红 萎仁【各四两】姜汁竹沥和丸梧子大食后服治脾经痰饮五更咳 喉中如有物咽之不下服之甚验 仲淳立

白茯苓【四两】苏子【另研如泥入药同捣三两】白荳蔻仁【七钱】贝母【去心三两】括萎根【三两】薄荷叶【一两五钱】连翹【三两】硼砂【另研如飞麪七钱】广橘红【四两】麦门冬【去心三两】猫儿残叶【六两】山查肉【三两】麦芽【炒取淨麪一两五钱】神麪【炒一两五钱出峡江县】霞天膏麪【四两】枇杷叶【四两】为极细末怀山药粉糊和丸如麻子大白汤吞三四钱

治痰嗽吐不已胃膈有冷物上塞饮热汤稍下

橘红 白茯苓 苏子【研细】 萎仁【蛤粉拌炒研细各三钱】半夏【姜汁炙一钱】遠志【去心甘草汁浸蒸一钱五分】白荳蔻仁【五分】吴茱萸【汤泡去梗一钱】河水二钟半煎八分饥时服加姜汁五匙竹沥一杯化痰生津噤化丸 治胶痰不治陰虚痰火

五倍子拣粗大者安大鉢头内用煮糯米粥汤浸盖好安静处七日后常看待发芽黄金色又出黑毛然后将箸试之若透内无硬即收入粗瓦鉢中搗如酱连鉢日中晒至上皮干了又搗匀又晒至可丸方丸弹子大晒干收用其味甘酸能生津化痰

治痰

用柘木叶捣煎汤不时呷渐渐痰少兼治膈气呕吐赵太学文度顽痰积血仲淳以霞天膏加化痰消瘀之剂治之而愈

痰厥

金坛庠友张逢甫内人方食时触暴怒忽仆地气遂絕延一医视之用皂角灰吹鼻中不嚏用汤药灌之不受延至午夜谓必不治医告去逢甫急叩庄一生一生过视之六脉尚全而独气口沈伏细寻之滑甚曰此肝木之气逆冲入胃胃中素有痰致痰夹食闭胃口气不得行而暴絕也但歷时久汤药不入矣急宜吐之可活所谓木鬱则达之也亟令覆其身垂首向床下以鹅翎蘸桐油啓齿探入喉中展指引吐出痰与食才一口气便稍通再探吐至两三口便觉油臭以手推翎但不能言一生曰无妨矣知其体怯不宜多吐急煎枳橘推荡之药灌之尽剂而苏后以平肝和胃药调理数剂复故此因暴怒怒则气上逆痰因气壅故现斯证耳所谓痰厥也治厥往往有误予故表其证以示后来云

饮

饮与痰不同痰胶黏而饮惟水治法亦异饮虽有五总之或緣饮酒过多酒后发渴多饮茶汤或好饮冷酒或因天暑烦渴多饮凉水及冰因酒而得者则多湿热因饮冷而得者则多寒湿

或因鬱而得者则属木气侵脾药亦小有不同要以降气燥湿散鬱健脾行水为宗乃治法之要领也

方

半夏【姜汁明矾浸透四两】广陈皮【去白四两】白茯苓【四两】猪苓【二两】泽泻【米泔浸炒二两】旋复花【蒸三两】厚朴【姜汁炒一两五钱】白术【土炒二两】枳实【炒二两】人参【一两】酒湿者加川黄连【一两】木香【五钱】寒湿者加苍术【二两】木香【五钱】白豆蔻【五钱】因郁者加紫苏【四两去苍术】右为细末稀米糊入姜汁和丸如菉豆大每五钱淡姜汤下连进三服空心饥时皆可服如卒急不及治丸取二十倍中一倍作汤入豆蔻仁末木香汁姜汁和饮亦立效

丹阳葛文学字十内人因作家劳鬱患饮证每发吐呕不已肠如欲出所吐俱清水动以盆桶计日夜不止不思饮食就医金坛诸医以健脾行气理鬱清痰药投之愈剧困顿待毙字十计无复之矣适予偶从茗上来庄斂之与字十姻戚也向余语故余即与斂之偕往视脉审证知为饮无疑乃用前方加人参三钱一剂吐止再剂霍然随啖粥糜脾气渐复至今每病作检余方服之即平

云间康孟修患寒热不食久之势甚危以治寒热剂投不应徧检方书与王宇泰议投五饮丸立瘥盖饮证原有作寒热之条故治饮病自去矣

治瘵方【朱比部大复传】

真茅山苍术十觔洗净先以米泔浸三宿用蜜酒浸一宿去皮用黑豆一层拌苍术一层蒸二次再用蜜酒蒸一次用河水砂锅内熬浓汁去渣隔汤煮滴水成珠为度每膏一觔和炼蜜一觔白汤调服

一老人專用此方八十余身轻趨捷甚于少年

蕪州何刺史年七十余守桐川饮啗过少年叩其故曰平生服苍术丸每日数钱

真茅山苍术四觔如法洗浸去皮切片以桑椹懷生地何首乌各一觔熬浓汁至无味而止去渣滤清下苍术浸之晒干复浸汁尽为度细末又以人乳拌匀晒干数次约重数两炼蜜为丸白汤或酒吞

治蛊胀由于脾虚有湿

黄司寇葵峰中年病蛊得异方乃真茅山苍术末也每清晨米饮调三钱服不数月强健如故终身止服术七十余终少停疾作矣

又方

通血香【一钱】取小葫芦一个不去子膜入香在内再入煮酒仍以所开之盖合缝封之以酒入锅悬葫芦酒中挨定不可倾侧盖锅密煮以三炷线香为率煮时其香透达墙屋外煮完取葫芦内子膜并药烘干共为细末每服一钱空心酒送下间五日服一钱服尽葫芦内药约有五六钱之数病已释然矣通血香陕西羊羴客人带来苏杭有

又方

徐文江夫人病蛊胀张涟水治之百药不効张曰计穷矣记昔年西山有一姬患此意其必死后过复见之云遇一方上人得生徐如言访姬果在也问其方以陈葫芦一枚去顶入酒以竹筴松其子仍用顶封固重汤煮数沸去子饮酒尽一吐防死吐后腹渐寛调理渐愈盖元气有余而有痰饮者也若肾虚脾弱者宜用金匱肾气丸十全大补汤去当归加车前子肉桂

沈孝通观察中年无子患中满蛊胀势孔棘静养郭外小园中憭然独坐独宿食淡者五年归脾汤六味地黄丸朝暮间服不辍连举二子

顾奉常务远目黄脾气弱仲淳疏方用

山茵陈【三钱】人参【三钱】薏苡仁【三钱】莲肉【焙三钱】木通【八分】黄连【酒炒一钱】山梔仁【炒八分】白朮【土炒一钱】石斛【酒蒸三钱】皆治疸之剂以事冗未服既而身目皆黄小便亦赤乃服仲淳先见饮前药稍愈一按摩者投以草汁药酒脾败遂不起临没下瘀血数升亦蓄血证也以其年迈不絶欲故尔前方尚有茯苓【二钱】

施灵修乃兄七年前曾患疸症服草药愈后复发坐多气多劳故草药不効服田螺发胀一日夜大作寒热因发渴小便如油眼目黄且赤手足黄紫仲淳以阙血发黄服后药大小便通黄及渴俱减

橘红【一钱五分】红麴【炒研二钱】山查肉【五钱】鬱金汁【十五匙】薏苡【六钱】木【忌铁三钱】牛膝【去芦酒蒸五钱五分】麦门冬【去心五钱】车前子【二钱五分】赤茯苓【三钱】川通草【五分】白芍药【酒炒四钱】竹茹【二钱】河水二钟煎八分饥时服三日后加人参三钱

孙俟居比部病腹中若有症瘕不食不眠烦懣身热仲淳投以人参芍药茯苓麦门冬木通枣仁石斛方甫具史鹤亭太史至见方中有大剂人参骇曰向因投参至剧此得无谬乎仲淳曰病势先后不同当时邪未退滞未消故不宜今病久饱胀烦闷者气不归元也不食者脾元虚也不眠而烦者内热津液少也今宜亟用此药矣四剂而瘳后复病仲淳诊之曰此陰虚也非前证矣更以麦门冬白芍药甘枸杞五味子生地黄车前子而热遂退

神效沉香丸又名聚宝丹

真沉香【二钱】真麝香【八分】血竭【一钱五分】乳香【一钱五分】缩砂仁【二钱】木香【二钱】胡索【一钱】没药【五分】细末糯米糊丸如弹子大用辰砂【一钱五分】为衣治男子翻胃呕吐饮食不通此是胃腕寒痰结阻诸医无効屡试神验烧酒磨服男妇腹痛诸气作痛产后血气攻心用陈酒磨服如热气痛葱汤嚼下小儿天吊作痛啼叫不已葱汤磨服

太学顾仲恭遭乃正之变复患病在牀延一医者诊视惊讶而出语其所亲云仲恭病已不起只在旦晚就木可速备后事仲恭闻知忧疑殊甚举家惶惶计无所出来请予诊脉按其左手三部平和右手尺寸无恙独關部杳然不见谛视其形色虽羸而神气安静予询之曾大怒乎病者首肯云生平不善怒独日来有拂意事恼怒异常予曰信哉此怒则气并于肝而脾土受邪之证也经云大怒则形气俱絶而况一部之脉乎甚不足怪第脾家有积滞目中微带黄色恐成黄疸两三日后果遍体发黄服茵陈利水平肝顺气药数剂而瘳李文孺四年前曾患黄疸嗣后每诊其脉甚沈瀯肝脾尤甚望其面色如黄土予尝私语相知云文孺色脉不佳恐非久于人世者且又好劳损神多怒伤气后疸果复发不起【已上二条附】

泄泻

天地之间动静云为者无非气也人身之内转运升降者亦气也天地之气不和则山川为之崩竭人身之气不调则肠胃失其转输外则风寒暑湿之交侵内则饮食劳倦之不节肠胃因之而变此泄泻之由也致疾之端匪一治疗之法自殊经云春伤于风夏生飧泄春者木令风为木气其伤人也必土脏受之又风为阳邪其性急速故其泄必完谷不化洞注而有声风之化也古之所谓洞风是也宜先以风药发散升举之次用参苓白术茯苓大枣甘草肉桂等药以制肝实脾芍药甘草乃始终必用之剂伤暑作泻必暴注大孔作痛火性急速失于传送也口多渴小便多赤或不利身多发热泻后则无气以动热伤气也清暑用十味香薷饮清暑益气汤内虚之人中气不足用六和汤不止用黄连理中汤或加減桂苓甘露饮肾泄者难经所谓大瘕泄也好色而加之饮食不节者多能致此其泄多于五更或天明上厕溏而弗甚累年弗瘳服补脾胃药多不应此其一也夫脾胃受纳水谷必借肾间真阳之气熏蒸鼓动然后能腐熟而消化之肾脏一虚阳火不应此火乃先天之真气丹溪所谓人非此火不能有生者也治宜益火之原当以四神丸加人参沈香甚者加熟附茴香川椒

又有醉饱行房肾气虚乏湿热乘之下流客肾久泄不止治宜升阳除湿次用八味丸加山药茯苓地黄減半肾司二便久泄不止下多亡陰当求责肾破故纸肉豆蔻茴香五味子之属不可废也白术陈皮虽云健胃除湿救标则可多服反能泻肝以其燥能损津液故耳长夏湿热令行又歲湿太过民多病泄当專以风药如羌活防风升麻柴胡白芷之属必二三剂緣除风能胜湿故也

泄而少食胃弱故也人参为君扁豆橘皮佐之

泄而食不消缩砂人参肉豆蔻

泄而腹痛白芍药炙甘草防风木香

泄而气弱干葛人参白术白茯苓

泄而小水不利车前子末木通【中焦有湿热者当用猪苓泽泻】

肉积作泻用肉豆蔻山查蒜

面积作泻萝卜子

感寒而泻理中汤加紫苏

湿痰作泻半夏白术茯苓为君神麴为佐

九制黄连最能止泻须与人参等分迺可盖久泻不止多缘气虚纯用苦寒胃气愈闭又下多亡阴必用人参亦阳生阴长之意也【然此亦指肠胃虚热者而言如虚寒者不宜概用】

脾肾双补丸 治肾泄

人参【去芦一觔】莲肉【去心每粒分作八小块炒黄一觔】兔丝子【如法另末一斛半】五味子【蜜蒸烘干一觔半】山茱萸肉【拣鲜红肉厚者去核烘干一觔】真怀山药【炒黄一觔】车前子【米泔淘净炒十二两】肉豆蔻【十两】橘红【六两】砂仁【六两炒最后入】巴防天【十二两甘草汁煮去骨】补骨脂【圆而黑色者佳盐水拌炒研末一觔】为细末炼蜜和丸如菉豆大每五钱空心饥时各一服
如虚而有火者火盛肺热者去人参肉豆蔻巴防天补骨脂忌羊肉羊血

梁溪一女人茹素患内热每食肠鸣清晨大瘕泄脾肾双补丸内去肉豆蔻以白芍药代之外加白扁豆十二两立愈

无锡秦公安患中气虚不能食食亦难化时作泄胃膈不宽一医误投枳壳青皮等破气药下利完谷不化面色黧白仲淳用人参【四钱】白术【二钱】橘红【钱许】干姜【泡七分】甘草【炙一钱】大枣肉豆 四五剂渐愈后加参至两许全愈三年后病寒热不思食他医以前病因参得愈仍投以参病转剧仲淳至曰此阴虚也不宜参乃用麦门冬五味子牛膝枸杞芍药茯苓石斛酸枣仁鳖甲等十余剂愈从妹患泄后虚弱腹胀不食季父延诸医疗之予偶问疾见其用二陈汤及枳壳山查等味予曰请一看病者见其向内卧眠两手置一处不复动曰元气虚甚矣法宜用理中汤恐食积未尽进以人参三钱橘红二钱加姜汁竹沥数匙夜半思粥神思顿活季父大喜尽谢诸医再以六君子汤加山查肉砂仁麦门冬调理之数剂

立起

治腹痛作泄【予患腹痛泄日十余度仲淳以一剂止之】

人参【一钱五分】苍术【米泔浸炒三钱】黄连【姜汁炒三次一钱】北五味【蜜蒸一钱】橘红【一钱五分】肉豆蔻 吴茱萸【汤泡】白茯苓【各一钱】藿香【五分】庄敛之平日素壮实善啖丁巳四月忽患泄泻凡一应药粥蔬菜入喉觉如针刺下咽即辣因而满腹绞辣随觉腹中有气先从左升次即右升氤氲遍腹即欲如厕弹响大泄粪门恍如火灼一阵甫毕一阵继之更番转厕逾时方得离厕谛视所泄俱清水盈器白脂上浮药粥及蔬菜俱不化而出甚至梦中大遗了不收摄诸医或云停滞或云受暑或云中寒百药杂投竟如沃石约月余大肉尽脱束手待毙敛之有孀母朝夕相视哀号呼天恨不以身代也余于仲夏末偶过金坛诊其脉洪大而数知其为火热所生病为疏一方用川黄连三钱白芍药五钱橘红二钱车前子三钱白扁豆三钱白茯苓三钱石斛三钱炙甘草一钱祝其煎成将井水澄冷加童便一杯始服临别再三叮咛云此方勿出以示人恐时师见之大笑不已也若为躯命计须坚信服之耳敛之却众医下键煎服药方入喉恍如饮薄荷汁 沁入心脾腹中似别成一清凉世界甫一剂夜卧达旦洞泻顿止连服三剂大便已实前泄时药粥等物凡温者下咽腹中遂觉气升即欲大解一切俱以冷进方快家人日以为常至是啖之觉恶心畏冷旋易以温始相安余曰此火退之征也前方加人参二钱半莲肉四十粒红麴一钱五分黄耆三钱升麻五分黄连减半五六剂后余将返长兴敛之持方求余加减余曰此已试效方宜固守多服但去升麻可耳越月余余再过金坛敛之频颺向余曰自先生去后守方煎服防三十余剂矣今泻久止而脾气困顿不知饥饱且稍饮茶汤觉肠满急胀如欲寸裂奈何余曰大泻之后是下多亡阴也法宜用补倘此时轻听盲师妄用香燥诸药取快暂时元气受伤必致变成蛊胀即不救矣复为疏一丸方人参五两白芍药六两炙甘草一两五味子六两绵黄耆五两山茱萸肉五两怀山药五两熟地黄八两牛膝六两紫河车二具蜜丸空心饥时各一服而日令进前汤液方敛之相信甚力坚守二方服防三年脾胃始知饥而嗜食四体亦渐丰矣敛之恒对余言每遇脾胃不和时或作泻觉腹中有火则用黄连否则去之一照余方修治煎服泄遂止而脾顿醒迄今以余所疏方俨如重宝什袭珍藏谓余不啻起死而生之也其病初平后余劝其绝欲年余敛之因出妾得尽发家人私谋乃知向之暴泄由中巴豆毒本草中巴豆毒者用黄连冷水解之余用大剂黄连澄冷方服政为对治向使如俗医所疑停滞受寒中暑法治之何啻千里即信为是火而时师所投黄连不过七八分至钱许止矣况一月之泻未有不疑为虚寒者用黄连至四钱此俗医所必不解也向余祝其勿出以示人为是故耳始知察脉施治贵在合法神而明之存乎其人耳

余治敛之泻止后恐其元气下陷急宜升举用升麻以提之初不知其为中毒也乃因用升麻太早致浊气混于上焦胸中时觉似辣非辣似嘈非嘈迷闷之状不可名状有时滴酒入腹或啖一切菓物稍辛温者更冤苦不胜庄一生知其故曰此病在上焦汤液入口即下注恐未易奏功宜以噙化丸治之用贝母五钱苦参一两真龙脑薄荷叶二钱沉香四钱人参五钱为极细末蜜丸如弹子大午食后临卧时各噙化一丸甫四丸胸中恍如有物推下三年所苦一朝若失

治泄泻在阳明胃太陰脾经者

白茯苓【三钱】白术【炒二钱】炙甘草【三钱】车前子【炒三钱】陈皮【二钱】升麻【五分】干葛【一钱】姜【三大片】砂仁【炒一钱】川黄连【一钱五分姜汁炒如无湿热者去之】河水二钟加枣肉二枚饥时服

治大便不通 张选卿屡验

硃砂【研如飞面五钱】真芦荟【研细七钱】滴好酒少许和丸每服一钱二分好酒吞朝服暮通暮服朝通须天晴时修合为妙

唐震山年七十余【阙】此血液枯槁之 用

大肉苁蓉【三两白酒浸洗去鳞甲切片】白汤三碗煎一碗顿饮饮竟大便通胸中快然偶一医问疾曰此劫药也当调补脾胃为主易以白术厚朴茯苓陈皮病如故唐翁曰误矣仍饮前药立解高存之闻而叩其故仲淳曰肉苁蓉峻补精血骤用之反动大便药性载甚明也

虚弱

天王补心丹 陈练塘先生得自蛮洞中

宁心保神益气固精壮力强志令人不忘清三焦化痰涎去烦热除惊悸疗咽干养育心神

人参 懷山药【坚白者】麦门冬【去心】当归身【酒洗各一两】懷生地天门冬【去心各一两三钱三分】丹参【去黄皮八钱】百部【去芦土】白茯神

【去粗皮坚白者良】石菖蒲【去毛】栝子仁【去油者佳另研】甘草【长流水润炙】北五味【去枯者】杜仲【以上七味各六钱六分】遠志【三钱三分】白茯苓【一两五钱四分】淨末炼蜜丸如弹重一钱硃砂【一两】研极细为衣食遠临卧时嚙化后饮灯心汤一小杯

加味六味地黄丸【滋陰固精明目不寒不热和平之剂久服延年】

懷生地【如法制八两】懷山药【四两】白茯苓【坚白者四两人乳拌晒干又拌多多更妙】山茱萸【去核四两】牡丹皮【三两】麦门冬【去心六两】泽泻【原方三两目疾減半】甘菊花【苦者不用六两】真甘枸杞【去蒂六两】北五味【去枯者六两】细末蜜丸如梧子大空心淡盐汤服四钱又方加白蒺藜【炒去刺五两】

治目疾久不愈

天王补心丸临卧服加味六味地黄丸空心服虚甚者地黄丸加紫河车一具酒洗极净磁罐内酒煮极烂捣如泥或焙干为末
二方朝夕并进久久自効世医治目多补肾不知补心心君火也

治虚眼方

枸杞子 生地 麦门冬【各三钱】龙胆草【一钱下焦无湿热者勿用】水二钟煎七分半饥时服如脾气不佳加白豆蔻末【五六分】治肝肾二经目疾从父病后眼花服此立愈

真甘枸杞【一觔去蒂】真懷生地黄【一觔极肥大者酒洗净】河水砂锅内熬膏以无味为度去渣重汤煮滴水成珠便成膏也每膏一觔入炼蜜六两空心白汤化下

又丸方仲淳立

真甘枸杞【一觔】甘菊花【去蒂一觔】白蒺藜【炒去刺一觔】细末炼蜜丸梧子大每四五钱空心白汤吞入地黄觔许更妙黄学谕 白患风泪眼每出则流泪盈颊仲淳疏一方寄之谷精草为君蒺藜和枸杞之属佐之羊肝为丸不终剂愈

治不眠【以清心火为第一义】

麦门冬【五钱】茯神 丹参 沙参【各三钱】竹茹【二钱】炙甘草【一钱】竹叶【六十片】石斛【酒蒸三钱】遠志【一钱】生地【四钱】枣仁【炒五钱】五味子【八分】有痰者加竹沥

乌须明目丸【脾胃不佳者去槐角子仲淳立】

女贞实【酒拌九蒸九晒净末一觔】甘菊花【十二两】何首乌【赤白各半净二觔如法蒸晒】桑叶【一觔】牛膝【酒蒸一觔】懷生地【酒洗净二觔】甘枸杞【去枯者一觔半】乳拌茯苓酥【一觔】麦门冬【去心一觔半】槐角子【十两】苍术【蜜酒拌蒸晒十二两】人参【一觔人乳拌烘干】山茱萸肉【酒蒸十二两】乌饭子之黑者取汁熬膏每觔加炼蜜半觔丸如梧子大每日三服服五钱白汤吞忌白菜菹牛肉牛乳蒜桃李雀蛤

补心肾久服轻身延年 仲淳定有热人宜之

头桑叶【九蒸九晒一觔】黑芝蔴【九蒸九晒一觔】甘菊花【去蒂八两】何首乌【一觔】甘枸杞【一觔】白蒺藜【炒去刺另末一觔】女贞实【酒拌九蒸九晒一觔】细末炼蜜丸梧子大白汤或酒服

补虚丸方 许廓如丈传服之有奇验

棉花子仁【一觔】补骨脂【四两】白茯苓【二两】没药【二两】炼蜜丸如梧子空心淡盐汤服

凉血去湿补陰益气丸【予服之甚验】仲淳立

真茅山苍术【二觔】懷生地【酒洗一觔】甘菊花【一觔】车前子【米泔浸八两】人参【八两】牛膝【八两】白茯苓【八两人乳拌积粉至一觔】天门冬熬膏和丸

治虚弱陰精不足

白茯苓【粉一觔拌人乳晒至一觔半】另将童便重汤顿温取壮盛女子月经布一二个洗入便内拌入茯苓粉晒干将茯苓粉再磨加鹿角胶【四两】酒化同炼蜜丸如梧子大空心服白汤吞三钱服久痰从大便出

又方前方

加熟地黄【半觔】苍术【八两】鹿角胶【四两】黄檗【四两】兔丝子【半觔】砂仁【三两】

养陰凉血补心滋肾丸【予长儿久服此神验】

麦门冬【六两】鳖甲【六两】五味子【六两】懷生地黄【八两】山茱萸【四两】牡丹皮【三两】白茯苓【三两拌人乳晒至六两】天门冬【四两】杜仲【去皮切片酥炙四两】黄檗【四两】砂仁【二两】甘草【一两】懷山药【四两】栝子仁【拣淨八两酒蒸另研细如泥】车前子【三两】兔丝子【淨末八两】枸杞子【去枯者八两】遠志肉【三两】牛膝【四两】炼蜜为丸空心白汤服五钱仲淳定

集灵方【出内府补心肾益气血延年益壽】

人参 枸杞 牛膝【酒蒸】天门冬【去心】麦门冬【去心】懷生地黄懷熟地黄【七味各一觔】河水砂锅熬膏如法加炼蜜白汤

或酒调服

通真延齡丹

五味子【三觔】山茱萸【二觔】兔丝子【二觔】砂仁【一觔】车前子【一觔】巴防天【一觔】甘菊花【二觔】枸杞子【三觔】生地黄【三觔】熟地黄【三觔】狗肾【四觔】懷山药【二觔】天门冬【一觔】麦门冬【三觔】栝子仁【二觔】鹿角霜【二

觔】鹿角胶【四觔】人参【二觔】黄檗【一觔半】杜仲【一觔半】肉苁蓉【三觔】覆盆子【一觔】没食子【一觔】紫河车【十具】何首乌【四觔】牛膝【三觔】补骨脂【一觔】胡桃肉【二觔】鹿茸【一觔】沙苑蒺藜【四觔二觔炒磨入药二觔磨粉打糊】为末同栝子仁胡桃肉泥蒺藜糊酒化鹿角胶拣蜜和丸如梧子大每服五钱空心饥时各一服龙眼汤吞有火者不可服

梦遗封髓丹

黄檗【去皮蜜炙半觔】砂仁【四两最后炒入药末中】甘草【二两】山药糊为丸加远志肉【甘草汁煮去骨二两】猪苓【一两】白茯苓【一两五钱】莲须【二两】山茱萸【三两】北五味【去枯者一两五钱】名大封髓丹出暨奎元戎仲淳屡用之验

种子方【鸿一兄传自高中白】

沙苑蒺藜【八两粗者四两为末精者四两为膏】川续防【酒蒸二两】兔丝子【三两煮三日】山茱萸肉【生用】芡实粉【生用】莲须【各四两生用】覆盆子【生用】甘枸杞子【各二两】前末以蒺藜膏同炼蜜和丸如梧子大每服四五钱空腹盐汤下有火者宜服此兼治梦遗

又方 此方仲淳传自江右邓医官

真合州补骨脂【沉实者二觔】以食盐【四两】入滚汤乘热浸一宿晒干次用杜仲【去皮酒炒去丝四两】煎浓汤浸一宿晒干次用厚黄檗【去皮蜜炙四两】煎浓汤浸一宿晒干别用鱼胶【四两】剪碎以蛤粉炒成珠同补骨脂炒香磨细末将胡桃肉捣如泥盛以锡盆蒸之取油和末量加蜜捣和丸如梧子大空心用三钱白汤或淡盐汤吞晚间或饥时更一服老年人及阳虚无火者宜此有火者忌之

种子奇方

栝子仁【去油者好酒浸一宿砂锅上蒸捣烂如泥】鲜鹿茸【火燎去毛净酥炙透如带血者须慢火防其皮破血走也切片为末】等分和栝子仁泥捣极匀加炼蜜丸如梧子大每服空心三钱淡盐汤吞

补肾健脾益气方 朱鹤山老年久患腰痛日服一剂强健再生子八十未艾

白茯苓【三钱】枸杞子【一两】怀生地【二钱】麦门冬【五钱】人参【二钱】陈皮【三钱】白术【三钱】河水二钟煎八分

高存之长子患腹痛仲淳问曰按之痛更甚否曰按之则痛缓仲淳曰此虚症也即以人参等

药饮之数剂不愈但药入口则痛止其痛每以卯时发得药渐安至午痛复发又进再煎而安近晚再发又进三剂而安睡则不复痛矣如是者月余存之疑之更他医药则痛愈甚药入痛不止矣以是服仲淳方不疑一年后渐愈服药六百剂全愈

人参【三钱】白芍药【三钱】炙甘草【一钱】橘红【一钱五分】后加木 【一钱】
麦门冬【三钱】当归身【二钱】

又重定方

人参【四钱】白芍药【三钱】麦门冬【三钱】甘草【一钱五分】当归【三钱】枸杞子【三钱】山茱萸肉【二钱】木 【二钱】黄檗【一钱五分】鳖甲【二钱】又以鹿角胶间服又以饮食少时恶心去当归黄檗加牛膝【三钱】秦艽【一钱五分】石斛【二钱】酸枣仁【三钱】延胡索【一钱】

丸方

鳖甲 北五味 白芍药【各四两】当归身【五钱】麦门冬 牛膝 黄檗【蜜炙】枸杞【各四两】炙甘草【二两】川续防【酒洗三两】杜仲【酥炙三两】怀熟地【五两】山茱萸肉【四两】白茯苓【三两】车前子【二两五钱】怀山药【炒三两】人参【人乳浸四两】天门冬【酒洗去心】鹿角胶【各四两】炼蜜丸每服四钱

高存之长子两年腹痛愈后又患臂痛每发一处辄于手臂指屈伸之间肿痛不可忍三四日方愈痛时在手即不能动仲淳曰此即前病之余虚火移走为害也立丸方凡四五更定服至此方全愈

治臂痛方

怀生地黄【一觔】牡丹皮【濶而厚者良酒蒸六两】山茱萸肉【八两】白茯苓【为末水澄去筋膜蒸晒再磨以人乳拌晒数次六两】山药【八两切片炒】泽泻【米泔浸切片炒六两】天门冬【去心酒蒸烘燥六两】麦门冬【去心烘燥八两】五味子【如法烘干八两】牛膝【酒蒸八两】黄檗【切片蜜拌炒褐色八两】枸杞子【去枯者及蒂八两】砂仁【二两炒】甘菊花【八两】何首乌【一觔】虎前胫骨【二对酒蒸三日酥炙透】白蒺藜【炒去刺十两】兔丝子【三两】为细末炼蜜丸如梧子大每服五钱空心白汤下

高存之壻浦生气上逆每饭下一二口辄暖气数十口再饭再暖食顷三四作仲淳曰此气不归元中焦不运也每剂须人参【二钱】不信服他医快气药愈甚逾二三月仲淳云今须参【四钱】矣不信又逾二三月仲淳云今须参【六钱】矣不信又逾月饮食不下每呕冷气如团而出上下气不属分必死存之坐其家迫令服仲淳药服首剂不动服再煎不动然亦不如他汤药辄呕也服三煎忽心口下如爆一声上则暖气下则小遗无算上下洞然即索粥顿

食三四盃不上逆也服五六剂减参二钱暖逆复作复用六钱而安一月后方减参二钱服半年全愈人参【六钱】麦门冬【三钱】五味子【二钱】橘红【一钱】砂仁【一钱】白芍药【二钱】角沉香【五分】益智仁【一钱五分】山茱萸肉【三钱】真苏子【二钱】枇杷叶【三大片】水煎临服加沉香汁十五匙逆水芦根汁一大盏又十倍为末山药糊丸空心白汤吞

陆祚先乃正咳 饱胀痰喘水火不通眠食俱废人参【君】白芍药【君】苏子【炒研极细佐】枇杷叶【三大片】白茯苓【佐】二服得眠大小便通啖粥

顾仲恭心肾不交先因失意久鬱及平日劳心致心血耗散去歲十月晨起尚未离牀忽左足五指麻冷條已至膝便不省人事良久而苏乍醒乍迷一日夜十余次医者咸云痰厥仲淳云纯是虚火服丸药一剂今春觉体稍健至四月后丸药不继而房事稍过至六月初十偶出门前症复发扶归良久方醒是日止发一次过六日天雨稍感寒气前症又发二次见今两足无力畏寒之甚自腹以上不畏寒仲淳云人之五脏各有致病之由谨而察之自不爽也夫志意不遂则心病房劳不节则肾病心肾交病则陰阳将离离则大病必作以二脏不交故也法当清热补心降气豁痰以治其上益精强肾滋陰增志以治其下则病本必拔以心藏神肾藏精与志故也平居应独处旷野与道流韵士讨论离欲之道根极性命之源使心境清宁慙离爱染则情念不起真精自固陰阳互摄而形神调适矣

暂服汤液方

贝母【三钱】白茯苓【三钱】遠志肉【一钱五分】酸枣仁【五钱】苏子【二钱】石斛【三钱】麦门冬【五钱】甘草【炙五分】木 【三钱】牛膝【八钱】石菖蒲【一钱人乳和童便浸忌铁】水二钟煎八分调入牛黄末【一分】天竺黄末【二分】竹沥一大杯临卧饥时各一服三剂后加人参【五钱】枇杷叶【三片】调入牛黄【一分】天竺黄【三分】霞天膏【五钱】

丸方

遠志肉 天门冬 麦门冬 白茯神 白茯苓【人乳拌晒各六两】枣仁【八两】杜仲【四两】懷生地【八两】白芍药【六两】甘草【蜜炙三两五钱】川黄檗【六两】牛膝【十两】五味子【六两】蜜丸如梧子大每空心服五钱临卧六钱石斛汤加竹沥送下忌猪牛羊肉 羊血 面蒜 胡椒 鲤鱼 牛乳 白莱菔

一人年三十三歲因努力即发心腹饱满疼痛直至脐下皆板两脇空松不可言腹寒即欲就火火至稍睡痛止大便不通小便短缩似宿茶日夜不卧至五周时饮食渐加时常举发大约性嗜酒善怒劳碌所致仲淳为之疏方用当归身【五钱】牛膝【四钱】麦门冬【五钱】白芍药【五钱酒炒】炙甘草【七分】五味子【一钱】广橘红【二钱】茅根【打碎一钱五分】懷生地【三钱】宜多食葦菜童便胡桃肉

娄东王官壽患遗精闻妇人声即泄瘠甚欲死医告术穷仲淳之门人以遠志为君莲须石莲子为臣龙齿茯神沙苑蒺藜牡蛎为佐使丸服稍止然终不防仲淳于前方加鰮胶一味不终剂即愈

治腰痛

钱晋吾文学腰痛甚诊之气鬱兼有伤瘀血停滞仲淳投以

牛膝【五钱】当归身【二钱五分】炙甘草【一钱】紫苏梗【一钱】五加皮【三钱】广橘红【二钱】香附【二钱童便炒研细末】川续防【二钱】水二钟煎八分饥时加童便一大杯服二剂愈

又方

先外祖李思塘公少年患腰痛至不能坐立诸医以补肾药疗之不効朱遠斋者湖明医也用润字号丸药下之去黑粪数升盖湿痰乘虚流入肾中作苦痰去方以补药滋肾不逾月起惜其方传者不真

治盗汗【予妇幼患此仲淳以二剂疗之今二十余年不发】

黄耆【蜜炙三钱】北五味【二钱】酸枣仁【炒研五钱】炙甘草【一钱】麦门冬【去心三钱】人参【三钱】白芍药【酒炒三钱】香附【童便浸炒二钱】龙眼肉【十枚】

治噎

苏子【研细二钱】广橘红【二钱五分】麦门冬【去心五钱】白芍药【酒炒四钱】枇杷叶【去毛刷净蜜炙三大片】山查肉【三钱】白豆蔻仁【四分先嚼下】人参【三钱】逆水芦根汁一大盞河水一钟半同芦根汁煎至八分加姜汁三匙竹沥一杯饥时服

治溺有余沥精不固

兔丝子【半觔净】牛膝【与何首乌同蒸半觔净】栝子仁【去油者酒蒸另研如泥十二两】杜仲【四两净】麦门冬【去心六两】枸杞【六两】北五味【六两】血鹿角【一觔】鹿茸【去毛酥炙六两】车前子【米泔浸四两】白茯苓【多用人乳拌晒四两】大何首乌【赤白各半蒸如法一觔】没石子【三两】细末炼蜜丸如梧子每服五钱空腹白汤吞

治鼻衄肠风腹胀便燥

麦门冬【去心十两】懷生地【十两】天门冬【去心六两】五味子【去枯者四两】鳖虱胡麻【酒拌九蒸九晒去殼另研如泥十二两】山茱萸肉【六两】白芍药【八两】当归身【五两】砂仁【炒二两】紫苏子【六两另研后入】炼蜜丸如梧子大每五钱空心白汤吞

治腿酸足胫痛

牛膝【去芦酒蒸八两】杜仲【六两】懷生地【蒸熟八两】甘枸杞【八两】山茱萸肉【六两】五味子 黄檗【各六两】白茯苓【三两】砂仁【三两】细末炼蜜丸如梧子大每五钱空心白汤吞皆仲淳定

补肾固精方

北五味如法为细末每服以好酒下方寸匕久之兼可御女

治弱症吐血夜热不眠腰痛 陈 斋传

紫河车十具【男而首胎佳】自采侧栢叶【东南枝去粗梗陰干四觔】将河车入石臼内木杵轻轻捣渐下栢叶以极烂为度起置磁盆内砂锅上蒸熟烈日曝干如无日色或夏天将栢叶摊成薄饼于磁盆上火烘干研细末蜜丸如梧子大空心淡盐汤下五钱家叔久患肠风百药不効服此顿释

久 噙化丸 仲淳定

真龙脑薄荷叶【三两五钱】百部【酒浸去心三两五钱】麦门冬【去心二两】天门冬【去心二两】桑白皮【蜜炙三两】枇杷叶【蜜炙三两】贝母【去心二两】桔梗【米泔浸蒸去芦一两】甘草【蜜炙七钱】天花粉【二两】 参【一两】北五味【蜜炙一两】欸冬花蕊【二两】紫苑【八钱】真柿霜【二两】橘红【一两】极细末炼蜜丸如弹子大不时噙化临卧更佳

于中父患目珠痛如欲堕胸脇及背如槌碎状昼夜咳 眠食俱废自分不起促仲淳诀别仲淳曰何至是耶令日进童便三大碗七日下黑血无数痛除咳热如故再投以二冬贝母苏子橘红白芍药鳖甲青蒿子桑根白皮五味子百部枇杷叶竹沥童便久之未痊太夫人及胞弟润父疑其虚促用参耆仲淳不可润父阴以黄耆二钱入前药尝之竟夕闷热目不交睫始信仲淳不谬固守前方兼服噙化丸勿辍逾月平盖中父病起于乃翁之变哀伤过甚更触恼怒所致非虚也肺热而实肝火上冲故不宜参耆尔

里中一童子年十五患寒热咳 面赤鼻塞夜剧家人以为伤风仲淳视之曰陰虚也盖伤风之证面色宜黯今反赤而明伤风发热必昼夜无间今夜剧鼻塞者因虚则火上升壅肺故鼻

塞以是知其陰虛也投以麦門冬五味桑皮貝母百部鱉甲生地黄沙參不四劑瘳臧儀部靜涵患氣喘自汗晝夜不眠食諸醫以外感治之病甚仲淳診之曰此腎虛氣不歸元故火上浮喘汗交作脾虛故不思食亟以麦門冬五味子枸杞子滋陰斂肺以蘇子橘紅降氣消痰以芍藥酸棗仁茯苓補脾斂汗不數劑瘳

趙景之太史未第時因肄業勞心太過患夢遺証已三四年矣不數日一發發過則虛火上炎頭面烘熱手足逆冷終夜不寐補心腎及瀦精藥無不用過壬申春偶因感冒來邀診視談及前証之苦予為之疏一丸方以黃檗為君佐以地黄枸杞蓮須膠山茱萸五味車前天麥門冬之類不終劑而瘳初時景之意恐黃檗太寒不欲用予謂尊恙之所以久而不愈者政未用此藥耳五臟苦欲補洩云腎欲堅急食苦以堅之黃檗是矣腎得堅則心經雖有火而精自固何夢遺之有哉向徒用補益收瀦而未及此故難取效

湖廣張仲虎客邸耽于青樓且多拂意之事至冬底發太寒熱咳 吳中醫者皆以外感治之發表和解無不遍試適毛子晉拉予視之見其神色消耗脈氣虛數中時復一結咳 有血卧不貼席予謂子晉曰此陰虛內傷証也陰精虧竭故脈見虛數內有瘀血故結脈時見肺肝葉損所以卧不能下此不治之証況誤認外感多服發散復蹈虛虛之故耶不數日而歿

太學許韜美形体卑弱神氣短少且素耽酒色時嘗齒衄辛未春偶患右乳傍及肩背作痛異常手不可近扪之如火晝夜不眠醫以內傷治之服桃仁紅花乳沒延胡靈脂等藥廿余劑不効邀予診視六脈虛數肝腎為甚予防為陰虛火旺之証當滋養陰血扶持脾胃俾陰血漸生虛火降下則痛不求其止而止矣如必以和傷治痛為急則徒敗胃氣剋削真元非所宜也疏一方付之用生地牡丹皮芍藥牛膝枸杞續防石斛甘草桑枝麥冬蘇子囑其服十劑方有効以陰無驟補之法耳服至八劑後復邀過看診其脈氣漸和精神漸旺向未出房室至此則能步至中堂但痛處未盡除然而生機則躍躍矣惜其欲速太過惑于羣小棄置予方復以前藥雜進一月後胃氣果敗作嘔逆陰血愈耗發潮熱脾氣傷盡作腹脹再半月而死矣【已上三條附】

吐血三要法

宜行血不宜止血

血不行經絡者氣逆上壅也行血則血循經絡不止自止止之則血凝血凝則發熱惡食病日痼矣

宜補肝不宜伐肝

經曰五臟者藏精氣而不洩者也肝為將軍之官主藏血吐血者肝失其職也養肝則肝氣平而血有所歸伐之則肝虛不能藏血血愈不止矣

宜降气不宜降火

气有余即是火气降则火降火降则气不上升血随气行无溢出上窍之患矣降火必用寒凉之剂反伤胃气胃气伤则脾不能统血血愈不能归经矣今之疗吐血者大患有二一则專用寒凉之味如芩连山梔四物汤黄檗知母之类往往伤脾作泄以致不救一則專用人参肺热还伤肺咳 愈甚亦有用参而愈者此是气虚喘 气属阳不由阴虚火炽所致然亦百不一二也仲淳立论專以白芍药炙甘草制肝枇杷叶麦门冬薄荷叶橘红贝母清肺薏苡仁懷山药养脾韭菜菴降香真苏子下气青蒿鳖甲银柴胡牡丹皮地骨皮补陰清热酸枣仁【炒研】白茯苓养心山茱萸肉枸杞子补肾予累试之辄验然陰无骤补之法非多服药不效病家欲速其功医者张皇无主百药杂试以致殒身覆辙相寻不悟悲夫【鬱金治吐血圣药患无真者尔】

顾季昭患陰虚内热仲淳云法当用甘寒不当用苦寒然非百余剂不可慎勿更吾方欲加減使吾徒畧加增损可也果百剂而安

天门冬 麦门冬 桑白皮 贝母 枇杷叶【各二钱】地骨皮【三钱】五味子【一钱】白芍药【二钱】鳖甲【三钱】苏子【研细二钱】车前子【二钱】

王司丞逊之患吐血仲淳诊之云多服童便自愈别去貽书门人张选卿曰逊之旋已勿药矣但相公年尊右手脉弱甚此非细故可致意逊之预为计时文肃公尚无恙不两月而逊之疾瘳文肃一病不起

加味六味地黄丸【治吐血赵冠山子服之立起】

地黄【半觔】天门冬 麦门冬 牛膝 鳖甲 黄檗 青蒿 五味子 橘红 枇杷叶 懷山药 山茱萸肉【各四两】泽泻 牡丹皮 白茯苓

煎方

苏子【炒研二钱】枇杷叶【三大片】生地黄【三钱】广陈皮【二钱】白芍药【三钱】茅根【一两】麦门冬【五钱】桑白皮【二钱】菴降香【一钱二分血止去之】贝母【二钱】牛膝【四钱】鳖甲【四钱】甘草【一钱】天门冬【二钱】

治陰虚喉痛喉间血腥气声哑到此便难措手

麦门冬【三钱】天门冬【三钱】薄荷【八分】贝母【三钱】苏子【研一钱】橘红【二钱】炙甘草【一钱】百部【去心三钱】欸冬花蕊【二钱】鳖甲【如法四钱】桑白皮【如法三钱】懷生地【三钱】河水二钟煎八分加童便一杯饥时服

丸方

六味地黄丸中加鳖甲 天门冬 麦门冬 百部 五味子 真阿胶
各如山药之数炼蜜丸每六钱空心淡盐汤吞饥时白滚汤吞【已上皆仲淳法】

消渴证

湖州庠友张君时泰辛酉正月骤发齿痛十余日而愈四月间焦劳过多齿痛大发医用石膏知母等药投之不效用刀去齿间紫血满口痛不可忍齿俱摇动矣至六七月间饮食益多小便如注状如膏肌肉尽削至十一月身不能起冬末用黄耆地黄等药稍能起立然善食易饥如故小便如膏亦如故今年二三月愈甚亦不服药齿痛如故当门二齿脱落复加口渴昼夜不止此中下二消证也予为立后方服未数剂而瘳

麦门冬【五两】五味子【三钱】黄连【三钱】芦根【五两】黄耆【五钱】怀生地黄【六钱】天门冬【一两】用缲丝汤十碗煎二碗不拘时服丸方于前药中加黄檗【三两】牛膝【五两】沙参【六两】枸杞子【四两】五味子【六两】蜜丸常服遂不复发

妇人

治妇人血热经行先期

枇杷叶【一觔蜜炙】白芍药【半觔酒浸切片半生半炒】怀生地黄【六两酒洗】怀熟地黄【四两】青蒿子【五两童便浸】五味子【四两蜜蒸】生甘草【去皮一两】山茱萸肉【四两】黄檗【四两去皮切片蜜拌炒】川续断【酒洗炒四两】阿胶【五两蛤粉炒无真者鹿角胶代之重汤酒化】杜仲【去皮三两酥炙】细末怀山药粉四两打糊同炼蜜和丸如梧子大每五钱空心淡醋汤吞饥时更进一服忌白萝卜

加减正元丹【治妇人经不调无子】

香附【一觔同艾二两醋浸二宿分作四分一分用盐水炒一分酥炙一分童便浸炒一分和乳瓦上炒】当归身【酒洗五两】川芎【二两】白芍药【八两酒浸切片半生半炒】生地【六两酒洗】阿胶【四两蛤粉炒成珠无则鹿角胶代之】枳壳【三两江西者良半生半炒】艾【二两用浸香附醋打糊饼晒干】为末米醋煮山药粉糊丸如梧子大每四钱空腹淡醋汤吞忌白菜菰右八味乃正元丹后加减法也加青蒿子【三两】山茱萸肉【三两】银柴胡【一两】五味子【三两】鳖甲【醋炙如法四两】如经调后觉经不行恐有妊娠即勿服如后期去青蒿子银柴胡鳖甲

治血热经行先期腰腹痛发热【血热忌用芎归当用第一方】

正元丹中去香附换入枇杷叶【十两蜜炙】杜仲【去皮酥炙三两】鹿角胶【蛤粉炒四两】麦门冬【去心四两】青蒿子 山茱萸肉 北五味子【各三两】银柴胡【一两】

治血虚经行后期

白芍药【六两半生半熟】香附【四两童便浸炒】蕲艾叶【一两五钱如法】懷生地【六两】麦门冬【六两】杜仲【三两酥炙】橘红【二两】枇杷叶【六两】甘草【一两五钱半生半炒】白胶【四两蛤粉炒成珠研】川芎【二两】青蒿子【四两童便浸风干】当归【六两】用醋煮懷山药糊丸梧子大每服五钱白汤送下

治血虚经行后期太甚半边头疼

当归身 白芍药【各二钱五分】川芎【一钱】甘菊花【三钱】藁本【一钱】懷生地【二钱】荆芥穗【八分】天门冬【二钱】麦门冬【三钱】炙甘草【一钱五分】河水煎临服加童便一小杯

又治经行后期太甚

香附【一觔四制】懷生地【五两】白芍药【八两】枳殼【二两】砂仁【二两】阿胶【四两】蕲艾【二两如法】为末醋煮懷山药糊丸梧子大每服四钱空心淡醋汤下一方加懷熟地【三两】川芎【二两】去砂仁一味俱神效

治肾泄兼脾泄

肉苁蓉【粉裹煨四两】北五味子【四两】补骨脂【如法制二两半】白芍药【二两半】砂仁【一两半】甘草【八钱】人参【三两】吴茱萸【汤泡去梗三两】为末山药粉糊丸如梧子大空心白汤下三钱至五钱

治妇人肾泄无子

肉苁蓉【粉裹煨四两】吴茱萸【汤泡二两五钱】补骨脂【三两】五味子【三两】人参【一两】木香【不见火六钱】砂仁【八钱】细末山药粉糊丸如梧子大每服三四钱空腹白汤下

李博士本石内人患痰嗽三年骨立矣经不行诸医或以为积血或以为血枯经闭仲淳云孕也若行血则祸不旋踵但分娩后恐不能全吉尔已而果然

安胎将堕欲死方

懷生地【二两】酒炒砂仁末【一两】水酒各二碗煎一碗分作二次服立愈此方出本草予偶阅之传一内人试之如神保胎资生丸【妊娠三月阳明脉养胎阳明脉衰胎无所养故胎堕也服资生丸】

人参【人乳浸饭上蒸烘干三两】白术【三两】白茯苓【细末水澄蒸晒干入人乳再蒸晒干一两半】广陈皮【去白畧蒸二两】山查肉【蒸二两】甘草【去皮蜜炙五钱】懷山药【切片炒一两五钱】川黄连【如法炒七次三钱】薏苡仁【炒三次又方一两半】白扁豆【炒一两半】白苳蔻仁【不可见火三钱五分】藿香叶【不见火五钱】莲肉【去心炒一两五钱】泽泻【切片炒三钱半】桔梗【米泔浸去芦蒸五钱】芡实粉【炒黄一两五钱】麦芽【炒研磨取净麪一两】右药共十七味如法修事细末炼蜜丸如弹子大每丸重二钱用白汤或清米汤橘皮汤炒砂仁汤嚼化下忌桃李雀蛤生冷

治恶阻【即胎前呕吐】

橘红【一钱】麦门冬【二钱】人参【一钱】木 【二钱】竹茹【一钱】枇杷叶【三大片】藿香【五分】下咽即验

乌蠡鱼汤治妊娠腹胀满【顾仲穆子妇患此数剂而安】

白茯苓【二钱】白术【炒二钱五分】广橘红 木 桑白皮【如法蜜炙各二钱】紫苏叶【一钱】秦艽【酒洗三钱】生姜皮【一钱五分】用大蠡鱼一枚河水五碗煎至三大碗去鱼骨滤清始入前药煎至一碗服之以愈为度

治子悬【即胎上冲】

紫苏 橘红 麦门冬【去心】各等分为细末每服四钱用枇杷【三大片】竹茹【一钱五分】煎汤调服

治胎惊胎热一受孕即宜预服【姚康成乃正服之神验】

木 【一钱】天门冬 黄耆 白芍药【各三钱】麦门冬【五钱】鼠粘子【一钱】金银花 甘菊花 石斛 懷生地【各三钱】连翘【一钱】炙甘草【一钱】贝母【二钱】砂仁【一钱】人参【一钱五分】河水二大碗煎八分食远温服服至百帖神效

治小儿脐风撮口孕时母服可预解一切胎毒

甘草【二钱生用】懷生地【四钱】连翘【二钱】黄连【一钱酒炒】 参【二钱】括萎根【二钱】木通【一钱】贝母【二钱】牡丹皮【一钱五分】金银花【四钱】荆芥穗【一钱】羚羊角【磨汁入药汁中二十匙约五分】河水二钟煎八分空心饥时服【仲

淳传自京华祝生试之神验】

催生累验方

鱼膘【四钱切碎每块针刺灯火上炙脆研】柞枝【四两蚕食者一叶一刺者是即凿子木五月开白花不结子其里纯白】白芷【一钱五分】百草霜【山家者良一钱】千里马【男子左足旧草鞋烧灰存性二钱】水酒各钟半将柞枝白芷煎浓至一碗去渣滤清入胶同煮化调二末服之【已上调经胎产诸方仲淳手定】

琥珀丸【專治妇人生产艰难下胎衣血晕服之即活李 白传神验】

胡索【六钱】懷熟地【八钱】当归身川续断【酒洗炒】川芎【各六钱】川牛膝
人参 沉香 乳香 没药【去油各五钱】真阿胶【蛤粉炒八钱】辰砂【水飞】大附子
五味子【各五钱】金 石斛【六钱】肉苁蓉【八钱酒洗】琥珀
珍珠【上上者各五钱】极细末炼蜜丸如圆眼大以好辰砂飞过为衣蜡丸

家宝丹【马铭鞠传不如李 白方妙】

專治妇人产难胎衣不下血晕胎死腹中及产后小腹痛如刀刺兼治胎前产后一切诸病杂症诸气中风乳肿血淋胎孕不安平时赤白带下呕吐恶心心气烦闷经脉不调或不通番胃饮食无味面唇焦黑手足顽麻一切风痰俱效高存之每年修合普施

何首乌【二两取鲜者竹刀切片晒干】川乌【四两先用湿纸包煨去皮留待草乌同煮】
草乌【四两温水浸半日洗去黑毛刮去皮与川乌同切厚片将无灰酒和匀入砂器中炭火慢煮渐渐添酒一日夜以入口不麻为度】苍术【四两米泔浸一宿去皮切片酒炒】大当归【二两酒洗】白附子【二两去皮】麻黄【去头节滚汤炮去沫】桔梗【炒】粉草【炙】防风 白芷 川芎 人参 天麻 大茴香【炒】荆芥【炒】白术【麴炒各四两】木香 血竭 细辛【各一两】共极细末蜜丸弹子大每丸重二钱酒化开和童便下如不能饮者酒化开白汤下产后腹痛者酒化开益母汤下 更有男妇年久腹

痛诸药不效者服两三丸即愈

室女经脉不通者用桃仁苏木红花当归煎汤下惟劳热有肺火者不宜服

治横生【高存之试验】

益母草【六两】酒煎浓汁加童便一大杯

治胞衣不下【高存之屡试验】

芒硝【三钱】酒煎服宜加牛膝当归各五钱然芒硝咸寒太甚用时极宜斟酌

产后调理方【仲淳立 如产时恶露过多无儿枕痛者不可用此方】

当归身【三钱】川芎【一钱五分】生地【二钱】赤芍药【一钱五分】延胡索【醋煮二钱】牛膝【五钱】蒲黄【一钱五分】干姜【炒黑七分】肉桂【七分火盛者并夏月勿用】山查肉【三钱】五灵脂【醋煮去沙一钱】桃仁【去皮尖】红花【各八分】黑豆【炒一合】杜仲【炒去丝二钱】续断【二钱】益母草【五钱瘀血行腹痛去之】泽兰叶【一钱】荆芥穗【一钱炒】水煎入童便服过五七日觉少腹已软无块按之不痛即将赤芍药蒲黄肉桂五灵脂桃仁红花六味尽去之另加白芍药【二钱】麦门冬【三钱】五味子【七分】如虚汗去荆芥川芎加枣仁【五钱】惊悸亦加之
汗不止加黄芪人参【各二钱】虚甚作喘倍加人参黄耆倍麦门冬去生地当归桃仁红花如脾胃弱不食泄泻加人参【多少量人】肉果【一钱五分】砂仁【七分】橘红【八分】腰痛无力是血虚以鹿角胶【五钱】酒浆化空心温服血晕及血不止发热作渴用童便一味是产后圣药

预防血晕神方【古方】

将产预将荆芥穗末【三钱】童便沸汤各一杯听用儿一产下即将前末同童便入汤调服永无血晕之病荆芥能引血归经也虚脱者人参【五钱】干姜【二钱】肉桂【二钱】虚甚者参至【一加两力】附子【童便制过一钱夏月去姜桂附子之半】

治产后虚脱兼防血晕【予家素试之神验】

人参【一两】真苏木【打碎二两】鹿角胶【五钱】水二碗酒一碗煎至一碗加童便一杯预煎候产下即服

治产后虚喘

己丑予妇产后五日食冷物怒伤脾作泄乃微嗽又三日泄不止手足冷发喘床亦动摇神飞荡不守一医以人参【五钱】附子【五钱】疗之如故加参附又不效渐加至参【三两】附子【三钱】一剂霍然起

于中甫夫人产后气喘仲淳投以人参【五钱】苏木【五钱】麦门冬【五钱】一剂愈五日后忽自汗无间昼夜闻响声及饮热茶汤即汗徧体投以人参【五钱】黄芪【五钱】加当归身生地黄二剂不効即令停药弥日金坛俗忌未弥月不得诊视仲淳徧检方书至证治要诀治汗门内有凡服固表药不効者法当补心汗者心之液也洒然曰是已于夫人素稟有火气非不足也产后陰血暴亡心主血故心无所养而病汗亟以炒酸枣仁【一两】为君生地黄白芍药麦门冬五味子枸杞牛膝杜仲当归身阿胶牡蛎龙眼肉大剂与之至三十二剂

罔效中甫惧曰得无不起乎或药应更改乎仲淳曰非也吾前所以投参芪不应而遽止之者以参芪为气分药剂且大其不应者必与证不合也兹得其情复何惑乎盖陰血者难成易亏者也不可责效旦夕仍投前剂至四十二帖忽得睡汗渐收睡愈熟睡至四日夜一醒霍然顏色逾常血足则色华也王善长夫人产后腿疼不能行立久之饮食不进困惫之极仲淳诊之曰此脾陰不足之候脾主四肢陰不足故病下体向所饮药虽多皆苦燥之剂不能益陰用石斛木 牛膝白芍药酸枣仁为主生地黄甘枸杞白茯苓黄檗为臣甘草车前为使投之一剂辄效四剂而起昔人治病必求其本非虚语也

施灵修乃正产后发寒热咳嗽不止因本元虚弱误用姜桂势甚剧数剂辄定

鳖甲【四钱】山查肉【五钱】橘红【二钱】当归【二钱】青蒿子【二钱五分】白芍药【四钱】牛膝【四钱】杜仲【二钱五分】枣仁【八钱】遠志肉【一钱】麦门冬【五钱】五味子【一钱】生地黄【四钱】茯神【三钱】益母草【五钱】竹叶【三十片】偶伤风加荆芥【一钱】防风【五分】咳嗽甚加桑白皮【三钱】有痰加苏子贝母【各二钱】腰痛加枸杞子【五钱】阙血未尽加黑豆炒一大把脾胃不佳去牛膝生地益母草

丸方

鳖甲【六两】牛膝【酒蒸六两】青蒿子【四两】懷生地 白芍药 枣仁【各六两】当归身 真阿胶【重荡酒顿化入药各四两】白茯苓【六两】遠志肉杜仲【各三两】麦门冬【六两】五味子【四两】枸杞子【六两】懷山药【切片】

【炒黄四两】牡丹皮【酒蒸二两五钱】山茱萸肉【四两】砂仁【炒二两】牡蛎粉【火煨通红淬入醋中如此七次研如飞面三两】细末炼蜜丸如梧子大每五钱空心白汤吞饥时更进一服

黄桂峯乃正产后头疼大便秘用生料五积散一剂不效仲淳加归身【一两】一服大便通头疼立止

张璇浦乃正产六朝发狂持刀杀人陰血暴崩肝虚火炎故也仲淳令先饮童便一瓯少止再服

龙齿 泽兰 生地 当归 牛膝 茯神 遠志 酸枣仁 大剂仍加童便顿服而止

王六息乃正产后惊悸闻声辄死非用力抱持则虚烦欲死如是累月仲淳曰此心脾肝三经俱虚也用人参酸枣仁茯神遠志芍药石斛甘草麦门冬五味丹砂为丸以龙眼汤吞弥月而愈

贺函伯乃正小产后陰血暴崩作晕恶心牙龈浮肿喉咙作痛日夜叫号不絕仲淳曰此证因失血过多陰气暴亏阳无所附火空则发故炎上胸中觉烦热所谓上盛下虚之候也法当降气气降则火自降矣火降则气归元而上焦不烦热齿龈肿消喉咙痛止阳交于陰而诸病自已尔

苏子【研细二钱五分】麦门冬【去心四钱】白芍药【酒炒四钱】青蒿子【二钱五分】牛膝【四钱】五味子【打碎五分】鳖甲 生地黄 甘枸杞【各四钱】枇杷叶【三大片】川续断【二钱】酸枣仁【炒爆研五钱】橘红【二钱】河水二钟半煎一碗加童便一大杯鬱金汁十二匙空心服时进童便一杯

庄敛之次女产后恶露未净至夜发热脾胃却弱腰腹大痛时师谓产后气血俱虚投以人参当归诸补剂转剧敛之深以为忧恐其成蓐劳也余诊视之谓不数帖即痊矣安用过虑为为疏一方白芍药【二钱】红麴【二钱】山茱萸肉【四钱】橘红【一钱五分】麦门冬【四钱】苏子【二钱】车前子【二钱】炙甘草【八分】干葛【一钱半】白扁豆【三钱】杜仲【三钱】牛膝【五钱】黑豆【八钱】泽兰【一钱】青蒿子【四钱】十剂而恶露净发热已腹痛亦止但腰痛尚未尽除而脾胃尚未健更为改定一方白芍药【一钱】山查肉【三钱】橘红【三钱】砂仁【二钱】麦芽【三钱】石斛【三钱】莲肉【四十粒】白扁豆【三钱】杜仲【二钱】五味子【一钱】山茱萸肉【二钱】炙甘草【五分】沙参【三钱】牛膝【五钱】十余剂脾胃亦佳其疾遂瘳

调理丸方

懷生地 熟地【各五两】麦门冬【去心】甘枸杞【去枯者及蒂各六两】杜仲【如法】川续断【去芦各五两】五味子【三两】栝子仁【如法六两】酸枣仁【炒爆研六两】茯苓【三两】青蒿子【四两】山药【五两炒】山茱萸肉【五两】牡丹皮【潤而厚者三两半】鹿角胶【酒化入药六两】橘红【三两】砂仁【炒二两】细末炼蜜和丸如梧子大每服五钱空心淡盐汤吞忌食鲫鱼子白菜菹

治女人血崩

人参 黄芪 麦门冬【各三钱】五味子【七分】杜仲 熟地 山茱萸【各二钱】枸杞子【三钱】续断【一钱】荆芥穗【八分炒】阿胶【二钱】河水煎日进三服

又丸方

黄耆【二两蜜炙】人参【一两】熟地【二两】白芍药【一两五钱酒浸切片半生半炒】五味子 懷山药 续断【酒洗】杜仲【酥炙】栝子仁【酒浸二宿蒸捣如泥】青蒿子【童便浸陰干】麦门冬 酸枣仁【各一两五钱炒】鹿角胶【三两酒顿化】共末将酒化鹿角胶栝子仁泥同炼蜜丸如梧子大每服五钱空心白汤下

董龙山夫人患血崩由于中年鬱怒诸医百药不効用大剂参耆徧覓胎发百余丸火煅调入药服久之渐愈火煅髮用小砂罐盐泥炼极熟将发入罐中封固陰干以炭火围之俟黑烟将尽即起若青烟出发枯不可用矣非细心人不可任盖火候不可过也

顾太学叔夏内人舟中为火所惊身热羸弱几成瘵羣医误投参芪势危甚仲淳以清肌安神之剂与之戒以勿求速效凡数十剂而安

麦门冬【二钱】鳖甲【小便炙三钱】青蒿子 银柴胡 桑白皮【自采忌铁蜜炙各二钱】五味子【一钱】枇杷叶【二钱】白芍药【一钱】生地黄【酒洗一钱】薏苡仁【三钱】

包海亭夫人患腹痛连少腹上支心日夜靡间百药不効仲淳诊其脉两寸關俱伏独两尺实大按之愈甚询知其起自暴怒风木鬱于地中投以芎防【上】柴胡【中】升麻【下】下咽暖气数十声痛立已已而作喘仲淳曰是升之太骤也以四磨汤与之遂平

甲申夏旧妇因鬱火痰喘身热手拳目张半月不眠食按其胃口不痛诸医疑其虚也或云中暑百药试之痰喘滋急以皂角末嚏鼻通窍痰上逆如沸延杨石林胗视请亟吐之先大夫曰病久矣虚甚可奈何石林曰经云上部无脉下部有脉其人当吐不吐则死即以盐汤吞之去白痰数盃喘定先大夫曰何以药之石林曰吐即药也待其熟寢勿服药以养胃气夜半啜粥二碗诘旦投六君子汤数剂而起石林者里中博雅士不行术而精方脉者也

高存之夫人患心口痛一日忽大发胸中有一物上升冲心三妇人用力捺之不下叫号欲絶存之曾预求仲淳立此方是日急煎服之服一盞冲上者立墮下腹中作痛不升矣再服腹中痛者亦消二日后以病愈起洗沐又忽作呕头痛如劈存之曰此即前症煎前药服之立安

白芍药【酒炒三钱】炙甘草【五分】吴茱萸【汤泡三次八分】白茯苓【二钱】延胡索【醋煮切片一钱】苏子【炒研一钱五分】橘红【盐水润过一钱二分】后加半夏【一钱姜汁拌炒】旋覆花【一钱】木通【七分】竹茹【一钱】

予妇今春忽患心痛连下腹如有物上下撞痛不可忍急以手重按之痛稍定按者稍松即叫号仲淳曰此必血虚也脉之果然急投以白芍药【五钱】炙甘草【七分】橘红【三钱】砂仁【砂三钱】炒盐【五分】二剂稍定已久以牛黄苏合丸疏其气暖气数次痛徐解予问故仲淳曰白芍药甘草治血虚之圣药也因久鬱气逆故減甘草之半仲景甲已化土之论详矣诸医不解尔炒盐者何曰心虚以炒盐补之即水火既济之意也予惧俗师槩以痰火食积疔心腹之痛故疏其详如左

昔年予过曲河适王宇泰夫人病心口痛甚日夜不眠手摸之如火予问用何药曰以大剂参归补之稍定今尚未除也曰得无有火或气乎宇泰曰下陈皮及凉药少许即胀闷欲死非主人精医未有不误者予又存此公案以告世之不识虚实而轻执方者

梁溪一妇人喉间如一物上下作梗前后板痛服仲淳方二十剂全愈

番降香【一钱】川通草【五分二味服三剂去之】苏子【三钱】橘红【二钱】枇杷叶【三片】人参【一钱】炙甘草【七分】石菖蒲【一钱】麦门冬【三钱】甘菊花【二钱】白芍药【三钱】远志【一钱】白豆蔻仁【四分】木【二钱】石斛【酒蒸二钱】加芦根汁一钟同煎入姜汁二匙

梁溪一女子头痛作呕米饮不能下仲淳云因于血热血虚火上炎

麦门冬【五钱】橘红【二钱】枇杷叶【三大片】苏子【一钱五分】白芍药【三钱】木【二钱】白茯苓【二钱】甘菊花【一钱五分】乌梅肉【二枚】竹沥【一杯】芦根汁【半碗】一二剂呕止头尚痛加天门冬【二钱】头痛少止再加土茯苓【二两】小黑豆【一撮】全愈

白带赤淋

妇人多忧思鬱怒损伤心脾肝火时发血走不归经此所以多患赤白带也白带多是脾虚盖肝气鬱则脾受伤脾伤则湿土之气下陷是脾精不守不能输为荣血而下白滑之物矣皆由风木鬱于地中使然耳法当开提肝气补助脾元宜以补中益气汤加酸枣仁茯苓山药黄檗苍术麦冬之类浓煎不时饮之再用六味丸中加牡蛎粉海螵蛸杜仲牛膝蜜丸光大如豆空心饥时吞下五六钱陰虚火炽加枸杞子五味子黄檗

白带多属气虚补气健脾治法之要领也

带下如浓泔而臭秽特甚者湿热甚也且多有湿痰下坠者宜苍术白术黄檗黄芩茯苓车前子为主佐以升提

带下如鸡子清者脾肾虚极也面色必不华足胫必浮腰腿必酸宜五味子八味丸间用开脾养心之剂如归脾汤之类陰虚有火宜六味丸中加五味子兔丝子车前子黄檗叔和云崩中日久为白带漏下多时骨肉枯盖言崩久血气虚脱而白滑之物下不止耳此症虽有血气寒热之分要归总属于虚赤淋多因于心火肝火时炽不已久而陰血渐虚中气渐损遂下赤矣治宜养心为主兼以和肝缓中凉血清气赤带久不止则血虚宜胶艾四物汤加便煅牡蛎粉酸枣仁麦门冬

标急而元气不甚惫者先救其标

标急而元气衰剧者则当本而标之也

治白带

蛇床子【米泔淘取沈水者蒸晒干去皮炒为细末】每一两加枯白矾末【五分】山茱萸肉 五味子 车前子【米泔浸蒸】香附【醋煮各三钱】细末山药糊丸如梧子大每四钱空心淡醋汤吞饥时再进一服后用四物汤加山茱萸 五味子 炒砂仁 白芍药 杜仲 黄檗 车前子【各等分】鹿角胶醋化丸如梧子大每日空心白汤吞五钱调理自除

治老年白带

黄檗【去粗皮切片蜜炒四两】砂仁【炒二两】杜仲【去皮切片盐酒炒去丝四两】川续断【酒洗二两】补骨脂【酒浸瓦上炒三两】川芎【二两】香附【八两醋浸二宿晒干分作四分一分酥炙一分童便炒一分醋炒一分盐水炒】蕲艾【用浸香附醋炒加山药粉煮作糊拌艾打成饼晒干一两五钱】山茱萸肉【四两】白茯苓【如法水澄蒸晒干二两】白芍药【酒浸六两半生半炒】鹿角胶【醋化五两】北五味【蜜蒸四两】车前子【米泔浸蒸晒干二两】牡蛎粉【火煨醋淬研如飞面三两】细末和鹿角胶丸如梧子大空心淡姜汤送下五钱

庶母因儿痘惊苦积劳虚烦不得卧心胆虚怯触事惊悸百药不效家弟长文偶于友人许闻兴化陈丹崖疗一女人甚奇其症与母类叩其方乃温胆汤也试之数剂而效

半夏【七钱】竹茹 枳实【各三钱】陈皮【四钱半】白茯苓 炙甘草【各二钱二分半】分二剂姜枣煎服外加酸枣仁【五钱】后因虚极加人参【二钱】质之仲淳曰此必有痰而善饭者也果然先安人因亡女忽患腰痛转侧艰苦至不能张口受食投以鹿角胶不斂以湿痰疗之亦不斂偏走使延仲淳曰此非肾虚也如肾虚不能延至今日矣用

白芍药【三钱】橘红【二钱】白芷【二钱】炙甘草【一钱】香附【童便浸炒三钱】肉桂【二钱】乳香 没药【各七分半灯心同研细临服下之】一剂腰脱然觉偏体疼仲淳曰愈矣再煎滓服立起予骇问故仲淳曰此在素问木鬱则达之顾诸君不识尔

姚公遠内子病延仲淳入诊其继母乘便亦求诊仲淳语伯道曰妇病不足虑嫂不救矣闻者骇甚曰吴方新婚亡大恙何至是耶予私扣之仲淳曰脉 数真弱症也不半歲夜热咳 势渐剧仓皇延仲淳疏方予之曰此尽吾心尔病不起矣逾年医家百药杂试竟夭瞿元立夫人素清癯不耐烦劳一日谓仲淳曰弟妇未生子而弱烦兄为诊其故次日仲淳往诊得其脉细无神赵文肃公问曰兄从元立许来诊其嫂得何脉曰今虽无恙必不久矣文肃顿足曰有是哉天胡厄善人甚耶此丙戌事也至秋夫人歿

祝氏妇年五十余患中满腹胀兼崩漏下虚清上则下虚弥甚实下则上胀弥甚仲淳为立二方以苏子石斛陈皮贝母 参人参白芍药治其上以地榆阿胶木 牛膝杜仲茜根椿皮治其下各为丸分食前后服之渐愈

顾太学叔夏内人患陰虚火证彻夜不眠者两月饮食俱废形体日削中外疑其必无救矣予

为之诊视决其必无大害第要多需时日耳用大剂人参枣仁茯神远志生地当归五味麦冬因虚甚气怯佐以琥珀辰砂金银器之类约百余剂而瘳后友人询其故予谓此病虽属虚幸脏腑无损心经虽有火幸不至烁肺多服补阴收敛之剂则水火自然升降所云壮水制阳光正此谓耳至于久病脉调身不发热岂有他虞哉

太学朱方仲内人禀赋极弱兼之作劳善怒内热怔忡胆虚气怯已三四年矣壬申夏忽发厥冒痰气上升则两目上窜手足发搐不省人事初时一日一发三四日后则连发不止日夜防百次牛黄竹沥遍尝不效予计已穷意欲用参附峻补因其时常口渴大便不通不敢轻投适一友至极其讚决谓非附不可强用附子二钱人参六钱作一剂投下午后进药黄昏发大热烦躁渴甚不两日毙矣此固非因附子而然第证候决不宜用傲幸之愈念漫试也【上三条附】

先醒斋广笔记卷三

明 繆希雍 撰

防科附痘疹

小儿初生即以粉草【三钱切片】江西淡豇豉【三钱】入沸汤一碗隔水煮干至一二小杯以绵为乳蘸药汁入儿口吮之以尽为度腹内有声去胎粪数次方饮乳月内永无惊风诸病

儿初生不可剪脐 三朝用麪和水成薄饼置儿腹穿脐 于麪上将薪艾火灸脐 近脐处或三炷或五七炷灸须下帐避风灸毕仍将脐 紮好听其自脱至七日方脱者元气足也罔儿九日方脱其神甚王

凡儿生下每日夜时将清汤或苦茶蘸软绢搅儿口内如齿边有白防即以指爪或细针挑破取桑树内汁滤清涂之永无惊风撮口之患予家用前三方儿月内并无殇者

治撮口 其症必先大便热

用生犀角及真羚羊角磨和蜜汁饮之有效急则用大黄【二钱】甘草【二钱】煎服

治月内啼

【阙】 飞辰砂极细末各五厘涂儿舌上立止

治胎惊 仲淳定有验

人参 白芍药【酒炒各一两】白茯神 酸枣仁【各一两五钱】炙甘草 远志肉【甘草汁浸蒸晒干各一两】真天竺黄【另研如飞麪】硃砂【另研如法各五钱】脐 【新瓦土炙焦存性另研细三条】天麻 犀角 滑石末【各一两】如有紫河车加【一具火烘干研细忌铁】右天竺黄硃砂脐 另研外余筛极细末然后加入另研三味再研和令极匀用钩藤浓汁四两和炼蜜半觔捣和前药每丸重一钱二分饥时临卧以灯心薄荷汤调化服日可与二三服或以钩藤汤煎浓化药更佳 如治急惊本方去脐 河车人参加白僵蚕【蜜炙六钱】全蝎【六钱】牛黄【一钱二分】琥珀【一钱】胆星【八钱】麝香【三分】

治胎疰 家弟患此服之神验

人参【三钱虚甚症久者加至一两止】白芍药【三钱酒炒】广陈皮【二钱】鼈甲【醋炙二钱】麦门冬【三钱】厚朴【二钱】青皮【七分醋炒】山查肉【三钱】水二钟煎

八分温服脾胃不佳加川黄连【一钱五分姜汁炒】真藿香【五分】白豆蔻【二分五厘】姜皮【五分】竹叶【三十片】白茯苓【二钱】

治小儿痼症或惊风不止【黄孟芳防患此症久服効】

天竺黄【五钱】酸枣仁【二两】麦门冬【去心二两】人参【一两】明天麻【五钱】天门冬【去心一两】白茯神【一两五钱】橘红【七钱】远志肉【甘草汁煮去骨一两】白芍药【酒浸一两】钩藤【五钱】细末炼蜜和丸如弹子大水飞极细硃砂为衣每服一丸灯心汤或龙眼汤化下又一方加紫河车一具酒洗净煮烂或焙干为末入前药中

疳积散 宋二怀传累试神效

治儿乳食不节过饱伤脾面黄腹大小便浊如米泔大便黄泄酸臭皮毛枯索甚而双目羞明生翳形骸骨立夜热昼凉等证并用此方主之

厚朴【去皮切片姜汁炒熟净末一两】广陈皮【去白净末八钱】粉甘草【去皮炙七钱净】真芦荟【明如漆苦如胆净末七钱】茺莢【真孔林大面多白衣者佳去白衣殼净末五钱】青黛【取颜料铺中浮碎花青淘净研二钱】百草霜【取山庄人家锅底煤二钱五分】旋覆花【净末一钱五分】匀和成剂小儿每一岁用药一分灯心汤空心调服服后病愈再用肥儿丸调理如脾气未实用啓脾丸或大健脾丸如疳气未尽用陈皮【一两】白木香【三钱】白茯苓【五钱】加平胃散【三钱】为末陈米汤调下

肥儿丸

人参【三钱】茺莢【一两】史君子肉【一两】白芍药【一两】橘红【八钱】黄连【一两】甘草【五钱】红麴【七钱】麦芽【七钱】砂仁【五钱】白茯苓【一两】山楂肉【七钱】滑石【一两】莲肉【二两】扁豆【一两】青黛【一两】炼蜜丸弹子大每服一丸空心白汤化下

治疳泻痢见红白积者

用前散子加黄连【姜汁土炒】肉豆蔻二味灯心汤少入熟蜜调服

治食积成疳

用前散砂仁汤调服四方俱宋二怀传

治小儿疳症唇白或紫腹大面黄髮干上指

施季泉有丸药如龙眼大纳猪肝内白酒煮之止食肝一剂而愈其丸取出尚可揉人方不传儿辈累试之奇验价亦廉

治疳眼

生鸡肝一具不拘大小雌雄二三岁者只用半具外去衣内去筋膜研极细如麪入疳积散若干调极匀加熟白酒厚薄相和隔汤顿极热空心服或用甜酒少加熟白汤调服至眼开翳散乃止

又方

白芙蓉花【阴干三四钱听用】另以不油不蛀肉荳蔻【一枚粉裹煨】真胡黄连【五分】共细末将赤雄鸡软肝去筋膜入前药末同研极细丸如龙眼核大白酒隔汤煮熟空心与儿吃其药约分三分如儿小可再分作四分儿大者可一二次顿服立效

治小儿走马牙疳百验方

冰片【三分】黄连【不犯铁】括萎【为末】红褐子【煨存性研细】黄蚕茧壳【煨存性研各五钱】明矾【一钱五分煨过研】五谷虫【要有尾者瓦上煨过存性研二钱五分】各末和匀再碾连吹数次立效吹药时先以米泔漱净吹药后仍以米泔漱净

又将夜壶底内积垢取出烧灰存性研极细敷牙根肿烂处立愈前方中加入更效

又将蜗牛连壳煨灰存性研极细末吹患处立愈右二方俱施季泉传

治小儿心口疼 仲淳定【非虫积作痛者不宜用】

牵牛【炒八钱】白木香【三钱】槟榔【一两二钱】红麴【炒一两】甘草【炙三钱】橘红【八钱】绿矾【火煨红以米醋淬入另研如麪四钱】细末粉糊和丸如梧子大每四钱白汤吞终身不可食荞麦

存之防郎病内伤大小便俱血诸医竞用红花桃仁病愈甚仲淳曰桃仁之类疏其瘀也血且行奈何又重伤之伤则补之而已以生地黄【四钱】川续断及杜仲牛膝等饮之稍平而腹痛不已仲淳曰是在内经强者气盈则愈弱者着而成病加人参【二钱】一剂而愈

月埠张氏儿十岁自防心痛得于母气不时发者发时饮食不进呻吟反覆三四日仲淳疏方药入口即止槟榔【一钱】黑丑【一钱】木香【五分】史君子【二钱】橘红【二钱】白茯苓【三钱】白芍药【二钱】旋覆花【二钱】猪苓【一钱五分】

义兴杨纯父防儿病寒热势甚棘诸医以为伤寒也药之不效仲淳曰此必内伤纯父不信徧询乳媪及左右并不知所以伤故仲淳固问不已偶一负薪者自外至闻而讶曰曩见郎君攀竹梢为戏梢折坠地伤或坐此乎仲淳曰信矣投以活血导滞之剂数服而起仲淳尝言古人先望闻问而后切良有深意世人以多问嘲医医者含糊胗脉以致两误悲夫

猴疳方 此胎毒湿热从肛门或阴囊边红晕烂

起渐至皮肤不结靨不治必烂死

生姜【四两】鳗鱼【一觔】共煮烂取浓汁涂之次用贝母灰存性【二钱五分】牛黄冰片【各一钱】共研细末敷之如复发用绵花油【一觔】大枫子肉 蛇床子 乳香 没药【共四两】青黛【一两】五味研细浸油内青布盖口以青钱压之数日后以鷺翎蘸油涂之再用鳗骨灰【君】牛黄 冰片【各少许】共为末敷之愈

儿服末药

人中白【煨】胡黄连

青黛【各五分】辰砂【三分】甘草【二分】人参【一分】共为末蜜调服之

乳母服药

当归 黄连 金银花 桔梗 连翘 川芎 甘草 山梔 薄荷【各等分】水煎服

【以上三方马铭鞠传】

张守为防郎患癆疳嗜食易饥腹如蜘蛛过数日一泻泻则无度面目黧黑指节中亦几无剩肉矣其母亦病诊脉 数骨蒸劳热大渴引饮淋闭【阙】然马铭鞠曰儿病实母病也用麦门冬枇杷叶怀生地白芍药青蒿鼈甲之属以治母用干蟾为君加犀角羚羊角白芙蓉花牛黄每用分许日入鸡肝内饭上蒸服以治儿再用滑石白扁豆白茯苓车前子山查肉五谷虫等分为末拌人乳晒干七次畧入砂仁末陈米汤丸弹子大日进两丸不二十日子母俱痊二方絶无药气故儿喜啖之

华叔蟾乃郎慢脾风五六日愈愈甫三四日即过多饮食连浴两宵复痰壅沉迷面目俱浮胸腹肿满呕吐乳食不进角弓反张二便交秘有欲进以牛黄丸者马铭鞠曰下咽死矣此病后虚症也然参且勿用用麦门冬【三钱】枇杷叶【三片】贝母【二钱五分】桑白皮【一钱五分】杏仁【一钱】藿香【一钱】新鲜大糖球【一枚】苍术【用人乳汁炒三次八分】橘红【一钱二分】加灯心煎临服入姜汁逾时小便随利腹即寛而诸证悉退尽剂竟愈以此知婴儿病后不可不慎即此儿半年后下午连食冷鸭子二枚午间又纵恣饮食更余病发上不吐下不泻胸腹胀满目闭气喘身热按其胸腹则双手来防马曰食也鸭子黄闭气得水则化今尚在胃口急索大枣数枚煎汤入砂仁钱许以通其气儿渴顿饮碗许气渐通目

开手足亦渐流动再煎饮之夜半吐泻交作次日勿药而愈

万中丞涵台患痰症合琥珀丸不用弃去马铭鞠曰此防科絶胜药也开缄而琥珀清香之气触鼻入脑光莹可爱取之凡遇慢惊所投神验兼治小儿一切虚证如华虚舟五郎庇甚善哭周岁中每哭即气絶絶而苏一饭时许矣至三岁外其病日深哭而絶絶而苏甚至经时初或一月一发后则频发有日再发者投以此药人参圆眼汤下数丸遂瘥

琥珀丸方

琥珀【三钱】天竺黄【二钱】人参【三钱】茯神【二钱】粉甘草【三钱】硃砂【一钱五分】山药【一两】胆星【二钱】莲肉【三钱】炼蜜丸硃砂为衣每服【一钱】庄敛之艰嗣辛酉幸举一子未及三月乳妇不善抚养盛暑中拥衾令卧忽患丹毒遍游四肢渐延腹背敛之仓皇来告予曰儿方数月奈何苦之以药急以犀角绞鲜梨汁磨服敛之问故予曰犀角能解心热而梨汁更能豁痰且味甘则儿易服别疏一方用荆芥穗【二钱半】鼠黏子【二钱】怀生地【四钱】牡丹皮【一钱五分】参【三钱】括萎根【三钱】薄荷叶【一钱】竹叶【百片】麦门冬【去心四钱】生甘草【三钱】连翘【三钱】贝母【去心三钱】生蒲黄【二钱】令煎与乳妇服之乳汁即汤液矣敛之依法治之一日夜赤者渐淡再越日丹尽退后卒以乳妇不戒患惊风而殇

稀痘神方

金银花为末糖调不住服有效【顾骧宇传】

又方【江右米以功传神方也】

赤豆【小饭赤豆】黑豆 菉豆 粉草【各一两】为细末用竹筒削去皮两头留节一头凿一孔以药末入筒中用杉木砧塞 黄蜡封固外以小绳系之投入腊月厕中满一月即取出洗净风干每药一两配腊月梅花片三钱和匀若得雪中梅花片落地者不着人手以针刺取者更妙如急用入纸封套内略烘即干儿大者用一钱小者用五分俱以霜后丝 藤上小藤丝煎汤调空腹服汤宜多服服后忌荤腥十二日解出黑粪为验一次可稀三次不出每年服一次

又方 娄江王相公传甚效

菟丝子【半觔好酒浸二宿煮干去皮】黑 参【四两】为极细末炼蜜丸如弹子大每空心白汤调化一丸日二次

又方加生地黄 麦门冬【各四钱】犀角末【一两】

又方

脑不去骨 肚不去粪 葡萄【五钱】白葡萄【五钱】共炙蜜丸每一钱白汤下此侯少芝方

又方 丁见源比部传

用白牛虱数百枚焙燥和糖令儿服之服数次有红防发出此毒解之侯也不效再服先头面次心坎次腰肚次四肢以渐见防痘必稀白牛惟江北多虱藏牛耳中不多得须多服方效

痘症有二一曰血热毒盛一曰气虚毒盛气虚者可以徐补血热毒盛者势必亟一发热便口渴面赤气喘狂噪谵语此其证也一见防即宜凉血解毒急磨犀角汁多饮之十可疗四五稍迟难捱矣又有血热兼气虚者初发先服凉血解毒之剂五六朝后可以并力补气助浆唯初时不早凉血则毒不解毒不解延至六七朝势必以参耆助浆浆必不来反滋毒火又有血热毒盛似气虚者初热放防神思昏乱足冷痘色白如水窠唯有唇肿口渴辨其火症医者反以气虚治之十无一生孙生东疗郑黄门子血热毒盛初起急以犀角地黄汤疗之不效至用白芍药【八钱】一泄毒解徐补收功家弟 箸一发热即谵语唇肿齿黑痘欲出不出医者以为发斑伤寒也延仲淳施季泉不至予曰事急矣以生地【八钱】白芍药【五钱】黄芩黄连【各二钱】稍加发药日三剂势稍定痘渐次出医者曰尔时宜发痘奈何以凉剂遏之予曰解毒即所以发也未几季泉至以予言为然第减地黄芍药之半复于助浆中兼清凉之剂九十朝浆足卒伤一目仲淳曰使子之言尽行则目亦可不眇矣后方大便此真血热症也

松江黄绮云疗徐氏儿痘儿防遇冬月痘不起炽炭围炉抱儿火边以酒浆搥火火气薰儿痘立起

又有痘而腰痛者一医以人参芦【三两】煎汤饮之一吐痘起痛寻解叩其故曰毒在下部提之则上升而毒散矣大抵痘家利吐吐中便有散毒之义

施季泉曰凡成婚或破阳后出痘而腰痛者可疗童子而腰痛是先天之水不足也不治惊痘易治者以毒由心经出故轻非因恐吓成惊反易治也其言甚有味故存之【施君讳一中住良渚去杭州塘栖二十五里】

顾叔夏次郎八岁出痘而先腰痛予断以不治果殇【附】一小儿初痘血热甚黄绮云用怀生地【三两】浓煎顿饮其痘紫色立转红

臧玉涵次郎年十六因新婚兼酒食忽感痘诸医以为不可治施季泉至八日浆清寒战咬牙谵语神思恍惚诸医皆欲以保元汤大剂补之季泉以为不然改用犀角地黄汤得脱痂后忽呕吐大便燥结淹延一年羣医束手告急仲淳仲淳视其舌多裂文曰必当时未曾解阳明之热故有是症命以石膏【一两】人参【一两】麦门冬【五钱】枇杷叶橘红竹沥童便为

佐一剂即安再进二剂隔间如冷物隔定父母俱谓必毙仲淳曰不妨当以参汤投之服两许即思粥食晚得大便夙疾顿瘳

治痘喘

取白花地丁以水煎服止喘甚神

治火痘毒盛遇火令 施季泉传

白花地丁滤汁和淡白酒浆少服之立解

治痘泄

长儿痘初热即泄日十数行见痘泄不止时医以脾胃药止之愈甚施季泉曰是在不治予强之曰止泄不难发药中加黄连【二钱】黄芩【一钱】一剂泄止予喜甚施君曰非也毒火太炽故泄初泄时即以解利药乘热导之或可望生今迟矣过四日即欲解毒无及矣坐视七日死臧玉涵防儿甫半周身热一日即见痘郡有专门知名者延治之云树小花多顶平脚塌根窠薄百死一生之症也五朝固辞去药以保元汤为主拟六朝多用人参加附子疑虑间施季泉忽至曰此险症且诫云必发痒异常须看守严密药用凉剂与前治大别七朝大发痒作泻一日夜二十余行或药水或乳或汤饮俱倾注不变色举家谓必无幸矣季泉怡然自若因强之用参必不许药内加炒黑黄连泻止十三朝复发痒口渴唇燥舌生白胎又加炒黄连白胎去到底不用参十九朝季泉别又诫曰慎防痘疗口疳疔之发也必在脑后枕骨间当以収口膏药贴之禁用掺药口疳惟君家人中白散为妙不数日发疗口生疳如其言治之辄效季泉口授一家传秘方治痘后余毒如神

人参 白茯苓 金银花 犀角【各三钱】甘草【一钱五分】羚羊角【一钱】珍珠【八分】蜜丸每服一钱日二服

一小儿痘泄诸豎以升澁之剂投之不効黄绮云至以白芍药约三两余酒炒一剂即止此脾虚有热故也治痘虚寒将行浆时作泄【若系火热泄者不可用】

莲肉【炒去心】一味为末每末一两加云南鸦片五分研匀儿大者用末五分儿小者三分白汤调下立止虚痒或虚烦躁不止亦如之

于中甫长郎痘患血热兼气虚先服解毒药后毒尽作泄日数次不止痘平陷矣仲淳以真鸦片【五厘】加炒莲肉末【五分】米饮调饮之泄立止王宇泰继以人参【二两】黄芪【三两】鹿茸【三钱】煎服补其元气浆顿足盖以先服解毒药已多无余毒矣故可补而无余证

存之孙女痘后泄以鷓鴣片如法饮之不止仲淳更以糯米莲肉作糜一瓯立愈

一老医有孙痘已脱痂少腹胀小水不通众鑿以为痘后余毒以利水解毒药投之愈胀老医忽悟曰痘后无实证土坚则水清脾虚下陷故也用后方一服立效人参【一两】大枣【五枚】水姜【五片】

治痘后脾虚作泄老人脾虚作泻亦甚效

黄耆【四两】人参【四两】肉豆蔻【二两】五味子【四两】山茱萸肉【四两】莲肉【六两】白扁豆【四两】白术【三两】为细末枣肉捣膏和丸如弹子大每用一丸姜汤磨化下

一小儿痘已脱痂初无他苦一鑿视其目精无神 白曰不可为已逾日亡

治痘痂艰脱【血热又兼血虚故艰脱也尚宜保养俟脱尽乃可见风】

人参【一钱五分】白芍药【酒炒三钱】甘草【炙一钱】麦门冬【去心五钱】五味子【六钱】怀生地【四钱】金银花【四钱】水煎饥时服

痘毒非元气壮实者不可外治大忌围敷药戒之

痘痂神效方

雄黄牛粪尖烧灰存性为末每一钱加冰片【二分】研细吹患处立愈

治痘后翻痂【不拘上下部肿烂淋漓者俱效】

象牙末【三钱】真珠末【三钱】白僵蚕【二钱炒】孩儿茶【一钱五分】为极细末以济寧胭脂调敷毒水如注渐渐収口

防痘伤目方 吳季泉传自王府

雌雄槟榔二枚每枚用清水粗碗上磨一百转随将痘儿目闭者以口津润开用鸡毛蘸槟榔水拖眼稍三四次其痘痂即落永不伤目

又方

用真济寧油胭脂涂眼腔周遭三四次永不伤目试之累验

治痘后病目兼治血热病目而脾胃壮实者

天门冬【四两】麦门冬【四两】枸杞子【四两】甘草【一两】生地黄【八两】五味子【二两五钱】甘菊花【三两】参【三两】地骨皮【二两】白蒺藜【炒去刺五两】谷精草【三两】木贼草【三两】蜜蒙花【二两】草决明【二两】女真实【同黑豆九蒸九晒六两】槐角【四两】羚羊角【三两】蜜丸

梁溪一女子痘后目痛上白靥不见物服二十剂全愈 仲淳立

谷精草【二钱】草决明【炒研一钱五分】川黄连【酒炒一钱五分】怀生地【二钱】川芎【八分】甘草【六分】白蒺藜【炒研一钱】柴胡【七分】甘菊花【二钱】石菖蒲【一钱】木贼草【一钱五分】参【一钱五分】连翘【一钱】麦门冬【二钱】

痧 论并治法

痧 者手太阴肺足阳明胃二经之火热发而为病者也小儿居多大人亦时有之殆时气瘟疫之类欤其证类多咳嗽多嚏眼中如泪多泄泻多痰多热多渴多烦闷甚则躁乱咽痛唇焦神昏是其候也治法当以清凉发散为主药用辛寒甘寒苦寒以升发之惟忌酸收最宜辛散误施温补祸不旋踵辛散如荆芥穗干葛西河柳石膏麻黄鼠黏子清凉如 参括楼根薄荷竹叶青黛甘寒如麦门冬生甘草蔗浆苦寒如黄芩黄连黄檗贝母连翘皆应用之药也量证轻重制剂大小中病则已毋太过焉

痧 续论

痧 乃肺胃热邪所致初发时必咳嗽宜清热透毒不得止 后咳嗽但用贝母括楼根甘草麦门冬苦梗 参薄荷以清余热消痰壅则自愈慎勿用五味子等收敛之剂多喘喘者热邪壅于肺故也慎勿用定喘药惟应大剂竹叶石膏汤加西河柳两许 参薄荷各二钱如冬天寒甚痧毒为寒气郁于内不得透出者加蜜酒炒麻黄一剂立止凡热势甚者即用白虎汤加西河柳切忌过用升麻服之必喘多泄防慎勿止防惟用黄连升麻干葛甘草则泻自止家不忌泻泻则阳明之邪热得解是亦表里分消之义也痧后泄泻及便脓血皆由热邪内陷故也大忌止澁惟宜升散仍用升麻干葛白芍药甘草白扁豆黄连便脓血则加滑石未必自愈痧后牙疳最危外用雄黄牛粪尖煨存性研极细加真片脑一分研匀吹之内用连翘荆芥穗 参干葛升麻黄连甘草生地黄水煎加生犀角汁二三十匙调服缓则不可救药痧后元气不复脾胃虚弱宜用白芍药炙甘草为君莲肉白扁豆山药青黛麦门冬龙眼肉为臣多服必渐强慎勿轻用参术痧后生疮不已余热未尽故也宜用金银花连翘荆芥穗 参甘草怀生地鼈虱胡麻黄连木通浓煎饮之良

痧 不宜依证施治惟当治本本者手太阴足阳明二经之邪热也解其邪热则诸证自退矣

治痧 发不出喘 烦闷躁乱

西河柳叶风干为细末水调四钱顿服立定此神秘方也砂糖调服兼可治 后痢去岁铭鞠救呉少海子及其侄汤水不入矣逐口强灌之而生今岁张守为长郎初婚亦危矣治之亦愈皆仲淳法也

又方 仲淳立

蝉蜕【一钱】鼠黏子【炒研一钱五分】荆芥穗【一钱】 参【二钱】甘草【一钱】麦门冬【去心三钱】干葛【一钱五分】薄荷叶【一钱】知母【蜜炙一钱】西河柳【五钱】竹叶【三十片】甚者加石膏【五钱】冬米【一撮】又方加三黄

贺知忍少子病痧 家人不知尚以肉饭与之仲淳适至惊曰此痧症之极重者何易视之遂以西河柳两许杂以 参【三钱】知母【五钱】贝母【三钱】麦门冬【两许】石膏【两半】竹叶【七十片】二剂而痧尽现徧体皆赤连进四剂薄暮矣知忍曰儿今无恙乎仲淳曰痧虽出尽烦躁不止尚不可保再以石膏【三两】知母【一两】麦门冬【三两】加黄芩 黄连 黄栢【各五钱】西河柳【一两】竹叶【二百片】浓煎饮之烦躁遂定而瘥冬月痧 因寒不得发透喘渴闷乱烦躁不定用麻黄去节汤泡过以蜜酒拌炒加一钱或七八分于治痧药中一服立透药用干葛麦门冬贝母前胡荆芥 参西河柳甘草知母

治痧后下积滞 仲淳立

川黄连【酒炒一两】升麻【七分】干葛【八钱】甘草【四钱】黄芩【八钱】白芍药【酒炒八钱】滑石【如法一两】怀山药粉和丸白汤吞三五钱

治痧后口疮

雄黄牛粪尖一个【火煨过研细】明矾【五分】冰片【一分五厘】皮硝【一钱】白硼砂【三钱】铜青【三分能作痛可去之】研细以鹅翎管吹入患处

治痧后症 仲淳立

鼈甲【如法二钱】山查肉【三钱】橘红【二钱五分】贝母【三钱】竹叶【五十片】炙甘草【七分】麦门冬【去心三钱】知母【一钱二分】白茯苓【二钱】干葛【一钱五分】柴胡【一钱】 如不渴去知母渴甚加石膏【五钱】

顾鸣六乃郎禀赋素弱年数岁患脾虚证饮食絶不沾唇父母强之终日不满稀粥半盂形体倍削鸣六深以为忧予为之疏一九方以人参为君茯苓山药橘红白芍药莲肉扁豆为佐更定一加味集灵膏相间服之百日后饮食顿加半年肌体丰满世人徒知香燥温补为治脾虚

之法而不知甘寒滋润益阴之有益于脾也治病全在活法不宜拘滞【附】

肿毒

疔疽一切肿毒神方 仲淳立屡试神验

生甘菊【连根打碎一两五钱】紫花地丁【五钱】甘草【水炙三钱】鼠黏子【砂研一钱五分】括萎根【二钱】贝母【去心三钱】金银花【五钱】白芷【一钱五分】怀生地【三钱】白芨【三钱】连翘【二钱五分】五爪龙【五钱即茜草】先用夏枯草六两河水六碗煎三大碗去渣入前药煎一碗不拘时服溃后加盐水炒黄芪【五钱】麦门冬【五钱】五味子【一钱】

秘传治痈疽诀

凡未发疽大热作渴及愈后作渴大小便秘神昏作呕不食不知痛全犯者不治腰痛者不治清便自调神思清爽能食知痛不呕夜能睡微发热者易治

痈疽发热作渴不知痛用黄芪【君】麦门冬【上】五味【中】甘草【下】煎汤服大小便秘用大黄下之毒气攻心神昏作呕不食用防心托里散菉豆粉【上】硃砂【中】乳香【下】俱为极细末和匀每服三钱白滚汤下

围阴症疮疡【外势平而不起色黑黯其痛沉在肉里者用此】

红药子【四两】白芨【一两五钱】白芷【一两五钱】乳香【六钱】没药【六钱】硃砂【三钱】雄黄【三钱】麝香【一钱】冰片【一钱】黑狗下颏【一个煨存性】豌豆粉【一两】各另研为极细末和匀以醋蜜调敷四围以极滚热醋蘸润兼可服

围阳症疮疡【外势高肿散大色红甚者 紫但发亮鲜明发热大小便不利用此】

大同城【以桑皮绵纸衬滚汤淋下十分】加桑灰淋汁【三分】下硃砂 雄黄乳香 没药 冰片 白芨 白芷 蟾酥【俱中】 麝

香 牛黄【俱下】明矾【上】五倍子 大黄【上上】各药另碾为细末待汁冷和匀入上好小口磁器罐中口上用铅套套上外以黄蜡封好令固密听用

灸痈疽药饼

夜明砂【五钱】月经布灰【存性一钱】麝香【三分】冰片【三分】乳香【一钱】没药【一钱】明矾【研细一钱五分】雄黄【一钱】荞麦麴拌匀做薄饼放疽头上加大炷

艾火灸之先令病者吃些米饮及托里等汤药每灸至百壮痛者灸至不痛不痛者灸至痛但得一爆其疮立愈元气弱者停一会再灸镇日夜灸方好

治发背及肿毒围药

腾黄【三钱五分研细】五倍子末【二两】米醋调敷围

治发背神方

一法单用败龟板一味去肋涂黄蜡灸透内服外敷锡山保安寺僧秘诀也有奇效 马铭鞠传

又方

血竭【一钱】雄黄【一钱】没药【五分】麝香【五厘】研细末用绵纸为燃长一尺二寸将药四五分以真麻油润燃着灯头令病人避风处端坐执燃者离疮四五分自外而内徐徐照之疮上微微觉热即心神快爽不可太过恐伤好肉初用三条每日加一条渐加七条势消每日减一条直熏至红肿消尽为度可贴太乙膏加琥珀熏一次随用敷药日日如此熏时将猪蹄汤掠去油用新羊毛笔润汤将敷药洗净始熏熏罢用后敷药车前子【连根叶】蓍荳草金银花五爪龙【俱用鲜者】各等分捣烂加多年陈小粉调敷四围红肿处中留一孔恐出脓如疮口大用葱叶滚水泡批开去内涎水拍熟贴之如疮口久不合恐流脓水再以药敷之

太乙膏方

参白芷生地甘草当归血余【多】大黄【多】

治背毒初起【由于郁者遠志一味可治】

遠志肉【甘草汁煮去骨五钱】甘草【一钱五分】甘菊花叶【一两鲜】贝母【三钱】鲜忍冬藤【五钱】紫花地丁【五钱鲜】连翘【一钱】白芨【三钱】

托里败毒散

绵黄芪【盐水炒三钱或五钱或八钱或一两】甘草节【水炙二钱可加至四五钱】赤芍药【二钱】金银花【三钱】茜草【江西出细如灯心者佳三钱】何首乌【鲜者五钱】真白僵蚕【炙研六分】白芨【二钱五分】皂角刺【一钱】贝母【去心二钱】括萎根【三钱】穿山甲【土炒研一钱】鼠黏子【炒研一钱】蝉蜕【去翅爪一钱】先用夏枯草五两河水五大碗煎三碗入前药同煎至一碗不拘时服阴症去后五味加人参【三钱】麦门冬【五钱】

溃后服药

人参【三钱】麦门冬【五钱】绵黄芪【蜜炒五钱或一两】甘草【炙二钱】五味子【蜜蒸一钱】白药【酒炒三钱】金银花【三钱】山药【三钱炒】水二钟煎一钟难得收口加肉桂胃气弱加生姜【三五片】大枣【三枚】痈疽溃疡忌术肿疡忌当归

替针散

蜜壳一个煨存性为末酒调下不可多服

去烂肉方

用巴豆炒烟起焦黑为度碾极细末敷上去旧生新

长肉方

用无人见处自死竹蘸菜油烧滴下油用磁碟盛之搽上即生肉神验

防膜矾蜡丸

白矾【明亮者研二两】黄蜡【一两熔化提起待稍冷入矾末不住手搅匀加蜜五六钱和匀】众手丸如梧子大蜡冷不能丸以滚汤燂之便软硃砂为衣每二十丸渐加至三四十丸白汤或酒吞此药防膜防毒气内攻未破即内消已破即便合一日之中服百粒方有功终始服过半觔必万全病愈后服之尤佳

又方

白矾【生研末四两】真黄腊【二两半】加炼蜜七八钱硃砂研如飞麴水飞如法六钱搅匀急须众手为丸如梧子大每四钱白酒吞

治痈疽对口疔疮发背一切无名恶肿毒方名无敌大将军

桑柴灰【将柴另烧取其炭火置一大缸内待其自化成白灰取一斗绵纸衬入淘箩内清滚水淋下汁磁缸盛贮淋至汁味不苦澁鹹则止将汁入磁碗中重汤燂浓如稀糊为度】茄杆烧灰【淋制如前法用一斗】矿灰【即石灰须柴烧者佳一斗淋汁如前法】三味熬调和匀名三仙膏亦可防痈疽之稍轻者再和城水熬膏一两加入后开细药则成全方每三仙膏五两真正自收蟾酥【三钱五分酒化令匀】梅花冰片【二钱】真正牛黄【一钱】珍珠【二钱三味俱研如飞麴】透明雄黄【二钱】明矾【三钱】硃砂【一钱五分】白硼砂【二钱】八味另研如飞麴方妙真麝香须用当门子【即麝香最上乘者一钱碾匀】铜青

【一钱五分】硃砂【二分五厘】火硝【三钱】轻粉【二钱】乳香【二钱打碎人乳浸烂研匀】没药【一钱五分制法同前】各药研细末和匀再碾数千下将前膏加入搅得极匀入磁罐内罐须小口者妙以乌金纸塞口封以好黄蜡勿令一毫气走每遇毒取少许涂其顶干则以米醋和蜜少许润之其毒黑血或毒水爆出即时松解切忌不可着在好肉上或用荞麦麴调若系疔疮加铁锈黄一分研如麴和入多涂其正顶信宿其根烂出内服紫金锭一锭须内府者方効若系痈疽等症别服蜡矾丸及托里解毒之剂此药有夺命之功难以尽述倘一时无许多好药即制半料亦救人无算矣

治疗丸

蟾酥【三钱】冰片【一钱】麝香【七分】真白僵蚕【一钱五分】明矾【三钱】牛黄【一钱】硃砂【一钱五分】黄白占溶成油须令软冷定加前药末和丸如麻子大每七分葱头白酒吞下取汗汗后即以半枝莲为君连翘【上】赤药甘草白芨白蔹金银花【俱中】紫花地丁【五钱】生甘菊【二两】河水二钟煎一钟下大黄随病势加之一滚即起服后必行然须察病人胃气壮者可用后方用败毒托里之药调理之可不死矣大抵治疗毒在急急则毒气未走若走黄多不可治走黄后发狂咬人便能发疔汗下时其秽气触人亦能发疔宜谨避之看疮疡疔毒须饮酒以麻油涂鼻

治疗膏 金太初传神验

以透明松香沥青【各五钱】麻子肉【二钱如冬季加五分】三味大青石上以铁锤锤细锤至前药粘在锤上拈起如清水一般为度又加飞丹【一钱】再锤数百下取取小磁杯内如遇初起疔毒以新青布照疔疮一般大小摊膏药贴之痛即止少顷毒水渐渐流尽疔根如灯心一条拔出仍用原旧膏贴上至重者再换一膏药全痊矣摊膏药小磁杯隔汤煨化竹筋摊膏约一文钱厚

疔毒神驗方

用陈年露天铁锈碾如飞麴将金银簪脚挑破毒处一孔纳铁锈末于内仍将皮盖好少顷黑水流尽中有白丝如细线慢慢抽尽此疔根也尽即立愈

又方用甘菊花并根叶捣汁以酒下之立消

顾圣符防弟患髭疔医者先用火针围药肿胀至目与鼻俱隐入肉牙关急马铭鞠用患者耳垢齿垢刮手足指甲屑和匀如豆大放茶匙内灯火上炙少许取作丸令洗净围药将银簪挑开疔头抹入外用绵纸一层津湿覆之痛立止半日肿半消目可开次日服仙方活命饮二剂愈此法兼可治红丝疔长洲华承溪指节间患之得此而痊又云可治面白疔未试也此方传自道人

顾博士伯钦内人左耳患疔时方孕仲淳先以白药子末鸡子清调涂腹上防胎次以夏枯草甘菊贝母忍冬地丁之属大剂饮之一服痛止疔立拔胎亦无恙白药子疗马病者也

治耳边发肿连太阳腮齿俱痛不可忍

大黄【一两】青木香【三钱】姜黄【三钱】槟榔【三钱】为末醋蜜调匀贴患处中留一孔出气

治乳鵞

芒硝【研细一钱五分】胆矾【八分】雄黄【八分】明矾【八分】俱研细和匀吹入喉中

又方

用蛤蚧草【即土牛膝叶如荔枝】捣汁灌鼻内右鵞灌左鼻内左鵞灌右一吐而愈或急不及药以针或芦管刺喉令出黑血复以蚰蜒加乌梅少许捣烂取乱发裹箸上涂前药搅患处去其腻痰则愈矣蚰蜒不能卒办梅雨时取贮磁瓶内封固久而不坏

纏喉风方【即喉痹仲淳试过有验】

明矾【三钱】巴豆【去壳七粒】溶矾入巴豆烧至矾枯去巴豆研细吹入喉中流出热涎立开

治喉癰内热

贝母【去心三钱】鼠黏子【酒炒研二钱】参【二钱五分】射干【二钱不辣者是】甘草【二钱五分】括萎根【二钱】怀生地【三钱】白僵蚕【一钱畧炒研】连翘【一钱】竹叶【二十片】水二钟煎八分饥时服

倪仲昭患喉癰邑中治喉者遍矣喉渐渐腐去饮食用粉麪之烂者必仰口而咽每咽泣数行下马铭鞠曰此非风火毒也若少年曾患霉疮乎曰未也父母曾患霉疮乎曰然愈三年而得我铭鞠以为此必误服升药之故凡患此疮者中寒凉轻粉之毒毒发于身升药之毒毒发于愈后所生子女毒深者且延及于孙若甥倘不以治结毒之法治之必死以甘桔汤为君少入山豆根草龙胆麝干每剂用土茯苓半觔浓煎送下牛黄二分半月而痊竟不用吹药既而询之云父母病时果服丸药而痊痊后曾口碎非升药而何今鑿家恬然用之不晓其中毒之深故特明其说

喉痹

雄黄 芒硝【各一钱】研细以鷺毛管吹少许数吹立散但待其肿甚而吹为妙

又方用半枝莲捣汁吃立散其渣须藏于家中勿令见风

吹喉方【治双鷺单鷺神效】

火硝【一钱五分】官硼砂【五分】片脑【三厘即冰片】雄黄【一分不用亦可】鷺管芦管银管共可盛吹前药用三匙吹上喉即吐痰涎愈从鼻孔中吹入亦效

瘰癧丸方

贝母【去心二两】天花粉【一两五钱】 参【一两五钱】甘草【一两五钱】斑猫【古米炒去头足听用】肥皂【二觔每一肥皂去核入斑猫四个线缚蒸取出去斑猫并肥皂皮觔净肉十两】前药为末共捣如泥丸如梧子大每服一钱白滚汤吞服后腹疼勿虑此药力追毒之故

又方

取过冬青【即荔枝草正名天明精】五六枝同鲫鱼入锅煮熟去草及鱼食汁数次即愈

朱文学鑪患瘰癧仲淳为灸肩井肘尖两穴各数壮而愈

治瘰癧【回燕膏仲淳试之有效】

真芝麻油【二觔】胎发【四两如无以童男发洗净代之】川山甲【五钱】白矾【飞过一两】黄蜡【四两】飞丹【二两】松香【六两】轻粉【五钱研】乳香 没药【各五钱另研】燕窝泥【朝北者二两微炒】五灵脂【淘净五钱】麝香【另研五钱】蜜陀僧【五钱】将川山甲五灵脂煎数沸下胎发熬溶滤去渣称净熟油二十四两仍入锅内下白矾煎二三沸下黄腊黄丹煎一沸下松香官粉六两再煎一沸下燕土如沉香色滴水成珠住火方下乳香没药搅匀少顷下轻粉桃柳枝搅温可入手然后投麝香搅匀水浸去火毒七日用贴瘰癧未破者软已溃者干内服夏枯草汤

夏枯草汤

金银花【五钱】夏枯草【二两】柴胡【七分】贝母【二钱】土茯苓【白色者二两】鼠黏子【一钱微炒】鼈虱胡麻仁【二钱微炒】酸枣仁【二钱】 萎仁【二钱畧炒】陈皮【一钱】皂角子【一钱】白 药【酒炒一钱】当归身【二钱】粉甘草【一钱】荆芥穗【一钱】连翘【一钱五分】何首乌【五钱】漏芦【二钱】水煎食后服

又方

夏枯草 蛇苗草 紫背天葵 紫花地丁 金银花 九龙草 或汁者汁 或末者末 俱要以好酒调服

又方【藻星膏兼治鱼口一切等疮】

巴豆【一两炒黄色复以纸条防火烧之候黑色用】海藻【二钱炒】昆布【一钱炒产海中】天南星【一钱切碎醋浸二日炒】升麻【五分】天花粉【五分炒】各为极细末以香油和成稀膏用文火熬候烧干入巴豆下巴豆后畧熬退火冬月加巴豆【五钱】南星【一钱】夏月减南星【五分】加天花粉【一钱】

治热疔 廖宪副梦衡传

黄梅水时取新出虾蟆【黑而细者是】置瓶内木盖口蜡封埋地下久化成清水取出蘸抹之兼可治疗疽

治对口疔【试之神效】

鲜茄蒂【七个】鲜何首乌【轻重等分】水二钟煎八分一服出脓再服收口

又方

金银花【一两净】木槿树根皮【一两切片】酒水各一碗煎食后服面上疔加白芷【一钱】蒲公英【即直下根】和黄蚬打烂罨患处以真麻布包之三日立愈

梁谿一女子颞下发一硬块而不痛有似石癭仲淳疏方服十剂全消

贝母【去心三钱】连翘【二钱】鼠黏子【酒炒研一钱五分】括萎根【二钱】金银花【五钱】何首乌【去皮竹刀切片三钱】白芨【二钱】苍耳子【研细一钱五分】生甘菊【五钱】青木香【一钱五分】紫花地丁【五钱】先用夏枯草【五两】河水五碗煎至三碗去渣纳煎药同煎至一碗

敷药方

南星【三两】海藻 昆布 槟榔 姜黄 白芨 猪牙皂角【各一两】细末醋调敷

梁谿一妇人生疔臂上服此半日立出血脓愈

连翘【二钱】白芷【二钱】甘菊【一两】紫花地丁【五钱】白芨【二钱】粉甘草【

三钱】金银花【五钱】生地【三钱】地榆【四钱】皂角刺【一钱】括萎根【二钱】茜草【三钱】鼠黏子【一钱】

治肺痈 马铭鞠传

其法用百年芥菜卤久窖地中者数匙立起此卤嘉兴府城中大家多藏之目击神效

又方

鱼腥草水煮不住口食之治肺痈吐脓血神方也正名蕺草 兼治鱼口

又方

金丝荷叶捣汁同生白酒数饮立效

乳癖乳痛方 神验

用活鲫鱼【一个】山药【一段如鱼长】同捣汁敷乳上以纸盖之立愈

乳癖方 张王屋屠后江孟脩兄验过

白芷【一钱】雄鼠粪【一钱】二种晒干为末用好酒调服必多饮取一醺睡而愈
雄鼠粪尖者是

又方

顾文学又善内人患左乳岩仲淳立一方夏枯草蒲公英为君金银花漏芦为臣贝母橘叶甘菊花雄鼠粪连翘白芷紫花地丁山茨菰炙甘草 萎茜根陈皮乳香没药为佐使另用夏枯草煎浓汁丸之服觔许而消三年后右乳复患用旧存余药服之亦消后以此方治数人俱效

里中妇沈姓者患乳病溃烂经年不见脏腑者一膜尔马铭鞠用鼠粪【三钱】土栋树子【三钱经霜者佳川栋不用】露蜂房【三钱】俱煨存性各取净末和匀每服三钱酒下间两日一服痛即止不数日脓尽收敛此方传自江西贩糖客因治祝氏喉证得之

围药

白芨【研末一两】水调敷乳癖处候干再以水润二三次愈

防脓散 治腹中肿毒

川山甲【炙】白僵蚕【炒去丝嘴】白芷【各五钱】大黄【二两】乳香
没药五灵脂【各五钱】为末每服五钱酒服脓从大便出防者

用三钱

治脇痛【杜武服之甚验】

金银花【五钱】贝母【二钱】皂角刺【一钱五分】连翘【一钱五分】穿山甲【三钱】
赤芍药【三钱】白芷【一钱五分】地榆【五钱】甘草节【一钱】当归【二钱】夏
枯草【一两煎汁和药复煎】鼠黏子【一钱五分】紫花地丁【一两】生甘菊花根【二
两】捣汁和药内服

一人患肠痈伛偻痛不能伸有道人教以饮纯黄犬血二碗和白酒服其人遂饮至四碗次日
下脓血尽而瘰治便毒【仲淳亲试之甚验加穿山甲同患处者二片土炒引经更妙】

棉地榆【四两】白酒三碗煎一碗空心服虽有脓者亦愈

又方

全蝎 生矾 贯众 等分为末空心调下

又方

棉地榆【四两】粉甘草【一两】金银花【一两】白芷【三钱】皂角刺【二钱五分】
水二钟煎一钟空心温服

治下疳

仲淳治数友下疳用黄栢官粉膩粉杏仁珠末冰片敷之无不愈者后去膩粉杏仁加黄芩更
以小大蓯地骨皮汤洗净敷之效更良

又方

蝉蜕【七分】真白僵蚕【紫蕪叶包蜜炙七个】杏仁【七粒去皮尖】芭蕉根【五钱捣
烂】独核肥皂仁【七粒】雪里红【一把打烂】土茯苓【白色者去皮二两】白藓皮【
一钱】牛膝【二钱】黄栢【一钱】木通【七分】皂荚核【七粒】薏苡仁【二钱】连
翘【一钱】汉防己【酒浸六分】甘草节【一钱】石斛【三钱】柴胡【六分】萆薢【
二钱】地骨皮【二钱】水三大碗煎不拘时饥则服日三服气虚脾弱加蜜炙黄芪【三钱】
血虚加生地【三钱】

又极秘神方【治一切极痛下疳仲淳屡用甚效】

鲜小蓟 鲜地骨皮【各五两】煎浓汁浸之不三四日即愈

治蛙疳服药

珍珠【生研细】牙末 牛黄 冰片【各一钱】真白僵蚕
皂角【各二钱】滴乳石【一两研细如飞麴】细末每服九厘土茯苓汤吞下以干物压之

蛙疳掺方

橄榄烧灰研细末掺上

治痔疮出血过多【东垣名黑地黄丸臧晋叔试之效】

生怀庆【一觔酒洗净用水煮连汁磨为末重汤熬成膏听用】茅山苍术【一觔切片用真麻油浸一日夜去油晒干为末】北五味【半觔晒干为末】炒黑干姜【净末八钱】用黑枣肉半觔去皮入前药捣丸空心白汤每服三钱

治痔疮 归安陈汝良传

用荔枝草即天明精一名地菰煎汤洗仍以草手搓软塞患处

治漏

铅花【四两研如麴】黄牛腮边合扇骨【二两酥炙燥为末】雄猪前脚踏【二两酥炙燥为末】青黛【二两】槐花【二两】人中白【煨过五钱】将药总置阳城罐内用铁油盏盐泥封好置淘湿大米数粒于盏上四面用火煨以米熟为度取出研细炼蜜丸如梧子大每五钱空心下午各进一服淡盐汤吞水白酒二杯以猪蹄下酒醋紫蕪畧吃些亦可

坐板疮方 丁右武亲验有效

松香【五钱研细】雄黄【一钱研细】如湿痒加苍术【三钱】各末和匀以绵纸包裹撚成纸撚二条腊月猪油浸透防火烧着取滴下油搽上立效

治臀痛

一人患臀痛用五爪龙连枝捣汁酒漉服日进四五次脓从大便出未成脓者内消如有头以渣敷上立散治鱼口极效

治下部火丹 马铭鞠传

用蚕砂山梔黄连黄芩黄檗大黄寒水石共末水调敷上立效【切勿用芭蕉根】

又方

川黄连末蜜和鸡子清调敷

马铭鞠云若遇抱头火丹必砭去恶血方效每用此法治人其不肯砭者多误事予家儿辈试之甚验

煎方

牛膝【三钱】木 【二钱】石斛【三钱】生地【五钱】连翘【三钱】黄檗【二钱】甘草【一钱】金银花【五钱】地榆【三钱】茜草【三钱】赤芍药【二钱】水煎服

治悬痈【一名鹳口疽生在阴囊后谷道前疗之不早变为漏则难治矣一仆试之立消】

大粉甘草【一觔】每根劈作四片或二片用泉水二碗轮流蘸炙以水尽为度切片河水十碗熬至一碗空腹服尽即愈 此孙真人方

谈公武患跨马痈外势不肿毒内攻脓多疮口甚小突出如指大一块触之痛不可忍多饮寒剂外敷凉药毒内攻胃气俱损铭鞠尽去围药洗净疮口但用一膏药以防其风用大剂黄芪山药怀生地白芷牛膝米仁金银花杂以健脾药十余剂脓尽再数剂肉长突出者平矣后服六味丸觔许精神始复

江都尹奉麓乃尊毙于腿痈其子九岁亦患之就医弥月势渐盛铭鞠按之坚如石幸儿气厚可内消用牛膝薏苡地榆生地鼠黏子金银花连翘粉草皆仲淳常用法也初剂加利药微利之即稍宽过两剂加汗药微汗之势益宽至数剂取穿山甲末【五钱】半入煎半调药送下儿善饮令儿一醉自此顿消半月地下行矣初一医欲开刀遇铭鞠中止凡外科宜以开刀为戒

梁谿一男子生疔膝下楚甚仲淳适至即于席间作剂服之饮酒数杯疔立破出鲜血愈

连翘【二钱】白芷【二钱】粉甘草【水炙三钱】金银花【五钱】牛膝【三钱】怀生地【三钱】地榆【四钱】皂角刺【一钱】鼠黏子【酒炒研一钱】

陆封公养质患腿痈疡医用忍冬花角刺连翘白芷贝母天花粉陈皮乳香没药治之不效仲淳即前方加绵地榆炙甘草紫花地丁服三四剂愈

治鹤膝风【一人患此五年敷药三日即愈王心涵传】

乳香 没药【各一钱五分】地骨皮【三钱】无名异【五钱】麝香【一分】各为末用车前草捣汁入老酒少许调敷患处

疮方【章宇泰传六郎乳母试之神效】

松香【一两】轻粉【三钱】乳香【五钱】细茶【五钱】四味共打成膏先将葱头花椒煎浓汤熏洗净用布摊膏厚贴患处以绢缚定黄水流尽烂肉生肌

又方 曹和尚传

松香【四两】好韶粉【二两】先将松香投入滚水中一捞即起另研如飞麪后加韶粉研匀入真麻油勿令太薄调如极稠糊用筋挑起以不断丝为度仍用极细松江布摊成膏贴于疮上将寸许阔绢条紮急勿使泄气一日收 三次三日一换膏药半月必愈

疮久不愈方

黄占 白占 轻粉 韶粉 腊月猪板油麻油各半化匀调和前药用薄油纸摊贴疮上血风疮久不结痂亦妙【入芝麻油乳香更妙】

足指疗毒

生甘菊【一两五钱】紫花地丁【八钱】金银花藤【一两】穿山甲【三片土炒研细】木【二钱】牛膝【五钱】薏苡【一两】生地【五钱】连翘【三钱】白芨【三钱】夏枯草【六两】

李行甫患霉疮【俗呼广疮】误用水银番硃等药搓五心三日间舌烂齿脱喉溃秽气满室吐出腐肉如猪肝色汤水不入腹胀二便不通医皆谢去独用治喉药吹喉痰壅愈甚痛难忍几死铭鞠按其腹不痛虽胀满未坚犹未及心知水银毒入腹未深法宜以铅収之急用黑铅觔余分作百余块加大剂甘桔汤料金银花粉草各用四五两水二三十碗锅内浓煎先取三四碗入汤注中徐灌之任其自流逾时舌渐转动口亦漱净即令恣饮数盏另取渣再煎连前浓汁频濯手足次日二便去黑水无算始安方用吹口药及败毒托里药数剂而愈后贾仆有颜孝者亦患霉疮误用水银薰条其证一如行甫即以前法治之次日立起

治霉疮

猪胰脂【二两】金银花【二钱】皂角刺【一钱】芭蕉根【一两】雪里红【五钱】五加皮【二钱】土茯苓【白色者二两】皂荚子【七粒打碎】独核肥皂仁【七粒切片】

白僵蚕【炙七分】木 【一钱】白藓皮【一钱】蝉蜕【一钱】年久力衰者加薏苡仁【五钱】甘草节【二钱】绵黄芪【三钱】怀生地【二钱】人参【二钱】久不愈加黄连【三钱】胡麻仁【二钱】全蝎【七枚】水三大碗煎一碗不拘时饥则服

又方

棉花子仁一味研如泥入细槐花末和丸如菉荳大每四钱空心及饥时吞

治结毒

独核肥皂仁【七粒】千年矮【即雪里红一两】皂荚子【七粒】甘草节【一钱五分】木 【一钱五分】蝉蜕【一钱】青木香【一钱】土茯苓【白色者二两】绵黄芪【盐水炒三钱】白僵蚕【蜜炙炒研七分】鼈虱胡麻仁【炒研三钱】白芷【一钱】何首乌【三钱】金银花【三钱】连翘【一钱】水三大碗煎一碗不拘时饥则服

结毒丸方

钟乳石【研如飞麴水飞一两五钱】真牛黄【研如飞麴三钱】珍珠【研如飞麴四钱】猪牙皂角【去皮膜为极细末七钱】桦皮灰【存性研如飞麴四钱】百草霜【庄家锅底者佳七钱】

牛黄丸 神效

牛黄【真者研细三钱】象牙末【三钱】白僵蚕【二钱】红铅【二钱】冰片【五分】明矾【二钱】极细末炼蜜丸如麻子大每服五分土茯苓【白色者木槌打碎三两】砂锅内煮汁吞丸药空心上下午饥时日三次

洗方

五倍子【四两】地骨皮【四两】皮硝【五钱】甘草【二两】苦参【四两】葱头【十个】河水煎浓汤一锅于无风处乘热蘸日浴三次浴时先吃饱或服煎药一贴忌食茶醋牛肉麯河鲀火酒

掺方

粉霜【一钱五分甘草汁飞过】真冰片【三分另研】二味和匀洗净掺上立瘥

浸酒方

防风 当归 羌活 白芷 白藓皮 五加皮 苍术 牛膝【各二两】 荆芥 薏苡 蔓荆子 木 白蒺藜【去刺各一两】 生地黄【三两】 乌梢蛇【出吴江尹山方额者佳一尾】 好酒十觔浸煮三炷香卧时服丸亦可

治头面结毒

蕲艾【去筋膜一两】 川椒【去核八钱】 麻黄【去节二钱】 川芎【二钱】 猪头天灵盖【火煨存性五钱】 白茯苓【二两】 极细末蒸饼丸如菉荳大饭后白汤送下每服三钱服后二三日疮口干燥不臭是其效也服至疮口平复方住 忌牛羊鱼腥房欲患久者宜间服十全大补汤十数剂【川椒出桃花洞者佳嚼半粒口辣不能言者真】

又治结毒方 兼治积年虚劳痰火健脾进食

极木一名十大功劳一名猫儿残【俗呼光菰枏】 黑子者是红子者名柘木亦可用取其叶或泡汤或为末不住服谭公亮患结毒医用五宝丹饵之三年不效仲淳云五宝丹非完方也无红铅灵柴不能奏功时无红铅姑以松脂铅粉麻油调敷应手而减公亮先用乔伯珪所赠乳香膏止痛生肌甚防及用此二味功效弥良乃知方药中病不在珍贵之剂也

又方

银硃【三钱】 轻粉【三钱】 白占【三钱】 黄占【三钱】 用麻油【三两】 先将二占化匀调前药末摊成膏贴之戒房事必效

凡父母正患霉疮时育儿鲜有免者其证浑身破烂自顶至踵两目外几无完肤日夜号泣或吐或泻似疟似惊变态百出父母不知见有他证别作治疗十无一生治法以牛黄为君再加犀角羚羊角硃砂冰麝和入土茯苓粉生蜜调服使儿日日利去恶毒见有他证随宜治之母亦随宜用药加以散毒剂不住口服其外用大粉草金银花为极细末二三升破烂处洗净大握敷之半月后方易神效敷药再敷数日自愈愈后一两月当复发再后两三月当再复发渐轻仍如法治之自愈愈后或口角眉角或肛门存二三余毒不必治矣其浑身或癣或疮忽聚忽散敷之便愈大抵年余始得除根若母不禁口或儿渐大不能禁口有延至二三年者然不毙足矣胎中之毒彻骨入髓焉能旦夕除哉 马铭鞠传

升药五灵散 马铭鞠传

胆矾【治筋而滋肝其色青应东方木】 辰砂【养血而益心其色赤应南方火】 雄黄【长肉而补脾其色黄应中央土】 明矾【理脂膏而助肺其色白应西方金】 磁石【荣骨液而壮肾其色黑应北方水】 此方见焦氏笔乘喜其不用水银制而用之功效迟缓后因加水银一两与前五味等分和匀入阳城罐内打火三香取出加敷药中用之效如神

神效敷药方 马铭鞠传

夜合花【白者良阴干】象皮【同黄砂炒候软切片再炒候脆方研】樟香【炒研】乳香没药【各去汗】血竭孩儿茶【湿纸包煨】花蕊石五倍子【色红者良半生半煨各一两】白占【八钱】珍珠【五钱】冰片【一钱】各极细末方入白占研匀最后入冰片如欲去腐每两加五灵散【二钱】欲生肌每两加前散三分或五分如治痘后脓水淋漓下疳等疮只加一二分治汤火伤每两加丝绵灰【二钱】剔牙松皮【煨存性五六钱】韶粉雄黄【五六钱】或干掺或香油调一切外症俱效

附海上单方

里中有周七者少年曾患毒左腋下得一异方用糯米炊饭乘热入盐块夹葱管少许捣极烂如膏贴患处辄消至中年腰间忽生一毒热如火板硬痛不可忍佝偻局蹐自分必死屡药不效急思前方如法贴之未几大便去粪如宿垢甚多硬者渐软数日而起

杂症

脑漏

脑者诸阳之防而为髓之海其位高其气清忽下浊者其变也东垣云上焦元气不足则脑为之不满经云胆移热于脑为鼻渊夫髓者至精之物为水之属脑者至阳之物清气所居今为浊气邪热所干遂下臭浊之汁是火能消物脑有所伤也治法先宜清肃上焦气道继以镇坠心火补养水源此其大畧耳药多取夫辛凉者辛为金而入肺有清肃之义故每用以引散上焦之邪如薄荷荆芥甘菊连翘升麻鼠黏天麻之属镇坠心火补养水源如犀角人参天冬麦冬五味朱砂甘草山药生地茯苓牡丹皮之属然须兼理乎肺肝盖鼻乃肺之窍而为脑气宣通之路又治乎上焦而行清肃之令胆为春升少阳之气与厥阴为表里而上属于脑戴人有云胆与三焦寻火治内经谓胆热所干义亦明矣理肺用桑皮鼠黏桔梗二冬花粉竹沥清肝胆以柴胡白芍羚羊竹茹枣仁川芎或者又谓世人多用辛温辛热之药取效此义何居盖辛热甘温多能宣通发散故病之微者亦能奏效耳此从治刼法非不易常经明者察之头风神方【沈观颐中丞传自一道人予仆妇患此痛甚欲自缢服二剂数年不发】

土茯苓【忌铁四两】金银花【三钱】蔓荆子【一钱】参【八分】防风【一钱】明天麻【一钱】辛夷花【五分】川芎【五分】黑豆【四十九粒】灯心【二十根】芽茶【五钱】河水井水各一钟半煎一钟服

治半边头痛【属火证者用之妙】

大黄末【三分】黄芩末【一钱】二味和生白酒一碗顿热调匀服之即愈

又方

用芝蔴炒热舂碎乘热将好烧酒入磁器中重汤热入芝蔴扎 只用一葱管孔插入磁瓶口内引鼻吸其气左则薰左右亦如之虚寒用烧酒虚热用好米醋代之内服对病方药

郁证

纪华山先生雅自负数奇更无子时邑邑不快渐至痞胀四年肌肉尽削自分死矣姑蘓张涟水胗而戏之曰公那须药一第便当霍然以当归【六钱】韭菜子【一两】香附【童便炒八钱】下之纪有难色不得已减其半张曰作二剂耶一服夜梦遗举家恸哭张拍案曰吾正欲其通尔仍以前半剂进胸膈间若勇士猛力一拥解黑粪数升寻啜粥二碗明日巾栉起见客矣逾年生一子即表弟汝占也治筋骨疼甚如夹板状痛不可忍者【李景渠中丞传】

将骡子脩下蹄爪烧灰存性研末或酒白汤调服立愈

癰症方【名补心寧志丸】

天竺黄【另研如麪五钱】沉香【另研如麪三钱】天门冬【去心酒洗蒸二两】白芍药【酒炒三两】白茯苓【去心四两】遠志肉【甘草汁浸蒸二两】麦门冬【去心二两】炙甘草【六钱】旋覆花【一两五钱】眞苏子【研一两】香附【醋浸晒干童便拌瓦上炒三两】半夏【姜汁拌以明矾末少许同浸二两】皂角荚【不蛀者去黑皮酥炒去子取末二两】为末和匀怀山药粉糊丸如豌豆大硃砂一两研如法为衣每服三钱用竹沥防汤下

风癲病神方

好生犀角【四两】剉末每用一两加清水十碗入砂锅内熬至一碗滤净再加水十碗熬至二酒杯加淡竹叶【四两】水六碗煎二碗去渣加犀角汁同服尽四剂即愈

治火上升有痰留滞喉间如有核上法宜降气清火

眞苏子【研二钱】广橘红【三钱】贝母【三钱】括萎根【三钱】白茯苓【三钱】麦门冬【五钱】白芍药【三钱酒炒】黑连翘【一钱五分】黄檗【蜜炙一钱五分】五味子【一钱打碎】水煎加竹沥服

施灵修有一里人善酒卧床褥者三年灵修怜而索方于仲淳仲淳亲胗之知其酒病也夫酒湿热之物多饮者湿热之邪贯于阳明湿热胜则下客于肾而为骨痿昔人治痿病取阳明以五味子为君黄连为臣麦门冬干葛白扁豆为佐服之立起

治血痞沉香丸

沉香 血竭 辰砂【各二钱五分】 木香【一钱三分】 真麝香【一钱三分】 琥珀【五分】 当归尾【二钱五分】 牡丹皮【二钱五分】 延胡索【一钱五分】 为细末用磁器煎甘草汤打糯米糊为丸凡气痛酒磨葱汤亦可产后血块酒磨服

乌须神方

女贞实一斗如法去皮每斗用马料黑豆一斗拣净淘洗晒干同蒸透九蒸九晒先将女贞实为末加生姜自然汁三两好川椒去闭口者及蒂为末三两同黑豆末和匀蜜丸如梧子大先食服四五钱白汤或酒吞

又方

将鳢肠草采鲜者二三十觔捣汁入九蒸九晒过女贞实末再晒干如前为丸亦佳但服之腹痛作泄不若姜汁椒末为佳蒸女贞实先将上好老酒浸一宿次日用黑豆蒸如此者九以其性寒故也更服八珍丸以实根本

又方【旧传女贞实旱莲草二方试之甚验苦于腹痛作泄仲淳再为更定凉血兼理脾】

何首乌【勿去皮乌豆同牛膝蒸制如常法最后用人乳浸晒三四十次赤白各二觔】 女贞实【酒拌九蒸九晒二觔】 旱莲草【熬膏十二两】 乌饭子膏【即南竺枝子也十二两】 茅山术【米泔浸蒸晒三次去皮切片十二两】 真川椒红【十二两去白膜闭口勿用】 没石子【十两】 为细末以旱莲草膏乌饭子膏同炼蜜和丸如梧子大每五钱空心饥时各一服白汤吞

碧霞丹【治内障外障暴赤眼眵泪昏花翳膜】

当归 没药【各二钱】 血竭 白丁香 硼砂 冰片 麝香【各一钱】 马牙硝 乳香【各五分】 俱极细末比飞麴更细三五倍以川黄连去须切片三钱熬成膏子和前药为丸如豆大用铜绿一两五钱为衣每用一丸以新汲水半盏浸磁盒内日洗五六次一丸可洗七日重者半月轻者七日迎风冷泪三日见效【贺知忍传】

洗眼方 仲淳立予亲试验

皮硝【一两】 杏仁【去皮尖】 铜绿 明矾【各三分】 侧柏叶【三钱】 甘菊花【三钱】 桑白皮【五钱】 河水五碗煎至二大碗置铜盆内洗眼及眉棱骨两太阳涕出即爽然矣日夜不拘次数一服冬可半月夏十日

牙痛方 邓定宇先生传

经霜西 皮烧灰敷患处牙缝内立效

擦牙散 章泰宇传

石膏【半觔火煨熟】白蒺藜【去刺四两】为极细末每日擦牙漱口牙痛时频频擦之立愈

又方【陈筠翁传自江阴云旱莲草开红花者与此地不类】

旱莲草以青盐腌一二宿晒干为极细末置磁罐内擦牙以沸汤漱口咽下久久兼能乌须种子

治胃火牙疼

马兰头叶并放水沟内青苔捣烂以丝绵卷之左齿痛塞左耳右亦然

治聋 王槐亭服之验

白蒺藜【炒去刺】为末蜜丸空心服 沈四明相公专服此方延年益寿

治耳中瘡痛或出水出脓

金丝荷叶【即名虎耳草】捣汁滴入耳中如有脓可加枯矾末及干胭脂末各少许

又方

用鲜薄荷叶同蜗牛捣汁滴耳中亦妙

顾奉常女臂患紫云风仲淳用稀荳蔻耳雄黄末之醇漆为丸或疑漆有毒竟沮之然竟以此药收功【制漆用生蟹黄搅和可化作水入药】

稀荳蔻 治烂风及风 作痒如神

稀荳蔻取末调吞治瘫痪甚验初时以人参蕲木等分熬膏和酒吞伤损皆除曾有八十老人试过五七九月采近根处剥开有小虫一条能治小儿疳症

解牛肉毒

取虾蟆一只置滚酒内数沸去虾蟆饮酒一吐即愈

又方 马铭鞠传

用甘菊花连根叶捣烂和酒服一两碗立愈

治疝气痛方【顾冲吾司马传表兄李瀛洲试之神验】

六味地黄丸古方加北五味【三两】肉桂【二两味甘者真】枸杞子【去蒂四两】车前子【米泔浸蒸三两】将糯米一斗炊饭乘热下白酒药并前药料和匀如常制白酒法三两日后浆来用上好镜面烧酒五十觔连酒浆并糟入大瓮内泥封固一月开去糟滤清酒味甘香异常空心或饥时随量饮多不渴

疝攻上作痛秘方 陈敬泉亲验

【阙】子根有叶时用根叶捣烂绞汁和好酒服之覆被出汗永不发

木肾方

用豆田中菟丝子草【一名黄丝草】煎浓汤洗之时以手搓之随消

治便红或因酒毒发者 南昌邓思济传

先用川黄连【去须切片酒炒】细末一服三钱空心白酒调下忌晕腥一日服连末后必腹痛去血愈多复用白芍药【一两】白术【五钱】甘草【三钱】同炒拣开先用白药煎汤服腹痛自止后以白术甘草同煎服遂愈又一法以粳米三分糯米七分煮粥空腹服遂愈此无他补胃气则阳明调所以便红自除也

肠风

黄芪【蜜炙三钱】白芍药【酒炒三钱】炙甘草【一钱】麦门冬【去心五钱】生地【酒洗四钱】当归【酒洗二钱】荆芥【一钱炒】白芷【一钱】柴胡【五分】地榆【酒洗三钱】人参【一钱】五味子【八分去枯者打碎蜜蒸】河水二钟煎八分空腹饥时服

治肠风【因饮酒过多得之者效甚】

专服北五味打碎蜜蒸为细末蜜丸每清晨服三钱服至半年因味酸甚服后喉中觉吞酸加熟地黄等分为丸服久肠风顿止

治獬犬伤

野葡萄根捣汁酒服

治蜈蚣伤

用旧竹筴火中将头上烧黑取下少许研细敷患处立愈

又方 马铭鞠传

一法取蜒蝥涂上其痛立止屡试神验

治蛇伤

雄黄 雌黄 等分极细末先以白芷磨菜油调涂患处以温火薰之滴尽黄水为度水出肿渐消

又方

明矾 麝香 二味为末掺上以艾灸之随灸随消

又方

慎火草【即墙头草色绿极脆】捣汁同酒饮一面捣敷咬伤处立愈一妇人于壁上取鸡翎卷耳适蜈蚣生子在翎上 入耳中生小蜈蚣穿脑内且痛且痒百药莫效梦神人传一方令炒鸡肉热置一器内留一小孔盖上令病者以耳受之鸡气薰入蜈蚣悉攢鸡肉上其病立愈

跌打秘方

用露天粪窖中砖瓦块多年者或碗架浊水长流处砖瓦块火煨红研极细跌打伤者酒调服五分立愈未打服之可不痛不宜多服令人骨软

金疮并跌打破损出血方

炼过云母粉菜油调敷立止痛更不作脓

金疮止血方

真番降香【紫糖色者真切如豆大炒畧焦研再炒】五味子【一两】二味共研敷上

又方

旧毡帽檐烧灰敷上 旧网巾灰亦好

金石汤火跌损方

用花蕊石旧家有用为几上小屏风者取三钱为极细末真麻油调敷患处当日者立愈隔日敷之痛轻易收口 亦治产后瘀血攻心血晕神丹

桃花散治跌损刀伤狗咬烂脚

用陈年风化石灰一官升锦纹大黄【一两焙燥研末】并石灰炒桃花色存性真麻油调敷患处当日敷之更妙

火伤兼治汤泡方

大松树皮 川大黄 二味等分为细末生桐油调敷立愈

又方

用大黄一味为细末砂糖调敷立愈

火烧烂神方

将好煮酒一二瓮入浴缸内令患者浸酒中极重不死

又方

用鼠初生者以真麻油浸之入磁瓶内封固患者将油搽上痛处即愈

汤火神验方

猪毛煨存性研细末加轻粉白硼砂少许麻油调和敷之立效无瘢痕

治水渰【出说海】

凡遇溺水者视其心坎尚温以圆器覆地下置门一扇于上令溺者仰卧以鸭血灌之口中或大小便出水即苏

临杖预服药【湖州司狱司内杖单神效】

胎元【一个煨存性】黑犬对前脚上边顶骨一副【酥炙存性】川麻皮【煨存性】麝香【五分】乳香 没药【各五钱】炼蜜丸如梧子大每服三钱酒吞

杖后煎剂

红花 红麴【各一钱】延胡索 牛膝【各三钱】牡丹皮 五灵脂 赤 药 番降香【各二钱】炙甘草【七分】桃仁【七分】肉桂【五分】水酒煎若伤重出虚汗加参耆

杖丹

风化石灰【君】真番降香末【上】半夏末【上】黄芩 黄连 黄檗 大黄【俱中】为细末麻油调敷患处

杖丹散血

龙须草【二两】大黄【三两】二味为末用麻油一觔蒸大黄焦色滤净去渣加后药樟脑【一两五钱】麝香【四钱】冰片【四钱】降香末【一两】乳香 没药【各五钱】自然铜【烧红醋淬九次研细如烟六钱】共熬成膏药先划碎杖处用软帛摊成膏紫于杖处蒸熟热韭菜熨之黑血出尽愈

杖丹长肉

腊月猪油【一觔】白占 黄占【各二两】黄连【四两】以猪油熬黄连转焦色去渣下占熬敷上帛紫 自愈

汤洗

用葱头煮烂揩洗杖疮伤

治杖夹神方

狗胎【封固煨五分】遠年粪缸内瓦片【醋淬七次二钱】雄黄【一分】硃砂【一分】木香【五分】麝香【三厘】细末和匀用芊芊活【最能活血】捣烂绞汁和丸金箔为衣酒磨下

杖伤丸方

乳香 没药 血竭 孩儿茶 自然铜【煨】 川木鼈人中白
孩儿骨【如无以狗胎代之倍加】 地龙 土木鼈 无名异
为细末炼蜜丸如梧子大杖过酒服百丸

杖癖方

水银【五分】 轻粉 乳香
象牙末【各一钱】 细茶【二钱】 木香【五分】 麝【少许】 为细末鸡子黄蜡羊油调搽

杖丹

如遇打出即将松香【四两】 溶化又将葱一握捣入松香内搅匀摊一膏药贴患处外以绵帛掩上紮定五六日愈

又方 朱南溪传

杖伤及跌磕者用落得打草【似孩儿菊对节生枝】 不拘多少捣烂酒服 如伏天杖伤出蛆真麻油浇之立尽

附海上单方

颠犬咬方

先用蓑衣草紮住患处两头以众人热小便捻洗去血水次用胡桃壳半个以本人热粪装满盖患处艾火灸七壮如本人不欲大便傍人者亦可急取斑猫七个去头足并翅酒洗和湿糯米铜杓内炒米熟为度随将二物研成细末加六一散三两份作七服每清晨一服白滚汤调下本人头顶心必有红发一根要不时寻觅拔去

刘襟湖验过颠犬咬方

防风【五钱】 黑牵牛【三钱】 雄黄【三钱】 斑蝥【一钱占米炒】 真麝香【三分】 锦纹大黄【三钱】 右为末温滚水调下空心每日服二钱 先将斑猫去头翅足【一两】 和白粘米【半升】 共炒去斑猫食米二撮许后服前药其斑猫即合入前药内服一料后斑猫不可用外加雄黄【一钱】 或蜜或米粉丸药再服即间二三日服亦可每服【三分】 茄子茄地切不可踐食即茄浆水亦须忌之二三年后不必忌也 此刘友自患颠犬咬三日内即服此方小便下血块有形得以全愈有一人患犬吠六日服此方小便下血块竟似犬状亦终不救矣然刘友所伤不曾破皮或毒轻而得愈总不如前方歷试歷验且犬咬之毒入心经则以益元散为引经之药甚为有理山乡一时无处买药多蓄斑猫预制益元散以救人大是恩德

治酒疸

用苜蓿煎汤渐饮之愈

治刀疮

化尸塲取烧过人骨【不化者更佳】研细末敷刀疮患处立愈

治小儿疳症方

用天南竺煎汤饮神效 以上二方俱冯权奇传

治蛔结丸方

胡黄连【八钱】白芍药【一两五钱】槟榔【八钱】粉草【五钱】广陈皮【二两】肉豆蔻【不油不蛀者五钱】史君子肉【五钱】为细末白糖调服

先醒斋广笔记卷四

明 繆希雍 撰

炮炙大法

按雷公炮制法有十七曰炮曰熅曰煨曰炙曰煨曰炒曰煨曰炼曰制曰度曰飞曰伏曰镑曰搯曰防曰曝曰露是也用者宜如法各尽其宜

水部

雨水【立春节雨水 梅雨水芒种后逢壬为入梅小暑后逢壬为出梅
液雨水立冬后十日为入液至

小雪为出液得雨谓之液雨】

冬霜【凡收霜以鸡羽扫之瓶中密封陰处久亦不壞】

腊雪【用净瓶收净雪筑实密封瓶口置于陰室中不见日色春雪有虫水亦便败所以不收】
神水【五月五日午时有雨急伐竹竿中必有神水 取为药】

半天河【此竹篱头水及空树穴中水也】

流水【千里水东流水二水皆堪荡涤邪秽煎煮汤液劳水即 泛水张仲景谓之甘烂水用流水二斗置大盆中以杓高扬之千万遍有沸珠相逐乃取煎药盖水性本盐而体重劳之则甘而轻取其不助肾气而益脾胃也虞抟医学正传云甘烂水甘温而性柔故烹伤寒陰证等药用之顺流水性顺而下流故治下焦腰膝之证及通利大小便之药用之急流水湍上峻急之水其性急 而下达故通二便风痺之药用之逆流水洄澜之水其性逆而倒上故发吐痰饮之药用之也】

井泉水【反酌而倾曰倒流出 未放曰无根无时初出曰新汲将旦首汲曰井华】

地浆【此掘黄土地作坎深三尺以新汲水沃入搅浊少顷取清用之】

热汤【须百沸者佳若半沸者饮之反伤元气作胀】

生熟汤【以新汲水百沸汤合一盏和匀故曰生熟今人谓之陰阳水】

菊潭水【山涧两岸有天生甘菊花其下流泉是也】

浆水【浆酢也炊粟米热投冷水中浸五六日味酢生白花色类浆故名若浸至败者害人】

米泔水【即淘米汁也】

缫丝汤【以磁瓶收密封埋净土地中任经 年久而愈妙】

火部

桑柴火【凡一切补药诸膏宜此火煎之】

炭火【栎炭火宜煅炼一切金石药煇炭火宜烹煎焙炙百药丸防】

芦火竹火【宜煎一切滋补药 凡服汤药虽品物专精脩治如法而煎药者卤莽造次水火不良火 失度则药亦无功观夫茶味之美恶饭味之甘饴皆系于水火烹饪之得失即可推矣是以煎药须用小心老成人以深罐密封新水活火先武后文如法服之未有不効者火用陈芦枯竹取其不强不损药力也】

土部

黄土【三尺以上曰粪三尺以下曰土凡用当去上恶物勿令入客水】

东壁土【此屋之东壁上土尔当取东壁之东边谓常先见目光刮取用之】

伏龙肝【凡使勿悞用灶下土其伏龙肝是十年以来灶额内火气积久自结如赤色石中黄其形貌八棱取得后细研以滑石水飞过两遍令干用熟绢裹却取子时安于旧额内一伏时重研了用】

自然铜【生出铜处方圆不定色青黄如铜凡使用甘草汤煮一伏时至明漉出摊令干入臼中捣了重筛过以醋浸一宿至明用六一混泥瓷盒子盛二升文武火养三日夜才干用盖盖了火】

墨【陈久而料精者入药新而粗者不堪】

百草霜【此乃灶额及烟炉中墨烟也其质轻细故谓之霜山庄人家者良】

梁上尘【须去烟火远高堂殿上者拂下筛用之一云凡用倒挂尘烧令烟尽筛取末入药雷氏所説似

是梁上灰尘今人不见用】

金部

金银铜铁【凡使只可浑安在药中借气生药力而已勿入药服能消人脂】

赤铜屑【即打铜落下屑也或以红铜火煅水淬亦自落下以水淘净用好酒入砂锅内炒见火星取研

末用】

【煅两伏时去上研如粉用凡修事五两以醋两镒为度今人只以火煅醋淬七次研细水飞过用一云制后半年方可入药否则杀人】

铜青【生熟铜皆有青则铜之精华大者即空绿以次空青也铜青则是铜器上绿色者淘洗用之近时人

以醋制铜生绿取收晒干货之】

铅【凡用以铁铔镕化防瓦上滤去渣脚如此数次收用其黑锡灰则以铅沙取黑灰白锡灰不入药】铅霜【以铅打成钱穿成串瓦盆盛生醋以串横盆中离醋三寸仍以瓦盆覆之置陰处 生霜刷下仍合

住】

铅丹【即黄丹也生铅一味火煅研成细末水飞过用今货者多以盐消砂石 之凡用以水漂去消盐飞

去砂石澄干微火炒紫色地上去火毒入药】

密陀僧【凡使捣细安瓮锅中重纸袋盛柳蛀末焙之次下东流水浸满火煮一伏时去柳末纸袋取用近人以煎银罐底代之误矣罐底能消炼一切衣帛焉可服耶如无真者勿用制狼毒】

古文钱【周秦汉五代者方可用以火煅微红淬醋中六七次用入目者磨用入防者用胡桃研成粉】铁锈【此铁上赤衣也刮下用】

石部

丹砂【即朱砂也有数种硫砂如拳许大或重一镒有十四面面如镜若遇陰沉天雨即镜面上有红浆汁出有梅栢砂如梅子许大夜有光生照见一室有白庭砂如帝珠子许大面上有

小星现有神座砂又有金座砂玉座砂不经丹灶用之而自延壽命次有神锦砂芙蓉砂箭镞砂已上九种皆可入药用丹砂入药祇宜生用慎勿升炼一经火炼饵之杀人研须万遍要若轻尘以磁石吸去铁气 恶磁石 畏盐水车前石韦皂荚决明瞿麦南星乌头地榆桑椹紫河车地丁马鞭草地骨皮陰地厥白附子忌诸血】

云母【凡使色黄黑者厚而顽赤色者经妇人手把者并不中用须要光莹如水色者为上几脩事一斤先用小地胆草紫背天葵生目草地黄汁各一镒干者细剉湿者收汁了于甃锅中安云母于诸药了下天池水三镒着火煮一日夜水火勿令失度其云母自然成碧玉浆在锅底却以天池水猛投其中将物搅之浮如坭涎者即去如此三度淘净了取沉香一两搗作末以天池水煎沉香汤三升已来分为三度再淘云母浆了日中晒任用之泽防为之使 恶徐长卿羊血 畏鮃甲矾石东流水百草上露茅屋漏水 制汞 伏丹砂】

石钟乳【凡使勿用头粗厚并尾大者为孔公石不用色黑及经大火惊过并久在地上收者曾经药物制者并不得用须要鲜明薄而有光润者似鷺翎筒子为上有长五六寸者凡修事法以五香水煮过一伏时然后漉出又别用甘草紫背天葵汁渍再煮一伏时凡八两钟乳用沉香零陵藿香甘松白茅等各一两以水先煮过一度了第二度方用甘草等二味各二两再煮了漉出拭干缓火烘之然后入臼杵如粉筛过却入鉢中令有力少壮者三两人不住研三日夜勿歇然后用水飞澄了以甃盒子收贮用之令干又入鉢中研二万遍后以甃盒子收贮用之 蛇牀为之使 恶牡丹 石牡蒙人参二术 忌羊血 畏紫石英蓑草韭实独蒜胡葱胡葵麦门冬猫儿眼草】

矾石【生用解毒煨用生肌 甘草为之使 恶牡蛎 畏麻黄红心灰藿】

芒硝【水飞过用五重纸滴过去脚于铛中干之方入乳鉢研如粉任用芒硝是朴硝中炼出形似麦芒者

号曰芒硝 火为之使 恶苦参苦菜 畏女菀杏仁竹叶】

滑石【以刀刮去浮面黄者研如粉以牡丹皮同煮一伏时出去牡丹皮取滑石却用东流水淘飞去下脚七次于日中晒干方用 白如凝脂软滑者良 石韦为之使 恶曾青 制雄黄】

赤石脂【研如粉新汲水飞过三度晒干用亦有火煨水飞者 恶大黄松脂 畏芫花豉汁 畏黄芩

大黄官桂】

白石英【可煮汁用张仲景只令咬咀不为细末 恶马目毒公】

紫石英【煮汁用或火烧醋淬为末传毒 长石为之使得茯苓人参芍药主心中结气

得天雄菖

蒲主霍乱 恶蛇甲黄连麦旬姜 畏扁青附子及酒】

炉甘石【以炭火煨红童便淬七次水洗净研粉水飞过晒用】

绿矾【火煨通红淬入米醋中烘干研如飞粉 畏醋】

雄黄【取透明色鲜红质嫩者研如飞尘水飞数次
畏南星地黄芫莩地榆黄芩白芷当归地锦苦参五

加皮紫河车五叶藤鹳肠草鸡肠草鹳不食草圆桑叶猬脂】

石硫黄【研如飞尘用以杀虫行血 曾青石亭脂为之使 畏细辛朴硝铁醋黑锡猪肉鸭汁余
甘子桑灰益母天盐车前黄蘗石韦荠麦独帚地骨皮地榆蛇牀蓖麻兔丝蚕沙紫河波棱桑
白皮马鞭草】

食盐【凡盐多以矾消石灰之类杂之入药须用水化澄去脚滓煎链白色乃良 漏芦为之使
】水银【凡使草中取者并旧朱漆中者经别药制过者在尸过者半生半死者俱勿用在朱
砂中产出者其色微红收得后用葫芦收免遗失先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮
一伏时其毒自退若修十两用前二味汁各七铤和合煮足为度 畏磁石砒石黑铅硫黄大枣
蜀椒紫河车松脂松叶荷叶谷精草金星草萱草夏枯草葇荑子鴈来红马蹄香独脚莲水慈
姑瓦松 冬】

水银粉【凡水银一斤用明矾焰硝皂矾食盐冬二两同一处研以不见汞星为度用乌磁盒
二个以药铺盆内上用一盆合定以盐泥石膏蜜醋调封盆口勿令泄气下盆底用铁钉三脚
支住四五寸高用炭火先文后武蒸半日次日冷定轻轻取起上盆则轻粉尽腾其上以鹳翎
扫下听用此乃真正轻粉生肌立效市肆多搀寒水石银母石石膏焉得有用乎
黄连土茯苓陈醋黑铅铁浆可制其毒】

戎盐【即青盐温水洗去尘土净晒干入药】

石膏【雪白有墙壁者真即市之寒水石也石臼中捣成粉以密绢罗过生甘草水飞过了水
澄令干重研用之作防者煨熟入煎剂半生半熟鸡子为之使 畏铁 恶莽草巴豆马目毒公】

磁石【欲验者一斤磁石四 只吸铁一斤者此名延年沙四 只吸得铁八两者号曰续末
石四 只吸得五两已来者号曰磁石修事一斤用五花皮一铤地榆一铤故绵十五两三件
并细剉以槌于石碎作二三十块子 磁石于瓷瓶中下草药以东流水煮三日夜然后漉出
拭干以布裹之向大石上再槌令细了却入乳鉢中研细如尘以水沉飞过了又研如粉用之

柴胡为之使 杀铁毒消金 恶牡丹莽草 畏黄石脂 伏丹砂养永去铜晕】

阳起石【用火煅透红研极细如麝 桑螵蛸为之使恶泽防雷丸菌桂石葵蛇蛻皮 畏兔丝子 忌羊血】

玛瑙【犬肉内煮之火煅红醋淬用试玛瑙法以研木不 者为真】

石 【凡使用醋浸一宿漉出待干下火煅令腥口之气出用瓶盛着密盖放令拭上 令浮细研用 去

锡晕 制三黄硃砂消石】

砒霜【凡使用小瓷瓶子盛后入紫背天葵石龙芮二味三件便下火煅从巳至申使用甘草水浸从申至子出拭干入瓶盛于火中煅别研三万下用之一法每砒霜一两打碎用明矾一两为末盖砒上贮罐中入明火一煅以枯矾为度砒之悍气随烟而去驻形于矾中者庶几无大毒用之不伤也用砒霜即用矾霜是也似简便 畏菉豆冷水 青盐鹤顶草消石蒜水蓼常山益母独活木律菖蒲二角酸鹺不食草波棱莨菪皆能伏砒】

礞石【与火硝相半入阳成罐封固煅存性研如飞尘入药 得焰硝良】

花乳石【出陝华诸郡色正黄形之大小方圆无定凡入丸散以罐固济顶火煅过出火毒研细水飞晒

干用】

蓬砂【即硼砂也白如明矾者良研如飞尘 畏知母芸薹紫苏甌带何首乌鹺不食草】

草部

人参【色微黄皮薄滋润明亮濶而独株味甘回味不苦者良去芦 茯苓马蔺为之使 恶卤咸溲疏

畏五灵脂】

天门冬【劈破去心用柳木甌烧柳木柴蒸一伏时洒酒令逼更添火蒸出曝地黄贝母垣衣为之使

忌鲤鱼 畏曾青浮萍 制雄黄硃砂】

麦门冬【产杭州苕桥细白而皱者良水洗去心大抵一斤须减去五六两凡入汤液或以水润去心或以瓦焙乘 去心若入丸防须瓦焙熟即于风中吹冷如此三四次即易燥且无损药力或以汤浸捣膏和药亦可滋补药则以酒浸搗之 地黄车前为之使 恶欸冬苦芙苦瓠畏苦参青葙木耳 伏石钟乳】

甘草【须去头尾尖处头尾土人截作三寸长劈破作六七片以瓷器盛之用浸蒸从巳至午出曝干或用清水蘸炙或切片用 水拌炒如防火生用术苦参干漆为之使 恶远志忌猪肉】

生地黄【大如大指坚实者佳酒洗晒干以手擘之有声为度好酒拌匀置瓷瓮内包固重汤煮一昼夜胜于蒸者名熟地黄生者酒洗用 得酒麦门冬姜汁缩沙良 恶贝母 畏羌黄忌葱蒜萝卜诸血制地黄勿犯铜铁器令人肾消并白髮男损荣女损卫也】

菖蒲【勿用泥菖夏菖其二件相似如竹根鞭形黑气秽味腥不堪用石上生者根条嫩黄坚硬节稠长一寸有九节者是真也用铜刀刮上黄黑硬节皮一重了用嫩桑枝条相拌蒸出曝干 秦皮秦艽为之使 恶麻黄地胆忌饴糖羊血铁器】

黄连【非真川黄连不効折之中有孔色如赤金者良去须切片分开粗细各置姜汁拌透用绵纸衬先用山黄土炒干研细再炒至将红以连片隔纸放上炒干再加姜汁切不可用水纸焦易新者如是九次为度赤痢用湿槐花拌炒上法入痢药中至于治本脏之火则生用之治肝胆之实火则以猪胆汁浸炒治肝胆之虚火则以醋浸炒治上焦之火则以酒炒治中焦之火则以姜汁炒治下焦之火则以盐水或朴硝炒治气分湿热之火则以茱萸汤浸炒治血分块中防火则以干漆水炒诸法不独为之导引盖辛热能制其苦寒咸寒能制其燥性在用者详酌之 黄芩龙骨理石为之使 忌猪肉 畏牛膝欸冬 恶冷水菊花 参白姜蚕白鲜芫花】

胡黄连【似干柳枝心黑外黄折之尘出如烟者真 忌恶同黄连 忌铁】

菊花【真者味甘色黄单瓣光心去蒂用术枸杞根桑根白皮青葙叶为之使】

白术【米泔浸去油者山黄土裹蒸晒九次洗净去皮切片晒干 防风地榆为之使 忌桃李雀肉菰菜

青鱼】

苍术【出茅山细而带糖香味甘者真米泔浸洗极净刮去皮拌黑豆蒸又拌蜜酒蒸又拌人乳透蒸凡三次

蒸时须烘晒极干气方透忌同白术】

兔丝子【米泔淘洗极净畧晒拣去稗草子磨五六次酒浸一宿慢火煮干木槌去殼一法用酒煮一昼夜搗作饼晒干然后复研方细一法以白纸条同研方细 薯蕷松脂为之使 得酒良 恶藿菌】

牛膝【酒浸蒸曝干形长二尺五寸已上者方佳蜀地及懷庆产者良 恶萤火 甲陆英 畏白前 忌

牛肉】

茺蔚子【花红者良 忌铁制三黄砒石】

柴胡【凡使茎长软皮赤黄防须出在平州平县即今银州银县也西畔生处有白鹤緑鹤于此翔处是柴胡香直上云间若有过往闻者皆气爽此种治骨蒸不入发表药去髭并头勿令犯火立便无効也半夏为之使 恶皂荚 畏女菀藜芦】

前胡【切开白色者良水洗用竹刀刮去苍黑皮并髭上了细剉以甜竹 浸令润日中防干用 使恶畏

同柴胡】

独活羌活【细剉拌淫羊藿裹二日后曝干去淫羊藿用免烦人心此服食家治法防常去皮或焙用

尔 蠡实为之使】

升麻【緑色者良治滞下用醋拌炒】

车前子【自收 色者良卖家多以葶苈子代充不可不辨使叶勿使葹茎入补益药中用米泔淘净蒸

入利水治泄防药炒为末用 常山为之使】

木香【形如枯骨油重者良忌见火入煎药磨汁内熟汤中服若实大肠宜麩煨熟用】

薯蕷【补益药及脾胃中熟用外科生用切用铜刀 紫芝为之使 恶甘遂】

萎防【凡使勿用黄精并钩吻二物相似萎防上有须毛茎班叶尖处有小黄防为不同采得以竹刀刮去

节皮洗净以蜜水浸一宿蒸了焙干用 畏卤咸】

薏苡仁【颗小色青味甘用糯米炒咬着粘人齿凡一两以糯米一两同炒令糯米熟去糯米取使或以

盐汤煮过亦得一法灑汤泡三次去油蒸气日干用】

泽泻【不油不蛀者良细剉酒浸一宿漉出曝干用一法米泔浸去毛蒸或捣碎焙
畏海蛤文蛤

忌铁】 远志【去心若不去心服之令人闷去心了用熟甘草汤浸一宿漉出曝干用之
得茯苓龙骨冬葵子良

畏真珠飞廉藜芦齐蛤】

龙胆草【甘草汤中浸一宿至明漉出曝干用勿空腹饵之令人溺不禁 贯众赤小豆为之使
恶地

黄防葵】

细辛【拣去双叶服之害人洗净去泥沙 曾青草根为之使 忌生菜狸肉
恶黄芩狼毒山茱萸 畏

滑石消石】

石斛【长而中实味不苦者真去头土了用酒浸一宿漉出于日中曝干却用酥蒸从巳至酉
却徐徐焙干用石斛鎖阳澁丈夫元气如斯修事服满一镒永不骨痛慙使酒蒸用服饵当如
法 陆英为之使恶凝水石巴豆 畏雷丸】

巴防天【去心用枸杞子汤浸一宿待稍软漉出却用酒浸一伏时又漉出用菊花同熬令焦
黄去菊花用布拭令干用今法惟以酒浸一宿剉焙入药若急用只以温水浸软去心也
覆盆子为之使恶雷丸丹参朝生】

庵防子【煮汁作饮为末作防俱可 荆子薏苡为之使】

芎防【形块重实色白者良 白芷为之使 畏黄连 伏雌黄】

刺蒺藜【净拣择了蒸从午至酉出日干于木臼中舂令皮上刺尽用酒拌再蒸从午至酉出
日干用一

法炒研去刺为末如入煎药临时调服不入汤煎 乌头为之使】

沙苑蒺藜【綠色形如腰子细而香如天池茶者真即同州多伪者或炒或酒浆拌蒸亦不入汤药】黄耆【软如绵直而细中有菊心味甘者良补气药中蜜炙用疮疡药中盐水炒用俱去皮 茯苓为之使

恶白鲜 甲】

肉苁蓉【肥大者良用清酒浸一宿至明以防刷上去沙土浮甲尽劈破中心去白膜一重如竹丝草樣是此偏隔人心前气不防令人上气不出凡使用先须酒浸并刷草了却蒸从午至酉出又用苏炙得所忌铁】

防风【实而润头节坚者良去芦并叉头叉尾者形弯者令人吐勿用 畏葶藶 恶干姜藜芦白薇芫花】蒲黄【自采者真勿用松黄并黄 其二件全似只是味粗及吐人凡欲使蒲黄须隔三重纸焙令色黄蒸

半日却焙令干用之妙行血生用止血炒用】

续断【皱皮黄色折之烟尘起者良用酒浸一伏时捶碎去筋焙干用 地黄为之使 恶雷丸】漏芦【枯黑如漆味不苦酸者真细剉拌生甘草相对蒸从巳至申去甘草拣净用连翘为之使】天名精【一名过冬青即荔枝草吴人又呼为天麻地菰搗汁服 垣衣地黄为之使】

决明子【炒研 蓍实为之使 恶大麻子】

丹参【去芦卖家多染色须辨之 畏盐水】

茜根【勿用赤柳草根真似茜根只是滋味澁不入药中用若服令人患内瘴眼速服甘草水解之凡使用

铜刀于槐砧上剉日干勿犯铁并铅 畏鼠姑 制雄黄】

五味子【辽东者佳去枯者铜刀劈作两片用蜜浸蒸从巳至申或晒或烘炒 苁蓉为之使 恶葳防

胜乌头】

忍冬【花四月采藤叶不拘时采俱陰干不见日火】

蛇床子【凡使须用浓盐汁百部煎浓汁二味同浸三伏时漉出日干却用生地黄汁相拌蒸从午至亥

日干用 恶牡丹贝母巴豆 伏硫黄】

茵陈蒿【须用叶有八角者采得阴干去根细剉用勿令犯火山茵陈俗呼为帝钟茵陈即八角也 伏

礞砂】

沙参【去芦白实味甘者良 恶防已】

王不留行【拌湿蒸之从巳至未以浆水浸一宿焙干用】

干姜【马湖者良微炒若治产后血虚发热及止血俱炒黑温中炮用散寒邪理肺气止呕生用 秦椒为

之使 恶黄芩黄连天防葵 杀半夏南星莨菪毒】

生姜【不宜使熟宜捣绞汁待药煎成倾入方不失生字之义如入药煎乃熟姜非生姜矣 使恶杀同干

姜】

枲耳实【蒸用或炒熟捣去刺用忌猪肉马肉米泔】

葛根【雪白多粉者良】

葛花【消酒煎饮】

栝楼根【雪白多粉者良 枸杞为之使 恶干姜 畏牛膝干漆】

栝楼仁【捣碎用粗纸压去油】

苦参【先须用糯米浓泔汁浸一宿上有腥秽气并在水面上浮并须重重淘过即蒸从巳至申出曝干细剉用之不入汤药 参为之使 恶贝母漏芦兔丝子 伏汞雌黄焰硝】

当归【包白味甘者良去尘并头尖硬处一分已来洗净酒浸一宿若要破血即使头一节硬实处若要止痛止血即用尾若一防用不如不使服食无効单使妙也 恶防茹湿麝 制雄黄

畏菖蒲生姜海藻牡蒙】

麻黄【陈从者良去节并沫若不尽服之令人闷用夹刀剪去节并头槐砧上用铜刀细剉煎三四十沸竹

片掠去上沫尽漉出熬干用之厚朴白微为之使 恶辛夷石韦】

白芍药【以竹刀刮去麤皮并头土了剉之将蜜水拌蒸从巳至未曝干用之今人多以酒浸蒸切片或

用烦亦良 须丸乌药末药为之使 恶石斛芒硝】

赤芍药【制度并使恶同白芍药】

瞿麦【只用蒴壳不用茎叶若一时使即空心令人气咽小便不禁凡欲用先须以莖竹沥浸一伏时漉出

晒干用 牡丹蓑草为之使 恶螬蛸 伏丹砂】

参【墨黑者良用蒲草重重相隔入甑蒸两伏时后出干勿令犯铜铁饵之噎人喉防人目拣去蒲草尽

了用之一法用酒洗去尘土切片晒干用 恶黄芪干姜大枣山茱萸】

秦艽【凡使秦并艽须于脚文处认取左文列为文即治疾艽即发脚气凡用秦先以布拭上黄肉毛尽然

后用童便浸一宿至明出日干用 菖蒲为之使 畏牛乳】

百合【白花者良酒拌蒸】

知母【皮黄肉白者良于槐砧上细剉焙干木臼杵捣一法去毛蜜炙勿令犯铁器得黄蘗及酒良 伏蓬

砂盐】

贝母【黄白轻松者良先于柳木灰中炮令黄劈破去内口鼻上有米许大者心一小颗后拌糯米于铤上同炒待米黄熟然后去米取出其中有独颗 不作两片无皱者号曰丹龙精不入药用若误服令人筋脉不收用黄精小蓝汁合服立愈 厚朴白薇为之使 恶桃花

畏秦艽莽草礞石】

白芷【白色不蛀者良 当归为之使恶旋覆花 制雄黄硫黄】

淫羊藿【细剉用羊脂相对拌炒过待羊脂尽为度每修事一斤用羊脂四两为度也
薯蓣紫芝为之

使得酒良】

黄芩【大肺经用枯芩去腐酒浸切炒入大腸或安胎等俱用子芩酒浸切炒
龙骨山茱萸为之使 恶

葱实 畏丹砂牡丹藜芦】

狗脊【凡修事火燎去毛细剉了酒拌蒸从巳至申出曝干用 萆薢为之使
恶莎草败醬】 茅根【洗净捣烂勿用露根】

紫菀【用东流水淘洗令净用蜜浸一宿火上焙干用凡修事一两用蜜二分 欸冬为之使
恶天雄藁

本雷丸遠志瞿麦 畏茵陳】

紫草【真者方佳须用蜡水蒸之待水干取去头并两畔髭细剉用每修事紫草一斤用蜡三
两于铛中镕

净便投蜡水作汤用】

通草【即木通也有紫白二色紫者皮厚味辛白者皮薄味淡二者皆能通利】

藁本【去芦水洗切 恶防茹 畏青箱子】

石韦【背有黄毛须拭极净羊脂拌炒焦黄色 滑石杏仁射干为之使 得菖蒲良
制丹砂矾石】 萆薢【其根细长浅白者真酒浸一宿焙干 忌铁薏苡为之使
畏前胡柴胡牡蛎大黄葵根】 土茯苓【忌铁茶】

白薇【用糯米泔汁浸一宿至明取出去髭了于槐砧上细剉蒸从巳至申出用夏月浸二时
许 恶黄芩

干姜大枣山茱萸大黄大防干漆】

大青【处处有之三四月采茎陰干】

艾叶【产蕲州者良入药用新炙火用陈 苦酒香附为之使】

恶实【一名防粘子一名牛旁子一名大力子用酒拌蒸待上有薄白霜重出却用布拭上然后焙干捣如

粉用】

水萍【紫背浮萍七月采之拣净以竹筛摊晒下置水一盆映之即易干也】

王 【根能吐下子生用润心肺治黄病炒用治肺痿吐血肠风防血赤白痢反胃吐食取汁制雄汞】地榆【切之如绵者良酒洗 得髮良恶麦門冬 伏丹砂雄黄硫黄】

大小蓟根【消肿捣汁止血烧灰存性】

海藻【凡使先须用生乌豆并紫背天葵和海藻三件同蒸一伏时 日干用之近人但洗净咸味焙干用

反甘草】

泽兰【凡使先要别识雄雌其形不同大泽兰形叶皆圆根青黄能生血调气与缺合小泽兰迥别采得后防叶上斑根须尖茎方此药能破血通久积凡修事大小泽兰须细剉之用绢袋盛悬于屋南畔角上令干用防己为之使】

昆布【凡使先用弊甑簞同煮去咸味焙细剉用每修事一斤用甑簞十个用昆布细剉二味各一处下东

流水从巳至亥水旋添勿令少】

防己【凡使勿使木条以其木条已黄腥皮皱上有子足子不堪用凡使防己要心花文黄色者然后细剉车前草根相对同蒸半日后出取去车前草根细剉用之一法用酒洗切殷孽为之使 恶细辛畏葶藶女菀卤咸杀雄黄硝石毒】

天麻【透明者良天麻十两用蒺藜子一镒缓火熬焦熟后便先安置天麻十两于瓶中上用火熬过蒺藜子盖内外使用三重纸盖并系从巳至未时又出蒺藜子再入熬炒准前安天麻瓶内用炒了蒺藜子于中依前盖又隔一伏时后出如此七遍瓶盛出后用布拭上气汗用刀劈焙之细剉单捣一法麪裹煨透切】

阿魏【凡使各有讹伪有三验第一验将半铢安于铜器中一宿至明霑阿魏处白如银汞无赤色第二验将一铢置于五防草自然汁中一夜至明如鲜血色第三验将一铢安于柚树上树立干便是真色黑者力微黄溲者力上凡使先于净鉢中研如粉了于热酒器上裹过任入药用】

香薷【八九月开花着穗时采之去根留叶陰干勿令犯火服至十两一生不得食白山桃也】百部根【去心皮用酒浸一宿漉出焙干细剉用】

款冬花【花未舒者良去梗蒂甘草水浸一时晒干用杏仁为之使得紫苑良恶 参皂荚消石

畏贝母麻黄辛夷黄芩黄芪连翘青葙】

红蓝花【自种者真得酒良】

牡丹皮【凡使采得后日干用铜刀劈破去骨了细剉如大豆许用清酒拌蒸从巳至未出日干用潤而

厚者良 忌蒜胡荽 伏砒 畏兔丝子贝母大黄】

三棱【去毛米醋浸一日切片炒或煮熟焙干入药乃良】

青黛【水飞去脚縁中有石灰入服饵药中宜飞净用一法用青布浸汁代之】

郁金【色赤似姜黄蟬肚者良置生鸡血中化成水者真磨汁临服入药】

卢防【上有青竹文斑并光膩味极苦勿便和众药搗此末先搗成粉待众药末出然后入药中】延胡索【产茅山谿陵涧粒粒金黄色者良醋煮切】

肉豆防【不油不蛀不皱皮者佳糯米作粉使热汤搜裹豆防于糖灰中炮待米 子焦黄熟然后出去

米粉用勿令犯铜铁】

白豆防【药煎成方炒研入一二沸即起入丸待诸药细末后方入勿隔宿】

砂仁【畧炒吹去衣研用入汤丸法同白豆蔻得白檀香豆防为使入肺得人参益智为使入脾得黄檗

茯苓为使入肾得赤白石脂为使入大小肠得诃子白芨萸鳖甲良】

补骨脂【即破故纸形圆实色黑者良此药性本太燥每用酒浸一宿后漉出浮者去之却用东流水浸三日夜却蒸从巳至申出日干用 忌铁得胡桃胡麻良 恶甘草 忌诸血芸蓼】

蓬莪茂【凡使于砂盆中用醋磨令尽然后于火畔吸令干重筛过用一法火炮醋浸煨切得酒醋良】 白前【用生甘草水浸一伏时后漉出去头须了焙干任入药中用】

荠苎【解百药毒生捣汁服或末煮俱可】

白药子【末用】

香附【细者佳去毛以水洗净拣去砂石于石臼内捣去皮用童便浸透晒捣用或以酒醋酥盐水姜汁浸

俱瓦上焙干 得芎防苍术醋童子小便良 忌铁】

鳢肠【即旱莲草性太寒宜熬膏用须日色中 忌铁】

使君子【慢煨香热用或云七生七煨食亦良忌饮热茶犯之即防】

翦草【治肺热吐血有神旧出婺州今产寧州】

附子【底平有九角如铁色一个重一两即是气全堪用修事十两于文武火中炮令皴折者去之用刀刮上孕子并去底尖微细劈破于屋下午地上掘一坑可深一尺安于中一宿至明取出焙干用麸炒欲炮者灰火勿用襍木火只用柳木最多若陰制使即生去尖皮底薄切用东流水并黑豆浸五日夜然后漉出于日中曝今干用凡使须陰制去皮尖了每十两用生乌豆五两东流水六升一云此物性太烈古方用火炮不若用童便煮透尤良地胆为之使得蜀椒食盐下达命门 恶蜈蚣豉汁 畏防风甘草人参黄芪綠豆乌韭童溲犀角】

半夏【陈久者良若修事四两用捣了白芥子末二两头醋六两二味搅令浊将半夏投中洗三遍用之半夏上有巢涎若洗不净令人气逆肝气怒满若入治痰饮药用白矾汤入姜汁浸透洗净用无白星为度造麴法用半夏不拘多少将滚汤泡过宿捣烂每一斗入生姜一斤同捣之作饼子用干稻秆或粟麦秆 之如 麴法干久用 射干柴胡为之使 恶皂荚海藻饴糖羊血 畏生姜干姜秦皮 甲雄黄】

大黄【细切内文如水旋斑 重剉蒸从巳至未晒干又用腊水蒸从未至亥如此蒸七度却酒薄蜜水再蒸一伏时其大黄譬如乌膏樣于日中晒干用之为妙下药酒浸一时煮二三沸即服 黄芩为之使 恶干漆忌冷水】

桔梗【味苦而有心者良凡使去头上尖硬二三分已来并两畔附枝子于槐砧上细剉用百合水浸一伏时漉出缓火熬令干用每修事四两用生百合五分捣作膏投于水中浸一法用米泔浸一宿微焙用 节皮为之使 畏白及龙胆龙眼 忌猪肉 伏砒】

草蒿【即青蒿叶细而香自采佳陰干凡使唯中为妙到膝即仰到腰即俛使子勿使叶使根勿使茎四件若同使翻然成痼疾采得叶不计多少用童溺浸七日七夜后漉出晒干 伏硫黄】

旋覆花【去裹花蕊壳皮并蒂蒸已至午晒干用】

射干【不辣者良米泔水浸一宿漉出然后用菰竹叶煮从午至亥漉出日干用之】

常山【如鸡骨者良春使茎叶夏秋冬使根酒浸一宿至明漉出日干熬捣少用勿令老人久病者服之切

忌 畏玉札忌葱菰菜 伏砒石】

甘遂【用生甘草汤小荠苳自然汁二味搅浸三日其水如墨汁更漉出用东流水淘六七次令水清为度漉出于土器中熬令脆用之一法麪包煨热去麪 蒂为之使 恶远志】

白敛【生取根捣烂可传痈肿 代赭为之使】

白及【水洗切 紫石英为之使恶理石 畏杏仁李核仁】

贯众【洗净切片炒 藿菌赤小豆为之使 伏石钟乳】

何首乌【冬至后采者良入春则芽而中空矣北人以麝种欺人香气不能混也临用勿去皮以苦竹刀切米泔浸经宿同豆九蒸九晒木杵臼捣之勿犯铁器 茯苓为之使 忌葱蒜萝卜诸血无鳞鱼】

威灵仙【去芦酒洗忌茶麪汤】

牵牛子【即草金零入水中淘浮者去之取沉者防干拌酒蒸从巳至未防干临用春去黑皮用之黑者

力速磨取头末入药得干姜青木香良】

蓖麻子【形似巴豆节节有黄黑斑防凡使先须和皮用盐汤煮半日去皮取子研过用 忌炒豆 伏

丹砂粉霜】

天南星【陈久松白者良滚汤明矾或姜汁拌和泡用一用泡过者为末入腊月黑牛胆中陰干用蜀漆为之使得火牛胆良恶莽草畏附子干姜防风生姜伏雌黄丹砂焰硝】

稀莖【方赤莖者良采叶陰干醇酒拌九蒸九晒忌铁】

苈根【此物大能补陰而行滯血方药以其目前贱物多不用】

白头翁【花子莖叶同蠡实为之使得酒良】

芦根【逆水生并黄泡肥厚味甘者良露根勿用去须节并赤黄皮用其汁消痰开胃下气除热解一切食

物鱼鰕河鲀鱼】

马兜铃【凡使采得后去叶并蔓了用生绢袋盛于东屋角畔悬令干了劈作片取向里子去革膜并令

净用子勿令去革膜不尽用并皮炒入药】

仙茅【刮上皮于槐砧上用铜刀切豆许大却用生稀布袋盛于乌豆水中浸一宿取出用酒湿拌了蒸从

巳至亥取出曝干勿犯铁斑人须鬣禁食牛乳及黑牛肉】

刘寄奴【凡使去梗以布拭上薄殼皮令净拌酒蒸从巳至申出曝干用之莖叶花子皆可用】骨碎补【生江南根着树石上采得用铜刀刮去上黄赤毛尽便细切用蜜拌令润架柳甑蒸一日后出

曝干用一法去毛细切后用生蜜拌蒸从巳至亥】

连翘【黑而闭口者良去蒂根研】

续随子【凡用去殼取色白者以纸包压去油取霜用】

山豆根【或末或研或噉咽】

白附子【竹节者良炮去皮得火良】

预知子【去皮研服】

木贼草【去节童便浸一宿焙干】

蒲公英【自采鲜者入汤药煎入丸末 疮毒捣烂用】

谷精草【土 为之使忌铁 伏汞砂】

夏枯草【土 为之使忌铁 伏汞砂】

山慈菴根【出浙江处州府遂昌县洪山地方市中无真者形光无毛本草注中云有毛误也】灯心草【蒸熟待干折取中心白穰燃灯者是为熟草不蒸者生干剥取为生草入药用之最难研以粳

米粉浆染过晒干研末入水澄之浮者是灯心也晒干用】

海金沙【或丸或防沙及草俱可入药】

萱草根【晒干为末或用水煎酒煎研汁皆可服】

藿香【自种者良揉之如藿香气者真薄荷香者非也】

络石【凡采得后用簾布楷叶上茎蔓上毛了用熟甘草水浸一伏时出切日干任用杜仲牡丹为之使

恶铁落 畏贝母菖蒲 杀孽毒】

木部

桂【凡使勿薄者要紫色厚者去上簾皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五两取有味厚处生用加末用即用重蜜熟绢并纸裹勿令犯风其州土只有桂草元无桂心用桂草煮丹阳木皮遂成桂心凡用 单捣用之得人参甘草麦门冬大黄黄芩调中益气得柴胡紫石英干地黄疗吐逆忌生葱石脂】

桂枝【即桂之枝条轻薄者】

槐实【凡采得后去单子并五子者只取两子三子者凡使用铜槌槌之令破用乌牛乳浸一宿蒸过用

景天为之使】

槐花【未开时收采陈久者良入药拣净酒浸微炒若止血炒黑】

枸杞根【即地骨皮凡使根掘得后用东流水浸以物刷上土了待干破去心用热甘草汤浸一宿然后焙干用其根若似物命形状者上春食叶夏食子秋食根并子也 制硫黄丹砂】

枸杞子【去蒂及枯者酒润一夜捣烂入药】

栢实【去油者酒拌蒸另捣如泥或蒸熟曝烈舂簸取仁砂研入药 子牡蛎桂为之使 畏菊花羊蹄

诸石及麝麴伏砒硝】

栢叶【向月令采之春东夏南秋西冬北 使畏伏同实】

茯苓【坚白者良去皮捣为末于水盆中搅三次将浊浮者去之是茯苓筋若误服之令人眼中童子并黑精防小兼盲日切记如飞澄浮晒干人乳拌蒸用赤茯苓则不必飞也 使恶畏忌同茯神】

茯神【去皮木用 马问为之使 得甘草防风芍药麦门冬紫石英疗五脏 恶白蘖 畏地榆秦艽牡

防 甲雄黄忌米醋及酸物】

琥珀【凡用红松脂石珀水珀花珀物象珀防珀琥珀红松脂如琥珀只是浊太脆文横水珀多无红色如浅黄多麤皮皱石珀如石重色黄不堪用花珀文似新马尾松心文一路赤一路黄物象珀其内自有物命动此使有神妙防珀其珀是众珀之长故号曰防珀琥珀如血色于布上拭吸得芥子者真也大率以轻而透明者为佳入药中用水调侧栢子末安于甞锅子中安琥珀于末中了下火煮从巳至申别有异光别捣如粉重筛用一法用细布包内豆腐锅中煮之然后灰火畧煨过入目制用安心神生用】

酸枣【粒粒粗勿碎皮者良炒爆研细入药如砂仁法勿隔宿 恶防己】

黄檗木【即黄檗也凡使用刀削上麤皮了用生蜜水浸半日漉出晒干用蜜涂文武火炙令蜜尽为度

凡修事五两用蜜三两一法用盐酒拌炒褐色 恶甘漆 伏硫黄】

楮实【凡使采得后用水浸三日将物搅旋投水浮者去之晒干用酒浸一伏时了便蒸从巳至亥出焙令

干用之】

松脂【凡用以胡葱同煮二十沸入冷水揉扯数十次晒干用】

降真香【以番舶来者色较红香气恬而不辣用之入药殊胜色深紫者不良】

茗苦【入清头目药用苦 消食下气用佳茗】

南烛【茎叶捣汁渍米炊饭子入澁精补益药用】

干漆【火煨黑烟起尽存性研如飞尘 半夏为之使 畏鸡子紫苏杉木漆姑草蟹
忌油脂】五加皮【五叶者是剥皮去骨陰干遠志为之使 畏 参蛇皮】

蔓荆实【凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一伏时后蒸从巳至未出防用一法炒捶碎用
恶乌头石

膏】

辛夷【凡用去麤皮拭上白赤毛了去心即以芭蕉水浸一宿漉出用浆水煮过从巳至未出
焙干用若治眼目中患即一时去皮用向里实者 芎防为之使 恶五石脂
畏菖蒲黄石膏黄环】

桑上寄生【凡使在树上自然生独枝树是也采得后用铜刀和根枝茎细剉陰干了用 忌火
】杜仲【极厚者良削去麤皮每一斤用酥一两蜜三两和涂火炙以尽为度一法用酒炒断
丝以渐取屑方

不焦 恶 参蛇蜕皮】

女贞实【按本草女贞实与冬青似是而非也女贞叶长四五寸子黑冬青叶 子微红俱霜
后采陰干

去粗皮内更有细皮实白色酒拌黑豆同蒸九次】

枫香脂【凡用以蠶水煮二十沸入冷水中揉扯数十次晒干用】

防核【凡使汤浸去皮尖擘作两片用芒硝木通草二味和防仁同水煮一伏时后漉出去诸

般药取防仁研成膏任加減入药中使每修事四两用芒硝一两木通草七两一法去衣绵纸包研去油用】

丁香【凡使有雄雌雄颗小雌颗大似櫻枣核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲使雄须去下盖乳子发人

背痛也入煎药为末调入或将好投入一二沸即倾 畏郁金 忌火】

沉香【凡使须要不枯色黑润者良如觜角硬重沉于水下为上也半沉者次也入防中用须众药出即

入拌和用之入煎磨汁 忌见火】

乳香【圆小光明者良古方以灯心同研或以糯米数粒同研或以人指甲二三片同研或以乳鉢坐热水中乳之云皆易细总不如研细和人乳畧蒸再研匀晒干研如飞尘为妙药将沉下一二即起勿多煮】

没药【透明者良制同乳香法】

金樱子【熬膏服或和药霜降后采金樱子不拘多少以粗气微搗去毛刺净复搗破去子约有一斗用水二斗煮之一饭时漉起清汁又入白水煮之又漉起又入白水煮三次之后其渣淡而无味去之止将净汁复以细蜜绢滤过净锅熬之如饴乃止收贮磁 中坐凉水内一宿用服之大能固精良方二仙丹即此膏加入芡实粉】

桑根白皮【自采入土东行者或竹刀或铜刀刮去黄粗皮手析成丝拌蜜瓦上炙根浮土上者杀人

桂心续断麻子为之使忌铁器】

桑叶【煎汤研汁为末俱可经霜者另取洗眼用】

淡竹叶【防竹叶别有用】

竹沥【用取新鲜金竹锯尺许中留节两头去节劈两开不拘多少用砖二块架定竹两头出砖二寸许各以磁盘置于下 沥滴其中用烈火薰逼则两头濺濺滴沥于 中竹将自燃沥便尽矣就将滴过沥竹为薪又架新竹于砖上如前烧逼任取多少淡竹防竹苦竹慈竹惟四种各有沥堪用 姜汁为之使】

竹皮茹【取极鲜竹刮皮磋去外硬青勿用止淡竹箎竹苦竹堪用余不入药】

吴茱萸【凡使先去叶核并襍物了用大盆一口使盐水洗一百转自然无涎日干任入丸防中用修事十两用盐二两研作末投东流水四斗中分作一百度洗别有大効若用醋煮即先沸醋三十余沸后入茱萸待醋尽干每用十两使醋一镒为度 蓼实为之使丹参消石白垩畏紫石英】

防榔【凡使取外存坐穩心文如流水碎破内文如锦纹者妙半白半黑并心虚者不入药用凡使须别防与榔头圆身形矮毗者是榔身形尖紫文麓者是防防力小榔力大欲使先以刀刮去底细切勿经火恐无力効若熟使不如不用】

梔子【凡使勿用颗大者号曰伏尸梔子无力须要如雀脑并须长有九路赤色者上凡使先去皮须了取九棱者仁以甘草水浸一宿漉出焙干捣晒如赤金末用大率治上焦中焦连殼用下焦去殼洗去黄浆炒用治血病炒黑用】

骐驎竭【凡使勿用海母血真似骐驎竭只是味盐并腥气骐驎竭味微盐甘似梔子气是也欲使先研作粉重筛过丸防膏中任使用勿与众药同捣化作飞尘也 得蜜陀僧良】

龙脑香【即冰片也形似白松脂作杉木气明净者善久经风日或如雀屎者不佳今人多以樟脑身打

乱之不可不辨也云合糯 米炭相思子贮之则不耗膏主耳聋】

茺莢【妙去谷气嗅如信者真】

枳殼【凡使勿使枳实縁性効不同若使枳殼取辛苦腥并有隙油能消一切防要陈久年深者为上用时先去瓢以麸炒过待麸黑焦遂出用布拭上焦黑然后单捣如粉用产江右者良】

枳实【色黑陈久者良去穰麸炒黄色】

厚朴【凡使要用紫色有油质厚者良去麓皮用酥炙过每修事一斤用酥四两炙了细剉用若汤饮下使用自然姜汁八两炙一升为度 干姜为之使 恶泽防消石寒水石 忌豆】

山茱萸【凡使勿用雀儿酥真似山茱萸只是核八棱不入药用圆而红润肉厚者佳酒拌砂锅上蒸去核了一斤取肉皮用只秤成四两已来凡蒸药用柳木甑去水八九寸水不泛上余悉准此 蓼实为之使恶桔梗防风防己】

胡桐淚【形似黄矾而坚实有夹烂木者木淚乃树脂流出者其状如膏油石淚乃脂入土石间者其状

成块以其得卤斥之气故入药为胜 伏砒石】

猪苓【用铜刀削去麤皮一重薄切下东流水浸一夜至明漉出细切蒸一日出防干用一云猪苓取其行

湿生用更佳】

乌药【连珠者良洗净切】

龙眼【生者沸汤漚遇食不动脾】

安息香【或烧薰或末服】

仙人杖【此是笋欲成时立死者色黑如漆五六月收之】

海桐皮【酒浸服亦可入煎】

五倍子【或生或炒俱为末入药】

大腹【擘去垢黑用温水洗净再用黑豆汁洗方可用日干此树鸬鸟多栖之遗屎在皮上不净恐有毒今

人用之不制大误】

天竺黄【轻者真伏粉霜】

蜜蒙花【凡使先拣令净用酒浸一宿漉出 干却拌蜜令润蒸从卯至酉出日干如此拌蒸三度又却日干用每修事一两用酒八两浸待色变用蜜半两蒸为度此元名水锦花】

巴豆【凡使巴之与豆及刚子须在仔细认勿误用杀人巴颗小 实色黄豆颗有三棱黑色刚子颗小似枣核两头尖巴与豆即用刚子勿使凡修事巴豆敲碎去油净用白绢袋包甘草水煮焙干或研膏用每修事一两以酒麻油各七合尽为度为疮疡传药须炒黑存性能去瘀肉生新肉有神 芫花为之使 得火良 恶蓑草牵牛 畏大黄藜芦黄连芦笋豨豉豆汁冷水】

蜀椒【一名南椒凡使须去目及闭口者不用其椒子先须酒拌令湿蒸从巳至午放冷密盖除下火四畔无气后取出便入瓷器中盛勿令伤风用也 杏仁为之使 得盐良 畏欬冬花防风附子雄黄橐吾冷水麻仁浆】

皂荚【凡使须要赤膩肥并不蛀者用新汲水浸一宿用铜刀削上麤皮用酥反覆炙酥尽为

度取出槌之去子搗篩皂莢一兩酥二分子收得拣取圓滿堅硬不蛀者用瓶盛下水于火畔
煑待炮熟剥去硬皮一重□取向里白嫩肉两片去黃其黃消人腎氣將白两片用銅刀細切
于日中干用一法麪裹煨去核 栢實为之使 惡麥門冬 畏空青人參苦參
伏丹砂粉霜硫黃礞砂】

诃子【本名诃梨勒凡使勿用毗梨勒罽梨勒榔精勒襍路勒若诃梨勒文只有六路或多或
少并是襍路勒毗路勒个个毗襍路勒皆圓露文或八路至十三路号曰榔精勒多澁不入用
凡修事先于酒內浸然後蒸一伏時其诃梨勒以刀削路細剉焙干用之】

赤怪柳【治痧 聖藥也得之毒自出可不死】

栢實【凡采得後防干酒拌浸令濕蒸待上皮軟剥去皮取肉去核勿單用其核槌碎用漿水
煑一伏時了

用如使肉即不使核使核即不使肉 茴香为之使】

椿木【椿木根凡使不近西頭者上及不用其葉只有根采出拌生葱蒸半日出生葱細剉用
袋盛挂屋南

畔陰干用偏利溺澁也一法用根皮漂淨酒拌蒸】

无食子【凡使勿令犯銅鐵并被火驚者顆小文細上无皺米者炒用漿水于砂盆中或硬石
上研令盡

却焙干研了用勿搗能為黑犀色】

雷丸【赤色者殺人取肉白者用甘草水浸一宿銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸
一宿後蒸從巳至未出日干却以酒拌如前從巳至未蒸日干用一法用蒼朮湯泡去皮切
厚朴芫花蓄根荔實为之使惡葛根】

蘇方木【紅潤者良凡使去麤皮并節了若有中心文橫如紫角者号曰木中尊色甚致倍常
百等須細

剉了重搗拌細條梅枝蒸從巳至申出陰干用】

胡椒【凡使只用內无皺殼者用方大漢椒使殼胡椒使子每修煉了于石槽中碾碎成粉用
】益智子【去殼炒臨用研】

梓木皮【主諸黃疸濃煑汁飲之良】

榧实【同鷲肉食生断节风又上壅人皮反绿豆能杀人 忌火气】

木鼈子【入药去油者】

柞木子【能开交骨所以催生有神】

櫻桐子【入药烧灰用不可絶过即是煨存性研如飞尘防瘀止血之神药也】

木槿【入药炒用取汁度丝使得易落】

果部

豆防【俗名草菓者是也去蒂并内里子后取皮同茱萸于锅中缓炒待茱萸微黄黑即去茱萸取草豆防

皮及子杵用之】

莲肉【去心勿去皮分作两片每片分作四小块瓦上焙焦色一法每一斤用豮猪肚一个盛贮煮熟捣焙

用之 得茯苓山药白术枸杞子良】

荷鼻【采荷叶近蒂者是 畏桐油 伏白银硫黄】

橘皮【真广陈皮猪鬃纹香气异常去白时不可浸于水中止以滚汤手蘸三次轻轻刮去白要极净】橘核【以新瓦焙香去壳取仁研碎入药】

青皮【以汤浸去瓢切片醋拌瓦炒过用】

大枣【去核有齿病疳病虫慝人及小儿不宜食

忌与葱同食令人五脏不和与鱼同食令人腰腹痛】栗【日中曝干食下气补益火煨去汗亦佳生食有木气不补益人蒸炒熟食壅气凡患风人及小儿不

可食解羊肉羶】

覆盆子【凡使用东流水淘去黄叶并皮蒂尽子用酒拌蒸一宿以东流水淘两遍晒干方用为妙也】鸡头实【凡用蒸熟烈日晒裂取仁亦可舂取粉用入涩精药有连壳用者一云茭实一斗以防风四两

煎汤浸过用且经久不坏】

乌梅【去核微炒用造法取青梅篮盛于 上薰黑若以稻灰淋汁润湿蒸过则肥泽不蠹 忌猪肉】木 【产宣州者真即彼处多以小梨充之勿令犯铁用铜刀削去硬皮并子薄切于日中晒却用黄牛乳汁拌蒸从巳至未其木 如膏煎却于日中摊晒干用也今止去穰槌碎用】

柿【不用火烘日晒采青者 置器中自然红熟滋味尽去而甘不可与蟹同食作防惟木香磨汁饮可解】柿霜【用大柿去皮捻遍日晒夜露至干内瓮中待生白霜乃取出市者多伪不入药】

乌芋【即芋薺也能消瘴气】

枇杷叶【凡使采得后秤湿者一叶重一两干者三叶重一两是气足堪用以簾布拭上毛令尽用甘草汤洗一遍却用绵再拭极净每一两以酥一分炙之酥尽为度如治肺病以蜜涂炙治胃病以姜汁涂炙此物治咳嗽如去毛不尽反令人嗽也】

甘蔗【榨浆饮消渴解酒痧 最宜】

桃仁【七月采之去皮尖及双仁者麸炒研如泥或烧存性用此破血行瘀血之要药也雷公法用白术乌豆一味和桃仁同于埧埧子中煮一伏时后漉出用手擘作两片其心黄如金色任用之行血宜连皮尖生用香附为之使】

桃花【三月三日采阴干之勿使千叶者能使人鼻衄不止目黄凡用拣令净以绢袋盛于檐下悬令干去

尘用】

桃梲【是千叶桃花结子在树上不落者于十一月内采得一云正月采之中实者良凡修事以酒拌蒸从

巳至未焙干以铜刀切焙取肉用一法捣碎炒若止血炒黑存性】

杏仁【五月采之以汤浸去皮尖及双仁者麸炒研用治风寒肺病药中亦有连皮尖用者取其发防也】梨子【消热痰加牛黄末疗小儿风疾痰涌有神解热毒久服不患痈疽】

橄榄【中河豚毒煮汁服或生嚼】

山查【水润蒸去核净肉用】

米谷部

胡麻【凡修事以水淘浮者去之沉者漉出令干以酒拌蒸从巳至亥出摊晒干于臼中舂令麤皮一重尽拌小豆相对同炒小豆熟即出去小豆用之蒸不熟令人髮落 与茯苓相宜】

麻子【极难去殼取帛包置沸汤中浸至冷出之垂井中一夜勿令着水次日日中曝干就新瓦上揅去殼

簸 取仁粒粒皆完畏牡蛎白茯苓白微】

饴糖【糯米作者入药粟米者次之余但可食耳】

生大豆【或搗或煮汁或炒屑各有用 得前胡乌喙杏仁牡蛎诸胆汁良 恶五参龙胆豆黄屑忌

猪肉小儿以炒豆猪肉同食必壅气致死十有八九十歲以上不畏也】

赤小豆【法同大豆合鱼酢食成消渴】

大豆黄卷【或研烂绞汁或炒为末用黑大豆为蘖牙生五寸长便干之名为黄卷一法壬癸日以井华水浸大豆 生芽取皮陰干用 得前胡杏子牡蛎乌喙天雄鼠屎共蜜和良 恶海藻龙胆】

酒【人为火燎以陈酒浸之止痛防出火毒令人不死】

粟米【即小米陈者与杏仁同食令人吐防】

粳米【小儿病人不宜多食】

粳米【陈者下气病人宜之】

蘖米【凡谷皆可生蘖有粟黍谷麦豆诸蘖皆水浸胀 生芽曝干去须取其中米炒研麪用其功皆主消

导 粟蘖 稻蘖 穬麦蘖各有用】

舂杵头细糠【凡谷皆有糠粳稻粟粳者胜北方多用杵南方多用碓入药并用丹家云糠火炼物

力倍于常】

小麦【浮者止汗须拣净焙用】

麦麸【性凉用炒诸药】

荞麦【压丹石毒作麪和猪羊肉热食不过八九顿即患热风须眉脱落还生亦希泾汾以北多此疾又不

可合黄鱼食家常多犯故特拈着】

麪【凡使须陈久者搗作末后掘地坑深二尺用物裹内坑中至一宿明出焙干用】

神麪【五月五日六月六日或三伏日为诸神集防之辰故名神麪如过此日造者非也法用白虎白麪一百斤勾陈苍耳自然汁三升腾蛇青蓼自然汁四升青龙青蒿自然汁三升 武杏仁四升泡去皮尖捣烂入麪朱雀赤小豆三升煮熟去皮 捣烂和麪一处匀一如造酒麪法以麻叶或楮叶包裹如造醬黄法待生黄衣晒收之凡用须火炒黄以助土气陈久者良】

菹豆【紫花者良炒去壳打碎 解酒河豚鱼一切草木毒生嚼及煮汁饮】

淡豆豉【出江西者良黑豆性平作豉则温既经蒸罾故能升能散得葱则发汗得盐则能吐得酒则治

风得薤则治痢得蒜则止血炒熟则又能止汗】

红麪【亦出江西陈久者良吹净炒研用】

绿豆【生研绞汁或煮食用之宜连皮去皮则令人缺壅气当是皮寒肉平故也圆小绿者佳反榧子壳

忌鲤鱼酢 解金石砒霜一切草木诸毒连皮生研水服】

醋【米造陈者良醋酒为用无所不入故制药多用之 服茯苓丹参不可食醋】

醬【豆作者良麦作者不用以久久为佳又有肉醬鱼醬皆呼为醢不入药用】

罌子粟【用热水泡软擘去筋膜切成丝用蜜水或米醋拌微炒晒干用 忌蒜醋胡椒】

菜部

蒂【凡使勿用白 蒂要采取青綠色 待 气足其 蒂自然落在蔓茎上采得未用时使栳栳叶裹

于东墙有风处挂令吹干用】

白冬 【此物经霜后皮上白如粉涂故云白冬 也被霜后取置经年破取核水洗燥去殼搗仁用一

用皮肉搗绞汁服】

白芥子【研用】

莱菔【生食熟食俱可治久脾泄百药不効煮食经年无不効者但不可与地黄同食多食动气惟生姜能

制其毒伏硃砂】

莱菔子【炒研能消食性峻利伤人真气勿久服】

黄蜀葵花【疮家要药作末及浸油俱可】

葱头【取根白一二寸连须用洗净 忌蜜及常山】

韭【绞生汁饮其子入药拣净蒸熟暴干簸去黑皮炒黄研用 忌蜜及牛肉伏石钟乳乳香】荊芥【陈者良去梗取穗若用止血须炒黑】

苏子【自收方真市者俱伪畧妙研极细煎成药投入二三沸即倾】

紫苏【两面俱紫自种者真】

薄荷【产苏州龙脑者良】

苦匏【即苦壶卢也凡用须细理莹净无廕翳者乃佳不尔有毒】

马齿苋【凡使勿用叶大者不是马齿苋亦无水银忌与鼈同食食之俱变成鼈啮人腹至不可治】葢菜【治肺 俗名鱼腥草生陰处】

木耳【桑槐树生者良煮羹食有用礮盛大火内煨去烟存性为末入药】

人部

髮髮【凡使是男子年可二十已来无疾患顔貌红白于顶心剪下者髮是凡于丸防膏中先用苦参水浸

一宿漉出入瓶子以火煅之令通赤放冷研用】

人乳汁【白而不腥者良】

人牙齿【入药烧用】

人粪【宜用絶干者捣末沸汤沃服之一名金汁埋地中年久者良】

人溺【肥白无病童子味不咸雪白者良】

人中白【溺器中者良火煅研】

裤裆【取中裊近隐处男用女女用男或取汁或烧灰服】

天灵盖【凡使弥腐烂者佳有一片如三指濶者取得用塘灰火爇一夜待腥秽气尽却用童便于甕锅中煮一伏时漉出于屋下掘得一坑深一尺置骨于中一伏时其药魂归神妙阳人使陰陰人使阳男骨色不赤女骨色赤以此别之一法同檀香汤洗过酥炙用或烧存性用】

紫河车【置酒内覆者男胎也首胎重十五两以上先将酒洗数次血水方尽用银簪脚剔去筋膜封固银锅内加酒重汤煮一昼夜或文武火焙干一法米泔浸净入猪肚中蒸烂捣膏入药忌犯铁】兽部

龙骨【骨细文广者是雌骨龕文狭者是雄骨五色者上白色者中黑色者次黄色者稍得经络不净之处并妇人采得者不用洗净 研如粉极细方入药其効始神但是丈夫服空心益肾药中安置图龙骨气入肾脏中也雷公所云生用法也一法用酒浸一宿焙干研粉水飞三度用如急用以酒煮焙干或云凡入药须水飞晒干每斤用黑豆一斗蒸一伏时晒干用否则着人肠胃晚年作热也 得人参牛黄黑豆良畏石膏铁 忌鱼】

龙齿【捣碎入丸煅研得畏忌同龙骨】

麝香【其香有三等一者名遗香是麝子脐闭满其麝自于石上用蹄尖挥脐落处一里草木不生并焦黄人若收得此香价与明珠同也二名膝香采得甚堪用三名心结香被犬兽惊心破了因兹狂走裸诸羣中遂乱投水被人收得擘破见心流在脾结作一个干血块可隔山涧早闻之香是香中之次也凡使麝香并用子日开之方用细研筛用之也当门子良凡用另研

忌大蒜】

牛黄【凡使有四件第一件是生神黄赚得者次有角黄是取之者又有心黄是病死后识者剥之劈破取心其黄在心中如浓黄酱汁采得便投于水中黄霑水复便如碎蒺藜子许如豆者硬如帝珠子次有肝黄其牛身上光眼如血色多玩弄好照水自有夜光恐惧人或有人别采之凡用须先单捣细研如尘却绢裹又用黄嫩牛皮裹安于井面上去水三四尺已来一宿至明方取用之 人参为之使 得牡丹菖蒲利耳目 恶龙骨龙胆地黄常山蜚蠊 畏牛膝干漆】

象牙【刮取屑细研用】

鹿角胶【自煎者良酒化服为上或用麦门冬橘红砂仁煎汤化服入丸用酒或水顿化和蜜或炒成珠

亦得 得火良 畏大黄】

阿胶【油绿色光明可鉴者真凡使先于猪脂内浸一宿至明出于柳木火上炙待炮了可研用只以蛤粉

炒成珠用为便 薯蓣为之使 得火良 畏大黄】

白马茎【凡收当取银色无病白马春月游牝时力势正强者生取阴干百日用一法以铜刀破作七片

将生羊血拌蒸半日晒干以粗布去毛及干血挫碎用】

鹿茸【须茄茸如琥珀红润者良凡使先以天灵盖作末然后锯解鹿茸作片子以好羊脂拌天灵盖末涂之于鹿茸上慢火炙之令内外黄脆了如褐色用鹿皮一片裹之安室上一宿其药魂归也至明则以慢火焙之令脆方捣作末用之每五两鹿茸用羊脂三两炙尽为度茸中有小白虫视之不见入人鼻必为麝蛊药不及也切不可鼻嗅 麻勃为之使】

牛胆【腊月黄牛青牛者良】

牡狗阴茎【六月上伏日取阴干百日切片酥拌炒】

羚羊角【带黄色者角弯中深锐 小有挂痕者真耳边听之集集鸣者良凡修事勿令单用不复有验须要不折原对以绳 之将铁错子错之旋旋取用勿令犯风错未尽处须二重纸裹恐力防也错得了即单捣捣尽背风头重筛过然后入药中用免刮人肠也一说密裹藏怀中取出捣易碎】

犀角【凡使以黑如漆黄如栗上下相透云头雨脚分明者为上次用乌黑肌麓皱折裂光润者良近人多巧伪药染汤煮无所不至须辨之凡修治错其屑入臼中捣令细再入鉢中研万匝方入药中用之一説入人懷内一宿易碎或磨汁入药用 松脂升麻为之使 恶雷丸藿菌乌头乌喙 忌盐妊妇勿服能消胎气】

虎骨【胫骨良头颈骨俱可用色黄者佳雄虎者胜药箭射杀者不可入药其毒浸渍骨血间能伤人也制

法并捶碎去髓涂酥或酒或醋各随方法炭火炙黄入药】

猪悬蹄【古方有用左蹄甲者有后蹄甲者酒浸半日炙焦用】

猪四足【母猪者良】

猪胆【陰干汁亦可和药】

猪肚【猪水畜而胃属土故方药用之补虚以胃治胃也】

麋角【煎胶与鹿角胶同法取霜用角水浸七日刮去皮错屑以银瓶盛牛乳浸一日乳耗再加至不耗乃止用油纸密封瓶口别用大麦铺锅中三寸上安置再以麦四周填满入水浸一伏时水耗旋加待屑软如麪取出焙研成霜用】

狐陰茎【炙为末酒服】

獭肝【炙脆研

诸畜肝叶皆有定数惟獭肝一月一叶十二月十二叶其间又有退叶用之须见形乃可

验不尔多伪也】

猫肉【膏油入膏药中防湿如神赵府膏药中用之】

鳝肭脐【此物多伪海中有兽号曰水乌龙海人采得杀之取肾药中修合恐有误其物自殊有一对其有两重薄皮裹丸气肉核皮上自有肉黄毛三茎其一穴年年陰湿常如新兼将于睡着犬蹶足置于犬头其蓦惊如狂即是真也用酒浸一宿后以布裹微微火上炙令青细剉单捣用也 以汉椒樟脑同收则不壞】

禽部

雄雀屎【凡使勿用雀儿粪其雀儿口黄未经淫者粪名雀苏不入药雄屎两头尖圆者是凡

采得先去两畔有附子生者勿用鉢中研如粉煎甘草汤浸一宿头上清甘草水尽焙干任用
日华子云凡鸟左翼掩右者是雄其屎头尖挺直】

伏翼【凡使要重一斤者先拭去肉上毛及去爪肠留肉翅并嘴脚以好酒浸一宿取出以黄
精自然汁五两涂炙至尽炙干用一法止煨存性近世用者多煨存性耳 苋云实为之使】

天鼠屎【即伏翼粪方言名天防尔一名夜明砂凡采得以水淘去灰土恶气取细砂晒干焙
用其砂乃

蚊蚋眼也恶白敛白微】

虫鱼部

石蜜【凡炼蜜只得十二两半是数若火少火过并用不得凡炼蜜每斤入水四两银石器内
以桑柴火慢炼掠去浮沫至滴水成珠不防乃用谓之水火炼法又法以器盛置重汤中煮一
日 滴水不防取用更不伤火】

蜜蜡【蜡乃蜜脾底也取蜜后炼过滤入水中 凝取之色黄者名黄蜡煎炼极净色白者名
白蜡一说新

则白久则黄非也与今时所用虫造白蜡不同 恶芫花齐蛤】

牡蛎【左顾者良东流水入盐一两煮一伏时后入火中烧令通赤然后入鉢中研如粉用也
一法火煨醋淬七次研极细如飞麝 贝母为之使 得甘草牛膝远志蛇床子良
恶麻黄辛夷吴茱萸 伏硃砂】

真珠【于臼中捣令细以绢罗重重筛过却便研二万下了用不细则伤脏腑凡使要不伤破
及鑽透者可

用也一法入豆腐内蒸易碎入目生用不用蒸依上法为是】

瑇瑁【入药生用以其性味全也既经阳火即不堪用与生熟犀角义同】

桑螵蛸【凡使勿用诸裸树上生者不入药中用须桑树畔枝上者采得去核了用沸浆水浸
淘七遍令水遍沸于甕锅中熬令干用勿乱别修事却无効也 得龙骨止精 畏旋覆花戴椹】

石决明【即真珠母也七九孔者良先去上龕皮用盐并东流水于大甕器中煮一伏时了漉
出拭干捣为末研如粉更用东流水于甕器中如此淘之三度待干再研一万匝方入药中用
凡修事五两以盐半分则取服之十两永不得食山桃令人防目也】

海蛤【此即鲜蛤子雁食后粪中出有文彩者为文蛤无文彩者为海蛤乡人多将海岸边烂蛤壳被风涛打磨莹滑者伪作之凡修事一两于浆水中煮一伏时后却以地骨皮栢叶各二两又煮一伏时后于东流水中淘三遍拭干细捣研如粉用 蜀漆为之使 畏狗胆甘遂芫花】

文蛤【修事法同海蛤】

鱻鱼【俗名乌鱼亦名黑鱼诸鱼中惟此胆甘可食】

鲫鱼【子不宜与猪肉同食同沙糖食生疳虫同芥菜食成肿疾同猪肝鸡肉雉肉鹿肉猴肉食生痈疽同

麦门冬食害人】

猬皮【作猪蹄者妙防脚者次炙脆研用】

露蜂房【治臃肿醋水调涂治疮煎洗入药炙用 恶干姜丹参黄芩芍药牡蛎】

蝉蜕【用沸汤洗净泥土去头足翅用攻毒全用】

乌贼鱼骨【凡使要上文顺浑用血卤作水浸并煮一伏时了漉出于屋下掘一地坑可盛得前件乌贼鱼骨多少先烧坑子去炭灰了盛药一宿至明取出用之其効倍多 恶白及白敛附子】

原蚕蛾【炒去翅足用】

蚕退【近世医家多用蚕退纸而东方诸医用蚕欲老眠起所蜕皮虽二者之用各殊然东人所用者为正

用之当微炒】

白僵蚕【凡使除丝绵并子尽以糯米泔浸一宿待蚕桑涎出如蜗牛涎浮于水面上然后漉出微火焙干以布净拭蚕上黄肉毛并黑口甲了单捣筛如粉用也白而直折开如沥青色者佳 恶桔梗茯苓茯神草薺桑螵蛸】

蛞蝓【即蜒蚰也畏盐】

蜗牛【此即负壳蜒蚰也生研服入药炒用 畏盐】

防虫【即俗名地鼈也生人家墙壁下土中湿处治伤寒损续絶及消疟母为必须之药也能

行瘀血 畏

皂莢菖蒲屋游】

青鱼胆【鲜者可煮服干者用醋及水磨用】

鼈甲【七九肋者良醋炙透焦研细再拌醋瓦上焙干再研如飞麪 恶矾石理石】

蝎【形 小者良酒洗净炙干研】

蟾酥【端午日取虾蟆眉脂其法取大虾蟆用蛤蜊殼未离带者合虾蟆眉上用力一捻则苏出于殼内收

在油明纸上干收贮用虾蟆放去而苏复生仍活】

鼠粪【牡防者良其粪两头尖】

蚺蛇胆【人多以猪胆虎胆伪为之试法剔取粟许着净水中浮游水上回旋行走者为真伪者亦走但迟

耳其径沉者诸胆血也勿多着亦沉散也】

蛇蛻【凡使勿用青黄苍色者要用白如银色者凡欲使先于屋下以地掘一坑可深一尺二寸安蛇皮于

中一宿至卯时出用醋浸一时于火上炙干用之得火良 畏慈石及酒】

白颈蚯蚓【凡使收得后用糯米水浸一宿至明漉出以无灰酒浸一日至夜漉出晒令干后细切取蜀椒并糯米及切了蚯蚓三件同熬之待糯米熟去米椒了拣净用之凡修事二两糯米一分椒一分为準畏葱盐】

蜈蚣【凡使勿用千足虫真似只是头上有白肉面并嘴尖若误用并闻着腥臭气入顶致死凡治蜈蚣先以蜈蚣木末不然用柳蚰末于土器中炒令木末焦黑后去木末了用竹刀刮去足甲了用蜈蚣木不知是何木也今人惟以火炙去头足用或去尾足以薄荷叶火煨用之 畏蛭螭蜘蛛白盐鸡屎桑白皮】

蛤蚧【凡使须认雄雌若雄为蛤皮龕口大身小尾粗雌为蚧口尖身大尾粗男服雌女服雄凡修事服之其毒在眼须去眼及去甲上尾上腹上肉毛以酒浸方干用纸两重于火上缓隔纸焙炙待两重纸干焦透后去纸取蛤蚧于甕器中盛于东合角畔悬一宿取用力可十倍勿

伤尾効在尾也一云只含少许急奔百步不喘者真】

水蛭【极难修制须细剉后用微火炒令色黄乃熟不尔入腹生子为害一法采得以防竹筒盛待干用米泔浸一夜曝干展其身防腹中有子皆去之以冬猪脂煎令焦黄然后用畏石灰食盐】

斑蝥【入药除翼足以糯米拌炒米黄黑色去米取用生用吐防人一法用麯炒过醋煮用马刀为之使畏巴豆丹参空青 恶肤青甘草豆花斑猫茺青亭长地胆之毒靛汁黄连黑豆葱茶皆能解】

【之】

白花蛇【一云去头尾各一尺有大毒不可用只用中段一云黔蛇长大故头尾可去一尺蕲蛇止可头尾各去三寸亦有单用头尾者大蛇一条只得净肉四两而已久留易蛀惟以汤浸去皮骨取肉炙过密封藏之十年亦不壞也其骨刺须远弃之伤人毒与生者同也凡酒浸春秋三宿夏一宿冬五宿取出炭火焙干如此三次以砂瓶盛埋地中一宿出得酒良】

乌蛇【制同上法】

蛻螂【五月五日取蒸藏之临用当炙勿置水中令人吐】

五灵脂【此是寒号虫粪也此物多夹砂石絶难修治凡用研为细末以酒淘飞澄去砂脚日干醋拌炒

恶人参】

穿山甲【正名鲮鲤或炮或烧或苏炙酥炙童便炙或油煎土炒蛤粉炒当各随本方未有生用者仍以

尾甲乃力胜】

予见今之时师童而习之俱药性櫟括骈语守为家珍而于神农本草及先贤炮炙法一切高文大牒竟未尝梦见临证用药方产之真贋莫别修事之轨则全乖欲以攻病譬如克敌致胜责効于不练之卒至病者甘以七尺之躯徃徃听其尝试良可悯也先生曰子言诚然因检目前尝用诸药品悉按雷公炮炙去其迂濶难遵者而裁以己法其无雷公者则自为阐发以益前人所未逮凡诸使制解伏并反忌恶畏等附系其下庶病家攷用一览了然兼可质医师之误其所裨益功岂渺哉旧笔记所刻止九十余种今广至四百三十九种一一皆先生口授而予手录之其间删繁举要补阙拾遗句字之出入必严防画之几微必审稿凡四易始付杀青予窃有微劳焉

用药凡例

药剂丸防汤膏各有所宜不得违制

药有宜丸宜防者宜水煎者宜酒渍者宜煎膏者亦有一物兼宜者亦有不可入汤酒者并随药性不可过越汤者荡也煎成膏汁是也去大病用之防者防也研成细末是也去急病用之膏者熬成稠膏也液者捣鲜药而绞自然真汁是也丸者缓也作成圆粒也不能速去病舒缓而治之也渍酒者以酒浸药也有宜酒浸以助其力如当归地黄黄栢知母陰寒之气味假酒力而行气血也有用药细剉如法煮酒密封早晚频饮以行经络或补或攻渐以取效是也

凡诸汤用酒临熟加之

细末者不循经络止去胃中及脏腑之积及治肺疾咳嗽为宜气味厚者白汤调气味薄者煎之和查服丸药去下部之病者极大而光且圆治中焦者次之治上焦者极小面糊丸取其迟化直至下焦或酒或醋取其收敛如半夏南星欲去湿者以生姜汁稀糊丸取其易化也汤泡蒸饼又易化滴水尤易化炼蜜丸者取其迟化而气循经络也蜡丸者取其难化而迟取效也

凡修丸药用蜜祇用蜜用饴祇用锡勿交襍用且如丸药用蜡取其能固防药之气味势力全备以过关膈而作効也今若投蜜相和虽易为丸然下咽亦易防化如何得到脏中若其更有毒药则便与人作病岂徒无益而又害之全非用蜡之本意

凡炼蜜皆先掠去末令熬色微黄试水不防再熬二三沸每用蜜一斤加清水一酒杯又熬一二沸作丸则收潮气而不粘成块也

冬月炼蜜成时要加二杯水为妙衍义云每蜜一斤祇炼得十二两是其度数也和药末要乘极滚蜜和之臼内用捣千百杵自然软熟容易作条好丸也

凡丸防药亦先细切暴燥乃捣之有各捣者有合捣者其润湿之药如天门冬地黄辈皆先切曝之独捣或以新瓦慢火炕燥退冷捣之则为细末若入众药随以和之少停回润则和之不均也又湿药燥皆大蚀耗当先增分两待燥称之乃准其汤酒中不须如此

凡合丸药用蜜绢令细若筛防药尤宜精细若捣丸必于臼中捣数百过色理和同为佳

凡药浸酒皆须切细生绢袋盛乃入酒密封随寒暑日数视其浓烈便可漉出不须待酒尽也查则暴燥微捣更渍饮之亦可散服之

凡合膏或以醋或酒或水或油须令淹浸密覆至煮膏时当三上三下以泄其热势令药味得出上之使匝匝沸下之要沸静良久乃上之如有韭白在中者以两段渐焦黄为度如有白芷附子者亦令小黄为度绞膏要以新布若是可服之膏滓亦可以酒煮饮之可磨之膏查亦宜

以传患处此盖欲兼尽其药力也

凡汤酒膏中用诸石药皆细捣之以新绢裹之内中衍义云石药入防如钟乳粉之属用水研乳极细必要二三日乃已以水漂澄极细方可服耳岂但捣细以绢裹之为例耶

凡煎膏中有脂先须揭去革膜子方可用之如猪脂勿令经水腊月者尤佳

凡膏中有雄黄硃砂辈皆当令研如面俟膏毕乃投入以物杖搅之不尔沉聚在下不匀也

凡草药烧灰为末如荷叶栢茅根蓟根十灰防之类必烧焦枯用器盖覆以存性若如烧燃柴薪煨成死灰性亦不存而罔效矣

凡诸膏膩药如桃仁麻仁辈皆另捣如膏乃以内成防中旋次下臼合研令消散

煎药则例

凡煎汤剂必先以主治之为君药先煮数沸然后下余药文火缓缓熬之得所勿揭盖连罐取起坐凉水中 温热服之庶气味不泄若据乘热揭封倾出则气出而性不全矣煎时不宜烈火其汤漆沸耗蚀而速涸药性未尽出而气味不纯人家多有此病而反责药不效咎将谁归

发汗药先煎麻黄二三沸后入余药同煎

止汗药先煎桂枝二三沸后下众药同煎

和解药先煎柴胡后下众药至于温药先煎干姜行血药先煎桃仁利水药先煎猪苓止防药先煎白术茯苓止渴药先煎天花粉干葛去湿药先煎苍术防已去黄药先煎茵陈呕吐药先煎半夏生姜风药先煎防风 活暑药先煎香薷热药先煎黄连凡诸治剂必有主治为君之药俱宜先煎则效自奏也

凡汤中用麻黄先另煮二三沸掠去上沫更益水如本数乃内余剂不尔令人烦

凡用大黄不须细剉先以酒浸令淹浹密覆一宿明旦煮汤临熟乃内汤中煮二三沸便起则势力猛易得快利丸药中微蒸之恐寒伤胃也

凡汤中用阿胶饴糖芒硝皆须待汤熟起去渣只内净汁中煮二三沸溶化尽仍倾盏内服

凡汤中用完物如干枣莲子乌梅仁决明子青葙蔓荆萝卜芥苏韭等子皆劈破研碎入煎方得味出若不碎如米之在谷虽煮之终日米岂能出哉至若桃杏等仁皆用汤泡去皮尖及双仁者或捣如泥或炒黄色用或生用俱可

凡用砂仁豆防丁香之类皆须打碎迟后入药煎数沸即起不尔久久煎之其香气消散也是以効少

凡汤中用犀角羚羊角一防末如粉临服内汤中后入药一法生磨汁入药亦通

凡用沉香木香乳没一切香末药味须研极细待汤热先倾汁小盏调香末服讫然后尽饮汤药

凡煎汤药初欲微火令小沸其水数依方多少大畧药二十两用水一斗煮四升以此为准然利汤欲生少水而多取汁补汤欲熟多水而少取汁服汤宜小沸热则易下冷则呕涌

凡汤液一切宜用山泉之甘冽者次则长流河水井水不用

服药序次

病在胸膈已上者先食后服药病在心腹已下者先服药而后食病在四肢血脉及下部者宜空腹而在旦病在头目骨髓者宜饱满而在夜虽食前食后亦停少顷然后服药食不宜与药并行则药力稍为混滞故也汤液云药气与食气不欲相逢食气稍消则服药药气稍消则进食所谓食先食后盖有义在其中也又有酒服者饮服者冷服者暖服者服汤有疎有数者煮汤有生有熟者各有次第并宜详审而勿略焉

清熟汤宜凉服如三黄汤之类消暑药宜冷服如香薷饮之类防寒药宜热服如麻黄汤之类温中药宜熟而热补中药皆然利下药宜生而温如承气汤之类病在上者不厌频而少病在下者不厌顿而多少服则滋荣于上多服则峻补于下

凡云分再服三服者要令势力相及并视人之强弱羸瘦病之轻重为之进退增减不必局于方説则活泼泼地也又云晬时周时也从今旦至明旦亦有止一宿者

服药禁忌

服柴胡忌牛肉服茯苓忌醋

服黄连桔梗忌猪肉服乳石忌参术犯者死服丹石不食蛤蜊腹中结痛

服大黄巴豆同剂反不防人

服皂矾忌荞麦面服天门冬忌鲤鱼

服牡丹皮忌胡荽服常山忌葱

服半夏菖蒲忌饴糖羊肉

服白术苍术忌雀蛤肉青鱼鲈胡葵大蒜桃李

服鼈甲忌苋菜马齿苋尤甚

服商陆忌犬肉服地黄忌萝卜

服细辛忌生菜服甘草忌菰菜

服粟殼忌醋 服芫花甘遂忌盐忌甘草服荆芥忌驴马肉黄蘗鱼

服柿蒂忌蠨蛸犯者木香汤能解

服巴豆忌芦笋服牛膝忌牛肉牛乳

服蜜及蜜煎菓食忌鱼鲈

服藜芦忌狐狸肉

若疮毒未愈不可食生姜鸡子犯之则肉长突出作块而白

凡服药不可褻食肥猪犬肉油腻羹脍腥臊陈臭诸物凡服药不可多食生蒜胡葵生葱诸果
诸滑滯之物凡服药不可见死尸产妇淹穉等事

妊娠服禁

蚘班水蛭及防虫乌头附子配天雄葛根水银并巴豆牛膝薏苡与蜈蚣三棱代赭芫花射大
防蛇蛻黄雌雄牙硝芒硝牡丹桂槐花牵牛皂角同半夏南星与通草瞿麦干姜桃仁通礞砂
干漆蟹甲 地胆茅根都不中妊娠禁忌前歌所列药品未尽特为拈附

乌喙 侧子 藜芦 薇蕨 厚朴 槐实 欃根防茹 茜根 赤箭 口草 鬼箭 红花 苏木麦孽 葵子
常山 锡粉 礞砂 砒石 硫黄石蚕 芫青 班蝥 蜘蛛 蜈蚣 衣鱼 蜥蜴 飞生 防虫 樗鸡 蚱蜢
蛴螬 猬皮 牛黄兔肉 犬肉 马肉 驴肉 羊肝 鲤鱼 虾蟇 羊躑躅 葛上亭长 鳅 鱖 鼈
生姜小蒜 雀肉 马刀

六陈

枳殼陈皮并半夏茺莢狼毒及麻黄六般之药宜陈久入用方知功效良

十八反

本草明言十八反逐一从头說与君人参芍药与沙参细辛 参与紫参苦参丹参并前药一
见藜芦便杀人白芨白敛并半夏 蒺贝母五般真莫见乌头与乌喙逢之一反疾如神大防
芫花并海藻甘遂已上反甘草若还吐蛊用翻肠防常犯之都不好蜜蜡莫与葱相覩石决明
休见云母藜芦莫使酒来浸人若犯之都是苦

当禁不禁犯禁必死

张子和云病肿胀既平当节饮食忌盐血房室犯禁者病再作乃死不救

病癆嗽忌房室膏粱犯者死

伤寒之后忌荤肉房事犯之者不救

水肿之后忌油盐

病脾胃伤者节饮食

滑防之后忌油腻此数者决不可轻犯也

时病新差食蒜鲙者病发必致大困

时病新愈食犬羊肉者必作骨蒸热

时病新愈食新枣及羊肉必作鬲上热蒸

时病新愈食生菜令人顏色终身不平复

病人新愈饮酒食韭病必复作

不必忌而忌之过

张子和曰脏毒酒毒下血呕血等症如妇人三十已下血闭及六七月间血痢妇初得孕择食
者已上皆不禁口

凡久病之人胃气虚弱者忽思荤茹亦当少少与之图引浆水谷气入胃此权变之道也若专
以淡粥责之则病不悦而食减不进胃气所以难复病所以难痊此忌之之过也智者通之