

外科理例

汪机

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
标点本	5
前序	6
序	7
石山先生自赞	8
卷一	9
卷二	34
卷三	52
卷四	78
卷五	102
卷六	127
卷七	141
补遗	163
附方	165
四库本	237
提要	238
原序	239
卷一	240
卷二	260
卷三	274
卷四	296
卷五	317
卷六	339
卷七	350
附方	371

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

标点本

前序

外科者。以其痈疽疮疡皆见于外。故以外科名之。然外科必本于内。知乎内。以求乎外如视诸掌乎。经曰。膏粱之变。足生大疔。由膏粱蕴毒于内而生也。又曰。荣气不从。逆于肉理。乃生痈肿。是痈肿由荣气逆于肉理之内而生也。有诸中。然后形诸外。治外遗内。所谓不揣其本而齐其末。殆必已误于人。己尚不知。人误于己。人亦不悟。呜呼。己虽不知。天必知之。人虽不悟。神必识之。异日明受天责。阴获神谴。不在于身。则在于子孙矣。予于是惧。因辑此书。名曰外科理例。盖其中古人所论治。无非理也。学人能仿其例而推展之。于焉而求古人不言之妙旨。庶几小不误己。大不误人。抑亦有补于将来矣。辑已成编。复得新甫薛先生心法发挥读之。观其论治。亦皆一本于理。而予窃喜暗与之合。于是复采其说参于其中。庶得以为全书。而学人无复有遗憾矣。是为序。

嘉靖辛卯冬十一月长至日祁门汪机识

序

夫天下之事。莫不有理。然有正、有偏、有常、有变。不可以概视也。譬之兵焉。声罪致。正也。潜师掠境者。偏也。常则按图布阵。而守据险凭高之法。变则隐显出没。而有鬼神不测之机。夫医之道。亦犹是焉。故望气听声。审症切脉。乃医理之正。执方治病。根据分处剂。乃医学之偏。按脉辨症。审时制方。分经络。别表里。此医之处乎常也。或凭脉而不凭。或凭症而不凭脉。或因情性而处方。或因形质而用药。此医之达乎变也。然正可守而偏可。常可学而变难穷。医岂可以易言哉。何今之业外科者。惟视外之形症。疮之肿溃。而不察其脉理虚实之殊。经络表里之异。欲其药全而无误也难矣。先生深为之惜。故辑此书。名曰外科理例。盖以其正、偏、常、变之用。各有其例。而莫不同归于一理。学人诚能因是而求未书之旨。扩其未言之妙。则其临病用药。必求诸理。而不至孟浪以杀人矣。此先生作书之

嘉靖丁酉孟春朔旦新安祁门石墅陈桷书

石山先生自赞

睹兹厥像。貌焉寒微。其容和粹。其貌清。心存仁术。主好儒书。颠已垂白。手不停平居不敢干名而犯义。交际不敢口是而心违。事求免于流俗。礼□合于先儒。谦约节俭。乐疏愚。不求闻达。甘守穷庐。宁为礼屈。勿为势拘。不知我者。谓我狂妄。其知我者。谓我夷。噫。顾我所行。未必尽合于道也。然造次克念。惟求无愧于心坎。

试问林翁。何名何氏。细认来都不似。好三分似得石山居士。一种心苗。许多春意。却不逐杏花飞去。听傍人齐说。是这林翁。卢扁再生今世。

上锦堂春 镜山李汛题

貌古心明。言和行固。咀英华以充日用之强。耻奔竞而却云霄之步。学以为己是图。医以济人为务。居穷不失其自然。处变弗愆于常度。所以为一代之伟人。起四方之敬慕也。

休阳程文杰师周书于率溪书院

舜颜贝齿。玉质丹唇。襟度吞云梦之泽。英迈盖苍梧之云。学足以溯河洛之趣。医足逼岐黄之真。出入造化。弛张鬼神。凄情于烟霞泉石。却步于云路鹏程。激励之论。足以回狂澜于既倒。回天之术。曾以极夭札于同仁。庙算神谟。余盖得之万一。生死肉骨。迨不知其几人。蓍蔡之德未艾。乔松之寿方臻。是盖卢扁之能契其妙。而岂摩诘之能状其亲也欤。

门生石墅陈桷（惟宜）拜题

先生姓汪氏。名机，字省之。别号石山。世居徽祁之朴墅。早岁习春补邑庠弟子员。性至因思事亲者不可不知医。复精于医。赖以存活者众。镜山李先生别传详矣。所著有素问抄、本草会编脉诀刊误、推求师意、伤寒选录、外科理例、运气易览、痘治理辨、石山医案、针灸问对诸书若干卷行于世。先生生天顺癸未九月十六日酉时。歿嘉靖己亥十二月初四日戌时。

嘉靖辛丑五月朔旦桷续题

卷一

痈疽脉一

浮 主表症浮数之脉。应发热不发热。反恶寒。痈疽也。

洪 主血实积热。肿疡洪大。则疮势进脓未成。宜下。溃脓后洪大难治。若自利不可救滑 主热。主虚。脓未溃者宜内消。脓溃后宜托里。所谓始为热。终为虚也。

数 主热。仲景曰。数脉不时见。生恶疮。又曰。肺脉俱数。则生疮。诸疮脉洪数。里欲有脓结也。

散 肿溃后。烦满尚未全退。其脉洪滑粗散。难治。以正气虚。邪气实也。又曰。肢体沉重。肺脉大则毙。谓浮散也。

芤 主血虚。脓溃后见之。易治。

牢 按之实大而弦。且沉且浮。而有坚实之意。瘰 结核得之。不可内消。

实 久病虚人。得此最忌。疮疽得此。宜急下之。以邪气与脏腑俱实故也。

弦 浮弦不时见。为饮为痛。主寒主虚。弦洪相搏。外紧内热。欲发疮疽。

紧 主痛疮肿。得之气血沉涩。

涩 主气涩血虚。脓溃后得之。无妨。

短 诸病脉短。难治疮肿脉短。真气短也。

细 主亡阳。阳气衰也。疮肿脉来细而沉。时直者里虚欲变症也。

微 主虚。真气复者生。邪气胜者危。疮肿溃后。脉微而匀。当自瘥。

迟 痼疾得之则善。新病得之主血气虚惫。疮肿溃后得之自瘥。

缓 疮肿溃后。其脉涩迟缓者。皆易愈。

沉 水气得之则逆。疮肿得之邪气深。

虚脉虚。血虚。血虚生寒。阳气不足也。疮肿得之。宜托里和气养血也。

疮肿得之。补虚排脓托里。

弱主气血俱虚。形精不足。大抵疮家沉迟弱。皆宜托里。

促主热蓄于里。下之则和。疮肿脉促。亦急下之。

代诸病见之不祥。疮肿脉促结难治。况代脉乎。

动动于阳。阳虚发厥。动于阴。阴虚发热。

卷一 痈疽脉一

治疮脉诀

身重脉缓。湿盛除湿。身热脉大。心燥热发肿。乍来乍去除热。诸痛。眩晕。动摇。脉弦去风。

脉涩气滞。燥渴亡津液。脉涩。泻气补血。寒胜则浮。食不入。便溺多。恶寒。脉紧细。泻寒水。

数脉不时见。当生恶疮。诸浮数脉应发热。反洒淅恶寒。

若有痛处。当发痈疽。脉滑而数。滑则为实。数则为热。

滑则为荣。数则为卫。荣卫相逢。则结为痈。热之所过。则为痈脓。

机按今之疡医多不诊脉。惟视疮形以施治法。盖疮有表里虚实之殊。兼有风寒暑湿之变非脉以别之。安得而察识乎。东垣云。疮疡凭脉。此之谓也。因详列其脉之所主。揭之于首。学人宜加意焉。

卷一

七恶五善二

医疮概举七恶五善。此特谓肠胃之内。脏腑疮疽之证也。发背脑疽。别有善恶。载之于七恶者。烦躁时嗽。腹痛渴甚。或泄利无度。或小便如淋。一恶也。脓血既泄。肿尤脓色败臭。痛不可近。二恶也。目视不正。黑睛紧小。白睛青赤。瞳子上看

。三恶也。喘粗短气。恍惚嗜卧。四恶也。肩背不便。四肢沉重。五恶也。不能下食。服药而呕。食不知味。

六恶也。声嘶色败。唇鼻青赤。面目四肢浮肿。七恶也。

五善者。动息自宁。饮食知味。一善。便利调匀。二善。脓溃肿消。水鲜不臭。三善。

神彩精明。语声清亮。四善。体气平和。五善。

五善之中。乍见一二善证。疮亦回也。七恶之内。忽见一二恶证。宜深惧之。又有证合。皮急紧而知善。又或证合五善。皮缓虚而知恶。此又在人详审。大抵虚中见恶证者不可救。实证无恶候者自愈。脓溃后尚烦疼。脉洪滑粗散者难治。微涩迟缓者易痊。

卷一

诸恶疮五逆三

白睛青黑眼小。服药而呕。腹痛渴甚。肩项中不便。声嘶色脱。是为五逆。其余热、渴、利、呕。盖毒瓦斯入里。脏腑之伤也。（机按以上不治。皆五脏气已绝。）

卷一

定痈死地分四

一伏兔 二腓 三背 四五藏俞 五项 六脑 七髭 八九颐

卷一

背上九处不可病痈五

第一入发际为玉枕。亦为舌本。第二颈项节。第三椎为崇骨。第四大椎为五脏。第五脊边肺俞穴。第六夹脊两边（膈俞及肝俞。）第七脊骨两边肾俞二穴。第八后心鸠尾。第九鸠尾附 正面五处。不可患痈。

第一喉骨为垂膺。第二当胸为神舍。第三心鸠尾。第四当两乳穴。第五脐下二寸为肠屈附 侧面三处。不可患痈。

耳下近耳后牙车尖央陷中为喉脉一穴。当膊下一穴为肩骨。承山上三寸一穴 肠。

卷一

痈发有不可治六

脑上诸阳所会。穴则髓出。颈项近咽喉。一有所碍。药食莫进。肾俞与肾相抵。乃命之所系。穴则透空。此三处有疽并难治。

发背透膜者不治（此言肝俞以上。）未溃肉陷。面青唇黑。便瘀者死（此言脏坏便瘀血。）右一寸三分。毒锐者不治。溃喉者不治。阴入腹者不治。入囊者死。鬓深及寸余者不治。病疮腰背强急蜷者。皆不治。

卷一

发背治之难易七

疽发背上。以两手上搭着者。谓之左右搭。头多如蜂巢者。易治。以两手下搭着者。谓之腰疽。亦易治。

以两手上下俱搭不着者。谓之发背。此证最重。

大抵以上所言地分。皆脉络所会。内系脏腑。患者得而早言。医者审证。按法治之。皆为不死。设不早治治不对证。虽发于不死地分。恐亦致死也。

卷一

占色候生死八

病患目中赤脉。从上下贯瞳仁。一脉一年死。二脉二年死。若脉下者。疗之瘥。面上忽贯上下如脂赤色。从额上下至鼻。黑色出额上。大如指。及连鼻上至肩。又有赤色垂。并为机按赤脉属火。瞳仁属水。赤脉贯瞳。火反乘水。面属阳。阳部赤色。阳胜阴微。额上黑色。阳微阴胜。故多危也。

卷一

痈之源有五九

天行一 瘦弱气滞二 怒气三 肾气虚四 服法酒食炙爆服丹药热毒五盖治痈疽不可一概

视为热。其治难易。当自一而至五动。

卷一

生痈所感不同十

膏粱之变。足生大丁。受如持虚。膏粱浓味。热毒内积。其变多生大疽。受毒部分。其毒从虚处受之。大丁、大疽也。以其根深在内也。此言疽因浓味内热为变而生。

阳气者精则养神。柔则养筋。开阖不得。寒气从之。乃生大痙。陷脉为。留连肉腠。

人身阳气。其精微以养神。其柔和以养筋。阳气在身表。开阖失宜。在外寒气从而袭之袭其筋络。则筋络拘急为痙俯。如陷入经脉。则经脉凝瘀为痙。留连分肉节腠间。不易散此言痙因阳气开阖失宜。外寒袭陷。经脉凝瘀而生。

营气不从逆于肉理。乃生痈肿。

营生血。营气流行失宜。不从其道阻逆于肉理。则血郁热。聚而为痈肿。

此言痈肿因营气失宜。逆于肉理。血郁热聚而生。

三阳为病发寒热。下为痈肿。

三阳。手阳明大肠。太阳小肠。足太阳膀胱。其三阳为病。在上发寒热。在下为痈肿。

此言痈肿在下。从三阳而生。当视三阳脉而辨。

东方之域。鱼盐之地。其民食鱼嗜咸。安其处。美其食。鱼热中。盐胜血。故其民黑色疏理。其病为痈疡。

此言痈疽。因土地濒海。食鱼嗜咸。安居不劳。美味不节。鱼热中。盐胜血而生。

诸痈肿。筋挛骨痛。此寒气之肿。八风之变也。

经曰。寒伤形。形伤肿。八风。八方之风。灵枢云。东南方来名弱风。伤人也在肌。西名谋风。伤人也在肉。东方来名婴儿风。伤人也在筋。北方来名大刚风。伤人

也在骨。此寒气之肿。八风之变。而为痈肿。筋挛。骨痛。

此言痈疽。因四方寒气。八风过伤而生。

肾移寒于脾。痈肿少气。

夫肾伤于寒。转移于脾。脾主肉。分肉之间。卫气行处。肾寒复传脾。则分肉寒而卫气凝。故肾结为痈肿。肉结血伤而少气。

此言痈肿。因肾寒传脾而生。

脾移寒于肝。痈肿筋挛。

脾主肉。肝主筋。肉温则筋舒。今脾传寒于肝。故肉寒则卫气结聚为痈肿。筋寒则急为此言痈肿。因脾寒传肝而生。

肝满。肺满。肾满。皆实。则为肝肺肾痈。

满实。脉气满实也。以脏气邪盛满实。故脉气如是。

此言肝肺肾痈。因脏气邪盛满实而生。当视脉气满实而辨。

卷一

肺肝肾痈症十一

肺痈主满。肺藏气而外主息。其脉支别者。从肺系横出腋下。故喘而两满。此言肺痈所见症。

肝痈主小便。肝主惊。肝脉循股入毛中。环阴器抵少腹。直上贯肝膈。布胁肋。故两满。两满。卧则惊。不得小便。

此言肝痈所见证。

肾痈主少腹满。此言肾痈所见证。

卷一

痈生原于脏腑十二

五脏菹熟。痛发六腑。

菹、积也。熟、热也。五脏积热。六腑受之。阳热相薄。热之所过。则为痛也。

此言五脏积热。六腑受之而生。

六腑不和。留结为痛。

六腑属阳而主气。肌肉上为阳脉。邪气游于六腑。则肌肉上之脉不和。邪气停留肌肤。

结聚为痈肿矣。此言六腑受邪而生。

卷一

辨脏腑内疮十三

中府隐隐痛者。肺疽。其上肉微起者。肺痛。

巨阙隐隐痛者。心疽。其上肉微起者。心痛。

期门隐隐痛者。肝疽。其上肉微起者。肝痛。

章门隐隐痛者。脾疽。其上肉微起者。脾痛。

京门隐隐痛者。肾疽。其上肉微起者。肾痛。

中脘隐隐痛者。胃疽。其上肉微起者。胃痛。

天枢隐隐痛。大肠疽。其上肉微起。大肠痛。

丹田隐隐痛。三焦疽。其上肉微起。三焦痛。

关元隐隐痛。小肠疽。其上肉微起。小肠痛。

卷一

明疮瘍本末十四

今富贵之人。饮食肥脓。日久太过。其气味俱浓之物。乃阳中之阳。不能走空窍。先行。反行阴道。逆于肉理。则湿气大胜。子（土）能令母（火）实。火乃大旺。湿热既盛。必来克肾。若杂以不顺。必损其真水。肾既受邪。积久水乏。水乏则从湿热之化而上行。其疮多出背出脑。此为大丁之最重也。若毒瓦斯行于肺或脾胃之部分。毒之次也。若出于他经。又其次也。湿热之毒所止处。无不溃烂。故经言膏粱之变。足生大丁。受如持虚。如持虚器以授物。物无不受。故治大丁之法。必当泻其营气。以标本言之。先受病为本。非苦寒之剂为主为君。不能除其苦楚疼痛也。

卷一

阴滞于阳为疽阳滞于阴为痈十五

痈疽因阴阳相滞而生。盖气阳也。血阴也。血行脉内。气行脉外。相并周流。寒与湿搏凝泣行迟为不及。热与火搏之。则沸腾行速为太过。气得邪而郁。则津液稠粘。为痰为饮。积久渗入脉中。血为之浊。此阴滞于阳也。血得邪而郁。隧道阻隔。或溢或结。积久渗出脉外。气为之乱。此阳滞于阴也。病皆由此。不特痈疽。阳滞于阴。谓阳盛而滞其阴。脉则浮洪弦数。阴滞于阳。谓阴弱而滞其阳。脉则沉弱细涩。阳滞以寒治之。阴滞以热治之。

卷一

疮疽分三治十六

疮疡者火之属。须分内外以治其本。经曰。膏粱之变。足生大丁。其源在里。发于表也如持虚。言内结而发诸外。皆是从虚而出也。假如太阳经虚。从鬓而出。阳明经虚。从髭而出。督脉经虚。从脑而出。经曰。地之湿气。感则害人皮肉筋脉。其源在外。盛则内行也。若脉沉实。当先疏内以绝其源。若脉浮大。当先托里以防邪气侵内。又有内外之中者。邪气至盛。遏绝经络。故发痈肿。经曰。营气不从。逆于肉理。乃生痈肿是也。此因失托里失疏通。及失和荣卫而然也。治疮大要。须明托里。疏通。和荣卫三法。托里者。治其外之内也。

疏通者。治其内之外也。和荣卫者。治其中也。内之外者。其脉沉实。发热烦躁。外无赤。痛深在内。邪气沉于里也。故先疏通以绝其源。如内疏。黄连汤是也。外之内者。其脉浮数。肿在外。形证外显。恐邪气极则内行。或汗或先托里。以防入内。如荆防败毒散。

内托复煎散是也。内外之中者。外无恶之气。内则脏腑宣通。知其在经。当和荣卫。如当归黄汤。东垣白芷升麻汤是也。

。用此三法。虽未痊瘥。必无变证。亦可使邪气峻减而易痊也。其汗下和之间。又有外治之次第。详见天容穴疗疮条。

卷一

疮肿分浅深十七

疮疽有三种。高而软者发于血脉。肿下而坚者发于筋骨皮肉。色不辨者发于骨髓。又曰手按摇疮肿。根牢而大者深也。根小而浮者浅也。又验。初生疮时。便觉壮热。恶寒。拘急。头痛。精神不宁。烦躁饮冷。疮疽必深也。若起居平和。饮食如故。其疮浮浅也。恶疮初生。其头如粟微似有痛痒。误触破之。即展有深意。酌其深浅。浮则表之。深则疏之。

卷一

辨痈与疽治法十八

精要云。始患高肿五七日勿平陷者。是攻内之候。以托里散内补汤填补脏腑令实。最怕透膜。透膜者。十无一生。

丹溪曰。痈之邪浅。其稽留壅遏。“浊”在经脉之中。而专于外。故初发时。身表便热。患枕如盆。高肿痛甚者。纵欲下陷。缘正气内固不肯受。故或便秘。或发渴发逆以拒之。是以骨髓终不焦枯。五脏终不损也。痈疽之邪。其稽留壅遏。内连五脏而不专攻于外。故身或无热。患处或不肿痛。甚者声嘶色脱。眼黑青小。十指肿黑如墨。多死也。治痈初发。当以洁古法为主。表者散之。里者下之。火以灸之。药以敷之。脓未成者必消。已成者速溃。治疽初发。当以涓子法为主。填补脏腑令实。勿令下陷之邪延蔓。外以火灸。引邪透出。使有穴归而不乱攻。可转死为生。变凶为吉。今世不分痈疽。一概宣热拔毒。外以五香耗其气。内以大黄竭其血。终不自悟其药之非。惜哉。

卷一

疮名有三曰疔曰痈曰疽十九

疔者。初生突起。浮赤。无根脚。肿见于皮肤。止阔一二寸。有少疼痛。数日后微软。

剥起。始出青水。后自破脓出。如不破。用簪针丸。○痈者。初生红肿。突起阔三四寸。

热恶寒。烦渴。或不热。抽掣疼痛。四五日后按之微软。此证毒瓦斯浮浅。春夏宜防风败毒散。加葱姜枣煎。秋冬去葱姜枣。加木香。身半以上。加栝蒌。身半以下。加射干。又有皮色不变。但肌肉内微痛。甚发热恶寒。烦渴。此证热毒深沉。日久按之。中心微软。脓成。用火烙烙开。以决大脓。宜服托里之药。○疽者。初生白粒如粟米。便觉痒痛。触着其痛应心。此疽始发之兆。或误触者。便觉微赤肿痛。三四日后。根脚赤晕展开。浑身壮热微渴。疮上亦热。此疽也。疽上或渐生白粒如黍米。逐个用银篦挑去。勿令见血。或有少血亦不妨。

不见血尤妙。却用老皮散敷之。五七日。疮头无数如蜂房。脓不肯出。冬用五香连翘汤。夏用黄连羌活散。夏初用防风败毒散。加葱枣。秋去之。加木香。若形气实。脉洪滑有力。痛肿开。壮热便闭。宜五利大黄汤。复元通。气散。选用通利。又有初生白粒。误触后。便觉情思不畅。背重如石。身体烦疼。胸膈痞闷。怕闻食气。此谓外如麻。里如瓜。疽毒深恶。内连腑脏。疽顶白粒如椒者数十。间有大如连子蜂房者。指HT有脓不流。时有清水微肿不突。根脚红晕。渐渐展开。或痒痛。或不痛。疽不甚热。疮反陷下。如领之皮。渐变黑色。

恍惚沉重。脉若虚弱。便用大料参 归术。浓煎调理。

卷一

辨痈疽疔二十

疮疡有痈疽。疔。轻重浅深。或止发于一经。或兼二经者。止当求责于一二经。不可余经也。若东垣用药处方是矣。矧有兼风。兼湿。兼痰。兼气。兼血。兼阴虚等证者。病本不同。治当求责。疮疡郁冒。俗呼昏迷是也。宜汗之则愈。

卷一

辨瘤二十一

若发肿都软不痛者。血瘤。虚肿而黄者水也。发肿日渐增长而不大热。时时牵痛者。气结微肿。久而不消。后亦成脓。诸癰。瘤。疣。赘等。至年衰皆自内溃。治于壮年。可无后忧。

卷一

疮疽分虚实用药二十二

疮疽痛息自宁。饮食知味。脉证俱缓。缓则治本。故可以王道平和之药徐而治之。

亦无。若脉实肿，烦躁。寒热。脉证俱实。非硝黄猛烈之剂不能除。投以王道之剂则非也。若疮疡聚肿不溃。溃而脓水清稀。或泄利肠鸣。饮食不入。呕吐无时。或手足并冷。此脉证俱虚。非大补之。药不能平。投以硝黄攻伐之剂亦非也。故治其证者。当辨表里虚实。随宜治之。庶得万全。

卷一

治疮须分补泻二十三

东垣云。疮疽受之有内外之别。治之有寒温之异。受之外者。法当托里以温剂。反用寒则是皮毛之邪引入骨髓矣。受之内者。法当疏利以寒剂。反用温剂托里。则是骨髓之病。上彻皮毛矣。殆必表里通溃。共通为一疮。助邪为毒。苦楚百倍。轻则危。重则死矣。

卷一

男女痈疽治法不同二十四

男妇痈疽。精要谓治法无异。丹溪曰。妇人情性执着。比之男子。其难何止十倍。虽有宜补。亦当以执着为虑。向见一妇早寡。善饮啖。形肥伟。性沉毒。年六十六。七月间背疽近正脊。医乃横直裂开取血。杂以五香十宣散。酒饮月余。未尝及其寡居之郁。酒肉之毒。

执着之滞。时令之热。竟至平陷。淹延两三月不愈。

卷一

小儿疮疽二十五

小儿纯阳多热。心气郁而多疮疽。胎食过而受热毒。犀角散为最。余如常法。大下恐伤

卷一

痈疽当分经络二十六

丹溪曰。六阳、六阴经。有多气少血者。有少气多血者。有多气多血者。不可概论。诸经惟少阳厥阴生痈。理宜预防。以其多气少血。血少肌肉难长。疮久不合。必成死证。或者驱毒利药以伐阴分之血。祸不旋踵。才得肿痛。参之脉症。若有虚弱

。便与滋补。气血无亏。可保终吉。若用寻常驱热拔毒及舒气药。虚虚之祸如□掌耳。

一人年三十。左腿外廉红肿。一人年四十。胁下红肿二人皆不预防本经少阳血少。孟浪用大黄攻里而死。

一人年六十。左膊外侧一核。一女髀骨中痛。二人亦不预防本经血少。孟浪用五香十宣散表而死。

按此分经不致有犯禁坏逆之失。然手少阳少阴太阴。足少阳少阴太阴。俱多气少血也。

手厥阴太阳。足厥阴太阳。俱多血少气也。手足阳明。俱多血多气也。

以上病例。不系膏粱丹毒火热之变。因虚劳气郁所致。只宜补形气。调经脉。疮当自消。不待汗下而已也。若不详脉证经络受病之异下之。先犯病禁经禁。故致失手。

卷一

论内消二十七

内消。当审浅深大小经络处。所形脉虚实。如脑背、腰项、臀、皆太阳经宜黄连羌活连肋处为近少阳。宜败毒散。形实脉实者。宜漏芦汤、五利大黄汤等疏利之。气虚参为主。血虚当归、人参为主，佐以消毒，加以引经。六经分野。各随本经标本寒温气血多少以行补泻惟少阳一经。治与气血虚同法。（凡栝蒌、射干、山甲、蝉酥、连翘、地丁、鼠粘子、金银花、木鳖之类、皆内消之药）

卷一

内托二十八

一凡痈疽已成。血气虚者。邪气深者。邪气散慢不能突起。亦难溃脓。或破后脓少。

清稀。或坚硬不软。或虽得脓而根脚红肿开大。皆气血虚。邪气盛。兼以六淫之邪变生。诸症必用内托。令其毒热出于肌表。则易愈也。内托以补药为主。活血驱邪之药为臣。或以芳香之药行其郁滞。或加温热之药御其风寒。亦有疮疽肿痛。初生一二日。便觉脉沉细而烦闷。脏腑弱而皮寒。邪毒猛烈。恍惚不宁。外证沉深者。

即当用托里散或增损茯苓汤。及温热之剂以从治之。

或问内托。河间治肿于外。根盘不深。形证在表。其脉多浮。病在皮肉。非气盛则必侵急须内托。宜复煎散除湿散郁。使胃气和平。如或未已。再煎半料饮之。如大便秘及烦热。

少服黄连汤。如微利及烦热已退。却与复煎散。如此使荣卫俱行。邪气不能内伤。

卷一

肿疡二十九

肿疡内外皆壅。宜托里表散为主。如用大黄。宜戒孟浪之非。

卷一

溃疡三十

溃疡内外皆虚。宜以补接为主。欲用香燥。宜戒虚虚之失。

卷一

外施贴药三十一

外施贴药。正是发表之意。经曰发表不远热。大凡气得热则散。得冷则凝。庸医敷贴冷药。岂理也哉。

一人年五十。嗜酒与煎爆。后左丝竹空忽努出一角。以硝黄脑子庵之。致毙。

卷一

疮疡作渴三十二

疮疡作渴。不问肿溃。但脉数发热而渴。用竹叶黄汤。脉不数。不发热。或脉数无力而渴。或口干。用补中益气汤。若脉数便秘。用清凉饮。尺脉洪大。按之无力而渴。用加减八味丸。若治口燥舌黄。饮水不歇。此丸尤妙。

精要曰。口渴与口干不同。不宜用丹药镇坠。祸如反掌。惟桑枝煎五味汤以救阴水。

丹溪曰。不言食味起火。怒气生火。房劳激火。吾恐渴亦未易止也。

精要曰。疮作渴甚。急与神仙追毒丸。取下恶毒。清膻汤。千金漏芦汤。五香连翘汤。

六味车螯散。万金散。皆可选用。利后仍渴。却用生津补气药。津液生。气血完。渴自止。

丹溪曰。大渴而与利药。非明示脉证。何以知其当下。后言利后仍渴。却用补药。又不明言脉证。恐是但有大渴必下。下后尚渴。方与补药。古人治未病。如此用药可乎。况渴。

属上焦。当肿疡时。犹或可用。若溃疡后渴。多因血气之虚。何待利后方议甚虚也。

痈疽发渴。乃气血两虚。用参、以补气。归、苓以养血。或忍冬丸。黄六一汤。

一人渴后发背未溃。脉数无力。此阴虚火动。用加减八味丸。咀二剂。稍缓次用丸剂。一人脑疽作渴。脉虽洪。按之无力。治以此药不信。自用滋阴等药愈盛。七恶并致而没东垣云。论人病疽愈后发渴。多致不救。惟加减八味丸最妙。盖痈疽多因虚而得。疽安而渴者。服此丸则渴止。安。而未渴者服此丸。永不发渴。或未疽而先渴者。服此不惟渴止。而疽亦不作。

一贵人疽未安而渴作。一日饮水数升。予用加减八味丸。诸医大笑。云此能止渴。我辈不复业医矣。皆用木瓜、乌梅、紫苏、参、苓、百药煎等剂而渴愈甚。不得已用此药。三日渴止。其疾本以肾水枯竭。心火上炎。是以生渴。此药生水降火为最。患者鉴之。

附子气味劲悍。有回阳之功。命门火衰。非此不补。性虽有毒。但炮制有法。或用甘草、防风同炒。或童便久浸以去其毒。复与地黄等味同用。以制其热。润其燥。缓其急。假其克捷之功。而驾驭其剽悍之势。则虽久服亦无害也。观东垣八味丸论。则较然矣。

精要曰。疽向安后发渴。与加减八味丸。

丹溪曰。夫当此时气血两虚。当用参补气。归、补血。渴当自止。何必泽泻、茯苓佐以肉桂以导水耶。若忍冬丸。黄六一汤。亦为切当。忍冬养血。黄补气。渴何由作。

（机）按丹溪所言

卷一

疮疡呕逆三十三

精要云。有二证。一谓初发。不曾得内托散。伏热在心。一谓气虚。脾气不正。其伏热在心者。与内托散。气虚者。宜嘉禾散。有寒热。宜正气散。兼与山药丸以补肾。

丹溪曰。诸逆冲上呕哕。皆属于火。托里散性凉。固有降火之理。若嘉禾散徒温暖以助。山药丸补肾以壮下焦之阴。粗为近理。然治呕须分先后。肿疡时当作毒瓦斯上攻治之。溃疡后当作阴虚补之。若年老因疽溃后呕不食者。宜参白术膏佐使药。随时随证加减。亦用独参汤而愈者。山药丸缓急未易治。○河间谓病疮呕逆。湿气侵于胃也。药中宜倍加白术。海云。吐者有物无声。乃血病也。哕者无物有声。乃气病也。呕者有声有物。气血俱病也。仲景曰。呕家虽有阳明证。勿下之。咳逆者。火自下冲上胃口而作声也。病后胃虚所致。阴大虚也。病而至此多危。善于治者。岂可泛言呕吐无分别耶。

热盛脉数。精要与漏芦汤。单煎大黄汤等。若不甚热。脉缓弱。只投五香连翘汤。

丹溪曰。热盛脉数。若肿疡时脏腑秘而体实者。犹可与也。若溃疡脓血出多。热盛脉数。去死为近。岂可下乎。缓弱之脉。古人皆以为邪毒已散。五香之飞走升散。其可用乎。

卷一

疮肿寒热用药法三十四

尝见治寒以热。而寒弥甚。治热以寒。而热弥炽。何也。假如心实生热者。当益其肾。

滋。热自除。肾虚生寒者。当补其心。心火降。寒自退。此所谓寒之而热取之阴。热之而寒者取之阳也。又寒因热用。热因寒用。要在通其理类而已。又闻微者逆之。甚者从之。盖治寒以热。必凉而行之。治热以寒。必温而行之。此亦欲其调和也。其间有正有权者。盖病有微有甚。微者逆治。理之正也。甚者从治。理之权也。

卷一

疮疡面赤不得攻下三十五

疮疡及诸病面赤。虽伏大热。禁不得攻里。为阳气怫郁。邪气在经。宜发表以去之。故郁则发之。虽大便数日不去。宜多攻其表以发散阳气。少加润燥之药。若见风脉风证。只可用发表风药。便可以通利也。若只干燥秘涩。只宜润之不可。（注：“可”下疑有脱。）

卷一

论疮疡发寒热或汗三十六

疮疡发寒热。多汗。或先寒后热。或先热后寒。或连日作。又有或间日作。必先呕吐。

寒热。寒热解。大汗出。精要言以上之证。不可专以为热。亦有气虚而得。亦有因怒而得。

或先感寒邪。脾气不正而然者。

丹溪曰。因气虚者。当以补气药补之。因怒者当以顺气药和之。脾气不正者。当以脾药之。今用不换金正气散。悉是温散泄卫之药。欲以一两人参。收拾十四两之泄卫可乎。若用于肿疡时感寒邪者。犹或庶几。彼气虚者。因怒者。脾气不正者。此方能兼治乎。抑不知其用于肿疡耶。溃疡耶。

卷一

论疽疾咽喉口舌生疮三十七

凡疽疾咽喉口舌生疮。精要归罪不得内托。以致热毒冲心。

一贵人病此。与琥珀犀角膏。一日而安。

丹溪曰。肿疡用之。尚为近理。若溃疡后用之。彼犀角之升散。宁不助邪致虚以速其死后有犀角散以大黄佐黄。用黄则知为虚矣。用大黄又似疑其有实热。夫疮脓体虚。纵有旧热。将自渐因脓血而消。何必以峻冷利动脏腑。若在秋冬。何异刀剑。

卷一

论疮疡食肉三十八

东垣曰。疮疡食肉。乃自弃也。疮疡乃营气而作。今反补之。自弃何异。虽用药治。不精要曰。羊、鸡、牛、鹅、鱼、面、煎爆、炒、炙、酒等味。犯之必发热。用梔子黄芩丹溪曰。梔苓、苦参、犀角。佐辅人参。固可解食毒之热。若寒月与虚人。宁无加減乎经谓膏粱之变。足生大丁。此言疮疽之因也。禁戒浓味。恐其引起宿火之热。此诚富贵豢养口腹者所当谨。若素贫者大不然矣。

予治一人。背痈径尺。穴深而黑。家贫得此。急作参归术膏。多肉馄饨与之而安。多肉馄饨补气之有益者也。

卷一

论气血喜香恶臭三十九

精要曰。凡血气闻香则行。闻臭则逆。饮食调令香美。益脾土。养真气。疮疡或为秽气所触。可用香药熏之。

丹溪曰。甘而淡者可养脾土。若香美者但能起火。故经以热伤脾、热伤气为戒。今曰益脾养气。施之肿疡。似有畅达之益。溃瘍后用香美。恐有发湿热、损真阴之患。

卷一

论脓四十

夫痈、疽、疮、疖。皆由气血壅滞而生。当推虚、实、表、里而早治之。可以内消。此里之意也。若毒瓦斯已结者。勿泥此内消之法。当辨脓之有无浅深。急酌量刺之。缓则穿通脏腑。腐烂筋骨。可不慎哉。若脉紧而数。为脓未成。紧去但数。为脓已成。以手按上。热者有脓。不热无脓。按之牢硬未有脓。按之半软半硬已有脓。大软方是脓成。若大按之痛者脓深。按之不甚痛者脓未成。按之即复痛者为有脓。不复痛者无脓。薄皮剥起。起者脓浅。

皮色不变。不高阜者脓深。浅者宜砭。深者宜针。手足指梢及乳上。宜脓大软方开。麻豆后肢疔有痈。稍觉有脓。便用决破。迟则成挛曲之疾。

卷一

论痈疽脓成十死一生四十一

凡痈疽脓已成。十死一生。故圣人弗使已成。已成脓血。砭石锋针取之也。但病者

多喜。而医者即用十宣散、败毒散、流气饮之类。殊不知十宣散虽有参、。然防风、白芷、浓朴、桔梗皆足以耗气。况不分经络时令。气血多少。安可概用。败毒散乃表散药也。虽有表证。不过一二服。况非表证。宁用之乎。流气饮乃行气散血之剂。服之过度。则气血虚耗。

何以为脓。此三药不可轻用明矣。若脓既成。昧者待其自穿。殊不知少壮充实者。或能自破。若老弱之人又有攻发太过。不行针刺。脓毒乘虚内攻。穿肠腐膜。鲜不误事。一妇乳痈脓成。针刺及时。不月而愈。一人腿痈脓成。畏针几殆。后为针之。大补三月而平。一人腿痈。脉症俱弱。亦危症也。治以托里得脓。不急针刺。后脓水开泄不敛而死。一妇发背。待自破。毒内攻。一人腹痛溃透。秽从疮口出。皆由畏针而毙。

卷一

论恶肉四十二

恶肉者。腐肉也。痈疽溃后。腐肉凝滞。必须去之。推陈致新之意。若壮者筋骨强盛。

充溢。真能胜邪。或自去或自平。不能为害。若年高及怯弱之人。血液少。肌肉涩。设或留而不去。则有烂筋腐肉之患。一夫人取之及时。而新肉早生。得以全愈。一人去之稍迟。几致不救。一人取之失期。大溃而毙。尝见腐肉既去。虽少壮者不补其气血。亦不能收敛。若怯弱者不取恶肉。不补养气血。未见其生也。

腐肉可用手法去之。或用雄黄、轻粉敷之。蠹肉努出。用远志末酒调涂之。（又法）息肉。乌头五钱。苦酒三升。浸渍三日洗之。日夜三四次。诸疮肉。如蛇出数寸。硫黄末敷之即缩。脓溃后蠹肉不腐。亦用硫黄、轻粉敷之。四围仍有肿处。用毫针烧赤刺之。约一米深。红肿则缩。

卷一

论蚀脓四十三

追蚀脓法。使毒瓦斯外泄而不内攻。恶肉易去。好肉易生也。若其疮。血出不止者未可但掺追蚀药于疮上。待其熟可。方。之痛应心者。亦不可。误触其疮。痛必倍。

必生变症。若疮疖脓成未破者于上薄皮剥起者。当用破头代针之药安其上。以膏贴之。脓出之后。用搜脓化毒药。若脓血未尽。便用生肌。务其早愈。则毒瓦斯未尽

。必再发。

卷一

生肌止痛四十四

肌肉。脾之所主也。溃后收敛迟速者。乃气血盛衰使然。世人但知生肌用龙竭。止痛用。予谓不然。生肌之法。当先理脾胃助气血为主。则肌肉自生。岂假龙竭之属。设若脓毒未尽。就用生肌。反增溃烂。壮者轻者。不过复溃。或迟敛而已。怯者重者。必致内攻。或溃烂不敛者亦多矣。止痛之法。热者清之。寒者温之。实者损之。虚者补之。脓郁者开之。恶肉侵蚀者。去之。如是则痛自止。岂特乳没之属。

一人发背。毒瓦斯未尽。早用生肌。竟背溃烂。治以解毒药而愈。又有患此。毒瓦斯始发。

生肌。其毒内攻而死。一人腿痛。因寒作痛。与乳香定痛丸。一妇时毒。因热作痛。与防风通圣散。一人腿痛脓溃。因虚作痛。与益气养荣汤。一人腹痛。因实作痛。与黄连内疏汤。

一人腿痛。脓成作痛。予为刺之。一妇发背。腐肉不去作痛。予为取之。痛各自止。专用龙竭生肌。乳没止痛。未之察也。

疮痛不可忍者。苦寒药可施于资禀浓者。若资禀素薄者。宜补中益气汤。加苦寒药。血。四物汤加黄芩、鼠粘子、连翘。在下加黄柏。若肥人湿热疮痛者。羌活、防风、荆芥、白芷、取其风能胜湿也。

每见疮作。先发为肿。气血郁积。蒸肉为脓。故痛多在疮始作时。脓溃之后。肿退肌宽必渐减。而反痛者虚也。宜补参之属。亦有秽气所触者。宜和解之。乳香、芍药之属。亦有风寒所逼。宜温散之。羌桂之属。

卷一

论并治法四十五

诸疮患久成。常有脓水不绝。其脓不臭。内无歹肉。须先服参归术芍大剂。托里为或服以丸。尤宜用附子浸透。切作片。浓二三分。于疮上着艾灸之。仍服前托里之药。隔三日再灸。不五七次。肌肉自长满矣。

至有脓水恶物。渐溃根深者。用面、硫黄、大蒜三物一处捣烂。看疮大小。捻作饼

子。

分。安疮上。用艾炷灸二十一壮。一壮一易。后隔四五日。方用翠霞锭子。并信效锭子互用。入疮内。歹肉尽去。好长肉平。然贴收敛之药。内服应病之剂。调理则瘥矣。

卷一

论附子饼四十六

（附豆豉饼）

附子为末。唾津和为饼如三钱浓。安疮上。以艾炷灸之。漏大炷大。漏小炷小。但灸令。不可令痛。干则易之。如困则止。来日如前再灸。直至肉平为效。仍用前补药作膏贴。豆豉饼专治发背已溃未溃。用江西淡豆豉为末。唾津作饼置患处灸之。饼干再用唾津和之。疮大用水和。捣成硬泥。根据疮大小作饼子浓三分。如已有疮孔。勿敷孔上。四布豉饼列艾其上灸之。使微热勿令破肉。如热痛急易之。日灸二度。先有疮孔者。孔出汁即瘥。

卷一

论隔蒜灸四十七

隔蒜灸 元戎云。疮疡自外而入者不宜灸。自内而出者宜灸。外入者托之而不内。内出之而令外。故经云陷者灸之。丹溪曰。痈疽之发。或因内有积热。或因外寒而郁内热。若于始发之际。外灸以散其毒。治之之早。亦可移重就轻。转深于浅。东垣曰。初觉发背。欲结未结。赤热肿痛。先以湿纸覆其上。立视纸先干处。即痛头也。取蒜切片如三钱浓。安头上。用大艾炷灸之。三壮换一蒜片。痛者灸至不痛。不痛者灸至痛。早觉早灸为上。一日三日。十灸十活。三日四日六七活。五六日三四活。过十数日不可灸。若有十数头作一处者。

用蒜研成膏。作薄饼铺头上。聚艾烧之。亦能活也。若初发赤肿。中间有一黄粟米头。便用独蒜切去两头。取中间片浓薄。安头上。着艾灸十四壮。多至四十九壮。本事方云。一人四月背疽。治之逾月益甚矣。以艾加疮头。自旦及暮。灸百五十壮。知痛乃已。明日镊去黑痂。脓尽不痛。始别以药敷之。日一易。易时旋去前黑烂。月余乃平。

卷一

灸法总论四十八

疮疡在外者引而拔之。在内者疏而下之。灼艾之功甚大。若毒瓦斯郁结。气血凝聚。轻者药散。重者药无全功。东垣云。若不针烙。则毒瓦斯无从而散。脓瘀无从而泄。过时不烙。反攻于内。故治毒者必用隔蒜灸。舍是而用苦寒之剂。其壮实内有火者或可。彼怯弱气寒。未有不败者也。又有毒瓦斯沉伏。或年高气弱。若服克伐之剂。气血愈虚。脓因不溃。必假火力以成功。

一人足患疔已十一日。气短。灸五十余壮。更以托里药而愈。黄君腿痛。脓清脉弱。一结一块。溃不收敛。各灸以豆豉饼。更饮托里药而愈。一人胸肿一块。半载不消。明灸百壮方溃。与大补药不敛。复灸以附子饼而愈。一人发背痛如灼。隔蒜灸三十余壮。肿痛悉退。更服托里消毒而愈。一人发背疮。头甚多。肿硬。色紫。不甚痛。不腐溃。以艾铺患处灸之。更服大补药。数日死肉脱去而愈。一人发背已四五日。疮头虽小。根畔颇大。隔蒜灸三十余壮。其根内消。惟疮头作脓而愈。精要。曰。灸法有回生之功。信矣。大凡蒸灸。若未溃则拔引郁毒。已溃则补接阳气。祛散寒邪疮口自合。其功甚大。尝治四肢疮疡气血不足者。只以前法灸之皆愈。疔毒甚者。痛则灸至不痛。不痛则灸至痛。亦无不愈。若中虚者。不服败毒药。则疮毒未除。中气先伤。未有不败者也。李氏云。治疽之法。着艾胜于用药。缘热毒中隔。外内不通。不发泄则不散。又有处贫居僻。一时无药。用灸尤便。大概蒜用大者。取其散毒有力。用着艾炷多者。取其火力透也。如法灸之。疮发脓溃。继以神异膏贴之。不日而安。一则疮不开大。二则内肉不溃。三则疮口易合。见效甚神。

辨精要曰。始发时用针灸。十死八九。丹溪曰。火以畅达。拔引郁毒。此从治之意。因死者。盖虚甚孤阴将绝。脉必浮数而大且鼓。精神必短而昏。无以抵挡火气故也。岂可泛言始发不可灸以误人。精要又谓头上有毒不得灸。恐火拔起热毒而加病。丹溪曰。头为诸阳所聚。艾炷宜小而少。小者如椒粒。少者三五壮而已。若猛浪如灸腹背。炷大数多。斯为误矣。按东垣灸元好问脑疽。以大艾炷如两核许。灸百壮。始觉痛而安。由是推之。则头上发毒。灸之痛则炷宜小。数宜少。不痛者。炷大数多亦无妨也。

经曰。陷者灸之。如外微觉木硬不痛者。是邪气深陷也。急灸之。浅者不可灸。又曰。

浅者有数头肿痛。亦灸之无妨。

卷一

竹马灸四十九

丹溪曰。诸项灸法皆好。惟骑竹马灸法尤为切要。此消患于未形也。先令病患以肘凭几臂腕。腰直。用箴一条自臂腕中曲纹尽处。男左女右。贴肉量起。直至中指尖尽处为则。不量指甲。却用竹杠一条。令病患脱衣骑定。令身正直。前后二人扛起。令脚不着地。又令二人扶定。勿令僵仆。却将所量臂腕。箴从竹杠坐处尾骨尽处。直竖竹上贴脊背。量至箴尽为则。用墨点。此只是取中。非灸穴也。另用薄箴。量病患中指节。相去两横为则。男左女右。截为一则。就前所点记处两边。各量开尽处。即是灸穴。两穴各灸五壮或七壮。不可多灸。不问痈在何处及乳痈。并用此法灸之。无不愈者。一云。疽发于左。灸左。发于右。灸右。甚则左右皆灸。盖此二穴。心脉所过处。经曰。诸痛痒疮疡皆属心火。又云。心主血。心气滞则血不行。故逆于肉理而生痈。灸此穴使心火调畅。血脉流通。即能奏效。起死回生。

卷一

论灸刺分经络五十

河间谓灸刺疮疡。须分经络部分。气血多少。俞穴远近。从背出者。当从太阳五穴选用、（在足小指外侧。去爪甲角如韭叶。）通谷、（在足小指外侧。本节前陷中。）束骨、（在足小指外侧。本节后陷中。）昆仑、（在足外踝后跟骨上陷中。）委中。（在胸中央约绞中动脉。

）从髤出者。当从少阳五穴、选用窍阴、（在足小指之次指端。去爪甲如韭叶。）夹溪、（在足小指次指岐骨间、本节前陷中。）临泣、（在足小指次指。本节后间陷中。）阳辅、（在足外踝上四寸辅骨前绝骨端如前三分。）阳陵泉。（在膝下一寸外廉陷中。）从髤出者。当从阳明五穴选用厉兑、（在足大指次指。去爪甲如韭叶。）内庭、（在足大指次指外间陷中。）陷谷、（在足大指间。本节后陷中。）冲阳、（在足趺上五寸骨间动脉去陷谷三寸。）解溪。（在冲阳后一寸五手腕上陷中。）从脑出者。则以绝骨一穴。（在外踝上三寸动脉中。）

一说。痈疽初发。必先当头灸之。以开其户。次看所发分野属何经脉。即内用所属经脉之药。引经以发其表。外用所属经脉之俞穴针灸。以泄其邪。内外交治。邪无容矣。

卷一

针法总论五十一

经曰。冬则闭脏。用药多而少针石。少针石者。非谓痈疽也。痈疽不得顷时回。回者远（远顷时而不写。则烂筋骨穿脏腑矣。）又曰。痈疽之生。脓血之成。积微之所生也。故圣人自治于未有形。愚者遭其已成也。已成脓者。唯砭石铍锋之所取也

。

疮疡一科。用针为贵。用之之际。须视其溃之浅深。审其肉之浓薄。若皮薄针深。反伤。益增其溃。肉浓针浅。脓毒不出。反益其痛。至于附骨疽、气毒、流注。及有经久不消。

内溃不痛。宜燔针开之。若治咽喉。当用三棱针。若丹瘤及痈疽。四畔赤。疼痛如灼。宜砭石砭之。去血以泄其毒。重者减。轻者消。

一妇患腹痛。脓胀闷瞽。卧针。脓出即苏。

一人囊痈脓熟肿胀。小便不利。几殆。急针。脓水大泄。气通而愈。

大抵用针迎而夺之。顺而取之。所谓不治已病。治未病。不治已成。治未成。正此意也之患者。或畏针而不用。医者又徇患者之意而不针。遂或脓成而不得溃。或得溃而所伤已深矣。卒之夭枉。十常八九。悲夫。

精要谓痈如椒眼十数头。或如蜂巢连房。脓血不出者。用针横直裂之。如无椒眼之类。

只消直入取脓。不必裂之。（一法）当椒眼上各各灸之。亦佳。不必裂也。

小儿疮疖。先当温衣覆盖。令其凝泣壅滞。血脉温和。则出血立已。不如此。血脉凝便针。则邪毒不泄。反伤良肉。又益其疮势也。

精要曰。痈者皮薄肿高。多有椒眼十数粒。疽者皮肤顽硬。状如牛颈之皮。○痈成脓则。针宜用马衔铁为之。形如薤叶样。两面皆利。可以横直裂开五六分许。攻去毒血。须先灸而后裂。○疽成脓则宜烙。可用银篦。大二寸。长六寸。火上烧令赤。急于毒上熨烙。得脓利为效。

又曰。一妇病痈在背之左。高硕而熟。未破。医云可烙。傍有老成者曰。凡背之上。五穴之所系。膈膜之所近。烙不得法。必致伤人。医曰。但宜浅而不宜深。宜横而不宜直入。

（恐伤膈膜。）宜下而不宜上。（恐贮脓血。）

谓此诀尽无妨也。于是烧铁箸烙之。肉破脓出。自此而愈。当时直惊人非刽子手者。不又曰。方其已熟未溃之时。用铁箸一烙。极是快意。方扇火欲着时。诚是惊人。予尝用临时犹且颤悸。况未曾经历者乎。烙后脓水流通。百无所忌。名曰熟疮。

其疮突者。针口宜向下。然须是熟于用烙者。识浅深。知穴道。审生熟。非其时则所出皆生血。当其时则出黄脓瘀肉。用尖针烙者不得法。尖针头细。其口易合。惟用平员头者为妙。盖要孔穴通透。

或恐疮口再合。用细牛膝根。如疮口之大小。略割去粗皮。插入疮口。外留半寸许。即用嫩橘树叶、地锦草各一握。研成膏敷之。牛膝能使恶肉常流。二草温凉止痛。随干随换。此十全之功也。

火烙针。其针圆如箸。大如纬挺。头员平。长六七寸。一样二枚。捻蘸香油。于炭火中。于疮头近下烙之。宜斜入向软处。一烙不透再烙。必得脓。疮口烙者。名曰熟疮。脓水常流。不假按抑。仍须之。勿令口合。

卷一

论蜚针五十二

蜚针吮出血。可施于轻小症候。若积毒在脏腑。徒竭其血干外无益。一儿二岁赤疹。取大蜚数条吮其血。疹消。予曰。非治也。三日大热而死。盖血去。气不能独居故也。

卷一

论金银花酒五十三

金银花生取藤叶一把。瓷器内烂研。入白酒少许。调和稀稠得宜。涂敷四围。中心留泄毒瓦斯。（又法）取藤五两。木杵槌碎。生甘草节一两。二味以水二碗用砂瓶文武火煎至一碗。入无灰酒一碗。再熬十数沸。去渣。分温三服。渣敷患处。一日夜吃尽。病势重。日夜两剂。服至大小便通利。药力到矣。或用干者。终不及生者力大效速。或只用藤五六两。捣烂热酒一钟。绞取汁。酒温服。渣罨患处。四五服而平。此藤延蔓附树。或园圃墙垣之上。藤方而紫。叶似薜荔而青。三月间花微香。蒂带黄色。花初开色白。经一二日色黄。故又名金银花。又名鹭鸶藤。又名金钗股。又名老翁须。因藤左缠。又名左缠。凌冬不凋。又名忍冬。在处有之。治痈疽发背乳痈。初发盒饭服此。不问疽何处。皆有奇效。兼麦饭石膏、神异膏贴之。尤效。

卷一

论槐花酒五十四

槐花酒 槐花四五两。炒微黄。乘热入酒二钟。煎十余滚。去渣热服。未成者二三服。已一二服。一人髀HT 患毒痛甚。服消毒药不减。饮槐花酒一服。劳随大退。再服托里消毒药而愈。一人发背十余日。势危脉大。先饮槐花酒二服杀其势。退再服败毒散二剂。托里药数剂。渐溃。又用桑柴烧灸患处。每日灸良久。仍以膏药贴之。灸至数次。脓溃腐脱。以托里药白术、陈皮。月余而愈。一人肩疽脉数。用槐花酒一服。势顿退。更与金银花、黄、甘草十余服而平。

大抵肿毒。非用蒜灸及饮槐花酒先去其毒。虽服托里诸药。其效未必甚速。槐花治湿热之功最为神速。但胃寒人不宜过剂。

卷一

八味丸治验五十五

一人年逾三十。素怯弱不能食冷。臂痛愈后。饮食少思。或作胀。或吞酸。日渐羸瘦。

参苓等药不应。右尺脉弱。此命门火衰。不能生土。遂以八味丸补土之原。食进而愈。

一人病脾胃。服补剂及针灸脾俞等穴不应。几殆。服八味丸三料而平。一人脾虚发肿。

服此丸不半年而康。

一人貌丰气弱。遇风则眩。劳则口舌生疮。胸常有痰。目常赤涩。服此而安。一人患脾。服此将验。而庸医阻之。反用寒药。遂致不救。

尝验人有不耐劳。不能食冷。或饮食作胀。大便不实。或口舌常破如疮。服凉药愈盛。

不止。小便频数。腰腿无力。或咽津。或呼吸觉冷气入腹。或阴囊湿痒。或手足冷。或面白。或黧黑。或畏寒短气。以上诸症皆属肾。非用附子不可。

治验数条。见前渴论。

卷二

论十六味流气饮五十六

丹溪曰。夫十六味流气饮。乃表里气血药也。复以疏风助阳之药参入。非脉之洪、缓、迟、紧、细者不宜用。诸家往往不分经络脉症。不具时宜。但云消毒化毒。又云不退。加补气血药。此又使人不能无疑也。

卷二

论十宣散五十七

经曰。诸痛痒疮疡。皆属心火。言其常也。如疮盛形羸。邪高痛下。始热终寒。此反常故当察时下而权治。可收十全之功。此表里气血之药。若用于痈疽。初发或已发。或内托。

或身倦恶寒热少。或脉缓涩。或弦。或紧细。宜用之散风寒以助阳。乃始热终寒之变也。若施于积热毒。更不分经络时宜。不能不无惧也。

丹溪曰。精要谓治未成也速散。已成者速溃。若用于轻小症候。与冬月时令。尽有内托。冬月肿疡。用之亦可转重就轻。移深于浅。夏月溃疡用之。其桂朴之温散。佐以防风、白芷。虽有参、。亦难倚仗。世人用此不问是痈是疽。是冬是夏。无经络。无前后。如盲人骑瞎马。半夜临深池。危哉。又曰。燥血泻气药太多。涉虚者勿轻用。一士背臀腿节次生疽。率用五香连翘汤、十宣散。致不救。一人年六十。好酒肉。背疽。与独参膏十五六斤而愈。若用十宣。宁保无危。

卷二

论内托散五十八

精要谓一日至三日进十数服。防毒瓦斯攻脏腑。名护心散。切详绿豆解丹毒。又言治石毒甘入阳明。性寒能补为君。以乳香去恶毒。入少阴。性温善窜为佐。甘草性缓。解五金八石及百药毒为使。想此方专为服丹石发疽者。设不因丹石而发疽。恐非必用之剂。

丹溪曰。痈疽因积毒在脏腑。非一朝一夕。治当先助气壮胃。使本根坚固。而以行经活佐。参以经络时令。使毒外发。施治之。早。可以内消。此乃内托之本意。（又云）内托散性冷。治呕有降火之理。若夫老年者病深。诸症备者。体虚者。绿豆虽补。将有不胜重任之患一妇年七十。形实性急。好酒。冬病脑疽。与麻黄桂枝汤

而愈。此亦内托。岂必皆冷药

卷二

论神仙追毒丸五十九

精要曰。初成脓宜烙。得脓利为效。亦服追毒丸。

丹溪曰。追毒丸下积取毒之药。决无取脓之效。今用烙而得脓。若在里而血气实。则脓。如托不出。何不以和气活血药。佐以参补剂。使脓托出也。其方用五倍子。消毒杀虫解风为君。山慈菇、千金子、大戟、皆驱逐走泄为臣。佐以麝香升散。用之以治痈疽。实非所宜。果见脏腑有积毒。或异虫缠滞深固而体气不虚者。亦是快药、但戒勿轻用耳。

卷二

论独胜散六十

谓痈疽皆绿气滞血凝。或因怒气所致。用香附子去毛。以生姜汁淹一夕。研干为末。白汤调服二钱。无时。

丹溪曰。本方谓疽后常服。半年尤效。此皆施于体实气郁之人也。

一人浓味气郁。形实性重。年近六十。背疽。医与他药皆不行。惟饮香附米甚快。始终只此一味而安此千百而一二。

卷二

论柞木饮子六十一

干柞木叶（四两半） 干荷叶中心蒂 干萱草根甘草节 地榆（各一两）
细锉。每服半两。水二碗。分二服。早晚各一服。未成者自消。脓者自干。

丹溪曰。荷蒂去恶血。萱根下水。解毒。利胸膈。柞木有芒刺。能驱逐。地榆主下焦血病。轻小症候。或可以为防托。

卷二

论阿胶饮子六十二

（蜡矾丸 国老膏 远志酒）

丹溪曰。阿胶饮子以牛胶属金属土。补肺气。实大肠。壮胃止泄。黄蜡丸以蜡味甘淡。

实大肠。补而难化。

国老膏以甘草化毒行经。远志酒、忍冬酒皆有补性。归心归血。用之颇切。善用者以之配入肿疡之散。结溃疡之补虚。亦奏捷效。

卷二

论六味车螯散六十三

车螯（四个黄泥红。出火毒。研末） 栝蒌仁（新瓦上。炒令香。）
甘草节（二钱。炒灯草（三十茎。） 上除车螯为粗末。作一服。用酒二碗。煎耗半碗。去渣。入蜜一大匙和匀。调车螯末二钱。膩粉少许。空心温服。取下恶物。

丹溪曰。车螯散一以轻粉为佐。一以灯心为佐。其散肿消毒下积。安详稳重。轻小症候。亦可仗之。

卷二

论飞龙夺命丹六十四

飞龙夺命丹 治疗疮恶肿。初发或发而黑陷。毒瓦斯内陷者。

丹溪曰。世多用之。香窜燥毒之剂。无经不至。故能宣泄。备汗、吐、下三法。病因食禽畜毒发。及疮脉沉、紧、细、数。蕴毒在里。并湿毒。用之神效若大热大渴。毒瓦斯 发而脉浮洪在表。及膏粱积热之人。未宜轻举。

卷二

论加味十全汤六十五

凡治痈疽后。补血气。进饮食。实为切要。盖脓血出多。阴阳两虚。此药可以回生起死其不分经络时令。须在识者触而长之。今医以肿平痛宽。遂以为安。漫不加省。往往于结痂后两三月或半年。虚证乃见。医者不察。而加补养之功。因而转成他病者多矣。一人因脚弱。详见后条。

卷二

论五香汤六十六

精要云。大凡痈疽不可舍五香汤。

丹溪曰。吾不知良甫之时。有许多大府秘坚。病气郁塞。若是之顽浓。可以骤散而大下。亦当开陈时之先后。症之可否。庶乎后人不敢孟浪杀人。殊不知此小寒热。或者由其气血不和而然。便以为外感而行表散。害人最速。

卷二

论防风通圣散六十七

此表里气血药也。治一切风毒。积热疮肿。脉候弦、洪、实、数、浮、紧。气血盛实者丹溪曰。秘传以是方加人参、黄、苍术、赤茯苓、金银花。名消肿托里散。虽以参、主。复云人参无亦可。则又不能无疑而难用也。且临症加减。须较表里。如表症多者。当从此方以辛甘为主散之也。里症多者。须当从变。

卷二

论大黄六十八

精要云。大黄宣热散毒。治痈疽要药。痈疽始作。皆须大黄等汤极转利之。排日不废。

又曰。疮疽泄利。皆是恶候。

丹溪曰。此皆不能使人无疑。借曰用大黄。恐因大府秘而病体实。有积热沉痼者发也。

破结导滞。推令转动而已。岂可谓极转利之。而且排日不废耶若下利之后。又与利药。恐非防微杜渐之意。疮之始作。肿在肌肉。若非大满大坚实之症。自当行仲景发表之法。借五香汤为例。散之于外可也。何必遽用峻下之药。夺其里哉。或曰。痈疽用大黄走泄以去毒。孙真人尝言之。良甫祖述其说耳。曰。孙以盛名行奇术于公卿间者。良甫宋人。若其交游亦皆公卿之家。肉食之辈。固皆捷效。今不分贫富苦乐。一概用之宁免孟浪之过乎。况有心劳而虚者。忧怒而虚者。强力劳动而虚者。大醉饱而虚者。皆气少而涩。血少而浊。生疽固是难治。若大府秘而稍安谷。甘淡薄而守戒律。犹为可治。不免尚费调补。苟因旬日半月。大府秘实。不知亦有其

气不降而然者。便以为实而行大黄。岂不杀人。

卷二

论白蜡六十九

白蜡禀收敛坚凝之气。外科要药。生肌止痛。接骨续筋。补虚用合欢树皮。同入长肉膏。有神效。但未试其可服否。合欢皮尝服之验矣。

卷二

论蓖麻子七十

（附皂角刺 神异膏 麦饭石膏）

蓖麻子性善收。能追脓取毒。亦要药也。皂角刺治痈疽未破已破。能钻引至溃处。神异说膏药方甚多。神效无出于此。麦饭石膏脓溃后围疮口。一说内冷恶寒不（注：“不”下疑

卷二

论流气饮十宣散七十一

夫气血凝滞。多因营卫之气弱。不能运散。岂可复用流气饮以益其虚。况各经气血多少。心包络、膀胱、小肠、肝经。多血少气。三焦、胆、肾、心、脾、肺。少血多气。人年四十以上。阴血日衰。若于血少经分而病痈肿。或脉症不足。当以补接为主。

丹溪曰。肿疡内外皆壅。宜托里表散为主。乃补气血药而加之以行散之剂。非专攻之谓或者肿 痛甚。烦躁脉大。其辛热之剂。不但肿疡不可用。虽溃疡亦不可用也。凡患者须分经络、血气、地部远近、年岁老幼、禀气虚实。及七情所感、时令所宜而治之。常见以流气、十宣散二药。概治结肿之症。以致取败者多矣。

大抵症有主末。治有权宜。治其主则末病自退。用其权则不拘于时。泥于守常。必致危甚。况杂用攻剂。动扰各经。故丹溪云。凡疮发于一经。只当求责本经。不可干扰余经

卷二

论败毒散流气饮七十二

凡治疮疡。不审元气虚实。病在表里。便服败毒流气等药。盖败毒散。发表药也。果有。止宜一二服。多则元气损。毒愈盛。虽有人参亦莫能补。流气饮耗血药也。果气结胸满。

只宜二三服。多则血反致败。虽有芎、归。亦难倚仗。丹溪曰。此不系膏粱丹毒之变。因虚劳气郁所故也。

卷二

蜡矾丸七十三

一人肩患毒。肿硬作痛。恶症迭见。用矾末三钱糊丸。以葱白七茎煎汤调下。肿痛悉退矾末葱汤调下。因未难服。故以蜡为丸。一方士治疮疽。不问肿溃。先用此药二三服。后用消毒药甚效。常治刍豢之人。用此即退。不用托里亦愈。盖止热毒为患。血气不亏。故用多效若金石毒药发疽者。尤效。以矾能解金石之毒也。一方用矾末五钱。朱砂五分。热酒下。

亦效此药托里固内、止泄、解毒、排脓。不动脏腑。不伤气血。有益无损。其药易得。其功甚大。偏僻之处不可不知此方。或虫犬所伤。溶化热涂患处。更以热酒调末服皆效。

卷二

汗之则疮已七十四

东垣曰。其疮外有六经之形症。内无便溺之阻隔。饮食如故。清便自调。知不在里。非也。小则为疔。大则为痛。其邪所受于下。风湿之地气。自外而来。侵于身也。经曰。营气不从。逆于肉理。乃生痈肿。诸痛痒疮疡。皆属心火。此元气不足。营气逆行。其疮初出。

未有传变。在于肌肉之上。皮肤之间。只为风热六经所行经络地分出矣。宜泄其风湿热疮之情势。亦旧然高起。结硬作痛。此疮自外而入。其脉只在左手。左手主表。左寸外洪缓。左关洪缓而弦是客邪客于血脉之上。皮肤之间。宜急发汗而通其荣卫。则邪气出矣。托里荣卫汤此足太阳药表里气血之剂。

黄 红花 桂枝（各五钱） 苍术（三钱） 柴胡 连翘（各二钱） 羌活 防风
归身 甘草（炙） 黄芩（各半钱） 人参（一钱）

上锉。每服一两。水酒各半。煎。

卷二

论须针决七十五

凡疮不起者托而起之。不成脓者补而成之。使不内攻。脓成宜及时针之。若畏痛而不肯。又有恐伤良肉而不肯针。殊不知疮虽发于肉薄之处。若脓成。其肿亦高寸余。疮皮又浓分许。用针深不过二分。若发于背。肿高必有三四寸。针入止于寸许。况患处肉已坏矣。何痛之有。何伤之虑。怯弱之人。及患附骨疽。待脓自通。必致大溃不能收敛。血气沥尽而亡者

卷二

论痛七十六

上部脉数实而痛者。宜降火。

上部脉数虚而痛者。宜滋阴降火为主。

尺部脉数而作渴者。滋阴降火。如四物加黄柏、知母。

大抵疮之寒热虚实。皆能为痛。热毒痛者。药用寒凉折之。寒邪痛者。药用温热散之。

痛者除风。因湿痛者导湿。燥而痛者润之。塞而痛者通之。虚而痛者补之。实而痛者泄之。

脓郁而闭者开之。恶肉侵蚀者去之。阴阳不和者调之。经络闭涩者利之。慎勿概用寒凉之药。盖血脉喜温而恶寒。若冷气入里。血即凝滞。反难瘥矣。又曰。大抵疮疽之症虽发疼痛。

情势高硕。烦渴不宁。脉若有力。饮食颇进。可保无虞。其脓一溃。诸症悉退。多有因脓不得外泄以致疼痛。若用败毒寒药攻之。反致悟事。若有脓急针之。脓出痛止。脓未成而热毒作痛。用解毒之药。亦有腐烂尺余者。若无恶症。投以大补之剂。肉最易生。亦无所妨。

卷二

论痈疽虚实七十七

疮疡之症。五善之中见一二善症者可治。七恶之内见一二恶症者难治。若虚中见恶症者。实中无恶者自愈。此症虽云属火。未有不由阴虚而致者。故经云督经虚从脑出。膀胱经虚从背出。岂可专泥于火而用苦寒药治。夫苦寒之药。虽治阳症。尤当分表里、虚实、次第、时宜。岂可始末悉用之。

凡疮肿坚而不泽。（不泽。不光泽而色夭）坚如牛领之皮。疮头如粟。脉洪大。按之则涩。此精气已绝。不治亦死。

凡痈疽之作。皆五脏六腑蓄毒不流。非独荣气壅塞而发。其行也有处。其主也有归。假于喉舌者心之毒。皮毛者肺之毒。肌肉者脾之毒。骨髓者肾之毒。发于下者阴中之毒。发于上者阳中之毒。外者六腑之毒。内者五脏之毒。故内曰坏。外曰溃。上曰从。下曰逆。发于上者得之速。发于下者得之缓。感于六腑者易治。感于五脏者则难治也。

发背、脑疽、大疔、悬痈、脱疽、脚发之类。皆由膏粱浓味。尽力房劳。七情六淫。或补药。精虚气耗所致。非独因荣卫凝滞而生也。必灸之以拔其毒。更辨其因。及察邪在脏腑之异、虚实之殊而治之。庶无误也。凡大痈疽。藉气血为主。若塌而不起。或溃而不腐。或不收敛。及脓少。或清。皆气血虚也。宜大补之。最忌攻伐之剂。亦有脓反多者。乃气血虚不能禁止也。若溃后发热作渴。脉大而脓愈多。属真气虚邪气实也。俱不治。常见气血充实之人。患疮皆肿高。色赤。易腐溃而脓且稠。又易收敛。怯弱之人多不起。发不腐溃。及难收敛。若不审察。妄投攻剂。虚虚之祸不免矣。

大抵疮之始作。先发为肿。气血郁积。蒸肉为脓。故多痛。脓溃之后。脓退肌宽。痛必渐减。

元太医令。）疮疽之症。有脏腑气血。上下真邪。虚实不同也。不可不辨。如肿起坚硬脓稠者实也。肿下软慢脓稀者虚也。泻利肠鸣。饮食不入。呕吐无时。手足并冷。脉弱皮寒。小便自利。或小便时难。大便滑利。声音不出。精神不爽。悉脏腑虚也。大便硬。小便涩。饮食如故。腹满膨胀。胸膈痞闷。肢节疼痛。口苦咽干。烦躁多渴。身热脉大。精神昏塞。悉脏腑实也。凡诸疮疽。脓水清稀。疮口不合。聚肿不赤。肌寒肉冷。自汗色脱者。气血虚也。肿起色赤。寒热疼痛。皮肤壮热。脓水稠粘。头目昏重。气血实也。头痛鼻塞。目赤心惊。咽喉不利。口舌生疮。烦渴饮冷。睡语切牙者。上实也。精滑不禁。大便自利。腰脚沉重。睡卧不能者。下虚也。肩头不便。四肢沉重。目视不正。睛不。食不知味。音嘶色。四肢浮肿者。真气虚也。肿尤甚。痛不可近。多日不溃。寒热往来。大便秘涩。小便如淋。心神烦闷。惚恍不宁者。邪气实也。又曰。诸痛为

实。诸痒为虚。又曰。其脉洪大而数者实也。微细而软者虚也。虚则补之。和其气血托里也。实则泻之。疏利而导其气。内经谓血实则决之。气虚则掣引之。

溃疡虽有表症。发热宜以托里药为主。佐以表散之剂。

卷二

论附骨疽七十八

疽乃流注之败症也。如用凉药。则内伤其脾。外冰其血。脾主肌肉。脾气受伤。饮食必肌肉不生。血为脉络。血既受冰。则血气不旺而愈滞。宜用理脾。脾健则肉自生。血气自运行矣。又曰。白虎飞尸。留连周期。或展转数岁。冷毒朽骨出尽自愈。若附骨腐者可痊。正骨腐则为终身废疾矣。有毒自手足或头面肿起。或兼疼痛。止至颈项骨节去处。如 痲贯珠此风湿流气之症也。宜加减小续命汤、独活寄生汤主之。有两膝肿痛起。或至遍身骨疼痛者。此风湿痹。又名节风。宜附子八物汤。又有结核在项腋或两胯软肉处。名曰 痲。属冷症也。又有小儿宿痰失道。致结核于项颈、臂膊、胸背之处。亦冷症也。俱用热药敷贴。

以上诸症。皆原于肾。肾主骨。肾虚则骨冷而为患也。所谓骨疽皆起于肾。亦以其根于此也。故用大附子以补肾气。肾实则骨有生气。而疽不附骨矣。

卷二

论疮疽所致之由七十九

若气血充实。经络通畅。决无患者。若气血素亏。或七情所伤。经络郁结。或腠理不密。六淫外侵。隧道壅塞。

医者须当察其所由。辨其虚实。庶不误人。

卷二

论痲可治不可治八十

发背、脑疽、脱疽、肿痛赤色。水衰火旺之色。尚可治。若黑或紫。火极以水之象也。

乃肾水已竭。精气已涸。决不治。

凡肿不高。色不赤。不痛。脉无力。不饮食。肿不溃。腐不烂。脓水清。或多而不止肉不生。属元气虚也。皆难治。宜峻补之。或脓血既泄。肿痛尤甚。脓水败臭。烦躁时嗽。

腹痛渴甚。泄利无度。小便如淋。乃恶症也。皆不治。

未成脓不灸。脓熟不开。腐不取。多致不救。

肿而一日至四五日未成脓而痛者。宜灸至不痛。灸而不痛或麻木者。明灸之。

肿硬不作脓。或痛或不痛。或微痛。或疮头如黍者。灸之尤效。亦有数日色尚微赤。肿尚不起痛不甚。脓不作者。尤宜多灸。勿拘日期。更服甘温托里药。切忌寒凉之剂。

瘀肉不腐。桑柴火灸之。

脉数发热而痛者。发于阳也。可治。脉不数。不热不痛者。发于阴也。难治。不痛最恶。不可视为常疾。此症不可不痛。不可大痛烦闷者不治。

卷二

肿疡八十一

肿高痛脉浮者。邪在表也。宜托之。如内托复煎散。

肿硬痛深脉沉者。邪在内也。宜下之。如黄连内疏汤。仙方活命饮。苦参丸。

外无

肿。内则便利调和者。邪在经络也。宜调和荣卫。如托里荣卫汤。白芷升麻辈。

痛燥烦。或咽干作渴者。宜降火。如黄连解毒汤。

痛发热。或拘急。或头痛者。邪在表也。宜散之。如荆防败毒散。人参败毒散辈。

大痛或不痛者。邪气实也。隔蒜灸之。更用解毒。如仙方活命饮。

烦躁饮冷痛脉数者。邪在上也。宜清之。如清凉饮。或金银花散。

恶寒而不溃者。气实兼寒邪也。宜宣而补之。如十宣散。

痛发热。汗多。大渴。便秘。谵语者。结阳症也。宜下之。如黄连内疏汤。破棺丹。辈不作脓或熟而不溃者。虚也。宜补之。如补中益气汤。八物汤。十全大补汤辈。

痛或不痛及麻木者。邪气盛也。隔蒜灸之。

肿痛或不作脓者。邪气凝结也。宜解之。如仙方活命饮。

肿痛饮冷发热睡语者。火也。宜清之。如清心汤。或防风通胜散加黄连。

不作脓。或不溃。及不敛者。阳气虚也。宜补之。如托里消毒散。疮后当调养。

患后当调养。若瘰 流注之症。尤当补益。否则更患他症矣。必难措治。慎之。蜡矾丸。败毒散。流气饮。

卷二

溃疡八十二

脓熟不溃者。阳气虚也。宜补之。如圣愈汤。

瘀肉不腐者。宜大补阳气。更以桑柴火灸之。如参 归术。

脓清或不敛者。气血俱虚。宜大补。如八物汤。

溃后食少无睡。或发热者。虚也。宜补之。如内补黄 汤。

倦怠懒言。食少不睡者。虚也。宜补之。如黄 人参汤。

寒气袭于疮口。不敛。或陷下不敛者。温补之。如十全大补汤。

脉大无力。或涩微。而肌肉迟生者。气血俱虚也。峻补之。如十全大补汤。

出血或脓多烦躁不眠者。乃亡阳也。急补之。脓多或清者。血气俱虚也。宜峻补之。

右关脉弱而肌肉迟生者。宜健脾胃。如六君子汤。

脓清补之不应及不痛。或木闷及坚硬者。俱不治。

卷二

溃疡作痛八十三

脓出而反痛者。虚也。宜补之。

凡脓溃之后。脉涩迟缓者易愈。以其有胃气故也。脉细而沉时直者。里虚欲变症也。若痛尚未痊。洪滑粗散者难疗。以正气虚邪气实也。

脉数虚而痛者属虚火。宜滋阴。如托里散加生地黄。

脉数实而痛者。邪气实也。宜泄之。

脉实便秘而痛者。邪在内也。宜下之。如清凉饮。

脉涩而痛者。气血虚寒也。温补之。如定痛托里散。

若有脓为脂膜间隔不出。或作胀痛者。宜用针引之。或用利刀。剪之。腐肉堵塞者去之

卷二

溃疡发热八十四

脉浮或弱。而热或恶寒者。阳气虚也。宜补气。如补中益气汤。

脉涩而热者。血虚也。宜补血。如四物汤。人参养荣汤。

午前热补气为主。如四君子汤。

午后热者补血为主，如四物汤。

脉浮数发热而痛者。邪在表也。宜散之。如补中益气汤。

脉沉数发热而痛者。邪在内也。宜下之。

东垣云。发热恶热。不渴不止。烦躁肌热。不欲近衣。脉洪大。按之无力。或目痛鼻干非白虎汤症也。此血虚发热。宜用当归补血汤。又有火郁而热者。如不能食而热。自汗气短者。虚也。以甘寒之剂泻热补气。如能食而热。口舌干燥。大便难者

。以辛苦大寒之剂下之。以泄火补水。

脓血大泄。当大补气血为先。虽有他症。以末治之。

凡痈大溃发热恶寒。皆属气血虚甚。若左手脉不足者。补血药当多于补气药。右手脉不足者。补气药当多于补血药。切不可发表。

附余诸症十五条。

卷二

论寒热八十五

大抵七情皆能动火。各经之热亦异。当分治之。东垣曰。昼则发热。夜则安静。是阳气自旺于阳分也。

昼则安静。夜则发热烦躁。是阳气下陷入阴中也。名曰热入血室。昼则发热烦躁。夜亦烦躁。是重阳无阴也。当急泻其阳。峻补其阴。王注曰。病热而脉数。按之不动。乃寒盛格阳。非热也。形症是寒。按之而脉鼓。击于指下而盛者。此为热盛拒阴。非寒也。伤寒论曰。

寸口脉微。为阳不足。阴气上入阳中。则洒淅恶寒。尺脉弱为阴不足。阳气下陷入阴中。则发热也。肺热者。轻手乃得。微按全无。日晡热甚。乃皮毛之热。其症必见喘咳。寒热轻者泻白散。重者凉膈散。地骨皮散。心热者。微按至皮肤之下则热少。加力按之则不热。是热在血脉也。其症烦心。心痛。掌中热而嘔。以黄连泻心汤、导赤散、朱砂安神丸。脾热者。

轻按之不热。重按之亦不热。不轻不重。热在肌肉。遇夜尤甚。其症必怠惰嗜卧四肢不收。

无气以动。泻黄散。肝热者。重按之。肌肉之下。至骨之上乃热。寅卯时间尤甚。其脉弦。四肢满闷。便难。转筋。多怒。多惊。四肢困热。筋痿不能起于床。泻青丸。柴胡引子。

肾热者。重手按至骨分。其热蒸手如火。其人骨苏苏如虫蚀。其骨困热不任。亦不能起于床。滋肾丸主之。徐用诚云。面热者。足阳明。

口中热如胶。足少阴。口热舌干。足少阴。耳前热。手太阳。掌中热。手厥阴。少阴。

太阴。足下热而痛。足少阴。足外热。足少阳。身热肤痛。手少阴。身前热。足阳明。洒淅寒热。手太阴。肩上热。肩似拔。手太阳。中热而喘。足少阴。肩背热。及足小指外胫踝后。皆属足太阳。一身尽热。狂而妄闻妄见妄言。足阳明。热而筋纵缓不收。足痿。足阳明。厥阴。手少阴。

溪曰。恶寒者。卫气虚衰不能温。分肉实表而恶寒者。又有上焦之邪。隔绝营卫。不能出表而恶寒者。东垣云。昼则恶寒。夜则安静。是阴气上溢于阳中也。夜则恶寒。昼则安静。是阴血自旺于阴分也。夜则恶寒。昼亦恶寒。是重阴无阳也。当急泻其阴。峻补其阳。

卷二

七情所伤八十六

经云。神伤于思虑则肉脱。意伤于忧愁则肢废。魂伤于悲哀则筋挛。魄伤于喜乐则皮槁。志伤于盛怒则腰脊难以俯仰也。七情所伤。气血所损之症也。当先滋养血气。

卷二

论精血八十七

夫月水之为物。乃手太阳手少阴二经主之。此二经相为表里。在上为乳汁。下为月水。

络之余气。苟外无六淫所侵。内无七情所伤。脾胃之气壮。则冲任之气盛。故为月水。适时而至。然面色痿黄。四肢消瘦。发热口干。月水过期且少。乃阴血不足也。非有余瘀之症。宜以滋养血气之剂。徐而培之。则经气盛而经水自根据期而下。

又云。精未通而御女以通其精。则五体有不满之处。异日有难状之疾。阴已痿而思色以精。则精不出而内败。小便道涩而为淋。精已耗而复竭之。则大小便道牵疼。愈疼则愈欲大小便。愈便则愈疼。女人天癸既至。逾十年无男子合则不调。未逾十年思男子合亦不调。不调则旧血不出。新血误行。或溃而入骨。或变而为肿。或虽合而难子。合男子多则沥枯虚。

又产乳众则血枯杀人。观其精血。思过半矣。又曰。夫人之生以血气为本。人之病未有不先伤其气血者。世有室女童男。积想在心。思虑过当。多致劳损。男子则神色先散。女子则月水先闭。何以致然。盖忧愁思虑则伤心。心伤则血逆竭。血逆竭则神色先散。而月水先闭也。火既受病。不能营养其子。故不嗜食。脾既虚则金气

亏。故发嗽。嗽既作。水气绝。故四肢干。木气不充。故多怒。鬓发焦。筋骨痿。俟五脏传遍。故卒不能死。然终死矣。此一种于劳中最难治。盖病起于五脏之中。无有已期。药力不可及也。若或自能改易心志。用药扶接。如此则可得九死一生。

又云。室女月水久不行。切不可用青蒿等凉剂。医家多以室女血热。故以凉药解之。殊血得热则行。冷则凝。（养生必用方）言之甚详。此说大有理。不可不知。若经候微少。渐渐不通。手足骨肉烦疼。日渐羸瘦。渐生潮热。其脉微数。此由阴虚血弱。阳往乘之。少水不能灭盛火。火逼水涸亡津液。当养血益阴。慎勿以毒药通之。毒药

悍。甚助阳火。阴血得之则妄行。脾胃得之则愈虚。惟宜柏子仁丸、泽兰丸。

卷二

论水肿八十八

月水不通。久则血结于内。生块变为血瘕。亦作血。血水相并。壅塞不通。脾胃虚弱为水肿。所以然者。脾候身之肌肉象于土。土主克水。水血既并脾气衰弱。不能克消。致水气流溢。浸渍肌肉。故肿满也。观此岂宜用克伐之剂。

卷二

论妇人病八十九

妇人情性执滞不能宽解。多被七情所伤。遂致遍身作痛。或肢节肿痛。或气填胸满。或核塞喉。咽吐不出。或痰涎壅盛。上气喘急。或呕逆恶心。甚者渴闷欲绝。产妇多有此症。

宜服四七汤。先调滞气。更以养血之药。若因思忧致小便白浊者。用此药吞青州白丸子。屡

卷二

论妇人热劳九十

妇人热劳者。由心肺壅热。伤于气血。气血不调。脏腑壅滞。热毒内积。不得宣通之所。其候。心神烦躁。颊赤头痛。眼涩神昏。四肢壮热。烦渴不止。口舌生疮。神思昏沉。嗜卧少寐。饮食无味。身体酸疼。或时心怔。或时盗汗。肌肤日渐消瘦。故名热劳也。

卷二

自汗忌利小便九十一

自汗。小便少。不可以药利之。既已自汗。则津液外亡。小便自少。若利之则荣卫枯竭。

无以制火。烦热愈甚。当俟热退汗止。小便自行也。兼此症乃阳明经。大忌利小便。

卷二

论下血九十二

下血服凉血药不应。必因中气虚。不能摄血。非补中升阳之药不能愈。切忌寒凉之剂。

伤湿热之食成肠癖而下脓血者。宜苦寒之剂。以内疏之。脉弦绝涩者难治。滑大柔和者易治

卷二

论血崩九十三

妇人崩中。由脏腑伤损冲任二脉。血气俱虚故也。二脉为经脉之海。血气之行。外循经内营脏腑。若气血调适。经下根据时。若劳动过极。脏腑俱伤。冲任之气虚。不能约制其经血。故忽然而下。谓之崩中。治宜大补气血之药。以养脾胃。微加镇坠心火之药治其心。补阴泻阳。经自止矣。

卷二

论治病不可责效太速九十四

凡治病。若患者责效太速。及不戒七情。或药不分经络虚实。俱难治。

卷二

论寡妇病九十五

寡妇之病。自古未有言者。惟仓公与褚澄略而论及。寡者言师尼丧夫之妇。独居无阳。

子而不可得。是以郁悒而成病也。夫处闺门。欲心萌而未遂。致阴阳交争。乍寒乍热。有类疟疾。久则为劳。又有经闭。白淫。痰逆。头风。膈气。痞闷。面。瘦瘠等症。皆寡之。诊其脉。独肝脉弦出寸口而上鱼际。皆血盛而得。经云。男子精盛则思室。女人血盛则怀胎是也。

卷二

论痿与柔风脚气相类九十六

人身有皮毛、血脉、筋膜、肌肉、骨髓以成其形。内则有心、肝、脾、肺、肾以主之。

情妄用喜、怒、劳、佚。致五内精血虚耗。使皮血筋骨肉痿弱。无力以运动。故致痿。状与柔风、脚气相类。柔风脚气皆外所因。痿则五内不足之所致也。

卷二

论病犯不治九十七

饮食不为肌肤。水谷不能运化。精微灌溉脏腑。周身百脉。神将何根据。故气短而促。真也。怠惰嗜卧。脾气衰也。小便不禁。膀胱不藏也。时有燥热。心下虚痞。胃气不能上荣也。恍惚健忘神明乱也。犯此数者。病皆不治。

卷二

论脚气九十八

若饮食自倍。脾胃乃伤。则胃气不能施行。脾气不能四布。故下流乘其肝肾之虚。以肿。加之房事不节。阳虚阴盛。遂成脚气。亦有内伤食。脾胃之气有亏。不能上升。则下注为脚气者。宜用东垣开结导引丸开导。引水运化脾气。如脾气虚。湿气壅遏不通。致面目发肿或痛者。宜用导滞通经汤以疏导之。脚气由肾虚而生。然妇人亦有病脚气者。乃因血海虚而七情所感。遂成斯疾。今妇人病此亦众。则知妇人以血海虚而得之。与男子肾虚类也。男女用药同无异。更当兼治七情。无不效也。脚气虽云肿有浅深。感有轻重。其所受皆因真气虚弱。邪气得以深袭。若真气壮实。邪气焉能为患耶。故附骨疽及鹤膝风症。肾虚者多患之。前人用附子者。以温补肾气。而又能行药势。散寒邪也。

凡湿痰湿热。或死血流注关节。非辛温之剂。开发腠理。流通隧道。使气行血和。焉能。但人谓附子有毒、多不肯服。若用童便炮制。何毒之有。况不常服。何足为虑。予中气不足。以补中益气汤加附子。服之三年。何见其毒也。经云。有是病用是药也。故大防风汤、活络丹。治脚气、鹤膝风症。多效。

活络丹

夫病深伏在内。非此药莫能通达。但近代始云此药引风入骨。如油入面之说。

故后人多不肯服。

大抵有是病用是药。岂可泥此。以致难瘥。

卷二

论表虚及小便多少肺痈肺痿九十九

经曰。肺内主气。外司。皮毛。若肺气虚则腠理不密。皮毛不泽。肺受伤则皮毛错纵。

肺痈。肺痿。肠痈。必致皮毛如此。以其气不能荣养而然也。亦有服表药。见邪不解。又复发表。殊不知邪不解者。非邪不能解。多因腠理不密而邪复入也。专用发表则腠理愈虚。邪愈易入。反为败症矣。宜胗其脉。邪在表者。止当和解而实腠理。乘虚复入者。亦当和解。

兼实腠理。故用托里益气之药。若小便赤涩为肺热所传。小便短少为肺气虚盖肺为母。肾为子。母虚不能生子故也。亦有小便频数者。亦为肺虚不能约制耳。大抵劳伤血气。则腠理不密。风邪乘肺。虚风热相抟。郁滞结不散。以致喘嗽。若误汗下过度。则津液重亡。遂成肺痈、肺痿之症矣。

桷按以上一十五条。原系后病案中互发挥者。虽非外科。以其议论有切于杂症。不敢脱略。故采附诸论之后。俾学人以便观览。

卷三

头面赤肿一百

（时毒发于面鼻耳项者是）

里实而不利者。下之。

表实而不解者。散之。

表里俱实而不解者。解表攻里。

表里俱解而不消者。和之。

肿甚痛者。砭去恶血。更用消毒之剂。

不作脓或不溃者。托之。

饥年普患者。不宜用峻利。当审而治之。

时毒者。为四时邪毒之气感之于人也。其候发于面、鼻、耳、项、咽喉。赤肿无头。或有根。令人增寒。发热。头痛。或肢体痛。恍惚不宁。咽喉闭塞。人不识者将为伤寒。便服解药。一二日肿气益增。方悟。始求疮医。原夫此疾古无方论。世俗通为丹瘤。病家恶言时。切恐传染。考之经曰。人身忽经变赤。状如涂丹。谓之丹毒。此风热恶毒所为。与时毒特不同耳。盖时毒初状如伤寒。五七日间乃能杀人。治者宜精辨之。先论其脉、滑、数、浮、洪、沉、紧、弦、涩、皆其候。盖浮数者邪在表也。沉涩者邪气深也。气实之人急服化毒丹以攻之。热实不利。大黄汤下之。有表证者。解毒升麻汤以发之。年高气软者。五香连翘主之。又于鼻内搔。通气散。取十余嚏作效。若搔药不嚏者。不可治。如嚏出脓者。治之必愈。左右之人。每日用嚏药搔之。必不传染。其病患亦每日用嚏药三五次以泄热毒。此治时毒之良法也。经三四日不解者。不可大下。犹宜和解之。犀角连翘散之类。至七八日大小便通利。头面肿起高赤者。可服托里散。黄散。宜针镰出血。泄其毒瓦斯。十日外不治自愈也。

此病若五日以前。精神昏乱。咽喉闭塞。语声不出。头面不肿。食不知味者必死。治之无功矣。然而此疾有阴有阳。有可汗。有可下。粗工但云热毒。就用寒药。殊不知病有微甚。治有逆从。不可不审也。

一人头面肿痛。服硝黄败毒之剂愈甚。诊之脉浮数。邪在表尚未解。用荆防败毒散

二剂。势退大半。更以葛根牛蒡子汤。四剂而痊。（此凭脉发表。）

经云。身半以上肿。天之气也。身半以下肿。地之气也。乃邪客心肺之间。上攻头目而。此感四时不正之气也。与膏粱积热之症不同。硝黄之剂。非大便秘实不可用。若不审其因。及辨其虚实表里。概用攻之。必致有误。常见饥馑之际。刍豢之人多患之。乃是胃气有损。邪气从之。不可不察。予常治邪在表者。用葛根牛蒡子汤。人参败毒散。或普济消毒饮子。邪在里者。五利大黄汤。栀子仁汤。表里俱不解者。防风通圣散。表里俱解而肿不退者。

犀角升麻汤。肿甚者砭患处。出恶血以泄其毒。十日外自愈。若噤出脓血即愈。欲其作脓者。用托里消毒散。欲其收敛者。用托里散。此法最为稳当。五七日咽喉不闭。言语不出。头面不肿。食不知味者。不治。

一人患此。肿痛发热。作渴。脉实便闭。以五利大黄汤下之。诸症悉退。以葛根牛蒡子汤四剂而痊。（此凭脉攻里。）

一人表里俱解。肿痛尚不退。以葛根升麻汤二剂而消。（此凭症也。）

一人肿痛发寒热。脉浮数。以荆防败毒散二剂。少愈。再人参败毒散二剂。势减半。又二剂而痊。（此凭脉发表。）

一人耳面赤肿作痛。咽干发热。脉浮数。先以荆防败毒散二剂。势退大半。又以葛根牛蒡子汤四剂而痊。（凭脉发表）

一妇表邪已解。肿尚不消。诊之脉滑而数。乃瘀血作脓也。以托里消毒散溃之而愈。（此凭脉也。）

一人肿胀痛。作渴烦热。便秘脉数。按之尤实。用防风通圣散一剂。诸症顿退。以荆防败毒散加玄参牛蒡黄芩。二剂而痊。（此凭症凭脉。发表攻里。）

一老冬月头面耳项俱肿。痛甚。便秘脉实。此表里俱实也。饮防风通圣散不应。遂砭患处出黑血。仍投前药。即应。又以荆防败毒散而瘳。盖前药不应者。毒血凝聚上部经络。药力难达故也。恶血既去。其药自效。或拘用寒远寒。及年高畏用硝黄。而用托里与夫寻常消毒之剂。或不砭泄其毒。专假药力。鲜不危矣、（此舍时从症。）

一人表里俱解。惟肿不消。以托里消毒散四剂。脓成。针之而愈。（此凭症而治。）

一妇肿痛。用硝黄之剂攻之。稍缓。翌日复痛。诊。之外邪已退。此瘀血欲作脓也。用托里消毒散溃之而愈。（此凭脉与症也。）

一人表散药愈。发热便秘。诊脉沉实。此邪在里也。以大黄汤下之。里症悉退。以葛根牛蒡子汤。浮肿亦消。惟赤肿尚存。更以托里药溃之而愈。（此凭脉与症也。）

一人冬月病头面赤肿。耳前后尤甚。痛不可忍。发热恶寒。牙关紧急。涕唾稠粘。饮食。不得安卧。医砭肿上四五十针。肿赤不减。痛益甚。予诊其脉浮紧。按之洪缓。知为寒覆皮毛。郁遏经络。热不得升。聚而赤肿。且夫天冷寒凛之时。腠理闭。汗不出。血气强。肉坚涩。善用针者不得取四厥。必待天温。又云。冬月闭脏。用药多。少针石也。宜以苦温之剂。温经散寒。所谓寒致腠理。以苦发之。以辛散之。

方名托里温经汤麻黄（苦温发之为君去根节二钱） 防风（辛温散之去芦二分） 升麻（苦辛四钱） 葛根（解肌出汗专治阳明经邪故以为臣） 白芷归身（血流不行则痛白芷归身辛温以和血散滞各二钱） 苍术（湿热则肿苍术甘温体轻浮力雄壮能泄肤腠间温热一钱） 人参（去芦一钱） 甘草（甘温） 白芍药（酸微寒调中益气使托其里为佐各钱半）

上锉。每服一两。水二盏。先煎麻黄令沸。去沫。再下余药。同煎至一盏。去渣。大温。以薄衣覆首。浓被覆身。卧暖处。使经血温。腠理开。寒乃散。阳气升。大汗出。肿减七八分。再服去麻黄、防风。加连翘、鼠粘子。肿痛悉愈。经言汗之则。疮已。信哉。

或曰。仲景言疮家虽身痛不可汗。何也。予曰。此言营气不从。逆于肉理。乃主痈肿而痛。非外感寒邪作痛。故戒不可汗。汗之则成。又问。仲景言鼻衄者不可汗。复言脉浮紧者以麻黄汤发之。衄血自止。何也。予曰。血与汗异名同类。夺汗者无血。夺血者无汗。今血妄行。为热所逼。更发其汗。反助邪热。重竭津液。必变凶症。故不可汗。若脉浮为在表。紧则为寒。寒邪郁遏。阳不得伸。热伏荣中。迫血妄行。上出于鼻。故用麻黄汤散其寒邪。阳气得舒。其衄自止。洁古之学。可谓知其要矣。

泰和二年四月。民多疫疠。初觉增寒体重。次传头目。肿盛目不能开。上喘。咽喉不利。舌干口燥。俗云大头天行。亲戚不通。染之多殆。

一人病此五六日。医以承气加蓝根下之。稍缓。翌日其病如故。下之又缓。终莫能愈。

困笃。予曰。身半以上。天之气也。身半以下。地之气也。此邪热客于心肺之间。上攻头目肿盛。以承气泻胃中之实热。是诛罚无过。不知适其至所为。故遂用黄连黄芩（味苦寒各半两泄心肺间热为君）橘红（苦平）玄参（苦寒）生甘草（甘寒）人参（三钱泄火补气为臣）连翘 鼠粘子 薄荷叶（苦辛平）板蓝根（苦寒）马勃（各一钱）白僵蚕（炒七分）升麻柴胡（苦平各二钱行少阳阳明二经气不得伸）桔梗（辛温为舟楫不使下行）

共为细末。半用汤调。时时服之。半用蜜丸噙化。服尽良愈。

凡他处有病此者。书方贴之。名曰普济消毒饮。或加川芎、归身。咀如麻豆。每服五钱。水二钟。煎至一钟。去滓。食后稍热时时服。如大便硬。加大黄（酒煨一钱或二钱）以利之。肿势甚。宜砭刺之。

按时行疫疾。虽由热毒所染。有气实人下之可愈。气虚者概下之。鲜不危矣。故东垣制此方救斯人。其惠博哉。

一人年逾三十。肩患毒。服人参败毒散一剂。更服十宣散去参、桂。加金银花、天花粉而溃。因怒动肝火。风热上壅。头面赤肿。痛。饮冷。以荆防败毒散。加芩、连、薄荷。

二剂不应。急砭患处。出黑血盏许。仍以一剂。势退大半。再服人参败毒散四剂而愈。

夫病有表里、上下之殊。治有缓急攻补之异。若不砭刺。气血结为肉理。药不能及。肿日盛。使峻利之药。则上热未除。中寒已作。必伤命矣。

升麻牛蒡子散 治时毒疮发头面胸膈。脉浮洪在表者。

升麻 牛蒡 甘草 桔梗 葛根 玄参 麻黄 连翘（各一钱） 锉。作一服。姜三片。

水二盏煎。一黄门腮赤肿痛。此胃经风热上攻。以犀角升麻汤（三八）二剂而平。

又一大理患此。用前汤为人所惑。谓汤内白附子性温故也。另用荆防败毒散愈盛。后用此汤尚去白附子。不应。再用全方。三剂而愈。

本草云。白附子。味甘辛。气温。无毒。主面上百病。及一切风疮。乃风热之主药。经曰。有是病。用是药。苟不用主病之药。安得而愈。

一人腮颊肿

至于牙龈。右关脉数。此胃经风热上攻也。治以犀角升麻汤（三八）而消。

卷三

瘰一百一

肿痛脉浮数者。祛风清热。

脉涩者。补血为主。

脉弱者。补气为主。

肿硬不溃者。补血气为主。

郁抑所致者。解郁结。调气血。

溃后不敛者。属气血俱虚。宜大补。

虚劳所致者。补之。

因有核而不敛者。腐而补之。

脉实而不敛。或不消者。下之。

瘰者。结核是也。或在耳后。耳前。或在耳下。连及颐颌。或在颈下。连缺盆。皆谓之瘰。或在胸及胸之侧。或在两胁。皆谓之马刀。手足少阳主之。

瘰

必起于少阳一经。不守禁忌。延及阳明。大抵食物之浓。郁气之积。曰毒。曰风。

。皆此三端。拓引变换。须分虚实。实者易治。虚者可虑。以其属胆经。主决断。有相火。

且气多血少。妇人见此。若月经不调。寒热变生。稍久转为潮热。危矣。自非断欲。神仙不救。苦化坚汤瘰。马刀。挟瘰。从耳下。或耳后。下颈至肩。或入缺盆。乃手足少阳经分。其在颌下或颊车。乃足阳明经分。受心脾之邪而作。宜将二症合而治之。

升麻（一钱） 葛根（半钱） 真漏芦

三味俱足。阳明本经药。连翘（一钱。能散诸血。

聚疮之神药。十二经疮药不可无。） 归身（三分） 熟（二分）

牡丹皮（三分。去肠胃中留血、滞血、三味。诸经中和血、生血、凉血药也） 黄（一钱。枯皮毛。实腠理。补表之元气。反活血脉、生血。亦疮家圣药。） 白芍药（三分。味酸气寒。补中益肺。气散而不收。故用酸寒以收散气。腹痛必用。夏月倍之。冬寒下用酸寒故也。又治腹中不和。） 肉桂（三分。大辛热。能散结积疮症。属阳。须少用之。寒因热用也。又寒覆其疮。以大辛热消浮冻之气。或躁烦者去之。） 麦芽（一钱。治腹中缩急。兼能消食神胃。） 柴胡（八分。

说同连翘） 鼠粘子（当肿不用。若当马刀挟痿。不在少阳经矣。去此二味。） 羌活（一钱）

独活（半钱。） 防风（半钱。三味乃手足太阳经药。脊痛项强。不可回顾。腰似拆。项似拔者用之。或只用防风一味亦可。疮在膈以上。虽为手足太阳经症。亦当用之。为能散结。去上部风病。身拘急者。风也。诸疮见此症亦用。）

曲末（炒黄二分。为消化食。） 昆布（二分。味大咸酸。能坚。疮坚硬者用之。） 黄连（去毛三分。治烦闷。） 广术（三分。煨。

） 三棱（二分。煨。坚者削之。疮坚硬甚者用之。不甚勿用。）

人参（三分。补肺气。如气短气喘。气不调加之。）

浓朴（姜制一钱二分。腹时见胀加之。）

益智仁（二分。唾多者胃不和也。或吐沫吐食。胃上寒者加之。） 黄柏（炒三分。有热或脚膝无力。加之。或燥烦欲去衣者。肾中伏火者。亦加之。） 甘草（炙五分。或二分。调中益胃。泄火和诸药。分两不定者。疮宜泻营气。而甘入脾胃。生湿助疮邪故也。）

上为细末。汤浸蒸饼。和作饼子。日干。捣如米粒。每服二钱。或三钱。白汤下。量病人虚实。无令药多。妨其饮食。此治之大法也。

如在少阳经分。为马刀、挟痿者。去独活、漏芦、升麻、葛根。加瞿麦。（三分）

顺加橘皮甚者加木香。（少许） 人素气弱。若病来气盛不短促者。不可拘其平素。只作气盛治之。而从病变之权。邪在上焦加黄芩。（一半酒制。一半生用。） 在中焦加黄连。（一半酒制。一半生用。） 在下焦加黄柏、知母、防己。皆酒制选用之、大便不通。滋其邪盛。急加酒大黄以利之。

如血燥不行。加桃仁、酒大黄。如风结燥不行。加麻仁、大黄。风涩不行。加煨皂角仁、大黄。如脉涩觉身气滞不行。加郁李仁、大黄、以除气燥。如阴寒秘结不

行。以局方半硫丸。或加附子、干姜。冰冷与之。

大抵诸病素气弱者。当去苦寒之药。多加参、
、甘草之类。泄火而补元气。少佐寒散肿溃坚汤
治马刀坚硬如石。在耳下至缺盆。或肩上。或胁下。皆手足少阳经分。

或颞。或颊车。坚硬如石。在足阳明经分。或二经疮已破。流脓。并皆治之。

柴胡（四钱）升麻（三钱）甘草（炙）归尾葛根白芍（各二钱）黄连（一钱）
三棱（酒制微炒）连翘（各三钱）昆布（去土）

知母（酒制）黄柏（酒制）土瓜根（切碎酒制）草龙胆（酒制炒四次）

桔梗（各半两）黄芩（八钱酒制一半生用一半）广术（酒制微炒）

上锉。每服五钱。或七钱。水二盏八分。浸大半日。煎至一盏。热服。卧宜去枕。
头低。每嚥一口。作十次咽。留一口送下后项丸药。服毕。卧如常。取药在膈上。
停留故也。若能食。粪硬者。旋加作七八钱。止可秤半料作末。炼蜜丸如绿豆大。
每服百丸或二百丸。此制之缓也。一方海藻昆布二味洗净。焙干为末。何首乌木
臼捣末。皂角刺炒黄色。公蛇蛻一条。树上墙上者是。

上五味为末。用猪项下刀口肉。烧熟蘸药末吃。食后向患处一边侧卧一伏时。每核
上灸七壮。烟从口中出为度。脓尽即安。

连翘散坚汤 治耳下或肩上及缺盆疮硬如石。动之无根。或生两胁。或已脓流作疮未
破。此手足少阳经分也。

柴胡（一两二钱）归尾（酒制）黄芩（生）广术（酒炒）三棱（酒炒）连翘
芍药（各半两）黄连（酒炒二次）苍术（各二钱）土瓜根（一两酒炒）

草龙胆（一两酒制四次）黄芩（酒炒二次七钱）甘草（三钱炙）

上秤一半蜜丸。一半锉。煎如前法。服。

柴胡连翘汤 治男妇马刀疮。

黄芩（炒）知母（酒制）连翘柴胡（各半两）中桂（三分）甘草（炙）
黄柏（酒制）

生（各三钱） 归尾（钱半） 瞿麦穗（六钱） 鼠粘子（二钱）

锉如麻豆。每服五钱或三钱。水二盏。煎一盏。食后稍热时服之。

柴胡通经汤 治小儿项侧有疮坚而不溃。名曰马刀。

柴胡 归尾 桔梗 甘草（生） 连翘 三棱 鼠粘子 黄芩（各二分） 红花（少许）
黄连（五分） 锉。作一服。水二大盏。煎一盏。食后稍热服。忌苦药泄大便。

项上瘰、马刀。将初生者用四棱铁环按定作口子。以油纸捻之。勿令合了。以绝其疮之源。其效至速。如瘰不破。或畏破。以龙泉粉涂。

龙泉粉（炒半润湿另研） 瓦粉（各半两） 昆布（去土三钱或五钱） 广术（酒制）
三棱（炒各半两）
上细末。熟水调涂之。用此去疾尤速。一二日一易。龙泉粉。即磨刀水脓汁。

青石者佳。

瘰、马刀血少肚泄。

四物汤加芍药（炒）、牡蛎、（细研）陈皮、柴胡、甘草、黄连、玄参、神曲（炒）
、及桑椹桑椹膏取极熟黑色者二斗。以布滤取自然汁。砂器属性武火慢熬成薄膏。
每日白汤点一匙。食后日三服。

夏枯草。本草言大治瘰
。散结气。有补养厥阴血脉之功。而经不言。观其能退寒热。

虚者可仗。实者以行散之药佐之。外以艾灸。亦渐取效。

一妇患瘰

。延至胸腋。脓水淋漓。日久五心烦热。肢体疼痛。头目昏重。心忪颊赤。

咽燥。发热盗汗。食少嗜卧。月水不调。脐腹作痛。予谓血虚而然。非故也。服逍遥散（二三）月余少可。更服八珍汤（十四）。加牡丹皮、香附子。又月余而经通。再加黄、白芩。两月余而愈。（此凭症也。）

一妇久患瘰不消。自汗恶寒。此血气俱虚。服十全大补汤（十三）月余而溃。然坚核虽取。疮口不敛。灸以豆豉饼（四三）仍与前药。加香附、乌药两月而愈。（此凭症也。）

一人劳倦。耳下肿。恶寒发热。头痛作渴。右脉大而软。当服补中益气汤。彼自用
药发表。遂致呕吐。始信予用六君子汤。（二）更服补中益气汤（十六）而愈。（
此凭症也。）

大抵内伤。荣卫失守。皮肤间无气滋养。则不任风寒。胃气下陷。则阴火上冲。气
喘发头痛脉大。此不足证也。误作外感。表实而反泻之。宁免虚虚之祸。东垣云。
内伤右脉大。

外感左脉大。当以此别之。

机按左脉大属外感。此亦难凭。必须察形观色。审症参之以脉。乃得不误。丹溪治
一老饥寒作劳。患头痛。发热恶寒。骨节疼。无汗妄语。脉洪数而左甚。治以参、
、归、术皮、甘草。每贴加附一片。五贴而愈。又一少年。九月间发热头痛。妄语
大渴。形肥脉数大左甚。以参、术、君、茯苓、臣、
、佐。附一片使。盖人肥而脉左大于右。事急矣。非附则参、无捷效。五十贴大汗
而愈。此皆左脉大。丹溪悉以内伤治之。若根据东垣认作外感。宁一妇年二十。耳
下结核。经每过期。午后头痛。服头痛药愈甚。治以八珍汤。（十四）加柴胡、地
骨皮二十余贴。愈。（此凭症也。）

一妇溃后。发热烦躁作渴。脉大无力。此血虚也。以当归补血汤六剂顿退。又。以
圣愈汤数剂少健。加以八珍汤。加贝母、远志三十余剂而敛。（此凭脉也。）

一妇四肢倦怠类痿症。以养气血健脾胃而愈。（此凭症也。）

一人素弱。溃后核将不腐。此气血皆虚。用托里养荣汤。气血复。核尚在。以簪挺
拨去。又服前药月余而痊。（此凭症也。）

一人患之痰盛。胸膈痞闷。脾胃脉弦。此脾土虚。肝木乘之也。当实脾土。伐肝木
为主以治痰为先。乃服苦寒化痰药。不应。又加破气药。病愈甚。始用六君子汤加
芎归。数剂。

饮食少思。以补中益气汤。倍加白术。月余中气少健。又以益气养荣汤。四月肿消
而血气亦复矣。夫右关脉弦。弦属木。乃木盛而克脾土。为贼邪也。虚而用苦寒之
剂。是虚虚也。况痰之为病。其因不一。主治之法不同。凡治痰利药过多。则脾气
愈虚。虚则痰愈易生。如中气不足。必用参术之类为主。佐以痰药。（此凭症与脉
也。）

一人久而不敛。神思困倦。脉虚。予欲投以托里。彼以为迂。乃服散肿溃坚汤。半
月余果发热。饮食愈少。复求治。投益气养荣汤三月。喜其谨守。得以收救。（此

凭症脉也。)

齐氏曰。结核瘰

。初觉宜内消之。如经久不除。气血渐衰。肌寒肉冷。或脓汁清稀。

不出。疮口不合。聚肿不赤。结核无脓。外症不明者。并宜托里。脓未成者。使脓早成。脓已溃者。使新肉早生。血气虚者。托里补之。阴阳不和。托里调之。大抵托里之法。使疮无变坏之症。所以宜用也。

一人久而不敛。脓出更清。面黄羸瘦。每侵晨作泻。与二神丸数服。泄止。更以六君子加芎归。月余肌体渐复。灸以豆豉饼。及用补剂作膏药贴之。三月余而愈。(此凭症也。)

一妇溃后核不腐。以益气养荣汤三十余剂。更敷针头散腐之。再与前汤三十余剂而敛。

(此凭症也。)

一人患而肿硬。久而不消。亦不作脓。服散坚毒药不应令。灸肘尖看尖二穴。更服益气养荣汤。月余而消。(此凭症也。)

一人尚硬。亦灸前穴。饮前药。脓成针之而敛。

一妇久溃发热。月经过期且少。用逍遥散兼前汤。两月余气血复而疮亦愈。但一口不收。敷针头散。更灸前穴而痊。

常治二三年不愈者。连灸三次。兼用托里药即愈。(前二条俱凭症。)

一人患此肿痛。发寒热。大便秘。以射干连翘散六剂。热退大半。以仙方活命饮(六一)

四剂而消。(此凭症也。)

一妇肝经积热。患而作痛。脉沉数。以射干连翘汤四剂少愈。更用散肿溃坚丸月余而消。(此凭脉也。)

一妇耳下肿痛。发寒热。与荆防败毒散四剂。表症悉退。以散肿溃坚汤数剂。肿消大半。再以神效栝蒌散(五一)四剂而平。(此凭症也。)

一人肝经风热。耳下肿痛发热。脉浮数。以薄荷丹治之而消。（此凭脉也。）

一人年二十。耳下患

痛。左关脉数。此肝经风热所致。以荆防败毒散（七）。三贴。

表症悉退。再与散肿溃坚丸（五十）。月余平复。（此凭脉也。）

一妇因怒耳下肿痛。以荆防败毒散（七）加连翘黄芩。四剂而愈。（此无脉症而用发表。

必有所见也。）

尝治此旬日不消者。以益气血药。及饮远志酒（二十）。并效。无脓自消。有脓自溃。

一妇因怒。耳下

痛。头痛寒热。以荆防败毒散（七）加黄芩。表证悉退。但饮食少思。

发热。东垣云。虽有虚热。不可大攻。热去则寒起。遂以小柴胡加地骨皮、芎、归、芩、术、陈皮十余贴而愈。次年春复肿坚不溃。用八珍汤（十四）加香附、柴胡、地骨皮、桔梗。服至六七贴以为延缓。仍服人参败毒散。势愈盛。又服流气饮。则盗汗发热口干食少。至秋复求诊视。气血虚极。辞之。果没。（此凭症也。）

一人每怒。耳下肿。或胁作痛。以小柴胡汤加青皮、红花、桃仁。四剂而愈。（此凭症一人肿硬不作脓。脉弦而数。以小柴胡汤兼神效栝蒌散（五三）各数剂。及隔蒜灸数次。

月余而消。（此凭脉与症也。）

一妇颈痛不消。与神效栝蒌散（五三）六剂。少退。更以小柴胡加青皮、枳壳、贝母数剂。痛肿减大半。再以四物对小柴胡数剂而平。（此凭症也。）

罗宗伯耳后发际患毒

痛。脉数。以小柴胡（五）加桔梗、牛蒡子、金银花。四剂而愈。

（此凭脉症也。）

一人气血已复。核尚不腐。用针头散及必效散各三次。不旬日而愈。（此凭症处治。）

一妇瘰。与养气顺血药不应。服神效栝蒌散二剂（五三）顿退。又六剂而消却。与托里药。气血平复而愈。（此凭症也。）

一妇年逾三十。瘰已溃。不愈。与八珍汤（十四）加小柴胡、地骨皮、夏枯草、香附、五十余剂、形气渐转。更与必效散（四九）二服疮口遂合。惟气血未平。再用前药三十余剂而平。（此凭症也。）

治瘰。用必效散与栝蒌散相间服。神效。

后有不问虚实。概用必效散。殊不知斑蝥性猛大毒。利水破血。大损元气。若气血实者此劫之而投补剂。或可愈。若虚而用此。或用追蚀之药。瘀肉虽去。而疮口不合。反至不救一妇因怒结核肿痛。察其气血俱实。先以神效散下之。更以益气养荣汤三十余剂而消。

（此凭症也。）

常治此症。虚者先用益气养荣汤。待其气血完充。乃取神效散去其毒。仍进前药。无不一人耳下患五枚如贯珠。年许尚硬。面色痿黄。饮食不甘。劳而发热。脉数软而涩。以益气一妇瘰不消。脓清不敛。用八珍汤（十四）少愈。忽肩背痛不能回顾。此膀胱经气郁所当服防风通气汤。彼云瘰胆经病也。是经火动而然。自服凉肝降火之药。反致不食。痛盛。予诊其脉。胃气愈弱。先以四君子（六三）加陈皮、炒芍药、半夏、羌活、蔓荆子四剂。食进痛止。继以防风通气（四二）二剂而愈。（此凭脉与症也。）

一人神劳多怒。颈肿一块。久而不消。诸药不应。予以八珍汤（十四）加柴胡、香附。每日更隔蒜灸数壮。及日饮远志酒二三盏渐消。（此凭症也。）

一妇月水不行。渐热。咳嗽。肌体渐瘦。胸膈不利。颈肿一块。日久不消。令服逍遥散三）月余。更服八珍汤（十四）加牡丹皮、香附。又月余加黄、白芩。两月余热退肿消。经行而愈。（此凭症也。）

一人年逾三十。每劳心过度。颈肿发热。服败毒散愈盛。用补中益气汤数贴而消。（此张通府耳后发际患肿一块。无头。肉色不变。按之微痛。彼谓痰结。脉软而时见数。经脉数不时见。疮也。非痰也。仲景云。微弱之脉。主血气俱虚。形精不足。又曰。沉迟软弱皆宜托里。遂用参、归、术、川芎、炙甘草以托里。少加金银花、白芷、桔梗以消毒。

彼谓不然。内饮降火消痰。外贴凉药。觉寒彻脑。患处大热。头愈重。食愈少。复请治。以四君子加藿香、炮干姜数剂。食渐进。肿成刺之。更以十全大补汤（十三

）去桂。灸以豆豉饼。又有余而愈。（此凭脉症也。）

一人耳内出脓。或痛。或痒。服聪耳益气汤不应。服防风通圣散愈甚。予用补肾丸而愈机按前条瘰治法。虚者补之。而补有先后温凉之殊。实者泻之。而泻有轻重表里之异。或行开郁滞。或舍时从症。或变法用权。或针。或砭。或灸。或敷。其法亦粗备矣。医者能仿是例而扩充之。庶几亦可以应变矣。）

一儿宿痰失道。痈肿见于颈项。或臂膊胸背。是为冷症。宜四生散敷贴。内服附子八物汤及隔蒜灸。（此无脉可凭而治。当时必有所见也。）

一人因暴怒。项下肿痛。胸膈痞闷，兼发热。用方脉流气二剂。胸膈利。以荆防败毒剂而热退。肝脉尚弦涩。以小柴胡加芎、归、芍药四剂。脉症顿退。以散肿溃坚丸一料。将平。唯一核不消。服遇神仙无比丸二两而瘳。（此凭症凭脉也。）

一儿甫周岁。项患胎毒。予俟有脓刺之。脓出碗许。乳食如常。用托里药月余而愈。又一儿患此。待脓自出。几至不救。（此凭症也。）

大抵疮浅宜砭。深宜刺。使瘀血去于毒聚之始。则易消也。况小儿气血又弱。脓成不针。鲜不毙矣。

一人项下患毒脓已成。因畏针。延至胸。赤如霞。其脉滑数。饮食不进。月余不寐。甚倦。予密针之。脓出即睡觉而思食。用托里散（百五七）两月余而愈。又一人患此。及时针刺。数日而愈。一人素虚。患此不针。溃透颌颊。血气愈虚而死。（此凭症也。）

一人耳后患毒。脉症俱实。宜用内疏黄连汤。彼以严冬不服寒剂。竟至不起。

罗谦甫曰。用寒远寒。用热远热。假者反之。虽违其时。以从其症。又云。凡治病必察。谓察时下之宜而权治之。故曰经者常也。法者用也。医者意也。随其所宜而治之。则万全一妇因怒。项肿。后月水不通。四肢浮肿。小便如淋。此血分症也。先以椒仁丸数服。

肿消。更以六君子汤加柴胡、枳壳数剂。颈肿亦消矣。亦有先因小便不利。后身发肿。致经水不通。名曰水分。宜葶苈丸治之。良方云。妇人肿满。若先因经水断绝。后致四肢浮肿。

小便不通。名曰血分。水化为血。血不通则复化为水矣。宜服椒仁丸。（此凭症也。）

一妇。咽间如一核所哽咽吐不出。倦怠发热。先以四七汤而咽利。更以逍遥散。（此一妇所患同前。兼胸膈不利。肚腹膨胀。饮食少思。卧睡不安。用分心气饮并效。（此一女年十七。项下时或作痛。乍寒乍热如疟状。肝脉弦长。此血盛之症也。先以小柴胡汤二剂。少愈更以生地黄丸而瘥（此凭脉症也。）

一贵人女适夫。夫早逝。患十指挛。拳掌垂莫举。肤体疮疡粟栗然。汤剂杂进。饮食顿减于半载。诊之非风也。乃忧愁悲哀以致耳。病属内因。宜用内因药。仍以鹿角胶辈。多用麝香熬膏贴痿处。挛能举。指能伸。病渐安。（此因情而治也。）

一女性急好怒。耳下常肿痛。发寒热。肝脉弦急。投小柴胡加青皮、牛蒡子、荆芥、防而寒热退、更以小柴胡对四物。数剂而肿消。其父欲除病根。予谓肝内主藏血。外主荣筋。

若恚怒气逆则伤肝。肝主筋。故筋蓄结而肿。须要自加调摄。庶可免患。否则肝迭受伤。不能藏血。血虚则难瘥矣。后不戒。果结三核。屡用追蚀。不敛而殁。（此因情而治。）

一人先于耳前耳下患之。将愈。延及项侧缺盆。三年遂延胸腋。诊之肝脉弦数。以龙会坚二丸治之将愈。肝脉尚数。四年后。小腹阴囊内股皆患毒。年余不敛。脉诊如前。以清肝养血及前丸而愈。（此凭脉也。）

一人因怒。耳下及缺盆患
。溃延腋下。形气颇实。疮口不合。治以散肿溃坚丸（五十）

而愈。（此凭形症也。）

一儿七岁。项结二核。时发寒热。日久不愈。治以连翘丸。而消。若患在面臂等处。尤宜此丸。若溃而不敛。兼以托里之药。（此凭症也。）

一儿项结一核。坚硬如。面色痿黄。饮食不甘。服托里药不应。此无辜疳毒也。以蟾治之而愈。若数服不消。按之转动。软而不痛者。内有虫如粉。急针出之。若不速去。则虫随气走。内蚀脏腑不治。（按此因治不应而变法也。蟾蜍夏月沟渠中。腹大不跳不鸣者。先取粪蛆一杓置桶中。以尿浸之。桶近上令干。使蛆不得出。将蟾蜍扑死投蛆中。任蛆食昼夜。次以新布袋包系。置水急处。浸一宿取出。瓦上焙为末。入麝香一字。软饭丸如麻子大。

每服二三十丸。空心米饮送下。）

一人眼赤痒痛。时或羞明下泪。耳内作痒。服诸药气血日虚。饮食日减。而痒愈盛

。此肝肾风热上攻也，以四生散酒调四服而愈。（此凭症也。）

一妇人久郁。患而不溃。既溃不敛。发热口干月水短少。饮食无味。日晡尤倦。益气养二十余剂少健。予谓须服百剂。庶保无危。彼欲速效。反服斑蝥之剂。及数用追蚀毒药。去而复结。以致不能收敛。出水不止。遂致不救。（此凭症也。）

一妇久不作脓。脉浮而涩。此气血俱虚。欲补之。使自溃。彼欲内消。专服斑蝥及散坚之药。血气愈虚而死。（此凭症也。）

一人因劳而患怠惰。发热。脉洪大。按之无力。宜用补中益气汤。（十六）彼不信。辄服攻伐之剂。吐泄不止亦死。（此凭脉因补误治致死。）

大抵此症原属虚损。若不审虚实而犯病禁经禁。鲜有不误。常治先以调经解郁。更以膈之多自消。如不消。即以琥珀膏贴之。候有脓则针之。否则变生他症。设若兼痰兼阴虚等症。只宜加兼症之剂。不可干扰余经。或气血已复而核不消却。服散坚之剂。至月许不应。气血亦不觉损。方进必效散。或遇神仙无比丸。其毒一下。即止二药。更服益气养荣汤（百二十一）数剂以调理。疮口不敛。豆豉饼、琥珀膏贴。气血俱虚。或不慎饮食起居七情者。俱不治。然此症以气血为主。气血壮实。不用追蚀之剂。彼亦能自腐。但取去使易于收敛。若气血虚。不先用补剂而数用追蚀之药。适足以败矣。若发寒热。眼内有赤脉贯瞳仁者。亦不治。一脉者一年死。二脉者二年死。

一女年十九。颈肿一块。硬而色不变。肌肉日削。筋挛急痛。此七情所伤。气血所损之症。当先滋养血气。不信。乃服风药。后不起。（此凭症也。）

一人耳后漫肿〔（注）：“漫”下疑有脱文〕一少妇耳下患肿。素勤苦。发热口干。月水过期且少。一姬以为经闭。用水蛭之类通之。以致愈虚而毙。

一女年十七。患瘰久不愈。月水尚未通。发热咳嗽。饮食少思。老嫗欲用巴豆、肉桂先通其经。予谓此症渐热经候不调者不治。但喜脉不涩。且不潮热。尚可治。须养气血。益津液。其经自行。彼欲效。仍用巴、桂。此剽悍之剂。大助阳火。阴血得之则妄行。脾胃得之则愈虚。果通而不止。饮食愈少。更加潮热。遂致不救。

一人远途劳倦。发热。脉大无力然热退肿消。彼不听。服降火药及必夫劳倦损气。气衰则火旺。火乘脾土。故倦怠而热。此元气伤也。丹溪曰。宜补形气。

调经脉。其疮自消。不可汗下。若不详脉症经络受病之异。而辄用峻利之剂。鲜不危矣。

一妇因怒不思食。发热倦怠。骨肉酸疼。体瘦面黄。经渐不通。颈间结核。以逍遥散（二三）八珍汤（十四）治之少可。彼自误服水蛭等药。血气愈虚。遂致不救。（此凭症也。）

一人耳后寸余发一毒。名曰锐疽。痛寒热。烦躁喜冷。此胆经蕴热而然。先用神仙一剂。势减二三。时值仲冬。彼惑于用寒远寒之禁。自用十宣托里之药。势渐炽。耳内脓溃。喉肿。开药不能下而歿。

一放出宫女。年逾三十。两胯作痛。不肿。色不变。大小道作痛血渍入隧道为患。乃男女失合之症也。难治。后溃不敛。又患瘰而此妇为人之外家。夫为商。常在外。可见此妇久怀忧郁。及放出。又不能如愿。是以致生此疾。其流注瘰。乃七情气血皆已损伤。不可用攻伐之剂皎然矣。

卷三

流注一百二

暴怒所致。胸膈不利者。调气为主。

抑郁所致而不痛者。宜调经脉补气血。

肿硬作痛者。行气和血。

溃而不敛者。益气血为主。

伤寒余邪未尽者。和而解之。

脾气虚。湿热凝滞肉理而然。健脾除湿为主。

闪肭瘀血凝滞为患者。和气血。调经络。

寒邪所袭。筋挛骨痛。或遍身痛。宜温经络。养血气。

大抵流注之症。多因郁结。或暴怒。或脾虚湿气逆于肉理。或腠理不密。寒邪客于经络闪肭。或产后瘀血流注关节。或伤寒。余邪未尽为患。皆因真气不足。邪得乘之。常治郁者开之。怒者平之。闪肭及产后瘀血者散之。脾虚及腠理不密者。除而补之。伤寒余邪者。

调而解之。六要以固元气为主。佐以见症之药。如久而疮口寒者。更用豆豉饼或附

子饼灸之有脓管或瘀肉者。用针头散腐及锭子尤效。若不补血气。及不慎饮食起居七情。俱不治。

一人因怒。胁下作痛。以小柴胡对四物。加青皮、桔梗、枳壳而愈。（因情处治。）

一人臀肿一块微痛。脉弦紧。以疮科流气饮四剂而消。（因情处治。）

一人因怒胁下肿痛。胸膈不利。脉沉迟。以方脉流气饮数剂少愈。以小柴胡对二陈加青皮、桔梗、贝母。数剂顿退。更以小柴胡二十余剂而痊。（因七情处治。）

一妇因闪肭。肩患肿。遍身作痛。以黑丸子二服而痛止。以（方脉）流气饮二剂而肿消。

更以二陈对四物加香附、枳壳、桔梗而愈。（凭症处治。）

一妇腿患筋挛骨痛。诸药不应。脉迟紧。用大防风汤一剂顿退。又二剂而安。又一妇患之亦然。先用前汤二剂。更服黑丸子而痊。此二患若失治。溃作败症。（凭症凭脉处治。）

一妇稟弱性躁。胁臂肿痛。胸膈痞满。服流气败毒。反发热少食。用四七汤数剂。胸宽气利。以小柴胡对四物。加香附、陈皮。肿痛亦退。（此因治不对病而变方。）

一人腿患溃而不敛。用人参养荣汤。及附子饼灸。更以补剂煎膏贴之。两月余愈。（凭一人脾气素弱。臂肿一块。不痛。肉色不变。饮食少思。半载不溃。先以六君子加芎归二十余剂。饮食渐进。更以豆豉饼日灸数壮。于前药再加黄肉桂三十余剂。脓熟针去。以十全大补汤及附子饼灸之。月余而敛。（此凭症处治。）

一人腿肿。肉色不变。不痛。脉浮而滑。以补中益气汤加半夏、茯苓、枳壳、木香饮之香附饼熨之。彼谓气无补法。乃服方脉流气饮。愈虚。始用六君子汤加芎、归数剂。饮食少进。再用补剂。月余而消。（凭脉凭症处治。）

夫气无补法。世俗论也。以其为病痞满壅塞。似难为补。殊不知正气虚不能营运。则邪气滞而为病。不用补法。气何由行乎。

一人臂肿。筋挛骨痛。年余方溃。不敛。诊脉更虚。以内塞散一料。少愈。以十全大补汤及附子饼灸而愈。（凭症凭脉处治。）

精要云。留积经久。极阴生阳。寒极为热。以此溃多成。宜早服内塞散排之。

一人腿肿一块。经年不消。且不作脓。饮食少思。强食则胀。或作泻。日渐消瘦。诊脉。此乃命门火衰。不能生土。以致脾虚而然也。遂以八味丸。饮食渐进。肿患亦消。（凭症一人背髀。患之微肿。形劳气弱。以益气养荣汤。间服黑丸子及木香、生地黄作饼覆患处。熨之月余。脓成针之。仍服前药而愈。（此凭所因而治。）

一人腿患。久而不敛。饮大补药及附子饼及针头散。之而愈。（凭症处治。）

一人臂患。年余尚硬。饮食少思。朝寒暮热。八珍汤加柴胡、地骨、牡丹皮。月余寒热。再用益气养荣汤附子饼灸。两月余脓成。针之。更服人参养荣汤。半载而愈。（凭症而治一妇脓溃清稀。脉弱恶寒。久而不愈。服内塞散。灸附子饼而瘳。（凭脉凭症而治。）

一人臂患。出腐骨三块尚不敛。发热作渴。脉浮大而涩。乃气血俱损。须多服生气血之庶可保全。彼谓火尚未尽。乃用凉药内服外敷。几危求治。其形甚悴。脉愈虚。先以六君子加芎归月余。饮食渐进。以八珍汤加肉桂三十余剂。疮色乃赤。更以十全大补汤。外以附子饼。仅年而瘳。（凭症凭脉。）

一老伤寒。表邪未尽。股内患肿发热。以人参败毒散二剂。热止。灸香附饼。又小柴胡加二陈、羌活。川芎、归、术、枳壳。数剂而消。（凭症处治。）

一妇腰间患一小块。肉色如常。不溃。发热。予欲治以益气养荣解郁之剂。彼却别服流气饮。后针破出水。

年余而没。又一妇久不敛。忽发寒热。予决其气血俱虚。彼反服表散之剂。果发大热。

亦死。（凭症处治）

一人元气素弱。将患此胸膈不利。饮食少思。予欲健脾。解郁。养气血。彼反服辛香流剂。致腹胀。又服三棱、莪术、浓朴。之类。饮食少。四肢微肿。兼腰肿一块。不溃而歿一妇经不调。两月或三月一至。四肢肿。饮食少。日晡发热。予曰。此脾土气血虚也。

脾滋气血药。饮食进则浮肿自消。血气充则经水自调。彼以为缓。用峻剂先通月经。果腹疼泄不止。遍身浮肿。饮食少。没于木旺之月。

一人年逾三十。小腹胀硬。逾年成疮。头破时出血水。此七情所伤。营气逆于肉理

也。

流注。诊之肝脉涩。盖肝病脉不宜涩。小腹正属肝经。须涩属金。脉退乃可。予欲以甘温之药补其气血。令自消溃。彼不信。乃服攻伐之药。气血愈虚。果没于金旺之月。（此凭脉也（丹溪曰。诸经惟少阳厥阴二经痈疽。宜预防之。以其多气少血也。少血则肌肉难长。

疮久不敛。必成败症。若不知此。辄用峻利之药。以攻伐其阴分之血。祸不旋踵。）

卷三

悬痈一百三

肿或发热者。清肝解毒。（小柴胡、制甘草。）

肿痛者。解毒为主。（制甘草。）不作脓或不溃者。气血虚也。（八珍汤。）肿痛小便赤滞者。肝经湿热也。宜分利清肝。（龙胆泄肝汤。）

一人谷道前患毒。痛寒热。此肝经湿热所致。名曰悬痈。属阴虚。先以制甘草（百二服。顿退。再以四物加车前、青皮、甘草节、酒制黄柏、知母。数服而消。（此凭症也。）

一人年逾五十。患悬痈。脓清脉弱。此不慎酒色。湿热壅滞而然。脓清脉弱。老年值此以收敛。况谷道前为任脉发原之地。肝经宗筋之所。予辞。果歿。治此痈惟涧水制甘草有效。已破者。兼十全大补汤（十三）为要。

一人患此。

痛发寒热。以小柴胡汤加制甘草（百二七）二剂少退。又制甘草四剂而消。

（按小柴胡清肝。制甘草解毒。）

大抵此症属阴虚。故不足之人多患之。寒凉之剂。不可过用。恐伤胃气。惟制甘草一药。不损气血。不动脏腑。其功甚捷。

一人肿痛。小便赤涩。以加减龙胆泻肝汤。加制甘草二剂。少愈。以参、归、术、知母、制甘草。四剂（百二七）而溃。更以四物加黄柏、知母、参、制甘草而痊。（按此先泻后补。当时以有所据。但不知其脉耳。）

一人肿痛未作脓。以加减龙胆泻肝汤二剂。少愈。再以四物加黄柏、知母、木通、四剂消。（按此先治湿热后养血。）

一人脓熟不溃。胀痛。小便不利。急针之。尿脓皆利。以小柴胡加黄柏、白芷金银花、四剂痛止。以托里消毒散数剂而愈。

常见患者多不肯针。待其自破。殊不知紧要之地有脓。宜急针之。使毒外发。不致内溃曰宜开户以逐之。凡疮若不针烙。毒瓦斯无从解。脓瘀无从泄。今之患者。反谓紧要之处。不宜用针。何相违之远耶。

一人脓清不敛。内有一核。以十全大补汤加青皮、柴胡、制甘草。更以豆豉饼灸。核消而敛。（此凭症也。）

一人久而不敛。脉大无力。以十全大补加五味、麦门。灸以豆豉饼。月余而愈。（此凭症凭脉也。）

一老年余而不敛。诊脉尚有湿热。以龙胆泻肝汤（六七）二剂。湿退。以托里药及豆豉饼灸而愈。（此凭症凭脉也。）

一人肿痛发热。以小柴胡加黄连、青皮（五）。四剂少愈。更以龙胆泻肝汤（六七）而消。

（此凭症也。）

一人脓熟不溃。脉数无力。此气血俱虚也。宜滋阴益气血之药。更针之。使脓毒外泄。彼反用败毒药。致元气愈虚。疮势愈盛。后溃不敛。竟致不救。（按此不凭脉症而误治也。）

悬痈原系肝肾二经阴虚。须一于补。尤恐不治。况脓成而又克伐。不死何待。常治初起肿痛。或小便赤涩。

先以制甘草一二剂。及蒜灸。更饮龙胆泻肝汤。若发热肿痛者。以小柴胡加车前、黄柏、归。脓已成。即针之。已溃用八珍汤（十四）。加制甘草、柴胡稍、酒炒黄柏、知母。小便涩而脉有力者。仍用龙胆泻肝汤。加制甘草。小便涩而脉无力者。用清心莲子饮。加制甘草。脓清不敛者。用大补剂。间以豆豉饼灸。或久而不敛者。亦用附子饼灸。并效。

卷三

囊痈一百四

肿痛未作脓者。疏肝导湿。

肿硬发热。清肝降火。

脓清不敛者。大补气血。

已溃者。滋阴托里。

脓成胀痛者。急针之。更饮消毒之剂。

囊痈。湿热下注也。有作脓者。此浊气顺下。将流入渗道。因阴道或亏。水道不利而然。脓尽自安。不药可也。

惟在善于调摄耳。又有因腹肿。渐流入囊。肿甚而囊自裂开。睾丸悬挂水出。以麝炭（杉木炭也）末敷外。以紫苏叶包裹。仰卧养之。

精要谓痈入囊者死。将以为属肾耶。予治数人。悉以湿热入肝经施治。而以补阴佐之。

虽脓溃皮脱。睾丸悬挂亦不死。但未知下虚年老者如何耳。

大抵此症属阴道亏。湿热不利所致。故滋阴降湿药不可缺。常治肿痛小便秘滞者。用除主。滋阴佐之。肿痛已退。便利已和者。除湿滋阴药相兼治之。欲其成脓。用托里为主。滋阴佐之。候脓成即针之。

仍用托里滋阴。若湿毒已尽者。专用托里。如脓清或多或敛迟者。用大补之剂。或附子一人囊痈。未作脓而肿痛。以加减龙胆泻肝汤二剂少愈。更以四物加木通、知母、黄柏而消。（此凭症也。）

一人脓熟作胀。致小便不利。急针。以小柴胡。加黄柏、白芷、金银花。四剂少愈。更托里消毒散数剂而消。（此凭症也。）

一弱人脓熟胀痛。大小便秘。急针之。脓出三碗许。即鼾睡。觉神思少健。但针迟。须服解毒药。亦溃尽矣。故用托里药至三十余剂始瘥。（此凭症也。）

一人年逾四十。阴囊肿痛。以热手熨之。少缓。服五苓散不应。尺脉迟软。此下虚寒邪而然。名曰阴疝。非疮毒也。治以蟠葱散（九七）少可。更服葫芦巴丸而平。

（此因脉迟为寒。脉软为虚而治。）

一人年逾三十。阴囊湿痒。茎出白物如脓。举则急痛。此肝疝也。用龙胆泻肝汤而愈。

（此因症处治）阴jing或肿。或缩。或挺。或痒。皆宜此药治之。

一人年逾五十。患此疮口不敛。诊之微有湿热。治以龙胆泻肝汤。湿热悉退。乃以托里豆豉饼灸而愈。次年复患湿热颇盛。仍用前汤四剂而退。又以滋阴药而消。若溃后虚而不补。少壮者成漏。老弱者不治。脓清作渴脉大者亦不治。（此凭脉也。）

一人年逾五十。阴囊肿痛。得热愈盛。服蟠葱散不应。肝脉数。此囊痈也。乃肝经湿热所致。脓已成。急针之。

进龙胆泄肝汤（六七）。脉症悉退。更服托里滋阴药。外敷杉木炭紫苏末。月余而愈。（此因脉处治）

一人年逾六十。阴囊溃痛不可忍。辜丸露出。服龙胆泻肝汤。敷麝炭紫苏末不应。予意气炽盛。先饮槐花酒一碗。次服前汤。少愈。更服托里加滋阴药而平。设以前药不应。加之峻剂。未有不损中气以致败也。（此因处治不效。而知为湿盛。）

一少年玉jing捷长。肿而痿。皮塌常润。磨股难行。两胁气冲上。手足卷弱。先以小柴胡连大剂。行其湿热。少加黄柏降其逆气。肿渐收。茎中有坚块未消。以青皮为君。少佐散风之药末服之。外丝瓜子汁调五倍子敷。愈。（此凭症也。）

一人囊肿状如水晶。时痛时痒。出水。小腹按之作水声。小便频数。脉迟缓。此醉后饮房。汗出遇风寒。湿毒乘聚于囊。名水疝也。先以导水丸二服。腹水已去。小便如常。再以胃苓散倍白术、茯苓。更用气针引去聚水而瘥。（此凭症脉也。）

一弱人茎根结核如大豆许。劳则肿痛。先以十全大补汤去桂。加车前、麦门、酒制黄柏母少愈。更加制甘草四剂。仍以四物、车前之类而消。又有患此痛发热。服龙胆泻肝汤二剂。制甘草四剂而溃。再用滋阴之剂而愈。或脓未成。以葱炒热敷上。冷易之。隔蒜灸赤。

可数日不消。或不溃。或溃而不敛。以十全大补加柴胡稍为主。间服制甘草而愈。若不保守。必成漏矣。（以上二条。此凭症也。）

一弱人拗中作痛。小便淋沥。此因火躁下焦。无血气不能降。而渗泄之令不行。用

四物加黄柏、知母、茯苓、牛膝、木通十余剂。痛止便利。（此凭症也。）

一人气短。拗中若疮。小便不通。用四物加参、煎吞滋肾丸而愈。（此凭症也。）

前症以虚为本。以病为末。益其本则末自去。设若不固元气。专攻其病。宁无害耶。

一人遗精。劳苦愈盛。拗中结核。服清心莲子饮、连翘消毒散不应。予以八珍汤（十四）

药、山茱萸、远志十余剂渐愈。更服茯兔丸遂不复作。又有患此。诸药不应。服八味丸而愈。（此因处治不应。故推求另为之治。）

一人尿血。阴jing作痛。服清心莲子饮不应。服八正散愈盛。予以发灰醋汤调服少愈。更服斑龙丸（百二）而平。（此因处治不应以推求也。）

一人患而久不敛。以十全大补加五味、麦门。灸以豆豉饼。月余而平。（此凭症也。）

一弱人肿痛未成脓。小便赤涩。以制甘草、青皮、木通、黄柏、当归、麦门。四剂少愈。以清心莲子饮四剂而消。（此凭症也。）

一人肿痛甚。小便涩。发热脉数。以龙胆泻肝汤倍车前、木通、泽泻、茯苓。势去半以前汤加黄柏、金银花四剂。又减二三。便利如常。唯一处不消。此欲成脓。再用前汤加金银花、皂角针、白芷六剂。微肿痛。脉滑数。乃脓已成。针之。肿痛悉退。投滋阴托里药。

及紫苏末敷之而愈。

一人病势已甚。脉洪大可畏。用前汤二剂。肿少退。以仙方活命饮二剂。痛少止。脉洪脓已成。须针之。否则阴囊皆溃。彼不信。更他医。果大溃。辜丸挂。复求治。脉将静。以八珍汤加黄、黄柏、知母、山枝。更敷紫苏末。数日而痊。

一人患此。肿痛发热。以小柴胡加黄连、青皮。四剂少愈。更以龙胆泄肝汤而消。（凡肿属湿痛属热。故痛者宜清湿热。）

一儿生三月。病热。左右胁下节次生疔。用四物汤败毒散倍人参。香附为佐犀角为使饮乳母两月。而愈。逾三月腹胀生丹疹。又半月移胀入囊为肿。黄莹裂开。两丸显露水出。以紫苏叶盛麝炭末托之。

旬余而合。此因父病症遗热于胎也。（此凭症也。）

一人玉jīng肿痛。服五苓散等药不应。其脉左关弦数。此肝经积热而成。以小柴胡（五）送芦荟丸。一服势去三四。再服顿愈。（此凭脉凭症也。）

一人连日饮酒。阴挺并囊湿痒。服滋阴等药不应。予谓前阴肝脉络也。阴气从挺而出。

湿。继以酒。为温热合于下焦而然。经曰。下焦如渫。又云在下者引而竭之。遂以龙胆泻肝汤。及清震汤而愈。此或不应。宜补肝汤及四生散治之。（此凭症也。）

一妇隐内脓水淋漓。或痒或痛。状如虫行。少阴脉滑数。此阴中有疮也。名曰。由心郁。胃气虚弱。气血凝滞所致。与升麻、白芷、黄连、木通、当归、川芎、白术、茯苓、柴胡煎服。以拓肿汤熏洗。更搽蒲黄、水银。两月余而愈。此条因脉而知疮。其曰胃气虚者。

当时必有见也。或有包络虚。风邪乘阴。血气相抟。令气痞涩。致阴肿痛。治以菖蒲散。（一百）更以枳实炒热。帛包熨之。冷则再炒。

或有子脏虚。冷气下冲。致阴脱出。谓之下脱。或因产努力而脱者。宜当归散。久不愈者。补中益气汤。倍加升麻柴胡举之。

卷三

下疳一百五

肿痛或发热者。肝经湿热也。清肝除湿。

肿痛发寒热者。邪气伤表也。发散之。

肿痛小便赤涩者。肝经湿热壅滞也。疏肝导湿。

一人患此肿硬。痛寒热。先以人参败毒散二剂而止。更以小柴胡加黄连青皮而愈。（此因症因经也。）

一人溃而肿痛。小便赤涩。以加减龙胆泻肝汤加青皮、黄连二剂少愈。以小柴胡加黄柏、知母、当归、茯苓数剂而愈。（此因症因经也。）

一人茎肿不消。一人溃而肿痛。发热。小便秘涩。日晡或热。一小儿肿痛。诸药不

应。

各以小柴胡吞芦荟丸数剂并愈。

一人阴jing或肿。或作痛。或挺纵不收。一人茎中作痛。筋急缩。或作痒。白物如精。随溺而下。此筋疝也。并用龙胆泻肝汤皆愈。（此因症也。）

张子和曰。遗精癰闭。阴痿瘰癧。精滑白淫。皆男子之疝。不可妄归之肾冷。若月涸。

。月罢。腰膝上热。足热。噤干。癰闭。少腹有块。或定或移。前阴突出。后阴痔核。皆女子之疝也。但女子不谓之疝。而谓之瘕。

一人溃而肿痛。发热。日晡尤甚。以小柴胡加黄柏、知母、当归而愈。（此因症也。）

一人已愈。惟茎中一块不散。以小柴胡加青皮、荆防治之。更以荆、防、牛膝、何首乌、活石、甘草各五钱。煎汤熏洗。各数剂而消。（此因症也。）

一人年逾四十。素有淋。患疳疮。

痛倦怠。用小柴胡（五）加连、柏、青皮、当归而愈。（此因症而治。）

一人因劳。茎窍作痒。时出白物。发热口干。以清心莲子饮而安。（此因劳处治。）

一人玉jing肿痛。小便如淋。自汗甚苦。时或尿血少许。尺脉洪滑。按之则涩。先用清心莲子饮。加牛膝、山枝、黄柏、知母数剂少愈。更以滋肾丸一剂而痊。（此因症也。）

前贤云。如自汗。小便少。不可以药利之。既已自汗。则津液外亡。小便自少。若利之卫涸竭。无以制火。烦热。愈甚。当俟热退汗止。小便自行也。兼此乃阳明经。大忌利小便一老患疳疮。小便淋漓。脉细体倦。此气虚兼湿热也。用清心莲子饮。及补中益气汤（而愈。下疳疮。丹溪用青黛、蛤粉、密陀僧、黄连为末。敷。又以鸡肫皮烧存性。为末。敷。

下疳疮并疮 蛤粉 蜡茶 苦参 密陀僧为末。河水洗净。腊猪油调敷。

又方

米泔水洗疮净。用头发盐水洗去油净。再用清汤洗。晒干。烧灰。敷疮即生靨又方

治下注疳疮。蚀臭腐烂。疼痛难忍。兼治小儿疳疮。

黄柏（蜜炙） 黄丹（三分） 轻粉（钱半） 乳香（三分） 密陀僧 高末茶（各三分）
麝香（少许）

上末。用葱汤洗疮。次贴此药。

洗药 黄连 黄柏 当归 白芷 独活 防风 荆芥 朴硝等分。水煎。入钱五十文。

乌梅五个。盐一匙同煎。温洗。日五七次。敷下项药。

敷药 木香 槟榔 黄连 铜青 轻粉 枯矾 海螵硝 麝香等分为末。洗后至夜敷上。

卷四

便毒一百六

内蕴热毒寒邪者。解散之。劳役而患者。补之。

不遂交感。或强固精气致败而结者。解散之。

湿热而致者。清肝导湿。

一人患此未作脓。小便秘涩。以八正散三剂少愈。以小柴胡加泽泻、山枝、木通。二剂而消。（此凭症也。）

一老妇肿痛。脓未作。小便滞。肝脉数。以加减小柴胡汤加山枝、黄柏。四剂而消。

（此因症也。）

一人肿痛发寒热。以荆防败毒散二剂而止。以双解散二剂而消。（此因寒热认作外邪处一人脓未成大痛。服消毒托里内疏药不应。脉洪大。毒尚在。以仙方活命饮一剂痛止。

又剂而消。（此因治不应而处也。）

一人肿痛。日晡发热。以小柴胡加青皮、天花粉四剂。痛止。热退。以神效栝蒌散四剂而消。（此因症也）

一人肿作痛。大小便秘。脉有力。以玉烛散二剂顿退。更以龙胆泻肝汤四剂而消。（此因症因脉而治。）

一人溃而痛不止。诸药不应。诊之脉大。按之则数。乃毒未解也。以仙方活命饮而止。

又二剂而消。（此因症因脉而治。）

一人溃而痛不止。以小柴胡加黄柏、知母、芎、归四剂少止。更以托里当归汤数剂而敛。（此因症也。）

一人服克伐药以求内消。致泻利少食。以二神丸先止其泻。以十全大补倍加白术、

茯苓。数剂而消。（此因症也。）

大抵此症多患于劳役之人。亦有内蕴热毒而生者。须辨虚实及脓成否。不可妄投药餌。

治此概用大黄之类下之。以求内消。或脓成。令脓从大便出。鲜有见其痊者。人多欲内消者。恐收之难也。若补养气血。不旬日而收矣。若脓既成。岂有可消之理。再用克伐之剂。反一人不慎房劳。患此肿痛。以双解散二服。其病即止。更以补中汤数剂而脓成针之。以八珍汤加五味、麦门、柴胡三十余剂。（此因症也）

大抵便毒者血疔也。俗呼为便毒。言于不便处患之故也。乃足厥阴肝经络及冲任督脉。

肝之旁络也。是气血流通之道路。今壅而肿痛。此则热毒所致。宜先疏导其滞。更用托里之剂。此临症制宜也。

一人年逾四十。患便毒克伐太过。饮食少思。大便不实。遗精脉微。东垣云。精滑不禁便自利。腰脚沉重。下虚也。仲景曰。微弱之脉。主气血俱虚。先以六君子（二）加破故纸、肉豆蔻煎服。泄止食进。更以十全大补汤（十三）加行经药十余剂而消。（此因脉虚也）

一人患便毒。脓稀脉弱。以十全大补汤。加五味、麦门、白朮三十剂稍愈。更以参归而平。因新婚复发。聚肿坚硬。四肢冷。脉弱皮寒。饮食少思。此虚极也。仍用前药加桂、附。三剂稍可。彼欲速愈。自用连翘消毒散。泄利不止而歿。（此因症脉也）

一人年逾四十。素劳苦。患便毒发寒热。先以小柴胡加青皮一服。表症悉退。次以补中汤加穿山甲二剂。肿去三四。更以托里之药五六服。脓成刺去。旬日而敛。（此因症也。）夫便毒足厥阴湿气。因劳倦而发。用射干三寸同生姜煎。食前服。得利一二行。效。射干紫花者是。红花者非。又方。破故纸牛蒡子（微炒）牵牛（炒）大黄（酒拌煨）等分末之。每服一两。

酒调下。

又方 已成脓者。大黄连翘（各五钱）枳实（三钱）浓朴甘草节（各二钱）桃仁（二十一粒）姜三片。分三贴。煎服。

消毒饮 便毒初发。三四日可消。

皂角刺 金银花 防风 当归 大黄 甘草节
栝水酒各半煎。食前温服。仍频提掣顶中发。立效。

又方 白僵蚕、槐花为末。酒调服。一方。加酒大黄。

又方 木鳖子 大黄 栝蒌 桃仁 草龙胆 咀。浓煎。露一宿。清晨温服。立愈。

又方 山梔 大黄 乳香 没药 当归（各半钱）

栝蒌仁（二钱） 代赭石（一钱） 上作一服。煎。

一人肿而不溃。以参、归、术、白芷、皂角针、柴胡、甘草节数剂而溃。以八珍汤加柴胡数剂愈。（此因症也。）

一人溃而肿不消且不敛。诊之脉浮而涩。以豆豉灸。（四三）更以十全大补汤（十三）月余而愈。（此因症也）

卷四

乳痈一百七

（附乳岩 无乳并男子乳痈）

暴怒或儿口气所吹痛肿者。疏肝行气。

肿 痛甚者。清肝消毒。

痛发寒热者。发散表邪。

未成脓者。疏肝行气。

不作脓或不溃。托里为主。

溃而不敛。或脓清者。大补气血。

一妇稟实性躁。怀抱久郁。左乳内结一核不消。按之微痛。以连翘饮子（二百六四）二十剂少退。更以八珍汤（十四）加青皮、桔梗、香附、贝母。二十余剂而消。（此因症因情也。）

一妇发热作渴。至夜尤甚。两乳忽肿。服败毒药热反炽。诊之肝脉洪数。乃热入血室。

以加味小柴胡治之。热止肿消。（此因症因脉也。）

一妇两乳内时常作痛。口内常辣。卧起若急。脐下牵痛。以小柴胡加青皮、黄连、山梔而愈。（此因症也。）

一妇郁久。左乳内结核如杏许。三月不消。心脉涩。脾脉大。按之无力。以八珍汤（十贝母、远志、香附、柴胡、青皮、桔梗五十余剂而溃。又三十余剂而愈。（此因情因脉也。）

一妇久郁。右乳内结三核。年余不消。朝寒暮热。饮食不甘。此乳岩也。乃七情所伤。

血气枯槁之症。宜补气血。解郁结。遂以益气养荣汤（二百二一）百余剂。血气渐复。更以木香饼灸之。嘉其谨疾而消。（此因症因情也。）

一妇脓成不溃。胀痛。予欲针之。令毒不侵展。不从。又数日。痛极始针。涌出败脓三四碗。虚症蜂起几殆。用大补药两月余始安。（此因症也。）

夫乳者。有囊橐。有脓不针。则遍患诸囊矣。少壮者得以收敛。老弱者多致不救。

一妇肿而不作脓。以益气养荣汤加香附、青皮、数剂脓成。针之。旬日而愈。（此因症一妇右乳肿。发热。怠惰嗜卧。无气以动。致夜热尤甚。以补中益气汤兼逍遥散而痊。

（此因症也）

一产妇因乳少。服药通之。致乳房肿胀。发热作渴。状若伤寒。以玉露散补之而愈。

夫乳汁乃气血行化。在上为乳。在下为经。若冲任脉盛。脾胃气壮。则乳汁多而浓。血衰则少而淡。所乳之子亦弱而多病。此自然之理也。亦有屡产有乳。再产乳无。或大便涩滞。乃亡津液也。三因论云。产妇乳脉不行有二。有气血盛闭而不行者。有血气弱涩而不行者。虚当补之。盛当疏之。盛者当用通草、漏芦、土瓜根辈。虚者当用炼成钟乳粉、猪蹄、鲫鱼之类。概可见矣。亦有乳出不止者。多属于虚不约束也。

一妇乳痈。愈后发热。服养气血药不应。八珍汤加炮姜四剂而愈。仍以前汤加黄香附三十余剂而安。（此因症也。）

一妇患此。脓成畏针。病势渐盛。乃强针之。脓出三碗许。脉数发渴。以大补药三十余剂而愈。（此因症也。）

一妇乳痈脓成。针刺之及时。不月而愈。

一妇产次子而无乳。服下乳药但作胀。予谓乳皆气血所化。今胀而无乳。是气血竭而津也。当补气血。自有乳矣。与八珍汤倍加参、术、少加肉桂。二十余剂乳遂生。后因劳役复竭。（此因症也。）

盖初产有乳。再产而无。其气血只给一产耳。其衰可知。闻有产后乳出不止。亦为气虚补药止之。其或断乳。儿不吮。亦能作胀。用麦芽炒为末。白汤调服以散之。若儿吮破ru头成疮。用蒲公英末。或黄连、胡粉散掺之。若ru头裂破。以丁香末。或蛤粉、胭脂末敷之。

一妇因怒。两乳肿兼头痛寒热。以人参败毒散二剂。表症已退。以小柴胡（五）加芎、归、桔梗、枳壳。四剂而痊。（此因症也。）

一妇郁久。右乳内肿硬。以八珍汤加远志、贝母、柴胡、青皮。及隔蒜灸、兼服神效栝蒌散。（五三）两月余而消。（此因情因症也。）

一妇左乳内肿如桃许。不痛。色不变。发热。渐消瘦。以八珍汤（十四）加香附、远志、青皮、柴胡百余剂。又间服神效栝蒌散（五三）三十余剂。脓溃而愈。（此因症也。）

患者或责效大速。或不戒七情。俱难治。大抵四十以后者尤难治。盖因阴血日虚也。况医用药不分经络虚实。未有能保痊也。

一妇乳内肿一块如鸡子大。劳则作痛。久而不消。服托里药不应。此乳劳症也。肝经血致。先与神效栝蒌散四剂。更隔蒜灸。肿少退。再服八珍汤。倍加香附、夏枯草、蒲公英。

仍间服前散。月余而消。（此因症因治而处也。）

又有乳疽一症。肿硬木闷。虽破而不溃。肿亦不消。尤当急服此散及隔蒜灸。此二症乃七情所伤。气血所损。亦劳症也。宜戒怒。节饮食。慎起居。否则不治。

一妇年逾二十。稟弱。乳内作痛。头疼脉浮。与人参败毒散倍加参一剂。表症悉退。但少思。日晡微热。更以小柴胡合六君子二剂。热退食进。方以托里药加柴胡十余剂。针出脓而愈。（此因稟受、因症、因脉也。）

一妇亦患此。予谓须多服养气血解郁结药。可保无害。不信。乃服克伐之剂。反大如碗。日出清脓。不敛而歿。（此误治也。）

一妇郁久。乳内结核。年余不散。日晡微热。饮食少思。治以益气养荣汤嫌缓。乃服行气之剂。势愈甚。溃而日出清脓不止。复求治。诊之脉洪而数。辞不治。又年余果歿。

一人年逾五十。患子不立。致左乳肿痛。左肋胀痛。肝脉弦数而涩。先以龙荟丸二服。

顿退。又以小柴胡对四物加青皮、贝母、远志数剂。脓成。予欲针之。仍用养气血解郁结。

不从。乃杂用流气败毒之剂。致便秘发热作渴。复求治。予谓脓成不溃。阳气虚不能鼓舞也。（此因情因脉也。）

一外家。放出宫人。年四十。左乳内结一核。坚硬。按之微痛。脉弱懒言。此郁结症也。

乳岩。须服解郁结益气血药百贴可保。彼不为然。服十宣散、流气饮。疮反盛。逾二年复请予视。其形如覆碗。肿硬如石。脓出如泔。予曰脓清脉大。寒热发渴。治之无功。果歿。（此因情因脉因症而处治。）

一妇因怒。左乳内肿痛。发热。表散太过。致热益甚。以益气养荣汤数剂。热止脓成。

痛。针之不从。遂肿胀。大热发渴始针。脓大泄。仍以前汤百余帖始愈。（此因误治也。）

一妇因怒。左乳作痛。胸膈不利。以方脉流气饮加木香青皮四剂而安。（此因情也）

一男子左乳肿硬痛甚。以仙方活命饮二剂。更以十宣散加青皮、香附四剂。脓成针之而若脓成未破。疮头有薄皮剥起者。用代针之剂点皮起处。以膏药覆之。脓亦自出。不若及时之。不致大溃。如出不利。更搜脓化毒之药。若脓血未尽。辄用生肌

之药。反助邪气。纵早合。必再发。不可不慎。

一人因怒。左乳肿痛。肝脉弦数。以复元通气散二服少愈。以小柴胡加青皮、芎、归而消。（此因情因脉也。）

一妇年逾三十。每怒后乳内作痛。或肿。此肝火也。与小柴胡合四物汤。加青皮、桔梗壳、香附而愈。彼欲绝去病根。自服流气饮。遂致朝寒暮热。益加肿痛。此气血被损而然。

予与八珍汤三十余剂。赖其年壮。元气易复。得愈。

一治妇人两乳间出黑头疮。疮顶陷下。作黑眼子。脉弦洪。按之细小。并乳痈初起亦治升麻 葛根 连翘（各钱半） 黄 归身 甘草（炙各一钱） 肉桂（三分） 黄柏（二分）

粘子（半钱） 锉。作一服。水二分。酒一分。同煎。食后服。此足阳明厥阴药。（此因症也一后生作劳风寒。夜发热。左乳痛。有核如掌。脉细涩而数。此阴滞于阳也。询之已得遂以栝蒌子。石膏干葛、川芎、白芷、蜂房、生姜同研。入酒饮之。四贴而安。（此因症因ru头厥阴所经。乳房阳明所属。厥阴者肝也。乃女子致命之地。宗筋之所。且各有囊橐。其始肿虽盛受患止于一二橐。若脓成不刺。攻溃诸囊矣。壮者犹可。弱者多致不救。所以必针而后愈。皂用蒲公英、忍冬藤入少酒。煎服。即欲睡。是其功也。及觉而病安矣。未溃以青皮、栝蒌、桃仁、连翘、川芎、橘叶、皂角刺、甘草节。随症加减。煎服。已溃以参、芎、归、白芍、青皮、连翘、栝蒌、甘草节、煎服。

一妇乳痈。气血颇实。但疮口不合。百法不应。与神效栝蒌散四剂少可。更与数剂。及豆豉饼灸而愈。（此因人因治而处也。）

又有患此未溃。亦与此散三剂而消。良甫云。如有乳劳。便服此药。可杜绝病根。如毒已成。能化脓为水。毒未成者。从大小便中散矣。

一妇乳痈。寒热头痛。与荆防败毒散一剂。更与蒲公英一握。入酒二三盏。再捣。取酒热服。渣热罨患处而消。此因头痛发热。乃表症也。故用表散。

蒲公英俗呼孛孛丁。夏秋间开黄花似菊。散热毒。消肿核。散滞气。解金石毒圣药。乳因乳母不知调养所致。或忿怒所逆。郁闷所遏。浓味所酿。以致厥阴之气不行。故窍闭而汁不通。阳明之血沸腾。故热甚而化脓。或因乳子膈有滞痰。含乳而睡。口气热所吹而成结核。初便忍痛揉软。吮令汁透可散。否则结成矣。治以青皮疏厥阴之滞。石膏清阳明之热。

生甘草节行污浊之血。栝蒌子导毒消肿。或加没药。青橘叶、皂角刺、金银花、当归。或汤或散。佐以少酒。若加艾火两三壮于痛处。尤妙。粗工使用针刀。必惹崛病。（机按前条用针。以已成脓言。此条禁针。以未成脓言。未成脓而针则伤良肉。反增疮势。已成脓不针。）

则脓蚀良肉。延溃无休。其意各有在也。）

一妇形脉稍实。性躁。难于后姑。乳生隐核。以单味青皮汤间以加减四物汤。加行经络之剂。两月而安。（此因情也。）

卷四

腹痛一百八

一人年逾三十。腹患痈肿。脉数喜冷。齐氏曰。疮疡肿起。坚硬者实也。河间曰。肿硬。烦躁饮冷。邪在内也。用清凉饮（十二）倍大黄三剂。稍缓。次以四物汤加芩、连、山栀、木通四剂而溃。更以十宣散（四）去参、桂。加金银花、天花粉。彼欲速效。自服温补药。肚腹遂肿小便不利。仍用清凉饮。脓溃数碗。再以托里药治之而愈。（此因症因脉处治一人腹痛。烦躁作呕。脉实。河间曰。疮疡属火。须分内外以治其本。又云呕哕心肿硬瞽闷。或皮肉不变。脉沉而实。毒在内也。当疏其内以绝其源。用内疏黄连汤。（三）利二三行。诸症悉去。更以连翘消毒散而愈。（此据脉症而治。）

一人腹痛。脓熟开迟。脉微细。脓出后。疮口微脓如蟹吐沫。此内溃透膜也。疮疡透膜。十无一生。虽用大补。亦不能救。此可为待脓自出之戒也。（此据症也。）

一恭人腹内一块。不时作痛。痛则不知人事。良久方苏。诸药不应。其脉沉细。非疮也。间云。失笑散（百九）治疝气及妇人血气痛欲死。并效。与一服。痛去六七。再服而平。此药治产后心腹绞痛及儿枕痛。尤妙。（按此凭脉处治。）

一儿十岁。腹胀痛。服消导药不应。彼以为毒。其脉右关沉伏。此食积也。河间云。食吐。胃脘痛也。更兼身体痛难移。腹胀善噫。舌本强。得后与气快然衰。皆脾病也。审之。

因食粽得此。以白酒曲热酒服而愈。（按此凭脉凭症而治也。）

一人素嗜酒色。小腹患毒。脉弱微痛。欲求内消。予谓当助胃壮气。兼行经活血佐之可消欲速效。自用败毒等药。势果盛。疮不溃脓。饮食少思。两月余复请诊。脉愈弱。盗汗不止。

聚肿不溃。肌寒肉冷。自汗色脱。此气血俱虚。故不能发肿成脓。以十全大补汤（十三）三十余剂。脓成针之。反加烦躁。脉大。此亡阳也。以圣愈汤（十七）二剂。仍以前汤百剂而愈。

（此凭脉症处治。）

卷四

疔疮一百九

脉浮数者。散之。

脉沉实者。下之。

表里俱实者。解表攻里。

麻木大痛或不痛者并灸之。更兼攻毒。

疔疮。以其疮形如丁盖之状也。多因肥甘过度。不慎房酒。以致邪毒蓄结。遂生疔疮。经膏粱之变。足生大丁是也。亦有人汗滴入食肉而生。亦有误食死牛马而生。不可不慎。初生头凹肿痛。青黄赤黑。无复定色。便令烦躁闷乱。或增寒头痛。或呕吐心逆者是也。急于艾炷灸之。若不觉痛。针疮四边。皆令血出。以回疮錠子从疮孔之。贴以膏药。仍服五香连翘汤、漏芦汤等疏下之为效。若针之不痛无血者。以猛火烧铁针通赤。于疮上烙之。令如炭。取痛为效。亦前錠子贴以膏药。经一二日脓溃根出。服托里汤散。根据常疗之。如针不痛。其人眼黑。或见火光者。不可治。此毒已入脏腑也。

一人足患作痒。恶寒呕吐。时发昏乱。脉浮数。明灸二十余壮始痛。以夺命丹一服。肿起。更以荆防败毒散而愈。

一人左手臂患之。是日一臂麻木。次日半体皆然。神思昏溃。遂明灸二十余壮。始不痛。至百壮始痛。以夺命丹一服始肿起。更用神异膏及荆防败毒散而愈。（此凭症也。）

一妇忽恶寒作呕。肩臂麻木。手心瘙痒。遂瞽闷不自知其故。但手有一泡。此疔毒也。

急灸患处五十余壮而苏。又五十余壮知痛。投荆防败毒散而愈。（此因恶寒。故用发表。）

一人脚面生疔。形虽如粟。其毒甚大。宜峻利之药攻之。因其怯弱。以隔蒜灸五十余止再灸。片时知痛。更贴膏药。再以人参败毒散一服渐愈。至阴之下。道远位僻。药力难达。若用峻剂。则药力未到。胃气先伤。不如灸之为宜。（此据形症而治。）

一人感痘毒。面生疔十余枚。肿痛脉数。服荆防败毒散稍愈。尚可畏。更用夺命丹（百二四）一服而愈。（此凭脉症而治。）

一妇六十。右耳下天容穴间一疔。其头黑靥。四边泡起。黄水时流。浑身麻木。发热谵语时时昏沉。六脉浮洪。用乌金散汗之。就用铍针刺。疮心不痛。周遭再刺十余下。紫黑血出。方知疼痛。即将寸金錠子入疮内。外用提疔錠子放疮上。膏日贴护。次日汗后。精神微爽。却用破棺丹下之。病即定。其疔溃动后。用守效散贴涂。红玉錠子之。八日疔出。兹所谓审脉症汗下之间。外治次第如此殊胜。不察脉症。但见发热谵语。便投下药。或兼香窜之药。遂致误人远矣。

世人多云。是疮不是疮。且服五香、连翘汤。然或中或否。致误者多。盖不审形气虚实毒浅深。发表攻里。所因不同故也。此既善于驱逐。又以五般香窜佐之。与漏芦汤相间。大黄为佐。大黄入阳明、太阳。性走不守。泄诸实热。以其峻捷。故号将军。虽各有参、漏芦、甘草之补药。宁免驱逐之祸乎。

一人胸患遍身麻木。脉数而实。急针出恶血。更明灸数壮始痛。服防风通圣散得利而愈。（此凭脉症而治。）

一夫人面生疔。肿痛甚。数日不溃。脉症俱实。治以荆防败毒散加芩连稍愈。彼以为乃服托里散一剂。势盛痛极。始悟。再用凉膈散（二六）二剂。痛减肿溃。又与连翘消毒散（二六）十余剂而愈。（此凭脉症也。）

一人唇生疔疮已五日。肿硬脉数。烦躁喜冷。此胃经积热所致。先以凉膈散（二六）一服。热去五六。更与夺命丹（百二四）二粒。肿退二三。再以荆防败毒散四剂而愈。

（按此先攻里。因其脉症而施。后发表。不言脉症。当时必有所见。）

一人患之。发热烦躁。脉实。以清凉饮下之而愈。（此凭脉症而治。）

一郑氏举家生疔。多在四肢。皆食死牛肉所致。刺去恶血。更服紫金錠（百二十二）悉愈。

一人唇下生疔。脉症俱实。法宜下之。反用托里。故口鼻流脓而死。是谓实实之祸。

也。

一老妇足大指患疔甚痛。令灸之。彼不从。专服败毒药。致真气虚而邪气愈实。竟不救盖败。毒药须能表散疮毒。然而感有表里。所发有轻重。体段有上下。所禀有虚实。岂可一概而用之耶。

且至阴之下。药力难到。专假药力则缓不及事。不若灸之为速。故下部患疮。皆宜隔蒜。不痛者宜明灸之。及针疔四畔去恶血。以夺命丹一粒入疮头孔内。仍以膏药贴之。若患在手足。红系攻心腹者。就于系尽处刺去恶血。宜服荆防败毒散。若系近心腹者。宜挑破疮头去恶水。亦以膏药贴之。如麻木者服夺命丹。如牙关紧急。或喉内患者。并宜噙一二丸。

疔疮丹溪用磁石为末。苦酒和封之。根即出。

又方巴豆十粒。半夏一大颗。附子半个。蜣螂一枚。各为末。用麝香和。看疮大。小以纸绳子围疮口。以药泥上。用帛贴敷。时换新药。以瘥为度。活人甚多。

卷四

痔漏一百十

（附便血脱肛）

大便秘涩或作痛者。滋躁除湿。

下坠肿痛或作痒者。祛风胜湿。

肛门下坠或作痛。泻火导湿。

肿痛小便秘涩者。清肝导湿。

一人患痔。大便燥结。痛作渴。脉数。按之则实。以秦艽、苍术汤一剂少愈。更以四物加芩、连槐花、枳壳四剂而愈。

一人素不慎酒色。患痔痛。肛门坠痛。兼下血。大便干燥。脉洪。按之则涩。以当归、郁李仁汤加桃仁。四剂少愈。更以四物加红花、桃仁、条芩、槐花。数剂而愈。

大抵醉饱入房则经脉横。解则精气脱泄。脉络一虚。酒食之毒乘虚流注。或淫极强

固。

精气遂传大肠。以致木乘火势而毁金。或食浓味过多。必成斯疾。

夫受病者燥湿也。为病者湿热也。宜以泻火和血润躁疏风之剂治之。若破而不愈。即成。有串臀者。有串阴者。有串阳者。有秽从疮口出者。形虽不同。治法颇似。其肠头肿成块者湿热也。作痛者风也。大便燥结者火也。溃而为脓者热盛血也。当各推其所因而治之。

一人患痔成漏。登侧则痛。以秦艽防风汤加条芩、枳壳。四剂而愈。以四物加升麻、芩、连、荆、防不复作。

一人患痔漏。登侧则肛门下脱作痛。良久方收。以秦艽防风汤数剂少愈。乃去大黄加黄芩、川芎、芍药而痛止。更以补中益气汤二十余剂。后不再脱。

一妇患痔漏

痛甚。以四物加芩、连、红花、桃仁、牡丹皮。四剂少止。又数剂而愈。

一人便血。春间尤甚。兼腹痛。以和血除湿汤而愈。

一人素有湿热。便血。治以槐花散而愈。

一人粪后下血。诸药久而不愈。甚危。诊之乃湿热。用黄连丸二服顿止。数服而痊。

一妇素患痔漏而安。因热则下血数滴。以四物加黄连治之而愈。后因大劳疮肿痛。经水。脉洪大。按之无力。此劳伤血气火动而然也。用八珍加黄芩、连、蒲二剂而止。后去蒲、黄、芩、连、加地骨皮数剂而安。

丹溪曰。妇人崩中者。由脏腑伤损。冲任二脉血气俱虚故也。二脉为经脉之海。血气之外循经络。内营脏腑。若气血调适。经下根据时。若劳动过极。脏腑俱伤。冲任之气虚。不能约制其经血。故忽然而下。谓之崩中暴下。治宜大补气血之药。举养脾胃。微加镇坠心火之药治其心。补阴泻阳。经自止矣。

一人因饮法酒。肛门肿痛。便秘脉实。用黄连内疏汤而愈。

一人便血。过劳益甚。饮食无味。以六君子加黄、地黄、地榆而愈。

一人粪后下血久不愈。中气不足。以补中益气汤数剂。更以黄连丸数服。血止。又

服前汤月余。不再作。

一人脏毒下血。服凉血败毒药。不惟血不止。且饮食少思。肢体愈倦。脉数。按之则涩以补中益气汤数剂。少止。更以六君子加升麻、炮姜。四剂而止。乃去炮姜加芎归。月余脾胃亦愈。常治积热。或风热下血者。先以败毒散散之。胃寒者。气弱者。用四君子或参苓白术散补之。并效。

一人脏毒下血。脾气素弱。用六君子加芎、归、枳壳、地榆、槐花而愈。后因谋事。

血复下。诸药不应。予意思虑伤脾所致。投归脾汤四剂而痊。

大抵此症所致之由不一。当究其因而治之。丹溪云。芎归汤调血之上品。热加茯苓、槐冷加茯苓、木香。此自根自本而论也。盖精气生于谷气。惟大肠下血。以胃气收功。或四君子。或参苓白术散。或枳壳散。小乌沉汤以和之。胃气一回。血自循经络矣。

肠风者。邪气外入。随感随见。脏毒者。蕴积毒久而始见。人惟坐卧。风湿。醉饱。房生冷停寒。酒面。积热。以致荣血失道。渗入大肠。此肠风藏毒之所作也。挟热下血。清而色鲜。腹中有痛。挟冷下血。浊而色黯。腹内略痛。清则为肠风。浊则脏毒。有先便而后血者。其来也远。有先血而后便者。其来也近。世俗粪前粪后之说。非也。治法先当解散肠胃之邪。热则攻毒散。冷则不换金正气散加芎归。后随其症冷热治之。河间云。起居不节。

用力过度。则络脉伤。阳络伤则血外溢而衄血。阴络伤则血内溢而便血。肠胃之络伤则血溢肠外。有寒。汁沫与血相转。则并合凝聚不得散而成积矣。经云。肠癖下脓血。脉弦绝者死。滑大者生。血溢身热者死。身凉者生。诸方皆谓风热侵于大肠而然。若饮食有节。起居有时。肠胃不虚。邪气何从而入。

一人痔漏。每登厕脱肛。良久方上。脉细而微。用补中益气汤（十六）三十余剂。遂不再丹溪曰。脱肛属气热气虚。血虚血热。气虚者补气。参、芎、归、升麻。血虚者四。（九）血热者凉血四物汤加黄柏。肺与大肠为表里。故肺脏蕴热则肛闭结。肺脏虚寒则肛脱出。○有妇人产育用力。及小儿久痢。亦致此症治宜温肺腑肠胃。久自然收矣。

人痔者。贫富男女皆有之。富者酒色财气。贫者担轻负重。饥露早行。皆心肝二血。喜心。怒则伤肝。喜怒无常。风血侵于大肠。致谷道无出路。结积成块。出血生乳。各有形用。妇人因经后伤冷。月事伤风。余血在心经。血流于大肠。小儿痢后。或母腹中受热也。治水登膏 治痔护肉郁金 白芨（各一两）一方加黄连上二味为

细末。如内痔。候登厕翻出在外。用温汤洗净。侧卧于床。用温水调令得中。

谷道四边好肉上。以纸盖药。留痔在外。良久方用枯药搽痔上。时时笔蘸。温水润之。不令药干。亦勿使四散。

好白矾（四两） 生信石（二钱五分） 朱砂（一钱生研极细）

上各研细末。先用砒入瓷泥罐。次用白矾末盖之。令烟断。其砒尽随烟去。止借砒气中耳。用矾为极细末。看痔大小。取矾末在掌中。更以朱砂少许。以唾调稀。篋挑涂痔上周遍。一日三五上。候痔颜色焦黑为效。至夜有黄水出尽为妙。至中夜上药一遍。来日依然上药三次。有小痛不妨。换药时以碗盛新水或温汤。在痔边用笔轻洗去痔上旧药。再上新药。仍用护肉膏。次用荆芥汤浇之。三两日后黄水出将尽。却于药中增朱砂减白矾。则药力缓矣。三两日方可增减。渐渐取之。庶不惊人。全在用药人看痔头转色。增减浓薄敷之。此药只借砒气。又有朱砂解之。有将此二方在京治人多效。一富人痔漏。口干。胃脉弱。此中气不足。津液短少。不能上润而然。治以黄六一汤。（三十）七味白术散。（三十一）或曰。诸痛疮疡。皆属心火。宜服苦寒以泄火。因致大便不禁而歿。

夫诸痛疮疡皆属心火。言其常也。始热终寒。则反常矣。

一妇粪后下血。面色痿黄。耳鸣嗜卧。饮食不甘。服凉血药愈甚。右关脉浮而弱。以加味四君子汤。加升麻、柴胡数剂。脾气已腥。兼黄连丸数剂而愈。

大凡下血服凉血药不应。必因中气虚不能摄血。非补中益阳之药不能愈。切忌寒凉之剂有伤湿热之食成肠癖而下脓血者。宜苦寒之剂以內疏之。脉弦绝涩者难治。滑大柔和者易治一人年五十。每至秋。脉沉涩而粪后下红。饮食少进。倦怠无力。面色痿黄。夫病每至作者。盖天令至此。肃气乃行。阳气下降。人身之阳气衰不能升举。故阴血亦顺天时而下陷矣。盖脾具坤静之德。而有干健之运。故能使心肺之阳降。肝肾之阴升。自然天地和而万物育。则无以上之症矣。其原盖因饱食筋脉横解。则脾气倦甚。不能运化精微。故食积下流于大肠之间。而阴血亦下陷矣。或欲用凉血清热之剂。予曰。不惟胃气重伤。兼又愈助降下之令。理宜用升阳益胃之剂。则阴血自循经隧矣。数十剂后不复作。

一人痔疮肿痛。便血尤甚。脉洪且涩。经曰。因而饱食。筋脉横解。肠为痔。盖风气。肝生风。风生热。风客则淫气伤精而成斯疾、与黄、黄连、当归、生、防风、枳壳、白芷、柴胡、槐花、地榆、甘草渐愈。次以黄连丸（九四）而瘥。又有便血数年。百药不应。

面色痿黄。眼花头晕。亦用黄连丸而愈。

一人患痔。脉浮鼓。午后发热作痛。以八珍汤加黄、柴胡、地骨皮稍可。彼欲速效。

以劫药蚀之。痛甚。绝食而歿。

夫疮之贵敛。气血使然也。脉浮鼓。日晡痛。此气血虚也。丹溪曰。疮口不合。补以大剂参、归、术。灸以附子饼。贴以补药膏是也。

一人年逾四十有痔漏。大便不实。服五苓散愈加泄泻。饮食少思。予谓非湿毒。乃肠胃。宜理中汤。彼不为然。仍服五苓散愈盛。复请治。以理中汤及二神丸月余而愈。（此因治而知中虚。）

一人因痔疮怯弱。以补中益气汤（十六）少加芩、连、枳壳稍愈。后因怒加甚。时仲冬脉大。予谓脉不应时。乃肾水不足。火来乘之。药不能治。果歿。火旺之月。常见患痔者肾脉不足。俱难治。

一人有痔。肛门脱出。此湿热下注。真气不能外举。其脉果虚。以四君子加芎、归、黄苍术、黄柏、升麻、柴胡治之。更以五味子煎汤熏洗。彼以为缓。乃用砒霜等毒药蚀之而歿。夫劫药特治其未耳。能伐真元。鲜不害人。戒之。

一人因痔。气血愈虚。饮食不甘。小便不禁。夜或遗精。此气虚兼湿热。非疮也。用补中益气汤（十六）加山药、山茱萸、五味子。兼还少丹（九四）治之而愈。

一人痔漏。脓出大便。诸药不应。其脉颇实。令用猪腰一个切开。用黑牛末五分线扎。

用荷叶包煨熟。空心细嚼。温温盐酒送下。数服顿退。更服托里药而愈。

卷四

鬢疽一百十一

痛或发热者。祛风清热。

痛发寒热或拘急者。发散表邪。

作脓痛者。托里消毒。

脓已成作痛者。针之。

不斂或膿清者。宜峻補。

不作膿或膿成不潰者。并用托里。

一人患此。痛作腫。發熱。以小柴胡湯加連翹、金銀花、桔梗。四劑而消。（此因症一人因怒後鬢際腫痛。發熱。以小柴胡湯加連翹、金銀花、天花粉、四劑根畔俱消。惟瘡頭作痛。以仙方活命飲二劑。痛止膿熟。針之。更以托里消毒藥而愈。（此因情也。）

一老腫痛發熱。膿清作渴。脈軟而澀。此氣血俱虛也。欲補之。彼見作渴發熱。乃服降劑。果作嘔。少食。復求治。投六君子湯四劑。嘔止食進。仍用補藥。月余而愈。（此因症與脈也。）夫患者臟腑氣血上下虛實。（詳見潰瘍作痛第十三條。）況陰症似陽。陽症似陰。（治論見外科心法）豈可以發熱作渴而遂用寒涼之劑。常治患者正氣虛。邪氣實。以托里為主。消毒佐之。正氣實。邪氣虛。以攻毒為主。托里佐之。正氣虛。邪氣實。而專用攻毒則先損胃氣。宜先服仙方活命飲。托里消毒散。或用灸法。俟邪氣退。正氣復。更酌量治之。

大抵正氣奪則虛。邪氣盛則實。蓋邪正不並立。一勝則一負。其虛不待損而自虛矣。若腦疽疔毒。及患在四肢。必用灸法。拔引郁毒以行瘀滯。尤不可專于攻毒。診其脈而辨之。

庶不有誤。

一官肩患毒。發熱惡寒。大渴煩躁。症似有余。脈雖大而無力。却屬不足。用當歸補血湯治之。（此凭脈也。）

一人膿熟不潰。脹痛。針之而止。更以托里消毒散而愈。凡膿熟不潰。血氣虛也。若不托里。必致難瘥。

一人作膿痛。發嘔。少食。以仙方活命飲一劑而止。以六君子加當歸、桔梗、皂角刺潰而愈。（此凭症也。）

一人膿清不斂。以托里散加五味麥門而愈。（此凭症也。）

一人嗜酒與煎爆。年五十余。夏初左絲竹空穴忽努出一角。長短大小如雞距而稍堅。予此少陽所過。氣多血少。未易治也。須斷肉味。先解其食毒。針灸以開泄其壅滯。彼不聽。

以黃連、朴硝、腦子等冷藥盒之。一夕豁開如醬蚶。徑三寸。二日後蚶中濺血高數

寸而死。

因冷外逼。气郁不得发。宜其发之暴也如此。（此凭症也。）

一人肿痛寒热拘急。脉浮数。以荆防败毒散二剂。表症悉退。更以托里消毒散溃之而安。一人肿痛甚。发寒热。服十宣散愈。诊之脉数而实。此表里俱有邪也。以荆防败毒散加芩、连、大黄二剂少愈。更以荆防败毒散四剂而消。

俞黄门年逾三十。冬患鬓毒。肿烦躁。便秘脉实。此胆经风热壅上也。马氏曰。疮疡不利者。大黄汤下之。一剂便通疮退。更以荆防败毒散（七）二剂。十宣散去桂加天花粉、金银花数剂而愈。（此凭症脉也。）

一人头面肿作痛。时仲冬。脉弦紧。以托里温经汤汗之而消。

赵宜人年逾七十。鬓疽已溃。肿痛甚。喜冷。脉实便秘。东垣云。烦躁饮冷。身热脉精神昏闷者。脏腑实也。以清凉饮（二六）肿痛悉退。更以托里药三十余剂而平。（此凭脉症机按。前疽虽出少阳血少之分。然症与脉皆属于实。故年壮者用泻剂之重。老年者用泻剂之轻。若拘以年老。或守其经禁。而投补剂。实实之祸杂免矣。

卷四

胁疽一百十二

一人年逾五十。腋下患毒。疮口不合。右关脉数而渴。此胃火也。用竹叶黄汤（二九）而止。再用补气药而愈。尝治午后发渴或发热。用地骨皮散效。

一人性急。味浓。常服躁热之药。左胁一点痛。轻诊弦重乳。知其痛处有脓。与四物加、香附、生姜煎十余帖。痛处微肿如指大。针之。少时屈身脓出。与四物调理而安。（此因脉而处治。）

一夫人左胁内作痛。牵引胸前。此肝气不和。尚未成疮。用小柴胡（五）加青皮、枳壳四剂少可。加芎、归治之而愈。

一人连年病症。后生子。三月病热。右胁下阳明少阳之分生一疔甫平。左胁下相对又一脓血淋漓几死。医以四物汤败毒散数倍人参。以香附为佐。犀角为使。大料饮乳母两月而愈。逾三月忽腹胀。生赤疹如霞片。取剪刀草汁调原蚕砂敷随消。又半月移胀入囊为肿。黄莹裂开。两丸显露水出。以紫苏叶盛麝炭末托之。旬余而合。此胎毒症也。

一妇因忿郁。腋下结一核二十余年。因怒加肿痛。完谷不化。饮食少思。此肠胃虚也。

君子（二）加砂仁、肉桂、干姜、肉豆蔻。泄虽止而脓清。疮口不合。用十全大补汤（十三）月余而愈。（此凭症也。）

机按。前项二条胁疮。一因其性多躁急。故用四物汤阴柔之剂以安静之。一因其肝气不平。故用小柴胡疏理之剂以和解之。此又因其性情为治。不特专于攻毒也。

张通北人年逾四十。夏月腋下患毒。溃后不敛。脓出清稀。皮寒脉弱。肠鸣切痛。大便食下即呕。此寒变而内陷也。宜大辛温之剂。遂以托里温中汤一二帖。诸症悉退。更以六君子（二）加炮干姜、肉桂数剂。再以十全大补汤而愈。（此凭症也。）

一人肋肿一块。日久不溃。按之微痛。脉微而涩。此形症俱虚也。经曰。形气不足。病足。当补不当泻。宜用人参养荣汤。彼不信。乃服流气饮。虚症悉至。方服前汤月余少愈。

但肿尚硬。以艾叶炒热熨患处。至十余日脓成。以火针刺之。更灸豆豉饼。（四三）又服十全大补汤（十三）百帖而愈。（此凭脉症也。）

盖流气饮通行十二经。诸经皆为所损。况胆经之血本少。又从而损之。宁不伤生。东垣凡一经受病。止当求责其一经。不可干扰余经。苟泛投克伐之剂。则诸经被戕。宁无危乎。

一人年三十。素饥寒。患右肋肿如覆瓢。转侧作水声。脉数。经曰。阴虚阳气凑袭。寒热。热甚则肉腐为脓。即此症也。及按其肿处即起。是脓成。遂浓煎黄六一汤。令先饮二钟。然后针之。脓出数碗。虚症并至。遂用大补三月余而愈。（此凭脉症也。）

大抵脓血大泄。血气俱虚。当峻补之。虽有他病。皆宜缓治。盖元气一复。诸病自退。

老弱之人。不问肿溃。尤当补也。

一人因劳发热。肋下肿痛脉虽大。按之无力。此气血虚。腠理不密。邪气袭于肉理而然当补之。以接虚怯之气。以补中益气汤加羌活四剂少可。去羌活又百余剂而愈。（此凭脉也）一人面白神劳。肋下生一红肿如桃。教用补剂不信。乃用流气饮十宣散。血气俱惫而死一人年逾二十。腋下患毒。十余日肿硬不溃。脉弱时呕。予谓肿

硬不溃阳虚。呕吐少气弱。宜六君子汤加砂仁、藿香。彼谓肿疡时呕。毒瓦斯攻心。溃疡时呕。阴虚宜补。予曰。

此丹溪大概言也。若肿赤痛甚。烦躁脉实而呕为有余。当作毒瓦斯攻心而下之。以疮属心火故也。肿硬不溃。脉弱时呕为不足。当补之。亦有痛伤胃气。或感寒邪秽气而呕者。虽肿疡尤当助胃壮气。盖肿疡毒瓦斯内侵作呕。十有一二。溃疡湿气内伤作呕。十有八九。彼不信。饮攻伐药愈甚。复请诊。脉微弱而发热。予谓热而脉静。及脱血脉实。汗后脉躁。皆难治。果歿。（此凭脉症也。）

卷四

胸疡一百十三

一夫人性刚多怒。胸前作痛。肉色不变。脉数恶寒。经曰。洪数脉。应发热。反恶寒。

也。今脉洪数则脓已成。但体丰浓。故色不变。似乎无脓。以痛极始肯针。入数寸。脓数碗。以清肝消毒药治之而愈。设泥其色而不用针。无可救之理。（此凭症脉也。）

一人年逾四十。胸患疮成漏。日出脓碗许。喜饮食如常。用十全大补汤。（十三）加远志、贝母、白蔹、续断。灸以附子饼。脓渐少。调护岁余而愈。（此凭症也。）

一少妇胸膺间溃一窍。脓血。与口中所咳相应而出。以参、当归。加退热排脓等药而愈。一说此因肺痿所致。

一人胸肿一块。半载不消。令灸百壮方溃。服大补药不敛。灸附子饼而愈。（此凭症也）一百户胸患毒。肿高赤。发热脉数。大小便涩。饮食如常。齐氏曰。肿起色赤。寒热。皮肤壮热。头目昏重。气血实也。又曰。大小便涩。饮食如故。肠满膨胀。胸膈痞闷。肢节疼痛。身热脉大精神昏塞。脏腑实也。进黄连内疏汤（三）二剂。诸症悉退。更以荆防败毒散。加黄芩、山梔四剂少愈。再以四物加芩连、白芷、桔梗、甘草、金银花数剂而消。（此凭脉症也。）

机按此项治法。虽因脉症皆实而用泄法。然泄法又有前后次序。先攻里。后发表。最后又用和解。前贤治病。不肯孟浪如此。学人可不以此为法哉。

卷四

脑疽一百十四

肿痛未作脓者。宜除湿消毒。黄连消毒饮之类。

大痛或不痛。或麻木者。毒甚也。隔蒜灸之。更用解毒药。

肿痛便秘者。邪在内也。泄之。

不甚痛。或不作脓者。虚也。托里为主。

脓成胀痛者。针之。更以托里。

不作脓。或不溃者。托里药为主。

脓溃或不敛。或多者。大补气血。

烦躁饮冷。脉实而痛。宜泻火。

一人素不慎起居饮食。赤肿痛。尺脉洪数。以黄连消毒散一剂。湿热顿除。惟肿硬作以仙方活命饮二剂。肿痛悉退。但疮头不消。投十宣。去桂。加金银花、本、白术、茯苓、陈皮。以托里排脓。彼欲全消。自制黄连解毒散二服。反肿硬不作脓。始悟。仍用十宣散。加白术、茯苓、陈皮、半夏。肿少退。仍去桂。又四剂而脓成。肿势亦退。继以八珍汤加黄、五味子、麦门。月余脓溃而愈。（此凭脉症也。）

夫苦寒之药虽治阳症。尤当分表里虚实次第时宜。岂可始末悉用之。然肿赤痛。尺脉按之则濡。乃膀胱经湿热壅盛也。故用黄连消毒散。以解毒除湿。顾肿硬作痛。乃气血凝滞不行而作也。遂用仙方活命饮。以散结消毒破血也。其疮头不消。盖因热毒熏蒸。气血凝滞而然也。宜用甘温之剂补益阳气。托里以腐溃之。况此症原属督脉经因虚火盛而出。若不审其因。专用苦寒之药。胃气以伤。何以腐化收敛。几何不致于败耶。凡疮易消散。易腐溃。

易收敛。皆气血壮盛故也。

一人耳后漫肿作痛。肉色不变。脉微数。以小柴胡汤加芎、归、桔梗四剂。肿少起。更里消毒散数剂。脉活数。此脓已成。宜针。彼畏不从。因痛极始针。出脓碗许以托里药两月余始安。（此凭脉症也。）

一人脑疽。肿痛脉数。以黄连消毒散二剂少退。与仙方活命饮二剂而止。再以当归、川芎、芍药、金银花、黄柏、知母而溃。又以托里药而愈。（此凭脉症也。）

一人头项俱痛。虽大溃。肿痛益甚。兼作泻。烦躁不睡。饮食少思。其势可畏。诊其毒尚在。与仙方活命饮二剂。肿痛退半。与二神丸及六君子汤。加五味、麦门、酸枣仁四剂。诸症少退。食颇进睡少得。及与参苓白术散数服。饮食颇进。又与十全大补汤。加金银花、白芷、桔梗。月余瘥。

一老患此。色赤肿痛。脉数有力。与黄连消毒散二剂少退。更与清心莲子饮。四剂而消。（此凭脉症也。）

一人肿硬不作脓。惟疮头出水。疼甚。以仙方活命饮二剂。痛止而脓成。针之。更以托里药而愈。

一妇脑左肿痛。左鼻出脓。年余不愈。时或掉如坐舟车。许叔微曰。肝虚风邪袭之。然以川芎一两。当归三钱。羌活、旋复花、细辛、防风、蔓荆子、石膏、本、荆芥穗、半夏曲、干地黄、甘草各半两。每服一两。姜水煎服。一料而愈。

机按此条认作肝虚风邪袭之。而治以去风清热养血祛痰之剂。因其掉。痛偏于左也。

。诸风掉

。皆属肝木。又病偏左。乃肝胆所主。又曰。风从上受之。又曰。无痰不成运。又曰。肝藏血。又曰。风乃阳邪。故方以风热痰血为主治者。理也。

一人脑疽已十余日。面目肿闭。头如斗。脉洪数。烦躁饮冷。此膀胱湿热所致。用黄毒饮（百二一）二剂。次饮槐花酒二碗。顿退。以指按下。肿则复起。此脓已成。于颈额肩颊各刺一孔。脓并涌出。口目始开。更以托里药。加金银花、连翘三十余帖而愈。（此凭脉症一儿头患白疮。皮光且急。诸药不应。名曰脑疽疮。乃胎毒挟风热而成。服龙胆丸。（百十五）及吹芦荟末鼻内。

兼搽解毒散

而愈。若重者。发结如穗。脑热如火。遍身出汗。腮肿胸高。尤宜此药。

机按龙胆丸芦荟末。皆凉肝胆杀虫之剂。盖肝胆主风。又风木自甚则生虫。故治疳多此一人素饮酒。九月患脑之下项之上出小疮。后数日脑项麻木。肿势外。疡医处五香连且云不可速疗。俟脓出用药。或。砭刺。三月可平。四月如故。予曰。凡疮见脓。九死一生。果如医言。则束手待毙矣。且膏粱之变。不当投五香。当先火攻。然后用药。以大艾炷如两核许者。灸至百壮乃痛。次为处方。足太阳膀胱经其病逆。当反治。脉得弦紧。按之洪大而数有力。必当伏其所主。而先其所因。其始则同。其终则异。以时言之。可收不可汗。经与病禁下。法当结者散之。咸以之。然寒受邪而又禁咸。遂以诸苦寒为君。甘寒为佐。酒热为因。用大辛以解结为臣。三

辛三甘。益元气而和血脉。淡渗以导酒湿。扶持秋令。益气泻火。以入本经药通经为引用。故以羌活、独活、防风、本、连翘以解结。黄连、芩、柏、知母、酒制以泻火、生甘草泄肾火。补下焦元气。参、橘皮以补胃。但参、甘草配诸苦寒药三之一。多则滋营气补土湿邪也。苏木、归尾去恶血。生地黄补血。酒防己除膀胱留热。泽泻助秋去酒湿热。凡此诸药。必得桔梗为舟楫。乃不下沉。服之投床大鼾。日出乃寤。以手扪疮。肿减七八。至疮痂敛。都十四日而已。

机按脉之紧弦主疮痛。按之洪数主内热。大阳寒水而受阳热。故曰其病逆寒水之经。而用寒凉之药。

故曰反治。此因脉因经因其所嗜而制此方也。

一人患脑疽。势剧脉实。用黄连消毒散不应。以金银藤二两。水二钟。煎一钟。入酒半服之势去三四。再服渐退。又加黄柏、知母、栝蒌、当归、甘草节。数剂而溃止。加黄、川芎、白芷、桔梗数剂而愈。（机按此条凭脉而治也。）

一人脑疽。其头数多。痛不可忍。服消毒药不应。更以金银花服之。即鼾睡。觉而势去。再四剂而消。一人所患尤甚。亦令服之。肿痛顿退。但不能平。加黄、当归、栝蒌仁、白芷、桔梗、甘草节数剂而愈。

前条因治不应而变法。后条因症而处治。

一人脓将成。微痛兼渴。尺脉大而无力量。此阴虚火动之症。彼谓心经热毒。自服清凉降。愈炽。复求治。乃以四物汤加黄柏、知母、五味、麦门、黄。及加減八味丸。渴止疮溃。更以托里药兼前丸而愈。（此凭脉也。）

一妇脓成不溃。胀痛欲呕。饮食少思。急针之。与托里药而愈。（此凭症也。）

一妇脑疽不甚痛。作脓。以托里消毒。脓成针之。补以托里药亦愈。（此凭症也。）

一老人脓清兼作渴。脉软而涩。予以为气血俱虚。用八珍汤加黄、五味。彼不信。乃火之剂。果反作呕少食。始信。服香砂六君子汤四剂。呕止食进。仍投前汤。月余而愈。（此脉凭症也。）

一人未溃兼作渴。尺脉大而无力量。以四物汤加黄柏、知母、黄、麦门四剂而渴减。又与加減八味丸。渴止疮溃。更用托里药兼前丸而愈。（此凭症也。）

一夫人年逾八十。脑疽已溃。发背。继生头如粟许。脉大无力。此膀胱经湿热所致

。脉。血气衰。进托里药消毒数服。稍可。更加参
。虽起而渴。此血气虚甚。以参、各一两。归、各五钱。麦门、五味各一钱。数服
渴止不溃。加肉桂十余剂。脓成针之。瘀肉渐腐。徐徐取去。而脓清不敛。投十全
大补汤。（十三）加白蔹、贝母、远志三十余剂。脓稠而愈。设不峻补。不去腐肉
。以渴为火。投以凉药。宁免死哉。疮疽之症。虽属心火。当分表里虚实。果元气
充实。内有实火。寒剂或可责效。若寒凉过度。使胃寒脾弱。阳症变阴。或结而不
溃。或溃而不敛。阴阳乖戾。水火交争。死无日矣。（机按此凭形凭脉凭症而治之
也一人肿痛。脉数。以荆防败毒散二剂而痛止。更以托里消毒药而消。（此凭脉也
。）

一人肿。疼痛发热。饮冷。脉洪数。与凉膈散二剂而止。以金银花四剂而溃。更以
托里药而愈。（此凭症脉也。）

一老妇稟实。溃而痛不止。脉实便秘。以清凉二剂而止。更以托里消毒药而愈。（
此凭脉一妇年逾七十。冬至后脑出疽如瓠面大。疡医诊视。候熟以针出脓。因怒答
婢。疽辄凹韭叶许。面色青黄不泽。四肢逆冷。汗出身清。时呕吐。脉极沉细而迟
。盖缘衰老之年。严寒之时。病中苦楚。饮食淡薄。肥脓之气色涤。瘦悴之形独存
。加之暴怒。精神愈损。故有此寒变也。病与时同速。制五香汤一剂。加丁香附子
各五钱。剂尽疽复大发。随症调理而愈经曰。治病必察其下。谓察时下之宜。诸痛
疮疡皆属心火。言其常也。如疮盛形羸。邪高痛下。始热终寒。此反常也。固当察
时下之宜而权治之。不可执一。

机按此条年老冬寒。理宜温补。兹用五香汤加丁附以辛散。何也。盖因其怒气郁结
。阻气。不得营运。致疽凹陷。且脉极沉细而迟。其为气郁可知矣。故用五香以开
结。丁、附以助阳。则郁散阳复。疽乃大发。此亦因其性因其脉而为治也。

一人脑疽作渴。脉虽洪。按之无力。予
咀加減八味丸与之。彼不信。自用滋阴等药。

并至而歿。精要曰。患疽虽云有热。皆因虚而得之。愈后作渴。或先渴后疽。非加
減八味丸一妇年将七十形实性急。好酒。脑疽才五日。脉紧急又涩。急用大黄酒煨
细切。酒拌炒末。又酒拌人参炒。入姜煎调一钱服。过两时再与。得卧而上半身汗
。睡觉病已失。此亦内托之意。

机按此治。因性急。因好酒。兼因其脉而制此方。脉紧急且涩。由其性急嗜酒。以
伤其血而然。故用大黄以泄酒热。人参以养气血也。

一人便血数年。舌下筋紫。午后唇下赤。胃肺脉洪。予谓大肠脉散舌下。大肠有热
。故筋紫而又便血。胃脉环承浆。唇下即承浆。午后因火旺。故承浆发赤。盖胃为

本。肺为标。

乃标本有热也。用防风通圣散（六）为丸治之而愈。后每睡觉惊跳而起。不自知其故。如是者年余。脑发一毒。痛。左尺脉数。此膀胱经热。而然。服黄连消毒散数剂少愈。次服金银花、栝蒌、甘草节、当归。月余而平。

机按便血之后。睡觉惊跳者。由失血阴虚。心失所养而然。阴虚阳必亢。头为诸阳之首。故亢阳上从于阳。疽发于脑。此条治法。因经因脉而制方也。

杜清碧病脑疽。疗之不愈。丹溪往视之。曰。何不服防风通圣散。（四十）曰。已服数剂。丹溪曰。合以酒制之。清碧乃自悟以为不及。（此因症也。）

一举人年逾四十。患脑疽肿。其脉沉静。此阳症阴脉。断不起。果歿。

卷五

臂疽一百十五

一人年将六十。五月患右臂膊肿盛。上至肩。下至手指。色变。皮肤凉。六脉沉细而微。

症俱寒。乃附骨痛也。开发已迟。以燔针启之。脓清稀解。次日肘下再开之。加吃逆不绝。

与丁香柿蒂散两服稍缓。次日吃逆尤甚。自利。脐腹冷痛。腹满食减。时发昏愤。灸左乳下黑尽处二七壮。又处托里温中汤一两半与服。或曰。诸痛疮疡皆属心火。又时当盛暑而用姜、附可乎。予曰。经云脉细皮寒。泻利前后。饮食不入。是为五虚。况吃逆胃中虚寒。此症内外相反。须当舍时从症。遂投之。诸症悉去。饮食倍进。疮势温。脓色正。复用五香汤数服。月余而愈。

机按此症多属虚寒。此方专用辛热以治其寒。不用参、术以补其虚。盖因吃逆腹满。乃气郁壅也。想必其人年虽老。脉症虽虚。而形体颇实。非阴虚吃逆比。

一挥使臂肿一块。不痛不赤。脉弱懒食。时呕。以六君子（二）加藿香。酒炒芍药。呕止。再以八珍汤（十四）二十余剂。脓成刺之。又以十全大补而愈。次年伤寒。后臂复肿。微痛。乃伤寒余毒也。然无表症。俱虚弱耳。先用十宣散四剂。取参、芎、归扶助元气。防风、桔梗、白芷、浓朴行散肿结。肉桂引经破血。肿退三四。再用八珍汤。肿溃而愈。至冬臂复作痛。因服祛风药。反筋挛痛甚。此血虚不能养筋。筋虚不能束骨。用加味十全大补汤（十三）百贴而愈。

一女臂患肿。溃久不敛。寒热交作。五心烦热。饮食少思。月水不通。以逍遥散月余少可。

更服八珍汤。（十四）加牡丹皮、香附。又月余经通。再加黄、白朮。两月余而愈。（此凭一人臂肿。患毒作痛。服寒凉药。食少。大便不实。予用理中丸二服。更以六君子加砂仁、藿香。再以托里。脓溃而愈。

此因治不应而变方也。

凡疮痛甚者。若禀浓有火。宜苦寒药。若禀薄者。宜补中益气汤。加芩、连之类。在下加黄柏。人肥加荆、防、独、羌之类。取其风能胜湿也。

一妇左臂胆经部分结肿一块。年许不溃。坚硬不痛。肉色不变。脉弱少食。月水过

期。

发热。遇劳或怒则痛。此不足症也。与参、 、归、术、芎、
、芍药、贝母、远志、香附、桔梗、牡丹皮、甘草百余帖而消。（此因症脉也。）

大抵妇病多起于郁。郁则气血受伤。百病生矣。

一人臂患漏。口干发热。喜脓不清稀。脉来迟缓。灸以豆豉饼。服八珍汤。（十四）加麦门、五味、软柴胡、地骨皮、三月余而愈。后因房劳复溃。脓清脉大。辞不治。果歿。

河间曰。因病致虚为轻。盖病势尚浅。元气未虚也。若病初愈。或饮食、劳倦、房劳、加至羸损。此因虚致损则为重。病势已过。元气已索故也。

一儿臂患痘毒作炒。按之复起。此脓胀痛也。刺之。以托里而愈。

一妇臂结一块。已溃不敛。灸以豆豉饼。更服托里药而愈。

一人年逾三十。素怯弱。不能食冷。臂患一毒。脉虚弱。予以托里药而消。但饮食少思作胀。或吞酸。日渐羸瘦。参苓等药不应。右尺脉弱。此命门火衰。不能生土。遂以八味丸补土之原。饮食渐进而愈。（此凭脉症也。）

一媪左臂结核。年余方溃。脓清不敛。以十全大补汤。（十三）外用附子饼灸。及贴补药膏。调护得宜。百帖而愈。（此凭症也。）

一人多虑神劳。年近五十。左膊外侧。红肿如粟。予曰。勿轻视。得独参汤数斤乃佳。

而止。旬余值大风拔木。疮上起一红线。绕背抵右肋。与大料人参汤。加芎、术补剂。两月而安。机按此条。因形因经而为治也。

一妇臂痛。筋挛不能屈伸。遇寒则剧。脉紧细。比良甫所谓肝气虚为风寒流于血脉经络于筋。筋不荣则干急为痛。先用舒筋汤。（八三）更用四物汤。（九）加牡丹皮、泽兰、白术而愈。亦有臂痛不能举。或转左右作痛。由中脘伏痰。脾气滞不行。宜茯苓丸。（百二十五）或控涎丹治之。（此因脉处治之。）

一人手臂结核如粟。延至颈项。状似瘰。此风湿流注。用加减小续命汤。（七五）及独活寄生汤。（七六）更以托里药。倍加参、 、归、术。百帖而愈。

机按此条。有症无脉。认作风湿流注而治。当时必有所见也。后用补剂百贴而愈。是终于虚也。一儿三岁。臂患毒。痛。服解毒丸。搽神功散（七十）而消。（此条症脉。不详。

当时必有所见。）

尝治臂毒。便闭烦躁。服五福化毒丹（百九）亦效。若脓成急刺。用纸捻蘸麻油疮内。

以膏药贴之。若儿安静。不必服药。候有脓取去。仍用贴。

一人肩患疽。脉数。饮槐花酒一服。势顿退。再与金银花、黄、甘草十余服而平。（槐花治湿热之功最为神速。胃寒不宜过剂。

尹老家贫。形志皆苦。自幼颊疔。孟冬于手阳明大肠经分出痛。第四日稠脓。臂外皆肿在手阳明左右经中。其脉俱弦。按之洪缓有力。此得自八风之变。以脉断之。邪气在表。饮食如常。大小便如故。腹中和。口知味。知不在里也。不恶风寒。只热躁。脉不浮。知不在表也。表里既和。邪在经脉之中。故曰凝于血脉为痛是也。痛出身半以上。故风从上受。因知为八风之变。而疮只在经脉之中。法当却寒。调和经脉中血气。使无凝滞。可愈矣。宜用以白芷升麻汤。（百四一）

机按此方。举一身而言。故阳明为一身之中。若以各经言之。而阳明亦自有表里中三等之剂。太阳亦有表里之中之方。余经皆可以类推也。

一人年逾三十。臂患痈溃而不痛。脓稀脉弱。丹溪曰。疽溃深而不痛者。胃气大虚。不也。东垣曰。脓水清稀。疮口不合。气血俱虚也。理宜大补。彼不听。服消毒药。气血愈虚丹溪曰。才见肿痛。参之脉症。倘有虚弱。便与滋补气血。可保终吉。又曰。溃疡内外皆虚。补接为主。兹则见善不从。自用己智。宁免死乎。

一人年逾四十。臂患毒。痛作呕。服托里消毒药愈盛。予用凉膈散二剂顿退。更以四物汤加芩、连四剂而消。

机按此则所谓肿疡热毒攻心而作呕也。

一人两臂肿痛。服托里药日盛。予谓肿属湿。痛属火。此湿热流注经络也。用人参败毒加威灵仙、酒炒黄芩、南星数剂渐愈。更以四物汤。（九）加苍术、黄柏、桔梗二十余剂而消。按此托里药日盛。故改作湿热治也。

一尚书左臂肘患一紫泡。根畔肿赤。大肠脉乳。予谓乳主失血。或积血。公曰。血

痢未瘳。以芍药汤（九二）二剂。更以人参败毒散（六四）二剂。疮痢并愈。

机按用芍药汤以治血痢。用败毒散以治紫泡。但所录脉症未甚详悉。观其所治。多属血热而近实也。

卷五

背疽一百十六

痛。或不痛。及麻木者。邪气盛也。隔蒜灸之。痛者灸至不痛。不痛者灸至痛。毒随火而散。再不痛者。须明灸（不隔蒜灸。）之。或用黄连解毒散之类。

右关脉弱而肌肉迟生者。宜健脾胃。

头痛拘急乃表症。先服人参败毒散一二剂。如痛。用金银花散。或槐花酒。神效托里痛肿硬。脉实者。以清凉饮。仙方活命饮。苦参丸。

肿硬木闷。疼痛发热。烦躁饮冷。便秘脉沉实者。内疏黄连汤。或清凉饮。大便已利。

欲得作脓。用仙方活命饮。托里散。蜡矾丸。外用神异膏。

饮食少思。或不甘美。用六君子汤加藿香。连进三五剂。更用雄黄解毒散洗患处。每日金膏涂疮口处。候有疮口。即用纸作捻。蘸乌金膏入疮内。若有脓为脂膜间隔不出而作胀痛者。宜用针引之。腐肉堵塞者去之。若瘀肉腐动。用猪蹄汤洗。如脓稠或痛。饮食如常。

瘀肉自腐。用消毒与托里药相兼服之。仍用前二膏涂贴。若腐肉已离好肉。宜速去之。如脓不稠不稀。微有疼痛。饮食不甘。瘀肉腐迟。更用桑柴灸之。亦用托里药。若瘀肉不腐。或脓清稀。不痛者。急服大补之剂。亦用桑柴灸之。以补接阳气。解散郁毒。

大抵气血壮实。或毒轻少者。可假药力。或自腐溃。怯弱之人。热毒中膈。内外不通。

针灸。药无全功。然此症若脓已成。宜急开之。否则重者溃通脏腑。腐烂筋骨。轻者延溃良肉。难于收功。因而不敛者多矣。

一人患此痛甚。服消毒药愈炽。予为隔蒜灸之而止。与仙方活命饮二剂顿退。以托

里药溃而愈。（此凭症也。）

一妇发热。烦躁饮冷。与黄连解毒汤四剂少愈。更与托里消毒散始溃。与托里药而敛。

（此凭症也。）

一人已愈。唯一眼番出

肉如菌。三月不愈。乃伤风寒也。以生猪油调藜芦末涂之即愈。亦有出三寸许者。乌梅涂之亦效。但缓硫黄亦可。（此凭症也。）

一人年逾五十。患已五日。肿大痛。赤晕尺余。重如负石。势炽。当峻攻。察其脉又。遂先砭赤处。出黑血碗许。肿痛背重皆去。更敷神效散。及服仙方活命饮二剂。疮口及砭处出黑水而消。（此凭症也。）

大抵疮毒势甚。若用攻剂。怯弱之人必损元气。因而变症者多矣。

一人肿作痛。脉浮数。与内托复煎散二剂少退。与仙方活命饮四剂痛止而溃。再与托里药而愈。（此凭脉症也。）

一人毒势炽甚。痛不可忍。诸药不应。以仙方活命饮二剂。诸症悉退。又二剂而溃。以金银花散六剂而愈。（此凭症也。）

一人浓味气郁。形实性重。年近六十背疽。医与他药皆不行。惟饮香附末甚快。自肿至始终只此一味而安。然此等体实而又病实。盖千百而一见也。每思香附。经不言补。惟不老汤乃言有益于老人。用片子姜黄、甘草、香附三味。以不老为名。且引铁瓮先生与刘君为证。夫岂无其故哉。盖于行中有补之理耳。天之所以为天健而有常。因其不息。所以生生无穷。正如芎藭活血行气。有补阴之妙。故名益母。胎产所恃者气血也。胎前无滞。产后无虚。

以其行中有补也。夏枯草治瘰 亦然。（此因情性而治。）

一人感冒后发。不醒人事。磨死臂肉三寸许一块。此膀胱经必有湿热。其脉果数。

死肉最毒。宜速去之。否则延害良肉。多致不救。取之。果不知痛。因不止。疑为去肉所触。予曰非也。由风热未已。彼不听。另用乳没之剂。愈盛。复请治。予以怯风消毒敷贴。

饮以怯风凉血化痰降火之剂而愈。

按此因脉因症而处治也。

一通府发背十余日。势危脉大。先饮槐花酒二服杀其势。退。再饮败毒散二剂。更饮药数剂。渐溃。又用桑柴燃灸患处。每日灸良久。仍贴膏药。灸至数次。脓溃腐脱。以托里药加白术、陈皮。月余而愈。

按此先发后补。当时必有所见也。惜乎脉症不甚辨。

一县尹发背六七日。满背肿痛。势甚危。隔蒜灸百壮。饮槐花酒二碗即睡觉。用托里药消毒。十去五六。令将桑柴燃患处而溃。数日而愈。

一侍御髀HT患毒。痛甚。服消毒药不减。饮槐花酒一服。势随大退。再用托里消毒药而大抵肿毒。非用蒜灸。及饮槐花酒先杀其势。虽用托里诸药。其效未必甚速。（按前条皆先泻后补法。）

一园丁发背甚危。取金银藤五六两捣烂。入热酒一钟。绞取汁。温服。渣罨患处。四五平。彼用此药治疮。足以养身成家。遂弃园业。盖金银花治疮。未成即散。已成即溃。有回一妇半月余尚不发起。不作脓。痛甚。脉弱。隔蒜灸二十余壮而止。更服托里药渐溃。脓清而瘀肉不腐。以大补药及桑柴灸之。渐腐。取之而寻愈。（此凭脉症也。）

一人腐肉渐脱而脓微清。饮食无味。以十宣散去白芷、防风。加茯苓、白术、陈皮。

月余而敛。（此凭症也。）

一人将愈。但肌肉生迟。脾胃俱虚。以六君子汤。加芎、归、五味、黄 治之而愈。（此凭一人已愈。唯一口不敛。脉浮而涩。以十全大补汤治之而愈。（此凭脉也。）

一老人七十余。背疽径尺余。杂服五香汤。十宣散数十帖。脓血腥秽。呕逆不食。旬余自言。服十宣散膈中不安。且素有淋病三十年。今苦淋痛。呕逆。及不得睡而已。急煎参归术膏。以牛膝汤入竹沥调化与之。三日尽药斤半。淋止思食。七日尽药四斤。脓自涌出。

得睡。兼旬而安。时六七月也。（此凭症也。）

一人年六十余。好酒肉。背疽见脓。呕逆发热。得十宣已多。医以呕逆。投嘉禾散加丁时七月大热。脉洪数有力。予曰。脉症在溃疡尤忌。然形气尚可为。只与独参

汤加竹沥。尽药十五六斤。竹百余竿而安。予曰。此幸耳。不薄味。必再发。后因夏月醉坐池中。左胁傍生软块如饼。二年后溃为疽。自见脉症如前。仍服参膏竹沥而安。

二人年老血气弱。无以供给。脓血。胃虚而呕。若与十宣。宁保无危。

机按后条。乃膏粱积热之变。宜用寒凉之剂。兹用骤补。盖以年老溃疡故也。

一妇发背。用托里消毒药二十余剂而溃。因怒。顿吐血五六碗。气弱脉细。此气血虚极令服独参膏斤许少缓。更以参、归、术、陈皮、炙甘草三十余剂。疮口渐合。若投犀角地黄汤沉寒之药。鲜不误矣。（此凭脉症也。）

一妇年逾四十发背。治以托里药而溃。或呕而疮痛。胃脉弦紧。彼为余毒内攻。东垣云呕无时。手足逆冷。脏腑虚也。丹溪曰。溃后发呕不食者。湿气侵内也。又云。脓出反痛。

虚也。今胃脉弦紧。木乘土位。其虚明矣。用六君子（二）加酒炒芍药、砂仁、藿香。彼自服护心散。呕愈盛。复邀治。仍用前药。更以补气血药。两月而愈。（此凭脉症也。）

大抵湿气内侵。或感秽气而作呕。必喜温而脉弱。热毒内攻而作呕。必喜凉而脉数。必须辨不应。加熟附子二三片。有侵晨作泻者。名曰肾泄。宜二神丸。有食少渐瘦者。为脾肾虚。

尤宜二神丸。又治梦遗。生肌肉圣药。予尝饮食少思。吞酸噎腐。诸药不应。惟服理中丸。

及附子理中丸有效。盖此皆因中气虚寒。不能运化郁滞所致。故用温补之剂。中气温和。自一人渴后发背未溃。脉数无力。此阴虚火动。咀加減八味丸二剂稍缓。次用丸药而愈。（此凭脉症也。）

一人年逾五十。发背。生肌太早。背竟腐溃。更泄泻。脉微缓。用二神丸先止其泻。次补药。以猪蹄汤洗净。用黄末填满患处。贴以膏药。喜其初起时多用蒜灸。故毒不内攻。

两月而愈。（此凭脉症也）

一妇因子迟。服神仙聚宝丹。背生痛甚危。脉散大而涩。急以加減四物汤百余帖。补其阴血。幸质浓易于收救。

机按此条。因服食因脉而处治也。

一人背疮如碗大。溃见五脏。仅膈膜耳。自谓必死。精要。取大鲫鱼一枚去肠脏。以羯羊粪填实。焙令焦黑极燥为末。干掺之疮口遂合。累用有效。须脓少欲生肌时用之。

机按此二味有补土功。土主肌肉。故用生肌。

一人背疽径尺。穴深而黑。家贫得此。急作参归术膏与之。三日以艾芎汤洗之。气息。然可饮食。每日作多肉馄饨大碗与之。尽药膏五斤。馄饨三十碗。疮渐合。肉与馄饨补气有益者也。

机按此条。因饥寒多虚。故用此补法也。

一老妇患此。初生三头皆如粟。肿硬木闷。烦躁。至六日。其头甚多。脉大。按之沉隔蒜灸及托里。渐起发。尚不溃。又数剂。内外虽腐。惟筋所隔。脓不得出。胀痛不安。予谓须开之。彼不从。后虽自穿。毒已攻深矣。亦没。

一妇素弱。未成脓。大痛发热。予欲隔蒜灸以拔其毒。令自消。不从而殁。

大抵发背之患。其名虽多。惟阴阳二证为要。若发一头或二头。其形赤。肿高头起。

发热。为痈属阳。易治。若初起一头如黍。不肿不赤。闷痛烦躁。大渴便秘。睡语切牙。四五日间。其头计数十。其疮口各含如一粟。形似莲蓬。故名莲蓬发。积日不溃。按之流血。至八九日或数日。其头成片。所含之物俱出。通结一衣。揭去又结。其口共烂为一疮。其脓内攻。色紫黯。为疽属阴。难治。脉洪滑者尚可。沉细尤难。如此恶症。惟隔蒜灸。及涂乌金凡人背近脊。并髀皮里有筋一层。患此症者。外皮虽破难溃。以致内脓不出。令人胀痛。气血转虚。变症百出。若待自溃。多致不救。必须开之。兼以托里。常治此症。以利刀剪之。尚不能去。以此坚物。待其自溃。不亦反伤。非气血壮实者。未见其能自溃也。

一弱妇。外皮虽腐。内脓不溃。胀痛。烦热不安。予谓宜急开之。脓一出。毒即解。痛。诸症自退。待其自溃。不惟疼痛。溃烂愈深。彼不从。待将旬日。脓尚未出。人已痛疲矣。须针之。终不能收敛。竟至不起。一人溃而瘀肉不腐。予欲取之。更以峻补。不从而没。

一妇发背。待其自破。毒瓦斯内攻而殁。开迟故也。东垣云。过时不烙。反攻于内。内既消败。不死何待。

一指挥年逾五十发背。形症俱虚。用托里药而溃。但腐肉当去。彼惧不从。延至旬日。

肉皆败矣。虽投大剂。毒甚不救。古人谓坏肉恶如野狼虎。毒如蜂螫。缓去则戕性命。信哉。

一人年逾四十发背。心脉洪数。势危剧。经曰。痛痒疮疡。皆属心火。心脉洪数。乃心甚。心主血。心气滞则血不流。故生痛也。骑竹马灸、灸其穴。是心脉所游之地。急用隔蒜灸。以泻心火。拔其毒。再用托里消毒而愈。（此凭脉也。）

一人发背十八日。疮头如粟。内如锥。痛极。时有闷瞽。饮食不思。气则愈虚。以大艾灸十余壮。不知热。内痛不减。遂明灸二十余壮。内痛悉去毒瓦斯大发。饮食渐进。更用大补汤。及桑柴燃灸。瘀肉渐溃。（此凭症也。）

一人发背。疮头甚多。肿硬色紫。不甚痛。不腐溃。以艾铺患处灸之。更用大补药。数日死肉脱去而愈。（此因症处治也。）

一人发背。痛如灼。隔蒜灸三十余壮。肿痛悉退。更用托里消毒药而愈。（此凭症也）一人发背已四五日。疮头虽小。根畔颇大。隔蒜灸三十余壮。其根内消。惟疮头作脓一人忽恶心。大椎骨甚痒。须臾臂不能举。神思甚倦。此谓夭疽。危病也。隔蒜灸。痒愈盛。乃明灸（着肉灸也）五十余壮。痒止。旬日而愈。精要谓之灸有回生之功。信矣。

一人患此已四日。疮头如黍。痛背重。脉沉实。与黄连内疏汤二剂少退。更与仙方活命饮二剂而消。（此凭脉症也。）

一妇肿痛发热。睡语脉大用清心汤一剂而安。以金银花、甘草、天花粉、当归、栝蒌、黄数剂渐溃。更以托里药而愈。（此凭脉症也。）

一人背毒。痛发热。饮冷。多汗。便秘。谵言。以破棺丹二丸而宁。以金银花四剂而脓成。开之。更用托里药而愈。

一太监发背。肿痛色紫。脉息沉数。良甫曰。脉数发热而痛者。发于阳也。且疮疡赤甚。火极似水也。询之。常服透骨丹半载。乃积温成热所致。遂以内疏黄连汤再服稍平。更用排脓消毒药。及猪蹄汤大乙膏而愈。

机按此条。因脉因服食而为之处治也。

一人伤寒后亦患此。甚危。取去死肉。以神效当归膏敷贴。饮内疏黄连汤。狂言愈

盛。脉愈大。更用凉膈散（二六）二剂。又以四物汤。（九）加芩连数剂而愈。

机按此条脉症不甚详悉。观其下后狂愈盛、脉愈大。似属虚也。仍用凉膈散下之。此必形实进食。故用此也。

大凡患疮者责效太迫。一二剂未应。辄改服他药。及致有误。不思病有轻重。治有缓急。而概欲效于一二剂。难矣。况疮疡一症。其所由来固深已久。又形症在外。肌肉溃损。较无形之疾不同。安可旦夕取效。患者审之。

一人形实色黑。背生红肿。近髀骨下痛甚。脉浮数而洪紧正冬月。与麻黄桂枝汤。加酒、生附子、栝蒌子、甘草节、人参、羌活、青皮、黄、半夏、生姜六贴而消。此亦用托里机按此条。因时因脉而制方也。

一水部年逾四十。髀HT

患毒已半月。头甚多。大如粟许。内痛如刺。饮食不思。怯甚。

至。此元气虚。疽蓄于内。非灸不可。遂灸二十余壮。饮以六君子（二）加藿香、当归数剂。

疮势渐起。内痛顿去。胃脉渐至。但疮色尚紫。瘀肉不溃。此阳气尚虚也。用桑柴火灸以接阳气。解散其毒。仍以前药加参、
、归、桂。色赤脓稠。瘀肉渐腐。取去。两月余而愈。

（此凭脉症也）

夫邪气沉伏。真气怯弱。不能起发。须灸。灸而兼大补。若投常药。待其自溃。鲜不误一人年逾六十。冬至后疽发背。五七日肿势约七寸许。不任其痛。视之脓成。彼惧开发三日始以燔针开之。以开迟。迨二日变症果生。觉重如负石。热如炳火。痛楚倍常。六脉沉数。按之有力。此膏粱积热之变。邪气酷热。固宜治之以寒药。但时月严凝。有用寒远寒之戒。经曰。假者反之。虽违其时。以从其症可也。急作清凉饮子。加黄连秤一两半作一服。

利下两行。痛减七分。翌日复进。其症悉除。月余平复。

机按此条。因浓味因脉而为之治法也。

一人初生如粟。闷痛烦渴。便秘脉实。此毒在脏也。予谓宜急疏去之。以绝其源。使毒不致外侵。彼以为小恙。乃服寻常之药。后大溃而没。

一士因脚弱求诊。两手脉皆浮洪稍鼓。饮食如常。懒于言动。肌起白屑如麸片。时在冬予作极虚处治。询知半年前背臀腿三处。自夏至秋冬节次生疽。率用五香连翘汤。十宣散。

今力。补药应效已渐。病家嫌缓。自作风病治。炼青礞石二钱半。以青州白丸作料。煎饮子顿服之。予谏不听。因致不救。

一人背疮毒瓦斯未尽。早用生肌。背竟溃烂。予以解毒药治之得愈。又一人患毒瓦斯始发。

骤用生肌。其毒内攻而死。

一人年逾四十。发背五日起。肉色不变。脉弱少食。大便不实。予谓凡疮未溃脉先弱于收敛。用托里消毒散二剂方起发。彼惑一姬言。贴膏药。服攻毒剂。反盛。背如负石。复请予治。隔蒜灸三十余壮。彼云负石已去。但痒痛未知。更用托里药。知痛痒。脓清。前药倍加参、。佐以姜、桂。脓稍稠。又为人惑。外贴猪腰子。抽脓血。内服硝、黄。遂流血五六碗许。连泄十余行。腹内如冰。饮食不进。不得已。速予诊之。脉尽脱。不可救。盖其症属大虚。一于温补。犹恐不救。况用攻伐。不死何待。

一人发背十余日。疮头如栗许。肿硬木闷。肉色不变。寒热拘急。脉沉实。此毒在内也以黄连内疏汤次以消毒托里药。其毒始发。柰速用生肌。患处忽若负重。身如火。后竟不东垣云。毒瓦斯未尽。速用生肌。纵平复必再发。若毒瓦斯入腹。十死八九。大抵毒瓦斯尽。

脾气壮。则肌肉自生。生肌药不用亦可。

一宜人年逾六十。发背三日。肉色不变。头如栗许。肩背重。寒热饮冷。脉洪数。良甫外如麻。里如瓜。齐氏曰。增寒壮热。所患必深。又曰。肉色不变。发于内也。用人参败毒散（六二）二剂。又隔蒜灸五十余壮。毒始发。背始轻。再用托里药渐溃。顾气血虚甚。作渴。服参、、归、等。渴止。彼欲速愈。自用草药敷患处。毒瓦斯复入。遂不救。

大抵老弱患疮。疮头不起。或坚如牛领皮。多不待溃而死。溃后气血不能培养者亦死。

初溃。毒正发越。宜用膏药吸之。参等药托之。若反用药遏之使毒瓦斯内攻者。必不救也。

一女背HT结一核如钱大。不。但倦怠少食。日晡发热。脉软而涩。此虚劳气郁所致。予气养血开郁之药。复令饮人乳。精神稍健。彼不深信。又服流气饮。食遂少。四肢痿。其父悔。复请予。予谓决不起矣。果歿。

一妇发热作痛。专服降火败毒药。溃后尤甚烦躁。时嗽。小便如淋。皆恶症也。辞不治此症虽云属火。未有不由阴虚而致者。故经云督脉经虚。从脑而出。膀胱经虚。从背而出。岂可专泥于火。

一太守肿硬不泽。疮头如粟。脉洪大。按之即涩。经云骨髓不枯。脏腑不败者可治。然肿硬色夭。坚如牛领之皮。脉更涩。此精气已绝矣。不治。

一宜人发背。脓熟不开。昏闷不食。此毒瓦斯入内也。断不治。强之针。脓碗许。稍苏。

须臾竟亡。

大抵血气壮实。脓自涌出。老弱之人。血气枯槁。必须迎而夺之。顺而取之。若毒结四刺少缓。腐溃深大。亦难收敛。结于颊项胸腹紧要之地。不问壮弱。急宜针刺。否则难治。

一人背疮溃陷。色紫舌卷。予谓下陷色紫。阳气脱也。舌卷囊缩。肝气绝也。经曰。此筋先死。庚日笃。辛日死。果立秋日而歿。

卷五

臂痛一百十七

（附腿痛 环跳疽 脚气 脚跟疽 腿痛）

痛。尺脉紧而无力者。托之。

肿硬痛甚者。隔蒜灸之。更以托里。

不作脓而痛者。解毒为主。

不作脓者。托里为主。

不溃或溃而不敛者。托里为主。

一人臀痛。肿硬作痛。尺脉浮紧。按之无力。以内托羌活汤一剂痛止。再以金银花散四剂。脓溃而愈。

一人臀痛。肿硬痛甚。隔蒜灸之。更服仙方活命饮二剂。痛止肿消。以托里消毒散。加黄柏、苍术、羌活。疮头溃而愈。

一人臀痛。作脓而痛。以仙方活命饮二剂痛止。更以托里消毒散。脓溃而瘥。（此条无一人臀痛不作脓。饮食少思。先以六君子加芎、归黄。饮食渐进。更以托里散。脓溃一人溃而脓清不敛。灸以豆豉饼。更饮十全大补汤。两月余而痊。

凡疮不作脓。或不溃。或溃而不敛。皆气血虚也。若脓清稀。尤虚甚也。

一人臀痛。脓水不止。肌渐瘦。食少思。胃脉微弦。以六君子加藿香、当归数剂。食遂进。以十全大补汤。灸以豆豉饼。两月余而痊。

一弱人臀痛。脓成不溃。以十全大补汤数剂始托起。乃针之。又二十余剂而愈。夫臀居僻位。气血罕到。老弱患之。尤宜补其气血。庶可保痊。

一人腿内侧患痛。未作脓而肿痛。以内托黄 柴胡汤二剂少愈。又二剂而消。

一人臀漫肿。色不变。脉活数无力。脓将成尚在内。欲治以托里药。待发出而用针。彼欲内消。服攻伐药愈虚。复求治。仍投前药。托出针之。以大补药而愈。

凡疮毒瓦斯已结不起者。但可补其气血。使脓速成而针去。不可论内消之法。脓成。又当生熟浅深而针之。若大按乃痛者。脓深也。小按便痛者。脓浅也。按不甚痛。未成脓也。按之即复起者。脓也。按之不复起者。无脓也。若肿高而软者。发于血脉也。肿下而坚者。发于筋骨也。肉色不变者。发于骨髓也。

一人腿外侧患痛。漫肿大痛。以内托黄 汤酒煎二剂少可。更以托里数剂溃之而愈。

一妇腿痛。久而不愈。疮口紫陷。脓水清稀，予以为虚。彼不信。乃服攻毒之剂。虚症蜂起。复求治。灸以附子饼。服十全大补汤百余帖而愈。

凡疮脓清及不敛者。或陷下。皆气血虚极也。最宜大补。瘡成败症。若更患他症。卒难一人腿痛内溃。针之脓出四五碗许。恶寒畏食。脉诊如丝。此阳气微也。以四君子加炮。畏寒少止。又四剂而止。以六君子加桂数剂。饮食颇进。乃以十全大补。乃灸附子饼两月而愈。

一老腿痛脓自溃。忽发昏瞽。脉细而微。此气血虚极也。以大补之剂而苏。

一弱人流注内溃。出败脓五六碗。口服歪斜。脉亦虚极。乃虚甚也。非真中风。以独参汤加附子一钱二剂。更以大补药。月余而痊。

大抵脓血大泄。当大补气血为先。虽有他症。以末治之。凡痈大溃。发热恶寒。皆属气甚。若左脉不足者。补血药多于补气药。右脉不足者。补气药多于补血药。切不可发表。

一妇腰痛。脚弱弛长。不能动履。以人参败毒散。加苍术、黄柏、泽泄、而愈。

此条脚弱弛长。属湿热也。故凭症而治。

一妇环跳穴痛。肉色不变。脉紧数。此附骨疽也。脓未成。用内托黄酒煎汤。加青皮、龙胆草、山梔。数剂而止。

一人腿痛兼筋挛痛。脉弦紧。用五积散。加黄柏、柴胡、苍术而痊。（此凭脉凭症而作湿热治也。）

一妇附骨疽久不愈。脓水不绝。皮肤瘙痒四肢痿软。予以为虚。欲补之。彼惑为风疾。

遂服祛风药。竟至不救。

陈无择云。人身有皮毛、血脉、筋膜、肌肉、骨髓以成其形。内则有心、肝、脾、肺、主之。若随情妄用喜、怒、劳、佚。致五内精血虚耗。使皮血筋骨肉痿弱无力以运动。故致痿。状与柔风脚气相类。柔风脚气皆外所因。痿则五内不足也。

一人附骨疽。肿硬发热骨痛筋挛。脉数而沉。用当归拈痛汤而愈。

一人腿根近环跳穴痛彻骨。外皮如故。脉数带滑。此附骨疽脓将成。用托里药六剂。肿起作痛。脉滑数。脓已成。针之出碗许。更加补剂。月余而瘳。

一人腿内患痛。漫肿作痛。四肢厥。咽喉塞。发寒热。诸治不应。乃邪郁经络而然也。

香连翘汤一剂。诸症少退。又服。大便行二次。诸症悉退而愈。（此因诸治不效。故作郁结而用五香也。）

一妇左腿痛不能伸。脉弦紧。按则涩。以五积散二剂痛少止。又二剂而止。以神应养真而愈。（脉弦紧涩属寒。故用五积散辛热以散之。）

一人腿痛。膝微肿。轻诊则浮。按之弦紧。此鹤膝风也。与大防风汤二剂。已退。二三谓附子有毒。乃服败毒药。日渐消瘦。复求治。予谓今饮食不为肌肤。水谷不能运化精微。

溉脏腑周身百脉。神将何根据。兹故气短而促。其气损也。怠惰嗜卧。脾气虚也。小便不禁。

膀胱不藏也。时有躁热。心下虚痞。胃气不能上荣也。恍惚健忘。神明乱也。不治。后果歿。此症多患于不足之人。故以加减小续命、大防风二汤有效。若用攻毒药必误。

一妇患脚气。或时腿肿。筋挛腹痛。诸药不应。渐危笃。诸书云。八味丸治足少阴。脚腹疼痛。上气喘促欲死。遂投一服顿退。又服而愈。肾经虚尽之人。多有此患。乃肾水乘心克火。死不旋踵。宜急服。

一人腿痛。兼筋挛骨痛。脉弦紧。以大防风汤六剂。筋挛少愈。又二剂而肿消。但内一作痛。脉不弦紧。此寒邪已去。乃所滞瘀浊之物欲作脓。故痛不止。用托里药数剂。肿发起。脉滑数。乃脓已成。针之。用十全大补汤。月余而安。（按以前数条。皆筋挛骨痛而脉弦紧。可见弦紧多主寒邪。）

一妇膝肿痛。遇寒痛益甚。月余不愈。诸药不应。脉弦紧。此寒邪深伏于内也。用大防风汤。与火龙丹治之而消。

大抵此症。虽云肿有浅深。感有轻重。其所受皆因真气虚弱。而邪得以深袭。故附骨痛疽及鹤膝风症。

肾虚者多有之。前人用附子者。以温补肾气。而又能行药势散寒邪也。亦有体虚之人。

露卧。为冷气所袭。寒热伏结。多成此症。不能转动。乍热而无汗。按之痛应骨者是也。若经久不消。极阴生阳。寒化为热而溃也。若被贼风所甚伤。患处不甚热而洒淅恶寒。不时汗出。熨之痛少止。须大防风汤、火龙膏治之。又有挛曲偏枯。坚硬如石。谓之石疽。若热缓。积不溃。肉色赤紫。皮肉俱烂。名缓疽。其始末皆宜服前汤。欲其驱散寒邪。以补虚托里。一人右腿赤肿。痛。脉沉数。用当归拈痛汤。四肢反痛。乃湿毒壅遏。又况下部药力难达。非药不对症。遂砭患处。去毒血。仍用前药。一剂顿减。又四剂而消。

一人先腿痛。后又四肢皆痛。游走不定。至夜益甚。服除湿败毒之剂不应。脉滑而涩。

浊血为患。以二陈汤加苍术、羌活、桃仁、红花、牛膝、草乌治之而愈。（活与涩相反，此云何谓也。）

凡湿痰湿热。或死血流注关节。非辛温之剂。开发腠理。流通隧道。使气行血和。安能一人腿痛。每痛则痰盛。或作嘈杂。脉滑而数。以二陈汤加升麻、二术、泽泻、羌活、南星。治之而安。（此凭脉也。）

一人素有脚气。胁下作痛。发热。头晕。呕吐。腿痺不仁。服消毒护心等药不应。左关脉紧。右关脉弦。此亦脚气也。以半夏左经汤治之而愈。

一人脚软肿痛。发热饮冷。大小便秘。右关脉数。乃足阳明经湿热下注也。以大黄左经汤服而愈。

一人胫兼膝脚皆痛。治以加味败毒而愈。

一人两腿痛。脉活而迟。此湿痰所致。以二陈汤加术、黄柏、羌活、泽泻而愈。（此凭一人两腿肿痛。脉滑而缓。此湿痰所致。先以五苓散加苍术、黄柏二剂少愈。再以二陈、二术、槟榔、紫苏、羌活、独活、牛膝、黄柏而瘥。（此凭脉也。）

夫湿痰之症。必先以行气利湿健中为主。若中气和。则痰消而湿亦无所容矣。

一妇两腿痛。脉涩而数。此血虚兼湿热。先以苍术、黄柏、知母、龙胆草、茯苓、防风己、羌活数剂。肿痛渐愈。又以四物加二术、黄柏、牛膝、木瓜、月余而愈。（此凭脉也。）

一人肢节肿痛。脉迟而数。此湿热之症。以荆防败毒散加麻黄二剂。痛减半。以槟榔败四剂。肿亦除。更以四物汤加二术、牛膝、木瓜数剂而愈。（按脉迟与数相反。迟恐作细。）

一妇人脚胫肿痛。发寒热。脉浮数。此三阳经湿热下注。为患尚在表。用加味败毒散不乃瘀血凝结。药不能及于患处。砭去瘀血。乃用前药二剂顿退。以当归拈痛汤四剂而愈。

古云脚气是为壅疾。治当宣通。使气不能成壅也。壅既成而甚者。砭去恶血而去重势。

经云蓄则肿热。砭射之后。以药治之。

一妇两腿痛。遇寒则筋挛。脉弦紧。此寒邪之症。以五积散对四物汤数剂痛止。更

以四物汤加木瓜、牛膝、枳壳。月余而安。

一人腿肿筋挛。不能动履。以交加散二剂而愈。

一妇患腿不能伸屈。遇风寒。痛益甚。诸药不应。甚苦。先以活络丹一丸。顿退。又服而瘳。次年复痛。仍服一丸。亦退大半。更以独活寄生汤四剂而愈。

一人素有脚气。又患附骨痛作痛。服活络丹一丸。二症并瘳。

一人素有疝不能愈。因患腿痛。亦用一丸。不惟治腿有效。而疝亦愈矣。

一太安人臂痛数年。二丸而瘳。

一女患惊风甚危。诸医莫救。自用一丸即愈。且不再作。

夫病深伏在内。非此药莫能通达。但近代始云此药引风入骨。如油入面。故后人多不肯服。大抵有是病。宜用是药。岂可泥于此言。以致难瘳。

一妇两腿作痛。时或走痛。气短自汗。诸药不应。诊其尺脉弦数。此寒湿流注于肾经也。治以附子六物汤愈。

但人谓附子有毒。多不肯服。若用童便炮制。何患之有。况不常服。何足为虑。予中气不足。以补中益气汤加附子服三年。何常见其有毒。经云有是病用是药。

一妇肢节肿痛。胫足尤甚。时或自汗。或头痛。此大阳经湿热所致。用麻黄左经汤二剂而愈。（前条脉弦数而病寒湿。恐湿生热故也。）

一妇。血痔。兼腿酸痛似痹。此阴血虚不能养于筋而然。宜先养血为主。遂以加味四斤丸治之而愈。

一老筋挛骨痛。两腿无力。不能步履。以局方换腿丸治之。

一妇筋挛痹痛。两腿无力。不能步履。以三因胜酸丸治之并愈。

河间云。脚气由肾虚而生。然妇人亦病脚气者。乃因血海虚而七情所感。遂成斯疾。血海虚与男子肾虚类也。男女用药固无异。更当兼治七情。无不效也。

一妇腿痛。兼足胫挛痛。服发散药愈甚。脉弦紧。此肾肝虚弱。风湿内侵也。治以独活寄生汤痛止。更以神应养真丹而不挛矣。

一人素有腿痛。饮食过伤。痛益甚。倦怠。脉弱。以六君子加山楂、神曲、苍术、芎归、升麻、柴胡而愈。

一老素善饮。腿常肿痛。脉洪而缓。先以当归拈痛汤。湿热少退。后用六君子加苍术、黄柏、泽泻而痊。

一人饮食少过。胸满痞闷。或吞酸。两腿作痛。用导引丸二服顿愈。更以六君子汤加神曲、麦芽、苍术二十余剂。遂不复作而愈。

经云。饮食自倍。肠胃乃伤。是胃气不能施行。脾气不能四布。故下流乘其肝肾之虚。

足肿。加之房事不节。阳虚阴盛。遂成脚气。亦有内伤饮食。脾胃之气有亏。不能上升。则下注为脚气者。宜用东垣开结导引丸。开导引水。运化脾气。如脾气湿气壅遏不通。致面目发肿或痛者。宜用导滞通经汤以疏导之。

以上十九条乃脚气症。虽非疮毒。因治有验。故录之。

臀居少腹之后。此阴中之阴。其处下。其道远。其位僻。太阳虽多血。其气少也。气少行不到。血亦因而少来。中年以后生疽。须预补之。若无积补之功。其祸多在疮成痂后。或半年乃发。故人多忽略。

一人腿痛。脉症俱弱。亦危症也。治以托里。急使针刺。彼因不从。后脓开泻。淋漓不能收敛而死。

一人年逾五十。冬患腿痛。脉数。烦躁。饮冷。便秘。肿痛甚。此热淫于内也。宜用苦寒之药。投清凉饮。（二六）倍加黄芩。其势顿退。更以四物汤加黄芩而愈。

此条因症因脉而药之也。

一人年三十。连得忧患。作劳好色。左腿外侧廉红肿如粟。医以大府实。与承气两贴下之。又一医与大黄、朱砂、血竭三贴而脉大实。后果死。此厥阴多气少血经也。

一侍御患臀肿痛。小便不利。彼谓关格。

以艾蒸脐。大便亦不利。治以降火分利药不应。予诊其脉。脓已成。此患痈也。针之出脓数碗。大便即利。

五日后阴囊肿胀。小便不行。针之尿脓大泄。气息、归、术大剂犹缓。俾服独参汤至二斤。气稍复大抵疮疡。脓血大泄。先补气血为主。虽有他病。当从未治。

一人腿痛。脓成。针之出脓二碗许。饮托里药一剂大发热。更用圣愈汤（十七）二剂而止。翌汤而平。

一人腿肿。发热恶寒。以补中益气汤治之。彼以为缓。乃服芩、连等药。热愈盛。复请予治夫火之为病。当分虚实。芩连苦寒。能泄心肺有余之火。若老弱。或饮食劳倦而发者。

此为不足。当治以甘温之剂。未尝有实热而畏寒。虚热而喜寒者。此其验也。

一人年逾三十。左腿微肿痛。日久肉色如故。不思饮食。东垣云。疮疡肿下而坚者。发于筋。以六君子加藿香、当归数剂。饮食渐进。更以十全大补汤而愈。

此条因症制方而处治也。

一妇人二十余。饮食后。每有怒气。吞酸暖腐。或兼腿根胯内肿。服越鞠丸不应。此肝气此条因症而制方也。

一人年逾二十。稟弱。左腿外侧患毒。三月方溃。脓水清稀。肌肉不生。以十全大补汤（十三）加牛膝二十余剂渐愈。更以豆豉饼灸。月余而痊。

一人膝腿肿。筋骨痛。服十宣散不应。脉沉细。予用五积散二剂痛止。更以十宣散（四）

去桔梗。加牛膝、杜仲三十余剂。脓溃而愈。此寒气之肿。八风之变也。

此条因脉制方处治。

一人遍身走痛。两月后。在脚面结肿。未几腿股又患一块。脉轻诊则浮。重诊浮缓。此足。腠理不密。寒邪袭虚而然。以加减小续命汤（七五）四剂。及独活寄生汤（七六）数剂。疼痛顿去。更以托里药倍加参、归、术百贴而愈。

此条因脉制方而治也。

一人年二十。腿膝肿痛。不能屈伸。服托里药不应。以人参败毒散加槟榔、木瓜、柴胡、紫苏、苍术、黄柏而愈。此因症制方以治之也。

一人年逾五十。两腿肿胀。或生。小便频而少。声如瓮出。服五皮散不应。予诊之关沉缓。此脾虚湿气流注而然。非疮也。经曰。诸湿肿满。皆属脾土。按之不起。皆属于湿。以五苓散加木香。倍苍术、白术亦不应。予意至阴之地。关节之间。湿气凝滞。且水性下。脾气既虚。安能运散。非辛温之药。开通腠理。行经活血。邪气安得发散。遂以五积散二剂。势去大半。更以六君子加木香、升麻、柴胡、薏苡仁。两月余而愈。设使前药不应。更投峻剂。虚虚之祸不救矣。（此因渗泄不效。故用辛温以散之也。）

一人腿痛。脓清脉弱。灸以豆豉饼。更以托里药而愈。

一人年二十余。股内患毒日久。欲求内消。诊脉活数。知脓已成。因气血虚不溃。刺之脓痛。用八珍汤稍可。但脓水清稀。用十全大补汤（十三）三十余剂而痊。盖脓出反痛者虚也。

一僧股内患肿一块。不痛不溃。治托里二十余剂。脓成刺之作痛。予谓肿而溃。溃而反以气血虚甚也。宜峻补之。彼云。气无补法。予曰。正气不足。不可不补。补之则气化而痛自除。遂以参、归、术、熟、治之。两月余而平。

大抵疮疡。先发为肿。气血郁积。蒸肉为脓。故多痛。脓溃之后。肿退肌宽。痛必渐减。而痛愈盛者。气血不足也。即丹溪、河间虚甚之说。

附骨痛。皆因久得浓味。及酒后涉水得寒。故热深入髀枢穴左右。积痰瘀血相搏而成也。一女髀枢穴生附骨疽。在外侧廉少阳经分。始末用五香汤十宣散。一日。恶寒发热。膈满。犹大服五香汤。一夕喘死。此升散太过。孤阳发越于上也。

一人年逾四十。夏患附骨痛。予以火针刺去瘀血。更服托里药而愈。至秋忽不饮食。痰盛。劳则口舌生疮。服寒药腹痛。彼疑为疮。脾胃脉轻取似大。按之无力。此真气不足。虚火炎上也。治以八味丸。彼不信。自服二陈四物。几殆。复请予。仍以前丸治之而愈。

有脾土虚。不能克制肾水。吐痰而不咳者。尤宜用此丸。

王老年七十。季春因寒湿地气。得附骨疽于左腿足少阳分。微侵足阳明。阔六七寸。长。坚硬漫肿。肉色不变。皮泽深。但行步作痛。以指按至骨大痛。服内托黄汤一服立止。

再服肿消。

柴胡（钱半） 连翘 肉桂（各一钱） 黄归尾（各二钱） 鼠粘子（炒一钱）

黄柏甘草（炒各半钱） 升麻（七分）

上锉。酒盏半。水盏半。同煎至二盏。去渣。空心宿食消尽。大温服。少时。以早膳压之。不令大热上攻。犯中上二焦也。

一儿年十岁。四月于左腿近膝股内出附骨痛。不辨肉色。漫肿。皮泽木硬。疮势甚大。左腿乃肝之髀上也。

足厥阴肝经之分。少侵足太阴脾经。其脉左三部细而弦。按之洪缓微有力。用内托黄黄（二钱）柴胡（钱半）连翘（一钱二分）羌活（半钱）生（二分）归尾（七分半）

官桂 土瓜根 黄柏（酒洗各二分）

上锉。作一服。水酒各盏半。同煎至一盏。去渣。空心稍热服。

一人附骨痛。畏针不开。臀膝通溃。脉数发渴。烦躁。时嗽。饮食少思。齐氏曰。疮疡。时嗽。腹痛。渴甚。或泄利无度。或小便如淋。此恶症也。脓出之后。若脉洪数。难治。

微涩迟缓。易治。刺之脓出四五碗。即服参、
、归、术大剂。翌日脉稍敛。更服八珍汤。

（十四）加五味、麦门、肉桂、白朮三十余贴。脉缓脓稠。三月乃愈。

一老腿患附骨疽。肿硬。大按方痛。口干脉弱。肿聚不溃。饮食少思。予谓肿下而坚者筋骨。肉色不变者发于骨髓。遂托以参、等药三十余剂。脓虽熟不穿。予谓药力难达。必须针刺。不听。至旬日方刺。涌出清脓五六碗。然衰老气血不足养。毒又久。竟不救。

大抵疮疽。旬日不退。宜托之。有脓刺之。有腐肉取之。虚则补之。此十全之功也。

一人患贴骨疽。腿细短软。疮口不合。以十全大补汤。外灸附子饼。贴补药膏。调护得宜。百贴而愈。

一人环跳穴患附骨疽。彼谓小疮。服败毒药。外以寒药敷贴。因痛极针之。脓瘀大泄。

方知为痈。请治其脉。

右关浮大。此胃气已伤。故疮口开张。肉紫下陷。扪之 not 热。彼谓疮内更觉微冷。自谓漏矣。灸以豆豉饼。饮六君子加藿香、砂仁、炮姜数剂。胃气渐醒。饮食渐进。患处渐暖。

肌肉渐生。再以十全大补汤而愈。

一人亦患此。内痛如锥。外色不变。势不可消。喜其未用寒剂。只因痛伤胃气而不思食前药去炮姜治之。饮食稍进。更以十全大补汤二十余剂。脓成针去。仍以大补汤倍加参、芎、归。脓久不止。更加麦门、五味、贝母、远志数服渐止。疮亦寻愈。

二症盖因湿热滞于肉理。真气不能运化。其始宜除湿热。实脾土。和气血。则湿自消散。若脓未成。以隔蒜灸之。立效。

环跳穴痛。防生附骨疽。以苍术佐黄柏之辛。行以青皮。冬加桂枝。夏加黄芩。体虚加膝。以生甘草为使。大料煎。入姜汁。食前饮之。痛甚者。恐十数贴发不动。少如麻黄一二贴。又不动。恐疽将成。急掘地成坎。以火红。沃以小便。赤体坐其中。以席围下体。使热气熏蒸。腠理开、气血畅而愈。

一妇四十余。近环跳生疽。尺脉沉紧。腿不能伸。经曰。脾移寒于肝。痛肿筋挛。盖脾。肝主筋。肉温则筋舒。肉冷则筋急。遂与乳香定痛丸少愈。更以助胃壮气血药二十余剂而按此因脉沉紧。又因筋挛。是脉症俱寒。故治以此。

一人因痢骤涩。环跳穴作痛。与四物汤加桃仁、酒黄芩、红花、苍术、枳壳、黄柏、柴胡、青皮、生姜十余剂稍可。更刺委中出黑血而愈。

一后生HT骨痛。以风药饮酒一年。予以防风通圣散（六）去硝黄。加生犀角、浮萍百余贴成一疽近皮革。脓出而愈。后五六年。其处再痛。予曰。旧病作。无能为矣。盖发于新娶之后。多得香辣肉味。若能茹淡远房劳。犹可生也。出脓血四五年。延及腰背皆空。又三年而死。此纯乎病热者。

一少年天寒极劳。HT

骨痛。两月后生疽。深入骨边。卧二年剩骨而安。此寒转热者也。

取久疽及痔漏中朽骨。用乌骨鸡胫骨。以砒实之。盐泥固济。火红。地上出火毒。去泥。用骨研细。饭丸如粟米大。以纸捻送入窍内。更以膏贴之。

一人年逾五十。臀痛。脓熟不开。攻通大肛。脓从大便而出。予辞不治。果歿。

丹溪谓中年后不宜患此。脓成不刺。不亡得乎。

一人左膝肿大。三月不溃。予谓体虚。风邪袭于骨节。使气滞不行。故膝愈大而腿愈细曰鹤膝风。以大防风汤三十余剂而消。又有患此。伏枕半载。流脓三月。彼云初服大防风汤（八五）去附子。将溃。服十宣散。今用十全大补汤去桂。皆不应。视脉症甚弱。予以十全大补汤。每帖加熟附一钱。三十余剂少愈。乃减附子五分。服至三十余剂。将愈。却去附子。

更用三十余剂而痊。

夫立方之义。各有所宜。体气虚弱。邪入骨界。遏绝隧道。若非桂附辛温之药。开发腠理关节之寒邪。通畅荣卫经络之气血。决不能愈。

一人脚跟生毒如豆许。痛甚。状似伤寒。予谓猎人被兔咬。脚跟成疮淫蚀。为终身之疾。因名兔齿。以还少丹（九四）内塞散（五十）治之稍可。次因纳宠作痛。反服攻毒药。致血气愈弱。

腿膝软痿而死。

盖足根乃二跷发源之处。肾经所由之地。疮口不合。则跷气不能发生。肾气由此而泄。

终身之疾。况彼疮先得于虚。复不知戒。虽大补气血。犹恐不及。安服攻毒暴悍之药以戕一人腿痛筋挛。遍身酸软。方士与痰药及托里药。期三日可痊。不应。予谓非疮毒也。

软短。小筋弛长。此湿热为患。以人参败毒散加苍术、黄柏、槟榔、木瓜少愈。更以清躁汤二十帖而愈。（此因症也。兼之屡治不效。此作湿热而治有所本也。）

夫内有湿热。外有风寒当泻不当补。托里甘温之剂。安得取效。

冷漏。精要治冷漏诸疮。与桂附丸。

丹溪曰。此冷只因疮久不合。风寒乘之。气血不朝而成。浓朴虽温。泄散尤速。恐不若参、佐以陈皮。庶乎与病相得。

痛疽。疮口久不合。肉白脓少。此为疮口冷滞。气血枯竭。不朝于疮。以致如是。

精要艾叶一握煎汤。避风处以绢兜艾叶乘热浇洗疮口四围净肉。一日一次。仍烧松香熏疮口良久。以神异膏贴之。

丹溪曰。血气枯燥。不知痛。虚于内。惟务热洗于外。不揣其本而齐其末。却乃归罪于。大抵溃疡宜洗。若无补药以实其内。切恐有时之快。少顷疲惫。有不耐烦之意。非虚而何。可不先议补接乎。

内托羌活汤 治足太阳经尻臀生痛坚硬。肿痛大作。左右尺脉俱紧。按之无力。

防风 本 归尾（各一钱） 羌活 黄柏（酒制各二钱）

肉桂（三分） 连翘 甘草（炙） 苍术（各五分） 陈皮（五分） 黄（钱半）

上锉。水酒各半煎。食前温服。取汁内托。

一官两腿作痛。形体清瘦。肝脉弦数。却属有余之症。治以龙胆泻肝汤并愈。（此凭症疮肿之症若不诊候。何以知阴阳勇怯气血聚散耶。又云。脉洪大而数者实也。细微而数者虚也。河间云。脉沉实者邪在脏。浮大者邪在表。观此诚发前言所未发。诊候之道。岂可缺耶

卷五

腰疽一百十八

一妇年逾七十。腰生一。作痒异常。疑虫虱所毒。诊脉浮数。齐氏曰。脉浮数反恶寒疮也。翌日复诊。脉乃弱。予谓未溃而脉先弱。何以收敛。况大便不通。则真气已竭。治之无功。固请不得已。用六君子（二）加藿香神曲。饮食渐进。大便始通。更用峻补之剂。溃而脓清作渴。再用参、归、麦门、五味而渴止。喜曰可无虞矣。予曰不然。不能收敛。先入之言也。彼疑更医。果歿。

一人年十九。腰间肿一块。无头不痛。色不变。三月不溃。饮食少思。肌肉日瘦。此气理。荣气不行。郁而为肿。名曰湿毒流注。元戎曰。若人饮食疏。精神衰。气血弱。肌肉消瘦。荣卫之气。短促而涩滞。故寒转腠理。闭郁为痛者。当补以接虚怯之气。遂以十全大补汤（十三）加香附、陈皮三十余剂。始针出白脓一碗许。仍用药倍加参、。仍灸以豆豉饼渐愈。彼乃惑于速效。内服败毒。外贴凉药。反致食少脓稀。患处色紫。复请予治。喜得精气未衰。仍以前药加远志、贝母、白蔹百剂而愈。此或久而不愈。或脓水清稀。当服内塞散（五二）及附子饼灸。然后可愈。

一妇年逾二十腰间突肿寸许。肉色不变。微痛不溃。发热脉大。此七情所损。气血

凝滯而然。当益气血。开郁结。更以香附饼熨之。使气血充畅。内自消散。若尔。虽溃亦无危。

不听。乃服十宣流气之药。气血愈虚。溃出清脓。不敛而死。按此脉大。非七情脉也。当时必有所见。

一妇产后腰间肿。两腿尤甚。此瘀血滯于经络而然。不早治。必作痈。遂与桃仁汤二剂。更没药丸（五六）数服而痊。亦有恶血未尽。脐腹刺痛。或流注四肢。或注股内。痛如锥刺。或两股肿痛。此由冷热不调。或思虑动作。气乃壅遏。血蓄经络而然。宜没药丸（五二）治之。亦有或因水湿所触。经水不行而肿痛者宜当归丸（五七）治之。

凡恶血停滯。为患匪轻。治之稍缓。则为流注。为骨疽。多致不救。

一老人患痢。骤用涩药。致大肠经分作痛。此湿毒流于经隧而然。以四物加桃仁、酒芩、红花、升麻、枳壳、陈皮、甘草治之渐愈。因年高胃弱竟歿。

一人年二十。遍身微痛。腰间作肿痛甚。以补中益气汤（十六）加羌活四剂少可。又去羌活十余剂而愈。

此条以虚治。当时于形色脉上必有所见。

一人逾四十。患腰痛。服流气饮寄生汤不应。以热手熨之少可。其脉沉弦。肾虚所致。

肾丸（四六）而愈。此因脉沉弦。且据服攻剂不应。故知虚也。弦则不软。如物无水不柔软之

卷六

脱疽一百十九

（丁生手足指。或足溃而自脱。故名脱疽。有发于手指者。名蛀节。丁重者痛者。除湿攻毒。更隔蒜灸至不痛。

痛或不痛者。隔蒜灸。更用解毒药。若色黑急割去。速服补剂。庶可救。黑延上者不色赤 痛者。托里消毒更兼灸。

作渴者。滋阴降火。色黑者不治。

一人足指患此。痛色赤发热。隔蒜灸之。更以人参败毒散去桔梗。加金银花、白芷、大黄二剂痛止。又十宣散去桔梗、官桂。加天花粉、金银花。数剂而平。（此凭症也。）

一人年逾四十。左足大指赤肿 痛。此脾经积毒下注而然。名曰脱疽。喜色赤而肿。以败毒散去人参、桔梗。加金银花、白芷、大黄二剂。更以栝蒌金银花、甘草节四剂顿退。再以十宣散去桔梗、桂。加金银花、防己数剂愈。

一人患此。色紫赤不痛。隔蒜灸五十余壮。尚不痛。又明灸百壮方知。乃以败毒散加金银花、白芷。数剂而愈。

一膏粱年逾五十亦患此。色紫黑。脚 痛。孙真人曰。脱疽之症。急斩之去。毒延腹必。色黑不痛者亦不治。喜其饮食如故。动息自宁。为疮善症。遂以连翘败毒散（二六）六剂。

更以金银花、栝蒌、甘草节二十余剂。患指溃脱。更以芎、归、生、连翘、金银花、白芷二十余剂而愈。

次年忽发渴。服生津等药愈盛。用八味丸而止。

大抵此症。皆由膏粱浓味。或房劳太过。丹石补药所致。其发于指。微赤而痛可治。治愈。急斩去之。庶可保。否则不治。色紫黑。或发于脚背亦不治。或先渴而后发。或先发而后渴。色紫赤不痛。此精气已竭。决不可治。

一刍豢左足指患一泡。麻木色赤。次日指黑。五日连足黑冷。不知疼痛。脉沉细。此脾毒所致。进飞龙夺命丹一服。翌日令割去足上死黑肉。割后骨始痛。可救治。以十全大补汤而愈。（此因症肉黑知为毒盛。不在于脉也。）

盖死肉乃毒瓦斯盛拒截荣气所致。况至阴之下。血气难达。经曰。风淫末疾是也。向若攻伐之。则邪气乘虚上侵。必不救矣。

一人足指患之大痛。色赤而肿。隔蒜灸之痛止。以人参败毒散去桔梗。加金银花、白芷。大黄而溃。更以仙方活命饮而痊。（此凭症也。）

此症情势虽小。其恶甚大。须隔蒜灸之。不痛者宜明灸之。庶得少杀其毒。此症因膏粱浓味酒渴者。皆肾水涸、不能制火故也。初发而色黑者不治。赤者水未涸尚可。若失解其毒。以致肉死色黑者。急斩去之。缓则黑延上足必死。而患不问肿溃。惟隔蒜灸有效。亦有色赤作痛溃者。元气未脱易治。夫至阴之下。血气难到。毒易腐肉。药力又不易到。况所用皆攻毒之药。未免先干肠胃。又不能攻敌其毒。不若隔蒜灸。并割去。最为良法。孙真人云。在指则截。在肉则割去。即此意也。

一人足指患之。色黑不痛。令明灸三十余壮而痛。喜饮食如常。予谓急割去之。速服补剂。彼不信。果延上。遂致不救。

一人脚背患之。色黯而不肿痛。烦躁大渴。尺脉大而涩。此精气已绝。不治。后歿。

又有手指患此。色黑不痛。其指已死。予欲斩去。速服补药。恐黑上臂不治。彼不信。

另服败毒药手竟黑。遂不救。

一人足指患之。色紫不痛。隔蒜灸五十余壮。尚不知痛。又明灸百壮始痛。更投仙方活命饮四剂。乃以托里药溃脱而愈。（此凭症也。）

一人脚背患此。赤肿作痛。隔蒜灸三十余壮痛止。以仙方活命饮四剂而溃。更以托里消毒药而愈。（此凭症也。）

一人足指患之。色赤痛。作渴。隔蒜灸数壮。以仙方活命饮三剂而溃。更服托里药。

及加减八味丸溃脱而愈。

一妇修伤次指。成脓不溃。痛至手。误敷冷药。以致通溃。饮食少思。彼为毒瓦斯内攻脉沉细。此痛伤胃气而然。遂刺之。服六君子加藿香、当归。食进。更以八珍汤加黄。白芷。桔梗。月余而愈。（此凭症脉也。）

一人伤拇指。色紫不痛。服托里药。及灸五十余壮。作痛。溃脓而愈。（此凭症也。）

一幼女因冻伤两足。至春发溃。指俱坏。令取之。服大补药而愈。（此凭症也。）

一女患嵌甲伤指。年余不愈。日出脓数滴。予谓足大指乃脾经发源之所。宜灸患处。使瘀肉去。阳气至。疮口自合。否则不治。彼惑之。不早治。后变劳症而歿。

盖至阴之下。血气难到。女人患此。多因扎缚。致血脉不通。或被风邪所袭。则无血气。遂成死肉。惟当壮脾胃。行经络。生血气则愈。有成破伤风。以致牙关紧急。口眼邪者。先玉真散（百二三）一二服。然后投以生血通经则可。

卷六

面疮一百二十

（附颐毒）

一人年逾三十。夏月热病后患颐毒。积日不溃。气息奄奄。饮食少思。大便不禁。诊脉如经曰。脉息如无似有细而微者。阳气衰也。齐氏曰。饮食不入。大便滑利。肠胃虚也。以六君子加炮姜、肉豆蔻、破故纸数剂。泄稍止。食稍进。更加黄柏、当归、肉桂。溃而脓水清稀。前药每服加熟附一钱。数剂泄止。食进。脓渐稠。再以十全大补汤加酒炒芍药、白朮。

月余而愈。（此凭脉症也。）

一人年逾四十。胃气素弱。面常生疮。盗汗发热。用黄建中汤少愈。更用补中益气汤而平。（此凭症也。）

东垣云。气虚则腠理不密。邪气从之。逆于肉理。故多生疮。若以甘温之剂实其根本。

则腠理自固。即无他疾。

一人年三十。面患疮。溃已作渴。自服托里及降火药不应。脉浮而弱。丹溪曰。溃瘍作属气血俱虚。遂以参、各三钱。归、、朮各二钱。数服渴止。又以八珍汤加黄数剂。

脉敛而愈。（此凭脉症也。）

一人年四十。头面生疮数枚。痛饮冷。积日不溃。服清热消毒不应。脉数。按之即实。用防风通圣散（六）二剂顿退。又以荆防败毒散（七）而愈。（此凭脉症也。）

一人年逾六十。素食浓味。颊腮患毒未溃而肉先死。脉数无力。此胃经积毒所致。然颊属胃经。未溃肉死。则胃气虚极。老人岂宜患此。果歿。经曰。膏粱之变。足生大疔。受如持虚。此之谓也。

卷六

口齿一百二十一

一人齿痛。脉数实。便秘。用防风通圣散即愈。（此凭脉症也。）

一人齿痛甚。胃脉数实。以承气一剂即止。（此凭脉症也。）

一老齿痛。午后则发。至晚尤甚。胃脉数而实。以凉膈散加荆芥、防风、石膏。一剂而瘳。（此凭脉症也。）

一人齿痛。胃脉数而有力。以清胃散加石膏、荆芥、防风二剂而痊。（此凭脉症也。）

一人齿痛。脉浮无力。以补中益气汤加黄连、生地黄、石膏治之。不复作。（此凭脉症也。一人齿痛。脉数无力。用补中益气加生、牡丹皮而愈。）

一人齿肿痛。至颊腮。素善饮。治以清胃散数剂而愈。

一人齿痛。服清胃散不应。服凉膈散愈盛。予用补肾丸（四六）而愈。（此条因治不效而知为肾虚也。）

一人颊腮肿。至牙龈。右关脉数。此胃经风热上攻也。治以犀角升麻汤而消。（此凭一妇常口舌糜烂。颊赤唇干。眼涩作渴。脉数。按之则涩。此心肺壅热于气血为患。名热劳症也。当多服滋阴养血药。彼欲速效。用败毒寒剂攻之。后变瘵而歿。）

良方云。妇人热劳者。由心肺壅热伤于气血。气血不调。脏腑壅滞。热毒内积。不得宣所致也。其候心神烦躁。颊赤头痛。眼涩唇干。四肢壮热。烦渴不止。口舌生疮。神思沉昏。嗜卧少寐。饮食无味。举体酸疼。或时心怔。或时盗汗。肌肤日渐消瘦。故名热劳也。

卷六

口舌疮一百二十二

一人胃弱痰盛。口舌生疮。服滚痰丸愈盛。吐泻不止。恶食倦怠。此胃被伤也。予以香砂六君子汤（二百三六）数剂少可。再以补中益气加茯苓、半夏二十余剂而愈。

夫胃气不足。饮食不化。亦能为痰。补中益气。乃治痰之法也。苟虚症而用峻利之药。

鲜有不殆。

一人年逾四十。貌丰气弱。遇风则
。劳则口舌生疮。胸常有痰。目常赤涩。服八味丸而愈。（此凭症也。）

一人脾胃虚。初服养胃汤、枳术丸有效。久服反虚。口舌生疮。劳则愈盛。服败毒药则呕吐。此中气虚寒也。

治以理中汤少愈。更以补中益气加半夏、茯苓。月余而平。

夫养胃汤。香燥药也。若饮食停滞。或寒滞中州。服则燥开脾胃。宿滞消化。少为近理。枳术丸。消导药也。

虽有白术。终是燥剂。故久服此二药。津液愈燥。胃气愈虚。况胃气本虚而用之。岂不其病哉。亦有房劳过度。真阳虚惫。或元稟不足。不能上蒸。中州。不运。致食不进者。以补真丸。（三六）治之。使丹田之火上蒸脾土。

则脾土温和。中焦自治。饮食自进。经曰。饮食不进。胸膈痞塞。或食不消。大府溏泄。此皆真火不能上蒸脾土而然也。若肾气壮。则丹田之火上蒸脾土。则无此病矣。

一方 小儿口疮。江茶、粉草为末。敷之。

一方 用黄丹。

又方 苦参 黄丹 五倍子 青黛等分。研为末敷。

又方 青黛 芒硝 为末。敷。

胎毒口疮 五倍子 黄丹 江茶 芒硝 甘草等分。为末。敷。

又方口疮 黄柏 细辛 青盐等分。为末。敷之。三日即愈。

卷六

咽喉一百二十三

疼痛或寒热者。邪在表也。宜发散。

肿痛痰涎壅盛者。邪在上也。宜降之。

痛而脉数无力者属阴虚。宜滋阴降火。

肿痛发热便秘者。表里俱实也。宜解表攻里。如症紧急。便刺患处。或刺少商穴。

一人咽痛脉数。以荆防败毒散加黄连二剂少愈。乃去芩、连。又六剂而愈。（此凭脉症一人乳蛾肿痛。脉浮数。尚未成脓。针去恶血。饮荆防败毒散二剂而消。（此凭症也。）

一人咽喉作痛。痰涎上壅。予欲治以荆防败毒散加连翘、山梔、玄参、牛蒡子。彼自服降火之药。反加发热。咽愈肿痛。急刺少商二穴。仍以前药加麻黄汗之。诸症并退。惟咽间一紫泡仍痛。此欲作脓。以前药去麻黄一剂。脓溃而愈。（此凭症也。）

凡咽痛之疾。治之早或势轻者。宜荆防败毒散以散之。治之迟或势重者。须刺少商穴。

已结。必刺患处。亦有刺少商。咽虽利而未痊愈者。必成脓也。然脓去则安。若有大便秘结者。虽经针刺去血。必以防风通圣散（六）攻之。然甘寒之剂。非虚火不宜用。

一妇咽喉肿痛。大小便秘。以防风通圣散（六）一剂。诸症悉退。又荆防败毒散（七）三剂而安。（此凭症也。）

治此。轻则荆防败毒散、吹喉散、重则用密钥匙。及刺患处出血最效。否则不救。针少商二穴亦可。但不若刺患处之神速耳。

一人咽喉肿痛。脉数而实。以凉膈散一剂而痛止。再以荆防败毒散加牛蒡子二剂而

肿退。以荆防败毒散二剂。又以甘桔、荆防、玄参、牛蒡子四剂而平。

一人噤痛肿痛。脉浮数。更沉实。饮防风通圣散（六）一剂。泻一次。势顿退。又荆防败毒散二剂而消。（此凭症脉也。）

一人咽喉肿秘。牙关紧急。针不能入。先刺少商二穴出黑血。口即开。更针患处。饮清咽利膈散一剂而愈。（此凭症也。）

大抵吐痰针刺。皆有发散之意。故多效。不用针刺。多致不救。

一人咽喉肿闭。痰涎壅甚。以胆矾吹咽中。吐痰碗许。更以清咽利膈汤四剂而安。（此凭症也。）

一人咽喉肿痛。药不能下。针患处出紫血少愈。以破棺丹噙之。更以清咽消毒散（六五）

而愈。（此凭症也。）

一人咽喉干燥而痛。以四物汤（九）加黄柏、知母、玄参四剂少愈。再用人参固本丸（二百四一）一剂。不复发。

一人口舌生疮。服凉药愈甚。治以理中汤（二七）而愈。（此因治误而变。）

一人咽痛。午后益甚。脉数无力。以四物汤（九）加黄柏、知母、荆、防四剂而愈。仍以前药去荆防。加玄参、甘、桔数剂。后不再发。

一人口舌糜烂。服凉药愈甚。脉数无力。以四物加酒炒黄柏、知母、玄参一剂顿退。四剂而痊。（此凭脉症也。）

一人口舌生疮。饮食不甘。劳而愈甚。以理中汤顿愈。（此凭症也。）

一人口舌生疮。脉浮而缓。用补中益气汤（十六）加炮干姜。更以桂末含之。即愈。

一人患之。劳而愈甚。以前药加附子三片。二剂即愈。

丹溪曰。口疮服凉药不愈者。此中气不足。虚火从上无制。用理中汤。甚则加附子。

一弱人咽痛。服凉药或遇劳愈甚。以补中益气汤（十六）加芩、连四剂而愈。乃去芩、连又数剂不再发。（此凭症也。）

常治午后痛。去芩、连加黄柏、知母、玄参。亦效。

一老咽痛。日晡甚。以补中益气汤（十六）加酒炒黄柏、知母。数剂而愈。（此凭症也。）

一人乳蛾肿痛。饮食不入。疮色白。其脓已成。针之脓出。即安。（此凭症也。）

一人咽喉肿痛。予欲针之。以泄其毒。彼畏针。只服药。然药既熟。已不能下矣。始急针患处。出毒血。更以清咽消毒药而愈。

一患者其气已绝。心头尚温。急针患处。出黑血即苏。如鲍符卿、乔侍郎素有此症。每患。针去血即愈。

大抵咽喉之症。皆因火为患。其害甚速。须分缓急。及脓成否。若肿闭及壅塞者。死如。宜用密钥匙吹患处。吐出痰涎。气得流通则苏。若吐后仍闭。乃是恶血或脓毒。须急针患处。否则不治。前人云。喉闭之火与救火同不容少待。治喉之方固多。惟用针有回生之功。

学人不可不察。

一妇咽间作痛。两月后。始溃。突而不敛。遍身筋骨作痛。诸药不应。先以萆汤数剂而敛。更以四物汤（九）倍用萆、黄二十余剂。诸症悉退。（此凭症也。）

一弥月小儿。先于口内患之。后延于身。年余不愈。以萆为末。乳汁调服。母以白汤调服。月余而愈。（此凭症也。）

一人咽间先患。及于身。服轻粉之剂稍愈。已而复发。仍服之。亦稍愈。后大发。上与鼻相通。臂腿数枚。其状如桃。大溃。年余不敛。神思倦怠。饮食少思。虚症悉具。投以萆汤为主。以健脾胃之剂兼服之。月余而安。（此凭症也。）

一妇患之。脸鼻俱蚀。筋骨作痛。脚面与膝各肿一块。三月而溃。脓水淋漓。半载不敛。治以前药。亦愈。（此凭症也。）

一人咽喉肿痛。口舌生疮。先以清咽消毒散（六五）二服。更以玄参升麻汤而愈。（此凭一人咽喉作痛。午后尤甚。以四物加酒炒知母、黄柏、桔梗治之而愈。（此凭症也。）

一人喉闭。服防风通圣散。肿不能咽。此症惟针乃可。牙关已闭。刺少商出血。口即开。以胆矾吹患处。吐痰二碗许。仍投前药而愈。尝见此疾畏针不刺。多毙。（此凭症也。）

一人喉闭。肿痛寒热。脉洪数。此少阴心火。少阳相火。二脏为病。其症最恶。惟刺患血为上。彼畏针。以凉膈散（二六）服之。药从鼻出。急乃愿针。则牙关已紧。遂刺少商二穴。以手勒出黑血。口即开。仍刺喉间。治以前药。及密钥匙（四八）吹之顿退。又以人参败毒散（六四）加芩、连、玄参、牛蒡子四剂而平。

经曰。火郁发之出血。亦发汗之一端。河间曰。治喉闭之火。与救火同。不容少怠。尝闭不去血。喉风不去痰。以致不救者多矣。每治喉咽肿痛。或生疮毒。以荆防败毒加芩连。重者用防风通圣散。并效。

一人患此。劳则愈盛。以补中益气加玄参、酒炒黄柏、知母而愈。（此凭症也。）

一人口舌常破。如无皮状。或咽喉作痛。服清咽利膈散愈盛。治以理中汤而愈。（此因治不应而更方也。）

精要曰。凡痈疽失于治疗。致令热毒冲心。咽喉口舌生疮。甚至生红黑菌。难于治疗。

宜琥珀犀角膏。

生犀角屑 真琥珀（研） 辰砂（研） 茯神（去皮木） 酸枣仁（去壳研） 人参 各一钱（研一字）

上为细末。入乳钵研匀。炼蜜搜为膏。瓷器盛贮。疾作。每服一弹子大。浓煎麦门冬汤化下。一日连进五服。或先服犀角散以解之。生犀角屑、玄参、（去芦）升麻、生黄、赤芍药、麦门冬、生甘草、当归（各一两）、大黄（微炒二两）为粗末。每服三钱。水盏半煎至七分。去滓温服。

卷六

诸哽一百二十四

诸骨哽。用象牙末吹患处。或取犬涎。徐徐咽下。立效。用苕根捣烂。丸如弹子大。

就将所哽物煎汤化下。

又方。食橄榄。用核为末。含之亦效。

谷麦芒在咽不出。取鸡鹅延含之。立消。

误吞金银等物。多食诸般肥肉膏滑。自从大便出。

误吞铜钱。用炭末白汤调服。多食蜜食饴糖。自从大便出。或多食葶苈。或胡桃肉。钱误吞针。用磁石如枣核大。磨令光。钻一孔。用线穿。含之。针自口出。

卷六

伤损脉法一百二十五

（附破伤风）

经云。肝脉转坚而长。色不青。当病坠若转。因血在胁下。令人呕逆。

金匱云。寸口脉浮。微而涩。当亡血。若汗出者。当身有疮。被刀斧所伤。亡血故也。

脉经云。金疮出血太多。脉虚细者生。数实大者死。金疮出血。脉沉小者生。浮大者死。斫刺出血不止者。脉来大者。七日死。滑细者生。

从高颠仆。内有瘀血。腹胀脉坚强者生。小弱者死。

破伤有瘀血在内。脉坚强实则生。虚小弱者死。皆为脉病不相应故也。

一妇臀痛。疮将愈。患破伤风。发热搐搦。脉浮数。治以当归地黄汤。不信。乃服发散败毒药。果甚。始信而服之。至数剂而痊。

脉浮数而发表。今用发表而病重。可见脉之浮数。亦有主阴虚者、必兼症参之为稳。认作阴虚。由臀痛后也。

夫破伤风症。须分表里。别虚实。不可一概治之。原病式云。破伤中风之由。因疮热甚结而荣卫不得宣通。怫热因之遍体。故多白痴。是时疮口闭塞。气难通泄。热甚则生风也。

不已。则表传于里矣。但有风热微甚兼化。故殊异耳。

大法。破伤中风。风热燥甚。怫郁在表而里气尚平者。善伸数欠。筋脉拘急。时或恶寒筋畅而搐。脉浮数而弦者。宜辛热治风之药。开冲结滞而犹伤寒。表热怫郁。而以麻黄汤。

辛热发散者同也。凡用辛热开冲风热结滞。宜以寒药佐之则良。免致药虽中病。而风热转甚也。如治伤寒发热。用麻黄、桂皮、加黄芩、知母、石膏之类足也。若世以甘草、滑石、葱、豉寒药发散甚妙。若表不已。渐伤入里。里又未大。甚而脉在肌肉者。宜以退风热开结滞之寒药调之。或微加治风辛热亦得。犹伤寒在半表半里。以小柴胡和解之意也。若里热已甚。而舌强口噤。项背反张。惊搐惕搦。涎唾涸枯。胸腹满塞。而或便溺秘结。或时汗出。脉洪数而弦也。然汗出者。由风热郁甚于里。而表热稍罢。则腠理疏泄。而心火热甚。故汗出也。法宜除风散结寒药下之。后以退风热开郁滞之寒药调之。而热退结散。则风自愈矣。凡治此。亦宜按摩导引。及以箸斡开牙关。勿令口噤。使粥药得下也。

病机云。破伤风者。有因卒暴损伤。风袭之间。传播经络。致使寒热更作。身体反张。

不开。甚者邪气入脏。有因诸疮不瘥荣卫俱虚。肌肉不生。疮眼不合。邪亦能外入于疮。为破伤风之疾。有诸疮不瘥。举世皆言着灸为上。是为熟疮。而不知火热客毒。逐经传变。不可胜数。微则发热。甚则生风而搐。或角弓反张。口噤目斜。亦有破伤不灸。而病此者。因疮着白痂。疮口闭塞。气难通泄。故阳热易为郁结。热甚则生风也。徐用诚云。此论所因有四。一者因疮口入风。似属外因。一者因灸逐热。似属不内外因。一者因疮口闭塞。内热生风似属内因也。又云。破伤风症。古方药论甚少。岂非以此疾与中风同论。故不另立条目也。唯河间论。与伤寒表里中三法同治。用药甚详。其言病因。有因外伤于风。有因灸及内热所作者。然与中风相似也。但中风之人。尚可淹漚岁月。而破伤风者。犯之多致不救。盖中风有在经、在脏、在腑之异。独入脏者最难治。破伤风或始而出血过多。或疮早闭合。瘀血停滞。俱是血受病。属阴五脏之所主。故此风所伤。始虽在表。随则必传入里脏。故多死也。此病或疮口袒露。不避风寒。而有所伤。或疮口闭合。密被风邪而及。病已十分安全而忽有此。大抵皆由内气虚而有郁热者得之。若内气不虚而无郁热者。虽伤而无所害也。

卷六

跌仆一百二十六

一人坠马。两胁作痛。以复元活血汤二剂顿止。更以小柴胡加当归、桃仁二剂而安。（此凭症也。）

一老坠马。腹作痛。以复元通气散。用童便调进二服少愈。更以四物加柴胡、桃仁、红花四剂而安。（此凭症也。）

一人跌仆。皮肤不破。两胁作疼发热。口干。自汗。须先饮童便一瓯。烦渴顿止。随进复血汤。倍用柴胡、青皮一剂。胀痛悉愈。又剂而安发明经曰。从高坠下。血流于内。不分十二经络。圣人俱作风中肝血。留于胁下。以中风疗之。血者皆肝之所主。恶血必归于肝。不问何经之伤。必留于胁下。盖肝主血故也。痛甚则必自有汗。但人汗出。皆为风症。诸痛皆属于肝木一人青肿作痛。以萝卜汁调梔子末敷之。以四物汤加柴胡、黄芩、天花粉、穿山甲。二剂少愈。更以托里散、健脾药而愈。（此凭症也。）

卷六

杖疮血热作痛一百二十七

胸膈胀满宜行血。老弱者宜行气活血。更饮童便酒。肠痛者宜下血。血去多而烦躁者补血。如不应。独参汤。（四五）瘀肉不溃。或溃而不敛。宜大补气血。

一人杖疮。瘀肉不腐。乃大补之。渐腐。更以托里健脾药而愈。（此凭症也。）

一人风入杖疮。牙关紧急。以玉真散一服少愈。再服而安。

一官谏南巡受杖。瘀血已散。坏肉不溃。用托里药稍溃。脓清。此血气虚也。非大剂参、不能补彼恐腹满。予强之。饮食稍思。遂加大补。肉溃脓稠而愈。（此凭症也。）

一尝治。被杖数人。皆先散。其瘀血渐用排脓托里之药。俱愈。夫叫号伤气。忍痛气血虚明矣。况脾主肌肉。脾气受伤。饮食必减。血一冰则肌肉不生故必理脾脾健肉自生。

非参、术、归、之类培养脾土。则肌肉何由而生。又须分人虚实。及有无瘀血。盖打扑坠堕。皮肉不破。肚腹作疼者。必有瘀血在内。宜复元活血汤（三三）攻之。老弱者。加桃仁、红花、穿山甲。补而行之。

若血去多而或烦躁。此血虚也。宜独参汤补之。（四五）有打扑坠堕稍轻。别无瘀血等症。但只痛不止者。惟和气血。调经脉。其痛自止。更以养气血健脾胃。无有不效。亦有痛伤胃气作呕。或不饮食。以四君子加藿香、砂仁、当归治之。

若有瘀血。不先消散。而加补剂。则成实实之祸。设无瘀血。妄行攻利。则致虚虚之祸矣。

一人因杖臀膝俱溃。脓瘀未出。时发昏愤。此脓毒内作也。急开之。昏愤愈盛。此虚也八珍汤（十四）一服少可。数服死肉自溃。顿取之。用猪蹄汤洗净。以神效当归膏涂贴。再服十全大补汤。两月而愈。若更投破血之剂。危矣。（此凭症也。）

大抵杖疮。皆瘀血为患。宜速治疗。浅者砭之。深者刺之。更以活血流气药治之。内溃之。有腐肉取之。以壮胃生血药托之。可保无危。有伤筋骨而作痛者。以没药降圣丹治之。若牙关紧急。或腰背反张者。以玉真散治之。并效。

杖疮热血作痛。凉血去瘀血为先。须下鸡鸣散之类。黄柏 生地黄 紫金皮皆要药。

膏药 紫金皮 生地黄 黄柏 乳香 没药 大黄之类 又方 大黄 黄柏为末。生地汁调敷。干则易。

又方 野苳根嫩者。不拘多少。洗净。同盐搗敷。伤重多用盐。效。

尝见覆车压伤者。七人仆地呻吟。一人未苏。俱令以热童便灌之。皆得无事。又曾被重伤。瞋闷。良久复苏。胸满如筑。气息不通。随饮热童便一碗。胸宽气利。惟小腹作痛。与复元活血汤（三三）一剂。便血数升许。痛肿悉退。更服养血气药而痊。

大凡损伤。不问壮弱。有无瘀血。俱宜热童便以酒佐之。推陈致新。其功甚大。若胁或作痛。或发热烦躁。口干喜冷。饮热童便一瓯。胜服他药。他药虽亦取效。但有无瘀血。

不能尽识。反致误人。惟童便不动脏腑。不伤血气。闻操军或坠马伤者。服之亦佳。又凡肿痛。或伤损者。以葱捣烂热罨之。尤妙。本草云。葱治伤损。

一人坠马伤头并臂。取葱捣烂。炒热罨患处。以热手熨之。服没药降圣丹（百六）而愈。

一人误伤去小指一节。牙关紧急。腰背反张。人事不知。用玉真散、（百二三）青州白丸（百八）各一服。未应。此亦药力不能及也。急用蒜捣烂裹患指。以艾灸之。良久觉痛。仍以白丸子一服。及托里散数服而愈。

夫四肢受患。风邪所袭。遏绝经络者。古人所制淋渍贴镰刺等法。正为通经络。导引

火疮一百二十八

一人火疮。骤用凉药敷贴。更加腹胀不食。予以人参败毒散。（四六）加木通、山梔。外用柏叶。炒为末。麻油调搽。渐愈。

尝用煮大汁上浮脂调银朱。更效。若用凉药逼火毒入内。多致不救。汤火疮以淋了第二次灰渣敷患处。

又方 以腊月猪胆涂黄柏。炙干为末。敷。

热油汤火伤皮烂肉大痛冷霜散 牡蛎（）寒水石（生）明朴硝 青黛（各一两）轻粉（一钱）。掺上新水。或油调湿则干贴。痛立止。

卷六

漆疮一百二十九

一人漆疮作呕。由中气弱。漆毒侵之。以六君子加砂仁、藿香、酒炒芍药。彼不为然。

服连翘消毒散。呕果盛。复邀治。以前药。外以香油调铁锈末涂之而愈。

卷七

天疮一百三十

脉浮发热。或拘急者。发散表邪。

脉沉发热便秘者。解表攻里。

发热小便赤涩者。分利消毒。

一小儿患此。痛发热。脉浮数。挑去毒水。以黄柏、滑石末敷之。更饮荆防败毒散（七）二剂而愈。（此凭症也。）

一人痛发热。服祛风清热药愈炽。其脉沉实。乃邪在内也。用防风通圣散（六）一剂顿退。又荆防败毒散（七）二剂而安。（此凭症脉也。）

此症为风热。当审表里。治无误矣。

一儿赤发热。以黄柏、滑石末敷之。饮大连翘汤（七一）二剂少愈。更以金银花散（百七十）二剂而痊。（此凭症也。）

一儿十余岁。背侧患水泡数颗。发热脉数。此肺胃风热所致。名曰天泡疮。以荆防败毒散（七）加芩、连。外去毒水。以金黄散（六六）敷之。又四剂而愈。（此凭症也。）

一有腹患此。延及腰背。痛饮冷。脉数。按之愈大。乃表里俱实也。用防风通圣散（六）一剂。更敷前药。势减大半。再以荆防败毒散（七）二剂而愈。

卷七

杨梅疮一百三十一

（有从咽喉患起者见咽喉）

湿胜者。宜先导湿。表实者。宜先解表。

里实者。宜先疏里。表里若俱实。解表攻里。

表虚者。补气。里虚者。补血。表里俱虚者。补气血。

一人遍身皆患。左手脉数。以荆防败毒散。（七）表症乃退。以仙方活命饮。（六一）六剂疮渐愈。兼葶苈汤。（二百四五）月余而痊。

一妇痛发热。便秘。作渴。脉沉实。以内疏黄连汤（三）二剂。里症已退。以龙胆泻肝汤（六七）数剂。疮毒顿退。间服葶苈汤。（二百四五）月余而痊。（此凭症脉治也。）

一人下部生疳。诸药不应。延及遍身。突肿。状如翻花。筋挛骨痛。至夜尤甚。此肝肾湿热所致。先以导水丸（二百四八）进五服。次以龙胆泻肝汤（六七）数剂。再与除湿健脾之药。外贴神异膏吸其脓。隔蒜灸。拔其毒而愈。（此凭症也。）

若表实者。以荆防败毒散。（七）里实者。以内疏黄连汤。（三）表里俱实者。防风通圣散（六）气虚者四君子。（六三）血虚者四物。仍加兼症之药。并愈。若服轻粉等药。反收毒于内。以致迭发。概服防风通圣。则气血愈虚。因而不治者多矣。

一人患之。发寒热。作渴。便秘。两手脉实。用防风通圣散（六）而退。以荆防败毒散。

（七）兼龙胆泻肝汤（六七）而痊。（此凭症也。）

一人患之肿痛。先以龙胆泻肝汤、（六七）导水丸各四剂少愈。再以小柴胡加黄柏、苍术五十余剂而平。（此凭症也。）

一人玉茎肿溃。小便赤色。肝脉弦数。以小柴胡加木通、青皮、龙胆草四剂。又龙胆泻肝汤（六七）数剂而痊。（此凭脉症也。）

一童玉茎患之。延及小腹数枚。作痛发热。以小柴胡汤（五）吞芦荟丸。更贴神异膏。月余而痊。（此凭症也。）

一人愈后。腿肿一块。久而溃烂不敛。以蒜捣烂敷患处。以艾灸其上。更贴神异膏。及服黑丸子。并托里药。两月而愈。（此凭症也。）

一妇燃轻粉药。于被中熏之。致遍身皮塌。脓水淋漓。不能起居。以滑石、黄柏为末。

绿豆粉等分补席上。令可卧。更以金银花散。月余而痊。（此凭症也。）

一人皆愈。但背肿一块甚硬。肉色不变。年余方溃出水。三载不愈。气血俱虚。饮

食少思。以六君子汤（二）加当归、藿香三十余剂。更饮萆汤。两月余而痊。（此凭症也。）

一人患之势炽。兼脾胃气血皆虚。亦服前药而痊。

一妇患之皆愈。惟两腿两

。各烂一块如掌。兼筋挛骨痛。三载不愈。诸药不应。日晡。饮食少思。以萆汤兼逍遥散。倍用白术、茯苓。数剂。热止食进。贴神异膏。更服八珍汤（十四）加牛膝、杜仲、木瓜三十余剂而痊。（此凭症也。）

又捷法。治杨梅疮不问新旧。并效。不过旬日。每日用胆矾、白矾末。并水银各三钱五入香油、津吐各少许。和匀。坐无风处。取药少许。涂两脚心。以两手心对两脚心擦磨良久。再涂药少许。仍前再擦。用药尽。即卧。汗出或大便去垢。口出秽涎为验。连擦三日。煎通圣散（六）澡洗。更服内疏黄连汤败毒散。愈后服萆汤。有热加芩、连。气虚参、。血虚四物之类。

一人杨梅疮后。两腿一臂。各溃二寸许。一穴脓水淋漓。少食不睡。久而不愈。以八珍茯苓、酸枣仁服。每日以蒜捣烂涂患处。灸良久。随贴膏药。数日少可。却用豆豉灸。更服十全大补汤（十三）而愈。（此凭症也。）

凡有肿硬。或作痛。亦用蒜灸。及敷中和膏。内服补药。并效。

卷七

斑疹一百三十二

（附小儿丹毒痘后毒）

脉浮者。消风为主。

脉浮数者。祛风清热。

脉数。按之沉实者。解表攻里。

一妇患斑作痒。脉浮。以消风散（八十）四剂而愈。（此凭症也。）

一妇患斑作痒。脉浮数。以人参败毒散（六四）二剂少愈。更以消风散（八十）四剂而安。

一人患斑。色赤紫。痛发热。喜冷。脉沉实。以防风通圣散（六）一剂顿退。又以荆防败毒散。（七）加芩、连。四剂而愈。

一老患疹。色微赤。作痒发热。以人参败毒散（六四）二剂少愈。以补中益气汤。加黄芩、山梔而愈。（此凭症也。）

一妇患斑痒痛。大便秘。脉沉实。以四物加芩、连、大黄、槐花而愈。（此凭症也。）

一儿患斑作痛。发热烦渴。欲服清凉饮下之。诊脉不实。举按不数。此邪在经络不可下。用解毒防风汤二剂而安。

此症小儿多患之。须审在表在里。及邪之微甚而治之。前人谓首尾俱不可下者。何也。

首不可下者为斑。未见于表下。则邪气不得伸越。又脉症有表而无里。故禁首不可下也。尾不可下者。斑毒已显于外。内无根蒂。大便不实。无一切里症。下之则斑气逆陷。故不可下一人作痒发热。以消毒犀角饮（二百四二）一剂作吐泻。此邪上下俱出也。毒自解。少顷吐泻俱止。其疹果消。吐泻后。□脉七诊。此小儿和平脉也。邪已尽矣。不须治。果愈。

洁古云。斑疹为症各异。发肿于外者。少阳属三焦相火也。谓之斑。小红靨行于中不出者。属少阴君火也。谓之疹。凡显斑症。若有吐泻者。慎勿乱治而多吉。谓邪上下出也。斑疹并出。小儿难禁。是以别生他症也。首尾不可下。大抵安里之药多。发表之药少。

秘则微疏之。令邪气不壅并而作次以出。使儿易禁也。身温暖者顺。身凉者逆。

一子痘毒。及时针刺。毒不内侵。数日而愈。

大抵古人制法。浅宜砭。深宜刺。使瘀血去于毒聚之始则易消。况小儿气血又弱。脓成而不针砭。鲜不毙矣。

一儿臂患痘毒作烧。按之复起。此脓胀痛而然。遂刺之。以托里而愈。

痘后肢节作肿而色不赤。宜金银花散。（百七十）更以生黄豆末。热水调敷。干以水润。

自消。若敷六七日。脓已成。急刺之。宜服托里药。

一儿痘疮已愈。腿上数枚。变疳蚀陷。用雄黄、铜绿等分为末。敷。兼金银花散而愈。

遍身。用出蛾绵茧填实白矾末。烧候汁干。取出为末。放地上。碗盖良久。出火毒。敷之。

一儿痘后搔痒。搔破成疮。脓水淋漓。用经霜陈茅草为末。敷之。及铺席上。兼服金银花散（百七十）而愈。若用绿豆、活石末亦可。似不及茅草功速。

一儿周岁患丹毒。延及遍身如血染。用瓷锋击刺。遍身出黑血。以神功散（七十）涂之。

服大连翘饮而愈。

又儿未盈月。阴囊患此。为前治之而愈。

又儿不欲刺。毒入腹而死。河间云。丹从四肢延腹者不治。予尝刺毒未入腹者。无一小儿腿患丹如霞。游走不定。先以麻油涂患处。砭出恶血。更以金银花散。（百七十）

一剂而安。（此凭症也。）

一小儿遍身皆赤。砭之。投解毒药即愈。（此凭症也。）

一人患丹毒。

痛便秘。脉数而实。服防风通圣散不应。令砭患处去恶血。仍用前药即愈。

（此凭脉症也。）

一小儿患之。外势须轻。内则大便不利。此在脏。服大连翘饮。敷神功散而瘥。（此凭一小儿遍身亦赤。不从砭治。以致毒瓦斯入腹而死。此症乃恶毒热血。蕴蓄于命门。遇而合起也。如霞片者。须砭去恶血为善。如肿起赤色。游走不定者。宜先以升麻油涂患处砭之。以泄其毒。凡从四肢起入腹者不治。须知丹有数种。治者有数法。无如砭之为善。常见患稍重者不用砭法。俱不救也。

卷七

肠痈一百三十三

小腹硬痛。脉迟紧者。瘀血也。宜下之。

小腹软痛。脉洪数者。脓成也。宜托之。

一产妇小腹痛。小便不利。以薏苡仁汤二剂痛止。更以四物加桃仁、红花。下瘀血升许大抵此症、皆因荣卫不调。或瘀血停滞所致。若脉洪数。已有脓。脉但数。微有脓。脉。乃瘀血。下之则愈。若患甚者。腹胀大转侧作水声。或脓从脐出。或从大便出。宜蜡矾丸、太乙膏、及托里药。

一妇小腹胀痛。小便如淋。尺脉芤而迟。以神效栝蒌散二剂少愈。更以薏苡仁汤二剂而愈。（此凭脉症也。）

一人脓已成。用云母膏一服。下脓升许。更以排脓托里药而愈。后因不守禁忌。以致不救。（此凭症也。）

一人里急后重。时或下脓。胀痛。脉滑数。以排脓散及蜡矾丸而愈。（此凭症脉也。）

一妇小腹痛有块。脉芤而涩。以四物汤加玄胡、红花、桃仁、牛膝、木香而愈、（此凭一妇小腹隐痛。大便秘涩。腹胀。转侧作水声。脉洪数。以梅仁汤一剂。诸症悉退。以薏苡仁汤二剂而痊。（此凭脉症也。）

一妇腹胀痛。皮毛错纵。小便不利。脉数滑。以太乙膏一服。脓下升许。胀痛顿退。以神效栝蒌散二剂而全退更以蜡矾丸及托里药十余剂而安。（此凭脉症也。）

一妇因经水。多服涩药止之。致腹作痛。以失笑散（百九）二服而瘳。（此凭症也。）

一人小腹痛而坚硬。小便数。汗时出。脉迟紧。以大黄汤一剂。下瘀血合许。以薏苡仁汤四剂而安。（此凭脉也。）

一妇小腹恶露不尽。小腹痛。以薏苡仁汤（二百十五）下瘀血而痊。（此凭症也。）凡瘀血停涩。宜急治之。缓则腐为脓。最难治疗。若流满节骨。则患骨疽。失治多为败症。

肠痛。身甲错。腹皮急。按之濡。如肿状。腹无聚积。身无热。此久积冷所致。故金匱附子温之。若小腹胀痞。按之痛如淋。小便自调发热身无汗。复恶寒。脉迟紧。肿未成可下之。当有血。洪数者脓已成。不可下、此内结热所成。故金匱有用大黄利之甚者腹胀大。

转侧闻水声。或绕脐生疮。脓从疮出者。有出脐中者。不治必死。惟大便下脓血者自愈。

一妇病少腹痞坚。小便或涩。或时汗出。或复恶寒。此肠痈也。脉滑而数。为痈已成。

设脉迟紧。即为瘀血。惟血下则愈。（此凭症脉也。）

内经载有息积病。此得之二三年。遍身微肿。续乃大肠与脐连日出脓。遂至不救。此亦肠痈之类。

肠痈作湿热积治。入风难治。千金谓妄治必杀人。要略以薏苡仁附子败毒散。千金以大黄牡丹汤。三因以薏苡仁汤。千金又有灸法。曲两肘头正肘锐骨灸百壮。下脓血而安。

一人伤寒逾月。既下。内热未已。胁及小腹偏左肿满。肉色不变。俚医为风矢所中。以之。月余。毒循宗筋流入睾丸。赤肿如瓠。翁诊关尺滑数且芤。曰。数脉不时见。当生恶疮。关芤为肠痈。用保生膏。

更以乳香。用硝黄作汤下之。脓如糜者五升许。明日再围。

余脓而瘥。（此凭脉症也。）

一妇肠中痛。大便自小便出。诊之芤脉见于关。此肠痈也。以云母膏（二百十六）作百十丸。煎黄汤吞之。利脓数升而安。

一女腹痛。百方不应。脉滑数。时作热。腹微急。曰。痛病脉沉细。今滑数。此肠痈也云母膏一两。丸如梧桐子。以牛皮胶熔入酒中。并水吞之。饬时服尽。下脓血。愈（此凭脉一人年逾五十。腹内隐痛。小便如淋。皮肤错纵而脉滑数。此肠痈也。滑数脓成。以广东牛皮胶酒融化送太乙膏。脓下升许。更以排脓托里药、及蜡矾丸而愈。（此凭脉也。）

一妇产后小腹作痛。诸药不应。其脉滑数。此瘀血内溃为脓也。服瓜子仁汤（五九）痛止。更以太乙膏而愈。（此凭脉也。）

今人产后。多有此病。纵非痈毒。用之更效。有人脐出脓水。久而不愈。亦以前膏及蜡矾丸而瘥。

一儿年十二。患腹胀。脐突颇锐。医谓肠痈。舍针脐无他法。翁曰。脐神阙也。针刺当况痈舍子内。惟当以汤丸攻之。进透脓散一剂。脓自溃。继以十奇汤下善应膏

丸。渐瘥。（此凭症也。）

卷七

肺痈肺痿一百三十四

喘嗽气急胸满者。表散之。

咳嗽发热者。和解之。

咳而胸膈隐痛唾痰腥臭者。宜排脓。

喘急恍惚。疾盛者。宜平肺。

咳脓脉短者。宜补之。

肺痿。寸口脉数而虚肺痿之候久嗽不已。汗出过度。重亡津液便如烂瓜。下如豕脂。小便数而不渴。渴者自愈。欲饮者瘥。此由多唾涎沫而无脓。

肺疽。寸口脉数而实。肺疽之候。口干喘满。咽喉而渴甚者。四肢微肿。咳唾脓血。或浊味。胸中隐隐微痛。候始萌则可救。脓成则多死。脉若微紧而数者。未有脓。紧甚而数者。已有脓。呕脓不止者。难治。久久如粳米粥者。亦难治。

脓自止者。自愈。其脉短而涩者。自瘥。浮大者难治。面色常白反赤者。此火克金。皆内疽皆因饮食之火。七情之火。相郁而发。饮食者阴受之。七情者脏腑受之。宜其发在腔子而向内。非干肠胃盲膜也。

肺痈先须发表。千金曰。咳唾脓血。其脉数实。或口中咳。胸中隐痛。脉反滑数者为肺痈。脉紧数为脓未成。紧去但数为脓已成。

要略。先以小青龙汤（百九十五）一贴。以解表之风寒。然后以葶苈大枣泻肺汤、桔梗汤、苇叶汤、随症用之。以取脓。此治肿疡例也。终以黄昏汤。以补里之阴气。此治溃疡例也。

肺痈已破。入风者不治。或用太乙膏。凡服以搜风汤吐之。吐脓血如肺痈状。口臭。他方不应者。宜消风散。入男子发灰。清米饮下。两服可除。

一人喘咳。脉紧数。以小青龙汤（百九十五）一剂。表症已解。更以葶苈大枣汤（百九十六）喘止。乃以桔梗汤愈。（此凭脉症也。）

一人咳嗽气急。胸膈胀满。睡卧不安。以葶苈散二服少愈。更桔梗汤瘥。（此凭症也。）

一人咳嗽。项强气促。脉浮而紧。以参苏饮二剂少愈。更以桔梗汤四剂而安。（此凭脉一人咳嗽。胁胀满。咽干口燥。咳唾腥臭。以桔梗汤四剂而唾脓。以排脓散数服而止。乃以补阴托里之剂而瘳。（此凭症也。）

一人咳而脓不止。脉不退。诸药不应。甚危。用柘黄丸一服少愈。再服顿退。数服而瘥。溃者尤效。（此凭症也。）

一妇唾脓。五心烦热。口干胸闷。以四顺散（二百一）三剂少止。以排脓散数服而安。（此凭症也。）

一人面白神劳。咳而胸膈隐痛。其脉滑数。予以为肺痈。欲用桔梗汤。不信。乃服表药。致数剂而愈。（此凭脉症也。）

大抵劳伤血气。则腠理不密。风邪乘肺。风热相抟。蕴结不散。必致喘嗽。若误汗下过则津液重亡。遂成斯症。若寸脉数而虚者为肺痿。数而实者为肺疽。脉微紧而数者未有脓。

紧甚而数者已有脓。唾脓自止者。脉短而面白者。易治。脓不止。脉洪大而面色赤者。不治。使其治早可救。脓成则无及矣。金匱方论。热在上焦者。因咳为肺痿。得之或从汗出。或从呕吐。或从渴消。小便不利。或从便难。又被下药快利。重亡津液。故寸口脉数。其人燥咳。胸中隐隐而痛。脉反滑数。此为肺痈。咳唾脓血。其脉数虚者为肺痿实者为肺痈。

一童气禀不足。患肺痈。唾脓腥臭。皮毛枯槁。脉浮。按之涩更无力。治以钟乳粉汤。

（此凭脉症也。）

一弱人咳脓。日晡发热。夜间盗汗。脉浮数而紧。用人参五味汤数剂顿退。以紫菀茸汤月余而瘥。（此凭症也。）

一仆年逾三十。嗽久不愈。气壅不利睡卧。脓血甚虚。其主已弃矣。予以宁肺散一服少又服而止大半。乃以宁肺汤数剂而瘥。所谓有是病。必用是药。若泥前散。性涩而不利。何以得愈。（此凭症也。）

一人患肺痿。咳嗽喘急。吐痰腥臭。胸满咽干。脉洪数。用人参平肺散六剂。及饮

童便诸症悉退。更以紫菀茸汤而愈。（此凭脉症也。）

童便虽云专治火虚。常治疮疡肿疼痛。发热作渴。及肺痿肺痛。发热口渴者尤效。

一妇患肺痿咳嗽。吐痰腥臭。日晡发热。脉数无力。治以地骨皮散。热止。更用人参养肺汤。月余而安。（此凭脉症也。）

一人咳嗽喘急。发热烦躁。面赤咽痛。脉洪大。用黄连解毒汤（八）二剂少退。更以梔子汤（二百九）四剂而安。（此凭脉症也。）

一人春间咳嗽。唾脓腥秽。胸满气促。皮肤不泽。项强脉数。此肺疽也。盖肺系在项。

则系伤。故牵引不能转侧。肺主皮毛。为气之本。肺伤不能摄气。故胁胀气促而皮肤纵。东垣云。肺疮脉微紧而数者未成脓。紧甚而数者已有脓。其脉紧数。脓为已成。以参、归、芎、白芷、贝母、知母、桔梗、防风、甘草、麦门、栝蒌仁。兼以蜡矾丸及太乙膏。脓尽脉涩而愈。至冬脉复数。经曰。饮食劳倦伤脾。脾伤不能主肺。形寒饮冷伤肺。肺伤不能主肾。肾水不足则心火炽盛。故脉洪数。经曰。冬见心而莫治。果歿火旺之月。

一人年逾三十患咳嗽。项强气促。右寸脉数。此肺疽也。东垣云。风伤皮毛。热伤血脉热相抟。血气稽留于肺。变成疮疽。今脉滑疽脓已成。以排脓托里之药。及蜡矾丸。脉渐涩而愈。（此凭脉症也。）

一人病胸膈壅满。昏不知人。予以杏仁、薏苡之剂灌之。立苏。继以升麻、黄、桔梗脓。逾月而愈。予所以知其病者。以阳明脉浮滑。阴脉不足也。浮为风。滑为血聚。始由风伤肺。故结聚客于肺。阴脉不足。过于宣逐也。诸气本于肺。肺气治则出入顺而菀陈除。故行其肺气而病自己。（此凭脉也。）

一人肾气素弱。咳唾痰涎。小便赤色。服肾气丸而愈。（此凭症也。）

一

妇咳而无痰。咽痛。日晡发热。脉浮数。先以甘桔汤少愈。后以地骨皮散而热退。

更以肾气丸。及八珍汤加柴胡地骨皮而愈。（此凭脉症也。）

丹溪云。咳而无痰者。乃火郁之症。及痰郁火邪在中。用苦梗开之。下用补阴降火之剂。不已。则成劳嗽。此症不得志者多有之。又原病式。瘦人腠理疏通而多汗。血液衰为燥。故为劳嗽之症也。

一人年前病肺壅。后又患咳嗽。头眩唾沫。饮食少思。小便频数。服解散化痰药不应。

脾肺二脉虚甚。予谓眩晕唾涎。属脾气不能上升。小便无度。乃肺气不得下制。内未成痈。

宜投以加味理中汤。四剂诸症已退大半。更用钟乳粉汤而安。（此凭脉也。）

河间曰。肺痿属热。如咳久肺痿。声哑声嘶。咯血。此属阴虚热甚然也。本论治肺痿。吐涎沫而不咳者。其人不渴。必遗尿。小便数。以上虚不能制下故也。此为肺中冷。必眩。多痰唾。用炙甘草、干姜。此属寒也。肺痿涎唾多心中湿液。湿液者。用炙甘草汤。此补虚劳也。与补阴大热不同。是皆宜分治。故肺痿又有寒热之异。

一人因劳。咳嗽不止。项强而痛。脉微紧而数。此肺痈也。尚未成脓。欲用托里益气药。彼不信。仍以发散药。以致血气愈虚。吐脓不止。竟致不救。

经云。肺内主气。外司皮毛。若肺气虚则腠理不密。皮毛不泽。肺受伤则皮毛错纵。故痈、肺痿、肠痈者。致皮毛如此。以其气不能荣养而然也。亦有服表药见邪不解。仍复发表。殊不知邪不解者。非邪不能解。多因腠理不密而邪复入也。专用发表。则腠理愈虚。邪愈易入。反为败症矣。若诊其脉。邪在表者。只当和解而实腠理。乘虚复入者。亦当和解兼实腠理。故用托里益气之药。若小便赤涩。为肺热所传。短少为肺气虚。盖肺为母。肾为子。

母虚不能生子故也。亦有小便频数者。亦为肺虚不能约制耳。

一人年逾四十。喘咳胁痛。胸满气促。右寸脉大。此风热蕴于肺也。尚未成疮。属有余。欲用泻白散。（六十）彼谓肺气素弱。自服补药。喘嗽愈盛。两月后复请视。汗出如雨。喘而不休。此肺气已绝。安用治。果歿夫肺气充实。邪何从袭。邪气既入。则宜散之。故用泻白散。乃泻肺之邪气。邪气既去。真气自实。一有患此吐脓。面赤脉大。予谓肺病脉宜涩。面宜白。今面赤脉大。火克金。不可治。果歿。

卷七

胃脘痛一百三十五

胃脘痛当候胃脉。人迎者。胃脉也。其脉沉细。气逆则甚。甚则热聚胃口而为痈。若脉。脓已成。迟紧。虽脓未就。已有瘀血。宜急治之。否则邪毒内攻。腐烂肠胃。不可救也。宜射干汤 射干（去毛） 梔子 赤茯苓 升麻（各一两） 赤芍（两半）

白术（半两）

上锉。水煎。入地黄汁一合。蜜半合。温服。芍药甘草汤。升麻汤随选用之。

卷七

脑疳一百三十六

一儿头患白疮。皮光且急。诸药不应。名曰脑疳疮。乃胎毒挟风热而成。服龙胆丸及荅末于鼻内。兼搽解毒散而愈。若重者。发结如穗。脑热如火。遍身汗出。凶肿胞高。尤当

卷七

肺疳一百三十七

一儿咳嗽。喘逆。壮热恶寒。皮肤如粟。鼻痒流涕。咽喉不利。颐烂吐红。气胀毛焦。

作利。名曰肺疳。以地黄清肺饮及化丸治之而愈。

卷七

蛔疳一百三十八

一儿眉HT多啼。呕吐清沫。腹痛腹胀。筋青。唇口紫黑。肛门作痒。名曰蛔疳。服大芦荟丸而愈。

卷七

脊疳一百三十九

有虫蚀脊臂。食热黄瘦。烦温下痢。拍背如鼓鸣。脊骨如锯齿。十指生疮。常啮。此脊疳也。亦宜大芦荟丸治之。

卷七

肾疳一百四十

一儿十岁患疮疥。久不愈。肌瘦。寒热时作。脑热足冷。滑泻肚痛。龈烂口臭。干揭。爪黑面黧。此肾疳也。服六味地黄丸。更搽解毒散而愈。

卷七

鬼击一百四十一

一人被鬼击。身有青痕作痛。以金银花煎汤饮之即愈。

卷七

历节风一百四十二

一妇患。寒热痛。服人参败毒散。翌日遍身作痛。不能转侧。彼云素有此疾。每发月余自止。服药不应。妇人体虚。因受风邪之气。随血而行。淫溢皮肤。卒然掣痛。游走无常。名曰历节风。治以四生丸而愈。（此凭脉也。）

一宜人先两膝。后至遍身骨节皆痛。脉迟缓。用羌活胜湿汤。及荆防败毒散。（七）加渗湿药不应。次以附子八物汤（七四）一剂悉退。再服而愈。（此凭脉也。）

若脉洪数而痛者。宜人参败毒散。（六四）有毒自手足起至遍身作痛。或颈项结核如贯珠。此风湿流气之症。宜加减小续命。及独活寄生汤。（七六）

一人年逾五十。筋骨痿软。卧床五年。遍身瘙痒。午后尤甚。治以生血药。痒渐愈。痿少可。更以加味四斤丸治之。调理谨守。年余而痊。（此凭症也。）

或曰。热淫于内。药用温补。何也。盖因血衰弱不能养筋。筋缓不能自持。阳躁热淫于内。宜养阳滋阴。阳实则水升火降矣。

卷七

疮疥一百四十三

瘙痒或脓水浸淫者。消风除湿。

痒痛无脓者。祛风润躁。

瘙痒或疼。午后尤甚者。益阴降火。

痛。大便秘涩者。滋阴泻火。

搔起白屑。耳作蝉鸣者。祛风清热。

一妇患此作痒。脓水不止。脉浮无力。以消风散（八十）四剂少愈。再四生丸（八六）月余而平。（此凭症脉也。）

一人痒少痛多。无脓水。以芩、连、荆、防、山、梔、薄荷、芍药、归身、治之而愈。

（此凭症也。）

一妇作痒。午后尤甚。以当归饮子数剂少愈。更以人参荆芥散数剂而安。（此凭脉症也）一人久而不愈。搔起白屑。耳作蝉声。以四生散数服痒止。更以当归饮子数剂而痊。（一人下体居多痛。日晡尤甚。腿腕筋紫而胀。就于紫处刺去瘀血。以四物加芩连四剂而安。在上体若。臂腕筋紫胀。亦宜刺去其血。以前汤加柴胡黄芩即愈。（此凭症也。）

一人搔痒成疮。日晡痛甚。以四物加芩、连、荆、防数剂而止。更以四物加蒺藜、何首乌、黄二十剂而愈。（此凭症也。）

一人头目昏眩。皮肤瘙痒。搔破成疮。以八风散治之而愈。

一人患疮疥多在两足。午后痛甚。腿腕筋紫而胀。脉洪大。此血热也。于紫处砭去毒血以四物加芩、连。柴胡、地骨皮而愈。（此凭脉症也。）

如手臂有疮。臂腕筋紫。亦宜砭之。老弱人患此作痛。须补中益气汤加凉血药。

一儿周岁。先头患疮疥。渐至遍身。久而不愈。用四物汤（九）加防风、黄芩、升麻。外搽毒药散。月余而愈。（此凭症也。）

一小儿疮毒不愈。或愈而复发。皆因母食炙爆辛辣。或有热。宜先治母热。若小儿不能服药者。就于母药中加漏芦煎服。儿疮亦愈。

一儿头面生疮数枚作痒。疮痂累积。名曰粘疮。以枯矾、黄丹等分。麻油调搽。更服败毒散而愈。（此凭症也。）

一人腿生湿疮。数年不愈。尺脉轻诊似大。重诊无力。此肾虚风邪袭之而然。名曰肾。以四生散治之。彼不信。自服芩连等药。遂致气血日弱。脓水愈多。形症愈急。迨二年。复请予治。仍用前药而愈。（此凭症脉也。）

失肢体有上下。脏腑有虚实。世人但知苦寒之药能消疮毒。不知肾脏风因肾不足所致。

以蒺藜为主。黄

为臣。白附子独活为佐使。再若服败毒等药。则愈耗元气。促之死矣。

一人痛发热。脉浮数。以人参败毒散（六四）四剂少愈。更以当归饮子数剂而愈。（此凭脉症也。）

一人遍身作痒。搔破成疮。出水。脉浮数。此手足阳明经风热所致。以人参败毒对四物九）加芩连。外以松香一两。枯矾五钱。轻粉三钱为末。麻油调敷。月余而愈。（此凭症也。）

一儿头面胸腹患水疮数枚。溃而成疮。此风邪乘于皮肤也。名曰瘰疮。饮荆防败毒散。

（七）更以牛粪烧存性。为末敷之而愈。（此凭症也。）

瘰疽为患最毒。形如粟许。大者如栗。患无常处。多在手指。溃而出血。用南星、半夏、白芷末敷之。重者见骨。或狂言烦闷。

一儿鼻下生疮。不时揉擦。延及两耳诸药不效。服芦荟丸。搽松香、绿豆末而愈。

一人湿热下注。两腿生疮。以人参败毒散加苍术、黄柏、服之。外贴金黄散。（此凭症一人痛。寒热便秘。脉数有力。以防风通圣散二剂少愈。更荆防败毒散（七）加黄芩、山栀。四剂而愈。（此凭症也。）

有患此但脉沉实。以前药加大黄渐愈。再服人参败毒散而平。（此凭脉也。）

一僧患疮疥自用雄黄、艾叶等药。燃于被中熏之。翌日遍身肿。皮破水出。饮食不入。予投以解药不应而死。

又有患此久而不愈。以船板灰存性一两。轻粉三钱为末。麻油调贴。更以知母、黄柏、防己、龙胆、茯苓、归、弓、、术服之而愈。

大凡下部生疮虽属湿热。未有不因脾肾虚而得之。

一人两腿生疮。每服败毒散则饮食无味。反增肿胀。此脾虚湿热下注也。以六君子加苍术、升麻、酒炒芍药服之。以黄蜡、麻油各一两、轻粉三钱为膏贴之而愈。（

此凭症也。)

两腿生疮作痛。或遍身作痛。用当归拈痛汤甚效。

一人年逾五十。两生疮。日久不愈。饮食失节。或劳苦。或服渗利消毒之剂愈盛。脾无力。此脾虚兼湿热也。用补中益气汤数剂少愈。更六君子加苍术、升麻、神曲治之而愈。

大凡下部生疮。痛或发寒热。或脚气肿痛。以人参败毒散加槟榔、紫苏、苍术、黄柏并效。久不愈。以四物汤（九）治之。愈后以补肾丸补之。庶不再发。

疮方 乳香 没药 水银 当归（各半两） 川芎 贝母 黄丹（各二钱半） 真麻油（五两）

又方 龙骨（生用） 血蝎 赤石脂（各一两） 头发（如指大） 黄蜡 白胶香（各一两）

不拘多少。煎发三五沸。去发入蜡白胶。再以龙骨、血蝎、石脂搅匀。安水盆中。候冷。瓷器盛。每用捻作薄片。贴疮口。外贴竹箬。三日后番过再贴。仍服活血药。

又方 用砂糖水煎冬青叶三五沸。捞起。石压平。贴疮。日换二次。又方头垢烧灰。

和枣肉捣膏。先以葱椒叶煎汤洗净。用轻粉糝上。却以前膏伞纸摊贴之。

又方 地骨皮（一两） 甘草节（半两） 入香油熬熟。去渣。入黄丹（一两半） 白蜡（半两） 紧火熬黑提起。白纸摊贴。次用醋煎。冬青叶摊药贴之。

冻疮 用煎熟桐油调密陀僧末敷。

牛皮癣 用牛胆调烧酒敷之。

诸疮痛不可忍者。用苦寒药黄连、黄芩。详上下及引经药则可。又云。诸疮以黄连、当归为君。

连翘、甘草、黄芩为佐。在下者加黄柏。

若禀受壮盛。宜四物汤（九）加大承气下之。

若性急黑瘦血热之人疮痛。宜四物加芩连大力子甘草。

若肥胖人疮痛。乃湿热也。宜羌活、防风、荆芥、白芷、苍术、连翘。取其风能胜湿也在上者多通圣散。在下多须用下。

敷药 脓窠治热燥湿为主。无名异。松皮炭亦主脓。干疥开郁为主。吴茱萸。肿多者加白芷开郁。干痒出血多者。加大黄、黄连、猪脂调敷。

湿多者油调敷。痒多加枯矾。痛多加白芷、方解石。

定痒杀虫用蛇床。

虫疮如癣状。退热杀虫为主。用羌活、黑狗脊、白矾、雄黄、硫黄、水银、樟脑、松香虫多加藜芦、斑蝥。或锡灰、槟榔。红色加黄丹。青色加青黛。头上疮加黄连、方解石。阴囊疮加茱萸。脚肿出血。分湿热用药。脓疮治热为主。

黄连 黄芩 大黄（各无名异（少许炒） 白芷 轻粉沙疮 羌活 寒水石（各二钱） 剪草 吴茱萸 黄柏 枯矾（各一钱） 苍术 浓朴 雄（各五分） 轻粉（十贴）

上为末。油调敷。

又方 羌活 枯矾 软石膏 大黄 樟脑 上为末。先洗去疮痂。油调敷。

一上散雄黄 硫黄（各三钱半） 寒水石 白胶香 黑狗脊 蛇床（各一两） 黄连 枯矾（各五钱） 吴茱萸（三钱） 斑蝥（十四个去翅足） 上除硫黄、雄黄、寒水石。另研为粉外。余皆研极细末次以斑蝥同余药研匀。先洗疮。令汤透去痂。用腊猪油手心中擦热。鼻中嗅二三次。即擦疮上。一上即愈。如痛甚肿满高处。加寒水石一倍。如不苦痒。只加狗脊。微痒只加蛇床。

有虫加雄黄。如喜火炙汤炮加硫黄。只嗅不已。亦可愈也。

疥疮 春天发者。开郁为主。吴茱萸 白矾（各二钱） 樟脑（五分） 轻粉（十） 寒（二钱半） 蛇床（三钱） 黄柏 大黄 硫黄（各一钱） 槟榔（一个） 为末。油调。莫抓破。

小儿头疮 川芎 片芩 酒炒白芍 陈皮（各半两） 酒归 酒白术（各半两） 天麻（酒苍术 苍耳（各七钱半） 酒柏 酒粉草（各四钱） 防风（三钱） 为末。水荡起。煎服。日四五次。服后睡片时。

又方 腊猪油（半生半熟） 雄黄 水银等分为末。洗净疮。敷上。

小儿癩头并身癩 松皮（烧灰） 白胶香 枯矾 大黄 黄柏 为末。熟油调敷。

耳后月蚀疮 黄连 枯矾 为末敷。

小儿疮 牙皂（去皮） 胡椒（些少） 枯矾 轻粉 樟脑 为末。
烛油调搽。七日如樱桃脓窠。乃去椒。

小儿秃头

通圣散酒制。取大黄另用酒炒。入研为末。再仍通用酒拌焙干。每服一钱。

。频服。用白炭烧红淬长流水令热。洗之。外用胡荽子、伏龙肝、梁上尘、黄连、白矾为末。油调敷。

又方 松树浓皮（烧炭二两） 黄丹（水飞一两） 寒水石（一两细研） 枯矾 黄连 大黄（各半两） 白胶香（熬飞倾石上二两） 轻粉（四 或云一分）

上为末。先洗去疮痂。熬熟油调敷。

癣疮 用防风通圣散。去硝黄加浮萍、皂角刺。

又方 浮萍（一两） 苍耳 苍术（各二两） 苦参（一两半） 黄芩（半两）
香附（二钱半）

为末。酒糊丸。

敷药 先用洗药。后上敷药。芦荟 大黄 轻粉 雄黄 蛇床 槟榔 槿树皮
上为末。先刮癣。

用米醋调涂。又方 芦荟（三盛） 巴豆（去壳十四粒） 白蜡 蓖麻子（去壳十四粒）

斑蝥（七个去翅足）

上用香油二两。熬巴豆、蓖麻、斑蝥三药。以黑为度。去粗入蜡。并芦荟末在内。
用瓷罐盛贮。微微刮癣令破。以油涂上。过夜略肿而愈。

洗药 紫苏 樟树 苍耳 浮萍煎汤洗。先洗后上敷药。

卷七

诸虫伤一百四十四

（附犬蛇伤）

一人被犬伤。痛甚恶。令急吮去毒血。隔蒜灸患处数壮。痛即止。更贴太乙膏、服玉真散而愈。

一人疯犬所伤。牙关紧急。不省人事。紧针患处出毒血。隔蒜灸良久而醒。用太乙膏封贴。饮玉真散二服。

少苏。更以解毒散（百一十）二服而痊。若患重者。须先以苏合香丸灌之。后进汤药。

针灸经云。外丘穴治犬。即疯犬所伤。发寒热。速灸三壮。更灸患处。立愈。春末夏狂犬咬人。待过百日得安。终身禁犬肉、蚕蛹。食此即发。不可救也。宜先去恶血。灸咬处十壮。明日以后。日灸一壮。百日乃止。忌酒七日。捣韭汁一二盏。狂犬伤。令人吮去恶血。灸百壮效。

治蛇入七窍。急以艾灸蛇尾。（又法）以刀破蛇尾少许。入花椒七粒。蛇自出。即用雄黄砂末煎人参汤调灌之。内毒即解。

山居人被蛇伤。急用溺洗患处。拭干。以艾灸之。大效。又方独头大蒜切片置患处。以艾于蒜上灸之。每三壮换蒜。效。

一人被蝎螫手。痛彻心。顷刻痛至腋。寒热拘急。头痛恶心。此邪正二气相搏而然。

以飞龙夺命丹涂患处。及服止痛之药。俱不应。乃隔蒜灸之。遂愈。

后有被螫。如前灸之。痛即止。

一人蜈蚣伤指。亦用前法而愈。

凡蛇毒之类所伤。根据此疗之并效。本草谓蒜疗疮毒有回生之功。

一猎户腿被野狼咬痛甚。治以乳香定痛散不应。予思至阴之下。气血凝结。药力难达。令隔蒜灸至五十余壮。痛去。仍以托里药及膏药贴之。愈。

一人被斗犬伤腿。顷间痛至股。翌日牙关紧急。用玉真散不应。隔蒜灸三十余壮而苏。仍以玉真散（百二十三）及托里消毒药而愈。

诸虫伤。白矾一块。于端午日自早晒至晚收贮。用时旋为末。水调搽患处。痛即止。

卷七

误吞水蛭一百四十五

一人腹痛。食热则甚。诸药不应。半年后腹加肿胀。面色痿黄。脉不洪滑。非痈也。询始因渴甚。俯饮涧水。意其误吞水蛭。令取黄泥为丸。空心用水送下百丸。果下蛭而愈。

一儿因跌沟中腹痛。服惊积等药不应。亦根据前症疗之。愈。

卷七

虫入耳一百四十六

一人睡间有虫入耳。痛瞽。将生姜擦猫鼻。其尿自出。取尿滴耳内。虫出。

一人耳内生疮。不时作痛。欲死。痛止如故。脉皆安静。非疮也。话间痛忽作。予意有虫入耳。急取猫尿滴耳。

果出一臭虫。不复痛。或用麻油滴之。则虫死难出。

或炒脂麻枕之。则虫亦出。但不及猫尿速也。

卷七

血风疮一百四十七

脉浮者。祛风为主。益气佐之。

脉涩者。祛风为主。养血佐之。

脉浮而涩者。祛风养气血。

一妇患此作痒。五心烦热。以逍遥数剂而止。更人参荆芥散二十余剂而愈。

一妇遍身作痒。秋冬尤甚。脉浮数。饮消风散。敷蛇床子散。数月顿愈。

一妇遍身赤色。拨破成疮。脓出不止。以当归饮子及蛇床子散而愈。

一老妇遍身作痒。午前益甚。以四君子加荆。防、芎、归而安。

一妇洗头。致头患肿兼痒。以人参荆芥散数剂而愈。

一妇作痒成疮。久而患处仍痒。搔起白屑。以四生散数服痒止。以人参荆芥散二十余剂而愈。

一人遍身瘙痒。诸药不应。脉浮。按之而涩。以生血药为主。间以益气。百贴而愈。（此凭脉也。）

一儿瘾疹。瘙痒发热不安。以消风散治之。

一儿亦患此咳嗽时呕。以葛根橘皮汤并愈。

一妇生风癩似癖。三年不愈。五心烦热。脉洪。按之则涩。此血虚症也。以生血为主。

之。若专攻风毒。则血愈虚而热愈炽。血被煎熬则发瘰。或为怯症。遂以逍遥散（二三）数剂。及人参荆芥散（七九）二十余剂而愈。（此凭脉症也。）

一妇遍身瘙痒。秋冬则剧。脉浮数。此风邪客于皮肤。名曰血风疹。饮消风散。及搽蛇床子散少可。更以四物汤加荆防数剂而愈。（此凭脉症也。）

又一妇患此。夏月尤甚。脉洪大。用何首乌散。（七九）

一妇患赤癩瘙痒。搔破成疮。出水。久而不愈。内服当归饮。外搽蛇床子散并愈。（此一妇亦患此。诸药不应。以四生散数服而愈。）

大抵妇人体虚。风邪客于皮肤则成白疹。寒湿客于肌肉。郁热而为赤疹。色虽有异。治同。凡人汗出不可露卧及浴。经曰。汗出见湿。乃生瘰。雷公云。遍身风疹。酒调生柏一人每至秋冬。遍身发红点如癩。作痒。此寒气收敛腠理。阳气不得发越。怫郁内作也。人参败毒散解散表邪。再以补中益气汤实表益气。彼以为热毒。自用凉药。愈盛。复请。仍用前汤加茯苓、半夏、羌活四剂，更用补中益气汤而愈。（此凭症也。）

河间曰。疮肿因内热外虚。风湿所乘。盖肺主皮毛。脾主肌肉。肺气虚则腠理开。为风乘。脾气湿而内热。则生疮也。肿者。由寒热毒瓦斯客于经络。使血涩壅结成

肿。风邪内作者。则无头无根。血气相抟作者。则有头有根。
赤核肿则风热流会。疮以痛为实。痒为虚。虚非为寒。乃热之微甚也。

麦饭石膏治诸般痈疽神效。

麦饭石膏不拘多少。炭火至红。以好米醋淬之。如此淬十数次。研为末。重罗去粗取细末。入乳钵。数人更递研五七日。如面极细为妙。白藟（研为细末）鹿角（不用自蜕者。须择带脑顶骨全者。却是生取之角。截作二三寸长。炭火烧令烟尽。研罗如末。再入乳钵。更递研令极细。）

上用麦饭石膏细末二两。白藟末二两。鹿角灰四两。最要研得极细。方有效。粗则反致。细则大能止痛。收口排脓（精粗之异如此。）和合量药末多寡。用经年好米醋入银石器内。

熬令鱼眼沸。却旋。又入药末。用竹篾子不住手搅。熬一二时久。令稀稠得所。提出以瓷器盛之。候冷。以纸盖覆。勿令着尘。用时先以猪蹄汤洗去脓血。以故帛搥干。鹅翎蘸膏涂敷四围。凡有赤处尽涂之。但留中心一口如钱大。未溃能令内消。已溃则排脓如湍水。逐日疮口收敛。疮久肌肉腐烂。筋骨出露。用旧布片涂药贴疮。但内膜不穿。亦能取安。洗疮勿可手触嫩肉。亦不可口气吹着。合药亦忌腋气之人。及月经有孕妇人见之。再可熬好米醋一大碗。收瓷器内。候逐日用药于疮上。久则药干。以鹅翎点醋拂湿其药。勿令绷也。初则一日一洗一换药。十日后。两日一换。古方云。麦饭石颜色黄白类麦饭。曾作磨者尤佳。按麦饭石不可作磨。状如麦饭团生粒点。如无此石。可以旧面家磨近齿处石代之。取其有麦性故也。或溪中寻白石如豆如米大者。即是也。其石大小不等。或如拳。如鹅卵。略如握聚一古之吕西华秘传此方。虽在至亲。亦不可得。裴员外啖之以名第。河南尹胁之以重刑。

守死不传。君子责其存心虽隘。尚可恕也。近世医者。每见已效之方。设为诡诈之术。使人勿复用之。其罪不容诛矣。常有赵尹来宰龙泉。速于赴任。单骑兼程。到任未几。鼻衄大作。日出血数升。有医教服藕汁地黄膏。赵曰。往年因劳感热而骤得此。寻叩名医。服药愈。临分袂时。医者属云。疾若再作。不可轻信医者服生地黄藕汁。冰冷脾胃。无复可疗。因此半月间易数医无效。前医遂密制藕汁地黄膏进之。即愈。赵问。蒙惠药。与吾初衄时所服之药。气味相似。得非方同乎。医曰。即日前所献藕汁地黄膏也。赵惊叹曰。医乃诡谋以误我耶。早信此方。不受苦许久。

补遗

痈疔一百四十八

些小痈疔。方结未成。不可贴膏药。取生鹿角尖于砂盆内。同老米醋浓磨。以鹅翎涂拂疔之四围。当中留一口。遇干再涂。一二日即内消。

又方用吴茱萸微炒为细末。鸡子清调涂病处。神效。

些小痈疔。疼痛发热时。用生粉草节。不炙不焙。只日晒干。无日。于焙笼盖上微火焙研为细末。热酒调服一二钱。连追数服。痛热皆止。微觉恶寒。似欲发背。或已生疮肿癰疹。以硝石三两。暖水一升。和令硝。待冷。取故青布沓三重于赤处方员。湿布拓之。热则频易。立瘥。

补遗

发背及诸痈毒一百四十九

黑铅一片。甘草三两。微炙。锉。用酒一斗。置瓷瓶中。然后熔铅投酒中。却出酒。另以瓶盛。取出铅根据前熔投。如此者九度。并甘草去之。只用酒令病患饮醉寝则愈。

又方

甘草三两。生捣为末。大麦面九面大盘中搅和令匀。取上好酥少许。别捻入药。

。百沸水搜作饼。方员大于疮一分。热敷肿上。以细片及故纸隔令通气。冷则换之。已成脓自出。未成脓便内消。

补遗

发背欲死一百五十

取冬瓜截去头。合疮上。瓜当烂。截去更合之。瓜未尽。疮已敛小矣。即用膏养之。

又方取独头大蒜两头细捣。以麻油和研。浓敷疮上。干即易。或以苎根烂捣敷之数

补遗

石痈坚如石不作脓者一百五十一

生商陆根捣烂搽之。燥则易。

补遗

乳硬欲结脓一百五十二

以鹿角于臼内磨取白汁涂之。干又涂。不得近手。并令人嚼去黄水。一日许即散。

补遗

痈疔欲愈必痒又治肾脏湿痒一百五十三

一人髀上生疔数日。疮口欲合。四边痒甚。以绵帛蘸汤熨洗。甚快。再痒再熨。觉倦。。洗熨最损人气血或至眩绝。于是取盐于四缘遍擦。觉疮内外清凉。更不复痒。如或痒甚则重擦。随其轻重。盐入疮内亦无害。

补遗

刀伤磕损血不止一百五十四

一人磕损大指甲。离肉血淋。急取葱白煨烂。乘热缚定。痛与血随止。葱冷再易。

一匠斧伤脚跟。乘急用泥塞。延后攻注。肿盛发寒热。遂令剔去旧土。使血再出。却用白敷之。不移时痛住血止。又遇杀伤。气偶未绝。急令取葱白锅内炒熟。以敷伤处。继而呻吟。再易已无事矣。无葱白，用叶亦可。只要炒热为上。时易为佳。若伤多煨炮不及。

但以干锅且烙且杵。令延出葱热用之妙。

附方

托里温中汤

治疮为寒变而内陷者。脓出消解，皮肤凉。心下痞满。肠鸣切痛。大便微溏。食即呕。

气短吃逆不绝。不得安卧。时发愤。

丁香 沉香 茴香 益智仁 陈皮 木香 羌活 干姜（炮各一钱） 甘草（炙）
附子（炮去皮脐各二钱）

作一剂。水二钟。姜三片。煎八分。不拘时服。

附方

六君子汤

治一切脾胃不健。或胸膈不利。饮食少思。或作呕。或食不化。或膨胀。

人参 白术（炒） 茯苓 半夏（姜制） 陈皮（各一钱） 甘草（炙五分）

作一剂。水二钟。姜三片。煎八分。不拘时服。

附方

内疏黄连汤

（一名黄连内疏汤）

治疮疡肿硬。发热作呕。大便秘涩。烦躁。饮冷。呕哕。心烦。脉沉实。此邪在脏也。急服以内除之。使邪不得犯经络。

黄连 山栀子 当归（酒拌） 芍药 木香 槟榔 黄芩 薄荷 桔梗 甘草（各一钱）

连翘 大黄（炒各一钱）

作一剂。水二钟。煎八分。食前服。

附方

十宣散

治疮疡。脉缓涩。身倦怠。恶寒。或脉弦。或紧细者。皆宜用之。散风寒。助阳气也。

人参 当归（酒拌） 黄（盐水拌炒各一钱） 甘草 白芷 川芎 桔梗（炒各一钱）
浓朴（姜汁制炒五分） 防风 肉桂（各三分）

作一剂。水二钟。煎八分。服。

附方

小柴胡汤

治瘰。乳痈。便毒。下疳。及肝经分一切疮疡。发热。潮热。或饮食少思。

半夏（姜制一钱） 柴胡（二钱） 黄芩（炒二钱） 人参（一钱） 甘草（炙五分）

作一剂。水二钟。姜三片。煎八分。食远服。

附方

防风通圣散

治一切风热。积毒。疮肿。发热。便秘。表里俱实者。

芍药（炒） 芒硝 滑石（） 川芎 当归（酒拌） 桔梗 石膏（） 荆芥 麻黄（各四半）
薄荷 大黄（煨） 山栀（炒） 白术（炒） 连翘 甘草（炙） 防风 黄芩（炒各五分）

作一剂。水二钟。煎八分。服。

附方

荆防败毒散

治一切疮疡。时毒。肿痛。发热。左手脉浮数。

荆芥 防风 人参 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 枳壳 茯苓 川芎 甘草（各一钱）
即人参败毒散加荆芥防风作一剂。水二钟。煎八分。食远服。

附方

黄连解毒汤

治积热。疮疡肿。作痛烦躁。饮冷。脉洪数。或口舌生疮。或疫毒发狂。

黄芩 黄柏（炒） 黄连（炒） 山栀（各一钱半）

作一剂。水二钟。煎七分。热服。

附方

四物汤

治一切血虚。或发热之证。

当归（酒拌） 川芎（各一钱） 芍药（炒） 生地（一钱）

作一剂。水二钟。煎八分。食远服。

加四君汤。即八物汤。又名八珍汤。治症详见于后。

附方

大黄牡丹汤

大黄（四两） 牡丹皮（三两） 芒硝（二两） 桃仁（五十个）

每服五钱。水煎服。

附方

隔蒜灸法

治一切疮毒。大痛或不痛。或麻木。如痛者灸至不痛。不痛者灸至痛。其毒随而散。盖火以畅达。拔引郁毒。此从治之法也。有回生之功。

大蒜去皮。切三文铜钱浓。安疮头上。用艾壮于蒜上灸之。三壮。换蒜复灸。未成者即已成者亦杀其大势。不能为害。若疮大。用蒜捣烂摊患处。将艾铺上烧之。蒜败再换。如不痛。或不作脓。及不发起。或阴疮。尤宜多灸。

附方

清凉饮

治疮积热烦躁。饮冷痛。脉实。大小便秘涩。

大黄（炒） 赤芍 当归 甘草（各二钱）

水二钟。煎八分。食前服。

附方

十全大补汤

治疮溃脓清。或不溃不敛。皆由元气虚弱。不能营运。服此生血气。壮脾胃。兼补诸虚溃疡发热。或恶寒。或作痛。或脓多。或自汗盗汗。及流注。瘰。便毒。久不作脓。或脓成不溃而不敛。若血气不足。结肿未成脓者。加枳壳、香附、连翘服之。自消。

人参 肉桂 地黄（酒蒸焙） 川芎 白芍（炒） 茯苓 白术（炒） 黄（盐水拌炒）
当归（酒拌各一钱） 甘草（炙五分）

作一剂。水二钟。姜三片。枣二枚。煎八分。食前服。

附方

八珍汤

调和荣卫。顺理阴阳。滋养血气。进饮食。退虚热。此气血虚乏大药也。

当归（酒拌） 川芎 芍药（炒） 熟（酒拌） 人参 白术（炒） 茯苓（各一钱）
甘草（炙五分）

水二钟。姜三片。枣二枚。煎八分。食前服。

附方

加味十全大补汤

人参 肉桂 地黄 川芎 白芍药 茯苓 白术 黄 甘草 当归 乌药 香附（各等分）

姜枣水煎。空心温服。每剂一两。

附方

补中益气汤

治疮疡元气不足。四肢倦怠。口干发热。饮食无味。或饮食失节。或劳倦身热。脉洪大无力。或头痛。或恶寒自汗。或气高而喘。身热而烦。

黄（炙一钱半） 甘草（炙） 人参 当归（酒拌） 白术（炒各一钱） 升麻 柴胡 陈皮（各三分）

水二钟。姜二片。枣二枚。煎一钟。空心服。

附方

圣愈汤

治疮疡脓水出多。或金疮出血。心烦不安。睡卧不宁。或五心烦热。

地黄（酒拌蒸半日） 生地黄（酒拌） 川芎 人参（各五钱） 当归（酒拌） 黄（盐水浸炒各一钱）

水二钟。煎八分。食远服。

附方

人参养荣汤

治溃疡发热。或恶寒。或四肢倦怠。肌肉消瘦。面色痿黄。呼吸短气。饮食无味。或气血原不足。不能收敛。若大疮愈后。服之不变他病。

白芍（一钱五分） 人参 陈皮 黄（蜜炙） 桂心 当归（酒拌） 白术

甘草（炙各一钱） 熟（酒拌） 五味子（炒捣碎） 茯苓（各一钱半）
远志（去心炒五分）

水二钟。姜三片。枣一枚。煎八分。食前服。

附方

归脾汤

治思虑伤脾。不能统摄心血。以致妄行。或吐血下血。或健忘怔忡。惊悸少寐。或
心脾茯神 白术 人参 黄（蜜炙） 龙眼肉 酸枣仁（蒸各一钱） 木香（三分）
甘草（炙一分半）

水一钟。姜一片。枣一枚。煎六分。食远并临卧服。

附方

远志酒

远志（不拘多少泔浸洗去土捶去心）

上为末。每三钱。用酒一盞调。迟少顷。澄清饮之。以滓敷患处。治女人乳痈尤效
。

附方

黄建中汤

黄（蜜制） 肉桂（去皮各三两） 甘草（炙二两） 白芍每服一两。姜枣水煎服。

附方

内补黄汤

黄（炙） 麦门冬（各一两） 熟地黄 人参 茯苓 甘草（炙七分） 白芍 川芎
官桂每服一两。姜枣水煎服。

附方

逍遥散

治妇人血虚。五心烦热。肢体痛。头昏重。心忪。颊赤。口燥咽干。发热。盗汗。食少。嗜卧。及血弱荣卫不调。痰嗽潮热。肌体羸瘦。渐成骨蒸。

当归（酒拌） 芍药 茯苓 白术（炒） 柴胡（各一钱） 甘草（七分）

水二钟。煎八分。食远服。

附方

柏子丸

治月经短少。渐至不通。手足骨肉烦疼。日渐羸瘦。渐生潮热。其脉微数。此由阴虚血阳往乘之。少水不能胜盛火。火逼水涸。亡津液。当养血益阴。慎毋以毒药通之。宜此丸与柏子仁（炒研） 牛膝（酒拌） 卷柏（各半两） 泽兰叶 续断（各二两） 地黄（三两酒拌蒸半日杵膏）

上为末。入地黄膏。加炼蜜丸梧子大。每服三十丸。空心米饮下。

附方

泽兰汤

治症同前。

泽兰叶（三两） 当归（酒拌） 芍药（炒各一两） 甘草（五钱）

上为粗末。每服五钱。水二钟。煎一钟。去滓温服。

附方

连翘消毒散

（即凉膈散）

治积热。疮疡痛。发热。烦渴。大便秘。及咽喉肿痛。或生疮毒。

连翘（一两） 山栀子 大黄 薄荷叶 黄芩（各五钱） 甘草（一两五钱）

朴硝（二钱半）

每服一两。水煎。温服。

附方

理中汤

治脾胃不健。饮食少思。或作呕。伤寒及肚腹作痛。

人参 干姜（炮） 甘草（炙） 白术（炒各钱半）

水一钟。煎五分。食远服。

附方

二神丸

治脾肾俱虚。侵晨作泻。或饮食少思。或食而不化。或作呕。或久泻不止。如脾经有湿。大便不实者。神效。

一人年逾四十。遍身发肿。腹胀如鼓。甚危。诸药不应。用此数服。饮食顿进。其肿渐消。兼以除湿健脾之剂而愈。

破故纸（四两炒） 肉豆蔻（二两生用）

上为末。用大红枣四十九枚。生姜。四两切碎。同枣用水煎熟。去姜。取枣肉和药丸梧子大。每服五十丸。空心盐汤送下。

附方

竹叶黄汤

淡竹叶（二钱） 生 麦门冬（去心） 黄（炙） 当归（酒拌） 川芎 甘草 黄芩（炒）

芍药 人参 半夏（姜制） 石膏（各一钱）

水二钟。煎八分。食远服。

附方

黄六一汤

治溃后作渴。必发痈疮。宜常服此。可免。

绵黄（六两一半生焙一半盐水润瓷器饭上蒸三次焙干）甘草（一两半生半炙）

每锉一两。水二钟。煎八分。食远服。或为末。每服二钱。早晨日午。白汤调服更妙。

加人参尤效。

附方

七味白术散

白术 茯苓（去皮）人参（各半两）甘草（炙一两半）木香（二钱半）
藿香（半两）葛根（一两）

上为末。每服五钱。白汤调下。

附方

猪蹄汤

消肿毒。去恶肉。润疮口。止痛。

白芷 黄芩 当归 羌活 赤芍 露蜂房（蜂儿多者佳）生甘草（各五钱）

用猪蹄一双。水四五碗。煮熟去油滓。取清汤入前药煎数沸。去滓温洗。以膏药贴之。

附方

复元活血汤

治坠堕或打扑。瘀血流于胁下作痛。或小腹作痛。或痞闷及便毒。初起肿痛。

柴胡（钱半）天花粉 当归（酒拌各一钱）红花 甘草（七分）穿山甲（一钱）
大黄（酒拌炒三钱）桃仁（二十粒去皮尖酒浸研）

水二钟。煎一钟。食前服。

附方

桃仁承气汤

治伤损。瘀血停滞。腹痛发热。或发狂。或便毒。壅肿疼痛。便秘发热。用此通之。
。

桃仁（五十粒去皮尖）桂枝 芒硝 甘草（炙各一钱）大黄（二钱）

水二钟。煎一钟。空心服。

附方

当归地黄汤

治破伤风。气血俱虚。发热头痛。服此养血气。祛风邪。不拘新旧并治之。

当归（酒拌）地黄（酒拌）芍药 川芎 本 防风 白芷（各一钱）细辛（五分）

附方

补真丸

肉苁蓉（酒浸焙）葫芦巴（炒）附子（炮去皮）阳起石（煨）鹿茸（酒浸焙）
菟丝子（净洗酒浸）肉豆蔻（面裹煨）川乌（炮去皮）五味子（各五钱）

上为末。用羊腰子两对。治如食法。葱椒酒煮。捣烂入酒。糊丸如梧子大。每服七十丸。空心米饮盐汤任下。

附方

玄参升麻汤

玄参 赤芍药 升麻 犀角屑 桔梗 贯众 黄芩（各一钱）甘草（五分）

作一贴。水姜煎。食后服。

附方

犀角升麻汤

犀角（七钱半）升麻（五钱）防风羌活川芎黄芩白附子（各二钱半）
甘草（一每服一两。水煎。食后服。

附方

清胃散

治胃经湿热。牙齿或牙龈肿痛。或牵引头脑。或面发热。

归身（酒拌一钱）黄连生地黄（酒拌各一钱）牡丹皮（钱半）升麻（二钱）

水二钟。煎七分。食远服。

附方

清咽利膈散

金银花防风荆芥薄荷桔梗黄芩黄连（各一钱半）山梔连翘（各钱）
玄参大黄（煨）朴硝牛蒡子甘草（各七分）

作一贴。水煎服。

附方

聪耳益气汤

黄（一钱）甘草（炙五分）人参（三分）当归（二分酒焙干）橘皮（二分）
升麻（二分）柴胡（三分）白术（三分）菖蒲防风荆芥作一服。水煎。空心服。

附方

防风通气汤

羌活 独活（各二钱） 防风 甘草（炙） 本（各一钱） 川芎（五钱） 蔓荆子（三钱）
锉。分二贴。水煎服。

附方

豆豉饼

治疮疡肿硬不溃。及溃而不敛。并一切顽疮恶疮。用江西豆豉为末。唾津和作饼如钱大三文。置患处。又艾壮于饼上灸之。饼干再用唾津和作疮大。用漱口水调作饼覆患处。以艾铺饼上烧之。未成者即消。已成者虽不全消。其毒顿减。甚有奇功。不可忽之。

附方

流气饮

治流注及一切恚怒气结肿作痛。或胸膈痞闷。或风寒湿毒。转于经络。致气血不和。结成肿块。肉色不变。或漫肿木闷。无头。（即疮科流气饮）

桔梗（炒） 人参 当归（酒拌） 官桂 甘草（炙） 黄（盐汤浸炒） 浓朴（姜制）
防风 紫苏 芍药 乌药 枳壳（各七分） 槟榔 木香 川芎 白芷（各五分）

水二钟。煎八分。食远服。

附方

独参汤

治溃疡。气血虚极。恶寒或发热。或失血之证。葛可久血脱补气。即此方也。

人参（一两） 水二钟。枣十枚。煎一钟。徐服。若煎至稠浓。即为膏。

附方

补肾丸

巴戟（去心） 山药 补骨脂（炒） 小茴香（炒） 牡丹皮（各五钱）
清盐（二钱半后入）

肉苁蓉（酒洗一两） 枸杞子（一两）

上为末。蜜丸梧桐子大。每服五十丸。空心盐汤下。

附方

地骨皮散

治骨蒸。潮热。自汗。咳吐腥秽稠痰。

人参 地骨皮 生地黄（各钱半） 白茯苓 柴胡 黄（炙） 知母（炒） 石膏（各一水二钟。煎八分。食远服。

附方

密钥匙

治喉闭。缠喉风。痰涎壅塞。甚者水浆难下。

焰硝（一两五钱） 鹏砂（五钱） 脑子（一字） 雄黄（二钱） 白僵蚕（一钱）

各研为末。和匀。以竹管吹患处。痰涎即出。如痰出喉仍不消。急针患处。去恶血。

附方

必效散

治 未成脓自消。已溃者自敛。如核未去。更以针头散腐之。若气血虚者。先服益气养荣汤数剂。然后服此散。服而 毒以下。再服前汤数剂。

南鹏砂（二钱半） 轻粉（一钱） 斑蝥（四十个糯米同炒熟去翅及头）
麝香（五分） 巴豆（五粒去壳心膜） 白槟榔（一个）

上为末。每服一钱。壮实者钱半。五更滚汤调下。小水涩滞。或微痛。此欲下也。进散一服。其毒即下。斑蝥、巴豆似为峻利。然巴豆能解斑蝥之毒。用者勿畏。尝遇富商项有痕颇大。询之。彼云因怒而致。困苦二年。百法不应。方与药一服。即退二三。再服顿退。四服而平。旬日而痊。以重礼求之。乃是必效散。一老嫗亦治此症。索重价始肯治。其方乃是中品锭子

疮内。以膏药贴之。其根自腐。未尽再用。去尽更搽生肌药。数日即愈。

予见血气不虚者果验。血气虚者溃去亦不愈。丹溪亦云。必效散与神效栝蒌散相兼服之。有神效。常以二药兼补剂用之。效。按錠子虽峻利。盖结核坚硬。非此未见易腐。必效散虽有斑蝥峻利。然毒深者。非此莫能易解。又有巴豆解毒。但有气血虚者。用之恐有误。一道人治此症。用鸡子七个。每个入斑蝥一枚。饭上蒸熟。每日空心服一枚。求者甚多。然气血虚者恐亦不能治也。

附方

散肿溃坚丸

知母（酒浸炒） 黄柏（酒洗炒） 昆布 桔梗（各半两） 栝蒌根（酒洗） 广术
三棱（酒连翘）（各三钱） 升麻（六分） 白芍药 黄连 葛根（各二钱）
草龙胆（四两酒洗炒） 黄芩稍（一钱半一半酒洗一半生）

为末。蜜丸如梧子大。每服五十丸。滚汤下。

附方

香附饼

治瘰 流注肿块。或风寒袭于经络。结肿或痛。用香附为末。酒和。量疮大小。作饼覆患处。以熨斗熨之。未成者内消。已成者自溃。若风寒湿毒。宜用姜汁作饼。

附方

内塞散

治阴虚。阳气凑袭。患肿或溃而不敛。或风寒袭于患处。致气血不能运。至久不愈遂成附子（童便浸三日一日一换切作四块再浸数日炮一两） 肉桂（去皮） 赤小豆
甘草（炙）

盐水浸炒） 当归（酒拌） 茯苓 白芷 桔梗（炒） 川芎 人参 远志（去心）
浓朴（姜制各一两） 防风（四钱）

为末，每服二钱，空心温酒下。或酒糊丸，盐汤下亦可。或炼蜜丸亦可

附方

神效栝蒌散

治乳痈乳劳已成。化脓为水。未成即消。治乳之方甚多。独此神效。瘰疬疮毒尤效。

甘草 当归（各五钱） 没药（另研） 乳香（各一钱另研） 栝蒌（大者二个杵）

作二剂。用酒三碗。煎至二碗。分三次饮。更以渣罨患处。一切痈疽。肿毒。便毒。并效。如数剂不消不痛。兼服补气血之药。

附方

黄连胡粉散

黄连（二两） 胡粉（一钱） 水银（一两同粉研令消）

三味相和。用皮包裹。熟良久。敷患处。

附方

桃仁汤

桃仁 苏木 蜜虫（去足翅炒） 水蛭（三十个炒）
生地黄每服三钱。水一钟。煎六分。空心服。

附方

没药丸

当归（一两） 桂心 芍药（各半两） 没药（研一分） 桃仁（去皮尖炒研碎一分）
蜜虫（去足翅炒） 水蛭（炒各三十个）

上为末。醋糊丸梧子大。每服三五丸。空心醋汤下。

附方

当归丸

当归（半两） 大黄 桂心（各三钱） 赤芍药 葶苈（各二钱） 人参（一钱）
甘遂（半钱）

炼蜜为丸如弹子大。空心米饮化下一丸。

附方

当归散

治妇人阴中突出一物。长五六寸。名阴挺。

当归 黄芩（各二两） 牡蛎（两半） 皮（一两炙） 赤芍（五钱）

为末。每服二钱。食前温酒或滚汤调下。如不应。更以补中益气倍加升麻、柴胡兼服之

附方

瓜子仁汤

治产后恶露不尽。或经后瘀血作痛。或肠胃停滞。瘀血作痛。或作痢。并治。

薏苡仁（四钱） 桃仁（去皮尖研） 牡丹皮 栝蒌仁（各一钱半）

水二钟。煎八分。食前服。

附方

泻白散

桑皮（炙） 桔梗 栝蒌实 升麻 半夏 杏仁（去皮尖炒） 地骨皮（各一钱）
甘草（五分）作一贴。姜水煎服。

附方

神仙活命饮

治诸疮未作脓者内消。已成脓者即溃。又排脓止痛消毒圣药也。

穿山甲（蛤粉炒黄色） 甘草节 防风 没药 赤芍 白芷 归尾 乳香（各一钱）
天花粉 贝母（各八分） 金银花 陈皮（各三钱） 皂角刺（炒黄一钱）

用酒一碗。同入瓶内。纸糊瓶口。勿令泄气。慢火煎数沸去渣。分病上下。食前后服之。能饮酒者。再饮三二杯。尤妙。

附方

蜡矾丸

治一切痈疽。托里止痛。护脏腑。神效。不问老幼皆可服。

白矾（一两明亮者研末） 黄蜡（一两黄色好者溶开离火入矾末一方用七钱）

众手急丸梧桐子大。每服十丸。渐加至二十丸。熟水或温酒送下。日进二服。一法将蜡水煮。用匙挑浮水上者。和矾末丸。则软而易丸。

附方

四君子汤

治脾胃虚弱。便血不止。

甘草（炙五分） 人参 白术（炒） 白茯苓（各一钱）

水一钟。姜三片。枣二枚。煎八分。食远服。

附方

人参败毒散

一切疮疡。痛发寒热。或拘急头痛。脉数有力者。

人参 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 枳壳 茯苓 川芎 甘草（各一钱）

水二钟。煎八分。食远服。

附方

清咽消毒散

治咽喉生疮肿痛。痰涎壅盛。或口舌生疮。大便秘结。即荆防败毒散加芩连硝黄。

附方

金黄散

滑石 甘草各为末。等分。敷搽。

附方

龙胆泻肝汤

柴胡 泽泻（各一钱） 车前子 木通（各五分） 生地黄 当归尾（酒洗）
草龙胆（酒浸炒黄色各三钱）

作一贴。水煎。食前服。

附方

神异膏

治痈疽疮毒甚效。此疮中第一药也。

露蜂房（蜂儿多者一两） 蛇蛻（盐水洗焙半两） 玄参（半两） 黄（三钱）
男发（洗如鸡子一丸） 杏仁（去皮尖一两） 黄丹（十一两） 真麻油（二斤）

先以玄参、黄、杏仁、入油煎至黑色。方入蜂房、蛇蛻、男发、再煎至黑。滤去渣。

徐徐入黄丹。慢火煎。以柳枝不住手搅。滴水捻。软硬得中。即成膏矣。

附方

冲和膏

治一切疮肿不甚热。积日不消。

紫荆皮（炒五钱） 赤芍药（炒二两） 独活（去节炒三两） 白芷（一两）
菖蒲（一两）

上为末。葱头煎汤。调搽。

附方

神功散

（即四生散）

治腿生疮。浸淫不愈。类风痹。名肾脏风疮。如上攻则目昏花。视物不明。并一切风痹疥癩。

白附子（生用）黄独活 蒺藜等分。研末。每服二钱。用猪腰子一个。批开入药。湿纸裹。煨熟。空心连腰细嚼盐汤下。风痹酒下。

附方

大连翘饮

治丹毒、斑疹瘙痒。或作痛。及大人风邪热毒肿或痒。小便涩。

连翘 瞿麦 荆芥 木通 芍药 蝉蜕 当归（酒拌） 甘草 防风 柴胡 滑石（）

山梔（炒） 黄芩（各一钱）

水钟半。煎七分。小儿宜为末。每服一二钱。滚汤调下。

附方

通气散

治时毒肿。咽喉不利。取嚏以泄其毒。

玄胡（钱半） 牙皂 川芎（各一钱） 藜芦（五分） 踯躅花（一分半）

为细末。用纸捻蘸少许。鼻内。取嚏为效。

附方

羌活胜湿汤

羌活（去芦） 独活（去芦一钱） 本 防风（去芦半钱） 川芎（二分）

甘草（炙半分）

蔓荆子（二分）

作一贴。姜水煎服。

附方

附子八物汤

附子（炮） 干姜（炮） 芍药（炒） 茯苓 人参 甘草（炙各一钱五分） 肉桂（一钱）
白术（二钱炒）

作一贴。水煎。食前服。

附方

加减小续命汤

麻黄（去节） 人参 黄芩 芍药 杏仁（去皮尖面炒） 甘草 防己 肉桂（各一两半）

附子（炮去皮脐五钱）

每服一两。姜水煎服。

附方

独活寄生汤

白茯苓 杜仲 当归（酒洗） 防风 牛膝 白芍药 人参 细辛 桂心 秦艽 熟地黄 芎
甘草（各二两） 独活（三两） 桑寄生（二两）

姜水煎服。每服一两。

附方

五香连翘汤

治诸疮初觉。一二日便厥逆。咽喉塞。寒热。

沉香 木香 麝香 连翘 射干 升麻 丁香 独活 甘草（炙） 桑寄生（各一钱） 大黄 木通 乳香（各一钱半）

每服五钱。水一钟。煎八分。取利。

附方

八风散

藿香（半斤） 白芷 前胡（各半斤） 黄 甘草 人参（各二斤） 羌活 防风（各三斤）

上为细末。每服四钱。薄荷煎滚汤调服。

附方

人参荆芥散

治妇人血风发热。或疮毒瘙痒。肢体疼痛。头目昏涩。烦渴盗汗。或月水不调。脐腹疼痛。癖积块。

人参 桂心 柴胡 鳖甲（醋炙） 荆芥穗 枳壳（麸炒） 生地黄（酒拌） 酸枣仁（炒）

羚羊角 白术（炒各一钱） 川芎 当归（酒拌） 防风 甘草（炙各五分）

水二钟。姜三片。煎八分。入羚羊角末。食远服。

附方

消风散

治风热。瘾疹瘙痒。及妇人血风瘙痒。或头皮肿痒。或诸风上攻。头目昏。项背拘急。鼻流清水。嚏喷声重。耳作蝉声。

陈皮（焙五钱） 甘草（炒） 人参 茯苓 荆芥穗 防风 川芎（炒） 白僵蚕（炒） 蝉蜕（各二两） 浓朴（姜制五钱） 藿香 羌活（一两）

上为末。每服三钱。茶清调下。疮癣温酒下。

附方

何首乌散

何首乌 防风 蒺藜 枳壳 天麻 胡麻子 僵蚕 茺蔚子（各等分）

每服五钱。茵陈汤下。

附方

神效当归膏

当归 黄蜡（各一两一方用白蜡尤效） 麻油（四两）

先将当归入油煎至黑。滤去。入蜡溶化。即成膏矣。

附方

乳香定痛丸

乳香 没药（各另研） 羌活 五灵脂 独活（各三钱） 川芎 当归 交趾桂
川白芷 真绿豆粉 白胶香（各半两）

上为末。炼蜜丸如弹子大。每服一丸。细嚼。薄荷汤送下。手足损痛不能举动。加草乌。用五钱盐汤下。

附方

五积散

治风寒湿毒客于经络。致筋挛骨痛。或脚腰酸疼。或身重痛拘急。

苍术（二钱半） 桔梗（炒钱半） 陈皮（去白六分） 白芷（三分） 甘草
当归（酒拌） 川芍药（炒） 半夏（姜制） 茯苓（去皮各三分） 麻黄（去节六分）
干姜（炮四分） 枳壳（麸炒六分） 桂心（一钱） 浓朴（姜制四分）

水二钟。姜三片。枣一枚。煎一钟。服。

附方

舒筋汤

片子姜黄 甘草（炙） 羌活（各一钱） 当归（酒洗） 赤芍药 白术 海桐皮（各二钱）
作一贴。姜水煎服。

附方

四生丸

治血风。骨节疼痛。不能举动。或行步不前。或浑身瘙痒。或麻痹。

地龙（去土） 僵蚕（炒去丝） 白附子（生） 五灵脂 草乌（去皮尖各等分）

为末。米糊丸梧子大。每服二三十丸。茶酒任下。或作末。酒调服。

附方

大防风汤

治三阴之气不足。风邪乘之。两膝作痛。久则膝大腿愈细。名曰鹤膝风。乃败证也。
。非此不治。又治痢后脚痛缓弱。不能行步。或腿肿痛。

附子（炮一钱） 白术（炒） 羌活 人参（各二钱） 川芎（钱半） 防风（二钱）
甘草（炙牛膝（酒浸一钱） 当归（酒拌二钱） 黄（炙二钱） 白芍（炒二钱）
杜仲（姜制二钱） 生地黄（酒拌蒸半日忌铁器一钱）

作一服。水二钟。姜三片。煎八分。空心服。愈后尤宜调摄。更服还少丹。或加桂
以行地黄之滞。若脾胃虚寒之人。宜服八味丸。

附方

芦荟丸

治下疳溃烂或作痛。及小儿肝积发热。口鼻生疮。或牙龈蚀烂。

胡黄连 黄连 芦荟 木香 白芨（炒） 白雷丸 青皮 鹤虱草（各一两）
麝香（三为末。蒸饼糊丸麻子大。每服一钱。空心米汤下。

附方

当归拈痛汤

治湿热下注。脚膝生疮。或脓水不绝。或赤肿。或痒痛。或四肢遍身肿痛。

防风 归身 知母（酒炒） 泽泻 猪苓（各三钱） 白术（钱半） 羌活（五钱） 人参
苦参（酒制） 升麻 葛根 苍术（各二钱） 甘草（炙） 黄芩（酒炒）
茵陈叶（酒炒各五钱）

作四剂。水二钟。煎一钟。空心并临卧服。

附方

清震汤

升麻 柴胡 苍术 黄芩（各五分） 甘草（炙二分） 本（二分） 当归身（二分）
麻黄根 防风 猪苓（各三分） 红花（一分） 泽泻（四分） 羌活 酒黄柏（各一钱）

作一服。水煎。临睡服。

附方

补肝汤

黄（七分） 人参 葛根 白茯苓（各三分） 升麻 猪苓（各四分） 柴胡 羌活 知母 连翘
泽泻 防风 苍术 当归身 曲末 炒黄柏 陈皮（各二分） 甘草（炙五分）

作一服。水煎。空心热服。

附方

芍药汤

芍药（四钱） 当归 黄连 黄芩 官桂（各二钱） 槟榔（一钱二分） 甘草（炙一分）
木香（八钱） 大黄（一钱二分）

分二贴。水煎服。如后重加大黄。脏毒加黄柏。

附方

清燥汤

白术 黄 黄连（各一钱） 苍术（钱半） 白茯苓 当归 陈皮（各一钱） 生地黄
人（各七分） 神曲（炒） 猪苓 麦门冬（去心） 黄柏（酒炒） 甘草 泽泻（各五分）
柴胡 升麻（各三分）

作一服。水煎服。

附方

黄连丸

治大肠有热。下血。

黄连、吴茱萸等分。热汤拌湿。罨二日。同炒拣出。各另研末。亦各米糊丸梧子大。
。每服二三钱。粪前红服茱萸丸。粪后红服黄连丸。俱酒下。

附方

黄连消毒散

治痈疽肿势外感 痛。或不痛麻木。服此更宜蒜灸。

黄连（酒拌） 羌活 黄芩（酒拌） 黄柏（酒拌炒） 生地黄（酒拌） 知母（酒拌炒）
独活防草（炙各五分） 黄（盐水拌炒二钱）

作一贴。水二钟姜三片煎八分。食后服。

附方

还少丹

远志 茴香 巴戟 山药 牛膝 杜仲 肉苁蓉 枸杞子 熟地黄 石菖蒲 五味子 白茯苓
楮实子上为末。各等分。用枣肉同蜜丸如梧子大。每服五十丸。空心酒下。

附方

蟠葱散

肉桂 干姜（炮二两） 苍术 甘草（炙各半斤） 缩砂 丁皮 槟榔（各四两）
莪术 三棱（煨） 茯苓 青皮（去白各六两） 延胡索（二两）

为末。每服五钱。葱汤空心调下。

附方

葫芦巴丸

葫芦巴（炒一斤） 茴香（去脐炒十二两） 川楝子（炒一斤二两）
大巴戟（去心炒六两）

川乌（炮去皮尖六两） 吴茱萸（汤洗七次，炒十两）

上为末。酒糊如梧子大。每服十五丸。空心温酒下。小儿茴香汤下。

附方

塌肿汤

治妇人阴hu生疮。或肿。或痛。或脓水淋漓。

甘草 干漆（各三两） 黄芩 当归 生地黄 川芎（各二两） 龟甲（五两）

用水数碗。煎良久。去渣。塌洗患处。

附方

菖蒲散

治妇人阴hu肿痛。月水涩滞。

菖蒲 当归（各一钱） 秦艽（七钱半） 吴茱萸（五钱制）

为末。每服三钱。空心葱汤调下。更以枳实炒热。频熨患处。阴内脓水淋漓。或痒痛。

以升麻、白芷、黄连、木通、当归、川芎、白术、茯苓煎服。更用塌肿汤浴洗。

附方

清心莲子饮

治心经蕴热。小便赤涩。或茎肿窍痛。及上下虚。心火炎上口苦咽干。烦躁作渴。发热。小便白浊。夜则安静。昼则发热。

黄芩（炒） 黄（蜜炙） 石连肉（去心） 赤茯苓 人参（各一钱） 甘草（炙）
车前子（炒） 麦门冬（去心） 地骨皮（各五分）

水二钟。煎八分空心食前服。

附方

斑龙丸

鹿茸（酥炙为末） 山药（为末） 熟地黄（酒蒸捣膏） 柏子仁（捣膏）
菟丝子（各等分）

蜜丸梧子大。每服八十丸。空心盐汤下。

附方

滋肾丸

治下焦阴虚。小便涩滞。或膝无力。阴汗阴痿。或足热不履地。不渴而小便闭。

肉桂（二钱） 黄柏（酒拌焙） 知母（酒洗焙各一两）

为末水丸梧子大。每服百丸。加至二百丸。百沸汤下。

附方

茯兔丸

菟丝子（五两） 白茯苓（三两） 石连肉（去心三两）

酒糊丸梧子大。每服五十丸。空心盐汤下。

附方

木香饼

治一切气滞结肿。或痛或闪肭。及风寒所伤作痛。并效。

木香（五钱为末） 生地黄（一两杵膏）

和匀。量患处大小。作饼置肿上。以热熨斗熨之。

附方

没药降圣丹

川乌头（炮去脐） 骨碎补（炙） 白芍药 没药（另研） 当归（焙） 乳香（各研）
生地黄 川芎 苏木（各一两） 自然铜（火醋淬十次为末一两）

上为末。生姜汁与蜜和丸。每一两作丸。每服一丸。水酒各半盏。煎至八分。空心
热服

附方

乳香定痛散

治疮痛不可忍。

乳香 没药（各二钱） 寒水石（） 滑石（各四钱） 冰片（一分）

为细末。搽患处。痛即止。甚妙。此方乳、没性温。佐以寒剂制之。故寒热之痛皆
有效也

附方

青州白丸子

白附子（炮二两） 半夏（姜制） 南星（各二两） 川乌（炮去皮脐半两）

为末。用糯米糊丸如绿豆大。每服二十丸。生姜汤下。瘫痪温酒下。小儿惊风薄荷
汤下

附方

失笑散

治产后心腹绞痛欲死。或血迷心窍。不知人事及寻常腹内瘀血。或积血作痛。妇人血气痛之圣药也。亦治疝气疼痛。

五灵脂 蒲黄（俱炒等分）

每服二三钱。醋一合。熬或膏。入水一盞。煎七分。食前热服。

附方

解毒散

治一切毒蛇恶虫并兽所伤。重者毒入腹。则眼黑口噤。手足强直。此药平易不伤气血。

大有神效。不可以为易而忽之。

白矾 甘草（各一两）

为末。每服二钱。不拘时冷水调下。更敷患处。

附方

五福化毒丹

玄参 桔梗（各一两半） 茯苓（二两半） 人参 牙硝 青黛（各一两） 甘草（七钱半）

麝香（少许） 金银箔（各十片）

上为末。炼蜜丸芡实大。每服一丸。薄荷汤下。痘毒上攻。口齿生疮。以生地黄汁化服。及用鸡翎敷患处。

附方

连翘丸

连翘 防风（去芦） 黄柏 肉桂（去粗皮） 桑白皮 香豉 独活 秦艽 牡丹皮（各半两）
海藻（二钱半）

上为末。炼蜜丸如绿豆大。每服十丸。灯心汤下。

附方

当归饮子

治血燥作痒。及风热疮疥瘙痒或作痛。

当归（酒拌） 川芎 白芍 防风 生地黄（酒拌） 白蒺藜 荆芥（各钱半） 黄
何首乌 甘草（各五分）

水二钟。煎八分。食远服。

附方

葛根橘皮汤

葛根 陈皮 杏仁（去皮尖） 麻黄（去节） 知母 黄芩 甘草（各等分）

每服二钱。水煎服。

附方

龙胆丸

龙胆草 赤茯苓 升麻 苦楝根皮 防风 芦荟 油发灰（各二钱） 青黛 黄连（各三猪胆浸
。丸如麻子大每服二十丸薄荷汤下。

附方

地黄清肺饮

紫苏 前胡 防风 黄芩 赤茯苓 当归 连翘 桔梗 甘草 天门冬（去心） 生地黄（各一钱）
桑白皮（半两炙）

每服三钱。水煎。食后服。次进化 丸。

附方

化丸

芩薢 青黛 芦荟 川芎 虾蟆灰 白芷 胡黄连（各等分）

猪胆浸。丸如麻子大。每服十丸。食后并临卧杏仁汤下。

附方

大芦荟丸

黄连 芦荟 木香 青皮 胡黄连 雷丸（用白者） 白芩薢 鹤虱（各半两炒）
麝香（二钱另研）

用粟米饭丸绿豆大。每服一二十丸。米饮下。

附方

六味地黄丸

（即肾气丸）

治肾气素虚。不交于心。津液不降。败浊为痰。咳逆。

干山药（四两） 泽泻（蒸） 牡丹皮（白者佳） 白茯苓（各三两）
山茱萸（去核四两酒拌）

熟（四两酒拌瓷器蒸半日捣膏）

余为末。加蜜丸如梧子大每服五六十丸。空心。滚汤或盐汤温酒下。

附方

槐花酒

治一切疮毒。不问已成未成及痛者。并治之。槐花四五两微炒黄。乘热入酒二钟。
煎沸。去渣热服。未成者二三服。已成者一二服。又治湿热疮疥。肠风。痔漏诸疮
作痛。尤效

附方

黄连消毒饮

（即黄连消毒散方见第一卷）

附方

紫金锭

（一名神仙追毒丸又名太乙丹）

治一切痈疽。

五味子（焙三两） 山慈菇（焙二两） 麝香（三钱别研入） 红牙大戟（焙一两半）
续随子（去壳去油一两）

上除续随子麝香外。三味为细末。却入研药令匀。用糯米煮浓饮为丸。分为四十锭。每锭。各根据后项汤使服。如治一切药毒蛊毒瘴气吃死牛马驼骡等肉。毒发恶疮。痈疽发背。无名疔肿。及蛇犬恶虫所伤。汤荡火烧急。喉闭缠喉风。诸般头风。牙疼。用凉水磨搽。并治四时瘟疫。感冒风寒。暑热闷乱。及自缢溺水鬼迷惊死未经隔宿。心头微温。并用凉水磨灌。良久复苏。男子妇人急中颠邪鬼气狂乱。及打扑伤损。中风中气。口眼邪。牙关紧急。

语言謇涩。筋脉挛缩。骨节风肿。手脚疼痛。行履艰辛。应是风气。并用热酒磨服。小儿急慢惊风。八疳五痢。脾病黄肿。瘾疹疮瘤。并用蜜水磨服。并搽有效。诸般疟疾。不问新久。发日用桃柳枝煎汤磨服。

附方

玉真散

治破伤风。重者牙关紧急。腰背反张。并蛇犬所伤。（又名定风散）

天南星 防风（各为末。每服二钱。温酒调下。更搽患处。若牙关紧急。腰背反张者。每服三钱。童便调服。虽内有瘀血亦愈。

至于昏死。心腹尚温者。连进二服。亦可保全。若治疯犬咬。用嗽口水洗净搽之。
神效

附方

夺命丹

（又名蟾蜍丸）

治疗疮发背及恶证不痛。或麻木。或呕吐。重者昏愤。服此。不起发者即发。不痛者即痛甚者即止。昏愤者即苏。呕吐者即解。未成者即消。已成者即溃。有回天之功。乃恶证中至宝也。

蟾酥（干者酒化）轻粉（各五分）白矾（枯）铜绿 寒水石（）乳香 没药 麝香（各一钱）朱砂（二钱）蜗牛（二十个另研无亦效）

上研细末。将蜗牛研烂。入药末捣匀。丸如绿豆大。如丸不就。入酒糊些少。每服一二用生葱白三五寸。病者自嚼烂。吐于手心。男左女右。包药在内。热酒连葱送下。如人行五七里。汗出为效。重者再服一二丸。

附方

茯苓丸

茯苓（一两）半夏（二两）枳壳（五钱）风化朴硝（一两）

姜汁糊丸梧子大。每服二十丸。食后姜汤下。

附方

控涎丹

甘遂（去心）大戟 真白芥子（各等分）

糊丸梧子大。每服五七丸。临卧姜汤下。

附方

制甘草法

（详见外科精要）

治悬痈肿痛。或发寒热。不问肿溃。神效。其法大甘草每一两切三寸许。开涧水一碗浸慢火炙干。仍投前水浸透。再炙再浸。以碗水干为度。锉细。以无灰酒一碗。煎至七分。去渣。空心服。

附方

五苓散

泽泻（一钱二分） 肉桂（五分） 白术 猪苓 赤茯苓（各一钱）

作一贴。水煎服。

附方

忍冬酒

（一名金银花一名鹭鸶藤详见外科精要）

忍冬藤（生者四五两如干者只用一两捣） 大甘草节（一两生用）

二味入瓷器内。以水二碗。慢火煎至一碗。再入无灰酒一碗。再煎十余沸。去渣饮之。

查敷患处。

附方

回阳玉龙膏

治痈肿。坚硬不痛。肉色不变。久而不溃。或溃而不敛。或筋挛骨痛。及一切冷症。

草乌（三两炒） 南星（一两煨） 军姜（二两煨） 白芷（一两） 肉桂（半两）
赤芍药（一为末。葱汤调搽。

附方

蛇床子散

治风癖疥癩瘙痒。脓水淋漓。

蛇床子 独活 苦参 防风 荆芥穗（各一两） 枯矾 铜绿（各五钱）

为末。麻油调搽。

附方

人参平肺散

治心火克肺。传为肺痿。咳嗽喘呕。痰涎壅盛。胸膈痞满。咽嗑不利。

人参 陈皮（去白） 甘草（炙） 地骨皮（各五分） 茯苓 知母（炒各七分） 青皮 天门冬（去心） 五味子（捣炒各四分） 桑白皮（炒一钱）

水二钟。姜三片。煎八分。食后服。

附方

如圣柘黄丸

治肺痈。咳而腥臭。或唾脓瘀。不问脓盛否。并效。肺家虽有方。惟此功效甚捷。

柘黄（一两为末） 百齿霜（即梳垢二钱）

糊丸梧子大。每服三五丸。米饮下。柘黄乃柘树所生。色黄。状如灵芝。江南最多。北

附方

万金散

治痈疽恶核肿痛。发背等疮。不问已溃未溃。

栝蒌（一棵全） 没药 乳香（各一钱研） 甘草节（二钱）

先以栝蒌、甘草用无灰酒二碗。煎至一碗。去渣入乳、没不拘时服。

附方

皮丸

治痔久而不愈。或作漏。

皮（一两炙） 槐花（微炒） 艾叶（炒） 枳壳（炒） 白芍药 地榆 川芎
当归（酒洗）

矾（） 黄（盐水炒） 贯众（各半两） 头发（三钱烧存性） 猪后悬蹄甲（十枚炙）
盈尺皂角（一挺去弦醋炙）

为末。炼蜜丸如梧子大。每服五十丸。食前米饮下。（若气血虚。或肿痛。先投他药。

待气血稍复。肿痛已去。方可服此。此乃收后之剂。）

附方

苦参丸

治一切疮毒。

痛作渴。或烦躁。苦参不拘多少。为末。水糊丸如梧子大。每服二三钱温酒下。

附方

秦艽苍术汤

治肠风痔漏。大小便秘涩。

黄柏（酒拌） 泽泻 归尾（酒拌） 防风（各一钱） 皂角仁（烧存性） 秦艽
苍术（米泔浸炒） 桃仁（各钱半） 槟榔（五分） 大黄（炒量入）

水二钟。煎八分。空心服。

附方

卷柏散

治脏毒便血。

卷柏（生石上高四五寸根黄如丝上有黄点焙干） 黄（盐水浸炒各等分）

上为细末。每服五钱。空心米饮调下。

附方

寒水石散

治痔发热作痛。

寒水石 朴硝（各等分）

为末。温水调服。

附方

内托羌活汤

（见臀痈条）

附方

白芷升麻汤

治臀痈肿痛。右手脉大。未成脓者。

白芷（一钱半） 升麻 桔梗（各一钱） 生黄芩（三钱） 红花 甘草（炙各五分）
酒黄芩作一服。水一钟。酒半钟。煎至八分。食后服。

附方

内托黄柴胡汤

（见附骨痈条）

附方

内托升麻汤

治妇人乳中结核。或肿痛。并效。久而不消者。宜以托里药为主。间服此药。

栝蒌仁（三钱）升麻连翘青皮甘草节（各二钱）

作一服。水煎服。若数剂不消。宜以托里。

附方

升麻牛蒡子散

治时毒疮疹。发于头面或胸膈之际。及一切疮毒。并效。

升麻桔梗葛根玄参牛蒡子麻黄甘草（各一钱半）连翘（二钱）

作一帖。水姜煎。食远服。

附方

黄人参汤

治溃疡。虚热无睡。少食。或秽气所触作痛。

人参白术（炒）归身（酒拌）麦门冬（去心）苍术（米泔浸各一钱）甘草（炙）
陈皮升麻神曲（炒各五分）黄（盐水拌炒二钱）黄柏（酒炒三分）
五味子（九粒捣碎）

水二钟。姜三片。枣一枚。煎八分。食远服。

附方

雄黄解毒散

治一切痈肿毒烂。毒势甚者。先用此药二三次。后用猪蹄汤。

雄黄（一两）白矾（四两）寒水石（一两）

用滚水二三碗。乘热入前药末一两洗患处。以太乙膏或神异膏贴之。

附方

玉粉散

治一切疔疮。

轻粉 银朱 滑石 寒水石 孩儿茶（各二钱） 片脑（二分）

上为细末。香油调搽。干搽亦可。若肿硬不消。以防风、荆芥、牛膝、甘草、滑石、各五钱。用水三碗。煎二碗。乘热熏洗。

附方

千两金丸

治喉风喉闭。及一切急症肿塞。立效真起死回生之药也。

蚬 草 铜青 大黄 牙硝（各五钱）

上为末。以白梅肉烂研一处。捣匀。每一两作五丸。以新棉裹噙化咽。津涎吐出。

附方

破关丹

治乳蛾、喉闭、缠喉风等症。

硼砂末（五钱） 霜梅肉（一两）

捣烂为丸如芡实大。噙化咽下。内服荆防败毒散。重者服防风通圣散

附方

如圣黑丸子

治风寒袭于经络。肿痛或不痛。或打扑跌坠。筋骨疼痛。瘀血不散。遂成肿毒。及风湿四肢疼痛。或手足缓弱。行步不前。并妇人血风劳损。

白芨 当归（各四钱） 白芷（一两六钱） 南星（焙三钱） 百草霜 芍药（各一两）
牛膝（焙六钱） 川乌（炮二钱） 赤小豆（一两六钱） 骨碎补（焙八钱）

为末。炼蜜丸梧子大。每服三十丸。盐汤或酒下。风疾更煨葱一茎。温酒下。孕妇勿用

附方

如圣丸

治癫风（即大麻风。苏州敛院使方甚效。）

全蝎（酒洗）连翘 天麻 防风（各一两半） 荆芥 川芎 白芷 当（酒洗） 黄柏 羌活 桔梗 大黄（煨） 滑石 石膏（） 白术 麻黄 苦参 僵蚕（炒）

蝉蜕 芍药 山梔 枳壳 细辛 皂角刺 大风子（肉各一两） 独活 人参 郁金 芒硝 黄连（各五钱）

共三十味为细末。用红米糊为丸如梧子大。每服五七十丸。用六安茶煎汤送下。日进三半年全愈。小便尿如靛水黑色。此病之深者。只用此药二料。如眉毛须发。脱落日渐生者。

切不可食羊肉、鹅、鸡、猪头、蹄、鲤鱼、生冷。如肯食淡。百日全愈。如疮破裂。只风子壳煎汤洗。春夏滑石、石膏根据方用。秋冬二味减半。遇春分、秋分服防风通圣散一贴。空心服。利三四次。以粥补之。

附方

四七汤

半夏（五两） 紫苏（二两） 茯苓（四两） 浓朴（三两）

水钟半。姜三片。枣一枚。煎。热服。

附方

玉烛散

治便痢初起。肿痛发热。大小便秘。用此行散。

川芎 当归（酒拌） 芍药 芒硝 生地黄（酒拌） 大黄（煨各二钱） 甘草（炙五分）

水二钟。煎八分。食前服。

附方

神效活络丹

官桂 羌活 麻黄（一半去节） 贯众 白花蛇（酒浸） 甘草（炙） 草豆蔻 天麻
白芷两头尖（去皮油浸微炒） 零陵香 黄连 熟地黄 黄芩 何首乌（酒浸） 大黄
木香（芍药 细辛（去土） 天竹叶（另研） 没药（另研） 朱砂（水飞另研）
乳香（另研） 丁香 白僵蚕（炒） 虎骨（酒炙） 玄参 龟板（酒炙） 人参
黑附子（炮去皮脐） 乌药 青皮 香附子 茯苓 安息香（另研） 白豆蔻 白术 骨碎补
沉香（各一两） 威灵仙（酒浸） 全蝎（新者） 葛根 当归（各两半） 麝香
乌梢蛇（去皮骨酒浸） 乌犀屑（地龙去土） 松香脂（各五钱）
血竭（七钱半另研） 防风（二两半） 牛黄（二钱半另研） 金箔为衣
冰片（二钱半另上共五十二味。

为末。炼蜜和杵千余杵。每药两半作十丸。如弹子。金箔为衣。每服一丸。细嚼。
温酒漱下。临卧空心各一丸。随症上下。食前后服。头搐茶下。男妇卒暴中风。不
省人事。斜口噤。失音。涎盛。拘挛。临睡烂研一丸。好酒化下便睡觉。有汗将病
患手背。随即舒拳。

天明用人扶行。早饭日西再服一丸。可痊。产后暗风及破伤风。内外一切伤寒。人
年四十以上。间二三日服一丸。永无风疾。

一方无白花蛇、零陵香、黄连、黄芩、熟地黄、大黄、虎骨、龟板、乌药、安息香
、青皮、白豆蔻、骨碎补、茯苓、白术、松香脂。多藿香。

附方

内托复煎散

治疮疡肿 在外。其脉多浮。邪气胜。必侵内。

地骨皮 黄芩（炒） 茯苓 人参 白芍药（炒） 黄（盐水拌炒） 白术（炒） 肉桂
甘草（炙） 防己（酒拌） 当归（酒拌各一钱） 防风（二钱）

先锉苍术一升。水五升煎。先去术入药再煎至二升。终日饮之。苍术渣外再煎服。

附方

托里消毒散

治疽已攻发不消者。服此。未成即消。已成即溃。腐肉易去。新肉易生。有疮口宜。贴膏药。敛则不用。切忌早用生肌。又治时毒。表里俱解。肿肉不退。欲其作脓。

人参 黄（盐水拌炒） 当归（酒洗） 川芎 芍药（炒） 白术（炒） 茯苓（各一钱）
白芷 金银花（各七分） 甘草（五分）

作一剂。水二钟。煎八分。疮在上下。分食前后服。

附方

托里散

治疮。饮食少思。或不腐。或不收敛。

人参 黄（盐水拌炒） 当归（酒拌） 川芎 白术（炒） 茯苓 芍药（各一钱）
浓朴（姜制） 白芷 甘草（各五分）

作一剂。水二钟。煎八分服。

附方

代针膏

治脓熟不溃。

乳香（二分） 巴豆（去壳炒焦） 碱 白丁香（细直者是各五分）

为末。熟水调。点疮头上。常以碱水润之。勿令干。

附方

托里荣卫汤

治疮外无肿、内亦便利。乃邪在经络。用此调理。（见汗之则疮已条）

附方

定痛托里散

治疮血虚疼痛圣药也。

当归（酒拌） 白芍（炒） 川芎（各钱半） 乳香 没药 肉桂（各一钱）
栗壳（去蒂炒二水二钟。煎八分服。

附方

内托黄汤

治溃疡作痛。倦怠少食。无睡。自汗。口干或发热。久不愈。

黄（盐水拌炒） 麦门冬（去心） 熟地黄（酒拌） 人参 茯苓（各一钱） 白术（炒）
川芎 官桂 远志（去心） 当归（酒拌各五分） 甘草（炙三分）

作一剂。水二钟。姜三片。枣二枚。煎八分。食远服。

附方

当归补血汤

治疮溃后气血俱虚。肌热。躁热。目赤面红。烦渴引饮。昼夜不息。脉洪大而虚。
重按全无。此脉虚血虚也。若误服白虎汤必死。

黄（炙六钱） 当归（酒拌一钱）

水钟半。煎六分。服。

附方

玉露散

治产后乳脉不通。身体壮热。头目昏痛。大便涩滞。

人参 白茯苓 甘草（各五分） 桔梗（炒） 川芎 白芷（各一钱） 当归（五分）
芍药（水二钟。煎八分。食后服。如热甚。大便秘。加大黄三分。煎服。

附方

加味小柴胡汤

治妇人热入血室。致寒热如疟。昼则安静。夜则发热妄语。

柴胡（二钱半） 黄芩 人参 生甘草（各一钱） 半夏（六分）

水钟半。姜三片。煎八分。食远服。

附方

清心汤

治疮肿痛。发热。饮冷。脉沉实。睡语不宁。即防风通圣散。每料加黄连五钱。每剂一两。水二钟。煎八分。食远服。

附方

破棺丹

治疮热极。汗多。大渴。便秘。谵语。或发狂。结阳之症。

芒硝 甘草（各二两） 大黄（二两五钱半生半熟）

为末。炼蜜丸如弹子大。每服一丸。食后童便酒下。白汤亦可。

附方

箍药

治发背毒甚。HT走不住。此药涂之而解。

白芷 大黄 白芨 黄柏（炒） 芙蓉叶 山慈菇 寒水石（） 苍耳草（各等分）

上另为末。用水调搽。四围留中。如干。以水润之。

附方

乌金膏

解一切疮毒。及腐化瘀肉。最能推陈致新。用巴豆去壳炒焦。研如膏。点肿处则解毒。涂则自化、加乳香少许亦可。如疮内。能搜脓化毒。加香油少许。调稀可用。若余毒深伏。不能收敛者。宜此之。不致成疮。

附方

援生膏

治一切恶疮、及瘰 初起点破。虽未全消。亦得以杀其毒。

轻粉（三钱） 乳香 没药 血竭（各一钱） 蟾酥（三钱） 麝香（五分） 雄黄（五钱）

用荞麦箕灰。或真炭灰一斗三升。淋灰汤八九碗。将栗或桑柴文武火煎作三碗。以久药干添用。取二碗盛瓷器内。将前药研为极细末。入灰汤内。用铁干或柳枝顺搅。再入好细锻石一升。再搅匀。过一宿却分于小瓷器收贮凡遇诸肿。点当头一二点。一日换二次。次日又一次。须出血水为妙。如药干却。加所存灰汤少许调之。

附方

神效托里散

治一切肿毒 痛。增寒壮热。（又名金银花散）

黄（盐水拌炒） 当归 粉草 忍冬藤（各一钱）

酒水各一钟。煎一钟。分病上下。食前后服。少顷。再进一剂。渣罨患处。不问阴阳肿溃。老少虚实。皆可服。

为末。酒调服。尤效。消脓托里。止痛排脓。

附方

托里温经汤

治寒覆皮毛。郁遏经络。不得伸越。热伏荣中。聚结。赤肿作痛。恶寒发热。或痛引肢体。若头肿痛 甚。更宜砭之。（见头面赤肿门）

附方

五利大黄汤

治时毒 肿赤痛。烦渴便秘。脉数。

大黄（煨） 黄芩 升麻（各二钱） 芒硝 梔子（各一钱二分）

作一帖。水钟半。煎六分。空心热服。

附方

梔子仁汤

治时毒肿痛。便秘。脉沉数。

郁金 枳壳（麸炒去瓢） 升麻 大黄（煨） 山梔仁（炒） 牛蒡子（炒各等分）

为末。每服三钱。蜜水调下。

附方

葛根牛蒡子汤

治时毒肿痛。脉数而少力者。

葛根 贯众 甘草 豆豉（江西者） 牛蒡子（半生炒各二钱）

作一服。水钟半。煎八分。食后服。

附方

普济消毒饮

治时毒。疫 初觉。增寒体重。次传头面肿痛。或咽喉不利。口干舌燥。

黄芩 黄连（各五钱） 人参（三钱） 橘红 玄参 甘草（各二钱） 柴胡
桔梗（炒各二钱） 连翘 鼠粘子 板蓝根 马勃（各一钱） 升麻 白僵蚕（炒各七分）

作一帖。水二钟。煎一钟。去渣。稍热。食后徐服之。如大便硬。加大黄（酒煨）
一钱或二钱。肿势甚者砭之。去恶血。

附方

内托羌活汤

（见臀痈条）

附方

内托黄酒煎汤

治寒湿。腿外侧少阳经分患痈。或附骨痈。坚硬漫肿作痛。或侵足阳明经。亦治之。

柴胡（钱半） 连翘 肉桂（各一钱） 黄柏（五分） 黄（盐水拌炒二钱）
归尾（二钱）

升麻（七分） 甘草（炙五分） 大力子（炒一钱）

作一服。水酒各一钟。煎八分。食前服。

附方

附子饼

治溃疡气血虚不能收敛。或风邪袭之。以致气血不能运于疮致难收敛。用炮附子去皮脐。唾津和为饼。置疮口处。将艾于饼上灸之。每日灸数壮。但令微热。勿令痛。饼干再用唾津和做。以疮口活润为度。

附方

二陈汤

和中理气。健脾胃。消痰。进食。

半夏（姜制） 陈皮（炒） 茯苓（各钱半） 甘草（炒五分）

水一钟。姜三片。煎六分。食远服。

附方

火龙膏

治风寒湿毒所袭。筋挛骨痛。或肢节疼痛。及湿痰流注。经络作痛。不能行步鹤膝风。节风疼痛。其效尤速。

生姜（半斤取汁）乳香（为末）没药（末各五钱）麝香（为末一钱）牛皮胶（广东者二先将姜汁并胶溶化。方下乳、没。调匀。待温。下麝香即成膏。摊贴患处。更服五积散。如鹤膝风须大防风、汤。

附方

半夏左经汤

治足少阳经为四气所乘。以致发热。腰胁疼痛。头目眩晕。呕吐不食。热闷烦心。腿痹半夏（姜制）干葛细辛白术茯苓桂心防风干姜（炮）黄芩麦门冬（去心）

柴胡甘草（炙各一钱）

水二钟。姜三片。枣二枚。煎八分。食前服。

附方

大黄左经汤

治四气流注足阳明经。致腰脚肿痛不能行。大小便闭。或恶闻食气。喘满自汗。

细辛茯苓羌活大黄（煨）甘草（炙）前胡枳壳浓朴（姜制）黄芩杏仁（各水二钟。姜三片。枣二枚。煎八分。食前服。

附方

加味败毒散

治足三阳经受热。毒流于脚踝。赤肿痛。寒热如疟。自汗。短气。小便不利。手足或无汗。恶寒。

羌活独活前胡柴胡枳壳桔梗甘草人参茯苓川芎大黄苍术（各一分二剂。水一钟。姜三片。煎八分。不拘时服。

附方

导滞通经汤

治脾经湿热。壅遏不通。面目手足作痛。即五苓散减猪苓、官桂。加木、香陈皮。每服二钱。滚汤下。

附方

附子六物汤

治四气流注于足太阴经。骨节烦痛。四肢拘急。自汗短气。小便不利。手足或时浮肿。

附子 防己（各四钱） 甘草（炙二钱） 白术（炒） 茯苓（各三钱） 桂枝（一钱）

分二剂。水钟半。姜三片。煎一钟。食远服。

附方

八味丸

治命门火衰。不能上生脾土。致脾胃虚弱。饮食少思。或食不化。日渐消瘦。及虚劳。

饮水。腰肿痛疼。小腹不利。及肾气虚寒。脐腹作痛。夜多漩溺。脚膝无力。肢体倦怠。即肾气丸每料加肉桂一两。附子一两。每日用新童便数碗浸五六日。切作四块。再如前浸数日。以草纸包裹。水湿纸炮半日。出去皮脐尖。切作大片。如有白星。再用火炙。以无为度。

附方

交加散

治风寒湿毒所伤。腿脚痛。或筋挛骨痛。腰背掣痛。或头痛恶寒拘急。遍身疼痛。一切寒毒之病并治。即五积散对人参败毒散。

附方

槟榔散

治风湿流注。脚胫酸痛。或呕吐不食。

槟榔 木瓜（各一钱） 香附子 紫苏（各三分） 陈皮 甘草（炙各一钱）

水钟半。姜三片。葱白三茎。煎一钟。空心服。

附方

麻黄左经汤

治四气流注足太阳经。腰足挛痹。关节重痛。增寒发热。无汗恶寒。或自汗恶风头痛。

麻黄（去节） 干葛 茯苓 苍术（米泔浸炒） 防己（酒拌） 桂心 羌活 防风 细辛 甘草（炙各一钱二分）

水二钟。姜三片。枣一枚。煎八分。食前服。

附方

加味四斤丸

治肝肾气血不足。足胫酸痛。步履不随。腿受风寒湿毒以致脚气者。更宜。

虎胫骨（一两酥炙） 没药（另研） 乳香（另研各五钱） 川乌（一两炮去皮） 肉苁蓉 牛膝（各一两半） 木瓜（一斤去瓢蒸） 天麻（一两）

木瓜、苁蓉捣膏。余为末。加酒糊。和匀熟杵。丸梧子大。每服七八十丸。空心温酒或盐汤任下。

附方

局方换腿丸

治足三阴经为四气所乘。挛痹缓纵。上攻胸胁肩背。或下注脚膝作痛。足心发热。行步薏苡仁 石楠叶 南星（汤泡） 石斛 槟榔 萆（炙） 牛膝 羌活 防风 木瓜（各四两） 黄（炙） 当归 天麻 续断（各一两）

为末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。盐汤下。

附方

三因胜骏丸

治元气不足。为寒湿所袭。腰足挛拳。或脚面连指。走痛无定。筋脉不伸。行步不随常服益真气。壮筋骨。

当归 天麻 牛膝 木香 熟地黄（酒拌蒸半日杵膏） 酸枣仁（炒） 防风（各二两）
木四两） 羌活 乳香（各五钱） 麝香（二钱） 全蝎（炒） 没药 甘草（炙各一两）
附子（制法见八。味丸二两）

地黄三斤。用无灰酒四升煮干。再晒二日。杵如膏。入余药末杵千余下。每两作十丸。

每服一丸。细嚼。临卧酒下。作小丸服亦可。

附方

神应养真丸

治厥阴经为四气所袭。脚膝无力。或左瘫右疾。半身不遂。手足顽麻。语言謇涩。气血凝滞。通身疼痛。

当归（酒洗） 川芎 芍药 地黄（酒蒸捣膏） 羌活 天麻 木瓜 菟丝子（酒制各等分为末。入地黄膏加炼蜜丸梧桐子大。每服百丸。空心酒下。盐汤亦可。

附方

开结导引丸

治饮食不消。心下痞闷。腿脚肿痛。

白术（炒） 陈皮（炒） 泽泻 茯苓 神曲（炒） 麦芽（炒） 半夏（姜制各两） 青皮 干姜（各五钱） 巴豆霜 枳实（炒各钱半）

为末。汤侵。蒸饼丸梧子大。每服四五丸或十丸。温水下。

此内伤饮食。脾胃营运之气有亏。不能上升。则注为脚气。用此导引。行水化脾气也。

附方

青龙汤

治肺受寒咳嗽喘。

干姜（炮） 细辛 麻黄（去节） 肉桂（各三两） 半夏（汤泡七次二两半） 芍药 甘草（炙各三两） 五味子（二两捣炒）

每服五钱。水一钟姜三片。煎七分。食后服。

附方

葶苈大枣泻肺汤

治肺痈。胸膈胀满。上气咳嗽。或身面浮肿。鼻塞声重。

葶苈（炒黄研末每服三钱）

水二钟。枣一枚。煎一钟。去枣入药。煎七分。食后服。

附方

升麻汤

治肺痈。胸乳间皆痛。吐痰腥臭。

川升麻 苦梗（炒） 薏苡仁 地榆 黄芩（炒） 赤芍药（炒） 生甘草 牡丹皮（去心各水二钟。煎八分。食远服。

附方

参苏饮

治感风咳嗽。涕唾稠粘。或发热头痛或头目不清胸膈不利。

木香 苏叶 葛根（姜制） 前胡 半夏（汤泡七次） 人参 茯苓（各七分）
枳壳（麸炒）

桔梗（炒） 甘草 陈皮（去白各五分）

水二钟。姜一片。葱一茎。煎八分。食远服。

附方

桔梗汤

治咳而胸膈隐痛。两脚肿满。咽干口燥。烦闷多渴。时出浊涕腥臭。

桔梗（炒） 贝母（去心） 当归（酒浸） 栝蒌仁 枳壳（麸炒） 薏苡仁（炒）
桑白皮（炒） 甘草节 防己（去皮各一钱） 黄（盐水拌炒） 百合（蒸各钱半）
五味子（捣炒） 甜葶苈（炒）

地骨皮 知母（炒） 杏仁（各五分）

水钟半。生姜三片。煎七分。不拘时温服。咳加百药煎。热加黄芩。大便秘加煨大黄少许。小便涩加木通、车前子。烦躁加白茅根。咳而痛甚。加人参、白芷。

附方

排脓散

肺痈吐脓后服此。排脓补肺。

嫩黄（盐水拌炒） 白芷 五味子（杵炒） 人参（各等分）

细末。每服三钱。食后蜜汤调下。

附方

四顺散

治肺痈吐脓。五心烦热壅闷。咳嗽。

贝母（去心） 紫菀（去苗） 桔梗（炒各钱半） 甘草（七分）

水二钟。煎八分。食远服。咳嗽加杏仁。亦可为末。白汤调服。

附方

葶苈散

治过食煎爆。或饮酒过度。致肺壅喘不卧。及肺痛浊唾腥臭。

甜葶苈 桔梗（炒） 栝蒌仁 川升麻 薏苡仁 桑白皮（炒） 葛根（各一钱）
甘草（炙水钟半。生姜三片。煎八分。食后服。

附方

钟乳粉散

治肺气虚。久嗽。皮毛枯槁。唾血腥臭。或喘不已。

钟乳粉（炼熟） 桑白皮（蜜炙） 麦门冬（去心） 紫苏（各五分）

水一钟。姜三片。枣一枚。煎六分。食后服。

附方

紫菀茸汤

治饮食过度。或煎爆伤肺。咳嗽。咽干。吐痰唾血。喘急。胸痛。不得卧。

紫菀茸（去苗一钱） 犀角（镑因） 甘草（炙） 人参（各五分） 款冬花
桑叶（经霜者） 百（蒸焙） 杏仁（去皮尖） 阿胶（蛤粉炒） 贝母（去心）
半夏（汤泡七次） 蒲黄（炒各一钱）

水钟半。姜三片。煎八分。入犀末。食后服。

附方

人参五味子汤

治劳复咳脓或咯血。寒热往来。盗汗。羸瘦。因乏。一切虚损并治。

人参 五味子（杵炒） 前胡 桔梗（炒） 白术（炒） 白茯苓（去皮） 陈皮（去白）
甘草 地黄（生者酒拌蒸半日） 当归（酒拌炒各一钱） 地骨皮 黄（炙）
桑白皮（炒） 枳壳（去穰炒） 柴胡（各七分）

水钟半。姜三片。煎八分。食后服。

附方

宁肺汤

治荣卫俱虚。发热自汗。或喘急咳嗽唾脓。

人参 当归 白术（炒） 川芎 白芍 熟地黄（酒蒸） 五味子（杵炒） 麦门冬（去心）
桑白皮（炒） 甘草（炙） 白茯苓 阿胶（蛤粉炒）

水二钟。姜三片。煎八分。食后服。

附方

知母茯苓汤

治肺痿。喘嗽不已。往来寒热。自汗。

茯苓 黄芩（炒各二钱） 甘草（炙） 知母（炒） 人参 五味子（杵炒） 桔梗 薄荷
半夏（姜制） 柴胡 白术 麦门冬（去心） 款冬花（各三钱） 川芎
阿胶（蛤粉炒各二钱）

作一贴。水二钟。姜三片。煎一钟。食后服。

附方

人参养肺汤

治肺痿。咳嗽有痰。午后热。并声飒者。

人参 五味子（捣炒） 贝母（去心） 柴胡（各四分） 桔梗（炒） 茯苓（各钱半）
甘草（五分） 桑白皮（炒一钱） 枳实（麸炒钱半） 杏仁（炒）
阿胶（蛤粉炒各一钱）

水钟半。姜三片。枣一枚。煎八分。食后服。

附方

梔子仁汤

治肺痿。发热。潮热。或发狂烦躁。面赤咽痛。

梔子仁 赤芍药 大青叶 知母（炒各七分） 黄芩（炒） 石膏（） 杏仁（去皮尖炒）

升麻（各钱半） 柴胡（二钱） 甘草（一钱） 豆豉（百粒）

水二钟。煎八分。食远服。

附方

甘桔汤

治肺气壅热胸膈不利。咽喉肿痛。痰涎壅盛。

甘草 桔梗（各五钱）

水钟半。煎八分。食远服。

附方

加味理中汤

治肺胃俱寒。发热不已。

甘草（炙） 半夏（姜制） 茯苓 干姜（炮） 白术（炒） 橘红 细辛 人参
五味子（捣炒各五分）

水一钟。煎六分。食远服。

附方

大黄汤

治肠痈。小腹坚肿如掌而热。按之则痛。肉色如故。或赤微肿。小便频数。汗出增寒。其脉迟紧。未成脓宜服。

朴硝 大黄（炒各一钱） 牡丹皮 栝蒌仁（研） 桃仁（去皮尖各二钱）

水二钟。煎八分。食前或空腹温服。

附方

牡丹皮散

治肠痈腹濡而痛。时时下脓。

牡丹皮 白茯苓 薏苡仁 人参 天麻 黄（炒） 桃仁（去皮尖） 白芷 当归（酒浸）

川芎（各一钱） 官桂 甘草（炙各五分） 木香（二分）

水二钟。煎八分。食远服。

附方

梅仁汤

治肠痈隐痛。大便秘涩。

核桃仁（九个去皮尖） 牡丹皮 大黄（炒） 芒硝（各一钱） 犀角（镑末一钱）
冬瓜仁（研二钱）

水二钟。煎八分。入犀角末。空心服。

附方

薏苡仁汤

治肠痈。腹中疝痛。或胀满不食。小便涩。妇人产后多有此病。纵非脓。服之尤效。

薏苡仁 栝蒌仁（各三钱） 牡丹皮 桃仁（去皮尖各二钱）

水二钟。煎八分。空心服。

附方

云母膏

治一切疮疽。及肠痈折伤。

蜀椒（开口者去目微炒） 白芷 没药 赤芍 肉桂 当归 盐花 血竭 菖蒲 黄白芩 黄芩 夜合皮 乳香 附子 良姜 茯苓（各五钱） 硝石 甘草 云母（各四两） 柏叶 桑白皮 槐枝 柳枝（各二两） 陈皮（一两） 清油（四十两） 黄丹（十四两）

上除血竭、乳、没、射、黄丹、盐花、硝石、七味、另研外。余并锉。入油浸七日。文。以柳篦不住手搅。候匝沸乃下火。沸定又上火。如此三次。以药黑色为度。纸滤去渣。再熬。续入丹。将凝再下余味药末。仍不住手搅。又熬。滴水中成珠为度。瓷器收之。候温将水银绢包。以手细弹铺在上。谓之养药母。用时刮去水银。或服。或贴。随用。其功甚大

附方

神仙太乙膏

治一切疮毒。不问年月深浅。已未成脓。先以温水洗净。软帛拭干。用绯帛摊贴亦可用冷水吞下。血气不通。温酒下。赤白带。当归酒下。咳嗽及喉闭。缠喉风。并用绵裹含。诸风弦赤眼。HT 作小饼。贴太阳穴。以出梘汤下。打扑伤损外贴。内服橘皮汤。腰膝痛贴处。盐汤下。唾血丸以蛤粉为衣。桑白皮汤下。瘰盐汤洗贴。酒下一丸。妇人经脉不通。

甘草汤下。其膏可收十余年不坏。愈久愈烈。一切疥。别炼油少许。和膏涂之。诸虫蛇并汤火刀斧伤。皆可内服外贴。

玄参 白芷 当归 肉桂 生地黄 大黄 赤芍（各一两）

咀。用麻油二斤。入铜锅内煎至黑。滤去渣。入黄丹十二两再煎滴水中捻。软硬得中。

矣。予尝用治疮毒并内痈。有奇效。一妇月经不行。腹结块作痛。贴之经行痛止。愈。此方

附方

排脓散

治肠痈少腹痛。脉滑数。或里急后重。或时时下脓。

黄（炒） 当归（酒浸） 金银花 白芷 穿山甲（蛤粉拌炒） 防风 连翘
栝蒌仁（各水二钟。煎八分。食前服。为末。每服三钱。食后蜜汤调下亦可。

附方

射干连翘散

治塞热。瘰。

射干 连翘 玄参 木香 赤芍药 升麻 前胡 当归 山梔仁 甘草（炙各七分）
大黄（炒二钱）

水二钟。煎八分。食后服。

附方

薄荷丹

治风热瘰。久服毒自小便宣出。未作脓者自消。

薄荷 皂角（去皮弦） 三棱（煨） 连翘 何首乌（米泔浸） 蔓荆子（各一钱）
荆芥穗（一两） 豆豉末（二两半）

为末。醋糊丸如梧子大。每服三十丸。食后滚汤下。日二服。病难愈。须常服之。

附方

益气养荣汤

治抑郁或劳伤气血。或四肢颈项患肿。或软。或赤不赤。或痛不痛。或日晡发热。
或溃人 参 茯苓 陈皮 贝母 香附 当归（酒拌） 川芎 黄（盐水拌炒） 熟（酒拌）

芍药（炒各一钱） 甘草（炙） 桔梗（炒五分） 白术（炒二钱）

水二钟。姜三片。煎八分。食远服。

胸膈满加枳壳、香附、（各一钱）人参、熟。（各减二分）

饮食不甘。暂加浓朴、苍术。痰多加橘红、半夏。

往来寒热。加柴胡、地骨皮。发热加柴胡、黄芩脓溃作渴。加参、归、术。脓多或清加归、芎。

胁下痛或痞。加青皮、木香。肌肉生迟。加白芷、官桂。

口干加五味子、麦门冬。渴不止加知母、赤小豆。（俱酒拌炒）

浓不止。倍加参、归、当。

附方

针头散

治一切顽疮瘀肉不尽。及核不化。疮口不合。宜此腐之。

赤石脂（五钱）白丁香乳香（各二钱）黄丹（一钱）砒生（一钱）轻粉麝香（各五分）蜈蚣（一条炙干）

为末。搽瘀肉上。其肉自化。若疮口小。或痔疮。用糊和作条子。阴干之。凡疮久不合者。内有脓管。须用此药腐之。兼服托里之剂。

附方

如神散

治瘰已溃。瘀肉不去。疮口不合。

松香末（一两）白矾（三钱）

为末。香油调搽。干搽亦可。

附方

当归龙荟丸

治瘰 肿痛。或胁痛以有积块。及下疳便痛。小便涩。大便秘。或瘀血凝滞。小腹作痛当归（酒浸） 梔子仁（炒） 黄连 青皮 龙胆草（酒拌炒） 黄芩（各一钱） 大黄（酒拌炒） 芦荟 青黛 柴胡（各五钱） 木香（二钱半） 麝香（五分另研）

为末。神曲糊丸。每服二三十丸。姜汤下。

附方

分心气饮

治七情郁结。胸膈不利。或胁肋虚张。噎塞不通。或噫气吞酸。呕哕恶心。或头目昏眩。四肢倦怠。面色痿黄。口苦舌干。饮食减小。日渐羸瘦。或大肠虚秘。或病后虚痞。

木通 赤芍 官桂 半夏（姜制） 赤茯苓 桑白皮（炒） 大腹皮 陈皮（去白） 青皮（去白） 甘草（炙） 羌活（各五分） 紫苏（二钱）

水二钟。姜三片。枣二枚。灯心十茎。煎八分。食远服。

附方

生地黄丸

许白云云。有一师尼患恶风。体倦。乍寒乍热。面赤心烦。或时自汗。是时疫气大行。

热。作伤寒治。大小柴胡汤杂进。数日病剧。予诊三部无寒邪。但肝脉弦长上鱼际。宜用抑阴之药。遂用此方。

秦艽 黄芩 硬柴胡（各五钱） 赤芍药（一两） 生地黄（一两酒蒸捣膏）

为末。入地黄膏。加炼蜜少许。丸如梧子大。每服三十丸。乌梅汤下。日进二服。

附方

遇仙无化丸

治未成脓。其人气体如常。宜服此丸。形气觉衰者。先服益气养荣汤。待血气。少充方服此丸。核消仍服前汤。溃后有瘀肉。宜针头散。若不敛。亦服此丸。敛后再服前汤。

白术（炒） 槟榔 防风 密陀僧 郁李仁（汤泡去皮） 甘草（各五钱）
斑蝥（去翅足用糯米同炒米不用五钱）

细末。水糊丸梧子大。每服二十丸。早晚煎甘草槟榔汤下。服至月许。觉腹微痛。自小便中取下毒。如鱼目状。已破者自合。未脓者自消。

附方

三品錠子

上品 去十八种痔。

白矾（二两） 乳香（三钱五分） 没药（三钱五分） 牛黄（三钱）
白砒（一两零五分）

中品 去五漏及番花瘤气核。

白矾（二两） 白砒（一两三钱） 乳香 没药（各三钱）

下品 治瘰、气核、疔疮、发背、脑疽诸恶症。

白矾（二两） 白砒（一两五钱） 乳香 没药（各二钱半） 牛黄（三分）

先将砒末入紫泥罐内。次用矾末盖之。以炭火令烟尽。取出研极细末。糯米糊和为挺状如线香。阴干疮内三四次。年深者五六次。其根自腐溃。如疮露在外。更用蜜水调搽。

附方

益元散

滑石（六两） 甘草（炙二两）

各研为末。和蜜与服三钱。热汤冷水任下。

附方

治血分椒仁丸

续随子（去皮研） 郁李仁 黑牵牛（研） 五灵脂（研） 吴茱萸 延胡索 椒仁
甘遂 当归（各五钱） 芫花（醋浸一钱） 石膏 胆矾（一钱） 人言（一钱）
青（十枚去头翅足同糯米炒黄米不用）

为末。面糊丸如豌豆大。每服一丸。橘皮汤下。此方药虽峻利。所用不多。畏而不服。

是养病害身也。尝治虚弱之人。亦未见其有误。

附方

治水分葶苈丸

葶苈（炒另研） 续随子（去壳研各半两） 干笋末（一两）

为末。枣肉丸如梧子大。每服七丸。煎扁蓄汤下。如大便利者。减葶苈、续随子各一钱。加白术五钱。

又方 治经脉不利即为水。水流四肢即为肿满。名曰血分。

其候与水相类。作水治之非也。宜用此方。

人参 当归 桂心 赤芍 瞿麦穗 白茯苓 大黄（湿纸裹三斗米下蒸米熟去纸切炒各半两）
葶苈（炒另研一钱）

为末。炼蜜丸如梧子大。空心米饮下十五至二三十丸。

附方

托里养荣汤

治瘰 流注。及一切不足之证。不作脓或不溃。或溃后发热恶寒。肌肉消瘦。饮食少思。睡卧不宁。盗汗不止。

人参 黄（炙） 当归（酒拌） 川芎 芍药（炒） 白术（炒各一钱） 五味子（炒研）

麦门冬 甘草（各五分） 生（酒拌蒸半日）

水二钟。姜三片。枣一枚。煎八分。食远服。

附方

琥珀膏

治颈项及腋下初如梅核。肿结硬强。渐如连珠。不消不溃。或溃而脓水不绝。经久不瘥琥珀（一两） 木通 桂心 当归 白芷 防风 松脂 朱砂（研） 木鳖子（各五钱肉） 麻油（二斤） 丁香 木香（各三钱）

先用琥珀、丁香、桂心、朱砂、木通为末。余锉。以油二斤四两。浸七日。入铛慢火煎焦黄漉出。徐徐下黄丹一斤。以柳枝不住手搅煎至滴水捻软硬得中。却入琥珀等末搅匀。瓷器盛。用时取少许。摊纸贴之。

附方

方脉流气饮

治瘰 流注。及郁结肿块。或走注疼痛。或心胸痞闷。咽塞不通。胁腹膨胀。呕吐不食。上气喘急咳嗽痰盛。面目四肢浮肿。大小便秘。

紫苏 青皮（去白） 当归（酒拌） 芍药（炒） 乌药 茯苓 枳实（麸炒） 桔梗（炒） 半（姜制） 川芎 黄（炙） 防风 陈皮（去白） 甘草（炙各一钱） 木香 大腹皮 槟榔 枳壳（麸炒各五分）

水二钟。姜三片。枣一枚。煎八分。食远服。

附方

加减八味丸

治疮痍后口干渴。甚则舌或黄。及未患先渴。此肾水枯竭。不能上润。以致心火上炎。

不能既济。故心烦躁作渴。小便频数。或白浊阴痿。饮食不多。肌肤渐削。或腿肿膝先瘦。

服此以生肾水。降心火。诸症顿止。及治口舌生疮不绝。

山茱萸（净肉一两） 五味子（炒二两） 牡丹皮（半两） 白茯苓（半两）
山药（一两） 桂心（去皮半两） 泽泻（切片蒸焙半两）
生地黄（二两酒拌蒸捣膏）

为末。入地黄膏。加炼蜜少许丸梧子大。每服六七十丸。五更初未语前。或空心淡盐汤

附方

香砂六君子汤

治脾胃不健。饮食少思。或作呕。或过服凉药。致伤脾胃。即六君子加藿香。砂仁。

附方

金不换正气散

治疮脾气虚弱。寒邪相搏。痰停胸膈。以致发寒热。服此正脾气则痰自消。寒热不作。

浓朴（去皮姜制） 藿香 半夏（姜制） 苍术（米泔浸） 陈皮（去白各一钱）
甘草（炙五水二钟。姜三片。枣二枚。煎七分。食远服。

附方

清咽利膈汤

治积热。咽喉肿痛。痰涎壅盛。或胸膈不利。烦躁饮冷。大便秘结。

金银花 防风 荆芥 薄荷 桔梗（炒） 黄芩（炒） 黄连（炒各钱半） 山梔（炒研）
连翘（各一钱） 玄参 大黄（煨） 朴硝 牛蒡子（炒） 甘草（各七分）

水二钟。煎一钟。食后服。

附方

刺少商穴法

穴在手大指内侧。去爪甲如韭叶。刺入二分许。以手自臂勒至刺处。出血则消。若重者。及脓成者。必须刺患处。否则不治。

附方

承气汤

治肠胃积热。口舌生疮。或牙龈作痛。

大黄（煨） 甘草 朴硝（各一钱）

水钟半。煎七分。食前服。

附方

人参固本丸

治肺气燥热作渴。或小便短赤如淋。此治虚而有火之圣药也。

生地黄（酒拌） 熟地黄（酒洗） 天门冬（去心） 麦门冬（去心各一两）
人参（五钱）

除人参为末。余药捣膏加炼蜜少许丸梧子大。每服五十丸。空心盐汤或温酒下。中寒人

附方

消毒犀角饮子

治斑或瘾疹瘙痒。或作痛。及风热疮毒。

荆芥 防风（各钱半） 甘草（三分） 牛蒡子（二钱）

水一钟。煎五分。徐徐服。

附方

解毒防风汤

治斑或瘾疹痒或痛。

防风（二钱） 地骨皮 黄芩药 荆芥 枳壳（各二钱炒）

水一钟。煎五分。徐徐服。

附方

砭法

治小儿丹毒色赤。游走不定。用细瓷器击碎。取有锋芒者一块。以箸一根。劈开头尖。

以线。缚定两指。轻撮箸稍。令瓷器芒者正对患处。悬寸许。再用箸一根频击箸头。令毒血遇刺皆出。却以神功散敷之。毒入腹者不救。

附方

萆汤

治杨梅疮。不问新旧溃烂。筋骨作痛。并。

川萆（俗呼王茯苓） 每用二两。水三钟。煎二钟。去渣。不拘时。徐徐温服。若患久。或服攻击之剂。致伤脾胃气血者。以此一味为主。而加以兼证之剂。

附方

双解散

治便痢。内蕴热毒。外挟寒邪。或交感强固精气。致精血交错。肿结疼痛。大小便秘。

宜此通解。更随症调治。

辣桂 大黄（酒拌炒） 白芍 泽泻 牵牛（炒杵） 杏仁（去皮尖） 甘草（炙）
干姜（炮水二钟。煎八分。空心服。

附方

八正散

治积热。小便不通。及淋症脉实。

大黄（酒拌炒） 车前子（炒） 瞿麦 蓄 山梔仁（炒） 木通 甘草（各一钱）
活石（水二钟。煎八分。食前服。

附方

导水丸

治便痛。初起肿痛。及下疳大小便秘。又治杨梅疮初起。湿盛之际。宜先用此数服。

大黄（酒拌炒） 黄芩（炒各二钱） 黑丑末（炒） 滑石（各四钱）

为末。糊丸梧子大。每服五十丸。临卧温水下。

附方

托里当归汤

治溃疡。气血俱虚。发热。及瘰 诸痛。不问肿溃。皆宜服之。久服能敛疮口。

当归（酒拌） 黄（盐水拌炒） 人参 熟（酒拌） 川芎 芍药（炒各一钱） 柴胡
甘草（炙各五分）

水二钟。煎八分。食远服。

附方

加减龙胆泻肝汤

治肝经湿热。玉茎患疮。或便毒。悬痈肿痛。小便赤涩。或溃烂不愈。又治阴囊肿痛。

或溃烂作痛。或睾丸悬挂。亦治痔疮肿痛。小便赤涩。

龙胆草（酒拌炒黄） 泽泻（各一钱） 车前子（炒） 木通 黄芩 生地黄（酒拌）
归尾（酒拌） 山梔（炒） 甘草（各五分）

水二钟。煎八分。食前服。湿盛加黄连。大便秘加大黄。（炒）

附方

胃苓散

猪苓 泽泻 白术 茯苓 苍术 浓朴 陈皮（各一钱） 甘草（炙） 肉桂（各五分）

水二钟。姜三片。枣二枚。煎八分。服。

附方

当归郁李仁汤

治痔漏。大便结硬。大肠下坠出血。苦痛难忍。

归尾（酒拌） 郁李仁 泽泻 生大黄（煨） 枳实 苍术 秦艽（各一钱）
麻黄仁（钱半） 皂角（一钱另研细末）

水二钟。煎八分。入皂角末。空心服。

附方

秦艽防风汤

治痔漏结燥。每大便作痛。

秦艽 防风 当归（酒拌） 白术（各钱半） 黄柏 陈皮 柴胡 大黄（煨）
泽泻（各一钱） 红花 桃仁（去皮尖研） 升麻 甘草（炙各五分）

水二钟。煎八分。空心服。

附方

加味四君子汤

治痔漏下血。面色痿黄。心忪耳鸣。脚弱气乏。及脾胃虚。口淡。食不知味。又治中气虚。不能摄血。致使血不禁。

人参 白术（炒） 茯苓 黄（炙） 白扁豆（蒸） 甘草（炙各等分）

为末。每服三钱。滚白汤点服。

附方

除湿和血汤

治阳明经湿热。便血腹痛。

生地黄 牡丹皮 生甘草（各五分） 熟甘草 黄（炙各一钱） 白芍（钱半）
升麻（七分） 归身（酒拌） 苍术（炒） 秦艽 陈皮 肉桂 熟（酒拌各三分）

水二钟。煎八分。空心。候宿食消尽。热服。

附方

槐花散

治肠风藏毒下血。

槐花 生地黄（酒拌蒸） 青皮 白术（炒） 荆芥穗（各六分） 川芎（四分）
归身（酒拌）

升麻（各一钱）

为末。每服三钱。空心米饮调下。水煎亦可。

附方

参苓白术散

治脾胃不和。饮食不进。或呕吐泄泻。凡大病后皆宜服此。以调理脾胃。

人参 茯苓 白术（炒） 连肉（去心皮） 白扁豆（去皮姜汁拌炒） 砂仁（炒）
桔梗（炒）

山药 甘草（炙） 薏苡仁（炒各二两）

细末。每服三钱。石菖蒲煎汤下。

附方

小乌沉汤

治气不调和。便血不止。

乌药（一两） 甘草（炙二钱） 香附（四两醋制）

每服二钱。食前盐汤下。

附方

枳壳散

治便血。或妇人经候不调。手足烦热。夜多盗汗。胸膈不利。

枳壳（麸炒二钱） 半夏曲 赤芍药（炒各一钱） 茈菰 黄芩（炒各钱半）

水二钟。姜三片。枣二枚。煎八分。食远服。

附方

芎归汤

治便血。或失血过多。眩晕。

芎 当归（酒拌各五钱）

水钟半。煎六分。食后服。

附方

如神千金方

治痔无有不效。

附方

水澄膏

治痔护肉。

附方

枯药

（以上三方。俱见前痔疮条下。）

附方

连翘饮子

治乳内结核。服数剂不消。宜兼服八珍汤。初起有表症者。宜先解表。

连翘 川芎 栝蒌仁（研） 皂角刺（炒） 甘草节 橘叶 青皮（去白）
桃仁（各一钱半）

水二钟。煎一钟。食远服。

附方

复元通气散

治乳痈便毒肿痛。及一切气滞肿毒。如打扑伤损。闪肭作痛。及疝气。尤效。

木香 茴香（炒） 青皮（去白） 陈皮 穿山甲（苏炒） 白芷 甘草 漏芦
贝母（去心各等分）

为末。每服三钱。温酒调下。

四库本

提要

钦定四库全书

外科理例

提要

【臣】等谨案外科理例七卷附方一卷明汪机撰机字省之号石山祁门人有鍼灸问对已着録是书成於嘉靖辛卯凡分一百四十七类又补遗七类共为一百五十四门後附方一卷凡一百六十五则前有自序称外科必本诸内知乎内以求乎外其如视诸掌乎治外遗内所谓不揣其本而齐其末可谓探源之论其曰理例者谓古人所论治无非理欲学者仿其例而推广之大旨主於调补元气先固根柢不轻用寒凉攻利之剂又分为舍脉从证舍证从脉及治之不应别求其故三例用法通变亦异於胶轕之谈惟措词拙澁骤读之或不了了是其所短然方技之书不能责以文章之事存而不论可矣书中多引外科精要朱震亨之论又称辑已成编得新甫薛先生心法发挥复采其说参入其中考新甫为薛已之字已父铠弘治时官太医则已为弘治正德间人是书杖疮门中记疗治武宗时廷杖谏官事则机在正德中亦以医名二人同时而虚心从善如是其持论平允良亦有由也乾隆四十四年二月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

原序

外科理例原序

外科者以其痛疽疮?皆见於外故以外科名之然外科必本於内知乎内以求乎外其如视诸掌乎经曰膏粱之变足生大疔由膏粱蘊毒於内而生也又曰荣气不从逆於肉理乃生痈肿是痈肿由荣气逆於肉理之内而生也有诸中然後形诸外治外遗内所谓不揣其本而齐其末殆必已误於人已尚不知人误於己人亦不悟呜呼已虽不知天必知之人虽不悟神必识之异日明受天责陰获神谴不在於身则在於子孙矣予於是惧因辑此书名曰外科理例盖其中古人所论治无非理也学者能仿其例而推广之於焉而求古人不言之妙旨庶几小不误已大不误人抑亦有补於将来矣辑已成编复得新甫薛先生心法发挥读之观其论治亦皆一本於理而予窃喜暗与之合於是复采其说参於其中庶得以为全书而学者无复有遗憾矣是为序嘉靖辛卯冬十一月长至日祁门汪机识

卷一

钦定四库全书

外科理例卷一

明 汪机 撰

疮疽脉一

浮 主表症浮数之脉应发热不发热反恶寒痈疽也洪主血实积热肿?洪大则疮势进脓未成宜下溃

脓後洪大难治若自利不可救

滑 主热主虚脓未溃者宜内消脓溃後宜托里所谓

始为热终为虚也

数 主热仲景曰数脉不时见生恶疮又曰肺脉俱数

则生疮诸疮脉洪数里欲有脓结也

散 脓溃後烦满尚未全退其脉洪滑麤散难治以正气虚邪气实也又曰肢体沉重肺脉大则毙谓浮散也

芤 主血虚脓溃後见之易治

牢 按之实大而弦且沉且浮而有坚实之意癰癥结

核得之不可内消

实 久病虚人得此最忌疮疽得此宜急下之以邪气

与脏腑俱实故也

弦 浮弦不时见为饮为痛主寒主虚弦洪相?外紧

内热欲发疮疽

紧 主痛疮肿得之气血沉濇

濇 主气濇血虚脓溃後得之无妨

短 诸病脉短难治疮肿脉短真气短也

细 主亡阳阳气衰也疮肿脉来细而沉时直者里虚
欲变症也

微 主虚真气复者生邪气胜者危疮肿溃後脉微而
匀当自差

迟 痼疾得之则善新病得之主血气虚急疮肿溃後
得之自痊

缓 疮肿溃後其脉濇迟缓者皆易愈

沉 水气得之则逆疮肿得之邪气深

虚 脉虚血虚血虚生寒阳气不足也疮肿得之宜托
里和气养血也

㒹 疮肿得之补虚排脓托里

弱 主气血俱虚形精不足大抵疮家沈迟㒹弱皆宜
托里

促 主热蓄于里下之则和疮肿脉促亦急下之代
诸病见之不祥疮肿脉促结难治况代脉乎动 动於阳阳虚发厥动於陰陰虚发热

治疮脉诀

身重脉缓湿胜除湿 身热脉大心躁热发肿乍来乍去除热 诸痛眩晕动摇脉弦去风

脉濡气滞燥渴亡津液脉濡泻气补血 寒胜则浮食不入便溺多恶寒脉紧细泻寒水

数脉不时见当生恶疮 诸浮数脉应发热反洒淅恶寒 若有痛处当发痈疽

脉滑而数滑则为实数则为热 滑则为荣数则为卫荣卫相逢则结为痈热之所过则为痈脓

机按今之医多不脉惟视疮形以施治法盖疮有表里虚实之殊兼有风寒暑湿之变自非脉以别之安得而察识乎东垣云疮凭脉此之谓也因详列其脉之所主揭之於首学者宜加意焉

七恶五善二

医疮概举七恶五善此特谓肠胃之内藏府疮疽之证也发背脑疽别有善恶载之於後

七恶者烦躁时 腹痛渴甚或泄利无度或小便如淋一恶也

脓血既泄肿焮尤甚脓色败臭痛不可近二恶也

目视不正黑睛紧小白睛青赤瞳子上看三恶也 喘粗短气恍惚嗜卧四恶也

肩背不便四肢沉重五恶也 不能下食服药而呕食不知味六恶也

声嘶色败唇鼻青赤面目四肢浮肿七恶也

五善者动息自宁饮食知味一善 便利调匀二善脓溃肿消水鲜不臭三善

神彩精明语声清亮四善 体气平和五善

五善之中乍见一二善证疮亦回也七恶之内忽见一二恶证当深惧之又有证合七恶皮急紧而知善又或证合五善皮缓虚而知恶此又在人详审大抵虚中见恶证者不可救实证无恶候者自愈

脓溃後尚烦疼 脉洪滑粗散者难治 微濡迟缓者易痊

诸恶疮五逆三

白睛青黑眼小 服药而呕

腹痛渴甚肩项中不便声嘶色脱是为五逆其余热渴利呕盖毒气入里脏府之伤也

【机按以上不治皆五脏气已絶】

定痈死地分四

一伏兔 二腓腧 三背 四五脏俞 五项 六脑七髭 八髻 九颐

背上九处不可病痈五

第一入髮际为玉枕亦为舌本 第二颈项节 第三椎为崇骨 第四大椎为五脏
第五脊骨两边肺俞穴 第六夹脊两边脾俞及肝俞 第七脊骨两边肾俞二穴
第八後心鸠尾 第九鸠尾骨穴

附 正面五处不可患痈

第一喉骨为垂膺 第二当膺为神舍 第三心鸠尾 第四当两乳穴 第五脐下二寸为肠屈间

附 侧面三处不可患痈

耳下近耳後牙车尖尖?中为喉脉一穴

当膊下一穴为肩骨 承山上三寸一穴膈肠

痈发有不可治六

脑上诸阳所会穴则髓出 颈项近咽喉一有所碍药食莫进
肾俞与肾相抵乃命之所繫穴则透空 此三处有疽并难治

发背透膜者不治【此言肝俞以上】未溃肉?面青唇黑便瘀者死【此言脏坏便瘀血】右
颐後一寸三分毒銳者不治 溃喉者不治阴入腹者不治入?者死
鬣深及寸余者不治病疮腰背强急癰癤者皆不治

发背治之难易七

疽发背上以两手上搭着者谓之左右搭头多如蜂窠者易治
以两手下搭着者谓之腰疽亦易治 以两手上下俱搭不着者谓之发背此证最重

大抵以上所言地分皆脉络所会内系脏府患者得而早言医者审证按法治之皆为不死设
不早治治不对证虽发於不死之地恐亦致死也

占色候生死八

病人目中赤脉从上下贯瞳人一脉一年死二脉二年死若脉下者疗之差
面上忽多赤贯上下如脂 赤色从额上下至鼻
黑色出额上大如指反连鼻上至肩又有赤色垂并为死候

机按赤脉属火瞳人属水赤脉贯瞳火反乘水面属阳阳部赤色阳胜陰微额上黑色阳微陰胜故多危也

痈之源有五九

天行一 瘦弱气滞二 怒气三

肾气虚四 服法酒食灸燔服丹药热毒五

盖治痈疽不可一概视为热其治难易当自一而至五动

生痈所感不同十

膏粱之变足生大丁受如持虚膏粱厚味热毒内积其变多生大疽受毒部分其毒从虚处受之大丁大疽也以其根深在内也 此言疽因厚味内热为变而生

阳气者精则养神柔则养筋开阖不得寒气从之乃生大痿?脉为痿留连肉腠

人身阳气其精微以养神其柔和以养筋阳气在身表开阖失宜在外寒气从而袭之如袭其筋络则筋络拘急为痿俯如?入经脉则经脉凝瘀为?痿留连分肉节腠间不易散矣【此言?痿因阳气开阖失宜外寒袭?经脉凝瘀而生】

营气不从逆於肉理乃生痈肿

营生血营气流行失宜不从其道阻逆於肉理则血鬱热聚而为痈肿

此言痈肿因营气失宜逆於肉理血鬱热聚而生

三阳为病发寒热下为痈肿

三阳手阳明大肠太阳小肠足太阳膀胱其三阳为病在上发寒热在下为痈肿

此言痈肿在下从三阳而生当视三阳脉而辨

东方之域鱼盐之地其民食鱼嗜鹹安其处美其食鱼热中盐胜血故其民黑色踈理其病为痈?

此言痈疽因土地濒海食鱼嗜鹹安居不劳美味不节鱼热中盐胜血而生

诸痈肿筋挛骨痛此寒气之肿八风之变也

经曰寒伤形形伤肿八风八方之风灵枢云东南方来名弱风伤人也在肌西南来名谋风伤人也在肉东方来名婴儿风伤人也在筋北方来名大刚风伤人也在骨此寒气之肿八风之变而为痈肿筋挛骨痛

此言痈疽因四方寒气八风过伤而生

肾移寒於脾痈肿少气

夫肾伤於寒转移於脾脾主肉分肉之间卫气行处肾寒复传脾则分肉寒而卫气凝故坚结为痈肿肉结血伤而少气

此言痈肿因肾寒传脾而生

脾移寒於肝痈肿筋挛

脾主肉肝主筋肉温则筋舒今脾传寒於肝故肉寒则卫气结聚为痈肿筋寒则急为筋挛

此言痈肿因脾寒传肝而生

肝满肺满肾满皆实则肝肺肾痈

满实脉气满实也以脏气邪盛满实故脉气如是此言肝肺肾痈因脏气邪盛满实而生当视脉气满实而辨

肺肝肾痈症十一

肺痈主两胁满 肺脏气而外主息其脉支别者从肺系横出腋下故喘而两胁满
此言肺痈所见症

肝痈主小便肝主惊肝脉循股入毛中环阴器抵少腹直上贯肝膈布脇肋故两胁满两胁满卧则惊不得小便 此言肝痈所见证

肾痈主少腹满 此言肾痈所见证

痈生原於脏府十二

五脏菹熟痈发六府

菴积也熟热也五脏积热六府受之阳热相薄热之所过则为痛也

此言五脏积热六府受之而生

六府不和留结为痛

六府属阳而主气肌肉上为阳脉邪气游於六府则肌肉上之脉不和邪气停留肌肤结聚为痛肿矣此言六府受邪而生

辨脏府内疮十三

中府隐隐痛者肺疽 其上肉微起者肺痛巨阙隐隐痛者心疽
其上肉微起者心痛期门隐隐痛者肝疽 其上肉微起者肝痛章门隐隐痛者脾疽
其上肉微起者脾痛京门隐隐痛者肾疽 其上肉微起者肾痛中脘隐隐痛者胃疽
其上肉微起者胃痛天枢隐隐痛大肠疽 其上肉微起大肠痛丹田隐隐痛三焦疽
其上肉微起三焦痛关元隐隐痛小肠疽 其上肉微起小肠痛明疮?本末十四

今富贵之人饮食肥浓日久太过其气味俱厚之物乃陰中之阳不能走空窍先行阳道反行阴道逆於肉理则湿气大胜子【土】能令母【火】实火乃大旺热湿既盛必来尅肾若杂以不顺必损其真水肾既受邪积久水乏水乏则从湿热之化而上行其疮多出背出脑此为大疔之最重也若毒气行於肺或脾胃之部分毒之次也若出於他经又其次也湿热之毒所止处无不溃烂故经言膏粱之变足生大疔受如持虚如持虚器以授物物无不受故治大疔之法必当泻其营气以标本言之先受病为本非苦寒之剂为主为君不能除其苦楚疼痛也

陰滯於阳为疽阳滯於陰为痛十五

痛疽因阴阳相滯而生盖气阳也血陰也血行脉内气行脉外相并周流寒与湿抟之则凝结行迟为不反热与火抟之则沸腾行速为大过气得邪而鬱则津液稠粘为痰为饮积久渗入脉中血为之浊此陰滯於阳也血得邪而鬱隧道阻隔或溢或结积久渗出脉外气为之乱此阳滯於陰也病皆由此不特痛疽阳滯於陰谓阳盛而滯其陰脉则浮洪弦数陰滯於阳谓陰弱而滯其阳脉则沈弱细濇阳滯以寒治之阴滯以热治之

疮疽分三治十六

疮?者火之属须分内外以治其本经曰膏粱之变足生大疔其源在里发於表也受如持虚言内结而发诸外皆是从虚而出也假如太阳经虚从鬢而出阳明经虚从髭而出督脉经虚从脑而出 经曰地之湿气感则害人皮肉筋脉其源在外盛则内行也若脉沈实当先疎内以絕其源若脉浮大当先托里以防邪气侵内又有内外之中者邪气至盛遏絕经络故发痛肿经曰营气不从逆於肉理乃生痛肿是也此因失托里及失疏通及失和荣卫而然也治疮大要

须明托里疏通行荣卫三法托里者治其外之内也疏通者治其内之外也行荣卫者治其中也内之外者其脉沈实发热烦躁外无焮赤痛深在内邪气沈於里也故先疏通以绝其源如内疏黄连汤是也外之内者其脉浮数焮肿在外形证外显恐邪气极则内行或汗或先托里以防入内如荆防败毒散内托复煎散是也内外之中者外无焮恶之气内则脏府宣通知其在经当和荣卫如当归黄耆汤东垣白芷升麻汤是也用此三法虽未痊差必无变证亦可使邪气峻减而易痊也其汗下和之间又有外治之次第详见天容穴疗疮条

疮肿分浅深十七

疮疽有三种高而软者发於血脉肿下而坚者发於筋骨皮肉色不辨者发於骨髓又曰以手按摇疮肿根牢而大者深也根小而浮者浅也又验初生疮时便觉壮热恶寒拘急头痛精神不宁烦躁饮冷疮疽必深也若起居平和饮食如故其疮浮浅也恶疮初生其头如粟微似有痛痒误触破之即焮展有深意酌其深浅浮则表之深则疎之

辨痈与疽治法十八

精要云始患高肿五七日勿平?者是攻内之候以托里散内补汤填补脏府令实最怕透膜透膜者十无一生

丹溪曰痈之邪浅其稽留壅遏浊在经脉之中而专於外故初发时身表便热患处便如枕如盆高肿痛甚者纵欲下?缘正气内固不肯受故或便秘或发渴发逆以拒之是以骨髓终不焦枯五脏终不损也疽之邪其稽留壅遏内连五脏而不专攻於外故身或无热患处或不肿痛甚者声嘶色脱眼黑青小十指肿黑如墨多死也治痈初发当以洁古法为主表者散之里者下之火以灸之药以敷之脓未成者必消已成者速溃治疽初发当以消子法为主填补脏府令实勿令下

?之邪延蔓外以火灸引邪透出使有穴归而不乱攻可转死为生变凶为吉今世不分痈疽一概宣热拔毒外以五香耗其气内以大黄竭其血终不自悟其药之非惜哉

疮名有三曰?曰痈曰疽十九

?者初生突起浮赤无根脚肿见於皮肤止濶一二寸有少疼痛数日後微软薄皮剥起始出青水後自破脓出如不破用簪针丸痈者初生红肿突起濶三四寸发热恶寒烦渴或不热抽掣疼痛四五日後按之微软此证毒气浮浅春夏宜防风败毒散加葱姜枣煎秋冬去葱姜枣加木香身半以上加瓜蒌身半以下加射干又有皮色不变但肌肉内微痛甚发热恶寒烦渴此证热毒深沈日久按之中心微软脓成用火烙烙开以决大脓宜服托里之药疽者初生白粒如粟米便觉痒痛触着其痛应心此疽始发之兆或误触着便觉微赤肿痛三四日後根脚赤晕展开浑身壮热微渴疮上亦热此疽也疽上或渐生白粒如黍米逐个用银篦挑去勿令见血或有少血亦不妨不见血尤妙却用老皮散傅之五七日疮头无数如蜂房脓不肯出冬用

五香连翘汤夏用黄连羌活散夏初用防风败毒散加葱枣秋去之加木香若形气实脉洪滑有力痛肿焮开壮热便闭宜五利大黄汤复元通气散选用通利又有初生白粒误触後便觉情思不畅背重如石身体烦疼胸膈痞闷怕闻食气此谓外如麻里如瓜疽毒深恶内连府脏疽顶白粒如椒者数十间有大如莲子蜂房者指?有脓不流时有清水微肿不突根脚红晕渐渐展开或痒痛或不痛疽不甚热疮反?下如领之皮渐变黑色恍惚沈重脉若虚弱使用大料参耆归术浓煎调理疮?有痈疽疔癰轻重浅深或止发於一经或兼二经者止当求责於一二经不可干扰余经也若东垣用药处方是矣矧有兼风兼湿兼痰兼气兼血兼阴虚等证者病本不同治当求责

疮?鬱冒俗呼昏迷是也宜汗之则愈

辨瘤二十一

若发肿都软不痛者血瘤虚肿而黄者水也发肿日渐增长而不大热时时牵痛者气瘤气结微肿久而不消後亦成脓诸癰瘤疣 等至年衰皆自内溃治於壮年可无後忧

疽分虚实用药二十二

疮疽痛息自宁饮食知味脉证俱缓缓则治本故可以王道平和之药徐而治之亦无不愈若脉实焮肿烦躁寒热脉证俱实非硝黄猛烈之剂不能除投以王道之剂则非也若疮?聚肿不溃溃而脓水清稀或泻利肠鸣饮食不入呕吐无时或手足并冷此脉证俱虚非大补之药不能平投以硝黄攻伐之剂亦非也故治其证者当辨表里虚实随宜治之庶得万全

治疮须分补泻二十三

东垣云疮疽受之有内外之别治之有寒温之异受之外者法当托里以温剂反用寒药则是皮毛之邪引入骨髓矣受之内者法当疎利以寒剂反用温剂托里则是骨髓之病上彻皮毛矣殆必表里通溃共通为一疮助邪为毒苦楚百倍轻则危重则死矣

男女痈疽治法不同二十四

男妇痈疽精要谓治法无异丹溪曰妇人情性执着比之男子其难何止十倍虽有虚证宜补亦当以执着为虑向见有一妇早寡善饮啖形肥伟性沈毒年六十六七月间背疽近正脊医乃横直裂开取血杂以五香十宣散酒饮月余未尝及其寡居之鬱酒肉之毒执着之滞时令之热竟至平?淹延两三月不愈

小儿疮疽二十五

小儿纯阳多热心气鬱而多疮疽胎食过而受热毒犀角散为最余如常法大下恐伤其胃

痈疽当分经络二十六

丹溪曰六阳六陰经有多气少血者有少血多气者有多气多血者不可概论诸经惟少阳厥陰生痈理宜预防以其多气少血血少肌肉难长疮久不合必成死证或者遽用驱毒利药以伐陰分之血祸不旋踵才得肿痛参之脉证若有虚弱便与滋补气血无亏可保终吉若用寻常驱热拔毒及散气药虚之祸如反掌耳一人年三十左腿外廉红肿一人年四十脇下红肿二人皆不预防本经少阳血少猛浪用大黄攻里而死一人年六十左膊外侧一核一女髀骨中痛二人亦不预防本经血少猛浪用五香十宣散表而死

按此分经不致有犯禁坏逆之失然手少阳少阴太陰足少阳少陰太陰俱多气少血也手厥陰太陽足厥陰太陽俱多血少气也手足阳明俱多血多气也

以上病例不系膏?丹毒火热之变因虚劳气鬱所致只宜补形气调经脉疮当自消不待汗下而已也若不详脉证经络受病之异下之先犯病禁经禁故致失手

论内消二十七

内消当审浅深大小经络处所形脉虚实如脑背腰顶臀膈皆太阳经宜黄连羌活 背连脇处为近少阳宜败毒散形实脉实者宜漏芦汤五利大黄汤等疎利之气虚参耆为主血虚当归人参为主佐以消毒加以引经六经分野各随本经标本寒温气血多少以行补泻惟少阳一经治与气血虚同法【凡瓜蒌射干山甲蟾酥连翘地丁鼠粘子金银花木鳖之类皆内消之药】

内托二十八

一凡痈疽或已成血气虚者邪气深者邪气散慢不能突起亦难溃脓或破後脓少或脓清稀或坚硬不软或虽得脓而根脚红肿开大皆气血虚邪气盛兼以六淫之邪变生诸症必用内托令其毒热出於肌表则易愈也内托以补药为主活血驱邪之药为臣或以芳香之药行其鬱滯或加温热之药御其风寒

亦有疮疽肿痛初生一二日便觉脉沈细而烦闷脏府弱而皮寒邪毒猛烈恍惚不宁外证沈深者即当用托里散或增损茯苓汤及温热之剂以从治之

或问内托河间治肿焮於外根盘不深形证在表其脉多浮病在皮肉非气盛则必侵於内急须内托宜服煎散除湿散鬱使胃气和平如或未已再煎半料饮之如大便闭及烦热少服黄连汤如微利及烦热已退却与复煎散如此使荣卫俱行邪气不能内伤肿?二十九

肿?内外皆壅宜托里表散为主如用大黄宜戒猛浪之非

潰?三十

潰?内外皆虚宜以补接为主欲用香燥宜戒虚亡之失

外施贴药三十一

外施贴药正是发表之意经曰发表不远热大凡气得热则散得冷则凝庸医敷贴冷药岂理也哉 一人年五十嗜酒与煎?後左丝竹空忽努出一角以硝黄脑子盒之致毙

疮?作渴三十二

疮?作渴不问肿溃但脉数发热而渴用竹叶黄耆汤脉不数不发热或脉数无力而渴或口乾用补中益气汤若脉数便闭用清凉饮尺脉洪大按之无力而渴用加減八味丸若治口燥舌黄饮水不歇此丸尤妙精要曰口渴与口乾不同不宜用丹药鎮坠祸如反掌惟桑枝煎五味汤以救陰水甚妙

丹溪曰不言食味起火怒气生火房劳激火吾恐渴亦未易止也

精要曰疮作渴甚急与神仙追毒丸取下恶毒清臈汤千金漏芦汤五香连翘汤六味车螯散万金散皆可选用利後仍渴却用生津补气药津液生气血完渴自止

丹溪曰大渴而与利药非明示脉证何以知其当下後言利後仍渴却用补药又不明言脉证恐是但有大渴必下下後尚渴方与补药古人治未病如此用药可乎况渴属上焦当肿?时犹或可用若潰?後渴多因血气之虚何待利後方议其虚也

痈疽发渴乃气血两虚用参耆以补气归芎以养血或忍冬丸黄耆六一汤

一人渴後发背未溃脉数无力此陰虚火动用加減八味丸?咀二剂稍缓次用丸剂而愈

一人脑疽作渴脉虽洪按之无力治以此药不信自用滋阴等药愈盛七恶并致而没

东垣云论人病疽愈後发渴多致不救惟加減八味丸最妙盖痈疽多因虚而得疽安而渴者服此丸则渴止安而未渴者服此丸永不发渴或未疽而先渴者服此不惟渴止而疽亦不作

一贵人疽未安而渴作一日饮水数升予用加減八味丸诸医大笑云此能止渴我辈不复业医矣皆用木瓜乌梅紫苏参苓百药煎等剂而渴愈甚不得已用此药三日渴止其疾本以肾水枯竭心火上炎是以生渴此药生水降火为最患者鉴之

附子气味劲悍有回阳之功命门火衰非此不补性虽有毒但炮制有法或用甘草防风同炒

或童便久浸以去其毒复与地黄等味同用以制其热润其燥缓其急假其克捷之功而驾驭其慄悍之势则虽久服亦无害也观东垣八味丸论则较然矣

精要曰疽向安後发渴与加減八味丸

丹溪曰夫当此时气血两虚当用参耆补气归苈补血渴当自止何必泽泻茯苓佐以肉桂以导水耶若忍冬丸黄耆六一汤亦为切当忍冬养血黄耆补气渴何由作机按丹溪所言与前八味丸论治不合宜以脉证别之庶几两得其宜而无背驰之失也疮?呕逆三十三

精要云有二证一谓初发不曾得内托散伏热在心一谓气虚脾气不正其伏热在心者与内托散气虚者宜嘉禾散有寒热宜正气散兼与山药丸以补肾

丹溪曰诸逆冲上呕?皆属於火托里散性凉固有降火之理若嘉禾散徒温暖以助火耳山药丸补肾以壮下焦之阴粗为近理然治呕须分先後肿?时当作毒气上攻治之溃?後当作阴虚补之若年老因疽溃後呕不食者宜参耆白术膏佐使药随时随证加減亦用独参汤而愈者山药丸缓急未易治 河间谓病疮呕逆湿气侵於胃也药中宜倍加白术

海藏云吐者有物无声乃血病也?者无物有声乃气病也呕者有声有物气血俱病也仲景曰呕家虽有阳明证勿下之欬逆者火自下冲上胃口而作声也病後胃虚所致阴大虚也病而至此多危善於治者岂可泛言呕吐无分别耶

热盛脉数精要与漏芦汤单煮大黄汤等若不甚热脉缓弱只投五香连翘汤

丹溪曰热盛脉数若肿?时脏府秘而体实者犹可与也若溃?脓血出多热盛脉数去死为近岂可下乎缓弱之脉古人皆以为邪毒已散五香之飞走升散其可用乎

疮肿寒热用药法三十四

尝见治寒以热而寒弥甚治热以寒而热弥炽何也假如心实生热者当益其肾肾水滋热自除肾虚生寒者当补其心心火降寒自退此所谓寒之而热取之阴热之而寒者取之阳也又寒因热用热因寒用要在通其理类而已又闻寒热逆之甚者从之盖治寒以热必凉而行之治热以寒必温而行之此亦欲其调和也其间有正有权者盖病有微有甚微者逆治理之正也甚者从治理之权也

疮?面赤不得攻下三十五

疮?及诸病面赤虽伏大热禁不得攻里为阳气怫鬱邪气在经宜发表以去之故曰火鬱则发之虽大便数日不去亦宜攻其表以发散阳气少加润燥之药若见风脉风证只宜用发表风药便可以通利也若只乾燥秘澁只宜润之

疮?发寒热或汗三十六

疮?发寒热多汗或先寒後热或先热後寒或连日作寒热或间日作必先呕痰然後寒热寒热解大汗出精要言以上之证不可专以为热亦有气虚而得亦有因怒而得或先感寒邪脾气不正而然者

丹溪曰因气虚者当以补气药补之因怒者当以顺气药和之脾气不正者当以脾药调养之今用不换金正气散悉是温散泻卫之药欲以一两人参收拾十四两之泻卫可乎若用於肿?时感寒邪者犹或庶几彼气虚者因怒者脾气不正者此方能兼治乎抑不知其用於肿?耶溃?耶

论疽疾咽喉口舌 三十七

凡疽疾咽喉口舌生疮精要【阙】罪不得内托以致热毒

【阙】与琥珀犀角膏一日而安

【阙】尚为近理若溃?後用之

彼【阙】宁不助邪致虚以速其死也後有犀角散以大黄佐黄蓍用黄蓍则知为虚矣用大黄又似疑其有实热夫疮脓体虚纵有旧热将自渐因脓血而消何必以峻冷利动脏府若在秋冬何异刀劍

论疮?食肉三十八

东垣曰疮?食肉乃自弃也疮?乃营气而作今反补之自弃何异虽用药治不能愈也精要曰羊鷄牛鷲鱼面煎?炒炙酒等味犯之必发热用梔子黄芩汤最効

丹溪曰梔芩苦参犀角佐辅人参固可解食毒之热若寒月与虚人宁无加減乎内经谓膏粱之变足生大疔此言疮疽之因也禁戒厚味恐其引起宿火之热此诚富贵豢养口腹者所当谨若素贫者大不然矣予曾治一人背痈径尺穴深而黑家贫得此急作参蓍归术膏多肉馄饨与之而安多肉馄饨补气之有益者也

论气血喜香恶臭三十九

精要曰凡气血闻香则行闻臭则逆饮食调令香美益脾土养真气疮?或为秽气所触可用香药薰之丹溪曰甘而淡者可养脾土若香美者但能起火故经以热伤脾热伤气为戒今日益脾养气施之肿?似有畅达之益溃?後用香美恐有发湿热损真陰之患

论脓溃四十

夫痈疽疮疖皆由气血壅滞而生当推虚实表里而早治之可以内消此内托里之意也若毒气已结者勿泥此内消之法当辨脓之有无浅深急酌量刺之缓则穿通脏府腐烂筋骨可不慎哉若脉紧而数为脓未成紧去但数为脓已成以手按上热者有脓不热无脓按之牢硬未有脓按之半软半硬已有脓大软方是脓成若大按之痛者脓深按之不甚痛者脓未成按之即复痛为有脓不复痛者无脓薄皮剥起者脓浅皮色不变不高阜者脓深浅者宜砭深者宜针足指稍及乳上宜脓大软方开麻豆後肢疔有痈稍觉有脓便用决破迟则成挛曲之疾

论痈疽脓成十死一生四十一

凡痈疽脓已成十死一生故圣人弗使已成已成脓血砭石锋针取之也但病者多喜内消而医者即用十宣散败毒散流气饮之类殊不知十宣散虽有参蓂然防风白芷厚朴桔梗皆足以耗气况不分经络时令气血多少安可概用败毒散乃表散药也虽有表证不过一二服况非表证宁用之乎流气饮乃行气散血之剂服之过度则气血虚耗何以为脓此三药不可轻用明矣若脓既成昧者待其自穿殊不知少壮充实者或能自破若老弱之人又有攻发太过不行针刺脓毒乘虚内攻穿肠腐膜鲜不误事

一妇乳痈脓成针刺及时不月而愈一人腿痈脓成畏针几殆後为针之大补三月而平
一人腿痈脉证俱弱亦危证也治以托里得脓不急针刺脓水开泻不斂而死
一妇发背待自破毒内攻一人腹痈溃透秽从疮口出皆由畏针而毙

论恶肉四十二

恶肉者腐肉也痈疽溃後腐肉凝滞必须去之推陈致新之意若壮者筋骨强盛气血充溢真能胜邪或自去或自平不能为害若年高及怯弱之人血液少肌肉澁设或留而不去则有烂筋腐肉之患一人取之及时而新肉早生得以全愈
一人去之稍迟几致不救一人取之失期大溃而毙尝见腐肉既去虽少壮者

不补其气血亦不能收斂若怯弱者不取恶肉不补养气血未见其生也

腐肉可用手法去之或用雄黄轻粉傅之蠹肉努出用远志末酒调之又法息肉突出乌头五钱苦酒三升浸溃三日洗之日夜三四次诸疮努肉如蛇出数寸硫黄末傅之即缩脓溃後蠹肉不腐亦用硫黄轻粉傅之四围仍有肿焮处用毫针烧赤刺之约一米深红肿则缩

论蚀脓四十三

追蚀脓法使毒气外泄而不内攻恶肉易去好肉易生也若絀其疮血出不止者未可絀但掺追蚀药於疮上待其熟可絀方絀絀之痛应心者亦不可絀误触其焮痛必倍必生变症若疮

疔脓成未破者於上薄皮剥起者当用破头代针之药安其上以膏贴之脓出之後用搜脓化毒药若脓血未尽便用生肌务其早愈则毒气未尽必再发

生肌止痛四十四

肌肉脾之所主也溃後收斂迟速者乃气血盛衰使然世人但知生肌用龙竭止痛用乳没予谓不然生肌之法当先理脾胃助气血为主则肌肉自生岂假龙竭之属设若脓毒未尽就用生肌反增溃烂壮者轻者不过复溃或迟斂而已怯者重者必致内攻或溃烂不斂者亦多矣止痛之法热者清之寒者温之实者损之虚者补之脓郁者开之恶肉侵蚀者去之如是则痛自止岂特乳没之属

一人发背毒气未尽早用生肌竟背溃烂治以解毒药而愈
又有患此毒气始发骤用生肌其毒内攻而死一人腿痈因寒作痛与乳香定痛丸
一妇时毒因

热作痛与防风通圣散 一人腿痈脓溃因虚作痛与益气养荣汤
一人腹痛因实作痛与黄连内疏汤 一人腿痈脓成作痛予为刺之
一妇发背腐肉不去作痛予为取之痛各自止专用龙竭生肌乳没止痛未之察也

疮痛不可忍者苦寒药可施於资稟厚者若资稟素薄者宜补中益气汤加苦寒药血热者四物汤加黄芩鼠粘子连翘在下加黄柏若肥人湿热疮痛者羌活防风荆芥白芷取其风能胜湿也

每见疮作先发为肿气血郁积蒸肉为脓故痛多在疮始作时脓溃之後肿退肌宽痛必渐减而反痛者虚也宜补参芪之属亦有秽气所触者宜和解之乳香芍药之属亦有风寒所逼宜温散之羌桂之属论瘰并治法四十五

诸疮患久成瘰常有脓水不絶其脓不臭内无歹肉须先服参芪归术芎大剂托里为主或服以丸尤宜用附子浸透切作片厚二三分於疮上着艾灸之仍服前托里之药隔三日再灸不五七次肌肉自长满矣

至有脓水恶物渐溃根深者用麴硫黄大蒜三物一处捣烂看疮大小捻作饼子厚三分安疮上用艾炷灸二十三壮一壮一易後隔四五日方用【阙】霞锭子并信効锭子
用絀入疮内歹肉尽去好肉长平然贴收斂之药内服应病之剂调理则差矣

论附子饼四十六【附豆?饼】

附子为末唾津和为饼如三钱厚安疮上以艾炷灸之漏大炷大漏小炷小但灸令微热不可令痛乾则易之如困则止来日如前再灸直至肉平为效仍用前补药作膏贴豆?饼专治发背

已潰未潰用江西淡豆?为末唾津作饼置患处灸之饼乾再用唾津和之疮大用水和捣成硬泥依疮大小作饼子厚三分如已有疮孔勿覆孔上四布?饼列艾其上灸之使微热勿令破肉如热痛急易之日灸二度先有疮孔者孔出汁即差

论隔蒜灸四十七

隔蒜灸 元戎云疮?自外而入者不宜灸自内而出者宜灸外入者托之而不内内出者接之而令外故经云?者灸之 丹溪曰痈疽之发或因内有积热或因外寒而郁内热若於始发之际外灸以散其毒治之之早亦可移重就轻转深於浅 东垣曰初觉发背欲结未结赤热肿痛先以湿纸覆其上立视纸先乾处即痛头也取蒜切片如三钱厚安头上用大艾炷灸之三壮换一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛早觉早灸为上一日三日十灸十活三日四日六七活五六日三四活过十数日不可灸若有十数头作一处者用蒜研成膏作薄饼铺头上聚艾烧之亦能活也若初发赤肿中间有一黄粟米头便用独蒜切去两头取中间片厚薄安头上着艾灸十四壮多至四十九壮 本事方云一人四月背疽治之踰月益甚矣以艾加疮头自旦及暮灸百五十壮知痛乃已明日镊去黑痂脓尽不痛始别以药傅之日一易易时旋前去黑烂月余乃平

灸法总论四十八

疮?在外者引而拔之在内者疏而下之灼艾之功甚大若毒气郁结气血凝聚轻者或可药散重者药无全功东垣云若不针烙则毒气无从而散脓瘀无从而泻过时不烙反攻於内故治毒者必用隔蒜灸舍是而用苦寒之剂其壮实内有火者或可彼怯弱气寒未有不败者也又有毒气沈伏或年高气弱若服剋伐之剂气血愈虚脓因不溃必假火力以成功

一人足患疔已十一日气弱灸五十余壮更以托里药而愈 黄君腿痛脓清脉弱

一妇臂结一块溃不收敛各灸以豆?饼更饮托里药而愈

一人胷肿一块半载不消明灸百壮方溃与大补药不敛复灸以附子饼而愈

一人发背焮痛如灼隔蒜灸三十余壮肿痛悉退更服托里消毒而愈 一人发背疮头甚多肿硬色紫不甚痛不腐溃以艾铺患处灸之更服大补药数日死肉脱去而愈 一人发背已四五日疮头虽小根畔颇大隔蒜灸三十余壮其根肉消惟疮头作浓而愈精要曰灸法有回生之功信矣大凡蒸灸若未溃则

拔引郁毒已溃则补接阳气祛散寒邪疮口自合其功甚大尝治四肢疮?气血不足者只以前法灸之皆愈疔毒甚者痛则灸至不痛不痛则灸至痛亦无不愈若中虚者不灸而服败毒药则疮毒未除中气先伤

未有不败者也李氏云治疽之法着艾胜於用药缘热毒中隔外内不通不发泄则不散又有处贫居僻一时无药用灸尤便大概蒜用大者取其散毒有力用着艾炷多者取其火力透也如法灸之疮发脓溃继以神异膏贴之不日而安一则疮不开大二则内肉不溃三则疮口

易合见效甚神

辨精要曰始发时用针灸十死八九丹溪曰火以畅达拔引郁毒此从治之意因灸而死者盖虚甚孤陰将絕脉必浮数而大且鼓精神必短而昏无以抵当火气故也岂可泛言始发不可灸以悞人精要又谓头上有毒不得灸恐火拔起热毒而加病丹溪曰头为诸阳所聚艾炷宜小而少小者如椒粒少者三五壮而已若猛浪如灸腹背炷大数多斯为悞矣按东垣灸元好问脑疽以大艾炷如两核许灸百壮始觉痛而安由是推之则头上发毒灸之痛则炷宜小数宜少不痛者炷大数多亦无妨也

经曰?者灸之如外微觉木硬不痛者是邪气深?也急灸之浅者不可灸又曰浅者有数头肿痛亦灸之无妨

竹马灸法四十九

丹溪曰诸项灸法皆好惟骑竹马灸法尤为切要此消患於未形也先令病人以肘凭几竖臂腕腰直用篾一条自臂腕中曲纹尽处男左女右贴肉量起直至中指尖尽处为则不量指甲却用竹扛一条令病人脱衣骑定令身正直前後二人扛起令脚不着地又令二人扶定勿令僵仆却将所量臂腕篾从竹扛坐处尾骶骨尽处直竖竹上贴脊背量至篾尽为则用墨点此只是取中非灸穴也另用薄篾量病人中中指节相去两横为则男左女右截为一则就前所点记处两边各量开尽处即是灸穴两穴各灸五壮或七壮不可多灸不问痛在何处及乳痛并用此法灸之无不愈者一云疽发於左灸左发於右灸右甚则左右皆灸盖此二穴心脉所过处经曰诸痛痒疮?皆属心火又云心主血心气滯则血不行故逆於肉理而生痛灸此穴使心火调畅血脉流通即能奏效起死回生

论灸刺分经络五十

河间谓灸刺疮?须分经络部分气血多少俞穴远近从背出者当从太阳五穴选用至阴【在足小指外侧去爪甲角如韭叶】通谷【在足小指外侧本节前?中】束骨【在足小指外侧本节後?中】崑崙【在足外踝後跟骨上?中】委中【在足中央约纹中动脉】从鬣出者当从少阳五穴选用窍阴【在足小指之次指端去爪甲如韭叶】夹谿【在足小指次指岐骨间本节前?中】临泣【在足小指次指本节後间?中】阳辅【在足外踝上四寸辅骨前絶骨端如前三分】阳陵泉【在膝下一寸外廉?中】从鬣出者当从阳明五穴选用厉兑【在足大指次指去爪甲如韭叶】内庭【在足大指次指外间?中】?谷【在足大指间本节後?中】冲阳【在足趺上五寸骨间动脉去?谷三寸】解谿【在冲阳後一寸五分寸腕上?中】从脑出者则以絶骨一穴【在外踝上三寸动脉中】

一说痈疽初发必先当头灸之以开其户次看所发分野属何经脉即内用所属经脉之药引经以发其表外用所属经脉之俞穴针灸以泄其邪内外交治邪无容矣

针法总论五十一

经曰冬则闭藏用药多而少针石少针石者非谓痈疽也痈疽不得顷时回回者远也【远顷时而不泻则烂筋骨穿脏府矣】又曰痈疽之生脓血之成积微之所生也故圣人自治於未有形愚者遭其已成也已成脓者唯砭石铍锋之所取也

疮?一科用针为贵用之之际须视其溃之浅深审其肉之厚薄若皮薄针深反伤良肉益增其溃肉厚针浅脓毒不出反益其痛至於附骨疽气毒流注及有经久不消内溃不痛宜燔针开之若治咽喉当用三棱针若丹瘤及痈疽四畔赤焮疼痛如灼宜砭石砭之去血以泄其毒重者减轻者消

一妇患腹痛脓胀闷瞽卧针脓出即苏

一人囊痈脓熟肿胀小便不利几殆急针脓水大泄气通而愈

大抵用针迎而夺之顺而取之所谓不治已病治未病不治已成治未成正此意也今之患者或畏针而不用医者又徇患者之意而不针遂或溃成而不得溃或得溃而所伤已深灸卒之夭枉十常八九悲夫

精要谓痈如椒眼十数头或如蜂巢莲房脓血不出者用针横直裂之如无椒眼之类只消直入取脓不必裂之一法当椒眼上各灸之亦佳不必裂也

小儿疮疖先当温衣覆盖令其凝结壅滞血脉温和则出血立已不如此血脉凝便针则邪毒不泄反伤良肉又益其疮势也

精要曰痈者皮薄肿高多有椒眼十数粒疽者皮肤顽硬状如牛颈之皮痈成脓则宜针针宜用马御铁为之形如薤叶样两面皆利可以横直裂开五六分许攻去毒血须先灸而後裂疽成脓则宜烙可用银篦大二寸长六寸火上烧令赤急於毒上熨烙得脓利为效又曰一妇病痈在背之左高大而熟未破医云可烙傍有老成者曰凡背之上五脏俞穴之所系膈膜之所近烙不得法必致伤人医曰但宜浅而不宜深宜横而不宜直入【恐伤膈膜】宜下而不宜上【恐贮脓血】谓此诀尽无妨也於是烧铁筋烙之肉破脓出自此而愈当时直惊人非刽子手者不能为也

又曰方其已熟未溃之时用铁筋一烙极是快意方扇火欲着时诚是惊人予尝用矣临时犹且颤悸况未曾经历者乎烙後脓水流通百无所忌名曰熟疮其疮突者针口宜向下然须是熟於用烙者识浅深知穴道审生熟非其时则所出皆生血当其时则出黄脓瘀肉用尖针烙者不得法尖针头细其口易合惟用平员头者为妙盖要孔穴通透或恐疮口再合用细牛膝根如疮口之大小略割去粗皮插入疮口外留半寸许即用嫩橘树叶地锦草各一握研成膏傅之牛膝能使恶血常流二草温凉止痛随乾随换此十全之功也

火烙针其针员如筋大如纬挺头员平长六七寸一样二枚捻蘸香油於炭火中烧红於疮头近下烙之宜斜入向软处一烙不透再烙必得脓疮口烙者名曰熟疮脓水常流不假按抑仍须紮之勿令口合论蜚针五十二

蜚针吮出血可施於轻小症候若积毒在臟府徒竭其血於外无益一儿二岁赤疹取大蜚数条吮其血疹消予曰非治也三日大热而死外血去气不能独居故也

论金银花酒五十三

金银花生取藤叶一把磁器内烂研入白酒少许调和稀稠得宜涂敷四围中心留口以泄毒气又法取藤五两木杵槌碎生甘草节一两二味以水二碗用砂瓶文武火煎至一碗入无灰酒一碗再熬十数沸去渣分温三服查敷患处一日夜吃尽病势重日夜两剂服至大小便通利药力到矣或用乾者终不及生者力大效速或只用藤五六两捣烂入热酒一钟绞取汁酒温服查敷患处四五服而平此藤延蔓附树或园圃墙垣之上藤方而紫叶似薛荔而青三月间花微香蒂带黄色花初开色白经一二日色黄故又名金银花又名鹭鸶藤又名金钗股又名若翁须因藤左缠又名左缠凌冬不雕又名忍冬在处有之治痈疽发背乳痈初发便当服此不问疽何处皆有奇效兼麦饭石膏神异膏贴之尤效

论槐花酒五十四

槐花酒

槐花四五两炒微黄乘热入酒二钟煎十余滚去渣热服未成者二三服已成者一二服一人髀患毒痛甚服消毒药不减饮槐花酒一服势随大退再服托里消毒药而愈一人发背十余日势危脉大先饮槐花酒二服杀其势退再服败毒散二剂托里药数剂渐溃又用桑柴烧灸患处每日灸良久仍以膏药贴之灸至数次脓溃腐脱以托里药加白术陈皮月余而愈一人肩疽脉数用槐花酒一服势顿退更与金银花黄耆甘草十余服而平

大抵肿毒非用蒜灸及饮槐花酒先去其毒虽服托里诸药其效未必甚速槐花治湿热之功最为神速但胃寒人不宜过剂

八味丸治验五十五

一人年踰三十素怯弱不能食冷臂痛愈後饮食少思或作胀或吞酸日渐羸瘦参苓等药不应右尺脉弱此命门火衰不能生土遂以八味丸补土之原食进而愈一人病脾胃服补剂及针灸脾俞等穴不应几殆服八

味丸三料而平

一人脾虚发肿服此丸不半年而康一人貌丰气弱遇风则眩劳则口舌生疮胃常有痰目

常赤澁服此而安 一人患脾服此將驗而庸醫阻之反用寒藥遂致不救

嘗驗人有不耐勞不能食冷或飲食作脹大便不實或口舌常破如瘡服涼藥盛盜汗不止小便頻數腰腿無力或咽津或呼吸覺令氣入腹或陰囊濕痒或手足冷或面白或黧黑或畏寒短氣以上諸症皆屬腎非用附子不可

治驗數條見前渴論

外科理例卷一

卷二

钦定四库全书

外科理例卷二

明 汪机 撰

论十六味流气饮五十六治无名恶肿痈疽

丹溪曰夫十六味流气饮乃表里气血药也复以疎风助阳之药参入非脉之洪缓沈迟紧细者不宜用诸家往往不分经络脉症不具时宜但云消毒化毒又云不退加补气血药此又使人不能无疑也

论十宣散五十七

经曰诸痛痒疮?皆属心火言其常也如疮盛形羸邪高痛下始热终寒此反常也故当察时下而权治可收十全之功此表里气血之药若用於痈疽初发或已发或内托或身倦恶寒热少或脉缓濇或弦或紧细宜用之散风寒以助阳乃始热终寒之变也若施於积热熖毒更不分经络时宜不能无惧也

丹溪曰精要谓治未成也速散已成者速溃若用於轻小症候与冬月时令尽有内托之功冬月肿?用之亦可转重就轻移深於浅夏月溃?用之其桂朴之温散佐以防风白芷虽有参芪亦难倚仗世人用此不问是痈是疽是冬是夏无经络无前後如盲人骑瞎马半夜临深池危哉又曰燥血泻气药太多涉虚者勿轻用一士背臀腿节次生疽率用五香连翘汤十宣散致不救一人年六十好酒肉背疽与独参膏十五六斤而愈若用十宣宁保无危

论内托散五十八

精要谓一日至三日进十数服防毒气攻脏府名护心散切详菥豆解丹毒又言治石毒味甘入阳明性寒能补为君以乳香去恶毒入少阴性温善窜为佐甘草性缓解五金八石及百药毒为使想此方专为服丹石发疽者设不因丹石而发疽恐非必用之剂

丹溪曰痈疽因积毒在脏府非一朝一夕治当先助气壮胃使本根坚固而以行经活血为佐参以经络时令使毒外发施治之早可以内消此乃内托之本意【又云】内托散性冷治呕有降火之理若夫老年者病深诸症备者体虚者菥豆虽补将有不胜重任之患矣

一妇年七十形实性急好酒冬病脑疽与麻黄桂枝汤而愈此亦内托岂必皆冷药哉

论神仙追毒丸五十九

精要曰初成脓宜烙得脓利为効亦服追毒丸

丹溪曰追毒丸下积取毒之药决无取脓之効今用烙而得脓若在里而血气实则脓自出如托不出何不以和气活血药佐以参芪补剂使脓托出也其方用五倍子消毒杀虫解风为君山茨菇千金子大戟皆驱逐走泄为臣佐以射香升散用之以治痈疽实非所宜果见脏府有积毒或异虫纏滯深固而体气不虚者亦是快药但戒勿轻用耳

论独胜散六十

谓痈疽皆缘气滯血凝或因怒气所致用香附子去毛以生姜汁淹一夕研乾为末白汤调服二钱无时丹溪曰本方谓疽後常服半年尤効此皆施於体实气郁之人也

一人厚味气郁形实性重年近六十背疽医与他药皆不行惟饮香附米甚快始终止此一味而安此千百而一二

论柞木饮子六十一

乾柞木叶【四两半】 乾荷叶中心蒂 乾萱草根

甘草节 地榆【各一两】 细剉每服半两水二碗分二服早晚各一服未成者自消脓者自乾

丹溪曰荷蒂去恶血萱根下水解毒利胃膈柞木有芒刺能驱逐地榆主下焦血病轻小症候或可以为防托论阿胶饮子六十二【蜡矾丸 国老膏 远志酒】

丹溪曰阿胶饮子以牛胶属金属土补肺气实大肠壮胃止泄

黄蜡丸以蜡味甘淡实大肠补而难化国老膏以甘草化毒行经 远志酒

忍冬酒皆有补性归心归血用之颇切善用者以之配入肿?之散结溃?之补虚亦奏捷効

论六味车螯散六十三

车螯【四个黄泥煨红出火毒研末】 瓜蒌仁【新瓦上炒令香】 甘草节【二钱炒】 灯草【三十茎】 右除车螯为粗末作一服用酒二碗煎耗半碗去查入蜜一大匙和匀调车螯末二钱膩粉少许空心温服取下恶物

丹溪曰车螯散一以轻粉为佐一以灯心为佐其散肿消毒下积安详稳重轻小症候亦可仗之

论飞龙夺命丹六十四

飞龙夺命丹 治疗疮恶肿初发或发而黑陷毒气内陷者

丹溪曰世多用之香窜燥毒之剂无经不至故能宣泄备汗吐下三法病因食一切禽畜毒发及疮脉沈紧细数蕴毒在里并湿毒用之神效若大热

大渴毒气熅发而脉浮洪在表及膏粱积热之人未宜轻举

论加味十全汤六十五

凡治痈疽後补血气进饮食实为切要盖脓血出多阴阳两虚此药可以回生起死惜其不分经络时令须在识者触而长之今医以肿平痛寛遂以为安漫不加省往往於结痈後两三月或半年虚证乃见医者不察而加补养之功因而转成他病者多矣 一人因脚弱详见後条

论五香汤六十六

精要云大凡痈疽不可舍五香汤

丹溪曰吾不知良甫之时有许多大府秘坚病气郁塞若是之顽厚可以骤散而大下者耶亦当开陈时之先後症之可否庶乎後人不敢猛浪杀人殊不知些小寒热或者由其气血不和而然便以为外感而行表散害人最速

论防风通圣散六十七

此表里气血药也治一切风毒积热疮肿脉候弦洪实数浮紧气血盛实者不可缺此

丹溪曰秘传以是方加人参黄蓍苍术赤茯苓金银花名消肿托里虽以参耆为主复云人参无亦可则又不能无疑而难用也且临症加减须较表里如表症多者当从此方以辛甘为主散之也里症多者须当从变

论大黄六十八

精要云大黄宜热散毒治痈疽要药痈疽始作皆须大黄等汤极转利之排日不废又曰疮疽泄利皆是恶候

丹溪曰此皆不能使人无疑借曰用大黄恐因大府秘而病体实有积热沈痼者发也止可破结导滯推令转动而已岂可谓极转利之而且排日不废耶若下利之後又与利药恐非防微杜渐之意疮之始作肿在肌肉若非大满大坚实之症自当行仲景发表之法借五香汤为例

散之於外可也何必遽用峻下之药夺其里哉或曰痈疽用大黄走泻以去毒孙真人尝言之良甫祖述其说耳曰孙以盛名行奇术於公卿间者良甫宋人若其交游亦皆公卿之家肉食之辈故皆捷效今不分贫富苦乐一概用之宁免孟浪之过乎况有心劳而虚者忧怒而虚者强力劳动而虚者大醉饱而虚者皆气少而溢血少而浊生疽固是难治若大府秘而稍安谷甘淡薄而守戒律犹为可治不免尚费调补苟因旬日半月大府秘实不知亦有其气不降而然者便以为实而行大黄岂不杀人

论白蜡六十九

白蜡禀收斂坚凝之气外科要药生肌止痛接骨续筋补虚用合欢树皮同入长肉膏有神效但未试其可服否合欢皮尝服之验矣

论草麻子七十【附皂角刺 神异膏 麦饭石膏】

草麻子性善收能追脓取毒亦要药也 皂角刺治痈疽未破已破能钻引至溃处 神异膏一说膏药方甚多神效无出於此 麦饭石膏脓後围疮口一说内冷恶寒不宜用

论流气饮十宣散七十一

夫气血凝滯多因营卫之气弱不能运散岂可复用流气饮以益其虚况各经气血多少不同心包络膀胱小肠肝经多血少气 三焦胆肾心脾肺少血多气人年四十以上陰血日衰若於血少经分而病痈肿或脉证不足当以补接为主丹溪曰肿?内外皆壅宜托里表散为主乃补气血药而加之以行散之剂非专攻之谓也或者肿焮痛甚烦燥脉大其辛热之剂不但肿?不可用虽溃?亦不可用也 凡患者须分经络血气地部远近年岁老幼禀气虚实及七情所感时令所宜而治之常见以流气十宣散二药概治结肿之症以致取败者多矣

大抵证有主末治有权宜治其主则末病自退用其权则不拘於时泥於守常必致病势危甚况杂用攻剂动扰各经故丹溪云凡疮发於一经只当求责本经不可干扰余经是也

论败毒流气饮七十二

凡治疮?不审元气虚实病在表里便服败毒流气等药盖败毒散发表药也果有表证止宜一二服多则元气损毒愈盛虽有人参亦莫能补流气饮耗血药也果气结胸满只宜二三服多则血反致败虽有芎归亦难倚仗丹溪曰此不系膏粱丹毒之变因虚劳气郁所致也

蜡矾丸七十三

一人肩患毒肿硬作痛恶症逖见用矾末三钱糊丸以葱白脉实而不斂或不消者下之

瘰癧者结核是也或在耳後耳前或在耳下连及颐颌或在颈下连缺盆皆谓之瘰癧或在胃及胃之侧或在两脇皆谓之马刀手足少阳主之

瘰癧必起於少阳一经不守禁忌延及阳明大抵食物之厚郁气之积曰毒曰风曰热皆此三端加引变换须分虚实实者易治虚者可虑以其属胆经主决断有相火且气多血少妇人见此若月经不调寒热变生稍久转为潮热危矣自非断欲神仙不治也

救苦化坚汤 瘰癧马刀挟癭从耳下或耳後下颈至肩或入缺盆乃手足少阳经分其在颈下或颊车乃足阳明经分受心脾之邪而作宜将二症合而治之升麻【一钱】葛根【半钱】真漏芦 三味俱足阳明本经药

连翘【一钱能散诸血结气聚疮之神药十二经疮药不可无】归身【三分】熟苻【二分】牡丹皮【三分去肠胃中留血滯血三味诸经中和血生血凉血药也】黄芪【一钱枯皮毛实腠理补表之元气反活血脉生血亦疮家圣药】白芍药【三分味酸气寒补中益肺气散而不收故用酸寒以收散气腹痛必用夏月倍之冬寒下用酸寒故也又治腹中不和】肉桂【三分大辛热能散结积疮症属阳须少用之寒因热用也又寒覆其疮以大辛热消浮冻之气或燥烦者去之】麦芽【一钱治腹中缩急兼能消食补胃】柴胡【八分说同连翘】鼠粘子【无肿不用若无马刀挟癭不在少阳经矣去此二味】羌活【一钱】独活【半钱】防风【半钱三味乃手足太阳经药脊痛项强不可回顾腰似折项似拔者用之或只用防风一味亦可疮在膈以上虽无手足太阳经证亦当用之为能散结去上部风病身拘急者风也诸疮见此症亦用】麴末【炒黄二分为消化食】昆布【二分味大鹹酸能炙坚疮坚硬者用之】黄连【去毛三分治烦闷】广茂【三分煨】三棱【二分煨坚者削之疮坚硬甚者用之不甚勿用】人参【三分补肺气如气短气喘气不调加之】厚朴【姜制一钱二分腹时见胀加之】益智仁【二分唾多者胃不和也或吐沫吐食胃吐】

凡疮不起者托而起之不成脓者补而成之使不内攻脓成宜及时针之若畏痛而不肯针之又有恐伤良肉而不肯针殊不知疮虽发於肉薄之处若脓成其肿亦高寸余疮皮又厚分许用针深不过二分若发於背肿高必有三四寸针入止於寸许况患处肉已坏矣何痛之有何伤之虑怯弱之人及患附骨疽待脓自通必致大溃不能收敛血气?尽而亡者多矣论痛七十六

上部脉数实而痛者宜降火

上部脉数虚而痛者宜滋阴降火为主

尺部脉数而作渴者滋阴降火 如四物加黄栢知母大抵疮之寒热虚实皆能为痛热毒痛者药用寒凉折之寒邪痛者药用温热散之因风痛者除风因湿痛者导湿燥而痛者润之塞而痛者通之虚而痛者补之实而痛者泻之脓郁而闭者开之恶肉侵蚀者去之陰阳不和者调之经络闭澁者利之慎勿概用寒凉之药盖血脉喜温而恶寒若冷气入里血即凝滯反难瘥

矣又曰大抵疮疽之症虽发疼痛形势高大烦渴不宁脉若有力饮食颇进可保无虞其脓一溃诸症悉退多有因脓不得外泻以致疼痛若用败毒寒药攻之反致误事若有脓急针之脓出痛止脓未成而热毒作痛用解毒之药亦有腐烂尺余者若无恶症投以大补之剂肉最易生亦无所妨

论痈疽虚实七十七

疮之症五善之中见一二善症者可治七恶之内见一二恶症者难治若虚中见恶症者不救实中无恶者自愈此症虽云属火未有不由阴虚而致者故经云督经虚从脑出膀胱经虚从背出岂可专泥於火而用苦寒药治夫苦寒之药虽治阳症尤当分表里虚实次第时宜岂可始末悉用之

凡疮肿坚而不泽【不泽不光泽而色夭】坚如牛领之皮疮头如粟脉洪大按之则濡此精气已绝不治亦死

凡痈疽之作皆五脏六腑蓄毒不流非独荣气壅塞而发其行也有处其主也有归假令发於喉舌者心之毒皮毛者肺之毒肌肉者脾之毒骨髓者肾之毒发於下者阴中之毒发於上者阳中之毒外者六腑之毒内者五脏之毒故内曰坏外曰溃上曰从下曰逆发於上者得之速发於下者得之缓感於六腑者易治感於五脏者则难治也

发背脑疽大疔悬痈脱疽脚发之类皆由膏粱厚味尽力房劳七情六淫或丹石补药精虚气耗所致非独因荣卫凝滞而生也必灸之以拔其毒更辨其因及察邪在脏腑之异虚实之殊而治之庶无误也

凡大痈疽藉气血为主若塌而不起或溃而不腐或不收斂及脓少或清皆气血虚也宜大补之最忌攻伐之剂亦有脓反多者乃气血虚不能禁止也若溃後发热作渴脉大而脓愈多属真气虚邪气实也皆不治 尝见气血充实之人患疮皆肿高色赤易腐溃而脓且稠又易收斂怯弱之人多不起发不腐溃及难收斂若不审察妄投攻剂虚虚之祸不免矣

大抵疮之始作先发为肿气血郁积蒸肉为脓故多痛脓溃之後肿退肌宽痛必渐减若反痛乃虚也宜以补之有秽气所触者和解之风寒所逼者温散之齐氏云【名德之元太医令】疮疽之症有脏腑气血上下真邪虚实不同也不可不辨如肿起坚硬脓稠者实也肿下缓慢脓稀者虚也泻痢肠鸣饮食不入呕吐无时手足并冷脉弱皮寒小便自利或小便时难大便滑利声音不出精神不爽悉脏腑虚也大便硬小便澁饮食如故腹满膨胀胸膈痞闷肢节疼痛口苦咽乾烦躁多渴身热脉大精神昏塞悉脏腑实也凡诸疮疽脓水清稀疮口不合聚肿不赤肌寒肉冷自汗色脱者气血虚也肿起色赤寒热疼痛皮肤壮热脓水稠粘头目昏重气血实也头痛鼻塞目赤心惊喉不利口舌生疮烦渴冷睡语咬牙者上实也精滑不禁大便自利腰脚沉重睡卧不能者下虚也肩项不便四肢沉重目视不正睛不了了食不知味音嘶色败四肢浮肿者真气虚也肿焮尤甚痛不可近多日不溃寒热往来大便秘澁小便如淋心神

烦闷恍惚不宁者邪气实也又曰诸痛为实诸痒为虚又曰其脉洪大而数者实也微细而软者虚也虚则补之和其气血托里也实则泻之疏利而导其气内经谓血实则决之气虚则掣引之

溃?虽有表症发热宜以托里药为主佐以表散之剂

论附骨疽七十八

骨疽乃流注之败症也如用凉药则内伤其脾外冰其血脾主肌肉脾气受伤饮食必减肌肉不生血为脉络血既受冰则血气不旺而愈滞宜用理脾脾健则肉自生血气自运行矣又曰白虎飞尸留连周期或展转数岁冷毒朽骨出尽自愈若附骨腐者可痊至骨腐则为终身癰疾矣有毒自手足或头面肿起或兼疼痛止至颈项骨节去处如癰?贯珠此风湿流气之症也宜加减小续命汤独活寄生汤主之有两膝肿痛起或至遍身骨疼痛者此风湿痹又

名癰节风宜附子八物汤又有结核在项腋或两胯软肉处名曰 癰痛属冷症也又有小儿宿痰失道致结核於项颈臂膊胛背之处亦冷症也俱用热药敷贴

以上诸症皆原於肾肾主骨肾虚则骨冷而为患也所谓骨疽皆起於肾亦以其根於此也故用大附子以补肾气肾实则骨有生气而疽不附骨矣论疮疽所致之由七十九

若气血充实经络通畅决无患者若气血素亏或七情所伤经络郁结或腠理不密六淫外侵隧道壅塞医者须当察其所由辨其虚实庶不误人

论痈可治不可治八十

发背脑疽脱疽肿痛赤色水衰火旺之色尚可治若黑或紫火极以水之象也乃肾水已竭精气已涸决不治

凡肿不高色不赤不焮痛脉无力不饮食肿不溃腐不烂脓水清或多而不止肌肉不生属元气虚也皆难治宜峻补之或脓血既泄肿痛尤甚脓水败臭烦躁时 腹痛渴甚泻利无度小便如淋乃恶症也皆不治

未成脓不灸脓熟不开腐不去多致不救

肿而一日至四五月未成脓而痛者宜灸至不痛灸而不痛或麻木者明灸之

肿硬不作脓或痛或不痛或微痛或疮头如黍者灸之尤効亦有数日色尚微赤肿尚不起痛不甚脓不作者尤宜多灸勿拘日期更服甘温托里药切忌寒凉之剂

瘀肉不腐桑柴火灸之

脉数发热而痛者发於阳也可治脉不数不热不痛者发於陰也难治不痛最恶不可视为常疾此症不可不痛不可大痛顿闷者不治

肿?八十一

肿高焮痛脉浮者邪在表也宜托之 如内托复煎散肿硬痛深脉沈者邪在内也宜下之 如黄连内疎汤仙方活命饮苦参丸

外无焮肿内则便利调和者邪在经络也宜调和荣卫托里荣卫汤白芷升麻辈

焮痛燥烦或咽乾作渴者宜降火

如黄连解毒汤焮痛发热或拘急或头痛者邪在表也宜散之 如荆防败毒散人参败毒散辈

大痛或不痛者邪气实也隔蒜灸之更用解毒 如仙方活命饮

烦躁饮冷焮痛脉数者邪在上也宜清之 如清凉饮或金银花散

恶寒而不溃者气实兼寒邪也宜宣而补之 如十宣散

焮痛发热汗多大渴便秘谵语者结阳症也宜下之如黄连内疎汤破棺丹辈

不作脓或热而不溃者虚也宜补之 如补中益气汤

八物汤 十全大补汤辈

焮痛或不痛及麻木者邪气盛也隔蒜灸之

肿痛或不作脓者邪气凝结也宜解之 如仙方活命饮

肿痛饮冷发热睡语者火也宜清之 如清心汤或防风通圣散加黄连

不作脓或不溃及不斂者阳气虚也宜补之 如托里消毒散 疮後当调养

患後当调养若瘰癧流注之症尤当补益否则更患他症矣必难措治慎之 蜡矾丸 败毒散
流气饮溃?八十二

脓热不溃者阳气虚也宜补之 如圣愈汤

瘀肉不腐者宜大补阳气更以桑柴火灸之 如参芪归术

脓清或不斂者气血俱虚宜大补 如八物汤

溃後食少无睡或发热者虚也宜补之 如内补黄芪汤

倦怠懒言食少不睡者虚也宜补之

如黄耆人参汤寒气袭於疮口不斂或下不斂者温补之 如十全大补汤

脉大无力或濡微而肌肉迟生者气血俱虚也峻补之如十全大补汤

出血成脓多烦燥不眠者乃亡阳也急补之 脓多或清者血气俱虚也宜峻补之

右关脉弱而肌肉迟生者宜健脾胃

如六君子汤脓清补之不应及不痛或木闷及坚硬者俱不治

溃作痛八十三

脓出而反痛者虚也宜补之

凡脓溃之後脉濡迟缓者易愈以其有胃气故也脉细而沈时直者里虚欲变症也若痛尚未痊洪滑粗散者难疗以正气虚邪气实也

脉数虚而痛者属虚火宜滋陰 如托里散加生地黄脉数实而痛者邪气实也宜泄之

脉实便秘而痛者邪在内也宜下之 如清凉饮脉濡而痛者气血虚寒也温补之 如定痛托里散若有脓为脂膜间隔不出或作胀痛者宜用针引之或用利刀剪之腐肉堵塞者去之

溃发热八十四

脉浮或弱而热或恶寒者阳气虚也宜补气 如补中益气汤

脉濡而热者血虚也宜补血 如四物汤 人参养荣汤

午前热补气为主 如四君子汤

午後热者补血为主 如四物汤

脉浮数发热而痛者邪在表也宜散之 如补中益气汤

脉沈数发热而痛者邪在内也宜下之

东垣云发热恶热大渴不止烦燥肌热不欲近衣脉洪大按之无力或目痛鼻乾者非白虎汤症也此血虚发热宜用当归补血汤又有火郁而热者如不能食而热自汗气短者虚也以甘寒之剂泻热补气如能食而热口舌乾燥大便难者以辛苦大寒之剂下之以泄火补水

脓血大泄当大补气血为先虽有他症以未治之凡痈大溃发热恶寒皆属气血虚甚若左手脉不足者补血药当多於补气药右手脉不足者补气药当多於补血药切不可发表

附余诸症十五条

论寒热八十五

大抵七情皆能动火各经之热亦异当分治之东垣曰昼则发热夜则安静是阳气自旺於阳分也 昼则安静夜则发热烦燥是阳气下?入陰中也名曰热入血室
昼则发热烦燥夜亦发热烦燥是重阳无陰也当急泻其阳峻补其陰
王注曰病热而脉数按之不动乃寒盛格阳非热也 形症是寒按之而脉鼓击於指下而盛者此谓热盛拒陰非寒也伤寒论曰寸口脉微为阳不足陰气上入阳中则洒淅恶寒
尺脉弱为陰不足阳气下?入陰中则发热也 肺热者轻手乃得微按全无日晡热甚乃皮毛之热其症必见喘欬寒热轻者泻白散重者凉膈散地骨皮散 心热者微按至皮肤之下则热少加力按之则不热是热在血脉也其症烦闷心痛掌中热而嘔以黄连泻心汤导赤散朱砂安神丸 脾热者轻按之不热重按之亦不热不轻不重热在肌肉遇夜尤甚其症必怠惰嗜卧四肢不收无气以动泻黄散 肝热者重按之肌肉之下至骨之上乃热寅卯时间尤甚其脉弦四肢满闷便难转筋多怒多惊四肢困热筋痿不能起於牀泻青丸柴胡引子 肾热者重手按至骨分其热蒸手如火其人骨蒸又如虫蚀其骨困热不任亦不能起於牀滋肾丸主之
徐用诚云面热者足阳明 口中热如胶足少陰 口热舌乾足少陰 耳前热手太阳 掌中热手厥陰少陰太陰 足下热而痛足少陰 足外热足少

阳 身热肤痛手少陰 身前热足阳明 洒淅寒热身太陰 肩上热肩似拔手太阳
中热而喘足少陰 肩背热及足小指外廉胫踝後皆属足太阳
一身尽热狂而妄闻妄见妄言足阳明 热而筋纵缓不收足痿足阳明厥陰手少陰

丹溪曰恶寒者卫气虚衰不能温分肉实表而恶寒者又有上焦之邪隔絕营卫不能升降出表而恶寒者东垣云昼则恶寒夜则安静是陰气上溢於阳中也夜则恶寒昼则安静是陰血自旺於陰分也夜则恶寒昼亦恶寒是重陰无阳也当急泻其陰峻补其阳七情所伤

经云神伤於思虑则肉脱 意伤於忧愁则肢癱魂伤於悲哀则筋挛 魄伤於喜乐则皮槁志伤於盛怒则腰脊难以俯仰也七情所伤气血所损之症也当先滋养血气

论精血

夫月水之为物乃手太阳手少陰二经主之此二经相为表里在上为乳汁下为月水为经络之余气苟外无六淫所侵内无七情所伤脾胃之气壮则冲任之气盛故为月水适时而至然面色痿黄四肢消瘦发热口乾月水过期且少乃陰血不足也非有余瘀閼之症宜以滋养血气之剂徐而培之则经气盛而经水自依期而下

又云精未通而御女以通其精则四体有不满之处异日有难状之疾陰已痿而思色以降其精则精不出而内败小便道澁而为淋精已耗而复竭之则大小便道牵疼愈疼则愈欲大小便愈便则愈疼女人天癸既至踰十年无男子合则不调未踰十年思男子合亦不调不调则旧血不出新血误行或溃而入骨或变而为肿或虽合而难子合男子多则沥枯虚又产乳衆则血枯杀人观其精血思过半矣又曰夫人之生以血气为本人之病未有不先伤其气血者世有室女童男积想在心思虑过当多致劳损男子则神色先散女子则月水先闭何以致然盖忧愁思虑则伤心心伤则血逆竭血逆竭则神色先散而月水先闭也火既受病不能营养其子故不嗜食脾既虚则金气亏故发 既作水气絶故四肢乾木气不充故多怒鬢髮焦筋骨痿俟五脏传遍故卒不能死然终死矣此一种於劳中最难治盖病起於五脏之中无有已期药力不可及也若或自能改易心志用药扶接如此则可得九死一生

又云室女月水久不行切不可用青蒿等凉剂医家多以室女血热故以凉药解之殊不知血得热则行冷则凝【养生必用方】言之甚详此说大有理不可不知若经候微少渐渐不通手足骨肉烦疼日渐羸瘦渐生潮热其脉微数此由陰虚血弱阳往乘之少水不能灭盛火火逼水涸亡津液当养血益陰慎无以毒药通之毒药慄悍甚助阳火陰血得之则妄行脾胃得之则愈虚惟宜栝子仁丸泽兰丸

论水肿八十八

月水不通久则血结於内生块变为血瘕亦作血症血水相并壅塞不通脾胃虚弱变为水肿所以然者脾候身之肌肉象於土土主尅水水血既并脾气衰弱不能尅消致水气流溢浸渍肌肉故肿满也观此岂宜用尅伐之剂

论妇人病八十九

妇人性情执滯不能寬解多被七情所伤遂致遍身作痛或肢节肿痛或气填胷满或如梅核塞喉咽吐不出或痰涎壅盛上气喘急或呕逆恶心甚者渴闷欲絶产妇多有此症宜服四七汤先调滯气更以养血之药若因思忧致小便白浊者用此药吞青州白丸子屡効

论妇人热劳九十

妇人热劳者由心肺壅热伤於气血气血不调脏腑壅滯热毒内积不得宣通之所致也其候

心神烦燥颊赤头痛眼澁神昏四肢壮热烦渴不止口舌生疮神思昏沈嗜卧少寐饮食无味举体酸疼或时心怔或时盗汗肌肤日渐消瘦故名热劳也

自汗忌利小便九十一

自汗小便少不可以药利之既已自汗则津液外亡小便自少若利之则荣卫枯竭无以制火烦热愈甚当俟热退汗止小便自行也兼此症乃阳明经大忌利小便

论下血九十二

下血服凉血药不应必应中气虚不能摄血非补中升阳之药不能愈切忌寒凉之剂亦有伤湿热之食成肠癖而下脓血者宜苦寒之剂以内疎之脉弦絶濇者难治滑大柔和者易治

论血崩九十三

妇人崩中由脏腑伤损冲任二脉血气俱虚故也二脉为经脉之海血气之行外循经络内营脏腑若气血调适经下依时若劳动过极脏腑俱伤冲任之气虚不能约制其经血故忽然而下谓之崩中治宜大补气血之药举养脾胃微加鎮坠心火之药治其心补陰泻阳经自止矣

论治病不可责効太速九十四

凡治病若患者责効太速及不戒七情或药不分经络虚实俱难治

论寡妇病九十五

寡妇之病自古未有言者惟仓公与褚澄略而论及寡者言师尼丧夫之妇独居无阳欲男子而不可得是以郁悒而成病也夫处闺门欲心萌而未遂致阴阳交争乍寒乍热有类疟疾久则为劳又有经闭白淫痰逆头风膈气痞闷面?瘦瘠等症皆寡之病胗其脉独肝脉弦出寸口而上鱼际皆血盛而得经云男子精盛则思室女人血盛则怀胎是也

论痿与柔风脚气相类九十六

人身有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以成其形内则有心肝脾肺肾以主之若随情妄用喜怒劳佚致内脏精血虚耗使皮血筋骨肉痿弱无力以运动故致痿躄状与柔风脚气相类柔风脚气皆外所因痿则内脏不足之所致也

论病犯不治九十七

饮食不为肌肤水谷不能运化精微灌溉脏腑周身有脉神将何依故气短而促真气损也怠

惰嗜卧脾气衰也小便不禁膀胱不藏也时有燥热心下虚痞胃气不能上荣也恍惚健忘神明乱也犯此数者病皆不治

论脚气九十八

若饮食自倍脾胃乃伤则胃气不能施行脾气不能四布故下流乘其肝肾之虚以致足肿加之房事不节阳虚陰盛遂成脚气亦有内伤食脾胃之气有亏不能上升则下注为脚气者宜用东垣开结导引丸开导引水运化脾气如脾气虚湿气壅遏不通致面目发肿或痛者宜用导滞通经汤以疏导之

脚气由肾虚而生然妇人亦有病脚气者乃因血海虚而七情所感遂成斯疾今妇人病此亦衆则知妇人以血海虚而得之与男子肾虚类也男女用药同无异更当兼治七情无不効也脚气虽云肿有浅深感有轻重其所受皆因真气虚弱邪气得以深袭若真气壮实邪气焉能为患耶故附骨疽及鹤膝风症肾虚者多患之前人用附子者以温补肾气而又能行药势散寒邪也

凡湿痰湿热或死血流注关节非辛温之剂开发腠理流通隧道使气行血和焉能得愈但人谓附子有毒多不肯服若用童便炮制何毒之有况不常服何足为虑予中气不足以补中益气汤加附子服之三年何见其毒也经云有是病用是药也故大防风汤活络丹治脚气鹤膝风症多効

活络丹 夫病深伏在内非此药莫能通达但近代始云此药引风入骨如油如麵之说故後人多不肯服

大抵有是病用是药岂可泥此言以致难痊论表虚及小便多少肺痈肺痿九十九

经曰肺内主气外司皮毛若肺气虚则腠理不密皮毛不泽肺受伤则皮毛错纵故患肺痈肺痿肠痈必致皮毛如此以其气不能荣养而然也亦有服表药见邪不解又复发表殊不知邪不解者非邪不能解多因腠理不密而邪复入也专用发表则腠理愈虚邪愈易入反为败症矣宜胗其脉邪在表者止当和解而实腠理乘虚复入者亦当和解兼实腠理故用托里益气之药若小便赤澀为肺热所传小便短少为肺气虚盖肺为母肾为子母虚不能生子故也亦有小便频数者亦为肺虚不能约制耳

大抵劳伤血气则腠理不密风邪乘肺虚风热相搏郁滞结不散以致喘 若误汗下过度则津液重亡遂成肺痈肺痿之症矣

桷按以上一十五条原系後病案中忽发挥者虽非外科以其议论有切於杂症不敢脱略故采附诸论之後俾学者以便观览

外科理例卷二

<子部,医家类,外科理例>

卷三

钦定四库全书

外科理例卷三

明 汪机 撰

头面赤肿一百

里实而不利者下之

表实而不解者散之

表里俱实而不解者解表攻里

表里俱解而不消者和之

肿甚焮痛者砭去恶血更用消毒之剂

不作脓或不溃者托之

饥年普患者不宜用峻利当审而治之

时毒者爲四时邪毒之气感之於人也其候发于鼻面耳项?喉赤肿无头或结核有根令人增寒发热头痛或肢体痛恍惚不宁咽喉闭塞人不识者将为伤寒便服解药一二日肿气益增方悟始求疮医原夫此疾古无方论世俗通为丹瘤病家恶言时毒切恐传染考之经曰人身忽经变赤状如涂丹谓之丹毒此风热恶毒所为与时毒特不同耳盖时毒初状如伤寒五七日乃能杀人治者宜精辨之先论其脉滑数浮洪沉紧弦濇皆其候盖浮数者邪在表也沉濇者邪气深也气实之人急服化毒丹以攻之热实不利大黄汤下之有表证者解毒升麻汤以发之年高气软者五香连翘汤主之又于鼻内搔通气散取十余嚏作効若搔药不嚏者不可治如嚏出脓者治之必愈左右之人每日用嚏药搔之必不传染其病人亦每日用嚏药三五次以泄热毒此治时毒之良法也经三四日不解者不可大下犹宜和解之犀角连翘散之类至七八日大小便通利头面肿起高赤者可服托里散黄芪散宜针鎌出血泄其毒气十日外不治自愈也此病若五日已前精神昏乱咽喉闭塞语声不出头面不肿食不知味者必死治之无功矣然而此病有陰有阳有可汗有可下粗工但云热毒就用寒药殊不知病有微甚治有逆从不可不审也

一人头面肿痛服硝黄败毒之剂愈甚诊之脉浮数邪在表尚未解用荆防败毒散二剂势退

大半更以葛根牛旁子汤四剂而痊【此凭脉发表】

经云身半已上肿天之气也身半已下肿地之气也乃邪客心肺之间上攻头目而为肿此感四时不正之气也与膏粱积热之症不同硝黄之剂非大便秘实不可用若不审其因及辨其虚实表里概用攻之必致有悞常见饥馑之际藟莠之人多患之乃是胃气有损邪气从之不可不察予常治邪在表者用葛根牛旁子汤人参败毒散或普济消毒饮子邪在里者五利大黄汤栀子仁汤表里俱不解者防风通圣散表里俱解而肿不退者犀角升麻汤肿甚者砭患处出恶血以泄其毒十日外自愈若嚏出脓血即愈欲其作脓者用托里消毒散欲其收敛者用托里散此法最为稳当五七日咽喉不闭言语不出头面不肿食不知味者不治

一人患此肿痛发热作渴脉实便秘以五利大黄汤下之诸症悉退以葛根牛旁子汤四剂而痊【此凭脉攻里】

一人表里俱解肿痛尚不退以葛根升麻汤二剂而消【此凭症也】

一人肿痛发寒热脉浮数以荆防败毒散二剂少愈 人参败毒散二剂势减半又二剂而痊【此凭脉发表】

一人耳面赤肿作痛咽乾发热脉浮数先以荆防败毒散二剂势退大半又以葛根牛旁子汤四剂而痊【凭脉发表】

一妇表邪已解肿尚不消诊之脉滑而数乃瘀血作脓也以托里消毒散溃之而愈【此凭脉托里消毒也】

一人焮肿胀痛作渴烦热便秘脉数按之尤实用防风通圣散一剂诸症顿退以荆防败毒散加玄参牛旁黄芩二剂而差【此凭症凭脉发表攻里】

一老冬月头面耳项俱肿痛甚便秘脉实此表里俱实也饮防风通圣散不应遂砭患处出黑血仍投前药即应又服荆防败毒散而瘳盖前药不应者毒血凝聚上部经络药力难达故也恶血既去其药自効或拘用寒远寒及年高畏用硝黄而用托里与夫寻常消毒之剂或不砭泄其毒专假药力鲜不危矣【此舍时从症】

一人表里俱解惟肿不消以托里消毒散四剂脓成针之而愈【此凭症而治】

一妇肿痛用硝黄之剂攻之稍缓翼日复痛诊之外邪已退此瘀血欲作脓也用托里消毒散溃之而愈【此凭脉与症也】

一人表散药愈炽发热便秘诊脉沈实此邪在里也以大黄汤下之里症悉退以葛根牛旁子汤浮肿亦消惟赤肿尚存以托里药溃之而愈【此凭脉与症也】

一人冬月病头面赤肿耳前後尤甚痛不可忍发热恶寒牙关紧急涕唾稠粘饮食难下不得安卧医砭肿上四五十针肿赤不减痛益甚予诊其脉浮紧按之洪缓知爲寒覆皮毛鬱遏经络热不得升聚而赤肿且夫天令寒冷之时腠理闭汗不出血气强肉坚濇善用针者不得取四厥必待天温又云冬月闭藏用药多少针石也宜以苦温之剂温经散寒所谓寒致腠理以苦发之以辛散之

方名

托里温经汤

麻黄【苦温发之为君去根节二钱】防风【辛温散之去芦二钱】升麻【苦辛四钱】葛根【甘平解肌出汗专治阳明经邪故以为臣】白芷归身【血流不行则痛白芷归身辛温以和血散滞各二钱】苍术【湿热则肿苍术甘温体轻浮力雄壮能泄肤腠间温热二钱】人参【去芦一钱】甘草【甘温】白芍药【酸微寒调中益气使托其?为佐各钱半】

右剉每服一两水二盏先煎麻黄令沸去沫下余药同煎至一盏去渣大温服讫以薄衣覆首厚被覆身卧煖处使经血温腠理开寒乃散阳气升大汗出肿减七八分服去麻黄防风加连翘鼠粘子肿痛悉愈经言汗之则疮已信哉

或曰仲景言疮家虽身痛不可汗何也予曰此言营气不从逆于肉理乃主痈肿而作身痛则非外感寒邪作痛故戒不可汗汗之则成痼又问仲景言鼻衄者不可汗复言脉浮紧者以麻黄汤发之衄血自止何也予曰血与汗异名同类夺汗者无血夺血者无汗今衄血妄行爲热所逼更发其汗反助邪热重竭津液必变凶症故不可汗若脉浮爲在表紧则为寒寒邪鬱遏阳不得伸热伏荣中迫血妄行上出于鼻故用麻黄汤散其寒邪阳气得舒其衄自止洁古之学可谓知其要矣

泰和二年四月民多疫疠初觉增寒体重次传头目肿盛目不能开上喘咽喉不利舌乾口躁俗云大头天行亲戚不通染之多殆

一人病此五六日医以承气加蓝根下之稍缓翼日其病如故下之又缓终莫能愈渐至困笃予曰身半已上天之气也身半已下地之气也此邪热客于心肺之间上攻头目肿盛以承气泻胃中之实热是诛罚无过不知病源之所爲故遂用

黄连黄芩【味苦寒各半两泄心肺间热为君】橘红【苦平】玄参【苦寒】生甘草【甘寒各二钱】人参【三钱泄火补气为臣】连翘鼠粘子薄荷叶【苦辛平】板蓝根【苦寒】马勃【各一钱】白僵蚕【炒七分】升麻柴胡【苦平各二钱行少阳阳明二经气不得伸】桔梗【辛温为舟楫不使下行】

共为细末半用汤调时时服之半用蜜丸嚙化服尽良愈凡他处有病此者书方贴之名曰

普济消毒饮 或加川芎归身?咀如麻豆每服五钱水二鍾煎至一鍾去滓食後稍热时时服如大便硬加大黄【酒煨一钱或二钱】以利之肿势甚宜砭刺之按时行疫疾虽由热毒所染有气实人下之可愈气虚者概下之鲜不危矣故东垣制此方救斯人其惠博哉

一人年踰三十肩患毒服人参败毒散一剂更服十宣散去参桂加金银花天花粉四剂而溃因怒动肝火风热上壅头面赤肿焮痛饮冷以荆防败毒散加芩连薄荷二剂不应急砭患处出黑血璣许仍以一剂势退大半 服人参败毒散四剂而愈

夫病有表里上下之殊治有缓急攻补之异若不砭刺气血结爲肉理药不能及肿焮日盛使峻利之药则上热未除中寒已作必伤命矣

升麻牛旁子散 治时毒疮发头面胸膈脉浮洪在表者

升麻 牛旁 甘草 桔梗 葛根玄参 麻黄 连翘【各一钱】

剉作一服姜三片水二盞煎

一黄门腮赤肿痛此胃经风热上攻以犀角升麻汤三六二剂而平又一大理患此用前汤爲人所惑谓汤内白附子性温故也另用荆防败毒散愈盛後用此汤尚去白附子不应 用全方三剂而愈

本草云白附子味甘辛气温无毒主面上百病及一切风疮乃风热之主药经曰有是病用是药苟不用主病之药安得而愈

一人腮颊肿焮至于牙龈右关脉数此胃经风热上攻也治以犀角升麻汤三六而消

瘰癧百一

肿痛脉浮数者祛风清热

脉濇者补血爲主

脉弱者补气爲主

肿硬不溃者补血气爲主

鬱抑所致者解鬱结调气血

溃後不斂者属气血俱虚宜大补

虚劳所致者补之

因有核而不敛者腐而补之

脉实而不敛或不消者下之

瘰癧者结核是也或在耳後耳前或在耳不连及颐颌或在颈下连缺盆皆谓之瘰癧或在胸及胸之侧或在两脇皆谓之马刀手足少阳主之

瘰癧必起于少阳一经不守禁忌延及阳明大抵食物之厚鬱气之积曰毒曰风曰热皆此三端拓引变换须分虚实实者易治虚者可虑以其属胆经主决断有相火且气多血少妇人见此若月经不调寒热变生稍久转爲潮热危矣自非断欲神仙不治也救苦化坚汤?瘰癧马刀挟癭或耳下或耳後下颈至肩或入缺盆乃手足少阳经分其在颌下或颊车乃足阳明经分受心脾之邪而作宜将二症合而治之

升麻【一钱】葛根【半钱】真漏芦 三味俱足阳明本经药 连翘【一钱能散诸血结气聚疮之神药十二经疮药不可无】归身【三分】熟苳【二分】牡丹皮【三分去汤胃中留血滯血三味诸经中和血生血凉血药也】黄芪【一钱祛皮毛实腠理补表之元气反活血脉生血亦疮家圣药】白芍药【三分味酸气寒补中益肺气散而不收故用酸寒以收散气散痛必用夏月倍之冬寒下用酸寒故也又治腹中不和】肉桂【三分大辛热能散结积疮症属阳须少用之寒因热用也又寒覆其疮以大辛热消浮冻之气或燥烦者去之】麦芽【一钱治腹中缩急兼能消食补胃】柴胡【八分说同连翘】鼠粘子【无肿不用若无马刀挟癭不在少阳经矣去此二味】羌活【一钱】独活【半钱】防风【半钱三味乃手足大阳经药脊痛项强不可回顾股似 项似拔者用之或只用防风一味亦可疮在膈已上虽无手足太少经症亦当用之为能散结去上部风病身拘急者风也诸疮见此症亦用】麴末【炒炙二分为消化食】昆布【一分味大鹹酸能要坚疮坚硬者用之】黄连【去毛三分治烦闷】广茂【三分煨】三棱【二分煨坚者削之疮坚硬甚者用之不甚勿用】人参【三分补肺气如气短气喘气下调加之】厚朴【姜制一钱二分腹时见胀加之】益智仁【二分唾多者胃不和也或吐沫吐食胃土寒者加之】黄栢【炒三分有热或脚膝无力加之或烦燥欲去衣者肾中伏火者亦加之】甘草【炙五分或二分调中益胃泄火和诸药分两不定者疮宜泻营气而甘入脾胃生湿助疮邪故也】

右为细末汤浸蒸饼和作饼子日乾捣如米粒每服二钱或三钱白汤下量病人虚实无令药多妨其饮食此治之大法也

如在少阳经分爲马刀挟癭者去独活漏芦升麻葛根加瞿麦【三分】气不顺加橘皮甚者加木香【少许】人素气弱若病来气盛不短促者不可拘其平素只作盛气治之而从病变之权邪在上焦加黄芩【一半酒制一半生用】在中焦加黄连【一半酒制一半生用】在下焦加黄栢知母防己皆酒制选用之大通不通滋其邪盛急加酒大黄以利之

如血燥不行加桃仁酒大黄如风结燥不行加麻仁大黄风澁不行加煨皂角仁秦艽大黄如脉濡觉身气滞不行加郁李仁大黄以除气燥如陰寒秘结不行以局方半硫或加附子乾姜冰冷与之

大抵诸病素气弱者当去苦寒之药多加参蓂甘草之类泄火而补元气少佐寒凉可也

散肿溃坚汤 治马刀坚硬如石在耳下至缺盆或肩上或脇下皆手足少阳经分或颞或颊车坚硬如石在足阳明经分或二经疮已破流脓并皆治之柴胡【四钱】升麻【三钱】甘草【炙】归尾葛根白芍【各二钱】黄连【一钱】三棱【酒制微炒】连翘【各三钱】昆布【去土】知母【酒制】黄栢【酒制】土瓜根【切碎酒制】草龙胆【酒制炒四次】桔梗【各半两】黄芩【八钱酒制一半生用一半】广茂【酒制微炒】

右剉每服五钱或七钱水二盏八分浸大半日煎至一盏热服卧宜去枕头低脚高每嚥一口作十次咽留一口送下後项丸药服毕卧如常取药在膈上停畜故也若能食粪硬者旋加作七八钱止可秤半料作末炼蜜丸如菉豆大每服百丸或二百丸此制之缓也一方

海藻 昆布 二味洗净焙乾爲末何首乌木臼搗末皂角刺炒黄色 公蛇退一条树上墙上者是右五味爲末用猪项下刃口肉烧熟醺药末吃食从向患处一边侧卧一伏时每核上灸七壮?从口中出爲度脓尽即安

连翘散坚汤 治耳下或肩上及缺盆疮硬如石动之无根或生两脇或已脓流作疮未破此手足少阳经分也

柴胡【一两二钱】归尾【酒制】黄芩【生】广茂【酒炒】三棱【酒炒】连翘芍药【各半两】黄连【酒炒二次】苍术【各二钱】土瓜根【一两酒炒】草龙胆【一两酒制四次】黄芩【酒炒二次七钱】甘草【三钱炙】

右秤一半蜜丸一半剉煎如前法服

柴胡连翘汤 治男妇马刀疮

黄芩【炒】知母【酒制】连翘柴胡【各半两】中桂【三分】甘草【炙】黄栢【酒制】生夏【各三钱】归尾【钱半】瞿麦穗【六钱】鼠粘子【二钱】

剉如麻豆每服五钱或三钱水二盏煎一盏食後稍热时服之

柴胡通经汤 治小儿项侧有疮坚而不溃名曰马刀

柴胡 归尾 桔梗 甘草【生】 连翘三棱 鼠粘子

黄芩【各二分】红花【少许】黄连【五分】

剉作一服二大盏煎一盏食後稍热服忌苦药泄大便

项上瘰癧马刀将初生者用四棱铁环按定作口子以油纸捻紵之勿令合了以絕其疮之源其効至速如瘰不破或畏破以龙泉粉涂

龙泉粉【炒半润湿另研】瓦粉【各半两】昆布【去土三钱或五钱】广茂【酒制】三棱【酒制炒各半两】

右细末熟水调涂之用此去疾尤速一二日一易龙泉粉即磨刀水浓汁青石者佳

瘰癧马刀血少肚泄

四物汤加芍药【炒】牡蛎【细研】陈皮柴胡甘草黄连玄参神麴【炒】及桑椹膏桑椹膏取极熟黑色者二?以布滤取自然汁砂器内文武火慢熬成薄膏每日白汤点一匙

服

夏枯草本草言大治瘰癧散结气有补养厥陰血脉之功而经亦言观其能退寒热虚者可伏实者以行散之药佐之外以艾灸亦渐取効

一妇患瘰癧延至胸腋脓水淋漓日久五心烦热肢体疼痛头目昏重心忪颊赤口乾咽燥发热盗汗食少嗜卧月水不调脐腹作痛予谓血虚而然非广故也服逍遥散【三三】月余少可更服八珍汤【十四】加牡丹皮香附子又月余而经通 加黄芪白朮两月余而愈【此凭症也】

一妇久患瘰癧不消自汗恶寒此血气俱虚服十全大补汤【十三】月余而溃然坚核虽取疮口不斂灸以豆豉饼【一】仍与前药加香附乌药两月而愈【此凭症也】

一人劳倦耳下焮肿恶寒发热头疼作渴右脉大而软当服补中益气汤彼自用药发表遂致呕吐始信予用六君子汤【二】更服补中益气汤【十六】而愈【此凭症也】大抵内伤荣卫失守皮肤间无气滋养则不任风寒胃气下?则陰火上冲气喘发热头痛脉大此不足证也误作外感表实而反泻之寧免虚怯之祸东垣云内伤右脉大外感左脉大当以此别之

机按左脉大属外感此亦难凭必须察形观色审症参之以脉乃得不误丹溪治一老人饥寒作劳患头疼发热恶寒骨节疼无汗妄语脉洪数而左甚治以参芪归术陈皮甘草每贴加附一片五贴而愈又一少年九月间发热头痛妄语大渴形肥脉数大左甚以参术君茯苓臣耆佐附一片使盖人肥而脉左大于右事急矣非附则参芪无捷効五十贴大汗而愈此皆左脉

大丹溪悉以内伤治之若依东垣认作外感寧不杀人

一妇年二十耳下结核经每过期午後头痛服头痛药愈甚治以八珍汤【十四】加柴胡地骨皮二十余贴愈【此凭症也】

一妇癰潰後发热烦燥作渴脉大无力此血虚也以当归补血汤六剂顿退又以圣愈汤数剂少健加以八珍汤加贝母远志三十余剂而敛【此凭脉也】

一癰妇四肢倦怠类痿症以养气血健脾胃而愈【此凭症也】一人素弱潰後核将不腐此气血皆虚用托?养荣汤气血复核尚在以簪挺拨去又服前药月余而痊【此凭症也】

一人患 痰盛胸膈痞闷脾胃脉弦此脾土虚肝木乘之也当实脾土伐肝木爲主彼以治痰为先乃服苦寒化痰药不应又加破气药病愈甚始用六君子汤加芎归数剂饮食少思以补中益气汤倍加白术月余中气少健又以益气养荣汤四月肿消而血气亦复矣夫右关脉弦弦属木乃木盛而尅脾土爲贼邪也虚而用苦寒之剂是虚虚也况痰之爲病其因不一主治之法不同凡治痰利药过多则脾气愈虚虚则痰愈易生如中气不足必用参术之类爲主佐以痰药【此凭症与脉也】

一人久而不斂神思困倦脉虚予欲投以托?彼以爲迂乃服散肿溃坚汤半月余果发热饮食愈少复求治投益气养荣汤三月喜其谨守得以收救【此凭症脉也】齐氏曰结核癰癰初觉宜内消之如经久不除气血渐衰肌寒肉冷或脓汁清稀毒气不出疮口不合聚肿不赤结核无脓外症不明者并宜托?脓未成者使脓早成脓已溃者使新肉早生血气虚者托?补之陰阳不和托里调之大抵托里之法使疮无变坏之症所以宜用也

一人久而不斂脓出更清面黄羸瘦每侵晨作泻与二神丸数服泄止更以六君子加芎归月余肌体渐复灸以豆豉饼及用补剂作膏药贴之三月余而愈【此凭症也】

一妇潰後核不腐以益气养荣汤三十余剂更敷针头散腐之 与前汤三十余剂而斂【此凭症也】

一人患而肿硬久而不消亦不作脓服散坚毒药不应令灸肘尖看尖二穴更服益气养荣汤月余而消【此凭症也】

一人尚硬亦灸前穴饮前药脓成针之而斂

一妇久潰发热月经过期且少用逍遥散兼前汤两月余气血复而疮亦愈但一口不收敷针头散更灸前穴而痊

常治二三年不愈者连灸三次兼用托里药即愈【前二条俱凭症】

一人患此肿痛发寒热大便秘以射干连翘散六剂热退大半以仙方活命饮四剂而消【此凭症也】

一妇肝经积热患而作痛脉沉数以射干连翘汤四剂少愈更用散肿溃坚丸月余而消【此凭脉也】

一妇耳下肿痛发寒热与荆防败毒散四剂表症悉退以散肿溃坚汤数剂肿消大半 以神效瓜蒌散【五一】四剂而平【此凭症也】

一人肝经风热耳下肿痛发热脉浮数以薄荷丹治之而消【此凭脉也】

一人年二十耳下患癰焮痛左关脉数此肝经风热所致以荆防败毒散【七】三贴表症悉退 与散肿溃坚丸【四八】月余平复【此凭脉也】

一妇因怒耳下肿痛以荆防败毒散【七】加连翘黄芩四剂而愈【此无脉症而用发表必有所见也】

尝治此旬日不消者以益气血药及饮远志酒并効无脓自消有脓自溃

一妇因怒耳下焮痛头痛寒热以荆防败毒【七】加黄芩表证悉退但饮食少思日脯发热东垣云虽有虚热不可大攻热去则寒起遂以小柴胡加地骨皮芎归苓术陈皮十余贴而愈次年春复肿坚不溃用八珍汤【十四】加香附柴胡地骨皮桔梗服至六七贴以爲延缓仍服人参败毒散势愈盛又服流气饮则盗汗发热口乾食少至秋复求疹视气血虚极辞之果没【此凭症也】

一人每怒耳下肿或脇作痛以小柴胡汤加青皮红花桃仁四剂而愈【此凭症也】

一人肿硬不作脓脉弦而数以小柴胡汤兼神効瓜蒌散【五一】各数剂及隔蒜灸数次月余而消【此凭脉与症也】

一妇颈痛不消与神効瓜蒌散【五一】六剂少愈更以小柴胡加青皮枳殼贝母数剂痛肿减大半 以四物对小柴胡数剂而平【此凭症也】

罗宗伯耳後髮际患毒焮痛脉数以小柴胡【三】加桔梗牛蒡子金银花四剂而愈【此凭脉症也】

一人气血已复核尚不腐用针头散及必効散各三次不旬日而愈【此凭症处治】

一妇癰癰与养气顺血药不应服神効瓜蒌散二剂【五一】顿退又六剂而消却与托里药

气血平复而愈【此凭症也】

一妇年踰二十瘰癧已溃不愈与八珍汤【十四】加小柴胡地骨皮夏枯草香附贝母五十余剂形气渐转更与必効散【四七】二服疮口遂合惟气血未平 用前药三十余剂而平【此凭症也】

治瘰癧用必効散与瓜蒌散相间服神効

後有不问虚实概用必効散殊不知斑猫性猛大毒利水破血大损元气若气血实者用此却之而投补剂或可愈若虚而用此或用追蚀之药瘀肉虽去而疮口不合反至不救

一妇因怒结核肿痛察其气血俱实先以神効散下之更以益气养荣汤三十余剂而消【此凭症也】

常治此症虚者先用益气养荣汤待其气血完充乃取神効散去其毒仍进前药无不効者

一人耳下患五枚如贯珠年许尚硬面色痿黄饮食不甘劳而发热脉数软而濡以益气养荣汤六十余剂元气已复患处已消一核尚存以必効散二服而平【此凭症脉也】

一妇瘰癧不消脓清不斂用八珍汤【十四】少愈忽肩背痛不能回顾此膀胱经气鬱所致当服防风通气汤彼云瘰癧胆经病也是经火动而然自服凉肝降火之药反致不食痛甚予诊其脉胃气愈弱先以四君子【六一】加陈皮炒芍药半夏羌活蔓荆子四剂食进痛止继以防风通气散【四十】二剂而愈【此凭脉与症也】

一人神劳多怒颈肿一块久而不消诸药不应予以八珍汤【十四】加柴胡香附每日更隔蒜灸数壮及日饮远志酒二三盏渐消【此凭症也】

一妇月水不行渐热欬 肌体渐瘦胸膈不利颈肿一块日久不消令服逍遥散月余更服八珍汤【十四】加牡丹皮香附又月余加黄芪白斂两月余热退肿消经行而愈【此凭症也】

一人年踰三十每劳心过度颈肿发热服败毒散愈盛用补中益气汤数贴而消【此凭症也】

张通府耳後髮际患肿一块无头肉色不变按之微痛彼谓痰结脉软而时见数经曰脉数不时见疮也非痰也仲景云微弱之脉主血气俱虚形精不足又曰沉迟软弱皆宜托里遂用参芪归术川芎炙甘草以托里少加金银花白芷桔梗以消毒彼谓不然内饮降火消痰外贴凉药觉寒彻脑患处大热头愈重食愈少复请治以四君子加藿香炮乾姜数剂食渐进脓成刺之更以十全大补汤【十三】去桂灸以豆豉饼又月余而愈【此凭脉症也】

一人耳内出脓或痛或痒服聪耳益气汤不应服防风圣散愈甚予用补肾丸而愈

【机按前条瘰 治法虚者补之而补有先後温凉之殊实者泻之而泻有轻重表里之异或行消削或开鬱滯或合时从症或变法从权或针或砭或灸或敷其法亦粗备矣医者能仿是例而扩充之庶几亦可以应变矣】

一儿宿痰失道痈肿见于颈项或臂膊胸背是爲冷症宜四生散【七五】敷贴内服附子八物汤及隔蒜灸【此无脉可凭而治当时必有所见也】

一人因暴怒项下肿痛胸膈痞闷兼发热用方脉流气二剂胸膈利以荆防败毒散二剂而热退肝脉尚弦濇以小柴胡加芎归芍药四剂脉症顿退以散肿溃坚丸一料将平惟一核不消服遇神仙无比丸二两而瘰【此凭症凭脉也】

一儿甫周岁项患胎毒予俟有脓刺之脓出椀许乳食如常用托里药月余而愈又一儿患此待脓自出几至不救【此凭症也】

大抵疮浅宜砭深宜刺使瘀血去于毒聚之始则易消也况小儿气血又弱脓成不针不砭鲜不毙矣

一人项下患毒脓已成因畏针焮延至胸赤如霞其脉滑数饮食不进月余不寐甚倦予密针之脓出即睡觉而思食用托里散两月余而愈又一人患此及时针刺数日而愈一人素虚患此不针溃透颌颊血气愈虚而死【此凭症也】

一人耳後患毒脉症俱实宜用内疎黄连汤彼以严冬不服寒剂竟至不起

罗谦甫曰用寒远寒用热远热假者反之虽违其时以从其症又云凡治病必察其下谓察时下之宜而权治之故曰经者常也法者用也医者意也随其所宜而治之则万全矣

一妇因怒项肿後月水不通四肢浮肿小便如淋此血分症也先以椒仁丸数服经行肿消更以六君子汤加柴胡枳殼数剂颈肿亦消矣亦有先因小便不利後身发肿致经水不通名曰水分宜葶苈丸治之【良方】云妇人肿满若先因经水断絶後致四肢浮肿小便不通名曰血分水化爲血血不通则复化爲水矣宜服椒仁丸【此凭症也】

一癰妇?间如一核所哽咽吐不出倦怠发热先以四七汤而咽利更以逍遥散【此凭症也】

一妇所患同前兼胸膈不利肚腹膨胀饮食少思卧睡不安用分心气饮并効【此凭症也】

一女年十七项下时或作痛乍寒乍热如疟状肝脉弦长此血盛之症也先以小柴胡汤二剂少愈更以生地黄丸而痊【此凭脉症也】

一贵人女适夫夫早逝患十指挛拳掌垂莫举肤体疮疡粟然汤剂杂进饮食顿减几于半载诊之非风也乃忧愁悲哀以致耳病属内因宜用内因药仍以鹿角胶辈多用射香熬膏贴痿处挛能举指能伸病渐安【此因情而治也】

一女性急好怒耳下常肿痛发寒热肝脉弦急投小柴胡加青皮牛蒡子荆芥防风而寒热退更以小柴胡对四物数剂而肿消其父欲除病根予谓肝内主藏血外主荣筋若志怒气逆则伤肝肝主筋故筋蓄结而肿须要自加调摄庶可免患否则肝迭受伤不能藏血血虚则难差矣後不戒果结三核屡用追蚀不斂而歿【此因情而治】

一人先于耳前耳下患之将愈延及项侧缺盆三年遂延胸腋诊之肝脉弦数以龙会散坚二丸治之将愈肝脉尚数四年後小腹陰囊内股皆患毒年余不斂脉诊如前以清肝养血及前丸而愈【此凭脉也】

一人因怒耳下及缺盆患癰溃延腋下形气颇实疮口不合治以散肿溃坚丸【四八】而愈【此凭形症也】

一儿七岁项结二核时发寒热日久不愈治以连翘丸数服而消若患在面臂等处尤宜此丸若溃而不斂兼以托?之药【此凭症也】

一儿项结一核坚硬如癰面色痿黄饮食不甘服托?药不应此无辜疳毒也以蟾蜍丸治之而愈若数服不消按之转动软而不痛者内有?如粉急针出之若不速去则?随气走内蚀脏府不治【按此因治不应而变法也蟾蜍夏月沟渠中腹大不跳不鸣者先取粪蛆一杓置桶中以尿浸之桶近上令乾使蛆不得出将蟾蜍扑死投蛆中任蛆食昼夜次以新布袋包繫置水急处浸一宿取出瓦上焙为末入射香一字软饭丸如麻子大每服二三十丸空心米饮送下】

一人眼赤痒痛时或羞明下泪耳内作痒服诸药气血日虚饮食日减而痒愈盛此肝肾风热上攻也以四生散酒调四服而愈【此凭症也】

一妇久鬱患而不溃既溃不斂发热口乾月水短少饮食无味日晡尤倦益气养荣汤二十余剂少健予谓须服百剂庶保无危彼欲速効反服斑猫之剂及数用追蚀毒药去而复结以致不能收斂出水不止遂致不救【此凭症也】

一妇久不作脓脉浮而濡此气血俱虚欲补之使自溃彼欲内消专服斑猫及散坚之药气血愈虚而死【此凭症也】

一人因劳而患怠惰发热脉洪大按之无力宜用补中益气汤【十六】彼不信辄服攻伐之剂吐泄不止亦死【此凭脉因补误治致死】

大抵此症原属虚损若不审虚实而犯病禁经禁鲜有不误常治先以调经解鬱更以隔蒜灸之多自消如不消即以琥珀膏贴之俟有脓则针之否则变生他症设若兼痰兼陰虚等症只宜加兼症之剂不可干扰余经或气血已复而核不消却服散坚之剂至月许不应气血亦不觉损方进必効散或遇神仙无比丸其毒一下即止二药更服益气养荣汤数剂以调理疮口不斂豆?饼琥珀膏贴气血俱虚或不慎饮食起居七情者俱不治然此症以气血爲主气血壮实不用追蚀之剂彼亦能自腐但取去使易于收斂若气血虚不先用补剂而数用追蚀之药适足以败矣若发寒热眼内有赤脉贯瞳人者亦不治一脉者一年死二脉者二年死

一女年十九颈肿一块硬而色不变肌肉日削筋挛急痛此七情所伤气血所损之症当先滋养血气不信乃服风药後不起【此凭症也】

一人耳後漫肿【阙】

一少妇耳下患肿素勤苦发热口乾月水过期且少姬以爲经闭用水蛭之类通之以致愈虚而毙

一女年十七患瘰 久不愈月水尚未通发热欬 饮食少思老嫗欲用巴豆肉桂之类先通其经予谓此症潮热经候不调者不治但喜脉不濇且不潮热尚可治须养气血益津液其经自行彼欲効仍用巴桂此慄悍之剂大助阳火陰血得之则妄行脾胃得之则愈虚果通而不止饮食愈少更加潮热遂致不救

一人远途劳倦发热脉大无力耳下患肿此劳损也宜补中益气养荣汤【十六】自然热退肿消彼不听服降火药及必効散果吐泻不食而死

夫劳倦损气气衰则火旺火乘脾土故倦怠而热此元气伤也丹溪曰宜补形气调经脉其瘡自消不可汗下若不详脉症经络受病之异而辄用峻利之剂鲜不危矣

一妇因怒不思食发热倦怠骨肉酸疼体瘦面黄经渐不通颈间结核以逍遥散【三三】八珍汤【十四】治之少可彼自误服水蛭等药血气愈虚遂致不救【此凭症也】

一人耳後寸余发一毒名曰銳疽焮痛寒热烦燥喜冷此胆经蘊热而然先用神仙活命饮一剂势减二三时值仲冬彼惑于用寒远寒之禁自用十宣托?之药势渐炽耳内脓溃喉肿闭药不能下而歿

一放出宫女年踰三十两胯作痛不肿色不变大小道作痛如淋登厠尤痛此瘀血渍入隧道爲患乃男女失合之症也难治後潰不斂又患瘰癧而歿【此久鬱也】此妇爲人之妾夫爲商常在外可见此妇久怀忧鬱及放出又不能如愿是以致生此疾其流注瘰癧乃七情气血皆已损伤不可用攻伐之剂皎然矣流注百二

暴怒所致胸膈不利者调气爲主

抑鬱所致而不痛者宜调经脉补气血

肿硬作痛者行气和血

溃而不斂者益气血爲主

伤寒余邪未尽者和而解之

脾气虚湿热凝滯肉理而然健脾除湿爲主

闪肭瘀血凝滯爲患者和气血调经络

寒邪所袭筋挛骨痛或遍身痛宜温经络养气血大抵流注之症多因鬱结或暴怒或脾虚湿
气逆于肉理或腠理不密寒邪客于经络或闪扑或产後瘀血流注关节或伤寒余邪未尽爲
患皆因真气不足邪得乘之常治鬱者开之怒者平之闪扑及产後瘀血者散之脾虚及腠理
不密者除而补之伤寒余邪者调而解之大要以固元气爲主佐以见症之药如久而疮口寒
者更用豆豉饼或附子饼灸之有脓管或瘀肉者用针头散腐及铤子尤效若不补血气及不
慎饮食起居七情俱不治

一人因怒脇下作痛以小柴胡对四物加青皮桔梗枳殼而愈【因情处治】

一人臀肿一块微痛脉弦紧以疮科流气饮四剂而消【因情处治】

一人因怒脇下肿痛胸膈不利脉沉迟以方脉流气饮数剂少愈以小柴胡对二陈加青皮桔
梗贝母数剂頓退更以小柴胡二十余剂而痊【因七情处治】

一妇因闪肭肩患肿遍身作痛以黑丸子二服而痛止以方脉流气饮二剂而肿消更以二陈
对四物加香附枳殼桔梗而愈【凭症处治】

一妇腿患筋挛骨痛诸药不应脉迟紧用大防风汤一剂頓退又二剂而安 又一妇患之亦然
先用前汤二剂更服黑丸子而痊此二患若失治溃作败症【凭症凭脉处治】

一妇稟弱性躁脇臂肿痛胸膈痞满服流气败毒反发热少食用四七汤数剂胸寬气利以小
柴胡对四物加香附陈皮肿痛亦退【此因治不对病而变方】

一人腿患溃而不斂用人参养荣汤及附子饼灸更以补剂煎膏贴之两月余愈【凭症处治
】

一人脾气素弱臂肿一块不痛肉色不变饮食少思半载不溃先以六君子加芎归芍药二十余剂饮食渐进更以豆豉饼日灸数壮于前药 加黄蓍肉桂三十余剂脓熟针去以十全大补汤及附子饼灸之月余而斂【此凭症处治】

一人腿肿肉色不变不痛脉浮而滑以补中益气汤加半夏茯苓枳壳木香饮之以香附饼熨之彼谓气无补法乃服方脉流气饮愈虚始用六君子汤加芎归数剂饮食少进 用补剂月余而消【凭脉凭症处治】

夫气无补法世俗论也以其爲病痞满壅塞似难爲补殊不知正气虚不能运行则邪气滞而爲病不用补法气何由行乎

一人臂肿筋挛骨痛年余方溃不斂诊脉更虚以内塞散一料少愈以十全大补汤及附子饼灸而愈【凭症凭脉处治】

精要云留积经久极陰生陰寒反为热以此溃多成瘻宜早服内塞散排之

一人腿肿一块经年不消且不作脓饮食少思强食则胀或作泻日渐消瘦诊脉微细此乃命门火衰不能生土以致脾虚而然也遂以八味丸饮食渐进肿患亦消【凭症凭脉处治】

一人背髀患之微肿形劳气弱以益气养荣汤间服黑丸子及木香生地黄作饼覆患处熨之月余脓成针之仍服前药而愈【此凭所因而治】

一人腿患久而不斂饮大补药及附子饼及针头散絀之而愈【凭症处治】

一人臂患年余尚硬饮食少思朝寒暮热八珍汤加柴胡地骨牡丹皮月余寒热少止 用益气养荣汤附子饼灸两月余脓成针之更服人参养荣汤半载而愈【凭症而治】

一妇脓溃清稀脉弱恶寒久而不愈服内塞散灸附子饼而瘳【凭脉凭症而治】

一人臂患出腐骨三块尚不斂发热作渴脉浮大而濇乃气血俱损须多服生气血之剂庶可保全彼谓火尚未尽乃用凉药内服外敷几危求治其形甚悴脉愈虚先以六君子加芎归月余饮食渐进以八珍汤加肉桂三十余剂疮色乃赤更以十全大补汤外以附子饼仅年而差【凭症凭脉】

一老伤寒表邪未尽股内患肿发热以人参败毒散二剂热止灸香附饼又小柴胡加二陈羌活川芎归术枳壳数剂而消【凭症处治】

一妇腰间患一小块肉色如常不溃发热予欲治以益气养荣解鬱之剂彼却别服流气饮後针破出水年余而没

一妇久不斂忽发寒热予决其气血俱虚彼反服表散之剂果发大热亦死【凭症处治】

一人元气素弱将患此胸膈不利饮食少思予欲健脾解鬱养气血彼反服辛香流气之剂致腹胀又服三棱蓬朮厚朴之类饮食少四肢微肿兼腰肿一块不溃而没

一妇经不调两月或三月一至四肢肿饮食少日晡发热予曰此脾土气血虚也用养脾滋气血药饮食进则浮肿自消血气充则经水自调彼以爲缓用峻剂先通月经果腹疼泄不止遍身浮肿饮食少没于木旺之月

一人年踰三十小腹痛硬逾年成疮头破时出血水此七情所伤营气逆於肉理也名曰流注胗之肝脉瀦盖肝病脉不宜瀦小腹正属肝经须瀦属金脉退乃可予欲以甘温之药补其气血令自消溃彼不信乃服攻伐之药气血愈虚果没于金旺之月【此凭脉也丹溪曰诸经惟少阳厥阴二经痼疽宜预防之以其多气少血也少血则肌肉难长疮久不斂必成败症若不知此辄用峻利之药以攻伐其陰分之血祸不旋踵】

悬痈百三

焮肿或发热者清肝解毒【小柴胡制甘草】

肿痛者解毒爲主【制甘草】

不作脓或不溃者气血虚也【八珍汤】

肿痛小便赤滯者肝经湿热也宜分利清肝【龙胆泄肝汤】一人谷道前患毒焮痛寒热此肝经湿热所致名曰悬痈属陰虚先以制甘草【百二五】二服顿退以四物加车前青皮甘草节酒制黄栢知母数服而消【此凭症也】

一人年踰五十患悬痈脓清脉弱此不慎酒色湿热壅滯而然脓清脉弱老年值此何以收斂况谷道前为任脉发源之地肝经宗筋之所予辞果没治此痈惟润水制甘草有効已破者兼十全大补汤【十三】为要

一人患此焮痛发热寒以小柴胡汤加制甘草【百二五】二剂少退又制甘草四剂而消【按小柴胡清肝制甘草解毒】

大抵此症属陰虚故不足之人多患之寒凉之剂不可过用恐伤胃气惟制甘草一药不损气血不动脏腑其功甚捷

一人肿痛小便赤澁以加减龙胆泻肝汤加制甘草二剂少愈以参耆归朮黄栢知母制甘草四剂【百二五】而溃更以四物加黄栢知母参耆制甘草而痊【按此先泻後补当时以有

所?但不知其脉耳】

一人肿痛未作脓以加減龙胆泻肝汤二剂少愈 以四物加黄栢知母木通四剂消【按此先治湿热後养血】

一人脓熟不溃胀痛小便不利急针之尿脓皆利以小柴胡加黄栢白芷金银花四剂痛止以托?消毒散数剂而愈

常见患者多不肯针待其自破殊不知紧要之地有脓宜急针之使毒外发不致内溃故曰宜开户以逐之凡疮若不针烙毒气无从而解脓瘀无从而泄今之患者反谓紧要之处不宜用针何相违之远耶

一人脓清不斂内有一核以十全大补汤加青皮柴胡制甘草更以豆?饼灸核消而斂【此凭症也】

一人久而不斂脉大无力以十全大补加五味麦门灸以豆豉饼月余而愈【此凭症凭脉也】

一老年余而不斂诊脉尚有湿热以龙胆泻肝汤【六五】二剂湿退以托里药及豆?饼灸而愈【此凭症凭脉也】

一人肿痛发热以小柴胡加黄连青皮【五】四剂少愈更以龙胆泻肝汤【六五】而消【此凭症也】

一人脓熟不溃脉数无力此气血俱虚也宜滋陰益气血之药更针之使脓毒外泄彼反用败毒药致元气愈虚疮势愈盛後溃不斂竟致不救【按此不凭脉症而悞治也】

悬痈原系肝肾二经陰虚须一于补尤恐不治况脓成而又剋伐不死何待常治初起肿痛或小便赤澁先以制甘草一二剂及蒜灸更饮龙胆泻肝汤若发热肿痛者以小柴胡加车前黄栢芎归脓已成即针之已溃用八珍汤【十四】加制甘草柴胡稍酒炒黄栢知母小便澁而脉有力者仍用龙胆泻肝汤加制甘草小便澁而脉无力者用清心莲子饮加制甘草脓清不斂者用大补剂间以豆豉饼灸或久而不斂者亦用附子饼灸并効

囊痈百四

肿痛未作脓者?肝导湿

肿硬发热清肝降火

脓清不斂者大补血气

已溃者滋陰托里

脓成胀痛者急针之更饮消毒之剂

囊痈湿热下注也有作脓者此浊气顺下将流入渗道因陰道或亏水道不利而然脓尽自安不药可也惟在善于调摄耳又有因腹肿渐流入囊肿甚而囊自裂开睪丸悬挂水出以麩炭【杉木炭也】末传外以紫苏叶包裹仰卧养之

精要谓痈入囊者死将以爲属肾耶予治数人悉以湿热入肝经施治而以补陰佐之虽脓溃皮脱睪丸悬挂亦不死但未知下虚年老者如何耳

大抵此症属陰道亏湿热不利所致故滋陰降湿药不可缺常治此肿痛小便秘滯者用除湿为主滋陰佐之肿痛已退便利已和者除湿滋陰药相兼治之欲其成脓用托里为主滋陰佐之候脓成即针之仍用托里滋陰若湿毒已尽者专用托里如脓清或多或斂迟者用大补之剂或附子饼灸之

一人囊痈未作脓而肿痛以加减龙胆泻肝汤二剂少愈更以四物加木通知母黄柏而消【此凭症也】

一人脓熟作胀致小便不利急针以小柴胡加黄柏白芷金银花四剂少愈更托里消毒散数剂而消【此凭症也】

一弱人脓熟胀痛大小便秘急针之脓出三碗许即鼾睡觉神思少健但针迟须服解毒药亦溃尽矣故用托里药至三十余剂始差【此凭症也】

一人年踰四十陰囊肿痛以热手熨之少缓服五苓散不应尺脉迟软此下虚寒邪所袭而然名曰陰疝非疮毒也治以蟠葱散【九五】少可更服葫芦巴丸而平【此因脉迟为寒脉软为虚而治】

一人年踰三十陰囊湿痒茎出白物如脓举则急痛此肝疝也用龙胆泻肝汤【此因症处治】而愈陰茎或肿或缩或挺或痒皆宜此药治之

一人年踰五十患此疮口不斂诊之微有湿热治以龙胆泻肝汤湿热悉退乃以托里药及豆饼灸而愈次年复患湿热颇盛仍用前汤四剂而退又以滋陰药而消若溃後虚而不补少壮者成漏老弱者不治脓清作渴脉大者亦不治【此凭脉也】

一人年踰五十陰囊肿痛得热愈盛服蟠葱散不应肝脉数此囊痈也乃肝经湿热所致脓已

成急针之进龙胆泄肝汤【六五】脉症悉退更服托里滋陰药外敷杉木炭紫苏末月余而愈【此因脉处治】

一人年踰六十陰囊潰痛不可忍睪丸露出服龙胆泄肝汤敷麩炭紫苏末不应予意此湿气炽盛先饮槐花酒一椀次服前汤少愈更服托里加滋陰药而平设以前药不应加之峻剂未有不损中气以致败也【此因处治不効而知为湿盛】

一少年玉jing挺长肿而痿皮塌常润磨股难行两脇气冲上手足倦弱先以小柴胡加黄连大剂行其湿热少加黄栢降其逆气肿渐收茎中有坚块未消以青皮爲君少佐散风之药末服之外以丝瓜子汁调五倍子敷愈【此凭症也】

一人囊肿状如水晶时痛时痒出水小腹按之作水声小便频数脉迟缓此醉後饮水入房汗出遇风寒湿毒乘聚于囊名水疝也先以导水丸二服腹水已去小便如常以胃苓散倍白术茯苓更用气针引去聚水而差【此凭症脉也】

一弱人茎根结核如大豆许劳则肿痛先以十全大补汤去桂加车前麦门酒制黄栢知母少愈更加制甘草四剂仍以四物车前之类而消又有患此焮痛发热服龙胆泄肝汤二剂制甘草四剂而溃用滋陰之剂而愈或脓未成以葱炒热敷上冷易之隔蒜灸赤可数日不消或不溃或溃而不斂以十全大补加柴胡稍爲主间服制甘草并愈若不保守必成漏矣【已上二条此凭症也】

一弱人扠中作痛小便淋沥此因火躁下焦无血气不能降而渗泄之令不行用四物加黄栢知母茯苓牛膝木通十余剂痛止便利【此凭症也】

一人气短扠中若疮小便不通用四物加参耆煎吞滋肾丸而愈【此凭症也】

前症以虚爲本以病爲末益其本则末自去设若不固元气专攻其病寧无害耶

一人遗精劳苦愈盛扠中结核服清心莲子饮连翹消毒散不应予以八珍汤【十四】加山药山茱萸远志十余剂渐愈更服茯兔丸遂不复作又有患此诸药不应服八味丸而愈【此因处治不应故推求另为之治】

一人尿血陰茎作痛服清心莲子饮不应服八正散愈盛予以发灰醋汤调服少愈更服班龙丸【百】而平【此因处治不应以推求也】

一人患而久不斂以十全大补加五味麦门灸以豆饼月余而平【此凭症也】

一弱人肿痛未成脓小便赤澀以制甘草青皮木通黄栢当归麦门四剂少愈以清心莲子饮四剂而消【此凭症也】

一人焮肿痛甚小便澁发热脉数以龙胆泻肝汤倍车前木通泽泻茯苓势去半仍以前汤加黄栢金银花四剂又减二三便利如常惟一处不消此欲成脓 用前汤加金银花皂角针白芷六剂微肿痛脉滑数乃脓已成针之肿痛悉退投滋陰托里药及紫苏末敷之而愈

一人病势已甚脉洪大可畏用前汤二剂肿少退以仙方活命饮二剂痛少止脉洪数脓已成须针之否则陰囊皆溃彼不信更他医果大溃辜丸挂复求治脉将静以八珍汤加黄芪黄栢知母山枝更敷紫苏末数日而痊

一人患此肿痛发热以小柴胡加黄连青皮四剂少愈更以龙胆泻肝汤而消【凡肿属湿痛属热故痛者宜清湿热】

一儿生三月病热左右脇下节次生疔用四物汤败毒散倍人参香附爲佐犀角爲使大料饮乳母两月而愈踰三月腹胀生丹 又半月移胀入囊为肿黄莹裂开两丸显露水出以紫苏叶盛麩炭末托之旬余而合此因父病症遗热于胎也【此凭症也】

一人玉jing肿痛服五苓散等药不应其脉左关弦数此肝经积热而成以小柴胡【五】送芦荟丸一服势去三四 服顿愈【此凭脉凭症也】

一人连日饮酒陰挺并囊湿痒服滋陰等药不应予谓前陰肝脉络也陰气从挺而出素有湿继以酒爲湿热合于下焦而然经曰下焦如渎又云在下者引而竭之遂以龙胆泻肝汤及清震汤而愈此或不应宜补肝汤及四生散治之【此凭症也】

一妇隱内脓水淋漓或痒或痛状如?行少陰脉活数此陰中有疮也名曰?由心神烦鬱胃气虚弱气血凝滯所致与升麻白芷黄连木通当归川芎白术茯苓柴胡煎服以搗肿汤熏洗更搽蒲黄水银两月余而愈 此条因脉而知疮其曰胃气虚者当时必有见也 或有包络虚风邪乘陰血气相搏令气痞澁致陰肿痛治以菖蒲散【九八】更以枳实炒热帛包熨之冷则炒

或有子藏虚冷气下冲致陰脱出谓之下脱或因产努力而脱者宜当归散久不愈者补中益气汤倍加升麻柴胡举之

下疳百五

肿痛或发热者肝经湿热也清肝除湿

肿痛发寒热者邪气伤表也发散之

肿痛小便赤澁者肝经湿热壅滯也?肝导湿

一人患此肿硬焮痛寒热先以人参败毒散二剂而止更以小柴胡加黄连青皮而愈【此因症因经也】

一人溃而肿痛小便赤澀以加减龙胆泻肝汤加青皮黄连二剂少愈以小柴胡加黄栢知母当归茯苓数剂而愈【此因症因经也】

一人茎肿不消 一人溃而肿痛发热小便秘澀日晡或热 一小儿肿痛诸药不应各以小柴胡吞芦荟丸数剂并愈

一人陰茎或肿或作痛或挺纵不收 一人茎中作痛筋急缩或作痒白物如精随溺而下此筋疝也并用龙胆泻肝汤皆愈【此因症也】

张子和曰遗精癰闭陰痿瘰癧精滑白淫皆男子之疝不可妄归之肾冷 若月涸不月月罢腰膝上热足热噤乾癰闭少腹有块或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不谓之疝而谓之瘕

一人溃而肿痛发热日晡尤甚以小柴胡加黄栢知母当归而愈【此因症也】

一人已愈惟茎中一块不散以小柴胡加青皮荆防治之更以荆防牛膝何首乌活石甘草各五钱煎汤熏洗各数剂而消【此因症也】

一人年踰四十素有淋患疳疮焮痛倦怠用小柴胡【五】加连栢青皮当归而愈【此因症而治】

一人因劳茎窍作痒时出白物发热口乾以清心莲子饮而安【此因劳处治】

一人玉jing肿痛小便如淋自汗甚苦时或尿血少许尺脉洪滑按之则澹先用清心莲子饮加牛膝山枝黄栢知母数剂少愈更以滋肾丸一剂而痊【此因症也】前贤云如自汗小便少不可以药利之既已自汗则津液外亡小便自少若利之则荣卫涸竭无以制火烦热愈甚当俟热退汗止小便自行也兼此乃阳明经大忌利小便也

一老患疳疮小便淋沥脉细体倦此气虚兼湿热也用清心莲子饮及补中益气汤【十六】而愈下疳疮丹溪用青黛蛤粉密陀僧黄连爲末敷 又以鷄肫皮烧存性爲末敷

下疳疮并廉疮

蛤粉 蜡茶 苦参 密陀僧

爲末河水洗净腊猪油调敷

又方

米泔水洗疮净用头发塩水洗去油净 用清汤洗晒乾烧灰敷疮即生靨

又方 治下注疳疮蚀臭腐烂疼痛难忍兼治小儿疳疮

黄栢【蜜炙】黄丹

轻粉【钱半】乳香【三分】蜜陀僧高末茶【各三分】射香【少许】

右末用葱汤洗疮次贴此药

洗药

黄连 黄栢 当归 白芷 独活 防风 荆芥

朴硝等分水煎入钱五十文乌梅五个塩一匙同煎温洗日五七次敷下项药敷药

木香 枳榔 黄连 铜青 轻粉 枯? 海螵硝 射香等分爲末洗後至夜敷上

外科理例卷三

<子部,医家类,外科理例>

卷四

钦定四库全书

外科理例卷四

明 汪机 撰

便毒一百六

内蕴热毒寒邪者解散之

劳役而患者补之

不遂交感或强固精气致败而结者解散之

湿热而致者清肝导湿

一人患此未作脓小便秘澁以八正散三剂少愈以小柴胡加泽泻山枝木通二剂而消【此凭症也】

一老妇肿痛脓未作小便滞肝脉数以加减龙胆泻肝汤加山枝黄栢四剂而消【此因症也】

一人肿痛发寒热以荆防败毒散二剂而止以双解散二剂而消【此因寒热认作外邪处治】

一人脓未成大痛服消毒托里内?药不应脉洪大毒尚在以仙方活命饮一剂痛止又剂而消【此因治不应而处也】

一人肿痛日晡发热以小柴胡加青皮天花粉四剂痛止热退以神效瓜蒌散四剂而消【此因症也】

一人焮肿作痛大小便秘脉有力以玉蠅散二剂顿退更以龙胆泻肝汤四剂而消【此因症因脉而治】

一人溃而痛不止诸药不应诊之脉大按之则数乃毒未解也以仙方活命饮而止又二剂而消【此因症因脉而治】

一人潰而痛不止以小柴胡加黃栢知母芍歸四劑少止更以托里當歸湯數劑而斂【此因症也】

一人服剋伐藥以求內消致瀉利少食以二神丸先止其瀉以十全大補倍加白朮茯苓數劑而消【此因症也】大抵此症多患于勞役之人亦有內蘊熱毒而生者須辨虛實及膿成否不可妄投藥餌常見治此概用大黃之類下之以求內消或膿成令膿從大便出鮮有見其痊者人多欲內消者恐收之難也若補養氣血不旬日而收矣若膿既成豈有可消之理 用剋伐之劑反爲難治

一人不慎房勞患此腫痛以雙解散二服其病即止更以補中湯數劑而膿成針之以八珍湯加五味麥門柴胡三十余劑【此因症也】

大抵便毒者血疔也俗呼爲便毒言于不便處患之故也乃足厥陰肝經絡及沖任督脈亦屬肝之旁絡也是氣血流通之道路今壅而腫痛此則熱毒所致宜先導其滯更用托里之劑此臨症制宜也

一人年踰四十患便毒剋伐太過飲食少思大便不實遺精脈微東垣云精滑不禁大便自利腰腳沉重下虛也仲景曰微弱之脈主氣血俱虛先以六君子【二】加破故紙肉豆蔻煎服瀉止食進更以十全大補湯【十三】加行經藥十余劑而消【此因脈症也】

一人患便毒膿稀脈弱以十全大補湯加五味麥門白朮三十劑稍愈更以參耆歸朮膏而平因新婚復發聚腫堅硬四肢冷脈弱皮寒飲食少思此虛極也仍用前藥加桂附三劑稍可彼欲速愈自用連翹消毒散瀉利不止而沒【此因症脈也】

一人年踰四十素勞苦患便毒發寒熱先以小柴胡加青皮一服表症悉退次以補中益氣湯加川山甲二劑腫去三四更以托里之藥五六服膿成刺去旬日而斂【此因症也】

夫便毒足厥陰濕氣因勞倦而發用射干三寸同生姜煎食前服得利一二行効射干紫花者是紅花者非

又方

破故紙 牛旁子【微炒】 牽牛【炒】 大黃【酒拌煨】等分末之每服一兩酒調下

又方 已成膿者

大黃 連翹【各五錢】 枳實【三錢】 厚朴 甘草節【各二錢】 桃仁【二十一粒】

姜三片分三貼煎服

消毒饮便毒初发三四日可消

皂角刺 金银花 防风 当归 大黄

甘草节 瓜蒌仁

等分水酒各半煎食前温服仍频提掣顶中发立効又方

白僵蚕 槐花

爲末酒调服一方加酒大黄

又方

木笔子 大黄 瓜蒌 桃仁 草龙胆?咀浓煎露一宿清晨温服立愈

又方

山梔 大黄 乳香 没药 当归【各半钱】 瓜蒌仁【二钱】 代赭石【一钱】

右作一服煎

一人肿而不溃以参耆归术白芷皂角针柴胡甘草节数剂而溃以八珍汤加柴胡数剂愈【此因症也】

一人溃而肿不消且不斂诊之脉浮而濡以豆豉灸更以十全大补汤月余而愈【此因症也】

乳痛一百七【附乳岩 无乳并男子乳痛】

暴怒或儿口气所吹痛肿者?肝行气

肿焮痛甚者清肝消毒

焮痛发寒热者发散表邪

未成脓者?肝行气

不作脓或不溃托里爲主

溃而不斂或脓清者大补气血

一妇稟实性躁怀抱久鬱左乳内结一核不消按之微痛以连翘饮子二十余剂少退更以八珍汤加青皮桔梗香附贝母二十余剂而消【此因症因情也】

一妇发热作渴至夜尤甚两乳忽肿服败毒药热反炽诊之肝脉洪数乃热入血室以加味小柴胡治之热止肿消【此因症因脉也】

一妇两乳内时常作痛口内常辣卧起若急脐下牵痛以小柴胡加青皮黄连山梔而愈【此因症也】

一妇鬱久左乳内结核如杏许三月不消心脉澹脾脉大按之无力以八珍汤加贝母远志香附柴胡青皮桔梗五十余剂而溃又三十余剂而愈【此因情因脉也】

一妇久鬱右乳内结三核年余不消朝寒暮热饮食不甘此乳岩也乃七情所伤肝经血气枯槁之症宜补气血解鬱结遂以益气养荣汤百余剂血气渐复更以木香饼灸之嘉其谨疾而消【此因症因情也】

一妇脓成不溃胀痛予欲针之令毒不侵展不从又数日痛极始针涌出败脓三四碗虚症蜂起几殆用大补药两月余始安【此因症也】

夫乳者有囊橐有脓不针则遍患诸囊矣少壮者得以收敛老弱者多致不救

一妇肿而不作脓以益气养荣汤加香附青皮数剂脓成针之旬日而愈【此因症也】

一妇右乳肿发热怠惰嗜卧无气以动致夜热尤甚以补中益气汤兼逍遥散而痊【此因症也】

一产妇因乳少服药通之致乳房肿胀发热作渴状若伤寒以玉露散补之而愈

夫乳汁乃气血行化在上爲乳在下爲经若冲任脉盛脾胃气壮则乳汁多而浓血衰则少而淡所乳之子亦弱而多病此自然之理也亦有屡产有乳 产乳无或大便澁滯乃亡津液也【三因论】云产妇乳脉不行有二有气血盛闭而不行者有血气弱澁而不行者虚当补之盛当?之盛者当用通草漏芦土瓜根辈虚者当用炼成锤乳粉猪蹄鲫鱼之类概可见矣亦有乳出不止者多属于虚不约束也

一妇乳痈愈後发热服养气血药不应八珍汤加炮姜四剂而愈仍以前汤加黄耆香附三十余剂而安【此因症也】

一妇患此脓成畏针病势渐盛乃强针之脓出三椀许脉数发渴以大补药三十余剂而愈【此因症也】

一妇乳痈脓成针刺之及时不月而愈

一妇产次子而无乳服下乳药但作胀予谓乳皆血气所化今胀而无乳是气血竭而津液亡也当补气血自有乳矣与八珍汤倍加参朮少加肉桂二十余剂乳遂生後因劳役乳复竭【此因症也】

盖初产有乳再产而无其气血只给一产耳其衰可知闻有产後乳出不止亦为气虚宜补药止之其或断乳儿不吮亦能作胀用麦芽炒为末白汤调服以散之若儿吮破乳头成疮用蒲公英末或黄连胡粉散掺之若乳头裂破以丁香末或蛤粉麝脂末敷之并効

一妇因怒两乳肿兼头痛寒热以人参败毒散二剂表症已退以小柴胡加芎归桔梗枳殼四剂而痊【此因症也】

一妇鬱久右乳内肿硬以八珍汤加远志贝母柴胡青皮及隔蒜灸兼服神効瓜蒌散两月余而消【此因情因症也】

一妇左乳内肿如桃许不痛色不变发热渐消瘦以八珍汤加香附远志青皮柴胡百余剂又间服神効瓜蒌散三十余剂脓溃而愈【此因症也】

患者或责効太速或不戒七情俱难治大抵四十已後者尤难治盖因陰血日虚也况医用药不分经络虚实未有能保痊也

一妇乳内肿一块如鷄子大劳则作痛久而不消服托里药不应此乳劳症也肝经血少所致先与神効瓜蒌散四剂更隔蒜灸肿少退服八珍汤倍加香附夏枯草蒲公英仍间服前散月余而消【此因症因治而处也】

又有乳疽一症肿硬木闷虽破而不溃肿亦不消尤当急服此散及隔蒜灸此二症乃七情所伤气血所损亦劳症也宜戒怒节饮食慎起居否则不治

一妇年逾二十稟弱乳内作痛头疼脉浮与人参败毒散倍加参一剂表症悉退但饮食少思日晡微热更以小柴胡合六君子二剂热退食进方以托里药加柴胡十余剂针出脓而愈【此因稟受因症因脉也】

一妇亦患此予谓须多服养气血解郁结药可保无害不信乃服剋伐之剂反大如椀日出清脓不斂而歿【此悞治也】

一妇郁久乳内结核年余不散日晡微热饮食少思治以益气养荣汤嫌缓乃服行气之剂势愈甚溃而日出清脓不止复求治诊之脉洪而数辞不治又年余果歿

一人年踰五十患子不立致左乳肿痛左脇胀痛肝脉弦数而濇先以龙荟丸二服诸症顿退又以小柴胡对四物加青皮贝母远志数剂脓成予欲针之仍用养气血解鬱结不从乃杂用流气败毒之剂致便秘发热作渴复求治予谓脓成不溃阳气虚不能鼓舞也【此因情因脉也】

一妾放出宫人年四十左乳内结一核坚硬按之微痛脉弱懒言此鬱结症也名曰乳岩须服解鬱结益气血药百贴可保彼不爲然服十宣散流气饮疮反盛逾二年复请予视其形如覆碗肿硬如石脓出如泔予曰脓清脉大寒热发渴治之无功果歿【此因情因脉因症而处治】

一妇因怒左乳内肿痛发热表散太过致热益甚以益气养荣汤数剂热止脓成焮痛针之不从遂肿胀大热发渴始针脓大泄仍以前汤百余贴始愈【此因悞治也】

一妇因怒左乳作痛胸膈不利以方脉流气饮加木香青皮四剂而安【此因情也】

一男子左乳肿硬痛甚以仙方活命饮二剂更以十宣散加青皮香附四剂脓成针之而愈若脓成未破疮头有薄皮剥起者用代针之剂点皮起处以膏药覆之脓亦自出不若及时针之不致大溃如出不利更絀搜脓化毒之药若脓血未尽辄用生肌之药反助邪气纵早合必发不可不慎

一人因怒左乳肿痛肝脉弦数以复元通气散二服少愈以小柴胡加青皮芎归而消【此因情因脉也】

一妇年踰三十每怒後乳内作痛或肿此肝火也与小柴胡合四物汤加青皮桔梗枳殼香附而愈彼欲絶去病根自服流气饮遂致朝寒暮热益加肿痛此气血被损而然予与八珍汤三十余剂赖其年壮元气易复得愈

一治妇人两乳间出黑头疮疮顶下作黑眼子脉弦洪按之细小并乳痈初起亦治宜内托升麻汤升麻 葛根 连翘【各半钱】 黄耆 归身 甘草【炙各一钱】 肉桂【三分】 黄柏【二分】 鼠粘子【半钱】

剉作一服水二分酒一分同煎食後服 此足阳明厥药【此因症也】

一後生作劳风寒夜发热左乳痛有核如掌脉细濇而数此陰滯于阳也询之已得酒遂以瓜蒌子石膏乾葛川芎白芷蜂房生姜同研入酒饮之四贴而安【此因症因脉处治】

一ru头厥陰所经乳房阳明所属厥陰者肝也乃女子致命之地宗筋之所且各有囊橐其始焮肿虽盛受患止于一二橐若脓成不刺攻溃诸囊矣壮者犹可弱者多致不救所以必针而後愈用蒲公英忍冬藤入少酒煎服即欲睡是其功也及觉而病安矣未溃以青皮瓜蒌桃仁连翘川芎橘叶皂角刺甘草节随症加減煎服已溃以参耆芎归白芍青皮连翘瓜蒌甘草节煎服

一妇乳痈气血颇实但疮口不合百法不应与神効瓜蒌散四剂少可更与数剂及豆豉饼灸而愈【此因人因治而处也】

又有患此未溃亦与此散三剂而消良甫云如有乳劳便服此药可杜絶病根如毒已成能化脓爲水毒未成者从大小便中散矣

一妇乳痈寒热头痛与荆防败毒散一剂更与蒲公英一握入酒二三盏 搗取酒热服查热罨患处而消此因头痛发热乃表症也故用表散蒲公英俗呼苧苧丁夏秋间开黄花似菊散热毒消肿核散滯气解金石毒圣药

乳硬多因乳母不知调养所致或忿怒所逆鬱闷所遏厚味所酿以致厥陰之气不行故窍闭而汁不通阳明之血沸腾故热甚而化脓或因乳子膈有滯痰含乳而睡口气焮热所吹而成结核初便忍痛揉软吮令汁透可散否则结成矣治以青皮疎厥陰之滯石膏清阳明之热生甘草节行污浊之血瓜蒌子导毒消肿或加没药清橘叶皂角刺金银花当归或汤或散佐以少酒若加艾火两三壮于痛处尤妙粗工使用针刀必惹崛病【机按前条用针以已成脓言此条禁针以未成脓言未成脓而针则伤良肉反增疮势已成脓不针则脓蚀良肉延溃无休其意各有在也】

一妇形脉稍实性躁难于後姑乳生隐核以单味青皮汤间以加減四物汤加行经络之剂两月而安【此因情也】腹痛一百八

一人年踰三十腹患痈肿脉数喜冷齐氏曰疮疡肿起坚硬者实也河间曰肿硬瞋闷烦躁饮冷邪在内也用清凉饮【二六】倍大黄三剂稍缓次以四物汤加芩连山梔木通四剂而溃更以十宣散【四】去参耆桂加金银花天花粉彼欲速効自服温补药肚腹遂肿小便不利仍用清凉饮脓溃数椀 以托里药治之而愈【此因症因脉处治】

一人腹痛焮痛烦躁作呕脉实河间曰疮疡火属须分内外以治其本又云呕哕心烦肿硬瞋闷或皮肉不变脉沉而实毒在内也当疎其内以絶其源用内疎黄连汤利二三行诸症悉去更以连翘消毒散而愈【此据脉症而治】

一人腹痛脓熟开迟脉微细脓出後疮口微脓如蟹吐沫此内溃透膜也疮疡透膜十无一生虽用大补亦不能救此可为待脓自出之戒也【此据症也】

一恭人腹内一块不时作痛痛则不知人事良久方苏诸药不应其脉沉细非疮也河间云失笑散【百七】治疝气及妇人血气痛欲死并効与一服痛去六七服而平此药治产後心腹绞痛及儿枕痛尤妙【按此凭脉处治】

一儿十岁腹胀痛服消导药不应彼以爲毒其脉右关沉伏此食积也河间云食入则吐胃脘痛也更兼身体痛难移腹胀善噫舌本强食後其气繭然衰皆脾病也审之因食粽得此以白酒麴热酒服而愈【按此凭脉凭症而治也】

一人素嗜酒色小腹患毒脉弱微痛欲求内消予谓当助胃壮气兼行经活血佐之可消彼欲速効自用败毒等药势果盛疮不溃脓饮食少思两月余复请诊脉愈弱盗汗不止聚肿不溃肌寒肉冷自汗色脱此气血俱虚故不能发肿成脓以十全大补汤三十余剂脓成针之反加烦躁脉大此亡阳也以圣愈汤二剂仍以前汤百剂而愈【此凭脉症处治】

疔疮一百九

脉浮数者散之

脉沉实者下之

表里俱实者解表攻里

麻木大痛或不痛者并灸之更兼攻毒

疔疮以其疮形如丁盖之状也多因肥甘过度不慎房酒以致邪毒蓄结遂生疔疮经曰膏粱之变足生大丁是也亦有人汗滴入食肉而生亦有悞食死牛马而生不可不慎初生头凹肿痛青黄赤黑无复定色便令烦躁闷乱或增寒头痛或呕吐心逆者是也急于艾炷灸之若不觉痛针疮四边皆令血出以回疮錠子从疮孔紵之贴以膏药仍服五香连翘汤漏芦汤等踈下之爲効若针之不痛无血者以猛火烧铁针通赤于疮上烙之令如焦炭取痛爲効亦紵前錠子贴以膏药经一二日脓溃根出服托里汤散依常疗之如针不痛其人眼黑或见火光者不可治此毒已入脏腑也

一人足患作痒恶寒呕吐时发昏乱脉浮数明灸二十余壮始痛以夺命丹一服肿起更以荆防败毒散而愈

一人左手臂患之是日一臂麻木次日半体皆然神思昏溃遂明灸二十余壮始不痛至百壮始痛以夺命丹一服始肿起更用神异膏及荆防败毒散而愈【此凭症也】

一妇忽恶寒作呕肩臂麻木手心瘙痒遂瞽闷不自知其故但手有一泡此疔毒也急灸患处五十余壮而苏又五十余壮知痛投荆防败毒散而愈【此因恶寒故用发表】

一人脚面生疔形虽如粟其毒甚大宜峻利之药攻之因其怯弱以隔蒜灸五十余壮痒止灸片时知痛更贴膏药以人参败毒散一服渐愈至陰之下道远位僻药力难达若用峻剂则药力未到胃气先伤不如灸之爲宜【此据形症而治】

一人感痘毒面生疔十余枚肿痛脉数服荆防败毒散稍愈尚可畏更用夺命丹一服而愈【此凭脉症而治】

一妇六十右耳下天容穴间一疔其头黑靨四边泡起黄水时流浑身麻木发热谵语时时昏沉六脉浮洪用乌金散汗之就用铍针刺疮心不痛周遭刺十余下紫黑血出方知疼痛即将寸金錠子紵入疮内外用提疔錠子放疮上膏日贴护次日汗後精神微爽却用破棺丹下之病即定其疔溃动後用守効散贴涂红玉錠子紵之八日疔出兹所谓审脉症汗下之间外治次第如此殊胜不察脉症但见发热谵语便投下药或兼香窜之药遂致悞人远矣

世人多云是疮不是疮且服五香连翘汤然或中或否致悞者多盖不审形气虚实疮毒浅深发表攻里所因不同故也此既善于驱逐又以五般香窜佐之与漏芦汤相间大黄爲佐大黄入阳明太阳性走不守泄诸实热以其峻捷故号将军虽各有参耆漏芦甘草之补药寧免驱逐之祸乎

一人胸患遍身麻木脉数而实急针出恶血更明灸数壮始痛服防风通圣散得利而愈【此凭脉症而治】

一夫人面生疔肿焮痛甚数日不溃脉症俱实治以荆防败毒散加芩连稍愈彼以爲缓乃服托里散一剂势盛痛极始误用凉膈散【二六】二剂痛减肿溃又与连翘消毒散【二六】十余剂而愈【此凭脉症也】

一人唇生疔疮已五日肿硬脉数烦躁喜冷此胃经积热所致先以凉膈散【二六】一服热去五六更与夺命丹二粒肿退二三再以荆防败毒散四剂而愈

【按此先攻里因其脉症而施後发表不言脉症当时必有所见】

一人患之发热烦躁脉实以清凉饮下之而愈【此凭脉症而治】一郑氏举家生疔多在四肢皆食死牛肉所致刺去恶血更服紫金丹【百廿】悉愈

一人唇下生疔脉症俱实法宜下之反用托里故口鼻流脓而死是谓实实之祸也

一老妇足大指患疔甚痛令灸之彼不从专服败毒药致真气虚而邪气愈实竟不救

盖败毒药须能表散疮毒然而感有表里所发有轻重体段有上下所禀有虚实岂可一概而用之耶且至陰之下药力难到专假药力则缓不及事不若灸之爲速故下部患疮皆宜隔蒜

灸之不痛者宜明灸之及针疔四畔去恶血以夺命丹一粒入疮头孔内仍以膏药贴之若患在手足红丝攻心腹者就於丝尽处刺去恶血宜服荆防败毒散若丝近心腹者宜挑破疮头去恶水亦以膏药贴之如麻木者服夺命丹如牙关紧急或喉内患者并宜噙一二丸

疔疮丹溪用磁石爲末苦酒和封之根即出

又方

巴豆十粒半夏一大颗附子半个蜣螂一枚各爲末用麝相和看疮大小以纸绳子围疮口以药泥上用帛贴傳时换新药以差爲度活人甚多

痔漏一百十【附便血脱肛】

大便秘澁或作痛者滋躁除湿

下坠肿痛或作痒者祛风胜湿

肛门下坠或作痛泻火导湿

肿痛小便秘澁者清肝导湿

一人患痔大便躁结焮痛作渴脉数按之则实以秦艽苍术汤一剂少愈更以四物加芩连槐花枳殼四剂而愈

一人素不慎酒色患痔焮痛肛门坠痛兼下血大便乾躁脉洪按之则瀼以当归郁李仁汤加桃仁四剂少愈更以四物加红花桃仁条芩槐花数剂而愈大抵醉饱入房则经脉横解则精气脱泄脉络一虚酒食之毒乘虚流注或淫极强固精气遂传大肠以致木乘火势而毁金或食厚味过多必成斯疾夫受病者燥湿也爲病者湿热也宜以泻火和血润躁疎风之剂治之若破而不愈即成漏矣有串臀者有串陰者有串阳者有秽从疮口出者形虽不同治法颇似其肠头肿成块者湿热也作痛者风也大便燥结者火也溃而爲脓者热盛血也当各推其所因而治之

一人患痔成漏登侧则痛以秦艽防风汤加条芩枳殼四剂而愈以四物加升麻芩连荆防不复作

一人患痔漏登侧则肛门下脱作痛良久方收以秦艽防风汤数剂少愈乃去大黄加黄芩川芎芍药而痛止更以补中益气汤二十余剂後再不脱

一妇患痔漏焮痛甚以四物加芩连红花桃仁牡丹皮四剂少止又数剂而愈

一人便血春间尤甚兼腹痛以和血除湿汤而愈一人素有湿热便血治以槐花散而愈

一人粪後下血诸药久而不愈甚危诊之乃湿热用黄连丸二服顿止数服而痊

一妇素患痔漏而安因热则下血数滴以四物加黄连治之而愈後因大劳疮肿痛经水不止脉洪大按之无力此劳伤血气火动而然也用八珍加黄芩连蒲二剂而止後去蒲黄芩连加地骨皮数剂而安

丹溪曰妇人崩中者由脏腑伤损冲任二脉血气俱虚故也二脉为经脉之海血气之行外循经络内营脏腑若气血调适经下依时若劳动过极脏腑俱伤冲任之气虚不能约制其经血故忽然而下谓之崩中暴下治宜大补气血之药举养脾胃微加镇坠心火之药治其心补陰浮阳经自止矣

一人因饮法酒肛门肿痛便秘脉实用黄连内疎汤而愈

一人便血过劳益甚饮食无味以六君子加黄耆地黄地榆而愈

一人粪後下血久不愈中气不足以补中益气汤数剂更以黄连丸数服血止又服前汤月余不再作

一人脏毒下血服凉血败毒药不惟血不止且饮食少思肢体愈倦脉数按之则濡先以补中益气汤数剂少止更以六君子加升麻炮姜四剂而止乃去炮姜加芎归月余脾胃亦愈常治积热或风热下血者先以败毒散散之胃寒者气弱者用四君子或参苓白术散补之并効

一人脏毒下血脾气素弱用六君子加芎归枳殼地榆槐花而愈後因谋事血复下诸药不应予意思虑伤脾所致投归脾汤四剂而痊

大抵此症所致之由不一尚?其因而治之丹溪云芎归汤调血之上品热加茯苓槐花冷加茯苓木香此自根自本而论也盖精气生于谷气惟大肠下血以胃气收功或四君子或参苓白术散或枳殼散小乌沉汤以和之胃气一回血自循经络矣

肠风者邪气外入随感随见脏毒者蕴积毒久而始见人惟坐卧风湿醉饱房劳生冷停寒酒麪积热以致荣血失道渗入大肠此肠风脏毒之所作也挟热下血清而色鲜腹中有痛挟冷下血浊而色黯腹内略痛清则为肠风浊则脏毒有先便而後血者其来也远有先血而後便者其来也近世俗粪前粪後之说非也治法先当解散肠胃之邪热则败毒散冷则不换金正气散加芎归後随其症冷热治之

河间云起居不节用力过度则络脉伤阳络伤则血外溢而衄血陰络伤则血内溢而便血肠胃之络伤则血溢肠外有寒汁沫与血相转则并合凝聚不得散而成积矣经云肠癖下脓血

脉弦絶者死滑大者生血溢身热者死身凉者生诸方皆谓风热侵于大肠而然若饮食有节起居有时肠胃不虚邪气何从而入

一人痔漏每登厕脱肛良久方上脉细而微用补中益气汤【十六】三十余剂遂不再作

丹溪曰脱肛属气热气虚血虚血热气虚者补气参耆芎归升麻血虚者四物汤【九】血热者凉血四物汤加黄栢肺与大肠为表里故肺脏蕴热则肛闭结肺脏虚寒则肛脱出有妇人产育用力及小儿久痢亦致此症治宜温肺腑肠胃久自然收矣

人痔漏口乾胃脉弱此中气不足津液短少不能上润而然治以黄耆六一汤【三十】七味白术散【廿一】或曰诸痛疮?背属心火宜服苦寒以泄火因致大便不禁而歿

夫诸痛疮疡皆属心火言其常也始热终寒则反常矣可泥此而不察乎

一妇粪後下血面色痿黄耳鸣嗜卧饮食不甘服凉血药愈甚右关脉浮而弱以加味四君子汤加升麻柴胡数剂脾气已腥兼黄连丸数剂而愈

大凡下血服凉血药不应必因中气虚不能摄血非补中益阳之药不能愈切忌寒凉之剂亦有伤湿热之食成肠癖而下脓血者宜苦寒之剂以内疎之脉弦絶濇者难治滑大柔和者易治

一人年五十每至秋脉沉濇而粪後下红饮食少进倦怠无力面色痿黄夫病每至秋而作者盖天令至此肃气乃行阳气下降人身之阳气衰不能升举故陰血亦顺天时而下?矣盖脾具坤静之德而有乾健之运故能使心肺之阳降肝肾之陰升自然天地和而万物育则无已上之症矣其原盖因饱食筋脉横解则脾气倦甚不能运化精微故食积下流于大肠之间而陰血亦下?矣或欲用凉血清热之剂子曰不惟胃气重伤兼又愈助下降之令理宜用升阳益胃之剂则陰血自循经隧矣数十剂後不复作

一人痔疮肿痛便血尤甚脉洪且濇经曰因而饱食筋脉横解肠澼爲痔盖风气通肝肝生风风生热风客则淫气伤精而成斯疾与黄耆黄连当归生地防风枳殼白芷柴胡槐花地榆甘草斩愈次以黄连丸【丸三】而瘥又有便血数年百药不应而色痿黄眼花头晕亦用黄连丸而愈

一人患痔脉浮鼓午後发热作痛以八珍汤加黄耆柴胡地骨皮稍可彼欲速効以刼药蚀之痛甚絶食而歿

夫疮之贵斂气血使然也脉浮鼓日晡痛此气血虚也安曹五方爲高宗取痔得効官封至察使

人痔者贫富男女皆有之富者酒色财气贫者担轻负重饥露早行皆心肝二血喜则伤心怒则伤肝喜怒无常风血侵于大肠到谷道无出路结积成块出血生乳各有形相妇人因经後伤冷月事伤风余血在心经血流于大肠小儿痢後或母腹中受热也治方于後

水登膏 治痔护肉

麝金 白芨【各一两】一方加黄连

右二味爲细末如内痔候登厕翻出在外用温汤洗净侧卧于床用温水调令得中篋涂谷道四边好肉上以纸盖药留痔在外良久方用粘药搽痔上时时笔蘸温水润之不令药乾亦勿使四散

好白矾【四两】生信石【二钱五分】朱砂【一钱生研极细】

右各研细末先用砒入磁泥罐次用白矾末盖之煨令烟断其砒尽随烟去止借砒气于矾中耳用矾爲极细末看痔大小取矾末在掌中更以朱砂小许以唾调稀篋挑涂痔上周遍一日三五上候痔颜色焦黑爲効至夜有黄水出尽爲妙至中夜上药一遍来日依然上药三次有小痛不妨换药时以碗盛新水或温汤在痔边用笔轻洗去痔上旧药再上新药仍用护肉膏次用荆芥汤浇之三两日後黄水出将尽却于药中增朱砂减白矾则药力缓矣三两日方可增减渐渐取之庶不惊人全在用药人看痔头转色增减厚薄敷之此药只借砒气又有朱砂解之有将此二方在京治人多効二富丹溪曰疮口不合补以大剂参耆归术灸以附子饼贴以补膏药是也

一人年踰四十有痔漏大便不实服五苓散愈加泄泻饮食少思予谓非湿毒乃肠胃虚也宜理中汤彼不爲然仍服五苓散愈盛复请治以理中汤及二神丸月余而愈【此因治而知中虚】

一人因痔疮怯弱以补中益气汤【十六】少加芩连枳殼稍愈後因怒加甚时仲冬脉得洪大予谓脉不应时乃肾水不足火来乘之药不能治果歿火旺之月常见患痔者肾脉不足俱难治

一人有痔肛門脱出此湿热下注真气不能外举其脉果虚以四君子加芎归黄耆苍术黄栢升麻柴胡治之更以五味子煎汤熏洗彼以爲缓乃用砒霜等毒药蚀之而歿夫劫药特治其末耳能伐真元鲜不害人戒之

一人因痔气血愈虚饮食不甘小便不禁夜或遗精此气虚兼湿热非疮也用补中益气汤【十六】加山药山茱萸五味子兼还少丹【九四】治之而愈

一人痔漏脓出大便诸药不应其脉颇实令用猪腰一个切开用黑牛末五分线札用荷叶包

煨熟空心细嚼温温盐酒送下数服顿退更服托里药而愈鬢疽百十一

焮痛或发热者祛风清热

焮痛发寒热或拘急者发散表邪

作脓焮痛者托里消毒

脓已成作痛者针之

不斂或脓清者宜峻补

不作脓或脓成不溃者并用托里

一人患此焮痛作肿发热以小柴胡汤加连翘金银花桔梗四剂而消【此因症也】

一人因怒後鬢际肿痛发热以小柴胡汤加连翘金银花天花粉四剂根畔俱消惟疮头作痛以仙方活命饮二剂痛止脓熟针之更以托里消毒药而愈【此因情也】

一老肿痛发热脓清作渴脉软而濡此气血俱虚也欲补之彼见作渴发热乃服降火之剂果作呕少食复求治投六君子汤四剂呕止食进仍用补药月余而愈【此因症与脉也】夫患者脏腑气血上下虚实【详见溃?作痛第十三条】况陰症似阳阳症似陰【治论见外科心法】岂可以发热作渴而遂用寒凉之剂常治患者正气虚邪气实以托里爲主消毒佐之正气实邪气虚以攻毒爲主托里佐之正气虚邪气实而专用攻毒则先损胃气宜先服仙方活命饮托里消毒散或用灸法俟邪气退正气复更酌量治之

大抵正气夺则虚邪气盛则实盖邪正不并立一胜则一负其虚不待损而自虚矣若发背脑疽疔毒及患在四肢必用灸法拔引鬱毒以行瘀滯尤不可专于攻毒诊其脉而辨之庶不有悞

一官肩患毒发热恶寒大渴烦躁症似有余脉虽大而无力量却属不足用当归补血汤治之【此凭脉也】

一人脓熟不溃胀痛针之而止更以托里消毒散而愈凡脓熟不溃血气虚也若不托里必致难差

一人作脓焮痛发呕少食以仙方活命饮一剂而止以六君子加当归桔梗皂角刺溃而愈【此凭症也】

一人脓清不斂以托里散加五味麦门而愈【此凭症也】一人嗜酒与煎?年五十余夏初左丝竹空穴忽努出一角长短大小如鸡距而稍坚予曰此少阳所过气多血少未易治也须断肉味先解其食毒针灸以开泄其壅滞彼不听以大黄朴消脑子等冷药盒之一夕豁开如酱蚶径三寸二日後蚶中溅血高数寸而死因冷外逼气鬱不得发宜其发之暴也如此【此凭症也】

一人肿痛寒热拘急脉浮数以荆防败毒散二剂表症悉退更以托里消毒散溃之而安【此因症也】

一人焮肿痛甚发寒热服十宣散愈焮诊之脉数而实此表里俱有邪也以荆防败毒散加芩连大黄二剂少愈更以荆防败毒散四剂而消

俞黄门年踰三十冬患鬢毒肿焮烦躁便秘脉实此胆经风热壅上也马氏曰疮疡热实不利者大黄汤下之一剂便通疮退更以荆防败毒散【七】二剂十宣散去桂加天花粉金银花数剂而愈【此凭症脉也】

一人头面焮肿作痛时仲冬脉弦紧以托里温经汤汗之而消

赵宜人年踰七十鬢疽已溃焮肿痛甚喜冷脉实便秘东垣云烦躁饮冷身热脉大精神昏闷者脏腑实也以清凉饮【二六】肿痛悉退更以托里药三十余剂而平【此凭脉症也】

机按前疽虽出少阳血少之分然症与脉皆属于实故年壮者用泻剂之重老年者用泻剂之轻若拘以年老或守其经禁而投补剂实实之祸难免矣脇疽一百十二

一人年踰五十腋下患毒疮口不合右关脉数而渴此胃火也用竹叶黄耆汤【二九】而止再用补气药而愈尝治午後发渴或发热用地骨皮散効

一人性急味厚常服躁热之药左脇一点痛轻胗弦重乳知其痛处有脓与四物加桔梗香附生姜煎十余贴痛处微肿如指大针之少时屈身脓出与四物调理而安【此因症因脉而处治】

一夫人左脇内作痛牵引胸前此肝气不和尚未成疮用小柴胡【五】加青皮枳殼四剂少可加芎归治之而愈

一人连年病症後生子三月病热右脇下阳明少阳之分生一疔甫平左脇下相对又一疔脓血淋漓几死医以四物汤败毒散数倍人参以香附爲佐犀角爲使大料饮乳母两月而愈踰三月忽腹胀生赤如霞片取剪刀草汁调原蚕沙傅随消又半月移胀入囊爲肿黄莹裂开两丸显露水出以紫苏叶盛麩炭末托之旬余而合此胎毒症也

一妇因忿鬱腋下结一核二十余年因怒加肿痛完谷不化饮食少思此肠胃虚也以六君子【六】加砂仁肉桂乾姜肉豆寇泄虽止而脓清疮口不合用十全大补汤【十三】月余而愈【此凭症也】

机按前项二条脇疮一因其性多躁急故用四物汤陰柔之剂以安静之一因其肝气不平故用小柴胡疎理之剂以和解之此又因其性情爲治不恃专于攻毒也

张通北人年踰四十夏月腋下患毒潰後不斂脓出清稀皮寒脉弱肠鸣切痛大便溏泄食下即呕此寒变而内也宜大辛温之剂遂以托里温中汤【一】二贴诸症悉退更以六君子【二】加炮乾姜肉桂数剂再以十全大补汤而愈【此凭症也】

一人脇肿一块日久不溃按之微痛脉微而澹此形症俱虚也经曰形气不足病气不足当补不当泻宜用人参养荣汤彼不信乃服流气饮虚症悉至方服前汤月余少愈但肿尚硬以艾叶炒热熨患处至十余日脓成以火针刺之更灸豆饼【四一】又服十全大补汤【十三】百贴而愈【此凭脉症也】

盖流气饮通行十二经诸经皆爲所损况胆经之血本少又从而损之寧不伤生东垣曰凡一经受病止当求责其一经不可干扰余经苟泛投剋伐之剂则诸经被戕寧无危乎

一人年三十素饥寒患右肋肿如覆瓢转侧作水声脉数经曰陰虚阳气凑袭寒化爲热热甚则肉腐爲脓即此症也及按其肿处即起是脓成遂浓煎黄耆六一汤令先饮二鍾然後针之脓出数碗虚症并至遂用大补三月余而愈【此凭脉症也】

大抵脓血大泄血气俱虚当峻补之虽有他病皆宜缓十全大补汤【十二】加远志贝母白斂续断灸以附子饼脓渐少调护岁余而愈【此凭症也】

一少妇胸膈间溃一窍脓血与口中所欬相应而出以参耆当归加退热排脓等药而愈一说此因肺痿所致

一人胸肿一块半载不消令灸百壮方溃服大补药不斂灸附子饼而愈【此凭症也】

一百户胸患毒肿高焮赤发热脉数大小便澁饮食如常齐氏曰肿起色赤寒热疼痛皮肤壮热头目昏重气血实也又曰大小便澁饮食如故肠满膨胀胸膈痞闷肢节疼痛身热脉大精神昏塞脏腑实也进黄连内疎汤【三】二剂诸症悉退更以荆防败毒散加黄芩山梔四剂少愈再以四物加芩连白芷桔梗甘草金银花数剂而消【此凭脉症也】

机按此项治法虽因脉症皆实而用泄法然泻法又有前後次序先攻里後发表最後又用和解前贤治病不肯孟浪如此学者可不以此爲法哉

脑疽一百十二

肿痛未作脓者宜除湿消毒 黄连消毒饮之类大痛或不痛或麻木者毒甚也
隔蒜灸之更用解毒药

肿痛便秘者邪在内也泄之

不甚痛或不作脓者虚也托里爲主

脓成胀痛者针之更以托里

不作脓或不溃者托?药爲主

脓溃或不斂或多者大补气血

大凡元气一复诸病自退老弱之人不问肿溃尤当补也

一人因劳发热脇下肿痛脉虽大按之无力此气血虚腠理不密邪气袭于肉理而然也当补之以接虚怯之气以补中益气汤加羌活四剂少可去羌活又百余剂而愈【此凭脉也】

一人面白神劳脇下生一红肿如桃教用补剂不信乃用流气饮十宣散血气俱惫而死

一人年踰二十腋下患毒十余日肿硬不溃脉弱时呕予谓肿硬不溃阳气虚呕吐少食胃气弱宜六君子汤加砂仁藿香彼谓肿疡时呕毒气攻心溃疡时呕陰虚宜补予曰此丹溪大概言也若肿赤痛甚烦躁脉实而呕爲有余当作毒气攻心而下之以疮属心火故也肿硬不溃脉弱时呕爲不足当补之亦有痛伤胃气或感寒邪秽气而呕者虽肿疡尤当助胃壮气盖肿疡毒气内侵作呕十有一二溃疡湿气内伤作呕十有八九彼不信饮攻伐药愈甚复请脉微弱而发热予谓热而脉静及脱血脉实汗後脉躁皆难治果歿【此凭脉症也】

胸疮一百十四

一夫人性刚多怒胸前作痛肉色不变脉数恶寒经曰洪数脉应发热反恶寒疮疽也今脉洪数则脓已成但体丰厚故色不变似乎无脓以痛极始肯针入数寸脓数碗以清肝消毒药治之而愈设泥其色而不用针无可救之理【此凭症脉也】

一人年踰四十胸患疮成漏日出脓碗许喜饮食如常用烦躁饮冷脉实而痛宜泻火

一人素不慎起居饮食焮赤肿痛尺脉洪数以黄连消毒散一剂湿热顿除惟肿硬作痛以仙方活命饮二剂肿痛悉退但疮头不消投十宣去桂加金银花藁本白术茯苓陈皮以托里排

脓彼欲全消自制黄连解毒散二服反肿硬不作脓始悟仍用十宣散加白术茯苓陈皮半夏肿少退仍去桂又四剂而脓成肿势亦退继以八珍汤加黄耆五味子麦门月余脓溃而愈【此凭脉症也】

夫苦寒之药难治阳症尤当分表里虚实次第时宜岂可始末悉用之然焮肿赤痛尺脉数按之则濡乃膀胱经湿热壅盛也故用黄连消毒散以解毒除湿顾肿硬作痛乃气血凝滞不行而作也遂用仙方活命饮以散结消毒破血也其疮头不消盖因热毒薰蒸气血凝滞而然也宜用甘温之剂补益阳气托里以腐溃之况此症原属肾脉经因虚火盛而出若不审其因专用苦寒之药胃气以伤何以腐化收斂几何不致于败耶凡疮易消散易腐溃易收斂皆气血壮盛故也

一人耳後漫肿作痛肉色不变脉微数以小柴胡汤加芎归桔梗四剂肿少起更以托里消毒散数剂脉活数此脓已成宜针彼畏不从因痛极始针出脓碗许以托里药两月余始安【此凭脉症也】

一人脑疽肿痛脉数以黄连消毒散二剂少退与仙方活命饮二剂而止再以当归川芎芍药金银花黄栢知母而溃又以托里药而愈【此凭脉症也】

一人头项俱痛虽大溃肿痛益甚兼作泻烦躁不睡饮食少思其势可畏诊其脉毒尚在与仙方活命饮二剂肿痛退半与二神丸及六君子汤加五味麦门酸枣仁四剂诸症少退食颇进睡少得及与参苓白术散数服饮食颇进又与十全大补汤加金银花白芷桔梗月余差

一老患此色赤肿痛脉数有力与黄连消毒散二剂少退更与清心莲子饮四剂而消【此凭脉症也】

一人肿硬不作脓惟疮头出水疼甚以仙方活命饮二剂痛止而脓成针之更以托里药而愈

一妇脑左肿痛左鼻出脓年余不愈时或掉眩如坐舟车许叔微曰肝虚风邪袭之然也以川芎一两当归三钱羌活旋覆花细辛防风蔓荆子石膏藁本荆芥穗半夏麴乾地黄甘草各半两每服一两姜水煎服一料而愈

机按此条认作肝虚风邪袭之而治以去风清热养血祛痰之剂因其掉眩痛偏于左也经曰诸风掉眩皆属肝木又病偏左乃肝胆所主又曰风从上受之又曰无痰不成眩晕又曰肝藏血又曰风乃阳邪故方以风热痰血而主治者理也

一人脑疽已十余日面目肿闭头焮如斗脉洪数烦燥饮冷此膀胱湿热所致用黄连消毒饮【百十九】二剂次饮槐花酒二碗顿退以指按下肿则复起此脓已成于颈额肩颊各刺一孔脓并涌出口目始开更以托里药加金银花连翘三十余贴而愈【此凭脉症也】

一儿头患白疮皮光且急诸药不应名曰脑疽疮乃胎毒挟风热而成服龙胆丸【百十三】及吹芦会末鼻内兼搽解毒散而愈若重者发结如穗脑热如火遍身出汗腮肿胸高尤宜此药

机按龙胆丸芦会末皆凉肝胆杀?之剂盖肝胆主风又风木自甚则生?故治疽多此药也

一人素饮酒九月患脑之下项之上出小疮後数日脑项麻木肿势外焮痈医处五香连翘且云不可速疗俟脓出用药或砭刺三月可平四月如故予曰凡疮见脓九死一生果如医言则束手待毙矣且膏粱之变不当投五香当先火攻然後用药以大艾炷如两核许者灸至百壮乃痛次爲处方足太阳膀胱经其病逆当反治脉得弦紧按之洪大而数有力必当伏其所主而先其所因其始则同其终则异以时言之可收不可汗经与病禁下法当结者散之鹹以栗之然寒受邪而又禁鹹遂以诸苦寒爲君甘寒爲佐酒热爲因用大辛以解结爲臣三辛三甘益元气而和血脉淡渗以导酒湿扶持秋令益气泻火以入本经药通经爲引用故以羌活独活防风藁本连翘以解结黄连芩栝知母酒制以泻火生甘草泄胃火补下焦元气参耆橘皮以补胃但参耆甘草配诸苦寒药三之一多则滋营气补土湿邪也苏木归尾去恶血生地黄补血酒防已除膀胱留热泽泻助秋去酒湿热凡此诸药必得桔梗爲舟楫乃不下沉服之投床大鼾日出乃寤以手扪疮肿减七八至疮痂斂都十四日而已

机按脉之紧弦主疮痛按之洪数主内热大阳寒水而受阳热故曰其病逆寒水之经而用寒凉之药故曰反治此因脉因经因其所嗜而制此方也

一人患脑疽势剧脉实用黄连消毒散不应以金银藤二两水二鍾煎一鍾入酒半碗服之势去三四再服渐退又加黄栝知母瓜蒌当归甘草节数剂而溃止加黄耆川芎白芷桔梗数剂而愈【机按此条凭脉而治也】

一人脑疽其头数多痛不可忍服消毒药不应更以金银花服之即鼾睡觉而势去六七再四剂而消

一人所患尤甚亦令服之肿痛顿退但不能平加黄耆当归瓜蒌仁白芷桔梗甘草节数剂而愈

前条因治不应而变法後条因疽而处治

一人脓将成微痛兼渴尺脉大而无此陰虛火动之症彼谓心经热毒自服清凉降火药愈炽复求治乃以四物汤加黄栝知母五味麦门黄耆及加减八味丸渴止疮溃更以托里药兼前丸而愈【此凭脉也】

一妇脓成不溃胀痛欲呕饮食少思急针之与托里药而愈【此凭症也】

一妇脑疽不甚痛作脓以托里消毒脓成针之补以托里药亦愈【此凭症也】

一老人脓清兼作渴脉软而濡予以爲气血俱虚用八珍汤加黄耆五味彼不信乃服降火之剂果反作呕少食始信服香砂六君子汤四剂呕止食进仍投前汤月余而愈【此脉凭症也】

一人未溃兼作渴尺脉大而无力量以四物汤加黄柏知母黄耆麦门四剂而渴减又与加减八味丸渴止疮溃更用托里药兼前丸而愈【此凭症也】

一夫人年踰八十脑疽已溃发背继生头如粟许脉大无力此膀胱经湿热所致脉无力血气衰进托里药消毒数服稍可更加参耆虽起而渴此血气虚甚以参耆各一两归地各五钱麦门五味各一钱数服渴止不溃加肉桂十余剂脓成针之瘀肉渐腐徐徐取去而脓清不斂投十全大补汤【十二】加白斂贝母远志三十余剂脓稠而愈设不峻补不去腐肉以渴爲火投以凉药寧免死哉 疮疽之症虽属心火当分表里虚实果元气充实内有实火寒剂或可责效若寒凉过度使胃寒脾弱阳症变陰或结而不溃或溃而不斂陰阳乖戾水火交争死无日矣【机按此凭形凭脉凭症而治之也】

一人肿痛脉数以荆防败毒散二剂而痛止更以托里消毒药而消【此凭脉也】

一人焮肿疼痛发热饮冷脉洪数与凉膈散二剂而止以金银花四剂而溃更以托里药而愈【此凭症脉也】

一老妇稟实溃而痛不止脉实便秘以清凉二剂而止便以托里消毒药而愈【此凭脉也】

一妇年踰七十冬至後脑出疽如瓠面大?医胗视候熟以针出脓因怒答婢疽辄凹?一韭叶许面色青黄不泽四肢逆冷汗出身清时呕吐脉极沉细而迟盖缘衰老之年严寒之时病中苦楚饮食淡薄肥脓之气色涿瘦悴之形独存加之暴怒精神愈损故有此寒变也病与时同速制五香汤一剂加丁香附子冬五钱剂尽疽复大发随症调理而愈

经曰治病必察其下谓察时下之宜诸痛疮?皆属心火言其常也如疮盛形羸邪高痛下始热终寒此反常也固当察时下之宜而权治之不可执一机按此条年老冬寒理宜温补兹用五香汤加丁附以辛散何也盖因其怒气鬱结阻碍阳气不得营运致疽凹?且脉极沉细而迟其爲气鬱可知矣故用五香以开结丁附以助阳则鬱散阳复疽乃大发此亦因其性因其脉而爲治也

一人脑疽作渴脉虽洪按之无力予?咀加减八味丸与之彼不信自用滋陰等药七恶并至而殁精要曰患疽虽云有热皆因虚而得之愈後作渴或先渴後疽非加减八味丸不能治

一妇年将七十形实性急好酒脑疽才五日脉紧急又濡急用大黄酒煨细切酒拌炒爲末又

酒拌人参炒入姜煎调一钱服过两时再与得卧而上半身汗睡觉病已失此亦内托之意

机按此治因性急因好酒兼因其脉而制此方脉紧急且濇由其性急嗜酒以伤其血而然故用大黄以泄酒热人参以养气血也

一人便血数年舌下筋紫午後唇下赤胃肺脉洪予谓大肠脉散舌下大肠有热故舌下筋紫而又便血胃脉环承浆唇下即承浆午後因火旺故承浆发赤盖胃爲本肺爲标乃标本有热也用防风通圣散【四十】爲九治之而愈後每睡觉惊跳而起不自知其故如是者年余脑发一毒焮痛左尺脉数此膀胱经热而然服黄连消毒散数剂少愈次服金银花瓜蒌甘草节当归月余而平

机按便血之後睡觉惊跳者由失血陰虚心失所养而然陰虚阳必亢头爲诸阳之首故亢阳上从于阳疽发于脑此条治法因经因脉而制方也

杜清碧病脑疽疗之不愈丹溪往视之曰何不服防风通圣散【四十】曰已服数剂丹溪曰合以酒制之清碧乃自悟以爲不及【此因症也】

一举人年踰四十患脑疽肿焮其脉沉静此阳症陰脉断不起果歿

外科理例卷四

<子部,医家类,外科理例>

卷五

钦定四库全书

外科理例卷五

明 汪机 撰

臂疽一百十五

一人年将六十五月患右臂膊肿盛上至肩下至手指色变皮肤凉六脉沉细而微此脉症俱寒乃附骨痈也开发已迟以燔针启之脓清稀解次日肘下再开之加呃逆不絶与丁香柿蒂散两服稍缓次日吃逆尤甚自利脐腹冷痛腹满食减时发昏愤灸左乳下黑尽处二七壮又处托?温中汤一两半与服或曰诸痛疮?皆属心火又时当盛暑而用姜附可乎予曰经云脉细皮寒溷利前後饮食不入是为五虚况呃逆胃中虚寒此症内外相反须当舍时从症遂投之诸症悉去饮食倍进疮势温脓色正复用五香汤数服月余而愈

机按此症多属虚寒此方专用辛热以治之其寒不用参术以补其虚盖因呃逆腹满乃气鬱壅也想必其人年虽老脉症虽虚而形体颇实非陰虚呃逆比

一挥使臂肿一块不痛不赤脉弱?食时呕以六君子【二】加藿香酒炒芍药呕止食进再以八珍汤【十四】二十余剂脓成刺之又以十全大补而愈次年伤寒後臂复肿微痛乃伤寒余毒也然无表症但虚弱耳先用十宣散四剂取参蓍芎归扶助元气防风桔梗白芷厚朴行散肿结肉桂引经破血肿退三四再用八珍汤脓溃而愈至冬臂复作痛因服祛风药反筋挛痛甚此血虚不能养筋筋虚不能束骨用加味十全大补汤【十二】百贴而愈

一女臂患肿溃久不斂寒热交作五心烦热饮食少思月水不通以逍遥散月余少可更服八珍汤【十四】加牡丹皮香附又月余经通再加黄蓍白斂两月余而愈【此凭症也】

一人臂肿患毒作痛服寒凉药食少大便不实予用理中丸二服更以六君子加砂仁藿香再以托?脓溃而愈【此因治不应而变方也】

凡疮痛甚者若稟厚有火宜苦寒药若稟薄者宜补中益气汤加芩连之类在下加黄栢人肥加荆防独羌之类取其风能胜湿也

妇左臂胆经部分结肿一块年许不溃坚硬不痛肉色不变脉弱少食月水过期日晡发热遇劳或怒则痛此不足症也与参蓍归术芎地芍药贝母远志香附桔梗牡丹皮甘草百余贴而消【此因症脉也】

大抵妇人之病多起於郁郁则气血受伤百病生矣

一人臂患漏口乾发热喜脓不清稀脉来迟缓灸以豆?饼服八珍汤【十四】加麦门五味软柴胡地骨皮三月余而愈後因房劳复溃脓清脉大辞不治果歿河间曰因病致虚为轻盖病势尚浅元气未虚也若病初愈或饮食劳倦房劳加至羸损此因虚致损则为重病势已过元气已索故也

一儿臂患痘毒作抄按之复起此脓胀痛也刺之以托?而愈

一妇臂结一块已溃不斂灸以豆?饼更服托里药而愈

一人年踰三十素怯弱不能食冷臂患一毒脉虚弱予以托里药而消但饮食少思或作胀或吞酸日渐羸瘦参苓等药不应右尺脉弱此命门火衰不能生土遂以八味丸补土之原饮食渐进而愈【此凭脉症也】

一媼左臂结核年余方溃脓清不斂以十全大补汤【十三】外用附子饼灸及贴补药膏调护得宜百贴而愈【此凭症也】

一人多虑神劳年近五十左膊外侧红肿如粟予曰勿轻视得独参汤数斤乃佳数贴而止旬余值大风拔木疮上起一红线绕背抵右肋与大料人参汤加芎术补剂两月而安机按此条因形因经而为治也

一妇臂痛筋挛不能屈伸遇寒则剧脉紧细此良甫所谓肝气虚为风寒流於血脉经络转於筋筋不荣则乾急为痛先用舒筋汤【八三】更用四物汤【九】加牡丹皮泽兰白术而愈亦有臂痛不能举或转左右作痛由中脘伏痰脾气滯不行宜茯苓丸【一百十三】或控涎丹治之【此因脉处之治】

一人手臂结核如粟延至颈项状似瘰 此风湿流注用加减小续命汤【七三】及独活寄生汤【七四】更以托?药倍加参蓂归木百贴而愈

机按此条有症急脉认作风湿流注而治当时必有所见也後用补剂百贴而愈是终不离于虚也

一儿三岁臂患毒焮痛服解毒丸搽神功散【六八】而消【此条症脉不详当时必有所见】尝治臂毒便闭烦燥服五福化毒丹【一百九】亦効若脓成急刺用纸捻蘸麻油絰疮内以膏药贴之若儿安静不必服药候有脓取去仍用絰贴

一人肩患疽脉数饮槐花酒一服势顿退再与金银花黄蓂甘草十余服而平【此凭脉也】

槐花治湿热之功最为神速胃寒不宜过剂

尹老家贫形志皆苦自幼颓疔孟冬於手阳明大肠经分出痈第四日稠脓臂外皆肿痛在手阳明左右经中其脉俱弦按之洪缓有力此得自八风之变以脉断之邪气在表饮食如常大小便如故腹中和口知味知不在里也不恶风寒只热躁脉不浮知不在表也表里既和邪在经脉之中故曰凝手血脉为痈是也痈出身半已上故风从上受因知为八风之变而疮只在经脉之中法当却寒调和经脉中血气使无凝滞可愈矣宜用以白芷升麻汤【一百三九】机按此方举一身而言故阳明为一身之中若以各经言之而阳明亦自有表里中三等之剂太阳亦有表里中之方余经皆可以类推也

一人年踰三十臂患痈溃而不痛脓稀脉弱丹溪曰疽溃深而不痛者胃气大虚不知痛也东垣曰脓水清稀疮口不合气血俱虚也理宜大补彼不听服消毒药气血愈虚遂不救

丹溪曰才见肿痛参之脉症倘有虚弱便与滋补气血可保终吉又曰溃疡内外皆虚补接为主兹则见善不从自用已智宁免死乎

一人年逾四十臂患毒焮痛作呕服托里消毒药愈盛予用凉膈散二剂顿退更以四物汤加芩连四剂而消

机按此则所谓肿?热毒攻心而作呕也

一人两臂肿痛服托里药日盛予谓肿属湿痛属大此湿热流注经络也用人参败毒散加威灵仙酒炒黄芩南星数剂渐愈更以四物汤【九】加苍术黄柏桔梗二十余剂而消按此托里药日盛故改作湿热治也

一尚书左臂肘患一紫泡根畔肿赤大肠脉芤予谓芤主失血或积血公曰血痢未瘳以芍药汤【九十】二剂更以人参败毒散【六二】二剂疮痢并愈

机按用芍药汤以治血痢用败毒散以治紫泡但所録脉症未甚详悉观其所治多属血热而近实也

背疽一百十六

焮痛或不痛及麻木者邪气盛也隔蒜灸之痛者灸至不痛不痛者灸至痛毒随火而散再不痛者须明灸不隔蒜灸之或用黄连解毒散之类

右关脉弱而肌肉迟生者宜健脾胃

头痛拘急乃表症先服人参败毒散一二剂如焮痛用金银花散或槐花酒神効托里散

焮痛肿硬脉实者以清凉饮仙方活命饮苦参丸肿硬木闷疼痛发热烦燥饮冷便秘脉沉实者内疎黄连汤或清凉饮大便已利欲得作脓用仙方活命饮托里散蜡矾丸外用神异膏

饮食少思或不甘美用六君子汤加藿香连进三五剂更用?黄解毒散洗患处每日用乌金膏涂疮口处候有疮口即用纸作捻蘸乌金膏絀入疮内若有脓为脂膜间隔不出而作胀痛者宜用针引之腐肉堵塞者去之若瘀肉腐动用猪蹄汤洗如脓稠或痛饮食如常瘀肉自腐用消毒与托里药相兼服之仍用前二膏涂贴若腐肉已离好肉宜速去之如脓不稠不稀微有疼痛饮食不甘瘀肉腐迟更用桑柴灸之亦用托里药若瘀肉不腐或脓清稀不焮痛者急服大补之剂亦用桑柴灸之以补接阳气解散鬱毒大抵气血壮实或毒轻少者可假药力或自腐溃怯弱之人热毒中膈内外不通不行针灸药无全功然此症若脓已成宜急开之否则重者溃通臟腑腐烂筋骨轻者延溃良肉难於收功因而不斂者多矣

一人患此痛甚服消毒药愈炽予为隔蒜灸之而止与仙方活命饮二剂顿退以托里药溃而愈【此凭症也】

一妇发热烦躁饮冷与黄连解毒汤四剂少愈更与托里消毒散始溃与托里药而斂【此凭症也】

一人已愈惟一眼番出努肉如?三月不愈乃伤风寒也以生猪油调藜芦末涂之即愈亦有努出三寸许者乌梅涂之亦効但缓硫黄亦可【此凭症也】

一人年踰五十患已五日焮肿大痛赤晕尺余重如负石势炽当峻攻察其脉又不宜遂先砭赤处出黑血碗许肿痛背重皆去更敷神効散及服仙方活命饮二剂疮口及砭处出黑水而消【此凭症也】

大抵疮毒势甚若用攻剂怯弱之人必损元气因而变症者多矣

一人焮肿作痛脉浮数与内托复煎散二剂少退与仙方活命饮四剂痛止而溃再与托里药而愈【此凭脉症也】

一人毒势炽甚痛不可忍诸药不应以仙方活命饮二剂诸症悉退又二剂而溃以金银花散六剂而愈【此凭症也】

一人厚味气鬱形实性重年近六十背疽医与他药皆不行惟饮香附末甚快自肿至溃始终只此一味而安然此等体实而又病实盖千百而一见也每思香附经不言补惟不老汤乃言有益於老人用片子姜黄甘草香附三味以不老为名且引铁瓮先生与刘君为证夫岂无其故哉盖於行中有补之理耳天之所以为天健而有常因其不息所以生生无穷正如茺蔚活血行气有补陰之妙故名益母胎产所恃者气血也胎前无滯产後无虚以其行中有补也夏枯草治瘰 亦然【此因情性而治】

一人感冒後发瘰不醒人事磨死臂肉三寸许一块此膀胱经必有湿热其脉果数予谓死肉最毒宜速去之否则延害良肉多致不救取之果不知痛因瘰不止疑为去肉所触予曰非也由风热未已彼不听另用乳没之剂愈盛复请治予以怯风消毒敷贴饮以怯风凉血化痰降火之剂而愈 按此因脉因症而处治也

一通府发背十余日势危脉大先饮槐花酒二服杀其势退再饮败毒散二剂更饮托里药数剂渐溃又周桑柴燃灸患处每日灸良久仍贴膏药灸至数次脓溃腐脱以托里药加白术陈皮月余而愈

按此先发後补当时必有所见也惜乎脉症不甚详悉

一县尹发背六七日满背肿痛势甚危隔蒜灸百壮饮槐花酒二碗即睡觉用托里药消毒十去五六令将桑柴燃灸患处而溃数日而愈

一侍御髀 患毒痛甚服消毒药不减饮槐花酒一服势随大退再用托里消毒药而愈

大抵肿毒非用蒜灸及饮槐花酒先杀其势虽用托里诸药其效未必甚速【按前条皆先泻後补法】

一园丁发背甚危取金银藤五六两捣烂入热酒一锺绞取汁温服相罨患处四五服而平彼用此药治疮足以养身成家遂弃园业盖金银花治疮未成即散已成即溃有回生之功

一妇半月余尚不发起不作脓痛甚脉弱隔蒜灸二十余壮而止更服托里药渐溃脓清而瘀肉不腐以大补药及桑柴灸之渐腐取之而寻愈【此凭脉症也】

一人腐肉渐脱而脓微清饮食无味以十宣散去白芷防风加茯苓白术陈皮月余而斂【此凭症也】

一人将愈但肌肉生迟脾胃俱虚以六君子汤加芎归五味黄蓍治之而愈【此凭症也】

一人已愈惟一口不斂脉浮而濇以十全大补汤治之而愈【此凭脉也】

一老人七十余背疽径尺余杂服五香汤十宣散数十贴脓血腥?呕逆不食旬余病人自言服十宣散膈中不安且素有淋病三十年今苦淋痛呕逆及不得睡而已急煎参蓍归术膏以牛膝汤入竹?调化与之三日尽药斤半淋止思食七日尽药四斤脓自涌出得睡兼旬而安时六七月也【此凭症也】

一人年六十余好酒肉背疽见脓呕逆发热得十宣已多医以呕逆投嘉禾散加丁香时七月大热脉洪数有力予曰脉症在溃疡尤忌然形气尚可为只与独参汤加竹 尽药十五六斤

竹百余竿而安予曰此幸耳不薄味必再发後因夏月醉坐池中左脇傍生软块如饼二年後潰为疽自见脉症如前仍服参膏竹?而安

二人年老血气弱无以供给脓血胃虚而呕若与十宣宁保无危

机按後条乃膏粱积热之变宜用寒凉之剂兹用骤补盖以年老潰?故也

一妇发背用托里消毒药二十余剂而潰因怒顿吐血五六碗气弱脉细此气血虚极也令服独参膏斤许少缓更以参蓍归木陈皮炙甘草三十余剂疮口渐合若投犀角地黄汤沉寒之药鲜不悞矣【此凭脉症也】

一妇年踰四十发背治以托里药而潰或呕而疮痛胃脉弦紧彼为余毒内攻东垣云吐呕无时手足逆冷脏腑虚也丹溪曰潰後发呕不食者湿气侵内也又云脓出反痛虚也今胃脉弦紧木乘土位其虚明矣用六君子【二】加酒炒芍药砂仁藿香彼自服护心散呕愈盛复邀治仍用前药更以补气血药两月而愈【此凭脉症也】

大抵湿气内侵或感?气而作呕必喜温而脉弱热毒内攻而作呕必喜凉而脉数必须辨明明白亦有大便不实或腹痛或膨胀或呕吐或吞酸暖腐此肠胃虚寒宜理中丸不应加熟附子二三片有侵晨作泻者名曰肾泄宜二神丸有食少渐瘦者为脾肾虚尤宜二神丸又治梦遗生肌肉圣药予尝饮食少思吞酸暖腐诸药不应惟服理中丸及附子理中丸有效盖此皆因中气虚寒不能运化鬱滯所致故用温补之剂中气温和自无此症

一人渴後发背未潰脉数无力此陰虚火动?咀加減八味丸二剂稍缓次用丸药而愈【此凭脉症也】

一人年踰五十发背生肌太早背竟腐潰更泄泻脉微缓用二神丸先止其泻次用大补药以猪蹄汤洗淨用黄蓍末填满患处贴以膏药喜其初起时多用蒜灸故毒不内攻两月而愈【此凭脉症也】

一妇因子迟服神仙聚宝丹背生痛甚危脉散大而濇急以加減四物汤百余贴补其陰血幸质厚易於收救

机按此条因服食因脉而处治也

一人背疮如碗大潰见五脏仅膈膜耳自谓必死精要取大鲫鱼一枚去肠脏以羯羊粪填实焙令焦黑极燥为末乾摻之疮口遂合累用有效须脓少欲生肌时用之

机按此二味有补土功土主肌肉故用生肌

一人背疽径尺穴深而黑家贫得此急作参蓂归术膏与之三日以艾芎汤洗之气息奄奄然可饮食每日作多肉馄饨大碗与之尽药膏五斤馄饨三十碗疮渐合肉与馄饨补气有益者也

机按此条因饥寒多虚故用此补法也

一老妇患此初生三头皆如粟肿硬木闷烦躁至六日其头甚多脉大按之沉细为隔蒜灸及托里渐起发尚不溃又数剂内外虽腐惟筋所隔脓不得出胀痛不安予谓须开之彼不从後虽自穿毒已攻深矣亦没

一妇素弱未成脓大痛发热予欲隔蒜灸以拔其毒令自消不从而殁

大抵发背之患其名虽多惟陰阳二证为要若发一头或二头其形焮赤肿高头起疼痛发热为痈属阳易治 若初起一头如黍不肿不赤闷痛烦躁大渴便秘睡语咬牙四五日间其计数十其疮口各含如一粟形似莲蓬故名莲蓬发积日不溃按之流血至八九日或数日其头成片所含之物俱出通结一?揭去又结其口共烂为一疮其脓内攻色紫黯为疽属陰难治脉洪滑者尚可沉细尤难如此恶症惟隔蒜灸及涂乌金膏有效 凡人背近脊并髀皮?有筋一层患此症者外皮虽破难溃以致内脓不出令人胀痛苦楚气血转虚变症百出若待自溃多致不救必须开之兼以托里常治此症以利刀剪之尚不能去以此坚物待其自溃不亦反伤非气血壮实者未见其能自溃也

一弱妇外皮虽腐内脓不溃胀痛烦热不安予谓宜急开之脓一出毒即解痛即止诸症自退待其自溃不惟疼痛溃烂愈深彼不从待将旬日脓尚未出人已痛疲矣须针之终不能收斂竟至不起

一人溃而瘀肉不腐予欲取之更以峻补不从而没一妇发背待其自破毒气内攻而殁开迟故也东垣云过时不烙反攻於内内既消败不死何待

一指挥年踰五十发背形症俱虚用托里药而溃但腐肉当去彼惧不从延至旬日则好肉皆败矣虽投大剂毒甚不救 古人谓坏肉恶如狼虎毒如蜂螫缓去则戕性命信哉

一人年踰四十发背心脉洪数势危剧经曰痛痒疮?属心火心脉洪数乃心火炽甚心主血心气滞则血不流故生痛也骑竹马灸其穴是心脉所游之地急用隔蒜灸以泻心火拔其毒再用托里消毒而愈【此凭脉也】

一人发背十八日疮头如粟内如锥痛极时有闷瞀饮食不思气则愈虚以大艾隔蒜灸十余壮不知热内痛不减遂明灸二十余壮内痛悉去毒气大发饮食渐进更用大补汤及桑柴燃灸瘀肉渐溃【此凭症也】

一人发背疮头甚多肿硬色紫不甚痛不腐溃以艾铺患处灸之更用大补药数日死肉脱去而愈【此因症处治也】

一人发背焮痛如灼隔蒜灸三十余壮肿痛悉退更用托里消毒药而愈【此凭症也】

一人发背已四五日疮头虽小根畔颇大隔蒜灸三十余壮其根内消惟疮头作脓数日而愈

一人忽恶心大椎骨甚痒须臾臂不能举神思甚倦此谓天疽危病也隔蒜灸痒愈盛乃明灸【着肉灸也】五十余壮痒止旬日而愈精要谓之灸有回生之功信矣

一人患此已四日疮头如黍焮痛背重脉沉实与黄连内疎汤二剂少退更与仙方活命饮二剂而消【此凭脉症也】

一妇肿痛发热睡语脉大用清心汤一剂而安以金银花甘草天花粉当归瓜蒌黄蓍数剂渐溃更以托里药而愈【此凭脉症也】

一人背毒焮痛发热饮冷多汗便秘谵言以破棺丹二丸而宁以金银花四剂而脓成开之更用托里药而愈

一太监发背肿痛色紫脉息沉数良甫曰脉数发热而痛者发于阳也且疮疡赤甚则紫火极似水也询之常服透骨丹半载乃积温成热所致遂以内疎黄连汤再服稍平更用排脓消毒药及猪蹄汤太乙膏而愈

机按此条因脉因服食而为之处治也

一人伤寒後亦患此甚危取去死肉以神効当归膏敷贴饮内疎黄连汤狂言愈盛脉愈大使用凉膈散【二六】二剂又以四物汤【九】加芩连数剂而愈

机按此条脉症不甚详悉观其下後狂愈盛脉愈大似属虚也仍用凉膈散下之此必形实进食故用此也

大凡患疮者责效太迫一二剂未应辄改服他药反致有悞不思病有轻重治有缓急而槩欲效于一二剂难矣况疮疡一症其所由来固深以久又形症在外肌肉溃损较之感冒无形之疾不同安可旦夕取效患者审之

一人形实色黑背生红肿近髀骨下痛甚脉浮数而洪紧正冬月与麻黄桂枝汤加酒栝生附子瓜蒌子甘草节人参羌活青皮黄蓍半夏生姜六贴而消此亦内托里之意

机按此条因时因脉而制方也

一水部年踰四十髀 患毒已半月头甚多大如栗许内痛如刺饮食不思怯甚脉歇至此元
气虚疽蓄於内非灸不可遂灸二十余壮饮以六君子【二】加藿香当归数剂疮势渐起内
痛顿去胃脉渐至但疮色尚紫瘀肉不溃此阳气尚虚也用桑柴火灸以接阳气解散其毒仍
以前药加参蓂归桂色赤脓稠瘀肉渐腐取去两月余而愈【此凭脉症也】

夫邪气沉伏真气怯弱不能起发须灸灸而兼大补若投常药待其自溃鲜不悞矣

一人年踰六十冬至後疽发背五七日肿势约七寸许不任其痛视之脓成彼惧开发越三日
始以燔针开之以开迟迨二日变症果生觉重如负石热如炳火痛楚倍常六脉沉数按之有
力此膏粱积热之变邪气酷热固宜治之以寒药但时月严凝有用寒远寒之戒经曰假者反
之虽违其时以从其症可也急作清凉饮子加黄连秤一两半作一服利下两行痛减七分翌
日复进其症悉除月愈平复

机按此条因厚味因脉而为之治法也

一人初生如粟闷痛烦渴便秘脉实此毒在脏也予谓宜急疎去之以絶其源使毒不致外侵
彼以为小恙乃服寻常之药後大溃而没

一士因脚弱求诊两手脉背浮洪稍鼓饮食如常?於言动肌起白屑如麸片时在冬月予作极
虚处治询知半年前背臀腿三处自夏至秋冬节次生疽率用五香连翘汤十宣散今结痂久
矣急煎参蓂归术膏以二陈汤化开服之三日尽药一斤半白屑没大半呼吸觉有力补药应
効已渐病家嫌缓自作风病冶炼青礞石二钱半以青州白丸作料煎饮子顿服之予谏不听
因致不救

一人背疮毒气未尽早用生肌背竟溃烂予以解毒药治之得愈
又一人患毒气始发骤用生肌其毒内攻而死

一人年踰四十发背五日不起肉色不变脉弱少食大便不实予谓凡疮未溃脉先弱难於收
斂用托里消毒散服二剂方起发彼惑一姬言贴膏药服攻毒剂反盛背如负石复请予治隔
蒜灸三十余壮彼云负石已去但痒痛未知更用托里药知痛痒脓清前药倍加参蓂佐以姜
桂脓稍稠又为人惑外贴猪腰子抽脓血内服硝黄遂流血五六椀许连泄十余行腹内如水
饮食不进不得已速予诊之脉尽脱不可救盖其症属大虚一於温补犹恐不救况用攻伐不
死何待

一人发背十余日疮头如栗许肿硬木闷肉色不变寒热拘急脉沉实此毒在内也先以黄连
内疎汤次以消毒托里药其毒始发奈速用生肌患处忽若负重身如火熯後竟不起

东垣云毒气未尽速用生肌纵平复必再发若毒气入腹十死八九大抵毒气尽脾气壮则肌
肉自生生肌药不用亦可

一宜人年逾六十发背三日肉色不变头如粟许肩背加重寒热饮冷脉洪数良甫曰外如麻里如瓜齐氏曰增寒壮热所患必深又曰肉色不变发於内也用人参败毒散【六二】二剂又隔蒜灸五十余壮毒始发背始轻再用托里药渐溃顾气血虚甚作渴服参耆归芩等渴止彼欲速愈自用草药罨患处毒气复入遂不救

大抵老弱患疮疮头不起或坚如牛领皮多不待溃而死溃後气血不能培养者亦死凡疮初溃毒正发越宜用膏药吸之参耆等药托之若反用药遏之毒气内攻者必不救也

一女背 结一核如钱大不焮但倦怠少食日晡发热脉软而濡此虚劳气鬱所致予用益气养血开鬱之药复令饮人乳精神稍健彼不深信又服流气饮食遂少四肢痿其父悔复请予予谓决不起矣果歿

一妇发热作痛专服降火败毒药溃後尤甚烦躁时 小便如淋皆恶症也辞不治果歿

此症虽云属火未有不由陰虚而致者故经云督脉经虚从脑而出膀胱经虚从背而出岂可专泥於火

一太守肿硬不泽疮头如粟脉洪大按之即濡经云骨髓不枯脏腑不败者可治然肿硬色夭坚如牛领之皮脉更濡精气已絕矣不治

一宜人发背脓熟不开昏闷不食此毒气入内也断不治强之针脓碗许稍苏须臾竟亡

大抵血气壮实脓自涌出老弱之人血气枯槁必须迎而夺之顺而取之若毒结四肢砭刺少缓腐溃深大亦难收斂结於颊项胸腹紧要之地不问壮弱急宜针刺否则难治

一人背疮溃?色紫舌卷予谓下?色紫阳气脱也舌卷囊缩肝气絕也经曰此筋先死庚日笃辛日死果立秋日而歿

臀痛一百十七【附腿痛 环跳疽 腿气脚跟疽 腿?】

焮痛尺脉紧而无力者托之

肿硬痛甚者隔蒜灸之更以托?

不作脓而痛者解毒为主

不作脓者托里为主

不溃或溃而不斂者托里为主

一人臀痈肿硬作痛尺脉浮紧按之无力以内托羌活汤一剂痛止再金银花散四剂脓溃而愈

一人臀痈肿硬痛甚隔蒜灸之更服仙方活命饮二剂痛止肿消以托?消毒散加黄栢苍术羌活疮头溃而愈

一人臀痈作脓而痛以仙方活命饮二剂痛止更以托里消毒散脓溃而瘥【此条无脉可据】

一人臀痈不作脓饮食少思先以六君子加芎归黄蓍饮食渐进更以托?散脓溃而愈

一人溃而脓清不斂灸以豆?饼更饮十全大补汤两月余而瘥

凡疮不作脓或不溃或溃而不斂皆气血虚也若脓清稀尤虚甚也

一人臀痈脓水不止肌渐瘦食少思胃脉微弦以六君子加藿香当归数剂食遂进以十全大补汤灸以豆?饼两月余而瘥

一弱人臀痈脓成不溃以十全大补汤数剂始托起乃针之又二十余剂而愈夫臀居僻位气血罕到老弱患之尤宜补其气血庶可保瘥

一人腿内侧患痈未作脓而肿痛以内托黄蓍柴胡汤二剂少愈又二剂而消

一人臀漫肿色不变脉活数无力脓将成尚在内欲治以托里药待发出而用针彼欲内消服攻伐药愈虚复求治仍投前药托出针之以大补药而愈

凡疮毒气已结不起者但可补其气血使脓速成而针去不可论内消之法脓成又当辨其生熟浅深而针之若大按乃痛者脓深也小按便痛者脓浅也按不甚痛未成脓也按之即复起者脓也按之不复起者无脓也若肿高而软者发於血脉也肿下而坚发於筋骨也肉色不变者发於骨髓也

一人腿外侧患痈漫肿大痛以内托黄蓍汤酒煎二剂少可更以托里数剂溃之而愈

一妇腿痈久而不愈疮口紫?脓水清稀予以为虚彼不信乃服攻毒之剂虚症蜂起复求治灸以附子饼服十全大补汤百余贴而愈

凡疮脓清及不斂者或?下皆气血虚极也最宜大补否成败症若更患他症卒难治疗

一人腿痈内溃针之脓出四五碗许恶寒畏食脉诊如丝此阳气微也以四君子加炮附子畏

寒少止又四剂而止以六君子加桂数剂饮食颇进乃以十全大补及灸附子饼两月而愈

一老腿痈脓自溃忽发昏瞽脉细而微此气血虚极也以大补之剂而苏

一弱人流注内溃出败脓五六碗口眼歪斜脉亦虚极乃虚甚也非真中风以独参汤加附子一钱二剂更以大补药月余而痊

大抵脓血大泄当大补气血为先虽有他症以未治之凡痈大溃发热恶寒皆属气血虚甚若左脉不足者补血药多于补气药右脉不足者补气药多於补血药切不可发表

一妇腰痛脚弱弛长不能动履以人参败毒散加苍术黄柏泽泻而愈

此条脚弱弛长属湿热也故凭症而治

一妇环跳穴痛肉色不变脉紧数此附骨疽也脓未成用内托黄蓍酒煎汤加青皮龙胆草山梔数剂而止

一人腿痛兼筋挛痛脉弦紧用五积散加黄柏柴胡苍术而痊【此凭脉凭症而作湿热治也】

一妇附骨疽久不愈脓水不絶皮肤瘙痒四肢痿软予以为虚欲补之彼惑为风疾遂服祛风药竟致不救陈无择云人身有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以成其形内则有心肝脾肺肾以主之若随情妄用喜怒劳佚致内臓精血虚耗使皮血筋骨肉痿弱无力以运动故致痿 状与柔风脚气相类柔风脚气皆外所因痿则内臓不足也

一人拊骨疽肿硬发热骨痛筋挛脉数而沉用当归拈痛汤而愈

一人腿根近环跳穴痛彻骨外皮如故脉数带滑此附骨疽脓将成用托里药六剂肿起作痛脉滑数已成针之出碗许更加补剂月余而瘳

一人腿内患痛漫肿作痛四肢厥咽咙塞发寒热诸治不应乃邪鬱经络而然也用五香连翘汤一剂诸症少退又服大便行二次诸症悉退而愈【此因诸治不効故作鬱治而用五香也】

一妇左腿痛不能伸脉弦紧按则濡以五积散二剂痛少止又二剂而止以神应养真而愈【脉弦紧濡属寒故用五积散辛热以散之】

一人腿痛膝微肿轻诊则浮按之弦紧此鹤膝风也与大防风汤二剂已退二三彼谓附子有毒乃服败毒药日渐消瘦复求治予谓今饮食不为肌肤水谷不能运化精微灌溉脏腑周身

百脉神将何依兹故气短而促其气损也怠惰嗜卧脾气虚也小便不禁膀胱不藏也时有躁热心下虚痞胃气不能上荣也恍惚健忘神明乱也不治後果歿
此症多患於不足之人故以加减小续命大防风二汤有效若用攻毒药必悞

一妇患脚气或时腿肿筋挛腹痛诸药不应渐危笃诸书云八味丸治足少陰脚气入腹疼痛上气喘促欲死遂投一服顿退又服而愈肾经虚尽之人多有此患乃肾水乘心尅火死不旋踵宜急服

一人腿痛兼筋挛骨痛脉弦紧以大防风汤六剂筋挛少愈又二剂而肿消但内一处尚作痛脉不弦紧此寒邪已去乃所滞瘀浊之物欲作脓故痛不止用托里药数剂肿发起脉滑数乃脓已成针之用十全大补汤月余而安【按已前数条皆筋挛骨痛而脉弦紧可见弦紧多主寒邪】

一妇膝肿痛遇寒痛益甚月余不愈诸药不应脉弦紧此寒邪深伏於内也用大防风汤与火龙丹治之而消

大抵此症虽云肿有浅深感有轻重其所受皆因真气虚弱而邪得以深袭故附骨痛疽及鹤膝风症肾虚者多有之前人用附子者以温补肾气而又能行药势散寒邪也亦有体虚之人秋夏露卧为冷气所袭寒热伏结多成此症不能转动乍热而无汗按之痛应骨者是也若经久不消极陰生阳寒化为热而溃也若被贼风所甚伤患处不甚热而洒淅恶寒不时汗出熨之痛少止须大防风汤火龙膏治之又有挛曲偏枯坚硬如石谓之石疽若热缓积不溃肉色赤紫皮肉俱烂名缓疽其始末皆宜服前汤欲其驱散寒邪以补虚托里也

一人右腿赤肿焮痛脉沉数用当归拈痛汤四肢反痛乃湿毒壅遏又况下部药力难达非药不对症遂砭患处去毒血仍用前药一剂顿减又四剂而消

一人先腿痛後又四肢皆痛游走不定至夜益甚服除湿败毒之剂不应脉滑而濡湿痰浊血为患以二陈汤加苍术羌活桃仁红花牛膝草乌治之而愈【活与濡相反北云活谓少】

凡湿痰湿热或死血流注关即非辛温之剂开发腠理流通隧道使气行血和安能得愈

一人腿痛每痛则痰盛或作嘈杂脉滑而数以二陈汤加升麻二术泽泻羌活南星治之而安【此凭脉也】

一人素有脚气脇下作痛发热头晕呕吐腿痺不仁服消毒护心等药不应左关脉紧右关脉弦此亦脚气也以半夏左经汤治之而愈

一人脚软肿痛发热饮冷大小便秘右关脉数乃足阳明经湿热下注也以大黄左经汤服而愈

一人膝胫兼膝脚皆焮痛治以加味败毒而愈

一人两腿痛脉活而迟此湿痰所致以二陈汤加术黄栢羌活泽泻而愈【此凭脉也】

一人两腿肿痛脉滑而缓此湿痰所致先以五苓散加苍术黄栢二剂少愈再以二陈二术槟榔紫苏羌滑独活牛膝黄栢而差【此凭脉也】

夫湿痰之症必先以行气利湿健中为主若中气和则痰消而湿亦无所容矣

一妇两腿痛脉濡而数此血虚兼湿热先以苍术黄栢知母龙胆草茯苓防风防己羌活数剂肿痛渐愈又以四物加二术黄栢牛膝木瓜月余而愈【此凭脉也】

一人肢节肿痛脉迟而数此湿热之症以荆防败毒散加麻黄二剂痛减半以槟榔败毒散四剂肿亦除後更以四物汤加二术牛膝木瓜数剂而愈【按脉迟与数相反迟恐作细】

一妇人脚胫肿痛发寒热脉浮数此三阳经湿热下注为患尚在表用加味败毒散不应乃瘀血凝结药不能及於患处砭去瘀血乃用前药二剂顿退以当归拈痛汤四剂而愈

古云脚气是为壅疾治当宣通使气不能成壅也壅既成而甚者砭去恶血而去重势经云畜则肿热砭射之後以药治之

一妇两腿痛遇寒则筋挛脉弦紧此寒邪之症以五积散对四物汤数剂痛止更以四物汤加木瓜牛膝枳壳月余而安

一人腿肿筋挛不能动履以交加散二剂而愈

一妇患腿不能伸屈遇风寒痛益甚诸药不应甚苦先以活络丹一丸顿退又服而瘳次年复痛仍服一丸亦退大半更以独活寄生汤四剂而愈

一人素有脚气又患附骨痛作痛服活络丹一丸二症并差

一人素有疝不能愈因患腿痛亦用一丸不惟治腿有効而疝亦愈矣

一太安人臂痛数年二丸而差

一女患惊风甚危诸医莫救自用一丸即愈且不再作夫病深伏在内非此药莫能通达但近代始云此药引风入骨如油入?故後人多不肯服大抵有是病宜用是药岂可泥于此言以致难差

一妇两腿作痛时或走痛气短自汗诸药不应诊其尺脉弦数此寒湿流注于肾经也治以附子六物汤愈但人谓附子有毒多不肯服若用童便炮制何患之有况不常服何足为虑予中气不足以补中益气汤加附子服三年何常见其有毒经云有是病用是药

一妇肢节肿痛胫足尤甚时或自汗或头痛此太阳经湿热所致用麻黄左经汤二剂而愈【前条脉弦数而病寒湿恐湿生热故也】

一妇血痔兼腿酸痛似痹此陰血虚不能养於筋而然宜先养血为主遂以加味四斤丸治之而愈

一老筋挛骨痛两腿无力不能步履以局方换腿丸治之

一妇筋挛痹痛两腿无力不能步履以三因胜酸丸治之并愈

河间云脚气由肾虚而生然妇人亦病脚气者乃因血海虚而七情所感遂成斯疾血海虚与男子肾虚类也男女用药固无异更当兼治七情无不効也

一妇腿痛兼足胫挛痛服发散药愈甚脉弦紧此肾肝虚弱风湿内侵也治以独活寄生汤痛止更以神应养真丹而不挛矣

一人素有腿痛饮食过伤痛益甚倦怠脉弱以六君子加山查神麴苍术芎归升麻柴胡而愈

一老素善饮腿常肿痛脉洪而缓先以当归拈痛汤湿热少退後用六君子加苍术黄栢泽泻而痊

一人饮食少过胸满痞闷或吞酸两腿作痛用导引丸二服顿愈更以六君子汤加神麴麦芽苍术二十余剂遂不复作而愈

经云饮食自倍肠胃乃伤是胃气不能施行脾气不能四布故下流乘其肝肾之虚以致足肿加之房事不节阳虚陰盛遂成脚气亦有内伤饮食脾胃之气有亏不能上升则下注为脚气者宜用东垣开结导引水运化脾气如脾气湿气壅遏不通致面目发肿或痛者宜用导滞通经汤以疎导之

已上十九条乃脚气症虽非疮毒因治有验故録之

臀居小腹之後此陰中之陰其处下其道远其位僻太阳虽多血其气少也气少则运行不到血亦因而少来中年已後生疽须预补之若无积补之功其祸多在疮成痂後或半年乃发故多惑略

一人腿痈脉症俱弱亦危症也治以托里急使针刺彼因不从後脓开泻淋漓不能收斂而死

一人年踰五十冬患腿痈脉数烦躁饮冷便秘肿痛熯甚此热淫於内也宜用苦寒之药投清凉饮【二六】倍加黄芩其势顿退更以四物汤加黄芩而愈

此条因症因脉而药之也

一人年三十连得忧患作劳好色左腿外侧廉红肿如栗医以大府实与承气两贴下之又一医与大黄朱砂血竭三贴而脉大实後果死此厥陰多气少血经也

一侍御患臀肿痛小便不利彼谓关格以艾蒸脐大便亦不利治以降火分利药不应予胗其脉脓已成此患痈也针之出脓数碗大便即利五日後陰囊肿胀小便不行针之尿脓大泄气息奄奄脉细汗不止溃处愈胀用参耆归术大剂犹缓俾服独参汤至二斤气稍复又服独参膏至十余斤兼以托里药两月余而愈

大抵疮?脓血大泄先补气血为主虽有他病当从未治

一人腿痈脓成针之出脓二碗许饮托里药一剂大发热更用圣愈汤【十七】二剂而止翌日恶寒不食脉细如丝以人参一两熟附三片姜枣煎服而愈但食少不寐更以内补黄耆汤而平

一人腿肿发热恶寒以补中益气汤治之彼以为缓乃服芩连等药热愈盛复请予治以人参养荣汤【十八】二十余剂而溃更以参耆归术炙甘草肉桂月余而斂夫火之为病当分虚实芩连苦寒能泄心肺有余之火若老弱或饮食劳倦而发者此为不足当治以甘温之剂未尝有实热而畏寒虚热而喜寒者此其验也

一人年踰三十左腿微肿痛日久肉色如故不思饮食东垣云疮?肿下而坚者发於筋骨此附骨疽也乃真虚湿气袭於肉理而然盖诸虚皆稟於胃食少则胃弱法当助胃壮气以六君子加藿香当归数剂饮食渐进更以十全大补汤而愈

此条因症制方而处治也

一妇人二十余饮食後每有怒气吞酸暖腐或兼腿根胯内焮肿服越鞠丸不应此肝气虚湿气下注而然以六君子【二】加香附砂仁藿香炮姜数剂少愈更以六君子数剂而愈

此条因症而制方也

一人年踰二十稟弱左腿外侧患毒三月方溃脓水清稀肌肉不生以十全大补汤【十三】加牛膝二十余剂渐愈更以豆?饼灸月余而痊

一人膝腿肿筋骨痛服十宣散不应脉沉细予用五积散二剂痛止更以十宣散【四】去桔梗加牛膝杜仲三十余剂脓溃而愈此寒气之肿八风之变也

此条因脉制方处治

一人遍身走痛两月後在脚面结肿未几腿股又患一块脉轻胗则浮重胗浮缓此气血不足腠理不密寒邪袭虚而然以加减小续命汤【七三】四剂及独活寄生汤【七四】数剂疼痛顿去更以托里药倍加参耆归术百贴而愈

此条因脉制方而治也

一人年及二十腿膝肿痛不能屈伸服托里药不应以人参败毒散加槟榔木瓜柴胡紫苏苍术黄柏而愈此因症制方以治之也

一人年逾五十两腿痛胀或生??小便频而少声如瓮出服五皮散不应予胗之右关沉缓此脾虚湿气流注而然非疮也经曰诸湿肿满皆属脾土按之不起皆属於湿以五苓散加木香倍苍术白术亦不应予意至陰之地关节之闲湿气凝滞且水性下流脾气既虚安能运散非辛温之药开通腠理行经活血邪气安得发散遂以五积散二剂势去大半更以六君子加木香升麻柴胡薏苡仁两月余而愈设使前药不应更投峻剂虚虚之禍不救矣【此因渗泄不效故用辛温以散之也】

一人腿痛脓清脉弱灸以豆?饼更以托里药而愈一人年二十余股内患毒日久欲求内消胗脉活数知脓已成因气血虚不溃刺之脓出作痛用八珍汤稍可但脓水清稀用十全大补汤【十三】三十余剂而痊盖脓出反痛者虚也

一僧股内患肿一块不痛不溃治托里二十余剂脓成刺之作痛予谓肿而溃溃而反痛此气血虚甚也宜峻补之彼云气无补法予曰正气不足不可不补补之则气化而痛自除遂以参耆归术熟地治之两月余而平

大抵疮疡先发为肿气血鬱积蒸肉为脓故多痛脓溃之後肿退肌寛痛必渐减而痛愈盛者气血不足也即丹溪河间虚甚之说

附骨痛皆因久得厚味及酒後涉水得寒故热深入髀枢穴左右积痰瘀血相抟而成也

一女髀枢穴生附骨疽在外侧廉少阳经分始末用五香汤十宣散一日恶寒发热膈满犹大服五香汤一夕喘死此升散太过孤阳发越於上也

一人年踰四十夏患附骨痛予以火针刺去瘀血更服托里药而愈至秋忽不饮食痰气壅盛劳则口舌生疮服寒药腹痛彼疑为疮脾胃脉轻胗似大按之无力此真气不足虚火炎上也

治以八味丸彼不信自服二陈四物几殆复请予仍以前丸治之而愈有脾土虚不能尅制肾水吐痰而不效者尤宜用此丸

王老年七十季春因寒湿地气得附骨疽於左腿足少阳分微侵足阳明阔六七寸长一尺坚硬漫肿肉色不变皮泽深但行步作痛以指按至骨大痛服内托黄耆汤一服立止再服肿消

柴胡【钱半】连翘 肉桂【各一钱】黄耆 归尾【各二钱】鼠粘子【炒一钱】黄栢甘草【炒各半钱】升麻【七分】

右剉酒盏半水盏半同煎至二盏去查空心宿食消尽大温服少时以早饧压之不令大热上攻犯中上二焦也

一儿年十岁四月于左腿近膝股内出附骨痛不辨肉色漫肿皮泽木硬疮势甚大左腿乃肝之髀上也足厥陰肝经之分少侵足太陰脾经其脉左三部细而弦按之洪缓微有力用内托黄耆柴胡汤

黄耆【二钱】柴胡【钱半】连翘【一钱二分】羌活【半钱】生地【二分】归尾【七分半】官桂 土瓜根 黄栢【酒洗各二分】

右剉作一服水酒各盏半同煎至一盏去查空心稍热服

一人附骨痛畏针不开臀膝通溃脉数发渴烦躁时 饮食少思齐氏曰疮?烦躁时嗽腹痛渴甚或泄利无度或小便如淋此恶症也脓出之後若脉洪数治微瀼迟缓易治刺之脓出四五椀即服参耆归术大剂翌日脉稍斂更服八珍汤【十四】加五味麦门肉桂白斂三十余贴脉缓脓稠三月乃愈

一老腿患附骨疽肿硬大按方痛口乾脉弱肿聚不溃饮食少思予谓肿下而坚者发於筋骨肉色不变者发於骨髓遂托以参耆等药三十余剂脓虽熟不穿予谓药力难达必须针刺不听至旬日方刺涌出清脓五六椀然衰老气血不足养毒又久竟不救大抵疮疽旬日不退宜托之有脓刺之有腐肉取之虚则补之此十全之功也

一人患贴骨疽腿细短软疮口不合以十全大补汤外灸附子饼贴补药膏调护得宜百贴而愈

一人环跳穴患附骨疽彼谓小疮服败毒药外以寒药敷贴因痛极针之脓瘀大泄方知为痈请治其脉右关浮大此胃气已伤故疮口开张肉紫下?扪之不热彼谓疮内更觉微冷自谓必成漏矣灸以豆?饼饮六君子加藿香砂仁炮姜数剂胃气渐醒饮食渐进患处渐煖肌肉渐生再以十全大补汤而愈

一人亦患此内痛如锥外色不变势不可消喜其未用寒剂祇因痛伤胃气而不思食以前药去炮姜治之饮食稍进更以十全大补汤二十余剂脓成针去仍以大补汤倍加参蓂芎归脓久不止更加麦门五味贝母远志数服渐止疮亦寻愈

二症盖因湿热滯於肉理真气不能运化其始宜除湿热实脾土和气血则湿自消散若脓未成以隔蒜灸之立効

环跳穴痛防生附骨疽以苍术佐黄柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加黄芩体虚加杜牛膝以生甘草为使大料煎入姜汁食前饮之痛甚者恐十数贴发不动少加麻黄一二贴又不动恐疽将成急掘地成坎以火煨红沃以小便赤体坐其中以席围下体使热气薰蒸腠理开气血畅而愈

一妇四十余近环跳生疽尺脉沉紧腿不能伸经曰脾移寒於肝痛肿筋挛盖脾主肉肝主筋肉温则筋舒肉冷则筋急遂与乳香定痛丸少愈更以助胃壮气血药二十余剂而消

按此因脉沉紧又因筋挛是脉症俱寒故治以此

一人因痢骤澁环跳穴作痛与四物汤加桃仁酒黄芩红花苍术枳殼黄柏柴胡青皮生姜十余剂稍可更刺委中出黑血而愈

一後生 骨痛以风药饮酒一年予以防风通圣散【四十】去硝黄加生犀角浮萍百余贴成一疽近皮革脓出而愈後五六年其处再痛予曰旧病作无能为矣盖发於新娶之後多得香辣肉味若能茹淡远房劳犹可生也出脓血四五年延及腰背皆空又三年而死此纯乎病热者

一少年天寒极劳 骨痛两月後生疽深入骨边卧二年取剩骨而安此寒?热者也

取久疽及痔漏中圻骨用乌骨鸡胫骨以砒实之盐泥固济火煨红地上出火毒去泥用骨研细饭丸如粟米大以纸捻送入窍内更以膏贴之

一人年踰五十臀痛脓熟不开攻通大肛脓从大便而出予辞不治果歿丹溪谓中年後不宜患此脓成不刺不亡得乎

一人左膝肿大三月不溃予谓体虚风邪袭於骨节使气滯不行故膝愈大而腿愈细名曰鹤膝风以防风汤三十余剂而消 又有患此伏枕半载流脓三月彼云初服大防风汤【八五】去附子将溃服十宣散今用十全大补汤去桂皆不应视脉症甚弱予以十全大补汤一贴加熟附一钱三十余剂少愈乃減附子五分服至三十余剂将愈却去附子更用三十余剂而痊

夫立方之义各有所宜体气虚弱邪入骨界遏絕隧道若非桂附辛温之药开发腠理关节之寒邪通畅荣卫经络之气血决不能愈

一人脚跟生毒如豆许痛甚状似伤寒予谓猎人被兔咬脚跟成疮淫蚀为终身之疾因名兔齿以还少丹【九四】内塞散【五十】治之稍可次因纳宠作痛反服攻毒药致血气愈弱腿膝软痿而死

盖足跟乃二蹻发源之处肾经所由之地疮口不合则蹻气不能发生肾气由此而泄故为终身之疾况彼疮先得於虚复不知戒虽大补气血犹恐不及安服攻毒暴悍之药以戕贼乎

一人腿痛筋挛遍身酸软方士与痰药及托?药期三日可痊不应予谓非疮毒也大筋软短小筋弛长此湿热为患以人参败毒散加苍术黄栢槟榔木瓜少愈更以清躁汤二十贴而愈【此因症也兼之屡治不効此作湿热而治有所本也】

夫内有湿热外有风寒当泻不当补托?甘温之剂安得取効

冷漏精要治冷漏诸疮与桂附丸

丹溪曰此冷只因疮久不合风寒乘之气血不朝而成厚朴虽温泄散尤速恐不若参蓂佐以陈皮庶乎与病相得

大凡疮口久不合肉白脓少此为疮口冷滯气血枯竭不朝於疮以致如是精要用北艾叶一握煎汤避风处以绢兜艾叶乘热浇洗疮口四围净肉一日一次仍燒松香薰疮口良久以神异膏贴之

丹溪曰血气枯燥不知补虚於内惟务热洗於外不揣其本而齐其末却乃归罪於冷滯大抵溃?宜洗若无补药以实其内切恐有时之快少顷疲惫有不耐烦之意非虚而何可不先议补接乎

内托羌活汤 治足太阳经尻臀生痛坚硬肿痛大作左右尺脉俱紧按之无力

防风?本 归尾【各一钱】羌活 黄栢【酒制各二钱】肉桂【三分】连翘 甘草【炙】苍术【各五分】陈皮【各五分】黄耆【钱半】 右剉水酒各半煎食前温服取汁内托

一官两腿作痛形体清瘦肝脉弦数却属有余之症治以龙胆泻肝汤并愈【此凭症也】

【疮肿之症若不诊候何以知陰阳勇怯气血聚散耶又云脉洪大而数者实也细微而数者虚也河间云脉沉实者邪在藏浮大者邪在表观此诚发前言所未发诊候之道岂可缺耶】

腰疽一百十八

一妇人逾七十腰生一?作痒异常疑?蝨所毒胗脉浮数齐氏曰脉浮数反恶寒者疮也翌日复胗脉乃弱予谓未溃而脉先弱何以收斂况大便不通则真气已竭治之无功固请不得已用六君子【二】加藿香神麴饮食渐进大便始通更用峻补之剂溃而脓清作渴再用参蓍归地麦门五味而渴止喜曰可无虞矣予曰不然不能收斂先入之言也彼疑更医果歿

一人年十九腰间肿一块无头不痛色不变三月不溃饮食少思肌肉日瘦此气转腠理荣气不行鬱而为肿名曰湿毒流注元戎曰若人饮食疎精神衰气血弱肌肉消瘦荣卫之气短促而澁滯故寒转腠理闭鬱为痛者当补以接虚怯之气遂以十全大补汤【十三】加香附陈皮三十余剂始针出白脓二椀许仍用药倍加参蓍仍灸以豆?饼渐愈彼乃惑於速効内服败毒外贴凉药反致食少脓稀患处色紫复请予治喜得精气未衰仍以前药加远志贝母白斂百剂而愈此或久而不愈或脓水清稀当服内塞散【五十】及附子饼灸然後可愈

一妇人踰二十腰间突肿寸许肉色不变微痛不溃发热脉大此七情所损气血凝滯隧然而然当益气血开鬱结更以香附饼熨之使气血充畅内自消散若尔虽溃亦无危不听乃服十宣流气之药气血愈虚溃出清脓不斂而死 按此脉大非七情脉也当时必有所见

一妇产後腰间肿两腿尤甚此瘀血滯於经络而然不早治必作痛遂与桃仁汤二剂稍愈更没药丸【五四】数服而痊 亦有恶血未尽脐腹刺痛或流注四肢或注股内痛如锥刺或两股肿痛此由冷热不调或思虑动作气乃壅遏血蓄经络而然宜没药丸【五四】治之亦有或因水湿所触经水不行而肿痛者宜当归

丸【五五】治之

凡恶血停滯为患匪轻治之稍缓则为流注为骨疽多致不救

一老人患痢骤用澁药致大肠经分作痛此湿毒流於经隧而然以四物加桃仁酒芩红花升麻枳殼陈皮甘草治之渐愈因年高胃弱竟歿

一人年二十遍身微痛腰间作肿痛甚以补中益气汤【十六】加羌活四剂少可又去羌活十余剂而愈

此条以虚治当时於形色脉上必有所见也

一人年踰四十患腰痛服流气饮寄生汤不应以热手熨之少可其脉沉弦且剧服攻剂不应故知虚也弦则不软如物无水不柔软之意

外科理例卷五

<子部,医家类,外科理例>

卷六

钦定四库全书

外科理例卷六

明 汪机 撰

脱疽一百十九【丁生手足指或足溃而自脱故名脱疽有发於手指者名蛀节丁重者腐去本节轻者筋挛】

焮痛者除湿攻毒更隔蒜灸至不痛

焮痛或不痛者隔蒜灸更用解毒药若色黑急割去速服补剂庶可救黑延上者不治

色赤焮痛者托?消毒更兼灸

作渴者滋陰降火色黑者不治

一人足指患此焮痛色赤发热隔蒜灸之更以人参败毒散去桔梗加金银花白芷大黄二剂痛止又十宣散去桔梗官桂加天花粉金银花数剂而平【此凭症也】

一人年逾四十左足大指赤肿焮痛此脾经积毒下注而然名曰脱疽喜色赤而肿以人参败毒散去人参桔梗加金银花白芷大黄二剂更以瓜蒌金银花甘草节四剂顿退再以十宣散去桔梗桂加金银花防己数剂愈

一人患此色紫赤不痛隔蒜灸五十余壮尚不痛又明灸百壮方知乃以败毒散加金银花白芷数剂而愈

一膏粱年逾五十亦患此色紫黑脚焮痛孙真人曰脱疽之症急斩之去毒延腹必不治色黑不痛者亦不治喜其饮食如故动息自宁为疮善症遂以连翘败毒散服六剂更以金银花瓜蒌甘草节二十余剂患指溃脱更以芎归生地连翘金银花白芷二十余剂而愈

次年忽发渴服生津等药愈盛用八味丸而止大抵此症皆由膏粱厚味或房劳太过丹石补药所致其发於指微赤而痛可治治之不愈急斩去之庶可保否则不治色紫黑或发於脚背亦不治或先渴而後发或先发而後渴色紫赤不痛此精气已竭决不可治

一乌菟左足指患一泡麻木色赤次日指黑五日连足黑冷不知疼痛脉沉细此脾胃受毒所致进飞龙夺命丹一服翌日令割去足上死黑肉割後骨始痛可救治以十全大补汤而愈【

此因症肉黑知为毒盛不在於脉也】

盖死肉乃毒气盛拒截荣气所致况至陰之下血气难达经曰风淫末疾是也向若攻伐之则邪气乘虚上侵必不救矣

一人足指患之大痛色赤而肿隔蒜灸之痛止以人参败毒散去桔梗加金银花白芷大黄而溃更以仙方活命饮而痊【此凭症也】

此症形势虽小其恶甚大须隔蒜灸之不痛者宜明灸之庶得少杀其毒此症因膏粱厚味酒面灸?积毒所致或不慎房劳肾水枯竭或服丹石补药故有先渴而後患者有先患而後渴者皆肾水涸不能制火故也初发而色黑者不治赤者水未涸尚可若失解其毒以致肉死色黑者急斩去之缓则黑延上足必死而患不问肿溃惟隔蒜灸有效亦有色赤作痛而自溃者元气未脱易治夫至陰之下血气难到毒易腐肉药力又不易到况所用皆攻毒之药未免先肝肠胃又不能攻敌其毒不若隔蒜灸并割去最为良法孙真人云在指则截在肉则割去即此意也

一人足指患之色黑不痛令明灸三十余壮而痛喜饮食如常予谓急割去之速服补剂彼不信果延上遂致不救

一人脚背患之色黯而不肿痛烦躁大渴尺脉大而濇此精气已絕不治後歿

又有手指患此色黑不痛其指已死予欲斩去速服补药恐黑上臂不治彼不信另服败毒药手竟黑遂不救

一人足指患之色紫不痛隔蒜灸五十余壮尚不知痛又明灸百壮始痛更投仙方活命饮四剂乃以托?药溃脱而愈【此凭症也】

一人脚背患此赤肿作痛隔蒜灸三十余壮痛止以仙方活命饮四剂而溃更以托里消毒药而愈【此凭症也】

一人足指患之色赤焮痛作渴隔蒜灸数壮以仙方活命饮三剂而溃更服托里药及加減八味丸溃脱而愈

一妇修伤次指成脓不溃焮痛至手悞敷冷药以致通溃饮食少思彼为毒气内攻胛脉沉细此痛伤胃气而然遂刺之服六君子加藿香当归食进更以八珍汤加黄蓍白芷桔梗月余而愈【此凭症脉也】

一人伤拇指色紫不痛服托里药及灸五十余壮作痛溃脓而愈【此凭症也】

一幼女因冻伤两足至春发溃指俱坏令取之服大补药而愈【此凭症也】

一女患嵌甲伤指年逾不愈日出脓数滴予谓足大指乃脾经发源之所宜灸患处使瘀肉去阳气至疮口自合否则不治彼惑之不早治後变劳症而殁盖至陰之下血气难到女人患此多因紮缚致血脉不通或被风邪所袭则无血气荣养遂成死肉惟当壮脾胃行经络生血气则愈有成破伤风以致牙关紧急口眼喎邪者先玉真散【一百二】一二服然後投以生血通经则可

面疮一百二十【附颐毒】

一人年逾三十夏月热病後患颐毒积日不溃气息奄奄饮食少思大便不禁脉如无经曰脉息如无似有细而微者阳气衰也齐氏曰饮食不入大便滑利肠胃虚也以六君子加炮姜肉豆寇破故纸数剂泄稍止食稍进更加黄柏当归肉桂溃而脓水清稀前药每服加熟附一钱数剂泄止食进脓渐稠再以十全大补汤加酒炒芍药白朮月余而愈【此凭脉症也】

一人年踰四十胃气素弱面常生疮盗汗发热用黄耆建中汤少愈更用补中益气汤而平【此凭症也】

东垣云气虚则腠理不密邪气从之逆於肉理故多生疮若以甘温之剂实其根本则腠理自固即无他疾

一人年三十面患疮溃已作渴自服托?及降火药不应脉浮而弱丹溪曰溃?作渴属气血俱虚遂以参耆各三钱归苈木各二钱数服渴止又以八珍汤加黄耆数剂脉斂而愈【此凭脉症也】

一人年四十头面生疮数枚焮痛饮冷积日不溃服清热消毒不应脉数按之即实用防风通圣散【四十】二剂顿退又以荆防败毒散【七】而愈【此凭脉症也】

一人年逾六十素食厚味颊颧患毒未溃而肉先死脉数无力此胃经积毒所致然颊颧正属胃经未溃肉死则胃气虚极老人岂宜患此果殁经曰膏粱之变足生大丁受如持虚此之谓也

口齿一百二十一

一人齿痛脉数实便秘用防风通圣散即愈【此凭脉症也】一人齿痛甚胃脉数实以承气一剂即止【此凭脉症也】一老齿痛午後则发至晚尤甚胃脉数而实以凉膈散加荆芥防风石膏一剂而瘳【此凭症脉也】

一人齿痛胃脉数而有力以清胃散加石膏荆芥防风二剂而痊【此凭脉症也】

一人齿痛脉浮无力以补中益气汤加黄连生地黄石膏治之不复作【凭脉症也】

一人齿痛脉数无力用补中益气加生地牡丹皮而愈一人齿肿痛焮至颊颧素善饮治以清胃散数剂而愈一人齿痛服清胃散不应服凉隔散愈盛予用补肾丸【四四】而愈【此条因治不効而知为肾虚也】

一人颊颧肿焮至牙龈右关脉数此胃经风热上攻也治以犀角升麻汤而消【此凭症脉也】

一妇常口舌糜烂颊赤唇乾眼溢作渴脉数按之则濡此心肺壅热於气血为患名热劳症也当多服滋陰养血药彼欲速効用败毒寒剂攻之後变瘵而歿良方云妇人热劳者由心肺壅热伤於气血气血不调臟腑壅滯热毒内积不得宣通之所致也其候心神烦躁颊赤头痛眼溢唇乾四肢壮热烦渴不止口舌生疮神思沉昏嗜卧少寐饮食无味举体酸疼或时心怔或时盗汗肌肤日渐消瘦故名热劳也口舌疮一百二十二

一人胃弱痰盛口舌生疮服滚痰丸愈盛吐泻不止恶食倦怠此胃被伤也予以香砂六君子汤服数剂少可再以补中益气加茯苓半夏二十余剂而愈夫胃气不足饮食不化亦能为痰补中益气乃治痰之法也苟虚症而用峻利之药鲜有不殆

一人年踰四十貌丰气弱遇风则弦劳则口舌生疮胸常有痰日常赤溢服八味丸而愈【此凭症也】

一人脾胃虚初服养胃汤枳术丸有効久服反虚口舌生疮劳则愈盛服败毒药则呕吐此中气虚寒也治以理中汤少愈更以补中益气加半夏茯苓月余而平夫养胃汤香燥药也若饮食停滯或寒滯中州服则燥开脾胃宿滯消化少为近理枳术丸消导药也虽有白术终是燥剂故久服此二药津液愈燥胃气愈虚况胃气本虚而用之岂不反甚其病哉亦有房劳过度真阳虚惫或元稟不足不能上蒸中州不运致食不进者以补真丸【三四】治之使丹田之火上蒸脾土则脾土温和中焦自治饮食自进经曰饮食不进胸膈痞塞或食不消大府溏泄此皆真火不能上蒸脾土而然也若肾气壮则丹田之火上蒸脾土则无此病矣一方小儿口疮江茶粉草为末傅之一方用黄丹

又方 苦参 黄丹 五倍子 青黛等分研为末敷又方 青黛 芒消 为末傅

胎毒口疮 五倍子 黄丹 江茶 芒硝 甘草等分为末傅

咽喉一百二十三

疼痛或寒热者邪在表也宜发散

肿痛痰涎壅盛者邪在上也宜降之

痛而脉数无力者属阴虚宜滋阴降火

肿痛发热便秘者表证俱实也宜解表攻下如症紧急便秘刺患处或刺少商穴

一人咽喉脉数以荆防败毒散加黄连二剂少愈乃去芩连又六剂而愈【此凭脉症也】

一人乳蛾肿痛脉浮数尚未成脓针去恶血饮荆防败毒散二剂而消【此凭症也】

一人咽喉作痛痰涎上壅予欲治以荆防败毒散加连翘山梔玄参牛蒡子饮自服甘寒降火之药反加发热咽愈肿痛急刺少商二穴仍以前药加麻黄汗之诸症并退惟咽间一紫泡仍痛此欲作脓以前药去麻黄一剂脓溃而愈【此凭症也】

凡咽喉之疾治之曰或势轻者宜荆防败毒散以散之治之迟或势重者宜刺少商穴瘀血已结必刺患处亦有刺少商咽虽利而未痊愈者必成脓也然脓去则安若有大便秘结者内经针刺去血必以防风通圣散急攻之然甘寒之剂非虚火不宜用

一妇咽喉肿痛大小便秘以防风通圣散【六】一剂诸症悉退又荆防败毒散服三剂而安【此凭症也】

治此轻则荆防败毒散吹喉散

重则用金钥匙及刺患处出血最效否则不救针少商二穴亦可但不若刺患处之神速耳

一人咽喉肿痛脉数而实以凉膈散一剂而痛止再以荆防败毒散加牛蒡子二剂而肿退以荆防败毒散二剂又以甘桔荆防玄参牛蒡子四剂而平

一人咽喉肿痛脉浮数更沉实饮防风通圣散【六】一剂泻一次势顿退又荆防败毒散二剂而消【此凭症脉也】

一人咽喉肿秘牙关紧急针不能入先刺少商二穴出黑血口即开更针患处饮清咽利隔散一剂而愈【此凭症也】大抵吐痰针刺皆有发散之意故多效不用针刺多致不救

一人咽喉肿闭痰涎壅甚以胆矾吹咽中吐痰碗许更以清咽利隔汤四剂而安【此凭症也】

一人咽喉肿痛药不能下针患处出紫血少愈以破棺丹噙之更以清咽消毒散饮而愈【此凭症也】

一人咽喉乾燥而痛以四物汤又加黄栢知母玄参四剂少愈再用人参固本丸只一剂不复发

一人口舌生疮服凉药愈甚治以理中汤【二七】而愈【此因治误而变】

一人咽痛午後益甚脉数无力以四物汤【九】加黄栢知母荆防四剂而愈仍以前药去荆防加玄参甘桔数剂後不再发

一人口舌糜烂服凉药愈甚脉数无力以四物加酒炒黄栢知母玄参一剂顿退四剂而痊【此凭脉症也】

一人口舌生疮饮食不甘劳而愈甚以理中汤顿愈【此凭症也】

一人口舌生疮脉浮而缓用补中益气汤【十六】加炮乾姜更以桂末含之即愈

一人患之劳而愈甚以前药加附子三片二剂即愈丹溪曰口疮服凉药不愈者此中气不足虚火从上无制用理中汤甚则加附子

一弱人?痛服凉药或遇劳愈甚以补中益气汤【十六】加芩连四剂而愈乃去芩连又数剂不再发【此凭症也】常治午後痛去芩连加黄栢知母玄参亦効

一老咽痛日晡甚以补中益气汤【十六】加酒炒黄栢知母数剂而愈【此凭症也】

一人乳蛾肿痛饮食不入疮色白其脓已成针之脓出即安【此凭症也】

一人咽喉肿痛予欲针之以泄其毒彼畏针止服药然药既熟已不能下矣始急针患处出毒血更以清咽消毒药而愈

一患者其气已絶心头尚温急针患处出黑血即苏如鲍符卿乔侍郎素有此症每患针去血即愈

大抵咽喉之症皆因火为患其害甚速须分缓急及脓成否若肿闭及壅塞者死如反掌宜用金钥匙吹患处吐出痰涎气得流通则苏若吐後仍闭乃是恶血或脓毒须急针患处否则不治前人云喉闭之火与救火同不容少待治喉之方固多惟用针有回生之功学者不可不察

一妇咽间作痛两月後始溃突而不斂遍身筋骨作痛诸药不应先以萆薢汤数剂而斂更以四物汤【九】倍用萆薢黄耆二十余剂诸症悉退【此凭症也】

一弥月小儿先於口内患之後延於身年余不愈以萆薢为末乳汁调服母以白汤调服月余

而愈【此凭症也】

一人咽间先患及於身服轻粉之剂稍愈已而复发仍服之亦稍愈後大发上腭溃蚀与鼻相通臂腿数枚其状如桃大溃年余不斂神思倦怠饮食少思虚症悉具投以萆薢汤为主以健脾胃之剂兼服之月余而安【此凭症也】

一妇患之脸鼻俱蚀筋骨作痛脚面与膝各肿一块三月而溃脓水淋漓半载不斂治以前药亦愈【此凭症也】

一人?喉肿痛口舌生疮先以清?消毒散【六三】二服更以玄参升麻汤而愈【此凭症也】

一人咽喉作痛午後尤甚以四物加酒炒知母黄栢桔梗治之而愈【此凭症也】

一人喉闭服防风通圣散肿不能咽此症惟针乃可牙关已闭刺少商出血口即开以胆矾吹患处吐痰二碗许仍投前药而愈 尝见此疾畏针不刺多毙【此凭症也】

一人喉闭肿痛寒热脉洪数此少陰心火少阳相火二脏为病其症最恶惟刺患处出血为上彼畏针以凉隔散【二六】服之药从鼻出急乃愿针则牙关已紧遂刺少商二穴以手勒出黑血口即开仍刺喉间治以前药及金钥匙【四六】吹之顿退又以人参败毒散【六二】加芩连玄参牛旁子四剂而平

经曰太髡发之出血亦发汗之一端河间曰治喉闭之火与救火同不容少怠尝见喉闭不去血喉风不去痰以致不救者多矣每治咽喉肿痛或生疮毒以荆防败毒加芩连重者用防风通圣散并效

一人患此劳则愈盛以补中益气加元参酒炒黄栢知母而愈【此凭症也】

一人口舌常破如无皮状或咽喉作痛服清咽利膈散愈盛治以理中汤而愈【此因治不应而更方也】

精要曰凡痈疽失於治疗致令热毒冲心咽咙口舌生疮甚至生红黑?难於治疗宜琥珀犀角膏生犀角屑真琥珀【研】辰砂【研】茯神?【皮】

酸枣仁【去殼研】人参【各一钱】脑子【研一字】右为细末入乳鉢研匀炼蜜溲为膏磁器盛贮疾作每服一弹子大浓煎麦門冬汤化下一日连进五服或先服犀角散以解之 生犀角屑玄参【去芦】升麻生黄蓍赤芍药麦門冬生甘草当归【各一两】大黄【微炒二两】为粗末每服

三钱水盞半煎至七分去滓温服

诸哽一百二十四

诸骨哽用象牙末吹患处或取犬涎徐徐咽下立効用苕根捣烂丸如弹子大就将所哽物煎汤化下又方食橄?用核为末含之亦効

谷麦芒在咽不出取鸡鷺涎含之立消

误吞金银等物多食诸般肥肉膏滑自从大便出误吞铜钱用炭末白汤调服多食蜜食饴糖自从大便出或多食荸荠或胡桃肉钱自消

误吞针用磁石如枣核大磨令光鑽一孔用线穿含之针自口出

伤损脉法一百二十五【附破伤风】

经云肝脉转坚而长色不青当病坠若转因血在脇下令人呕逆

金匱云寸口脉浮微而濇当亡血若汗出者当身有疮被刀斧所伤亡血故也

脉经云金疮出血太多脉虚细者生数实大者死

金疮出血脉沉小者生浮大者死斫刺出血不止者脉来大者七日死滑细者生

从高颠仆内有瘀血腹胀脉坚强者生小弱者死破伤有瘀血在内脉坚强实则生虚小弱者死皆为脉病不相应故也

一妇臀痈疮将愈患破伤风发热搐搦脉浮数治以当归地黄汤不信乃服发散败毒药果甚始信而服之至数剂而痊

脉浮数而发表今用发表而病重可见脉之浮数亦有主陰虚者必兼症参之为稳认作陰虚由臀痈後也

夫破伤风症须分表?别虚实不可一槩治之【原病式】经云破伤中风之由因疮热甚鬱结而荣卫不得宣通沸热因之遍体故多白痴是时疮口闭塞气难通泄热甚则生风也不已则表传於?矣但有风热微甚兼化故殊异耳

一法破伤中风风热燥甚怫鬱在表而?气尚平者善伸数欠筋脉拘急时或恶寒或筋畅而搐脉浮数而弦者宜辛热治风之药开冲结滯而犹伤寒表热怫鬱而以麻黄汤辛热发散者同也凡用辛热开冲风热结滯宜以寒药佐之则良免致药虽中病而风热转甚也如治伤寒发

热用麻黄桂皮加黄芩知母石膏之类足也若世以甘草滑石葱?寒药发散甚妙若表不已渐伤入?里又未大甚而脉在肌肉者宜以退风热开结滞之寒药调之或微加治风辛热亦得犹伤寒在半表半里以小柴胡和解之意也若?热已甚而舌强口禁项背反张惊搐惕搦涎唾涸枯胸腹满塞而或便溺秘结或时汗出脉洪数而弦也然汗出者由风热鬱甚於?而表热稍罢则腠理疏泄而心火热甚故汗出也法宜除风散结寒药下之後以退风热开鬱滞之寒药调之而热退结散则风自愈矣凡治此亦宜按摩导引及以药斡开牙关勿令口禁使粥药得下也

病机云破伤风者有因卒暴损伤风袭之间传播经络致使寒热更作身体反张口禁不开甚者邪气入藏有因诸疮不差荣卫俱虚肌肉不生疮眼不合邪亦能外入於疮为破伤风之疾有诸疮不差举世皆言着灸为上是为熟疮而不知火热客毒逐经传变不可胜数微则发热甚则生风而搐或角弓反张口禁目斜亦有破伤不灸而病此者因疮着白痂疮口闭塞气难通泄故阳热易为鬱结热甚则生风也【徐用诚】云此论所因有四一者因疮口入风似属外因一者因疮口闭塞内热生风似属内因也【又云】破伤风症古方药论甚少岂非以此疾与中风同论故不另立条目也唯河间论与伤寒表?中三法同治用药甚详其言病因有因外伤於风有因灸及内热所作者然与中风相似也但中风之人尚可淹延岁月而破伤风者犯之多致不救盖中风有在经在脏在府之异独入臟者最难治破伤风或始而出血过多或疮早闭合瘀血停滞俱是血受病属陰五臟之所主故此风所伤始虽在表随则必传入?脏故多死也此病或疮口袒露不避风寒而有所伤或疮口闭合密被风邪而及病已十分安全而忽有此大抵皆由内气虚而有鬱热者得之若内气不虚而无鬱热者虽伤而无所害也

跌蹶一百二十六

一人坠马两脇作痛以复元活血汤二剂顿止更以小柴胡加当归桃仁二剂而安【此凭症也】

一老坠马腹作痛以复元通气散用童便调进二服少愈更以四物加柴胡桃仁红花四剂而安【此凭症也】

一人跌仆皮肤不破两脇作疼发热口乾自汗须先饮童便一瓯烦渴顿止随进复元活血汤倍用柴胡青皮一剂胀痛悉愈又剂而安【发明经】曰从高坠下血流於内不分十二经络圣人俱作风中肝血留於脇下以中风疗之血者皆肝之所主恶血必归於肝不问何经之伤必留於脇下盖肝主血故也痛甚则必自有汗但人汗出皆为风症诸痛皆属於肝木况败血凝滞从其所属入於肝也从高坠下逆其所行之血气非肝而何故用破血行经

一人青肿作痛以萝卜汁调梔子末敷之以四物汤加柴胡黄芩天花粉川山甲二剂少愈更以托?散健脾药而愈【此凭症也】

杖疮血热作痛一百二十七

胸膈胀满宜行血老弱者宜行气活血更饮童便酒腸痛者宜下血血去多而烦躁者补血如不应独参汤或瘀肉不溃或溃而不斂宜大补气血

一人杖疮瘀肉不腐乃大补之渐腐更以托?健脾药而愈【此凭症也】

一人风入杖疮牙关紧急以玉真散一服少愈再服而安

一官諫南巡受杖瘀血已散坏肉不溃用托?药稍溃脓清此血气虚也非大剂参蓂不能补彼恐腹满予强之饮食稍思遂加大补肉溃脓稠而愈【此凭症也】

一尝治被杖数人皆先散其瘀血渐用排脓托?之药俱愈 夫叫号伤气忍痛伤血气血虚明矣况脾主肌肉脾气受伤饮食必减血一冰则肌肉不生故必理脾脾健肉自生非参术归蓂之类培养脾土则肌肉何由而生 又须分人虚实及有无瘀血盖打扑坠堕皮肉不破肚腹作疼者必有瘀血在内宜复元活血汤【三】 攻之老弱者加桃仁红花川山甲补而行之 若血去多而或烦燥此血虚也宜独参汤补之有打扑坠堕稍轻别无瘀血等症但只痛不止者

惟和气血调经脉其痛自止更以养气血健脾胃无有不効
亦有痛伤胃气作呕或不饮食以四君子加藿香砂仁当归治之

若有瘀血不先消散而加补剂则成实实之祸设无瘀血妄行攻利则致虚虚之祸矣

一人因杖臀膝俱溃脓瘀未出时发昏愤此脓毒内作也急开之昏愤愈盛此虚也投八珍汤【十四】一服少可数服死肉自溃顿取之用猪蹄汤洗净以神効当归膏涂贴再服十全大补汤两月而愈若更投破血之剂危矣【此凭症也】

大抵杖疮皆瘀血为患宜速治疗浅者砭之深者刺之更以活血流气药治之内溃者开之有腐肉取之以壮胃生血药托之可保无危 有伤筋骨而作痛者以没药降圣丹治之
若牙关紧急或腰背反张者以玉真散治之并効

杖疮热血作痛以凉血去瘀血为先须下鸡鸣散之类黄栢 生地黄 紫金皮皆要药 生地黄黄栢为末童便调傅或加韭汁不破者以韭菜葱头舂碎炒热贴冷则易

膏药 紫金皮 生地黄 黄栢 乳香 没药 大黄之类 又方 大黄黄栢为末生地黄汁调傅乾则易 又方 野苳根嫩者不拘多少洗净同盐擂傅伤重多用盐効

尝见覆车压伤者七人仆地呻吟一人未苏俱即令以热童便灌之皆得无事又曾被重车研伤督闷良久复苏胸满如筑气息不通随饮热童便一碗胸宽气利惟小腹作痛与复元活血汤【百三】一剂便血数升许痛肿悉退更服养血气药而痊

大凡损伤不问壮弱有无瘀血俱宜热童便以酒佐之推陈致新其功甚大 若脇胀或作痛或发热烦躁口乾喜冷饮热童便一瓯胜服他药他药虽亦取効但有无瘀血不能尽识反致悞人惟童便不动脏腑不伤血气闻操军或坠马伤者服之亦佳又凡肿痛或伤损者以葱捣烂热罨之尤妙本草云葱大利伤损

一人坠马伤头并臂取葱捣烂炒热罨患处以热手熨之服没药降圣丹【百四】而愈

一人误伤去小指一节牙关紧急腰背反张人事不知用玉真散【一百二一】青州白丸子【百六】各一服未应此亦药力不能及也急用蒜捣烂裹患指以艾灸之良久觉痛仍以白丸子一服及托?散数服而愈

夫四肢受患风邪所袭遏絶经络者古人所制淋渍贴?刺等法正为通经络导引气血也

火疮一百二十八

一人火疮骤用凉药敷贴更加腹胀不食予以人参败毒散【六二】加木通山梔外用栢叶炒为末麻油调搽渐愈

尝用煮大汁上浮脂调银朱更效若用凉药逼火毒入内多致不救
汤火疮以淋了第二次灰搽傳患处

又方 以腊月猪胆涂黄栢灸乾为末傳

热油汤火伤皮烂肉大痛冷霜散 牡蛎【煅】寒水石【生】明朴硝 青黛【各一两】轻粉【一钱】桐油【二钱】水一钱以桃柳枝不住手搅成膏再以少水溶涂之外用猫儿肚底毛细剪掺上新水或油调湿则乾贴痛立止漆疮一百二十九

一人漆疮作呕由中气弱漆毒侵之以六君子加砂仁藿香酒炒芍药彼不为然服连翘消毒散呕果盛复邀治以前药外以香油调铁锈末涂之而愈

外科理例卷六

卷七

钦定四库全书

外科理例卷七

明 汪机 撰

天泡疮一百三十

脉浮发热或拘急者发散表邪

脉沉发热便秘者解表攻?

发热小便赤澀者分利消毒

一小儿患此焮痛发热脉浮数挑去毒水以黄栢滑石末敷之更饮荆防败毒散【七】二剂而愈【此凭症也】

一人焮痛发热服祛风清热药愈炽其脉沉实乃邪在内也用防风通圣散【四十】一剂顿退又荆防败毒散【七】二剂而安【此凭症脉也】

此症须为风热当审表?治无悞矣

一儿焮赤发热以黄栢滑石末敷之饮大连翘汤【六九】二剂少愈更以金银花散【一百十一】二剂而痊【此凭症也】

一儿十余岁背侧患水泡数颗发热脉数此肺胃风热所致名曰天泡疮以荆防败毒散【七】加芩连外去毒水以金黄散【六四】敷之又四剂而愈【此凭症也】

一有腹患此延及腰背焮痛饮冷脉数按之愈大乃表?俱实也用防风通圣散【四十】一剂更敷前药势减大半再以荆防败毒散【七】二剂而愈

杨梅疮一百三十一【有从咽喉患起者见咽喉】

湿胜者宜先导湿 表实者宜先解表

里实者宜先疎里 表里若俱实解表攻里

表虚者补气 里虚者补血 表里俱虚者补气血 一人遍身皆患左手脉数以荆防败毒散【七】表症乃退以仙方活命饮【立元】六剂疮渐愈兼萆薢汤服月余而痊

一妇焮痛发热便秘作渴脉沉实以内疎黄连汤【三】二剂里症已退以龙胆泻肝汤【六立】数剂疮毒顿退间服萆薢汤至月余而痊【此凭症脉症也】

一人下部生疳诸药不应延及遍身突肿状如翻花筋挛骨痛至夜尤甚此肝肾二经温热所致先以导水丸令进五服次以龙胆泻肝汤【六五】数剂再与除湿健脾之药外贴神异膏吸其脓膈蒜灸拔其毒而愈【此凭症也】

若表实者以荆防败毒散

里实者以内疎黄连汤表里俱实者防风通圣散【四十】气虚者四君子 血

虚者四物仍加兼症之药并愈 若服轻粉等药反收毒于内以致迭发
槩服防风通圣则气血愈虚因而不治者多矣

一人患之发寒热作渴便秘两手脉实用防风通圣散【四十】而退以荆防败毒散【七】兼龙胆泻肝汤【六五】而痊【此凭症也】

一人患之肿痛先以龙胆泻肝汤【六五】导水丸各四剂少愈再以小柴胡加黄栢苍术五十余剂而平【此凭症也】

一人玉jing肿溃小便赤色肝脉弦数以小柴胡加木通青皮龙胆草四剂又龙胆泻肝汤【六五】数剂而痊【此凭脉症也】

一童玉jing患之延及小腹数枚作痛发热以小柴胡汤【五】吞芦会丸更贴神异膏月余而痊【此凭症也】

一人愈後腿肿一块久而溃烂不斂以蒜捣烂敷患处以艾灸其上更贴神异膏及服黑丸子并托?药两月而愈【此凭症也】

一妇燃轻粉药於被中薰之致遍身皮塌脓水淋漓不能起居以滑石黄栢为末綠荳粉等分铺席上令可卧更以金银花散月余而痊【此凭症也】

一人皆愈但背肿一块甚硬肉色不变年余方溃出水三载不愈气血俱虚饮食少思以六君子汤【三】加当归藿香三十余剂更饮萆薢汤两月余而痊【此凭症也】

一人患之势炽兼脾胃气血皆虚亦服前药而差一妇患之皆愈惟两腿两膝各烂一块如掌兼筋挛骨痛三载不愈诸药不应日晡热甚饮食少思以萆薢汤兼逍遥散倍用白术茯苓数

剂热止食进贴神异膏更服八珍汤【十四】加牛膝杜仲木瓜三十余剂而痊【此凭症也】

又捷法治杨梅疮不问新旧并効不过旬日每日用胆矾白矾末并水银各三钱五分入香油津吐各少许和匀坐无风处取药少许涂两脚心以两手心对两脚心擦磨良久再涂药少许仍前再擦用药尽即卧汗出或大便去垢口出涎为验连擦三日煎通圣散【四十】澡洗更服内疎黄连汤败毒散愈後服萆薢汤有热加芩连气虚参蓂血虚四物之类

一人杨梅疮後两腿一臂各溃二寸许一穴脓水淋漓少食不睡久而不愈以八珍汤加茯神酸枣仁服每日以蒜捣烂涂患处灸良久随贴膏药数日已可却用豆灸更服十全大补汤【十三】而愈【此凭症也】

凡有肿硬或作痛亦用蒜灸及敷中和膏内服补药并効

班疹一百三十二【附小儿丹毒痘後毒】

脉浮者消风为主

脉浮数者祛风清热

脉数按之沉实者解表攻里

一妇患班作痒脉浮以消风散【七八】四剂而愈【此凭症也】一妇患班作痒脉浮数以人参败毒散【六二】二剂少愈更以消风散【七八】四剂而安【此凭症也】

一人患班色赤紫焮痛发热喜冷脉沉实以防风通圣散一剂顿退又以荆防败毒散【七】加芩连四剂而愈

一老患疹色微赤作痒发热以人参败毒散【六二】二剂少愈以补中益气汤加黄芩山梔而愈【此凭症也】

一妇患班痒痛大便秘脉沉实以四物加芩连大黄槐花而愈【此凭症也】

一儿患班作痛发热烦渴欲服清凉饮下之胗脉不实举按不数此邪在经络不可下用解毒防风汤二剂而安

此症小儿多患之须审在表在里及邪之微甚而治之前人谓首尾俱不可下者何也曰首不可下者为班未见於表下则邪气不得伸越又脉症有表而无里故禁首不可下也尾不可下者班毒已显於外内无根蒂大便不实无一切症下之则班气逆故不可下也

一人作痒发热以消毒犀角饮甫一剂作吐泻此邪上下俱出也毒自解少顷吐泻俱止其疹果消吐泻後脉见七芤此小儿和平脉也邪已尽矣不须治果愈洁古云班疹为症各异发焮肿于外者少阳属三焦相火也谓之班若小红靨行于皮肤之中不出者属少阴君火也谓之疹凡显班症若有吐泻者甚勿乱治而多吉谓邪上下出也班疹并出小儿难禁是以别生他症也首尾不可下大抵安里之药多发表之药少秘则微疎之令邪气不壅并而作次以出使儿易禁也身温暖者顺身凉者逆

一子痘毒及时针刺毒不内侵数日而愈

大抵古人制法浅宜砭深宜刺便瘀血去于毒聚之始则易消况小儿气血又弱脓成而不针砭鲜不毙矣

一儿臂患痘毒作炒按之复起此脓胀痛而然遂刺之以托之而愈

痘後肢节作肿而色不赤宜金银花散【一百十一】更以生黄豆末热水调敷乾以水润自消若敷六七日脓已成急刺之宜服托里药

一儿痘疮已愈腿上数枚变疳蚀之用雄黄铜绿等分为末敷兼金银花散而愈若患遍身用出蛾绵璽填实白矾末烧候汁乾取出为末放地上盖良久出火毒服之効

一儿痘後搔痒搔破成疮脓水淋漓用经霜陈茅草为末服之及铺蓆上兼服金银花散【一百十一】而愈若用菉荳活石末亦可但不及茅草功速

一儿周岁患丹毒延及遍身如血染用磁锋击刺遍身出黑血以神功散【六八】涂之服大连翹饮而愈

又儿未满月陰囊患此为前治之而愈

又儿不欲刺毒入腹而死河间云丹从四肢延腹者不治予尝刺毒未入腹者无不効

一小儿腿患丹如霞游走不定先以麻油涂患处砭出恶血更以金银花【一百十一】一剂而安【此凭症也】

一小儿遍身皆赤砭之投解毒药即愈【此凭症也】

一人患丹毒焮痛便秘脉数而实服防风通圣散不应令砭患处去恶血仍用前药即愈【此凭脉症也】

一小儿患之外势须轻内则大便不利此在藏服大连翹饮敷神功散而差【此凭症也】

一小儿遍身亦赤不从砭治以致毒气入腹而死此症乃恶毒热血蕴蓄于命门遇相火而合起也如霞片者须砭去恶血为善如肿起赤色游走不定者宜先以生麻油涂患处砭之以泄其毒凡从四肢起入腹者不治须丹有数种治者有数法无如砭之为善常见患稍重者不用砭法俱不救也

肠痛一百三十三

小腹硬痛脉迟紧者瘀血也宜下之

小腹软痛脉洪数者脓成也宜托之

一产妇小腹痛小便不利以薏苡仁汤二剂痛止更以四物加桃仁红花下瘀血升许而愈

大抵此症皆因荣卫不调或瘀血停滞所致若脉洪数已有脓脉但数微有脓脉迟紧乃瘀血下之则愈若患甚者腹胀大转侧作水声或脓从脐出或从大便出宜蜡矾丸太乙膏及托药

一妇小腹胀痛小便如淋尺脉芤而迟以神效瓜蒌散二剂少愈更以薏苡仁汤二剂而愈【此凭脉症也】

一人脓已成用云母膏一服下脓升许更以排脓托药而愈後因不守禁忌以致不救【此凭症也】

一人急後重时或下脓胀痛脉滑数以排脓散及蜡矾丸而愈【此凭症脉也】

一妇小腹痛有块脉芤而濡以四物汤加玄胡红花桃仁牛膝木香而愈【此凭脉也】

一妇小腹隐痛大便秘澁腹胀转侧作水声脉洪数以梅仁汤一剂诸症悉退以薏苡仁汤二剂而差【此凭脉症也】

一妇腹胀痛皮毛错纵小便不利脉数滑以太乙膏一服脓下升许胀痛顿退以神效瓜蒌散二剂而全退更以蜡矾丸及托药十余剂而安【此凭脉症也】

一妇因经水多服澁药止之致腹作痛以失笑散用二服而瘳【此凭症也】

一人小腹痛而坚硬小便数汗时出脉迟紧以大黄汤一剂下瘀血合许以薏苡仁汤四剂而安【此凭脉也】

一妇小腹恶露不尽小腹痛以薏苡仁汤【五七】下瘀血而痊【此凭症也】
凡瘀血停澁宜急治之缓则腐为脓最难治疗若流满节骨则患骨疽失治多为败症

肠痈身甲错腹皮急按之濡如肿状腹无聚积身无热此久积冷所致故金匱有用附子温之若小腹胀痞按之痛如淋小便自调发热身无汗复恶寒脉迟紧脓未成可下之当有血洪数者脓已成不可下此内结热所成故金匱有用大黄利之甚者腹胀大转侧闻水声或遶脐主疮脓从疮出者有出脐中者不治必死惟大便下脓血者自愈

一妇病少腹痞坚小便或澁或时汗出或复恶寒此肠痈也脉滑而数脓为已成设脉迟紧即为瘀血血下则愈【此凭症脉也】

内经载有息积病此得之二三年遍身微肿续乃大肠与脐连日出脓遂至不救此亦肠痈之类

肠痈作湿热积治入风难治千金谓妄治必杀人要略以薏苡仁附子败毒散千金以大黄牡丹汤三因以薏苡汤千金又有灸法曲两肘头正肘锐骨灸百壮下脓血而安

一人伤寒踰月既下内热未已脇及小腹偏左肿满肉色不变俚鑿为风矢所中以膏摩之月余毒循宗筋流入辜丸赤肿如瓠翁胗关尺滑数且芤曰数脉不时见当生恶疮关芤为肠痈用保生膏外衣以乳香用硝黄作汤下之脓如糜者五升许明日再围余脓而差【此凭脉症也】

一妇肠中痛大便自小便出胗之芤脉见于关此肠痈也以云母膏分作百十丸煎黄蓍汤吞之利脓数升而安

一女腹痛百方不应脉滑数时作热腹微急曰痛病脉沉细今滑数此肠痈也以云母膏一两丸如梧桐子以牛皮胶熔入酒中并水吞之饷时服尽下脓血愈【此凭脉也】

一人年踰五十腹内隐痛小便如淋皮肤错纵而脉滑数此肠痈也滑数脓成以广东牛皮胶酒熔化送太乙膏脓下升许更以排脓托?药及蜡矾丸而愈【此凭脉也】

一妇产後小腹作痛诸药不应其脉滑数此瘀血内溃为脓也服瓜子仁汤【五七】痛止更以太乙膏而愈【此凭脉也】今人产後多有此病纵非痈毒用之更効有人脐出脓水久而不愈亦以前膏及躡矾丸而痊

一儿年十二患腹胀脐突颇锐鑿谓肠痈舍针脐无他法翁曰脐神阙也针刺当禁况痈舍于内惟当以汤丸攻之进透脓散止一剂脓自溃继以十奇汤【四】下善应膏丸而渐差【此凭症也】

肺痈肺痿一百三十四

喘 气急胸满者表散之

欬嗽发热者和解之

欬而胸膈隐痛唾痰腥臭者宜排脓

喘急恍惚疾盛者宜平肺

欬脓脉短者宜补之

肺痿寸口脉数而虚肺痿之候久嗽不已汗出过度重亡津液便如烂瓜下如豕脂小便数而不渴者自愈欲饮者差此由多唾涎沫而无脓

肺疽寸口脉数而实肺疽之候口乾喘满咽喉而渴甚者四肢微肿欬唾脓血或腥臭浊味胸中隐隐微痛候始萌则可救脓成则多死脉若微紧而数者未有脓紧甚而数者已有脓呕脓不止者难治久久如粳米粥者亦难治呕脓自止者自愈其脉短而濇者自痊浮大者难治面色当白反赤者此火尅金皆不可治

内疽皆因饮食之火七情之火相鬱而发饮食者陰受之七情者臟腑受之宜其发在腔子而向内非肝肠胃胃膜也

肺痈先须发表千金曰欬唾脓血其脉数实或口中咳胸中隐痛脉反滑数者为肺痈脉紧数为脓未成紧去俱数为脓已成

要略先以小青龙汤服一贴以解表之风寒然後以葶苈大枣泻肺汤桔梗苇叶汤随症用之以取脓此治肿之例也终以黄耆汤以补之陰气此治溃之例也肺痈已破入风者不治或用太乙膏凡服以搜风汤吐之吐脓血如肺痈状口臭他方不应者宜消风散入男子髮灰清米饮下两服可除

一人喘欬脉紧数以小青龙汤服一剂表症已解更以葶苈大枣汤而喘止乃以桔梗汤愈【此凭脉症也】

一人欬嗽气急胸膈胀满睡卧不安以葶苈散二服少愈更桔梗汤差【此凭症也】

一人项强气促脉浮而紧以参苏饮二剂少愈更以桔梗汤四剂而安【此凭脉症也】

一人欬脇胀满咽乾口燥欬唾腥臭以桔梗汤四剂而陰脓以排脓数服而止乃以补陰托之剂而瘳【此凭症也】

一人欬而脓不止脉不退诸药不应甚危用柘黄丸一服少愈再服顿退数服而痊愈者尤効【此凭症也】

一妇唾脓五心烦热口乾胸闷以四顺散三剂少止以排脓散数服而安【此凭症也】

一人面白神劳欬而胸膈隐痛其脉滑数予以为肺痈欲用桔梗汤不信乃服表药致欬嗽愈甚唾痰腥臭始悟乃服前汤四剂欬嗽少止又以四顺散四剂而脉静更以托?药数剂而愈【此凭脉症也】

大抵劳伤血气则腠理不密风邪乘肺风热相?蕴结不散必致喘 若悟汗下过度则津液重亡遂成斯症若寸脉数而虚者为肺痿数而实者为肺疽脉微紧而数者未有脓紧甚而数者已有脓唾脓自止者脉短而面白者易治脓不止脉洪大而面色赤者不治使其治早可救脓成则无及矣 金匱方论热在上焦者因欬为肺痿得之或从汗出或从呕吐或从渴消小便不利或从便难又被下药快利重亡津液故寸口脉数其人燥咳胸中隐隐而痛脉反滑数此为肺痈咳唾脓血其脉数虚者为肺痿实者为肺痈

一童气禀不足患肺痈唾脓腥臭皮毛枯槁脉浮按之濡更无力治以锤乳粉汤【此凭脉症也】

一弱人咳脓日晡发热夜间盗汗脉浮数而紧用人参五味汤数剂顿退以紫苑茸汤月余而痊【此凭症也】

一仆年踰三十 久不愈气壅不利睡卧脓血甚虚其主已弃矣予以宁肺散一服少愈又服而止大半乃以宁肺汤数剂而痊所谓有是病必用是药若泥前散性澁而不利何以得愈【此凭症也】

凡肿而一日至四五日未成脓而痛者宜灸至不痛灸而不痛或麻木者明灸之

肿硬不作脓或痛或不痛或微痛或疮头如黍者灸之尤効亦有数日色尚微赤肿尚不起痛不甚脓不作者尤宜多灸勿拘日期更服甘温托里药切忌寒凉之剂

瘀肉不腐桑柴火灸之

脉数发热而痛者发于阳也可治脉不数小热不痛者发于陰也难治不痛最恶不可视为常疾此症不可不痛不可大痛顿闷者不治

肿?八十一

肿高焮痛脉浮者邪在表也宜托之 如内托复煎散肿硬痛深脉沉者邪在内也宜下之 如黄连内疎汤仙方活命饮苦参丸

外无焮肿内则便利调和者邪在经络也宜调和荣卫

如托里荣卫汤白芷升麻辈

嗽痛燥烦或咽乾作渴者宜降火

如黄连解毒汤嗽痛发热或拘急或头痛者邪在表也宜散之 如荆防败毒散人参败毒散辈

大痛或不痛者邪气实也隔蒜灸之更用解毒【如仙方活命饮】烦躁饮冷嗽痛脉数者邪在上也宜清之 如清凉饮或金银花散

恶寒而不溃者气实兼寒邪也宜宣而补之 如十宣散

嗽痛发热汗多大渴便秘谵语喉结阳症也宜下之如黄连内疎汤破棺丹辈

一人患肺痿咳 喘急吐痰腥臭胸满咽乾脉洪数用人参平肺散六剂及饮童便诸症悉退更以紫苑茸汤而愈【此凭脉症也】

童便虽云专治火虚常治疮?肿嗽疼痛发热作渴及肺痿肺痛发热口渴者尤効

一妇患肺痿咳 吐痰腥臭日晡发热脉数无力治以地骨皮散热止更用人参养肺汤月余而安【此凭脉症也】

一人咳 喘急发热烦燥面赤咽痛脉洪大用黄连解毒汤【八】二剂少退更以梔子汤服四剂而安【此凭脉症也】

一人春间咳嗽唾脓腥?胸满气促皮肤不泽项强脉数此肺疽也盖肺系在项肺伤则系伤故牵引不能转侧肺主皮毛为气之本肺伤不能摄气故脇胀气促而皮肤纵东垣云肺疮脉微紧而数者未成脓紧甚而数者已有脓其脉紧数脓为已成以参蓂归芎白芷贝母知母桔梗防风甘草麦门瓜蒌仁兼以蜡矾丸及太乙膏脓尽脉濇而愈至冬脉复数经曰饮食劳倦伤脾脾伤不能生肺形寒饮冷伤肺肺伤不能生肾肾水不足则心火炽盛故脉洪数经曰冬见心而莫治果歿火旺之月

一人年踰三十患咳嗽项强气促右寸脉数此肺疽也东垣云风伤皮毛热伤血脉风热相抟血气稽留于肺变成疮疽今脉滑疽脓已成以排脓托里之药及蜡矾丸脉渐濇而愈【此凭脉症也】

一人病胷膈壅满昏不知人予以杏仁薏苡之剂灌之立苏继以升麻黄蓂桔梗消其脓踰月而愈予所以知其病者以阳明脉浮滑陰脉不足也浮为风滑为血聚始由风伤肺故结聚客于肺陰脉不足过于宣逐也诸气本于肺肺气治则出入顺而菀陈除故行其肺气而病自己【此凭脉也】

一人肾气素弱咳唾痰涎小便赤色服肾气丸而愈【此凭症也】

一 妇咳而无痰咽痛日晡发热脉浮数先以甘桔汤少愈後以地骨皮散而热退更以肾气丸及八珍汤加柴胡地骨皮而愈【此凭脉症也】

丹溪云咳而无痰者乃火鬱之症及痰鬱火邪在中用苦梗开之下用补陰降火之剂不已则成劳 此症不得志者多有之又
原病式瘦人腠理疎通而多汗血液衰少而为燥故为劳 之症也

一人年前病肺痈後又患咳 头眩唾沫饮食少思小便频数服解散化痰药不应诊之脾肺二脉虚甚予谓眩暈唾涎属脾气不能上升小便无度乃肺气不得下制内未成痈宜服以加味理中汤脉四剂诸症已退大半更用锤乳粉汤而安【此凭脉也】

河间曰肺痿属热如咳久肺痿声哑声嘶咯血此属陰虚热甚然也本论治肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遗尿小便数以上虚不能制下故也此为肺中冷必眩多痰唾用炙甘草乾姜此属寒也肺痿涎唾多心中湿液湿液者用炙甘草汤此补虚劳也与补陰大热不同是皆宜分治故肺痿又有寒热之异

一人因劳咳嗽不止项强而痛脉微紧而数此肺痈也尚未成脓欲用托里益气药彼不信仍以发散药以致血气愈虚吐脓不止竟致不救

经云肺内主气外司皮毛若肺气虚则腠理不密皮毛不泽肺受伤则皮毛错纵故患肺痈肺痿肠痈者致皮毛如此以其气不能荣养而然也亦有服表药见邪不解仍复发表殊不知邪不解者非邪不能解多因腠理不密而邪复入也专用发表则腠理愈虚邪愈易入反为败症矣若诊其脉邪在表者止当和解而实腠理乘虚复入者亦当和解兼实腠理故用托里益气之药若小便赤澀为肺热所传短少为肺气虚盖肺为母肾为子母虚不能生子故也亦有小便频数者亦为肺虚不能约制耳

一人年踰四十喘咳脇痛胸满气促右寸脉大此风热蕴于肺也尚未成疮属有余之症欲用泻白散【五八】彼谓肺气素怯自服补药喘 愈盛两月後复请视汗出如雨喘而不休此肺气已絕安用治果歿

夫肺气充实邪何从袭邪气既入则宜散之故用泻白散乃泻肺之邪气邪气既去真气自实

一有患此吐脓面赤脉大予谓肺病脉宜濇面宜白今面赤脉大火尅金不可治果歿

胃脘痛一百三十五

胃脘痛当候胃脉人迎者胃脉也其脉沉细气逆则甚甚则热聚胃口而为痛若脉洪数脓已

成迟紧虽脓未就已有瘀血宜急治之否则邪毒内攻腐烂肠胃不可救也宜射干汤

射干【去毛】赤茯苓 梔子 升麻【各一两】

赤芍【两半】白术【半两】右剉水煎入地黄汁一合蜜半合温服 芍药甘草汤
升麻汤随选用之

脑疳一百三十六

一儿头患白疮皮光且急诸药不应名曰脑疳疮乃胎毒挟风热而成服龙胆丸 及吹芦会末于鼻内兼搽解毒散而愈若重者髮结如穗脑热如火遍身汗出顙肿胞高尤当服此药

肺疳一百三十七

一儿欬 喘逆壮热恶寒皮肤如粟鼻痒流涕咽喉不利颐烂吐红气胀毛焦作利名曰肺疳以地黄清肺饮及化愚丸治之而愈

蛔疳一百三十八

一儿眉?多啼呕吐清沫腹痛腹胀筋青唇口紫黑肚门作痒名曰蛔疳服大芦会丸而愈

脊疳一百三十九

有?蚀脊膂食热黄瘦烦温下痢拍背如鼓鸣脊骨如锯齿十指生疮常啮此脊疳也亦宜大芦会丸治之肾疳一百四十

一儿十岁患疮疥久不愈肌瘦寒热作时脑热足冷滑泻肚痛龈烂口臭乾渴瓜黑面黧此肾疳也服六味地黄丸更搽解毒散而愈

鬼击一百四十一

一人被鬼击身有青痕作痛以金银花煎汤饮之即愈

历节风一百四十二

一妇患?寒热焮痛服人参败毒散翌日遍身作痛不能转侧彼云素有此疾每发痛至月余自止服药不应妇人体虚因受风邪之气随血而行淫溢皮肤卒然掣痛游走无常名曰历节风治以四生丸而愈【此凭脉也】

一宜人先两膝後至遍身骨节皆痛脉迟缓用羌活胜湿汤及荆防败毒散七加渗湿药不应次以附予八物汤【七三】一剂悉退再服而愈【此凭脉也】

若脉洪数而痛者宜人参败毒散【六二】有毒自手足起至遍身作痛或颈项结核如贯珠此风湿流气之症宜加减小续命及独活寄生汤【七四】

一人年踰五十筋骨痿软卧床五年遍身瘙痒午後尤甚治以生血药痒渐愈痿少可更以加味四斤丸治之调理谨守年余而痊【此凭症也】

或曰热淫于内药用温补何也盖因血衰弱不能养筋筋缓不能自持阳躁热淫于内宜养阳滋陰阳实则水升火降矣

疮疥一百四十三

瘙痒或脓水浸淫者消风除湿

痒痛无脓者祛风润躁

瘙痒或疼午後尤甚者益陰降火

焮痛大便秘澀者滋陰泻火

搔起白屑耳作蝉声者祛风清热

一妇患此作痒脓水不止脉浮无力以消风散【七八】四剂少愈再四生丸【八四】月余而平【此凭症脉也】

一人痒少痛多无脓水以芩连荆防山梔薄荷 药归身治之而愈【此凭症也】

一妇作痒午後尤甚以当归饮子数剂少愈更以人参荆芥散数剂而安【此凭脉症也】

一人久而不愈搔起白屑耳作蝉声以四生散数服痒止更以当归饮子数剂而痊【此凭症也】

一人下体居多焮痛日晡尤甚腿腕筋紫而胀就于紫处刺去瘀血以四物加芩连四剂而安在上体若臂腕筋紫胀亦宜刺去其血以前汤加柴胡黄芩即愈【此凭症也】

一人搔痒成疮日晡痛甚以四物加芩连荆防数剂而止更以四物加蒺藜何首乌黄蓍二十剂而愈【此凭症也】

一人头目昏眩皮肤瘙痒搔破成疮以八风散治之而愈

一人患疮疥多在两足午後痛甚腿腕筋紫而胀脉洪大此血热也于紫处砭去毒血更以四物加芩连柴胡地骨皮而愈【此凭脉症也】如手臂有疮臂腕筋紫亦宜砭之老弱人患此作痛须补中益气汤加凉血药

一儿周岁先头患疮疥渐至遍身久而不愈用四物汤【九】加防风黄芩升麻外搽毒药散月余而愈【此凭症也】

一小儿疮毒不愈或愈而复发皆因母食炙煖辛辣或有热宜先治母热若小儿不能服药者就于母药中加漏芦煎服儿疮亦愈

一儿头面生疮数枚作痒疮痂积累名曰粘疮以枯矾黄丹等分麻油调搽更服败毒散而愈【此凭症也】

一人腿生湿疮数年不愈尺脉轻胗似大重胗无力此肾虚风邪袭之而然名曰肾藏风疮以四生散为治之彼不信自服芩连等药遂致气血日弱脓水愈多形症愈急迨二年复请予治仍用前药而愈【此凭症脉也】夫肢体有上下臟腑有虚实世人但知苦寒之药能消疮毒不知肾藏风因肾不足所致遂以蒺藜为主黄蓍为臣白附子独活为佐使再若服败毒等药则愈耗元气促之死矣

一人焮痛发热脉浮数以人参败毒散 四剂少愈更以当归饮子数剂而愈【此凭脉症也】

一人遍身作痒搔破成疮出水脉浮数此手足阳明经风热所致以人参败毒对四物汤再加芩连外以松香一两枯矾五钱轻粉三钱为末麻油调敷月余而愈【此凭症也】

一儿头面胸腹患水疮数枚溃而成疮此风邪乘于皮肤也名曰瘰疮饮荆防败毒散更以牛粪烧存性为末传之而愈【此凭症也】

瘰疽为患最毒形如粟许大者如栗患无常处多在手指溃而出血用南星半夏白芷末传之重者见骨或狂言烦闷

一儿鼻下生疮不时揉擦延及两耳诸药不効服芦荟丸搽松香菉荳末而愈

一人湿热下注两腿生疮以人参败毒散加苍术黄柏服之外贴金黄散【此凭症也】

一人焮痛寒热便秘脉数有力以防风通圣散二剂少愈更荆防败毒散 加黄芩山梔四剂而愈【此凭症也】有患此但脉沉实以前药加大黄渐愈再服人参败毒散而平【此凭脉也】

一僧患疮疥自用?黄艾叶等药燃于被中熏之翌日遍身焮肿皮破水出饮食不入予投以解药不应而死

又有患此久而不愈以船板灰存性一两轻粉三钱为末麻油调贴更以知母黄栢防己龙胆茯苓归芍薯术服之而愈

大凡下部生疮虽属湿热未有不因脾肾虚而得之

一人两腿生疮每服败毒散则饮食无味反增肿胀此脾虚湿热下注也以六君子加苍术升麻酒炒芍药服之以黄蜡麻油各一两轻粉三钱为膏贴之而愈【此凭症也】

两腿生疮作痛或遍身作痛用当归拈痛汤甚効

一人年踰五十两膝生疮日久不愈饮食失节或劳苦或服渗利消毒之剂愈盛脾脉大无力此脾虚兼湿热也用补中益气汤数剂少愈更六君子加苍术升麻神麴治之而愈【此凭症也】

大凡下部生疮焮痛或发寒热或脚气肿痛以人参败毒散加槟榔紫苏苍术黄栢并効久不愈以四物汤【九】治之愈後以补肾丸补之庶不再发

廉疮方 乳香 没药 水银 当归【各半两】 川芎 贝母 黄丹【各二钱半】 真麻油【五两】 除黄丹水银将余药同香油熬黑色去查下黄丹水银又煎黑色挑柳枝搅成膏油纸摊贴

又方 龙骨【生用】 血竭 赤石脂【各一两】 头髮【如指大】 黄蜡 白胶香【各一两】 香油不拘多少煎髮三五沸去髮入蜡白胶再以龙骨血竭石脂搅匀安水盆中候冷磁器盛每用捻作薄片贴疮口外贴竹箬三日後番过再贴仍服活血药

又方 用砂糖水煎冬青叶三五沸捞起石压平贴疮日换二次
又方 头垢烧灰和枣肉捣膏先以葱椒叶煎汤洗淨用轻粉掺上却以前膏伞纸摊贴之

又方 地骨皮【一两】 甘草节【半两】 入香油熬熟去查入黄丹【一两半】 白蜡【半两】 紧火熬黑提起白纸摊贴次用醋煎冬青叶摊药贴之

冻疮 用煎熟桐油调蜜陀僧末服

牛皮癬 用牛胆调烧酒敷之

诸疮痛不可忍者用苦寒药 黄连黄芩详上下及引经药则可
又云诸疮以黄连当归为君连翘甘草黄芩为佐 在下者加黄栢

若禀受壮盛宜四物汤【九】加大承气下之

若性急黑瘦血热之人疮痛宜四物加芩连大力子甘草若肥胖人疮痛乃湿热也宜羌活防风荆芥白芷苍术连翘取其风能胜湿也

在上者多通圣散 在下多须用下

敷药 脓窠治热燥湿为主 无名异 松皮炭亦主脓乾疥开鬱为主 吴茱萸 肿多者加白芷开鬱乾痒出血多者加大黄黄连猪脂调敷

湿多者油调敷 痒多加枯矾 痛多加白芷方解石 定痒杀?用蛇床

?疮如癣状退热杀?为主用羌黄黑狗?白矾?黄硫黄水银樟脑松香 虫多加藜芦斑猫或锡灰槲榔 红色加黄丹 青色加青黛 头上疮加黄连方解石阴囊疮加茱萸 脚肿出血分湿热用药

脓疱疮 治热为主 黄连 黄芩 大黄【各三钱】 蛇床 寒水石【各三两】 黄丹【五分】 白矾【一钱】 无名异【少许沙】 白芷 轻粉 木香【少许痛者用】 为末油调敷

沙疮 羌黄 寒水石【各二钱】 剪草 吴茱萸 黄栢枯矾【各一钱】 苍术 厚朴 ?黄【各五分】 轻粉【十贴】 右为末油调付 又方 羌黄 枯矾 软石膏 大黄 樟脑 右为末先洗去疮痂油调敷

一上散

?黄 硫黄【各三钱半】 寒水石 白胶香 黑狗脊 蛇床【各一两】 黄连 枯矾【各五钱】 吴茱萸【三钱】 斑猫【十四个去翅足】 右除硫黄?黄寒水石另研为粉外余皆研极细末次以斑猫同余药研匀先洗疮令汤透去痂用腊猪油手心中擦热鼻中嗅二三次却擦疮上一上即愈如痛甚肿满高处加寒水石一倍 如不苦痒只加狗? 微痒只加蛇床 有虫加?黄 如喜火灸汤炮加硫黄 只嗅不已亦可愈也

疥疮 春天发者开鬱为主 吴茱萸 白矾【各三钱】 樟脑【五分】 轻粉【十盏】 寒水石【二钱半】 蛇床【三钱】 黄栢 大黄 硫黄【各一钱】 槲榔【一个】 为末油调莫?破敷

小儿头疮 川芎 片芩 酒炒白芍

陈皮【各半两】 酒归 酒白术【各两半】 天麻【酒洗】 苍术 苍耳【各七钱半】 酒栢 酒粉草【各四钱】 防风【三钱】 为末水荡起煎服日四五次服後睡片时

又方 腊猪油【半生半熟】?黄 水银等分为末洗净疮敷上

小儿?头并身? 松皮【烧灰】 白胶香 枯矾 大黄黄栢 为末熟油调傅

耳後月蚀疮 黄连 枯矾 为末傅

小儿疮 牙皂【去皮】 胡椒【?少】 枯矾 轻粉 樟脑
为末柏烛油调搽七日如樱桃脓窠乃去

小儿秃头 通圣散酒制取大黄另用酒炒入研为末再仍通用酒拌焙乾每服一钱水煎频服
用白炭烧红淬长流水令热洗之外用胡荽子伏龙肝梁上尘黄连白矾为末油调服

又方松树厚皮【烧炭二两】 黄丹【水飞一两】 寒水石【一两细研】 枯矾 黄连 大黄【
各半两】 白胶香【熬飞倾石上二两】 轻粉【四铢或云一分】 右为末先洗去疮痂熬熟
油调敷

癣疮 用防风通圣散去硝黄加浮萍皂角刺

又方 浮萍【一两】 苍耳

苍术【各二两】 苦参【一两半】 黄芩【半两】 香附【二钱半】 为末酒糊丸

敷药 先用洗药後上敷药 芦会 大黄 轻粉?黄 蛇床 栝榔 槿树皮

右为末先刮癣用米醋调涂 又方

芦会【三盛】 巴豆【去壳十四粒】 白蜡草麻子【去壳四粒】 斑猫【七个去翅足】

右用香油二两熬巴豆草麻斑猫三药以黑为度去粗入蜡并芦会末在内用磁罐盛贮微微
刮癣令破以油涂上过夜略肿而愈

洗药 紫苏 樟树 苍耳 浮萍煎汤洗先洗後上敷药

诸?伤一百四十四【附犬 蛇咬】

一人被犬伤痛甚恶冷急吮去毒血隔蒜灸患处壮痛即止更贴太乙膏服玉真散而愈

一人风犬所伤牙关紧急不省人事急针患处出毒血隔蒜灸良久而醒用太乙膏封贴饮玉
真散二服更苏更以解毒散【百八】 二服而痊若患重者须先以苏合香丸灌之後进汤药

针灸经云外邱穴治獠犬即风犬所伤发寒热速灸三壮更灸患处立愈春末夏初狂犬咬人
须过百日得安终身禁犬肉蚕蛹食此即发不可救也宜先去恶血灸咬处十壮明日以後日

灸一壮百日乃止忌酒七日捣韭汁一二盏一狂犬伤令人吮去恶血灸百壮効

治蛇入七窍急以艾炙蛇尾

又方以刀破蛇尾少许入花椒七粒蛇目中即用?黄朱砂末煎人参汤调灌之内毒即解

山居人被蛇伤急用溺洗患处拭乾以艾灸之大効 又方

独头大蒜切片置患处以艾子蒜上灸之每三壮换蒜効

一人被蝎螫手痛彻心倾刻焮痛至腋寒热拘急头痛恶心此邪正二气相抟而然以飞龙夺命丹涂患处及服止痛之药俱不应乃隔蒜灸之遂愈

後有被螫如前灸之痛即止

一人蜈蚣伤指亦用前法而愈

凡蛇毒之类所伤依此疗之并効本草谓蒜疗疮毒有回生之功

一猎户腿被狼咬痛甚治以乳香定痛散不应予思至陰之下气血凝结药力难达令隔蒜灸至五十余壮痛去仍以托里药及膏药贴之愈

一人被鬪犬伤腿倾间焮痛至腋翌日牙关紧急用玉真散不应隔蒜灸三十余壮而苏仍以玉真散【一百二一】及托里消毒药而愈

诸?伤白矾一块於端午日自早晒至晚收贮用时旋为末水调搽患处痛即止

误吞水蛭一百四十五

一人腹痛食热则甚诸药不应半年後腹加肿胀面色痿黄脉不洪滑非痛也询之始因渴甚俯饮涧水意其误吞水蛭令取黄泥为丸空心用水送下百丸果下蛭而愈

一儿因跌沟中腹痛服惊积等药不应亦依前症疗之愈

?入耳一百四十六

一人睡间有?入耳痛瞥将生姜擦猫鼻其尿自出取尿滴耳内?出

一人耳内生疮不时作痛欲死痛止如故脉皆安静非疮也话间痛忽作予意有虫入耳急取猫尿滴耳果出一臭?不复痛

或用麻油滴之则?死难出或炒脂麻枕之则?亦出但不及猫尿速也

血风疮一百四十七

脉浮者祛风为主益气佐之

脉濇者祛风为主养血佐之

脉浮而濇者祛风养

一妇患此作痒五心烦热以逍遥数剂而止更人参荆芥散二十余剂而愈

一妇遍身作痒秋冬尤甚脉浮数饮消风散敷蛇床子散数月顿愈

一妇遍身赤色拨破成疮脓出不止以当归饮子及蛇床子散而愈

一老妇遍身作痒午前益甚以四君子加荆防芎归而安

一妇洗头致头患肿兼痒以人参荆芥散数剂而愈一妇作痒成疮久而患处仍痒搔起白屑以四生散数服痒止以人参荆芥散二十余剂而愈

一人遍身瘙痒诸药不应脉浮按之而濇以生血药为主间以益气百贴而愈【此凭脉也】

一儿瘾 痒痒发热不安以消风散治之

一儿亦患此咳 时呕以葛根橘皮汤并愈

一妇生风癩似癣三年不愈五心烦热脉洪按之则濇此血虚症也以生血为主风药佐之若专攻风毒则血愈虚而热愈炽血被煎熬则发瘰 或为怯症遂以逍遥散数剂及人参荆芥散 二十余剂而愈【此凭脉症也】

一妇遍身瘙痒秋冬则剧脉浮数此风邪客于皮肤名曰血风 饮消风散及搽蛇床子散少可更以四物汤加荆防数剂而愈【此凭脉症也】

又一妇患此夏月尤甚脉洪大用何首乌散【七九】

一妇患赤癩瘙痒搔破成疮出水久而不愈内服当归饮外搽蛇床子散并愈【此凭症也】

一妇亦患此诸药不应以四生散数服而愈

大抵妇人体虚风邪客于皮肤则成白 寒湿客於肌肉鬱热而为赤 色虽有异治法颇同

凡人汗出不可露卧及浴经日汗出见湿乃生痃痲雷公云遍身风 酒调生栝予用屡验

一人每至秋冬遍身发红点如癩作痒此寒气收斂腠理阳气不得发越怫鬱内作也宜人参败毒散解散表邪再以补中益气汤实表益气彼以为热毒自用凉药愈盛复请仍用前汤加茯苓半夏羌活四剂更用补中益气汤而愈【此凭症也】

河间曰疮肿因内热外虚风湿所乘盖肺主皮毛脾主肌肉肺气虚则腠理开为风湿所乘脾气湿而内热则生疮也 肿者由寒热毒气客於经络使血凝壅结成肿
风邪内作者则无头无根 血气相搏作者则有头有根 赤核种则风热流会
疮以痛为实痒为虚虚非为寒乃热之微甚也

麦饭石膏治诸般痃疽神效 附

麦饭石膏不拘多少炭火煨至红以好米醋淬之如此煨淬十数次研为末重罗去粗者取细末入乳鉢数人更递研五七日如面极细为妙 白斂【研为细末】鹿角【不用自蜕者须择带脑顶骨全者却是生取之角截作二三寸长炭火烧令烟尽研罗如末再入乳鉢更递研令极细】

右用麦饭石膏细末二两白斂末二两鹿角灰四两最要研得极细方有效粗则反致甚痛细则大能止痛收口排脓【精粗之异如此】和合量药末多寡用经年好米醋入银石器内熬令鱼眼沸却旋又入药末用竹篾子不住手搅熬一二时久令稀稠得所提出以磁器盛之候冷以纸盖覆勿令着尘用时先以猪蹄汤洗去脓血以故帛搥乾鹅翎蘸膏涂傅四围凡有赤处尽涂之但留中心一口如钱大未溃能令内消已溃则排脓如湍水逐日疮口收斂疮久肌肉腐烂筋骨出露用旧布片涂药贴疮但内膜不穿亦能取安洗疮勿可手触嫩肉亦不可口气吹着合药亦忌膈气之人及月经有孕妇人见之仍可熬好米醋一大碗收磁器内候逐日用药於疮上久则药乾以鹅翎点醋拂湿其药勿令綳也初则一日一洗一换药十日後两日一换 古方云麦饭石颜色黄白类麦饭曾作磨者尤佳按麦饭石不可作磨状如麦饭团生粒点如无此石常以旧面家磨近齿处石代之取其有麦性故也或溪中寻白石如豆如米大者即是也其石大小不等或如拳如鹅卵略如握聚一团麦饭古之吕西华秘传此方虽在至亲亦不可得裴员外?之以名第河南尹胁之以重刑吕宁守死不传君子责其存心虽隘尚可恕也近世鑿者每见已効之方设为诡诈之术使人勿复用之其罪不容诛矣常有赵尹来宰龙泉速於赴任单骑兼程到任未几鼻衄大作日出血数升有鑿教服藕汁地黄膏赵曰往年因劳感热而骤得此寻叩名鑿服药遂愈临分袂时鑿者属云疾若再作不可轻信鑿者服生地黄藕汁水冷脾胃无复可疗因此半月间易数鑿无効前鑿遂密制藕汁地黄膏进之即愈赵问蒙惠药与吾初衄时所服之药气味相似得非方同乎鑿曰即日前所献藕汁地黄膏也赵惊叹曰鑿乃诡谋以误我耶早信此方不受苦许久

补遗

痈疔一百四十八

些小痈疔方结未成不可贴膏药取生鹿角尖於砂盆内同老米醋浓磨以鹅翎涂拂疔之四围当中留一口遇乾再涂一二日即内消

又方用吴茱萸微炒为细末鷄子清调涂病处神効些小痈疔疼痛发热时用生粉草节不炙不焙只日晒乾无日於焙笼盖上微火焙乾研为细末热酒调服一二钱连追数服痛热皆止微觉恶寒似欲发背或已生疮肿癰疹以硝石三两煖水一升和令消待冷取故青布沓三重於赤处方员湿布搦之热则频易立差

发背及诸痈毒一百四十九

黑铅一片甘草三两微炙剉用酒一斗置磁瓶中然後熔铅投酒中却出酒另以瓶盛取出铅依前熔投如此者九度并甘草去之只用酒令病人饮醉寢则愈

又方甘草三两生捣为末大麦面九两大盘中搅和令匀取上好醋少许别捻入药令匀百沸水搜作饼方员大於疮一分热傅肿上以细片及故纸隔令通气冷则换之已成脓自出未成脓便内消

发背欲死一百五十

取冬瓜截去头合疮上瓜当烂截去更合之瓜未尽疮已斂小矣即用膏养之

又方取独头大蒜两头细捣以麻油和研厚傅疮上乾即易或以苕根烂捣传之数易

石痈坚如石不作脓者一百五十一

生商陆根捣烂搽之燥则易

乳硬欲结脓一百五十二

以鹿角於臼内磨取白汁涂之乾又涂不得近手并令人嚙去黄水一日许即散

痈疔欲愈必痒又治肾藏湿痒一百五十三

一人髀上生疔数日疮口欲合四边痒甚以绢帛蘸汤熨洗甚快再痒再熨觉倦鑿云洗熨最损人气血或至眩絶於是取盐於四缘遍擦觉疮内外清凉更不复痒如或痒甚则重擦随其轻重盐入疮内亦无害刀伤磕损血不止一百五十四

一人磕损大指甲离肉血淋急取葱白煨烂乘热缚定痛与血随止葱冷再易

一匠斧伤脚跟乘急用泥塞延後攻注肿盛发寒热遂令剔去旧土使血再出却用煨葱白傅之不移时痛住血止 又遇杀伤气偶未絶急令取葱白锅内炒热以傅伤处继而呻吟再易已无事矣无葱白用叶亦可只要炒热为上时易为佳若伤多煨炮不及但以乾锅且烙且杵令延出葱热用之妙

外科理例卷七

<子部,医家类,外科理例>

附方

钦定四库全书 子部五

外科理例附方 医家类

明 汪机 撰

【一】托里温中汤 治疮为寒变而内?者脓出消解皮肤凉心下痞满肠鸣切痛大便微溏食即呕气短呃逆不絶不得安卧时发愠愤

丁香 沉香 茴香 益智仁 陈皮 木香 羌活 乾姜【炮各一钱】 甘草【炙】
附子【炮去皮脐各二钱】

作一剂水二锺姜三片煎八分不拘时服

【二】六君子汤 治一切脾胃不健或胸膈不利饮食少思或作呕或食不化或膨胀大便不实面色痿黄四肢倦怠

人参 白术【炒】 茯苓 半夏【姜制】 陈皮【各一钱】 甘草【炙五分】

作一剂水二锺姜三片煎八分不拘时服

【三】内疎黄连汤【一名黄连内疎汤】 治疮?肿硬发热作呕大便秘澁烦躁饮冷呕哕心煩脉沉实此邪在臟也急服以內除之使邪不得犯经络

黄连 山梔子 当归【酒拌】 芍药 木香 枳榔 黄芩 薄荷 桔梗 甘草【各一钱】 连翘 大黄【炒各一钱】

作一剂水二锺煎八分食前服

【四】十宣散 治疮?脉缓濇身倦怠恶寒或脉弦或紧细者皆宜用之散风寒助阳气也

人参 当归【酒拌】 黄芪【盐水拌炒各一钱】 甘草

白芷 川芎 桔梗【炒各一钱】 厚朴【姜汁制炒五分】 防风 肉桂【各三分】

作一剂水二锺煎八分服

【五】小柴胡汤 治瘰癧乳痈便毒下疳及肝经分一切疮?发热或饮食少思

半夏【姜制一钱】柴胡【二钱】黄芩【炒二钱】人参【一钱】甘草【炙五分】作一剂水二鍾姜三片煎八分食远服

【六】防风通圣散 治一切风热积毒疮肿发热便秘表里俱实者

芍药【炒】芒硝 滑石【煨】川芎 当归【酒拌】桔梗 石膏【煨】荆芥
麻黄【各四分半】薄荷 大黄【煨】山梔【炒】白术【炒】连翘 甘草【炙】防风
黄芩【炒各五分】

作一剂水二鍾煎八分服

【七】荆防败毒散 治一切疮?时毒肿痛发热左手脉浮数

荆芥 防风 人参 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 枳壳 茯苓 川芎
甘草【各一钱】即人参败毒散加荆芥防风作一剂水二鍾煎八分食远服

【八】黄连解毒汤 治积热疮?焮肿作痛烦躁饮冷脉洪数或口舌生疮或疫毒发狂

黄芩 黄柏【炒】 黄连【炒】 山梔【各一钱半】

作一剂水二鍾煎七分热服

【九】四物汤 治一切血虚或发热之证

当归【酒拌】川芎【各一钱】芍药【炒】 生地【一钱】

作一剂水二鍾煎八分食远服

加四君汤即八物汤又名八珍汤治症详见于後

【十】大黄牡丹汤

大黄【四两】牡丹皮【三两】芒硝【一两】桃仁【五十个】每服五钱水煎服

【十一】隔蒜灸法 治一切疮毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒随而散盖火以畅达拔引郁毒此从治之法也有回生之功

大蒜去皮切三文铜钱厚安疮头上用艾壮于蒜上灸之三壮换蒜复灸未成者即消已成者亦杀其大势不能为害若疮大用蒜捣烂摊患处将艾铺上烧之蒜败再换如不痛或不作脓及不发起或陰疮尤宜多灸

【十二】清凉饮 治疮积热烦躁饮冷焮痛脉实大小便秘澀

大黄【炒】 赤芍 当归 甘草【各二钱】

水二鍾煎八分食前服

【十三】十全大补汤 治疮溃脓清或不溃不斂皆由元气虚弱不能营运服此生血气壮脾胃兼补诸虚及溃?发热或恶寒或作痛或脓多或自汗盗汗及流注瘰癧便毒久不作脓或脓成不溃而不斂若血气不足结肿未成脓者加枳殼香附连翹服之自消人参 肉桂

地黄【酒蒸焙】 川芎 白芍【炒】 茯苓 白术【炒】

黄耆【盐水拌炒】 当归【酒拌各一钱】

甘草【炙五分】

作一剂水二鍾姜三片枣二枚煎八分食前服

【十四】八珍汤 调和荣卫顺理陰阳滋养血气进饮食退虚热此气血虚乏之药也

当归【酒拌】 川芎 芍药【炒】 熟苳【酒拌】 人参 白术【炒】

茯苓【各一钱】 甘草【炙五分】

水二鍾姜三片枣二枚煎八分食前服

【十五】加味十全大补汤

人参 肉桂 地黄 川芎 白芍药 茯苓 白术 黄耆 甘草 当归 乌药 香附【各等分】

姜枣水煎空心温服每剂一两

【十六】补中益气汤 治疮?元气不足四肢倦怠口乾发热饮食无味或饮食失节或劳倦身热脉洪大无力或头痛或恶寒自汗或气高而喘身热而烦

黄耆【炙一钱半】 甘草【炙】 人参 当归【酒拌】 白术【炒各一钱】 升麻 柴胡 陈皮【各三分】

水二鍾姜二片枣二枚煎一鍾空心服

【十七】圣愈汤 治疮?脓水出多或金疮出血心烦不安睡卧不寧或五心烦热

地黄【酒拌蒸半日】生地黄【酒拌】川芎
人参【各五钱】当归【酒拌】黄耆【盐水浸炒各一钱】

水二鍾煎八分食远服

【十八】人参养荣汤 治溃疡发热或恶寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色痿黄呼吸短气饮食无味或气血原不足不能收斂若大疮愈後服之不变他病

白芍【一钱五分】人参 陈皮 黄耆【蜜炙】桂心当归【酒拌】白术 甘草【炙各一钱】
熟苳【酒拌】五味子【炒捣碎】茯苓【各一钱半】远志【去心炒五分】

水二鍾姜三片枣一枚煎八分食前服

【十九】归脾汤
治思虑伤脾不能统摄心血以致妄行或吐血下血或健忘怔忡惊悸少寐或心脾作痛茯神
白术 人参
黄耆【蜜炙】龙眼肉酸枣仁【蒸各一钱】木香【各三分】甘草【炙一分半】

水一鍾姜一片枣一枚煎六分食远并临卧服

【二十】远志酒

远志【不拘多少泔浸洗去土槌去心】

右为末每三钱用酒一盏调迟少顷澄清饮之以滓敷患处治女人乳痈尤效

【二一】黄耆建中汤

黄耆【蜜制】肉桂【去皮各三两】甘草【炙二两】白芍

每服一两姜枣水煎服

【二二】内补黄耆汤

黄耆【炙】麦门冬【各一两】熟地黄 人参 茯苓甘草【炙各一钱】白芍 川芎 官桂

远志

每服一两姜枣水煎服

【二三】逍遥散 治妇人血虚五心烦热肢体痛头昏重心忪颊赤口燥咽乾发热盗汗食少嗜卧及血弱荣卫不调痰嗽潮热饥体羸瘦渐成骨蒸

当归【酒拌】芍药 茯苓 白术【炒】 柴胡【各一钱】甘草【七分】

水二鍾煎八分食远服

【二四】栝子丸 治月经短少渐至不通手足骨肉烦疼日渐羸瘦渐生潮热其脉微数此由陰虛血弱阳往乘之少水不能胜火逼水涸亡津液当养血益阴慎毋以毒药通之宜此丸与泽兰汤主之

栝子仁【炒研】牛膝【酒拌】卷栝【各半两】泽兰叶

续断【各二两】地黄【三两酒拌蒸半日杵膏】

右为末入地黄膏加炼蜜丸梧子大每服三十丸空心米饮下

【二五】泽兰汤 治症同前

泽兰叶【三两】当归【酒拌】芍药【炒各一两】甘草【五钱】

右为粗末每服五钱水二鍾煎一鍾去滓温服

【二六】连翘消毒散【即凉膈散】治积热疮?痈痛发热【烦渴大便秘及咽喉肿痛或生疮毒】

连翘【一两】山梔子 大黄 薄荷叶

黄芩【各五钱】甘草【一两五钱】朴硝【二钱半】

每服一两水煎温服

【二七】理中汤 治脾胃不健饮食少思或作呕伤寒及肚腹作痛

人参 乾姜【炮】 甘草【炙】 白术【炒各钱半】

水一鍾煎五分食远服

【二八】二神丸 治脾肾俱虚侵晨作泻或饮食少思或食而不化或作呕或久泻不止如脾经有湿大便不实者神效一人年踰四十遍身发肿腹胀如鼓甚危诸药不应用此数服饮食顿进其肿渐消兼以除湿健脾之剂而愈

破故纸【四两炒】肉苳?【二两生用】

右为末用大红枣四十九枚生姜四两切碎同枣用水煎熟去姜取枣肉和药丸梧子大每服五十丸空心盐汤送下

【二九】竹叶黄耆汤

淡竹叶【二钱】生苳 麦门冬【去心】黄耆【炙】

当归【酒拌】川芎 甘草 黄芩【炒】

芍药 人参 半夏【姜制】石膏【煨各一钱】水二鍾煎八分食远服

【三十】黄耆六一汤 治溃後作渴必发痈疮宜常服此可免

绵黄耆【六两一半生焙一半盐水润磁器饭上蒸三次焙乾】甘草【一两半生半炙】每剂一两水二鍾煎八分食远服或为末每服二钱早晨日午白汤调服更妙加人参尤效

【三一】七味白术散

白术 茯苓【去皮】人参【各半两】甘草【炙一两半】木香【二钱半】藿香【半两】葛根【一两】

右为末每服五钱白汤调下

【三二】猪蹄汤 消肿毒去恶肉润疮口止痛

白芷 黄芩 当归 羌活 赤芍露蜂房【蜂儿多者佳】生甘草【各五钱】

用猪蹄一只水四五碗煮熟去油查取清汤入前药煎数沸去查温洗以膏药贴之

【三三】复元活血汤

治坠堕或打扑瘀血流于脇下作痛或小腹作痛或痞闷及便毒初起肿痛

柴胡【钱半】天花粉 当归【酒拌各二钱】红花 甘草【各七分】川山甲【各一钱】大黄【酒拌炒三钱】桃仁【二十粒去皮尖酒浸研】

水二锺煎一锺食服

【三四】桃仁承气汤

治伤损瘀血停滞腹痛发热或发狂或便毒壅肿疼痛便秘发热用此通之

桃仁【五十粒去皮尖】桂枝 芒硝 甘草【炙各一钱】

大黄【二钱】

水二锺煎一锺空心服

【三五】当归地黄汤 治破伤风气血俱虚发热头痛服此养血气祛风邪不拘新旧并治之

当归【酒拌】地黄【酒拌】芍药 川芎 藁本 防风 白芷【各一钱】细辛【五分】

【三六】补真丸

肉苁蓉【酒浸焙】葫芦巴【炒】附子【炮去皮】阳起石【煨】鹿茸【酒浸焙】兔丝子【净洗酒浸】肉苁蓉【麴裹煨】川乌【炮去皮】五味子【各五钱】

右为末用羊腰子两对治如食法葱椒酒煮捣烂入酒糊丸如梧子大每服七十丸空心米饮盐汤任下

【三七】玄参升麻汤

玄参 赤芍药 升麻 犀角屑

桔根 管仲 黄芩【各一钱】甘草【五分】

作一贴水姜煎食後服

【三八】犀角升麻汤

犀角【七钱半】升麻【五钱】防风 羌活 川芎 黄芩 白附子【各二钱半】甘草【一钱半】

每服一两水煎食後服

【三九】清胃散 治胃经湿热牙齿或牙龈肿痛或牵引头脑或面发热

归身【酒拌一钱】黄连 生地黄【酒拌各一钱】牡丹皮【钱半】升麻【二钱】

水二鍾煎七分食远服

【四十】清咽利膈散

金银花 防风 荆芥 薄荷 桔梗 黄芩 黄连【各一钱半】山梔
连翘【各一钱】玄参 大黄【煨】 朴硝 牛蒡子 甘草【各七分】

作一贴水煎服

【四一】聪耳益气汤

黄耆【一钱】甘草【炙五分】人参【三分】当归【二分酒焙乾】

橘皮【二分】升麻【二分】柴胡【三分】白术【三分】菖蒲 防风 荆芥

作一服水煎空心服

【四二】防风通气汤

羌活 独活【各二钱】防风 甘草【炙】
藁本【各一钱】川芎【五钱】蔓荆子【三钱】

剉分二贴水煎服

【四三】豆豉饼 治疮?肿硬不溃及溃而不斂并一切顽疮恶疮用江西豆?为末唾津和作饼如钱大厚如三文置患处以艾装于饼上灸之饼乾再用唾津和作疮大用 口水调作饼覆患处以艾铺饼上烧之未成者即消已成者虽不全消其毒顿减甚有奇功不可忽之

【四四】流气饮 治流注及一切恚怒气结肿作痛或胸膈痞闷或风寒湿毒转于经络致气血不和结成肿块肉色不变或漫肿木闷无头【即疮科流气饮】

桔梗【炒】 人参 当归【酒拌】 官桂
甘草【炙】 黄耆【盐汤浸炒】 厚朴【姜制】 防风 紫苏 芍药 乌药 枳壳【各七分】?榔

木香 川芎 白芷【各五分】

水二鍾煎八分食远服

【四五】独参汤 治溃疡气血虚极恶寒或发热或失血之证葛可久血脱补气即此方也

人参【一两】 水二钟枣十枚煎一钟徐服若煎至稠厚即为膏

【四六】补肾丸

巴戟【去心】 山药 补骨脂【炒】 小茴香【炒】

牡丹皮【各三钱】 清盐【二钱半後入】 肉苁蓉【酒洗一两】 枸杞子【一两】 右为末
蜜丸梧桐子大每服五十丸空心盐汤下

【四七】地骨皮散 治骨蒸潮热自汗咳吐腥?稠痰人参 地骨皮
生地黄【各钱半】 白茯苓

柴胡 黄耆【炙】 知母【炒】 石膏【煨各一钱】 水二鍾煎八分食远服

【四八】金钥匙 治喉闭?喉风痰涎壅塞甚者水浆难下焰硝【一两五钱】 硼砂【五钱】
脑子【一个】 雄黄【二钱】 白僵蚕【一钱】 各研为末和匀以竹管吹患处痰涎即出
如痰出喉仍不消急针患处去恶血

【四九】必效散 治癰未成脓自消已溃者自斂如核未去更以针头散腐之若气血虚者先
服益气养荣汤数剂然後以此散服而癰毒已下再服前汤数剂南硼砂【二钱半】 轻粉【
一钱】 斑猫【四十个糯米同炒熟去翅及头】

射香【五分】 巴豆【五粒去殼心膜】 白?榔【一个】

右为末每服一钱壮实者钱半五更滚汤调下小水澁滯或微痛此癰欲下也进益元散一服
其毒即下斑猫巴豆似为峻利然巴豆能解斑猫之毒用者勿畏尝遇富商项有癰痕颇大询
之彼云因怒而致困苦二年百法不应方与药一服即退二三再服顿退四服而平旬日而痊
以重礼求之乃是必效散一老嫗亦治此症索重价始肯治其方乃是中品錠子絳疮内以膏
药贴之其根自腐未尽再用去尽更搽生肌药数日即愈予见血气不虚者果验血气虚者溃
去亦不愈丹溪亦云必效散与神效瓜蒌散相兼服之有神效常以二药兼补剂用之效按錠
子虽峻利盖结核坚硬非此未见易腐必效散虽有斑猫峻利然癰毒深者非此莫能易解又
有巴豆解毒但有气血虚者恐亦不能治也

【五十】散肿溃坚丸

知母【酒浸炒】黄栢【酒洗炒】昆布 桔梗【各半两】瓜蒌根【酒洗】广茂
三棱【酒洗炒】连翘【各三钱】升麻【六分】白芍药黄连
葛根【各二钱】草龙胆【四两酒洗炒】黄芩稍【一钱半一半酒洗一半生】

为末蜜丸如梧子大每服五十丸滚汤下

【五一】香附饼 治癰癤流注肿块或风寒袭于经络结肿或痛用香附为末酒和量疮大小作饼覆患处以熨斗熨之未成者内消已成者自溃若风寒湿毒宜用姜汁作饼

【五二】内塞散 治陰虚阳气凑袭患肿或溃而不斂或风寒袭于患处致气血不能运至久不愈遂成漏证附子【童便浸三日一日一换切作四块再浸数日炮一两】肉桂【去皮】赤小豆甘草【炙】黄耆【盐水浸炒】当归【酒拌】茯苓白芷桔梗【炒】川芎人参远志【去心】厚朴【姜制各一两】防风【四钱】

为末每服二钱空心温酒下或酒糊丸盐汤下亦可或炼蜜丸亦可

【五三】神效瓜蒌散

治乳痈乳劳已成化脓为水未成即消治乳之方甚多独此神效癰癤疮毒尤效

甘草 当归【各五钱】没药【另研】乳香【各一钱另研】

瓜蒌【大者二个杵】

作二剂用酒三碗煎至二碗分三次饮更以查罨患处一切痈疽肿毒便毒并效如数剂不消不痛兼服补气血之药

【五四】黄连胡粉散

黄连【二两】胡粉【一钱】水银【一两同粉研令消】

三味相和用皮包裹熟按良久付患处

【五五】桃仁汤

桃仁 苏木 蜜虫【去足翅炒】水蛭【三十个炒】生地黄每服三钱水一鍾煎六分空心服

【五六】没药丸

当归【一两】桂心 芍药【各半两】没药【研各一分】

桃仁【去皮尖炒研碎一分】 蛭虫【去足翅炒】水蛭【炒各三十个】

右为末醋糊丸梧子大每服三五丸空心醋汤下

【五七】当归丸

当归【半两】大黄 桂心【各三钱】赤芍药
葶苈【各二钱】人参【一钱】甘遂【半钱】

炼蜜为丸如弹子大空心米饮化下一丸

【五八】当归散 治妇人阴中突出一物长五六寸名阴挺当归 黄芩【各二两】牡蛎【两半】蛭皮【一两炙】赤芍【五钱】为末每服二钱食前温酒或滚汤调下如不应更以补中益气倍加升麻柴胡兼服之

【五九】瓜子仁汤 治产後恶露不尽或经後瘀血作痛或肠胃停滯瘀血作痛或作痢并治
薏苡仁【四钱】桃仁【去皮尖研】牡丹皮 瓜蒌仁【各一钱半】水二鍾煎八分食前服

【六十】浮白散

桑皮【炙】桔梗 括萎实 升麻
半夏杏仁【去皮尖炒】地骨皮【各一钱】甘草【五分】

作一贴姜水煎服

【六一】神仙活命饮 治诸疮未作脓者内消已成脓者即溃又排脓止痛消毒圣药也

川山甲【蛤粉炒黄色】甘草节 防风 没药

赤芍 白芷 归尾 乳香【各一钱】天花粉 贝母【各八分】金银花
陈皮【各三钱】皂角刺【炒黄一钱】

用酒一碗同入瓶内纸糊瓶口勿令泄气慢火煎数沸去渣分病上下食前後服之能饮酒者再饮三二盃尤妙

【六二】蜡矾丸 治一切痈疽托里止痛护藏府神效不问老幼皆可服

白矾【一两明亮者研末】 黄蜡【一两黄色好者溶开离火入矾末一方用七钱】 衆手急丸梧桐子大每服十丸渐加至二十丸熟水或温酒送下日进二服一法将蜡水煮用匙挑浮水上者和矾末丸则软而易丸

【六三】 四君子汤 治脾胃虚弱便血不止

甘草【炙五分】 人参 白术【炒】 白茯苓【各一钱】

水一鍾姜三片枣二枚煎八分食远服

【六四】 人参败毒散 一切疮?焮痛发寒热或拘急头痛脉数有力者

人参 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 枳殼 茯苓 川芎 甘草【各一钱】 水二鍾煎八分食远服

【六五】 清咽消毒散 治咽喉生疮肿痛痰涎壅盛或口舌生疮大便秘结
即荆防败毒散加芩连硝黄

【六六】 金黄散

滑石 甘草

各为末等分付搽

【六七】 龙胆泻肝汤

柴胡 泽泻【各一钱】 车前子

木通【各五分】 生地黄 当归尾【酒洗】 草龙胆【酒浸炒黄色各三钱】

作一贴水煎食前服

【六八】 神异膏 治痈疽疮毒甚效此疮中第一药也露蜂房【儿多者一两】 蛇蛻【盐水洗焙半两】 玄参【半两】 黄耆【三钱】 男髮【洗如鸡子一圆】 杏仁【去皮尖一两】 黄丹【十一两】 真麻油【二斤】 先以玄参黄耆杏仁入油煎至黑色方入蜂房蛇蛻男发再煎至黑滤去查徐徐入黄丹慢火煎以柳枝不住手搅滴水捻软硬得中即成膏矣

【六九】 冲和膏 治一切疮肿不甚热积日不消

紫荆皮【炒五钱】 赤芍药【炒二两】 独活【去节炒二两】 白芷【一两】 菖蒲【一两】

右为末葱头煎汤调搽

【七十】神功散【即四生散】治膝腿生疮浸淫不愈类风癖名肾藏风疮如上攻则目昏花视物不明并一切风癖疥癩

白附子【生用】黄耆 独活 蒺藜

各分研末每服二钱用猪腰子一个批开入药湿纸里煨熟空心连腰细嚼盐汤下风癖酒下

【七一】大连翘饮 治丹毒班疹瘙痒或作痛及大人风邪热毒焮肿或痒小便澀

连翘 瞿麦 荆芥 木通 芍药 蝉蜕 当归【酒拌】甘草 防风 柴胡 滑石【煨】 山梔【炒】
黄芩【各一钱】

水鍾半煎七分小儿宜为末每服一二钱滚汤调下

【七二】通气散 治时毒焮肿咽喉不利取 以泄其毒玄胡【钱半】牙皂
川芎【各一钱】藜芦【五分】

踟躅花【二分半】

为细末用纸捻蘸少许絰鼻内取 为效

【七三】羌活胜湿汤

羌活【去芦】独活【去芦一钱】藁本
防风【去芦半钱】川芎【二分】甘草【炙半分】蔓荆子【二分】

作一贴姜水煎服

【七四】附子八物汤

附子【炮】乾姜【炮】芍药【炒】茯苓 人参 甘草【炙各一钱五分】
肉桂【一钱】白术【二钱炒】

作一贴水煎食前服

【七五】加减小续命汤

麻黄【去节】人参 黄芩 芍药 杏仁【去皮尖面炒】甘草 防己
肉桂【各一两半】附子【炮去皮脐五钱】

每服一两姜水煎服

【七六】独活寄生汤

白茯苓 杜仲 当归【酒洗】防风 牛膝 白芍药 人参 细辛 桂心 秦艽 熟地黄 芎藭
甘草【各二两】独活【三两】

桑寄生【二两】

姜水煎服每服一两

【七七】五香连翘汤 治诸疮初觉一二日便厥逆咽喉塞寒热

沉香 木香 射香 连翘 射干 升麻 丁香 独活 甘草【炙】 桑寄生【各一钱】 大黄 木通
乳香【各一钱半】

每服五钱水一钟煎八分取利

【七八】八风散

霍香【半斤】白芷 前胡【各半斤】黄耆 甘草 人参【各二斤】羌活 防风【各三斤】

右为细末每服四钱薄荷煎滚汤调服

【七九】人参荆芥散 治妇人血风发热或疮毒瘙痒肢体疼痛头目昏涩烦渴盗汗或月水
不调脐腹疼痛瘀癖积块

人参 桂心 柴胡

鳖甲【醋炙】荆芥 蕤积壳【麸炒】生地黄【酒拌】酸枣仁【炒】羚羊角
白术【炒各一钱】川芎 当归【酒拌】防风 甘草【炙各五分】

水二钟姜三片煎八分入羚羊角末食远服

【八十】消风散 治风热瘾疹瘙痒及妇人血风瘙痒或头皮肿痒或诸风上攻头目昏眩项
背拘急鼻流清水 喷声重耳作蝉声

陈皮【焙五钱】甘草【炒】人参茯苓荆芥蕙防风川芎【炒】
白姜蚕【炒】蝉蜕【各二两】厚朴【姜制五钱】藿香羌活【一两】

右为末每服三钱茶清调下疮癖温酒下

【八一】何首乌散

何首乌防风蒺藜枳壳天麻胡麻子僵蚕羌蔚子【各?分】

每服五钱茵陈汤下

【八二】神效当归膏

当归黄蜡【各一两一方用白蜡尤效】麻油【四两】

先将当归入油煎至黑滤去入蜡溶化即成膏矣

【八三】乳香定痛丸

乳香没药【各另研】羌活五灵脂独活【各三钱】川芎当归交趾桂川白芷
真蓰荳粉白胶香【各半两】

右为末炼蜜丸如弹子大每服一丸细嚼薄荷汤送下手足损痛不能举动加草乌用五钱盐汤下

【八四】五积散 治风寒湿毒客于经络致筋挛骨痛或脚腰酸疼或身重痛拘急

苍术【二钱半】桔梗【炒钱半】陈皮【去白六分】白芷【三分】甘草当归【酒拌】
川芎芍药【炒】半夏【姜制】茯苓【去皮各三分】麻黄【去节六分】乾姜【炮四分】
枳壳【麸炒六分】桂心【一钱】厚朴【姜制四分】水二锺姜三片枣一枚煎一锺服

【八五】舒筋汤

片子姜黄甘草【炙】羌活【各一钱】当归【酒洗】赤芍药白术海桐皮【各二钱】

作一贴姜水煎服

【八六】四生丸 治血风骨节疼痛不能举动或行步不前或浑身瘙痒或麻痺

地龙【去土】僵蚕【炒去丝】白附子【生】五灵脂
草乌【去皮尖各等分】为末米糊丸梧子大每服二三十丸茶酒任下或作末酒调服

【八七】大防风汤 治三陰之气不足风邪乘之两膝作痛久则膝大腿愈细名曰鹤膝风乃败证也非此不治又治痢後脚痛缓弱不能行步或腿肿痛

附子【炮一钱】白术【炒】羌活 人参【各二钱】川芎【钱半】防风【二钱】甘草【炙一钱】牛膝【酒浸一钱】当归【酒拌二钱】黄耆【炙二钱】白芍【炒二钱】杜仲【姜制三钱】生地黄【酒拌蒸半日忌铁器一钱】

作一服水二鍾姜三片煎八分空心服愈後尤宜调摄更服还少丹或加桂以行地黄之滯若脾胃虚寒之人宜服八味丸

【八八】芦荟丸 治下疳溃烂或作痛及小儿肝积发热口鼻生疮或牙龈蚀烂

胡黄连 黄连 芦荟 木香 白芫荽【炒】白雷丸 青皮 鹤虱草【各一两】射香【三钱】为末蒸饼糊丸麻子大每服一钱空心米汤下

【八九】当归拈痛汤 治湿热下注脚膝生疮或脓水不絕或赤肿或痒痛或四肢遍身肿痛

防风 归身 知母【酒炒】泽泻 猪苓【各三钱】白术【钱半】羌活【五钱】人参 苦参【酒制】升麻 葛根 苍术【各二钱】甘草【炙】黄芩【酒炒】

茵陈叶【酒炒各五钱】

作四剂水二鍾煎一鍾空心并临卧服

【九十】清震汤

升麻 柴胡 苍术
黄芩【各五分】甘草【炙二分】藁本【二分】当归身【二分】麻黄根 防风 猪苓【各三分】红花【一分】泽泻【四分】羌活 酒黄蘗【各一钱】

作一服水煎临睡服

【九一】补肝汤

黄耆【七分】人参 葛根 白茯苓【各三分】升麻 猪苓【各四分】柴胡 羌活 知母 连翘 泽泻 防风 苍术 当归身 麴末炒黄蘗 陈皮【各二分】甘草【炙五分】

作一服水煎空心热服

【九二】芍药汤

芍药【四钱】当归 黄连 黄芩

官桂【各二钱】槟榔【一钱二分】甘草【炙一钱】木香【八钱】大黄【一钱二分】

分二贴水煎服如後重加大黄臙毒加黄栢

【九三】清燥汤

白术 黄耆 黄连【各一钱】苍术钱【半】白茯苓当归 陈皮【各一钱】生地黄

人参【各七分】神麴【炒】猪苓 麦门冬【去心】黄栢【酒炒】甘草

泽泻【各五分】柴胡 升麻【各三分】

作一服水煎服

【九四】黄连丸 治大肠有热下血

黄连吴茱萸等分热汤拌湿罨二日同炒拣出各另研末亦各米糊丸梧子大每服二三钱粪前红服茱萸丸粪後红服黄连丸俱酒下

【九五】黄连消毒散 治痈疽肿势外感焮痛或不痛麻木服此更宜蒜灸

黄连【酒拌】羌活

黄芩【酒拌】黄栢【酒拌炒】生地黄【酒拌】知母【酒拌炒】独活 防风

归尾【酒拌】连翘【各一钱】苏木 藁本 防己【酒拌】桔梗 陈皮 泽泻 人参

甘草【炙各五分】黄耆【盐水拌炒二钱】

作一贴水二锤姜三片煎八分食後服

【九六】还少丹

远志 茴香 巴戟 山药 牛膝 杜仲 肉苁蓉 枸杞子 熟地黄 石菖蒲 五味子 白茯苓 楮实子

另为末各等分用枣肉同蜜丸如梧子大每服五十丸空心酒下

【九七】蟠葱散

肉桂 乾姜【炮二两】 苍术 甘草【炙各半斤】 砂丁皮 榔【各四两】 蓬术 三棱【煨】 茯苓 青皮【去白各六两】 延胡索【二两】

为末每服五钱葱汤空心调下

【九八】 葫芦巴丸

葫芦巴【炒一斤】 茴香【去脐炒十二两】 川练子【炒一斤二两】

大巴戟【去心炒六两】 川乌【炮去皮尖六两】 吴茱萸【汤洗七次炒十两】 右为末酒糊如梧子大每服十五丸空心温酒下小儿茴香汤下

【九九】 塌肿汤 治妇人阴hu生疮或肿或痛或脓水淋漓甘草 乾漆【各三两】 黄芩 当归 生地 黄芩 川芎【各二两】 龟甲【五两】

用水数碗煎良久去渣塌洗患处

【一百】 菖蒲散 治妇人阴户肿痛月水涩滞

菖蒲 当归【各一钱】 秦艽【七钱半】 吴茱萸【五钱制】

为末每服三钱空心葱汤调下更以枳实炒热熨患处阴内脓水淋漓或痒痛以升麻白芷 黄连木通当归川芎白术茯苓煎服更用塌肿汤浴洗

【百一】 清心莲子饮 治心经蕴热小便赤澀或茎肿窍痛及上下虚心火炎上口苦咽乾烦躁作渴发热小便白浊夜则安静昼则发热

黄芩【炒】 黄耆【蜜炙】 石连肉【去心】 赤茯苓 人参【各一钱】 甘草【炙】 车前子【炒】 麦门冬【去心】 地骨皮【各五分】

水二鍾煎八分空心食前服

【百二】 班龙丸

鹿茸

【炙为末】 山药【为末】 熟地黄【酒蒸捣膏】 栝子仁【捣膏】 兔丝子【各等分】

蜜丸梧子大每服八十丸空心盐汤下

【百三】滋肾丸 治下焦陰虛小便澀滯或膝无力阴汗阴痿或足热不履地不渴而小便闭
肉桂【二钱】黄栢【酒拌焙】知母【酒洗焙各一两】

为末水丸梧子大每服百丸加至二百丸百沸汤下

【百四】茯兔丸

兔丝子【五两】白茯苓【二两】石连肉【去心三两】

酒糊丸梧子大每服五十丸空心塩汤下

【百五】木香饼 治一切气滯结肿或痛或闪肭及风寒所伤作痛并效

木香【五钱为末】 生地黄【一两杵膏】

和匀量患处大小作饼置肿上以熨热斗熨之

【百六】没药降圣丹

川乌头【炮去脐】骨碎补【炙】白芍药 没药【另研】当归【焙】乳香【各研】
生地黄 川芎

苏木【各一两】 自然铜【火煨醋淬十次为末一两】

右为末生姜汁与蜜和丸每一两作四每服一丸水酒各半盏煎至八分空心热服

【百七】乳香定痛散 治疮痛不可忍

乳香 没药【各二钱】寒水石【煨】滑石【各四钱】冰片【一分】为细末搽患处痛即
止甚妙此方乳没性温佐以寒剂制之故寒热之痛皆有效也

【百八】青州白丸子

白附子【炮二两】半夏【姜制】南星【各二两】川乌【炮去皮剂半两】为末用糯米
糊丸如菉豆大每服二十丸生姜汤下瘫痪温酒下小儿惊风薄荷汤下

【百九】失笑散 治产後心腹绞痛欲死或血迷心窍不知人事及寻常腹内瘀血或积血作
痛妇人血气痛之圣药也亦治疝气疼痛

五灵脂 蒲黄【俱炒等分】

每服二三钱醋一合熬成膏入水一盞煎七分食前热服

【一百一十】解毒散 治一切毒蛇恶?并兽所伤重者毒入腹则眼黑口噤手足强直此药平易不伤气血大有神效不可以为易而忽之

白矾 甘草【各一两】

为末每服二钱不拘时冷水调下更敷患处

【一百一十一】五福化毒丹

玄参 桔梗【各一两半】茯苓【二两半】人参
牙硝青黛【各一两】甘草【七钱半】射香【少许】金银箔【各十片】

右为末炼蜜丸芡实大每服一丸薄荷汤下痘毒上攻口齿生疮以生地黄汁化服及用鸡翎
傅患处

【一百一十二】连翘丸

连翘 防风【去芦】黄栢 肉桂【去粗皮】桑白皮香?独活 秦艽 牡丹皮【各半两】

海藻【二钱半】

右为末炼蜜丸如菉豆大每服十丸灯心汤下

【一百一十三】当归饮子 治血燥作痒及风热疮疥瘙痒或作痛当归【酒拌】川芎 白芍
防风 生地黄【酒拌】白蒺藜 荆芥【各钱半】黄耆 何首乌
甘草【各五分】水二鍾煎八分食远服

【一百一十四】葛根橘皮汤

葛根 陈皮 杏仁【去皮尖】麻黄【去节】知母黄芩 甘草【各等分】

每服二钱水煎服

【一百一十五】龙胆丸

龙胆草 赤茯苓 升麻 苦练根皮 防风 芦荟 油髮灰【各二钱】

青黛 黄连【各三钱】

猪胆浸羔丸如麻子大每服二十丸薄荷汤下

【一百十六】地黄清肺饮

紫苏 前胡 防风 黄芩 赤茯苓 当归 连翘 桔梗 甘草 天门冬【去心】 生地黄【各二钱】
桑白皮【半两炙】

每服三钱水煎食後服次进化?丸

【一百十七】化?丸

芫荇 青黛 芦荟 川芎 虾?灰 白芷 胡黄连【各等分】

猪胆浸糍丸如麻子大每服十丸食後并临卧杏仁汤下

【一百十八】大芦荟丸

黄连 芦荟 木香 青皮 胡黄连 雷丸【用白】 白芫荇
鹤虱【各半两炒】 射香【二钱另研】

用粟米饭丸菉豆大每服一二十丸米饮下

【一百十九】六味地黄丸【即肾气丸】治肾气素虚不交於心浸液不降败毒为痰欬逆

乾山药【四两】 泽泻【蒸】

牡丹皮【白者佳】 白茯苓【各三两】 山茱萸【去核四两酒拌】

熟苳【四两酒拌磁器蒸半日捣膏】

余为末加蜜丸如梧子大每服五六十丸空心滚汤或盐汤温酒下

【一百二十】槐花酒 治一切疮毒不问已成未成及焮痛者并治之槐花四五两微炒黄乘
热入酒二鍾煎十余沸去查热服未成者二三服已成者一二服又治湿热疮疥肠风痔漏诸
疮作痛尤效

【一百二一】黄连消毒饮【即黄连消毒散方见第一卷】

【一百二二】紫金锭【一名神仙追毒丸又名太乙丹治一切痈疽】五味子【焙三两】山茨菇【焙二两】射香【三钱另研入】

红牙大戟【焙一两半】续随子【去殼去油一两】

右除续随子射香外三味为细末却入研药令匀用糯米煮浓饮为丸分为四十锭每服半锭各依後项汤使服如治一切药毒蛊毒瘴气吃死牛马驼骡等肉毒发恶疮痈疽发背无名疗肿及蛇大恶虫所伤汤荡火烧急喉闭纏喉风诸般头风牙疼用凉水磨搽并治四时瘟疫感冒风寒暑热闷乱及自缢溺水鬼迷惊死未经隔宿心头微温并用凉水磨灌良久复苏男子妇人急中颠邪鬼气狂乱及打扑伤损中风中气口眼喎邪牙关紧急语言蹇澁筋脉挛缩骨节风肿手脚疼痛行履艰辛应是风气并用热酒磨服小儿急慢惊风八疳五痢脾病黄肿癰疹疮瘤并用蜜水磨服并搽有效诸般症疾不问新久发日用桃柳枝煎汤磨服

【一百二三】玉真散 治破伤风重者牙关紧急腰背反张并蛇犬所伤又名定风散

天南星 防风【各等分】

为末每服二钱温酒调下更搽患处若牙关紧急腰背反张者每服三钱童便调服虽内有瘀血亦愈至于昏死心腹尚温者连进二服亦可保全若治风犬咬用漱口水洗净搽之神效

【一百二四】夺命丹【又名蟾蜍丸】治疗疮发背及?症不痛或麻木或呕吐重者昏愆服此不起发者即发不痛者即痛痛甚者即止昏愆者即苏呕吐者即解未成者即消已成者即溃有回生之功乃恶症中至宝也蟾酥【乾者酒化】轻粉【各五分】白矾【枯】铜绿寒水石【煨】乳香 没药 射香【各一钱】朱砂【三钱】

蜗牛【二十个另研无亦效】

右研细末将蜗牛研烂入药末捣匀丸如菉豆大如丸不就入酒糊些少每服一二丸用生葱白三五寸病者自嚼烂吐于手心男左女右包药在内热酒连葱送下如人行五七里汗出为效重者再服一二丸

【一百二五】茯苓丸

茯苓【一两】半夏【二两】枳殼【五钱】风化朴硝【一两】姜汁糊丸梧子大每服二十丸食後姜汤下

【一百二六】控涎丹

甘遂【去心】大戟 真白芥子【各等分】

糊丸梧子大每服五七丸临卧姜汤下

【一百二七】制甘草法【详见外科精要】治悬痈肿痛或发寒热不问肿溃神效其法大甘草每一两切三寸许开润水一碗浸透慢火炙乾仍投前水浸透再炙再浸以碗水乾为度剉细以无灰酒一碗煎至七分去查空心服

【一百二八】五苓散

泽泻【一钱二分】肉桂【五分】白术猪苓赤茯苓【各一钱】作一贴水煎服

【一百二九】忍冬酒【一名金银花一名鹭鸶藤详见外科精要】忍冬藤【生者四五两如乾者只用一两捣】大甘草节【一两生用】

二味入磁器内以水二碗慢火煎至一碗再入无灰酒一碗再煎十余沸去查饮之查敷患处

【一百三十】回阳玉龙膏

治痈肿坚硬不痛内色不变久而不溃或溃而不斂或筋挛骨痛及一切冷症

草乌【三两炒】南星【一两煨】军姜【二两煨】白芷【一两】肉桂【半两】赤芍药【一两炒】

为末葱汤调搽

【一百三一】蛇床子散 治风癣疥癩瘙痒脓水淋漓

蛇床子 独活 苦参 防风 荆芥蕙【各一两】枯矾 铜绿【各五钱】

为末麻油调搽

【一百三二】人参平肺散 治心火剋肺传为肺痿欬喘呕痰涎壅盛胸膈痞满咽噎不利

人参 陈皮【去白】甘草【炙】地骨皮【各五分】

茯苓 知母【炒各七分】青皮 天门冬【去心】

五味子【捣炒各四分】桑白皮【炒一钱】

水二鍾姜三片煎八分食後服

【一百三三】如圣柘黄丸

治肺痛欬而腥臭或唾脓瘀不问脓盛否并效肺家虽有方惟此功效甚捷

柘黄【一两为末】 百齿霜【即梳垢二钱】

糊丸梧子大每服三五丸米饮下柘黄乃柘树所生色黄状如灵芝江南最多北方鲜有

【一百三四】万金散 治痈疽恶核肿痛发背等疮不问已溃未溃

括萎【一朶全】 没药 乳香【各一钱研】 甘草节【二钱】

先以括萎甘草用无灰酒二碗煎至一碗去查入乳没不拘时服

【一百三五】蛭皮丸 治痔久而不愈或作漏

蛭皮【一两炙】 槐花【微炒】 艾叶【炒】 枳壳【炒】 白芍药 地榆 川芎
当归【酒洗】 白矾【煨】 黄耆【盐水炒】 贯众【各半两】 头发【三钱烧存性】
猪鬃悬蹄甲【十枚炙】 盈尺皂角【一挺去弦醋炙】

为末炼蜜丸如梧子大每服五十丸食前米饮下【若气血虚或肿痛先投他药待气血稍复
肿痛已去方可服此此乃收後之剂】

【一百三六】苦参丸

治一切疮毒焮痛作渴或烦躁苦参不拘多少为末水糊丸如梧子大每服二三钱温酒下

【一百三七】秦艽苍术汤 治肠风痔漏大小秘澁

黄栢【酒拌】 泽泻 归尾【酒拌】 防风【各一钱】 草角仁【烧存性】 秦艽
苍术【米泔浸炒】 桃仁【各钱半】 榔【五分】 大黄【烧量入】 水二鍾煎八分空心服

【一百三八】卷栢散 治臟毒便血

卷栢【生石上高四五寸根黄如丝上有黄点焙乾】 黄耆【盐水浸炒各等分】

右为细末每五钱空心米饮调下

【一百三九】寒水石散 治痔发热作痛

寒水石 朴硝【各等分】

为末温水调服

【一百四十】内托羌活汤 见疔痈条

【一百四一】白芷升麻汤 治疔痈肿痛右手脉大未成脓者白芷【一钱半】升麻
桔梗【各一钱】生黄芩【三钱】

红花 甘草【炙各五分】酒黄芩【四钱】

作一服水一钟酒半钟煎至八分食後服

【一百四二】内托黄耆柴胡汤 见附骨痈条

【一百四三】内托升麻汤
治妇人乳中结核或肿痛并效久而不消者宜以托里药为主间服此药

瓜蒌仁【三钱】升麻 连翘 青皮
甘草节【各二钱】作一服水煎服若数剂不消宜以托里

【一百四四】升麻牛蒡子散 治时毒疮疹发于头面或胸膈之际及一切疮毒并效
升麻 桔梗 葛根 玄参 牛蒡子 麻黄 甘草【各一钱半】连翘【二钱】

作一贴水姜煎食远服

【一百四五】黄耆人参汤 治溃?虚热无睡少食或秽气所触作痛

人参 白术【炒】 归身【酒拌】 麦门冬【去心】

苍术【米泔浸各一钱】甘草【炙】 陈皮 升麻

神曲【炒各五分】黄耆【盐水拌炒二钱】黄栢【酒炒三分】五味子【九粒捣碎】水
二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

【一百四六】雄黄解毒散 治一切痈肿毒烂毒势甚者先用此药二三次後用猪蹄汤

雄黄【一两】白矾【四两】寒水石【煨一两】

用滚水二三碗乘热入前药末一两洗患处以太乙膏或神异膏贴之

【一百四七】玉粉散 治一切疔疮

轻粉 银朱 滑石 寒水石

孩儿茶【各二钱】 片脑【二分】

右为细末香油调搽乾搽亦可若肿硬不消以防风荆芥牛膝甘草滑石各五钱用水三碗煎二碗乘热熏洗

【一百四八】千两金丸 治喉风喉闭及一切急证肿塞立效真起死回生之药也

蚶蜆草 铜青 大黄 牙硝【各五钱】 右为末以白梅肉烂研一处捣匀每一两作五丸以新绵裹噙化咽津涎吐出

【一百四九】破关丹 治乳蛾喉闭纏喉风等症

蓬砂末【五钱】 霜梅肉【一两】

捣烂为丸如芡实大噙化咽下内服荆防败毒散重者服防风通圣散

【一百五十】如圣黑丸子 治风寒袭于经络肿痛或不痛或打扑跌坠筋骨疼痛瘀血不散遂成肿毒及风湿四肢疼痛或手足缓弱行步不前并妇人血风劳损白芨 当归【各四钱】 白歛【一两六钱】 南星【焙三钱】 百草霜 芍药【各一两】 牛膝【焙六钱】 川乌【炮二钱】 赤小豆【一两六钱】

骨碎补【焙八钱】

为末炼蜜丸梧子大每服三十丸盐汤或酒下风疾更煨葱一茎温酒下孕妇勿用

【一百五一】如圣丸 治癩风【即大麻风苏州钦院使方甚妙】 全蝎【酒洗】 连翘 天麻 防风【各一两半】 荆芥 川芎 白芷 当归【酒洗】 黄栢 羌活 桔梗 大黄【煨】 滑石 石膏【煨】 白术 麻黄 苦参 僵蚕【炒】 蝉蜕 芍药 山梔 枳殼 细辛 皂角刺 大风子【肉各一两】 独活 人参 鬱金 芒硝 黄连【各五钱】 共三十味为细末用红米糊为丸如梧子大每服五七十丸用六安茶煎汤送下日进三服半年全愈小便尿如靛水黑色此病之深者只用此药二料如眉毛须髮脱落日渐生者切不可食羊肉鹅鸡猪头蹄鲤鱼生冷如肯食淡百日全愈如疮破裂只用大风子殼煎汤洗春夏滑石石膏依方用秋冬二味减半遇春分秋分服防风通圣散一贴空心服利三四次以粥补之

【一百五二】四七汤

半夏【五两】紫苏【二两】茯苓【四两】厚朴【三两】

水鍾半姜三片枣一枚煎热服

【一百五三】玉烛散 治便痢初起肿痛发热大小便秘用此行散

川芎 当归【酒拌】芍药 芒硝 生地黄【酒拌】大黄【煨各二钱】甘草【炙五分】

水二鍾煎八分食前服

【一百五四】神效活络丹

官桂 羌活 麻黄【一半去节】贯藟 白花蛇【酒浸】甘草【炙】草豆寇 天麻 白芷

两头尖【去皮 浸微炒】 零陵香 黄连

熟地黄 黄芩 何首乌【酒浸】 大黄

木香【各二两】 赤芍药

细辛【去土】 天竹叶【另研】 没药【另研】 朱砂【水飞另研】 乳香【另研】 丁香

白僵蚕【炒】 虎骨【酒炙】 玄参 龟板【酒炙】

人参 黑附子【炮去皮脐】 乌药 青皮

香附子 茯苓 安息香【另研】 白豆寇

白术 骨碎补 沉香【各一两】 威灵仙【酒浸】

全蝎【新者】 葛根 当归【各两半】 射香

乌梢蛇【去皮骨酒浸】 乌犀屑【地龙去土】 松香脂【各五钱】 血蝎【七钱半另研】
防风【二两半】 牛黄【二钱半另研】

金箔为衣 冰片【一钱半另研】

右共五十二味为末炼蜜和杵千余杵每药两半作十丸如弹子金箔为衣每服一丸细嚼温
酒茶清漱下临卧空心各一丸随症上下食前後服头搦茶下男妇暴卒中风不省人事喎斜
口噤失音涎盛拘挛临睡烂研一丸好酒化下便睡觉有汗将病人手背随即舒拳天明用人

扶行早饭日西再服一丸可痊产後暗风及破伤风内外一切伤寒人年四十已上间二三日服一丸永无风疾

一方无白花蛇零陵香黄连黄芩熟地黄大黄虎骨龟板乌药安息香青皮白豆寇骨碎补茯苓白术松香脂多藿香

【一百五五】内托复煎散 治疮?肿焮在外其脉多浮邪气胜必侵内

地骨皮 黄芩【炒】 茯苓 人参 白芍药【炒】 黄耆【盐水拌炒】 白术【炒】 肉桂 甘草【炙】 防己【酒拌】 当归【酒拌 各一钱】 防风【二钱】

先剉苍术一升水五升煎先去术入药再煎至二升终日饮之苍术查外再煎服

【一百五六】托里消毒散 治疽已攻发不消者服此未成即消已成即溃腐肉易去新肉易生有疮口宜贴膏药斂则不用切忌早用生肌又治时毒表里俱解肿肉不退欲其作脓

人参 黄耆【盐水拌炒】 当归【酒洗】 川芎 芍药【炒】 白术【炒】 茯苓【各一钱】 白芷 金银花【各七分】

甘草【五分】

作一剂水二锺煎八分疮在上下分食前後服

【一百五七】托里散 治疮饮食少思或不腐或不收斂人参 黄耆【盐水拌炒】 当归【酒拌】 川芎 白术【炒】 茯苓 芍药【各一钱】 厚朴【姜制】 白芷 甘草【各五分】 作一剂水二钟煎八分服

【一百五八】代针膏 治脓熟不溃

乳香【二分】 巴豆【去殼炒焦】 碱 白丁香【细直者是各五分】

为末熟水调点疮头上常以碱水润之勿令乾

【一百五九】托里荣卫汤 治疮外无焮肿内亦便利乃邪在经络用此调理【见汗之则疮已条】

【一百六十】定痛托里散 治疮血虚疼痛圣药也

当归【酒拌】 白芍【炒】 川芎【各钱半】 乳香

没药肉桂【各一钱】 栗殼【去蒂炒二钱】

水二鍾煎八分服

【一百六一】 内托黄耆汤 治溃疡作痛倦怠少食无睡自汗口乾或发热久不愈

黄耆【盐水拌炒】 麦門冬【去心】 熟地黄【酒拌】 人参 茯苓【各一钱】 白术【炒】
川芎 官桂 远志【去心】 当归【酒拌各五分】 甘草【炙二分】

作一剂水二鍾姜三片枣二枚煎八分食远服

【一百六二】 当归补血汤 治疮溃後气血俱虚肌热躁热目赤面红烦渴引饮昼夜不息脉
洪大而虚重按全无此脉虚血虚也若悞服白虎汤必死

黄耆【炙六钱】 当归【酒拌一钱】

水鍾半煎六分服

【一百六三】 玉露散 治产後乳脉不通身体壮热头目昏痛大便澁滯

人参 白茯苓 甘草【各五分】 桔梗【炒】
川芎 白芷【各一钱】 当归【五分】 芍药【七分】

水二鍾煎八分食後服如热甚大便秘加大黄三分煎服

【一百六四】 加味小柴胡汤 治妇人热入血室致寒热如疟昼则安静夜则发热妄语

柴胡【二钱半】 黄芩 人参 生苳 甘草【各一钱】 半夏【六分】

水鍾半姜三片煎八分食远服

【一百六五】 清心汤 治疮肿痛发热饮冷脉沉实睡语不寧即防风通圣散每料加黄连五
钱每剂一两水二鍾煎八分食远服

【一百六六】 破棺丹 治疮热极汗多大渴便秘谵语或发狂结阳之症

芒硝 甘草【各二两】 大黄【二两五钱半生半熟】

为末炼蜜丸如弹子大每服一丸食後童便酒下白汤亦可

【一百六七】 籬药 治发背毒甚散走不住此药图之而解白芷 大黄 白芨 黄栢【炒】
芙蓉叶 山茨菇 寒水石【煨】 苍耳草【各等分两】

右另为末用水调搽四围留中如乾以水润之

【一百六八】 乌金膏 解一切疮毒及腐化瘀肉最能推陈致新用巴豆去殼炒焦研如膏点
肿处则解毒涂瘀肉则自化加乳香少许亦可如紅疮内能搜脓化毒加香油少许调稀可用
若余毒深伏不能收斂者宜此紅之不致成疮

【一百六九】 援生膏 治一切恶疮及瘰?初起点破虽未全消亦得以杀其毒

轻粉【三钱】 乳香 没药 血竭【各一钱】 蟾酥【三钱】 射香【五分】 雄黄【五钱】

用荞麦箕灰或真炭灰一斗三升淋灰汤八九碗将栗或桑柴文武火煎作三碗以备日久药
乾添用取二碗盛磁器内将前药研为极细末入灰汤内用鉄干或柳枝顺搅再入好细石灰
一升再搅匀过一宿却分于小磁器收贮凡遇诸肿点当头一二点一日换二次次日又一次
须出血水为妙如药乾却加所存灰汤少许调之

【一百七十】 神效托里散
治一切肿毒焮痛增寒壮热【又名金银花散】 黄耆【盐水拌炒】 当归 粉草
忍冬藤【各一钱】

酒水各一钟煎一钟分病上下食前後服少顷再进一剂查罨患处不问陰阳肿溃老少虚实
皆可服为末酒调服尤效消脓托里止痛排脓

【一百七一】 托里温经汤 治寒覆皮毛鬱遏经络不得伸越热伏荣中聚结赤肿作痛恶寒
发热或痛引肢体若头肿痛焮甚更宜砭之【见头面赤肿门】

【一百七二】 五利大黄汤 治时毒焮肿赤痛烦渴便秘脉数大黄【煨】 黄芩
升麻【各二钱】 芒硝 梔子【各一钱二分】 作一贴水鍾半煎六分空心热服

【一百七三】 梔子仁汤 治时毒肿痛便秘脉沉数

郁金 枳殼【麩炒去瓢】 升麻 大黄【煨】 山梔仁【炒】 牛蒡子【炒各等分两】

为细末每服三钱蜜水调下

【一百七四】 葛根牛蒡子汤 治时毒肿痛脉数而少力者葛根 管仲 甘草
豆豉【江西者】

牛蒡子【半生炒各二钱】

作一服水鍾半煎八分食後服

【一百七五】普济消毒饮

治时毒疫疔初觉增寒体重次传头面肿痛或咽喉不利口乾舌燥

黄芩 黄连【各五钱】 人参【三钱】 橘红 玄参 甘草【各二钱】 柴胡
桔梗【炒各二钱】 连翘 鼠粘子 板蓝根 马勃【各一钱】 升麻 白殭蚕【炒各七分】

作一贴水二鍾煎一鍾去查稍热食後徐服之如大便硬加大黄【酒煨】一钱或二钱肿势甚者砭之去恶血

【一百七六】内托羌活滑【见醫痛条】

【一百七七】内托黄耆酒煎汤 治寒湿腿外侧少阳经分患痛或附骨痛坚硬漫肿作痛或侵足阳明经亦治之柴胡【钱半】连翘 肉桂【各一钱】黄栢【五分】黄耆【盐水拌炒二钱】归尾【二钱】升麻【七分】甘草【炙五分】大力子【炒一钱】

作一服水酒各一鍾煎八分食前服

【一百七八】附子饼 治溃?气血虚不能收斂或风邪袭之以致气血不能运于疮所致难收斂用炮附子去皮脐研末唾津和为饼置疮口处将艾于饼上灸之每日灸数壮但令微热勿令痛餅乾再用唾津和做以疮口活润为度

【一百七九】二陈汤 和中理气健脾胃消痰进食

半夏【姜制】 陈皮【炒】 茯苓【各钱半】 甘草【炒五分】

水一鍾姜三片煎六分食远服

【一百八十】火龙膏 治风寒湿毒所袭筋挛骨痛或肢节疼痛及湿痰流注经络作痛不能行步鹤膝风历节风疼痛其效尤速

生姜【半斤取汁】 乳香【为末】 没药【末各五钱】 射香【为末二钱】

牛皮胶【广东者二两切】

先将姜汁并胶溶化方下乳没调匀待温下射香即成膏摊贴患处更服五积散如鹤膝风须

大防风汤

【一百八一】半夏左经汤 治足少阳经为四气所乘以致发热腰脇疼痛头目眩晕呕吐不食热闷烦心腿痺纵缓半夏【姜制】乾葛 细辛 白术 茯苓桂心 防风 乾姜【炮】 黄芩 麦门冬【去心】 柴胡 甘草【炙各一钱】

水二鍾姜三片枣二枚煎八分食前服

【一百八二】大黄左经汤

治四气流注足阳明经致腰脚肿痛不能行大小便闭或恶闻食气喘满自汗

细辛 茯苓 羌活 大黄【煨】 甘草【炙】 前胡 枳殼 厚朴【姜制】 黄芩 杏仁【各一钱】 水二鍾姜三片枣二枚煎八分食前服

【一百八三】加味败毒散

治足三阳经受热毒流于脚踝焮赤肿痛寒热如疟自汗短气小便手足或无汗恶寒羌活 独活 前胡 柴胡 枳殼 桔梗 甘草 人参 茯苓 川芎 大黄 苍术【各一钱】

分二剂水一鍾姜三片煎八分不拘时服

【一百八四】遵滞通经汤

治脾经湿热壅遏不通面目手足作痛即五苓散减猪苓官桂加木香陈皮每服二钱滚汤下

【一百八五】附子六物汤

治四气流注于足太阴经骨节烦痛四肢拘急自汗短气小便不利手足或时浮肿附子 防已【各四钱】 甘草【炙二钱】 白术【炒】 茯苓【各三钱】 桂枝【一钱】

分二剂水鍾半姜三片煎一钟食远服

【一百八六】八味丸 治命门火衰不能上生脾土致脾胃虚弱饮食少思或食不化日渐消瘦及虚劳渴欲饮水腰肿痛疼小腹不利及肾气虚寒脐腹作痛夜多漩溺脚膝无力肢体倦怠 即肾气丸每科加肉桂一两附子一两每日用新童便数碗浸五六日切作四块再如前浸数日以草纸包裹水湿纸炮半日出去皮脐尖切作大片如有白星再用火炙以无为度

【一百八七】交加散 治风寒湿毒所伤腿脚痛或筋挛骨痛腰背掣痛或头痛恶寒拘急遍身疼痛一切寒毒之病并治即五积散对人参败毒散

【一百八八】?榔散 治风湿流注脚胫酸痛或呕吐不食?榔 木瓜【各一钱】 香附子 紫苏【各三分】 陈皮 甘草【炙各一钱】

水鍾半姜三片葱白三茎煎一鍾空心服

【一百八九】麻黄左经汤 治四气流注足太阳经腰足挛痹关节重痛增寒发热无汗恶寒或自汗恶风头痛麻黄【去节】乾葛 茯苓 苍术【米泔浸炒】防已【酒拌】桂心 羌活 防风 细辛 甘草【炙各一钱二分】水二鍾姜三片枣一枚煎八分食前服

【一百九十】加味四斤丸
治肝肾气血不足足胫酸痛步履不随如受风寒湿毒以致脚气者更宜

虎胫骨【一两酥炙】没药【另研】乳香【另研各五钱】川乌【一两炮去皮】肉苁蓉 牛膝【各一两半】木?【一斤去穰蒸】天麻【一两】木瓜苁蓉捣膏余为末加酒糊和匀熟杵丸梧子大每服七八十丸空心温酒或盐汤任下

【一百九一】局外换腿丸
治足三阴经为四气所乘挛痹缓纵上攻胸脇肩背或下注脚膝作痛足心发热行步艰辛

薏苡仁 石楠叶 南星【汤泡】石斛?榔?藓【炙】 牛膝 羌活 防风 木瓜【各四两】黄耆【炙】 当归 天麻 续断【各一两】

为末酒糊丸梧子大每服五十丸盐汤下

【一百九二】三因胜骏丸 治元气不足为寒湿所袭腰足挛拳或脚面连指走痛无定筋脉不伸行步不随常服益真气壮筋骨

当归 天麻 牛膝 木香

熟地黄【酒拌蒸半日杵膏】 酸枣仁【炒】 防风【各二钱】

木瓜【四两】 羌活 乳香【各五钱】 射香【二钱】

全蝎【炒】 没药 甘草【炙各一两】 附子【制法见八味丸二两】 地黄三斤用无灰酒四升煮乾再晒二日杵如膏入余药末杵千余下每两作十丸每服一丸细嚼临卧酒下作小丸服亦可

【一百九三】神应养真丸 治厥陰经为四气所袭脚膝无力或左痲右痿半身不遂手足顽麻语言蹇澁气血凝滯通身疼痛

当归【酒洗】 川芎 芍药 地黄【酒蒸捣膏】 羌活 天麻 木瓜 兔丝子【酒制各等分两】

为末入地黄膏加炼蜜丸梧桐子大每服百丸空心酒下盐汤亦可

【一百九四】开结导引丸 治饮食不消心下痞闷腿脚肿痛白术【炒】 陈皮【炒】
泽泻 茯苓 神曲【炒】 麦芽【炒】 半夏【姜制 各一两】 青皮
乾姜【各五钱】 巴豆霜枳实【炒各钱半】

为末汤浸蒸饼丸梧子大每服四五丸或十丸温水下
此内伤饮食脾胃营运之气有亏不能上升则注为脚气用此导引行水化脾气也

【一百九五】青龙汤 治肺受寒咳 喘

乾姜【炮】 细辛 麻黄【去节】 肉桂【各三两】 半夏【汤泡七次二两半】 芍药
甘草【炙各三两】 五味子【二两捣炒】

每服五钱水一鍾姜三片煎七分食後服

【一百九六】葶苈大枣泻肺汤 治肺痈胸膈胀满上气咳 或身面浮肿鼻塞声重

葶苈【炒黄研末每 三钱】

水二鍾枣一枚煎一鍾去枣入药煎七分食後服

【一百九七】升麻汤 治肺痈胸乳间皆痛吐痰腥臭

川升麻 苦梗【炒】 薏苡仁 地榆 黄芩【炒】 赤芍药【炒】 生甘草
牡丹皮【去心各一钱】

水二鍾煎八分食远服

【一百九八】参苏饮 治感风欬 涕唾稠粘或发热头痛或头目不清胸膈不利

木香 苏叶 葛根【姜制】 前胡 半夏【汤泡七次】 人参
茯苓【各七分】 枳壳【麸炒】 桔梗【炒】 甘草陈皮【去白各五分】

水二鍾姜一片葱一茎煎八分食远服

【一百九九】桔梗汤 治欬而胸膈隐痛两脚肿满咽乾口燥烦闷多渴时出浊涕腥臭

桔梗【炒】 贝母【去心】 当归【酒浸】 瓜蒌仁

枳殼【麩炒】薏苡仁【炒】桑白皮【炒】甘草節防己【去皮各一錢】黃耆【鹽水拌炒】百合【蒸各錢半】五味子【搗炒】甜葶【炒】地骨皮
知母【炒】杏仁【各五分】

水鍾半生薑三片煎七分不拘時溫服效加百藥煎熱加黃芩大便秘加煨大黃少許小便澀
加木通車前子煩燥加白茅根效而痛甚加人參白芷

【二百】排膿散 肺癰吐膿後服此排膿補肺

嫩黃耆【鹽水拌炒】白芷
五味子【杵炒】人參【各等分】細末每服三錢食後蜜湯調下

【二百一】四順散 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶效 貝母【去心】紫苑【去苗】桔梗【
炒各錢半】甘草【七分】

水二鍾煎八分食遠服效 加杏仁亦可为末白湯調服

【二百二】葶散 治過食煎或飲酒過度致肺壅喘不卧及肺癰濁唾腥臭

甜葶 桔梗【炒】瓜蒌仁 川升麻
薏苡仁桑白皮【炒】葛根【各一錢】甘草【炙五分】

水鍾半生薑三片煎八分食後服

【二百三】鍾乳粉散 治肺氣虛久嗽皮毛枯槁唾血腥臭或喘不已

鍾乳粉【煅煉熟】桑白皮【蜜炙】麥門冬【去心】紫蘇【各五分】水一鍾姜三片
一枚煎六分食後服

【二百四】紫苑茸湯 治飲食過度或煎傷肺效 咽乾吐痰唾血喘急胸痛不得卧

紫苑茸【去苗一錢】犀角【磅】甘草【炙】人參【各五分】

款冬花 桑葉【經霜者】百合【蒸焙】杏仁【去皮尖】

阿膠【蛤粉炒】貝母【去心】半夏【湯炮七次】蒲黃【炒各一錢】

水鍾半姜三片姜八分入犀末食後服

【二百五】 人参五味子汤 治劳复欬脓或咯血寒热往来盗汗羸瘦困乏一切虚损并治

人参 五味子【杵炒】 前胡 桔梗【炒】
白术【炒】 白茯苓【去皮】 陈皮【去白】 甘草【炙】
地黄【生者酒拌蒸半日】 当归【酒拌炒各一钱】 地骨皮 黄耆【炙】
桑白皮【炒】 枳壳【去穰炒】 柴胡【各七分】

水鍾半姜三片煎八分食後服

【二百六】 寧肺汤 治荣卫俱虚发热自汗或喘急欬 唾脓人参 当归 白术【炒】 川芎
白芍熟地黄【酒蒸】 五味子【杵炒】 麦门冬【去心】 桑白皮【炒】

甘草【炙】 白茯苓 阿胶【蛤粉炒】

水二鍾姜三片煎八分食後服

【二百七】 知母茯苓汤 治肺痿喘 不已往来寒热自汗茯苓
黄芩【炒各二钱】 甘草【炙】 知母【炒】 人参五味子【杵炒】 桔梗 薄荷
半夏【姜制】 柴胡白术 麦门冬【去心】 款冬花【各三钱】
川芎阿胶【蛤粉炒各二钱】

作一贴水二鍾姜三片煎一钟食後服

【二百八】 人参养肺汤 治肺痿欬 有痰午後热并声飒者人参
五味子【捣炒】 贝母【去心】 柴胡【各四分】

桔梗【炒】 茯苓【各钱半】 甘草【五分】 桑白皮【炒一钱】

枳实【麸炒钱半】 杏仁【炒】 阿胶【蛤粉炒各一钱】

水鍾半姜三片枣一枚煎八分食後服

【二百九】 梔子仁汤 治肺痿发热潮热或发狂烦躁面赤咽痛

梔子仁 赤芍药 大青叶 知母【炒各七分】 黄芩【炒】 石膏【煨】 杏仁【去皮尖炒】
升麻【各钱半】 柴胡【二钱】 甘草【一钱】 豆豉【百粒】

水二鍾煎八分食远服

【二百一十】甘结汤 治肺气壅热胸膈不利咽喉肿痛痰涎壅盛

甘草【炙】 桔梗【各五钱】

水鍾半煎八分食远服

【二百一十一】加味理中汤 治肺胃俱寒发热不已

甘草【炙】 半夏【姜制】 茯苓 乾姜【炮】 白术【炒】 橘红 细辛 人参
五味子【捣炒各五分】 水一鍾煎六分食远服

【二百一十二】大黄汤 治肠痈小腹坚肿如掌而热按之则痛肉色如故或焮赤微肿小便频
数汗出增寒其脉迟紧未成脓宜服

朴硝 大黄【炒各一钱】 牡丹皮 瓜蒌仁【研】

桃仁【去皮尖各二钱】

水二鍾煎八分食或空腹温服

【二百一十三】牡丹皮散 治肠痈腹濡而痛时时下脓

牡丹皮 白茯苓 薏苡仁 人参 天麻 黄耆【炒】 桃仁【去皮尖】 白芷
当归【酒浸】 川芎【各一钱】 官桂 甘草【炙各五分】 木香【二分】

水二鍾煎八分食远服

【二百一十四】梅仁汤 治肠痈隐痛大便秘澁

核桃仁【九个去皮尖】 牡丹皮 大黄【炒】 芒硝【各一钱】 犀角【镑末一钱】
冬瓜仁【研二钱】

水二鍾煎八分入犀角末空心服

【二百一十五】薏苡仁汤

治肠痈腹中?痛或胀满不食小便澁妇人产後多有此病纵非脓服之尤效

薏苡仁 瓜蒌仁【各三钱】 牡丹皮 桃仁【去皮尖各二钱】 水二鍾煎八分空心服

【二百十六】云母膏 治一切疮疽及肠痈折伤

蜀椒【开口者去微炒】白芷 没药 赤芍肉桂 当归 盐花 血竭 菖蒲黄耆 白芨 芎藭 龙胆草 木香白斂 防风 厚朴 射香 桔梗 茈胡 松脂 人参 苍术 黄芩 夜合皮 乳香 附子 良姜 茯苓【各钱半】硝石 甘草 云母【各四两】栝叶 桑白皮 槐枝 柳枝【各二两】陈皮【一两】清油【四十两】黄丹【十四两另研】右除血竭乳没射黄丹盐花硝石七味另研外余并剉入油浸七日文火煎以柳篋不住手搅候匝沸乃下火沸定又上火如此三次以药黑色为度纸滤去查再熬续入丹将凝再下余味药末仍不住手搅又熬滴水中成珠为度磁器收之候温将水银绢包以手细弹铺在上谓之养药母用时刮去水银或服或贴随用其功甚大

【二百十七】神仙太乙膏 治一切疮毒不问年月深浅已未成脓先以温水洗净软帛拭乾用绯帛摊贴亦可丸即用冷水吞下血气不通温酒下赤白带当归酒下欬 及喉闭纏喉风并用绵裹含化诸风弦赤眼捏作小饼贴太阳穴以山梔汤下打扑伤损外贴内服橘皮汤腰膝痛贴患处盐汤下唾血丸以蛤粉为衣桑白皮汤下瘰?盐汤洗贴酒下一丸妇人经脉不通甘草汤下其膏可收十余年不坏愈久愈烈一切疥别炼油少许和膏涂之诸?蛇并汤火刀斧伤皆可内服外贴

玄参 白芷 当归 肉桂 生地黄 大黄 赤芍【各一两】

咀用麻油一斤入铜锅内煎至黑滤去查入黄丹十二两再煎滴水中捻软硬得中成膏矣予尝用治疮毒并内痈有奇效一妇月经不行腹结块作痛贴之经行痛止愈此方之妙也

【二百十八】排脓散 治肠痈少腹痛脉滑数或里急後重或时时下脓

黄耆【炒】 当归【酒浸】 金银花 白芷 川山甲【蛤粉拌炒】 防风 连翘 瓜蒌仁【各一钱】

水二鍾煎八分食前服为末每服三钱食後蜜汤调下亦可

【二百十九】射干连翘散 治寒热瘰?

射干 连翘 玄参 木香 赤芍药 升麻 前胡 当归 山梔仁 甘草【各七分炙】 大黄【炒二钱】

水二鍾煎八分食後服

【二百二十】薄荷丹 治风热瘰 久服毒自小便宣出未作脓者自消

薄荷 皂角【去皮弦】 三棱【煨】 连翘

何首乌【米泔浸】 蔓荆子【各一钱】

荆芥穗【一两】 豆豉末【二两半】

为末醋糊丸如梧子大每服三十丸食後滚汤下日二服病难愈须常服之

【二百二一】 益气养荣汤

治抑郁或劳伤气血或四肢颈项患肿或软或赤不赤或痛不痛或日晡发热或溃而不斂

人参 茯苓 陈皮 贝母 香附 当归【酒拌】 川芎

黄耆【盐水拌炒】 熟苕【酒拌】 芍药【炒各一钱】 甘草【炙】

桔梗【炒五分】 白术【炒二钱】

水二鍾姜三片煎八分食远服

胸膈满加枳殼香附【各一钱】 人参熟苕【各減二分】

饮食不甘暂加厚朴苍术 痰多加橘红半夏往来寒热加柴胡地骨皮

发热加柴胡黄芩脓溃作渴加参耆归术 脓多或清加归芎脇下痛或痞加青皮木香

肌肉生迟加白斂官桂口乾加五味子麦门冬 渴不止加知母赤小豆

【俱酒拌炒】 脓不止倍加参耆当归

【二百二二】 针头散 治一切顽疮瘀肉不尽及 核不化疮口不合宜此腐之

赤石脂【五钱】 白丁香 乳香【各二钱】 黄丹【一钱】 砒生【二钱】 轻粉

射香【各五分】 蜈蚣【一条炙乾】 为末搽瘀肉上其肉自化若疮口小或痔疮用糊和作条子陰乾絰之凡疮久不合者内有脓管须用此药腐之兼服托里之剂

【二百二三】 如神散 治瘰癧已溃瘀肉不去疮口不合松香末【一两】 白矾【三钱】

为末香油调搽乾搽亦可

【二百二四】 当归龙会丸 治瘰癧肿痛或脇痛以有积块及下疳便痛小便澁大便秘或瘀血凝滯小腹作痛当归【酒浸】 栀子仁【炒】 黄连 青皮

龙胆草【酒拌炒】 黄芩【各一钱】 大黄【酒拌炒】 芦荟 青黛

柴胡【各五钱】 木香【二钱半】 射香【五分另研】

为末神曲糊丸每服二三十丸姜汤下

【二百二五】分心气饮 治七情郁结胸膈不利或脇肋虚胀噎塞不通或噫气吞酸呕恶心或头目昏眩四肢倦怠面色痿黄口苦舌乾饮食减少日渐羸瘦或大肠虚秘或病後虚痞

木通 赤芍 官桂 半夏【姜制】 赤茯苓桑白皮【炒】 大腹皮
陈皮【去白】 青皮【去白】 甘草【炙】 羌活【各五分】 紫苏【二钱】

水二鍾姜三片枣二枚灯心十茎煎八分食远服

【二百二六】生地黄丸 许白云云有一师尼患恶风体倦乍寒乍热面赤心烦或时自汗是时疫气大行医见寒热作伤寒治大小柴胡汤杂进数日病剧予脰三部无寒邪但肝脉弦长上鱼际宜用抑陰之药遂用此方秦艽 黄芩

硬柴胡【各五钱】 赤芍药【一两】 生地黄【一两酒蒸捣膏】

为末入地黄骨加炼蜜少许丸如梧子大每服三十丸乌梅汤下日进二服

【二百二七】遇仙无比丸 治未成脓其人气体如常宜服此丸形气觉衰者先服益气养荣汤待血气少充方服此丸核消仍服前汤溃後有瘀肉宜头散若不斂亦服此丸斂後再服前汤

白术【炒】 榔 防风 蜜陀僧

郁李仁【汤炮去皮】 甘草【各五钱】 斑猫【去翅足用糯米同炒米不用五钱】

细末水糊丸梧子大每服二十丸早晚煎甘草榔汤下服至用许觉腹微痛自小便中取下毒如鱼目状已破者自合未脓者自消

【二百二八】三品錠子

上品 去十八种痔

白矾【二两】 乳香【三钱五分】 没药【三钱五分】 牛黄【三钱】 白砒【一两零五分】

中品 去五漏及番花瘤气核

白矾【二两】 白砒【一两三钱】 乳香 没药【各三钱】

下品 治瘰疬气核疔疮发背脑疽诸恶症

白矾【二两】白砒【一两五钱】乳香 没药【各二钱半】牛黄【三分】先将砒末入紫泥罐内次用矾末盖之以炭火煅令烟尽取出研极细末糯米糊和为挺子状如线香陰乾紙疮内三四次年深者五六次其根自腐溃如疮露在外更用蜜水调搽乾上亦可

【二百二九】益元散

滑石【煅六两】甘草【炙二两】

各研为末和蜜与服三钱热汤冷水任下

【二百三十】治血分椒仁丸

续随子【去皮研】郁李仁 黑牵牛【研】五灵脂【研】吴茱萸 延胡索 椒仁 甘遂

附子 当归【各五钱】 芫花【醋浸一钱】石膏

胆矾【一钱】 人言【一钱】 蛭青【十枚去头翅足同糯米炒黄米不用】为末面糊丸如豌豆大每服一丸橘皮汤下此方药虽峻利所用不多畏而不服是养病害身也尝治虚弱之人亦未见其有悞

【二百三一】治水分葶?丸

葶?【炒另研】续随子【去殼研各半两】乾笋末【一两】

为末枣肉丸如梧子大每服七丸煎扁蓄汤下如大便利者减葶?续随子各一钱加白术五钱

又方 治经脉不利即为水水流四肢即为肿满名曰血分其候与水相类作水治之非也宜用此方人参 当归 桂心 赤芍 瞿麦穗白茯苓 大黄【湿纸裹三斗米下蒸米熟去纸切炒各半两】葶?【炒另研一钱】为末炼蜜丸如梧子大空心米饮下十五至二三十丸

【二百三二】托里养荣汤 治瘰?流注及一切不足之证不作脓或不溃或溃後发热恶寒肌肉消瘦饮食少思睡卧不寧盜汗不止

人参 黄耆【炙】 当归【酒拌】 川芎

芍药【炒】 白术【炒各一钱】 五味子【炒研】 麦門冬

甘草【各五分】 生苻【酒拌蒸半日】 水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

【二百三三】琥珀膏 治颈项及腋下初如梅核肿结硬强渐如连珠不消不溃或溃而脓水不絕经久不瘥渐成漏症

琥珀【一两】木通 桂心 当归 白芷 防风 松脂 朱砂【研】 木鳖子【各五钱肉】

麻油【二斤】丁香 木香【各三钱】

先用琥珀丁香桂心朱砂木香为末余剉以油二斤四两浸七日入铛慢火煎白芷焦黄漉出徐徐下黄丹一斤以柳枝不住手搅煎至滴水捻软硬得中却入琥珀等末搅匀磁器盛用时取少许摊纸贴之

【二百三四】方脉流气饮 治瘰?流注及鬱结肿块或走注疼痛或心胸痞闷咽塞不通脇腹膨胀呕吐不食上气喘急欬 痰盛面目四肢浮肿大小便秘

紫苏 青皮【去白】 当归【酒拌】 芍药【炒】 乌药 茯苓 枳实【麸炒】 桔梗【炒】 半夏【姜制】 川芎 黄耆【炙】 防风 陈皮【去白】 甘草【炙各一钱】 木香 大腹皮?榔 枳壳【麸炒各五分】

水二鍾姜三片枣一枚煎八分食远服

【二百三五】加減八味丸 治疮瘰後口乾渴甚则舌或黄及未患先渴此肾水枯竭不能上润以致心火上炎水火不能既济故心烦躁作渴小便频数或白浊阴痿饮食不多肌肤渐削或腿肿膝先瘦服此以生肾水降心火诸症顿止及治口舌生疮不絕

山茱萸【净肉一两】 五味子【炒二两】 牡丹皮【半两】 白茯苓【半两】 山药【一两】 桂心【去皮半两】 泽泻【切片蒸焙半两】 生地黄【二两酒拌蒸捣膏】

为末入地黄膏加炼蜜少许丸梧子大每服六七十丸五更初未语前或空心淡盐汤下

【二百三六】香砂六君子汤 治脾胃不健饮食少思或作呕或过服凉药致伤脾胃即六君子加藿香砂仁

【二百三七】不换金正气散 治疮脾气虚弱寒邪相抟痰停胸膈以致发寒热服此正脾气则痰自消寒热不作厚朴【去皮姜制】 藿香 半夏【姜制】 苍术【米泔浸】 陈皮【去白各一钱】 甘草【炙五分】

水二鍾姜三片枣二枚煎七分食远服

【二百三八】清咽利膈汤 治积热咽喉肿痛痰涎壅盛或胸膈不利烦躁饮冷大便秘结

金银花 防风 荆芥 薄荷 桔梗【炒】 黄芩【炒】 黄连【炒各钱半】 山梔【炒研】 连翘【各一钱】 玄参 大黄【煨】 朴硝

牛蒡子【炒】甘草【各七分】

水二鍾煎一鍾食後服

【二百三九】刺少商穴法 穴在手大指內側去爪甲如韭葉刺入二分許以手自臂勒至刺處出血則消若重者及膿成者必須患處否則不治

【二百四十】承氣湯 治腸胃積熱口舌生瘡或齦作痛大黃【煨】甘草朴硝【各一錢】

水鍾半煎七分食前服

【二百四一】人參固本丸 治肺氣燥熱作渴或小便短赤如淋此治虛而有火之聖藥也

生地黄【酒拌】熟地黄【酒洗】天門冬【去心】麥門冬【去心各一兩】人參【五錢】

除人參為末余藥搗膏加煉蜜少許丸梧子大每服五十丸空心鹽湯或溫酒下中寒人不可服

【二百四二】消毒犀角飲子 治班或癰 瘙癢或作痛及風熱瘡毒

荊芥 防風【各錢半】甘草【三分】牛蒡子【二錢】

水一鍾煎五分徐徐服

【二百四三】解毒防風湯 治班或癰 痒或痛

防風【一錢】地骨皮 黃耆 芍藥 荊芥 枳殼【各二錢炒】

水一鍾煎五分徐徐服

【二百四四】砭法 治小兒丹毒色赤游走不定用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊以筋一根劈開頭尖夾之以線縛定兩指輕撮筋稍令磁器芒者正對患處懸寸許再用筋一根頻擊筋頭令毒血遇刺皆出却以神功散敷之毒入腹者不救

【二百四五】?蘼湯 治楊梅瘡不問新舊潰爛筋骨作痛并效川?蘼【俗呼土茯苓】每用二兩水三鍾煎二鍾去渣不拘時徐徐溫服若患久或服攻伐之劑致傷脾胃氣血者以此一味為主而加以兼証之劑

【二百四六】双解散 治便痢内蕴热毒外挟寒邪或交感强固精气致精血交错肿结疼痛大小便秘宜此通解更随症调治

辣桂 大黄【酒拌炒】白芍 泽泻 牵牛【炒杵】杏仁【去皮尖】甘草【炙】乾姜【炮各五分】

水二锺煎八分空心服

【二百四七】八正散 治积热小便不通及淋症脉实

大黄【酒拌炒】车前子【炒】瞿麦 篇蓄 山梔仁【炒】木通 甘草【各一钱】活石【煨二钱】

水二锺煎八分食前服

【二百四八】导水丸

治便痢初起肿痛及下疳大小便秘又治杨梅疮初起湿盛之际宜先用此数服

大黄【酒拌炒】黄芩【炒各二钱】黑丑末【炒】活石【煨各四钱】

为末糊丸梧子大每服五十丸临卧温水下

【二百四九】托里当归汤

治溃?气血俱虚发热及瘰?诸痢不问肿溃皆宜服之久服能斂疮口

当归【酒拌】黄耆【盐水拌炒】人参 熟苧【酒拌】川芎芍药【炒各一钱】柴胡 甘草【炙各五分】

水二锺煎八分食远服

【二百五十】加减龙胆泻肝汤 治肝经湿热玉jing患疮或便毒悬痈肿痛小便赤涩或溃烂不愈又治阴囊肿痛或溃烂作痛或辜丸悬挂亦治痔疮肿痛小便赤澁龙胆草【酒拌炒】黄芩 泽泻【各一钱】车前子【炒】木通

黄芩 生地黄【酒拌】归尾【酒拌】山梔【炒】甘草【各五分】

水二锺煎八分食前服 湿盛加黄连大便秘加大黄【炒】

【二百五一】胃苓散

猪苓 泽泻 白术 茯苓 苍术 厚朴 陈皮【各一钱】 甘草【炙】 肉桂【各五分】

水二鍾姜三片枣二枚煎八分服

【二百五二】当归郁李仁汤 治痔漏大便结硬大肠下坠出血苦痛难忍

归尾【酒拌】 郁李仁 泽泻 生苳 大黄【煨】 枳实 苍术 秦艽【各一钱】 麻黄仁【钱半】 皂角【一钱另研细末】 水二鍾煎八分入皂角末空心服

【二百五三】秦艽防风汤 治痔漏结燥每大便作痛

秦艽 防风 当归【酒拌】 白术【各钱半】 黄柏 陈皮 柴胡 大黄【煨】 泽泻【各一钱】 红花 桃仁【去皮尖研】 升麻 甘草【炙各五分】

水二鍾煎八分空心服

【二百五四】加味四君子汤 治痔漏下血面色痿黄心忪耳鸣脚弱气乏及脾胃虚口淡食不知味又治中气虚不能摄血致使血不禁

人参 白术【炒】 茯苓 黄耆【炙】 白扁豆【蒸】 甘草【炙各等分】

为末每服三钱滚白汤点服

【二百五五】除湿和血汤 治阳明经湿热便血腹痛

生地黄 牡丹皮 生甘草【各五分】 熟甘草 黄耆【炙各一钱】 白芍【钱半】 升麻【七分】 归身【酒拌】 苍术 秦艽 陈皮 肉桂 熟苳【酒拌各三分】

水二鍾煎八分空心俟宿食消尽热服

【二百五六】槐花散 治肠风藏毒下血

槐花 生地黄【酒拌蒸】 青皮 白术

荆芥 蕪【各六分】 川芎【四分】 归身【酒拌】 升麻【各一钱】 为末服三钱空心米饮调下水煎亦可

【二百五七】参苓白术散

治脾胃不和饮食不进或呕吐泄泻凡大病後皆宜服此以调理脾胃

人参 茯苓 白术【炒】 连肉【去心皮】

白扁豆【去皮姜汁拌炒】 砂仁【炒】 桔梗【炒】

山药 甘草【炙】 薏苡仁【炒各二两】

细末每服三钱石菖蒲煎汤下

【二百五八】小乌沉汤 治气不调和便血不止

乌药【一两】 甘草【炙二钱】 香附【四两醋制】

每服二钱食前盐汤下

【二百五九】枳殼散 治便血或妇人经候不调手足烦热夜多盗汗胸膈不利

枳殼【麸炒二钱】 半夏曲 赤芍药【炒各一钱】 茺葫
黄芩【炒各钱半】 水二鍾姜三片枣二枚煎八分食远服

【二百六十】芎归汤 治便血或失血过多眩晕

芎藭 当归【酒拌各五钱】

水鍾半煎六分食後服

【二百六一】如神千金方 治痔无有不效

【二百六二】水澄膏 治痔护肉

【二百六三】桔药【已上三方俱见前痔疮条下】

【二百六四】连翘饮子 治乳内结核服数剂不消宜兼服八珍汤初起有表症者宜先解表

连翘 川芎 瓜蒌仁【研】 皂角刺【炒】 甘草节 橘叶 青皮【去白】 桃仁【各一钱半】

水二鍾煎一鍾食远服

【二百六五】复元通气散

治乳痈便毒肿痛及一切气滞肿毒如打扑伤损闪肭作痛及疝气尤效

木香 茴香【炒】 青皮【去白】 陈皮 川山甲【苏炒】 白芷 甘草 漏芦
贝母【去心各等分】

为末每服三钱温酒调下

外科理例附方