

仁斋直指

杨士瀛

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	4
标点本	6
《仁斋直指》序	7
卷之一 总论	8
卷之二 证治提纲	26
卷之三 诸风	42
卷之四 风缓（附痿证）	92
卷之五 诸气	112
四库本	116
提要	117
原序	118
卷一	119
卷二	134
卷三	146
卷四	203
卷五	232
卷六	249
卷七	288
卷八	313
卷九	337
卷十	369
卷十一	378
卷十二	385
卷十三	395
卷十四	407
卷十五	417
卷十六	442
卷十七	455
卷十八	479
卷十九	498
卷二十	511
卷二十一	536
卷二十二	568
卷二十三	618
卷二十四	639
卷二十五	671

卷二十六	683
仁斋伤寒类书卷一	733
仁斋伤寒类书卷二	744
仁斋伤寒类书卷三	747
仁斋伤寒类书卷四	755
仁斋伤寒类书卷五	767
仁斋伤寒类书卷六	780
仁斋伤寒类书卷七	790

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

标点本

《仁斋直指》序

余始撰《活人总括》、《婴儿指要》，俗皆以沽名讥。及《脉书》一行，于是敛肃而相告曰：诚不易也。谁肯倾竭廩，以徇人哉？余曰：尔亦知有天乎？天将寓其济人利物之心，故资我以心通意晓之学。既得于天，还以事之，是盖造物初心之所期也。或者隙光自耀，藏诸己而不溥诸人，政恐玉毁椟中，草木俱腐矣。虽然人有四百四病，或出于前三册之外者，可不原证择方，揭为直指之捷径乎！明白易晓之谓直，发踪以示之谓指。剖前哲未言之蕴，摘诸家已效之方，济以家传，参之《肘后》，使读者心目了然，对病识证，因证得药，犹绳墨诚陈之不可欺，庶几仁意周流，相续，非深愿欤？余尝慨而作曰：天之予人以是物，必使之有以用是物，有是物而不能用，非惟拂天，抑亦自弃其天者也。并书此为同志勉。

景定甲子良月朔。三山杨士瀛登父序。

卷之一 总论

五脏所主论

夫在天之风，在地为木，在人为肝，惟肝则主风。在天之热，（暄、暑、炽、燠，热之用也。）在地为火，在人为心，惟心则主热。在天之湿，在地为土，在人为脾，惟脾则主湿。

在天之燥，在地为金，在人为肺，惟肺则主燥。在天之寒，在地为水，在人为肾，惟肾则主寒。吁！此天地自然之气也。气之愆伏，乘虚入人，而人不能克，百病之所由生。故风喜伤肝，热喜伤心，湿喜伤脾，燥喜伤肺，寒喜伤肾，而暑喜伤心包络。（心包络曰膻中，在胸膈间。盖心主暑，故暑气伏于三焦膈胃之间。）其或风气之胜，木邪乘土，则脾病生焉。热气之胜，火邪乘金，则肺病生焉。湿气之胜，土邪乘水，则肾病生焉。燥气之胜，金邪乘木，则肝病生焉。寒气大来，心火亦为肾水所乘矣。左关为人迎，可以知风寒暑湿热燥所从入之门。右关为气口，可以别脏气郁畅与食气聚散盈虚之候。若乃忧愁思虑，易耗心神。恚怒气逆，易损肝气。纵欲强志，肾之戕。形寒饮冷，肺之害。饥饱劳倦，脾之伤。外之六气相乘，内之七情相感，凡是数者，皆为五脏之邪。因其所主，而寻其某脏所受之处，则得之矣。

心主血，所藏者神，上应舌，外应诸掌，其声言，其色赤，其臭焦，其味苦，其液汗。肝主筋，所藏者魂，上应眼，外应爪甲，其声呼，其色青，其臭燥，其味酸，其液泣。肾主骨，所藏者精与志，上应耳，外应腰背，其声呻，其色黑，其臭腐，其味咸，其液唾。（肾冷多辛，其液涕。脾主肌肉，所藏者意与智，上应口，外应四肢，其声歌，其色黄，其臭香，其味甘，其液涎。故心肺在上主脉气也，肝肾在下藏精血也，脾居中州又所以为精血脉气之养也。心之平脉浮大而散，肝之平脉弦细而长，肾之平脉沉濡而滑，肺之平脉短涩而浮，脾之平脉和缓而大。平者，五脏本然之正脉也。春弦、夏钩、（叔和云：夏洪取火脉来盛之义。）

秋毛、冬石，以其四时当旺者，象之木火金水，四时各旺七十有二日。土为季脉，每季之月寄旺一十八日。春则弦缓，夏则洪缓，秋则微缓，冬则沉缓。合四季而论，则亦七十有二日矣。春弦者，端直之状，细弱而长是也。夏钩者，浮大而散，来疾去迟是也。秋毛者，稀软之状，轻虚以浮是也。冬石者，沉濡而滑，举指来疾是也。土之脉，温浓气行乎脏腑之中，平和不可得见，其衰则现焉。所谓弦、钩、毛、石，盖应时而略见耳。其中须有谷神胃气之和。若弦如张弓弦，钩如操带钩，毛如风吹毛，石来如夺索，去如弹石，此皆危脉也。此绝无胃气也。胃气亏绝，其能久乎？若夫春得金脉，夏得水脉，秋得火脉，冬得土脉，四季得木脉，其与心之脉克肺，肺之脉克肝，肝之脉克脾，脾之脉克肾，肾之脉克心，此皆贼邪也。一脏无气，况可以为人乎？然则诸腑之脉可得闻欤？曰：小肠微洪，大肠微涩，膀胱微沉

，胃微缓而胆微弦急。此无他腑与脏合气，同气相求，斯有得其近似者矣。抑古人所谓九脏者又何如耶？曰：形脏四，一者头角，二者耳目，三者口齿，四者胸中。神脏五，在心藏神，在肝藏魂，在肾藏志，肺藏魄而脾藏意。然脏者，神之舍；色者，神之旗。五脏已败，其色必夭，槁怪异常，夭必亡矣。抑犹有说焉。微迟、濡弱，其候虽不同，而为寒为虚一也。

数实、长洪，其形虽不类，而为热为实一也。诸脉皆弦，吾知其病出于肝；诸脉皆缓，吾知其病出于脾；诸脉皆涩，吾知其病出于肺。

脉皆浮洪，病不在心乎？脉皆沉滑，病不在肾乎？若合腑脏而观，假如数在左寸，数主热也，沉之而得，则热入于心；浮之而得，则热入小肠。迟在左尺，迟主寒也，沉之而得，则寒入于肾；浮之而得，则寒入膀胱。其余以此推之。噫！此通变法也。安得圆机之士与之论此哉！

五脏病证虚实论

五脏各有所主，至其病证莫不随所主而见焉。面赤喜笑，舌破口干，烦躁掌热，心痛而嘔，脐上有动气者，心家病也。面青多怒，胁下痛硬，咳逆目眩，肢节挛急，转筋洩难，脐左有动气者，肝家病也。（肝乘脾挟水气，故咳逆。足厥阴下终于阴器，故洩难。）面黑而恐，呵欠呻吟，齿痛骨痠，耳鸣精泄，足胫寒，腰脊痛，小腹急疼，痾泄而里急后重，脐下有动气者，肾家病也。面白善嚏，忧愁欲哭，喘嗽气逆，咽喉不利，洒淅恶寒，时作寒热，脐右有动气者，肺家病也。面黄、善思、善噫、善嗜，中脘胀满，饮食不消，身体肿重，肢节酸疼肾受病则耳不能听，脾受病则口不能食，心受病则舌不能举。五脏病证，以此观之，不待智者而后知矣。然而，心之恶热者何？热则脉溃浊也。肝之恶风者何？风则筋燥急也。肾何以恶燥？燥则精涸竭也。肺何以恶寒？寒则气留滞也。脾何以恶湿？湿伤肌肉，肉伤则痿肿也。

五脏之病，推原及本，安有不从所受中来哉？是以脏气有余谓之实，脏气不足谓之虚。心实之候：口干，喜笑，身热，汗血，痛满乎胛胁膺背之间。肝实之候：目赤，多怒，头眩，耳聋，痛引乎两胁小腹之下。肾实之候：腹膨，体肿，少气不言，骨痛，痾泄而小便黄。肺实之候：喘促咳嗽，上气鼻张，胫股肩疼而胸中满。脾气一实，必至肢体重着而不举，腹胀，便秘而苦饥。故曰脏气有余谓之实者，此也。心虚则恍惚，多惊，忧烦，少色，咳唾，舌强，腰背酸疼。肝虚则眼昏，胸痛，筋肋拘挛，恐惧面青，如人将捕。肾虚则心悬如饥，胸痛引脊，厥逆，洩变，冷，耳鸣。肺虚则呼吸少气，鼻涕，咽干，肺中声鸣，喘之咳血。（唾中有红缕者，此肺损，为热气所伤也。若胁下痛而唾鲜血者，此热气伤肝也。）其或吐逆泄利，饮食

不消，腹胀肠鸣，四肢无力，则脾虚之证生焉。故曰脏气不足谓之虚者，此也。

大抵实者泻之，虚者补之，无过不及，以平为期。否则实实虚虚，损不足而益有余。如东坡先生所谓至虚有盛势，大实有羸状。差之毫厘，疑似之间，便有死生祸福之畏。吁！何畏哉？至若心病而直视，面黧，肝病而舌卷、囊缩，肾病而腰折、骨枯，肺病而毛焦、气出，脾病而脐突、唇反，此则五脏之气绝也。绝者无复生之理，脱遇岐、扁亦未如之何。虽然，病亦有虚实之证不同耳。邪气盛则实，精气夺则虚。脉盛、皮热、腹胀、前后不通曰五实；脉细、皮寒、气少、前后泄利、饮食不进曰五虚。诸病出者为虚，入者为实；（阴出乘阳，阳入乘阴。）言者为虚，不言者为实；缓者为虚，急者为实；（阴主静则缓，阳主躁则急。）濡者为虚，坚者为实；痒者为虚，痛者为实。外痛内快者，外实内虚；外快内痛者，外虚内实。其有心腹、皮肤内外俱痛，则按之而止者虚也，按之而痛者实也。经所谓：皮虚则热，脉虚则惊，肉虚则重，筋虚则急，骨虚则痛，髓虚则堕，肠虚则溏泄。三阳实三阴虚，汗不出；三阴实三阳虚，汗不止。与夫脉浮而缓，自汗恶风，法当解肌；脉浮而紧，无汗恶寒，法当发汗，此表病之一虚一实。脉伏而牢，腹痛秘结，法当下之；脉沉而弱，厥冷自利，法当温之，此里病之一实一虚。内实之证，心下牢强，腹中痛满，前后不通，干呕而无物出者，死。

内虚之证，厥逆烦躁而吐，利不止者，亡。是又不可不知也。故并及之。

诸阴诸阳论

禀五行之气而为万物之最灵者，人也。人禀五行之气而生，曰阴与阳，谁独无是哉？心为手少阴，肾为足少阴，肺为手太阴，脾为足太阴，肝为足厥阴，心包络为手厥阴，此手三阴。足三阴之经也。小肠曰手太阳，膀胱曰足太阳，大肠曰手阳明，胃曰足阳明，胆曰足少阳，三焦曰手少阳，此手三阳、足三阳之经也。阴六、阳六合而为人身之十二经。是经者，所以周环一身，自上至下，往来流通，而无间断也。其脉则于两手三部应焉。故自其身者言之，腑为阳，脏为阴；外为阳，内为阴；上为阳，下为阴；头戴阳，足履阴；背负阳，腹抱阴；气属阳，而阳为卫；血属阴，而阴为营。阳根于阴，阴根于阳，阴阳互根，营卫不息。

阳动所以为阴之役使，阴静所以为阳之镇守。呼出心与肺，吸入肝与肾。呼者因阳出，吸者随阴入。呼吸之间，脾受谷味。是则一身之阴阳也，自其脉者推之，关前为阳，阳得九分，关后为阴，阴得一寸，所以有主治之分。浮之实大，沉之损小，曰阳盛阴虚；沉之实大，浮之损小，曰阴盛阳虚，所以有表里之别。脉居阳部而阴脉形，脉居阴部而阳脉见，阳虚则阴出而乘之，阴虚则阳入而乘之，及所以见寒暑则变之机，至若阳生于尺，动于寸，阴生于寸，动于尺。牢、长、促、数之为阳；

虚、短、结、代、动、细之为阴。浮、芤、滑、实、弦、紧、洪之为表；微、沉、缓、涩、迟、伏、濡、弱之为里。阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死。是则六脉之阴阳也，自其病者求之，寸口浮疾，阳中之阳，病主身热头痛，烦满内热。寸口沉细，阳中之阴，病主少气汗出，悲伤不乐。尺脉浮滑，阴中之阳，病主小腹痛满，大小便难。尺脉沉细，阴中之阴，病主两股酸疼，阴痒遗沥。阴出于阳，其病怒；阳入于阴，其病静。腑病欲得寒，掀衣气粗，又欲见人者为阳。脏病欲得温，恶闻人声，闭户独处者为阴。腑病属阳，阳主动，故其痛多走注而不止。脏病属阴，阴主静，故其痛有常处而不移。阳病旦静，阴病夜宁。阳虚暮乱，阴虚夜争。阴胜则寒，阳胜则热。阴动则发热，阳动则有汗。贼风客邪阳受之，饮食居室阴受之。阳受风气，伤风者先于上；阴受湿气，伤湿者先于下。其或邪居阳脉之间，则四肢热盛而为狂；邪入阴脉之内，则六经凝涩而为痹。无阳即厥，无阴即呕。阳微不能呼，阴微不能吸。阳病不能俯，阴病不能仰。重阳者狂，重阴者癫。脱阳者见鬼，脱阴者目盲。是则诸病之阴阳也，噫！是固然矣。抑古人所谓阴阳维跷，溢关格者又何如哉？曰：脉有阳维、阴维、阳跷、阴跷、冲、督、任、带，凡此奇经八脉别道而行，如设沟渠以备水潦之溢。病非自生，盖诸经溢出而流入之也。维者，总持诸脉之纲维。（阴阳不相维则怅然失志。）跷者，健足行走之关要。督，言其都，阳脉之会也。任，取其妊生养之原也。冲者，阴脉之通，自足至头通受诸经之气血。带者，回绕于身，总束诸脉，取束带之义焉。故阳维之病苦寒热，阴维之病苦心痛；阳跷之病阳急而狂奔，阴跷之病阴急而足直。冲病则气逆而里急，督病则脊强而折厥，任病则男疝气而女带痕，带病则腹胀满而腰溶溶。其冲任二经是又妇人乳血月候之所以出。奇经之脉其如是乎？关前为阳，脉当九分而浮，若连并而上至鱼际者为溢，溢则外关内格，是为阴乘。关后为阴，脉当一寸而沉，若连并而下入尺泽者为覆，覆则内关外格，是为阳乘。寸脉皆虚为阳亏，尺脉皆虚为阴亏。

寸脉下不至关为阳绝，尺脉上不至关为阴绝。亏犹庶几绝，与关格其危脉也。覆、溢、亏、绝，其如是乎？虽然，人事不可不知也。暴喜伤阳，暴怒伤阴，犹愁不意，气多厥逆，七情所发，病家谨焉。甘辛之剂以之助阳，酸苦之剂以之助阴，有志活人者又当识此。

血营气卫论

人之一身，所以得全其性命者，气与血也。盖气取诸阳，血取诸阴。人生之初，具此阴阳，则亦具此血气，血气者，其人身之根本乎。血何以为营？营行脉中，滋营之义也。气何以为卫？卫行脉外，护卫之意也。然则营与卫岂独无所自来哉？曰：人受谷气于胃，胃为水谷之海，灌溉经络，长养百骸，而五脏六腑皆取其气。故清者为营，浊者为卫。营卫二气周流不息，一日一夜脉行五十度，平旦以来复会于肺口。所谓阴阳相贯，如环之无端，则是二气者，常相随而不相离也。夫惟血营气卫

常相流通，则于人何病之有？一窒碍焉，百病由此而生矣。故气之作恙，发而为寒热，恚、怒、喜、忧、愁；聚而为积痞，疝、瘕、症、癥。上为头旋，中为五膈，下为脐间动气，或喘促，或咳噫。聚则中满，逆则足寒。凡此者，气使之然也。血之为患，其妄行则吐衄，其衰涸则虚劳。蓄之在上，其人忘；蓄之在下，其人狂。逢寒则筋不营而挛急，挟热则毒内淤而发黄。在小便者，为淋痛；在大便者，为肠风。

其于妇人，月事进退，漏下崩中，病犹不一。凡此者，血使之然也。夫血譬则水也，气譬则风也，风行水上有血气之象焉，盖气者，血之帅也，气行则血行，气止则血止，气温则血滑，气寒则血凝，气有一息之不运，则血有一息之不行。病出于血，调其气犹可以导达病源。

于气，区区调血何加焉？故人之一身调气为上，调血次之，是亦先阳后阴之意也。若夫血有败淤滞泥乎诸经，则气之道路未免有所壅遏，又当审所先而决去之。经所谓先去其血，而后调之，又不可不通其变矣。然而调气之剂，以之调血而两得，调血之剂，以之调气而乖张。

如木香，如官桂，如细辛，如浓朴，以至乌药、香附、莪术、三棱之类，治气可也，治血亦可也。若以当归、地黄辈论之，施之血证无以逾此。然其性缠滞，每于胃气有亏焉。胃气既亏，则五脏六腑之气亦馁矣。善用药者，其间剂量而佐助之。（大凡治病，当识本末。假如呕吐痰涎，胃虚不食，以致发热，若与凉剂退热，则胃气愈虚，热愈不退。惟先以助胃止吐为本，其热自退。纵热不退，但得胃气已正，亦可旋与解热之剂。又有伤寒发大热，屡经寒凉疏转，其热仍前，但用和调胃气，自然无事。）虽然，心为血之主，肝为血之脏，肺为气之主，肾为气之脏，诚哉是言也！学人苟知血之出于心，而不知血之纳于肝；知气之出于肺，而不知气之纳于肾。用药模棱，往往南辕而北辙矣。假如血痢作恙，以五苓、门冬等剂行其心，以巴豆、大黄等剂逐其积，而其痛独存者，血之所藏无以养也，必佐以川芎或芎归汤辈，则其痛止。假如喘嗽气鸣，以姜、橘、枳、梗、苏、桂调其气，以南星、半夏、细辛豁其痰，而终不下降者，气之所藏无以收也，必佐以补骨脂或安肾丸辈，则其气归元。病有标本，治有后先，纲举而目斯张矣。噫！此传心吃紧之法也。耳目所接，敢不本卫生之家共之。

（经云：肾间动气，五脏六腑之本，十二经脉之根，呼吸之门，生气之源也。）

脉病逆顺论

岐伯曰：凡人形盛脉细，少气不足以息者，危；形瘦脉大，而胸中多气者，死。形

气相得者，生；参伍不调者，病。诚哉是言，脉病逆顺之不可不早辨也。盖人有强弱盛衰之不等，而脉实应焉；脉有阴阳虚实之不同，而病实应焉。脉病形证相应而不相反，每万举而万全，少有乖张，良工不能施其巧矣。故脉之于病，有利浮大而不沉小者，有利沉小而不浮大者，有大小无拘，而以浮沉、滑涩、坚软为顺逆者，又有五行反克，而贼邪乘虚为深患者，请条析而缕陈之。壮热，脉浮大而疾者生，沉小者死。癰疽，脉坚大而数者生，沉细者死。

谵语，脉洪大者生，厥逆而脉微者死。暴忤，脉实大者生，虚濡而小伏者死。诸药中毒，可洪大紧急，不可微小而不齐。疝瘕、积聚，可坚急实强，不可沉小而虚弱。腹胀者，浮大则顺，虚小则逆。头痛者，浮大则安，短涩则危。消渴之诊，贵乎数大紧实，不贵乎微细浮短。

（小急不可治。）水气之诊，贵乎浮而洪大，不贵乎虚细、沉微。击坠淤血，顺则脉坚强，反则脉小弱。中恶、吐血，反则脉沉细，顺则脉浮洪。前所谓利浮大而不沉小者，此也。

伤寒已得汗，沉小之脉安，浮大之脉危。自汗漏不止，虚细之脉安，躁盛之脉危。中恶腹胀，紧细则可，洪急则否。心腹痛，沉细则可，坚洪则否。厥逆之脉，顺则沉而涩，逆则大而浮。痿缓之脉，顺则散而虚，逆则坚而疾。唾衄衄血，顺者小弱、沉滑，逆者坚躁、浮洪。

金疮血多，顺者微细而虚，逆者躁实而大。久嗽、尿血、羸瘦者，其正则脉微，其反则洪急。

大肠泄筋挛者，其正则脉细，其反则坚洪。泄泻注谷、下痢，其正者，缓细、小结，其反者，弦数、浮洪。金疮与诸下血，其正者，细滑而沉，其反者，紧急疾大。（发热亦反。）

蚀肛阴，可虚小而不可紧急。产后出血，可沉小而不可疾浮。前所谓利沉小，而不浮大者，此也。伤寒脉躁盛，而不得汗者，阳之极。其治也，难。伤寒已得汗，而脉躁盛者，阴之极。

其候即死。中风口噤，四肢不收，脉浮迟而恬静者存，脉洪数而气粗者亡。上气喘急，面目浮肿，脉浮滑而手足温者存，脉涩涩而四肢厥者亡。（加痢即死。）心下牢强，胜则脉紧，负则沉濡。水病腹胀，胜则脉实，负则虚散。病黄疸者，胜则缓大，负则弦急而坚。猝中恶者，胜则洪缓，负则坚急而驰。腹胀便血，活者脉滑，殂者脉绝。肠痈肿结，活者脉浮，殂者脉沉。脓血诸疾，活以滑细，殂以坚强。肠下脓，活以其沉，殂以其浮。有迟滑而无紧数，则崩中漏下不必虑；有滑实而无浮虚，则月经闭塞何足忧。诸肠，身不热而脉和滑者易愈，身热而脉弦涩者难痊。诸

咳嗽，声不焦而脉浮软者易安，弦绝沉坚或伏而大者难保。逆而坚涩，顺而濡滑，其于上气为可推。反则急坚，正则虚缓，其于厥逆为可验。耳聋之脉，沉而滑者可愈，浮而涩者难疗。蛊毒之脉，数而软者可苏，数而坚者难苏。（凡蛊毒脉，类如钗股，其人吐甚，心下切痛如啮，而面目黄，或吐血不止者皆死。）前所谓大小无拘，而以浮沉、滑涩、坚软为顺逆者，此也。心病，面赤，喜笑，心烦，掌热，口干，开目妄语，脐上动气，脉当洪紧而数，反得沉濡而微者，水之克火，一不治；肝病，面青、筋急，多怒，目痛，目闭不欲见人，脐左动气，脉当弦急而长，反得浮涩而短者，金之克木，二不治；肾病，面黑恐，欠，足寒，逆气，腹痛，飧泄后重，脐下动气，脉当沉而滑，反得缓而大者，土之克水，三不治；肺病，面白，悲愁，嚏，哭，吐衄交血，喘咳，寒热，脐右动气，脉当沉细而涩，反得浮大而牢者，火之克金，四不治；五者，脾病，面黄，善思，善嗜，体重，节疼，四肢不收，怠惰喜卧，腹满泄利，饮食不消，当脐动气，脉来缓大者，脾家正形也。设或反是弦长而紧，是非木邪之克土乎？前所谓五行反克，而贼邪乘虚为深患者，此也。虽然，健人之脉病，病患之脉健，阳病得阴脉，阴病得阳脉，凡此皆反也。而刘元宾以为形病脉和人不死，张长沙以为阴病见阳脉者生，其言岂浓诬哉？经云：脉病患不病曰行尸，人病脉不病曰内虚。此二者虽皆非顺，然形病而脉和犹可用力，形和而脉病其死不疑。况脉和之与脉健本自不同，刚驰暴躁之谓健，调平而有胃气之谓和。毫厘疑似之间，学人当于此而致其辨矣。经云：忽阳病得阴脉，阴病得阳脉者，死。此二者虽皆非正，然张长沙之论，特为伤寒设，谓如伤寒心腹烦满而脉浮大之类是尔。腹满，病在太阴，浮大之脉属阳，亦脾家之本体，故能生焉。学人当于此而通其故矣。逆顺之说，故备论之，以俟大贤之折衷云。（老者脉，阳羸阴强顺，阴弱阳强逆。大人得小儿脉，不治。左病右痛，上病下痛，不治。下痢，手足温易治，手足寒难治，手足厥冷脉，不至者死。吐血，发嗽上气，脉数有热，不得卧者死。凡病患眼无魂，朦胧，白云如外障，并不治。病患脉和软者，生；刮涩如枝梗草根者，死。）

男女气血则一论

血气即阴阳也，不论男女长幼均具之。人之有病皆知调气，而血之一字念不到焉。至于调气不愈，加以消痰、逐水，无所不至，其病自如是，皆血之为患，伏于冥冥之中而不可测识矣。假如妇人得病于经水来去之时，固有可验而知者，其若经脉久遏而不行，与夫协热而伤血，变生他证，如之何而见之？况世俗循习，其能以男子之诊为血证乎？夫肝藏血而心主之，动则血运于诸经，静则血归于肝脏。肝受血则能视，足受血则能步，掌受血则能握，指受血则能摄。故血凝于肤者为痹，凝于脉者为泣，凝于足者为厥。凡神志昏昏，惊狂冒闷，烦渴呕吐，语短内疼，鼻衄唾红，眼红面赤，骨热肤哄，肠垢尿多，胸满顽痰，谵语多汗，甚至四肢厥冷，懵不知人，不问男子妇人，皆血证耳。据脉验之，挟血者，脉来乍涩乍数，闪烁明灭，或

沉细而隐伏也。若夫血与热交攻，则左手寸关按之洪盛。盖心主血，肝藏血，固如是尔。经曰：血上逆则忘，血下蓄则狂。上焦淤血，小便必难；下焦淤血，小便必自利。

血之所在，当以此推。《活人总括》所载小柴胡汤、犀角地黄汤、桃仁承气汤，皆其要药。

血结者，汤剂中入醋为佐，特于此而申言之。然犹有所谓血瘀、气瘀、酒瘀者，又不可不知也。盖平时酷酒，血入于酒，则为酒瘀；平时任气，血凝于气，则为气瘀；虚劳痼冷，败血化生，则为血瘀。摇头掉尾，如虫之行，上侵人之喉，下蚀人之肛，或附于背胁，或隐于胸腹，其大则如瘀，其小则如钱，良可怪也。治法用茺萸炒煎为妙，或生硫黄为末，老酒调下。

二者可以杀其毒。嗣此则以理中汤、沉香降气汤各半，温胃益血，常常服饵，以消胜之。如其不以温和为主，日从事于雷丸、锡灰之剂焉，君子未保其往。（《活人书》云：伤寒太阳证，衄血者病欲愈。热结膀胱，而血自下者，亦欲愈。以此观之，他病伏热之人，上焦淤血而作吐者，亦其病之有瘀也。虽然血既吐，而自止则可矣。）

问病论

东坡先生尝曰：吾平生求医，盖于平时默验其工拙，至于有疾，必先尽告以所患而后诊视，使医者了然，知厥疾之所在，虚实冷热先定于中，则脉之疑似不能惑也。故虽中医，疗疾常愈。吾求疾愈而已，岂以困医为事哉？诚哉斯言，真警迷济世之砭剂也。何者？脉之与证相依而行，脉者所以剖其证之未明，证者所以索其脉之犹隐。据脉以验证，所谓得乎应心者是尔，问证以参脉，所谓医者意也是尔。乌可举一而废一哉？私窃怪夫！近世以来，多秘所患以求诊，以此验医者之能否。医亦不屑下问，孟浪一诊，以自挟其所长。甚者病家从前误药或饮食居处有所讳海，虽问之而不以尽告，遂至索病于冥漠之间，辨虚实冷热于疑似之顷，毫厘千里宁不委命一掷与人试伎乎？此余于终篇所以特举前辈格言，以解世俗之惑，不然《难经》有谓：问其所欲五味，以知其病之所起所在者，又果何意邪？（大人、小儿诸病瘥后，饮食且须渐进，常若不足，毋使食气伤胃，其病复来。大热方退，尤不可饱。小儿伤乳，热复则同。）

论《易简方论》

《易简方论》前后，活人不知其几，近世之士，类以《春秋》之法绳之，曰《易简绳愆》，曰《增广易简》，曰《续易简论》，借古人之盛名以自伸其臆说。吁！王氏何负于人哉？余谓《易简方论》，后学指南，四时治要，议论似之自有人心权度存焉耳。况王氏晚年剂量更定者不一，日月薄蚀，何损于明，若夫索瘢洗垢，矫而过焉，或者公论之所不予也。

附：原脉论（出《保命集》）

大道之浑沦，莫知其原。然至道无言无以明其理，大象无形，非立象无以测其奥，道象之妙，非言不明。尝试原之脉者何也？非气非血，动而不息，营行脉中，卫行脉外，经曰：脉者，血之府也。自《素问》而下迄于今，经所不载，无传记而莫闻其名焉。然而玄机奥妙，圣意幽微，虽英俊明哲之士，非轻易可得而悟也。夫脉者，果何物乎？脉者有三名，一曰命之本，二曰气之神，三曰形之道。经谓天和者是也。至于折一肢瞽二目亦不为害，生而脉不可须臾失，失则绝命害生矣。经曰：春弦、（一曰长。）夏洪、（一曰钩。）秋毛、（一曰涩。）

冬石，（一曰沉。）此言正脉，同天真造化之元气也，巡于春夏秋冬，木火水金之位，生长收藏，参和相应，故禀二仪而生不离于气，故于脉有生死之验。经曰：脉者，血之府也。如世之京都，州县有公府解署也。国因置者，所以禁小人为非道也。公府不立，则善者无以伸其枉，恶者无以罚其罪，邪正混同，贤愚杂处，而乱之根也。经曰：五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。既阴阳为神明之府，脉为血之府而明可见焉。血之无脉，不得循其经络部分周流于身，滂沛奔迫，或散或聚。气之无脉不能行其筋骨、脏腑、上下，或暴或蹶。故经曰：出入废则神机化灭，升降息则气立孤危。故气化则物生，气变则物易，气盛则物壮，气弱则物衰，气绝则物死，气正则物和，气乱则物病，皆随气之盛衰而为变化也。脉字者，从肉从永，从爪从血，四肢百骸得此真元之气，血肉、筋骨、爪发荣茂可以倚凭而能生长也，长久永固道，故从肉从永者是也。从爪从血者，巡之如水，分流而布遍周身，无有不通也。《释名》曰：脉，脉幕也。如幔幕之遮覆，幕络一体之形，导太一真元之气也。元气者，在气非寒非热，非暖非凉，在脉者，非弦非洪，非涩非沉，不为气而浮沉，不为血而流停，乃冲和自然之气也。故春温、夏热、秋凉、冬寒，所以然者，为元气动而不息，巡于四方木火水金之位，温凉寒暑之化，生生相续，新新不停，日月更出，四序迭迁，脉不为息。故人有身形之后，五脏既生，身中元气即生焉。故春弦、夏洪、秋毛、冬石，此四时之气也，而脉者，乃在其中矣。《道经》曰：视之不见，听之不闻，搏之不得，迎之不见，其首随之，不见其后。此如脉之谓也。又云：埏埴以为器，当其无有器之用。故有之以为利，无之以为用。又曰：吾不知名字之曰道，强为之名曰大。斯立脉之名之本意也。

故道者，万物之奥。脉者，百骸之灵。奥灵之妙，其道乃同元气者，无器不有，无所不至，血因此而行，气因此而生。故营行脉中，卫行脉外。瞻之在前，忽然在后而不匮者，皆由于脉也。分而言之，曰气，曰血，曰脉；总而言之，惟脉营运血气而已。故经曰：血气者，人之神。不可不谨养也。《阴阳别论》曰：所谓阳者，胃脘之阳也。此阳者，言脉也。胃者，土也。脉乃天真造化之气也。若土无气，则何以生长收藏？若气无土，何以养化万物？是无生灭也。以平人之气，常禀于胃。正理论曰：谷入于胃，脉道乃行，阴阳交会，胃和脉行，人禀天地之候。故春胃微弦曰平，得弦而无胃曰死。夏胃微钩曰平，但钩而无胃曰死。长夏微软曰平，但弱而无胃曰死。秋胃微毛曰平，但毛而无胃曰死。冬胃微石曰平，但石而无胃曰死。

阴者，真脏也，见则败，败则必死。五脏为阴，肝脉至，中而无外，急如循刀刃，责责然如按琴弦。心脉至，坚而搏，如循薏苡仁累累然。肺脉至，大而虚，如毛羽中人皮肤。肾脉至，搏而绝，如以指弹石辟辟然。脾脉弱而乍数乍疏。夫如此脉者，皆为脏脉独见而无胃脉，五脏皆至悬绝而死。故经曰：别于阳者，知病忌时，别于阴者，知生死之期。故人性候躁急、促、迟缓、软弱、长短、大小、皮坚肉浓各随其状而脉应之。常以一息四至为准者，言呼出心与肺，吸入肾与肝，五者胃兼主四旁，在呼吸之间也。数则为热，迟则为寒。如天之春秋，二分阴阳，两停昼夜，各得五十度。自此添一遭则热，减一遭则寒。脉之妙道从此可知矣。或如散叶，或如燃薪，或如丸泥，或如丝缕，或如涌泉，或如吐衄、或如偃刀，或如转索，或如游鱼，假使千变万化，若失常者，乃真元之气离绝矣。经曰：积阳为天，积阴为地。阳化气，阴成形。此言一气判而清浊分也。元气者，天地根。华佗云：脉者，谓血气之先也。孔子曰：天不言而四时行焉，百物生焉。而脉亦如之。又经曰：自古通天者，生之本，皆通乎天气也。通天者，谓通元气天真也。然形体者，假天地之气而生，故奉生之气通计于天，禀受阴阳而为根本。天地合气，命之曰人。天气不绝，真灵内属，动静变化悉与天通。《易》云：乾坤成列，而易立乎其中矣。故天地之体得易而后生，天地之化得易而后成。故阳用事则春生夏长，阴用事则秋收冬藏。寒往则暑来，暑往则寒来，始而终之，终而复始，天地之化也。而易也，默然于其间，而使其四序各因时而成功。至于寒不凌暑，暑不夺寒，无愆阳伏阴之变，而不至于大肃大温，故万物各得其冲和之气，然后不为过而皆中节也。《道经》曰：万物负阴而抱阳，冲气以为和，百姓日用而不知。斯脉之道也，故脉不得独浮沉，独大小，独盛衰，独阴阳，须可沉中有浮，浮中有沉，大中有小，小中有大，盛中有衰，衰中有盛，阴中有阳，阳中有阴，充塞一身之中，盈溢百骸之内，无经络不有，无气血不至，养筋骨毛发，坚壮臑泽，非心，非肾，非肝，非脾，五脏之盛，真气固密，不为邪伤。若忧愁思虑、饥饱劳逸、风雨寒暑、大惊猝恐，真气耗乱，气血分离，为病之本。噫！夫万物之中，五常皆备，审脉之道而何独无五常邪？夫仁固卫一身，充盈五脏，四肢百骸，亦皆得营养，无冲和之气，独真脏脉见，则死矣。生则不见，死则独见，好生恶死，此仁之谓也。分布躯体，和调气血，贵之在头目耳鼻，贱之在跣臀阴篡。

不得上而有不得下，而无所不施，无所不至，此义之谓也，长人脉长，短人脉短，肥人脉沉，瘦人脉浮，大人脉壮，小人脉弱。若长人脉短，短人脉长，肥人浮，瘦人沉，大人弱，小人壮，夫如此者，皆不中理而为病，此礼之谓也。见在寸，则上病；见在关，则中病；见在尺，则下病。五脏有疾，各有部分，而脉出见，不为潜藏伏匿，一一得察有余不足，而愈其病，此智之谓也。春弦、夏洪、秋毛、冬石。太阳之至，其脉沉；太阴之至，其脉大而长；少阴之至，其脉浮；阳明之至，其脉涩而短；少阳之至，其脉钩；厥阴之至，其脉弦。四序不失其期，六气为常准者，此信之谓也。非探颐索隐，钩深致远，学贯天人，旁通物理者，未能达于此矣。

附论五篇（出《丹溪心法》）

不治已病治未病与其救疗于有疾之后，不若摄养于无疾之先，盖疾成而后药者，徒劳而已。是故已疾而不治，所以为医家之法，未病而先治，所以明摄生之理。夫如是则思患而预防之者，何患之有哉？此圣人不治已病治未病之意也。尝谓备土以防水也，苟不以闭塞其涓涓之流，则滔天之势不能遏；备水以防火也，若不以扑灭其荧荧之光，则燎燎之焰不能止。

其水火既盛尚不能止遏，况病已成，岂能治欤？故宜夜卧早起于发陈之春，早起夜卧于蕃秀之夏，以之缓形无怒而遂其志，以之食凉食寒而养其阳，圣人春夏治未病者如此。与鸡俱兴于容平之秋，必待日光于闭藏之冬，以之敛神匿志而私其意，以之食温食热而养其阴，圣人秋冬治未病者如此。或曰：见肝之病，先实其脾脏之虚，则木邪不能传，见右颊之赤，先泻其肺金之热，则金邪不能盛，此乃治未病之法。今以顺四时调养神志而为治未病者，是何意耶？盖保身长全者，所以为圣人之道，治病十全者，所以为上工术，不治已病治未病之说，着于“四气调神大论”，厥有旨哉！昔黄帝与天师难疑答问之书，未尝不以摄养为先，始论乎天真，次论乎调神，既以法于阴阳，而继之以调于四气，既曰饮食有节，而又继之以起居有常，谆谆然以养生为急务者，意欲治未然之病，无使至于已病难图也。厥后秦缓达乎此，见晋侯病在膏肓，语之曰：不可为也。扁鹊明乎此，见齐侯病至骨髓，断之曰：不可救也。噫！惜齐晋之候，不知亢则害承乃制气之来也，既以极而成灾，则气之乘也，必以复而得平。物极则反，理之自然也。大抵寒、暑、燥、湿、风、火之气，木、火、土、金、水之形，亢极则所以害其物，承乘则所以制其极。然则，极而成灾，复而得平，气运之妙，灼然而明矣。此亢则害承乃制之意。原夫天地阴阳之机，寒极生热，热极生寒，至神不测，有以斡旋宰制于其间也。故木极而似金，火极而似水，土极而似木，金极而似火，水极而似土。盖气之亢极，所以承之者，反胜于已也。夫惟承其亢而制其害者，造化之功可得而成也。今夫相火之下，水气承而火无其变；水位之下，土气承而水无其灾；土位之下，木承而土顺；风位之下，金乘而风平。火热成其燥金，自然金家之疾；yin精承其君火，自然火家之候。所谓亢

而有害，承而乃制者，如斯而已。且尝考之《六元正纪大论》云：少阳所至为火生，终为蒸溽。（火化以生，则火生也。阳在上，故终为蒸溽。）是水化以承相火之意。太阳所至为寒雪、冰雹、白埃，是土化以承寒水之意也。（霜雪冰雹，水也。白埃下承土也。）以至太阴所至为雷霆骤注烈风，（雷霆骤注，土也。烈风下承之木气也。）厥阴所至为风生，终为肃，（风化以生，则风生也。肃，静也。）阳明所至为散落温，（散落，金也。温下承之火气也。）少阴所至为热生，中为寒。（热化以生，则热生也。yin精承上，故中为寒也。）岂非亢为害则承乃制者欤？昔者黄帝与岐伯上穷天纪，下极地理，远取诸物，近取诸身，更相问难，以作《内经》，至于《六微旨大论》有及于六气相承之言，以为制则生化，外列盛衰，害则败乱，生化大病。诸以所胜之气承于下者，皆折其标盛也，不然曷以水发而电雪，土发而骤飘，木发而毁折，金发而清明，火发而熏昧。此皆郁极乃发，以承所亢之意也。呜呼！通天地人，曰僵医家者流，岂止治疾而已，当审察病机无失气宜邪气各有所属也，当穷其要于前；治法各有所归也，当防其差于后。盖治病之要，从穷其所属为先。苟不知法之所归，未免于无差尔。是故疾病之生，不胜其众，要其所属，不出乎五运六气而已。诚能于此审察而得其机要，然后为之治，又必使之各应于运气之宜，而不至有一毫差误之失。若然，则治病求属之道庶乎其无愧矣。《至真要大论》曰：审察病机，无失气宜。意蕴诸此。尝谓医道有一言而可以尽其要者，运气是也。天为阳，地为阴。阴阳二气各分三品，谓之三阴三阳。然天非纯阳，而亦有三阴；地非纯阴，而亦有三阳。故天地上下，各有风热火湿燥寒之六气，其斡旋运动乎两间者，而又有木火土金水之五运，人生其中，脏腑气穴亦与天地相为流通，是知众疾之作，而所属之机无出乎是也。然而医之为治，当如何哉？惟当察乎此，使无失其宜而后可。若夫诸风掉眩，皆属肝木；诸痛痒疮，皆属心火；诸湿肿满，皆属脾土；诸气恚郁，皆属肺金；诸寒收引，皆属肾水；此病机属于五运者也。诸暴强直，皆属于风；诸呕吐酸，皆属于热；诸躁扰狂越，皆属于火；诸痉强直，皆属于湿；诸涩枯涸，皆属于燥；诸病水液，澄彻清冷，皆属于寒；此病机属于六气者也。夫惟病机之察，虽曰既审，而治病之施亦不可不详。故必别阴阳于疑似之间，辨标本于隐微之际。

有无之殊者，求其有无之所以殊；虚实之异者，责其虚实之所以异。为汗吐下，投其所当投，寒热温凉，用其所当用。或逆之以制其微，或从之以导其甚。上焉以远司气之犯，中焉以辨岁运之化，下焉以审南北之宜，使大小适中，先后合度，以是为治，又岂有差殊乖乱之失耶？又六元正纪大论》曰：无失天信，无逆气宜。《五常政大论》曰：必先岁气，无伐天和。此皆无失气宜之意也。故《素问》、《灵枢》之经，未尝不以气运为言。既曰：先立其年，以明其气。复有以戒之曰：治病者必明天道地理，阴阳更胜。既曰：不知年之所加，气之盛衰，虚实之所起，不可以为工矣。谆谆然若有不能自己者，是岂圣人私忧过计哉？以医道之要，悉在乎此也。观乎《原病式》一书，比类物象，深明乎气运造化之妙，其于病机气宜之理不可以有加矣。

能合色脉可以万全欲知其内者，当以观乎外，诊于外者，斯以知其内。盖有诸内者形诸外，苟不以相参而断其病邪之逆顺，不可得也。为工者，深烛厥理。故望其五色以青黄赤白黑，以合于五脏之脉，穷其应与不应。切其五脉急大缓涩沉，以合其五脏之色顺与不顺。诚能察其精微之色，诊其微妙之脉，内外相参而治之，则万举万全之功可坐而致矣。《素问》曰：能合色脉，可以万全，其意如此。原夫道之一气，判而为阴阳，散而为五行，而人之所禀皆备焉。夫五脉者，天之真，行血气，通阴阳，以营于身。五色者，气之华，应五行，合四时，以彰于面。惟其察色按脉而不偏废，然后察病之机，断之以寒热，归之以脏腑，随证而疗之，而获全济之效者，本于能合色脉而已。假令肝色如翠羽之青，其脉微弦而急，所以为生，若浮涩而短，色见如草滋者，岂能生乎？心色如鸡冠之赤，其脉当浮大而散，所以为顺，若沉濡而滑，色见如血者，岂能顺乎？脾色如蟹腹之黄，其脉当中缓而大，所以为从；若微弦而急，色见如枳实者，岂能从乎？肺色如豕膏之白，其脉当浮涩而短，所以为吉；若浮大而散，色见如枯骨者，岂能吉乎？从至肾色见如乌羽之黑，其脉沉濡而滑，所以为生，或脉来缓而大，色见如赭者死。死生之理，夫惟诊视相参。既以如此，则药证相对，厥疾弗瘳者，未之有也。抑尝论之：容色所见，左右上下各有其部，脉息所动，寸关尺中皆有其位。

左颊者，肝之部，以合左手关位；肝胆之分，应于风木，为初之气。颜为心之部，以合于左手寸口，心与小肠之分，应于君火，为二之气。鼻为脾之部，合于右手关脉，脾胃之分，应于湿土，为四之气。右颊肺之部，合于右手寸口，肺与大肠之分，应于燥金，为五之气。

颐为肾之部，以合于左手尺中，肾与膀胱之分，应于寒水，为终之气。至于相火，为三之气，应于右手命门、三焦之分也。若夫阴阳五行相生相胜之理，当以合之于色脉而推之也。是故《脉要精微论》曰：色合五行，脉合阴阳。《十三难》曰：色之与脉，当参相应。

然而治病万全之功，苟非合于色脉者，莫之能也。《五脏生成》篇云：心之合脉也，其营色也。夫脉之大小、滑涩、沉浮，可以指别；五色微诊，可以目察。继之以能合色脉，可以万全。谓夫赤脉之至也，喘而坚；白脉之至也，喘而浮；青脉之至也，长而左右弹；黄脉之至也，大而虚；黑脉之至也，上坚而大。此先言五色，次言五脉。欲后之学人，望而切之，以相合也。厥后，扁鹊明乎此，述之曰：望而知之谓之神，切脉而知之谓之巧。深得《内经》之理也。下迨后世，有立方者，目之曰神巧万全，厥有旨哉！治病必求于本将以施其疗疾之法，当以穷其受病之源。盖疾源之源，不离于阴阳二邪也，穷此而疗之，厥疾勿瘳者鲜矣。良工知其然，谓夫风热火之病，所以属乎阳邪之所客，病既本于阳，苟不求其本而治之，则阳邪滋蔓而难制。湿燥寒之病，所以属乎阴邪之所客，病既本于阴，苟不求其本而治之，则阴邪滋蔓而难图。诚能穷原疗疾，各得其法，万举万全之功可坐而致也。

治病必求于本见于《素问·阴阳应象大论》者如此。夫邪气之基，久而传化，其变证不胜其众也。譬如水之有本，故能荐至汪洋浩瀚，派而趋下以渐大。草之有本，故能荐生茎叶，实秀而在上以渐蕃。若病之有本，变化无穷，苟非必求其本而治之，欲去深感之患，不可得也。

今夫厥阴为标，风木为本，其风邪伤于人也，掉摇而眩转，动而蜛，猝暴强直之病生矣。

少阴为标，君火为本，其热邪伤于人也，疮疡而痛痒，暴注而下迫，水液浑混之病生矣。少阳为标，相火为本，其火邪伤于人也，为热而瞽蜛，躁扰而狂越，如丧神守之病生矣。善为治者，风淫所胜，平以辛凉。热淫所胜，平以咸寒。火淫所胜，平以咸冷。以其病本于阳，必求其阳而疗之，病之不愈者未之有也。太阴为标，湿土为本，其湿邪伤于人也，腹满而身肿，按之而没指，诸强直之病生矣。阳明为标，燥金为本，其燥邪伤于人也，气滞而恚郁，皮肤以皱揭，诸涩枯涸之病生矣。太阳为标，寒水为本，其寒邪伤于人也，吐利而腥秽，水液以清冷，诸寒收引之病生矣。善为治者，湿淫所胜，平以苦热。燥淫所胜，平以苦温。寒淫所胜，平以辛热。以其病本于阴，必求其阴而治之，病之不愈者未之有也。岂非将以施其疗疾之法当以穷其受病之源者哉？抑尝论之邪气为病，各有其候，治之之法，各有其要，亦岂止于一端而已。其在表者，汗而发之；其入里者，下而夺之；其在高者，因而越之，谓可吐也；剽悍者，按而收之，谓按摩也。脏寒虚夺者，治以灸；脉病挛痹者，治以针刺；血实蓄结肿热者，治之砭石；气滞痿厥寒热者，治以导引；经络不通，病生于不仁者，治以醪醴；血气凝泣，病生于筋脉者，治以熨药。始焉求其受病之本，终焉蠲其为病之邪者，无出于此也。噫！昔黄帝处于法宫之中，坐于明堂之上，受业于歧伯，传道于雷公，曰：阴阳者，天地之道也，纲纪万物变化生杀之妙。盖有不测之神，斡旋宰制于其间也。人或受邪生病，不离于阴阳也。病既本于此，为工者岂可他求哉？必求于阴阳可也。《至真要大论》曰：有者求之，无者求之。此求其病机之说，与夫求于本其理一也。

大抵四时以胃气为本，然治病必须先诊六脉，皆有胃气，外证虽重，病亦可治。胃气未绝，则药力营运而输散于皮毛经络，故易治而生。胃气既绝，则药虽对证，不能使其运用以输精于皮毛经络。真脏独见而药不及矣，遂成不治之证也。东垣曰：脉贵有神。有神者，有胃气之谓也。故诸经方论皆曰有病早治疗，不令邪气深入。所以圣人治未病，不治已病，正谓此也。

附：十二经脉歌

手太阴肺中焦生，下络大肠出贲门，上膈属肺从肺系，系横出腋中行，肘臂寸口上

鱼际，大指内侧爪甲根，支络还从腕后出，接次指属阳明经。此经多气而少血，是动则病喘与咳，肺胀膨膨缺盆痛，两手交臂为臂厥。所生病者为气咳，喘渴烦心胸满结，臂之外前廉痛，小便频数掌中热，气虚肩背痛而寒，气盛亦疼风汗出，欠伸少气不足息，遗失无度溺变别。阳明之脉手大肠，次指内侧起商阳，循指上连出合谷，两筋岐骨循臂肪，入肘外廉循外，肩端前廉柱骨傍，从肩下入缺盆内，络肺下膈属大肠。支从缺盆上入颈，斜贯颊前下齿当，环出人中交左右，上挟鼻孔注迎香。此经血盛气亦盛，是动颈肿并齿痛，所生病者为鼻衄，目黄口干喉痹生，大指次指难为用，肩外侧痛相仍。

胃足阳明交鼻起，下循鼻外下入齿，还出挟口绕承浆，颐后大迎颊车里，耳前发际至额颅，支下人迎缺盆底，下膈入胃络脾宫，直者缺盆下乳内。一支幽门循腹中，下行直合气冲逢，遂由髀关抵膝腘，跗中指内间同。一支下膝注三里，前出中指外关通，一支别走足跗指，大指之端经尽矣。此经多气复多血，是动欠伸面颜黑，凄凄恶寒畏见人，忽闻木声心振慑，登高而歌弃衣走，甚则腹胀乃贲响。凡此诸疾皆厥，所生病者为狂疟，湿温汗出鼻流血，口唇裂又喉痹，膝腘疼痛腹胀结，气膺伏兔外廉，足跗中指俱痛彻，有余消谷溺色黄，不足身前寒振，胃房胀满食不消，气盛身前皆有热。

太阴脾起足大趾，上循内侧白肉际，核骨之后内踝前，上循胫膝里，股内前廉入肠中，属脾络胃与膈通，挟喉连舌散舌下。支络从胃注心宫，此经气盛而血衰，是动其病气所为，食入即吐胃脘痛，更兼身体痛难移，腹胀善噫舌本强，得后与气快然衰，所生病者舌亦痛，体重不食亦如之，烦心心下仍急痛，泄水溏瘕寒疟随，不卧强立股膝肿，疽发身黄大指痿。手少阴脉起心中，下膈直与小肠通，支者还从肺系走，直上咽喉系目瞳，直者上肺出腋下，后肘内少海从，臂内后廉抵掌中，兑骨之端注少冲，多气少血属此经，是动心脾痛难任，渴欲饮水咽干燥，所生胁痛目如金，胁臂之内后廉痛，掌中有热向经寻。

手太阳经小肠脉，小指之端起少泽，循手外廉出踝中，循臂骨出肘内侧，上循外出后廉，直过肩解绕肩甲，交肩下入缺盆内，向腋络心循咽噤，下膈抵胃属小肠，一支缺盆贯颈颊，至目锐却入耳，复从耳前仍上颊，抵鼻升至目内，斜络于颧别络接。此经少气还多血，是动则病痛咽噤，颌下肿兮不可顾，肩如拔兮似折，所生病兮主肩，耳聋目黄肿腮颊，肘臂之外后廉痛，部分犹当细分别。

足经太阳膀胱脉，目内上颧额尖。支者巅上至耳角；直者从巅脑后悬，络脑还出别下项，仍循肩膊挟脊边，抵腰臀肾膀胱内；一支下与后阴连，贯臀斜入委中穴；一支膊内左右别，贯胛挟脊过髀枢，髀外后廉中合，下贯内外踝后，京骨之下趾外侧。是经血多气少也，是动头痛不可当，项如拔兮腰似折，髀强痛彻脊中央，如结兮如裂，是为踝厥筋乃伤，所生疟痔小趾废，头囱顶痛目色黄，腰尻

脚疼连背，泪流鼻衄乃癫狂。

足经肾脉属少阴，小指斜透涌泉心，然骨之下内踝后，别入跟中内浸，出内廉上股内，贯脊属肾膀胱临，直者属肾贯肝膈，入肺循喉舌本寻，支者从肺络心内，仍至胸中部分深。此经多气而少血，是动病饥不欲食，喘嗽唾血喉中鸣，坐而欲起面如垢，目视气不足，心悬如饥常惕惕，所生病者为舌干，口热咽痛气赅逼，股内后廉并脊疼，心肠烦痛疽而痿厥嗜卧体怠堕，足下热痛皆肾厥。

手厥阴心主起胸，属包下膈三焦宫，支者循胸出胁下，胁下连腋三寸同，仍上抵腋循内，太阴少阴两经中，指透中冲支者别，小指次指络相通，是经少气原多血，是动则病手心热，肘臂挛急腋肿，甚则胸胁支满结，心中澹澹或大动，善笑目黄面赤色，所生病者为心烦，心痛掌热病之则。

手经少阳三焦脉，起自小指次指端，两指岐骨手腕表，上出臂外两骨间，肘后外循肩上，少阳之后交别传，下入缺盆膻中分，散络心膈高里穿；支者膻中缺盆上，上项耳后耳角旋，屈下至颐仍生颊；一支出耳入耳前，却从上关交曲颊，至目内乃尽焉。斯经少血还多气，是动耳鸣喉肿痹，所生病者汗自出，耳后痛兼目锐，肩肘臂外皆疼，小指次指亦如废。足脉少阳胆之经，始从两目锐生，抵头循角下耳后，脑空风池次第行，手少阳前至肩上，交少阳右上缺盆；支者耳后贯耳内，出走耳前锐循；一支锐大迎下，合手少阳抵项根，下加颊车缺盆合，入胸贯膈络肝经，属胆仍从胁里过，下入气街毛际紫，横入髀厌环跳内，直者缺盆下腋膺，过季肋下髀厌内，出膝外廉是阳陵，外辅绝骨踝前过，足跗小趾次趾分；一支别从大趾去，三毛之际接肝经。此经多气乃少血，是动口苦善太息，心胁疼痛难转移，面尘足热体无泽，所生头痛连锐，缺盆肿痛并两腋，马刀挟痿生两旁，汗出振寒疟疾，胸胁髀膝至骨，绝骨踝痛及诸节。

厥阴足脉肝所终，大趾之端毛际丛，足跗上廉太冲分，踝前一寸入中封，上踝交出太阴后，循内廉阴股充，环绕阴器抵小腹，挟胃属肝络胆逢，上贯膈里布肋肋，挟喉项颖目系同；脉上巅会督脉出；支者还生目系中，下络颊里还唇内；支者便从膈肺通。是经血多气少焉，是动腰疼俯仰难，男疝女人小腹肿，面尘脱色及咽干，所生病者为胸满，呕吐洞泄小便难，或时遗溺并狐疝，临证还须仔细看。

火湿分治论

肥人气虚生寒，寒生湿；湿生痰。瘦人血虚生热，热生火，火生燥。故肥人多寒湿，瘦人多热燥也。夫以人形分寒湿热燥，此得之于外，然其中脏腑为病，亦有寒湿热燥之殊，不可不知。《玉匮金钥》曰：肝脏由来同火治，三焦包络都无异，脾胃

常将湿处求，肺与大肠同湿类，肾与膀胱心小肠，寒热临时旋商议，恶寒表热小膀胱湿，发热表寒心肾炽，十二经最端的，四经属火四经湿，四经有热有寒时，攻里解表细消息，里热表寒宜越竭，表热表寒宜汗释，湿同寒，火同热，寒热到头无两说，六分分来火热寒，寒热中停真浪舌，热寒格拒病机深，亢则害兮承乃制，紧寒数热脉正邪，标本治之真妙诀，休治风，休治燥，治得火时风燥了，当解表时莫攻里，当攻里时莫解表，表里如或两可攻，后先内外分多少，治湿无过似决川，此个筌蹄最分晓，感谢轩岐万世恩，争奈醯鸡笑天小。

虚实分治论

夫疾病之生也，皆因外感内伤生火生湿，湿而生热，火而生痰，四者而已。审其为少壮新病，是湿则燥之，是火则泻之，是湿而生热则燥湿而兼清热，是火而生痰则泻火而兼豁痰，无余蕴矣。审其为老衰久病，又当半攻半补焉。如气虚而有湿热痰火，则以四君子汤补气而兼燥湿清热、豁痰泻火；如血虚而有痰火湿热，则以四物汤补血而兼泻火豁痰、清热燥湿。

如此则攻补兼施，庶乎可也。予故曰：少壮新病攻邪为主，老衰久疾补虚为先。若夫阴虚火动，脾胃衰弱，真阴者水也。脾胃者土也，土虽喜燥，然太燥则草木枯槁；水虽喜润，然太润则草木湿烂。是以补脾胃补肾之剂务在润燥得宜，亦随病加减焉。

附：病机赋

窃谓医虽小道，乃寄死生，最要变通，不宜固执，明药、脉、病、治之理，（药性、脉诀、病机、治法。）悉望、闻、问、切之情。（望色、闻声、问故、切脉。）药推寒热、温凉、平和之气，辛甘、淡苦、酸咸之味，升降、浮沉之性，宣通、泻补之能。脉究浮沉、迟数、滑涩之形，表里、寒热、实虚之应，阿阿嫩柳之和，弦钩毛石之顺。药用君臣佐使，（主病之谓君，最多；辅君之谓臣，次之；应臣之谓佐使，又其次之。）脉分老幼瘦肥。（老人脉濡，小儿脉数，瘦者脉大，肥者脉细。）药乃天地之精，药宜切病，（药不泛用，则切病矣。）脉者气血之表，脉贵有神。（脉中有力，谓有神也。）病有外感内伤、风寒、暑湿、燥火之机，治用宣通、泻补、滑涩、温燥、重轻之剂。外感异乎内伤，（外感乃有余之症，内伤乃不足之证。）寒证不同热证。（伤寒直中之邪为寒，伤寒传经之邪为热。）外感宜泻而内伤宜补，寒证可温而热证可清。补泻得宜，须臾病愈；温清失度，顷刻人亡。外感风寒宜分经而解散，（外感风寒传变不一，宜分经络解散方可。）内伤饮食可谓

胃以消溶。（内伤饮食只在一处，不过调胃消导而已。）胃阳主气，司纳受，阳常有余。脾阴主血，司运化，阴常不足。胃乃六腑之本，（能纳受水谷方可伤化气液。）脾为五脏之源。（能运化气液方可克营卫。）胃气弱则百病生，脾阴足而万邪息。调理脾胃为医中之王道，节戒饮食乃却病之良方。病多寒冷、郁气，气郁发热。（寒谓风寒外感，昼夜发热。冷谓生冷内伤，午后发热。）或出七情动火，火动生痰。有因行藏动静以伤暑邪，或是出入雨水而中湿气。亦有饮食失调而生湿热，倘或房劳过度以动相火。（以上六条言病机。）制伏相火要滋养其真阴，（以下六条言治法。）祛除湿热须燥补其脾胃。外湿宜表散，内湿宜淡渗。阳暑可清热，阴暑可散寒。寻火寻痰分多分少而治，究表究里或汗或下而施。（是风寒则汗之，谓温散也；是生冷则下之，谓温利也。）痰因火动，治火为先；火因气生，理气为本。治火轻者可降，重者从其性而升消。理气微则宜调，甚则究其源而发散。实火可泻，或泻表或泻里。（指外感也。）虚火宜补，或补阴而或补阳。（指内伤也。）暴病之谓火，怪病之谓痰。寒、热、湿、燥、风，五痰有异；温、清、燥、润、散，五治不同。（寒痰温之，热痰清之，湿痰燥之，燥痰润之，风痰散之。）有因火而生痰，有因痰而生火，或郁久而成病，或病久而成郁。金、水、木、火、土，五郁当分；泄、折、达、发、夺，五法宜审。（金郁泄之、水郁折之、木郁达之、火郁发之、土郁夺之。）郁则生火生痰而成病，病则耗气耗血以致虚。病有微甚，治有逆从。微则逆治。（以寒药治热，以热药治寒。）甚则从攻，（以寒药治热佐以热药，以热药治寒佐以寒药。）病有本标，急则治标，缓则治本。法分攻补，虚而用补，实而用攻。少壮新邪专攻则是，老衰久病兼为补为规。

久病兼补虚而兼解郁，陈症或荡涤而或消溶。积在胃肠可下而愈，块居经络宜消而痊。女人气滞淤血宜开血而行气；男子阳多乎阴，可补阴以配阳。苁蓉、山药，男子之佳珍，（补阴故也。）香附、缩砂，女人之至宝，（行气故也。）气病血病二者宜分，阳虚阴虚两般勿紊。阳虚气病昼重而夜轻，（自子至巳为昼。）血病阴虚昼轻而夜重。（自午至亥为夜。）阳虚生寒，寒生湿，湿生热。（阳为气、为真火。）阴虚生火，火生燥，燥生风。（阴为血，为真水。）阳盛阴虚则生火，火逼血而错轻妄行。阴盛阳虚则生寒，寒滞气而周身浮肿。阳虚畏外寒，（阳气虚不能外，故畏外寒。）阴虚生内热。（阴血虚不能配气，故生内热。）补阳补气用甘温之品，滋阴滋血以苦寒之流。调气贵用辛凉，（气属阳，无形者也。气郁则发热，故宜用辛凉之药以散之。）和血必须辛热。（血属阴，有形者也。血积则作痛，故宜用辛热之药以开之。）阳气为阴血之引导，阴血乃阳气之依归。阳虚补阳，而阴虚滋阴；气病调气，而血病和血。阴阳两虚，惟补其阳，阳生而阴长；气血俱病，只调其气，气行而血随。藏冰发冰以节阳气之燔，滋水养水以制心火之亢。火降水升斯人无病，阴平阳秘我体长春。小儿纯阳而无阴，老者多气而少血。肥人气虚有痰宜豁痰而补气，瘦者血虚有火可泻火以滋阴。

膏粱无厌发痈疽，热燥所使；痰薄不堪生肿胀，寒湿而然。北地耸高宜清热而用燥，南方下可散湿以温寒。

卷之二 证治提纲

得病有因

治病活法虽贵于辨受病之证，尤贵于问得病之因。风则走注，寒则拘挛，暑则烦渴，湿则重滞，此受病之证然尔。或耗于交媾，或触于惊恐，或伤于酒食，或深居简出而受暑，自非委曲寻问其因，则以意治病岂不谬邪？有人喉间麻痒，医问其平日所嗜，曰：常吃鸽子。

乃知鸽食半夏苗，以生姜治之而愈。有人昏迷不醒，医问其喜食者何有？曰：酷好煎炙飞禽。

乃用红丸子、小七香丸末之，而入朱砂膏为小丸，薄荷泡汤灌下，须臾即苏。有人暑月深藏不出，因客至于窗下，忽尔倦怠力疲，自作补汤，得之反剧。医问其由，连进两服香薷饮作效。举此为例，其他可推。古云：医者，意也。苟不究其得病之因，其何以为意会？

治病当先救急

治病如弈棋，当先救急。急者何？救其重而略其轻也。假如病患发热经日，服通利之剂，泄泻不止，呕吐大作，粥药不入，而热犹未已。治法略去发热一节，且以定呕进食为先。惟人参、生姜，入些炙甘草，煎汤调苏合香丸，咽下养正丹，斟酌丸数与之。进剂以还，呕吐自定，饮食渐进，泄泻亦自不作。是元气既正，纵有微热，特假热耳。人参、川芎、柴胡、甘草调理之。

治病如操舟

操舟在手，当风波震荡之中，一有转移，则舟覆矣。医权药衡，主持在我，不可偏徇病家所欲，尤不可张惶，使病患惊。间有病家，粗识皮肤，辨难反复，万勿惑焉。又有瘥后，触犯再复，隐讳不言，须诘问其由，庶得对病施药。

用药中病不必尽剂

治寒以温，治热以凉，但中病即止，矫枉则过正也。盖凉药频施，必至于呕恶沉冷，温药频施，必至于烦躁烘热。所贵酌量权度，一毫无过用焉，是为活法。

经常用药自有奇功

人有中年以上，素挟风痰，腹中时痛，忽尔感冒，虽已发散寒邪，无复发热头疼之苦，奈何风痰呕吐俱作，诸药罔功。但用茯苓二陈东加南木香、白豆蔻作剂，入生姜、乌梅同煎，调橘皮、白豆蔻、炙甘草调之。若通小便，则于内加麦门冬；若通大便，则于内加枳壳，以咽神保丸四五丸，大小腑一通，顿遂勿药之喜。

论肝脾生病

经曰：人迎紧盛，伤于寒；气口紧盛，伤于食。盖肝脉可以知风寒之出入，脾脉可以验饮食之盈亏。肝亦主血，脾亦主痰，以其脉之虚实而益损之，以其病之关系而对治之。君请择斯二者。

病人尺脉洪大

此病在下部也。当疏利而出之。脉洪大主热，多是大小便不通，或小腹结急，脐下蓄血；或肾气攻刺，发作奔豚；或下焦停水，外肾虚肿；或风邪攻肾，脚痹腰疼；或肾脏风毒，身下疮痒。当随证体认，以对病之剂主之，大概通利为第一义，临床精思而熟审焉。

水气、肾气、血气、风毒擒纵治法

此等证候，先以青皮、陈皮、枳壳、北梗、半夏、紫苏、生姜、甘草解其寒邪，调其卫气，然后斟酌，用十枣汤吞养正丹。轻者却只用神保丸夹青木香丸，以五灵脂入乌梅、浓蜜煎汤咽下钱氏宣风散，亦可以疏利风毒。俟大便通快流行，其病已减，继是二陈东加当归、川芎、木香、缩砂辈调理之。

治痢要诀

痢出于积滞。积，物积也；滞，气滞也。物积欲出，气滞而不与之出，所以下坠里急，乍起乍止，日夜凡百余度。病家所请，莫不求其止，孰知物积气滞致有如是之证耶？继人但见有上项证候，不论色之赤白，脉之大小，一皆以通利。行之物积，用巴豆、大黄辈；气滞用枳壳、桔梗、青皮、莪术辈；二者兼济，必能收功，其间佐以黄连阿胶丸效验尤着。盖痢疾多因伤暑、伏热、酒面、炙爆酝酿而成，其阿胶尤大肠之要药，有热毒留滞则能疏导，无热毒留滞则能安平。市肆或无丸子，即以炒阿胶、当归、青皮、赤茯苓、黄连作剂，入乌梅、浓蜜同煎，最能荡涤恶秽，积滞既去，遍数自疏，嗣是却以木香、茯苓、缩砂、白豆蔻、陈皮、甘草调之，自然喜食，食则糟粕入于大肠，然后真人养脏汤、易简断下汤，可止则止矣。

简径治痢

诸热痢、血痢，及痢后大肠里痛，用萝卜截碎研细，滤清汁一小盏，蜜水相半一盏，同煎。

又法 热痢，旧年白梅并好茶、蜜水各半煎服。冷痢，生姜汁、蜜水各半煎服。仍兼木香、生肉豆蔻为佐。蜜最治痢。

姜茶治痢法

姜能助阳，茶能助阴，二者皆能消散，又且调平阴阳，况于暑毒、酒食毒皆能解之也。

不问赤白冷热通用之。老生姜切如豆许，与茶叶等分，用新水煎服。东坡医文潞公作效。

噤口痢

下痢噤口不食，虽曰脾虚，盖亦热气闭隔心胸所致也。俗用木香则失之温，用山药则失之闭，惟真料参苓白术散加石菖蒲末，以道地粳米饮乘热调下，或用人参、茯苓、石莲子肉入

疟痢用常山、罌粟壳

常山治疟，罌粟壳治痢，人皆薄之固也。然下痢日久，腹中无痛，当涩肠岂容不涩？疟以痰水作恙，法当吐痰逐水，又岂容不为之吐下？于斯时也，不有罌粟壳、常山之剂，其何以为对治乎？但中间有药辅之耳。

治疟要诀

凡疟，皆因腹中停蓄黄水，惟水不行，所以寒热不歇，此疟家受病之处也。治法，暑疟纯热，以香薷散加青皮、北大黄、二个乌梅同煎，侵晨温服。寒疟多寒，以二陈东加青皮、良姜，多用姜同煎，侵晨吞神保丸五粒。并欲取下毒水，则去其病根，寒热自解。

发疟呕吐勿用常山

有中年人，脏腑久虚，大便常滑，忽得疟疾，呕吐异常，惟专用人参为能止呕，其他疟剂并不可施，遂以茯苓二陈东加人参、缩砂，而倍用白豆蔻，进一二服，病患自觉气脉颇消，于是寒热不作。盖白豆蔻能消能磨，流行三焦，营卫一转，寒热自平。继今遇有呕吐发疟之证，或其人素呕而发疟，谨勿用常山，惟以生萝卜、生姜各研自然汁半盏，入蜜三四匙、乌梅两个同煎，吞局方雄黄丸三四粒，候其利下恶血、痰水，即以人参、川芎、茯苓、半夏、缩砂、甘草调之，万一呕不止而热不退，却用真料小柴胡汤多加生姜主治。其或呕吐大作而又发热，且先与治疟生熟饮，呕定以小柴胡汤继之。

疟有水有血

水，即水饮也；血，即淤血也。惟水饮，所以作寒热；惟淤血，所以增寒热。常山逐水利饮固也，苟无行血药品佐助其间，何以收十全之效耶？继自今疟家，或衄血，或唾血，或大便血丝，或月候适来适去，皆是血证，当以常山、草果、槟榔、青皮、乌梅、甘草作剂，于内加五灵脂、桃仁为佐，入生姜、浓蜜同煎，以主治之。

疟证寒热有根

凡疟，固当以风寒暑湿别而治之，或汗、或下、或吐、或温，《活人书》之格法，虽卢扁不能违矣。然尝见疟之经久而不歇，其故何耶？有根在也。根者何？曰饮、曰水、曰败血是尔。惟癖为疟之母，惟败血为暑热之毒，惟饮与水皆生寒热。故暑之脉虚，水与饮之脉沉结，癖之脉结。聚挟水饮者，为之逐水消饮。结癖者，胁必痛，为之攻癖。若败血、暑毒随证而疏利之，寒热不除，吾未之信。

常山治疟须用大黄为佐

疟家多蓄痰涎黄水，常山为能吐之利之，是固然尔。其有纯热发疟或蕴热内实之证，投以常山，大便点滴而下，似泄不泄，须用北大黄为佐，大泄数行，然后获愈。或曰巴豆丸子相依而行，亦能泄也，是又不然，巴豆攻于下积，苟欲荡涤血热，不可以无大黄。凡疟方来于正发，不可服药，服药在于未发两时之先。否则药病交争，转为深害。

寒热似疟

此伤寒一证，而实非瘴疟也。其人肝脉浮盛，头痛怯风，大抵小柴胡东加青皮、紫苏主之。呕者多用生姜，渴者多加乌梅，其或伤暑，兼之小柴胡东加香薷，入生姜、乌梅同煎可也。抑犹有说焉，寒热之根，非通利不能除也。万一其根未锄，又当以麻仁丸、神保丸辈与之，是亦先解后攻之意。

吐、汗、下治疟

治疟总要不过吐、汗、下而已，当下而下不尽，腹中尚有余痛，或大便一泄之后不复再泄，但时时点滴而出者，须再下之，大黄以佐常山可也。当汗而汗不匝，或头汗至胸而手足无汗者，须周浹一身而汗之，青皮以佐紫苏可也。所谓吐者，须出尽其水饮，若作吐剂，常山岂容辍哉？能于三者究竟焉，收效必矣。

疟后调理

症之为厉，大抵连绵，有病瘥以后，或饮食失节，或恚怒伤中，或梳洗感风又再发者，何以处之？曰：热多者，二陈东加青皮、甘草；热少者，二陈东加青皮、草果，坚守胃气而二药并用生姜、乌梅、蜜水同煎，空心进剂。其间斡运，更用巴豆丸子药疏利大便，以泄毒瓦斯，其何厉之有？或服巴药过多，以致腹痛，可用生姜、甘草煎汤，温和解之。甘草、生姜解诸药毒。

退热

退热用凉药，不可十分尽，或余热些少未去，不足关心，自然无事，否则热去则寒起，古人戒之。一方多用川芎、茯苓、甘草，少用白术，粗末水煎，病后和胃，收敛浮阳，屡试得效。

柴胡退热不及黄芩

若药弗瞑眩，厥病弗瘳。世俗治热，例用柴胡，最为稳当。至若黄芩一辈，则指为大寒，不敢用之，不思药病不相当，鲜克有济，继今退热而热不去者，须用黄芩。

退热有法

凡壮热烦躁，用柴胡、黄芩、大黄解利之。其热乍轻而不退，盍用黄芩、川芎、甘草、乌梅作剂，或用黄连、生地黄、赤茯苓同煎，临熟入灯心一捻主之，其效亦速。盖川芎、生地黄皆能调血，心血一调，其热自退。

小儿风证解热有三

痰盛搐掣，大便秘结，当以枳壳、大黄、灵脂、甘草利之。小便赤涩，心热狂吼，以辰砂五苓散入灯心行之，既利大肠矣，利小便矣。而风证乍作，面色乍红，常有怫郁之状何耶？表热表邪犹未解也。人参羌活散加青皮、紫苏、薄荷主之，参苏饮亦可矣。

滞血发热

其人脉涩，必有漱水之证，必有呕恶痰涎之证，必有两脚厥冷之证，亦必有小腹结急之证，或唾红，或鼻衄，此皆滞血作热之明验也。用药不止于柴胡、黄芩，当以川芎、白芷、桃仁、五灵脂、甘草佐之。大便秘结者，于中更加大黄、浓蜜，使滞血一通，黑物流利，则热不复作。

佐助小柴胡汤

伤寒留蓄恶血，内外俱热，昏愤谵语，亦有耳聋虚鸣之证，与少阳经受病相似，如服小柴胡汤不效，当以黄连一分，赤茯苓半分锉细入灯心，煎与之。男女通用。凡大小产、热入血室、小柴胡汤力所不及者，于内加五灵脂，仍以黄连赤茯苓汤佐之。盖心生血，黄连、茯苓皆清心凉血之剂，所以收功。若夫疏利血毒，则《活人书》桃仁承气汤有余勇矣。

肾热用五苓散

肾气内虚，邪热流入于肾经，其脉洪大，小便频数，所出涩少，赤浊而痛，此不可以牵牛行

下后大肠热肿坠重

诸有里热，法当通利大便，然下后肠头热肿而坠重者，此更有热，有淤血挟气而蓄在下焦也。更用黄连、黄芩、大黄辈下之，于内以炒阿胶、炒枳壳、百药煎为佐，多入浓蜜并乌梅同煎，姜钱四五片可也。

通利大便有法

凡通利大便，若用大黄、巴豆等药而大便不通者，阴阳关隔，水火不升降故也。有热者，来复丹夹三黄丸，薄荷泡汤下；无热者，养正丹夹神保丸，橘皮煎汤下。

饭后随即大便

脾肾交济，所以有水谷之分，脾气虽强，而肾气不足，故饮食下咽而大肠为之飧泄也。

治法：二神丸用故纸、肉豆蔻修合，或不换金正气散吞安肾丸主之。盖脾肾之气交通，则水谷自然克化，此所谓妙合而凝者也。

脾泄、肾泄

有脾泄，有肾泄。脾泄者，肢体重着，中脘有妨，面色虚黄，腹肚微满。肾泄者，肤腠怯冷，腰臀酸疼，上咳面黧，脐腹作痛。治脾泄，用苍术、白术、浓朴、干姜、木香、生肉豆蔻辈。治肾泄，用补骨脂及安肾丸、震灵丹辈。

肾泄

诸有泄泻，用不换金正气散、除湿汤之类，以去风湿，以安肠胃，此上品药也。次则温脾养胃之剂，投之是为正法。然用之而不作效，抑且腹痛走上走下，或脐间隐痛，腰臀疼酸，骨节软弱，面色黧悴，尺脉虚弱，病安在哉？曰：此肾泄也。当以炒故纸、生干姜、官桂、木香、当归辈主之，仍用安肾丸为佐。其或肾水下涸，心火上炎，燥渴溺多，引饮无度，此阴阳离绝也，识者忧焉。

大便脱泄白脓

大人小儿，泄痢无已，其后变作白脓点滴而下，或于粪尾见之，为之温脾不愈，法当温肾。盖肾主骨髓，白脓者，骨髓之异名也。要之始作白痢，其气腥臭，已经转下，而且淹涎日久，无所谓痢矣。今之白脓，全无腥臭，面色微黑，骨力羸弱，的见肾虚，合用炒故纸、当归、木香、干姜、官桂主之，嗣是少与震灵丹或玉华白丹为佐。虽然，又有妇人一证，似痢非痢，泄下白脓，心腹暴痛，吼不忍闻，此当为之通血，投通血之剂，却以养正丹辅之。

脱肛

脱肛一证，气聚不散也，里急而不得出，外胀而不得入，先以枳壳散作剂，又以枳壳烧灰存性，细末掺敷，或津唾调敷，气散则肿消矣。仍用生姜汁调五苓散如膏，入新水研散，略煎，吞黄连阿胶丸。虽然，此论肛门挟热而肿胀也，其或肠中虚薄不收，则理中汤、钓肠丸、养脏汤辈主治，乌贼骨、木贼草敷之。（详见脱肛类。）

小便不通

大凡水道不行，其本在肾，合用牵牛、泽泻；其末在肺，合用葶苈、桑皮，二者得兼，必然中病。其间更以木通、滑石佐之，又能透达。虽然，大便、小便脉络相贯也，人有多日小便不通，但用神保丸、北亭丸辈，大泻数行，小肠自利。

石淋

沙淋凝脂而易散，石淋结块而难消。攻疗石淋，专以枳壳散空心食前吞来复丹为妙。但恐太

转胞

转胞证候，孕妇多有之。患在忍缩小便，或喜食煎爆，或饱后为热所迫，遂使小肠之气逆而不通，大肠之气与之俱滞，外水不能入膀胱，内水不能出膀胱，淋漓急数，每欲尿时痛不可言，大便亦里急频并，似痢非痢。必以手从胸间按至脐下，庶可立出小便，否则逆上出而不禁，甚者因此腹胀浮肿。治法用凉药疏利小肠中热，仍与通泄大肠，迨其腹中搅痛，大便大下，则溺胞随即归正，于是小便顺流。葵子散见附妇人摘奇方。

孕妇胎热似痢

孕妇七八个月，伤暑伤热以致子烦。胎气迫近于上，咽喉窒碍，心腹胀满，下坠似

痢。

每登厕时，坐一炊久，忽而气下，方得大便一通。世俗率用痢药，不知病在胎热子烦，可小柴胡汤下黄连阿胶丸，或用炒阿胶、净黄连各一分，枳壳、北大黄半之，分作两剂，乌梅、姜、蜜煎服，俟其大便调导，却以川芎、茯苓、缩砂、甘草继之。若五苓散、感应丸、香连、驻车，非其治也。

下焦蓄血

血之为病，冒闷烦躁，迷忘惊狂，痰呕汗多，骨热肢冷，此外证然尔。何以知其蓄在下焦？曰：脐下结急，外热内痛，尺脉洪而数也。桃仁、灵脂、生地黄、北大黄、甘草利而逐之。

产妇血块筑痛

此候因产断赶血未尽所致。世俗收生，多就踏板赶血，不思生产之时，已坐草近地久矣。

产毕脏腑虚空，又且近地赶血，冷湿乘之，风邪入之，使败淤凝为血块，是谓血母。冲筑硬痛，非乳香、没药、延胡索、五灵脂辈所能疗也。治法不换金正气散加辣桂、川芎、白芷、蓬莪术、干姜同煎，乘热入法醋，连进两服。冷湿风邪一散，其块自消，散淤皆从大小便而出。凡新产，须就床上赶血，下帐避风。

身体血滞作痛

身体疼痛，非湿则痰固也。人有挟刀锯之，惊而又馁在其中，为风寒水湿所伤，致使心窍凝滞，于是经络壅闭，血流不行，肠肉骨节为之刺痛。治法当归、川芎、芍药、白芷、灵脂、大黄、甘草利之，黑物小片而下，其痛有瘳。

身体胸腹隐热、隐疼、拘急、足冷

此血之为病也。以其饮酒嗜欲，伏热受暑得之。惟热毒、暑毒、酒毒为能伤血，淤血未去，新血不营身体，所以隐痛拘急。其里热足冷者，血之证也。用柴胡、黄芩、青皮、枳壳、灵脂、桃仁、木通、甘草作剂，多入大黄以利之，俟其流利已尽，小腹略无结急，即以当归、川芎一倍，橘皮、半夏、枳壳、北梗、木通、甘草平之，调其气血，于是有瘳。血属于心，木通以通其心窍，心窍既通，经络之流行可知矣。

血滞

人之一身不离乎气血，凡病经多日疗治不痊，须当为之调血。血之外证，痰呕、烦渴、昏愤、迷忘、常喜汤水漱口。不问男女老少，血之一字请加意焉。用药川芎、蓬莪术、桃仁、灵脂、生地黄、北大黄为要。呕甚者多加生姜，以此先利其宿淤，嗣是茯苓、茯神、川芎、甘草调理之。

血崩

《素问》云：阴虚阳搏谓之崩。此即血得热则宣流之意也。四物汤可以助阴，生料枳壳散可以抑阳，其间更以茯苓二陈汤和之，使阴阳两得其平，血自循于经络矣。若夫冲任不固，下

吐血

血随气行，气逆而上奔，则血不循于经络而涌吐矣。人知吐血出于上焦，有热固也。然能用柴胡、黄芩、蒲黄、茅花等辈，而不能用枳壳、北梗、青皮、生姜、乌梅佐之，又不能用通利丸子，以开其中脘，导其大便，则气如何而下降？血如何而下行？吾恐逆奔而上，有不可得而止之者，若夫依前治法，血止而后又当以人参、川芎、当归、茯苓、橘皮、半夏、甘草为之调理，虚则加木香，热则加柴胡，壅则加桑皮，荆芥，尤在权衡。

治渴有法

凡病患兼有燥渴之证，用乌梅、栝蒌根、干葛、甘草数辈皆不作效，遂致引饮过多，两脚浮肿，此证不可以为里热，盖肾水不上升，心火不下降故也。须用交感丹为主，却以乌梅、浓蜜、生姜、甘草煎汤咽之。肾水一升，心火一降，其渴自止，脚亦不复肿矣。

酒家有病勿用温药

有人饮酒过多，因酒作病，胸脘不快，其气扞隔，服无数二陈汤，竟无寸效，由是不喜饮食，复以调气散投之，致发大热，自后只用薄荷煎、鸡苏丸、麻仁丸，日就痊愈，乃知胸脘闭隔，热在上焦使然耳。又有人酷好饮酒，复感寒邪，服不换金正气散，以致内热愈炽，烦渴且闷，汗出如雨，身体怯寒，续后以小柴胡东加枳壳、白芍药解之。柴胡、黄芩退热，枳壳宽中，芍药调营止汗，顿然痊愈。然则酒家抱病，其可妄以温药尝试一中乎？

伤寒筋惕肉治法

筋惕身，发汗太过所致也。古人以真武汤主之。然真武汤能止其汗而不能定其。

者动也，汗出表虚，外风必入于腠理，人知风以动之，所以惕惕而自，而不知汗多则伤血，血虚无以荣筋，筋愈急而四体百骸愈为之动。治法不用驱风并发散等辈，惟人参、当归、川芎、芍药、半夏、茯苓、甘草作剂，以五灵脂为佐，入生姜、乌梅同煎，自有神效。上药专于生血，生血乃所以收汗。其或大便秘涩，少加大黄以导之。血脉一和，不反掌而静定矣。

发痉详证

庐江刘宝云：《产宝》所载方药甚详，独无产后中风、角弓反张一证。按产后中风，因怀胎时多啖生冷，脾胃受湿，复经乳卧之后，津液内竭，履地太早，脱着不时，以致风邪乘虚入于足太阳之经。其证发热头疼，或时不热，喘息痰咳，言语不伦，渐觉牙关紧急，十指微动，如摸物之状。加以项背强直，或哑或叫，目睛直视，肠滑不禁，身如反弓，转侧不仁，如此十无一生，《活人书》谓太阳发痉是尔。凡产后初得发热，常须审视，若唇急舌謇，手指微动，便以中风药品急治之。用药归荆汤、独活酒。附在湿门。独荆散、防风散、续命汤。

见附妇人方中。男女通用。

胸胁痛引背上，头面两手浮肿

肾虚不能纳气归，元气逆而上奔，故胸膈满痛，以手摩挲，痛走背上，又从背摩挲，则其气循胁泄于后，分而痛不作矣。此气之为病固也。奈何肾虚又不能行水，故水随气奔，上乘于肺，头面两手浮肿，气短而喘。由是血化为水，与之俱滞。况其人旧来有风。曰风、曰水、曰血、曰气，四者合而为病，其痛非常。如沉香、木香、乌药、槟榔之类，不能施其巧治，法将何如？曰：先以二十四味流气饮加独活、枳壳、五灵脂、炒牵牛，入姜、蜜、乌梅同煎，咽下养正丹二十粒、雄黄丸十粒，升降水火，引导大便。次用桑叶、紫苏、木通、阿胶、当归、桃仁、青皮、桔梗、炒芫花、生大黄作剂，依前煎以姜、蜜、乌梅，取尽大便黑物，即收全功。

肚皮痛

肾虚不能行水，加之酒面无度，醉后辄睡，酒与水交聚于腹中，而面毒复缠滞其气，是以水渗于肚皮而作痛矣。治法钱氏宣风散用蜜水煎，咽下神保丸，俟其大便流利，然后以青木香丸一分，安肾丸倍之，用二陈汤入少盐并生姜同煎，空心咽下。脾肾气复，自然向安。

胸膛气隔

有肺经伏热而气隔者，有痰水在上而气隔者，大概以茯苓、半夏、枳壳、桔梗为治法。

其肺热者，如圣东加桑白皮佐之；心下水气者，小半夏茯苓汤效；胸烦，《活人书》用山栀子。

附：证治赋

麻黄汤发腊月寒伤营，桂枝汤散冬天风伤卫。九味羌活汤发三时之表，（三时伤寒

，春夏秋也。）六神通解散理晚发之邪。（三月天行，谓之晚发。）香苏散、十神汤，参苏饮发表调中，（平和之药，外感内伤兼治。）葛根汤、解肌汤、小柴胡和解半表。大柴胡、三承气攻热邪传里，理中汤、四逆汤散寒中阴经。（以上治外感。）补中益气汤治饱饥劳役，升阳顺气汤疗怒恐忧思。调中益气汤调脾胃失协，参术调中汤治脾肺俱伤。升阳散火汤升散热邪。（凡言热者，指外热也。）升阳益胃汤分消湿气。（以上治内伤。）和解散、金沸草散治时行寒疫，神术散、定风饼子疗暴中风邪。人参败毒散、升麻葛根汤解温疫而身热，阳毒升麻汤、雄黄解毒丸散天行而咽疼。宣明双解散主温热始终之要药，藿香正气散治暑湿内外之良方。香薷饮、清暑益气汤、人参白虎汤、益原散、缩脾饮能祛实虚暑气，平胃散、羌活胜湿汤、升阳除湿汤、五苓散、术附汤善解外内湿邪。生料五积散解湿温寒，（治表里之寒湿。）防风通圣散清热润燥。（治表里之热燥。）搜风顺气丸、神芎丸润大肠燥症，黄连解毒汤、三黄丸泻三焦火邪。（凡言火者，指内火也。）当归六黄汤泻火滋阴，防风当归饮补虚退热。舟车丸、三花神丸能除湿热，（湿则生热。）秦艽汤、羌活愈风汤善解燥风。（燥则生风。）胃苓汤主伤暑泄泻腹疼，柴苓汤治伤寒泄泻身热。桂苓白术散疗霍乱而口发渴，加减理中汤治吐泻而咽不干。苍术汤、胃风汤治湿伤气分，白痢便脓；地黄汤、芍药汤主热伤血分，赤痢下血。万安散、七宝饮治疟无汗而寒多热少，清脾饮、六和汤疗疟有汗而寒少热多。华盖散、五拗汤主喘嗽因寒外袭，洗肺散、贝母散治咳嗽由火内生。（以上发表和中，以治风寒暑湿燥火。）

白虎汤泻胃火有余，八珍汤补脾阴不足。白术和胃丸能养脾胃，宽中进食丸喜滋形气。治中汤、枳术丸、和中丸、大安丸、保和丸健脾消食，香谷丸、香棱丸、积气丹、妙攻丸、消块丸破积除症。木香枳壳丸疗食停久发黄，神妙列仙散治酒积陈成疸。木香枳术丸、化滞汤调气进食，七转灵应丹、万应丸取积追虫。丁香脾积丸、妙应丸治心腹诸疼，大黄备急丸、三阳散主猝暴百病。三棱消积丸治新伤生冷硬物，（内用巴豆。）木香槟榔丸疗久患气食痞膨。

（内用大黄。）巴豆斩关，去时新之冷积可仗；大黄破结，推陈久之热症宜遵。气病宜调气，用木香、槟榔、香附、枳壳；血病宜和血，以川芎、当归、桃仁、红花。越鞠丸、木香流气饮开郁气之无形，蟠葱散、撞气阿魏丸破积血之有质。神砂一粒丹疗气郁而为心疼，神圣代针散治血积而作疝气。独活寄生汤开气血结滞在腰，当归拈痛汤散湿热沉凝于足。控涎丹、小胃丹治湿热流注四腹作疼，金枣丹、虎骨散疗气血怫郁遍体为病。（以上调胃消食并治气血湿热郁积。）二陈汤以豁痰，三补丸而泻火。六君汤豁痰补气调胃，六物汤降火补血滋阴。

（四物东加黄柏、知母是也。）当归龙荟丸善降阴火兼治胁痛，人参养胃汤能开结痰并疗久疟。太平丸、消化丸治痰嗽有功，左金丸、香连丸除热痢必效。洗心散、泻肝散泻心肝之火，滚痰丸、化痰丸蠲热燥之痰。四七汤、黑锡丹开痰结心胸，清空膏、凉膈散除火升头膈。石膏羌活散祛风明目，川芎石膏汤泻火定眩。川芎茶调

散治风热上攻头目，葛花解醒汤疗湿痰中满胃肠。龙脑鸡苏丸除心肺虚烦，人参泻肺汤散胸膈实火。犀角地黄汤、桃仁承气汤、茯苓补心汤、阿魏丸，小建中汤治火载血而上出，当归承气汤、瑞竹蒲黄散、当归和血散、聚金丸、伏龙肝散疗阳迫阴而下行。红花当归散、千金桃仁煎、六合汤理经脉不通，凉血地黄汤、解毒四物汤、胶艾汤治崩漏不止。金匱当归散清热安胎而易产，丹溪天麻丸活血保产而无惊。女金丹、乌鸡丸调气血，令老妇妊娠；天一丸、连翘饮泻火湿，主小儿百病。醒脾散、玉饼子、肥儿丸、香棱丸治婴孩脾气不足而致疾，泻青丸、夺命散、抱龙丸、槟榔丸疗童穉肝邪有余而生灾。金箔镇心丸、金箔镇心丹安神定惊，五福化毒丹、犀角消毒饮清热解毒。

异功散补痘疮之虚寒，通圣散泻斑疹之实热。内疏黄连汤、千金漏芦汤主阳痛肿掀向外，内托复煎散、渊然夺命丹治阴疽毒蕴于中。立马回疗丹、万灵夺命丹疗疔疮而有殊功，神效太乙膏、散肿溃坚汤治瘰而收实效。紫金丹治药食众毒兼痈疽疔肿，（主解利。）如圣散疗风湿诸邪及瘫痪痛风。（主发散。）香谷丸、芎归丸疗痔而清热凉血，槐角丸、乌王丸治漏而散湿补虚。清心莲子饮、八正散治小便淋浊有虚实之分，导滞通幽汤、三和散疗大肠燥结有血气之异。海藏五饮汤散五等之饮，开结枳实丸消诸般之痰。导痰汤、三生丸豁痰疏风，千缙汤、四磨汤下气定喘。苏子降气汤消痰利气，三因七气汤解郁开心。瓜蒂散、稀涎散、四灵散吐涎而祛风，苏青丹、星香汤、涤痰汤豁痰而顺气。苏合香丸、乌药顺气散、匀气散善开结气，小省风汤、青州白丸子、搜风丸能散风痰。牛黄清心丸治诸痰热而类风，诸小续命汤疗真中风而在脉。三化汤主风入腑，推陈润燥；至宝丹治邪入脏，散热消风。龙星丹疏风清热豁痰，愈风丹润燥祛风泻火。换骨丹、续命丹治风痰充塞经络而为瘫痪，清燥汤、健步丸疗湿热熏蒸筋骨而成痿痹。南星治风痰，苍术治湿痰，天花粉治热痰，海石治燥痰，半夏治寒痰。柴胡泻肝火，黄连泻心火，白芍药泻脾火，黄芩泻肺火，黄柏泻肾火。天门、麦门、知母石膏、竹茹、童便、玄明粉、上清丸能散虚火，荆沥、竹沥、贝母、瓜蒌、韭汁、姜汁、霞天膏、二沥汤善开虚痰。气虚加以四君，血虚加以四物。（以上治痰火气风。）四君补气并益脾，四物补血兼滋肾。八物汤、十全大补汤补气血两虚，固本丸、秘传补元丸补心肾不足。

钱氏白术散、参苓白术散、竹叶石膏汤补脾胃诸虚，丹溪补阴丸、金匱肾气丸、三一肾气丸滋真阴久损。崔氏八味丸补阴兴阳，天王补心丹宁神定志。朱砂安神丸凉血清心，八味定志丸补虚开窍。茯菟丸、葶厘清饮除浊止淋，固精丸、固真太宝丸秘精收脱。保和汤、知母茯苓汤、黄 鳖甲汤止嗽宁肺，保真汤、十味人参散，人参养荣汤除热补虚。一秤金、七仙丹乌发驻颜，琼玉膏、固本酒延年益寿。（以上补气血脏腑。）以方加减存乎，人要审病而合宜用药，补泻行于味，须随时而换气。奇偶复七方须知，（七方者，奇偶复大小缓急也。）初中末三治要察。（初则发攻，中则调和，末则收补。）寒因热用，热因寒用，通因通用，塞因塞用，（通因通用者，通其积滞而下焦自然闭密也。）高者抑之，下者举之，外者发之，内者夺之。（塞因塞用者，塞其下流而上焦自然开豁

也。)寒则兼凝，热则开行，风能胜湿，湿能润燥。辛能散结，甘能缓中，淡能利窍，苦以泄逆，酸以收耗，咸以软坚。升降浮沉则顺之，(谓顺其升降浮沉之性也。)寒热温凉宜逆也。(谓以寒治热，以热治寒也。)病有浅深，治有难易。初感风寒，乍伤饮食，一药可愈；旧存癖，久患虚劳，万方难瘳。履霜之疾亟疗，无妄之药勿试。病若伏虚，宜半攻而半补；医称多术，或用灸而用针。针有劫病之功，灸获回生之验。针能去气病而作痛，灸则消血症以成形。脏寒虚夺者，治以灸；脉因挛痹者，疗以针刺。血实畜结肿热者，宜从砭石；气滞痿厥寒热者，当仿导引。经络不通，病生于不仁者，须觅醪醴；血气凝泣，病生于筋脉者，可行熨药。病剽悍者，按而收之；(谓按摩也。)

干霍乱者，刮而行之。(谓刮痧也。)医业十三科，宜精一派；病情千万变，仔细推评。姑撮碎言，以陈管见，后之学人，庶达迷津。

卷之三 诸风

风论

气血痰水，受病于内者也；风寒暑湿，致寇于外者也。人之一身血气既虚，阴阳不守。

饮食居处，嗜欲无节，冲风卧地，调护不加，于是经络空疏，腠理开彻，风邪乘其虚而入之，中风诸风皆是物耳。风之为病，善行数变，其中人也猝，其眩人也晕，激人之涎浮，昏人之神乱。挟热则痿惰缓弛，挟寒则急痛拘挛。自其邪气之入人也，邪气反缓，正气反急，正气引邪为僻、为窜视、为掣纵、为搐搦、为瘫痪、为反张。在于阳则皮肤缓，在于阴则腹里急。缓则四肢不能收，急则一身不能仰。皆随其邪气所至表里浅深而有证也。种类虽多，大要有四。血气偏虚，半身不遂，肌肉枯瘦，骨间疼痛，谓之偏枯；神智不乱，身体无痛，四肢不举，一臂不随，谓之风痲；（能言则可治。）忽然迷仆，舌强不语，喉中窒塞，噫噫有声，谓之风；（身软有汗则生。）风寒湿三气合而为痹，其人肉浓，身顽不知痛痒。风多则走注，寒多则疼痛，湿多则重着，在筋则筋屈而不伸，在脉则血凝而不流，在肉则不仁，在骨则癱重，夫是之谓风痹。伤风一证，发热烦躁，头疼面光，恶风自汗，盖风能散气，故有汗也。

风家脉浮者，病在表；脉实者，病在里；脉虚者，病在脏；脉促者，病在上。浮则发散，实则疏导，虚则温之。促于上而病患壮盛，胸喉澎湃者，瓜蒂散少少吐之。俗谓热则生风，大纲然尔。多有胃虚、气虚、血虚，虚极而生风者。若诸虚证候，天雄、附子、官桂、川乌又不可缺。治法大要，尽以消痰顺气为先。顺气用南木香、苏合香丸辈；消痰用南星、半夏、细辛、僵蚕辈。如石绿、铁焰、水银、轻粉、铅霜、朴硝等剂，谨勿妄施。寒毒入胃，则血脉凝涩，真气消铄，不旋踵而废人。治风良剂，小续命汤为上，排风汤次之，然二药主风不主气，须以人参顺气散、乌药顺气散佐助其间，气一流行，则风亦疏散矣。至若口开手散，泻血遗尿，眼合不开，汗出不流，吐沫气粗，声如鼾睡，面绯面黑，发直头摇，手足口鼻清冷，口噤而脉急数，皆为不治之证。其余诸风种类，余于《婴儿惊风指要》备论之。

诸风

诸风证治

心中风

心风偃卧热而暗，唇赤其身有汗生，白黑青黄唇上见；停停时悚扁医惊。

心中风，偃卧不能倾侧，发热失音，其舌焦赤。汗流唇赤者，可治，灸心俞。若唇上白黑青黄，乃心坏为水，面目停停时时悚动者，并不治。心俞二穴在第五椎骨下两旁各一寸半。

五脏俞穴《千金翼》所载与《六十七难》注同取分寸法，男左手女右手，以中指第一节为一寸。

肝中风

肝家踞怒不低头，左胁偏疼筋急搜，额目唇青为可疗，目黄目白使人愁。

肝中风，踞坐不能低头，上视多怒，左胁偏疼，诸筋挛急，头目动，其目青绕。两目连额微青，面黄者，可治，灸肝俞。若大势青黑，其目一黄一白者，不治。肝俞二穴在第九椎骨下两旁各一寸半。

肾中风

肾中踞而腰脊疼，面浮耳黑贼风生，胁无黄迹能痊愈，直发泥容旦暮倾。

肾中风，踞坐腰脊痛引小腹，面上浮肿，其耳黑。视左右胁，未有点点黄色者，可治，灸肾俞。若胁上黄点，面如土色，鬓发直，齿黄赤者，不治。肾俞二穴在第十四椎骨下两旁各一寸半。

肺中风

肺风喘促满胸堂，偃卧燥异常，口鼻之间须要白，寻衣肺坏色忧黄。

肺中风，偃卧胸满气短，喘息时嗽，燥闷汗出，其鼻白。目下及鼻四周，以至于口色白者，可治，灸肺俞。若色黄，乃肺坏为血，其与寻衣摸空者并不治。肺俞二穴在第三椎骨下两旁各一寸半。

脾中风

脾中风兮肌肉，踞而腹满吐咸酸，唇并肢体通黄痿，手足眸青疗已难。

脾中风，踞坐腹满，皮肉动，四肢放纵，其唇黄。身通黄，吐咸汁者，可治，灸脾俞。

若

胃中风

胃病根源饮食来，抬肩喘息气难开，口张额汗腹中满，浮诊双关脉大哉。

胃中风，腹满胀，隔塞不通，张口喘息，额上多汗，孙地仙所谓新食竟取风为胃风是也胃俞二穴在第十二椎骨下两旁各一寸半。

中风恶证

中风恶证细推求，口噤须迟脉数忧，眼合不开并窜瞪，面绯面黑手难收。

口开吐沫气粗大，发直摇头汗不流。

鼾喉鸣兼鼻冷，遗尿泻血并皆休。

中风多是恶风自汗，心风脉浮洪，肝风脉浮弦，肾风脉浮滑，肺风脉浮涩，脾风脉浮缓。

或以三部候之，或以本脏取之，不可一概论也，医者当明辨之。

治猝中法

圆白 天南星（湿纸裹煨） 楠木香 苍术（生）
白羊眼半夏（用百沸汤就铍蘸少顷。各一钱半）

上件锉散，分作二服，水一盏半，生姜七浓片，煎取其半，乘热调苏合香丸三丸灌下。

痰盛者加全蝎二枚，炙。治一切猝中，不论中风、中寒、中暑、中湿、中气及痰厥、饮厥之类，初作皆可用此。先以皂角去弦皮，细辛或生南星、半夏为末，揭以管子吹入鼻中，俟其喷嚏，即进前药。牙噤者，中指点南星、细辛末，并乌梅肉，频擦自开。

又法

楠木香（细锉，二钱） 生南星（七片） 生姜（七片） 石菖蒲（二寸，捶碎）

上煎取清汁，乘热调楠木香末一钱、苏合香丸三丸与之。

小续命汤 治中风诸风，迷仆涎潮，舌强语謇，或昏愆痿弛，或厥冷拘挛，不论表里浅深，服之皆验。

麻黄（去节） 人参 防己 官桂 黄芩 杏仁（去皮尖，焙） 白芍药 芎
甘草（炒。各一两） 防风（一两半） 附子（炮，去皮脐，只用半两）

上锉散。每服三钱，姜五浓片，枣二枚，水盏半，煎一盏，温服。恍惚加白茯苓；骨节烦疼去黄芩，加白术、附子；骨肉冷疼，加辣桂、附子；呕逆腹胀，加人参、半夏；自汗去麻黄，加芍药；大便结热，去附子，加枳壳、大黄；痰多加南星炮切数片；风虚加当归；渴加栝蒌根；身疼加秦艽；喘急加炒桑白皮。

排风汤 治五脏风、诸风，亦治风毒脚气肿痛。

白藓皮 白术 白芍药 辣桂（去粗皮） 当归 川芎 杏仁（去皮尖，微炒）
防风 甘草（各二两。炒） 独活 麻黄（去节） 白茯苓（各三两）

上粗末。每服三钱，水盏半，姜四片，煎一盏，温服。

良方人参顺气散 治诸风战掉，拳挛眩暈，邪麻痹疼痛。

川芎 桔梗 白术 白芷 陈皮 枳壳（炒） 甘草（各一两。炒） 麻黄（去节）
天台乌药（上为末。每二钱，姜枣煎服。

乌药顺气散 证治同前，亦主脚气。

乌药（去心） 麻黄（去节） 陈皮（各二两） 川芎 枳壳（炒） 北梗 白芷
直僵蚕（炒，去丝） 甘草（炒。各一两） 白姜（炮，半两）

上为末。每二钱，姜枣煎服。

摄生饮 治一切猝中。不论中风、中寒、中暑、中湿及痰厥、饮厥、气厥之类，初作即用此。

圆白南星（湿纸裹煨） 楠木香 半夏（用百沸汤就铤蘸少顷。各一钱半） 辣细辛
苍术（生） 甘草（生） 细石菖蒲（各一钱）

上锉。分二服，每服水盏半，姜七浓片，煎取其半，乘热调苏合香丸（方具诸气门）。

三丸灌下。痰盛加炙全蝎二枚。先以皂角肉为细末，管子揭些吹入鼻中，候喷嚏即进药。牙噤者乌三生饮治卒中昏迷，痰盛喉鸣，口眼斜，半身不遂，但脉沉无热者可服。

南星（一两） 川乌（生） 附子（生。各去皮脐，半两） 楠木香（二钱半）

上咀。每服三钱，水一盞半，姜十浓片，煎取半，微温服。

附香饮 证治如前。

附子（生，四钱） 木香（二钱）

上咀。分二服，每用水盞半，姜十片，煎取半，微温服。虚人可用。

星香饮 证治如前。

南星（八钱） 木香（二钱）

上锉。分三服，每用水盞半，姜十片，煎六分，温服。气盛人用此。

大醒风汤 治卒中诸风，涎潮痰厥，语涩神昏。

附子（生） 南星（生。各三分） 全蝎 川芎 防风（各一分）

上锉散。每三钱，姜十片，煎服。气不和加木香。

省风汤 南星（炮，一两） 防风（半两） 甘草（炒，一分）

上锉。每服三钱，姜十片，煎服。气虚人加生附子、沉香，气逆加紫苏、木香；头痛而晕，左经丸治诸风瘫痪，拘挛强直，疼痛或跌扑伤损亦主之。

草乌（炮，去尖，四两） 川乌（炮，去皮脐，二两） 没药（一两半）
乳香（一两）

黑豆（生，一升，以斑蝥二十一个，去头、足、翅，同煮，候豆熟为度，去斑蝥，取豆焙干用）

上细末，醋和豆为糊丸，桐子大，每服三十丸，温酒下。

铁骨丹 治诸风瘫痪，拳挛，半身不遂。

川乌头 草乌头（各炮，去皮脐尖） 川芎 当归（酒浸，晒） 辣桂 川续断（洗，晒）
华阴细辛 补骨脂（炒） 乌蛇（洗，酒浸，取肉晒干，七钱半）
直僵蚕（炒，去丝） 木鳖子（去壳，炒熟） 天麻（酒浸，晒）
巴戟（酒浸，去心，晒） 防风 滴乳香 没药 麻黄（去节） 羌活 独活
坚白南星（炮熟） 白蒺藜（炒，捣去刺） 薏苡仁 苍术（炒。各半两）
萆（盐水煮干） 杜仲（去粗皮，锉，姜汁制，炒焦） 牛膝（酒浸，晒。各一两）
虎胫骨（洗，酒浸，炙焦） 自然铜（烧红，醋淬七次。各三两） 白附子（炮）
川五灵脂（各四钱） 秦艽 全蝎（去毒，微炒。各二钱半） 麝香（半钱）

上细末，乳香、没药、麝香另研，渐入拌和，以浸药酒，调飞面煮糊，研筑丸，弹子大。

每围熏汤浴最妙。未服药前，须以斑蝥二十一个，去翅足，用黑豆一建盏，慢火同炒焦，只用七个，并豆入全蝎十四枚，微炒，五灵脂二钱半为末，糕糊丸麻子大。每二十一丸，老酒下，先去其风根。

铁弹丸 治诸风瘫痪。

川乌（炮，去皮脐，一两半） 川五灵脂（四两） 乳香 没药（各一两） 麝（一钱）

上乳香以干竹叶包裹，用熨斗火熨过，即研成末，余药末之，拌和，再碾，滴水为丸，弹子大，每一丸，薄荷酒磨下。

拒风丹 治一切风。

川芎（四两） 防风（一两半） 天麻 甘草（炒。各一两） 细辛 萆苳（各半两）

上末，炼蜜和杵，每两作三十丸。每服一丸，细嚼，荆芥酒下。伤风鼻塞，项强头疼，姜汤下。

麝香丸 治白虎 节风，走注疼痛，遍身瘙痒如虫咬，昼静夜剧。

川乌（大八角者三个） 全蝎（二十一个） 地龙（半两） 黑豆（并生用，二钱半）
麝香（半字）

上细末，糯糊丸绿豆大。每服七个，甚者十丸，夜卧令膈空温酒下。微出冷汗便瘥。

增味五痹汤 治风寒湿合而为痹，肌体麻痹不仁。

羌活 防己 片子姜黄 白术 海桐皮 当归 白芍药（各一两） 甘草（炒，七钱半）

上锉。每服三钱，姜十浓片，煎服。病在上，食后；病在下，食前。

瓜蒂散 吐法上瓜蒂末一钱，熟水调下。若风癫证，须以瓜蒂散吐痰。

稀涎散 治风涎潮塞，上膈气闭不通。

猪牙皂角（四条，肥实不蛀者，去黑皮） 光明晋矾（一两）

上细末。轻者半钱，重者三字，熟水调下。但少吐之，弱者不可吐，吐用养正丹三十丸研细，楠木香煎汤调下，仍与南星、附子豁痰归经，鸡心槟榔亦能疏风顺气。

鹤膝风挛方 真紫金皮，老酒煎，候温常服。

急风方 朱砂（一字） 轻粉（一点） 巴豆（去油如霜，些儿） 全蝎（一枚）
蝉壳（两枚，去土）

上末之，研和。大人尽剂，用薄荷泡汤调下，小儿分半，用乳汁调下。或吐痰，或泄毒物，皆效。

乌龙丹 治诸风瘫痪，口眼斜，语言謇涩。

真川乌（生，去皮脐） 好五灵脂（各二两）

上末，入脑麝半钱同研，滴水丸小弹大，阴干。每一丸，先姜汁研开，次好酒调下，空心食前，日两服，似铁弹丸。

庐江刘宝治 良方归荆汤 治风昏迷，吐沫抽掣，背脊强直，产后中通用。

当归 荆芥穗上等分，末之。每二钱，水一盞，酒少许，煎七分灌下。如牙紧，用铜匙斡，以鸡羽沾药入口，或用童尿调下，或以芎代当归亦妙。

又方 黑豆（炒焦，好酒淋之，取清汁）

上每酒一盞，独活锉三钱，煎七分，温服。又连续进剂，以瘥为度。

太阳风证候太阳风证候，始则发热、腹痛、喘息、涎浮，次则牙紧、头摇、十指微动、渐加项背强直，转则不仁。甚者昏困、失音、目睛直视、滑泄不禁、身腰反张。如此则十不救一。新产血虚，汗出伤风，亦作证。凡产后发热，若舌謇唇急，手指微动，便急作风疗之。荆归汤、独活酒。（方见在湿门。）

人为邪气所干，则发而为病，若气、若血、若痰、若水、若风、若寒、若暑、若湿，脏腑、表里、冷热、虚实，各有受病之处，用药之法，必究其原，而后可以起病，否则，前贤所谓猎不知兔，广络原野，冀一人获之，术亦疏耳，是可以人试技乎哉！

诸风

附：诸贤论

《病机机要》曰：治风须分在脏、在腑、在经之异。云风本为热，热胜则风动，宜以静胜其燥，是养血也。治须少汗，亦宜少下。多汗则虚其卫，多下则损其营，宜治在经，虽有汗、下之戒，而有中脏、中腑之分。中腑者，多着四肢，有表证而脉浮，恶风，拘急不仁。

中脏者，多滞九窍，唇缓失音，耳聋，鼻塞，目瞽，大便结闭。中腑者宜汗之，中脏者宜下之，表里已和宜治之在经，当以大药养之。

《发明》云：中血脉则口眼斜，中腑则肢节废，中脏则性命危，治各不同。中血脉，外有六经之形证，则从小续命加减；中腑，内有便溺之阻隔，宜三化汤等通利之；外无六经之形证，内无便溺之阻隔，宜养血通气，大秦芩汤、羌活愈风汤主之。

刘宗浓曰：按此分在表、在里、在经之三证，立汗、下、调养之三法，可谓开后世之盲聋。但所用诸方，学人宜详审之。

河间曰：风病多因热甚，俗云风者，言末而忘其本也。所以中风有瘫痪者，非谓肝木之风实，甚而猝中之也，亦非外中于风，良由将息失宜而心火暴甚，肾水虚衰，不能制之，则阴虚阳实，而热气怫郁，心神昏冒，筋骨不用而猝倒无知也。多因喜、怒、悲、忧、恐五志过极，而猝中者，皆为热甚故也。若微，则但僵仆，气血流通，筋脉不挛。缓者，发过如故，或热气大盛，郁滞不通，阴气暴绝，阳气后竭而死。

痰涎者，由热甚则水化制火而生。

偏枯者，由经络一侧得通，痞者痹而瘫痪也。

口筋噤急者，由风热太甚，以胜水湿。又津液滞于胸膈，以为痰涎，则筋太燥，然燥金主于收敛，劲切故也。或筋反缓者，乃燥之甚，血液衰少也。诸筋挛易愈，诸筋痿难复，以见燥之微甚也。

丹溪云：案《内经》以下，皆谓外中风邪，然地有南北之殊，不可一概而论。往刘守真作将息失宜，水不能制火，极是。由今而言之，西北二方，亦有真为风所中者，但极少尔。

东南之人，多是湿土生痰，痰生热，热生风也。邪之所凑，其气必虚，风之伤人在肺脏为多。

许学士谓：气中者，亦有七情所伤。脉微而数，或浮而紧、缓而迟必也。脉迟浮可治，大数而极者死。若果外中者，则东垣所谓中血脉、中腑、中脏之理。其于四肢不举，亦有与痿相类者，当细分之。《局方》风、痿同治，大谬，《发挥》甚详。子和用三法，如的系邪气猝中、痰盛实热者可用，否则不可。

河间曰：中风之人，不宜用龙、麝、犀朱，譬之提铃巡于街，使盗者伏而不出，益使邪入于骨髓，如油入而莫能出也，此之类焉。若痰潮不省，昏愦不知事，宜用药下其痰涎。故风者，乃百病之长，虽审经意，故莫不有疑者也。吁！医之不明运气造化地理病机之微，而欲行通变之法者，难矣哉！

诸风

附诸方

防风通圣散（《宣明方》）论曰：风、寒、热，诸疾之始生也。人之脏腑，皆风之起。谓火热，阳之本也。谓曲直动摇，风之用也。眩晕呕吐，谓风热之甚也。夫风热拂郁，风火生于热，以热为本，而风为标。凡言风者，即风热病也。气壅滞，筋脉拘倦，肢体焦痿，头目昏眩，腰脊强痛，耳鸣鼻塞，口苦舌干，咽嗑不利，胸膈痞闷，咳呕喘满，涕唾稠粘，肠胃燥热结，便溺淋闭，或夜卧寝汗，切牙睡语，筋惕惊悸，或肠胃怫郁结，水液不能浸润于周身，而但为小便多出者，或湿热内郁而时有汗泄者，或因亡液而成燥淋闭者，或因肠胃燥郁，水液不能宣行于外，反以停湿而泄，或燥湿往来而时结时泄，或表之阳和，正气（卫气是也。）

与邪热相合并，入于里，阳极似阴而战、烦渴者，（表气寒故战，里热甚则渴。）或疟气久不已者，（经言邪热与卫气并入于里则寒战也，并出之于表则发热，并则病作，离则病已。）或风热走注，疼痛麻痹者，或肾水真阴衰虚，心火邪热暴甚而

僵仆，或卒中久不语，或一切暴暗而不语，语不出声，或暗风痫者，或洗头风，或破伤风，或中风诸潮搐，并小儿诸疳积热，或惊风积热，伤寒疫疔不能辨者，或热甚怫结而反出不快者，或热极黑陷将死，或大人、小儿风热疮疥及久不愈者，或头生屑，遍身黑黧紫白斑驳，或面鼻生紫赤风刺、瘾疹，俗呼为肺风者，或成风疔，世传为大风疾者，或肠风痔漏，并解酒过热毒，兼解利诸邪所伤，及调理伤寒未发汗，头项、身体疼痛者，并两感诸证。兼治产后血液损虚，以致阴气衰残，阳气郁甚，为诸热证，腹满涩痛，烦渴，喘闷，谵妄惊狂，或热极生风而热燥郁，舌强口噤，筋惕肉，一切风热燥证，郁而恶物不下，腹满撮痛而昏者，（恶物过多而不吐者，不宜服之。）

兼消除大小疮及恶毒。兼治堕马打扑，伤损疼痛，或因热结，大小便涩滞不通，或腹急痛，腹满喘闷者，并皆治之。

防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷叶 麻黄 连翘

芒硝（朴硝制过者是。以上各半两）石膏 黄芩 桔梗（各一两）滑石（三两）

甘草（二两）荆芥 白术 梔子（各二钱五分）

上为末。每服三钱，水一大盏，生姜三片，煎至六分，温服。涎嗽，加半夏五钱，姜制，此加减防风通圣散 顶防风疾，常服取效。

防风 川芎 当归 芍药 薄荷 麻黄 连翘（各半两）黄芩 桔梗（各一两）甘草（二两）荆芥 白术（各二钱半）乌药 羌活 天麻 僵蚕（等分）

体弱气虚者磨木香。痰涎壅盛者，加南星、半夏、枳实。

搜风顺气丸（《圣惠方》）治肠胃积热，以致膈间痞闷，大便结燥，小便赤涩。肠风痔痛，腰膝酸疼，肢节顽麻，手足瘫痪，行步艰辛，语言謇涩。三十六般风及七十二般气，无不治之。此药宣通气血，清热润燥，通利大小便，则诸病自愈。

车前子（一两半）白槟榔 大麻子（微炒，去壳，另研）牛膝（酒浸宿）干山药（各二两）枳壳（去穰，麸炒）防风（去芦）独活（各一两）郁李仁（汤泡，去皮研）大黄（五钱，半生半熟）

上为细末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服二十丸，茶、酒、米饮任下，早晨、临卧各一服。久觉大肠微动，以羊肚肺羹补之。此药膏粱之家，肥甘大过，以致大便结燥，尤宜服之。

老人大苏合香丸 疗传尸骨蒸，

肺痿，疰忤鬼气，猝心痛，霍乱吐利，时气鬼魅瘴疟，赤白暴痢，淤血月闭，

癰疔肿，惊痫及小儿吐乳，大人狐狸等病。

小儿用大绀绢袋盛，当心带之，一切邪鬼不敢近。

凡人痰气及中风痰涎壅上，喉中有声不能下者，青州白丸子同丸，生姜自然汁化下，立效。

产妇中风，小儿惊风，牙关紧硬不开及不省者，擦牙即开，然后用风药治之。

小儿吐泻、惊疳，先用火焙此药，然后用生姜白自然汁化开，白汤调灌。

脚气冲心，用蓖麻子去壳槌碎，和丸敷，则脚心疼痛，立止。

心腹绞痛，中满呕吐，姜汤化服。

大人小儿伤风咳嗽，姜、葱汁，白汤调下。

中风狂乱，如见鬼神，白汤调服。（方见咳嗽门。）

白丸子（《和剂方》）治男、妇风痰壅盛，手足瘫痪，呕吐涎沫，及小儿惊风，并皆治之。（方见痰类。）

大秦艽汤（《拔粹》方）治中风，外无六经之形证，内无便溺之阻隔。知为血弱不能养于筋，故手足不能运动，舌强不能言。宜养血而筋自营。

秦艽 石膏（各三两） 甘草 川芎 当归 羌活 独活 防风（去芦） 黄芩 白芍药 吴白芷 白术 生地黄 熟地黄 白茯苓（各二两） 细辛（五钱）

上咀。每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。如天阴雨，加生姜七片。如心下痞，加枳实一钱，煎服。

羌活愈风汤（《拔粹》方）治肝肾虚，筋骨弱，语言难，精神昏愦，及治风湿内弱，风热体重，或瘦而一枝偏枯，或肥而半身不遂。心乱则百病生，静则万病息，此药能安心养神，调阴阳，无偏胜。

羌活 甘草（炙） 防风（去芦） 黄（去芦） 人参（去芦） 蔓荆子 川芎 细辛（去芦） 枳壳（去穰麸炒） 地骨皮 麻黄（去根） 知母（去皮） 甘菊 薄荷（去枝） 枸杞 当归（去芦） 独活 白芷 杜仲（炒断丝） 秦艽（去芦） 柴胡（去苗） 半夏（汤洗，姜制） 浓朴（姜制） 防己 熟地黄 前胡（各二两）

芍药（去皮）黄芩（去腐）白茯苓（去皮。各三两）石膏上锉。每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，温服。如遇天阴，加生姜三片煎，空心一服，临卧再煎渣服。常服之药，不可失四时之辅。如望春大寒之后，加半夏、柴胡、人参各二两；望夏谷雨之后，加石膏、黄芩、知母各二两；季夏之月，加防己、白术、茯苓各二两；望秋大暑之后，加浓朴、藿香各二两，桂一两，望冬霜降之后，加附子、官桂各一两，当归二两。

大乌药顺气散 治诸风气，手足瘫痪。

归芍地黄芎，乌药陈皮龙，香附缩砂枳，芩半与防风，苏桔并甘草，乳没沉香停，姜枣均煎服，诸风气立通。

当归 芍药 生地黄 川芎 乌药 陈皮 地龙 香附子 砂仁 枳壳 黄芩 半夏 防风 紫苏 桔梗 甘草（各半两） 乳香 没药 沉香（各二钱五分。此三味为末，煎熟药加内服。）

上用姜、枣同煎。

匀气散（《瑞竹方》）治腰腿疼痛，手足挛拳。及治中风不语，口眼斜，半身不遂等证。前代曾服有效。

白术（二两，煨）天台乌药（一两）天麻（半两）沉香 青皮（去穰）白芷 人参（去芦）甘草 紫苏 木瓜（各二钱半）

上咀，作十服。每服水一盏，生姜三片，煎至半盏，去渣，温服。

换骨丹《宣明方》治瘫痪中风，口眼斜，半身不遂，并一切风痫、暗风，并宜服之。

我有换骨丹，传之极幽秘，疏开病者心，扶起衰翁臂，气壮即延年，神清自不睡，南山张仙翁，三百八十岁，槐皮芎术芷，仙人防首蔓，十伴各停匀，苦味香减半，龙麝即少许，朱砂作衣缠，麻黄煎膏丸，大小如指弹。修合在深房，勿令阴人见，夜卧服一粒，遍身汗津满，万病自消除，神仙为侣伴。

麻黄（煎膏）仙术 槐角子（取子）桑白皮 川芎 香白术 威灵仙 人参 防风 何首乌 蔓荆子（各一两）苦参 五味子 广木香（各半两）麝香 龙脑（少许，研）朱砂（研，为衣，不拘多少）

上为末，桑白单捣细，秤以麻黄膏和就，杵一万五千下，每两分作十丸。每服一丸，以硬物击碎，温酒半盏浸，以物盖，不可透气，食后临卧一呷咽之。衣盖覆，当

汗自出即瘥。

（和胃汤调补。）及避风寒，茶下半丸，盖出汗。入膏时如稠，再入水少许煎动，入药唯少为妙，其麻黄膏不可多。其麻黄膏炼法见后。

秘传祛风散羌活 独活 山梔 半夏 苍术 苍耳子 甘草 茯苓 陈皮 当归 生地黄 防风 荆芥 汉防己 白芍药 牙皂 威灵仙（各等分）

上咀。每服水二盏，姜三片，煎至一盏，不拘时服。加減于后。

御风丹（《圣惠方》）治一切中风，半身不遂，神昏语謇，口眼斜。妇人头风、血风，暗风倒仆，呕哕涎痰，手足麻痹。

川芎 白芍药 桔梗 细辛 白僵蚕 川羌活 天南星（姜制。各半两） 麻黄（去根、节） 防风（去芦） 白芷（各一两半） 干生姜 甘草（炒。各七钱半） 朱砂（二钱半，为衣）上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，熟酒化下，食前，日三服。神昏有涎者，加朱砂二钱半。

续命煮散《大全良方》治风气留滞，心中昏愤，四肢无力，口眼动，或时搐搦，亡失津液，渴欲饮水。此药能扶营卫，去虚风。中风自汗及产后中风自汗，尤宜服之。

防风 独活 当归 人参 细辛 葛根 芍药 川芎 甘草 熟地黄 远志（去心） 荆芥（各五钱） 官桂（七钱半） 半夏（五钱） 汗多不止加牡蛎粉上咀。每服一两，生姜三片，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。

独活汤（《大全良方》）治虚风昏愤，不自知觉，手足蜷，坐卧不宁，或发寒热。若血虚，不能服发汗药，及中风自汗，尤宜服。

川独活 羌活 人参（去芦） 防风 当归 细辛 茯神（去木） 半夏 桂心 白薇 远志 菖蒲（去毛） 川芎 甘草（各五钱）

上咀。每服一两，水一盏，生姜五片，煎至八分，去滓，食后温服。

川芎石膏汤（《宣明方》）治风热上攻，头目昏眩痛闷，风痰喘嗽，鼻塞口疮，烦渴淋闷，眼生翳膜。此药清神爽志，宣通气血，治中风偏枯，解中外诸邪，调理诸病劳复、传染。

川芎 芍药 当归 山梔子 黄芩 大黄 菊花 荆芥穗 人参 白术（各半两） 滑石（四两）

寒水石 桔梗（各二两） 甘草（三两） 砂仁（二钱半） 石膏 防风
连翘 薄荷叶（各一两）

上为末。每服三钱，水一盞，煎至六分，去滓，食后服。水调亦得。忌姜醋发热物。

保命丹（《千金方》） 治诸风痰，不能语言，心忪健忘，恍惚去来，头目晕眩，胸中烦郁，痰涎壅塞，抑气攻心，精神昏愤。治心气不足，神志不定，惊恐怕怖，悲忧惨蹙，虚烦少睡，喜怒不时，或发狂癫，神情昏乱，及小儿惊痫，惊风抽搐不定，及大人暗风，并羊癫、猪癫发叫。

朱砂（一两） 珍珠（二钱） 南星（一两） 麻黄（去根、节） 白附子（炮）
雄黄 龙脑（各半两） 琥珀（三钱） 僵蚕（炒） 犀角（镑） 麦门冬（去心） 枳壳
地骨皮 神曲 茯神 远志（去心） 人参 柴胡（各一两） 金箔（一薄片）
牛黄（三钱）

天麻（半两） 脑子（少许） 麝香（少许） 胆矾（半两） 牙硝（四钱） 毫车
天竺黄 防风 甘草 桔梗 白术 升麻（各一两） 蝉蜕（半两） 黄芩（二两）
荆芥（二两）

上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下，不拘时候。忌猪、羊、虾、核桃动风引痰之物，及猪、羊血。更加川乌炮去皮脐、姜制半夏、白芷、川芎各一两，猪牙皂一两，和前药丸服尤妙。

神效活络丹 治风湿诸痹，肩臂、腰膝、筋骨疼痛，口眼斜，半身不遂，行步艰辛，筋脉拘挛。能清心、明目、宽膈，宜通气血。年逾四十，预服十数丸，至不生风病。白花蛇（酒浸，焙干，二两） 乌梢蛇（酒浸，焙干，半两） 麻黄（二两，去节）
细辛（去土，一两） 全蝎（一两半，去毒） 两头尖（二两，酒浸）
赤芍药（一两） 贯芎（二两） 防风（二两半） 葛根（一两半）
没药（一两，另研） 血竭（七钱半，另研） 朱砂（一两，另研） 乌犀骨（半两）
地龙（半两，去土） 甘草（二两，去皮，炙） 丁香（一两，去枝）
白僵蚕（一两，炒） 乳香（一两，研） 麝香（半两，另研）
片脑（一钱半，另研） 官桂（二两，去粗皮） 草豆蔻（二两） 川羌活（二两）
虎胫骨（酥炙，一两） 玄参（一两） 牛黄（二钱半，另研） 天麻（二两）
威灵仙（一两半，酒浸） 藿香（二两，去土） 天竺黄（一两）
败龟板（一两，炙） 人参（一两） 何首乌（二两）

白芷（二两） 乌药（一两） 安息香（一两） 青皮（一两）
黑附子（一两，去皮，炮） 香附（一两） 白豆蔻 骨碎补（各一两）

黄连（二两）茯苓（一两）黄芩（二两）白术（一两）熟地黄（二两）
松香脂（半两）大黄（二两）当归（一两半）木香（二两）沉香（二两）
金箔（为衣）

上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，温酒、茶清漱下，随证上下，
食前、后搐鼻通天散治猝、暗中风，倒地，牙关紧急，人事昏沉。

川芎 细辛 藜芦 白芷 防风 薄荷（各一钱）猪牙皂角（刮去皮，三个）

上为细末，用芦筒纳药，每用少许。吹入鼻中。

麻黄膏（《宣明方》）治中风不省人事，猝然倒地。

上须旺日乙卯者，采麻黄一秤，拣去根一寸长，取东流水三石三斗，以无油腻铛量
大小盛五七斗者，可先煮五沸，掠去滓，逐旋添水，尽至三五斗以来，漉去麻黄，
淘在盆中，澄定良久，用细罗子滤去滓。取清者铛内再熬至一斗，再澄再滤。取汁
再熬至升半以来为度。

只是勤搅，勿令着底，恐焦了。熬时忌鸡犬、阴人。澄时须盖覆，不得飞入尘土。
其药放一二年不妨。如膏稠，用水解，熬再匀。凡中风猝倒，用此膏加入汤药内服
，或用此膏丸药。

三化汤（《拔粹》方）治中风外有六经之形证，先以加减续命汤随证治之，内有便
溺之阻隔，复以此导之。

浓朴（姜制） 大黄 枳实 羌活（等分）

上咀。每服三两，水三升，煎至一升半，终日服之，以微利则已。如内邪已除，外
邪已尽，当从愈风汤以行中道，久服大风悉去。纵有微邪，只从愈风东加减治之。
然治病之法，不可失于通塞，或一气之微汗，或一句之通利，如此为常治之法也。
久则清浊自分，营卫自和矣。

诸风

附：预防中风出《干坤生意》

夫圣人治未病之病，知未来之疾，此其良也。其中风者，必有先兆之证：觉大拇指
及次指麻木不仁，或手足少力，或肌肉微掣者，此先兆也，三年内必有大风之至。
经云：急则治其标，缓则治其本。宜调其营卫，先服八风散、愈风汤、天麻丸各一

料为效，宜常服加减防风通圣散预防其病，则风疾不作而获其安矣。

愈风汤 初觉风动，服此药不致倒仆，此乃治未病之圣药也。

又治中风症，内邪已除，外邪已尽，当服此药以行导诸经，久服大风悉去，纵有微邪，只从此药加减治之。然治病之法，不可失于通塞，或一气之微汗，或一句之通利，如此乃常服之法也。久则清浊自分，营卫自和矣。

羌活 甘草 防风 当归 蔓荆子 川芎 细辛 黄 枳壳 人参 麻黄 香白芷 甘菊花 薄荷 枸杞 柴胡 知母 地骨皮 独活 杜仲 秦艽 半夏 前胡 浓朴 熟地黄 防己（各二两） 茯苓 黄芩 芍药（各三两） 石膏 苍术 生地黄（各四两） 肉桂（一两）

上锉。每服一两，水二钟，生姜三片煎，空心服，临卧煎滓服。空心一服，吞下二丹丸，谓之重剂；临卧一服，吞下四白丹，谓之轻剂。其立法是动以安神，静以清肺。

假令一气之微，用愈风汤三两，加麻黄一两，匀作四服，加生姜，空心服，以粥投之，得微汗则往。如一句之通利，用愈风汤三两，加大黄一两，亦匀作四服，如前服，临卧服，得利为度。此药常服之，不可失四时之辅。

如望春大寒之后，本方加半夏、人参、柴胡各二两，通前四两，谓迎而夺少阳之气也。

如望夏谷雨之后，本方加石膏、黄芩、知母各二两，通四两，谓迎而夺阳明之气也。

季夏之月，本方中加防己、白术、茯苓各二两，通前四两，谓胜脾土之湿也。

望秋大暑之后，本方中加浓朴二两、藿香二两、桂一两，通前四两，谓迎而夺大阴之气也。

望冬霜降之后，本方中加附子、官桂各一两；当归二两，通前四两。谓胜少阴之气也。

如得春气候，减冬所加，四时类此。此虽立四时加减，更宜临病之际，审察虚实寒热，土地之宜，邪气灵少。此药具七情、六欲、四气，无使五脏偏胜，及不动于营卫。如风秘，服之永不结滞。此药与天麻丸相为表里，治未病之圣药也。若已病者，更宜常服。无问男女老幼，惊痫搐搦，急慢惊风，四时伤寒等病，服之神效。

八风散（《和剂方》）治风气上攻，头目昏眩，肢体拘急，皮肤瘙痒，瘾疹成疮。及治寒热不调，鼻塞声重。

藿香（去土，半斤）白芷 前胡（去芦。各一斤）黄（去芦）甘草（）
人参（去芦。各上为末。每服二钱，水一钟，入薄荷少许，煎汤调下，食后服之。

天麻丸 治风因热而生，热胜则动。宜以静胜其躁，是养血也。

天麻 牛膝（二味用酒同浸三日，焙干）玄参 萆（各六两，另研
杜仲炒断丝，七两）附子（炮，一两）羌活（十四两）川归（十两）生
（十六两）

一方有独活（五两）肾间风上为末，蜜为丸，如梧桐大。每服五七十丸，空心温酒、白汤下。予按：用药治病之法，寒因热用，热因寒用，正治也。今中风瘫痪之证，本风火阳邪，而用乌附等热药治之，何哉？盖中风瘫痪，乃湿痰、死血结滞于脏腑、经络之间，非乌附等热药，能开散流通之乎？此非正治，乃从治也。书云：从少从多，各观其事。则从治之药，只可为引经而已。丹溪云：肥白人多湿，少用乌附行经是也。此方既用附子，又用侧子、官桂助之，其理安在哉？本欲削去，姑存，以待肥白多湿之人，减而用之，中病则已，不可过。肥白多湿之人，不可用也。

灸法风池、百会、曲池、合谷、肩、风市、绝骨、环跳、三里等穴，皆可灸之。

附：胃风

胃风方论

丹溪云：此因初饮食讫，乘风凉而致。其证：胀满，食饮不下，形瘦腹大，恶风，头多汗，膈塞不通。胃风汤正始此。然亦看挟证加减。脉右关弦而缓，带浮。

胃风汤（《拔粹》方）治虚风证，能食，麻木，牙关急搐，目内蠕。胃风面肿。

白芷（一钱二分）葛根 苍术 当归身（各一钱）升麻（二钱）甘草（炙，一钱半）
柴胡 本 羌活 黄柏 草豆蔻（各三分）麻黄（五分，不去节）蔓荆子（一分）上
咀。水二盏，姜三片，枣一枚，煎至一盏，去滓，温服。

胃风汤

治风冷入于肠胃，泄下鲜血。或肠胃湿毒，下如豆汁或淤血。（方见泻痢门。）

附：伤风

伤风方论

《内经》曰：风为百病之长。又曰：风胜则动。又曰：贼虚邪者，阳受之。又曰：伤于风者，上先受之。

丹溪云：伤风属肺者多，宜辛温或辛凉之剂散之，如桂枝汤、参苏饮、消风散、羌活散，究证施治。

附：伤风

附诸方

桂枝汤

治太阳经，伤风头疼、身痛，或翕翕发热，或洒洒恶风，自汗（无汗者不可服。）

桂枝 芍药（各三两） 甘草（炙，一两）

上咀。每服三钱，水一盞，姜三片，枣二枚，煎七分，去滓，温服，不拘时服。惟春初依此方。自春末夏至以前，加黄芩半两；夏至后，加知母半两、石膏二两，或升麻半两。

若病患素虚寒，不用加减。

神术散（《和剂方》）治四时瘟疫，头痛发热，及伤风鼻塞声重。

苍术（米泔浸，五两） 本（去土） 香白芷 细辛（去叶土） 羌活（去芦）
川芎 甘草（炙。各二两）

上为细末。每服三钱，水一盞，姜三片，葱白三寸，煎七分，温服，不拘时。如伤风鼻塞，用葱茶调下二钱。

定风饼子（《简易方》）治风客阳经，邪伤腠理，背脊强直，言语謇涩，体热恶寒，痰厥头痛，肉筋惕，手颤，鼻渊。及饮酒过多，呕吐涎沫，头目晕眩。常服消风去邪。

川乌 南星 川芎 干姜 甘草 半夏天麻 白茯苓（各等分，生用）加白附子上为末，姜汁丸，如龙眼大，作饼子，生朱砂为衣。每服一饼，细嚼，热生姜汤下，不拘时服
金沸草散（《和剂方》）治肺经受风，头目昏痛，咳嗽声重，涕唾稠粘，及治时行寒疫，壮热恶风。

旋复花（去梗，二两） 荆芥穗（四两） 麻黄（去节） 前胡（去芦。各三两）
甘草（炙） 赤芍药 半夏（汤洗七次，姜汁浸。各一两）

上咀。每服五钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎八分，温服。

参苏饮（《和剂方》）治感冒风邪，发热头疼，咳嗽声重，涕唾稠粘。此药大解肌热，宽中快膈。或欲成痼瘵，潮热往来，并能治之。

木香 紫苏叶 干葛（洗） 半夏（汤泡七次，姜制） 前胡（去苗） 人参（去芦）
茯苓（去皮。各七钱半） 枳壳（去穰，麸炒） 桔梗（去芦） 甘草（炙）
陈皮（去白）。

各半两）

上咀。每服四钱，水一盞半，姜七片，枣一枚，煎六分，去滓，热服，不拘时。（《易简方》以气盛，不用木香。）

冲和散（《简易方》）治感冒风湿之气，头目不清，鼻塞声重，肢体倦怠，欠伸出泪。

苍术（米泔浸，炒，六两） 荆芥穗（二两） 甘草（一两一钱半）

上咀。每服五钱，水一盞，煎八分，去滓，热服，不拘时。

消风百解散（《和剂方》）治四时伤寒，头疼发热，恶寒，及风壅咳嗽，鼻塞声重。

荆芥 白芷 陈皮（去白） 麻黄（去节） 苍术（各四两） 甘草（炙，二两）

上咀。每服五钱，水一盞，姜三片，葱白三茎，煎七分，不拘时服。如咳嗽，再加乌梅煎。

川芎茶调散（《和剂方》）治诸风上攻，头目昏重，偏正头疼，鼻塞声重。

薄荷（去梗，不见火，八两） 川芎（四两） 羌活（二两） 甘草（二两）
细辛（去叶，一两）

上为末。每服二钱。食后，茶清调下。常服清头目。一方无细辛。

消风散（《和剂方》）治诸风上攻，头目昏眩，项背拘急，鼻嚏声重，耳作蝉鸣，及皮肤顽麻，瘙痒瘾疹，妇人血风，头痛肿痒，并皆治之。

荆芥穗 甘草（炒。各二两） 陈皮（去白，半两） 人参（去芦）
茯苓（去皮，用白者） 白僵蚕（炒） 防风（去芦） 芎 藭香叶（去梗）
蝉蜕（去土，炒，各一两）

浓朴（去皮，姜制，半两） 羌活（一两）

上为细末。每服二钱。感风头痛，鼻流清涕者，用荆芥汤、茶清调下。遍身疮癣，温酒下。

大辰砂丸（《御药院方》）清头目，化痰涎，及感冒风寒，声重，头目昏眩，项背拘急，皮肤瘙痒，并皆治之。

天麻（去苗，一两） 防风（去芦，二两） 细辛（去叶土，半两） 薄荷叶（半两）
川芎甘草（炙） 吴白芷 朱砂（各一两。为衣）

上以七味为细末，炼蜜丸，如弹子大，朱砂为衣。每服一丸，细嚼，食后，生姜汤下，茶清亦可。人参败毒散（《和剂方》）治伤寒头痛，壮热恶寒，及风痰咳嗽，鼻塞声重。如心经蕴热，口舌干燥者，加黄芩。

柴胡（去苗） 甘草（炙） 桔梗 人参（去芦） 芎 茯苓（去皮） 枳壳（去穰，麸炒）
前胡上咀。每服三钱，水一盞，姜三片，薄荷少许，同煎七分，去滓，温服。

羌活散（《和剂方》）治风气不调，头目昏眩，痰涎壅滞，遍身拘急，及风邪塞壅，头痛项强，鼻塞声重，肢节烦疼，天阴风雨，顿觉不安。

前胡（去芦） 羌活（去芦） 麻黄（去根、节） 白茯苓（去皮） 川芎 黄芩
甘草（炙） 蔓荆子（去白皮） 枳壳（去穰，麸炒） 细辛（去苗） 石膏（另研）
菊花（去梗） 防风（去芦。各上
咀。每服一两，姜四片，薄荷三叶，水二盞，煎至一盞，温服。

附：破伤风

破伤风方论

《病机》云：破伤风者，同伤寒证治，通于表里，分别阴阳。有在表，有在里，有在半表半里间曰：破伤风者从外至内，甚于内者则病也。因此，猝暴伤损，风袭之

间，传播经络，至使寒热更作，身体反强，口噤不开，甚者邪气入脏，则分汗下之治。诸疮不瘥，营卫虚，肌肉不生，疮眼不合者，风邪亦能外入于疮，为破伤风之候，故诸疮不瘥。吁！世皆言着灸为上，是为热疮，而不知火热客毒逐经，诸变不可胜数，微则发热，甚则生风而搐，或角弓反张，口噤目邪，皆因疮郁结于营卫，不得宣通而生。亦有破伤不灸而病此者，疮着白痂，疮口闭塞，气难通泄，故阳热亦为郁结，而热甚则生风也。故表脉浮而无力，太阳也；脉长而有力者，阳明也；脉浮而弦小者，少阳也。太阳宜汗，阳明宜下，少阳宜和。若明此三法，而治不中病者未之有也。

羌活防风汤（《拔粹》方）治破伤风，邪初传在表。

羌活 防风 川芎 本 当归 芍药 甘草（各一两） 地榆 细辛（各二两）

上咀。每服五七钱，水一盞半，同煎至七分，去渣，热服，不拘时候。量紧慢加减用之，热则加大黄二两；大便秘则加大黄一两，缓缓令过。

白术防风汤（《拔粹》方）若服前药之过，有自汗者，宜服此药。

白术 黄（各一两） 防风（二两）

上咀。每服五七钱，水一盞半，煎至一盞，去渣，温服，不拘时候。

脏腑和而有自汗，可用此药。

破伤风脏腑秘、小便赤、自汗不止者，因用热药汗出不休，故知无寒也，宜速下之。先用芎黄汤，三二服后，用大芎黄汤下之。

芎黄汤（《拔粹》方）

川芎（一两） 黄芩（六钱） 甘草（二钱）

上咀。每服五七钱，水一盞半，同煎至七分，去滓，温服，不拘时候。三服即止，再用下药。

大芎黄汤（《拔粹》方）

川芎 羌活 黄芩 大黄（各一两）

上咀。依前煎服。宜利为度。

羌活汤（《拔粹》方）治半在表半在里。

羌活（去芦）菊花（去梗）麻黄（去根、节）川芎白茯苓（去皮）防风（去芦）石膏（研）前胡（去芦）黄芩蔓荆子细辛（去叶）甘草（炙）枳壳（各一两）薄荷香白芷（各半上咀。每服一两，水二盏，生姜五片，煎至一盏，去滓，通口服，食后滓再煎服。

白术汤（《拔粹》方）治伤破风大汗不止，筋挛搐搦。

白术葛根芍药升麻黄芩（各五钱）甘草（炙，二钱半）

上咀。每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时。

江鲮丸（《拔粹》方）治破伤风惊而发搐，脏腑秘涩，知病在里，可用江鲮丸下之。

江鲮（锉，炒）野鸽粪（炒）白僵蚕（各五钱）雄黄（一两）蜈蚣（一对）天麻（一两）

上为末，作三分，二分用烧饭丸桐子大，朱砂为衣，一分巴豆霜二钱半，亦烧饭丸桐子大。每服朱衣丸三十丸，加巴豆霜丸一丸，第二服加二丸，加至利为度，再服朱砂丸，病愈止。

蜈蚣全蝎散 治破伤风搐搦，角弓反张。

蜈蚣（去毒，炒，一条）全蝎（一对，炒，去毒并头足）

上为细末。如发时用一字或二字擦牙缝内，或吹鼻中。

防风汤（《拔粹》方）治破伤风，同伤寒表证未传入里，宜急服此药。

防风羌活独活川芎（各等分）

上咀。每服五钱，水一钟半，煎至七分，去滓，温服。二三服后，宜调蜈蚣散，大效。

蜈蚣散（《拔粹》方）

蜈蚣（一对）江鲮（三钱）左盘龙（五钱，炒，烟尽用）

上为细末，用防风汤调下。如前药解表不已，觉转入里，当服左盘龙丸微利，看大便硬软，加巴豆霜服之。

左龙丸（《拔粹》）方左盘龙 白僵蚕 鳔（各五钱，炒） 雄黄（一钱）

上为细末，烧饼为丸，如桐子大。每服十五丸，温酒下。如里证不已，当于左龙丸一处半内入巴豆霜半钱，烧饼为丸如桐子大，每服一丸，同左龙丸一处合服，每服药中一丸，如此渐加服，至利为度。若利后更服后药。若搐不已，亦宜服后药，羌活汤也。

羌活汤（《拔粹》方）

羌活 独活 防风 地榆（各一两）

上咀。每服五钱，水一盞半，煎至一盞，去渣，温服。如有热加黄芩，有涎加半夏。

若病日久，气血渐虚，邪气入胃，宜养血为度。

养血当归地黄汤 当归 地黄 芍药 川芎 本 防风 白芷（各一两） 细辛（五钱）

上咀。依前煎服。

地榆防风散

治破伤中风，半在表半在里，头微汗，身无汗。不可发汗，宜表里治之。

地榆 防风 地丁香 马牙苋（各等分）

上为细末。每服三钱，温米饮调下。

秘传止血定痛生肌散 专治跌打损伤，牙咬刀伤出血，诸般肿毒出脓后，肌肉不生，痛不止者，并皆治之。

真龙骨（，三钱） 白芷（二钱五分） 黄丹（飞过，五钱） 软石膏（去火毒，一两） 血竭（二钱） 乳香（三钱） 没药（三钱） 樟脑（少许）

上为细末。磁罐掺患处，血止、痛定、肌生，累用应效如神。如若肿毒顽疮收口，先用此药掺疮口，再用白膏药贴之，肌生收口（方见肿毒门）。

秘传破伤风方初觉有风，急取热粪堆内蛭蟪虫一二个，用手捏住，待虫口中吐出水，就抹在破处，身穿稍浓衣裳，待少时疮口觉麻，两胁微汗，风出立效。如风紧，急速取此虫三五个，剪去尾，肚内黄水自出，涂疮口，再滴些少，入热酒饮之，汗出立效。

秘传独圣散 治破伤风五七日未愈，已至角弓反张，牙关紧急，服之立有神效。

蝉蜕（去头足、土，净，五钱）

上为末。用好酒一碗，煎滚服之，立苏为妙。

以上三方秘传，累用得效，故附于末。

如圣散（《圣惠方》）治破伤风，止血定痛。

苍术（六两） 川乌头（炮，去皮，四两） 防风 草乌头（炮，去皮）
细辛（各二两半） 两头尖（炮去皮，四两） 天麻 川芎 白芷（各两半）
蝎梢（微炒） 雄黄（各半两） 损骨加乳香（半两）

上为细末。每服一钱，酒调下，不拘时服。

蜈蚣散 治破伤风，搐搦，角弓反张。

蜈蚣（去毒，炒，一条） 全蝎（一对，炒，去毒）

上为细末。如发时用一字或二字擦牙缝内，或吹鼻中。

一方治破伤风欲死者川乌 南星 半夏（并生） 天麻（去芦，等分）

上为细末。每服一钱，豆淋酒调下，稍温服。次以酒三盏投之。

寒

中寒方论

寒者严凝杀厉之气也。人以肾为根本，惟肾则受寒，惟寒则伤肾。肾气一虚，寒邪交作，急痛拘挛，战掉强直，昏迷厥冷，口噤失音，此中寒也。无汗恶寒，头疼面惨，发热拘急，手足微寒，此伤寒也。霍乱转筋，洞泄下痢，干呕吐逆，积饮停痰，此寒邪入肠胃也，以至为咳嗽、为虚劳、为疝瘕、为脚气、为带漏、为遗精、为

症、为诸痛，寒亦主之。人惟肾气不充，疏于谨护，非特霜凝冰泫之谓寒，或者炎天暑月，当风取凉，卧地受冷，使寒邪之气自皮肤而达经络，自经络而入脏腑，如前数证，皆得以恣睢四出矣。温肾御寒，如干姜、附子、川乌、天雄辈，佐之以养正、灵砂，此固药笼中物，然寒伤营气，徒知温肾而不知温血，恐未必有十全之功，是则官桂、当归又温血之上药也。不然，古人何以致意于寒泣血云。

寒

中寒证治

不换金正气散 解散寒邪。

苍术（炒） 橘红 半夏曲 浓朴（制） 藿香叶（各一两） 甘草（炒，三分）

上锉散。每服三钱，姜五片，枣二枚，煎服。

养胃汤 治外感寒邪，内伤生冷。

苍术（炒） 浓朴（制） 半夏曲（各一两） 人参 茯苓 草果 藿香（各半两）
橘红（七钱半） 甘草（炒。三钱半）

上锉。每服三钱，加桂半钱，姜七片，乌梅半个，煎服。

姜桂散 温中散寒气 干姜 良姜（各半两） 辣桂 木香 半夏曲 甘草（炒。各二钱半）

上锉散。每服三钱，姜五片，枣二个，煎服。

寒

附诸方

生料五积散（《和剂方》）治感冒寒邪，头疼身痛，项强拘急，恶寒呕吐，或有腹痛。又治伤寒发热，头疼，恶风，无问内伤生冷，外感风寒，及寒湿客于经络，腰脚酸疼，及妇人经泄腹痛，并皆治之。苍术（米泔浸，去粗皮，二十四两）
桔梗（去芦，十二两） 陈皮（去白） 麻黄（去根、节）

枳壳（去穰，麸炒。各六两） 浓朴 干姜（各四两） 白芷 川芎 甘草（炙）
茯苓（去皮） 肉桂 芍药 当归（各三两） 半夏（汤泡七次，二两）

上咀。每服四钱，水一盞半，生姜三片，葱白三根，煎七分，热服。冒寒用煨姜，挟气加按：此药气味辛温，发表温中，开郁行气有殊功，去寒湿之圣药也。夫寒湿属阴，热燥属阳，人之为病，不过二者而已矣。善用药者，以苦寒而泻其阳，以辛温而散其阴，病之不愈者，未之有也。予尝以防风通圣散泻热燥之药也，生料五积散为散寒湿之药也，不识明哲以为何如？理中汤（《和剂方》）治脏腑中寒，口噤失音，四肢强直。兼治胃脘停痰，冷气刺痛。

人参 干姜（炮） 甘草（炙） 白术（各等分）

上咀。每服四钱，水一盞，煎服。

四逆汤（《和剂方》）治伤寒自利，脉微欲绝，手足厥冷。（四逆名者，四肢逆冷也。）

甘草（炙，二两） 干姜（一两半） 附子（去皮，半两）

上咀。每服五钱，水一盞，煎七分，温服，不拘时。

白术散（《活人》方）治阴毒伤寒，干烦躁，四肢逆冷。

川乌（炮，去皮脐） 桔梗（去芦）

干姜（炮，半两）

上为末。每服二钱，水一盞，煎六分，热服，不拘时。

补中益气汤（方见内伤）

附子理中汤 治中寒、中湿，呕逆虚弱。

人参 白术 干姜（炒） 熟附子（各一两） 甘草（炒，半两）

上咀。每三钱，姜五片，食前煎服。少血加当归。

沉附汤 治虚寒无阳，胃弱干呕。

熟附子 干姜（炮。各半两） 沉香 白术（各一分） 甘草（炒，一钱半）

上锉。每三钱，姜五片煎，食前服。

姜附汤 治中寒，厥冷强直，失音口噤，吐沫，或阴盛发躁。

熟附子 干姜（炮。等分。）

上咀 每服三钱，水盏半，煎半，空心，温和服。亦治洞泄，呕吐。

附子散 伤寒阴证，唇青面黑，身背强痛，四肢厥冷，及诸虚沉寒。

熟附子（三分） 官桂 当归 白术（各二分） 干姜（炮） 半夏曲（各一分）

上锉。每服三钱，姜五片，枣二枚，食前煎服。

五丹丸 治沉寒痼冷。（方见血证类）

应梦人参散 治伤寒身热头疼。亦主痰嗽。

人参 白术 白芷 干葛 北梗 青皮（各三分） 甘草（炒，一两） 干姜（一钱半）

上为末。每服二钱，姜枣煎服。

败毒散 伤寒热证通用。

人参 赤茯苓 川芎 北梗 羌活 独活 前胡 柴胡 枳壳（制） 甘草（炒。等分）

上锉散。每服三钱，姜五片，煎服。人参羌活散用药亦同。

伤寒证治格法《活人总括》备述其详。

暑

中暑论

人有常言，伤暑做出百般病，其果浓诬哉？盖暑之入人，伏于三焦、肠胃之间，至有兼旬累月而不可测识者，如呕吐、如中满、如泄泻、如下痢、如焦渴、如发疟、如腹痛、如下血，以至诸热等证。苟因暑得之，其根未除，虽百药遍尝，难施其巧。夫人心包络与胃口相应，胃气稍虚，或因饥冒暑，故暑气自口鼻而入，凝之于牙颊，达之于心胞络，如附应声。

遇暑以还，急漱口而勿咽可也，若觉暑毒逼塞咽喉，尤当灌涤而吐之。伤暑脉虚，

面垢，自汗，身热背寒，烦闷大渴，倦怠少气，毛耸恶寒，或头疼，或霍乱，或四肢厥冷，但身体无痛。经云：热则诸毛孔开，故洒然恶寒。体认不精，妄以伤暑为伤寒，误人不小。然而暑家何以脉虚？暑能消气，气消则血散，脉安得而不虚？其或六脉沉伏，冷汗自出，闷绝而昏不知人，此则中暑证候又加重耳。

治法大要，虽贵于驱暑，尤贵于和中，二者并行，则其间杂证不战而自屈。若汗、若下、若用药差冷，古人戒之。虽然，夏月伏阴在内，暑家气虚脉虚，或饮水过多，或冷药无度，伤动其中，呕吐不食，自利不渴，此则外热里寒，无惑乎伤暑伏热之说，非理中汤不可也。

又有冷药过度，胃寒停水，潮热而呕，或身热微烦，此则阳浮外而不内，非小半夏茯苓汤不可也。抑犹有戒焉，暑家脉虚，面黧，冷汗，洒然毛耸，手足微寒，苟不明辨其里热之证，误以刚剂投之，抱薪救焚，不发黄则发斑，甚者蓄血，闷乱而毙矣，吁！可畏哉。

暑

中暑证治

五物香薷汤 驱暑和中通用。

香薷（三两） 白扁豆（姜制） 浓朴（制） 白茯苓（各一两半） 甘草（炙，一两）

上锉。每服三钱，水煎，温服。

香薷缩脾饮 驱暑和中，除烦止渴。

缩砂仁（二两） 草果仁 乌梅肉 香薷 甘草（炒。各两半） 白扁豆（姜制）
白干葛（各一两）

上锉。每服三钱，姜五浓片，水煎，微温服。

香薷锉散 解暑毒，止霍乱。

香薷（二两） 浓朴（制，一两） 茯苓 陈皮 甘草（炙。各半两） 良姜（三钱）

上锉细。每服二钱半，盐一捻，水煎服。

五苓散 治伤暑烦渴，此引过多，小便赤涩，心下水气。（方见水饮门。）

小柴胡汤 治伤暑外热内渴。（方见血证类。）于内更加生姜为妙。

竹叶石膏汤 治伏暑内外热炽，烦躁大渴。

石膏（半斤） 半夏（汤洗七次，切，焙，一两二钱半）

麦门冬（去心，二两七钱半）

人参上粗末。每服二钱，姜五片，青竹叶七片，粳米百粒，水煎服。

六和汤 治暑证，身热，呕，不甚渴。

人参 半夏曲 杏仁（去皮，微炒） 甘草（炒） 缩砂仁（各一两） 茯苓 藿香 宣木瓜
扁豆（制。各二两） 浓朴（制，三两） 香薷（四两）

上锉。每服三钱，姜五片，煎服。内伤生冷通用。

二陈汤（见痰涎类） 治伤暑复感冷，及内伤生冷。

半夏（制） 橘红（各五两） 茯苓（三两） 甘草（炙，一两）

上咀。每服三钱，姜七片，小乌梅一枚，煎服。感冷更添生姜。

小半夏茯苓汤（方见水饮类）

消暑丸 治伤暑伏热生痰，以致头痛、中痞。

半夏（半斤，洗净，醋二升半，煮干，另碾） 茯苓 甘草（生。各四两）

上末之，用醋并姜汁调，半夏煮糊丸桐子大。每服七十丸，熟水下。暑药皆可下。

来复丹 均平阴阳。治中暑昏迷，霍乱吐泻。

透明硫黄 硝石（各一两，并为细末，入定磬内，以微微火慢炒，用柳篦不住手搅，
会阴阳气相入，再研极细） 元精石（一两，研细，水飞）

五灵脂（五台山者，水澄，去砂石，日干） 陈橘皮（去白）

青橘皮（去白。各二两）

上灵脂、二橘皮为细末，次入元精末及硫黄、硝石末，和毕，以好醋打糊丸豌豆大。
每服五十丸，空心米饮下。或五苓散下，或水研灌下亦得。

大黄龙丸 治中暑昏愦，眩晕。分利阴阳。

透明硫黄 硝石（各一两） 白矾（枯） 雄黄 滑石（各半两） 飞罗白面（四两）

上为细末，入面拌和，滴水丸桐子大。每服十五丸至二三十丸，新汲水下。昏塞者，水研灌下。如无硝石，以盆硝代。来复、黄龙大抵性温。道途中暑昏仆，即扶起，以手巾蘸热汤暖其脐腹，即渐苏醒。次以来复丹为末，井水调下。无中，则以大蒜细研，新水调与之，仍以蒜少许置鼻中。或谓中暑最忌得冷，来复、黄龙并蒜，以水调下者何？盖其药性温，因寒

暑

附诸方

香薷饮（《和剂方》）治伏暑引饮，口燥咽干，或吐，或泻，并皆治之。

一方加黄连四两，用姜汁同炒，令老黄色，名黄连香薷饮。

浓朴（去皮，姜汁炙熟，半斤） 白扁豆（微炒，半斤） 香薷（去土，一斤）

上咀。每服三钱，水一钟，入酒少许，煎七分，沉冷，不拘时服。热则作泻。香薷须陈者佳。

缩脾饮（《和剂方》）消暑气，除烦渴，止吐泻霍乱。

缩砂仁（四两） 干葛（二两） 白扁豆（二两） 乌梅肉 草果（炒，去皮）
甘草（炙。各四两）

一方无干葛，有干姜上咀。每服四钱，水一大碗，煎七分，以水沉冷服。

加味五苓散（《济生方》）治伏暑、热二气，及冒湿泄泻注下，或烦，或小便不利。

赤茯苓（去皮） 泽泻 猪苓（去皮） 白术（各一两） 官桂（不见火）
车前子（各半两）

生脉汤 生津止渴。

人参 麦门冬 五味子上锉。水煎服。

人参白虎汤（徐同知方）治伏暑发渴，呕吐，身热，脉虚，自汗。

人参（一钱半） 知母（二钱） 石膏（半两） 甘草（炙，一钱）

上咀。入粳米一合，水二钟，煎至一钟，不拘时，热服。如伏暑，作寒热未解，宜和五苓散同煎服。伏热后，或冷水沐浴，或吃冷物，清气在脾不觉散，令日晡作寒惨，壮热，浑身洒淅，宜加桂煎服，出汗便解。

大顺散（《和剂方》）治胃暑伏热，引饮过多，脾胃受湿，水谷下分，霍乱呕吐，脏腑不调。

甘草（三斤） 干姜 杏仁（去皮尖，炒） 肉桂（去皮。各六两四钱）

上先将甘草用白砂蜜炒，及八分黄熟，次入干姜同炒，却入杏仁，候杏仁不作声为度。用筛筛净后，入肉桂一处捣罗为末。每服三钱，水一盏，煎至七分，温服。如烦躁，并华水调下，不拘时候。以沸汤点服亦可。

十味香薷饮（《百一选方》。）消暑气，和脾胃。

香薷（一两） 人参（去芦） 陈皮（去白） 白术 黄（去芦） 白扁豆（炒，去壳） 甘草（炙上为末。每服二钱，热汤、冷水任调下。

清暑益气汤（东垣方）治长夏湿热蒸人，人感之四肢困倦，精神减少，懒于动作，胸满气促，肢下疼痛，或气高而喘，身热而烦，心下膨闷，小便黄而数，大便溏而频，或痢，或渴，不思饮食，自汗，体虚。

黄 苍术（米泔制） 升麻（各一钱） 人参 白术 神曲 陈皮 泽泻（各五分） 甘草（炙） 酒柏 麦门冬 当归（各三分） 葛根（三分） 五味子（九粒） 青皮（二分半）

上咀，作一服，水二大钟，煎至一钟，去渣，大温服，食远。

益元散（即天水散，又名六一散）治中暑身热，小便不利。此药性凉，除胃脘积热，又淡能渗湿，故利小便而散湿热也。

滑石（六两，桂府者为效，非桂府则不为佳） 甘草（微炒，一两）

上为末。每服三钱，蜜少许，热汤、冷水任下。如欲发汗，以葱白、豆豉汤调下。

桂苓甘露散 治伏暑，引饮过度，肚腹膨胀，霍乱泻利。

白术 茯苓（去皮） 甘草（炙） 葛根 泽泻 石膏 寒水石（各一两） 官桂（半两）
人参（去芦） 藿香（各半两） 滑石（一两） 木香（二钱半）

上为细末。每服二钱，白汤下。新汲水、姜汤亦好。

暑

暑病治例

（出《明医杂着》）

王节斋曰：夏至日后，病热为暑。暑者，相火行令也。夏日人感之，自口齿而入，伤心包络之经。其脉虚，或浮大而散，或弦细芤迟。盖热伤气，则气消而脉虚弱。其为症：汗，烦则喘、渴，静则多言，身热而烦，心痛，大渴引饮，头疼，自汗，倦怠少气，或下血，发黄，生斑。甚者，火热致金不能平木，搖擗不省人事。治暑之法，清心利小便最好。暑伤气，宜补真气为要。又有恶寒，或四肢逆冷，甚者迷闷不省，而为霍乱、吐利、痰滞、呕逆、腹痛、泻利，此则非暑伤人，乃因暑而自致之病也。以其因暑而得，故亦谓之暑病，然治法不同也。

若行人或农夫，于日中劳役得之者，是动而得之，阳证也。其病必苦头痛，发燥热，恶热，扪之肌肤大热，必大渴引饮，汗大泄，无气以动，乃天热外伤元气也。宜清暑益气，用香薷暑热发渴，脉虚，用人参白虎汤或用竹叶石膏汤亦好。（俱见前。）

东垣清暑益气汤 治长夏湿热蒸人，人感之四肢困倦，精神少，胸满气促，肢节痛，或气高而喘，身热而烦，心下痞闷，小便黄而数，大便溏而频，或痢，或渴，不思饮食，自汗，体虚，此汤最好。（见前。）

若暑热之时，无病之人，或避暑热，纳凉于深堂大厦、凉台冷馆、大扇风车得之者，是静而得之，阴证也。其病必头痛，恶寒，身形拘急，肢节疼痛而烦心，肌肤大热，无汗。此为阴寒所遏，使周身阳气不得伸越。宜用辛温之剂，以解表散寒，用浓朴、紫苏、干葛、藿香、羌活、苍术之类。若外既受寒，内复伤冰水生冷瓜果之类，前药再加干姜、缩砂、神曲之类，此非治暑也，治因暑而致之病也。

若外不受寒，只是内伤冰水冷物，腹痛泄泻，或霍乱吐逆，宜缩脾饮（见前）或理中汤（见中若吐泻，脉沉微甚者，不可用凉药，可用大顺散（见前）加熟附子等分，或附子理中加炒芍夏月多食冷物，及过饮茶水，致伤脾胃，吐泻霍乱。故治暑药

多用温脾消食，治湿利小便之药，医者要识此意。

若既伤暑热，复伤生冷，外热内寒，宜先治其内，温中消食，次治其外，消暑补气，而以理脾为主，于前阴阳二条内相兼取用。东垣清暑益气汤已兼此意，其用黄、升麻、人参、白术、甘草、麦门冬、当归、五味、黄柏、葛根，是清暑补气也；苍术、陈皮、神曲、泽泻、青皮，是治内补脾也。

暑

附：暑风

治暑风猝倒法 凡人中暑，先着于心，一时昏迷，切不可与冷水饮并卧湿地。其法先以热汤灌或童便灌，及用布蘸热汤熨脐并气海，续续令暖气透彻脐腹，俟其苏省，然后进药。

若旅途中猝然晕倒，急扶在阴凉处，掬路中热灰土作窝于脐中，令人尿其内，即苏。却灌以人尿或搅地浆，饮之半碗，或车轮土五钱，冷水调，澄清服，皆可。

一方用大蒜三两瓣细嚼，温汤送下，禁冷水，即愈。

丹溪云：挟火、挟痰，用二陈东加黄连，实者可用吐法。

戴氏曰：暑风者，夏月猝倒，不省人事者是也。有因火者，有因痰者。火，君、相二火也；暑，天、地二火也。内外合而炎烁，所以猝倒也。痰者，人身之痰饮也。因暑气入而鼓激痰饮，塞碍心之窍道，则手足不知动蹶而猝倒也。此二者皆可吐。《内经》曰：火郁则发之。

暑

附：疰夏

疰夏属阴虚元气不足。夏初春末，头疼脚软，食少体热者是。

宜补中益气汤去柴胡、升麻，加炒柏、白芍药。挟痰者加南星、半夏、陈皮煎服。又或用生脉汤。

补中益气汤（方见内伤门。）

湿

中湿论

天气下降，地气上腾，二气熏蒸，此即湿也。岂必水流湿而后为湿哉？且风之撼动，人知其为风；寒之严凝，人知其为寒；暑之炎热，人知其为暑；惟湿之入人，行住坐卧，实熏染于冥冥之中，人居、戴、履，受湿最多，况夫湿能伤脾，脾土一亏，百病根源发轫于此矣。

滞而为喘嗽，渍而为呕吐，渗而为泄泻，溢而为浮肿。湿淤热则发黄，湿遍体则重着，湿入关节则一身尽痛，湿聚痰涎则昏不知人。至于为身热，为鼻塞，为直视，为郑声，为虚汗，为脚气，为腹中胀，脐下坚，为小便难，大便自利，皆其证也。湿家不可汗，汗之则发，热而者，毙。又不可下，下之则额汗，胸满微喘而啰，小便淋闭，难以有瘳。

治湿之法，通利小便为上，益脾顺气次之，半夏、茯苓、苍术、白术、官桂、干姜皆要药耳。

其若小便挟热不利，则赤茯苓、防己辈，自有奇功。大抵湿之为病，易至沉深，渐润之余，沦肌浹髓于斯时也，须以术、附、姜、桂作大剂与之药力相接，病当渐解，不可以旦暮而责效焉。要之，治湿莫若生附、苍术为快。

湿

中湿证治

加剂除湿汤 治气虚伤湿，身重腰疼，四肢微冷，或呕逆，或溏泄，并主之。

苍术（炒） 白术 甘草（炙。各一两） 干姜（炮） 茯苓（各二两） 橘红 辣桂 浓朴（制）。

上锉。每服三钱，姜枣煎服。

茯苓白术汤 治受湿身体痛重。

茯苓 干姜（炮） 甘草（炙） 白术 辣桂 苍术（炒，等分）

上锉。每三钱，水煎服。

肾着汤 治肾虚受湿，小便自利，腰冷而痛重。

干姜（炮） 茯苓（各二两） 甘草（炙） 白术（各一两）

上锉。每二钱半，水煎服，加桂亦得。

黄建中汤 治伤湿，鼻塞身痛。

黄（微炙） 辣桂（各三两） 甘草（炙，二两） 白芍药（六两）

上粗散。每服三钱，姜四片，枣一枚煎，食前服。

不换金正气散 治湿，益脾顺气，加茯苓、生姜。（方见寒类。）

神术丸 治湿消饮。（方见痰涎类。）可用正气散送下。

生附除湿汤 治寒湿交攻，身体冷痛。

附子（生，一两） 苍术（制，一两半） 白术 浓朴（制，半两） 宣木瓜 甘草（炙。

各三钱半）

上锉。每服四钱，水二盏，姜十浓片，煎一盏，食前，微温服。

桂枝附子汤 治风湿相搏，汗出气短，身体烦疼，微肿，恶风不欲去衣。

辣桂（二两） 白术 附子（熟。各一两半） 甘草（炙，一两）

上锉散。每服二钱半，水盏半，姜七片，枣二枚，煎一盏，食前，微温服。小便不利、悸气加茯苓；痹加防己，腹痛加芍药。

甘草附子汤 治中湿小便不利，大便自利。

附子（熟，一个七钱，净者） 白术 甘草（炙。各一两） 辣桂（二两）

上锉。每服三钱，姜七片煎，食前，微温服。汗出加防风，悸气加茯苓。

术附汤 治伤湿，大小便皆自利。

白术（二两） 甘草（炒，一两） 附子（熟，七钱半）

上锉细。每服三钱，姜七片，水盏半，煎一盏，食前，微温服。

五苓散

治湿证，小便不利。经云：治湿之法，不利小便，非其治也。（方见水饮类。）

茵陈汤 治湿气淤热发黄，小便秘涩，渴引水浆。

茵陈蒿（一两半） 大黄（半斤） 小红梔子（十枚）

上锉。每服三钱，水煎服。五苓散亦治发黄，二药夹煎尤稳。

湿泻身痛方 五苓散加苍术，煎点随意。

湿

附：诸贤论

贾真孙曰：湿为土气，火热能生湿土，故夏热则万物湿润，秋凉则万物干燥。湿病本不自生，因热而怫郁，不能宣行水道，故停滞而生湿也。况脾土脆弱之人，易为感冒，岂必水不流而后为湿哉？人只知风寒之威严，不知暑湿之炎暄，感人于冥冥之中也。《病式》云：诸强直、积饮等证，皆属于湿。或肿体寒而有水气，里必小便赤少不通，或渴，是蓄热入里极深，非病寒也。大抵治法，宜理脾清热利小便为上，故治湿不利小便，非其治也。宜桂苓甘露、木香、葶苈、木通治之。守真师曰：葶苈木香散下神芎丸，此药下水湿，消肿胀，利小便，理脾胃，无出乎此也。腹胀脚肿甚者，舟车丸下之。湿热内深发黄，茵陈汤下之，或佐以防己、黄。一身尽肿痛，或无汗，是湿流关节，邪气在表，宜五苓散加官桂、苍术，微汗之，不可大汗。若自汗出多，热燥津液，内水不利，切勿利之，重损津液也，宜防风白术甘草汤主之。其湿证有二，湿热证多，湿寒证少，当以脉证明辨之。如脉滑数，小便赤涩，引饮，为湿热证；若小便自利清白，大便溏利，身疼，自汗，为寒湿证。治之宜五苓散加生附、苍术、木瓜主之。

湿

附诸方

防己黄汤（《金匱》方）治风湿，脉浮，身重，汗出恶风，或痛少力。

防己（一两） 甘草（炙，半两） 白术（七钱半） 黄（一两）

上咀。每服一两，入姜、枣煎。喘者加麻黄；胃气不和加芍药；气上冲加桂枝；下有寒加细辛。

按：湿胜身重，阳微中风则汗出恶风，故用黄、甘草实表，防己、白术胜湿也，足三阴例药。

五积散（《和剂方》）治外感风寒，冒寒湿身体重痛。（见寒类。）

按：海藏云：麻黄、桂、芍、甘草，即麻黄桂枝各半汤也；苍术、甘草、陈皮、浓朴，即平胃散也；枳壳、桔梗、陈皮、茯苓、半夏，即桔梗半夏等汤也。又川芎、当归治血，兼干姜、浓朴散气，此数药相合，为解表、温中、泄湿之剂，去痰、消痞、调经之方。虽为内寒外感，表里之分之所制，实非仲景表里麻黄、桂枝、姜附之方也。至于积冷呕泄，时疫项背拘急，如葱白、豆豉。厥逆加吴茱萸；寒热，咳逆加枣；妇人之产加醋。始知用之非一途也，惟知活法者其择之。

渗湿汤（《和剂方》）治寒湿所伤，身重腰冷如坐水中，小便或涩，大便溏泄。皆坐卧湿地，或阴雨所袭之也。

苍术 白术 甘草（各一两） 干姜 茯苓（各二两） 陈皮 丁香（各二钱半）

上咀。每服四钱，入枣煎。

按：此足阳明、太阴药也，温中胜湿之剂。

茵陈五苓散 治湿热胜，发热黄胆。

茵陈蒿（十分） 五苓散（五分）

上二物和匀，水煎服。

桂苓甘露饮（《宣明方》）治湿热内甚，烦渴，泻利，小便涩，大便急痛，霍乱吐下，头痛，口干。（方见暑门。）

清燥汤（东垣方）治表里有湿热，痿厥瘫痪，不能行走，或足踝、膝上、背肿痛，口干泻痢。（方见痿门。）

三花神丸（《宣明方》）治一切水湿肿病，大腹实胀喘满。

轻粉（一钱） 大黄（一两） 牵牛（二两） 芫花（醋炒） 甘遂 大戟（各半两）

上为末，滴水丸小豆大。初服五丸，每服加五丸，温水下，无时，日三服。

平胃散（《和剂方》）治脾胃不和，不进饮食。常服暖胃消痰。

苍术（米泔浸，五斤） 浓朴（姜制，炒） 陈皮（各三斤二两）
甘草（炒，三十两）

上为末。每五钱，姜三片，枣一枚，煎服。入盐一捻，沸汤点服亦得。一方加草果，名平胃草果散。

升阳除湿汤（东垣方）

升阳除湿防风汤（东垣方。俱见泄泻门。）

煮酒应效方 治诸般湿气，筋骨疼痛。（方见风门。）

秘授仙方万应膏

贴一切湿气袭于肌肉，入于筋骨，疼痛不常，贴之神效。（方见疽疽门。）

神芎导水丸 治湿热内郁，胸膈痞满，黧衄，口舌生疮，咽喉不利，牙疳齿蚀，口臭，或遍身生湿疮干疥，睡语切牙，惊惕怔忡，大小便滞涩，风热酒毒蕴热等证。

大黄 黄芩（各二两） 牵牛（头末） 滑石（各四两）

上为末，水丸如桐子大。每服四五十丸，温水下。虚实随证临时加减。

舟车丸 大黄（二两） 甘遂 大戟 芫花 青皮 陈皮（各一两） 牵牛（头末四两）
木香（五钱）

上为细末，水丸如梧桐子大。每服六七十丸，白沸汤下。随时加减。

经验祛湿煮酒方 治风湿相搏，遍身手足疼痛者，服之神效。

川芎 威灵仙 荆芥 麻黄 防风 天麻 青木香 金毛狗脊 羌活 独活 枳壳（各五钱） 川乌
草乌（各四钱） 苍术 陈皮 川当归（各五钱）

上咀，用好头酒五壶，将药用绢袋悬于坛口，再用重纸裹坛口，再用面糊密糊，勿令泄气，用文武火煮熟，每服五盏为度。

附：瘟疫

瘟疫方论

《内经》曰：苍天之气，清静则志意治，顺之则阳气固，虽有贼邪，弗能害也。又曰：冬不藏精者，春必病瘟。是以多感于房劳辛苦之人，安乐者未之有也，俗名瘟病。《杂着》云：冬温为病，此乃天时不正，阳气反泄，药忌温热。时行寒疫，却在温暖之时，时本温暖而寒，反为病。此亦天时不正，阴气反逆，药忌寒凉。又云：此病多发于春夏，一概相同者，此天地之厉气，当参运气而施治也。

东垣云：阳明邪热太甚，资实少阳相火而为之，视其肿势在何部，随经治之。当缓，勿令重剂过其病所。阳明为邪，首大肿；少阳为邪，出于耳前后。先以酒炒芩、连、炙甘草煎，少少不住服，再用大黄、鼠粘子煎，入芒硝等分，时时呷之，母令饮食在后。及邪气已，只服前药，未已，再煎，次第服之，取大便，邪气已，即止。阳明渴加石膏；少阳渴加瓜蒌根；阳明行经升麻、芍药、葛根、甘草；太阳行经羌活十神汤治时令不正，瘟疫妄行。

升麻葛根汤 治大人小儿时气瘟疫，头痛发热。

柴胡升麻汤 治时行瘟疫，壮热恶风，头痛体疼，鼻塞咽干，咳嗽，涕唾稠粘。（方见伤寒小柴胡汤治瘟疫内虚，发热，胸胁痞闷。渴加瓜蒌仁。（方见血门。）

竹叶石膏汤 伤寒时气，表里俱虚，遍身发热，心胸烦闷，得汗已解，内无津液，虚羸少气，欲吐。（方见暑门。）

大青丸 治时行瘟疫发热，并劳役发热，上膈一切结热，神效。

薄荷 甘草 梔子 黄芩 黄连（各三钱） 大黄（八钱） 玄明粉，连翘（各六钱）

上为细末，用青蒿自然汁为丸如绿豆大，用雄黄为衣。治杂病发热者，朱砂、青黛为衣。

每服五六十丸，白滚汤送下。

黄连鲜毒汤 治时疫三日已汗解，或因饮酒复剧，若烦闷，干呕，口燥，呻吟，错语不睡。（方见眼目门。）

荆防败毒散（《蕴要》方）

独活 前胡 人参 茯苓 川芎 枳壳 桔梗 甘草 荆芥 牛蒡子 薄荷（各一钱）

防风（一钱半）羌活（一钱）

上咀。水煎服。如内热加黄芩一钱；口渴加天花粉一钱。

四君子汤、四物汤（俱见补损门） 补中益气汤（方见内伤门。）

附：瘟疫

岭南诸病

（出《明医杂着》）

春秋时月，人感山岚瘴雾毒瓦斯，发寒热，胁膈饱闷，不思饮食。此毒瓦斯从鼻口入内也。

治当清上焦，解内毒，行气降痰，不宜发汗。

黄连（一钱，姜水洗） 升麻 苍术（各一钱半，米泔浸，盐水炒）
黄芩（酒拌，炒）

木香 浓朴（姜制） 枳实（麸炒） 半夏（汤泡七次） 桔梗（去芦） 川芎 柴胡
木通（各一钱） 生甘草（七分）

生姜五片，水一钟半，煎七分，食前，热服，滓煎四分，继服。

寒温不节，汗身脱衣巾，感冒风寒之气，气闭发热头疼，此伤寒类也。但岭南气温，易出汗，故多类疟，重则寒热不退，轻则为疟。南方气升，故岭南人得此病者，猝皆胸满，痰涎壅塞，饮食不进，与北方伤寒只伤表而里自和者不同。治当解表清热，降气行痰。此方用于寒凉时月及虽在温暖时而感冒风寒者。

羌活（一钱半） 苍术（泔浸） 柴胡 黄芩 橘红（去白） 半夏（汤洗） 枳实
甘草（炙） 川芎（各一钱）

生姜五片，水一钟半，煎七分，食前，温服，渣煎四分，随服，取汗出止服。

瘧疟、时疟，寒热往来。

柴胡 知母（炒） 半夏（汤洗。各一钱半） 苍术（泔洗） 黄芩（酒炒） 干葛 陈皮 川芎（生姜三大片，乌梅肉二个，水一钟半，煎七分，食前，清晨服；滓煎四分，午前服。

症久者加人参（一钱半）、
当归（一钱）；汗多者去苍术，换白术，加酒炒白芍药（各一钱半。）

后变成痢疾。症后之痢从虚治，用补脾胃药。

黄连（炒） 木香 缩砂 黄芩（炒） 橘皮 当归（酒洗。各一钱） 白术（一钱半）

白芍药（炒，二钱） 甘草（炙，五分）

生姜三片，水二钟，煎八分，食前，热服。

温暑之月，民病天行瘟疫热病，治宜清热解毒，兼治内外。

枯黄芩（酒炒） 知母（酒炒） 干葛（各一钱） 石膏 白芍药（酒炒）
人参（各一钱半） 黄连（酒炒） 生地黄（酒洗。各五分） 升麻（一钱）
生甘草（七分） 羌活（三钱）

生姜三片，水钟半，煎七分，食前热服，滓煎四分，继服。若胸膈痞满，痰涎壅塞者，加枳时气发热，变为黄病。所谓瘟黄也，宜治内泻湿热。

茵陈 黄连（姜水炒） 山梔仁 白术 白茯苓（去皮） 浓朴（姜水炒） 木通（去皮）
人参（生姜三大片，水二钟，煎七分，食前温服。渣煎四分，继服。

附：瘟疫

附：运气证治

（出《干坤生意》）

运气证治者，所以参天地阴阳之理，明五行衰旺之机。考气候之寒温，察民病之凶吉，推加临补泻之法，施寒热温凉之剂。古人云：治时病不知运气，如涉海问津。诚哉言也！今遵先贤图诀，撮其要领，使人一览而知其悉也矣。

五运配十干之年甲己得合为土运 乙庚得合为金运丁壬得合为木运
丙辛得合为水运戊癸得合为火运六气为司天之岁子午少阴君火

丑未太阴湿土寅申少阳相火 卯酉阳明燥金辰戌太阳寒水 巳亥厥阴风木南政北政甲己土运为南政。盖土居中央，君尊南面而行，余四运以臣事之，面北面受令，所以有别也。

十二支年分运气子午年，少阴君火司天，岁气热化之候。

司天者，天之气候也。

君火者，手少阴心经也。心者，君主之官，神明出焉。君火乃主宰阳气之本，余象生土，乃发生万物之源。

阳明燥金在泉。

在泉者，地之气候也。

初之气，厥阴风木用事，子上父下，益辛泻苦。

自年前十二月大寒节起，至二月惊蛰终止。

天时 寒风切冽，霜雪水冰，蛰虫伏藏。

民病 关节禁固，腰腿疼，中外疮疡。

二之气，少阴君火用事，火盛金衰，补肺泻心。

自二月春分节起，至四月立夏终止。

天时 风与时寒，雨生羽虫。

民病 淋气郁于上而热，令人目赤。

三之气，少阳相火用事，君相二火，泻苦益辛。

自四月小满节起，至六月小暑终止。

天时 大火行，热气生，羽虫不鸣，燕、百舌、杜宇之类。

民病 厥热，心痛，寒，更作咳喘，目赤。

四之气，太阴湿土用事，子母相顺，泻肺补肾。

自六月大暑节起，至八月白露终止。

天时 大雨时行，寒热互作。

民病 黄胆，衄血，咽干，呕吐，痰饮。

五之气，阳明燥金用事，心盛肺衰，火怕水复。

自八月秋分节起，至十月立冬终止。

天时 温气乃至，初冬尤暖，万物尚荣。

民病 寒热伏邪，于春为疟。

六之气，太阳寒水用事，火衰心病，泻咸益苦。

自十月小雪节起，至十二月小寒终止。

天时 暴寒劲切，火邪恣毒，寒气暴止民病
生肿咳喘，甚则血溢，下连小腹而作寒中。

丑未年，太阴湿土司天，岁气湿化之候。

太阴湿土者，足太阴脾经也。脾属中央戊己土，每季寄旺一十八日，合为七十二日，以应一岁六六三百六十日之成数也。

太阳寒水在泉。

初之气，厥阴风木用事，主旺客衰，泻酸补甘。

自年前十二月大寒节起，至闰二月惊蛰终止。

天时 大风发荣，雨生毛虫。

民病 血溢，经络拘强，关节不利，身重筋痛。

二之气，少阴君火用事，以下生上，泻甘补咸。

自二月春分节起，至四月立夏终止。

天时 大火至，疫疠， 君令宣行，湿蒸相搏，豪雨时降。

民病 瘟疫盛行，远近咸苦。

三之气，少阳相火用事，土旺克水，补肾泻脾。

自四月小满节起，至六月小暑终止。

天时 雷雨，电雹，地气腾，湿气降。

民病 身重，跗肿，胸腹满，感冒湿气。

四之气，太阴湿土用事，甘旺咸衰，补肾益膀胱。

自六月大暑节起，至八月白露终止。

天时 炎热沸腾，地气升，湿化不流。

民病 腠理，热血暴溢，寒疟，心腹胀，浮肿。

五之气，阳明燥金用事，土能生金，益肝泻肺。

自八月秋分节起，至十月立冬终止。

天时 大凉，雾露降。

民病 皮肤，寒疟，痢甚行六之气，太阳寒水用事，以上克下 泻脾补肾。

自十月小雪节起，至十一月小寒终止。

天时 大寒凝冽。

民病 关节禁固，腰腿拘痛。

寅申年，少阳相火司天，岁气火化之候。

少阳相火者，三焦浮流之火，火邪炎上，上克肺金，金受克，肾水失母，则上盛下

虚，虚阳上攻，变生诸疾，致伤元气。

厥阴风木在泉。

初之气，厥阴风木用事，子父相逢，泻苦益辛。

自年前十二月大寒节起，至二月惊蛰终止。

天时 热风伤人，时气流行。

民病 寒热交作，咳逆头痛，血气不调，心腹不快。

二之气，少阴君火用事，肺衰心盛，制苦益辛。

自二月春分节起，至四月立夏终止。

天时 暴风疾雨，温湿相蒸。

民病 上热咳逆，胸膈不利，头痛寒热。

三之气，少阳相火用事，夏旺火炽，补肺益大肠。

自四月小满节起，至六月小暑终止。

天时 炎暑亢旱，草萎河输。

民病 烦热，目赤喉闭，失血，热渴，风邪，人多暴死。

四之气，太阴湿土用事，火能生土，泻甘补咸。

自六月大暑节起，至八月白露终止。

天时 风雨时降，炎暑未去。

民病 疟病交作，寒热头痛。

五之气，阳明燥金用事，肺金受邪，泻苦补辛。

自八月秋分节起，至十月立冬终止。

天时 寒热风雨，草木黄落。

民病 寒邪风热，君子周密。

六之气，太阳寒水用事，心火受克，泻咸补苦。

自十月小雪节起，至十一月小寒终止。

天时 寒温无时，地气正寒，霜露乃降。

民病 感冒寒邪，关节不利，心腹痛。

卯酉年，阳明燥金司天，岁气燥化之候。

阳明燥金者，肺与大肠之气，象庚辛金也。

少阴君火在泉。

初之气，厥阴风木用事，金木相克，补酸泻辛。

自年前十二月大寒节起，二月惊蛰终止。

天时 阴始凝，风始肃，水乃冰寒，雨多，花开迟民病
寒热浮肿，失血，呕吐，小便赤淋。

二之气，少阴君火用事，火盛金衰，泻苦益辛。

自二月春分节起，至四月立夏终止。

天时 臣居君位，大热早行。

民病 疫疠流行，人多猝暴。

三之气，少阳相火用事，主盛客衰，泻心补肺。

自四月小满节起，至六月小暑终止。

天时 燥热交合，风雨暴至。

民病，寒热头疼，心烦作渴。

四之气，太阴湿土用事，以下生上，泻辛益酸。

自六月大暑节起，至八月白露终止。

天时 早秋寒雨，有伤苗稼。

民病 猝暴 寒热，风邪伤人，心疼，浮肿，疮疡，失血。

五之气，阳明燥金用事，金盛木衰，泻肺补肝。

自八月秋分节起，至十月立冬终止。

天时 冬行春令，草木生青，风雨生虫。

民病 寒热，作痢，气血不和。

六之气，太阳寒水用事，客来助主，益苦泻咸。

自十月小雪节起，至十二月小寒终止。

天时 气候反温，蛰虫出现，反行春令。

民病 疫疠，温毒，寒热伏邪。

辰戌年，太阳寒水司天，岁气寒化之候。

太阳寒水者，足膀胱经也，与足少阴肾经合为表里，属北方壬癸水。

太阴湿土在泉。

初之气，厥阴风木用事，脾胃受邪，泻咸助甘。

自年前十二月大寒节起，至二月惊蛰终止。

天时 气早暖，草早荣温风至。

民病 瘟疫，寒热，头痛呕吐，疮疡。

二之气，少阴君火用事，心火受邪，泻咸补甘。

自二月春分节起，至四月立夏终止。

天时 春寒多雨，寒湿无时。

民病 气郁中满，浮肿，寒热。

三之气，少阳相火用事，以上克下，泻咸助苦。

自四月小满节起，至六月小暑终止。

天时 暴热乍凉，疾风豪雨。

民病 寒热，吐利，生烦闷乱，痈疽疮疡。

四之气，太阴湿土用事，木旺土衰，泻甘补酸。

自六月大暑节起，至八月白露终止。

天时 风湿交争，雨生羽虫，暴风疾雨。

民病 大热短气，赤白痢泻。

五之气，阳明燥金用事，金生水旺，制咸益苦。

自八月秋分节起，至十月立冬终止。

天时 湿热而行，客行主令。

民病 气虚客热，血热妄行，肺气壅盛。

六之气，太阳寒水用事，水盛火衰，泻咸助苦。

自十月小雪节起，至十二月小寒终止。

天时 凝寒，雨雪，地气正，湿令行。

民病 病乃凄惨，孕妇多灾，脾受湿，肺旺肝衰。

己亥年，厥阴风木司天，岁气风化之候。

厥阴风木者，足厥阴肝经也。肝属东方，甲乙木春旺七十二日也。

少阳相火在泉。

初之气，厥阴风木用事，脾胃受邪，泻酸补甘。

自年前十二月大寒节起，至二月惊蛰终止。

天时 寒始肃，客行主令，杀气方至。

民病 寒居右胁，气滞，脾胃虚壅。

二之气，少阴君火用事，火旺金衰，泻心补肺。

自二月春分节起，至四月立夏终止。

天时 寒不去，霜雪，水杀气施，水草焦，寒雨至。

民病 热中，气血不升降。

三之气，少阳相火用事，肺经受邪，泻苦益辛。

自四月小满节起，至六月小暑终止。

天时 风热大作，雨生羽虫。

民病 泪出，耳鸣掉眩。

四之气，太阴湿土用事，木土相刑，泻酸益甘。

自六月大暑节起，至八月白露终止。

天时 热气返用，山泽浮云，豪雨溽温。

民病 心受邪，黄胆，面为浮肿。

五之气，阳明燥金用事，以金刑木，泻肺益肝。

自八月秋分节起，至十月立冬终止。

天时 燥湿更朦，沉阴乃布，风雨乃行。

民病 寒气及体，肺受风，脾受湿，发为疟。

六之气太阳寒水用事，主助客胜，泻酸补甘。

自十月小雪节起，至十二月小寒终止。

天时 畏火司令，阳乃火化，蛰虫出现，流水不冰，地气大发，草乃生。

民病 瘟疫，心肾相制。

谨按：运气之说，《内经》言之详矣。夫人在气交之中，与天地相为流通，苟不先立其年以明其气，临病施治之际，乌乎以用补泻之药哉？此运气证治不可不知也。又尝按而验之，多有不应，何则？阴阳之消长，寒暑之更易，或失其常，在智者通其活变，岂可胶柱鼓瑟，按图索骥也耶？

卷之四 风缓（附痿证）

卷之四 风缓（附痿证）

风缓方论

风缓者，风邪深入而手足为之缓弛也。夫人四肢百脉逢寒则挛急，遇热则柔缓。病在阳，经气行迟而关以纵；病在阴，经气行疾而关以收，此物理之常然也。然脾主肌肉、四肢，胃为水谷海，所以流布水谷之气，周养一身。脾胃既虚，肢体失其所养，于是风邪袭虚，由腠理而入肌肉，由肌肉而入脾胃，安得不为之缓废乎？若曰驱风之剂与助胃之剂不同，亦顾吾活法用之何如耳抑？余闻人之一身，筋骨为壮，肝主筋，肾主骨，肝肾气虚，风邪袭之，亦有肢体缓弱之证，然则先散其风而后益之，于此尤当加意。

风缓（附痿证）

风缓证治

排风汤、续命汤（方见风类）

加制半夏、鸡心大槟榔，增姜煎，先以此散风毒邪气。

苏合香丸用沸汤泡，生姜汁调开，吞真料白丸子二十丸，日二服，治手足风缓。或白丸子、安肾丸夹用，食前服。（方见嗽门、身疼门、水饮门。）

不换金正气散（方见寒类）加川芎、官桂煎，食前吞安肾丸，治脾胃肝肾俱虚，风入四体筋骨，缓弱不仁。仍早晨常服炒黑豆淋酒。

大圣一粒金丹治中风昏仆，舌强涎潮，瘫痪偏枯，顽痒麻痹，癫痫倒地，闭目作声，项强反张，口噤直视。

大川乌（炮）大附子（炮，去皮脐）新罗白附子（炮。各二两）川五灵脂白僵蚕（炒，去丝嘴）白蒺藜（炒，去刺。各一两）白矾（枯）朱砂没药麝香（另研。

各半两）

上细末，合和，用松烟墨半两，新汲水磨汁搜丸，每两作六丸，金箔二百片为衣，令自干。

大铁弹丸治中风瘫痪，口眼斜，筋骨挛疼，肢体麻木。

自然铜（烧红，醋淬七次，一两半）虎胫骨（酒浸，炙黄）当归（酒浸，焙）白附子（炮）川乌（炮，去皮脐）五灵脂（炒）麻黄（去节。各一两）没药乳香全蝎（焙）安息香白芷直僵蚕（炒，去丝。各半两）乌蛇肉（酒浸，焙干，三分）木鳖（二十一个，去壳，上为末，以酒煮安息香，入飞白面为糊丸，弹子大，每一丸，温酒磨下。

蝎附散 治肝肾气虚，风入筋骨，手足缓弱。

小附子（去皮）生草乌头（炮，去皮脐）苍术（炒）牛膝（酒浸，焙）川芎当归天麻（上末。每一钱，黑豆淋酒调下，兼用核桃肉研酒下，食前服。

四斤丸 治风寒湿毒与血气搏，筋骨缓弱，四肢酸疼、痒、痹。

宣木瓜（去穰，切，焙）天麻（锉）牛膝（锉，焙）苁蓉（洗，切，焙。四味各一斤，用好酒五升浸三日。）熟附子虎骨（酥炙。各二两）

上为末，用浸药酒调面糊丸，桐子大。每服三四十丸，食前温酒或豆淋酒下。

又方加当归三分，乳香、没药、五灵脂各半两，麝香一钱，名大四斤丸。用木瓜煎汤下，亦治脚气。

虎骨酒 治诸风缓弱及历节风，骨节酸疼。

虎胫骨（酥炙黄）

上捶碎如米，每骨一升以酒三升浸五日。空心服一盞，冷则暖之。

铁骨丹、铁弹丸（方并见风类。）治诸风缓弛。

其它用药，风类甚详也矣。

附：痿证

痿证方论

《内经》曰：肺热叶焦，五脏因而受之，发为痿蹙。心气热生脉痿，故胫纵不任地；肝气热为筋痿，故宗筋弛纵；脾气热生肉痿，故痹而不任；肾气热生骨痿，故足不任身。然治痿独取阳明。阳明者，五脏六腑之海，主润宗筋，宗筋主束骨而利机

关也云云。故阳明虚则宗筋纵，带脉不引，故足痿不用也。

或曰：手阳明大肠经，肺之腑也。足阳明胃经，脾之腑也。治痿之法，取阳明一经何也？愿明以告我。丹溪先生曰：《内经》云：诸痿生于肺热，只此一句，便见治法大意。经曰：东方实，西方虚，泻南方，补北方。此固是就生克言补泻，而大经大法，不外于此。东方木，肝也；西方金，肺也；南方火，心也；北方水，肾也。五行之中，惟火有二，肾虽有二，水居其一。阳常有余，阴常不足，故经曰：一水不胜二火，理之必然。肺金体燥而居上，主气，畏火者也。脾土性湿而居中，主四肢，畏木者也。火性炎上，若嗜欲无节，则水失所养，木寡于畏而侮所胜，肺得火邪而热矣。木性刚急，肺受热则金失所养，木寡于畏而侮所胜，脾得木邪而伤矣。肺热则不能管摄一身，脾伤则四肢不能为用，而诸痿之病作矣。泻南方，则肺经清而东方不实，何脾伤之有？补北方，则心火降而西方不虚，何肺热之有？故阳明实，则宗筋润，能束骨而利机关矣。治痿之法，无出于此。骆隆吉亦曰：风火既炽，当滋肾水。

东垣先生取黄柏为君，黄等补药之辅佐，以治诸痿而无一定之方。有兼痰积者，有湿多者，有热多者，有湿热相半者，有挟气者，临病制方，其善于治痿者乎！虽然药中肯綮矣，若将理失宜，圣医不治也。天产作阳，浓味发热，先哲格言，但是患痿之人，若不淡薄食味，吾知其必不能安全也。

丹溪云：痿证断不可作风治而用风药，有湿热、湿痰、气虚、血虚、淤血。湿热，东垣健步丸加燥湿降阴火药，苍术、黄芩、黄柏、牛膝之类。湿痰，二陈东加苍术、白术、黄芩、黄柏、竹沥、姜汁；气虚，四君子东加黄芩、黄柏、苍术之类；血虚，四物东加黄柏、苍术煎送补阴丸。（方见虚损门。）亦有食积、死血妨碍，不得下降者，大率属热。用参术四物汤、黄柏之类。

清燥汤（东垣方）治温热成，痿以燥金受湿热之邪，是绝寒水生化之源，绝则肾亏，痿厥之病大作，腰以下痿软瘫痪不能动。

黄（一钱半） 苍术（一钱） 白术 橘皮 泽泻（各五分） 五味子（九个）
人参 白茯苓 升麻（各三分） 麦门冬 当归身 生地黄 曲末 猪苓 酒黄柏（各二分）
柴胡 黄连 甘草（炙。各一分）

上咀。每半两，水煎，空心热服。

健步丸 治膝中无力，伸而不得屈，屈而不得伸，腰背、腿脚沉重，行步艰难。

羌活 柴胡（各半两） 防风（三钱） 川乌头（一钱） 炒滑石 炙甘草（各半两）
防己（一两） 苦参（一钱，酒制） 肉桂（半钱） 瓜蒌根（半两，酒制）

泽泻（三钱）

上为末，酒糊丸如桐子大。每服七十丸，煎愈风汤，空心送下。

愈风汤（方见风门。）

二陈汤（方见疟门）、四君子汤、四物汤（方并见虚劳门。）

谨按：风痿之别，痛则为风，不痛则为痿。经曰：痛则为实，不痛则为虚。曰风、曰痿，虚、实二者而已矣。东垣曰：气盛病盛，气衰病衰。何则？人之气血充实，而风寒客于经络之间，则邪正交攻而疼痛作矣。人之气血弱虚，而痰火起于手足之内，则正不能胜邪，而痿痹作矣。丹溪先生曰：痿症，切不可作风治而用风药。盖以风为实，而痿为虚也。曰散邪，曰补虚，岂可紊乱矣乎？

历节风

历节风方论

历节风之状，短气自汗，头眩欲吐，手指挛曲，身体魁羸，其肿如脱，渐至摧落，其痛如掣，不能屈伸。盖由饮酒当风，汗出入水，或体虚肤空，掩护不谨，以致风寒湿之邪，遍历关节，与血气搏而有斯疾也。其痛如掣者为寒多；其肿如脱者为湿多；肢节间黄汗出者为风多。遍身走痒，彻骨疼痛，昼静夜剧，发如虫啮者，谓之白虎历节。治法当以温药解其风寒湿之毒，或用和平，则独活寄生汤辈可也。其白虎历节，游走痒痛，虫实为之。况夫脾主肌肉，虚则为痒，遇痒而进饮食，尚庶几焉。而虫亦饕餮，其间不至于频频啮也。《书》曰：若药

历节风

历节风证治

虎骨散 治白虎历节，走注痒痛，不得屈伸。

虎胫骨（酒炙黄，一两半） 白花蛇（酒浸，取肉炙黄） 天麻
自然铜（用醋淬七次）

防风 白附子（炮） 槟榔 官桂 当归 羌活 牛膝 白芷 川芎 僵蚕（炒，去丝。各一两）
全上末。每服二钱，食前以暖豆淋酒调下。

雄麝丸 治历节风，骨节疼痛，挛急痹顽。

安息香 五灵脂 天麻（各一两半） 地龙（净） 白僵蚕（微炒。各三分）
全蝎（微炒） 雄黄（各半两） 麝香（一分） 乌蛇（酒浸，取肉炙）
天雄（炮，去皮脐） 当归川乌（炮，去皮脐） 川芎 南星（炮） 官桂
虎胫骨（酒炙黄。各一两） 川独活（二两）

上末，炼蜜杵丸桐子大。每服十五丸，食前温酒下。

海桐皮散 治历节走注，骨节疼痛。

独活 萆（盐水浸，焙） 川芎 当归（各三分） 桃仁（去皮，焙） 天麻 辣桂
牛膝麻黄（去节） 枳壳（制） 海桐皮 白芍药 川乌（炮，去皮脐） 松节 防风
杜仲（姜制） 甘草（炙。各半两） 麝香（一分） 虎胫骨（酒炙黄，一两）

上粗末。每服二钱，姜五片，枣二枚，食前煎服。

独活寄生汤 治历节风，亦治脚气。（方见腰疼门。）

麝香丸 治白虎历节，游走痒痛，状若虫啮。（方见风类。）

虎骨酒 治历节诸风，百节疼痛。（方见风缓门。）

硫黄酒 治恶风，头面肢体瘾疹，羸。

透明锋芒硫黄上每服三钱，乳钵内研细，入醇酒再研，空心饮其清者。滓又研细，入酒饮之，连日如是。

必用历节厉风方 治手指弯曲，骨节间痛甚。

蓖麻子（去皮，二两） 黄连（去须，锉如豆，一两）

上用新水二升，于瓷瓶内浸二药，密封七日取出，逐日侵晨面东，以浸药水吞蓖麻仁一粒，七日后添两粒，微利不妨。以疗大风亦效。

返魂追命再造散 治大风厉风。

川大黄（锦纹皱者，一两） 独生皂角刺（一两半）

上末。每服二钱，临夜冷酒调下，以净桶伺候泄虫。如虫口黑色，乃是多年；虫口赤色，是为方近。三数日又进一服，直候无虫，则绝根也。（瘾疹若吃醋，则风疹

食人。)

神授丸 治风寒湿合而为痹，遍身或半身麻木不仁，最能杀虫。（方见虚劳门。）用增味五痹白虎风走注痒痛方 鸡子揩患处，咒三遍，愿送粪堆头。盖白虎是粪神，爱吃鸡子。患者下饭用黄脚鸡为妙，亦可抱鸡来压之，其痒自止。

麝香丸

治白虎历节风，游走疼痛，遍身瘙痒，状如虫啮，昼静夜剧。（方见风类。）

历节风

附诸方

四炒散 治历节痛风走注。

威灵仙（酒浸，五钱） 羊角灰（二钱） 白芥子（一钱）
苍耳（一钱半。一云苍术）

上为末。每服一钱，生姜一大片搗汁入汤调服。

洗药方 治一切风气湿气，足胫羸肿疼痛，并皆有效。

荆芥 番白草 防风 苍耳草 苦参 地榆 青藤 威灵仙 麻黄 苍术 生葱 煨盐（各上件用水一桶煎热，于桶内熏蒸痛处，出微汗，待汤稍温再洗痛处，一二次觉痛减。如或贫者，只用、柳、榆、槐、桑、椿六件树枝煎汤洗之，亦有神效。

大补元丸 人参（去芦，二两） 黄（去芦，四两） 白术（四两，泔浸） 当归（酒洗，二两） 生地黄（酒洗，三两） 陈皮（去白，二两） 白芍（酒炒，一两） 黄柏（酒炒，二两） 知母（酒炒，二两） 山药（二两） 山茱萸（净肉，二两） 枸杞（二两） 牛膝（酒洗，二两） 杜仲（姜汁炒，一两五钱） 远志（去心，二两） 石菖蒲（去毛，二两） 巴戟（去心，三两） 破故纸（炒，二两） 菟丝子（炒，二两） 桔梗（二两）

上件共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，用白滚汤送下，或淡酒、姜汤、清祛风丸 防风（去芦，二两） 防己（二两） 荆芥（二两） 当归（酒洗，二两） 川芎（二两） 生地黄（酒洗，三两） 陈皮（去白） 白术（炒） 桑寄生 薏苡仁（各二两） 梔子仁（一两） 牙皂（二两） 何首乌（二两） 川乌（二个） 白芍药（酒炒） 羌活 独活 黄芩（酒炒。各一两半） 半夏（便煮） 木瓜 青藤 牛膝（酒洗） 沉香 白豆蔻（各二两） 木香（一两）

桂枝（一两） 光乌（酒浸，去皮，二两）

上件共为细末，酒打米糊为丸，如梧桐子大。每日五更时用清茶送下七八十丸，少
许时再服愈风化痰丸何首乌（酒浸） 僵蚕 光乌（酒浸，去皮） 全蝎 南星（姜制）
半夏（便煮） 桑寄生 荆芥 牙皂（瓦炒） 破故纸（炒） 陈皮（去白）
菟丝子（炒。各二两） 地黄（去土，八两） 木香（一两） 沉香（一两半）
白芍药（酒炒） 川乌（酒浸，去皮） 天麻（一两二钱） 黄芩（酒炒，二两）
防风（去芦） 汉防己 白术（炒） 当归（酒洗，各二两） 羌活 独活（各一两五钱）
杜仲（姜汁炒，四两） 巴戟（去心，三两）

上件共为细末，酒打米糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心食前酒送下，日服
二次。

诸风应效酒 治一切诸般风气湿痹，遍身骨节疼痛，紫白癜风神效。

当归 川芎 何首乌（各三钱） 苍术（四钱） 白芷 苦参 防风 胡麻 石楠藤 石连藤
僵蚕（各二钱） 细辛（一钱） 穿山甲 黄柏 知母 白芍药 生地黄 牛膝 白术 本 木瓜
大风子 威灵仙 羌活（各二钱） 川乌（一钱） 八角风 五加皮 紫荆皮（各二钱）
木香（一钱半） 薏苡仁（三钱）

上件共为粗末，用好酒一坛，将药用绢袋之，悬于坛口，下用文武火煮一二时辰，
取出放于湿泥去火毒，住二三日再服。每服加后末药入内饮之，量力而用。末药方
于后。

入酒末药方 每服煎药一钟，加此末药八分，入酒服之。

乌药 白芷 木香 荆芥 甘草 何首乌 川乌 青藤 本 天麻 金银花 苍术 全蝎 细辛 防风 草乌
川芎 人参 当归 石斛 麻黄 两头尖 上件共为细末，入煎药、酒，服之效。

又煮酒方 治一切肿风，白虎历节疼痛。

当归（三钱六分） 川芎（一钱八分） 苍术（六钱） 白术（九钱）
白芍药（一钱半） 枳壳（九分） 生地黄（一钱二分） 半夏（一钱半）
甘草（九分） 乌药（一钱半） 麻黄（三钱） 茯苓（二钱半） 防己 陈皮 木通
薏苡仁（各一钱八分） 五加皮（一钱半） 木香（六分） 桑寄生（一钱二分）
黄芩（一钱八分） 羌活（一钱二分）

独活（一钱二分） 牛膝 木瓜（一钱八分） 上件共为粗末，煮法照前。

秘传煮酒应效方 治诸风气、历节、插腿风。年高者亦可服，神效。

当归 人参 茯苓 乌药 砂仁 杏仁 川乌 草乌 何首乌 五加皮 枸杞子
川椒（以上各二钱半） 木香 牛膝 枳壳 干姜 虎骨 香附子 白芷 浓朴 麦门冬（去心）

陈皮（去白） 白术 川芎 麻黄 独活 羌活 半夏 肉桂 白芍药 生地黄 熟地黄 防风 天门冬
五味子 小茴香 细辛（以上各一钱半） 苍术 破故纸 甘草（各五钱） 核桃肉
红豆酥油（各五钱五分） 蜜（八两） 沉香（一钱五分） 葡萄（二钱） 荆芥 地骨皮
山茱萸 巴戟 知母（各一钱五分）

上为细末，分作二袋，用罐盛酒，袋悬于罐内，封罐口，安锅内煮熟，过五七日方用。

每服金刀如圣散 治三十六种风，七十二般气，口眼歪斜，半身不遂，遍身游风，白虎历节，疼川乌（炮） 草乌（炮。各四两） 朱砂（另研） 雄黄（另研） 荆芥 麻黄（去根）

天麻 当归 何首乌 细辛 石斛（去芦） 人参 全蝎（去足） 川芎 甘草
防风（以上各五钱） 苍术（上研为细末。每服五分，临卧温茶送下。如病长者，初服三分，渐渐加至七分，看人肥瘦大小加减。

又方 治证同前 苍术（泔浸，炒，一两半） 防风（去芦） 细辛 荆芥穗 何首乌 蝉蜕
全蝎 朱砂（另研） 白僵蚕（水洗，微炒） 麻黄（去根） 本 当归（酒洗）
天麻（各一钱七分） 人参 川芎 石斛（去根。各三钱三分） 川乌（煨）
草乌（煨。各一钱三分） 乳香 没药 乌药 青藤（各二钱） 白芷（五钱七分）
甘草（微炒，一两） 两头尖（一钱） 雄黄（一钱，另研） 蜂房（二钱五分）
白芍药（一钱五分）

上为极细末。临卧时用温茶送下，量人虚实，有力者服八分起至一钱止，老弱者只服五六分 羌活汤 治白虎历节，风毒注骨髓，疼痛不定（方见痹门。）

乌头汤 治历节痛不可伸屈。

川乌（一枚，用蜜四合煮二合，去乌） 甘草（炙） 麻黄（去节） 芍药
黄（各等分）

上水煎，蜜一合，再煎至八分，去渣，空心服，最治脚气不可屈伸。

附：痹证

痹证方论

《袖珍方》曰：凡痹疾，病目有五种，筋痹、脉痹、骨痹、皮痹、肌痹是也。多由体虚之人，腠理空疏，为风寒湿三气所侵，不能随时驱散，流注经络，久而为痹病者也。风多则引注；寒多掣痛；湿多则重着。治之当辨其所感风寒湿三气注于何部分，其表里须从偏胜者主之药饵。如有此证，治之宜早为贵乎。

五痹汤（《和剂方》）治风寒湿之气各留肌体，手足缓弱，麻顽不仁。

羌活 白术 防己（各一两） 片子姜黄（一两，洗去灰土） 甘草（微炙，半两）

上咀。每服四钱，水一盞半，姜七片，煎八分，去渣。病在上食后服，病在下食前服。

防风汤（《宣明方》）风寒湿三气合为痹，风气胜者行痹，上下左右无留，随所至作，防风汤主之。治行痹行走无定。

防风 甘草 当归 赤茯苓（去皮） 杏仁（去皮，炒熟） 桂（各一两） 黄芩 秦艽 葛根（各三钱） 麻黄（去节，半两）

上为末。每服五钱，酒水各二盞，枣三枚，姜五片，煎至一盞，温服。

茯苓汤（《宣明方》）寒气胜者为痛痹，大宜宣通。阴寒为痛，宜通气温经而愈，茯苓汤加减主之。治痛痹四肢疼痛，拘倦浮肿。

赤茯苓（去皮） 桑白皮（各二两） 防风 官桂 川芎 芍药 麻黄（去节。各一两半）

上为末。每服五钱，水一盞，枣一枚，煎至八分，温服。以姜粥投之，汗泄为度，效矣。

茯苓川芎汤（《宣明方》）湿气胜者为着痹，湿地水气甚重，着而不去，多汗而濡者，茯苓川芎汤主之。治着痹留注不去，四肢麻木，拘挛浮肿。

赤茯苓 桑白皮 防风 官桂 川芎 麻黄 芍药 当归 甘草（炙。各五分）

上为末。每服四钱半，水二盞，枣三枚，同煎至一盞，去滓，空心温服。如欲出汗，以粥投之。

蠲痹汤（《济生方》）治手足冷痹，腰腿沉重及身体烦疼，背项拘急。

当归（去芦，酒洗）赤芍药 黄（去芦） 防风（去芦） 片子姜黄
羌活（各一两半） 甘草（炙，半两）

上咀。每服四钱，水一盞半，姜五片，枣一枚，煎八分，去渣温服。

防风汤（《济生方》）治血痹，皮肤不仁。

川当归（去芦，洗） 赤茯苓（去皮） 川独活（各一两） 甘草（炙，半两）
防风（一两） 赤芍药 黄芩（各一两） 杏仁（去皮尖，半两） 秦艽（去芦，一两）
桂心（不见火，半两）

上咀。每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，去渣温服，不拘时。

续断丸（《本事方》）治风湿流注，四肢浮肿，肌肉麻痹。

当归（炒） 川续断 萆（各一两） 川芎（七钱半） 乳香（半两）
天麻、防风、附子（各一两） 没药（半两）

上为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服四十丸，温酒或饮任下。

黄酒（《济生方》）治风湿痒痛，筋脉挛急，或身体顽痹。

当归（去芦） 云母粉 茵芋叶 白术 虎骨 萆 木香（不见火） 仙灵脾
川续断 甘草（炙） 白芍药 黄（去芦） 防风（去芦） 官桂（不见火） 天麻
石斛（去根。各一两）

上咀，用绢袋盛，以好酒一斗浸之，春五、夏三、秋七、冬十日。每服一盞，温暖服之，常令酒气相续为佳。

茯苓汤（《济生方》）治停蓄支饮，手足麻痹，多睡眩冒。

半夏（汤洗七次） 赤茯苓（去皮） 陈皮（各一两） 枳实（去穰，麸炒）
桔梗（去芦） 甘草（炙。各半两）

上咀。每服四钱，水一盞半，姜七片，煎七分，温服。

增损续断丸（《本事方》）治寒湿之气痹滞关节，麻木疼痛。

人参 防风 鹿角胶 白术（炮。各七两） 麦门冬 干地黄 黄 续断 薏苡仁 山芋 牡丹皮

桂心 山茱萸 白茯苓 石斛（各二两）

上为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服五十丸，温酒空心下。

羌活汤（《济生方》）治白虎历节，风毒攻注，骨节疼痛，发作不定。

羌活（去芦。二两） 附子（炮，去皮脐） 秦艽（去芦） 桂心 木香（不见火）
川芎 当归（去芦） 牛膝（川者，去芦，洗） 桃仁（去皮尖，麸炒） 骨碎补
防风（去芦。各一两） 甘草（上
咀。每服四钱，水一盂半，姜五片，煎七分，温服。

虎骨散（《济生方》）治白虎风，肢节疼痛，发则不可忍。（方见白虎历节风门。）

谨按：痹病盖因风寒湿三气，客于经络，为病不一，或为痛，或为痒，或为麻痹不仁，或为手足缓弱，所以然者，有新久轻重之分，有湿痰死血之异。《济生》防风汤、茯苓汤所治已露端倪也，学人细心求之。仁斋先生不言痹病，盖已中风、白虎历节风条内矣。但所言病之见证，古人所言病之原因，即中庸费隐之义也。

脚气

脚气方论

肾司于下，一身之根本系焉。脚者，肾之外候也。夫人为嗜欲所戕，苦不自觉，肾气内虚，真元不守，凡骤立冷地，久坐卑湿，暴热濯水，凌晨履霜，感受四气于冥冥之中，不为脚气者鲜矣。脚气为病，虽起于足，实周乎身，或壮热头痛，或身体冷疼，或百节拘挛，或十指走注，或转筋急痛，或小腹不仁，以至胸满喘息，烦闷怔忡，昏愤羞明，误忘错语，腹痛下利，呕哕痰涎，食气恶闻，见食即吐，大便小便多是秘涩，自腿至膝，自胫及踝，屈弱顽痹，挛急酸疼，或不，或肿不肿，皆其候也。其自汗恶风，无汗恶寒，乍寒乍热，传足六经。外证与伤寒类焉，但猝然脚痛为异耳。治法究其所自来，挟风者游走有汗；挟寒者掣痛挛疼；挟暑者大渴热烦；挟湿者肿满重滞。其间四气兼有，则推其多者解之，对病施药，固在权衡。然古人以此名为缓风，谓其感于风毒所致，则总治之法，大要疏导大便，使毒瓦斯得泄而后愈，但分剂不可过焉。其补汤、淋洗，皆医家之大戒也。虽然脚气治法以疏利毒瓦斯为先，盖虑乎气实而死矣。然表里之有异经，冷热之有异证，或因他病而后发，或致他病之续生，又不可以不通其变。所谓寒则温之，热则寒之，在表则散，在里则下，太虚气乏，扶养其中，凝阴蕴毒，为之温利，是又胸中之活法矣。其或疗治不早，使毒瓦斯入腹冲心，攻筑作痛，喘满上气，呕吐异常，此则渐入顿深，或者自贻奄忽。

脚气

脚气证治

二十四味轻脚丸 治脚气通用。

当归（酒浸，晒）川芎 萆（盐水煮干）羌活 杜仲（姜制，炒）石楠叶 意苡仁
大鸡心 槟榔 华阴细辛 枳壳（各一两）苍术（炒）五加皮 防风 独活
续断（洗，晒）牛膝（酒浸，晒）威灵仙 海桐皮 木香 木瓜 麻黄（去节）川五灵
脂没药（另研。各三上细末，酒浸雪糕为丸，桐子大。每服五十丸，细锉辣桂、荆
芥穗，食前煎汤下，或枳壳、木瓜散 脚气通用。

大腹 紫苏 羌活 木香 茯苓 陈皮 甘草（炙。各半两）宣木瓜干（一两）

上细末。每三钱，姜枣 煎服。

降气汤 脚气通用。

半夏（制）真苏子（微炒。各五两）当归 浓朴（制）甘草（炙）
北前胡（各二两）

肉桂上锉散。每三钱，姜五片，枣两枚，煎服。如无苏子，以苏叶二两代之。

槟榔散 治风毒脚气肿痛。

橘叶 杉木节（各一握）

上童子尿一盞，醇酒半盞，煎六分，滤清，乘热调槟榔末二钱，食前服。

排风汤 通用。（方见风类。）

生木瓜丸 脚气通用。

宣州生木瓜（就蒂切一盖，取出瓢，以生艾叶塞满，合盖，竹针插定，蒸透，去艾
，其木瓜去皮研烂。）

上入五积散末，和丸桐子大，晒干。每服七十丸，食前醇酒下。

止呕汤 治脚气呕逆，吐泻转筋。

宣木瓜一味，细锉。每服四钱，新水煎服，神效。

槟榔一物汤 治脚气攻注，手足不能举。

鸡心大槟榔上末。每服三钱，用紫苏七叶，连梗橘皮一全个，不去白，姜五片，煎汤，乘热调下。

治脚气冲心痛闷，用童尿煎服；治脚心串痛，温酒调下。

海桐皮酒 治风毒脚气，膝胫疼痛。

海桐皮 五加皮 川独活 枳壳（制） 防风 杜仲（姜制，炒） 牛膝（酒浸，晒）
薏苡仁（炒。各一两半） 生地黄（二两半）

上末，用绵裹，以醇酒一斗，春浸七日，秋浸十四日。每日空心温服一盏，午前一盏。

杉节汤 治脚气攻心，痛闷胀满，不食。青皮 陈皮 天台乌药 鸡心槟榔 宣木瓜
干杉木节 半夏（制） 枳壳（制） 缩砂仁 赤茯苓（各半两） 丁香 茴香（微炒）
大腹皮 紫苏子（微炒） 萝卜子（微炒） 北梗 甘草（炙。各一分）

上锉。每三钱，姜五片煎。

三和散加木香、枳壳（方见水饮门。）

和剂流气散（方见胀满门。） 分气紫苏饮（方见喘门。）

枳壳散 疏导毒瓦斯。

枳壳（制，五两） 甘草（炙，一两半）

上末。每服二钱，浓煎木瓜汤调下。如要快利，更加麻仁。

脾约丸 治脚气大便秘涩。

麻仁（另研） 杏仁（浸去皮，炒。各五两半） 枳实（制） 浓朴（制）
芍药（各半斤 大黄一斤，蒸，切，晒）

上末，炼蜜丸桐子大。每二十丸，食后熟水下，或败毒散加大黄通用。

大黄汤 治脚气风热，烦闷发渴，大便不通。

木香 大黄（各半两） 黑豆（一两） 升麻（三分）

上锉。每服三钱，乌梅二个，新水煎服。

追风毒铤散 治脚气热多证，疏泄风毒。

羌活（一两） 鸡心槟榔 防风 桑白皮（炒。各半两） 郁李仁（炒） 大黄（生。

各一分）

上铤散。每服三钱，黑豆百粒煎服。热甚，大便秘，更加大黄。

败毒散（方见寒类。）治脚气热证。或自汗恶风，则加桂；无汗恶寒，则加去节麻黄。

又治风湿脚气，发热肿，加苍术、槟榔、大黄，微利为效。

竹茹汤 治脚气胃热，烦躁呕吐。（方见积热门。）加乌梅煎。豆苏（方见血类。）加生甘草，治热证脚气。

木香饮 治脚气入腹，攻心呕闷。

楠木香 甘草（炙） 青木香 吴茱萸（荡洗七次，炒干。各半两） 宣木瓜 青橘皮 紫苏茎叶 鸡心槟榔（各一两）。

上铤散。每服三钱，姜五片，乌梅一枚，煎服。

降气汤（方见前。） 吞养正丹（方见痼冷门。）
治脚气冲心筑痛，呕吐涎沫。和剂流气饮通用。（方见胀满门。）

椒瓜丸 治脚气里证。

大生木瓜（就蒂切盖，以真川椒去目碾末，纳实其中，用竹针插其盖，炊熟。）

上研二味为丸，桐子大。每四十丸，温酒下。扶虚用核桃肉煎汤下。

越婢汤 治脚气风多证。

麻黄（去节。一两半） 烂石膏（二两） 白术（一两） 熟附子 甘草（炙。各半两）
上锉散。每服三钱，姜五片，枣一枚煎服。

小续命汤 多用姜片，治脚气寒多证；加独活，治脚气风多证。（方见风类。）

干姜甘草汤（方见脾疼门。） 加制吴茱萸、官桂，治寒证脚气。

香薷锉散加木瓜煎，吞消暑丸，治暑证脚气。（方并见暑门。）

独活寄生东加陈皮

治风证脚气，无热者皆可服。最除风毒，消恶血。（方见腰疼门。）

石楠丸 治风毒脚肿生疮，或筋挛痛重。

石楠叶 薏苡仁 杏仁（浸，去皮微炒） 牵牛（炒熟） 大腹子（连皮用） 川芎 川续断
赤芍药 赤小豆 陈皮 当归 麻黄（去节。各二两） 五加皮 牛膝（各三两） 宣木瓜
独活上细末，以酒浸，蒸饼研糊丸桐子大。每服三十丸，煎木瓜汤下。

加剂除湿东加槟榔（方见湿门） 五苓散（方见水饮门） 治脚气渴多证。

换腿丸 治风湿脚气，缓弱，痺痛，上攻肩背。

石楠叶 南星（炮） 石斛（酒浸，晒） 牛膝（酒浸，晒） 羌活 薏苡仁（炒） 防风 萆
黄（蜜炙） 天麻 当归（酒浸，晒） 续断（各一两半） 槟榔（二两半）
宣木瓜（四两） 加上末，酒面稀糊丸桐子大。每五十丸，食前橘皮煎汤下。

独活汤 羌活 麻黄（去节） 熟附子 生干姜 川芎 牛膝 白芍药 白茯苓 黄（蜜炙）

人参 杜仲（姜制，炒） 甘草（炙） 辣桂 当归 白术 木香（等分）

上粗末。每服三钱，姜五片，枣二枚，同煎，吞活血应痛丸 活血应痛丸 苍术（炒，
六两） 香附（炒，杵净，七两） 威灵仙（二两）
草乌头（二十四两，炮，去皮脐）

上末，酒面稀糊丸桐子大。每服二十丸，用独活汤下。治肾受风冷，脚气酸疼，及
久痢登厕，风冷入于肠胃，以致两脚削小成鼓槌风，而痢又不止，用此两药俱效。

不老地仙丹 治肾脏风毒，轻脚壮筋。

当归 牛膝 苁蓉（各酒浸，焙干） 虎骨（酒炙黄） 真川椒（去目，出汗）
川茸（盐水煮干） 蒺藜（炒，捣，去刺） 川芎（各一两） 白附子（炮） 黄
（蜜炙） 圆白南星（炮） 何首乌 羌活 独活 杜仲（姜制，炒）
没药（另研。各三分） 防风 赤小豆 地龙（去土） 茴香（炒） 木鳖子（去油） 血竭
乳香（另研。各半两）

上细末，调面稀糊丸桐子大。每服四十丸，木瓜、橘皮煎汤下。

乌蛇丸 治风寒脚气，隐痛痒痺。

乌蛇（四两，酒浸，取肉，焙） 虎骨（醋浸，洗净，酒炙，二两） 石斛（令作末）
黄松柏节（酒浸，研） 巴戟（去心） 苁蓉（酒浸，焙） 官桂 防风 独活 续断
五加皮 薏苡仁 当归 木香 川芎（各半两） 乳香（另研） 生干姜（各二分）

上末，酒面稀糊丸桐子大。每四十丸，木瓜、橘皮煎汤下。

慈济丸 治脚气游走，两足转上，腰腿疼痛，不能转侧。

宣木瓜（二两） 川乌（炮，去皮脐） 黄 蒺藜（炒去刺） 当归 防风 萆
牛膝 天台乌药（各一两） 赤小豆 茴香（炒） 地龙（去土） 老白胶（研筛）
川五灵脂（各三分）

上细末，酒面稀糊丸桐子大。丸数四十，食前紫苏汤送下。

四斤丸 治脚气缓弱隐疼及肾虚感受风寒湿痺。（方见风缓门。）

大流气饮加当归下。（方见胀满门。）

虎骨散（方见历节门） 脚气筋急掣痛，用木瓜、橘皮煎汤调下。

金液丹（方见脾疼门）

治凝阴蕴毒，温而利之。养正丹通用。以枳壳、木瓜、槟榔煎汤下。

二陈东加槟榔、细辛、制枳壳 治脚气痰多证。（方见疟门。）无热者，二陈汤下养
正丹、艾瓜丸。（方见肾气门。）

脚痛缓弱，患在风湿。风证以乌药顺气散加麻黄、白芷主之，湿证以不换金正气散
加茯苓、生干姜主之，一匕收功，容易事也。若夫肾虚为病，脚弱而痛，又当何如
？曰：肾主骨，故尔惟安肾丸最良，以不换金正气散送下，仍夹和白丸子佐之。余

每见脚气缓弱人，多服四斤丸，亦安肾丸辈也。然则肾气充，则骨气强，骨气强，则无缓弱之患。治法要当究其源。

脚气

附诸方

麻黄左经汤（《三因方》）治风寒暑湿流注足太阳经，腰足挛痹，关节重痛，憎寒发热，无汗恶寒，或自汗恶风，头痛眩晕。

麻黄（去节） 干葛 细辛 白术（米泔浸） 茯苓 防己 桂心（不见火） 羌活
甘草（炙） 防风（各等分）

上为末。每服四钱，水一盂，姜三片，枣一枚，煎，空心服。自汗为麻黄，加肉桂、芍药，半夏左经汤（《三因方》）治足少阳经为风寒暑湿流注，发热，腰肋疼痛，头目眩晕，呕吐不食。

半夏（汤洗七次） 干葛 细辛 白术 麦门冬（去心） 柴胡 茯苓 桂心（不见火）

防风 干姜（炮） 黄芩 小草 甘草（炙。各等分）

上咀。每服四钱，水一盂，姜三片，枣一枚，煎七分，空心服。热闷加竹沥；喘急加杏仁、桑白皮。

大黄左经汤（《三因方》）治风寒暑湿流注足阳明经，使腰脚赤肿，痛不可行，大小便秘，或恶闻食气，喘满自汗。细辛（去苗） 茯苓 防己 羌活 大黄（蒸）
甘草（炙） 前胡 枳壳（去瓢，炒） 浓朴（去皮，炒） 黄芩
杏仁（去皮尖，另研。各等分）

上咀。每服四钱，水一盂，姜三片，枣一枚，煎七分，空心热服。腹痛加芍药；秘结加阿大料神秘左经汤（《三因方》）治风寒暑湿流注三阳经，腰足拘挛，大小便秘涩，喘满烦闷，并皆治之。

半夏（汤洗七次） 干葛 细辛 麻黄（去节） 麦门冬（去心） 小草（即远志苗）
白姜 浓朴（姜制，炒） 茯苓 防己 枳壳（去瓢，炒） 甘草（炙） 桂心 羌活 防风
柴胡 黄芩（各等分）

上咀。每服四钱，水一盂，姜三片，枣一枚，煎服。自汗加牡蛎、白术，去麻黄；黄肿加泽泻、木通；热甚无汗减桂，加橘皮、前胡、升麻；腹痛或利，去黄芩，加

芍药、附子；大六物附子汤（《三因方》）治四气流注于足太阴经，骨节烦疼，四肢拘急，自汗短气，小便不利，手足或时浮肿。

附子（炮，去皮脐） 桂心 防己（各四两） 甘草（炙，二两） 白术（三两）
茯苓（三两）

上咀。每服四钱，水一盞，姜七片，煎六分，食前温服。

当归拈痛汤（《拔粹》方）治湿热为病，肢节烦疼，肩背沉重，胸不利，及遍身疼痛，下注于足胫，痛不可忍。

羌活 甘草（炙） 黄芩（酒浸） 茵陈（酒炒。各五钱） 人参（去芦） 升麻
苦参（酒洗） 葛根 苍术（各二钱） 防风（去芦） 当归身 知母（酒洗） 茯苓（炒）
泽泻猪苓（各三钱）

上咀。每服一两，水二盞，煎至一盞，去滓，空心服。

乌药平气汤（《三因方》）治脚气上攻，头目昏眩，脚膝酸疼，行步艰苦，诸气不和，喘满迫促，并皆治之。

茯神（去木） 甘草（炙） 白芷 当归 白术 川芎 五味子 紫苏子 干木瓜
人参 乌药（去木。各等分）

上咀。每服四钱，水一盞，姜五片，枣三枚，煎七分，温服。

东垣羌活导滞汤 治脚气初发，一身尽痛，或股节肿痛，便溺阻隔。先以此药导之，后用当归拈痛汤。

羌活 独活 防己 当归（各三钱） 大黄（酒浸，煨，一两） 枳实（炒，二钱）

上咀。每服五钱或七钱，水煎服。

金匱八味丸 治足少阴经，脚气入腹，腹胀疼痛，上气喘急，肾经虚寒所致也。此证最急，以肾乘心，水克火，死不旋踵。（方见补损门。）

加味败毒散 治足三阳经受热，毒瓦斯流注，脚踝上
赤肿痛，寒热如疟，自汗恶风，或无汗恶寒。

羌活 独活 前胡 柴胡 枳壳 桔梗 甘草 人参 茯苓 川芎 大黄 苍术等分上

咀。每半两，入姜煎。

五积散（《和剂方》）治寒湿流注，两脚酸疼。有兼痰气者，用之尤宜，内加木瓜。（方见中寒门。）

健步丸（方见痿门。）

生（半两） 归尾 芍药 陈皮 苍术 牛膝（各一两） 吴茱萸 条芩（各半两）
桂枝（二上为末，蒸饼丸如梧子大。每服一百丸，空心煎白术、木通汤下。

防己饮（丹溪方）

白术 木通 防己 槟榔 川芎 甘草梢 犀角 苍术（盐炒） 生 黄柏（各酒炒）

大便实加桃仁；小便涩加牛膝；有热加黄芩、黄连；大热及时令热加石膏；有痰加竹沥、姜

脚气

脚气治例

《心法》附录曰：脚气有湿热，有食积流注，有风湿，有寒湿。

胜湿以仙术、白术、防己、川芎为主，或六物附子汤，或当归拈痛汤。

脚气气郁甚者，舟车丸、除湿丹；有饮者，东垣开结导饮丸。

脚气解表用麻黄左经汤等药，随经选用；有兼痰气寒湿者，五积散加木瓜。

若双解，以大黄左经汤、东垣羌活导滞汤。

若理血，以八味丸或四物加羌活、天麻，又或四物加黄柏、南星，或健步丸。

若疏风养血，用独活寄生汤最效。

春夏气溢肿而痛者，用香苏散加五加皮、木瓜、槟榔、川楝子。

热而红肿者，败毒散加木瓜、苍术。

秋冬以后，用五积散加木瓜、牛膝、槟榔、吴茱萸。

脚气

附：足跟痛

丹溪曰：有痰，有血热。血热，四物加黄柏、知母、牛膝之类；有痰唾者，五积散加木瓜。

四物汤（方见补损门。）

五积散（方见中寒门。）

舟车丸、除湿丹（俱见湿类。）

开结导饮丸（方见痰涎门。）

治脚转筋，疼痛挛急，用松节二两，锉细，乳香一钱，以银石器内，慢火略炒焦存性，研细，每服一钱至二钱，木瓜酒调下。

治脚气筋骨疼痛，用金银花为末，每服二钱，热酒调下，或锉碎，同木瓜、白芍药、官桂、当归、甘草，酒水各半钟煎，去滓，空心热服。

卷之五 诸气

诸气

（附梅核气、积聚、症瘕、痞块）

诸气

诸气方论

人以气为主，一息不运则机殫穷，一毫不续则穹判。阴阳之所以升降者，气也；血脉之所以流行者，亦气也。营卫之所以运转者，气也；五脏六腑之所以相养相生者，亦此气也。

盛则盈，衰则虚，顺则平，逆则病。气也者，独非人身之根本乎？人有七情，病生七气。七气者，寒、热、怒、恚、喜、忧、愁，或以为喜、怒、忧、思、悲、惊、恐，皆通也。然则均调是气将何先焉？曰：气结则生痰，痰盛则气愈结，故调气必先豁痰，如七气汤以半夏主治，而官桂佐之，盖良法也。况夫冷则生气，调气虽用豁痰，亦不可无温中之剂，其间用桂，又所以温其中也，不然七气相干，痰涎凝结，如絮如膜，甚如梅核窒碍于咽喉之间，咯不出咽不下，或中满艰食，或上气喘急，曰气隔、曰气滞、曰气秘、曰气中，以至五积六聚，疝癖瘕症，心腹块痛，发即欲绝，殆无往而不至矣。

冷气者，生冷伤脾，风冷入胃，或血海虚冷，冷则生气，用和剂七气汤、治中汤、沉香降气汤、大沉香丸。

痰结者，三因七气汤、指迷七气汤、易简二陈汤。

中满者，痞满不食，水气肿胀，面目俱浮，枳壳散加南木香、大流气饮、指迷七气汤、顺气木香散、三和散、五皮散加半夏、茯苓。

上气者，气逆而上，呼吸喘促，分气紫苏汤、苏子降气汤，或嚼苏合香丸以秘传降气汤送下。

气隔者，阴阳不和，中脘窒塞，五膈吐噎，食不能下，五膈宽中散、和剂七气东加木香、缩气滞者，滞于胸膈则胀满，滞于手足则浮肿，滞于腰间则坠痛。胀满用异香散、调气散、沉香降气汤，仍与神保丸，或少蓬煎丸利之；浮肿用三和散夹生料五苓散，或五皮散加桂吞青木香丸，局方流气饮加赤茯苓、枳壳；腰痛，俞山人降气汤、局方七气东加橘核或辣桂煎汤，点调气散，吞青娥丸。

气秘者，停宿不消，肠胃留滞，大便不通，苏合香丸夹和感应丸，或杨氏麝香丸，局方麻仁丸，并用枳壳散送下。

气疾之人，多因气不归元，遂成气中。状如中风，仆倒昏迷，牙关紧急，只是无痰。此为气中，不得误用风药及通关利膈等辈。先以姜汁泡汤，调苏合香丸，次用七气汤、大流气饮加石菖蒲，继之气顺而苏，即以治中东加木香，以和其中，使气归常道。若更不能调，则气逆而厥，又有变证。

五积者，五脏之所积，其病难医；六聚者，六腑之所聚，其病易治。挟水为癖，挟血为症，气血水饮皆能结块。轻者神保丸以麝香汤送下，或少与蓬煎丸、撞气阿魏丸、三棱煎丸；重者如意丸、顶珠丸酌量用。

又一证漉漉作声，腹中缠滞，他无所苦。此为水饮，消饮丸、倍术丸、（方并见水饮类。）

二姜丸夹和用之。

人有血气心知之性，而无哀乐喜怒之常。一种妇人，平时任气，易为七情所伤，适月事经季不行，一身百病，胸臆气填，呕恶全不入食，入食则吐痰涎。或一块如核，窒塞胸喉而痛；或一块如卵，筑触心下而疼；或腹中块物，动而作痛，攻刺腰背，时发哄热，四肢乏力，脚不能行，小便白浊浮油，带下淋漓，日就瘦弱，全似虚劳。然而谷虽不入，果子杂物常喜食枣、乌梅同煎。半夏理气消痰，缩砂安胎顺气，北梗以开胸喉之隔，服之自然安平。若妄以刚剂温胃，胎气必烦，病无由愈。白浊一节，谨勿燥涩，二陈东加白茯苓以下白丸子（方并见痰涎类）可也。若夫七情所发，逆气填胸，不惟核膜上塞咽喉，甚者攻击满闷欲绝，产后尤多有之。故曰产前安胎，产后调气。（男女或有胸喉间梅核作恙者，触事勿怒，饮食勿冷。）

诸气

诸气证治

和剂七气汤 治七气所伤，痰涎结聚，心腹刺痛，不能饮食。

半夏（制，焙，五两） 人参 辣桂（去粗皮。各一两） 甘草（炙，半两）

上锉散。每服三钱，水大盏，姜五片，枣一枚，煎至七分，食前服。

和剂治中汤（方见脾胃门。）

沉香降气汤 治阴阳交滞，心腹胀满，留饮停酸，积冷诸证。

沉香（一两二钱） 缩砂仁（三两） 甘草（，二两半） 香附（炒，净，一斤）

上末。每一钱，盐一点，沸汤点下。

大沉香丸 治一切冷气攻心，腹刺痛，胸膈噎塞，妇人血气刺痛，并宜服之。（方见心气类三因七气汤 证治如前，有热者可用此。

半夏（五两） 茯苓（四两） 浓朴（制，三两） 紫苏叶（二两）

上锉散。每服四钱，水盏半，姜七片，枣二枚，煎六分，不时服。

易简二陈汤（方见痰涎门。）

枳壳散（方见脚气门。） 治证同前，加南木香煎服。

和剂流气饮调营卫，利三焦，行痞滞，消肿胀。

橘红 青皮 紫苏叶 浓朴（制） 香附（炒，净） 甘草（炙。各四两） 木通（二两）
大腹皮 丁皮 槟榔 辣桂 木香 草果仁 蓬莪术（煨） 藿香叶（各一两半） 麦门冬 人参
白术 木瓜 赤茯苓 石菖蒲 白芷 半夏（制） 枳壳（制。各一两）

上锉散。每服三钱，姜四片，枣二枚，煎服。（余见水肿门。）

指迷七气汤 治七情相干，阴阳不得升降，气道壅滞，攻冲作疼。

青皮 陈皮 桔梗 蓬莪术 辣桂 藿香 益智仁（各一两） 香附（一两半）
甘草（炙，三） 上锉散。每服三钱，水一盏，姜四片，枣一枚，煎七分，不时服。

顺气木香散 治冷证肿胀泄泻。

良姜 干姜（炮） 茴香（炒） 缩砂仁 辣桂 橘红 浓朴（姜汁炙，焙） 甘草（）

苍术（炒） 丁皮 桔梗（各等分）

上末。每二钱半，姜、枣煎，食前服。

三和散 和畅三焦，治痞胀浮肿。

大腹皮（炒） 紫苏茎叶 沉香 宣木瓜（切，焙） 羌活（各一两） 白术 川芎
木香 甘草（炒） 陈橘皮（去白） 槟榔（湿纸煨。各三分）

四库本

提要

钦定四库全书 子部五

仁斋直指 医家类

提要

【臣】等谨案仁斋直指二十六卷伤寒类书七卷俱宋杨士瀛撰士瀛字登父仁斋其号也福州人始末无考前有自序题景定甲子甲子为景定五年次年即度宗咸淳元年则宋末人矣此本为嘉靖庚戌所刻前有余锓序称直指列为二十八卷析七十九条今考七十九条之数与序相符而其书止二十六卷焦竑国史经籍志载有此书亦作二十六卷盖序文偶悞然士瀛所撰本名仁斋直指其每条之後题曰附遗者则明嘉靖中朱崇正所续加崇正字宗儒徽州人即刊刻此本者也焦志既题曰仁斋直指附遗方乃惟注杨士瀛撰则并附遗归之士瀛亦未免小误也其伤寒类书七卷焦志不着录据仁斋直指自序其成书尚在直指前此本以卷帙较少故刻於後卷首标题亦称朱崇正附遗然核其全编每条皆文义相属絶无所谓附遗者惟卷一活人证治赋後有司天在泉图五运六气图伤寒脉法指掌图标目上冠一附字耳或因此一卷有附遗而牵连题及七卷或因直指有附遗而牵连题及此书均未可定宋槧旧本既已不存今亦无从考正姑疑以传疑可矣乾隆四十二年五月恭校上总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅总校官【臣】陆费墀

原序

仁斋直指原序

余始撰活人总括婴儿指要俗皆以沽名讥及脉书一行於是敛肃而相告曰诚不易也谁肯倾困竭廩以徇人哉余曰而亦知有天乎天将寓夫济人利物之心故资我以心通意晓之学既得於天还以事之是盖造物初心之所期也或者隙光自耀藏诸已而不溥诸人政恐玉毁椶中草木俱腐矣虽然人有四百四病或出於前三册之外者可不原证择方揭为直指之捷径乎明白易晓之谓直发踪以示之谓指剖前哲未言之蘊摘诸家已效之方济以家传参之肘後使读者心目了然对病识证因证得药犹绳墨诚陈之不可欺庶几仁意周流亹亹相续非深愿欤余尝慨而作曰天之予人以是物必使之有以用是物有是物而不能用非唯咈天抑亦自弃其天者也并书此为同志勉景定甲子良月朔三山杨士瀛登父序

医家者流自有神农本经粤传於兹圣贤师授格言星焕於是泄陰阳之秘运变化之机窥盛衰之理操从逆之宜可以事亲养生可以仁民爱物故自一指之外而兼乎六合之内至德要道偕需於此拘方之士不可以同语也允矣鼎湖既昇越人亦逝长沙不作叔和遂湮思邈东垣子微守真相继名世生逢之者宜若可以尽年而乃有不蒙其泽不慊其术者岂其犹未通於要妙之理耶景定时杨仁斋以济人利物之诚得心通意晓之学着书总括爰修直指列为二十八卷析之七十九条刻以遗世予自嘉靖庚子得善本阅之不欲释手考其撰次旨远义陈类分语悉上自本草素难之微言下及脉病证治之肯綮搜元剔诀灿若珠玑晬盘示儿随其所取乃若自序任重之言岂其矜哉噫仁斋已矣其如苍生何今其说存使擅医业者皆仁斋之学读仁斋之书者皆不欲释手心存理得而直达要妙不难矣将以同跻斯民於仁壽之域岂小补之功尔耶昔朱丹溪没世其門人戴元礼刻心法附以方论而朱氏之学益光仁斋於丹溪为先达师表鲜有能继之者然犹幸斯文之未丧也今朱氏惠斋校而刻之附之以所遗其用心亦勤矣继仁斋之学者将不在於兹举乎披览新刻乐而玩之致敬以序嘉靖庚戌夏日徽郡余颺撰

卷一

钦定四库全书

仁斋直指卷一 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

五脏所主论

夫在天之风在地为木在人为肝惟肝则主风在天之热【暄暑炽燠热之用也】在地为火在人为心惟心则主热在天之湿在地为土在人为脾惟脾则主湿在天之燥在地为金在人为肺惟肺则主燥在天之寒在地为水在人为肾惟肾则主寒吁此天地自然之气也气之愆伏乘虚入人而人不能克百病之所由生故风喜伤肝热喜伤心湿喜伤脾燥喜伤肺寒喜伤肾而暑气伤心包络【心包络曰膻中在胃膈间盖心主暑故暑气伏於三焦膈胃之间】其或风气之胜木邪乘土则脾病生焉热气之胜火邪乘金则肺病生焉湿气之胜土邪乘水则肾病生焉燥气之胜金邪乘木则肝病生焉寒气大来心火亦为肾水所乘矣左关为人迎可以知风寒暑湿热燥所从入之门右关为气口可以别臟气郁畅与食气聚散盈虚之候若乃忧愁思虑易耗心神恚怒逆易损肝气纵慾强志肾之戕形寒饮冷肺之害饥饱劳倦脾之伤外之六气相乘内之七情相感凡是数者皆为五臟之邪因其所主而?其某臟所受之处则得之矣心主血所藏者神上应舌外应诸掌其声言其色赤其臭焦其味苦其液汗肝主筋所藏者?上应眼外应爪甲其声呼其色青其臭臊其味酸其液泣肾主骨所藏者精与志上应耳外应腰背其声呻其色黑其臭腐其味咸其液唾【肾冷多唾肾热多渴】肺主气所藏者魄上应鼻外应皮毛其声哭其色白其臭腥其味辛其液涕脾主肌肉所藏者意与智上应口外应四肢其声歌其色黄其臭香其味甘其液涎故心肺在上主脉气也肝肾在下藏精血也脾居中州又所以为精血脉气之养也心之平脉浮大而散肝之平脉弦细而长肾之平脉沈濡而滑肺之平脉短濇而浮脾之平脉和缓而大平者五脏本然之正脉也春弦夏鉤【叔和云夏洪取火脉来盛之义】秋毛冬石以其四时当旺者象之木火金水四时各旺七十有二日土为季脉每季之月寄旺一十八日春则弦缓夏则洪缓秋则微缓冬则沈缓合四季而论则亦七十有二日矣春弦者端直之状细弱而长是也夏鉤者浮大而散来疾去迟是也秋毛者稀软之状轻虚以浮是也冬石者沈濡而滑举指来疾是也土之脉温厚气行乎臟腑之中平和不可得见其衰则现焉所谓弦鉤毛石盖应时而略见耳其中须有穀神胃气之和若弦如张弓弦鉤如操带鉤毛如风吹毛石来如夺索去如弹石此皆危脉也此絶无胃气也胃气亏絶其能久乎若夫春得金脉夏得水脉秋得火脉冬得土脉四季得木脉其与心之脉尅肺肺之脉尅肝肝之脉尅脾脾之脉尅肾肾之脉尅心此皆贼邪也一臟无气况可以为人乎然则诸府之脉可得闻欤曰小肠微洪大肠微濇膀胱微沈胃微缓而胆微弦急此无他腑与臟合气同气相求斯有得其近似者矣抑古人所谓九臟者又何如耶曰形臟四一者头角二者耳目三者口齿四者胷中神臟五在心藏神在肝藏魂在肾藏志肺藏魄而脾藏意然臟者神之

舍色者神之旗五臟已敗其色必夭槁怪异常夭必亡矣抑犹有说焉微迟濡弱其候虽不同而为寒为虚一也数实长洪其形虽不类而为热为实一也诸脉皆弦吾知其病出於肝诸脉皆缓吾知其病出於脾诸脉皆濇吾知其病出於肺脉皆浮洪病不在心乎脉皆沈滑病不在肾乎若合腑臟而观假如数在左寸数主热也沈之而得则热入於心浮之而得则热入小肠迟在左尺迟主寒也沈之而得则寒入於肾浮之而得则寒入膀胱其余以此推之噫此通变法也安得圆机之士与之论此哉

五臟病证虚实论

五臟各有所主至其病证莫不随所主而见焉面赤喜笑舌破口乾烦燥掌热心痛而腕脐上有动气者心家病也面青多怒脇下痛硬欬逆目眩肢节挛急转筋澼难脐左有动气者肝家病也【肝乘脾挟水气故欬逆足厥陰下終於陰器故澼难】面黑而恐呵欠呻吟齿痛骨痿耳鸣精泄足胫寒腰脊痛小腹急疼痼泄而里急後重脐下有动气者肾家病也面白善忧愁欲哭喘嗽气逆咽喉不利洒淅恶寒时作寒热脐右有动气者肺家病也面黄善思善噫善嗜中脘胀满饮食不消身体肿重肢节酸疼怠惰嗜卧四肢不收当脐动气是非脾家之病乎东莱先生有曰肝受病则目不能视肾受病则耳不能听脾受病则口不能食心受病则舌不能举五臟病证以此观之不待智者而後知也然而心之恶热者何热则脉溃浊也肝之恶风者何风则筋燥急也肾何以恶燥燥则精涸竭也肺何以恶寒寒则气留滯也脾何以恶湿湿伤肌肉肉伤则痿肿也五臟之病推原及本安有不从所受中来哉是以臟气有余谓之实臟气不足谓之虚心实之候口乾喜笑身热汗血痛满乎胛脇膺背之间肝实之候目赤多怒头眩耳聋痛引乎两脇小腹之下肾实之候腹膨体肿少气不言骨痛痼泄而小便黄肺实之候喘促咳嗽上气鼻张胫股肩疼而胷中满脾气一实必至肢体重着而不举腹胀尿秘而苦饥故曰臟气有余谓之实者此也心虚则恍惚多惊忧烦少色咳唾舌强腰背酸疼肝虚则眼昏胷痛筋脇拘挛恐惧面青如人将捕肾虚则心悬如饥胷痛引脊厥逆澼变冷耳鸣肺虚则呼吸少气鼻涕噤乾肺中声鸣喘乏咳血【唾中有红缕者此肺损为热气所伤也若脇下痛而唾鲜血者此热气伤肝也】其或吐逆泄利饮食不消腹胀肠鸣四肢无力则脾虚之证生焉故曰臟气不足谓之虚者此也大抵实者泻之虚者补之无过不及以平为期否则实实虚虚损不足而益有余如东坡先生所谓至虚有盛势大实有羸状差之毫厘疑似之间便有死生祸福之畏吁可畏哉至若心病而直视面鰲肝病而舌卷囊缩肾病而腰折骨枯肺病而毛焦气出脾病而脐突唇反此则五臟之气絕也絕者无复生之理脱遇岐扁亦末如之何虽然病亦有虚实之证不同耳邪气盛则实精气夺则虚脉盛皮热腹胀前後不通曰五实脉细皮寒气少前後泄利饮食不进曰五虚诸病出者为虚入者为实【陰出乘阳阳入乘陰】言者为虚不言者为实缓者为虚急者为实【陰主静则缓阳主燥则急】濡者为虚坚者为实痒者为虚痛者为实外痛内快者外实内虚外快内痛者外虚内实其有心腹皮肤内外俱痛则按之而止者虚也按之而痛者实也经所谓皮虚则热脉虚则惊肉虚则重筋虚则急骨虚则痛髓虚则堕肠虚则澼泄三阳实三陰虚汗不出三陰实三阳虚汗不止与夫脉浮而缓自汗恶风法当解肌脉浮而紧无汗恶寒法当发汗此表病之一虚一实脉伏而牢腹痛秘结法当下之脉沈而弱厥冷自利法当温之此里病之一实一虚内实之证心下牢强腹中痛满前後不通乾呕而无物出者死内虚之证厥逆烦燥而吐痢不止者亡是又不可不知也故并及之

诸陰诸阳论

禀五行之气而为万物之最灵者人也人禀五行之气而生曰陰与阳谁独无是哉心为手少陰肾为足少陰肺为手太陰脾为足太陰肝为足厥陰心包络为手厥陰此手三陰足三陰之经也小腸曰手太阳膀胱曰足太阳大腸曰手阳明胃曰足阳明胆曰足少阳三焦曰手少阳此手三阳足三阳之经也陰六阳六合而为人身之十二经是经者所以周环一身自上至下往来流通而无间断也其脉则於两手三部应焉故自其身者言之腑为阳臟为陰外为阳内为陰上为阳下为陰头戴阳足履陰背负阳腹抱陰气属阳而阳为卫血属陰而陰为荣阳根於陰陰根於阳陰阳互根荣卫不息阳动所以为陰之役使陰静所以为阳之镇守呼出心与肺吸入肝与肾呼者因阳出吸者随陰入呼吸之间脾受穀味是则一身之陰阳也自其脉者推之关前为阳阳得九分关後为陰陰得一寸所以有主治之分浮之实大沈之损小曰阳盛陰虚沈之实大净之损小曰陰盛阳虚所以有表里之别脉居阳部而陰脉形脉居陰部而阳脉见阳虚则陰出而乘之陰虚则阳入而乘之及所以见寒暑则变之机至若阳生於尺动於寸陰生於寸动於尺牢长促数之为阳虚短结代动细之为陰浮芤滑实弦紧洪之为表微沈缓濇迟伏濡弱之为里陰病见阳脉者生阳病见陰脉者死是则六脉之陰阳也自其病者求之寸口浮疾阳中之阳病主身热头痛烦满内热寸口沈细阳中之陰病主少气汗出悲伤不聊尺脉浮滑陰中之阳病主小腹痛满大小便难尺脉沈细陰中之陰病主两股酸疼陰痒遗沥陰出於阳其病怒阳入於陰其病静腑病欲得寒掀衣气薨又欲见人者为阳臟病欲得温恶闻人声闭户独处者为陰腑病属阳阳主动故其痛多走注而不止脏病属陰陰主静故其痛有常处而不移阳病旦静陰病夜宁阳虚暮乱陰虚夜争陰胜则寒阳胜则热陰动则发热阳动则有汗贼风客邪阳受之饮食居室陰受之阳受风气伤风者先於上陰受湿气伤湿者先於下其或邪居阳脉之间则四肢热盛而为狂邪入陰脉之内则六经凝滯而为痺无阳即厥无陰即呕阳微不能呼陰微不能吸阳病不能俯陰病不能仰重阳者狂重陰者颠脱阳者见鬼脱陰者目盲是则诸病之陰阳也噫是固然矣抑古人所谓陰阳维躋覆溢关格者又何如哉曰脉有阳维陰维阳躋陰躋冲督任带凡此奇经八脉别道而行如设沟渠以备水潦之溢病非自生盖诸经溢出而流入之也维者总持诸脉之纲维【陰阳不相维则怅然失志】躋者健足行走之关要督言其都阳脉之会也任取其妊生养之原也冲者陰脉之通自足至头通受诸经之气血带者回绕於身总束诸脉取束带之义焉故阳维之病苦寒热陰维之病苦心痛阳躋之病阳急而狂奔陰躋之病陰急而足直冲病则气逆而里急督病则脊强而折厥任病则男疝气而女带瘕带病则腹胀满而腰溶溶其冲任二经是又妇人乳血月候之所从出奇经之脉其如是乎关前为阳脉当九分而浮若连并而上至鱼际者为溢溢则外关内隔是为陰乘关後为陰脉当一寸而沈若连并而下入尺泽者为覆覆则内关外隔是为阳乘寸脉皆虚为阳亏尺脉皆虚为陰亏寸脉下不至关为阳絕尺脉上不至关为陰絕亏犹庶几絕与关隔真危脉也覆溢亏絕其如是乎虽然人事不可不知也暴喜伤阳暴怒伤陰忧愁不意气多厥逆七情所发病家谨焉甘辛之剂以之助阳酸苦之剂以之助陰有志活人者又当识此

血荣气卫论

人之一身所以得全其性命者气与血也盖气取诸阳血取诸阴人生之初具此阴阳则亦具此血气血气者其人身之根本乎血何以为荣荣行脉中滋荣之义也气何以为卫卫行脉外护卫之意也然则荣与卫岂独无所自来哉曰人受穀气於胃胃为水穀之海灌溉经络长养百骸而五臟六腑皆取其气故清者为荣浊者为卫荣卫二气周流不息一日一夜脉行五十度平旦以来复会于肺口所谓阴阳相贯如环之无端则是二气者常相随而不相离也夫惟血荣气卫常相流通则於人何病之有一窒碍焉百病由此而生矣故气之作恙发而为寒热恚怒喜忧愁聚而为积痞疝瘕症瘕癖上为头旋中为五鬲下为脐间动气或喘促或咳噫聚则中满逆则足寒凡此者气使之然也血之为患其妄行则吐衄其衰涸则虚劳蓄之在上其人忘蓄之在下其人狂逢寒则筋不荣而挛急挟热则毒内瘀而发黄在小便者为淋痛在大便者为肠风其於妇人月事进退漏下崩中病尤不一凡此者血使之然也夫血譬则水也气譬则风也风行水上有血气之象焉盖气者血之帅也气行则血行气止则血止气温则血滑气寒则血凝气有一息之不运则血有一息之不行病出於血调其气犹可以导达病原於气区区调血何加焉故人之一身调气为上调血次之是亦先阳後阴之意也若夫血有败瘀滞泥乎诸经则气之道路未免有所壅遏又当审所先而决去之经所谓先去其血而後调之又不可不通其变矣然而调气之剂以之调血而两得调血之剂以之调气而乖张如木香如官桂如细辛如厚朴以至乌药香附莪术三棱之类治气可也治血亦可也若以当归地黄辈论之施之血证无以逾此然其性纒滞每於胃气有亏焉胃气既亏则五臟六腑之气亦馁矣善用药者其间剂量而佐助之【大凡治病当识本末假如呕吐痰涎胃虚不食以致发热若与凉剂退热则胃气愈虚热愈不退惟先以助胃止吐为本其热自退纵热不退但得胃气已正亦可旋与解热之剂又有伤寒发大热屡经寒凉疏转其热仍前但用和调胃气自然无事】虽然心为血之主肝为血之藏肺为气之主肾为气之藏诚哉是言也学者苟知血之出於心而不知血之纳於肝知气之出於肺而不知气之纳於肾用药摸棱往往南辕而北辙矣假如血痢作恙以五苓门冬等剂行其心以巴豆大黄等剂逐其积而其痛独存者血之所藏无以养也必佐以川芎或芎归汤辈则其痛止假如喘嗽气鸣以姜橘枳梗苏桂调其气以南星半夏细辛豁其痰而终不下降者气之所藏无以收也必佐以补骨脂或安肾圆辈则其气归元病有标本治有後先纲举而目斯张矣噫此传心吃紧之法也耳目所接敢不本卫生之家共之【经云肾间动气五臟六腑之本十二经脉之根呼明之门生气之原也】

脉病逆顺论

岐伯曰凡人形盛脉细少气不足以息者危形瘦脉大而胷中多气者死形气相得者生参伍不调者病诚哉是言脉病逆顺之不可不蚤辨也盖人有强弱盛衰之不等而脉实应焉脉有阴阳虚实之不同而病实应焉脉病形证相应而不相反每万举而万全少有乖张良工不能施其巧矣故脉之於病有利浮大而不沉沈小者有利沉小而不沉浮大者有大小无拘而以浮沉滑澁坚软为顺逆者又有五行反尅而贼邪乘虚为深患者请条析而缕陈之壮热脉浮大而疾者生沈小者死颠痫脉坚大而数者生沈细者死谵语脉洪大者生厥逆而脉微者死暴忤脉实大者生虚濡而小伏者死诸药中毒可洪大紧急不可微小而不齐疝瘕积聚可紧急实强不可沈小而虚弱腹胀者浮大则顺虚小则逆头痛者浮大则安短澁则危瘠渴之诊贵乎数大紧实不贵乎微细浮短【小急不可治】水气之诊贵乎浮而洪大不贵乎虚细沈

微击坠瘀血顺则脉坚强反则脉小弱中恶吐血反则脉沈细顺则脉浮洪所谓利浮大而不利沈小者此也伤寒已得汗沈小之脉安浮大之脉危自汗漏不止虚细之脉安躁盛之脉危中恶腹胀紧细则可洪急则否心腹痛沈细则可坚洪则否厥逆之脉顺则沈而濡逆则大而浮痿缓之脉顺则散而虚逆则坚而疾唾衄血顺者小弱沈滑逆者坚燥浮洪金疮血多顺者微细而虚逆者燥实而大久嗽尿血羸瘦者其正则脉微其反则洪急大肠澀泄筋挛者其正则脉细其反则坚洪泄泻注谷下痢其正者缓细小结其反者弦数浮洪金疮与诸下血其正者细滑而沈其反者紧急疾大【发热亦反】?蚀肛陰可虚小而不可紧急产後出血可沈小而不可疾浮所谓利沈小而不利浮大者此也伤寒脉躁盛而不得汗者阳之极其治也难伤寒已得汗而脉躁盛者陰之极其候即死中风口噤四肢不收脉浮迟而恬静者存脉洪数而气麓者亡上气喘急面目浮肿脉浮滑而手足温者存脉澀澀而四肢厥者亡【加痢即死】心下牢强胜则脉紧负则沈濡水病腹胀胜则脉实负则虚散病黄疸者胜则缓大负则弦急而坚卒中恶者胜则洪缓负则紧急而馱腹胀便血活者脉滑殂者脉絶肠痈肿结活者脉浮殂者脉沈脓血诸疾活以滑细殂以坚强肠澀下脓活以其沈殂以其浮有迟滑而无紧数则崩中漏下不必虑有滑实而无浮虚则月经闭塞何足忧诸肠澀身不热而脉和滑者易愈身热而脉弦澀者难痊诸咳嗽声不焦而脉浮软者易安弦絶沈坚或伏而大者难保逆而坚澀顺而濡滑其於上气为可推反则急坚正则虚缓其於厥逆为可验耳聋之脉沈而滑者可疗浮而澀者难疗蛊毒之脉数而软者可苏数而坚者难苏【凡蛊毒脉类如钗股其人吐甚心下切痛如嚙而面目黄或吐血不止者皆死】所谓大小无拘而以浮沈滑澀坚软为顺逆者此也心病面赤喜笑心烦掌热口乾开目妄语脐上动气脉当洪紧而数反得沈濡而微者水之尅火一不治肝病面青筋急多怒目痛目闭不欲见人脐左动气脉当弦急而长反得浮澀而短者金之尅木二不治肾病面黑恐欠足寒逆气腹痛殂泄後重腹下动气脉当沈而滑反得缓而大者土之尅水三不治肺病面白悲愁 哭吐衄交血喘咳寒热脐右动气脉当沉细而澀反得浮大而牢者火之尅金四不治五者脾病面黄善思善嗜体重节疼四肢不收怠堕喜卧腹满泄痢饮食不消当脐动气脉来缓大者脾家正形也设或反是弦长而紧是非木邪之尅土乎所谓五行反尅而贼邪乘虚为深患者此也虽然健人之脉病病人之脉健阳病得陰脉陰病得阳脉凡此皆反也而刘元宾以为形病脉和人不死张长沙以为陰病见阳脉者生其言岂厚诬哉经云脉病人不病曰行尸人病脉不病曰内虚此二者虽皆非顺然形病而脉和犹可用力形和而脉病其死无疑况脉和之与脉健本自不同刚馱暴躁之谓健调平而有胃气之谓和毫厘疑似之间学者当於此而致其辨矣经云忽阳病得陰脉陰病得阳脉者死此二者虽皆非正然张长沙之论特为伤寒设谓如伤寒心腹烦满而脉浮大之类是尔腹满病在太陰浮大之脉属阳亦脾家之本体故能生焉学者当於此而通其故矣逆顺之说故备论之以俟大贤之折衷云【老者脉阳羸陰强顺陰弱阳强逆大人得小儿脉不治左病右痛上病下痛不治下痢手足温易治手足寒难治手足厥冷脉不至者死吐血发嗽上气脉数有热不得卧者死凡病人眼无??眈白云如外障并不治病人脉和软者生刮澀如枝梗草根者死】

男女气血则一论

血气即陰阳也不论男女长幼均具之人之有病皆知调气而血之一字念不到焉至於调气

不愈加以消痰逐水无所不至其病自如是皆血之为患伏於冥冥之中而不可测识矣假如妇人得病於经水来去之时固有可验而知者其若经脉久遏而不行与夫协热而伤血变生他证如之何而见之况世俗循习其能以男子之诊为血证乎夫肝藏血而心主之动则血运於诸经静则血归於肝臟肝受血则能视足受血则能步掌受血则能握指受血则能摄故血凝於肤者为痺凝於脉者为泣凝於足者为厥凡神志昏昏惊狂冒闷烦渴呕吐语短内疼鼻衄唾红眼红面赤骨热肤閤肠垢尿多胷满顽痰讖语多汗甚至四肢厥冷懵不知人不问男子妇人皆血证耳据脉验之挟血者脉来乍澁乍数闪灼明灭或沈细而隐伏也若夫血与热交攻则左手寸关按之洪盛盖心主血肝藏血固如是尔经云血上逆则忘血下蓄则狂上焦瘀血小便必难下焦瘀血小便必自利血之所在当以此推活人总括所载小柴胡汤犀角地黄汤桃仁承气汤皆其要药血结者汤剂中入醋为佐特於此而申言之然犹有所谓血螫气螫酒螫者又不可不知也盖平时酷酒血入於酒则为酒螫平时任气血凝於气则为气螫虚劳痼冷败血化生则为血螫摇头掉尾如虫之行上侵人之喉下蚀人之肛或附於背脇或隐於胷腹其大则如螫其小则如钱良可怪也治法用茺萸炒煎为妙或生硫黄为末老酒调下二者可以杀其毒嗣此则以理中汤沈香降气汤各半温胃益血常常服饵以消胜之如其不以温和为主日从事於雷圆锡灰之剂焉君子未保其往【活人书云伤寒太阳证衄血者病欲愈热结膀胱而血自下者亦欲愈以此观之他病伏热之人上焦瘀血而作吐者亦其病之有瘳也虽然血既吐而自止则可矣】

问病论

东坡先生尝曰吾平生求医盖於平时默验其工拙至於有疾必先尽告以所患而後诊视使医者了然知厥疾之所在虚实冷热先定于中则脉之疑似不能惑也故虽中医疗疾常愈吾求疾愈而已岂以困医为事哉诚哉斯言真警迷济世之砭剂也何者脉之与证相依而行脉者所以剖其证之未明证者所以索其脉之犹隐据脉以验证所谓得手应心者是尔问证以参脉所谓医者意也是尔乌可举一而废一哉私窃怪夫近世以来多秘所患以求诊以此验医者之能否医亦不屑下问孟浪一诊以自挟其所长甚者病家从前误药或饮食居处有所讳悔虽问之而不以尽告遂至索病於冥漠之间辨虚实冷热於疑似之顷毫厘千里宁不委命一掷与人试伎乎此余於终篇所以特举前辈格言以解世俗之惑不然难经有谓问其所欲五味以知其病之所起所在者又果何意邪【大人小儿诸病瘥後饮食且须旋进常若不足毋使食气伤胃其病复来大热方退尤不可饱小儿伤乳热复则同】

论易简方论

易简方论前後活人不知其几近世之士类以春秋之法绳之曰易简绳愆曰增广易简曰续易简论借古人之盛名以自伸其臆说吁王氏何负於人哉余谓易简方论後学指南四时治要议论似之自有人心权度存焉耳况王氏晚年剂量更定者不一日月薄蚀何损於明若夫索瘢洗垢矫而过焉或者公论之所不予也

附原脉论【出保命集】

道之浑沦莫知其原然至道无言无以明其理大象无形非立象无以测其奥道象之妙非言不明尝试原之脉者何也非气非血动而不息荣行脉中卫行脉外经曰脉者血之府也自素问而下迄於今经所不载无传记而莫闻其名焉然而玄机奥妙圣意幽微虽英俊明哲之士非轻易可得而悟也夫脉者果何物乎脉者有三名一曰命之本二曰气之神三曰形之道经谓天和者是也至於折一支瞽二目亦不为害生而脉不可须臾失失则絶命害生矣经曰春弦【一曰长】夏洪【一曰鉤】秋毛【一曰濡】冬石【一曰沈】此言正脉同天真造化之元气也巡於春夏秋冬木火水金之位生长收藏参和相应故禀二仪而生不離於气故于脉有生死之验经曰五运陰阳者天地之道也万物之纲纪变化之父母生杀之本始神明之府也既陰阳为神明之府脉为血之府而明可见焉血之无脉不得循其经络部分周流於身滂派奔迫或散或聚气之无脉不能行其筋骨臟腑上下或暴或蹶故经曰出入废则神机化灭升降息则气立孤危故气化则物生气变则物易气盛则物壮气弱则物衰气絶则物死气正则物和气乱则物病皆随气之盛衰而为变化也脉字者从肉从永从 从血四肢百骸得此真元之气血肉筋骨爪发荣茂可以倚凭而能生长也长久永固道故从肉从永者是也从

从血者巡之如水分流而布遍周身无有不通也释名曰脉脉幕也如幔幕之遮覆幕络一体之形导太一真元之气也元气者在气非寒非热非煖非凉在脉者非弦非洪非濡非沈不为气而浮沈不为血而流停乃冲和自然之气也故春温夏热秋凉冬寒所以然者为元气动而不息巡於四方木火金水之位温凉寒暑之化生生相续新新不停日月更出四序迭迁脉不为息故人有身形之後五臟既生身中元气即生焉故春弦夏洪秋毛冬石此四时之气也而脉者乃在其中矣道经曰视之不见听之不闻抟之不得迎之不见其首随之不见其後此如脉之谓也又云埏埴以为器当其无有器之用故有之以利无之以用又曰吾不知名字之曰道强为之名曰大斯立脉之名之本意也故道者万物之奥脉者百骸之灵奥灵之妙其道乃同元气者无器不有无所不至血因此而行气因此而生故荣行脉中卫行脉外瞻之在前忽焉在後而不匮者皆由於脉也分而言之曰气曰血曰脉统而言之惟脉运行血气而已故经曰血气者人之神不可不谨养也陰阳别论曰所谓阳者胃脘之阳也此阳者言脉也胃者土也脉乃天真造化之气也若土无气则何以生长收藏若气无土何以养化万物是无生灭也以平人之气常禀於胃正理论曰谷入於胃脉道乃行陰阳交会胃和脉行人禀天地之候故春胃微弦曰平得弦而无胃曰死夏胃微鉤曰平但鉤而无胃曰死长夏微 曰平但弱而无胃曰死秋胃微毛曰平但毛而无胃曰死冬胃微石曰平但石而无胃曰死陰者真臟也见则败败则必死五臟为陰肝脉至中而无外急如循刀刃责责然如按琴弦心脉至坚而搏如循薏苡仁累累然肺脉至大而虚如毛羽中人皮肤肾脉至博而絶如以指弹石辟辟然脾脉弱而乍数乍 夫如此脉者皆为臟脉独见而无胃脉五臟皆至悬絶而死故经曰别於阳者知病亡时别於陰者知生死之期故人性候躁急慍促迟缓 弱长短大小皮坚肉厚各随其状而脉应之常以一息四至为准者言呼出心与肺吸入肾与肝五者胃兼主四旁在呼吸之间也数则为热迟则为寒如天之春秋二分陰阳两停昼夜各得五十度自此添一遭则热减一遭则寒脉之妙道从此可知矣或如散叶或如燃薪或如泥泥或如丝缕或如涌泉或如溢吐頽或如偃刀或如转索或如游鱼假使千变万化若失常者乃真元之气离絶矣经曰积阳为天积陰为地阳化气陰成形此言一气判而清浊分也元气者天地之本天和者血气之根华佗云脉者谓血气之先也孔子曰天不言而四时行焉百物生焉而脉亦如之又经曰自古通天者生之本皆通乎天气也通天者谓通元气天真也然形体者假天地之气而生故奉生之

气通计於天禀受阴阳而为根本天地合气命之曰人天气不絶真灵内属动静变化悉与天通易云乾坤成列而易立乎其中矣故天地之体得易而後生天地之化得易而後成故阳用事则春生夏长陰用事则秋收冬藏寒往则暑来暑往则寒来始而终之终而复始天地之化也而易也默然於其间而使其四序各因时而成功至於寒不凌暑暑不夺寒无愆阳伏陰之变而不至於大肃大温故万物各得其冲和之气然後不为过而皆中节也道经曰万物负陰而抱阳冲气以为和百姓日用而不知斯脉之道也故脉不得独浮沈独大小独盛衰独陰阳须可沈中有浮浮中有沈大中有小小中有大盛中有衰衰中有盛陰中有阳阳中有陰充塞一身之中盈溢百骸之内无经络不有气血不至养筋骨毛髮坚壮膩泽非心非肾非肝非脾五臟之盛真气固密不为邪伤若忧愁思虑饥饱劳逸风雨寒暑大惊卒恐真气耗乱气血分离为病之本噫夫万物之中五常皆备审脉之道而何独无五常邪夫仁固卫一身充盈五臟四肢百骸亦皆得荣养无冲和之气独真臟脉见则死矣生则不见死则独见好生恶死此仁之谓也分布躯体和调气血贵之在头目耳鼻贱之在跖鬻陰篡不上而有不得下而无所不施无所不至此义之谓也长人脉长短人脉短肥人脉沈瘦人脉浮大人脉壮小人脉弱若长人脉短短人脉长肥人浮瘦人沈大人弱小人壮夫如此者皆不中理而为病此礼之谓也见在寸则上病见在关则中病见在尺则下病五臟有疾各有部分而脉出见不为潜藏伏匿一一得察有余不足而愈其病此智之谓也春弦夏洪秋毛冬石太阳之至其脉沈太陰之至其脉大而长少陰之至其脉浮阳明之至其脉濇而短少阳之至其脉鉤厥陰之至其脉弦四序不失其期六气为常準者此信之谓也非探赜索隐鉤深致远学贯天人旁通物理未能达於此矣

附论五篇【出丹溪心法】

不治已病治未病

与其救疗於有疾之後不若摄养於无疾之先盖疾成而後药者徒劳而已是故已病而不治所以为医家之法未病而先治所以明摄生之理夫如是则思患而预防之者何患之有哉此圣人不治已病治未病之意也尝谓备土以防水也苟不以闭塞其??之流则滔天之势不能遏备水以防火也若不以扑灭其荧荧之光则燎燎之焰不能止其水火既盛尚不能止遏况病之已成岂能治欤故宜夜卧早起於发成之春早起夜卧於蕃莠之夏以之缓形无怒而遂其志以之食凉食寒而养其阳圣人春夏治未病者如此与鸡俱兴於容平之秋必待日光於闭藏之冬以之斂神匿志而私其意以之食温食热而养其陰圣人秋冬治未病者如此或曰见肝之病先实其脾臟之虚则木邪不能传见右颊之赤先泻其肺金之热则金邪不能盛此乃治未病之法令以顺四时调养神志而为治未病者是何意耶盖保身长全者所以为圣人之道治病十全者所以为上工之术不治已病治未病之说着於四气调神大论厥有旨哉昔黄帝与天师难疑答问之书未尝不以摄养为先始论乎天真次论乎调神既以法於陰阳而继之以调於四气既曰饮食有节而又继之以起居有常谆谆然以养生为急务者意欲治未然之病无使至於已病难图也厥後秦缓达乎此见晋侯病在膏肓语之曰不可为也扁鹊明乎此视齐侯病至骨髓断之曰不可救也噫惜齐晋之侯不知治未病之理

亢则害承乃制

气之来也既以极而成灾则气之乘也必以复而得平物极则反理之自然也夫大抵寒暑燥湿风火之气木火土金水之形亢极则所以害其物承乘则所以制其极然则极而成灾复而得平气运之妙灼然而明矣此亢则害承乃制之意原夫天地陰阳之机寒极生热热极生寒至神不测有以斡旋宰制於其间也故木极而似金火极而似水土极而似木金极而似火水极而似土盖气之亢极所以承之者反胜於已也夫惟承其亢而制其害者造化之功可得而成也今夫相火之下水气承而火无其变水位之下土气承而水无其裁土位之下水承而土顺风位之下金乘而风平火热成其燥金自然金家之疾陰精承其君火自然火家之候所谓亢而有害承而乃制者如斯而已且尝考之六元正纪大论云少阳所至为火生终为蒸溽【火化以生则火生也阳在上故终为蒸溽】是水化以承相火之意太阳所至为寒雪冰雹白埃是土化以承寒水之意也【霜雪冰雹水也白埃下承土也】以至太陰所至为雷霆骤注烈风【雷霆骤注土也烈风下承之木气也】厥陰所至为风生终为肃【风化以生则风生也肃静也】阳明所至为散落温【散落经也温下承之火气也】少陰所至为热生中为寒【热化以生则热生也陰精承上故中为寒也】岂非亢为害则承乃制者欤昔者黄帝与岐伯上穷天纪下极地理远取诸物近取诸身更相问难以作内经至於六微旨大论有及於六气相承之言以为制则生化外别盛衰害则脉乱生化大病诸以所胜之气来於下者皆折其标盛也不然曷以水发而电雪土发而骤飘木发而毁折金发而清明火发而暵昧此皆郁极乃发以承所亢之意也呜呼通天地人曰儒医家者流岂止治疾而已当思其不明天地之理不定以为医工之语

审察病机无失气宜

邪气各有所属也当穷其要於前治法各有所归也当防其差於後盖治病之要以穷其所属为先苟不知法之所归未免於过差尔是故疾病之生不胜其衆要其所属不出乎五运六气而已诚能於此审察而得其机要然後为之治又必使之各应於运气之宜而不至有一毫差误之失若然则治病求属之道庶乎其无愧矣至真要大论曰审察病机无失气宜意蕴诸此尝谓医道有一言而可以尽其要者运气是也天为阳地为陰陰阳二气各分三品谓之三陰三阳然天非纯阳而亦有三陰地非纯陰而亦有三阳故天地上下各有风热火湿燥寒之六气其干旋运动乎两间者而又有木火土金水之五运人生其中臟腑气穴亦与天地相为流通是知衆疾之作而所属之机无出乎是也然而医之为治当如何哉惟当察乎此使无失其宜而後可若夫诸风掉眩皆属肝木诸痛痒疮皆属心火诸湿肿满皆属脾土诸气膈郁皆属肺金诸寒收引皆属肾水此病屬於五运者也诸暴强直皆屬於风诸呕吐酸皆屬於热诸躁扰狂越皆屬於火诸痙强直皆屬於湿诸澁枯涸皆屬於燥诸病水液澄彻清冷皆屬於寒此病机屬於六气者也夫惟病机之察虽曰既审而治病之施亦不可不详故必别陰阳於疑似之间辨标本於隱微之际有无之殊者求其有无之所以殊虚实之异者责其虚实之所以异为汗吐下投其所当投寒热温凉用其所当用或逆之以制其微或从之以导其甚上焉以远司气之犯中焉以辨岁运之化下焉以审南北之宜使小大适中先後合度以是为治又岂有差殊乖乱之失耶又考之内经曰治病必求其本本草曰欲疗病者先察病机此审病机之意

也六元正纪大论曰无失天信无逆气宜五常大论曰必先岁气无代天和此皆无失气宜之意也故素问灵枢之经未尝不以气运为言既曰先立其年以明其气复有以戒之曰治病者必明天道地理陰阳更胜既曰不知年之所加气之盛衰虚实之所起不可以为工矣谆谆然若有不能自己者是岂圣人私忧过计哉以医道之要悉在乎此也观乎原病式一书比类物象深明乎气运造化之妙其於病机气宜之理不可以有加矣

能合色脉可以万全

欲知其内者当以观乎外诊於外者斯以知其内盖有诸内者形诸外苟不以相参而断其病邪之逆顺不可得也为工者深烛厥理故望其五色以青黄赤白黑以合於五臟之脉穷其应与不应切其五脉急大缓濇沈以合其五臟之色顺与不顺诚能察其精微之色诊其微妙之脉内外相参而治之则万举万全之功可坐而致矣素问曰能合色脉可以万全其意如此原夫道之一气判而为陰阳散而为五行而人之所禀皆备焉夫五脉者天之真行血气通陰阳以荣於身五色者气之华应五行合四时以彰於面惟其察色按脉而不偏废然後察病之机断之以寒热归之以臟腑随证而疗之而获全济之效者本於能合色脉而已假令肝色如翠羽之青其脉微弦而急所以为生若浮濇而短色见如草滋者岂能生乎心色如鸡冠之赤其脉当浮大而散所以为顺若沈濡而滑色见如衄血者岂能顺乎脾色如蟹腹之黄其脉当中缓而大所以为从若微弦而急色见如枳实者岂能从乎肺色如豕膏之白其脉当浮濇而短所以为吉若浮大而散色见如枯骨者岂能吉乎以至肾色见如乌羽之黑其脉沈濡而滑所以为生或脉来缓而大色见如焔者死死之理夫惟诊视相参既以如此则药证相对厥疾弗瘳者未之有也抑尝论之容色所见左右上下各有其部脉息所动寸关尺中皆有其位左颊者肝之部以合左手关位肝胆之分应於风木为初之气顏为心之部以合於左手寸口心与小肠之分应於君火为二之气鼻为脾之部合於右手关脉脾胃之分应於湿土为四之气右颊肺之部合於右手寸口肺与大肠之分应於燥金为五之气颐为肾之部以合於左手尺中肾与膀胱之分应於寒水为终之气至於相火为三之气应於右手命门三焦之分也若夫陰阳五行相生相胜之理当以合之於色脉而推之也是故脉要精微论曰色合五行脉合陰阳十三难曰色之与脉当参相应然而治病万全之功苟非合於色脉者莫之能也五臟生成篇云心之合脉也其荣色也夫脉之大小滑濇沈浮可以指别五色微甚可以目察继之以能合色脉可以万全谓夫赤脉之至也喘而坚白脉之至也喘而浮青脉之至也长而左右弹黄脉之至也大而虚黑脉之至也上坚而大此先言五色次言五脉欲後之学者望而切之以相合也厥後扁鹊明乎此述之曰望而知之谓之神切脉而知之谓之巧深得内经之理也下迨後世有立方者目之曰神巧万全厥有旨哉

治病必求於本

将以施其疗治之法当以穷其受病之源盖疾病之原不離於陰阳之二邪也穷此而疗之厥疾弗瘳者鲜矣良工知其然谓夫风热火之病所以属乎阳邪之所客病既本於阳苟不求其本而治之则阳邪滋蔓而难制湿燥寒之病所以属乎陰邪之所客病既本於陰苟不求其本而治之则陰邪滋蔓而难图诚能穷原疗疾各得其法万举万全之功可坐而致也治病必求

於本見於素問陰陽應象大論者如此夫邪氣之基久而傳化其變證不勝其衆也譬如水之有本故能洊至汪洋浩瀚派而趨下以漸大草之有本故能荐生莖葉實秀而在上以漸蕃若病之有本變化無窮苟非必求其本而治之欲去深感之患不可得也今夫厥陰為標風木為本其風邪傷於人也掉搖而眩轉瞤動而痙瘓卒暴強直之病生矣少陰為標君火為本其熱邪傷於人也瘡癤而痛痒暴注而下迫水液渾混之病生矣少陽為標相火為本其火邪傷於人也為熱而瞽瘈躁擾而狂越如喪神守之病生矣善為治者風淫所勝平以辛涼熱淫所勝平以鹹寒火淫所勝平以鹹冷以其病本於陽必求其陽而療之病之不愈者未之有也太陰為標濕土為本其濕邪傷於人也腹滿而身腫按之而沒指諸瘕強直之病生矣陽明為標燥金為本其燥邪傷於人也氣滯而臃郁皮膚以皴揭諸澁枯涸之病生矣太陽為標寒水為本其寒邪傷於人也吐利而腥穢水液以清冷諸寒收引之病生矣善為治者濕淫所勝平以苦熱燥淫所勝平以苦溫寒淫所勝平以辛熱以其病本於陰必求本陰而治之病之不愈者未之有也豈非將以施其療疾之法當以窮其受病之源者哉抑嘗論之邪氣為病各有其候治之之法各有其要亦豈止於一端而已其在表者汗而發之其入里者下而奪之其在高者因而越之謂可吐也慄悍者按而收之謂按摩也藏寒虛奪者治以灸炳脈病牽痺者治以針刺血實畜結腫熱者治以砭石氣滯痿厥寒熱者治以導引經絡不通病生於不仁者治以醪醴血氣凝泣病生於筋脈者治以熨藥始焉求其受病之本終焉蠲其為病之邪者無出於此也噫昔黃帝處於法宮之中坐於明堂之上受業於岐伯傳道於雷公曰陰陽者天地之道也綱紀萬物變化生殺之妙蓋有不測之神斡旋宰制於其間也人或受邪生病不離於陰陽也病既本於此為上者豈可他求哉必求於陰陽可也至真要大論曰有者求之無者求之此求其病機之說與夫求於本其理一也大抵四時以胃氣為本然治病必須先診六脈皆有胃氣外証雖重病亦可治胃氣未絕則藥力運行而輸散於皮毛經絡故易治而生胃氣既絕則藥雖對証不能使其運用以輸精於皮毛經絡真臟獨見而藥不及矣遂成不治之証也東垣曰脈貴有神有神者有胃氣之謂也故諸經方論皆曰有病早治療不令邪氣深入所以聖人治未病不治已病正謂此也

附十二經脈歌

○手太陰肺中焦生下絡大腸出贛門上膈屬肺從肺系系橫出腋臑中行肘臂寸口上魚際大指內側爪甲根支絡還從腕後出接次指屬陽明經此經多氣而少血是動則病喘與咳肺脹膨膨缺盆痛兩手交臂為臂厥所生病者為氣咳喘渴煩心胃滿結臑臂之外前廉痛小便頻數掌中熱氣虛肩背痛而寒氣盛亦疼風汗出欠伸少氣不足息遺失無度溺變別

○陽明之脈手大腸次指內側起商陽循指上連出合谷兩筋岐骨循臂肪入肘外廉循臑外肩端前廉拄骨傍從肩下入缺盆內絡肺下膈屬大腸支從缺盆上入頸斜贛頰前下齒當環出人中交左右上俠鼻孔注迎香此經血盛氣亦盛是動頸腫并齒痛所生病者為鼻衄目黃口乾喉痺生大指次指難為用肩臑外側痛相仍

○胃足陽明交鼻起下循鼻外下入齒還出俠口繞承漿頤後大迎頰車耳前髮際至額頰支下人迎缺盆底下膈入胃絡脾宮直者缺盆下乳內一支幽門循腹中下行直合氣冲逢遂

由髀关抵膝腓?□中指内关同一支下膝注三里前出中指外关通一支别走足跗指大指之端经尽矣此经多气复多血是动欠伸面顔黑凄凄恶寒畏见人忽闻木声心振慄登高而歌弃衣走甚则腹胀乃贲响凡此诸疾皆肝厥所生病者为狂症湿温汗出鼻流血口喎唇裂又喉痹膝腓疼痛腹胀结气膺伏兔?外廉足跗中指俱痛彻有余消穀溺色黄不足身前寒振慄胃房胀满食不消气盛身前皆有热

○太陰脾起足大指上循内侧白肉际核骨之後内踝前上膈循?胫膝里股内前廉入膈中属脾络胃与膈通侠喉连舌散舌下支络从胃注心宫此经气盛而血衰是动具病气所为食入即吐胃脘痛更兼身体痛难移腹胀善噫舌木强得後与气快然衰所生病者舌亦痛体重不食亦如之烦心心下仍急痛泄水溏瘕寒疟随不卧强立股膝肿疽发身黄大指痿

○手少陰脉起心中下膈直与小肠通支者还从肺系走直上咽喉系目瞳直者上肺出腋下膈後肘内少海从臂内後廉抵掌中兑骨之端注少冲多气少血属此经是动心痛难任渴欲饮水咽乾燥所生脇痛目如金脇臂之内後廉痛掌中有热向经寻

○手太阳经小肠脉小指之端起少泽循手外廉出踝中循臂骨出肘内侧上循膈外出後廉直过肩解绕肩甲交肩下入缺盆内向腋络心循咽嗑下膈抵胃属小肠一支缺盆贯颈颊至目兑眦却入耳复从耳前仍上颊抵鼻升至目内眦斜络於颧别络接此经少气还多血是动则病痛咽嗑颌下肿兮不可顾肩如拔兮膈似拆所生病兮主肩膈耳聋目黄肿腮颊肘臂之外後廉痛部分犹当细分别

○足经太阳膀胱脉目内眦上颧额尖支者巅上至耳角直者从巅脑後悬络脑还出别下项仍循肩膊侠脊边抵腰脊肾膀胱内一支下与後陰连贯臀斜入委中穴一支膊内左右别贯胛侠脊过髀枢臂内後廉臑中合下贯踇内外踝後京骨之下指外侧是经血多气少也是动头疼不可当项如拔兮腰似拆髀强痛彻脊中央臑如结兮膈如裂是为踝厥筋乃伤所生疟痔小指废头 顶痛目色黄腰尻臑脚疼连背泪流鼻衄及颠狂

○足经肾脉属少陰小指斜透涌泉心然骨之下内踝後别入跟中膈内浸出臑内廉上股内贯脊属肾膀胱临直者属肾贯肝膈入肺循喉舌本寻支者从肺络心内仍至膻中部分深此经多气而少血是动病饥不欲食喘嗽唾血喉中鸣坐而欲起面如垢目视 气不足心悬如饥常惕惕所生病者为舌乾口热咽痛气贲逼股内後廉并脊疼心肠烦痛疽而癖痿厥嗜卧体怠堕足下热痛皆肾厥

○手厥陰心主起胸属包下膈三焦宫支者循胸出脇下脇下连腋三寸同仍上抵腋循膈内太陰少陰两经中指透中冲支者别小指次指络相通是经少气原多血是动则病手心热肘臂挛急腋下肿甚则胸脇支满结心中澹澹或大动善笑目黄面赤色所生之者为心烦心痛掌热病之则

○手经少阳三焦脉起自小指次指端两指歧骨手腕表上出臂外两骨间肘後膈外循肩上

少阳之後交别传下入缺盆膻中分散络心膈高里穿支者膻中缺盆上上项耳後耳角旋屈下至颐仍注颊一支出耳入耳前却从上关交曲颊至目内眦乃尽焉斯经少血还多气是动耳鸣喉肿痹所生病者汗自出耳後痛兼目锐眦肩髃肘臂外皆疼小指次指亦如癢

○足脉少阳胆之经始从两目锐眦生抵头循角下耳後脑空风池次第行手少阳前至肩上交少阳右上缺盆支者耳後贯耳内出走耳前锐眦皆循一支锐眦大迎下合手少阳抵项根下加颊车缺盆合入胸贯膈络肝经属胆仍从脇里过下入气街毛际紫横入髀厌环跳内直者缺盆下腋膺过季脇下髀厌内出膝外廉是阳陵外辅絶骨踝前过足跗小指次指分一支别从大指去三毛之际接肝经此经多气乃少血是动口苦善太息心脇疼痛难转移面尘足热体无泽所生头痛连锐眦缺盆肿痛并两腋马刀挟痿生两旁汗出振寒痲疾胸脇髀膝至骨絶骨踝痛及诸节

○厥陰足脉肝所终大指之端毛际丛足跗上廉太冲分踝前一寸入中封上踝交出太陰後循臑内廉陰股充环绕陰器抵小腹挟胃属肝络胆逢上贯膈里布脇肋侠喉项?日系同脉上巅会督脉出支者还生日系中下络颊里还唇内支者便从膈肺通是经血多气少焉是动腰疼俛仰难男疝女人小腹肿面尘脱色及咽乾所生病者为胸满呕吐洞泄小便难或时遗溺并狐疝临证还须仔细看

火温分治论

肥人气虚生寒寒生湿湿生痰瘦人血虚生热热生火火生燥故肥人多寒湿瘦人多热燥也夫以人形分寒湿热燥此得之於外然其中臟腑为病亦有寒湿热燥之殊不可不知玉匱金钥曰肝臟由来同火治三焦包络都无异脾胃常将湿处求肺与大肠同湿类肾与膀胱心小肠寒热临时旋商议恶寒表热小膀胱湿发热表寒心肾炽十二经最端的四经属火四经湿四经有热有寒时攻里解表细消息里热表寒宜越竭表热表寒宜汗释湿同寒火同热寒热到头无两说六分分来火热寒寒热中停真浪舌热寒格拒病机深亢则害兮承乃制紧寒数热脉正邪標本治之真妙诀休治风休治燥治得火时风燥了当解表时莫攻里当攻里时莫解表表里如或两可攻後先内外分多少治湿无过似决川此个筌蹄最分晓感谢轩岐万世恩争奈醯鸡笑天小

虚实分治论

夫疾病之生也皆因外感内伤生火生湿湿而生热火而生痰四者而已审其为少壮新病是湿则燥之是火则泻之是湿而生热则燥湿而兼清热是火而生痰则泻火而坚豁痰无余蕴矣审其为老衰久病又当半攻半补焉如气虚而有湿热痰火则以四君子汤补气而坚燥湿清热豁痰泻火如血虚而有痰火湿热则以四物汤补血而坚泻火豁痰清热燥湿如此则补攻兼施庶乎可也予故曰少壮新病攻邪为主老衰久病补虚为先若夫陰虚火动脾胃衰弱真陰者水也脾胃者土也土虽喜燥然太燥则草木枯槁水虽喜润然太润则草木湿烂是以补脾胃补肾之剂务在润燥得宜亦随病加減焉

附病机赋

窃谓医虽小道乃寄生死最要变通不宜固执明药脉病治之理【药性脉诀病机治法】悉望闻问切之情【望色闻声问故切脉】药推寒热温凉平和之气辛甘淡苦酸咸之味升降浮沉之性宣通泻补之能脉究浮沉迟数滑濇之形表里寒热实虚之应阿阿嫩柳之和弦钩毛石之顺药用君臣佐使【主病之谓君最多辅君之谓臣次之应臣之谓佐使又其次之】脉分老幼瘦肥【老人脉濡小儿脉数瘦者脉大肥者脉细】药乃天地之精药宜切病【药不泛用则切病矣】脉者气血之表脉贵有神【脉中有力谓有神也】病有外感内伤寒暑湿燥火之机治用宣通泻补滑濇温燥重轻之剂外感异乎内伤【外感乃有余之症内伤乃不足之症】寒证不同热证【伤寒直中之邪为寒伤热传经之邪为热】外感宜泻而内伤宜补寒证可温而热证可清补泻得宜须臾病瘳温清失度顷刻人亡外感风寒宜分经而解散【外感风寒传变不一宜分经络解散方可】内伤饮食可调胃以消溶【内伤饮食只在一处不过调胃消导而已】胃阳主气司纳受阳常有余脾阴主血司运化阴常不足胃乃六府之本【能纳受水谷方可化气液】脾为五臟之源【能运化气液方可充荣卫】胃气弱则百病生脾阴足而万邪息调理脾胃为医中之王道节戒饮食乃却病之良方病多寒冷郁气郁发热【寒谓风寒外感昼夜发热冷谓生冷内伤午後发热】或出七情动火火动生痰有因行藏动静以伤暑邪或是出入雨水而中湿气亦有饮食失调而生湿热倘或房劳过度以动相火【已上六条言病机】制伏相火要滋养其真阴【已下六条言治法】祛除湿热须燥补其脾胃外湿宜表散内湿宜淡渗阳暑可清热阴暑可散寒寻火?痰分多分少而治究表究里或汗或下而施【是风寒则汗之谓温散也是生冷则下之谓温利也】痰因火动治火为先火因气生理气为本治火轻者可降重者从其性而升消理气微则宜调甚则究其源而发散实火可泻或泻表而或泻里【指外感也】虚火宜补或补阴而或补阳【指内伤也】暴病之谓火怪病之谓痰寒热湿燥风五痰有异温清燥润散五治不同【寒痰温之热痰清之湿痰燥之燥痰润之风痰散之】有因火而生痰有因痰而生火或郁久而成病或病久而成郁金水木火土五郁当分泄折达发夺五法宜审【金郁泄之水郁折之木郁达之火郁发之土郁夺之】郁则生火生痰而成病病则耗气耗血以致虚病有微甚治有逆从微则逆治【以寒药治热以热药治寒】甚则从攻【以寒药治热佐以热药以热药治寒佐以寒药】病有本标急则治标缓则治本法分攻补虚而用补实而用攻少壮新邪专攻则是老衰久病兼为补为?久病兼补虚而兼解郁陈症或荡涤而或消溶积在胃肠可下而瘳块居经络宜消而瘳女人气滞於血宜开血而行气男子阳多乎阴可补阴以配阳苁蓉山药男子之佳珍【补阴故也】香附缩砂女人之至宝【行气故也】气病血病二者宜分阳虚阴虚两般勿紊阳虚气病昼重而夜轻【自子至巳为昼】血病阴虚昼轻而夜重【自午至亥为夜】阳虚生寒寒生湿湿生热【阳为气为真火】阴虚生火火生燥燥生风【阴为血为真水】阳盛阴虚则生火火逼血而错轻妄行阴盛阳虚则生寒寒滞气而周身浮肿阳虚畏外寒【阳气虚不能外故畏外寒】阴虚生内热【阴血虚不能配气故生内热】补阳补气用甘温之品滋阴滋血以苦寒之流调气贵用辛凉【气属阳无形者也气郁则发热故宜用辛凉之药以散之】和血必须辛热【血属阴有形者也血积则作痛故宜用辛热之药以开之】阳气为阴血之引导阴血乃阳气之依归阳虚补阳而阴虚滋阴气病调气而血病和血阴阳两虚惟补其阳阳生而阴长气血俱病只调其气气行而血随藏水发水以节阳气之燔滋水

养水以制心火之亢火降水升斯人无病陰平阳秘我体长春小儿纯阳而无陰老者多气而少血肥人气虚有痰宜豁痰而补气瘦者血虚有火可泻火以滋陰膏粱无厌发痈疽热燥所使痰薄不堪生肿胀寒湿而然北地耸高宜清热而用燥南方洿下可散湿以温寒

仁斋直指卷一

卷二

钦定四库全书

仁斋直指卷二 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

证治提纲

得病有因

治病活法虽贵於辨受病之证尤贵於问得病之因风则走注寒则拘挛暑则烦渴湿则重滯此受病之证然尔或耗於交淫或触於惊怒或伤於酒食或深居简出而受暑自非委曲?问其因则以意治病岂不缪耶有人喉间麻痒医问其平日所嗜曰常吃鸽子乃知鸽食半夏苗以生姜治之而愈有人痰热昏迷不醒医问其喜食者何有曰酷好煎炙飞禽乃用红圆子小七香圆和之而入朱砂膏为小圆薄荷泡汤灌下须臾即苏有人暑月深藏不出因客至于窗下忽尔倦怠力疲自作补汤得之反剧医问其由连进两服香薷饮作效举此为例其他可推古云医者意也苟不究其得病之因其何以为意会

治病当先救急

治病如奕碁当先救急急者何救其重而略其轻也假如病人发热经日服通利之剂泄泻不止呕吐大作粥药不入而热犹未已治法略去发热一节且以定呕进食为先惟人参生姜入些炙甘草煎汤调苏合香圆咽下养正丹斟酌圆数与之进剂以还呕吐自定饮食渐进泄泻亦自不作是元气既正纵有微热特假热耳人参川芎柴胡甘草调理之

治病如操舟

操舟在手当风波震荡之冲一有转移则舟覆矣医权药衡主持在我不可偏徇病家所欲尤不可张皇使病人惊间有病家粗识皮肤辨难反覆万物惑焉又有瘥後触犯再复隐讳不言须诘问其由庶得对病施药

用药中病不必尽剂

治寒以温治热以凉但中病即止矫枉则过正也盖凉药频施必至於呕恶沈冷温药频施必至於烦燥閤热所贵酌量权度一毫无过用焉是为活法

经常用药自有奇功

人有中年以上素挟风痰腹中时痛忽尔感冒虽已发散寒邪无复发热头疼之苦奈何风痰呕吐俱作诸药罔功但用茯苓二陈汤加南木香白豆蔻作剂入生姜乌梅同煎调苏合香圆贰粒咽下白圆子贰拾圆连续两服呕止痰消自然思食继是以北参川芎橘皮白豆蔻炙甘草调之若通小便则於内加麦门冬若通大便则於内加枳壳以咽神保圆肆伍圆大小腑一通顿遂勿药之喜

论肝脾主病

经曰人迎紧盛伤於寒气口紧盛伤於食盖肝脉可以知风寒之出入脾脉可以验饮食之盈亏肝亦主血脾亦主痰以其脉之虚实而益损之以其病之关系而对治之君请择斯二者

病人尺脉洪大

此病在下部也当踈利而出之脉洪大主热多是大小便不通或小腹结急脐下蓄血或肾气攻刺发作奔豚或下焦停水外肾虚肿或风邪攻肾脚痹腰疼或肾臟风毒身下疮痒当随证体认以对病之剂主之大槩通利为第一义临诊精思而熟审焉

水气肾气血气风毒擒纵治法

此等证候先以青皮陈皮枳壳北梗半夏紫苏生姜甘草解其寒邪调其卫气然从斟酌用十枣汤吞养正丹轻者却只用神保圆夹青木香圆以五灵脂入乌梅浓蜜煎汤咽下钱氏宣风散亦可以利风毒俟大便通快流行其痛已减继是二陈汤加当归川芎木香缩砂辈调理之

治痢要诀

痢出於积滞积物积也滞气滞也物积欲出气滞而不与之出所以下坠里急乍起乍止日夜凡百余度病家所请莫不求其止孰知物积气滞致有如是之证耶继人但见有上项证候不论色之赤白脉之大小壹皆以通利行之物积用巴豆大黄辈气滞用枳壳桔梗青皮蓬术辈二者兼济必能收功其间佐以黄连阿胶圆效验尤着盖痢疾多因伤暑伏热酒面炙醞酿而成其阿胶尤大肠之要药有热毒留滞则能导无热毒留滞则能安平市肆或无圆子即以炒阿胶当归青皮赤茯苓黄连作剂入乌梅浓蜜同煎最能荡涤恶秽积滞既去遍数自嗣是却以木香茯苓缩砂白豆蔻陈皮甘草调之自然喜食食则糟粕入於大肠然後真人养脏汤易简断下汤可止则止矣

简径治痢

诸热痢血痢及痢後大肠里痛用萝卜截碎研细滤清汁壹小盏蜜水相半壹盏同煎早午食前服日晡以米饮下黄连阿胶圆百粒无萝卜萝卜子代之○又法热痢旧年白梅并好茶蜜水各半煎服冷痢生姜汁蜜水各半煎服仍兼木香生肉豆蔻为佐蜜最治痢

姜茶治痢法

姜能助阳茶能助陰二者皆能消散又且调平陰阳况於暑毒酒食毒皆能解之也不问赤白冷热通用之老生姜切如豆许与茶叶等分用新水煎服东坡医文潞公作效

禁口痢

下痢禁口不食虽曰脾虚盖亦热气闭隔心胸所致也俗用木香则失之温用山药则失之闭惟真料参苓白术散加石菖蒲末以道地粳米饮乘热调下或用人参茯苓石莲子肉入些菖蒲与之胷次一开自然思食

疟痢用常山罌粟殼

常山治疟罌粟殼治痢人皆薄之固也然下痢日久腹中无痛当澁肠则岂容不澁疟以痰水作恙法当吐痰逐水又岂容不为之吐下於斯时也不有罌粟殼【阙】

以为对治乎但中间有药辅之耳

治疟要诀

凡疟皆因腹中停蓄黄水惟水不行所以寒热不歇此疟家受病之处也治法暑疟纯热以香薷散加青皮北大黄两个乌梅同煎侵晨温服寒疟多寒以二陈汤加青皮良姜多用姜同煎侵晨吞神保圆五粒并欲取下毒水则去其病根寒热自解

发疟呕吐勿用常山

有中年人臟腑久虚大便常滑忽得疟疾呕吐异常惟专用人参为能止呕其他疟剂并不可施遂以茯苓二陈汤加人参缩砂而倍用白豆蔻进一二服病人自觉气脉颇消於是寒热不作盖白豆蔻能消能磨流行三焦荣卫一转寒热自平继今遇有呕吐发疟之证或其人素呕而发疟谨勿用常山惟以生萝卜生姜各研自然汁半盞入蜜三四匙乌梅两个同煎吞局方雄黄圆三四粒候其利下恶血痰水即以人参川芎茯苓半夏缩砂甘草调之万一呕不止而热不退却用真料小柴胡汤多加生姜主治其或呕吐大作而又发热且先与治疟生熟饮呕定以小柴胡汤继之

疟有水有血

水即水饮也血即瘀血也惟水饮所以作寒热惟瘀血所以增寒热常山逐水利饮固也苟无行血药品佐助其问何以收十全之效耶继自今疟家或衄血或唾血或大便血丝或月候适来适去皆是血证当以常山草果槟榔青皮乌梅甘草作剂於内加五灵脂桃仁为佐入生姜

浓蜜同煎以主治之

疟证寒热不歇有根

凡疟固当以风寒暑湿别而治之或汗或下或吐或温活人书之格法虽卢扁不能违矣然尝见疟之经久而不歇其故何耶有根在也根者何曰饮曰水曰败血是尔惟癖为疟之母惟败血为暑热之毒惟饮与水皆生寒热故暑之脉虚水与饮之脉沈脉癖之脉结聚挟水饮者为逐水消饮结癖者脇必痛为之攻癖不败血暑毒随证而利之寒热不除吾未之信

常山治疟须用大黄为佐

疟家多蓄痰涎黄水常山为能吐之利之是固然尔其有纯热发疟或蕴热内实之证投以常山大便秘点滴而下似泄不泄须用北大黄为佐大泄数行然後获愈或曰巴豆圆子相依而行亦能泄也是又不然巴豆攻於下积苟欲荡涤血热不可以无大黄凡疟方来与正发不可服药服药在於未发两时之先否则药病交争转为深害

寒热似疟

此伤寒一证而实非瘴疟也其人肝脉浮盛头痛怯风大抵小柴胡汤加青皮紫苏主之呕者多用生姜渴者多加乌梅其或伤暑兼之小柴胡汤加香薷入生姜乌梅同煎可也抑犹有说焉寒热之根非通利不能除也万一其根未锄又当以麻仁圆神保圆辈与之是亦先解後攻之意

吐汗下治疟

治疟总要不过吐汗下而已当下而下不尽腹中尚有余痛或大便一泄之後不复再泄但时时点滴而出者须再下之大黄以佐常山可也当汗而汗不匝或头汗至胷而手足无汗者须周浹一身而汗之青皮以佐紫苏可也所谓吐者须出尽其水饮若作吐剂常山岂容辍哉能於三者究竟焉收效必矣

疟後調理

疟之为厉大抵连絛有病瘥以後或饮食失节或恚怒伤中或梳洗感风又再发者何处以之曰热多者二陈汤加青皮甘草热少者二陈汤加青皮草果坚守胃气而已二药并用生姜乌梅蜜水同煎空心进剂其间干运更用巴豆圆子药疎利大便以泄毒气其何厉之有或服巴药过多以致腹痛可用生姜甘草煎汤温和解之甘草生姜解诸药毒

退热

退热用凉药不可十分尽或余热些少未去不足关心自然无事否则热去则寒起古人戒之一方多用川芎茯苓甘草少用白术麤末水煎病後和胃收斂浮阳屡试得效

柴胡退热不及黄芩

若药弗瞑眩厥疾弗瘳世俗治热例用柴胡最为稳当至若黄芩一輩则指为大寒不敢用之不思药病不相当鲜克有济继今退热而热不去者须用黄芩

退热有法

凡壮热烦燥用柴胡黄芩大黄解利之其热乍轻而不退盍用黄芩川芎甘草乌梅作剂或用黄连生地黄赤茯苓同煎临熟入灯心壹捻主之其效亦速盖川芎生地黄皆能调血心血调其热自退

小儿风证解热有三

痰盛搐掣大便秘结当以枳殼大黄灵脂甘草利之小便赤澁心热狂吼当以辰砂五苓散入灯心行之既利大肠矣利小便矣而风证乍作面色乍红常有怫郁之状何耶表热表邪犹未解也人参羌活散加青皮紫苏薄荷主之参苏饮亦可矣

滞血发热

其人脉澀必有漱水之证必有呕恶痰涎之证必有两脚厥冷之证亦必有小腹结急之证或唾红或鼻衄此皆滞血作热之明验也用药不止於柴胡黄芩当以川芎白芷桃仁五灵脂甘草佐之大便秘结者於中更加大黄浓蜜使滞血一通黑物流利则热不复作

佐助小柴胡汤

伤寒留蓄恶血内外俱热昏溃譫语亦有耳聋虚鸣之证与少阳经受病相似如服小柴胡汤不效当以黄连壹分赤茯苓半分剉细入灯心煎与之男女通用凡大小产热入血室小柴胡汤力所不及者於内加五灵脂仍以黄连赤茯苓汤佐之盖心生血黄连茯苓皆清心凉血之剂所以收功若夫疏利血毒则活人书桃仁承气汤有余勇矣

肾热用五苓散

肾气内虚邪热流入於肾经其脉洪大小便频数所出澁少赤浊而痛此不可以牵牛行之治法瞿麦灯心煎汤调真料五苓散渗泄其热邪水窠一通勿药有喜

下後大肠热肿坠重

诸有里热法当通利大便然下後肠头热肿而坠重者此更有热有瘀血挟气而蓄在下焦也更用黄连黄芩大黄辈下之於内以炒阿胶炒枳殼百药煎为佐多入浓蜜并乌梅同煎姜钱四五片可也

通利大便有法

凡通利大便若用大黄巴豆等药而大便不通者陰阳关隔水火不升降故也有热者来复丹夹三黄圆薄荷泡汤下无热者养正丹夹神保圆橘皮煎汤下

饭後随即大便

脾肾交济所以有水谷之分脾气虽强而肾气不足故饮食下咽而大腑为之餐泄也治法二神圆用故纸肉豆?修合或不换金正气散吞安肾圆主之盖脾肾之气交通则水谷自然剋化此所谓妙合而凝者也

脾泄肾泄

有脾泄有肾泄脾泄者肢体重着中脘有妨面色虚黄腹肚微满肾泄者肤腠怯冷腰臀酸疼上咳面黧脐腹乍痛治脾泄用苍术白术厚朴乾姜木香生肉豆?辈治肾泄用补骨脂及安肾圆震灵丹辈

肾泄

诸有泄泻用不换金正气散除湿汤之类以去风湿以安肠胃此上品药也次则温脾养胃之剂投之是为正法然用之而不作效抑且腹痛走上走下或脐间隐痛腰臀疼酸骨节软弱面色黧悴尺脉虚弱病安在哉曰此肾泄也当以炒故纸生乾姜官桂木香当归辈主之仍以安肾圆为佐其或肾水下涸心火上炎燥渴溺多引饮无度此陰阳离絶也识者忧焉

大便脱泄白脓

大人小儿泄痢无已其後变作白脓点滴而下或於粪尾见之为之温脾不愈法当温肾盖肾主骨髓白脓者骨髓之异名也要之始作白痢其气腥臭已经转下而且淹延日久无所谓痢矣今之白脓全无腥臭面色微黑骨力羸弱的见肾虚合用炒故纸当归木香乾姜官桂主之嗣是少与震灵丹或玉华白丹为佐虽然又有妇人一证似痢非痢泄下白脓心腹暴痛吼不忍闻此当为之通血投通血之剂却以养正丹辅之

脱肛

脱肛一证气聚不散也里急而不得出外胀而不得入先以枳殼散作剂又以枳殼烧灰存性

细末掺傅或津唾调傅气散则肿消矣仍用生姜汁调五苓散如膏入新水研散略煎吞黄连阿胶圆虽然此论肛门挟热而肿胀也其或肠中虚薄不收则理中汤钓肠圆养脏汤辈主治乌贼骨木贼草傅之【详见脱肛类】

小便不通

大凡水道不行其本在肾合用牵牛泽泻其末在肺合用葶藶桑皮二者得兼必然中病其间更以木通滑石佐之又能透达虽然大便小便脉络相贯也人有多日小便不通但用神保圆北亭圆辈大泻数行小肠自利

石淋

沙淋凝脂而易散石淋结块而难消攻疗石淋专以枳壳散空心食前吞来复丹为妙但恐太阴玄精石不得其真惟得真料而常服之关络开通忽尔大便洞泄石块自小便出

转胞

转胞证候孕妇多有之患在忍缩小便或喜食煎炒或饱後为热所迫遂使小肠之气逆而不通大肠之气与之俱滞外水不能入膀胱内水不能出膀胱淋急数每欲尿时痛不可言大便亦里急频并似痢非痢必以手从臍间按至脐下庶可立出小便否则逆上出而不禁甚者因此腹胀浮肿治法用凉药疎利小肠中热仍与通泄大肠迨其腹中搅痛大便大下则溺胞随即归正於是小便顺流葵子散见附妇人摘奇方

孕妇胎热似痢

孕妇七八个月伤暑伤热以致子烦胎气迫近於上咽喉窒碍心腹胀满下坠似痢每登厕时坐一炊久忽尔气下方得大便一通世俗率用痢药不知病在胎热气烦可小柴胡汤下黄连阿胶圆或用炒阿胶净黄连各一分枳壳北大黄半之分作两剂乌梅姜蜜煎服俟其大便调导却以川芎茯苓缩砂甘草继之若五苓散感应圆香连驻车非其治也

下焦蓄血

血之为病冒闷烦燥迷忘惊狂痰呕汗多骨热肢冷此外证然尔何以知其蓄在下焦曰脐下结急外热内痛尺脉洪而数也桃仁灵脂生地黄北大黄甘草利而逐之

产妇血块筑痛

此候因产断赶血未尽所致世俗收生多就踏板赶血不思生产之时已坐草近地久矣产毕臟腑虚空又且近地赶血冷湿乘之风邪入之使败瘀凝为血块是谓血母冲筑硬痛非乳香

没药延胡索五灵脂辈所能疗也治法不换金正气散加辣桂川芎白芷蓬术乾姜同煎乘热入法醋连进两服冷湿风邪一散其块自消散瘀皆从大小便而出凡新产须就床上赶血下帐避风

身体血滯作痛

身体疼痛非湿则痰固也人有挟刀锯之惊而又馁在其中为风寒水湿所伤致使心窍凝滯於是经络壅闭血不流行肠肉骨节为之刺痛治法当归川芎芍药白芷灵脂大黄甘草利之黑物小片而下其痛有瘳

身体胷腹隐热隐疼拘急足冷

此血之为病也以其饮酒嗜慾伏热受暑得之惟热毒暑毒酒毒为能伤血瘀血未去新血不荣身体所以隐痛拘急其里热足冷者血之证也用柴胡黄芩青皮枳殼灵脂桃仁木通甘草作剂多入大黄以利之俟其流利已尽小腹略无结急即以当归川芎壹倍橘皮半夏枳殼北梗木通甘草平之调其气血於是有瘳血属於心木通以通其心窍心窍既通经络之流行可知矣

血滯

人之一身不离乎气血凡病经多日疗治不痊须当为之调血血之外证痰呕燥渴昏溃迷忘常喜汤水漱口不问男女老少血之一字请加意焉用药川芎蓬术桃仁灵脂生地黄北大黄为要呕甚者多加生姜以先利其宿瘀嗣是茯苓茯神川芎甘草调理之

血崩

素问云陰虚阳抟谓之崩此即血得热则宣流之意也四物汤可以助陰生料枳殼散可以抑阳其间更以茯苓二陈汤和之使陰阳两得其平血自循於经络矣若夫冲任不固下元久虚以致血无关锁则用胶艾汤加当归木香咽下震灵丹为妙

吐血

血随气行气逆而上奔则血不循於经络而涌吐矣人知吐血出於上焦有热固也然能用柴胡黄芩蒲黄茅花等辈而不能枳殼北梗青皮生姜乌梅佐之又不能通利圆子以开其中脘导其大便则气如何而下降血如何而下行吾恐逆奔而上有不可得而止之者若夫依前治法血止而後又当以人参川芎当归茯苓橘皮半夏甘草为之调理虚则加木香热则加柴胡壅则加桑皮荆芥尤在权衡

治渴有法

凡病人兼有燥渴之证用乌梅瓜蒌根乾葛甘草数辈皆不作效遂致引饮过多两脚浮肿此证不可以为里热盖肾水不上升心火不下降故也须用交感丹为主却以乌梅浓蜜生姜甘草煎汤咽之肾水一升心火一降其渴自止脚亦不复肿矣

酒家有病勿用温药

有人饮酒过多因酒作病胃脘不快其气扞隔服无数二陈汤竟无寸效由是不喜饮食复以调气散投之致发大热自後只用薄荷煎鸡苏圆麻仁圆日就痊愈乃知胃脘闭隔热在上焦使然耳又有人酷好饮酒复感寒邪服不换金正气散以致内热愈炽烦渴且闷汗出如雨身体怯寒续後以小柴胡汤加枳殼白芍药解之柴胡黄芩退热枳殼寬中芍药调荣止汗顿然痊愈然则酒家抱病其可妄以温药尝试一中乎

伤寒筋惕肉瞤治法

筋惕身瞤发汗太过所致也古人以真武汤主之然真武汤能止其汗而不能定其瞤瞤者动也汗出表虚外风必入於腠理人知风以动之所以惕惕而自瞤而不知汗多则伤血血虚无以荣筋筋愈急而四体百骸愈为之瞤动治法不用驱风并发散等辈惟人参当归川芎芍药半夏茯苓甘草作剂以五灵脂为佐入生姜乌梅同煎自有神效右药专於生血生血乃所以收汗其或大便秘澀少加大黄以导之血脉一和不反掌而静定矣

发痙详证

庐江刘宝云产宝所载方药甚详独无产後中风角弓反张一证按产後中风因怀胎时多啗生冷脾胃受湿复经乳卧之後津液内竭履地太早脱着不时以致风邪乘虚入於足太阳之经其证发热头疼或时不热喘息痰咳言语不伦渐觉牙关紧急十指微动如摸物之状加以项背强直或哑或叫目睛直视肠滑不禁身如反弓转侧不仁如此十无一生活人书谓太阳发痙是尔凡产後初得发热常须审视若唇急舌蹇手指微动便以中风药品急治之用药归荆汤独活酒附在湿门独荆散防风散续命汤见附妇人方中男女通用

胃脇痛引背上头面两手浮肿

肾虚不能纳气归元气逆而上奔故胃膈满痛以手摩挲痛走背上又从背摩挲则其气循脇泄於後分而痛不作矣此气之为病固也奈何肾虚又不能行水故水随气奔上乘於肺头面两手浮肿气短而喘由是血化为水与之俱滯况其人旧来有风曰风曰水曰血曰气四者合而为病其痛非常如沈香木香乌药槟榔之类不能施其巧治法将何如曰先以二十四味流气饮加独活枳殼五灵脂炒牵牛入姜蜜乌梅同煎咽下养正丹貳拾粒雄黄圓拾粒升降水火引导大便次用桑皮紫苏木通阿胶当归桃仁青皮桔梗炒芫花生大黄作剂依前煎以姜蜜乌梅取尽大便黑物即收全功

肚皮痛

肾虚不能行水加之酒面无度醉後辄睡酒与水交聚於腹中而面毒复纏滯其气是以水滲於肚皮而作痛矣治法钱氏宣风散用蜜水煎咽下神保圆俟其大便流利然後以青木香圆壹分安肾圆倍之用二陈汤入少盐并生姜同煎空心咽下脾肾气复自然向安

胃堂气隔

有肺经伏热而气隔者有痰水在上而气隔者大槩以茯苓半夏枳殼桔梗为治法其肺热者如圣汤加桑白皮佐之心下水气者小半夏茯苓汤效胃烦活人书用山梔子

附证治赋

麻黄汤发腊月寒伤荣桂枝汤散冬天风伤卫九味羌活汤发三时之表【三时伤寒春夏秋也】六神通解散理晚發之邪【三月天行谓之晚發】香苏散十神汤参苏饮发表调中【平和之药外感内伤兼治】葛根汤解肌汤小柴胡和解半表大柴胡三承气攻热邪传里理中汤四逆汤散寒中陰经○已上治外感补中益气汤治饱饥劳役升阳顺气汤疗怒恐忧思调中益气汤调胃脾失协参术调中汤治脾肺俱伤升阳散火汤升散热邪【凡言热者指外热也】升阳益胃汤分消湿气○已上治内伤和解散金沸草散治时行寒疫神术散定风饼子疗暴中风邪人参败毒散升麻葛根汤解瘟疫而身热阳毒升麻汤雄黄解毒丸散天行而咽疼宣明双解散主温热始终之要药藿香正气散治暑湿内外之良方香薷饮清暑益气汤人参白虎汤益原散缩脾饮能驱实虚暑气平胃散羌活胜湿汤升阳除湿汤五苓散术附汤善解外内湿邪生料五积散解湿温寒【治表里之寒湿】防风通圣散清热润燥【治表里之热燥】搜风顺气丸神芎丸润大肠燥症黄连解毒汤三黄丸泻三焦火邪【凡言火者指内火也】当归六黄汤泻火滋陰防风当归饮补虚退热舟车丸三花神佑丸能除湿热【湿则生热】秦艽汤羌活愈风汤善解燥风【燥则生风】胃苓汤主伤暑泄泻腹疼柴苓汤治伤寒泄泻身热桂苓白术散疗霍乱而口发渴加减理中汤治吐泻而咽不乾苍术汤胃风汤治湿伤气分白痢便脓地黄汤芍药汤主热伤血分赤痢下血万安散七宝饮治症无汗而寒多热少清脾饮六和汤疗症有汗而寒少热多华盖散五拗汤主喘嗽因寒外袭洗肺散贝母散治咳由火内生○已上发表和中已治风寒暑湿燥火白虎汤泻胃火有余八珍汤补脾陰不足白术和胃丸能养脾胃寬中进食丸喜滋形气治中汤枳术丸和中丸大安丸保和丸健脾消食香殼丸香椴丸积气丹妙攻丸消块丸破积除症木香枳殼丸疗食停久发黄神妙列仙散治酒积陈成疸木香枳术丸化滯汤调气进食七转灵应丹万应丸取积追虫丁香脾积丸妙应丸治心腹诸疼大黄备急丸三阳散主卒暴百病三棱消积丸治新伤生冷硬物【内用巴豆】木香槟榔丸疗久患气食痞膨【内用大黄】巴豆斩关去时新之冷积可仗大黄破结推陈久之热症宜遵气病宜调气用木香榔香附枳殼血病宜和血以川芎当归桃仁红花越麴丸木香流气饮开郁气之无形蟠葱散撞气阿魏丸破积血之有质神砂一粒丹疗气郁而为心疼神圣代针散治血积而作疝气独活寄生汤开气血结滯在腰当归拈痛汤散湿热沈凝于足控涎丹小胃丹治湿热流注四腹作疼金枣丹虎骨散疗气血怫郁遍体为病

○已上调胃消食并治气血湿热郁积二陈汤以豁痰三补丸而泻火六君汤豁痰补气调胃六物汤降火补血滋阴【四物汤加黄栢知母是也】当归龙会丸善降阴火兼治脇痛人参保胃汤能开结痰并疗久疟太平丸消化丸治痰嗽有攻左金丸香连丸除热疼必效洗心散洗肝散泻心肝之火滚痰丸化痰丸蠲热燥之痰四七汤黑锡丹开痰结心胸清空膏凉膈散除火升头膈石膏羌活散祛风明目川芎石膏汤泻火定眩川芎茶调散治风热上攻头目葛花解醒汤疗湿痰中满胃肠龙脑鸡苏丸除肺心虚烦人参泻肺汤散胸膈实火犀角地黄汤桃仁承气汤茯苓补心汤阿魏丸小建中汤治火载血而上出当归承气汤瑞竹蒲黄散当归和血散聚金丸伏龙肝散疗阳逼阴而下行红花当归散千金桃仁煎六合汤理经脉不通凉血地黄汤解毒四物汤胶艾汤治崩漏不止金匱当归散清热安胎而易产丹溪天麻丸活血保产而无惊女金丹乌鸡丸调气血令老妇妊娠天一丸连翘饮泻火湿主小儿百病醒脾散玉饼子肥儿丸香椴丸治婴孩脾气不足而致疾泻青丸夺命散抱龙丸槟榔丸疗童疳肝邪有余而生灾金箔镇心丸金箔镇心丹安神定惊五福化毒丹犀角消毒饮清热解毒异攻散补痘疮之虚寒通圣散泻疹之实热内疎黄连汤千金 芦汤主阳痈肿掀向外内托复煎散渊然夺命丹治阴疽毒蕴于中立马回疗丹万灵夺命丹疗疔疮而有殊攻神效太乙膏散肿溃坚汤治瘰 而收实效紫金丹治药食衆毒兼痈疽疔肿【主解利】如圣散疗风湿诸邪及瘫痪痛风【主发散】香薷丸芎归丸疗痔而清热凉血槐角丸乌王丸治漏而散湿补虚清心莲子饮八正散治小便淋浊有虚实之分导滞通幽汤三和散疗大肠燥结有血气之异海藏五饮汤散五等之饮开结枳实丸消诸般之痰导痰汤三生丸豁痰?风千缙汤四磨汤下气定喘苏子降气汤消痰利气三因七气汤解郁开心瓜蒂散稀涎散四灵散吐涎而祛风苏青丹星香汤涤痰汤豁痰而顺气苏合香丸乌药顺气散匀气散善开结气小省风汤青州白丸子搜风丸能散风痰牛黄清心丸治诸痰热而类风诸小续命汤疗真中风而在脉三化汤主风入腑推陈润燥至宝丹治邪入臟散热消风龙星丹疎风清热豁痰愈风丹润燥祛风泻火换骨丹续命丹治风痰充塞经络而为瘫痪清燥汤健步丸疗湿热薰蒸筋骨而成痿痠南星治风痰苍术治湿痰天花粉治热痰海石治燥痰半夏治寒痰柴胡泻肝火黄连泻心火白芍药泻脾火黄芩泻肺火黄栢泻肾火天门麦门知母石膏竹茹童便玄明粉上清丸能散虚火荆?竹?贝母瓜蒌韭汁姜汁霞天膏二?汤善开虚痰气虚加以四君血虚加以四物○已上治痰火气风四君补气并益脾四物补血兼滋肾八物汤十全大补汤补气血两虚固本丸秘传补元丸补心肾不足钱氏白术散参苓白术散竹叶石膏汤补脾胃诸虚丹溪补阴丸金匱肾气丸三一肾气丸滋真阴久损崔氏八味丸补阴兴阳天王补心丹宁神定志朱砂安神丸凉血清心八味定志丸补虚开窍茯兔丸萆薢分清饮除浊止淋固精丸固真太宝丸秘精收脱保和汤知母茯苓汤黄芪鳖甲汤止嗽宁肺保真汤十味人参散人参养荣汤除热补虚一秤金七仙丹乌髮驻顏琼玉膏固本酒延年益壽○已上补气血臟腑以方加减存乎人要审病而合宜用药补泻行於味须随时而换气奇偶复七方须知【七方者奇偶复大小缓急也】初中末三治要察【初则发攻中则调和末则收补】寒因热用热因寒用通因通用塞因塞用【通因通用者通其积滞而下焦自然闭塞也】高者抑之下者举之外者发之内者夺之【塞因塞用者塞其下流而上焦自然开豁也】寒则兼凝热则开行风能胜湿湿能润燥辛能散结甘能缓中淡能利窍苦以泄逆酸以收耗碱以软坚升降浮沉则顺之【谓顺其升降浮沈之性也】寒热温凉宜逆也【谓以寒治热以热治寒也】病有浅深治有难易初感风寒乍伤饮食一药可愈旧存痼癖久患虚劳万方难瘳履霜之疾亟疗无妄之药勿试病若

伏虚宜半攻而半补医称多术或用灸而用针针有劫病之功灸获回生之验针能去气病而作痛灸则消血症以成形臟寒虚夺者治以灸?脉 挛痹者疗以针刺血实畜结肿热者宜从砭石气滞痿厥寒热者当仿导引经络不通病生於不仁者须覓醪醴血气凝泣病生於筋脉者可行熨药病慄悍者按而收之【谓按摩也】乾霍乱者刮而行之【谓刮沙也】医业十三科宜精一派病情千万变仔细推评姑撮碎言以陈管见後之学者庶达迷津

仁斋直指卷二

卷三

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷三 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

诸风

风论

气血痰水受病於内者也风寒暑湿致寇于外者也人之一身血气既虚陰阳不守饮食居处嗜慾无节冲风卧地调护不加於是经络空疎腠理开彻风邪乘其虚而入之中风诸风皆是物耳风之为病善行数变其中人也卒其眩人也晕激人之涎浮昏人之神乱挟热则痿痺缓弛挟寒则急痛拘挛自其邪气之入人也邪气反缓正气反急正气引邪为喎僻为窜视为掣纵为搐搦为瘫痪为反张在於阳则皮肤缓在於阴则腹里急缓则四肢不能收急则一身不能仰皆随其邪气所至表里浅深而有证也种类虽多大要有四血气偏虚半身不遂肌肉枯瘦骨间疼痛谓之偏枯神智不乱身体无痛四肢不举一臂不随谓之风痺【能言则可治】忽然迷仆舌强不语喉中窒塞噫噫有声谓之风癰【身软有汗则生】风寒湿三气合而为痺其人肉厚身顽不知痛痒风多则走注寒多则疼痛湿多则重着在筋则筋屈而不伸在脉则血凝而不流在肉则不仁在骨则癰重夫是之谓风痺伤风一证发热烦躁头疼面光恶风自汗盖风能散气故有汗也风家脉浮者病在表脉实者病在里脉虚者病在脏脉促者病在上浮则发散实则疎导虚则温之促於上而病人壮盛胃喉澎湃者瓜蒂散少少吐之俗谓热则生风大纲然尔多有胃虚气虚血虚虚极而生风者若诸虚证候天雄附子官桂川乌又不可阙治法大要尽以消痰顺气为先顺气用南木香苏合香圆辈消痰用南星半夏细辛僵蚕辈如石緑铁?水银轻粉铅霜朴消等剂谨勿妄施寒毒入胃则血脉凝澁真气消铄不旋踵而废人治风良剂小续命汤为上排风汤次之然二药主风不主气须以人侵顺气散乌药顺气散佐助其间气一流行则风亦疎散矣至若口开手散溲血遗尿眼合不开汗出不流吐沫气鼾声如鼾睡面緋面黑发直头摇手足口鼻清冷口噤而脉急数皆为不治之证其余诸风种类余於婴儿惊风指要备论之

诸风证治

心中风

心风偃卧热而瘡 唇赤其身有汗生白黑青黄唇上见 停停时悚扁医惊

心中风偃卧不能颠倒发热失音其舌焦赤汗流唇赤者可治灸心俞若唇上白黑青黄乃心坏为水面目停停时时悚动者并不治心俞二穴在第五椎骨下两傍各一寸半五臟俞穴千金翼所载与六十七难注同取分寸法男左手女右手以中指第一节为一寸

肝中风

肝家踞怒不低头 左脇偏疼筋急搜额目唇青为可疗 目黄目白使人愁

肝中风踞坐不能低头上视多怒左脇偏疼诸筋挛急头目瞤动其目青遶两目连额微青面黄者可治灸肝俞若大势青黑其目一黄一白者不治肝俞二穴在第九椎骨下两傍各一寸半

肾中风

肾中踞而腰脊疼 面浮耳黑贼风生脇无黄迹能全愈 直发泥容旦暮倾

肾中风踞坐腰脊痛引小腹面上浮肿其耳黑视左右脇未有点点黄色者可治灸肾俞若脇上黄点面如土色鬓发直齿黄赤者不治肾俞二穴在第十四椎骨下两傍各一寸半

肺中风

肺风喘促满胷堂 偃卧絜絜燥异常口鼻之间须要白 寻衣肺坏色忧黄

肺中风偃卧胷满气短喘息时嗽燥闷汗出其鼻白目下及鼻四围以至於口色白者可治灸肺俞若色黄乃肺坏为血其与寻衣摸空者并不治肺俞二穴在第三椎骨下两傍各一寸半

脾中风

脾中风兮肌肉瞤 踞而腹满吐咸酸唇并肢体通黄瘥 手足眸青疗已难

脾中风踞坐腹满皮肉瞤动四肢放纵其唇黄身通黄吐咸汁者可治灸脾俞若手足青且冷或目下青并不治脾俞二穴在第十一椎骨下两傍各一寸半

胃中风

胃病根源饮食来 擡肩喘息气难开口张额汗腹中满 浮诊双关脉大哉

胃中风腹满填胀隔塞不通张口喘息额上多汗孙地仙所谓新食竟取风为胃风是也或曰风中诸脏不关诸府是亦一说然胃为水谷之海五脏皆取气於胃故并存之三因云胃俞二穴在第十二椎骨下两傍各一寸半

中风恶证

中风恶证细推求 口噤须迟脉数忧眼合不开并窜瞪 面绯面黑手难收口开吐沫气鼾大发直摇头汗不流 鼾?喉鸣兼鼻冷 遗尿泻血并皆休

中风多是恶风自汗心风脉浮洪肝风脉浮弦肾风脉浮滑肺风脉浮濡脾风脉浮缓或以三部候之或以本脏取之不可一槩论也医者当明辨之

治卒中法

圆白天南星【湿纸裹煨】 南木香

苍术【生】 白羊眼半夏【用百沸汤就跳蘸少顷各一钱半】 辣细辛 甘草【生】
石菖蒲【细切各一钱】

右件剉散分作二服水一盏半生姜七厚片煎取其半乘热调苏合香圆三圆灌下痰盛者加全蝎二枚灸治一切卒中不论中风中寒中暑中湿中气及痰厥饮厥之类初作皆可用此先以皂角去弦皮细辛或生南星半夏为末揭以管子吹入鼻中俟其喷嚏即进前药牙噤者中指点南星细辛末并乌梅肉频擦自开

又法

南木香【细剉贰钱】 生南星【七片】 生姜【七片】

石菖蒲【二寸槌碎】

右煎取清汁乘热调南木香末壹钱苏合香圆三圆与之

小续命汤治中风诸风迷仆涎潮舌强语蹇或昏溃痿?或厥冷拘挛不论表里浅深服之皆验

麻黄【去节】 人蓂 防己

官桂 黄芩 杏仁【去皮尖焙】

白芍药 芍药 甘草【炒各壹两】

防风【壹两半】 附子【炮去皮脐只用半两】

右剉散每服三钱姜五厚片枣二枚水盞半煎一盞温服恍惚加白茯苓骨节烦疼素有热去附子倍芍药烦燥大便秘去附子倍芍药加竹?大便利素有寒去黄芩加白术附子骨肉冷疼加辣桂附子呕逆腹胀加人蓂半夏自汗去麻黄加芍药大便结热去附子加枳殼大黄痰多加南星炮切数片风虚加当归渴加栝蒌根身疼加秦艽喘急加炒桑白皮

排风汤治五脏风诸风亦治风毒脚气肿痛

白鲜皮 白术 白芍药

辣桂 当归 川芎

杏仁【去皮尖微炒】 防风 甘草【各貳两炒】

独活 麻黄【去节】 白茯苓【各叁两】

右麤末每服三钱水盞半姜四片煎一盞温服

良方人蓂顺气散治诸风战掉拳挛眩晕喎邪麻痹疼痛

川芎 桔梗 白术

白芷 陈皮 枳殼【炒】

甘草【各壹两炒】 麻黄【去节】 天台乌药【去心各壹两半】

人蓂 白姜【炮各半两】

右为末每二钱姜枣煎服

乌药顺气散证治同前亦主脚气

乌药【去心】 麻黄【去节】 陈皮【各貳两】

川芎 枳殼【炒】 北梗

白芷 直僵蚕【炒去丝】 甘草【炒各壹两】

白姜【炮半两】

右为末每二钱姜枣煎服

摄生饮治一切卒中不论中风中寒中暑中湿及痰厥饮厥气厥之类初作即用此

圆白南星【湿纸裹煨】南木香 半夏【用百沸汤就跳蘸少顷各

壹钱半】 辣细辛 苍术【生】

甘草【生】 细石菖蒲【各壹钱】

右剉分贰服每服水盏半姜七厚片煎取其半乘热调苏合香圆【方具诸气门】参圆灌下痰盛加炙全蝎贰枚先以皂角肉细右为末管子竭些吹入鼻中候喷 即进药牙噤者乌梅肉揉和南星细辛末以中指频擦自开

三生饮治卒中昏迷痰盛喉鸣口眼喎斜半身不遂但脉沈无热者可服

南星【壹两】 川乌【生】 附子【生各去皮脐半两】 南木香【贰钱半】

右?咀每服三钱水壹盏半姜十厚片煎取半微温服

附香饮证治如前

附子【生四钱】 木香【贰钱】

右?咀分两服每用水盏半姜十片煎取半微温服虚人可用

星香饮证治如前

南星【捌钱】 木香【贰钱】

右剉分生服每用水盏半姜十片煎六分温服气盛人用此

大醒风汤治卒中诸风涎潮痰厥语澁神昏

附子【生】 南星【生各叁分】 全蝎

川芎 防风【各壹分】

右剉散每三钱姜十片煎服气不和加木香

省风汤

南星【炮壹两】 防风【半两】 甘草【炒壹分】

右剉每服三钱姜十片煎服气虚人加生附子沈香气逆加紫苏木香头痛而晕加全蝎多痰加半夏

左经圆治诸风瘫痪拘挛强直疼痛或跌扑伤损亦主之

草乌【炮去尖四两】 川乌【炮去皮脐贰两】 没药【壹两半】

乳香【壹两】

黑豆【生壹升以班猫貳拾壹个去头足翅同煮候豆熟为度去班犹取豆焙乾用】

右细末醋和豆为糊圆桐子大每服三十圆温酒下

铁骨丹治诸风瘫痪拳挛半身不遂

川乌头 草乌头【各炮去皮脐尖】 川芎

当归【酒浸】 辣桂 川续断【洗?】

华阴细辛 补骨脂【炒】 乌蛇【洗酒浸取肉?乾柒钱半】 直僵蚕【炒去丝】

木鼈子【去殼炒熟】 天麻【酒浸?】

巴戟【酒浸去心?】 防风 滴乳香

没香 麻黄【去节】 羌活

独活 坚白南星【炮熟】 白蒺?【炒搗去刺】 薏苡仁 苍术【炒各半两】

?藓【盐水煮乾】

杜仲【去麤皮剉盖注制炒焦】

牛膝【酒浸?各一两】 虎胫骨【洗酒浸炙焦】 自然铜【烧红醋淬化次各三两】

白附子【炮】 川五灵脂【各四钱】 秦艽

全蝎【去毒微炒各二钱半】麝香【半钱】

右细末乳香没药麝别研渐入拌和以浸药酒调飞麪煮糊研筑圆弹子大每服一圆温酒磨下或宣木瓜煎汤下黑豆淋酒下不拘时服仍间用高良姜碎壹升煎汤围燠荡浴最妙未服药前须以班猫二十一个去翅足用黑豆一建盏慢火同炒焦只用七个并豆入全蝎十四枚微炒五灵脂二钱半为末糕糊圆麻子大每二十一圆老酒下先去其风根

铁弹圆治诸风瘫痪

川乌【炮去皮脐一两半】川五灵脂【四两】乳香

没药【各一两】麝【一钱】

右乳香以乾竹叶包裹用熨斗火熨过即研成末余药末之拌和再碾滴水为圆弹子大每一圆薄荷酒磨下

拒风丹治一切风

川芎【四两】防风【一两半】天麻

甘草【炒各一两】细辛 萆拔【各半两】

右末炼蜜和杵每两作三十圆每服一圆细嚼荆芥酒下伤风鼻塞项强头疼姜汤下

麝香圆治白虎?疔风走注疼痛遍身瘙痒如虫啮昼静夜剧

川乌【大八角者三个】全蝎【二十一个】地龙【半两】

黑豆【并生用二钱半】麝香【半字】

右细末糯糊圆菉豆大每服七圆甚者十圆夜卧令膈空温酒下微出冷汗便瘥

增味五痹汤治风寒湿合而为痹肌体麻痹不仁

羌活 防己 片子姜黄

白术 海桐皮 当归

白芍药【各一两】甘草【炒七钱半】

右剉每服三钱姜十厚片煎服病在上食後病在下食前

瓜蒂散吐法

右瓜蒂末一钱熟水调下若风颠证须以瓜蒂散吐痰

稀涎散治风涎潮塞上膈气闭不通

猪牙皂角【四条肥实不蛀者去黑皮】 光明晋矾【一两】

右细末轻者半钱重者三字熟水调下但少吐之弱者不可吐用养正丹三十圆研细南木香煎汤调下仍与南星附子豁痰归经鸡心槟榔亦能疎风顺气

鹤膝风挛方真紫金皮老酒煎候温常服

急风方

朱砂【一字】 轻粉【一点】 巴豆【去油如霜些儿】 全蝎【一枚】
蝉壳【两枚去土】

右末之研和大人尽剂用薄荷泡汤调下小儿分半用乳汁调下或吐痰或泄毒物皆效

乌龙丹治诸风瘫痪口眼喎斜语言蹇澁

真川乌【生去皮脐】 好五灵脂【各二两】

右末入脑麝半钱同研滴水圆小弹大阴乾每一圆先姜汁研开次好酒调下空心食前日两服似铁弹圆

庐江刘宝治瘰良方

归荆汤治风瘰昏迷吐沫抽掣背脊强直产後中瘰通用

当归 荆芥穗

右等分末之每二钱水一盞酒少许煎七分灌下如牙紧用铜匙斡以鸡羽蘸药入口或用童尿调下或以川芎代当归亦妙

又方

黑豆【炒焦好酒淋之取清汁】

右每酒一盞独活剉三钱煎七分温服又连续进剂以瘥为度

太阳风痙证候始则发热腹痛喘息涎浮次则牙紧头摇十指微动渐加项背强直转侧不仁甚者昏困失音目睛直视滑泄不禁身腰反张如此则十不救一新产血虚汗出伤风亦作痙证凡产後发热若舌蹇唇急手指微动便急作风痙疗之荆归汤独活酒【方见在湿门】人为邪气所干则发而为病若气若血若痰若水若风若寒若暑若湿腑臟表里冷热虚实各有受病之处用药之法必究其原而後可以起病否则前贤所谓猎不知兔广络原野冀一人获之术亦疎耳是可以人试技乎哉

附诸贤论

病机机要曰治风须分在臟在腑在经之异云风本为热热胜则风动宜以静胜其燥是养血也治须少汗亦宜少下多汗则虚其卫多下则损其荣宜治在经虽有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者多着四肢有表证而脉浮恶风拘急不仁中臟者多滞九窍唇缓失音耳聋鼻塞目瞽大便结闭中腑者宜汗之中臟者宜下之表里已和宜治之在经当以大约养之

发明云中血脉则口眼喎斜中腑则肢节痙中臟则性命危三治各不同中血脉外有六经之形证则从小续命加減中腑内有便溺之阻隔宜三化汤等通利之外无六经之形证内无便溺之阻隔宜养血通气大秦芄汤羌活愈风汤主之

刘宗厚曰按此分在表在里在经之三证立汗下调养之三法可谓开後世之盲聋但所用诸方学者宜详审之河间曰风病多因热甚俗云风者言末而忘其本也所以中风有瘫痪者非谓肝木之风实甚而卒中之也亦非外中於风良由将息失宜而心火暴甚肾水虚衰不能制之则阴虚阳实而热气怫郁心神昏冒筋骨不用而卒倒无知也多因喜怒悲忧恐五志过极而卒中者皆为热甚故也若微则但僵仆气血流通筋脉不挛缓者发过如故或热气大盛郁滞不通阴气暴绝阳气後竭而死○痰涎者由热甚则水化制火而生○偏枯者由经络一侧得通否者痹而瘫痪也○口筋噤急者由风热太甚以胜水湿又津液滞于胸膈以为痰涎则筋太燥然燥金主于收敛劲切故也○或筋反缓者乃燥之甚血液衰少也诸筋挛易愈诸筋痿难复以见燥之微甚也

丹溪云案内经已下皆谓外中风邪然地有南北之殊不可一途而论往刘守真作将息失宜水不能制火极是由今言之西北二方亦有真为风所中者但极少尔东南之人多是湿土生痰痰生热热生风也邪之所臻其气必虚风之伤人在肺脏为多○许学士谓气中者亦有此七情所伤脉微而数或浮而紧缓而迟必也脉迟浮可治大数而极者死若果外中者则东垣所谓中血脉中府中臟之理其于四肢不举亦有与痿相类者当细分之局方风痿同治大谬发挥甚详子和用三法如的系邪气卒中痰盛实热者可用否则不可

河间曰中风之人不宜用龙麝【阙】朱譬之提铃巡於街使盗者伏而不出益使风邪入於骨髓如油入而莫能出也此之类焉若痰潮不省昏愤不知事宜用药下其痰涎故风者乃百病之长虽审经意故莫不有疑者也吁医之不明运气造化地理病机之微而欲行通变之法者难矣哉

附诸方

防风通圣散【宣明方】论曰风寒热诸疾之始生也人之藏府皆风之起谓火热阳之本也谓曲直动摇风之用也眩运呕吐谓风热之甚也夫风热拂郁风火生於热以热为本而风为标凡言风者即风热病也气壅沸筋脉拘倦肢体焦痿头目昏眩腰脊强痛耳鸣鼻塞口苦舌乾咽嗑不利胃隔痞闷咳呕喘满涕唾稠粘肠胃燥热结便溺淋闭或夜卧寝汗咬牙唾语筋惕惊悸或肠胃拂郁结水液不能浸润於周身而但为小便多出者或湿热内余而时有汗泄者或因亡液而成燥淋闭者或因肠胃燥郁水液不能宣行於外反以停湿而泄或燥湿往来而时结时泄者或表之阳和正气【卫气是也】与邪热相合并入于里阳极似阴而战烦渴者【表气寒故战里热甚则渴】或虚气人不已者【经言与卫气并入于里则寒战也并出邪热於表则发热大则病作离则病也】或风热走注疼痛麻痹者或肾水真阴衰虚心火邪热暴甚而僵仆或卒中久不语或一切暴瘖而不语语不出声或暗风痼者或洗头风或破伤风或中风诸潮搐并小儿诸疳积热或惊风积热伤寒疫疠不能辨者或热甚怫结而反出不?者或热极黑陷将死或大人小儿风热疮疥及久不愈者或头生屑偏身黑黧紫白斑驳或面鼻生紫赤风刺瘾疹俗呼为肺风者或成风疔世传为大风疾者或肠风痔漏并解酒过热毒兼解利诸邪所伤及调理伤寒未发汗头项身体疼痛者并两感诸证兼治产後血液损虚以致阴气衰残阳气郁甚为诸热证腹满澁痛烦渴喘闷谵妄惊狂或热极生风而热燥郁舌强口噤筋惕肉瞤一切风热燥证郁而恶物不下腹满撮痛而昏者【恶物过多而不吐者不宜服之】兼消除大小疮及恶毒兼治堕马打扑伤损疼痛或因热结大小便澁不通或腹急痛腹满喘闷者并皆治之

防风 川芎 当归

芍药 大黄 薄荷叶

麻黄 连翘 芒硝【朴硝制过者是已上各半

两】石膏 黄芩

桔梗【各一两】滑石【三两】甘草【二两】

荆芥 白术 梔子【各二钱五分】

右为末每服三钱水一大盏生姜三片煎至六分温服涎 加半夏五钱姜制此药不可无生

姜同前刘廷瑞方有缩砂无芒硝其余皆同

加减防风通圣散 顶防风疾常服取效

防风 川芎 当归

芍药 薄荷 麻黄

连翘【各半两】 黄芩 桔梗【各一两】

甘草【二两】 荆芥 白术【各二钱半】

乌药 羌活 天麻

僵蚕【等分】

体弱气虚者磨木香 痰涎壅盛者加南星半夏枳实

搜风顺气圆【圣惠方】治肠胃积热以致膈间痞闷大便结燥小便亦澁肠风痔痛腰膝酸疼肢节顽麻手足瘫痪行步艰辛语言蹇澁三十六般风及七十二般气无不治之此药宣通气血清热润燥通利大小便则诸病自愈

车前子【一两半】 白槟榔 大麻子【微炒去壳别研】 牛膝【酒浸宿】
乾山药【各二两】 枳壳【去穰麸炒】

防风【去芦】 独活【各一两】 郁李仁【汤泡去皮研】 大黄【五钱半生半熟】

右为细末练蜜丸如梧桐子大每服二十丸茶酒米饮任下早晨临卧各一服久觉大肠微动以羊肚肺羹补之此药膏粱之家肥甘大过以致大便结燥尤宜服之老人大肠无血大便结燥最宜

苏合香圆 疗传尸骨蒸殭殭肺痿症忤鬼气卒心痛霍乱吐痢时气鬼魅瘴痞赤白暴痢瘀血月闭痙癖丁肿惊癇及小儿吐乳大人狐狸等病○小儿用大绯绢袋盛当心带之一切邪鬼不敢近○凡人痰气及中风痰涎壅上喉中有声不能下者用青州白丸子同丸生姜自然汁化下立效○产妇中风小儿惊风牙关紧硬不开及不省者擦牙即开然後用风药治之○小儿吐泻惊疳先用火焙此药然後用生姜白自然汁化开白汤调灌○脚气冲心用萆薢子去壳槌碎和丸敷则脚心疼痛立止○心腹绞痛中满呕吐姜汤化服○大人小儿伤风咳嗽姜葱汁白汤调下○中风狂乱如见鬼神白汤调服【方见咳 门】

白圆子【和剂方】治男妇风痰壅盛手足瘫痪呕吐涎沫及小儿惊风并皆治之【方见痰类】

大秦艽汤【拔粹方】治中风外无六经之形证内无便溺之阻隔知为血弱不能养於筋故手足不能运动舌强不能言宜养血而筋自荣

秦艽 石膏【各三两】 甘草

川芎 当归 羌活

独活 防风【去芦】 黄芩

白芍药 吴白芷 白术

生地黄 熟地黄 白茯苓【各二两】 细辛【五钱】

右?咀每服一两水二盏煎至一盏去滓通口服如天阴雨加生姜七片如心下痞加枳实一钱煎服

羌活愈风汤【拔粹方】治肝肾虚筋骨弱语言难精神昏溃及治风湿内弱风热体重或瘦而一枝偏枯或肥而半身不遂心乱则百病生静则万病息此药能安心养神调阴阳无偏胜

羌活 甘草【炙】 防风【去芦】

黄芪【去芦】 人蓂【去芦】 蔓荆子

川芎 细辛【去芦】 枳壳【去穰麸炒】

地骨皮 麻黄【去根】 知母【去皮】

独活 白芷 杜仲【炒断丝】

秦艽【去芦】 柴胡【去苗】 半夏【汤洗姜制】

厚朴【姜制】 防己 熟地黄

前胡【各二两】 芍药【去皮】 黄芩【去腐】

白茯苓 石膏 生地黄

苍术【各四两】 桂【一两】

右剉每服一两水二盏煎至一盏去渣温服如遇天阴加生姜三片煎空心一服临卧再煎查服○常服之药不可失四时之辅如望春大寒之後加半夏柴胡人蓂各二两望夏穀雨之後加石膏黄芩知母各二两季夏之月加防己白术茯苓各二两望秋大暑之後加厚朴藿香各二两桂一两望冬霜降之後加附子官桂各一两当归二两

大乌药顺气散 治诸风气手足瘫痪

归芍地黄芎乌药陈地龙香附缩砂枳芩半与防风苏桔并甘草乳没沉香倭姜枣均煎服诸风气立通

当归 芍药 生地黄

川芎 乌药 陈皮

地龙 香附子 砂仁

枳殼 黄芩 半夏

防风 紫苏 桔梗

甘草【各半两】 乳香 没药

沉香【各二钱五分此三味为末煎熟药加内服】

右用姜枣同煎

匀气散【瑞竹方】 治腰腿疼痛手足挛拳及治中风不语口眼喎斜半身不遂等证前代曾服有效

白术【二两煨】 天台乌药【一两】 天麻【半两】

沉香 青皮【去穰】 白芷

人蓂【去芦】 甘草 紫苏

木瓜【各二钱半】

右?咀作十服每服水一盞生姜三片煎至半盞去渣溫服

換骨丹【宣明方】治癱瘓風中風口眼喎斜半身不遂并一切風癰暗風并宜服之

我有換骨丹傳之極幽秘疎開病者心扶起衰翁臂氣壯即延年神清日不睡南出張仙翁三百八十歲槐皮芎朮芷仙人方首蔓十伴各停勻苦味香減半龍麝即少許朱砂作衣纏麻黃煎膏丸大小如指彈修合在深房勿令陰人見夜臥服一粒遍身汗津滿萬病自消除神仙為侶伴

麻黃【煎膏】 仙朮 槐角子【取子】

桑白皮 川芎 香白朮

威靈仙 人蔘 防風

何首烏 蔓荊子【各一两】 苦蔞

五味子 廣木香【各半两】 麝香

龍腦【少許研】 朱砂【研為衣不拘多少】

右為末桑白單搗細秤以麻黃膏和就杵一万五千下每兩分作十丸每服一丸以硬物击碎溫酒半盞浸以物蓋不可透氣食後臨臥壹呷咽之衣蓋覆當自出汗即差【和胃湯調補】及避風寒茶下半丸蓋出汗入膏時如稠再入水少許煎動入藥唯少為妙其麻黃膏不可多其麻黃膏煉法見後

祕傳祛風散

羌活 獨活 山梔

半夏 蒼朮 蒼耳子

甘草 茯苓 陳皮

當歸 生地黄 防風

荊芥 漢防己 白芍藥

牙皂 威靈仙【各等分】

右?咀每服水二盞姜三片煎至一盞不拘時服加減于後

御風丹【聖惠方】治一切中風半身不遂神昏語蹇口眼喎斜婦人頭風血風暗風倒仆嘔
啉涎痰手足麻痺

川芎 白芍藥 桔梗

細辛 白僵蚕 川羌活

天南星【姜制各半兩】麻黃【去根節】 防風【去蘆】

白芷【各一兩半】 乾生姜 甘草【炒各七錢半】 朱砂【二錢半為衣】

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服一圓熟酒化下食前日三服神昏有涎者加朱砂二錢半

續命煮散【大全良方】治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼瞤動或時搖擗亡失津液渴
欲飲水此藥能扶榮衛去虛風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風 獨活 當歸

人蔘 細辛 葛根

芍藥 川芎 甘草

熟地黃 遠志【去心】 荊芥【各五錢】

官桂【七錢半】 半夏【五錢】 汗多不止加牡蠣粉

右?咀每服一兩生姜三片水二盞煎至一盞去滓通口服

獨活湯【大全良方】治虛風昏憤不自知覺手足痠癱坐臥不寧或發寒熱若血虛不能服
發汗藥及中風自汗尤宜服之

川獨活 羌活 人蔘【去蘆】

防風 當歸 細辛

茯神【去木】 半夏 桂心

白微 远志 菖蒲【去毛】

川芎 甘草【各五钱】

右?咀每服一两水一盞生姜五片煎至八分去滓食後温服

川芎石膏汤【宣明方】治风热上攻头目昏眩痛闷风痰喘嗽鼻塞口疮烦渴淋闷眼生翳膜此药清神爽志宣通气血治中风偏枯解中外诸邪调理诸病劳复传染

川芎 芍药 当归

山梔子 黄芩 大黄

菊花 荆芥穗 人葭

白术【各半两】 滑石【四两】 寒水石

桔梗【各二两】 甘草【三两】 砂仁【二钱半】

石膏 防风 连翘

薄荷叶【各一两】

右为末每服三钱水一盞煎至六分去滓食後服水调亦得忌姜醋发热物

保命丹【千金方】治诸风疾癰不能语言心忪健忘恍惚去来头日晕眩胷中烦郁痰涎壅塞抑气攻心精神昏愤又治心气不足神志不定惊恐怕怖悲忧惨蹙虚烦少睡喜怒不时或发狂颠神情昏乱及小儿惊癇惊风抽搐不定及大人暗风并羊颠猪颠发叫朱砂【一两】珍珠【二钱】 南星【一两】

麻黄【去根节】 白附子【炮】 雄黄

龙脑【各半两】 琥珀【三钱】 僵蚕【炒】

犀角【镑】 麦门冬【去心】 枳殼

地骨皮 神曲 茯神

远志【去心】 人葭 柴胡【各一两】

金箔【一百片】 牛黄【三钱】 天麻【半两】

脑子【少许】 麝香【少许】 胆矾【半两】

牙硝【四钱】 皂车 天竺黄

防风 甘草 桔梗

白术 升麻【各一两】 蝉蜕【半两】

黄芩【二两】 荆芥【二两】

右为细末炼蜜为丸如弹子大每服一圆薄荷汤化下不拘时候忌猪羊鰕核桃动风引痰之物及猪羊血更加大川乌炮去皮脐姜制半夏白芷川芎各壹两猪牙皂角一两和前药丸服尤妙

神效活络丹治风湿诸痹肩臂腰膝筋骨疼痛口眼喎斜半身不遂行步艰辛筋脉拘挛能清心明目宽膈宜通气血年逾四十预服十数丸至不生风病白花蛇【酒浸焙乾二两】 乌梢蛇【酒浸焙乾半两】 麻黄【二两去节】

细辛【去土一两】 全蝎【一两半去毒】 两头尖【二两酒浸】 赤芍药【一两】 贯芎【二两】 防风【二两半】

葛根【一两半】 没药【一两另研】 血竭【七钱半另研】 朱砂【一两另研】 乌犀骨【半两】 地龙【半两去土】

甘草【二两去皮炙】 丁香【一两去枝】 白僵蚕【一两炒】 乳香【一两研】 麝香【半两另研】 片脑【一钱半另研】 官桂【二两去粗皮】 草薢【二两】 川羌活【二两】

虎胫骨【酥炙一两】 玄参【一两】 牛黄【二钱半另研】 天麻【二两】 威灵仙【一两半酒浸】 藿香【二两去土】

天竺黄【一两】 败龟板【一两炙】 人蓂【一两】

何首乌【二两】 白芷【二两】 乌药【一两】

安息香【一两】 青皮【一两】 黑附子【一两去皮炮】 香附【一两】 白薢【骨碎补【各一两】 黄连【二两】 茯苓【一两】 黄芩【二两】

白朮【一两】 熟地黄【二两】 松香脂【半两】

大黄【二两】 当归【一两半】 木香【二两】

沉香【二两】 金箔【为衣】

右为细末炼蜜为丸如弹子大每服一丸细嚼温酒茶清漱下随证上下食前後服头风搐茶下

搐鼻通天散治卒暗中风倒地牙关紧急人事昏沈

川芎 细辛 藜芦

白芷 防风 薄荷【各一钱】

猪牙皂角【刮去皮三个】

右为细末用芦筒纳药每用少许吹入鼻中

麻黄膏【宣明方】 治中风不省人事卒然倒地

右须旺日乙卯者采麻黄一秤拣去根一寸长取东流水三石三斗以无油腻铛量大小盛五七斗者可先煮五沸掠去滓逐旋添水尽至三五斗以来漉去麻黄淘在盆中澄定良久用细罗子滤去滓取清者铛内再熬至一斗再澄再滤取汁再熬至升半已来为度只是勤搅勿令着底恐焦了熬时忌鸡犬阴人澄时须盖覆不得飞入尘土其药放一二年不妨如膏稠用水解熬再匀凡中风卒倒用此膏加入汤药内服或用此膏丸药

三化汤【拔粹方】 治中风外有六经之形证先以加减续命汤随证治之内有便溺之阻隔复以此导之

厚朴【姜制】 大黄 枳实

羌活【等分】

右?咀每服三两水三升煎至一升半终日服之以微利则已如内邪已除外邪已尽当从愈风汤以行中道久服大风悉去纵有微邪只从愈风汤加减治之然治病之法不可失於通塞或一气之微汗或一句之通利如此为常治之法也久则清浊自分荣卫自和矣

附预防中风【出乾坤生意】

夫圣人治未病之病知未来之疾此其良也其中风者必有先兆之证觉大拇指及次指麻木不仁或手足少力或肌肉微掣者此先兆也三年内必有大风之至经云急则治其标缓则治其本宜调其荣卫先服八风散愈风汤天麻丸各一料为効宜常服加减防风通圣散预防其病则风疾不作而获其安矣

愈风汤 初觉风动服此不致倒仆此乃治未病之圣药也

又治中风症内邪已除外邪已尽当服此药以行导诸经久服大风悉去纵有微邪只从此药加减治之然治病之法不可失於通塞或一气之微汗或一旬之通利如此乃常服之法也久则清浊自分荣卫自和矣

羌活 甘草 防风

当归 蔓荆子 川芎

细辛 黄耆 枳殼

人蔘 麻黄 香白芷

甘菊花 薄荷 枸?

柴胡 知母 地骨皮

独活 杜仲 秦艽

黄芩 芍药【各三两】 石膏

苍术 生地黄【各四两】 肉桂【一两】

右剉每服一两水二钟生姜三片煎空心服临卧煎滓服空心一服吞下二丹丸谓之重剂临卧一服吞下四白丹谓之轻剂立其法是动以安神静以清肺○假令一气之微汗用愈风汤三两加麻黄一两匀作四服加生姜空心服以粥投之得微汗则住○如一旬之通利用愈风汤三两加大黄一两亦匀作四服如前服临卧服得利为度此药常服之不可失四时之辅○如望春大寒之後本方中加半夏人蔘柴胡各二两通前四两谓迎而夺少阳之气也○如望夏谷雨之後本方中加石膏黄芩知母各二两通四两谓迎而夺阳明之气也○季夏之月本方中加防己白术茯苓各二两通前四两谓胜脾土之湿也○望秋大暑之後本方中加厚朴二两藿香二两桂一两通前四两谓迎而夺大阴之气也○望冬霜降之後本方中加附子官桂各一两当归二两通前四两谓胜少阴之气也○如得春气候减冬所加四时类此此虽立四时加减更宜临病之际审察虚实寒热土地之宜邪气灵少此药具七情六欲四气无使五

脏偏胜及不动於荣荣卫如风秘服之永不结滞此药与天麻丸相为表里治未病之圣药也若已病者更宜常服无问男女老幼惊癇搐搦急慢惊风四时伤寒等病服之神効

八风散【和剂方】治风气上攻头目昏眩肢体拘急皮肤瘙痒癰疹成疮及治寒热不调鼻塞声重

藿香【去土半斤】 白芷 前胡【去芦各一斤】 黄耆【去芦】 甘草【燼】
人蓂【去芦各二斤】 羌活【去芦】 防风【去芦各三斤】

右为末每服貳钱水一鍾入薄荷少许煎汤调下食後服之

天麻圆治风因热而生热胜则动宜以静胜其躁是养血也

天麻 牛膝【二味用酒同浸三日焙乾】

玄蓂?藟【各六两别研】 杜仲【炒断丝七两】 附子【炮一两】 羌活【十四两】
川归【十两】

生芩 一方有独活五两肾间风

右为末蜜为丸如梧桐子大每服五七十丸空心温酒白汤下予按用药治病之法寒因热用热因寒用正治也今中风瘫痪之证本风火阳邪而用乌附等热药治之何哉盖中风瘫痪乃湿痰死血结滞於脏腑经络之间非乌附等热药而能开散流通之乎此非正治乃从治也书云从少从多各观其事则从治之药只可为引经而已丹溪云肥白人多湿少用乌附行经是也此方既用附子又用侧子官桂助之其理安在哉本欲削去姑存以待肥白多湿之人减而用之中病则已不可过肥白多湿之人不可用也

灸法

风池百会曲池合谷肩髃风市絶骨环跳三里等穴皆可灸之

附胃风

胃风方论

丹溪云此因初饮食讫乘风凉而致其证胀满食饮不下形瘦腹大恶风头多汗膈塞不通胃风汤正始此然亦看挟证加减脉右关弦而缓带浮

胃风汤【拔粹方】治虚风证能食麻木牙关急搐目内蠕瞤胃风面肿

白芷【一钱二分】 葛根 苍术

当归身【各一钱】 升麻【二钱】 甘草【炙一钱半】

柴胡 藁本 羌活

黄柏 草豆蔻【各三分】 麻黄【五分不去节】 蔓荆子【一分】

右?咀水貳盏姜三片枣一枚煎至壹盏去滓温服

胃风汤治风冷入于肠胃泄下鲜血或肠胃湿毒下如豆汁或瘀血【方见泻痢门】

附伤风

伤风方论

内经曰风为百病之长又曰风胜则动又曰贼虚邪者阳受之又曰伤於风者上先受之

丹溪云伤风属肺者多宜辛温或辛凉之剂散之如桂枝汤茯苓饮消风散羌活散究证施治

附诸方

桂枝汤治太阳经伤风头疼身痛或翕翕发热或洒洒恶风自汗【无汗者不可服】

桂枝 芍药【各三两】 甘草【炙一两】

右?咀每服三钱水一盏姜三片枣二枚煎七分去滓温服不拘时服惟春初依此方自春末夏至已前加黄芩半两夏至後加知母半两石膏二两或升麻半两若病人素虚寒不用加減

神术散【和剂方】 治四时瘟疫头痛发热及伤风鼻塞声重苍术【米泔浸五两】

藁本【去上】 香白芷

细辛【去叶土】 羌活【去芦】 川芎

甘草【炙各二两】

右为细末每服三钱水一盏姜三片葱白三寸煎七分温服不拘时如伤风鼻塞用葱茶调下二钱

定风饼子【简易方】治风客阳经邪伤腠理背脊强直言语蹇澁体热恶寒痰厥头痛肉瞤筋惕手颤鼻渊及饮酒过多呕吐涎沫头目晕眩常服消风去邪

川乌 南星 川芎

乾姜 甘草 半夏

天麻 白茯苓【各等分生用】加白附子

右为末姜汁丸如龙眼大作饼子生朱砂为衣每服一饼细嚼热生姜汤下不拘时服

金沸草散【和剂方】治肺经受风头目昏痛咳嗽声重涕唾稠粘及治时行寒疫壮热恶风

旋覆花【去梗二两】 荆芥穗【四两】 麻黄【去节】

前胡【去芦各三两】 甘草【炙】 赤芍药

半夏【汤洗七次姜汁浸各一两】

右?咀每服五钱水一盞姜三片枣一枚煎八分温服

葭苏饮【和剂方】治感冒风邪发热头疼咳嗽声重涕唾稠粘此药大解肌热宽中快膈或欲成劳瘵潮热往来并能治之

木香 紫苏叶 乾葛【洗】

半夏【汤泡七次姜制】 前胡【去苗】 人参【去芦】

茯苓【去皮各七钱半】 枳壳【去穰麸炒】 桔梗【去芦】

甘草【炙】 陈皮【去白各半两】

右?咀每服四钱水一盞半姜七片枣一枚煎六分去滓热服不拘时【易简方以气盛不用木香】

冲和散【简易方】治感冒风湿之气头目不清鼻塞声重肢体倦怠欠伸出泪

苍术【米泔浸炒六两】 荆芥穗【二两】 甘草【一两一钱半】

右?咀每服五钱水壹盏煎八分去滓热服不拘时

消风百解散【和剂方】治四时伤寒头疼发热恶寒及风壅咳嗽鼻塞声重

荆芥 白芷 陈皮【去白】

麻黄【去节】 苍术【各四两】 甘草【炙二两】

右?咀每服五钱水一盏姜三片葱白三茎煎七分不拘时服如咳嗽再加乌梅煎

川芎茶调散【和剂方】治诸风上攻头目昏重偏正头疼鼻塞声重

薄荷【去梗不见火八两】 川芎【四两】 羌活【二两】

甘草【二两】 细辛【去叶一两】 防风【去芦一两半】 白芷【二两】
荆芥【去梗四两】

右为末每服二钱食後茶清调下常服清头目一方无细辛

消风散【和剂方】治诸风上攻头目昏眩项背拘急鼻嚏声重耳作蝉鸣及皮肤顽麻瘙痒
瘾疹妇人血风头痛肿痒并皆治之

荆芥穗 甘草【炒各二两】 陈皮【半白半两】

人蓂【去芦】 茯苓【去皮用白者】 白僵蚕【炒】

防风【去芦】 芎藭 藿香叶【去梗】

蝉蜕【去土炒各一两】 厚朴【去皮姜制半两】 羌活【一两】

右为细末每服二钱感风头痛鼻流清涕者用荆芥汤茶清调下遍身疮癣温酒下

大辰砂圆【御药院方】清头目化痰涎及感冒风寒声重头目昏眩项背拘急皮肤瘙痒并
皆治之

天麻【去苗一两】 防风【去芦二两】 细辛【去叶土半两】

薄荷叶【半两】 川芎 甘草【炙】

吴白芷 朱砂【各一两为衣】

右以七味为细末炼蜜丸如弹子大朱砂为衣每服一丸细嚼食後生姜汤下茶清亦可

人蓂败毒散【和剂方】治伤寒头痛壮热恶寒及风痰咳嗽鼻塞声重如心经蕴热口舌乾燥者加黄芩

柴胡【去苗】 甘草【炙】 桔梗

人蓂【去芦】 羌活【去苗】 芎藭

茯苓【去皮】 枳殼【去穰麸炒】 前胡【去苗洗】

独活【去芦各等分】

右?咀每服三钱水一盞姜三片薄荷少许同煎七分去滓温服

羌活散【和剂方】治风气不调头目昏眩痰涎壅滞遍身拘急及风邪塞壅头痛项强鼻塞声重肢节烦疼天阴风雨顿觉不安

前胡【去芦】 羌活【去芦】 麻黄【去根节】

白茯苓【去皮】 川芎 黄芩

甘草【炙】 蔓荆子【去白皮】 枳殼【去穰麸炒】

细辛【去苗】 石膏【别研】 菊花【去便】

防风【去芦各一两】

右?咀每服一两姜四片薄荷三叶水二盞煎至一盞温服

附破伤风

破伤风方论

病机云破伤风者同伤寒证治通於表里分别阴阳有在表有在里有在半表半里者在里宜下在表宜汗在表里之间宜和解不可过其治也

河间曰破伤风者从外至内甚于内者则病也因此卒暴伤损风袭之间传播经络至使寒热更作身体反强口噤不开甚者邪气入脏则分汗下之治诸疮不差荣卫虚肌肉不生疮眼不合者风邪亦能外入于疮为破伤风之候故诸疮不瘥吁世皆言着灸为上是为热疮而不知火热客毒逐经诸变不可胜数微则发热甚则生风而搐或角弓反张口噤目邪皆因疮郁结於荣卫不得宣通而生亦有破伤不灸而病此者疮着白痴疮口闭塞气难通泄故阳热亦为郁结而热甚则生风也故表脉浮而无力太阳也脉长而有力者阳明也脉浮而弦小者少阳也太阳宜汗阳明宜下少阳宜和若明此三法而治不中病者未之有也

羌活防风汤【拔粹方】治破伤风邪初传在表

羌活 防风 川芎

藁本 当归 芍药

甘草【各一两】 地榆 细辛【各二两】

右?咀每服五七钱水一盞半同煎至七分去粗热服不拘时候量紧慢加减用之热则加大黄二两大便秘则加大黄一两缓缓令过

白术防风汤【拔粹方】若服前药之过有自汗者宜服此药

白术 黄芪【各一两】 防风【二两】

右?咀每服五七钱水一盞半煎至一盞去粗温服不拘时候○脏腑和而有自汗可用此药○破伤风脏腑秘小便赤自汗不止者因用热药汗出不休故知无寒也宜速下之先用芎黄汤三二服後用大芎黄汤下之

芎黄汤【拔粹方】

川芎【一两】 黄芩【六钱】 甘草【二钱】

右?咀每服五七钱水一盞半同煎至七分去滓温服不拘时候三服即止再用下药

大芎黄汤【拔粹方】

川芎 羌活 黄芩

大黄【各一两】

右?咀依前煎服宜利为度

羌活汤【拔粹方】治半在表半在里

羌活【去芦】 菊花【去梗】 麻黄【去根节】

川芎 白茯苓【去皮】 防风【去芦】

石膏【研】 前胡【去芦】 黄芩

蔓荆子 细辛【去叶】 甘草【炙】

枳壳【各一两】 薄荷 香白芷【各半两】

右?咀每服一两水二盏生姜五片煎至一盏去滓通口服食後滓再煎服

白术汤【拔粹方】治破伤风大汗不止筋挛搐搦

白术 葛根 芍药

升麻 黄芩【各五钱】 甘草【炙二钱半】

右?咀每服一两水二盏煎至一盏去滓温服不拘时

江鲮丸【拔粹方】治破伤风惊而发搐脏腑秘澁知病在里可用江鲮丸下之

江鲮【剉炒】 野鸽粪【炒】 白姜蚕【各五钱】 雄黄【一两】 蜈蚣【一对】
天麻【一两】

右为末作三分二分用烧饭丸桐子大朱砂为衣一分巴豆霜二钱半亦烧饭丸桐子大每服
朱衣丸三十丸加巴豆霜丸一丸第二服加贰丸加至利为度再服朱砂丸病愈止

蜈蚣全蝎散治破伤风搐搦角弓反张

蜈蚣【去毒炒一条】 全蝎【一对炒去毒并头足】

右为细末如发时用一字或二字擦牙缝内或吹鼻中

防风汤【拔粹方】治破伤风同伤寒表证未传入里宜急服此药

防风 羌活 独活

川芎【各等分】

右?咀每服五钱水一鍾半煎至七分去滓温服二三服後宜调蜈蚣散大効

蜈蚣散【拔粹方】

蜈蚣【一对】 江鰮【三钱】

右为细末用防风汤调下如前药解表不已觉转入里当服左盘龙圆微利看大便硬软加巴豆霜服之

左龙丸【拔粹方】

左盘龙 白姜蚕 鰮【各五钱炒】

雄黄【一钱】

右为细末烧饼为丸如桐子大每服十五丸温洒下如里证不已当于左龙丸一处半内入巴豆霜半钱烧饼为丸如桐子大每服一丸同左龙丸一处合服每服药中一丸如此渐加服至利为度若利後更服後药若搐瘥不已亦宜服後药羌活汤也

羌活汤【拔粹方】

羌活 独活 防风

地榆【各一两】

右?咀每服五钱水一盞半煎至一盞去粗温服如有热加黄芩○有涎加半夏○若病日久气血渐虚邪气入胃宜养血为度

养血当归地黄汤

当归 地黄 芍药

川芎 藁本 防风

白芷【各一两】 细辛【五钱】

右?咀依前煎服

地榆防风散治破伤中风半在表半在里头微汗身无汗不可发汗宜表里治之

地榆 防风 地丁香

马牙苋【各等分】

右为细末每服三钱温米调下

秘传止血定痛生肌散专治跌打损伤牙咬刀伤出血诸般肿毒出脓後肌肉不生痛不止者并皆治之真龙骨【煨三钱】 白芷【二钱五分】 黄丹【飞过五钱】

软石膏【煨去火毒一两】 血结【二钱】 乳香【三钱】

没药【三钱】 朝脑【少许】

右为细末磁礮掺患处血止痛定肌生累用应効如神如若肿毒顽疮收口先用此药掺疮口再用白膏药贴之肌生收口【方见肿毒门】

秘传破伤风方

初觉有风急取热粪堆内蛭蟥虫一二个用手捏住待虫口中吐出水就抹在破处身穿稍厚衣裳待少时疮口觉麻两脇微汗风出立効如风紧急速取此虫三五个剪去尾肚内黄水自出涂疮口再滴些少入热酒饮之汗出立効

秘传独圣散治破伤风五七日未愈已至角弓反张牙关紧急服之立有神効

蝉退【去头足土净五钱】

右为末用好酒壹碗煎滚服之立苏为妙

已上三方秘传累用得効故附于末

如圣散【圣惠方】 治破伤风止血定痛

苍术【六两】 川乌头【炮去皮四两】 防风

草乌头【炮去皮】 细辛【各二两半】 两头尖【炮去皮四两】

天麻 川芎 白芷【各两半】

蝎梢【微炒】 雄黄【各半两】 损骨加乳香【半两】

右为细末每服一钱酒调下不拘时服

蜈蚣散治破伤风搐搦角弓反张

蜈蚣【去毒炒一条】 全蝎【一对炒去毒】

右为细末如发时用一字或二字擦牙缝内或吹鼻中

一方治破伤风欲死者

川乌 南星 半夏【并生】

天麻【去芦等分】

右为细末每服一钱豆淋酒调下稍温服次以酒三盏投之

寒

中寒方论

寒者严凝杀厉之气也人以肾为根本惟肾则受寒惟寒则伤肾肾气一虚寒邪交作急痛拘挛战掉强直昏迷厥冷口噤失音此中寒也无汗恶寒头疼面惨发热拘急手足微寒此伤寒也霍乱转筋洞泄下痢乾呕吐逆积饮停痰此寒邪入肠胃也以至为咳嗽为虚劳为疝瘕为脚气为带漏为遗精为咳疟为诸痛寒亦主之人惟肾气不充疎于谨护非特霜凝冰泫之谓寒或者炎天暑月当风取凉卧地受冷使寒邪之气自皮肤而达经络自经络而入脏腑如前数证皆得以恣睢四出矣温肾御寒如乾姜附子川乌天雄辈佐之以养正灵砂此固药笼中物然寒伤荣气徒知温肾而不知温血恐未必有十全之功是则官桂当归又温血之上药也不然古人何以致意於寒泣血云

中寒证治

不换金正气散解散寒邪

苍术【炒】 橘红 半夏麴

厚朴【制】 藿香叶【各一两】 甘草【炒三分】

右剉散每服三钱姜五片枣二枚煎服

养胃汤治外感寒邪内伤生冷

苍术【炒】 厚朴【制】 半夏麴【各一两】

人蓂 伏苓 草果

藿香【各半两】 橘红【七钱半】 甘草【炒三钱半】

右剉每服三钱加桂半钱姜七片乌梅半个煎服

姜桂散温中散寒生

乾姜 良姜【各半两】 辣桂

木香 半夏麴 甘草【炒各二钱半】

右剉散每服三钱姜五片枣二个煎服

附诸方

生料五积散【和剂方】治感冒寒邪头疼身痛项强拘急恶寒呕吐或有腹痛又治伤寒发热头疼恶风无问内伤生冷外感风寒及寒湿客於经络腰脚酸疼及妇人经泄腹痛并皆治之

苍术【米泔浸去粗皮二十四两】 桔梗【去芦十二两】 陈皮【去白】 麻黄【去根节】 枳壳【去穰麴炒各六两】

厚朴 乾姜【各四两】 白芷

川芎 甘草【炙】 茯苓【去皮】

肉桂 芍药 当归【各三两】

半夏【汤泡七次二两】

右?咀每服四钱水一盞半生姜三片葱白三根煎七分热服冒寒用煨姜挾气加吴茱萸妇人调经则用艾醋

按此药气味辛温发表温中开郁行气有殊功去寒湿之圣药也夫寒湿属阴热燥属阳人之为病不过二者而已矣善用药者以苦寒而泻其阳以辛温而散其阴病之不愈者未之有也予尝以防风通胜散泻热燥之药也生料五积散为散寒湿之药也不识明哲以为何如

理中汤【和剂方】治脏腑中寒口噤失音四肢强直兼治胃脘停痰冷气刺痛

人蓂 乾姜【炮】 甘草【炙】

白术【各等分】

右?咀每服四钱水一盞煎服

四逆汤【和剂方】治伤寒自利脉微欲絶手足厥冷【四逆名者四肢逆冷也】

甘草【炙二两】 乾姜【一两半】 附子【去皮半两】

右?咀每服五钱水一盞煎七分温服不拘时

白术散【活人方】治阴毒伤寒 乾烦躁四肢逆冷

川乌【炮去皮脐】 桔梗【去芦】 白术

附子【泡去皮脐】 细辛【各一两】 乾姜【炮半两】

右为末每服二钱水一盞煎六分热服不拘时

补中益气汤【方见内伤】

附子理中汤治中寒中湿呕逆虚弱

人蓂 白术 乾姜【炒】

熟附子【各一两】 甘草【炒半两】

右?咀每三钱姜五片食前煎服少血加当归

沈附汤治虚寒无阳胃弱乾呕

熟附子 乾姜【炮各半两】 沉香

白术【各一分】 甘草【炒一钱半】

右剉每三钱姜五片煎食前服

姜附汤治中寒厥冷强直失音口噤吐沫或阴盛发燥

熟附子 乾姜【炮等分】

右?咀每服三钱水盏半煎半空心温和服亦治洞泄呕吐

附子散伤寒阴证唇青面黑身背强痛四肢厥冷及诸虚沈寒

熟附子【三分】 官桂 当归

白术【各二分】 乾姜【炮】 半夏麴【各一分】

右剉每服三钱姜五片枣二枚食前煎服

五丹圆治沈寒痼冷方见血证类

应梦人蓂散治伤寒身热头疼亦主痰嗽

人蓂 白术 白芷

乾葛 北梗 青皮【各三分】

甘草【炒一两】 乾姜【一钱半】

右为末每服二钱姜枣煎服

败毒散伤寒热证通用

人蓂 赤茯苓 川芎

北梗 羌活 独活

前胡 柴胡 枳殼【制】

甘草【炒等分】

右剉散每服三钱姜五片煎服人参羌活散用药亦同

伤寒证治格法活人摠括备述其详

暑【附 暑风注夏】

中暑论

人有常言伤暑做出百般病其果厚诬哉盖暑之入人伏於三焦肠胃之间至有兼旬累月而不可测识者如呕吐如中满如泄泻如下痢如焦渴如发疟如腹痛如下血以至诸热等证苟因暑得之其根未除虽百药遍尝难施其巧夫人心胞络与胃口相应胃气稍虚或因饥冒暑故暑气自口鼻而入凝之於牙颊达之于心胞络如响应声遇暑以还急漱口而勿咽可也若觉暑毒逼塞咽喉尤当灌涤而吐之伤暑脉虚面垢自汗身热背寒烦闷大渴倦怠少气毛耸恶寒或头疼或霍乱或四肢厥冷但身体无痛经云热则诸毛孔开故洒然恶寒体认不精妄以伤暑为伤寒误人不小然而暑家何以脉虚暑能消气气消则血散脉安得而不虚其或六脉沈伏冷汗自出闷絕而昏不知人此则中暑证候又加重耳治法大要虽贵于驱暑尤贵于和中二者并行则其间杂证不战而自屈若汗若下若用药差冷古人戒之虽然夏月伏陰在内暑家气虚脉虚或饮水过多或冷药无度伤动其中呕吐不食自利不渴此则外热里寒无惑乎伤暑伏热之说非理中汤不可也又有冷药过度胃寒停水潮热而呕或身热微烦此则阳浮外而不内非小半夏茯苓汤不可也抑犹有戒焉暑家脉虚面黧冷汗洒然毛耸手足微寒苟不明辨其里热之证误以刚剂投之抱薪救焚不发黄则发斑甚者蓄血闷乱而毙矣吁可畏哉

中暑证治

五物香薷汤驱暑和中通用

香薷【三两】 白扁豆【姜制】 厚朴【制】

白茯苓【各一两半】 甘草【炙一两】

右剉每服三钱水煎温服

香薷缩脾饮驱暑和中除烦止渴

缩砂仁【二两】 草薢仁 乌梅肉

香薷 甘草【炒各两半】 白扁豆【姜制】

白乾葛【各一两】

右剉每服三钱姜五厚片水煎微温服

香薷剉散解暑毒止霍乱

香薷【二两】 厚朴【制一两】 茯苓

陈皮 甘草【炙各半两】 良姜【三钱】

右剉细每服二钱半盐一捻水煎服

五苓散治伤暑烦渴引饮过多小便赤澀心下水气【方见水饮门】

小柴胡汤治伤暑外热内渴【方见血证类】於内更加生姜为妙

竹叶石膏汤治伏暑内外热炽烦躁大渴

石膏【半斤】 半夏【荡洗七次切焙一两二钱半】

麦门冬【去心二两七钱半】 人蔘

甘草【炒各一两】

右麤末每服二钱姜五片青竹叶七片粳米百粒水煎服

六和汤治暑证身热呕不甚渴

人蔘 半夏麴 杏仁【去皮微炒】

甘草【炒】 缩砂仁【各一两】 茯苓

藿香 宣木瓜 扁豆【制各二两】

厚朴【制三两】 香薷【四两】

右剉每服三钱姜五片煎服内伤生冷通用

二陈汤【见痰涎类】治伤暑复感冷及内伤生冷

半夏【制】 橘红【各五两】 茯苓【三两】

甘草【炙一两】

右?咀每服三钱姜七片小乌梅一枚煎服感冷更添生姜

小半夏茯苓汤【方见水饮类】

消暑圆治伤暑伏热生痰以致头痛中痞

半夏【半斤洗净醋二升半煮乾别碾】 茯苓

甘草【生各四两】

右末之用醋并姜汁调半夏煮糊圆桐子大每服七十圆熟水下暑药皆可下

来复丹均平阴阳治中暑昏迷霍乱吐泻

透明硫黄 硝石【各一两并为细末入定磁内以微微火慢炒用柳?不住手搅令阴阳气相入再研极细】 元精石【一两研细水飞】 五灵脂【五台山者水澄去砂】

石日乾】 陈橘皮【去白】 青橘皮【去白各二两】

右灵脂二橘皮为细末次入元精末及硫黄硝石末和毕以好醋打糊圆豌豆大每服五十圆空心米饮下或五苓散下或水研灌亦得

大黄龙圆治中暑昏溃眩暈分利阴阳

透明硫黄 硝石【各一两】 白矾【枯】

雄黄?石【各半两】 飞罗白麝【四两】

右为细末入麝拌和滴水圆桐子大每服十五圆至二三十圆新汲水下昏塞者水研灌下如无硝石以盆硝代来复黄龙大抵性温

道途中暑昏仆即扶起以手巾蘸热汤煖其脐腹即渐苏醒次以来复丹为末井水调下无中则以大蒜细研新水调与之仍以蒜少许置鼻中或谓中暑最忌得冷来复黄龙并蒜以水调下者何盖其药性温因寒而发用也

附诸方

香薷饮【和剂方】治伏暑引饮口燥咽乾或吐或泻并皆治之

一方加黄连四两用姜汁同炒令老黄色名黄连香薷饮

厚朴【去皮姜汁炙熟半斤】白扁豆【微炒半斤】香薷【去土一斤】

右?咀每服三钱水一钟入酒少许煎七分沈冷不拘时服热则作泻香薷须陈者佳

缩脾饮【和剂方】消暑气除烦渴止吐泻霍乱

缩砂仁【四两】乾葛【二两】白扁豆【二两】

乌梅肉 草果【炒去皮】甘草【炙各四两】

一方无乾葛有乾姜

右?咀每服四钱水一大碗煎七分以水沈冷服

加味五苓散【济生方】治伏暑热二气及冒湿泄泻注下或烦或小便不利

赤茯苓【去皮】泽泻 猪苓【去皮】

白术【各一两】官桂【不见火】车前子【各半两】

生脉汤生津止渴

人蓂 麦门冬 五味子

右剉水煎服

人蓂白虎汤【徐同知方】治伏暑发渴呕吐身热脉虚自汗人蓂【一钱半】
知母【二钱】石膏【半两】

甘草【炙一钱】

右?咀入粳米一合水二鍾煎至一鍾不拘时热服如伏暑作寒热未解宜和五苓散同煎服伏热後或冷水沐浴或吃冷物清气在脾不觉散令日晡作寒惨壮热浑身洒淅宜加桂煎服出汗便解

大顺散【和剂方】治胃暑伏热引饮过多脾胃受湿水谷下分霍乱呕吐脏腑不调

甘草【三斤】 乾姜 杏仁【去皮尖炒】

肉桂【去皮各六两四钱】

右先将甘草用白砂蜜炒及八分黄熟次入乾姜同炒却入杏仁候杏仁不作声为度用筛筛淨後入肉桂一处捣罗为末每服三钱水一盏煎至七分温服如烦躁并花水调下不拘时候以沸汤点服亦可

十味香薷饮【百一选方】消暑气和脾胃

香薷【一两】 人蓂【去芦】 陈皮【去白】

白朮 黄蓂【去芦】 白扁豆【炒去殼】 甘草【炙】 厚朴【去皮姜汁炒黑色】 乾木瓜

白茯苓【去皮各半两】

右为末每服二钱热汤冷水任调下

清暑益气汤【东垣方】治长夏湿热蒸人人感之四肢困倦精神减少懒於动作胃满气促肢下疼痛或气高而喘身热而烦心下膨闷小便黄而数大便溏而频或痢或渴不思饮食自汗体虚

黄蓂 苍朮【米泔制】 升麻【各一钱】

人蓂 白朮 神麴

陈皮 泽泻【各五分】 甘草【炙】

酒柏 麦门冬 当归【各三分】

葛根【三分】 五味子【九粒】 青皮【二分半】

右?咀作一服水二大鍾煎至一鍾去查大溫服食遠

益元散【即天水散又名六一散】治中暑身热小便不利此药性凉除胃脘积热又淡能渗湿故利小便而散湿热也滑石【六两桂府者为効非桂府则不为佳】甘草【微炒一两】

右为末每服三钱蜜少许热汤冷水任下如欲发汗以葱白豆?汤调下

桂苓甘露散治伏暑引饮过度肚腹膨胀霍乱泻利

白朮 茯苓【去皮】 甘草【炙】

葛根 泽泻 石膏

寒水石【各一两】 官桂【半两】 人蓂【去芦】

藿香【各半两】 滑石【一两】 木香【二钱半】

右为细末每服二钱白汤下新汲水姜汤亦好

暑病治例【出明医杂着】

王节斋曰夏至日後病热为暑暑者相火行令也夏日人感之自口齿而入伤心包络之经其脉虚或浮大而散或弦细扎迟盖热伤气则气消而脉虚弱其为症汗烦则喘渴静则多言身热而烦心痛大渴引饮头疼自汗倦怠少气或下血发黄生斑甚者火热制金不能平木搐搦不省人事治暑之法清心利小便最好暑伤气宜补真气为要又有恶寒或四肢逆冷甚者迷闷不省而为霍乱吐利痰滞呕逆腹痛泻利此则非暑伤人乃因暑而自致之病也以其因暑而得故亦谓之暑病然治法不同也

若行人或农夫於日中劳役得之者是动而得之阳证也其病必苦头痛发燥热恶热扪之肌肤大热必大渴引饮汗大泄无气以动乃天热外伤元气也宜清暑益气用香薷黄连扁豆人蓂黄芪五味知母石膏之类

暑热发渴脉虚用人蓂白虎汤或用竹叶石膏汤亦好【俱见前】

东垣清暑益气汤治长夏湿热蒸人人感之四肢困倦精神少胸满气促肢节痛或气高而喘身热而烦心下痞闷小便黄而数大便溏而频或痢或渴不思饮食自汗体虚此汤最好【见前】

若暑热之时无病之人或避暑热纳凉於深堂大厦凉台冷馆大扇风车得之者是静而得之

阴证也其病必头痛恶寒身形拘急肢节疼痛而烦心肌肤大热无汗此为陰寒所遏使周身阳气不得伸越宜用辛温之剂以解表散寒用厚朴紫苏乾葛藿香羌活苍术之类若外既受寒内复伤水水生冷瓜果之类前药再加乾姜缩砂神曲之类此非治暑也治因暑而致之病也

若外不受寒止是内伤冰水冷物腹痛泄泻或霍乱吐逆宜缩脾饮【见前】或理中汤【见中寒类】加神曲麦芽缩砂苍术此专治内温中消食也

若吐泻脉沈微甚者不可用凉药可用大顺散【见前】加熟附子等分或附子理中加炒芍药

夏月多食冷物及过饮茶水致伤脾胃吐泻霍乱故治暑药多用温脾消食治湿利小便之药医者要识此意

若既伤暑热复伤生冷外热内寒宜先治其内温中消食次治其外清暑补气而以理脾为主於前陰阳二条内相兼取用东垣清暑益气汤已兼此意其用黄芪升麻人蓂白术甘草麦门冬当归五味黄柏葛根是清暑补气也苍术陈皮神曲泽泻青皮是治内补脾也

附暑风

治暑风卒倒法○凡人中暑先着於心一时昏迷切不可与冷水饮并卧湿地其法先以热汤灌或童便灌及用布蘸热汤熨脐并气海续续令暖气透彻脐腹俟其苏省然後进药若旅途中卒然晕倒急扶在阴凉处掬路中热灰土作窝於脐中令人尿其内即苏却灌以人尿或搅地浆饮之半碗或车轮土五钱冷水调澄清服皆可○一方用大蒜三两瓣细嚼温汤送下禁冷水即愈

丹溪云挟火挟痰用二陈汤加黄连实者可用吐法戴氏曰暑风者夏月卒倒不省人事者是也有因火者有因痰者火君相二火也暑天地二火也内外合而炎烁所以卒倒也痰者人身之痰饮也因暑气入而鼓激痰饮塞碍心之窍道则手足不知动蹶而卒倒也此二者皆可吐内经曰火郁则发之吐即发散也量其虚实而吐之吐醒後可用清剂调治之

附注夏

注夏属阴虚元气不足夏初春末头疼脚软食少体热者是宜

补中益气汤去柴胡升麻加炒柏白芍药挟痰者加南星半夏陈皮煎服又或用生脉汤

补中益气汤【方见内伤门】

湿

中湿论

天气下降地气上腾二气薰蒸此即湿也岂必水流湿而後为湿哉且风之撼动人知其为风寒之严凝人知其为寒暑之炎热人知其为暑惟湿之入人行住坐卧实薰染於冥冥之中人居戴履受湿最多况夫湿能伤脾脾土一亏百病根源发轫於此矣滯而为喘嗽渍而为呕吐渗而为泄泻溢而为浮肿湿瘀热则发黄湿遍体则重着湿入关节则一身尽痛湿聚痰涎则昏不知人至于为身热为鼻塞为直视为郑声为虚汗为脚气为腹中胀脐下坚为小便难大便自利皆其证也湿家不可汗汗之则发痙热而痙者毙又不可下下之则额汗胷满微喘而哕小便淋闭难以有瘳治湿之法通利小便为上益脾顺气次之半夏茯苓苍术白术官桂乾姜皆要药耳其若小便挟热不利则赤茯苓防己辈自有奇功大抵湿之为病易至沈深渐润之余沦肌浹髓於斯时也须以术附姜桂作大剂与之药力根按病当渐解不可以旦暮而责效焉要之治湿莫若生附苍术为快

中湿证治

加剂除湿汤治气虚伤湿身重腰疼四肢微冷或呕逆或溏泄并主之

苍术【炒】 白术 甘草【炙各一两】

乾姜【炮】 茯苓【各二两】 橘红

辣桂 厚朴【制各半两】

右剉每服三钱姜枣煎服

茯苓白术汤治受湿身体痛重

茯苓 乾姜【炮】 甘草【炙】

白术 辣桂 苍术【炒等分】

右剉每三钱水煎服

肾着汤治肾虚受湿小便自利腰冷而痛重

乾姜【炮】 茯苓【各二两】 甘草【炙】

白术【各一两】

右剉每二钱半水煎服加桂亦得

黄耆建中汤治伤湿鼻塞身痛

黄耆【微炙】 辣桂【各三两】 甘草【炙二两】

白芍药【六两】

右麤散每服三钱姜四片枣一枚煎食前服

不换金正气散治湿益脾顺气加茯苓生姜【方见寒类】 神术圆治湿消饮【六见痰涎类】可用正气散送下

生附除湿汤治寒湿交攻身体冷痛

附子【生一两】 苍术【制一两半】 白术

厚朴【制半两】 宣木瓜 甘草【炙各三钱半】

右剉每服四钱水二盏姜十厚片煎一盏食前微温服

桂枝附子汤治风湿相?汗出气短身体烦疼微肿恶风不欲去衣

辣桂【二两】 白术 附子【熟各一两半】

甘草【炙一两】

右剉散每服二钱半水盏半姜七片枣二枚煎一盏食前微温服小便不利悸气加茯苓痹加防己腹痛加芍药

甘草附子汤治中湿小便不利大便自利

附子【熟一个七钱净者】 白术 甘草【炙各一两】

辣桂【二两】

右剉每服三钱姜七片煎食前微温服汗出加防风悸气加茯苓

术附汤治伤湿大小便皆自利

白术【二两】 甘草【炒一两】 附子【熟七钱半】

右剉细每服三钱姜七片水盞半煎一盞食前微温服

五苓散治湿证小便不利经云治湿之法不利小便非其治也【方见水饮类】

茵陈汤治湿气瘀热发黄小便秘澁渴引水浆

茵陈蒿【一两半】 大黄【半两】 小红栀子【十枚】

右剉每服三钱水煎服五苓散亦治发黄二药夹煎尤稳

湿泻身痛方五苓散加苍术煎点随意

附诸贤论

贾真孙曰湿为土气火热能生湿土故夏热则万物湿润秋凉则万物乾燥湿病本不自生因热而怫郁不能宣行水道故停滯而生湿也况脾土脆弱之人易为感冒岂必水不流而後为湿哉人只知风寒之威严不知暑湿之炎暄感人於冥冥之中也病式云诸痿强直积饮等证皆属於湿或肘肿体寒而有水气里必小便赤少不通或渴是蓄热入里极深非病寒也大抵治法宜理脾清热利小便为上故治湿不利小便非其治也宜桂苓甘露木香葶?木通治之守真师曰葶?木香散下神芎丸此药下水湿消肿胀利小便理脾胃无出乎此也腹胀脚肿甚者舟车丸下之湿热内深发黄茵陈汤下之或佐以防己黄芪一身尽肿痛或无汗是湿流关节邪气在表宜五苓散加官桂苍术微汗之不可大汗若自汗出多热燥津液内水不利切勿利之重损津液也宜防风白术甘草汤主之其湿证有二湿热证多湿寒证少当以脉证明辨之如脉滑数小便赤澁引饮为湿热证若小便自利清白大便溏利身疼自汗为寒湿证治之宜五苓散加生附苍术木瓜主之

附诸方

防己黄芪汤【金匱方】治风湿脉浮身重汗出恶风或痛少力

防己【一两】 甘草【炙半两】 白术【七钱半】

黄芪【一两】

右?咀每服一两入姜枣煎喘者加麻黄胃气不和加芍药气上冲加桂枝下有寒加细辛

按湿胜身重阳微中风则汗出恶风故用黄芪甘草实表防己白术胜温也足三阴例药

五积散【和济方】治外感风寒冒寒湿身体重痛【见寒类】按海藏云麻黄桂芍甘草即麻黄桂枝各半汤也苍术甘草陈皮厚朴即平胃散也枳壳桔梗陈皮茯苓半夏即桔梗半夏等汤也又川芎当归治血兼乾姜厚朴散气此数药相令为解表温中泄湿之剂去痰消痞调经之方虽为内寒外感表里之分之所制实非仲景表里麻黄桂枝姜附之的方也至于积冷呕泄时疫项背拘挛如葱白豆豉厥逆加吴茱萸寒热欬逆加枣妇人之产加醋始知用之非一途也惟知活法者其择之

渗湿汤【和剂方】治寒湿所伤身重腰冷如坐水中小便或澁大便溏泄皆坐卧湿地或阴雨所袭之也

苍术 白术 甘草【各一两】

乾姜 茯苓【各二两】 陈皮

丁香【各二钱半】

右?咀每服四钱入枣煎

按此足阳明太阴药也温中胜湿之剂

茵陈五苓散治湿热胜发热黄疸

茵陈蒿【十分】 五苓散【五分】

右二物和匀水煎服

桂苓甘露散【宣明方】治湿热内甚烦渴泻利小便澁大便急痛霍乱吐下头痛口乾【方见暑门】

清燥汤【东垣方】治表里有湿热痿厥瘫痪不能行走或足踝膝上背肿痛口乾溼痢【方见痿门】

三花神佑丸【宣明方】治一切水湿肿病大腹实胀喘满轻粉【一钱】 大黄【一两】 牵牛【二两】

芫花【醋炒】 甘遂 大戟【各半两】

右为末滴水丸小豆大初服五丸每服加五丸温水下无时日三服

平胃散【和剂方】治脾胃不和不进饮食常服暖胃消痰苍术【米泔浸五斤】
厚朴【姜制炒】 陈皮【各三斤二两】 甘草【炒三十两】

右为末每五钱姜三片枣一枚煎服入盐一捻沸汤点服亦得一方加草菓名平胃草菓散

升阳除湿汤【东垣方】

升阳除湿防风汤【东垣方俱见泄瀉門】

煮酒应効方治诸般湿气筋骨疼痛【方见风門】

秘授仙方万应膏贴一切湿气袭于肌肉入于筋骨疼痛不常贴之神効【方见痈疽門】

神芎导水丸治湿热内郁胸膈痞满?衄口舌生疮咽喉不利牙疳齿蚀口臭或遍身生湿疮乾
疥睡语咬牙惊惕怔忡大小便滯澁风热酒毒蘊热等症

大黄 黄芩【各二两】 牵牛【头末】

滑石【各四两】

右为末水丸如桐子大每服四五十丸温水下虚实随证临时加减

舟车圓

大黄【二两】 甘遂 大戟

芫花 青皮 陈皮【各一两】

牵牛【头末四两】 木香【五钱】

右为细末水丸如梧桐子大每服六七十丸白沸汤下随时加减

经验祛湿煮酒方治风湿相抟遍身手足疼痛者服之神効

川芎 威灵仙 荆芥

麻黄 防风 天麻

青木香 金毛狗脊 羌活

独活 枳殼【各五钱】 川乌

草乌【各四钱】 苍术 陈皮

川当归【各五钱】

右?咀用好头酒五壶将药用绢袋悬於壘口再用重纸裹壘口再用面糊蜜糊勿令泄气用文武火煮热每服五盞为度

附瘟疫

瘟疫方论

内经曰苍天之气清净则志意治顺之则阳气固虽有贼邪弗能害也又曰冬不藏精者春必病瘟是以多感於房劳辛苦之人安乐者未之有也俗名瘟病杂着云冬温为病此乃天时不正阳气反泄药忌温热时行寒疫却在温暖之时时本温暖而寒反为病此亦天时不正阴气反逆药忌寒凉又云此病多发於春夏一槩相同者此天地之厉气当参运气而施治也

东垣云阳明邪热太甚资实少阳相火而为之视其种势在何部随经治之当缓勿令重剂过其病所阳明为邪首大肿少阳为邪出於耳前後先以酒炒芩连炙甘草煎少少不住服再用大黄鼠粘子煎入芒硝等分时时呷之母令饮食在後及邪气已只服前药未已再煎次第服之取大便邪气已即止阳明渴加石膏少阳渴加瓜蒌根阳明行经升麻芍药葛根甘草太阳行经羌活防风荆芥并与上药相合用之

十神汤治时令不正瘟疫妄行

升麻葛根汤治大人小儿时气瘟疫头痛发热

柴胡升麻汤治时瘟疫壮热恶风头痛体疼鼻塞咽乾乾咳 涕唾稠粘【俱见伤寒门】

小柴胡汤治瘟疫内虚发热胷脇痞闷渴加瓜蒌仁【方见血门】

竹叶石膏汤伤寒时气表里俱虚遍身发热心胸烦闷得汗已解内无津液虚羸少气欲吐【方见暑门】

大青丸治时行瘟疫发热并劳役发热上膈一切结热神効

薄荷 甘草 梔子

黄芩 黄连【各三钱】 大黄【八钱】

玄明粉 连翘【各六钱】

右为细末用青蒿自然汁为丸如菉豆大用雄黄为衣治杂病发热者朱砂青黛为衣每服五六十九丸白滚汤送下

黄连解毒汤治时疫三日已汗解或因饮酒复剧若烦闷乾呕口渴呻吟错语不睡【方见眼目门】

荆防败毒散【蕴要方】

独活 前胡 人蓂

茯苓 川芎 枳壳

桔梗 甘草 荆芥

牛旁子 薄荷【各一钱】 防风【一钱半】

羌活【一钱】

右?咀水煎服如内热加黄芩一钱口渴加天花粉一钱

四君子汤四物汤【俱见补损门】 补中益气汤【方见内伤门】

岭南诸病【出明医杂着】

春秋时月人感山岚瘴雾毒气发寒热脇膈饱闷不思饮食此毒气从鼻口入内也治当清上焦解内毒行气降痰不宜发汗

黄连【一钱姜水洗】 升麻 苍术【各一钱半米泔浸盐水炒】

黄芩【酒拌炒】 木香 厚朴【姜制】

枳实【麸炒】 半夏【汤泡七次】 桔梗【去芦】

柴胡 木通【各一钱】 生甘草【七分】

生姜五片水一钟半煎七分食前热服滓煎四分继服

寒温不节汗身脱衣巾感冒风寒之气气闭发热头疼此伤寒类也但岭南气温易出汗故多类疟重则寒热不退轻则为疟南方气升故岭南人得此病者卒皆胃满痰涎壅塞饮食不进与北方伤寒只伤表而里自和者不同治当解表清热降气行痰此方用於寒凉时月及虽在温暖时而感冒风寒者

羌活【一钱半】 苍术【泔浸】 柴胡

黄芩 橘红【去白】 半夏【汤洗】

枳实 甘草【炙】 川芎【各一钱】

生姜五片水一钟半煎七分食前温服渣煎四分随服取汗出止服

瘧疟时疟寒热往来

柴胡 知母【炒】 半夏【汤洗各一钱半】 苍术【泔洗】 黄芩【酒炒】 乾葛

陈皮 川芎 甘草【炙七分】

生姜三大片乌梅肉二个水一钟半煎七分食前清晨服滓煎四分午前服

疟久者加人蓂【一钱半】 当归【一钱】 汗多者去苍术换白术加酒炒白芍药【各一钱半】

後变成痢疾疟後之痢从虚治用补脾胃药

黄连【炒】 木香 宿砂

黄芩【炒】 橘皮 当归【酒洗各一钱】 白术【一钱半】 白芍药【炒二钱】 甘草【炙五分】

生姜三片水二钟煎八分食前热服

温暑之月民病大行瘟疫热病治宜清热解毒兼治内外

枯黄芩【酒炒】 知母【酒炒】 乾葛【各一钱】

石膏 白芍药【酒炒】 人蓂【各一钱半】

黄连【酒炒】 生地黄【酒洗各五分】 升麻【一钱】

生甘草【七分】 羌活【三钱】

生姜三片水一鍾半煎七分食前热服滓煎四分继服若胸膈痞闷痰涎壅塞者加枳实半夏【各一钱】 生姜汁四五匙若脾胃不实加白朮【一钱半】

时气发热变为黄病所谓瘟瘡也宜治内泻湿热

茵陳 黄连【姜水炒】 山梔仁

白朮 白茯苓【去皮】 厚朴【姜水炒】

木通【去皮】 人蓂【各一钱】 白芍药【酒炒】

乾葛【各一钱半】

生姜三大片水二鍾煎七分食前温服查煎四分继服

附运气证治【出乾坤生意】

运气证治者所以参天地阴阳之理明五行衰旺之机考气候之寒温察民病之凶吉推加临补泻之法施寒热温凉之剂古人云治时病不知运气如涉海问津诚哉言也今遵先贤图诀撮其要领使人一覽而知其悉也矣

五运配十干之年

甲巳得合为土运 乙庚得合为金运

丁壬得合为木运 丙辛得合为水运

戊癸得合为火运

六气为司天之岁

子午少阴君火 丑未太阴湿土

寅申少阳相火 卯酉阳明燥金

辰戌太阳寒水 己亥厥阴风木

南政北政

甲巳土运为南政盖土居中央君导南面而行余四运以臣事之面北面受令所以有别也

十二支年分运气

子午年少阴君火司天岁气热化之候

司天者天之气候也

君火者手少阴心经也心者君主之官神明出焉君火乃主宰阳气之本余象生土乃发生万物之源

阳明燥金在泉

在泉者地之气候也

初之气厥阴风木用事子上父下益辛泻苦

自年前十二月大寒节起至二月惊蛰终止天时 寒风切冽霜雪水冰蛰虫伏藏

民病 关节禁固腰腿疼中外疮伤

二之气少阴君火用事火盛金衰补肺泻心

自二月春分节起至四月立夏终止

天时 风与时寒雨生羽虫

民病 淋气郁于上而热令人目赤

三之气少阳相火用事君相二火泻苦益辛

自四月小满节起至六月小暑终止

天时 大火行热气生羽虫不鸣燕百舌杜宇

之类

民病 厥热心痛寒更作咳喘目赤

四之气太阴湿土用事子母相顺泻肺补肾

自六月大暑节起至八月白露终止

天时 大雨时行寒热互作

民病 黄疸衄血咽乾呕吐痰饮

五之气阳明燥金用事心盛肺衰火怕水复

自八月秋分节起至十月立冬终止

天时 温气乃至初冬尤暖万物尚荣

民病 寒热伏邪於春为疟

六之气太阳寒水用事火衰心病泻腑益苦

自十月小雪节起至十二月小寒终止

天时 暴寒劲切火邪恣毒寒气暴止

民病 生肿咳喘甚则血溢下连小腹而作寒

中

丑未年太阴湿土司天岁气湿化之候

太阴湿土者足太阴脾经也脾属中央戊巳土每季寄旺一十八日合为七十二日以应一岁六六三十六十日之成数也

太阳寒水在泉

初之气厥阴风木用事主旺客衰泻酸补甘

自年前十二月大寒节起至闰二月惊蛰终止天时 大风发荣羽生毛虫

民病 血溢经络拘强关节不利身重筋痛

二之气少阴君火用事以下生上泻甘补酸

自二月春分节起至四月立夏终止

天时 大火至疫疠君令宣行湿蒸相?暴雨

时降

民病 瘟疫盛行远近咸若

三之气少阳相火用事土旺冠水补肾泻脾

自四月小满节起至六月小暑终止

天时 雷雨电雹地气腾湿气降

民病 身重跗肿胸腹满感冒湿气

四之气大阴湿土用事甘旺酸衰补胃益膀胱自六月大暑节起至八月白露终止

天时 炎热沸腾地气升湿化不流

民病 腠理热血暴溢寒疟心腹胀浮肿

五之气阳明燥金用事土能生金益肝泻肺

自八月秋分节起至十月立冬终止

天时 大凉雾露降

民病 皮肤寒疟痢甚行

六之气太阳寒水用事以上尅下泻脾补肾

自十月小雪节起至十一月小寒终止

天时 大寒凝冽

民病 关节禁固腰腿拘痛

寅申年少阳相火司天岁气火化之候

少阳相火者三焦浮流之火火邪炎上上尅肺金金受尅肾水失母则上盛下虚虚阳上攻变生诸疾致伤元气

厥阴风木在泉

初之气厥阴风木用事子父相逢泻苦益辛

自年前十二月大寒节起至二月惊热终止天时 热风伤人时气流行

民病 寒热交作咳逆头痛血气不调心腹不

快

二之气少阴君火用事肺衰心盛制苦益辛

自二月春分节起至四月立夏终止

天时 暴风疾雨温湿相蒸

民病 上热咳逆胸膈不利头痛寒热

三之气少阳相火用事夏旺火炽补肺益大肠自四月小满节起至六月小暑终止

天时 炎暑亢旱草萎河输

民病 烦热目赤喉闭失血热渴风邪人多暴

死

四之气太阴湿土用事火能生土泻甘补咸

自六月大暑节起至八月白露终止

天时 风雨时降炎暑未去

民病 疟痢交作寒热头疼

五之气阳明燥金用事肺金受邪泻苦补辛

自八月秋分节起至十月立冬终止

天时 寒热风雨草木黄落

民病 寒邪风热君子周蜜

六之气太阳寒水用事心火受尅泻咸补苦

自十月小雪节起至十一月小寒终止

天时 寒温无时地气正寒霜露乃降

民病 感冒寒邪关节不利心腹痛

卯酉年阳明燥金司天岁气燥化之候

阳明燥金者肺与大肠之气象庚辛金也

少阴君火在泉

初之气厥阴风木用事金木相尅补酸泻辛

自年前十二月大寒节起二月惊蛰终止

天时 阴始凝风始肃水乃冰寒雨多花开迟民病 寒热浮肿失血呕吐小便赤淋

二之气少阴君火用事火盛金衰泻苦益辛

自二月春分节起至四月立夏终止

天时 臣居君位大热早行

民病 疫疠流行人多卒暴

三之气少阳相火用事主盛客衰泻心补肺

自四月小满节起至六月小暑终止

天时 燥热交合风雨暴至

民病 寒热头疼心烦作渴

四之气太阴湿土用事以下生上泻辛益酸

自六月大暑节起至八月白露终止

天时 早秋寒雨有伤苗稼

民病 卒暴寒热风邪伤人心疼浮肿疮疡失

血

五之气阳明燥金用事金盛木衰泻肺补肝

自八月秋分节起至十月立冬终止

天时 冬行春令草木生青风雨生虫

民病 寒热作痢气血不和

六之气太阳寒水用事客来助主益苦泻咸

自十月小雪节起至十二月小寒终止

天时 气候反温蛰虫出现反行春令

民病 疫疠温毒寒热伏邪

辰戌年太阳寒水司天岁气寒化之候

太阳寒水者足膀胱经也与足少阴肾经合为表里属北方壬癸水

太陰湿土在东

初之气厥阴风木用事脾胃受邪泻酸助甘

自年前十二月大寒节起至二月惊蛰终止天时 气早暖草早荣温风至

民病 瘟疫寒热头痛呕吐疮疡

二之气少陰君火用事心火受邪泻酸补甘

自二月春分节起至四月立夏终止

天时 春寒多雨寒湿无时

民病 气郁中满浮肿寒热

三之气少阳相火用事以上尅下泻酸助苦

自四月小满节起至六月小暑终止

天时 暴热乍凉疾风暴雨

民病 寒热吐利生烦闷乱痈疽疮疡

四之气太阴湿土用事木旺土衰泻甘补酸

自六月大暑节起至八月白露终止

天时 风湿交争雨生羽虫暴风疾雨

民病 大热短气赤白痢泻

五之气阳明燥金用事金生水旺制酸益苦

自八月秋分节起至十月立冬终止

天时 湿热而行客行主令

民病 气虚客热血热妄行肺气壅盛

六之气太阳寒水用事水盛火衰沍酖助苦

自十月小雪节起至十二月小寒终止

天时 凝寒雨雪地气正湿令行

民病 病乃凄惨孕妇多灾脾受湿肺旺肝衰

己亥年厥阴风木司天岁气风化之候

厥阴风木者足厥阴肝经也肝属东方甲乙木春旺七十二月也

少阳相火在泉

初之气厥阴风木用事脾胃受邪沍酸补甘

自年前十二月大寒节起至二月惊蛰终止天时 寒始肃客行主令杀气方至

民病 寒居右脇气滞脾胃虚壅

二之气少阴君火用事火旺金衰沍心补肺

自二月春分节起至四月立夏终止

天时 寒不去霜雪水杀气施水草焦寒雨至民病 热中气血不升降

三之气少阳相火用事肺气受邪沍苦益辛

自四月小满节起至六月小暑终止

天时 风热大作雨生羽虫

民病 泪出耳鸣掉眩

四之气太阴湿土用事木土相刑沍酸孟甘

自六月大暑节起至八月白露终止

天时 热气返用山泽浮云暴雨溽温

民病 心受邪黄疸面为浮肿

五之气阳明燥金用事以金刑木泻肺益肝

自八月秋分节起至十月立冬终止

天时 燥湿更朦沈阴乃布风雨乃行

民病 寒气及体肺受风脾受湿发为疟

六之气太阳寒水用事主助客胜泻酸补甘

自十月小雪节起至十二月小寒终止

天时 畏火司令阳乃火化蛰虫出现流水不

水地气大发草乃生

民病 瘟疫心肾相制

谨按运气之说内经言之详矣夫人在气交之中与天地相为流通苟不先立其年以明其气临病施治之际乌乎以用补泻之药哉此运气证治不可不知也又尝按而验之多有不应何则陰阳之消长寒暑之更易或失其常在智者通其活变岂可胶柱鼓瑟按图索骥也耶

仁斋直指卷三

卷四

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷四 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

风缓【附 痿证】

风缓方论

风缓者风邪深入而手足为之缓弛也夫人四肢百脉逢寒则挛急遇热则柔缓病在阳经气行迟而关以纵病在阴经气行疾而关以收此物理之常然也然脾主肌肉四肢胃为水谷海所以流布水谷之气周养一身脾胃既虚肢体失其所养於是风邪袭虚由腠理而入肌肉由肌肉而入脾胃安得不为之缓废乎若曰驱风之剂与助胃之剂不同亦顾吾活法用之何如耳抑余闻人之一身筋骨为壮肝主筋肾主骨肝肾气虚风邪袭之亦有肢体缓弱之证然则先散其风而後益之於此尤当加意

风缓证治

排风汤续命汤【方见风类】加制半夏鸡心大槟榔增姜煎先以此散风毒邪气

苏合香圆用沸汤泡生姜汁调开吞真料白圆子二十圆日二服治手足风缓或白圆子安肾圆夹用食前服【方见嗽门○身疼门○水饮门】

不换金正气散【方见寒类】加川芎官桂煎食前吞安肾圆治脾胃肝肾俱虚风入四体筋骨缓弱不仁仍早晨常服炒黑豆淋酒

大圣一粒金丹治中风昏仆舌强涎潮瘫痪偏枯顽痒麻痹癱倒地闭目作声项强反张口噤直视

大川乌【炮】 大附子【炮去皮脐】 新罗白附子【炮各二两】 川五灵脂 白僵蚕【炒去丝髯】 白蒺藜【炒去刺各一两】

白矾【枯】 朱砂 没药

麝香【别研各半两】

右细末合和用松烟墨半两新汲水磨汁搜圆每两作六圆金箔二百片为衣令自乾每服一圆以生姜半两取自然汁磨开温酒半盏调服盖取微汗为効

大铁弹圆治中风瘫痪口眼喎斜筋骨挛疼肢体麻木

自然铜【烧红醋淬七次一两半】 虎胫骨【酒浸炙黄】 当归【酒浸焙】 白附子【炮】 川乌【炮去皮脐】

五灵脂【炒】 麻黄【去节各一两】 没药

乳香 全蝎【焙】 安息香

白芷 直僵蚕【炒去丝各半两】 乌蛇肉【酒浸焙乾三分】

木鼈【二十一个去殼炒熟】 朱砂 麝香【各一分】

右为末以酒煮安息香入飞白麪为糊圆弹子大每一圆温酒磨下

蝎附散治肝肾气虚风入筋骨手足缓弱

小附子【去皮】 生草乌头【炮去皮脐】 苍术【炒】

牛膝【酒浸焙】 川芎 当归

天麻【各半两】 防己 白芷

黄耆【蜜炙】 全蝎【焙各一分】

右末每一钱黑豆淋酒调下兼用核桃肉研酒下食前服

四斤圆治风寒湿毒与血气转筋骨缓弱四肢酸疼痒痹

宣木瓜【去穰切焙】 天麻【剉】 牛膝【剉焙】

苁蓉【洗切焙四味各一斤用好酒五升浸三日】 熟附子

虎骨【酥炙各二两】

右为末用浸药酒调麪糊圆桐子大每服三四十圆食前温酒或豆淋酒下

又方加当归三分乳香没药五灵脂各半两麝香一钱名大四斤圆用木瓜煎汤下亦治脚气

虎骨酒治诸风缓弱及历节风骨节酸疼

虎胫骨【酥炙黄】

右槌碎如米每骨一升以酒三升浸五日空心服一盞冷则煖之

铁骨丹铁弹圆【方并见风类】治诸风缓弛其他用药风类甚详也矣

附痿证

痿证方论

内经曰肺热乘焦五脏因而受之发为痿蹶心气热生脉痿故胫纵不任地肝气热为筋痿故宗筋弛纵脾气热生肉痿故痹而不任肾气热生骨痿故足不任身然治痿独取阳明阳明者五脏六腑之海主润宗筋宗筋主束骨而利机关也云云故阳明则宗筋纵带脉不引故足痿不用也或曰手阳明大肠经肺之腑也足阳明胃经脾之腑也治痿之法取阳明一经何也愿明以告我丹溪先生曰内经云诸痿生於肺热只此一句便见治法大意经曰东方实西方虚泻南方补北方此固是就生剋言补泻而大经大法不外於此东方木肝也西方金肺也南方火心也北方水肾也五行之中惟火有二肾虽有二水居其一阳常有余阴常不足故经曰一水不胜二火理之必然肺金体燥而居上主气畏火者也脾土性湿而居中主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾无节则水失所养火寡于畏而侮所胜肺得火邪而热矣木性刚急肺受热则金失所养木寡于畏而侮所胜脾得木邪而伤矣肺热则不能管摄一身脾伤则四肢不能为用而诸痿之病作矣泻南方则肺经清而东方不实何脾伤之有补北方则心火降而西方不虚何肺热之有故阳明实则宗筋润能束骨而利机关矣治痿之法无出於此骆隆吉亦曰风火既炽当滋肾水东垣先生取黄柏为君黄芪等补药之辅佐以治诸痿而无一定之方有兼痰积者有湿多者有热多者有湿热相半者有挟气者临病制方其善於治痿者乎虽然药中肯綮矣若将理失宜圣鑒不治也天产作阳厚味发热先哲格言但是患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也

丹溪云痿证断不可作风治而用风药有湿热湿痰气虚血虚瘀血湿热东垣健步丸加燥滋降陰火药苍术黄芩黄柏牛膝之类湿痰二陈汤加苍术白术黄芩黄柏竹?姜汁气虚四君子汤加黄芩黄柏苍术之类血虚四物汤加黄柏苍术煎送补阴丸【方见虚损门】亦有食积死血妨碍不得下降者大率属热用参术四物汤黄柏之类

清燥汤【东垣方】治温热成痿以燥金受温热之邪是絶寒水生化之源絶则肾亏痿厥之

病大作腰以下痿软瘫痪不能动

黄芪【一钱半】 苍术【一钱】 白术

橘皮 泽泻 五味子【九个】

人参 白茯苓 升麻【各三分】

麦门冬 当归身 生地黄

麴末 猪苓 酒黄柏【各二分】

柴胡 黄连 甘草【炙各一分】

右?咀每半两水煎空心热服

健步圆治膝中无力伸而不得屈屈而不得伸腰背腿脚沉重行步艰难

羌活 柴胡【各半两】 防风【三钱】

川乌头【一钱】 炒滑石 炙甘草【各半两】 防己【一两】 苦参【一钱酒制】
肉桂【半钱】

瓜蒌根【半两酒制】 泽泻【三钱】

右为末酒糊圆如桐子大每服七十圆煎愈风汤空心送下

愈风汤【方见风门】

二陈汤【方见疟门】 四君子汤 四物汤【方并见虚劳门】

谨按风痿之别痛则为风不痛则为痿经曰痛则为实不痛则为虚曰风曰痿虚实二者而已矣东垣曰气盛病盛气衰病衰何则人之气血充实而风寒客於经络之间则邪正交攻而疼痛作矣人之气血弱虚而痰火起于手足之内则正不能胜邪而痿痹作矣丹溪先生曰痿症切不可作风治而用风药盖以风为实而痿为虚也曰散邪曰补虚岂可紊乱矣乎历节风【附痹证】

历节风方论

历节风之状短气自汗头眩欲吐手指挛曲身体魁癰其肿如脱渐至摧落其痛如掣不能屈伸盖由饮酒当风汗出入水或体虚肤空掩护不谨以致风寒湿之邪徧历关节与血气搏而有斯疾也其痛如掣者为寒多其肿如脱者为湿多肢节间黄汗出者为风多遍身走痒彻骨疼痛昼静夜剧发如虫啮者谓之白虎历节治法当以温药解其风寒湿之毒或用和平则独活寄生汤辈可也其白虎历节游走痒痛虫实为之况夫脾主肌肉虚则为痒遇痒而进饮食尚庶几焉而虫亦饜飫其间不至於频频啮也书曰若药弗瞑眩厥疾弗瘳似此证候一名厉风须当大作汤圆未可拘以平常浅近之剂

历节风证治

虎骨散治白虎历节走注痒痛不得屈伸

虎胫骨【酒炙黄一两半】 白花蛇【酒浸取肉炙黄】 天麻

自然铜【用醋淬七次】 防风 白附子【炮】

槟榔 官桂 当归

羌活 牛膝 白芷

川芎 僵蚕【炒去丝各一两】 全蝎【焙】

地龙【去土】 乳香 没药

雄黄【各半两】 麝香【一分】

右末每服二钱食前以煖豆淋酒调下

雄麝圆治历节风骨节疼痛挛急痺顽

安息香 五灵脂 天麻【各一两半】

地龙【淨】 白僵蚕【微炒各三分】 全蝎【微炒】

雄黄【各半两】 麝香【一分】 乌蛇【酒淨取肉炙】

天雄【炮去皮脐】 当归 川乌【炮去皮脐】

川芎 南星【炮】 官桂

虎胫骨【酒炙黄各一两】川独活【二两】

右末炼蜜杵圆桐子大每服十五圆食前温酒下

海桐皮散治历节走注骨节疼痛

独活 萆薢【盐水浸焙】 川芎

当归【各三分】 桃仁【去皮焙】 天麻

辣桂 牛膝 麻黄【去节】

枳壳【制】 海桐皮 白芍药

川乌【炮去皮脐】 松节 防风

杜仲【姜制】 甘草【炙各半两】 麝香【一分】

虎胫骨【酒炙黄一两】

右麝末每服二钱姜五片枣二枚食前煎服

独活寄生汤治历节风亦治脚气【方见腰疼门】

麝香圆治白虎历节游走痒痛状如虫啮【方见风类】

虎骨酒治历节诸风百节疼痛【方见风缓门】

硫黄酒治恶风头面肢体?疹疔羸

透明锋芒硫黄

右每服三钱乳鉢内研细入醇酒再研空心饮其清者滓又研细入酒饮之连日如是硫黄能杀恶虫自大便下

必用历节厉风方治手指挛曲骨节间痛甚

萆麻子【去皮二两】 黄连【去须剉如豆一两】

右用新水二升於磁瓶内浸二药密封七日取出逐日侵晨面东以浸药水吞苧麻仁一粒七日後添两粒微利不妨以疗大风亦效

返魂追命再造散治大风厉风

川大黄【锦纹皱者一两】独生皂角刺【一两半】

右末每服二钱临夜冷酒调下以净桶伺候泄虫如虫口黑色乃是多年虫口赤色是为方近三数日又进一服直候无虫则絶根也【?疹若吃醋则风疹食人】

神授圆治风寒湿合而为痹遍身或半身麻木不仁最能杀虫【方见虚劳门】用增味五痹汤下空心服【方见风类】

白虎风走注痒痛方

鸡子揩患处呪三遍愿送粪堆头盖白虎是粪神爱吃鸡子患者下饭用黄脚鸡为妙亦可抱鸡来压之其痒自止

麝香圆治白虎风历节风游走疼痛遍身瘙痒状如虫啮昼静夜剧【方见风类】

附诸方

四炒散治历节痛风走注

威灵仙【酒浸五钱】羊角灰【二钱】白芥子【一钱】

苍耳【一钱半一云苍术】

右为末每服一钱生姜一大片搗汁入汤调服

洗药方治一切风气湿气足胫羸肿疼痛并皆有效

荆芥 番白草 防风

苍耳草 苦参 地榆

青藤 威灵仙 麻黄

苍术 生葱 煨盐【各一两】

右件用水一桶煎热於桶内薰蒸痛处出微汗待汤稍温再洗痛处一二次觉痛减如或贫者只用柘柳榆桑椿六件桠枝煎汤洗之亦有神効

大补元丸

人参【去芦二两】 黄芪【去芦四两】 白术【四两泔浸】

当归【酒洗二两】 生地黄【酒洗三两】 陈皮【去白二两】

白芍【酒炒一两】 黄柏【酒炒二两】 知母【酒炒二两】

山药【二两】 山茱萸【淨肉二两】 枸杞【二两】

牛膝【酒洗二两】 杜仲【姜汁炒一两五钱】 远志【去心二两】

石菖蒲【去毛二两】 巴戟【去心三两】 破故纸【炒二两】 兔系子【炒二两】
桔梗【二两】

右件共为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服七八十丸用白滚汤送下或淡酒姜汤清米饮送下亦可

祛风丸

防风【去芦】 防己【二两】 荆芥【二两】

当归【酒洗二两】 川芎【二两】 生地黄【酒洗三两】 陈皮【去白】 白术【炒】
桑寄生

薏苡仁【各二两】 梔子仁【一两】 牙皂【二两】

何首乌【二两】 川乌【二个】 白芍药【酒炒】

羌活 独活 黄芩【酒炒各一两半】

半夏【便煮】 木瓜 青藤

牛膝【酒洗】 沉香 白豆蔻【各二两】 木香【一两】 桂枝【一两】
光乌【酒浸去皮二两】

右件共为细末酒打米糊为丸如梧桐子大每日五更时用清茶送下七八十丸少许时再服
前大补元丸

愈风化痰丸

何首乌【酒浸】 僵蚕 光乌【酒浸去皮】

全蝎 南星【姜制】 半夏【便煮】

桑寄生 荆芥 牙皂【瓦炒】

破故纸【炒】 陈皮【去白】 兔丝子【炒各二两】 地黄【去土八两】 木香【一两】
沉香【一两半】

白芍药【酒炒】 川乌【酒浸去皮】 天麻【一两二钱】

黄芩【酒炒二两】 防风【去芦】 汉防己

白术【炒】 当归【酒洗各二两】 羌活

独活【各一两五钱】 杜仲【姜汁炒四两】 巴戟【去心三两】

右件共为细末酒打米糊为丸如梧桐子大每服一百丸空心食前酒送下日服二次

诸风应効酒治一切诸般风气湿痹遍身骨节疼痛紫白癜风神効

当归 川芎 何首乌【各三钱】

苍术【四钱】 白芷 苦参

防风 胡麻 石南藤

石连藤 僵蚕【各二钱】 细辛【一钱】

川山甲 黄柏 知母

白芍药 生地黄 牛膝

白术 藁本 木瓜

大风子 威灵仙 羌活【各二钱】

川乌【一钱】 八角风 五加皮

紫荆皮【各二钱】 木香【一钱半】 薏苡仁【三钱】

右件共为粗末用好酒一壺将药用绢袋之悬於亮口下用文武火煮一二时辰取出放於湿泥去火毒住二三日再服每服加後末药入内饮之量力而用末药方於後

入酒末药方每服煎药一鍾加此末药八分入酒服之

乌药 白芷 木香

荆芥 甘草 何首乌

川乌 青藤 藁本

天麻 金银花 苍术

全蝎 细辛 防风

草乌 川芎 人参

当归 石斛 麻黄

两头尖

右件共为细末入煎药酒服之効

又煮酒方 治一切肿风白虎历节疼痛

当归【三钱六分】 川芎【一钱八分】 苍术【六钱】

白术【九钱】 白芍药【一钱半】 枳殼【九分】

生地黄【一钱二分】 半夏【一钱半】 甘草【九分】

乌药【一钱半】 麻黄【三钱】 茯苓【二钱半】

防己 陈皮 木通

薏苡仁【各一钱八分】 五加皮【一钱半】 木香【六分】

桑寄生【一钱二分】 黄芩【一钱八分】 羌活【一钱二分】

独活【一钱二分】 牛膝 木瓜【一钱八分】

海风藤【三钱】 苏叶【二钱四分】

右件共为粗末煮法照前

秘传煮酒应效方治诸风气历节插腿风年高者亦可服神效

当归 人参 茯苓

乌药 砂仁 杏仁

川乌 草乌 何首乌

五加皮 枸杞子 川椒【已上各二钱半】

木香 牛膝 枳壳

乾姜 虎骨 香附子

白芷 厚朴 麦门冬【去心】

陈皮【去白】 白术 川芎

麻黄 独活 羌活

半夏 肉桂 白芍药

生地黄 熟地黄 防风

天门冬 五味子 小茴香

细辛【已上各一钱半】 苍术 破故纸

甘草【各五钱】 核桃肉 红苳

酥油【各五钱五分】 蜜【八两】 沉香【一钱五分】

葡萄【二钱】 荆芥 地骨皮

山茱萸 巴戟 知母【各一钱五分】

右为细末分作二袋用罐盛酒袋悬於罐内封灌口安啗内煮熟过五七日方用每服随量饮
病在上食後服病在下食前服

金刀如圣散治三十六种风七十二般气口眼歪斜半身不遂遍身游风白虎历节疼痛立効

川乌【炮】 草乌【炮各四两】 朱砂【另研】

雄黄【另研】 荆芥 麻黄【去根】

天麻 当归 何首乌

细辛 石斛【去芦】 人参

全蝎【去足】 川芎 甘草

防风【已上各五钱】 苍术【泔浸炒一两】

右研为细末每服五分临卧温茶送下如病长者初服三分徐徐加至七分看人肥瘦大小加
減

又法治证同前

苍术【泔浸炒一两半】 防风【去芦】 细辛

荆芥穗 何首乌 蝉退

全蝎 朱砂【另研】 白僵蚕【水洗微炒】

麻黄【去根】 藁本 当归【酒洗】

天麻【各一钱七分】 人参 川芎

石斛【去根各三钱三分】 川乌【煨】 草乌【煨各一钱三分】

乳香 没药 乌药

青藤【各二钱】 白芷【五钱七分】 甘草【微炒一两】

两头尖【一钱】 雄黄【一钱另研】 蜂房【二钱五分】

白芍药【一钱五分】

右为极细末临卧时用温茶送下凉人虚实有力者服八分起至一钱止老弱者只服五六分止

羌活汤治白虎历节风毒注骨髓疼痛不定【方见痹门】 乌头汤治历节痛不可伸屈

川乌【一枚用蜜四合煮二合去乌】 甘草【炙】

麻黄【去节】 芍药 黄芪【各等分】

右水煎蜜一合再煎至八分去渣空心服最治脚气不可屈伸

附痹症

痹证方论

袖珍方曰凡痹疾病目有五种筋痹脉痹骨痹皮痹肌痹是也 多由体虚之人腠理空疎为风寒湿三气所侵不能随时驱散流注经络久而为痹病者也 风多则引注寒多掣痛湿多则重着治之当辩其所感风寒湿三气注於何部分其表里须从偏胜者主之药餌如有此证治之宜早为贵乎

五痹汤【和剂方】 治风寒湿之气各留肌体手足缓弱麻顽不仁

羌活 白术 防己【各一两】

片子姜黄【一两洗去灰土】 甘草【微炙半两】

右?咀每服四钱水一盞半姜七片煎八分去粗病在上食後服病在下食前服

防风汤【宣明方】 风寒湿三气合为痹风气胜者行痹上下左右无留随所至作防风汤主

之 治行痹行走无定

防风 甘草 当归

赤茯苓【去皮】 杏仁【去皮炒熟】 桂【各一两】

黄芩 秦艽 葛根【各三钱】

麻黄【去节半两】

右为末每服五钱酒水各二盏枣三枚姜伍片煎至一盏温服

茯苓汤【宣明方】 寒气胜者为痛痹大宜宣通阴寒为痛宜通气温经而愈茯苓汤加减主之 治痛脾四肢疼痛拘倦浮肿

赤茯苓【去皮】 桑白皮【各二两】 防风

官桂 川芎 芍药

麻黄【去节各一两半】

右为末每服五钱水一盏枣一枚煎至八分温服以姜粥投之汗泄为度効矣

茯苓川芎汤【宣明方】 湿气胜者为着痹湿地水气甚重着而不去多汗而濡者茯苓川芎汤主之 治着痹留注不去四肢麻木拘挛浮肿

赤茯苓 桑白皮 防风

官桂 川芎 麻黄

芍药 当归 甘草【炙各五分】

右为末每服四钱半水二盏枣三枚同煎至一盏去滓空心温服如欲出汗以粥投之

蠲痹汤【济生方】 治手足冷痹腰腿沉重及身体烦疼背项拘急

当归【去芦酒洗】 赤芍药 黄芪【去芦】

防风【去芦】 片子姜黄 羌活【各一两半】

甘草【炙半两】

右?咀每服四钱水一盞半姜五片枣一枚煎八分去粗温服

防风汤【济生方】治血痹皮肤不仁

川当归【去芦洗】 赤茯苓【去皮】 川独活【各一两】 甘草【炙半两】
防风【一两】 赤芍药

黄芩【各一两】 杏仁【去皮尖半两】 秦艽【去芦一两】

桂心【不见火半两】

右?咀每服四钱水一盞姜五片煎七分去粗温服不拘时

续断丸【本事方】治风湿流注四肢浮肿肌肉麻痹

当归【炒】 川续断 萆薢【各一两】

川芎【七钱半】 乳香【半两】 天麻

防风 附子【各一两】 没药【半两】

右为末炼蜜丸如梧桐子大每服四十丸温酒杳饮任下

黄耆酒【济生方】治风湿痒痛筋脉挛急或身体顽痹当归【去芦】 云母粉 茵芋叶

白朮 虎骨 萆薢

木香【不见火】 仙灵皮 川续断

甘草【炙】 白芍药 黄耆【去芦】

防风【去芦】 官桂【不见火】 天麻

石斛【去根各一两】

右?咀用绢袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七冬十日每服一盞温暖服之常令酒气相续为佳

茯苓汤【济寸方】治停蓄支饮手足麻痹多睡眩冒

半夏【汤洗七次】 赤茯苓【去皮】 陈皮【各一两】

枳实【去穰麸炒】 桔梗【去芦】 甘草【炙各半两】

右?咀每服四钱水一盞半姜七片煎七分温服损续断丸【本事方】治寒湿之气痹滞关节麻木疼痛

人参 防风 鹿角胶

白术【炮各七两】 麦门冬 乾地黄

黄芪 续断 薏苡仁

山芋 牡丹皮 桂心

山茱萸 白茯苓 石斛【各二两】

右为末炼蜜丸如梧桐子大每服五十丸温酒空心下

羌活汤【济生方】治白虎历节风毒攻注骨节疼痛发作不定

羌活【去芦二两】 附子【炮皮脐】 秦艽【去芦】

桂心 木香【不见火】 川芎

当归【去芦】 牛膝【川者去芦酒洗】 甘草【炙各半两】

桃仁【去皮尖麸炒】 骨碎补 防风【去叉各一两】

右?咀每服四钱水一盞半姜五片煎七分温服

虎骨散【济生方】治白虎风肢节疼痛发则不可忍【方见白虎历节风门】

谨按痹病盖因风寒温三气客於经络为病不一或为痛或为痒或为麻痹不仁或为手足缓弱所以然者有新久轻重之分有温痰死血之异济生防风汤茯苓汤所治已露端倪也学者细心求之仁斋先生不言痹病盖已中风白虎历节风条内矣但所言病之见证古人所言病之原因即中庸费隐之义也脚气

脚气方论

肾司於下一身之根本系焉脚者肾之外候也夫人为嗜慾所戕苦不自觉肾气内虚真元不守凡骤立冷地久坐卑湿暴热濯水凌晨履霜感受四气於冥冥之中不为脚气者鲜矣脚气为病虽起於足实周乎身或壮热头痛或身体冷疼或百节拘挛或十指走注或转筋急痛或小腹不仁以至胷满喘息烦闷怔忡昏溃羞明误忘错语腹痛下利呕哕痰涎食气恶闻见食即吐大便小便多是秘澁自腿至膝自胫及踝屈弱顽痺挛急酸疼或焮不焮或肿不肿皆其候也其自汗恶风无汗恶寒乍寒乍热传足六经外证与伤寒类焉但卒然脚痛为异耳治法究其所自来挟风者游走有汗挟寒者掣痛挛疼挟暑者大渴热烦挟湿者肿满重滞其间四气兼有则惟其多者解之对病施药固在权衡然古人以此名为缓风谓其感於风毒所致则总治之法大要疏导大便使毒气得泄而後愈但分剂不可过焉其补汤淋洗皆医家之大戒也虽然脚气治法以疏利毒气为先盖虑乎气实而死矣然表里之有异经冷热之有异证或因他病而後发或致他病之续生又不可以不通其变所谓寒则温之热则寒之在表则散在里则下太虚气乏扶养其中凝阴蘊毒为之温利是又胷中之活法矣其或疗治不早使毒气入复冲心攻筑作痛喘满上气呕吐异常此则渐入顿深或者自贻奄忽

脚气证治

二十四味轻脚圆治脚气通用

当归【酒浸晒】 川芎 萆薢【盐水煮乾】

羌活 杜仲【姜制炒】 石南叶

薏苡仁 大鸡心槟榔 华阴细辛

枳殼【各一两】 苍术【炒】 五加皮

防风 独活 续断【洗晒】

牛膝【酒浸晒】 威灵仙 海桐皮

木香 木瓜 麻黄【去节】

川五灵脂 没药【别研各三分】 滴乳香【半两】

右细末酒浸雪糕为圆桐子大每服五十圆细剉辣桂荆芥穗食前煎汤下或枳殼木瓜煎汤下

木瓜散脚气通用

大腹 紫苏 羌活

木香 茯苓 陈皮

甘草【炙各半两】 宣木瓜乾【一两】

右细末每三钱姜枣煎服

降气汤脚气通用

半夏【制】 真苏子【微炒各五两】 当归

厚朴【制】 甘草【炙】 北前胡【各二两】

肉桂 陈皮【各三两】

右剉散每三钱姜五片枣两枚煎服如无苏子以苏叶二两代之

槟榔散治风毒脚气肿痛

橘叶 杉木节【各一握】

右童子尿一盞醇酒半盞煎六分滤清乘热调槟榔末二钱食前服排风汤通用【方见风类】

生木瓜圆脚气通用

宣州生木瓜【就蒂切一盖取出穰以生艾叶塞蒲合盖竹针插定蒸透去艾其木瓜去皮研烂】

右入五积散末和圆桐子大日乾每服七十圆食前醇酒下

止呕汤治脚气呕逆吐泻转筋

宣木瓜一味细剉每服四钱新水煎服神効

槟榔一物汤治脚气攻注手足不能举

鸡心大槟榔

右末每服三钱用紫苏七叶连梗橘皮一全个不去白姜五片煎汤乘热调下治脚气冲心痛
闷用童尿煎服治脚心串痛温酒调下

海桐皮酒治风毒脚气膝胫疼痛

海桐皮 五加皮 川独活

枳壳【制】 防风 杜仲【姜制炒】

牛膝【酒浸晒】 薏苡仁【炒各一两半】 生地黄【二两半】

右末用绵裹以醇酒一斗春浸七日秋浸十四日每日空心温服一盞午前一盞

杉节汤治脚气攻心痛闷胀满不食

青皮 陈皮 天台乌药

鸡心槟榔 宣木瓜 乾杉木节

半夏【制】 枳壳【制】 缩砂仁

赤茯苓【各半两】 丁香 茴香【微炒】

大腹皮 紫苏子【微炒】 罗卜子【微炒】

北梗 甘草【炙各一分】

右剉每三钱姜五片煎

三和散加木香枳壳【方见水饮门】和剂流风散【方见胀满门】分气紫苏饮【方见喘
门】乌药顺气散【方见中风门】脚气通用枳壳散疏导毒气

枳壳【制五两】 甘草【炙一两半】

右末每服二钱浓煎木瓜汤调下如要【阙】利更加麻仁

脾约圆治脚气大便秘澹

麻仁【别研】 杏仁【浸去皮炒各五两半】 枳实【制】

厚朴【制】 芍药【各半斤】 大黄【一斤蒸切晒】

右末炼蜜圆桐子大每二十圆食後熟水下或败毒散加大黄通用

大黄汤治脚气风热烦闷发渴大便不通

木香 大黄【各半两】 黑豆【一两】

升麻【三分】

右剉每服三钱乌梅二个新水煎服

追风毒剉散治脚气热多证疎泄风毒

羌活【一两】 鸡心槟榔 防风

桑白皮【炒各半两】 郁李仁【炒】 大黄【生各一分】

右剉散每服三钱黑豆百粒煎服热甚大便秘更加大黄

败毒散【方见寒类】 治脚气热证或自汗恶风则加桂无汗恶寒则加去节麻黄又治风湿脚气发热焮肿加苍术槟榔大黄微利为效

竹茹汤治脚气胃热烦燥呕吐【方见积热门】 加乌梅煎豆豉【方见血类】 加生甘草治热证脚气

木香饮治脚气入腹攻心呕闷

南木香 甘草【炙】 青木香

吴茱萸【荡洗七次炒乾各半两】 宣木瓜

真橘皮 紫苏茎叶 鸡心槟榔【各一两】

右剉散每服三钱姜五片乌梅一枚煎服

降气汤【方见前】 吞养正丹【方见痼冷门】 治脚气冲心筑痛呕吐涎沫和剂流气饮通用【方见胀满门】

椒瓜圆治脚气寒证

大生木瓜【就蒂切盖以正川椒去目碾末纳实其中用竹钗插其盖炊熟】

右研二味为圆桐子大每四十圆温酒下扶虚用核桃肉煎汤下

越婢汤治脚气风多证

麻黄【去节一两半】 烂石膏【二两】 白术【一两】

熟附子 甘草【炙各半两】

右剉散每服三钱姜五片枣一枚煎服

小续命多用姜片治脚气寒多证加独活治脚气风多证【方见风类】

乾姜甘草汤【方见脾疼门】 加制吴茱萸官桂治寒证脚气香薷剉散加木瓜煎吞消暑圆治暑证脚气【方并见暑门】 独活寄生汤加陈皮治风证脚气无热者皆可服最除风毒消恶血【方见腰疼门】

石南圆治风毒脚肿生疮或筋挛痛重

石南叶 薏苡仁 杏仁【浸去皮微炒】 牵牛【炒?】 大腹子【连皮用】 川芎

川续断 赤芍药 赤小豆

陈皮 当归 麻黄【去节各二两】 五加皮 牛膝【各三两】 宣木瓜

独活 萆薢 杜仲【姜制炒各四两】

右细末以酒浸蒸饼研糊圆桐子大每服三十圆煎木瓜汤下

加剂除湿汤加槟榔【方见湿门】 五苓散【方见水饮门】 治脚气渴多证

换腿圆治风湿脚气缓弱痹痛上攻肩背

石南叶 南星【炮】 石斛【酒浸晒】

牛膝【酒浸晒】 羌活 薏苡仁【炒】

防风 萆薢 黄耆【蜜炙】

天麻 当归【酒浸晒】 续断【各一两半】

槟榔【二两半】 宣木瓜【四两】 加苍术【炒】

川芎【各一两半】

右末酒麪稀糊圆桐子大每五十圆食前橘皮煎汤下

独活汤

羌活 麻黄【去节】 熟附子

生地姜 川芎 牛膝

白芍药 白茯苓 黄耆【蜜炙】

人参 杜仲【姜制炒】 甘草【炙】

辣桂 当归 白术

木香【等分】

右麪末每服三钱姜五片枣二枚同煎吞活血应痛圆

活血应痛圆

苍术【炒六两】 香附【炒杵净七两】 威灵仙【二两】

草乌头【二十四两炮去皮脐】 陈皮【五两半】

狗脊【燎去毛四两】 没药【一两别研】

右末酒麪稀糊圆桐子大每服二十圆用独活汤下治肾受风冷脚气酸疼及久痢登厕风冷

入于肠胃以致两脚削小成鼓槌风而痢又不止用此两药俱效

不老地仙丹治肾脏风毒轻脚壮筋

当归 牛膝 苁蓉【各酒浸焙乾】 虎骨【酒炙黄】 真川椒【去目出汗】
川萆薢【盐水煮乾】 蒺藜【炒捣去刺】 川芎【各一两】 白附子【炮】

黄耆【蜜炙】 圆白南星【炮】 何首乌

羌活 独活 杜仲【姜制炒】

没药【别研三分】 防风 赤小豆

地龙【去土】 茴香【炒】 木鼈子【去油】

血竭 乳香【别研各半两】

右细末河麝稀糊圆桐子大每服四十圆木瓜橘皮煎汤下

乌蛇圆治风寒脚气隐痛痒痺

乌蛇【四两酒浸取肉焙】 虎骨【?浸洗净酒炙二两】 石斛【令作末】

黄松柏节【酒浸研】 巴戟【去心】 苁蓉【酒浸焙】

官桂 防风 独活

续断 五加皮 薏苡仁

当归 木香 川芎【各半两】

乳香 生乾姜【各二分】

右末酒麝稀糊圆桐子大每服四十圆木瓜橘皮煎汤下

慈济圆治脚气游走两足转上腰腿疼痛不能转侧

宣木瓜【二两】 川乌【炮去皮脐】 黄耆

蒺藜【炒去刺】 当归 防风

萆薢 牛膝 天台乌药【各一两】 赤小豆 茴香【炒】 地龙【去土】

老白胶【研筛】 川五灵脂【各三分】

右细末酒麪稀糊圆桐子大圆数四十食前紫苏汤送下

四斤圆治脚气缓弱隐疼及肾虚感受风寒湿痹【方见风缓门】

大流气饮加当归下【方见胀满门】

虎骨散【方见历节门】脚气筋急掣痛用木瓜橘皮煎汤调下金液丹【方见脾疼门】治凝阴蕴毒温而利之养正丹通用以枳壳木瓜槟榔煎汤下

二陈汤加槟榔细辛制枳壳治脚气痰多证【方见疟门】无热者二陈汤下养正丹艾瓜圆【方见肾气门】

脚痛缓弱患在风湿风证以乌药顺气散加麻黄白芷主之湿证以不换金正气散加茯苓生乾姜主之一匕收功容易事也若夫肾虚为病脚弱而痛又当何如曰肾主骨故尔惟安肾圆最良以不换金正气散送下仍夹和白圆子佐之余每见脚气缓弱人多服四斤圆亦安肾圆辈也然则肾气充则骨气强骨气强则无缓弱之患治法要当究其原

附诸方

麻黄左经汤【三因方】治风寒暑湿流注足太阳经腰足挛痹关节重痛增寒发热无汗恶寒或自汗恶风头痛眩晕

麻黄【去节】 乾葛 细辛

白术【米泔浸】 茯苓 防己

桂心【不见火】 羌活 甘草【炙】

防风【各等分】

右为末每服四钱水一盏姜三片枣一枚煎空心服自汗去麻黄加肉桂芍药重者加白术陈皮无汗减桂加杏仁泽泻并各等分

半夏左经汤【三因方】治之小肠经为风寒暑湿流注发热腰脇疼痛头目眩晕呕吐不食

半夏【汤洗七次】 乾葛 细辛

白术 麦门冬 柴胡

茯苓 桂心【不见火】 防风

乾姜【炮】 黄芩 小草

甘草【炙各等分】

右?咀每服四钱水一盞姜三片枣一枚煎七分空心服热闷加竹沥喘急加杏仁桑白皮

大黄左经汤【三因方】治风寒暑湿流注足阳明经使腰脚赤肿痛不可行大小便秘或恶闻食气喘满自汗

细辛【去苗】 茯苓 羌活

大黄【蒸】 甘草【炙】 前胡

枳殼【去穰炒】 厚朴【去皮炒】 黄芩

杏仁【去皮尖别研各等分】

右?咀每服四钱水一盞姜三片枣一枚煎七分空心热服腹痛加芍药秘结加阿胶喘急加桑白皮紫苏小便澁少加泽泻四肢疮疡浸淫加升麻并等分

大料神秘左经汤【三因方】治风寒暑温流注三阳经腰足拘挛大小便秘澁喘满烦闷并皆治之

半夏【汤洗七次】 乾葛 细辛

麻黄【去节】 麦门冬【去心】 小草【即远志苗】

白姜 厚朴【姜制炒】 茯苓

防己 枳殼【去穰炒】 甘草【炙】

桂心 羌活 防风

柴胡 黄芩

右?咀每服四钱水一盞姜三片枣一枚煎服自汗加牡蛎白术去麻黄黄肿加泽泻木通热甚无汗减桂加橘皮前胡升麻腹痛或利去黄芩加芍药附子大便秘加大黄竹沥喘满加杏仁药白皮紫苏竝等分对证加减尤宜审之

六物附子汤【三因方】治四气流注於足太阴经骨节烦疼四肢拘急自汗短气小便不利手足或时浮肿

附子【炮去皮脐】 桂心 防己【各四两】

甘草【炙二两】 白术【三两】

右?咀每服四钱水一盞姜七片煎六分食前温服

当归拈痛汤【拔粹方】治湿热为病肢节烦疼肩背沉重胸不利及遍身疼痛下疰于足胫痛不可忍

羌活 甘草【炙】 黄芩【酒浸】

茵陈【酒炒各五钱】 人参【去芦】 升麻

苦参【酒洗】 葛根 苍术【各二钱】

防风【去芦】 当归身 知母【酒洗】

茯苓【炒】 泽泻 猪苓【各三勺】

白术【一勺半】

右?咀每服一两水二盞煎至一盞去滓空心服

乌药平气汤【三因方】治脚气上攻头目昏眩脚膝酸疼行步艰苦诸气不和喘满迫促并皆治之

茯神【去木】 甘草【炙】 白芷

当归 白术 川芎

五味子 紫苏子 乾木瓜

人参 乌药【去木各等分】

右?咀每服四钱水一盞姜五片枣二枚煎七分温服

东垣羌活导滞汤治脚气初发一身尽痛或股节肿痛便溺阻隔先以此药导之後用当归拈痛汤

羌活 独活 防己

当归【各三钱】 大黄【酒浸煨一两】 枳实【炒二钱】

右?咀每服五钱或七钱水煎服

金匱八味丸治足少阴经脚气入腹腹胀疼痛上气喘急肾经虚寒所致也此证最急以肾乘心水尅火死不旋踵【方见补损门】

加味败毒散治足三阳经受热毒气流注脚踝上焮赤肿痛寒热如疟自汗恶风或无汗恶寒

羌活 独活 前胡

柴胡 枳殼 桔梗

甘草 人参 茯苓

川芎 大黄 苍术【等分】

右?咀每半两入姜煎

五积散【和剂方】治寒湿流注两脚酸疼有兼痰气者用之尤宜内加木瓜【方见中寒门】

健步丸【方见痿】

生苧【半两】 归尾 芍药

陈皮 苍术 牛膝【各一两】

吴茱萸 条芩【各半两】 桂枝【二钱】

大腹子【三个】

右为末蒸饼丸如梧子大每服一百丸空心煎白术木通汤下

防己饮【丹溪方】

白术 木通 防己

槟榔 川芎 甘草稍

犀角 苍术【盐炒】 生苧

黄柏【各酒炒】

大便实加桃仁小便澀加杜牛膝有热加黄芩黄连大热及时令热加石膏有痰加竹沥姜汁如常肿者专主乎湿热先生别有方

脚气治例

心法附錄曰脚气有湿热有食积流注有风湿有寒温○胜湿以仙术白术防己川芎为主或六物附子汤或当归拈痛汤○脚气气郁甚者舟车丸除湿丹有饮者东垣开结导饮丸○脚气解表用麻黄左经汤等药随经选用有兼痰气寒湿者五积散加木瓜若双解以大黄左经汤东垣羌活导滞汤

若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加黄柏南星或健步丸

若疎风养血用独活寄生汤最效○春夏气溢肿而痛者用香苏散加五加皮木瓜槟榔川练子○热而红肿者败毒散加木瓜苍术○秋冬已後用五积散加木瓜牛膝?榔吴茱萸

附足跟痛

丹溪曰○有痰有血热○血热四物加黄柏知母牛膝之类有痰唾者五积散加木瓜

四物汤【方见补损门】

五积散【方见中寒门】

舟车丸

除湿丹【俱见湿类】

开结导饮丸【方见痰涎门】

治脚转筋疼痛挛急用松节二两剉细乳香一钱以银石器内慢火略炒焦存性研细每服一钱至二钱木瓜酒调下

治脚气筋骨疼痛用金银花为末每服二钱热酒调下或剉碎同木瓜白芍药官桂当归甘草酒水各半锤煎去滓空心热服

仁斋直指卷四

卷五

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷五 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

诸气【附 梅核气积聚症瘕痞块】

诸气方论

人以气为主一息不运则机殫穷一毫不续则穹壤判阴阳之所以升降者气也血脉之所以流行者亦气也荣卫之所以运转者气也五脏六腑之所以相养相生者亦此气也盛则盈衰则虚顺则平逆则病气也者独非人身之根本乎人有七情病生七气七气者寒热怒恚喜忧愁或以为喜怒忧思悲惊恐皆通也然则均调是气将何先焉曰气结则生痰痰盛则气愈结故调气必先豁痰如七气汤以半夏主治而官桂佐之盖良法也况夫冷则生气调气虽用豁痰亦不可无温中之剂其间用桂又所以温其中也不然七气相干痰涎凝结如絮如膜甚如梅核窒碍於咽喉之间咯不出咽不下或中满艰食或上气喘急曰气隔曰气滞曰气秘曰气中以五积六聚疝癖瘕症心腹块痛发即欲绝殆无往而不至矣○冷气者生冷伤脾风冷入胃或血海虚冷冷则生气用和剂七气汤治中汤沈香降气汤大沈香圆○痰结者三因七气汤指迷七气汤易简二陈汤○中满者痞满不食水气肿胀面目俱浮枳壳散加南木香大流气饮指迷七气汤顺气木香散三和散五皮散加半夏茯苓○上气者气逆而上呼吸喘促分气紫苏汤苏子降气汤或嚼苏合香圆以秘传降气汤送下○气隔者阴阳不和中脘窒塞五隔吐噎食不能下五隔宽中散和剂七气汤加木香缩砂间以红圆子佐之○气滞者滞於胷膈则胀满滞于手足则浮肿滞于腰间则坠痛胀满用异香散调气散沈香降气汤仍与神保圆或少蓬煎圆利之浮肿用三和散夹生料五苓散或五皮散加桂吞青木香圆局方流气饮加赤茯苓枳壳腰痛俞山人降气汤局方七气汤加橘核或辣桂煎汤点调气散吞青娥丸○气秘者停宿不消肠胃留滞大便不通苏合香圆夹和感应圆或杨氏麝香圆局方麻仁圆并用枳壳散送下○气疾之人多因气不归元遂成气中状如中风仆倒昏迷牙关紧急只是无痰此为气中不得误用风药及通关利腠等辈先以姜汁泡汤调苏合香圆次用七气汤大流气饮加石菖蒲继之气顺而苏即以治中汤加木香以和其中使气归常道若更不能调则气逆而厥又有变证○五积者五臟之所积其病难医六聚者六腑之所聚其病易治挟水为癖挟血为症气血水饮皆能结块轻者神保圆以麝香汤送下或少与蓬煎圆撞气阿魏圆三棱煎圆重者如意圆顶珠圆酌量用○又一证漉漉作声腹中滞他无所苦此为水饮消饮圆倍术圆【方并见水饮类】二姜圆夹和用之○人有血气心知之性而无哀乐喜怒之常一

种妇人平时任气易为七情所伤适月事经季不行一身百病胃膈气填呕恶全不入食入食则吐痰涎或一块如核窒塞胃喉而痛或一块如卵筑触心下而疼或腹中块物动而作痛攻刺腰背时发闕热四肢乏力脚不能行小便白浊浮油带下淋漓日就瘦弱全似虚劳然而谷虽不入果子杂物常喜食之却只是有孕谚所谓孕妇做得百般病者此也用药但以二陈汤加缩砂桔梗姜枣乌梅同煎半夏理气消痰缩砂安胎顺气北梗以开胃喉之隔服之自然安平若妄以刚剂温胃胎气必烦病无由愈白浊一节谨勿燥澁二陈汤加白茯苓以下白圆子【方并见痰涎类】可也若夫七情所发逆气填胸不惟核膜上塞咽喉甚者攻击满闷欲絶产後尤多有之故曰产前安胎产後调气【男女或有胸喉间梅核作恙者触事勿怒饮食勿冷】

诸气证治

和剂七气汤治七气所伤痰涎结聚心腹刺痛不能饮食

半夏【制焙五两】 人参 辣桂【去麤皮各一两】 甘草【炙半两】

右剉散每服三钱水大盏姜五片枣一枚煎至七分食前服

和剂治中汤【方见脾胃门】

沈香降气汤治阴阳交滞心腹胀满留饮停酸积冷诸证

沈香【一两二钱】 缩砂仁【三两】 甘草【燼二两半】

香附【炒净一斤】

右末每一钱盐一点沸汤点下

大沈香圆治一切冷气攻心腹刺痛胃膈噎塞妇人血气刺痛并宜服之【方见心气类】

三因七气汤证治如前有热者可用此

半夏【五两】 茯苓【四两】 厚朴【制三两】

紫苏叶【二两】

右剉散每服四钱水盏半姜七片枣二枚煎六分不时服

易简二陈汤【方见痰涎门】

枳殼散【方见脚气门】治证同前加南木香煎服

和剂流气饮调荣卫利三焦行痞滞消肿胀

橘红 青皮 紫苏叶

厚朴【制】 香附【炒淨】 甘草【炙各四两】

木通【二两】 大腹皮 丁皮

槟榔 辣桂 木香

草果仁 蓬术【煨】 藿香叶【各一两半】

麦门冬 人参 白术

木瓜 赤茯苓 石菖蒲

白芷 半夏【制】 枳殼【制各一两】

右剉散每服三钱姜四片枣二枚煎服【余见水肿门】

指迷七气汤治七情相干阴阳不得升降气道壅滞攻冲作疼

青皮 陈皮 桔梗

蓬莪术 辣桂 藿香

益智仁【各一两】 香附【一两半】 甘草【炙三分】

加半夏【制三分】

右剉散每服三钱水一盞姜四片枣一枚煎七分不时服

顺气木香散治冷证肿胀泄泻

良姜 乾姜【炮】 茴香【炒】

缩砂仁 辣桂 橘红

厚朴【姜汁汁焙】 甘草【燼】 苍术【炒】

丁皮 桔梗【各等分】

右末每二钱半姜枣煎食前服

三和散和畅三焦治痞胀浮肿

大腹皮【炒】 紫苏茎叶 沉香

宣木瓜【切焙】 羌活【各一两】 白术

川芎 木香 甘草【炒】

陈橘皮【去白】 槟榔【湿纸煨各三分】

右麤末每二钱煎服加赤茯苓可以和气利水

五皮散治皮肤水气

大腹皮【炒】 桑白皮【炒】 茯苓皮

生姜皮 陈橘皮【等分】

右麤末每三钱煎服

分气紫苏汤治腹胁疼痛气促喘急

五味子【去梗洗淨】 桔梗【剉】 茯苓

大腹皮 陈橘皮【洗淨】 草果仁

桑白皮【炙剉】 甘草【炙各三斤】

右八味?咀为麤末秤二十斤淨入拣嫩枝叶乾紫苏十五斤捣碎同一处拌匀每服四钱水一大盏姜钱三片入盐少许同煎至七分去滓空心食前服常服和胃进食

苏子降气汤治心腹胀满喘促短急

苏子【淨炒】 半夏【洗七次各二两半】 甘草【炙二两】

前胡【去芦】 陈皮【去白】 厚朴【姜汁制各一两】 桂【一两去麋皮不见火】
川当归【去芦一两半】

右为?咀每服二钱至三钱水一大盏生姜三片煎至七分去滓温服不拘时常服消痰饮散滯
气进饮食

苏合香圆疗疰忤鬼气卒心痛霍乱吐利时气鬼魅瘴疟赤白暴利瘀血月闭痲癖丁肿惊癇
鬼忤中人小儿吐乳大人狐狸等疾【方见 类】

祕传降气汤治同前

五加皮【半两酒浸半日炒黄色】 枳殼【洗浸去穰麴炒】 柴胡【去芦洗各一两】
骨碎补【燎去毛括淨剉炒半两】

地骨皮【半两炒黄】 桔梗【半两炒黄色】 桑白皮【二两剉炒】 陈皮【一两炒黄色】
诃子【炮取肉半两炒】 甘草【一两炒】

半夏【半两生为末生姜自然汁为饼再碎炒】 草果【去皮膜半两淨洗炒黄】

右为麴散和匀以碗盛就饭甑上蒸一伏时倾出摊令冷收之每服二钱紫苏三叶姜钱三片
水一盏同煎七分食後通口服痰嗽加半夏麴煎心肺虚加人参茯苓煎上膈热加北黄芩煎
下部大段虚加少许炮附子煎如使附子多加生姜妇人血虚加当归煎

五膈寬中散治七气留滯饮食不下谷胀气胀通用

白豆?仁 丁香 木香

缩砂仁 甘草【炙】 青皮

陈皮【各二两】 川厚朴【姜汁炙焙】 香附【淨各四两】

右麴末每三钱姜三片盐一点煎服

红圆子治丈夫脾积气滯胃膈满闷酒积不食妇人脾血积气诸般血症气块【方见痲症门
】

异香散治腹脇膨胀痞闷噎塞噫气吞酸一切气痞腹中刺痛

蓬莪茂【煨】 益智仁 甘草【燼】

京三棱【煨各六两】 青皮【去白】 陈皮【去白各三两】 石莲肉【一两】
厚朴【去麤皮姜汁浸二两】

右为细末每服二钱水一盞姜三片枣一枚盐一捻煎七分通口服不计时或盐汤点或盐酒调皆可服

调气散治气滞不匀宿食不消

白豆蔻【用仁】 丁香 檀香【剉】

木香【各二十两】 藿香叶 甘草【燼各五斤】

缩砂仁【二斤半】

右为细末每服一钱入盐一捻沸汤点服不计时或用姜枣略煎服

神保圆

木香 胡椒【各一分】 巴豆【十枚去皮心研】 乾蝎【七枚】

右件汤释蒸饼圆如麻子大朱砂为衣每服三粒心膈痛柿蒂灯心汤下腹痛柿蒂煨姜煎汤下血痛炒姜醋汤下肺气盛者白矾蛤粉各三分黄丹一分同研为散煎桑根白皮糯米饮调三钱下小喘止用桑皮糯米饮下肾气脇下痛炒丁香酒下大便不通蜜汤调槟榔末一钱下气噎木香汤下宿食不消茶酒浆饮任下诸气惟膀胱气脇下痛最难治独此药辄能去之有人病项筋痛诸医皆以为风治之数月不瘥乃流入背脊久之又注右脇挛痛甚苦乃合服之一投而瘥後尝再发又一投瘥

蓬煎圆利大腑去积气

舶上茴香【炒】 附子【炮去皮脐】 枳壳【浸一宿去穰麸炒】

川练子【去核】 槟榔 山药【各二两】

礞砂【半两】 京三棱 蓬莪术【二味各四两醋煮令透切焙为末】
猪胰【一具入礞砂并三棱莪术末同熬膏】

右为末入膏内同醋麪糊为圆如梧桐子大每服十圆至十五圆生姜汤下妇人淡醋汤下不

拘时候更量虚实加减常服顺气寬中消积滯化痰饮

生料五苓散去水退肿

泽泻【剉二十五两】 猪苓【去皮】 赤茯苓【去皮】

白朮【去芦各一十五两】 桂【去麤皮一十两】

右为细末每服二钱热汤调下不拘时又治瘀热在里身发黄疽浓煎茵陈蒿汤下食前服疽病发渴及中暑引饮亦可用水调服小儿加白朮末少许如发虚热加绵黄耆人参末少许

俞山人降气汤治气不升降痰实喘满

紫苏子【微炒】 前胡【去芦】 厚朴【姜汁浸一宿炒香】 半夏麴【炙】 甘草【炙】 橘皮【去白】

五加皮【姜汁涂炙】 当归【洗去芦】 桂心【不见火】

黄耆【去芦各一两】 人参【去芦】 附子【炮去皮尖】

桔梗【炒】 羌活 乾姜【炮各半两】

右麤末每服三钱水一盞半紫苏三叶生姜三片枣子一枚同煎七分去滓食後服

青娥圆治气滯不散兼治腰痛

破故纸【酒浸炒八两】 胡桃【二十个去皮殼】 蒜【四两熬膏】

杜仲【十六两去皮姜汁浸炒】

右为细末蒜膏为圆每服三十圆空心温酒下妇人淡醋汤下常服壮筋骨活血脉乌髭须益顏色

感应圆治积冷伤胃腹脇胀痛【方见胀满门】

麻仁圆顺三焦润五脏治大便秘塞不通年高人尤宜服之

白槟榔【半煨半生】 羌活【去芦】 木香【各一两】

肉桂【去麤皮】 兔丝子【酒浸一宿别研为末】

山茱萸 车前子 枳殼【去穰麸炒】

防风【去芦头及义枝】 山蒟【各一两半】 麻仁【别捣研】

大黄【半蒸半生】 郁李仁【去皮别捣碎各四两】

右为细末入别研药匀炼蜜和圆如梧桐子大每服十五圆至二十圆温水吞下临卧服

撞气阿魏圆治五种噎疾九般心痛痞气块冷气攻刺

茴香【炒香】 陈橘皮【洗】 青橘皮【洗】

川芎 丁香皮【炒】 蓬莪术【炮】

甘草【炒各一两】 缩砂仁 肉桂【去麤皮】

白芷【炒各半两】 生姜【四两切作片子用盐半两淹一宿炒黑色】

胡椒【二钱半】 阿魏【二钱半醋浸一宿以麪同为糊】

右为末用阿魏糊和圆如鸡头大每药圆一斤用朱砂七钱为衣丈夫气痛炒姜盐汤下一粒至二粒妇人血气醋汤下常服一粒烂嚼茶酒任下

三棱煎圆治中脘气痞心腹坚胀胃中痞塞喘满短气大便不调或泄或秘

京三棱【生细剉半斤捣罗为末以好酒三升石器内熬成膏】

青橘皮【去白】 杏仁【汤浸去皮麸炒令黄】 萝卜子【微炒】

乾漆【炒各二两】 神麪【焙炒】 麦蘖【炒各三两】

礞砂【研飞一两】

右为末以三棱膏搜和圆如梧桐子大每服十五圆至二十圆温米饮下食後服

二姜圆养脾温胃去冷消痰大治心脾疼痛宽胃下气一切冷物所伤

良姜【去芦】 乾姜【炮】

右件等分为细末麪糊为圆如梧桐子大每服十五至二十圆食後橘皮汤下孕妇不宜服

香橘圆治七情所伤中脘不决腹脇胀满

香附【炒】 半夏【制】 橘红【各二两】

甘草【炒三分】

右剉散每三钱姜五片枣二枚煎服

桔梗枳殼汤治诸气痞结满闷

枳殼【制】 桔梗【各二两】 甘草【炒半两】

右剉散每四钱水盞半姜五片煎至中盞温服

姜桂散治心中卒痛腹脇气滞

辣桂 川白姜【不炒各一两】 蓬莪术【半两】

右末每一钱温酒调下

沉香开膈散治五膈五噎痞满呕吐心腹刺痛脇肋胀拒

沉香 荆三棱 蓬莪术

白豆蔻仁 荜澄茄 缩砂仁

草果仁 益智仁 川白姜

丁香 人参 丁皮【各半两】

木香 白茯苓 香附【炒】

藿香叶 半夏麪 青皮

陈皮【各一两】 甘草【炒一两一分】

右麤末每三钱水盞半姜五片枣二枚煎至中盞食前服

良姜汤治冷气腹痛

良姜 辣桂【各一两】 半夏【制三分】

木香 当归 厚朴【制各半两】

甘草【炒一分】

右麤散每三钱姜四片水大盞煎六分食前服

白豆?散治七气所伤滯於胸膈窒於咽喉胀痛于心下噫气吞酸不能饮食

白豆?仁 缩砂 萆澄茄

丁香 木香 甘草【炒各一分】

青皮 陈皮 辣桂【各二分】

厚朴【制】 香附【炒各三分】

右末每三钱水一盞姜三片盐一捻煎七分不时服

如意圆治积聚块痛疝瘕症癖等疾

沈香 木香 大丁香

萆澄茄 史君子 辣桂

川白姜【炒】 桃仁【炒】 五灵脂【炒】

礞砂【醋浸半月】 雄黄 没药

大戟 牵牛【炒取末】 巴豆【去油各一两】 荆三棱 蓬莪术 肉豆?【炮各半两】

右末研细水煮面糊圆麻子大每服二圆加至三圆止温酒送下

顶珠圆治积气块痛久年脾积癖瘕之疾

木香 丁香 淡豉

硃砂【醋浸半日并日乾】 朱砂【研细各一分】 巴豆【去油一钱半】

右末陈米饭为圆桐子大轻者一圆重者二圆临睡先嚼煨姜如指许咽下次以冷熟水吞药不得嚼破上项两圆子请酌量用

杨氏麝香圆治停宿积聚能寻诸处痛凡膀胱气脇下痛最难治此药主之

麝香【一钱】 木香 胡椒【各一两】

全蝎【去毒微炒】 巴豆【去皮心各四钱】

右为末汤泡蒸饼糊圆麻子大朱砂衣每三圆常服熟水下心腹痛研煨姜泡汤下血痛炒姜醋泡汤下肾气脇疼茴香酒下大便秘蜜汤下

橘皮一物汤治诸气攻刺及感受风寒暑湿初证通用凡酒食所伤中脘妨满呕吐吞酸悉疗之

陈橘皮洗净新汲水煎服屡效

气块石燕散治饮食伤冷心下结块状如伏梁又攻左脇

车蛾殼 蛤蜊殼【并烧灰存性为末各一两】

乾姜【生】 官桂 甘草【炙各一分】

右为末每服二钱临发时沸汤点服车蛾蛤蜊殼治块

分心气饮真方治忧思郁怒诸气痞满停滯通利大小便

紫苏茎叶【三两】 半夏【制】 枳殼【制各一两半】 青皮【去白】 陈橘皮 大腹皮

桑白皮【炒】 木通【去节】 赤茯苓

南木香 槟榔 蓬莪术【煨】

麦门冬【去心】 桔梗 辣桂

香附 藿香【各一两】 甘草【炙一两三分】

右剉散每服三钱水大盏姜三片枣二枚灯心十茎煎七分不时服里人瘴疟经年虚肿腹胀食不知饱以此药吞温白圆【见浮肿门】初则小便数次後则大便尽通其病顿愈

附梅核气

梅核气方论

梅核气者窒碍于咽喉之间咯之不出咽之不下如梅核之状者是也始因恚怒太过积热蕴隆乃成厉痰郁结致有斯疾耳治宜导痰开郁清热顺气如半夏陈皮香附川芎山枝仁黄芩枳壳苏子之类是也如老痰凝结不开以鹹软之坚海石是也

加味二陈汤

半夏 陈皮 茯苓

甘草 黄芩 枳壳

真苏子 桔梗 白豆?仁

山梔子仁【各等分】

右?咀每服五钱加生姜一片水一盞煎六分食後徐徐服

附积聚症癖痞块

积聚症癖痞块方论

内经云积者盖厥气生足悦悦生胫寒胫寒则血脉凝滯凝滯则寒气上入于肠胃则?胀?胀则肠外之汁沫迫聚不得散日以成积卒然多饮食则肠满起居不节用力过度则络脉伤阳络伤则血外溢血外溢则衄血陰络伤则血内溢血内溢则後血肠胃之络伤则血溢於肠外有寒汁沫与血相抟则并合凝聚不得散而成积矣或外中於寒内伤于忧怒则气上逆气上逆则六输不通温气不行凝血蕴裹不散津液凝滯渗着而不去而成积矣故曰肝之积名曰肥气在左脇下如覆杯有头足久不愈令人发欬逆症连岁不已心之积名曰伏梁起脐上大如臂上至心下久不愈令人烦心脾之积名曰痞气在胃脘右侧覆大如盘久不愈令人四肢不收发黄疸饮食不为肌肤肺之积名曰息奔在右脇下大如覆杯久不愈令人洒淅寒热喘咳发肺壅肾之积名奔豚在小腹上至心下若豚状或下或上无时久不愈令人喘逆骨痿少气

难经曰积者陰气也聚者阳气也故陰沈而伏阳浮而动气之所积名曰积气之所聚名曰聚故积者五脏所生聚者六腑所成也积者陰气也其始发有常处其痛不离其部上下有所终始左右有所穷处聚者阳气也其始发无根本上下无所留止其痛无常处谓之聚故以是别知积聚也矣

原病式曰症者腹中坚硬按之应手然水体柔顺而今反坚硬如地者亢则害承乃制也瘕者腹中虽硬而忽聚忽散无其常故其病未及症也经曰血不流而滞故血内凝而为瘕也小肠移热于大肠乃为虚瘕大肠移热於小肠谓两热相?则血移而为伏瘕血澁不利月事沈滞而不行故云为 瘕为 与伏同传写误尔陈无择云症瘕属肝部积聚属肺部夫症者坚也瘕者假也假物而成形然七症八瘕之名经论亦不详出虽有蛟蛇鼈肉发蝨米等七证初非定名偶因食物相感而致患尔若妇人症瘕则由内外不内外因动伤五脏气血而成古人谓为痼疾以蛟蛇等为生瘕然亦不必泥此并属血病蛇发等事皆出偶然但饮食间误中之留聚假血而成自有活性亦犹永徽中僧病噎者腹中有一物其状如鱼即生瘕也洁古云养正积自除譬如满座皆君子纵有一小人自无容地而出令其真气实胃气强积自消矣洁古之言岂欺我哉内经曰大积大聚衰其大半而止满实中有积气大毒之剂尚不可过况虚中有积者乎此乃治积之一端也邪正虚实宜详审焉丹溪云凡积病不可用下药徒损真气病亦不去当用消积药使之融化则根除矣又云气不能作块成聚块乃有形之物也痰与食积死血而成也在中为痰饮在右为食积在左为死血大法醎以软之坚以削之行气开痰为主用海石三棱蓬术【已上俱用醋煮】香附桃仁红花五灵脂之类为丸石?白术汤送下

凡妇人腹中有块多属死血

丹溪方治一妇人死血食积痰饮成块在两脇动作雷鸣嘈杂眩运身热时作时止

黄连【一两半一半以吴茱萸半两同炒去茱萸一半以益智半两同炒去益智】

莱菔子【一两半炒】 台芎 梔子

三棱 莪术【醋煮】 麦麴

桃仁【去皮尖各五钱】 香附【童便浸焙乾】 山查【各一两】

右为末蒸饼丸如梧桐子大每服五十丸姜汤下

撞气阿魏圆治五种噎疾九般心痛痞气块冷气攻刺如意圆治积聚块痛疝瘕症癖等疾顶珠圆治积气块痛久年脾积癖瘕之疾蓬煎圆利大腑去积气调气散治气滞不匀宿食不消红圆子治丈夫脾积气滞胃膈满闷酒积不食妇人脾血积气诸般血症气块气块石燕饮治饮食伤冷心下结块状如伏梁又攻左脇杨氏麝香圆治停宿积聚能寻诸处痛凡膀胱气脇下痛最难治此药主之【已上八方并见前诸气门】

肥气圆【东垣方】治肝之积在脇脇下如覆杯有头足久不愈令人发欬逆?症连岁不已

厚朴【五钱】 黄连【七钱】 柴胡【二两】

川乌头【炮去皮脐一钱一分】 巴豆霜【五分】

椒【四钱】 乾姜【炮五分】 皂角【去皮弦煨一钱五分】 白茯苓【一钱半】
甘草【三钱炙】 广木【炮】

人参 昆布【各二钱五分】

右件除茯苓皂角巴豆霜另末外为极细末和匀炼蜜为丸如桐子大初服二丸一日加一丸
二日加二丸渐渐加至大便微溏再从二加服周而复始积减大半勿服

伏梁圆治心之积起脐上大如臂上至心下久不愈令人烦心

黄连【一两半】 厚朴【制】 人参【各五钱】

黄芩【三钱】 桂【一钱】 乾姜

菖蒲 巴豆霜 红豆

川乌【炮各五分】 茯神 丹参【炒各一钱】

右件除巴豆霜外为细末另研豆霜旋旋入末炼蜜为丸如桐子大服如上淡黄连汤下

痞气圆治脾之积在胃脘覆大如盘久不愈令人四肢不收发黄疸饮食不为肌肤

厚朴【四钱半】 黄连【八钱】 吴茱萸【三钱】

黄芩【二钱】 泽泻 人参【各一钱】

川乌头【炮】 川椒【炒各五分】 茵陈【酒炒】

乾姜【炮各一钱半】 砂仁【一钱半】 白术

巴豆霜 桂【各四分】

右件除豆霜另研茯苓另末旋入外同为细末炼蜜为丸如桐子大每服用淡甘草汤下服如

上法

息贲丸治肺之积在右脇下覆大如杯久不已令人洒淅寒热喘欬发肺壅

厚朴【制八钱】 黄连【炒一两三钱】 乾姜【炮】

白茯苓 川椒【炒】 紫苑【各一钱半】

桂 川乌头【炮】 桔梗

白豆? 陈皮 京三棱【各一钱】 天门冬 人参【各一钱】 青皮【五分】

巴豆霜【四分】

右件除茯苓巴豆霜旋入外为末炼蜜为丸如桐子大以淡姜汤下服如上法已上四方秋冬加厚朴减黄连四分之一

奔豚丸治肾之积发于小腹上至心下若豚状或下或上无时久不已令人喘逆骨痿少气及治男子内结七疝女人瘕聚滞下

厚朴【制七钱】 黄连【五钱】 白茯苓

泽泻 菖蒲【各二钱】 川乌头【五分】

丁香【五分】 苦楝【酒煮三钱】 玄胡索【一钱半】

全蝎 附子 独活【各一钱】

桂【二分】 巴豆霜【四分】

右除巴豆霜茯苓另为末旋入外为细末炼蜜为丸如桐子大淡盐汤下服如上法

散聚汤【三因方】治久气积聚状如症瘕随气上下发作有时心腹绞痛攻刺腰脇小腹?胀大小便不利

半夏 槟榔 当归【各三分】

陈皮 杏仁【去皮尖炒】 桂【各二两】

茯苓 甘草【炙】 附子【炮】

川芎 枳壳【炒】 厚朴【制】

吴茱萸【汤洗各一两】 大黄【大便利去之】

右?咀每服四钱水煎

济生大七气汤治积聚状如症瘕随气上行发作者时心腹?痛上气窒塞小腹胀满

益智 陈皮 京三棱

蓬术 香附子【各一两半】 桔梗

肉桂 藿香叶 甘草【炙】

青皮【各三分】

右?咀每服五钱水煎

阿魏方【丹溪方】治肉积

连翘【半两】 糖球子【一两】 黄连【六钱半】

阿魏【一两醋煮作糊】

右为末用阿魏糊为丸如桐子大每二三十丸白汤送下

秘传赛宝丹追虫取积神効

黑丑【十两取头末四两分二处】 木香【末米两】

锡灰【醋炒末一两】

槟榔【取净末二两分二处】 雷丸【取净末二两分二处】 陈皮【取末半两】

青皮【取末半两】 三棱【醋炒】

莪术【醋炒各一两】

右件各为细末再用使君子二两鹤虱阜角各一两三味用水二碗煎至一盞用栗米一合布

包在药内煮将熟起手用黑丑末二两法起次用槟榔末一两再用雷圆末一两尽再用木香锡灰三棱莪术陈皮青皮等末尽後再一用雷圆二用槟榔三用丑末盖在外陰乾每服三钱四更时候用冷茶吞下复睡至天明不可洗手洗面吃汤物代取下或虫或积恶毒滯气并原药下尽方可用冷水洗面其药未下宁耐片时见其药下再用药食补之

木香槟榔圆【瑞竹方】治一切气滯心腹满闷脇肋膨胀大小便结滯不快【方见】

丹溪治茶癖方

石膏 黄芩 升麻【各等分】

右为末沙糖水调下

琥珀膏专贴积块

大黄 朴硝【各两】

右为末用大蒜捣膏和匀贴之

保和圆治一切食积【方见伤食门】

谨按丹溪曰气不能成块成聚块乃有形之物痰与食积死血而成也在中为痰饮在右为食积在左为血块诚然言也何以明之曰左关肝胆之位肝胆藏血液右关脾胃之位脾胃藏饮食所以左边有积则为血块右边有食则为食积而其中间则为水谷出入之道路五志之火薰蒸水谷而为痰饮所以中间有积则为痰饮也其理昭矣治法调其气而破其血消其食而豁其痰是已如木香槟榔去气积三棱莪术去血积麦芋神麴去酒积香附子枳实去食积牵牛甘遂去水积山查阿魏去肉积海粉礞石去痰积雄黄白矾去涎积乾姜巴豆去寒积黄连大黄去热积各从其类也若用羣队之药分其药势则难取効虽要认得分明是何积聚兼见何证然後增减斟量使之不尔反有所损要在临时通变也

仁斋直指卷五

卷六

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷六 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

心气

心疼方论

紫之夺朱相去一间耳而毫厘疑似实霄壤焉夫心爲五官之主百骸之所以听命者也心之正经果为风冷邪气所干果为气血痰水所犯则其痛掣背胀脇胸烦咽乾两目赤黄手足俱青至节朝发而暮殂矣然心之包络与胃口相应往往脾痛连心或阳虚阴厥亦令心下急痛或他臟之邪亦有客乘於心者是则心之别脉受焉如所谓九种心痛一虫二疰三风四悸五食六饮七冷八热九去来者皆是也真心果痛不知能愈否乎然则治剂之法将何如曰热者凉之寒者温之感受风邪者散之顺气调血逐水豁痰此其要略耳苏沈内翰有方目曰沉麝圆凡心脾疼痛随试辄効他如玄胡索五灵脂官桂当归乳香没药沉香木香等辈皆的对药也临机应变学者亦当察其微

心疼证治

沉麝圆治心脾气血诸痛【方见血类】

和剂七气汤治七气相干心下疼痛【方见气类】

沉香降气汤治陰阳不和心腹刺痛【方见气类】加些乳香为佐

大沉香圆治冷气攻冲心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香 乾姜【炮】 姜黄

辣桂 檀香【各四两】 白豆?仁【二两】

白芷 甘草【燼】 甘松【洗焙】

天台乌药【各半斤】 香附【淨熅一斤】

右末炼蜜圆如大弹子每一圆食前姜汤嚙下或姜三片略煎服

苏合香圆治卒心痛【方见 门】用生姜橘皮汤调下

桂枝四七汤治风冷寒邪客搏心腹作痛

桂枝 白芍药 半夏【制各一两】

白茯苓 厚朴【制】 枳壳【制】

甘草【炙各半两】 人参 紫苏【各一分】

右剉每服四钱姜七片枣二枚食前煎服

胜金散治心下痛

桂枝 延胡索【炒】 五灵脂

当归【等分】

右为末每服三钱水一盏酒三分同煎食前服

灵脂酒治心腹卒痛

川五灵脂【去砂石略炒】

右为末每二钱温酒调下加延胡索没药尤妙

生地黄膏治热气乘心作痛

石菖蒲【一两半】 北前胡 赤茯苓【各三分】

右为末蜜一盏生地黄汁一盏夹研为膏每服弹子大紫苏煎汤食後调下

灵砂丹治冷气乘心作痛

好灵砂【三分】 川五灵脂【二分】

右研极细稀糕糊圆麻子大每服二十圆食前石菖蒲生姜煎汤下或用五丹圆【方见血类】或用养正丹【方见痼冷门】须审其脉证虚冷乃可用脾家冷痛亦可择用

姜桂饮治心腹刺痛

良姜 辣桂【等分】

右为末每服二钱米汤乘热调下

生姜枳壳汤治中脘气滞心下引痛

辣桂【一两】 生姜母【一两半】 枳壳【制三分】

右龠末每服三钱新水煎服

拈痛圆治九种心痛

五灵脂 木香 当归

蓬莪术【煨各半两】 生乾姜【三分】

右为末炼蜜圆桐子大每二十圆食前橘皮煎汤下

心腹痛方

草果 延胡索 灵脂

没药

右末酒调一二钱腹痛手拈却

附诸方

家秘祛痛散治诸般心气疼痛气滞不行攻刺心腹痛连胸脇小肠吊疝及妇人血气刺痛立有神効青皮【去穰】 五灵脂【研飞去砂净】 川练子

川山甲【各二钱】 良姜【香油炒】 玄胡索

没药【各一钱五分】 沉香【一钱】 八角茴香【二钱】 诃榔【一钱五分】

木香【一钱二分】 砂仁【少许】

右件?咀为粗末用木鳖子去 一钱二分剉片同前药炒令焦香去木鳖子不用共为细末每服一钱加盐一星用酒或滚水送下此方累用无不应验故附於後与好生君子共之

落盏汤治急心痛

陈皮 香附子 良姜

吴茱萸 石菖蒲【各等分】

右末水煎先用碗一个用香油三五点在内小盏盖之将药淋下热服

玄桂丸【丹溪方】治死血留胃脘当心作痛

玄胡索【一两半】 滑石 红花

官桂 红麴【各五钱】 桃仁【三十个】

右为细末汤浸蒸饼为丸菉豆大每服四十丸姜汤下

螺蛳壳丸【丹溪方】治痰饮积胃脘当心而痛

螺蛳壳【墙头年久者佳】 滑石【炒】 苍术

山梔 香附 南星【各二两】

枳壳【去穰炒】 青皮 木香

半夏 砂仁【各半两】

右为末生姜汁浸蒸饼为丸如菉豆大每服三四十丸姜汤下春加川芎夏加黄连冬加吴茱萸各半两

安痛散治心胃急痛

五灵脂【去砂石】 玄胡索【炒去皮】 苍术

良姜【炒】 当归【洗各等分】

右为细末每服二钱不拘时热酒醋汤调下

脾胃【附腹痛脇痛内伤伤食调理

脾胃】

脾疼方论

血气痰水皆能作痛而食积伤脾风冷入脾与夫脾间虫动其为痛也居多血气痰水食积风冷诸证之痛每每停聚而不散惟虫动则乍作乍止来去无定又有呕吐清沫之为可验焉俗谓脾家疼痛出於胃虚大率用养脾之剂而不知受病各有自来苟不能推究其原则和养等剂掩护邪气非徒无益而又害之况夫风冷入脾尤念虑之所不到至有荏苒岁月而不可揣度者有一田夫醉饱之余露星取快一枕天明自此脾疼攻刺百药罔功淹淹数载後遇至人授以和气抽刀散温酒调下数服顿愈则知风露之根入胃良姜菖蒲为能散其邪巴猫借气为能伐其根观此可以通一毕万矣然而痛不复作养脾之剂独不可继是调理之乎疗病如濯衣必去其垢污而後可以加浆饰医言意也请借是以为喻

脾疼证治

良姜拈痛散治脾疼妙甚

良姜【切作大片先用吴茱萸慢火炒少顷次入东畔当日壁土须无雨处者同炒次以米醋酒

同炒至茱萸黑】

右只用良姜为末每服一钱重温米饮调空心服

和剂抽刀散治脾胃积冷中满疼痛

川白姜【五两剉入巴豆肉一钱一字同炒至巴黑去巴】石菖蒲【五钱半不炒】良姜【剉五两入班猫二十五个同炒至猫黑去班猫不用】糯米【六两一分炒黄】

右为末每服二钱空心温酒调下

调痛散治脾疼气隔

木香丁香檀香

大香附 天台乌药 蓬术【煨】

辣桂 片姜黄 生白姜

白豆蔻仁 缩砂仁 甘草【炙各等分】

右剉每服二钱半紫苏四叶煎服

桂花散治脾积气痛

香附【五两炒赤去毛】 蓬术【醋煮焙乾】 良姜

甘草【炙各三两】 桂花【一两】

右末每二钱盐一点沸汤热调食前服

秘迹脾疼方

香附【净】 良姜【等分】

右为末每服二钱空心陈米汤热调服

沉麝圆灵脂酒治气血攻刺脾疼【方见心疼类】

和剂七气汤治痰水攻脾作痛【方见气闷】 夹和剂流气饮煎亦得【方见胀满门】

苏合香圆【方见 门】 夹感应圆【方见胀满门】 等分用沉香降气汤下【方见诸气闷】 治食积脾痛

独桂汤治风冷入脾逆气上攻作痛

辣桂【去麋皮】

右细剉每二钱食前煎服或为末紫苏煎汤乘热调下腹痛通用

姜桂饮治风冷入脾作痛【方见心疼类】 姜桂散治心腹痛【方见气类】

胡椒散治虫动脾痛乍去乍来呕吐清沫

鸡心大?榔 贯衆【各二分】 石菖蒲

木香【各一分】 甘草【炙一钱】

右剉每三钱水煎空心吞灵砂十圆或金液丹盖灵砂金液有流黄水银能杀虫也

金液丹壮阳道健胃气除冷癖杀诸虫

好硫黄【十两飞炼去砂石研细末入磁合水调赤石脂封口盐泥固济日乾於地内埋小罐子盛蒲水安磁合在上再用泥固济慢火养七日七夜续加顶火一通候冷取出研末】

右药一两用蒸饼一两汤浸握去水为圆桐子大每三十圆空心米饮下

二物汤治脾痛

鸡心大?榔 良姜【等分】

右细剉每服三钱陈米百粒煎服

乾姜甘草汤治脾中冷痛呕吐不食

川白姜【微炒一两】 甘草【炙二钱】

右剉散每服二钱大枣一枚同煎食前温服

脾痛方治脾痛胀满

大草果【二个去壳】

右剉用酒煎痛时服酒能饮一盏以两盏煎一盏能饮两盏以三盏煎两盏欲其中节也

脾痛气痛方

良姜 陈皮【各半两】 丁香

石菖蒲 甘草【炙各一分】

右剉散每服三钱水大盏煎八分入鸡舌香散二钱再煎少顷滤清汁服

和胃证治

治中汤【方见呕吐门】加肉豆?缩砂温脾止痛

沉香磨脾散治脾胃虚寒腹中胀满

人参 沉香【各一分】 丁香

檀香 木香 白豆?

缩砂仁 半夏麴 辣桂

乌药【各半两】 藿香叶【三分】 甘草【炙三钱半】

右细剉每二钱姜五片枣二枚煎服

安胃散开胃和中止呕进食

人参 白术 木香

?榔 丁香 半夏麴

肉豆?【湿纸煨】 橘红 藿香

白茯苓 青皮 甘草【炙等分】

右剉散每三钱姜四片煎服

人参开胃汤助胃进食

人参 橘红 丁香

木香 藿香 神麴【炒】

麦蘖【炒】 白术 茯苓

缩砂仁 莲子肉 厚朴【制】

半夏麴 甘草【炙等分】

右剉散每三钱姜四片煎服

助胃膏治呕吐不食

人参 白术 白茯苓

橘红 缩砂仁【各一分】 木香

丁香 肉豆蔻【微煨】 草果仁【各一两半】 白豆蔻仁【一钱】

右末炼蜜圆弹子大每一圆姜三片煎汤下

官方七香圆消食快膈和胃止痛

木香 丁香 檀香

甘松【净】 丁皮 橘红

缩砂仁 白豆蔻仁 三棱【醋煮】

蓬术【醋煮焙乾各半两】 大香附【炒去毛二两半】

右为末研米糊圆菉豆大每三四十圆姜汤下

丁香半夏圆治脾胃宿冷呕吐痰水噫闷吞酸

人参 丁香 木香

肉豆蔻 陈橘红【各一分】 藿香叶【半两】

半夏【汤洗七次用姜汁淹炒黄用三两】

右细末姜汁煮麪糊圆小豆大每二十圆姜汤下

千金五套圆治胃虚膈满宿滞不消停痰留饮头眩臂疼辟雾露风冷岚瘴之气

南星【每个切十余块】 半夏【切破各二两以水同浸三日逐日换水次用白矾二两研

调水再浸三日洗焙】 良姜 乾姜【炮】

白术 伏苓【各一两】 丁香

木香 青皮 橘红【各半两】

右末用神麴一两大麦蘖二两同末为糊圆桐子大每五七十圆米汤下

附诸方

烧脾散【济生方】治饮啖生冷菓菜停留中焦心脾冷痛

乾姜【炮】 厚朴【姜汁炒】 草果

缩砂仁 甘草【炙】 神麴【炒】

麦蘖 陈皮 高良姜【炒各等分】

右为末每服三钱热盐汤点服不拘时

草豆?丸治客寒犯胃痛者宜此丸【方见内伤门】

二姜圆治心脾冷痛【方见诸气门】

家秘祛痛散治诸般心气疼痛气滞不行攻刺心腹痛连胸脇小肠吊疝及妇人血气刺痛立有神効【方见心痛门】

感应圆治积冷伤胃腹脇胀痛【方见诸气门】

温胃汤【拔粹方】治服寒药多致脾胃虚弱胃脘痛

益智【五钱】 砂仁 甘草【各二分】

姜黄【三分】 白豆?【三分】 陈皮【一分】

泽泻 乾姜【各三分】 黄耆【七分】

厚朴【二分】 人参【二分】

右?咀每服八钱水二盏煎至八分食前服

蟠葱散【和剂方】治男子妇人脾胃虚冷气滞不行攻刺心腹痛连胸脇膀胱小肠疝气及妇人血气刺痛

延胡索 肉桂 乾姜【炮各二两】

甘草【炙】 缩砂【去皮】 苍术【制各半两】

丁皮?榔【各四两】 蓬术

三棱【煨】 茯苓 青皮【去白各六两】

右为末每服二钱水一盏?白一茎煎七分空心热服

乌梅丸治胃冷 虫攻心痛呕吐四肢冷

乌梅【三百个】 黄栢【炙】 细辛

肉桂 附子【炮各六两】 黄连【十六两】

人参【六两】 蜀椒【炒去闲口者及目】 当归【各四两】

乾姜【炮十两】

右为末取乌梅肉和蜜丸梧子大每服五十

秘传?榔散治男妇心脾痛

五灵脂?榔

右为末煎菖蒲汤调三钱服隔夜先将猪肉盐酱煮熟令患人细嚼休吞了吐出却服前药空心食前服谨按用肉味所以引?头向上用药所以杀?也

螺蛳壳丸【丹溪方】治痰饮积胃脘当心而痛【方见心气门】 玄桂丸【丹溪方】治死血留胃脘当心作痛【方见心气门】

谨按痛则不通通则不痛夫胃脘心脾痛者或因身受寒邪口食冷物内有鬱热素有顽痰死血或因恼怒气滞虫动作痛种种不同若不分而治之何能愈乎予曰是寒则温之是热则清之是痰则化之是血则散之是气则顺之是虫则杀之庶乎临证不眩惑也夫

附腹痛【脇痛 新增】

腹痛方论

内经曰寒气入经而稽迟涩而不行客於脉外则血少客於脉中则气不通故卒然而痛按内经举痛论言寒邪外客而痛者甚为详悉未能尽述学者自宜检閱外有因虚因实因伤寒因痰火因食积因死血者种种不同原病式曰热鬱於内而腹满坚结痛者不可言为寒也东垣曰腹中诸痛皆因劳役过甚饮食失节中气不足寒邪乘虚而入客之故卒然而作大痛经言得灵则止灵者热也以热治寒治之正也此事难知集论曰伤寒中脘痛太陰也理中汤黄芪建中汤之类脐腹痛者少陰也四物汤真武汤附子汤之类小腹痛厥陰也重则正阳散回阳丹轻则当归四逆汤之类若夫杂病腹痛四物苦练汤酒煮当归丸之类夏月腹痛肌热恶热脉洪数属手太陰足阳明黄芩芍药汤主之秋月腹痛肌寒恶寒脉沉疾属足太陰足少陰桂枝芍药汤主之四时腹痛芍药甘草汤主之丹溪曰腹痛有积热有食积有痰有死血脉弦者多属食积宜温散之如乾姜炒苍术川芎白芷香附姜汁之类是也不可用峻利药攻下之盖食得寒则凝热则化更兼行气快气药助之无不可者脉滑者是痰痰因气滞宜导痰解鬱二陈汤加台芎苍术香附之类是也脐下忽大痛人中黑色者多死腹中水鸣乃火击动其水也凡腹痛以手不可按者属实宜大黄芒硝下之实痛不可用参芪白术盖补其气气旺不通而痛愈甚也

草豆蔻方【东垣方】治脐腹虚胀疼痛

泽泻【一钱】 木香【三分】 神麴【四分】

半夏 枳实【麴炒黄色】 草薢仁

黄芪【春夏勿用】 益智仁 甘草【炙各半钱】

青皮 陈皮【各六分】 川归【七分】

茯苓【七分】

右细切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞温服

小建中汤治伤寒阳脉濇陰脉弦腹中急痛者【方见虚劳门】 真武汤治腹痛下利四肢沉重【方见咳 门】 理中汤治霍乱头疼身寒腹痛四逆汤治伤寒下利腹痛四肢逆冷

附子汤【方并见中寒类】 四物苦练汤治脐下虚冷腹痛【方见疝门】 芍药甘草汤治四时腹痛

芍药 甘草【炙】

右等分每服五钱生姜三片水一盞半煎至一盞温服

元戎云腹痛脉弦伤气用本药○脉洪伤金加黄芩○脉缓伤水加桂枝○脉澹伤血加当归
○脉迟伤寒加乾姜

酒煮当归圆治小腹下痛

茴香【五钱】 良姜 附子【各七钱】

当归【一两】

右四味细切以无灰酒一碗半煮乾再焙乾入後药炙甘草 苦练【生用】 丁香【各五钱】

木香 升麻【各一钱】 柴胡【二钱】

炒黄盐 全蝎【各三钱】 玄胡索【四钱】

右为细末酒煮糊为丸如梧子大每服二三丸空心白汤下

桃仁承气治因跌扑损伤瘀血作腹痛者

内加当归苏木红花入酒童便煎服下之【方见血气门】

二陈汤养胃汤【俱见疟门】 黄芩芍药汤治腹痛脉洪【方见痢门】 备急大黄圆治心腹
诸卒疼痛百病【方见内伤门】

绞肠沙作痛以樟木煎汤大吐或白矾调汤吐之盐亦可探吐宜刺委中出血

脇痛【新增】

脇痛方论

内经曰肝病者两脇下痛引小腹令人善怒虚则目??无所见耳无所闻善恐如人将捕之又
曰怒则气逆虚则呕血及【阙】泄故气上矣盖心出血肝纳血因大怒而血不归经或随气
而上出於口鼻或留於本经而为脇痛又或岁木太过而木气自甚或岁经有余而木气被鬱
皆能令人脇痛经曰病脇下满气逆二三岁不已病名曰息积是亦肝木有余之证也外有伤
寒发寒热而脇痛者足少阳胆足厥陰肝二经病也治以小柴胡汤无有不効者丹溪曰脇痛

者肝火盛木气实有死血有痰流注肝急木气实用苍术川芎青皮当归之类痛甚者肝火盛以当归龙会丸姜汁下是泻火之要药死血用桃仁红花川芎痰流注以二陈汤加南星苍术川芎肝苦急急食辛以散之用抚芎川芎苍术血病入血药中行血故也去滞气须用青皮青皮乃肝胆两经之药也

左金丸泻肝火行温为热甚之反佐

黄连【六钱】 吴茱萸【一钱】

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大每服三伍十丸淡姜汤下

当归龙会丸治内有湿热两脇痛先以琥珀膏贴痛处却以生姜汁吞此丸痛甚者须炒令热服

草龙胆 当归 大梔子

黄连 黄芩【各两】 大黄

芦荟【半两】 木香【一钱半】 黄柏【一两】

麝香【半钱】

右十味为末面糊丸一方加柴胡川芎各半两又方加青黛半两蜜丸治脇痛面丸降肝火

推气散治右脇疼痛胀满不食

枳壳 桂心 片子姜黄【各半两一本作

殭蚕】 甘草【炙一钱半】

右为末每服二钱姜枣汤调下酒亦可

枳芎散治左脇痛刺不可忍者

枳实【炒】 川芎【各半两】 粉草【炙一钱半】

右为末每服二钱姜枣汤下酒亦可

盐煎散【和剂方】治男妇人一切冷气攻上胸脇刺痛不能已及脾胃虚冷呕吐泄泻膀胱

小腸氣婦人血氣

砂仁 甘草【炙】 茯苓

草果仁【去皮煨】 肉豆蔻 川芎【洗】

茴香【炒】 萆澄茄 大麦芽

檳榔 良姜 枳殼

蒼朮 陳皮【去白】 羌活

厚朴

右?咀每服三錢水一盞入鹽少許煎七分去粗空心溫服

小柴胡湯【見痰症門】 二陳湯【見痰飲門】 琥珀膏【見積聚門】

謹按丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰流注予每度之凡左脇痛甚者即是肝盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛涼之劑以治之凡右脇痛即是痰流注并食積宜用鹽煎散順氣丸等藥辛溫之劑以治是也又嘗論曰左脇痛胃脘痛婦人多有之以憂思忿怒之氣素蓄於中發則上冲被濕痰死血阻滯其氣不得條達故治婦人諸痛諸疾必以行氣開鬱為主而破血散火兼之庶乎得法矣諺云香附縮砂婦人之至寶此之謂也

附內傷【新增 傷食調理脾胃】

辨脈法

古人以脈上辨內外傷於人迎氣口人迎脈大於氣口為外傷氣口脈大於人迎為內傷此辯固是但其說有所未盡耳外感風寒皆有余之証是以前客邪來也其病必見於左手左手主表乃行陽二十五度內傷飲食及飲食不節勞役所傷皆不足之病也必見於右手右手主里乃行陰二十五度故外感寒邪則獨左寸人迎脈浮緊按之洪大緊者後甚於弦是足太陽寒水之脈按之洪大而有力中見手少陰心火之脈丁與壬合內顯洪大乃傷寒脈也若外感風邪則人迎脈緩而大於氣口一倍或兩倍三倍內傷飲食則右寸氣口脈大於人迎一倍傷之重者過在少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之脈若飲食不節勞役過甚則心肺變見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火之勢亦來薄肺經云侮所不勝寡於畏者是也故氣口脈急大而澀數時一代而澀也澀者肺之本脈大者元氣不相接脾胃不及之脈洪大而數者心火刑肺也急者肝木挾心火而反剋肺金也若不甚勞役惟右關脾脈大而數謂獨大於五脈數中顯緩時一代也如飲食不節寒溫失所則先右關胃脈損弱甚則隱而不可見惟內顯脾脈之

大数微缓时一代也宿食不消则独右关脉沉而滑经云脉滑者有宿食也以此辩之岂不明白易见乎但恐山野间卒无医者何以诊候故复说病证以辩之

辩陰证阳论

甚哉陰阳之证不可不详也徧观内经中所说变化百病其源皆由喜怒过度饮食失节寒温不适劳役所伤而然夫元气谷气荣气清气卫气生发诸阳上升之气此六者皆饮食入胃谷气上行胃气之异名其实一也既脾胃有伤则中气不足中气不足则六腑阳气皆絕於外故经言五臟之气已絕於外者是六腑之元气病也气伤臟乃病臟病则形乃应是五臟六腑真气皆不足也惟陰火独旺上乘阳分故荣卫失守诸病生焉其中变化皆由中气不足乃能生发耳後有脾胃以受劳役之疾饮食又复失节耽病日久事息心安饱食太甚病乃大作槩其外伤风寒六淫客邪皆有余之病当泻不当补饮食失节中气不足之病当补不当泻举世医者皆以饮食失节劳役所伤中气不足当补之证认作外感风寒有余客邪之病重泻其表使荣卫之气外絕其死只在旬日之间所谓差之毫厘谬以千里可不详辩乎按陰阳应象论云天之邪气感则害人五臟是八益之邪乃风邪伤人筋骨风从上受之风伤筋寒伤骨盖有形质之物受病也系在下焦肝肾是也肝肾者地之气难经解云肝肾之气已絕於内以其肝主筋肾主骨故风邪感则筋骨疼痛筋骨之絕则肾肝之本亦絕矣乃有余之证也及云水谷之寒热感则害人六腑是七损之病乃内伤饮食也黄帝鍼经解云适饮食不节劳役所伤温从下受之谓脾胃之气不足而反下行极则冲脉之火逆而上是无形质之元气受病也系在上焦心肺是也心肺者天之气故难经解云心肺之气已絕於外以其心主荣肺主卫荣者血也脉者血之腑神之所居也卫者元气七神之别名卫护周身在於皮毛之间也肺絕故皮毛先絕神无所依故内伤饮食则亦恶风寒是荣卫失守皮肤间无阳以滋养不能任风寒也皮毛之絕则心肺之本亦絕矣盖胃气不升元气不生无以滋养心肺乃不足之证也计受病之人饮食失节劳役所伤因而饱食内伤者甚多外伤者间而有之世俗不知往往将元气不足之证便作外伤风寒表实之证而反伤心肺是重絕其表也安得不死乎古人所谓实实虚虚医杀之耳若曰不然请以衆人之耳闻目见者证之向者壬辰改元京师戒严迨三月下旬受敌者凡半月解围之後都受病不受病者万无一二既病而死者继踵而不絕都门十有二所每日各门所送多者二千少者不下一千似此者几三月此百万人岂俱感风寒外伤者耶大抵人在围城中饮食不节乃劳役所伤不待言而知由其朝饥暮饱起居不时寒温失所动经三两月胃气亏乏久矣一旦饱食太过感而伤人而又调治失宜其死也无疑矣非惟大梁为然远在真佑兴定间如东平如太原如凤翔解围之後病伤而死无不然者余在大梁凡所亲见有表发者有以巴豆推之者有以承气汤下之者俄而变结胸发黄又以陷胃汤丸及茵陈汤下之无不死者盖初非伤寒以调治差悞变而似真伤寒之证皆药之罪也往者不可追来者犹可及辄以平生已成之効着内外伤辨论一篇推前哲之余论历举近世之变故庶几同志者审其或中触类而长之免後人之横夭耳僭易之罪将何所逃乎

辨寒热

外伤寒邪之证与饮食失节劳役形质之病及内伤饮食俱有寒热举世尽将内伤饮食失节

劳役不足之病作外伤寒邪表实有余之证反泻其表枉死者岂胜言哉皆由不别其寒热耳今细为分解之外伤寒邪发热恶寒寒热并作其热也翕翕发热又为之拂拂发热发於皮毛之上如羽毛之拂明其热在表也是寒邪犯高之高者也皮肤毛腠者阳之分也是卫之元气所滋养之分也以寒邪乘之鬱遏阳分阳不得伸故发热也其面赤鼻气壅塞不通心中烦闷稍以袒裸露其皮肤已不能禁其寒矣其表上虚热止此而已其恶寒也虽重衣下幕逼近烈火终不能御其寒一时一日增加愈甚必待传入里作下证乃罢其寒热齐作无有间断也其内伤饮食不节或劳役所伤亦有头痛项强腰痛与太阳表证微有相似余皆不同论中辩之矣内伤不足之病表上无阳不能禁风寒也此则常常有之其燥热发於肾间者间而有之与外中寒邪略不相似其恶风寒也盖脾胃不足荣气下流而乘肾肝此痰厥气逆之渐也若胃气平常饮食入胃其荣气上行以舒於心肺以滋养上焦之皮肤腠理之元气也既下流其心肺无所禀受皮肤间无阳失其荣卫之外护故阳分皮毛之间虚弱但见风见寒或居陰寒处无日阳处便恶之也此常常有之无间断者也但避风寒及温暖法或添衣盖温养其皮肤所恶风寒便不见矣是热也非表伤寒邪皮毛间发热也乃肾间受脾胃下流之湿气间塞其下攻陰火上冲作蒸蒸而燥热上彻头顶傍彻皮毛浑身燥热作须待袒衣露居近寒凉处即已或热极而汗出而亦解彼外伤恶寒发热岂有汗出者乎若得汗则病愈矣以此辩之岂不如黑白之易见乎当内虚而伤之者燥热也或因口吸风寒之气鬱其陰火使咽膈不通其吸入之气欲入为膈上冲脉之火所拒使陰气不得入其胸中之气为外风寒所遏而不得伸令人口开目瞪极则声发於外气不得上下塞於咽中而气欲絕又或因哕因呕因吐而燥热发必有所因方有此证其表虚恶风寒之证复见矣表虚之弱为陰火所乘燥发须臾而过其表虚无阳不任风寒复见矣是表虚无阳常常有之其燥热则间而有之此二者不齐燥作寒已寒作燥已非如外伤之寒热齐作无有间断也百病俱有身热又为之肌热又为之皮肤间热以手扪之方知者是也乃肌体有形之热也亦须皆待陰阳既和汗出则愈矣慎不可於此上辩之以其虚实内外病皆有之故难辩耳只依先说病人自觉发热恶寒之热及燥作之热上辩之为准则矣

辩外感八风之邪或有饮食劳役所伤之重者三二日特与外伤风者相似其余证有特异者若不将两证重别分解犹恐将内伤不足之证误作有外感风邪虽辞理有重复处但欲病者易辩医者易治耳

外感八风之邪乃有余证也内伤饮食不节劳役所伤皆不足之病也其内伤亦恶风自汗若在温暖无风处则不恶矣与外伤鼻流清涕头痛自汗颇相似分之特异耳外感风邪其恶风自汗头痛鼻流清涕常常有之一日一时增加愈甚直至传入里作下证乃罢语声重浊高厉有力鼻息拥塞不通能饮食腹中和口知味大小便如常筋骨疼痛不能动摇便着床枕非扶不起其内伤与饮食不节劳役所伤然亦恶风居露地中遇大漫风起却不恶也惟门窗隙中些小贼风来必大恶也与伤风伤寒俱不同矣况鼻流清涕头痛自汗间而有之鼻中气短少气不足以息语则气短而怯弱妨食或食不下或不饮食三者互有之腹中不和或腹中急而不能伸口不知五谷之味小便频数而不渴初劳役得病食少小便赤黄大便常难或秘或结或虚坐只见些小白脓时有下气或泄黄如糜或溏泄色白或结而不通若心下痞或胸中闭塞如刀剌之痛二者亦互作不并出也有时胃脘当心而痛上支两脇痛必脐下相火之势如

巨川之水不可遏而上行使阳明之经逆行乱於胸中其气无止息甚则高喘热伤元气令四肢不收无气以动而懒倦嗜卧其外感风寒俱无此证故易分别耳

辨手背手心

内伤及劳役饮食不节病手心热手背不热外伤风寒则手背热手心不热此辨至甚皎然

辨口鼻

若饮食劳役所伤其外证必显在口必口失谷味必腹中不和必不欲言纵勉强对答声必怯弱口沃沫多唾鼻中清涕或有或无即陰证也外伤风寒则其外证必显在鼻鼻气不利声重浊不清利其言壅塞盛有力而口中必和伤寒则面赤鼻壅塞而乾伤风则鼻流清涕而已内经云鼻者肺之侯肺气通於天外伤风寒则鼻为之不利口者坤土也脾气通於口饮食失节劳役所伤口不知谷味亦不知五味又云伤食恶食伤食明矣

辨气少气盛

外伤风寒者故其气壅盛而有余内伤饮食劳役者其口鼻中皆气短促不足以息何以分之盖外伤风寒者心肺元气初无减损又添邪气助之使鼻气壅塞不利面赤不通其鼻中气不能出并从口出但发一言必前轻而後重其言高其声壮厉而有力是伤寒则鼻乾无涕面壅色赤其言前轻後重其声壮厉而有力者乃有余之验也伤风则决然鼻流清涕其声哑其言响如从瓮中出亦前轻而後重高揭而有力皆气盛有余之验也内伤饮食劳役者心肺之气先损为热所伤热既伤气四肢无力以动故口鼻中皆短气少气上喘懒女人有所问十不欲对其一纵勉强答之其气亦怯其声亦低是其气短少不足之验也明白如此虽妇人女子亦能辨之岂有医者反不能辨之乎

辨头痛

内证头痛有时而作有时而止外证头痛常常有之直须传入里实方罢此又内外证之不同者也

辨筋骨四肢

内伤等病是心肺之气已絶於外必怠惰嗜卧四肢沈困不收此乃热伤元气脾主四肢既为热所乘无气以动经云热伤气又云热则骨消筋缓此之谓也若外伤风寒是肾肝之气已絶於内肾主骨为寒肝主筋为风自古肾肝之病同一治以其递相维持也故经言胆主筋膀胱主骨是也或中风或伤寒得病之日便着?枕非扶不起筋骨为之疼痛不能动摇乃形质之伤经云寒伤形又云寒则筋挛骨痛此之谓也

辯外傷不惡食若勞役飲食失節寒溫不適此三者皆惡食

仲景傷寒論云中風能食傷寒不能食二者皆口中和而不惡食若勞役所傷及飲食失節寒溫不適三者俱惡食口不知五味亦不知五穀之味只此一辯足以分內外有餘不足二証也陽寒証雖不能食而不惡食口中和知五味亦知穀味蓋無內証則心氣和脾氣通知五穀之味矣

辯渴與不渴

外感風寒之邪三日以外谷消水去邪氣傳里始有渴也內傷飲食失節勞役久病者必不渴是邪氣在血脈中有餘故也初勞役形質飲食失節傷之重者必有渴以其心火熾上尅於肺金故渴也及當以此辯之雖渴欲飲冷水者當徐徐少與之不可縱意而飲恐水多峻下則胃氣愈弱輕則為脹重則傳變諸疾必反覆悶亂百脈不安夜則增劇不得安臥不可不預度也

辯勞役受病表虛不作表實治之

或因勞役動作腎間陰火沸騰事閑之際或於陰涼處解脫衣裳更有新沐浴於背陰處坐臥其陰火下行還歸腎間皮膚腠理極虛無陽但風來為寒涼所遏表虛不任其風寒自認外感風寒求醫解表以重絕元氣取禍如反掌苟幸而免者致虛勞血氣皆弱不能完復且表虛之人為風寒所遏亦是虛邪犯表始病一二日之間時與外中賊邪有餘之証頗相似處故致疑惑請醫者只於氣少氣盛上辯之其外傷賊邪必語聲前輕後重高厲而有力若是勞役所傷飲食不節表虛不足之病必短氣氣促上氣高喘懶語其聲困弱而無力至易見也若毫厘之誤則千里之謬已上者辯証別有治法用藥正論故作此說分解於後

辯証與中熱頗相似

復有一等乘天氣大熱之時在於路途中勞役得之或在田野間勞形得之更或有身體薄弱食少勞役過甚又有修善當齋之人胃氣久虛而因勞役得之者皆與陽明中熱白虎湯証相似必肌體扪摸之壯熱必燥熱悶亂大惡熱渴而飲水以勞役過甚之故亦身疼痛始受病之時特與中熱外得有餘之証相似若誤與白虎湯旬日必死此証脾胃大虛元氣不足口鼻中氣皆短促而上喘至日轉以後是陽明得時之際病必少減若是外中熱之病必到日晡之際大作譫語其熱增加大渴飲水煩悶不止其勞役不足者皆無此証尤易為分解若有難決疑似之証必當待一二日而求醫治療必不至錯誤矣飲食不節勞役形體所受病皆脾虛腠理元氣已絕於往往病人將自己表虛不任風寒但有風來寒至招認作傷風召醫以瀉其表反重虛其虛輕則致危困虛勞重則必死深可哀憫故時一說以祛醫者之惑

論天地陰陽生殺之理在升降浮沉之間

陰陽應象論云天以陽生陰長地以陽殺陰藏然歲以春為首正正也寅引也少陽之氣始於

泉下引陰升而在天地人身上即天之分百谷草木皆甲坼於此时也至立夏少陰之火炽於太虚则草木盛茂垂枝布叶乃阳之用陰之体此所谓天以阳生陰长经言岁半以前天气主之在乎升浮也至秋而太陰之运初自天而下逐陰降而彻地则金振燥令风厉霜飞品物咸殒其枝独在若乎毫毛至冬则少陰之气复服於泉下水冰地拆万类周密陰之用阳之体也此所谓地以阳杀陰藏经云岁半已後地气主之在乎降沉也至於春气温和夏气暑热秋气清凉冬气冷冽此则正气之序也故曰履端於始序则不愆升已而降降已而升如环无端运化万物其实一气也设或陰阳错综胜复之变自此而起万物之中人一也呼吸升降倣象天地準绳陰阳盖胃为水谷之海饮食入胃而精气先输脾归肺上行春夏之令以滋养周身乃清气为天者也升已而下输膀胱行秋冬之令为传化糟粕转味而出乃浊陰为地者也若夫顺四时之气起居有时以避寒暑饮食有节及不暴喜怒以颐神志常欲四时均平而无偏胜则安不然损伤脾真气下溜或下泄而久不能升是在秋冬而无春夏乃生长之用於殒杀之气而百病皆起或久升而不降亦病焉於此求之则知履端之义矣

劳倦所伤论

调经篇云陰虚生内热岐伯曰有所劳倦形气衰少谷气不盛上焦不行下脘不通而胃气热热气薰胸中故内热举痛论云劳则气耗劳则喘且汗出内外皆越故气耗矣夫喜怒不节起居不时有所劳伤皆损其气气衰则火生火旺则乘其脾土脾主四肢故困热无气以动懒於语言动作喘乏表热自汗心烦不安当病之时宜安心静坐以养其气以甘寒泻其热火以酸味收其散气以甘温补其中气经言劳者温之损者温之者是也金匱要略云平人脉大为劳脉极虚亦为劳矣夫劳之为病其脉浮大手足烦热春夏剧秋冬差【脉大者热邪也极虚者气损也春夏剧者时助邪也秋冬差者时胜邪也】以黄耆建中汤治之此亦温之之意也夫上古圣人饮食有节起居有常不妄作劳形与神俱百岁乃去此谓治未病也今时之人去圣人久远则不然饮食失节起居失宜妄作劳役形气俱伤故病而後药之是治其已病也推其百病之源皆因饮食劳倦而胃气元气散解不能滋荣百脉灌溉脏腑卫护周身之所致也故苍天之气贵清静阳气恶烦劳噫饮食喜怒之间寒暑起居之际可不慎欤

饮食劳倦论

古之至人穷陰阳之造化究乎生死之际所着内经悉言人以胃气为本盖人受水谷之气以生所谓清气荣气卫气春升之气皆胃气之别称也夫胃为水谷之海饮食入胃游溢精气上输於脾脾气散精上归於肺通调水道下输膀胱水精四布五经并行合於四时五臟陰阳揆度以为常也苟饮食失节寒温不适则脾胃乃伤喜怒忧恐劳役过度而损耗元气既脾胃虚衰元气不足而心火独盛心火者陰火也起於下焦其系系於心心不主令相火代之相火下焦包络之火元气之贼也火与元气不能两立一胜则一负脾胃气虚则下流於肾肝陰火得以乘其土位故脾胃之证始得之则气高而喘身热而烦其脉洪大而头痛或渴不止皮肤不任风寒而生寒热盖陰火上冲则气高而喘身烦热为头痛为渴而脉洪大脾胃之气下流使谷气不得升浮是生长之令不行则无阳以护其荣卫不任风寒乃生寒热皆脾胃之气不足所致也然而与外感风寒所得之证颇同而理异内伤脾胃乃伤其气外感风寒乃伤其形伤

外为有余有余者泻之伤内为不足不足者补之汗之下之吐之尅之皆泻也温之和之调之养之皆补也内伤不足之病苟误认作外感有余之病而反泻之则虚其虚也难经云实实虚虚损不足而益有余如此死者医杀之耳然则奈何曰惟当以甘温之剂补其中升其阳甘寒以泻其火则愈内经曰劳者温之损者温之盖温能除大热大忌苦寒之药泻胃土耳今立补中益气汤

补中益气汤

黄芪【劳役热甚一钱】 甘草【炙已上各五分】 人参【去芦】

升麻 柴胡 橘皮

当归身【酒洗】 白术【已上各三分】

右件?咀都作一服水二盏煎至一盏去滓早饭後温服如伤之重者二服而愈量轻重治之

立方本指

夫脾胃虚者因饮食劳倦心火亢甚而乘其土位其次肺气受邪须用黄芪最多人参甘草次之脾胃一虚肺气先绝故用黄芪以益皮毛而闭腠理不令自汗上喘气短损真元气人参以补之心火乘脾炙甘草用甘温以泻火热而补脾胃中元气若脾胃急痛并大虚腹中急缩者宜多用之经云急者缓之白术苦甘温除胃中热利腰脐间血胃中清气在下必加升麻柴胡以引之引黄芪甘草甘温之气味上升能补胃气之散解而实其表也又缩带脉之缩急二味苦平物之薄者阴中之阳引清气上升也气乱於胸中为清浊相干用去白陈皮以理之又能助阳气上升以散滞气助诸甘辛为用也噤乾者加乾葛脾胃气虚不能升浮为阴火伤其生发之气荣血大亏荣气不营阴火炽盛是血中伏火日渐煎熬血气日减心包与心主血血减则心无所养致使心乱而烦病名曰惺惺者心惑而烦闷不安也故加辛甘微温之剂生阳气阳生则阴长或曰甘温何能生血曰仲景之法血虚以人参补之阳旺则能生阴血更以当归和之少加黄蘗以救肾水能泻阴中之伏火如烦犹不止少加生地黄补肾水水旺而心火自降如气浮心乱以朱砂安神丸镇固之则愈

四时用药加减法

内经曰胃为水谷之海又云肠胃为市无物不包无物不入寒热温凉皆有之其为病也不一故随时证於补中益气汤中权立四时加减法於後

以手扪之而肌表热者表热也只服补中益气汤一二服得微汗则已非正发汗乃阴阳气和自然汗出也○若更烦乱如腹中或周身有刺痛皆血涩不足加当归身【五钱或一钱】○如精神短少加人参【五分】五味子【二十个】○头痛加蔓荆子【三分】痛甚加川芎

【五分】○顶痛脑痛加藁本【五分】细辛【三分】诸头痛并用此四味足矣○如头痛有痰沈重懒倦者乃太陰痰厥头痛加半夏【五分】生姜【三分】○耳鸣目黄颊颌肿颈肩膈肘臂外後廉痛面赤脉洪大者以羌活【一钱】防风藁本【已上各七分】甘草【五分】通其经血加黄芩黄连【已上各三分】消其肿人参【五分】黄芪【七分】益元气而泻火邪另作一服与之○噤痛颌肿脉洪大面赤者加黄芩甘草【已上各三分】桔梗【七分】○口乾噤乾者加葛根【五分】升引胃气上行以润之○如夏月咳嗽者加五味子【二十五个】麦门冬【去心五分】○如冬月咳嗽加不去根节麻黄【五分】○如秋凉亦加○如春月天温只加佛耳草欵冬花【已上各五分】

若久病痰嗽肺中伏火去人参以防痰嗽增益耳食不下乃胸中胃上有寒或气滯滯加青皮木香【已上各三分】陈皮【五分】此三味为定法○如冬月加益智仁草豆

?仁【已上各五分】○如夏月少加黄芩黄连更加?榔草豆?仁缩砂仁白豆?仁【已上各五分】○如春初犹寒少加辛热之剂以补春气之不足为风药之佐益智草豆?可也○心下痞奔闷者加芍药黄连【已上各一钱】○如痞腹胀加枳实木香缩砂仁【已上各三分】厚朴【七分】如天寒少加乾姜或中桂【桂心也】○心下痞觉中寒加附子黄连【已上各一钱】不能食而心下痞加生姜陈皮【已上各一钱】能食而心下痞加黄连【五分】枳实【三分】脉缓有痰而痞加半夏黄连【已上各一钱】脉弦四肢满便难而心下痞加黄连【五分】柴胡【七分】甘草【三分】○腹中痛者加白芍药【五分】甘草【三分】如恶寒觉冷痛加中桂【五分】○如夏月腹中痛不恶寒不恶热者加黄芩甘草【已上各五分】芍药【一钱】以治时热也○腹痛在寒凉时加半夏益智草豆?之类○如腹中痛恶寒而脉弦者是木来尅土也小建中汤主之盖芍药味酸於土中泻木为君如脉沈细腹中痛是水来侮土以理中汤主之乾姜辛热於土中泻水以为主也如脉缓体重节痛腹胀自利米谷不化是湿胜以平胃散主之苍术苦辛温泻湿为主也○脇下痛或脇下缩急俱加柴胡【三分甚则五分】甘草【三分】○脐下痛者加真熟地黄【五分】如不已者乃大寒也加肉桂【伍分】

朱砂安补丸

朱砂【五钱别研水飞为衣】甘草【五钱五分】
黄连【去须净酒洗六钱】当归【去芦二钱五分】生地黄【一钱五分】

内经曰热湿所胜治以甘寒以苦泻之以黄连之苦寒去心烦除湿热为君以甘草生地黄之甘寒泻火补气滋生陰血为臣以当归身补其血不足朱砂纳浮溜之火而安神明也

右件除朱砂外四味共为细末汤浸蒸饼为丸如黍米大以朱砂为衣每服十五丸或二十丸津唾咽下食後或温水凉水少许送下亦得此近而奇偶制之缓也

参术调中汤泻热补气止 定喘和脾胃进饮食白术【五分】黄耆【四分】桑白皮

甘草【炙】 人参【已上各三分】 麦门冬【去心】

青皮【去白】 陈皮【去白】 地骨皮

白茯苓【已上各二分】 五味子【二十个】

右件?咀如麻豆大都作一服水二盏煎至一盏去滓大温服早饭後忌多语言劳役

升阳补气汤治饮食不时饥饱劳役胃气不足脾气下溜气短无力不能寒热早饭後转增昏闷须要眠睡怠惰四肢不收懒倦动作及五心烦热

厚朴【姜制五分】 升麻 羌活

白芍药 独活 防风

甘草【炙】 泽泻【已上各一钱】 生地黄【一钱五分】 柴胡【二钱五分】

右件为麤末每服五钱水二盏生姜三片枣二枚煎至一盏去滓大温服食前

加腹胀及窄狭加厚朴○如腹中似硬加砂仁【已上各三分】

双和散治虚劳少力补血益气

白芍药【二两五钱】 黄芪 熟地黄

川芎 当归【已上各一两】 甘草【炙】

官桂【已上各七钱五分】

右为麤末每服四钱水一盏半生姜三片枣二枚煎至七分去滓温服

如大病之後虚劳气乏者以此调治不热不冷温而有补

升阳顺气汤治因饮食不节劳役所伤腹脇满闷短气遇春则口淡无味遇夏虽热犹有恶寒饥则常如饱不喜食冷物

黄芪【一两】 半夏【三钱汤洗七次】 草豆?【二钱】

神麴【一钱五分炒】 升麻 柴胡

当归身 陈皮【已上各一钱】 甘草【炙】

黄蘗【已上各五分】 人参【去芦三分】

右件?咀每服三钱水二盏生姜三片煎至一盏去滓温服

升阳益胃汤治脾胃虚则怠惰嗜卧四肢不收时值秋燥令行湿热少退体重节痛口乾舌乾饮食无味大便不调小便频数不欲食食不消兼见肺病洒淅恶寒惨惨不乐面色恶而不和乃阳气不伸故也当升阳益气也

黄芪【二两】 半夏【洗此一味脉溢者用】 人参【去芦】

甘草【炙已上各一两】 黄连【一钱】

白芍【何故秋旺用人参白术芍药之类反补肺为脾胃虚则肺最受邪故因时而补也】
独活

防风【以秋旺故以辛温溺之】 羌活【已上各五钱】 橘皮【四钱】

茯苓【小便利不渴者勿用】 柴胡

泽泻【不淋勿用】 白术【已上各三钱】

右?咀每服秤三钱生姜五片枣二枚煎至一盏去查温服早饭后或加至五钱

门冬清肺饮治脾胃虚弱气促气弱精神短少衄血吐血

紫菀茸【一钱五分】 黄耆 白芍药

甘草【已上各一钱】 人参【去芦】 麦门冬【已上各五分】 当归身【三分】

五味子【三个】

右?咀分作二服每服水二盏煎至一盏去粗温服食后

○局方中大阿胶丸亦宜用

升阳散火汤【方见火门】

当归补血汤【方见热门】

饮食所伤论

陰陽應象論云水谷之寒熱感則害人六府痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為二飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則為喘咳為腫滿為水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積為滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫解湯瀝為痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸癖當分寒熱輕重而治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾姜三棱廣木巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘗黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而越之芫蒂散之屬主之然而不可過劑過劑則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加以藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五常政大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七凡毒治病不可過之此聖人之深戒也

論飲食自倍腸胃乃傷分而治之

痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此混言之也分之為二飲也食也又經云因而大飲則氣逆因而飽食筋脈橫解則腸癖為痔飲者無形之氣傷之則宜發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散之類主之食者有形之物傷之則宜損其谷其次莫若消導丁香爛飯丸枳朮丸之類主之稍重則攻化三棱消積丸木香見睨丸之類主之尤重者則或吐或下芫蒂散備急丸之類主之以平為期蓋脾已傷又以藥傷使營運之氣減削食愈難消故五常政論云大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法聖人垂此嚴戒是為萬世福也如能慎言語節飲食所謂治未病也

辯內傷飲食用藥所宜所禁

內傷飲食付藥者受藥者皆以為瑣末細事是以所當重者為輕利害非細殊不思胃氣者榮氣也衛氣也谷氣也清氣也資少陽生發之氣也人之真氣衰旺皆在飲食入胃胃和則谷氣上升谷氣者升騰之氣也乃足少陽胆手少陽元氣始發生長萬化之別名也飲食一傷若消導藥的對其所傷之物則胃氣愈旺五穀之精華上騰乃清氣為天者也精氣神氣皆強盛七神護衛生氣不乏增益大旺氣血周流則百病不能侵雖有大風苛毒弗能害也此一藥之用其利博哉易水張先生嘗戒不可用峻利食藥食藥下咽未至藥丸施化其標皮之力始明便言空快也所傷之物已去若更待一兩時辰許藥盡化開其峻利藥必有情性病去之後脾胃安得不損乎脾胃既損是真氣元氣敗壞促人之壽當時說下一藥枳實一兩麴炒黃色為度白朮二兩只此二味荷葉裹燒飯為丸以白朮苦甘溫其甘溫補脾胃之元氣其苦味除胃中之溫熱利腰臍間血故先補脾胃之弱過於枳實剋化之藥一倍枳實味苦寒泄心下痞悶消化胃中所傷此一藥下胃其所傷不能即去須待一兩時辰許食則消化是先補其虛而後化其所傷則不峻利矣當是之時未悟用荷葉燒飯為丸之理老年味之始得可謂神奇矣荷葉之一物中央空虛象震卦之體震者動也人感之生足少陽甲膽也甲膽者風也生化萬物之根蒂也左傳云履端於始序則不愆人之飲食入胃營氣上行即少陽甲膽之氣也其手少陽

三焦经人之元气也手足经同法便是少阳元气生发也胃气谷气元气甲胆上升之气一也异名虽多止是胃气上升者也荷叶之体生於水土之下出於秽污之中而不为秽污所染挺然独立其色青形乃空清而象风木者也食药感此气之化胃气何由不上升乎其主意用此一味为引用可谓远识深虑合於道者也更以烧饭和药与白术協力滋养谷气而补令胃厚再不至内伤其利广矣大矣若内伤脾胃以辛热之物酒肉之类自觉不快覓药於医者此风习以为常医者亦不问所伤即付之以集香丸巴豆大热药之类下之大便下则物去遗留食之熟性药之热性重伤元气七神不炽经云热伤气正谓此也其人必无气以动而热困四肢不举传变诸疾不可胜数使人真气自此衰矣若伤生冷硬物世医或用大黄牵牛二味大寒药投之物随药下所伤去矣遗留食之寒性药之寒性重泻其阳阳去则皮肤筋骨肉血脉无所依倚便为虚损之证论言及此令人寒心夫辛辣气薄之药无故不可乱服非止牵牛而已至真要大论云五味入胃各先逐其所喜攻攻者剋伐泻也辛味下咽先攻泻肺之五气气者真气元气也其牵牛之辛辣猛烈夺人尤甚饮食所伤肠胃受邪当以苦味泄其肠胃可也肺与元气何罪之有夫牵牛不可用者有五此其一也况胃主血为物所伤物者有形之物也皆是血病血病泻气此其二也且饮食伤於中焦止合剋化消导其食重泻上焦腹中已虚之气此其三也食伤肠胃当塞因塞用又寒因寒用枳实大黄苦寒之物以泄有形是也反以辛辣牵牛散泻真气犯大禁四也殊不知鍼经第一卷第一篇有云外来客邪风寒伤人五脏若误泻胃气必死误补亦死其死也陰气有余故躁今内伤肠胃是谓六腑不足之病反泻上焦虚无肺气肺者五臟之一数也为牵牛之类朝损暮损其元气消耗此乃暗里折人壽数犯大禁五也良可哀叹故特着此论并方庶令四海闻而行之不至天横耳此老夫之用心也胃气岂可不足复明养胃之理故经曰安谷则昌絶谷则亡水去则荣散谷消则卫亡荣散卫亡神无所依仲景云水入於经其血乃成谷入於胃脉道乃行故血不可不养胃不可不温血温胃和荣卫将行常有天命谷者身之大柄也书与周礼皆云金木水火土谷惟修以奉养五脏者也内伤饮食固非细事苟妄服食药而轻生损命其可乎哉黄帝鍼经有说胃恶热而喜清大肠恶清冷而喜热两者不和何以调之岐伯曰调此者饮食衣服亦欲适寒温寒无凄怆暑无出汗饮食者热无灼灼寒无滄滄寒温中适故气将特乃不致邪僻也【详说见於本经条下】是必有因用岂可用俱寒俱热之食药致损者与内经云内伤者其气口脉反大於人迎一倍二倍三倍分经用药又曰上部有脉下部无脉其人当吐不吐者死如但食不纳恶心欲吐者不问一倍二倍不当止与瓜蒂散吐之但以指或以物探去之若所伤之物去不尽者更诊其脉问其所伤以食药去之以应塞因塞用又谓之寒因寒用泄而下降乃应太陰之用其中更加升发之药令其元气上升塞因塞用因曲而为之直何为曲内伤胃气是也何为直而升发胃气是也因治其饮食之内伤而使生气增益胃气完复此乃因曲而为之直也若依分经用药其所伤之物寒热温凉生硬柔輭所伤不一难立定法只堕所伤之物不同各立治法临时加減用之其用药又问病人从来稟气盛衰所伤寒物热物是喜食而食之邪不可服破气药若乘饥困而食之邪当益胃气或为人所勉劝强食之宜损血而益气也诊其脉候伤在何臟方可与对病之药岂可妄泻大真生气以轻丧身宝乎且如先食热而不伤继之以寒物因後食致前食亦不消化而伤者当问热食寒食孰多孰少斟酌与药无不当矣喻如伤热物二分寒物一分则当用寒药一分热药二分相合而与之则荣卫之气必得周流更有或先饭酒而後伤寒冷之食及伤热食冷水与冰如此不等皆当验其节次所伤之物约量寒热之剂分数各各对证而与之无不取验自忖所定方药未敢便为能尽药性之理姑用指迷辩惑耳随证

立方备陈於後

易水张先生枳术丸治痞消食强胃

白术【二两】 枳实【麸炒黄色】

右为细末荷叶裹烧饭为丸如梧桐子大每服五十丸多用白汤下无时白术者本意不取其食速化俱久令人胃气强实不复伤也

橘皮枳术丸治老幼元气虚弱饮食不消或脏腑不调心下痞闷

橘皮 枳实【麸炒去穰已上各一两】

白术【二两】

右为细末荷叶烧饭为丸如梧桐子大每服五十丸熟水送下食远○夫内伤用药之大法所贵服之强人胃气令胃气益厚虽猛食多食重食而不伤此能用食药者也此药久久益胃气令人不复致伤也

麴蘖枳术丸治为人所勉强强食之致心腹满闷不快枳实【麸炒去穰】 大麦蘖【面炒】神麴【炒已上各一两】

右为细末荷叶烧饭为丸如梧桐子大每服五十丸用温水下食远

木香枳术丸破滯气消饮食开胃进食

木香 枳实【麸炒去穰已上各一两】

白术【二两】

右为细末荷叶烧饭为丸如梧桐子大每服五十丸温水送下食远

木香化滯汤治因忧气食湿面结於中脘腹皮底微痛心下痞满不思饮食食之不散常常痞气

半夏【一两】 草豆蔻仁 甘草【已上各五钱】

柴胡【四钱】 木香 橘皮【已上各三钱】 枳实【麸炒去穰】
当归稍【已上各二钱】 红花【五分】

右件剉如麻豆大每服五钱水二大盏生姜五片煎至一盏去滓稍热服食远忌酒湿面

半夏枳术丸治因冷食内伤

半夏【汤洗七次】 枳实【麸炒已上各一两】 白术【二两】

右为细末荷叶烧饭为丸如菉豆大每服五十丸温水送下添服不妨热汤浸蒸饼为丸亦可

○如食伤寒热不调每服加上二黄丸十丸白汤送下丁香烂饭丸治饭食所伤

丁香 京三棱 广茂【炮】

木香【已上各一钱】 甘草【炙】 甘松【去土】

缩砂仁 丁香皮 益智仁【已上各三钱】 香附子【五钱】

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大每服三十丸白汤送下或细嚼亦可不拘时候

○治卒心胃痛甚效

草豆?丸治秋冬伤寒冷物胃脘当心而痛上支两脇膈咽不通

草豆?【面裹煨去皮取仁】 枳实【麸炒黄色】

白术【已上各一两】 大麦蘖【麸炒黄色】 半夏【汤洗七次】

黄芩【刮去皮生】 神麴【炒黄色各五钱】 乾生姜

橘皮 青皮【已上各二钱】 炒盐【伍分】

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大每服五十丸白汤下量所伤多少加减服之

○如冬月用别作一药不用黄芩岁火不及又伤冷物加以温剂是其治也然有热物伤者从权以寒药治之随时之宜不可不知也

三黄枳术丸治伤肉食湿面辛辣味厚之物填塞闷乱不快

黄芩【二两】 黄连【酒洗】 大黄【湿纸煨】

神麴【炒】 橘皮 白朮【已上各一两】 枳实【麸炒五钱】

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大一倍每服五十丸白汤送下量所伤服之

除湿益气丸治伤湿面心腹满闷肢体沉重

枳实【麸炒黄色】 神麴【炒黄色】 黄芩【生用】

白朮【已上各一两】 萝卜子 红花【三分是一钱分十也】

右为细末荷叶烧饭为丸如菉豆大每服五十丸白汤送下量所伤多少服之

三棱消积丸治伤生冷硬物不能消化心腹满闷京三棱【炮】 广茂【炒】
炒麴【已上各七钱】 青橘皮 巴豆【和皮米炒黑燹去米】 陈皮【已上各五钱】

丁香 益智【已上各三钱】 茴香【五钱炒】

右为细末醋打面糊为丸如梧桐子大每服十丸加至二十丸温生姜汤下食前量虚实加减如更衣止後服之

备急大黄丸疗心腹诸卒暴百病

大黄 巴豆【去皮】 乾姜【已上各一两】

右须要精新好药捣罗蜜和更捣一千杵丸如小豆大每服三丸老少量之

益胃散治服寒药过多或脾胃虚弱胃脘痛

陈皮 黄芪【已上各七钱】 益智仁【六钱】

白豆蔻仁 泽泻 乾姜

姜黄【已上各三钱】 缩砂仁 甘草

厚朴 人参【已上各二钱】

右为细末每服三钱水一盏煎至七分温服食前○如脉弦恶寒腹痛乃中气弱也以仲景小建中汤加黄芪钱氏异攻散加芍药选而用之○如渴甚者以白朮散加葛根倍之

论酒客病

夫酒者大热有毒气味俱阳乃无形之物也若伤之止当发散汗出则愈矣此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消其湿何酒病之有今之酒病者往往服酒症丸大热之药下之又有用牵牛大黄下之者是无形元气受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大热已伤元气而复重泻之况亦损肾水真陰及有形陰血俱为不足如此则陰血愈虚真水愈弱阳毒之热大旺反增其陰火是谓元气消亡七神何依折人长命不然则虚损之病成矣金匱要略云酒疸下之久久为黑疸慎不可犯此戒不若令上下分消其湿葛花解酲汤主之葛花解酲汤

白豆?仁 缩砂仁 葛花【已上各五钱】

乾姜 神麴【炒】 泽泻

白术【已上各二钱】 橘皮【去白】 猪苓【去皮】

人参【去芦】 白茯苓【各一钱五分】 木香【五分】

莲花青皮【去穰三分】

右为细末秤和匀每服三钱七白汤调下但得微汗酒病去矣此盖不得已而用之岂可恃赖日日饮酒此药气味辛辣偶因酒病服之则不损元气何者敌酒病故也若频服之损人天年

五苓散治伤寒温热病表里未解头痛发热口渴咽乾烦渴饮水或水入即吐或小便不利及汗出表解烦渴不止者宜服之又治霍乱吐利燥渴引饮之证

泽泻【二两五钱】 猪苓 茯苓

白术【已上各一两五钱】 桂【一两】

右为细末每服二钱热汤调服不计时候服讫多饮热汤有汗出即愈

○又治瘀热在里身热黄疸浓煎茵陈蒿汤调下食前服之○如疸发渴及中暑引饮亦可用
水调服之

家秘加味枳术丸治脾胃虚弱饮食减少胸膈膨闷酒伤食积气滯腹满常服则进食寬中和
畅脾胃白术【泔浸土炒二两】 枳实【去穰麸炒一两】 神麴【炒】

麦蘖【炒研取粉】 陈皮【去白】 山楂肉

香附【炒已上各一两】 缩砂仁【炒五钱】

右为细末荷叶烧陈老米饭为丸如菉豆大每服五十丸用清米饮或滚水送下如胸膈膨闷枳壳汤送下如酒伤乾葛汤送下如脾胃虚弱者加人参五钱附伤食

伤食方论

病源曰宿食不消由藏气虚弱寒气在於脾胃之间故使谷不化也宿谷未消新谷又入脾气既弱故不能磨之则经宿而不消也令人腹胀气急噎气醋臭时或增寒壮热是也或头痛如疟之状寸口脉浮大按之反涩尺脉亦微而涩者则宿食不消也丹溪云伤食恶食者胸中有物宜导痰补脾用二陈汤加白术山查川芎苍术服之

荳蔻橘红散温脾养胃升降陰阳和三焦化宿食

丁香 木香【各一两】 肉荳蔻

人参 厚朴【姜汁制】 神麴【炒】

乾姜【炮】 半夏麴 橘红【去白】

甘草【炙】 藿香【去土】 白术【各半两】

右?咀每三钱水一盞姜三片枣一枚煎七分去渣温服

保和丸专治一切食积

山查【六两】 神麴 半夏

茯苓【各二两】 陈皮 连翘

萝卜子【各一两】

右为末炊饼子如梧子大每服七八十丸食远白汤下

大枳殼丸【御药院方】 治一切酒食伤胸膈闭闷疼痛饮食不消两脇刺痛呕逆恶心并皆治之

蓬莪术【煨香热】 厚朴【去皮姜制】 人参【去芦】

青皮 黑牵牛【炒】 枳殼【麸炒去穰】

茯苓【去皮】 木香 陈皮【去白】

白朮【各一两】 诃榔 大黄【锦纹者各二两】 半夏【汤炮七次】 麦蘖【微炒】
神麴【炒黄】

三棱【各一两】

又一方有乾生姜五钱

右为末姜汁糊丸如梧子大每服三四十丸姜汤下常服美食

木香诃榔丸治一切气滯心腹痞满脇肋胀闷大小便结滯不利者并亦服之

木香 诃榔 青皮【去白】

陈皮【去白】 枳殼【麸炒】 广茂【煨切】

黄连【各一两】 黄栢【去粗皮一两】 香附

大黄【炒各三两】 黑牵牛【生取头末各三两】

右为末滴水丸如豌豆大每服三五十丸食後生姜汤送下加至以利为度

秘方化滯圆理一切气化一切积夺造化有通塞之功调陰阳有补泻之妙久坚沉痼磨之自消暴积留导之立去

南木香【坚实者不见火】 丁香【去苞不见火】

青皮【四花者去白】 红橘皮【水浸去白】 黄连【大者各二钱半】

京三棱【慢火煨】 莪朮【慢火煨各五钱】 半夏麴【三钱】

前八味晒乾共研为细末

巴豆【去殼滚汤泡逐一研开去心膜以瓦器盛用好醋浸过一指慢火熬至醋乾秤六钱重碾

细将前药末和再碾令匀入後乌梅肉膏巴豆若乾止用四钱五分】

乌梅【用肉厚者打研去核细剉火焙乾为细末秤五钱重用米醋调略清慢火熬成膏和入前

药】

右通和匀了用白面八钱重水调得所慢火调糊为丸如粟米大每服五七丸人盛者十丸五更空心用橘皮汤下○常服磨滯不欲通泄津液咽下○停食饱闷枳殼汤下○但有所积物取本汁冷下○因食吐不止津液咽下即止○食泻不休及霍乱呕吐俱用冷水下○赤痢冷甘草汤下○白痢冷乾姜汤下○心动石菖蒲汤下○赤白痢冷甘草乾姜汤下○诸气痛生姜橘皮汤下○小肠气痛茴香酒下○妇人血气当归汤下

若欲宣积滚姜汤下仍如丸数未利再服利多饮冷水一口补住○小儿量岁数加減丸服痞积常服米饮

下不拘时服○孕妇勿服此药得热则行得冷则止

丁香烂饭圆治食伤卒心痛三黄枳术圆治伤肉食湿面辛辣味厚之物填塞闷乱不安葛花解醒汤治饮酒太过呕吐痰逆心神烦乱胸膈痞塞手足战摇饮食减少小便不利【方俱见内伤门】

大柴胡汤治内伤饮食郁结在里身热烦燥日晡发热如疟脉实而滑数者用此微利

柴胡【四钱】 黄芩 芍药【各二钱半】

半夏【二钱】 大黄【二钱】 枳实【一钱五分】

右?咀作一服加生姜三片枣二枚水二鍾煎一鍾去粗温服以利为度未利再投一服

附调理脾胃【新增】

调理脾胃方论

内经曰胃者五藏六府之海也水谷皆入於胃五藏六府皆禀气於胃胃者五藏之本六府之大源也又曰胃为水谷之海饮食入胃游溢精气上输於脾脾气散精上归於肺通调水道下输膀胱水精四布五经并行合於四时五藏陰阳揆度以为常也以此论之若夫饮食有节寒温适宜脾胃壮实则外邪不能侵内邪不能起何恙之有哉苟因饮食失节寒温不适则脾胃虚弱而百病生焉况脾胃属土土为五行之本万物藉土而生故古人以调理脾胃为医中之王道厥有旨哉予鄙见欲人知节饮食适寒温以养脾胃之本倘有脾胃虚弱最易作疾故开诸方於後择而用之苟得脾壮实固本澄源之事也夫

调中益气汤【东垣方】治因饥饱劳役损伤脾胃元气不足其脉弦或洪缓而沉按之无力中之下时得一澁其证身体沉重四肢倦懒百节烦疼胸满短气膈咽不通心烦不安耳鸣耳聋目有瘀肉热壅如火覩物昏花口中沃沫饮食失味怠惰嗜卧忽肥忽瘦溺色变或清利而数或上饮下便或夏月飧泄腹中虚痛不思饮食

升麻 柴胡 橘皮【各二分】

木香【二分】 甘草【炙】 人参

苍术【各五分】 黄芪【一钱】 当归【五分】

芍药【三分】 五味子【七个此後三味出东垣证効方有之】

右?咀作一处水煎食前热服如时显热燥是不元蒸蒸发也加生地黄黄栢如大便虚坐不得或大便秘了而不了腹常逼迫血虚血澁也加归身

治中汤治脾胃不和呕逆霍乱中满虚痞或泄泻参苓白术散治脾胃虚弱饮食不进或呕吐泄泻及大病後调助脾胃此药最好【方并见虚劳门】平胃散治脾胃不和呕吐痰水胸膈痞滞不美饮食并皆治之【方见泄泻门】枳术圆治痞消食理脾强胃【方见内伤门】家秘加味枳术丸治脾胃虚弱饮食减少胸膈膨闷酒伤食积气滞腹满常服则进食寛中和畅脾胃【方见内伤门】养胃汤【三因方】治脾胃虚寒呕逆恶心腹脇胀痛肠鸣泄泻或有外感寒热如疟骨节烦疼并皆治之【方见疟疾门】

白术和胃丸治病久不能食而臟腑或结或澹此胃气虚弱也常服则和中理气消痰去湿和脾胃进饮食厚朴【制】 半夏【各一两】 白术【一两二钱】

陈皮【八钱】 ?榔 枳实【各二钱半】

木香【一钱】 人参【七钱】 甘草【炙三钱】

右为末生姜汁浸蒸饼为丸如梧桐子大每三十丸温水食远服

补脾丸【心法秘方】有脾虚而恶汤药者制此丸用汤吞省口苦而易於从也

白术【半斤】 苍术 茯苓

陈皮【各三两】 芍药【半斤】

右为末粥糊丸加润下丸可作催生用上热甚者加清金丸尤妙与此药必无产患

养脾丸【和剂方】治脾胃虚冷心腹胀闷呕逆恶心泄泻大麦蘖【炒】白茯苓【去皮】
人参【去芦各一斤】白术【半斤】乾姜【炮】
缩砂【去皮各二斤】甘草【炙一斤半】

右为末炼蜜为丸每两作八丸每服一丸细嚼姜汤下

补脾汤【三因方】治脾胃虚寒泄泻腹满气逆呕吐饮食不消

人参【去芦】茯苓【去皮】草果【去皮】

乾姜【炮各一两】麦芽【炒】甘草【炙各一两半】厚朴【去皮姜制】
陈皮【去白】白术【各七钱半】

右?咀每服四钱水一盞煎七分去渣空心温服

温脾散【本是方】开胃进食利气散寒湿温中

青皮【去白】陈皮【去白】砂仁

船上茴香【炒】良姜 桔梗

白芷 厚朴【各一两】木香

麦芽 香附 白术【各半两】

甘草【一两半】红豆 乾葛【各三钱】

右?咀每服三钱水一盞枣一枚煎七分去渣空心服

八味理中丸【百一选方】治脾胃虚冷饮食不化胸膈痞闷或呕吐痰水或肠鸣泄泻

砂仁 川姜 麦芽【各二两】

白茯苓 神麴【炒】 人参【各一两】

白术【四两】 甘草【炙一两半】

右为末炼蜜丸每两分作十丸空心用一丸姜汤嚼下或加半夏麴一两为末入盐点服亦可

参苓平胃散【御药院方】治脾胃不和不思饮食心腹脇肋胀满刺痛口苦无味胃满短气
呕哕恶心噫气吞酸面色痿黄肌体瘦弱怠惰嗜卧体重节痛常多自利或发霍乱及五噎八
痞膈气反胃宜服

厚朴【制】 橘皮【各五两】 苍术【米泔浸半斤】 甘草【炙】 茯苓【各二两】
人参【二两】

右?咀水二盏生姜三片枣一枚煎至一盏去渣温服不拘时一方枣肉丸小豆大服五十丸姜
汤下空心常服调气暖胃化宿食消痰饮辟风寒凉温四时非节之气

异功散【拔粹方】治脾胃虚冷肠鸣腹痛自利不思饮食

人参 茯苓 白术

甘草【炙】 橘皮【各等分】

右?咀每服五钱生姜三片枣一枚水二盏煎八分温服

六君子汤【圣惠方】治脾脏不和不进饮食上燥下寒服热药不得者

人参 白术【各一两】 橘红

半夏【汤泡七次】 枳壳【去白麩炒】 甘草【炙各半两】

右?咀每服一两生姜七片枣一枚水二盏煎至一盏去渣温服

木香人参生姜枳术丸【拔粹方】开胃进食

木香【三钱】 人参【三钱半】 乾生姜【一钱半】 枳实【一两炒】 白术【一两半】
橘皮【四钱】

右件为末用荷叶烧饭为丸如梧桐子大每服三五十丸温水送下食前服

藿香安胃散【卫生宝监】治脾胃虚弱不能饮食呕吐不待腐熟

藿香 丁香 人参【各二钱半】

橘红【半两】

右?咀水二盞生姜三片煎至一盞溫服不拘時

寬中進食丸滋形氣美飲食

神麴【炒四錢】 木香【五分】 草薢仁【五錢】 枳實【炒四錢】 半夏【七錢】
甘草【炙一錢】

人參 乾生薑 青皮

豬苓【各一錢】 陳皮 白朮

白茯苓 澤瀉【各二錢】 砂仁【一錢半】

大麥芽【一兩】

右為末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服三四十丸溫米飲下食遠服之

八珍湯【御藥院方】治血氣理脾胃

當歸 赤芍藥 川芎

熟地黃 人參 白茯苓

甘草 砂仁【各等分】

右?咀每服三錢水一盞姜七片棗二枚煎至七分空心溫服

凝神散病後收斂胃氣清涼肌表

人參 白朮 茯苓

山藥【各一兩】 粳米 扁豆【炒】

知母 生苧 甘草【炙各五錢】

淡竹葉 地骨皮 麥門冬【各二錢半】

右?咀每服五錢水盞半姜三片棗一枚煎至一盞去渣溫服

加減保和丸消痰利氣扶脾胃進飲食

山查 神麴【炒】 半夏【湯泡七次】

茯苓【去皮各三兩】 陳皮【洗】 連翹

萝卜子【各二兩】 白朮【五兩】 蒼朮【米泔浸去粗皮】 枳實【去白各一兩】
香附【去皮酒浸】 厚朴【姜制各二兩】 黃芩【去腐酒浸炒】
黃連【去須酒浸炒各一兩】

右為細末姜汁面糊為丸如梧子大每服五十丸漸加至七八十丸食後茶湯任下

加味枳朮丸【明醫雜著】論曰人之一身脾胃為主胃陽主氣脾陰主血胃司納受脾司運化一納一運化生精氣津液上升糟粕下降斯無痛矣人惟飲食不節起居不時損傷脾胃胃損則不能納脾損則不能化脾胃俱損納化皆難元氣斯弱百邪易侵而飽悶痞積關格吐逆腹痛泄痢等証作矣況人於飲食豈能一一節調一或有傷脾胃便損飲食減常元氣漸急矣故古制枳朮之丸東垣發脾胃之論使人常以調理脾胃為主後人稱為醫中王道厥有旨哉近世論治脾胃者不分陰陽氣血而率皆理胃所用之藥又皆辛溫燥熱助火消陰之劑遂致胃火益旺脾陰愈傷清純中和之氣變為燥熱胃脘乾枯大腸燥結脾臟漸絕而死期迫矣殊不知脾胃屬土屬溫位居長夏故溫熱之病十居七八況土居四季寒熱溫涼各依其時豈可偏用辛熱之劑哉今舉枳朮丸方立加減法於後

白朮【二兩去梗】 枳實【一兩麴炒】

右為細末荷葉包飯燒取出杵爛和藥杵勻丸如菉豆大每服五六十丸清米湯下此法一補一消取飲食緩化不令有傷東垣加陳皮一兩橘皮枳朮丸治老幼元氣衰弱飲食少進久服令人多食而不傷若元氣素弱飲食難化食多即腹中不和疼痛泄瀉此虛寒一也加人參白芍藥【酒炒】神麴【炒】大麥芽【炒杵去皮各一兩】宿砂木香【各五錢】

若素有痰火胸膈郁塞咽酸噎氣及素有吞酸吐酸之証或有酒積滯結痛此皆溫熱也加黃連【姜汁炒】白芍藥【酒炒】陳皮【各一兩】石膏生甘草【各五錢】縮砂木香【各二錢】川芎【四錢】

若傷食飽悶痞塞不消加神麴大麥芽山查子【各一兩】如有食積痞塊在腹者再加黃連厚朴瓜蒌【制各五錢】積堅者再加蓬朮【醋煮】昆布【各三錢】

若傷冷食不消腹痛瀉泄加半夏【姜制一兩】縮砂乾姜【各炒】神麴大麥芽【各五錢】

若人性多气恼夹气伤食气滞不通加川芎香附米【各一两】木香黄连【姜制各五钱】

若胸膈不利人过服辛香燥热之药以致上焦受伤胃脘乾燥呕吐膈噎反胃加黄连【姜炒】山梔子【炒各五钱】白芍药当归【各一两】桔梗生甘草石膏【各五钱】胸膈顽痰胶结及大便燥秘再加芒硝【五钱】

若素有痰者加半夏【姜炒】橘红白茯苓【各一两】黄芩【炒】黄连【姜炒各五钱】

若人能食好食但食後反饱难化此胃火旺脾陰虚也加白芍药【酒炒一两半】人参【七钱】石膏【火煅一两】生甘草【五钱】黄连【炒】香附米【炒】木香【各四钱】

若年高人脾虚血燥易饥易饱大便燥难加白芍药当归【各一两】人参【七钱】升麻甘草【炙各四钱】山查子大麦芽桃仁【去皮尖各五钱】此老人常服药也

仁斋直指卷六

卷七

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷七 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

痰涎

痰涎方论

惟气与血能生诸病痰亦如之夫痰者津液之异名人之所恃以润养肢体者也血气和平关络条畅则痰散而无气脉闭塞脘窍凝滞则痰聚而有痰之所以发动者岂无自而然哉风搏寒凝暑烦湿滞以至诸热蒸郁啖食生冷煎煇鯁膈咸藏动风发气等辈皆能致痰也是痰作恙为喘为 为壅为呕为眩晕为风瘤为狂迷为忪悸或吞酸或短气或痞隔或肿胀或寒热或疼痛痰实主之人知痛生於气血孰知痰涎流注亦能缠滞而为痛乎如头风证眉棱耳角俱痛投以风药不效投以痰药收功如患眼证赤肿羞明而痛与之凉剂弗瘳与之痰剂获愈如酒家手臂痛重时或麻痹二陈汤加片子姜黄下白圆子消饮圆倍术圆辈每每就安如鬪家胸骨扑伤刺痛无已散血之剂罔功续以自己溲便饮之须臾吐痰其痛立止此皆痰涎作痛之明证也然而顽痰满胃上脘填塞其高者因而越之法当从权取吐或者津液不守所以痰多吐甚痰脱则精竭而毙矣疗痰之法理气为上和胃次之若风若寒若湿若热如前数者亦当推寻所受之因和胃谓何涎者脾之液也脾胃一和痰涎自散故治痰多用半夏盖半夏能利痰故也

痰涎证治

橘皮汤治胸膈停痰

半夏【制五两】 茯苓 陈皮【各三两】

细辛 青皮 桔梗

枳壳 甘草【炒各二两】 人参

旋覆花【去叶各一两】

右剉散每服三钱姜五厚片煎服

前胡半夏汤治痰盛

北前胡 半夏【制】 茯苓【各三分】

陈皮 木香 紫苏

枳壳【制】 甘草【炒各二分】

右剉散每服三钱姜五片乌梅少许煎服

人参饮治痰亦治

人参 桔梗 半夏麴

五味子 细辛 枳壳【制】

赤茯苓【各一分】 甘草【炒半分】

右剉散每服三钱姜五片煎服痰 加紫苑添甘草

星姜汤治痰去风

丸白南星【半两者一个】 老生姜【三钱半】

右各切片以水三盏磁器内煎取其半逐旋温服

二圣饮治风痰

南星 半夏【各二两切片】

右用生姜一斤捣取自然汁浸药磁器盛之顷在锅内隔汤熬洮令姜汁尽焙乾为末每挑二钱入生姜甘草少许煎汤调下或用糕糊小丸姜汤下三十丸入煨白矾少许同丸亦得

大半夏汤治痰饮

半夏【制】 茯苓 生姜【等分】

右剉碎每服三钱水二盏煎至一小盏温服如热痰加甘草少许胃不和去甘草加陈皮

半夏丸消下痰涎

丸白半夏 老生姜【等分捣如泥焙乾】

右为末煮姜汁为糊丸桐子大每三十丸姜汤下

豁痰丸治顽痰壅盛

南星【三两】 半夏【二两各剉作大片用浓皂角水浸一宿焙乾为末】 白附子 川灵脂 直僵蚕【炒去丝】 华陰细辛 白矾【煨枯各一两】 全蝎【三钱半焙】

右为末皂角浆煮面糊为丸桐子大每二三十丸姜汤下

神术丸治痰饮妙

茅山苍术【一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾为末】 生油麻【半两水二盏研细取浆】 大枣【十五个煮取肉研旗入麻浆拌和药】

右末为丸桐子大日乾每五七十丸空心温汤下

辰砂化痰丸驱风化痰

辰砂【研细】 白矾【煨枯各半两】 半夏麴【三两】

南星【炮一两】

右为末姜汁调麴煮糊丸桐子大别用朱砂衣每十丸姜汤下小儿风痰一二丸

强中二姜汤温脾胃消寒痰

良姜 乾姜 青皮

陈皮 大半夏【切开沸汤荡浸七次焙乾各一两】

南星【炮半两】

右为末姜汁调麪煮糊丸桐子大每三十丸姜汤下

养正丹治肾虚气不归元痰涎上壅亦治寒痰每服二十丸用降气汤送下

二陈汤吞白丸子【方见小儿类】治痰饮一证眉心眉梁骨痛状如头风

二陈汤【方见疟类】加苍术片子姜黄制枳殼各少许治酒麪积毒热生痰攻眼肿痛

控痰良方喘嗽通用

號丹 白矾【各二两】

右以钱王?剉一火孔先入號丹次以白矾盖顶用炭一斤煅至火尽矾枯丹黑出火毒研细煮稀麪糊丸麻子大每服十五丸沸汤泡生姜汁送下诸顽痰迷塞关窍不通声音不出以三十丸研末入全蝎少许用自然姜汁澄取清者调灌须臾吐痰立愈凡喘促胃膈膨湃寸脉急数须从权吐之中满内实而喘者与解毒雄黄丸【方见积热门】

附诸贤论

刘宗厚曰痰之为病仲景论四饮六证无择叙内外三因俱为切当盖四饮则叙因痰而显诸证者三因则论其因有所伤而生痰者也惟王隐君论人之诸疾悉出於痰此发前人所未论可谓深识痰之情状而得其奥者矣制滚痰丸一方丝治斯疾固为简便较之仲景三因有表里内外而分汗下温利之法则疎濶矣况又有虚实寒热之不同者哉夫痰病之原有因热而生痰者亦有因痰而生热者有因风寒暑湿而得者有因惊而得者有因气而得者有因酒食而得者有因食积而得者有脾虚不能运化而生者有肾虚不能降火而生者若热痰则多烦热风痰多成瘫痪奇证冷痰多成骨痺湿痰多倦怠软弱惊痰多成心痛癲疾饮痰多成脇痛臂痛食积痰多成癖块痞满其为病状种种难名王隐君论中颇为详尽学者但察其病形脉证则知所挟之邪随其表里上下虚实以治之若夫子和谓饮无补法必当去水故用吐汗下之三法治人常愈又论热药治痰之误固为详切亦有挟寒挟虚之证不可不论夫久痰凝结胶固不通状若寒凝不用温药引导必有拒格之患况有风寒外来痰气内郁者不出温散亦何以开郁行滞又有血气亏乏之人痰客中焦闭塞清道以致四肢百骸发为诸病理宜导去痰滞必当补接兼行又难拘於子和之三法也大凡病久淹延卒不便死者多因食积痰饮所致何以然者盖胃气亦赖痰积所养饮食虽少胃气卒不便虚故也亦有治痰用峻利过多则脾气愈虚津液不运痰反生而愈盛法当补脾胃清中气则痰自然运下此乃治本之法也谓医中之王道者正此类也

附诸方

金沸草散治外感风寒痰气内郁咳唾稠粘参苏饮亦治外感风寒痰饮停积胸膈咳嗽气促

言语不能相续【并见伤风门】小青龙汤治外感风寒内生溢饮支饮倚息喘满【方见咳嗽门】苏子降气汤治虚阳上攻气不升降上盛下虚痰涎壅盛【方见诸气门】

中和丸治湿痰气热

苍术 黄芩 半夏

香附【等分】

右为末粥丸如梧桐子大每服五七十丸姜汤下

导痰汤

南星【炮】 橘红【去白】 赤茯苓【去皮】

枳壳【麸炒】 甘草【炙半两各一两】 半夏【四两】

右?咀水煎生姜五片食前服

茯苓圆【出千金第一方】

半夏【四两】 茯苓【二两】 枳壳【一两】

风化硝【半两】

右为末蒸饼或神麴姜汁糊丸梧子大每服三十丸姜汤下

此方治中脘停痰臂痛难举手足不得转有效

清膈化痰圆

黄连 黄芩【各一两】 黄栢

山梔【半两】 香附【一两半】 苍术

右为末蒸饼丸白汤下

搜风化痰圆

人参 槐角子 僵蚕

白矾 陈皮【去白】 天麻

荆芥【各一两】 半夏【四两姜汁炒】 辰砂【半两另研】

右为末姜汁浸蒸饼为丸辰砂为衣服四拾丸姜汤下

利膈化痰圆

南星 蛤粉【研细一两】 半夏

瓜蒌仁 贝母【去心治胸膈痰气妙】 香附【半两童便浸】

右为末用猪牙皂角十四挺敲碎水一碗半煮杏仁去皮尖一两煮水将乾去皂角搗杏仁如泥入前药搜和再入姜汁泡蒸饼丸如菉豆大青黛为衣每服五六十丸姜汤下

清痰圆治清中脘热痰积

乌梅 枯矾 黄芩

苍术 陈皮 活石【炒】

青皮 枳实【各半两】 南星

半夏 神麴 山查

乾生姜 香附【各一两】

右为末汤浸蒸饼丸服

王隐君滚痰圆

括曰甌里翻身甲挂金于今头戴草堂深相逢二八求斤正硝煅青礞倍若沉十七两中零半两水丸桐子意常斟千般怪证如神効水泻双身却不任大黄【酒蒸】
黄片芩【酒洗净各八两】 沉香【半两】

礞石【一两槌碎焰硝一两用入小砂罐内瓦片盖之鉄线练定盐泥固济晒乾火煅红候冷取

出】

一方加珠砂二两【研为细末为衣】

右为细末水丸梧子大每服四五十丸量虚实加减服茶清温水任下临卧食後服

六君子汤治脾虚不进饮食呕吐痰水【方见调理脾胃门】清气化痰圆清头目凉膈化痰利气

半夏【汤洗七次二两】 陈皮【去白】 茯苓【去皮各一两半】 薄荷叶
荆芥穗【各五钱】 黄芩【酒浸炒】

连翘 梔子仁【炒】 桔梗【去芦】

甘草【炙各一两】 苍术【泔浸剉焙乾炒】 香附子【醋浸炒各一两】

右为末姜汁煎水打糊为丸如梧子大每服五十丸食後临卧各一服如肠胃燥实加酒炒大黄芒硝各一两

此方即二陈汤凉膈散加香附苍术相合是也盖痰者因火而动气者因郁而成故作胸膈痞满头目昏眩今用二陈汤以豁痰凉膈散以降火而散风热香附苍术开郁顺气何疾之不愈哉

节斋化痰圆

论曰痰者病名也人之一身气血清顺则津液流通何痰之有惟夫气血浊逆则津液不清熏蒸成聚而变为痰焉痰之本水也原於肾痰之动湿也主於脾古人用二陈汤为治痰通用者所实脾燥温治其标也然以之而治温痰寒痰痰饮痰涎则固是矣若夫痰因火上肺气不清咳嗽时作及老痰郁痰结成粘块凝滞喉间吐咯难出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺气被郁故其津液之随气而升者为火薰蒸凝浊郁结而成岁月积久根深蒂固故名老名郁而其源则火邪也病在上焦心肺之分咽喉之间非中焦脾胃温痰冷痰痰饮痰涎之比也故汤药难治亦非半夏茯苓苍术枳殼南星等药所能治也惟在开其郁降其火清润肺金而消化凝结之痰缓以治之庶可取効今制一方於後

天门冬【去心】 黄芩【酒炒】 海粉【别研】

瓜蒌仁【别研】 橘红【各一两】 桔梗【去芦】

连翘 香附子【搗研淡盐水浸炒各五钱】

青黛【别研二钱】 芒硝【别研三钱】

右为细末炼蜜入生姜汁少许和药末杵极匀丸如小龙眼大噙化一丸或嚼烂清汤细咽之或丸为细丸如黍米大淡姜汤送下五六十丸

此等老痰大率饮酒之人多有之酒气上升为火肺与胃脘皆受火邪故鬱滯而成此方用天门冬黄芩泄肺火也海粉芒硝鹹以软坚也瓜蒌仁润肺降痰香附米开郁降气连翘开结降火青黛解郁火故皆不用辛燥之药

秘传豁痰丸治食积痰热

陈皮【去白四两】 山楂 神麴【各二两】

当归 黄芩 白术【各四两】

半夏【姜汁浸七日】 黄连 白茯苓

甘草【各一两五钱】 枳实【二两五钱】

右为细末汤浸蒸饼为丸如梧桐子大每服四五十丸临卧或食後淡姜汤送下

秘传滚痰圆降痰火神効

大黄【八两剉片用皮硝三两酒一碗水一碗和匀蒸乾用】 黄芩【八两剉碎用明矾三钱酒水各一碗蒸用】 沉香【五钱】 礞石【一两用硝一两入礞固济煅红取出用】 朱砂【一两研末为衣】

右为细末水丸如梧桐子大朱砂为衣每服四五十丸量虚实加减

加味二陈汤

半夏【姜汁一钱五分】 白茯苓 白术【各一钱】

香附【一钱二分】 连翘 黄芩

枳实【麸炒】 前胡 甘草

瓜蒌仁 桔梗 麦芽

神麴【炒】 陈皮【盐水浸炒各一钱】

右?咀水二盞姜三片煎一盞

五饮汤【拔粹方】一留饮心下二癖饮脇下三疼饮胃中四溢饮膈上五流饮肠间凡此五饮酒後伤寒饮冷过多故有此疾

旋覆花 人参 陈皮

枳实 白术 茯苓

厚朴 半夏 泽泻

猪苓 前胡 桂心

芍药 甘草【各等分】

右剉每两分四服水二盞生姜十片同煎至六分取清温服不拘时忌食肉生冷滋味等物因酒有饮加葛根葛花砂仁

蠲饮枳实圆【拔粹方】逐饮消痰导滞清膈

枳实【炒】 半夏【汤泡七次】 陈皮【去白各二两】 黑牵牛【半斤取头末三两】

右为末水煮面糊为丸如梧子大每服五十丸姜汤下食後

辰砂祛痰丸【圣惠方】治酒食过多酸醎作成痰饮聚於胸中凝则呕逆恶心流则臂痛头目昏眩腰脚疼痛深则左瘫右痪浅则蹶然倒地此药神効

朱砂【一两水飞一半入药一半为衣】 半夏【四两】

槐角【炒】 陈皮 白矾【生】

荆芥【各一两】 生姜【四两与半夏制作饼陰乾】

右为末姜汁打糊丸如梧桐子大每服五十丸生姜汤下

八味圆治脾肾两虚痰唾而不咳者【方见诸虚门】

五虎汤治痰喘气急【方见喘门】

水饮

水饮方论

水之与饮同出而异名也人惟脾土有亏故平日所饮水浆不能传化或停於心下或聚於脇间或注於经络或溢於膀胱往往因此而致病矣孰谓血气痰涎能生诸疾而水饮之不能为恙乎惟水与饮漉漉有声为喘为咳为呕为泄为痞隔为胀满为眩运为怔忡为寒热为坚痛为浮肿为多唾为短气为体重气为饮隔痞满腹鸣骨痛冷痹则曰气分经脉不行血化为水四肢红肿则曰血分凡此等类皆水气之所由作也据病验证可不究其所受之原乎然则疗治之法将何先曰能以表里虚实订之斯得矣表有水者其身热 喘怔忡乾呕微利青龙汤汗之而愈里有水者其身凉呕 痞满引脇痛硬十枣汤下之而安虚者脉虚心腹满而濡当以安肾圆为主加青木香圆少许以行之实者脉实心腹满而硬当以青木香圆为主用五皮散加枳殼以导之?常水气心下怔忡大半夏汤小半夏茯苓汤五苓散辈通用可也然而疟家多积黄水或於心下停瀦或於脇间结癖惟癖为能生寒热所以疟剂多用常山盖水在上焦则吐之水不在於上焦则常山亦能破其癖而下其水也若夫水肿证候亦此种类详见於後请旁参而互考焉

水饮证治

芎夏汤逐水利饮通用

川芎 半夏【制】 茯苓【各一两】

青皮 陈皮 枳殼【制各半两】

白术 甘草【炒各一分】

右剉散每服三钱姜五厚片煎服川芎半夏能逐水也○喘加去节麻黄○ 加炒桑白皮○呕加生姜半夏○泄加苍术白术○痞隔加枳殼桔梗○胀满加缩砂白豆?○眩运加半夏南星○怔忡加白茯苓○寒热疼痛下其癖浮肿体重渗其湿余以类推

大半夏汤【方见痰涎门】

小半夏茯苓汤治诸水气

半夏【制五两】 茯苓【三两】

右剉散每服三钱水二盏半煎一盏秤生姜二钱半研取汁入药煎沸温服

五苓散流行水饮【方见气门】每二钱沸汤调下小便更不利加防己佐之

桂术汤治气分前证

辣桂【三两】 白术 麻黄【去节】

细辛【去苗】 甘草【炒各二两】 枳壳【制】

乾姜【炮各一两半】

右剉散每服三钱煎服

桂苓汤治血分前证

辣桂 赤茯苓 当归

川芎 赤芍药 蓬莪术

京三棱 槲 苍术【炒】

桑白皮【炒】 大腹皮 瞿麦穗

青皮 陈皮 甘草【炒各半两】

葶苈 大黄【湿纸煨各一分】

右剉散每服三钱姜五片煎服

平肺汤肺与肾皆以至陰积水喘嘈嗽咳盖水乘之

葶苈【微炒】 桑白皮【炒】 北梗

枳壳【制】 紫苏茎叶 半夏【制各一两】

麻黄【去节三分】 甘草【炒半两】

右剉散每三钱姜五片煎服治肾水用青木香圆

青龙汤治表不解有水气发热乾呕怔忡咳 微喘微利

麻黄【去节】 细辛 芍药

乾姜【炮】 甘草【炒】 辣桂【各三两】

五味子【二两】 半夏【制二两半】

右剉每服三钱水一盏半煎一盏温服

十枣汤治表解里有水身凉汗出乾呕短气微 微利胸下痞满引脇硬痛

芫花【炒】 大戟 甘遂【等分】

右件异筛 末合和入乳鉢研良久以肥枣十个擘开用水一碗煮烂取汁一盏调药壮者服一钱重弱者服半钱重平旦温服别用枣汤漱下通利即以糜粥自养未利明日再服半钱请酌量用

安肾圆治肾气不足膀胱虚冷

川乌【炮去皮脐】 辣桂【各四两】 茯苓

白术 石斛【酒炒】 白蒺藜【炒去刺】

巴戟 苁蓉【酒浸焙】 桃仁【去皮尖微炒】

萆薢 山药 破故纸【炒各十二两】

右末炼蜜圆如桐子每五七十圆盐汤空心服

青木香圆行滞通水

青木香【五两】 萆薢 澄茄 补骨脂【炒】

诃榔【炒各十两】 牵牛【六十两炒香捣取末三十两】

右为末滴水圆菉豆大每二十圆熟水下

五皮散治皮肤水气【方见诸气类】

二和散和畅三焦治痞胀浮肿【方见诸气类】

消饮圆

茯苓 乾姜【炮各三两】 白术【八两】

枳实【炒半两】

右末炼蜜圆桐子大每十五圆米饮下

倍术圆

白术【四两】 辣桂 乾姜【炒各二两】

右为末炼蜜圆桐子大每服二十圆米饮下此二药可以温中消水

呕吐

呕吐方论

呕吐出於胃气之不和人所共知也然有胃寒有胃热有痰水有宿食有脓血有气攻又有所谓风邪入胃凡是数者可不究其所自来哉寒而呕吐则喜热恶寒四肢凄清法当以刚壮温之热而呕吐则喜冷恶热烦燥口乾法当以温凉解之痰水证者唾沫怔忡先渴後呕与之消痰逐水辈宿食证者胸腹胀满醋闷吞酸与之消食去积辈腥气燥气熏炙恶心此脓血之聚经所谓呕家有痈脓不须治脓尽自愈是尔七情内郁关隔不平此气攻之证经所谓诸郁干胃则呕吐是尔若夫风邪入胃人多不审率用参术助之栏住寒邪於此尤关利害其或恶闻食臭汤水不下粥药不纳此则翻胃之垂絶者也辩之不早其何以为对治乎虽然足阳明之经胃之络脉也阳明之气下行则顺今逆而上行谨不可洪固也然呕吐者每每大便秘结上下壅遏气不流行盍思所以区画而利导之他如汗後水药不入口者逆呕而脉弱小便复利身微热而手足厥者虚寒之极也识者忧焉

呕吐证治

附子理中汤治寒证呕吐【方见寒类】

二姜汤治寒证呕吐

良姜 生白姜【各半两】 木香

丁香【各二钱半】 甘草【炙一钱半】

右剉散每服三钱水盏半煎半食前服

吴茱萸汤治冷涎呕吐陰证乾呕通用

吴茱萸【沸汤泡洗三次焙炒】 生姜【各一两半】

人参【三分】 大枣【五个】

右剉细每服四钱水盏半煎半食前服

小柴胡汤多加生姜治热证呕吐【方见血类】 人参须依分两用或加乌梅亦得

大半夏汤治痰证呕吐

半夏【制剉二两】 人参【四钱切片】

右每四钱姜七片蜜少许熟煎服

小半夏茯苓汤治水气呕吐【方见水饮门】 金匱云呕家用半夏以去其水水去则呕止

治中汤治食证呕吐

人参 白术 乾姜【炒】

甘草【炙】 青皮 橘红【等分】

右剉每服三钱枣一枚煎服积聚大便秘者加大黄二菴子许

二陈汤【方见壅类】 加缩砂丁香治宿食呕吐

地黄汤治脓血呕吐

生地黄【洗焙】 川芎【各一两】 半夏【制】

甘草【炙各三分】 南星【荡洗七次】 芍药

白芷 茯苓 北梗

前胡 知母 人参【各半两】

右剉每服三钱半姜五片乌梅一个煎服

加减七气汤治气郁呕吐

半夏【制二两半】 人参 辣桂

厚朴【制各一两】 茯苓【一两半】 甘草【炙半两】

右剉散每三钱半姜七片枣一枚煎服加木香亦得

藿香正气散治风邪入胃呕吐

半夏麴 川厚朴【制各三两】 藿香叶

橘红【各一两】 甘草【炙七钱】

右剉散每三钱姜七片枣一枚食前煎服又养胃汤【方见寒类】通用

木香豆蔻散治翻胃呕吐

人参 木香 肉豆蔻【面裹煨各半两】 白豆蔻仁【一分】 甘草【炒一钱半】

右麴末每三钱姜枣煎服

参橘汤治翻胃

人参 真橘红 石莲肉【各半两】 透明乳香【一钱半】

右末每一钱姜汤点服

丁香煮散治翻胃呕逆

丁香 石莲肉【各十四枚】 北枣【七枚截碎】

生姜【七片】 黄粳米半合洗

右水碗半煮稀粥去药取粥食之

附子散治弱证翻胃

大附子【一枚作两截中心各剜小孔入丁香四十九粒塞满以竹针插合置塶上炭火煨四

围淬姜汁半碗再淬再淬以尽为度去皮切焙】

右并末每一钱半粟米一捻北枣二个煎食前服

养正丹大治停寒留饮聚涎翻胃呕吐【方见病冷门】添姜煎二陈汤下

呕吐家多大便秘结虚冷者用灵砂或养正丹温而利之又苏合香圆【方见 门】用四分感应圆【方见胀满门】用六分夹研作细圆姜汁泡沸汤下此亦温利若大便热结用蜜煮凝捻作指铤纳後部导之或用獾猪胆一枚取汁入法醋少许以笔蘸滴灌於後部或烧皂角於桶内熏谷道或用连根葱白一握汉椒五十粒捣细作饼焙热和轻粉掩脐续以葱椒煎汤熏荡身下

翻胃方

橘皮汤治翻胃呕吐

真橘皮【用日照西方壁土炒香取橘皮为末】

右每二钱姜枣略煎服

连子散治翻胃

右石莲肉为末入些肉豆蔻末米汤乘热调服二方患痢禁口通用

温胃散治久冷翻胃

附子【一个生去皮脐分作四块生姜半斤水一大碗慢火同煮至半盞取附子切焙】

右为末每一钱空心温米汤调下

附诸方

加味二陈汤治停痰气结而呕

半夏【泡】 陈皮【各五两】 白茯苓【三两】

甘草【炙一两半】 砂仁【一两】 丁香【五钱】

生姜【三两】

右?咀每服一两水煎服

附膈噎

膈噎方论

能饮食而能便下无斯病矣饮食不下而便稍秘则膈噎成焉皆由恚忧气结思虑伤脾以致津液枯澹而饮食不能下下则便秘不通复而上行也内经曰三阳结谓之膈子和云三阳者大小肠膀胱也结谓热结也小肠热结则血脉燥大肠热结则不能圉膀胱热结则津液涸三阳既结则前後闭澹不通必反而上行所以噎食不下纵下而复出也此阳火不下推而上行也故经又曰少阳所致为呕涌溢食不下此理明矣严氏曰五噎五膈者由喜怒不常七情伤於脾胃郁而生痰痰与气搏升而不降饮食不下盖气留於咽嗑者则成五噎结於胸膈者为五膈五噎之名忧思劳食气也五膈之名忧恚寒热气也其病令人胸膈痞闷呕逆噎塞妨碍饮食夫喜怒忧郁内伤脾肺肝气愈盛痰火上升血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水饮可行食物难入间或可入入亦不多名之曰噎其槁在下与胃为近食虽可入难尽入胃良久复出名之曰膈又曰翻胃所因不同病出一體其病始有吞酸吐酸吐痰出沫痞塞嘈杂等证医者不察病原妄投峻剂愈耗真元久则脾胃渐虚血液枯澹以致传导失常便秘不通治尤难矣良可叹哉治法宜养血生津清痰降火润气补脾抑肝开郁治宜枳术二陈汤降火以炒黄芩黄连清痰以竹沥姜汁开郁以神麴香附润气以杏子麻仁燥以白蜜乳汁血虚以当归地黄之类其间倘服燥热过多津液枯澹肠胃燥结尿如羊矢者不治丹溪云年高者不治无血故也不守戒忌厚味房劳之人亦不可治张鸡峰曰噎是神思间病惟内观自养可治此一言深中病情可不信哉

秘传枳术二陈汤治痰气食膈呕吐痰涎翻胃嘈杂白术【泔洗剉土炒一钱】 黑枳实【麸炒】 陈皮【去白各八分】 茯苓【去麤皮】 香附子【童便浸炒】 半夏【汤泡七次各一钱】 黄连【姜汁炒】 ?榔【鸡心者】 白荳蔻【各五分】 青皮【麸炒】 吴茱萸 生甘草【各三分】

右?咀用水一鍾半姜三片枣一枚煎八分食远服气虚者加人参黄芪血虚者加当归地黄郁加神麴抚芎

秘传半夏厚朴汤治翻胃吐痰胸满肋痛嘈杂吐涎半夏【汤泡七次】 厚朴【姜汁制】 山梔【去皮炒黑】

川黄连【姜汁炒各一钱】 广陈皮【去白八分】

茯苓【去麤皮八分】甘草【生用三分】黑枳实【麯炒一钱】苍术【泔浸炒八分】

泽泻 香附子 青皮【各五分】

当归 白芷【各六分】

右?咀用水一钟半姜三片煎八分不拘时服

瓜蒌实圆【和剂方】治膈噎胃膈痞痛彻背脇喘急妨闷瓜蒌实【去殼别研】
枳殼【去穰麯炒】半夏【汤泡七次】

桔梗【炒各一两】

右为细末姜汁米糊为丸如梧桐子大每服五十丸生姜汤送下

人参利膈丸【东垣方】治膈噎胸中不利大便结燥痰喘满脾胃壅滞推陈致新治膈气之圣药也

木香?榔【各七钱半】人参

当归 藿香 甘草

枳实【麯炒黄各一两】大黄【酒湿蒸熟】厚朴【姜制一两】

右为细末滴水为丸如梧桐子大每服五十丸温水下

五膈寬中散治七气留滞饮食不下谷胀气胀通用撞气阿魏圆治五种噎疾九般心痛痞癖气块冷气攻刺【并见诸气门】

参苓白术散治脾胃虚弱不能运化

白术和胃丸

八珍汤治证同前

寬中进食丸滋形气美饮食【已上并见调理脾胃门】

保和丸消食开胃【方见积聚门】

橘杏麻仁圓治噎膈大便燥結

橘皮【炙】 杏仁【去皮尖】 麻仁【去殼各三兩】 郁李仁【去殼五錢】

右除陳皮為末三仁俱搗成膏用棗仁去核以石柏內三味搗和丸如梧桐子大每服五六十丸煎枳實湯送下食前服

謹按膈噎翻胃之証皆由七情太過而動五臟之火薰蒸津液而痰火益盛脾胃漸衰飲食不得流利為膈為噎為翻胃也矣丹溪云年高者不治蓋年少之人氣血未虛用藥劫去痰火調其脾胃病不復矣年老之人氣血已虛用藥劫去痰火雖得暫愈其病立復所以然者氣虛則不能運化而生痰血虛則不能滋潤而生火也又云此証切不可用香燥之藥而厚滋味蓋証屬熱燥固不用香燥之藥香能散氣燥能耗血而滋味助火而生痰也有等庸工但見斯疾不察病因便以峻劑投入而取刻效圖以厚賄不思病危復而不救可不嘆哉

附痞滿

痞滿方論

丹溪云痞者有食積兼濕東垣有法有方心下痞須用枳實炒黃連如稟受充實面蒼骨露氣實之人而心下痞者枳實黃連青皮陳皮枳殼如稟受素弱轉運不調飲食不化而心下痞者宜白朮山查神麴麥芽陳皮如肥人心下痞者乃有實痰宜蒼朮半夏砂仁茯苓滑石瘦人心下痞乃是溫熱在中焦宜枳實黃連葛根升麻如食後感寒飲食不化心下痞宜藿香草豆?吳茱萸砂仁痞挾血成窠?用桃仁紅花香附大黃之類難知云傷寒痞者從血中來從外之內從無形雜病痞者亦從血中來從內之外從有形故無形以苦泄之有形以辛散之又有虛實之殊如實痞大便秘厚朴枳實主之虛痞大便利芍藥陳皮主之飲食所傷而為痞滿者當用藥消導其胸中窒塞欲吐者則宜吐之有氣不運化及陰虛損血者以補虛之劑調之但世俗不明此理往往例用峻快藥下之復痞或致危篤者多矣

活人桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗 枳殼【去穰炒各三兩】

右剉水二盞煎至一盞去滓分作二服

半夏瀉心湯治汗下後身寒痞滿而嘔飲食不下

半夏【半升洗】 黃芩 乾姜

人參【三兩】 黃連【一兩】 大棗【十二枚】

甘草【三两炙】

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升温服一升日三服

仲景大黄黄连泻心汤治心下痞

大黄【二两】 黄连【一两】

右剉以麻沸汤二升渍之须臾绞去滓分温再服

黄连消痞丸【拔粹方】

黄连【炒一两半】 黄芩【炒三两】 枳实【一两一钱】

乾生姜【三钱】 茯苓 白术【炒】

甘草【炙各五钱】 片姜黄【一钱半】 陈皮【七钱半】

泽泻【一钱】 半夏【泡一两三钱半】 猪苓【五钱】

砂仁【三钱半】 厚朴【制五钱】

右为末蒸饼丸如梧子大每服一百丸温白汤送下

消痞丸【拔粹方】

黄连【六钱炒】 神麴【炒五钱】 黄芩【刮黄色六钱】

姜黄 白术【各一两】 人参【四钱】

甘草【炙二钱】 缩砂仁【三钱】 橘皮【四钱】

乾生姜【二钱】 枳实【麸炒黄色五钱】 猪苓【二钱半】

一方加泽泻厚朴【各三钱】 半夏【汤泡七次五钱】

右为细末汤浸蒸饼为丸如梧子大每服五七十丸白汤下

枳实消痞丸

枳实 黄连【各五钱】 乾生姜【二钱】

半夏麴【三钱】 厚朴【四钱】 人参【三钱】

甘草【炙二钱】 白术【三钱】 茯苓

麦芽【各二钱】

右为末水浸蒸饼丸如梧子大每服三十五丸温水下

橘连枳术丸

白术【三两去梗】 枳实【一两去穰麸炒】 陈皮

黄连【酒浸炒各一两】

右为末荷叶煮汤打米糊为丸如梧子大每服五十丸食後服

橘皮枳术丸【脾胃论】治老幼元气虚弱饮食不消臟腑不调心下痞闷

枳术丸【脾胃论】治痞消食强胃【并见内伤门】

瓜蒌实丸【济生方】治胸痞痛彻背脇喘急妨急【方见膈噎门】加味补中益气汤治内伤心下痞【方见内伤门】

有痰而痞加半夏黄连四肢满闭便难而心下痞加柴胡黄连甘草大便秘燥加黄连桃仁少加大黄当归心下痞腹胀加五味子砂仁芍药呕逆者加黄连生姜陈皮冬月加黄连丁香藿香食已心下痞别服橘皮枳术丸如不能食心下痞者勿加止服本方主之

附嘈杂

嘈杂方论

丹溪云嘈杂是痰因火动治痰为先姜汁炒黄连入痰药用炒山梔子黄芩为君南星半夏陈皮为佐热多加青黛嘈杂此乃食郁有热炒山梔姜炒黄连不可无肥人嘈杂二陈汤少加抚芎苍术白术炒山梔子嘈杂若湿痰气郁不喜食三补丸加苍术倍香附子医按蒋氏子条云心嘈索食白术黄连陈皮作丸白汤下七八十丸数服而止又云眩运嘈杂是火动其痰二陈汤加梔子芩连之类戴云此则俗谓之心嘈也

二陈汤【方见痰类】 三补丸【方见补损门】

附吞酸

吞酸方论

内经云诸呕吐酸皆属於热又云少阳之胜呕酸原病式云酸者肝木之味也由火胜制金不能平木则肝木自甚故为酸也如饮食热则易於酸矣是以肝热则口酸也或言为寒者但谓伤生冷硬物而喜噫醋吞酸故俗医主於温和脾胃岂知人之伤於寒也则为病热盖伤寒皮毛则腠理闭塞阳气怫郁而为热故伤寒热在表以麻黄汤热药发表使腠理开通汗泄热退而愈也凡内伤冷物者或即陰胜阳而为病寒或寒热相搏而致肠胃阳气怫郁而为热亦有内伤冷物而反病热得汗泄身凉而愈也或微而吐为中酸俗谓之醋心法宜温药散之亦犹解表之义若久喜酸不已则不宜温之宜以寒药下之後以凉药调之结散热去则气和也所以中酸不宜食粘活油腻者谓能令气郁不通畅也宜食粝食采蔬能令气通利也

丹溪云或曰吐酸素问明以为热东垣又言为寒何也予曰吐酸与吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平时津液随上升之气郁积而成郁积之久湿中生热故从火化遂作酸味非熟而何其有郁积之久不能自涌而出伏於肺胃之间咯不得上咽不得下肌表得风寒则内热愈郁而酸味刺心肌表温煖腠理开发或得香热汤丸津液得行亦可暂解非寒而何素问言热者言其本也东垣言寒者言其末也但东垣不言外得风寒而作收气立说欲泻肺金之实又谓寒药不可治酸而用安胃汤加減二陈汤俱犯丁香且无治湿热郁结之法为未合经意予尝治吞酸用黄连茱萸各炒随时令迭其佐使苍术茯苓为辅佐汤浸炊饼为小丸吞之仍告以粝食蔬菜自养则病易安

藿香安胃散【方见脾胃门】

加減二陈汤治痰饮为患呕吐头眩心悸或因食生冷脾胃不和

丁香【一两】 半夏 陈皮【各五两】

茯苓【三两】 甘草【一两半】

右?咀每服四钱水煎入生姜三片煎服

麴术丸治中脘宿食留饮酸蜚心痛或口吐清水神麴【炒三两】 苍术【泔浸炒一两半】 陈皮【一两】

右为末生姜汁煮神麴为丸每七十丸姜汤下

黄连清化丸

黄连【一两】 吴茱萸【浸炒一钱】 桃仁【二十四个研】 陈皮【半两】
半夏【一两半】

右为末神麴糊丸菉豆大每服百丸姜汤下

丹溪经验方

茱萸【一两去枝梗煮少时顷半日晒乾】 陈皮

苍术【米泔浸】 黄连【陈壁土炒去土秤】 黄芩【如上土炒】

桔梗 茯苓【各一两】

右为末神麴糊丸菉豆大每服二三十丸时时津液下食後服

附六郁

六郁方论

郁者六气血食痰湿热结聚不得发越当升不得升当降不得降者是也丹溪云血气冲和百病不生一有怫郁诸病生焉故人身诸病多生於郁或久病而生郁矣戴氏曰气郁者胸脇疼痛脉沉而澁血郁者四肢无力能食便红脉沉虬结食郁者噎酸腹饱不喜饮食人迎脉平气口紧盛痰郁者动则喘息寸脉沉滑湿郁者周身走痛或关节疼痛遇陰寒而发脉沉细缓热郁者瞋闷尿赤脉沉而数内经曰五郁者金郁泄之谓渗泄解表於小便也木郁達之谓吐之令其条達也水郁拆之谓抑之制其冲逆也火郁发之谓汗之令其疎散也土郁夺之谓下之无壅碍也此所谓六郁者或七情之郁遏或寒热之交侵故为九气怫郁之候或雨湿之侵袭或酒浆之积聚故谓留饮湿郁之疾热郁而成痰痰郁而成癖血郁而成症食郁而成痞满此必然之理也丹溪治六郁方法

气郁

香附【童便浸】 苍术【米泔浸】 抚芎

湿郁

白芷 苍术 川芎

茯苓

痰郁

海石 香附 南星【姜制】

瓜蒌【一本无南星瓜蒌有苍术川芎梔子】

热郁

山梔【炒】 青黛 香附

苍术 抚芎

血郁

桃仁【去皮】 红花 青黛

川芎【抚芎亦可】 香附

食郁

苍术 香附 山楂

神麴【炒】 针砂【醋炒七次研极细】

诸郁春加芎夏加苦参秋冬加吴茱萸

凡药在中焦以苍术抚芎开提其气以升之假令食在气上气升则食降余仿此

越麴丸

神麴【炒】 香附【童便浸一宿】 苍术

川芎 越梔【炒各等分】

右为细末水丸菉豆大每服五七十丸温水下

六郁汤解诸郁

陈皮【去白一钱】 半夏【汤泡七次】 苍术【米泔浸】

抚芎【各钱】 赤茯苓 梔子【炒各七分】

香附【二钱】 甘草【炙半钱】 砂仁【研细五分】

右细切作一服加生姜三片水二盏煎至一盏温服○如气郁加乌药木香?榔紫苏乾姜倍香附砂仁○如湿郁加白术倍苍术○如热郁加黄连倍梔子○如痰郁加南星枳壳小皂荚○如血郁加桃仁红花牡丹皮○如食郁加山楂神麴麦蘖麴

升发二陈汤治痰郁火邪在下焦大小便不利此药能使大便润而小便长

陈皮【去白】 抚芎 茯苓【各一钱】

半夏【一钱半】 升麻 防风

甘草 柴胡【各五分】

右细切作一服加生姜三片水一盏半煎至一盏温服

升阳散火汤治热郁【方见火门】

火郁汤【方见积热门】

仁斋直指卷七

卷八

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷八 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

咳嗽

咳嗽方论

江流滔滔日夜无声狂澜激石不平则鸣所以咳嗽者痰塞胸膈气逆不平冲击而动肺耳然亦何以致此哉曰感风伤冷挟热受湿淤血停水与夫肺实肺虚皆能壅痰而发嗽也夫肺为娇脏外主一身之皮毛内为五臟之华盖形寒饮冷最易得寒燥气郁蒸最易生热惟其易为冷热所以内外交侵动则邪气窒塞矣此非不平而鸣乎感风者鼻塞声重伤冷者凄清怯寒挟热为焦烦受湿为纒滯瘀血则膈间腥闷停水则心下怔忡或实或虚痰之黄白唾之稀稠从可知也治嗽大法肺脉浮为风邪所客以发散取之肺脉实为气壅内热以清利行之脉濡散为肺虚以补肺安之其间久嗽之人曾经解利以致肺胃俱冷饮食不进则用温中助胃加和平治嗽等辈至若酒色过度虚劳少血津液内耗心火自炎遂使燥热乘肺咯唾脓血上气涎潮其 连续而不已惟夫血不荣肌故邪在皮毛皆能入肺而自背得之尤速此则人参芎归所不可无一种传注病涉邪恶五臟反尅毒害尤深近世率用蛤蚧天灵盖桃柳枝丹砂雄黄安息香苏合香圆通神之剂然则咳 证治於此可以问津索途矣抑犹有说焉肺出气也肾纳气也肺为气之主肾为气之藏凡咳嗽暴重动引百骸自觉气从脐下逆奔而上者此肾虚不能收气归元也当以补骨脂安肾圆主之母徒从事於寧肺○诸气诸痰咳嗽喘壅之烦须用枳殼为佐枳殼不惟寬中又能行其气气下痰下他证自平

咳嗽证治

华盖散治肺感风寒痰壅咳

麻黄【去节】 紫苏子【炒】 杏仁【去皮尖炒】

橘红 桑白皮【炒】 赤茯苓【各一两】 甘草【炙半两】

右细剉每服二钱半姜枣煎食後服随意加制半夏添姜煎

加減麻黃湯治肺感寒邪咳嗽

麻黃【去節一兩】 辣桂 甘草【炙各半兩】

杏仁【五十枚去皮尖微炒別研】 陳皮

半夏【制各半兩】

右細剉拌和杏仁每三錢紫蘇三葉姜四片煎服

溫肺湯治肺虛感冷咳 嘔吐痰沫

乾姜 辣桂 甘草【炙】

半夏【制】 陳皮 北五味子

杏仁【去皮尖各一兩】 細辛 阿膠【炒各半兩】

右麤散每二錢半姜枣煎服

三物湯治寒燠不常暴 喘急鼻塞痰壅

麻黃【不去節】 杏仁【不去皮尖各一兩】 甘草【不炙半兩】

右剉散每二錢半姜五片煎服

金沸草散治上壅熱嗽

荊芥穗【二兩】 旋覆花【去梗】 麻黃【去節】

北前胡【各一兩半】 半夏【制】 赤芍藥

甘草【炒各半兩】

右細剉每二錢半加炒葶苈半錢姜四片煎服如咽喉焦燥加朴硝食後又治傷風鼻塞涕流壅 若聲啞嗽不止兼服人參欬花膏

人參欬花膏

欵冬花 紫苑茸【洗去土炒用】 人参

北五味子 桑白皮【炒等分】

右为末炼蜜圆小弹大含化一圆或淡姜汤嚼下若身热口乾兼服天麻防风圆

天麻防风圆

人参 天麻 防风【各一两】

全蝎【炒】 直僵蚕【炒各半两】 朱砂【研】

雄黄【研】 甘草【炙各一两】 牛黄【一钱】

麝【一字】

右细末炼蜜圆桐子大每二圆紫苏薄荷汤嚼下

清肺饮治肺气上热咳

前胡 荆芥 桑白皮【炒】

甘草【炙】 枳殼【制各三分】 知母

贝母【去心炒】 脑荷 赤茯苓

北梗 紫苏 阿胶【炒】

杏仁【去皮】 天门冬【去心各半两】

右剉散每三钱姜三片乌梅一枚食後煎服如更内实与解毒雄黄圆【方在积热门】

黄连阿胶圆治肺热或咯血

黄连【淨三两】 赤茯苓【二两】 阿胶【炒一两】

右黄连茯苓同末水调阿胶和衆手圆桐子大每三十圆食後米饮下黄连赤茯苓能抑心火则肺得其清

不换金正气散治伤温咳嗽【方见寒类】加赤茯苓生乾姜煎服

大阿胶圆治肺虚客热咳嗽咯血呕血

阿胶【炒热】地黄【淨】白茯苓

北五味子 山药【各一两】贝母【去心炒】

百部 栝子仁 茯神

丹参 杜仲【去麤皮剉炒】麦門冬【去心各半两】

远志【浸去心炒】人参 防风【各一分】

右细末炼蜜圆弹子大每一圆少水略煎食後临卧服或金沸草散加脑荷煎汤嚙下凡 药不效觉胸膈腥闷乃宿血乘肺黑豆入紫苏生姜煎汁与之

桑皮散治上焦有热壅血腥闷嗽声连并气不得透

脑荷 北梗 川芎

防风 桑白皮【炒】黄芩

北前胡 柴胡 紫苏

赤茯苓 枳殼【制各一分】甘草【炙一分半】

右剉细每三钱姜枣煎服或吃梨亦可

小青龙汤治表证水气身热嗽喘乾呕怔忡十枣汤治里有水气身凉咳痞满脇痛药证【方见水饮門】

真武汤治少陰肾证水饮与里寒合而作 腹痛下利

白茯苓 白术 白芍药【各一两】熟附子【半两】

右剉散每二钱半加生乾姜细辛五味子各半钱姜三片食前服凡年高气弱久嗽通用仍间服养正丹

补肺汤治肺虚气乏久

阿胶【炒】 真苏子 北梗

半夏【制】 甘草【炙各半两】 欵冬花

紫苑 细辛 杏仁【去皮焙】

陈皮 桑白皮【炒】 青皮

缩砂仁 五味子 石菖蒲

草果【各一分】

右剉散每三钱姜四片紫苏三叶煎服

理中圆补肺止寒

人参 乾姜 白术

甘草【炙等分】

右末炼蜜圆弹子大每一圆加炒阿胶五味子煎服

加味理中汤治肺胃俱寒咳嗽

人参 白术 乾姜【不炒】

甘草【炙】 半夏【制】 茯苓

橘红 细辛 北五味子【等分】

右细剉每服二钱半姜枣煎食前服曾经解利者还用

养胃汤【方见寒类】 人参欵花膏【方见前】 二药兼服治肺胃俱寒作 或煎人参饮嚼
下大阿胶圆亦可

人参饮咳嗽痰壅通用

人参 北梗 半夏麴

五味子 细辛 枳殼【制】

赤茯苓 杏仁【不去皮各一分】 甘草【炙半分】

右细剉每三钱姜五片乌梅半个食後煎服

养肺汤治肺壅上气痰嗽

人参 紫苑 赤茯苓

杏仁【不去皮】 真苏子 陈皮

桑白皮【炙】 欵冬花 半夏麴

北梗 甘草【炙等分】

右为麴末每三钱姜四片乌梅半个食後煎服寒者加桂

寧嗽汤诸嗽通用

桑白皮【炒】 紫苏 细辛

北五味子 橘皮 半夏【制】

茯苓 杏仁【去皮】 缩砂仁

枳殼【制】 北梗 甘草【炒等分】

右剉散每三钱姜四片乌梅半个食後煎服

人参润肺散治咳嗽喘急痰壅鼻塞

麻黄【去节】 杏仁【去皮麴炒】 贝母【去心麴炒各一两】

人参 阿胶【炒】 甘草【炙各半两】

橘红 北梗【各一分】

右麤末每二钱半紫苏三叶煎服亦能发散小儿通用

冷嗽寒痰方橘皮半夏汤大七气汤夹和每三钱姜七片枣二个同煎吞白圆子三十粒

加味半夏茯苓汤治痰多咳嗽

半夏【制二两半】 茯苓【一两半】 陈皮

五味子【各一两】 人参 细辛

甘草【炙各半两】

右剉散每四钱姜七厚片煎服

南星散治风气动痰发嗽

生南星【一两】 枳殼【制】 细辛【各半两】

木香 甘草【炙各一分】

右?咀每服三钱姜七厚片慢火熟煎服

人参芎归汤治虚劳少血津液内耗心火自炎燥热乘肺咳 咯血及血不荣肌动辄毛寒咳嗽

当归 川芎 白芍药【各二分】

人参 半夏【制】 橘皮

赤茯苓 阿胶【炒】 细辛

北五味子 甘草【炙各一分】

右剉每服三钱姜四片枣二个煎服

人参芎归汤大阿胶圆【方见前】 兼服治肾虚劳嗽

人参胡桃汤夹和定肺汤【方见喘门】 治劳气喘急

七宝散治肺痿劳嗽久嗽

人参 款冬花 鍾乳石

鵲管石【并生研】 胡矾【煅各二钱】 辣桂

甘草【各一钱】

右细末临卧以少许咽下两次

黄耆建中汤【方见湿门】加半夏麴生乾姜五味子同煎空心吞安肾圆【方见水饮门】
治肾经虚寒咳嗽痰唾而色黯黑小腹动气作痛

消脓饮治肺有痈脓腥气上冲呕吐咳

生南星【一两】 知母 贝母【去心炒】

生地黄 阿胶【炒】 川芎

桑白皮【炒】 甘草【炙各三分】 防风

射干 北梗 天门冬【去心】

脑荷 杏仁【不去皮】 半夏【制】

紫苏叶 白芷 白及【各半两】

右剉散每四钱姜七片乌梅一个食後煎服

雄黄散治传疟劳嗽肺管有虫令人喉痒

雄黄 安息香【各一分】 露蜂房【去子烧灰】 桃仁【去皮炒各二分】 麝【少许】

右为末每用一钱生艾叶入生蜜研汁夹和临卧含化仍烧艾以管子吸烟熏喉

苏合香圆

安息香【二两别为末用无灰酒一升熬膏】 苏合香油【一两入安息膏

内】白术丁香

青木香 白檀香 沉香

萆拔 香附【淨】 苟子【煨取肉】

乌犀【镑屑】 朱砂【研末飞各二两】 薰陆香

龙脑【研各一两】 麝香【一两半】

右为细末入研药拌和用安息香膏并炼白蜜和剂每一大圆沸汤化下前气血风类後诸痛
呕逆类并用此

咳逆方

苏合香圆用丁香柿蒂煎汤调下

噫逆即咳逆胃寒所致也良姜为要药人参白茯苓佐之良姜温胃能解散胃中风邪

安肾圆【方见诸虚门】凡咳嗽暴重觉气从脐下逆奔而上者盖肾虚气不归元补骨脂安
肾圆主之

附诸方

参苏饮治上膈有热咳嗽声重【方见伤风门】

五物汤【澹疗方】治风寒咳嗽肺气喘急

麻黄【不去节】 杏仁【不去皮】 甘草【生用】

荆芥穗 桔梗【各等分】

右?咀姜三片同煎温服咽痛甚者煎热後加朴硝少许一方去桔梗荆芥用半夏枳实等分

人参荆芥散【济生方】治肺感风邪上壅咳 头目不清言语不出咽乾项强鼻流清涕

陈皮【去白】 荆芥穗 桔梗

半夏【汤洗七次】 细辛【洗去土】 甘草【炙】

人参 杏仁【去皮尖】 通草

麻【去根节】

右?咀每服四钱水盞半姜五片煎八分食後温服

消风百解散【和济方】治咳 声重身热头疼【方见伤风门】 加減三奇汤【东垣方】
治咳嗽上气喘促胸膈不利

枳梗 陈皮 甘草

青皮 人参 紫苏

桑白皮【各五钱】 半夏【七钱】 杏仁【三钱】

五味子【四钱】

右?咀每六七钱入姜煎服

加減泻白散【东垣方】治陰气在下阳气在上咳嗽呕吐喘急

桑白皮【一两】 地骨皮【七钱】 陈皮

青皮 五味子 人参【各五钱】

白茯苓【一钱】

右?咀每服半两水煎入粳米二十粒

人参五味子散【圣惠方】治男女老稚诸虚百损气血劳伤涎喘欬脓或嗽咯血寒热往来
夜有盜汗羸瘦困乏一切虚损

人参 五味子 桔梗

白术 白茯苓 甘草【炙】

熟地黄 当归【焙半两】 地骨皮

前胡【去苗】 桑白皮【炒】 枳殼【去穰炒】

黄芪【炙】 陈皮【去白】 柴胡【各三钱】

右?咀每服八钱水一盞半生姜三片煎至八分去滓温服食後服日三次烦渴加乌梅青嵩煎
咳脓血加知母阿胶煎尤妙

诸般嗽不已

栗殼【制】 乌梅【去核】 陈皮【去白】

人参【去芦】 木香 五味子

桔梗【炒】 杏仁【去皮尖炒】 石膏

甘草

右?咀每服八钱薑水二盞煎至八分去滓温服食後

止 烟筒方

冬花蕊 鷺管石 雄黄

艾叶【各等分】

右为末用帛卷筒内用火点烟入口内吞下就用水吞一口以塞烟气立効

加味人参紫苑散治虚劳咳嗽

大寧嗽汤劳 诸 通用神効【并见虚劳门】

咳 治例【出明医杂着】

王节斋曰咳谓有声肺气伤而不清 谓有痰脾湿动而生痰咳 者因伤肺气而动脾湿也
病本虽分六气五臟之殊而其要皆主於肺盖肺生气而声出也须分新久虚实新病风寒则
散之火热则清之湿热则泻之久病便属虚属郁气虚则补气血虚则补血兼郁则开郁滋之
润之敛之降之则治虚之法也

主方

杏仁【去皮尖】 白茯苓【各一钱】 橘红【七分】

五味子 桔梗 甘草【各五分】

春作多上升之气宜润肺抑肝加川芎芍药半夏【各一钱】麦门冬【炒】黄芩知母【各五分】

春若伤风致欬鼻流清涕宜辛凉解散加防风薄荷紫苏炒黄芩麦门冬【各一钱】

夏多火热炎上最重宜清金降火加桑白皮知母炒黄芩麦门冬石膏【各一钱】

秋多湿热伤肺宜清热泻湿加苍术桑白皮【各一钱】防风黄芩山梔【各五钱炒】

冬多风寒外感宜解表行痰加麻黄桂枝半夏生乾姜防风【各一钱】肺经素有热者再加酒炒黄芩知母【各五分】若发热头疼鼻塞声重再加藁本川芎前胡柴胡【各一钱】

若有痰加半夏枳壳风痰再加南星【姜汁炒】湿痰脾困少食加白术苍术有痰而口燥咽乾勿用半夏南星宜加知母【蜜水拌炒】贝母瓜蒌仁黄芩【炒】

若夏月热痰或素热有痰加黄芩黄连知母石膏上半日欬者胃中有火加贝母石膏黄连五更嗽者同治

黄昏欬者火浮於肺不宜正用寒凉药宜加五味子诃子皮斂而降之

若咳嗽久肺虚益气补血加人参黄芪阿胶当归生姜天门冬欬冬花马兜铃酒芍药之类肺热咳喘去人参用沙参此兼补气血也

若午後欬者属陰虚即劳嗽也宜补陰降火如川芎当归芍药熟地黄黄柏知母竹沥姜汁天门冬瓜蒌仁贝母此专补陰血也

若火郁嗽谓痰郁火邪在中宜开郁消痰用诃子皮炒香附瓜蒌仁半夏麴海石青黛黄芩为末蜜调为丸噙化仍服前补陰降火汤药失治则成劳

若痰积食积作咳嗽者用香附瓜蒌仁贝母海石青黛半夏麴软石膏山楂子枳实姜炒黄连为末蜜调噙化

若劳嗽见血加阿胶当归芍药天门冬知母贝母桑白皮亦於前肺虚陰虚二条择用大抵咳嗽见血多是肺受热邪气得热而变为火火盛而陰虚不得安寧从火上升故治宜泻火滋陰忌用人参等甘温补气之药然亦有气虚而咳血者则宜用人参黄芪欬冬花之药但此等证不多耳

因咳而有痰者欬为重主治在肺因痰而致欬者痰为重主治在脾但是食积成痰痰气上升以致欬嗽只治其痰消其积而欬自止不必用肺药以治嗽也

针灸法风门二穴【在背二椎下各开寸半】肺俞二穴【三椎下各寸半】三里二穴【见前】

附肺痿肺癰

肺痿方论

金匱曰热在上焦者因欬为肺痿得之或从汗出或从呕吐或从消渴小便利数或从便难又被快药下利重亡津液故得之寸口脉数其人欬口中反有浊唾涎沫者为肺痿若口中辟辟燥咳即胸中隐隐痛脉反滑数此为肺癰欬唾脓血脉数虚者为肺痿数实者为肺癰欬伤肺叶成也丹溪云宜补血养肺养气清金虚者用人参平肺散治之

紫苑散【拔粹方】治咳嗽唾中有脓血虚劳证肺痿变癰

人参 桔梗 茯苓【各一钱】

知母 贝母【各一钱半】 紫苑

甘草 阿胶【炒各五分】 五味子【十五粒】

右?咀水煎服一云各等分水二盏生姜三片煎至一盏食前服

人参平肺散【拔粹方】治心火剋肺传为肺痿咳嗽喘呕痰涎壅盛胸膈痞满咽噎不利

桑白皮【炒一两】 知母【七钱】 甘草【炙】

地骨皮【各半两】 青皮 五味子【三百个】

茯苓 人参【各四钱】 陈皮【去白半两】

天门冬【去心四钱】

如热加黄芩【四钱】 紫苏叶半夏【各半两】

右?咀每服五钱水二盏生姜三片煎至八分去滓温服或为末姜汁丸弹子大噙化亦得食後

知母茯苓汤【宣明方】治肺痿喘嗽不已往来寒热自汗

茯苓甘草【炙各一两】知母

五味子人参【去芦】薄荷

半夏【洗七次】柴胡【去苗】白术

款冬花桔梗麦门冬【去心】

黄芩【各半两】川芎阿胶【各二钱炒】

右?咀每服一两水二盏生姜十片煎至一盏去滓通口服食後

生姜甘草汤【千金方】治肺痿咳唾涎痰不止咽燥而渴生姜【五两】人参【二两】
甘草【四两】

大枣【十五枚】

右四味以水七升煮取三升分温三服

七宝散治肺痿劳嗽久嗽【方见前咳嗽门】

保和丸【葛氏方】治劳嗽肺成痿者服之决効

润肺膏【葛氏方】治久肺燥成痿【并见劳瘵门】

葶历大枣泻肺汤治肺痈喘不得卧

葶历【熬令黄色捣丸如弹子大】大枣【十二枚】

右先以水三升煮枣取二升去枣内葶历煮取一升顿服

桔梗汤【金匱方】治欬而胸满振寒脉数咽乾不渴时出浊唾腥臭久久吐脓如米粥者为肺痈

桔梗【二两】甘草【二两】

右二味以水三升煮取一升分温再服则吐脓血也

桔梗汤【济生方】治肺痛咳嗽脓血咽喉多渴大小便赤澀桔梗【去芦】
贝母【去心膜】当归【去芦酒浸】

瓜蒌子 枳殼【去穰麸炒】薏苡仁【炒】

桑白皮【蜜水炙】防己【各二两】黄芪【去芦一两半】甘草节【生用】
杏仁【去皮尖麸炒】百合【蒸各半两】

右?咀每服五钱水盞半生姜五片煎八分不拘时服如大便秘加大黄小便赤少加木通

消脓饮治肺痛脓腥气上冲而呕欬嗽【方见前咳嗽门】

针灸法肺俞二穴【穴法见前】膻中一穴【在两乳相系玉下一寸六分又名元儿仰取之】

喘嗽

喘嗽方论

肺主气也一呼一吸上升下降荣卫息数往来流通安有所谓喘惟夫邪气伏藏痴涎浮涌呼不得呼吸不得吸於是上气促急填塞肺脘激乱争鸣如鼎之沸而喘之形状具矣有肺虚挟寒而喘者有肺实挟热而喘者有水气乘肺而喘者有惊忧气郁肺胀而喘者又有胃络不和喘出於阳明之气逆真元耗损喘生於肾气之上奔如是等类皆当审证而主治之肺虚肺寒必有气乏表怯冷痰如水之证法当温补如官桂阿胶之类是也肺实肺热必有壅盛胸满外閼上炎之状法当清利如桑白皮葶苈之类是也水气者漉漉有声怔忡浮肿与之逐水利小便如小半夏茯苓汤五苓散辈惊忧者惕惕闷闷引息鼻张与之寛中下气如四七汤桔梗枳殼汤辈阳明之气下行今逆而上行古人以通利为戒如分气紫苏饮指迷七气汤加半夏二陈汤加缩砂施之为当真阳虚惫肾气不得归元固有以金石镇坠助阳接真而愈者然亦不可峻骤且先与安肾圆八味圆辈否则人参煎汤下养正丹主之雄黄麻黄马兜铃汉防己鸡内金诸品非不主喘也如前治法大要究其受病之原至若伤寒发喘表汗里下脚气喘满疏导收功此则但疗本病其喘自安圆机之士可以举隅而反矣虽然喘有利下而愈者亦有因泻而殂者喘有数年沉痾而复瘳者亦有忽因他疾大喘而不救者汗出髮润喘者为肺絶身汗如油喘者为命絶直视譫语喘满者不治诸有笃病正气欲絶之时邪气盛行多壅逆而为喘然则喘之危恶又安可以寻常目之

喘 证治

九宝汤经年喘嗽通用常服屡效

麻黄【去节】 橘红 脑荷【各一两】

辣桂 紫苏 桑白皮【炒】

杏仁【去皮尖】 大腹子【连皮】 甘草【炙各半两】

右细剉每服三钱姜五片乌梅一个水煎食後临卧服或入童子小便半盞同煎尤妙

定肺汤治上气喘嗽

紫苑茸 北五味子 橘红

杏仁【去皮尖略炒】 甘草【炙】 真苏子【炒】

桑白皮【炒】 半夏【制】 枳殼【制等分】

右细剉每三钱姜五片紫苏五叶食後煎服

调降汤治喘嗽

枳殼【制一两】 半夏【制】 北梗

青皮 陈皮 真苏子

诃榔 茯苓 葶苈【隔纸炒各半两】

木香 白豆蔻仁 缩砂仁

紫苏叶【各二钱半】 甘草【炙三分】

右剉散每三钱姜五片煎服

杏苏饮治上气喘嗽浮肿

紫苏叶【二两】 五味子 大腹皮

乌梅肉 杏仁【去皮尖各一两半】 陈皮

北梗 麻黄【去节】 桑白皮【炒】

阿胶【炒各三分】 紫苑 甘草【炒各一两】

右?咀每三钱姜五片煎服

五味子汤治寒喘

北五味子 杏仁【去皮麸炒】 橘红【各一两】

麻黄【去节一两半】 甘草【炙】 生乾姜

辣桂【各半两】

右麤末每服二钱半苏三叶煎服肺虚加炒阿胶喘甚加马兜铃

人参胡桃汤治肺虚发喘气乏

人参【一寸拣者】 胡桃肉【二个去壳不去皮】

右切碎姜钱五片枣二枚食後临卧煎服盖人参定喘带皮胡桃歛肺夷坚志方

三物汤【方见咳嗽门】 寒证喘者加生乾姜辣桂热证喘者加葶苈脑荷煎毕入朴硝少许

玉华散清肺定喘

甘葶苈【焙香】 桑白皮【炒】 天门冬【去心】

马兜铃 半夏【制】 紫苑

杏仁【去皮尖】 贝母【炮】 百合

人参【各半两】 百部 甘草【炙各一分】

右剉散每服二钱半姜四片大枣三枚煎服

小青龙汤【方见水饮门】 本方去麻黄加杏仁去皮三两治水气喘嗽若小腹满更加茯苓

郁李仁圆治水气乘肺动痰作喘身体微肿

葶苈【隔纸炒】 杏仁【去皮尖】 防己

郁李仁【炒】 真苏子 陈皮

赤茯苓【各半两】

右末炼蜜圆桐子大每三四十圆食後生姜紫苏汤下

神秘汤治水气作喘

陈皮 北梗 紫苏

人参 五味子 榔

桑白皮【炒】 半夏【制】 甘草【炙等分】

右剉散每服三钱姜五片煎服

小半夏茯苓汤五苓散【方见水饮门】

四七汤治惊忧气遏上喘

半夏【制二两半】 茯苓【二两】 厚朴【制一两半】

紫苏叶【一两】

右咀每服三钱半姜七片枣二枚煎服

桔梗枳殼汤指迷七气汤分气紫苏汤【方见气门】

二陈汤【方见疟类】

安肾圆【方见水饮门】 八味圆养正丹【见痼冷门】 治肾虚上喘凡肾虚而喘须以人参为佐

五灵圆治久喘

木香【半两】 马兜零【去殼炒】 葶苈【微炒各一分】 川五灵脂【二两】

右为细末炼蜜圆桐子大每二十圆杏仁三个搥碎姜三片煎汤下

雄黄圓至誠修合治喘

雄黄【研】 白矾【煨】 木香

生葶苈【各一分】 马兜零【去殼】 鸡内金

淡豆?【各三钱半】 信砒【鋒芒莹者研生研一钱半】

右八味各取实分数并细末研米浆煮糊圆如胡椒大每服五圆茶清稍冷临卧送下加至七圆而止次日饮食勿用热菉豆生嚼解砒霜毒

控痰良方【方见痰饮门】 治喘

虚劳喘 眩运方

灵砂【一两研细】 人参 木香【各二钱半】

大香附【拚净】 大红川椒【去合口并子焙出汗各半两】

右细末糕糊圆麻子大每服二十圆空心食前橘皮汤下【川椒引气归元】

附诸方

苏沉九宝汤【简易方】 治老人小儿素有喘疾遇寒暄不常发则连绵不已咳嗽哮喘夜不得睡

桑白皮 甘草 大腹皮

麻黄 官桂 薄荷

陈皮 紫苏 杏仁【各六分】

右?咀每服三钱水盞半姜三片乌梅半个煎六分服

五味子汤【活人方】 治喘促脉伏而数者

五味子【五钱】 人参 麦门冬【去心】

杏仁【去皮尖】 生姜 陈皮【各一钱半】

枣子【三枚】

右?咀作二服每服水二盞煎至一盞食後溫服

四磨湯治七郁結上氣喘急

人參?榔 沉香

烏藥

右件各濃磨水和煎三五沸溫服

千縉湯治痰喘不能卧人扶而坐一服即安

半夏【七个剉泡七次】 甘草【炙一寸】 生姜【一指】

皂角【一寸】

右?咀作一服水煎

丹溪治痰喘方

南星 半夏 杏仁

瓜蒌仁 香附 陈皮【去白】

皂角灰 萝卜子

右为末神麴糊为丸每服六七十丸姜汤下

五虎湯治喘急痰氣

麻黃【七分】 杏仁【去皮尖一錢】 甘草【四分】

細茶【炒八分】 白石膏【一錢五分】

右作一服白水煎

○風寒傷而喘者三拗湯華蓋散神秘湯可選而用之○象云止喘氣促以天門冬人參黃耆

为主

针灸法璇玑一穴【在天突下一寸】气海一穴【在脐下一寸半】三里二穴

声音

声音方论

心为声音之主肺为声音之门肾为声音之根风寒暑湿气血痰热邪气有干於心肺者病在上脘随证解之邪气散则天?鸣矣惟夫肾虚为病不能纳诸气以归元故气奔而上咳嗽痰壅或喘或胀髓虚多唾足冷骨痿胸腹百骸俱为之牵制其嗽愈重其气愈乏其声愈乾君子当於受病之处图之可也按钱氏方小儿吐泻利其小便过多以致脾虚不受钱用益黄散作效数日以後忽尔不语钱知其脾气已复肾气尚虚投以地黄圆益肾相继数剂於是能言余益信声音之根出於肾也不诬矣○诸病不语或声乾沉难以痊复余见活人總括小儿疳瘕见小儿类

声音证治

星姜饮治风邪风毒纏喉不语

南星【略炮半两】 生姜【四钱】 橘皮【三钱】

右剉每服三钱紫苏五叶煎服

荆苏汤失音通用

荆芥 苏叶 木通

橘红 当归 桂

石菖蒲

右等分剉煎四钱服

金沸草散人参欬花膏兼服治伤风鼻塞涕流壅嗽声哑热证通用【方见嗽门】

二物汤治风寒邪气留滞失音

辣桂【半两】 石菖蒲【二钱】

右剉每服二钱半新水煎细呷

归荆汤治风痙口噤不语项强背直身腰反张【方附在湿门】小柴胡汤治伏暑发热汗渴暑入心胞不语【方见血类】加茯苓煎

不换金正气散【方见寒类】加石菖蒲治湿证声哑加桂治寒证声哑

三因七气汤【方见气类】加枳壳甘草治气隔声沉

犀角地黄汤治血证心忪语短眩冒迷忘

生地黄【四两净】犀角 牡丹皮

芍药【各半两】

右剉每服四钱入桃仁去皮尖七粒煎服如无犀角以升麻代

朱砂圆治打扑惊忤血入心窍不语【方见血类】

二陈汤【方见症类】加石菖蒲煎吞白圆子【方见身疼类】治痰证声沉

金花散治失音亦治喉痹

槐花新瓦上炒香热三更後床上仰卧随意食之热证通用

密陀僧散治大惊入心痰血窒塞瘖不能言亦治瘖风【方见惊悸门】

治?桃仁汤治狐惑虫食其臆上唇疮其声哑

桃仁【浸去皮焙】槐子 艾叶【各一两】

大枣【十五枚】

右用水三盏煎至一盏半分三次服

人参平补汤治肾虚声不出

人参 川芎 当归

熟地黄【洗晒】 白芍药 白茯苓

兔丝子【酒浸烂研细】 北五味子 杜仲【去麋皮剉姜汁制炒去丝】

巴戟【酒浸去心晒】 橘红 半夏麴【各半两】

牛膝【酒浸焙】 白术 补骨脂【炒】

葫芦巴【炒】 益智仁 甘草【炙各二钱半】 石菖蒲【一钱半】

右剉细每服三钱姜五片枣二枚令煎吞山药圆七十粒【方见漏浊门】 五更头肾气开不得咳唾言语默然再进上药功效胜常

杏仁煎治咳 暴重声音不出

杏仁【水浸去皮研膏】 冬蜜 砂糖

姜汁【各一盞】 桑白皮【去赤炒】 木通

贝母【去心各一两半】 北五味子 紫苑茸【各一两】 石菖蒲【半两】 欵冬花蕊

右後六味剉以水五升煎半去滓入杏姜糖蜜夹和微火煎取一升半每服三合两日夜服之

木通汤治诸风失音

木通 石菖蒲 防风

羌活 桑螵蛸 全蝎【焙】

直僵蚕【炒】 甘草【炙各一分】 圆白南星【略炮半两】

右剉每服二钱半紫苏五叶姜五片热煎服

附诸方

诃子汤治失音不语

诃子【四个半生半煨】 桔梗【一两五钱半生半炒】 甘草【二寸一寸生一寸熟】

右为粗末分二贴每贴水一盞童便一盞煎至八分去滓食後温服

玉粉圓治冬月寒痰結於咽喉不利语音不出鍼经云寒气客於会厌卒如瘕宜服此药

桂心 草乌【各一字】 半夏【汤洗五钱】

右为细末姜汁浸蒸饼为丸如鸡头大每服一丸至夜含化多年不愈者亦効

响圣破笛丸治歌讴失音不语者宜服神効

连翹 桔梗 甘草【各二两半】

薄荷【四两】 诃子肉【炒】 砂仁

大黄【各一两】 川芎【一两半】 白药煎【二两】

右为细末鸡子清和为丸如弹子大每用一丸临卧嚙化服

一方治失音不语

百药煎 杏仁【去皮尖】 百合

诃子肉 薏苡仁【各等分】

右为末以鸡子清和圆如弹子大每用一圆临卧嚙化

仁斋直指卷八

卷九

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷九 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

虚劳

虚劳方论

蒙庄有言精太用则竭神太劳则惫借是可以论病矣夫人所以根本此性命者气与血也若男若女气血均有独不能保而有之终日役役神倦力疲饥饱越常喜怒失节形寒饮冷纵慾恣情遂使五臟气血俱虚此五劳之所从始也六极七伤类焉故心家虚则便浊汗多肝家虚则筋挛目眩肾家虚则腰痛泄精肺家虚则咳嗽閤热脾胃虚则呕吐不食日就羸黄或乃胃热消谷饮食虽多亦不生肌肉而转加瘦悴矣前此数证其间大抵心下引脇俱疼盖滯血不消新血无以养之也治法大要潮热者不可过用寒凉秘结者不可骤与疎泄嗽喘者不可妄施发散咯血者不可错认以为热但以滋养荣血为上调平脏气次之某病某药又於养血调气之中而增益也其或骨间有热以至四肢缓弱不举此则骨痿欲斯疾之有瘳也艰哉虽然当归地黄黄耆芍药固养血之上药也亦当以益胃消痰辈佐之盖人以谷气为本所谓精气血气由谷气而生古人以五味五谷五药养其病者不无先後於其间也当归地黄恋膈引痰黄耆芍药多则伤胃是可胶柱调瑟而剂量轻重之不审乎抑余闻诸虚不足皆成劳倦此可疗不可恶之疾也其视传症一种实霄壤焉传症者挟邪精鬼怪之气而作也经曰人有逢年月之厄感鬼神之精无处不恶沉默而不能的知所苦积岁渐至委顿既往侵传症於傍人须用通神明去恶气等剂疗之或者剗麝剗犀驱伐邪恶飞丹炼石引纳清和盖为尸症设也前集咳 中亦略陈之

又论

劳倦之疾百脉空虚非滋润粘膩之物以养之不能实也古方用鹿鱼胶阿胶牛乳饴糖酥酪煎蜜人参杏仁当归熟地黄之类正此意耳或者妄施伏火金石附子燥热等辈以致血气乾涸心肾不交故火炎於上为痰 为咯血为口乾为五心热水走於下为脚弱为遗精为赤白浊为小便滑数误矣哉虚劳之脉大低多弦或浮大或数皆虚劳之候也大者易治血气未定可斂而正也弦者难治血气已耗未易调补之若带双弦则为贼邪侵脾此尤难治加数剂则殆矣○灸劳法膏肓二穴可以回生或肚脐相对取背脊骨对正灸亦有验艾炷亦不可多

虚劳证治

十补汤【方见痼冷门】虚劳通用嗽加北五味子痰加半夏发热加柴胡有汗加牡蛎虚寒加乾姜皆依元药分两稍不喜食则勿用

双和汤五劳六极七伤通用

白芍药【二两半】 当归 川芎

黄耆【蜜炙各一两】 熟地黄【洗酒蒸】 辣桂

甘草【炙各三分】

右麤末每服三钱姜枣煎食前服或入二陈汤同煎

地骨皮散治虚劳潮热骨蒸壮热

地骨皮【洗】 秦艽【洗去芦】 柴胡

枳殼【制】 知母【生】 当归

鳖甲【醋炙黄各半两】 川芎【半两】 甘草【炙一分】

右麤末各服三钱桃柳枝各七寸姜三片乌梅一个同煎空心临卧各一服潮热甚加些大黄微利之

枳殼散治虚劳大便秘澁

枳殼【五两制】 甘草【炙一两半】 加杏仁【去皮炒】 阿胶【炒酥】
生地黄【各一两】

右细剉每服三钱姜五片蜜三匙乌梅一个同煎空腹服

加味人参紫苑散治虚劳咳嗽

人参 北五味子 紫苑茸

陈皮 贝母【去心】 紫苏叶

桑白皮【炒】 白茯苓 杏仁【去皮炒】

甘草【炙各三分】 加川芎 半夏麴【各一两】 阿胶【炒酥半两】

右麴末每服三钱姜七片枣二枚乌梅一个食後煎服

大阿胶圆【方见嗽门】治虚劳嗽血咯血前血类紫苏汤豆苏汤薏苡汤人参汤咳嗽门用人参饮皆可煎汤嚼下肺热加脑荷桑白皮天门冬

人参芎归汤治虚劳少血肺热嗽血【方见咳嗽门】

地黄饮治骨蒸劳热咯血

生地黄捣汁入生姜汁少许服之以热退为度或利则止

大寧嗽汤劳嗽诸嗽通用神效

北五味子 茯苓 桑白皮【炒】

紫苏 细辛 橘皮

枳殼【制】 杏仁【去皮炒】 阿胶【炒酥】

甘草【炙】 罌粟殼【去筋萆截寧蜜酒炒热各一分】

半夏【制二分】

右剉散每服三钱姜五片枣二枚乌梅半个食後煎服劳嗽多加川芎

远志圆治虚劳惊悸神气不寧

远志【姜汁腌取肉焙】 茯神【去木】 黄蓍【炙】

熟地黄【洗】 人参【各一两】 石菖蒲【半两】

当归【三分】

右末粟米糊圆桐子大每二十圆米饮下

龙齿汤治心怔惊悸常怀忧惧如人将捕小便或少或多或浊

半夏【制】 辣桂【各二两】 人参

白茯苓 甘草【炙】 当归

龙骨【研】 北梗【炒】 远志【水浸取肉炒】 枳壳【制各一两半】 黄蓍【蜜炙】
茯神【去木各一两】

右末每三钱姜五片枣二枚粳米百粒食前煎服

养心汤吞十四友圆治虚劳少血心虚多惊精神恍惚【方见惊悸门】

辰砂妙香散治虚劳心气不平小便腻浊【方见疸门】

麝香鹿茸圆治劳损虚冷精血不足【方见痼冷门】

集验鹿茸圆治诸虚劳倦补养心肾滋益血气

鹿茸【酥炙】 熟地黄 当归【酒浸焙】

枸?子 酸枣仁【慢火炒去皮】 远志【姜汁腌取肉焙】

附子【炮】 沉香 牛膝【酒浸焙】

山药【炮】 苁蓉【酒浸焙各一两】 麝【半两】

右末炼蜜圆桐子大每五十圆空心盐汤下

还少丹补虚劳益心肾生精血

山药【炮】 牛膝【酒浸焙】 白茯苓

山茱萸 舶上茴香【炒各一两半】

续断 兔丝子【洗酒浸烂研焙】 杜仲【去麤皮姜汁涂炙截炒】 巴戟【去心】
苁蓉【酒浸焙】 北五味子

楮实 远志【姜汁腌取肉焙】 熟地黄【各一两】

右末炼蜜圆桐子大每三十圆盐汤下

黄耆十补汤补虚劳养血气

黄耆【蜜炙】 当归【酒浸焙】 熟地黄【洗】

茯神【各半两】 白芍药【一两】 人参

白术 酸枣仁【微炒】 半夏【制】

陈皮 北五味子 肉桂

天台乌药 甘草【炙】 麦门冬【去心各一分】

木香 沉香【各一钱】

右剉每服三钱姜五片枣二枚食前煎服

鹿茸大补汤补虚损益气血

人参 北五味子 当归

白术 白茯苓 熟地黄【洗】

白芍药 黄耆【炙】 甘草【炙】

阿胶【炒酥】 续断【洗】 半夏【制】

山药【炮】 石斛 酸枣仁【浸去皮焙】 栝子仁【略炒各一两】 远志【酒浸取肉焙】
川白姜【生各三分】 辣桂【半两】 鹿茸【二两去皮毛酥炙黄】

右细剉每服三钱半姜四片枣二枚食前煎服

黄耆六一汤治虚劳自汗

黄耆【炙六钱】 甘草【炙一钱】 加白术

白芍药【各三钱】

右麤末每服二钱姜枣煎服

当归散治虚汗盗汗

人参 当归【各一分】

右麤末分两服以雄猪心一个新水煮熟取汁两次煎药空心临卧服

沉香鳖甲散治虚劳肢节疼痛【方见身疼类】

参苓白术散治虚劳胃弱饮食不进

人参 白茯苓 白术

甘草【炒】 山药【炮各二两】 白扁豆【制一两半】

缩砂 桔梗【炒】 莲子肉

薏苡仁【各一两】

右末每二钱枣姜略煎服治中汤【方见呕吐门】 人参开胃汤【方见脾疼门】 二陈汤【方见疟类】 可择用

桃仁煎治劳瘵传尸骨蒸倦弱

大川椒【出汗】 生犀角 当归

续断【各一两】 桃仁【去皮炒】 鳖甲【醋炙黄各一两半】

蛤蚧【一对去头足洗酥炙】 木香 白矾【煨】

猪牙皂角【各半两】 安息香 苏合香

雄黄【各一分】 麝【一钱】

右末炼蜜圆桐子大每二十圆米饮下或用正川椒泡汤下

神授圆治传尸劳瘵最杀劳虫

正川椒【色红而大者去合口并子以黄杆纸二重托之於热炉内类拨令出油取顿地上用砂盆盖以火灰遮密四围约一时许】

右碾末老酒浸白糕为糊圆桐子大每服三四十圆食前盐汤下逐时常服满一斤瘵疾自瘵昔人服之日久取下劳虫如小蛇状即瘵此药亦治痹辣桂煎汤下治腰痛茴香酒下治肾冷盐汤下神妙

烧发方治劳瘵

生发烧存性为末水调空心服此亦用枕骨之意苏合香圆【方见诸气门】皆要药也

黄耆益损汤治诸虚劳倦

肉桂 熟地黄 半夏【制】

甘草【炙各三分】 石斛【酒炒】 当归

川芎 黄耆【炙】 白术【各一两】

白芍药【一两半】 北五味子【半两】 木香【三钱半】

右剉细每服三钱姜五片枣二枚食前煎服有热加柴胡

附诸方

补陰圆【明医杂着】论曰人之一身陰常不足阳常有余况节慾者少过慾者多精血既亏相火必旺火旺则陰愈消而劳瘵欬嗽咯血吐血等证作矣故宜常补其陰使与阳齐则水能制火而水升火降斯无病矣故丹溪先生发明补陰之说谓专补左尺肾水也古方滋补药皆兼补右尺相火不知左尺原虚右尺原旺若左右平补依旧火胜於水只补其左制其右庶得水火俱平也右尺相火固不可衰若果相火衰者方宜补火但世之人火旺而致病者十俱八九火衰成疾者百无二三且人在少年肾火正旺似不必补然慾心正炽妄用太过至於中年慾心虽减然少年斷丧既多焉得复实及至老年天真渐絕只有孤阳故补陰之药自少以至老不可缺也丹溪先生发明先圣之旨以正千载之讹其功甚哉今立补陰丸方备加减法於後

黄栢【去皮酒拌炒褐色】 知母【去皮毛酒拌炒忌铁各三两】

琐阳【酥炙乾二两】

败龟板【酸炙透三两】熟地黄【酒拌蒸忌铁五两】五味子【一两】
枸?子【甘州者】天门冬【去心】

白芍药【酒炒各二两】乾姜【炒紫色三钱寒月加至五钱】

右为细末炼净蜜和入猪骨髓三条和药末杵极匀丸如梧子大每服八九十丸空心淡盐汤送下寒月可用温酒

若有梦遗精滑病者加牡蛎【童便煅七次】白术【各一两】山茱萸【去核】椿根白皮【炒过各七钱】

若有赤白浊病者加白术白茯苓【各二两半】山梔仁黄连【各炒各五钱】

若有软弱无力者加牛膝【酒洗二两】虎胫骨【酥炙透二两】防己【酒浸洗】木瓜【各五钱】

若有疝气病加苍术【盐炒一两半】黄连【生姜汁炒】山梔子仁【炒各六钱】川芎【一两】吴茱萸【炒】青皮【去穰各五钱】

若脾胃虚弱畏寒易泄者加白术【三两】陈皮【一两】乾姜【炒加至七钱】

若眼目昏暗者加当归【酒洗】川芎菊花【各一两】柴胡黄连【酒炒】乌犀【各五钱】蔓荆子防风【各三钱】

若兼气虚之人加人参黄芪【蜜炙各二两】

若左尺既虚右尺亦微命门火衰阳事不举加黑附子【小便浸泡去皮】肉桂【去皮各七钱】沉香【五钱】

加减补阴丸

熟地黄【八两】兔丝子【四两盐酒浸一宿】

当归【三两酒浸】白芍【三两炒】琐阳【三两酥炙】

杜仲【二两炒】牛膝【四两酒浸】破故纸

枸?【一两半】虎骨【二两酥炙】龟板【三两酥炙】

黄栢【二两炒】 山药 人参

黄芪【各二两】 冬加乾姜【一两】

右为末猪骨髓入蜜丸梧子大空心服一百丸盐汤下

虎潜丸治痿与补肾丸同

黄栢【半斤酒炒】 龟板【四两酒炙】 知母【三两酒炒】

熟苳 陈皮 白芍药【各二两】 琐阳【一两半】 虎骨【一两炙】 乾姜【半两】

右为末酒糊丸或粥丸一方加金箔一片一方用生地黄懒言语加山药加炒黄栢知母炙龟板各等分乾姜三分之一酒糊丸名补血丸一方无乾姜冬月方加有当归一两半熟苳比前多一两余同

六味地黄丸【金匱方】治形體瘦弱无力多困肾气久虚久新憔悴寝汗发热五脏齐损遗精便血消渴淋浊等证妇人血虚无子者服之有效

乾山药 山茱萸肉【各四两】 泽泻【去毛】

牡丹皮【去心】 白茯苓【去皮各三两】 熟苳【八两】

右为末炼蜜为丸如梧子大每服五六十丸空心白汤下寒月温酒下如肾虚有饮作痰唾生姜汤下

八味丸治肾气虚乏下元冷惫脐腹疼痛夜多旋溺脚膝缓弱肢體倦怠面皮痿黄或黧黑及虚劳不足渴欲饮水腰重疼痛小腹急痛小便不利【方见痼冷门】

山药丸【和剂方】治诸虚百损五劳七伤肌體消瘦耳聋目暗常服壮筋骨益肾水【方见漏浊门】

四君子汤【和剂方】补气和胃进食

白术 人参 茯苓

甘草【各等分】

右?咀水煎服

四物汤【和剂方】 补血和血调经

当归 白芍药 芍药

地黄【妇人用生男子用熟】

右?咀水煎服

八物汤平补气血调和陰阳

白术 人参 茯苓

甘草 白芍 当归

地黄 川芎

右?咀水煎服

黄芪建中汤【和剂方】 治男子妇人诸虚不足羸乏少力此汤药大生血气补益荣卫【方见虚汗门】

人参养荣汤治男妇血虚短气痿弱有汗潮热等证

人参 白术 茯苓

甘草【炙】 川归 黄芪

肉桂 白芍药【炒】 远志【去心】

五味子 熟地黄 陈皮【各等分】

右?咀水二鍾姜三片煎服

加味补中益气汤治动作劳倦可服

人参【一钱】 黄芪【七分】 甘草【四分】

白术【一钱】 当归【酒洗一钱二分】 陈皮【去白一钱】

柴胡【去芦五分】 升麻【三分】 麦门冬【七分制去心】 天花粉【五分】
黄栢【七分酒盐炒】 黄芩【五分酒浸】

右?咀用水二锺煎至一锺去滓温服

加味虎潜丸治诸虚不足腰腿疼痛行步无力壮元阳滋肾水

熟地黄【酒洗八两】 黄栢【蜜炒褐色】 人参

黄芪【蜜炙】 当归【酒洗】 破故纸【炒】

锁阳【酒洗】 龟板【酥炙】 茯苓【各二两】

杜仲【酥炙断丝】 牛膝【酒洗】 兔丝子【酒浸蒸】 知母【酒炒】
虎胫骨【酥炙各二两】 山药【炒】

枸?子【炒】 芍药【酒炒各三两】

右为细末炼蜜和猪脊髓为丸如梧桐子大每服五六十丸空心盐汤送下好酒亦可乾物压之

济陰圓

黄栢【二两七钱盐酒拌炒】 龟板【炙一两三钱五分】 陈皮【七钱】

当归【一两酒浸】 知母【一两酒炒】 虎骨【七钱酥炙】

琐阳【一两】 牛膝【一两三钱半】 山药

白芍 砂仁 杜仲【炒断丝】

黄芪【盐水炒各七钱】 熟苻【七钱】 枸?子【五钱】

故纸【三钱半炒】 兔丝子【酒浸一两一钱半】

右为末以地黄膏为丸如梧子大每服七十丸

人参固本圓【简易方】夫人心藏血肾藏精精血充实则须髮不白顔貌不衰延年益壽其天阙者多由服性热之药不能滋生精血也而药之滋补精血者无出於生熟二地黄世人徒

知服二地黄而不知服二门冬为引也盖生地黄能生心血用麦门冬引入所生之地熟地黄能补肾精用天门冬引入所补之地四味互相为用本草又以人参为通心气之主故宜加焉生地黄 熟地黄【各酒洗浸】 天门冬【去心酒浸】

麦门冬【去心酒浸各二两】 人参【一两】

右为末炼蜜为丸如梧子大每服五十丸空心温酒淡盐汤任下如有痰者生熟地黄各用姜汁炒过恐泥隔故也

三才封髓丹降心火益肾水

天门冬【去心】 熟地黄【酒洗】 人参【各五钱】

黄栢【炒褐色三两】 砂仁【一两半】 甘草【七钱半一方无】

右为末水糊丸如梧子大每服五十丸用苁蓉半两切作片子酒一盏浸一宿次日煎三四沸去滓空心送丸子

固真丹治诸虚百损五劳七伤水火不升下元虚冷脐腹疼痛

人参【一两】 乾山药【一两半炒】 当归【酒浸】

黄芪【炒】 黄栢【炒】 白术【各一两】

杜仲【酒炙炒断丝】 补骨脂【炒各一两】 五味子【半两炒】 泽泻【半两】 白茯苓 牡丹皮

山茱萸【肉各一两】 熟地黄【四两汤头阑膏於石臼内捣如泥】

右前药为极细末和地黄膏拌匀却入炼蜜为丸如梧桐子大每服八九十丸空心淡盐汤送下腰腿无力加牛膝一两酒炒败龟板一两半酥炙夏天服加桂半两脉弱食少再加附子半两【炮】

沉香大补丸专治下焦虚弱补益元气久服身轻體健五臟调和血脉通泰功效甚妙

黄栢【四两酒浸炒褐色】 知母【一两半酒浸焙】 熟地黄【酒浸二两】

芍药 陈皮【去白】 牛膝【酒浸】

锁阳【酒浸】 当归【酒浸各一两】
败龟板【酥炙二两】 虎胫骨【酥炙七钱半】 山茱萸【肉一两】 山药

沉香 白茯苓 牡丹皮

杜仲【酥炙】 泽泻 大茴香【各一两】 人参【二两】

右件各要制度如法晒乾碾为细末酒煮黑羊羔肉熬为膏去骨内加猪脊髓二寸再加火熬和药为丸如梧桐子大每服四五十丸空心温酒送下乾物压之

仙传班龙圆蜀中有一道人童顏漆发眉宇疎秀自歌曰尾闾不禁沧海竭九转神丹都漫说惟有班龙顶上珠能补玉堂关下穴仙人许仲远得受其方道人曰吾饵此药今壽四百二十三岁缘汝有仙骨故此相授言讫化白鹤飞去许仙後传於世此药理百病养五臟补精髓壮筋骨益心志安魂魄令人悦泽驻顏轻身延年益壽久服成地仙矣

鹿霜【十两】 鹿胶【十两】 兔丝子【十两酒浸一日蒸焙

乾为末】 栝子仁【十两去壳净另研】

熟地黄【十两酒浸一宿蒸焙乾为末】

右为细末先将鹿胶用无灰酒於磁器内慢火化开却将胶酒煮糊和杵二千下丸如梧子大每服四五十丸空心盐汤下或酒亦可

煮炼鹿霜胶法

用新鹿角三对每对各长二寸截断长流水浸三日刷去垢每一斤用楮实子一两桑白皮黄芩各二两以铁锅器内以水煮三昼夜鱼眼汤慢火煮不可断火常添热汤不可添冷水毋令露角三日取出角削去黑皮薄切晒乾碾为末即成鹿霜也

右将煮鹿角汁滤去滓如熬胶法同却以慢火熬倾磁盆内候冷凝切作片陰乾成胶

经验养荣丸治男妇气血两虚精神短少脾胃不足形體羸乏

白术【土炒】 黄芪【蜜炙】 芍药【酒炒】

远志【甘草略煮去心各一两半】 当归身【酒洗】

山药 熟地黄【酒洗】 五味子

人参【去芦各一两】 白茯苓【二两】 山茱萸【去梗】

生地黄【酒洗各五钱】 陈皮【泡八钱】

右为细末用鸭一只取血入蜜炼和前药为丸如梧桐子大每服八十丸白盐汤送下寒月盐酒送下○如咳嗽加麦门冬贝母紫苑款冬花各一两热加黄栢知母各一两遗精带浊加牡蛎一两真龙骨五钱吐衄血腥加牡丹皮赤芍药各一两

秘传大补元圆治男妇诸虚百损五劳七伤形体羸乏腰背疼痛遗精带浊

黄栢【蜜炒褐色】 知母【乳汁浸炒】

龟板【酥炙各三两】 淮熟地黄【酒洗五两】 牛膝【酒洗】 麦门冬【去心】

肉苁蓉【酒洗】 虎胫骨【好酒炙】 淮山药

茯神【去心】 黄芪【蜜炙各一两半】

杜仲【去粗皮好酒炒断丝】 枸?子【甘州者佳】 何首乌【篋刮去皮】

人参【去芦各二两】 当归身【酒洗】 天门冬【去心】 五味子【去枝核】

淮生地黄【酒洗各一两】 白芍药【酒炒二两冬月只用

一两】 冬加乾姜【五钱炒黄色】

紫河车一具一名混沌皮即今之胞衣【取初产者为佳如无初产者或壮盛妇人胎者亦可取一具用线吊於急流水中漂一昼夜去其污浊血系取起再用净米泔水一碗许於小罐内微火煮一沸取出勿令泄气再用小蓝一个四围用帛密糊将河车安於蓝内用慢火烘乾为末入前药】

右共为极细末炼净蜜入猪脊髓三条和前药杵匀丸如梧桐子大每服八十丸空心淡盐汤下寒月可用温酒送下○如梦遗白浊加牡蛎一两白术山茱萸各一两五钱茯苓二两

秘传当归膏治五劳七伤诸虚劳极脾胃虚弱养血和中滋荣筋骨养陰抑阳

当归【酒洗一斤六两】 生地黄【一斤酒洗】

熟地黄【三两酒洗】 薏苡仁【八两米粉同炒】 白芍药【一斤粉炒】

白茯苓【十二两】 白术【一斤】 莲子【四两去心】 山药【五两】

人参【四两加洗用】 甘草【三两】 枸?子【一斤四两甘州者佳】 贝母【三两去心】

地骨皮【四两】 麦门冬【五两去心】 天门冬【二两去心】 五味子【一两】

琥珀【一钱二分】

右各细剉和足以水十斤微火煎之如再加水十斤如此四次如法滤去滓取汁文武火煎之渐加至三分後以文武火煎之如法为度每斤加炼熟净蜜四两春五两夏六两共熬成膏如法吐血加牡丹皮二两骨蒸加青蒿汁二碗童便二碗劳痰加锤乳粉一两

秘传远志养心丹治心虚手振

生地黄【酒洗】 远志【甘草汤煮去心】 当归【酒洗】

甘草【炙各一两五钱】 栝子仁 酸枣仁【各三两】

川芎 人参【去芦各一两】 茯神【去木七钱】

半夏【姜汁泡七次】 南星【炮】 朱砂【研末为衣已上各五钱】 麝香【一钱】
石菖蒲【六钱】 琥珀【三钱】

真金箔【二十片】

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大每服四五十丸津唾咽下痰用姜汤送下

茯苓补心汤治心虚耗不藏精血以致面色黄悴五心烦热咳嗽唾血及妇人怀妊恶阻呕吐亦服之

人参 茯苓 陈皮

桔梗 枳壳 前胡

川芎 地黄 川归

芍药 甘草【减半】 半夏

紫苏 乾葛【各等分】

右?咀水二盏姜三片枣一枚煎服

平补镇心丹【和剂方】 治心血不足时或怔忡夜多异梦如堕层崖常服安心肾益荣卫

白茯苓【去皮】 五味子【去梗】 车前子

茯神【去皮木】 肉桂 麦门冬【各一两二钱半】 远志【去心甘草汤煮两半】 天门冬 山药【洗姜制】

熟苧【酒蒸各一两半】 酸枣仁【去殼炒二钱半】 人参【去芦五钱】

龙齿【二两半】 朱砂【半两别研为衣】

右为末炼蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心米饮温酒下

八物定志圆【拔粹方】 补益心神安定魂魄去邪热治痰人参【一两半】 石菖蒲 远志【去心】

茯苓【去皮】 茯神【去心各一两】 朱砂【一钱】

麦门冬【去心】 白术【各半两】 牛黄【二钱别研】

右为细末炼蜜为丸如梧子大米饮下五十丸无时

天王补心丹寧心保神益血固精壮力强志令人不忘清三焦化痰涎去烦热除惊悸疗咽乾育养心神熟地黄 白茯苓 人参

远志【去心】 石菖蒲 玄参

栝子仁 桔梗 天门冬【去心】

丹参 酸枣仁【炒】 麦门冬【去心】

甘草【炙】 百部 五味子

茯神 当归 杜仲【姜汁炒断丝】

右各等分为细末煮蜜丸如弹子大每两作十丸金箔为衣每服一丸用灯心枣汤化下食远临卧服或作小丸亦可

灸法膏肓俞二穴百劳一穴心俞二穴肾俞二穴三里二穴关元一穴三焦俞二穴皆可灸之

虚汗

虚汗方论

汗者表虚而津液为之发泄也夫人以卫气固其表卫气所以温肌肉充皮肤肥腠理司开阖卫气一虚则肌肉不温皮肤不充腠理不肥而开阖失其司耳或昏或醒浸浸而出者曰自汗睡困则出醒而复收者曰盗汗若风若暑若湿邪气与卫气相干以至喜怒惊恐嗜慾劳伤皆能致之表虚者与之黄耆芍药官桂之剂邪气相袭者与之微微解散之剂惊恐劳伤者养心补肾之剂独不可调理之乎然而人之一身负陰抱阳平则寧偏则病陰虛阳必凑故发热汗出如水热而涌阳虛陰必乘故发厥汗出如水溢而流要之汗者血之异名阳主气气为卫陰主血血为荣气血二者俱不可一日馁矣抑余闻之汗出髮润一不治也汗出如油二不治也汗凝如珠三不治也君子见几辩之不可不早

虚汗证治

建中汤治表虚自汗

官桂【三分】 芍药【一两半】 甘草【炙半两】

右剉散每服四钱姜五片枣二枚食前煎服本方加黄耆一两名黄耆建中汤治虚劳自汗加当归一两名当归建中汤治妇人血虚自汗其自汗漏不止者加桂半两熟附子半个名桂枝附子汤每服四钱姜七片枣二枚空心煎服

黄耆六一汤加白术芍药治诸虚自汗【方见虚劳门】

当归散治虚汗盗汗【方见虚劳门】

术苓汤治虚汗盗汗

黄耆【炙】 防风 白茯苓

白术 麻黄根节【各半两】 甘草【炙二钱】

右剉细每服三钱入小麦百粒同煎临卧服加牡蛎亦得

牡蛎散治诸虚體常自汗惊惕不寧

左顾牡蛎【米泔浸洗煅透】 麻黄根

黄耆【蜜炙各一两】 加白术【半两】 甘草【炙一分】

右剉每服三钱小麦百余粒同煎服

龙胆散治盗汗有热

龙胆草 防风【等分日乾】

右为末每服一钱温米饮调下临卧服

防风散治盗汗

川芎【一分】 人参【半分】 防风【二分】

右为末每服一钱临卧米饮调下

温粉止汗法

川芎 白芷 白术

藁本【等分】

右为末每药末一两入米粉三分夹和扑身无藁本亦得

附诸方

耆附汤【济生方】 治气虚阳弱虚汗不止肢體倦怠

黄耆【去芦蜜炙】 附子【炮去皮脐各等分】

右?咀每服四钱水二鍾煎至一鍾去滓临卧通口服

大补黄耆汤治自汗虚弱之人可服

黄耆【蜜炙】 防风 川芎

山茱萸肉 当归 白术【炒】

肉桂 甘草【炙】 五味子

人参 肉苁蓉【各一两】 白茯苓【一两半】 熟苳【二两】

右每服五钱枣二枚水煎服

防己黄耆汤治风湿相搏时自汗出【方见湿门】

加味建中汤治诸虚自汗

白术 黄芪【各一钱蜜炙】 白芍药【二钱】

肉桂【去粗皮一钱】 甘草【七分】 当归【酒洗一钱】

右?咀用水一盞半加炒浮小麦一撮煎八分去滓入饴少许再煎温服

当归六黄汤【圣惠方】治盗汗之圣药也

当归 生地黄 熟地黄

黄栢 黄芩 黄连【各一分】

黄芪【加一倍】

右剉每服一两水二鍾煎至一鍾去滓临卧通口服

一方治盗汗

白术【三两】 茯苓【二两】

右?咀每服一两水一盞生姜三片枣一枚煎八分去滓温服食前

一方【百一选方】治脾虚盗汗

人参 当归【各等分】

右二味等分每服秤五钱先用猪心一枚破作数片并心内血煎汤澄清汁煎前药服

劳瘵

劳瘵方论

瘵虫食人骨髓血枯精竭不救者多人能平时爱护元气保养精血瘵不可得而传惟夫纵慾多淫苦不自觉精血内耗邪气外乘是不特男子有伤妇人亦不免矣然而气虚腹馁最不可入劳瘵者之门吊丧问疾衣服器用中皆能乘虚而染触间有妇人入其房睹其人病者思之

劳气随入染患日久莫不化而为虫治瘵之法大抵以保养精血为上去虫次之安息苏合阿魏麝犀丹砂雄黄固皆驱伐恶气之剂亦须以天灵盖行乎其间盖尸病者鬼气也伏而未起故令淹缠得枯骸枕骨治之魂气飞越不复附人於是乎瘵外此则虎牙骨鲤鱼头皆食人之类也其亦枕骨之亚乎要之发用以前当以川芎当归先立乎根本之地【瘵疾至於骨痛骨痿声沉声哑脉槁面黧断不可活凡治瘵疾所用药品永不得与病人知之也】

劳瘵证治

芎归血余散治瘵疾先用此次以鳖甲生犀散取虫室女顶门生髮【一小团井水洗取油腻法醋浸一宿日中晒乾纸捻火烧存性】真川芎【半两】当归【三钱】木香

桃仁【水浸去皮焙各二钱】安息香 雄黄【各一钱】

全蝎【二枚】江上大鲤鱼头【生截断一枚醋炙酥】

右为末分作四服每服井水一大碗净室中煎八分入红硬降真香末半钱烧北斗符入药月初五更空心向北目天呪曰瘵神瘵神害我生人吾奉 帝勅服药保身急急如律令念呪五遍面北服药毕面南吸生气入口腹中烧降真香置床下午时又如前服药

鼈甲生犀散治瘵疾杀瘵虫取出恶物

天灵盖【一具男者色不赤可用女者色赤勿用以檀香煎汤候冷洗呪曰电公灵雷公圣逢传尸即须应急急急如律令呪七遍次用酥炙黄】生鳖甲【一枚去裙醋炙黄】

虎长牙【二个醋炙酥如无则用牙关骨半两】安息香

鸡心?榔 桃仁【水浸去皮关焙各半两】

生犀角 木香 甘遂

降真香 乾漆【杵碎炒烟出略尽存性】

阿魏【酒浸研各三钱】穿山甲【取四趾醋炙焦】雷灵【二钱】

全蝎【三个】蚯蚓【十条生研和药】

右件为末每服半两先用?心四十九粒东向桃李桑梅小稍各二茎长七寸生临青七叶青蒿一小握葱白连根洗五片石臼内同杵用井水一碗半煎取一盏入童子尿一盏并药末煎取七分入麝一字月初旬五更空心温服即以被覆汗恐汗中有细虫软帛拭之即焚其帛少时

必泻虫以净桶盛急钳取虫付裂火焚之并收入磁器中瓦片傅雄黄盖之泥和灰扎埋深山絕人行处

虎牙圓治劳瘵瘦悴咳喘声哑骨痿杀下瘵虫

紫河车【一具即男子胎衣水洗淨酒醋再拆洗用童尿并好酒煮烂】

麝【半钱】

大红川椒【去合口并子以黄秆纸二重托之就热炉内频拨去油频地上盖一宿】

虎头关骨【酒浸二宿炙焦各一两半】

黄狗头【取肉四两童尿并酒煮烂】

鹿茸【七钱半酒炙】生鳖甲【一枚去裙醋炙一宿又醋一盞仰盛慢火炙令醋尽】

桃仁【水浸去皮焙】秦胶【洗】木香

明阿胶【炒酥各半两】雄黄 安息香

生髮【纸捻火烧存性各二钱半】

右细末以紫河车狗肉杵粘为圆桐子大每七十粒月首五更空心米汤下午时又服如无胎衣以雄猪肚代用修事同

雄麝圓治劳瘵杀瘵虫下恶物

雄黄 雌黄 青黛【乾】

代赭【煅醋石淬】朱砂【研细各二钱半】大虾?【一个酒炙黄】

男子天灵盖【酥炙黄三钱】安息香

阿魏【酒浸研各二钱】麝【半钱】川巴豆肉【肥者十粒略去油】

右细末软粳饭头揉和杵圆桐子大每二十粒桃仁十四个去皮研煎汤月初五更空心下

五枝散取下传尸劳虫

桃枝 李枝 梅枝

桑枝 石榴枝【并东向小枝各七茎长三寸】

青蒿【一小握】 苦练根【白皮七寸】 生蓝青【七叶】

葱白【连根洗七片各寸截】

右以童尿一升半煎取其半去滓入安息香苏合香阿魏各一钱煎至一盞滤清调朱砂雄黄雷圆枯白矾硫黄末各半钱鸡心?榔末一钱半麝一字分作二服月头五更空心进一服五更五点又进一服约午前取下瘵虫净桶盛急钳收入油铤内煮仍倾油虫入磁器灰扎埋山僻处

蓝汁方杀瘵虫恶虫皆化为水

生蓝青叶【研取自然汁一大盞】

右入雄黄枯白矾安息香红硬降真香末各半钱麝少许研和月头五更空心服蓝青杀诸虫解诸毒蛊毒通用此方

猫肝方杀瘵虫

黑猫生取肝晒乾

右为末月首五更空心醇酒调服或用酒浸而食之

木香蛤蚧圆治劳瘵久嗽声乾骨痿瘦瘁

蛤蚧【一对尾全者洗净酥炙】 生鳖甲【去裙醋炙焦】

白茯苓 川芎 当归

北五味子 牛膝【各七钱半】 绵黄耆

柴胡 知母 贝母【去心】

鸡心?榔 明阿胶【炒酥】 巴戟【酒浸去心】

桃仁【酒浸去皮焙各半两】 肉豆寇【三个生】 木香

秦艽【洗】 羌活 破故纸【炒】

生髮【纸捻火烧存性各三钱】

右细末炼蜜丸弹子大每一圆煎枣汤空心嚼下

参耆散治劳瘵 喘咯血声焦潮热盗汗

柴胡 明阿胶【炒酥】 黄耆【蜜炙】

白茯苓 紫苑茸 当归

川芎 半夏【制】 贝母【去心】

枳壳【制】 北梗 秦胶【洗】

甘草【焙各半两】 人参 北五味子

羌活 防风 杏仁【水浸去皮】

款冬花 桑白皮【炒各二钱半】 生鳖甲【去裙米醋炙黄】

右麤末每服二钱半姜枣煎食後少顷服

全鳖圆治劳瘵虚热 喘

知母 贝母【去心】 杏仁【浸去皮各三分】 柴胡【二两】 川芎【一两】 当归

明阿胶【炒酥各半两】

右麤截入厚磁器中用中等活鳖一个生宰於头上去鳖病以鳖肉并血并药用醇酒五升同浸一宿蜜纸封次早慢火同煮俟香熟取鳖令病者随意食之只留鳖甲并骨并药焙乾为末以浸药酒汁调米粉为糊圆桐子大每七十圆不时米饮下

神授圆【方见虚劳门】论治瘵疾瘵虫有效但随时用饭头圆服之庶得药味鲜【凡服药永戒苋菜牛马肉】

瘵有数虫如蜈蚣如小蛇如虾?如马尾如乱丝如烂麪如苍蝇如壁蚰虫上紫下白形鋭足细而有口或如白蚁孔窍中皆出此皆劳瘵根毒若传至三人则如人形如鬼状

前方鳖甲生犀散已服後準七日又再服之

附论

滑伯仁论曰劳患人者有病机之不同有形状之不一肌肤羸瘦骨热如蒸服药无効针灸无功何也对曰劳者虚劳也是因体虚之人房劳过损酒怒多端气虚血耗诸疾蜂生致使陰阳失序寒热自生阳虚曰生寒陰虚曰发热久虚久热变为骨蒸久则成劳久劳成痼痼者住也有二十四种之名有三十六种之类有九十九种之形种种不同症各各异内有劳痼尸痼鬼痼食痼虫痼毒痼此六者为传尸之劳患灭门絕户医难治之又云所因少壮之时醉饱迷房劳伤心肾盖心主血肾主精精竭血衰失於调护而无滋化之源致生融融之热咳咳之痰陰虚盗汗夜梦鬼交遗精困倦腰背酸疼咯血咯痰颊红喉痛饮食减少骨肉枯羸是为不治故曰患此疾者有气虚有血虚气虚者易治血虚者难调故也又云治虚劳世用寒凉之药治热症热之愈热用热药治寒症寒之愈寒何也对曰东垣有云用苦寒之剂妄治劳伤之热大寒则愈虚其中大热则愈怯其内治疗无端致伤脾胃殊不知甘能缓火劳者温之保全者当求微病之初莫治已病之後察气血之亏盈审病源之要道补益温平无不効验故集诸方补附於後附诸方

加味十全大补汤治发热渐成劳瘵者

十全大补汤加柴胡黄连煎服如热在骨髓更加青蒿鳖甲煎服【方见虚热门】

青骨散治男子妇人五心顿热欲成劳瘵

生地黄【二两】 人参【一两】 防风【去芦一两】

北柴胡【二两】 薄荷叶【七钱半】 秦艽

赤茯苓 胡黄连【半两】 熟地黄【一两】

右?咀每服五钱水一盞煎七分温服

太上混元丹【医方集成】治劳损五臟补益真气

紫河车【一具用少妇首生男子者良带子全者於东流水洗断血脉入麝香一钱在内以线缝定用生绢包裹悬胎於砂瓮内入无灰酒五升慢火熬成膏】沉香【别研】

朱砂【别研飞各一两】 人参 苁蓉【酒浸】

乳香【别研】 安息香【酒煮去沙各二两】

白茯苓【去皮二两】

右为末入河车膏子和药末杵千百下丸如梧桐子大每服七十丸空心温酒下沉香汤尤准服之可以轻身延年补损扶虚如病证虚极又须增加後项药味

川巴戟【去心】 锺乳粉 阳起石【煨】

鹿茸【酒蒸】 龙骨 附子【泡去皮脐】

黄芪【去芦各二两】 桑寄生 紫苑

生鹿角【镑各一两】

修制为末和前药为丸如妇人血海虚损荣卫不足多致潮热经候不调或闭断不通又宜增加此药当归【去芦】 石斛【去根】 紫石英【煨醋汁水飞】 栝子仁【炒别研】
鹿茸【酒蒸】 鳖甲【醋炙】

卷栝叶【各一两】 牛膝【去芦酒洗一两半】

修制为末和前药为丸汤使如前虚寒者加炮熟附子二两咳嗽者加紫苑茸二两

黄芪饮子【济生方】 治诸虚劳瘵四肢倦怠潮热乏力日渐黄瘦胸膈痞塞咳嗽痰多甚则唾血

黄芪【蜜炙两半】 当归【去芦酒洗】 紫苑茸【去土】

石斛【去根】 地骨皮【去根】 人参

桑白皮 附子【炮去皮】 鹿茸【酒蒸】

款冬花【各一两】 半夏【汤洗七次】 甘草【炙各半两】

右?咀每服四钱水一盏姜七片枣一枚煎服此药温补荣卫枯燥不宜进唾血加阿胶蒲黄各半两

乐令建中汤治臟腑虚损身軀消瘦潮热自汗将成劳瘵此药大能退虚热生血气

经验地仙散治骨蒸肌热一切虚烦

五蒸汤治骨蒸劳热自汗【俱见积热门】

苏合香圆【和剂方】治劳瘵传尸骨蒸发热肺痿喘急【方见咳嗽门】

地骨皮散治虚劳潮热骨蒸壮热瘵证【方见虚劳门】

遇仙灸【和剂方】治瘵捷法取癸亥日二更後六神皆聚时解去下衣直身平立以墨默记腰上两傍?处谓之腰腿穴然後上床合面卧每穴灸七壮劳虫或吐或泻而出取後用火焚之弃於江河中恐害人故也或依崔氏穴法灸之宜服後将军丸

将军丸【秘方】治传尸劳瘵前灸法并此药乃异人传授累经验

锦文大黄【酒蒸曝焙】麝香【一钱研】管仲

牙皂【去皮醋炙】桃仁【去皮炒】?榔

雷丸 鳖甲【醋炙黄各一两】茺莢【半两】

右为末先将蒿叶二两东边桃柳李桑叶各七片水一碗煎七分去滓入蜜一大盞再熬至成膏入前药末及麝安息香捣丸如梧桐子大每服三十丸食前枣汤下

七圣神効散【秘方】治男子妇人远年近日五劳七伤喘嗽血尸劳等疾前药无効针灸不应命将终服此神効鹿茸大补汤【方见虚劳门】

十全大补汤【方见虚劳门】黄耆益损汤【方见虚劳门】

进热饮【方书无进热饮今存之】清心莲子饮【方见诸淋门】

地骨皮散【方见虚劳门】

鳖甲散方【方见积热门】

右各一贴用无灰酒三升浸磁器瓶内半月开时空心进二盞轻者半月重者一月必然痊可

劳瘵治例【出明医杂着】

王节斋曰男子二十前後色慾过度损伤精血必生陰虚火动之病睡中盗汗午後发热哈哈咳嗽倦怠无力饮食少进甚则痰涎带血咯唾出血或咳血吐血衄血身热脉沉数肌肉消瘦此名劳瘵最重难治轻者用药数十服重者期以岁年然必须病人爱命坚心定志絶房室息妄想戒恼怒节饮食以自培其根否则虽服良药无用也此病治之於蚤则易若到肌肉消烁沉困着床尺脉沉取细数则难为矣又此病大忌服人参若曾服过多者亦难治今制一方於後治色慾证先见潮热盗汗咳嗽倦怠趁早服之

主方

川芎 熟地黄【各一钱】 白芍药【炒】

当归【酒洗各一钱三分】 黄蘗【七分水拌炒】

知母【一钱蜜水拌炒】 生地黄【酒浸】 甘草【炙各五分】 白术【二钱三分】

天门冬【一钱去心】 陈皮【七分】 乾姜【三分炒紫色】

生姜三片水煎空心温服

若咳嗽盛加桑白皮马兜铃瓜蒌仁【各七分】 五味子【十粒】 若痰盛加姜制半夏贝母瓜蒌仁【各一钱】

若盗汗多加牡蛎酸枣仁【各七分】 浮小麦【一撮】

若潮热盛加桑白皮沙参地骨皮【各七分】

若梦遗精滑加牡蛎龙骨山茱萸【各七分】

若赤白浊加白茯苓【一钱】 黄连【三分炒】

若兼衄血咳血出於肺也加桑白皮【一钱】 黄芩山梔仁【各五分炒】

若兼嗽血痰血出於脾也加桑白皮贝母黄连瓜蒌仁【各七分】

若兼呕血吐血出於胃也加山梔黄连乾姜蒲黄【炒各一钱】 韭汁【半银盏】 姜汁【少许】

若兼咯唾血出於肾也加桔梗玄参侧柏叶【炒各一钱】 若先见血证或吐衄盛大者宜先治血治法轻少者凉血止血盛大者先消瘀血次止血凉血盖血未多必有瘀於胃膈者不先消化之则止之凉之不应也葛可久十药神书方可次第检用方内惟独参汤止可用於大吐血後昏倦脉微细气虚者气虽虚而复有火可加天门冬【五钱】 若如前所云陰虛火动潮热盗汗咳嗽脉数不可用也说见本草集要人参条下明白

此病属火大便多燥然须节调饮食勿令泄泻若胃气复坏泄泻稀溏则前项寒凉之药难用了急宜服药理脾胃用白术茯苓陈皮半夏神麴麦芽甘草等药候胃气复然後用前本病药

收功保後可合补陰丸常服之及用葛可久方

又治劳瘵证方法【出十药补书】

心法附錄曰夫人之生也本天地氤氲之气在乎保养真元固守根本则万病不生四肢康健若曰不养真元不固根本疾病由是生焉且真元根本则气血精液也余尝闻葛先师有言曰万病莫若劳证最为难治盖劳之起因人之壮年气血完聚精液充满之际不能保养性命酒色是贪日夜耽嗜无有休息以致耗散真元虚败精液则呕血吐痰以致骨蒸體热肾虚精竭面白额红口乾咽燥白浊遗精盗汗饮食艰难气力全无谓之火盛金衰重则半年而毙轻则一载而亡见医者不究其源不穷其本或投之以大寒之剂或疗之以大热之药妄为施治绝不取效殊不知大寒则愈虚其中大热则愈竭其内所以世之医劳者万无一人焉先师用药治劳如羿之射无不中的今开用药次第於後用药之法如呕吐咯嗽血者先以十灰散遏住如甚者须以花蕊石散止之○大抵血见热则行见寒则凝见灰则止理之必然○止血之後其人必倦其體次用独参汤一补令其熟睡一觉不要惊动睡起病去五分後服诸药

保和汤止嗽寧肺 保真汤补虚除热

太平丸润肺除痰 消化丸下痰消气

保和汤内分血盛痰盛喘盛热盛风盛寒盛六事加味和之保真汤内分惊悸淋浊便澁遗精燥热盗汗六事加味用之余无加用○服药之法每日仍浓煎薄荷汤灌嗽喉中用太平丸先嚼一丸徐徐咽下次噙一丸缓缓溶化至上床时亦如此用之夜则肺窍开药必流入窍中此诀要紧○如痰壅却先用饴糖拌消化丸一百丸吞下次又依前噙嚼太平丸令其仰面卧而睡○服前七药後若肺有嗽可煮润肺丸食之如常七药之前有余暇煮此服之○亦可续煮白凤膏食之固其根源完其根本○病可之後方可合十珍丸服之此为收功起身之妙用也

甲字号十灰散治劳证呕血吐血咯血嗽血先用此药止之

大蓟 小蓟 栢叶

荷叶 茅根 茜根

大黄 山梔 牡丹皮

棕榈皮【各等分】

右各烧灰存性研极细末用纸包碗盖於地上一夕出火毒用时先将白藕捣绞汁或萝卜汁磨京墨半碗调服五钱食後下如病势轻用此立止如血出成升斗者用後药止之

乙字号花蕊石散五内崩损涌喷血出升斗用此止之

花蕊石【火煨存性研如粉】

右童子小便一鍾煎溫調末三錢甚者五錢食後服下○如男用酒一半女用醋一半与小便处处和药服使瘀血化为黄水服此讫以後药补之

丙字号独参汤止血後服此药补之

大人参【去芦二两】

右?咀水二鍾枣五个煎不狗时细细服之服後宜熟睡一觉後服诸药除根

丁字号保和丸治劳嗽肺成痿者服之决効

知母 贝母 天门冬

欸冬花【各三钱】 麦门冬【去心】 天花粉

薏苡仁 杏仁 五味子【各二钱】 粉草【炙】 马兜铃 紫苑

百合 桔梗 阿胶【炒】

当归 生苧 紫苏

薄荷【各五分】

一方无地黄有百部

右以水煎生姜三片入饴糖一匙入药内服之每日三服食後进加減於後

血盛加蒲黄茜根藕节大蓟小蓟茅花

痰盛加南星半夏橘红茯苓枳殼枳实括萎实【炒】

喘盛加桑皮陈皮大腹皮萝卜子葶苈苏子

热盛加山梔子【炒】 黄连黄芩黄柏连翘

风盛加防风荆芥金沸草甘菊细辛香附

寒盛加人参芍药桂皮五味蜡片

戊字号保真汤治劳证体虚胃蒸服之决补

当归 生苧 白朮

黄芩 人参【各三钱】 莲心

赤茯苓 白茯苓【各半钱】 天门冬

麦门冬 陈皮 白芍药

知母 黄栢【炒】 五味子

柴胡 地骨皮 熟苧【各一钱】

赤芍药 甘草【各一钱半】

右以水煎生姜三片枣一枚食後服

惊悸加茯神远志栢子仁酸枣仁

淋浊加萆薢台乌药猪苓泽泻

便 加木通石苇篇蓄

遗精加龙骨牡蛎莲须连子

燥热加滑石石膏青蒿鳖甲

盗汗加浮麦子【炒】 牡蛎黄芩麻黄根

己字号太平丸治劳证久嗽肺痿肺癰并皆噤服

天门冬 麦门冬 知母

贝母 款冬花 杏仁【各二两】

当归 生地黄 熟地黄

黄连 阿胶珠【各一两半】 蒲黄

京墨 桔梗 薄荷【各一两】

白蜜【四两】 麝香【少许】

右为细末和匀用银石器先下白蜜炼熟後下诸药末搅匀再上火入麝香略熬三二沸丸如弹子大每日三服食後细嚼一丸煎薄荷汤缓缓化下次噙一丸临卧时如痰盛先用饴糖拌消化丸吞下却噙嚼此丸仰卧使药流入肺窍则肺清润其嗽退除七日病痊凡一切咳 只服此药立愈

庚字号沉香消化丸治热痰壅盛

青礞石【煅黄金色】 明矾【飞研细】 猪牙皂角

南星【火炮】 半夏【生制】 白茯苓

陈皮【各二两】 枳殼 枳实【各一两半】

薄荷【一两】 沉香 黄芩

右为细末和匀姜汁浸神麴搅糊为丸如梧桐子大每服一百丸每夜临卧饴糖拌吞次噙嚼太平丸二药相攻痰 除根

辛字号润肺膏治久嗽肺燥肺痿

羊肺【一具】 杏仁【净研】 柿霜

真酥 真粉【各一两】 白蜜【二两】

右先将羊肺洗净次将五味入水搅粘灌入肺中白水煮熟如常服食前与七药相间服之亦佳

壬字号白凤膏治一切久怯弱极虚急咳嗽吐痰咳血发热

黑嘴白鸭【一只】 大京枣【二升】 参苓平胃散【一升】 陈煮酒【一瓶】

右将鸭缚定脚量患人饮酒多少随量以酒荡温将鸭项割开滴血入酒搅匀饮之直入肺经润肺补其肺却将鸭乾擗去毛於脇边开一孔取其肠杂拭乾次将枣子去核每个中实纳参苓平胃散末填满鸭肚中用麻扎定以沙瓮一个置鸭在内四围用火慢煨将陈煮酒作三次添入煮乾为度然後食其枣子陰乾随意食用参汤送下後服补髓丹则补髓生精和血顺气

癸字号补髓丹【一名十珍丸】治久劳虚败髓乾精竭血枯气少服前药愈後服此药

猪脊膂【一条】羊脊髓【一条】团鱼【一枚】

乌鸡【一只】

四味制净去骨存肉用酒一大碗於沙瓮内煮熟搗细再入後药

大山药【五条】莲肉【半斤】京枣【一百枚】

柿霜【十枚】

四味修制净用井花水一大瓶於沙瓮内煮熟搗细与前熟肉一处再用慢火熬之却下

明胶【四两】真黄蜡【三两】

右二味逐渐下与前八味和一处搗成膏子和平胃散末四君子汤末知母黄栢末各一两共一十两搜和成剂如十分硬再入白蜜同熬取起放青石上用木槌打如泥丸如梧桐子大每服一百丸不拘时候枣汤下

仁斋直指卷九

卷十

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷十 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

漏浊

漏浊方论

精之主宰在心精之藏制在肾凡人酒色无度思虑过情心肾气虚不能管摄往往小便频数漏浊之所由生也因小便而出者曰尿精因见闻而出者曰漏精心不足而挟热者为赤浊心不足而肾冷者为白浊陰不升阳不降上下乖睽是以有清浊不分之证药法品量条列于下要必体认之精而後发用之审欬外此又有脾精不禁小便漏浊淋漓不止手足力乏腰背酸疼盍用苍术等剂以敛脾精敛脾谓何精生於谷也

漏浊证治

约精圆治小便中泄精不止

白龙骨【貳两研细】 新韭子【冬霜後采者壹斤好酒浸壹宿次日捣细】

右末酒调糯米为糊圆桐子大每服叁拾圆空心塩汤下

莲子六一汤治心热赤浊

石莲肉【连心用陆两】 甘草【炙壹两】

右末每服貳钱食後灯心壹小撮煎汤调下

清心莲子饮治心中客热烦燥赤浊肥脂

石莲肉 白茯苓【各壹两】 益智仁

远志【水浸取肉姜制炒】麦门冬【去心】 人参【各半两】

石菖蒲 车前子 白术

泽泻 甘草【微炙各壹分】

右剉散每服叁钱添灯心壹握煎服有热加薄荷

辰砂妙香散【方见疽门】 蜡苓圆【方见消渴门】 治小便赤浊又五苓散【方见水饮门】可夹和辰砂妙香散每服壹钱用灯心并去心麦门冬煎汤调下男女通用

鸡清圆便浊通用

圆白半夏【生】

右为末用鸡子清圆桐子大稍乾以木猪苓末夹和慢火同炒圆子裂为度留木猪苓末养药磁器密收每叁拾圆食前白伏苓煎汤下或用盐汤

寧志膏调平心气赤白浊通用【方见心疼门】

十四友圆治心虚便浊【方见惊悸门】

妙应圆赤白浊通用

真龙骨 辰砂 厚牡蛎【以腐草鞋重包插定火煅并研细】 石菖蒲【各贰钱半】 白伏苓

益智仁 石莲肉 缩砂仁【各叁钱半】 川练子【蒸去皮取肉焙】 桑螵蛸【瓦上焙】 兔丝子【酒浸一宿焙杵各半两】

右末以山药碎炒末为糊圆桐子大每伍拾圆日间煎人参酸枣仁汤下临卧粳米汤下

远志圆治心气不足遗精白浊

远志【水浸取肉姜淹焙乾】 山药【炒熟】 地黄【洗晒】

天门冬【去心】 龙齿【研细各壹阙半】 麦门冬【去心】

北五味子 车前子【略炒】 白伏苓

伏神【去木】 地骨皮【各壹两贰钱半】 辣桂【陆钱壹字】

右末炼蜜圆桐子大每五十圆食前粳米汤下

伏兔丹赤白浊通用【方见消渴门】 赤浊灯心煎汤下白浊白伏苓煎汤下

平补圆治肾虚心热小便急而数澁而沥如水窠欲渗之状又且油浊【方见消渴门】 兼用辰砂妙香散佐之【方见疸门】 牡蛎圆治精气不禁白浊梦遗

圆白半夏【壹两荡洗拾次每个作两片以木猪苓去皮贰两为麤末同半夏慢火炒黄放
地出火毒壹宿】

右末用木猪苓入煨过厚牡蛎粉壹两同末以山药糊圆桐子大留木猪苓养药磁器密收每
叁拾圆伏苓煎汤下

金樱子圆治诸虚漏精白浊

真龙骨 厚牡蛎【煨】 桑螵蛸【各壹两】

右以雄黑豆壹盏淘湿将前叁件置豆上蒸半日去豆焙叁件为末入白伏苓壹两末金樱子
肆拾?枚去刺并穰蒂洗净搥碎磁器内入水一盏煮浓汁滤清调伏苓末为糊圆桐子大每叁
拾圆食前用益智伍枚连壳搥碎北五味子拾粒缩砂仁叁个煎汤下

小菟丝子圆用北五味子煎汤下治诸虚白浊【方见疸门】 桑螵蛸散治心肾不和小便白
浊或如米泔或为梦泄

桑螵蛸【蒸过略焙】 远志【水浸取肉晒姜汁和焙】

石菖蒲 人参 白伏神

当归 龙骨【别研】 鼈甲【炙黄各半两】 甘草【炙贰钱】

右为末每服贰钱人参伏苓煎汤调下夜卧服

生料四君子汤【方见疸门】 生料五苓散【方见水饮门】 贰药夹和每服贰钱用灯心壹
撮同煎服治小便白浊

龙齿补心汤治诸虚不足虚热潮来心神惊惕睡卧不宁小便油浊

龙齿【煨别研】 人参 当归【酒浸壹宿焙】 熟地黄【洗焙】 北梗【焙】
酸枣仁【炒】

白茯苓 白伏神【去木】 远志【水浸取肉晒姜汁淹焙】 枳壳【去穰麸炒】
麦门冬【去心】 半夏麴

白朮 甘草【炙各半两】 肉桂【貳钱半】

绵黄耆【?钱半蜜炙】

右麴末每服叁钱水盞半姜五片粳米一小撮同煎不时服临卧服

炼盐方治漏精白浊

雪白盐【入磁瓶内筑十分实以瓦盖顶黄泥涂封火煨壹日取出放陰地上壹夜密器收】
白茯苓 山药【炒各壹两】

右为末入塩壹两研和用沸汤浸枣取肉研夹炼蜜再研为圆桐子大每服叁拾圆空心枣汤
下盖欲甘以济咸脾肾两得也

山药圆

乾山药【貳两】 北五味子
苁蓉【酒浸焙各肆两】 兔丝子【酒浸散研焙三两】 牛膝【酒浸焙】 泽泻

熟地黄【洗】 山茱萸 伏神【去木】

巴戟【去心】 赤石脂【各壹两】 杜仲【剉姜汁淹炒壹两】

右末炼蜜圆桐子大常服叁拾圆盐汤下

安肾圆【方见水饮门】 白圆子【方见身疼门】 山药圆【方见前】 三药夹和每服?拾圆
食前煎双和汤送下【方见虚劳门】 治虚劳羸瘦浮臃白浊

还少丹治心肾俱虚漏精白浊【方见虚劳类】

鹿茸益精圆治心虚肾冷漏精白浊

鹿茸【去皮酥炙微黄】 桑螵蛸【瓦上焙】 肉苁蓉

当归 巴戟【去心】

兔丝子【酒浸软研】 杜仲【截碎姜汁淹炒断丝】 川练子【蒸去皮取肉焙】 益智仁

禹余粮【煨红醋淬以碎为度各叁分】 韭子【微炒】

故纸【炒】 山茱萸 赤石脂

龙骨【别研各贰分】 滴乳香【壹分】

右细末酒调糯米糊圆桐子大每?拾圆食前白伏苓煎汤下

家韭子圆治阳气衰败白浊遗精

家韭子【陆两炒】 鹿茸【肆两酥炙】 苁蓉【酒浸焙】

牛膝 熟地黄【洗晒】 当归【各贰两】

巴戟【去心】 兔丝子【酒浸研焙各壹两半】

杜仲【剉姜淹炒】 石斛 桂心

乾姜【生各一两】

右末酒调糯米为糊圆桐子大每服?拾圆空心塩汤下亦治胞冷遗尿

震灵丹治肾经虚惫漏浊不止【方见泻门】 用二陈汤加白伏苓送下【方见疟类】

白圆子治陰阳不调清浊相干小便浑浊【方见身疼门】 用伏苓汤送下

分清饮治思虑过度清浊相干小便白浊

益智仁【壹两醋浸壹】 川萆薢 石菖蒲【去毛】

天台乌药 白伏苓【各壹两】 甘草【肆钱】

右为末每贰钱塩少许同煎食前服

苍术难名丹治元阳气衰脾精不禁漏浊淋漓腰痛力疲

苍术【杵去麤皮壹斤米泔浸壹日夜焙乾】 舶上茴香【炒】

川练子【蒸去皮取肉焙乾各叁两】 川乌【炮去皮脐】

故纸【炒】 白茯苓 龙骨【别研各贰两】

右末酒麪糊圆桐子大朱砂为衣每服伍拾圆空心缩砂煎汤下粳米汤下苍术收斂脾精
附诸方

妙应圆治赤白浊

真龙骨 辰砂 石昌蒲【各贰钱半】 川练子【取肉半两】 白茯苓 益智仁

石莲肉 缩砂仁【各壹钱半】

桑螵蛸【瓦上焙】 兔丝子【酒浸一宿焙各半两】 牡蛎【破草鞋包火煨细研三钱】

右以山药碎炒为糊丸如桐子大每服五拾丸间日煎人参酸枣仁汤下临卧粳米饮汤下

远志圆【济生方】 治因事有惊心神不定夜梦惊堕小便白浊远志【去心煮汁奄】

石昌蒲【各贰两】 伏神【去木】

白茯苓【去皮】 人参 龙齿【各壹两】

右为末炼蜜丸梧子大以辰砂为衣每服?拾丸热汤下

一方治心经伏暑小便赤浊

人参 白术 赤茯苓【去皮】

香薷 泽泻 木猪苓【去皮】

莲肉 麦门冬【去心各等分】

右?咀每服肆钱水壹盏煎服

一方治小便白浊出髓条

酸枣仁【炒】 白术 白茯苓

破故纸 人参 益智【洗净】

大茴香 左顾牡蛎【童便煨各等分】

右为末加青塩酒丸如梧子大每服叁拾丸温酒米饮任下

秘传金鎖思仙丹治男子嗜慾过多精气不固澁以去脱之剂

莲花蕊拾两【煖无毒镇心忌硫黄蒜】

石莲子拾两【味甘平温无毒经秋正黑次水者是也本功益气安心澁精止痛取净粉用】

鷄头实拾两【味甘平无毒益精气强志取其实并中子捣烂曝乾再捣筛取净粉】

右以金櫻子三斤取霜後半黄者木臼中转杵却刺勿损擘为两片去水淘净烂捣入大锅以水煎不絶火约水耗半取出滤过重煎如稀饧市肆乾者焙之用水浸软去子煎令如法入前药末和丸桐子大每服叁拾丸空心塩汤下

针灸法陰交一穴【在脐下一寸】气海一穴【在脐下一寸半】关元【在脐下三寸】

梦泄

梦泄方论

邪客於陰神不守舍故心有所感梦而後泄也其候有三年少气盛鰥旷矜持强制情慾不自觉知此泄如瓶之满而溢者也人或有之是为无病勿药可矣心家气虚不能主宰或心受热阳气不收此泄如瓶之侧而出者也人多有之其病犹轻合用和平之剂脏腑积弱真元久亏心不摄念肾不摄精此泄如瓶之罅而漏者也人少有之其病最重须当大作补汤或谓梦泄尤甚於房劳此世俗习闻其说也独不观证候之有重轻乎外此又有一辈神气消磨怪异横生风邪乘其虚鬼气干其正往往与妖魅交通是又厄运之不可晓者也法药相助诚哉是言

梦泄证治

伏苓圆治心虚梦泄

白伏苓

右为末每服肆钱粳米汤调下间用温熟水调下空心食前临卧日叁服

莲子六一汤鸡清圆【方见漏浊门】辰砂妙香散【方见疸门】治心热梦泄并用灯心一

握煎汤下

鹿角散治脏腑久虚梦泄

鹿角屑 鹿茸【去皮酥炙各壹两】 白茯苓【叁分】

人参 白伏神 桑螵蛸【蒸焙】

芎藭 当归 故纸【炒】

龙骨【别研】 新韭子【酒浸壹宿焙各半两】

栝子仁【去壳】 甘草【炙各一分】

右末每服叁钱半姜伍片枣叁枚粳米百粒食前煎服

还少丹【方见虚劳门】 鹿茸益精圆家韭子圆【方见漏浊门】 大补虚损梦遗用十补汤送下【方见痼冷门】 间用滴乳香末泡汤下震灵丹封固下焦治梦泄不止【方见泻门】 空心人参北五味子煎汤下

附诸方

秘传龙骨锁精丹

白龙骨【煨贰两半】 牡蛎【煨贰两】 知母【伍钱】

黄栢【陆钱】 猪苓【伍钱】 人参【去芦壹两】

远志【甘草汤煮去心壹两半】

右为细末酒糊为丸如梧桐子大每服肆伍拾丸空心盐酒或盐汤送下

固精圆治心神不安肾虚自泄精

知母【炒】 黄栢【酒炒各壹两】 牡蛎【煨】

龙骨【煨】 芡实 莲蕊

伏苓 远志【去心】 山茱萸【肉各叁钱】

右为末煮山药糊丸梧子大朱砂为衣服五十丸

芡实圆【济生方】治思虑伤心疲劳伤肾心肾不交精元不固面少颜色惊悸健忘小便赤澁遗精白浊足胫酸疼耳聋目暗

芡实【蒸去皮】 莲花须【貳两】 伏神【去木】

山茱萸肉 龙骨【生用】 五味子

枸?子 熟地黄【酒蒸】 韭子【炒】

肉苁蓉【酒洗】 川牛膝【去芦酒洗】 紫石英【煅?次各壹两】

右为末酒煮山药为丸如梧子大每服?拾丸空心盐汤下

玉锁丹【御药院方】治精气虚滑遗泄不禁

龙骨 莲花蕊 鸡头实

乌梅肉【各等分】

右为末用熟山药去皮为膏和丸小豆大每服叁拾丸空心米饮下

秘传金锁思仙丹桑螵蛸散【并见漏浊门】

仁斋直指卷十

卷十一

钦定四库全书

仁斋直指卷十一 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

眩运

眩运方论

眩言其黑运言其转冒言其昏眩运之与冒眩其义一也其状目闭眼暗身转耳聋如立舟舡之上起则欲倒盖虚极乘寒得之亦不可一涂而取轨也风则有汗寒则掣痛暑则热闷湿则重滞此四气乘虚而眩运也喜怒哀乐悲恐忧思鬱而生痰随气上厥此七情攻虚而眩运也淫慾过度肾家不能纳气归元使诸气逆奔而上此眩运之出於气虚也明矣吐衄漏崩肝家不能收摄荣气使诸血失道妄行此眩运之生於血虚也又明矣以致新产之後血海虚损或瘀滞不行皆能眩运是可不推寻致病之因乎治法随机应敌其间以升降镇坠行焉最不可妄施汗下然而眩运欲解自汗则有之若诸逆发汗剧者言乱目眩与夫少陰病下利止而头眩时时自冒者此虚极而脱也识者将有采薪之忧【肝脉溢大多作眩运诸风棹眩皆属於肝】

眩运证治

伏苓桂枝白术甘草汤治气上冲胷战摇眩运

伏苓【壹两】 桂枝【叁分】 白术

甘草【炙各半两】

右剉散每服肆钱新水煎服风证加川芎细辛湿证加川芎苍术寒证加乾姜良姜

理中汤【方见泻门】治寒湿眩运仍吞来复丹【方见暑门】甚者养正丹【方见痼冷门】

芎术除眩汤治感湿感寒头重眩运

附子【生】 白术 川芎【各半两】

官桂 甘草【炙各貳钱半】

右剉每服叁钱姜?厚片同煎食前服

乾姜甘草汤【方见脾疼门】附子理中汤【方见寒类】并主虚寒眩运桂苓圆治暑证眩运

肉桂 伏苓【等分】

右细末炼蜜圆每两作捌圆每服壹圆用香薷剉散调下消暑圆通用【方并见暑门】

十四发圆【方见惊悸门】安肾圆【方见水饮门】二药夹和用和剂七气汤送下【方见气门】治七情相干眩运欲倒仍间用乳香泡汤下

芎辛汤【方见头风门】治痰饮厥逆眩运

千金五套圆【方见脾疼门】治痰饮结聚胃脘眩运欲呕香橘饮治气虚眩运

木香 白术 半夏麴

橘皮 白伏苓 缩砂【各半两】

丁香 甘草【炙各壹分】

右剉散每服叁钱姜伍厚片同煎吞苏合香圆【方见嗽门】本方加当归川芎各叁分官桂半两治血虚眩运

苏沈沉麴圆治一切血运每服壹圆研开用滴乳香泡汤调下

芎藭汤【方见血类】加细辛石菖蒲治妇人血运眩冒不省人事次用和剂七气汤佐之

五苓散【方见水饮门】加赤伏苓治停饮眩冒心下悸气养正丹【方见痼冷门】来复丹【方见暑门】升降陰阳用之养正丹夹和震灵丹以乳香泡汤下升降镇坠功用两全

震灵丹【方见泻门】黑锡丹【方见痼冷门】镇坠眩运用之

苏合香圆用枣汤调开吞震灵丹治心气不敛怔忡头运

二陈汤【方见疟门】加生乾姜治因气鬱痰眩运及酒食所伤眩运及酒食所伤眩运吞来

复丹尤胜

芷弹圆治风证眩运及血证眩运

新白芷【择大块汤荡洗三次日乾】

右为末炼蜜圆弹子大每服壹圆荆芥煎汤嚼下

白附子圆治风痰上厥眩运头疼

白附子【炮】 南星【炮】 半夏【荡?次】

旋覆花 甘菊 天麻

川芎 橘红 僵?【炒去丝觜】

乾姜【生各一两】 全蝎【半两焙】

右末用生姜半斤取汁打麪糊小圆每伍拾圆食後荆芥汤下

人参前胡汤治风痰头运目眩

前胡 橘红 半夏麪

木香 枳殼【制】 紫苏叶

赤茯苓 南星【炮】 甘草【炙各半两】

人参【叁钱】

右麪末每叁钱姜?厚片慢火熟煎服

真方白圆子【方见身疼门】用叁拾圆苏合香圆三粒全蝎壹个炙为末三件研和以紫苏橘皮煎汤入生姜汁少许调下治诸风眩运搐掣语短呕吐

惊悸

惊悸方论

人之所主者心心之所养者血心血一虚神气不守此惊悸之所肇端也曰惊曰悸其可无辩乎惊者恐怖之谓悸者怔忡之谓心虚而鬱痰则耳闻大声目擊异物遇险临危触事丧志心为之忤使人有惕惕之状是则为惊心虚而停水则胷中渗漉虚气流动水既上乘心火恶之心不自安使人有怏怏之状是则为悸惊者与之豁痰定惊之剂悸者与之逐水消饮之剂所谓扶虚不过调养心血和平心气而已若一切以刚燥用工或者心火自炎又有热生风之证

惊悸证治

养心汤治心虚血少惊惕不宁

黄耆【炙】 白茯苓 伏神

半夏麴 当归 川芎【各半两】

远志【取肉姜汁淹焙】 辣桂 栢子仁

酸枣仁【浸去皮隔纸炒香】 北五味子

人参【各壹分】 甘草【炙肆钱】

右麴末每服叁钱姜伍片枣贰枚煎食前服加?榔赤茯苓治停水怔悸

宁志圆治心虚血虚多惊

人参 白茯苓 伏神

栢子仁 琥珀 当归

酸枣仁【温酒浸半日去殼隔纸炒香】 远志【酒浸半日新布裹搥取肉

焙各半两】 乳香 朱砂【别研】

石昌蒲【各壹分】

右末炼蜜圆桐子大每叁拾圆食後枣汤下

参乳圆治心气不足怔忡自汗

人参【半两】 当归【壹两日乾】 乳香【壹钱半研】

右末山药煮糊圆桐子大每叁肆拾圆食後枣汤下

十四发圆治心血俱虚怔忡惊惕

栝子仁【研】 远志肉【姜汁淹焙】 酸枣仁【汤浸去皮隔纸炒香】 紫石英【煨】
熟乾地黄 川当归

白茯苓 白伏神 人参

黄耆【炙】 阿胶【炒】 辣桂

龙齿【研各一两】 朱砂【半两研】

右细末炼蜜圆桐子大每叁肆拾圆食後枣汤下

朱雀圆治心病怔忡不止

白伏神【貳两净】 沉香【半两】

右细末炼蜜圆小豆大每叁拾圆人参煎汤下

蜜陀僧散治大惊入心败血顽痰填塞心窍暗不能言

蜜陀僧【即是炉底研极细】

右每服挑壹大钱已无热者用热酒调下有热者沸汤泡麝香调下亦治瘡风颇有奇效【出
夷坚志】

温胆汤治心胆虚怯触事多惊亦治水气怔忡

半夏【制】 枳殼【制】 白茯苓【各壹两】 橘红【壹两半】 甘草【炙半两】

右剉每服叁钱半姜?片枣貳枚刮青竹皮壹块如钱大煎服或加制远志尤妙

加味四七汤治心气鬱滞豁痰散惊

半夏【制貳两半】 白茯苓 厚朴【制各壹两半】

伏神 紫苏叶【各壹两】 远志【姜汁蘸湿去肉焙】 甘草【炙各半两】

右剉每服肆钱姜?片石菖蒲半寸枣贰枚煎服

伏苓甘草汤治心下停水忪悸

伏苓 桂枝【各贰两】 甘草【炙壹两】

生姜【叁两】

右剉每服肆钱水煎服

姜术汤治虚证停饮怔忡

白姜【生】 白术 伏苓

半夏麴【各半两】 辣桂 甘草【炙各壹分】

右剉每服叁钱姜枣煎服

小半夏伏苓汤五苓散并主水气心下怔忡【方见水饮门】炙甘草汤治心下动悸其脉结代动而时止曰伏甘草【炙壹两】 人参【半两】 生乾地黄【肆两】

桂枝【叁分】 麻仁 麦门冬【去心各壹合】 生姜【叁分】 大枣【捌枚】

右麴末每碗叁大钱水壹盏半酒半盏煎至捌分入透明阿胶壹斤俟胶消温和服日进叁剂不拘时

宁志膏治因惊失心

人参 酸枣仁【汤浸去皮各壹两】

辰砂【半两】 滴乳香【壹钱乳鉢坐水研】

右末炼蜜和杵圆如弹子每壹圆薄荷汤化下

附诸方

朱砂安神丸治血虚心烦懊懣惊悸怔忡胸中气乱【方见内伤门】

加味定志圆治痰迷心隔惊悸怔忡

远志【去心貳两】 人参【壹两】 菖蒲【貳两】

白茯苓【叁两】 琥珀 鬱金

右为细末炼蜜丸如梧子大朱砂为衣每服貳拾丸米汤下

健忘

丹溪云精神短少者多亦有痰者戴云健忘者为事有始无终言谈不知首尾此以为病之名非此生成之愚顽不知人事者

归脾汤【济生方】 治思虑过制劳伤心脾健忘怔忡

白术 伏神【去木】 黄芪【蜜炙】

龙眼肉 酸枣仁【去殼】 人参【去芦各壹两】 木香【半两】 甘草【炙貳钱半】

右?咀每服肆钱水壹鍾姜伍片枣壹枚煎?分温服

人参远志圆【圣惠方】 治气不足惊悸健忘神思不宁天门冬【去心】 白茯苓 菖蒲【各?钱半】

人参【去芦】 远志【去心】 酸枣仁

黄芪【蜜炙各半两】 桔梗 丹砂

官桂【去皮各貳钱半】

右为末蜜丸如豆大每服貳拾丸至叁拾丸米汤下

宁志膏【和剂方】 治心神恍惚一时健忘【方见前】

仁斋直指卷十一

卷十二

钦定四库全书

仁斋直指卷十二 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

痄疰

痄疰方论

风寒暑湿邪自外来饮食居处邪由内作此痄疰感受之胚胎也岂特夏伤於暑秋必为疰哉古人盖以其受病最多者言之耳疰候何如始而呵欠继而足冷面色青黄身体拘急寒栗鼓颌腰脊俱疼寒去未几内外皆热头痛而渴但欲饮冷呕恶妨满而不嗜食者其候也或内伏寒痰寒从背起冷如掌大疰之寒热其岂非陰阳二气更相胜负而作耶邪并於陰则寒邪并於阳则热陰盛则寒多阳盛则热炽其寒也汤火不能温其热也冰水不能寒卫气与邪气相值故邪正交争而病以作卫气与邪气相离故汗出乃解而病以休卫气昼行阳夜行陰得阳而外出故发於日间得陰而内搏故发於暮夜若乃邪气内搏於五脏横连於募原其道远其行迟不能与卫气交并故有隔日发有三四日一发卫气之行疾行迟病作之有蚤有晏甚者内外失守真邪不分陰阳迭胜寒热互起则休作无定时矣疰有数种○风疰自感风而得恶风自汗烦燥头疼转而为疰风阳气也故先热後寒可与解散风邪如川芎白芷青皮紫苏之类或细辛?榔佐之温疰一证亦先热後寒此为伤寒坏病与风疰大略则同热多寒少小柴胡汤热少寒多小柴胡汤内加官桂○寒疰自感寒而得无汗恶寒挛痛面惨转而为疰寒陰气也故先寒後热可与发散寒邪生料五积散增桂养胃汤或良姜乾姜官桂草果之类甚则姜附汤附子理中汤○暑疰者暑胜热多得之一名瘧疰陰气独微阳气独发但热不寒里实不泄烦渴且呕肌肉消铄盍用小柴胡汤香薷散呕者缩脾饮加生姜温服下消暑圆热多燥甚者少与竹叶汤常山柴胡於暑证最便○湿疰者冒袞雨湿汗出澡浴得之身体痛重肢节烦疼呕逆胀满盍用五苓散除湿汤加苍术伏苓辈寒多者术附汤最良○牝疰者久受陰湿陰盛阳虚阳不能制陰所以寒多不热气虚而泄凄惨振振柴胡桂姜汤减半黄芩加以半夏施之为当○食疰一名胃疰饮食无节饥饱有伤致然也凡食啖生冷咸藏鱼塩肥膩中脘生痰皆为食疰其状苦饥而不能食食则中满呕逆腹痛青皮陈皮草果半夏缩砂白豆?作剂或四兽汤下红圆子自有奇功○瘧疰挟岚瘧溪源蒸毒之气致然也自岭以南地毒苦炎燥湿不常人多瘧疰其状血乘上焦病欲来时令人迷困甚则发燥狂忘亦有哑不能言者皆由败血瘀於心毒涎聚於脾坡仙指为脾胃实热所致又有甚於伤暑之疰耳治之须用凉膈疏通大肠小柴胡加大黄治瘧木香圆观音圆皆为要药○如前数证经久不瘥真气已耗邪气犹存则有所谓劳疰疰母者焉表里俱虚真元未复疾虽暂止小劳复来谓之劳疰法当调养气血川芎当归官桂芍药辈所不可无○弥年阅岁经吐汗下荣卫亏损邪气伏藏脇间结为症癖

谓之疟母此证未可直攻急作乌头七枣汤以扶其里俟其内气已充继此经效疟丹或消癖圆下之取愈大抵疟之初得三数日间如火燎原不可向迤波涛汹涌未易回澜当俟其稍定而图之经所谓其盛者可待衰而已疟方来与正发及将解不可投药耗其真气投药当於未发以前两时之先或遇发日凌晨空心与之诸疟之脉大约尺寸俱弦或浮数或紧实或缓濇或虚迟或左手濡而右手盛或尺寸盛而关中濡不可定名以为弦也总前治法弦数多热者寒之弦迟多寒者温之浮弦浮紧浮数其邪在表者可汗弦实沉实数实其邪在里者可下若夫调胃气利痰水分阴阳行三焦是又治法之纲领也渴欲水浆药入辄吐人参煎汤效抑犹有说焉尝读二广撮生见其论议若瘴疟若暑毒每用疎转之剂取下根源里有先伤暑後发疟涉年余者度其腹中有癖水磨沉香下解毒雄黄圆黑血如泥泄下极臭由是获愈因知诸疟皆有根在治法之外又当随轻重而利导之实者与巴豆大黄虚者用养正丹辈不然常山於疟每每作效何耶盖疟家多蓄黄水常山为能破其癖而下其水也

疟症证治

麻黄白术汤治感风发疟

麻黄【去节】 官桂 青皮

陈皮 川芎 白芷

半夏麴 紫苏 茯苓

白术 北梗 甘草【炙等分】

加细辛 槟榔

右剉散每服叁钱姜肆片枣贰枚空心煎服

五积散感寒发疟初作以此解散

苍术【炒贰两】 北梗【壹两】 麻黄【去节】

枳壳【制】 陈皮【各陆钱】 乾姜

厚朴【制各肆钱】 川芎 当归

白芍药 白芷 甘草【炒】

半夏【制】 官桂 茯苓【各叁钱】

右剉散每服叁钱水盞半葱白叁寸姜叁片煎半空心服

养胃汤加桂治感寒发疟

厚朴【制】 苍术【炒】 半夏【制各壹两】

人参 茯苓 草果

藿香【各半两】 橘红【叁分】 甘草【炙壹分】

右剉散每服叁钱水盞半姜伍片乌梅半个煎半温服

解毒雄黄圆【方见积热门】

养正丹主寒疟【方见痼冷门】 姜附汤附子理中汤主寒疟【方见寒类】

草果饮诸疟通用加乾姜治寒疟

草果 白芷 良姜

青皮 川芎 紫苏叶

甘草【炒等分】

右剉散每叁钱煎服

小柴胡汤治暑疟纯热【方见血类】 或寒热等则加桂

香薷散治伤暑发疟

香薷【肆两】 厚朴【制】 扁豆【制各贰两】

右剉散每叁钱乌梅壹个水煎临熟入姜汁壹匙温服

五物香薷汤香薷缩脾饮并主暑证【方见暑类】

常山饮治伤暑发疟

嫩黄川常山 知母 草果仁

甘草【炙各壹两】 良姜【陆钱】 乌梅肉【半两】

右?咀每叁钱水壹碗姜伍片枣叁枚煎半稍冷服

七宝剉散治暑症诸症

川常山 鸡心?榔 青皮【刮去白】

甘草【炙各半两】 草果仁【贰钱半】

右细剉每叁钱桃柳枝各?寸乌梅叁个水大碗煎半稍冷空心服

五苓散治伤湿发症及小便不利【方见水饮类】

加剂除湿汤术附汤并主湿症或加官桂茯苓【方见湿类】 柴胡桂姜汤治牝症但寒或寒多微热

柴胡【贰两】 辣桂【叁分】 栝蒌根【壹两】

乾姜【炮】 甘草【炙】 牡蛎【煨各半两】

黄芩【叁钱叁字】 内加半夏麴【半两】

右剉散每服叁钱姜枣煎服

二陈汤治食症诸症

陈皮 半夏【制各伍两】 茯苓【叁两】

甘草【炙壹两】

右?咀每服叁钱姜伍片乌梅半个煎服寒多者加草果热多者加前胡如青皮?榔缩砂白豆?之类随意增用

四兽汤治食症诸症和胃消痰

半夏【制】 人参 茯苓

白术 橘红 草果

生姜 乌梅 大枣【各等分】

甘草【炙減半】

右?咀以塩少许淹食顷湿纸厚裹慢火煨香熟每服肆钱水壹碗煎半温服

红圆子治食疟食积气滞腹胀

京三棱【水浸软截碎】蓬莪木【煨】 青皮

陈皮【各伍两】 胡椒 乾姜【炮各叁两】

右为末米醋煮米粉糊圆桐子大矾红为衣每伍拾圆二陈汤四兽汤皆可下

乌头七枣汤治久疟但久疟但寒及脾寒发疟或寒重热轻

大川乌头【壹个慢火灰炮裂以塩水浸再炮再浸凡七次去皮脐】

右细剉分貳服每服姜?厚片枣?个葱白三寸水大碗煎半先吃枣稍冷服

又方用小附子壹枚修制一同乌附皆能温脾挟风则用川乌寒甚则用附子

治瘴木香圆

牵牛【壹斤淘去浮者焙捣捣取末肆两别顿】 鸡心?榔

陈橘红【各貳两】 青木香 人参

熟附子 厚朴【制】 官桂【去麤皮】

京三棱 羌活 独活

乾姜【炮】 甘草【炙】 川芎

川大黄【剉焙】 芍药【各半两】 肉豆?【陆个】

右为末磁器密收临用枰牵牛末一两诸药末共壹两研和炼蜜圆桐子大每服贰拾圆橘皮煎汤下以通利为度

地龙饮治瘴症诸症大热烦燥

生地龙【叁条研极细】

右入生姜汁薄荷汁生蜜各少许新汲水调下如热炽加脑子少许

观音圆取下暑毒瘴毒

圆白半夏【生】 乌梅肉 母丁香

川巴豆【不去油每件各拾枚】

右为末姜麪糊圆麻子大上下以厚纸盖贴有油又再易纸每服伍圆临卧冷水下此方舟人
於海角遇一白衣授之

芎归鳖甲散治劳症寒热

当归 川芎 芍药

青皮 陈皮 茯苓

半夏【制各壹分】 鳖甲【醋炙黄半两】

右剉散每叁钱姜伍片枣贰个小乌梅壹个水煎服热多加柴胡寒多加草果

五劳圆治劳症瘴症久病

嫩黄常山【叁两半】 桃仁【去皮尖炒壹两贰钱】 辣桂【去麤皮?钱半】 淡?【叁两】
乌梅肉【贰两半】

右日乾为末炼蜜圆梧子大每叁肆拾圆空心温酒下不饮者熟水入些酒下

经效症丹治症母结癖寒热无已

真阿魏 雄黄【各贰钱半】 朱砂【壹钱半】

右沸汤泡阿魏研散雄朱为末和之稀麪糊圆桐子大每壹圆人参煎汤候冷空心服瘴症桃
枝煎汤冷服临发磨壹圆傅鼻头口畔

消癥圓治疰母停水結癥腹脇堅痛

芫花【炒】 朱砂【研細等分】

右為末煉蜜圓小豆許每拾圓濃煎棗湯下去癥須用芫花大戟破水之劑下後即與養胃湯

驅疰湯治諸疰久疰

草果仁 青皮 陳皮

人參 伏苓 半夏【制】

厚朴【制】 蒼朮【炒】 雞心?榔

白朮 甘草【炙各半兩】 良姜【壹分】

右剉散每叁錢姜伍片棗貳枚烏梅壹個空心煎服

生熟飲治脾寒發疰及寒多熱少

草果 肉豆?【各兩個壹煨壹生】

川厚朴【方寸許二片】 生薑【貳塊半生半濕紙煨】 甘草【貳寸半生半炙】

右剉散分貳服每服壹碗水貳棗壹烏梅煎半空心服

蒜丹圓截疰消痰

革丹【煨】 穿山甲【熱灰中炮焦各壹分】

土朱【半兩】

右為末以獨頭蒜煨去皮研膏圓桐子大每拾圓生薑烏梅紫蘇煎湯下

七物湯治諸疰

常山【酒浸蒸】?榔 草果

青皮 陳皮 川厚朴【制】

甘草【炒等分】

右剉细每服叁钱姜伍片乌梅贰个水壹碗煎半露壹宿来早温服之如热多加柴胡

截疟丹臻志修合

土朱【贰两半净末】 真绿豆粉【贰两壹两生入药壹两煮糊】

信砒【有锋芒者半两研细生】

右用绿豆粉糊筑和叁件圆如麻子每服止贰圆新汲水研桃软空心服是日饮食微和而已

胜金圆治一切疟寒热不一呕恶头疼烦渴喘息痰聚中满

鸡心?榔【壹两日乾】 川常山【酒浸蒸焙肆两】

右为末水麪糊圆桐子大每服叁拾圆於未发前半日冷酒下便睡不得吃热汤饮次日又用冷酒下贰拾圆仍不得吃热饮食又次日饮食无拘

治疟方二陈汤贰贴加常山贰钱分作两服每服姜?片枣贰枚乌梅贰枚水壹碗煎陆分候微冷吞前件脾积圆?圆次日吞叁圆

六物汤治久疟不已寒少热多

嫩常山【贰钱半】 柴胡 鸡心?榔

青皮【去白各贰钱】 草果仁 甘草【炙各壹钱半】

右剉分叁服每服大软乌梅贰个好夏酒準壹啜许新水贰盏煎半隔宿露空以纱盖之次早拂明服若寒热等加制厚朴贰钱略煖服是日饮食皆勿用热

附诸方

白虎加桂枝汤【活人方】 治疟疾但热不寒及有汗者

知母 甘草【炙】 桂枝

粳米【各叁两】 石膏【壹斤】

右?咀每服伍钱水盞半煎至壹盞去滓温服

大柴胡汤治疟热多寒少目痛多汗脉大以此汤微利为度余邪未尽以白芷石膏三物汤以尽其邪【方见伤食门】清脾饮【济生方】治瘴疟脉来弦数但热不寒或热多寒少口苦咽热小便赤澀

青皮【去白】 厚朴【姜制】 白术

半夏【汤泡?次】 黄芩 草果仁

柴胡【去苗】 茯苓【去皮】 甘草【炙各等分】

右?咀每服肆钱水盞半姜伍片煎?分温服不拘时

正气散【徐同知方】 退寒疟止胃寒进食

藿香 草果【各肆两】 半夏

陈皮 厚朴 砂仁

甘草【各壹两】

右剉为散生姜枣子煎服如疟未止俟发日早服

六和汤

人参 草果 知母

贝母 乌梅 白芷

?榔 柴胡【各壹钱用酒拌】 常山【贰钱】

右?咀姜叁片枣壹枚酒水同煎露壹宿临发前贰时服

疟疾治例【出明医杂着】

王节斋曰疟是风暑之邪有一日一发有二日一发有三日一发有间日连二日发有日与夜各发有有汗有无汗有上半日发有下半日发有发於夜者治法邪从外入宜发散之然以扶持胃气为本又须分别阳分陰分而用药邪疟及新发热者可散可截虚疟及久者宜补气血

若过服截药致伤脾胃则必延绵不休

主方

柴胡【去苗】 白术 苍术【米泔浸各壹钱】 已上三味疟疾必用之药

陈皮【?分】 甘草【炙伍分】 乾葛【壹钱贰分】

若一日一发及午前发者邪在阳分加枯黄芩伏苓半夏【各壹钱】 热甚头痛加川芎软石膏【各壹钱】 口渴加石膏知母麦门冬【各壹钱】

若间日或三日发午後或夜发者邪在陰分加川芎当归酒炒芍药熟地黄酒炒知母【各壹钱】 酒洗红花酒炒黄芩【各肆两】 提起阳分可截之

若间一日连发二日或日夜各发者气血俱病加人参黄芩白伏苓【各壹钱】 以补气川芎当归白芍药熟地黄【各壹钱】 以补血

若阳疟多汗用黄芩人参白术以敛之无汗柴胡苍术白术黄芩乾姜以发之

若陰疟多汗用当归白芍药熟地黄黄芩黄蘗以敛之无汗柴胡苍术大川芎红花升麻以发之故曰有汗者要无汗正气为主无汗者要有汗散邪为主

若病人胃气弱饮食少或服截药伤脾胃而少食者加人参【壹钱半】 酒炒芍药大麦芽【各壹钱】

若伤食痞闷或有食积者加神麴麦芽枳实【炒各贰钱】 炒黄芩【伍分】

若痰盛加姜制半夏南星枳实【炒各壹钱】 黄芩黄连【各陆分】 若欲截之加?榔黄芩青皮常山【各壹钱】 乌梅淨肉【三个肥者】

若日久虚疟寒热不多或无寒而但微热者邪气已无只用四君子合四物汤加柴胡黄芩陈皮以滋补气血

仁斋直指卷十二

卷十三

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷十三 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

霍乱吐泻

吐泻方论

乾上坤下其卦为否阳隔陰而不降陰无阳而不升此否之所以痞而下通也人具此陰阳挥霍变乱结搏於中卒然吐泻或泻而不吐或吐而不泻大抵心腹扰闷烦疼其视天地不交之否异乎否乎霍乱之证心腹卒痛呕吐下利发热增寒头痛眩暈先心痛则先吐先腹痛则先泻心腹俱痛则吐泻俱作甚则转筋颓顿特反掌间盖足阳明属胃以养宗筋暴吐暴下津液骤亡宗筋失其所养故挛急甚则舌卷缩囊危甚风烛矣然亦何以致此哉曰胃伤暑毒露卧卑湿当风取凉风冷邪气入於肠胃加以嗜好肥腥饮啖生冷居处不节激而发焉於是邪正相干中脘节闭气不得通吐利暴作所谓脾受贼邪木来胜土者此也治法霍香正气散加霍香生姜为上不惟可以温散风邪抑亦可以调理吐泻其若伤暑所致未可遽投香薷散沉冷之剂自合先治中脘如二陈汤橘皮半夏汤辈次则以香薷温服散暑解烦味者指为脾胃虚冷遽用人参白术苟子肉豆?之属以壮胃澁肠不思风冷未散骤以参术苟蔻拦补寒邪邪气得之愈盛愈作纵得淹延或下痢或久泻或腹胀虚浮或中满不食变证百出矣抑犹有说焉湿霍乱死者少乾霍乱死者多许仁则尝有是言矣盖谓所伤之物因吐利而出泄泄尽则止犹可幸免若上不得吐下不得利所伤之物拥闭正气关隔陰阳燥扰喘胀其能生乎则知挥霍变乱如人被髮交争必有以掇之可也古方用来复丹正取疎利之意但多则太温莫若姜汤下苏感圆为愈霍乱气息劣不欲言者不治

又论

治呕吐莫先於助胃既助胃而复呕吐者中脘挟风寒也治喘嗽莫先於调肺既调肺而复喘嗽者风寒在表或在里也泻痢之疾固肠断下终不作效非肠胃间留蓄风寒邪气之所致乎故必随其感受解散於其先则某病某药庶乎其对证矣解散风寒不换金正气散为上其间增益则青皮官桂良姜乾姜择用最良若欲其清解则紫苏荆芥乾葛柴胡等辈剂量可也惟暑亦然每每隐伏作病或为热呕或为焦烦或为腹痛或泄痢不止暑中类多有之炎烁蘊隆念虑又当及此此说虽详於卷首敬用申之

吐泻证治

霍香正气散治霍乱吐泻通用腹痛者加桂小便不利者加茯苓【方见呕吐门】此药能温散风寒湿气若暑证加香薷

五苓散治霍乱热多发渴【方见水饮门】

良姜饮治霍乱神效

良姜 霍香 陈皮【各壹两】

甘草【炙叁分】

右剉细每叁钱水煎服

又方

霍香叶 良姜 木瓜

右同煎治霍乱水泻效

治要除湿汤

半夏麴 川厚朴【制】 苍术【炒各贰两】

霍香叶 陈皮 茯苓【各壹两】

甘草【炙?钱】

右剉散每服肆钱姜?片枣壹枚煎服霍乱泻而不吐者加桂吐而不泻者去苍术加桂丁香吐泻俱作兼腹痛者只加桂

胡椒汤治霍乱吐泻

胡椒【?粒】 生绿豆【贰拾壹粒】

右末煎宣木瓜汤温和调下

治中汤治饮食居处不节以致霍乱【方见呕吐门】本方青皮陈皮乾姜能散风冷

香薷剉散治伤暑霍乱【方见暑门】

木瓜汤治吐泻不已转筋扰闷

酸木瓜【壹两】 茴香【壹分微炒】 甘草【炙贰钱】

吴茱萸【半两荡?次焙】

右剉散每肆钱姜伍片紫苏拾叶空心急煎服

四顺附子汤治吐泻过多手足逆冷六脉沉细气小不语急服

生附子 白姜【炮】 人参

甘草【炒各壹分】

右剉每服肆钱水贰盏煎壹盏空腹服腹痛加桂小便不利加茯苓仍用炒盐熨或用姜附汤【方见寒类】

姜盐饮治乾霍乱欲吐不吐欲泻不泻痰壅腹胀

盐【壹两】 生姜【半两切】

右同炒令色变以童尿两盏煎壹盏分为贰温服

塩汤法治乾霍乱心腹绞痛欲吐不吐欲下不下先以盐汤壹盏顿服候吐出令透不吐再服续以理中汤倍加橘红与之或霍香正气散加官桂茯苓倍加枳殼或苏合香圆用枳殼散调下

苏合香圆【方见诸气门】用枳殼壹分木瓜半分煎汤调下治乾霍乱不吐不泻气痞於中心腹绞痛此证最恶盐熨方治霍乱吐泻心腹作痛

炒盐贰碗纸包纱护顿其胷前并腹肚上截以熨斗火熨气透则苏续又以炒盐熨其背则十分无事

霍乱吐泻临时无药以生蒜头研细涂心下及两脚心即止附诸方

不换金正气散治霍乱转筋呕吐泄泻头疼【方见泻痢门】六和汤治心脾不调气不升降霍乱吐泻暑天泻痢【方见暑门】理中汤治中寒霍乱吐泻【方见寒门】

七气汤【三因方】治七气郁结五脏之间互相刑剋陰阳不和挥霍变乱吐利交作

半夏【汤洗伍两】厚朴【姜制】桂心【各叁两】白芍药 伏苓【去皮各肆两】
紫苏叶

橘皮【各貳两】人参【去芦壹两】

右?咀每服四钱水一盞酒半盞生姜七片枣一枚煎七分温服

加减理中汤

人参 白术 乾姜

甘草【炙各等分】

若为寒气温气所干者加附子壹两名附子理中汤若霍乱吐泻加陈皮青皮各壹两名治中汤

若乾霍乱心腹作痛先以盐汤少许频服候吐出令透即进此药

若呕吐者於治中汤内加丁香半夏壹两每服生姜拾片同煎

若泄泻者加橘红伏苓各壹两名补中汤

若溏泄不已者於补中汤内加附子壹两○不喜饮米谷不化者加缩砂仁壹两共成八味

若霍乱吐下心腹作痛手足逆冷於本方内去白术加熟附名四顺汤

若伤寒结胃先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及诸吐和後胃痞欲絶心膈高起急痛手不可近者加枳实伏苓各壹两名枳实理中汤

若渴者再於枳实理中汤内加括蒌根壹两

若霍乱後转筋者理中汤内加火煨石膏壹两若脐上筑者肾气动也去术加官桂壹两半肾恶燥故去术恐作奔豚故加官桂

若悸多加伏苓壹两

若渴欲饮水者添加术半两

若腹满者去白术加附子壹两

若饮酒过多及啖炙煖热食发为鼻衄加川芎壹两若伤胃吐血以此药能理中脘分利阴阳安定血脉

泄泻

泄泻方论

胃为水谷之海其精英则流布以养脏腑其糟粕则传送以归大肠肠胃虚弱或挟风挟寒或伤暑伤湿停冷蓄热冷热不调泄泻诸证皆能致之挟风者自汗恶风痛引腰背挟寒者筋节拘急身体怯寒伤暑者面垢燥渴泛引水浆伤湿者肌肉虚浮肢体重着冷则肠鸣肚冷而手足清静则烦燥肚热而手足温冷热不调者由热积於内不能去其积徒以冷药冰之热气无所发泄故冷与热搏而下注其或冷积於中不能去其滞徒以热药压之冷积不得宣行故热与冷干而成泄或澁或溏里急後重是其候也外此则伤食一证失饥伤饱胃不能消心腹膨胀所下酸臭可验焉治法当究其感受之源然後为之固实不窒其源吾恐决溃四出莫知其终者矣虽然脾胃合气以消水谷水谷既分安有所谓泄人皆以泄为脾恙而不知肾病有泄焉肾泄何如曰腹痛无定处似痢非痢骨弱面黧脚下时冷者是也前件诸方条例于后至若泄利之後腹满身疼是则为表里俱病先当温里急与四逆汤然後解表急以桂枝汤与之活人书言之详矣抑犹有绪余之论焉肝者脾之贼木能胜土古人虑之固也经曰肝肾气虚为病泄泻亦孰知肾者所以守司於下而肝者又门户要束之具束则不泄也不然泄泻而面色青惨者古书谓肝经受寒所致特设当归厚朴汤以主之果何意哉【下利恶证具载活人总括】

泄泻证治

理中汤治肠胃虚弱渗漉有声泄泻频并

人参 白术 乾姜【炒】

甘草【炒各壹两】 加茯苓 川厚朴【制各叁分】

右剉细每服叁钱空心煎服

调中散治肠虚泄泻止呕进食

藿香叶 缩砂 蓬术【炮】

乾姜【炮】 肉桂 茴香【炒】

草果【各半两】 麦牙【炒】 益智仁

橘红【各叁分】 苍术【炒】 神麴【炒】

甜梗【各壹两】 甘草【炙叁钱】

右末每服叁钱姜枣并少盐煎服

肉?散治脾虚肠鸣泄泻不食

大肉豆?【壹枚剉小窍子入乳香三小块在内以麴裹煨麴熟为度去麴】

右末每壹钱水饮调下

治要除湿汤治风邪泄泻加辣桂寒邪泄泻加乾姜良姜通用加木香【方见吐泻门】

香薷剉散【方见暑门】治伤暑泄泻更增茯苓

平胃散治伤湿泄泻

橘红 厚朴【制各叁两半】 苍术【炒伍两半】

甘草【炙壹两】

右剉细每服叁钱姜枣煎服

又法以生料五苓散对夹平胃散用陈米煎暑泻湿泻诸证皆验

黄连阿胶圆治暑泻热泻【方见嗽门】用五苓散送下【方见水饮门】又洞泄方车前子末米饮下

藁皮汤治协热泄泻亦治血痢

藁皮【叁两】 黄芩【贰两】 黄连【壹两】

右剉每服肆钱水大盏煎?分入阿胶末半钱再煎少顷温服

姜附汤治冷证泄泻【方见寒类】米附汤【见湿类】通用

大已寒圓治虛冷腸鳴滑泄

良姜 乾姜【炮各陸兩】 肉桂

萆撥【各肆兩】

右末麪糊圓桐子大每伍拾圓米飲下

戊己圓治冷熱不調泄瀉

吳茱萸【炒】 黃連【去須】 白芍藥【等分】

右末米糊圓桐子大每叁拾圓空心米飲下

真人養脏湯治冷熱不調泄瀉里急後重

罌粟殼【去筋萆蜜炙壹兩捌錢】 木香

白芍藥【各捌錢】 訶子肉【六錢】 人參

白朮 當歸【各叁錢】 甘草【炙】

肉桂【各肆錢】

右釐末每服貳錢姜枣煎食前服先用縮砂煎湯下感應圓【方見脹滿門】俟其積消然後服此

鷄舌香散治飧食生冷久為冷積

良姜 辣桂 香附【淨炒】

益智仁 天台烏藥【各壹兩】 甘草【炙半兩】

右末每貳錢入少鹽沸湯點吞感應圓

三棱散酒食傷積用此

京三棱【炮】 蓬莪朮【炮】 益智仁

甘草【炙】 青皮【去白各貳两】 白茯苓【肆两】

右末每貳钱少盐煎吞感应圆治伤食泄泻俟酸臭出尽即服固肠散止之

固肠散治冷泻肠滑及下痢频并

罌粟殼【去筋萆壹两蜜炙】 陈米【炒壹两】

乾姜【炮】 甘草【炙各貳钱半】 肉豆?【生貳钱】 木香【壹钱】

右末每貳钱姜枣煎食前服

实肠散治泄泻不止

川厚朴【制壹两半】 肉豆? 诃子【炮】

缩砂 橘红 苍术【炒】

伏苓【各壹两】 木香【半两】 甘草【炒肆钱】

右麤末每叁钱姜枣煎服手足冷加炒乾姜

安肾圆【方见水饮门】 治肾泄腹痛无定处似痢非痢骨痛面黧腰脚时冷用和剂七气汤送下【方见气门】

震灵丹治肾泄证候同前

禹余粮【火煨醋淬不计遍次手捻得碎为度】 丁香代赭石【如上修制】 赤石脂 紫石英【杵碎以上各肆两入甘锅内以瓦盖口盐泥固济候乾用硬炭壹拾斤煨通红火尽为度入地坑埋出火毒貳宿研末】

的乳香【别研】 没药 五灵脂【并去砂石研各貳两】 朱砂【壹两研】

右并为细末糯米粉糊圆小鸡头大风乾每服叁圆用炒故纸入枣煎汤调钟乳粉少许空心送下小儿肾泄白脓褐汁面黯齿脱猥人怯寒震灵丹末入些钟乳粉以枣煎炒故纸取热汁调下

木香散治脾肾俱虚泄泻

肉豆?【麪裹纸煨】 故纸【炒】 白术

白茯苓【各半两】 木香 甘草【炙各壹分】

右剉细每叁钱食前姜枣煎温服

二神圆治脾肾俱虚泄泻不食

破故纸【肆两炒】 肉豆?【贰两生】

右末用肥枣蒸烂取肉研膏夹和杵圆桐子大每服肆拾圆清米汤下若饭食後常一泄服此顿愈

当归厚朴汤治肝经受寒面色青惨厥而泄利

当归【炒】 厚朴【制各贰两】 官桂【叁两】

良姜【伍两】

右剉散每叁钱食前服

附诸方

白术芍药汤【机要方】 治太陰脾经受湿水泄注下体重微满困弱无力不欲饮食暴泄无数水谷不化

白术 芍药【各壹两】 甘草【伍钱】

右?咀每服壹两水煎

升阳除湿汤【拔粹方】 治脾胃虚弱不思饮食肠鸣腹痛泄泻无度小便黄色四肢困弱

升麻 柴胡 防风

神麴 泽泻 猪苓【各半两】

苍术【壹两】 陈皮 甘草【炙】

大麦芽【各叁钱】

右?咀水煎食後热服

升阳除湿防风汤【东垣方】如大便闭塞或里急後重数至圉而不能便或有白脓或血慎勿利之利之则必致重病及郁结而不通也又此道举其阳则陰气自降矣

苍术【米泔浸去皮乾淨肆两】 防风【貳钱】

白术 白茯苓 白芍药【各壹钱】

右?咀除苍术另作片子水壹碗半煎至貳盞内诸药同煎至壹大盞食前热服

益胃汤【拔粹方】治头闷劳动则微痛不喜饮食四肢怠惰燥热短气口不知味肠鸣大便微溏黄色身体皆闷口乾不喜饮冷

黄芪 甘草 半夏【汤泡各貳分】

黄芩 柴胡 人参

白术 益智【各叁分】 当归梢

升麻【各半钱】 陈皮【半钱】 苍术【壹钱半】

右?咀水盞半煎捌分食前通口服

胃苓汤治感暑夹食泄泻烦渴平胃散五苓散相合

苍术 陈皮 厚朴【姜制】

甘草 白术 茯苓

猪苓 泽泻 桂

右?咀水煎入盐少许服如作末药汤服亦可

柴苓汤分理陰阳治泻解热

柴胡 黄芩 半夏

甘草【減半】 人参 猪苓

白术 伏苓 泽泻【各等分】

水貳鍾姜叁片煎服

养胃汤治脾胃虚寒呕逆恶心腹脇胀痛肠鸣泄泻【方见痰疟门】

五苓散益元散【并见暑门】

丹溪方治一老人奉养太过饮食伤脾常常泄泻亦是脾泄

黄芩【炒半两】 白术【炒貳两】 白芍药【酒拌炒】 半夏【泡各半两】 神麴【炒】
山查【炒各壹两半】 霍香【壹两】

右为末青荷叶包饭烧熟研丸如梧子大食前白汤下

钱氏白术散治气血俱虚神弱之人或吐泻

人参 白伏苓 白术

木香 甘草 霍香【各壹两】

乾姜【半两】

右为粗末每服伍钱水壹鍾煎?分食前温服

参苓白术散治脾胃气虚饮食不进或致吐泻【方见虚劳门】 温脐止泻散治大人小儿久
泻滑脱不止

乾姜【微炒】 白芷 附子【生各壹钱】

右为细末用生白蜜丸如弹子大按入内一二日即止

泄泻治例【出明医杂着】

王节斋曰泄本属湿然多因饮食不节致伤脾胃而作须看时令分寒热新久而施治治法补
脾消食燥湿利小便亦有升提下陷之气用风药以胜湿亦有久泄肠胃虚滑不禁者宜收澀
之

主方

白术【貳钱】 白茯苓 白芍药【炒各壹钱半】 以上三味泄泻必用之药

陈皮【壹钱】 炙甘草【去皮伍分】

若伤食泄黄或食积加神麴大麦芽山楂子【各壹钱】 炒黄连【?分】 消之腹中窄狭饱闷
再加厚朴枳实木香【各伍分】

若小便赤澁短少加泽泻猪苓木通【各壹钱】 以分利之夏月再加茵陈【?分】 炒山梔仁
【肆分】

若口渴引饮加乾葛【壹钱半】 人参麦门冬【各壹钱】 升麻滑石【各肆分】 乌梅肉【
貳个】

若夏秋之间湿热大行暴注水泄加炒黄连苍术泽泻【各壹钱】 升麻木通【各伍分】 发
热燥渴加乾葛石膏【各壹钱】 黄疸小便黄赤加茵陈【壹钱】 山梔木通【各伍分】

若饮酒便泄此酒积热泻也加炒黄连茵陈乾葛【各壹钱】 木香【伍分】 神麴麦芽【各
捌分】

若寒月溏泄清冷腹痛或伤生冷饮食加神麴麦芽炙乾姜【各壹钱】 砂仁益智木香【各?
分】

若久泄胃气下陷服利小便之药而不效宜加人参黄芪【各壹钱】 以补中气升麻柴胡【
各肆分】 以升提之加羌活防风藁本白芷等风药【各叁肆分】 助风以平之更加炙乾姜
【伍分】 以固之

若久泄脾胃虚弱食少难化加炙黄芪人参【各壹钱】 神麴麦芽【各壹钱贰分】 木香【
煨过】 乾姜【炙各伍分】

若久泻肠胃虚滑不禁加肉豆?【壹钱】 诃子皮赤石脂【各壹钱】 煨木香炙乾姜【各伍
分】

针灸法脾腧二穴【在十一推下两傍各开寸半主泄泻】 中脘一穴【在脐上四寸主腹痛
泄泻】 关元一穴【在脐下三寸疗腹泄不止】 天枢二穴【在脐傍各开三寸治腹满脾泄
泻痢】 大肠俞二穴【在十六推下各开寸半灸三壮治肠鸣腹?胀暴泻】

仁斋直指卷十三

卷十四

钦定四库全书

仁斋直指卷十四 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

泻痢

泻痢方论

痢与泻名目不同而感受之源一也风邪得之鼻塞恶风腰背强痛寒邪得之面惨恶寒肢体拘挛受暑得之面垢背寒自汗发渴受温得之一身尽痛重着浮黄或停冷则凄清肠鸣或蕴热则发热烦燥冷热不调者乍澁乍溏饮食伤饱者注下酸臭诸有积以肚热纏痛推之诸有气以状如蟹渤验之究其受病之源决之对病之剂大要以散风邪行滯气开胃脘为先不可遽用肉豆?苟子白术辈以补住寒邪不可遽投罌粟殼龙骨牡蛎辈以闭澁肠胃邪气得补而愈盛补之愈盛而愈作不为纏扰撮痛则为里急後重所以日夕淹延而未已也痢之赤白其赤者热乘於血血渗大肠则赤也若风邪挟热则所下黄而赤焉其白者冷搏肠间津液凝滯则白也若寒邪并之则所下白而黑焉冷热相交故赤白相半重者状若脓涕而血杂之轻者白涕中间微有赤缕是也内挟风邪故清血流注或湿毒乘虚入肠胃之间则下如豆汁或有瘀血是也论者以手足寒为冷手足温为热於理甚当亦当合赤白而并观之庶乎其的矣虽然风寒暑湿感之於外者也其有大嚼伤饱宿酒浆醢醢以成积滯房闋纵情加奔走劳役以耗精血此非病生於内者乎必明白内外而权度之则受病浅深用药轻重知有定向矣母槃曰无积不成痢○下痢壮热须用败毒散加陈米间与五苓散黄连阿胶丸○下痢虽曰有积有暑如用药不效即是肠胃有风邪热者赤者与败毒散冷者白者不换金正气散加木香

泻痢证治

败毒散治风邪寒邪壮热下痢【方见寒类】陈米饮调五苓散佐之【方见水饮门】

不换金正气散治风邪寒邪冷证下痢【方见寒类】

治要除湿汤【方见吐泻门】加官桂木香治风寒冷证下痢加乾姜伏苓治伤湿下痢仍以五苓散利其小便

理中汤【方见泻门】加厚朴木香伏苓治湿冷下痢

艾姜丸治湿冷下痢脓血腹痛妇人下血

乾艾叶【肆两炒焦存性】川白姜【壹分炮】

右为末醋煮麪糊丸桐子大每?拾丸食前清米饮下

人参豆?散冷证泻痢通用

木香 厚朴【制】 苍术【米泔浸晒】

乾姜【炮】 肉豆?【生各贰两】 半夏麪

陈皮 阿胶【炒各肆两】 缩砂

甘草【炒各贰两半】 罌粟殼【去筋萆醋淹炒肆两】

右剉每叁钱姜枣煎食前服

香薷剉散五物香薷汤六和汤【方见暑门】治伤暑下痢五苓散佐之

升麻汤

升麻 白芍药 甘草【炙各拾两】

白乾葛【拾伍两】

右麪末每叁钱姜叁片同煎吞感应丸治伤暑下痢?痛

黄连阿胶丸【方见嗽门】 藁皮汤【方见泻门】治热证发热下痢亦治暑痢

香连丸治冷热不调泻痢

黄连【壹两用茱萸半两炒去茱萸不用】 木香【壹分】

右取香连为末醋糊丸桐子大每叁拾丸米饮下前戊己丸通用

真人养脏汤治冷热不调下痢【方见泻门】依前法用之三棱散治食积下痢腹痛【方见泻门】依前法用之

感应丸【方见诸气门】解毒雄黄丸【方见积热门】治诸积下痢用五苓散送下

和剂流气饮大异香散五膈宽中散【方见诸气门】治诸气痢牛乳汤治气痢泄如蟹渤

萆拔末【貳钱】牛乳【半升】

右同煎減半空腹服

茱连丸治赤白下痢

吴茱萸【拣净】黄连【去须半寸一截同炒熟分为二处】

右各碾末醋麪糊丸桐子大赤痢专服黄连白痢专服茱萸赤白并服或多或少以意增减每服?拾丸陈米饮下以愈为度

胃风汤治风冷客入肠胃泄下鲜血及肠胃湿毒下如豆汁或下瘀血

人参 白茯苓 川芎

当归 辣桂 白术

白芍药【等分】

右剉每服叁钱粟米百余粒同煎食前热服腹痛加木香

肉?散治冷证久痢不止【方见泻门】

附子理中汤姜附汤【方见寒类】术附汤【方见湿类】治虚损久痢四肢厥冷以意择用

禁口痢方

石莲肉【日乾】

右为末每服貳钱陈米饮调下便觉思食仍以日照东方壁土炒真橘皮为末姜枣略煎佐之

断下汤止赤白痢

茯苓 白术【各壹钱】甘草【半钱】

草果【连皮壹枝】 大罌粟殼【拾肆枝去筋萼剪碎醋浸炒燥】

加木香【半钱】

右为麤末分作两服每服姜伍片大枣叁个大乌梅叁个食前煎服固肠散【方见泻门】通用

玉华白丹治脏腑久虚止泻止痢

阳起石【入乾锅煨通红酒淬顿陰地令乾莫见日】 白石脂【煨红】

左顾牡蛎【塩泥周济煨红取白者各半两】 鍾乳粉【壹两】

右研极细如粉和毕糯米糊圆空心米饮下渴者人参汤下亦治肠风下血又震灵丹【方见泻门】通用

赤石脂禹余粮汤治泻痢诸药不效以此固其下焦

赤石脂【剉小块】 禹余粮【煨醋淬以碎为度】

右等分夹和每服肆钱空心煎温服

泻痢须要衣服周密恐伤风冷凡蕴热血痢里急而痛甚虽已踈通荡涤然其痛不减者非热亦非积也荣血亏少阳刚胜陰故尔用药当以川芎为佐荣血一调其痛立止

附诸方

防风芍药汤【拔粹方】治泄痢飧泄身热脉弦腹痛而渴及头痛微汗

防风 芍药 黄芩【各壹两】

右?咀每服壹两水貳鍾煎至壹鍾去滓食前通口服

经验栝皮汤治伤寒下痢亦治久血热痢

藥皮【叁两】 黄芩【貳两】 黄连【壹两】

右?咀每服壹两水貳鍾煎至壹鍾去滓通口服腹痛加山梔子小便不利加赤茯苓阿胶煎服

芍药黄蘗汤【子和方】治一切温热恶心痢频并窘痛无问脓血

芍药 黄蘗【各壹两】 当归

黄连【各半两】

右为末水丸豆大温水下叁肆拾丸等服忌油腻生冷热物

黄连香薷饮治感暑下痢鲜血

清暑益气汤治暑病内伤下痢不思饮食发热【并见暑门】白术芍药汤【机要方】治老人奉养太过饮食伤脾时或泻痢

钱氏白术散治气血俱虚之人或泻或痢【并见泄泻门】苍术芍药汤【粹粹方】治痢疾痛甚者

苍术【贰两】 芍药【壹两】 黄芩

官桂【各伍钱】

右?咀每壹两水贰锺煎至壹锺温服

芍药黄芩汤【拔粹方】治泄痢腹痛或後重身热久不愈脉洪疾者及下痢脓血稠粘

黄芩 芍药【各壹两】 甘草【炙半两】

右?咀每服壹两水贰锺煎至壹锺去滓通口服食前

调胃承气汤小承气汤大承气汤【俱见伤寒门】

四物汤【保命集】治下痢纯血

川芎 当归【酒洗】 白芍药

生地黄 槐花 黄连

御米穀【等分】

右?咀水煎服

地榆芍药汤【拔粹方】治泄痢脓血乃至脱肛

苍术【捌两】 地榆【贰两】 卷栢

芍药【各叁两】

右?咀每服壹两水贰锺煎至壹锺食前通口服

阿胶梅连丸【宣明方】治下痢无问久新赤白青黑疼痛诸证

金井阿胶【净草灰炒透明白别研细】 赤伏苓

乌梅肉【去核炒】 赤芍药 黄栢【剉炒】

黄连【去须】 乾姜【炮】 当归【酒洗各等分】

右为细末入阿胶研匀水丸梧子大温米饮下拾丸食前连夜伍陆服小儿丸如菉豆大忌油腻脂肥诸物

石榴皮散【经验方】治暴泻不止及痢赤白

用酸石榴皮烧存性不以多少空心米饮调下贰钱

保和丸专治脾虚因积作後重者不可下用此消导【方见积聚门】

秘传香连丸治男妇小儿诸般痢疾作痛并久痢虚脱浓血不止者服之神效如初痢一二日之间不可服恐拦住积滞热毒他证愈剧反为咎矣

川黄连【酒润炒伍两】 木香 白豆?【各壹两半】

乳香 没药【各伍钱】

右为细末麝糊丸如弹子大每服壹丸赤者甘草汤 下白者生姜汤下

黄连汤治痢疾

黄连 滑石 生地黄

白芍药 苍术 台术

当归 青皮 条黄芩【各等分】

右?咀每服?钱水貳盞煎捌分去滓食远温服

大柴胡汤治下痢舌黄口燥胃满作渴身热腹胀谵语此必有燥屎宜下後服木香黄连苦坚之三乙承气汤暑毒温热伤後下痢脓血宜服二方【见伤寒门】

针灸法见前泄泻门详施

脱肛

脱肛方论

四十八难曰病之虚实出者为虚入者为实肛门之脱非虚无故然哉盖惟实则温温则内气充而有所蓄惟虚则寒寒则内气馁而不能收而况大肠之厚薄膏脂之瘠肥亦视夫内气之虚实何如耳大凡脱肛须以温汤浇令和软然後摩挲而入治法以温敛行之其有产妇用力过多及小儿叫号努气久痢不止风邪袭虚亦有此证○凡肠头作痒即是腹中有虫生艾苦练根煎汤熏洗仍以乾艾生姜煎服其脱肛肠风痔漏者登溷不可用旧纸若包裹汤药杂物尤不可用才有一毫染污其间立见痛肿如此急以温汤涤之患在肛肠登溷後须用一洗

脱肛证治

蛭皮散治肛门脱出不收

蛭皮【壹个火内烧令焦黄存性】 磁石【半两法醋煎数沸焦磁石?次为末】

辣桂【叁钱】 鳖头【壹枚慢火炙令焦黄】

右细末每服貳钱食前米饮调下仍以破草鞋底炙上面熨按令入

鳖头散治脱肛

鳖头【慢火炙焦黄】

右为末涂傅肠头用软纸衬轻轻按入仍以方寸匕食前米饮调下

磁石散治脱肛

磁石【半两焦入煎沸醋中凡?次】

右为末每服壹钱空心米饮调下

香荆散治脱肛

大香附 荆芥穗【各半两】 缩砂【贰钱半】

右末每服叁钱食前新水煎数沸即服小儿通用

钓肠丸治大肠空冷脱肛不收及肠风诸痔

白矾【枯】 緑矾【枯】 诃子【煨取肉】

枳殼【去穰麩炒】 白附子 生南星

生半夏 生附子【去皮脐已上各壹两】

黄瓜萎【壹个烧存性】 蝟皮【壹个剉碎磁罐烧存性】

鸡冠花【剉炒贰两半】 胡桃仁【?个不用油者罐内烧存性】

右细末醋煮麪糊丸桐子大每服贰拾丸空心温酒下或枳殼散送下

缩砂汤治大肠虚而浹热脱肛红肿

缩砂 黄连 木贼

右末每贰钱米饮调下

黄连阿胶丸【方见嗽门】 治肠虚为暑热所攻脱肛红肿肛门热痛仍以荆芥穗朴硝泡汤温洗次用薄荷煎鹏砂丸津液调傅

铁粉散治大肠本虚风毒客热乘之脱肛红肿

铁粉【研细】

右入白敛末夹和傅之即按入

蒲黄膏治脱肛热痛

生蒲黄以猪膏和传即按入

桑螺膏治脱肛

桑 上缘桑螺子【烧存性】

右末以猪膏和涂雨後缘桑者佳

橡斗膏治脱肛

橡斗子烧存性猪脂和傅

木贼散治脱肛不热

木贼烧存性为末糝以帛按入

独虎散治脱肛不收五倍子半两末井水叁碗入磁瓶慢火煎半续入朴硝荆芥穗各壹钱乘热熏洗仍以五倍子末傅之

石灰方治大肠积冷久年脱肛

石灰炒热以帛包裹肛坐其上冷又别换仍以海螵蛸末傅

败毒散小儿痢後风邪入大肠脱肛不收以此散风邪加陈米煎【方见寒类】

桑叶方

黄皮桑 取叶叁升煎带温

右以布盛罨小儿肛门轻手按入次用门臼中细尘绵包扑之

小儿灸法百会穴直取前後髮际折中横取两耳尖折中在顺之中心端正螺毛处是也两手握蒜灸灸则肛肠自收

湿?证虫蚀肛门咽乾唇疮齿晦【方见活人总括】

附诸方

二灵散治久痢肠胃俱虚肛门自下

龙骨【煨伍钱】 木贼【烧存性贰钱伍分】

右为末掺托之

一方治脱肛用五倍子为末每用叁钱入白矾壹块水贰碗煎洗

一方用蔓陀罗花子连壳壹对橡斗拾陆个捣碎水煎叁伍沸入朴硝热洗其肛自收

一方用浮萍为末乾贴患处

针灸法命门一穴【在十四椎下灸二七壮治大肠虚冷脱肛不收】长强一穴【在尾闾骨尖底灸二七壮治痢肠风痔漏脱肛不收】

仁斋直指卷十四

卷十五

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷十五 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

积热【附 风热火□】

积热方论

酒麪煎?雄附峻补皆能生热谓之积者何哉朝斯夕斯其所由来尚矣夫人偏陰不可以无阳偏阳不可以无陰惟在冷煖得中而已矫枉过正识者忧焉然则欲去积热将何如曰三黄汤圆第一药耳虽然凡热皆出於心热甚则能伤血热出於心洗心散所不可阙热能伤血四顺清凉饮又不可无此自本自根之论也若夫酒後之麪饭後之酒最易积热又当防於未然

积热证治

小柴胡汤诸热通用【方见伤寒摠括】败毒散解热次之【方见寒类】三黄汤治积热蘊隆三焦皆热大小便闭

黄连【去须】 黄芩 大黄【湿纸煨等分】

右剉细每服叁钱姜叁片慢火略煎食後服

三黄圆证治同前即前项药品等为末炼蜜圆桐子大每叁肆拾圆滚水下

洗心散治壮热烦躁风热壅塞大小便秘澁

大黄【湿纸煨】 甘草【炒】 当归

芍药 麻黄【不去节】 荆芥穗【各叁两】 白术【?钱半】

右末每服贰钱半生姜薄荷少许同煎食後服

四顺清凉饮治血热蕴结壅滞

大黄【米上蒸日乾】 赤芍药 当归

甘草【微炙等分】

右为麤末每貳钱半慢火煎服小柴胡汤亦治血热可择用

八正散治心热烦燥目赤咽疼小便淋闭

大黄【湿纸煨】 瞿麦 木通

滑石 篇竹 车前子

山梔仁 甘草【炙等分】

右剉每服叁钱入灯心煎食後服大凡心热要得小便流利而出

甘露饮治诸疮发热

生乾地黄 熟地黄 天门冬

麦门冬【并去心】 黄芩 枇杷叶【刷去毛净】 山茵陈 枳壳【制】 石斛

甘草【炙等分】

右末每服貳钱半食前煎服加乾葛柴胡尤佳

木通散治诸热利小便

生乾地黄 木通 荆芥

地骨皮 桑白皮【炒】 甘草【炙】

北梗【等分】

右剉每叁钱姜叁片煎服

甘豆汤治诸热烦渴大小便澀

黑豆【貳合】 甘草【貳钱】

右生姜?片井水煎汁服

黄连汤治一切热血热眼热酒热并主之

黄连【去须剉碎】

右以井水浸良久磁碗盛之置铁铤内隔汤煖取清汁服再煖

牛黄凉膈圆治上焦壅热口乾咽痛烦燥涎潮

马牙硝 寒水石【煨】 硬石膏【各貳两】 甘草【微炙壹两】 牛胆南星【叁分】
紫石英【半两研飞】

牛黄 脑子 麝香【各壹分】

右末炼蜜圆每两作肆拾圆每服壹圆温薄荷人参汤调下

解毒雄黄圆取积下热

雄黄【研飞】 川鬱金【各壹分】 巴豆【拾肆个去油】

右末醋煮麪糊圆麻子大每服伍圆加至?圆热茶清下里实用此喉闭以热茶清调灌

竹茹汤治胃热而呕吐欲知胃热手足心皆热者是半夏【叁分用姜汁半盏浆水壹升煮去半切焙】 乾葛【叁两】

甘草【叁分生】

右剉散每叁钱青竹茹一弹子许姜枣煎温服或加前胡

诸热酒蒸黄连圆黄连阿胶圆皆可用【方见嗽门】

附诸方

凉膈散治脏腑积热口舌生疮痰实不利烦燥多渴肠胃秘澁便溺不利一切风热并皆治之

连翘 甘草【炙】 大黄

朴硝【各貳两】 薄荷 黄芩

梔子仁【各壹两】

右?咀每服水壹鍾半竹叶?片蜜少许煎食後温服

既济解毒汤治上热头目赤肿而痛胸膈烦闷不得安卧大便微秘

大黄【酒煨】 黄连【酒炒】 黄芩【酒炒】

甘草【炙】 桔梗【各貳钱】 柴胡

升麻 连翘 当归身【各壹钱】

右?咀每服水貳鍾煎食後温服

大金花圆治内外诸热寝汗咬牙睡语惊悸溺血淋闭咳嗽衄血瘦弱头痛并骨蒸肺痿喘嗽者

黄连 黄栢 黄芩

梔子仁 大黄【各等分】

右为末滴水丸如小豆大每服叁拾丸新汲水送下

加味金花圆治内外诸热气壅痰涎溺血淋闭

黄连 黄栢 黄芩

山梔【炒已上各貳两】 桔梗 半夏【泡】

陈皮 人参【去芦各壹两】

右为细末滴水丸如小豆大每服伍拾丸淡姜汤送下

清心莲子饮治上盛下虚心火炎上口苦咽乾烦渴微热小便赤澁或欲成淋者

黄芩 车前子 麦门冬【去心】

地骨皮 甘草【炙各半两】 黄芩【蜜炙】

石莲子【去心】 白茯苓 人参【各?钱半】

右?咀每服水壹钟煎服如发热加柴胡薄荷

经验地仙散治骨蒸肌热一切虚烦

地骨皮 防风【去芦各壹两】 鸡苏

人参 甘草【各贰钱伍分】

右?咀每服壹两姜叁片竹叶伍片水贰钟煎至壹钟去滓通口服不拘时候

五蒸汤治骨蒸劳热自汗

甘草 人参【去芦】 知母

黄芩【各贰钱】 茯苓 熟地黄

葛根【各叁钱】 石膏【伍钱】 竹叶【贰拾片】

右剉?咀作壹服入粳米壹合煎服

十全大补汤治诸虚不足五劳七伤不进饮食久病虚损时发潮热

人参 养荣汤治久病虚损口乾食少欬而下利心惊悸热而自汗【并见虚劳门】

黄芩 鳖甲散治男妇虚热身瘦五心烦热四肢怠惰欬咽乾自汗食少

人参 肉桂 桔梗【各壹钱伍分】 生地黄 半夏【泡】 紫苑

知母 芍药 黄芩

甘草 桑白皮【各贰钱半】 天门冬

鳖甲【各伍钱】 秦艽 茯苓

地骨皮 柴胡【各叁钱】

右?咀每服壹两姜水煎服

乐令建中汤治脏腑虚损身体消瘦潮热自汗将成劳瘵此药大能退虚热生血气

前胡【去芦壹两】 细辛 黄芪【蜜炙】

人参【去芦】 桂心 橘皮【去白】

当归【去土】 白芍药 茯苓【去皮】

麦门冬【去心】 甘草【炙各壹两】 半夏【汤泡?次】

右?咀每服肆钱水壹锺姜伍片枣壹枚煎服不拘时

防风当归饮子治烦渴发热虚烦蒸病

六物汤滋陰退热【并见火门】

龙脑鸡苏丸治心中鬱热消烦渴凉上膈解酒毒治肺热咳嗽吐血鼻衄崩中下血血淋劳烦诸淋胃热口臭【方见火门】

当归补血汤【东垣方】治肌热燥热目赤面红烦渴引饮昼夜不息其脉洪大而虚重按全无通评虚实论云脉虚血虚脉实血实又云血虚发热证象白虎惟脉不长实为辨热若悞服白虎汤必死此病得之於饥困劳役

黄芪【壹两】 当归【酒制貳钱】

右?咀都作壹服水貳盞煎至壹盞去滓稍热服之空心服

柴胡饮子解一切肌骨蒸热畜积热作往来及伤寒发热汗不解或骨蒸肺痿喘嗽妇人余疾产後经病皆治

柴胡 人参 黄芩

甘草【炙】 大黄 当归【酒浸】

芍药【各等分】

右?咀每服?钱水貳锺姜叁片煎捌分食後服

黄连安神丸治心烦懊憹反复心乱怔忡上热胷中气乱心下痞闷食入反出

朱砂【肆钱】 黄连【伍钱】 生甘草【贰钱半】

右为细末汤浸蒸饼丸如黍米大每服壹拾丸食後时时津唾咽下内经云心肺位近而倚偶制其小服此缓治之理也

补中益气汤【东垣方】治阳虚发热久患虚劳

朱砂安神丸【东垣方】治心神烦乱怔忡兀兀欲吐气乱而热似懊憹状【并见内伤门】

泻青丸【钱氏方】治肝经鬱热

当归【酒洗】 龙胆草 川芎

山梔【炒】 大黄 羌活

防风【去芦】

右为末蜜为丸鸡头子大每服壹贰丸

泻黄散治脾热口臭咽乾

藿香【?钱】 山梔【壹两】 石膏【伍钱】

甘草【叁两】 防风【去芦肆两】

右为末蜜酒拌微炒香每服壹钱

火鬱汤治手足心发热

升麻 葛根 柴胡

白芍药【各壹两】 防风 甘草【各伍钱】

右剉每服伍钱连须葱白叁寸煎稍热服不拘时

大青丸治上焦热结劳役发热并瘟疫时行发热【方见火门】 风热

防风通圣散治风热诸证【方见中风类】

定风饼子【不易方】治风客阳经邪伤腠理背脊强直言语蹇澁体热恶寒痰厥头痛肉瞤筋惕手颤鼻渊及饮酒过多呕吐涎沫头目晕眩常服消风去邪【方见伤风门】追风散【和剂方】治诸风上攻头疼目眩鼻塞声重皮肤瘙痒眉角牵引妇人血风一切头风并皆治之

白僵蚕【去丝髻炒】荆芥【各贰两】石膏

川乌【炮去皮脐】防风【去芦叉各肆两】全蝎【炒壹钱】

川芎【叁两】麝香【研】甘草【炙各壹两】

右为末每服半钱食後临卧茶调下

龙脑川芎丸【御药院方】消风化滞除热消痰通利七窍爽气清神

桔梗【壹两伍钱】片脑【陆钱】砂仁【贰钱】

白豆蔻【伍钱】薄荷【去土伍两叁钱】川芎

防风【去芦】甘草【炙各壹两】

右为末炼蜜为丸每两作贰拾丸每服贰丸细嚼茶清送下

附火证

火证方论

刘宗厚曰火之为病其害甚大其变甚速其势甚彰其死甚暴何者盖能燔灼焚焰飞走狂越消铄於物莫能御之游行乎三焦虚实之两途曰君火也犹人火也曰相火也犹龙火也火性不妄动能不违於道常以稟位听命运行造化生存之机矣夫人在气交之中多动少静欲不妄动其可得乎故凡动者皆属火化火一妄行元气受伤势不两立偏胜则病移害他经事非细故动之极也病则死矣经所谓一水不胜二火之火出於天造君相之外又有厥阳脏腑之火根於五志之内六欲七情激之其火随起盖大怒则火起於肝醉饱则火起於胃房劳则火起於肾悲哀动中则火起於肺心为君主自焚则死矣丹溪又曰火出五脏主病曰诸风掉眩属肝火动之类经所谓一水不胜五火之火出自人为又考内经病机一十九条内举属火者五诸热瞀瘈皆属於火之类而河间又广其说火之致病者甚多深契内经之旨曰诸病喘呕吐酸暴注下迫转筋小便浑浊腹胀大鼓之有声如鼓痈疽疮疹瘤气结核吐下霍乱瞀鬱肿

胀鼻塞衄衄血溢血泄淋闭身热恶寒战栗惊惑悲笑谵妄衄蔑血污此皆少陰君火之热乃真心小肠之气所为也若瞽瘵暴瘡冒昧操扰狂越骂詈惊骇附肿疼酸气逆冲上禁栗如丧神守 呕疮疡喉痹耳鸣及聋呕涌溢食不下目抹不明暴注瞶瘵暴病暴死此皆少阳相火之热乃心包络三焦之气所为也是皆火之变见为诸病也为脉虚则浮大实则洪数药之所主各因其属君火者心火也可以湿伏可以水灭可以直折惟黄连之属可以制之相火者龙火也不可以水湿折之从其性而伏之惟黄柏之属可以降之噫泻火之法岂止如此虚实多端不可不察以脏气司之黄连泻心火黄芩泻肺火芍药泻脾火大柴胡泻肝火知母泻肾火此皆苦寒之味能泻有余之火耳若饮食劳倦内伤元气火不两立为阳虚之病以甘温之剂除之如黄芪人参甘草之属若陰微阳强相火炽盛以乘陰位日渐煎熬为血虚之病以甘寒之剂降之如当归地黄之属若心火亢极鬱热内实为阳强之病以鹹冷之剂折之如大黄朴硝之属若肾水受伤真陰失守无根之火为陰虚之病以壮水之剂制之如生地黄玄参之属若右肾命门火衰为阳脱之病以温热之剂济之如附子乾姜之属若胃虚过食冷物抑遏阳气於脾土为火鬱之病以升散之剂发之如升麻葛根之属不明诸此之类而求火之为病施治何所依据故於诸经集略其说备处方之用庶免实实虚虚之祸也滑氏曰虚劳证中多云相火为患者何气使然是为火也请明议焉对曰华陀云三焦者相火也相火之相者譬之如丞相之相也善政之道辅佐周身维持纲纪所接元阳以为一身统领使百脉舒和上焦曰膻中之属宣行气血中焦曰中脘之缘腐熟水谷下焦曰膀胱之所搜便精溺无形而有用焉故曰三焦盖三焦者为诸阳升降之方呼吸发源之所三元有道九窍流通神志相关命脉相继周身有倚血气无偏治化宣和是无虞矣又曰於火为患者何以验云对曰於斯者是因体虚之人房劳过损肾水乾枯无因既济相火顿生或因七情所感或因怒火伤肝肝木相乘为热为风风邪鼓舞火性上炎为百病之长也华陀云三焦积热於火生焉六腑颠危从权所化且如脉来洪数者热之有准乳浮中空者吐血无疑咳嗽咯痰须明虚实欲知治嗽先补其源身热者滋陰清气恶寒者和阳挽陰治寒远寒治热远热甘缓温和调虚之则丹溪云陰虚火动证难治用四物汤加炒黄柏降火补陰龟板补陰乃陰中之至陰也又云气从脐下起者陰火也气从脚下起入腹如火者乃虚之极也盖火起於九泉之下多死一法用附子末津调塞涌泉穴以四物汤加降火药服之妙

东垣泻陰火升阳汤治肌热烦热面赤食少喘咳痰盛脉右关缓弱或弦或浮数

羌活 甘草【炙】 黄芪【蜜炙】

苍术【各壹两】 升麻【捌钱】 柴胡【壹两半】

人参 黄芩【各?钱】 黄连【酒炒半两】

石膏【半两秋深勿用】

右?咀每服壹两或半两水煎服

升阳散火汤治男子妇人四肢发热肌热筋痹热骨髓中热发困热如燎扞之烙手此病多因血虚而得之或胃虚过食冷物抑遏阳气於脾土火鬱则发之

升麻 葛根 独活

羌活 人参 白芍【各半两】

防风【貳钱半】 柴胡【捌钱】 甘草【炙叁钱】

甘草【生貳钱】

右?咀每服半两或壹两水煎积热服

柴胡饮子治一切肌热蒸热积热或汗後余热脉洪实弦数

八正散治大人小儿心经蕴热咽乾口燥目赤睛痛脏腑秘结小便赤澀

三黄汤治积热结滞脏腑大便秘结心膈烦燥

三黄丸治男子妇人三焦积热咽喉肿闭心膈烦燥小便赤澀大便秘结并宜治之

大金花丸治中外诸热寢汗咬牙时语惊悸溺血淋闭咳衄血瘦弱头痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黄加梔子名曰梔子金花丸又曰既济解毒丸

加味金花丸治内外诸热气壅痰涎溺血淋闭火证【方并见积热门】

黄连解毒汤治伤寒杂病热毒烦燥乾呕口渴喘满阳厥极深畜热内甚【方见眼目门】

大青丸治上焦热结劳役发热并痰火瘟疫发热【方见疫门】凉膈散治大人小儿脏腑积热口舌生疮痰实不利煊烁多渴肠胃秘澀便溺不利【方见积热门】

神芎丸治一切热证常服保养除痰饮消酒食清头目利咽膈能令遍身结滞宣通气利而愈神强体健耐伤省病

大黄 黄芩【各貳两】 牵牛

滑石【各肆两】 黄连 薄荷

川芎【各半两】

右为末水为丸如小豆大温水下拾丸至拾伍丸貳拾丸

清心汤即凉膈散料内加黄连伍钱用蜜与竹叶同煎

连翹 山梔子 大黃

薄荷叶 黄芩【各伍钱】 甘草【壹两半】

朴硝【貳钱伍分】 加黄连【半两】

右为细末每服伍钱水壹盞蜜少许竹叶拾片同煎分服

黄芩汤治心肺蕴热口疮咽痛膈闷小便淋浊不利

泽泻 梔子仁 黄芩

麦門冬【去心】 木通 生地黄

黄连 甘草【各等分】

右咀每服壹两水貳盞姜伍片煎至壹盞食前温服

玄明粉【御药院方】此药大治邪热所干膈上气滞脏腑秘澁并宜服之以朴硝煎过澄濾伍遍至夜於星月下露至天明自然结作青白块子用磁罐子按实於炭火内从慢至紧自然成汁煎沸直候不响再加顶火一煨便取出於淨地上倒下用盆合盖以去火毒然後研为细末每貳斤入甘草生熟貳两为末一处搅匀临睡斟酌用之或壹钱貳钱以桃花煎汤或葱白汤下

防风通圣散【方见风门】清燥汤【方见痿门】龙脑鸡苏圆【方见鼻门】地骨皮散治虚潮热骨蒸壮热

六味地黄丸治肾气虚久新憔悴寢汗发热五脏齐损瘦弱虚烦骨蒸下血

补陰丸降陰火治发渴骨蒸补肾水真陰不足【俱见虚劳门】大补丸【丹溪方】去肾经火燥下焦湿治筋骨软气虚以补气药下血虚以补血药下并不单用

川黄栢【炒褐色】

右以水丸服

六物汤滋陰血降肾火

川芎 白芍药【酒炒】 生地黄【酒洗】

当归【酒洗】 黄栢【蜜炒】 知母【酒炒各等分】

右?咀用水壹鍾半煎至捌分食前温服

当归龙胆圆治肾水陰虚风热蘊积时发惊悸筋惕搖溺神志不宁荣卫壅滯头目昏眩肌肉
痠瘕胸膈咽噎不利肠胃燥澁躁扰狂越骂詈惊骇火热等证

当归 草龙胆 山梔仁

黄连 黄栢 黄芩【各壹两】

大黄 芦荟 青黛【各半两】

木香【壹钱】 麝香【伍分】

右为末炼蜜为丸如小豆大姜汤下叁贰拾丸此药泻肝心脾肺肾胃火之神药也

麦门冬汤【千金方】 治诸疾後火热乘肺咳唾有血胸脇胀满上气羸瘦五心烦热渴而烦
闷

麦门冬 桑白皮 生地黄【各壹两】

半夏 紫苑 桔梗

淡竹茹 麻黄【各七钱半】 五味子

甘草【各伍钱】

右?咀每服伍钱或壹两入姜煎

防风当归饮子【宣明方】 治烦渴发热虚烦火证

柴胡 人参 黄芩

甘草【各壹两】 滑石【叁两】 大黄

当归 芍药 防风【各伍钱】

右?咀每服壹两水贰锺生姜叁片煎至壹锺去滓通口服不拘时如有痰嗽加半夏泄者去大黄

左金圆【丹溪方】治肝火

黄连【陆两】 吴茱萸【壹两】

右为末水丸或蒸饼丸白汤下伍拾丸

滋陰降火汤养血降火之圣药也

川归身【酒洗】 地黄【凉血用生补血用熟】 天门冬【去心】

白芍药【薄荷炒】 白术【各壹钱】 麦门冬【去心】

甘草【炙各伍钱】 知母 黄栢【俱蜜水蒸】

远志 陈皮【洗】 川芎【各陆分久病去之】

右?咀姜水煎服气血虚加人参黄芪嗽加五味阿胶痰加瓜蒌贝母吐血加丹皮藕汁热加地骨皮痼冷

痼冷方论

苟得其养无物不长苟失其养无物不消人之处世饮食为上汤药次之惟其口腹不充嗜慾无节所以脏中停寒而为之沉痼也男子精流女子带下骨寒脑冷气乏血衰呕吐恶心久泄暴下皆其证耳疗治之法虽贵乎温补不贵乎大刚惟於滋血养气中佐以姜桂雄附为愈抑古人所谓精不足者补之以味继此尤当加意焉若夫执剂刚燥亟欲阳气顿回吾恐肾水易涸心火独炎识者未保其往

痼冷证治

十补汤治诸虚百损

人参【壹分】 白术 白茯苓

甘草【炙】 辣桂 黄蓍【蜜炙】

当归 川芎 熟地黄

白芍药【各半两】

右剉散每服叁钱半姜枣煎空心食前服加熟附子温之

附子理中汤沉附汤姜附汤并主痼冷须加当归【方见寒类】麝香鹿茸圆治真元虚惫精血耗少

熟地黄 山药【各叁两】 杜仲【炒断丝】

鹿茸【酒炙各壹两半】 北五味子 肉苁蓉

牛膝【并酒浸焙各壹两】 沉香【半两】 麝香【半钱】

右末炼蜜圆桐子大每叁伍拾圆食前塩汤下

八味圆治下元冷惫腰脚酸重虚劳消渴

熟地黄【肆两】 山药 山茱萸【各贰两】

辣桂 熟附子【各壹两】 泽泻

牡丹皮 白茯苓【各壹两半】

右为末炼蜜圆桐子大每服叁拾圆食前盐汤下

黑锡丹治脾肾俱虚冷气刺痛止汗坠痰除湿破癖黑锡【洗熔取净】

透明硫黄【结砂各贰两】 金铃子【蒸熟去皮核】

沉香 木香 熟附子

葫芦巴【酒浸炒】 肉桂【各半两】 舶上茴香【炒】 破故纸【酒浸炒】

阳起石【研细水飞】 肉豆蔻【麝裹煨各壹两】

右用新铁铤如常法结黑锡硫黄砂子地上出火毒候冷研极细余药并末同研自朝至暮以黑光为度酒麪糊圆桐子大陰乾每叁伍拾圆空心盐汤下妇人艾醋汤下本方加苁蓉背膝白术丁香名接气丹治真元虚?

养正丹升降水火助阳接真治咳逆翻胃痰结头运腹痛腰疼霍乱吐泻

好硫黄【研】 黑锡 水银

朱砂【研细各壹两】

右净铁笏以厚纸布扎柄先熔铅滤去滓壹两净再放笏内用铁匙炒搅将熟硫黄末叁钱重渐入其中或焰起亦莫管只急手炒搅令铅熟无性其硫黄皆烧去但得铅熟遂倾放地下纸上令硬即碾开以纱筛出铅粉其余成珠者再炒碾为末次将笏铍顿慢火炉上又熔铅粉以熟硫黄末壹两渐入频搅炒才见黄烟上急拖过冷炉上少顷又过火上再搅炒得铅与硫黄皆成黑色极调和了却放冷炉上候铅硫微冷又顿在十分微微火上少顷入水银以铁匙频搅切勿令青烟上烟上便走了水银又次入朱砂末频搅炒令十分调和即倾放地下纸上俟硬别碾为末糯米糊圆菉豆大每叁拾圆盐汤空心下

灵砂诸虚痼冷厥冷神效

好硫黄【壹两】 水银【叁两】

右修炼家有见成者赎研细糯米糊圆小麻子大每服伍?圆加至拾伍圆空心人参枣汤下或盐汤下○疝气偏坠木肾肿疼炒茴香入酒煎候温下○虚劳喘嗽生姜乌梅紫苏茎煎汤下○盗汗小便多煨牡蛎入盐煎汤下○痰疟不已桃柳枝煎汤下○胀满腹痛腰疼莪术汤下○呕逆翻胃丁香木香煎汤下○白浊遗精白伏苓煎汤下○中风痰厥向青木香汤研灌○走注风遍身痛嚼葱白酒下○脚痛木瓜汤下○气滞生姜陈皮汤下○妇人血痛气痛延胡索五灵脂酒醋各半煎汤下○小儿慢惊沉困胃虚神脱人参丁香煎汤吞下

椒附散治肾气上攻项背不能转侧亦治冷痺不仁

熟附子【末】 真川椒

右每服附子末贰大钱匕川椒贰拾壹粒用白麪塞满水盞半姜?片煎半去椒入盐少许通口空心服

大凡肾气须以川椒引而归经则安矣又一证肾虚血寒气逆而胀胸腹走痛中脘痞满两眼多泪此寒泣血也二陈汤加官桂当归下安肾圆立愈若大便澁更加枳壳二陈汤【方见疟类】安肾圆【方见水饮门】

附诸方

沉香毕澄茄圆【和剂方】治内挟积冷脐腹弦急痛引腰背面色痿黄脏腑自利小便滑数

少阳一切气痛并皆治之

桃仁【去皮尖貳两】 木香 川练子【炮去核炙肆两】 附子【炮去皮】
川乌【炮去皮脐半两】 沉香

葫芦巴 肉桂【去皮】 萆澄茄

补骨脂【炒】 茴香 巴戟天【去心】

右?咀剉服叁钱水壹盏入塩少许煎捌分空心热服

复阳丹【济生方】 治阳虚陰盛手足厥冷暴吐大下脉细羸瘦伤寒陰证悉皆治之

川乌【去皮肆两炮】 天推【炮去皮貳两】 附子【炮去皮脐】

鍾乳粉【各壹两】 阳起石【火煨肆两】 朱砂【煨别研壹两】

右为末酒煮神麴糊丸如梧桐子大每服伍拾丸空心塩汤下

附子茴香散【詹疗方】 治气积冷心腹绞痛

肉豆蔻 乾姜【炮】 附子【大者壹枚炮去皮脐各壹两】

茴香 木香 白术【炒】

人参 甘草【炙各半两】 白茯苓

丁香

右?咀每服叁钱水壹盏塩少许煎柒分空心服

雄朱丹【百一选方】 治宿寒痼冷饮食呕逆久则羸弱变为劳瘵

朱砂 雄黄【各貳两】

以上用沙合壹个先以牡丹皮貳两内外薰黄入药於内以严醋和臈茶作饼盖定合口以赤石脂固济合缝又用赤石脂泥裹合了一重再用黄泥纸筋又裹一重先以草火烧令乾次以炭火伍斤渐又添至壹秤候火力渐消取出掘地坑壹尺埋壹宿去火毒取研入後药

丁香 萆薢 赤石脂

胡椒 附子 白朮【各壹两】

乳香【半两与前赤石脂同研】 官桂

木香

右为末入前药研匀以清酒貳升貳分熬去貳分入附子末煮糊丸如梧桐子大每服拾丸空心温酒塩汤任下

秘澁【附 转胞便多】

小便不通方论

肾主水膀胱为之府水瀦於膀胱而泄於小肠实相通也然小肠独应於心者何哉盖陰不可以无阳水不可以无火水火既济上下相交此荣卫所以流行而水窵开阖所以不失其司耳惟夫心肾不济陰阳不调故内外关格而水道澁传送失度而水道滑热则不通冷则不禁其热盛者小便闭而絶无其热微者小便难而仅有肾与膀胱俱虚客热乘之故不能制水水挟热而行澁焉是以数起而溺有余?肾与膀胱俱冷内气不充故胞中自滑所出多而色白焉是以遇夜而陰盛愈多若夫下焦蓄血其与虚劳内损则便溺自遗而不知下焦虚寒不能温制水液则便溺欲出而不禁是皆心不与肾交通故或冷或热而滑澁随之矣继自今心气旺盛小便壅遏以清利行之如赤茯苓麦门冬灯心车前子之类是也心气虚怯小便滑利以温和益之如乳香益智巴戟人参之类是也演触其间肾实肾虚皆可以举隅而反或者胶柱调瑟详於肾而略於心其可乎虽然小肠之与膀胱心肾所主固也然素问有云水之本在肾其末在肺则知天一之水自上而下相为贯通亦犹心肾之不可不升降也昧者夜间忍缩小便使水气上逆乘肺痰涎喘嗽激乱争鸣其来不可御於此见肺主气也小便澁滑又当调适其气焉毋徒曰萆薢桑皮可以逐肺经之水

小便不通证治

草蜜汤治心肾有热小便不通

生车前草捣取自然汁半盞入蜜壹匙调服

蒲黄汤治心肾有热小便不通

赤茯苓 木通 车前子

桑白皮【炒】 荆芥 灯心

赤芍药 甘草【微炙】 生蒲黄

滑石【等分】

右末每服贰钱葱头壹片紫苏伍叶煎汤调下

八正散治心经邪热小便赤澀不通【方见积热门】

五苓散【方见水饮门】加赤茯苓治小便不通每服贰钱用灯心山茵陈各壹握煎汤调下

参耆汤治心肺虚而客热乘之小便澀而数数而沥

赤茯苓【?钱半】 生乾地黄 黄耆

桑螵蛸【微炙】 地骨皮【各半两】 人参

北五味子 兔丝子【酒浸研】 甘草【炙各贰钱半】

右细剉每服叁钱新水煎临熟入灯心贰拾壹茎温服

平补圆治肾虚小便数而沥如欲渗之状或虚劳内损遗尿或下焦虚寒小便欲出而不禁通用【方见消渴门】茸香圆治下焦虚冷尿多或虚劳遗尿或欲出而不禁鹿茸【酥炙】

肉苁蓉【酒浸焙】 当归【各半两】

鸡内金【?钱半微炙】 龙骨 牡蛎灰

赤石脂 禹余粮【煨醋淬碎为度各研细】

川白姜 益智仁 巴戟

乳香【各贰钱半】

右细末糯米糊圆桐子大每服?拾圆空心塩汤下

桃仁承气汤治下焦蓄血漱水迷忘小腹急痛内外有热加生蒲黄【方见血类】

大小便不通证治

掩脐法治小便大便不通连根葱壹茎不得洗带土生姜壹块淡豆?貳拾壹粒塩貳匙同研烂捏饼烘热掩脐中以帛扎定良久气透自通不然再换一剂

转胞证治

转胞方治胞转小便不能通先用

良姜 葱头 紫苏茎叶【各壹握】

右煎汤密室内熏洗小腹外肾肛门留汤再添蘸帛洗以手拊摩脐下拭乾绵被中仰坐垂脚自舒其气次用

蜀葵子【貳钱半】 赤茯苓 赤芍药

白芍药【各半两】

右剉每服叁钱煎取清汁再煖乘热调苏合香圆叁丸并研细青塩半钱食前温服○又法炒塩半斤囊盛熨小腹

便多证治

多溺方暖肾圆治肾虚多溺或小便不禁而浊

葫芦巴【炒】 故纸【炒】 川练肉【用牡蛎炒去牡蛎】 大熟地黄【洗焙】 益智仁 鹿茸【酒炙】

山茱萸 代赭石【煮熟醋蘸?次研细】

赤石脂【各叁分】 龙骨 海螵蛸

熟艾【米醋浸壹宿炙焦】 丁香 沉香

滴乳香【各貳分】 禹余粮【煨醋淬碎为度细研叁分】

右细末水煮糯米糊圆桐子大每服伍拾圆食前石菖蒲煎汤送下

附诸方

导气除燥汤【东垣方】 治小便闭塞不通乃血澁致气不通而窍澁也

知母【酒炒叁钱】 黄栢【酒炒肆分】 滑石【炒黄色】

泽泻 伏苓【去皮各贰钱】

右件和匀每服半两水叁大盏煎至壹盏去滓稍热服空心如急闭不计时候

肾疸汤【东垣方】 治肾疸目黄甚至浑身黄小便赤澁

升麻【半两】 羌活 防风

藁本 独活 柴胡【已上各伍分】 已上治肾疸目黄浑身黄

白术【半钱】 苍术【壹钱】 猪苓【肆分】

泽泻【叁分】 伏苓【贰分】

已上治小便赤澁

葛根【伍分】 甘草 人参【各叁分】

黄蘗【壹分】 麴【陆分】

右件剉如麻豆大分作贰服每服水叁盏煎至壹盏去滓稍热服食前

鬱金黄连圆治心火上炎肾水不升致使水火不得相济膀胱小肠积热或癃闭不通或遗溺不禁或白浊如泔或膏淋如脓或如梔子水或如小石米粒或如粉糊相似者诸热证也

鬱金 黄连【各壹两】 黄芩

琥珀【研】 大黄【酒浸各贰两】 滑石

白伏苓【各肆两】 黑牵牛【炒取头末叁两】

右为末水丸如梧子大每服伍拾丸沸汤下空心服如用消导饮食降心火可加沉香伍钱

一方治孕妇转胞并男子小便不通用冬葵子山梔子炒滑石研各伍钱木通叁钱

右作壹服水煎温服外用冬葵子滑石梔子为末田螺肉和捣成膏或用生葱汁调贴脐中立通

一方治遗尿失禁用益智【去皮盐炒】乌药【各肆两】

右为末以山药末陆两打糊为丸如梧桐子大每服?拾丸空心清米饮送下

大便秘澁方论

凡人五味之秀者养脏腑诸阳之浊者归大肠大肠所以司出而不纳也今停蓄蕴结独不得其疏导何哉抑有由矣热邪入里则胃有燥粪三焦伏热则津液中乾此大肠之挟热然也虚人脏冷而血脉枯老人肠寒而气道澁此大肠之挟冷然也腹胀痛闷胃痞欲呕此证结聚以宿食留滞得之肠胃受风涸燥秘澁此证闭塞以风气燔灼得之若夫气不下降而谷道难噫逆泛满必有其证矣剂量治法热者三黄汤冷者金液丹宿食者脾积圆风秘者脾约麻仁圆气不下降则桔梗枳殼汤固在精择而审处其间纵横泛应亦自胷中活法充之矣然而大肠与肺为表里大肠者诸气之道路关焉热则清利冷则温利积聚者挨其积风壅者疏其风是固然尔孰知流行肺气又所以为四者之枢纽乎不然叔和何以曰肺与大肠为传送

大便秘澁证治

大黄饮子治身热烦燥大便不通

川大黄【湿纸略煨】杏仁【去皮尖略炒】梔子仁

川升麻 枳殼【浸去穰碎炒各半两】生地黄【壹两】

人参 黄芩 甘草【炙各貳钱半】

右剉散每服叁钱生姜伍片豉貳拾壹粒小乌梅壹枚煎服

三黄汤三黄圆治热证大便结【方见积热门】

甘豆汤治热证风证大便不通【方见积热门】

金液丹治大便挟冷结滞用麻仁杏仁煎汤下【方见脾疼门】半硫圆治冷秘风秘老人秘结

透明硫黄【研十分细】圆白半夏【汤荡?次焙乾等分】

右末生姜汁煮白麪糊筑圆桐子大每服貳拾圆姜汤下或用葱白壹条生姜叁片煎熟入阿胶貳片熔开食空送下

胶蜜汤治老人虚人大便秘澁

连根葱白【叁片】

右新水煎去葱入透明阿胶炒貳钱蜜貳匙熔开食前温服

润肠圆大便秘澁通用

杏仁【去皮尖略炒】 枳殼【浸去穰炒】 麻仁

陈皮【各半两】 阿胶【炒】 防风【各貳钱半】

右末炼蜜圆桐子大每服伍拾圆老者苏子煎汤下壮者荆芥泡汤下

脾积圆治饮食停滯腹胀痛闷呕恶吞酸大便秘结

蓬莪术【叁两】 京三棱【貳两】

良姜【半两已上用米醋壹升於磁瓶内煮乾乘热切碎焙】 青皮【去白壹两】

南木香【各半两】 不蛀皂角【叁大铤烧存性】

百草霜【深村锅底者佳叁匙】

右为细末用川巴豆半两只去殼研如泥渐入药末研和得所麪糊圆麻子大每服伍圆加至拾圆橘皮煎汤下

木香逐气圆治食积气滯通利大便兼治脚气小肠气诸气攻刺腹痛

橘红 青皮【去白】 榔【鸡心者各半两】 南木香【貳钱半】

川巴豆肉【壹钱半研如泥渐入药夹研】

右件并末用生姜自然汁调神麪末为糊圆麻子大每服拾圆姜汤下如气攻腹痛枳殼木瓜煎汤下

二香圆治积滯气秘心腹刺痛中满壅嗽

南木香 丁香 青皮【浸去白晒】

橘红 草果仁 肉豆蔻【生】

白豆蔻仁 五灵脂【香润者别研各半两】

蓬木【炮乘热碎研】 缩砂仁【各?钱半】

右细末用川巴豆肉半两研如泥渐入药末研和白麪稀糊圆麻子大候乾每服叁圆加至伍柒圆止姜汤下壅嗽紫苏生姜煎汤下

独枣汤治大便积日不通

大好枣【壹枚擘开入轻粉半钱】

右以枣相合麻线札缚慢火煮熟嚼细以枣汁送下

脾约麻仁圆治风秘及脾约证小便数大便秘【方见脚气门】用枳殼散送下

追风毒剉散治风气蓄盛大便秘结【方见脚气门】

疎风散治风毒秘结

枳殼【制半两】 防风 羌活

独活?榔 白芷

威灵仙 蒺?【炒赤去刺】 麻仁

杏仁 甘草【炙各壹分】

右麤末每貳钱半姜伍片蜜壹匙慢火煎服

桔梗枳殼汤治气不下降大便不通【方见气门】加紫苏茎叶煎

寬快汤治气不下降大肠澁滯

香附【杵净貳两】 天台乌药【去心】 枳殼【制各壹两半】 缩砂仁【?钱半】
苏子【炒半两】 青木香【叁钱】

甘草【炙?钱半】

右末每服貳钱陈皮煎汤调下或吞青木香圆少许

降气汤治气不下降大便不通【方见脚气门】加枳殼杏仁煎此药流行肺气

苏感圆治气秘不大便用紫苏橘皮煎汤下或枳殼散送下苏合香圆【方见嗽门】感应圆【方见胀满门】苏合肆分感应陆分研和别圆大凡腹痛而呕欲利其大便诸药皆吐惟苏感圆用姜汁泡汤下最妙

煨蒜方独头蒜煨熟去皮以绵裹纳後部即通

又掩脐法【方见小便门】临用入轻粉少许尤速

熏方不蛀皂角用椀烧置於桶内熏其後部自通调导饮治妇人产前产後大便不通

当归 川芎 防风

枳殼【制各肆分】 甘草【炙貳钱】

右细剉每服叁钱食前姜枣煎服

附诸方

润肠圆【东垣方】治脾胃中伏火大便秘澁或乾燥秘塞不通全不思食乃风结秘血结秘皆令闭塞也以润燥和血疏风自然通

麻子仁 桃仁【去皮尖各壹两】 羌活

当归尾 煨大黄【各半两】

右件除麻仁桃仁别研如泥外搗罗为末五上火炼蜜圆如桐子大每服叁伍拾圆空心白汤送下○如病人不大便为大便不通而滋其邪盛者急加酒制大黄以利之○如血燥而大便燥乾者加桃仁酒制大黄○如风结燥大便不行者加麻子仁大黄○如风澁而大便不行者加皂角仁大黄秦艽以利之○如脉澁觉身有气澁而大便不通者加郁李仁大黄以除之干燥○如寒因之病为寒结闭而大便不通者以局方中半硫圆或加煎附子乾姜汤水冷与之其病虽陰寒之证常当服阳药补之若大便不通者亦当十服中与一服药微通其大便不令闭结乃治之大法

若病人虽是陰证或是陰寒之证其病显燥脉实坚亦宜与阳药中少加苦寒之药以去热燥燥止勿加如陰燥欲坐井中者其二肾脉必按之虚或沉细而迟此易为辨耳知有客邪之病

亦从权加药去之

当归润燥汤

升麻【貳钱】 当归 熟地黄【各壹钱】

生地黄【貳钱】 甘草 大黄

桃仁 罌子 麻仁【各壹钱】 红花【少许】

右件除桃仁麻仁另研如泥外剉如麻豆大作壹服水二大盏入桃仁麻仁煎至壹盏去滓空心宿食消尽热服之

导滞通幽汤治大便难幽门不通上冲吸门不开噎塞不便燥闭气不得下治在幽门以辛润之

当归 升麻 桃仁泥【各壹钱】 生地黄 熟地黄【各伍分】 红花

炙甘草【各壹分】

右件作壹服水貳盏煎至壹盏去滓调?榔细末半钱稍热服

四物汤治脏结秘澁

当归 熟地黄 川芎

白芍药 大黄【煨】 桃仁【去皮尖各壹钱】

右?咀作壹服水貳盏煎捌分去滓服或为丸亦得

橘杏麻仁圆治噎膈大便燥结【方见膈噎门】

六味地黄丸治下焦燥热小便澁而数【方见虚损门】

大补丸治陰虚燥热【方见火门】

仁斋直指卷十五

卷十六

钦定四库全书

仁斋直指卷十六 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

五疸

五疸论

湿与热郁蒸於脾面目肢体为之发黄此即疸也疸之名有五发热不渴身肿而汗汗如黄蘗汁者曰黄汗此胃中蓄热汗出浴水得之已食如饥但欲安卧小便如黄蘗汁者曰黄疸此酒麪炙?蘊热瘀滯得之食则腹满怫郁眩暈心忪而不自安者曰谷疸此失饥大嚼遽饱冲脾得之其或饮酒常多进食常少醞热入水大醉当风以致中心懊疼足胫肿满是之谓酒疸大劳淫慾大热交接衽席未几遽就浴室以致发热恶寒小腹满急是之谓色疸五者虽不同其为黄则一自本自根未有非热非湿而能致病者也湿也热也又岂无轻重之别乎湿气胜则如薰黄而晦热气胜则如橘黄而明盖脾主肌肉土色尚黄湿热内蒸或重或轻不容揜於外矣自其湿热瘀而伤血此又为血证发黄何以明之疸证之黄小便不利血证之黄则小便自利耳况夫脾受湿热郁而不行亦有腹胀之候治法纲领大要疏导湿热於大小便之中人徒见茵陈汤五苓散黄连圆三黄圆辈随试辄效则目之以寻常不思单阳无陰病势已极疸而不渴犹可用工疸而复渴其或腹膨全济者鲜甚则寸口无脉鼻出冷气与夫形如烟熏摇头直视为心絕环口黧黑油汗发黄为脾絕此皆仓扁所望而惊者也孰谓黑疸之能有瘳乎脾与肾俱病为黑疸色疸一名女劳身黄额黑疸脉缓大顺弦急而坚逆已食如饥胃热消谷五疸证治

姜蜜汤诸疸通用或小便出血或小便如血用之皆效蜜半盞姜钱拾片新汲水一碗煎服逐日常进两服小便渐白而疸遂瘥

桂枝黄耆汤治黄汗自出发热身肿小便不利

白芍药【壹两半】 辣桂 甘草【炙各壹两】

黄耆【炙貳两】 黄芩【半两】

右剉散每服肆钱水盞半姜伍片枣叁枚煎服覆取微汗未汗再服

必效散黄疸通用

葶苈子【隔纸炒】 龙胆草 山梔仁

山茵陈 黄芩【等分】

右麤末每服叁钱新水煎服

一清饮疸证发热诸热通用

柴胡【叁两】 赤茯苓【貳两】 桑白皮【制】

川芎【壹两】 甘草【炙半两】

右剉每服叁钱姜枣煎服

茵陈汤治湿热瘀而发黄小便秘澁头汗而渴【方见湿门】 五苓散疸证通用【方见饮水门】 吞酒蒸黄连圆【方在後】 治湿热发疸或煎茵陈汤调下亦得

山茵陈散治黄疸大小便秘澁

梔子【壹两】 茵陈【壹两】 枳实【制?枚】

赤茯苓 葶苈 甘草【炙各壹分】

右剉每服叁钱姜叁片煎服

甘露饮【见积热门】 加山梔柴胡同煎吞黄连阿胶圆【方见嗽门】 治鬱热发疸小便秘澁

柴胡甘草汤治热疸

柴胡【壹两】 甘草【壹分剉细】 白茅根【壹握】

右件以水貳碗煎?分时时服壹日尽

生发方治疸

生髮烧灰存性为末新汲水调方寸匕日叁服

红圆子治谷疸腹满眩运怫鬱怔忡酒疸通用○二陈汤加缩砂煎下【并见疟类】

辰砂妙香散治饮酒行事酒热瘀於心经致成黄疸

伏苓 伏神【去木】 山药【炒】

远志【水浸去心酒炒】 黄耆【炙各壹两】 人参

甘草【炙】 北梗【各半两】 木香

辰砂【别研各叁钱】 麝香【壹钱重】

右细末每服贰钱加辰砂少许用茵陈煎汤调下日叁服

酒蒸黄连圆治酒疸

黄连去须净肆两略碎以酒洒腌壹宿日乾为末粟米糊为圆桐子大每服叁肆拾圆以二陈汤加乾葛茵陈入姜枣煎送下

当归白术汤治酒疸发黄心下饮结妨满

伏苓【壹两半】 当归 黄芩

茵陈【各半两】 白术 枳壳【制】

甘草【炙】 杏仁【去皮麩炒】 前胡

乾葛【各壹两】 半夏【制叁分】

右剉散每服叁钱水盏半姜?片食前煎服凡酒疸热疸大便秘者可三黄汤【见积热门】

六物汤治酒疸腹胀

萆拔 荆芥穗 不蛀川练子【连皮核用】 生姜母 软乌梅 甘草

右件等分於石臼中捣细用磁器盛以自己满腹小便去其首尾取中间小便浸药两重纱盖露星壹宿拂明饮其清汁续用车前子山茵陈竹园茛煎汤乘热调五苓散服自觉黄水从小便出而肚不胀妙

土瓜方治酒疸热疸土瓜捣取汁恣服

小菟丝子圆治色疸

菟丝子【伍两洗酒浸叁宿研捏饼焙】 石莲肉【贰两】

白茯苓【壹两】 山药【壹两留壹半打糊】

右为末山药糊圆桐子大每伍拾圆用芎藭汤多加茯苓煎汤下【方见血类】

四君子汤【加剂】治色疸

人参【壹两】 白茯苓【壹两】 白术【壹两】

甘草【炙半两】 加黄耆【炙】 白芍药

白扁豆【制各壹两】

右剉细每服叁钱姜伍片枣贰枚煎服

解热方

生车前草最治黄疸解诸热淋研细井水调下

又方

车前子炒末之米饮调立止洞泄

附诸贤论

此事难知云色如重火黄乃湿病也一身尽痛色如橘子黄乃黄病也一身不痛乾黄燥也小便自利四肢不沉重渴而引饮者栀子蘖皮汤湿黄脾也小便不利四肢沉重似渴不欲饮者茵陈汤若大便自利而黄者茵陈栀子黄连三物汤往来寒热一身尽黄者小柴胡加山栀子汤略例云内感伤寒劳役形体饮食失节中州变寒之病生黄非伤坏之而得只用建中理中大建中足矣不必用茵陈也

附诸方

茵陈大黄汤治伤寒大热发黄面目悉黄小便赤

茵陈蒿 栀子 柴胡

栝皮 黄芩 升麻

大黄【炒各壹两】 龙胆草【半两】

右为粗末每服伍钱水煎服

茵陈五苓散【局方】 治伤寒或伏暑发黄小便不利烦渴【方见湿门】

加减五苓散【济生方】 治饮食伏暑鬱发为疸烦渴引饮小便不利

茵陈 赤茯苓【去皮】 猪苓【去皮】

白术 泽泻【各等分】

右?咀每服肆钱水壹盏姜伍片煎捌分温服不拘时

葛根汤【济生方】 治酒疸

枳实【去白】 栀子仁 豆?【各壹两】

甘草【炙半两】 葛根【贰两】

右?咀每服肆钱水壹盏煎捌分温服不拘时

茯苓渗湿汤治黄疸寒热呕逆渴饮冷水身体面目俱黄小便不利

白茯苓【伍分】 茵陈【陆分】 猪苓

泽泻 黄连 黄芩

栀子 汉防己 白术

苍术 陈皮 青皮

枳实【麸炒各叁分】

右?咀每服水贰钟煎至壹钟去滓食前温服

小温中丸治疸又能去食积

苍术 川芎 香附

神麴 针砂【醋炒红】

春加芎夏加苦参或黄连冬加吴茱萸或乾姜

大温中丸治食积与黄肿又可借为制肝燥脾之用脾虚者以参术芍药陈皮甘草作汤使

陈皮 苍术 厚朴

三棱 蓬术 青皮【各伍两】

香附【壹斤】 甘草 针砂【醋炒红各贰两】

右为末醋糊丸空心姜塩汤下午後饭食可酒下忌大肉果菜

搐药瓜蒂散【拔粹方】治黄疸遍身如金色累效

瓜蒂【贰钱】 母丁香【壹钱】 黍米【肆拾玖粒】

赤小豆【伍分】

右先将瓜蒂为末次入三味再碾至夜令病人先含水壹口次将药半字搐入鼻内待下或吐去水便睡至半夜或次入取下黄水直候利水止即服黄连散或茵陈五苓散病轻者五日病重者半月见效

黄连散【拔粹方】治黄疸大小便秘澁脏腑壅热

黄连【贰两】 川大黄【好酒拌炒贰两】 黄芩【去黑心】

炙甘草【各壹两】

右为极细末每服贰钱食後温水调下日叁服

一方治黄肿及积滞浮肿

皂矾【半斤醋煮乾】 胶枣仁【二斤煮去皮核】 平胃散【肆两】

右用枣捣烂入矾丸如梧桐子大以平胃散为衣每服叁伍拾丸临卧以温酒送下

针砂圆治黄病助脾去湿

用针砂不拘多少以水播尽 淘洗白色为妙就用米醋於铁铤内浸过壹指深炒乾再炒叁伍次候铤内通红方可取出又用陈粳米半升隔夜以水浸次日漉起於臼内捣为粉就作成块如鸭蛋大入釜中煮如粉剂又以生熟相停再杵调粘为度却入百草霜炒过壹两半针砂贰两半於粉内仍捣数百下为丸如梧桐子大每服伍拾丸用五加皮牛膝根木瓜浸酒吞下初服若泄泻其病源去也

肾疸汤【东垣方】治肾疸目黄甚至浑身黄小便赤遗【方见秘澁门】

一方治遍身黄不浮肿手足怠倦

针砂【用水播净醋煮】 陈皮【去白炒】
苍术【米泔水净焙乾】 青皮【去白炒各肆两】 青矾【炒令赤黑陆两】
飞罗麪【炒黄】

百草霜【炒】 三棱【煨】 莪术【煨各贰两】

右为末麪糊丸如梧桐子每服叁拾丸米汤温酒任下

綠矾丸治黄胖

针砂【贰两炒醋汁】 綠矾【肆两姜汁煮】 五倍子

神麪【各半斤】

右为末大枣半斤取肉为丸此方神効但愈後宜忌食荞麦母猪肉诸毒物若犯之即死余尝见一人服此药後二年下因食所犯忽无故而就死

一方治黄胖

用明亮綠矾壹斤锅内熔化次下多年黄陈米肆升慢火煮炒约壹时许烟尽为度攤於地上出火毒为末另用苍术壹斤贰两米泔水浸壹昼夜刮净剉晒乾为末壹斤和前药以陈米醋为丸如梧桐子大每服捌拾丸空心临卧温酒送下陈米汤亦可忌糯米麪生冷

一方

用丝瓜全者烧灰为末病因麪伤麪汤下因酒伤酒调下

针灸法至阳一穴【在第七推下灸二七壮治浑身发黄谷疸酒疸黄汗心中痛女劳疸发热】脾俞二穴【在十一推下】胃俞二穴【在十二推下】胆俞【在十推下已上各开寸半】百劳一穴【在第一推骨尖上】中脘一穴三里二穴【穴法见前】

诸淋

诸淋方论

诸淋所发皆肾虚而膀胱生热也水火不交心肾气鬱遂使陰阳乖舛清浊相干蓄在下焦故膀胱里急膏血砂石从小便道出焉於是有欲出不出淋?不断之状甚者窒塞其间则令人闷絕矣大凡小肠有气则小便胀小肠有血则小便澁小肠有热则小便痛痛者为血淋不痛者为尿血败精结者为沙精结散者为膏金石结者为石揣本揆原各从其类也执剂之法并用流行滯气疎利小便清解邪热其於调平心火又三者之纲领焉心清则小便自利心平则血不妄行最不可姑息用补气得补而愈胀血得补而愈澁热得补而愈盛水窞不行加之谷道闭遏未见其有能生者也虽然肾气虚弱囊中受寒亦有挟冷而小便淋澁者其状先寒战而後溲便盖冷气与正气交争冷气胜则寒战而成淋正气胜则寒战解而得便溺也况又有胞系转戾之不通者乎是不可以无辩胞转证候脐下急痛小便不通凡强忍小便或尿急疾走或饱食忍尿饱食走马忍尿入房使水气上逆气迫於胞故屈戾而不得舒张也胞落即殂

诸淋证治

消石散治诸淋

消石白者为细末每服貳钱○血淋山梔仁煎汤调下○热淋小便赤而淋?脐下急痛新水调下或黄芩煎汤下○气淋小腹胀满尿後常有余沥木通煎汤下○石淋茎内痛割尿不能出尿中有沙石令人闷絕此证将消石用抄纸隔炒纸焦为度再研细蜀葵子叁拾粒打开煎汤下

二神散治诸淋急痛

黄色海金沙【?钱半】滑石【半两】

右为细末每服貳钱半多用灯心木通麦门冬草新水煎入蜜调下

五淋散治诸淋

赤伏苓 赤芍药 山梔仁

生甘草【各叁分】 当归 黄芩【各贰分】

右为细末每服贰钱半水壹盏煎至捌分空腹服或以五苓散和之用竹园尿门冬草葱头灯心煎汤调下

车前子散治诸淋小便痛不可忍

车前子【不炒半两】 淡竹叶 荆芥穗

赤茯苓 灯心【各贰钱半】

右件分作两剂多用新汲水煎恁意服荆芥通窍

血余散治诸血下【见血类】 白茅花灯心各壹握新汲水煎汤调下若血淋妇人髮更好加海金砂佐之切不可用百草霜莲蓬止澁之剂

黄芩一物汤治血淋热痛

黄芩细剉新水煎通口服

八正散治热淋【方见积热门】

琥珀饮治尿血

琥珀为细末每服贰钱灯心壹握脑荷少许煎汤调下

增味导赤散血淋尿血通用

生乾地黄【洗晒】 木通 黄芩

生甘草 车前子【不炒】 山梔仁

川芎 赤芍药【已上等分】

右件为末每服叁钱入竹叶拾叶姜叁片煎服

车前草方治小肠有热血淋急痛

生车前草洗净白内捣细每服准壹盏许井水调滤清汁食前服若沙石淋则以煨寒水石为

末和之新水调下

瞿麦汤血淋尿血通用

烂滑石 赤芍药 瞿麦穗

车前子【不炒】 赤伏苓 石韦【去毛】

桑白皮【炒】 阿胶【炒酥】 黄芩

生乾地黄【洗焙】 甘草【炙】 白茅根【已上并等分晒乾】

右为细末每服贰钱入生髮烧灰壹钱沸汤调下如无茅根止用茅花

海金散治血淋沙淋小便澀痛

黄烂浮石於草陰地为末每服贰钱生甘草煎汤调下亦治小肠气茎缩囊肿用木通灯心赤伏苓麦门冬煎汤调下

五苓散治尿血【方见水饮门】内加辰砂少许用灯心壹握新水煎汤调下

伏苓调血汤治酒麪过度房劳後小便下血

半赤伏苓【壹两】 赤芍药 川芎

半夏麴【各半两】 前胡 柴胡

青皮 枳殼 北梗

桑白皮【炒】 白茅根 灯心

甘草【炙各贰钱半】

右剉细每服叁钱姜伍片蜜贰匙新水煎服

姜蜜汤治小便出血【方见疸门】加白茅根煎

甘豆汤治血淋诸淋小便痛不可忍【方具积热门】

导赤圆治心肾气鬱膀胱有热小便淋痛及诸热壅滯生乾地黄【洗焙】
木通【去节各貳两】 山梔仁【叁两】

赤伏苓【壹两半】 赤芍药 滑石【各壹两】

大黄【湿纸裹煨叁两半】

右为末炼蜜圆桐子大每服貳拾圆食後煎导赤散送下熟水亦得

秋石圆治浊气干清精散而成膏淋黄赤白黯如肥膏油蜜之状

白伏苓【壹两】 桑螵蛸【蜜炙】 鹿角胶【捣碎炒黄焦末之】 秋石【各半两】

右末研和糕糊圆桐子大每服伍拾圆人参煎汤下

滑石散治沙石淋痛割

烂滑石 烂石膏【各半两】 石韦【去毛】

瞿麦穗 木通【去节】 蜀葵子【各叁钱】

右细末每服貳钱半用葱头貳片灯心壹握新水壹大盏蜜貳匙煎汤调下

鹏砂散治沙石淋急痛

鹏砂【细研】 琥珀 赤伏苓

蜀葵子 陈橘皮【不去白等分】

右末每服貳钱半用葱头貳片去心麦門冬貳拾壹粒蜜貳匙新水煎取清汁调下或菉豆水
浸和皮研清汁调下

木香汤治冷气凝滯小便淋澁作痛身体冷清

木香 木通 檳榔

舶上茴香【焙】 当归 赤芍药

青皮【去白】 泽泻 辣桂

橘红 甘草【炙】

右剉散每服叁钱姜五片煎服

沙石淋方

黑豆【壹百贰拾粒】 粉草【壹寸生剉】

右以新水煎乘热入滑石末壹钱调和空腹服

附诸方

琥珀散【宣明方】治五淋沙石淋

滑石 琥珀【各壹两】 木通

当归 木香 鬱金

篇竹【各半两】

右为末每服伍钱以芦苇叶煎汤空心调服如无芦苇叶以竹叶煎汤送下

参苓琥珀汤治淋茎中痛不可忍相引脇下痛

人参【伍分】 伏苓【肆分】 川练子【炒壹钱】 琥珀【叁分】 生甘草【壹钱】
玄胡索【?分】

泽泻 柴胡 当归梢

加青皮 黄栢【各叁分】

右作壹服水壹鍾半煎至?分空心温服

石苇散治妇人小便卒淋澁

石苇 黄芩 木通

榆栢皮 瞿子 瞿麦穗

甘草【各等分】

右?咀每服捌钱水壹锺半姜叁片煎至捌分去滓食前服

五淋散治膀胱有热水道不通淋漓不宣脐腹急痛或尿如豆汁便如沙石淋膏尿血并宜服

山茵陈【贰两去梗】 淡竹叶【肆两】 木通【去节】

滑石 甘草【炙各陆两】 山梔仁【炒拾肆两】 赤茯苓【去皮】 赤芍药【各半斤】

右?咀每服叁钱水壹锺煎服【一方加当归除木通滑石】

地肤子散【济生方】 治诸病後体虚触热热结下焦遂成淋病小便赤澁数起少出

猪苓 地肤子 知母

黄芩 海藻 通草

瞿麦 枳实【炒】 升麻

葵子

右?咀每半两水煎入姜

丹溪方治气虚而淋者

八物汤加黄芪虎杖甘草煎汤服诸药中可加牛膝老人虚寒者八味丸或六味地黄丸为要药

清心莲子饮【和济方】 治上盛下虚心火炎上口苦咽乾烦渴微热小便赤澁或欲成淋并皆治之【方见漏浊门】

八味丸

六味地黄丸【并见虚劳门】

针灸法陰谷二穴【在腘内转骨後大筋下小筋上按之有动脉是穴灸二七壮治小便淋闭作痛陰囊肿痒】 三陰交二穴【在踝上三寸按之有动脉是穴治小便淋闭不通七般疝气】 仁斋直指卷十六

卷十七

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷十七 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

消渴

消渴方论

水包天地前辈尝有是说矣然则中天地而为人水亦可以包润五脏乎曰天一生水肾实主之膀胱为津液之府所以宣行肾水上润於肺故识者以肺为津液之脏自上而下三焦脏腑皆囿乎天一真水之中素问以水之本在肾末在肺者此也真水不竭安有所谓渴哉人惟淫慾恣情酒麪无节酷嗜炙燂糟藏咸酸酢醢甘肥腥羶之属复以丹砂五石济其私於是炎火上熏脏腑生热燥气炽盛津液乾焦渴引水浆而不能自禁矣渴之为病有三曰消渴曰消中曰消肾分上中下三焦而应焉热气上腾心虚受之心火散漫不能收敛胷中烦燥舌赤唇红此渴引饮常多小便数而少病属上焦谓之瘠渴热蓄於中脾虚受之伏阳蒸胃消谷善饥饮食倍常不生肌肉此渴亦不甚烦但欲饮冷小便数而泔病属中焦谓之瘠中热伏於下肾虚受之腿膝枯细骨节酸疼精走髓虚引水自救此渴水饮不多随即溺下小便多而浊病属下焦谓之瘠肾自瘠肾而析之又有五石过度之人真气既尽石气独留而肾为之石阳道兴强不交精泄谓之强中消渴轻也消中甚焉消肾又甚焉若强中则其毙可立待也虽然真水不充日从事於盃勺之水其间小便或油腻或赤黄或泔白或渴而且利或渴而不利或不渴而利但所食之物皆从小便出焉甚而水气浸渍溢於肌肤则胀为肿满猛火自炎留於肌肉则发为痈疽此又病之深而证之变者也总前数者其何以为执剂乎吁此虚阳炎上之热也叔和有言虚热不可大攻热去则寒起请援此以为治法又曰消渴证候人皆知其心火上炎肾水下泄小便愈多津液愈涸饮食滋味皆从小便消焉是水火不交济然尔孰知脾土不能制肾水而心肾二者皆取气於胃乎治法总要当服真料参苓白术散可以养脾自生津液兼用好粳米煮粥以膂肉碎细入塩醋油酒葱椒茴香调和少顷粥熟而後入以此养肾则水有所司又用净黄连温剉入雄猪肚中密扎於斗米上蒸烂添些蒸饭臼中杵粘圆如桐子每服百粒食後米饮下可以清心止渴

消渴证治

茯苓丹三瘠渴通用亦治白浊

兔丝子【酒浸叁宿水淘砂盆研细捏饼焙乾壹拾两】北五味子【?两】白茯苓【伍两】
石莲肉【叁两】

右末山药陆两末为糊搅和捣叁百杵圆桐子大每伍拾圆食前米汤下神妙

降心汤治心火上炎肾水不济烦渴引饮气血日消

人参 远志【姜淹取肉焙】 当归

川芎 熟地黄 白茯苓

黄耆【蜜炙】 北五味子 甘草【微炙各半两】 天花粉【壹两】

右剉细每叁钱枣煎食前服

生地黄膏渴证通用

生地黄【束如常椀大貳把】 冬蜜【壹椀】

人参【半两】 白茯苓【壹两】

右将地黄洗切研细以新水壹椀调开同蜜煎至半次入参苓末拌和磁器密收匙挑服

黄耆汤治诸渴疾

黄耆 伏神 瓜蒌根

麦门冬【去心各壹两】 北五味子 甘草【炙各半两】

生乾地黄【壹两半】

右剉细每肆钱新水煎服

猪肚圆治诸渴疾

川黄连【伍两】 净白乾葛 知母

伏神 麦门冬【去心】 大熟地黄【洗焙各貳两】 瓜蒌根 粟米【各叁两】
人参【壹两】

右木臼中同捣为散入净猪肚内缝密置甑内蒸极烂乘热再杵细若硬加少蜜丸桐子大蒸汁下伍拾丸或粥饮下

又方一味黄连末入猪肚内缝密满甑粳米上蒸熟日过杵丸如前法

川黄连丸治诸渴

川黄连【净伍两】 白天花粉 麦门冬【去心各贰钱半】

右末以生地黄汁并牛乳汁夹和捣圆桐子大每叁拾丸粳米饮下

玉泉圆治烦渴口乾

麦门冬【去心晒】 人参 茯苓

黄耆【半生半蜜炙】 乌梅肉【焙】 甘草【各壹两】

瓜蒌根 乾葛【各壹两半】

右末炼蜜丸弹子大每壹丸温汤嚼下

止渴剉散

枇杷叶【新布拭去毛炙】 白乾葛 生姜【切片焙各壹两】 大乌梅【?个】
大草果【贰个去皮】 淡竹叶

甘草【生各半两】

右剉每肆钱新水煎服

卫生天花圆治渴通用

黄连【净叁两童尿浸叁宿焙】 白扁豆【姜制去皮炒贰两】

辰砂 白茯苓 牡蛎粉

知母 苦参 天花粉

铁粉【各半两】 芦会【壹分】 金银箔【各贰拾片】

右末取瓜蒌根生汁和生蜜圆桐子大每叁拾丸麦门冬汤下

桑椹方治渴疾桑椹熟时尽意食之为妙

又方生牛乳细呷○又方生萝卜捣取汁时饮少许蜡苓圆补虚治浊止渴

黄蜡 雪白伏苓【各肆两】

右伏苓为末熔蜡和圆弹子大每壹丸不饥饱细嚼下

茧丝汤治渴神效煮茧搔丝汤任意饮之顿效如非时以丝或绵煎汤服

辰砂妙香散治渴证小便澁数而沥兼有油浊【方见疸门】用灯草伏苓煎汤下

天花粉圆治消渴饮水多身体瘦

天花粉 黄连【去须各壹两】 伏苓

当归【各半两】

右末炼蜜圆桐子大每叁拾丸茅根煎汤下

瓜蒌丸治消渴骨蒸

黄连【净剉用冬瓜汁浸壹宿晒乾凡?次】

右末冬瓜汁丸桐子大每三四十丸半饥饱熟水下或伍拾丸米饮下

玉壶丸治消渴引饮无度

人参 瓜蒌根【等分】

右末炼蜜丸桐子大每叁拾丸麦门冬煎汤下

天花散治消渴

天花粉 生乾地黄【洗各壹两】 乾葛

麦门冬【去心】 北五味子【各半两】 甘草【壹分】

右麤末每服叁钱粳米伯粒同煎服

钱氏白术散治消中消谷善饥

人参 白术 白茯苓

甘草【炙】 霍香叶【壹两】 白乾葛【贰两】

木香【半两】 加北五味子 柴胡

枳殼【制各半两】

右麤末每叁钱新水煎服

伏神丸治消中烦渴消谷小便数

人参 伏神 生乾地黄

黄连【净】 麦门冬【去心焙】 枳殼【制】

牡蛎粉【各壹两】 石莲肉 黄耆【炙】

知母【各半两】 瓜蒌根【叁分】

右末炼蜜同捣叁百杵丸桐子大每伍拾丸清粥饮下

小兎丝子丸治消肾以天花粉北五味子煎汤下【方见疸门】 枸?子丸治消肾久渴困乏小便滑数

枸? 兎丝子【酒浸研焙】 白茯苓

黄耆【炙】 牡蛎粉 牛膝

熟地黄【洗】 麦门冬【去心各壹两】 鸡内金【微炙壹两半】 桑螵蛸
瓜蒌根【各叁分】 山茱萸

牡丹皮【各半两】

右末炼蜜和捣叁百杵丸桐子大每伍拾丸食前粥饮下

八味圓治消腎補虛止渴【方見癩冷門】本方去附子以北五味子代之內澤瀉截塊再蒸熟地黃再蒸

平補圓治消腎不渴肌肉瘦削小便澁數而瀝如欲滲之狀

兔絲子【酒浸研焙】山茱萸【酒浸焙】當歸

益智仁【各半兩】川練肉牛膝

胡蘆巴【炒】厚杜仲【姜制炒】巴戟【去心】

苁蓉【酒浸焙各叁錢半】乳香【貳錢】

右末糯米糊丸桐子大每伍拾丸棗湯或塩湯食前服

雙補丸治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠【貳兩】沉香【半兩】澤瀉【截塊再蒸半兩】覆盆子白茯苓人參

宣木瓜薏苡仁黃耆【炙】

熟地黃【洗再蒸】苁蓉【酒浸焙】兔絲子【酒浸蒸碾焙】北五味子石斛【炒】
當歸【酒浸焙各壹兩】麝香【壹錢】

右末煉蜜丸桐子大朱砂衣每伍拾丸空心棗湯下

煞虫方治消渴有虫【出夷堅志】苦練根取新白皮壹握切焙入麝少许水貳碗煎至壹碗
空心飲之虽困頓不妨自浸下虫三四条狀如蛔虫其色真紅而渴頓止乃知消渴一証有虫
耗其津液

附諸方

麥門冬飲子治膈消胃脹滿心煩津液乾燥短氣消渴

人參伏神麥門冬

知母五味子生地黃

甘草【炒】括萎根葛根【各等分】

每服水貳鍾竹叶拾肆片煎去滓温服

生津甘露饮子【东垣方】治膈消大渴饮水无度舌上赤澁上下齿皆麻舌根强硬肿痛食不下腹时胀痛浑身色黄白白睛黄甚则四肢痿弱无力面尘脱色脇下急痛善 善怒健忘 髀腰背寒两丸冷甚

石膏【壹钱貳分】 人参 炙甘草【各貳钱】 生甘草 山梔子 萆澄茄

白豆蔻 香白芷 连翘【各壹钱】

杏仁【去皮尖】 黄蘗【酒拌各壹钱半】 白葵

麦門冬【各半钱】 黄连 木香【各叁分】

桔梗【叁钱】 升麻 知母【酒制各貳钱】 姜黄【壹钱】 当归身【半钱】
全蝎【貳个】

藿香【貳分】 柴胡【叁分】 兰香【半钱】

右件为细末如法汤浸蒸饼和匀成剂捻作饼子晒半乾杵碎筛如黄米大食後每服貳钱抄於掌中以舌舐之随津唾下或送以白汤少许亦可此制之缓也不惟不成中满亦不传下消矣戊申正月七日叶律千户服此大効

枇杷叶散治消渴胃满心烦津液大消

枇杷叶【去毛水洗貳张】 麦門冬【去心壹钱】 五味子【去梗伍分】 瓜蒌实 生地黄 人参【去苗芦各?分】 茯神【去木】 粉葛【家种者佳壹钱】 知母【去毛】

甘草【炙已上各?分】

右作壹服水貳鍾竹叶拾肆片入乌梅壹个去内仁煎柒分去滓食远温服不拘时

人参石膏汤【即白虎加人参汤】治膈消上焦燥渴不欲饮食人参【半两】
石膏【壹两貳钱】 甘草【肆钱】

知母【?钱】 东垣加黄芩杏仁

右?咀每服壹两水貳盞粳米壹撮煎至壹盞去滓通口服

朱砂黄连丸【秘方】治心虚蕴热或因饮酒过多发为消渴朱砂【贰两别研】
黄连【叁两】 生地黄【贰两】

右为末炼蜜丸如桐子大每服伍拾丸灯心枣子汤送下

人参白术汤【宣明方】治胃膈瘴热烦满饥不欲食瘴成为消中善食而瘦燥热鬱甚而成
消渴多饮而数小便兼疗一切阳实陰虚风热燥鬱头目昏眩中风偏枯酒过积毒一切肠胃
燥澁倦闷壅塞疮疥痿痹并伤寒杂病产後烦渴气液不得宣通

人参 白术 当归

芍药 大黄山梔子

荆芥穗 薄荷 桔梗

知母 泽泻【各半两】 伏苓【去皮】

连翘 瓜蒌根 乾葛【各壹两】

甘草【叁两】 藿香叶 青木香

官桂【各壹分即贰钱半是也】 石膏【肆两】

寒水石【贰两】 滑石【半斤】

右为细末每服抄伍钱水壹茶盏入盆消半两生姜叁片煎至半盏绞汁入蜜少许温服渐加
至拾余钱得脏腑流利取効如常服以意加减兼服消痞丸散以散肠胃结治湿热内甚自利
者去了大黄芒硝

调胃承气汤治消中暑热在胃而能饮食小便黄赤【方见伤寒门】

三黄丸【方见火门】

加减八味丸治肾水枯竭心火炙炎烦燥渴小便频数白浊陰痿饮食不多肌肤日削本方减
附子加五味子六味地黄丸【方并见虚劳门】

针灸法脾俞二穴【在十一推下各开寸半】中脘一穴【在脐上四寸】治饮不止渴三里
二穴【在膝下三寸大胫骨外廉两筋间举足取之】治食不充饥太谿二穴【在足内踝後
跟骨上动脉?中】治房劳肾消

胀满

胀满方论

陰阳愆伏荣卫凝滯三焦不能宣行脾胃不能传布此胀满之所由生也曰谷胀曰水胀曰气胀曰血胀或冷或热又不可以无别失饥伤饱痞闷停酸旦则陰消阳长谷气易行故能饮食暮则陰长阳消谷气难化故不能食是为谷胀脾土受湿不能制水水渍於肠胃而溢於体肤漉漉有声怔忡喘息是为水胀七情鬱结气道拥隔上不得降下不得升身肿大而四肢瘦削是为气胀烦躁漱水迷忘惊狂痛闷呕恶虚汗厥逆小便多大便黑妇人尤多见之是为血胀阳热为邪则身体有热胀满而咽乾陰寒为邪则吐不下食胀满而自利随证剂量是固然尔抑犹有虚实之辨焉实者腹中常胀外坚内痛按之不陷法当为之疏利虚者时胀时减虚气留滯按之则濡法当以温药和之此又出於随证剂量之外其若久病羸乏卒然胀满喘息不得与夫脐心突起或下利频频百药遍尝未见一愈者耳

胀满证治

十膈散治七气为隔饮食不消谷胀气胀通用

人参 茯苓 厚朴【制】

橘红 蓬术 枳殼【制】

半夏麴 甘草【炙】 生白姜

辣桂 ? 榔 木香【等分】

右麴末每叁钱姜貳片枣貳枚煎服

大异香散治谷胀气胀

京三棱 蓬术 青皮

陈皮 半夏麴 藿香

北梗 益智仁 枳殼【制】

香附【炒各半两】 甘草【炙叁分】

右剉散每叁钱姜伍片枣貳枚煎服

五膈寬中散治七气留滯飲食不下气滿膨脹【方見諸气门】 荜澄茄圓治痞滿脹痛谷脹
气脹通用

荜澄茄 白豆蔻仁 縮砂仁

青皮 蘿菔子 木香【各叁分】

肉豆蔻 茴香【炒】 辣桂

丁香【各壹分半】 陳皮【叁分】

右末飛麩煮稀糊圓桐子大每叁拾圓陳皮煎湯下

調气散治气滯脹滿宿食不消【方見諸气门】

大半夏湯【方見痰涎門】 小半夏茯苓湯【方見水飲門】 二药加橘紅北梗?榔甘草【炙】
并主水气脹滿

和剂流气飲調榮衛利三焦行痞滯消腫【方見諸气门加減見水飲門】 調降湯治气脹【
方見喘門】

沉香降气湯治陰陽交滯心腹脹滿留飲停酸積冷諸証【方見諸气门】

人參芎歸湯治血脹

當歸 半夏【制叁分】 川芎【壹兩】

蓬朮 木香 縮砂仁

烏药 甘草【炙各半兩】 人參

辣桂 五靈脂【炒各壹分】

右剉散每服叁錢姜伍片枣貳枚紫苏肆叶煎食前服

溫胃湯治冷则气聚脹滿不下食

熟附子 當歸 厚朴【制】

人参 橘红 半夏麴

生白姜 甘草【炙各壹两】 川椒【去合口者叁分】

右剉散每服叁钱枣贰枚食前煎服

顺气木香散治冷证肿胀泄泻【方见诸气门】

枳殼剉散治热证胀满

厚朴【制】 枳殼【制】 北梗【各半两】

甘草【炙】 大黄【蒸各壹分】

右剉每叁钱姜伍片枣贰枚乌梅壹枚煎服

感应圆

丁香 木香【各壹两半】 乾姜【壹两煨】

深村百草霜【贰两净】 大杏仁【壹百肆拾个去皮尖】 肉豆蔻【贰拾个】
肥巴豆【?拾粒略去油】 黄蜡【肆两用老酒煮】 麻油【壹两秋冬添半两减蜡半两】

右将丁香木香姜蔻为细末并三味研极得所炼油蜡和剂油单裹渐圆菉豆大每伍?圆加至拾伍圆熟水下夹苏合香圆【方见诸气门】通利胀满虽然感应圆只可治痢不可治泻盖痢家服之有积则行无积则止若以此亦可治泻误人已上数剂前气类多用之方却在此

附诸贤论

东垣曰六元政纪论云太陰所至为中满【云云】太陰所至为畜满【云云】诸湿肿满皆属脾土论云脾乃陰中之太陰同湿土之化脾湿有余腹满食不化天为阳为热主运化也地为陰为湿主长养也无阳则陰不能生化故云藏寒生满病调经篇云因饮食劳倦损伤脾胃始受热中末传寒中皆由脾胃之气虚弱不能运化精微而制水谷聚而不散而成胀满经云腹满填胀支膈肱脇下厥上冒过在太陰阳明乃寒湿鬱遏也脉经所谓胃中寒则胀满者是也【鍼经三卷杂病第八】腹满大便不利上走胃溢喘息喝喝然取足少陰又云胀取三阳三阳者足太阳寒水为胀与通评虚实论说腹暴满按之不下取太阳经络胃之募也正同取者泻也经云中满者泻之於内者是也宜以辛热散之以苦泻之淡渗利之使上下分消其湿正如开鬼门洁净府温衣繆处其处是先泻其血络後调其真经气血平阳布神清此治之正也或曰诸胀腹大皆属於热者何也此乃病机摠辞假令外伤风寒有余之邪自表传里寒变

为热而作胃实腹满仲景以大承气汤治之亦有膏粱之人湿热鬱於内而成胀满者此热胀之谓也大抵寒胀多而热胀少治之者宜详辨之心法附錄曰心肺阳也居上肾肝陰也居下脾居中亦陰也属土经曰饮食入胃游溢精气上输於脾脾气散精上归於肺通调水道下输膀胱水精四布五经并行是脾具坤静之德而有乾健之运故能使心肺之阳降肾肝之陰升而成天地交之泰是为无病今也七情内伤六淫外侵饮食不节房劳致虚脾土之陰受伤转运之官失职胃虽受谷不能运化故阳自升陰自降而成天地不交之否清浊相混隧道壅塞鬱而为热热留为湿湿热相生遂成胀满经曰鼓胀是也以其外虽坚满中空无物有似於鼓其病胶固难以疗治又名曰蛊若虫侵蚀之义理宜补脾又须养肺金以制木使脾无邪贼之患滋肾水以制火使肺得清化却厚味断妄想远音乐无有不安医又不察虚实急於作効病者苦於胀急喜行利药以求通快不知寬得一日半日其肿愈甚病邪甚矣真气伤矣古方惟禹余粮丸又名紫金丸制肝补脾殊为切当又曰朝寬暮急血虚暮寬朝急气虚终日急气血皆虚严氏曰胀脉浮者易治虚者为难治

平肝饮子【济生方】 专治喜怒不节肝气不平邪乘脾胃心腹胀满头晕呕逆脉来浮弦

防风【去芦】 桂心【不见火】 枳殼

赤芍药 桔梗【去芦炒各壹两】 甘草【炙】

木香【不见火】 人参?榔

当归【去芦酒浸】 川芎 陈皮【半两】

右?咀每服肆钱水壹盏姜伍片煎服不拘时

木香顺气汤治浊气在上则生?胀

木香【壹钱貳分】 厚朴【制壹钱陆分】 青皮

陈皮 益智 白茯苓【去皮】

泽泻 乾姜 半夏【洗】

吴茱萸【各壹钱捌分】 当归 升麻

柴胡【各肆分】 苍术【米泔浸貳钱】 草豆蔻【煨壹钱貳分】

右?咀分二贴每贴水貳盏姜叁片煎捌分食前温服忌生冷硬物恚怒

广茂溃坚汤治中满腹胀内有积聚坚硬如石令人坐卧不能二便澹滞上喘气促面色痿黄通身虚肿

厚朴【制】 黄芩 草豆蔻【麪裹煨】 益智仁【炒】 当归【酒洗各贰钱半】
黄连【叁分】

半夏【汤泡叁分半】 蓬术【煨】 红花

吴茱萸【汤泡去苦水】 升麻 甘草【炙】

柴胡 泽泻 神麪【炒】

陈皮 青皮【各壹钱半】

右?咀分二贴每贴水贰鍾姜叁片煎捌分食远服

木香塌气丸治中满腹胀

陈皮 萝卜子【炒各伍钱】 胡椒

木香 草豆蔻【麪裹煨】 青皮【各叁钱】

蝎梢【炒去毒贰钱半】

右为细末麪糊为丸如梧桐子大每服伍拾丸食远米饮下

禹余粮丸治中满气胀喘满及水气胀

蛇含石【叁两煨】 真针砂【伍两】 禹余粮【叁两同上砂炒】

右已上三味为主其次量人虚实入下项药

木香 牛膝 蓬术【炮】

白蒺藜 桂心 川芎

白豆蔻 茴香【炒】 三棱【炮】

羌活 伏苓 乾姜

青皮 陈皮 附子【炮】

当归【各半两】

右为细末拌匀以汤浸蒸饼去水捣匀丸如桐子大每服伍拾丸空心温酒送下

中满分消丸治中满鼓气水气等证

黄芩【炒伍钱】 姜黄 白术

人参 甘草【炙】 猪苓【各壹钱】

黄连【剉炒伍钱】 白茯苓 砂仁

乾生姜【各贰钱】 枳实 半夏【洗各伍钱】

厚朴【壹两制】 知母【炒肆钱】 泽泻

陈皮【各叁钱】

右为末汤浸蒸饼丸如桐子大每服壹百丸食远白汤下

中满分消汤治中满寒胀寒疝大小便不通四肢厥冷食入反出心痞奔豚

益智 半夏【汤洗】 茯苓

木香 升麻【各贰钱】 川乌【炮】

泽泻 人参 青皮

当归【酒浸】 生姜 麻黄

柴胡 乾姜【炮】 萆澄茄

黄连【各贰钱】 黄芪 吴茱萸【洗】

草豆蔻【煨】 厚朴【制各伍钱】 黄柏【贰钱】

右?咀每贴壹两水贰钟姜叁片枣壹枚煎捌分食後温服

人参定喘汤治蛊胀有喘

人参【壹两】 杏仁【去皮尖炒壹两】 陈皮【伍钱】

木香【叁钱】 甘草【伍钱】

右为末每服叁钱食远浓煎苏木汤调服叁服喘即止

秘传诸蛊保命丹

肉苁蓉【叁两】 皂矾【壹斤】 红枣【壹斤煮熟去核】 大麦芽【炒壹斤半】
香附【壹 苁蓉皂矾二味入斤 罐内火煨尽烟】

右为末麪糊为丸如梧桐子大每服贰拾丸好酒下食後服日进叁服量人大小用

四炒枳殼丸

枳殼 去穰咀分四分

一分同苍术壹两炒 一分同萝卜子壹合炒 一分同乾漆壹两炒 一分同小茴香壹两炒

右各炒枳殼黄色为度拣出为细末却将苍术等四味用水贰碗煎至半碗去滓搅麪糊和枳殼末为丸如梧桐子大每服叁拾丸食远米饮送下

一方治血鼓腹如盆胀

三棱【煨】 莪术 乾漆【炒烟尽】

牛膝【去芦酒洗】 虫虫【糯米炒】 琥珀

肉桂 礞砂 水蛭【石灰炒赤】

大黄【各等分】

右为末用生地黄自然汁和米醋调匀为丸如梧桐子大每服拾丸空心温酒送下童便下亦可

敷法治腹紧硬如石或陰囊肿大先用甘草煎汤壹鍾服之後用此药敷

大戟 芫花 甘遂

海藻【各等分】

右为末醋糊和药涂肿胀处

针灸法脾俞二穴【在第十一推下两傍相去各一寸半随年壮】肝腧二穴【在九推下两傍各一寸半随百壮】分水穴【在脐上一寸治腹胀统脐结痛灸百壮】三焦腧二穴【在十三推下两傍各一寸半治心腹满腰背痛饮食吐逆小便不利羸瘦少气】

虚肿

虚肿方论

贾洛阳以病瘕不治必为痼疾虽有扁鹊亦莫能为则知肿之危恶非他病比也夫人所以得全其性命者水与谷而已水则肾主之谷则脾主之惟肾虚不能行水惟脾虚不能制水胃与脾合气胃为水谷之海又因虚而不能传化焉故肾水泛溢反得以浸渍脾土於是三焦停滞经络壅塞水渗於皮肤注於肌肉而发肿矣其状目胞上下微起肢体重着咳喘怔忡股间清冷小便澀黄皮薄而光手按成窟举手即满是也治法大要身有热者水气在表可汗身无热者水气在里可下其间通利小便顺气和脾俱不可缓耳然而证虽可下又当权其重轻不可过用芫花大戟甘遂猛烈之剂一发不收吾恐峻决者易固闭者难水气复来而无以治之也虽然水之为肿特一耳曰风曰气曰血合而有四焉风肿者皮龛麻木不仁走注疼痛气肿者皮厚四肢瘦削腹脇胀膨其或烦燥漱水迷忘惊狂呕逆烦闷皮间有红缕赤痕者此血肿也妇人经脉壅闭败血停腐尤多见之然妇人怀胎亦有气遏水道而虚肿者此但顺气安脾饮食无阻既产而肿自消若产後发虚则虚退而告殂矣大凡虚肿先起於腹而後散於四肢者可活先起於四肢而後归於腹者不治至若蛊胀而肚上有筋腹满而大便滑泄久疰而转作虚浮与夫唇黑伤肝缺盆平伤心脐突伤脾足平伤肾背平伤肺皆为不治之证当明辨之○男从脚下肿而上女从身上肿而下或肉硬或手掌平并不治

虚肿证治

青龙汤治表有水十枣汤量用治里有水【方详见水饮门】安肾圆多用青木香圆少用貳药夹和食前温汤下治水肿屡效【方见水饮门】

温白圆治十种水病积聚胀满症癖块痛久疰诸风

吴茱萸【荡洗?次焙】柴胡 北梗

石菖蒲 乾姜 肉桂

黄连【去须】 伏苓 人参

川椒【去目隔纸炒出汗】 厚朴【制】 皂角【去皮子炒】

紫苑茸 巴豆【去皮膜出油各半两】 川乌头【炮去皮脐壹两半】

右细末和匀炼蜜圆桐子大每服叁圆食後姜汤下加至伍?圆止治水肿温白圆用五苓散加炒牵牛入些姜汁略煎送下【方见水饮门】

集香汤

沉香 丁香【各贰钱】 木香

青木香 藿香 川芎

赤伏苓 ?榔 枳殼【制】

甘草【炙各叁钱】 乳香【壹钱半】 麝香【壹字别研】

右麝末每贰钱半姜叁片紫苏叁叶空心煎服凡虚肿先用诸香以透其关络然後审证疗之

萝卜子饮治水病浮肿

萝卜子 赤伏苓【生各半两】 牵牛末【炒】

葶苈【炒香】 甘草【炙各肆两】 半夏【制】

川芎 ?榔 辣桂

青皮 陈皮 青木香

白色商陆【各叁钱】

右剉每服叁钱姜肆片不饥不饱煎服

三和散【方见诸气门】加缩砂赤伏苓煎吞青木香圆治水蛊气胀腹肿肾肿面浮青木香圆乃水肿要药但酌量用或五皮散送下或枳殼散下无热者沉香降气汤下神助散治水肿

牵牛【炒取末】 葶苈【炒香各贰两半】 木猪苓【水浸软去皮切焙】

泽泻 木香【各壹两】 川椒目【壹两半】

右末先以葱白叁茎浆水壹盏煎半盏入老酒半盏调药末叁钱空心服

行水圆治水肿气肿

葫芦巴【炒】 故纸【炒】 缩砂仁

萆澄茄 真川椒【去目纸上炒出汗】

乌梅肉【焙乾各贰钱半】 木香 牵牛【炒取末各半两】 巴豆肉【略去油壹钱半】

右末稀麪糊圆菉豆大每伍圆食後姜汤下

姜蔻散治胃满腹肿大泻不止时或乾呕

人参 川厚朴【制】 草果仁

良姜 苟子【炒】 川白姜【生】

霍香 丁皮 苍术【炒】

真橘红 甘草【炒各壹分】 木香

肉豆蔻【炮】 缩砂仁 伏苓【各壹分半】

右剉散每服叁钱水煎食前服仍以木香缩砂煎汤浓调正料参苓白术散佐之

桑皮饮治肺间积水头面浮肿

桑白皮 青皮 陈皮

诃榔【制】 枳殼 赤伏苓

青木香 当归 川芎

石韦【炙去毛】 羌活【各壹分】 牵牛【炒末】

半夏【制】 葶苈【炒香】 甘草【炙各壹分半】

右剉每叁钱姜肆片煎服

防风散治风肿皮粗麻木不仁或时疼痛

麻黄【去节】 牵牛【炒取末】 甘草【炙各壹分半】

杏仁【去皮】 防风 半夏【制】

芍药 辣桂 白芷

防己 当归 川芎

羌活 独活 㯽榔【各壹分】

右剉每叁钱姜肆片紫苏叁叶煎服

消蛊汤治气作蛊胀但腹满而四肢头面不肿

紫苏茎叶 缩砂 肉豆蔻【生】

枳壳【制】 青皮 陈皮

三棱 蓬术 㯽榔

辣桂 白豆蔻仁 荜澄茄

木香【各壹分】 半夏【制】 萝卜子【生】

甘草【炙各壹分半】

右剉每叁钱姜枣煎服

加味枳术汤治气为痰饮所隔心下坚胀名曰气分

枳壳【制】 白术 紫苏茎叶

辣桂 陈皮 㯽榔

北梗 木香 五灵脂【炒各壹分】

半夏【制】 伏苓 甘草【炙各壹分半】

右剉每服叁钱姜肆片煎服

调荣饮治瘀血留滞血化为水四肢浮肿皮肉赤纹名曰血分

华陰细辛 莪术 辣桂

赤芍药 延胡索 当归

川芎 白芷?榔

大腹皮 桑白皮【炒】 瞿麦穗

赤伏苓 陈皮 葶苈【炒香】

大黄【湿纸煨各壹分】 甘草【炙壹分半】

右剉每服叁钱姜枣煎食前服

续断饮治血分如前

延胡索【微炒】 当归 川芎

牛膝 川续断 赤芍药

辣桂 白芷 五灵脂【炒】

羌活【各壹分】 赤伏苓 牵牛【炒取末】

半夏【制】 甘草【炙各壹分半】

右剉散每服叁钱姜肆片食前煎服

土狗方治遍身肿外肾肿生土狗壹个手足全者研细入缩砂末等分老酒调下

虚肿方以大香附杵净以童尿浸壹日夜取出别换童尿又浸壹日夜再取出又换童尿浸壹日夜次以生布钱袋牵擦去皮於臼中捣细用米醋煮飞白麪糊圆桐子大每服?拾圆煎和剂流气饮送下【方见胀满门】

又方

生綠豆【壹合碾末】 橘皮【貳钱】 良姜【壹钱细剉】

右橘皮貳钱良姜壹钱细剉煎汤候冷调綠豆末得所然後略煖连叁日空心服

青皮 木香 黄连

橘红【各壹分】 胡椒【壹钱半】

右为末入巴豆肉不用去油壹钱麪糊圆胡椒大每叁肆圆姜汤下大便利肿自消未利再服
停积痢滯通用

又方二十四味大流气饮壹贴加枳殼壹钱用紫苏连茎叁条截碎灯心壹握生姜?片大枣貳
枚新水壹大碗同煎取清汁调苏合香圆叁圆吞温白圆伍圆效温白圆【方见浮肿门】

治外肾肿大茎物水泡通明方二十四味流气饮加白芷木通紫苏煎吞青木香圆百粒效

附诸方

治十种水气病根源证方法

先从面肿者曰热水其根在肺 桑白皮为主先从四肢肿者曰黄水其根在脾
大戟为主先从背肿者曰鬼水其根在胆 雄黄为主先从胷肿者曰食水根在皮肤
茯苓为主先从脇肿者曰饮水其根在肚 芫花为主先从腰肿者曰肝水其根在胃
甘遂为主先从腹肿者曰冷水其根在肺 商陆为主先从陰肿者曰劳水其根在肾
泽泻为主先从手肿者曰心水其根在腹 巴戟为主先从脚肿者曰清水其根在心 葶苈为主
右十味为末所主药加倍余药各等分每服壹钱空心井水调服以利为度忌塩百日外忌鱼
虾麪食一切毒物房事病痊後更服调补药

调补药方

肉桂 乾姜【炮】 肉豆蔻

青皮 白朮 川芎

?榔 桔梗【各等分】

右为细末每服叁钱食远白汤调服

神效丸治十种水气

大戟【微炒】 泽泻 葶苈【炒】

连翘 桑白皮 木香【炒】

甘遂【炒】 赤小豆【炒】 芫花【醋炒】

巴戟【去心已上各等分】

右为末炼蜜为丸如梧桐子大每服叁拾丸桑白皮汤送下

道滞通经汤治脾湿有余气不宜通面目四肢浮肿

桑白皮 白术 木香

茯苓 泽泻 陈皮【各等分】

右?咀每服?钱水貳盏煎捌分去滓食远温服

香苏饮治上气喘嗽面目浮肿

紫苑 紫苏子【炒各壹钱貳分】 大腹皮

乌梅肉 杏仁【去皮尖】 五味子

陈皮 桔梗 桑白皮【炙】

麻黄【去节】 阿胶【炒】 甘草【炙各壹钱】

右?咀分貳贴每贴水貳盏姜叁片煎捌分食远温服

葶苈丸治肺气咳喘面目浮肿喘促不安小便赤澁

防己 木通 甜葶苈【纸炒各壹两】 杏仁【去皮尖麸炒黄】 贝母【煨各壹两】

右为末枣肉捣膏为丸如梧桐子大每服伍拾丸食远桑白皮煎汤下

治男子妇人十种水气取水法

大鲫鱼【壹个去肠肚】大戟 甘遂【各贰钱半】

雄黄【另研半钱】 木香 牵牛【各半钱】

右先以大戟同甘遂一半入鱼肚里水湿纸裹煨令焦取出焙乾同衆药为末每服叁贰钱用土狗壹个烂研入药内冷水调下

涂脐膏治肿满小便少

地龙 猪苓 针砂【各等分】

右为末葱涎调敷脐中寸高以帛束之

五皮饮治水气遍身浮肿宜先此药数日次服消水丸

伏苓皮 陈皮 生姜皮

大腹皮 桑白皮 加萝卜子

苏子 葶苈子 汉秋子

右四子同炒?咀每服伍钱水壹钟生姜叁片同煎至?分去滓不拘时服

一方治酒肿及脾虚作肿

萝卜【拾枚】 皂角【伍斤】

右二味用水同煮乾去皂角将萝卜捣烂入蒸饼和丸如鸡头实大萝卜子煎汤如意送下

一方治水肿气蛊

木香?榔 陈皮

青皮 大戟 甘遂

肉豆蔻【各贰钱半】 牵牛【末壹两半】

右为末水丸或商陆汁丸如菉豆大每服伍拾丸空心白汤下

三花神佑丸治一切水湿肿病大腹实胀喘满舟车丸【方见湿门】

针灸法分水一穴【在脐上一寸灸七壮疗腹肿不能食若是水病灸大良】神阙一穴【当脐中灸三壮主水肿鼓胀肠鸣如流水声】石门一穴【在脐下二寸灸七壮主水胀水气行皮中小便黄气满】三里二穴【在膝下三寸?外廉两筋间灸七壮主水腹胀皮肿】水沟名人中【在鼻楮下灸三壮主水肿人中满】

水肿惟得针水沟若针余穴水尽即死此明堂铜人所戒也庸医多为人针分水杀人多矣若其他穴亦有针得瘥者特幸焉再不可为法也

仁斋直指卷十七

卷十八

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷十八 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

身体

身疼方论

凡人百骸四体肌肉皮肤关节脉络总而谓之身风淫湿滞血刺痰攻皆能作痛至於骨之酸疼或寒或热入里彻骨则倍蓰千万大不侔焉盖骨为髓之藏髓者饮食五味之实秀也髓虚则骨虚势所必至矣痛在於身风之证以走注知之湿之证以重着验之血有筋脉鑽刺之证痰有眩暈咳唾之证驱风除湿行血豁痰对证一投犹冀可以旦暮起病入於骨此劳极损伤之不可救药者也其能生乎然则身痛之与骨痛毫厘千里之差於此不可以无辩虽然酒家之癖多为项肿臂痛盖热在上焦不能清利故酝酿日久生痰涎聚饮气流入於项臂之间不肿则痛耳然而曰痰曰涎曰饮又有理一分殊之别伏於包络随气上浮客肺壅嗽而发动者痰也聚於脾元随气上溢口角流出而不禁者涎也惟饮生於胃府为呕为吐此胃家之病学者不可不知

身疼证治

人参顺气散身疼通用【方见风类】更增川芎半两亦散风邪左经圆麝香圆增味五痹汤治风湿身痛【并见风类】

加剂除湿汤生附除湿汤【方见湿类】五苓散【见水饮类】并主伤湿身痛

黄耆建中汤【方见湿类】加川芎当归治血刺身痛

大半夏汤【方见痰涎类】加辣桂陈皮治痰证身痛

消痰茯苓圆治臂痛不能举手或左右转移或两臂如人抽拽

圆白半夏【荡洗三次切碎日乾一两半】茯苓【一两】

风化朴消【一分】 枳殼【麸炒半两】

右末姜汁煮稀麪糊圓桐子大每三十圓食後姜汤下

天仙饮治痰注臂痛

片子姜黄【六钱】 天仙藤 羌活

白朮 白芷梢【各三钱】 半夏【制半两】

右挫每服三钱姜五片煎服间下千金五套圆【方见脾疼类】

白圆子诸风痰涎通用

圆白半夏【七两生水浸洗过】 南星【三两】

白附子【生二两】 川乌头【生去皮脐半两】

右细末入生绢袋井水摆以手揉出滓再研入袋摆尽磁盆中晒露星至晓弃旧水换新水搅晒次早又换新水搅晒春五日夏三日秋七日冬十日去水曝乾研开糯米粉煎粥清圆菉豆大每三十圆姜汤下治酒家痰壅项肿白圆子二钱研末白豆蔻缩砂煎汤调下化痰立愈自後二陈汤加荆芥服【方见疟类】

婆蒿根酒治风淫湿滞手足不举筋节挛疼先与通关用

全蝎【七个新瓦上微炒末之】 麝【一字】

右老酒三盏空心调作一服如觉已透则止未透次日再作一剂然病未尽除自後专以婆蒿根洗净切碎酒煎日二服神效

消饮圆倍朮圆治酒癖停饮臂痛【见水饮门】

沉香鳖甲散治劳倦身痛

沉香 人参 牛膝

茯苓 秦艽 木香

黄耆【微炙】 巴戟【去心】 当归

半夏【制】 柴胡 荆芥【各半两】

熟附子 辣桂【去粗皮】 鳖甲【浸去裙醋炙黄各一两】

羌活 熟地黄【洗酒蘸蒸焙七钱半】

全蝎【二钱半】 大肉豆蔻【四个】

右末每二钱葱白二寸姜三片枣二枚食前煎服温酒调下尤妙

十补汤加制半夏添桂治劳倦身痛【方见痼冷门】

舒筋散治风淫血刺身痛体疼痛四肢拘挛

延胡索【炒】 辣桂【去粗皮】 当归【等分】

右末每二钱酒调下延胡索活血除风理气

补髓丹补益真元治臂痛腰痛

杜仲【去粗炒黑十两】

破故纸【十两用芝麻五两同炒候芝麻黑筛去之】 鹿茸【二两酒炙】

没药【一两别研】

右细末用胡桃肉三十个汤浸去皮杵为膏入面少许酒煮糊圆桐子大每百粒空心盐汤下

附诸方

通气防风汤【拔粹方】肩背痛不可回顾者此太阳气鬱而不行以风药散之背痛项强腰似折项似拔者此足太阳经不通也

羌活 独活【各一钱】 藁本

防风 甘草【各半钱】 川芎

荆芥【各三分】

右?咀水煎服

麒麟竭散治寒湿搏於经络以致气血凝滞疼痛不可忍者

血竭 乳香 没药

白芍药 当归 水蛭【炒令烟尽】

麝香【各二钱】 虎胫骨【酥炙黄半两】

右为末每三钱温酒调下食前

当归拈痛汤【拔粹方】治湿热为病肢节烦痛肩背沉重胸膈不利及遍身疼痛下疰於足胫痛肿不可忍【方见脚气门】

丹溪方治上中下疼痛

南星【姜制】 苍术【泔洗】 黄栢【酒炒各二两】 川芎【一两】 白芷【半两】
神麴【炒一两】

桃仁【半两】 威灵仙【酒炒三钱】 羌活【三钱走骨节】 防己【半两下行】
桂枝【三钱行臂】 红花【酒洗钱半】

草龙胆【半钱下行】

右为末麴糊丸梧子大每服一百丸空心白汤下

一方治血气虚有痰白浊陰火痛风

人参【一两】 白术 熟苧

川黄栢【炒黑各二两】 山药 海石

南星【各一两】 鎖阳【半两】 败龟板【酒炙二两】 乾姜【烧灰半两取其不走】

右为末粥丸一云酒糊丸

一方治酒湿痰痛风

黄栢【酒炒】 威灵仙【酒炒各五钱】 苍术

羌活 甘草【三钱】 陈皮

芍药【各一钱】

右为末每服一钱或二钱沸汤入姜汁调下

诸风应効酒治一切诸般风气湿痺通身骨节疼痛【方见风门】

腰

腰痛方论

腰者肾之外候一身所恃以转移阖辟者也盖诸经皆贯於肾而络於腰脊肾气一虚凡冲风受湿伤冷蓄热血?气滯水积墮伤与夫失志作劳种种腰疼叠见而层出矣冲风者汗出乘风风邪风毒之胚胎也受湿者践雨卧湿重着肿滯之萌蘖也腰间如水为伤冷发渴便闭为蓄热血?则转侧如锥之所刺气滯则鬱鬱闷闷而不伸积水沉重则小肠不得宣通坠堕损伤则瘀血为之凝结沮剉失志者肾之蠹疲精劳力者肾之戕举是数证肾家之感受如此腰安得而不为痛乎内经曰腰者肾之府转摇不能肾将惫矣审如是则痛在少陰必究其受病之原而处之为得虽然宗筋聚於陰器肝者肾之同系也五脏皆取气於谷脾者肾之仓廩也鬱怒伤肝则诸筋纵弛忧思伤脾则胃气不行二者又能为腰痛之寇故并及之

腰痛证治

青娥圆治肾虚腰痛益精助阳乌须壮脚用安胎饮吞神效

破故纸【四两炒香】 杜仲【去粗剉四两用生姜二两半擦俺炒乾】

右为末用胡桃肉三十个研膏入少熟蜜圆桐子大每服五十圆调气散食前下【方见胀满门】

安肾圆治肾虚腰痛橘皮煎汤食前下【方见水饮门】

独活寄生汤治风邪冷湿伤肾腰脚背痛及新产腹痛腰脚挛疼最除风活血脚气通用

独活【二两半】 桑寄生【如无以续断代之】

杜仲【姜制炒】 细辛 牛膝【酒浸焙】

秦艽【去芦】 茯苓 白芍药

辣桂 川芎 防风

人参 当归 熟地黄【净】

甘草【炙各二两】

右细剉每服三钱空心煎服下利者去地黄

小续命汤治风攻腰痛【方见诸风门】加桃仁去皮尖炒生附汤治受湿腰痛

附子【生一分】 苍术【炒】 杜仲【姜制炒各半两】

生乾姜 白术 茯苓

牛膝【酒浸焙】 厚朴【制】 甘草【炙各一分】

右剉每三钱姜四片枣二枚食前煎服

姜附汤治伤冷腰痛【方见寒类】加辣桂制杜仲食前煎服甘豆汤治内蓄风热入肾腰痛大小便不通【方见积热门】加续断天麻间服败毒散【方见寒类】

苏沈沉麝圆治血沥腰痛【方见血类】用续断牛膝桃仁炒煎汤磨下

人参顺气散 乌药顺气散治气滞腰痛【方见诸风类】加五加皮入少甘草煎汤调下

肾着汤治腰间积水痛重【方见湿门】续用安肾圆并少许青木香圆继之【方见水饮门】

乳香趁痛散治打坠腰痛

虎胫骨【酒炙黄】 败龟【酒炙各二两】 骐驎竭

赤芍药 当归 没药

自然铜【煨醋淬细研】 防风 白附子【炮】

辣桂【去粗】 白芷 苍耳子【微炒】

骨碎补【炒去毛各三两】 牛膝 天麻

榔 五加皮 羌活【各一两】

右末每服一钱温酒调下加全蝎妙脚气通用

茴香酒治打坠凝瘀腰疼通用

破故纸【炒香研】 茴香【炒】 辣桂【等分】

右为末每服二钱热酒调食前进故纸主腰痛主行血

和剂七气汤治失志伤肾气剉腰痛【方见气类】多加白茯苓少加沉香乳香

麝香鹿茸丸八味丸治房劳伤肾腰痛十补汤下青娥丸治劳力腰痛【三方见痼冷门】

调肝散治郁怒伤肝发为腰痛

半夏【制三分】 辣桂 宣木瓜

当归 川芎 牛膝

好细辛【各二分】 石菖蒲 酸枣仁【荡去皮微炒】 甘草【炙各一分】

右剉细每三钱姜五片枣二枚煎服

沉香降气汤和调气散每服二钱半姜枣煎治忧思伤脾发为腰痛【方见诸气门】

橘香丸治腰痛经久不瘥

橘核 茴香 葫芦巴

庵?子 破故纸【各炒】 附子【炮等分】

右末酒煮糯米糊圆桐子大每服三四十圆食前盐汤下

神麴酒治腰痛不能转侧陈久神麴一大块烧通红淬老酒去神麴通口吞青娥圆两服顿愈

腰重痛方

八角茴香炒末食前温酒调下

附诸方

独活汤治因劳役得腰痛沉重如水似折

羌活 防风 独活

肉桂 大黄【煨】 泽泻【三钱】

桃仁【五十个】 当归 连翘【半两】

甘草【二钱】 防己 酒连【一两】

右?咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服

补髓丹【百一选方】 升降水火补益心肾强筋壮骨治肾虚腰痛【方见身体门】

若湿腰痛如坐水中盖肾属水久坐水湿处或为雨露所着湿流入肾经以致腰痛宜渗湿汤不効宜肾着汤

若风伤肾而腰痛者或左右痛无常处牵引两足宜五积散每服加防风半钱或加全蝎三个小续命汤独活寄生汤可选而用

经验羌活桃仁汤治坠堕挫闪气血凝滞攻刺腰痛神効

桃仁【去皮尖】 红花 牛膝【酒洗】

玄胡索 破故纸【炒】 杜仲【炒】

川归尾【酒洗】 羌活 官桂

苍术【泔浸炒各等分】 茴香 乳香【少许】

右?咀用水一鍾酒半鍾煎至八分食前温服

补陰丸治肾虚腰痛【方见虚劳门】

牛膝酒【三因方】 治肾伤於风毒攻刺腰痛不可忍者地骨皮 五加皮 薏苡仁

川芎 牛膝【各二两】 甘草【一两】

生地黄【十两】 海桐皮【二两】 羌活【一两】

右?咀用绢帛裹药入无灰酒内炙浸七日夏三五宿每服一盃日用三四服长令酒气不絕一法加炒杜仲【一两】

杜仲酒【三因方】治风冷伤肾腰痛不能屈伸

杜仲【一两去粗皮用姜汁制炒】

右用无灰酒三升浸十日每服二三合四五服

针灸法肾俞二穴【在十四椎下两旁各寸半】一法【令患者正立用竹杖度脐点记度皆尽处灸随年壮】

肾气

肾气方论

肾主纳气人之气海繫焉肾虚而为风寒所乘为暑湿所袭为喜怒忧恐所伤而水结不散又与气?是以群邪聚於其中曰疝曰奔豚曰小肠气曰膀胱气皆是物也其候不特外肾小腹作痛或攻刺於腰脇或游走於背脊或冷气抢心心下痛满或手足厥冷痛绕脐傍或脇之左右如盃或脐之上下如臂或腹中累累如桃李或胃脘间覆大如盘有壮热恶寒者有洒淅寒热者有不得大小便者有里急而下泄者有自汗出者有不欲食者其於陰间则卵有大小伸缩而上下不常囊有肿胀急痛而发歇无定挟冷触怒则块物逼上囊根或攻腹脇时和心平则块物自循脊系归入囊中凡此皆谓之肾气治法纲领风则散之寒则温之暑则解其热湿则渗其水七情所发调其心气水与气?行其小便其间以主治肾气之剂参之固定则也然总治之法大要以流行疎利为先母曰肾虚得病不敢疎泄盖肾为邪气所干若非逐去病何由愈僥或姑息畏虚妄以刚剂兜住使大小腑秘而不通邪气入腹冲心危殆必矣虽然肾气发作固以肾虚得之然虚中有冷虚中有热又有冷热不调尤当详审冷者脇边及外肾清冷小便清而多遇寒即发是也热者内挟暑气或积酒毒或服煖药於前外肾与小腹俱热肛门间粪後亦热小便数而澁遇热则甚是也冷热不调者小腹外肾乍冷乍热大便小便或秘或利用药温凉当随证而权度之但所谓流行疎导常常运斡於其中矣其若大小便流利之後或更有牵刺引疼或微气游注於肌肤之间此则肾虚血虚气不還元当加润养人参当归川芎芍药桑螵蛸葫芦巴辈又不可无惟是逆气长嘘中脘停酸燥闷扰扰甚而至於呕吐最为恶候何则天一生水肾实主之宗筋聚於陰器惟藉阳明以养之今脾土不济肾水上乘必为酸汁必为涎饮荏苒踰时遂成暴吐医家执剂之始皆知肾经恶燥如苍术白术良姜之类诚不敢发用耳及其呕吐大作姜术辈用之而不顾若犹也则吴茱萸萆拔刚燥等剂又加多焉虽附子亦用之而救急矣病势至此脾土未强肾水已为之涸肾水既涸脾土又为之焦往往陰阳不升降荣卫不流行大小二便关隔澁闭而肾汁胃汁皆自其口出也如此者大抵不救临病

须当识证预与病家言之

肾气证治

牡丹丸治风寒疝痛及诸血滞作痛

牡丹皮【四两】 桃仁【浸去皮炒别研】 官桂【各五两】

川乌头【一只炮热去皮尖】

右末炼蜜圆桐子大每服五十圆温酒下血痛醋汤下

养正丹【方见痼冷门】治奔豚气痛呕吐身冷调气散下沈附汤治肾虚无阳小肠气痛头额小腹外肾时冷兼治湿证

附子【生一钱】 沉香 辣桂

萆澄茄 甘草【炙各半钱】 香附【一钱】

右剉为一服姜七片空心煎服

桂姜汤治无阳脐冷疝气兼治湿证

吴茱萸【十两半酒醋浸一宿焙乾】 川白姜【生】

辣桂【各半两】 良姜 萆澄茄

茴香【炒】 缩砂仁 益智仁

木香 茯苓 甘草【炙各三钱】

右剉每服三钱水煎调苏合香丸食前服

姜桂丸治肾冷寒疝

良姜【碎片半两】 巴豆肉【二十一粒截断同炒焦去巴豆】

桂心【半两】

右并末醋麪糊圆桐子大每三十丸温酒食前服

茴香雀酒治肾冷疝气偏坠急痛

舶上茴香【三钱】 胡椒【一钱】 缩砂仁

辣桂【各二钱】

右粗末以生雀燎毛去肠拭净不洗用三个入药於腹中麻绳繫定湿纸数重裹煨香熟空心嚼食温酒送下

川椒散治疝气外肾肿痛

真川椒【去目并合口者微炒出汗】 官桂【各半两】

川芎 当归 青皮

陈皮【制】 枳殼?榔

赤茯苓 青木香 南木香

萆澄茄 白豆蔻仁 甘草【炙各一分】

右粗末每三钱姜枣煎食前服

梔子散治肾气虚中有热小腹外肾肛門俱热大小便不通梔子仁【制】 枳殼【各半两】 北梗

北前胡 青木香 赤茯苓

车前子 甘草【各一分】

右剉每三钱新水煎服壮热加柴胡大便秘加大黄

甘豆汤治肾气虚中有热大小便不通

黑豆【三合】 甘草【二钱剉】 姜【七片】

右作一剂新水煎取清汁服

海浮石散治肾气热证小便秘澁黄色

海浮石

右为末每二钱煎麦门冬赤茯苓汤调下

金莲散治膀胱气痛

巴豆【三十粒去殼截断】川练子【二十四个汤浸去皮薄切片】

右件用麩二合同炒令黄赤去麩与巴豆只将川练为末每二钱温酒调空心服

五苓散【方见水饮门】用生车前子竹园尿赤茯苓麦门冬去心灯心乌梅煎汤调下治肾气小便不通兼治水结不散暑证通用

柴胡桂枝汤治肾气冷热不调证

柴胡【一两三钱】 人参 桂枝

白芍药 生姜【各半两】 半夏【制四钱】

黄芩 甘草【炙各三钱】

右剉散每服四钱枣一枚水大盏煎七分温服

解毒?黄丸【方见积热门】温白丸【见浮肿门】以枳殼散送下【方见脚气门】治肾气大便不通酌量轻重用

二物汤治奔豚疝气攻刺走痛

辣桂【一两半】 牵牛【炒一两】

右粗末每服二钱姜枣煎温服

青木香丸治膀胱疝气每五十丸以醇酒入葱白煎五苓散送下【方并见水饮门】又方青木香圆二百粒班猫七个去头足翅为末同於文武火上慢慢炒令丸子微香以磁碟盖铫上顿在冷处少顷去班猫末取圆子每服五十丸茴香酒下

金铃散治膀胱小肠气外肾肿痛

大川练子【三十个汤浸去薄皮每个作六七片巴豆三十粒去皮膜每粒作两三段夹炒候巴色焦去巴】

右以舶上茴香与川练等秤并木香一分为末每二钱水酒各半盏连根葱白二寸煎取汁食前调下

煨枣方治小肠气痛不可忍班猫一个去头足翅入大枣中线系湿纸包置慢火中煨令香熟去猫空腹食枣以桂心茱澄茄煎汤送下

蝎麝散治膀胱小肠气痛全蝎紧实而全者不拘多少焙乾为末每迎病发时用蝎末一钱入麝半字分作二服温酒调下人行十里又进後服神効

失笑散治小肠气痛及诸血痛

川五灵脂 蒲黄【隔纸微炒】 加延胡索【各等分】

右末每服二钱酒半盏水半盏煎七分食前服血痛临熟入米醋少许

盐煎散治小肠气吊腹中成阵刺痛兼治风证

益智仁 白芷 白乾姜【炮】

茴香【炒】 甘草【炙】 天台乌药【去心】 香附【净各一两】 青皮【一两半】 榔

麻黄【去节】 川芎 枳殼【制各半两】

右末每服二钱盐少许水煎食前服

全蝎延胡散治小肠气痛最良

延胡索【用盐炒一两】 全蝎【日乾生用一分】

右细末每服一钱食前温酒调下亦治心痛不饥饱醋汤调下

葫芦巴散治小肠气攻刺

葫芦巴【炒一两】

右末每服二钱茴香炒紫用热酒沃盖定取酒调下

葱白散治肾气刺痛七气通用

当归 川芎 枳壳【制】

官桂 青皮 川白姜【生】

茴香【炒】 川练肉 陈皮

紫苏 三棱【煨】 蓬术【醋浸一宿焙】

白芍药 茯苓 木香【各一两】

人参 沉香 甘草【炙各半两】

右粗末每服三钱葱白二寸盐少许煎服大便秘加大黄

寸金圆治奔豚诸疝作痛

当归 延胡索 舶上茴香【炒】 葫芦巴【炒各一两】 桃仁【浸去皮焙】
桑螵蛸【酒蒸焙】 川五灵脂【别研】 白芍药 川练肉【各半两】 萆澄茄
木香【二钱半】 全蝎【十个焙】

右末米醋打麵糊圆桐子大每服五十圆少盐入酒送下有热小便秘车前子赤茯苓煎汤下

生料调气散治寒疝作痛【方见诸气门】 每服二钱入生姜紫苏少盐煎服若是药末用茴香盐酒调下

秘传茱萸内消圆治肾虚为邪所袭留伏作痛陰?偏大或生疮出黄水

吴茱萸【半酒半醋浸一宿焙乾】 山茱萸【蒸去核】 马兰花【醋浸焙】
川练子【蒸去皮核】 官桂

黑牵牛【炒取末】 舶上茴香【用盐炒】 延胡索【略炒】

橘红 青皮【去白】 海藻【浸洗去鹹焙各一两】 桃仁【浸去皮炒】
白蒺?【炒杵去刺】 木香【各半两】

右细末酒麪稀糊圆桐子大每四十圆食前温酒盐汤任下

葫芦巴丸治肾经虚冷膀胱气痛或陰肿偏坠或小腹有物如卵上下走痛

葫芦巴【炒】 川练子【蒸去皮核焙各四两】

川乌【炮去皮脐】 大巴戟【去心各一两半】 茴香【炒三两】

吴茱萸【半酒半醋浸一宿焙乾二两半】 牵牛【炒取末二两】

右为末酒麪稀糊圆桐子大每二十圆空心温酒送下

蠲痛圆治小肠膀胱气痛

延胡索【略炒一两】 川练【蒸去皮核】 舶上茴香【炒各半两】

牵牛【炒取末】 当归 良姜

青皮【去白】 木香 天台乌药【各一分】 全蝎【七个焙】

右末生姜自然汁浸糕为糊圆桐子大每服三十圆烧绵灰存性调酒送下

腰子散治肾气作痛

黑牵牛【炒熟】 白牵牛【炒熟等分】

右为末每服挑三钱匕猪腰一副薄切开缝入川椒五十粒茴香一百粒以牵牛末徧掺入肾中线系湿纸数重裹煨香熟出火气灯後空腹嚼吃好酒送下少顷就枕天明取下恶物即愈

茯苓桂甘汤治脐下悸动欲作奔豚

茯苓【二两】 甘草【炙半两】 桂枝【一两】

右剉细每服四钱枣一个用甘泉水一盞半煎一盞温服

敌金圆治疝气外肾肿胀极大或生疮出黄水其痛遶腹寒热往来

京三棱 蓬莪术 木猪苓

白附子 萝卜子 赤芍药

黑牵牛 川练肉 山茵陈

青木香 陈橘皮 五灵脂

姜黄 茴香【各一两】 南木香【半两】

丁香【一分】 泽泻【一两半已上并生用】 海藻【酒浸一宿焙乾】 海浮石【米醋浸火煨红淬醋又煨淬如此七次黑为度】 川山甲【热大灰煨焦各一两】 青皮【去白二两一两生用一两截碎以班猫五十个去头足翅同炒黄色去班猫不用】 香附【杵净二两一两生用一两以巴豆五十粒去壳同炒色焦去巴豆不用】

右件截碎夹和微炒并为末酒麪稀糊圆桐子大每服三十圆温酒送下此药能泄斟酌用之

川练散治膀胱小肠气木肾诸疝通用【方具木肾门】

金山老艾瓜丸治肾气攻刺及脚气酸疼通用皆得効葫芦巴【慢火炒】 牛膝【酒浸焙】 舶上茴香【酒浸炒】 肉苁蓉【酒浸焙】 川续断【拣净生用】

厚杜仲【去粗皮姜制炒令丝断】 天麻【各二两】

当归【酒浸焙】 没药【别研各一两】

右为末以艾去枝梗二两大木瓜二枚切盖去穰入艾塞满盖定竹针插麻线繫蒸烂研细和药为丸桐子大每服七十圆温酒盐汤任下

肾气方大七气汤加炒牵牛煎服

又方生姜母多开小孔纳以川椒湿纸煨透老酒嚼下附诸方

川练子散治小肠气痛

木香【不见火】 茴香【盐炒黄去盐】

川练子【用巴豆十粒槌碎同川练炒黄色去巴豆各一两】

右为末每服二钱温酒空心食前调服

玄胡索散治小肠气痛

用玄胡索盐炒乾姜各等分为细末空心盐酒调下

肾气方【丹溪方】治诸疝定痛

茴香 破故纸 吴茱萸【盐炒各五钱】 葫芦巴【七钱半】 木香【三钱半】

右为末萝卜捣汁丸盐汤下

守効丸治疝要药不痛者

苍术 南星 白芷【散水】

山查【各一两】 川芎 枳殼【又云枳实炒】 半夏【各半两】 秋冬加吴茱萸

右为末神麴糊丸服又云有热加山梔一两坚硬加朴硝半两又或加青皮荔枝核

又方治疝

南星 山查 苍术【各二两】

白芷 半夏【制】 枳核

神麴【各一两】 海藻【半两】 昆布【半两】

玄明粉 吴茱萸【各二钱】

右为末酒糊丸

积疝方

山查【炒一两】 茴香【炒】 柴胡【炒二钱】

牡丹皮【一钱】

右为末酒糊丸如梧子大服五六十丸盐汤下

又方治疝作痛

苍术 香附【俱盐炒】 黄栢【酒炒已上为君】 玄胡索 益智仁 桃仁【已上为臣】

茴香【炒】 附子【盐钊炒】 甘草【已上为使】

右为末作汤服後一痛过更不再作矣

治偏坠用没药川练肉角茴全蝎为末每服二钱空心热酒调下

木肾

木肾方论

心火下降则肾水不患其不温真阳下行则肾气不患其不和温温其和安有所谓木强者哉惟夫嗜慾内戕肾家虚惫故陰阳不相交水火不相济而沉寒痼冷凝滯其间胀大作疼顽痹结硬势所必至矣执剂之法不可纯用燥热当温散温利以逐其邪邪气内消荣卫流转盎如寒谷回春盖有不疾而速不行而至者矣外此又有一种升高坠下外肾跌伤惊气与败血交攻亦有木强胀痛之证治法大要则同於中更为之消瘀

木肾证治

川练散治外肾胀大麻木痛硬及奔豚疝气偏坠诸证川练子【不蛀者四十九个先切七个取肉以茴香二钱半慢火同炒并留茴香又切七个以破故纸二钱半同炒并留故纸又切七个以黑牵牛二钱半同炒并留牵牛又切七个以盐一钱同炒并留盐又切七个以班猫十四个去翅同炒去班猫不用又切七个以巴豆肉十四个作两断同炒去巴豆不用又切七个以萝卜子二钱半同炒去萝卜子不用外更别入】

茴香【炒】 青木香【各半两】 辣桂

南木香【各二钱半】

右并为末酒调稀麪糊圆桐子大每服三十圆食前盐酒下积日计功打坠瘀血证本方加延胡索半两略炒入药以没药研为末调酒下

金铃散煨枣方治膀胱小肠气痛外肾胀大通治木肾【方见肾气门】

四神丸治肾冷疝气胀痛

吴茱萸【拣淨一两一半用老酒浸一宿一半用米醋浸一宿各焙乾】

大香附【杵淨一两】 萆澄茄 青木香【各半两】

右为末米糊圓桐子大每服七十圓食前盐汤下或乳香葱白煎汤下

附诸方

一方治木肾不痛

枸?子 南星 半夏

黄栢【酒炒】 苍术【盐炒】 山查

白芷 神麴【炒】 滑石

昆布 吴茱萸

右为末酒糊丸桐子大空心盐汤下七十丸

治小肠气及木肾偏坠方

黑牵牛一斤用猪尿胞装满以线缚定口子好酒米醋各一碗於砂锅内煮乾为度取去黑牵牛用青红娘子十九个於鉄锅内炒燥去青红娘子将牵牛研取头末四两另入猪苓泽泻细末各二两醋糊丸如梧桐子大每服三十丸空心盐酒送下不可多服如多服令人头眩如头眩可服黑锡丹

夺命丹【和济方】 远年近日小肠疝气脐下撮痛外肾偏坠肿硬陰间湿痒抓成疮癬

吴茱萸【一斤酒浸四两醋浸四两汤浸四两童便浸四两各浸一宿用火焙乾】 泽泻【去灰十一二两】

右为末酒煮?糊丸如梧子大每服五十丸温酒盐汤任下

一方治木肾

楮树叶【又云杨树】?者晒乾为末酒糊丸桐子大空心盐汤下五十丸

仁斋直指卷十八

卷十九

钦定四库全书

仁斋直指卷十九 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

肾脏风痒

肾痒方论

实则痛虚则为痒痒之出於骨虚也明矣肾属足少陰之经囊间湿痒谓之肾脏风世所共知也孰知宗筋聚於陰器足厥陰之肝系焉惟肾主虚惟肝主风人之精血不充内为嗜慾所耗外为风冷所乘风毒湿气皆从虚入囊间其有不湿痒者乎脚下其有不疮者乎疗治之法先当疏散风邪流行湿毒夫然後以芎归活血与细辛蒺藜驱风数辈润养而平治之若欲遽用川乌故纸燥烈之剂吾恐拦住内邪病无由愈间有患者为酒麪炙所伤肾虚而挟热如猪肚黄连蒸为圆子又不可无其或不施药饵一切从事於热汤虽沃之暂止然真气愈泄肝肾愈虚或者未知攸济

肾痒证治

宣风散疎肝肾风

大鸡心?榔【二个】橘皮【半两】牵牛【生取末一两炒取末一两】甘草【焙三钱】

右末每服二钱蜜汤调下

不换金正气散去肝肾湿气【方见伤寒类】

青木香圆疎导肾经风水【方见水饮门】病人肾虚挟邪浮肿多用安肾圆少用青木香圆夹和盐汤下屡效安肾圆【方见水饮门】

活血驱风散治肝肾风毒肾囊湿痒脚下疮癣

当归 川芎 白芷

华陰细辛 白蒺藜【炒去刺】桃仁【浸去皮焙】

白芍药 半夏【制】 块润

五灵脂 甘草【生各三钱】 苍术【炒】

杜仲【姜汁炙炒去丝】 辣桂 天麻

薏苡 橘红?榔

厚朴【制】 枳壳【制】

右细剉每服三钱水盏半姜钱五片枣二枚煎七分滤清煖热入乳香末少许食前服乳香以佐心气使心肾相交或有热证去乳香加黑豆煎

痰?散治?风上攻耳鸣目眩下注陰湿疮痒

痰?【炒杵刺】 草乌头【水浸三日逐日换水去皮晒各半两】

白芷 白附【生】 苍术【炒】

荆芥穗【各二钱半】

右?末米糊圆桐子大每三十圆上则茶清下则盐酒服

乌荆圆治肝肾风痒【方见肠风门】

神授圆治外肾湿痒【方见虚劳门】

茎物肿烂淫汁方

大腹皮【一斤】

右夹苦参荆芥煎汤温洗拭以津唾涂次用油发烧存性入些白及末傅逐日煎汤密室洗换药或用乳香龙骨散仍服蜡矾圆并髮灰用米饮调下

茎头三五孔小漏疮出血微脓妙方

油发烧存性灰传乾则津唾调仍以米汤调髮灰食前服

乳香龙骨散治外肾湿痒淫烂如?

龙骨 石膏【生】 五倍子【各一分】

白及 乳香 黄革丹【各半分】 麝【少许】

右细末先以苦参大腹皮紫苏茎叶煎汤温洗後傳

陰汗湿痒方

炉甘石【緑者一分】 真蚌粉 黄连

五倍子【各半分】

右细末掺先以蜂房大腹皮煎汤温洗

又炉甘石方【见诸疮门】

妬精疮陰蚀疮方

油发灰 青黛【乾等分】

右为末入些麝或掺或津唾调傳

又青纸方【见妬精疮中】

大学治肾脏风发疮疥方

鸡心?榔【一大个破开以黄革月一钱合在内湿纸裏煨】

明硫黄【研二钱】 生革丹【一钱】 全蝎

右同末入轻粉半钱麝少许於磁器收每用少许麻油调抹两掌先以鼻臭男以两掌揜外肾女以两掌掩两乳各睡至醒次日又如此用药屡效

又方用大红川椒去目水蘸湿半日夹生杏仁研膏擦手如上法亦验

附诸方

龙胆泻肝汤治陰部时复湿痒及臊臭

柴胡 泽泻【各一钱】 车前子

木通【各五分】 生地黄 当归尾

草龙胆【各三分】

右件咀如麻豆大都作一服水三大盏煎至一盏去滓稍热空心宿食消尽服之更以美膳压之

柴胡胜湿汤治两外肾冷两脾枢阴汗前阴痿阴囊湿痒臊气

生甘草 酒黄柏【各二钱】 柴胡

当归尾【各一钱】 红花【少许】 草龙胆

麻黄根 羌活 汉防己【各一钱】

五味子【三个】 升麻 泽泻【各一钱半】

茯苓【一钱】

右件剉如麻豆大都作一服水三大盏煎至一盏去滓温服食前忌酒湿房事

补肝汤【东垣方】 前阴如冰冷并阴汗两脚痿饮无力

黄耆【七分】 人参 葛根

白茯苓【各三分】 升麻【四分】 柴胡

羌活 当归身 连翘

炒黄蘗 泽泻 苍术

麴末 知母 防风

陈皮【各二分】 炙甘草【半分】 猪苓【四分】

右件剉如麻豆大都作一服水二盏煎至一盏去滓稍热服空心食前忌酒湿

一方治肾囊湿疮

蜜陀僧 乾姜 滑石

右为末擦上

又方先用吴茱萸煎汤洗

吴茱萸【半两】 寒水石【三钱】 黄栢【二钱】

樟脑 蛇床子【半两】 轻粉

硫黄【二钱】 白矾?榔

白芷【各三钱】

右为末麻油调搽

头风

头风方论

足太阳者头之经也六经伤寒惟太阳受病最多盖头居其上当风寒之冲一有间隙则若项若脑若耳若鼻风邪乘虚皆得而入之矣况复栴沐取凉饱食仰卧之不慎乎头风为病不必须有偏正头疼之证但自颈项以上耳目口鼻眉棱之间或有一处不若吾之体焉皆其渐也有头疼有头运有头皮顽厚不自觉知有口舌不仁莫知滋味或耳聋或头汗或目痛或眉棱上下掣痛或鼻中闻香极香闻臭极臭或只呵欠而作冒眩之状凡此皆头风证也治法大要有热证者消风散用防风荆芥煎汤下无热证者追风散用薄茶清下又有素患头风之人或因伤风寒暑湿依证调理已获轻安未几头风发作则不必拘泥前药当以头风和平之剂疗之其或病躯老弱先患头风复感寒邪自汗不止此等用药无附子又不可也若夫太阳项强一证无汗恶风则为表实合用葛根汤汗出恶风则为表虚合用桂枝葛根汤是又感受风邪在头风界限之内者也入水捕鱼入林捕兔要必知其所在斯可矣【妇人月候适行辄敢?篋多成头风痒痛满头如水泡之状】

头风证治

消风散治头目昏痛鼻塞冒运

人参 羌活 川芎

白茯苓 白僵蚕【炒】 霍香叶

荆芥穗 防风 甘草【炒】

蝉壳【各二两】 厚朴【制】 陈皮【各半两】

右末每服二钱防风荆芥煎汤调下

追风散治偏正头风疼痛面上游风状若虫行

川乌【炮去皮尖】 软石膏【煨】 白僵蚕【炒去觜丝】

川芎 防风 荆芥

甘草【炙各一两】 南星【炮】 白附子【炮】

羌活 天麻 全蝎

地龙【去土】 白芷【各半两】 草乌【炮去皮尖】

没药 乳香?黄【并研各一分】

右为末每服半钱入好茶少许沸汤调食後临睡服

川芎茶调散治诸风上攻偏正头疼

川芎 荆芥穗【各二两】 香附【去毛】

薄荷【各四两】 白芷 羌活

细辛 甘草【炙各一两】 防风【三分】

右末每服二钱食後茶清调下

究原抽刀散治头风掣痛

川乌【切片姜汁浸晒】?黄 蝉退【去头足各半两】

川芎 细辛【各一两】

右末每服半钱食後临卧茶清调下

芎芷散治头风风壅

川芎 白芷 荆芥穗

软石膏【煨等分】

右末每服一钱食後沸汤调下

香芷散治头面诸风

新白芷【剉以萝卜汁浸日乾】

右末沸汤调食後服或以些子搐入鼻左用右右用左屡效

又方

新白芷【洗晒】

右为末炼蜜圆弹子大每一圆食後荆芥汤嚼下妙

二陈汤【方见暑门】加荆芥治头风兼治痰壅酒壅

如圣饼子治偏正头疼痛连脑项吐逆恶心耳聋目暗

川乌【炮去皮尖】 南星 川白姜【各一两】

川芎 甘草【各二两】 天麻

防风 半夏【重洗去滑生各半两】

右末蒸饼糊圆鸡头大捻作饼日乾每服五饼同荆芥二穗细嚼姜汤下

细辛汤治诸头疼及痰厥饮厥肾厥气厥等证但发热者不可服

附子【生】 乌头【生】 南星

乾姜 川芎 细辛【各一两】

甘草【三分】

右剉散每服三钱姜五片茶芽少许熟煎空心服

活人书葛根汤治太阳病颈项强无汗恶风为表实

葛根【一两】 麻黄【去节三分】 官桂

芍药 甘草【炙各半两】

右剉散每服四钱姜五片大枣一枚煎服

桂枝葛根汤治太阳病颈项强汗出恶风为表虚

桂枝 芍药 甘草【各七钱】

葛根【一两三钱】

右剉散每服四钱姜五片大枣一枚煎服

头风方

川芎 天麻【各半两】 细辛【华陰者去苗土】 烂石膏 荆芥穗 白芷梢

甘草【微炙各二钱】 全蝎【炙五个】

右末白汤或茶清调食後临卧服消风散加蝉壳白圆子加朱砂姜汁汤下皆要药

附诸方

川芎散【拔粹方】 治偏头痛头风神効

甘菊花 石膏 川芎【各三钱】

右为末每服一钱茶清调下一方有白僵蚕六钱生用

菊花茶调散治诸风头目昏重偏正头痛头风鼻塞

菊花 川芎 荆芥穗

羌活 甘草 白芷【各二两】

细辛【一两洗淨】 防风【去芦一两半】 蝉蜕

僵蚕 薄荷【各五钱】

右为末每服二钱食後用茶清调下

又方

片苓【酒炒五钱】 苍术【二钱半】 羌活

苍耳 川芎 生甘草

酒黄连【各一钱半】 半夏麴【炒三钱半】

右为末服法同前

附东垣头痛论

金匱真言论云东风生於春病在肝俞在颈项故春气者病在头又诸阳会於头面如足太阳膀胱之脉起於目内眦上额交颠上入络脑还出别下项病冲头痛又足少阳胆之脉起於目锐眦上抵头角病则头角额痛夫风从上受之风寒伤上邪从外入客於经络令人振寒头痛身重恶寒治在风池风府调其陰阳不足则补有余则泻汗之则愈此伤寒头痛也头痛耳鸣九窍不利者肠胃之所生乃气虚头痛也心烦头痛者病在鬲中过在手巨阳少陰乃湿热头痛也如气上不下头痛癰疾者下虚上实也过在足少陰巨阳甚则入肾寒湿头痛也如痛半寒痛者先取手少阳阳明後取足少阳阳明此偏头痛也有真头痛者甚则脑尽痛手足寒至节死不治有厥逆头痛者所犯大寒内至骨髓髓者以脑为主脑逆故令头痛齿亦痛凡头痛皆以风药治之者总其大体而言之也高颠之上惟风可到故味之薄者陰中之阳乃自地升天者也然亦有三陰三阳之异故太阳头痛恶风脉浮紧川芎羌活独活麻黄之类为主少阳经头痛脉弦细往来寒热柴胡为主阳明头痛自汗发热恶寒脉浮缓长实者升麻葛根石膏白芷为主太陰头痛必有痰体重或腹痛为痰癖其脉沉缓苍术半夏南星为主少陰经头痛三陰三阳经不流行而足寒气逆为寒厥其脉沈细麻黄附子细辛为主厥陰头痛项痛或痰吐涎沫厥冷其脉浮缓吴茱萸汤主之诸血虚头痛当归川芎为主诸气虚头痛人参黄耆为主为主者主治也兼见何证以佐使药治之此立方之大法也气血俱虚头痛者於调中益气汤中少加川芎蔓荆子细辛其効如神半夏白术天麻汤治痰厥头痛药也青空膏乃风湿热头痛药也羌活附子汤厥逆头痛药也如温气在头者以苦吐之不可热方而治

加减三五七散【和剂方】治八风五痹肢体不仁大治风寒入脑阳虚头痛畏闻人声目旋

运转耳内蝉鸣应有温痺脚气缓弱并皆治之

山茱萸【去核】 乾姜【泡】 茯苓【去皮各三两】 细辛【一两半】
防风【去芦四两】 附子【三个半炮去皮脐】

右为细末每服温酒食前调服

仲景麻黄汤治太阳伤寒头痛无汗

桂枝汤治太阳伤风头痛有汗【并见伤寒门】

定风饼子【秘方】 治偏正头痛【方见伤风门】

川芎散【圣惠方】 治头风偏正头痛

羌活 细辛 川芎

香附子 槐花 甘草【炙】

石膏 荆芥穗 薄荷

菊花 茵陈 防风

右为末每服二钱茶清调食後服忌动风物

清空膏治偏正头痛年深不愈者又治风温热头上壅及脑痛除血虚头痛不治余皆治之

川芎【五钱】 柴胡【七钱】 黄连【酒炒】

防风 羌活【各一两】 炙甘草【一两五钱】 细挺子黄芩【三两去皮一半酒制一半炒】

右为末每服二钱热盏内入茶少许汤调如膏抹在口内少用白汤送下临卧如苦头痛每服加细辛二分痰厥头痛脉缓减羌活防风川芎甘草加半夏一两五钱如偏正头痛服之不愈减羌活防风川芎一半加柴胡一倍如发热恶热口渴此阳明头痛只与白虎汤加吴白芷【白虎汤方见暑门】

一方治伤风减风一切头痛

甘菊【一两】 细辛【半两】 甘草【七钱半】

白芷 香附子 羌活

薄荷【各两】 二荆芥【二十枚】 茵陈【半两】

苍术【泔浸】 川芎【各两】

右为末每服二钱茶清调下妇人产後当归石膏末调下

宝监石膏散治头疼

川芎 石膏 白芷【各等分】

右为末每服四钱热茶清调下

豆粉丸【圣惠方】治风热头疼

川芎 细辛 甘草

白芷 豆粉【各二钱半】 薄荷

石膏【各半两】 朴硝【二钱】

右为细末炼蜜和丸如弹子大石膏末为衣每服一丸细嚼茶清下

彻清膏

蔓荆子 细辛【各一分】 薄荷叶

川芎【各二分】 生甘草 炙甘草【各五分】 藁本【一钱】

右为末茶清调二钱下

半夏白术天麻汤治脾胃证已经服疎风丸下二三次元证不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑头旋目不敢开头苦痛如裂四肢厥冷不得安卧此气虚头痛也黄栢【二分酒洗】

乾姜【三分】 泽泻

白茯苓 天麻 黄耆

人参 苍术【各五分】 炒神麴

白术【各一钱】 麦芽 半夏【汤洗】

陈皮【各一钱半】

右每服五钱水煎热服

顺气和中汤治气虚头痛此药升阳补气头痛自愈黄耆【一钱半】 人参【一钱】
甘草【炙七分】

白术 陈皮 当归

芍药【各二分】 升麻 柴胡【各一分】

细辛 蔓荆子 川芎【各二分】

右作一服水煎食後服亦治气血俱虚头痛

安神汤治头旋眼黑头痛

羌活【一两】 防风【二钱半】 柴胡

升麻【各半两】 黄蘗【酒制一两】 知母【酒制一两】

生地黄【半两】 黄耆【二两】 炙甘草

生甘草【各二钱】

右件每服秤半两水二盏煎至一盏半加蔓荆子半钱川芎三分再煎至一盏去滓临卧热服

芎归汤治血虚头痛

川芎 当归【各等分】

右每服五钱水煎服

调中益气汤治气血俱虚头痛【方见脾胃门】

内加川芎三分蔓荆子三分细辛二分

眉眶痛

丹溪云眉眶痛者属风热与痰作风痰治类痛风一方

黄芩【酒浸炒】 白芷

右为末茶清调二钱

选奇汤治眉骨痛不可忍大有効

羌活 防风 甘草【各二钱】

酒黄芩【一钱冬月不用】

右每服三钱水一鍾煎七分食後温服

一方治头痛连眼痛此风痰上攻须用白芷开

雨前茶 川芎 白芷

防风 藁本 细辛

当归

右用水煎服

仁斋直指卷十九

卷二十

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷二十 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

眼目

眼目方论

眼者五脏六腑之精华如日月丽天着明而不可掩者也其首尾赤眦属心其满眼白睛属肺其乌睛圆大属肝其上下肉胞属脾而中间黑瞳一点如漆者肾实主之是虽五脏各有证应然论其所主则瞳子之关系重焉何以言之目者肝之外候也肝取木肾取水水能生木子肝母肾焉有子母而能相离者哉故肝肾之气充则精彩光明肝肾之气乏则昏蒙晕眩乌轮赤晕刺痛浮浆此肝热也胆生清泪枯黄遶睛此肝虚也瞳人开大淡白?斜此肾虚也瞳人焦小或带微黄此肾热也一虚一实以此验之然人知肝肾之气相依而行孰知心者神之舍又所以为肝肾之副焉所谓一而二二而三者也何则心主血肝藏血血能生热凡热冲发於眼皆当清心凉肝又不可固执水生木之说特眼者轻膜裹水照彻四方溯源反本非天一之水又果孰为之主宰乎析而论之则拘急牵颞瞳青胞白痒而清泪不赤不疼是之谓风眼乌轮突起胞硬肿红眵泪湿浆里热刺痛是之谓热眼眼浑而泪胞肿而软上壅?眵酸澁微赤是之谓气眼其或风与热并则痒而浮赤风与气抟则痒澁昏沉血热交聚故生淫肤粟肉红缕偷针之类气血不至故有眇视胞垂雀眼盲障之形淡紫而隐红者为虚热鲜红而妬赤者为实热两眦呈露生胬肉者此心热血旺白睛红膜如纸伞者此气滞血凝热证瞳人内涌白睛带湿色浮而赤也冷证瞳人青绿白睛枯槁气沉而浊也眼热经久复为风冷所乘则赤烂眼中不赤但为痰饮所注则作疼肝气不顺而挟热所以羞明热气蓄聚而伤饱所以胞合吁此外证之大概然尔五脏不可阙一脾与肺独无预何耶曰白睛带赤或红筋者其热在肺上胞下胞或目唇间如疥点者其热在脾脾主味也五味之秀养诸中则精华发见於外肺主气也水火升降荣卫流转非气孰能使之前所谓五脏各有证应者於此又可推矣虽然眼之为患多生於热其间用药大抵以清心凉肝调血顺气为先有如肾家恶燥设遇虚证亦不过以当归地黄辈润养之轻用温药不可也况夫肺能发燥肝亦好润古方率用杏仁柿乾饴糖砂蜜为佐果非润益之意乎至於退翳一节尤关利害凡翳起於肺家受热轻则?眵重则生翳真珠翳状如碎米者易散梅花翳状如梅花叶者难消虽翳自热生然治法先退翳而後退热者谓热极生翳若先去赤热则血为之水而翳不能去其有赤眼与之凉药过多又且涤之以水不反掌而水凝眼特一团水耳水性清澄尤不可规规於点洗喜怒失节嗜慾无度穷役眼力泣涕过

伤凌寒冲风当暑冒日不避烟火饮啖热多此皆患生于腑脏者也专事点洗可乎哉有能静坐澄神爱护目力放怀息虑心逸日休调和饮食以养之斟酌药餌以平之明察秋毫断可必矣谚曰眼不点不害耳不聾不聋请以为戒【风眼肿则软热眼肿则硬】

眼目证治

人参羌活散治风眼热眼澁痒昏?

羌活 独活 柴胡

人参 川芎 枳殼【麸炒】

茯苓【各半两】 前胡 北梗

天麻 地骨皮 甘草【炙各二钱半】

右末每服一钱半荆芥煎汤调下

菊花散【方在後】 夹和亦得

败毒散【方见伤寒类】 加荆芥性效同

消风散【方见头风门】 治眼风痒昏澁荆芥煎汤下

治眼壅热赤肿方

山茵陈 车前子

右煎汤下本门川芎茶调散通用食後临卧服

磨光散治诸风攻眼消磨翳膜

沙苑蒺?【形如羊肾慢火略炒杵去刺】 防风

羌活 甘草【盐水炙】 石决明【捣碎研水飞过】 草决明 蝉蜕【去足】
蛇皮【剪碎和麻油新瓦炒】 川芎【各半两】 甘菊

右末每一钱半用麦门冬去心煎汤下食後临卧服

菩萨散治风毒攻眼昏泪颞痒

苍术【日换童尿浸二宿挫晒】 防风

白蒺藜【炒捣去刺各二两】 荆芥穗【一两半】 甘草【盐水炙七钱半】

右末每服一钱入盐少许沸汤点下或用消风散夹和尤佳

羌活散治风气攻眼昏澁淚花

羌活 川芎 天麻

旋覆花 甘菊 藁本

防风 蝉壳【洗晒】 细辛

杏仁【浸去皮各一两】 甘草【半两炙】

右为末每二钱新水略煎服

菊花散治肝受风毒眼目昏?渐生翳膜

蝉壳【去足】 木贼【去节童尿浸一宿晒】 白蒺藜【炒捣去刺】 羌活【各三两】
甘菊【去萼四两】 荆芥穗

甘草【炙各二两】

右末每服二钱食後茶清下

白蒺藜散治肾经风毒攻眼昏泪澁痒

白蒺藜【炒捣去刺】 防风 甘草

生直僵蚕【炒去?觜各一两】

白南星【一两半用黑豆二合青盐半两水煮透焙去盐豆】

甘菊【去萼一两半】

右末每二钱沸汤少盐点下

开明散风毒气眼朦濫障膜通用

蒺藜【炒去刺】 防风 羌活

川芎 天麻 茯苓

蝉壳【去足】 苍术【童尿浸一宿焙各半两】

华阴细辛 荆芥 荒蔚子

甘草【炙各一分】 甘菊【去萼二两】

右末每二钱盐一点食後沸汤调下

海明散治风眼昏泪翳膜

川芎【一两】 苍术【童尿浸一宿去皮焙】 木贼【去节童尿浸晒】 蝉壳【洗晒】
蛇皮【皂角水洗新瓦焙】 羌活

防风 荒蔚子 楮实

地骨皮 荆芥穗 旋覆花

白蒺藜【炒去刺】 烂石膏 细辛

杏仁【浸去皮晒】 甘草【盐水炙各半两】 全蝎【五枚】

右细末每服一钱半食後临卧服或秦皮煎汤下

蝉花无比散治风眼气眼昏泪痒翳膜或头风牵引眼小胞烂

石决明【用东流水入盐煮一伏时捣研如粉】 当归

防风 羌活【各三两】 蝉壳【洗晒】

甘草【炙各二两】 蛇皮【皂角水洗新瓦焙】 荆芥

细辛【各一两】 茯苓【四两】 蒺藜【炒去刺八两】

芍药 苍术【童尿浸二宿去皮切晒各十两】

右细末每二钱食後米泔茶清任下

蝉花散治风眼热眼昏澁肿疼渐生翳膜

蝉壳【洗晒】 甘菊 川芎

防风 羌活 山梔仁

白蒺藜【炒去刺】 草决明【炒】 荆芥穗

蔓荆子 谷精草【洗晒】 蜜蒙花

木贼【去节童尿浸晒】 苍术【米泔浸焙】 甘草【炙等分】

右末每二钱食後米泔茶清任下

治眼流气饮治风热攻眼赤肿

荆芥穗 梔子仁 牛蒡子【炒】

蔓荆子 甘菊 细辛

甘草【炙】 防风 白蒺藜【炒去刺】

玄参 川芎 大黄

黄芩 木贼【去节童尿浸晒】 草决明【各一两】 苍术【米泔浸一宿焙二两】

右末每服二钱食後临卧紫苏煎汤调下或蜜汤下

千金漏芦汤治热眼赤肿朦雾

白及 漏芦 黄芩

麻黄【去节】 川升麻 芍药

白微 枳殼【麩炒】 大黃

甘草【炙等分】

右粗末每三钱新水煎热服以通利为度

八珍饮治热眼肿痛

车前子 龙胆草 谷精草

仙灵脾 威灵仙 藁本【各半两】

荆芥穗 秦皮 甘草【炙各二钱半】

右细剉每服二钱食後煎服

黄连解毒汤治诸热眼赤肿羞明冒暑饮酒患眼通用

黄连【去须捣碎色红者随意新水浸半日】

右以磁碗盛重汤炖食後服滓再炖

泻肝散治肝热赤眼肿痛

梔子仁 荆芥 大黃

甘草【等分】

右剉每服二钱水煎食後服

洗肝散肝盛风热攻眼赤肿眵泪浮雾蔽明

当归 川芎 防风

羌活 山梔仁 薄荷叶

大黃【焙】 甘草【炙等分】

右末每服二钱食後荆芥泡汤调下

治眼痛方

当归须 木贼 茺拨

右末茶水调舌浸出涎

消毒麻仁圆治肝热风毒攻眼赤痛

大黄【生五两】 山梔仁【十两】 杏仁【去皮晒二两】

右末炼蜜圆桐子大每服三四十圆临卧温汤下

龙胆散治肝热乌睛浮肿赤晕昏疼

龙胆草 梔子仁【各二钱】 防风

川芎 玄参 荆芥

山茵陈 甘菊【去萼】 楮实

甘草【各一钱】

右末每服一钱半食後茶清调下

和剂流气饮加川芎治气眼浮软上壅?朧加蒺?治风眼牵腮昏泪澁痒【方见胀满类】 调
消风散尤佳【方见头风门】 楮实散治肝热生翳亦治气翳细点者

楮实子【研细】

右以蜜汤调下食後服亦治小儿翳眼

远志圆清心益肝明目退翳

人参 茯神【去木】 芦荟【研】

琥珀 蔓荆子【各半两】 川芎

生地黄 熟地黄【洗焙】 茺蔚子

蝉殼【洗晒各一两】 车前子 细辛

白蒺藜【炒去刺】 远志【水浸去心晒乾姜汁蘸焙各七钱半】

全蝎【伍枚】

右细末炼蜜圆桐子大每五十圆空心粥饮下临卧石菖蒲汤下

麦黄汤治热眼赤痛

车前子 麦门冬【去心】 生地黄【洗晒等分】

右剉每服三钱新水入蜜同煎食後服加川芎尤好

生地黄圆明目活血消去瘀肉

人参 防风【各半两】 当归

川芎 生地黄 乾白蒺藜【炒去刺各一两】 全蝎【五尾】

右晒为末炼蜜圆桐子大每五十圆食後薄茶下加羚羊角半两尤佳

朱僧热翳方

蝉殼【洗晒半两】 蒺藜【炒捣去刺半两】 防风

羌活 木贼【去节童尿浸一宿晒】 川芎

细辛 秦皮 楮实

荆芥 藁本 甘菊

甘草【各二钱半】

右末每服一钱薄茶调下

道人开障散治诸障翳

蛇退【洗焙煎细】 蝉退【洗焙】 黄连【去须各半两】 綠豆【一两】

甘草【生二钱】

右剉细每服二钱食後临卧新水煎服

杏仁方治肝肾风虚瞳人带青润泽脏腑洗垢开光能驱风明目

真杏仁【水浸五枚去皮尖】

右五更初就床端坐勿言勿睡息虑澄神嚼杏仁一粒勿咽逐一细嚼至五粒俟津液满口分为三咽直入肝肾惟在久而成功

花草膏治患眼肿痛澁痒昏泪羞明

羯羊胆【一枚饭上蒸熟】

右以冬蜜研和入朱砂末少许频研成膏食後临卧匙抄少许含咽亦可点目

夏枯草散治眼痛痒翳膜

夏枯草 大香附【杵净童尿浸一宿晒】

木贼【去节童尿浸晒】 蚕退纸【炒焦存性】 细辛

连翹 川芎 当归须

赤芍药 蝉殼【洗晒各半两】 甘草【微炙】

脑荷【各二钱半】

右末每二钱茶清米泔任下无蚕纸以夜明砂代用

神授钱太师方治一切眼疾昏翳通用

木贼【去节童尿浸一宿晒】 甘草【生】 川芎

谷精草 蒺藜【炒杵去刺】 蝉殼【洗晒】

荆芥 羌活 防风

旋覆花 蜜蒙花【等分】

右末每二钱秦皮煎汤调下

盐术散治内外障

苍术【四两日换米泔浸七日刮去皮细切入青盐一两同炒黄去盐不用】

木贼【去节二两童尿浸一宿晒】

右捣为末每一钱温米泔调下或渗入饮食中任服

仙木饮治眼中翳膜

苍术【童尿换浸二宿洗净晒乾一两一分】 木贼【去节童尿浸一宿晒】 蝉壳【去足】
白蛇皮【皂角水洗焙】 白蒺藜【炒去刺】

谷精草 防风 羌活

川芎 杏仁【去皮】 甘草【生焙各一分】

右末每一钱食後蜜汤调下

观音圆治内外障失明或欲结青光内障或赤脉疼痛悉疗之

血竭 熊胆【研各二钱】 人参

蛇退【皂角水洗新瓦焙各半两】 木贼【去节童尿浸晒】 苍术【童尿浸二宿晒】
威灵仙 鹰爪黄连【去须】 地骨皮【洗晒】 蔓荆子 茺蔚子

车前子 川芎 当归

羌活 蝉退【洗晒】 石决明【煨存半生各一两】 蚕退纸【二十幅炒焦】

右细末用羯羊肝一具去筋膜慢火煮半生熟带血性和药同捣以粟米粉用肝汁煮糊圆桐
子大每七八十圆温米泔下或石菖蒲煎汤下食後常服

羊肝圆解热消血明目

黄连【淨为末二两】 杏仁【去皮半两】 白羊子肝一具【去筋膜】

右件臼内捣细衆手圆桐子大每七十粒食後临卧温米泔下日三服

大仙饮治内外障翳目睛疼痛

石决明【煨存半生】 明烂石膏【生】 川芎

木贼【去节童尿浸一夜晒各一两】 杏仁【浸去皮半两】 甘草【炙二钱】

右细末每二钱灯心薄荷少许煎服食後临卧

前麓开翳散治眼生翳障神效

白蒺?【炒捣去刺】 苍术【洗童尿换浸二宿晒各一两】

蝉壳【洗晒】 蛇退【去头尾及脊上一线皮不堪用皂角水洗新瓦焙】 菜花蛇皮 好川芎
杏仁【水浸去皮】

防风 羌活 白芷【各半两】

华陰细辛 独活【各四钱】 白附子【生】

明烂石膏 荆芥穗 真蚌粉【各三钱】

右细末每服一钱半沸汤点茶清调以舌浸於药中良久毒涎自出又别换药食後临卧服仍
用点翳膏

真珠退翳散

白泽石膏 乌贼骨 真蚌粉【等分】

小珠【少许】

右细末每一钱第二米泔调食後临卧常服

退翳散治眼中翳膜疮豆翳眼通用

真蛤粉【研一两】 细谷精草【日乾细末一两】

右夹和每服二钱生猪肝三指大竹刀切开藏药卷束麻绳扎米泔一碗煮肝熟食後临卧细嚼以汁下

五退散治内障眼

蝉退 蛇退 蚕纸

乌鸡卵殼 男子发【等分】

右夹烧存性研细末每一钱和羊肝汤吃不时常服

还睛圆治眼目昏翳

蝉殼【洗□】 苍术【童尿换浸二宿焙】 熟地黄【洗焙】

川芎 白蒺?【炒杵去刺各一两】

茺蔚子 羌活 防风

木贼【去节童尿浸一宿晒】 甘菊 荆芥

蔓荆子 杏仁【浸去皮焙】 兔?子【研酒浸】 石决明【煨各半生】

蛇皮【酒浸洗净焙各半两】

右细末炼蜜圆弹子大每一圆食後细嚼茶下

明眼生熟地黄圆治肾气衰弱肝受虚热眼生黑花生地黄 熟地黄【各一斤半】
净石斛【炒】

枳殼【麸炒各六两】 羌活 防风

牛膝【各四两】 甘菊【去萼一斤】 杏仁【去皮焙十两】

右末炼蜜圆桐子大每五十粒空心食前盐汤下或蒺?煎汤下

驻景圆治肝肾俱虚眼目昏翳

兔?子【酒浸研五两】 熟地黄【洗晒】 车前子【各三两】

右末炼蜜圆桐子大每五十粒食前盐汤下或白茯苓石菖蒲煎汤下本方加枸杞子一两半尤佳

山药圆【见漏浊门】驻景圆明眼地黄圆菊睛圆【见本门】

右四药夹和每服百粒食前盐汤下或大流气饮下治肾虚瞳人开大淡白昏蒙凡人五更初肾气开才一言语咳唾肾气即合当肾开时静默进前药百粒功效胜常

菊睛圆治肝肾气虚日暗黑花

苁蓉【酒浸洗焙二两】 枸杞子【三两】
甘菊【去萼四两焙】川巴戟【去心酒浸晒一两】

右细末炼蜜圆桐子大每五七十粒食前盐汤下余太宰方加熟地黄二两净或用驻景圆对交服

千金神麴圆升降水火明眼目血心肾

磁石【烧红碎法醋以碎为度研细无声二两】 朱砂【一两研细】

神麴【炒二两】 加沉香【半两】

右细末别用生神麴水调浓煮糊圆桐子大每服三十粒空心盐汤下磁石法水入肾朱砂法火入心济以沉香是则升降水火

汤泡散治肝虚风热攻眼赤肿羞明渐形翳膜

当归 赤芍药 黄连【去须等分】

右末每用二钱极沸汤泡乘热先熏後洗冷则再煖用日两三次又方沸汤入白盐少许闭目沃洗盐亦散血

水淋法治眼睛肿胀突出新汲水沃眼中频数换水眼睛自入仍以麦门冬桑白皮山梔仁煎汤通口服之黄连滴眼方治热眼赤肿疼痛

鹰爪黄连【净二钱】 乾艾叶【少许】 真杏仁【一个去皮】

右同捣碎新汲水浸一日夜滤清汁仰卧以帛蘸滴入眼中鼻内见苦味即药透也或新水浸黄连磁器盛重汤煖浓汁以熟艾烧存性入药用

滌風散治風毒攻眼赤腫痒疼

黃連【去須】 蔓荊子【各半兩】 五倍子【三錢】

右剉細分三次新水煎濾清汁以手沃洗效

立消膏治浮翳粟翳霧膜遮睛

雪白鹽【淨器中生研少許】

右以大灯草蘸鹽輕手指定浮翳就點凡三次不疼痛勿驚恐屢效

姜液膏治眼風痒冷泪爛眩有虫

生薑母【一塊】以銀簪插入即拔出點眼頭尾效

南鵬砂散治胬肉瘀突

南鵬砂【色黃】 腦子【少許研細】

右以灯草蘸點其上玄參麥門冬煎湯調洗心散服

爛眩方治爛眩風綠色炉甘石燒紅淬童尿凡三次出火毒一日夜研細末夾黃連末用童尿浸取清汁點眼胞仍取覆盆子軟葉入男兒乳汁研為圓置眼眦頭引虫自出

甘石散治風眼流泪不止

綠炉甘石 烏賊骨【等分】

右細末入腦少許點目井口泪自收二藥燥腦和之

前麓點翳膏

朱砂【二錢】 南鵬砂【一錢半】 蕤仁【二十一粒用抄紙去油乾為度】

真珠 爛石膏【各半錢】 熊胆【一字】

麝【少許】

右细末用冬蜜研和於?内蒸得粘入角罐收用时煎秦皮汁调铜筋点於眼眦头泪出为效
傳眼方治患眼赤肿闭合

土朱【二分】 烂石膏【一分】

右末新水入蜜调传眼头尾及太阳处仍以山梔煎汤调治眼流气饮服一泄而愈【方见前】

雀盲散治遇夜目不能视建昌军螺儿蚌粉三钱为末?猪肝一叶竹刀披开纳蚌粉於中麻线扎第二米泔煮七分熟又别蘸蚌粉细嚼以汁送下无蚌粉以夜明砂代用夜明砂治内外障?入猪肝煮带生和汁细嚼效

治偷针方脾间积热兼宿食不消则偷针秦皮剉细夹砂糖水煎调大黄末少许利之

鱧血方治小儿豆疮入眼生翳鱧鱼系其尾而垂之从项下割破些少取生血点翳白鱧尤佳若翳已凝即用南鹏砂以灯心蘸点仍用威灵仙仙灵脾洗晒等为末每一钱第二米泔调服

通关散

细辛 川芎 脑荷

蔓荆子【等分】

右为末每半钱搐入鼻又头风门消风散加细辛皆可通关【小儿泔眼不开诸泔方论在後】

附诸方

石膏羌活散【宣明方】治久患双目不覩光明远年近日内外气障风昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活【治脑热头风】 蜜蒙花【治羞明怕日】 木贼【退翳障】

香白芷【清利头目】 乾菜子 荆芥穗【治目中生疮】 细辛【二味起倒睫】
蒺藜子【起拳毛】 川芎【治头风】

苍术【闭鬱行气】 甘菊花【明目去风】 石膏

黄芩【二味洗心退热】 藁本【治偏正头风】 甘草【和诸药各等分】

右为末每服一钱至二钱食後临卧用蜜水一盞调下或茶清亦可日进三服至十日渐明至二十日大验此方医数十余人矣後人加当归枸杞子梔子仁连翘柴胡薄荷叶防风天麻桔梗【各等分为小丸服】

上清丸【秘方】治风热上壅眼目昏花迎风冷泪羞明赤烂

羚羊角 犀角 黄连

厚朴【各一两】 牛黄 黄芩

川芎 羌活 蝉退

白芷 菊花 大黄

防风 草决明 地肤子

滑石【各五钱】 生地黄 熟地黄【各七钱】 牵牛【八钱半】

右为末炼蜜丸如梧桐子大

清神益气汤【东垣方】治因脾胃虚损黄证之人误服泻肝散致目疾

茯苓 升麻 陈皮

生甘草 芍药 白术【各二分】

五味子 麦门冬 泽泻

苍术 防风【各三分】 黄柏

青皮【各一分】 人参 生姜【五分】

右剉水煎服

救苦汤治赤肿苦痛

桂枝 连翘 红花

细辛 归身 甘草【各五分】

苍术 草龙胆【各七分】 羌活

黄芩 麻黄 柴胡

防风 藁本 黄连

黄栢 生地黄 知母【各一钱】

芍药【二钱】

右剉水煎服

经验神仙退云丸治一切翳晕内外障昏无睛屡効

川归 川芎 木贼【各一两半去节】

犀角 枳实 黄连

蝉退 薄荷【各半两】 瓜蒌根【六钱】

甘菊 蛇退 蜜蒙花

荆芥 地骨皮【各三两】 白蒺藜

乾地黄【二两】

右蜜为丸饮下妇人当归汤下有气木香汤下

羊肝丸治一切目病不间障盲

黄连【一两】 白乳羊肝 甘菊

防风 薄荷 荆芥

羌活 川芎 川归【各二钱】

右为末羊肝杵丸水下

助阳和血补气汤【卫生宝鉴】治眼发後上热白睛红多眼泪无疼痛而癰澁难开此服苦寒药太过而真气不能通九窍故眼昏花不明宜助阳和血补气

防风【七分】 黄耆【二钱】 甘草【炙】

蔓荆子【各一钱】 当归身 白芷

升麻 柴胡【各五分】

右?咀作一服水一鍾半煎一鍾临卧通口服忌风寒及食冷物

蔓荆汤【圣惠方】治劳役饮食不节内障眼疾此方立効

黄耆 人参【各一两】 蔓荆子【二钱半】 甘草【炙八钱】 白芍药【二钱】
黄栢【三钱酒浸晒四次】

右?咀每服五钱水二盞食後临卧温服

车前散【曾氏家传】肝经积热上攻眼目逆顺生翳血灌瞳人羞明多泪

蜜蒙花【去枝】 甘菊花【去枝叶】 白蒺?【炒去刺】

羌活 粉草 草决明

车前子【各炒】 黄芩 龙胆草【洗各等分】

右为末每服二钱食後饭汤调下

四物龙胆汤【拔粹方】治目赤暴发作云翳疼痛不可忍者

当归 川芎 芍药

地黄【各五钱】 羌活【三钱】 草龙胆【二钱】

防风【三钱】 防己【二钱】

右?咀每服八钱水一鍾半煎八分食後通口服

东垣熟乾地黄丸治血少神劳肾虚眼目昏黑

熟地黄【一两】 生地黄【一两五钱】 柴胡【八钱】

天门冬 甘草【炙】 枳壳

地骨皮 黄连 五味子【各三钱】 人参【三钱】 当归身【酒蒸焙乾】 黄芩【各五钱】

右为末炼蜜丸如菉豆大每服百丸茶清下

决明散治眼青盲内障方

桔梗 羚羊角 大黄

紫决明 当归 川芎

瞿麦【用花】 生地黄 木贼

羌活 防风 赤芍药

石决明【火煨】 青相子 车前子

蝉退 白芷 细辛

蔓荆子 蒺藜【炒】 香附子

玄参 瞿麦【各半两】

右?咀每服四钱水一鍾半煎至一鍾通口服立効加

黄连 猪苓 杏仁

犀角 蛇退 菊花

旋覆花 木通 山梔子

丹砂 空清殼【水】 甘草

养肝丸治肝血不足眼目昏花或生眵泪久视无力

当归【酒浸】 车前子【酒蒸】 防风

白芍药 葳?仁【汤泡去皮】 熟地黄【酒蒸焙】

川芎 楮实子【各等分】

右为细末炼蜜为丸如桐子大每服七十丸食後白汤下又妇人血虚目疾日宜服

益陰肾气丸【东垣方】 此壮水之主以镇阳光

熟地黄【三两】 牡丹皮【五钱】 生地黄【四两酒制炒】 泽泻【二钱半】
当归尾【去上酒制】 山茱萸【各半两】

茯苓【二钱半】 柴胡 五味子

乾山药【各五钱】

右件为细末炼蜜为丸如桐子大朱砂为衣每服五七十丸空心盐汤送下

地芝丸治目不能远视能近视或亦妨近视

生地黄【焙乾秤】

天门冬【去心秤各四两】 枳殼【麸炒去穰秤】 甘菊花【去枝秤各二两】

右为细末炼蜜为丸如桐子大茶清送下百丸温酒亦可

定志丸治眼不能近视反能远视者【方见惊悸门】

秘传程东阳光明散屡用神効

水银【五钱】 铅锡【三钱一方五钱】 枯矾

炒盐 炒硝【各五钱】

治翳膜加鹏砂硃砂【各一钱】

右五味共研为末入於阳城罐内用铁灯盏盖之再用鉄线扎定外用旧草鞋烧灰和盐泥固济用文武火升之勿令泄气鉄灯盏上常用水渍之依法三炷官香时退火候冷轻手开罐取下灵气雪白重五钱者为佳用磁罐收贮入後炉甘石煅炼听用羊脑炉甘石一两用槌熟黄泥包封甘石在内再将前灵气五分掺於泥上再用青盐合黄泥槌熟又裹於外故蜜晒乾用髻条铁线团围缚定用炭火煅红用童便渍之依法七次取出去土将炉甘石研为极细末

点之立効或加冰片少许

又方治赤眼烂眩风神効

防风 连翹 荆芥

黄芩 黄栢 生地黄

海漂硝 羌活 黄连

当归【各一两】

右?咀用水五碗煎熟去滓再熬成膏入面粉一两铜緑三钱前灵气五分气脚三分共为细末入膏和成条子每用二三钱井水 化重汤煨温淋洗三次立愈神効

秘传神仙拨云散点开翳膜如神

真珠 鹏砂 石燕子【炒过各一分】 冰片【三厘】 硃砂【升过】 牙硝【炒过】

石蟹 牛黄【各半分】

右为极细末点开再用後方末药点之神効

又方

乳香【制过】 没药【制各五分】 轻粉【五厘】

石燕子【一个醋浸九次】 青盐【温纸包烧一分】

珍珠【温纸包烧过】 琥珀【放豆腐内煮五次用】 血结【各三分】 ?黄

雄胆【用箸焙乾】 朱砂【各二分】 枯矾

胆矾【各五厘】 海漂硝【三厘】

白丁香【三粒水洗过】 炉甘石【火煨童便渌七次一钱】

右研极细末加冰片少许点之神効

服药方

蜜蒙花 生地黃 甘菊花

梔子仁 黃柏 黃芩

木賊 知母 木通

川芎 藁本 甘草

石決明 黃連 陳皮

草決明 龍胆草 枳殼

當歸 白附子 柴胡

桔梗【各等分】

右?咀用水二鍾煎食後服

又末藥方服之神効

防風 木香 川芎

黃連 黃芩 白荳蔻

菊花 川椒 瓜蒌仁

秦皮 蜜蒙花 羚羊角

犀角 枸?子 蟬退

枳殼【各等分】

右爲末每服一錢茶清調下

秘傳受仙方復明膏

黃連【一斤淨細剉碎】 赤芍藥【半兩洗淨】 當歸【一兩洗淨】

杏仁【三七粒】 黃柏皮【一兩去粗】

右剉碎安铜铫内用水满浸文武火熬至茶鍾鍾半一次二次三次熬至一茶鍾熬至九次次用磁器盛药水上於内搅动取大半碗药水煨红炉甘石九次吃将乾为度炉甘石虽用茶褐色者【土十分轻者为佳】用乳鉢细研为末用密绢罗罗之再研二十分细用制了净朴硝三钱重【除用三分】制了炉甘石末【一两半重】

朱砂【一钱重】 片脑【二钱重】

前五味用信白纸好绵滤过洗铜铫净於内慢火熬不可吹灰尘在内切忌诸般灰秽之事用竹篦子不住手搅之休令铫底焦了再括下乳鉢中乳得十分均上殼如常法立効

补陰圓治肾虚眼目昏暗【方见虚劳门】

防风通圣散治风热眼痛头目昏眩【方见中风门】

明日流气饮治一切眼疾疼痛神効

大黄【炮】 牛蒡子【炒】 川芎

菊花【去枝】 细辛【去苗】 白蒺?【炒去刺】 防风【去芦】 玄参【去芦】
山梔【去殼】

黄芩 甘草【炙】 蔓荆子

荆芥【去梗】 木贼【去节各一两】 草决明【一两五钱】 苍术【米泔浸二两】

右为细末临睡酒服二钱

秘传神应眼药

制炉甘石【十两】 黄连 黄栢

薄荷【各三两】 甘草【一两】 朴硝【二两】

右五味?咀用水数碗煎熟滤去滓用鉢头盛之将炉甘石研细入银窝内火煨深红倾入药水上就研飞过淨末听用

水银【一两】 黑铅【一钱已上二味配作一块】

白鵬砂【一钱】 硃砂【五分】 食盐【一两用白水煮炒乾】 枯白矾【一两】

皂矾【二钱】 火硝【萝卜汁提过七钱五分】

右八味同一处入阳城罐内用盐泥固济於蜜升打一炷官香候冷取出听用将前制炉甘石研细再入五两在阳城罐底次将前灵气七钱五分亦研细上又安甘石五两盖定亦严封固打一炷官香冷定出火毒研极细纸罗过如点翳膜加白鹏砂五钱硃一钱五分火硝一钱五分照前制过名曰卷帘散如点昏?加水片名曰光明散

至宝琥珀錠子

炉甘石【童便煅七次】 府丹【各四两水飞过】 鹏砂【四钱】

琥珀 硃砂 玳珠

朱砂 明矾 熊胆

轻粉 海漂硝 净皮硝

?黄 乳香 没药【各四钱】

冰片【五分】 麝香【四分】

右为极细末又黄连黄栢黄芩白蒺? 梔子仁谷精草菊花各一两五钱诃子三个共味?咀滚水浸一昼夜铜器熬成老膏又蜜一斤六两熬成老膏滴水成珠去火为度同煎成膏和均下前末药令匀梨子三个取汁通和前药成錠子用乳汁银簪蘸点一切眼疾如神

倒睫拳毛

因邪风攻入脾经致使两皮风痒不住双手背揉目久赤烂拳毛入眼内将木鼈子去殼槌烂用丝绵包捻成条左患塞右鼻右患塞左其毛自分上下次服五退散

五退散

蝉退【二钱】 猪退【四钱】 蚕蜕【三钱】

穿山甲【炙焦五钱】 防风【二两去芦】 荆芥【一两半】

石决明 川乌【炮去皮脐】 草决明【炒各五钱】 甘草【三钱】
蛇蜕【醋煮竹筒盛焙乾一钱五分】

右为末每服二钱盐汤送下

针法攢竹二穴【在两眉头内尖?中是穴宜以细三棱针刺之宣泄热气三度刺目大明】丝竹空二穴【在两眉後尖髮际?中针三分宜泻不宜补禁灸】

灸法三里二穴【穴法见前治眼目昏暗】

风翳在左灸右手中指本节头骨上灸五壮炷如小麦大右患灸左

仁斋直指卷二十

卷二十一

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷二十一 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

耳

耳论

耳属足少陰之经肾家之寄窍於耳也肾通乎耳所主者精精气调和肾气充足则耳闻而聪若劳伤气血风邪袭虚使精脱肾惫则耳转而聋又有气厥而聋者有扶风而聋者有劳损而聋者盖十二经脉上络於耳其腧穴诸经适有交并则脏气逆而为厥厥气入於耳是为厥聋必有时乎眩晕之证耳者宗脉之所附脉虚而风邪乘之风入於耳之脉使经气痞而不宣是为风聋必有时乎头痛之证劳役伤於气血淫慾耗其精元瘦悴力疲昏昏瞶瞶是为劳聋有能将适得所血气和平则其聋暂轻其或日就劳伤风邪停滯则为久聋之证矣外此又有耳触风邪与气相击其声嘈嘈眼或见光谓之虚鸣热气乘虚随脉入耳聚热不散脓汁出焉谓之脓耳人耳间有津液轻则不能为害若风热之津液结而成核塞耳亦令暴聋谓之聤耳前是数者肾脉可推风则浮而盛热则洪而实虚则濡而濡风为之踈散热为之清利虚为之调养邪气屏退然後以通耳调气安肾之剂主之於此得耳中三昧

耳病证治

治厥聋方和剂流气饮加石菖蒲每服三钱以生姜葱白同煎食後服沉香降气汤【方见胀满门】或降气汤【方见脚气门】不换金正气散【方见寒门】指迷七气汤【方见气门通用】轻者吞来复丹【方见暑门】重者吞养正丹【方见痼冷门】凡治耳聋皆当调气桂星散治风虚耳聋

辣桂 川芎 当归

细辛 净石菖蒲 白蒺藜【炒杵去刺】

木通 木香 麻黄【去节】

甘草 大南星【煨裂】 白芷稍【各四钱】

右件剉碎每服三钱水盞半葱白二片紫苏五叶姜五片食後煎服晚少食临卧加些全蝎服排风汤亦可用【方见风类】

加味宣风散通利肾脏风气

鸡心?榔【三个】 橘皮 桃仁【浸去皮焙】

白芷 枳殼【制各半两】 牵牛【二两重半炒半生】

右为末每服二钱蜜汤调下食前服

地黄丸治劳损耳聋

大熟地黄【洗焙】 当归 川芎

辣桂 兔?子【酒浸三日?乾捣末】

大川椒【出汗】 故纸【炒】 白蒺?【炒杵去刺】 葫芦巴【炒】 杜仲【姜制炒去丝】 白芷

石菖蒲【各一分】 磁石【火烧醋淬七次研细水飞一分半】

右为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服五十丸以葱白温酒空心吞下晚饭前又服

益肾散治肾虚耳聋

磁石【制度如前】 巴戟 大川椒【开口者各一两】

沈香 石菖蒲【各半两】

右为细末每服二钱用猪肾一只细切和以葱白少盐并药湿纸十重裹煨令香熟空心嚼以酒送下

芎芷散治风入耳虚鸣

白芷 石菖蒲【炒】 苍术

陈皮 细辛 厚朴【制】

半夏【制】 辣桂 木通

紫苏茎叶 甘草【炙各一分】 川芎【二分】

右剉散每三钱姜五片葱白二片水煎食後临卧服

耳鸣方

草乌头【烧带生】 石菖蒲

右等分为末用绵裹塞耳一日三度

耳鸣暴聋方

川椒 石菖蒲 旧松脂【各一分】 巴豆肉【五分】

右为细末熔蜡圆如枣核大塞入耳

蔓荆子散治内热耳出浓汁

川升麻 木通 赤芍药

桑白皮【炒】 麦门冬【去心】 生地黄

前胡 甘菊 赤茯苓

蔓荆子 甘草【炙等分】

右件剉散每服三钱姜枣煎食後临卧服

耳热出汁方

消石 烂石膏 天花粉

防风【已上各一钱】 脑【少许】

右件为末掺耳立止

脓耳方

真龙骨 白矾【煨】 赤小豆

黄革丹【煨】 乌贼骨【各一分】 臙脂【半分】

右为细末掺耳

又方

烂石膏【於新瓦上煨出火毒】 明矾【煨】

黄革丹【煨】 真蚌粉 真龙骨【各等分】 麝【少许】

右为细末用绵?竹?拭耳换绵蘸药入耳

聤耳方

生猪脂 生地龙 釜丁墨【等分】

右件细研以葱汁和捏如枣核薄绵包入耳令润即挑出

耳聋方

明硫黄 雄黄【各研细】 远志【去心】

皂角肉【等分】

右为细末葱白捣粘入麝少许绵包入耳

又方

蓖麻子肉 巴豆【去膜油】 杏仁【去皮】

滴乳香 松脂【各别研等分】 青盐【半分】

右件细研熔蜡圆如枣核大入耳

又方

以生鼠取胆汁尽入耳又以生鼠取脑髓绵包入耳生鲤鱼脑通用

鸡峰方

菖蒲【一寸】 巴豆【一个去心膜】 麝【少许】

右为末合研作七圆绵包入耳日一圆

久聋方

蓖麻子【两个一个去油用】 远志【去心】

乳香 磁石【烧如前各二钱】 皂角【煨取肉半铤】 生地龙【中者一条】
全蝎【二个焙】

右为细末入蜡捣圆柱入耳

耳痛方

白盐炒热重帛包熨

又方

杏仁炒焦研细帛包塞

虫入耳方

桃叶按细塞其耳自出○或以蓝青研汁滴入耳又以川椒为末法醋浸一宿滴耳

蚁入耳方

猪脂一指许炙令香置耳孔边其蚁自出

蜈蚣入耳方

用生姜取汁灌放耳中少时自出或以桑皮捣汁灌入耳即自出

耳聋方

用大蒜一瓣从一头开孔以巴豆肉一粒慢火煨极热入蒜孔中以新绵包塞耳逐日换
又方

用猛燬石半钱槌碎生研细入聋耳孔别用针砂末入不聋耳孔自然通透然後倾出
大治耳聋通神散

全蝎【一枚】 土狗【二枚】 中地龙【二条】

?黄明矾【半生半煨各半钱】 麝【一字】

右研细葱白引药入耳闭气面壁坐一时三日一次

脓耳方

明白矾【煨】 黄虢丹【煨】 龙骨

麝脂【等分为末】 麝【少许】

右件研为细末用绵杖?乾换绵杖蘸药入耳入麝香轻粉各少许掺入耳

又方

蝎梢【七个去毒焙】 麝脂【半钱】 乳香

麝香【各少许】

右研为细末以斡子挑入耳

耳鸣方论肾者宗脉所聚耳为之窍血气不足宗脉乃虚风邪乘虚随脉入耳气与之?故为耳
鸣先用生料五苓散加制枳壳橘皮紫苏生姜同煎吞青木香圆【方并见水饮门】散邪疎
风下气续芎归饮和养

川芎 当归 华陰细辛【各半两】

辣桂 石菖蒲 白芷【各三钱】

右剉细每服三钱入紫苏姜枣煎服如虚冷甚者酌量加生附子

附诸方

犀角散子【济生方】治风热上壅两耳聋闭内外肿痛脓水流出

犀角【镑】 菖蒲 木通

玄参 赤芍药 赤小豆【炒各一两】 甘菊花【去梗一两】 甘草【炙半两】

右?咀每服四钱水一盞半生姜五片煎七分温服

清神散治风气壅上头目不清耳常重听

僵蚕【炒去丝嘴】 乾菊花【各一两】 荆芥穗

羌活 木通 川芎

防风【各五钱】 木香【一钱】 石菖蒲

甘草【各三钱】

右为末每服三钱食後临卧茶清调下

复聪汤【姚方伯传】治痰火上攻耳聋耳鸣

半夏【制】 陈皮【去白】 白茯苓【去皮】

甘草【炙】 瞿麦 篇蓄

木通 黄栢【去粗皮炒褐色各一钱】

右用水二茶鍾生姜三片煎至一茶鍾空心临卧各一服

凉膈散治风热上攻耳聋【方见积热门】

通圣散治风热上攻耳聋【方见风门】

滚痰丸治热痰湿痰耳聋【方见痰门】

神芎散治湿热湿痰耳聋

?榔丸治湿热湿痰耳聋【方见积聚门】

龙会丸治肝火上升耳聋【方见脇痛门】

一方治耳聋久不闻

磁石【一块如豆大】 川山甲【烧存性为末一字】

右用新绵子裹塞於患耳内口中含些生铁觉耳内如风声即愈

一方治耳作脓者

用甘遂一块如枣核大以绵裹塞耳中以甘草含口中徐徐嚙下

一方治冻耳

用橄?核烧灰清油调敷雀脑亦可

鼻

鼻论

肺为气之主通窍於鼻鼻者清气出入之道路也陰阳升降气血和平则一呼一吸荣卫行焉其或七情内蠹六气外伤则清浊不分泥丸汨乱诸证迭起矣夫血之与气相随而行若脏腑生热乘於血气故热气迫血妄行自鼻孔出谓之鼻衄热则津液中乾冷则髓涕流注若风冷随气乘於鼻脑则津液交涕不能自收谓之流涕肺为风寒所伤津液冷滞鼻气不宣香臭不闻於是壅作鼻鼈冷气停聚血脉陰凝岁月淹延转加壅结於是变生息肉或风邪入鼻?於正气邪正相击鼻道不通则为鼻痛或气血壅滞上焦生热邪热之气留伏不散则为鼻疮叠是数证七情六气皆当究其感受之原用药有序痊愈可期执方无权迄未有所济也外此更有湿?一证鼻烂汁臭下部生疮详於後篇疳论见之

鼻病证治

生地黄汤治上热衄血

生地黄【洗淨二两】 阿胶【炒酥一两】 川芎

北梗 蒲黄 甘草【生各半两】

右剉碎每服三钱水煎熟入生姜汁二匙温服

麦门冬散治鼻衄

生地黄 生麦门冬【三钱】 生姜【一钱】

白药 蒲黄【各二钱】 白蜜【一合】

右捣细以井水二大碗煎七分两服

川芎三黄散治实热衄血

大黄【湿纸裹蒸】 川芎 黄连【净】

黄芩【等分】

右为末每服二钱井水调服食後

败毒散【方见寒类】 吞鸡苏丸治肺热膈中鬱热衄血兼治血淋吐血口臭

鸡苏【即脑荷半斤】 真蒲黄【一两焙】 麦门冬【浸去心晒二两】 阿胶【一两炒】
甘草【七钱半焙】 人参

黄耆【各半两】 木通 柴胡【各一两】

生地黄末【三两】

右研为细末用冬蜜一斤熬一二沸即入地黄末频搅得所次将余药和圆如桐子大每服三十圆食後下

苏子降气汤治虚壅鼻血【方见脚气门】

血方

川郁金末井水调下亦治吐血○又茅花煎汤通口服○又方血余散【方见血类】曾服烧炼药致鼻血者山梔煎汤解之仍烧山梔存性为末入鼻○又方乌贼骨槐花等末入鼻○又方槐花半生半炒末入鼻○又方成片人中白烧去秽为末入鼻少许入鼻或加油髮灰○又方萝卜汁或藕汁滴入鼻○又方大蒜煨香取三瓣研传脚底鼻中有蒜气即去之

川椒散治流涕

大红开口川椒【微炒盖出汗】 苡子【煨取肉】

川白姜【生者】 辣桂 川芎

细辛 净白术【等分】

右件为末每服二钱温酒调下

南星饮治风邪入脑宿冷不消鼻内结硬物窒塞脑气不宣遂流髓涕

上等大白南星切成片用沸汤荡两次焙乾每服二钱用枣七个甘草少许同煎食後服三四服後其硬物自出脑气流转髓涕自收仍以大蒜茸拔末杵作饼用纱衬炙热贴額前熨斗火熨透或香附茸拔末入鼻

芎藭散治鼻塞为鼈

芎穷 ? 榔 麻黄【去节】

肉桂 防己 木通

细辛 白芷 石菖蒲【各一分】

木香 川椒 甘草【焙各半分】

右剉每三钱生姜紫苏煎服

通顶散治鼻鼈

瓜蒂 ? 芦【各一分】 皂角肉【半分】

麝【少许】

右为末吹些入鼻

鼻鼈雄黄丸

雄黄【半钱】 瓜蒂【二个】 緑矾【一钱】

麝【少许】

右为细末搽些入鼻亦治息肉

又方

瓜蒂 明矾 华陰细辛【各一钱】 雄黄【半钱】

右为末以?犬胆汁和圆绵包塞鼻

千金息肉方

瓜蒂 华陰细辛【等分】

右末绵包少许塞鼻

又息肉方

甘遂 明矾【煨】 朱砂

雄黄 雌黄?芦

瓜蒂【等分】

右为末清蜜调傅前鼈二药通用

人参顺气散【方见风类】 霍香正气散【方见呕吐类】 皆治鼻痛又方

杏仁【水浸去皮焙】 细辛 白芷【各一钱】

全蝎【两个焙】

右为末麻油调傅

甘露饮【方见积热门】 黄连阿胶丸【方见 门】 共治鼻疮

又方

用杏仁研乳汁傅之○或以乌牛耳垢傅○或黄栢苦参?榔等为末以猪脂研傅○或青黛槐

花杏仁研传

酒查鼻并鼻上赘肉面粉刺雀斑方

黄革丹【二钱半】 硃砂【半钱】 巴豆肉【十个纸压去油】 饼药【一盞半】

右件同入罐子中以慢火熬三四沸取下续入研细石灰三钱和毕酒查鷺毛蘸扫红处日一次粉刺雀斑小竹杖挑药点才见微肿便洗去鼻上赘肉傅之半月取出脓血自成痂落矣

又酒查鼻面上肺风疮方

白龙圆末逐日洗面如澡豆法更罨少时方以汤洗去食後常服龙丹一贴【并见和剂方】半月莹洁

酒查鼻方

白盐常擦妙

鼻血方

发灰入鼻磨好墨入点法醋并水调下

附诸方

茜根散治鼻衄不止

茜根 阿胶【蛤粉炒】 黄芩

侧柏叶 生苳【各一两】 甘草【半两】

右以水煎服加姜三片

黄芩芍药汤治鼻衄不止

黄芩 芍药 甘草

右以水煎服或犀角地黄汤如无犀角以升麻代之

一方治鼻血不止

用頭髮燒灰以竹管吹入鼻中即止或以酒調亦可

御寒湯治寒邪傷於皮毛令人鼻塞咳嗽上喘

黃蘗【二分】 黃耆【一两】 人參【五分】

炙甘草 欬冬花【各三分】 羌活

黃連【各二分】 白芷 防風【各三分】

陳皮【五分】 佛耳草【三分】 升麻【半錢】

蒼朮【七分】

右?咀如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服

菖蒲散【御藥院方】治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲 皂角【等分】

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時

增損防風通聖散治鼻塞不利肺氣不清

鼠粘子 桔梗 桑白皮

紫苑 荊芥穗【各三兩】 甘草【生二兩】

右?咀每服八錢水一鍾半姜五片煎八分食後溫服

羌活散治腦有郁熱遇寒鼻塞【方見傷風門】

蒼耳散【三因方】治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛荑仁【半兩】 蒼耳子【炒二錢半】 香白芷【一两】

薄荷葉【五分】

右為末每服二錢葱茶清食後調下

辛荑散【济生方】治肺虚为四气所干鼻塞涕出不已或气息不通或不闻香臭

川芎 木通【去节】 防风【去芦】

甘草 辛荑 细辛【洗去土】

藁本 升麻 香白芷【各等分】

右为末每服三钱茶清调下

防风汤治鼻渊脑热渗下浊涕不止久而不已必衄血

防风【二两半】 黄芩 人参

甘草【炙】 川芎 麦门冬【去心各一两】

右为末每服二钱沸汤调食後服

丹溪方治鼻中瘖肉胃中有食积热痰流注治本当消食积

蝴蝶矾【二钱】 细辛【一钱】 白芷【半钱】

右为末内鼻中

治鼻渊方

南星 半夏 苍术

白芷 神? 酒芩

辛荑 荆芥【各等分】

右为末水调食後服

白黄散【简易方】治鼻鼈瘖肉鼻痔等证

雄黄 白矾 细辛

瓜子【各等分】

右为末搐入鼻中

辛荑膏【御药院方】治鼻生瘰肉窒塞不通有时疼痛

辛荑叶【二两】细辛 木香

木通 白芷 杏仁【汤泡去皮尖研各五钱用】

右用羊髓猪脂二两和药於石器内慢火熬成膏取赤黄色放冷入龙脑麝香一钱为丸绵裹塞鼻中数日肉脱即愈

又方治鼻中瘰肉

蝴蝶矾【二钱】细辛【一钱】白芷【五分】

右为末内鼻中

唇舌

唇舌论

心之所司者舌脾之所司者唇口是虽各有司存然心之气未尝不通於脾脾之气未尝不通於心也夫舌者心之官尝五味之秀以荣养一身资脾胃之藏以分布水谷故心之本脉系於舌根脾之络脉系於舌傍或风寒暑湿之所中伤则舌缩卷而不能言或忧怒思恐之所郁闭则舌肿满而不得息心热则破裂生疮脾闭则白胎如雪舌之为病合心脾而主治之故曰心之气未尝不通於脾者此也口者一身吐纳之都门百物荣养之要道节宣少舛病必生焉故热则苦寒则咸宿食则酸烦燥则澁虚则淡疸则甘脏气偏胜则其味必偏应於口咸酸甘苦非舌味之而谁欤若夫上池津液出於舌端心实主之也津液流布非胃而何故曰脾之气未尝不通於心者此也或问口臭一证可得闻乎曰脏腑异气燥腐不同是气蕴积胷膈之间挟热而冲发於口人将掩鼻而过之信夫医不难於处方惟难於识证受病源流懵不及究律以古方尝试一中不几费人乎此辩之不可不早

唇舌证治

升麻散治心脾有热口舌破裂生疮

川升麻 玄参 川芎

生地黄【洗晒】麦门冬【去心各半两】大黄

黄连 淨黄芩 甘草【焙各三钱】

右件剉碎每服三钱姜枣煎食後服

龙石散治口舌生疮喉间肿痛

寒水石【烧红半斤】 朱砂【六钱】 脑【半钱】

右为细末日三五次掺

五福化毒丹治唇舌肿破生疮烦渴

玄参【洗焙】 北梗【各三两】 茯苓【二两半】

人参【半两】 马牙硝【枯】 青黛【各一两】

甘草【七钱半焙】 麝【一字】 金银箔【用四十片为衣】

右为细末炼蜜圆如皂子大以脑荷泡汤候冷调下如口臭以生地黄汁调下

生地黄膏治口舌疮肿

生地黄 蓝青叶【各等分】

右入蜜杵细每服半两井水煎食後服

萍草圆治口舌疮

浮萍草【晒】 黄栢【并末】 杏仁

青黛【等分】 轻粉【少许】

右炼蜜研圆皂子大以绵裹含有涎吐之

洗心散治心热四顺清凉饮治脾热甘露饮治血热牛黄凉膈丸治唇焦口疮咽痛【并见积热门】

舌出血

槐花晒为末傅舌上或真蒲黄生傅

黄连阿胶丸治心热口疮【方见嗽门】可择用

鹏砂圆治口臭口乾口舌疮

寒水石【烧红十两】 鹏砂【二两】 脑

麝【各二钱】 马牙硝【枯四钱】 甘草【浸汁熬膏二两】

右为细末甘草膏搜圆麻子大含咽

鸡苏圆治胷中郁热口臭烦渴【方见鼻门】

舌肿大方

真蒲黄掺傅

又方

鹏砂末姜钱蘸擦

舌肿强方

蛇皮【烧存性】 全蝎

右为末少许掺傅

治舌疮肿方

大山豆根剉细含咽或末掺傅

口疮方

正黄连 厚黄栢 鸡心?榔

右等分为细末傅之即可

又方

黄栢【四钱】 青黛【二钱】 铜绿【一钱】

右件为末傅之

又方

黄连 升麻

右二件为末以薄绵包含咽芦荟末傅

又口吻边疮

白烂?榔【烧存性】和少轻粉研傅

唇舌焦燥口破生疮者盖心脾受热所致也以水浸黄连重汤烺而饮之或用黄连阿胶丸以粳米饮吞下此为要药至於大渴而不可御合少与竹叶汤执剂之法无以踰此然此特随几应变而已就根本论之则水火相济蜡苓圆【方见消渴门】

附诸方

立効散【端効方】治唇紧疮疼痛

诃子肉 五倍子

右为末乾贴唇上立効

赴筵散【端効方】治赤白口疮

黄栢 青黛 蜜陀僧

右为末乾贴疮

桃花散治口舌生疮

玄胡索【一两】 黄栢 黄连【各半两】

蜜陀僧【一钱】 青黛【二钱】

右为末傅贴口内有津即吐

升麻散【济生方】治上膈壅毒口舌生疮咽喉肿痛

升麻 赤芍药 人参

桔梗 乾葛【各一两】 甘草【生用五钱】

右?咀每服四钱水一鍾半姜五片煎八分温服

增损如圣散治上焦热壅口舌生疮

桔梗【二两】 甘草【炙一两半】 防风【半两】

枳殼【制二钱半】 黄芩

右为末每服三钱水煎食後服

一方治舌肿

用百草霜为末以好醋调敷立効

一方治口唇生疮赤烂

青黛 枯矾?榔末【各等分】 冰片【少许】

右共为细末掺患处

泻黄饮子【济生方】治风热蕴於脾经唇燥折裂生疮

白芷 升麻 枳殼【去白炒】

黄芩 防风【去芦】 半夏【汤洗】

石斛【各一两】 甘草【炙半两】

右?咀每服四钱水一盞姜五片煎七分温服咽喉

咽喉论

咽者胃之系喉者肺气之所通咽以咽物喉以候气理一而分殊也自其风邪客於喉间气郁

而热则壅遏而为咽疼自其热气生於肺胃风毒蘊隆则肿结而为喉痹尸咽者陰阳不和脾肺壅盛风热毒气不能宣通故令尸虫发动上蚀於喉或痒或疼如?之候也谷贼者谷芒强澁藏於米而误食之滯於咽门不能传化故风热并聚与血气搏遂令肿刺如喉噎之生谷贼也胃脘实热燿灸上焦发为白头赤根固有咽疮之证脏腑停寒寒则气缩如物窒碍於其间亦有喉闭之证至若悬痈生於上腭虽不关於咽喉所以暴肿者抑亦热气使然也咽喉悬痈关要所系病不急疗皆能杀人然则疗之将何如曰热则通之寒则温之不热不寒依经调之寒热和平病不生矣

咽喉证治

胆矾散治酒麪热盛咽喉肿结闭塞

鸭觔胆矾【半钱】 全蝎【二个】

右为末以鸡羽蘸药入喉中须臾破开声出次用生青苛研细井水调下候吐出毒涎即愈未吐再服

山豆根丸治积热咽喉闭塞肿痛

山豆根【一两】 北大黄 川升麻

朴消【生各半两】

右为末炼蜜丸如皂子大每一粒以薄绵包少痛便含咽液

青解毒丸治热毒上攻咽喉肿痛

寒水石 石膏【各四两研】 青黛【二两】

右为细末拌和青黛水浸蒸饼研糊丸龙眼大每一丸食後以井花水化下

吹喉散治咽喉热肿口舌生疮

盆硝【四两】 青黛【七钱半】 真蒲黄【半两】

右以生荷汁半斤和三件入磁铫慢火熬乾研细每半钱筒吹入口内

绦雪散治咽喉热痛肿塞

寒水石【半两煨红】 鹏砂 牙硝

朱砂【各研一钱】 脑【半钱】

右为细末每一字掺入口咽津

玉屑无忧散治咽喉热闭肿痛舌疮物哽

贯众 缩砂仁 荆芥穗

白茯苓 玄参 黄连【净】

山豆根 滑石【研】 甘草【生各半两】

寒水石【一两】 鹏砂【一钱研细】

右为细末每一钱乾掺舌上渐以新水咽下

牛黄凉膈丸治咽喉唇舌热肿生疮【方见积热门】

如圣汤治咽喉肿痛

北梗【去芦】 甘草【焙】 加荆芥穗

右件等分为粗末每服二钱用井水煎临卧服

僵蚕丸治喉风

白僵蚕【炒】 明白矾【生】

右件为末以白梅肉和圆如皂子大每一圆薄绵包入喉少顷涎水出即愈

远志散治喉闭

远志【去心取肉】

右为细末以管子擗开口吹药入喉策令头低涎出而愈

白药散治喉中热塞肿痛散血消痰

白药 朴硝

右为末以小管吹入喉

谷贼方

木鳖子仁 川大黄【焙】 牙硝

射干 山豆根 川升麻

白药

右件等分为末炼蜜圆如皂子大以薄绵包含咽液

又方

鹏砂 牙硝

右件等分细研每服半钱以薄绵裹含咽

口疮赤烂方

清蜜浸黄栢一宿取汁含咽

和剂七气汤加北梗甘草指迷七气汤治冷证气缩喉闭【方见气类】

半夏桂甘汤治冷证无阳咽疼喉闭

辣桂 甘草【焙】 半夏【制】

右件等分剉碎每服三钱水一大盏煎半候冷少呷

咽闭方

胆矾细研以管子挑少许吹入喉中即破续以白梅煎汤调炒僵蚕末以去其风如无胆矾只透明绿矾代之亦得

又方

明白矾末一大钱匕用川巴豆肉一粒入矾中以火熬乾取矾为末极细每一字以小管挑吹入喉涎出自愈

又喉风喉痹方

蛇皮【略洗过日乾剪作细屑】 白梅肉

右件研和为圆含化屡效

解毒?黄丸治?喉风急喉闭【方见积热门】 每服七圆研细以熟水研白梅肉调下或热茶清下热则通之用此玉钥匙治风热喉痹

焰消【三分】 鹏砂【一分】 直僵蚕【炒半分】 脑【少许】

右为末每半钱以竹管吹入喉

又热闭方

川升麻【半两】

右剉井水浓煎服少顷吐出毒气

又方

山豆根 射干 升麻

右井水平煎服

喉风喉痹方

蚕退纸烧存性为末炼蜜圆皂子大含咽

又方 绿矾研细米醋调咽一边痛侧卧含咽

又方 皂角肉半锭剉细以米醋一大盏煎至七分滤清咽

通关散

白矾【枯】 直僵蚕【炒】 南星【生】

芦【各一钱】 全蝎【焙二个】

右为末以小管挑一字吹入鼻中吐痰喉通

又方治喉脾欲绝

雄黄【二钱】 明矾【生】 芦【各一钱】

蝎梢【七枚】 猪牙皂【七钱】

右为细末每服一字吹入鼻吐痰効

悬痈肿痛方

玄参【半两】 升麻 射干

大黄【各一分】 甘草【一钱】

右为末每三钱以井水煎时时含咽

又方 明矾烧灰存性和盐花研细筋头点傅患处谷贼方 脂麻炒为末以汤点服

喉痈闭方

白明矾【煨】 牙硝【各一钱】 麝【旨半月钱】

右研细烂乌梅肉圆旋含咽

又方治痰热闭喉以萝卜汁和皂角浆吐之

又喉闭方

牙硝 麝脂 盐梅屑

右件同研以鸡羽送入

又喉痛方以山豆根常常含咽汁

附诸方

甘桔汤【活人方】治少陰喉痛

桔梗 甘草【各等分】

右?咀每服五钱水一鍾半

又方治喉痹并时行疼痛

桔梗 甘草 升麻

连翹 防风 牛旁子【杵研】

黄芩【酒炒各一钱】

右?咀作一服水二盞煎八分食後细细饮服

噤化三黄丸【秘方】治咽喉痛大效

山豆根【一两】 鵬砂【二钱】 龙脑【少许】

麝香【少许】

右为末用青鱼胆为丸如菉豆大每服三五丸噤化津咽下

一方治咽喉肿痛

山豆根 射干 花根

右同陰乾为末吹入喉中如神

三黄丸【大成】治丈夫妇人三焦积热咽喉肿闷心膈燥烦小便赤澁大便秘结并宜治之【方见火門】

凉膈散【大成】治大人小儿脏腑积热口舌生疮痰实不利咽喉烦燥多渴肠胃秘澁小便不利一切风热并宜治之【方见积熱門】

吹喉散治咽喉肿痛急慢喉闭悬痈乳鵞咽物不下

诃子【一两醋浸一宿去核晒乾】 黄芩【酒浸一宿晒乾】 胆矾【一钱】

明矾【一钱半】 牛旁子

甘草【生】 薄荷【各五钱】 一方有百药煎

右为末先用好生姜擦舌上每用药一钱芦管吹入喉中吐出涎痰便用热茶吃下再吹第二次便用热粥三次再吹用热茶或热粥乘热食之加朴硝末少许如口舌生疮用药吹之口中利去痰涎为妙

针灸法一穴【在大指甲後第一节灸三小壮治累年喉痹举发男灸左女灸右】

少商二穴【在大指内侧去爪甲角韭策许针出血愈】 合谷二穴【在虎口针五分治喉闭立愈】

齿

齿论

齿者骨之所终髓之所养肾实主之经云肾衰则齿豁精固则齿坚诚哉是言也或曰手阳明之支脉入齿手阳明者大肠经也於齿夫何预不思大肠传送气道行焉壅则齿浮虚则宣露挟风则上攻头面疳?则变成齲脱不相为而实相关也夫齿之为痛者五一曰风热二曰风冷三曰毒痰四曰恶血五曰虫蚀风气袭虚客於齿间乘於血气故令齲肿热气加之脓汁遗臭此风热之为齿痛一也血气不足骨髓乃虚风冷凑入停於齿根不肿不蛀日渐动摇此风冷之为齿痛二也热则生痰毒气上攻灌注经络最能发痛外证壅盛咳唾交冲此毒痰之为齿痛三也头面有风挟热攻齲热?於血故令血出瘀滞不消掣痛鑽刺此恶血之为齿痛四也凡人饮食甘肥不能洁齿腐臭之气淹渍日久齿根有孔虫在其间蚀一齿尽又度其余至如疳?皆其种类必虫杀而後痛止此非五曰虫蚀之证乎前是数者痛有自来治各随证条列於後虽然百物养生莫先口齿不漱不洗损蠹之媒是不惟患生宿腐而暑毒酒毒常伏於口齿之间莫若时时洗漱之为愈也临睡洗毕至於晨兴灌漱一口吐出掌中就掌涤眼自觉光明终身行之直可为终身受用

齿病证治

荆芥汤治风热齿痛

荆芥 脑荷 升麻

细辛

右件等分为末每服二钱以沸汤点漱口含咽并用擦牙

消风散【方见头风门】治齿热痛齲肿有汁先傳消风散又以朴消传其上○又法川升麻煎汤漱咽解毒

温风散治风冷齿痛

当归 川芎 细辛

白芷 萆拔 藁本

蜂房【炒等分】

右剉每二钱井水煎服仍含漱

安肾圆【方见水饮门】八味圆【方见痼冷门】治冷证齿痛

香椒散治冷证齿痛

香附 红川椒【炒】 故纸【炒各二钱】

萆拔【一钱】

右为末和炒盐二钱擦傳

开笑散治风冷齿痛

白芷 细辛【淨】 良姜

萆拔 川椒 香附

蜂房【炒】

右件等分为末擦牙搖鼻

皂荚散治风齿动摇

长肥皂荚【二钱】 白盐【半两】

右二件同烧赤研细常擦

一陈汤【方见疟类】加细辛枳殼用姜枣乌梅煎治毒痰齿痛仍以片子姜黄芩拔等分并水煎候温以舌浸其中涎自流出

甘露饮治毒血齿痛【方见积热门】加升麻煎

荆槐散治牙宣出血或痛

槐花 荆芥穗

右等分为末擦牙仍煎点服

郁金散治齿出血

郁金 白芷 细辛

右件等分为末擦牙仍以竹叶竹皮浓煎入盐少许含咽或炒盐傳

灵脂醋治恶血齿痛

川五灵脂以米醋煎汁含咽

鹤虱圆治虫蚀齿痛

猪牙皂角【三钱】 川椒【一钱半】 生明矾

鹤虱【各一钱】

右为末蒸饭搜圆如麻子大纳於孔中有痰吐之

椒盐散治齿虫痛

川椒 白盐 蜂房【炒】

右件剉碎等分每服二钱以井水葱白煎热含冷吐

虫蛀牙痛方

川巴豆肉【三枚】 明乳香【一钱】

右同研溶?圆麻子大每服一圆塞孔

又虫痛方

红川椒末【一钱】 大巴豆肉【一粒】

右件研细蒸饭圆如麻子大以薄绵包塞孔

又方

明矾【煨二钱】 滴乳香【一钱】

右为细末饭圆塞孔

又方

蜘蛛壳一个揉软以薄绵包塞痰吐之○又方米醋煮川椒入蜂房蘸软捻塞○又方蚕纸烧存性擦少时盐汤漱口○又方雄黄末入麝研傅患处

又方

直僵蚕 蜂房【炒二件各等分】 樟脑【半之】

右为末皂角肉掇浓浆煮少顷和作小圆塞痛孔

齿痛通用方

荜拨 生地黄 当归须

荆芥穗 白芷 桑白皮【炒】

蜂房【炒】 赤芍药 姜黄

细辛 藁本 赤甘草【生等分】

右为粗末每服三钱井水煎频漱口

归荆散齿痛通用

当归 荆芥穗 川升麻

川郁金 细辛 白芷

萆拔【等分】

右为末每服半钱揩痛处良久盐汤灌漱

齐峰川椒散齿痛通用

红川椒【四钱】 樟脑 赤小豆

缩砂仁【各二钱】 明矾【煨一钱】

右为末少许塞傅咽不妨齿痛惟藉川椒麻痺

又方蜂房【三钱炒】 全蝎【二个焙】 为末傅亦治风疼

又通用方丝瓜乾烧存性为末擦傅

又方

蜂房【炒】 明矾【煨】 黄革丹【等分】

右为末饭为小圆塞齿

麝香散治疳?斷烂口臭

白矾【煨】 青黛 胡黄连

芦荟【各一分】 虾蟇【炙焦半分】 麝【一字】

右为末每服半钱传患处

又牙疳臭方以蜘蛛殼为末入咽脂麝傅之或用大蜘蛛一枚以湿纸裹又用荷叶外包煨令焦存性为末入少麝研傅○又蚕退纸烧入麝亦治牙疳○香附末可为齿药

牙痛方

朱砂 雄黄 磁石

石胆 礞石【即银星石】

右件等分入磁合盐泥涂烧两日夜覆地出火毒两日细末鸡羽蘸傅疮恶肉朽骨损牙俱出而愈此周官五毒攻?正方诸恶肉朽骨疮毒通用

牙蛀痛方

蚕纸【烧存性】 直僵蚕【炒等分】

右为末擦傅良久盐汤漱口

又方鹤虱为细末擦良久盐汤洗口

又牙宣出血方

明白矾【煨二钱】 乳香【半钱】 少麝

右件同研细轻手擦良久盐汤灌漱

酒齿痛方以井水洗口频换且含且漱或百药煎泡汤微冷含咽或缩砂嚼传齿痛通缩砂

附诸方

羌活散治客寒犯脑风寒湿脑痛项筋急牙齿动摇肉断袒脱疼痛苦楚

麻黄【去节根三两】 羌活【一钱半】 防风【三分半】

藁本【三分】 细辛【少许】 升麻【五分】

柴胡【半两】 当归身【六分】 苍术【五分】

白芷 桂枝【三分】 骨灰【即羊胫骨灰也二钱】 草薢?【二钱】

右为细末先用温水漱口净擦之其痛立止

草薢?散治寒多热少牙疼痛

草荳?【一钱二分不去皮】 黄连【一钱半】

升麻【二钱半】 细辛叶 防风【各二分】

骨灰 熟地黄【各五分】 当归【六分】

右为细末擦之同前

立效散治牙齿疼不可忍痛及头脑项背微恶寒饮大恶热饮

防风【一钱】 升麻【七分】 炙甘草【三分】 细辛叶【二分】 草龙胆【酒制四分】

右?咀如麻豆大都作一服水一盞煎至五分去滓以匙抄在口中煤痛处待少时立止如多恶热饮更加草龙胆【一钱】 此法不定随寒热多少临时加減若更恶风作痛加草荳?【五分】 黄连【五分】 却勿加草龙胆累用得効

秘方治风牙疼痛用芒硝食盐川椒等分为末用肥皂一个去子将药末安於肥皂内用线缚定用炭火烧存性为末擦於患处立効久擦齿白牙坚

一方治陰虚牙出鲜血

四物汤赤牛膝香附生甘草侧柏

秘方治牙落重出

公鼠骨【一付取骨法用鼠一个剥去皮用硃砂擦上三日肉烂化尽取骨瓦上焙乾用】

香附【一两】 白芷 川芎

桑叶 地骨皮 川椒

蒲公英 青盐 川槿皮【各三钱】 旱莲草

右为细末擦百日复出固齿无不效验

仁斋直指卷二十一

卷二十二

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷二十二 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

痈疽

痈疽方论

痈疽五发发脑发鬓发眉发颐发背是也人之一身血气周流而无间稍有壅聚莫不随所至而发见焉又岂特五者而已哉俗以癌瘤瘰附於痈疽之列以是为五岂知瘰与癌不过痈疽之一物古书所载仅有所谓瘰疽则瘰亦同出而异名也若癌若瘤前未之闻合是以为五发其可乎痈者壅也疽者沮也血气壅沮寒热不散陰滯於阳则发痈阳滯於陰则发疽而所发无定处也盖衣服厚煖则表易招寒滋味过多则里易生热感受日久热胜於寒寒化为热六腑蘊热腾出於肤肉之间其发暴盛肿而光软皮薄以泽侵展广大者为痈其患浮浅不伤筋骨此可治也五脏蘊热攻熈乎肌骨之内其发停蓄状如??皮厚以坚淡白焦枯者为疽其患沈深伤筋蚀骨此不可治也凡发热憎寒头痛恶心筋节拘牵气急闷闷或病渴经年是皆欲发痈疽之证发於喉舌头面脑项肩背胷腹四肢大节女子妬乳数者为险其他为缓肿高而软者发於血脉肿下而坚者发於筋骨肉皮色不变者发於骨髓近骨者多冷近虚者多热近骨久不愈则化血成虫近虚久不愈则传气成漏成虫则多痒少痛或先痒後痛成漏则多痛少痒或不痛不痒若形状肿大按而後痛者其脓深小按即痛者其脓浅按之软而即复者有脓按之强而不复者无脓疮浅者欲在厚处疮深者欲在薄处肿起坚硬脓稠者为实肿下软慢脓稀者为虚有实热者易疗虚寒而邪热多者难瘳痈疽已决去其脓而烦疼尚未全退其脉洪粗者又难为力要之痈疽脉来带澁但得和缓为平若洪粗则銳毒不收鲜有济也然则治疗之法将何如曰血得温则流行气得温则和畅服餌贴傅药用和平初觉则散肿内消已溃则排脓歛毒脓尽则去腐内塞恶肉尽则生肌傅痂此定则也疮家脏腑生热热蒸其血血败则腐肉肉腐则成脓当脓血熈聚之时所赖朝夕洗疮以外舒其毒气才觉有脓即煖醋蘸熨而破之才见败肉即煮药荡射而去之稍或稽延不反掌而侵蚀筋骨是必腐败尽除庶几真气得复好肉得生耳而况痈疽险恶古人以虎口鸩毒喻之一芽初萌炙熨宣散急作主张殆有甚於拯溺救焚之不可缓也柰何人多玩忽荏苒成形溃裂四出往往不救伊谁咎欤大抵痈疽自内发外最不可服冷药亦不可傅冷药但以温和调治使毒气自内发出可也若服冷药则必至伤动脏腑若傅冷药则逼令毒气内行内气有亏毒从外入冲心烦燥呕吃喘以至泄泻此为内坏杀人无疑或不随顺疗理妄以急澁澁剂行之歛口太速毒气舒泄未

尽必於其傍复发大疽活血排脓歛毒去腐生新收口人所共知也孰知诸痛痒疮皆属於心主血脉心通诸窍如茯苓茯神远志益智石菖蒲等辈又当佐助於其间抑使病人不得忧惊嗔怒劳精疲神有触於心尤关利害五脏六腑所包者一膜耳人有患疽医疗两月新肉已平夜寐中干者攻击疾呼惊触入心新肉开裂医者谓其肉膜已破而後肉开神仙莫救果非心乎於此又能精加饮食使胃气有所充和剂救里使内气得所养有诸中形诸外理势必然切戒痈疽成形以後不得通利大便上医宣毒盖用车?瓜蒌甘草紫草等类以乳香没药佐之若大黄则不敢轻用也如其有热即以赤茯苓麦门冬桑白皮灯心草利其热於小便之中或以盂勺黑豆入紫苏生姜如豆汤法亦能疏导若夫疮口瘀热而焮疼却暂用升麻山豆根厚黄蘗煎汤入麝为之熏洗或疮口歛平尚留一窍经时汁水不乾者其中必有淫虫朽骨当以药消蚀而尽除之妇人患此适值月候不行尤当急为调血所谓大寒大热大渴大吐大痛狂言无事喜笑鼻青唇惨赤晕不收脓青血黯脓血腥臭血流不止小便如淋结硬过月方发硬如石榴不破多日不肿不疼昏睡不知痛痒患热恣意取凉沈重痿弱气乏肩项运掉不便心病脸如脂坏贴药鲜血常流脓如赤白下痢眼小窳视而白睛青黑脓血大泄而焮肿且坚声嘶色脱而肢体肿浮气短喘粗赤恍惚嗜肿烦燥时 而腹痛渴甚饮食不下而服药即呕与热吃逆 喘大便泄泻皆恶证也抑犹有内外之别焉疽初发来一粒如麻豆许身体即热患处亦热肿大而高多生疼痛破後肉色红紫此为外发纵使极大用药有条百无一失自发疽以来不问小大身体无热但觉倦怠疮亦不热数日之间渐渐开濶不肿不高不焮不痛低?而坏烂肉色紫黑此为内发卢扁无如之何盖其未发以前脏腑已先溃烂矣此又善恶之衡监云虽然痈疽治法已条列於前矣究其病源有风有气有食有药毒有劳损而所受不同焉风则多痒气则多痛食则发寒热药毒则坚硬劳损则瘦弱此外证之为可验也风气食三种易疗药毒劳损二者难医大概风毒当驱风气毒当调气食毒当消积劳损当补虚药毒则黑豆汁利之甘草生姜解之丹砂则羊血菉豆可以为佐登山到须酌水问源故推明本始以为?医一髮之助

痈疽证治

灸法痈疽初发小点一二日间急以大蒜头横切如钱贴其中心顿小艾柱灸之五壮而止若形状稍大以黄秆纸蘸酒全贴认先乾处为筋脚於先乾处灸之或两处先乾皆灸但五七壮而止又法屈指从四围寻按遇痛处是根就此重按深入自觉轻快即此灸之更於别处寻灸若或大肿即捣蒜为饼焙乾蘸法醋灸热更换频晷或以熨汁火於蒜饼上熨之更换热饼频熨如觉患处走散即以绵帛覆盖勿令气泄俟少间传药凡痈疽展大如龟之形且看头向上下先灸其前两脚次灸其尾或红筋走紧而长从尽处灸之须留头并後两脚勿灸若尽灸之不惟火气壅聚彼毒无所走散又攻入里也或辨认不明以

白芷【三分】 汉椒 桑白皮【各一分】 连根葱白【十片】

右取新水煎汤入酸醋半盏淋洗少顷其筋自现可以辨认头尾

速消方痈疽发背已发未结已结未溃急以黄明牛皮胶新水溶令稀稠得所摊在抄纸上贴

之良久以软布二条於酃醋中煮热互换漉出罨在胶纸上蒸熨常要热气相接若患处痒乃药气透须忍痒频蒸熨直至消散或破而脓出将尽即以贯衆煎汤洗去胶纸用退肿散蠲毒散沈水膏等类掺傅或使用拔毒散随意急服万金一醉膏或内消散乳粉托里散破後以洗疮方荡洗发散毒气

拔毒散痈疽肿结通用能散能溃

南星【上等大白者一两】草乌头 白芷【各半两】

木鳖子仁【一个研】

右细末分两次法醋入蜜调傅纱贴之

蠲毒散治痈疽肿毒未结则散已结则溃去风排脓

大南星【一两】 贝母【三分】 白芷

赤小豆 直僵蚕【焙各半两】 雄黄【二钱研】

右细末初用醋调传後用蜜水调传

痈疽宣毒方诸痈疽已破未破通用

瓜蒌【一个去皮剉细】 紫车蛾壳【一个黄泥和盐涂傅煨通红用三钱】 皂角刺
甘草【微炙各二钱】 乳香

轻粉【各半钱】

右细末先用老酒二椀煎瓜蒌滤清取一大椀五更煖瓜蒌酒调上项药末空心服大便自下恶物如鱼涎状

宣毒一醉膏

瓜蒌【一个去皮】 老翁须【一倍半】

右剉酒水等分同煎少顷入开口真川椒四十九粒临熟又入乳香没药末少许任意服

痈疽宣毒方

黑牵牛【去皮】

右取仁入猪肾中线札湿纸包热火灰内煨香熟候冷温酒嚼下

宣毒方

斑猫【一枚只去翅】

好大枣【一枚去核包裹斑猫入猪肾中线扎青竹叶重包湿纸裹煨熟去猫】

右空心吃猪肾温酒下

又方宣散痈疽肿毒

老翁须草【亦名金银花忍冬草鹭鸶藤水杨藤其藤左?花五出而白微香蒂带红色野生延蔓】

右花与叶生捣煖酒调服无花只用叶酒和叶烘煖可传疮

穿山甲散痈疽托毒排脓治五毒附骨在脏腑里托出毒气止痛内消

蜂房【一两】 蛇退 穿山甲

油发【并烧带生存性各一分】

右为末每服二钱入乳香末半钱煖酒调下

皂棘散托毒排脓

川芎【半两】 甘草【生一两】 乳香【一分】

皂荚刺【烧带生存性四两】

右末每二钱温酒调下

芎归托里散托里排脓生肌

川芎 当归 白芍药【炒】

木香 白芷 茯苓【各半两】

人参 辣桂 丁香

甘草【生各一分】

右末每二钱食前米汤调下

痈疽毒入脏腑呕吐恶食方

甘草【焙半两】 丁香【三钱半】

右剉每服二钱水煎入麝少许温服

痈疽肿毒傅药仙灵散收肿斂毒排脓

滑兰 皮【末】 紫贝草【捣】

右二味同捣酒调为膏傅或蜜水调亦好滑兰托毒紫贝散血或单用紫贝草亦效

妙胜散收肿斂毒排脓

落地茄花【去心】 黄蜀葵花【去心并萼日乾磁器收】

右为末井水稀调鸡羽扫放患处乾则再傅或收毒平散或破溃出脓神效如疮口开用末掺亦斂毒不急澁

消肿散痈疽通用

滑兰皮 大南星 赤小豆

白芷 姜黄【各一分】 白芨【半分】

右细末酒调传或蜜水醋同调傅

退毒散痈肿通用

木鳖子【去油】 大南星 半夏【生】

赤小豆 白芷 草乌【连皮尖等分】

右细末硬则法醋调傅热熨则蜜水调傅

川乌散痈肿初发急用

川乌 蜈蚣窠土【等分】

右细末法醋调傅未结则散已结则溃

夜明砂膏溃肿排脓

夜明砂【一两】 辣桂【半两】 乳香【一分】

右细末入乾砂糖半两研和用井水调膏傅

乳豆膏治痈疽肿节疼痛入门先用此止痛

绿豆【去皮取肉一两】 乳香【竹叶裹熨斗熨一分】

右末酒调傅伞纸贴乾则再傅续後却换消肿排脓药

星乌散治痈疽已结未作穴溃

大南星 草乌头 辣桂【等分】

右末用酒或醋调傅软白纸贴未穴再用

斂毒散傅四围收毒

南星 赤小豆 白芨【等分】

右末井水调傅四围软帛贴上

退肿散痈疽肿毒通用

大南星【圆白者】 半夏【生各半两】 赤小豆

五倍子 白芷 贝母【各二钱半】

右细末蜜醋调傅

收毒外消膏

黄明牛皮胶【以长流水半升溶开一两】 虢丹【再煎柳枝急搅五六沸一两】

右候冷收入磁合以鸡羽摊於疮上留口如未破傅肿自消

乳香膏治痈疽肿毒恶疮排脓止痛收缩筋脚

乳香【竹叶包熨研】 没药【各一分】 轻粉【一钱】

麝【半钱】 黄蜡【二钱】 蓖麻子仁【一两】

右捣研极细成膏以抚纸折薄摊药留眼贴之日二换或纯用蓖麻子仁入没药研细傅贴

保安妙贴散治痈疽发背肿毒

透明硫黄【为细末】 乔麦麪【各二两】

右用井花水调和作饼焙乾收下要得硫黄性和用时再末之入乳香少许井水调厚傅疮上如乾以鸡羽蘸新水润之如此至疮愈方歇痛则不痛不痛则痛神验

蜀葵膏治痈疽肿毒恶疮

黄蜀葵花

右用盐掺取入磁器密封经年不坏患处传之自平自溃蜀葵子炒碎入宣毒药中尤验

皂角膏痈疽肿结通用

不蛀皂角【满尺者槌碎去弦核】

右以法醋煮烂研膏传之自消

四虎散治发疽肿硬厚如牛皮按之方痛

大南星 草乌头 半夏【生】

狼毒【等分】

右细末醋蜜调傅留头出毒气

沈水膏痈疽发背排脓斂毒

大南星【三分】 白芨 白芷

赤小豆 半夏【生】 贝母【各半两】

木鳖子仁【去油】 乳香 没药【各二钱半】

雄黄【一钱】

右细末井水入蜜调傅纱贴

炉峯散治痈疽肿毒等患

炉甘石【緑者十分细一两】 大南星

半夏【生各半两】 五倍子 赤小豆

片姜黄 直僵蚕 贝母

白芨【各四钱】 乳香【二钱半】

右细末未破者酸醋调傅已溃者清蜜调傅半乾湿只掺若红肿多汁生地黄研汁调傅仍煎苦参桑白皮汤淋

麝香散痈疽已结而头不破用此

直雀屎【研一钱】 斑猫【去头足翅一钱半】 脑

麝【随意】

右细末法醋调少许点在有头处立破急用煎黄连汤洗去

涌泉膏治痈疽软而疮头不破或已破而疮头肿结无脓

斑猫【去头足翅焙】

右为末揉和蒜膏似小豆许点在膏药中准疮口处贴之少顷脓出即去药或用绿矾直雀屎少许用饼药调一点传疮头软处亦破须四围涂药护之

蚣蝎散治痈疽疮口小而硬贴膏药脓不出是为风毒所胜用

赤足蜈蚣【一条去头足】全蝎【三枚实全尾者并生用】木香【一钱】

右细末每用一字掺於膏药钱上准疮口贴如疮口开濶不硬勿用若是风邪所搏即煎连根葱白五茎次入白芷末半两少顷滤清淋洗明日又洗仍服不换金正气散

护肌膏收晕斂毒

大南星【二两】明白矾【并生用七钱半】白斂

白芨 雄黄

右细末每半两生地黄取汁调传疮晕外旧肉上自外圆而促斂之又验疮用新水调笔蘸傅疮药力胜则肿消皮皱易疗若肿处皮急晕开难疗

神功妙贴散涂传痈疽晕内使脓血化为水出收晕斂毒大南星【圆白者】
蓖麻子仁【各四钱】半夏【生】

白芷【消片】姜黄 五倍子【淡红者】

贝母 白芨【各三钱】没药

乳香【各三钱】花麝石散【二贴】

右细末夹和井水入蜜调傅疮色黯晦姜汁调傅从晕边抹收入里留中间如钱大贴膏药若疮开大全用纱摊药以旧茶笼内白竹叶尾煎两片如疮势先贴药上然後贴疮久年蓬仰上竹叶亦得竹叶出水藉药以行之凡傅药须是细末则不痛

内消散痈疽恶疮方萌才觉便服

穿山甲【插入谷芒热灰中候焦黄】

右为末入麝随意每服二钱半温酒调下或瓜蒌煎酒调下尤妙日两服

大全内消散内消痈疽恶毒才觉便服

穿山甲【截片以谷芒?炒脆一两】 当归【半两】

甘草【二钱半生】

右末每服三钱温酒调下

小车?散内消痈疽取下恶毒首初便服

紫贝大车?【生取壳一合盐泥塞满相合麻线纏盐泥涂外日乾炭火煨通红去泥冷

地出火毒一伏时】

右细末每服三钱入生甘草末一钱轻粉一字用瓜蒌一枚灯心三十茎分两次煎酒乘热调下五更温服天明又服日中大便下黑苔恶物或不用甘草入蜜二匙

皂刺散治痈疽等患宣毒排脓首初便服

皂角刺【紫黑色者】 连皮瓜蒌【等分】 北五灵脂【减半】

右剉细每服四钱酒二大盏煎六分入乳香少许温服皂刺亦能宣毒

万金一醉膏治痈疽发背宣导恶毒始初便服神妙瓜蒌【一个去皮碎研】

甘草【生粗末半两】 没药【水中研二钱半】

右用红酒三大碗煎取其半分两服温服之在上食後服在下食前服重者再剂以瘥为度又方加当归白芷并些乳香更要宣毒加紫皂角刺一分

粉乳托里散痈疽初发便服或毒气入里冲心烦闷吃呕嗽喘以至泄泻急用此频服托里返出毒气自内发起於外此药又能消已发未发皆可服神妙

真菉豆粉心【二两】 明乳香【半两以竹叶包熨斗火熨乃研细】

右末每服二钱熟新水调下或生甘草煎汤调食後少时细呷常要药味在胃膈间则毒气不能攻心或疮已沈晦用当归一钱辣桂二钱煎汤调下仍以加味不换金正气散为佐小儿豆疮?入粉乳散能救之瘰癧攻心呕闷通治

蜡矾圆治痈疽发背瘰癧漏疮恶疮卫护内膜驱解诸毒自然内消神妙

通明白矾【生用二两】

右细末黄蜡一两二钱溶汁就炉上入矾拌和衆手圆桐子大每服十五圆熟水下或冷酒下常常服之漏疮用油发叉和鸡内金末外塞

明胶酒治痈疽等患使毒气不攻於内不转恶证

通明牛皮胶【每用一两截片】

右醇酒一大碗入胶重汤烱令溶散通口服

排脓内消散治痈疽发背活血排脓消毒红内消即红

何首乌【一两】 当归 川芎

生地黄 川续断【各洗焙】 茯苓

芍药 白芷 半夏麴

霍香叶【各半两】 紫草茸 甘草【炙各三钱半】

右粗末每服三钱新水二分酒一分姜枣煎服有热者加灯心只用水煎

究原排脓内补散活血排脓扶养内气或大溃开烂用此救里内塞【方见肠痈门】以加味不换金正气散佐之有热证者勿用以排脓内消散加灯心服

五香散治痈疽须用香气透達经络

木香 丁香 霍香叶【各一分】

沈香 乳香 连翘

木通 续断 桑寄生

甘草【微炙各半分】

右细剉每服三钱井水一碗煎七分入麝少许患在上食後服患在下食前服五发证皆令人头痛恶心寒热气急拘挛此药疗之如有热加灯心桑白皮

加味不换金正气散治痈疽寒热往来或内挟风邪或内气虚馁通用最能发出风毒可与排脓内补散并行

苍术【麸炒】 橘红 半夏麴

霍香叶 厚朴【制各一两】 甘草【炙七钱半】

白茯苓 川芎【各半两】 木香【二钱半】

右为末每服三钱姜五片枣二枚煎服若疮陷不发多加辣桂当归

二香散风气食三证通用调畅胃气须兼服之

木香 霍香叶 白豆蔻仁

半夏麴 厚朴【制】 橘皮

茯苓 苍术【炒】 甘草【炙各半两】

益智仁 缩砂仁【各一两】 丁香【二钱半】

右粗末每二钱半姜枣煎服

黄耆托里散托里内虚止痛

黄耆 白茯苓【各一两】 甘草【生二钱半】

乳香【别研一钱半】

右末每服二钱酒小盏慢火煎如膏再添酒调服内虚加当归

当归酒治痈疽陰证头平向内沈黯不疼浑身患处不热

辣桂【去粗皮半两】 当归【四钱】 木香

白芷【各二钱】

右细剉每服三钱半醇酒一碗慢火煎七分入乳香末半钱不饥饱温服以排脓内补散加味不换金正气散为佐以熟餬猪蹄膂肉为养乔麦麴能起发可煮食之如更不发起用局方姜

附汤加当归木香灸甘草煎服又更不发起用

穿山甲【头截片蘸醋炒焦】 生人牙【煨留性各一分】

右为末分作两服用辣桂当归去节麻黄煎酒食前调下患处用生姜汁和麪厚涂或用川乌硫黄人牙煨并细末酒调传之

神授香附汤治痈肿结硬聚毒作痛

香附【杵去皮用生姜汁浸一宿晒乾】

右末每一钱半米饮调下或紫苏甘草煎汤调下进数服肿硬自消有脓即出於气证尤便急用只小乌沈汤

消毒散内消痈疽恶毒

当归 白芷 甘草【生】

赤小豆 紫草茸【各半两】 贝母【一两】

右末每二钱半水酒煎日二服

瞿麦散排脓止痛通利小便从小便出毒气

瞿麦穗 赤小豆 当归

川芎 白芷 黄耆

赤茯苓【各半两】 辣桂 甘草【各二钱半】

右末每二钱半酒调下

万病解毒圆治痈疽发背鱼脐毒疮药毒草毒挑生毒蛇兽毒蛊毒瘰虫诸恶病

文蛤【即五倍子一两半】 山茨菰【即金灯花根一两洗焙】

红牙大戟【洗焙七钱半】 全蝎【五枚】

大山豆根 续随子【取仁去油留性各半两】

麝香【一钱】 朱砂 雄黄【各二钱】

右件先以前五味入木臼捣罗为细末次研後四味夹和糯米糊圆分作三十五圆端午七夕
重阳腊日淨室修合每服一圆生姜蜜水磨下井水浸研傳患处解毒收疮救病神妙朱砂雄
黄功能医五毒攻?中物也

红内消散痈疽内蕴热外发热用此

红何首乌【半两】 远志【水浸取肉蘸姜汁焙】 赤茯苓

川芎 北梗 苦参

赤小豆 赤芍药 蔓荆子

威灵仙【各三钱】 生甘草【半两】

右末每服二钱麦门冬十四粒煎汤调下

清心散治痈疽有热证

远志【制】 赤茯苓 赤芍药

生地黄 麦门冬【去心】 知母

甘草【生各等分】

右剉每三钱姜枣煎服小便秘加灯心木通

痈疽大便秘导毒方

紫草 瓜蒌【连皮】

右剉新水煎服或用黑豆一盞入生姜紫苏煎汤亦得

痈疽烦渴方

参苓白术散

右以瓜蒌根菉豆乌梅煎汤调下

加味八味九降心火生肾水治诸渴疾痈疽未发前已瘥後渴证通用

好熟地黄【洗焙二两】 山药【剉微炒】
山茱萸【蒸取肉焙各一两】 辣桂【去粗皮半两】
泽泻【截作块酒蘸磁器盛甑内蒸五次剉焙】

牡丹皮【焙】 白茯苓【各八钱】

真北五味子【慢火焙透别研一两半】

右为末炼蜜候冷和圆桐子大每服三十圆空心盐汤下

痈疽腹痛方

辣桂【一分】 木香 芍药

北五灵脂【各半分】

右剉散每服三钱姜枣煎服

痈疽泄泻方

粉乳托里散

右用木香白茯苓煎汤调下加味不换金正气散佐之呕恶通用

痈疽虚证寒战方

明乳香【研细半两】

右每服一钱熟水调下战发於肝乳香着肝而温之寒战随止

山药丸【见口浊门】治痈疽因肾虚劳损所发每服七十圆五更初肾气开时端坐勿言勿动勿咳勿唾侍侧有人进药盐汤下日间以排脓内补散加川芎当归白茯苓佐之最疗劳损证

内托黄耆丸痈疽因针砭锥割伤其经络白脓赤汁逗留不止用此

黄耆【二两】 当归【生七钱半】 肉桂

木香 沉香 乳香【别研各二钱半】

右末菥豆粉一两生姜汁煮糊圆桐子大每服七十圆温熟水下

特异万灵散治痈疽发背肿毒等患神妙

软石膏【烧通红椀覆在泥地上一宿】 大白南星

赤小豆 草乌【连皮尖各半两】 乳香【别研二钱】

右细末蜜水调膏从外抹收入留最高处如钱勿傳如已破切忌药入疮口恐痛歛毒排脓不致溃烂屡效

洗疮方

莽草 苦参 贝母

射干 木通 蜂房

大腹皮 桑白皮 汉椒

连根葱白【多用】 白芷

右煎汤密室中淋洗

又方

白芷【一两】 新桑白皮【三分】 贝母【半两】

汉椒【三钱】 紫苏【三茎】

右剉碎分两次入连根葱煎以葱蘸汤洗溃烂者猪蹄煎汤洗或水胶煎汤洗亦好

北艾汤痈疽疮口冷滞脓血少肉色白久不合逐日用

北艾【一把】

右煎汤密室中洗仍以白胶烧烟熏之续贴膏药仍多服排脓内补散加味不换金正气散

又方疮口已成大窟以

桑白皮【一分】 当归【半分】

右为末乾掺外用北艾蘸蜜水研细塞口

桑皮散治疮口有热攻焮作痛亦烂淫汁

桑白皮【新者一两】 苦参 槐花

天花粉【晒各半两】

右杵细末乾掺仍煎苦参桑白皮汤荡洗痒者加?榔轻粉

又痈疽方

白芷 桑白皮

右煎汤洗以桑白皮末掺效

又疮口大窟专以

大桑叶【日乾】

右末之频掺効经霜黄桑叶尤好掺傅煎汤皆可用

又方

生丝瓜或生地黄或芭蕉根取汁笔蘸抹

消蚀散消蚀恶肉淫虫朽骨先用洗疮方然後傅此明白矾【入银 内瓦盖煨令性尽一两】 緑矾【煨热】

雄黄 乳香 好胭脂

远志【水浸取肉焙各二钱】

右细末蜜水研膏传恶肉上麻油调亦得

又消蚀方腊月收豮猪粪烧存性

豮猪粪【腊月取一两】雄黄【研】鸡心?榔【各二钱】

右细末湿者掺乾者麻油轻粉调抹蚀恶肉?茹好

茶蜡圆诸疮溃後孔中以熔蜡和好茶捏尖圆塞其中以牛角内粉屑夹天花粉真蚌粉乾掺消毒生肌歛疮散

软滑石 花蘘石 鸡内金【各半两】白芨【三钱半】白歛【二钱半】虢丹【煨】

滴乳香【各一钱】

右滑石花蘘石炭烧通红椀覆泥地一伏时为细末次入余药末研和乾掺神妙

保安歛疮方

白歛 白芨【各一两】鸡内金【二两】

厚黄蘘【半两】

右细末井水调傅须脓尽乃用溃者亦能歛

硬疮生肌方

降真香【一两紫赤大片者油处更好】桑白皮【新者】

半夏【生各半两】乳香 当归

五倍子【各二钱】

右细末乾掺

又方

大南星 半夏【生】五倍子

鸡内金【各半两】南木香 当归

厚黄蘗 降真香节 白歛

白芨【各二钱半】

右细末先荡洗後掺药伤扑通用

生肌散

老狗头生脑骨【截碎新瓦煨透二两】 桑白皮【新者一两】 当归【二钱半】

右细末麻油调傅疮深则掺 纸护之

太乙膏治痈疽发背恶毒

好虢丹【二两半】 男生发【洗焙二钱】 木鳖仁【碎三枚】 肥白巴豆肉【十八粒】

右用麻油四两慢火先煎巴豆木鳖发团更换柳枝搅准发耗五分顿冷炉绢滤再煖入淨虢丹换柳枝频搅候色变滴入水成珠随意入乳香末再煎沸倾入磁器候凝覆泥三日贴用凡修合膏药密室中勿令猫犬妇人见之

神应膏治痈疽发背恶毒

龙泉好光粉【二两】 真麻油【三两】

右慢火同熬更换柳枝频搅滴入水成珠方入白胶末少许徐徐倾入磁器以水浸两日抄纸摊贴

神异膏治痈疽发背恶毒疮疔

黑参 白芷实 露蜂房

杏仁【不去皮】 木鳖仁 男生发【洗焙各二钱】 蛇退【盐水洗焙一钱】
肥白巴豆【一十五粒】

右剉细麻油五两同药入磁铫浸一宿慢火煎更换柳枝搅候药色焦黑顿冷炉生绢滤再入铫煖入淨虢丹二两柳枝急搅候黑滴入水成珠入乳香末二钱拌和倾入磁器候凝覆泥地三日贴用

遇仙膏治痈疽发背毒疮等

川五灵脂 白芷 贝母【各半两】

当归【二钱半】

右剉细柳枝截二十四寸麻油六两同上药入磁铫一宿慢火煎柳枝搅药色稍焦入肥白巴豆二十一粒木鳖仁碎五个搅煎令黑顿冷炉生绢滤再煖入蜡半两溶尽再顿冷炉入净虢丹二两半更换柳枝急搅候色黑滴入水如珠入乳香没药末各二钱拌和倾入磁器候凝覆泥地三日贴服皆好柳枝止痛

神仙截法治痈疽发背毒疮发作便服使毒气不内攻可保

真麻油【银器内煎十余沸倾出候冷一斤】

右和醇酒二椀分五次荡温日夜服尽解陰证沈毒

将理法

避风邪 少睡卧 勿惊忧 勿嗔怒 徐行动省言语 戒闺房 絕思虑 防触秽 听好事疮频洗 药常助 盥漱闻香 二便顺序

择饮食内充无饥饱失度 传药运掉屈伸疮口常加爱护 妄用恶草愈滋其毒不忌饮食反害其疮皆非正法

痈疽发背龟形灸法凡发背如龟形辨认gui头不论左右上下但以肿高处为头或有疑似即以黄秆纸蘸醋掩之先乾处为头把笔点定男女皆取左手中指用草比量全指为度一樣剪草十二片六片安顿在外合作龟背形六片安顿於龟背之内中心直顿二片四方分顿四片内外各相连合如是则头尾四足定矣以笔点其尾足抹蒜膏灸之先灸其尾七壮火未灭便灸後一脚七壮火未灭又灸後一脚七壮迤邐如是灸至前两脚而止须留gui头莫灸以出毒气法艾扞实如筋中间大剪作艾柱此法合陰阳气候可用灸之省力疗理论热背发大疮惟发热则谓之背若不发热皆疔也其有陰证於五脏内发者却又沈晦无热大凡痈疽惟藉有热则发热则气血行冷则气血滯热则能生肌冷则疮不合遇有热者切不可退热但用温药以微凉少济之是为和剂

论晕痈疽发背俗以肿痕所至为晕非真晕也晕生於疮口之傍如红筋之状才见晕则非美证矣一晕二晕以至三晕尚可措手若四晕五晕是脏腑蕴受銳毒断断难医

保安灸甘草方痈疽漏疮通用神妙

粉草【以山泉溪涧长流水一小椀徐蘸慢火灸水尽为度秤一两】

右剉粗末用醇酒三椀煎二椀空心随意温服最活血消毒

痈疽方

赤小豆 綠豆 黑豆

川姜黄

右为细末未发起姜汁和井水调傅已发起蜜水调傅

诸痈疽大便秘方

甘草【生一两】

右剉碎井水浓煎入酒温服能疎导恶物

蚀漏方

生油发【烧留性四钱】白及一钱细末掺傅

去水膏治痈疽破穴後误饮皂角水及诸毒水以致疼痛

甘草【生为末一分】 砂糖 糯米粉【各三分】

右为膏摊在绢上贴毒水自出驴马汗及尿粪一切青水皆治之

木香掺收疮口方

木香 鸡心?榔 虢丹【煨各一钱】

轻粉【半钱】

右细末掺

秦芄掺方治一切疮口不合

秦芄细末掺之

荡洗方

蜂房 白芷 苦参

川椒

右煎洗热熨加荆芥

痈疽疮口深大方

深山黄牛粪【塞满疮藤纸贴上一四日後】 蜂房

白芷 大腹皮【三件煎汤淋洗拭乾】

右以黄桑叶晒为细末撒掺常服酒调排脓内补散饮醇酒食肥肉自然生肌深山黄牛吃百草平田牛只吃禾藁

诸恶核方或在上或在下顽结留滞不溃不散用瘰癧门立应散宣毒从小便出非用一醉膏之类宣毒从大便出也先以大戟草乌为末酒调傅仍服蜡矾丸或穿山甲灸焦为末温酒调下佐之在上者加皂荚刺带生灰煎葱汤熏洗

痈疽恶核男以左边为重女以右边为重

发颐方此疮最险毒气灌注头面肿大可畏牙齿亦脱治法○解开头发寻顶螺中灸二十一壮如不透达灸至四十九壮而止其疮开口大孔用东向石榴皮晒为细末撒掺其中特异万灵散本方加煨过石膏半倍蜜水少许调传四围不换金正气散排脓内补散二药各加川续断皂荚刺烧去半带生灰相间煎服皂荚刺性上行主上焦病凡痈疽药太温加乾薄荷煎服石膏性寒始亦疑之然火煨通红盆覆地上以出火毒最能收晕使疮口把就不至烂肌

附诸方

真人活命饮治痈疽发背发脑发髭发脇疔毒骑毒肿肚痛腿痛附骨痈疽恶疮恶漏疮血块气块面目手足浮肿随病加减并宜治之

天花粉【一钱】 甘草节 乳香【透明各一钱】

川山甲【三大片蛤粉炒去粉】 赤芍药

白芷 贝母【各一钱】 防风【去芦七分】

没药 皂角刺【各五分】 当归尾【酒洗】

陈皮【各一钱半】 金银花【三钱】 或加大黄【一钱】 木鳖子【去殼八分】
体虚加黄耆【一钱】

在背俞皂角刺为君 在腹白芷为君 在胸次加瓜蒌二钱 在四肢金银花为君
如疔疮加紫河车草根三钱【无加亦可】

右作一贴用金华好酒一鍾半煎至一鍾温服煎时次用大瓦瓶以纸密封口勿令泄气能饮
酒服药後再饮数鍾浩大不可忆度

偈云

真人活法世间稀 大恶痈疽总可医

消毒只如汤泼雪 化脓渐使肉生肌

陰功岂止万人活 神効何须刻日期

留下仙方诚信授 存仁修制上天知

此方治一切痈疽疔肿不问陰阳虚实善恶肿溃大痛或不痛先用此剂大势以退然後随余
证调治其功甚捷诚仙方也

防风通圣散治痈疽通用【方见中风门】

狗宝丸【济生方】 专治痈疽发背附骨疽诸般恶肿将发时先觉口中烦渴四肢沈重遍身
壮热乃其候也此药功效不可具述

蟾酥【二钱】 金条蜈蚣【七条全者酥炙黄色】

轻粉 雄黄 滴乳香

没药 乌金石【即石炭各一钱】

狗宝【癩狗腹中得之一钱又去一两】

狗胆【一个乾者用之去皮黑狗腊月者佳】

鲤鱼胆【一个乾者用之腊月者佳】 粉霜

黄腊【各三钱】 硃砂【半两】 麝香【一分】

孩儿乳【一合头首者】 铅白霜【一钱一本无此】

右先将乳汁黄腊放在罐内文武火化开次将各药末和成剂用时大人丸菉豆大小儿丸如芥子大每服三丸病重者加至五丸用白丁香七个研烂新汲水调送下腰以下食前服腰已上食後服如人行五里热葱白粥投之即以衣被盖定汗出为度已後只吃白粥常服十宣散留头其四边以乌龙膏贴

漏芦汤【精义】治一切恶疮毒肿丹瘤瘰癧疔肿鱼睛五发瘰疽初觉一二日便如伤寒头痛烦渴拘急恶寒肢体疼痛四肢沉重恍惚闷乱坐卧不宁皮肤壮热大便秘澹小便赤黄并宜服之惟妊娠忌服

漏芦 白欬 黄芩【去黑心】

麻黄【去节】 枳实【麸炒去穰】 升麻

芍药 甘草【炙各一钱】 大黄【二钱】

朴硝【一钱】

右水煎服

千金漏芦汤【精要】治证同前

漏芦 连翘 黄芩

白欬 枳殼【去穰麸炒】 升麻

粉草【炙】 麻黄【去根节各一钱】 大黄【一钱半湿纸煨】 朴硝【别研一字】

右作一服用水一盞半煎至八分去滓空心热服

渊然真人夺命丹专治疗疮发背脑疽乳痈附骨疽一切无头肿毒恶疮服之便有头不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃恶证药中至宝病危者服之亦可矣万无一失不可轻易

蟾酥【二钱乾者老酒化】 血竭【一钱】 乳香

没药 铜綠 朱砂【为衣各二钱】

轻粉【半钱】 胆矾 寒水石【各一钱】 雄黄【三钱】 射香【半钱】
脑子【半钱无亦可】 蜗牛【一十一个连壳用】 蜈蚣【一条酒浸炙黄去头足】

右为细末将蜗牛研作泥和前药为丸如菉豆大若丸不就以好酒煮麪糊为丸每服只二丸先用葱白三寸令病人嚼烂吐於手心男左女右将丸子裹在葱白内用无灰热酒三四盏送下於避风处以衣被盖覆约人行五里之久再用热酒数杯以助药力发热大汗出为度如汗不出重者再服二丸汗出即効初觉者二丸即消三五日病重者再进二丸如疔疮走黄过心者难治汗出冷者亦死如病人不能嚼葱搗烂裹药仍以热酒吞下疮在上食後服疮在下食前服服後忌冷水黄瓜茄子油麵猪羊杂肉鱼一切发风疮毒等物及妇人洗换狐臭犯之难治

竹叶黄耆汤【精义方】 治诸痈疽发背烦渴及一切恶疮发大渴者

淡竹叶【二分半】 生地黄【一两】 黄耆

黄芩【去腐】 当归 川芎

甘草 芍药 人参

麦门冬【去心】 半夏【汤洗】 石膏【各四分】

右用水一盞半竹叶五片生姜五片煎至一盞温服

内补散专治痈疽发背溃脓出多内虚少力不进饮食有虚证恶重者亦治之

人参 白茯苓 川归

黄耆 桂心 甘草

远志【各半两】 芎藭 麦门冬

白芍药 陈皮 熟地黄

五味子【各一两】

右?咀水一鍾姜三片枣一枚煎至半鍾温服

败毒流气散

人参 桔梗 枳殼

甘草 防风 柴胡

前胡 川芎 羌活

白芷 芍药 紫苏【各等分】

右?咀水一鍾半姜枣煎服

护心托里饮

人参 黄耆 当归

川芎 甘草 白芍药

乳香 木香 乌药

官桂 防风 枳殼

桔梗 厚朴【各等分】

右?咀水姜煎服

鉄圈散治痈疽肿毒

乳香 没药【半两】 火黄

黄栢 黄连 南星

半夏 防风 皂角刺

木鳖子 瓜蒌 甘草节

草乌 阿胶

右为末醋调成膏砂石器内火熬黑色鹅翎传之

围药治诸般痈疽传上消散

乳香 没药 大黄

连翘 黄芩 黄连

黄柏 南星 半夏

防风 羌活 瓜蒌

阿胶 皂角刺【各等分】

右研细末好醋煎黑色成膏寒者热用热者寒用

围药鉄井栏

贝母 南星【各七钱】 连翘

五倍子 经霜芙蓉叶【各一两】

右为细末用水调传四向肿处止留中间一窍出毒气

秘传鉄箍散

霜後芙蓉叶【二两】 海金砂【五钱】 草乌

金线重楼 天南星【生者佳各五钱】

右为末用好米醋调药成膏围傳患处若是发背加木鳖子五钱为末和前药立効

千金托里散治背疽併诸恶疮如三日以内未针灸及利大便者则可消矣

羌活 藁本 生黄芩

人参 灸甘草 木猪苓【各一钱半】 防风身【洗】 防风稍【各五分】 川归身【酒洗】

连翘 酒黄芩【各三钱】 川归稍

生甘草 陈皮 苏木

五味子 酒黄柏 酒防已【各五分】

桔梗 山梔 酒生苳

酒黄连【各一钱】 酒大黄【三钱】 麦门冬【二钱】

右细切分作二服每服用水三大盏浸半日煎一盏稍热服後一服如前并滓煎服忌冷水此方如觉有病即便忙服无不効者若疮势已发三四日或成脓者则不消矣

十全内托散治疮肿托里未成者速散已成者速溃

人参 当归 黄耆【各一钱】

厚朴 川芎 桔梗

防风 桂心 白芷

甘草【各一钱】

右细切作一服用水二盏煎至一盏去滓食远服

秘授仙方万应膏药治一切肿毒未溃贴之则消已溃贴则去腐生肌并治杨梅痈漏恶疮风气骨节疼痛痞气积块坐闪腰痛一切诸证贴之神効

羌活【一两】 巴豆【二两】 木鳖子【二两】

川乌 皂角刺 川山甲

白芷 蝉退 杜当

赤芍药 金线重楼 五倍子

独脚连 雷藤 连翘

血余 白芨 降香

白歛 紫荆皮 藁本

黄连 石羊角 广藤

川芎 僵蚕【各一两】 草薢子【二两五钱】 防风【二两】 蜈蚣【七条】

草乌【二两】

当归【一两五钱】 蛇退 叶下红

三白草 八角风 苦参

孩思母 何首乌 大风藤

小风藤 海风藤 寻风藤

七叶黄荆 松节 金银花

车前草 槐角 丹参

斑? 青木香 玄参

牛膝 地榆 威灵仙

生地黄 薄荷 苍术

五灵脂 天花粉 南星【生者一个佳】

细辛 虾蟇【一只】 桔梗

山梔 荆芥 黑丑

花蛇 大风子 乌药

小茴 节骨草 两头尖

黄蘗 乌梢蛇 槐嫩枝

桃嫩枝 柳嫩枝 榆嫩枝

椿嫩枝【各五两】

右件七十九味?咀片末用真香油十斤和药浸七日下锅熬待药滓成炭血余无形方可滤去药滓再熬滴水成珠再将黄丹徐徐入内收为膏再入後项药

乳香 血竭 阿魏

龙骨 胆矾 雄黄

轻粉 没药 孩儿茶【各五钱】 樟脑【四钱】 赤石脂【七钱】 沉香

木香【各三钱】 麝香【一钱】 冰片【三分】

右十五味研为极细末入膏内搅匀用磁鉢收贮出火毒油纸摊贴神效

秘傳定痛生肌散

龙骨【煨】 白芷【各三钱】 黄丹【水飞五钱】

软石膏【煨去火毒一两】 没药 乳香【各三钱】

血竭【二钱】 黄连【四钱】 轻粉

朱砂【各五钱】

右为极细末掺於疮口上止痛生肌神效再用白膏药贴之

秘传白膏药

官白粉【一两半】 赤石脂【煨一两】 樟脑【五钱】

轻粉【二钱五分】

右为细末生猪油去膜捣烂和前药调匀先将生肌散掺上後贴之

洗毒散【通玄论】治诸般恶疮风湿陰蚀并宜此洗之用蛇床子地骨皮丁麻黄荆芥防风
桔矾各三钱右用水三椀葱白三根煎至二椀无风处洗

乳痈

乳痈方论

男子以肾为重妇人以乳为重上下不同而性命之根一也坐草以後风邪袭虚荣卫为之凝
滯与夫嬰幼未能吮乳或乳为儿輩所吹饮而不泄或断乳之时捻出不尽皆令乳汁停蓄其

间与血气?始而肿痛继而结硬至於手不能近则乳痈之患成矣乳痈一名妬乳妇人四十以下血气周流患此可疗年事既高血气耗澁患此难瘳恶寒发热烦燥大渴是其证也甚则呕吐无已咽膈窒碍何耶盖胃属足阳明之经实通乎乳血热入胃呕吐何疑或者不能温散妄以寒凉踈转之剂行之即使痈毒自外入里呕吐尤甚其咽膈妨碍者毒气上冲所致也生姜甘桔汤最为咽间要药乳粉托里散最能反出毒气二香散加瓜蒌根止呕止渴两得其便焉更伏万金一醉膏佐之能事毕矣虽然渴而过饮水入肠胃必至下利医理失节久而不瘥必成漏疮又不可不防其变

乳痈证治

究原五物汤痈疽发背乳痈通用

瓜蒌【研一枚】 皂角刺【半烧带生】 没药【各半两】

乳香 甘草【各二钱半】

右粗末醇酒三升煎取二升时时饮之痛不可忍立止

万金一醉膏内加川芎一分当归半分

乳痈方

皂荚刺【半烧带生半两】 真蚌粉【三钱】

右研细每一钱酒调下

生姜甘桔汤治痈疽诸发毒气上冲咽喉胷膈窒塞不利

北梗【去芦头一两】 甘草【生】 生姜【各半两】

右剉细每服三钱井水煎服

乳初肿方

甘草【生二钱炙二钱】

粗末分两次新水煎服即令人吮乳

传乳方

大南星 半夏【生】 皂荚刺【烧带生各二分】

白芷 草乌 直僵蚕【焙各一分】

右细末多用葱白研取汁入蜜调傅若破疮口用膏药贴

乳痈方乳痈初发

贝母【为末】

右每服二钱温酒调下即以两手覆按於棹上垂乳良久自通

又方

石膏烧红椀覆地出毒细末三钱温酒调下

附诸方

橘皮汤治乳痈初发即散已溃即効痛不可忍者

陈皮【汤浸去白晒乾麸炒微黄色】

右为细末麝香研少许每服二钱酒调服初发觉赤肿疼痛一服効因小儿吹你变成此疾者并治

复元通气散治发乳痈疽及一切肿毒

木香 茴香 青皮

川山甲【炙酥】 陈皮 白芷

甘草【各等分】 贝母【去心姜制】 加漏芦

右?咀每服五钱水一盞半煎八分去滓入酒食远服末酒服二钱亦可

一方治妇人乳赤肿成痈者

歌曰

欲治乳痈良捷法 紫苏一味胜他方

浓煎汤饮频频服 苏叶围来合乳房

一方治乳痈神効

用桑黄不拘多少用好酒磨热服即安

一方治妇人吹你

用枣七枚去核入鼠矢七粒火煨存性研末入麝香少许温酒调服

又方治妇人吹你

诗曰

妇人吹你治如何 皂角烧灰蛤粉和

热酒一盏调八字 双手揉散笑呵呵

一方加乳香【少许】

一方治妇人ru头裂

用秋後冷露茄儿裂开者晒乾烧存性为末水调敷患处甚验

癌【痈疽诸发此法通用】

发癌方论

癌者上高下深岩穴之状颗颗累垂裂如瞽眼其中带青由是簇头各露一舌毒根深藏穿孔透里男则多发於腹女则多发於乳或项或肩或臂外证令人昏迷治法急用蓖麻子等药外傳以多出其毒水如痈疽方中乳香膏神功妙贴散是也内则於小便利之盖诸痛痒疮皆属於心心与小肠为表里所当宣毒於小便但诸发蘊毒又非麦门冬灯心草之所能宣必如是斋方中立应散以地胆为主以白牵牛滑石木通佐之而後可以宣其毒矣自此又於心肾用工人之一身水不能济火则渴而後发疮心肾相交水火既济於人何病之有心主血也清心行血固所当然亦使肾得其养则水有所司真元凝合彼疮自平更服童尿又可以灌涤余毒切戒忌风邪入之将理一节米舖猪蹄可以益肾可以养中当加之意

痼

发痼方论

痼发於手足或掌心或腰腿或臀下伸缩处长形平肿无头无面低贴肌肉瞰里开疮如疽而大走注牵连较之诸发烦渴为甚其患浅则可疗其患深则害人或重毒已平数月之後复於他处大发但作肉色微带淡红终不能救治法以痈疽类例推之大要培养内气以防滑泄兼用膏药吮疮神异膏遇仙膏可贴可服

瘰

发瘰方论

瘰疽之发有数种先作点而後露肉小者如粟如豆剧者如梅如李赤黑青白色变不常或臂或臀或口齿或肚脐发无定处大概多见於手指之间根深入肌走臂游肿毒血流注贯串筋脉烂肉见骨出血极多令人串痛狂言痛入於心即死突出於外肾者亦死此疮最虑引风治法宣毒行血尤当於心肾加意焉盖心为万病之门败血郁滞烦燥暖闷皆毒气攻心之候也心家为毒所攻若於小便利之又恐外肾虚怯易至伤风势必宣毒於大便如瓜蒌酒之入没药五灵脂皂荚刺带生灰是也是虽大便引导毒气然清心行血去风邪之剂如之何而废之心清血行风邪解散庶乎有瘳矣经云在指则截在肉则割盖虑毒气随风走肌随脉入腹倏忽害人至速而不可留也此疾根源初因感受恶风入於脉理或伤寒瘴疰之後毒变所生凡痈疽诸发开一寸则一寸引风非必风入於其中盖虚处自引风也惟风邪袭虚则肉烂透骨恶血横流大南星生半夏白芷梢最能去风可以频傅其诸疗理推广痈疽法度行之

发瘰证治

痈疽瘰瘰恶疮妙方

生发【烧留性三分】 皂荚刺【烧带生二分】 白芨【一分】

右细末乾搯或井水调傅皂荚刺能行诸药

瘰方

生发【烧留性】 皂荚刺【烧留性各二分】 赤蜈蚣【半烧】

厚黄栢【各一分】

右细末雄猪胆汁调傅

又方

鸡内金 生发【各烧留性夹和】 大南星

半夏【生】

右为细末掺

又方

皂荚刺【烧带生】 白芨【少许】

右为细末掺诸疮通用

又方 燕窠和百雀儿粪研膏傅

又方 生发烧留性末之米汤调服兼傅漏疮亦効诸发诸疮蜡矾圆冷酒入麝香送下

洗荡癰疮方

荆芥穗 白芷 汉椒【去目】

葱白连根

右用井水煎入盐候温自手臂上荡下日三次癰疽毒气走臂肿所至处紧系之

又洗方

山竈屋垂尘 竈烟 釜下土【各半升】

右研和分两次井水煮沸温洗日如是

療方

生井蛙【取皮日乾烧带生】

右细末掺或蜜水调傅又通用方在前

是斋立应散【方见癰癧门】

癰瘡灸法癰瘡自手发者毒走至心不救自足发者毒走至肾不救各有小红筋汤洗再寻其筋之住处灸小艾柱三壮即瘥此即蛇瘡

癰瘡方论癰瘡一名蛇瘡南地多有毒蛇吐毒於蜜烟瘡雨之乡人有伏水土风气而感触之者数月以还未有不发为蛇瘡也惟赤蜈蚣夫蛇最为上药雄黄白芷次之诸蛇药亦可以制其毒矣【?黄有毒烂肌但夹和蛇药用】

疔瘡

疔瘡方论

疔瘡含蓄毒气突出两寸痛痒异常一二日间害人甚速是尤在痈疽之上也内经以白疔发於右鼻赤疔发於舌根黄疔发於口唇黑疔发於耳前青疔发於目下盖取五色之应五脏各有所属部位而已然或肩或腰或足发无定处在手足头面骨节间者最急其余尚庶几焉疔曰五疔类分数种如白如豆如葩如箔金如茱萸如石榴子或发疹搔破而青黄汁出或衣物触着而疼痛忽生或白而肿实或赤而浮虚其状不一大抵疮头黑硬如钉四畔带赤如火盘根突起随变焦黑未几肿大而光转为湿烂深孔透肌如大针穿之状外证心惊头痛拘急恶寒四肢痛强或寒热交作颊舌间赤黑点点如珠若毒入腹心则烦闷呕逆恍惚痴眠其毙可立待也此疾虽自风毒而来其诸触犯不可不信如石疔之忌瓦砾砖石麻子疔之忌麻衣麻仁火疔之忌火光炙燔水疔之忌饮水渡河恶眼?食烂帛刀鎌色色见忌又不特雌雄二疔戒谨房事而止一有触犯难以有瘳其或背脊拘强疮痛彻骨此触犯之候也治法以调平心气为上盖疔瘡蓄毒壅结於心如茯苓茯神远志益智莲子石菖蒲之类佐以川芎当归皆舒豁心经之剂也心气一清毒自消散外所传者用销蚀恶肉辈如胆矾綠矾铅霜斑?等类以饼药调和而笔傳之烂其肉而後剪随傳随烂次第剪平却以生发蛇皮土蜂窠皂荚刺各烧留性白芨減半并为细末以平疮口或销蚀恶肉辈傳之作痛则以排脓内补散多用酒调以醉之矣又有一种疮头黑深形如鱼脐破之黄水渗出四畔浮浆是曰鱼脐疔瘡其毒尤甚通前治法即痈疽方中万病解毒圆以清心行血汤使服之以井花水磨傳之是为神仙妙药

疔瘡证治

诸疔瘡方

生发【拔一圆如□子大摊在一尺绯绢上】?黄【研一豆许】

皂荚刺【二十一针】 赤小豆【二十一粒】

右并粗末撒放发上卷就绯绢作一团外用发绳十字缚定熨斗内烈火烧带性为末入地骨皮末倍之分作两服空心酒调下

又方

生发 蛇皮【洗晒】 土蜂巢

皂荚刺【各半两】

右以绯绢一尺分作四片分裹上件药发绳扎之炭火烧带生并为细末每一钱空心酒调下

又方

蛇皮 土蜂巢【烧带性等分】

右为末每一钱酒调下

又方蛇皮洗晒炙焦为末鸡子清调傅

又方磁石【於石臼中捣为细末】再研醋调傅

又方

苍耳【亦名鼠粘子根茎苗实但取一色研细】

右酒调下仍以苍耳烧灰醋调傅或不拘一色杂采用之

疗疮方

金头蜈蚣【一条】 胆矾 铜绿

乌贼骨【各一钱】 麝【一字】

右细末以纸捻蘸麻油粘药引入疮中如疮头硬即灸破或针刺破然後入药

附诸方

立马回疗丹治疗疮走彻不止

金脚信 蟾酥 血竭

朱砂 没药【各五分】 轻粉

片脑 麝香【各一字】

右为细末生草乌头汁为锭如麦子长大用时将疮头刺破纳入一锭第二日疮肿为効以膏药贴之

飞龙夺命丹【圣惠方】治一切恶疮

人言【二钱半】斑猫【十二个去足】巴豆【十二个去壳油】

朱砂【三钱】硃砂 硼砂

乳香 没药 黄丹【各三钱】

南星【水洗】半夏【水洗各一钱】血竭【二钱】

麝香【一钱二分半】

右为末蟾酥汁为丸如红豆大五分钟内分一分加入斑猫四个然後捻成定子如小麦大每一疮针破下一定子用饭粘白纸封口用前四分内一丸噙在舌上觉麻凉水吞下忌热物片时如蟾酥乾用人乳汁化开一方加雄黄二钱

千金托里散治疗肿发背一切恶肿

官桂 人参 甘草

川芎 白芷 芍药【各一两】

木香 没药【各二钱】乳香【二钱】

当归【半两】连翘【一两二钱】黄耆【一两半】

防风 桔梗 厚朴

右十五味为细末每服三钱酒一盞煎三二沸和滓服无时

一方治疗疮

土蜂房【一口全】蛇蛻【一条全】

右作一处细瓦器中以黄泥封固火煨存性研为细末空心酒调服一钱少顷腹中大痛痛止其疮已化为黄水仍服五圣散

五圣散

大黄 生姜 金银花

甘草【各一两】 瓜蒌【一个】 皂角针【二两】

右?咀每服一两用好酒二盏煎至一盏温服瘰癧

瘰癧方论

瘰癧生於项腋之间凡人少小以来动辄蓄怒或忧思惊恐抑郁不伸多致结核於项日积月累风毒热气聚焉於是肿湿开疮起伏无已甚则牵连至於腋下自腋下而蔓衍心胸殆无及矣发热增寒烦渴盗汗或寒热往来或痛或不痛其外证也治法无他大抵以地胆斑猫为主盖瘰癧之毒莫不有根地胆斑猫制度如法能使其根从小便中出或如粉片或如块血或如烂肉皆其验耳但毒根之行小便亦必澁痛当以木通滑石辈导之然是毒必从小便出者何哉诸痛痒疮盖属於心其或一二流行於大便尤快便也人有此患不惟慙忿窒慾谨护燥湿风寒其於饮食百味一切戒之然则投方匕之剂当何如而责効焉曰饭蔬食而已

瘰癧证治

是斋立应散治瘰癧神効已破未破皆可服

连翹 赤芍药 川芎

当归 甘草【炙】 滑石【研各半两】

黄芩【三钱】 白牵牛【生取末】

土蜂房【蜜水洗饭上蒸日乾各二钱半】 川乌尖【七个】

地胆【去头皮足秣米炒米黄为度去米秤三钱】

右为细末每服抄一大钱匕煎浓木通汤调下临卧服毒根从小便中出澁痛不妨毒根如粉片块血烂肉是也如未効後再服继以薄荷丹解其风热且地胆性带毒济以乌尖或冲上麻闷不能强制嚼葱白一寸茶清下以解之如小便澁灯心煎汤调五苓散服疮处用好膏药贴若疗痈疽用此宣导恶毒本方去黄芩不用

薄荷丹解瘰癧风热之毒自小便宜毒後须常服

杜薄荷 皂角【不蛀者去弦皮】 连翘

何首乌【米泔浸一宿】 蔓荆子 京三棱【煨】

荆芥【各一两】

右为末好?二两半以米醋煎沸酒?淹令软研和糊如圆桐子大每三十圆食後熟水下日一服病虽愈常服之

必捷圆治瘰癧多年不瘥

斑猫【去头翅足秣米炒一分】 薄荷叶【三分】

右细末乌鸡子清和圆桐子大空心茶清下二圆午时後服三圆临卧服四圆次日空心服五圆脐下痛小便取下恶物为効如小便秘吃葱茶少许

神秘散治瘰癧

斑猫【去头足皮麪炒二十一个】 荆芥穗【日乾】

直僵蚕【炒去丝髯】 黑牵牛【微炒取仁各二钱】

右细末每服一钱五更好酒调下日中当取下恶物如不下次日五更再进一服或更不下第三日五更先吃秣米粥一盏次服此药其毒决下如小便痛澁以葱茶解之或木通灯心煎汤利之

雌雄散治瘰癧

斑猫【一雌一雄足翅全者新瓦焙焦去头翅足】 贯衆【二钱】

鹤虱 甘草【各五分】

右细末作两服饱饭後好茶浓点一盏调下

木鳖膏治瘰癧经年发歇无已

木鳖仁【二个用厚纸扞去油研碎】

右以乌鸡子清调和磁盏盛之甑内蒸熟每日食後吃一次服之半月自然消靡

粉乳托里散治癰癤攻心呕吐发出毒方【见痈疽门】

蜡矾圆治癰 神効方【见痈疽门】

山豆根方治咽喉上膈热毒患癰癤者常常含汁咽下仍以

山豆根 紫苏叶细剉煎汤临卧服

解热方癰癤四畔红肿多汁为热证

小黑豆【二合】 紫苏【一茎】 姜【七片】

右细剉煎汤食後服

洗传方

白芷煎汤泡荆芥

右候温软帛蘸洗拭乾好膏药贴脓汁恶肉出尽更用

半夏【生】 南星【各二钱】 血竭【一钱】

轻粉【少许】

右细末以津唾调傅

究原方斂疮口

血竭【一字】 枣【烧灰半钱】 麝【少许】

右夹研津唾调傅

附诸方

散肿溃坚汤治马刀疮结硬如石或在耳前後上下及肩脇背手足少阳经及癰癤遍於头或颊车坚面不溃在足阳明经○一疮已破乃流脓水并皆治之草龙胆【酒洗炒四次】 桔梗【各五钱】 升麻【六钱】

甘草【炙】 柴胡【各五分】 连翘【三钱】

葛根 白芍药 黄连【各二钱】

黄芩稍【钱半酒钱半生】 昆布 知母【酒洗】

括萎根【酒洗】 黄栢【各五钱】 京三棱【酒洗】

广茂【酒洗各三钱】 当归梢【酒洗半钱】

右?咀每贴七钱水二盏煎八分去粗食远热服於卧处伸足於高处头微低每嚙一口作数次咽下至服毕如常安卧取药在胸中停蓄也另攢一料作细末炼蜜丸每服百丸此药汤留一口送下更加海藻五钱炒

白花蛇散【三因方】 治久漏瘰癧发於项腋之间痒痛增寒发热

青皮【半两】 生犀【镑半钱】

黑牵牛【半两一半生用一半炒熟】

白花蛇【酒浸软去皮骨焙乾秤二两】

右为末每服二钱膩粉五分研匀五更糯米饮调下以利下恶毒为度十余日再进一服可絶病根

梅花点舌丹治男妇恶疮瘰癧

蟾酥【二钱】 粉霜 没药

轻粉【各六分】 麝香 冰片

血竭【各四分】 乳香 雄黄【各一钱】

右为细末用男人乳丸如茄子大每服一丸含一丸在舌上待自化瘰癧可先食胡椒麪然後含之其疮自消神効

针灸法治瘰癧以手仰置肩上微举肘尖上是穴随患处左即灸左右即灸右艾炷如筋头大再灸如前三次永无恙如患四五年用药不退辰时着灸申时即落所感稍深三灸即安法仍以蒜切片贴瘰疮上灸七壮易蒜多灸取効

癭瘤

癭瘤方论

气血凝滞结为癭瘤癭则忧恚所生多着於肩项皮宽不急槌槌而垂是也瘤则随气留住初作梅李之状皮嫩而光渐如盂卵是也其肉色不变者谓之肉癭其筋脉呈露者谓之筋癭其赤脉交络者谓之血癭随忧愁而消长者谓之气癭坚硬而不可移者谓之石癭癭之名有五者此也一曰骨瘤二曰脂瘤三曰肉瘤四曰脓瘤五曰血瘤六曰石瘤瘤之种有六者此也癭瘤二者虽无痛痒最不可决破决破则脓血崩溃渗漏无已必至杀人其间肉瘤攻疗尤所不许若夫脂瘤气癭随顺用药尚庶几焉

癭瘤证治

海藻圆癭瘤通用

海藻【洗晒一两】 海蛤【煨】 松萝【各七钱半】

当归 川芎 官桂

白芷 细辛 藿香

白歛 明矾【煨】 昆布【洗晒】

右细末炼蜜圆弹子大每一圆含咽下

蜡矾圆癭瘤通用常服自然缩小消磨【方见痈疽门】

针沙方专治气癭

针沙【浸於水缸平日饮食皆用此水十日一换针沙服之半年自然消散针沙能去积也】

治小瘤方先用甘草煎膏笔蘸粧瘤傍四围乾而复粧凡三次後以

大戟 芫花 甘遂

右等分为细末米醋调别笔粧傳其中不得近着甘草处次日缩小又以甘草膏粧小晕三次中间仍用大戟芫花甘遂如前自然焦缩

又治瘤方旧牛皮鞋皮洗煎冻常食之瘤若破如豆腐极臭

附诸方

破结散治五癭

海藻【洗】 龙胆草 海蛤

通草 昆布 明矾【枯】

松萝【各三分】 麦?【四分】 半夏

贝母【各二分】

右为末酒调服日三食忌甘草鲫鱼猪肉五辛生菜毒物

昆布丸治一切癭瘤

昆布【洗】 海藻【洗】 小麦【醋煮乾各一两】

右为末炼蜜丸如杏核大每一丸食後嚥咽

秘传治癭方治一切癭瘤神効

乾猪脰【七个用灯盏火烘过乾为末】 海漂硝

木香 青木香 孩儿茶【各五钱】

雄黄 神? 麦芽

辰砂【各一钱】

右为细末用酒送下食後令睡时服之即睡再不可言语戒恼怒房室此方系累用无不効验

海带丸治癭气久不消者

海带 贝母 青皮

陈皮

右各等分为末炼蜜丸如弹子大每服一丸食後嚥化

一方治頰下结核不消经効

大蜘蛛【不计多少】

右以好酒浸过研烂同酒调开澄去滓临卧服

外台秘要治项下卒结囊渐大欲成瘰者

昆布 海藻【各等分】

右为末蜜丸如杏核大含稍稍咽津

针灸法天突一穴【在结喉下宛宛中灸三七壮治诸般瘰疾】

肩禺二穴在膊骨头肩端两骨间?宛中举臂取之男左十八壮右十七壮女左十七壮右十八壮又灸

两耳後【发际七壮】

漏疮

漏疮方论

漏者诸瘻之潰漏也狼瘻鼠瘻蝼蛄瘻蜂瘻蚬瘻蟥瘻浮蛆瘻瘰癧瘻转筋瘻古所谓九瘻是尔析而言之三十六种其名目又不同焉大抵外伤四气内窘七情与夫饮食乖常染触蠢动含灵之毒未有不变为瘻疮穿孔一深脓汁不尽得冷而风邪并之於是??而成漏矣漏喜发於顷腋亦喜发於陰僻肛門之間疗治失时即生寒热不特瘻能为漏凡痈疽诸发随所在处苟有宿脓败肉朽骨停蓄其间皆一切漏疮之萌蘖也治法温散风冷为急收水次之生肌又次之霍香厚朴半夏橘皮苍术细辛川芎白芷以官桂乾姜一已佐之此足以温散风冷矣然有近年漏者有久年漏者近则或带淡红或带微肿或留小核久则上而槁白内而黑烂淫虫恶臭生焉近者不过前药数品而已久者复其元阳亦当以漏监辈加減而用之如其不当用而轻用又恐热气乘虚变移结核旁缘相通而孔窍为尤甚若夫收水一节则有司存水属肾也肾虚不能传导而後水溢於肾水溢则渗漉於漏疮行肾之水无如黑牵牛必以牵牛取末入於猪肾慢火煨熟而温酒下之则借肾入肾一纵一擒两得其便恶水既泄不复淋漓继以当归黄耆川芎官桂川续断葫芦巴等修治细末佐以发灰空心温酒调下仍以安肾圆山药圆兼而济之庶几肾得所养真元凝合夫然後龙骨牡蛎人齿犬牙加之血竭乳麝发灰内外相维生肌必矣然而新肉方生又当以臀肉猪蹄米舖为养不惟滋味益肾而阳明之主肌肉亦藉谷气以充之此则自本自根之论也虽然漏已息矣疮已平矣衾帟动念可乎否乎曰始焉之漏者沟洫之细流也终焉之犯者江河之浚决也知而故作卢扁其如之何

漏疮证治

温解散温散漏疮风冷

霍香叶 厚朴【制】 半夏麴

橘皮 苍术【炒】 细辛

川芎 白芷【各一分】 辣桂

川白姜【生】 甘草【炙各半分】

右剉散姜枣煎服

猪肾酒通行漏疮中恶水自大肠出

黑牵牛碾细去皮取末一分入猪肾中以线扎青竹叶包

右慢火煨熟空心温酒嚼下

续断散止漏活血益肾气续筋脉

槁藤子【去穰酥炙】 当归 川芎

黄耆【微炙】 川续断【洗晒】 葫芦巴【炒】

紫金皮 生乾地黄【洗晒】 牡蛎粉【研细各半两】

木香 辣桂【各三钱】 甘草【炙二钱】

右为末每二钱空心温酒调下或加发灰佐之

保安炙甘草方治漏疮内外痛【方见乳痈门】

乳麝云母膏治漏疮効

穿山甲【浸一宿去肉用一片】

真蚌粉【同炒候香熟起泡去粉以甲为末四两】

右入乳香末一钱麝香半钱夹和云母膏十五贴为圆桐子大每服三十圆温酒下仍以鹿角胶调盐酒服神授圆川椒方见虚劳门兼服之

代赭石圆治漏疮脓血不止【方见痔门】

冷漏乳香圆

白净滴乳香【一分】牡蛎粉【半分】

右细末雪糕糊圆麻子大每服三十圆道地川白姜生用煎汤空心下

雄黄膏治积年冷漏黄水不止

雄黄 硫黄【研细各一分】 头发

黄蜡【各半两】

右用麻油二两煎熬头发溶尽去滓次入雄黄硫黄碎片黄蜡慢火上桑枝频搅为膏摊生绢贴用药先以赤甘草头煎汤洗或露蜂房白芷煎汤常洗常贴

黑灵散漏疮通用

露蜂房【剉净二分】 牡蛎粉 虢丹

硫黄【研各一分】

右同炒令烟尽为细末入发灰一分麝少许拌和傅患处麝能引药透达亦杀虫

血竭散治痔漏痛不可忍

血竭 牡蛎灰 发灰【各等分】

右细末入麝香少许自以津唾调傅如更痛研杏仁膏调药傅之

生地黄膏漏疮通用

露蜂房【炙黄】 五倍子 木香【各三钱】

滴乳香【二钱】 轻粉【一字】

右细末用生地黄一握捣细和为膏摊生绢上贴疮

蜂房散治久年漏疮或暂瘥复发或移於别处

多孔露蜂房【炙黄三分】穿山甲【炙焦】 龙骨【各一分】

右末入麝香用腊月猪脂调傅湿则掺

蛇蛻散治漏疮血水不止

蛇皮【洗焙焦】 五倍子 龙骨【各一分】

川续断【洗晒二分】

右细末入麝香少许津唾调傅

人牙散治漏疮恶疮生肌里欲乾则用

人牙 油发【各烧存性】 雄鸡内金【各等分】

右为末入麝香轻粉少许湿则掺乾则麻油调傅

平肌散治漏疮久不合露乾则用

老狗骨头 露蜂房 生发【各烧存性一分】 新桑白皮【半分】

右细末入轻粉麝香少许津唾调傅乾则掺

铁屑膏治漏疮露乾则用

鍛落铁屑【半两】 狗头连齿骨【炙黄一两】

鹿角【烧灰一两】 真轻粉【一钱】

右细末用猪脂调傅

薰漏疮方

艾叶 五倍子 白胶

苦练根【等分】

右剉碎如烧香法置长桶内坐薰疮处

洗漏疮方漏疮孔中多有恶秽常须避风洗净

露蜂房白芷煎汤洗 或大腹皮苦参煎汤洗

右洗毕候水出拭乾先用东向石榴皮晒为末乾掺以杀淫虫少顷傅药

诸漏疮方

百日儿尿密器封五日取涂疮

恶核漏疮并戒怒气不然核则大漏则水多

漏疮方

真龙骨 蜂房【炙黄各二钱】 黄丹【煨】

五倍子 降真香节 枯骸骨【瓦煨各一钱】

右为细末傅之

久瘰方

九孔蜂房炙黄为末腊月猪脂研傅俟收汁以真龙骨降真香节细末入些乳香硬疮

附诸方

盖漏疮须先服补药以主血

人参 黄耆 白术

当归 川芎【各等分】

右?咀为一大剂服之外以附子末唾调作饼如钱厚以艾炷灸之漏大艾炷亦大但灸令微热不可令痛乾则易之如困倦则止来日又灸直至肉平为効仍用好膏药贴之

翠霞錠子治年深冷漏日久恶疮有反肉用之

铜録 寒水石【煨】 滑石【各三钱】

明矾 膩粉 砒霜

云母石【研如粉各钱二分半】

右为细末擦百日便愈

仁斋直指卷二十二

卷二十三

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷二十三 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

肠痈

肠痈论

痈发於外人可得见者犹为危急之疾而况隐伏肠间痛无定处人不可得而见者乎盖痈疽五发在外则为发背发脑发眉发须发颐在内则为肠痈心痛肾痈肺痈脐痈等患治之得法尚庶几焉一着少差枵碁去矣何则肠痈为病身皮甲错腹皮紧急如肿之状而按之濡体无闕热腹无积聚者此积陰冷之所致也当以温药调之发热无汗洒淅恶寒小腹胀强而按之痛小便澀数其候如淋者此内结热之所致也当以凉剂利之其脉迟紧脓未成者可下其脉洪数脓已成者不可下甚者腹肚胀大转侧闻有水声或遶脐生疮脓汁穿出或脐中常常出脓或大便屢下脓血凡此皆为恶证其间寒热气急烦渴惊悸呕恶唾脓咳嗽痰涎自汗自利如寻常发痈之状亦类有此妇人尤多得之但恐世俗不识其证耳抑余闻焉内经有曰息贵病有人得之二三年遍身微肿其後大肠与脐俱出脓血遂至不救此亦肠痈类也又可不审思而明辨之乎

肠痈证治

牡丹散治肠痈冷证腹濡而痛时时利脓

人参 牡丹皮 白茯苓

天麻 黄耆 木香

当归 川芎 辣桂

桃仁【浸去皮炒各三分】 白芷 薏苡仁

甘草【炙各二分】

右末每服三钱井水煎食前服

木通散治肠痈热证腹痛而强发热恶寒小便似淋浓未成者用此

木通 薏苡仁 葶苈【炒】

甘草【炙】 川升麻 北梗

桃仁【侵去皮炒】 赤茯苓 牡丹皮【各一两】 生乾地黄 甜瓜子 败酱

赤芍药【各一两半】 大黄【半两】 朴消【一分】

右剉为散每服三钱井水一盞半姜五片煎服

四圣散治肠痈痈疽便毒神效

生黄瓜萎【一枚去皮】 粉草末【四钱】 没药末【三钱】

乳香末【一钱】

右件用好红酒二大椀慢火煎至一椀分作两服两日服尽大便顺导恶物妙若乾瓜萎则用两枚

薏苡汤治肠痈冷热证通用【方见血类】 加北梗甘草煎服究原排脓内补散治肠痈冷证及痈疽等患

人参 当归 川芎

厚朴【姜制】 防风 北梗【焙】

白芷 辣桂 黄耆【炙】

甘草【炙】 白茯苓【等分】

右为末每服三钱温酒调下如不饮酒南木香煎汤下诸痈热证黄瓜萎煎汤下

云母膏治内外一切痈肿结毒冷热证通用药料四十件【修制法度详见和剂方】 每服一钱圆如梧桐子大冷证以酒送下热证甘草煎汤送下○又肺痈胷膈间隐痛而咯脓血腥气上冲浓煎北梗甘草汤送下服毕皆就枕蜡矾丸治诸痈肿毒痔瘻恶疮【方见痔门】

烧枣散治肠痈

乾枣【连核烧存性】 川百药煎【研细等用】

右为末每服一钱米饮调下

附诸方

秘传薏苡仁汤治肠痈腹中 痛烦毒不安或胀满不食小便澁妇人产後虚热多有此病纵非是痈证疑似间便可服

薏苡仁【五钱】 牡丹皮 桃仁【去皮尖炒各三钱】 瓜仁【四钱】

右?咀分二贴每贴水二盏煎八分去滓温服

一方治肚痛便痈

牵牛末【一两】 大黄【半两】 牛旁子【二钱半】 补骨脂【一钱二分半】

右为细末冷蜜水调空心服每二钱加芒硝妙

牡丹汤治肠痈小便肿否按之即痛如淋或小便自调时时发热自汗出复恶寒其脉迟紧者脓未成可下之当有血洪数者脓已成不可下

大黄【蒸】 桃仁【去皮尖各五钱】 牡丹【一钱一字】

瓜蒌实【三钱】 芒硝【三钱三分包】

右?咀作一服煎去滓入芒硝再煎沸频服未効再服败毒散【方见伤寒门】

神効托里散【和剂方】 治痈疽发背肠痈奶痈无名毒肿毒作疼痛增寒壮热类若伤寒不问老幼虚人并治之忍冬草【去梗】 黄耆【各五两去芦】 当归【八两二钱】

甘草【炙八钱】

右为细末每服二钱酒一盏半煎至一盏病上食後病下食前少顷再进滓外傳未成内消已成即潰也

一方治腹内痈肿

大黄【一两取末四钱半】破故纸【一两取末二钱】牛旁子【一两取末一钱】牵牛【一两取末二钱半】

右和作二服蜜水调空心服以利为度

丹溪云

大肠有痰积死血流注用桃仁承气汤加连翘秦艽近肛门破入风者难治防风之类

桃仁承气汤【方见血门】

肠风

肠风论

肠胃不虚邪气无从而入人惟坐卧风湿醉饱房劳生冷停寒酒麪积热以致荣血失道渗入大肠此肠风脏毒之所由作也挟热下血清而色鲜腹中有痛挟冷下血浊而色黯腹内略疼清则为肠风浊则为脏毒有先便而後血者其来也远有先血而後便者其来也近世俗粪前粪後之说非也治法大要先当解散肠胃风邪热者与败毒散冷者与不换金正气散风邪既去然後随其冷热而对治之或曰血遇热则行止血多有凉药如地榆散蘘皮汤黄连阿胶丸酒蒸黄连丸辈施之热证固当然尔其或阳虚陰走正气不得归元则用木香理中汤附子理中汤震灵丹黑锡丹辈如之何而废之要之芎归汤一剂又调血之上品热者如伏苓槐花冷者加伏苓木香此则自根自本之论也虽然精气血气生於谷气靖惟大肠下血大抵以胃药收功真料四君子汤参苓白术散以枳殼散小乌沉汤和之胃气一回血自循於经络矣抑犹有说焉肠风之与虫痔特介乎毫芒之间肠风之血自肠中来虫痔之血肛门边傍别一小窍射如血线是也迨夫肛门既脱腐血浸淫於其间则俱化为虫蠹蚀肠口滴血淋漓自此又不能约而收之矣善调理者尤当以芫黄艾叶苦练根辈为之化虫○血属於心虽曰川芎当归主血当以伏苓伏神佐之前辈止血亦不用甘草但增枣入药用

肠风证治

败毒散不换金正气散【方并见寒类】

地榆散治肠风热证下血

地榆 黄连 茜根

黄芩 伏神【各半两】 梔子仁【一分】

右麤末每服三钱薤白五寸同煎服又藁皮汤【方见泻类通用】

酒蒸黄连圆【方见疸门】黄连阿胶丸【方见嗽门】伏苓伏神煎汤下治诸下血腹痛痛即是血多服为佳附子理中汤【方见寒类】理中汤【方见泻类】内加木香治虚冷肠风○芎归汤【方见血类】热证加伏苓槐花冷证加伏苓木香

小乌沉汤

香附【杵去皮毛焙二两】天台乌药【去心一两】甘草【炒一分】

右为末每一钱盐点服枳壳散正方不用加药参苓白术散【方并见虚劳门】四君子汤【疸门】四件夹和姜枣煎服治诸下血

乌荆圆治肠风下血诸风抽掣

川乌头【一两炮去皮】荆芥穗【二两】

右为末醋麪糊圆如桐子大每服二十圆枳壳散下

不换金正气散加川芎当归同煎吞白圆子【方见身疼门】治肠风及便血妙

四君子汤加制白扁豆黄耆治肠风五痔下血痿黄乏力

猪脏圆治大人小儿大便下血日久多食易饥腹不痛里不急名曰野鸡先用海螵蛸炙黄去皮取白者为末以木贼草煎汤调下服之三日後用淨黄连二两剉碎嫩猪脏二尺去肥以黄连塞满猪脏系两头煮十分烂研细添糕糊圆如桐子大每服三五十圆米饮下橄?散治肠风脏毒久不止

橄?核於灯烛上烧存性研为末每服二钱用陈米饮食前调下

蒜连圆一名金屑万应丸治肠风脏毒【方见血类】○法制香附方并黑散子治肠风脏毒【方见血门类】

黑玉丹治肠风痔瘻等疾

棕?头发【以皂角水洗净各二两】

刺蝟皮 槐角【各三两】牛角髓【四两已上并烧存性】生油麻 雷圆【各一两】苦练根【一两一分】乳香【半两】麝香【二钱】

猪蹄甲【四十九个烧】 槁藤子【炒香一两一分】

右为末酒麪糊圆桐子大每服五十圆食前米饮下

肠风黑散治肠风下血腹痛

败棕 头发 木馒头

木贼【各烧存性】 槐角【炒】 枳壳【制各一分】

甘草【炒焦】 乌梅肉【炒各半分】

右为末每服二钱陈米饮乘热调下

木贼散治肠风下血

木贼【去节炒一两】 木馒头【炒】 枳壳【制】

槐角【炒】 茯苓 荆芥【各半两】

右为末每二钱浓煎枣汤调下

槐角圆治伤风泻血脱肛

槐角【一两】 防风 地榆

当归 枳壳【制】 木贼

茯神【各半两】

右末酒麪糊圆桐子大每服三十圆米饮下

真人养脏汤【方见泻类】 加生槐花治肠风冷热不调下血黑圣散治肠风脏毒痔瘻及诸下血

当归 川芎 茯苓

地榆 槐花【焙】 败棕

艾叶【烧存性】 百草霜

右件等分为末每服二钱食前陈米饮调下

鲫鱼方治肠风血痔及下痢脓血

大活鲫鱼一个不去鳞肚下穿一孔去其肠秽入透明白矾一块如金橘大以败棕皮重包外用厚纸裹先煨令香熟去纸於熨斗内烧带生存性为末每服一钱空心温米饮调下

震灵丹【方见泻类】 玉华白丹【方见痢类】 治脏腑虚损大肠不收久作肠风下血二药夹用煎不换金正气散加川芎空心咽下

黄龙圆治伤酒脏毒及暑泻热泻

黄连净八两用酒一大升煮乾研细水麪糊为圆如桐子大每服四五十圆陈米饮汤下

消风散治肠风米饮调下吞乌荆圆酒蒸黄连圆随意【方见头风门】

肠风久血方

吴茱萸【净半两荡七次炒过】 黄连【去须七钱】

右为末陈米糊圆桐子大每服五十圆陈米饮下食前服

又方

茅花 败荷叶 败棕【各半两烧存性】 香附【杵净一两炒盐和一半炒焦一半略炒】

右为末食前米饮调下二钱

肠风方

香附【一两制】 枳壳【三分】 当归

川芎【各半两】 槐花【炒】 甘草【炙各一分】

右为麪末每服三钱新水一盞半姜枣煎食前服

附诸方

加減四物湯治腸風下血不止

側柏葉 生地黄 當歸【酒浸去蘆】

川芎【各一两】 枳殼【去白炒】 荊芥穗

槐花【炒】 甘草【炙各半兩】

右?咀每服四錢水一鍾姜三片烏梅少許同煎空心溫服

腸風黑散【和劑方】治腸風下血或在糞前後并皆治之

荊芥【二兩】 亂髮 槐花

槐角【各一两燒】 甘草【炙】 蝟皮【炒各兩半】

枳殼【去白二兩炒一两】

右將所燒藥同入甕瓶內鹽泥固濟燒存三分性出火毒同甘草枳殼搗羅為末每服三錢水一鍾煎七分空心服

結陰丹【拔粹方】治腸風下血 臟毒下血 諸大便秘疾

枳殼【去穰麩炒】 葳靈仙 黃耆

陳皮【去白】 椿根白皮 何首烏

荊芥穗【各半兩】

右為末酒糊丸如梧子大每服五七十丸陳米飲入醋少許煎過要放溫水送下

黃連貫衆散【張子和方】治腸風下血

黃連 雞冠花 貫衆

大黃 烏梅肉 枳殼

荊芥【各一两】 甘草【炙七錢五分】

右为末每服二钱温米饮下食前

一方治脏毒下血

用黄连四两酒浸春秋五日夏三日冬七日晒乾为末以乌梅肉六两同捣为膏丸如梧子大每二三十丸空心白汤下

一方治肠风下血

滑石 当归 生苳

黄芩 苍术【各等分】

右以水煎服或以苍术生苳不犯铁器为末丸服

一方治肠风脏毒

用茄蒂烧灰存性为末米饮调下二钱小儿服半钱诸痔

诸痔论

脏腑本虚外伤风湿内蕴热毒醉饱交接多慾自戕以故气血下坠结聚肛門宿滯不散而冲突为痔也肛边发露肉珠状如鼠乳时时滴溃脓血曰牡痔肛边生疮肿痛突出一枚数日脓溃即散曰牝痔肠口颗颗发?且痛且痒出血淋漓曰脉痔肠内结核有血寒热往来登溷脱肛曰肠痔若血痔则每遇大便清血随下而不止若酒痔则每遇饮酒发动疮肿而血流若气痔则忧恐郁怒适临乎前立见肿痛大便艰难强力则肛出而不收矣此诸痔之外证然也治法总要大抵以解热调血顺气先之盖热则血伤血伤则经滯经滯则气不运行气与血俱滯乘虚而坠入大肠此其所以为痔也诸痔出血肛門间别有小窍下如血线不与便物共道痔久不愈必至穿穴疮口不合漏无已时此则变而为瘻矣前乎治法之外抑犹有说焉肠风脏毒之与痔瘻同出而异名也岁积月累淫蚀肠头湿烂可畏此果何物致然哉虫是也其间执剂又当为之化虫不然古书何以谓之虫痔○气血下坠冲突为痔既不能坐又不容行立行立则愈坠矣惟高枕偃仰心平气定其肿自收

诸痔证治

清心汤素问云诸痛痒疮皆属於心心主血热诸痔受病之源也此药主之

黄连【淨一两】 茯神【去木】 微赤茯苓【各半两】

右为末炼蜜圆如桐子大每服一百圆食前米饮下患痔只是吃白米稀粥疏其肠胃

黄连阿胶圆治诸痔解热调血【方见嗽门】用枳壳散送下【方见虚劳门】或黑豆煎汤下解里热先用此○追风毒剉散治诸痔蕴热肿痛大便不通加枳壳煎【方见脚气门】

清凉饮治诸痔热证大便秘结

当归 赤芍药 甘草【炙】

大黄【米上蒸晒等分】

右为粗末每服二钱新水煎服

五痔散治诸痔不问冷热内外

鳖甲【醋浸炙焦】 蝟皮【剉碎炒焦】 猪甲【剉碎炒焦】

蜂房【炒各半两】 蛇皮【一条烧并各存性】

右为末入麝少许每服一钱半食前米饮调下

圣圆子诸痔通用

槁藤子【重一两者三个去穰酥炙】 猪牙皂角【二两醋炙】 蝟皮【一个炙令焦】
大皂荚刺【二两烧各存性用】

没药【别研】 槐角【各三分】 麝【少许】

右为末酒麪稀糊圆桐子大每服三十圆枳壳散送下

鸡峯乌金散治痔漏

穿山甲 刺蝟皮 黄牛角心【各碎炒黄】

猪牙皂角 槐子 皂荚刺

枳壳 贯众 阿胶【各等分再夹和】

牛角 蝟皮 山甲【同炒黑】

右为末每服一钱半用胡桃肉研烂并调酒食前服大肠有热荆芥泡汤调下漏血不止当归煎汤调下

槐角圆治诸痔及肠风下血脱肛

槐角【去梗一两】 防风 地榆

当归 枳壳【麸炒】 黄芩【各半两】

右为末酒麪稀糊圆梧桐子大每服三十圆米饮下

蛭皮圆治诸痔出血里急疼痛

槐花【微炒】 艾叶【炒黄】 枳壳【制】

地榆 当归 川芎

黄耆 白芍药 白矾【煨】

贯众【各半两】 蛭皮【一两炙焦】

头发【烧三钱各存性】 猪後蹄垂甲【十枚炙焦】 盈尺皂角【一铤去弦核醋炙黄】

右为细末炼蜜圆桐子大每服五十圆食前米饮下

收痔圆诸痔通用

透明阿胶【炒酥】 黄连【淨】 贯众【各半两】

盈尺皂角【去弦核醋炙焦】 蛭皮【炙焦】

蜂房【炒焦】 蛇皮【略炒】 皂角刺【略炒】

穿山甲【插入热火灰中令焦】 猪後蹄垂甲【烧已上各存性】

当归 川芎 槐花【并用二钱半】

右为末米醋煮麪糊圆桐子大每服七十圆调气用枳壳散下消血热荆芥煎汤下食前服

蜡矾圆治诸痔诸痛恶疮便毒

明白矾煨为末熔蜡圆桐子大每服七圆温熟水下

猪甲散治诸痔

猪後蹄垂甲【不拘多少烧存性】

右为末陈米饮调二钱空心服

青蛙圆治诸痔

青色蛙【长脚者取一个烧存性】

右为末雪糕圆桐子大每服十五圆空心先吃饭二匙次以胡桃肉切细煎汤调枳殼散送下
若产妇发痔里急作疼用黑豆一百粒陈米一合夹煎汤下亦先吃饭二匙

穿山甲散治痔肛边生鼠乳或成疮痛

穿山甲【横取後段尾根尽处一两炙焦存性】 鳖甲【半两酒炙酥】 麝【半钱细研】

右为末每服一钱半用?茶半匙夹和沸汤调下防风煎调亦得留滓傳痔○又方单用穿山甲

地榆散治痔生疮肿痛

地榆 黄耆 枳殼

?榔 川芎 黄芩

赤芍药 槐花 羌活【各半两】

白歛 蜂房【炒焦】 甘草【炙各一分】

右剉每服三钱新水煎服

皂刺圆治痔痛而复痒

皂荚刺【二两烧烟尽存性】 防风

槐花【各三分】 蛇床 白矾【煨】

白蒺?【炒去刺】 枳殼【制】 羌活【各半两】

蜂房【炒焦】 五倍子【各一分】

右为末醋调菥豆粉为糊圆如小豆大每服五十圆以苦练根煎汤下仍用童子热尿入白矾末浇洗肛門

皂角煎圆治内痔肠头里面生核寒热往来

满尺皂角【三铤去弦核醋炙】 刺蝟皮【一两炙黄】 白矾【煨一两】
猪後蹄垂甲【十枚烧存性】

桃仁【浸去皮尖】 川芎 北梗

甘葶苈【炒焦各半两】 薏苡 白芷

右为末炼蜜圆如桐子大每五十圆桑白皮煎汤下仍以藩篱草根煎汤熏洗

芎归圆治痔下血不止

川芎 当归 黄耆

神?【炒】 地榆 槐花【微炒各半两】 阿胶【炒酥】 荆芥穗 木贼

头发【烧存性各一分】

右末炼蜜圆桐子大每服五十圆食前米饮下

乾葛汤治酒痔

白乾葛 枳殼【炒】 半夏【制】

伏苓 生乾地黄 杏仁【各半两】

黄芩 甘草【各一分】

右剉碎每服三钱黑豆百粒姜五片白梅一个煎服

橘皮汤治气痔

橘皮 枳殼【炒】 川芎

槐花【炒各半两】 榔木香

桃仁【浸去皮尖】 紫苏茎叶 香附

甘草【炙各二钱半】

右剉每三钱姜枣煎服

代赭石圆治痔变为瘰脓血不止

代赭石【煨醋淬研】 磁石【煮米醋数沸蘸七次研】 白矾【煨】

牡蛎灰 龙骨【研】 蝟皮【炙焦】

皂荚刺【烧】 猪後蹄垂甲【烧各存性】 赤石脂

川椒【焙】 木贼 蜂房【炒】

右件等分细末神糊圆小豆大每服五十圆食前艾并生姜煎汤下漏血处以熟艾揉和血竭塞日三换

荆枳汤治气滞发痔

荆芥穗 枳殼【炒】 槐花

香附 紫苏茎叶 甘草【炙等分】

右为末每服二钱米汤调下

芎归汤【方具载血类】加伏苓槐花微炒治产妇诸痔

傅痔方治肠口热肿朴消二钱鹏砂半钱末之乾摻○又大黄滑石等分末之井水调傅○又朴硝五倍子等末傅之止血方

明血竭末傅之○通用方猪後蹄垂甲烧灰傅○又水浸熊胆汁以笔傅○又鸭觜青胆矾煨为末用清蜜调笔傅可以消脱○又鸡子一个煮熟去黄取白切焙明矾煨白歛各一钱同末傅有孔用纸捻蘸入

熏洗方

槐花荆芥枳殼艾叶水煎入白矾熏洗○又木鳖七枚取仁研土矾末二钱少水煎熏两三次○又藩篱草根煎汤先熏後洗藩篱花似小芙蓉○又蝟皮三指许艾叶一团如烧香法置长桶中坐熏三次凡痔发於肛内者须用熏洗若肠口肿热朴硝末新汲水调常常淋之治诸痔方凡痔皆因酒麪炙煨蓄热伤血恶血结聚於下焦不得疏通於是下坠而为痔患痔之人下部留蓄血热多致大小便不通小腹结急才得一通又复闭塞且有漱水之证此下焦留蓄血热明矣其下焦蓄血亦以尺脉洪盛见之合用逐瘀汤主治须得大小便通快患处即以明白矾泡汤温洗仍以葱汤再沃次用桐殼灰穿山甲尾闾炙焦地胆去翅足秫米炒各一分为细末入胆矾少许研和酒调以笔蘸傅少顷痛来以葱汤沃去準一时许前药又增些胆矾若痛又以葱汤沃之又等一时药中又增些胆矾并如前法一日三次用前药其胆矾又以渐加多於第一日矣後日三次用煎药其胆矾又以渐加多於第二日矣痛则沃之以葱汤三日以还更不用药只是明矾泡汤与白汤相间淋洗日三四次十余日自然成痂如柿乾之状无胆矾以綠矾代之

逐瘀汤通利大小便取下黑物

川芎 白芷 生乾地黄

赤芍药 五灵脂 枳殼【制】

阿胶【炒】 蓬莪术 茯苓

茯神 木通 生甘草【各一分】 实大黄【生用】 桃仁【荡去皮焙各一分半】

右剉散每三钱井水一碗姜三片蜜三匙煎服以利为度瘀血作痛通用

治痔五圣丹

?黄 叶子雌黄 朴硝

綠矾 明白矾【各半两】

右件各别磕碎以银窝一入?黄二入雌黄三入朴硝四入綠矾五入白矾圓瓦片盖定炭火煨一日夜看青烟出尽有红烟上方好候冷取出纸衬顿地上用盆盖出火毒一日夜入乳香没药末各一钱同研极细每抄一匙煎甘草汤调傅外用鸡羽扫药末盖之日二次夜一次自然乾硬而脱逐日须用葱白煎汤入朴硝温洗软帛拭乾然後傅药○治痔猪胆膏猪胆七枚各取汁以建盞盛炭火熬成膏用单纸摊傅须先用槐根取白皮煎汤温洗然後傅药

熏痔方

五倍子日乾如烧香法置长桶内坐燻患处自然收缩

治痔方

紫荆皮新水煎食前服○又方白芷末用米饮调食前服○又方赤蜈蚣焙乾为末入脑以津唾调傅青纱上贴或朴硝末掺亦得○又方五倍子焙黄剉碎每用一两井水三大碗煎乘热熏先拭乾烂石膏烧红碗覆地出毒细末傅

附诸方

乾葛汤治每遇饮酒发动痔疮肿痛而流血

乾葛 枳殼【炒】 半夏

茯苓 生苧 杏仁【各半两】

黄芩 甘草【炙各二钱半】

右剉每服三钱黑豆一百粒姜三片白梅一个水煎服

橘皮丸治因忧思恐怒适临於前痔疮发作肿痛大便难强努则肛出并皆治之

橘皮 枳殼【炒】 川芎

槐花【炒各半两】 榔 木香

桃仁【炒去皮】 紫苏茎叶 香附

甘草【炙各二钱半】

右剉每服三钱姜枣煎服

地黄丸治五痔滋陰必用之

地黄【酒蒸熟一两六钱】 槐花【炒】 黄栢【炒】

杜仲【炒】 白芷【各一两】 山药

山茱萸【取肉】 独活【各八钱】 泽泻

牡丹皮【各六钱】 茯苓【六钱】 黄耆【一两半】

白附子【二钱】

右为末炼蜜丸如梧子大每服五十丸空心米汤服下

五灰散【三因方】治五种痔疮不问内外并宜服之

鳖甲【治牡痔】 蛭皮【治牡痔】 蜂房【治脉痔】

蛇蜕【治气痔】 猪左足悬蹄甲【治肠痔各等分】

右烧存性随证倍用一分为末井花水调二钱空心临卧时服之

一方治热痔疼痛不可忍者

用鲜枸?根数茎杵烂煎汤熏洗其痛立止

四物汤【方见虚劳门】

解毒汤【方见积热门】

灸法用大蒜一片头垢捻成饼子先安头垢饼於痔上外安蒜艾灸之

便毒

便毒论

肾为作强之官所藏者志也男女大慾不能以直遂其志故败精搏血留聚中途而结为便毒矣夫人脚腿与小腹合缝之间精气所出之道路也或触景而动心或梦泄而不泄既不得偶合陰阳又不能忘情息念精与血交滞其不为肿结也几希便毒处所上不在腹下不在腿介乎两者之中是也尝怪世俗无知才觉有便毒证状必以为热气所攻每每薄衣露足遂使寒邪乘之热气转不得散日复一日败精宿血愈聚而愈结焉不思一身宗筋上络於舌本下聚於陰器筋得寒则急急则缩甚至伛偻而不获伸於斯时也百药并陈亦难责效况复从事於寒凉者乎治法散寒利热泄其肾邪活其血脉是为捷径外此老人气滯亦或有之

便毒证治

双解散治便毒内蕴热气外挟寒邪精血交滞肿结疼痛

辣桂 川大黄【生】 白芍药

泽泻 牵牛【炒取末】 桃仁【去皮炒乾各一分】 甘草【半分】

右为粗末每服三钱姜五片食前煎服日两服先小便快热从小便出後大便利皆是稠毒

连翘汤治便毒肿结

连翘 独活 川升麻

射干 木通 桑寄生

赤茯苓 甘草【炙各七钱半】 大黄【生用】

木香 乳香 沉香【各半两】

右剉细每服三钱慢火煎服

复元通气散便毒初发用此方

穿山甲【酒浸炙焦二两】 天花粉【酒浸一宿焙】 白芷

舶上茴香【炒】 白牵牛末【炒】 延胡索【擦去皮】

南木香 当归 甘草【炙各一两】

青木香【半两】

右为细末每服二钱温酒调食前服不饮酒南木香煎汤下

退毒饮治便毒肿结

穿山甲【半两蘸法醋炙焦】 木猪苓【三钱法醋微炙】

右为末每服二钱食前老酒调下次以法醋煮肥皂研膏传之妙

五苓散疎利小便以泄败精【方见饮水门】 用葱二茎煎汤调下○追风毒剉散治便毒热

证大便秘结【方见脚气门】又清凉饮通用【方见痔门】○和剂流气饮治便毒大便不通加生大黄食前服【方见胀满门】○究原排脓内补散便毒已消常服之【方见肠痈门】溃处以白敛白及没药乳香血竭为末傅之○蜡矾圆治肿核痔漏诸痈【方见痔门】四圣散治便毒痈疽肠痈神效【方见肠痈门】

傅方治便毒肿痛

？黄 乳香【各二钱半重】 黄栢【一钱】

右为细末分作两服以新水调傅自平

皂角膏治痈疽便毒等

皂角一条长尺以上者槌碎法醋煮烂研成膏傅之屡效

胶方便毒初发

水胶用水溶开涂傅若便毒已大而软则用鱼鳔胶於热汤中煮软乘热研烂傅之或要换药以热汤洗去

蕉叶方治便毒

蕉弓叶乾者焙焦为末法醋生姜自然汁等分调傅

又方

紫背草研醋调傅

附诸方

秘传蝉退散治便毒初起疼痛服之神效

蝉退【去土并头足】 枫由虫【炙死各二钱】 蜈蚣【三条烧存性】 ？黄【三分】

右件共为细末分三服用好酒煎一二沸食前服忌食诸热毒物

秘传独圣散治一切便毒连连作痛更不肿起名曰陰毒服之立应

取活蜈蚣一二条用炭火烧存性为末用好酒调服食前下

双解散治便毒内蕴热气外挟寒邪精血交错肿结疼痛

辣桂 大黄 白芍药

泽泻 牵牛【炒捣研】 桃仁【去皮各二钱半】 甘草【五分】 乾姜【一钱】

右?咀分二贴每服用水二盏煎七分食前服

一方治便毒初发以生姜一大块米醋一合以姜蘸醋磨取千步峰泥敷之即散【千步峯泥地上人经行日久其泥突起者是】

附疔疮方

秘传凤凰衣散治疔疮肿痛神效

凤凰衣【即包鸡子壳内衣是也不以多少】 轻粉

冰片【各少许】

右为极细末傅患处効

麝香轻粉散治血疔陰蚀臃疮耳疔一切恶疮

轻粉 麝香【各五分】 乳香

没药 明矾【各一两】

右为细末乾贴

一方治下疳疮

蜜陀僧 黄连 黄栢

轻粉【各等分】

右为细末以盐艾汤沃洗乾掺

附妬精疮方

津调散治妬精疮脓汁淋漓臭烂

黄连 欵花【等分】

右为末以地骨皮蛇床子煎汤洗绢帛挹乾津调药敷

歌曰

陰疮痒痛黄汁注 轻粉石膏湿乾傳

不然细研生白矾 冷水洗之根亦去

又

臈茶五倍末同调 掺傳陰疮便可消

更有一般官局药 水银和粉玉龙膏

又

妇人交接妬精疮 地龙蛇床作洗汤

细研黄连欵冬末 唾津调傳是良方

仁斋直指卷二十三

卷二十四

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷二十四 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

瘾疹风

瘾疹风论

风气挟热起於凑理皮肤不肿不疼发为瘙痒谓之瘾疹此风热之浮浅者也其亦有寒暑湿之气行焉风热在表天时炎暄而燥气乘之则为赤疹风热在表天时寒凉而冷气折之则为白疹赤者遇凉清而後消白者遇温暖而後灭然则用药加減可无权度於此哉其有浴後凑风与夫汗出解脱而得之者隐隐微黄似赤似白凝滯於肌肉之间而四体为之重着此风热之挟湿外证又可推矣如其不知寒暑湿之所由生概以疗风热等辈索之按图殆恐痰嗽呕渴杂证交攻由瘾疹而变为疮疹

瘾疹证治

天麻散治风热瘾疹

天麻 川芎 川升麻

半夏【制各三钱】 防风 细辛

羌活 荆芥穗 蝉殼【去觜足】

甘草【焙各二钱】

右细剉每服二钱姜三片井水煎服挟寒者加官桂挟暑者加柴胡黄芩挟湿者加茯苓苍朮

加味羌活散瘾疹通用

羌活 前胡【各半两】 人参

北梗 川芎 茯苓

天麻 枳殼【制】 甘草【炙各二钱半】 蝉殼【去头足二钱】 脑荷【一钱半】

右末每挑二大钱匕姜钱三片煎服

消风散治癰疹瘙痒【方见头风门】

川芎茶调散治风热癰疹【方见头风门】

胡麻散治风热癰疹【方见历节门】

人参羌活散治风热癰疹瘙痒【方见眼目门】

惺惺散

桔梗 细辛 人参

茯苓 白术 瓜蒌根

甘草【炙等分】

右末入薄荷煎要和气添姜钱可夹和人参羌活散治癰疹亦治疮疹

羌蚕散治癰疹

白僵蚕【直者去觜焙尽丝令黄】

右末好茶清入些姜汁调下

傳药

明矾 朴硝为末井水调鸡羽扫傳

又方

赤小豆 荆芥穗晒为末鸡子清调薄傳

又方朱黛散扑传【方见丹毒门】

洗方蚕沙新水煎密室温洗

胡麻散治风气挟热瘾疹瘙痒

胡麻子【十二两】 苦参 荆芥穗

何首乌【各八两】 威灵仙 防风

石昌蒲 牛旁子【炒】 菊花

蔓荆子 蒺?【炒去刺】 甘草【炙各六两】

右末每服二钱食後薄荷汤点服或好茶清亦得

丹疹并不得吃醋

附诸方

阳毒升麻汤?在面伤寒一二日或吐下後变或阳毒腰背痛烦闷不安面赤狂言见鬼下痢脉浮大咽痛

人参 黄芩 麝香

犀角 甘草【各二钱五分】 升麻【半两】

右?咀水煎取饮半盏刻许再进温覆手足得汗出解

玄参升麻汤?在身治汗下吐後毒不散表虚里实发於外甚则烦燥谵妄

玄参 升麻 甘草【各等分】

右?咀水煎服

阳毒梔子汤治伤寒壮热百节疼痛而发?

升麻 梔子仁 黄芩

芍药 石膏 知母

杏仁 柴胡 甘草【各等分】

右为粗末每五钱入姜五片豉百粒煎服

消毒犀角饮子治?及癰疹

牛旁子【六钱】 荆芥 防风【各三钱】

甘草【一钱】

右?咀水煎服

解毒防风汤治?及癰疹痒痛

防风【一两】 地骨皮 黄耆

芍药 荆芥 枳殼

牛旁子【各半两】

右为粗末每四五钱水煎服

调中汤治内伤外感而发陰?

苍术【一钱半】 陈皮 砂仁

藿香 芍药【炒】 甘草【炙】

桔梗 半夏 白芷

羌活 枳殼【各一钱】 川芎【五分】

麻黄 桂枝【各五分】

右咬咀姜三片水煎服

丹毒

丹毒方论

丹之为候由热毒之气搏於荣血而风乘之所以赤浮肌肉而为之走注也然丹有五丹不特色赤或青或黄或白或黑是血热风毒有盛有衰元冷挟热故其色变易又不同焉要之诸疮皆属於心心为血之主血为热之媒古人以丹命名盖谓心应火色尚赤端冷揆元夫既心家血热所致风以动之於是游走而遍体也蔓延而不歇则烂肌自四肢而入腹入肾则杀人惟初生於胷腹然後流散於四肢者易愈

丹毒证治

蓝叶散治诸丹发热赤肿

白芷 柴胡 知母

杏仁【去皮】 川芎 赤芍药

生地黄 川升麻 乾葛

生甘草【各一分】 烂石膏 梔子仁【各半分】 蓝叶【日乾一分】

右剉细每一钱半新水煎服热甚加黄芩玄参煎服

防己散治诸丹

汉防己【三钱】 川升麻 黄芩

犀角 黄耆 川芎【各一分】

朴硝【一钱】

右剉每一钱半新水入少蜜并竹叶煎

朱黛散解丹热诸毒

青黛 土朱【各一分】 软滑石

荆芥穗【各半分】

右为末每一钱半蜜水调下兼与扑身

人参羌活散【方见眼目门】 惺惺散【方见癰疹门】 夹和用竹叶煎汤调下治诸丹

诸丹热证加黄芩玄参冷证加黄耆白芷

疎风解毒散亦治丹毒【方见诸恶疮门】

傳方

紫浮萍一椀 中等活地龙七条研细傳

又方芒硝末水调傳 又方赤小豆末鸡子清调傳又方青淀汁傳 又方水藻搗傳

又方芭蕉根取汁傳 又方梔子大黄蜜水搗傳又方猪粪烧灰鸡子清调傳

洗方蚕沙一升井水煎温和密室洗

青白丹竈中黄土一分?半分为末麻油调傳

小儿风疹走带方

姜黄 荆芥 黄连

土朱 赤小豆 烂石膏【等分】

右为末扑之服药同前

附诸方

蓝青散治一切丹毒赤肿

蓝青 知母 甘草

杏仁【去皮尖各五钱】 黄芩 升麻

柴胡 寒水石 石膏

山梔 赤芍药【各四钱】 羚羊角【三钱】

右剉每服三钱水煎服

消毒饮治赤丹火丹紫?丹

牛旁子【炒研三两】 荆芥穗【五钱】 甘草【炙一两】

防风 升麻【各七钱半】 犀角【三钱】

麦门冬 桔梗【各五钱】

一方加朴硝【二钱】

右?咀每服一二钱水煎服

一方治火丹毒遍身赤肿痛

寒水石 石膏【各三钱】 黄栢

甘草【各一两】

右为末芭蕉汁调敷

一方治火带

歌曰

疮毒细如火带 能令斑驳皮肉坏

烂研一味百合根 傅若频时消亦快

一方治丹瘤

大黄 朴硝 土蜂窝

右为末水调涂之

洗药方

防风 酸车草 赤豆

竈心土【等分】

右煎汤洗立効

附天疱疮方

防风通圣散 蚯蚓泥

右共为末略炒蜜调傅极妙

从肚皮上起者是重热发於外还服防风通圣散【见中风门】

癩风

癩风方论

癩风即经所载疔风也癩之名非一证状多端不出五种风生五种虫是尔黄风生黄虫青风生青?赤风生赤?白风生白?黑风生黑虫四虫犹可措手惟黑?未必有瘰吁此恶疾也疮痍荼毒乍热乍寒身体魁?手足指脱眼烂鼻塌齿豁唇翻顔色枯黄眉鬓堕落顽痹痛痒不能屈伸病证之恶莫甚乎此然此虽出於风必有所致大率多因嗜慾无度劳动气血热发汗出不避冷湿外风遂致淫气与荣卫相干卫气挟邪则肌肉不仁荣气泣浊则脉络瘀热故遍身疡溃变坏人形千金所谓自作不仁极猥之业虽有悔言而无悔心故应如是亦有传染触犯而得者此则不谨之所招也其?在於病躯去来无数甚入骨髓食人肝则眉睫脱落食人肺则鼻柱颓崩食人脾则语音变散食人肾则耳鸣如雷若食其心则诸痛痒疮心实司之心不受触触则死矣人有斯疾切须忌盐及一切口味幽隐林泉屏弃世务蚤蚤救疗庶为全人治法以疎风杀?逐恶毒辈为之宣通谨勿用补此风从头起而下者顺从足起而上者逆顺则易逆则难又当识此余於直指後集历节方论见之【大寒大热不得行淫多致风癩或久病疰羸废其肢体】

癩风方论

通天再造散治大风诸癩

川鬱金【半两】 绵纹皱大黄【一两微焙】

白牵牛【半生半炒取仁半两】

黑色大皂荚刺【一两半焙】

右细末每服三钱半月首五更面东好酒调下重者泄出黑头小?轻者泄如鱼肠烂肉极臭服药至无?则瘥四个月絶口味但吃白粥白饭惩忿窒慾永断牛马鷲鸭等物下药俟至勿令病人知恐虫匿也

本事神效追命散治大风

北大黄【七钱半】 大皂荚刺【一两】 川郁金【半两】

右细末每二钱用真大风油入好酒温调临睡服隔两日再服直候泄下无?方瘥此疾业缘果报常须至诚念佛懺悔以全其身

皂棘汤治大风

皂荚刺【烧半生半灰二钱】 北大黄【一钱】

轻粉【半钱】

右末酒调空心服取下恶物服药数日齿出毒血甚臭

皂角圆治大风诸癩

肥长皂角【二十条先炙透後去皮弦其核自脱】

右以皂角肉多用酒慢火煎得稠粘滤出清稠者候冷入雪糕杵为圆桐子大每五十圆不饥饱酒送下

硫黄酒煞癩风?

明硫黄【乳鉢研细】

右入酒调空心饮清汁明日添硫黄再研入酒如前或添大风油更好

黑虎丹治大风诸癩恶虫内蚀形骸变坏

天灵盖【三两】 虾蟇【二个去头足烧存半生】

生人中白 桃仁【浸去皮各二两】 麝香【一钱】

硫黄?黄【各一两】 穿山甲【熟灰插焦】

老皂荚刺【烧存半生各半两】 轻粉【二钱半】

右末炼蜜圆桐子大每三十圆月首五更米饮连日服取虫尽则愈杀瘵虫通用

乌蛇圆治风癩杀五?

胡麻子【四两】 乌蛇肉【酒浸焙】 乾 房【炙各两半】

苦参?榔 独活

桃仁【浸去皮日乾】 白蒺?【炒杵去刺各一两】

皂荚刺【炒焦】 贯衆【各七钱半】 芫荑

雷圆?黄 硫黄【各半两】

朱砂【二钱半】 虾蟇【二个去头足炙焦】

右细末以长皂角十条水三升掇取浓汁去滓煎成膏和药末圆如桐子每三十圆空心温酒下

?朱散治大风

?黄 朱砂 滑石

阿魏 雌黄 雷圆【炒】

?芦【炒】 硫黄 生犀角屑【各三钱半】 芫青虫
斑猫虫【各去翅足糯米炒透各用二十四个】

黑皂荚刺【焙七钱半】

右细末每服三钱天明温酒调下明日再服

雷圆散风癩取虫

水银 硫黄

?黄【各二钱半用乳鉢入点醋同研令星尽为度】 雷圆

阿魏 贯衆末【各二钱半】 麝香

右研极细每一钱天明温酒调下明日又服

虾蟇圆治大风杀五虫

乾虾蟇【一两炙黄】 肥长皂角【一条先炙透後去皮弦核蘸酒再炙】

右为末以竹管引入羊肠内系两头用麩二升铺甑内置麩上蒸熟去麩入麝半钱同捣圆如桐子每二十一粒空心温酒下

蔓荆圆治大风

蔓荆子 苍耳【即鼠粘子】 枸?子

牛蒡子【炒】 黑牵牛【炒】 胡麻

白芷 何首乌 威灵仙

荆芥穗 独活 蒺?【炒杵去刺】

华陰细辛【去苗叶土】 直僵蚕【炒去糸】 道人头【去刺取仁各半两】

皂荚刺【炒焦】 苦参 大草乌【去皮尖生各一两】

右细末大风油和圆桐子大每二十四圆食前茶清下

必用厉风方并返魂追命再造散皆治大风胡麻散解风毒热气瘾疹瘙痒【方并见历节门】 蜡矾圆癩风常服以解内毒【方见痈疽门】 圣惠方千金方治大风单服链成松脂癩风服药半月後两腰眼各灸七壮

附诸方

磨风丸治大风

川当归 羌活 独活

川芎 天麻 细辛

防风 荆芥 威灵仙

麻黄 何首乌 石京子

牛旁子 车前子 皱面草【即地松】 苍耳子【各一两】

右皆不见火晒乾为细末酒煮麵糊为丸如梧桐子大每服三十丸食前温酒下服後煎药熏洗

加减大造苦参丸治大风疮及诸风赤白癜风

苦参【一斤】 防风 荆芥

苍耳子 胡麻子【半生半熟】 皂角刺【各十两】 蔓荆子 牛旁子 黄荆子

枸?子 何首乌 禹余粮

蛇床子【各三两】 香白芷【一两半】 薄荷

生地黄【各一两】

右为细末用皂角捣烂熬膏入前药匀为丸丸如梧桐子大每服五十丸茶酒任下

一方治大风眉毛脱落肌肤拆裂

用防风通圣散加苦参天麻蝉蜕早晚各一服至百贴必愈忌房事盐酱荤腥生冷油腻之物

一方治大麻风

苦参【酒浸一宿】 牙皂【一两】 龟板【一个酥炙】

僵蚕【一钱】 全蝎【去头尾一钱】 轻粉【三分】

全付鷲毛【锅内炒化放於地上出火毒】

共为末每服一钱好酒调下每日早晚各一服

一方治大麻风洗药

苦参 荆芥 防风

白芷 独活 羌活

藁本【各一两】 落阳花【四两用烧酒一斤浸一宿酒不用】

右?咀匀作三次煎水洗汗出为度

防风通圣散【方见中风门】

当归括痛汤治大麻风两足血风疮痛痒等证【方见脚气门】

癩风

癩风方

鸡子一枚用酸醋浸一宿

右以针刺小穿沥清汁入砒末并绿豆末少许夹和先以石札擦破次用青布蘸擦妙

治赤癩白癩方

硫黄 明白矾【并生】

右为末姜汁调茄蒂蘸擦两三次

癩风方

?黄 硫黄 黄骨丹

蜜陀僧 大南星

右等分为末先用姜汁擦患处次用姜蘸药末擦擦後渐黑次日再擦黑散则无事矣

附诸方

苍耳丸治诸风及诸风癰疹白紫癩风

五月五日割取苍耳草叶洗净晒乾为末炼蜜丸如梧桐子大每服十丸日三服若身体有风处或如麻豆粒此为风毒出也可以针刺黄汁出尽乃止

灵草丹治一切风疾及癰疹紫白癩风痛痒顽麻采紫背浮萍草摊於竹筛内下着水晒乾为细末炼蜜丸如弹子大每服一丸用黑豆淋酒化下及治脚气打扑伤损浑身麻痺

诸风应効酒治一切诸般风湿痹遍身骨节疼痛紫白癰风神効【方见历节门】

附汗斑方

一方治汗斑紫白色者

用白附子硫黄各等分为细末以茄带蘸醋粘末擦

一方

用夏枯草浓煎水日洗数次

肥皂方去白癰黑?白癰诸般疮?令人面色好

白芷 白附子 白殭蚕

白芨 猪牙皂角 白蒺?

白斂 草乌 山查

甘松 白丁香 大黄

藁本 鹤白 杏仁

豆粉【各一两】 猪脂【去膜三两】 轻粉

蜜陀僧 樟脑【各半两】 孩儿茶【三钱】

肥皂【去里外皮筋并子只要淨肉一茶盏】

右先将淨肥皂肉捣烂用鸡清和晒去气息将各药为末同肥皂猪脂鸡清和为丸

一方

用生小茄儿分为节擦之三五次効

诸疮

诸疮方论

诸疮虽不能害人然浸淫无已亦有多年不获愈者此皆心肾不济饮食不节肠胃停留以致风毒与血气抟凝滞於肌肉之间而发露也其名目疗治有异焉凡人体虚感受风热湿毒之气发为疮疡痒痛焮肿身热多汗是为恶疮或生於手足间相对如新茱萸痒痛拆裂搔则黄汁淋漓有孔如痈久而生虫是为蜗疮或初生如饭粒渐大而有根头破血流浓出肉反如花开之状是为反花疮或初生甚小先痒後痛汁出浸淫湿烂肌肉延至遍身若从口发出流散四肢者轻若从四肢发生然後入口者重是为浸淫疮或生於两耳鼻面间及下部诸窍侵蚀筋络月中则疮盛月末则疮衰以其随月而生是为月蚀疮【小儿耳下疮亦名月蚀】或毒气攻於手足指弩肉裹上指甲疼痛出血疮中有虫是为甲姐疮或指头先肿焮热掣痛然後於爪甲边结脓甚者爪甲俱脱是为代指或人禀性畏漆见漆则中毒面痒而肿遶眼微赤痒处搔之随起??重者遍身如豆如杏脓焮作痛是为漆疮或盛夏腠理易开风热毒气抟於皮肤轻者状如撒粟重者热汗浸渍匝匝成疮曰痂疮或心神鬱燥遍身发疮多出脓血赤烂如火曰热疮或身触风寒冷气以致血澁不行其疮顽滞不知痛痒经久难瘥曰冷疮或身发疮肿非痛非疽非癣非疥状如恶疮或瘥或剧曰无名疮或头生白团班剥如癣上有白皮久则成痂遂至满头疮中有孔有脓细虫入里不痛微痒少长不瘥曰秃疮或风热毒气流注两脚生疮肿烂疼痛步履艰难惟生於膝骨者为重曰膝疮以其骨上肉少皮薄难愈至有多年无已疮口开阔皮烂骨现臭秽可畏者先当取虫然後傅药或淫夫龟上生疮初发如粟拂之则痛由是出清脓作白孔侵蚀臭烂日渐大痛曰妬精疮以妇人先有宿精在内或月水未断与之交接滌秽不前傅气而作妇人亦有生於玉门者曰陰蚀疮或满颊满项发如豆梅痒而多汁延蔓两耳内外湿烂如浸淫疮之状曰走皮?疮田野呼为悲羊疮已上数种名目不同治各有方条列於後

诸疮证治

桑螵蛸散治诸恶疮

桑螵蛸 地龙 贝母

厚黄栢【各半两】 虢丹【煨】 乳香【各一分】

粳米粉【二钱】 ?黄 轻粉【各一钱】

麝香【半钱】

右细末以不食井水和沙糖调傅

又方

蜘蛛晒为末麻油轻粉调傅

乳香蜡油膏治蜗疮久不瘥

杏仁【水浸去皮晒】 乳香【各三钱】 硫黄

轻粉【各一钱半】 蜡【半两】 麻油【一合】

右研极细先熬油沸入蜡溶尽次入诸药煎搅成膏冷地出火毒磁器收用

又方

燕窠取抱子处土为末掺先以白芷大腹皮煎汤洗拭後掺

胭脂散治反花疮

胭脂 贝母 胡粉【各一分】

硼砂 没药【各半分】

右末研细先以温浆水洗拭後傳药

苦练散治浸淫疮

苦练根【日乾烧存性】

右为末猪脂调傳湿则掺先用苦参大腹皮煎汤洗

胡粉散治月蚀疮

胡粉【炒微黄】 白矾【煨】 虢丹【煨】

黄连【淨】 轻粉【各二钱】 胭脂【一钱】

麝【少许】

右末先以温浆水入盐洗拭後掺药如疮乾麻油调 傳

綠矾散治甲疮

绿矾【半两烧熟】 芦会【一钱半】 麝【一字】

右研如粉以绢袋盛药纳所患指於袋中线札定瘥为度

乌梅醋法治代指手指甲头肿

乌梅【搥去壳肉只取仁】

右研细米醋调得所入指溃之自愈

又方

中样蚯蚓和猪脂捣如泥傅

漆疮方

生蟹取黄随疮大小徧傅之

又方腊茶用麻油调涂 又方鸡子中黄打开涂又方磨铁槽中取泥涂磨刀石下泥亦得

滑石粉治痂疮

绿豆粉【二两焙透】 软滑石【一两研】

右末拌和以绵扑子蘸扑仍以石粉佐之

紫草膏治热疮

紫草茸 黄连 黄栢

漏芦【各半两】 赤小豆 缘豆粉【各一合】

右捣细入麻油为膏日三傅常服黄连阿胶圆清心

又方治热疮淫湿

南星 半夏 黄栢

黄连【各一分】 五倍子【煨】 号丹【各半分】

右细末掺痒加煨白矾更痒加?黄

又方热疮止痛收汁先用大腹皮苦参白芷煎汤泡荆芥洗次用

地榆 苦参 黄连【等分】

右为细末入些真蚌粉乾掺更去皮绿豆

㝱榔散治冷疮

鸡心㝱榔 木香 硫黄

姜黄【各半两】 吴茱萸【二钱】 麝【一字】

右捣末麻油调傅有脓则乾掺

赤豆散治无名疮

赤小豆 吴茱萸 赤色白胶

厚黄栢 黄连 贝母

硫黄 糯米【焙各一分】 麝丹【煨半分】

右末麻油轻粉调抹槐枝煎汤先洗後抹

乌羊膏治头白秃疮及恶疮𦔁疮

獐猪粪【腊月收烧灰半两】 㝱榔【二钱】

㝱黄【一钱】

右末先以麻油调和鸭子清约头大小作厚饼温覆头上引虫不可热覆不得动头待十分痒忍不得令人急手揭起次用苦练根煎汤淋洗拭净湿则掺乾则麻油轻粉调抹

治头烂疮燕窠土为末掺

竹叶膏治两脚骨𦔁疮先用

小网虾【三十尾去头殼尾】

右同糯米饭一合研细临卧以帛扎患处上下次以青纱罩疮却将虾饭传青纱上别用青纱罩虾饭之上系定至五更初解纱连虾饭揭起挂空闲处皆是小赤虫即以汉椒葱白煎汤候温淋洗次用旧茶笼内白竹叶随疮大小剪贴软帛系之一日两换直待汁水出尽方以好膏药贴逐日煎苦练根汤淋洗仍换膏药直待生肉将满则不用膏药其疮口只如筋尾许乃可以血竭或降真香节夹白歛收平疮口切忌动风发气等物

又廉疮方先用荆芥葱头入白盐少许煎汤洗拭次用

？黄 雌黄 硫黄

白矾【煨各二钱】 鹰爪黄连【去须】 厚黄栢【各三钱】 轻粉【半钱】
虢丹【煨二钱】

右并细末外用麻油一酒盏煎巴豆肉二钱滤清笔蘸抹药末掺其上妙甚

又方先用桑叶白芷煎汤洗拭次用

木香 ？榔 五倍子

白芷 贝母【等分末掺】

又方

獐猪粪【烧带性半两】 鸡心？榔【三钱】 真龙骨【二钱】

轻粉【一字】

右末麻油调傅先盐汤洗拭後用药两日一换

又方

中鲫鱼【二尾洗净】

满尺皂角【一条擘开两片夹鲫鱼用麻扎煨乾烧存性】 穿山甲【炙焦入皂角内二钱】

右细末先以井花水洗尽脓汁用白竹叶一叶针插多孔缚於疮上候水出尽然以麻油轻粉调药傅

又方先用酸浆水温煖淋洗次用

生覆盆子叶【瓦上煨乾】

右碾极细乾掺纱扎次日以新水湿去痂又用温浆水洗拭掺药

麝香散治妬精疮

青黛乾 欵冬花【等分】 麝【少许】

右末先以地骨皮桑白皮煎汤温洗软帛拭乾次以津唾调药傅

又方久年册皮青纸以津唾粘湿贴上明日又重贴勿动自愈旧青纸盖取青黛凉而煞虫纸无性耳

治陰汗湿痒方

绿色炉甘石【一分】 真蚌粉【半分】

右细末扑傅

豆坯散治陰蚀疮

绿豆粉 虾蟆灰【各一分】 麝脂【半分】

右细末乾掺

神降散治走皮?桑寄生一小把木 桑根取皮一握白芷黄连煎汤温和以帛蘸洗候露出尽拭乾傅药

满尺皂角【去弦核烧存性】 麻竹大箨【烧存性】 厚黄栢 鹰爪黄连 瓜樟叶【乾】

白芷

右逐件为末等分麻油调抹自然生 神效谨勿吃醋

又?疮发歇不止

凌霄藤并叶煎汤温洗凌霄傍松栢 生数次洗效

蜡矾圆【方见痈疽门】 诸疮皆可服内消其毒凡洗疮须用药草煎汤

疎风解毒散治诸恶疮顽痒閤热及妇人血风遍身红斑圆点斑中渐发疹癩开烂成疮痒痛

白芷 细辛 蒺藜【炒去刺】

麻黄【去节】 鸡心?榔 当归须

生乾地黄 川芎 赤芍药

川独活 牵牛【微炒取仁】 苍术【炒】

桑白皮【炒】 枳殼【制】 甘草【微炙等分】

右剉散每服三钱入黑豆七十粒紫苏五叶姜五片同煎服如大便秘加些生大黄次用贝母膏傅疮

贝母膏

贝母【三钱半】 半夏【生】 南星

五倍子 白芷 厚黄栢

苦参【各二钱半】 虢丹【煨一钱半】 ?黄【一钱】

右细末初用蜜水调傅两三次後只乾摻先以蜂房白芷苦参大腹皮荆芥煎汤熏洗拭乾即用药或间有留滞不瘥以好膏药贴

恶疮方

赤色白胶【一钱】 明白矾【三钱】 黄色黄丹【半钱】

右细末麻油调傅先以酸浆水煖过洗疮拭乾用

又方贝母为末入些?黄摻

又方治久不瘥

透明硫黄 黄连【等分】

右细末以鸡子清一个打碎铺新瓦上焙为末夹上项药麻油轻粉调傅先用白芷葱头煎洗

诸疮头疮方

满尺皂角【去弦核一铤】 黄连【净半两】

赤色白胶 五倍子【各三钱】 蛇床【一钱】

黄丹【煨二钱】 轻粉【半钱】

右细末先用柳枝煎汤洗拭後掺或用黄连半两蛇床一分晒乾为末麻油轻粉调傅

又头疮方

黄连【为末用麻油轻粉调得所摊於碗中将艾一撮烧烟碗覆其上熏之续再加艾熏用】

治头秃疮方

五灵脂 白矾 白芷

青黛 好草乌【各一分】

右为末麻油调傅

头痹头脑方头枕後生正者为脑侧者为痹

轻浮白浮石【烧存性各半】

右麻油轻粉调鸡羽刷上勿用手按即涨或用黄牛粪於瓦上焙乾加之尤好亦治头

治 方

大乾芭蕉叶【熨斗内烧存性】

右为末麻油轻粉打和傅 留头以软纱贴换易三次或散或破无痕

又方

穿山甲 蚌粉【同炒】

右末麻油轻粉调傅

胎?头热红饼疮方

生艾 白芷 大腹皮

连根葱

右煎汤洗拭以生蓝青叶入些生艾捣细蜜水为膏傅亦治恶疮

又恶疮方

硫黄 黄连【净末各一分】 黄丹

赤白胶 蛇床 樟脑

发灰【各半分】

右末湿则掺乾则麻油调传

又方

白矾【煨】 五倍子 厚黄栢

黄连【净】 黄丹【煨】 海螵蛸

贝母【等分】

右为末入麝少许掺痛则加地榆痒则加苦参

又方用贝母膏【方见诸恶疮类】加黄连蜂房烂石膏尤好或用麻油膩粉调抹本方内去?黄

白秃头方?猪胆汁半入法醋须以鸡羽扫傅

附诸方

当归饮子治心血凝滞内蕴风热发见皮肤遍身疮疥或肿痒脓水浸淫或发赤疹?瘤

当归 川芎 芍药

地黄 防风 白蒺藜【炒去刺】 荆芥穗【各一钱七分】 何首乌 黄耆

甘草【各八分半】

右?咀分二贴每贴水二盏姜三片煎八分温服

连翘饮治诸恶疮痛痒不定心烦口乾及妇人血风红斑圆点开烂成疮流黄汁

川芎 当归 芍药

地黄 防风 荆芥

连翘 牛蒡子【炒研破】 山梔

黄芩 瞿麦 木通

瓜蒌根 麦门冬【去心】 甘草【各等分】

右?咀每贴七钱水二盏灯心二十茎同煎八分服

一方治一切疥疮

?黄【五钱】 樟脑【五分】 大枫子【取肉】

斑猫【去足翅炒各十双】 狗脊 蛇床子

寒水石 硫黄【各五钱】

右为极细末疥疮用柏油调搽癣疮用栝油调搽

一方治疥疮神效

大枫子肉 樟脑【各一两】 水银

皂矾【各一钱】 油核桃肉 柏烛油

先将大风子捣烂次加樟脑水银皂矾核桃碾和为末再将柏油熬化入药和匀抓破疮搽之
効

一方治冻烂脚成疮

黑附子【生去皮脐】

右为末?水调贴

白歛散治冻耳成疮痒痛

黄栢 白歛【各五钱】

右为末先汤洗次用香油调傅

治手足皴裂方

沥青二两黄蜡一两共熬搅匀瓦罐盛贮先以热汤洗令皮软拭乾将药於慢火上略炙擦傅

一方治手足皴裂春夏不愈者

生姜汁 红糟 盐

猪膏【腊月者佳】

右研烂炒熟擦入皴内一时虽痛少须使皮软皴合再擦即安

一方治脚跟皴

用头发一大握桐油一椀於瓦器内熬候油沸头发化烂出火摊冷以瓦器收贮勿令灰入每用百沸汤泡洗皴裂令软拭乾傅其上即安一方加米粉

附杨梅疮方

防风通圣散治杨梅疮初起疼痛增寒壮热【方见中风门】本方每服加山牛四两如汗多去麻黄大便溏去硝黄服之

又方

冷饭团【一名土茯苓】五加皮 白藓皮

防风 白芍药 木瓜【各一两半】

皂角 白丑【各三十粒】 生地黄【酒洗】

地骨皮 牛膝 黄连

槐花 川芎 寻风藤

蕨灵仙 白茯苓 杜仲【炒断丝】

白芷 当归【酒浸洗各一两】 甘草【炙半两】

荆芥穗【一两半】

右?咀作二十服每服用水一钟酒一钟煎至一钟在上食後服在下食前服忌牛肉

又方

当归 连翘 羌活

荆芥穗 薄荷叶 枳壳

黄柏 茯苓 车前子

防风 木通 芍药

川芎【头上用】 山梔 桔梗

天花粉 僵蚕 白芷

甘草 金银花 独活【各一两】

柴胡 前胡【各半两】

右?咀作二十服每服用水二钟煎至八分温服上多食後服下多食前服服此仍用熏药并治

一方治杨梅疮神効

人参 白术 当归

生地黄【各一钱二分】 防风【一钱五分】 木通

苦参 川芎 连翘

薏苡仁【各一钱】 木瓜 皂角刺

天花粉【各八分】 甘草 羌活

青风藤【各五分】 白藓皮【一钱】 山牛【三两】

金银花【一钱八分】

右?咀每服水三碗煎至二碗一次用渣并二次忌烧酒茶牛肉

薰杨梅疮方

?黄 沉香【各三分】 乳香

没药 朱砂【各五分】 血竭【三分】

黑铅 水银【各一钱】

右为末均作纸捻七条用香油点灯放床上令病人两腿抱住上用单被通身盖之口噙冷水频频换之则不损口头一日用三条後每日用一条薰之有效

一方治杨梅痈漏肿块

杜枸?子 防风 牛膝

牙皂 枳殼 当归

连翘 苦参 蓼栗壳

僵蚕 赤芍药 杜仲

荆芥 白藓皮 川芎

皂角刺 木瓜 防已

薏苡仁 天麻 木通

金银花 茯苓【各等分】 黄栢

牛旁子

右?咀每服一两加冷饭团四两用水五碗煎三碗病在上食後服病在下食前服忌食鸡鱼牛肉煎炒虚者人参服之神効外用秘传止血定痛生肌散掺之去腐生新收口【方见折伤门】

疥癬

疥癬方论

疥与癬风毒客於肌肤所致也风毒之浮浅者为疥风毒之沉深者为癬疥则多因风毒挟热得之癬则多因风毒挟湿得之疥发於手足或至於遍身癬则肌肉癰疹或圆或斜或如苔莓走散内藏汁而外有筐二者莫不均有虫也亦莫不易为之染触也焮赤痒痛作疮有脓曰大疥隐起带根搔不知痛曰马疥??含浆摘破出水曰水疥痒而搔之皮起乾痂曰乾疥薄皮小疮常常淫汁曰湿疥此疥之名目自然也乾癬则搔出白屑索然雕枯湿癬则淫如虫行搔之多汁风癬则爪擦痒顽不知痛痒牛癬则状如牛领皮厚而坚其若时作微痒白点相连是之谓狗癬轮廓全无纵横不定是之谓刀癬此癬之种类然也疥癬治法驱风杀虫固也然杀?於其外亦须以硫黄轻粉蜡矾圆辈服饵而内济之庶絶其根矣若夫肿而湿者有热槁而乾者无热用药加減又当权衡

疥癬证治

诸疥方

透明生硫黄【半两】 明白矾【煨二钱半】 白叶【一叶去中心骨烧存性】

右末麻油轻粉调抹

又方 疥癬方

硫黄 明矾【煨各半两】 黄连【淨七钱半】

雌黄 胡粉 蛇床【各二钱半】

右细末猪膏稀调抹

又方

生明硫黄【半两】 黄丹 樟脑【各一钱】

轻粉【半钱】

右末乾擦热疥赤肿加荆芥

又方

生明硫黄【半两】 烂石膏【二钱】 黄丹【一钱】

右末麻油调抹

湿疥方

生明硫黄【半两】 胡粉 黄丹【各二钱】

右末乾擦

疥癣恶疮方

满尺不蛀皂角【三条炙去弦核为末米醋二大盏煮如铅胶滤清汁】

右入黄连末半两轻粉二钱调抹太学全蝎散治疮疥【方见痒门】

诸癣妙方

斑猫【二十一枚生用】 明硫黄 藜芦【各三钱】

轻粉【一钱半】

右细末麻油调擦

又方

鲫鱼【一头】 生发【一鸡子大】 明硫黄

硫黄【各半两】 生猪脂【四两】

右件先煮猪脂溶沸即入鲫鱼煎令烟尽次入发销尽滤清即入硫黄硫黄末拌和磁器收用

又方

草乌头【不去皮尖截小块一半用猪脂煮令浮黄一半用盐炒令焦黄】

右末酒?糊圆桐子大每十五圆茶酒任下亦治诸风顽痹

王医师癖方先用川椒连根葱紫苏茎煎汤温洗次用

吴茱萸 生半夏 草乌

白芷 赤小豆【等分】

右细末米醋夹生蜜稀调傅

又恶癖方

紫背草入生明矾研细傅两三次断根

又久癖方

生硫黄 消石 明矾【煨各半两】

?黄 雌黄【各二钱半】 轻粉【一钱】

右细末好麻油调傅湿则掺

又方猪脂蘸真膩粉擦○小儿癖猪脊骨髓条研和膩粉傅

乾癖方

狼毒 草乌头【各二钱半】 斑猫【七枚去翅足】

右生为末津唾调抹

湿癖方

明矾【煨】 黄连【各半两】 胡粉

黄丹 水银【各二钱】

右末用猪脂油二两夹研令水银星尽散磁盒收用

又方

斑猫【去头足糯米炒去米】

右为末以淮枣荡软取肉研圆津唾调抹

牛皮癬方旧皮鞋底烧存性麻油轻粉调抹

又癬方石榴根取皮蘸明矾末擦切莫用醋则虫沉也轻粉治癬方五更吃炙牛肉一片细嚼下少刻以真轻粉醇酒调下

遍身牛皮癬方

川乌 草乌【去皮尖】 何首乌

白芷 苏木【等分】

右截小片腊月猪脂油煮焦候冷入盐少许磁器收时常挑一匙酒调空心服

又方雌黄末入轻粉猪膏调抹

附诸方

连粉散风癬湿疮并皆治之

黄连 膩粉 黄栢

黄丹 枯白矾【各一钱】 轻粉

龙骨 芦甘石【各五分】

右为细末每用少许湿则乾搽乾则香油调搽

碧玉散治癬

铜绿 硼砂 白矾【各等分】

右为细末香油调搽

又方

防风通圣散去硝黄加浮萍皂角刺服又用紫苏樟脑苍耳浮萍煎汤洗

又方

浮萍 苍耳 苍术【各一两】

苦参【一两半】 黄芩【半两】 香附【二钱半】

右用酒糊为丸

一方治癣神効

巴豆【十粒】 黑枣【五个】

共捣为烂搽之立効

一方治诸癣神効

川槿皮 剪草 木鳖子【各等分】

右为细末用醋调涂之即愈

仁斋直指卷二十四

卷二十五

<子部,医家类,仁斋直指

钦定四库全书

仁斋直指卷二十五 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

诸虫【附折伤】

诸虫方论

经云人身中有八万尸虫若无即人身不成不立尸虫与人俱生状如马尾或如薄筋出则在脾入则五脏之俞居之然人亦不必尽有有亦不必尽多也古人论脏腑九虫多寡有无固未可必亦当备识其名目九虫者何一曰伏虫二曰白虫三曰肉虫四曰肺虫五曰胃虫六曰弱虫七曰赤虫八曰蛲虫九曰蛭虫蛭虫俗谓之食虫固不待辨而知矣其他皆由脏腑不实脾胃俱虚杂食生冷甘肥油腻咸藏等物节宣不时腐败停滞所以发动虫之为候呕恶吐涎口出清沫痛有去来乍作乍止寸白虫色白形扁摸人精气力乏腰痛蛲虫细如菜虫能为痔瘻疮癩疥癰疽等患寸白蛲蛭是三者皆九虫数中之一物也外此又有儿童疳?昏睡烦燥鼻烂汁臭齿龈生疮下利黑血支集疳论附之其伤寒湿?证候虫食下部为狐下唇有疮虫食其脏为惑上唇有疮活人总括言之详矣

诸虫证治

茺莢散取诸虫

鸡心?榔【三钱】 茺莢【二钱】 木香【一钱】

右末为一服当晚先煎酸石榴根汤至五更吃炙肉一片嚼细引虫上至喉以石榴根汤煖温调药服虫自软而下

木香?榔圆杀下诸虫

鸡心?榔【一两】 木香 鹤虱

贯衆 錫灰 乾漆【烧烟尽】

史君子肉【各半两】轻粉【二钱】雷圆

巴豆肉【各二钱半】

右细末飞白麪糊圆麻子大每服二十粒五更粥饮下或昌蒲石榴根煎汤下

锡灰圆取寸白诸虫

锡灰【研细末一两】鸡心?榔贯衆【各半两】

木香【二钱半】轻粉黄丹【为衣各二钱】

右细末酒醋煮麪糊圆荔枝乾大每一圆米泔浸软日衙先吃饭了至黄昏不饥饱时吃肉舖一片引虫俟少刻温酒嚼下天明虫出又专吃蕪菜治寸白虫

虾蟇圆杀虫

大虾蟇乾【一个炙令焦】木香

鸡心?榔桃仁【水浸去皮晒】苦楝根

酸石榴根皮贯衆【各三钱】茺葍

鹤虱【各二钱】巴豆肉【二钱半】

右末粳米粉糊研圆麻子大每服十圆五更石昌蒲煎汤下

?砂圆杀诸虫

鹤虱茺葍乾漆【炒令烟尽】

直僵蚕【炒各三钱】贯衆

酸石榴根皮【日乾各半两】朱砂

?黄雷圆甘遂【各一钱半】

右细末粳米粉糊圆麻子大每十圆五更粥饮下

化虫散

雷圆【二个】 鸡心?榔【二个】 鹤虱【一钱】

大史君子【七个去壳】

右细末入轻粉少许分作两服当晚用精猪肉一两切成片以皂角浆浸一宿至五更微火炙熟又用些麻油拭肉候温取一服药末掺於肉上略烘过空腹食之至巳刻虫自下迺饮食

贯衆酒取寸白诸虫五更嚼炙肉一片莫吞俟虫寻肉其头向上却吐出肉嚼史君子三个并轻粉一字吞下少顷以当晚所煎贯衆酒吞解毒?黄圆七粒泻下皆虫也

酒蜡膏杀诸虫

醇酒【一盞】 蜜【一合】 蜡【三钱】

蜀漆【一两】

右铜铫内慢火同熬可圆即圆弹子大每服一圆温酒化开拂晓服之虫自下

附诸方

万应丸下诸虫

?榔【五钱末】 大黄【八两末】 黑牵牛【四两末】 皂角【十定用不蛀者】
苦楝根皮【一斤】

右件将皂角苦楝根皮二味用水一大碗熬成膏子一处搜和前药二味研细末为衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三丸四更时分用沙糖水送下

一方取寸白虫

紫?榔【十个】 向阳石榴皮【七十片】

右水煎露一宿以下虫为度

一方治吐虫有积

黑锡灰?榔

右为末米饮调下

木香三棱散【瑞竹】治腹中有虫面色痿黄一切积滞

黑牵牛【半生半取末五钱】大腹子【二钱】

诃榔 雷丸 锡灰【醋炒】

三棱【煨】 诃术【煨】 木香【二钱】

大黄【二钱】

右为末每服五钱用沙糖水调服先将烧肉一片口中细嚼吐出然後服药一方加阿魏一钱
茺莢仁三钱

一方消化虫毒在腹作痛

诃榔 酸榴根皮【焙乾各一两】

红丹【煨】 雷丸 贯衆【如鸡头者】

君子肉【各二钱】 甘草【炙】 枳殼【制】

大黄【各五钱】

右为末清油打薄鸡子饼抄药一钱於上空心卷而食之小儿糯米糊丸粟米大每服二三十
丸以淡猪肉汁或鸡汁吞下空心亦佳

乌梅丸治胃冷虺虫攻心痛呕吐四肢冷

秘传诃榔散治男妇心脾痛虫痛【方并见脾疼门】

蛊毒

蛊毒方论

害人利己识者不为昧者竞趋之而况伤人性命以图家道之温燠此为富不仁之甚者也夫
蛊毒有数种皆妖魅变惑之气其怪使然人有造作而得之者多取虫蛇之类以盆盎盛之任
其自相噉食其间一物独存则以之为蛊即能变惑随酒食以毒害於人他人受殃则蓄事之

家日益富盛又有一种飞蛊倏尔去来状如鬼气得之卒重吁母怪乎变现惑人之不可晓也凡中蛊毒不论年月远近但煮一鸡卵去壳以小银钗插入其中并含入口一饭之顷取视钗卵俱黑即为中毒又法以水一椀唾津液入水其唾沉则为蛊浮则非蛊又法口含天豆中蛊者豆胀烂而皮脱非蛊则豆不脱烂其候面目青黄力乏身痛唇口乾焦烦躁而闷胃脇妨满肚胀皮坚腹中??切痛如虫啮又如虫行唾吐鲜血小便淋沥大便脓血杂下病人所食之物皆变化而为虫侵蚀脏腑蚀尽则死矣死则病气流注复染着於傍人夫是之谓蛊症

凡中蛊人用药已瘥自後饮食永不得吃冷若饮食带冷鬼气乘之毒虫复生竟不能救

蛊毒证治

治蛊毒挑生毒神呪出大藏经典凡在外饮食先默诵七遍则其毒不行呪曰姑苏琢磨耶琢吾知蛊毒生四角父是穹窿穹母是舍耶女眷属百千万吾今悉知汝摩诃萨摩诃如饮食上有蜘蛛?便莫吃又法每遇所到处念药王万福七遍亦可辟之灸蛊毒於足小指尖处灸三壮即有物出酒得之随酒出饭得之随饭出肉菜得之随肉菜出

保灵丹治蛊毒诸毒一切药毒神妙出刘?子神仙遗论鸡峯普济方一卷凡三处刊

朱砂【净细研一两】 大山豆根【半两】 ?黄

黄丹 麝香 黄药子

续随子【生杵末各二钱半】

川巴豆【肥者二钱半取肉不去油】 斑猫【二钱半去头翅足】 糯米【半炒半生用】
赤蜈蚣【二条一炙一生】

右十味各修治入乳鉢研和於端午重阳腊日修合不令鸡犬妇人见用糯米稀糊圆如圆眼核大陰乾磁合收每服一圆好茶清吞下不得嚼破须臾病人自觉心头如拽断皮条声将次毒物下或自口出或大便出嫩则是血老则成鳖或蛭虻诸杂带命之物药圆凝血并下以水洗净收之可救三人如中毒口噤即挑开下药或蛇蝎马汗诸毒以好醋磨傅患处立解服药已效如知毒害之家不必研究若诉之其毒再发不救瘥後更忌酒肉毒食一月惟软饭可也或急用但择吉日精洁修合

圣惠圆治蛊毒心腹坚痛羸瘠骨立

朱砂【研】 ?黄【研细各七钱半】 藜芦【去芦头】

莽草【微炙】 鬼臼【去须各半两】 肥巴豆肉【十五个去油】 麝香【一钱】

青色大虾蟆【一个烧存性】

斑猫【去翅足三钱糯米炒黄】

右细末炼蜜和捣五百杵圆如小豆大每五圆空心温酒下少刻更吃粥饮一盏利出虫蛇恶物若不吐利更服二丸必效

万病解毒圆治蛊毒挑生毒药毒草毒畜兽毒【方见痈疽门】夷坚志治蛊毒方

五倍子【一两】硫黄【末二钱】甘草【三寸半生半炙透】

丁香 木香【各一钱】轻粉【半钱】

麝香【少许】糯米【二十一粒】

右八味剉细入磁瓶内用水满十分煎取七分候药面带皱皮为熟生绢滤去滓空腹通口服却令病人平正仰睡高起头觉腹中有物冲心者三即不得动若吐出以桶盛之如鱼鳔烂肉之类乃是恶物吐罢吃茶一盏泻亦不妨少进白粥为补忌生冷油腻鮓脯咸藏五日後服万病解毒圆二粒旬日又服二粒自然平复

生漆圆治蛊毒

正料平胃散

右用好生漆和圆桐子大每七十粒空腹温酒下加至百粒

东坡?黄圆治蛊毒及虫蛇畜兽毒

?黄 明白矾【生研等分】

右端午日研细溶黄蜡为圆桐子大每七圆念药王菩萨药上菩萨七遍熟水送下

黄南卫生治蛊毒单方

破鼓皮【烧存性为末新水调二钱服之中蛊者虽昏眊口中言蛊主姓名】

又方

蚕退纸【不拘多少以麻油纸捻烧存性】

右为末研细新水调一钱频服诸中毒面青脉絶昏迷如醉口噤吐血服之即苏

七宝圆治蛊毒

破鼓皮 蚕退纸【各烧存性】 刺蝟皮

五倍子 续随子 朱砂【研】

?黄【研】

右等分为细末糯米稀糊圆桐子大每七圆空心熟水下

又方治蛊毒亦治挑生毒

川升麻细剉一两作一服水煎常服

又方

明矾生末夹好茶水调解百毒

挑生

挑生方论

人苟爱身不可轻於濯水江南有射工毒虫其色黑形如肉窗口中横骨如角弓生溪涧内或因雨潦逐水而入人家含沙射人之影得之寒热闷乱头目俱痛亦如中尸卒不能语又水毒虫一名溪温得之病状与射工相若但有烂疮为射工无疮为溪温特少异耳又沙蝨虫细如疥虫视不得见遇陰雨则行出草间着人身则钻入皮里刺如针芒是三者为病朝轻暮剧皆能杀人以方术灸法麝犀辈治之治之不早变生飞蛊倏入患躯噉食五脏而死矣挑生之毒其类是乎挑生多於饮食过度凡鱼肉果菜茶汤酒醋之中皆可挑毒以中人自岭以南率多有此其候初觉胷腹作痛次则渐渐搅刺十日生於腹中生则能动矣治法胷痛则为生在上膈腹痛则为生在下膈在上膈者用胆矾半钱投入一盞热茶之内候矾溶化通口服之少顷以鸡翎搅刺喉中取吐在下膈者用川郁金二钱末之米汤调下即泻出恶物吐泻以後以人参一分白术茯苓倍之碎为麤末新汲水和入磁瓶中慢火煨至半日每一盞通口服日两三剂前蛊毒挑生呪常须诵之抑有闻焉二广山谷间有草曰胡蔓草亦曰断肠草或以药人急水吞之急死缓水吞之缓死又有取毒蛇杀之以草覆蛇以水洒草数日菌生采取为末入酒毒人始亦无患後再饮酒毒发立死其俗淫妇多偶合北人情好虽稠不肯归北陰以药置食中与之还即叩之曰子某年来若从其说复以药解之若过期不来则毙矣戒之哉戒之哉

挑生证治

万病解毒圆治挑生毒蛊毒药毒草毒金石毒百虫毒蛇畜兽恶毒鬼胎鬼气痈疽诸病一切毒出入可以此药随身若觉意思不快四大不和即磨服之【方见痈疽门】治挑生方

好茶生明矾各一钱沸汤调服即吐毒

中诸毒证治

立胜散治虫蛇蜂蝎蛇蜘蛛沙虫等伤毒

大红川椒【去核十五粒】 豆?【十粒】

右同入口嚼烂唾在手心次将南星末调和得所傅伤处毒水自出续又再傅神效

又方

贝母【为末】

右每服半两令病人尽其酒量剧饮良久酒化为水从伤处出俟出尽又以贝母末塞疮口妙不可言

蠮螋方蠮螋妖虫也隐於墙壁间尿射人之影令人遍体烂疮如汤火所伤治法以

鸡羽【烧存性】

右麻油调傅鸡食百虫故能治之或用燕糞水调傅或南向燕窠自东取土末之新水调傅

天蛇毒方

秦皮浓煎服蚌粉滑石贝母末傅

辟妖魅瘟瘵

朱砂雄黄等分为末法醋调入口鼻

治挑生毒蛊毒野葛毒方

川升麻多煎频服

解诸药毒杀腹内毒虫方

蓝青叶多研水调服

五絕欲死方

半夏末水圆风乾入鼻气回即活

头虱方藜芦末掺发○又方麻油调轻粉涂发

身虱方水银和鹤虱末帛揉之为索系衣自落

独胜散解药毒蛊毒虫蛇诸毒

大甘草节以真麻油浸年岁愈多愈妙

右取甘草嚼或水煎服神効

附跌扑损伤

跌扑损伤方论

珍方云折伤者谓其有所伤於身体者也或为刀斧所刃或坠堕险地打扑身体皆能使血出不止又恐瘀血停积於脏腑结而不散去之不早恐有入腹攻心之患治疗之法须外用敷贴之药散其血止其痛内则用花蘘石散之类化利瘀血然後欸欸调理生肌或因折伤而停鬱其气又当顺之和云诸落马坠井打扑伤损闪肭损折杖疮肿发焮痛不止者可峻下二三十行痛止肿消宜以通经散导水丸等药或加汤剂泻之後服和血消肿散毒之药

花蘘石散【和剂方】治一切金刃所伤打扑伤损身体血出者急於伤处掺药其血自化为黄水如有内损血入脏腑热煎童子小便入酒少许调一钱服之立效若牛觝肠出不损者急送入用细丝桑白皮尖茸为线缝合肚皮缝上掺药血止立活如无桑白皮用生麻缕亦得并不得封裹疮口恐作脓血如疮乾以津液润之然後掺药妇人产後败血不尽恶血奔心胎死腹中胎衣不下并用童子小便调下

硫黄【上色明淨者四两捣为细末】 花蘘石【一两捣为粗末】

右二味相拌和匀先用纸筋和盐泥固济瓦罐子一个候泥乾入药於内再用泥封口候乾安在四方砖 书八卦五行字用炭一秤笼叠固匝自己午时从下着火令渐渐上彻直至经宿火冷炭消又放经宿罐冷取出细研以绢罗子罗至细磁合内盛依前法服

金匱治马坠及一切筋骨损方

大黄【一两切浸成汤下】 緋帛【如手大烧灰】

乱发【如鸡子大烧灰】 炊单布【一尺烧灰】 败蒲【一把二寸】

桃仁【四十九个去皮尖】 甘草【如中指节炙剉】

右七味以童子小便量多少煎汤成内酒一大盏次下大黄去滓分温三服先剉败蒲席半领煎汤浴衣被处斯须通利数行痛楚立瘥

复元活血汤【发明方】 治从高堕下恶血留於脇下疼痛实不可忍者

柴胡【半两】 当归【六钱】 甘草

川山甲【炮各二钱】 大黄【酒浸一两】 桃仁【去皮尖五十个】

红花 瓜蒌根【各二钱】

右件桃仁研烂余药剉如麻豆大每服一两水二盏半酒半盏煎至七分去滓食前大温服以利为度得利後痛或不尽服乳香神应散灵枢云坠堕恶血留於脇下则伤肝肝胆之经行於脇下属厥陰少阳宜以柴胡为引用为君以当归活血脉又急者痛也以甘草缓其急亦能生新血阳生陰长故也为臣川山甲瓜蒌根桃仁红花破血润血为之佐大黄酒制以荡涤败血为之使

地龙散治腰?痛或打扑损伤从高堕下恶血留在太阳经中令人腰?或胫膕臂腰中痛不可忍

中桂 地龙【各四分】 羌活【二钱】

黄栢 甘草【各一钱】 苏木【六分】

麻黄【五分】 桃仁【六个】 归梢【一分】

右?咀每服半两水二盏煎至一盏去滓温服

补损当归散疗坠马落车伤腕折臂疼痛服此药疼痛即止筋骨即当相连

泽兰【炒】 附子【炮各一钱】 当归【炒】

蜀极【炒】 甘草【炙】 桂心【各三分】

芎藭【炒六分】

右为细末每服二钱温酒调服日三忌生葱猪肉冷水生果

接骨丹

没药 乳香 当归

川椒 自然铜【醋淬】 赤芍药

败龟【炙】 虎骨 白芷

骨碎补【炙】 千金藤【郁李仁是也各等分】

又方加龙骨川芎

右为细末化腊半两丸如弹子大每服一丸好酒半升化开煎用东南柳枝搅散热服

秘传止血定痛生肌散专治跌打损伤牙咬刀伤出血诸般肿毒出脓後肌肉不生痛不止者并皆治之【方见破伤风门】

一方治刀伤斧斫

五倍子一味为末乾贴神効

桑叶陰乾为末乾贴如无旋熨乾末贴之妙

汤火疮

用腊月猪胆涂黄栢炙乾为末傅之

一方治火烧

桐油 水【各二钱】

右二件以桃柳枝不住手搅成膏再入少水溶外用猫儿肚底毛细剪掺上

一方治汤火伤未成疮者

用小麦炒黑为度研为末膩粉減半油调涂之

四黄散【澹疗方】治汤荡火烧热疮连痛

大黄 黄连 黄蘗

黄芩 白芨【各等分】

右为末水调成膏以鸡翎时涂疮上

治汤火疮【澹疗方】

用螺蛳殼多年乾白者火煨为末如疮破用乾摻之如不破轻粉清油调傅之

仁斋直指卷二十五

卷二十六

钦定四库全书

仁斋直指卷二十六 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

妇人【附 子嗣】

产妇伤寒方论

或问妇人伤寒可得闻乎曰伤寒三百九十七条一百一十三方此张氏截然之笔削也於某证则有某药曷尝以男女为别哉要之月事去来产前产後男子所无请发明其蕴以解世俗之惑盖妇人以血为主发热恶寒经水适来经日热除而胃满讖语者是则邪气结於胃脇当刺期门随其实而取之伤风经日续生寒热发作似疟而经水适断者是则血结而不行当以小柴胡汤散之所谓治之而愈者此也至如伤寒发热经水适来昼醒暮讖如见怪状是则里无留邪热随血散所谓不治自愈者此也前乎吐血下血两条并以犀角地黄汤桃仁承气汤抵当汤丸之类言之详矣抑产前产後治法将何择焉曰产前安胎产後消瘀於是遵依条例斟酌轻重而调理之安胎者何桑寄生阿胶缩砂为要药他如桂枝半夏桃仁大黄堕胎及燥热等辈则不可轻用也消瘀者何川芎蒲黄赤芍药生地黄为要药他如内补拦住败血之剂则不可轻进也朱氏以阿胶桑寄生人参茯苓白术等为细末糯米饮调剂为孕妇安胎以红花一分官桂芍药甘草半之姜枣同煎为解表消瘀以葱白生姜大剂浓汁为产前发散以小柴胡汤去半夏和解热入子宫郭稽中以枳壳防风一度甘草减半末之点服主大便秘澁又以蜜导一法真可活人然则产妇证治观此可以问津索涂矣虽然知安胎则不可不调气知消瘀则不可不扶虚枳壳香附陈皮以调气也当归川芎黄耆人参以扶虚也退热则柴胡黄芩解肌则紫苏乾葛滋肠则麻仁枳壳助阳则乾姜良姜其间采摭虽未备古人之经然而甘辛为阳酸苦为陰皆不越古人之意姑存之篇末以便学者之观览云

妇人论

男女均有此血气人皆曰妇人以血为本何邪盖其血胜於气耳血藏於肝流注子脏而主其血者在心上为乳汁下为月水合精而为胞胎独非血乎血之所以流畅於经络者气实使之又不可举一而遗一也女子十四而天癸至【男子二八天癸至精气溢泻冲任二脉男女均有】任脉通太冲之脉盛故月候以时而行冲任者血之海也月候者经络之余也经言其常其来有期无过不及反此皆病其不行则尤甚百病生焉○自其血气和平陰阳调顺则精血聚而胞胎成胞胎已成而心肾二脉其动也应手而疾盖心之所主者血肾之所主者精精血交并而成之精胜则为男血胜则为女此亦自然之理也○自其血气不调陰阳愆伏过於阳

则经脉前期而来过於陰则经脉後期而至盖血性得热则宣流得寒则凝滯陰气乘阳内寒血滯故其来乍少阳气乘陰血热流散故其来乍多过与不及皆致病也○然经脉不行其候有三一则血气盛实经络遏闭其脉滑实见之【当通经疎利】一则形体憔悴经络涸竭其脉虚弱见之【当滋养血气】一则风冷内伤七情内贼以致经络痺滯其脉浮濇见之【解散风冷去瘀生热】经脉不行此诸病之所由生也○是故血虚关热盗汗筋挛则为虚劳血少水涸燥气乘肺则为乾嗽宿寒留滯血与气搏则为腹痛败血结块时发寒热则为瘕症或风寒滯经血化为水流溢四肢谓之血分或脾不制水血与水并浮胀肌肉谓之虚肿或冲任气虚内慾过度风邪冷热诸气入於胞门秽液与血相兼而下冷则多白热则多赤冷热不调赤白相半谓之赤白带或冲任劳损经海伤动脾虚卫弱不能约制其血倏然暴下谓之崩中亦有非时血行淋漓不断谓之漏下崩之中复有瘀血时崩时止谓之崩中漏下【所下五色各应五脏五脏俱虚五色俱下妇人血海挟受风邪不换金正气散加川芎官桂主之】以至眩晕烦闷呕恶怔忡迷乱多忘发狂妄语小便不禁此妇人以血受病最多而血之为病遇夜愈增剧也【血属陰陰虚则夜争】○然则产育一科可得闻乎曰产前之病其脉贵乎实产後之病其脉贵乎虚产前为之顺气安胎产後为之扶虚消瘀此其要也抑产育之後血衰气弱宿瘀未尽饮食起居梳洗解脱一有不谨得病犹甚易焉凡妇人血气诸疾但用四物汤加以炒吴茱萸主之陰脏加多阳脏加少无不効者若产难若胎衣不下若胎损腹中则入醋夹煎或生料五积散加芎归缩砂煎之以水醋或局方黑神散用乳香煎汤调下皆其类耳外此则有芎归汤佐以缩砂调理胎妇腹痛或胎动下血更以炒阿胶并熟艾济之至若胎妇喘咳则缩砂川芎炒阿胶等分入生姜乌梅紫苏梗最良胎妇艰食则调气散枳殼散等分入缩砂为妙大小产後津液涸燥滯血停留易至大便秘结枳殼散加炒桃仁用蜜水同煎入醋数沸可也缩胎之剂枳殼缩砂乌药所不可无安胎之剂阿胶缩砂桑寄生又不可阙妇人多因怒气伤胎所以安胎尤莫先於顺气其於产後发热黑神散加川芎荆芥入生姜葱白尤佳产後消瘀黑神散须多服餌至一腊以後腹中略无疼痛方可与四物建中汤辈服之太早则补住败血为害非轻若夫郭稽中所编产宝方论迺来书肆别有经验节本辞简理明此可为产科公据

附调经诸方

丹溪曰经候有枯闭不通者有不及期与过期者有妄行者有色紫黑及淡者有成块者有作疼者夫经不通或因堕胎及多产伤血或因久患潮热销血或因久发盗汗耗血或因脾胃不和饮食少进而不生血或因痢疾失血治宜生血补血除热调胃之剂随证用之或因七情伤心心气停结故血闭而不行宜调心气通心经使血生而经自行矣如虚中有热月事不来以四物汤加黄芩治之常过期者血少也以芎归参术兼痰药治之过期紫黑有块作痛血热也以四物汤加香附黄连过期色淡挟痰者以二陈汤加芎归常不及期者血热也以四物汤加黄芩黄连香附肥人多兼痰药治之血枯经闭者以四物汤加红花桃仁痰多拈住血海地位因而下多者目必渐昏肥人多有之以南星苍术川芎香附作丸服之肥人躯脂满经闭者以导痰汤加芎归黄连不可服地黄泥痰故也如用必以姜汁炒肥人少子亦由痰多脂膜闭塞子宫不能受精而施化也宜服上药瘦人子宫无血精气不聚亦令无子以四物汤养血养陰等药经水未行临经将来作痛者血实也一日瘀血郁滯也以四物汤加桃仁香附黄连红花

或加玄胡索莪术木香有热加柴胡黄芩经水行後而作痛者气血俱虚也以八物汤加减煎服又云血为气之配因气而行成块者气之凝将行而痛者气之滞行後作痛者气血虚也色淡者亦虚也而有水以混之也错经妄行者气之乱也紫者气之热黑则热之甚也今人悉指为风冷而行温热之剂祸不旋踵

四物汤【和剂方】治冲任虚损月水不调常服调益荣卫滋养血气

当归【去芦】 川芎 白芍药

熟乾地黄【酒蒸焙各等分】

右?咀每服四钱水一盞煎八分空心服崩中去血过多者加熟艾煎服

大温经汤【和剂方】治冲任虚损月候不调或来多不已或过期不行或崩中去血过多或经损瘀血停留小腹急痛五心烦热

阿胶【碎炒】 芎穷 当归【去芦】

人参【去芦】 肉桂【去皮】 甘草【炒】

芍药 牡丹皮【各一两】 半夏【二两半】

吴茱萸【二两各汤洗七次】 麦门冬【去心五两半】

右?咀每服三钱水一盞姜五片煎八分空心热服

调经散治经水或前或後或多或少或踰月不至或一月而来皆可服

川归【酒洗一钱半】 麦门冬【去心二钱】

吴茱萸【择去闭目者沸汤泡七次焙乾半钱】 人参【去芦】

半夏【汤泡七次】 白芍药 牡丹皮【去心】

川芎【各一钱】 肉桂【半钱】 阿胶【炒】

甘草【各七分半】

右细切作一服水二盞加生姜三片煎至一盞空心稍热服

逍遥散【和剂方】治血虚烦热月水不调脐胀疼痛痰嗽潮热

甘草【炙半两】 当归【去芦炒】 茯苓【去皮】

芍药 白术 柴胡【去苗各一两】

右?咀每服三钱水一盞煨姜一块薄荷少许煎服不拘时

加減吳茱萸湯治冲任衰弱月候愆期或前或後或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至经脉行时头眩飲食減少气满心忪肌肤不泽悉皆主之

吳茱萸【半兩】 麥門冬 乾姜

白茯苓 牡丹皮 南木香

苦梗【各三錢】 甘草【三錢半】 当归【半兩】

北細辛【一錢半】 防风 官桂【各一分】

半夏【七錢】

右?咀每服四錢水一盞半生薑五片枣子一枚煎至七分去滓空心溫服

桃仁散治婦人月水不調或淋漓不斷斷後復來狀如瀉水四體虛翕不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉體沉重唯欲眠睡多思酸物

桃仁 粉草 半夏【各一两】

赤芍药 生地黄【各三两】 泽兰叶

川牛膝 当归 桂心

牡丹皮 人参 蒲黄

川芎【各兩】

右为粗末每服五大钱水盞半姜三片煎七分空心去滓溫服

牡丹散【和剂方】治血气虚损内则月水不行外发潮热肢体羸困渐成骨蒸并宜服之

桂心 牡丹皮 芍药

玄胡索【炒】 没药【别研】 陈皮【去白】

红花 当归【去芦】 甘草

乌药【各一两】 真蓬莪术 鬼箭

苏木【各二钱半】 乾漆【炒二两】

右咀每服三钱水一盞煎七分不拘时候

内补当归圆治血气虚损月水不调或崩中漏下去血过多肌体羸困及月水将行腰腿痛重并皆治之真蒲黄【炒七钱】 熟地黄【半两】 当归【酒煮】

阿胶【炒】 白芷 续断

乾姜【炮】 甘草【炙】 川芎【各四两】

肉桂 附子【炮去皮脐】 白芍药【各一两】

白术 吴茱萸【汤洗七次炒各三两】

右为末炼蜜丸梧桐子大每服五十丸食前温酒下

内炙散【和剂方】治妇人血气虚损崩中漏下淋漓不已或凝积血块腰腹刺痛凡月水不调血晕头眩皆治藿香叶 丁香皮 熟乾地黄【洗焙】 肉桂【去皮各一两半】 甘草【炙】 当归【去芦】

白术 山药 白芷【各八两】

茴香【一两半】 藁本【去芦】 乾姜【炮】

川芎 黄芪【去苗】 木香

白芍药【各一两】 陈皮【去白四两】

右为末每服三钱水一盞姜五片艾十叶同煎空心热服温酒调下亦可如产後下血过多加蒲黄煎恶露不快加当归红花煎呕吐加藿香生姜煎

温经汤【大全良方】治妇人血海虚寒月水不利

当归 川芎 芍药

桂心 牡丹皮 莪术【各半两】

人参 甘草 牛膝【各一两】

右?咀每服五钱水一盏半煎至八分温服不拘时服

凌花散【澹寮方】治妇人月水不行发热腹胀

当归【酒浸】 凌霄花 刘寄奴

红花【酒浸候煎药一二沸即入】 官桂【去皮】

牡丹皮【酒洗】 川白芷 赤芍药

延胡索【各等分】

右?咀每服四钱水一盏酒半盏煎八分再入红花煎热服

四制醋附丸【瑞竹堂方】治妇人女子经候不调

香附子【去毛一斤作四分】

一分好酒浸七日 一分小便浸七日 一分盐水浸七日 一分米醋浸七日【各焙乾】

右为末醋糊丸如梧桐子大每服七十丸空心食前盐酒送下肥人依方服瘦人加泽兰叶赤茯苓【各二两】

六合汤【济生方】治妇人经事不行腹中结块腰腿重痛

当归 白芍药 官桂【去皮】

熟地黄【洗】 川芎 蓬术【炮各等分】

右?咀每服四钱水一盏煎七分空心服

白薇圆【大全良方】治妇人月水不利四肢羸瘦渐觉虚乏

当归 白薇 栝子仁

白芍药 川芎 白术

桂心 附子 萆解

木香 细辛 吴茱萸【各半两】

人参 石斛 白茯苓

川牛膝 泽兰叶【各七钱半】 榔【半两】

熟地黄【二两】 牡丹皮 紫石英【各一两】

右为末炼蜜圆如梧桐子大每服五十丸空心温酒下

茯苓补心汤【澹寮方】治妇人去血过多虚劳发热

用四物汤一两参苏饮三两和匀生姜五片煎八分温服【方见虚劳门】

增损四物汤【兰室秘藏方】治血积

当归 川芎 白芍

熟地黄 莪术 京三棱

官桂 乾漆【炒烟尽各等分】

右咀每服五钱水二盏煎一盏去滓温服食前

磨积圆【杨氏家藏方】治妇人积气内攻经候不调腹脇膨胀刺痛

京三棱 莪术【各煨二两】 茴香【炒】

附子【炮】 川楝子肉 白芍药

乾姜【炮各一两半】 巴戟【去心炒】 当归【洗】

艾叶【醋炒各一两七钱半】

右为末酒糊圆如梧桐子大每服五十圆空心温酒下

麦门冬散【大全良方】治妇人客热四肢烦闷疼痛饮食不下

麦门冬 柴胡 赤茯苓【各一两】 羚羊角 赤芍药 桑白皮

黄耆【各三分】 生地黄 甘草【各五钱】

右?咀每服一两水二盏生姜三片煎至一盏去滓通口服

黄耆散【大全良方】治妇人热劳羸瘦四肢烦疼心燥口乾不欲饮食

人参 黄芩 当归【各七钱半】

柴胡【一两半】 黄耆 地骨皮

赤茯苓 麦门冬 生地黄

赤芍药 白芍药【各一两】

右?咀每服一两水二盏姜五片煎至一盏去滓通口食前服

乌鸡煎圆【秘方】治妇人百病虚劳血气赤白带下等证人参【二两】 茯苓【三两】
香附子【四两】

当归【六两】 官桂 地骨皮【各二两】 生熟地黄【四两】 黄耆【六两】

右用乌骨白鸡一只男用雌女用?笼住将黄耆末和炒面圆鸡头大喂鸡服生?吊死肠肚洗净
擗毛搥碎骨入前药鸡腹内用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙枯研用汁打糊圆如梧桐子大
每服五十圆盐汤下

胜金圆【一方名不换金丸治妇人诸虚不足心腹疼痛一名胜金丹有沉香】治妇人久虚
无子产前产後一切病患兼疗男子下虚无力此药能安胎催生妊娠临月服五七圆产时减
痛妇人无子是子宫冷如服二十圆男女自至又治积年血风脚手麻痹半身不遂赤白带下
血如山崩及治产後腹中结痛吐逆心痛子死腹中遶脐痛气满烦闷失盖汗不出月水不通
四肢浮肿无力血劳虚劳小便不禁中风不语口禁产後痢疾消渴眼前见鬼迷晕败血上冲
寒热头痛面色痿黄淋澁诸疾血下无度血痢不止饮食无味产後伤寒虚烦劳闷产後血癖

产後羸瘦凡妇人衆疾不论年月日深并皆治之

白芍药 藁本 石脂【赤白皆可】

川芎【不见火】 牡丹皮 当归

白茯苓 人参 白薇

白芷 桂心 延胡索

白术 没药

甘草【炙○江西安抚司没药甘草咸半】

右十五味等分为细末炼蜜为圆如弹子大每服一圆温酒化下初产子并用热醋汤下空心食前此方系王子宣祖传渠家凡妇人怀身便服此药甚神妙常服尤好系在京师於能家传到

七制香附丸治妇人诸虚百损血气不调月水前後结成症瘕或骨蒸发热四肢无力并皆治之

香附 当归【各二两同用酒浸】 香附

莪术【各二两同用童便浸】 香附【二两】 牡丹皮【一两】

艾叶【一两同用米泔浸】 香附 乌药【各二两同用米泔浸】

香附【二两】 川芎 玄胡【各一两同用水浸】

香附【二两】 三棱 柴胡【各一两同用泔浸】 香附【二两】 红花【一两】
乌梅肉【二十个同用盐水浸】

右作七处春浸三日夏浸二日秋浸七日冬浸十日晒乾为末入药汁打糊为丸如梧桐子大每服八十丸临卧酒调下

王节斋曰妇人女子经脉不行多有脾胃损伤而致者不可便认作经闭血死轻用通经破血之药遇有此证便须审其脾胃如何若因饮食劳倦损伤脾胃少食恶食泄泻疼痛或因误服汗下攻剋药伤其中气以致血少而不行者只宜补养脾胃用白术为君茯苓芍药为臣佐以黄耆甘草陈皮麦芽川芎当归柴胡等药脾旺则能生血而经自行矣又有饮食积滯致损脾

胃者亦宜消积补脾若脾胃无病果有血块凝结方宜行血通经

附子嗣

子嗣方论

内经曰陰搏阳别谓之有子【谓陰脉?手其中别有阳脉也】是为血气和平阳施而陰化也盖为人之夫妇犹天地然天地之道陰阳和而後万物育夫妇之道陰阳和而後男女生是故欲求嗣者先须调其妇之经脉经脉既调则气血和平气血和平则百病不生而乐乎有子矣丹溪云若是肥盛妇人稟受盛厚恣於酒食之人经水不调不能成胎谓之軀脂满溢闭塞子宫宜行湿燥痰用半夏苍术台芎防风羌活滑石或导痰汤之类若是怯瘦性急之人经水不调不能成胎谓之子宫乾澁无血不能摄受精气宜凉血降火或四物加香附黄芩柴胡养血养陰等药可宜东垣有六味地黄丸以补妇人之陰血不足无子服之者能使胎孕

又诀云三十时中两日半二十八九君须筭落红满地是佳期金水过时空霍乱霍乱之後枉费工树头树底覓残红但解开花能结子何愁丹桂不成从此盖妇人月经方絕金水才生此时子宫正开乃受精结胎之候妙合太和之时过此佳期则子宫闭而不受胎矣然男女之分各有要妙存焉如月候方经一日三日五日交会者成男二日四日六日交会者成女过此则不孕矣又云陰血先至阳精後冲纵气来乘血开裹精陰外阴内则成坎卦之象而为男若阳精先入陰血後参横气来助精开裹血陰外阴外则成离卦之象而为女若胎成三月之内男女未分之时亦有转女为男之术其法以鉄斧一柄置於孕妇床蓆之下勿令人见知更佩?黄一二两於孕妇身左或佩萱花亦可已上三法皆验不可轻忽传曰不孝有三无後为大古诗云无官一身轻有子万事足诚哉是言也无嗣者宜深思之无怠诿诿圆【利剂方】治妇人冲任虚寒胎孕不成或多损坠泽兰叶【一两半】肉桂【去皮五钱】当归【洗焙】

熟地黄【洗焙】川芎 石斛【酒洗炒】

白芍药 牡丹皮 延胡索【各一两】白术【一两半】乾姜【炮半两】

右为末醋糊丸如梧桐子大每五十丸空心温酒下

艾附暖宫丸治妇人子宫虚冷带下白淫面色痿黄四肢痰痛倦怠无力饮食减少经脉不调血无顔色肚腹时痛久无子息服药更宜戒恼怒生冷累用经验艾叶【大叶者去枝梗三两】香附【去毛六两俱要合时采者用醋五升以瓦罐煮一昼夜捣烂分饼慢火焙乾】

吴茱萸【去枝梗】大川芎【雀胎者】白芍药【□酒炒】

黄耆【取黄色白色软者各二两】

川椒【酒洗三两】续断【去芦一两五钱】

生地黄【生用一两酒洗焙乾】官桂【五钱】

右为细末上好米醋打糊为丸如梧桐子大每服五七十丸淡醋汤食远送下修合日宜天德合月德合日壬子日精选药材为妙耳

乌鸡丸治妇人羸弱血虚有热经水不调崩漏带下骨蒸等疾不能成胎

用白毛乌骨公鸡一只重二斤半许闭死去毛腸净用艾四两青蒿四两剉碎纳一半在鸡肠用空酒壘一只纳鸡并余艾蒿在内用童便和水灌令没鸡二寸许煮絕乾取出去骨余俱捣烂如薄饼状焙乾研为细末

南香附子去毛净一斤分作四分米泔水浸一分童便浸一分醋浸一分酒浸一分春秋二日夏一日冬四日取出晒乾

熟地黄【四两】 当归【酒浸洗】 白芍药

鳖甲【醋浸炙黄色】 辽人参【各三两】 川牛膝【去芦】

白术 知母【各二两】 川芎【三两半】

牡丹皮【去心】 贝母 柴胡【各二两】

地骨皮 乾姜 玄胡索

黄连【炒各一两】 秦艽【一两半】 黄耆

白茯苓【去木一两】 生地黄【怀庆者勿犯鉄三两】

右并香附共为细末并鸡末酒醋糊为丸如梧子大每服五六十丸渐加至七八十丸温酒下或米饮下亦得忌煎炒辛辣之物及菹菜

白薇丸【大全良方】 治妇人无子

白薇 牡蒙 藁本【各五分】

姜黄 当归 熟地黄【各七分】

川芎 人参 栝子仁

石斛 桂心 附子【炮】

五味子 防风 甘草

川牛膝 吴茱萸 桑寄生【各六分】 川椒【二分】 禹余粮【八分】

右为末炼蜜丸如梧桐子大空心酒下三十丸日二服忌生菜葱热麪荞麦蒜猪肉炙?葵菜芜荑菰菜海藻粘食臭物

孕育备论

经云少陰脉动甚者有子厥旨何哉曰手少陰之经属心足少陰之经属肾心之所主者血肾之所主者精精血合气而成之也然而胞门子户又所以为精血之会其於尺部二脉尤有可验者焉且妇人尺部之脉滑是为血实必主月事不行若其来断絕或中絕而不至者此皆无孕惟滑而不絕略无间断於其间此则真胎孕之脉也○妇人怀胎脏气拥闭不可多睡不可忧惧劳役不可啖食粘滯辛辣强硬之物又不可妄施针灸所贵时行数步调畅自适使气得其平若酒麵炙?热毒熏蒸若感触风邪傳染热气若误服药饵破血动胎若七情内伤快意纵慾则易致漏胎若腹痛方来用力太早若觉则惊动胎转未得若抱持不正奔突後趋若近产多淫触犯禁忌则易致产难既产之後或过用心力或素有痰阻或血虚气逆或虚极乘寒则血晕眩闷之证生矣○然而安胎之法有二因母病以致动胎者但疗母病其胎自安或胎气不坚因触动以致母病者则安胎而母自产以胶艾汤芎归汤各半缩砂佐之为良难产之剂前所谓四物汤加吴茱萸入醋夹煎黑神散用乳香煎汤调下皆其要药产後血晕先以旧漆器烧烟微向其鼻次则五灵脂末半生半炒入苏合香圆百沸汤调与之或黑神散入麝少许调以紫苏汤或花蘂石散用童子小便温温调剂可也损孕验法妇人面色青手足冷指甲黑而且遍体不仁腰腹痛割其或面青唇青以至舌间黯黑口角沫出则不容以人力胜之大要将产腹痛万勿惊动且须凭物而行直至腰疼子逼育门方可用力盖肾系於腰而胎系於肾故也○俗於产下多用理中丸然蜜甘而滯不若但用理中汤俗於小儿初诞多用黄连然差苦伤胃不若但用甘草炙煎绵蘸入口良久迭用恶物自出俗於胎孕已成多服滑胎枳殼散然枳殼微寒须以缩砂乌药为佐产後饭食米饮勿用产後盥洗沸汤是常调血以四物逐瘀以黑神人所共知也若夫顺气等剂胎前产後尤当兼施而并用之【血晕昏迷切勿用降真香熏之以塞其气】

论王叔和刘元宾别男女法

叔和以左手太阳浮大为男右手太陰沉细为女元宾以右手浮大为女左手沉实为男较是二说不无抵牾然即其脉经本旨而详之又有若异而实同者经曰左手沉实为男右手浮大为女又曰左右手俱浮大者生二女俱沉实者生二男元宾之所主者此也经曰左手尺中浮大者男右手尺中沉细者女又曰尺脉俱浮产二男尺脉俱沉产二女叔和之所主者此也何者沉细之说与沉实之义不同左尺浮大之说与右手浮大者亦异欲知男女之法大抵沉实者可以为男沉细者断然为女右手浮大者固知其女左尺浮大者大抵皆男沉细为女沉实为男即所谓诸阳为男诸陰为女者是也左尺浮大为男右手浮大为女即所谓左疾为男右

疾为女者是也元宾言其详盖合左右手而别陰阳叔和言其略特不过脉经论尺脉之义矣尚何有异同之辨哉

圣惠云凡脉得太阳为男得太陰为女盖太阳则浮太陰则沉也脉经云尺脉左偏大为男尺脉右偏大为女左右俱大产二子大者大而有力也左右手脉俱疾二子脉来纵横逆而不顺并主夹胎左尺脉带强右尺带弱者为男右尺脉带强左尺带弱者为女胎妇遣面南而行忽从後呼之左回首者为男右回首者为女或於厕所呼之亦同又胎妇其夫左乳有核者生男右乳有核者生女附胎前诸方

安胎当归汤【大全良方】疗妊娠五月举动惊愕胎动不安下坠小腹痛引腰脇小便疼痛下血

当归 阿胶 川芎

人参【各一两】 枣子【二枚】 艾【一虎口】

右细切酒水各三升合煮至三升内胶令烊分二服腹中当安小便当煖也○一方有甘草无参枣

旋覆花汤【大全良方】疗妊娠六七月间胎不安常处亦名阻病

旋覆花【一两】 厚朴 白术

枳殼 黄芩 茯苓【各三两】

半夏【炒一方无】 芍药 生姜【各二两】

右?咀每服一两水鍾半煎至一鍾去滓温服食前忌羊肉饴醋桃李雀肉

阿胶散【大全良方】治妊娠胎动腹中痞痛不思饮食

白茯苓 白术 川芎

阿胶【炒各七钱半】 当归【炒】 陈皮【各一两】

甘草【二钱半】

右?咀每服八钱生姜三片枣二枚水一鍾半煎至八分食前温服

当归散【金匱方】妊娠宜常服之

当归 川芎 白芍药

黄芩【各一两】 白术【半两】

右五味为末酒饮调服方寸匕日二次或用酒糊为丸如梧桐子大每服五十丸茶汤任下空心食前服日三次

桑寄生散【济生方】治胎漏经血妄行淋漓不已

当归【去芦酒浸】 桑寄生 川续断【酒浸】

川芎 白术 香附子【炒去毛】

阿胶【蛤粉炒成珠】 人参 茯神【去木各一两】 甘草【炙五钱】

右?咀每服四钱水一锺姜五片煎七分去滓不拘时服

半夏茯苓汤【和剂方】治妊娠恶阻恶闻食气胃膈痰逆呕吐

旋覆花 陈皮【去白麩炒】 桔梗

白芍药 人参【去芦】 甘草【炙】

川芎【各半两】 半夏【炮二两二钱半】 赤茯苓

熟苕【各七钱半】

右?咀每服四钱水一锺姜四片煎七分空心热服

竹茹汤【和剂方】治妊娠呕吐头痛眩暈

橘红【去白一两】 人参 麦门冬【去心】

白术【各一两】 甘草【二钱半】 厚朴【姜制】

白茯苓【各半两】

右?咀每服五钱水一锺姜五片入竹茹一块如弹子大同煎至八分温服不拘时

竹叶汤【简易方】治妊娠心惊胆怯终日烦闷证曰子烦

白茯苓【四两】 防风 麦门冬【去心】

黄芩【各三两】

右?咀每服四钱水一锺竹叶五片煎服不拘时

羚羊角散【永类经方】治妊娠中风头项强直筋脉挛急言语蹇澁痰涎不利或时发搐不省人事名曰子痫羚羊角【镑】 川独活 酸枣仁【炒】

五加皮【各半钱】 薏苡仁 防风

当归 川芎 茯神

杏仁【各四分】 木香 甘草【各二分半】

右?咀每服四钱水一锺姜五片煎七分不拘时服

防风汤【大全良方】治妊娠中风卒倒心神闷乱口噤不能言四肢强怠

防风 寄生 葛根【各一两】

菊花 防己 细辛

秦艽 当归 官桂

茯神 甘草 羚羊角【各半两】

右?咀每服四钱水一锺半生姜三片煎至八分去滓加竹沥半合温服不拘时

全生白术散【简易方】治妊娠面目虚浮肢体肿如水气名曰子肿

白术 生姜皮 大腹皮

陈皮 白茯苓皮【各半两】

右为末每服二钱米饮调下不拘时

肾着汤【大全良方】治妊娠腰脚肿

茯苓 白术【各四钱】 杏仁

甘草【各三钱】

右?咀每服八钱水二锺煎至一锺去滓通口食前

安荣散【剂生方】治妊娠小便澁少遂成淋沥名曰子淋

麦门冬【去心】 通草 滑石【各三钱】

当归【去芦酒浸】 灯心 甘草【各半两】

人参 细辛【各一两】

右为细末煎麦门冬汤调下不拘时

紫苏饮【济生方】治胎气不和湊上心腹胀满疼痛谓之子悬

大腹皮 川芎 白芍药

陈皮【去白】 紫苏叶 当归【去芦酒浸各一两】

人参 甘草【各半两】

右?咀每服四钱水一锺生姜五片葱白七寸煎至七分空心温服

独圣散治胎前心腹诸痛胎动不安此药安胎止痛行气故也若非八九个月不宜多服

砂仁【不拘多少去皮略炒】

右为细末每服一匕热酒或艾汤米饮盐汤皆可调服如觉胎中热即安矣大抵妊妇不可缺此

束胎散第八个月可服

炒黄芩【夏一两春秋七钱半冬五钱】 白术【不见火】

陈皮【各二两】 茯苓【七钱半不见火】

右为末粥丸服

達生散又名束胎散

大腹皮【三钱】 人参 陈皮

紫苏【茎叶各半钱】 白术 芍药

归身尾 甘草【炙二钱】

右作一服入青葱五叶黄杨脑十个此即黄杨树叶稍儿也或加枳殼砂仁以水煎食後服於八九个月服十数贴甚得力夏月加黄芩冬不必加春加川芎或有别证以意消息於后气虚加参术气实倍香附陈皮血虚倍当归加地黄形实倍紫苏性急加黄连有热加黄芩湿痰加滑石半夏食积加山楂食後易饥倍黄杨脑有痰加半夏腹痛加木香桂

又方治难产

砂仁 香附【醋煮】 枳殼

甘草

右为末汤调下以香油蜜小便和匀各半鍾调益母草末

催生

白芷灰 百草霜 滑石

右为末用芎归煎汤调下或姜汁服

天麻丸易产

天麻【即益母草六月间连根采陰乾】

右为末不拘多少炼蜜丸如龙眼大临睡时温酒或白汤化一丸能除产後百病

催生丹疗产妇生理不顺产育艰难或横或逆大有神效宜天医日合

十二月兔脑【去膜碾如泥】

通明乳香【研细】母丁香【研为末各一钱】麝香【一字研细】

右以乳麝丁香拌匀入兔脑髓和丸鸡头大陰乾油纸密封固临产服一丸温水送下立产男
左女右手中握药出神验

风寒热病

表虚六合汤【圣惠方】若妊娠伤寒中风表虚自汗头痛项强身热恶风脉浮而弱太阳经病宜服

四物汤【四两】桂枝 地骨皮【各七钱】

表实六合汤【圣惠方】若妊娠伤寒头痛身热无汗脉浮紧恶寒太阳经病宜服

四物汤【四两】麻黄 细辛【各半两】

风湿六合汤【圣惠方】若妊娠伤寒中风湿之气肢节烦疼脉浮而漈头痛太阳标病也宜服

四物汤【四两】防风 苍术【制各七钱】

升麻六合汤【圣惠方】若妊娠伤寒下後过经不愈温毒发斑如锦文宜服

四物汤【四两】升麻 连翘【各七钱】

柴胡六合汤【圣惠方】若妊娠伤寒胷满痛而脉弦少阳头昏项强宜服

四物汤【四两】柴胡 黄芩【各七钱】

大黄六合汤【圣惠方】若妊娠伤寒大便硬小便赤气满而脉沉数阳明太阳本病也急下之宜服

四物汤【四两】大黄【五钱】桃仁【十个去皮尖麩炒】

厚朴六合汤【圣惠方】若妊娠伤寒汗下後虚痞胀满者阳明本病也宜服亦治咳嗽喘满

四物汤【四两】 厚朴 枳实【麸炒各五钱】

人参六合汤【圣惠方】 若妊娠伤寒汗下後咳嗽不止者宜服

四物汤【四两】 人参 五味子【各五钱】

梔子六合汤【圣惠方】 若妊娠伤寒汗下後不得眠者宜服

四物汤【四两】 梔子 黄芩【各五钱】

石膏六合汤【圣惠方】 若妊娠伤寒身热大渴蒸热而烦脉长而大者宜服

四物汤【四两】 石膏 知母【各五钱】

茯苓六合汤【圣惠方】 若妊娠伤寒小便不利太阳本病宜服

四物汤【四两】 茯苓 泽泻【各五钱】

琥珀六合汤【圣惠方】 若妊娠伤寒太阳本病小便赤如血状者宜服

四物汤【四两】 琥珀 茯苓【各五钱】

胶艾六合汤【圣惠方】 若妊娠伤寒汗下後血漏不止胎气损者宜服

四物汤【四两】 阿胶 艾叶【各五钱】

一方加甘草同上一方加乾姜甘草黄耆

附子六合汤【圣惠方】 若妊娠伤寒四肢拘急身凉微汗腹中痛脉沉而迟少陰病也宜服

四物汤【四两】 附子【炮去皮脐】 桂【各五钱】

前胡汤【大全良方】 治妊娠伤寒头痛壮热肢节烦疼

石膏【一钱二分】 前胡【六分】 甜竹叶【三分】

黄芩 大青【各五分】 知母

梔子【各四分】

右?咀每服八钱水一盞半葱白三寸煎至八分去滓温服不拘时外台无甜竹叶

黄耆解肌汤【圣惠方】治妊娠伤风自汗

人参 黄耆 当归

川芎 甘草【各半两】 芍药【六钱】

右?咀每服八钱水二盞煎至八分去滓温服不拘时加苍术生地黄亦可

百合散【济生方】治妊娠风壅咳嗽痰喘满闷

百合【蒸】 紫苑茸【洗】 贝母【去心】

白芍药 前胡【去芦】 赤茯苓【去皮】

桔梗【去芦炒各一两】 甘草【炙五钱】

右?咀每服四钱水一盞姜五片煎至八分去滓温服不拘时

马兜铃散【大全良方】治妊娠胎气壅滞咳嗽喘急

马兜铃 桔梗 人参

甘草 贝母【各五钱】 陈皮

大腹皮 紫苏 桑白皮【各一两】 五味子【七钱】

右?咀每服八钱生姜三片水一盞半煎至八分去滓食後温服

食公下气汤【大全良方】治妊娠心腹胀满两脇妨闷不下饮食四肢无力

羌活 赤芍药 甘草

?榔 青皮 大腹皮

陈皮 赤茯苓 半夏

桑白皮 官桂【各五钱】 紫苏【二两】

右?咀每服八钱生姜五片枣一枚水一盞半煎至八分去滓食前服

香桂散【大全良方】下死胎

麝香【另研五分】 官桂【末三钱】

右共和匀用温酒一盞调服须臾如手推下

一字神散【大全良方】治子死腹中胎不下胞破不生此方累有效验

鬼臼【不拘多少黄色者去毛】

右研为末以手指捻之如粉极细为度此药不用罗每服三钱用无灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神

附产後诸方

王节斋曰凡妇人产後陰血虚阳无所依而浮散於外故多发热治法用四物汤补陰血而以炙乾姜之苦温从治收其浮散使归依於陰然产後脾胃虚多有过服饮食伤滯而发热者悞作血虚则不効矣但遇产後发热者须审问服何饮食有无伤积胃膈饱闷暖气恶食泄泻等证只作伤食治之若发热而饮食自调者方用补血证法产後无得令虚当大补气血为先虽有杂证以末治之一切病多是血虚皆不可发表产後中风切不可作风治必大补气血为主然後治痰当以左右手之脉分其血气多少而治产後中风口眼喎斜切不可服小续命汤产後水肿必用大补气血为主少佐苍术茯苓使水自利产後大发热必用乾姜轻者用茯苓淡渗其热一应寒苦并发表之药皆不可用产後发热恶寒皆属血虚左手脉不足补血药多於补气药恶寒发热腹痛者当去恶血腹满者不是产後发热乳汁不通及膨者无子当消用麦蘖二两炒研细末清汤调下作四服有子者用木通通草猪蹄煎服凡产後有病先固正气前条云产後大热必用乾姜或曰用姜者何也曰此热非有余之热乃陰虚生内热耳故以补陰药大剂服之且乾姜能入肺和肺气入肝分引血药生血然不可独用必与补陰药同用此造化自然之妙非天下之至神孰能与於此乎产後脉洪数产前脉细小澁弱多死怀孕者脉主洪数已产而洪数不段者多主死

一方产後补虚

人参 白术【各一钱】 茯苓

归身尾 陈皮 川芎【各半钱】

甘草【炙三分】 有热加黄芩【一钱】

生姜三片水煎服

产後消血块方

滑石【三钱】 没药 血竭【各二钱如无牡丹皮代之】

右为末醋糊丸如恶露不下以【阙】

皮汤下瓦礬子能消血块

又方治产後泄泻

黄芩 白术 川芎

茯苓 乾姜 滑石

陈皮 炒芍药 甘草【炙】

右?咀水煎服

又方治产後恶露不尽小腹作痛

五灵脂 香附 一方加蛤粉

右为末醋糊丸甚者入桃仁不去尖用

参术膏治产後胞损成淋沥证

人参【二钱半】 白术【二钱】 桃仁

陈皮 茯苓【各一钱】 黄耆【一钱半】

甘草【炙五分】

右?咀水煎猪羊胞後入药作一服

夺命丹【济生方】治产後血入衣中胀满冲心久而不下或去血过多肺气喘促谓之孤阳絶陰亦难治之证宜急取鞋底炙热小腹上下熨之次进此药

附子【炮去皮脐半两】 牡丹皮【去心】 乾漆【炒令烟尽各一两】

右为末用酸醋一升大黄末一两同熬成膏和药丸如梧桐子大每服五十丸温酒送下

花蘘石散治产後胎衣不下极有神效【方见跌扑门】

返魂丹治生产一十六证一名益母丸

野天麻【一名益母草方梗四五月节间开紫花时采花叶子陰乾半斤】

木香【五钱】 赤芍药【六钱】 当归【七钱】

右同为末炼蜜丸如弹子大每服一丸随饮子下子死腹中冷痛小便流出腹胀四肢冷爪甲青黑童便酒和匀煎沸化下○产後恶血不尽脐腹刺痛童便和酒化下○产时面垢顔赤胎衣不下败血自下如带或横生不顺心闷欲死童便酒薄荷自然汁和匀化下盐酒亦可○产後三四日起卧不得眼暗生花口乾烦燥心乱见鬼狂言不省人事童便酒薄荷汁下○产後烦渴呵欠不思饮食手足麻疼温米饮下○产後浮肿气喘小便澁咳嗽恶心口吐酸水脇痛要痛无力酒下○产後寒热如疟脐肠作痛米汤下桂枝汤亦可○产後中风牙关紧急半身不遂失音不语童便和酒下○产後大便秘心烦躁口渴童便酒化下薄荷自然汁亦可○产後痢疾月未满食冷物与血相击或有积枣汤化下○产後身体百节疼痛温米饮下○产後崩中盖是伤酸物状如鸡肝?背闷倦糯米秦艽汤下桂枝汤下亦可产後食热麪壅结成块四肢无力睡後汗出不止月水不调久成骨蒸劳童便和酒下○产後呕逆虚胀酒下○产後鼻衄口乾舌黑童便酒下○产後赤白带下秦艽同糯米煎汤下

黑神散【和剂方】治妇人产後恶露不尽胎衣不下血气攻心眩晕等证

黑豆【炒半斤】 熟地黄 当归【酒浸去芦】

肉桂【去皮】 乾姜【炮】 甘草【炙】

芍药 蒲黄【各四两】 济生方除蒲黄加附子

右为末每服二钱热酒调下

清魂散【济生方】治产後血晕昏不知人更宜先取乾漆或漆器烧烟鼻中薰之频置醋炭房内次进此药泽兰叶 人参【去芦一两】 荆芥穗【四两】

甘草【炙八钱】 川芎【二两】

右为末每服二钱热汤温酒各半盏调匀灌下

愈风散【圣惠方】疗产後中风不省人事口噤牙紧手足痠痿如角弓状口吐涎沫亦治血晕四肢强直或筑心眼倒吐泻欲死

荆芥穗【略焙】 当归身尾【各等分】

右为末每服三钱豆淋酒调下用童子小便亦可其効如神口噤者斡开灌之或吹鼻中皆効一方用蜜丸或麪糊丸如梧子大每服五十丸空心米汤下

人参汤【永类铃方】治产後诸虚不足发热盗汗

人参【去芦】 归身

右等分为末猪腰子一只去膜切作片子以水三升糯米半合葱二茎煮米熟取清汁一盞入药二钱煎至八分不拘时服

黄龙汤【大全良方】治妇人寒热头痛嘿嘿不欲食脇下痛呕逆痰气及产後伤风热入胞室寒热如疟并经水适来适断病後劳後余热不解

柴胡【四钱八分】 黄芩 人参

甘草【各一钱八分】

右作一服用水二盏煎至一盏去滓温服不拘时服

汉防己散【大全良方】治产後风虚气壅上攻头面浮肿

汉防己 猪苓 枳殼

桑白皮【各两】 商陆 甘草【各七钱半】

右?咀每服八钱水一盏半生姜三片煎至八分去滓温服无时一方空心服

参苏饮【圣惠方】治妇人产後血入於肺面赤发肿欲死者

人参【一两为末】 苏木【二两槌碎】

右用水二碗煮取一碗去滓调人参末随时加减服

玉露散【大全良方】治产後乳脉不行身体壮热疼痛头目昏痛大便澁滯悉能治之凉膈压热下乳

人参 白茯苓 甘草【各半两】

桔梗【炒】 川芎 白芷【各一两】

当归【二钱半】 芍药【七钱半】

右?咀每服四钱水一鍾半煎至七分去滓温服食後如头热甚大便秘加大黄二钱半

涌泉散治因气乳汁少

瞿麦穗 麦门冬【去心】 王不留行

紧龙骨 川山甲【炮黄各等分】

右为细末每服一钱热酒调下先食猪蹄羹後服药以木梳左右乳上梳三十余下日三服

猪蹄汤【澹疗方】治你妇气少力衰脉澁不行絶乳汁

猪蹄【七孔者一只】 通草【五两】

右将猪蹄净洗依食法事治次用水一斗同通草浸煮得四五升取汁饮之

歌曰

妇人吹乳意如何 皂角烧灰蛤粉和

热酒一盃调八字 须臾揉散笑呵呵

理中汤【方见中寒门】

苏合香圆【方见咳嗽门】

四物汤【方见调经类】

论崩中帶下

下部出血不止谓之崩中秽液常流谓之带下崩中失血多因冲任虚损荣道受伤得之冷带杂下多因下焦不固内挟风冷得之是固然尔然崩中者投以当归川芎香附诸黑药之属血暂止而终不止带下者投以熟艾余粮母蛎海螵蛸之类带暂歇而终不歇其故何哉经曰卫气者所以温分肉充皮肤肥腠理司开阖卫气若虚则分肉不温皮肤不充腠理不肥而开阖失其司耳况胃为血海水液会焉胃者中央之土又所以主肌肉而约血水也卫气与胃气俱虚则肌弱而肤空血之与水不能约制是以??漏卮休作无时而不暂停矣然则封之止之其可不加意於固卫厚脾之剂乎此桂枝附子汤以之固卫【见活人书】而人参白术茯苓草果丁香木香以之厚脾二者俱不可阙也○虽然酒家嗜好炙煿亦有協热而下血者此则黄连圆辈所不可无肺经脉微亦主带下此则草果白术虽可燥水亦须以阿胶佐之若夫带之为患出於风冷停宿官桂乾姜细辛白芷先与散其寒邪然後为之封固所贵择之精而用之审云○一应妇人大小产及诸下血新瘥未得经久遽触房事皆作崩中漏下二带之疾又有月事久闭才得一通下部为风邪所?致使败瘀出而未尽亦作崩中漏下黄水或粉红渗漏无时其崩中下血不止者震灵丹三粒陈米并香附煎汤食前送下又方人参白术炮乾姜炒甘草制半夏缩砂香附木香等分姜枣煎服又方圆白半夏剉碎以姜汁和面捏饼包裹炙令香熟去面取半夏末之糯米稀糊圆麻子大每服伍十圆芎归汤沉香降气汤各半食空送下此皆止血之圣药

附诸方

胶艾汤【和剂方】治劳伤血气冲任虚损月水过多淋漓不断及妊娠调摄失宜胎气不安或因损动漏血伤胎并宜服之

阿胶 芎藭 甘草【炙各二两】

当归 艾叶【炒各二两】 熟乾地黄

白芍药【各四两】

右?咀每服三钱水一盏酒半锤煎八分热服

当归芍药汤【东垣方】治妇人经脉漏下不止其色鲜红饮食减

黄耆 橘皮 熟地黄【各半钱】

苍术 白术 当归

白芍药【各一钱】 炙甘草 柴胡

生地黄【各二分】

右?咀煎服空心食前

柴胡调经汤【试効方】治经水不止鲜红项筋急脑痛?骨强痛不思饮食

羌活 苍术【各一钱】 独活

藁本 升麻【各半钱】 柴胡【七分】

乾葛 当归 甘草【各三分】

红花【少许】

右?咀水煎去滓空心稍热服取微汗立止

艾煎圆治崩伤淋漓不已小腹满痛常服益荣调经吴茱萸【汤炮】 当归【各七钱半】
熟地黄

白芍药【各一两半】 石菖蒲【炒】 川芎

人参 熟艾【四两熟米饮调作饼子】

右为末酒糊为丸如梧桐子大每服五十丸酒饮任下

鹿茸丸【大全良方】治冲任虚损以致经候过多又为风冷所乘尺脉微细甚者可灸关元
百壮

鹿茸【火去毛醋炙煮】 赤石脂 禹余粮【各一两】

艾叶 栝叶 附子【焙去皮脐各半两】 熟地黄【酒洗】 当归【酒浸】 续断【各二两】

右为末酒糊为丸如梧桐子大每服五十丸空心温酒下

凉血地黄汤【拔萃方】治妇人血崩是肾水真陰不能镇守包络相火故血走而崩也

生地 当归【各五分】 黄连

黄栢 知母 藁本

川芎 升麻【各二分】 柴胡

羌活 防风【各三钱】 黄芩

甘草【炙】 细辛 荆芥

蔓荆子【各一分】 红花【少许】

右?咀水煎通口服食前

一方治妇人血崩不止

槐花【一两】 棕毛灰【五钱】

右为末水一鍾盐少许煎七分去滓温服

一方【大全良方】

用棕白矾煨为末酒调二钱服

带下方

暖宫妙丸治妇人赤白带下

艾叶 龙骨 当归

川芎 牡蛎 白芍药

牡丹皮 茯苓 赤石脂

熟地黄【各等分】

右为末?糊为丸梧桐子大服五十丸空心艾醋汤下

白芷散【大全良方】治妇人赤白带下

白芷【一两】 海螵蛸【二个烧】 胎发【一个烧】

右为末空心酒调服二钱

当归煎【济生方】治妇人赤白带下腹内疼痛不欲饮食日渐羸瘦

当归【酒洗】 赤芍药 牡蛎【火煨取粉】

熟地【酒洗蒸焙】 阿胶 白芍药

续断【酒浸各一两】 地榆【半两】

右为末醋糊丸如梧桐子大每服五十丸空心米饮下

一方【丹溪方】治白带因七情所伤而脉数者

黄连【炒】 匾栢【酒蒸】 黄栢【炒各半两】

香附【醋炒】 白芍药 白术【各一两】

椿根皮【二两炒】 白芷【烧存性三钱】

右为末粥糊丸梧子大每服五十丸食前米饮下

伏龙肝散治妇人五色带下

伏龙肝【即灶心土】 麦门冬【去心】 赤石脂【各一两】

甘草 肉桂【各五钱】 川芎【三两】

艾叶 熟地黄【各二两】 乾姜【烧七钱】

当归头【七钱半】

右?咀水枣煎服或作末子米饮调下

一方【丹溪方】治妇人怀孕白带

苍术【三钱】 白芷【二钱】 黄连【炒二钱】

黄芩【炒二钱】 白芍药 山茱【各二钱半】

椿根皮【炒】 黄栢【炒各一半】

右为末糊丸空心温酒下

一方【丹溪方】治白帶兼風痛

半夏 茯苓 川芎

陳皮 甘草 蒼朮

黃柏【酒炒】 南星 牛膝【各等分】

右?咀水姜煎服

一方治婦人白帶

龜板【炙】 枳子【各二兩】 黃柏【炒一兩】

白芍藥【七錢半】 香附【半兩】 乾姜【炒二錢半】

山茱萸 苦參 椿根皮

貝母【各半兩】

右為末酒糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

一方治白帶或時腹痛

龜板【酒炙二兩】 黃柏【炒兩】 乾姜【炒一錢】

枳子【二錢半】

右為末酒糊丸梧子大每服七十丸日服二次

桂枝附子湯【方見傷寒門】

黃連丸【方見痢門】

芎歸湯【方見痔類】

沉香降氣湯【方見諸氣門】

血【附 諸血】

血论

人具此陰阳即有此血气气阳也血陰也男以阳为主则阳胜乎陰女以陰为主则陰胜乎阳气血之为病男女则同耳人皆知百病生於气又孰知血为百病之胎乎血犹水也水行乎地中百川理则无壅遏之患人之血脉一或凝滯於经络肠胃之间百病由此而根矣乍寒乍热发黄发斑譫妄惊狂烦闷呕恶痴痰自汗闕热虚劳尿淋漏崩吐衄咳唾以至眩运厥冷昏遗迷忘块痛瘀疼起止遗溺凡此数证非血而何经所谓先去其血然後调之良有以也夫血得寒则闭澁得热则宣流荣气虚竭风冷交侵固易为虚劳月闭之证其若出血等类大抵多因蓄热致之荣道一开解血亦为之不禁矣川芎当归血中上药也出血诸证每每以胃药收功盖心主血肝藏血胃者又所以生其血而能使真气归元故其血自止经又云乎血随气行气逆则血逆於此尤当加意

血疾证治

血崩芎归汤加南木香下震灵丹

血崩带下胶艾汤以海螵蛸炙黄刮碎和入同煎吞产宝固经圆并局方泽兰丸

血气虚损腰腹疼痛当归建中汤加南木香若自汗则去木香加人参白术

嗽血咯血局方大阿胶圆加木香末少许略煎食後服肺热嗽血金沸草散【方见咳 类】加桑白皮天门冬去心同煎乘热调大阿胶圆服

霍乱吐泻泻血不止正料治中汤【方见诸气类】

大便下血芎归汤加炒槐花

口舌出血槐花日乾为末傅之

血遇热则宣流故止血多用凉药然亦有气虚挟寒陰阳不相为守荣气虚散血亦错行所谓阳虚陰必走是尔外证必有虚冷之状法当温中使血自归於经络可用理中汤加南木香或局方七气汤【方见诸气类】加川芎或甘草乾姜汤其效甚着又有饮食伤胃或胃虚不能传化其气逆上亦令吐衄木香理中汤甘草乾姜汤通用五丹圆治虚极而壅气不归元衄血喘嗽痰作来复丹黑锡丹震灵丹金液丹各一贴养正丹二贴右件别研细末米糊圆桐子大每服三十圆空心生料理中汤加木香送下或沸汤调苏合香圆下【方见诸气类】

出血诸证每以胃药收功用木香理中汤或参苓白术散二分枳殼散一分【方见诸气类】夹和米汤乘热调下或真方四君子汤夹和小乌沉汤米汤调下已上并用姜枣略煎亦得右药不惟养胃盖以调气辈与之并行若夫桔梗枳殼汤【方见诸气类】夹和二陈汤【方见

诸气类】姜枣同煎入苏合香圆少许佐之又调气之上药也

苏没沉麝丸治诸血诸气痛不可忍

血竭 没药 沉香

辰砂【各一分】 木香 麝香【各半分】

右生为末磁器熬生甘草膏丸如皂子大每一丸姜盐汤嚼下产後血痛气痛并主之亦治脾痛

桂香丸治月事不调心腹刺痛寒热间作

当归须 川芎 赤芍药

牡丹皮 南木香 细辛

辣桂【并日乾】 延胡索【略炒】 乳香

没药【等分】

右煮米醋将乳香没药为膏余药末之揉和为丸桐子大每服七十丸续断煎汤送下有热多加生槐花煎汤

调荣汤治瘀血不消脐腹引腰背俱痛

川芎 当归 芍药

生乾地黄 三棱 莪术

白芷 延胡索 蒲黄

香附子 泽兰 细辛

川白姜 厚朴【制】 桃仁【浸去皮焙各二分】

辣桂 半夏【制】 甘草【炙各三分】

右剉散每服三钱姜枣煎食服

缩砂汤治胎动腹脇腰痛或忍痛失气胎又不动或血水间下

缩砂 桑寄生【各半两】 当归

川芎 艾叶【炒】 阿胶【炒酥各三钱】 南木香 甘草【炙各二钱】

右剉散每服三钱姜五片枣两枚煎服下血水者更以真料理中汤加缩砂佐之

交济散治血结作痛

生地黄【生取半斤】 生姜【四两各洗净同杵治留一夕焙乾】

右末每服二钱温酒调下或男女血热心烦或产後伤风则以荆芥煎汤调下

小柴胡汤男女诸热出血血热蘊隆

柴胡【二两】 黄芩 人参

甘草【炙各七钱半】 半夏【制六钱一字】

右剉散每服三钱姜五片枣二个乌梅一个煎服

桃仁承气汤治男女下焦蓄血小腹急痛内外有热大便秘结

大黄【半两】 桂枝 甘草【炙各二钱半】 桃仁【浸去皮炒】 芒硝【别下各一钱半】

右剉散分作三服每煎至临熟入芒硝半钱再煎沸温服以通利为度

甘草乾姜汤男女诸虚出血胃寒不能引气归元无以收约其血

甘草【炙】 川白姜【炮各等分】

右剉散每服三钱食前煎服

加减四物汤治血气不足肢体乏力或瘀血腹痛或下血过多

当归 川芎 白芍药

乾姜【炒各半两】 南木香 甘草【炒各二钱半】

右剉散每服三钱食前煎服若腹不痛则无瘀血更加人参又能益血

半夏丸治吐血下血崩中带下喘急痰呕中满虚肿亦消宿瘀百病通用

圆白半夏【刮净槌扁以生姜汁调和飞白麪作软饼包拵半夏慢火炙令色黄去麪取半夏为末】

右末米糊丸菉豆大日乾每三四十圆温熟水下

黑散子诸窍出血并主之

隔年莲? 败棕? 头发【并烧存性等分】

右为末每服二钱煎南木香汤调下或只用棕?烧灰米汤调下亦可

茅苏汤治吐血衄血

茅花【三钱】 紫苏茎叶【二钱】

右散新汲水一椀煎七分乘热调生蒲黄二钱旋服仍以大蒜两颗煨熟槌扁贴傅两脚心少顷自觉胷中有蒜气其血立止若下部出血可以煨蒜傅两掌心

豆苏汤治上焦有热咯血瘀血烦闷燥渴

黑豆【三合】 紫苏茎叶【二条】 乌梅【两个】

右水大椀同煎临熟入姜汁三大匙食後旋服

阿胶散治肺破嗽血唾血

人参 茯苓 生乾地黄

天门冬【水浸去心】 北五味子【各一分】 阿胶【炒酥】

白及【各二钱】

右白及别为末余药剉散每服三钱水大盏入蜜二大匙粳米百粒姜五片同煎临熟入白及少许食後服

地黄煎治肺损吐血嗽血

生地黄【四两取汁】 鹿角胶【一两捣碎炒黄】

右为末拌和每服三钱童子小便一盞煖热入姜汁少许调下无鹿胶则以透明阿胶炒酥代用

薏苡汤治肺痛唾吐脓血

薏苡【二合】 黑豆【百粒】 乌梅【一个】

右水二盞煎一盞入透明阿胶生蒲黄各一钱再煎沸食後服

艾姜汤治大便下脓血

艾叶【一握】 黑豆【百粒】

右新水一大盞煎六分入生姜汁三大匙稍热服

又方

黄连【一钱】 南木香【一钱】

右剉细慢火煎食前服

蒜连丸治诸血妄行

黄连【日乾为末】 独头蒜【一颗煨熟取肉研细】

右入米醋些子捣和为圆桐子大日乾每三四十圆陈米饮下

人参汤治吐血咯血

新罗人参慢火煎服

又方

人参 川芎 茯苓

半夏【制各三分】 甘草【炒一分】

右剉每服三钱姜五片煎服

萝卜饮治诸热吐血衄血

生萝卜取汁半盏入白盐少许服之立效如无生萝卜只用萝卜子一分微炒紫苏茎叶半分剉散用煎亦效

血余散治吐血衄血

头发烧存性

右研细每服二钱米汤调下衄者更以少许吹入鼻

小便出血则小肠气秘气秘则小便难其痛者谓之淋不痛者谓之尿血

头发烧存性为末新汲水调下妙

又方

车前子但晒乾为末每二钱以车前子叶煎汤调下

又方

海金砂为细末新汲水调下五淋散夹五苓散竹园尿门冬草灯心葱头煎汤调下

法制香附方治诸下血

大香附【杵去毛皮以童子小便浸一日夜日乾截碎又用米醋蘸过焙乾】

右为末每二钱米汤调下治冷带用炒艾叶煎汤调下

又方

净香附酒醋各半煮透焙

右为末黄稬米糊圆桐子大每四五十丸米汤下

又方治血下带下

香附【杵去皮二分童尿浸一日夜】 艾叶【三分米醋煮透晒焙】

右为末粳米糊圆桐子大每五六十丸艾醋汤或醋汤下

烧盐酒治血闭腹痛产後瘀血腹痛

新布数重包裹白盐一合炭火烧存性

右研细末温酒调下新布即青麻也能逐瘀血

桂枝酒治打扑伤坠瘀血溷闷身体疼痛

辣桂

右为末每二钱温酒调下或用辣桂一分大黄当归各半分每三钱生姜紫苏煎服取下黑物即安或未有药仓卒且服米醋一小盏亦散瘀血

朱砂丸治打扑惊忤血入心窍不能语言

朱砂为细末

右以猪心生血和圆麻子大日乾每服七圆石菖蒲煎汤下枣汤亦可

咯血方

天门冬【去心】 青黛【晒乾各四钱】 生蒲黄

川姜黄 油发灰【各钱】

右末炼蜜丸桐子大每五十丸入松阳柿中湿纸包煨香候冷桑白皮煎汤临卧嚼下柿能恋肺咯血属肺呕血属脾

九窍出血方

荆芥酒煎通口服

又方暴惊风九窍血其脉虚者

灵砂百粒分三次人参煎汤下【此证不可错认血得热则宣流妄用凉药误矣】

又方治伤寒呕血继而齿缝皆流血不止

开口川椒四十九粒

右用法醋大盏同煎临熟入白矾少许漱口含在口中少顷吐出再啜漱而含

和剂芎归汤治诸血作痛血晕沉迷血溢难产一切出血过多

川芎 当归【等分】

右为粗散每服三钱水盏半取一盏稍热服不拘时加缩砂治胎动腹痛漏血又名芎藭汤

胶艾汤治劳伤血气月水过多淋漓漏下连日不断脐腹疼痛经血淋漓不断

熟乾地黄 白芍药【各四两】 当归【去芦头】

艾叶【微炒各三钱】 阿胶【捣碎炒令黄燥】 芎藭

甘草【炙各二两】

右为粗末每服三钱水一盏酒六分煎至八分去滓热服空心食前日三服病甚者连夜并服

产宝固经丸

赤石脂【煨】 艾叶 补骨脂【炒】

木贼【各半两】 附子【炮一枚】

右末陈米饮和丸梧桐子大每服五十丸食前温酒送下

泽兰丸治气血不调肢体瘦弱

熟乾地黄【一两半】 泽兰【去大枝梗】 人参【去芦头】

黄耆【去芦头剉】 牛膝【去芦酒浸一宿焙】 赤石脂【各一两】

白茯苓【去皮】 木香 萆薢【酒浸一宿剉】 附子【炮去皮脐】 续断【各三分】
乾姜【炮】

肉桂【去粗皮】 芎藭 白术

当归【去芦酒浸一宿剉碎微炒】 甘草【炙微赤各半两】

右为末炼蜜丸如梧桐子大每服三十圆温米饮下空心食前产一百日内每日常服壮气益血

当归建中汤治妇人一切血气虚损【方见虚汗门】

和剂大阿胶丸【方见咳嗽门】

理中汤治胃脘逆冷心腹?痛【方见泄泻门】

和剂来复丹配类陰阳扶虚补损治心腹冷痛小儿慢惊风或吐利不止变成虚风搐搦者非风也胃气欲絶故也用五粒研碎米饮送下老人伏暑迷闷紫苏汤下妇人产後血逆上抢闷絶并恶露下上及赤白带下并用醋汤下常服和陰阳益精神散肾陰湿止腹脇冷疼应诸疾不辨陰阳证并宜服之【方见暑门】

震灵丹【方见湿门】

和剂黑锡丹升降陰阳暖脾补肾气冲胃腹膨胀刺痛【方见痼冷门】

和剂金液丹固其气治衄血【方见脾胃类】

养正丹治妇人血气带下腹痛助阳接真升降陰阳【方见痼冷门】

小乌沉汤调中快气治心腹刺痛

乌药【一两去心】 香附子【沙盆内浙去皮毛焙乾秤二两】

甘草【一分】

右为细末每服一钱盐少许【或不着盐】 沸汤点不拘时

参苓白术散【方见虚劳门】

附诸血

诸血方论

内经曰大怒则形气绝而血菀於上又曰怒则气逆甚则吐血又曰阳明厥逆喘咳身热善惊衄吐血又曰湿淫汗出为鼽衄又曰脾移热於肝则为惊衄胞移热於膀胱则癃而溺血又曰结阴者便血一升 结二升三结三升刘宗厚曰经云荣者水谷之精也和调五脏洒陈於六腑乃能入於脉也源源而来生化於脾总统於心藏受於肝宣布於肺施泄於肾灌溉一身目得之而能视耳得之而能听手得之而能握足得之而能步脏得之而能液腑得之而能气是以出入升降濡润宣通者由此使然也注之於脉少则濡充则实常以饮食日滋故能阳生阴长取汁变化而赤为血也生化旺则诸经恃此而长养衰耗竭则百脉由此而空虚可不知谨养哉故经曰一息不运则机缄穷一毫不续则穹壤判若夫失於调护者或暴喜伤心暴怒伤肝劳役太过饮酒坠堕积热三焦以致阴火沸腾血从火起故错经妄行而出诸窍是以从肺而上溢於鼻者曰衄血从胃而上溢於口者曰呕血咯血唾血者出於肾也咳血嗽血出者出於肺也痰中带血丝而出者或从肾或从肺来也又有血从毛孔出者曰肌衄血从齿出者曰牙宣其血出於小便来者曰溺血曰血淋出於大便者曰肠风痔血粪前来者曰近血粪后来者曰远血流结於肠胃之间而成积者曰血瘕血蔑大抵血从下流者为顺易治血从上溢者为逆难治丹溪曰口鼻出血皆是阳盛阴虚有升无降血随气上而出上窍法当补阴抑阳气降则血归经矣夫治血必血属之药欲求血药其四物之谓乎河间谓随证辅佐谓之大合汤者详言之矣余故陈其气味专司之要不可不察如川芎血中气药也通肝经性味辛散能行血滞於气也地黄血中血药也通肾经性味甘寒能生真阴之虚也当归分三治血中主药也通肝经性味辛温全用能活血各归其经也芍药阴分药也通脾经性味酸寒能和血治虚腹痛也若求阴药之属必於此而取则焉脾胃论有云若善治者随证损益摘其一二味之所宜为主治可也此特论血病而求其血药之属者也若气虚血弱又当从长沙血虚以人参补之阳旺则生阴血也若四物者独能主血分受伤为气不虚也辅佐之属若桃仁红花苏木血竭牡丹皮者血滞所宜蒲黄阿胶地榆百草霜棕榈灰者血崩所宜乳香没药五灵脂凌霄花者血痛所宜肉苁蓉琐阳牛膝枸?子益母草夏枯草败龟板者血虚所宜乳酪血液之物血燥所宜乾姜桂者血寒所宜生地苦参血热所宜特取其证治大略耳夫人生之血赖气升降气升则升气降则降气逆则逆气和则和气浊则乱如此失血岂不皆由气浊遇热妄行之所致也大抵治血莫先清气气清则血和气浊则血乱斯言信矣大凡失血当先辨其血出何经当用此经清气之药然後凉血审其虚实调治之东垣云伤寒家衄血者仲景言不可发汗盖为脉微也若浮紧者麻黄汤浮缓者桂枝汤脉已微者二药俱不可用宜黄芩芍药汤主之经曰诸见血身热脉大者难治是火邪胜也身凉脉静者易治是正气复也故脉诀云鼻衄吐血沉细宜忽然脉大即倾危此之谓也

犀角地黄汤治伤寒汗下不解郁於经络随气涌泄为衄血或沟道闭塞流入胃腹吐出清血如鼻衄吐血不尽余血停留致面色痿黄大便黑者更宜服之【方见声音门】

木香理中汤甘草乾姜汤治男妇饮食伤胃虚寒呕吐衄血

小柴胡汤茅苏汤人参汤茺藟汤血余散治诸呕吐血【俱见前气血门】

三黄补血汤治初见血及血多宜服

熟地【一钱】 生地【五分】 当归

川芎【各七分半】 柴胡 黄耆

牡丹皮【各五分】 升麻 芍药【二钱】

右以水煎服血不止可加桃仁五分酒大黄斟酌虚实用之内却去柴胡升麻

人参饮子治脾胃虚弱气促气弱精神短少衄血吐血人参【去芦三分】 黄耆【一钱】
五味子【五个】

白芍药 甘草【各一钱】 当归身【三分】

麦门冬【二分】

右件为粗散分作二服每服水一盏八分煎至一盏去滓稍热服

麦门冬饮子【拔粹方】 治脾胃虚弱气促气弱精神短少衄血吐血【方见内伤门】

归脾汤治思虑伤脾不能统摄心血以致反行或吐血下血【方见惊悸门】

是斋白术散【简易方】 治积热吐血咳血若因饮食过度负重有伤脾胃而吐血者最宜服之惟忌食热?煎?一切发风之物

白术【二两】 人参【去芦】 白茯苓【去皮】

黄耆【蜜浸各一两】 山药 百合【去心各七钱半】

甘草【炙半两】 柴胡 前胡【各二钱半】

右?咀每服三钱水一钟姜三片枣一枚煎六分温服

黄连解毒汤三黄丸治积热吐血咽膈不利【并见火门】 龙脑鸡苏丸治膈热咳嗽或吐血衄血【方见积热门】

茯苓补心汤治心虚为邪气所伤吐血【方见虚劳门】

四生圆【良方】治吐血衄血阳盛於陰血热妄行

生荷叶 生艾叶 生栝叶

生地黄【各等分】

右研烂丸如鸡子大每服一丸水三锺煎至一锺滤过温服

藕汁散【济生方】治吐衄不止

生藕汁 生地黄汁 大蓯汁【各三合】 生蜜【半匙】

右件药汁调和令匀每服一小锺不拘时候

双荷散【圣惠方】治卒暴吐血

藕节【七个】 荷叶顶【七个】

右同蜜搗细水二锺煎八分去滓温服或研末蜜调下

枇杷叶散治暑毒攻心呕吐鲜血【方见中暑门】

侧栝散治内损吐血下血因酒太过劳伤於内血气妄行其血如涌泉口鼻皆流须臾不救服此即安又治男子妇人九窍出血

人参【去芦】 荆芥穗【烧灰各一两】 侧栝叶【蒸乾一两五钱】

右为末每服三钱入飞罗?三钱拌和汲水调粘相似啜服

一方治饮酒过多蕴热胸膈以致吐血衄血

葛花【二两】 黄连【四两】

右为末以大黄末熬膏子丸如梧桐子大每服一百丸温汤下或煎服亦可

衄血

丹溪云凉血行血为主大抵与吐血同

犀角地黄汤入鬱金黄芩升麻煎服

金液丹【和剂方】固真气治衄血【方见气血门】

生地黄散【河间方】治鬱热衄血或咯吐血皆治之

枸?柴胡 黄连

地骨 白芍 甘草

天门冬 黄芩 黄耆

生地 熟地【各分】

右?咀水煎服若下血加地榆

茜根散黄芩芍药汤治鼻衄不止【方并见鼻门】

鼻通於脑血上溢於脑所以从鼻而出凡鼻衄并以茅花调止衄散时进折二泔仍令以麻油滴於鼻或以萝卜汁滴入亦可又茅花白芍药对半尤好外迎法以井花水湿纸顶上贴之左鼻衄以线扎左手中指右出扎右手中指俱出两手俱扎或炒黑蒲黄吹鼻中或龙骨末亦可

止衄散

黄耆【六钱】 赤茯苓 白芍药

当归 生芩 阿胶【各三钱】

右为末每服二钱食黄耆汤调下

麦门冬饮治鼻衄川芎三黄散治实热衄血【并见鼻门】清肺饮【试効方】治衄血吐血久不愈者

五味子【十个】 麦门冬 当归身

人参 生地黄【各五分】 黄耆【二钱】

右?咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓食後溫服用三棱針氣街出血立愈

一方治鼻?不止

用茅花塞鼻中外用茅花濃煎湯服

咯唾血

咯唾血者由於腎也又有瘀血內積肺氣壅遏不能下降用天門冬麥門冬知母貝母桔梗黃柏熟地黃遠志百部或加乾姜丹溪云痰帶血絲出者用姜汁青黛童便竹瀝入血藥中用如四物湯加地黃膏牛膝膏之類主之

阿膠圓治肺破嗽血唾血【方見前氣血門】

一方治痰中見血

牡丹皮 白朮【各一錢五分】 當歸

芍藥 桃仁【研】 貝母【各一錢】

山梔【炒黑】 黃芩【各八分】 桔梗【七分】

甘草【三分】 青皮【五分】

右以水煎服

又方治痰中血

牡丹皮 白朮【各一錢五分】 貝母

芍藥 桑白皮 桃仁【研各一錢】

甘草【三分】 山梔【炒黑一錢一分】

右以水煎服

又方治痰中血

橘紅【二錢】 五味【十五個】 甘草【三分】

人参【五分】 半夏 茯苓

白术 枳壳 桑白皮

黄芩【各一钱】

右以水一钟姜三片煎服或加青黛二钱

鸡苏散【济生方】 治劳伤肺经唾内有血咽喉不利

鸡苏叶 黄耆 生地黄【洗净】

阿胶 贝母【去心】 白茅根【各一两】 麦门冬【去心】 桔梗【去芦】
甘草【炙各五钱】

右?咀每服四钱水一钟姜三片煎七分温服

黄连阿胶丸【济生方】 治劳嗽血唾血【方见咳嗽门】

咳嗽血

丹溪云火升痰盛身热多是血虚用青黛瓜蒌仁诃子贝母海石山栀子为末蜜同姜汁丸噙化嗽盛者加杏仁後以八物汤加减调理痰盛者更加痰药主之大阿胶丸【局方】 治嗽血咯血金沸草散治肺热嗽血【并见咳嗽门】

茯苓补心汤治心气虚耗不能藏血以致面色黄瘁五心烦热咳嗽唾血及妇人怀妊恶阻呕吐亦宜治之【方见虚劳门】

人参芎归汤治虚劳少血津液内耗心火自炎燥热乘肺咳嗽咯血及血不荣肌动辄毛寒咳嗽【方见咳嗽门】

鸡苏圆【拔粹方】 治虚热昏冒倦怠下虚上壅嗽血衄血

黄耆 防风 荆芥【各一两】

鸡苏叶【八两即金钱薄荷】 桔梗

川芎 甘草 菊花

生地黄【各半两】 片脑【五分】

右为末炼蜜丸如弹子大每服一丸用麦门冬去心煎汤送下

牙宣血

戴氏曰牙宣有二证有风壅牙宣有肾虚牙宣风壅宣消风散擦之仍服肾虚牙宣以肾主骨牙者骨之余虚而上炎故宜服凉剂而愈甚者此属肾经下虚上盛宜盐汤下安肾丸间黑锡丹仍用姜盐炒香附黑色为末揩擦其妙不可言也

消风散【方见伤风门】 安肾丸【方见水饮门】 黑锡丹【方见痼冷门】

肌衄

巢氏曰肝藏血心之液为汗言肝心俱伤於邪故血从肤腠而出也名曰肌衄

一方治肌衄

用男胎发烧灰盒之立效

溺血

巢氏云心主於血与小肠合若心家有热结於小肠故小便血也血虚者四物汤加牛膝膏实者当归承气汤下之

琥珀散治尿血增味导赤散治血淋尿血瞿麦汤姜蜜汤五苓散并治小便尿血【方并见诸淋门】

小蓟饮子治下焦结热血淋尿血

生苳 小蓟 滑石

通草 淡竹叶 蒲黄【炒】

藕节 当归【酒浸】 梔子【炒】

甘草【炙各半两】

右用水煎空心服

当归承气汤

当归 厚朴 枳实

大黄 芒硝

右剉水煎

便血

大便下血者皆由五脏伤损所为脏气既伤则风邪易入积热在内而大便下血治宜四物汤加炒山梔升麻秦艽阿胶虚者加乾姜温散之

法制香附方治诸下血【方见气血门】黄连香薷饮治伏暑纯下鲜血【方见暑门】败毒散治风热流入大肠经下血不止【方见中寒门】胃风汤治风湿乘虚入於肠胃或下瘀血【方见痢门】当归和血散治肠癖下血湿毒下血

槐花 青皮【各六钱】 当归身

升麻【各二钱】 荆芥穗 熟地黄

白术【各六分】 川芎【四分】

右为末每服二三钱清米饮调下

一方治中毒下血

用蜡皮烧存性研细每服二钱水调下日进三服

肠风下血方别有肠风门类故不载矣

拾遗

腋气方

明白矾 黄丹入麝少许末之傅

又方

白矾研飞过临卧以纸衬棹上伸手托壁柱以矾擦腋下令热痛即换衣着旧衣用灰汁洗
又方

好绿矾半生半煨为细末入少轻粉研细每半钱匕浴後以生姜汁调擦候十分热痛即止

又方治腋下遗臭不可向迕

大蜘蛛一个以黄泥入少赤石脂并盐杵为窠子纳裹蜘蛛烧令通红候冷取蜘蛛研细入轻粉一字米醋调膏临卧浴净傅之腋下来早泻黑汁恶物为効埋之僻处

又方夜明砂为末用豉汁调傅

跌破出血方乌贼鱼骨细末傅亦治汤火伤烂

头破伤风方大南星末水调涂四围水出为効

失欠颊骨差方恣酒令醉通关散入鼻 即止

脚筋冷缩顽痹方大川椒【去肉二分炒出汗】

辣桂 川白姜 华陰细辛【各一分】

右为末酒麪糊圆桐子大每七十圆食前温酒下

附诸杂方

体气方

田螺散治体气【患此疾者因内有油湿是】

用大田螺一枚水中养之俟靛开以巴豆一粒去殼将针挑巴豆放在内取去拭乾仰頓盎内夏月一宿冬月五七宿自然成水取搽腋下絶根

一方先用臙脂搽腋下其出狐臭之处黄色就将前说巴豆田螺去靛掩於狐臭之上绢帛勒紧其狐臭从大便出则絶根矣

一方

用熟蒸饼一个擘开作两边掺蜜陀僧细末一钱急夹在腋下略睡少时候冷热之除根

附倒仓法

倒仓法治癰劳蛊癩等证推陈致新扶虚补损可吐可下用黄色肥牯牛腿精肉二十斤或十五斤顺取长流急水於大锅内煮候水乾少 添汤不可用冷水以肉烂成粥为度滤去滓用肉汤再熬如琥珀色隔宿不吃晚饭大便秘者隔宿进神芎丸不秘者不用五更於密室不通风处温服一鍾伺膈间药行又续续服至七八鍾病人不欲服强再与之必身体皮毛皆痛方见吐下寒月则重汤温之病在上欲吐多者须紧服又不可太紧恐其不纳病在下欲利多者须疎服又不可太疎恐其不達临时消息大抵先见下方可使吐须极吐下伺其上下积俱出尽在大便中见如胡桃肉状无臭气则止吐利後或渴不得与汤其小便必长取以饮病者名曰轮回酒与一二碗非惟可以止渴抑亦可以涤荡余垢睡一二日觉饥甚乃与粥淡食之待三日後始与少菜羹自养半月觉精神焕发形体轻健沉痾悉安矣大概中间饮至七八鍾时药力经涉经络骨节搜逐宿垢正邪宁不抵牾悉有急闷似痛非痛自然恶况此皆好消息邪不能胜正将就擒耳尤须宁耐忍受又於欲吐未吐欲泄未泄交作皆有恼聒意思皆须欢喜乐受一以静处之此等有大半日景象不先说知使方寸了然鲜有不张皇者矣未行此法前一月不可近妇人已行此法半年不可近妇人五年不可吃牛肉性急好淫不守禁忌者皆不可行此法倒仓全在初起三鍾慢饮最紧要能行经隧中去丹溪曰肠胃为市以其无物不有而谷为最多故曰仓仓积谷之室也倒者倾去积垢而涤濯使之洁净也经曰胃为受盛之官故五味入口即入於胃留毒不散积聚既久致伤冲和诸病生焉今用黄牯牛肉其义至矣夫牛坤土也黄土之色也以顺为德而効法乎健以为功者牡之用也肉者胃之药也熟而为液无形之物也横散入肉络由肠胃而渗透肌肤毛窍爪甲无不入也积聚久则形质成依附肠胃回薄曲折处以为栖泊之窠臼阻碍津液气血重蒸燔灼成病自非剖肠刮骨之神妙孰能去之又岂合勺铢两之丸散所能窥犯其藩墙户牖乎夫牛肉全重厚和顺之性润枯泽槁岂有损也其方出於西域之异人人於中年後行一二次亦却疾养壽之一助也

附取吐方

独圣散治中风痰迷心窍癩狂烦乱人事昏沉痰涎壅盛及治五癰心风等证

瓜蒂【不拘多少】

右为细末每服一钱以藟汁调下

四灵散治证同前

瓜蒂【一钱】 人参芦【二钱】 赤小豆

甘草【各一钱半】

右为细末每服一二钱或少至半钱量情与之食後薑汁调下

四玄散治证同前

綠矾 赤小豆 猪牙皂角【不蛀者去皮弦炙】明矾【二钱】葱管藜芦【五钱】

右为细末每服半钱或一二钱浆水调下如牙关紧闭斡开灌之

鱼骨鯁方

鱼骨鯁用砂糖白炭皮末紫苏叶滑石末和丸含口中津液咽下骨白随下

一方治鱼刺骨鯁在喉内

用山查树独根向下者与玉簪花根同捣取自然汁用匙或竹筒盛汁送入口内不可着牙着牙皆化累验

附自缢法

凡自缢高悬者徐徐抱住解绳不得截断上下安被卧之以一人用脚踏其两肩手挽其发常令弦急勿使缓纵一人以手按据胸上数摩动之一人摩捋臂胫屈伸之若已强直但渐屈之并按其腹如此一时顷虽得气从口出呼吸眼开仍引按不住须臾以少桂汤及粥清灌令喉润渐渐能咽乃止更令两人以管吹其两耳此法最好无不活者自旦至暮虽冷亦可救自暮至旦陰气盛为难救尔

附救冻死法

凡四肢直口噤只有微气者用大釜炒灰煖以囊盛熨心上冷即换之目开气出然後以粥清稍稍进之若不先温其心便将火炙则冷气与火争必死

孙真人救落水法【医方大成】

急解去死人衣带艾灸脐中即活

一方治风狗咬

用小儿胎发炒新香附子野菊花研细酒调服尽醉

仁斋直指卷二十六

仁斋伤寒类书卷一

<子部,医家类,仁斋直指—仁斋伤寒类书

钦定四库全书

仁斋伤寒类书卷一 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

活人证治赋【理内通彻攻取陰阳】

论风寒暑湿温热诸种脉证治法

风缓寒紧

太阳病自汗脉浮缓为伤风用桂枝汤无汗脉浮紧为伤寒用麻黄汤伤风证见寒脉伤寒证见风脉则二药兼用○张氏云凡服桂枝汤而吐者其後必吐脓血诸可汗证服麻黄汤之後发烦目?□者必衄血衄乃解○寻常感冒不换金正气散加川芎燥实内热者人参败毒散与之世俗多以五积散为常用之剂然其用药温燥但可施之寒湿其他证候服之误人

暑虚热洪

中暑与夏月热病外证皆相似但中暑脉虚弱肢节不疼热病脉洪盛肢体痛重○中暑与香薷散小柴胡汤小便不通五苓散○夏月热病用药不可太温如表证当用桂枝汤麻黄汤之类须以黄芩升麻佐之其有表里俱热经日不解而脉数者竹叶汤可量与之○中暑何以脉虚暑伤气而不伤形热则气散也夏月登途十神汤亦能解暑

春日温斑曰毒

春病曰温脉浮紧其病轻夏至以前是也○春病发斑疹者曰温毒寸脉洪数尺脉实大其病重盖陰气衰而阳气盛也○春温升麻葛根汤热多者小柴胡汤○温毒用败毒散葛根橘皮汤并加紫草芍药

坏如?瘥如风

坏病曰温?尺寸脉弦盛先热後寒吐汗下积之余证也温?先热後寒及寒热相等者并小柴胡汤先寒後热小柴胡汤加桂若脉紧实大便秘大柴胡汤下之○瘥如风痼脉沉迟弦细项

背强急身体反张刚瘥无汗柔瘥有汗先識语者发刚瘥先手足冷者发柔瘥并属太阳盖先伤风又感寒湿致之阳沉於陰之中故其脉沉细瘥最难瘥十救一二湿家发汗太过亦作瘥刚瘥麻黄葛根汤柔瘥桂枝加葛根汤

风温湿温自汗多发汗逆

风温脉浮张氏云寸脉浮滑尺脉濡弱盖素伤於风因而伤热所致也湿温寸脉濡弱尺脉小急素伤於湿因而伤暑所致也外证并多自汗谨勿发表表汗则逆○风温人参羌活散小柴胡汤萎?汤○湿温通用除湿汤五苓散湿气胜身痛大便滑与术附汤暑气胜烦渴大便秘白虎加苍术汤

风湿中湿有便秘与便通

风湿脉浮虚大便秘小便利身痛微肿风气与湿气相搏然也○中湿脉沉缓大便利小便秘身痛发黄风雨袭虚山泽蒸气然也○风湿通用败毒散小便不利者五苓散○中湿通用除湿汤五苓散大便利小便亦自利术附汤已上总名伤寒

【二】论陰阳虚盛表汗里下及表里余证

原夫阳虚则陰从内出而恶寒陰虚则阳自外入而结热

经云阳虚则外寒陰虚则内热阳虚於表故陰出而乘之所以恶寒而支肤怯冷也○陰虚於里故阳入而乘之所以结热而燥胃乾而大便鞭秘也出入之间寒暑则变

恶寒者为表邪汗则必愈结热者为里病下之随彻阳虚陰盛表病里和汗之而愈属桂枝汤麻黄汤葛根解肌汤○陰虚阳盛里病表和下之而愈属小承气汤大柴胡汤大承气汤随轻重而度用之不过除邪辅正而已○原韵四句汗下纲领表证脉浮里证脉实有能察脉以辨其表里验证以审其汗下治法无余蘊矣○脉微迟坏病虚烦咽乾诸血诸动气并不可汗○脉浮濇小便清或少呕吐厥逆喉塞诸动气并不可下

非汗候又不可下表里无证但解和

非汗证又非下证小柴胡汤随证加减为良解表加桂通里加枳殼半表半里证亦主之败毒散和解散可以参用○若经多日不大便目中不了了或热不止脉虽浮数可小承气汤大柴胡汤下之

有浮脉复作里烦内外俱见惟渗泄

渗泄以五苓散利小便若久不大便而小便反清者与桂枝汤○若心下满大便鞭头汗出微

恶寒与小柴胡汤○又桂枝人参汤即理中汤加桂可以解表和里桂枝加大黄汤可以解表攻里皆主治表里俱见之证

【三】论随变随应不可拘以日数及荣卫府脏受病浅深

意曰脉以证别证因脉寻

据脉以验证问证而对脉证如此脉亦如此一依条例用药证与脉略同则加減於其间证与脉大异则消息揣量俟其形见然後以某证某药条例主之凡治伤寒贵乎纖悉问证

阳脉浮长弦而盛陰家细微缓而沉

太阳脉浮阳明脉长少阳脉弦太陰脉沉细少陰脉沉带紧厥陰脉微缓尺寸俱如此手六经足六经经有十二伤寒只传足六经

始证遽阳盛即下胃府

始得病便为阳盛入内之证即属阳明阳明即胃府也用小承气汤下之不必拘以一二日在太阳

初得若脏病直温少陰

阳受病则在腑陰受病则入脏发於阳则先属太阳发於陰则先属少陰此二经受病最多○若初得病便作脉沉厥冷恶寒即是少陰用乾姜甘草汤四逆汤温之○少陰反发热证麻黄细辛附子汤○少陰属肾太阳属膀胱合为脏腑此二经受病最多者谚曰伤寒偏打下虚人是也

如脉浮多日以有表但病在太阳宜究心

张氏云凡病至十余日太阳证犹在而脉浮者但治太阳不可拘以日数桂枝麻黄各半汤主之

皮肤为卫血脉为荣荣行中卫行外

卫行脉外在皮肤荣行脉中在血脉风伤卫气其病浅故用桂枝汤以解肌寒伤荣气其病深故用麻黄汤以发汗合而谓之太阳表证也

肌肉属胃陰证属脏胃入里脏尤深

荣卫之下为肌肉阳明主之肌肉之下为脏三陰主之胃者阳证之里脏者陰证之里入胃当下入脏当温胃府为里脏则又深於里者矣

【四】论一证之中有表有里

岂不以恶寒一也外热属阳无热属陰

太阳恶寒脉浮有热用桂枝汤麻黄汤○少陰恶寒脉沉无热用理中汤四逆汤○太陰厥陰皆不恶寒然厥陰只有一证大汗出热不去中拘急肢体疼下利厥逆不恶寒者四逆汤主之

发热一也不渴为表见渴为里

表有热不渴小柴胡加桂○里有热口燥烦渴身热四肢厥而脉滑白虎加人参汤欲知内有热内无热但以饮食喜冷喜热试之○太阳发热则恶寒阳明发热则自汗少阳发热则呕

有先温乃汗之证

厥陰下利腹满身疼先温里乃发表温里用四逆汤发表用桂枝汤

有先解後攻之理

太阳病不解热结膀胱其人善忘如狂而血自下下者愈若外不解可先与桂枝汤外已解但小腹结急乃以桃仁承气汤攻之

身疼作热诊之浮则腑候外应体痛自利沉而得则脏家病起

均是身体疼痛脉浮发热者表未解用桂枝汤○脉沉自利者里不和用四逆汤○凡下利须辨陰阳三阳下利身热太陰下利手足温少陰厥陰下利身冷

热而忪满嘔曰支饮凉而脇坚呕为里水

身热乾呕嗽喘微利心下怔忡此为表有水小青龙汤汗之○身凉乾呕汗出短气微利心下痞满引脇鞭痛此为表已解而里有水十枣汤下之经云诸有水气目下微肿

体如火反欲被寒在骨髓热在皮肤身极冷犹恶衣寒在皮肤热在骨髓

表热里寒者脉沉而迟先与陰旦汤寒已用小柴胡汤加桂○里热表寒者状如热厥脉沉而滑先与白虎加人参汤热已用桂枝麻黄各半汤○又少陰恶寒而蜷时烦不欲厚衣大柴胡汤下之

【五】论病在三陰当温病在胃膈可吐及合病并病治法误汗误下失汗失下诸变证

大抵无身热无头疼则温以陰经之剂

身热头疼多是阳证三陰证例无身热无头疼盖诸陰经络上至颈而不至头故也理中汤甘草乾姜汤四逆汤温之○惟厥陰呕吐涎沫有头疼而无身热用吴茱萸汤○少陰有反发热而无头疼然其脉沉不可误下以麻黄细辛附子汤温而表之○但陰证终无大热亦无汗纵有微热亦或下利手足厥也世俗不识陰证者多每遇伤寒必欲发汗请以上数条例鉴之

有痰妨有胃满则吐其膈上之忪

病在胃膈或多痰或邪气妨满而怔忪者可吐之用瓜蒂散梔子豉汤或盐汤脉微者不可吐只用半夏茯苓枳殼桔梗陈皮之剂

三阳明俱可下惟合病恶寒者有表当汗

太阳阳明本太阳病因汗下利小便後胃中燥大便坚小便数属脾约圆不恶寒反恶热大便秘或谵语属调胃承气汤○少阳阳明本少阳病因发汗利小便後胃中燥大便难亦属调胃承气汤○正阳阳明即本经自病属小承气汤大承气汤三者俱可下○惟太阳阳明合病而有恶寒之证此则病在表却当汗之用麻黄桂枝各半汤○又喘条太阳阳明合病喘而胃满者不可下可与麻黄汤盖麻黄主喘故也○少阳阳明合病下利脉弦者木剋土名曰负不治

并太阳在外解若归根入胃者本条用攻

太阳阳明先合病然後并归一经但见太阳证者可汗但见阳明证者可下

所以阳盛有桂枝之毙陰多戒承气之冲

桂枝下咽阳盛即毙以火济火也承气入胃陰盛以亡以水济水也

当下而汗为无阳为厥竭为譫语当汗而下为痞气为懊憹为结胸

当下而误汗则外泄其正气内之邪气乘虚而出焉当汗而误下则内泄其正气外之邪气乘虚而入焉又有伏阳证候而脉沉伏尤不可误用热药温之轻则变证重则害人常须体认○下厥上竭者由其妄汗动血口鼻耳目有血出也○懊憹者真气内虚客气动膈懊恼烦郁之状

失下则血凝气滯以热厥

当下不下血气不通故热深则厥深也热厥初得病身有热其脉沉滑指瓜时温小承气汤主之

失汗则热闭狂忘而蓄脓

当汗不汗蓄热化为毒血善忘如狂昏迷譫语心忪语短眼闭目红漱水燥烦喘满痛闷骨热肤闕背冷足寒小便多大便黑小腹结急皆血证也轻者犀角地黄汤重者桃仁承气汤三黄圆抵当汤员取尽黑物为度○若外不解者用先解後攻条例经云血在上则忘血在下则狂

下後脉数大便坚当解瘀红之毒

无表里证已下後脉数不解消谷易饥至六七日不大便内有瘀血也属抵当汤

少者热壮与断下转加热闷之凶

少实人壮热下利若用药止之则转加热闷而死矣【六】论审证投药三可轻用

尝考夫无汗烦燥而脉浮紧者可服青龙

无汗脉紧为伤寒烦燥脉浮为伤风若无汗而烦燥其脉浮紧比为伤风见伤寒证候风寒俱盛小青龙汤汗之

无汗喜渴而脉单浮者勿投白虎

无汗脉浮表未解而陰气盛虽渴不可用白虎太寒可小柴胡汤若汗後脉洪大而渴则为里有热乃可用白虎汤或脉浮滑而渴则为表里皆热亦可用白虎汤盖滑在浮之下生血气实滑脉当作里证大抵白虎汤主病在太阳阳明之间若全谓太阳则表证已解全谓阳明则大便不结若表里之间有热故用之然而当用白虎汤者可且与竹叶汤

用热远热之为当用寒远寒而後愈

冬温夏清用药亦然谓如夏月桂枝汤加黄芩冬月柴胡汤加桂是也嗜饮酒者不可用桂枝热呕者不可用生姜○伤寒服药中病即止後服不必尽剂

阳明自汗引饮则五苓散非可轻进

阳明汗多以利小便为戒汗多则胃燥虽渴不可用五苓散恐利其小便胃愈燥也可竹叶汤此渴证与其他不可

太阳自汗数尿则桂枝汤不容妄取

桂利小便自汗数尿津液已泄故不可与桂枝汤误服桂枝得之便厥但用甘草乾姜汤芍药甘草汤甘辛以表之皆去桂甘

发散为阳药以甘辛涌泄为陰剂惟酸苦

阳虚陰盛汗之则愈故用甘辛发散以助阳甘辛之药为能复其阳气也○陰虚阳盛下之则愈故用酸苦涌泄以助陰酸苦之剂为能复其陰气也

口噤咬齿大承气

刚瘕咬齿口禁胃满脚挛大承气汤主之

吐取?行

瓜蒂散栀子?汤皆用?

奔豚动气用桂心

动气曰奔豚桂利小便而泄之故动气药中多用桂大抵水结不散气与之?即发奔豚治法多利小便勿汗下或用理中汤去术加桂盖肾恶燥故去术也

呕由姜主

呕家圣药是生姜千金之说信矣然气逆作呕生姜散之痰与水作呕半夏逐之呕有热有寒生姜於寒证最便若遇热呕不可无乌梅

【七】论脉证顺逆及诸恶证不治

又当知陰病阳脉与汗後而平静者活阳病陰脉兼汗已而疾洪者亡

陰病阳脉则不成阳病陰脉则不水得汗而脉静者生汗已而脉燥疾者死故汗後复热其脉燥疾狂言不食曰陰阳交不治○凡汗後复热脉浮数或洪大者为表证犹在当再汗之若脉沉实则下之○尺寸脉俱虚而热不止者不治七八日已上发大热者难治大发湿家汗则成瘕热而瘕者不治又厥逆胃脉无脉服药後脉不至或脉暴出者并死

厥而烦加吐泻肾证未易保

少陰证四肢厥冷吐利烦燥不治盖真阳气絕而虚阳独用也

厥而利反能食除中何以当

厥陰证厥逆下利当不能食反能食者曰陰中不治张氏云胷中如虫啮粥入则出盖暴多食一顿而絕也

或气出呕闷或肢冷脐硬

张口出气乾呕或目眶陷不治上气喘粗心下痞闷不治四肢冷脐下绞痛如石硬者逆

或口噤汗战或肝弦土伤

汗出如油口噤肉战伸吟喘促者死○六七日传厥陰经脉来浮缓此为胃气全其病欲愈荣卫将复寒热作而大汗解若脉弦为厥陰肝经移气尅土肝受贼邪不治故有耳聋舌卷囊缩之证○又阳明少阳合病下利脉弦本尅土不治

两感之与脏结脏厥

两感乃陰阳二经双传最恶不治有本条○脏结者证如结胷舌上胎滑虽能饮食然时时下利脐腹引陰筋急痛不治有本条○脏厥者七八日肌肤冷下利发燥无时暂安不治

多日而为毒陰毒阳

阳气暴絕病为陰毒陰气暴絕病为阳毒非得汗不能复其正气然此二毒随气逆上结伏於胷中皆令人心腹筑痛有自利者有用药而不得利者并要随其寒温而利逐之庶几毒泄则暴絕之气复荣卫流行自然大汗而解矣药证详见本条凡陰阳二毒急作救疗过六七日者不治

烦燥结胷

结胷证具更加烦燥者逆盖陰气内絕而孤阳不生也

重喝寻衣而直视

误发湿温汗曰重喝不治目直视口鼻黑手寻衣缝最逆形体黯惨直视摇头为心絕不治狂言直视遗尿为肾絕不治喘满下利妄言直视亦死○又日晡潮热独语直视如?甚则循衣摸床但譫语者承气汤下之下後脉弦者生脉濇者死弦为阳濇为陰是阳病见陰脉也

缩囊咳逆

厥陰唇青舌卷黑而肾囊缩者死伤寒腹满而泄或咳逆不止者死

离经代脉以皆戕

损脉离经一呼一至为不及至脉离经一呼二至为太过惟陰易阳易二证有之○代脉动而中止不能自还因而复动元气絕也并不治张氏曰脉乍数乍疎者死又曰伤寒脉结代心动悸灸甘草汤主之【八】论变例法当通变

断之曰阳明无汗少陰反热取表以温

阳明反无汗皮上如虫行此为久虚用术附汤建中汤温之又阳明脉浮无汗而喘可发汗用麻黄汤又阳明脉迟汗出多微恶寒者表未解也用桂枝汤○少陰反发热脉虽沉麻黄细辛附子汤微汗之又少陰反发热自利厥逆无脉用通脉四逆汤又少陰病二三日常见少陰无阳热中满之证用麻黄附子甘草汤少陰亦有反自汗之证见无阳咽痛条○太陰腹满脉浮与桂枝汤

少陰口燥阳明汗多急攻其内

少陰口燥咽乾而渴恐肾汁乾大承气汤急下之者口燥自利心下痛则为积证亦用承气汤少陰恶寒而蜷时烦不欲衣被为表塞里热大柴胡汤下之少陰多日脉腹满不大便可与承气汤○阳明发热汗出多恐胃汁乾大承气汤急下之○又太阳结热在里往来寒热太阳发热吐利心下痞便太阳无表里证发热多日大便难并用大柴胡汤下之此亦变例

下腹满下缩囊皆陰证之下剂

太陰腹满时痛桂枝加大黄汤若腹满而脉浮则表证犹在只用桂枝汤微汗之○厥陰舌卷囊缩为毒气入脏承气汤下之厥陰下利譫语脉不微细与小承气汤

温漏虚温濇脉乃阳家之温辈

太阳证发汗漏不止拘急恶风太阳风湿八九日身烦疼脉虚浮濇通用桂皮加附子汤芍药甘草附子汤太阳七八日脉细恶寒为陰阳俱虚黄耆建中汤太阳风湿身体肿疼汗出短气恶风小便不利甘草附子汤太阳心中悸而烦燥小建中汤太阳汗後或下後病不解而烦燥茯苓四逆汤

至若陰极发燥

脉沉迟

热极发厥

脉沉滑

与夫陰证似阳

脉沉微

阳证似陰

脉沉滑

又当识脉之所在

物极则反寒暑则变证虽疑似脉可推寻数热迟寒陰阳别矣○又陰盛膈阳证身冷烦躁而不饮水者是霹雳散主之○厥有二证初得病身热烦躁大小便秘以至於厥者为热厥其脉沉滑可下之初得病身不热大小便利常凄清而厥者为冷厥其脉沉迟可温之又有发寒热而厥者面色不泽眩冒无脉急与麻黄甘草附子汤以汗之汗解则生服药无汗或脉不至者不治○凡当汗当下者如更有他证相妨切须且用和解俟其他证已退即依汗下法谓如脉来微迟虚濇不可汗下且与建中汤辈四肢厥冷不可汗下且与通和血脉脐间动气不可汗下且与理中汤去术加桂俟其脉不微迟虚濇俟其四肢已和俟其动气不作然後详审表里而汗下之至若结胷当下厥冷脉微即未可下且与枳梗汤之属热厥当下疑似未辨且以理中汤试之谨勿尚急急则误误则不可救解戒之哉○妊娠伤寒产前安胎产後调血川芎香附为要药发热以小柴胡主之汗下温法酌量而已○伤寒多日忽觉浑身癢疹发越而痒此乃用药中病陰阳分别荣卫流行病气自毛窍中出也他病亦然小儿惊风发热将产亦如是

伤寒格法张长沙开其源朱奉议导其流前哲後贤发明秘妙吾儒之孔孟矣世有谓伤寒论其辞艰深亦有以问答繁多增益意度议活人书者多见其不知量也活人宗师张朱作古是篇刊布不敢名称使学者稽为验为决以遡古人之用心皆知起敬

云先立其年以明其气是知司天在泉上见下临为其始也如子午卯酉陰阳互换六气在其中矣胜复之理补泻之法可从而推之 诀曰

子午少陰君火天阳明燥金应在泉丑未太陰温土上太阳寒水两连绵寅申少阳相火旺厥陰风木地中联卯酉却与子午比辰戌巳亥亦同然

岁会者甲巳化土而遇辰戌丑未之岁乙庚化金而遇申酉岁之类也太乙天符如乙酉岁乙

庚化金而遇酉又上见燥金司天也天符者如丙戌岁丙辛化水上见寒水司天是也司天符者如庚子庚午岁下临燥金在泉同岁会者如辛丑辛未岁下临寒水在泉是也岁遇天符岁会则为卑气阳干阳辰则为太过陰干陰辰则为不及也

六气图说曰太阳寒水治宜热阳明燥金金宜苦温少阳相火治宜鹹寒太陰湿土治宜苦热少陰君火治宜鹹寒厥陰风木治宜辛凉六气之行各居六十日有奇以真时而化其气过犹不及病乃生焉故察其盛衰以味折之以正其气经云必折其还气而取化源益其岁元使邪胜使暴过不生奇疾不起是理岁之大要也

附伤寒脉法指掌图

阳脉陰病见阳脉则生

陰脉阳病见陰脉则死

<子部,医家类,仁斋直指__仁斋伤寒类书,卷一

<子部,医家类,仁斋直指__仁斋伤寒类书,卷一

或曰杂病以弦为阳伤寒以弦为阴杂病以缓为阴弱伤寒以缓为和缓何也曰杂病以弦为阳者脉近乎浮实也伤寒以弦为阴者弦乃阳为阴所郁如养时寒气尚凜阳不得发越故春脉弦经云厥陰之至其脉弦是也若缓者伤寒以大为病进缓为邪退邪退病际则气脉和缓故为欲愈之脉杂病以紧为七表伤寒以紧急少陰盖紧者仲景多言咽痛下利虚损多汗等证然在阳经则浮而紧在陰经则沈而紧也若时疫流行经所谓天地之气胜复之作不行於证诊当於运气内详之

仁斋伤寒类书卷一

仁斋伤寒类书卷二

钦定四库全书

仁斋伤寒类书卷二 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

伤寒总括

调理伤寒统论

伤寒汗下温之法最不可轻据脉以验证问证而对脉太阳者阳证之表也阳明者阳证之里也少阳者二阳三阴之间太阴少阴厥阴又居於里总而谓之阴证也发於阳则太阳为之首发於阴则少阴为之先太阳恶寒而少阴亦恶寒但太阳之脉多浮少阴之脉沉细与其他证状亦自异也发热恶寒身体疼痛或自汗或无汗是为表证可汗不恶寒反恶热手掌心并腋下濇上而汗口渴胃乾壮热腹满小便如常不白不少而大便秘鞭是为里证可下厥冷拳默自利烦燥而无身热头疼是为阴证可温单浮与浮洪浮数浮紧者此表病之脉滑实弦紧中间数盛者此里病之脉沉而微细缓弱者此阴病之脉在表者邪传於荣卫之间在里者邪入於胃府之内胃府而下少阳居焉若传次三阴则为邪气入脏矣【胃府如府库之府故谓之里少阳一证惟小柴胡汤和解之三阴之经曰脏大抵以刚剂温之】荣与卫均为表也亦均可汗也然自汗者为伤风风伤卫气卫行脉外其脉浮缓而病尚浅则以桂枝汤助阳而汗之轻无汗者为伤寒寒伤荣气荣行脉中其脉浮紧而病稍深则以麻黄汤助阳而汗之重荣卫固为表也胃府亦可以为表也然以府脏而分表里则在府者谓之表在脏者谓之里胃取诸府可以表言若合荣卫府脏而分之则表者荣卫之所行里者胃府之所主而脏则又深於里者矣【荣卫属太阳经胃府属阳明经脏属三阴经】审脉问证辨名定经真知其为表邪则汗之真知其为里邪则下之真知其为阴病则温之表有邪则为阳虚阴盛而发表之药温里有邪则为阴虚阳盛而攻里之药寒阴经受邪则为脏病而温阴之药热是三者贵乎得中否则宁可不及亦不可太过得中者上也不及者次也夫苟太过则斯为下矣盖得中者如此而汗如彼而下又如彼而温桂枝承气投之不差姜附理中发而必中重者用药紧轻者用药微不背阴阳深合法度故曰得中者上也宁可不及者证与脉大同而小异名与证似异而实同当五分取汗而三分之剂散之当五分转下而三分之剂导之当纯刚温里而略温之剂扶持之未可汗下者与之和解未可遽温者且安其中若犹未也则增减於其间细细而加消详徐徐而就条理虽未遽安亦无传变故曰宁可不及者次也太过者粗工不知深浅轻举妄动者为之或问证而不知脉或执脉而不对证或名实之不辨或日数之为拘遂有汗下太早之失甚者诿曰不问阴阳当汗而反下则为痞为结胃为懊憹当下而反汗则为譫语为无阳动经为下厥上竭至於阳厥似阴之类误以刚剂投之舌黑发狂闷乱可畏性命至贵可轻试哉故曰夫苟太过则斯为下矣大抵治伤寒有法与治他病不同条例审的药进病除除剂少差生

死立异古之人处方立论曰可汗曰可下曰可温曰和解曰少与曰急下曰随证渗泄与夫先温其里乃发其表先解其表乃攻其里谓知音者若网在纲有条不紊此固得中者之事也若班固所谓有病不服药常得中医许仁则以为守过七日最为得计此非宁可不及之意乎王叔和善脉而且以承气为戒初虞世善方而论伤寒一节且谓麻黄桂枝非深於其道则莫之敢为又非所以为太过者之戒乎论而至此则知古人之立论甚严而伤寒汗下温之法其不可轻也信矣虽然汗下温之法固自有定论也经云伤寒六七日目中不了了无表里证脉虽浮亦有可下者少阴二三日无证亦有可汗者阴证四逆法当用温而四逆散辈中有柴胡枳实此岂厚诬哉曰医在九流之中非圆机之士不足与语也何者脉虽浮而亦可下者无表里证谓六七日大便难也藉使大便不难其敢轻下之乎少阴病亦有发汗者谓阴证初病便属少阴而反发热少阴本无热今反发热者是表犹未解故用温药微取其汗也藉使身不发热其敢轻汗之乎四逆汤用姜附四逆散用枳柴一热一寒并主厥逆固不侔矣然传经之邪与阴经受邪初病便厥者不同故四逆散用药寒主先阳而后阴也四逆汤用药热主阳不足而阴有余也其敢例视阴逆一切温之乎不特此尔伤寒有始得病其脉沉数外证腹满口燥烦渴即为阳盛入内之证医法以下剂攻之不可槩以一二日太阳而发表也前所谓阴证伤寒初病以来便见脉沉厥冷恶寒更无头痛即是少阴受病之证医法以乾姜附子辈温之又不可概以三阴传次先太阴而后少阴也若张氏之论日数则曰日数虽多但有表证而脉浮者犹可发汗日数虽少若有里证而脉沉实者即须下之是日数之不可拘也如此孙思邈云服承气得利谨不中补热气得补复成此所以言实热也王叔和有曰虚热不可大攻热去则寒起此所以言虚热也二人之言殊途同归是虚实之不可不辨也如此又况寒温热同实而不同名暑湿风异种而有兼病异气之相乘他邪之并作表证中之有不可汗里证中之有不可下三阴可温而攻积证者不同表里俱见与半表里无表里者有异中暑热病疑似难明伤寒伤风脉证互见阳明本多汗而有反无汗之形少阴本无汗而有反自汗之证或阴极发燥热极发厥阴证似阳阳证似阴差之毫厘缪以千里又有痰证食积虚烦脚气证似伤寒不可以伤寒之法拘之自非心领意会达变知几体认之精发用之审则纵横泛应几何而不误哉孔子曰可与适道未可与立可与立未可与权是说也亦在夫人权之而已矣

阴阳虚盛用药寒温辩义

外有脉内无脉为外实内虚外无脉内有脉为内实外虚虚实之义随其脉之有无者言之人所共知也若夫伤寒一书所谓阴阳虚盛则精微之义不无辨析於其间四十八难曰病之虚实出者为虚入者为实盖外有脉者表之真阳气虚故阴邪以盛出而乘阳是以脉浮於外其病在表法当汗之当其阴邪出表脉浮於外之时不可自惑以为阳脉盛也内有脉者里之真阴气虚故阳邪以盛入而乘阴是以脉实於内其病在里法当下之当其阳热入里脉实於内之时不可自惑以为阴脉盛也是说非古人之立意也盖使人知如此之为阴盛则抑阴而助阳如彼之为阳盛则抑阳而助阴阴盛而邪出於外者发表之药当性温以助阳如桂枝汤之类是也阳盛而邪入於内者攻里之药当性寒以抑阳如承气汤之类是也或曰阴出而乘於外是阳之不足也发汗则亡阳而汗之何哉是大不然阴邪传於外不汗之则邪何由去桂枝之性温温之乃所以助阳阳有所助而长则阴邪之所由以消甘辛发散为阳者此也张氏所谓承气入胃阴盛以亡者正恐阴盛出外而误以承气下之外得寒以助邪内攻虚而损正安

得而不亡或者又曰阳入而乘於内是陰之不足也陰受病则当有以温养而下之何哉是又不然阳邪入於内不下之则邪何从出承气之性寒寒之乃所以抑阳阳有所抑而微则真陰之所由以长酸苦涌泄为陰者此也张氏所谓桂枝下咽阳盛即毙者正恐阳盛入内而误以桂枝汗之内得热以助邪外撤虚而损正又安得而不毙观古人发表之药多温攻里之药多寒则知陰阳虚盛之意微非止为汗下设正所以为用药寒温设也可不明辩哉【桂枝汤麻黄汤辈夏月用之须加黄芩升麻柴胡汤辈冬月用之须加官桂】

表里虚实辩义

伤寒治法内则审脉外则审证大要辩表里虚实为先病在表有表虚有表实病在里有里实有里虚又有表里俱虚表里俱实毫厘之分贵乎早辩表虚者脉浮而缓自汗恶风用桂枝汤以解肌表实者脉浮而紧无汗恶寒用麻黄汤以发汗里实者脉伏而牢心腹痛结或大便坚小承气汤大柴胡汤以下之里虚者脉沉而弱自利厥冷理中汤四逆汤以温之至若表里俱虚则举按脉虚如急救表里之类下利身疼先与四逆汤清温自调後与桂枝汤是也表里俱实则举按脉实如表里俱见之类脉浮尿赤与五苓散设下腹痛与桂枝大黄汤是也大抵出入传变各有处所浅深轻重时刻异同精对无差立当见效

六经用药格法

太阳属膀胱非发汗不能愈必用桂枝麻黄以助阳却邪阳明属胃非通泄不能痊必用大黄芒硝以疏利阳热少阳属胆无出入道柴胡半夏能利能汗消解血热黄芩佐之太陰脾土性恶寒湿非乾姜白术不能温燥少陰肾水性恶寒燥非附子不能温厥陰肝木藏血荣筋非芍药甘草不能滋养此用药经常之道也然三阳汗下和解人皆知之至若太陰温燥不行则亦当温利如桂枝加大黄之类是太陰自阳明而出也少陰虽用附子亦有麻黄细辛之证是少陰自太阳而出也厥陰类例其间有用桂者是厥陰自少阳而出也其或太阳少阳二经郁闭则三陰皆自阳明出焉故三陰皆有下证如太陰腹满时痛为有积少陰咽乾口渴为肾汁乾厥陰烦满耳聋舌卷囊缩为毒气入脏皆当下之知乎此则伤寒用药之法随变随应而不穷矣虽然伤寒七日传遍六经此约法也或首尾只在一经或间传一二经而止又不可拘但据脉与外证验之是为活法是篇用字膀胱即太阳胃即阳明胆即少阳太陰曰脾少陰曰肾厥陰曰肝盖取其音律正耳

伤寒内实大热通利之後已得轻瘥且量进白粥两三日未可遽与和胃之剂热气得之又复作也继此旋以易简温胆汤入竹筴与之或二陈汤加前胡亦可矣二药伤寒瘥後通用无热者只守本方世俗以四君子汤为贵细循习用之不思内有白术温而闭气往往因此而燥闕矣

仁斋伤寒类书卷二

仁斋伤寒类书卷三

<子部,医家类,仁斋直指—仁斋伤寒类书

钦定四库全书

仁斋伤寒类书卷三 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

伤寒证治

表里汗下二证

发热憎寒体痛时 脉浮解表定无疑不憎寒却频憎热 多汗咽乾里下之

○表证脉浮身体肢节疼痛恶风恶寒○里证脉实而不浮不恶风寒反恶热身不疼自汗譫语不大便或咽乾腹满○表里俱见证张氏用五苓散真人用桂枝大黄甘草汤一块生姜两个枣肉桂大黄等甘草满盏水煎存七分表里伤寒只一扫【岳阳楼降笔】

三阳三陰脉

阳属膀胱胃胆间 陰居脾肾更连肝浮长弦细沉微缓
审脉仍将外证看三阳外证【足之三阳从头走足】

腰脊头疼热恶寒 目疼汗热鼻中乾耳聋口苦时乾呕 胷脇坚疼寒热干

○太阳证腰脊强头项痛发热恶寒若伤风则鼻塞恶风○阳明证目疼身热鼻乾不恶寒反恶热自汗出不得卧内实大便难○少阳证耳聋胷脇痛或口苦咽乾目眩或往来寒热而呕○阳病体轻脉轻外证壮热烦渴大小便秘头面有汗昏溃气鼯扬手掷足

三陰外证【足之三陰从足走腹】

腹满肢温利不烦 舌乾燥渴或憎寒唇青舌卷多烦满 筋急囊间缩又挛

○太陰证腹满或痛手足温自利不渴喉下乾○少陰证口燥舌乾而渴或口中和则恶寒常默默欲寐不欲见光明有时腹痛又有咽痛二证○厥陰证唇青舌卷烦满筋急囊缩【妇人则乳缩】或消渴饥不欲食食即吐蛔○陰病体重脉重外证厥冷唇青腹满不渴大小便自

利惺惺而静引衣自盖足挛而卧三陰病无身热无头痛其或渴者陰极发躁也○陰证唇青舌黑或白胎或卷强者用生姜频擦唇口续又易之姜能回阳生胃解毒温血散气擦之後陰消阳长黑转而红最为良法

汗下温正法

○太阳伤风自汗恶风桂枝汤伤寒无汗恶寒麻黄汤风寒俱盛则以桂枝麻黄汤兼用自汗小便数者勿用桂枝可乾姜甘草汤芍药甘草汤桂枝汤麻黄汤夏月用之须加黄芩○阳明不恶寒反恶热自汗大便难用小承气大柴胡汗多者胃汁乾急下大承气无汗恶寒升麻汤有汗脉迟微恶寒为表未解桂枝汤无汗脉浮发喘麻黄汤○少阳并属小柴胡汤柴胡汤辈冬月用之须加官桂○太陰自利不渴为脏寒理中汤四逆汤陰证手足必微厥若手足温便是太陰胃膈胀满枳实理中圆腹满脉浮桂枝汤腹满时痛桂枝加芍药汤痛甚桂枝加大黄汤○少陰脉沉口不乾舌不燥及背恶寒者并用四逆汤小便白者亦用四逆始得病脉沉反发热麻黄细辛附子汤口燥咽乾而渴急下之用大承气○厥陰脉微浮为欲愈不浮未愈小建中汤脉浮缓如疟状者囊不缩亦欲愈桂枝麻黄各半汤脉沉短者囊必缩为毒气入脏可承气汤下之利不止用四逆汤○三陰中寒微则理中汤稍厥或中寒下利则乾姜甘草汤大段重者用四逆汤无脉者用通脉四逆汤六经惟少陰难治大要以口燥而渴知其热脉沉而迟别其寒然亦有表里无热但烦憊默默不欲见光明其脉沉细或时腹痛此可以四顺汤增加乾姜对之增损理中圆亦可矣凡陰证白通汤四逆汤通脉汤条例未敢遽用者且以理中汤甘草乾姜汤代之虽然陰寒亦有毒乃病气也滞须行之养正丹金液丹半硫圆皆可流利又为要药

变汗法

○阳明与太阳合病有恶寒证属表可汗用升麻汤又太阳阳明合病胃满而喘麻黄汤○阳明本多汗若脉浮无汗而喘可发汗亦用麻黄汤又阳明病脉迟汗出多微恶寒者表未解也可与桂枝汤又阳明烦热汗出如疟或日晡发潮热而脉浮虚者并与桂枝汤若脉实者当用承气○太陰腹满脉浮桂枝汤凡太陰证有用五积散者非谓发汗盖去积耳○少陰初得病脉沉反发热者温之而微取其汗用麻黄细辛附子汤下利手足冷而身热者非属通脉四逆汤又少陰病二三日常见少陰而无阳热中满之证者用麻黄附子甘草汤微汗之二药皆陰证伤寒解表之剂陰证初病便属少陰不待传次

变下法

○太阳发热汗出不解呕吐下利而心中痞硬者大柴胡下之又太阳病十余日热结在里往来寒热亦用大柴胡汤无表里证发热七八日脉虽浮数可下大柴胡若大便难身微热者大柴胡急下○太陰腹满时痛甚者桂枝加大黄汤○少陰口燥咽乾而渴大承气急下之若口乾燥下利清水心下痛者为积证亦用承气汤又少陰证六七日腹胀满不大使用承气汤又少陰恶寒而蜷时烦不欲衣被为表寒里热大柴胡下之○厥陰脉沉短舌卷囊缩为毒气入

脏承气汤下之若厥冷耳聋囊缩而脉沉弦者为少阳厥陰两感不治有本条又厥陰下利譫语脉不微细与小承气汤

变温法

○太阳发汗漏不止恶风小便难四肢急难屈伸桂枝加附子汤太阳发汗後病不解而恶风者虚也芍药甘草附子汤又太阳汗後或下後病不解而烦躁者茯苓四逆汤又太阳心中悸而烦躁小建中汤又太阳七八日脉细恶寒为陰阳俱虚并不可汗下其人素无热者芍药甘草附子汤素有热者黄耆建中汤又太阳病八九日风湿相搏身烦疼难转侧不呕渴脉浮虚而濇桂枝附子汤若大便硬而小便自利者去桂加白术又太阳风湿相搏骨节疼烦身体微肿不能屈伸汗出短气恶风而小便不利者甘草附子汤○阳明病反无汗皮上如虫行者为久虚可温之用术附汤黄耆建中汤此非冬阳明无汗证也当加体认

伤寒伤风脉证

伤寒无汗恶寒攻紧濇浮兮惨在容自汗恶风浮缓脉面光不惨是伤风

○伤风脉浮而缓自汗恶风头疼面光发热烦躁手足不寒热胜於寒耳风伤卫气表虚自汗法当解肌桂枝汤败毒散独活散人参羌活散可选用之若项背强桂枝加葛根汤里寒不饮水者桂枝去芍药加附子汤或加乾姜脏腑滑者和解散若鼻塞通关散或发汗漏不止而恶风四肢拘急桂枝加附子汤壮热烦躁人参羌活散参苏饮或天麻防风丸薄荷泡汤调下脉濡紧自汗勿用桂枝汤当用小建中汤○伤寒脉浮而紧无汗恶寒头疼面惨发热拘急手足微寒寒胜於热耳寒伤荣气表实无汗法当发汗麻黄汤麻黄葛根汤人参顺气散可选用之头痛甚者葱白汤或热多寒少脉弱无阳只用桂枝二越婢一汤或喘急者可与麻黄汤尺脉迟而血少者黄耆建中汤○淋家衄家疮家虚家四动气不可汗可与小柴胡汤○太阳脉浮有汗为伤风脉紧无汗为伤寒○阳明善饥为伤风不食为伤寒○少阳耳聋目赤胷烦满为伤风口苦咽乾目眩为伤寒○三陰伤风但四肢烦疼

伤风见寒伤寒见风脉证

热盛而烦手足温风生寒脉紧浮全不烦少热肢微厥寒证兼风浮缓然

○伤风见寒脉伤寒见风脉为荣卫俱受邪用大青龙汤然大青龙不可轻用须是风寒俱盛又加烦躁一证方可与之叙易简者谓二证交攻则桂枝麻黄汤兼用尤为稳当

二阳合病

太阳合胃脉浮长若是浮弦合少阳胆合胃时弦不短更将外证互推详

○太阳阳明本太阳病若汗若下若利小便无津液胃中燥转属阳明故大便坚小便利是为脾约脾约圆麻子仁圆主之若恶寒则用升麻葛根汤不恶寒反恶热大便秘可少与白虎汤不恶寒反恶热大便秘或谵语调胃承气汤下之喘而胃满者不可下用麻黄汤○太阳少阳颈项强急脇下鞭满目眩往来寒热诸证并小柴胡汤○少阳阳明本少阳病因发汗利小便後胃中躁大便难属调胃承气汤○正阳阳明本经风盛气实也大柴胡汤大小承气汤主之○又三阳合病腹满身重面垢譫语遗尿口中不仁属白虎汤或舌乾口渴不仁背恶寒者通用○太阳阳明少阳阳明正阳阳明无表证者俱可下惟恶寒中寒为太阳阳明合病未过经却属表可发汗用桂枝麻黄各半汤盖在经则汗过经则下也○三陰无合病

太阳阳明并病

太阳已汗并阳明 不恶寒兮里未宁全入阳明须下剂 汗之犹在太阳经

○太阳阳明并病本太阳初病发汗而汗出不彻转属阳明续微汗自出不恶寒是并归阳明也○若太阳证尚在桂枝麻黄各半汤○若太阳证已退但有阳明者大承气汤下之

春温夏热

春温浮紧易轻安 发热头疼渴 干夏月伤寒为热病 脉来洪盛疗应难

温病发於春间及夏至以前是也发热咳 头痛身疼口中燥渴脉来浮紧特其病轻耳○热多者小柴胡汤热少者升麻汤解肌汤微热不渴者小柴胡加桂○渴者小柴胡去半夏加人参瓜蒌根脉实烦渴大柴胡微利之以其实而大便秘也虚烦用竹叶汤○嗽者小柴胡加五味子○夏月伤寒是为热病发热头疼肢体痛肿或恶寒或恶热其脉洪盛用药不可太温如桂枝麻黄青龙汤之属须以黄芩升麻佐之○热病二日外脉仍数邪犹在经络未入脏腑者桂枝石膏汤三月至夏谓之晚发栝子升麻汤

风温湿温

风温热汗脉多浮 喘渴痴眠体不收腹满脚寒头目痛 湿温譫热汗频流

风温尺寸俱浮素伤於风因而伤热风与热?即发风温惟其有风则四肢缓纵而不收也其证身热自汗头疼喘息发渴昏睡或体重不仁谨勿发汗汗之则譫语燥扰目乱无精张氏又云寸脉浮滑尺脉濡弱亦不可下下之则失洩直视若被火则发黄瘕瘕状如惊癇皆变逆之证耳○病在少陰厥陰二经用萎蕤汤人参败毒散○身灼热知母乾葛汤○渴甚括萎根汤○脉浮身重汗出汉防己汤误汗用防己黄耆汤救之○龐氏用葛根龙胆汤证治论用小柴胡汤未醒汤柴胡桂枝汤取微汗○痰壅金沸草散咳嗽加杏仁细辛五味子○湿温寸濡而弱尺小而急素伤於湿因而中暑湿与热?即发湿温其状胃腹满头目痛发壮热苦妄言身上汗多两胫逆冷倦怠恶寒苦若忘发其汗使人不能言耳聋不知痛处其身青面色变是重喝而

医杀之○湿温病在太陰经用白虎加苍术汤更加官桂○湿气胜则一身尽痛发热身黄小便不利大便反快用除湿汤五苓散脏腑虚大便湿者理中汤加苍术白茯苓虚滑甚者术附汤○暑气胜则壮热烦燥小便不利大便闭澀用香薷散治要六和汤脏腑闭而烦渴者白虎加苍术汤

风湿中湿

风湿浮兮额汗微 肿疼发热喜重衣身黄热痛沉而缓 中湿肠踈小腑稀

风湿脉浮先伤湿而後伤风故也外证肢体肿痛不能转侧额上微汗怯寒而不欲去衣大便难小便利热至日脯而剧治法但微解肌若发正汗则风去湿在非徒无益而又害之○治法微解肌用麻黄杏仁意苡甘草加白术防己黄耆汤不呕不渴脉虚浮濇者桂枝附子汤○湿多身痛小便不利甘草附子汤烦渴小便不利五苓散○外不热内不渴小便自利术附汤缓弱昏迷腹满身重自汗失音下利不禁白通汤多加白术少用甘草○身肿痛微喘恶风杏仁汤○通用人参败毒散热而烦渴者加括萎根若误下之小便必不利可与五苓散○中湿脉沉而缓风雨袭虚泽润蒸气人多为湿所伤也一身尽痛重着发黄关节烦疼发热鼻塞时或胀满大便利小便难其外证可汗湿家不可汗汗之则发瘥热而瘥者死亦不可下下之则额汗胷满微喘而嘔小便不利全济亦难经云治湿之法不利小便非其治也○中湿小便不利大便自利甘草附子汤五苓散或除湿汤加茯苓主之大小便皆自利则与术附汤身体痛或鼻塞黄耆建中汤小建中汤寒湿交攻疼痛重着易简渗湿汤甚者生料理中汤加熟附子○风寒气湿合而为痹其何以为之治曰寒多则为疼痛当用官桂乾姜附子风多则为走注当用麻黄意苡为头中气则为坚满紫苏陈皮枳殼所不可阙中湿则为重着能以茯苓苍术乾姜主之应手而愈

温暑中暑

温毒春间斑发疮 呕而咳闷透心脐背寒面垢虚表脉 自汗焦烦是暑伤

温毒者冬间感受寒毒乖气至春而发也表证未退毒气不散所以发斑肌肉疹纹心下烦闷呕逆咳嗽後必下利寸脉洪数尺脉实大其为病重盖阳气盛耳○治法通用玄参升麻汤黑膏亦主之或用败毒散加紫草咳闷而呕清汁者葛根橘皮汤证治论黄连橘皮汤○中暑脉虚弱或沉伏身热背寒面垢自汗烦燥大渴手耸恶寒昏昏倦怠而身不痛经云寒则腠理闭暑则腠理开开则洒然寒闭则热而闷体认不精以伤暑为热病误人多矣○内外俱热口燥烦渴四肢微冷而不痛白虎汤○痰逆恶寒橘皮汤热闷不恶寒竹叶石膏汤○头疼恶心烦燥心下不快五苓散消暑圆○霍乱吐泻香薷散温服○信効方中暑用小柴胡汤脉乳迟腠理开洒然毛耸口前开而板齿燥用白虎加人参汤○伤暑发大热头痛自汗咽疼烦燥腹中热缓诸药不効者小柴胡汤最良小便不利五苓散○热病中暑湿温虽皆因暑所致然脉证不同当明辨之热病者冬间感寒至暑气盛而後发此即夏月伤寒但热多而脉洪盛是也中暑者病在太阳外证与热病相似但热病脉盛肢节痛肿中暑脉虚肢节不疼兼面垢背寒而

手足微冷是也湿温者湿热相?致之病在太陰其脉寸濡而弱尺小而急外证胃腹满头目痛身热汗多而足胫逆冷是也以上三证夏月病多有之须别其名庶无毫厘千里之缪○凡夏月伤暑虽则热毒作恙皆因脾胃虚怯而得之胃虚然後伏暑伏暑然後烦燥其有饮水过多及用解暑冷药太过伤动其中真气内亏呕吐不食自利不渴六脉沉微按之隐隐是为里寒外热如陰盛隔阳之类不可更泥中暑伏热之说急以理中汤甘草乾姜汤与之纵或微烦小便不利断不可以为热也又有冷药过度胃寒停水潮热而呕或身热微烦此亦阳浮外而不内可与小半夏汤或加前胡脾胃素弱者二陈汤主之虽然抑犹有戒也夏月病多伤暑暑家脉虚面黧冷汗手足微寒苟不揣其里热之证妄以刚剂投之抱薪救焚不发黄则发斑甚至蓄血闷乱而死矣可不遡源徂流而精审云○假如夏月泄泻不止胃脘闭隔饮食不进或心腹痛满大抵因暑得之泄泻中满者香需散加缩砂下消暑圆心腹刺痛者香需散加缩砂下苏感圆俱得其便○假如夏月下痢【或赤或白】烦渴呕逆腹中搅痛小便不利是亦因暑致之可与五苓散香需散小柴胡汤黄龙圆之属若以此呕证为脾胃虚寒则误矣

痄病温症疫疔

痄甚风痙强体肢 柔刚二证汗谿推後寒先热名温症 疫疔之邪责四时

痄者先伤於风又感寒温致之发热腹痛口噤头摇痙痙不语项强背直腰身反张或目疼或目赤或闭目或反目或足冷或足温或妄行其脉沉弦而迟亦或带紧此为恶候不救者多若脉如雨溅散出於指外者旦暮殂也伤风头痛发热常出微汗又自呕逆汗之必发痄新产血虚汗出伤风亦致发痄大发湿家汗亦作痄热而痄者死痄初发来多有腹痛之证内经曰戴眼反折痙痙汗出如珠着身不流太阳絶也其谓是乎○发热无汗恶寒讖语为刚痄曰阳葛根汤麻黄葛根汤○发热有汗不恶寒为柔痄曰陰桂枝加葛根汤桂枝括萎葛根汤○二痄通用小续命汤阳痄去附子陰痄去麻黄○刚痄胃满口噤咬齿脚挛卧不着蓆大承气汤下之○柔痄桂心白术汤附子防风散八物白术散桂枝煮散○温症即坏病也尺寸俱盛先热後寒吐汗下後重感於寒得之寒多者其脉弦迟热多者其脉弦数寒热乃陰阳之争也或者谈论伤寒误药坏病吐汗下後续生寒热则曰?未必死所幸分而成之不思古人一药对一病药进病除安有所谓分为寒热者哉噫此可为智者道也○先热後寒及寒热相等并小柴胡汤先寒後热小柴胡汤加桂○多热但热而燥少与白虎汤或白虎加桂汤○多寒但寒者柴胡桂姜汤治中汤加桂虚人寒甚七枣汤○热多痰多呕不入食二陈汤加乌梅○小便赤澀汗出烦渴素有瘴气不伏水土而呕五苓散○大便秘呕吐寒热无时脉小紧者大柴胡下之○?脉自弦弦数多热弦迟多寒迟弱可温紧浮可汗紧实可下浮大而胃满者可吐○经云夏伤於暑秋必病?固非伤寒之谓然坏伤寒有温?一证若纏綿不已腹中必有症癖用药对治或者殊途而同归活人书以祛邪丸取吐久不愈者服疰母煎丸亦诸?中通用之剂耳惟症癖能生寒热凡癖皆有水恶血包裹而成也?母煎丸中有逐水破血之剂为能下之痰水在上者祛邪圆中有常山为能吐之疰家多蓄黄水若水不在於上焦则常山亦能下之也一法常山?榔一倍草果乌梅炙甘草各半新汲水隔宿煎凌晨服又法青蒿革丹等为细末研蒜入蜡圆如桐子凌晨三十粒枣汤下此皆胜药呕者可与二陈汤痰饮中节致生寒热者亦与二陈汤余见似?条例○疫疔传染老幼皆相似调治一也寸濡弱尺弦紧或肝脉濡细是虽积邪四时

然发汗吐下条例通行故曰明知逆顺正行无问虽然陰阳表里条例通行固也然其毒疔之气蘊蓄于中亦须随其温凉权其轻重而利导之庶毒有所泄则易为力也○病源云挟毒疔之气壮热烦毒发为心腹胀满者不治○春感清邪在肝升麻葛根汤解肌汤○夏感寒邪在心调中汤射干汤半夏桂枝甘草汤○秋感热邪在肺白虎加苍术汤发黄瘧茵陈调五苓散○冬感温邪在肾亦名冬温萎蕤汤○土无正刑因火而名当随经取之此大槩然耳○寒证者圣散子荧火圆神明散可选用圣散子内用术附豆?良姜只可施之寒湿毋惑於通用之说○温疫通用败毒散

痰证伤食类伤寒

有痰头项皆和畅 外热憎寒寸浮上头疼右数身不疼 左手脉平伤食状

痰证寸口脉浮发热憎寒恶风自汗胃膈妨满气上冲咽不能喘息头不疼项不强为异耳○有热用柴胡半夏汤金沸草散易简参苏饮无热二陈汤温胆汤○非次头痛者胃膈满发寒热亦是痰证但脉紧而不大瓜蒂吐之此不可谓痰证例无头疼当以他证参之也○伤食右手关脉紧盛而数头痛发热恶寒但身体不疼中脘痞闷噎食臭为异耳热邪伏於脾胃则食不能消经云人迎紧盛伤於寒气口紧盛伤於食人迎主外风寒入之气口主中饮食伤之是以有左右手之别○中脘痞闷呕而热者二陈汤加生姜乌梅○寒多不甚热者治中汤五积散○心腹满痛者大柴胡下之○胃膈实而呕吐者食在上脘瓜蒂散吐之○夹食伤寒证候按病源云下後六七日不大便烦热腹满而痛为胃中有乾糞挟宿食故也审如是则夹食伤寒即太陰积证腹满时痛桂枝汤加大黄者是尔所以太陰受病主胃膈?胀呕吐飧泄朱氏以为饮食得之如曰太陰证饮食不节胃膈不快用理中汤加青皮陈皮或枳实理中圆或二陈汤皆其治也今推明治法有表者与治中汤去白术多用青皮有表复有里者与桂枝加大黄汤若表证已解但有里证者小承气汤与之可也张氏云伤食者剉大黄三五粒入汤剂中正此意耳虽然夹食伤寒则脾胃已伤暴加转下不可也妄发其汗亦不可也识者於此又当权衡余见霍乱条例○夹食伤寒便见吐利厥逆而不挟表证者依陰病及霍乱等治之若吐利厥逆而挟表证者即依先救里後救表之法

虚烦脚气类伤寒

虚烦身首全无痛 脉自和平多热壅转筋恶食大便难 脚气酸疼而弱肿

虚烦诸虚烦热也不恶寒身不痛头不疼脉不浮不紧数为异耳【伤寒亦有虚烦见胃满烦燥条例】○重者竹叶汤轻者小柴胡汤呕者大橘皮汤并不可汗下○陰证虚烦外热内寒肢节疼痛陰旦汤○脚气初病发热憎寒头痛呕哕恶闻食臭肢节酸疼大便艰难或胃满腹痛卒起而脚转筋屈弱挛痛肿重痺顽为异耳○脚气通用三和散降气汤大流气饮乌药顺气散分气紫苏饮木瓜散只可二仁圆石南圆枳殼散用木瓜煎汤调下○毒气入腹冲心作痛吐涎者降气汤下养正丹或用吴茱萸制炒煎热入生姜汁主之○寒多者越婢汤小续命汤加生姜汁○热多者人参羌活散败毒散并加木瓜或追风毒剉散加大黄○风多者小续

命汤加独活或越婢汤○温多者除湿汤五苓散○痰多者除湿汤下白圆子挟寒者养正丹
○烦燥者竹沥汤或紫雪○大便秘者脾约圆神功圆麻仁圆或五积散加大黄○风毒肿痛
排风汤?榔散○筋急掣痛南木香煎汤调乳香趁痛散○又法香苏散三钱川练子两个取皮
肉剉新瓦上焙降真香碎三节和之新汲水煎空心热服脚气风癱痛痒皆作效更加川芎

脚气证候直与伤寒无异或发热头痛或身体冷疼或寒热往来或自汗恶风或无汗恶寒或
大小便秘澁腹痛下利胃满气短怔忡烦闷呕哕涎沫恶闻食臭大槩伤寒但卒起腿脚屈弱
顽痺肢节挛急酸疼或历节及踝胫间焮然赤肿为异耳伤寒传足六经脚气亦传足六经在
太阳则头痛项强腰背酸重在阳明则口燥鼻乾恶热谵语在少阳则耳聋口苦胃脇俱疼在
太陰则胃腹满痞肢体浮肿在少陰则咳喘恐惕咽痛面黧在厥陰则癱缓筋挛陰器胀痛六
经所传又有合病并病外证与伤寒并同凡遇发热烦燥大便不通呕哕痰涎而恶食者须审
问之脉浮而弦者起於风风则汗而愈濡而弱者起於湿湿则渗而愈洪而数者起於热热则
下而愈迟而澁者起於寒寒则湿而愈风寒暑湿证状不同然风为走注寒为疼痛暑为热烦
湿为重着必有可验之迹治法总要贵乎疎导大便但不可过剂其补汤淋洗则医家之大戒
也虽然脚气渐入顿深非药力相接不可也治之亦当究其源或因丹砂发动则为之解丹砂
或因饮食酿成则为之消饮食气触而作者与之调气续生他病者则以他病方药理之所患
气实而死未有服药致虚而殂甚者喘嗽上气冲筑心疼呕吐无已腹脇胀满脐下顽痺不仁
最为恶候大槩然尔所谓寒则温之热则寒之在表则散在里则下太虚气乏扶养其中是为
不刊之法○千金熨法食盐并竈中灰等和炒热重帛盛而熨

伤寒传经之邪病至厥陰其脉微带浮缓之状是则脾气将复邪无所容必寒热作而得汗解
若尺寸俱沉短此为毒气入脏土败木贼脾受肝邪必有囊缩舌卷耳聋不知人之证当急下
之五救其一或脉来弦亦贼邪也○许学士云轻手脉浮为在表表实浮而兼有力但浮无力
表中虚自汗恶风常淅淅重手脉沉为在里里实脉沉来有力重手无力大而虚此是里虚理
端的气口紧盛食必伤人迎紧盛寒邪炽趺阳胃脉定死生太谿肾脉为根蒂○之热入血室
血热留滞小柴胡汤加生地黄治血结胃按之痛活人书海蛤散盖血聚膈中则小肠必壅小
便通则胃次之血散矣○凡小便或赤或澁皆其里有热也

仁斋伤寒类书卷三

仁斋伤寒类书卷四

钦定四库全书

仁斋伤寒类书卷四 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

发热

发热初阳冷必憎 阳明发热汗之形少阳脉细仍兼呕 反热而沉属肾经

发热多属三阳太陰厥陰皆不发热惟少陰有反热之证然少陰发热终是脉沉或下利手足冷也三阳发热何以明之太阳发热则恶寒阳明发热则自汗少阳发热必有乾呕之证矣热邪在表病属太阳此表热而里不热也热邪在里病属阳明此里热盛而達於表也若表证未罢邪气传里里未作实病在表证里证之间若传经之邪至於少阳病在二阳三陰之间其热皆轻於纯在表纯在里者也然而阳明里实热盛固当攻之以寒太阳风寒外转陰盛恶寒虽热尤当温散少阳和解虽属小柴胡微热不渴者又当加桂是不可无以权之虽然伤寒发热病之常也脉陰阳俱虚热不止者仆下利发热者殂汗後复热其脉躁疾为陰阳交此皆不治之证其可例视之乎○太阳发热恶风有汗桂枝汤恶寒无汗麻黄汤○吐利发热恶寒是为霍乱○发热而渴自汗不恶寒是为风温若误汗之必身灼热烦渴独语各有本条○阳明发热汗出脉实调胃承气汤脉浮桂枝汤汗多者胃汁乾急下之用大承气汤○少阳发热脉细而呕小柴胡汤○少陰反发热有二证脉沉发热者麻黄细辛附子汤若下利厥逆里寒外热脉不出者通脉四逆汤○身热而不渴则为表热小柴胡汤加桂身热而燥渴则为里热白虎加人参汤○无表里证发热七八日脉虽浮数可大柴胡汤下之若下後脉数不解消谷易饥不大便则为瘀血属抵当汤

潮热

热潮属胃下之和 大结胷家本例图咳逆利溇并表证 勿攻则用小柴胡

潮热属阳明一日一发日晡而作也若非日晡所发是谓其热不潮盖阳明旺於未申故尔惟属阳明故潮热为可下之证苟其脉或弦或浮大便或溇或利小便艰澁外证犹有恶寒则其热未全入府并不可下但以小柴胡和解之是必表证已退大便鞅结小便如常乃可攻也

○日晡潮热属阳明经脉实可下证用小承气汤大柴胡汤脉虚不可下者与桂枝汤○大结胷潮一证却属太阳用大陷胷汤○咳逆潮热○大便溇利潮热○表证潮热并用小柴胡汤○腹满不大便只用小承气汤微利之勿令大泄○日晡潮热甚者循衣摸床独语如怪直视

微喘脉弦者可治脉濡者不治脉不实不虚但用小柴胡汤

○冬阳明潮热有时脉浮紧者无汗脉但浮必盗汗并用黄芩汤

寒热

往来寒热 阴阳 大小柴胡及桂姜结热 心烦仍喜呕 渴而头汗用之良

阳不足则先寒後热 阴不足则先热後寒 寒热往来者 阴阳相胜 邪正交争而作也 盖阳不足则阴邪出於表而与之争 故阴胜而为寒 阴不足则阳邪入於里而与之争 故阳胜而为热 若邪气在半表半里之间 则外与阳争而为寒 内与阴争而为热 出入无拘 所以乍往乍来而间作也 大抵邪居表多则多寒 邪居里多则多热 邪在半表半里 则寒热相半 此又可以知其受病之处 用药固自有条 然小柴胡汤最主寒热 寒多者加桂 热结者加大黄 脉不甚实而大便澁者加枳实 寒热相半 只守本方是亦活法 虽然寒热之方来如波涛之汹涌 其势有不容遏者 当迟之一二日 候少定而图之 经所谓其盛者可待衰而已 是又不可不知

○病至十余日 结热在里 往来寒热 大柴胡汤下之 ○心烦喜呕 胃脘满不欲食 寒热往来 小柴胡汤 或血气弱 腠理开 邪正交争 痰呕甚者 二陈汤 ○汗下後不呕而渴 头汗出 胃脘满 小便不利 寒热往来 柴胡桂姜汤

寒热似?

似? 膀胱 桂可医 清便不呕 半麻枝 阳明实下 浮须汗 血室 柴胡小者奇

似? 一名? 状作止 有时非若寒热往来 或踈或数 而作止无定时也 凡感冒之人 忽觉毛寒 股栗 筋节攣挛 百骸鼓撼 呕不欲食 其寒不可御 未几复转而发热者 此即温? 不必谓? 脉自弦或洪数 或紧实 或虚缓 或刮濡 皆为? 状 但以外证别之 用药固有本条 然小柴胡汤如前斟酌 加减亦是活法 虽然血虚能生寒 热败血亦作寒 热 阴阳相胜 虽一证各有一方 其间当以川芎为佐

○太阳似? 证脉洪浮 与桂枝汤 ○清便自可 不呕 日一二发 桂枝麻黄各半汤 其脉微缓微浮 则欲愈也 ○阳明似? 证烦热汗出 日晡发热 脉浮虚 与桂枝汤 脉实与承气汤 ○病人热入血室 其血必结 如疟状者 小柴胡汤主之 ○疟後寒热 或潮热 见瘥後昏沉 条 ○诸疟通用二陈汤 热多者加川芎 前胡 寒多者加川芎 草果 ○余见温疟

热多寒少

热多寒少 治膀胱 不呕 清便 各半汤 及脉若迟为血少 脉皆微弱 号无阳

热多寒少阳乘陰也其间三证并属太阳脉浮紧者可汗或迟或弱皆和解之清便自可谓大便如常也○不呕清便自可桂枝麻黄各半汤○尺脉迟血少者先以小建中加黄耆以养血俟脉不迟即以小柴胡桂枝二越婢一证主之○诸脉皆微弱无阳者用桂枝二越婢一汤不可正汗

汗後寒热

汗余寒热脉中论 若见憎寒法用温沉实当攻浮再表 风温误汗热而烦

汗後寒热邪气未解彻也脉浮洪者邪在太阳法当再汗脉沉实者邪在阳明又须下之若厥陰余热加以下利厥逆恶寒四逆汤温之无疑矣

○憎寒者属厥陰大汗出热不去拘急体疼下利厥逆四逆汤温之○脉沉实者属阳明得汗後如症状日晡而发大柴胡汤承气汤下之若只恶寒则为虚用芍药甘草附子汤只发热则为实大承气汤○脉浮洪者属太阳汗後寒热桂枝二麻黄一汤○风温不恶寒若误发汗必身灼热烦渴独语姜薤汤○温家汗後火热脉躁名陰阳交不治热病已得汗而脉躁盛亦不治详见陰阳交条有再汗再下之剂

下後有热【劳食复附】

下於汗後致伤荣 陰气衰兮热又生瘥後热名劳食复 心中痛者豉枳平

○大汗则损气损气则阳微脉虚而恶寒大下则伤血伤血则陰弱脉濇而发热误汗误下亦犹是尔且陰以阳为主阳以陰为根血陰也气阳也血非气使不能自行令也下之亡阳是阳不主陰矣陰无所主而寒气抔之所以脉濇寒极血虚所以发热方方之剂其可轻乎

○汗後阳微而恶寒可四逆汤或用芍药甘草附子汤○下後陰弱而发热是为内热可葶苈苦酒汤○瘥後劳复发热小柴胡汤枳壳栀子汤豶鼠粪汤【即雄鼠粪两头尖者】若脉浮则汗之用麻黄汤葱白汤脉实则下之用承气汤大柴胡汤证治论瘥後余热用柴胡桂枝汤下利腹鸣痞满者生姜泻心汤小便不利麦门冬汤○交接劳复外肾肿腹中绞痛竹皮汤劳役心力复热用枳壳栀子汤小柴胡汤余见陰阳易条○瘥後食复发热枳实栀子汤加大黄粥饭伤饱或食肉或饼脯硬物不消皆复热也伤食必有痞满暖气吞酸腹鸣下利等证可与生姜泻心汤○下後身热而心中结痛栀子汤○饮酒复热有本条

恶风

恶风汗出怯风吹 脉缓而浮但解肌发汗亡阳成漏者 温经之法莫迟疑

恶风者见风则怯密室之中无所恶也风伤卫气卫虚则腠理不密由是而汗出焉证虽属表

不可发汗但微解肌而已卫者阳也恶风阳证也所以表怯而恶风盖亦阳虚故陰邪出而乘之特其病在皮肤邪气尚浅耳

○桂枝汤桂枝加葛根汤主之壮热者与参苏饮○发汗太过卫虚亡阳汗漏不止而恶风者法当温经用桂枝附子汤或小便难四肢微急难以屈伸并用桂枝附子汤○身热恶风项强脇满手足温而渴小柴胡汤○风湿恶风不欲去衣骨节间烦疼掣痛不得屈伸汗出短气小便不利或身微肿甘草附子汤

恶寒

恶寒发热属於阳 陰病憎寒体自凉浮数桂枝并越婢 沉而细者理中汤

恶寒者不见风而怯寒身虽灼热亦不欲去衣被也此陰邪出而乘阳致之盖寒伤荣气荣行脉中居卫之下是为表邪已深法当发汗间有一二自汗则其表已虚但与解肌可也然而发热恶寒者属阳无热恶寒者属陰在阳则发汗在陰则温里常须识之大要恶寒皆为表证或里证悉具而微恶寒者是表犹未解当先解表俟不恶寒然後可以攻里【恶寒家不可近火气及过覆衣被则寒热相?脉道沉伏愈令寒不可遏但服和表等剂温而散之】○发於阳者脉浮数桂枝汤桂枝二越婢一汤麻黄汤青龙汤酌量轻重用○太阳证发热或未发热皆恶寒有汗用桂枝汤无汗用麻黄汤○阳明证固当下之惟恶寒中寒者系与太阳合病在经属表可汗用麻黄汤若脉迟汗多微恶寒者表未解也虽阳明病可桂枝汤○少阳证头汗出微恶寒小柴胡汤加桂○发热微恶寒柴胡桂枝汤○汗後反恶寒者为虚芍药甘草附子汤○下後复发其汗心下痞而恶寒者表未解也当先解表用桂枝汤表解然後攻痞用三黄泻心汤入生姜汁○发於阴者脉沉细理中汤四逆汤○少陰证脉沉细用理中汤四逆汤若下利恶寒而蜷手足温者可治用小建中汤若恶寒而蜷时时自烦不欲厚衣可大柴胡汤下之

背恶寒

背上憎寒值少陰 口和附子本条寻舌乾口渴三阳合 白虎汤中好酌斟

背负阳腹抱陰背寒者阳弱也然背寒有陰陝二证何以别之少陰一证以其陰寒气盛不能消耗津液故口中和三阳合病以其阳气?入津液为之乾焦故舌乾口渴陰寒阳热识者以口中润燥推之思过半矣

○口中和而背恶寒者属少陰附子汤○舌乾口渴内有热证口中不仁而背恶寒者为三阳合病白虎汤经云腹满身重面垢譫语遗尿口中不仁为三阳合病白虎加人参汤主之若自汗者亦用白虎加人参汤○又阳明证背微恶寒无大热口中燥渴者亦用白虎加人参汤○中暑亦有背恶寒证但面垢自汗脉虚而伏自有本条○凡脾胃素虚之人遇暑月间或饮冷水或多吃茶或餐雪菓之属易致生冷坏脾寒气蓄聚陰上乘阳故寒从背起冷如掌大此当以温药主之

四逆

四逆须将肾证详 病家手足但微凉枳柴芍药传经剂 邪中陰经四逆汤

手足不温谓之四逆陰经之邪主之太陰受病手足自温传至少陰则有手足四逆之证四逆之与厥冷实相远也或曰均是四逆耳而四逆汤散一寒一热用药何不类耶盖手足自热而至温由温而至四逆是传经之邪非虚寒之候也四逆散主之若得病以来手足不温便成厥逆此则陰经受邪阳气之不足也可以四逆汤温之脉诊要当审此虽然吐利烦燥恶见四逆四逆下利恶寒而蜷并属少陰又为不治之证故并及之○少陰四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛满或泄利下重并用四逆散○初病以来厥冷四逆即用四逆汤○湿温两足胫逆冷有本条

厥

冷厥初来厥有源 沉迟而弱冷常存热深发厥初身热 沉滑时乎指爪温

阳气伏藏陰气越出陰阳不相顺接所以厥也其手足逆冷之证乎盖诸阳会於四末阳微而为陰所胜初病便厥者是为冷厥其脉沉迟按之则弱醒醒而静恶寒引衣足多挛卧或身上粟形或下利清谷也热伏於内先热而後厥者是为热厥脉必沉滑按之则数昏塞狂言发渴引饮露手揭衣或燥不得眠或大小便不利也外证皆可验焉若先厥而後得热是则陰邪退而阳气复矣伤寒热多厥少其病当愈厥多热少其病则进下利发厥一条亦以厥者复热为有瘳热者复厥为己甚盖下虚则厥陰实使之阳长陰消其可也虽然伤寒血证亦有四肢发厥以至昏迷闷絕者此又不可不知至若少陰下利恶寒而拳手足厥冷与夫脏厥一证皆为不治之证厥之为厥可无辩乎○冷厥初病便作四肢逆冷足挛恶寒引衣自盖不渴大小便滑泄外证默默而醒四逆汤理中汤通脉四逆汤白通加猪胆汤当归四逆加茱萸生姜汤可选用○又痰厥气厥肾厥用易简芎辛汤○热厥初病身热然後发厥其人畏热扬手掷足烦燥饮水头汗大便秘小便赤怫郁昏愤盖当下失下血气不通故四肢逆冷所谓热深则厥深所谓下证悉具而见厥逆者此也与大承气汤大柴胡汤或白虎汤○热厥与冷厥相类但指爪时温为异耳若疑似未明且以四顺圆试之阳厥则有热陰厥则无热○寒热而厥者一手或两手无脉面色昏昧不泽急与五味子汤并麻黄细辛甘草汤人参调血通脉可以为佐服无汗解则生投药无汗或脉不至者不治○水气厥者心下怔忡茯苓甘草汤○邪气结胃中而厥者脉乍紧乍结心烦满饥不欲食瓜蒂散吐之○脏厥者七八日逆冷下利发躁无时暂安不治○痰饮厥逆眩运少与三生饮

头痛

头疼恶冷太阳先 恶热阳明胆细弦湿鼻寒兮痰膈满 厥陰乾呕吐清涎

头痛属三阳阳明少阳皆有之而太阳则专主是也太阳专主头痛则头痛之属表证者居多

阳明少阳又次而轻耳三陰经络上不至头故无头痛惟厥陰循喉咙之後上连目系顶巅有头痛乾呕吐涎吴茱萸汤一证却无身热亦与阳证不同也虽然太陰少陰其经从足至胷并无头疼是固然尔然风温病在少陰湿温病在太陰而头反痛至於陰毒亦是又某病则有某证脉络相通不可拘也若夫头痛剧甚入连於脑手足俱寒此则真痛神丹在手其能救乎○太阳头疼发热恶寒无汗麻黄汤有汗桂枝汤已汗未汗头痛如破连须葱白汤服之痛不止葛根葱白汤○阳明头疼不恶寒反恶热胃实气实攻於头也少与调胃承气汤○少阳头疼发热脉弦细小柴胡汤○湿头疼鼻塞头中寒湿也瓜蒂末纳鼻中黄水出则愈○痰涎头疼胷膈满发寒热脉紧不大瓜蒂散吐之可以痰证条参验○厥陰头疼乾呕涎泳吴茱萸汤若脉微浮为欲愈【脾气将复邪无所容】不愈用桂枝汤小建中汤若发热似疟亦欲愈桂枝麻黄各半汤诸头疼无热如圣饼用生姜葱白煎汤下

项强

项强葛根主表强 表虚桂葛去麻黄结胷须进?胷剂 桂入括萎瘕反张

伤寒颈项强急太阳表证也当发散而解之若误下太阳邪气乘虚入里则为结胷项强

○太阳病项背强无汗恶风为表实葛根汤项背强发热汗出恶风为表虚桂枝汤加葛根不加麻黄○误下太阳结胷项强大陷胷圆○太阳伤风复感寒湿身热足寒头摇口噤颈项强背反张其脉沉迟此为发瘕桂枝加括萎根汤○项强脇下满小柴胡汤

咽痛

咽疼阳毒发成斑 肢冷咽疮肾证看脉紧无阳咽亦痛 脉微下利肾伤寒

咽喉不利或痛或疮谷不入而呕吐者毒气上冲所致也阳毒必然发斑少陰四肢必冷其有下利者可与甘桔汤半夏散入甘草生姜佐之其不下利或小便赤而去衣者可与甘桔汤入玄参枳殼使大便顺导则黑臭之毒泄矣续以甘草生姜煎汤调之甘草生姜解其毒也肾病咽痛下利身犹热者未可用四顺汤且与黄连龙骨汤即黄连鸡子汤去鸡子加龙汤

○阳毒咽痛发斑唾脓血脉洪数用药有本条○少陰咽痛咽疮脉沉迟厥冷或吐利又陰阳脉俱紧反自汗为无阳法当咽痛而後吐利亦属少陰并不可汗下熏熨汗出以藁本粉傅之咽痛用甘桔汤猪肤汤若沉冷甚者半夏散通脉四逆去芍药加北梗与之○咽疼通用甘桔汤上焦壅热加枳殼北前胡○肾伤寒一证乃非时暴寒中人伏於少陰之经头疼腰痛其脉微弱初咽痛以伤寒次必下利非咽闭之比咽痛半夏桂甘汤即半夏散是也下利四逆汤或四顺汤下之○证治论口疮赤烂用蜜浸黄檗一宿取汁含咽热甚升麻六物汤咽中闭塞乌扇汤○伤寒六七日大下之寸脉沉迟尺脉不至咽喉不利唾脓血手足厥利不止者难治麻黄升麻汤

身痛

身疼浮紧太阳临 自利肝并肾带沉中湿毒陰与风湿 汗余霍乱本条寻

○局方大柴胡证云邪结在里大便秘澁心腹痛鞭者可服若身体疼痛是表证未解不可与之然则身体疼痛不脉沉不自利太阳之表证明矣其或自利脉沉此则陰证之身痛脏家之里病云【身痛大抵多是表证】○太阳身痛脉浮紧无汗麻黄汤以汗之或尺脉迟者血不足也先用小建中汤以养之俟其尺脉浮即用麻黄汤太阳病七八日脉细恶寒为陰阳俱虚吐汗下并不可至再其人素无热可芍药甘草附子汤素有热可黄耆建中汤○厥陰少陰身痛其脉沉必自利四逆汤真武汤附子汤○中湿一身尽痛不可汗下但利小便有本条○陰毒身痛如被杖腹中绞痛脉沉而疾有本条○风湿一身痛重但微汗不可大发汗有本条○发汗後身痛脉沉迟桂枝加芍药人参汤汗後身痛为寒邪在表脉沉迟为在里用芍药入荣人参安和真气或用黄耆建中汤又汗後霍乱身痛不休少与桂枝汤

腹痛胀

腹痛肾亏通脉汤 脾兼表证桂加黄实疼便结虚疼利 胀则陈皮梗夏良

陰邪在里阳邪入里与正气转则为腹痛所以痛者有异焉脉实腹满而大便秘者实痛也脉虚肠鸣而大便泄者虚痛也陰阳异证用药不同大抵痛为邪气实法当疏利陰受病则金液咏养正丹辈温而利之○少陰腹痛四逆或欬或悸或小便不利或泄利下重四逆散下利清谷脉微欲絶通脉四逆汤腹痛小便不利用真武汤○误下太阳因而腹满时痛是有表复有里为太陰太阳俱病用桂枝加芍药汤痛甚桂枝加大黄汤○实痛者关脉实烦燥腹满大便秘结桂枝加大黄汤小承气汤胃中热胃中邪气腹痛欲呕吐则用黄连汤○虚痛者寸脉濡尺脉弦肠鸣泄利先与小建中汤不瘥小柴胡去黄芩加芍药与之易简用建中汤加远志腹中冷痛四肢厥逆用萸附汤○腹胀者陰阳不和也桔梗半夏汤最良

奔豚动气

奔豚动气数般【阙】 左右高低细揣量玄术理中并【阙】 不堪汗下例中详

动气者脏气不调筑触而动随脏所主而形见於脐之左右上下也大抵真气内虚水结不散气与之转即发奔豚以其走痛冲突如豚之奔虽有发表攻里之证汗之下之并不可也然而不言当脐动气者何耶盖胃为中州以主津液妄施汗下必先动脾是以不言而喻也举此动气非问证何以知之然则调理伤寒贵乎纖悉问证【动气诸药详见不可汗不可下条例中】

○太阳病下之後气上冲者桂枝汤若不上冲不可与也若从小腹上冲於心桂枝加桂汤○发汗後脐下悸者欲作奔豚茯苓桂甘大黄汤○动气通用理中汤去术加桂盖桂利小便泄

奔豚故也奔豚一名肾气白术燥肾闭气是以去之○吐汗下後心下逆满气上冲胃起即头眩其脉沉紧误汗之则动经故其身振振摇动伏苓桂甘白术汤主之此方用白术者盖以误汗动经故用白术闭其汗也○奔豚动气脉沉弱肢体冷可与养正丹○动气证治论用柴胡桂枝汤

腹满

腹满脾家及胃家 三阳合病口顽麻入邪吐汗下之後 肾证便坚承气加

腹满多属太陰盖脾为中央土所以主腹满之候腹中常满者里实而可下时满时减者里虚不可下当以温药和之其有吐汗下後因成腹满者此则邪气乘虚而入或踈利或温散或涌吐条例又不同焉审其邪气之所起知其邪气之所在斯可矣虽然太陰主腹满固也阳热为邪必腹满而咽乾陰寒为邪必腹满吐食而自利一热一寒又不可以无别若夫腹满而泄难以有瘳

○太陰腹满吐食不可下枳实理中丸主之误下太阳因而腹满时痛为太陰太阳俱病桂枝大黄汤重者桂枝加大黄汤○阳明发热腹满微喘口苦咽乾或不大便譫语火迫者亦有此证并小柴胡汤啜而小便难加伏苓又阳明腹大满不大便小承气汤微下之阳明脉迟腹满时喘潮热亦用小承气汤发黄证有本条○三阳合病腹满身重难以转侧譫语口中不仁少与白虎汤○吐後腹胀满常不减者胃中之邪下传入胃拥而为实也少与调胃承气汤○汗後腹胀满者胃虚而不能敷布诸气壅滞也厚朴生姜半夏人参甘草汤若满而痛则小承气汤微下之○妄下後腹胀满心烦而卧起不安者表邪乘虚而入郁於胃中也栀子厚朴汤○少陰病六七日腹胀满不大便承气汤急下之○腹胀通用桔梗半夏汤○腹皮痛者脾不胜水故水与气抟於皮肉之间观其肠鸣漉漉可知矣小半夏茯苓汤加官桂伏苓○腹胀满而短气者邪在里而为实也腹濡满而短气者邪在里而为虚也见气短条

○腹满用药皆去白术术温燥而闭气也

胃脇满

胃满多将表证看 半居表里脇间坚虚烦客热须梔? 瓜蒂拈来吐冷涎

胃满者胃膈间气塞满闷非心下满也脇满者脇肋下气胀填满非腹中满也胃满多带表证脇满多在半表半里之间○太阳病下後脉促胃满桂枝去芍药汤病在卫气芍药入荣其性利故去之○阳明喘而胃满此犹带表证不可下可与麻黄汤○胃脇俱满或脇下鞭痛此半表半里之证并用小柴胡汤和解之○胃中虚烦客热或经汗下後烦热窒塞气逆抢心并栀子豉汤吐之若气乏则与栀子甘草汤若呕则与栀子生姜汤○胃中痰实宿寒瓜蒂散吐之○又阳明病心下鞭满不可下下之遂利不止而死法当涌吐详见结胃解题此则胃中虚而气痞也或用半夏泻心汤生姜泻心汤○孙用和云胃满则诸泻心汤审证用○邪气留於胃

中法当涌吐其高者因而越之是尔然有吐汗下後邪气乘虚入而为烦是则胃中客热以栀子汤吐之此吐剂之轻者也不经发汗吐下邪气留聚烦满痰实是则胃中宿寒以瓜蒂散吐之此吐剂之重者也均之为吐又当权衡

脇疼

脇疼多属少阳家 燥粪阳明并小柴里水痞坚须十枣 陰 引痛脏中乖

脇肋痛满者邪气在半表半里之间也邪方传里未留为实气郁不行法当和解若夫里水痛坚非下之不可也

○少阳病脇痛耳聋寒热乾呕或脇下坚满并用小柴胡汤和解之○阳明病不解转入少阳脇下坚满乾呕小柴胡汤又阳明燥粪不大便脇下坚满舌上胎滑小柴胡汤○太阳病咳嗽乾呕微利心下痞鞭引脇下痛身凉汗出或时头疼此为表解里有水十枣汤下之○病者脇下痛素有痞积在於脐傍引小腹入陰筋俱作痛此为脏结不治

自汗

自汗伤风暑不消 风温风湿卫难调无阳霍乱并柔痙 更与阳明共九条

卫气所以蜜腠理而固津液也卫为邪所干不能护卫於见而汗出焉寒伤荣气汗独无之惟风暑湿之邪有干於卫皆为自汗之证也若夫寒已入里寒极生热热则荣卫通腠理开又为阳明自汗是其热越而汗出矣治法各自有条然而汗出以至髮润或汗出如油或汗出如珠凝而不流此皆不救他病见之亦然

○太阳伤风自汗脉浮缓者桂枝汤汗出而渴或小便难者五苓散不渴者茯苓甘草汤自汗小便数者勿用桂枝惟芍药甘草汤主之自汗小便不数心烦微恶寒脚挛急桂枝附子汤加人参以调荣脚必伸也○太阳中暑汗出恶寒身热而渴香薷散白虎汤或用小柴胡汤○风温多眠喘息自汗若误汗之必身灼热譫语并用菱莖汤○风湿额上自汗关节痛重但微解饥通用败毒散【余见本条】○卫不和者脏无他病时发热自汗出桂枝汤○亡阳者太阳证发汗多漏不止而恶风用桂枝加附子汤又少陰证尺寸脉紧反有汗出额上手背冷汗为亡阳主咽痛吐利四肢疼急厥逆恶寒用四逆汤汗多不止温粉扑之若汗不止恶风烦躁不得卧先服防风白术牡蛎汤次服小建中汤咽痛通用甘桔汤猪肤汤○霍乱吐利汗出发热恶寒手足拘急厥冷四逆汤又中暑霍乱烦渴香薷散○柔痙太阳病身项反张口噤瘈瘲发热汗出小续命汤○阳明汗多而渴发热譫语大便硬调胃承气汤若小便自利而汗出者为津液少不可攻但用蜜导若汗多者胃汗乾急下大承气汤阳明汗多而渴勿用五苓散阳明反无汗脉浮而喘麻黄汤

无汗

无汗因寒中太阳 三陰刚瘧证中详冬阳明病兼陰易 七例推寻各有方

腠理为风暑温所干皆令自汗惟寒邪中经腠理密致则津液内渗独无汗焉此特伤寒在表然耳若陰病若水饮与夫亡阳久虚亦皆无汗随证各自有条惟热病脉躁盛而不得汗此阳亢也当汗无汗与麻黄汤三数剂而汗不出者此亦不可活也知其可进则进知其不可则已之君请择斯二者○小柴胡汤证云陰病不得有汗盖三陰证本无汗其或有汗者亡阳也○冬阳明脉浮紧者必发潮热脉但浮者必有盗汗黄芩汤主之○盗汗者邪气方侵於里尚连於表睡则卫气行里而表阳不致因其表阳不致故津液得泄觉则气散而周於表腠理闭焉汗复止也是之谓盗汗此邪在半表半里之间法当和表○余证无汗治法各有本条

头汗出

头汗诸阳气上蒸 身黄尿秘引浆频心忪水结譫言血 表里柴胡小是珍

诸阳之经循於头三陰则至颈而还也里虚表实腠理密致热不得越故阳气上腾津液上凑而汗出於头抑亦胞虚内涸使然耳夫里虚则不可下内涸则不可汗头汗之证无所谓表邪汗之断不可也若夫阳明热入血室燥粪譫语俟其过经利之以小承气汤是可无以权之哉大抵寒湿相博与夫邪在半表半里之间则有头汗设或小便不利内外关格头汗则为阳脱误下湿家额上汗出而喘或小便不利大便自利亦为阳脱二者皆不可活临诊又当审斯○发黄证头汗及颈而止小便难引水浆此受湿也茵陈汤五苓散主之○水结胃证心下忪满无大热头汗出小半夏加茯苓汤○譫言头汗是为血热病属阳明可承气汤若心中懊憹而头汗者栀子汤○半在表半在里及余证并小柴胡汤寒热往来微恶寒为表脇下满大便坚为里○汗下後胃满微结寒热心烦呕渴为表未解柴胡桂枝乾姜汤或柴胡桂枝汤

手足汗

手足如何汗不休 胃中热聚液旁流热家燥粪为譫语 寒证难教水谷留

手足汗者热聚於胃而津液之旁達也亦有寒聚於胃致之挟寒则水谷不分蕴热则燥粪譫语

○阳明病手足烝烝汗出譫语大便难此热证也与承气汤下之

○阳明中寒不能食小便不利手足濇然汗出大便初鞭後溏水谷不分则不可下少与理中汤

不得汗

汗之不得亦须蒸 躁盛还无未必生身痒浮迟惟各半 阳明虚证若虫行

伤寒欲得汗与麻黄汤数剂而汗不出者不治热病脉躁盛而不得汗诸阳之极亦不治二者盖真病也亦有寒热而厥忽两手或一手无脉是犹重陰欲雨之时必濺濺然大汗而解其或投药无汗而脉不至者亦不可活也是可以容易谈哉虽然诸虚少血津液中乾亦不能作汗病人有挟宿恙如痰饮症癖之类又隔汗而不能出也少血者养血以汗之痰癖者开关散气以汗之是为活法若夫汗出如油喘而不休未有能生者也

○服药不得汗当用蒸法烧地令热去其火以水洒之用桃栢叶蚕沙糠麸夹和铺地厚三寸许上铺席令病人仰卧衣被覆之片时周身至脚心皆汗出乃用温粉扑即移上床○身痒脉浮迟为气虚亡阳不能作汗桂枝麻黄各半汤主之○阳明反无汗皮中如虫行以久虚也术附汤黄耆建中汤○凡发汗须令上下周遍身上衣被如常腰以下厚盖之若盖覆不周汗出不匝不流必致肢体挛搐可与牛蒡根散

不可汗

不堪汗者脉微迟 温湿虚烦坏病推经水忽来兼失血 脐间动气并如之

病在表而脉浮者可汗表证悉具若发渴若脉不浮是表犹带里也未可汗之伤寒不可汗条例最多其可汗者大抵脉证全在表也表固可汗然汗之太早太过或者津液泄而变生焉至於当下而误汗则为亡阳为譫语为下厥上竭等证其害人又速耳设或误汗则真武汤以救解之羸甚者去芍药有热者去附子吁此救兵也谨之谨之【表中风寒里则不消里病表热者虽无阳证可以小辛之剂微汗而温散之】

○脉微弱为亡阳不可汗用桂枝二越婢一汤尺脉迟为血少荣气不足也不可发汗先与黄耆建中汤以养血俟其脉不迟即以柴胡汤桂枝二越婢一汤和解之○风温湿温各有本条○虚烦似伤寒却不恶寒身不疼脉不紧并不可汗下可竹叶汤或小柴胡汤○坏病者此汗下温不解知犯何逆以法治之并不可汗下小柴胡加減○经水适下表里俱虚不可汗小柴胡汤主之衄血下血虽脉浮紧无汗然衄者欲愈下者亦欲愈不愈则用桂枝汤但不可发汗○腹中左右上下动气筑触并不可汗下证治论用柴胡桂枝汤动在左发汗则头眩汗不止筋惕肉瞤为逆先服防风白术牡蛎汤汗止以建中汤与之动在右发汗则衄而渴心苦烦饮则吐先五苓散次竹叶汤动在上发汗则气上冲心枣根汤动在下发汗则心中大烦骨节烦疼头痛目运入食即吐先用大吉皮汤止吐次小建中汤○下利清谷用理中汤或大便不通者皆不可汗○恶寒脉浮此为表证若渴则邪欲入里不可汗○咽乾喉塞亡血淋家衄家疮家动气并不可汗证治论皆用小柴胡汤厥逆不可汗当归四逆汤

不可下

不可攻浮及细虚 恶寒呕吐与之俱小便自利并清少 有表仍兼失气无

病在里而脉实者可下里证悉具若恶寒若脉不实是里犹带表也未可下之伤寒不可下条

例最多其可下者大抵脉证全在里也里固可下然下之太早太过或者水谷脱而变生焉至於当汗而误下则为痞气为懊憹为结胸等证其害人又速耳设或误下则理中汤丸以救解之或里烦则少加乌梅或转损厥逆则兼与四逆汤辈吁此救兵也谨之谨之○脉来细小固不可下若细小而牢紧又可下也

○脉浮病在表不可下结胸脉浮大不可下○脉细虚或迟缓或尺部濇弱此凡皆为血气衰不可下也○恶寒者表之虚证虽阳明恶寒则与太阳合病属表可汗不可下若少阴证恶寒则温之○呕吐者虽有阳明证谨不可下小柴胡加生姜主之○小便自利汗出者津液竭虽硬属阳明但用蜜导而出也猪胆汁亦可导也○脾约证大便坚小便数者枳实脾约丸○大便坚小便清者热不在里虽不大便不可下可桂枝汤汗之○少阴证小便白为下焦虚寒用四逆汤○大便坚小便少者津液还入胃必先鞭後溏不久自出惟小便如常乃可下之○有表证脉带浮或恶寒或犹生寒热并不可下○不转失气谓不下泄也不下泄则先鞭後溏不可下大抵阳明躁粪欲下之先与小承气汤若转失气则必先溏後鞭更进一剂不转失气则止又阳明譫语潮热脉疾与小承气汤不转失气则与小柴胡汤若次日又不大便而脉濇则为里虚黄耆建中汤主之凡阳证而脉濇谨不可下○头汗出为津液少胞中虚不可下唯阳明譫语血热头汗则可下○诸虚少血厥逆喉闭呕吐亡阳阴实动气皆不可下虚家附子汤厥逆当归四逆汤咽痛闭塞乌扇汤呕吐小半夏加吉皮汤无阳阴实而大便鞭者下之必清谷腹满但用蜜导○左动气下之则腹满拘急气愈动身虽热反欲拳先甘草乾姜汤次小建中汤○右动气下之则津液竭咽鼻乾头眩心悸竹叶汤○上动气下之则握掌热烦汗出欲灌水竹叶汤○下动气下之则腹满清谷心痞头眩甘草泻心汤

仁斋伤寒类书卷四

仁斋伤寒类书卷五

<子部,医家类,仁斋直指—仁斋伤寒类书

钦定四库全书

仁斋伤寒类书卷五 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

懊憹【憹平仄两音】

懊憹心坚用陷胷 舌间胎白?梔供发黄须与茵陈辈 燥粪阳明承气攻

懊憹者懊恼郁闷之状盖由表证误下正气内虚於是客气乘虚入而动膈烦郁微疼特未至结胷之甚也由懊憹而结胷亦不难矣

○短气烦燥胷中懊憹心下困鞭则为结胷用陷胷汤○舌上白胎虚烦不得眠心下懊憹或饥不能食头汗出此邪热郁於胷中也并梔子豉汤吐之○阳明病下之後懊憹而烦胃中有燥粪此热结於胃也承气汤攻之○阳明无汗小便不利心中懊憹者必发黄用茵陈汤是则胷中邪热前後二部俱泄之也

痞

痞满关沉痛不侵 关浮肝热用连苓恶寒勿下先投桂 痞利余粮及泻心

当汗误下或病属陰而反下之轻则为痞其状心下满而不痛按之则濡是其虚邪留滞故但满而不痛也通用枳殼桔梗最良若欲攻之亦须表证已解则可矣

○痞满关脉多沉枳实理中丸半夏泻心汤主之桔梗枳殼汤尤妙○关脉浮而痞此为肝热用三黄汤泻其肝若或恶寒汗出三黄汤加附子名附子泻心汤服汤後痞不去烦渴小便不利五苓散主之○下後复汗心下痞而恶寒者表未解不可攻痞当先与桂枝汤表解乃可攻痞用三黄汤表未解而心下妨闷曰支结用柴胡桂枝汤胷脇满而微结小柴胡加乾姜牡砺汤表证在数下之協热而利心下痞鞭表里俱病桂枝人参汤○下利心下痞鞭乾噫食臭腹鸣甘草泻心汤生姜泻心汤证治论用桂枝人参汤若利不止则治下焦用赤石脂禹余粮汤又不止即利小使用五苓散○发热汗出不解呕吐下利心中痞鞭用大柴胡汤下之此太阳证○吐汗下後暖气痞鞭旋覆代赭汤若咳逆气虚则先用四逆汤胃寒则先用理中丸後用旋覆代赭汤若虚烦心下痞薄气上冲胷头眩经脉动身振摇伏苓桂枝白术甘草汤○十枣

汤证须是身凉表解脇疼而痞则可用

结胃

结胃痛硬满其中 大小随名用陷胃热实多烦寒不热 水兼浮脉岂容攻

凡病发於阳而下之早或当汗而误下外证项强心下满硬而痛者结胃也结胃痛硬是为实邪在里法当下之若脉浮大若表证若水气戒不可下亦有不经下剂而心下鞭满者此又有可吐可下不同焉经曰病人手足厥脉乍紧邪结胃中心满而烦饥不入食当吐之是则病在胃中故也经曰阳明病心下鞭满不可下下之遂利不止而死是则邪气自表传重留於心下未全为实法当吐之故有此戒也审如是则经所谓高者因而越之是尔吐下界限判然天壤安可以结胃里实例论之乎要之结胃治法大要审其邪气所在而已矣或曰结胃证具加烦躁而不治者何此胃气絶也胃气既絶安能布药力以胜邪也哉○凡病在胃膈者上脘澎湃痰壅气促粥药不能下咽

○结胃寸脉浮关尺皆沉或沉紧俱当下若脉浮大或有表证则先用小柴胡汤表已解即下之○大结胃不按而痛胃连脐腹痛硬不可近大陷胃汤陷胃汤太峻合用者只与陷胃丸○小结胃按之而痛只心下硬用小陷胃汤○热实结胃懊憹烦渴心下痛少与大陷胃汤○寒实结胃无热证三物白散枳实理中汤丸○水结胃心下怔忡头汗出无大热小半夏加茯苓汤小柴胡去枣加干哂汤○脏结亦是结胃一种但舌上胎滑时时下利陰筋引痛有本条○病人血结胃此热入血室见譌语条下脓血条○结胃先理其气用桔梗枳殼汤枳实理中汤渴者加括萎根证治论诸药不愈用增损理中丸凡结胃理气已平旋腹大便澁者须利导之否则热邪结为块血○误下後未成结胃急与理中汤救解○陰毒阳毒随气逆上伏於胃中亦有结胃痛硬之证治法详见本条

气短

气短里实热来潮 风湿溲难汗自流停水心间并里水 太阳误下结胃痞

气短者呼吸短促而不能相续是也其间呼多吸少皆不救焉千金曰少气不足以息者危金匱曰短气不足以息者实大抵短气为实亦有表里虚实之差心腹胀满而短气者邪在里而为实也心腹濡满而短气者邪在表而为虚也其或怔忡气短此则心下停水致之体认不精其差千里信矣哉○气短潮热腹满而喘此为外欲解而里实小承气汤大柴胡汤○风湿相?汗出短气小便不利恶风不欲去衣其邪在表甘草附子汤○食少饮多水停心下亦令气短小半夏汤○身凉乾呕短气汗出不恶寒此表解而里有水十枣汤○误下太阳短气烦躁心中懊憹因鞭硬为结胃大陷胃汤丸【更发黄一证】

喘

喘不繫解表家 汗多潮热里攻邪满胃合病尤须汗 水嗽青龙杏去麻

内经云肺气实则喘逆上气所以气逆者邪气为实耳伤寒发喘邪气在表者心腹濡而不坚外证无汗法当汗之邪气在里者心腹胀而为满外证有汗法当下之又有水气作喘心下怔忡即水为邪是以有小青龙之证若经汗下逐水不获痊愈喘促上攻壅塞而不得息可以瓜蒂散从权吐之吁喘特病之常也其或直视谵语而喘汗出髮润而喘身汗如油而喘皆不可救此邪气内盛而正气欲绝也临机对境盍消息焉○麻黄宁主喘喘家汤剂多用麻黄○太阳证无汗而喘麻黄汤或误下之利不止脉促有汗而喘葛根黄芩黄连汤下之微喘者桂枝加厚朴杏子汤发汗後不可更行桂枝汤若汗出而喘无大热者麻黄杏仁甘草石膏汤○阳明证汗出不恶寒气短腹满潮热而喘小承气汤若脉浮无汗而喘即汗之用麻黄汤○太阳阳明合病喘而胃满勿下可麻黄汤○水气嗽喘乃太阳汗後饮水多而水停心下小青龙去麻黄加杏仁主之小腹满者小青龙去麻黄加茯苓○陰证喘则必促脉伏而厥返陰丹五味子汤○鼻息鸣喘气逆上冲孙用和用麻黄汤加吉皮杏子久喘咳嗽感冒鼻涕易简九宝汤

咳嗽

嗽家呕喘属膀胱 寒热胃坚值少阳若是少陰频下利 四肢沉重更清凉

凡肺主气气逆而不下则嗽热邪乘之气则燥郁寒邪乘之气则冷滞水饮乘之又与气?热寒水饮皆生痰壅嗽之所从始乎陰阳治法固自有条其间水咳三证不可无辨小青龙汤太阳之表水也十枣汤太阳之里水也真武汤陰证之水气也常须识之虽然古人一药对一病所主安在哉曰水与表寒相合而咳则小青龙法之水与里寒相合而咳则真武汤温之里癖合水动肺而嗽焉十枣所以下之也○太阳病身热嗽喘心下怔忡乾呕微利此水气在表小青龙汤小便不利小腹满者去麻黄加茯苓发热恶寒身体痛者只依本方若身凉咳嗽乾呕微利心下痞满引脇疼痛为里有水十枣汤○少阳病寒热往来胃脇鞭满而痛咳嗽小柴胡汤或微利去人参生姜枣加五味子乾姜○少陰病水气咳嗽四肢痛重腹痛下利或呕真武汤加五味子乾姜细辛少阴咳而四逆或腹痛或泄利或悸四逆散加五味子乾姜少阴咳而呕渴心烦不得眠下利猪苓汤○热咳金沸草散或唾脓血小柴胡加黄芩或黑豆入生姜煎汤○咳嗽头痛不恶寒身大热若脐腹亦有热而内作痛者须下之用大柴胡汤张氏曰发汗不解腹满痛者急下之可大承气汤又曰腹中满痛此为实大柴胡下之○咳嗽中满而呕用大半夏汤解利以後胃寒不食则理中汤加橘皮半夏茯苓细辛五味子痰多二陈汤加细辛五味子治嗽通用大橘皮汤

咳逆

咳逆垂危苦胃寒 橘姜苓夏胜灵丹不痊乳下应须灸 腹满之时疗已难

咳逆俗谓之噫古人谓之哕盖胃气本虚吐下太过或复与之水以发其汗胃虚气逆噫哕生焉病势至此极矣虽然咳逆出於胃寒固也其有水挟寒气击?而成者则茯苓半夏逐水主噫

官桂丁香下气御寒又有热气拥郁气不得通而成者则小柴胡加生姜自有条例惟是嘔而腹满不得小便或後部不通此为真病虽有神医末如之何

○橘皮乾姜汤羌活附子散半夏生姜汤退陰散主之以意择用不瘥即炙乳下其法妇人屈r u头向下尽处骨间三壮丈夫乳小以一指为率亦三壮男左女右艾员如小豆许大抵乳直下?中有动脉处是详见下脓血条○证治论嘔哕手足逆冷小橘皮汤若加胃满虚烦不安大橘皮汤○阳证咳逆潮热小柴胡汤加生姜吉皮竹茹汤仍视其大小便何部不调即通利之○嘔而腹满大便不利小承气汤嘔而腹满小便不利猪苓汤○秋明伤风脉弦浮小便难潮热而嘔小柴胡加茯苓汤○易简论伤寒咳逆为笃证他病见之亦然以半夏生姜汤主之又方丁香甘草煎汤调苏合香丸大抵咳逆不止者不可救药○水气乘肺亦主噫逆微咳当以表水里水法治之见咳嗽条

乾嘔

乾嘔身热小青龙 涎沫茱萸汗桂供下利白通并四逆 脇疼十枣里之攻

乾嘔者嘔而无物出也大抵热在胃脘与谷气并热气上熏心下痞结则嘔而无所出焉少陰下利姜附主下利也厥陰吐沫茱萸主涎沫也汗出乾嘔桂枝主自汗也邪去则嘔者定矣若夫水气二证又当以表里分之发热欬喘而乾嘔者此则水气在表与青龙汤不发热不恶寒脇痛咳利而乾嘔者此则水气在里与十枣汤是又不可无别然而表水里水皆有效嗽何耶曰水气乘肺也

○表不解心下水气身热乾嘔微喘或利小青龙汗之○乾嘔吐涎沫头痛一云少陰一云厥陰并吴茱萸汤得汤反剧者则与小柴胡汤○汗出头痛乾嘔桂枝汤○少陰下利乾嘔脉微白通汤利不止乾嘔而烦厥逆无脉白通加猪苓【阙】汤里寒外热脉微欲絶或乾嘔通脉四逆汤○身凉汗出脇疼乾嘔心下痞硬短气欬而微利不恶寒无表证此里有水十枣汤下之○膈上有寒饮乾嘔亦属少阴用四逆汤○证治论乾嘔而利黄芩半夏生姜汤○胃中似喘不喘似嘔不嘔似哕不哕愤愤然无奈者生姜半夏汤

嘔吐

嘔吐阳明气逆行 数为胃热缓寒生太阳合病利不利 肾证三条各有评

表邪传里里气上逆则为嘔吐水谷不下是也伤寒嘔吐有胃热有胃寒有水气有脓血辨是四者而已胃热者脉数或紧必有口苦舌乾烦渴之证胃寒者脉弦而迟必有逆冷不食大小便自利之证水气者先渴後嘔膈满怔忡若胃脘脓血则腥气燥气奔逆上冲经所谓呕家有痛脓不须治脓尽自愈又谓服桂枝汤吐者其後必吐脓血是矣大抵嘔吐皆有所出已下咽而出者嘔也未下咽而出者吐也吐特甚於嘔耳若槩以嘔无所出则其间所谓乾嘔者独何耶嘔吐多属阳明气逆而上行戒不可下汗後水药不入口者逆嘔而脉弱小便自利微热而

厥者虚极难调也生姜呕家圣药热燥者乌梅代之

○阳明呕吐小柴胡汤加生姜主之阳证通用呕而发热小柴胡汤呕而渴猪苓汤先呕後渴此为欲解急与水解先渴後呕为心下停水赤伏苓汤汗後或瘥後胃脘余热虚烦呕吐竹叶汤加生姜汁吐汗下後虚烦不得眠而呕梔子生姜汤○寸脉数烦热而吐为胃热五苓散竹茹汤小柴胡汤○汗下後关脉迟缓而吐为胃寒理中汤正气散加生姜寒多不饮水而吐理中汤去术加生姜○太阳少阳合病自利而呕黄芩加半夏生姜汤○太阳阳明合病当自利若不利但呕葛根加半夏汤胃中有热胃中有邪气腹痛气逆欲呕黄连汤○太阳发热汗出心下烦郁痞鞭下利呕吐大柴胡汤○少陰呕证四逆汤加生姜水气或欬或悸身痛自利真武汤去附子加生姜膈上寒饮乾呕吐涎沫四逆汤若更吐利手足逆冷烦躁甚者吴茱萸汤又手足寒心中温温欲吐不得吐脉弦迟为胃中实可吐之或用半夏汤入生姜汁并属少陰○温毒发斑心闷而呕身热足冷有本条○水逆证渴欲饮水水入即吐小腸不利故也五苓散小半夏茯苓汤○金匱云诸呕吐谷不下小半夏汤似呕似哕似喘心中澼澼生姜汁半夏汤大小橘皮汤○伤寒屡经吐下寒气隔塞食入口即吐乾姜黄芩黄连人参汤○汗後水药不入口者逆半夏茯苓汤○呕吐脓血见吐血条

吐血

吐血诸阳受热邪 表之不发咎醫家因而热毒流於脏 地血三黄数剂嘉

诸阳受热其邪在表当汗不汗致使热毒入脏积瘀於内遂成吐血盖伤寒失汗则邪热化为恶血或蘊毒不除亦能蒸腐其血凡眼闭目红神昏语短心忪痛闷眩冒迷忘漱水燥烦呕吐喘促惊狂譫语鼻衄唾红背冷足寒骨热肤閤四肢厥逆多汗顽痰胃脘小腹满急大便黑而微利小便多而不禁此等皆瘀血证也男女均有此血脉妇人伤寒尤多见之以其得病於经水来去之期或受病中间经水适至耳血之为病大抵夜重日轻或昼明了而暮譫语血属陰从其类也前证不必悉具但见其一二分晓便作血证主张犀角地黄汤小柴胡汤桃仁承气汤三黄汤丸酌量轻重用瘀血结其抵当汤丸主之诸汤皆以川芎为佐取尽大便黑物则佳虽然伤寒咯血犹难救疗况吐血乎凡吐血皆非美恙初病犹可用工有陆续而来或经数时而复吐者断不可救药也○方药详见解题通用萝卜汁一小盞入新汲水煎茅花主之血热者黄连阿胶汤证治论用地血散槧皮汤三黄泻心汤○大下後寸脉沉迟尺脉不至咽喉不利唾脓血者麻黄升麻汤此有两证一阳毒一少陰在阳毒则或用阳毒升麻汤在少陰则或用甘梗汤加半夏生姜汁○服桂枝汤吐者其後必吐脓血犀角地黄汤○非伤寒证而吐血者与蛤粉散若虚劳咳嗽吐血口苦咽乾真黄耆汤主之

衄血

衄血膀胱病欲瘳 脉微发表病家愁紧而无汗麻黄进 浮缓絜絜以桂投

经络热盛阳气拥重迫血妄行出於鼻者为衄其热在表也是虽表热邪犹在经然亦不可发

汗汗之则额上陷脉紧急直视而不得卧古人戒之所以无汗用麻黄有汗用桂枝者非治衄也散其经中邪气耳若邪气不得发散拥迫於血而衄复不止也太阳衄血固为饮解或有衄血不止但头面汗出其身无汗及发汗不至足者又为恶证当明辨之

○太阳证衄血及服桂枝汤後致衄者皆阳气盛长病欲解也属犀角地黄汤○衄而脉微不可发汗与犀角地黄汤黄芩芍药汤衄不止茅花汤○无汗而衄脉尚浮紧可再与麻黄汤○有汗而衄脉尚浮缓可再与桂枝汤○衄而烦渴欲饮水水入即吐者先服五苓散次服竹叶汤○陰证本无衄若少陰厥而无汗强发汗必动血血从耳目口鼻而出是为下厥上竭不可治治要方用黑锡丹○千金云凡时行衄血不可断之如或过多即可断以龙骨末吹入鼻九窍出血通用○阳明发热口燥漱水者必衄见漱水条谨不可汗

衄血

下衄血室必譫言 湿毒无如肠垢鲜消谷粪坚脐下蓄 膀胱热结六条全

凡冲脉为血之海即血室也男女均有此血气亦均有此冲脉冲之得热血必妄行在男子则为下血譫语在妇人则於经水适来适去之时经气尚虚邪乘虚入或热退而胃满譫语或蓄血而寒热似疟皆谓之热入血室私窃怪夫世俗常谈凡病皆先调气而血之一字念不到焉其间一二亦知理血则曰妇人有之不思血气即陰阳也负陰抱阳中两间而为人谁独无此血气哉否则张朱之书所谓桃仁承气汤抵当汤丸之类是特为妇人设耳然而血证之脉何如曰挟血者脉来乍澀乍数闪灼明灭或沉细而隱伏也若夫血热交攻则寸关洪盛大抵多於左手见之左手主血固如是尔经云血上逆则忘血下蓄则狂下焦蓄血小便必自利血结之处又当以此推之外证具于吐血汗解

○阳明病下血 语或胃脇满如结胃暮夜如见怪状此为热入血室头汗出者刺期门以泻肝若不刺合用小柴胡汤加生地黄枳实栀子仁○腹痛身热下衄血如鱼脑如烂肉汁曰湿毒桃花汤地榆散黄连阿胶丸治要方用冒风汤加木香或除湿汤○热气乘虚入於肠胃脐下有热泄汗赤黄白肠垢黄芩汤白头翁汤藜皮汤○无表里证已下後脉数不解消谷易饥多日不大便此有瘀血桃仁承气汤抵当汤或小柴胡加桃仁大黄又脾约证胃热消谷有本条○下焦蓄血其人如狂小腹结急小便必自利与抵当丸或小柴胡加桃仁大黄抵当汤大峻合用者只与抵当丸○太阳病不解热结膀胱其人如狂而血自下下者愈不愈用桂枝汤○瘀血炙甘草半钱川芎香附倍之枳实又倍之新汲水煎入醋下○失血少血或尺脉迟或诸脉不出汤剂中须以人参为佐

期门即三焦之府取穴以病人中指中节为寸令仰卧从脐心正中向上五寸以墨点定从墨点两边横量各二寸半大约直两乳是期门穴也针入四分此证治论穴法可与咳逆条乳下穴参用

发黄

发黄尿秘引清浆 便黑尿多血证黄身热尽疼为中湿 鼻乾腹满胃风伤

发黄者湿气在里复瘀热於脾胃蒸湿不散而得之或病属阳而用温内热而被火亦发黄也
湿气胜则如熏黄而晦热气胜则如橘黄而明伤寒至於发黄单阳无陰病势已极不可以寻
常目之如所谓寸口无脉鼻出冷气如所谓形如烟熏摇头直视如所谓环口黧黑柔汗发黄
不治者亦多矣然而发黄之与瘀血大抵相类又何以辨之曰小便不利者为黄小便自利则
瘀血也○千金云酒疸下之终为黑疸土瓜连根捣取汁效

○黄瘴证脉浮滑而紧数尿秘头面汗出及颈而止渴引水浆茵陈汤五苓散夹和茵陈汤或
五苓散下酒蒸黄连圆○血证发黄如狂小便多大便黑桃仁承气汤犀角地黄汤抵当圆○
太阳中湿发黄身热尽痛头汗目黄盖寒湿在里致之可五苓散栀子蘖皮汤若欲解散则用
麻黄连翘赤小豆汤余见中湿条中湿与发黄不利小便非其治也○阳明伤风发黄易饥气
短腹满鼻咽乾心脇痛小便难潮热咳 咽痛息短头弦嗜卧脉弦浮大小柴胡加伏苓○初
发黄急用瓜蒂末口含水搐一字许入鼻中出黄水次服茵陈五苓散

发斑

斑如温毒黑膏良 热病重阳别有方里实表虚因发出 若还发汗愈增疮

病证属阳误投温药或当汗不汗或当下不下或汗下未解阳热内然蒸滯外迫热毒入胃皆
致发斑盖热必伤血血热不散里实表虚由是热气乘虚出於皮肤轻则如疹子重则如锦纹
是尔斑家谨勿发汗汗之重令閼泄疮烂又加多也凡斑略见一二须早图之日子稍延独阳
絕陰不可救药其发黑斑者热剧胃烂无及矣然而斑之方萌与蚊迹类焉又不可误用药也
发斑多见於胷腹蚊迹多在手足之间关前阳脉洪大病人昏溃先红後赤者斑也阳脉不洪
病人自静先红後黄者蚊也发斑属阳阳毒具而陰脉形或大便自利或怫郁气短而燥粪久
不得通卢扁复生莫能施其巧

○温毒发斑冬月冒寒至春间阳气盛则发病经吐汗下而表未解毒未消也黑膏主之肌肉
斑烂咳而心闷下利呕吐清汁下部疮或口疮黄连橘皮汤葛根橘皮汤○热病发斑时气发
斑大青四物汤猪胆鸡子汤○阳毒曰重阳发斑有本条○咽痛者玄参升麻汤○发斑通用
升麻葛根汤败毒散犀角地黄汤热多者玄参升麻汤加生姜乌梅又黄连一物汤青木香一
物汤可择用有下证者少与调胃承气汤孙兆用紫灵一剂证治论用白虎加人参汤○发斑
汤剂须以紫草川芎为佐血热内结者与小柴胡汤○发斑小点稀疎色常鲜红者易治或如
锦纹隐起饼搭者难治若初发色红渐次微黯良久黯又转甚面色肌肉黧晦者断不可救初
发便如黑志者亦然赤斑五死一生黑斑十死凡内外热炽汗下不解烦闷咳呕足冷耳聋便
是发斑之证

舌白胎

舌胎大热疗应难 利腹疼兮呕恶寒懊憹脇坚并中湿 更兼脏结六条看

病家邪气在表舌上无胎目传入里津液结?则舌生白膜如胎之状是亦丹田有热也热初传里其舌胎滑热气渐深其舌胎澁热聚於胃舌为之黄若舌间黑色则病已深而热已极矣经云热病口乾舌黑者不治盖舌属心心属火黑者肾家贼热所胜五脏反尅其能生乎

○尺寸脉紧口中热气而乾燥足冷蜷卧鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七八日以来微热手足温为欲解或七八日以上反大热者难治若腹痛者必欲利与理中汤若恶寒者必欲呕与小柴胡汤加人参括萎根○太阳误下胃中空虚客热动膈懊憹舌胎垢子豉汤或阳明证具其脉浮紧下之而懊憹舌胎用药同○阳明脇下鞭满不大便而呕舌上白胎小柴胡汤○阳明中湿舌上生胎以丹田有热胃中有寒湿也五苓散主之○脏结亦属阳明舌上白胎有本条○舌黄者法当下之舌黑者不治

口燥咽乾

口燥阳明背乍寒 人参白虎疗咽乾少阳专以柴胡治 肾证应须急下安

脾胃有热津液涸少所以口燥舌乾然而口中乾燥汗之将何如曰汗之重无津液其咽乾者尤不可汗也治法固自有条或依条用药而口中尚更不和则当以瘀血推之盖焦烦漱水口燥唇乾血证有之矣○阳明口燥咽乾无大热背微恶寒烦渴白虎加人参汤渴欲饮水者用药同○少阳口燥咽乾小柴胡汤○少陰口燥咽乾而渴者急下之用承气汤○血证口燥唇乾见漱水条○狐惑咽乾唇疮声哑有本条

烦燥

烦燥来时热气升 陰为阳胜太阳经阳明躁粪连脐痛 肾候阳虚陰燥乘

心主火肾主水心热则烦肾热则燥此通论也伤寒烦燥则有陰阳虚盛之别焉陰虚而阳胜则为烦阳虚而陰胜则为躁有先烦而渐加躁者有先躁而後复烦者烦其热之轻燥其热之甚也或邪在表或邪在里或阳胜或陰胜或火邪条例不一当详审而调理之设若结胃证具而烦燥吐利四逆而烦燥下利发热厥逆而燥不得眠恶寒蜷挛脉不出而燥此皆不治之证或者见几而作声之可乎

○太阳证烦燥寸关脉浮数身热是也风寒俱盛其脉浮紧无汗而烦燥当汗不汗其人烦燥并用大青龙汤心中悸而烦燥小建中汤热六七日渴欲饮水五苓散无热但狂言烦燥五苓散水调服刺吐之自汗心烦小便数不可与桂枝汤只用芍药甘草汤服桂枝後汗出烦渴甚脉洪大白虎加人参汤○阳明证烦燥以多日不大便有躁粪故遶脐痛而烦燥也以承气汤随轻重用○少陰证烦燥尺寸俱沉厥冷自利是也心烦不得卧黄连鸡子汤黄连阿胶汤吐利厥逆烦躁欲死吴茱萸汤伏苓四逆汤下利咽痛心中烦满猪肤汤下利嗽呕烦渴不得眠

猪苓汤恶寒而蜷时时自烦欲去衣被大柴胡汤○太阳病以火熏之而不得汗亦致烦燥或火熨其背令人汗出大热入胃而烦燥并黑豆煎汤解之○汗後烦不得眠欲水者少与之小便不利与五苓散○下後昼烦夜静不呕不渴无表证脉沉微乾姜附子汤若兼懊憹即与栀子豉汤发汗若下之病仍不解而烦燥伏苓四逆汤吐汗下後虚烦心下痞满气上冲胃头眩经动身为振摇伏苓桂枝白术甘草汤虚烦附入胃满条○瘥後胃弱不能胜谷亦致微烦减谷则愈仍与小柴胡汤○陰极发燥或陰毒用火熨炙及投热药以致发燥者并不可误用凉药燥甚仍与热剂用四逆汤返陰丹○陰盛隔阳身冷大燥欲饮水不入口不得睡脉细沉紧有本条

渴

渴为浮脉太阳临 汗是阳明利少陰阳毒热多并中暑 其人引饮喜盃深

热气薰蒸津液耗少所以发渴热邪深浅条例不同然是渴者大抵里有热也或曰六经外证独少陰曰渴厥陰曰烦何耶少陰属肾主水热气既深肾水易竭安得而不渴厥陰属肝心之母也病主消渴饮水多而小便少是其里热已极子气乘母於是挟心火以为烦惟烦则消矣凡渴证用药并去半夏以其性燥而逐水也若先呕後渴则为欲解当与之水先渴後呕则为水停心下属赤伏苓汤故并述之

○太阳发渴则脉浮表不解心下水气小青龙汤去半夏加括萎根服桂枝汤汗出後烦渴甚者白虎加人参汤小便不利而渴五苓散身热恶风手足温脇满而渴小柴胡去半夏加人参括萎根太阳病无汗而渴勿用白虎汤可小柴胡若得汗後脉洪大而渴可少与白虎汤○风湿灼热而渴括萎根汤○阳明发渴则有汗脇下鞭不大便而呕舌上白胎小柴胡去半夏加人参括萎根阳明病汗多而渴勿用五苓散可竹叶汤若汗少小便不利脉浮而渴与五苓散一云猪石汤然本方内有阿胶滑石其性尤利又当审之发黄证头汗出小便不利渴引水浆茵陈汤茵陈五苓散○少陰发渴则自利咳而呕引水饮猪苓汤下利而渴欲饮白头翁汤脉微细欲吐不吐心烦但寐小便白下利而渴四逆汤○阳毒大热大渴黑效圆主之○中暑渴者白虎加人参汤若渴不已与酒蒸黄连圆○渴欲饮水水入则吐曰水逆五苓散

漱水不咽

漱水阳明衄血时 头疼口燥热生肌发狂瘀血无寒热 犀角桃仁类例推

唇燥口乾血证类有之必欲取水而灌漱也然漱水而不饮水何哉盖渴者易为饮阳热入里胃中液乾患不与水耳惟夫上焦瘀血下焦蓄血乘肺发燥渴证独无是以漱水而不欲下咽也漱水条例惟血证有焉

○阳明身热头疼口躁漱水不欲入咽必衄血脉微者犀角地黄汤棠花汤○无表证不寒热胃腹满唇躁口乾漱水不咽小便多此为瘀血必发狂轻者犀角地黄汤桃仁承气汤甚者抵

当圆取尽黑物为度

可与水

可水除烦使胃和 常须少与勿令多若还不与无由汗 强与还因水致病

病非大渴不可与水渴不与水无由作汗则喘而殂也伤寒饮水是为欲愈之候若渴者与之过多或小渴而强与之饮腹中热少一不能消停饮作害者多矣曰水结曰喘悸曰咳噎曰呕啰曰肿满曰下利曰小便不利安有不自水气得之诊视又当识此○太阳病发汗後大汗出胃中燥不得眠其人欲饮水当少与之胃和则愈○厥陰病渴欲饮水者与水则愈○霍乱发热头痛身疼热多饮水者与五苓散○呕吐病在膈上後必思水者与猪苓汤○水逆证见呕吐条○水结证见头汗出条○饮水多水停心下气上乘心则为悸水气结於胃脇则为水结胃中虚冷则为呕啰冷气相抟为噎上迫於肺则为咳喘渍入肠中则为下利邪热所抟畜於下焦则为小便不利小腹满而里急溢於皮肤则为肿痛○饮水过多者五苓散导之

小便自利

小便自利血相干 蜜导阳明肾证寒脾约讖言脚挛厥 太阳汗下大便难

小便自利非血证则肾虚也惟血证则小腹结而如狂惟肾与膀胱俱虚则不能约制水液是二者小便皆自利也若肾虚而挟热焉故乍沥乍旋谓之小便数

○伤寒下焦有热小腹必满应小便不利今反自利者此血证也法当下之又有病在太阳遍身发黄其脉沉结小腹虽坚而小便不利此则非血若或小便自利其人如狂血证谛矣下之抵当汤圆○阳明自汗应小便少而反自利者津液竭也粪虽硬但以蜜导猪胆汁亦可以导○少陰四逆小便自利为虚寒用四逆汤或真武汤去茯苓若小便白亦是下焦寒与四逆汤○小便数大便鞭此为脾约脾约圆麻仁圆主之张氏云趺阳脉浮而濇浮则胃气强濇则小便数是为脾约趺阳胃脉也此证消谷引饮盖胃壮而热矣○伤寒脉浮自汗小便数若胃不和而讖语少与调胃承气汤○太阳自汗四肢拘急心烦微恶寒脚挛急小便数误服桂枝得之便厥可与甘草乾姜汤芍药甘草汤○太阳吐汗下後小便数大便因鞭小承气和之○小便尿血证治论用延胡索散

遗溺

遗溺风温戒利肠 腹澎身重合三阳下焦不摄兼停血 肾絶狂言五证详

水液之余者入胞而为小便胞中虚寒不能约制水液加以邪气乘之故旋溺自遗而不禁也

○风温脉浮自汗体重多眠鼻鼾喘息恬不欲言误下则小便不利直视失溲○三阳合病腹

满身重口中不仁面垢讖语遗尿并不可汗下少与白虎汤○膀胱瀦水下焦不摄则亦遗溺经云邪中下焦陰气为栗足膝逆冷便溺妄出合用四逆汤○下焦蓄血小腹结急小便自利不禁轻者桃仁承气汤重则抵当汤○狂言直视遗尿肾絕不治

小便难

小便汗竭胃乾空 多汗阳明并戒通引饮湿黄须要利 澁难虚热客胞中

汗自外泄津液中乾此小便所以不通也或陰虚而阳凑之小腸伏热亦令旋溺赤黄数且难矣素问曰阳入陰分则膀胱热而小便难其谓是乎多汗者以利小便为戒伏热者以凉剂行之若夫中湿发黄不利小便非其治也

○发汗多亡津液胃中乾小便不利及阳明汗多小便不利者并不得利之小便自利则愈○引饮过多下焦有热小便不利脉浮者五苓散脉沉者猪苓汤○中湿发黄家并与利小便○小便难者陰虚而阳凑之故小便黄为下焦热以瞿麦滑石輩利之木通散亦可太阳汗後漏不止而恶风四肢急小便难桂枝加附子汤阳明中风脉浮弦大身黄乌乾气短腹满潮热时哕心脇痛嗜卧小便难小柴胡加茯苓○表有水气身热而咳表不解心下停水小腹满小便不利小青龙汤去麻黄加茯苓汗下後发热头项强痛无汗心下满微泄小便不利桂枝汤去桂加茯苓白术呕而发热胃脇满心下怔忡小便不利小柴胡去黄芩加茯苓少陰亏小便不利四逆散加茯苓○瘥後腰下有水气牡砺泽泻散主之

大便下利

利惟胆胃负时殂 不渴脾寒渴肾虚肠垢鸭溏并湿毒 讖言备载古人书

下利须别陰阳三阳下利身热太陰下利手足温少陰厥陰下利身凉无热此大槩也自利不渴小便色白脉微清谷厥冷恶寒凡此皆寒渴欲饮水尿色如常泄下赤黄发热後重凡此皆热要之风邪入胃木来胜土故大肠暴下其里虚協热者下利尤多或解散或和解或攻泄或温中或固下焦或利小便随证有条但不容发汗盖邪气内攻若外复泄其津液则胃气转虚必胀满矣然则下利之脉何如曰身凉脉小者顺身热脉大者逆大则为虚微弱则自止滑而数者是又有宿食也若夫下利讖语而目直视下利厥燥而不得眠下利发热汗不止或厥不止下利厥冷无脉灸之身不温而脉不回下利日十余行其脉反实皆邪拥正气而下脱五夺之最急者也虽有工巧将焉用哉

○太阳阳明合病下利头疼目疼鼻乾脉浮长葛根汤○太阳少阳合病下利头疼胃满乾呕脉浮弦黄芩汤呕者加半夏生姜○少阳阳明合病下利身热胃脇满乾呕往来寒热脉长大而弦为负负者死但长大而不弦为顺又脉滑而数则有宿食小承气汤下之迟而滑者亦少下之○太陰自和不渴四逆汤理中汤术附汤○少陰自利必渴肾虚引水自救脉微者白通汤厥逆无脉白通猪胆汁汤通脉四逆汤若渴而呕嗽心烦不得眠猪苓汤自利清水色青心

下必痛口中乾燥此不可温須下之用大承氣湯三陰下利法當用温若自利清水心下痛口乾燥須下之下利發渴屬少陰固也然三陽亦有飲水者乃有熱也○協熱利者曰腸垢臍下必熱便中垢膩赤黃或飲水乃熱也黃芩湯白頭翁湯薜荔湯此證惟黃芩最妙凡協熱下利通用之○胃寒利者曰鴨溏臍下必寒腹脹滿便中黃白青黑或清谷四逆湯理中湯白通加附子湯寒毒下利面戴陽者下虛也○濕毒利者腹必滿下膿血如魚腦如爛肉汁桃花湯地榆散黃連阿膠湯或用除濕湯冒風湯加木香○下利識語有燥尿也脈不微細可下之用小承氣湯○三部脈平心下硬而下利者腸胃有積結也急下之○下利心下痞者詳見痞條○陰毒陽毒亦有下利有本條○下利身痛腹滿清谷急救里用四逆湯服藥後清谷止但身痛者急解表用桂枝湯○固下焦利小便方論見痞條風邪入胃下利熱則敗毒散冷則不換金正氣散或加乾姜木香○假如他病腸風失血崩中漏血之人繼而下利大腸里急痛不可忍雖與巴粉取積已行疎導其痛獨存者此非積也榮血亏少陽剛勝陰故爾役藥當以川芎為佐榮氣一調其痛立止設或小便不通五苓散不能作效當以分心氣飲加川芎麥門冬與之自然快利或蘊熱血痢腹中痛甚疎通滌熱痛未得平亦當為之調血

霍亂

霍亂渴來用五苓 寒多不水理中尋憎寒厥熱姜甘附 中暑焦煩腹痛侵

張氏但稱吐利者非霍亂也霍亂邪在中焦以飲食無節居處不常得之夾食傷寒陰陽乖隔上吐下利而燥擾痛悶是其候爾偏陽則多熱偏陰則多寒卒然而來危甚風燭許仁則謂濕霍亂死者少乾霍亂死者多蓋以所傷之物或因吐利而出泄泄盡則止其死少也未上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣關隔陰陽煩燥喘脹其死多也夫飲食起居當以此為戒○霍亂吐利熱多而渴五苓散○寒多而不飲水理中湯圓或有寒腹滿而痛四肢拘急轉筋下利者剉理中湯加生附子官桂○吐利汗出發熱憎寒手足厥冷拘急其脈沉細四逆湯○中暑霍亂煩燥大渴心腹撮痛四肢冷冷汗出脚轉筋香薷散千金云轉筋者用理中湯加煨石膏○汗後霍亂雖吐利已止而身痛不休少與桂枝湯吐利已止汗出四肢厥而拘急脈微欲絕通脈四逆加豬膽湯○霍亂通用霍香正氣散腹痛加桂痛甚去霍香加茱萸小便不利加伏苓瀉而不吐除濕湯加桂吐而不瀉除濕湯去蒼朮加桂丁香○乾霍亂心腹作痛欲吐不吐欲下不下先以鹽湯一盞頓服候吐出令透即以剉理中湯倍加橘紅與之凡氣痞于中不吐不瀉害人甚急可蘇合香圓用枳殼散下或用霍香正氣散加官桂茯苓倍加枳殼大抵風雨寒濕邪自外入霍香正氣散除濕湯為要飲食居處邪由內發治中湯主之其或吐瀉不止面青厥冷者震靈丹研開木香乾姜煎湯調下○大柴胡湯一證云發熱汗出不解嘔吐下利而心中痞者大柴胡主之此則非霍亂也

失音

失音發瘥反張弓 狐惑唇瘡啞似聾風濕血迷并舌卷 更兼中暑語難通

言心聲也而聲音道路出於喉嚨肺亦主之若風若痰若血若熱與夫邪毒之氣伏於心竅或

滯於喉間皆令人失音或語短而聲蹇澁也活人書惟有發瘧狐惑條例風濕而下諸家之正說附焉○瘧證口噤頭搖掣瘓不語項強背直腰身反張有本條○狐惑即濕?也蟲食下部為狐下唇有瘡其咽乾蟲食其脏為惑上唇有瘡其聲啞有本條○風濕內有一証緩弱昏迷腹滿身重自汗失音下利不禁白通湯加白朮甘草○血証心忪語短眩冒迷忘詳見吐血下衄血條○厥陰舌卷囊縮毒氣入脏或有不語此用小承氣湯○伏暑發熱汗渴暑入心胞絡亦或不語此用小柴胡湯熱渴甚者用竹葉湯○風纏喉噤不語細辛皂角末入鼻通關次用南星略炮加生姜紫蘇熟煎與之

失音亦須調導大小便

仁齋傷寒類書卷五

仁斋伤寒类书卷六

<子部,医家类,仁斋直指—仁斋伤寒类书

钦定四库全书

仁斋伤寒类书卷六 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

怫郁

怫郁阳蒸聚体肤 便坚为实哕为虚二阳并病顔容赤 火迫身黄惕惕如

怫郁者阳气蒸越形见於头面体肤之间聚赤而不散也其证则有异焉大便鞭而气短者实也汗下後而得哕者虚也若虚若实当详审之

○小便不利时有微热大便乍难怫郁而不得卧此燥粪里实也承气汤主之○吐下後极虚而汗之其人怫郁复与之水以发其汗因而得哕此胃中寒也桂枝人参汤加茯苓○太阳初得病发汗不撤并归阳明续自微汗面色赤者阳气怫郁也解饥汤主之或汗又不撤其脉紧濇与麻黄汤○阳脉浮陰脉濡弱妄以火熏熨欲令汗出客热得火内则惊惕外则怫郁蒸肌身目发黄小柴胡汤加黑豆与之

冒眩

冒因虚极有寒伤 头痛胷坚属二阳吐汗下余苓桂术 脉沉自利理中汤

冒者蒙冒之谓眩者眩运之谓上虚则眩诸虚极而乘寒则冒二者皆相似眩其轻而冒其重也妇人新产血虚挟寒必冒冒家自汗则愈若少陰病下利止而头眩时时自冒者此虚极而脱也其与诸逆发汗剧者言乱目眩设遇歧扁其能起之乎

○太阳少阳并病头项强痛或眩冒胷中痞鞭刺太頔戒不得发汗少阳本证亦有目眩见本条○阳明伤风头眩见发黄条○吐汗下後虚烦脉微或沉紧心下痞脇下痛气冲胷喉眩冒身摇筋脉动惕久而成萎伏苓桂枝白术甘草汤○脉沉迟面微赤身微热下利清谷者必郁冒汗出证属少陰理中汤甘草乾姜汤四逆汤随轻重用○太阳病若下之不愈因复发汗以此表里俱虚其人必冒冒家汗自出而愈○又痰饮眩冒厥逆少与易简三生饮感湿头重眩晕芎术除眩汤○金匱曰产妇亡血复汗寒多故冒又曰产妇厥冒其脉微弱不能食大便坚盖血虚则厥厥而必冒皆是虚寒

心动悸

心悸三阳证自详 龚坚譚语胃调汤冒旋甘桂瞿真武 小建中兼炙甘草方

动悸多生於停水或阳气尚弱心下虚空正气内动致之或汗下以後正气内虚邪气与之擊? 而然也此盖心悸而气动其与惊惕不同焉

○太阳病小便利者以饮水多故心下悸小便少者必膀胱里急也并用五苓散小半夏茯苓汤主之○阳明病壮热往来心下悸小便不利心烦喜呕小柴胡汤伤风往来寒热或心下悸小柴胡汤○少阳病脉弦细头痛发热误汗之必譚语转属胃胃和则愈胃不和则烦悸而大便鞭属调胃承气汤然调胃承气汤太峻证治论只用小柴胡汤龚鞭者可加大黄烦躁者可入芒消些少凡调胃承气证以此法代之尤为稳当○太阳发汗过多其人叉手自护心下悸欲得按者桂枝甘草汤○太阳病发汗不解仍发热心下悸头眩肌体瞤动振振欲擗地者真武汤主之或理中汤加茯苓○伤寒二三日心中悸而烦与小建中汤经云先烦而後悸者为热先悸而後烦者为虚惟虚则小建中主之○少阳病耳聋目赤胷满而烦妄加吐下则悸而惊可与小建中汤如有热证即以小柴胡继之○伤寒脉结代心动悸炙甘草汤○少陰四逆证其人或悸以四逆散加桂主之○心下水气厥而悸当先治水茯苓甘草汤然後治厥有本条不然水入胃必下利也○伤寒多因吐下或火熏或温针以致惊惕○太阳病若下之胷满烦惊小便不利譚语身重难以转侧用柴胡牡蛎龙骨汤不可发汗○风温妄用火熏以致发狂剧则如惊癇时时瘈瘲此为逆也金匱风引汤

发狂

发狂面赤属重阳 葶苈升麻及大黄血证身黄仍漱水 尿多承气地黄汤

陰邪并於陰则颠阳邪并於阳则狂伤寒热毒在胃并入於心遂使神志昏乱言动急速而发狂也狂之发作少卧不饥妄语妄笑妄倨妄辩妄起妄行弃衣而走登高而歌甚则踰垣上屋皆独阳亢热使之非吐下不能止亦有当汗不汗瘀热在里下焦蓄血而如狂者小便必利特如狂而未至於狂耳其或熏熨迫汗灼艾烧针令人烦躁卧起不安则谓之火邪惊狂凡是数者各有条例若夫狂言直视旋溺自遗其与汗後热多脉躁狂言不食智者寒心焉

○重阳即阳毒脉实数狂走错语烦躁乾呕面赤咽痛潮热发斑葶苈苦酒汤阳毒升麻汤栀子仁汤三黄汤大黄散升麻葛根汤加大黄狂走者水调瓜蒂末吐痰瓜蒂散亦可吐○血证如狂脉微而沉身黄唇燥漱水不欲下咽无寒热小腹鞭满小便利大便微利而黑轻者犀角地黄汤重者桃仁承气汤或抵当圆取尽黑物为効张云太阳病不解热结膀胱其人如狂而血自下下者愈若外不解可与桂枝汤外已解但小腹结急乃以桃仁承气汤攻之大抵伤寒当汗不汗热蓄在里热化为血故喜忘如狂○阳狂寒水石黄连末各一钱冷水调下皆效发斑妄语未可下者龙胆草一物汤

○火邪惊狂者医家以火熏熨迫汗及烧针灼艾而然也其人亡阳烦躁卧起不安金匱风引汤柴胡加龙骨牡蛎汤桂枝甘草龙骨牡蛎汤柴胡加龙骨牡蛎汤

又火劫腹满微喘口乾咽烂或不大便譫语用小柴胡汤黑豆解火邪汤

直视

直视无神不转睛 衄兼少血汗犹轻遗尿喘泄摇头证 脉澹循衣并卒倾

水之精为志火之精为神五脏六腑之精皆上注於目病人邪气极盛冒其正气遂使神志不慧目不转睛而为之直视伤寒至於直视证候最逆不救者多亦有反目倒窜眼睛上腾此则肾绝虽昌阳引年亦不及新矣

○衄血不可汗汗之则额上脉紧急直视不能眴不得眠○少血者肝气虚目力弱若又发汗亡阳则阴阳俱虚必至直视二者虽逆犹未甚也○狂言遗尿反目直视肾绝不治○直视譫语喘满者不治下利者亦不治○摇头直视形如烟熏心绝不治○循衣摸床惕惕不安微喘直视日晡潮热下之後脉弦者生脉澹者不治弦为阳澹为阴是阳病见阴脉邪盛而正脱也○无表里证目中不了了睛不和大便难身微热此非直视盖内实也小承气汤大柴胡汤

譫语

譫言脉数郑声虚 胃实身和热有无下利湿温并血证 三阳合病各殊途

实则譫语虚则郑声经曰邪气盛则实精气夺则虚伤寒胃中热盛上乘於心心为热冒则神识昏迷呢喃谵妄此邪气盛而语言差也若汗後若病久本音失而正气亏则郑重语散不知高下此精气夺而声不正也譫语为热独语亦热若狂语则其热加多至於言乱恶骂又剧甚而难制矣大抵大热入胃水涸粪燥必发譫语当下误汗当汗过多亦发譫语譫语属阳见阴证者逆譫语喘满气逆而上奔也譫语下利气脱而下夺也真气离绝谓之何哉

○譫语为实脉洪数大便秘小便赤手足温少与调胃承气汤阳实譫语脉短促者不治若逆冷而脉沉细者即死○郑声为虚脉微细大小便自利手足冷用白通汤○胃实譫语身热汗多胃中燥大便硬或潮热少与调胃承气汤大小承气汤酌量用○身和譫语以发汗多亡阳津液不和致之不可下只与柴胡桂枝汤○下利譫语为有燥屎脉不微细即须下之用小承气汤譫语而利不止则不治又汗出譫语者风也须俟其过经乃下之○湿温苦妄言证有本条○瘀血譫语狂言漱水大便黑小便多遍身黄小腹满缘当汗不汗蓄热在里热化为血故尔轻者犀角地黄汤重者桃仁承气汤抵当圆○热入血室譫语昼静夜譫如见鬼状速与小柴胡汤稍迟则热入胃津液燥中焦上焦不荣必为血结胃当针期门或脉迟身凉无热胃满如结胃状亦刺期门若血热犯於胃气小腹急满小便自利喜忘如狂昼夜譫语抵当圆主之○三阳合病譫语脉滑实身重难以转侧口中不仁而垢遗尿不可汗下少与白虎汤○发少

阳汗则讖语经云汗之则讖语甚谓有少阳也下之则额上汗手足逆冷谓下之早也○太阳病八九日下之胃满烦惊小便不利讖语身重不可转侧柴胡龙骨牡蛎汤○发汗多亡阳讖语不可下柴胡桂枝汤主之○火劫讖语口乾烦燥喘满小柴胡加黑豆

摇头

摇头直视似烟熏 真病心家已絶根痊证反张并口噤 头中痛者战而言

头者诸阳之会阳脉有乖则头为之摇动然有心絶而摇头者有风盛而摇头者有里痛而摇头者形证皆不类焉盖陰根於阳阳根於陰陰阳互根气血所以周流而无间若心絶则神去而陰竭阳独无根不能自主是以头摇经法谓阳反独留形体如烟熏直视摇头者此也至於太阳发痊则风盛於上风主乎动是以头摇经所谓独摇头卒口噤项背反张者此也言而摇头者头中有痛言则痛甚痛则必摇经所谓摇头言者里痛也又谓言者为虚不言者为实是也合是言之均是摇头耳析而分之曰实邪曰虚邪曰真病又当明其臧否云○摇头直视形如烟熏心家絶也真病不治○太阳发痊摇头噤口颌背反张身热足冷有本条○摇头言者其里有痛言者虚也可与如圣饼易简芎辛汤

战栗

战动於身栗动心 正邪胜负两般寻振振汗出将痊愈 鼓颌虚寒病已深

战栗皆陰阳之争战者身为之摇也栗者心战而惕也邪气外与正气争则为战邪气内与正气争则为栗战者正气胜栗者邪气胜战则欲愈栗其已甚乎○振振汗解者盖邪气欲出其人不虚故邪与正争发为振战正气胜则得汗而解矣○伤寒六七日欲愈必振振汗出而解其有身不战而但鼓颌心栗者遂成寒逆此陰气内盛正气内虚不能胜邪反为邪所胜当以四逆汤姜附汤并御文御之理至明矣经云陰中於邪心内栗也又云邪中下焦陰气为栗足胫逆冷便溺妄出此合用四逆汤姜附汤仍与养正丹

瘈瘲

瘈为引缩瘲为伸 热极风生并在经涤热祛风犹可望 火熏发表定归冥

瘈则急而缩瘲则缓而伸病軀瘈瘲热气极矣热极生风风主乎动故筋脉相引而伸缩不宁伤寒至於瘈瘲疾势过甚诊视调理难乎否乎内经曰太阳终者戴眼反折瘈瘲汗出不流瘈瘲之为絶证也如此○瘈瘲最难疗理能用涤热祛风之剂以折其热间有可活之者涤热如柴胡山梔辈祛风如防风羌活辈是也○风温妄以火熏必然发黄剧则状如惊癇时瘈瘲经云一逆尚引日再逆促命期设或为医所误只得与金匱风引汤火邪用黑豆解

筋惕身瞤

筋惕身瞤发汗多 酌量真武更无过左边动气如轻汗 此证难医奈命何

发汗过多津液涸少阳气偏虚筋肉失其所养故惕惕瞤瞤而跳动也张氏特设真武汤以救之然本方不特温经助阳而已其间术苓姜附皆於胃气有关焉素问云脾中风则肌肉瞤盖脾主肌肉胃为津液之海是虽过汗法当温经助阳又不可不以胃气为本也虽然已经吐下而复汗汗下而复烧针得之尤甚逆也经曰伤寒吐下後发汗脉微心脇痞痛虚烦眩胃气上冲咽筋脉动惕者久而成痿又曰太阳汗後复下表里俱虚更加烧针因胃烦面黄肤瞤者难治以至汗出如油口噤肉战伸吟喘促者不治然则吐汗下可轻乎

○阳气之柔者养筋发汗过多病躯无阳筋必战动或虚人微取汗或伤风自汗妄用大青龙汤便有厥逆筋惕肉瞤之证俱属真武汤羸甚者去芍药有热证者去附子尤当酌量用之○应发汗证而腹中左右上下有动气者并不可汗若汗之即筋惕身瞤其左边动气者尤不可汗发汗则头眩汗不止筋惕肉瞤其候最逆且先服防风白术牡砺散次服小建中汤十救一二○太阳病发汗不解发热心悸头眩身瞤欲擗地真武汤○吐下後心下逆满气上冲胃起则头眩脉沉紧身振摇者伏苓桂枝白术甘草汤久而成痿者通用若心下满痞兼与枳梗汤加茯苓甘草

不仁

不仁口腹及肤皮 痛痒寒温总不知正气重为邪气伏 荣虚卫弱厥如尸

经曰诸邪乘寒则为厥爵冒不仁盖其血气亏少不能周流於一身於是正气为邪气所伏故肢体顽痹不知痛痒寒温厥如尸而郁且冒也苟其不仁脉或浮洪发喘无已水浆不下汗出如油是气絶於命门束手待尽而已

○甘草乾姜汤桂枝芍药汤加乾姜或桂枝麻黄各半汤以意度用○少陰脉不至肾气微精血少寒气上奔血结心下阳气退下热归陰股与陰相动令其身不仁是为尸厥

不得眠

不眠肾证利而顺 大汗膀胱胃里乾吐汗下余烦懊懣 热多热少数般看

按素问云胃不和则卧不安所以不和者津液乾焦热邪烦燥阳独盛而陰偏虚故尔盖夜以陰为主陰气盛则目闭而卧安惟夫陰为阳所胜故终夜烦扰而不得宁所谓陰虚则夜争者此也若阳虚而陰胜焉又有夜静昼烦之证耳

○少陰下利而渴不得眠猪苓汤此停水也若二三日以上心烦不得眠黄连阿胶汤主之○太阳发汗多或大汗出胃中乾燥烦不得眠欲饮水者少与之胃和即愈若脉浮小便不利而渴五苓散○吐汗下後心中懊懣虚烦颠倒不得眠栀子豉汤或酸枣汤○大热乾呕呻吟错

语不得眠黄连解毒汤凡阳毒热病皆不得眠○下後发汗无大热脉沉微不呕渴无表证夜静昼烦而不得眠乾姜附子汤○阳胜陰则狂眠乱梦用梔子豉汤陰胜阳则惊悸昏沉用酸枣汤○产後不得眠者热气与诸阳相并陰气未复故也梔子乌梅汤或易简温胆汤加竹茹此可通用

多眠

多眠神思苦沉昏 自汗风温默默然狐惑唇疮沉细肾 太阳浮细亦痴眠

陰邪胜阳人多昏默默昏闭目者陰司闔也默默不言者陰主静也多眠四证二者病在经若太阳恶寒其脉浮细是阳气未尽复也若狐惑淹沉素得之下利则其亡阳可知矣此所以为陰胜欤

○风温证尺寸俱浮自汗喘息体重不收嘿欲眠不可发汗可萎蕤汤病在少陰厥陰二经
○狐惑证四肢沉重咽乾声哑上下唇疮害人甚急有本条○少陰证尺寸俱沉细但欲寐急与四逆汤复其阳气又少陰欲吐不吐烦而多寐五六日自利而渴张氏无治法若小便白者可用四逆汤张氏又云少陰病脉微细沉多寐汗出不烦欲吐若变证五六日自利烦燥反不得寐者死少陰证变难辨难治贵在审详○太阳证头项痛恶寒嗜卧脉浮细或胃脇满者小柴胡汤脉但浮麻黄汤○胃伤风发黄嗜引有本条

瘥後昏沉

瘥後昏沉似怪妖 或时寒热或时潮语言错谬精神少 毒在心胞汗未消

伤寒瘥後半月以来终不惺惺错语少神或无寒热或寒热似疟或潮热烦赤医以风魅治之非也是由发汗不尽余毒在心胞络间致之

○瘥後昏沉不惺知母麻黄汤再取微汗○瘥後劳复食复见下後有热条○瘥後胃脘余热虚烦而呕竹叶汤加生姜○瘥後喜唾不已膈上有寒理中圆○瘥後从腰以下有水气牡蛎泽泻散○瘥後日暮微烦以其病方瘥强与谷食而不消也节饮食则愈

饮酒复

饮酒还教病复来 闷烦口燥舌生胎妄言不寐仍乾呕 解毒黄连汤妙哉

极陰变阳寒盛生热古人以伤寒为大病大病之後可与酒乎有劳复而发热者有食复而发热者饮酒致剧其热尤甚於劳食复也

○伤寒已得汗解因饮酒而复剧烦闷口燥乾呕伸吟妄语不得睡黄连解毒汤龙胆草煎汤

或吉皮为佐

寻衣摸空

寻衣妄语晡热潮 下後阳弦病有瘳脉濇为陰终不救 发黄须要小便流

华陀云病人手循衣缝不治间有一二活者幸也○吐下後不解多日不大便日晡潮热不恶寒独语如见怪剧者不识人循衣撮空怵惕不安微喘直视微者但发热譫语并用大承气汤下之若得大便後脉弦者生脉濇者死弦为阳濇为陰是阳病见陰脉也○太阳病用火熏之以致发黄阳盛则欲衄陰虚小便难陰阳俱虚身体枯燥头汗及颈口乾咽烂腹满微喘或不大便譫语甚者呶呶循衣摸床此证小便利则可治

百合

百合昏如祟物厌 或时喜食或时嫌似寒不冷热无热 欲步难行卧不恬

百合者百脉一宗举皆受病无所谓经络传次也皆因伤寒虚劳大病之後脏腑不平变而成此其状似寒无寒似热无热意中欲食复不能食默默欲卧复不得卧强欲出行复不能行崇朝口若小便赤黄药入即吐利也病源所载证状一同其脉微数每尿则头痛者六十日愈若尿不头痛但淅淅如寒者四十日愈若尿则快然而但眩者二十日愈

○百合知母汤百合地黄汤滑石代赭汤鸡子汤百合洗方选用之

脏结

脏结无阳舌白胎 陰筋急痛引脐来虽然饮食全如故 下利频频不可回

脏结者脏气闭结而不复流布也一息不运机穢穷一毫不续穹壤判脏其可结乎外证有如结胷但饮食如故时时下利为异耳其脉寸浮关沉细而紧无阳舌胎陰筋引脐腹俱痛是也病人脇下宿有痞气连於脐傍痛引小腹而入陰筋者亦名脏结於此而图其痊济岂不难矣哉

○脏结无阳证不往来寒热或寒而不热其人反静舌白胎者皆不可下也盖其邪未全成热犹带表寒可刺关元穴仍与小柴胡汤加生姜

两感

两感膀胱对少陰 头疼口燥大而沉胃脾肝胆二三日 脉证双传准例寻

伤寒惟两感不治两感者半属於陰半属於阳脏腑俱受病也一日太阳少陰俱病则头疼口乾烦满而渴脉大而沉二日阳明太陰俱病则身热鼻乾譫语腹满不食脉长而沉三日少阳厥陰俱病则耳聋囊缩厥冷水浆不入脉弦而沉或三日而僵或六日而仆张氏无治法但曰两感病俱作治有先後发表攻里本自不同双锤以意消息谓如下利不止身体疼痛急先救其里与四逆汤如不下利但身体疼痛急先救其表与桂枝汤此为治有先後其達权识变之论也谢复古释张氏治有先後之说亦以为阳先受病在乎表则先解表陰先受病在乎里则先救里是亦一意然先表者里不可缓先里者表亦不可缓也欤

虬厥狐惑

蛔厥乌梅及理中 脏寒胃冷吐长虫咽乾声哑名狐惑 湿?唇疮限数终

虬厥证属厥陰病家有寒妄发其汗或汗後身热又复汗之以致胃中虚冷故长虫逆上饥不欲食食即吐虫其乍静乍烦者虫或上而或止也虫闻食臭必出所以食则吐虫也张氏有言厥陰为病消渴气上冲心饥不欲食食则吐蛔吐蛔既出於胃令役有消渴之证何哉盖热在上焦而中焦下焦虚寒无热耳设或大便鞭结是亦蘊毒使然又不可指为燥粪但用生料理中汤加大黄入蜜以利之白术乾姜所以辅大黄也○治法先脉理中圆次用乌梅圆若误下之利不止则用四逆汤又法理中圆加伏苓枳殼乌梅渴者加括萎根○狐惑与湿?皆虫证也状如伤寒多因伤寒下利变坏成之盖腹中有热入食无多肠胃空虚故三虫求食而食人之五脏也其候四肢沉重并恶饮食默默欲眠目不能闭舌白齿晦面目间赤白黑色变易不当虫食下部为狐下唇有疮其咽乾虫食其脏为惑上唇有疮其声哑湿?条例是虽调理有方此越人所以望而惊也○治?桃仁汤黄连犀角汤雄黄硃散备用而已金液丹方状治湿?盖硫磺能杀腹中诸虫无阳者与之

陰阳易陰阳交

阳易陰根肿痛深 腹连腰胯痛为陰温家脉躁重生热 陰与阳交汗莫禁

男子阳易妇人陰易病新产而动淫慾也一名女劳复感於情者亦然其候身重气乏小腹绞痛头不能举足不能立四肢拘急百节解散眼中生花热上冲胷在男子则陰肿入里腹内攻刺在妇人则里急腰肿引腹俱疼若手足拳挛其脉离经皆不可活或荣卫虚精髓竭翕翕少气着蓆不能动摇者引岁月死吁内伤六气外伤七情其受害若是欤

○损脉离经一呼一至是为不足至脉离经一呼三至是为有余○烧棍散假鼠粪汤竹皮汤乾姜汤青竹茹汤当归白术汤以意择用○陰阳交者温病不得发汗若汗之复大六热狂言不食其脉躁疾是也大抵不治若脉浮数则表证犹在可再汗之若脉沉实或狂语则为胃实阳盛又当下之发汗後复热者通用此例○再汗用桂枝汤○再下用承气汤

陰毒阳毒

陰毒身如击扑然 疾沉汗渴痛脐咽身斑面赤多烦燥 阳毒狂言洪数弦

陰气独盛阳气暴絕则为陰毒身冷有汗其脉沉细而疾是也【沉而右疾者升】有初病遽然而成者有服药数日变而成者盖以肾气极损生冷伤脾内已伏陰外又感寒致之或先感外寒而後伏陰於内内外皆陰阳气不守故尔阳气独盛陰气暴絕则为阳毒身热无汗其脉弦洪促数是也有初病遽然而成者有已经吐下变而成者盖以酒麪过度丹砂僭燥肠胃极热致之或病证属阳误投温药助热为邪内外皆阳陰气不守故尔陰阳二毒皆有头疼微利之证抑陰用热抑阳用寒固有条例然此二毒随气逆上结伏於胷中皆令人心下痛硬非常法所能通也当急作规摹以泄之陰毒泄则阳气复阳毒泄则陰气复陰阳升降荣卫流行自然大汗而解矣若心下已结延至六七日间断不可活外证治法详于後篇○陰毒外证面目唇爪青黑口开气短咽喉不利手足厥冷身不甚热痛肿如打扑或数栗而寒头目俱疼腰重背强毒气攻心心下坚闷腹中绞痛外肾并脐下冷硬额上及手背间冷汗不止呕吐下利燥渴陰极发燥精神恍惚言语醒醒声音郑重舌上黑色陰病回阳服药未透亦须外借火气但勿迫燖也生姜良姜能解散寒邪发越阳气亦要药也○陰毒沉细而疾身冷有汗陰毒甘草汤白术散附子散正阳散肉桂散回阳丹返陰丹天雄散正元散退陰散金液丹可选用之令阳气复而大汗解矣○陰毒已深则灸气海关元二穴以手足和为効仍以前项药济之若六脉附骨疾势困甚者脐中用先艾後葱法方诀详具于後凡治陰毒得阳气乍复者皆生烦燥切勿误投凉药躁甚与返陰丹辈○阳毒外证身量大热面目俱赤无汗头疼腰背四肢疼痛发斑如锦纹心下结闷烦燥咽痛喘促唾吐脓血下利赤黄小便亦赤黄错语惊狂或走甚者舌卷而焦黑鼻如烟煤○阳毒弦洪促数身热无汗阳毒升麻汤葶苈汤即米醋大黄汤栀子红汤黑奴圆太乙牛黄膏用竹叶汤调下或研生地龙大者三条入生姜汁薄荷汁生蜜脑子各少许新汲水调灌下可选用之令陰气复而大汗解矣阳毒大热烦渴譫语赤斑衄血不止白虎汤一服効○阳毒已深脉洪大内外结热舌卷黑鼻中如烟煤用新汲水浸湿布数重搭於胷上续又换新水浸布渍冷热势才减即已之详法于後○太师陈北山方诀治陰毒心下结伏按之极痛大小便秘澁累日用药不下但出气稍煖亦可疗治急取巴豆肉十粒研烂入麪一钱许捻作一饼坚实安顿脐心立小艾柱灸五七壮觉腹中鸣良久自通利其次用葱白一束紧扎切作数饼灸令温热贴於脐下以熨斗火熨其上续又易之渐觉体温即以五积散二钱附子末一钱姜七片枣二枚盐少许水大盏煎七分温服连并二三剂即汗出而瘥又法以大蒜一枚捣研?作饼子炙热置於脐心灸十壮大小便即通○治阳毒累经药下不通结胷坚硬按之极痛或稍通而复再结喘促极热大燥狂乱即取大活地龙四条洗净砂盆内研如泥入生姜自然汁少许蜜一匙薄荷汁少许新汲水小盏调和徐徐灌尽渐次凉快若热炽者加脑子少许如未効再作一剂自然汗出而解或用竹叶汤调太乙牛黄圆灌下二毒灌药少顷以手揉其心膈即得药下○本事方灸结胷巴豆肉七粒黄车七寸捣细津唾调膏安於脐心艾炙其上不拘壮数以腹中有声为効灸毕即以汤蘸软帛拭之恐成疮烂此方与集验神助散一同陰阳二毒但有微气者皆可灸脐间有声即得汗解○尚药孙用和破结丹治陰阳伏逆变为结胷五六日大便结攻之不及達之不可以此主之用锦辰砂银青磁石北【阙】脂肉豆?木香官桂牵牛生黑附炮巴豆肉不去油各半两轻粉半分麝半钱金五箔右件将法醋半升入朱砂附子牵牛三末?成膏次入徐药打和得所圆如皂子大轻粉衣每二圆蜜汤调下

阳证似陰陰证似阳

阳证如陰冷四肢 滑沉尿赤大便稀面红烦燥身微热 陰证如阳沉更微

陰极发燥热极发厥物极则反也重阳必陰重陰必阳寒暑之变也四肢冷小便赤大便秘或粪色黑眼开言动脉沉而滑谓之阳证似陰面赤烦燥身有微热眼闭谷热脉沉而微谓之陰证似阳欲知的定当推原反本察色听声辨以六经参以外证徐徐焉据脉验之数热迟寒陰阳别矣○阳之体轻陰之体重陰家脉重阳家脉轻○阳盛旦静陰盛夜宁阳虚暮乱陰虚夜争○阳证似陰白虎汤热极生寒则四肢逆冷水或用承气汤○陰证似阳四逆汤加葱白主之陰盛则燥下虚则而赤衰寒则身微热也

陰盛隔阳

凡陰盛隔阳脉细沉疾身冷大烦燥嗜卧泥水之中欲饮水而不欲入口者是饮水者非可服霽?散少焰散丹砂圓亦効孙用和以半两黑附子一枚烧存性候冷为末入真朮茶一大钱钱和为二服每服水一盞蜜半匙煎六分冷服躁止得睡汗出皆药之验也

仁斋伤寒类书卷六

仁斋伤寒类书卷七

钦定四库全书

仁斋伤寒类书卷七 宋 杨士瀛 撰

明 朱崇正 附遗

小柴胡汤加减法

伤寒诸方惟小柴胡为用最多而诸家屡称述之盖以柴胡半夏能利能汗凡半表半里之间以之和解皆可用也抑不知小柴胡非特为表里和解设其於解血热消恶血诚有功焉盖伤寒发热一二日间解撤不去其热必至於伤血不问男女皆然小柴胡汤内有黄芩柴胡最行血热所以屡获奇功但药性差寒用之贵能加减今推明活法凡表发热里又有燥渴粪鞭热证者是为内外俱热小柴胡加大黄里无热证但发热在表者小柴胡加桂桂主解表可以温血所谓陰盛恶寒甘辛发散者此也大黄主攻里可以荡涤血热所谓阳盛内热酸苦涌泄者此也是又别其解表以温攻里以寒之义若遇少阳本证及无表里证或表里不分之证但依本方用之并不须加减此为正诀虚者少与尤在酌量予每见後学数辈疗治伤寒辄用当归其意盖为调血计不思一滞中脘二动痰涎三坏胃气而血热又非当归之所能除惑之甚矣否则热入血室张氏特以小柴胡主之何哉虽然均是和解耳局方以和解散平稳之剂为和解张氏以小柴胡差寒之剂为和解意安在哉盖局方和解散为寻常感冒和平解散设也若夫热在半表半里既不可汗又不可下并小柴胡一剂孰能内和而外解之乎然而学者亦不可以轻心而用小柴胡也脉之不审证之不详纵横泛应执小柴胡以为公据脉遇浮热似阳其不误人性命几希矣甚者仅以小柴胡收效一二而乃不遵格法轻用大柴胡立意一差祸不旋踵吁可畏哉

伤寒诸笃证

摇头直视形如烟熏心絶○唇腮反青四肢多汗肝絶○反目直视狂言遗尿肾絶○汗出髮润喘而不休肺絶○环口黧黑柔汗发黄脾絶○汗出如油喘促无已水浆不下形体不仁命絶○大发湿家汗则成痙热而痙不治○发湿温汗身青面变耳聋不语曰重喝不治○发风湿汗必譫语并不治○发风湿中湿汗并逆○发动气汗不治○发少陰汗九窍出血曰下厥上竭不治○发少阳汗则胆语○发汗只在头面不至遍身鼻衄不止者逆○发汗不至足者逆○诸逆发汗剧者言乱目眩并不治○当汗无汗服麻黄数剂汗不出者不治○汗出如珠不流不治○汗出如油口噤肉战声吟喘促不治○汗後呕吐水药不入口者逆○热病脉躁盛而不得汗不治○汗後不为汗衰复大热脐躁疾狂言不食曰陰阳交不治○忽冒脉无脉服药後汗解则生若无汗脉不至者不治○少陰厥逆无脉服药通脉其脉渐续则生暴出则不治○下利厥逆无脉灸之脉不回身不温不治○少陰四逆下利恶寒而拳发躁无脉不治

○下利日十余行其脉反穴者逆○少阳阳明合病下利脉长大而弦曰负不治○阳病见阴脉不治○发斑属阳见阴脉不治○代脉不治吐血衄血脉反浮大而牢不治○阴易阳易脉离经外肾肿腹中绞痛手足拳挛不治○欬逆上气脉散者不治○谵语脉反沉微四肢厥冷不治○脉阴阳俱虚热不止者不治○七八日以上发大热难治○舌木烂热不止者逆○下利发热或汗不止厥不止并不治○下利发热厥逆燥不得眠不治○譫语直视或喘满或下利并不治○譫语属阳见阴证者逆○伤寒脉乍疎乍数不治○发斑先赤後黯面色黧晦不治○发斑大便自利不治○发黄而变黑不治○口乾舌黑不治○口张目?不治○张口出气乾呕骨骸热痛者逆咳逆不止者不治○心下痞闷上气喘急者逆○霍乱喘胀烦燥不治○误下湿家额汗喘促或小便不利大便自利不治○头汗内外开格小便不利此为阳脱不治○腹满咳逆不得小便不治○腹大满而下泄不治若脉洪紧而滑尤可虑○脏结如结胃舌白胎阴筋引脐腹痛时时下利不治○结胃证其加烦燥不治○脏厥七八日发厥肤冷烦燥下利无时暂安不治○少阴吐利厥逆烦燥不治○厥而下利反能食者曰除中不治○四肢厥逆脐下绞痛石硬眼定者逆○厥阴唇青舌卷黑而耳聋囊缩不治○头连脑痛甚手足俱寒不治○阴毒阳毒过六七日不治○两感不治○狐惑咽乾声哑唇疮不治○赤斑五救其一○黑斑十救其一○寻衣摸空者逆

伤寒别名

清便自调自可谓大小便如常也○大便秘而坚则曰鞭○小便不利小便少下利清谷皆谓水谷不分○得大便曰更衣○大便坚小便利曰脾约○下利曰殄泄○肠僻谓痔也○寒而利曰鸭溏热而利曰肠垢○转失气谓气转而响时时失下即後分泄气盖腹中有积○大汗伤气大下伤血或火邪逼迫惊狂或尺寸脉紧而反有汗或发汗後汗不止而漏风或阴病本无汗而反有汗或其脉浮迟微弱不能作汗皆曰亡阳○吐汗下温针以後其病不解曰坏病曰何逆○瘥後更发热曰遗热○脉相尅贼曰负○两手无脉曰双伏一手无脉曰单伏○左关脉曰人迎右关脉曰气口足趺上动脉曰冲阳足後根上?中动脉曰太谿○妇人ru头直下近腹处曰期门○脐下一寸曰气海二寸曰丹田三寸曰关元○玄府即汗空也○脐间动气曰奔豚○筋惕肉动曰瞤○中暑曰中喝○妄发湿温汗曰重喝○渴欲饮水水入即吐曰水逆○心下停水怔忡身无大热头额微汗曰水结胃○乾呕曰哕咳逆曰哕○目中不了了谓不明也睛不和谓不和平如常也○三月至夏方发病曰晚发

伤寒戒忌

伤寒新瘥後但少吃糜粥常令稍饥不得饱食反此则复○又不得早起不得梳头洗面不得多言不得劳心费力反此则复○瘥後百日内气体未得平复犯房室者死○忌食猪羊鸡鸭狗肉肥鱼油腻诸骨汁及咸藏鮓脯饼麪果物

药有寒温相济

黄连汤用乾姜黄连柴胡桂姜汤用黄芩姜桂麻黄升麻汤用桂枝石膏返阴丹用附子膩粉

陰旦汤用乾姜黄芩与夫桂枝石膏汤桂枝大黄汤乾姜黄连黄芩人参汤某药性寒某药性温温以调陰寒以调阳盖使陰阳调而得其正其有阳证当下而表怯者陰证当温而带热者皆可以前例推之亦当权其冷热重轻为之增减斯可矣虽然古之分剂与今之分剂多寡又不同焉药则秤三四钱为一服水则用一大盞取七分为一剂此亦通今之论也所谓利药不嫌生温汤须要熟又当权衡於此云

据脉

伤寒治法据脉为要问证次之证如此脉亦如此条例径行若证热而脉迟证寒而脉数切不可自惑於仓卒须是略去外证专以脉为主领斟酌而调理之庶无差误虽然偏阳之脉又何耶曰人禀陰阳二气陰根於阳阳根於陰往来流通而无间断者也一或偏胜百病生焉盖偏阳则多热偏陰则多寒偏陰则六脉虚濡按之无力颇有细濇轻濇之状病主沉寒法当温散人所易知若夫病軀内外有热其脉不数不洪但指下急濇而小紧如枝条刮刮之状此则为阳胜陰当用寒凉之剂以解阳热愆伏之邪以行血热凝结之毒不可错认以为脉小脾虚误以温药益其疾也纵或呕逆亦是热邪乘虚热气闭隔断不可以温热之剂投之否则墮厝火积薪之辙矣凡病皆当审斯

警省

伤寒证候顷刻传变伤寒治法绳尺谨严非可以轻心视之也其间种类不一条例浩繁是固难矣至於陰极发燥热极发厥陰证如阳阳证如陰脚气似乎伤寒中暑似乎热病与夫蓄血一证上热下冷乍閤乍寒甚至四肢发厥昏迷闷絕凡此等类尤当审思而明辯之若疑似未别体认未明姑且试探切不可妄投决病之剂方方虽微死生之系也谨之哉

药方

本祖南阳活人书其详见於伤寒百问

凡下证不得用圆子药谓水银?巴粉霜之类作圆以为转下药性有毒只取积滯伤动脏腑不能荡涤邪热以去病也○小儿伤寒节度如大人法但分剂少异其间用药小冷耳

产妇伤寒

或问妇人伤寒可得闻乎曰伤寒三百九十七条一百一十三方此张氏截然之笔削也於某证则有某药曷尝以男女为别哉要之月事去来产前产後男子所无请发明其蘊以解世俗之惑盖妇人以血为主发热恶寒经水适来经日热除而胃满譫语者是则邪气结於胃脇当刺期门随其实而取之伤风经日续生寒热发作似疟而经水适断者是则血结而不行当以小柴胡汤散之所谓治之而愈者此也至如伤寒发热经水适来昼醒暮譫如见怪状是则里无留邪热随血散所谓不治自愈者此也前乎吐血下血两条并以犀角地黄汤桃仁承气汤

抵当汤圆之类言之详矣抑产前产後治法将何择焉曰产前安胎产後消瘀於是遵依条例斟酌轻重而调理之安胎者何桑寄生阿胶缩砂为要药他如桂枝半夏桃仁大黄堕胎及燥热等辈则不可轻用也消瘀者何川芎蒲黄赤芍药生地黄为要药他如内补拦住败血之剂则不可轻进也朱氏以阿胶桑寄生人参茯苓白术等而细末糯米饮调剂为孕妇安胎以红花一分官桂芍药甘草半之姜枣同煎为解表消瘀以葱白生姜大剂浓汁为产前发散以小柴胡汤去半夏和解热入子宫郭稽中以枳殼防风一度甘草减半末之点服主大便秘澁又以蜜导一法真可活人然则产妇证治观此可以问津索涂矣虽然知安胎则不可不调气知消瘀则不可不扶虚枳殼香附陈皮以调气也当归川芎黄蓍人参以扶虚也退热则柴胡黄芩解肌则紫苏乾葛滋肠则麻仁枳殼助阳则乾姜良姜其间采摭虽未备古人之经然而甘辛为阳酸苦为陰皆不越古人之意姑存之篇末以便学者之观览云

小儿伤寒

或问小儿伤寒可得闻乎曰小儿伤寒与大人法度则同但分剂少异用药少冷已略陈於前矣然而惊风疮豆亦尝赘布此尤不可阙请发明药证而条析之恶风恶寒者必隈人藏身引衣密隐是为表证可微取其汗也恶热内实者必出头露面扬手掷足烦渴燥粪掀衣气麤是为里证可略与疎利也至若头额冷手足凉口中冷气面色黯淡大便泻青此则陰病里虚当以温药救其里也举是三者汗下温之法可以类推矣发汗用桂枝麻黄各半汤加黄芩解肌用香苏散加乾葛通利四顺清凉饮微利人参败毒散温里理中汤厥冷甘草乾姜汤寻常感冒惺惺散或参苏饮伤风发热人参羌活散或天麻防风圆壮热者升麻葛根汤潮热者生犀散小柴胡汤加大黄小便不通者导赤散五苓散甘露饮表里俱热如表里俱见之证洗心散主之咳嗽则人参润肺散加紫苏夹食则异香散紫霜圆辈然亦视其小便或赤或白可以知里热之有无或清或浊可以知里热之轻重幼而婴孩则以虎口指纹之红色验之长而童孺则以一指按其三关据左手人迎之紧盛者断之所谓七十二证某证某方皆无越张朱格例特不过小小分剂而中病则止也不然幼幼新书骈集小儿伤寒虽略举巢源一二而终篇以活人书为法果何意哉故附于卷末以备学者之观览云

仁斋伤寒类书卷七