

文堂集验方

何京

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
例言	5
卷一	6
卷二	40
卷三	68
卷四	114

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

例言

一医期明理。不贵执方。以方论医。失之浅矣。是编专为僻壤穷乡。持危济急。第志捷法。不列全方。如伤寒六经症论。概不备录。

一行世方书。匪乏善本。或虚实寒热。有未缕析条分。偶尔轻投。虑多贻误。兹刻悉为详注。用者审诸。

一群方或采诸古本。或传自良师。虽极搜采。终嫌挂漏。偶阅济人自济一刻。颇觉先得我心。用是广为增订。参互旧文。谨志由来。匪同掠美。

一纂辑甫竟。即患沉。未经讎校。或症论参差。辞意刺繆。惟冀当代宗工哲匠。示我周行。节取所长。教其所短。

一是集授梓。原期利济。公诸海内。毫不取酬。同志如欲印施。概无所吝。

卷一

中风

（附类中）

〔总论〕 凡卒然仆倒。昏不知人。痰涎壅塞。口眼斜。四肢不遂。概名中风。然中风症候。与中气相类。中气乃忿怒忽然昏仆。不可以中风一概治之。中风身温。中气身冷。

中风多痰涎。中气无痰涎。中风脉浮应左人迎。中气脉沉应右气口。以气药治风则可。以风药治气则不可。

中风多痰。勿骤以人参补之。恐痰愈盛而气愈塞矣。慎之。阳中者面赤。

牙关紧闭。目上视。身强直。手拳掉眩。阴中者面青白。痰喘。手足冷。多汗。更有元气虚。

忽然昏仆似乎中风者。手必撒。口必开。与正中风不同。又宜温补药治之。（凡中脏口开心绝。手撒脾绝。眼合肝绝。遗尿肾绝。鼻声如鼾肺绝。五症齐犯。不治之症也。如只见一二症。用重参治之。或灸法救之。）更有气血偏枯。半身不遂者。如在左者血虚。宜四物汤。

熟地黄。当归（各三钱）川芎（一钱）

白芍（二钱酒炒）水煎服。如在右者气虚。宜四君子汤。人参（一钱）

白术（土炒二钱）茯苓（二钱）

炙甘草（五分）水煎服。二方中皆可加祛风活络之药。如防风（一二钱）

桂枝（一钱）钩藤（三五钱）之类。如有痰加竹沥。姜汁。

佐之。（此二症尚须审视。左或死血。右或湿痰。）若类而推之。则又有中痰。中寒。中暑。

中食。中恶等症。分别症治。切勿误施。惟是中风一症最急而暴。历代名贤。各有发明。良法具在。所当深究。第一时卒倒。医药迫不及备。故节取古方之效捷而易办者。谨述于下。

庶几对症处方。稍为救急之一助云。

〔传心方〕 治卒然仆倒。痰涎壅盛。难辨虚实。扶病患于避风室内。用炭火一盆。将米醋洒上。使醋气冲入口鼻。病轻者即苏。重者亦易治。勿遽服补药米汤之类。

恐痰涎永系于心。致成终身痼疾。（此法即虚中亦可用。）

〔中风昏迷不省〕

不论风寒。食痰邪祟。一时昏仆。用生姜汁半钟。童便一钟和匀。

荡温灌下即醒。

牙皂荚（去皮弦二两。用生矾一两同入水中煮化。取出晒干为末。）

北细辛（五钱去叶土净）共研细末。用少许吹入鼻中即醒。

人手足指甲（炒黄酒煮服。）立醒。

〔中风口噤不能开〕白盐梅揩齿即能开。并不伤齿。

不拘男妇小儿中风。口噤身直。

用〔中风口不语〕白明矾（二钱研末。）

用生姜自然汁调化。斡开口灌服。其涎或吐或化下即醒。

马料豆一升。煮浓汁如饴。含汁在口。即能言也。侧柏叶一握。去枝梗。

葱白一握。连根研如泥。无灰酒一斤。煎十余沸温服。（按柏叶能行血消风。葱白散气祛痰。

酒能通经助药力。如国中即服数杯。能使风退气和。一切易治。）

〔国中痰盛不省人事〕

苏合丸一圆。用竹沥姜汁。调药灌下。醒后。用白术（土炒）

当归。天麻（各二钱）川芎、薄荷、桂枝、南星（姜汁制）

陈皮（各一钱）水煎。临服加竹沥一酒盏。姜汁二茶匙。和匀服。

〔中风口眼斜〕生栝蒌绞汁。和大麦面炙热熨心头。一正便止。勿令过分。口

用皂荚五两。（去皮为末）三年老醋和糊。左涂右。右涂左。干更上之。以正为度。用石灰一合。醋炒调如泥。于不患处涂之。立便牵正灸法最妙。听会、（耳珠前陷中。开口有空。）

〔中风灸法〕

一时昏仆气塞。涎流不语。药物难施之际。灸法最善。百会、（头顶中。）

风池、（耳后一寸半。并治偏正头风。）大椎、（项背一节骨陷中。）曲池、（屈手陷中。）足三里、（膝眼下三寸。骨外廉陷中。）绝骨、（一名悬中。外踝上三寸。附飞阳之前。）间使、（手掌上横纹中后一寸。）以上七穴。凡人心中昏乱。

或手足麻痹。不拘是风是气。用绿豆大艾丸。各灸三五壮。
卒死不知何症。用此灸法即苏。

〔中风手足麻痒〕羌活煎汤洗。大肠燥闭不见虚症者。枳实浓朴大黄。羌活。（各二三钱）水煎服。自解。（即三化汤。）

〔太玄汤〕治中风痰塞不语。染布活靛缸水一盞。温灌下。即能言语。（按蓝汁解诸风热毒。散经络结气败血。染布活水。内有锻石能下痰水。取攸扬之义。）

〔丸〕专治肝肾风气。四肢麻痹。骨间疼痛。腰膝无力。亦能行大肠气。治三十六般风。或受寒湿而起。瘫痪年久不愈。服久神效。
草。（法于五月五日。六月六日。

九月九日。采叶。洗净焙干。）用好酒白蜜和匀。洒在叶上。铺入甑中。上锅内蒸透。取出晒燥。再洒再蒸。晒共九次。碾末。炼蜜丸如桐子大。每服五十丸。空心白酒下。病五七年者。服至二千丸。病转盛者。乃药胜于病。服至四千丸仍如完人。

〔浮萍一粒丹〕治中风瘫痪。三十六种无名风疾。遍身癩癣脚气。并治跌扑损伤。胎孕筋搐挛结。此药性寒而散。中风挟火者。功效至灵。服之百粒。乃为完人。紫背浮萍。（宜七月十五日采。捡净。以竹筛摊晒。下置水一盆。映之易燥。）研细末。炼蜜丸弹子大。每服一粒。空心豆淋酒下。

〔史国公药酒方〕防风。秦艽。川芎。鳖甲。虎胫骨（炙酥）羌活。晚蚕砂。（炒黄）油松节。白术。（土炒各二两）杜仲。（姜汁拌炒）当归。（各三两）川牛膝。（一两）苍耳子。（四两）干茄根。（八两蒸）枸杞子。（五两）上切片盛夏布袋中。投大坛内。入好酒三十五斤。封口。浸十四日。将坛入汤锅内煮三个时辰。取坛入土埋三日。去火气。每日清晨午后。各服三五杯。大有效验。愈于服他药也。

〔中风拘挛〕中风昏仆省后。筋络挛结。肢节疼痛。或半身不遂。用八角刺树皮。（俗名老鼠刺。树高三五尺。冬季结红子。鲜者取皮。四两。）木莲叶。（似茶花叶而色老。生于土墙头上者。多一岁一片。）无灰酒二斤。煎至两碗。作二次服。大有奇功。三四服全效。

〔预防中风方〕
凡人觉大指次指麻木。或眉棱骨痛。三年之内。定有风疾。宜服此方。

更以慎起居。远房帙。节浓味醇酒。为最要。

草。（三片。制法如前。）制首乌。当归。

熟地黄。（各八分）牛膝。续断。秦艽。五加皮。川芎。赤芍。（各四两）俱为细末。炼蜜丸。

桐子大。空心淡酒下三钱。

附类中风

〔中气〕

前已合辨。用苏合丸姜汤调灌醒后。次用人参。白术。（炒）茯苓。青皮。

陈皮。白芷。乌药。（各一钱）甘草。（五分）水煎温服。（或分二次服。）即是中风。去人参。

先进此方顺气。次进治风药。亦善法也。此即八味顺气散。

〔中痰〕寒痰迷闷心胸。僵仆卒倒。口角流涎。四肢厥冷。脉沉滑。姜汁调白矾二钱灌下。如不效。再用牙皂。（去皮弦。炙净末一钱。）藜芦。（五分）俱为细末。每服五分。

灯心汤下。吐去顽痰即醒。次服导痰汤。陈皮。姜半夏。茯苓。枳壳。（炒）南星。（姜汁制。

各一钱。）甘草。（五分）加生姜五七片。水煎服。

端午日取白凤仙花。浸于烧酒内封固。

无论年月。遇此症温服一杯。其痰立时消化。

〔中寒〕身体僵直。口噤不语。四肢战掉。洒洒恶寒。脉浮紧。无汗。用热酒。姜汁各半盏。灌下即醒。或用生葱二斤。截去其根叶。用绳缚作两束。先用一束。入空锅内顿热。（不可用水。）乘热。置病患脐上熨之。再将次束置锅内。候前束冷则易之。如此数换。

病患鼻中闻葱气即醒。此法最善。或用豆大艾丸。隔大蒜片。灸脐下一寸五分气海穴。不拘壮数。以手暖为度。醒后。次服干姜。附子。（各一二钱以病之轻重增减。）佐以麻黄五分。水煎服。或服加味理中汤（人参。茯苓。姜半夏。干姜。北五

味。白术。陈皮。炙甘草。细〔中食〕饮食过伤之后。或感风寒气恼。以致填塞胸中。胃气不行。脉紧盛。状似中风。或有半身不遂。手足抽搐等症。先以萝卜子捣碎。以温汤和搅。取淡汤徐徐饮之。少顷即吐。（此法即吐不尽。亦能下行。）或用食盐少许。于热锅中炒红色。入水。煮至将滚之际搅匀。淡盐汤徐饮徐吐。以去病为止。次用平胃散。浓朴。（姜汁炒。）陈皮。（各一钱）

苍术。（米泔水浸一宿。切片。炒一钱半）
炙甘草。（六分）或加減。水煎服。以风药治之则死。

〔中阴毒〕房劳后感中风寒。一时沉重。四肢逆冷。腹痛冷汗。爪甲面色青黑。六脉俱沉。两尺脉伏。乃阴毒也。用豆大艾丸。隔大蒜片灸气海、（脐下一寸半。）关元、（脐下三寸。）二穴。各灸百壮。以手足暖为度。更服羌附汤。羌活。附子。（制）干姜。（炮。）茴香。（各一钱）木香。（五分）加黑枣二枚。水煎服。

〔中恶〕
多由暮夜登厕。或行人所不到之地。忽然眼见鬼物。卒然僵仆。四肢逆冷。

两手拳屈。甚者口鼻出血。惟心腹俱暖。凡遇此症。切勿移动。即令众人围绕。打鼓烧火。

或焚紫金锭、檀香、苏合香、樟木之类。直候省知人事。方可移归。用菖蒲根生捣绞汁。灌口鼻中即醒。或用紫金锭磨灌下。或用犀黄。（五钱锉细。）麝香。朱砂。（各二钱五分。）俱研细。水调服二钱。凡中鬼祟。一时不醒。用麦大艾丸。灸人中穴。一壮即醒。或于两脚大拇趾离甲一韭叶处。各灸七壮亦效。

风痫诸症

〔总论〕痫病有五。多属痰迷心窍。故一时病作。或类猪羊六畜之声者。皆应乎脏腑之所属。亦有得之大惊恐者。

〔风癫不识人〕伏龙肝。（即灶心土。）水调五分或一钱服。凡风痲卒然口噤。手足强直。俱可用此。

〔暗风痲症〕及痰涎晕闷欲绝者。芭蕉油饮之。得吐即愈。（取油如取漆法。削竹筒插蕉树上。）腊月乌鸦一只。盐泥固济。于瓦罐中过。出火性。为末。入朱砂末。五钱。

每〔痰迷〕风痰迷闷不识人。及肺热痰实。胸膈不利。其法用半夏。火硝。为末。糊丸绿豆大。姜汤下五十丸。风加南星。（汤泡七次。）热甚加黄芩。一方加朱砂。雄黄。各少许。小儿牛胆汁为丸。

〔风邪痼疾〕

皂荚。（四两。存性。）苍耳。（四两。连根茎。）陀僧。（一两）为末。

蜜丸朱衣。每服二三十丸。枣汤下。日二服。稍退日二丸。

〔妇女郁气风痰〕郁金。（七两）明矾。（三两）为末糊丸。白汤下五十丸。（亦治痼症。一妇人。病狂十年。遇异人授方。初服心间如有物脱去。神气洒然。再服而愈。）

〔心风痰迷颠痫〕

甘遂。（二钱）为末。取猪心血和匀。入心内。纸裹煨熟。为末。

入朱砂一钱。分作四丸。每服一丸。猪心煎汤送下。以泻下恶物为效。不泻再服。并治妇女心风血邪。

〔急救痰晕方〕生姜汁。（一小盏。）砂糖（四两）和匀。入盐少许。白汤调服。

〔化痰丸〕治风痰痼症。生白矾（一两）红茶。（五钱）为末。炼蜜丸如桐子大。一岁十丸。茶汤下。大人五十丸久服痰自大便中出。断病根。

〔痼病神方〕牙皂。（四两）陀僧。（一两）为末。蜜丸朱砂为衣。每服二三钱。滚水下。终身忌食一切诸血。

〔失心疯〕

闹杨花根。（竹刀掘取。勿犯铁器。去梗。用皮五钱。木杵捣碎。）金首饰。

（重五七钱）珍珠。（五分。豆腐煮数滚。布包槌碎。同灯心碾末。）将前二味。用水二碗。

煎砂子母。

神。当归分）用猪心一浸蒸饼为丸。杵极坚。丸如黍米大。食后灯心汤服二钱。狂邪发作无时。披头大叫。不避水火。惟苦参一味为末。蜜丸桐子大。薄荷汤服。

感冒伤风

〔总论〕

凡人坐卧当风。或起居失于衣被。风邪之气。从毛孔鼻中而入。所感者浅。

在于经络腠理之间。故身体憎寒壮热。头痛面赤。或四肢逆冷。无汗恶寒。或咳嗽痰稠。鼻塞声重。左脉浮缓。口能知味者是也。宜用紫苏。陈皮。行气轻浮之药发散。若多服姜汤。

重被盖覆。风邪入里。反成热咳者有之。宜戒生冷。勿使风邪变成寒中。慎之。

〔鼻塞咳嗽胸胁吊痛发热口渴〕苏叶。广皮。前胡。葛根。薄荷。（各一钱）杏仁。

姜半夏。炙桑皮。桔梗。（各一钱半）加生姜三片。葱白三茎。水煎服。
如上攻头痛。

鼻塞声重。防风。荆芥穗。（各一钱半）薄荷。川芎。白芷。细辛。（各一钱）甘草。（五分）加葱白三茎。水煎服。

〔四时感冒风寒〕初起。葱白（连须五茎）生捣。滚酒冲服。
如身痛。头痛。腰脊强。

发热不散。不思饮食。羌活。（八分）
川芎。白芷。苍术。生地。黄芩。防风。（各一钱）细辛。（八分）
加生姜三片。枣一枚。水煎服。
如恶心。去（黄芩生地。）如有汗。（加白术。去苍术。）
如口渴。加（知母。煨石膏）如两头角痛。及寒热胁痛。加柴胡。如鼻塞。

加苏叶葱白。周身连项脊疼痛。用羌活。能散肌表之寒邪。定痛。
川芎。辛温。能散风寒。

治头苍术温散。发汗宽中。止呕吐。
黄芩。苦寒。取其消痰利气。清上焦之火。（欲其上者酒炒。欲其下者生用。）
防风散风邪。治一身之痛。细辛温散。善祛阴分之寒邪。除阴经之头痛。
以病之轻重。加减服之。无不应手。

〔身热有汗脉浮咳嗽痰多〕广皮。姜半夏。苏叶。杏仁。（去皮尖）炙桑皮。象贝。（去心）白术。（土炒各一钱。）甘草。（五分）加生姜三片。水煎服。

〔风热发痒风疹块〕 防风。荆芥。（各一钱半）
黄芩。连翘。木通。桔梗。（各一钱）

钩煎汤

伤寒

〔总论〕 伤寒传变。先哲已详。症候繁多。难于枚举。大抵自霜降后。春分前。寒邪所感者。为正伤寒。至春夏别感。俗谓之四时伤寒。或兼杂症。惟得病之初。宜加审辨。则调理自得其宜矣。

如头痛。恶寒。发热。身足酸痛。昼夜不歇者。伤寒也。如胸膈胀满。

头痛发热。时有止歇者。劳役食积也。

伤寒最为难治之症。其患一日病在皮。二日在肤。

三日在肌。四日在胸。五日在腹。六日在胃。初起即治。邪浅易为消散也。伤寒传经。一日在太阳。则头项痛。腰脊强。脉浮紧。或浮缓。

二日在阳明。则为目痛。鼻干。脉浮长。

身热不得眠。三日在少阳。则为耳聋。胁痛。脉弦。寒热。口苦而呕。

四日在太阴。则咽干。腹满。自利。脉沉细。

五日在少阴。则舌干。口燥。脉浮缓。

六日在厥阴。则烦满。囊缩。脉沉涩。此传经之大概也。

所忌者。脉坚大急身汗如油。水浆不入。喘而不休。

环口黧黑。形如烟煤。直视摇头。唇吻青色。反目直视。溲便遗矢。有犯于斯。皆不治之症也。伤寒初起。疑似之际。无论四时阴阳虚实。用洁白糖五钱。阴症葱姜汤下。阳症百滚汤下。重者亦能减轻。

不问阴阳二症。仓卒无药。用生姜。（一两）葱白。（十茎）好酒二大碗。

煎一碗。热服。盖被出汗即解。勿令汗太过。忌大荤五七日。春季根据此方。夏月减半。冬月加黑豆。（二合炒焦）同煎服。

〔神白散〕

治一切时行伤寒。不问阴阳二症。老少男妇孕妇皆可服。白芷。（一两）

生甘草。（五钱）生姜（三片）葱头。（三寸）黑枣。（一枚）豆豉。（五十粒）

水二碗。煎服取汗。不汗再服。病至十余日。不得汗者。皆可服。（按白芷芳香之品。行手阳明大肠。足阳明胃。

手太阴肺。三经。解利风寒之剂。味和平。不大峻烈。用至一两。取其力专。以解三经之邪。

〔头痛内热脉洪无汗〕

葛根一两。豆豉一勺。水煎。临服。加生姜汁少许。顿服取汗。

（按葛根解利足阳明。伤寒头痛之圣药。味甘平。解表止渴。古方用至四两。以其味淡也。

用者审之。治时疫病更妙。）日久不得汗者。大梨一个。生姜一块。同捣取汁。入童便一碗。隔汤顿热。服之即汗。（初起寒重者勿服。）

〔伤寒结胸停食〕

初起胸中满闷。喉中有痰声。寸口浮滑。用（中风门中。食吐法治之。）如三四日后。不能吐。痛结不通。用陈香糟。（六两）生姜。（四两）水菖蒲根。（四两）食盐。（二两）共捣匀。炒热为饼。敷胸前痛处。如再不解。以熨斗火熨之。内响即去。如口渴任吃茶水。待大便利下恶物即愈。

如胸膈不宽。疼痛。及一切寒热。痰食水结。用生姜。

（捣烂如泥。去汁。取渣。）炒热。绢包。徐徐揉熨心胸胁下。其效甚速。如姜冷。入汁再炒〔阴毒伤寒四肢逆冷〕

茱萸一升酒拌。湿绢袋二个。包蒸极热。更换熨足心。候气透即止。

四时杂病呕吐。手足逆冷。橘红。（一两）生姜。（一两）水煎。徐徐饮下即止。

〔伤寒内伤〕食积畜血。小腹硬胀。不能言语。两目直视。手足强仆。神气欲脱。难以下药者。用紫苏。（五七两）煎汤。将手巾入汤内泡热。取起绞干。乘热摊病患肚上。令人以手在手巾上旋旋摩擦。冷即易之。待其宿食积血自下。即易医治。如肛门闭结。照大小便症导引方治之。

〔喉管伤寒〕

凡喉中痒不可忍。用薄荷。（二分）麝香少许。研极细末。吹入喉中。

待其气通。吐出涎水碗许。然后吃陈米汤半茶杯即止。如误饮茶酒。水解痒则不可救。

〔伤寒发颐〕

原受风寒。表邪未尽。日久身热不解。耳项前后结肿疼痛。身热口渴。

柴胡。天花粉。干葛。牛蒡子。黄芩。桔梗。连翘。石膏。（各一钱）甘草。（五分）升麻。

（三分）

〔邪热亢极〕

黄连（二两）煎浓汁一盞。放井水上顿冷。浸青布。搭胸前。徐徐换之。

以热势稍退即止。

〔伤寒发黄〕

五六日上。周身发黄。用麻油半盞。和水半盞。入鸡子清一枚。搅和服之即退。

〔舌黄烦躁狂言〕吞生鸡子清一二枚。即清爽。

发热狂走。用鸡子壳。（出过小鸡者。）泡汤服即睡。

〔服药吐出不纳〕生姜自然汁。温服数匙。或半盞即进。

〔吐血不止〕陈京墨。用鸡子清磨服即止。

鼻血不止。用冷水浸纸。搭于鼻冲。再用黑山梔研细吹入鼻中。

〔小便不通〕半夏。麝香。（各少许。研末。）填入病患脐中。再用葱白。田螺。（去壳。取肉。）共捣成饼。封脐上。

〔服附子过多身目发红者〕

黄连。生甘草。（各五钱）用萝卜汁同煎服。其红自退。

如不急治。恐血从诸上窍出。则无救矣。（如无萝卜时。用子煎汤可代。）或以地浆水。（不种植洁净地上。掘深三尺许。入泉水搅和。澄清取饮。）服二三碗即解。如轻发附毒者。

用小黑豆煮汁。连豆吃数升效。

〔服麻黄汗出不止〕糯米粉。龙骨。牡蛎。防风。本。（各一两）

共研细末。遍扑周身即止。并将病患头发披入水盆中。捷效。

〔护胎法〕

妊妇伤寒。恐伤胎气。用伏龙肝。（即灶心土）青黛。井底泥。各等分为末。

涂脐中二寸许。不损胎。伤寒病初愈。勿过饱。勿劳动。忌食浓味。羊肉。饮酒。大忌房事百日。盖脾胃初复。犯之无救。

暑症

（附痧症）

〔总论〕 深堂大厦得之为中暑。日中劳役得之为中热。有冒暑。有中暑。有伤暑。三者轻重之分耳。腹痛呕泻者。冒暑也。宜凉解清利。身热头痛。烦躁不宁。或面垢背寒。

昏不知人。为中暑。宜温散。

不思饮食四肢困倦。汗出不止。为热伤元气。宜清暑益气。

手足搐搦者。为暑风。不可以风治。宜清凉药。加通经药治之。夏月中热中暑。乃因时而感或有伤寒。亦类似中暑。但伤寒恶寒而身寒。伤暑恶热而身热。故脉紧恶寒。胁下无汗。为之伤寒。脉虚身热。胁下有汗。为之伤暑。盖伤暑气散。故脉弱而散。或弦细而迟也。是宜详审。

〔中暑〕

中暑者静而得之。避暑于深堂大厦。为阴寒所遏。暑不得越之故此寒为标。

热为本。先以辛温之药治其标。继以清凉之药治其本热。若头痛恶寒。身形拘急。肢节疼痛。

烦热无汗。虽因暑而得。仍如伤寒症治之。用干姜。（炒一钱）甘草。（八分炒黄）杏仁。（去皮尖炒研）肉桂。（去皮各六分）水煎温服。如烦躁井水调服。凡盛暑之时。必令身有微汗。

此养身之道得时宜者也。经云。夏暑汗不出者。秋成风疟。

〔中热〕 冒暑远行。初觉昏闷之时。急嚼大蒜头一枚。或生姜一块。捣烂。冷水送下即醒。如不能嚼。用水研灌之。牙皂荚。（刮去黑皮。取不蛀者佳。）烧烟欲尽。用盆合于地上。勿令透烟。每皂荚末一两。加甘草（焙研末六钱）和匀。每服一钱。温水调下。重者两服。即昏沉不省者。立能救之。（盖皂荚能通利去痰也。）途路之人。酷日之下。劳力过度。

猝然昏倒。切不可使冷及饮冷水。得冷则不救。仓猝无药。取路上微热黄土。堆于脐上。中空脐眼。使一二人撒尿于其中。再以大蒜捣烂。温汤灌之。内外通畅。立可回生。若得热汤徐徐浇于脐中更好。或以布蘸热汤。熨关元。（在脐下三寸。）皆能立醒。醒后吃冷无救。以上之症。若得紫金锭井水微温。杵化一钱。灌下。或急痧至宝丹五七粒。温水灌下立苏。好于他法也。

〔冒暑〕

头痛腹痛昏愤。或吐或泻。香薷。（一钱）茯苓。（二钱）白扁豆。（二三钱炒）

水煎服。如热甚者。加黄连一钱。（姜汁炒）胸膈饱闷者。加浓朴一钱五分。（姜汁炒）脉虚者。

加〔热伤元气〕肢体倦怠。汗出不止。脚软无力。人参。麦冬。（各二钱）五味子。（一钱）水煎服。

〔竹叶石膏汤〕

治气虚暑热烦躁。石膏。半夏。（制）麦冬。（各二钱）人参。甘草。

（各一钱）粳米。（一撮）竹叶二十片。加生姜三片。水煎服。凡热症烦躁口渴。觉心胃热。

宜用石膏。

〔益元散〕治受暑。烦闷身热。小便不利。滑石。（六两水飞净）粉甘草。（一两研极细末）朱砂。（三钱）俱研细和匀。每服二三钱。新汲井水调下。或灯心汤调服。酷暑宜服。

〔中暑大小便不通〕田螺。（三个）青盐。（三分）同捣烂。贴脐下一寸即通。

〔解暑〕干葛。（二两）苏叶。乌梅肉。（各四两）青盐。（一两）白糖。（一斤）俱为末。和糖捣为丸。不时噙化。口中生津。途行不受暑。途行仓卒无水。渴甚。嚼生葱二寸。

和津同咽。可抵水饮二升。

〔太乙紫金锭〕（通治百病。功效甚速。寒热皆投。真能起死回生。仙传至宝。修制济人。奇效不可尽述。）山茨菇。（洗去毛皮切片焙研细末三两）五倍子。（槌破拣净研细二两两。）

净三钱)

山豆根。(晒燥研六钱)各药先期制就。宜端午七夕。或上吉日。净室修合。将各药秤准入大乳钵中。再研数百转。方入石臼中。加糯米粉糊。(如汤团浓者。)调和。燥湿得中。用木杵捣千二三百下。至光润为度。每锭。(三五分一钱不拘)

一治一切饮食药毒蛊毒。及吃自死牛马六畜等肉。恶菌河豚之类。人误食之。胀闷昏倒。

急一治山岚瘴气。途行触秽。实时呕吐。憎寒壮热者。用凉水磨服一钱。轻者五分。途行少许噙嚼。则邪不侵。

一治中风卒倒。用生姜汤磨服。

一治痈疽发背。一切无名肿毒。用无灰酒磨服。外用米醋磨涂患处。中留一孔日夜数次。已溃只涂勿服。

一治一切咽喉风闭。双蛾单蛾。汤水不进。无药可救者。用冷薄荷汤磨服。或口中噙化。

立一治中热中暑等症。温井水磨服。或吐或泻。生姜汤磨服。

一治一切水泻急痛。霍乱绞肠痧。赤白暑痢。用姜汤磨服。

一治男妇急中。癫邪。喝叫奔走。鬼气鬼压。用石菖蒲煎汤磨服。

一治一切毒虫恶蛇风犬咬伤。随即发肿。昏闷喊叫。命在须臾。用酒磨灌下。并涂患处。

再吃葱汤一碗。(盖被出汗立苏。)

一治小儿急慢惊风。一切寒暑疾病。用薄荷汤磨服。如膨胀噎膈。用麦芽汤磨服。

一治妇女经水不通。红花汤磨服。

一治暑症邪症。临发时。取东流水煎桃柳枝汤磨服。

一遇天行疫症传染者。用桃根煎汤。磨浓抹入鼻孔。次服少许。任入病家。再不沾染。

时常佩带。能祛诸邪。

以上诸邪。大人每服一钱。虚弱者减半。小儿未及周岁者。半分一分。一二岁者。每服二三分。或吐或利。即效。势重者。连进二服。孕妇忌服。凡服此丹。忌甜物。甘草。一二日。所列治法。指其大概。各病经验处。及焚烧可以辟鬼魅。一切蛇虫。焚之立去。真卫身济世之宝。居家出外。皆宜佩之。

〔急痧至宝丹〕

蟾酥。（用活虾蟆取下晒干三钱临用切半烧酒化开）丁香。（二钱研细）

真西黄。（三分研）广木香。（二钱研细）沉香。（二钱研细）茅山苍术。（四钱土炒焦如不焦合好则易霉）朱砂。（水飞净一钱半）雄黄。（水飞净三钱）麝香。（捡净一钱）上药先期各研极细照合太乙丹法。上吉日。净室中和匀。同蟾酥加（糯米粽尖五个。）捣千余下。丸如椒子大。（晒干。盛于细瓷盖碗内。再用朱砂一钱五分。烧酒调涂碗内。盖好摇一二千下则光亮。）收贮瓷罐内。每服三粒。轻者一粒。至重者五粒。泉水吞下。（或口内含化津液咽下。）专治霍乱吐泻。腹痛昏溃。及一切痧气。暑气瘴气。途行触秽中暑热。绞肠痧。即已死途中。略有微息者。灌下即苏。止痛如神。孕妇少服。制之济人。功效不可尽述。（凡服药后。停烟、茶、酒、饭、一二时。）

〔人马平安散〕朱砂。（水飞净五钱）雄黄。（水飞净五钱）越石。（三钱）火硝。（萝卜子汁煮净五钱）冰片。（一钱）麝香。（捡净一钱）俱研极细末。择上吉日和匀后。再加明矾研细末三钱。再和匀。入瓷罐内。治一切中暑中热。腹痛头昏。及途行触秽等症。用少许入鼻中。眼角。或服少许。立效如神。

〔治绞肠痧法〕阴痧一时腹痛极。神气昏沉。手足冷。身上有红点。以灯草蘸油。点火淬之。（以灯近肉即提起。）即愈。如阳痧腹痛极。而手足暖。先将手臂捋下至手。令恶血聚于指头。以红绳扎住。以针刺其手指反面。近指甲一分许。出紫血即安。或以手蘸温水。

于病患膝腕处。用力拍打。有紫黑处。以针刺出恶血即安。如尿粪已出。垂危将死者。用生芋艿一片。放在病患口中。咽汁下喉即醒。醒后。再食二三片。亦可生。明矾研末。滚水调服三五钱。亦效。

〔黑痧〕俗名满痧。患者立时昏倒。微觉肚疼。面色黑胀。不呼不叫。甚者过两三时即不救。急用荞麦数合。焙燥研碎。去皮为末。每服三钱。温汤调服。重者再一服即愈。服药时。忌吃茶。日后设染别症。倘药内有皂矾合就者。忌服。凡此症食清油不觉油气如水者是。随灌一碗。得吐即愈。凡一切痧症。疑似之间。先煎艾汤试之。吐者是。

霍乱吐泻

（附转筋）

〔总论〕

其症初因好饮冷物。或冒寒。或失饥。或大怒大惊。或乘舟车。动伤胃气。

外感内伤。阴阳乖隔。以致心腹卒痛上吐下泻。偏阳多热偏阴多寒。心痛则先吐。腹痛则先泻。初起宜用淡姜盐汤。令其徐饮徐吐。以尽为度。痛时即得吐泻者。其症轻。盖所伤之物尽出也。切勿与谷食米饮。吃入口即死。直至饥甚。吐泻过二三个时辰。方可与稀粥食之。吐止后。勿妄用凉药。盖吐泻之后。脾胃更虚。宜以和胃健脾为主。

〔干霍乱〕胸腹搅痛。胀急闷乱。上欲吐而不能出。下欲泻而不能行。即今所谓绞肠痧。最为危急之症。急以炒盐搅滚汤内。入皂荚末三分。候汤冷灌之。令其大吐。庶可得生。

或用生白矾末一钱。入滚汤内。候冷灌之如不止。将针刺十指出血。（如治痧法。）将病患腿腕横纹上。蘸温水拍打。紫红纹见。以针刺出紫血立愈。用手在脚弯内拍数十下。即有青麻突起。用针刺去黑血立愈。如手足厥冷。转筋入腹。并痰壅汗出。气冷欲绝。即用炒盐一包。熨其心腹。令气透。又以一包熨其背。待手足暖。再用丁香。白豆蔻。二味等分。

为末。姜汤调下一钱。如寒重数服不拘。
吴茱萸。三四两。食盐数两。炒热熨脐下亦效。
霍乱危急将死。用盐填脐中。艾灸二七壮。立愈。
以脉气浮洪者易治。若脉微迟。加以气少。

昏沉不语。皆难治。吐后仍照前缓进米饮。吐泻止后口渴者。用白术。茯苓。猪苓。（各一钱半）泽泻。（二钱半）肉桂。（五七分体寒者加重）水煎服。如不渴者。用白术。人参。（各三钱）炙甘草。（一钱）干姜。（二三钱）水煎服。
如泻不止。加橘红。茯苓。（各一钱）

肉豆蔻（面煨一钱）如呕吐不止。加丁香。姜半夏。（各一钱）二三剂后即安。

〔伤暑霍乱〕

丝瓜叶。（一片）白霜梅。（一个同仁）二味。研极烂。用新汲水调服立愈。

〔中湿霍乱吐泻〕

凡水泻而腹不甚痛者。湿也。夏秋多有之。用苍术。（炒）广皮。

姜半夏。（各一钱半）藿香。（二钱）炙甘草。（五分）加生姜。（三五片）枣二枚。水煎服。

一方加苏叶。桔梗。浓朴。

〔霍乱吐泻不止〕 陈皮。藿香叶。（各三五钱）水煎服。或为末。热酒调服。有一点胃气存者。无不见效。泻痢不止。转筋入腹欲死者。生姜三两捣烂。入酒二碗。煮三四沸顿服可解。或用艾一把。水三碗煎一碗顿服。亦效。

〔霍乱烦渴不止〕 糯米三合。白蜜一合。同研。煮汁饮即止。如吐泻已愈。烦热多渴。小便不利。用麦冬。茯苓。半夏。陈皮。白术。（各一钱半）人参。小麦。（各一钱）生甘草。（六分）加生姜三片。乌梅半个。水煎服。

〔吐泻不已转筋〕

白扁豆叶捣汁一碗。入米醋少许。温服。因暑而起者。服之立效。

转筋十指挛急。不能屈伸者。灸足外踝骨尖上五壮。（麦大艾丸。）即止。

转筋不止。用蓼一大握。水煎浓熏洗。或以帛蘸汤熨患处。

〔寻常转筋〕 不因霍乱而发者。四时皆有。因血虚而转者。多以大蒜捣烂。涂足心即止。再服四物汤。（方见中风门。）加酒炒黄芩。红花。（各一二钱）水煎服。有筋动于足大趾。

至腰而住者。乃奉养过浓。因风寒湿而作。用威灵仙一两。窖酒每日服二杯。湿去自止。如睡中伸欠而转筋者。男子以手挽其阴。女子以手牵其乳近两边即止。

〔转筋遍身入腹不可忍者〕 重盐汤浸患处。或浓煮蓼汤或白矾汤。皆效。或以盐擦痛处。三五十匝。即皮破亦无妨。可以断根。

〔肝虚转筋〕 赤蓼茎叶三两。水一盞。酒一碗。煎六分服。

〔转筋疼痛挛急〕 松节二两。锉如米粒。加乳香。一钱。以瓦器内慢火炒令焦。（出火性为末。）每服一钱。渐加至二钱。热木瓜酒调下。

〔转筋诸药不效〕

雄猪肾。（二条全者。）薄切。香油煎熟。空心细嚼。盐汤送下三四次。如神效。

泄泻

〔湿泻〕肠鸣腹不痛。纯出清水。湿也。白术。（土炒）猪苓。茯苓。（各一钱半）泽泻。（二钱）水煎服。即四苓散。小水利而泻自止也。

如兼湿热者。茯苓。白术。（土炒焦各三钱）白芍。（炒二钱）水煎服即效。

如兼寒湿者。四苓加肉桂一钱。同煎服。

〔寒湿〕手足冷。口不渴。小便清。泻下清冷者。为寒泻。先以老姜。砂糖。煎浓服之。次以山药。（炒）白扁豆。（炒）炙甘草。焦干姜。（各二钱）白术。（土炒焦二三钱）吴茱萸。（〔食积泻〕

或胀或痛。痛甚而泻。泻后痛减。得食又痛。粪色白者是。枳术丸。白术。

（面炒）赤芍。（酒炒各二两）枳实。（面炒一两）广皮。（一两）用新荷叶汤。煮老黄米为丸。桐〔热泻〕

腹痛泻水如热汤。热渴喜冷。或泻黄垢。或赤粪如糜者。皆热也。益元散。

（方见暑症门）三钱。灯心汤调服二三次。即愈。

或服茯苓。泽泻。木通。（各二钱）猪苓。

梔子。（各三钱）枳壳。车前子。（各一钱）水煎。食远温服。

热泻如痢。用苦楝树根。（去粗皮。晒干为末。）米饮为丸。米汤下甚效。

〔中寒泄泻腹痛无度〕

浓朴。（一两姜汁炒）肉豆蔻。（面裹煨）草豆蔻。（煨各五钱）

俱为末。每服二三钱。煨姜汤调服。

〔水泻〕夏秋初起。不拘寒暑湿。腹痛水泻。用紫金锭。（药真者效速。）冷滚水磨服五七分。重者两服。（忌食甜物。）冬月寒重者。藟艾三钱。水煎空心服。不论男妇老少。

水泻垂危者。用诃子。（一枚。湿草纸包裹。煨熟去核。）

肉果。（一枚。水调干面包裹。

微火黑色。）共研细。每服五分。米饮调下。

〔平胃散〕

治脾胃不和。腹痛满胀。呕哕水泻。浓朴。（姜汁炒）陈皮。（去白各五两）

苍朮。（去皮米泔浸炒八两）炙甘草。（三两）俱为末。每服二三钱。姜汤下。如小便不利。

（茯苓。

〔久泻成痢〕不拘赤白。腹胀攻痛。川黄连。（二钱）肉豆蔻。木香。（各一钱）俱研细。米〔虚泻〕饮食入胃。不住。完谷不化。或困倦自汗者。气虚也。人参。（一钱）黄。

（蜜炙透）白朮。（土炒焦）茯苓。枣仁。（炒研各二三钱）归身。（一钱）木香。炙甘草。（各五分）加煨姜三片。水煎。食远服。

〔脾胃虚寒泻〕陈老米。（淘净炒香燥）磨为粉。每粉一两。加干姜。（炒燥研末）二分半。白糖二钱。拌匀。于饥时滚水调服一二两。气滞者。加炒广皮末。二分。或砂仁末。一分。能治食滞气滞。腹痛泄泻久不止。多服自效。

〔泻久饮食不进〕糯米一升。（水浸一宿。滤干。慢火炒熟。）磨为粉。入山药末一两。

川椒末少许。和匀。加砂糖。二三匙。空心滚水调服。老少皆宜。大有滋补。再加莲肉芡实皆可。

〔久泻不止〕猪肾一个。批开。掺入骨碎补末一钱。火内煨熟。食之。三四次即止。柿饼一个。开一孔入白矾末三分。湿纸包裹。灰火内煨熟。大人三个。小儿一个立效。

〔肾虚脾泄〕日泄三五次。如鸭粪稀溏。或五更早晨泄一二次。乃脾泄也。与泻不同。

最难治。补骨脂。（盐水炒五钱）白朮。（炒焦二钱）杜仲。（盐水炒二钱）泽泻。（一钱）水煎。

空心服三十剂后。自愈。鲜稻根。（不拘多少。洗去泥。）熬成膏。早晚滚水冲浓入白糖一钱。调匀服。

〔灸法〕泄泻日久。诸药不效者。用豆大艾丸。灸天枢二穴。（脐旁各开二寸。）或气海穴。（在脐下一寸半。）隔蒜片灸二七壮。以得效为止。

瘟疫（仁人君子。倘遇此疾。或制药以济。或书方以救。功德最为无量。附救饥方

)

〔总论〕众病一般者。即谓天行时疫。其治法有宜补、宜散、宜降之不同。甚者仍类似伤寒。察其传变。治之方能奏效。其病初起先憎寒而后发热。日后止热而不憎寒也。其脉数。昼夜发热。日晡益甚。头疼身痛。乃时邪伏于脊之前。肠胃之后。不可认为伤寒表症。

辄用麻黄桂枝之类。强发其汗。徒伤表气。即热不减。亦从缓下。恐伤胃气。宜用达原饮。

槟榔。（二钱）浓朴。知母。芍药。黄芩。（各一钱）草果仁。甘草。（各五分）水煎。午前温服。如胁痛耳聋。寒热呕吐而口苦。加柴胡。（一钱）如腰背项痛。加羌活。（一钱）如目痛。眉棱骨眼眶痛。鼻干不眠。加干葛。（一钱）症之轻重。药之分两。临时增减。如舌上白胎薄。

热不甚。脉不数。症不致传里。照方一二剂。其病即解。盖疫病从口鼻而入。必先犯胃，上膈痞满者多。此方用破气之品三味。服之即效。若年老气弱之人。胸膈不满闷者。槟榔果。

不可全用。又或三四日后。舌上胎如粉积。脉洪而数者。又须或汗或下解之。伤寒汗解在前。时疫汗解在后。伤寒投剂可使立汗。时疫汗解俟其内苏。汗出自然。是故瘟疫不必重加衣被发汗。四时头痛发热。初起用黑砂糖一盞。生姜汁二盞。化开。令病患多少服之。轻者即愈。重者减轻。

〔时疫不传人〕

苍术。（三钱三分三厘）泔水浸一宿切片炒）生甘草。（一钱六分六厘）

抚芎。（八钱五分）干葛。（一钱三分六厘）加生姜三片。连须葱头。三个。水煎空心服。已病者。一服即愈。未病者服一半不染。白粳米五合。连须葱头。二十根。水二十碗。煮成粥汤。加米醋一小碗。再煮一滚。各与一碗。热服得微汗即解。如有汗者勿服。初病之人。

衣服蒸过。则一家不染。

〔避疫法〕凡入病患家不宜空腹。饮雄黄酒一杯。再以香油调雄黄末苍术末。涂鼻孔则不染。出则以纸燃探鼻。得嚏更好。误触汗气入鼻。即觉头痛不快。急以水调芥菜子末填脐中。以热物隔衣一层熨之。汗出即愈。如觉胸次饱胀者。以淡盐汤探吐即解。

〔预避疫法〕青松毛切细为末。酒下二钱。常服大能避疫。每年四五月。用贯众一个。置食水缸内。不染时疾。五月五日。用艾扎一人形。悬挂门户上。避邪气。以五彩丝系于臂上。不染疫。正月初一日。将赤小豆二十一粒投井中避疫。十二月二十五日。煮赤豆粥合家食之。能祛疫。除夕以花椒二十一粒。赤小豆二十一粒。投井中。（勿使他人见。）一年不染疫。时疫之年。每日早晨。水缸内投黑大豆一握。全家无恙。五更时。投黑大豆二三合于井中。勿使人见。凡饮水家俱无染。

每日多焚降香。再随身佩带。祛疫。

凡时疫之年。能首忌房事即受病亦易解也。

〔瘟疫发狂〕

天行时气热极。狂言不识人。即以地浆水。服一二碗。即解。（方见伤寒门。）或用童便浸白颈蚯蚓。捣烂。取新汲井水滤下清汁。任服一二碗。即清爽。并能即愈。如热甚无汗。用新青布以冷水浸过。略挤干。置病患胸上。以手按之。布热即易之。

少顷汗出如雨。或作战汗而解。（夏月用此法。他时勿用。）

病八九日后。已经汗下。热仍不退。口渴咽干。欲饮水者。以六一泥。（即蚯蚓屎。不拘多少。）搗新汲水饮之。即效。

〔三白饮〕治天行时疫。热极狂乱。及发热不退。或大便燥结不通。鸡子清一个。白蜜一大匙。芒硝三钱。合一处泉水送下即愈。

〔瘟疫发斑〕病至困笃者。取大虾蟆一二个。去肠肚。生捣绞汁。服下可解。

〔虾蟆瘟〕其症项肿头大。用贯众。黑豆。（炒香各三钱）生甘草。白僵蚕。（各一钱半）葛根。（二钱）水煎服。外用井底泥。调大黄芒硝涂之。大黄。（四两）僵蚕（三两）

姜黄。（二钱半）蝉蜕。（六钱半）俱为末。姜汁糊丸。每丸重一钱。蜜水调服。（大人一丸。

小儿半丸。）外用靛青涂肿处。燥即再润之。亦效。

〔避瘟丹〕

苍术。（一斤）降香。（锉末八两）雄黄朱砂。大黄。独活。藿香赤小豆。

（各二两）羌活。白芷。菖蒲根。桃头。（端午日收者佳各四两）柏叶。（八两）硫黄。火硝。

（各一两）俱为末。红枣糊为丸印方锭焚烧祛疫。即端午除夕。宜多焚之。

〔许真君救饥方〕黄豆七斗。芝麻三斗。水淘净。即蒸。不可浸多时。恐去元气。蒸过即晒。晒干去壳。再蒸再晒。共三次。捣极熟。丸如核桃大。每服一丸。可耐三日饥。此方所费不多。一料可济万人。夫仁人君子。义田储粟。利及后世。此仁德之大者。其或凶年荒岁。随力施赈。贵买贱卖。以救一方。能救千人者。名登仙录。仁人力行利济。天之报施。

末〔救饥方〕芝麻三升。糯米三升。（俱水淘晾干。悠火炒。）先将糯米磨成粉。和入芝麻。再磨一遍。另用红枣三斤。（煮烂。只留汁一碗。去皮核）同粉石臼内捣熟。丸如弹子大。（

咳嗽

（附哮喘痰症）

〔热嗽〕有痰面赤。烦热午前更甚。起于夏季者多。黄芩。知母。桑皮。杏仁。黑山栀。象贝。桔梗。（各一钱半）生甘草。（五分）水煎服。

〔秋月肺燥咳嗽〕

嗽多痰少。午后至夜更甚。松子仁。（一两）胡桃肉。（二两）研膏。

加熟蜜。（五钱）和匀。每服二钱。食后沸汤点服。
日久痰多者。加北五味二钱。屡效。

〔肺热久嗽〕

痰少有声。肌瘦将成肺癆者。杷杷叶。（蜜炙去毛）木通。款冬花。紫菀。

桑皮。杏仁。（各等分）制大黄。（照分减半）各为末。蜜丸如樱桃大。食后夜卧。含化一丸。

〔肺郁痰嗽胸膈疼痛夜卧不安者〕

贝母。杏仁。（各等分）共捣。研入姜汁。白糖。

蒸饼为丸。夜卧含化。

〔痰嗽〕胡桃肉。（三枚）生姜。（三片）卧时嚼服。即饮汤二三呷。再食胡桃。（三枚）生姜。（三片）缓缓嚼下。数次即效。气壅痰盛者。用悉尼一个。开一窍。入白矾一钱。用纸封固。隔水蒸熟。食二三次愈。

〔食积痰嗽〕萝卜子半斤。焙燥炒为末。以糖和丸。如樱桃大。绵裹含化。汁下甚效。

〔膈中老痰〕不论男妇。久积老痰。或失音。或发喘。汤药不效者。密陀僧一二钱。

砂糖调白汤送下。痰与药从大便出无碍。（不宜多服。）

〔痰晕〕明矾。（火枯。）研末。姜汤调下。吐之即愈。

〔痰厥〕千年锻石一合。水一钟。煎滚。去水。再用清水一钟。煎至极滚。倾出澄清。

灌之痰下自愈。（即气绝心温者皆效。）

〔久嗽接连四五十声者〕（即名顿嗽。）姜半夏。（一两）贝母。（一两初时用象贝久嗽用川贝）为末。姜汁为丸。每服一二钱。（小儿减半。）即二仙丹。频服即效。生姜。（连皮捣汁。）入白蜜一二匙。滚汤点服亦效。

〔咳嗽吐脓〕乃肺伤也。知母。贝母。白芨。枯矾。（各等分）为末。每服三钱。生姜三片。泡汤。嚼服三五次愈。

〔久嗽不愈〕枇杷叶。（去毛净切碎）杏仁。（去皮尖研）等分。泡汤。多服即止。若无痰虚嗽。只用枇杷叶。去毛。蜜炙。泡汤饮。叭哒杏仁。（去皮尖四两）胡桃肉。（泡去衣四两）上白糖。（六两）共捣如饴。时时入口含化。如痰未尽。加川贝母五钱。同捣。能治一切久嗽。及体虚午后面赤气冲。至晚更盛者。屡效如神。

〔涤痰散〕陈广皮。先用泉水洗净。每一斤。入食盐四两。同入水浸过一指。锅内煮干。去筋膜。切作小片炒干。每陈皮一两。入粉甘草二钱。共为末。每日早晚服二匙。白汤调下。能清肺消痰。定嗽解酒毒。除一切痰火甚效。

〔痰火〕

选老足西瓜一个。刮去青皮。钻一孔。入白蜜一碗。绳络挂于当风处。过冬。

春天取用。凡痰火者。只服半小钟立愈。天萝水。（霜降后三日。老丝瓜藤三四株。离地三四尺割断倒插入瓶中。取汁存用。）痰火者。以滚水冲服甚效。痰火面赤鼻红者。用青黛。（水飞晒二次。研极细。三四钱）蛤粉。（三钱）二味。炼蜜为丸。临卧时。口中噙化即效。

（二两）豆腐浆。（一碗）煮化。多服即愈。
鸡蛋。（用豆腐浆冲服。久则自效。盖鸡蛋能去喉中之风也。）

〔痰喘咳嗽〕
藕汁。梨汁。白果汁。萝卜汁。（各等分和匀）铜锅内熬成膏。随意服之。

白蚬壳。（多年陈者。过存性。）为极细末。以米饮调服一钱。日三服。（盖蚬蛤蚌粉。皆能清热行湿。湿热去。痰自消嗽自止也。）

〔喘急欲绝者〕 韭菜汁服之可治。

〔老年痰喘〕 秋白梨一个。去心。入燕窝一钱。（先用滚水泡。）再入冰糖。一钱。蒸熟。每日早晨服。勿间断。如气促坐卧不得。胡桃肉。（连衣）杏仁。（去皮尖）生姜（各一两）同捣成膏。入炼蜜少许。丸弹子大。卧时白汤含化一丸。

〔风寒郁结哮喘气逆〕 麻黄。（去节二两）炙甘草。（二两）御米壳。（即罌粟壳去蒂炒黄四两）俱为末。每用二钱，白汤调下。以好为度。

〔虚喘〕
喘无休歇。呼吸不接续。出多入少。乃不足也。用人参。（一钱半）胡桃肉。

（五个连衣）加生姜三片。枣一枚。水煎温服。

〔劳症发热喘嗽〕 鲜百部二斤。切细。用无灰酒浸坛内。灰火煨热熟每日五更。温饮一杯。以好为止。

〔口燥咽干有痰喘嗽〕
栝蒌一个。入明矾枣大一块。同烧存性。研细。以熟萝卜蘸食。

一〔痰哮〕 苕麻根。（火烧存性。研细。）用生豆腐蘸食三五钱。或以猪肉二三片。蘸食即效。

〔盐哮〕豆腐浆。每日早晚久服即效。如小儿。用芝麻秸瓦上炙焦存性。出火毒。研细。以生豆腐蘸食即效。

疟疾

〔总论〕

疟有内因外感之殊。有隔一日二日三日之不同。治法邪从外入者。宜发散之。

兼扶持胃气为本。又须分别阴分阳分。而用药。如邪疟及新发寒热者。服发散药三五剂后。

其势减轻。或可用截药治之。虚疟及病久者。宜补气血为主。若急用截药。致伤脾胃。则延绵不休矣。

〔治疟奇效三方〕

（不论老少久近。一日二日三日。不用加减。次第服之。无不应手而愈。）

第一方。

广皮。姜半夏。白茯苓。威灵仙。（各一钱）苍术。（米泔浸一日切炒净八分）

浓朴。（姜汁炒八分）柴胡梢。（八分）青皮。（六分）槟榔。（六分）炙甘草。（三分）生姜。

（三片）井水河水各一钟。煎七分。空心服。渣再煎服。如头痛。加白芷一钱。此方平胃消痰。理气除湿。有疏导开先之功。受病轻者。二服即愈。若三服后病势虽减而不愈者。即用第二方三五剂。

第二方。何首乌。（制过三钱如三剂后不效生用三钱）广皮。柴胡。白茯苓。黄芩。（各八分）白术。（土炒）当归。威灵仙。（各一钱）知母。（二钱）鳖甲。（醋炙二钱）炙甘草。

（三分）

再服。此方第三方。人参。（一钱）炙黄。（一钱二分）当归。（一钱二分）白术。（土炒一钱）

广皮。柴胡。（各八分）升麻。（四分）炙甘草。（三分）煨姜。（一片）黑枣。（一枚）水煎。

半饥时服。三五剂后。元气充足。则不发矣。

〔治疟初起无汗〕苏叶。（二三钱）葱白。（三五个）扁豆叶。（五七片）浓煎。入生姜汁四五匙。乘疟发口渴时。热服取汗。无汗再服汗时勿受风。如现热象。无汗。进凉药润之。亦即汗。

〔暑疟〕

单热少寒。口苦咽干。小便赤涩者。青蒿子。（童便浸焙干研细）头一日晚。

白汤调下三钱。临期早晨。淡酒调服三钱。暑重者井水调服。

〔脾寒疟疾〕

石胡荽一把。（即鹅不食草。）捣汁半钟。入热酒和匀。服即效。良姜。

（麻油炒）干姜。（炮焦各一两）为末。每服五钱。用猪胆汁调成膏子。临发时。热酒调服。

（或用胆汁为丸。酒下亦佳。大抵寒发于胆。用猪胆引。姜性入胆。去寒而燥脾胃。一寒一热。

阴阳相制。甚验。）多寒少热。饮食不进者服之即止。橘红。（生姜汁浸。一宿。石器内重汤煮。干焙研末。每服三钱。黑枣汤下。）

〔疟疾寒热〕萝卜子。（捡净炒至烟尽。存性研极细。）新疟用白汤调下三钱。只吃汤去渣。重者三服愈。如久病体虚者。加人参三分。同煎服。独头蒜。火上炙熟。酒服二钱。

数〔邪疟〕黑牛尾。（烧存性研末。）每服二钱。酒下三服即效。

〔久疟阴疟效方〕

荞麦面不拘多少。用鳖血和成丸。阴干。临发之日朝东白汤下三钱。

小〔老年疟劳疟久不愈〕

鳖甲。（醋炙黄。研极细。）每服一钱。入雄黄一二分。酒调下。

隔〔止疟方〕

归身。制首乌。荆芥。山楂。（炒各三钱）酒水各一碗。慢火煎至一碗。

露一宿。次日早晨温服。不论一日二日三日。及久病体虚者。皆可服。小儿减半。知母。生槟榔。象贝。（各二钱）常山。（一钱）水酒各一碗。煎至一碗。露一宿。早晨隔汤温服。体虚加人参三分。同服。凡服常山。忌食鸡肉三月。大枣肉二个。去皮核。斑蝥二个。焙研。

同入枣肉。研匀。加熟猪油少许。捣成饼子。指头大。贴在两眉中间印堂上。一周时即止。蛇蛻一条。完全者。用纸包固。男左女右。系臂上勿令患人知。忌四目见。愈。后送之野外。

勿开看。不论一日二日皆效。

端午午时。取虾蟆。（以大为佳。倒挂阴干。）系臂上。勿令病患知即止。

〔三阴症〕症久饮食如常者。用何首乌。（二钱）人参。（一钱）桂圆肉。（十枚）甘草。（炙三分）水煎服即愈。大淡菜。（煮烂连汁。）陈酒下。久服即止。南天竺子。隔年陈者。

蒸熟。每岁一粒。每早晨白汤下。陈香圆一个。切开。入雄黄末三钱。原合好。用纸封固。火煨至烟尽。取出为末。每服二三钱。米饮下。此方初起者宜服。

〔三阴症年久不愈〕野茄根。（一两）不沾水。不沾铁器。用无灰酒一斤。将根洗去泥。原酒澄清滤净。入根同煎一碗。临发日服之。即止。

〔疔瘡〕（即病久胁下成块疼痛。名疔母。）核桃壳。（灰研细末三钱）木香。（研细八分）好酒调服。三五次即消。外用芒硝。（五钱）独头蒜肉。（一两）共捣烂。贴患处。上用布盖之。并治诸瘡。

心腹痛。

（附胁痛闪痛）

〔总论〕心痛即胃脘痛。有寒有热。或气逆。或痰饮。或虫。或死血。皆能致痛。如真心痛。大寒直中中宫。手足青冷过节，随发随死。非药可治。（白杨花煎汤服。或可救治。

又〔胃脘食滞气逆胀痛〕

凡宿食停滯上焦者。心与腹相连皆痛。兀兀欲吐。欲其速效。

用伤寒门吐法即止。陈皮。藿香。（各一钱半）香附。乌药。泽泻。（各二钱）木香。（七分）

浓朴。枳壳。（各一钱）水煎服。如食重者。加山楂。麦芽。（各二钱）如寒滯者。加焦干姜。

（一二钱）如气逆之甚者。加沉香。青皮。之属。
如呕而兼痛者。加制半夏。丁香。之属。如兼疝者。加荔枝核。（煨熟二三钱）

〔寒滯痰饮痛〕胸腹胀满。呕哕。痛时手足厥冷。遍身冷汗。便清不渴。丁香。白豆蔻。等分。为末。姜汤调下五七分。日二三服。即愈。
良姜。香附。（炒各等分）为末。

白汤调下二钱。即效。（因寒而起者。良姜多一倍。因气而起者。香附多一倍。）

〔通治心痛〕即胃脘痛初起。用淡豆豉五钱。煎汤半钟。服下即止。久痛屡发者。

荔枝核。（煨焦研碎一钱。）木香。（七分）为末。白汤调服。或酒神效。
二蚕沙。（不拘多少）为末。滚水泡过。滤净晒燥。每服一二钱。白汤下。
万灵膏贴当痛处。三五十日除根。

檀香孔内泥。冲酒服效。瓦棱子。（即蚶子壳。醋七次。）为末。每服三钱。白汤下。诸药不效者。用玄胡索三钱。酒煎服即止。
牙皂角。（不拘多少。微火烧烟。甫尽取起。）为末。以烧酒调服五七分。即效。
年久心痛。不可忍。醋煮小蒜头食饱。勿着盐。不拘十年五年。随手见效。

〔腹痛〕有寒、热、食、痰、死血、肠痛、虫、疝之不同。大要以甘温为主。惟夏秋卒然痛不可忍。照暑症治之。如热则大便燥闭。如阴症痛。四肢逆冷或冷汗。（如热宜凉散。

佐以甘温。如阴症宜服理中汤治之。方见黄胆症。）或巴豆。（三粒）
红枣。（一枚）同捣烂。裹缚脐上立止。

〔一切男妇心腹痛不可忍〕葱头去根二斤。炒热，布裹作二包。脐上熨之。如冷则易次包。如无葱则韭菜。（或食盐俱可。）脐下忽大痛。人中黑色者。不治之症。

〔心腹虫痛〕恶心吐水。痛极如咬。面清白少光彩。时痛时止。四肢微冷。痛定便

能饮食者。是虫。干漆四两。慢火
烟尽。醋糊为丸。绿豆大。食后。或酒或醋下十五丸。日进二服。
草捣汁。醋调和服。即效。
锻石二三钱。和鸡蛋煎饼。食前服之。少顷虫从大便出。
虫咬如刺。生艾汁。（如无生艾。用熟艾二两。水三碗。煎汁一碗。）隔宿勿食。

早晨空心先食香味之物少许。咀嚼勿吞下。令虫闻香。然后饮艾汁。虫自出。（并治鬼击猝死。及中恶腹痛。）如痛时自上而下。自闻唧唧有声。搔抓无措。眠坐不稳。心下如刮。上连胸臆。乃积血不消。因火而动。不可认以为虫。而投以虫剂也。

〔心腹痰饮痛〕 痛时嘈杂不宁。如饥如饱。怏怏欲吐。吐即稍宽。姜半夏。猪苓。（各二两）白芥子。干姜。（炒黄各一两）陈皮。（四两切碎入盐水中拌浸晒干）炙甘草。（五钱）

俱为末。水法为丸。每服一钱。淡姜汤下。

〔蛔厥心腹痛〕 乌梅二个。川椒十四粒。煎汤服。即止。

〔瘀血心腹痛〕
平日好食热物。致死血留于胃脘。山羊血。（一分）烧酒化下。即散。

胸〔郁火心腹痛〕
有因病久。郁热生火。温散不效者。用山梔。（一两姜汁炒黑）木香。

（三分）水煎服。初起即觉热者。用锅脐煤三钱。热童便调服即愈。

〔气滞腹痛〕 乌药。（水磨浓汁半钟）加陈皮。苏叶。（各一钱半）同煎服。

〔九种心痛〕 千年锻石研。端午午时独蒜捣丸。如桐子大。每服十三丸。烧酒下。

〔胁痛〕 芥菜子研末。水调敷。韭菜炒热熨之。即止。有因肝火胁痛。或胁下如食积一条梗起者。黄连。（六两炒）吴茱萸。（一两汤泡四五次炒）俱为末。蒸饼。丸如绿豆大。每服三十丸。淡醋汤下。肝气平和。痛即止。

〔心气痛〕
生芝麻半升。候痛时。不必看。随手取来。不拘多少。放铜锅内炒黑为末。

好〔七情交感丹〕 治一切公私拂情。名利失志。抑郁烦恼。七情所伤。不思饮食。

面黄形瘦。胸膈痞闷疼痛。香附米。（一斤长流水浸三日砂锅炒干为末）白茯神。（四两）俱研细。炼〔闪痛〕凡闪挫打伤腰胁痛。或不出血。皮肉青紫色者。先用葱白炒热。捣烂罨伤处擦遍。再用生大黄。（研末）以生姜汁调敷。内服陈酒。以醉为度。即半年不愈者。立验。

脾胃

（附呃逆 翻胃噎膈）

〔食伤脾胃〕 陈火肉骨。或白酒酒药。（存性。）砂糖调服。皆效。

〔胃强脾弱〕 饮食不能运化。胸膈胀闷不舒。白蒺藜。（去刺炒黄取净末十两）水法为丸。每服二钱。空心白汤下。如食积重者。加山楂肉。（饭上蒸三次晒干净末四两）如呕吐作酸。口苦舌烂。有痰加苍术。（去芦米泔水浸洗刮去黑皮切片晒干炒黄磨取头末十两）

川黄连。（酒炒净末二两）蜜丸。白汤下。老年血枯之人。宜酌用之。（恐苍术过于燥血也。）

〔胃脘嘈杂吐清水〕
广橘红为末。五更坐起床上。安末五分于手心男左女右干舐下。

勿卧。服三四次愈。

〔饮食不住口仍易饥饿〕
绿豆。糯米。黄麦。（各一升炒熟）共磨成粉。每服一酒杯。

以滚汤调服。三五日即效。

〔胸膈饱胀虚肿〕 苍术。（制如前末四两）
陈皮。浓朴。（各五分）川椒。（少许）

猪肚一具。去油净。入大蒜装满。线缝口。用冷热水各七碗。先烧滚入肚。煮至水干为度。

取出捣烂无丝。合前药末为丸。每日空心滚汤下二钱。最速效。

〔呃逆〕因寒而起者。良姜。（一钱五分）丁香。（一钱）柿蒂。（二钱）甘草。（炙五分）

水煎服。柿蒂煎汤饮亦止。

日久不愈。连四五十声者。生姜汁一杯。加蜜一二匙。温热服之即止。用纸燃刺鼻中。得嚏即止。诸药不效。用硫黄。乳香。各等分。以酒煎。令病患以鼻嗅之即止。（或单用雄黄。酒煎。嗅鼻即止。）

〔呃逆灸法〕

妇人以ru头垂下到处是穴。男子以ru头下一指许为率。骨间动脉处是穴。

男左女右。灸一处。艾炷如小麦大。着火即止。三壮不止者。不可治。此最神效。

〔噎膈翻胃〕凡人朝食而暮吐。暮食而朝吐。或食罢即吐。谓之翻胃。饮食膈噎。咽吞不下。谓之膈食。二者名异。而症实同。盖翻胃未有不由于膈噎起。此症年老及血气枯槁者难治。惟痰火久郁。胃脘壅塞者。可渐次调治。

〔胃热呕噎〕芦根五两。切碎。水煎空心服即止。凡噎症。用糯米粉。以牛涎拌作小丸。煮熟食之即效。或水服牛口。涎二匙。终身不噎。（以水洗净老牛口。用盐涂之。以荷叶包牛口。使耕力乏即涎出。）

〔气噎不下饮〕枇杷叶。（去毛净蜜炙五钱）陈皮。（去白一钱半）生姜三片。水煎匀二次服。并治暴呕吐。

〔翻胃〕芦根。茅根。（各二两）水煎服。（凡用芦根。取不浮露在外者。）翻胃吐食初起。用树上黄香圆。粪内浸七日。再用童便浸七日。水洗风干。煎汤吃。干柿饼。每用三枚。连蒂捣烂。用酒服甚效。

甘蔗汁一碗。入生姜汁半钟匀二次。服三次效。（甘蔗汁又治中酒毒干呕者）大鲫鱼。（自死者一个。活者不效。）剖去肠留鳞。用大蒜头去皮切薄。

填鳞骨俱去。用平胃散。（姜炒浓朴一钱陈皮一钱米泔浸过苍术一钱甘草六分共为末）杵丸桐子大。晒干收贮。勿令泄气。空心米汤下三十丸。日久不效。用韭汁。（二两）牛乳。（一盏）

生姜。（五钱取汁）竹沥。（半盏）童便。（一盏）和匀温服效。曾治一人。饮食一二日后。

一齐吐出。气味酸变。病久肌肉尽落。皮枯羊粪。诸药无效。用千金方。猪板油。（十两熬净去渣）白蜜。（八两炼净）二味再入铜锅内熬数沸。入生姜自然汁三两

。和匀。取起成膏。

不时含服含化。初吃一服。尚吐一次。连吃三服全愈。（原孙真人治关隔不通神方也。）久吐枯燥有服人乳多吃燕窝而愈者。

〔冷涎翻胃〕其形发时先吐冷涎。次则吐食。因劳而起者。多。用大黄。（一两生姜自然汁半茶杯。炙大黄令燥。浸入姜汁内。再炙再浸。以汁尽为度。）切焙为末。每服二钱。

用〔膈食〕马子碱。（火透四两）研细。蜜水调服。

〔隔气〕沉香。（一钱磨汁）白汤徐下。凡噎膈症病久。已经血枯。肠结羊矢。口吐蟹沫。或年过五十岁者。勿服峻利之药。

腰痛

〔总论〕腰痛有湿、热、寒、滞、肾虚、之不同。然患者起于真阴不足者多。故宜培养肾气。其实邪腰痛者。十之二三耳。

〔湿热腰腿痛〕痛时腰骨如板。不能俯仰。遇阴雨或久坐而痛更盛者用苍术。（米泔水浸一宿焙燥切片三钱）防风。黄柏。（酒炒各一钱）水煎空心服。以好为度。

〔寒湿腰痛〕
威灵仙。（五钱）好酒一斤。蒸出味。每日空心饮二杯。得微利下即效。

并治痰积腰痛。寒湿脚腿痛。

〔腰痛如刺〕
面肿垢黑。气血虚惫。发落齿枯。唾涕痰涎。痛不能行立者。新鹿角。

（心黄者勿用。刮去黑皮。取白者锉屑。四两炒黄。）为末。加牛膝五钱为丸。每服空心酒下痛屈而难伸。山楂。（三钱研末。）盐汤下。

〔肾虚腰痛〕
痛时悠悠戚戚。屡发不已。劳动即痛。杜仲。补骨脂。青盐。共为末。

入猪腰子内蒸熟。好酒下。连服数次即效。小茴香研末。煨猪腰子服亦效。

羊肾为末。

每服酒下二钱。日三服。大能补肾气。益精髓。

〔跌扑瘀血腰痛〕 橘核。（炒去皮二钱）为末。酒调下。日一服。

诸药食毒

〔解诸中毒〕 一觉腹中不快。即以生豆试之。入口不觉豆腥气。乃是中毒。急以升麻煎汤连饮。以手探吐即解。白蜡。（一块研细）清水搅匀服下。得吐泻即解。

〔百药毒〕 生甘草。或用绿豆煎浓饮之。能解百毒。甚至口眼已闭垂危而气未绝者。

急以上白糖。淡豆豉。靛花。甘草。（各等分研细）冷水调灌即醒。或服药过多。以致头面浮肿。唇裂流血。或心腹饱闷。脐下撮痛者。用马料豆。绿豆。（各三四合）煎汁。连豆服。

以好为度。服散风药过多。以致闷乱不省。用甘草同生姜。煎汁顿服。

〔中附子天雄毒〕 绿豆。小黑豆。（水浸捣汁服）或煎汁服。

〔中巴豆毒〕

口渴面赤。五心烦热。泄痢不止。川黄连。（二钱炒）干姜。（炮一钱）

煎服。芭蕉根叶捣汁饮之。利止即安。绿豆煮汁冷服之。皆效。

〔铅粉毒〕 肥皂水灌下。得吐即解。砂糖水调服。亦效。

〔生半夏毒〕 令人口哑。以生姜自然汁灌之。（即垂危者服之即解。）

〔中钩吻毒〕 生池傍。与芹菜相似无他异。惟茎有毛别之。误食杀人。急取鸡蛋。（须抱未成雏者。研烂。）和麻油灌之。吐出毒物可生。或白鸭血。羊血灌之。或用芥。（即甜桔梗。）八两。水煎浓分二次温服。

〔野蕈毒〕 忍冬藤生啖之。或煎浓汁饮。或煮黑豆汁饮。或饮地浆水（方见伤寒门。）

并〔闭口椒毒〕误食之。舌麻心开。口吐白沫。甚者身冷欲绝。地浆水灌之。或饮醋解之。如只气闭。饮井水可解。

〔升丹毒〕地浆水多服即效。口破烂者。先服绿豆汁。

〔误食桐油〕令人呕吐不止。急饮热酒即解。

〔解果毒〕麝香一分煎汤服。或猪骨烧灰。水调服。
多吃白果成疯者。用白鲞骨煎汤服。小儿多食菱成病者。用龟肉煮食即愈。

〔解中蛊毒〕嚼白矾反甜。食黄豆不腥。吐唾于水内，沉下水底。乃是中蛊。或令含黑豆。豆胀皮脱者为蛊。国中在上膈者。急以白矾。建茶。（各三钱）新汲水调下。得吐出毒物即解不净再服。或服青油取吐。遇有蛊之处。见饮食上有蛛丝者勿食。先用炙甘草一寸。

嚼咽下。然后饮食即中蛊。仍吐出。再以炙甘草。生姜。（各二三两）水煎。日三服。

〔酒毒〕醉后经日不醒。用大黑豆。（一升）煮汁。温服。即至将死。服之即效。有因酒醉而气绝者。用尿桶洗去浮垢。急以滚水浇在桶内。片时取其清汁。缓缓灌入口中咽下。

鼻〔烧酒醉死〕

锅盖上气水半盏灌下。再以冷污泥搭胸前。燥即再搭。直至泥湿即效。

〔解食自死六畜毒〕犀角磨浓汁。饮之即解。
豆豉煎浓服。或雄鼠屎。（两头尖者是。）研末。和水服。或饮人乳二碗皆效。

〔食牛肉毒〕猪牙。（灰。）水调服。或甘草汁亦效。
多食马肉毒。用芦根煎汁服。或多吃好酒亦解。皆忌饮水。
误食牛马生疔肉。用生菖蒲搗酒服。菊叶（或花或根。）

捣〔食狗肉毒〕心下坚。或腹胀。口干。忽发热妄语。用芦根汁煮服。
凡食肉不消。

仍饮本畜汁或脑即消。

〔食猪肉伤〕杏仁煎汁饮。或韭菜汁煮服。或朴硝煎汤服皆效。食物中未知何毒。

用苦参煎汁饮。令吐出自安。

〔多食禽鸟毒〕 生白扁豆。（研末。）冷水调服。
误食鸟兽中药箭死者毒。用黑大豆煮汁。入盐少许服。

〔多食鸡蛋伤〕 米醋饮三四口即消。

〔解河鱼毒〕 香油一碗灌之。吐出即解。橄榄煎汁。或芦根。粪清。皆可救之。

〔如诸鱼毒〕
只用橄榄煎汁饮。或用橘皮煎浓。冷服即消。（鱼无腮及腮大者有毒。

如鳖肚下有红藻文者有毒。）

〔解蟹毒〕 紫苏生姜煎汁饮。
大蒜汁。或黑豆煮汁。皆可解。误同柿吃。大吐泻不止者。磨木香汁灌之即止。

〔解食鳖毒〕 饮蓝汁数碗即安。无蓝用靛青水亦可。

〔解食蚂蝗〕 多吃芹菜者有此疾。空腹时食黄泥小圆数枚。即从大便中出。

〔误食水蛭〕 食蜜即化为水。凡井中生蛭。以白马骨投之即消。
误食诸虫。以香油灌之。取吐即消。

〔误食蜈蚣毒〕 舌头肿胀。以鸡冠血生饮之。伤损则用血涂上即消。如误食毒物。

肚痛欲死者。用鸡蛋。（一枚）煮熟。连壳切开。将半
入纹银一块。（或小银器。）于蛋黄内。

将蛋合在肚脐上缚定一时。银上有黑色。易换二三次止痛。如食久不能吐者。以熟鸡蛋入朴硝同捣为糊服下。肚泻后即安。凡饮食虑有毒者。入麻油多煮可解。

〔一切食毒〕 不知中何毒。一时无药可解者。芥。生甘草。（各二两）水煎待冷。
入白蜜少许。分三次服。

〔解闷香〕 触之昏迷不省者。饮冷水即醒。

卷二

血症

〔总论〕

血症有吐血。唾血。咳血。衄血之别。大抵多属于热。盖脏腑有热火逼之。

然后血涌溢而出也。吐血即呕血。属胃经兼肝经。多因酒过。或食热物太过。或劳伤用力太过。也有瘀血紫黑色者。吐之无妨。若鲜红者。则火太盛。若劳伤而吐者。未尽属火也。唾血咯血。出于肾经兼脾经。因色欲太过者。多咳血。嗽血。出于肺经兼肝经。乃酒色怒气。

种种不节。咳嗽有痰。痰中带血也。血鼻中出血也。属肺经兼肝经。治法须究其因。若饮食过饱。负重伤胃而吐者。调胃安血。思虑伤心。积热而吐衄者。须补益心志。积热则清之。

如气郁则顺之。脉宜沉细。不喜浮数。吐而不咳易治。唾中带红丝者难医。为有内损也。有因怒气伤肝。肝木火旺。侵克脾土。致肝不能藏血。脾不能统血。忽然血晕。不省人事。吐血至升斗者。一时切勿用寒凉之剂。及骤用补药。先服童便二三碗。得血止瘥安。次用归身。

丹参。丹皮。生地。熟地。远志。枣仁。茯苓。（各一钱半）炙甘草。（五分）水煎浓。和童便一盞服。临卧用广西真山羊血。每服三分。引血归源。不过三服。其血自止。然后徐用气血兼补之剂。宿疾自霍然矣。

〔吐血不止〕白茅草根水煎服之。（按白茅草根除肠胃中客热。止吐血。消瘀血。利小便。凡劳伤而中气虚者。常服最有益。味甘平无毒。）

白薄纸五张烧灰。水服立效。此方甚奇。

蒲黄。生地。（各一两）忌铁器。水煎。再用藕节七个。捣汁入药。食后温服。韭菜根于净石臼内木杵捣烂。入童便在内。布帛滤去渣。只将汁与便以碗盛之。置火边令热。

浊者俱下不用。只取汁便之轻者。服之立效。嫩荷蒂七个。擂水服之甚佳。经霜败荷叶烧存性。研末。新汲水调服二钱。（按本草荷叶灰止吐血。莲房灰止泻血。）

〔血热妄行〕生荷叶。生艾叶。生侧柏叶。鲜生地各等分捣烂。丸如鸡子大。每一丸水煎去渣服。不拘吐血鼻血。妄行不止。鲜生地二三斤。取汁服即止。如病久者。用干生地煎浓。日饮三五次即效。

〔酒伤吐血〕 饮酒过多。热积胸膈。以致吐衄。葛花。（二两）川黄连。（四两）俱为末。以大黄末。（熬膏为丸。如桐子大。）每服百丸。温汤下。

〔妇女吐血不止〕
益母草捣汁一盞。和童便半盞。顿热服。如无鲜者。以干者二两。

煎汁和服。（或用韭菜连根取汁。合服同效。）

〔血喷成升斗者〕 花蕊石。（不拘多少。存性研如粉。）每用二三钱。用童便一盞顿温。食后调下。止后。用人参煎汤补之。须熟睡一觉即安。如吐出瘀血至升斗。及跌打损伤瘀血冲心。与女人血崩等症。用真广西山羊心血。每服三分。用无灰陈酒下。立见神效。

〔久嗽以致吐血〕 鲜桑白皮。（一斤米泔水浸刮去黄皮）锉细。入糯米四两焙干。同捣为细末。每服二钱。米饮调下。以好为度。

〔吐血咳嗽〕
藕节汁。梨汁。茅草根汁。萝卜汁。鸡冠油。麻油各四两。煎膏早晚服即愈。真阿胶。（五钱蛤粉炒）天冬。（去心一两）川贝母。（水洗去心五钱）白茯苓。（五钱）杏仁。（汤泡去皮尖炒黄五钱）甘草。（五钱）俱为末。炼蜜丸如龙眼核大。不时噙化一丸。

〔夜热咳嗽口燥吐血初起〕 枯黄芩四两。用猪胆三个。取汁拌匀。饭锅上蒸透晒干三次。为末。米糊为丸。每服二钱。空心白汤下。轻者四两，重者一斤。无不全愈。

〔痰中带血〕
肺热咳嗽初起。萝卜汁半盞。入盐少许。服之立效。如因虚损而起者。

童便和竹沥服之即止。

〔咯血〕（喉中常有血腥。一咯血即出是也。或鲜或紫。又如细屑者皆是也。）白芨一两。藕节五钱。各切片焙燥为末。每服一钱。白汤调下立效。
新丝绵烧灰五分。好酒下即效。
嗽久虚劳咯血。五倍子炒研细。每服五分。渐加至一钱。茶调匀。米饮下。

〔心肺受热受暑吐血〕 真桑黄每用三五钱煎汤服。以好为度。枯黄芩。（二两）桑皮。（一两）水法为丸。每服二钱白汤下。日二服。以好为度。

〔妊娠吐血〕 马屁勃研末。浓米汤调服五分即止。

〔鼻血不止〕

好陈酒烫热。自足浸至膝腕。以汗出为度。凶者浸至半身。再无不止。
栗壳。（烧存性研末）米饮调下二钱立止。刀刮指甲细末。吹入鼻中立止。
本人头发烧灰。

吹入鼻中立止。（或乱发烧灰存性。去火毒。井水调下一钱五分。并用少许吹入鼻即止。）纹银一铤。烧红烫足心。或用红线一根。紧扎手上中指中节。右鼻扎左指。左扎右。皆立止。大蒜头捣烂。浓涂足心即止。附子末酒调涂足心亦效。纸燃蘸麻油入鼻取嚏即止。（有人一夕衄血盈盈。用此而效。）

白纸一张八折。水湿铺于头顶上。用熨斗微熨之立止。用小豆大艾丸灸项后发际两肋中间。即常人括痧处。三壮立止。（盖血自此入脑注鼻中出也。）久衄虚者。用栗壳灰。（二钱）人参末。（五分）黄连末。（一钱）人乳调服立效。人乳。童便。各一杯。和酒少许。顿热服立止。好后多服润肺之剂。或用枇杷叶刷去毛蜜炙泡茶当茶吃。久服不再发。

〔九窍出血〕 黄荆叶捣汁。和酒服之。墙上青苔揉匀塞之。生大蓟一握。捣汁和酒服。（如无生者。以干者为末。冷水调下三钱。）或以冷水浸足。或以冷水喷面。皆可救止。

然此症名曰上厥下竭。百中救一耳。

劳损诸症

（附怔忡 不寐盗汗）

〔骨蒸劳热〕 地骨皮。（一两）小青草。（三钱）六月雪。（五钱）胡黄连。（一钱）米仁。（三钱）柴胡。（二钱）用嫩鸡一双。（约一斤许。取乌骨者佳。用铜刀宰。白酒洗。）将药塞鸡内。线缝。酒水少许盛碗内。蒸熟食之。鸡骨同药炒燥为末。炼蜜丸如桐子大。每巳申时服三钱。白汤下。数次即效。青蒿子。（连叶去梗约一斗）水三升。童便五升。煎取一升半去渣。（慢火熬成膏。甘草末收之。）空心白汤调服五茶匙最效。

〔五劳七伤咳嗽吐血〕

白蒺藜。（二斤炒去刺研末）枸杞子。（一斤慢火炒）黑芝麻。

（二斤炒极熟研）牛骨髓。（二斤化开去渣）白蜜。（二斤炼去渣）上将三味药末同髓蜜和匀。

盛瓷盆内。锅中蒸熟。丸如弹子大。随意食之。白汤送下甚效。

〔气虚血弱饮食减少〕

莲子肉。（不拘多少。去皮酒浸一宿。）入猪肚中煮捣烂成饼。

炙燥为末。酒糊丸桐子大。每服百丸白汤下。

〔补中益气汤〕 治劳役负重。内伤元气。或中气不足。体倦食少。人参。黄。（炙）

白术。（土炒）炙甘草。（各一钱半）当归（一钱）广皮。（五分）升麻。柴胡。（各三分）加姜枣水煎空心服。

〔六味丸〕 治肾气虚损。新久憔悴。盗汗发热。瘦弱烦热。吐血下血等症。人秉阴虚者十之八九。中年以后。宜常服之。熟地。（八两）山萸肉。山药。（各四两）茯苓。丹皮。

泽泻。（各三两）为末蜜丸。每服三钱白汤下。

〔棉花子丸〕 久服乌须黑发。暖腰肾。起痿弱。种子。阳虚者宜之。棉花子。（数十斤。滚水泡过。盛蒲包内。闷一炷香取出晒裂。取仁去衣净三斤。压去油。酒浸一夜。再蒸三炷香晒干。）破故纸。（一斤。盐水泡一夜炒。）枸杞子。（一斤酒浸蒸晒干。）杜仲。（一斤姜汁炒去丝）菟丝子。（一斤酒煮炒燥）俱为末。蜜丸。（桐子大。每服三钱白汤下。）

〔胡麻丸〕

黑芝麻一斗酒拌。九蒸九晒。以汤脱去皮。炒香杵为末。炼蜜丸。弹子大。

每日空心服一二丸。能补虚羸。润肺腑。益精神。疗一切疾病。去风。服至三年。白发还黑。

黑取其入肾。蒸去其寒滑之性耳。

〔冬瓜仁丸〕 治男子五癆七伤。补肝明目。老冬瓜仁二升。以绢袋盛投三沸汤中。须臾取起晒干。如此三次。又以苦酒渍之二宿。晒干为末。水法为丸。每服三钱白汤下。久服悦颜色。延年不老。（按本草极赞性味平和。功效之妙。）

〔癆症〕不拘男女。用鮮剥出小胎羊。砂锅内焙干为末。淡酒调服。
腌鳗鱼细嚼其骨。能追癆虫。
元参一斤。甘松六两为末。加炼蜜一斤和匀。入瓶中封闭。埋地下十日。

加炭末六两。再埋五日。取出烧之。常令闻香疾自愈。亦可熏衣被。
栗子煮粥食。或羊肾煮粥食。大能补肾益腰脚。芡实煮粥食。能固精气。明耳目。

〔乌须种子丸〕治男子精虚无子。肾水不足。小黑豆。（二升砂锅内酒煮熟晒干）破故纸。（十两盐水炒）菟丝子。（一斤酒煮晒燥）枸杞子。（一斤酒炒）川椒。（八两去闭口并椒目。

先扫净土地一块。炭火烧红水泼湿。将椒放在地上。用布衬之。以瓦盆盖之。一宿取用。）

鱼鳔。（一斤蛤粉炒成珠极焦不可生）俱为末。酒糊丸桐子大。每服三钱。空心白汤下。

〔传尸癆〕血气未甚虚损者。不必多方。早服此味。则虫不能为患。无有不愈。此方传自神授。济世之功。不可尽述。川椒。（二斤照前法制研末）酒煮米粉糊为丸。每服三十丸。渐〔返本丸〕补诸虚百损。黄牛肉。（去筋膜切片。水浸一宿。洗二三遍。用无灰酒入瓦罐内。盐泥封固。文武火煮一昼夜。取出如黄沙样为佳。焦黑无用。焙干为末。每用八两。）

山药。（盐水炒）白茯苓。小茴香。莲肉。（盐水炒各四两）为细末和匀。用酒煮红枣。（去皮核）同捣为丸。每服三钱。淡酒下。

〔怔忡〕
其症心中如有人欲捕状。人参。茯苓。（各三钱）制半夏。（二钱）水煎服。

久服不发。

〔天王补心丸〕
人参。玄参。丹参。（酒洗各一两）生地。归身。（酒洗各二两）天冬。

（去心）麦冬。（去心）远志。（去骨甘草水泡）柏子仁。（去油）桔梗。枣仁。（去壳炒黑）

杜仲。（姜汁炒）生甘草。（各一两）白茯神。（二两）五味子。百部。石菖蒲。（各五钱）俱为末。蜜丸。（不忘。

〔不寐〕灯草煎汤。代茶饮即得睡。（每日向晚以后。勿饮茶。勿多言静养。）或用人参。当归。远志肉。（各一钱）白茯神。（一钱半）枣仁。（炒黑）炙鳖甲。

（各三钱）水煎服。以〔盗汗〕睡着有汗。故曰盗。阴虚也。莲子。（七粒）黑枣。（七枚）浮麦。马料豆。

（各一合）水煎服三次愈。
五倍子研细末。以津吐调涂脐中。用绢帕包住。一宿即止。病后体虚者。用黄。（六两）甘草。（一两）各用蜜炙数次。出火气。每用一两。水煎服。

〔自汗〕病后身体虚而出汗。阳虚也。麻黄根。黄。等分为末。飞罗面打糊丸。桐子大。每用百丸。浮麦汤下。
经霜桑叶煎汤服即止。多食鲜山药自止。
黑豆腐浆取衣一张。同豆浆一碗。每日清晨食之即止。炙黄。小黑豆。等分。煎服。半月全愈。诸汗皆治。凡虚损症由劳力过度而成者。得安养药食之功。尚在易治。若由偏性七情六欲而成也。

药力之功居其三。惟静养之功。方可回天。随分忘其家业。住于安闲之所。清心寡欲。去其酒色财气之私心。清晨醒即起。（醒而再睡。易于神驰而昏乱）物我相忘。安神静坐。若有妄念。即徐步自审。此念因何而起。如何而止。与身心无益之念去之。静则再坐。动则再步。

（此即道经之回光也。）如此行一炷香。少顷再行。必得心息相根据。呼吸自然。坐时以口生精液此人身之大关键也。（此指坐时神注两眼齐平。处如平时心神内守。两目不动。）试细思之。

一日不静坐。此光流转。何所底止。若一刻能静坐。万劫千生。从此了彻。万法归于静真不可思议。此妙谛也。然工夫下手。由浅入深。由粗入细。总以不间断为妙。工夫始终则一。

（根据此法参之。可以超凡入道。岂特却病而已哉。）即行住坐卧。皆要安神内守。行之半月。

即有奇功。加之善愿助之。可以希仙矣。若从服奇药。或逆气闭息。非徒无益而有害。

胀满诸症

〔总论〕胀与满不同。胀者胀于皮肤之间。非脏腑肠胃之内。满者满在肠胃之内。如饱满一般。胀多属虚。而满有虚实之别。实者属热。中气郁滞不行也。若大便结。小便赤。

口干。体壮者宜下。如虚则吐食。或食不下。大小便清利。以指按之陷者为虚。或朝宽而暮急。或朝急而晚宽。皆属气虚。宜温补。妇女满胀兼积血者多。治宜行血。又若男妇四肢节痛而兼肿。则属风湿。又有周身四肢皆肿。乃表病也。有先胀满而后肿者可治。若先肿而后胀满者难治。男从脚下肿而上。女从头面肿而下。为顺可治。反此则难治也。四肢安而腹独胀者为鼓胀。其治之法。须审其气鼓、水鼓、湿鼓、食鼓之不同。大抵气与水者居多。

将手指按病患腹上。有窝者可治。脉壮者易治。若脉细脐肿突出者。阴囊无缝者。肚上青筋见。泻后腹肿者。皆不治。

〔满胀〕气滞属实者。鸡内金。（一个焙）真沉香。砂仁。（各三钱）陈香圆。（去核五钱）共为末。每服五分。姜汤下。土鳖。（即接骨虫）瓦上焙燥。每用一二个。以沉香一钱磨水调服甚效。

〔气虚中满〕或因病后。或劳役过度。胸腹痞满者。宜补中益气汤。（方见劳损门。）

多服取效。

〔气鼓〕陈年大麦须水煎汤服。泄气即消。（再以清补药服之不再发。）

〔一切鼓胀〕雄猪肚一具洗净。入大蒜四两淡煮烂。去蒜连汁食之。连吃五七次全愈。

忌〔水鼓〕赤尾大鲤鱼。用大蒜二两淡煮食。以好为度。或服陈皮。木通。大腹皮。

（盐水洗）茯苓。（各一钱）车前子。米仁。（各三钱）茵陈。（一钱半）榔槟。（八分）水煎服。忌食盐。好后。调养脾胃。方无后患。真水银粉。（二钱）巴豆肉。（研去油四两）生硫黄。（一钱）研成饼贴脐上。黄水自下。（贴时。先以绵二片铺脐上。次贴药饼。外用帛缚之。如人行三五里。黄水自下。待三五度后。去饼温粥补之。调理脾胃自愈。久患者隔日取水。一药饼可治二三十人。）凡水鼓食盐太早。复发无药可治者。用大虾蟆。（取腹中KT肚。不见水切碎）

〔腹胀及四肢发肿〕

干鸡屎半斤。酒一斗浸七日。日饮三杯。或炒燥为末。酒下二钱即效。鸡屎炒研。沸汤淋汁。调木香。（研）槟榔。（炒研各一钱）即效。（按本草鸡屎白。

微寒无毒。治痼症鼓胀。诸药不效者。用之即验。用此等方勿与病患知之） 鸬鸟焙干为末。米饮调下亦效。

〔妇人血鼓〕 马鞭草。刘寄奴煎浓服。

黄疸症

〔总论〕 其症有黄胆、谷疸、色疸、劳疸、酒疸之分。大抵多属湿热。盖湿热积于脾胃之中。久而不散。故致土色形于面与肌肤也。凡郁郁不得志之人。多生此病。虽云湿热不可纯用寒凉。必佐之以甘温。行之以渗泄。则湿易除。热易解。其病自愈。若纯用凉药。重伤脾土。湿未必除。热未必解。反变为腹胀者有矣。（脉宜洪数浮大。如微涩即难医。）

〔谷疸〕

谷疸者。食已头眩。心中怫郁不安。饥饱失调所致。胃气蒸冲而黄。苦参。

（二两）龙胆草。（一两碎）牛胆汁。（一两）入炼蜜少许。丸如桐子大。每服五十丸。滚水或生姜〔酒疸〕

酒疸者。身目俱黄。足胫肿。尿赤。面黄。赤斑。因酒后胃热。醉卧当风。

滞湿得之也。葛根。（三钱）山梔仁。淡豆豉。枳实。（麸炒各二钱）炙甘草。（一钱）水煎服。

以好为度。

〔黄胆〕 黄胆者。多起于饮食劳倦。脾土不能运化。湿热内郁所致。通身面目悉黄如金。白朮。猪苓。泽泻。茵陈。（各一两）茯苓。（一两五钱）为末。白汤调下五钱。日三服。

多饮热汤。汗出愈。

田螺去尾。单取头肉。以米醋浸吃数次愈。如吃时觉腥气者。非黄胆也。

凡患疸症。宜多吃荸荠。不拘生熟自效。如黄焦色而兼渴者难治。

〔食积黄胆〕 老丝瓜。（连子烧存性为末。）每服二钱。因面得病者面汤下。因酒

得病者淡酒下。连进数服即愈。

〔女劳疸〕

大劳大热之后。或房劳之后。为水湿所搏。以致日晡发热畏寒。膀胱急。

少腹满。目黄。额上黑腹胀如水。大便黑色时溏。故云黑疸。白术。茯苓。白芍。炙黄。

白扁豆。（炒各三钱）炙甘草。（一钱）加生姜五片。枣二枚。水煎服。以好为度。凡疸症好后。忌盐及糟鹅百日。

〔一切黄疸通治方〕

平地木。（生于山上。随处有之。叶似山茶而色老。冬结红子。

如南天竺子。木本高尺许者多。至冬不凋。）采叶煎汤当茶饮。数日即效。黑山栀。萝卜子。（炒各等分为末。）每服二三钱。（即饮食不进。病至垂危。有湿热者。服三钱。二三次。

如虚黄者减轻服。）用天青地白叶。（生于平野者多。叶似山茶而狭面青底白。故名天青地白。

春采叶煎汤调服。每日煎汤当茶吃。立能见效。

三白草。（捣汁一茶杯。）冲生白酒空心服。

（冬用根。如干者。研末三钱酒下。）枸杞根捣汁。用生白酒热冲服。

土牛膝四两。生白凡好后忌一切鲜发之物。并宜食淡。

〔虚疸〕 阴虚病后调理失宜。以致周身色似黄疸者。其状耳鸣口淡。怔忡微热。四肢无力。怠惰嗜卧。脚软脉细。以理中汤治之。人参。白术。（土炒各二钱半）炮姜。炙甘草。

（各〔食积脾病黄肿〕 青矾。（四两火成赤珠为度）归身。（四两酒浸七日焙燥）百草霜。

（三两）俱为末。以浸过归身酒为丸如桐子大。每服五丸至七丸温汤下。一月后全愈。

〔瘀血发黄〕

起于伤力。或因跌扑。身体发热。小便利。大便黑。脉芤涩者是。桃仁。

丹皮。（各一钱）桂枝。枳壳。（各八分）生甘草。（六分）水碗半煎至一半。入大黄。（炒熟一二钱）再煎一二沸。五更时热服。利下黑物即愈。（此即桃仁承气汤。治一切瘀血胀满。

大实大痛〔黄汗〕

身体俱肿。汗出不渴。其汗能染衣如柏汁。此由脾胃有热。汗出为风所闭。

热结于中之病也。生黄。赤芍。茵陈。（各二两）石膏。（四两）麦冬。（去心）豆豉。（各一两）炙甘草。（五钱）俱为末。每服五钱。淡姜汤调。食远服。

〔黄病〕六味丸。（方见劳损门。）照分两。加青矾二两。（即绿矾中颜色深。青莹净者。醋炒红。）为末和匀。蜜丸。每服二钱。白汤早晚下。

痞积诸症

（附虫积）

〔总论〕丹溪论积聚症瘕不一。积者停蓄之总名也。宜以在中在左在右分治。凡块乃有形之物。气不能成形。痰与食积死血而已。在中为痰饮。在右为食积。在左为死血。大法盐以软之。坚则削之。行气开痰为主。久痞及老年者。大约不宜妄动。虚损人亦不宜乱治。

而孕妇尤不宜治痞。恐伤其胎也。慎之慎之。有此症者。大宜戒气恼。及冷物发气等项。不然。恐再发难治。（积聚之脉。实强可生。沉细难愈。）

〔治痞积方〕不拘何膏药二张。以一张揭开。用白信五分。研细糝之。（小儿只用三分。）再以一张粘贴。将背面贴患处。以布包好。数日痞化。治皮里膜外者效尤速。如贴膏药后。腹中胀闷。乃痞积将散。须服枳壳。（八分）大腹皮。（盐水洗一钱）苏梗。（八分）

浓朴。（一钱二分）青皮。莪术。（各八分）山楂。（二钱）乌药。（六分）香附。（一钱五分）

缩砂。（五分）广木香。（三分）水二碗煎六分。空心服。三四剂愈。

〔痞块熨法〕

葱白同蜜二味捣烂。浓涂患处上。以布盖。用熨斗微火熨之。痞即消。

愈后宜服四物汤。（方见中风门以养气血。）

〔消痞膏〕 大黄。朴硝。（各一两）独部蒜。（七枚）同捣烂贴患处即消。水红花。

（无花。用子捣取汁。）
每汁一碗。水三碗。桑柴火熬成膏。量痞之大小。用纸摊贴以好为度。

仍将膏用酒调服。忌荤腥油腻。
独部蒜。穿山甲。真蕲艾等分。将穿山甲洗净。瓦上过成炭研细。又将艾拌匀。同蒜捣烂贴患处。（照痞大小药味量加。）
候线香一炷为度。

〔腹中痞积〕 观音柳。（即垂丝柳。）煎汤露一夜。五更空心饮数次。痞自消。如已成痞块。猪腰子两个切薄片。用木鳖子肉一两。与猪腰子相间缚定。外用湿纸包。火煨熟。

捣如泥。加黄连三钱。研末为丸。桐子大。初服二十丸。乌梅甘草汤下。第二服加五丸。渐加至以痛为度。块从大便中出。神效。
凡服利药。或外治消痞之后。宜服人参。（一钱）

熟地。当归。（各二三钱）白术。（炒一钱半）炙甘草。（一钱）水煎。食远服。五七剂后不再发。

〔诸物食积久不愈〕 海蜇。（一斤）水煮化。加白芥四十九个同煮收干。每早晚空心吃五七枚。以好为度。
如食积作痛。白术。（炒焦）茯苓。制半夏。（各一两）萝卜子。（二钱）

山楂肉。（一两五钱）陈皮。（五钱）炼蜜丸如弹子大。空心米汤下一丸即止。如已成痞块胀痛。野芋头。（一名仙人掌。同野芋一种。但此种叶较小。略似慈菇。叶有尖。）磨烂和糯米粉淡煮粥。每早食一茶钟。不用油盐。十服之后。其积自消。甚效无害。

〔食积成痞〕 木贼草为末。每服三五分。白汤空心服即消。年远不过两服。

〔痰积成痞〕 瓦棱子。（火醋淬三次研细。）醋糊为丸。桐子大。每服三四十丸。淡醋汤下。

〔气滞似痞〕

胡桃肉每两加明矾末三钱。同捣为丸。桐子大。每服三五十丸。好酒下。

〔鱼生积〕生鱼多食不化。即成痼症。马鞭草捣汁饮之即消。生姜汁点汤服。

或橄榄煎浓汁服皆效。

〔诸虫积〕痛时口中清涎流出。汤饮不能进。用乌梅。花椒。生姜片煎汤服止痛。于月之初一至初五六虫头向上。用芦荟。（二钱）史君子肉。搗丸。（各四钱）苦楝根。（向东不出土者佳。去皮及骨一两半。）白茺萸仁。（炒）鹤虱草。槟榔。（各五钱）俱研末。砂糖为丸。

痿痹

（附鹅掌风鹤膝风）

痿症之状。四肢难举。不能伸缩转动。状若瘫痪。而不痛者。乃因气血不足属虚。勿以风治。误用热燥攻风之药。宜当归。白芍。杜仲。牛膝。黄。炒白术。（各一钱）熟地。（二三风痹之症。即今人所谓痛风也。盖痹者闭也。以血气为邪所闭。不得通行而病也。故宜行血养血药治之。

〔筋骨酸痛〕十大功劳叶。（即老鼠刺叶。采一篮剪去叶上刺。好酒一斤拌蒸晒干七次。）红花。（五钱炒）当归。（一两酒炒枯）虎骨。（一两炙酥）同为细末。砂糖调服二钱。

日两次。

〔风气痛〕

一切肩背手足皆治。姜汁。葱汁。蒜汁。凤仙花汁各一碗。米醋一小碗。

牛入独部蒜四十九个。葱头一大握。油内煎枯。去渣。加入血丹四两。铅粉四两。（俱炒黄）

慢〔历节风〕每遇天将阴雨。手足作痛。至夜转甚。肢节肿痛者。用松树节十斤。好酒三斗。浸二十七日。每服二钟。日五六次。以好为度。腰腿风气痛不可践地。用松叶一升。

（神。

〔手足痛风冷痛如虎咬者〕 樟木屑一斗。以急流水一担煮沸。将樟木屑入大桶内。用沸水泡之。桶内安一踏脚凳。桶边放一兀凳。患者坐桶边。以脚在桶内熏之。候温洗。外以夹布单围之。勿令汤气入目。恐致坏眼。其功甚捷。一切风湿脚气肿大者俱宜。

〔风热臂痛〕 桑枝切段炒。水煎服。小便黄涩者。用木通一二两水煎。服三次愈。

〔秘传黄豆丸〕 治湿痹膝痛。五脏不足。脾胃气结积滞。大黑豆一斗。（水浸透。）甑上蒸熟。如造酱法铺席上。用荷叶覆盖七日。黄透取出晒干。去黄为末。炼蜜丸如桐子大。

空心每服百丸。白汤下。（并能壮力补虚损。开胃进食。大有神验。）

〔秘传药酒方〕

治一切风痹。手足麻木。肢体不仁。将成瘫痪之症。不拘男妇屡效。

肉桂。秦艽。山萸肉。川断肉。（各一钱）广木香。牛膝。（各三钱）当归。枸杞。风藤。防风。

黄。（各五钱）熟地。杜仲。木瓜。白术。丹皮。五加皮。（各二钱）陈绍酒二斤。连药入瓶内。隔水蒸出药性。待凉。加烧酒十斤。（冬用煮酒亦可。）过七日。早晚饮三杯。如体素热者〔鹅掌疯〕

穿山甲。雄黄二味。火烧烟熏之。数次自愈。吕祖传方。

鸡脑髓乘热掌心搓擦数次即愈。

真蕲艾四五两。水煮五六滚。入大口瓶内盛贮。将手心放在瓶口熏之。

如冷再煮热即效。活蟹煮汤。洗手即效。

〔鹤膝风〕

三阴之气不足。风邪乘之。两膝作痛。久则膝愈大而腿愈细。因名鹤膝风。

乃败症也。乳香。没药。（各一钱五分）地骨皮。（三钱）无名异。（五钱）麝香。（一分）共为细末。用车前草捣汁。入酒少许。调敷患处。不拘久近。敷三日愈。用去湿膏药贴患处一二日。次用鲜威灵仙捣烂罨上。须略痛一日。出黄水即愈。仍贴膏药收功。此症须内服人参。

（二钱）白术。制附子。当归。白芍。（酒炒）熟地。川芎。防风。杜仲。黄。羌活。牛膝。

甘草。（各一钱）加姜一片水煎。食前服。多服易效。（此方兼治附骨疽。皮色不变。大腿通肿。疼痛无奈。及痢后脚疼缓弱不能行。或腿膝肿痛等症。须配参方验。）

疝气

（附囊痈）

〔总论〕

疝气症有各别。治亦不同。如寒疝。囊冷结硬如石。阴jing不举。或引辜丸痛。

乃起于坐卧湿地。或寒月涉水。喜暖畏寒者是也。以温暖去湿之药治之。水疝。囊肿如水晶。阴汗痒搔出黄水。或小腹按之作水声。乃得于醉酒行房。汗出遇风寒。湿结囊中。以逐水之剂下之。筋疝。阴jing肿胀。或溃或脓。里急筋缩疼痛。痛极则痒。或挺出不收。溺浊如精。乃得于房中邪术所致。宜降心火之药治之。血疝。状如黄瓜。在小腹两傍横骨两端。

俗名便痈。得之春夏大暖。劳于使内。其气流溢。渗入睪囊。结为痈肿。以和血药治之。

气疝。上连肾区。下及阴囊。或因号哭忿怒气郁而胀。以散气药治之。狐疝。状如瓦。卧则入腹。行则出。上下无定。如狐之惑也。以逐气流经之药治之。疝。阴囊肿大。如升如斗。不痒不痛。因受湿气而生。多服去湿之药治之。凡患疝气者。杨梅不可与烧酒同食。

食则实时举发。无药可解矣。慎之。

〔疝气初起〕白凤仙花阴干。荸荠风干等分。烧酒浸服。日饮二三钟即效。橘核炒去壳为末。每日空心温酒调服一二钱甚效。

山楂。苍术。（各五钱）无灰酒碗半。煎八分热服。盖被出汗数服愈。

〔寒疝攻痛及偏坠〕不论老少。病在左。荔枝核一岁一粒。慢火存性。研末。空心好酒调服。（年纪多者。不妨作数次服。须一日服之。）病在右。小茴香盐水炒。研末。空心烧酒调下三钱。黄酒亦效。

〔寒疝气上冲中脘筑痛〕

乳香。（箬上炙去油研细二钱）生姜自然汁二钱。水一钟。

同煎三五沸。通口服。

〔寒疝诸疝心腹痛不可忍〕

当归。（三两）生姜。（五两）羊肉。（一斤）共煮浓汁。

每服半碗。日三服。如寒重加生姜。呕吐者加陈皮二两。白术一两。
玄胡索。小茴香。（等分）胡椒少许为末。每服二钱。酒调下。寒重加胡椒。

〔寒疝偏坠〕

大茴香一两。（研末）小茴香一两。用猪尿脬一个连尿。入二末于内。

系定入罐内。以酒煮烂。连脬捣丸。如桐子大。每服五十丸。白滚汤下。

〔热疝〕乃火邪聚于阴分。大能作痛。必以热症热脉。或大便秘结。小便热少。烦热喜冷者是也。用紫背天葵草三两。好酒二斤。灰火上煎至十分之五。早晚饮一二杯。两次愈。

忌〔水疝〕

苍术。（八两米泔水浸一宿晒干用生姜八两葱白四两捣炒苍术干去葱姜不用）

茴香。（八两。用生姜汁四两浸一二宿后用盐炒燥）吴茱萸。（汤泡三五次焙燥二两）共为细末。捣葱白成膏为丸。桐子大。每服五十丸。空心温酒下。
湿疝阴丸作痛。艾叶。紫苏叶。

川椒同炒热拌匀。乘热用绢袋盛夹囊下。勿令走气。冷即易之。

〔血疝偏坠肿痛〕苏木煮酒服。楮树叶。栗树叶。煮酒服。俱效。

以铁秤锤烧红淬酒服。亦效。雄鸡翼毛。左患取左。右患取右。烧灰酒调下。

〔偏坠〕鸡子。（一个尖上开一孔）入硫黄末三钱。火成炭。研细。白汤下。
丝瓜叶烧存性三钱。鸡蛋壳烧灰二钱。温酒调服。左里
螺蛳骨上排起四指。是三阳交穴。

灸七壮止痛如神。即除根。

〔主心疝〕山羊血不落水者。荷叶包裹。挂当风处阴干。不可着雨。遇此症。取三五钱冲热酒服。（不饮酒者。滚汤亦可。并治诸疝。）

〔疝〕南星。（汤泡）山楂。苍术。（各二两）白芷。半夏。（制）枳实。神曲。

（各一两）海藻。昆布。（各五钱）玄明粉。吴茱萸。（泡三次各二钱）为末。酒糊为丸。盐汤下。

三五十丸。

〔木疝〕

即木肾。凡人心火下降。则肾水不患其不温。真阳下行。则肾气不患其不和。

温且和安有所谓木强者哉。木强则伤肾矣。故不可纯用燥药。当行温和散利。以逐其邪。病邪渐去。营卫流转则愈。须服枸杞子丸。枸杞子。昆布吴茱萸。（汤泡二次各四两）南星。

（汤泡七次）半夏。（制）白芷。山楂。（去核）神曲。（炒各二两）滑石。（炒）苍术。（盐炒）橘核〔诸疝举发痛不可忍〕荔枝核。（炒脆为末）空心白汤下。或加青皮。山梔。山楂。

茱萸。各等分。炒末。仍用白汤调服。

大茴香同荔枝核炒黑。各半研末。每服一钱。温酒调下。如兼肿痛。取旱莲草捣汁一盞。酒半盞和匀。顿热服。不论老少新久。服之立效。以旱莲草能行血治血故也。

〔疝气囊肿〕

田间青蛙皮贴之效。艾灸大敦穴。（在足大趾肉甲相连之处。）灸三壮即愈。

〔治诸疝〕茄蒂。伏天晒干切片。交秋不用。蒸好。酒服自愈。

如主心疝。加砂仁。

〔再发〔偏坠初起〕

小茴香。（盐水炒一两）穿山甲。（炮五钱）俱为末。每服二钱。酒调下。

如蛋九个。（米醋二斤。锅内浸煮。以醋干为度。）取出去壳。每食三个。好酒下。年久者二次愈。

〔木偏坠上下不定疼痛不止〕牡蛎。（不拘多少）盐泥固济。用炭三斤。令火尽。

冷取出。每用二两。加干姜末一两。同研和匀。冷水调涂患处。小便大利即愈。内服玄胡索。（盐水炒一两）全蝎。（五钱）俱为末。每服二钱。盐汤下。

〔囊痈〕

凡小腹作痛。牵引肾子。多寒少热。好饮热汤。乃疝气也。如阴囊红肿发热。

小便赤涩。内热口干。坠重作痛。乃囊痈之症。不宜用疝家热药。清肝渗湿汤治之。川芎。

龙胆草。天花粉。当归。生地。柴胡。山梔。黄芩。（各一钱）泽泻。木通。甘草。（各五分）

加灯心水煎。食前服。溃后糝药。蚌壳。（
）黄连。（炒）青黛各等分。研极细敷之。

〔阴肿核痛大如升者〕 捣马鞭草汁涂之。韭菜地上蚯蚓粪。以生甘草煎浓调涂。

〔阴囊烂尽只留二子〕 凤仙花子。甘草等分。研末。麻油调敷即生肉。（囊痈。乃阴虚湿热流注于囊。结而为肿。至溃后辜丸悬挂者。犹不伤人。以其毒从外发。治当补阴清利湿热。取效者十有八九。）

老杉木。（烧灰存性）苏叶。（焙燥）各等分。为细末敷上。仍以苏叶包之。

〔肾子肿如水晶阴汗潮湿〕 灶心土二升研碎。砂锅内炒热。加川椒小茴香于上。乘温将阴囊放在上面。冷则再炒。三次愈。内服米仁。（朝东壁土同炒燥去土。）水煮连汁服。（多吃〔肾囊风肾子肿大〕

鸡蛋煮熟去白留黄。炒枯出油，再用老杉木烧灰存性。调油搽之。

〔囊痒〕 燥者以油核桃取油润之。湿者五加皮。千里光。明矾。刘寄奴。草。

煎汤洗之。猪窠草。（生小猪时者。）煎汤洗。陈壁土研末扑上愈。

阴囊。肾茎。肛门搔痒难忍。用陈葫芦烧灰存性。擦糝患处立愈。

痢疾

〔总论〕 治痢大法。当祖述内经。参考诸家名论。方能尽善。或六淫 疔之邪侵于外。或饮食之积伤于内。间或岁时疫气流行。皆能致痢。其病大率至三秋而发者。盖暑湿之邪偏多。

伤气分则白。伤血分则赤。赤白相兼。气血俱病。焦黄色者。食积也。绿豆汁色者。湿也。

纯血无粪者。热毒极深也。杂下散血者。内伤也。五色备者。五脏俱受病也。青碧色者。有风邪。肝气实也。当分内伤外感。虚实寒热而施治。初起头疼发热。四肢酸痛者。宜表散微汗之。勿骤服攻里之药。倘口干舌黄。里急后重。或日下数十行者。则攻里又不容缓矣。手足热能食为实。手足冷不能食为虚。古人以行血调气为主。行血则便脓自愈。调气则后重自除。三五日内。宜通因通用。不可即服收涩之药而遽止之。必变生他病。惟日久正气虚而不止者。然后用补涩之剂。更须节饮食。慎起居。忌一切油腻面果之物。若宿滞未除。又增新积。肠胃何由而清。元气何由而复。渐至痞满恶食。成噤口痢。多至不救者有之。痢稍久不宜下。胃虚故也。属热滞者十之六七。亦有虚而寒者。虚者宜补。寒者宜温。老年及虚弱人不宜下。

〔主方〕

黄连。（酒炒一钱半）黄芩。（酒炒二钱半）白芍。（酒炒二钱）木香。枳壳。

（炒各一钱）槟榔。（五分）炙甘草。（三分）
腹痛加当归。（一钱半）缩砂。（一钱）再加木香。

白芍。（各五分）后重小便涩。加滑石。（炒一钱半）
白痢加白术。（炒）白茯苓。（炒）滑石。

陈皮。（各一钱）烦躁闭急。再加大黄。（五钱）兼食积者。加山楂。枳实。（各一钱）红痢加当归。川芎。桃仁。（各一钱半）初欲下之。再加大黄。（五钱）
红白相杂。加当归。川芎。

桃仁。（各一钱半）以理血。滑石。陈皮。苍术。（炒各一钱半）以理气。有食积。亦加山楂。

枳实。赤黑相杂。小便赤涩者。加木通。泽泻。茯苓。（各一钱）黑山栀。（五分）以分利之。

〔痢疾初起〕水红花近水边者取花叶晒。
炒。研。每服三钱。红痢蜜汤下。白痢砂糖汤下。山楂肉。（炒炭研末三钱）槟榔。（一钱焙研末）陈细茶。（二钱研）红痢蜜汤下。白痢加橘红。（五分）木香。（六分）同研末。砂糖调服即效。千金方用薤白一握。细切煮粥食即止。灰苋菜子。（连叶阴干研末）每服三钱。砂糖调下。

〔白痢〕

痢下白脓不止。白面。（炒熟筛）煮米粥将好。入面和匀食之。即日痢百行。

亦能见效。痢下如鱼冻。用白鸭血好酒冲热服。

〔冷痢腹痛〕

肉豆蔻一两去皮。醋和面裹煨捣末。每服一钱。米饮下。即饮食不进者。

亦能见效。如食蟹冷痢。用鲜藕节洗净。捣碎煮汁热服。

白痢如冻胶。如鼻涕者。又宜干姜。缩砂。浓朴。肉桂之类温之。

〔热痢〕痢下纯血鲜红。小便热涩而痛。脉息滑实有力。畏热喜冷。躁急多烦。益元散。（方见暑症门。）每服三钱。新汲井水调服。以好为止。车前草。（取子叶）捣汁一杯。

入白蜜半杯调服。或用大黄（一两酒浸一日去酒）水煎匀。两次服。或加入煎药内服。

〔血痢〕韭菜连根捣汁一杯。和酒一杯。温服最效。荷叶蒂水煎服亦效。臭椿树。

（取根上白皮）枯矾。（各一两）槐米。（二两）炙甘草。（五钱）俱为末。水法为丸。每服三钱。

米饮下。日两服。

血痢诸药不效。垂危者。取臭椿根白皮。五钱。酒二杯。煎一杯服下即效。屡验。

痢下纯血。麻仁汁。绿豆同煮食即效。饮食不进。疼痛不可忍者。用延胡索（炒为末）三钱。米饮调下立止。或淡酒温下。

痢下清血。腹中刺痛。樗树根白皮切片炒。

研末。米醋丸。如桐子大。空心米饮下三五十丸。

〔酒痢〕痢血腹痛。或如鱼脑五色者。老丝瓜一条。连皮烧研。空心酒服二钱。以好为度〔不论赤白久痢〕白扁豆花照本人每岁一朵。加冰糖三钱。陈细茶三钱。水一碗煎至六分服。缓一顿饭间。再用红扁豆花如前法煎服。屡验。

〔久痢不愈〕桑树蛀虫屎炒燥。研细。筛过。砂糖调服即效。

〔肛门痛〕久痢痛不可忍。炒食盐布包温熨之。或用枳实炙热熨之。熟艾。黄蜡。诃子。烧烟熏之。

〔痢后脱肛〕赤石脂。伏龙肝。（即灶心土。）研细敷之。

五倍子三钱。研入。白矾一块。水碗半煎汤洗之。

大肠虚冷脱肛。用蜗牛。（一两焙燥烧灰）猪脂调和。敷之立缩。

最效。

〔清暑丸〕

治痢疾不拘红白。日夜。无度。里急后重等症。用猪苓。（酒炒）赤芍。

广皮。乌药。玄胡索。（淡醋汤炒）生甘草。（切片晒燥研末各二两）葛根。（三两）黄芩。（三两酒炒）泽泻。（四两。盐水拌炒）广木香。（一两切片研）俱为细末。用青蒿。（三两）苏叶。

（二两）煎浓汤洒药末上。如水法为丸。外用白云苓。（四两研末）滑石。（八两水飞研）为衣。

每服三钱。以白扁豆花。（二十朵）鲜荷叶。（三钱）同煎汤吞下。或用陈年萝卜菜干。煎汤下更效。服一二次后。屡试立效。忌油腻荤腥。面、蛋、生冷、数日。如酷热之后。宜多备济人。

惟白痢如鱼冻者勿服。水泻勿服。

〔噤口痢〕古方用石莲肉。二钱为末。陈米饮下。但石莲如无真者。用藕汁煮熟。稍加砂糖频服。兼进多年陈米稀糜。调其胃口必效。丹溪方。用人参。（二钱）黄连。（一钱姜汁炒）水煎浓。终日细细呷之。如吐再服。但得一呷下咽便开。又宜引热下行。用田螺一个捣碎。入麝香少许。罨脐中即效。

大蒜捣烂贴足心。（并治小儿。）水蛙。（即田鸡一个。）连肚肠捣烂。新瓦上烘热。入麝香三分。贴脐上气通即食。金鲤鱼一尾。（重一二斤者。治净。）用葱酱入胡椒三五分煮熟。令病患嗅之。欲食随意食之。即效。乌梅一斤敲碎。置盆中。用滚水十余碗泡熟。令病患坐盆上。待热气冲上肛门。温即洗。其人如睡去。

即扶上床。煎陈米粥汤候之。如思食即食半碗。少顷再饮。不宜多。若小儿减半治之。诸药不效者。用水仙子。（即粪缸中蛆。）洗净。瓦上焙干为末。每服一二匙。米饮调下。便能思食凡噤口痢。如头痛。心烦。手足温热。未尝多服凉药。察其脉症。脾胃不弱者。乃毒瓦斯上冲心肺。以致呕而不食。宜用败毒散。（茯苓。川芎。柴胡。前胡。桔梗。羌活。独活。

枳壳。生甘草。）各等分。每服四钱。加陈仓米百粒。生姜三片。枣一枚。水煎温服。若脉气微弱。或心腹膨胀。手足厥冷。初病则不呕。因服罨粟。乌梅。苦涩凉药太过。以致闻食先呕者。乃脾胃虚弱。用山药。（一半生。一半熟。）炒为末。米饮下。若虚寒甚。脉弱者。须理中汤治之。（人参。炒白术。炮干姜。炙甘草。）各一钱。水煎服。

〔渴痢不止〕 羊肺一具。和盐豉作羹食。三次即愈。

大小便症

（附脱肛 便血淋浊 遗精）

〔大便闭结〕 胃实能食。小便热赤者。芝麻。（二两捣烂和水少许去汁）杏仁。（二两去皮尖研如泥）大黄。（二两煨熟）黑山栀。（四两）俱为末。炼蜜入麻汁和丸。桐子大。每服五十丸。空心白汤下〔大肠实热秘结〕生大黄。（四两）牙皂荚。（去子筋炒黄四钱）俱为末。蜜丸绿豆大。

每服一二钱。白汤空心下。并治肠风秘结。如年老不可服大黄者。柏子仁。松子仁。火麻仁。（各一两）共研匀。用黄蜡五钱。熔化和丸。桐子大。每服二三十丸。空心米饮下即通。

苏子。麻仁。（不拘多少。研烂。）水滤取汁。煮粥食之。即津液枯燥肠风。服之即效。

〔风结血秘〕

或胃中伏火。大便秘涩不通。不思饮食。皆应润燥和血疏风。则自通矣。

归尾。大黄。（煨熟切片研）羌活。（各五钱）麻仁。桃仁。（去皮尖各一两）先以二仁研如泥。

同药末蜜丸。桐子大。每服五十丸。空心白汤下。

〔老年津液枯燥秘结〕 猪脂油。（一斤。熬净去渣。）白蜜。（一斤炼净）再同入铜锅熬数沸。加归身。（四两煎浓汁）和入成膏。不时挑服至妙。

〔一切秘结〕

生蜜一大杯。滚水一碗调玄明粉三钱服之即通快。不损脾胃。大小便。

五七日不通者。牙皂。（二分取不蛀者烧灰）米饮调下二三钱即通。

〔大小便日久不通欲死者〕 推车虫。（七枚）土狗。（七枚）男病。（推车虫用头。土狗用身。）女病。（土狗用头。推车虫用身。）新瓦上焙干为末。用虎杖树皮向南者。浓煎汁调服。诸药不效。用此即通。

〔大小便一切秘结〕

或兼他症。或老弱虚极。不可用下药者。蜜。（不拘多少熬老。）

入皂荚末少许。以葱白作骨。乘热捏作兑。候冷硬。用油涂肛门。插入立通。

以锅勺炒盐至赤。为末。入竹筒中纳肛门内。一次立解。

葱白。（一斤。捣烂炒热。）用帕包熨小腹上。

气透即通。（无葱大蒜同效。）食盐。（炒红待冷。）填脐内。切蒜一片盖盐上。用艾炷灸三五壮即通。此二方小儿同治。男妇皆效。大猪胆。（一枚取汁）和醋少许。用竹筒灌入肛门内。少顷即通。（如不得进。竹管一头。用猪尿脬扎紧。然后入汁内。手力一捻。药即入内。）

〔脱肛〕气虚而脱者多。人参。（一二钱）炙黄。（三钱）川芎。当归。升麻。（各一钱）水煎食前服。如血虚。加白芍。熟地。如血热。加炒黄柏。如虚寒。加炒黑干姜。外用五倍子。（炒研）水煎汤浸洗即收入。或再用五倍子。（研极细。）或加赤石脂细末。糝在芭蕉叶上。托而上之。再无不效。如肠风有血者。加蛇床子煎汤洗。外用蛇床子。（炒为末。）

出火〔大肠伏热脱肛红肿〕砂仁。黄连。木贼。各等分。为细末。空心米饮下。外用五倍子。荆芥。煎浓洗之。再以木贼烧灰存性。研细糝上托入。

〔脱肛下血〕

韭菜。（一大握。捣碎。瓦罐内煎熟。）再用生韭汁冲汤内。先熏后洗。

一二次即效。

〔一切脱肛〕常以升麻煮猪大肠食之。即收上。常以二桑叶代草纸效。

用药收上频脱者。多服补中益气汤。（方见劳损门。）

年久不愈。生铁三斤。（水一斗煎至五升。）取汤洗。

鳖头一枚。烧令烟尽。为末敷上。手按托之。即止。

〔肛门肿痛〕

木鳖子。（去壳取油。五六枚。）研如泥。滚水泡汤乘热洗。另研少许敷患处。

〔肛门肿痒〕杏仁捣膏。敷上即止。

病久虫多者。用桃叶五七斤。蒸热透。纳小口坛内。以患处坐上受熏。虫尽死。

有因脱肛。里急后重。久而生虫者。刮取猪肚上垢腻。

入花椒末拌匀。涂痒处。上以青布袋兜之。再以温汤入坛内。坐上熏之。少顷虫入

布袋内。

二三次虫去痒止。

〔大便血〕 血清色鲜者肠风也。血浊而色黯者。脏毒也。肛门射血如线者虫痔也。

〔肠风下血〕

槐米。（二两）防风。地榆。黄芩。（酒炒）当归。（各一两）枳壳。（六钱）

俱为末。用面糊丸。桐子大。空心白汤下二十丸。赤小豆炒黑为末。每服二钱米饮下。如先血后便。用赤小豆。（五两。浸令芽出。晒干。）当归。（一两）为末。白汤调下二钱。日三服。绿豆粉。（一斤。炒黄黑色。）为末。每服五钱。砂糖汤调服立效。忌食榧子。豆腐。

（末入袋滤出浆者。带渣取来。）锅内炒黄燥。可以研末为度。每服三钱。如下紫血块者。

白糖汤调服。红血块者。砂糖汤服。日三钱。即远年便血。至面皮黄色垂危者。服之神效。木耳。（炒黑一两。生一两。）芝麻。（五钱）煎水作茶饮甚效。荞麦粉。（一斤）二蚕砂。（二斤。焙燥研细。）米饮丸桐子大。每服五钱。以好为度。便血服凉药不效者。用归脾汤。

加（槐米。黄芩。）治之。

〔脏毒血痔〕 秦艽。防风。当归。川芎。地榆。红花。（各五钱）宣州大黄连。（二两去毛净）俱为末。糯米一茶杯。（浸一宿）用猪大肠。（洗净）将药末装入肠内。两头扎紧。

煮烂杵为丸。桐子大。早晚空心白汤下三四十丸。日久不止者。用僵蚕。（炒黄。一两研。）

败棕。（烧灰存性。二两。）米饮丸桐子大。每服二钱。醋汤空心下。年久不效。用百药煎。

（生用一两。烧灰一两。炒焦一两。）共研细蜜丸。桐子大。空心参汤下五七十丸。（或米饮下二三十丸。）

〔酒积便血〕

神曲。（一两半）白酒药。（二丸）俱为末。水调捏成饼。慢火炙黄为末。

每服二钱。白汤下。

〔粪后红〕下霜时冬青子。蜜浸。晒干三次。空心。白汤下二三十粒。

〔小便不通〕脉浮发热。口渴溺管疼痛者。猪苓。滑石。（各三钱）茯苓。泽泻。（各二钱）阿胶。（一钱半）水煎温服。连服即通。
益元散。（方见暑症）泉水调下三钱即通。因肺燥热。小便不通。黄芩。（一钱）黑山栀。（二钱）盐豉。（二十粒）长流水煎服。
如服热药过多。致小便不利。或脐下痛不可忍。黄连（炒一钱）黄柏。知母。（俱盐水炒各一钱半。）

生甘草。（一钱）水煎服。

如血郁脐下切痛不通。蒲黄粉。（二钱）滑石。（六分）白汤调下。

日三服。或用妇人油发灰二钱。酒调下。止痛即通。

〔小便不通兼血淋〕茎中痛不可忍者。牛膝。（二两）煎浓。用无灰白酒冲服。或时刻煎汤当茶饮。以好为度。并治五淋。如不通畅。每牛膝一两。加朴硝三钱。

〔热症中暑小便不通〕蚯蚓。（杵烂。用凉泉水搅和澄清。）取汁半碗。服下立通。能大解热疾。不知人事欲死者。服下即效。

〔老年或虚弱小便不通淋涩〕琥珀。（研细末。）每服一钱。人参汤调服。并治一切淋症。诸药无效。病久虚损。服之即效。

〔小便不通至急〕大田螺。（三枚。生去壳。）捣烂。入麝香三厘。封脐上即通。不拘男妇。用大蒜分开取瓣内心一条。入水门内即通。
至急者。土狗一枚。独头蒜一个。同捣烂。贴脐上即通。
皂荚。葱头。王不留行。各数两。煎汤一盆。令病者熏洗小腹下体。

热气内达即通矣。如妇女用葱白塞水道中。再加熏洗。其通尤速。

前法炒葱。熨脐至效。白菊花根。捣烂。生白酒冲汁温服。有因膀胱气闭。结滞。不能通达。诸药不效。危困将死者。用猪尿脬一个。两头俱用鹅毛管穿透。线扎。先缚住下口。将上口进气满亦缚定。将下口鹅毛管尖插入马口内。去根下所缚。则气直入膀胱。塞开小水自通矣。最妙法也。〔尿哽淋漓滴不出〕屋檐上清明日插杨柳条。（朝北者效。）煎汤服。一二日效。大人病此。忍小便一二时。畅解即愈。

〔老年遗尿不知〕蔷薇根捣烂绞汁。温酒冲服。
桑螵蛸。（不拘多少。酒炒为末。）

姜汤调下二钱。

〔小便血〕

尿血不痛。如溺管中痛者。以淋症同治。发灰二钱。用茅草根。车前子。

煎汤调下。二三次即止。并治舌上出血。

干柿饼。（三枚烧灰。）陈米汤调服。以好为度。苳麻根。（一两）煎汤服。益母草捣汁服皆效。日久不愈。用鲜地骨皮。（洗净捣自然汁。）

加酒少许。空心温服。（清心肾。开郁结。兼分利。）如无汁。煎浓。每服一二杯。久病而体虚者。阿胶三两。（蛤粉炒成珠。研末。）淡酒调服三钱。

〔房劳小便出血〕

山药。（一两）鹿角。（五钱刮屑。）发灰。（二钱）俱研末。苳根捣汁。

打糊为丸。桐子大。每服五十丸。空心白汤下。

凡小便血。服清利药不效者。用补中益气汤。加车前子治之。（方见劳损门。）

〔小便淋症〕淋者。淋漓涩痛也。小便尿血为血淋。火气煎烁为砂石淋。气滞涩痛为气淋。尿出凝如膏糊为膏淋。因劳而作为劳淋。此五淋之辨也。总以疏通清热为主。韭菜捣汁。和生白酒空心服。其渣煎汤洗阴jing。船底青苔煮水饮之。（此药得水气之精。大能分利阴阳。去脏腑之邪毒。）

〔血淋痛不可忍〕

侧柏叶。藕节。车前子。煎浓温服。如重者调益元散（方见暑症门。）

三钱。服下即效。茅草根煎汤。当茶饮即止。

旱莲草。车前草同取汁。每服一钟立效。

发灰二钱。藕节汤调服三次愈。

〔诸淋〕

初起。用车前子。（五钱）淡竹叶。赤茯苓。荆芥穗。灯草。（各二钱）水煎服。

以好为度。痛不可忍者。白硝石二钱。（研细。）以泉水调下即止。如气淋小腹急满。尿后而有余沥。用木通煎汤下。如石淋将硝微炒研。温水调下。

葛粉。砂糖和丸。如弹子大。泉水化服。日三服。多吃即效。杜牛膝。捣碎煎浓汁。入麝香少许。频服至效。（盖牛膝茎叶煮酒服。治小便不利。茎中痛欲死。及妇人血结。坚痛如刺。及治淋症之要药也。）

〔砂石淋〕 石首鱼脑骨。（五对火。）滑石。（五钱）俱研细。分两服。用木通煎汤调下。以好为度。白扁豆根数寸煎汤服。能止痛。瓦松煎汤乘热洗。良久即通。

〔膏淋〕 海金沙。滑石。（研细各一两）瞿麦穗。杏仁。（各三钱）甘草。（二钱）俱为末。

每服二钱。用麦冬通草煎汤调服。

〔死血作淋〕
牛膝。（四两。酒浸一宿。）归尾。（二两酒洗）赤芍。（一两半）生地。

（一两半酒洗）川芎。（五钱）水五碗煎至二碗。入麝香少许。分四次服。

〔白浊〕 色白若泔浆浊。在溺后不痛者。乃湿热所致。用五爪龙藤。（连根一两）土茯苓。杜牛膝。（各八钱）生白酒三碗。煎至一碗。空心服三次愈。并治下疳如神。冬瓜仁炒为末。米饮下五钱。亦治白带。（按冬瓜仁久服悦颜色。益气血。补肝。明目。治五劳七伤。）

病久下元虚冷。小便不禁。浊而兼遗者。韭菜。（二斤取汁。）牡蛎。（左边者八两。）

炭〔淋浊〕 小便频数而痛者。车前草四两捣烂。生白酒搅汁。入盐少许。空心热服一二次即愈。痛不可忍。羊角烧灰三钱。好酒空心下。

〔赤浊〕 益母草子茎叶。取汁一盞。空心服即效。

〔梦遗〕 肾虚精滑。日久不愈。服之如神。鸡蛋十个煮熟。去壳。再用砵糠火煨如黑炭。如不能透。皮上先焦者。剥下再煨。中心以黑炭为度。研细。每服三钱。用潼关沙苑蒺藜一钱。煎汤冲服。新出蚕茧七枚。去蚕蛾。用新瓦二片合茧。火上炙烟尽存性。逐个各包开。每日清晨。用树脂一茶匙。调化一枚。好酒半杯送下。服完全愈。

〔茯菟丸〕
治思虑太过。心肾虚损。溺有余沥。或白浊遗精。菟丝子。（五两酒煮。）白茯苓。（三两）石莲肉。（二两）酒糊丸桐子大。每服五十丸。空心盐汤下〔一切遗症〕白浊血淋难愈者。谷精草。猪骨髓。（各一两）酒煎服。以好为度。

脚气

（附肾脏风）

〔总论〕脚气始受于湿。复挟风寒暑热之邪而成。故先起于腿足。脚先屈弱。而举体转筋。肢节痛。而足肿。少腹不仁。心中悸动。胸满便涩。发热头疼身痛。其状绝似伤寒。

人多误治。仲景以脚气为类伤寒症。另立篇目以别之。盖为此也。初起按之必热且痛。但红肿自足起渐行至股。势必上升。如升至心者不治。急宜疗之。

〔一切脚气初起〕

土乌药。（一二两去皮）以碗片刮下屑。收于瓷器内。以好酒一斤。

浸一宿。次日空心去药。入麝香少许。将酒分三次温服。如无麝。多服一二次。得溏泻后即效。

〔脚丫湿烂肿痛〕两足生疮。不能行走。苍术。（米泔浸一日。晒干切片。盐水炒三钱。）黄柏。（酒炒三钱）川牛膝。（酒炒二钱）水煎。空心服。重者日两服。五七次后。再无不效。

外用枸杞叶捣汁。将鹅毛涂患处。或萝卜菜连根煎汤洗皆效。

〔防己饮〕

治湿气足痛胫肿。白术。（土炒）苍术。（照前制）犀角。生地。（酒炒）

黄柏。

（酒炒各一钱）木通。防己。槟榔。龙胆草。（各八分）甘草。（五分）水煎热服。如有痰。

加竹沥姜汁。如大便秘。加桃仁。小便涩。加牛膝。

凤仙花叶晒干。煎汤热洗。仍以叶捣烂敷患处。

〔脚气发肿〕马鞭草煎汤洗二三次愈。如老年或病后虚肿。用补中益气汤。（方见虚损门。）加（米仁三钱。牛膝二钱。）多服即效。

〔脚气止痛〕

牛皮胶。（锉碎。同麝皮炒成珠。研细末。）每用酒调下一钱。日两服止痛。

赤小豆。（研末）南星。（炒研）和匀。姜汁调涂止痛。

艾叶。（八两揉）花椒。（一斤）

草乌。（二两切片）和匀。布包如棉褥。置悠火炉上洗足。于褥上之。椒气上升。立能止痛。

〔脚气冲心〕 槟榔一个为末。用童便姜汁。共半盏调下。

〔脚气垂死〕 恶寒发热。两足肿大。心烦体痛垂死者。用杉木节。（三两）槟榔。大腹皮。橘叶。（各一两）俱切细。长流水六碗。煎至二碗。分作三服。如少年体实者。一日服尽。

大（按此症非风邪。乃气逆也。槟榔行至高之气。腹皮行胸膈之气。杉节行肢节之气。橘行肝气。气行则病去。药非大剂。不胜其邪。用者酌宜。）

〔流火〕 腿足红肿。疼痛无定处。活络丹酒调服甚效。
外用海蜃皮。取薄者。粘贴。

燥则易之。

或用碱。（不拘多少。研细。）水调涂。燥则有霜。拂去再涂。或用煤炭研细。

米醋调涂。皆止痛妙法也。杉木屑煎汤洗亦效。

〔肾脏风壅积腰膝沉重〕

威灵仙。（炒研细末）蜜丸桐子大。五更时酒下七八十丸。

平明微利恶物如青脓。即是风湿积滞。如未动。次日再服百丸。利后吃粥补之。愈后仍服平补药数剂。则不再发。（按威灵仙去众风。通十二经络。微利不泻。服之忌茶面。）

〔肾脏风攻注脚膝腿肿如瓠〕 甘遂一两。木鳖子。（一雌。一雄。）去壳为末和匀。用猪腰子二个。批开入药末一钱。湿纸裹数重。火内煨熟。五更初细嚼米饮下。平明利下积水为度。利后吃粥助之。如只患左腿。用左边腰子。患右用右。药末只用一钱。即年久。服之得效。

卷三

头痛

〔风热上攻头目昏痛〕黄芩。（一两。酒炒三次。不可令焦。）川芎。（五钱）白芷。（二钱五分）荆芥。（二钱）芽茶。薄荷。（各一钱半）为末。每服三钱。清晨调下。如头巅及脑痛。

加细辛 本。蔓荆子。（各一钱半）或煎服亦可。

〔伤风头痛〕白芷切片。以萝卜汁浸透。搐入鼻中即止。

〔湿热头痛〕痛时头重如山。脉细是也。麻黄根。（炒）苦丁香。（各五分）红豆。（十粒）羌活。（炒）连翘。（各二钱）为细末。搐入鼻中效。

〔痰厥头痛〕其痛如裂。头旋眼花。目黑不敢开。如在风云中。烦闷恶心。厥冷不得安卧者是也。川芎。细辛。南星。（火炮）橘红。茯苓。（各一钱）半夏。（二钱）枳实。甘草。

（各〔寒湿头痛〕
苏叶。川芎。花椒。雨前茶。葱头。水煎。熏头一刻服下。多盖衣被。

汗出即愈。

〔血虚头痛〕
起自鱼尾。上攻头痛。日轻夜重也。当归。川芎。（各等分）每服二三钱。

水煎服。产后头痛。服之即验。

〔气虚头痛〕
耳鸣九窍不利。或因病后而起者。人参。茯苓。炙甘草。（各一钱）白术。

（土炒二钱）加生姜。（三片）枣二枚。煎服。如连巅顶痛者。加

本。防风。（各一钱）柴胡。

（三五分）
〔头痛连睛痛〕
石膏。牛蒡子。（炒）各等分为末。清茶食前调下三钱即止。（眉棱骨痛不可忍）

防风。羌活。（各三钱）黄芩。（酒炒一钱。冬不用。如能食而热痛者加用。）

甘草。（三钱夏生用。冬炙用。）每服三钱。水煎食后服。

〔半头痛〕熟石膏牛蒡子。（各三钱为末）酒调随量饮醉。取汗即愈。香白芷。

天南星。（炮制。各一钱。）川乌。制半夏。（各八分为末）每服一钱。水调服。妇人加甘草一钱。

〔诸头痛〕生萝卜汁一蚬壳。仰卧注鼻中。（左痛注左。右痛注右即效。）

〔风热痛〕川芎。白芷。石膏。（
）荆芥。（各等分为末）每服一二钱。白汤调下。

以好为度。

〔头风〕头连筋痛。受风即发。恶心呕吐。偏左者属风与血虚。或属火也。偏右者痰与气虚。或属热也。左右皆痛者。气血两虚也。不拘偏正远近。用白芷。川芎。（各三钱）

黄牛脑子一枚。同药入臼捣匀。加酒煮熟食之。尽量饮。睡后酒醒。其患若失。羌活。（一两半）独活。（炒一两半）赤芍。（一两）白芷。菖蒲。（各六钱）俱为末。葱头煎浓汤调涂。

药到痛止。石姜树叶煎汤频熏洗。或用荆芥蔓荆子作散皆效。或用荆芥（焙燥研末）每日服二钱。豆酒下。或用羊粪为末。搐入鼻中亦效。鹅儿不食草。（牵藤丫枝有一粒。小子者真。阴干。）研末吹入鼻中。连打数嚏即效。

〔头风煎药〕
痛在左属风者。荆芥薄荷之类。风热者用荆芥。白芷。麻黄。（各一钱）

陈皮。（八分）苍术。（米泔水浸一钱）甘草。（八分）水煎服。血虚者。川芎。当归。（各三钱）荆芥。黄芩。（酒炒）防风。白芷。薄荷。蔓荆子。（各一钱）水煎服。头风在右属痰。

苍术。半夏之类。
湿痰头风。酒芩。（三钱）苍术。（四钱）川芎。细辛。（各一钱半）甘草。

（一钱）为末。姜茶搗匀调服。

头风属火。酒芩。（二三钱）陈皮。半夏。茯苓。薄荷。

川芎。

细辛。（各一钱）甘草。（五分）水煎服。

〔头风年久不愈〕
痛甚者。用玄胡索。（七枚）青黛。（二钱）牙皂。（二个去皮子为末。）

俱研细。水和丸。如杏仁大。每用水化一丸。灌入病患鼻内。随左右咬钱一枚。当有涎出成盆而愈。

〔偏头风〕蓖麻仁五钱。黑大枣十五枚。（去核）同捣烂涂纸上。用箸一只卷之。去箸纳鼻中。良久取下。清涕即止。

〔头风发晕〕苍耳草叶。（晒干为末。蜜丸桐子大。）每服二十丸。十日愈。

〔头风白屑〕桑灰汁沐之。或用山豆根油浸涂之。皆效。

〔头上白秃〕
大鳊鱼捣烂敷之。或用生鹅油涂头上。将旧鞋底洗净烤热擦之。去白皮。

一连数次。不可洗去即愈。如不生发。用枸杞煎汤饮。生半夏磨汁涂之。

〔诸头眩〕
风热头眩。用薄荷。川芎。（各一钱）荆芥。（六分）羌活。白芷。炙甘草。

（各五分）细辛。防风。（各三分）水煎服。痰火眩晕。用大黄酒浸九蒸九晒。为末水丸。

如绿〔乌须黑发〕茄树上留茄一个。挖一洞。将上好京墨二钱嵌茄内。用纸封好。留在树上。待茄老取下烧灰水调。将指头蘸灰搽上即黑。永不退。勿沾肉上。

〔妇女乌发丹〕侧柏叶。（一握）核桃。（一个）榧子。（三个）同捣烂。用滚水泡待凉搽发。频年不断。至老黑而不秃。

面病

〔附脱颧〕

〔头面癣疮〕 生白果仁。切断频擦即效。
日久者。用黄柏末。黄丹。烟胶。（各等分。同研细。）香油调涂。

〔面上暴生疮〕

杏仁。（研细。）以鸡子清调如煎饼。至夜洗面后敷之。旦仍洗去。数十次效。
生小疔。用生半夏。面。食盐。（各等分。同细研）醋调敷。

〔抓破面上皮〕 生姜自然汁调轻粉敷之。无疤。

〔两颧骨红疮〕

初如细斑。久则成堆。白藜。白芷。（等分。炒研末存性。）盖烛油。

黄蜡。同药末熔化。调匀搽上即退。

〔面上雀斑〕 鹰粪白水调敷之。并治疮疤。

樱桃枝。紫背浮萍。白梅肉。牙皂各等分。焙干为末。洗面时和水擦之渐退。
绿豆。（生磨细八两）白芷。白僵蚕。（各二两）防风。

滑周身白屑。皮肤作痒。若面生黑点如芥者。鹿角烧灰猪油调涂。
黑牵牛。（研细末。）鸡子清调。夜敷旦去。皆效。

〔面上肺风疮〕 鹿角尖。（无灰酒磨浓。）频涂即退。

〔腮〕 靛青花涂之即消。如无靛用大黄。（生研细末。）葱汁调涂立消。
赤小豆研末。米醋调敷。常以醋润之即消。

〔两腮红肿〕

百合。（一个）山芝麻根。（去皮）贝母。元明粉。（各一钱）银朱。（七分）

加白面调敷。口含白梅置腮边。良久吐涎出肿退。

〔脱颧〕 起于肾肺虚损。元神不足。或笑谈高兴忘倦。一时元气不能接续所致。患者平身正坐。令人以两手托住下颧。向脑后送上关窍。随用绢条兜颧于顶上。或口含乌梅一个即上。或用南星末姜汁调涂两颊。一夜即上。须避风。如虚损不足者。宜速服煎剂。以免风邪外受。毋致痰涎壅盛。口眼歪斜。而风中脏腑。十无一瘳矣。制附子。（六分）僵蚕。（酒炙）当归。（各二钱）人参。制半夏。茯苓。（各一钱五分）陈皮。（一钱）炙甘草。（三分）

川芎。（

耳症

〔治耳暴聋〕全蝎去尾毒为末。酒调滴入耳内即效。
芥菜子捣碎。入人乳和丸。绵裹塞耳内。数易即通。
骨碎补削作条。火炮乘热塞耳中亦效。聋久不效。大蒜一瓣。中剜一孔。以巴豆一粒去皮膜。火炮极熟。入蒜内。用新绵包定。塞耳内三次效。白蒺藜。（半生〔气闭耳聋〕甘遂一寸塞耳中。甘草一寸口噙即通。

〔鼻塞耳聋〕柿饼三枚切细。加粳米三合煮粥。空心食之。

〔虚聋〕茯苓。（二两）山药。（炒三两）杏仁。（炒一两去皮尖）俱研细。用黄蜡十两熔化为丸。弹子大。盐汤嚼下。（或只用黄蜡一味。细嚼。点好茶送下亦效。）

〔病后耳聋〕石菖蒲捣汁滴入耳。或用叶揉软塞之。

〔耳中虚鸣〕全蝎。（十四个）麝香。（少许）薄荷。（十四叶。裹香蝎瓦上焙燥。）研极细末。滴水捏作锭子。塞耳内极效。

〔耳中常鸣〕生地黄煨熟截段。塞耳中。日数易即效。

〔耳痛〕杏仁。（炒黑研碎）加葱白捣捏枣核大。塞耳中。数易即效。
耳痛不可忍者。

用磨刀铁浆滴入耳。极验。鲜薄荷叶。同蜗牛捣汁。滴耳中。即效。

初痛。用油胡桃绞汁。滴入耳。即止。

吴茱萸。大黄。乌头尖。共为末。贴足心。引热下行即止。耳内忽大痛。如有虫在内奔走。或有血水流出。或干痛不可忍者。用蛇蜕皮。（烧存性研细。）以鹅毛管吹入耳中。立愈。耳内肿痛者。用番木鳖磨水。滴入耳。即愈。

连外根肿痛者。蚯蚓泥调涂。

〔耳根肿痛〕

连腮齿太阳俱痛不可忍者。大黄。（一两）青木香。（三钱）姜黄（三钱）

槟榔〔三钱〕共为末。醋蜜调匀。贴患处。中留一孔出气。

赤小豆木鳖子研末。鸡蛋清调涂立止。

〔耳内出血〕 蒲黄。（炒黑研细）吹入。或用龙骨。（枯研细）吹入。即止。

〔耳内肿痛出脓及黄水〕 枯矾。（五分）胭脂坏。（烧灰二分）麝香。（五厘）陈皮。（烧灰五分）共研细。先有菖蒲根汁。（和熟水）以棉杖将耳内脓水洗净。再以新棉杖蘸药引入耳中。即愈。

凤凰衣。（即鸡雏壳内衣。）炒黄为末。香油调灌。即止痛。

日久不愈。铜香炉盖上香烟结成块者。配轻粉研匀。吹入耳。或用人牙存性。加麝香少许吹入。圆眼壳。（烧灰存性。）研细吹入。夏月加冰片少许。或用五倍子烧灰吹入。皆效。

〔耳烂〕 贝母。（焙炒研细）干糝入。即效。

久烂耳聋。取大鼠一枚。立时热水泡死。

剖取胆汁滴入即效。迟则胆化。

〔耳冻〕 茄蒂煎汤乘热多洗。或用胡椒煎汤亦效。至春夏用生姜自然汁熬膏。揉散血块。冬月不再发。或用桑椹捣汁甚效。

〔诸虫入耳〕

葱汁。韭汁。桃叶汁。人乳。鸡冠血。猫尿。（以姜擦鼻即尿）止用一味。

灌之即出。或用火熨桃叶塞耳。或善取耳用长箝夹出之捷也。

苍蝇入耳。生鳝鱼血滴入即出。蜈蚣蜒蝥入耳。用鸡一只去毛油煎熟。以箸穿孔枕之即出。或用牛乳入耳。误吃蜒蝥者。多服牛乳即化。

马蝗入耳。以黄泥作枕即出。飞蛾入耳。用酱油滴入即出。

蚤虱入耳。用菖蒲为末炒热。以绵裹着耳边。或作枕即出。

目疾

〔总论〕 其症虽曰七十二种。大约红为热。白为冷。痒为风。涩为毒瓦斯之作也。风则散之。热则清凉之。冷则温补之。气结则调顺之。切不可刀针点割。偶得小愈。出乎侥幸。

倘或不然。终身之患。又不宜过用凉药。恐冰其血凝而不流。致成痼疾。当谅其老少体气虚实治之。又有肾虚者。亦令眼目无光。或生冷翳。补暖下元。益其肾水自

愈。孩童之患眼。

有实无虚。多热无冷。勿用吹药。恐血气未定。致伤其目。宜以败毒药治之。（凡目疾者切忌浴。令人盲。犯房事者必生内障。）

〔目疾通治〕 荆芥。羌活。甘草。甘菊。防风。本。黄芩（酒炒）当归。山梔。赤芍。

白芷。乳香。没药。（各一钱）全蝎。（三个）水煎空心服。目疾初起。服二三剂。立效。

〔眼痛〕 鸡肝。（不落水者一个）芙蓉叶。（烘燥。研末二钱。）肉果末。（五分）龙胆草。

（〔风火赤眼肿痛〕 大菜头一个。（切去盖。剜中心。作一孔。）又生黄连末三分。仍用盖住签定。慢火煨熟取出。以菜头中水冷滴入目中即愈。
猪胆一个。古钱三文。同置盏内蒸干。取胆丸粟米大。安眼角中即效。内服方当归。黄芩。连翘。甘菊。山梔。生地。（各一钱）赤芍。柴胡。川芎。防风。龙胆草。桔梗。（各八分）黄连。（六分）甘草。（五分）

加灯心二十根。水煎服。患赤目以热水濯足佳。若澡浴必至失明。切忌食犬、鸡、鱼、鹅、鸭、蛋。勿用冷水洗。

〔暴发肿痛〕 青布一块。（水浸洗令干）另用生姜汁。白矾末。将布蘸搭眼胞上。闭目少顷。泪出痛止。

〔一切目疾痛痒血风〕 生羊胆一个剖开。入蜜。用线扎。揉匀。入滚水内一二沸即取出。冷水浸半日。将胆内汁入瓶中。点眼 流泪即愈。
杏仁。（去皮尖研）人乳浸蒸汁。

点眼最效。

〔目珠至晚疼甚〕 夏枯草。香附。（各二两） 共为末。每服一钱五分。清茶调下。

服三四日即效。（盖夏枯草治厥阴目痛如神。）

〔眼胞肿大如拳〕

霜梅。（三个去核）白果。（七个去壳）青铜。（五分）共捣成饼。

置瓷器内。用井华水浸一宿。用绵纸滤去渣。（用古钱蘸洗之效。）

〔目中多泪〕

鲫鱼胆。（七个）人乳。（一盞）和匀。饭上蒸透。点眼一二次即止。

〔冷泪〕

菊花。密蒙花。石决明。白芍。甘草。木贼。白蒺藜。（去刺）各等分为末。

每服自一钱二分起。渐加至二钱止。茶调下即效。凡眼昏暗。或流冷泪。子后初醒。未曾开言〔迎风流泪〕蕲艾一团。（烧烟熏瓷碗内以黄色为度。）加黄连一撮。枯矾少许。再滴温水碗内。用五铢钱磨匀。洗一二次即愈。
年久不愈。用炉甘石。（绿色者一钱数次）

海螵蛸。（五分）冰片少许。共乳研极细。点大角数次即收。（勿使入眼珠内为妙。）

〔烂弦风〕

眼眶湿烂红赤。二蚕砂。（真麻油浸二三日）取起研细涂患处。不问新久。

大人小儿。一二次即愈。名一抹膏。

红枣二枚。明矾。（二三分）铜青。（二三分）水半钟。

蒸熟。频搽即效。

〔风痒冷泪烂弦有虫〕生姜。（一块）银簪插入即拔出。点眼两角效甚。

〔年久烂弦风眼虫痒〕

覆盆子叶。（手揉碎取汁）用皂纱蒙眼。取笔画眼眶于纱上。

然后滴药汁先渍眼下弦一时。虫从纱中出。下弦愈。数日照前法再渍上弦。（按覆盆治眼暗不见冷泪浸淫等症。取此草晒干。研细绵裹。以人乳汁浸一二时。用点眼中。即仰面卧。不过三四日。视物如平时。忌食油酒面。）

〔烂弦倒睫〕青矾。（火出火毒）研细泡汤澄清。点洗二三次即效。

〔眼内翳障〕

蕤仁。（一两去油净）硼砂。（一钱）麝香。（三分）共研极细。入瓷瓶内。

临用点眼。以好为度。神效。

如赤筋缠瞳仁。用白丁香。（研极细）以初胎生男儿乳调点。

食盐。（取雪白者生研如尘。）以粗灯草蘸盐少许。轻手指定浮翳。点上三次即没。亦不疼痛。

内服。夜明砂。当归。蝉蜕。木贼。（去节。一两）共为末。用黑羊肝。（四两）水煮烂和丸。如桐子大。每服四五十丸。食后温汤下。服之百日后。明如旧。皆仙传也。

〔一切云翳雾膜遮睛〕
鹅不食草研塞鼻中。频频更换。时时自搔其鼻。五日可以复明。

亦大治赤眼。雀粪。（小直者。）以人乳和敷目上。并治赤脉贯瞳仁。及肉青盲眼。点之极效。猪胆皮晒干。作两股绳如箸大。烧灰出火毒。点之亦效。

〔目中风翳作痛〕取薤白截断安膜上。少顷去之。数次痛止膜去。（按薤白味辛。能散血行气。故可以去膜。）

〔青盲不见〕
小青草晒干为末。每日以不落水猪肝一块。入草末五钱。用无灰酒同煮。

单食猪肝。饱时服半月。即效。诸葛菜子六升。蒸之气遍取下。以釜中热汤淋之。乃晒干再淋。再晒三次。杵为末。饱时清酒服二三钱。日两服。并治虚劳目暗冷泪眼障。十得九愈。

〔青盲雀目〕雀目即鸡盲。至夜不见物。谷精草。（一两）羊肝一具。勿犯铁器。入瓦罐内。水煮熟。食羊肝。以好为度。（小儿同治。如小儿不肯食。则焙干为丸。）石决明。

（入炭火存性）夜明砂。（淘净瓦上炙黄。各二钱。）谷精草。（二钱）共为细末。用不落水猪肝一块。将竹刀切肝为两片。夹药末于内。用麻皮缚之。米泔水一碗入瓦罐内。煮至半碗。

临卧连肝连汁饮。以好为度。

〔拳毛倒睫〕
木鳖子。（一个去壳为末）绵裹塞鼻中。左目塞右鼻。右目塞左鼻。即效。

先拔去毛。后用石燕子。（一雌。一雄。）磨水频搽。再用黄连汁频洗。则不复出

。内服黄连。

（酒炒）炙甘草。人参。（各一钱）归身。（一钱半）葛根。防风。（各五分）细辛叶。蔓荆子。（〔肉攀睛〕浮萍草研烂。入冰片少许。贴眼上效。白丁香。人乳调点最效。并治面上酒刺雀斑。

〔目中起星〕
初起用鹅不食草研烂塞鼻中。过夜即去。如韭菜根。橘叶菊叶。研烂。

俱须用绵裹塞鼻中。皆效。日久不去者。用象牙细磨汁。频点眼角即去。

〔肾虚目暗〕
或见黑光。照方常服自明。甘菊。熟地。（各二两）枸杞。（三两）山药。

（五钱）炼蜜丸桐子大。每服二三钱。空心食后服。
小红枣。十二枚。（冷水洗净去蒂。）

枸杞〔肝虚目翳〕凡气血虚者。眼白睛俱赤。海蚌壳。（火成灰）木贼草。（去节焙）各等分为末。每服三钱。姜枣同水煎和渣服。日二次即效。

〔眼生珠管〕鲜牛膝。（连叶同捣汁）日点三四次即退。鲤鱼胆取汁。入黄丹。（一二钱）和如膏。日点三五次即效。

〔疳眼〕珍珠草煮羊肝食效。（一名阴阳草。以其叶朝开而暮合也。）

〔眼目打伤青肿〕生半夏为末。水调涂之即愈。
眼内伤用羊胆。鸡胆。鲤鱼胆。（各等〔眼内生毒〕鸡嘴壳。（瓦上焙燥研细）加乳香。没药。麝香。（各少许）共研细。香油调敷眼眶上即愈。

〔斑疮入目〕
马屁勃。蛇蛻。（各五钱）皂角子。（十四粒）共入瓦罐内。盐泥固济。

烧存性研细。每服一钱。温酒食后服。

〔飞丝入目〕（春天风高之时有之。每从上而下者是。）
红肿如桃。不拘三五日皆治。

篋下头垢少许。揩入眼角内即出。亦治赤肿。芥菜汁点之立效。
刺鸡冠血滴入眼内。捉去丝即效。细刮指甲末。唾津和点。其丝自聚。拔出即效。

菖蒲研碎入鼻孔内。左患塞右。右患〔蛛丝入目〕
京墨磨浓。新笔点眼角内。少时轻手抹眼即出。如丝未出。再以墨点之。

别物皆治。

〔一切物入眼中〕 细刮指甲末。津唾调。用灯草点上即出。
东墙上马齿苋。（晒燥烧灰研细。）点 头少许即出。

〔麦芒入目〕 煮大麦汁洗之即出。

〔眼生偷针〕 如左目。以红丝系扎右手中指节根。如右系左。一宿即愈。

〔眼皮上生瘤〕 樱桃核磨水搽之。即渐渐日消。

鼻症

〔鼻渊〕 即脑漏之渐。因风寒凝入脑户。与太阳湿热交蒸。乃成其患。鼻流清涕。或流黄水。点点滴滴。长湿无干。用白芷。（一两）苍耳子。（炒）辛夷仁。（各五钱五分）薄荷。

（鼻。二三次即愈。江鱼牙。（
存性研细）去鼻中清水仰卧。吹入一二分入鼻中。再以一两。

（研细）茯苓。（一两）共研匀。每服三钱白汤下。
鼻中时时流臭黄水者。有虫入脑中。

治法。用丝瓜藤近根三五尺。（晒燥烧存性研细。）每服一钱。温酒调下。以好为度。

〔鼻塞不通〕
不论外感症。及内火炽盛。用通草。细辛。炮附子。（各一钱）研细。

蜜丸。绵裹塞鼻中立通。 菖蒲。牙皂荚。（各一钱）研细绵裹塞鼻即通。

〔鼻生息肉〕
凡息肉之患。乃因食积胃中。热痰流注。宜内服消痰之剂。再加外治。

可以效捷。用瓜蒂。细辛。（各一钱研细）绵裹塞鼻中。以好为度。藕节。（有根处一段。

烧灰存性。）研细吹患处立效。

〔鼻痔〕 苦瓜蒂。（四钱炒）甘遂。（炒二钱）枯矾。螺蛳壳。（）草乌尖。（各五分）

共为末。麻油调作一团。每用一丸。入鼻内点痔化为臭水。一日一次自烂下。

〔鼻疮〕 百草霜。（研细三钱）冷水调服。杏仁。（去皮尖研细）人乳汁。调和搽之。

桃叶嫩心捣烂塞之即效。

〔酒渣鼻〕 硫黄。（用豆腐水煮三次净研二钱。）轻粉。（一钱）密陀僧。（一钱）白芷。

（一钱）杏仁。（五分）共为末。以津唾调搽。年久不愈。用大黄。朴硝。共为细末。津唾涂之。内服苦参。当归。（各净末四两和匀。）酒糊为丸。桐子大。食后热茶吞八十丸。药尽即愈。连翘心四两。每用二三钱。泡汤当茶吃即愈。凌霄花。山梔子。等分为末。每服二钱。清茶调下。日二服。

口舌

〔总论〕 凡肝热则口酸。心热则口苦。脾热则口甘。肺热则口辛。肾热则口咸。胃热则口淡。口臭。

〔口疮〕 黄柏。（炒）蒲黄。青黛。人中白。（各等分）为末敷之。陈年白螺蛳壳。

（烧灰存性。）加儿茶。冰片。少许。同研细。吹患处一二次即效。不能饮食。用五倍子。

（研细末。）糝之。便可进食。如口疮饮食不进。服凉药不愈者。乃中焦土虚。相火冲上无制。须服理中汤。（人参。白术。甘草。黑姜。）补土之虚。干姜散火之

标。甚则加附子。或口噤官桂方愈。
或用黄连。干姜。（各等分）研细搽上。流涎即愈。
捣生姜自然汁漱口数次。涎出即效。烧青钱二十文令赤。投酒中服之。立效。

〔口疳疮〕 红枣十枚。（烧灰存性。）加冰片二分研细。吹患处即效。

〔三焦实热口舌生疮〕 黄芩。（春四两。夏秋六两。冬五两。）黄连。（春四两。夏五两。秋冬三两。）大黄。（春三两。夏一两。秋二两。冬五两。）各炒研为末蜜丸。桐子大。

每服五七十丸。食远白汤下。即三黄丸。（药末麻油调。涂一切热疮甚效。）
用吴茱萸研末。

醋调涂足心一夜。引火归下即愈。凡口疮无论新旧。夜卧时将自己两肾子以手拉紧。左右交手揉三五十度。但于夜卧觉时即行之。因酒而生者一夜即愈。久病者三五夜即效。

〔口破〕 滑石。（一钱）辰砂。（三钱）冰片。（二分）研末糝上即效。（忌水漱口。并治鹅口。）如跌破者。用象牙或象皮刮细末敷之。

〔口烂〕 生明矾。（研极细）敷之立效。或噙良久。以水漱之再噙。久烂不愈者。

人中白。（
）真铜绿。杏仁。（各等分）加冰片少许。共为末敷患处。并治小儿走马牙疳。

〔口唇肿痛〕
痛不可忍。胃中风热也。用瓷锋刺破出紫血。以古铜钱磨猪油搽上即消。

大黄。生研细。用猪胆汁调涂即效。

〔口唇燥裂〕 青皮烧灰猪油调涂效。
橄榄泡汤服。核中仁研烂敷燥处。或胭脂敷之皆立效。
燥裂出血者。用白梅花瓣。贴患处立效。以上之方。唇疮同治。

〔口臭〕 香薷煎浓汤。稍稍含之。并治口上出血。
连翘为末泡汤当茶饮。多服即效。

儿茶。（四两）桂花。硼砂。薄荷。（各五钱）各研细。用甘草三两熬膏。入药末为丸。口中噙化。白僵蚕。（捡直者。新瓦上焙干断丝。）为细末。用少许敷上。

吐涎出即愈。

〔木舌〕涨大满口。肿胀坚硬。语言不利。或胀退场门。乃因心火妄动。结热于舌。不急治即杀人。白矾。百草霜。各等分为细末。用糟茄自然汁调服。如无茄以白酒调服。不能进药者。用真蒲黄。（研细调稀。）频刷舌上。其肿自退。或用针砭出血。稍退后。急用黄连。

（通。薄荷。黄连。牛蒡子。（各一钱）甘草。（五分）灯心。（二十根）水煎。食后服。忌食煎炒半月。不再发。（如用针。舌下不可妄刺。）

〔舌胀退场门者〕
蓖麻油涂绵纸上。即将纸作拈（三五个）点着。旋即吹灭。以烟熏之。

良久即消。舌出寸许者。以梅花冰片一钱。研细敷舌上即入。皆奇验方。

〔重舌〕
舌尖叠浓为重舌。牙皂角。（不蛀者四五挺。去皮核炙焦。）荆芥穗。（一钱）
共为细末。以米醋调涂患处。即消。

〔舌木不知味〕
黄连。（酒炒研细）米糊为丸。每服五七分。重者一钱。白汤食后下。
数服即效。

〔舌上出血如簪孔〕香薷煎汤服。发灰二钱。米醋调敷出血处。
槐米。（炒研为末。）糝上即止。仍用。（人参。甘草。麦冬。）补之。

牙齿痛

〔总论〕
大凡齿牙疼。属手足阳明胃经之风热上侵。虚火上炎而发者。有热。有风。
有寒。有虫。有湿热。皆能作痛。清火除热诛虫之法。备列于下。

〔风热牙痛主方〕
石膏。（三五钱。年壮火盛者生用五七钱。）荆芥。防风。丹皮。

（各一钱）生地。（二钱）青皮。（六分虚弱者勿用）生甘草。（五分）如上正四门牙痛属心火。加黄连。（炒八分）麦冬。（一钱半）下正四门牙痛属肾火。加知母。（盐水炒）黄柏。（炒各一钱）

上两边虎牙痛属胃火。加白芷。（八分）川芎。（一钱）下两边虎牙痛属脾火。加白术。（八分）

白芍。（一钱二分）上左边尽牙痛属胆火。加羌活。胆草。（各八分）下左边尽牙痛属肝火。

加柴胡。（八分）黑山栀。（一钱）上右边尽牙痛属大肠火。加大黄。（酒炒）枳壳。（各一钱）

下右边尽牙痛属肺火。加黄芩。（酒炒）桔梗。（各一钱）按经加药。再加灯心草根。水煎。食远温服三剂即愈。忌油腻、煎炒、鸭蛋、糟、醋、等物。

〔牙痛清胃汤〕石膏。（三钱）生地。（三钱）黄连。（一钱）丹皮。当归。（各一钱五分）升麻。（五分）水煎服。凤头荔枝一个。（或桂圆亦可。）将壳上开一孔。入盐填满。（火烟尽出火毒。）研细搽痛处。略含片时。再以防风。甘草。细辛。浮麦。（各一钱）煎汤漱口即止。如风虫牙痛。加花椒同煎。

〔风火牙痛〕黄连末同生姜捣烂。塞痛处即止。香薷蒂捣碎。浸湿贴痛处即止。粗碗一只用薄荷铺底。樟脑盖面。覆碗一只于上。盐泥封固。文武火一炷香取出。研细出火毒。每用一二厘擦牙根即止。如虫牙用川椒铺底。白蒺藜一钱。冰片半分。同研细。痛时擦之。

〔虫牙痛〕韭菜子煎浓汤漱之。虫自出。贯众一两。以米醋两碗多煮如左牙痛侧左边。右痛右。不宜吃。松脂烘软塞孔中。少顷虫出在脂上。五灵脂如米粒大三粒。

令咬在疼牙上。少顷以温水漱出小虫即止。

〔虚火齿痛〕诸药不效。用人参二三分贴患处。即止。附子五七分研末。以津唾调涂足心。引火归原。即止。

〔擦齿至验方〕无论风火虫痛。初用生明矾。（六两）生石膏。（四两）共研细。早晚擦牙。（一料擦完。矾加二两。石膏减二两。渐渐用生矾一味。）常年不可间断。终身无牙痛之患。风牙诸药不效。用凤头荔枝连壳烧存性。擦牙至验。

〔取痛牙法〕

白马尾。（烧灰存性）用新笔蘸一二厘。点牙根上即落。勿沾着好齿。腊月取大鲫鱼一尾。用白砒。为细末。装入鱼腹中。挂当风处。其霜吐出鳞上。扫下收之。每用半厘点在牙根。即刻自落不痛。

〔牙宣血〕 经霜丝瓜筋火 存性。研细擦上即止。苦竹茹以醋浸一宿。含之即止。牙宣而痛甚者。用丝瓜藤一握。川椒一撮。灯心一把。水煎浓汁。漱吐即止。牙缝出血不止。用纸燃蘸蟾酥少许。插入出血处立止。

内服薄荷。花粉。连翘。桔梗。参玄。木通。葛根。（各一钱）甘草。（五分）水煎服。凡牙宣服凉药不效者。又宜滋肾水。泻相火。即愈。（外以香附同青盐炒黑色为末擦之。）

〔虚火牙痛出血牙龈痛痒〕

骨碎补。（二两炒黑色为末）早晨漱久吐出。临睡再擦勿漱。

候津满口咽之即愈。骨碎补。（捣烂豆大一团。）用绢包塞牙痛上立止痛。

〔鹅口牙烂〕 满口黄皮肿烂。鹅口皮。（三个）儿茶。马子碱。（研）各等分。加冰片二分研匀。搽上自愈。凡牙龈烂不论大人小儿。用人中白研掺上最效。

〔牙痛灸法〕

独大蒜。（一个）蓖麻子。（七粒）樟脑。（一钱）同研碎敷在大指根背上穴。

（左痛敷右指。右痛敷左指。）痒即去之。不论风火虫痛。皆效。大蒜铅粉同捣烂。照法敷灸。治牙痛甚效。

咽喉

（附骨哽）

〔总论〕

单乳蛾者。谓肿于咽之一边。双乳蛾者。谓肿于咽之两旁也。其形圆突如珠。

乃痈疔之类。结于喉间。宜刺之出毒。或出血而愈。缠喉风即满片红肿。多不成脓。亦不出血。但使火降。其肿自消。

锁喉风者。以咽喉肿痛。饮食难入。或痰气壅塞不通者。须吐出痰涎。喉癖症。凡阴虚劳损之人。多有此病。其状满喉生疮。红痛。久不能愈。乃水亏火上炎也。

〔通治风热上壅咽喉肿痛〕甘草。（一钱）桔梗。（二钱）荆芥穗。（一钱半）以三味为主方。加防风。连翘。牛蒡子。薄荷。丹皮。（各一钱）小生地。（二三钱）灯心甘根水煎服。

（初起〔一切肿痛喉闭吹药〕薄荷。（一两另研为极细末。）硼砂。（二钱五分）僵蚕。（直者五分。瓦上炙焦研。）儿茶。（一钱）牙硝。（七钱五分）雄黄。（二钱）冰片。（三分）俱研细和匀。贮瓷罐内勿泄气。用芦管挑末少许。吹入患处。或以茶匙挑入舌上。噙一会咽下。日八九次即愈。或用山豆根口中噙汁。下咽即效。

〔喉闭〕

饮食不通。危急欲绝者。紫金锭。（即太乙丹须真药料者佳）薄荷汤磨服五分。

缓缓灌下。喉间即通。重者两服。屡验神效。巴豆取油。涂竹纸上合满。作纸燃点灯。旋吹灭之。令患者张口。以纸燃烟熏刺喉间。吐出紫血即通。

凡肿痛喉闭。初起用络石一味。水煎服下即效。

或用牙皂荚。（去皮筋）白矾。黄连。（各等分）新瓦上焙干为极细末。

（出火毒。）芦管吹入少许即愈。

凡喉闭至急。仓卒无药。急将病患两臂。以手勒数十次。

取扎发绳扎大拇指如放痧法。以针刺指背离指甲一分许。紫血滴下即解。（乳蛾同治。）

〔喉闭连牙关不开〕巴豆七粒纸裹油。将油纸作条烧烟。熏入鼻内。牙关即开。再用箸点雄黄胆矾末入喉间。吐出涎痰立愈。白矾〔三钱〕慢火熬化。入去壳巴豆研烂者两粒。候干。去巴豆取矾研细末。用少许吹入喉中。吐出顽痰立愈。真陈胆星一粒许。含口内即通。一切喉闭。无论轻重。紫金锭为最效。宜多吃悉尼汁和泉水一半和匀饮。或绿豆煎数十沸。（以豆未开花即取起。用豆皮上绿性凉解。）入蜜少许。频吃甚佳。如无此二味。以萝卜汁和泉水。入玄明粉少许。搅匀。徐徐饮之。既可消痰。又能清火。皆妙法也。咽喉十八症。皆属火热内结而成。俱宜凉药治之。惟隔阳咽闭。（火虚于下。格阳于上。寒热相搏而成喉痹。其脉细数而微。声似不能振者。方是此症。）大附子一个。（去皮脐。切作大片。

用蜜涂炙令黄。待冷含口中。津咽甘味。淡即易之。脉症不对勿用。）

〔单蛾双蛾〕鸡蛋清半钟。入明矾末三钱。调匀。仰卧以茶匙锹入口。着喉即解。兰根捣汁滴入即效。冬月取青鱼胆入研细胆矾二钱。（阴干研末。贮瓷瓶中。）如遇此症。吹少许入喉。吐痰立愈。至重危急者。用壁上蛛窠七片。（内取活蛛二个。团作一处。）以白矾一块。（七分）化开。以窠惹矾存性。出火毒。加灯草灰。（取灰。用竹筒内烧草闷灰。）和匀。吹少许入喉中。即破。人指甲。（一二个。）瓦上炙黄色。研细末。吹入喉中立效。双蛾至急者。用麻雀粪二十一粒。砂糖和作三丸。每用一丸。绵裹吞咽立愈。甚者不过二丸。有奇效。一时无药或有药不能进者。用干猪尿脬一个。水润套指上蘸生桐油少许。入喉搅吐。得吐即解。或用温汤半碗。加入桐油三四匙和匀。用硬鹅翎蘸油探入喉中。

连探四五次。其痰吐出。再探再吐。须以人苏醒声高为度。再服清咽利膈之剂。凡急症通后。略进薄粥半碗。压下邪热。不致再发。忌食热物硬物。

〔帝锤垂下〕（即喉间小舌垂下）以食盐。（雪水淋炒枯出火毒。）频点患处即消。或加枯矾少许。如状悬痈肿痛用射干。炙甘草。（各五钱）川升麻。大黄。木鳖仁。（各二钱五分）

杏仁。（去皮尖炒微黄五钱）俱为末。蜜丸小弹子大。常含一丸津化。

〔喉癖〕冰片。西黄。（各一分）胆矾。（三分）大硼砂。（八分）山豆根。（二钱）雄黄。

儿茶。（各八分）陈白梅。（去核三个）共研末。次将白梅捣烂。入药和匀，丸如芡实大。

临卧含口内。过夜即消。再用兰花根捣汁。时时漱之。头胎黄牛粪。以新瓦洗净盖粪周遭。

用文武火。烟尽存性。研末。将芦管徐徐吸入自愈。多年芥菜卤埋地中者。每服数匙。

并时时漱口。（嘉兴城中大家藏此者多。）

〔梅核气〕喉仲介介如梗。吐之不出。咽之不下者。用栝蒌仁。青黛。杏仁。海蛤粉。

桔梗。连翘。各等分为末。炼蜜和姜汁少许丸。如芡实大。时时含化。

〔虚火上炎伤肺咽喉生疮破烂〕 黄柏。（为末蜜丸炙数次以熟为度研细一两）
硼砂。

僵蚕。（各一钱半）牛黄。（三分）冰片。（半分）俱研细和匀。蜜调如稀糊。涂敷患处。或丸如芡实大。含化即效。

〔喉烂至宝丹〕 人中白。（自制者佳。取多年尿壶。或尿坛经风日晒者。击破去其浮垢。刮下白色硬碱。在新瓦上
红。研细。再入水中。飞去浮腻。）每用五七分。白蜜和匀。

流入喉中。日二三次。重者一二钱。立效如神。并治一切大人小儿牙龈久烂不愈。烂久饮食不进。诸药不效者。立夏前池塘中取未变成形小虾蟆。（黑色而有尾者。）不拘多少。取起晒干研末。吹上即效。或取小虾蟆入瓷瓶中。以碗盖之。黄蜡化开封口。埋入地中。三四月成水。治喉以鸡翎时时润患处。奇效。并治一切痈疽肿毒。涂敷四围即消。
有因杨梅疮毒之后。喉烂不愈。又须照毒症重服土茯苓汤方愈。

〔缠喉风声不出〕 靛花。薄荷叶。等分为末。蜜丸弹子大。每服一丸。临卧噙化。

〔暴失音〕
公猪板油一斤。（熬净去渣。）白蜜一斤。（熬净去泛。）并和。再熬少顷。

入瓷罐内。冷定成膏。不时挑服。肺润即愈。
因热而哑者。天萝水空心温服。（方见痰嗽门。）

〔鱼骨哽〕 白饴糖切如枣栗大。吞之立下。
韭菜煮半熟。勿切断。吞下一束。即裹而下。
在喉刺痛。用威灵仙五钱。饴糖五钱酒水各一碗。煎服软化。鹿角屑含津咽之。

橄榄多服即化。诸药不效者。用贯众。（不拘多少。）煎浓汁一钟。二次服以好为度。以上之方。诸骨同治。如七日不出。烧鲤鱼鳞皮。以水服之。
已经入肚刺痛。煎茱萸汁一杯饮之。凡鱼骨。或误食竹木丝。即席间将鱼骨一根。或竹丝顺插入发辫中。不令人知即下。

或旁人代插。勿令患人知。颇有奇效。
又法用白面调稀糊。涂两膝盖骨。自然下。颇验。

〔竹木丝等物哽喉〕
丝绵扯长。将一头拌白糖。徐徐咽下。约下喉一二寸。待糖化尽。

渐将丝绵拖出。则所哽之物亦带出矣。铁斧磨水灌之即下。

〔猪骨哽〕 硼砂一块入口含化自消。贯众汁亦效。

〔诸兽骨哽〕 虎骨锉细末。水调徐徐咽之自化。

〔鸡骨哽〕

野苕根捣如泥。每用圆眼大鸡汤化下。（或捣汁服亦效。）鱼骨鱼汤化下、贯众汁亦效。

〔稻芒谷哽〕 多吃饴糖即下。或用鹅吊一足。取涎咽之。

〔误吞金钱及铜钱〕 初在胸胃哽痛不下者。先以砂仁。（研碎。）煎浓。徐徐饮下。

再以羊胫骨。（灰研细）每服三钱。猪油调服。服至从大便裹物而出为度。杉木炭烧红。

带红即研细末。砂糖调服三钱。日二三次。如肠中不能转送坠痛者。多吃青菜猪油。自然送下。

至〔小儿误吞针〕 先用虾蟆眼。（或用鸡眼。）一对。木通汤吞下。其针两头穿眼。立能吐出。或从大便而出。奇效。如冬天急不可得。大桑树下掘深二三尺可得也。出芽蚕豆。

半生半熟。捣烂。用韭菜汁为丸吞下。砂糖和黄泥为丸。令小儿吞下。皆能从大便中出。

〔小儿误吞钉〕 活磁石。（一钱）朴硝。（二钱）同研细。以熬熟猪油白蜜和稀糊。一顷吞下。次早即从大便中出。凡铁器皆可以此法治之。

〔误吞发绕喉不出者〕 将自己乱发烧灰。白汤调下一钱。

女科

凡妇女之症。惟经水与胎前产后诸症为异耳。余病与男子同。在诸科中参治之。

〔逍遥散〕

治血虚烦热。月水不调。脐腹胀痛。潮热咳嗽。当归。茯苓。白术。（炒）

白芍。（酒炒各一钱）柴胡。（八分）炙甘草。薄荷。（各五分）姜一片。水煎服。

〔经候不调〕或三四月不行。或一月再至。归身。白芍。黄芩。（各五钱）白术。（土炒）川芎。（各三钱）山萸肉。（一两五钱）俱为末。每服空心酒调二钱。日二服。白汤下亦可。

〔子芩丸〕

治四十九岁之后。天癸当住之时。每月仍行。过多不止。子黄芩。（四两。

米泔浸七日。须一日换泔水一次。至七日晒燥。如此七次。共浸四十九日。晒七次。）为细末。米醋丸。桐子大。每服三五十丸。空心淡醋汤或白酒下。服完全效。

〔经水久闭〕蚕砂四两。炒半黄色。入无灰酒一壶。于砂锅内沸过。取起。以瓷器盛之。去蚕砂。温饮数盏即通。室女数月不通。或寒热并作。或血滞腹痛。用雄鼠粪。（两头尖者。）炒研细末。温酒调下二钱。通即止。久闭不通。渐成症瘕气块者。香附。（一斤。

米泔水浸一宿晒燥。石臼内杵。去毛分四处。一用童便浸一宿。一用米醋浸一宿。一用酒浸一宿。一用盐水浸一宿。晒燥和匀。）蕲艾。（八两。米醋煮炒黄色。）俱为末。用米醋丸。

如桐子大。每服五十丸。淡醋或白汤下日进二服。以好为度。忌生冷、油腻等物。

〔血瘕〕

经闭结成血瘕。腹胁胀痛欲死者。水红花。马鞭草。（各洗净一斤）熬成膏。

配入当归。生地。川芎。白芍。（酒炒各二两）红花。没药。（炙去油各一两）延胡。五灵脂。

（各一两五钱）乌药。木香。（各一两）俱为末。和前膏。少加米糊为丸。桐子大。每服空心酒〔逆经〕久闭血从口鼻中出者。好陈墨水磨一杯服之。其血即止。次用当归尾。红花。

各二钱。水煎服。（或服韭菜汁甚效。）

〔血漏不止〕或一月两次。或逢期过多。槐花。（烧存性研末。）每服二三钱。食前温酒下。或盐汤下。子黄芩。（酒炒）白芍。（酒炒各一两）黄柏。（盐水炒三钱）龟板。（醋炙一两）椿树白皮。（酒炒七钱半）俱为末蜜丸桐子大。空心淡醋汤下。每服三钱。

〔血崩不止〕
不拘寒热。用莲蓬壳。（风干久者佳。）荆芥穗。（俱烧灰存性。）各等分。

研细末。每服二钱。米饮下。（并治血漏不止。）
白扁豆花。（焙干为末。）每服二钱。空心米饮入盐少许调下。

〔血崩如泉〕
老丝瓜筋。败棕。（或旧棕器洗净）俱烧灰存性等分。盐汤调服二钱。

至重不止者。乌梅。干姜。（俱烧灰存性）各等分为末。每服二钱。盐汤下。止后用藕节煎汤频服效。

〔风热血崩〕荆芥穗。（二两麻油灯上烧灰存性研细末）童便调下二钱。

凡血漏或血崩日久不止。用人参叶。每用一钱。泡汤服。连进五七服即止。

〔血崩小腹痛〕下血不止。兼小腹痛者。白芍。（酒炒一两）侧柏叶。（微炒三两）为细末。每服二钱酒调下。

〔血淋〕金针菜一斤。每日淡煮数两。任意吃之。自愈。青蒿子。（不拘多少。）研细末。同冬米饭捣烂成丸。每日早晨好酒送下三钱。轻则半月。重则二十日自效。但此药服后断产。如年少生育之女勿服。

〔白带〕因肾虚带下。破故纸。（炒燥研末。）每用八分。将鸡蛋一个开一孔。入药末内搅匀用纸封固。饭上蒸熟。空心食之。十次全愈。
石菖蒲。破故纸。（各等分）炒研细。

每服二钱。以菖蒲浸酒调下。鱼胶慢火炒为末。好酒下亦效。

〔内热血热白带〕
土沙参。（不拘多少。）炒燥为末。每服二三钱。每日早晨米饮下。

以好为度。
荞麦面。（炒焦研。）用鸡子清捣为丸。绿豆大。每清晨白汤下二钱。以好为度。

〔湿痰流注带下〕由此而下者多。风化锻石一两。白茯苓三两。米糊丸桐子大。每服二三十丸。空心米饮下甚验。（按锻石能敛。茯苓渗湿故也。累试有效。必用锻石乃可。）

〔白带年久不愈〕赤白带下。诸药不能疗者。贯众一个全用。（抹去毛。及花萼。）以米醋蘸湿。慢火炙熟为末。空心米饮下。每服二钱。累试甚验。能不再发。

〔安胎散〕治气血两亏。或肥而气虚。或瘦而血热。或脾胃素虚。倦怠少食。屡有堕胎之患。此名泰山盘石散。药味和平。兼养脾胃。人参。黄芩。（蜜炙）当归。续断。黄芩。

（酒炒）熟地。（各一钱）川芎。白芍。（酒炒各八分）白术。（土炒二钱）炙甘草。砂仁。（各五分）加糯米一撮。水煎。食远服。如觉血热者。倍加黄芩。少用砂仁。如胃弱者。多用砂仁。

少用黄芩。有孕之后。三五日进一服。四月之后。方无虞。宜戒欲事。节恼怒。忌酒、醋、辛热之物。勿服艾附热药。

〔小产神效膏〕久惯小产者。贴之可保。当归。（一两）生地。（八钱）白术。川断。

（各六钱）子黄芩。（酒炒）益母草。（各一两）白芍。（酒炒）黄芩。党参。（各五钱）生甘草。

（三钱）

用麻油二斤浸七日熬成膏。加（原缺）三四沸。入飞过黄丹。（七钱）（原缺）炒研搅匀。滴水成珠。入井中浸十日取出。红布上摊碗口大。贴丹田上。十四日一换。贴过八个月〔小产〕老雌鸡白煮食。约二十只。不再发。受孕后。用苧麻根三钱。糯米煮粥食。

一月五七次效。鲤鱼。（约二斤重者一尾。）用盐酱煮食。一月三次。并能长胎。丝绵一两。入瓷罐内。烧灰热酒冲饮。约七次服。

〔佛手散〕治一切胎气不安。或因病后。或因跌磕。伤胎子死腹中。或疼痛昏闷。或血上冲心。服之生胎即安。死胎即下。全当归。（五钱）川芎。（三钱）水酒对和煎服。以好为度。

〔胎动不安〕

苈麻根。（如足大趾粗者一尺。）水煎去渣服。（按苈根大能补阴血而行滞血。）胎动如重物所坠。冷如冰者。用全当归。（酒洗）益母草。（各五钱）川芎。（三钱）

水煎服即安。胎动痛不可忍。如坠在须臾者。用砂仁。（连壳炒黑为末。）每服二钱。温酒下。或用大生地。（一两）砂仁。（连壳五钱酒炒。）水酒各半煎服。安则再服一剂。

〔气虚胎动〕糯米。（一合）炙黄。（一两）川芎。（三五钱）水煎分二次服。即腹痛水下者可保。

〔胎漏下血不止〕生地。（五六两）淡酒煎浓服。无故下血。用真陈阿胶一两。炒为末。酒煎化匀二次服。如血热者。加生地二两。煎汁和匀服。

〔胎动恶漏〕妊娠忽然下黄汁如胶。或如豆汁。胎动腹痛。以气虚治之。糯米五合。

黄一两。煮粥食之即止。
苈麻根二两。纹银五两。水酒各半煎服。并治胎动痛不可忍。

胎漏欲坠。如无苈根。以茅草根代之。

〔妊娠子烦〕口渴烦躁。夜不得卧。黄连为末一钱。米饮调服。竹茹水煎。饮即安。

〔妊娠痢疾〕鸡蛋一个。（开一孔。以银簪搅匀。）加入黄丹五分。（饭上蒸熟食之。）

〔妊娠咳嗽〕川贝母。（去心。麸皮炒。黄。去麸为末）砂糖为丸。芡实大。口中不时含化即止。

〔璃胎〕受孕之后。肚腹头面浮肿。赤茯苓。（二钱）防己。苏叶。桑皮。（各一钱）

木香。（五分）水煎服。间数日一服。

〔肾虚痛腰〕马料豆。（二合炒焦待冷。）白酒煎服。或用猪腰子一个批开。去膜。

入补骨脂一钱。蒸熟去药。连汁食之。

〔小便不通〕车前草捣汁。调滑石末涂脐四围。如碗口大。热则易之。如怀孕至六七月。

小便不通。乃胎气下陷。溺孔被压而然。气虚不能举胎所致。宜服补中益气汤。

人参 黄炙 白术炒 甘草炙各一钱五分 当归一钱 陈皮五分 升麻 柴胡各三分加〔胎散〕受孕五六月后。一切胎气不安者。一月两剂。胎安易产。归身。菟丝子。

（酒炒各一钱半）川芎。白芍。（酒炒）川贝母。（去心各一钱）炙黄。荆芥穗。（各八分）

浓朴。

（三片。

水煎服。此方体肥安逸者常服之。安胎易产。产后可保无病。若瘦弱淡薄者。不宜多服。

凡怀孕五六月后。宜多食猪肚。能令易产。腐衣煮烂。麻油拌食。大能解毒滑胎清补。宜日食一次。即乳母常食麻油。（磨下。日久者勿服。）能令小儿无病。

〔临产〕孕妇临月。忽然腹痛如欲产而不产者。名曰试月。至腹痛连腰痛极者。乃是正产。试捏产母手中指本节跳动。方是当产。初觉欲产。先须惜力。安心养调。不可用力妄施。致临产乏力。若用力太早。每致横生逆产之病。故临产要言。一曰睡。二曰忍痛。三曰慢临盆。此人道之常。容易之事。切谕不必惊慌。即遇逆产。一时难下。仍宜仰卧。使腹中宽舒。小儿易于转动。稳婆用手推正。得顺即下。若小儿果然逼到产门。则浑身骨节疏解。

胸前陷下。腰腹重坠异常。大小便一齐俱急。目中金光爆溅。真其时矣。于此临盆。用力一阵。即安然生下矣。

〔加味芎归汤〕治交骨不开。不能生产。全当归。（一两）川芎。（七钱）血余灰。（三钱）龟板。（手大一片醋炙研碎）水二碗。煎一碗服之。如人行五里即下。如横生倒产。

急服此方。仍令安睡。用手将小儿手足缓缓托入。再睡一夜。自然生矣。如临盆一二日不下者。

亦服此方。用手推上。安睡气平。自然生下。暑天因热难下者。六一散。（滑石六钱甘草一钱）冷滚水调服三钱。（不因酷热者勿用。）

〔催生丹〕

难产及横生倒产不下者。车前子。（研末二钱）酒调服即下。不饮酒者。

水调服。（按车前甘寒无毒。治妇人难产。利小便而不走气。即连进二三。亦无妨）黄蜀葵花焙研为末。温酒或白汤调服二钱。如胎脏干涩难产者。连进三服即下。如无花用子半合研末温酒下。（按蜀葵性滑。甘寒无毒。催生服之。能令腹中气宽。胎滑即下也。）益母草煎汤当茶吃易生。小虎刺根捣烂。好酒一盞冲服即下。乳香。（炙去油为末。）以猪心血丸。

桐子大。朱砂为衣。阴干。每服二丸。温酒下。荷花瓣上书人字。嚼而吞之即下。凡一切催生丹不宜早服。如胞浆不下。只宜稳守。须俟胞浆破后一二时。再迟则力乏干涩愈难下。

急宜服之。如加味芎归汤。佛手散。皆催生之妙品。即早服之亦无妨。催生不须奇药。活血滑胎。如水推船矣。

〔难产〕胞浆先干。胎涩不下。用此最效。滑石。（水飞过一两）白蜜。麻油。（各半盞）先将蜜油慢火熬熟。去沫调滑石顿服。外以油调涂产妇脐腹。上下摩之立效。

〔难产灸法〕米粒大艾丸。灸右脚小末趾三五壮。即下。

〔盘肠生〕慎勿惊忙。从容产毕。剪去产妇头顶心发少许。用蓖麻子四十九粒。（去壳去衣捣烂）涂顶心。肠即入。将入完即洗去迟则有害。或用半夏末少许。入鼻中。得嚏肠自上。或盛以洁净漆过木盆内浓煎黄汤。得温浸之即入。

〔胎衣不下〕令产妇将自己头发稍搅入喉中。恶心即下。此法亦治难产。吞生鸡蛋清一枚亦下。取产母鞋底烘热。熨小腹上下十四次即下。蓖麻子仁一两。研烂贴产母右足心。胎衣下后须速去之。迟恐肠出。（即肠出仍以此膏贴头顶心即收。）

〔产后血晕〕恶血上冲。不知人事者。须先以两手提起产妇头发勿放倒。如放倒恐血攻心则不救。急以韭菜一把切碎。先放入有嘴壶瓶内。再用米醋煮滚。冲入瓶内。上扎瓶口。

以壶嘴出醋气熏病患口鼻间。或以少许涂妇手鼻。安定后然后放手。以荆芥穗六分

。（炒黑研细。）热童便调灌下即苏。即一时无药。单用热童便灌下可救。如去血过多。时时发晕者。

用当归。五钱。川芎。三钱。水煎服。

〔预防发晕〕置好醋于床头。用烧红栗炭盆内。常以米醋洒上。令房中常有醋气。或时焚旧漆器。皆妙法也。

产后用莲蓬蒂十数枚。毛米一合。清水煎一杯。和童便一杯服之。

好〔产后烦闷〕

恶血未尽。上奔冲心。致烦闷腹痛者。藕。（捣烂取汁。）温服一二盏即效。恶露未尽之时。儿枕腹痛。用山楂肉百个打碎煎汤。入砂糖和成膏。好酒冲服三钱。

催下败血即安。恶血不尽心痛。荷叶。炒香为末。童便或白汤调服。

〔产后血淤〕恶露不行而兼腹痛者。蒲黄。（五钱微炒）水煎服。（按本草蒲黄甘平无毒。能运血活血。止心腹诸痛。）产后一二两皆可服。淤血上攻痛而兼胀。手不可近，心胸满喘命在须臾者。用没药。（箬上炙去油）血竭。（各一钱研细）童便和酒调服。（按本草没药味苦平无毒。能散血定痛。血竭甘平无毒。能散滞血。止痛。补心胞络。）

〔子宫不收〕产后外坠者。宜补中益气汤。（方见前。加醋炒白芍服之。）外用黄煎浓汤洗之即收。阴突阴挺。用艾叶煎汤洗。外用蛇床子。（微炒热。）绢包熨之。内服四物汤。（当归熟地各二钱川芎炒白芍各一钱半）水煎好。入龙骨末少许。空心服三次愈。

〔产后大小便不通〕诸药不效。饮人乳三日即安。（无则牛乳代之。）

〔小便不禁〕白薇。白芍。（酒炒为末。）温酒调下三钱。日二服。气虚遗溺。用鸡肫皮。鸡肠。（一具烧为末。）温酒调下。

〔小便出血〕血余灰。（二钱）滑石末。（一钱）生地汤调下。

〔虚汗〕小麦。牡蛎。（研各等分）俱为末。以猪肉汁调服二钱。

〔舌出不收〕辰砂敷之。或暗掷盆碗作坠地声惊之即收。

〔乳汁不通〕麦芽二三两炒研。煎汤常服即通。并可治痈。鲤鱼头烧灰。白酒调下一钱。一服即通。外用葱头橘叶煎汤洗三五次。忌食冷物。即夏月亦宜盖暖。

木馒头二个。

猪前蹄一只。煮烂食之。饮汁尽。一日即通。（即无子妇人食之亦有乳。）
忽时乳胀。及乳眼不通。用青蛤蜊壳。（新瓦上焦研。）
青黛等分拌匀。加冰片少许。每服三钱。酒冲服神效。

〔乳少〕 芝麻。（炒香捣烂）入盐少许。食之即生。

〔乳疔初起〕

蒲公英。（七钱）金银花。（五钱）水酒各半煎服。得睡即消。至重者。

加穿山甲。（三片炒黄色）橘叶。（七片）煎服外用葱白捣烂炒热。多围乳上。冷则易之即消。葱头。（三个每个切一片。）生半夏。（三粒）胡椒。（三粒）雄黄。（少许）米醋捣烂为丸。绵裹塞鼻孔内。过夜即消。（右乳塞左。左乳塞右。）

〔乳上结核〕

肿痛难忍者。广皮。（浸去白。晒燥干面炒黄。）研末。入麝香少许和匀。

每服二钱。热酒调下即散。（外用葱白。和白蜜捣烂敷之。）

〔ru头肿硬〕

鹿角尖。（烧灰存性研末。）酒调服一二钱。（外以鹿角石上磨汁涂之。）

〔ru头裂破〕 秋茄子开裂者。（阴干烧存性。）为末。水调涂之。

〔止乳〕 产妇气血壮盛。ru房或胀。或无儿饮。因而肿痛。憎寒发热。老丝瓜。（近蒂连子烧灰存性。）为末酒下。盖被出热即消。或用麦芽三两炒熟。水煎服立消。（外用长布束紧。以手揉散自消。）

〔乳涌〕

劳役过度。乳出如泉。神昏痰塞者。以独参汤灌之即苏。再以十全大补汤服之。

〔乳痈〕 红肿发热疼痛者是痈。坚硬腐烂者是疽。凡初起当用发散流气之药。若已成脓。又当内托排脓养血顺气。切勿用刀针取咎。栝蒌。（一个捣烂。）当归。（五钱）生甘草。

（三钱）乳香。（炙去油）没药。（去油各一钱）酒煎服。或水酒各半煎亦可。良久再服。如数服不俱炒黄为末。酒下二三钱。皆能即消。
紫苏叶煎汤频频服之。以渣敷乳上即消。四旁硬者。以牙梳梳四旁亦消。

外用京墨。猪胆汁。玄参。（研末）和匀搽上立消。益母草和生〔乳痈红肿〕蒲公英一两。忍冬藤二两水煎食前服。睡觉病即去矣。芭蕉叶捣烂敷之。

（〔乳痈成脓痛不可忍〕
蜂房烧灰为末。每服一钱。水煎去渣。食后服。重者连进二服。

〔乳吹〕因吃乳时。含乳睡着。乳为儿气所吹。乳汁不通。肿硬重者即成痈。生山药捣烂敷之即消。消即速去之。

〔乳上生毒〕败龟板一枚烧存性。研末。酒服四钱。

〔乳癌〕忧郁积成乳中隐核。如棋子大。其硬如石。不痛不痒。或一二年五七年始发为疮。破陷空洞。是为难治之症。若能清心寡欲。薄滋味。戒恼怒。仍服内托活血顺气之药。

庶有可生之理。初起用生蟹壳。（砂锅内焙焦为末。）每服二钱。酒调下。日一次不间断效。

或用巴豆肉。（焙燥研）麻黄。（焙燥俱研极细等分）作香袋入鼻中。数次渐消。外用圆蛤壳研极细末。加皂荚末少许。米醋煎滚调敷即消。

〔乳癌已破〕甘草汤洗净。用白蜡三钱。好酒化服五七次。可愈。贝母。（去心）

核桃。金银花。连翘。（各三钱）水酒各半煎服。

荷叶蒂。（七个烧灰存性研末。）酒调久服见效。

白糖。（一两）活鲫鱼一尾。连鳞同捣烂敷之。即烂见骨者。数次可效。

〔乳癖〕白松香。（二钱）川椒。（二十粒）研末。先用槐枝汤洗。和猪油调涂。

〔误服坠胎药〕已伤未坠。致口噤。手强。自汗。头低。似乎中风者。生白扁豆去皮为末。米饮调服。如胎动呕血下血者。靛青草叶汁一碗。急服即安。

〔妇人心痛〕青鱼枕骨磨水服即愈。并治血痛气痛。陈瓦棱子。（灰存性为末）

酒下六分立止。生萝卜同白蜜。捣烂蒸熟食之。

〔心风癫痫〕因血邪风痰迷心癫狂者。甘遂二钱为末。以猪心内三管血和药。仍入猪心内缚定。用湿纸裹火煨焦。取出药末。入朱砂一钱。分作四丸。每服一丸。仍将猪心煎汤调下。大便下恶物为效。

〔小便不通〕 鲫鱼一尾捣烂。用少许填脐内即解。
墙上活蜒螺或田螺。入麝香三厘。

即将螺肉水滴入脐中即解。盐一味纳入脐中。再滴水入即解。

〔鸡爪风〕 或逢月事受风。手足拘挛。拳如鸡爪。颇疼痛。急于膝骨两旁。各有小窝共四穴。俗名鬼眼。用艾丸各灸三壮立效。

〔阴内生疮〕 马齿苋四两。青黛一两。同捣烂敷之即效。杏仁。（烧存性）雄黄。

明矾。（各五钱） 麝香。（五分） 共为末敷之。（治痒疮）

〔阴内痒疮〕 新桃叶捣烂绵裹纳阴中。日三易。猪肝切片。以花椒葱拌猪油。将猪肝煎干。待稍冷纳入阴内。日三五易。以虫尽为度。以黄葱煎汤洗。

〔脚丫痒〕 枯矾。（五钱） 石膏。（
） 轻粉。黄丹。（各三钱。洗研细后搽上。并治湿烂。）

〔裙边疮〕
梨叶百片。用鲜猪油二两。将梨叶入锅内。炒拌油在叶上。次下白蜡二两。

亦令熬化在叶上。又下食盐二两。亦拌在内。取起待冷出火气。粘贴神效。（勿令梨叶炒焦）

黑鱼皮。（不拘大小。） 乳香。没药。（等分研末。） 鲛鱼皮上贴之。
初起用鲜茶叶捣烂敷之。

即效。

〔驴眼疮〕 生脚胫骨周遭。亦似疮。田螺。去壳捣烂敷数次即效。

〔腋臭方〕 密陀僧。（四两） 枯矾。（二两） 轻粉。（三钱） 共为细末。频擦两腋。半月见效。半年全愈。生姜频擦亦效。蒸热馒头一个掰作两片。入密陀僧末一钱许。急挟在腋下。略睡片时。冷则易之。数次效。田螺。（大者一个） 巴豆。（一粒研细） 胆矾。（豆大一块） 麝香。（少许共三味研细） 将田螺水养三日。去土揭起靥。入药末在内以线拴住。置瓷器中。次日化成水。五更时将药水以手自抹在两腋下。不住手抹。直待腹内欲行方住手。择于无人处大便去其臭秽。如是二三次。再用前药擦数次。永绝病根。男女皆治。

〔胎死腹中〕因跌扑损伤者。看产母面赤舌青。母活子死。面青舌赤。子活母亡。面舌俱青。子母俱死。或因误服毒物。以致死胎坠胀淤痛。亦与常产不同。用平胃散苍术。（米泔浸炒燥）浓朴。（姜汁炒）陈皮。（各二钱）甘草。（六分）水酒各半煎浓。入朴硝二三钱。

再煎三五沸。温服即化水而下。或以巴豆。（二三粒）蓖麻子。（十数粒）去壳。加麝香少许。

同捣成饼。贴脐上即下。如下净即速洗去。

〔产后鼻衄〕红线一条。并产妇顶心发两根。紧扎中指节即止。鼻血兼中风者。用荆芥。（炒焦为细末）童便调下。如气虚者勿服。

〔产后血痢〕小便不通脐腹绞痛。用生马齿苋捣汁三合。煎一沸。下白蜜一合和匀服。

儿科

（症有所不备者查各门治之）

〔小儿初生〕宜以甘草浓汤。用软帛蘸汁拭口中。去其秽浊。随用胡桃肉去皮捣取汁饮之。非独和中。且能养脏。如母气素寒。又值冷天。只以淡姜汤拭口。可免吐泻之患。

拭后仍用胡桃汁饮之。

〔浴儿〕用槐、榆、桃、桑、柳枝。各三五寸煎汤。临浴加入猪胆汁一二个。浴之周岁内可免疮疥丹毒。又避邪恶。

〔多啼〕初生二三日内多啼。即看口中上颚。如有白泡子。即以银针轻轻挑破。将白泡内如米粒取出。勿令入喉。以金墨涂之。或因胎毒未尽。多啼不乳。用淡豆豉浓煎汁。

常与三五匙。其毒自下。又能助养脾气消乳。

〔二便不通〕急令人以热汤漱口。吸吮小儿前后两心。两手足心脐下。共七处。吮到红色即通。

六七日内小便不通。用葱白一寸捣烂。入人乳拌匀二次。入儿口内。再与乳吮咽下即通。

〔初生谷道不通〕 金银器或玉簪烧热穿通。

〔初生周身无皮〕 速取白米粉遍身扑之。一日三次。以皮遍为度。遍身如鱼鳃。或如水晶。擦破则水渗流。即用密陀僧研极细末炒燥。出火毒。糝上即效。

〔生下即死〕 可看上颚有泡。急须挑破。（以绵拭去血。勿令血入喉即活。）

〔不乳〕 初生面赤眼闭不开。大便不通。不能进乳。多由胎中热毒所致。用粪清数匙饮之立解。即能吃乳。

开口后不乳。用葱白一寸破开。以人乳同入砂罐内煎过。饮之即乳。

即口噤者亦效。如因受风。鼻塞不能吮乳。用天南星为末。以生姜自然汁调成膏。敷贴于囟门。（勿轻用发散药。）

〔小儿口噤〕

猪乳滴入口中即开。（此法最良。须令小猪吮吃。时将小猪后脚提起。

其口即开。取之可得。）面赤多啼。口噤不乳。天南星一个。炮去皮脐。冰片三厘。同研细。将指蘸姜汁〔脐中汁出〕

或赤肿。或出血。用白石脂研极细末。一日三次敷之。

如久不干。用当归炒研末。去火气。频敷即效。多年墙上白螺蛳壳。火研细。糝上即效。

〔脐突光肿〕 赤小豆。豆豉。天南星。（火炮）白藜各等分研细末。每用五分。以芭蕉自然汁调敷脐四旁。一日一次。三次后得小便下白物即消。

〔马牙〕

初生口唇牙龈生白点。不能食乳。亦胎热所致。鹅口不同。少缓即不能救。

急用银针将白点挑破出血。凶则连日。缓则间日挑之。挑后仍用青绢绞出涎。以好墨薄荷汤遍搽满口。勿令食乳。待睡片时醒。方与乳。无不立效。

〔阴囊收缩〕 初生六七日阴囊入腹。啼哭不止者。每因受寒所致。硫黄。（二钱）吴茱萸。（三钱）为细末。研。大蒜调涂脐下。再以蛇床子微炒。帛包熨其囊即下。

〔月内多啼〕真西黄。朱砂。（各五厘）同研细。用少许点舌上。

〔脐风〕断脐带之后。为水湿风冷所乘。或胎中受热所致。肚胀脐肿。四肢强直为脐风。用独蒜切片安脐上。以绿豆大艾圆灸三壮。口中有蒜气即效。七日之内。若有脐风。

肚腹上必发青筋一道。寻照青筋行至处灸三壮。如分两岔。即灸两尽头可救。已行至心。则不治。全蝎。（五个酒洗炙脆）僵蚕。（七条白而直者炙脆）麝香。（二三厘）俱研细。每服一分。用薄荷。灯心。加金器一件。煎汤调服。并治撮口。

〔撮口〕或因胎中受热。或因脐风不愈。面赤喘急。啼声不出。名曰撮口。看牙龈上有小泡子如粟米大。急以温水蘸净。绢裹手指轻轻擦破即开口。或灸小儿头上三五壮即愈。照治脐风药服一二分即效。犀角羚羊角。水磨。和蜜饮之亦效。如大便不通热甚者。制大黄。甘草各五分。水煎服。脐旁及爪甲青黑者不治。

〔鹅口〕满口白烂。用枯矾一钱。朱砂二分共为末。每以少许敷之。三次即效。人中白为末。拭口内即效。

〔口中白点〕百日内口中白点。拭之则去。少刻复有。口内流涎。啼哭不乳。黄丹研极细。用竹沥调涂口中。日洗三次即去。内服益元散。灯心汤。调下。则不再发。（方见暑症。）

〔乳伤〕大麦芽煎汤服之。如恶吐者。加陈皮五分同煎服。

〔竹衣垂〕因胎中遗毒。周身脓血淋漓。疮形如赤剥杨梅状。上白芦甘石。（火淬。

入黄连汁三次。童便内四次一两。）黄柏。（猪胆涂炙七次七钱）紫甘蔗皮。（烧灰存性五钱）

儿茶。（五钱）真绿豆粉。（炒七钱）冰片。（五分）赤石脂。（五钱）俱为细末。用鸡蛋二个煮熟去白。将黄煎出油去渣。和麻油调末药搽患处。内服丸方。真西黄。（三分）朱砂。

雄黄。

重三分。

一月全好。

〔赤游风〕啼叫惊搐。次生红肿光亮。发热。瞬息游走。发无定处。先起于腹背。流入四肢者易治。若起于四肢。流入胸腹者难治。先用生姜汁。葱汁。加食盐。（炒）煎水。

和汁洗疮。洗时勿令水入目。恐伤目。

长流水一碗。锻石一块。入水化开。取水面上如浮油者。涂肿处即消。

朴硝。大黄等分为末。井水调敷。

如寒凉药涂之不效。用灶心土研极细末。以煮熟鸡蛋黄入锅熬出油调涂。

马齿苋捣汁调银朱涂之即效。干则以汁润之。内服连翘。荆芥。木通。当归。赤芍。防风。滑石。蝉蜕。（各八分）黄芩。甘草。（各五分）

水煎服。游风肿痛。用破草鞋。人乱发。烧灰。米醋调敷。

如平常红肿。以青菜捣汁涂之即消。亦可服之。

〔慢惊风〕多因久病之后。或因吐泻之后。损伤脾胃所致。则四肢冷。手足微动。眼上视。面青唇白。或乍发乍静。或身凉身热。二便利。其脉迟缓。治法当培养元气。即有风痰。不得过行消散。致伤元气为主。病后脾胃虚弱。致成慢惊。四肢渐冷。虚肿面有浮气者。人参。茯苓。扁豆。（炒）陈米。（炒各一钱）木香。全蝎。（酒洗炙脆）天麻。（各五分）

匀两剂。姜枣水煎服。如尚有阳症咳嗽喘急。胸膈煽动。痰涎壅塞之状。仍须全蝎。（酒洗炙脆）乌梢蛇。（酒浸去骨瓦上焙燥各五分）天竺黄。朱砂。（另研各二分半）白附子。（炮）

天麻。青黛。（另研各一钱）麝香。（一分）俱为细末。蜜调为膏。贮瓷器内。以蜡封口。大儿一分。小儿五六厘。薄荷汤下。并治急惊。

〔囟门肿〕因热上冲而肿者。高而柔软。用黄柏末水调涂足心。因寒而肿者。则坚硬。宜温散之。

〔囟门陷〕水调半夏末涂足心。因病久气虚而陷者。用狗头骨炙黄为末。鸡子清调敷。

〔小儿赤眼〕黄连为末。水调敷足心。

〔头上肥疮〕嫩松香绵纸包作纸燃。入香油内浸一宿。灯上点烧。滴下油敷之。皂荚烧灰。香油调敷。三次即效。

〔头上痒疮〕

地沥青。（二两）入紫草。川椒。明矾。蒸透。乘热搽之。轻者白果仁擦之。

并〔腊梨头方〕

锻石窑内烧过土墼。（四两）百草霜。（一两）雄黄。（一两）胆矾。（六钱）

榆皮。（三钱）轻粉。（一钱）共为末。猪胆汁调匀。剃头后搽之。百发百中之妙。宰猪汤取面上浮腻。入砂罐内。再加葱头。（五个）明矾。花椒。（各五钱）同煎。乘热洗二三次即愈。

〔小儿重舌〕舌尖叠浓为重舌。用巴豆半粒。饭五粒。共捣为饼。如黄豆大。贴眉心中间。待四围起泡即去之。或黄柏用竹沥浸一宿。点舌上即效。

〔木舌〕

舌下生薄膜如连舌尖。绊住不能吮乳。治法。用针横刺舌下总筋之外膜中。

（勿穿总筋之内。）直勒至舌尖上断此膜。舌即能伸。（勿治。大不能言。）刺后出血。用蒲黄〔口舌生疮〕桑皮中白汁敷之。生黄柏末涂之皆立效。

〔耳内出脓〕枯矾。龙骨。（炙）胭脂。（烧灰各一钱）麝香少许。俱研极细末。先以棉杖拭去耳中脓。吹入药末少许。如不效。加海螵蛸一钱炙研同吹。脓汁久不愈。用山羊角烧存性为末。每吹二三分入内。一日三次即效。

〔耳后项间湿烂〕五倍子研极细末糝上即效。如体肥耳后腋下阴囊湿痒者用海螵蛸研末。（炒微黄。）敷之甚妙。

〔月蚀疮〕生于耳后。用黄连。（切片。焙研末。）敷之。

〔羊须疮〕生于口下。用小红枣烧灰存性。香油调涂。

〔头软疔〕大枳壳一个泡软。去穰磨口平。以面糊合在疔上一周时。脓血自出。古瓷器碗片研极细。菜油调涂。并治痘毒久烂。

〔燕窝疮〕用鼠屎研末。香油调敷。

〔小儿歪嘴〕蓖麻子。（七粒去壳）麝香。（少许）共捣成一团。安于手心。内用滚水半碗。将碗足坐在手心药上。左歪放右手。右歪放左手。久久行之正即止。

〔两目夜不见物〕羯羊肝一具。（勿见水。勿犯铁器。）以竹刀划开。入谷精草末。瓦罐内水煮熟。不时服之屡验。

〔鸡臑眼〕夜合草燥干为末。蘸猪肝常食之即效。
鸡蛋开一小孔。入雄黄一钱。煮熟食之。多吃即效。

〔误将竹木刺入眼内〕白颈蚯蚓捏断。滴血入眼即出。

〔小儿咳嗽〕生姜四两。煎浓汤沐浴即愈。

〔小儿癣疥〕本煎汤沐浴。并浣衣即效。或用地沥青敷之。

〔肛门作痒〕杏仁嚼烂敷之即止。生艾叶同川楝根煎汤熏洗即止。如阴亏燥痒。

兼服六味丸易效。

〔蛔虫〕因失乳而早哺。或食甜过多。胃虚虫动。以致腹痛恶心。口吐清水。腹上有青筋。火煨史君子与食。以壳煎汤送下。宜每月初四五五更时服之验。

〔小儿吐〕砂仁。（童便拌炒三四次为末一两）
加丁香。藿香。（各三钱）俱研细。

每服一茶匙姜汤下。如百日内吐乳。（直出而不停为之乳）用麦芽。（三钱）橘红。（一钱）丁香。

〔呕吐〕吐时酸逆而难出者为热。用和中清热饮。黄连。（姜汁炒一钱）姜半夏。（一钱）陈皮。藿香。砂仁。（各七分）茯苓。（一钱半）分两服。水煎徐饮。如吐时顺而直出。

或吐清水者。为寒。用温中止吐汤。白豆蔻。茯苓。（各一钱）半夏。（五分）加生姜五片。

分两服。水煎热服不效。加沉香二分。为末和入。

〔泄泻〕干山药半生半炒为末。每服二钱。砂糖水调服即愈。
或巴豆研末为膏。贴顶门上。烧线香一炷。未尽即去巴豆。立愈。
伤乳腹泄。仍用人乳一碗。铜锅内煎成红色焦皮。研细频吃即止。

〔久泻不止〕
白术。（土炒）白茯苓（各二钱）黄米一合煮粥。只服米饮。泻自止。

〔痢疾〕鸡肫皮。（焙炒研末。）以乳汁调服。

鸡蛋一个煮二三沸。取起去白用黄。

研碎。以生姜汁半小钟和匀服之。不宜吃茶。俱神效。木香。（二钱）生黄连。（五分）肉豆蔻。（一个）俱为末。以鸡子清和作饼。慢火炙黄色转红为度。研细末。用白面糊为丸。

麻子大。每服三五十丸。米饮下即效。

〔血痢黑痢〕茅草花一把水煎服。无花以根代之。

〔泻痢〕

土木鳖半个。母丁香四粒。麝香一分研末。津唾调丸如芡实大。纳一丸于脐中。

〔泻痢肚痛〕砂仁。川椒。（各五分）炒研。和姜汁少许。津唾为丸。纳入脐内。外以膏药贴之。

〔休息痢及疳泻久不愈者〕

鸡蛋一个。先用黄蜡如指大一块。锅内熔化。入鸡蛋拌炒熟。空心食之大效。

〔噤口痢〕

莲子内心五分研末。陈米饮调下。毒瓦斯上冲心肺者。用此以通心气。则思食。如胃口毒瓦斯所阻。不能进食。用精猪肉一两。扯薄片。于炭火上慢炙时。随用膩粉少许糝肉上。令匀成脯。每以少许放小儿鼻边。自然吃下。

〔久疰〕不拘寒热。用桃叶尖。（取东南方者四十九片）半夏。（四十九粒）俱为末捣桃尖为丸。雄黄为衣。晒干贮瓶中封固。临用取一丸绵裹塞鼻中。男左女右。即止。端午日合更验。

〔痰核〕公鲫鱼一尾。竹刀去肠。用酒洗净。入红花少许。蒸食六七次即消。

〔痞块〕

肚大肌瘦面黄。渐成疳疾。白芙蓉花阴干为末。用鸡肝破开。入花末在内。

饭上蒸熟食之。至重者。用木鳖子肉。史君子肉。（各五钱）共为细末。水丸圆眼大。每一丸以鸡蛋一个破顶。入药调匀。饭上蒸熟食之。

〔好吃生米茶炭黄病〕麦芽。（一斤炒）史君子。（二两）槟榔。（一两）南星。（一两姜汁炒）为末。如吃茶加茶八两。（吃泥加泥。吃炭加炭。只用八两。）炼蜜丸。桐子大。每服五十丸。（每日早晨空心砂糖汤下。如初起多服肥儿丸即效。

方见后。)

〔睡中遗尿〕

鸡肫皮。(二个) 鸡肠。(一具焙燥烧灰) 猪脬。(一个炙焦) 俱为末。

每服二钱。酒调下。男用雌。女用雄。三四次愈。

白纸一张铺席下。不令人知。待遗尿于上。

取纸晒烧酒服。用红纸剪马四匹。令小儿自安身下。每夜如之。

〔小便频多〕

乌药。益智仁。(去壳盐水炒) 桑螵蛸。等分。为末。酒煮山药糊为丸。

空心盐汤下二钱。

〔尿血〕 甘草一钱煎汤。调六一散一钱服。(加升麻二三分更效。)

〔小便不通〕 木通。茄儿蒂。水煎服立通。并治尿梗。

〔阴囊忽肿痛〕 生甘草汁。蚯蚓粪。调涂之。或用蝉蜕煎汤。洗二三次效。

内服四苓散。(白术。赤苓。泽泻。猪苓。) 等分。每服二钱。灯心汤调服。

如中蚯蚓毒忽肿。用盐汤洗后。以鸭血涂之。

〔脱囊疮〕 因湿热所致。阴囊溃烂。皮脱子欲堕。用紫苏叶研细。湿则糝上。干则清油调敷。(多年白螺蛳壳研末搽亦效。) 内服木通。(五分) 甘草。(三分) 黄连。(炒四分)

当归。(〔疝气〕 肾子收上肚痛。用小茴香一钱研末。好酒调下。

〔盘肠吊痛〕 忽然腹中吊痛之甚。用葱一大握捣烂煎汤。手巾蘸洗儿腹。再以葱白炒热捣贴脐上。良久尿出痛止。

如先恶寒小腹痛甚。皮急一脚不能举行者。又须以肠痈治之。

用苍耳子。(二钱) 杏仁。薄荷。栝蒌。(各一钱) 甘草。(五分) 水酒各半煎服。渣敷脐上。

二服见效。如便下脓血者。加木香。当归。(各五分) 同煎服。再每日空心酒吞蜡矾丸三五十丸。

〔疳疾〕

如心脏受疳者。小便不通。口干。舌烂。牙臭。此乃心脏受积也。用羊肝散。

谷精草。（五钱）胡黄连。（二钱）甘草。（五分）地骨皮。（五钱）芦荟。（三分）俱为末。

羊肝一具竹刀剖开一缝。将药末五分入肝内。用线捆好。砂锅内煮熟肝为度。随时服七日。频服即效。

〔肝脏受疳〕眼生翳膜。羞明不见物。用鸡肝散。雄黄。威灵仙。谷精草。蛤粉。夜明砂。（水洗净各一钱）俱为末。每用鸡肝一具。入药末五分。砂锅内煮熟连汁服。以好为度。

鸡肝一具。（不犯铁器。不落水。）入硼砂少许。蒸熟服十次。即能开瞽复明。

〔胃脏受疳〕

撒泻口干。夜出盗汗。用茯苓。白术。（土炒）泽泻。（各二钱）山楂肉。

（五米汤下。

〔肺脏受疳〕发热夜啼。胸高咳嗽。用天冬。麦冬。苦楝皮。桑白皮。橘红。生地。（各三钱）河水十碗煎至一碗。再入白蜜八两。（炼熟）山药一两为末。再煎成膏。每日服三次即〔食伤成疳〕

六月收五谷虫洗净。入竹筒封之。待干研末。入麝香少许。每服一二钱。

米汤下。食积腹硬者。用香圆半干者。入尿缸中。（每日更换者。）浸一月。取起洗净。晒干研末。白汤调服一钱。年小者三五分。肚软仍服肥儿丸。

〔完谷不化〕脾胃不能消运所致。用绿矾一钱为馅。作面馒头一个。蒸好晒干。火存性研细。绿者转为红色。用砂糖调服一钱。以大便如常即止。

〔五疳丸〕治一切疳疾皆效。羊肝一具。（竹刀切片新瓦上焙干）海螵蛸。（二两醋浸炒黄）白米。（炒五钱）和羊肝同捣。丸如黍米大。日服二钱。米汤下。肚大筋青。口舌生疮皆效。

〔五疳八痢〕

面黄肌瘦发焦。诸药不效。用牙皂荚。（二个去皮炙酥）蛤粉。（三钱）

麝香。（一分另研）大虾蟆。（二个。瓦上炙焦黑枯存性。）俱为末。米糊为丸。

粟米大。每服二三十丸。米饮下。

〔疳鼓〕久疳腹胀如鼓者。大虾蟆一个剖开。入白豆蔻四十九粒。外用黄泥固济。火存性。每服一钱五分。淡酒下甚效。

如因湿气而成者。用鸡屎。（炒燥一两）入丁香一钱。研〔久疳不愈〕疳积病久。身体羸弱。不能重药下者。雄猪肝。（不见水者四两。竹刀批开。）新荷叶。（晒干为末。每用二钱。）入肝内蒸熟。空心服之。半日后得下恶物从大便而出即效。再以人参茯苓白术之类调理。立秋后大虾蟆。（去头足肠。以麻油涂之。）净瓦上炙熟食之。积秽自下。连服五六枚。一月之后形容顿改。其效如神。一切疳积。泻痢。疳泄皆治。

〔走马牙疳〕

即肾经受疳。肌肉瘦。遍身生疮。寒热时。头热脚冷。牙床腐烂溃脱。

走马者。言其危急之症。多因痘疹余毒所致。或热甚而成者。患之甚者黑腐而臭。宜多吃绿豆汁解热。初起用人中白。（即多年尿缸中澄下白。以风日久干者为良。或尿壶中白碱洗净。瓦上红研极细。）先用荆芥汤洗疳处。日敷六七次。（涎从外出为吉。涎毒内收为凶。）

或用妇人尿桶中白垢。（火研细一钱）铜绿。（真者三分）麝香。（一分）和匀研细。贴之神效。

川黄竹叶十草。青黛。（各六分）麝香。（少许）俱研细和匀。敷患处神效。如口臭涎秽。黑腐不脱。牙落无血。用药不效。穿腮破唇。皆不治之症。马桶碱。（不拘多少。米醋三次。）常年擦牙则无是病。

〔疳痢〕益母草叶煮粥食。并绞汁服之。立效。

鸡肫皮炒黄色为末。每服一钱。并治水泄及脾胃虚弱。

〔肚腹胀满〕

胀久成鼓胀者。用猪肚一个。入大蒜肉四两。同煮蒜化为度。（忌盐酱。）

食之三个全效。（余治一人十二岁时交夏腹满。用广、半、腹皮之药。随减随发。至两月后。

朝暮胀急。连及腰胯。气急食少。诸药不应。食蒜肚两个如旧。五六个不再发。）

〔锅焦丸〕

小儿常服健脾消食。能治黄瘦大便不结。水泻等症。锅焦。（炒黄三斤）

神曲。（炒三两）砂仁。（炒二两）山楂。（蒸四两）莲肉。（去心四两）鸡肫皮。（炒一两）

共碾细末。加〔肥儿丸〕

治面黄肌瘦。食积脾疳。大便不结。疳泻等症。山药。（二两炒）茯苓。

白扁豆。（炒）五谷虫。（洗净焙燥）山楂。（炒）白芍。（炒）麦芽。（炒）神曲。（炒）当归。

（各一两五钱）白术。（土炒一两）陈皮。（一两）史君子肉。（煨八钱）胡黄连。（七钱姜汁炒）生甘草。

（七〔班龙丸〕

治小儿一切内热潮热。神昏不宁。咳嗽痰涎。及惊风惊搐等症。天竺黄。

辰砂。胆星。（姜汁炒）枳壳。茯神。硼砂。（各一两）琥珀。（七钱）山药。（二两）沉香。

雄黄。

（贮瓷器内。每服一丸。薄荷或灯心汤下。

〔稀痘丹〕赤小豆。大黑豆。绿豆。生甘草。（各等分焙燥为末）用大竹一段。（两头留节。刮去青。钻一孔入药末填满。以木针塞之。熔黄蜡护口。）至冬间浸入粪窖中月余。

立春前三日取起。水洗净。挂临风处百余日。取出再研。（不用时原存竹筒内不蛀。）每用药末三钱。配入绿萼梅蕊。（不经手取下。锻石内窖燥。研末一钱。）不拘春秋时。清晨用经霜丝瓜藤上细藤丝。煎汤调服。（服药后。忌荤腥。油腻。十日内得利下青黑粪为验。则胎毒出矣。每年服一次。）时痘行年。用玳瑁。犀角。各水磨服。日三次最良。并治心热血凝研匀。即于午时搽小儿头顶心。及心前心后。两手心。两足心。两臂弯。两腿弯。两胁肋。共十三处。均搽如象棋大。勿使药余多。不可洗去。听其自落。搽过一次。出痘数十粒。二次出痘数粒。三次则终身不出。过周岁七夕重九皆可搽。

〔六味稀痘饮〕将发痘时预服之。出痘无虞。山楂。牛蒡子。紫草。（各一钱）防风。

荆芥。（各一钱二分）甘草。（五分）生姜一片。水煎服。

将出未见点时。用绿萼梅蕊三钱。

草兰五朵。水煎服。（花须预收焙燥。或蜜藏住。）即多者可少。并得易发。

〔治痘不起〕紫草茸。（即紫草根头白毛）五分滚汤。砂锅内煎服即起。（按本草紫草治斑疹痘毒。活血凉血。利大肠。痘欲出未出。血热毒盛。大便闭涩者。宜用之。若已出而红活。及白陷。大便利者。不宜用。惟用茸以取其初得阳气相类之义。发痘如神。有益无损。）

绿萼梅蕊。（五钱焙）桃仁。朱砂。甘草。（各一钱）老丝瓜。（枯燥成筋者近蒂三钱烧存性）

俱研末。每服五分。白汤调下。隐在皮肤之间者。服之即起。并治麻症斑症。（按本草老丝瓜烧灰存性。甘平无毒。能通脉络而去风。解毒消肿化痰。治痘疮不快。用枯者烧存性。入朱砂研末。蜜水调服甚妙。）

出痘时或因触犯。或痘不起。多用胡荽。（即 荽菜。）捣汁和酒。卧处。门户。床帐。及墙壁各处喷之即起。如手足未发齐者。水煎汤温洗神效。（若儿虚弱。天时阴寒。即无变症。用之最妙。若儿壮实。春夏晴暖。又所不宜。）用红枣烧烟熏之亦妙。不论冬夏阴晴。凡出痘家皆宜用。能转逆为顺。

〔天萝水〕（一名西来甘露饮。）治痘疮清热解毒。及斑疹烦热。口渴。咳嗽。疹色枯燥。或谵语喘急。睡卧不宁。服之神效。痘症发热三四日而热不退。痘色红紫口渴。大便燥结之症。服之即能红润。

丝瓜藤霜降后三日近根三尺剪断。将根头一节倒插入新瓦瓶中。

上以物盖之。勿使灰入。次日另用新坛一只。将瓶中之汁倾在坛内。将藤仍插入瓶中。三日后汁收尽。（不拘三五枝数）将坛封固窖于泥地上。如遇热症痘疹。每服两酒杯。和蜜少许温服二三次。胜于别味凉药。若夹斑痘疹。和犀角磨汁服。寒月酒服。一切时疫热症。或配药服之甚验。

〔防痘入目〕未见痘时。用绿豆七粒。令儿自投井中。频看井中七次而还。胭脂。

（不拘多少。）口中嚼汁。频揩眼眶。则痘不入目。如已见点。用牛蒡子。（不拘多少。）

乳母口中嚼烂。贴儿头上囟门。则痘不入目。

〔痘疮入目〕

目中已生痘。用芥菜子一合研碎。入百草霜同研匀。男女各吐津一口。

拌匀作饼。（左目则贴右足心。右目则贴左足心。）两目皆有。贴左右足心。一昼夜即消。黑狗耳上取血一滴。入眼角即去。

兔粪。（炒黄为末。）炼蜜丸绿豆大。用木通蝉蜕煎汤下三十丸。以好为度。眼内有痘痛楚者。用浮萍。（晒干为末三钱。晒时摊竹筛上。下用水映。

则易〔痘疮入目后生膜翳〕白菊花。谷精草。绿豆皮。（各等分）为末。每用一钱。用柿饼一个。米泔水一盞。同煎。候水干。只吃柿饼。日三次。十日效。

〔痘后眼疳〕

菊花。蛤粉。兔粪。草决明。谷精草。（各一两）蝉蜕。（去翅足三钱）

为末。鸡肝一具。（不落水者。）竹刀批开。入药末一钱。箬裹蒸熟食之。以好为度。

〔痘疮作痒〕荆芥穗。（一把束成帚）刷痘痒处。以散郁邪。其痒即止。再以茵陈梗叶烧烟。房内熏之。

〔痘陷不起〕

痘色变黑气欲绝者。穿山甲。（洗净。蛤粉炒令黄脆为末。）每用五分。

紫苏煎汤。加酒调服。即发红色如神。倒陷黑色。口唇冰冷。取狗蝇。（七枚。狗身上夏月最多。冬月藏于耳中以镊取。）焙干为末。酒调下。移时即红润如常。痘疮倒陷。人中白。（火为末。）水调三钱服之。陷者自起。年大倍加。（此三方。按本草亦皆验过而无碍。胜如用人牙多矣。）

〔治痘口渴〕红花子。牛蒡子。水煎细细咽之。即口中如烟。服之即止。（按红花子能治血热烦渴。天行时痘。宜水吞数粒甚效。）

〔痘疮擦破〕松花糝之即效。发热发痒擦破。用蝉蜕。地骨皮。（各一两）为末。

每服二三匙。白汤服。日二三次。

〔烂痘及误抓破者〕黄牛粪。（在风露中久干者火成灰）取中心白者为末。以薄绢包盛于疮上扑之。如久不愈。墙上白螺蛳壳。研敷之。

〔痘疮溃烂〕荞麦面用绢袋盛扑烂处。或铺席上衬卧。

〔斑烂〕

痘出抓成疮。浓血淋漓者是。多年墙屋上烂草。焙燥研极细。糝疮上即效。

（此草善解疮毒之功甚验。）

气虚血热。遍身皆是者。铺席上。令儿坐卧其间甚验。黄豆壳烧白灰。研细糝之。遍身无皮。脓水粘衣被。茶叶。（不拘斤数拣去子梗净。）入滚水一泡。随即捞起。乘湿铺床上。用草纸隔一层。令儿睡一夜则脓皆干。神效。

〔湿烂〕 痘疹十余日。湿烂不结痂。干绿豆粉糝之。

〔痘后头上破碎不结痂〕 黑豆。（炒焦为细末）香油调敷。

〔痘后不收脓〕

墙上草研末。（即前治斑烂之草。）敷之。内服保元汤。人参。（一钱）

黄。（二钱）甘草。（五钱）生姜二片。水煎。不拘时服。

〔痘痂燥〕 痂皮溅起作痛。或痘痂欲落不落者。白蜜。（不拘多少）略用汤和稀。

时时以鹅翎润痛处。痘痂易落无痕。

〔痘疮不靨及痂靨不落〕

猪骨髓。白蜜。共捣匀。火上熬三五沸退凉。用鸡翎刷上。

数次即落。如不能脱靨。用乳香房内焚之。

〔痘痂不落肿而成斑痕者〕

马齿苋。（捣汁）猪脂油。（熬净）石蜜。各等分。共熬成膏。

涂肿处即消。并治痘后肿毒。

〔落靨后痘疤痛痒〕

马齿苋。（捣汁一碗）冰糖。（一两）猪脂油。（三钱）绿豆。

赤小豆。（研末各五钱）先将苋菜汁同豆末熬成膏。加入糖油和匀涂之。

〔出汗不止〕

牡蛎粉。贝母。（各五钱）粳米粉。（一升）和匀。绢袋盛。周身扑之即止。

〔痘有浆时腹泻〕 大魁栗。（以酒坛头黄泥和湿火煨熟）服之即止。

〔痘中出蛆〕 桃叶。（不拘多少揉软）盖在痘疮上。并垫身下即消。或用真麻油滴一点痘上。即消尽不再生。（并治夏季一切疮毒皆效。）

〔痘疔〕

凡痘中数颗不起。变黑而痛者痘疔也。绿豆。菟豆。（各四十九粒各烧存性）

珍珠。（一分。入豆腐内煮过研细。）油发灰。（二分）俱为极细末和匀。用胭脂水调成膏。先以银针挑破痘疔。拭去紫血。敷药疔上。

升麻煎浓汤去渣。将胭脂浸汤内。揉出红汁。即以脂棉蘸汁。时时涂之。

〔暑天火痘〕

遍身皆红者是。白花地丁捣汁。白酒冲服。并治痘喘。用水煎服甚验。

〔痘后余毒〕 初发红肿。用赤小豆。绿豆。黑大豆。（各等分）

为末。醋调时时敷之。

如已成痈毒。四围涂之即消。

〔痘毒〕 即高肿不宜开刀。大虾蟆。（一个取皮）中用针穿五七孔。盖在毒上。

燥则易之。至三四个立消。并不再发。（冬月在乱石下。或沿河近水石岸寻之。）羯羊屎以新瓦洗净置屎于其中。上下以瓦覆定。慢火炙燥。烟尽存性。研细末。香油调敷。

〔痘毒溃烂〕 百合。（焙研细末）糝之。自溃出脓之后。脾胃虚弱。脓清不敛。

人参。黄。白术。（炒各一钱）甘草。（三分）加姜一片。枣二枚。水煎食远服。以好为度。

〔痘后疳蚀疮〕 遍身及肢节生疮。脓水不绝。鹅口茧。（不拘多少）将生明矾末。

装入满。火烧枯为末。干糝疮口内即敛。

〔痘后面疮〕 密陀僧。白僵蚕。白芷。鹰矢白。白附子。（各等分）

研极细末。以水调敷。凡痘后不宜即吃豆腐。鱼腥。肥肉。多食致泄脾气。

〔麻疹发散〕 樱桃核。（四十九粒）敲碎。葱头一个。水煎服。即能透发。

分开顶门。内有红筋瘰挑破。即闷者易出。
如发时腹泻。只宜清解。不宜止泻。用西河柳五钱。

水煎服。如闷疹发不出。喘嗽烦闷躁乱者。用西河柳叶。（风干为末。）每服四钱。水煎服。

疹〔治疹不透〕

头面眼眶肿胀。气喘命在顷刻者。以熏法治之。生葱头。（斤许连须捣烂。）放在盆内〔儿大盆大。葱亦加多。〕盆上用木架将小儿睡在盆架上。然后将滚水冲入盆内。以葱气熏儿周身。稍温即抱起。此法须在密布帐中。勿受一线风吹。直待汗干。即得透发全好。（须防小儿手足入滚水。）

杏仁。（十粒去皮尖。研细末。）

酒酿。（乃酒初酿之酒母。不可误服烧酒酒浆）调服发暗疹最效。

〔冬月麻疹〕

因寒不得发透。喘渴闷躁者。麻黄。（去节汤泡过）用蜜酒拌炒八分。

加入治疹药中。一服立透。

〔误吞诸虫〕 饮靛青水即泻出。

〔腹内虫积〕 槟榔为末。清晨蜜水调服。使君子肉。（半生半熟）每日食数粒。榧子切片多吃甚效。如觉咬痛。（痛时恶心吐水流涎。时痛时止者。为虫痛。）用五灵脂二钱。

白枯矾五钱。研匀。每服一二钱。不拘时服。以好为度。

〔寸白虫〕

色白两头尖长三五分不等。常从肛门口出。槟榔。（八两）榧子。（一斤）

木香。（一两）俱切片微炒为末。每服二三钱。先吃素三日。择初三四五更先吃炙肉。口中嚼汁咽下。

卷四

外科

〔总论〕

外科最重者莫如痈疽。最急者莫如喉风疔肿。患之者生死立见。痈者壅也。

大而高起属乎阳。其发红肿广大者痈也。（痛而实者为热。痛而痒者为寒。）发于六腑易治而难瘥。（浅而大者为痈。深而恶者为疽。）疽者沮也。平而内发属乎阴。其发猛恶。其初发也。形如黍粟粒大。白色焦枯。触之而痛应心者疽也。最不可轻忽。难治而易瘥。如其不痛。更为恶症。所发之处。最忌发背。发脑。发鬓。发眉。发颐。初生之时。便觉壮热恶寒。

拘急头痛。精神不宁。烦躁饮冷者。其疮必重。若得起居平和。饮食如故。便利调匀者。为易治。一寸以上曰痈疽。一寸以下曰疮疖。（发热于皮肤之间。浮肿根小。即大亦疮疖。）大抵痈属热宜凉药。（已溃勿服。）疽属寒宜温补之药。

〔背疽〕初起之时。不拘日期。阴阳肿痛。即用独头大蒜。（切片如二三钱浓。）安于疮头上。用大艾炷灸之。（三壮一换蒜片。不论数十百壮。）大痛者灸至不痛。麻木不痛者。

灸至痛时方止。最宜早觉早灸。过七日则无效。如背疽赤热肿痛。莫辨其头者。但以湿纸覆于背上。立候视之。其纸上有先干处。即是疮头。如十数头作一处生者。即用大蒜捣成膏。

作饼铺头上。聚艾于蒜饼上烧之。亦能活也。盖艾火能使毒瓦斯随火而散。（凡毒初起皆可灸。

惟头顶以上属阳明。断不可灸。）若失之于初。疮势以成。又当审其虚实寒热。实热则清之。虚寒则温之。得毒散脓溃。方为可治之症。（痒极者。用针刺破。挤出恶血。数次得痒止即易治。）

〔托里护心丸〕

灸后即宜多服白矾。（一两二钱）黄蜡。（一两）雄黄。（一两二钱）

朱砂。

（六钱水飞）琥珀。（一钱）俱为细末。先将黄蜡化开。入药末和匀。须众手为丸。桐子大。

每服三十丸。白滚水下。日三服。可免口舌生疮黑烂等症。凡痈疽毒症。多进数服。已成者最能止痛。未破者即能内消。不问阴阳老少。皆可服。（原方用白矾末一两。黄蜡七钱。化蜡众手为丸。每服三十丸多服神效仙方也。）

〔一切痈疽发背对口〕 不论阴阳平肿。无名肿毒皆治。大虾蟆。（一个。毒大者。二三个。生于住屋檐下者佳。冬天为乱石下。或河沿口石缝中。）入明矾二三钱。连肠肚同捣烂。浓涂四围。中留一孔。毒重者一二时后即臭。再取捣换。以好为度。至重昏沉不知疼痛者。更换十余次。再无不效。是能收提散毒至稳方也。

〔发背肿硬痛深〕 槐米。（五两鲜者更佳）炒黄微。乘热入酒二碗。煎十余沸。去渣热服。取汗即愈。未成者二三服即消。已成者三四服即减轻。渣捣敷患处。惟胃寒者不连服。

甚神效。肿硬脉实。邪在内者。用大黄。（不拘多少。一半火煨。一半生用。）生甘草节等分为末。每服一二钱。空心温酒调下二三次。以疏利为度。

〔阴疽外势平而不起色黑黯〕
艾叶。（一斤）硫黄。雄黄。（各五钱）以水同煮半日。

捣烂候温敷上。冷则再煮。易十余次不痛者知痛。如痛在肉里者。肿痛出外可生。猪胆汁。

（炒〔痈疽半阴半阳〕
肿不甚高。积日不消。白芷。石菖蒲。赤芍药。（炒各二两）紫荆皮。（炒五两）独活。（去节炒一两）俱为末。葱头煎浓汤。调涂四围。即肿出高起易治。

〔一切痈疽发背〕 由七情内郁而生。蕴热在内。热气逼人。服之极验。并治乳痈乳疔尤效。远志。（米泔浸洗去心）焙燥为末。每服三钱。酒一杯。煎数沸。澄清饮。渣敷患处。

以好为度。

〔蟾酥丸〕 治一切痈疽发背疔毒恶症。此药服之。不痛者即痛。如痛者即止。昏愤者即醒。呕吐者即解。未成者即消。已成者即溃。真有回生之功。乃恶证之至宝也。宜备施之。

蟾酥。（生取晒干二钱用时烧酒化开）轻粉。（五分）枯矾。铜绿。胆矾。寒水石。乳香。（箬上炙去油）没药。（箬上炙去油）麝香。（各一钱）蜗牛。（二十一个）朱砂。（三钱）上药俱为细末。照合太乙丹法。于端午七夕静室中。先将蜗牛

研烂。再同蟾酥和匀。方入群药。共捣极匀。丸如绿豆大。每服（轻者三粒。重者五粒。）用葱白五寸。患者自嚼。吐于男左女右手心。

包〔仙方活命饮〕治一切痈疽。无名肿毒。未成脓者内消。已成者即溃。此止痛消毒通用之神方也。不论虚实老幼皆可服。穿山甲。（炮黄）白芷。防风。天花粉。赤芍药。归尾。

贝母。皂角刺。生甘草。乳香。（去油）没药。（去油各一钱重者加重。）金银花。陈皮。（各三钱）在背俞用角刺为君。如在胸次。加栝蒌仁三钱。在四肢金银花为君。如疗毒。加草河车根三钱。将各药水酒各半煎浓。再将乳没研细。入药调服。日进二服。侧睡片时即效。

如阴毒平而不起者。去花粉。银花。如热甚脉实。大小便秘者。加疏利之药。

〔七厘散〕治一切无名恶毒。诸药不效者。赤练蛇。（灰存性）研细末。米糊为丸。

如芥菜子大。每服七粒。症重者加至十四粒。好酒下四五服全消。此方甚效。孕妇忌服。

〔大归汤〕治一切痈肿大毒。初起者立消。已溃者止痛收功。服下立效。大全当归。

（一两切片）生黄。金银花。（各五钱）生甘草。（二钱）水酒各半煎浓温服。重者日二服。

上部藤。

（五两。用木槌微捣不可碎。）甘草节一两。水二碗。入瓦罐内慢火煎至一碗。加生酒一碗。

再煎十数沸。分二次一日服尽。得两便通利即效。如不利再服。（此方神效。）

〔一切痈疽肿毒围药〕不拘部位。红肿高起者。用野苈麻根。（取白嫩者。）赤小豆。

（痛。

如大痛者可以止痛。

大虾蟆一个取皮。包四围。中留一孔。二三次其效甚速。不论阴阳皆治。活蜗牛。（不拘个数。）入银朱二钱。同捣烂敷四围。活蜗牛百个。以井水一钟同入净瓶内。自晚封闭至晓。其水如涎。调真蛤粉涂四围。治发背效。葱白捣烂。和蜜调匀。涂四围。轻者即效。端午日取苍耳草。（根叶风干。研细。或烧存性。）重阳日采芙蓉叶。风干为末。等分和匀。蜜水调涂四围。即消。芙蓉叶捣汁。和生白酒服。将渣敷上即消。或用芙蓉根切片煎酒服。随量饮更效。黄瓜放在滴卤内。发背初发时。将黄瓜切薄片贴上。一周时一换即消。发久破烂不住。用花椒煎汤。或甘草汤洗去烂肉。亦用黄瓜粘贴。

一日一换。二三日内可收口。发背诸药不效。芭蕉根捣烂敷之。效。

〔秘方托里散〕治一切疮毒。始终常服。不致内陷。至效仙方也。栝蒌。（大者一个捣碎）当归。（酒拌炒）黄。（盐水炒）白芍。生甘草。（各一两五钱）熟地。天花粉。金银花。

皂角刺。（切片炒各一两）每用五两。以无灰酒五茶杯入瓷器内。浓纸封口。再以油纸重封。

置汤锅内盖煮至药香。取出。每日分服。直至疮愈为止。（此方药品平易。消毒之功甚大。

且不动脏腑。不伤血气。不问阴阳肿溃。屡用屡效之妙。）凡治背疽脑疽。势甚者。先用蒜法灸之。若脉实大小便秘者。先用疏通而后用此。其功甚捷。若火毒已退。不作脓不溃者。

更宜托里。如溃而不敛脓清者。又宜峻补。如十全大补汤之类。

〔定痛散〕一切肿毒发背痛不可忍。服之即止。白芷。（未溃五钱已溃二钱五分）贝母。（未溃二钱五分已溃五钱）水酒各半煎浓服。外用鲜山药。（一两）白糖霜。大黄。（各四钱）

俱研细。

甚者。用赤练蛇。（火存性。研末。不犯铁器。）加姜黄。藤黄。各研细。米醋调敷。即能止痛。

〔透骨丹〕治一切痈疽肿毒。坚硬不溃。此药立能溃脓。蟾酥。硼砂。轻粉。巴豆。

（各五钱）蜗牛。（二个）麝香（一分）先将巴豆研如泥。次入蜗牛麝香再研。后入各药研极细。

以瓷瓶收藏。每用少许。以乳汁化开。先用银针轻轻拨破。挑药米粒许纳于疮口。外用清凉膏贴之。即溃。

凡疮未破。先湿热脓水淋漓不得卧者。用菖蒲晒干为末涂之。鲜用亦可。

〔替针散〕一切肿毒。不出头。不穿破。用蛾口茧。（出过蚕蛾者一枚烧灰。）酒调服自出头。切不可多服。二三枚即出二三头。

雄麻雀粪。（头尖挺直者是也。）同赤小豆为末调敷之。自破。痒肿无头。用皂角刺烧灰。酒下三钱。嚼黄蜀葵花子三五粒即穿。

〔透脓散〕一切痈疽肿毒。内脓已成不穿破者。生黄。（四钱）穿山甲。（炒末一钱）

川芎。当归。（各二钱）皂角刺。（一钱五分）水二碗。煎一碗。随病前后服。入酒一杯同服。

即出毒。

〔猪蹄汤〕洗一切痈疽杖疮溃烂。去恶肉。黄芩。白芷。赤芍药。当归。羌活。甘草。

露蜂房。（有蜂儿者佳各等分）看毒之大小。每用两许。先用猪前蹄二只。（重一斤许者）并水六碗。煮蹄软为度。去油只取清汁。入前药两许。再前十数沸。去渣。以旧片温洗。恶肉随手而下。宜避风。忌人口气吹之。并忌月妇孝服。及猫犬入病患房。次用抿脚挑玉红膏于掌中捺化。遍捺新腐肉上。外以黑膏贴护。早晚洗换两次。内兼服大补脾胃暖药。腐肉自脱。

新肉即生。洗疽之方甚多。惟此方为最效。然轻者仍用生甘草煎浓洗。

〔玉红膏〕白芷。（五钱）归身。（二两）紫草。（二钱）甘草。（一两二钱）血竭。轻粉。

（各四钱）白蜡。（二两）真麻油一斤。先以前四味入油内浸三日。大勺内慢火熬药微枯色。

细绢滤去渣。将药再煎滚。下血竭化尽。次下白蜡亦化。遂倾入碗内顿冷水中。候少顷。将研细轻粉投下搅匀。收口生肌。长肉。诚外科收敛药中之神品也。（凡用

收敛收口药。须看疮内新肉淡红色掺入。好后无患。紫色者尚须提毒。)

〔治一切腐肉〕巴豆。(二十粒去壳及细皮炒黑存性)雄黄二分共研极细。取少许掺腐肉上。一日夜即去。(麻油调涂亦可。即乌金膏。去腐生新之宝也。)

〔肿毒烂不住者〕白盐梅同皂角烧灰存性为末。四围箍之。发背烂见五脏。用大鲫鱼一个。去肠。入羯羊粪其中。烘焙焦黑为细末。掺之疮口自收。昔有人溃烂将死。人传是方。用之即效。后屡试皆验。须脓少生肌时用之。

〔治肉瘀突〕南硼砂。(黄色者一钱)入冰片少许研细。灯草蘸药点之。如恶疮死肉不消成紫黑突出高起。乌梅肉捣烂。入蜜少许。摊纸贴之。恶肉即收。永无后患。

〔治一切痈疽不收口〕红粉霜。(四钱即三仙丹)乳香。(二钱炙去油)没药(二钱炙去油)儿茶。(二钱)珍珠。(一钱入豆腐蒸过布包捶碎研细)俱为细末。先用甘草汁洗净。棉花拭干。将药末掺上。外用膏药贴之。一日一洗。此药能提毒生肌。脓未尽时即可用。或只用乳香。没药。(俱炙去〔制红粉霜法〕水银一两。焰硝一两。明矾一两。俱研细。与水银拌匀。入铁锅内。

用浓瓷碗覆之。盐泥封碗口。晒干。不令些微透气。用石一块压之。文武火烧三炷香。常看泥干有缝。即以湿衣补之。忌孝服月妇鸡犬见。候冷升在碗上者即三仙丹。能治一切肿毒。

及刀伤跌破成脓者。皆用少许掺入疮口。上以膏药盖之。未溃者能化脓。已溃者能提毒收口。

不须换药。如加入朱砂雄黄。(各水飞三钱)同升。即五仙丹。利于收口。凡升就一年后。

用入疮不痛。急用者以井水飞之。

〔一切痈疽痔漏恶血不止〕琥珀。(二三分)研极细末掺上。即能止血收口。脓水不干。用黄蜀葵花煎汤洗。如多年不瘥。及翻花疮。用马齿苋捣烂敷上。多次即效。

〔一切肿毒脓尽虚不收口〕鳖甲。(存性)研极细末。掺入疮口即效。地鳖虫。

(新瓦上焙焦)研极细末。掺上即效。并治刀斧伤久不收口。如年久不收口成管者。用不见天以膏盖之。即愈。

〔多年恶疮肉顽不收口〕久年锻石研末。鸡蛋清和成块。过。再研姜汁调敷即敛。蜣螂一个。焦研极细。掺入即敛。漏疮皆治。上好松萝茶一撮。先用水漱口。将茶叶嚼烂敷在疮上一夜。次日揭下。再用人参末拌油胭脂涂在疮上。二三日即收口。

〔诸疮成管〕大蒜梗烧灰存性搽患处。其管即退。

〔诸疮久溃〕丝瓜老根熬水洗之。数次即愈。

〔豆豉饼〕治一切肿毒硬而不溃。溃而不敛。及顽恶年久不敛。用江西豆豉研末。唾津和饼。如三钱浓。一钱大。置患处。以艾壮于饼上灸之。干则再易。如背疮以漱口水调饼铺患处。以艾铺饼上灸之。如未成者即消。已成者亦杀其大毒。不问阴阳至稳之方也。如有不效。必气血虚败也。

〔溃后煎方〕凡疮毒已溃之后。不生肌而色赤甚者。乃血热也。四物汤。（熟地当归各三钱川芎一钱芍药二钱）加黑山栀。连翘。各二钱。色白而无神者气虚也。四君汤。（人参白术茯苓各二钱炙甘草一钱）加当归。黄。各二钱。晡热内热。阴血虚也。四物汤加人参。白术。各二三钱。脓水清稀者。气血虚也。十全大补汤。（四物四君汤相合。加黄肉桂各一钱。）食少体倦。脾气虚也。补中益气汤。（方见虚损门）烦热作渴。饮食如常。

胃火也。竹叶黄汤。（淡竹叶二钱。人参黄生地当归麦冬芍药甘草石膏炒黄芩各一钱。）

若败肉去后。新肉微赤。四沿白膜者。乃胃中生气也。但用四君子汤以培补之。如毒深溃浅。红肿未退者。仍宜金银花。黄。当归。甘草。各等分。水酒各半煎浓。分病上下。食前后日二服。不问老少虚实皆可服。

〔巴膏方〕治发背。对口。搭手。疔疮。肿毒仙方也。象皮。穿山甲。（各六钱）人头发。（一两二钱）山栀子。（红者八十个去壳）血竭。儿茶。（研各二钱）真番砂。（一钱五分研末）桃、柳、榆、桑、槐、五种树枝。每种七条。三寸长。麻油二斤。将树枝煎枯。

取出树枝。再入头发象皮穿山甲煎化。再入山栀煎枯。用绢袋滤去渣。将前油复入锅内。熬沸去火。少定入炒过黄丹半斤搅匀。将锅取起。再入血竭。儿茶。砂。细细搅匀。用冷水一盆。将药倾入水内。用手扯药千余遍。换水数次。拔去火气。保存瓷罐内。临用温水荡开摊贴。不用火烤。如存地下年余。不用水拔。每净油一斤。入黄丹四两。夏用五两炒枯加入。

〔紫云膏〕

治一切肿毒初起。未破者即消。已破者即愈。白芨。白蔹。马钱子。商陆根。

黄柏。蓖麻仁。独活。羌活。生大黄。（各一两）生地。当归。血余。（各四两）用麻油四斤。春夏浸三日。入桃、柳、桑、榆、槐枝。（三寸许。各三十段。）每净油一斤。加炒黄丹五两收之。（一切膏药熬好。浸入尿缸内愈久愈妙。）

〔鲫鱼膏〕治百样疮毒。未成者即消。已成者拔毒收敛。牛脚合。（二只）羊角。（二只）猪脚合。（三十个）穿山甲。番木鳖。南星。赤芍。白芨。（各一两）商陆。地丁。白紫英花。（即夜合花各一两五钱）巴豆肉。（五钱）大黄。（四两）蓖麻仁。（二两）生地。当归。

（各二两）元参。（三两）鲫鱼。（一尾约十两重）用麻油五斤。将药煎枯滤去渣。再熬滴水成珠。

每净油一斤。入炒黄丹五两收之。

〔神效当归膏〕治一切发背肿毒。汤火疼痛。生肌止痛。去腐生新。其效如神。凡洗拭换膏。必须预备即贴之。新肉畏风故也。当归。生地黄。（各二两）白蜡。（一两）用麻油六两。先将当归。生地。各一两入油内煎黑去渣。又将二味各入一两。煎至微焦复去渣。乃入蜡熔化。候冷搅匀。即成膏矣。用涂患处。以纸盖之。如有死肉剪去。则生肌尤速。

〔疔疮〕症有十三种。色有青黄赤白黑。（青疔发于目下。黄疔发于口唇。赤疔发于舌根。白疔发于鼻右。黑疔发于耳前。）因发于五脏。色故有各别。内一种名三十六疔。（其状头黑浮起。形如黑豆。四畔赤色。初生一个。日增一个。若满至三十六个。则药所不治。

急疔之得生。）复有暑疔。火疔。气疔。冷疔者。皆以其时候缓急浮实之不同。但初起疮心先痒后痛。先寒后热。热定则寒多。凡人一二日间恶寒发热。四肢沉重。心惊眼花。或遍身麻木。头痛呕逆。稍异如常。须宜遍身寻认。如有小疮突起如钉。即是疔也。大抵起紫者多。起堆核者少。发于手骨节之间。其症最急。或肩或腰或足稍缓。初生用黄豆入口嚼。无豆腥气者是疔。即吃菜油一钟。保无性命之忧。生两足者。多有红丝至脐。生两手者。多有红丝至腋。生唇面口内者。多有红丝入喉。以针刺疮不痛无血。是其候也。急宜用针于血丝尽处挑破。使出恶血。若红丝已近心者。即挑破疮头。用铁锈三钱。（生铁上衣也。）牡蛎二钱。青盐一钱为末。以灯盏内油调搽。其丝自回。凡疔初起。急用针刺中心至痛处出毒血。

并刺疔四畔十余针出恶血。即以蟾酥丸一粒。（方见治痈疽。）研碎掺入。上以巴膏。（无则拔毒膏。）贴之。

或用大蒜片贴疮口。用艾丸不拘壮数灸之。若灸而不痛。去蒜贴疔灸之。

如灸或刺之后。宜服乳香一两。（炙去油。）绿豆粉四两和匀。每服三钱。甘草浓汤下。即护心散连下数服。可免毒瓦斯攻心。迷闷呕吐。并服通利药。（乳香。木香。沉香。丁香。香附。黄。射干。连翘。升麻。独活。桑寄生。甘草。木通。）各一钱。水煎服。或蟾酥丸之类。

如针之不痛。其人眼黑。或见火光若呕。直视谵语如醉者。皆不治。凡人暴死。

取灯遍照其身。若有小疮。即是疔毒。宜急灸之。并服蟾酥丸。可以得生者。

〔治疗急救方〕家菊花叶捣汁一碗。（冬间用根。）生甘草四钱。另煎浓汁半钟和入菊汁内服之。重者二三次。再无不效。（如一时无鲜者。以茶菊四两。甘草四钱煎浓服。）肘后方云。生疔垂死者。菊汁入口即活。

苍耳子及梗内虫冲酒服。至验。

外用蜣螂一个。巴豆一粒。同捣极烂敷上。即能拔去疔。

苍耳根白梅肉。同研烂敷疔上。即能拔疔。陈年露天铁锈。研极细末。将银针挑破疔头一孔。纳铁锈末于内。仍将皮盖好。少顷黑水流尽。

有白丝如细线。慢慢抽尽疔根即愈。虾蟆。（取肝胆一副。）加银朱五分。麝香五厘。共捣敷疔上。干即易之。数次即消。蜈蚣虫捣烂敷疮上。疔即拔。

仙乔草。紫花蒂。草。

各〔疔疮毒瓦斯入腹呕吐〕苍耳草。（根叶共捣。）服之即效。

〔嘴唇上疔疮〕将两腿腕中紫黑筋。用针刺出恶血。即消。

〔疔疮针刺之后余毒走散作肿〕郁金。白芨。白蔹。大黄。白芷。（各四两）黄柏。（二两）轻粉。（五钱）绿豆粉。（一两）俱为细末。蜜水调涂四围。凡疔毒点化毒丸之后。如无巴膏及拔毒膏。宁用白芨为细末。放在瓷碗内。入水沉下如糊。涂纸上贴之。切勿用生肌膏。

出脓血之后。中如黑陷漏疮。四围死肉不去。不生肌者。仍不治。

〔血疔〕刺破血出不止。用真麻油一钟服下。即止。

〔麻子疔〕

其状肉起头如黍米。色稍黑。四边微赤。始末皆痒。忌芝麻麻油着麻衣。

仍照前法治之。

〔刀镰疔〕

其状如韭菜阔。长一寸。左侧肉黑如烧烙。忌铁器针刺。仍照前法治之。

〔暗疔〕 疮头凸红。人气昏狂。乌

根当行路者取二尺。去皮捣烂。井华水调下一盏。

服后泻一二次立效。

〔鱼脐疔〕 丝瓜叶。葱白。（连根）韭菜同捣烂取汁。以热酒和服。渣贴腋下。病在左手贴左腋。右手贴右腋。左脚贴左胯。右脚贴右胯。在中贴心脐。用绵缚住。候肉下红线处皆白则散矣。须令人抱住。恐其颠倒。则难救矣。

〔食牛马六畜毒生疔〕 昏狂欲死者。用乌

叶或根捣汁一二碗服之。得泻即愈。不泻再服。

〔疔疮恶毒攻心烦燥作渴〕

青靛。（无灰净者二两）雄黄。（五钱）苍耳子。（烧灰二钱）

俱研细。每服二三钱。蜜水调下。可以护心。

〔疔疮危笃〕 土蜂房。（连子全个）蛇蛻一条。（全）入瓦罐中。黄泥固济。火存性为末。每服一钱。酒调下。少顷。腹中腹痛。痛止。其疮已化为黄水矣。危笃者两服愈。轻者一生姜。（二两）和匀。每服一两。水酒各半煎浓服。解毒尽为度。即生疔走黄将死者。加牛蒡子一两。乳香没药各五钱。和匀服之。即可回生。凡生疔毒。忌孝服月妇。并安息麝香。汤火气。臭气触犯。更忌风寒、房事、荤腥、油腻、生冷等物。若有不谨。则痛不可忍。亦且难治。疔症由于恣食浓味。或食自死六畜等肉。或人汗入肉而食之。或感蛇虫之毒。皆致生疔。人事者咸宜避之。

〔水疔〕

蜗牛同菊叶捣烂敷之。（如无菊叶。以野苧麻嫩头代之。）初生白头痛而兼痒。

亦带黑色。不在部位。不发寒热易治。

〔对口疮〕 大鲫鱼一尾。入瓷器内捣烂。再加头垢二三两拌匀浓敷上。中留一孔。外以纸贴之。一二日即愈。膨皮鱼连肠骨捣烂敷上。即散。至重昏沉者。虾蟆一二个连肠骨捣烂。加白矾末二三钱。拌匀浓敷之。中留一孔。或干或臭即易之。甚者一二十次。再无不消。屡试神验。芭蕉根四两洗净捣烂。热酒冲服。渣敷患处。鲜茄蒂七个。鲜何首乌等分。水煎服。一服出脓。二服即敛。老母鸡出窠热屎。（抱小鸡蛋时佳。）涂之即愈。

〔肺痈〕咳时膈上隐隐作痛。吐咯如脓血臭秽乃是。鲜橘叶捣汁一盞缓缓服之。吐出脓血即效。鱼腥草水煮。不住口食之神效。兼治鱼口。金丝荷叶捣汁。生白酒冲服亦效。

大鲫鱼。（重半斤者两尾。）剖开洗净。入白果仁。（去心衣即银杏。）塞满鱼腹。用苙线扎紧。每日饭上蒸熟食之。不拘次数。以好为度。（鱼内勿用盐）白花百合洗净捣汁。每日用一碗。不拘时呷之。服七日后即见效。芥菜卤久窖地中百年者。每日服数匙。白汤下神效。

惟嘉兴府城中大家藏之。即转成肺痿者。服之即效。（愈后忌食葷一年。白鲞。鸭蛋。萝卜终身忌。）

〔肠痈〕小腹坚硬如掌而热。按之则痛。肉色如故。或赤微肿。小便如淋。汗出憎寒。脉气紧实者。用明矾。（四两）肥皂。（十五个存性）雄黄。（一两）大黄。（一两酒拌蒸。）

为末和匀。每服三钱。酒煎金银花五钱下。有脓从大便中出。无脓暗消。不泄再服。（若腹肚胀。大转侧闻有水声。或绕脐生疮。或脓从脐出。或大便下脓血。皆恶症不易治。）如脓出收口。白木耳淡煮猪大肠食之。即效。

〔悬痈〕由于三阴亏损。湿热结聚而成。在谷道之前。阴器之后。即海底穴也。初生状如莲子。少痒多痛。日久渐如桃李。赤肿痛。溃后轻则成漏。重则沥尽气血。变为劳瘵不起者多矣。用粉甘草四两。长流水浸透。炭火上炙干。再浸再炙。如此三度切片。甘草三两。当归三两。水三碗。慢火煎至稠膏。去渣再煎。稠浓为度。每服三钱。无灰热酒一大杯。

空〔搭手〕

生于背上近肩。全蝎三个。核桃肉同捣末。好酒冲服二三次。未成者即消。

已成者即轻。如已破烂。仍照痈疽门治之。

搭肩。大蒜片贴患处。艾灸三五壮即消。

〔肚内无名肿毒〕鳖甲存性为末酒服。腹内生疮。在肠胃不可医治者。取皂角刺不拘多少。酒一碗煎七分温服。其脓血俱从大便中出。

〔热疔〕端午日午时，独蒜切片贴眉心。至夏不发。芙蓉叶同菊叶捣敷之。立夏前水荡中小虾蟆。（初出黑而有尾者。）置瓶内。用碗盖之。以蜡封口埋地下。久窖成水。加入冰片二三钱。（如无亦可。）涂疔四围即消。一切肿毒。其效甚速。并治一切喉烂。涂上即效。热疔久不收口。用白木槿花。（存性。）

为细末。糝上即愈。（即疮口如碗大者亦效。兼治金疮刀斧伤。）

〔扎马疔〕 草。车前草。紫花地丁。水酒各半煎服。忌食鲜肉。

〔瘰〕 项颌结核名曰。生于胸膈者名马刀。久恐成漏。宜从早治。初起未破者。

将面捏成薄条。照子大小略离患处作圈围。着留子在内。再取槐树根在土内掘出者。白皮数条。放面圈内。皮上用小艾丸于子中心灸之。肉上略觉痛。即拂去艾丸。更换白皮灸三次。面圈不动。照法连灸三日即消。嫩苎根捣如泥。照疮大作小薄饼。每疮贴一个。再用艾加入乳香末丸如黄豆大。灸苎根饼上。每日灸三五壮。一月全愈。

〔治方〕 不论已破未破。蓖麻子。（去壳四十九粒）沥青。（一两）杏仁。（去皮尖十三粒半）真铜青。（二钱）共捣千余槌。自然粘软成膏。摊贴患处神应。未破者即消。已溃者去腐收口。内服玄参。（四两蒸）牡蛎。（四两醋）贝母（四两去心蒸）甘草。（一两）为细末蜜丸。每服三钱。白汤下。更效速。雄猪胆约百个。取汁去皮。入夏枯草三两。锅内同熬去渣。滴水成珠。加入沉香末三钱。砒霜三分和匀。收入瓷罐内。摊贴患处。如已破者涂四围。

中留头。以好为度。

〔瘰 肿痛久不瘥〕

狸头蹄骨并涂酥炙黄为散。每日空心米饮下一钱。外以狸头烧灰。

频敷之。（已破者更效。）

〔瘰 溃烂〕 土茯苓水煎服。以多服为妙。

或白玉簪花叶取其嫩者。以米醋浸一宿。

饭锅上蒸三次。先用苦茶洗过。贴患处。

久不收口。用田螺数个。炭火上炙干为末。糝上即效。凡此症。多食海带亦易消。

〔痰核〕 红肿寒热。状如瘰

。用锻石窑中流结土渣。轻虚而色赭者为末。菜油调涂。

其肿即消。三桑叶晒干为末。红砂糖调服。至二三两即效。如不痛不红。痰结痰核。用天南星。（研末。）芭蕉根捣汁。加姜汁少许。调匀涂之即消。内服金银花蒲公英。各四五钱。

煎汤代茶。饮半月效。

〔一切瘰 验方〕 不问已成未成。已溃。未溃。取肩尖肘尖骨缝交接处各一穴。即肩、曲池、二穴也。艾丸各灸七壮。如止病在左灸左。在右灸右。内服益气养营汤数十剂。

再无不效。人参。黄

。(盐水炒) 当归。川芎。熟地。芍药。(酒炒) 贝母。香附。茯苓。

陈皮。(各一钱) 白术。(炒二钱) 柴胡。(六分) 甘草。桔梗。(各五分) 水煎服。(脓多加芎归。

脓清加参〔鼠〕

石菖蒲生研罨之微破。以猫鼠皮连毛烧灰。用香油调敷。内服白薇为末酒下。

多服即效。并以酒调敷之。

〔瘤赘〕

初生如莲子大者。取蛛丝拈成粗线。缠扎其根。数日其丝渐紧。瘤根渐细。

屡易屡细即落。蒜片贴患处。艾丸灸五七壮。即能渐消。

血瘤已成大者。用甘草煎膏。

以笔涂周遭。一日上三次。又芫花。大戟。甘遂。各等分。为末。醋调。另以新笔涂甘草圈内。勿近甘草。频涂即消。

〔项下瘤〕 牛蒡子根为末。蜜丸常服即消。

〔两腮肿毒〕 大黄末葱汁调搽即效。 风热腮肿。用老丝瓜烧存性。研末水调涂。

〔腮〕 用赤小豆为末水调涂。腮破烂。用野苈根捣敷患处。内服龙须草煎汤服。

〔浸淫疮〕 生耳边面上出黄水。

羊须。荆芥。干枣。(去核各二三钱) 俱烧存性研末。

入膩粉五分。每用少许。先以温汤洗净拭干。以清油调搽。轻者以五倍子研细敷之。

〔火珠疮〕 其疮如珠。始于发中。相染不已。亦有伤命者。用生萝卜捣烂。将滴醋

浸敷患处即愈。

〔金丝疮〕形如绳线。巨细不一。上下至心即死。治法于疮头截住。刺之出血。后嚼浮萍涂之。即愈。

〔白蛇缠〕生于腰肚间。细白泡如白蛇相缠因名之。白芨。水龙骨。（粪船板缝上干灰。陈年朽烂者妙。）共研末。天泉水调涂。橘叶七片。糯米共捣敷即效。柿漆汁敷上四围。以朱点之。粪桶箍烧灰研末。麻油调涂。即红泡者皆治。凡肚上生疮。口嚼糯米敷之〔天泡疮〕天萝水。（方见痘症门）调宫粉敷上立愈。白花百合捣烂敷之。即效。

丝瓜叶捣汁涂之。立愈。小麦。（炒黑为末。）以生桐油调涂。立效。鲜蚕豆壳炒黑研末。

麻油调涂。立效。如日久作烂。疼痛不已。脓水淋漓。用石膏。（火研。）轻粉。（各一两）青黛。黄柏。（各三钱）俱研细。甘草汤洗净糝之。其痛即止。初起用柿漆涂之。即效。

〔漆疮〕韭菜捣汁。入烧酒少许涂之。即效。麻油调铁锈末涂之。蟹壳滑石研细末。蜜和涂之。旱莲草捣汁和酒服。另用煎水。日洗数次。忌浴热水。兼戒口味。畏漆之人。口嚼川椒。涂口鼻可免。漆入目。蟹汁滴入愈。

〔艾灸火疮不收口〕瓦松阴干为末。先以槐枝葱白煎汤洗之。以药糝上即效。

〔蛇窠疮〕即缠腰火丹。小疮如麦大。千百缠腰如蛇形。用蛇泡勒烧灰。麻油调搽。雄黄末酒调服。外用油调涂。

〔天蛇头疮〕生于手指尖。初起用生鸡蛋两个开一孔。取蜈蚣一条焙末入蛋内。套在患指上候热。再一个即消。猪胆一个。加入蜈蚣末套上亦妙。白芨末一钱。蟾酥三分。

共和鸡子清调涂。燥则易之。内服绿豆粉一两。乳香一钱。水调服三次愈。痛不可忍。

用蜈蚣一条火上烧。以烟熏之。良久即止。（按用蜈蚣者取相制之义。）凡手足指尖毒。用田螺捣烂涂上。即愈。

〔手指罗疔〕

菊叶捣汁和酒服三次。外以苍耳子内虫一枚捣敷疮口。上以膏药盖之。

数次效。夏秋取苍耳子内或梗内虫。以麻油浸入瓷瓶内。如遇疔疮肿毒。将虫敷疮口。并冲酒服。其效神速。

〔甲疽〕

绿矾。（火烧赤五钱）芦荟。（一钱半）麝香。（二分半）俱研末。以绢袋盛。

包患指上扎定。以好为度。如已溃烂。用牡蛎。（浓处生研）每服二钱。靛青和酒调下。渣敷患处。凡手足甲疽。或割损成疮。日久不愈者。用绿矾五两火烧至汁尽。研细。色如黄丹。

收入瓷罐内。先以盐汤洗净。敷上即愈。

〔手指忽然肿痛〕乌梅肉连仁捣烂。醋调稀入指浸之即愈。如因蛇蕈毒瓦斯触痛。以柏树叶同蜜捣烂敷之。

〔指义生毒〕名鸦翅。用蛇瓢草捣烂。入酒酿少许敷上愈。

〔虎口毒〕在手大指次指中缝不治。烂手。用鲜蟹捣烂涂患处自消。

〔寒湿疮〕鸡子煮熟。去白用黄。慢火炒出油。加黄柏末调匀涂上。立效。烟胶为末掺上。若燥。香油调涂。

〔湿热疮〕痛多出血。去腐即流血者。番木鳖念个切片。和麩皮同炒去油尽为末。加雄黄三钱。烛油调搽。

〔脓窠疮〕

大枫子肉。（乙佰粒）蛇床子。（五钱）雄黄。（二钱）枯矾。花椒。（各三钱）

俱为末。用烛油猪油。（各五钱）同捣烂。熔化调搽。内服川黄连三钱。白酒十斤。雄猪板油。（一斤）共入酒瓶内。蒸三炷香。随量饮。（须出火气一二日服。）苦参。（一两）花椒。

（三钱）煎汤洗效。

如生疮周身至重。诸药不效者。用穿山甲片。（炒黄研极细末）每服一两。

好酒调服。至三四服后尽行发出。连进七服后。即如完体。甚验。

〔疥疮〕 风化锻石和醋浆水调涂。随手而减。锻石淋汁洗之。甚效。
枯矾。（五钱）滑石。（五钱）硫黄。（三钱）俱为细末。猪油同研糊搽。
苋菜根焙燥为末。香油调涂。

东瓜藤或皮煎汤洗。遍身风痒者。浓煎浮萍汤浸浴速效。或用茵陈草浓汤洗。
遍身燥痒者。内服红花。归尾。荆芥。紫草。生地。（各二钱）
水酒各半煎。多服即效。

〔遍身热疥〕 痛而不痒。粘着衣被不得卧者。菖蒲根叶晒干为细末。先铺席上。恣卧于上。仍以衣被覆之。既不粘衣。又得安睡。五七日愈。

〔恶疮似疥十年不愈〕 全蛇蛻一条烧灰。猪油调搽。另烧一条。温酒服即效。

〔膝上生无名肿毒〕
名牛头痛。不即治则伤人。用糯米三合。连须葱头五个同煮饭。

乘热敷二三次即消。曲鳅未过七日用。牛皮胶四两入烧酒煎服。醉卧立愈。

〔冻疮〕 鸽子粪煎汤洗之。自效。冬瓜皮茄根煎汤洗之。
蟹壳烧灰存性研末。菜油调涂。冻脸上。用活雀脑涂之即效。
端午日用姜葱汁于冻处揉散血结。冬不再发。鲜樱桃。（不拘斤数。）入瓷瓶内封口。放在凉处发过。至冬月将樱桃水涂冻疮甚效。早涂数次则不冻。

〔翻花疮〕
其状疮内如饭粒。破之血出。随生反出。苍耳叶捣汁服半碗。并日涂三次即效。

〔肛门口痒疮〕 葫芦。（火烧存性）糝搽。
生疮久不愈。用鸡内金。（即鸡肫皮）烧灰存性。研极细。干贴立效。

〔偷粪老鼠〕
生肛门口。仙茅。（一两）山豆根。（二两）大黄。（一两）金银花。（一两）

百草霜。（五钱）俱为末和匀。每日清晨米饮和酒下五钱。外用干猫粪灰。用井底泥调敷。

〔坐板疮〕 牙皂荚。（微火炒。）天南星等分。俱研末。用姜汁调匀敷疮上。即效。
。绿矾一把。放脚盆内。滚水冲下浸洗。待痒止坐草纸上自干。数次效。切勿入尿管中。（入则疼痛。水洗即止。）黑芝麻口嚼敷之。立能止痒。
浮萍煎汤洗。甚效。

〔肾囊忽肿〕 韭菜地上蚯蚓粪二两。加甘草末五钱和匀。水调涂。肿痛者。用葱白乳香捣涂。痛即止。

〔肾囊疮〕 密陀僧。滑石各等分研细。姜汁调涂。
如阴汗湿痒疮。用桴炭紫苏叶为末。糝上即效。
连两腿生疮。用牡蛎。（炒）黄丹。（炒各二两）枯矾。（四两）为细末。

至夜睡时连擦两三次。五七日全消。松毛煎汤温洗。
燥痒疮。至五更时先以粗布擦过。口中嚼生芝麻搽涂五七次。即效。
抓搔成疮。以致肿痛者。甘草汤洗。以丝瓜汁调五倍子末涂之。
凡下部湿气。每日以百沸汤洗。亦能去湿。（忌用生水。）

〔肾囊风〕 地骨皮。（二两）吴茱萸。（一两）煎汤洗。松毛枫树叶同煎汤温洗。
如血热风痒。用地肤子煎浓汤洗。绿矾冲汤洗效。（勿可入尿管。）

〔阴颈生疮〕 白蜜调甘草末敷之。阴头溃烂。用女人经布烧灰油调涂之。
阴肿痛极。用马齿苋捣烂敷之。

〔癣疮〕 新鲜羊蹄叶不拘多少捣烂。加川椒。白糖。并食盐少许。以布共包之。浸陈醋内半日。取布包擦癣。三日愈。土蒺藜连根带叶捣烂。煎水荡洗即效。
皂矾不拘多少。

炒极干为末。猪胆调敷甚效。
大露蜂房不拘多少。以生白矾填入孔内。用破罐底盛之。仰口朝上。用炭火令白矾化尽。为末搽癣上二三次。除根不发。年久罗汉松树皮 存性。

米醋调搽。风癣时好时发者。巴豆壳二钱。明矾一钱。同研细生姜擦之。
三年老芋擦之。

能治年久顽癣。凡癣治好后忌食茄子。

〔黄水疮〕 石膏。（三钱火）龙骨。（三钱火）松香。（三钱）枯矾。（三钱）共研细。

用煮熟鸡蛋黄熬油。和前药敷上。
头面俱生者。苍术。（炒燥）糯米粉。（炒燥）等分。研匀。

糝〔疮〕
杏仁去皮尖。纸压去油。取霜五钱。轻粉。（一钱）和匀。将雄猪脊髓同捣。

先用黄柏煎浓汤洗净拭干敷之。将绢包好。数日即愈。
如污臭者。用龟板醋炙黄。火存性。加轻粉麝香少许和匀。先用葱汤洗净敷之。
柿叶烧灰存性。同川椒为末。搽患处即效。

花椒水洗过。将妇女头上带过通草花。不论颜色。贴之即效。敷治后不合口。以血竭为末糝之。将好用鲤鱼腹前鳞眼贴之。半月揭下。则不再发。

〔注脚疮〕 马齿苋捣烂敷之。或焙燥研细。蜜调涂之。

〔疮隔纸膏〕

松香。（一两。火上化开。倾入水中取起。）乳香。血竭。（各三钱）

共为末。香油调摊贴纸上。用针刺数百孔。反贴疮上。三日一换。贴时先用米泔水温洗净。初起陈年猪脂油。（数年久者佳各等分）乳香。（三钱研末）共入锅内熬化。用白绵纸裁成疮大二三十张。每张在药内提过。候纸两面蜡凝浓为度。将三十张叠成半寸浓。用针刺数百孔。以便通气。贴于疮上。用绢缚住。过一夜将贴疮一张抽去。又复包上。每日如此。俟恶水消尽。

即生肌长肉矣。血用桑根白皮。（捣烂加猪油研匀。照隔纸膏贴之。）

〔两腿血风疮〕 猪鬃。（灰五钱）烟胶。（即皮市熏皮烟煤炒净五两）黄柏。（一两炒研）真川连。（三钱）轻粉。（三钱）乳香。（去油）没药。（去油各五钱）血丹。（炒五钱）

俱为细末。用真地沥青调匀。先以葱椒水洗透。拭干敷上。用油纸包好绢扎。至七日后。再洗再敷。

屡验如神。如腿疮流黄水。瘙痒不止。用地肤草。（四两）花椒。（三钱）煎汤洗之。再用房内倒挂屋龙灰敷之。二三次立效。

〔脚面恶疮〕 羊粪 成白灰。麻油调涂。痒入枯矾。轻粉。少许。
久不收口。枯矾。

杉木。（烧灰各一钱）共研细。麻油调敷。

〔脚指缝烂疮〕 鹅掌黄皮焙干。烧灰存性。为末糝之。
赤石脂。苍术。（炒焦）俱研极细末。糝上皆效。暑月抓烂疮。口嚼细茶叶敷之。
风痒流黄水者。黄柏。（去皮不拘多少）用猪胆汁涂搽。晒干数次。酥透柏皮。方研末。先用花椒汤洗过拭干。随以末药敷之。

二三次即效。极痒有虫者。用乌根为细末。油调涂上。少顷涎水出即愈。湿烂不愈者。

以多年尿桶烧灰存性敷之。凡下部湿气脚烂。不能移步者。内服黄柏。（酒炒）苍术。（米泔水浸一宿盐水炒燥各五钱）水煎食前服。连服四五次。再无不效。

〔脚上生疮乱孔如蚁窝〕如意草捣烂敷上。桃树嫩精和陈年锻石。共捣成饼敷之。穿山甲烧灰敷之。皆效。

〔远行足打成泡〕水调生干面涂之。一夜即消。

〔脚垫毒〕人走长路紧急。被石块脚底垫。肿痛不能移步者。急用旧草鞋入尿桶内浸半日。或一夜。将新砖烧红。以浸湿草鞋放砖上。随以肿脚踏上。火逼尿气入里即消。若不即治。烂则难愈。远行肿痛。亦用此法。

〔脚碱鸡眼〕葱白荸荠捣汁一碗。再取松香四两。蜈蚣三条。麻油八两。另煎滴水成珠。方入前汁再煎。摊膏贴之即落。

〔手足冻裂〕蛇壳。乱发。鲜猪板油。（各二两）用清水十数饭碗。锅置露天。入药同煮。以棍频搅。熬至壳发无形。（如不化。再加水五十碗。）加入黄蜡四两。俟蜡化。倾入极浓瓷钵内。待其自凝。患裂者。先以温汤洗净。临睡时。用抵脚挑入裂内。立时定痛。冬至日制更效。

〔痔疮〕初起用马齿苋。不拘鲜干。煮熟食之。并煎汤熏洗即效。痔疮肿痛。用白鹅蛋两个去壳。入熊胆二分。冰片少许。研匀。入瓷罐内。密封。临用以手指蘸药搽之。

〔痔疮红肿翻头痛不可忍〕极大螺蛳一个去盖。入冰片五分。置茶钟内一夜。尽化为水。用鸡翎蘸扫患处。其性凉。立能止痛消肿。葱头和蜜捣点肿处。觉冷即消。破流脓血。用儿茶口中嚼烂敷疮上。先作微痛。数次后即结靥愈。

〔痔疮日久成漏〕胡黄连。（一两）穿山甲。（麻油内煮黄色）石决明。（）槐米。（微炒各五钱）炼蜜丸如麻子大。每服一钱。空心清米汤下。早晚日进两服。至重者四十日全愈。

如漏之四边有硬肉突起者。加蚕茧二十个炒枯研末。和入药内。外用苦参煎汤洗。每日二次效。如脓血多。肠污从疮孔中出者。先服刺皮。（炙切片再炒黄）胡黄连。（切片姜汁炒各一两）麝二分俱为末。软饭丸如麻子大。食前酒下一钱。服后脓水多去尽。再服前药。更易见功。

〔痔疮去管〕

犀角。（末）象牙。（末）乳香。（去油）没药。（去油各一两）明矾。（末）

黄蜡。（各五钱）先将黄蜡铜锅内熔化。掺入药末。丸如桐子大。再用连翘。金银花。各一两。

好酒五斤。同煮去渣。收入瓷瓶内。每日酒一杯。服前药二十一丸。即能除根。辣椒一百个连蒂晒干为末。糯米粉三升拌匀。水法为丸。如芡实大。每空心服十丸。白汤下。药完其管挂出如带。用麻药剪切。贴膏收口。立秋后马齿苋三十斤。取汁熬膏。用槐米三斤焙研细和入膏内。每服三钱。空心滚水下。即能去管。

〔洗痔极效方〕威灵仙。槐米。防风。（各一两）五倍子。（五钱）瓦松。柳须。

（即杨柳小红根各二两）各锉碎。水煎浓熏洗。

未破者茄蒂或根晒干煎洗。日二三次即效。

已成漏者。用蒲公英一斤。猪蹄一只。煎汤去油。滤净熏洗。

〔血痔内胀〕枯桑树烧成白灰。每服酒下三钱。

韭菜煎浓汤先熏透。候温洗疮。日二次。（盖韭菜大能散血也。）

〔痔疮出血〕

橡子。（研成粉）糯米粉各一升炒黄。滚汤和作饼。饭上蒸熟食之。四五次即效。

如不因疮内由大便而下血者。用干莲蓬壳。（烧灰煎汤。）

代茶饮即止。以好为度。

〔内痔不出〕草乌为末。津调点肛门。痔即反出。便于敷治。

〔灸痔疮法〕

蕲艾丸黄豆大。灸手背腕陷内。待灸疮发。用清凉膏贴之。灸疮愈时。

痔亦愈矣。

〔痔疮脱肛〕脚鱼头灰为末。掺上即收。

〔杨梅疮〕

凡生疮之人。只图速效。因而医家投之升丹轻粉。半月奏功。至后半载。

或数载。水银轻粉之毒。流入四肢。以致结喉烂头。无药可治者。不可胜数矣。更有甚者名状有五。或观灯。（药灯点于房中。病患眼看臭烟。数日即愈。）或焚香。（药香入鼻。）或看水。（药投水内。）或烘被。（药香熏被。）

或药擦脉息。犯此复发。无药可解。凡一切杨梅广疮。周身红块广栗。不论初起已经溃烂。先用茯苓。木通。防风。荆芥。（各一钱）当归。

（二钱）生黄。（三钱）麻黄。（一钱。大热有汗时少用。犯此症者五火并升。即病至瘦弱者皆可发汗。有羊肉为佐。即大汗无损。）用精羊肉二斤。水五碗。煮至三碗。去肉用汤。煎药至二碗。先于下午照常食饱。至晚吃药。如寒冷时。服生白酒一杯。盖被出汗。（已经得汗。不必过浓。）头面亦须出汗。发汗一处不透。此一处即有后患。至天明时自然汗止。即用热汤沐浴。另换新衣被。（将有汗衣被换水自洗。病中大便泻无人空处。）不可使他人闻。

触之未有不生者。然后用大黄一两。生研细。加牙皂荚。（炒黄研净末三钱）水法为丸。每服二钱白汤下。（早食薄饱。即服药泻三五次后。如脾倦吃粥一二碗即止。体浓者间日一服。）

是后每日用土茯苓一斤。（即土萆。病重者用斤半。取白色糯者佳。红色者杀人。不犯铁器。以石捶碎。入瓷罐内。入水二升煎汁六碗。存瓷器内。将前渣再入水一升。煎汁三碗取起。再入水煎三碗。并入煎汁。以为一日之用。如只用一斤酌减。）此药治一切杨梅疮毒。

不问远年近日。虚实溃烂。筋骨拘挛疼痛之、妙药。久服开胃进食。能解轻粉水银宿疾。每服一碗。入五宝丹六厘。（约每日服五六分。体浓者加二三分。）病者不得另饮茶汤。将土茯苓汤十一二碗。一日饮完。逐日照法服。不拘日期。以全好日为止。服三五日后。筋骨减痛。

至十日后。未成者内消。已成者照痈疽门用三仙丹掺入提毒。贴膏收口。如旧受轻粉伏毒。

服药三五日上。当尽发出。无则不发大忌房事。忌一切鸡、鱼、鲜、发、之物。只食猪肉、猪肠、肚、鲫鱼、鸭。即菜蔬之鲜发者。亦勿食。医家每以丸散秘方居奇。亦无能胜过此方也。照方根据治至三五日。头上发出多疮。此皆筋络透出之效验。（如生疮日久。或未服升药者。亦不发。）如口臭起泡。破烂齿浮。用银花。（一两）寒水石。甘草。（各五钱）煎浓。

加柿霜一两和匀漱口。五七日自愈。

〔五宝丹方〕

琥珀。（透明血色者。用甘草水煮过。三钱五分。）珍珠。（三钱五分。

豆腐包蒸。布包捶碎。同灯草磨。）钟乳石。（三钱五分。用木香甘草各一钱同煮

干。) 飞罗面。(炒过五钱五分) 真西黄二钱。(研细) 临用加冰片五分。俱各研极细末。入瓷罐收贮。

治九种〔杨梅疮余毒未尽〕 槐米。(捡净微炒。略研去尖。) 每服一二钱。不拘白汤好酒空心下。日二次。服至一二升。永无后患。

〔解升丹毒〕 误服升丹水银轻粉之毒。流入筋络。老年手足直硬。不能行走者。平地上掘深三尺许。取净黄土。入井水搅浓。澄清取起。泡汤煮饭。皆用此水。一二月即效。如初服口破齿浮。痛不可忍者。以地浆水解之。(方见药食毒。)

〔鱼口〕 生在左胯缝内名鱼口。五月五日采树上青核桃。筐内阴干。临用火存性为末。好酒空心服。少行一二次。服三次。未成者即消。已成者减轻。槐米。(炒黄色二两)

好酒煎熟。饮酒盖被出汗。未成者即消。已成者减轻。

〔便毒〕 生于右胯缝为便毒。白芷。僵蚕。(炒黄色) 穿山甲。(炮各二钱) 当归。生大黄。(各三钱) 乳香。没药。(各一钱) 水煎服即消。此恶毒初起之妙方也。外用千年锻石入白矾一撮。食盐少许。米汤调敷即散。若久旷房室。大小便秘。发热痛。或交感时强固精气。以致交错壅滞。而结为肿痛便秘者。用当归。(酒拌) 甘草节。滑石。(各一钱五分)

牡蛎。(二钱) 生大黄。(三钱) 木鳖子。(三五个杵。非有大热便秘者。此味不可用。) 水煎浓露一宿。五更顿服。冬月温服。无论已溃未溃。脓血俱从大便中出。若劳倦虚弱之人。不甚痛。大小便无热秘者。不宜轻用。鱼口便毒已溃者。照痈疽门升药提毒。膏药收口。

〔下疳〕 阴头皮皱处湿烂疼痛。生甘草。瓦松。煎汤洗净拭干。用凤凰衣。(即出鸡雏壳内衣。炒黄。) 儿茶等分。为末敷之。壁上蛛钱。逐个在灯上烧存性研细。加冰片少许。搽之立能止痛。如已蛀烂。照疮毒门升药提毒贴膏。初起即服。照煎大黄一两。

皂荚二钱。水法为丸。每服二钱。泻去其毒。日一服。如不服大黄。用猪胰子。(一个) 核桃肉。(二两连) 银花。(一两) 甘草。(五钱) 土茯苓。(二两。不犯铁器敲碎。) 瓦罐内煮烂。

酒通。金银花。白藓皮。防风。甘草。(各二钱) 皂角刺。(三钱) 先用土茯苓。(六两。不犯铁器捶碎。) 煎汤煎药一碗。分二次。一日服。不拘九种杨梅疮毒。一切鱼口便毒下疳。久近服久自效。下疳从阴jing管心内烂出者。须用升药药线提

毒。仍照法服药。数日即愈。（此二方即至重杨梅疮毒。服头方四次。再服第二方八十剂日二三服。无不全效。）

〔下疳阴痒〕 生甘草煎浓洗。用海螵蛸末敷之。鳖甲为末。鸡子清调涂。

〔下疳日久不愈〕 墙上白螺壳。（去土。火研末五钱。）轻粉。宫粉。（各三分）冰片。

（蛛丝以箸头缠成弹子大。用酥油微炙燥。研细末。菜油调搽。并能复长。杨梅疮毒。若因地气卑湿。由受湿热或触臭气而生者。所受不过皮毛肌肉之间。生于前阴通肾囊筋上者多。或身上紫色红晕癣。不在骨节穴道。用前下疳症下。（米仁。木瓜。）等煎方。数服即愈。若因淫毒传染而生者。盖此淫秽之毒瓦斯。从精道乘虚直透命门。以贯冲脉。无处不到。为害最恶。起则发于四肢骨节穴道之间。或发于头顶。或先遗精如浊。下疳蛀烂。疮头高轰红紫。

根盘红黑元晕。形如杨梅。数日之后。中起白头。脓出臭不可近。或白累如堆。色如棉花。

已溃者去腐。照痈疽门提净毒瓦斯。（深处用药线。）他处不再生。若治失其宜。头鼻烂穿者多矣。明哲之人。静而思之。何苦贪瞬息之欢娱。轻则痛苦之灾。毒于别病。重则终身生理残障。

毒延子女。如此恶途。不寒心知避者。其愚亦甚矣。

〔白癩瘋〕

由于脾滯而生。食后即睡者常有之。白蒺藜六两。（炒黄去刺。研为细末。）

水法为丸。每服二钱白汤下。一月除根。久服并能耳聪目明。羊蹄根二两。（如无生用生姜二两。）枯矾。（五钱）轻粉。（一钱）信石。（五分）为细末。同捣如泥。沐浴后。以布包药着力擦之。暖卧取汗即愈。并治汗斑。

〔紫云斑〕 川乌。（姜汁炒）

草乌。（黑豆炒豆熟。去豆用）防己。（各五钱）甘草。

（一两）牛膝。（七钱炒）羌活。（上部用）独活。（下部用）川芎。白芷。马兜铃。（炒各四钱）

俱为末。每服七分。好酒调下外用蛇床子。夏枯草。煎汤洗数次。风块自退。硫黄。（一两醋煮一日）海螵蛸。（三个）同研细浴后以生姜擦之。须避风少时。

〔汗斑〕 枯矾。轻粉。硫黄。密陀僧。各等分。用浮萍取汁。调匀搽之即退。或用花红果蘸药擦之。不再发。

〔丹毒如火〕 赤小豆末和鸡子清调糊。时时涂之不已。即消。铁锈水浓涂不已亦消。

大麻疯

〔总论〕 麻疯之症大抵得之传染。或一时感天地不正之气。故深居处女亦有之。然须验其果系此病。方用是药治之。或有风热所感。遍体如云。似是而非。若误用药则反促之而成真矣。

其验之之法。初起之时。周身必有一二点。或如莲子。或如橄榄。或如鸡蛋大。

或在身上。或在四肢手足。或红或青。或微白。或同好肉一色。不痛不痒。麻麻木木。随月渐次而大。又或身上皮间。常如虫蚁内走。或如蜂刺咬痛。或筋骨刺痛。或膝后肉麻。或大小手足一指麻痹。凡麻木处以手指刺之不痛者是。以上有一者。皆谓之真麻疯矣。人秉浓薄气血之不同。风湿所感深浅之各易。治之亦有轻重之别。病者急欲见功。每用巴豆。牵牛。

斑蝥。等烈药以下之。或大枫子。川乌之类以发之。其次轻粉。麝。脑之药敛之。亦能取效目前。然转眼复发。则症反更甚也。盖泻与发皆能虚其血气。故暂觉势减红退而微白耳。敛者敛其毒瓦斯于脏腑之内。则红肿收缩。火毒久而发则愈。烈也。每医者舍此三法。无能速效。

故患此症而能治者鲜矣。孙真人医中之仙也。恒谓生平治此病再发者。十常八九。以其不守禁戒也。然果能自谨。渐可得效。何患病之不去。盖人患此疾。则父母妻子亲友。皆厌秽而断绝之矣。是天地中之弃人。虽生不如死。患者于此。能绝嗜欲。持斋戒。守禁忌。而信之于医。病岂不愈。古人此症谓之天刑。患者或出于少年不谨。或无故自生。必有定数。此生既为弃人。则须安命以悔夙业之前非可耳。每见近世之人。患此病者。明知妻子之厌恶。

又不能舍。甚而淫淫欲他人。唾涕传染。种种秽恶作贱。奴婢不知此疾最能传染。如此损人。

愈应天怒。岂特医治不愈。更增罪过而已。然非独此症。如虚损已成者。能忘形而静养。

可保永寿。如年久痼疾。无药可治者。安心悔过行善。每得仙方。非特书籍累累。目击者亦不少矣。

〔治大麻疯〕 大黄。（煨）皂角刺。（各一两）为末。每服三钱。空心温酒下。泻恶物如鱼脑。未泻再服。所下之虫。如乱发状。候虫取尽。乃止此药。老虾蟆一个。白砒二钱。

铜绿二钱。人中白二钱。研末装入蟆口内。线缝好。外以泥包裹。火烟尽为度。取起去泥。

约〔大麻疯眉发脱落〕 松香。（不拘多少。）化去渣。取河水于净锅中将松香煮化。不住手搅匀。视水色如米泔。尝味极苦者。即倾入冷水内。将松香乘热扯拔。冷定坚硬。另换清水再煮再拔。如前法数十次。以松香松洁白。所煮之水不苦为度。再用葱汁煮一次。阴干为极细末。每料二斤。每日将白粥量投药末和匀食。不可多嚼。日进数次。不可更吃干饭。

只以菜干。笋干。少许过口。忌一切油、盐、酱、醋、荤、腥、酒、果。如渴时只饮白滚水。

每日约服数钱。以渐而进。勿太骤。服后大便得下毒物。服尽一料自愈。或炼蜜丸亦可。好后服补气之剂。紫背浮萍捡净摊竹篮。水映晒燥为末。蜜丸弹子大。黑豆汤调下三钱。腹内泻虫之后。服之大能去周身之疯。（盖浮萍大治疯瘫恶疾。服至百丸。再无不效。如类似麻疯之症。服之即效。）生穿山甲一只。以生漆三斤纳其腹中。及涂外面。以盐泥固济。

炭火存性为末。每服三钱。白汤下。（盖漆大能杀虫。穿山甲直透病根。治眉发已脱之病。

大能见功。或有畏漆之人。服下虫虽治而生漆疮者。即饮铁浆水。黄栌汁。解之。）一僧大麻疯眉发俱落。哀苦不堪。忽得仙传。教服长松。（生山谷中古松树下。其叶如松。其根似人参。长三五寸。其味微苦。清香可爱。取根食之。即骸体腐溃者。服之半月。毛发复生神方。）每服长松一两。入甘草少许。水煎服。无病者服之。大有补益长寿。

〔绿云散〕 治肺毒风疮状如大麻疯。好桑叶。（洗净蒸熟）一宿日干为末。水调二钱。

〔防风天麻丸〕 治麻风癩病。其效如神。此方应是仙传。一年中常疗数人。初服药有呕吐者。不可疑弃。久服自愈。防风。（去芦）天麻。升麻。白附子。（炮）定

风草。（即乌头茎）细辛。（去苗）川芎。人参。丹参。苦参。玄参。紫参。蔓荆子。威灵仙。穿山甲。（炒）

何首乌。（另捣各二两）蜈蚣。（二条）上为细末。同首乌末拌匀。再用芝麻一斤。（淘净晒干。

炒香研细末。）入前药末二两和匀。炼蜜丸作十丸。不拘时候。日三丸。细嚼白汤下。忌房劳。须食淡白粥四五月。

〔白花蛇膏〕

治诸疯癩。遍身生疮。白花蛇。（取肉。四两洒浸。）天麻。（七钱）荆芥。

薄荷。（各三钱）俱为末。用好酒二斤。蜜四两。以瓷器熬成膏。每温服一酒杯。日三次。

不拘饼食压下。于暖处得汗即效。

折伤诸症

（附金疮 破伤风 夹杖 汤火伤）

〔总论〕

凡折伤症。如跌扑木石所伤。或兵器。或汤火伤。为症不一。切不可饮冷水。

血见寒则凝。多致不救。慎之。即口渴以温肥膩之物解之。勿吃粥。恐血沸而出。则无救。

〔从高坠下〕

或木石所压。或扑车落马。一切伤损瘀血凝滞。气绝欲死者。一时无药。

掰开口以热小便灌之即醒。再取净土五升。蒸热以旧布重裹作二包。更互熨之。勿过热。恐伤破肉。取痛止则已神效。如跌破血出不止。伤处以穿旧丝绵。（极旧者为佳。）照伤口略大剪切粘贴。或先将丝绵。（不拘新旧。烧灰研细待冷。）护上。立能止血。（如无丝绵。用干面和生姜汁捣匀。贴伤者。亦能止血止痛。）或预备后方金疮药敷之更佳。或用白蜡刮细末。罨上伤处。不论大小。皆宜包好。勿见风。七日后方愈。如出血过多。昏沉不醒者。人参三五钱煎汤灌下。醒后白米一协议参渣煮服。（血出多者。脉沉细者生。浮大者死。）

若伤处调理不谨。五七日后成脓肿者。又须用外科症五仙丹。以收口法治之。

〔压伤〕压倒打死。心头尚温者。将本人如僧打坐。令一人持其头发稍放低。用半夏末吹入鼻中即醒。醒后以生姜汁。真麻油。和匀灌之。再以山羊血少许。酒调服。（如无山羊血。以干荷叶烧灰。童便调服三钱。日进三服自愈。）或用木耳四两。（烧灰研极细。出火性。）

好陈酒调服二钱。日两服。大能去瘀生新。止晕之妙药。跌打损伤气绝不能言。

用〔瘀血胀痛〕

一切跌打压坠。瘀血腹内痛。大黄。（酒炒熟）归身。（酒炒）等分为末。

每服（二三五钱）以瘀积之轻重增减。早晨空心酒调服。大便中取下黑物自愈。如痛至不可忍者。加桃仁。（去皮尖二十一粒）大黄。（用至七八钱）

瘀血攻心。胀满疼痛。气急。

用青麻叶连根捣汁温服。（如无叶。以麻子和酒研汁代之。）

竹青。乱发。（各一把炭火炙焦为末。）酒一斤。煮三五沸。去渣服之。如体虚不能服大黄者。用生地汁一碗。好酒半碗和匀。温服三次愈。（凡跌损之后。即大便不通。喘咳吐血。照方皆可治效。脉弦者生。脉细者死。）

〔跌扑疼痛〕跌打未曾出血。内伤疼痛。用延胡索。（盐水炒研。）每服二钱。日进二服。好陈酒调下。或用乳香。没药。（俱箬叶上炙去油研细。）

每服一二钱。酒调下。皆止痛之妙品也。外用葱白。（不拘多少。捣烂炒热。）罨伤处。冷则易之。止痛如神。不拘已伤出血。连伤处罨上。止痛止血之第一品也。鲜山药。活鲫鱼。同捣烂敷伤处。立能止痛。跌坏日久肿痛。用生姜。陈香糟。（各一斤同捣烂）炒热罨伤处。（如不急治。一年之后。成东瓜串不救。）

〔伤痕紫黑血不散〕大黄末以生姜汁调涂。一夜黑者转紫。二夜紫者即白矣。

〔跌伤青肿〕新做下热豆腐切一指浓片。贴伤处。冷则易之。数次即消。凤仙花叶捣如泥。涂肿处。干则再上。一夜血散即效。

周身青肿。用熟麻油和酒饮之。以火烧热地上卧之。觉即肿痛全消矣。

〔坠跌吐血〕荷花晒燥为末。每服二三钱。好酒调下。

〔跌扑折骨脱臼〕不论折伤骨碎脱臼。白凤仙根酒磨服半寸。伤处不知痛。（至重者服一寸。多服伤人。以一寸为极。）或茉莉花根捣烂罨上。立能定痛。（此根不可吃）急将骨断处理好。脱臼者揉托而上。外用公鸡一只。地骨皮。五加皮。（各四两。鲜者佳。如无鲜者。用干者研细末。）同鸡乘活连毛同捣烂。浓敷伤处。再

用杉木皮。（活树上剥下者佳。树脂能补皮肉。）缚好然后用生蟹一二斤捣烂以好陈酒煮熟。去渣取汁。连服数碗。（渣亦可敷患处。如不饮酒者。随量缓饮。）半日后。其伤骨处瑟瑟有声自合。一周时全接合矣。

街路上尿缸边砖瓦片。（须用常有日光晒着。多年久尿处者佳。新者勿用。）取回洗净。火内烧红。即入醋内淬之。冷即再烧。如此五七次。研细末。每服二三钱。酒调下。或取露天地上窖坑中多年砖一块。亦照法火。醋淬五七次。研极细。好酒调下。每服五分。此二味极能理伤续断。接骨止痛。功效如神。未打之时服之。可以不痛。不可多服。令人骨软。

〔接骨方〕

土鳖。（即接骨虫去足。用生半夏二粒同焙干。去半夏一钱。）乳香。没药。

（俱瓦上炙去油研）自然铜。（火醋淬七次）骨碎补。（去毛焙）当归尾。硼砂。（各一钱）

俱研极细和匀。瓷罐内收贮。治一切跌打损伤。每服八厘好酒下。

土鳖。（隔纸砂锅内焙干。净末六钱。）自然铜。（火醋淬七次。净末二两。）和匀。每服二钱。温酒调下。治一切跌伤筋骨。每日一服自愈。（病在上食后服。病在下食前服。）自然铜。大能接骨续断。惟好后终身忌食白芥。

凡跌扑损伤。照方调治。如体虚不安者。兼服人参。（一钱）白术。（土炒）炙黄。当归。（各二三钱）白芷。（一钱）川芎。浓朴。甘草。（各五七分）每日一剂。

兼助气血自愈。

〔折伤头脑肩骨〕葱白同蜜捣烂。浓封伤处。再以蟹盖瓦上。炙成炭。研细末。酒调尽量饮。其骨自合。

〔打伤眼睛〕

生猪肉一薄片。用当归。（焙燥研）赤石脂。（研细）用少许糝肉上贴之。

燥则易之。拔去毒血自愈。

〔制土鳖虫法〕米栈中或酒栈中取大土鳖虫百余个。入大缸中养三日。去土。再入大酒坛内。以稀布包口。用红花八两酒浸与之食。俟食尽。令其大小自食。约留十个。入小瓦罐内。泥封护。慢火内煨四寸半香倒转。再煨二寸半香不可焦。提起存石上。三日取出。入瓷罐中收贮。如跌伤筋骨者。用土鳖一个研细。（以真古钱一二个。酒磨调敷。）如至重折骨者。照前法将伤处理整缚好。用土鳖三分。好酒调服。（病在下用下半个。病在上用上。）

或配乳没香自然铜。更效。) 接骨至灵。一二日即见效。宜备以施人。如半身不仁。或久远痼疾。药力不能到者。用此配药服下。直达病所。除宿疾。(病在左用左。病在右用右。)

〔金疮方〕金疮者。即刀斧箭簇之伤也。(如伤后两目直视。痛不在伤处。出血赤后见黑者。或痛处寒冷坚实者。皆不可治。) 一切破伤出血。急用小便乘温淋伤处易好。最忌饮冷见风。恐风邪从此而入。忌食粥。宜食童便韭汁。渴时食肥膩。紫降香。(锉研极细末。

或灰。) 圆眼。(连壳肉核。火存性。) 研细和匀敷伤口。止血无后患。(此行军中之第一方也。) 千年锻石。(研极细) 和大黄。(切片) 同煮烂晒干研细。敷疮口止血如神。(如无千年锻石。用陈年风化锻石六两。和大黄十两切片。同入砂锅内。炒至桃花色取起。研极细。

功效同。) 血竭为末糝之。止血生肌。乳香。(五分) 没药。(三分) 研细末糝入。极能止血止痛之妙药。冬月取牛胆一个。入风化锻石悬当风处候干。出血不止者。刮细末敷之极效。血出不止。陈紫苏叶蘸所出血。研烂敷之。既不作脓。且愈后无斑痕。或用胎发烧灰研细敷之。立止。蝙蝠一只。(火存性。烟尽为末。) 酒调下三钱。血立止。肿痛自消。

此方甚奇。或用雄鸡血冲酒服。同效。端午日取野苧麻叶。和风化锻石。(炒) 同捣烂。

阴干研细末。敷上止血如神。(或用韭菜连根照法治之同效。) 秋间取丝瓜叶。(晒燥去筋研细末。) 每末八两。加千年锻石二两〔炒研。如无千年即多年者。炒燥可用。〕和匀敷之。止血如以上之方。止而兼散。好无后患。宜备以济急。传述同人。止痛之法。前方葱白炒热罨之最灵。如疮口已经敷药。乘热四围浓涂。冷则易之。立能止痛。

〔刀伤跌损深入寸外者〕千年锻石。轻粉。竭血。白蜡共等分。为末糝上。外用生肌玉红膏敷之。(方见外科症。) 日久成脓不愈。以五仙丹。(方见外科门。) 糝入少许。膏盖之。

〔刀伤断筋者〕紫降香。(锉研极细末。) 铜花。(即打铜店打红铜落衣也。) 五倍子。

(炒研极细) 各等分为末。糝上扎住自愈。外以缠枝牡丹根捣汁。滴疮口。渣敷四围。

半月自〔出血过多寒热口渴〕

补中益气汤。（方见劳损症。）加麦冬。（一钱）五味子五分。

水煎空心服。金疮烦痛。酒制大黄。（研细末）黄芩。（酒炒研）水法为丸。早晚淡酒吞一二钱。

〔箭伤入肉〕花蕊石。（形似硫黄。有白斑点者。火七次。）研末敷伤处四围。箭渐自出。或易拔。巴豆仁略炒。取蛭螂虫同捣烂。浓涂四围。须臾痛定微痒。忍之。待痒极。

便摇动拔出。速以生肌玉红膏敷之。（方见外科症）

〔恶刺入肉〕象牙屑研细水调涂。或用栗子生嚼细敷之。刺自出。竹木刺入肉。用蓖麻子去壳捣烂罨上。过夜即出。或以鹿角烧灰。研末调敷。半日即出。竹木签伤成疮痛甚。用炉炭灰干糝上肿处。以米醋润之。

〔蚯蚓散〕打伤至重者。用白颈蚯蚓洗净。焙干为末。每服二钱。姜葱汤下。盖被出汗即愈。神效。止痛后。以松节浸酒服之。如打伤筋缩痛甚者。急取白颈蚯蚓二三条。捣烂冲酒服。外以前方敷药治之。甚效速。

〔金疮久不收口〕白芨末。石膏。（各等分。）研细糝入疮口。即能见效。千年石灰。入象皮末和匀。敷上即效。内服白芨末。酒调二钱。并能接骨。以好为度或米饮下。

〔破伤风〕

一切跌破出血。及蛇犬伤，不即药护包扎。以致感冒风寒。或吃鲜发毒物。

或疮口久不收口。因之寒热并作。身体强直。甚则角弓反张。口吐涎沫。传入阴分。则身凉自汗。伤处反平陷如故者。乃毒瓦斯内收。当用万灵丹发汗。令风邪外出。外用南星。防风。

蚯蚓等分。为末。用生姜。薄荷汁。调敷伤处。得脓即效。如汗后前症不退。伤处不高。渐醒渐昏。时发时止。口噤不开。语多不出者。终为不治。

〔万灵丹〕茅术。（八两）全蝎。石斛。明天麻。当归。甘草。（炙）川芎。荆芥。北细辛。防风。麻黄。川乌。（汤泡去皮）草乌。（汤泡去皮尖）何首乌。（各一两）雄黄。（六钱）

俱为细末。炼蜜为丸。或一两分四丸。或一两分六丸。或一两分作九丸。三等做下

。以备年岁老壮。病势缓急取用。外以朱砂研细为衣。瓷罐收贮。如治破伤风。每用连须大葱白九枚。煎汤一茶钟。将药一丸乘热化开。通口服。盖被出汗为愈。如服后汗迟。再用葱汤催之。

汗必如淋。少顷渐去盖被。其汗自敛。此丹治一切肿毒风气。四时感冒风寒。头疼身痛。寒热交作。初病在表宜发散者。葱白汤化服。出汗即愈。如诸病无表症相兼。不必发散者。只用热酒化服。服后避风。宜食稀粥。忌冷物房事。孕妇勿服。治病甚灵。有力之家。多备济人。美事也。（如忌出汗者。皆以酒化服。）

〔头面身体因破伤风顷刻肿胀〕急用草二两酒煎服。少顷即可。迟则不救。蝉蜕一两酒煎浓服。或用蝉蜕四两。烧灰存性。无灰酒服。盖被出汗愈。生葛根四两。水六碗。煮取两碗。去渣分服。口噤者灌之。若干者捣末。滚水调服五钱。及竹沥多服取效。

〔玉真散〕天南星。（汤泡五七次。如急用以湿纸裹煨。）
防风。白芷。天麻。羌活。

白附子。等分研末。敷伤处。（此药如破伤风牙关紧急腰背反张。甚则切牙缩舌。以童便调服三钱。虽内有淤血亦愈。如治疯犬咬。急用漱口水洗净。搽咬伤处亦效。如治打伤欲死。

心头尚温者。以热酒童便灌下二钱。随进二服。立可回生。）
蛭螬虫三五个。（一名土蚕粪。

土堆中多有之。剪去尾。将肚内黄水涂患处。再将黄水滴热酒内饮之。治破伤风汗出〔破伤风表症未传入里〕
蜈蚣一对。（炙）鳔胶。（三钱炒焦）为末。用羌活。防风。

川芎。（各一钱）煎汤调服。脉气浮紧者。速服即效。

〔破伤风服表药过多自汗者〕白术。（炒）黄。（各一两）防风。（二两）和匀。每服五七钱。水煎服。脏腑已和而自汗者可服此方。如脏腑秘。小便赤而多汗者。仍宜川芎。羌活。

黄〔夹棍伤〕一出衙门。即用热小便一盆。将足浸之。如冷。烧红砖二块淬之即热。直浸至童便面上浮起白油。其伤尽出矣。不
不烂。再用肥皂捣如泥。入鸡蛋清和匀罨患处。

以草纸包裹脚。缚紧一夜不可动即效。内服末药。人中白。（

一两。即多年尿壶中白碱。

研细。水飞净。新瓦上焙。燥足。再研细末用。）自然铜。（火。醋淬七次五钱。）乳香。（箬上炙去油二钱。）没药。（箬炙二钱。）牛膝。（三钱）木耳。（烧灰存性五钱。）为末。再用牛膝五六钱煎酒调服三五钱。如仓猝无末药。用当归。川芎。乳香。独活。鳖虱。胡麻。骨碎补。红花。五加皮。各一钱。生白酒一壶煎数沸。纵量饮。避风寒。浓被出汗即止痛。如骨伤加土鳖一枚。数服即愈。

〔预防夹棍〕大肥皂用陈米醋煮捣烂。加皮硝。敷过夜。夹时不痛。若夹出肿痛难走者。热豆腐和松香末捣匀。敷过夜即好行走。永无后患。

〔KT 伤〕皂矾二两。水四五碗砂锅内蒸滚。将手熏洗。良久即血活痛止。不致溃烂。忌用铜铁器。其洗手水过夜即臭。洗后服治夹伤末药。去牛膝酒调服。

〔杖伤〕杖后即饮童便一碗。以免血攻心。再用热豆腐铺在杖伤处。其气如蒸。其腐即紫。复易之。须散尽紫色转淡红色为度。如人受责极重。昼夜无眠。种种诸症。用木耳四两净。砂锅内炒焦炭存性为末。每服五钱。好酒一碗调服。服药后坐少时。俟药力行至杖疮上。从肉里往外透。如针刺痒甚。不时流血水。粘贴膏药。次日即消。如临杖先服四五钱。

则〔受杖不痛〕

无名异。乳香。（去油）没药。（去油）蚯蚓。（去土）自然铜。（火。

醋淬五次、）木鳖。（去壳）各等分。蜜丸桐子大。温酒预服十丸。不痛。

〔杖疮敷药〕

乳香。没药。干胭脂。（各一两五钱）膩粉。（五钱）为末。入冰片五分。

葱白十根。全羊骨髓研如泥。摊帛上贴之。立时止痛。

野苧麻嫩根。（白色者不拘多少、）

洗净。同盐捣如泥敷上神效。止痛无淤。血伤重者多用盐。

不破者。韭菜葱白二味同捣烂炒热。浓敷之。冷则易之。止痛如神。

已破者。刘寄奴。（焙燥研。）马鞭草研末。和匀糝之。

如已溃烂。用乳香煎油搽上。外贴膏药。

如只肿痛。用生大黄研末。醋调涂。或小便调涂。

凡杖后日服白芨末一二钱。米饮下最效。

〔杖后发热腹痛〕或杖处瘀积痛甚。当归尾。（五钱）大黄。（酒蒸一两）桃仁。

（去皮尖廿一个。）酒煎。五更时服。利下瘀血即效。（轻者减半。）

〔人咬伤〕即将小便或浓茶洗去牙龈毒。（如不洗。必至红肿疼痛。日久伤命。）山半枝。背阴处采取捣敷即效。龟板。鳖甲。（俱烧灰存性为末。）香油调涂。生栗子。（捣烂〔汤泡火烧〕切不可用井泥冷水拓之。盖热气得冷。深入至骨。烂人筋脉。后至手足挛缩之患。且恐火毒攻心。则难治。凡火烧昏倒者。急用萝卜捣汁两碗饮之。（如无萝卜。

用子和水捣浓汁。）或童便一碗。皆可服以护心。即死者灌之可活。外以冷柴草灰。（不拘多少。入盐少许。）以水调如稀糊。尝味微咸为度。用以浓涂伤处。觉热则易之。连易数次。

则火毒皆拔于灰中。肿痛随散而愈。火烧周身痛甚者。用好老酒。或烧酒。冷浇上。或浸入片时。干则再浸。半身受伤者。以马槽盛酒浇之。以散火毒。立能止痛。大黄末。芒硝。

研细。以鸡子调涂。银朱以鸡子清调涂。皆能止痛。鸡子清磨金墨涂患处。上用鸡子清湿纸盖之。则不起泡。猪毛。（连衣火存性）研细末。加轻粉。白硼砂。少许。麻油调敷。

止痛无疤痕。

真金箔贴伤处稠密。用桐油涂金箔上。或蚌壳粉。（须盐萝中者佳。）香油调敷。不溃烂。止痛无痕。瓷瓶一个。入麻油大半瓶。采黄蜀葵花入瓶内。（采时勿犯人手。以箸夹取。）密封。遇有伤者。以油浓涂神效。秋冬烂南瓜贮瓷瓶中。日久成汁。涂患处。止痛易好。并治一切无名肿毒。冬间烂橘子贮瓶中。成汁涂之。同效。（此二方用蜡封瓶口埋地中。再加冰片一二钱。更灵。）泡过残茶叶瓶中久烂。取涂频换。不痛不烂。

凡火伤。先用宿小便浇洗过。易好不烂。

〔汤火伤溃烂〕人中白。（制法见喉症门。）用桐油调涂即效。如肉烂赤痛。用煮熟鸡蛋。（不拘个数。去白取黄。）置瓷罐内熬出油。调胡粉敷之。汤火之妙方。初起皆治。赤石脂。寒水石。大黄。俱研细。冷水调涂止痛。如烂久见骨者。用百草霜三钱。轻粉一钱半。研细。掺入。或麻油调涂。即收口。

〔汤火伤烦热不宁〕服玄妙饮即愈。黄连天花粉。玄参。（各二钱）陈皮。桔梗。

黑山栀。（各一钱半）淡竹叶。（二十片）水煎服。如误用冷水所浸。火毒入内。致生烦躁。

口渴。大便秘实者。连翘。赤芍。羌活。防风。当归。黑山栀。生甘草。（各一钱）大黄。（切片炒熟二钱。）灯心二十根。水煎服。

〔火药伤〕 先用小便浸洗。再用蚌壳。（盐萝中者佳。）火研细末。同烂茶叶捣匀敷上。止痛易好。

火药冲眼。登时仆地者。亦用小便浇洗。候痛定。徐用自己小便频洗即明。

如误被鸟枪伤白蜂蜜八两煎滚。入好烧酒一斤。随量热服。取汗安卧。次日铁子自粘被上。

五绝

〔五绝〕 一自缢。二墙压。三溺水。四魇魅。五产后晕绝。皆以生半夏研末。冷水为丸。如小豆大。塞鼻中。并用燥末吹耳内。或用皂荚末吹耳鼻。即死一日者。犹可治。鸡粪炒燥调酒服下可救。或用艾灸人中穴。易醒。

〔缢死〕 切不可用刀剪断绳索。即旦至暮。心下微温者。尚可救。轻轻解下。安放平坦。仰面朝天。头要扶正。将手足慢慢屈弯。将粪门用力塞住。勿令泄气。一人用手揪着头发。脚两肩。用鸡冠血滴入。（男用雌。女用雄。）再二人将苇筒（或通气笔杆。）入耳内。

不住口吹气。再不住手按摩胸前即醒。若气不接续。将腰打三四拳。须臾少以桂汤或姜汤含与之。老鹅一只。将香油抹鹅嘴上。插入粪门内。一二时即活。

〔溺死〕 切忌火烘。逼寒气入内。则不救。用牛一头。令腹横卧在牛背上。两边用人扶策。牵牛徐徐而行。出腹中之水。以老姜切片擦牙即活。先口中横放箸一根。以便出水。

或卧于铁锅上亦可出水。醒后。即以大凳卧之。后足放高。用盐擦脐中。水自流出。切勿倒提。以苏合丸调灌之。如水不行。用纸裹皂荚末纳肛门内。水即流出。

〔冻死〕 切忌火烘。用灰炒暖盛囊中熨心头。冷即易之。先温其心。得气回开眼。少以温酒姜汤徐徐灌之。即醒。

〔惊死〕 以醇酒温灌之。即醒。

〔解砒毒〕 凡中此毒。烦躁如狂。心腹绞痛。头眩呕吐。面色青黑。四肢逆冷。六

脉洪数。从饮食中得者为易治。若空心酒醋中服者难救。如在初吃。急灌香油一二碗。得吐即解。鲜羊血鸭血乘温吃一二碗。即解。地浆水。（方见伤寒门。）多服。若吐出再服。（治此毒不必澄清。混泥水饮。）所谓洗净腹中毒。全凭地上浆。毒解。然后用绿豆半升。（生磨粉。）入新汲水搅和。去粗取汁服。如醒后一日。仍颠不语者。每日煮绿豆汁冷冻饮料。毒尽自安。如已过两三时。毒入腹中。吐不出者。用青铅水磨一二两灌下。得泻即解。

〔解盐卤毒〕生豆腐浆。多多灌下。（如无生浆。急以黄豆浸湿。捣烂绞汁。）服下片时。再用肥皂水。或抹墙纸水灌下。即能吐出如脑子者。即生。（切勿热吃。）或用鲜羊血乘温灌下。或取活鸡去头。以颈接喉中灌下。（毒少一二只。毒多四五只。）得吐即生。吐后心痛声哑者。每日调白糖汤服。五七日即安。

虫兽伤

〔疯狗咬〕

春末夏初。犬多发狂。其尾直拖。口流涎。舌黑色者最伤人。若不急治。

男七日。女一月即死。如仓卒无药。急于无风处捏去伤处恶血。如伤孔干者。用针刺出血。

即以小便。或盐汤洗净。随以葱白捣烂敷之。或用蓖麻仁井水捣成膏贴之。或杏仁炒黑捣成膏贴之。或牛屎蚯蚓泥皆能救急。或天南星。（生研）防风。（等分为细末。）糝上不溃脓。

若少缓毒瓦斯入内。不救。大班螫二十一个。（去头足翅。）用糯米一撮。先将螫七个。木鳖子半个。入米内慢火炒。勿令焦。去螫。又入螫七个。木鳖子半个。同米炒焦色变。又去螫再入螫七个。木鳖子半个。同米炒出青烟为度。去螫不用。只将米与木鳖研末。分作三服。冷水入香油少许空心调服。须臾又进一服。以二便利下恶物为度。若服后腹痛。急以冷水调靛青服之。或煎黄连甘草汤冷服。或冷水调益元散（方见暑症门）服。切勿吃热物。（盖斑螫有毒。服之杀人。以毒攻毒。非此不可。故只用糯米。亦宜预备凉药解之。）一二日后用白芷五钱。雄黄二钱五分。捣韭菜汁和酒调下。四十九日之内。宜多吃韭菜汁。百日之内。忌食发风、荤腥、鸡鸭、蛋。勿听锣鼓声。大忌房事。犯者不救。终身切戒狗肉。食之复发无救。

勿食茄子小赤豆。凡服斑螫药至四五服后。即不利亦无妨。咬后大约七日一发。三七日不发可免。三四日内头顶中若有红发。急宜拔去之。如见痛定疮合。便谓已好而不治者。多死。轻者用番木鳖一钱。铜锅炒为末。入雄黄四分和匀。冷水调服三

分五厘。服后以大小便出血为度。好后不戒忌。复发诸药不效。垂危者。用雄黄五钱。麝香三分研细。好酒调服二钱。

服药后必使得睡。切勿惊起。任其自醒。俟利下恶物。再进前药即生。

〔诸犬咬〕先须忍痛。以人尿或河水洗。捏去血水。即用虎骨。（火存性研细末。）

干糝上即效。或以头垢敷伤处。外用牛屎涂于外。或刮肉店切肉墩上腻屑。拌砂糖敷之。

前治疯犬敷药方皆可用。

〔破伤风〕野狼犬蛇蝎蜈蚣诸伤痛极。或因伤受风而牙关紧急。腰背反张。不省人事者。

速切蒜片或捣烂罨伤处。隔蒜艾丸灸之。不拘三五十壮。无不应手。内服方。（列入折伤诸症。）外用人参于桑柴火上烧成灰敷之。

〔毒蛇咬〕先将伤处用针刺出血。随用绳紧扎两头。勿使毒瓦斯延入好处。将伤处浸入尿缸内。腹中即须食饱。免毒瓦斯内攻。（如轻者勿浸入尿缸。）即用雄黄五钱。五灵脂一两。

共或以三七捣烂罨上。毒即消散。或取大虾蟆一个。去肠肚捣烂敷之。干则易之。三四次无害。皆神妙无比。（并治疯犬一切毒物咬伤。）次服细辛。白芷。（各五钱）雄黄五分。俱为末。每服三钱。好酒调下亦妙。如毒重不知痛者。用水调干面和作圆圈。箍于伤处。将明矾一两。勺内熔化。乘热浇在圈内。伤处顷刻化为清水。毒解知痛。如轻者将矾熔化。以箸头挑矾点伤处。数次知痛即解。半枝莲取汁冲酒服。渣敷患处。或九龙草（状如杨梅生平泽。）捣汁。入雄黄末一钱服之。皆能止痛。即效。如毒入内。眼合口噤急。用苍耳草捣汁。和酒服之。渣敷患处可救。

〔诸蛇咬〕急以小便洗去恶血。取口中津唾涂之。以近牙刮取封伤处。则不肿痛。

前方皆可酌用。

〔百虫毒〕蛇虫沙虱百虫咬。捣大蒜敷之。多食蒜饮酒。或用艾丸隔蒜灸之。皆可解毒止痛。靛青汁。敷之即效。

〔蛇入七窍〕

急以艾灸。蛇尾即退出。即用雄黄。朱砂。共研细。煎人参汤调灌之。

再食蒜饮酒。内毒即消。可救。凡有蛇之处。常以雄黄豆大一块烧烟熏衣被。皆远避。夏月犬伤。及诸折伤。蛆虫极多。臭不可近者。用蛇蛻。（一两火烧存性）蝉蛻。青黛。（各五钱）细辛。（二钱半）共研细。好酒送下三钱。外以寒水石研末敷之。旬日即愈。

〔蝎螫毒〕 生半夏。白矾。（等分研细）以醋调敷痛处。胆矾研细擦之。立消。

〔蜈蚣毒〕 盐汤洗伤处。以紫菜口中嚼敷上。止痛。生半夏末醋调敷即效。或蜒蚰二个。入冰片少许敷上。最效。

吴茱萸嚼烂敷之亦妙。皂荚半片钻孔贴伤处。艾丸灸孔上三五壮。止痛妙法也。草纸点烟。从下熏伤处。立止痛。井底泥亦可敷效。

一人误吞蜈蚣入喉。急以鲜鸡血顿饮之。复灌以香油取吐。蜈蚣随出。

〔蜂刺入肉〕 先以热酒洗之。得拔去刺为好。即用青黛。（研）香油调涂。或口嚼青蒿敷之。或芋艿擦之。皆能止痛。（无芋用梗亦效）生半夏末。醋调敷亦效。

〔八脚虫毒〕

其虫隐壁间。以尿射人生疮。状如汤火伤。用乌鸡翎烧灰鸡子清调涂。

〔中蚯蚓毒〕 形如大麻风。眉须脱落。用锻石泡热水候凉洗患处。浸之良久即效。

〔蜘蛛咬〕

花蜘蛛伤。令人遍身生丝。惟羊乳饮之可解。外用生姜汁调胡粉敷疮口。

即效。凡百虫咬毒痛不可忍者。用大纸拈蘸麻油点火。照熏伤处。其毒尽入油烟内。立能止痛。最妙法也。

〔杨刺子〕 水搭伤处。随用马齿苋捣敷止痛。蜜涂上亦效。

〔蚂蟥入肉〕 不得出者。用女头发一握。菜油八两。先将油熬滚。入发煎枯去渣。再煎鸡蛋五个。服之无害。

〔蚕咬毒〕 蚕咬人毒入肉中。令人发寒热。用苎叶捣汁敷之。

〔虎咬〕 麻油一碗饮之。毒不入内。生姜汁洗伤处。研白矾末敷之止痛。多服生葛汁。日夜五六次。并以汁洗疮口。

〔马咬〕 苏木汁一碗。服之止痛。
鼠屎。（烧研末）和猪脂调涂伤处即效。或艾丸灸伤处。
如毒瓦斯入心则危。用马齿苋捣烂煎汤服。
马踏伤。急服童便或韭菜汁一二碗。外以寒水石研细敷伤处。

〔猪咬〕 黄连。甘草。煎汁洗净。以松脂熔作饼贴之。

〔鼠咬〕 猫毛烧灰存性。入麝香少许。香油调敷。