

颇 凶 经

卫
汛

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
原序	6
脉法	7
病證	8
驚癇癲證治	10
疳痢證治	12
顱顙經卷上考證	16
火丹證治	17
雜證	20

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

《颅凶经》二卷，不著撰人名氏，世亦别无传本，独《永乐大典》内载有其书。考历代史志，自《唐·艺文志》以上皆无此名，至《宋·艺文志》始有师巫《颅凶经》二卷。今检此书，前有序文一篇，称王母金文，黄帝得之天，秘藏金匱，名曰《内经》，百姓莫可见之。後穆王贤士师巫於崆峒山得而释之云云。其所谓师巫，与《宋志》相合，当即此本。疑是唐末宋初人所为，以王冰《素问注》第七卷内有师氏藏之一语，遂托名师巫以自神其说耳。其名颅凶者，案首骨曰颅，脑盖曰凶，殆因小儿初生，颅凶未合，证治各别，故取以名其书。首论脉候至数之法，小儿与大人不同。次论受病之本与治疗之术，皆极中肯綮，要言不烦。次论火丹证治分别十五名目。皆他书所未尝见。其论杂证，亦多秘方，非後世俗医所可及。盖必别有师承，故能精晰如此。《宋史·方技传》载，钱乙始以《颅凶经》著名，召至京师，视长公主女疾，授翰林医学。钱乙幼科冠绝一代，而其源实出於此书，亦可知其术之精矣。谨据《永乐大典》所载，裒而辑之，依《宋志》旧目厘为二卷，俾不至无传於後焉。

原序

夫“顛顛”者，謂天地陰陽化感顛顛，故受名也。嘗覽《黃帝內傳》，王母金文始演四序二儀陰陽之術、三才一元之道、採御靈機，黃帝得之昇天，祕藏金匱，名曰《內經》，百姓莫可見之。後穆王賢士“師巫”於崆峒山得而釋之，叙天地大德、陰陽化功、父母交和、中成胎質。爰自精凝血室、兒感陽興，血入精宮、女隨陰住，故以清氣降而陽谷生，濁氣升而陰井盛也。甚者二儀互換，五氣相參，目覩元機，非賢莫達。謂真陰錯雜，使精血聚而成殃；陽發異端，感榮衛合而有疾。遂使嬰兒纔養，驚候多生。庸愚不測始末，亂施攻療，便致枉損嬰兒。吁哉！吁哉！遂究古言，尋察端由，叙成疾目，曰“顛顛經”焉。真憑辨證，乃定死生。後學之流，審依濟疾。天和太清降乘赤海，真一元氣乘之，則母情先搖，蕩漾熾然，是陽盛發陰，當妊男也。六脉諸經皆舉其陽證，所謂妊衰不勝藏氣，則觸忤而便傷妊；勝而氣劣，則母疾三五月而發，皆隨五藏。心藏，乾而口苦，舌乾；肺藏，渴而多涕，發寒；肝藏，邪而臍酸，多睡；脾藏，發而嘔逆，惡食；腎藏，困而軟弱無力。藏、妊氣平，則和而無苦。胎若劣，而強得藏養，至生亦乃多疾。二儀純陰之證，昇雜真一者，謂“陰發陽”，則父精薄，妊當成女也。六脉諸經皆發陰證，若血盛氣衰，則肥而劣氣；若氣盛血衰，則瘦而壯氣。餘藏、妊之氣皆同男說。孩子處母腹之內時，受化和之正氣，分陰陽之紀綱，天地降靈十月，而化萬物以生成。隨其時變，大理清純化成祥瑞之基，全真道一，故生成焉。一月，為胚精血凝也；二月，為胎形兆分也；三月，陽神為三魂動以生也；四月，陰靈為七魄靜鎮形也；五月，五行分藏安神也；六月，六律定腑滋靈也；七月，精開竅通光明也；八月，元神具降真靈也；九月，宮室羅布以生人也；十月，氣足萬物成也。太乙元真在頭曰“泥丸”，總衆神也，得諸百靈，以禦邪氣。陶甄萬類，以靜為源，是知慎於調護，即以守恬和，可以保長生耳。故小兒瘦病，蓋他人之過也。

脉法

凡孩子三歲以下，呼為“純陽”，元氣未散。若有脉候，即須於一寸取之，不得同大人分寸。其脉候未來，呼之脉來三至，吸之脉來三至，呼吸定息一至，此為無患矣。所言“定息”，呼氣未出、吸氣未入，定息之中又至，此是平和也。若以大人脉五至取之，即差矣。如此七至以上，即為有氣；或脉浮如弓之張弦，此為有風，並可依後方合藥治之(一)。或七至以下，此為冷候，亦宜依後方合藥療之。或診候取平，或忽而不見，沉浮不定，伏益根平者，此為神鬼之病。且合求崇，續宜使藥。或桃柳枝湯浴，煎飲子為使，一兩顆桃心。

孩子脉呼吸十五至以上、三至以下，皆死矣。

病證

初生小兒鵝口、撮噤，並是出胎客風着顱、臍，致有此。可以小艾灸三壯(二)及烙之愈。

初生小兒至夜啼者，是有瘀血腹痛，夜乘陰而痛則啼。

初生小兒一月內，乳痢如膠，是母寒氣傷胃所致也。

初生小兒一月內，乳痢如血，是母胃有滯熱所作也。

初生小兒一月內，兩眼赤者，是在胎之時，母喫灸燂、熱麪壅滯，氣入胎中，熏兒腦所致也。

小兒溫熱，皆因從氣熱而搏胃氣。然若下之，平氣即愈，氣虛則生驚而變癇。

小兒驚、癇，一從虛邪、客熱相搏而生。其候當用補養安和即愈，加以性冷及太過即死。

小兒噦、逆、吐，皆胃氣虛，逆氣客於藏氣而作。當和胃養氣至如下冷即極。

小兒霍亂、吐逆，皆胃氣與陰陽氣上下交爭而作，當用分和補藥調養即愈，餘皆死。

小兒客忤無辜，皆因客入所觸及暴露星月。小兒嫩弱，所以此候多惡。

小兒一、眼青揉癢，是肝疳；二、齒焦，是骨疳；三、肉色鼻中乾，是肺疳；四、皮乾肉裂，是筋疳；五、髮焦黃，是血疳；六、舌上生瘡，是心疳；七、愛喫泥土，是脾疳。

孩子肌膚肥實、皮膚白，無故煩渴，此自小妳猛衝損肺，但依後方，內用“甘草人參合飲子”；若氣急、甚胃脹起、鼻連眼下臉青色、呻S吟Y之聲者，此必死之兆，不得與藥。

孩子利如泔、澀者，難效；利如鵝、鴨血者，脾已爛損，不宜與藥。

孩子凡有諸色疾苦，但眼瞼下垂牽，必定死矣。

孩子瘡，皆難效。或發無時，即口噤，咬牙作聲，此必死矣，呼為“瀝瘡疳瘡”，

亦名為“鎖腸疳”。

孩子渴喫乳食，夜啼作聲，此即是腹肚痛。

孩子無故搖頭，此是腦頂風。

孩子喫乳食皆出，此是脾冷。

孩子無故肚大、項細、四肢消瘦，筋脉、骨節起，自是小來少乳，嚼食與喫早，成骨熱疳勞。先宜與“保童丸”吃，續與“柴胡鼈甲引子”。（“保童丸”方見“一切疳門”中，“柴胡飲子”方見“行遲門”中。）

孩兒頭面、胛膊肌厚，臂脛細瘦，行走遲者，是小兒抱損。

孩子鼻流清涕、或鼻下赤痒，此是腦中、鼻中疳極，宜用後方。“青黛散”吹鼻、兼傳鼻下赤爛處（方見疳疾吹鼻門中）。

以前並診候孩子疾狀。孩子氣脉未調，藏府脆薄，腠理開疎，看脉以時依方用藥。

孩子或夏中熱時，因乳母沐浴多使冷水，妳得冷氣，血脉皆伏，見孩兒氣未定便與妳，使孩子多胃毒、及赤、白兩般惡痢，此乃是妳母之過。凡浴後，可令定息良久，候氣定，揉與之，即全無患。

師巫燒錢，乳母須預祝之，勿令着水噴兒，皆令驚、熱入心，轉成患害，切細慎之。

凡孩子自生，但任陰陽推移、即每六十日一度變蒸，此骨節長來。四肢發熱、或不下食乳，遇如此之時，上唇有珠子如粟粒大，此呼為“變蒸珠子”，以後方“退熱飲子”療之，不宜別與方藥。（《幼幼新書》注云：“《顱凶經》以六十日為一變，巢氏《病源》以三十二日為一變，說有不同，故兼存之。）

驚癇癲證治

牛黃丸

治小兒胎驚及癇、或心熱。

牛黃、龍齒、馬牙硝、鐵焰粉（各一分）

右為細末，鍊蜜丸如梧桐子大。每日乳食前，熟水調破一丸灌下。令母忌口。

又、牛黃丸

治孩子驚熱入心，擬成癇疾。面色不定、啼哭不出、潮熱無度、不吃乳食、大段眼翻露白、手足逆冷、呼喚不應。

牛黃（研）、大黃、獨活（各一分），琥珀（炙、別研）、升麻、菉豆粉、大麻仁（別研，各半兩）

右為末，蜜丸如梧子大。空心、熟水下一丸，頓服之，食後再服一丸。至十歲，加金、銀箔各五片，忌煇炙、毒物。

虎睛丸

治孩兒風癇、驚啼不喫乳。

虎睛（一隻），犀角、子芩（各等分），梔子仁、大黃（各十分）

右五味，為細末，鍊蜜丸如梧子大。驚啼不喫乳，乳汁下七丸；風癇，米飲下五丸至七丸。兒小，減丸數。取利為度。忌毒物。若有虛熱，加知母六分。

又、虎睛丸

治小兒、孩子二十四種驚、癇，壯熱、抽掣脚手、嘔吐、夜啼、眼腫。

虎睛（一隻）、犀角、子芩（各等分）、梔子仁、大黃（各十分）

右五味，為細末，鍊蜜丸如梧子大。驚啼不喫乳，乳汁下七丸；風癇，米飲下五丸至七丸。兒小，減丸數。取利為度。忌毒物。若有虛熱，加知母六分。

又、虎睛丸

治小兒、孩子二十四種驚、癇，壯熱、抽掣脚手、嘔吐、夜啼、眼腫。

虎睛（一隻，生用一對），梔子仁、茯苓（各二分），牛黃（少許，生用半兩），人參（一分，生用一兩），鈎藤、大黃（各四分），犀角（末、一分，生用二兩），黃芩（一分，生用一兩），蛇退（七寸、燒灰，生用一分）

右為末，蜜丸如黍米大。空心、熟水下，隨年。丸輕者一服，重者三服，妳汁下。亦得生、熟水下。妳母忌一切生冷、油膩、毒物。

廣利方

治孩子驚、癇不知，迷悶、嚼舌仰目。

牛黃（一大豆）

右為細末，研和蜜水服之。

二十二味虎睛丸

治孩子從一歲至大，癲發無時，口出白沫，小便淋瀝不利。

虎睛（一隻，生眼四佳，曝乾，酒浸令黃色），真珠、蜂房（各三錢），麻黃（二分、去節），鈎藤（三分），鐵精、防葵、大黃、子芩、龍齒、銀屑、梔子仁、羌活（各四分），柴胡、升麻、白蘚皮、雷丸（燒令赤）、人參（各三分），細辛（一分半），蛇皮（五寸、炙），石膏（五分），蚱蟬（四枚，去翅、足，炙）

右為末，蜜丸如赤豆大。四、五歲五丸，日再服。大兒十丸。濃煎米飲下，忌生冷、油膩。

疳痢證治

保童丸

治小兒、孩子諸色疳，或腹內虛脹，驚、癇，頭髮立，常咬手指，脊疳，疳勞，臂脛細弱、倚立不得，及鼻下常赤、清涕，流涎不止，舌上生瘡，腦疳，口疳，腹上筋脉。

虎睛（半隻）、硃砂、麝香（各一錢），牛黃、龍腦、巴豆、芎藭、桔梗、枳殼、檀香、茯神、人參、當歸、羌活、代赭、鶴虱、白朮（各半兩）

右為細末，下香、砂、巴豆，令勻，鍊蜜丸如梧子大。一歲至五歲，每日一丸。十歲，每日兩丸。並空心、米飲下。但稍知孩子病甚，即加藥與之孩子未較，妳母忌生冷、油膩、灸燂、毒、魚、大蒜、米醋。

又方

治孩子疳、痢、諸色疳、并一十五種病狀。一、腹大；二、皮膚黑黃；三、骨節羸；四、眼赤；五、口赤；六、鼻中生瘡；七、頭髮黃；八、咬指甲；九、愛喫土；十、愛喫甜物；十一、身熱；十二、頭大；十三、臍凸；十四、項細；十五、面無光。並宜常服“保童丸”方。

硃砂、牛黃、麝香、蟾酥（各少許），阿魏（二分）

右、先將硃砂於淨器中研如粉，入諸藥，一時以蒸餅為丸。忌羊血、生冷等。

又方

治孩子疳氣，或釀肚脹上筋脉，頭大項細，喫物不知足，夜中即起，腹內長鳴。

大黃（一兩）、陳橘皮（二兩，酸醋二合、浸二日，曬乾）、蜣螂（二十箇，去翅、足、子，熱燒醋安之，以盃蓋地上，去火毒，冷，取出炒過）

右為末，蜜丸如梧子大。每日空心、熟水下十丸。忌如常。

紫雪圓方

治小兒五疳、兼腹肚虛脹，疳氣煩悶、或時燥渴。

大黃、黃連、代赭（各二分），硃砂、麝香（各少許），杏仁（去皮尖、別研）、肉豆蔻、巴豆（去皮、以冷水浸、別研，各一兩）

右為細末，蜜丸如梧子大。每服空心、米飲湯下一圓。五歲、十歲只可服五丸。臨時加減。忌冷水、油膩、炙燂。

硃砂丸

治孩子疳、痢，辨蟲顏色、定吉凶。

硃砂（半石蓮大）、阿魏（如硃砂大）、蝙蝠血（三、兩滴）、蟾酥（少許）

右為細末，和少許口脂調。先以桃柳枝煎湯浴兒後，看小兒大小，以菉豆大填兒臍中，後用紙片向臍中貼之，用青衣蓋兒。看蟲出來，黃色輕，青黑色重。

青黛散

治孩子鼻流清涕、或鼻下赤癢。

青黛（一錢），蘆薈、地龍（各半錢），硃砂（一字匕），瓜蒂（半錢），細辛（一錢），宣連（半錢）

右為細末，和合，吹鼻中，入麝香少許。

保童丸

硃砂、麝香、新蟾酥（各等分）

右研合成劑，合子內盛，丸如麻子大。又於一合子內浸一丸，以筋頭點入鼻中，亦名“問命丸”。但孩子病甚，即與吹之，或得七噴，可以治之；五噴即甚；三、兩噴即死矣。此不可深著水浸，臨時入水亦不畏。

蓋腦散

治孩子腦疳、鼻癢、毛髮作穗、面色赤。

地榆（炙）、蝦蟆（燒，各一分），蝸牛殼（二十一箇），青黛、石蜜（各二分），麝香

右為末，吹鼻當有黃水出。忌甜物。

胡黃連丸

治孩子熱疳

胡黃連、蟾酥（各等分）

右為末，蜜丸如菉豆大。五歲，熟水送下二丸。

調中丸

治孩子諸疳、或熱攻衝心肺，氣急，晝夜有汗，日漸羸瘦，不吃乳食。

柴胡、茯苓、人參、木香、桂心、大黃（濕紙裏、煨）、枳殼、甘草（炙）、蟹甲（醋炙，各等分）

右為末，蜜丸如桐子大。每歲兩丸，至五歲三丸。熟水下。忌如常。

地黃煎方

治孩子疳勞、肺氣熱欬、四肢漸瘦、心肺乾。

生地黄汁（五兩），酥、生薑汁、蜜（各一兩），鹿角膠（半兩）

右，先將地黄汁安鍋內，慢火煎，手不住攪。約五六沸下酥，又五六沸下蜜，次下膠，又下薑汁，慢火煎如稀餚^五，即住火。每食後，兩度共與一匙頭。忌毒物。

又方

治孩兒疳蝕口齒，齒齦宣露、臭穢不可近。

葶藶（炒）、梧桐葉（等分）

右為末，以臘月豬脂調，微煎作膏。取柳木筋子綿裹，微微搵藥，時烙。

又方

治孩子疳蝕脣鼻，及諸瘡。

硫黃、乾漆、文蛤

右等分。燒灰，稍煙盡，研為末，入麝子少許。以帛拭瘡膿血後，用藥乾糝之，立效。

又方

治孩子初患諸色痢，及微有疳氣。

右，用枳實，不限多少。炒令黑，拗破看、內外相似，為散。空心、米飲下半錢，以歲加減服之。忌如常。

又方

治孩子赤白痢

阿膠、赤石脂、枳殼（麩炒）、龍骨、訶子（炮半熟、去核，各半兩），白朮

右為末，一歲、二歲空心、米飲下半錢。

又方

治孩子冷毒疳、痢白膿、疳澁、日加瘦弱，不喫食，腹痛。

青木香（一分）、黃連（半兩）

右為末，蜜丸如梧子大。一歲以上，空心、熟水下一丸。三歲、五歲服二丸藥。性熱者，不宜多服。忌生冷。

溫脾散

治孩子水瀉利，并脾冷、食乳不消，喫妳頻吐。

附子、乾薑、甘草（炮剉各半兩），白朮（一兩）

右為末，空心、米飲下半錢。忌鮮魚、毒物。

顱顙經卷上考證

(一)第一頁後二行、三行，原本“依後方同藥治之”，按，後方已佚，謹簽出聲明。

(二)第二頁前一行，“以小艾灸三壯”，原本脫“艾”字，謹增。

(三)第五頁前六行，“灌”字、原本訛“蒲”，謹校正。

(四)第七頁前三行，注“生眼”訛“在眼”，謹校正。

(五)十二頁前七行，稀錫原本訛“稀錫”，謹校正。

火丹證治

黃帝問歧伯曰：“後生少稚，多被惡疾、丹毒二品，若何分之？”歧伯曰：“陽解百年、一十以上為毒，一十以下為丹。丹、毒一也，隨其大、小分別之，治之有毒，至依方，萬無一差。”

喻人間男女，皆遭丹毒，至依此枉死者，復何限哉！良由信邪師之語，仍被恐之。愚昧之人勿與下手，請依方用之。

今出此圖，形狀如後。

伊火丹，從兩脇起。

神竈丹，從肚起。

尿竈丹，從踝起。

胡吹竈丹，從陰囊上起。

天火丹，從腹背、遍身起。

天雷丹，從頭、項起。

燂火丹，從背、甲起。

胡漏竈丹，從臍中起。

廢竈丹，從曲臂起。

神氣丹，從頭、背上起。

土竈丹、從陰踝起。

朱黃丹，赤豆色，遍身上起。

螢火丹，從耳起。

野竈丹，從背脊起。

鬼火丹，從面上起。

伊火丹，從兩脇起。

右用豬糞燒灰，并鐵槽中泥，拌調塗之，日三。

神竈丹，從肚起。

右用土蜂窠、杏仁、膩粉、生油調塗，立差。

尿竈丹，從踝起。

右用屋四角頭茅草，燒灰。使雞子白調塗之。

胡吹竈丹，從陰囊上起。

右用水茄窠下泥，和苦酒塗之。

天火丹，從腹、背、遍身起。

右用樺皮白末，和生油調塗之。亦用赤石脂、羊脂調塗之。

天雷丹，從頭、項起。

右用陰乾蔥赤末，拌脂塗。又用竈下土、雞子白調塗。

胡漏竈丹，從臍中起。

右用屋漏水，調竈中土塗之。

廢竈丹，從曲臂起。

右用屋四角茅草灰，雞子白調塗之。

神氣丹，從頭、背上起。

右用牯牛骨燒灰，羊脂塗之。

土竈丹，從陰踝起。

右用屋四角茅草、竈橫麻、及雞子白調塗之。

朱黃丹，赤豆色，徧身上起。

右用慎火草擣汁，和酒調塗之。

螢火丹，從耳起。

右用慎火草擣汁塗之，生以醋調塗

野竈丹，從背脊起。

右用柔香茸蒴、赤小豆末，塗之，立差。

鬼火丹，從面上起。

右用竈下土，雞子白調塗之，立差。

雜證

平和飲子

小兒初生，可日與之。

人參、茯苓、甘草（炙）、升麻（以上各一分）

右以水一白盞，煎至一合半以來，時時與之。乳母忌油膩。滿月及百晬以來加之。臨時冷加白朮、熱加（缺）各半錢。

又方

治孩子臍中不乾。

白礬（一錢煨過）、龍骨（一分）

右為細末，入麝香少許。每次使拭臍乾，糝之，用帕裏，避風。

青木香散

治孩子陰囊或如疝腫脹。

狐陰（一雙、炙）、蒺藜（炒）、地膚子、昆布、枳殼（炒）、槐子（炒，各一分）

右為末，一歲、二歲空心、米飲下一錢。

又方

治孩子蛔蟲咬心痛，面伏地卧，口吐清水、痰涎。

檳榔、苦楝根、鶴蝨（炒，各半兩）

右為末，空心、熱茶下一錢，以意加減。忌粘食。

杏仁丸

治孩子或渴，此是蛔蟲傷。

杏仁（去皮尖）、膩粉（各一分）

右為末，每用唾丸，空心，米飲、茶任下二丸。

又方

治孩子赤遊腫、或如丹，煩渴，渾身赤瘤，壯熱。

菉豆粉、鉛白霜

右細研，薤薑汁調塗之。

又方

取鉛霜法，將鉛來於石上打令薄，掘地作坑可鉛片大，以杵擣坑實，滿坑着醋，以鉛盖定。經一宿去取霜，如珠子大，和藥使之。如煩渴，以後服“解熱飲子”。

又方

麥門冬、小蘆根、竹葉、乾葛、漏蘆、犀角屑

右用水四合、藥半兩，煎一合。無問食前、後，徐徐與之。

消石散

治孩兒身上無故腫，但覺肉色赤熱。

消石、大黃、菉豆（各等分）

右為末。每用時，隨腫大小、取荇蓬根研汁，調塗腫上。如有惡物，即看有点子、以膏貼之，四面以散子熯之。若無荇蓬根，即用雞子白、或車前根葉亦得。

又方

治孩子胎中受風，長後或滿身生瘡，沸癢如疹癩，或如飢飽痒瘡。葱白、硝、臭黃、硫黃（各等分）

右，用油半兩燒令熱，下少許蠟，先剥葱白三莖，細切，待油熱即潑葱上，細研。續下硫黃、臭黃、硝，更研之，旋塗。

茴香散

治孩兒赤眼，并胎熱，及疳障多淚。

茴香、冬青膽（陰乾）、生甘草

右為細末。每洗眼時，取藥一分、水一盞，煎十沸後，溫洗之。或孩兒長大，即加藥并水。

引子方

孩兒用藥洗眼，後可更服之。

知母、黃芩、青箱子、地蛹子、秦皮、車前草、山梔子、獨活（各等分）

右藥，以水五合煎二合，去滓，溫服。忌食如常。

又方

治孩子聾耳

白礬（半兩、燒過）、龍骨、鉛丹（燒，各一分），麝香（少許）

右為末。以綿裹竹枝子淨，探膿水，以一小豆大藥傅之，別以綿裹塞填之，勿令見風。

又方

治小兒聾耳

石硫黃（製）

右為細末，以糝耳中，日一夜一。

又方

治孩子小便不通。

茯苓、通草、冬瓜子、車前子（各等分）

右，以水四合、藥半兩，煎一合半，作二服。忌油膩。

側柏散

治孩兒風熱

側柏、鬱金、天麻（酒浸一宿）、乾蝎、天南星、地黄（去土）、子芩、大黃（以上各半兩）

右為末。治風及驚，溫酒下；退熱，每夜熟水下半錢。

柴胡引子

治小兒行遲，小兒自小傷抱、腳纖細無力，行止不得。或骨熱疳勞肌肉消瘦。

柴胡、鼈甲（米醋塗、炙）、知母、桔梗、枳殼（麩炒、去瓢）、玄參、升麻

右藥等分，並細剉。每日煎時，三歲以下取藥半兩、水五合，煎二合，去滓，分兩服，空心食前、後各一服。忌毒物。飲後用“澡浴方”。

澡浴方

苦參、茯苓皮、蒼朮、桑白皮、白礬（各半兩），蔥白（少許）

右藥剉細，每浴時取一兩、沸水二升，浸藥後，通溫與兒浴之。避風。於溫處妙。

又方

治小兒數歲不能行。

取葬家未開戶，盜其飯食來以哺之，不過三日便起行。勿令人知之。