

宣明方论

刘完素

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
卷一	6
卷二	15
卷三	26
卷四	32
卷五	37
卷六	41
卷七	48
卷八	55
卷九	59
卷十	67
卷十一	72
卷十二	77
卷十三	82
卷十四	88
卷十五	95

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

钦定四库全书 子部五

宣明方论 医家类

提要

【臣】等谨案宣明方论十五卷金刘完素撰是书皆对病处方之法首诸证门自煎厥薄厥餐泄?胀以及诸痹心疝凡六十一证皆采用内经诸篇每证各有主治之方一宗仲景次诸风次热次伤寒次积聚次水湿次痰饮次劳次泄痢次妇人次补养次诸痛次痔瘻次眼目次小儿次襍病共十七门每门各有总论亦发明运气之理兼及诸家方论於轩岐奥旨实有所阐发而多用凉剂偏主其说者不无流弊在善用者消息之耳考原病式自序云作医方精要宣明论一部三卷十万余言今刊入河间六书者乃有十五卷其二卷之菊叶法薄荷白檀汤四卷之妙功藏用丸十二卷之萆澄茄丸补中丸楮实子丸皆注新增字而七卷之信香十方青金膏不注新增字者据其方下小序称灌顶法王子所传并有偈?金时安有灌顶法王显为元明以後之方则窜入而不注者不知其几矣卷增於旧殆以是欵乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

卷一

钦定四库全书

宣明方论卷一

金 刘完素 撰

诸证门

诸证总论

黄帝曰善言天者必验於人善言古者必合於今善言人者必厌於己如道不惑所谓明也余问夫子言而可知视而可见扪而可得今验於发蒙解惑可得闻乎岐伯稽首对曰何道之问也天覆地载万物悉备莫贵於人人以天地之气生四时之法成君王宰职黎庶尽欲全形贵贱虽殊宝命一矣好生恶死者是世人之常也若人有患如救水火莫待留淫日深着於骨髓所以难矣

素问诸证略备具题

煎厥之状阳气烦劳精絶辟积於夏致目盲不可视耳闭不可听薄厥之状阳气大怒形气绝而血菀於上?胀殄泄寒热不散升降上下颓疝心掣寒多下坠以为诸疝心热内掣陰阳之结四肢浮肿便血不已蛊癰之病肾气不足冤热筋急白液出跳掣也膀胱不利致三焦约而遗溺肾精不足强上冥视唾之若涕恶风振寒为之劳风虽近衣絮荣虚卫实名曰肉苛心移寒於肺则肺消肺移寒於肾为涌水心移热於肺为膈消胆移热於脑为肺渊膀胱移热於小肠为口糜大肠移热於胃为食?热盛则阳络溢阳络溢为衄蔑醉以入房气竭伤肝大脱其血月事衰少名曰血枯蘊热怫郁生於诸风寒湿风之三气杂合而为诸痹宗筋纵发为白淫热聚胃口而不散行故胃脘为痛面色白黑所谓????筋口苦积热名之胆痺肾虚内夺则为瘖痺血气竭少令人解?腹满不食寒中肠泄斯病鹜溏腰股痛发附肿不便寒生濡泄聊叙此证不能备举

煎厥证 主热

阳气烦劳积於夏令人热厥目盲不可视耳闭不可听人参散
主之治煎厥气逆头目昏愤听不闻目不明七气善怒

人参 远志【去心】 赤茯苓【去皮】 防风【去苗以上各二两】 芍药 麦门冬【去心】 陈皮【去白】 白术【以上各一两】

右为末每服三钱水一盞半煎至八分去滓温服不计时候日再服

薄厥证 主肝

阳气大怒则形气絕而血脉菀於上令人薄厥於胸中赤茯苓汤
主之治薄厥恭怒则伤肝气逆胸中不和甚则呕血衄衄也

赤茯苓【去皮】人参 桔梗 陈皮【各一两】芍药 麦门冬【去心】槟榔【各半两】

右为末每服三钱水一盞生姜五片同煎至八分去滓温服不计时候

飧泄证 主冷

清气在下则生飧泄清浊交错食不化而清谷出矣白术汤
主之治飧泄风冷入中泄痢不止脉虚而细日夜数行口乾腹痛不已

白术 厚朴【生姜制】当归【去苗】龙骨【各一两】艾叶【半两熟炒】

右为末每服三钱水一盞生姜三片同煎至八分去滓空心温服

痞胀证 主心腹

浊气在上则生痞胀此陰阳返则气结不散胀满常如饱

吴茱萸汤 主之治痞胀陰盛生寒腹满痞胀且常常如饱不欲饮食进之无味

吴茱萸【汤淘炒】厚朴【生姜制】官桂【去皮】乾姜【炮各二两】白术 陈皮【去白】蜀椒【出子各半两】

右为末每服三钱水一大盞生姜三片同煎至八分空心去滓温服

风消证 主心脾

二阳之病心脾不得隐曲女人月水病血不流脾病食不化风胜真气消

黄耆羌活散 主之治心脾受病精血虚少气力衰乏日溢消矣

黄耆【一两半芦头】羌活 石斛 防风 枳殼【火炒去穰】人参 生地黄 牡蛎【烧】黑附子【炮】茯苓【去皮】五味子 牛膝【酒浸各一两】续断【半两】地骨皮【三分】

右为末每服三钱水一大盏煎至八分去滓温服不计时候日进

心掣证 主心

一阳发病少气 泄三焦不利上咳下泄心烦不宁其动若掣

调中散 主之治心掣不定胸中刺气痞壅上若咳 下若泄利

白朮 乾姜【炮】 当归 人参 五味子

赤茯苓【去皮】 甘草【炙各一两】 官桂【一两半】

右为末每服三钱水一盏煎至八分温服去滓稍热日二服临卧

风厥证 主脾胃

一阳一陰病发惊骇背痛噫欠名风厥盖胃土肝木为木剋土风胜湿不制肾水故令上逆

远志散 主之治风厥多惊背痛善噫善欠志意不乐身背皆痛

远志【去心】 人参

细辛【去苗】 白茯苓【去皮】 黄耆【去芦头】 官桂【各一两半】 菖蒲

熟乾地黄【焙】 白朮 防风【各半两】

右末每服一钱至二钱温酒调下空心食前日三服

结阳证 主四肢

四肢肿四肢热胜则肿四肢者谓诸阳之本阳结者故不行於陰脉阳脉不行故留结也

犀角汤 主之治结阳四肢肿满热菀不散或毒攻注大便闷澀

犀角【屑】 玄参 连翘 柴胡【去苗各半两】 升麻

木通【各三钱】 沉香【剉】 射干【去毛】 甘草【炙一两】 芒硝 麦门冬【去心一两】

右为末每服三钱水一大盏同煎至八分食前去滓温服

厥疝证 主腹痛

脉至太虚积气腹中隐而难见陰沉使脾弱寒於肢膜气厥逆也

吴茱萸加減湯 主之治厥疝腹中冷痛積氣上逆致令陰冷於肢膜

吳茱萸【二兩湯澆炒】川烏頭【去皮炮】細辛【去苗各三兩】良姜當歸
乾姜【炮】官桂【各一兩】

右為末每服二錢水一盞同煎至七分去滓溫服日進二服

結陰 主便血

結陰便血一升再結二升三結三升以陰氣內結故不得通行血氣無宗滲入陽下致使漸多

地榆湯 主之治陰結下血不止漸漸極多腹痛不已地榆【四兩】甘草【三兩半炙半生】
縮砂仁【七枚每服可加為炒】

右為末每服五錢水三盞縮砂同煎至一半去滓溫服

解?証 主腎實

冬脈太過緩而澁腎實精不運解者緩?疑寒熱類也利腎湯
主之治解?春脈動氣痛氣乏不欲言此為腎元有余矣

澤瀉 生地黄 赤茯苓【去皮各一兩半】檳榔 麥門冬【去心】柴胡
枳殼【麩炒去穰】牛膝【去苗酒浸各一兩】黃芩【去朽一兩】

右為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不計時候

胃疽証 主胃熱

食已如飢胃熱能消谷陽明脈終心火上行心憎煩身黃小便赤澁也

茯苓加減湯 主之治胃疽積熱食已輒飢面黃瘦胸滿脇脹小便悶赤

赤茯苓 陳皮【去白】澤瀉 桑白皮【剉各三兩】赤芍藥 白朮【各四兩】人參
官桂【各二兩】石膏【八兩】半夏【六兩湯洗生薑制焙】

右為末每服三錢水一盞生薑十斤同煎至八分去滓不計時候如病甚者加大黃朴硝【各二兩】

蟲病証 主脾風

脾风传肾一名疝气小腹痛出白液名曰蛊左传云以丧志名为蛊病乃真精不守也

大建中汤 主之治蛊病小腹急痛便溺失精洩而出白液

黄耆 远志【去心】当归 泽泻【各三两】芍药 人参 龙骨 甘草【炙各二两】

右为末每服三钱水一盞生姜五片煎至八分去滓温服不计时候

瘰病证 主筋急

蛊腹痛肾传心筋脉相引而急精液少筋脉不荣灌而引急

建中加減汤 主之治瘰筋病相引而急及五劳七伤小便数腹痛难立

人参 甘草【炙】官桂 白茯苓【去皮】当归 附子【炮】厚朴【生姜制各一两】龙骨
黄耆【剉】麦门冬 白芍药 生地黄【各四两】

右为末每服三钱水一盞半生姜五片枣一枚饴少许煎至一盞温服去滓

劳风证 主诸风

发在肺下病强上冥视唾涕恶风肾肺入肺中振栗故俛仰成劳风

芎枳丸 主之治劳风强上冥视肺热上壅唾稠喉中不利头目昏眩

川芎 枳殼【麩炒去穰各等分】

右炼蜜为丸如桐子大每服十丸温水送下食後日三服

痹气证 主阳虚陰实

身非衣寒中非受寒气痹者气血不行如从水中出不必寒伤而作也

附子丸 主之治痹气中寒阳虚陰盛一身如从水中出

附子【炮】川乌头【炮二味通剉碎炒为末入药】官桂 川椒 菖蒲
甘草【各四两】骨碎补【炒】天麻 白术【各二两】

右为末炼蜜为丸如桐子大每服三十丸温酒下空心食前日三服

骨痹证 主肾弱

身寒大衣不能热肾脂枯涸不行髓少筋弱冻栗故挛急

附子汤 主之治肾藏风寒湿骨痹腰脊疼不得俛仰两脚冷受热不遂头昏耳聾音浑

附子【炮】独活 防风【去苗】川芎 丹参 草薢 菖蒲 天麻 官桂 当归【各一两】黄耆
细辛【去苗】山茱萸 白术 甘菊花
牛膝【酒浸】甘草【炙】枳殼【麸炒去穰各半两】

右为末每服三钱水一大盏生姜五片煎至七分去滓温服不计时候日进三服

肉苛证 主荣虚胃寒

近衣絮肉苛也荣气虚则不仁其证 重为苛也前胡散
主之治荣虚卫实肌肉不仁致令 重名曰肉苛虚其气

前胡【去苗】白芷【剉】细辛【去苗】官桂 白术 川芎【各三两】川椒【去目闭口者
生用二钱】吴茱萸【汤洗炒】附子【炮】当归【去苗各二两】

右剉捣以茶酒三升匀拌同窖一宿以炼成猪脂膏五斤入药微煎候白芷黄紫色漉出滓成
膏病在处摩之病以热调此药樱桃大症瘕疮痍皆治并去诸风疮痒疼痛伤折坠损故摩内
皆可用之

肺消证 主心肺

心移寒於肺肺消饮少溲多当补肺平心死而可治乃心肺为贼也

黄耆汤 主之治消肺饮少溲多补肺平心移寒在肺痿劣

黄耆【三两】五味子 人参 桑白皮【剉各二两】麦门冬【去心二两】枸?子
熟地黄【各一两】

右为末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服无时

涌水证 主水病

肺移寒於肾名曰涌水其证如溢囊里裹将或徧身肿满按腹不坚疾行则濯濯有声或咳喘
不定

葶苈丸 主之治涌水腹满不坚溢如囊里裹浆疾行则濯濯有声

葶苈【纸炒】 泽泻 椒目 桑白皮【剉】 杏仁【去皮麸炒】 木猪苓【去黑皮各半两】

右为细末炼蜜和丸如桐子大每服二十丸葱白汤下不计时候以利为度

膈消证 主肺门

心移热於肺名曰膈消二者心膈有热久则引饮为消渴耳

麦门冬饮子 主之治膈消胸满烦心津液燥少短气久为消渴

麦门冬【二两去心】 括楼实 知母 甘草【炙】 生地黄 人参 葛根 茯神【各一两】

右为末每服五钱水二盏竹叶数片同煎至一盏去滓温服食後

口糜证 主口

膀胱移热於小肠膈肠不便上为口糜心胃壅热水谷不化转下小肠

柴胡地骨皮汤 主之治口糜生疮损烂小肠有热胀满不便宜服之

柴胡【去苗】 地骨皮【各等分】

右为末每服三钱水一大盏煎至八分去滓食後如有病人大段实者加大黄朴硝可泻热甚

虚痼证 主女病

大肠小肠移热名虚痼津液耗散不能滑利菀结而大肠閼澹

槟榔圆 主之治大肠有遗热津液壅滞腹痛闷澹名曰虚痼证

槟榔 大黄【剉炒】 枳壳【面炒去穰各二两】 木香
桃仁【去皮尖炒】 大麻仁【另研各一两】

右为末炼蜜和圆如桐子大每服十圆至十五圆温酒下不计时候汤亦得

食亦证 主胃病

大肠移热於胃善食而瘦或胃热遗於胆能食善饮大胜土也

参苓圆 主之治食亦胃中结热消谷善食不生肌肉此名食?

人参 菖蒲 远志 赤茯苓 地骨皮 牛膝【酒浸各一两】

右为末炼蜜为圆如桐子大每服十圆至十五圆米饮下不计时候

鼻渊证 主鼻门

胆移热於脑则辛频鼻渊浊涕不止如涌泉不渗而不久不已衄血为患

防风汤 主之治鼻渊脑热渗下浊涕不止久而不已必成衄血之疾

黄芩 人参 甘草【炙】 麦门冬【去心各一两】 川芎【一两】 防风【去芦一两半】

右为末每服二钱沸汤点之食後服日三服

衄蔑证 主失血

胆受胃热循脉而上於脑阳络溢血妄行在鼻空蔑目瞑者

定命散 治胆受热血妄行鼻中衄蔑并血汗不止

朱砂 水银 麝香【各等分】

右为末每服半钱新汲水调下不计时候如用药看老幼虚实加减

鼓胀证 主胃病气逆

病有心腹胀满旦食不能暮食致令胃逆不散太阳不传逆满

鸡屎醴散 治鼓胀旦食不能暮食痞满古法用此可择焉

大黄 桃仁 鸡屎醴【乾者各等分】

右为末每服一钱水一盏生姜三片煎汤调下食後临卧服

血枯证 主妇人经病

年少醉入房室气竭肝伤故经衰少不来肝伤则血涸脾胃相传大脱其血目眩心烦故月事不来也

乌鱼骨圆 主之治血涸胸脇交满妨饮食变则闻腥臊之气唾血出清液前後泄血

?茹 乌贼鱼骨 【各一两】

右为末雀卵不拘数和成剂圆如小豆大每服五圆至十圆煎饱鱼汤下食後此日三服食压之妙矣

宣明方论卷一

卷二

钦定四库全书

宣明方论卷二

金 刘完素 撰

诸证门

伏梁证 主心积

若梁之伏隐也居脐上逆脐下顺不可移动为水溺故有二等

鼈甲汤 主之治伏梁积气心下如臂痞痛不消小便不利

鼈甲【去裙栏醋炙黄色】京三棱 大腹子皮 芍药 当归
柴胡【去苗】 生地黄【各一两】 官桂 生姜【各三分切作片子焙乾】

右为末每服三钱水一大盏入生姜木香半钱同煎至八分去滓空心温服

瘖俳证 主肾虚

内夺而厥舌瘖不能言二足废不为用肾脉虚弱其气厥不至舌不仁经云瘖俳足不履用音声不出者黄饮子 主之治瘖俳肾虚弱厥逆语声不出足软不用

熟乾地黄 巴戟【去心】 山茱萸 石斛 肉苁蓉【酒浸焙】 附子【炮】 五味子 官桂
白茯苓 麦门冬【去心】 菖蒲 远志【去心等分】

右为末每服三钱水一盞半生姜五片枣一枚薄荷同煎至八分不计时候

厥逆证 主心痛

膺肿颈痛胸满腹胀上实下虚气厥而逆阳气有余郁於胸也不可鍼灸宜服顺气汤

小茯苓汤 主之治厥逆病三焦不调升降胸膈膺肿胸满腹胀冷气冲注刺痛

赤茯苓 人参 陈皮【去白】 桔梗【剉炒各等分】

右为末每服三钱水一盞半生姜五片同煎至八分去滓不计时候

风成寒热证 主风

因於露风寒热之始腠理次入胃食不化热则消中寒栗振动也

解风散 主之治风成寒热头目昏眩支体疼痛手足麻痹上膈壅滞

人参 川芎 独活 麻黄【去节汤洗焙各一两】 甘草【一两】 细辛【去苗半两】

右为末每服三钱水一盞半生姜五片薄荷叶少许同煎至八分不计时候

风成寒中证 主风

风气与阳明入胃循脉而上至目皆津液所生为泣也当归汤
主之治风邪所伤寒中目泣自出肌瘦泄汗不止

当归 人参 官桂【各三钱】 乾姜【炮】 白术 白茯苓 甘草 川芎
白芍药【各半两】 细辛【去苗半两】 陈皮【一两】

【去白】

右为末每服三钱水一盞半生姜三片枣二枚同煎至八分去滓热服不许时候并三服

风成热中证 主风

风气与阳明入胃循脉而上目眦肥人气不外泄为热中目黄之病也

青龙散 主之治风气邪传化腹内瘀结而目黄风气不得泄为热中烦渴引饮

地黄 仙灵脾

何首乌【去黑皮泔浸一宿竹刀子切焙各一分】 防风【去苗】 荆芥穗【一两】

右为末每服一钱沸汤点调下食後每日三服

脑风证 主风气

气循风府而上则为脑风顶背怯寒脑户极冷以此为病

神圣散 主之治脑风邪气留饮不散顶背怯寒头疼不可忍者

麻黄【去节】 细辛【去苗】 乾蝎【一半生一半炒】 藿香叶【各等分】

右为末每服二钱煮荆芥薄荷酒调下茶亦得并血风

又方

治脑风邪气留饮头疼不可忍者用远志末不以多少於鼻中?与痛处柔之相兼前药可用也

首风证 主新沐中风

中风为首风头面多汗恶风当先一日甚至其风日则少愈

大川芎丸 主之治首风旋晕眩急外合阳气风寒相搏胃膈痰饮偏正头疼身拘倦

川芎【一斤】 天麻【四两用郢州者】

右为末炼蜜为丸每两作十丸每服一丸细嚼茶酒下食後

秘方茶酒调散 治一切诸风痰壅目澁昏眩头疼心懊烦热皮肤痛痒并风毒壅滞清爽神志通辟关窍消恶汗

石膏【另为细末】 菊花 细辛【去苗】 香附子【去须炒各等分】

右为末每服二钱温茶酒调下食後每日三服

目风眼寒证 主眼门

风入系头则血脉凝滞不能上下通流於目令风寒客之风眼寒也

石膏散 主之治目风眼寒及偏正头疼夹脑风鼻出清涕目泪疼痛不已

石膏【二两炭火烧研细末】 川芎【一两】 甘草【半两炙】

右为末每服一钱葱白好茶同煎汤调下食後日二服

漏风证 主酒风

饮酒中风或汗多不可单衣食则汗出多如液漏久不治为消渴疾

白术散 主之治漏不久虚风多汗食之汗出如洗少者痿劣

牡蛎【二钱焙赤】白术【一两一分】防风【二两半】

右为末每服一钱温水调下不计时如恶风倍防风白术如汗多面肿倍牡蛎

胃风证 主风

因於失衣风感之颈汗多恶风膈塞不通寒则胃拽腹满气不通

大豆?丸胃风汤 主之治胃风颈多汗恶风饮食不下小腹善满失衣则腹胀食寒则泻形瘦

肉豆菹 草豆? 陈皮 独活 薏苡仁 人参 川芎【各半两】羌活 防风 桔梗
甘草【炙】木香【各分】

右为末炼蜜为丸如桐子大每服四十丸米饮下不计时日进三服

胃风汤 治风冷乘虚入客肠胃水谷不化肠脇虚满?痛及肠胃泄毒或下瘀血

人参 白茯苓【去皮】芎藭 官桂 当归【去苗】白芍药白术【各等分】

右为末每服二钱水一大盏入粟米百余粒同煎至七分去滓热服空心食前【此药与豆?丸为表里也】

行痹证 主痹

风寒湿三气合而为痹风气胜者行痹上下左右无留随所至作

防风汤 主之治行痹行走无定

防风 甘草 当归 赤茯苓【去皮】杏仁【去皮炒熟】桂【各一两】黄芩 秦艽
葛根【各三钱】麻黄【半两去节】

右为末每服五钱酒水合二盏枣三枚姜五片煎至一盏去滓温服

痛痹证 主痹

寒胜者为痛痹大宜宣通陰寒为痛宜通气温经而愈茯苓汤
加减治痛痹四肢疼痛拘倦浮肿

赤茯苓【去皮】桑白皮【各二两】防风 官桂 川芎 芍药 麻黄【去节各一半半】

右为末每服五钱水一盞枣一枚煎至八分去滓温服以姜粥投之汗泄为度效矣

着痹证 主痹

湿气胜者为着痹湿地水气甚重着而不去多汗而濡者

茯苓川芎汤 主之治着痹留注不去四肢麻拘挛浮肿

赤茯苓 桑白皮 防风 官桂 川芎 麻黄 芍药 当归 甘草【炙各等分】

右为末每服二钱水二盞枣三枚同煎至一盞去滓空心温服如欲出汗以粥投之

周痹证 主痹

黄帝鍼经云在血脉之中随上下本痹不痛今能上下周身故以名之

大豆萆散 主之治周痹注五脏留滞胃中结聚益气出毒润皮毛补肾气

大豆萆【一斤炒香熟】

右为末每服半钱温酒调下空心加至一钱日三服

胞痹证 主膀胱

小腹膀胱按之内痛若沃以汤澁於小便上为清涕太阳直行从巅入循於脑气下灌於鼻时出清涕不止肾着汤 主之治胞痹小便不利鼻出清涕者

赤茯苓【去皮】白术【各四两】甘草【三两炙】乾姜【二两炮】

右为末每服五钱水二盞煎至一盞去滓温服日三服

肠痹证 主痹

虽多饮不得溲不成大便使糟粕不化故气喘急而飧泄

木香丸 主之治肠痹腹?痛时发飧泄气不消化小便秘澁

木香 白术 官桂 羌活 良姜 诃子皮【各一两】 附子【炮去皮】 厚朴【生姜制】 肉豆蔻【各二两】 乾姜【三分】 甘草【半两】

右为末麴麪糊为丸如桐子大每服二十丸姜汤下空心

热痹证 主痹

阳气多陰气少阳热其陰寒故痹藏府热熯然而闷也升麻汤
主之治热痹肌肉热极体上如鼠走唇口反纵皮色变兼诸风皆治

升麻【三两】 茯神【去皮】 人参 防风
犀角【镑】 羚羊角【镑】 羌活【各一两】 官桂【半两】

右为末每服四钱水二盏生姜二块碎竹?少许同煎至一盏温服不计时候

白淫证 主虚劳

思想无穷所愿不得意淫於外入房太甚筋纵发为筋痿及为白淫大过者白物为淫随洩而下故为劳弱秘真丸 主之治白淫小便不止精气不固及有余?或梦寢陰人通泄耳

龙骨【一两别研】 诃子皮【大者五个用】 缩砂仁【半两去皮】 朱砂【一两研细一分为衣】

右为末麴糊为丸如菉豆大每服一丸空心温酒下冷水亦得不可多服大便秘白汤茶下

胃脘痛证 主痈门

胃脉沉细阳气不得下通寒痈阳热聚胃口腐坏成脓射干汤
主之治胃脘痛人迎脉逆而甚嗽浓血荣卫不流热聚胃口成痈

射干【去毛】 梔子仁
赤茯苓【去皮】 升麻【各一两】 赤芍药【一两半】 白术【半两】

右为末每服五钱水二盏煎至一盏去滓入地黄汁一合蜜半合再煎温服不计时候

阳厥证 主诸气

怒狂者生於阳也阳胜则气逆狂怒上气夺食即已食入於陰养於阳则平其气若阳胜气逆多怒

羚羊角汤 主之治阳厥气逆多怒而颈脉腹効已食陰养於阳平其气

羚羊角 人参【各三两】赤茯苓【二两去去皮】志【去心】大黄【炒各半两】甘草【一分炙】

右为末每服三钱水一盞半煎至八分去滓温服不计时候

新补又方 治阳厥若除烦下气铁洛为饮铁浆汤饮之食後并服

息积证 主腹心

病脇下满逆气不已气聚脇下息而不消积而不散气元在胃妨饮食不可鍼灸宜导引服药尔

白朮丸 治息积脇下气逆妨闷喘息不便呼吸引痛不已

白朮 枳实 官桂【各一两半】人参【二两】陈皮 桔梗【醋炒】甘草【各一钱】

右为末炼蜜为丸如桐子大每服二十丸温酒下日三服

筋证 主肝

人有尺脉数甚筋急而见腹必急数亦为虚筋见以名耳

栝子仁散 主之治筋肝虚生寒脉寒数筋急腹脇痞闷筋见於外【圣惠方中十五味栝子仁丸亦治】

栝子仁 茯苓 防风 细辛 白朮 官桂 枳殼 川芎【各三两】附子 当归 槟榔【各半两】

右为末每服三钱水一盞半生姜三片枣二枚同煎至八分去滓温服不计时候

厥逆头疼证 主胃

肾虚犯大寒头疼齿亦痛痛之甚数不已者是也天南星丸
主之治厥头痛齿痛骨寒胃脉同肾脉厥逆头痛不可忍之

天南星【炮】硫黄【研】石膏【研】消石【研各等分】

右为末麝糊为丸如桐子大却每服二十丸温酒下空心日午临卧三时服

胆痹证 主肝

谋虑不决胆虚气上冲口中上溢则口苦是清淨之府浊扰之气上溢

益胆汤 主之治胆痹肝虚热气上冲口中常苦泄热不已藏府固虚致然

黄芩【去朽】甘草【炙】人参【各二两】官桂【一两】苦参 茯神【各两半】

右为末每服三钱水一盏煎至八分去滓温服不计计时候

濡泄证 主利

内经云湿胜则濡甲乙经云寒客生濡胃泄如随气而下利

豆蔻散 主之治濡泄不止寒客於脾胃故伤湿而腹痛滑利不止

肉豆蔻【五个】甘草【炙】厚朴【各等分】

右为末每服二钱米饮一盏调下食前白汤亦得

鹜溏证 主利

脾虚风冷陰盛糟粕不化大便黄黑如鹜溏或大肠有寒也

吴茱萸丸 治鹜溏泄泻不止脾虚胃弱大肠有寒大便青黑或黄利下

吴茱萸【汤洗炒】乾姜 赤石脂 陈麴【炒熟】当归【焙】厚朴【各三钱】

右为末炼蜜为丸如桐子大每服三十丸温米饮下空心服

三焦约证 主大小肠

小腹痛不得大小便邪气入客约而不行故谷气不得通也

枳壳丸 主之治三焦约调顺三焦气脉消痞滞利胸膈治风通大小便

陈皮【一两】槟榔【半两】牵牛【四两一半生一半熟捣取头末一两半余不用】木香【一分】枳壳【二两】

右为末炼蜜为丸如桐子大每服十五丸生姜汤下食後日三服

胃寒肠热证 主胃

胃寒主收水谷不化泄泻寒之气在上肠热之气在下故胀而泄

妙应丸 主之治胃寒肠热水谷不化腹胀痞满泄利不已

川乌头【去尖半两】 梔子仁 乾姜【生各一分】

右为末生姜汁麪糊为丸如桐子大每服五丸温酒下食前日进二服

胃热肠寒证 主胃

胃热则消谷善食而饥奈肠寒则血凝脉重小便痛痛而胀

青橘皮丸【又云前胡水香散亦治】 治胃热肠寒善食而饥便溺小腹而胀痛大便或澁

青皮 京三棱 黄连 蓬莪茂【炮各一两】 苞荳霜【一分】

右为末麪糊为丸如菉豆大每服三丸至五丸茶酒下食後【少与之不可多也】

控辜证 主小肠

甲乙经云小肠病结於腰上而不下痛冲心肺邪所系茴香楝实丸

主之治小肠病结上而不下痛冲心肺茴香【炒】 练石【麪炒去核】 石茺萸
马楝花【醋炒各一两】 陈皮【一两】 芫花【半两醋炒】

右为末醋麪糊为丸如桐子大每服十丸至二十丸温酒下空心食前

陰疝证 主男病

足厥陰之脉环器底小腹胀或痛肾虚寒水涸渴泻邪补脉为治

蒺藜汤 主之治陰疝牵引小腹痛诸厥疝即陰疝也嘻慾劳痛不可忍之

蒺藜【去角炒】 附子【炮去皮脐】 梔【各等分】

右为末每服三钱水一盏半煎至六分去滓食前温服控辜证茴香练实丸【亦治此证】

诸痹证 主风

痹乃风寒湿三气相合而为痹风者百疾之长善行数变当汗恶风目膈脇痛或走注四肢皮肤不仁屈伸不便

升麻前胡汤 主之治肝风虚所中头痛目眩胸膈壅滞心烦痛昏闷屈伸不便

升麻 前胡【一两半】 玄参 地骨皮【各一两】 羚羊角 葛根【各二两】 酸枣仁【一钱】

右为末每服三钱水一盞半煎至八分去滓再煎三五沸食後温服如行五六里更进一服

心疝证 主心痛

心脉急小腹有形心不受邪必传於腑故小腹有形心气逆不顺当痛不已当兼心气治不止为有寒邪所中木香散 主之治心疝小腹痛闷絶不已者

木香 陈皮【各一两】 良姜 乾姜 诃皮子 赤芍药 枳实【各半两】 草豆蔻 黑牵牛【各三两】 川芎【三两】

右为末每服二钱水一盞煎至七分去滓温服

四圣散 治肾脏风并一切癖

白附子 白蒺藜 黄耆 羌活【各等分生用】

右为末每服二钱盐汤调下空心一日三服久癖不差十日大愈

赴筵散 治口疮不已者

蜜陀僧 黄蘗 青黛【各等分】

右同研为细末每用乾糝於疮上不过三二日即便愈

诃子汤 治失音不能言语者

诃子【四个半炮半生】 桔梗【一两半炙半生】 甘草【二寸半炙半生】

右为细末每服二钱用童子小便一盞同水一盞煎至五七沸温服甚者不过三服即愈

宣明方论卷二

卷三

[子部,医家类,宣明方论]

钦定四库全书

宣明方论卷三

金 刘完素 撰

风论

素问云诸风掉眩强直支痛缓戾里急筋缩皆足厥陰风木之位肝胆之气也【风者动也动者摇也所谓风气甚而主目眩运由风木王则是金衰不能制木而木能生火故风火多为热化皆阳热多也】风为病者或为寒热或为热中或为寒中或为厉风或为偏枯或为腰脊强痛或为耳鸣鼻塞诸证皆不仁其病各异其名不同 经云风者善行数变腠理开则洒然寒闭则热而风风气俱入行於诸脉分肉之间与卫气相干其道不利致使肌肉愤?而有疡也 卫气所凝而不行故其肉有不仁也分肉之间卫气行处风与卫气相薄俱行肉分故气道澁而不利气道不利风热内郁卫气相持肉愤?而疮出卫气被风郁不得传徧昇凝而不行则肉不仁也谓皮肉 而不知寒热痛痒如木石也 经曰风者百病之首也其变乃乃为他病无常皆风气所发也以四时五运六气千变万化冲荡推击无穷安得失时而絶也故春甲乙伤於风者为肝风夏丙子伤於风者为心风季夏戊巳伤於风者为脾风秋庚辛伤於风者为肺风冬壬癸伤於风者为肾风

风中五脏六腑自俞而入为藏府之风肺风之状多汗恶风色白时嗽短气昼则微暮则甚心风之状【上同】善怒色赤病甚则言不可快肝风善悲色微苍噤乾善怒时憎女子脾风身体怠惰四肢不收色薄微黄不嗜饮食肾风面庞而浮肿脊痛不能正立其色如隐曲不利又曰风寒热诸疾之始生也人之藏府皆风之起谓火热阳之本也谓曲直动摇风之用也眩运呕吐谓风热之甚也夫风热拂郁风大生於热以热为本而风为标风言风者即风热病也气壅滞筋脉拘倦肢体焦痿头目昏眩腰脊强痛耳鸣鼻塞口苦舌乾咽噤不利胸膈痞闷咳呕喘满涕唾稠粘肠胃燥热结便溺淋闭或夜卧寝汗咬牙睡语筋惕惊悸或肠胃拂郁结水夜不能浸润於周身而但为小便多出者或湿热内郁而时有汗泄者或因亡液而成燥淋闭者或因肠胃燥郁水液不能宣行於外反以停湿而泄或燥湿往来而时结时泄者或表之阳如正气【卫气是也】与邪热相合并入於里阳极似陰而战烦渴者【热间寒故战里热甚则渴】或虚气久不已者【经言邪热与卫气并入於里则寒战也并出之於表则发热大则病作离则病已】或风热走注疼痛麻痹者或肾水真陰衰虚心火邪热暴甚而僵仆或卒中久不语或一切暴瘖而不语语不出声或暗风痼者或洗头风或破伤或中风诸潮搐并小儿诸疳积热或惊风积热伤寒疫疔而能辨者或热甚怫结而反出不快者或热黑陷将死或大人

小儿风热疮疥及久不愈者或头生屑偏身黑黧紫白斑驳或面鼻生紫赤风刺癰疹俗呼为肺风者或成风疔世传为大风疾者或肠风痔漏并解酒过热毒兼解利诸邪所伤及调理伤寒未发汗头项身体疼痛者并两感诸证兼治产後血液损虚以致陰气衰残阳气郁甚为诸热证腹满澁痛烦渴喘闷谵妄惊狂或热极生风而热燥郁舌强口噤筋惕肉瞤一切风热燥证郁而恶物不下腹满赧痛而昏者【恶物过多而不吐者不宜服之】兼消除大小疮及恶毒兼治堕马打扑伤损痛疼或因而热结大小便澁滯不通或腰腹急痛腹满喘闷者

防风通圣散

防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷叶 麻黄 连翘 芒硝【已上各半两两朴朴者】石膏 黄芩 桔梗【各一两】滑石【三两】甘草【二两】荆芥 白术 栀子【各一分】

右为末每服二钱水一大盏生姜三片煎至六分温服涎嗽加半夏【半两姜制】

贾同知通圣散

防风 芍药【各二钱半】甘草【三两】荆芥【三钱半】薄荷【一两】黄芩【一两】白术【一分】石膏【一两】川芎【半两】滑石【三两】当归【半两】大黄【半两】麻黄【半两】山栀子【一分】连翘【半两】桔梗【一两】无芒硝 无缩砂

崔宣武通圣散

防风 芍药 荆芥 当归 白术 山栀子【各一分】川芎 大黄 薄荷 连翘 黄芩 桔梗缩砂【各半两】甘草 石膏【各一两】滑石【三两】

刘庭瑞通圣散

此方有缩砂无芒硝其余皆同缘庭瑞於河间守真先生札师传之随从二年始受於方斯且取为端而可准凭以用之兼庭瑞以用治病百发百中何以疑之因録但庭瑞临时以意加減一依前法嗽加半夏半两生姜制

防风天麻散 治风麻痹走注肢节疼痛中风偏枯强暴音不语内外风热壅滯解昏眩

防风 川芎 天麻 羌活 香白芷 草乌头 白附子 荆芥穗 当归【焙】甘草【各半两】滑石【二两】

右为末热酒化蜜少许调半钱加至一钱觉药力运行微麻为度或炼蜜为丸如弹子大热酒化下一丸或半丸【细嚼白汤化下亦得】散郁结宜通气【如甚者與服防风通圣散】

犀角丸 治风癇日发作有时扬手掷足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角【末半两】赤石脂【三两】朴硝【二两】白僵蚕【一两】薄荷叶【一两】

右为末麝糊为丸如桐子大每服二十丸至三十丸温水下日三服不计时候如觉痰多即减丸数忌油腻物风痊病目直卒中口禁背强如弓卧摇动手足搐搦【无汗名刚为阳痊有汗名柔为阴痊】通三一承气下妙

搜风丸 治邪气上逆以致上实下虚风热上攻眼目昏耳鸣鼻塞头痛眩运躁热上壅痰逆涎嗽心腹痞痛大小便结滞清利头面鼻聪耳鸣宣通血气

人参 茯苓 天南星【半两】乾生姜
藿香叶【一分】白矾【生各一两】蛤粉【二两】寒水石【一两】大黄
黄芩【一两】牵牛【四两】薄荷叶【半两】滑石【四两】半夏【一两】

右为末滴水为丸如小豆大每服十丸生姜汤下加至二十丸日三服

川芎石膏汤 治风热上攻头面目昏眩痛闷风痰喘嗽鼻塞口疮烦渴淋瀝眼生翳膜清神利头宣通气血中风偏枯解中外诸邪调理诸病劳复传染

川芎 芍药 当归 山梔子 黄芩 大黄 菊花 荆芥穗 人参 白术【各半两】滑石【四两】寒水石【二两】甘草【三两】桔梗【二两】缩砂仁【一分】石膏 防风 连翘 薄荷叶【各一两】

右为末每服二钱水一盏煎至六分去滓食後水调亦得忌姜醋发热物

川芎神功散 治风热上攻偏正头痛无问微甚久新头面昏眩清神

川芎【四钱】甘草【一分】川乌头 吴白芷 天南星 麻黄【各半两】

右为末每服二钱水一盏生姜三片煎至半盏投清酒半盏避风

换骨丹 治瘫痪中风口眼喎斜半身不遂并一切风癇暗风并宜服之颂曰

我有换骨丹 传之极幽秘 疎开病者心扶起衰翁臂 气壮即延年 神清自不睡 南山张仙翁 三百八十岁 槐皮芎术芷 仙人防首蔓 十件各停匀 苦味香减半 龙麝即少许 朱砂作衣纒 勿令阴人见 夜卧服一粒 遍身汗津满 万病自消除 神仙为侣伴

麻黄【煎膏】仙术 香白芷 槐角子【取子】川芎 人参 防风 桑白皮 苦参 威灵仙

何首乌

蔓荆子 木香 龙脑【研】 朱砂【研】 麝香【研】 五味子

右为末桑白单捣细秤以麻黄膏和就杵一万五千下每两分作十丸每服一丸以硬物击碎温酒半盏浸以物盖不可透气食後临卧一呷咽之衣盖覆当自出汗即瘥以【和胃汤调补】及避风寒茶下半

铅红散 治风热上攻阳明经络面鼻紫色刺癢????【俗呼为肺风者以肺主鼻而又浅在皮肤之内皮肤属於肺】

舶上硫黄 白矾灰【半两】

右为末少许入黄丹染与病人面色同每上半钱津液涂之【洗 罢临卧再服防风通圣散】 効速

神芎散 治风热上攻头目眩痛上壅鼻并牙齿闷痛川芎 郁金【各二钱】 荆芥穗 薄荷叶 红豆【各一分】

右为末入盆硝二钱研匀鼻内?三二剋耳许力慢加药病甚兼夜?

万灵丸 治肾藏一切耳鸣腰疼筋骨痛

赤芍药 五灵脂 防风 草乌头【二两炮】 黄蓍 细辛 海桐皮 山茵陈 骨碎补 地龙【各八钱】 黑狗脊【二两】 牛膝 何首乌 蔓荆子 白附子 川乌头 巨胜子【各八钱】 仙术【一两】 芫花【三钱炒】 黑牵牛【半两】 青皮【二钱】 御米子【二钱炒】

右为末酒麪糊为丸如桐子大每服十丸至二十丸温酒下空心食前服

伊祁丸 治腰脚拳弯鹤膝风筋缩

伊祁【头尾全者】 桃仁【生】 白附子 阿魏 桂心 白芷 当归 北漏卢 安息香【用胡桃穰研】 芍药 牛膝 地骨皮 威灵仙 羌活【各等分】

右为末麪糊为丸如弹子空心每服温酒化下一丸

祛风丸 治中风偏枯手足战掉语言蹇澁筋骨痛菉豆粉 川乌头【炮】 草乌头【炮】 天南星 半夏【各一两】 甘草 川芎 藿香叶 苓苓香 地龙 蝎稍【各三钱】 白僵蚕【淘米泔浸去丝】 川姜【半两炮】

右为末一两用菥豆粉一两【又一法】用药一两以白麪二两滴水为丸如桐子大量人虚实加减细嚼茶酒下五丸至七丸食後初服三丸渐加

舒筋散 治妇人血气并产後风热搐搦舒筋【俗鸡爪风】人参 川芎 官桂 丁香【各半两】木香 天麻【酒浸焙各一两】井泉石【四两别为末】

右为末每服三钱井泉末三钱大豆半升淨淘好酒一大升煮豆软去豆用豆汁酒调下後以酒送下盖覆汗出为效

胜金丸 治风热惊骇不时旋运潮搐口吐痰沫忽然倒地不省人事名曰癇病

白僵蚕 细辛 天南星 皂角【炙黄】川乌头【生】乌蛇【真者好酒浸去骨】白矾 桔梗 蕨灵仙 何首乌 草乌头【各】荆芥穗 川芎【各二两】

右为末酒麪糊为丸如桐子大每服十丸食後温酒下

比金散 治伤寒胃风头目痛四肢拘倦鼻塞

麻黄 白芷 细辛 荆芥穗 菊花 防风 石膏 何首乌 川芎 薄荷 乾蝎 草头乌【各等分】

右为末每服一钱水一盏煎温服酒茶亦得

神白丹 治伤寒积热及风生惊搐或如狂病诸药不効此方不可尽述

铅白霜【一分】轻粉【半两】粉霜【一两用白麪六钱和作饼子炙热同研】

右为末滴水为丸桐子大每服十丸至十五丸米饮下量虚实加减

桃仁丸 治一切风毒偏身疼痛四肢拘急

草乌头【生用】五灵脂【三两】桃仁【取霜一两】

右为末酒煮麪糊丸如桐子大以青黛为衣嚼胡桃仁以温酒下五丸食後加减

瓜蒂神妙丹 治头目昏眩偏正头痛等

焰硝 雄黄 川芎 薄荷叶 道人头 梨芦【各一分】天竺黄【一钱半如无以蔚金代之】

右为末研细含水鼻中?壹字神验

清风散 治头目昏眩咽膈不利痰涎壅塞

石礞【一钱】朱砂 牙硝 雄黄【各三字】龙脑【一字】瓜蒂【二钱】滑石
赤小豆【半钱】皂角【一字去皮炙黄取末】

右为极细末每服半钱新汲水调下如噤不省人事滴水鼻中或健者可治为验

灵砂丹 治破伤风一切诸风等

葳灵仙 黑牵牛 何首乌 苍术【半两】香附子【六两】川乌豆【去尖】朱砂 没药
乳香【各三钱】陈皂角【四钱炙黄去皮】

右为末把皂角打破用酒二升半春夏三日秋冬七日取汁打面糊为丸如桐子大每服五丸
如破伤风煎鳔酒下如牙疼赤眼搥碎研三五丸鼻?之

天麻散 治头顶痛头面肿拘急风伤荣卫发燥热川芎 细辛 苦参 地骨皮 菖蒲
何首乌蔓荆子 薄荷叶 杜钱黎 牛旁子 荆芥

穗 蛇蛻草 葳灵仙 防风 天麻【一两】甘草【二两炙】

右为末每服二三钱研蜜水调下茶水任不计时

薄荷白檀汤【新补】治风壅头目眩鼻塞烦闷精神不爽消风化痰清头目

白檀【一两】荆芥穗【二两】薄荷叶【四两】苳蒻根【二两】甘草【四两炙】白芷
【二两】盐【四两】缩砂仁【半两】

右为末每服一钱百沸汤点食後临卧稍热温服

菊叶汤 治一切风头目昏眩呕吐面目浮肿者菊花【去梗】羌活 独活 旋覆花 牛旁子
甘草【各等分】

右为末每服二钱水一盞生姜三片同煎至七分去滓温服食後

宣明方论卷三

卷四

钦定四库全书

宣明方论卷四

金 刘完素 撰

风论

黄帝曰病热当何禁之岐伯曰病热少愈食肉则复多食则遗此其禁也因热少愈犹未尽除不戒饮食劳动情慾扰乱奈脾胃气虚未能消化坚食故热复生五臟者皆热

夫热病者伤寒之类也人之伤於寒则为病热寒毒藏於肌肤阳气不行散发而内为怫结故伤寒者反病为热热虽甚不死奈巨阳为首巨阳者诸阳之属也诸阳为热以气诸陰为寒以血热病已愈其有复作谓病已衰而热有作所藏因其谷气相薄两热相合故有所遗缘热也虽邪气而不尽遗热在故当复作

五臟俱热者皆视之肝热左颊先赤心热颜先赤脾热鼻先赤肺热右颊先赤肾热颐先赤肝热者小便黄腹痛多卧身热热争则狂惊脇满手足躁而不得安卧心热者不乐数日乃热热争则卒心痛烦闷善呕头痛面赤无汗脾热者头重颊痛烦心颜青欲吐身热热争则腰痛不可仰腹满泄两颌痛肺热者淅然厥起毫毛恶风寒舌上黄身热热争则唾咳痛走胸背不得太息头痛不堪汗出而寒肾热者腰痛胫酸苦渴数饮食热热争则项痛而强胛寒且酸足下热不欲言 经曰汗出脉躁盛一死脉不与汗相应其病二死狂言失志者三死皆是怫郁结不能解散以致危殆

素问诸热瞀瘵暴痞冒昧躁扰狂言骂詈惊骇肘肿疼酸气逆皆手少阳相火心胞络三焦之气也

夫肾水真阴本虚心火狂阳积热以甚以致风热壅滞头面昏眩肢体麻痹皮肤瘙痒筋脉拘倦胸膈痞满时或痛闷或鼻塞鼽衄口舌生疮咽喉不利牙齿疳蚀或偏身生疮癣疥或睡语咬牙惊惕虚汗或健妄心忪烦燥多睡或大小便澁滞或烦热腹满或酒过积毒劳役过度中外一切劳损神狂气心志不宁口苦咽乾饮食减少变生风热诸病虚羸困倦或酒病瘦悴及老弱虚人或脾肾经虚风热燥郁色黑齿宣身瘦焦痿或热中烦满饥不饮食或瘵或消中善食而瘦或消渴多虚头面肿小便数或服甘辛热药过度变成三消上则消渴中则消中下则消肾小便白膏也

神芎丸 治一切热证常服保养除痰饮消酒食清头目利咽膈能令偏身结滞宣通气利而神

强体健耐伤省病并妇人经病及产後血滯腰脚重痛小儿积热惊风潮搐藏用丸亦曰显仁丸加黄连薄荷川芎各半两名曰神芎丸

大黄 黄芩【各二两】 牵牛 滑石【四两】

右为细末滴水为丸如小豆大温水下十丸至十五丸每服加十丸日三服冷水下亦得或炼蜜丸愈佳或久病热郁无问瘦悴老弱并一切证可下者始自十丸每服加十丸以利为度如常服此药但除肠垢积滯不伤和气推陈致新得利便快并无药燥搔扰亦不困倦虚损颇遂病人心意或热甚必须急下者便服四五十丸未利再服以意消息三五岁孩儿丸如麻子大凡此一法此药至善常服二三十丸不利藏府但有益无损或妇人血下恶物加桂枝半两病微者常服病重者亦取利因而结滯开通恶物自下也此方除藏府滑泄者或重寒脉迟者或妇人经病产後血下不止者及孕妇等则不宜服除此以外一切风热杂病闷壅塞神气不和或平人保养常服自显其功若以効验观其药味则非明本草造化之理者不可得而知其然也犹孔子讚易道明显应化万仁之善而不见其大道之功用故曰显诸仁藏诸用因以云藏用丸亦其义也兼以世讹之久矣而反不喜此等妙方不肯服之每有久获大効而诚恳求其方不得已而授之既见其方反生疑惧不复用焉亦有效而志信求其方务以广传救病因而衆议百端拟疑妄生谤说使致俗医皆畏之致道不能神但有妨病者後之君子但行其药明显诸人勿示其方而密藏诸用耳或以一法加黄连川芎薄荷等各半两治一切头目昏眩者愈佳

柴胡饮子 治解一切肌骨蒸积热作发寒热往来【表热里和则发寒里热表和则发热邪热半在表半在里出入进退无和即寒热往来阴阳相胜也】 畜热寒战【表之阳和正气与邪热并畜於里脉道不行故身冷脉絶寒战而反烦渴也】 及伤寒发汗不解或中外诸邪热口乾烦渴或下後热未愈汗後劳复或骨蒸肺痿喘嗽妇人余疾产後经病

柴胡 人参 黄芩 甘草 大黄 当归 芍药【各半两】

右为末每服抄三钱水一盞生姜三片煎至七分温服日三服病热甚者加減之

崔宣武柴胡饮子 加半夏 五味子

桔梗【各三钱】 刘庭瑞柴胡饮子【与前分用不同故以录之】

柴胡 甘草【二两】 黄芩 当归 芍药 大黄【各一两】 人参【半两】 半夏【半两】

右为大劳热病五七钱以利为度未利更加使病不再发也

木香万安丸 治一切风热怫郁气血壅滯头目昏眩鼻塞耳鸣筋脉拘倦肢体焦痿咽嗑不利胸膈痞塞腹脇痛闷肠胃燥澁淋閼不通腰脚重痛疝瘕急结痃癖坚积肠滯胃满久不了絶走注疼痛瘡风瘤病湿病腹胀水肿

木香 拣桂 甘遂【各一分】 牵牛【二两】 大戟【半两】 大黄 红皮 槟榔【各一两】 皂角【二两要得肥好者洗净水三盏煮三二沸取出槌碎揉取汁再煮成稠膏下蜜?二沸便取出】

右膏丸小豆大每服十丸至十五丸生姜汤下小儿丸如麻子大水肿痼病诸积快利为度

玉芝徐老丸 治一切风壅消痰利膈胸脇痞闷美饮食调五味【徐老缓慢迟老】

天南星 乾姜【各半两】 黄栢【一两半】 牵牛【四两】 半夏 白矾 大黄【各一两】 蛤粉【二两】

右为末滴水丸如小豆大每服十丸至二十丸温水下食後日三服常服顺气调血令人徐老或已衰大便结者除肠垢积物可渐加至三五十丸孕妇滑泄病忌服滑泄为牵牛大黄孕妇为南星半夏

消痞丸 治积湿热毒甚者身体面目黄心脇腹满呕吐不能饮食痿弱难以运动咽噎不利肢体焦𦑔眩悸膈热坐卧不宁心火有余而妄行上为咳血衄血下为大小便血肠风痔瘻三焦壅滞閤痺热中消渴传化失常小儿疳积热

黄连 乾葛【各一两】 黄芩 大黄 黄蘗 梔子 薄荷 藿香 厚朴 茴香【炒各半两】 木香 辣桂【各一分】 青黛【一两研】 牵牛【二两】

右为细末滴水丸如小豆大每服十丸新水下温水亦得小儿丸如麻子大病本湿热内基本自利者去大黄牵牛忌发热诸物

和中丸 治口燥舌乾咽噎不利胸脇痞满心腹痛闷小便赤涩大便结滞风气怫郁头目昏眩筋脉拘急肢体疼倦一切风壅常服宽膈美食消痰止逆

牵牛【一两】 官桂【一分】 大黄 红皮 黄芩 茴香【各半两】 木香【一分】 滑石【二两】

右为末滴水丸如小豆大每服二十丸煎生姜汤下温水亦得日三服

崔宣武和中丸 大黄【一两】 茴香【炒】 外七味同

龙脑丸 治大小人一切蕴积热毒气不散及失瘖癰????

龙脑 朱砂 鹏砂 牛黄【各等分】

右为末熔黄蜡为丸如米粒大每服三五丸以甘草人参汤下不计时候

大金花丸 治中外诸热寝汗咬牙睡语惊悸溺血淋閼咳衄血瘦弱头痛并骨蒸肺痿喘

金花丸 又名既济解毒丸

黄连 黄蘗 黄芩 大黄【各半两】

右为末滴水丸如小豆大每服三二十丸新汲水下自利去大黄加梔子小儿丸如麻子大三五丸

当归龙胆丸 治肾水阴虚风热蕴积时发惊悸筋惕搐搦神志不宁荣卫壅滞头目昏眩肌肉瞤瘕胸膈痞寒咽嗑不利肠胃燥澁小便溺閼筋脉拘奇【奇犹急也重也】肢体痿弱暗风痼病小儿急慢惊风常服宣通血气调顺阴阳病无再作

当归【焙】 龙胆草 大梔子 黄连 黄蘗 黄芩【各一两】 大黄 芦荟 青黛【各半两】 木香【一分】 麝香【半钱别研】

右为末炼蜜和丸如小豆大小儿如麻子大生姜汤下每服二十丸忌发热诸物兼服防风通圣散

软金丸 治一切热疾常服润饥肤柰老诸热证皆可服

大黄 牵牛 皂角【各二两】 朴硝【半两】

右为末滴水和丸如桐子大每服三十丸白汤下自十丸服至三十丸食後服

妙香丸 治一切久远沉积伤寒结胸太阳厥证燥郁攻不开者皆可服此药亦名大圣丸

芭豆【皮不出油】 膩粉 礞砂 龙脑 麝香
牛黄【少许】 朱砂【各分】 水银【各一钱锡结砂子】

右为末炼蜜和丸又一方用?丸如皂子大用药时急要动一丸分作三丸割作眼子冷水浸煎大黄汤下然後服热茶一盃便行也局方内无礞砂加金薄

妙功藏用丸【新补】 亦名显仁丸又名神芎丸治呕哕不食痿弱难运血溢血泄淋閼不通或泄利三焦壅滞传化失常功不可述并宜服之

大黄 黄芩 黄连【各半两】 黑牵牛【一两】 滑石【二分】 荆芥穗【二两】 防风【一分】

】川芎【一两】木香【二分】官桂【三分去皮】

右为末滴水为丸如小豆大每服二十丸三十丸生姜汤下日三服温水亦得

宣明方论卷四

卷五

钦定四库全书

宣明方论卷五

金 刘完素 撰

伤寒门

主疗说

伤寒表证当汗而不可下里证当下而不可汗半在表半里则当和解不可发汗吐下在上则通之在下则泄之伤寒无汗表病里和则麻黄汤汗之或天水散之类亦佳表不解半入於里半尚在表者小柴胡汤和解之或天水凉膈散甚良表里热势俱甚者大柴胡汤微下之更甚者大承气汤下之表热多里热少者天水一凉膈半和解之里热多表热少未可下之者凉膈天水一半调之势更甚者小承气汤下之凡此诸可下者通宜大承气汤下之凡此诸可下者通宜三一承气汤下之发汗不解下後前後别无异证者通宜凉膈散调之以退其热两感仿此而已伤风自汗表病里和者桂枝汤解肌半在表半在里白虎汤和解之病在里者大承气汤下之一法无问风寒暑湿有汗无汗内外诸邪所伤但有可下诸证或表里两证俱不见而日深但目睛不了了睛不和者或腹满实痛者或烦渴或谵妄或狂躁满者或畜热极而将死者通宜大气汤下之或三一承气汤尤良伤寒大发汗汗出不解反无汗脉尚浮者苍术白虎汤再解之 或中暑自汗大出脉虚弱头痛口乾倦怠烦躁或时恶寒或畏日气无问表里通宜白虎或里热势甚腹满而脉沉可下者宜大承气汤或三一承气汤伤寒表热极甚身疼头痛不可忍或眩或呕里有微热不可发汗吐下拟以小柴胡天水凉膈之类和解恐不能退其热势之甚或大下後再三下後热势尚甚不能退本气虚损而脉不能实拟更下之恐下脱而立死不下亦热极而死寒凉之药不能退甚热势之甚者或热湿内余下利不止热不退者或因大下後热退利不止热不退脉弱气虚不可更下者或诸湿热内余小便赤澀大便溏泄频并少而急痛者必欲作利也须宜黄连解毒汤 或里热极甚而恐陰气不能退者或已下後热不退者或畜热内甚阳厥极深以至阳气沉细而不能营运於身陰欲絕而以致徧身青冷痛甚不堪项背拘急目赤睛疼昏眩恍惚咽乾或痛躁渴虚汗呕吐下利腹满实痛烦痞闷乱喘息急声脉虽疾数以其畜热极深而脉道不利以致脉沉细而欲絕俗未明其造化之理而反伤热寒极陰毒者或始得之阳热暴甚而便有此证者 或两感势甚者通宜解毒汤加大承气汤下之热不退者再下之然虽古人皆云三下热不退即死矣亦有按法以下四五次利一二十行热方退而救活者免致不下退其热而必死也下後热稍退而未愈者黄连解毒汤调之或微热未除者凉膈散调之或失下热极以至身冷脉微而昏冒将死者若急下之则残陰暴絕阳气後竭而立死不下亦死当以凉膈散或者黄连解毒汤养陰退阳畜热渐以消散则心胸腹脉渐以生至阳脉复有力者方可以三一承气汤微下之或解毒加大承气汤尤良或下

後微热不解者凉膈散调之愈後但宜退热之药忌发热诸物阳热易为再作也

论风热湿燥寒

诸风

风本生热以热为本风为标言风者即风热病也

诸热

热甚而生风或热微风甚即兼治风热或风微热甚但治其热即风自消也

诸湿

湿本土气火热能生土湿故夏热则万物湿润秋凉则湿复燥乾也湿病本不自生因於火热怫郁水液不能宣行即停滯而生水湿也凡病湿者多自热生而热气尚多以为兼证当云湿热亦犹风热义同虽病水寒不得宣行亦能为湿虽有此异亦以鲜矣或跗肿体寒而有水者以为畜热入里极深本非病寒也及夫寒热吐泻因得湿而成也

诸燥

燥乾者金肺之本肺藏气以血液内损气虚或风则皴揭风能胜湿热能耗液皆能成燥故经云风热火兼为阳寒湿燥同为陰又燥湿亦异也然燥金虽属秋陰而其性异於寒湿燥陰盛於风热火也故风热甚而寒湿同於燥也然中寒吐泻亡液而成燥者亦以此矣故经云诸澁枯涸乾劲皴揭皆属於燥也

诸寒

寒者上下所生水液澄彻清冷谷不化小便清白不澁身凉不渴本末不经有见阳热证其脉迟者是也此因饮食冷物过多陰胜阳衰而为中寒也或冷热相并而反阳气怫郁不能宣散怫热内作以成热证者不可亦言为冷当以成证辨之夫湿热吐泻当见阳脉若亡液气虚亦能反见诸陰脉也当以标本明之不可妄治或热证误服白术调中汤温药亦能开发阳气宣通而愈别无加害也

伤寒表证

夫伤寒之候头项痛腰脊强身体拘急表热恶寒不烦躁无自汗或头而痛肌热鼻乾或胸满而喘手足指末厥脉浮数而紧者邪热在表皆麻黄汤发汗之证也或天水散之类甚佳

伤寒表里证

伤寒身热为热在表引饮或小便黄赤热在里身热渴或小便黄赤为表里俱有热凉不渴小便清白为表里俱无热身疼拘急表热恶寒而脉浮者皆为热在表也引饮谵妄腹满实痛发热而脉沉者皆为热在里也胸脇痞痛或呕而实热往来脉在肌肉者邪半在表半在里也

内外伤

始得病脉便沉而里病表和者内伤也脉浮而表病里和者外伤也病在身体头面四肢为表病在胸腹之内为里病也

伤寒论

夫风寒者百病之始也是四时八节不正疫疠之气故云春气温和夏气暑热秋气清凉冬气水冰乃四时之正气冬时严寒万类深藏君子固密则不伤於寒触冒之者乃伤耳春应暖而反寒夏应热而反冷秋应凉而反热冬应寒而反温非时而邪气是以辛苦之人一岁之中病无少长始自一日巨阳膀胱受之巨阳者三阳之首故先受之二日阳明胃受之三日少阳胆受之未入其藏可汗之四日太阴脾受之五日少阴肾受之六日厥阴肝受之其入藏可泄之经云其未滿三日汗之而已其滿三日泄之而已故圣人论汗下大槩言之以脉分別三四日脉沉伏亦当下六七日脉浮滑亦可汗故伤寒传足经不传手经未详耳且自人身十二经络分布上下手足各有三陰三阳稟天地之气天枢之上同天之阳天枢之下同地之陰至真大论云身半以上其气三矣天之分也天气主之身半以下其气三矣地之分也地气主之【注云】当陰之分冷病归之当阳之分热病归之有八节邪气所中於人阳邪为病传手经陰邪为病传足经其邪自何而入自风池而入为?骨两傍一寸五分是十二经之俞穴春夏应阳秋冬应陰至真大论云寒暑温凉盛衰之用其在四唯故阳之动始於温盛於暑陰之动始於凉盛於寒春夏秋冬各差其分易云水流湿火就燥热论云热病者皆伤寒之类也人之伤於寒则为病热热虽甚不死太陰阳明论云阳受风气陰受湿气【注云】同气相求耳又曰伤於风者上先受之伤於湿者下先受之【注云】阳气炎上故受风陰气润下故受湿盖同气相合耳故风热火为阳寒湿燥为陰【刺热论云】五脏俱有热病肝热病左颊先赤心热病顔先赤脾热病鼻先赤肺热病右颊先赤肾热病颧先赤【甲乙热论云】有手足太陰热病有手足少陰热病有手足厥陰热病热论其三陰三阳五脏六腑皆受病荣卫不行五脏不通则死矣未尝则传足经不传手经麻黄汤 治伤寒头痛发热体痛恶风无汗喘满又治太阳病脉浮紧无汗发热身疼八九日不解表证在此当发其汗其人发烦目瞑必衄衄者阳气重也麻黄【一两半去节】桂枝【一两去皮】甘草【半两炙剉】杏仁【二十枚汤浸去皮尖或湿病身烦痛小便自利者加白术四分微汗之】

右为末每服三钱水一盞半煎至八分去滓温服不计时候衣覆以取汗

桂枝汤 治伤寒发热恶寒乾呕头痛太阳中风阳浮陰弱解肌脉浮紧鼻鸣者

桂枝【三分去皮】芍药【三分】甘草【三分】

右剉如麻豆大每服五钱水一盞半生姜三片枣三个煎至七分不计时候

小青龙汤 治伤寒表未罢心下有水气乾呕发热而咳或渴利小便不利小腹满喘

麻黄【去节汤炮去黄汗焙乾三钱利者去麻黄加芫花弹子大噎者去麻黄加附子】

右剉如麻豆大每服五钱水一大盞煎至半盞生姜枣同煎不计时候温服

瓜蒂散 治伤寒表证罢邪热入里结於胸中项满而饥不能食四肢微厥而脉乍紧者宜以吐之经云在上吐之在下泄之

瓜蒂 赤小豆【等分】

右为末香?半合【豆豉是也】水一盞半煮取汁半盞调下钱七不吐加服

五苓汤【五苓散是也】治伤寒中暑大汗後胃中乾烦躁不得眠脉浮小便不利微热烦渴及表里俱热饮水反吐【名曰水逆】或攻表不解当汗而反下之利不止脉浮表不解自利或一切留饮不散水停心下并两感中湿而昏躁霍乱吐泻惊风

猪苓【去皮】茯苓【去皮】白术【各半两】桂【一分去皮】泽泻【一两】

右为末每服二钱热汤调下愈妙加滑石二两甚佳喘 烦心不得眠者加阿胶半两枯夏月大暑新水调服立愈

宣明方论卷五

卷六

钦定四库全书

宣明方论卷六

金 刘完素 撰

伤寒方

抵当汤 治伤寒日深表证乃甚畜热下焦脉微沈不结胸发狂者小腹胀而硬小便自和者瘀血证也小便不和无血也或阳明畜热内甚而喜忘或狂大便虽硬而反易其色黑者有畜血也无表里证但发热日深脉虽浮者亦可下之或已下後脉数胃热消谷善饥数日不大便有瘀血也

桃仁【七个】 大黄【一分】 水蛭【炒】 䖫虫【各十个去翅足炒】

右剉如麻豆大分作二服水一盞煮半盞绞去滓温服未下再服

抵当丸 治伤寒有热小腹满小便不利者为有血也当下之不可余药

桃仁【八】 大黄【一分】 水蛭【炒】 䖫虫【各七依前炒】

右为末蜜和作二丸用水一小盞煮一丸至六分温服晡时血未下再服

大承气汤 治表里俱热病势更甚者阳明脉迟汗出不恶寒身里烦燥时或作谵语如见鬼状剧者发则不识人循衣摸牀惕而不安微喘直视阳明里热极甚或吐下後不解大便五六日至十余日日晡潮热心胃燥热而懊憹复如疟状脉沈实或小便不利大便乍难乍易喘冒不能卧或腹满实痛烦渴谵妄脉实数而沈里热燥甚肠胃怫郁留饮不散胸腹高起痛不可忍但呕冷夜大渴反不能饮强饮不能止喘急闷者

大黄【半两】 芒硝【半两】 厚朴【半两去皮】 枳实【半两】

右剉如麻豆大分半水一盞半生姜三片煎至六分内【音纳】硝煎去滓服

小承气汤 治伤寒日深恐有燥屎腹中转失乃可攻之不转失者必初硬後溏未可攻之攻之则腹满不能食饮水而哕其後发热大便复硬若腹大满不通或阳明多汗津液外出肠胃躁热大便必硬而谵语脉滑吐下微烦小便数大便结或下利谵语脉滑病二三日脉弱无太阳

证柴胡证烦心心下结至四五日虽能食少少与承气汤和之令小安

大黄【半两】厚朴【三钱去皮】枳实【三钱】

右剉如麻豆大分作二服水一盞生姜三片煎至半盞绞汁服未利再服

调胃承气汤 治诸发汗和解不恶寒但发热蒸蒸然者或日深心下温温欲吐胸中痛大便溏腹满郁郁微烦先此时吐下者或日深里热谵语法当下之以银粉巴豆燥热大毒丸药下之致真阴损虚邪热转甚因而协热下利不止及表里热下之太早乘虚而入不成结胸但为热利不止满鞭或痛烦渴咽乾脉滑数而实诸腹满实痛者烦渴谵妄小便赤大便鞭脉滑实紧

大黄 芒硝 甘草【各等分】

右剉如麻豆大分一半水一大盞煎至半盞绞去滓内硝煎不利再煎服

三一承气汤 治伤寒杂病内外所伤日数远近腹满烦乱魔吃谵妄心下按之硬痛小便赤澁大便沉滞肺痿痞或积久而为滑泄热甚喘咳闷乱惊悸狂噪反覆甚至舌肿喉痹痈疡阳明胃热发斑脉沈可下者小儿恶风惊涎痰须喘昏寒并斑???黑色胸膈心腹刺痛欲死或斑疹後热不退久不作痂或作斑纹疮癖久不已者怫热内成疹癖坚积黄瘦痛疾久新卒暴心痛风痰酒膈肠垢积滞久壅风热暴伤酒食烦心闷乱脉数沈实或肾水陰虚阳热独甚而僵仆卒中一切暴音不语【一名失音】畜热内甚阳厥极深脉反沈细欲絶或表之冲和正虚寒邪热并之於里则里热亢极阳极似阴反为寒战脉微而絶或风热燥甚客於下焦而大小便澁滞不通者或产妇死胎不下及两感表里热甚须可下者大黄【半两去皮】芒硝【半两】厚朴【半两去皮】枳实【半两】甘草【一两】

右剉如麻豆大水一盞半生姜三片煎至七分内硝煎二服去滓服

十枣汤 治太阳中风下利呕逆短气不恶寒热汗出发作有时头痛心下痞硬引下痛兼下水肿腹胀并酒食积胀垢积滞痞坚积畜热暴痛疟气久不已或表之正气与邪热并甚於里热极似阴反寒战表气入里阳厥极深脉微而絶并风热燥甚结於下焦大小便不通实热腰痛及小儿热结乳癖积热作发惊风潮搐斑疹热毒不能了絶者

大戟 芫花【慢火炒变色仲景乡俗异语云炒作?下凡言?者皆乾炒也】甘遂【各等分】

右为末水一大盞枣十枚切开煮取汁半盞调半钱已实人每一钱

茵陈汤 治阳明里热极甚烦渴热郁留饮不散以致湿热相?而身发黄疸但头汗出身无汗小便不利渴引水浆身心发黄【宜茵陈汤谓下桂苓散】黄利大小便

茵陈蒿【一名茵陈一两去茎】大黄【半两】大梔子【七个色深坚实好者稍小者用十个】

右剉如麻豆大水二盏半慢火煮至一盏绞汁温服以利为度甚者再作当下如烂鱼肚及脓血胶膜等物及小便多出金色如皂荚汁或见证将发黄此一剂分作四服调五苓散三钱凡治发黄者无越此法妙

桂苓甘露散【一名桂苓白术散一方甘草一两半】治伤寒中暑胃风饮食中外一切所伤传受湿热内甚头痛口乾吐泻烦渴不利间小便赤澁大便急痛湿热霍乱吐下腹满痛闷及小儿吐泻惊风

茯苓【一两去皮】甘草【二两炙】白术【半两】泽泻【一两】桂【半两去皮】石膏【二两】寒水石【二两】滑石【四两】猪苓【半两】

右为末每服三钱温汤调下新水亦得生姜汤尤良小儿每服一钱同上法【此药下神金丸止泻痢无不验也并解内外诸邪所伤湿热又一方却不用猪苓或曰三服不计时候】

梔子蘖皮汤 治头微汗小便利而微发黄者湿热相转微者宜服

黄蘖【半两】甘草【一分】大梔子【十五个】

右剉如麻豆大水三盏煎至一盏绞汁分次作一日温服之

梔子汤 治懊憹烦心反伤不得眠燥热怫郁於内而气不宣通胸满痛头微汗虚烦

大梔子【七个剉碎】豆豉【半合俗言盐?少气者加甘草一分呕者误以丸药下之者加生姜半两或用温汤濯手足使心胸结热宣通而已】

右剉如麻豆大或先以水二盏煮梔子至一盏半内豉煮至半盏绞汁温服【凡加者皆用梔子先煮或吐止後服凡用梔子汤皆非吐人之药以其燥热郁结之甚而药顿攻之不能开通则发热而又吐发开郁结则气通津液宣行而已故不须再服也】

大陷胸汤 治汗下之後不大便五六日舌乾而渴日晡潮热从心至小腹胀满而痛不可近脉当沈紧滑数或但胸结则无大段热头微汗出脉沈澁者水结也

大黄【三钱】芒硝【三钱】甘遂末【三】

右剉如麻豆大分作二服每服水一盏煎大黄至六分内硝一二沸绞汁调甘遂一字七半温服末快利再服势恶不能利以意加服

小陷胸汤

治小结胸心下按之痛脉浮而滑无大段热表未罢不可下之下之即死小结胸宜服

半夏【四钱汤洗全用不剉】生姜【二钱切】黄连【二钱剉】栝楼实【大者半两惟剉其殼子则不剉若剉其中子者非也】

右以水三盏煮栝楼汁一盏半内药至一盏绞汁两次温服以効

大陷胸丸 治发热而下之太早热入因作结胸者项亦强如柔瘕状下之则和也

大黄【半两】芒硝【一分】杏仁【十二个去皮尖双仁草灰炒变色】葶苈【三钱微炒】

右大黄为末下葶苈杵罗研杏仁硝如泥和弹子大每服一丸入甘遂末三字白蜜半匙水一盏煮至半盏温服当一宿许乃下未利再服

栀子厚朴汤 治伤寒下後心烦腹满坐卧不安者

大栀子【七个】枳实【二钱】厚朴【半两去皮炙】

右剉如麻豆大以水一盏半煮绞汁半盏温服

槟榔散 治伤寒阴痛下之太早成痞心下痞满而不痛按之软虚也

槟榔 枳殼【等分】

右为末每服三钱煎黄连汤调下不计时候温服

大黄黄连泻心汤 治伤寒成病痞不已心腹亦实热烦满或谵妄而脉沈无他证者

大黄 黄连 黄芩【各一分又一法加生姜一分甚良】

右剉如麻豆大水二盏煎至一盏绞汁分三次温服

黄连解毒汤 治伤寒杂病躁热毒烦闷乾呕口燥吟呻喘满阳厥极深畜热内甚俗妄传为阴毒者及汗下吐後寒凉诸药不能退热势两感证同法

黄连【去须】黄蘗 黄芩 大栀子【各半两】

右剉如麻豆大每服秤半两水一茶盏煎至四分绞去滓温服或腹满呕吐或欲作利者每服加半夏【三个生全用】厚朴【二钱剉】茯苓【二钱去皮剉】用水一盏半生姜三片煎至半盏绞汁温服名半夏黄连解毒汤

白虎汤【加减白虎汤随证用】治伤风自汗桂枝证表未解半斑於里中暑自汗脉虚弱伤寒自汗脉滑数而实表里俱热三阳合病腹满身重口燥面垢谵语发黄厥逆自汗和解两感解头痛止自汗杂病时疫未泻发斑兼豆疱疮疹伏热

知母【一两半】甘草【一两炙】粳米【一合】石膏【四两两末】

右剉如麻豆大抄五钱水一盏煎至六分去滓温服无时候日三四服或眩欬呕者加半夏半两红皮半两每服生姜三片煎服伤寒发汗不解脉浮者加苍术白虎汤汗吐下後烦渴口乾脉洪大加人参半两名人参白虎汤

贾同知已効方

石膏【四两】知母【一两】甘草【一两】

刘庭瑞已効方

知母【一两半】石膏【四两】粳米【一合】

崔宣武已効方

知母【一两】石膏【三两】甘草【一两半】

右为末每服三钱水一盏入粳米二十五粒煎至六分未曾下胃热发斑兼豆疱如液虚瘦加人参半两白术半两头疼加川芎荆芥各三钱咳嗽加半夏三钱桔梗一两恍惚加人参三钱茯苓半两

凉膈散【一名连翘饮子亦有加减法】治伤寒表不解半入於里下证未全下後燥热怫结於内烦心懊憹不得眠藏府积热烦渴头昏唇焦咽燥喉闭目赤烦渴口舌生疮欬唾稠粘谵语狂妄肠胃燥澁便溺閼结风热壅滞疮癣发斑惊风热极黑陷将死

连翘【一两】山栀子【半两】大黄【半两】薄荷叶【半两】黄芩【半两】甘草【一两半】朴硝【一分】

右为末每服二钱水一盏密少许同煎至七分去滓温服虚实加减咽喉痛涎嗽加桔梗【一两】荆芥穗【半两】嗽而呕者加半夏【半两每服生姜三片同煎】血衄呕血加当归【

半两】芍药【半两】生地黄【一两】淋者加滑石【四两】茯苓【一两去皮】风眩加芎【半两】石膏【三两】防风【半两】酒毒加葛根【一两】荆芥穗【半两】赤芍药【半两】芎【半两】防风【半两】桔梗【半两三岁儿可服七八钱或无热甚黑?腹满喘急小便赤澁而将死者此一服更加大防风汤约以下之得和者立効】凡言加者皆自本方加也以上之减退表里热加益元散効速

人参石膏汤 治伤寒咳嗽不已心烦及风热头痛精神不利惛愤宜服

人参【一钱】石膏【三两】芎【半两】半夏【二钱去滑】白术【半两】茯苓【半两】甘草【一两炙】大梔子【三钱】知母【一两半】苓【三钱】

右为末每服一钱水一盞生姜三片煎至六分去滓温服

崔宣武人参石膏汤 治伤寒头痛心烦闷风热并汗後余热自汗多清头目定喘嗽

人参【二钱半】石膏【一两】芎【一两】黄芩【二钱】茯苓【三钱】甘草【半两】防风【三钱】

右为细末每服五钱水一盞半煎至六分去滓温服不计时候

双解散 治风寒暑湿饥饱劳役内外诸邪所伤无问自汗汗後杂病但觉不快便可通解得愈小儿生疮疹使利出快亦能气通宣而愈

益元散【七两】防风通圣散【七两】

右二药一处相和名为双解散益元散方在痢门通圣散方在风门各七两搅匀每服三钱水一盞半入葱白五寸盐?五十粒生姜三片煎至一盞温服

白术散 治伤寒杂病一切泻烦渴霍乱虚损气弱保养衰老及治酒积呕哕

白术 茯苓【去皮】人参【各半两】甘草【一两半炙】木香【一分】藿香【半两】葛根【一两】

右为末白汤调下二钱烦渴者加滑石二两甚者加姜汗续续饮之

四逆汤 治伤寒表热未入里误以寒药下之太早表热不已入里寒下利不止因表热里寒自利急以温里利止又治少阴病脉沈下利厥逆烦渴呕吐

甘草【一钱炙】乾姜【一分】附子【半个生去皮脐附子以半两者佳小者力弱大者性

恶非古方之宜也不但以美其大者要知古人之有则也】

右剉如麻豆大水二盏煎至一盏绞汁温服或畜热深极而手足厥冷者不宜此方当以下之

茯苓半夏汤 治伤寒杂病一切呕吐或喘咳疼痛痞满头痛者

茯苓【一分去皮】半夏【一钱】生姜【一分取汁】

一方治风痰加 黄芩【一分去腐】甘草【一分】红皮【一分去穰】右剉如麻豆大水一盏煎至四分空心下生姜汁温服不计时候

宣明方论卷六

卷七

钦定四库全书

宣明方论卷七

金 刘完素 撰

积聚论

素问曰积聚留饮痞隔中满湿积霍乱吐下瘕症坚硬腹满皆太阴湿土乃脾胃之气积聚之根也【积者不散聚者不化留者不行饮者停滯痞者不通隔者阻也中满者湿为积霍乱吐下为留停瘕症者瘕也瘕假也】斯疾乃五藏六腑阴阳变化兴衰之制也亢则害承乃制极则反矣

谓水得燥则消散而得湿则不消乃为积饮也谓人形精神与荣卫血气津液出入流通谓夫腠理闭塞乃为痞也谓肠胃隔絕传化失常而乃滯也土主形体腹满於中央乃曰中满以传化失度故甚则霍乱吐泻也症者腹中主硬按之应手然水体柔顺而今乃坚硬如此者亢则害承乃制也瘕者中虽硬而忽聚忽散无其常故其病未及症也
经曰血不流而滯故血内凝而乃瘕也

小肠移热於大肠乃为虚瘕大肠移热於小肠谓血热相抃则血溢而为伏瘕血溢不利月事沈滯而不行故行为虚瘕为虚与伏同瘕与疝同为传写误也世传冷病然瘕病亦有热或阳气郁结怫热壅滯而坚硬不消者世传为寒症瘕也或坚痞腹满急痛【寒主筋缩故急主痛】寒极血凝泣而反兼土化制之故坚痞之腹满或热郁於内而腹满坚结痛不可忍者皆可为寒误矣误矣

何不以脉证辨之凡诸疾病皆有阴阳寒热宜推详之五藏六腑四季皆有积聚心之积名曰伏梁在於脐上大如臂上至於心横於心上如屋梁故曰伏梁肝之积名曰贲【音奔】气在左脇下覆如杯有头足久不愈令人痃瘕脾之积名曰痞气在胃腕覆大如杯久不愈令人四肢不收发黄疸食不为肌肤肺之积名曰息贲结在右脇下覆大如杯久不愈令人洒淅寒热喘咳发为肺癰肾之积名曰贲【音奔】在於小腹上至心下如贲走往来无定久不愈令人喘逆发为骨痿少气乏力此为五藏之积也尝斯义未可悉也

传其所胜者死传不胜者可治假令肺病传肝肝病传脾脾病传肾肾病传心心病传肺皆传所胜五藏之气虚而内外诸邪所侵故留稽不行遂成积聚其脉沈细而微者是也

木香三棱丸

治一切气闷胸膈痞满荣卫不和口吐酸水呕逆恶心饮食不化肋脇疼痛无问久新

青木香 破故纸 茴香 黑牵牛 甘遂 芫花 大戟 荆三棱 蓬莪茂 川楝子 葫芦巴 巴戟【已上各一两】巴豆【去皮不出油二分】陈米【三合将芭豆一处同炒黑】缩砂仁【一两半】

右件一十五味用好醋二升除缩砂木香余药入醋中浸一宿入锅煮尽为度乾为细末醋麪糊和丸如菉豆大每服五七丸食後加減看虚实随汤水下

导气枳殼丸 治气结不散心胸痞痛逆气上攻分气逐风功不可述

枳殼【去穰麸炒】木通【剉炒】青皮【去皮】陈皮【去白】桑白皮【剉炒】萝卜子【微炒】白牵牛【炒】黑牵牛【炒】莪茂【煨】茴香【炒】荆三棱【煨各等分】

右为末生姜汁打麪糊为丸如桐子大每服二十丸煎橘皮汤下不计时候

透膈寬肠散 治肠上壅实膈热难行者

白牵牛【一两】芒硝【三两】川大黄【二两】甘遂【半两】

右为细末食後温蜜水调下一钱虚实加減疎动止

密补固真丹 治皮肾真元损虚泄痢痰嗽哆痞水谷酸臭饮食无味脐腹冷痛肢体麻痹下虚痰厥上实壅滞肾虚耳鸣脾虚困怠耳焦齿稿面黧身悴唇黄口燥髮堕爪退风虚偏枯中满膈气一切脾胃虚证常服补养宜通气血

天南星【半两】半夏【制】神面 麦蘖 茴香【炒】荆三棱【炮各一两】白附子 乾生姜

川乌头【生各一两】巴豆【七个】牵牛【三两】代赭石【二两】官桂【一分】

右为末水和丸小豆大每服十丸加至五十丸温水下除泄泻外并加大黄一两

木香丸 治和脾胃膈消痰逆止呕吐进益美饮食官桂 乾姜【各半两】木香【一分】大黄 蓬莪茂 芫花【醋拌湿炒乾】枳殼【去穰】陈皮【各半两】半夏【二两】牵牛【半斤取末四两】茴香【一两炒】巴豆【四个】

右为末滴水为丸如小豆大每服二三十丸温水下

散金丸 治心胸腰腹急痛或淋闷升产後经病血刺痛

当归【半两】破故纸 黑牵牛【各五钱别研用】轻粉
硃砂粉霜【各一分】蓬莪茂【二钱炒】

右同研匀枣同为膏蜜丸梧子大新水下一丸病甚者加得利後复

泥金丸 治心腹急痛取久效能消积滞推陈致新黄蘗 大黄 巴豆
五灵脂【各半两】猪牙皂角【一分】轻粉 铅霜 硃砂【各一分】

右研匀炼密拌得所杵千下丸菉豆大新水下一丸未利更加服

状元丸 治膈气酒膈酒积涎嗽腹痛吐逆痞满巴豆【五十各取霜】神麴【半两末】半夏
【一两洗】雄黄 白麴【一两炒】

右研匀酒水丸小豆大细米糠炒变赤色食後温水下童子二丸三四岁一丸岁半半丸止嗽
温?汁下止呕吐生姜汤下

玄胡丸 治积聚症瘕解中外诸邪所伤

玄胡索 青皮【去白】陈皮【去白】当归 木香 雄黄【别研】荆三棱 生姜【各一两】

右为末酒麴糊为丸如小豆大每服五七丸生姜汤下

又一方 无陈皮 生姜 有广茂【一两】槟榔【分两同】大延胡索散
治妇人经病产後腹痛腹满喘闷症瘕癖块及一切心腹暴痛

延胡索 当归 芍药 京三棱 川苦楝 蓬莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎【各一分】桔梗黄芩
大黄【各半两】甘草【一两】槟榔【二钱】

右为麴末每服三钱水一盞煎至六分去滓热服食前如恶物过多去大黄官桂加黄药子染
槐子龙骨各半两如前法煎服平人心急痛加本方得利尤良後常服

三棱汤 治症瘕痞癖积聚不散坚满痞膈食不下腹胀

荆三棱【二两】白术【一两】蓬莪茂【半两】当归【半两焙】槟榔 木香【三钱】

右为末每服三钱沸汤点服食後每日三服

消饮丸 治一切积聚痞癖气块及大小结胸痛不能仰按

天南星 半夏 芫花 自然铜【等分生用】

右为末醋煮麪糊为丸如桐子大每服五七丸食前温水下良久葱粥投之相虚实加减

除湿丹 治诸湿客转腰膝重痛足胫浮肿筋脉紧急津液凝澁便溺不利赤癰????疽痈发背疥癬走注脚气无首尾疮疖功效不可尽述

槟榔 甘遂 葳灵仙 赤芍药 泽泻 葶苈【已上各二两】乳香
没药【一两别研】黑牵牛【半两】大戟【二两炒】陈皮【四两去白】

右为末麪糊为丸如桐子大每服五十丸至七八十丸温水下後食如服药前後忌酒一日药後忌湿麪食温粥补暖

保安丸 治症积心腹内结如拳渐上不止抢心疼痛及遶脐腹痛不可忍者

川大黄【三两新水浸一宿蒸熟切片子焙】乾姜【一两炮】大附子【半两去皮脐】鳖甲【一两半】

右为末取三年米醋一大升先煎四五合然後和药丸如桐子大每服十丸至二十丸空心服或酒米饮下後取积如鱼肠脓血烂肉汁青水当下

开结妙功丸 治怫热内盛痙癖坚积肠腹症瘕结聚疼痛胀闷作发有时三焦壅滞二肠滑泄逆气烦心不得眠咳喘逆不能食或风湿内攻肢体麻痹肿胀黄瘦眼澁昏暗一切所伤心腹暴痛神思烦郁偏正头疼筋脉拘疾肢体麻痹走注疼酸两目昏眩中风偏枯邪气上逆上实下虚脚膝疲软不通气血

荆三棱【炮】茴香【各一两炒】川乌头【四两】神麴 麦芽
大黄【各一两好醋半升熬成稠膏不破坚积不须熬膏水丸】乾姜
巴豆【二个破坚积用四个】半夏【半两】桂【二钱】牵牛【二钱】

右为末膏丸小豆大生姜汤下十丸十五丸温水冷水亦得或心胃间稍觉药力煖性却凉尤数以加至快利三五行以意消息病去为度

木香分气丸 治积滞癖块不消心腹痞结疼痛抢刺如覆杯状

陈皮【去白】槟榔【各一两】破故纸【二两】木香【一两半】黑牵牛【十二两炒香熟取末五两半余不用】

右为末滴水为丸如桐子大每服二三十丸生姜汤下食後临卧服

开胃生姜丸 治中焦不和胃口气寒水谷不化噫气不通噎塞痞满口淡吞酸食时膨胀逆
恶心呕吐痰水宿食不消中满膈气刺痛宽中开胃导饮食

桂心【一两】 陈皮【去白】 甘草【炙各二两】 砂仁【四十九个】 广茂
当归【各半两】

右为末炼蜜为丸如弹子大每服一丸食前细嚼沸汤化下

导滞定功丸 治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利消食止逆定疼痛

大椒 木香【各一钱】 蝎梢【三钱】 巴豆【八个出油为度】

右为末後入巴豆霜研匀醋麪糊和丸如菉豆大朱砂为衣每服五丸至十丸淡醋汤下

积气丹 治一切新久沈积气块面黄黑瘦诸气无力症瘕积聚口吐酸水

槟榔【二个】 芫花【一两】 礞砂【二钱】 芭豆【二钱半生】 青皮【去白】 陈皮【各
三钱】 蓬莪茂 鸡爪黄连 京三棱 章柳根 牛膝【各一两】 肉豆蔻【三个】 大戟 川大黄
甘遂 白牵牛 乾姜 青礞石 乾漆【各半两】 木香【二钱】 石菖蒲【三钱】

右为末醋麪和为丸如桐子大每服一丸临卧烧枣汤下每夜一丸或二丸候肚内作声病退
为度

金露紫菀丸 治一切脾积两肋虚胀脐疼痛

草乌头【去尖炒】 黄连【半两】 官桂 桔梗 乾地黄 乾生姜 川椒 芫荽
紫菀【去皮】 柴胡 防风 厚朴 甘草 人参 川芎 鼈甲【酒浸】 贝母
枳殼【去穰】 甘遂【各一两】 巴豆【三两醋煮半日出油】 入礞砂

右为末水煮麪糊为丸如桐子大每服五丸空心临卧米饮汤下或微疎动详虚实加减

信香十方青金膏 灌顶法王子所传十二上愿云药师琉璃光如来应当供养正徧知明行足
善游世间解无上士调御丈夫天人师

佛世尊方境授治周身中外陰阳不调气血壅滞变生百病乃至虚羸困倦偏攻酒食内伤心
腹满塞急痛或酒积食积症瘕积聚痞癖坚积中满膈气食臭酸醋呕吐翻胃或膈痺消中善
食而瘦或消渴多饮而数【色角切频也】 小便或肠风下血痔瘻痒痛或胃癰????或偏身痛
疽恶疮或疮毒已入於里腹满呕吐或成泻痢或出恶疮瘰肉或下痢腹痛或一切风气肢体
疼痛及中风偏枯或痰逆生风痰涎嗽兼产後腹痛及小儿疳疾诸风潮搐但平人常服补养

宣行荣卫调饮食

信砒 乳香 轻粉 粉霜 芭豆【已上各一两同研】龙脑【半字】麝香【半字】青黛【二钱同研】黄蜡【三钱】

右研细末熔蜡入蜜半钱就搓匀旋丸菉豆至小豆大先服小丸病在上食後在下食前在中不计时候面东顶礼一丸净器盛水送下如合药即净处面东每一丸密念呪三遍或病人不能呪请人呪

或师氏呪过 呪曰

信香十方青金膏 药师圆成蜜遍抛普济有缘除百病 仰吞一粒体坚牢密呪曰

但言八金刚 莫说十方佛

五蘊六根俱不道 十二上愿自然成

金黄丸 治酒积食积诸积面黄疸积硬块

荆三棱 香附子【半两】泽泻【二钱半】巴豆【四十九粒出】黍米粉 牵牛【二钱半】

右为末用梔子煎汤和丸如菉豆大每服三丸至五丸如心痛艾醋汤下七丸

逆气丸 治心胸满闷脇肋刺痛不思饮食常服寬膈进美饮食

姜黄【四两】香附子【四两】缩砂 甘草 广茂【各二两】丁皮甘松 木香 荆三棱【各一两】白檀【半两】藿香叶【半两】

右为末入菉豆粉二两用汤浸蒸饼为丸如桐子大每服三二十丸细嚼日汤下食後日进三服

丁香散 治疰癖气脇下痞满息而不消积而不散元气在胃不妨食者

好丁香【二十五个】白丁香【七十个】蜜陀僧 舶上硫黄黄芩调【各五分】

右为细末每服一字皂子煎汤调下不计时候治肚内生硬物黑瘦如柴呕吐积滞日三服食後

圣饼子 治一切沉积气胀两脇气满无问久新者大黄【三两】黑牵牛头末【一两】礞砂

【三钱】山梔子【半两】轻粉【二钱】

右为末炼蜜和丸捻作饼子如小钱大厚様食後每服三饼子细嚼温酒下临卧如行粥补之虚实加減

无忧散【一名万病散】治风疾疮肿疥癬或臟腑积冷壅滯气结风劳膀胱宿冷臟腑虚衰面色痿黄内有症癖气并当有疳虫蛇虫攻心腹俱痛忽中伤寒头痛不忍状若山嵐时气瘟疫之疾并宜急服此药宣通三五行立瘥或中风口喎语多蹇澁睡後口中涎出不限时节不问男子女人但五日一服不过三服永瘥人患腰膝疼痛脚气肿满运动艰难饮食无味并小儿疳痢脱肛者量大小与服利三五行自瘥大人久泄气痢状若休息痢止有时俱一服取下冷脓一二升当日见効药无四时冷热老幼衰弱病患悉皆除之任服他药无妨若服常时盖缘搜出藏府中积滯虫脓故也无孕妇人久患血虚气弱痿黄无力者亦可依方服宣通气候殊不困倦无妨此药凡有百病并皆治之其功不可具载有孕妇人或遇陰晦时即不可服天道晴明可进若虽复疾而未愈者再可服

黄耆 木通 桑白皮 陈皮【各一两】胡椒
白术 木香【各半两】白牵牛【四两炒别取头末】

右七味为细末每服二钱牵牛末二钱生姜二钱切作片子煎生姜汤一大盏调药须臾又用生姜汤或温汤送下平明可行三五次快利无妨如病瘥後以白粥补之瘥矣

五积丹 治心腹痞满呕吐不止破积聚者

皂荚一铤【一尺二寸火烧留性淨盆合之四面土壅合物令出烟】巴豆【十二个白面一两五钱同炒令黄色为度】

右为末醋面糊为丸菉豆大每服十丸盐汤下食後加減

宣明方论卷七

卷八

钦定四库全书

宣明方论卷八

金 刘完素 撰

木湿门

夫诸湿者湿为土气火热能生土湿也故夏热则万物湿润秋凉则湿物燥乾也湿病本不自生因於大热怫郁水液不能宣通即停滞而生水湿也凡病湿者多自热生而热气尚多以为兼证云湿热亦犹风热义同虽病水寒不得宣行亦能为湿虽有此异亦以鲜矣或跗肿体寒而有水者以畜热入里极深本非病寒也三花神佑丸 治中满腹胀喘嗽淋瀝一切水湿肿满湿热肠垢沉积变生疾病久病不已黄瘦困倦气血壅滞不得宣通或风热燥郁肢体麻痹走注疼痛风痰涎嗽头目旋运疟疾不已症瘕积聚坚满痞闷酒积食积一切痰饮呕逆及妇人经病不快带下淋漓无问赤白并男子妇人伤寒湿热腹满实痛久新瘦弱俗不能别辨或汛常只为转动之药兼泻久新腰痛并一切下痢及小儿惊疳积热乳癖满并宜服之

甘遂 大戟 芫花【醋拌湿炒各半两】 牵牛【二两】 大黄【一两为细末】 轻粉【一钱】

右为末滴水为丸如小豆大初服五丸每服加五丸温水下每日三服加至快利利後却常服病去为度设病愈後老弱虚人平人常服保养宣通气血消进酒食病癖闷极甚者便多服则顿攻不开转加痛闷则初服两丸每服加两丸至快利为度以意消息小儿丸如麻子大随强弱增损三四岁者三五丸依前法

崔宣武神佑丸

加黄柏【一两】 牵牛【四两】 大黄【二两】 轻粉【二钱】 甘遂
大戟芫花【各一分依前法】

刘庭瑞神佑丸 用此药治水气常得効 贾同知称之不已乃神仙奇絶之药也

葶苈木香散 治湿热内外甚水肿腹胀小便赤澁大便滑泄

葶苈 茯苓【去皮】 猪苓【去皮】 白术【各一分】 木香【半钱】 泽泻 木通
甘草【各半两】 辣桂【一分】 滑石【三两】

右为末每服三钱白汤调下食前 此药下水湿消肿胀止泄泻利小便若小便不得通利而反转泄者此乃湿热痞闷极热而攻之不开是能反为注泄此正气已衰而多难救也慎不可攻之而无益耳

白术木香散 治喘嗽肿满欲变成水病者不能卧不敢食小便澁者

白术 木猪苓【去皮】 赤茯苓 甘草 泽泻【各半两】 木香
槟榔【三钱】 陈皮【二两去白】 官桂【二钱】 滑石【三两】

右为末每服五钱水一盞生姜三片同煎至六分食後去滓温服

大橘皮汤 治湿热内甚心腹胀满水肿小便不利大便滑泄

橘皮【一两去白】 木香【一分】 滑石【六两】 槟榔【三钱】 茯苓【一两去皮】 木猪
苓【去皮】 泽泻 白术 官桂【各半两】 甘草【二钱】

右为末每服五钱水一盞生姜五片煎至六分去滓温服【大小便秘先服十枣汤二三日後再服此药】

葶苈膏 治水肿腹腹

牛黄 麝香 龙脑【各一分】 昆布 海藻【上同三十分洗】 牵牛
桂心【各八分】 椒目【三分】 葶苈【六分炒】

右为末别捣葶苈熬成膏丸如桐子大每服十丸日再服稍利小便为度详虚实加减

茯苓散 治诸般气肿等疾

芫花【醋拌炒】 泽泻 郁李仁 甜葶苈 汉防己【各二钱半】 陈皮【去白】 白槟榔
瞿麦【各半两】 藁本【二钱半】 滑石【三分】 大戟【炒三分】

右为细末每服一钱取桑白皮浓煎汤空心调下取下碧渌水如烂羊脂即瘥如未尽隔日又服肿消如故不用服忌盐百日

调胃散 治胸膈痞闷不思饮食脇肋硬痛消腹胀半夏【制】 甘草【炙】 厚朴【去皮】 陈
皮【去白】 藿香【各等分】

右为末每服一钱生姜三片枣二枚水一盞同煎温服食前

二气散 治水气蛊胀满

白牵牛 黑牵牛【各二钱】

右为末用大麦麴四两同一处为烧饼临卧用茶汤一盏下降气为验

雄黄神金散

雄黄 葶苈【一两用糯米和炒半熟米不用】泽泻【二两】椒目【半两】大戟巴戟【去心】茯苓【去黑皮】芫花【醋五升浸一日炒】甘遂 桑白皮【已上各一两】

右为末从发时加减一分空心用井花水调下每服一钱加至五钱以利为度忌盐醋生冷毒物油腻血物

从脚肿根在心加葶苈 从肚肿根在腹加椒目从阴肿根在胸加泽泻

从膝肿根在肝加芫花从面肿根在肺加桑白 从心肿根在肋加雄黄从肢肿根在脾加甘遂

从口肿根在小肠加巴戟从腰肿根在肾加大戟 从四肢肿根在胃加茯苓

万胜散 治十种水气不可愈者

海带 海藻 海蛤 芫花【醋浸炒】甘遂 大戟甜葶苈 樟柳根 续随子 巴戟【各等分去心】

右为末每服三钱至五钱温酒调下临卧间日再服

牵牛丸 治一切湿热肿满等疾

黑牵牛 黄芩 大黄 大椒 滑石【各等分】

右为细末酒煮麴糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生姜汤下食後虚实加减

梔子蘘皮汤 治头微汗小便利而微发黄者湿热相转微者宜服

大梔子【十五个】黄蘘【半两】甘草【一分】

右剉如麻豆大水三盏煮至一盏缓汁分三次作一日服温吃不计时

大戟丸 治十种水气肿胀喘满热寒咳嗽心胸痞闷背项拘急膀胱紧肿於小腹小便不通反转大便溏泄不能坐卧

大戟 芫花【醋炒】甘遂 海带 海藻 郁李仁 续随子【各半两】樟柳根【一两已上八味为末每料抄药末十五钱七分便入後药】硃砂 轻粉【各一钱】粉霜【各一钱】水银砂子【一皂子大】龙脑【半钱】巴豆【二十一个生用去皮】

右八味已下同研匀用枣肉为丸如菉豆大每服五丸至七丸龙脑腊茶送下食後临卧虚实加減

粉霜丸 治病水鼓满不食四肢浮肿大小便閤不进饮食

粉霜 硃砂 海蛤 寒水石【烧粉】玄精石 白丁香 头白麝【各钱】轻粉【三钱】海金砂【一钱】

右研匀着纸裹数重上使麝裹又纸裹冷酒蘸了桑柴火烧麝熟为度宿?餅和丸如桐子大每服三丸生姜汤下一日三服二日加一丸至六日不加即止以补之妙

苦葶苈丸 治一切水湿气通身肿满不可当者

人参【一两】苦葶苈【四两於锅内纸上炒黄色为度】

右二味同为细末用枣肉和丸如桐子大每服十五丸煎桑白皮汤下日进三服空心食前此药恐君子不信试验之

肉豆蔻丸 治水湿胀如鼓不食者病可下

肉豆蔻?榔 轻粉【各一分】黑牵牛【一两半取头末】

右为末麝糊为丸如菉豆大每服十丸至二十丸煎连翘汤下食後日三服

宣明方论卷八

卷九

[子部,医家类,宣明方论]

钦定四库全书

宣明方论卷九

金 刘完素 撰

痰饮门

痰饮论

夫嗽者五脏皆有嗽皆因内伤脾胃外感风邪皮毛痹肺风寒随玄府而入腠理开张内外相合先传肺而入遂成咳嗽迺肺热也寒化热热则生痰喘满也经云喉中介介如梗壮甚则嗽血也胸满气喘痰盛稠粘皆肺气热也

大人参半夏丸 治化痰坠涎止嗽定喘诸痰不可尽述呕吐痰逆痰厥头痛风气偏正头疼风壅头目昏眩耳鸣鼻塞咽膈不利心腹痞满筋脉拘倦肢体麻痹疼痛中风偏枯咳唾稠粘肺痿劳虚人保养宣通气血调和脏腑进饮食

人参 茯苓【去皮】 天南星 薄荷叶【各半两】 半夏 乾生姜
白矾【生】 寒水石【各一两】 蛤粉【一两】 藿香叶【一分】

右为末麪糊为丸如小豆大生姜汤下二三十丸食後温水亦得一法加黄连半两黄蘗二两水丸取効愈妙治酒病调和藏尤宜服之

新添半夏瓜蒌丸 治远近痰嗽烦喘不止者

半夏【生姜制】 瓜蒌 杏仁【去皮尖】 麻黄 白矾【枯秤】 款冬花【各等分】

右为末生姜汁打麪糊为丸如梧子大每服二十丸煎生姜汤下不计时候

白术厚朴汤 治痰呕不散利胸膈除寒热美饮食

白术 甘草【炙】 葛根【各一两】 厚朴【半两】

右件为末每服一二钱水一大盏生姜五片煎至六分去滓食前服显仁丸仙术芎散大人参半夏丸

橘皮半夏汤 治痰壅涎嗽久不已者常服养液润燥解肌热止咳嗽

橘皮【半两去皮】半夏【二钱半汤洗七次】

右为末分作二服每服水一盏半入生姜十片同煎至七分去滓温服

知母茯苓汤 治肺痿喘咳不已往来寒热自汗茯苓【去皮】甘草【各一两】知母 五味子 人参 薄荷半夏【洗七次】柴胡 白术 款冬花 桔梗 麦

门冬 黄芩【半两】川芎【三钱】阿胶【三钱炒】

右为末每服三钱水一盏半生姜十片同煎至七分去滓稍热服

人参润肺汤 治肺气不足喘急咳嗽不已并伤寒头疼增寒壮热四肢疼痛

人参 桔梗 白芷 麻黄【去节】乾葛 白术 甘草【各一两炙】白姜【半两】

右为末每服二钱水一大盏生姜三片葱白二寸煎至八分如出汗连进二服通口温服

杏仁半夏汤 治肺痿涎喘不定咳嗽不已及甚者往来寒暑

杏仁【去皮】桔梗 陈皮【去白】茯苓【去皮】汉防己 白矾桑白皮【各三钱】薄荷叶【一钱】甘草【二寸】猪牙皂角【一锭】

右为末作二服水二盏生姜三片煎至六分去滓食後温服

防己丸 治肺不足喘嗽久不已者调顺气血消化痰涎

防己【二钱】杏仁【三钱】木香【二钱】

右为末炼蜜为丸如小豆大每服二十丸煎桑白皮汤下如大便閼加葶?一两食後服

葶?散 治肺气喘满痰嗽眠卧不安不思饮食苦葶苈 蛤粉【各三钱】桑白皮 山梔子 人参荆芥穗 薄荷叶 赤茯苓【去皮】陈皮 桔梗 杏仁 甘草【各半两】

右为末每服三钱水一大盏入生姜三片煎至六分去滓温服食後

保安半夏丸 治久新诸嗽或上逆涎喘短气痰鸣咽乾烦渴大小便澁滯肺痿劳劣心腹痞满急痛中满膈气上实下虚酒食积聚不消补养气血宣行荣卫半夏 天南星【各半两】牵牛【一两】大黄【半两】黄蘗【一两半】蛤粉【一两】巴豆【四个】

右为末水为丸如小豆大每服十丸十五丸温水下食後日三服孕妇不可服又方无芭豆有乾姜一钱半

人参保肺汤 治五劳七伤喘气不接涎痰稠粘骨蒸潮热

人参 柴胡 当归 芍药 桑白皮 知母 白术 川芎 黄耆 紫苑 荆芥 地骨皮【各一分】茯苓【去皮】黄芩 连翘 大黄 薄荷【各半两山梔子同】甘草 桔梗【各一两】石膏 滑石 寒水石【半两】

右为末每服三钱水一盞生姜三片煎至七分去滓温服泄者去大黄同人参半夏丸服

神应丹 治涎嗽喘满上攻心腹卒痛及利下血兼妇人带下病一切肋脇痛满

薄荷叶 甘草【四钱】巴豆【灯烧存性】盆硝【各二钱】轻粉【二钱】豆豉【一两慢火炒】五灵脂【二钱】

右为末炼蜜为丸如桐子大每服一丸温酒下续後空咽津三五次禁饮食少时觉咽喉微煖効心腹急痛温酒下二丸未効再服得利尤良带下以温酒下二丸或大便流利再服

人参散 治身热头痛积热黄瘦肌热恶寒畜热发战膈热呕吐烦渴湿热泻利或目赤口疮咽?肿痛或风昏眩虚汗肺痿劳嗽不已者

石膏 甘草【各一两】滑石【四两】寒水石【二两】人参【半两】

右为末每服二钱温水调下早晚食後兼服梔子金花丸 一名既济解毒丸

宁神散 治一切痰 不已者诸药无効世传极验

御米囊【一筋生醋炒】乌梅【四两】

右为末每服二三钱沸汤点常服食後日三服

贾同知方 御米殼【一两炒】乌梅肉【半两】依前法服之康少尹传 煎乌梅汤尤妙

桂苓白术丸 治消痰逆止咳嗽散痞满壅塞开坚结痛闷推进饮食调和藏无问寒湿湿热呕

吐泻痢皆能开发以令遍身流湿润燥气液宣平而愈解酒毒疗肺痿劳嗽水肿腹胀泄泻不能止者服之利止为度随证调之

拣桂 乾生姜【各一分】茯苓【去皮】半夏【一两】白术
红皮【去白】泽泻【各半两】

右为末麝糊为丸如小豆大生姜汤下二三十丸日三服病在膈上食後在下食前在中不计
时候或一法更加黄连【半两】黄蘗【二两】水丸取效愈妙

润肺散 治小儿膈热咳嗽痰喘甚者久不瘥者

瓜蒌实【一枚去子用穰】

右为末以寒食麝和为饼子炙黄为末每服一钱温水化乳糖下日三服效乃止

又方 治寒嗽

麻黄【四两】官桂【一两】?【二钱】

右为末以?同煎每服一二钱温服

宁肺散 治一切寒热痰盛久新咳 不止者

御米殼【四两】木瓜【三两御米殼一处用蜜二两水化同炒微黄】五味子【一两】人
参【一两】皂角【二两】

右为末每服二钱乌梅同煎临卧食服大效

鳖甲丸 治吐血咳嗽神效

鳖甲【一个九肋者醋炙黄】柴胡【一两酒浸一宿】杏仁【一两童子小便浸炒】甘遂
【一两炙】人参【半两】

右为末炼蜜为丸如桐子大每服十丸至十五丸煎生姜汤下

又方 用厚朴【一两生姜制】

石膏散 治热嗽喘甚者

石膏【一两】甘草【半两炙】

右为末每服三钱新汲水下又生姜汁蜜调下

人参半夏丸 治一切痰饮喘嗽不已

白矾 天南星 半夏【各半两】甘草【二钱半炙】人参【二钱】赤小豆【四十九粒】杏仁【四十九粒】猪牙皂角【一铤】

右为末用多年小米一升熬粥和丸如桐子大每服十五丸炒萝卜子汤临卧下

仙人肢丸 治远年劳嗽不问寒热痰涎喘满先服松花膏下过多服此药无不效

人参 沙参 玄参 紫团参 丹参 白术 牡蛎 知母
甘草【各二两】蛤蚧【一对头尾全用河水洗净文武火酥炙黄色】

右为末用麻黄十五斤去根枸?子三斤熬成膏丸如弹子大磁合子内盛临卧煎生姜自然汁化下一丸小儿量数加減

松花膏 治三二十年劳嗽预九月间宣利一切痰涎肺积喘嗽不利

防风 乾生姜 野菊花 芫花 枸?子 甘草 苍术 黄精

右为末取黄精根熬成膏子和药末丸如弹子大每服细嚼一丸冷水化下临卧不吃夜饭服药一粒

辰砂半夏丸 治小儿肺壅痰实咳嗽喘急胸膈痞满公忪烦闷痰涎不利呀呷有声

半夏【半两洗】葶?【水研成膏】杏仁【各半两炒研成膏】朱砂
五灵脂【各一两微炒】

右为末更研匀生姜汁煮麪糊为丸如桐子大每服十五丸生姜汤下

大百劳散 治一切劳疾肌劣喘息不卧痰涎不食蛤蚧【一对蜜炙】元州鳖甲【一个去裙醋炙】附子【一两】人参 柴胡 川乾姜 白茯苓【去皮】白术 茴香
青皮【去白】杏仁【去皮尖】知母 贝母 陈皮【去白】官桂
甘草【炙】半夏【生姜制】苍术【汤浸各一两苏木 龙胆各半两】

右为末每服二钱水一盏用生姜三片枣二枚乌梅二枚同煎空心稍热服有汗加小麦二十

粒不用铁煎

小百劳散 治劳喘嗽不已自汗者

御米穀【不拘多少炒】

右为末每服二钱入乌梅同煎水一盞温服食後有汗加小麦三十粒同煎温服

五味子汤 治胸膈痞满心腹刺痛短气噎闷咳嗽痰唾呕逆恶心不思饮食温中益气

五味子【九两】良姜【一两半】红皮【去白】茴香【炒各一两】乾姜【两半】甘草【七两炙】盐【一斤炒】

右为末每服一钱百沸汤点空心食前甚者日进三服

安神散 治远年近日喘嗽不已

御米穀【蜜炒一两】人参 陈皮【去白】甘草【一两炙】

右为末每服一钱煎乌梅汤调下临卧服

劳门

白术黄耆散 治五心烦自汗四肢痿劣饮食减少肌瘦昏昧

白术 黄耆 当归 黄芩【去皮】芍药【各半两】石膏甘草【各二两】茯苓
寒水石【各一两】官桂【一分】人参 川芎【各三分】

右为末每服三钱水一盞煎至六分去滓温服食前一日三服

人参白术汤方 在消渴门第一方是也【此乃为同不复録耳】黄连丸
治湿热流运气血不通壅滞不散清爽头目

黄连【好者不拘多少】

右为末酒麪糊为丸如小豆大每服二十丸温水下不计时候日三服

必効散 治五劳七伤劳役肌瘦不思饮食喘 不已

川乌头【一两生】天南星【半两生】

右为末每服二钱萝卜八块如母指大以水煮熟去滓食後服嚼

当归地黄汤 治嗽血衄血大小便血或妇人经候不调月水过多喘嗽者

当归 芍药 川芎 白术 染槐子 黄药子【各半两】生地黄 甘草 茯苓【去皮】黄芩 白龙骨【各一两】

右为末每服三钱水一盞煎至七分去滓温服食前

紫菀散 治劳体热心寒脉滑短咳嗽妇人多有此疾口乾眼澁骨痿短气皆因肠胃燥滞荣卫不能开发玄府闭塞热郁内余可以开发陰阳宣通澁滞和荣卫顺三焦兼服人参白术汤

紫菀 桑白皮 桔梗 续断 甘草 五味子【各一两】赤小豆【一合】

右为末水一大盞药末五钱青竹茹弹子大同煎至七分温服去滓

枳实饮子 治妇人手足烦热夜卧多汗肌肉黄瘁经候不调四肢烦倦心腹满闷状似劳气

枳殼【一两】吴半夏【一两汤洗七次以生姜汁浸三日火炒黄色用半夏】红芍药柴胡【各一两】黄芩【一两半】

右为末每服二钱水一盞生姜三片枣二枚同煎至八分去滓温服及治五心烦热及身体壮热潮热续服桃仁煎丸又治月经不调阻滯不通

桃仁【二两汤洗火炒】川大黄 川朴硝【各二两】蟲虫【一两去翅头足】

右为末用醋五升入金银铛内以慢火熬成膏可丸如桐子大当日晚不食夜饭温酒下一丸不嚼破午际取下赤小豆汁似鸡肝小虾蟊衣未再服候鲜红即住服

卢同散 治男子妇人一切咳嗽喘急

款冬花 井泉石 鹅管石 鍾乳石 官桂甘草 白矾 佛耳草【各等分】

右为末每服一钱竹筒子吸吃日三服立效

焚香透膈散 治一切劳咳嗽壅滯胸膈痞满

雄黄 佛耳草 鹅管石 款冬花【各等分】

右为末每服用药一钱安在香炉子上焚着以开口吸烟在喉中立効

鸩粟神圣散 治男子妇人久新日夜咳嗽不止者御米殼【一两用蜜炒】乌梅肉 拣人参 呵子肉 葶苈 桑白皮【各半两】

右为细末每服二三钱百沸汤泼临卧调下

新添三黄丸 治五劳七伤流湿润燥消渴烦热甚者

大黄 黄芩 黄连【各等分】

右为末炼蜜为丸如桐子大每服二三十丸加至五十丸生姜汤下不计时候日三服妙

当归木香汤 治妇人血气虚劳令人头目昏眩讖语声沉重舌根强硬言语蹇澁口苦不思饮食白日闲睡夜发虚汗神思恍惚梦寐狂言面色痿黄频发喘咳遍身疼痛骨节气走注四肢沉重背脾拘急发寒热五心烦燥唇乾多渴胸膈不利喉咽噎塞疰羸瘦弱经曰脉大为劳宜服此药

青皮 五加皮 海桐皮 桑白皮 陈皮 地骨皮 丁香皮 牡丹皮 棕?皮【已上诸药全烧为灰末用十大钱秤】当归【一两】木香 红芍药【半两】

右为细末每服一钱水一盞入小油二点钱一文同煎至七分温服如妇人血脏脐下冷痛似刀搅遍身肿满室女经脉不通用斑猫一两大黄一两炒剉二味为末用黄狗胆汁以温酒送下一钱如脐下痛止心间痰未止不服二味

宣明方论卷九

卷十

钦定四库全书

宣明方论卷十

金 刘完素 撰

燥门

燥乾者今肺之本燥金受热化以成燥澁也兼火热致金衰耗液而损血郁而成燥者由风能胜湿热能耗液故经云风热火同阳也寒湿燥同陰也又燥湿小异也金燥虽属秋陰而其性异於寒湿而反同於风热火也又加大便乾澁乃大肠受热化成燥澁经云诸澁枯渴又如瘫痪中风皆因火热耗损血液玄腑闭塞不能浸润金受火郁不能发声【经云肺主声】肢痛縲戾者风热湿相致而遂以偏枯语音澁手足不随也然中寒吐泻亡液而成燥亦以鲜矣亦有寒湿相郁荣卫不能开发贯注多成偏枯经曰诸澁枯涸乾劲皴揭属於燥也 又如胃膈痺热烦满饥不欲食或痺成消中善食而瘦或燥热郁甚而成消渴多饮而数小便【或因热病或恣酒欲误服热药以致脾胃真阴阳损虚肝心衰弱也】狂阳火燥其三焦肠胃燥热怫郁而水液不能宣行也周身不得润泽故瘦悴黄黑也而燥热消渴日夜狂饮亦其水液不能浸润於肠胃之外汤不能止渴徒注为小便多出俗未明妄为下焦虚冷误人多矣 又如周身热燥郁故变为雀目或内障痈疽疮疡上为咳嗽喘下为痔痢或停积而湿热内甚不能传化者变为水肿湿胀也世传消渴病及消瘦弱或小便有脂液者为消肾也此为三消病也消渴消中消肾经意但皆热之所致也

人参白术汤 治胃膈痺热烦满饥不欲食痺成为消中善食而瘦燥热郁甚而成消渴多饮而数小便兼疗一切阳实陰虚风热燥郁头目昏眩风中偏枯酒过积毒一切肠胃燥澁倦闷壅塞疮疥痿痹并伤寒杂病产後烦渴气液不得宣通

人参 白术 当归 芍药 大黄山梔子 荆芥穗 薄荷 桔梗 知母
泽泻【各半两】 茯苓【去皮】 连翘 瓜蒌根
乾葛【各一两】 甘草【三两】 藿香叶 青木香
官桂【各一分】 石膏【四两】 寒水石【二两】 滑石【半斤】

右为细末每服抄五钱水一茶盏入盆硝半两生姜三片煎至半盏绞汁入蜜少许温服渐加至十余钱得脏腑流利取効如常服以意加减兼服【消痞丸散以散肠胃结滞湿热内甚自利者去了大黄芒硝】

绦雪散 治消渴饮水无度小便数者大有神効黄芩 黄丹 汉防己 括蒌实【各等分】

右为细末每服二钱汤浆水调下临卧时并进三二服即止

人参散 治消肾善饮而食後数小便溺者

人参【三钱】白术 泽泻 瓜蒌 桔梗 梔子 连翘【各半两】葛根 黄芩 大黄 薄荷
白茯苓【各一两】甘草【一两半】石膏【二两】滑石 寒水石【各三两】

右为末入宿砂仁三钱每服五钱水一盞煎至七分入蜜少许再煎三二沸去滓食前食後服
消痞丸

大黄甘草饮子 治男子妇人一切消渴不能止者大豆五升【先煮三沸出淘苦水再煮】大
黄【一两半】甘草【大龕者四两长四指打碎】

右三味用井水一桶将前药同煮三五时如稠糲水少候大豆软盛大盆中故冷令病人食豆
渴食豆汤无时停止腑脏自然清润如渴尚不止再服前药不三五日自愈

痢門

总论

夫痢者五脏窘毒结而不散或生冷物或冒寒暑失饥不能开发又伤冷热等食更或服暖药
过郁化成利自古人三口白利为寒赤利乃热其三口悞也今人疮疖初发刺开乃血多日成
脓何为先热而後寒也

叔和云湿多成五泄肠走若雷奔愚医不悟三口黄者乃热青利是寒太素曰五泄有溏泄鹜
泄飧泄濡泄滑泄也此乃五泄五泄者青是感肝木之象其色青赤者受心火之气其色赤白
者得西方金肺之气色白黄者脾土之色苍者土气之下与水随之其色苍也三口苍曰寒黄
赤热其三口非也若下利热极频并窘痛或久不愈诸药不能止者须下之以开除湿热痞闭
积滯而使气液宣行者宜以逐之兼宣利积热也

益元散 治身热吐痢泄泻肠癖下痢赤白癰闭淋痛利小便偏主石淋【乃服金石热药多待
为砂石从小便淋出者也】肠胃中积聚寒热宣积气通九窍六府生津液去留结消蓄水止
渴寛中除烦热心躁腹胀痛闷补益五藏大养脾胃之气【此肾水之藏非为王之府也】理
内伤陰痿安魂定魄补五劳七伤一切虚损主癰瘰惊悸【其季切惊动貌】健忘止烦满短
气藏伤咳嗽饮食不下肌肉疼痛并口疮牙齿疳蚀明耳目壮筋骨通经脉和血气消水谷保
元真解百药酒食邪毒耐劳役饥渴宣热辟中外诸邪所伤久服强志轻身注顏延壽及解中
暑伤寒疫疠饥饱劳损忧愁思虑恚怒惊恐传染并汗後遗热劳复诸疾并解两感伤寒能令
遍身结滯宣通气和而愈及妇人下乳催生产後损益血衰陰虚热甚一切热证兼吹你乳痈
此神验之仙药也惟孕妇不宜服滑胎也

桂府膩白滑石【六两】甘草【一两炙】

右为末每服三钱【蜜少许】温水调下【无蜜亦得】日三服欲冷饮者新汲水调下解利
伤寒发汗煎葱豆汤调下四钱【每服水一盞葱白五十个豉五十粒煮取汁一盞调服】併
合服効为度此药是寒凉解散郁热苦涩甚不解多服此药无害但有益而无损俗恶性寒兼
喜得之贱物而不明素问造化之理故不能体会神验之言而多不用焉若以随证用之知此
方之仙药也不可阙之【伤寒邪热太甚照用分两而不可减省往往投以此药则汗出自愈
里热便得宣通而愈若半在里半在表可和解而不可发汗吐下者顿服少许多愈亦获小效
是解散怫郁邪热甚者小加减】凉膈散【和解为主故男妇皆可服之不加】苍术末【二
分同葱?煎汤调服甚良或孕妇不宜服】滑石麻黄桂枝【要发汗当即用】甘草【一两】
苍术【二两同为末每服二钱水一盞半更加入】葱白【五寸】豆豉【五十枚同煎至六
分去滓温服并三服取微汗为度】逼毒散【非孕妇可服】太白散【加入】麻黄【二两
去节如法煎服世云】神白散【或逼毒散与加】麻黄苍术【各等分去节秤】济衆云青
龙散【或青龙散欲更加入】滑石与苍术【二倍】最为发汗之妙药也【唯正可汗者即
用此服之则转加利也名为】大通毒散【或解利两感同更兼煎】凉膈散【调下】益元
散【四钱或下乳用猪肉麪羹或酒之类调下四钱不计时候日三服宜食肉麪羹粥】催产
【用温油浆调下三钱并二三服以产为度或死胎不下者煎】三一承气汤【一服调下五
钱须臾更频用温油浆调服前後俱下胎可活产母也凡难产或死胎不下皆由风热燥澁紧
歛结滯不能舒缓是故产户不得自然开也其药力至则热结顿开而产矣慎不可温补而反
生燥热也俗未知产後日夜损血疼痛怖惧以致神狂气乱则陰气损虚邪热太甚而为诸证
由不明素问造化故不识证候陰阳反以妄为产後诸虚百损便为虚冷而无热也误以热药
温补或见渴甚者不少饮水本为善心为害多矣岂知治病之道俱在临时审其藏府六气虚
实明其标本如法治之而已矣此药之常多用虽为効至大俗以病异药同将为妄行反招侮
慢】今以【若加】黄丹【令桃仁色是以名之】红玉散【若加】青黛【令轻粉碧色名
】碧玉散【若加】薄荷叶【末一分同研名】鸡苏散【主疗并同但以遭愚俗之妄侮慢
耳】

玄青丸 治下痢势恶频并窘痛或久不愈诸方不能止须可下之以开除湿热痞闷积滯而使
气得宣行者宜以逐之兼宣利积热酒食积黄瘦中虚水肿腹胀兼疗小儿惊疳积热乳癖诸
证唯泄泻者勿服

黄连 黄蘗 大黄 甘遂

芫花【醋麪炒】大戟【各半两】牵牛【四两取末二两】已上同细末
轻粉【三分】青黛【一两】

右为末匀水丸小豆大初服十丸每服加十丸空腹日午临卧三服以快利为度後常服十五
二十丸数日後得食久病未痊除者再加取利後却常服以意消息病去为度後随证止之
小儿丸如黍米或麻子大退惊疳热积不下者须常服十丸

阿胶梅连丸 治下痢无问久新赤白青黑疼痛诸证金井阿胶【淨草灰炒透明白别研不细者再炒研细】乌梅肉【去核炒】黄蘗【剉炒】黄连 当归【焙】赤芍药 乾姜【炮】赤茯苓【半两各等分】

右为末入阿胶研匀水丸桐子大温米饮下十丸食前兼夜五六服小儿丸如菉豆忌油腻脂肥诸物也

牛黄神金丸 治大人小儿呕吐泻痢无问久新赤白诸色或渴或不渴小便澁或不澁并小儿惊疳积热痲癖坚积腹满硬痛作发往来亦能寬膈消食

轻粉 粉霜 礞砂【以上别研】雄黄【研】朱砂 信砒巴豆【去皮各一钱】黄丹 蜡【三钱】

右先研粉霜次旋入礞砂研细下雄黄朱砂信砒再研下丹粉研匀别研芭豆烂为油与前药研匀近火上炙控热别研蜡软入药匀搓作剂旋丸小豆大新水下一丸小儿黍米麻子大或止吐泻痢疾调甘露散【是桂苓甘露饮】或益元散亦得

芍药蘗皮丸 治一切湿热恶痢频年窘痛无问脓血并宜服之

芍药 黄蘗【各一两】 当归 黄连【各半两】

右为末水丸如小豆大温水下三四十丸每日兼夜五六服忌油腻脂肥发热等物

二胜丸 治泻痢虚损问久新者加減服之

淡?【二两】 白术【三钱】 甘草【五分】

右同杵为膏丸如桐子大每服三丸或四丸以米饮汤下如未愈及赤白痢腹满脇痛者加一二丸

杏仁丸 治一切赤白泻痢腹痛里急後重诸证

杏仁【四十九个】 芭豆【四十九个去皮】

右以药同烧存性研细如泥用蜡熔和为丸如桐子大每服一二丸煎大黄汤间日下之

白术圣散子 治一切泻痢久不瘥并滯积疼痛者亦治

御米殼【二两蜜炒】 当归 肉豆? 缩砂 石榴皮诃子 乾姜【炮】 陈皮 白术 甘草

芍药【各等分】

右为细末每服二钱水一大盏入乳汁少许去滓服

胜金膏 治一切泄泻痢不已胃脉浮滑赤白疼痛不已者微小者立止

芭豆皮 楮实叶【同烧存性等分】

右为末熔蜡丸如菉豆大每服三四丸米饮汤下

大圣金真散 治一切寒热赤白泻痢诸证

御米殼【半斤炒】甘草【一两炙】乾姜

当归【各三钱】醋石榴皮【一两炒】陈皮【去白】白茯苓【各五钱】

右为末每服二钱水一盏小儿半盏每一盏煎至七分食前忌油腻生冷毒物等

车前子散【一名】断痢散 治一切痢不止者

车前子【不以多少炒香】

右为末每服二钱米饮调下食前空心服

象骨散 治脾胃虚弱心腹胀满水谷不消黄瘦疼酸食辄呕吐霍乱泄泻脓血四肢沉重一切後重里急夜起频併不思饮食皆可治之

象骨【四两炒】诃子【取肉二两】肉豆蔻【一两】枳殼【一两】乾姜【半两】

右为末每服三钱水一盏半煎至八分微冷温服食前日三服

海蛤玉粉散 治血痢解藏中积毒热

海蛤【二十个炒焦研末】

右为末每服二钱入蜜少许冷水调服不拘时候宣明方论卷十

卷十一

钦定四库全书

宣明方论卷十一

金 刘完素 撰

妇入门

总论

素问曰目得血而能视耳得血而能听指得血而能握掌得血而能握足得血而能步藏得血而能液腑得血而能气然血所通流则气亦然也气血宣行其中神自清利而应机能用矣

素问气血人之神也不可不谨调护然妇人以血藏为基本也夫妇人之病手太阳足少阴小肠心之经络为里表起自任冲之脉於经脉之下以上毛际循腹里关元上至咽喉颐循面目过带脉贯脐而止以妇人月水一月一来如期谓之月信其不来则风热伤於经血故血在内不通或内受邪热脾胃虚损不能饮食食既不克荣卫凝滞肌肤黄燥面不光泽或大肠虚变为下痢流入关元致绝子嗣为子藏冷虚劳损而病带下起於胞内则夫带下之造化但分经络标本殊异为病之本气也其病所发正在过带脉之分而淋漓以下故曰带下也赤白之说者无定也法曰头目昏眩口苦舌乾咽喉不利小便赤色大小便秘滞脉实而数者皆热证也凡白带下者亦多有之为病寒岂能然素问亢则害承廼制谓亢过极而反兼胜己之化制其甚也则如火炼金热极则反化为水及六月热极则物反出液而湿润林木流津故肝热则出泣心热则出汗脾热则出涎肺热则出涕肾热甚则唾大凡俗论已煎热汤煮极则沸溢及热气重蒸於物而生津液也故下部任脉湿热甚者津液涌而溢已为带下见俗医白带下者但依方论而用辛热之药虽有误中致令郁结热聚不能宣通旧病转加世传误之久矣

人参白术散 治徧身燥湿相?玄府致密遂令忪悸发渴饮食减少不为肌肤

人参【三钱】白术【七钱】薄荷【半两】缩砂仁【三钱】生地黄 茯苓【去皮】甘草【各半两】黄芩【一钱】滑石【三两】藿香【三钱半】石膏【一两】

右为末每服三钱水一盏煎至六分去滓温服食前日进二三服

白术汤 治妊娠血液虚衰痿弱难以运动气滞痹麻荣卫不能通宣常服养液润燥开通结滞令血昌盛白术【三】寒水石 当归 黄芩 芍药 人参 石膏 乾葛 防风 乾姜 藿香 甘草 茯苓【一两】木香

崔宣武方【用白朮一两】

右为末每服三钱水一盞生姜三片同煎至五分去滓温服食前日三服

二气汤 治月水不调断絶不产面黄肌瘦恒不思美食有燥热以柴胡饮子相参服之

大黄【四两别为末醋一升慢火熬成膏子】当归【二两】白芍药【二两】

右为末以膏子和丸如桐子大每服二十丸淡醋汤下食前日进三服【如月水不通加入】乾漆【三钱炒焦用】没药【半两】硃砂【三钱研】官桂【二钱】斑猫【三钱去头足炒热用本草云此用熬不可生用则吐泻】

当归龙骨丸 治月事失常经水过多及带下淋?无问久新赤白诸证并产後恶物不止或孕妇恶露胎痛动不安及大小儿痢泻并宜服之

当归 芍药 黄连 染槐子

艾叶【炒各半两】龙骨黄蘗【各一两】茯苓【半两】木香【一分】

右末滴水为丸如小豆大温米饮下三四十丸食前日三四服

当归人参散 治产後虚损痿弱难以运动疼痛胸满不思饮食

当归 白朮 黄芩 芍药 大黄 茯苓【去皮】陈皮【各半两】人参 黄耆【剉】川芎 厚朴【去皮姜制】官桂肉【各三钱】甘草【一两】枳殼【四钱去穰炒】

右为末每服三钱水一盞生姜三片煎至六分去滓不计时候温服如大便閼以此散下和中丸

增损四物汤 治月经不调心腹疼痛补血脏温经注颜

川芎 当归 芍药 熟地黄 白朮 牡丹皮【各半两】地骨皮【一两】

右为末每服五钱水一盞煎至六分去滓温服食前

当归川芎散 治风壅头目昏眩痛闷筋脉拘倦肢体麻痹保护胎气调和荣卫

当归 川芎【各半两】甘草【二两半】黄芩【四两】薄荷【一两】缩砂仁【一分】

右为末温水调下一钱渐加至二钱食後日进三服

辰砂大红丸 治产後寒热运闷血气块硬疼痛不止朱砂【一两一半入药一半为衣】附子【炮】没药【半两】海马【半钱】乳香苁蓉 肉桂 玄胡 姜黄 硃砂【各半两】斑猫【一分】生地黄【一两】

右为末酒煮麪糊为丸如酸枣大每服一丸煎当归酒下放温经水不行煎红花酒下

三圣散 治产後下血痢不止

乌鱼骨【炒】烧绵灰 血余灰【汗脂者各等分】

右为细末每服煎石榴皮汤调下热服一钱

没药丹 治产後恶血不下月候不行血刺腰腹急痛或一切肠垢沉积坚满痞痛作发往来或燥热烦渴喘急闷乱肢体疼倦大小人心腹暴痛孕妇自利恶物过多不宜服燥热极甚血液衰竭不可强行宜调气养血细详证用

没药【一钱】当归 大黄【一两】牵牛【二两】轻粉【一钱】官桂【一分已上同研末】硃砂【一钱同研】

右研匀醋麪糊为丸如小豆大每服五丸至十丸温水下以快利取积病下为度虽利後病未痊者後再加取利止心腹急痛煎乳香下未止取大便利

黄药子散 治月事不止烦渴闷乱心腹急痛肢体困倦不美饮食

黄药子 当归 芍药 生地黄 黄芩 人参 白术 知母 石膏【各一两】川芎 桔梗【各一分】甘草【一两】紫菀 槐花子 柴胡【各一分】

右为麪末抄三钱水一盏煎至七分滤汁温服食前但一服

大延胡索散 治妇人经病并产後腹痛或腹满喘闷或症瘕癖块及一切心腹暴痛

延胡索 当归 赤芍药 京三棱 川楝子 蓬莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎【各一分】桔梗 黄芩 大黄【各半两】甘草【一两】槟榔【一钱】

右为末每服三钱水一盏煎至六分去滓热服食前日三服恶物过多去大黄官桂加入黄药子 染槐子 龙骨各半两如前法或平人心胃急痛如本方煎服得利尤好

枳实?榔丸 治安养胎气调和经候症瘕痞块有似妊孕可以久服血气通和兼宽膈美食

枳实?榔 黄连 黄蘗 黄芩 当归 阿胶【灰炒细研】 木香【各半两】

右为末水和丸如小豆大温米饮下三十丸不计时候日进三服

软金花丸 治心胸腰腹急痛或淋病并产前後经病刺痛乾呕气劳往来寒热四肢困倦夜多盗汗者兼治血积食积

当归【半两焙】 乾漆【二钱生】 轻粉
斑猫【生全用为末】 礞砂粉霜【各一钱】 芭豆【二钱去油】

右为末同研细枣肉为膏旋丸如菉豆大每服一丸新水下病甚者加服看虚实

大红花丸 治妇人血积聚症瘕经络注滞

川大黄 红花【各二两】 蟲虫【十个去翅足】

右取大黄七钱醋熬成膏和药丸如桐子大每服五七丸温酒下食後日三服

黄芩汤 治妇人孕胎不安

白术 黄芩【各等分】

右为末每服三钱水二盏当归一根同煎至一盏稍温服

海蛤丸 治妇人小便浊败赤白带下五淋脐腹疼痛寒热口乾舌澁不思饮食

海蛤 半夏 芫花【醋炒】 红娘子【去翅】 诃子【炒】 玄胡索 川楝子【麪裹煨去皮】
茴香【炒各一两】 乳香【三钱】 礞砂【半两】 朱砂【半入药半为衣】 没药【各一两研】 当归【一两半】

右为末醋煮麪糊为丸如小豆大每服五丸至十丸醋汤下量人病虚实加減

乌金散 治妇人诸疾寒热头痛一切等疾

乌金子 肉桂 蒲黄 当归 蟲虫 血余灰 水蛭 鲤鱼灰 木香 青皮 皂角【大者炙各半两】 芍药【半两】 芫花【三两醋浸】 芭豆【一钱出油】 朱砂【少许】 棕皮灰
红花【一两】 川乌头【半两】

右为末每服半钱加至一钱煎生姜汤调下空心食前忌油腻物

伏龙肝散 治妇人血崩不止或结作片者

芎藭【一两】 生地黄【一分】 阿胶【八钱炙】 当归【一两】 续断【一分】 地榆刺蓟根【一两】 伏龙肝【七钱】 青竹茹【八钱】

右为末每服三钱水一盏半煎至一盏温服日五服不计时候後服补药

阿胶丸

阿胶 鳖甲【六分】 续断【五分】 龙骨【一两半】 芎藭【六分】 地胆【四分】 鹿茸【五分】 乌鱼骨【八钱】 丹参【六钱】 龟甲【一钱】

右为末醋麪糊为丸如桐子大每服三十丸艾汤下日进三四服

麝香杏仁散 治妇人陰疮

麝香【少许】 杏仁【不以多少烧存性】

右为细末如疮口深用小布袋子二个盛药满系口临上药炙热安在陰内立愈

朱砂斑猫丸 治妇人产後吃硬食变作血气食块无问久新

皂角末【二钱】 芭豆【四个去油】 朱砂【一钱】 礞砂【一皂子大块】 乾蝎【一个全】 斑猫【十个】 红娘子【五个】 水蛭【三个】

右为细末蜜和丸分作十五丸每服一丸至二丸三丸温酒下初更吃平明取下血化水十年之病皆治之或大便或小便不多出也

宣明方论卷十一

卷十二

钦定四库全书

宣明方论卷十二

金 刘完素 撰

补养门

补养寒论

素问云诸寒收引皆属於肾肾者少陰也少陰者至陰也至者为极也少陰者冬脉所旺居北而属水为寒为归藏为周密寒中收引拘缩寒之用也其病上下所生水澄彻冷清者不浊其气寒冷水谷不消化吐利清冷为病则如天气寒而水自清也

素问云太阳受寒血凝为痼太陰受寒气聚为疝但脉急而寒之象也急主於痛故紧急也又内经云数则为热迟则为寒诸阳为热诸陰为寒脉当迟缓寒毒内郁洪数为热所养心之脉也寒气生清水清就於湿故以下利清白此乃肠胃寒化物失常热则壅澁不通寒胜则火衰火衰金旺吐利腥秽腥者金肺之属也热则喜酸寒则水腥只如四肢逆冷坚痞腹满屈伸不便禁固战栗谓陰水主之舒倦不便诊其脉沉伏而迟病之证也若身凉不渴而寒蜷足而卧恶闻人声不欲言皆陰证也陰阳停则和偏则病如阳气暴絕陰气独胜则为寒证陰气暴絕阳气独胜则为热证

经曰阳盛陰虚汗之而死陰胜阳虚下之而死若阳实外热陰虚内寒陰实内热阳虚外寒阳实伐其阳当凉膈散承气汤主之陰实伐其陰当白术散四逆汤主之

论曰

大凡治病必求标本受先者为本次者为标此为兼证故知逆与从正行无问知标本者万举万当不知标本者是谓妄行也本病相传先以治其急六气为本三陰三阳为标故病气为本受病经络藏府谓之标也

补养类

防风当归饮子 治脾肾真陰损虚肝心风热郁甚阳陰虚内寒陰实内热上实下虚怯弱不耐或表热而身热恶寒或里热而躁热烦渴或邪热半在表半在里进退出入不已而为寒热往来或表多则恶寒里多则发热或表之阳分阳和正气与邪相助并甚於里畜热极深而外无

阳气里热极甚阳极似陰而寒战腹满烦渴者或里之陰分正气反助邪气并甚於表则躁热烦渴而汗出也或邪热壅塞者或烦热痛者或热结极甚阳气不通而反觉冷痛或中外热郁烦躁甚喜凉畏热者或热极閤寒不得宣通阳极似陰中外喜热而反畏寒者或躁热烦渴者或湿热极甚而腹满不渴者或一切风热壅滞头目昏眩暗风眼黑偏正头疼口乾鼻塞耳鸣及聋咽嗑不利或目赤肿痛口疮舌痹或上气痰嗽心脇郁痞肠胃燥澁小便溺淋閤或是皮肤瘙痒手足麻痺又或筋脉拘急肢体倦怠或浑身肌肉跳动心忪惊悸或口眼喎斜语言蹇澁或狂妄昏惑健忘失志及或肠胃燥热怫郁而饥不欲食或湿热内余而消谷善饥然能食而反瘦弱或误服燥热毒药及妄食热物过多而耗损脾肾则风热郁甚而多有如此不必全见也无问自病及中燥热毒药所使者并宜宣通气血调顺饮食久服之旧病除去新病不生设虚人常服补益功验自可知矣

当归 大黄 柴胡 人参 黄芩 甘草【炙】 芍药【各一两】 滑石【六两】

右停每服三钱至五钱水一大盞生姜三片同煎至七分去渣温服下补校【此方未为至当恐当时传写之误】

双芝丸 治补精气填骨髓壮筋骨助五脏调六腑久服注颜不老

熟乾地黄【焙取末】 石斛【去根酒炙】 五味子【焙】 黄耆【剉】 肉苁蓉【酒浸】 牛膝【酒浸】 杜仲【蜜水浸炮】 兔丝子【酒浸三日炒】 麋鹿角霜【半斤】 沉香【三钱】 麝香【二钱研】 人参 白茯苓【去皮】 覆盆子 乾山药 木瓜 天麻【酒浸】 秦艽【已上各一两】 薏苡仁【二两炒】

右为末炼蜜为丸如桐子大每服二十丸至三四十丸温酒下盐汤米饮亦可【凡年五十岁已上加】入黑附子【以青盐汤蘸泡】鹿角【一大对去顶三指】硫黄【半斤浑用】以上用些油釜中以水同煮令微沸勿太急甚水耗只旋添温水须用水以备添也炼令角胶汁出尽其角如霜以手捻如膩粉乃盛之取用勿令秽污也

内固丹 治诸补养肾气调和脾脏壽高者常服筋骨劲健浑如壮士

肉苁蓉【酒浸】 茴香【炒一两】 破故纸 胡芦巴【炒】 巴戟【去心】 黑附子【炮】 川楝子 胡桃仁【各四两麪炒】

右为末研桃仁为膏余药末和匀酒麪糊为丸如桐子大每服十丸至三十丸温酒盐汤下食前虚者加至五七十丸此药明目补肾乌须进美食空心

大补丸 治男子脾肾不足不问久新者

陈萑子

陈萝卜子【已上炒】蕤仁【去皮各半两】川山甲【七片用酒炙】麝香【少许】

右为细末用蜜和丸如樱桃大每服一丸温酒送下食前空心

蛤蚧散 治脾胃气攻心刺痛者

蛤蚧【一对酒炙】乳香 木香 白茯苓 丁香 茴香【各一钱】川山甲【二钱】

右为细末每服一钱好温酒调下空心食前

金锁丹 治男子本藏虚冷夜梦鬼交者

龙骨【水飞】兔丝子【一两】破故纸 韭子 泽泻 牡蛎【各半两】麝香【少许】

右为末酒麪糊为丸如桐子大每服三十丸温酒下空心食前日三服

调中丸 治脾胃虚止呕吐宽利胸膈

青皮 红皮【各一两】大黄【一两】牵牛【三两】

右为细末滴水调和丸如桐子大每服三二十丸温水下空心食前

水中金丹 治元藏气虚不足梦寐陰人走失精气阳起石【研】木香 乳香【研】青盐【各一分】茴香【炒】骨碎补【炒】杜仲【各半两去皮生姜炙丝尽】白龙骨【一两紧者槌碎绢袋盛大豆蒸熟取出焙乾研】黄戍肾【一对酒一升煮熟切作片子焙】入白茯苓【一两与肾为末】

右为细末酒麪糊和丸如皂子大每服二丸温酒下空心忌房室

和气地黄汤 治沉积气结不散调养荣卫补顺陰阳常服以代汤茶酒果

木香【一字】?桂【去皮】茯苓【去皮】白芥子【各一钱炒香】白术 乾山药 川芎 当归【各一分焙】桂花 缩砂仁【各半钱】甘草【半两炙】

右为细末入麝香少许研匀用数重油纸或甕器内密封起每用蜜二斤饴饴一斤温好甜水五升化匀开抄前药并杏仁十枚去皮尖洗净炒香焦槌碎湿地黄根计切长寸约取汁半盞温服

白术调中汤 治中寒痞闷急痛寒湿相抟吐泻腹痛【上不所出水液澄彻清冷谷不化小便

清白不澁身凉不渴本末不经有见阳热证其脉迟者是也此因饮食冷物过多陰胜阳衰而为中寒也或冷热相击而反阳气怫郁不能宣散怫热内作以成热证者不可亦言为冷当以脉证别之夫湿热上泻常见阳脉若亡液气虚亦能反见诸陰脉也当以标本之不可治或热证误服此白术调中汤温药亦能开发阳气一通而愈别无加害】无问寒热久新并宜服之【或有口疮目疾孕妇等吐泻者以畏乾姜官桂不服】

白术 茯苓【去皮】红皮【去白】泽泻【各半两】乾姜【炮】官桂【去皮】缩砂仁 藿香【各一分】甘草【一两】

右为末白汤化蜜少许调下二钱每日三服炼蜜和就每两作十丸名白术调中丸小儿一服分三服

人参白术散 此方证同调中汤治法

人参 白术 茯苓 甘草 橘皮 葛根 泽泻 滑石 藿香【各半两】

右为末每服三钱水一盏煎至六分温服妊妇加苍术三五片热服

白术散 治伤寒下後余热以药下之大过胃中虚热饮水无力也当生胃中津液多服此药

人参 白术 木香 白茯苓 甘草【剉炙】藿香叶乾葛【剉各二两】

右为末每服一钱至二钱水一盏煎至五分温服如饮水者多煎与之无时也

丁香附子散 治脾胃虚弱胸膈痞结吐逆不止

附子【一两】母丁香【四十九个】生姜【半斤取自然汁半碗】

右用附子钻孔四十九以丁香刺上面填内将生姜汁用文武火熬尽又用大萝卜一个取一穴子入附子又填内将萝卜盖之又用文武桑柴火烧香熟为度取出切附子作片子焙乾捣为细末每服一钱米汤一盏调下日进三服

何首乌丸 治男子元藏虚损髮白再黑填精

何首乌【半斤】肉苁蓉【六两】牛膝【四两】

右将何首乌半斤用枣一层何首乌甑内蒸枣软用切焙同为末枣肉和丸如桐子大每服五七丸嚼马练子服酒送食前一服加一丸日三服至四十丸即止却减至数効如神妙

煨肾丸 治男子腰膝疼夜多小便者

川楝子 马楝花 破故纸 胡芦巴 茴香【炒各等分】

右除茴香外四味酒浸同为末煮麪糊为丸如桐子大每服十丸至二十丸温酒下空心食前

神仙楮实丸 治积冷气冲心胸及背有虺虫疼痛痔瘻痲痺气块心腹胀满两肋气急食不消化上逆气奔於心并疝气下坠饮食不得吐水呕逆上气咳嗽眼花少力心虚健忘冷风偏风等疾坐则思睡起则头眩男子冷气腰疼膝痛冷痺风顽陰汗盗汗夜多小便泄利阳道衰弱妇人月水不通小便冷痛赤白带下一切冷疾无问大小能明目益力轻身补髓益精

楮实子【一升淘去泥微炒】官桂【四两去皮】牛膝【半斤酒浸三日】乾姜【三两炮】

右为末酒麪糊为丸如桐子大每服二十丸温酒空心食前盐汤亦得

补中丸 治一切气疾心腹?痛呕吐气逆不思美食厚朴【生姜制香】乾姜【炮】陈皮【去白】白茯苓【去皮】甘草【炙紫各等分】

右为末炼蜜为丸如樱桃大每服一丸空心白汤化下细嚼亦得

茱澄茄丸 治中焦痞塞气逆上攻心腹?痛吐逆下痢美饮食

茱澄茄【半两】良姜【二两】神麴【炒】青皮【去白】官桂【去皮各一两】阿魏【半两醋麪裹煨熟】

右为末醋麪糊为丸如桐子大每服二十丸生姜汤下不计时候

宣明方论卷十二

卷十三

钦定四库全书

宣明方论卷十三

金 刘完素 撰

诸痛门

总论

夫痛者经脉流行不止环周不休寒气入经而稽迟血泣凝而不行客於脉外血少客脉中气不通故卒然而痛其痛者卒然而止或痛甚而不休或痛甚而可按或按之而痛止或按之而无益或喘痛动应手或与心背相引而痛或脇肋与少腹相引而痛或腹痛或引陰股宿昔而成积或卒然而痛死不知人而少间复生或痛而闭不通者诸痛各不同形经日寒气客於脉外则脉寒脉寒则蜷缩蜷缩则脉绌【音督】脉绌急则外引小腹卫气不得通流故卒然而痛得炅则痛止寒气客於经脉之中相薄则脉满满则血气乱故痛而不可按寒气客於肠胃之间膜原之下血不得散小腹急引故痛按之血气散痛乃止也脇肋痛者寒气客於厥陰之络脉也背与心相引痛者寒气客於背俞之脉注於心相引痛寒气客於陰股血泣在小腹相引痛卒然而痛死者寒气客於五臟厥逆上壅陰气竭阳气未入故卒然痛死气复反则生矣视其五色黄赤为热白青则为寒青黑为痛经日感虚乃下其留於筋骨之间寒多则筋挛骨痛热则骨弛肉消但痛痒疮疡痈痛肿血聚者皆属心火热也不可一例伤寒凡治痛者先察本次明经络皮部虚实用药无悞矣

神砂一粒丹 治一切厥心痛小肠膀胱痛不可止者附子【一两炮】郁金 橘红等附子停用

右为末醋麪糊为丸如酸枣大以朱砂为衣每服一丸男子酒下妇人醋汤下服罢又服散子

神圣代鍼散

乳香 没药 当归 香白芷 川芎【各半两】 芫青【一两去足翅】

右为细末更研每服一字病甚者半钱先点好茶一盏次掺药末在茶上不得吹搅立地细细急呷之心惊欲死者小肠气搐得如角弓膀胱肿硬一切气刺虚痛并妇人血癖血迷血晕血刺血冲心胎衣不下难产但一切痛疾服之大有神効只是要详疾证用药

茴香丸 治男子妇人脐腹疼痛刺胸膈不止者

茴香【炒】 良姜 官桂【各半两】 苍术【一两汁浸】

右为末酒煮麪糊和丸如桐子大每服十丸生姜汤止痛温酒下空心食後

趋痛丸 治一切走注疼痛妇人经脉住滯水肿腹胀

甘遂 大戟 芫花 黑牵牛【各等分】

右为末以莽麪同末和作饼子扞切为棋子煮熟服之得利为度每服一钱加减相虚实

六合散 治一切燥结汗後余热宣转不通亦名金钥匙散并治小肠气结心腹满胸中结痞走
疰疼痛大黄【一两纸裹煨】 白牵牛【半两生】 黑牵牛【微炒】 甘遂【各半两】 槟榔
【三钱生】 轻粉【一钱】

右为细末每服一钱密水调下服量虚实加减

定痛丸 治打扑损伤筋骨疼痛等如打扑骨损者先整骨定用竹夹然後先用好酒下麻黄三
钱然後服药大効

乳香【一分】 川椒 当归 没药 赤芍药 川芎自然铜

右为末熔?为丸如弹子大细嚼酒下一丸骨碎者先用竹夹夹定三五日依旧小可与服

香殼散 治小肠气脐腹搅痛急陰股中疼闷不省人事

舶上茴香【用盐炒】 枳殼【各一两】 没药【半两】

右为末每服一钱温热酒下不计时候并二三服

金鍼丸【亦名陆神丸】 治阳絶痞气心腹不忍者

丁香 木香 乳香 阿魏 轻粉 骨碎补【去毛】 槟榔 官桂 桂心
芭豆【去皮】 杏仁【去皮】 不灰木 肉豆蔻 阳起石 朱砂【各等分】

右为细末水麪糊为丸如小豆大每服一丸针穿作孔子小油内裹过灯焰内燎遍於油中蘸
死嚼生姜下不计时候日三服虚实加减

一粒金丹 治腰膝走注疼痛如虎啮

草乌头 五灵脂【各一筋】 木鼈子【四两】 白胶香【半筋】 地龙【四两去土炒】 细墨【一两】 乳香【一两】 当归【二两焙】 没药【二两】 麝香【一钱】

右为末再研一千下糯米麪糊和丸如桐子大每服一丸至二丸温酒下吃药罢遍身微汗立验

没药散 治一切心肚疼痛不可忍者

没药【乳香别研】 乳香【各三钱】 川山甲【五钱炙】 木鼈子【四钱】

右为细末每服半钱一钱酒大半盏同煎温服不计时候

痔门

痔瘻总论

夫肠风痔病者所发手太陰手阳明经以应动脉谓肺与大肠为表里主为传道以行糟粕肠风痔病有五种其证亦异盖因阳气虚而玄腑踈风邪乘而热自生风湿邪热攻於肠中致使大便澁而燥热郁血热散而流溢冲浸浚肠里故以先血後便热在下先便後血热在上血後便久而不愈乃作痔

素问云因而饱食筋脉横解房室劳伤肠癖为痔风热不散谷气流溢传於下部故令肛门肿满结如梅李核甚者而变成瘻也五臟切宜保养勿令受邪

香殼丸 治湿热内甚因而饱食肠癖成痔久而成瘻速服悉愈之

木香 黄蘗【各三钱】 枳殼【去穰炒】 厚朴【各半两】 黄连【一两】 蛻皮【一个烧】 当归【四钱】 荆芥穗【三钱】

右为末麪糊为丸如桐子大每服二三十丸温水食前日三服

槤藤子丸 治肠风泻血湿热内甚因为诸痔久而不治乃变成瘻

黄耆 枳实 槐花 荆芥穗 凤眼草【已上各二两】 槤藤子【一对炙】 皂子【三百个炙】

右为细末麪糊为丸如桐子大每服二三十丸空心酒下米饮亦得忌油腻冷猪鱼臭血物等

乌荆丸 治肠风痔疾大肠閼滞

川乌头【二两炮】 荆芥穗【四两】

右为末醋麪糊为丸每服二三十丸如桐子大温水下日三服

黄耆葛花丸 治肠中久积热痔瘻下血疼痛

黄耆 葛花 黄赤小豆花【各一两】 白芍 赤芍药 黄芩
当归【各三分】 丹皮【一个】 槟榔 白蒺梨 皂

角子仁【炒各半两】 生地黄【焙一两】

右为末炼蜜和丸如桐子大每服二十丸至三十丸煎桑白皮汤下食前槐子煎汤下亦得

黄连散 治肠风下血疼痛不止

鷄冠花 黄连 贯衆 川大黄 乌梅【各一两】 甘草【三分炙】

右为末每服二钱用温米饮调下日三服不计时候

乳香没药散 治五种肠风痔瘻无问久新

宣黄连 白矾【各一两】 谷精草【半两】 石榴【一个用刀子割下盖子里面取子三停一
停次将黄连白矾碎内入石榴内用元盖子合用】

右以湿纸一张裹了後用胶泥拍作饼子裹石榴以炭火烧通赤为度取出去泥纸次将谷精
草於铤子内炒焦黄为度与石榴研细後入麝香一钱乳香二钱没药一钱研细拌匀每服一
钱热酒小半盏调下日三服

木香厚朴汤 治痔瘻脱肛肠胃间冷腹脇虚胀不思饮食

木香 桂心 桃仁 陈皮 厚朴【各一两】 肉豆蔻 赤石脂【各半两】 皂角子【三两去皮子醋
炙黄】 大附【三分炮】

右为末每服二钱温粥饮调下食前

疝门

疟疾总论

素问云疟疾皆生於风其蓄作有时何气使然夫陰阳上下交争虚实相移也阳并於陰陰实阳虚寒慄鼓颔此皆夏伤於暑热气藏於皮肤之内肠胃之外腠理开得秋气汗出遇风得之与卫气并卫气昼行阳夜行陰气得阳外出得陰内薄外内相薄是以日作也 其有间日者气深内薄於陰阳气独发陰邪内着陰与阳争不得出是以间日作也其作晏与早者邪气客於风府循膂而下卫气一日一夜大会於风府其日下一节先客於脊背每至风府则腠理开腠理开邪气入邪气入则病作晏也

大寒者陰气也风者阳气也先伤寒而後伤风故曰先寒而後热名曰寒疟先伤於风後伤寒故曰先热而後寒名曰温疟其热而不寒者陰气先絕阳气独胜少气烦冤手足热欲吐名曰苦疟有余则泻不足则补热为有余寒为不足已得火不能温热已冰水不凉气陰胜并於阳阳胜并於陰陰胜则寒阳胜则热故疟者陰阳风寒虚实邪气不常之所作也

辟邪丹 治嵐嶂鬼疟食疟并月频日者

菉豆 雄黑豆【各四十九粒】 信砒【半钱别研】 黄丹【一钱为衣】 朱砂【二粒】

右为末同入乳鉢内滴水为丸分作三十粒每服一粒已用东南桃心取七枝研汁将井花水早辰日欲出不出向日吞之醋汤亦得已发日服

斩邪丹 治诸般疟疾无时不止者

菉豆 小豆【三十粒口退皮再入】 朱砂 信砒【各一钱】

右为末同研细滴水和丸匀分作十丸每服一丸已早辰服夜间於北斗下香水献至早晨用新倒流水送下

断魔如圣丹

信砒【一钱】 蜘蛛【大者三个】 雄黑豆【四十九粒】

右为末滴水和丸如豌豆大如来日发於今晚夜北斗下献於早晨已纸裹於耳内扎一丸立见愈神圣一粒可医三人

辰砂丸 治一切脾胃虚疟邪热毒者

信砒 甘草【各一钱】 朱砂【二钱】 大豆【四十九粒】

右为末滴水和丸匀分作四十九服发日早晨日欲出煎桃心汤下忌热物

疰神丹 治诸般疰疾

信砒【一两】雄黄【一钱】

右以於五月重五日用□子尖拌匀研三千下日未出不令鷄犬妇人见丸如桐子大未发前一日面东冷水下一丸

趋鬼丹 治一切疰疾神効

信砒【一钱】大豆【七钱】雄黄 轻粉 荷叶【各半钱】甘草【一寸】

右为末滴水为丸如小豆大重午日未出不见鷄犬妇人修合每服一丸无根水下平日夜视北斗来日服忌热物

宣明方论卷十三

卷十四

钦定四库全书

宣明方论卷十四

金 刘完素 撰

眼目门

眼科总论

素问云目得血而能视手得血而能握其证足厥陰之经络所主肝臟受虚而即补肾实而即泻心 夫人之眼目者似天地之日月也若人无双目岂能别辩贤愚天无日月万物安能照耀是以眼通五臟气贯五轮外应肝候肝臟虚而风邪郁风邪郁而热蕴冲火炎上行故攻目昏渗澁疼痛赤丝皆发荣卫实则能视荣卫虚则昏暗凡人多食热物或嗜五辛坐湿当风凌寒冒暑将息失度皆丧目之源也

黄连膏 治一切眼目瘀肉攀睛风痒泪落不止朴硝【一斗以水半斗淘净去土陰乾用】黄连【半筋】白丁香【五升以水一斗淘净去土搅细用】

右取水入硝香釜内熬至七分淘出令经宿水面浮牙者取出挖乾以纸袋子盛风中悬至风化将黄连细末熬清汁晒乾硝用猪羊胆和加蜜妙点之效矣

涤昏膏 治一切风眼疼痛不可忍者洗之妙矣好崖蜜【一筋】黄连【一两】没药【半两】黄丹【一两炒紫色】

右入蜜同熬黑煎黄连成稠汁入二味药内煎熬稠更入没药末同熬数沸滤去滓洗甚妙後更用通天散?鼻

通天散 治偏正头疼并夹脑风通一切壅滯明目赤芍药 川芎 黄连 黄芩 玄胡索 草乌头 当归 乳香【别研各等分】

右为细末每服少许纸捻子蘸药任之鼻?神效

神芎散 治风热上攻头目眩痛上壅鼻塞眼昏并牙齿闷痛

川芎 郁金【各二钱】荆芥穗【一分】薄荷叶【一分】盆硝【二钱】红豆【一钱已上

为细末後入盆硝】

右研匀鼻内?三两剜耳力慢加药病甚者兼夜?之凡热多风少随证选用诸药

金丝膏 治一切目疾昏暗如纱罗所遮或疼或痛宣黄连【半两剉碎水一盞浸一宿取汁再添水半盞浸滓经半日许取汁与前汁放别用水半盞】蜜【一两】白矾【一字】井盐【一分如无以青盐代之】山梔子【二钱好者槌碎与黄连滓同煮五十沸取尽力子滤去滓与前黄连汁一处入筛药】

右用银盏器内同熬十余沸用生绢上细纸数重再滤过用时常点

白药子散 治一切疳眼赤烂目生翳膜内外瘴疾并小儿吐痢

白药子【一两】甘草【半两】

右为末用猪肝一叶批开糝药五钱水一大盞煮熟食後服

胡黄连散 治一切久新赤目疼痛不能坐卧并大小人口疮

胡黄连 槟榔【各半两】麝香【少许别研】

右为细末研细点之如口疮每服半钱麝香一字匀口疮大小贴之忌食鱼猪油腻物

碧霞丹 点一切恶眼风赤者

龙脑 麝香 硃砂【各二钱】血竭 没药 乳香 铜青【各一钱】鹏砂【三钱】

右为末滴水 and 丸如桐子大每服一丸新水化开点之立效

菩萨散 治远年近日一切眼疾

菩萨石 金精石 银精石 太陰石 太阳石 雨余石 河洛石 矾矿石 云母石 卢甘

石 井泉石 白滑石 紫英石 寒水石 阳起石 猪牙石 代赭石 碧霞石 乌鱼石 青盐【各一两】硃砂【半两】蜜陀僧【一两】铜青【一两】黄丹【四两】麝香 脑子【一钱】轻粉【一钱半】鹏砂【三钱】乳香【二钱】雄胆【一筋】白砂

蜜【二筋】

右为细末以井花水九大碗熬就作四碗点水内落下钱许大不散可如散者再熬滤滓过露旋点

石膏羌活散 治久患双目不覩光明远年近日内外气障风昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活【治脑热头风】蜜?花【治羞明怕日】木贼【退翳障】香白芷【清利头目】细辛
乾菜子【二味起倒睫】麻子【起拳毛】川芎【治头风】苍术【明目暖水藏】甘菊花
荆芥穗【治目中生疮】黄芩【洗心退热】石膏【二味】藁本【治偏正头痛】甘草【
解诸药毒各等分】

右为末每服一钱至二钱食後临卧用蜜水一盞调下或茶清或淘米第二遍泔亦得日进三服至十日渐明服至二十日大验此方医数十余人矣

重明散 治一切风热内外障气眼疾

川独活 川羌活 川芎 吴射干 仙苓脾防风 甘草 井泉石 苍术【各半两】丹参
白术石决明 草决明【各三分】

右为末每服二钱水一盞半煎至一盞温服日进三服食後

雷岩丸 治男子妇人肝经不足风邪内乘上攻眼暗泪出差明怕日多见黑花生障翳膜遮睛
脸生风粟或痒或痛隐澁难开兼久患偏正头疼牵引两目渐觉细小视物不明皆因肾水不
能溉济於肝水此药久服大补肾藏添目力

肉苁蓉【一两】牛膝【一两】芭豆【一两浸一宿去皮心】菊花【二两】黑附子【青
盐二钱以河水三升同煮为度去皮脐一两】枸?子【二两】川椒【三两去目】

右为末元浸药酒煮麪糊为丸如桐子大每服十丸空心酒下世人服药不知多少根源往往不效耳

丁香复光丸 治一切远近目疾

丁香【二钱】巴豆【一钱去皮油】半夏【二两】乌梅【半两去核】南鹏砂【三钱】
脑子【二百】盆硝【半两】缩砂仁【二钱半】甘草【半两】荆芥穗【二钱】

右为末醋煮麪糊为丸如菉豆大每服十丸至十五丸米泔下食後日三服

已上诸方系先生亲验可録

小儿门

小儿科论

素问云身热恶寒战栗惊惑皆属热证为少陰君火暴强直支綆戾里急筋缩也皆属风证为厥陰风木大小儿六岁之上为小儿十八岁已上为少年其六岁已下者诸经不载是以乳下婴儿有病难治无可定也然小儿与大人不可一例各异治之虽小儿诞生襁褓之後骨肉脆软肠胃细微可以乳食调和臟府迺得平安肌肤滋润筋骨轻嫩以绵衣之故生壅滯内有积热热乘於心心受邪热乃发为惊惊不止返为潮搐则为病也大槩小儿病者纯阳热多冷少故引 素问少陰厥陰证以小儿病惊风热多矣小儿惊风者皆由心火暴甚而制金不能平木故风火相?而昏冒惊悸潮热此证皆谓热甚而风生 素问惊骇惊愕少陰君火也小儿脾疳痢泻者皆热甚急惊泻痢色多青为热证明矣痢色黄者何为火甚则水衰而脾土旺故痢色黄也痢色红赤者为心火热甚深也痢色黑者为火热过极则反兼水化制之故色黑也

五臟皆言热证无寒冷证亦有谓泻痢小便青白不澁为寒水谷不化而色不变吐痢腥秽澄澈清冷白不澁身凉不渴脉迟细而微者寒证也

谷虽不化而色变非白烦渴小便赤黄而澁者为之热证世传大人小儿吐痢霍乱食乳未及消化而痢尚白便言论为寒证误矣【向不脉候别之】仲景邪热不化谷岂为寒也【大人亦同】

小儿方类

龙脑地黄膏 治小儿急慢惊风涎痰上潮心胸天吊惊纏喉风小儿胸膈不利一切热毒大有神效如病不已与分肢散一二服吐利得快常服此药

川大黄【别捣】甘草【横文者别捣】麝香【一钱别研】雄黄【水窟者一分别研】生脑子【一钱别研】

右五味各修制了再入乳鉢内同研细炼蜜为膏油单裹如有前病煎薄荷汤下旋丸如皂子大化下如小儿大人睡惊及心神恍惚煎金银汤下一丸常服新汲水下大解暑毒如孕妇人常服新生男女永无疾病如有大人阳毒伤寒加轻粉【二?子】龙脑【少许】水化下一丸杏核大小儿看年纪大小加减服立效

分肢散 治小儿卒风大人口眼喎斜风涎裹心惊癇天吊走马喉闭急惊一切风热等疾

巴豆【半两不出油】川大黄【一两】朴硝【半两】

右大黄为末後入巴豆霜朴硝一处细研用油贴起如有前患每服半钱熟茶下吐下顽涎立

愈如小儿胃喉惊吊等先服龙脑地黄膏一服次服此药一字茶下时上吐下泻以吐利得快为效大人半钱小儿一字看虚实加减只是一两服见效不宜频服如吐泻不定以白汤立止

珍珠丸 治小儿虚中积热惊癇等疾

巴豆霜 膩粉【二钱】滑石【二钱】天南星【一钱半】蝎稍【二十四个】续随子【二十四个去皮】粉霜【一钱半】

右为末研令极细以糯米粥为丸如黄米大小儿二岁已下每服三丸至一丸十五岁每服五丸至十丸点茶汤下荆芥汤亦得虚实加减

牛黄散 治小儿上焦壅热诸眼疾

肉桂 郁金【各一两】马牙硝【四两】甘草【半两并生】

右为末如患眼三五年吃三五两便瘥每服一钱新汲水调下垂枕卧片时若是小儿十岁服半钱五岁已下服一字永无惊瘕癇风患服之立效

朱砂丸 治小儿急慢惊风及风热生涎咽喉不利取惊积

朱砂 天南星 巴豆霜【各一钱】

右为末麝糊和丸如黍粒大看病虚实大小每服二丸或天吊戴上眼每服四五丸薄荷水下立愈

郁金散 治小儿急慢惊风等疾

郁金【一枚大者】巴豆【七个去皮不出油】

右研为细末每服一字煎竹叶汤放温下把药抄盏唇上放以汤充下喉咽为妙

泽泻散 治小儿??膈上壅热涎潮

泽泻【一分】蝉壳【全者二十一个】黄明胶【手掌大一片炙令焦】

右为细末每服一大钱温米汤调下日进二服未愈再服

镇庭散 治小儿一切惊喘肚胀咳嗽

郁金 大黄【各半两】 甘草【三钱】 轻粉【一钱】

右为末每服半钱用薄荷汁朱砂细研冷水以木匙沥下

定命散 治小儿天吊惊风不能哭泣

梨芦 川芎 蔚金【各等分】

右研为细末鼻中?之如哭可医

金肺散 治小儿诸般喘 急惊风神效

锡灰【一钱】 汉防己【二钱】 郁金【一钱半】 砒黄【二钱】 半夏【一钱半汤洗七次】

右为细末每服半钱加一钱小儿加減煎猪肉汤下日进二服食後

厚朴散 治小儿虚滑泻痢不止

厚朴 呵子皮【半两】 史君子【一个】?丁香【十个】 茯苓 吴白术 青皮【各二钱】 甘草【一寸炒】

右为末每服一字一岁加減用清米汤下

人参散 治小儿虚热烦渴因吐泻烦渴不止及踈转後服之

人参【半两】 茯苓【二两半】 牛犀【二钱半】 甘草【半两】 乾葛【半两】 桔梗【二钱半】

右为末每服二钱水一大盞入灯心五茎同煎至六分放温不计时候烦渴者以新竹汤下量年纪加減

碧云散 治小儿惊风有涎

胆矾【半两研】 铜青【一分研】 粉霜 轻粉【各一钱】

右为细末每服一字薄荷汤下中风将水下如吐多不定煎葱白汤投之立止效

桃符丸 治小儿风热

大黄 郁李仁 黄栢 宣连 蔚金【各一分】 芭豆【二七个去皮出油为霜】 轻粉【二钱】

右为细末滴水为丸如菉豆大以朱砂为衣每服二丸用桃符煎汤下看大人小儿加减

宣明方论卷十四

卷十五

钦定四库全书

宣明方论卷十五

金 刘完素 撰

杂病门

杂论

素问云痛痒疮疡痈疽痘疹瘤气结核怫郁甚者皆热五臟不和九窍不通六府不和留结为痈近於火气微热则痒热甚则痛附近则灼而为疮皆火之用也人之疮肿因内热外虚所生也为风湿之所乘则生疮肿然肺主气候於皮毛脾主肌肉气虚则肤腠开为风湿所乘脾气温而内热即生疮也肿者皆由寒热毒气客於经络使血滯而不通壅结成肿风邪内作即无头无根气血相搏作者即有头有根结壅盛则为脓赤核肿则风气流溃也疮以痛痒痛则为实痒则为虚非谓虚为寒也正谓热之微甚也痒者美疾也故火旺於夏而万物蕃鲜荣美也炙之以火溃之以汤而其痒转甚者微热之所使也痒去者谓热令皮肤纵缓腠理开通阳气得泄热散而去或夏热皮肤痒而以冷水沃之其痒不去谓寒收斂腠理闭塞阳气郁结不能散越怫热内作故也疮痒皆为火热而反腐出脓水者犹谷肉果菜热极则腐烂而溃为污水也溃而腐烂者水之化也痈浅而大疽深而恶热胜血则为痈脓也疡有头小疮也疹浮而小瘾疹也瘤气赤瘤丹熛热胜气火之色也如意散

治疥癣无时痛痒愈发有时不问久新者吴茱萸 牛蒡子

荆芥【各一分】牡蛎【半两】轻粉【半钱】信砒【二钱】

右为细末研匀每临卧抄一钱油调徧身搓摩上一半如後有痒不止更少许涂之股髀之间闻香悉愈

信效散 治风热上客阳明之经牙齿疳蚀断宣腐臭血出色黄气腐注闷动摇疼痛作发有时兼解中金石一切毒药

信砒【一钱】黄丹【二钱】千古石灰【如无但以陈久者炒细研四钱】

右研细末入青盐一分麝香少许如无此二味亦得每上抄三两大豆许先洗漱净以手指蘸药捺上下牙齿断沥涎勿咽之须臾漱净或有蚀处再上少许日三四次常用如意一上以频为妙或服金石药致病便一日三四上更不上牙齿如神或已上牙齿者傅之即愈或平人常用颇能清利头目宽膈美食使髭须迟白久用亦能固牙齿便迟老人气於面而手足阳明经

络贯注忧思则气结而血液不行燥怫郁而血衰不能荣养藏府故早苍黄而班白也此药能使阳明气血宣通故效能然也 又方使龙骨不用石灰

神圣饼子 治一切打扑伤损金石刀刃血出不止者立效此药上无脓退痂便愈

乌鱼骨【一两五月五日前先准备下】莴苣菜【一握】韭菜【一握】青蓊草【一握约一虎口人手取团圆是也】石灰【四两】

右以五月五日未出本人不语将取三味同杵烂次後下余药味杵得所搏作饼子晒乾用时旋刮敷之

芙蓉膏 治徧满头面大小诸靨子或身体者

料炭灰 桑柴灰 荞麦?灰【各半升】

右灰用热汤淋取 升熬至五分又用

独角仙【一个不用角】红娘子【半钱不去翅足】糯米【四十九粒】石灰【一两风化者】

右为末将前项灰汁调如麪糊相似在甕合子内於土底埋五七日取出使用取 痕靨内刺破用细竹签子点之放药用湿纸揩药再点至三上见 痕时冷水淋洗忌姜醋鱼马肉

鈆白霜散 治大小人口疮牙齿腐蚀气臭血出者

鈆白霜【二钱】铜録【二钱】白矾【一块大许】

右为末以翎羽扫上疮以温浆水漱之

麝香散 治大小人口齿腐蚀出血断根宣烂者

上好咸土【不以多少】麝香【真好者少许】

右热汤淋取汁去滓用清汁银石器中熬乾刮下再与麝香同研匀掺於疮上以纸贴神效

乳香散 治一切瘰癧疮新久远近不已者

乳香【一钱】砒霜【一钱】礞砂【一钱半】红娘子【一十四个去翅足】黄丹【半钱】

右为末糯米粥和作饼子如折三钱厚小铜钱里卷大破疮上白麪糊如不破者炙柴炷大者不过一月其瘰癧核自下

後歛疮生肌药 黄蘗【不以多少】

为细末麪糊涂患处甚妙

五香丸 治一切恶疮瘰癧结核无首尾及诸疮肿沉香 木香 鷄舌香【各一两】 薰陆香 麝香【各三钱】 连翘【一两半】

右研为细末每服二钱水一盏煎至六分不拘时

紫参丸 治热毒瘰癧肿痛已内消疮已破出脓水服此药

紫参 苦参【各一钱剉】 连翘【二两】 丹参【一两半】 膩粉【三钱】 麝香【三钱别研】 滑石【二两】

右为末别用玄参一筋捣碎以酒三碗浸三日揉取汁去滓用皂角子三伯枚煨熟捣为末用玄参酒熬皂子未成膏和前药如桐子大每服一丸以黄耆汤下一日加一丸至患人岁数即止如四十则二十每日却减一丸疮自乾有结内消

麝香雄黄散 治十七般恶虫咬伤人及疮肿者麝香 雄黄 乳香 硃砂【各二钱】 土蜂窠 露蜂窠【烧灰】

右研为细末以醋调少许涂咬着处或不辩认得多凝是恶疮三五日不疗即毒入心难瘥忌鷄鱼油腻物

硃砂散 治一切疔疮

硃砂 雄黄 天南星 砒霜【各等分】 麝香【少许】

右研为细末用竹针针开用药到黄水出疮已

圣力散 治诸疔疮肿

草乌头 白及 白歛 木鼈子【去皮】 地龙 金毛狗脊【各二钱半】 麝香【三钱】 黄丹【少许】

右研为细末用针针到生肉痛者用药黄水出为度

川山甲散 治一切通气破疮肿行脓血如神效川山甲 木鼈子
乌龙角【各等分都烧存性】

右为末每服一钱半空心热酒调下至中午疮破脓血便行

守瘰丸 治瘰瘤结硬

通草【二两】杏仁【一大合去皮尖研】牛蒡子【一合出油】吴射干
昆布【去咸】呵梨勒 海藻【各四两去咸】

右为末炼蜜为丸如弹子大含化咽津下日进三服

鬼代丹 治打着不痛

无名异【研】没药【研】乳香【研】自然铜【醋淬研】地龙【去】木鼈子【去殼各
等分】

右为末炼蜜为丸如弹子大温酒下一丸打不痛

龙脑润肌散 治杖疮热毒疼痛

黄丹【一两】蜜陀僧【半两】轻粉【一钱半】麝香【半两】龙脑【一字】

右为细末掺药在疮上用青白子涂之内留一眼子

香药丸 治瘰癧疮

硃砂 乳香 没药 半夏 轻粉 赤石脂【各等分】

右为末糯米粉为丸如桐子大每服十丸加至二十丸皂角子临卧

红玉挺子 治一切牙疳

砒霜【一块皂角子大】黄丹【煨过】鲁土

右为细末餤饼和作剂子任牙

桃花散 治一切疮生肌药

白及 白歛 黄栢 黄连 乳香【别研】 麝香【别研】 黄丹【各等分】

右为细末掺於疮上三二日生肌肉满

追毒散 治生疮发闷吐 霍乱

螺儿青?甘草【各一两】 白矾【二钱半】

右为细末每服一钱新汲水调下立止

胆矾丸 治男子年少而鬓髮班白

土马鬃【烧存性】 石马鬃【烧存性】 半夏【各一两】 生姜【二两】 胡桃【十个】 真胆矾【半两】 川五倍子【一两】

右为末和作一块绢袋子盛如弹子大热酒水各少许浸下药汁淋洗头髮一月神效

伏神散 治胆热多睡神思不安昏闷

伏神【去皮】 麦门冬 地骨皮 茯苓【各一两】 白藓皮 酸枣仁 沙参 甘草【炙半两】

右为末每服三钱水一盏煎至六分去滓食後服

铁脚丸 治大小便不通

皂角【炙去皮不以多少去却子】

右为末酒麪糊为丸如桐子大每服三十丸酒服

全圣散 治小肠膀胱气痛不忍者

地胆【半两去足趺微炒】 滑石【一两】 朱砂【半钱】

右为末每服二钱用苦杖酒调下食前服

琥珀散 治五淋

滑石【二两】 木通 当归 木香 尉金 扁竹【各一两】 琥珀【二两】

右为末每服三五钱用芦苇叶同煎食後日三服

葵子散 治小便不通

葵子 茯苓【去黑皮各等分】

右为末每服四钱水一盏煎三沸食前

倒换散 治无问久新癰閼不通小腹急痛肛门肿疼

大黄【小便不通减半】荆芥穗【大便不通减半各等分】

右件药味各别为末每服一二钱温水调下临时加減服

败毒散 治男子往来寒热妇人产後骨蒸血运大黄 黄药子 紫河车 赤芍药
甘草【各等分】

右为末每服一钱如发热冷水下如发寒煎生姜菰蔞汤同调下此药偏治妇人

补真丹 治男子元藏虚冷兴阳固肾不虚

黑附子【一两煨】阳起石【火烧酒淬三钱】海马【二钱】乳香 雄黄【为衣】血蝎【
各三钱】石莲子【去殼皮心】黑锡【炒去砂子半两】石鷲子【烧以醋淬】麝香【一
分】

右为细末麪糊为丸每服二十丸用五香汤空心下

五香汤

沉香 笏香 乳香 麝香 檀香

右为细末每服半钱煎汤下

新添 一醉乌法治头须白再黑方

诃?勒【十个不去核】醋石榴【三个大者取汁】碌矾【五分】生地黄汁【一升】礞砂
【研】硫黄【研各一钱】

右药同入甕瓶内用二味汁浸密封勿令透气至四十九日後取出其诃子状若黑梅至夜临

卧含一枚咽津到晓烂嚼以酒一盞下之三二日後再服忌葱大蒜萝卜

宣明方论卷十五