

薛氏医案

薛己

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	5
提要	7
卷一	8
卷二	26
卷三	51
卷四	74
卷五	97
卷六	132
卷七	153
卷八	161
卷九	176
卷十	199
卷十一	221
卷十二	236
卷十三	250
卷十四	264
卷十五	282
卷十六	301
卷十七	328
卷十八	341
卷十九	349
卷二十	369
卷二十一	388
卷二十二	406
卷二十三	422
卷二十四	434
卷二十五	448
卷二十六	481
卷二十七	504
卷二十八	537
卷二十九	557
卷三十	570
卷三十一	594
卷三十二	622
卷三十三	653
卷三十四	660

卷三十五	667
卷三十六	674
卷三十七	696
卷三十八	707
卷三十九	721
卷四十	735
卷四十一	745
卷四十二	753
卷四十三	760
卷四十四	772
卷四十五	784
卷四十六	794
卷四十七	806
卷四十八	818
卷四十九	856
卷五十	865
卷五十一	880
卷五十二	885
卷五十三	894
卷五十四	920
卷五十五	937
卷五十六	952
卷五十七	976
卷五十八	999
卷五十九	1.017
卷六十	1.047
卷六十一	1.070
卷六十二	1.092
卷六十三	1.111
卷六十四	1.130
卷六十五	1.153
卷六十六	1.174
卷六十七	1.193
卷六十八	1.214
卷六十九	1.243
卷七十	1.264
卷七十一	1.284
卷七十二	1.312

卷七十三		1.330
卷七十四		1.349
卷七十五		1.365
卷七十六		1.379
卷七十七		1.399

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

钦定四库全书 子部五

薛氏医案 医家类

提要

【臣】等谨案薛氏医案七十七卷明薛己撰己字立斋吴县人是书凡十六种己所自着者为内科摘要二卷女科撮要二卷保婴粹要一卷保婴金镜录一卷原机启微三卷口齿类要一卷正体类要二卷外科枢要四卷疔?机要三卷其订定旧本附以己说者为王履明医杂着六卷陈自明妇人良方二十三卷敖氏伤寒金镜录一卷钱氏小儿直诀四卷其父铠保婴撮要二十卷又陈自明外科精要三卷陈文仲小儿痘疹方论一卷初刻於秀水沈氏板已残缺天啓丁卯朱明为重刻之旧有明纪事一篇载明病困时梦己教以方药服之得愈又梦己求刻此书其事甚怪然精神所注魂魄是凭固亦理之所有不妨存其说也己本?医後乃以内科得名其老也竟以?卒诟之者以为温补之弊终於自戕然己治病务求本原用八味丸六味丸直补真阳真陰以滋化源实自己发之其治病多用古方而出入加減具有至理多在一味间见神明变化之妙厥後赵献可作医贯执其成法遂以八味丸六味丸通治各病甚至以六味丸治伤寒之渴胶柱鼓瑟流弊遂多徐大椿作医贯砭因并集矢於薛氏其实非己本旨不得以李斯之故归罪荀卿也世所行者别有一本益以十四经发挥诸书实非己所着亦非己所校盖坊贾务新耳目滥为增入犹之东垣十书河间六书泛收他家所作以足卷帙固不及此本所载皆己原书矣乾隆四十四年三月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

卷一

钦定四库全书

薛氏医案卷一

明 薛已 撰

内科摘要

元气亏损内伤外感等症【一】

车驾王用之卒中昏愠口眼喎斜痰气上涌咽喉有声六脉沉伏此真气虚而风邪所乘以三生饮一两加人参一两煎服即苏若遗尿手撒口开鼾睡为不治用前药亦有得生者夫前饮乃行经络治寒痰之药有斩关夺旗之功每服必用人参两许驾驱其邪而补助真气否则不惟无益适足以取败矣观先哲用芪附参附等汤其义可见

州判蒋大用形体魁伟中满吐痰劳则头晕所服皆清痰理气余曰中满者脾气亏损也痰盛者脾气不能运也头晕者脾气不能升也指麻者脾气不能周也遂以补中益气加茯苓半夏以补脾土用八味地黄以补土母而愈後惑於乾坤生意方云凡人手指麻软三年後有中风之疾可服搜风天麻二丸以预防之乃朝饵暮服以致大便不禁饮食不进而歿愚谓预防之理当养气血节饮食戒七情远帷幙可也若服前丸以预防适所以招风取中也

一男子卒中口眼喎斜不能言语遇风寒四肢拘急脉浮而紧此手足阳明经虚风寒所乘用秦艽升麻汤治之稍愈乃以补中益气加山梔而痊若舌瘡不能言足痿不能行属肾气虚弱名曰痲症宜用地黄饮子治之然此症皆由将息失宜肾水不足而心火暴盛痰滯於胸也轻者自苏重者或死

一男子体肥善饮舌本硬强语言不清口眼喎斜痰气涌盛肢体不遂余以为脾虚湿热用六君加煨葛根山梔神麴而痊

吾师金宪高如斋自大同回谓余曰吾成风疾矣两腿逸则痿软而无力劳则作痛如针刺脉洪数而有力余告之曰此肝肾陰虚火盛而致痿软无力真病之形作痛如锥邪火之象也用壮水益肾之剂而愈先生曰向寓宦邸皆以为风恨无医药若服风剂岂其然哉乃吾之幸也窃谓前症往往以为风疾辄用发散而促其危者多矣

大尹刘孟春素有痰两臂作麻两目流泪服祛风化痰药痰愈甚臂反痛不能伸手指俱挛余曰麻属气虚因前药而复伤肝火盛而筋挛耳况风自火出当补脾肺滋肾水则风自息热自

退痰自清遂用六味地黄丸补中益气汤不三月而痊

一儒者素勤苦恶风寒鼻流清涕寒禁 喷余曰此脾肺气虚不能实腠理彼不信服祛风之药肢体麻倦痰涎自出殊类中风余曰此因风剂耗散元气陰火乘其土位遂以补中益气加麦门五味治之而愈

外舅年六十余素善饮两臂作痛恪服祛风治痿之药更加麻木?热体软痰涌腿膝拘痛口噤语澁头目晕重口角流涎身如虫行搔起白屑始信谓余曰何也余曰臂麻体软脾无用也痰涎自出脾不能摄也口斜语澁脾气伤也头目晕重脾气?也身如虫行白屑脾气不能营也遂用补中益气加神麴半夏茯苓三十余剂诸症悉退又用参朮煎膏治之而愈

秀才刘允功形体魁伟不慎酒色因劳怒头晕仆地痰涎上涌手足麻痹口乾引饮六脉洪数而虚余以为肾经亏损不能纳气归源而头晕不能摄水归源而为痰阳气虚热而麻痹虚火上炎而作渴用补中益气合六味丸料治之而愈其後或劳役或入房其病即作用前药随愈

宪幕顾斐斋饮食起居失宜左半身并手不遂汗出神昏痰涎上涌王竹西用参芪大补之剂汗止而神思渐清颇能步履後不守禁左腿自膝至足肿胀甚大重坠如石痛不能忍其痰甚多肝脾肾脉洪大而数重按则软濇余朝用补中益气加黄栢知母麦门五味煎送地黄丸晚用地黄丸料加黄栢知母数剂诸症悉退但自弛禁不能全愈耳庠生陈时用素勤苦因劳怒口斜痰盛脉滑数而虚此劳伤中气怒动肝火用补中益气加山梔茯苓半夏桔梗数剂而愈

锦衣杨永兴形体丰厚筋骨软痛痰盛作渴喜饮冷水或用愈风汤天麻丸等药痰热益甚服牛黄清心丸更加肢体麻痹余以为脾肾俱虚用补中益气汤加减八味丸三月余而痊已後连生七子寿踰七旬外科精要云凡人久服加减八味丸必肥健而多子信哉

先母七十有五遍身作痛筋骨尤甚不能伸屈口乾目赤头晕痰壅胸膈不利小便短赤夜间殊甚遍身作痒如虫行用六味地黄丸料加山梔柴胡治之诸症悉愈一男子时疮愈後遍身作痛服愈风丹半身不遂痰涎上涌夜间痛甚余作风客淫气治以地黄丸而愈一老人两臂不遂语言蹇澁服祛风之药筋挛骨痛此风药亏损肝血益增其病也余用八珍汤补其气血用地黄丸补其肾水佐以愈风丹而愈

一妇人因怒吐痰胸满作痛服四物二陈苓连枳殼之类不应更加祛风之剂半身不遂筋渐挛缩四肢痿软日晡益甚内热口乾形体倦怠余以为郁怒伤脾肝气血复损而然遂用逍遥散补中益气汤六味地黄丸调治喜其谨疾年余悉愈形体康健

一妇人脾胃虚弱饮食素少忽痰涌气喘头摇目割手扬足掷难以候脉视其面色黄中见青此肝木乘脾土用六君加柴胡升麻治之而苏更以补中益气加半夏调理而痊

一妇人怀抱郁结筋挛骨痛喉间似有一核服乌药顺气散等药口眼歪斜臂难伸举痰涎愈

甚内热晡热食少体倦余以为郁火伤脾血燥生风所致用加味归脾汤二十余剂形体渐健饮食渐加又服加味逍遥散十余剂痰热少退喉核少利更用升阳益胃汤数剂诸症渐愈但臂不能伸此肝经血少用地黄丸而愈

一产妇筋挛臂软肌肉掣动此气血俱虚而有热用十全大补汤而痊其後因怒而复作用加味逍遥散而愈一产妇两手麻木服愈风丹天麻丸遍身皆麻神思倦怠晡热作渴自汗盗汗此气血俱虚用十全大补加炮姜数剂诸症悉退却去炮姜又数剂而愈但有内热用加味逍遥散数剂而痊

一男子善饮舌本强硬语言不清余曰此脾虚湿热当用补中益气加神麴麦芽乾葛泽泻治之○一妇人善怒舌本强手臂麻余曰舌本属土被木尅制故耳当用六君加柴胡芍药治之○一男子舌下牵强手大指次指不仁或大便秘结或皮肤赤晕余曰大肠之脉散舌下此大肠血虚风热当用逍遥散加槐角秦艽治之○一男子足痿软日晡热余曰此足三阴虚当用六味滋肾二丸补之○一妇人腿足无力劳则倦怠余曰四肢者土也此属脾虚当用补中益气及还少丹主之俱不从余言各执搜风天麻二丸并愈风丹而殒

饮食劳倦亏损元气等症【二】

进士王汝和因劳役失於调养忽然昏愆此元气虚火妄动挟痰而作急令灌童便神思渐爽更用参芪各五钱芎归各三钱玄参柴胡升麻炙草各一钱服之稍定察其形倦甚又以十全大补汤加五味麦门治之而安凡人元气素弱或因起居失宜或因饮食劳倦或因用心太过致遗精白浊自汗盗汗或内热晡热潮热发热或口乾作渴喉痛舌裂或胸乳膨胀脇肋作痛或头颈时痛眩暈目花或心神不宁寤而不寐或小便赤澀茎中作痛或便溺余滴脐腹陰冷或形容不充肢体畏寒或鼻气急促或更有一切热症皆是无根虚火但服前汤固其根本诸症自息若攻其风热则悞矣

光祿高署丞脾胃素虚因饮食劳倦腹痛胸痞误用大黄等药下之谵语烦躁头痛喘汗吐泻频频时或昏愆脉大而无伦次用六君子加炮姜四剂而安但倦怠少食口乾发热六脉浮数欲为泻火之药余曰不时发热是无火也脉浮大是血虚也此因胃虚五脏亏损虚症发见服补胃之剂诸症悉退

大尹徐克明因饮食失宜日晡发热口乾体倦小便赤澀两腿酸痛余用补中益气汤治之彼知医自用四物黄栢知母之剂反头眩目赤耳鸣唇燥寒热痰涌大便热痛小便赤澀又用四物芩连枳实之类胸膈痞满饮食少思汗出如水再用二陈芩连黄栢知母麦门五味言语谵妄两手举拂屡治反甚复求余用参芪各五钱归术各三钱远志茯神酸枣仁炙草各一钱服之熟睡良久四剂稍安又用八珍汤调补而愈夫陰虚乃脾虚也脾为至陰因脾虚而致前症盖脾稟於胃故用甘温之剂以生发胃中元气而除大热胡乃反用苦寒复伤脾血耶若前症果属肾经陰虚亦因肾经阳虚不能生陰耳经云无阳则陰无以生无陰则阳无以化又云虚则补其母当用补中益气六味地黄以补其母尤不宜用苦寒之药世以脾虚误为肾虚辄用

黄栢知母之类反伤胃中生气害人多矣大凡足三陰虛多因饮食劳役以致肾不能生肝肝不能生火而害脾土不能滋化但补脾土则金旺水生水得平而自相生矣

一男子每遇劳役食少胸痞发热头痛吐痰作渴脉浮大余曰此脾胃血虛病也脾属土为至陰而生血故曰陰虛彼不信服二陈黄连枳实厚朴之类诸症益甚又服四物黄栢知母麦門更腹痛作呕脉洪数而无伦次余先用六君加炮姜痛呕渐愈又用补中益气全痊秀才刘贯卿劳役失宜饮食失节肢体倦怠发热作渴头痛恶寒误用人参败毒散痰喘昏愠扬手掷足胸间发癰如蚊所啞余用补中益气加姜桂麦門五味补之而愈

黄武选饮食劳倦发热恶寒或用解表之药益甚再剂昏愠胸发黑癰脉洪数而无力余欲用补中益气之剂不从而歿

一儒者素勤苦因饮食失节大便下血或赤或黯半载之後非便血则盜汗非恶寒则发热血汗二药用之无效六脉浮大心脾则瀦此思伤心脾不能摄血归源然血即汗汗即血其色赤黯便血盜汗皆火之升降微甚耳恶寒发热气血俱虛也乃午前用补中益气以补脾肺之源举下陷之气午後用归脾加麦門五味以补心脾之血收耗散之液不两月而诸症悉愈

癸卯春人日余在下堡顾氏会间有儒者许梅村云舍亲马生者发热烦渴时或头痛昨服发散药反加喘急腹痛其汗如水昼夜谵语余意此劳伤元气误汗所致其腹必喜手按许往询之果然遂与十全大补加附子一钱服之熟睡唤而不醒举家惊惶及觉诸症顿退再剂而痊凡人饮食劳役起居失宜见一切火症悉属内真寒而外假热故肚腹喜煖口畏冷物此乃形气病气俱属不足法当纯补元气为善

一儒者日晡两目紧澁不能瞻视此元气下陷用补中益气倍加参芪数剂全愈

一男子患症同前服黄栢知母之类目疾益甚更加便血此脾气虛不能统血肝气虛不能藏血用补中益气六味地黄以补肝脾生肾水诸症渐愈

一男子饮食劳倦而发寒热右手麻木或悞以为疔毒敷服皆寒凉败毒肿胀重坠面色痿黄肢体倦怠六脉浮大按之如无此脾胃之气虛也询之果是销银匠因热手入水梅银寒凝隧道前药益伤元气故耳遂用补中益气及温和之药煎汤渍手而愈

一儒者修左足伤其大指甲少许不见血不作痛形体如故後因饮食劳倦足重坠微肿痛或昼睡或夜寐其足如故误服败毒之剂寒热肿痛盖脾起於足大指此是脾气虛弱下陷用十全大补汤而愈

余素性爱坐观书久则倦怠必服补中益气加麦門五味酒炒黑黄栢少许方觉精神清妥否则夜间少寐足内酸热若再良久不寐腿内亦然且兼腿内筋似有抽缩意致两腿左右频移展转不安必至倦极方寐此劳伤元气陰火乘虛下注丁酉五十一岁齿缝中有如物塞作胀

不安甚则口舌如有疮然日晡益甚若睡良久或服前药始安至辛丑时五十有五昼间齿缝中作胀服补中益气一剂夜间得寐至壬寅有内艰之变日间虽服前剂夜间齿缝亦胀每至午前诸齿并肢体方得稍健午後仍胀观此可知血气日衰治法不同

脾胃亏损心腹作痛等症【三】

唐仪部胸内作痛月余腹亦痛左关弦长右关弦紧此脾虚肝邪所乘以补中益气加半夏木香二剂而愈又用六君子汤二剂而安此面色黄中见青

仪部李北川常患腹痛每治以补中益气加山梔即愈一日因怒肚腹作痛胸脇作胀呕吐不食肝脉弦紧此脾气虚弱肝火所乘仍用前汤吞左金丸一服而愈此面色黄中见青兼赤

太守朱阳山因怒腹痛作泻或两脇作胀或胸乳作痛或寒热往来或小便不利饮食不入呕吐痰涎神思不清此肝木乘脾土用小柴胡加山梔炮姜茯苓陈皮制黄连一剂即愈【制黄连即黄连吴茱萸等分用热水拌湿□二三日同炒焦取连用后仿此】阳山之内素善怒胸膈不利吐痰甚多吞酸暖腐饮食少思手足发热十余年矣所服非芩连枳实必?苏厚朴左关弦洪右关弦数此属肝火血燥木乘上位朝用六味地黄丸以滋养肝木夕用六君加当归芍药以调补脾土不月而愈癸卯夏患背疽症属虚寒用大温补之药而愈乙巳夏因大怒吞酸暖腐胸腹胀满余以他往旬日或用二陈石膏治之吐涎如涌外热如灼将用滚痰丸下之余到诊之脉洪大按之如无余曰此乃脾胃亏损而发热脾弱而涎泛出也余用六君加姜桂一锤即睡觉而诸症如失又数剂而康

儒者沈尼文内停饮食外感风寒头痛发热恶心腹痛就治敝止余用人参养胃加芎芷麝香附桔梗一剂而愈次日抵家前病仍作腹痛请治以手重按痛即止此客寒乘虚而作也乃以香砂六君加木香炮姜服之睡觉痛减六七去二香再服饮食少进又加黄芪当归少佐升麻而愈

府庠徐道夫母胃脘当心痛剧右寸关俱无左虽有微而似绝手足厥冷病势危笃察其色眼胞上下青黯此脾虚肝木所胜用参术茯苓陈皮甘草补其中气用木香和胃气以行肝气用吴茱萸散脾胃之寒止心腹之痛急与一剂俟滚先服煎熟再进诸病悉愈向使泥其痛无补法而反用攻伐之药祸不旋踵

一妇人怀抱鬱结不时心腹作痛年余不愈诸药不应余用归脾加炒山梔而愈

脾肾虚寒阳气脱陷等症【四】

谭侍御但头痛即吐清水不拘冬夏吃姜便止已三年矣余作中气虚寒用六君加当归黄芪木香炮姜而瘥一儒者四时喜极热饮食或吞酸暖腐或大便不实足指缝湿痒此脾气虚寒下陷用六君加姜桂治之而愈稍为失宜诸疾仍作用前药更加附子钱许数剂不再发

一男子形体倦怠饮食适可足指缝湿痒行坐久则重坠此脾胃气虚而下陷用补中益气加茯苓半夏而愈一男子胸腹胀满手足逆冷饮食畏寒发热吐痰时欲作呕尝服清化痰及二陈枳实之类胸腹膨胀呕吐痰食小便淋漓又用四苓连栝知母车前小便不利诸病益甚余曰此脾胃虚寒无火之症故食入不消而反出遂用八味丸补火以生土用补中益气加姜桂培养中宫生发阳气寻愈

一男子每劳肢体时痛或用清痰理气之剂不劳常痛加以导湿臂痛漫肿形体倦怠内热盗汗脉浮大按之微细此阳气虚寒用补中益气加附子一钱人参五钱肿痛悉愈又以十全大补百余剂而康彼计服过人参一十三斤姜附各斤余

大雅云家母年四十有二嘉靖壬寅七月患脾虚中满痰嗽发热又因湿面冷茶吞酸呕吐絶食误服芩连青皮等药益加寒热口乾流涎不收且作渴闻食则呕数日矣迎先生视之曰脾主涎此脾虚不能约制故涎自出也欲用人参安胃散惑於衆论以为胃经实火宿食治之病日增剧忽思冬瓜食如指甲一块顿发呕吐酸水不止仍服前药愈剧复邀先生视之则神脱脉絶濒死矣惟目睛尚动先生曰寒淫於内治以辛热然药不能下矣急用盐艾附子炒热熨脐腹以散寒回阳又以口气补接母口之气又以附子作饼热贴脐间时许神气少苏以参朮附子为末仍以是药加陈皮煎膏为丸如粟米大入五七粒於口随津液咽下即不呕二日後加至十余粒诸病少退甘涎不止五日後渐服煎剂一二匙胃气少复乃思粥饮後投以参朮等药温补脾胃五十余剂而愈大雅敢述病状之奇用药之神求附卷末一以见感恩之意一以示後之患者当取法於此云尔府学晚生长洲镗潭沈大雅顿首拜书

命门火衰不能生土等症【五】

廷评张汝翰胸膈作痞饮食难化服枳术丸久而形体消瘦发热口乾脉浮大而微用补中益气加姜桂诸症悉退惟见脾胃虚寒遂用八味丸补命门火不月而饮食进三月而形体充此症若不用前丸多变腹胀喘促腿足浮肿小便淋漓等症急用济生加減肾气丸亦有得生者

一儒者虽盛暑喜燃火四肢常欲沸汤渍之面赤吐痰一似实火吐甚宿食亦出惟食椒姜之物方快余谓食入反出乃脾胃虚寒用八味丸及十全大补加炮姜渐愈不月平复

一妇人饮食无过碗许非大便不实必吞酸暖腐或用二陈黄连更加内热作呕余谓东垣先生云邪热不杀谷此脾胃虚弱未传寒中以六君加炮姜木香数剂胃气渐复饮食渐进又以补中益气加炮姜木香茯苓半夏数剂全愈後怒饮食顿少元气顿怯更加发热诚似实火脉洪大而虚两尺如无用益气汤八味丸两月余诸症悉愈

佐云向因失足划然有声坐立久则左足麻木虽夏月足寒如水嘉靖己亥夏月因醉睡觉而饮水复睡遂觉右腹痞结以手摩之腹间沥漉有声热摩则气泄而止每每加剧饮食稍多则作痛泻求治於医令服枳术丸固守勿效甲辰岁求治於立斋先生诊之喟然叹曰此非脾胃病乃命门火衰不能生土虚寒使之然也若专主脾胃误矣可服八味丸则愈予亦敬服果验

盖八味丸有附子医家罔敢轻用夫附子斩关夺旗回生起死非良将莫能用立斋先生今之武侯也家贫不能报德姑序此以记治验嘉靖甲辰十二月望後二日杉墩介庵朱佐顿首拜书

光禄郎子泾面白神劳食少难化所服皆二陈山梔枳实之类形体日瘦饮食日减余谓此脾土虚寒之症法当补土之母彼不信乃径补土以致不起

罗工部仲夏腹恶寒而外恶热鼻吸气而腹觉冷体畏风而恶寒脉大而虚微每次进热粥瓯许必兼食生姜瓯许若粥离火食腹内即冷余曰热之不热是无火也当用八味丸壮火之源以消陰翳彼反服四物玄参之类而歿

工部陈禅亭发热有痰服二陈黄连枳殼之类病益甚甲辰季冬请治其脉左尺微细右关浮大重按微弱余曰此命门火衰不能生土而脾病当补火以生土或可愈也不悟仍服前药脾上愈弱至乙巳閏正月病已革复邀治右寸脉平脱此土不能生金生气絕於内矣辞不治经云虚则补其母实则泻其子凡病在子当补其母况病在母而属不足反泻其子不死何俟

辛丑年余在嘉兴屠渐山第有林二守不时昏愦请余治之谗语不絕脉洪大按之如无此阳虚之症也当用参附汤治之有原医者扬喜而迎曰先得我心之同然遂服之即静睡觉而进食午後再剂神思如故其脉顿敛余返後又诈云用附子多矣吾以黄连解之陰仍用参附汤窃观仲景先生治伤寒云桂枝下咽阳盛乃毙硝黄入胃陰盛乃亡不辯而自明矣吾恐前言致误患者故表而出之

肾虚火不归经发热等症【六】

大尹沈用之不时发热日饮水数碗寒药一剂热渴益甚形体日瘦尺脉洪大而数时或无力王太仆曰热之不热责其无火寒之不寒责其无水又云倏热往来是无火也时作时止是无水也法当补肾用加減八味丸不月而愈

通安桥顾大有父年七十有九仲冬将出少妾入房致头痛发热眩晕喘急痰涎壅盛小便频数口乾引饮遍舌生刺缩斂如荔枝然下唇黑裂面目俱赤烦躁不寐或时喉间如烟火上冲急饮凉茶少解已濒於死脉洪大而无伦且有力扪其身烙手此肾经虚火游行於外投以十全大补加山茱泽泻丹皮山药麦门五味附子一锤熟寐良久脉症各减三四再与八味丸服之诸症悉退後畏冷物而痊

下堡顾仁成年六十有一痢後入房精滑自遗二日方止又房劳感寒怒气遂发寒热右脇痛连心胸腹痞自汗盗汗如雨四肢厥冷睡中惊悸或觉上升如浮或觉下陷如堕遂致废寝或用补药二剂益甚脉浮大洪数按之微细此属无火虚热急与十全大补加山药山茱丹皮附子一剂诸症顿愈而痊此等元气百无一二【二顾是父子也】

一儒者口乾发热小便频浊大便秘结盗汗梦遗遂致废寝用当归六黄汤二剂盗汗顿止用六味地黄丸二便调和用十全大补汤及前丸兼服月余诸症悉愈州同韩用之年四十有六时仲夏色慾过度烦热作渴饮水不絕小便淋沥大便秘结唾痰如涌面目俱赤满舌生刺两唇燥裂遍身发热或时如芒刺而无定处两足心如烙以冰折之作痛脉洪而无伦此肾陰虚阳无所附而发於外非火也盖大热而甚寒之不寒是无水也当峻补其陰遂以加減八味丸料一斤内肉桂一两以水顿煎六碗水冷与饮半饷已用大半睡觉而食温粥一碗复睡至晚乃以前药温饮一碗乃睡至晓食热粥二碗诸症悉退翌日畏寒足冷至膝诸症仍至或以为伤寒余曰非也大寒而甚热之不热是无火也阳气亦虚矣急以八味丸一剂服之稍缓四剂诸症复退大便至十三日不通以猪胆导之诸症复作急用十全大补汤数剂方应

举人陈履贤色慾过度丁酉孟冬发热无时饮水不絕遗精不止小便淋沥或用四物芩连之类前症益甚更加痰涎上涌口舌生疮服二陈黄栢知母之类胸膈不利饮食少思更加枳殼香附肚腹作胀大便不实脉浮大按之微细余朝用四君为主佐以熟地当归夕用加減八味丸更以附子唾津调搽涌泉穴渐愈後用十全大补汤其大便不通小腹作胀此直肠乾澀令猪胆通之形体殊倦痰热顿增急用独参汤而安再用前药而愈但劳发热无时其脉浮洪余谓其当慎起居否则难治彼以余言为迂至乙巳夏复作乃服四物黄栢知母而歿

吴江晚生沈察顿首【云云】仆年二十有六所禀虚弱兼之劳心癸巳春发热吐痰甲午冬为甚其热时起於小腹吐痰而无定时治者谓脾经湿痰郁火用芩连枳实二陈或专主心火用三黄丸之类至乙未冬其热多起足心亦无定时吐痰不絕或遍身如芒刺然治者又以为陰火生痰用四物二陈黄栢知母之类俱无验丙申夏痰热愈甚盗汗作渴果属痰火耶陰虚耶乞高明裁示【云云】余曰此症乃肾经亏损火不归经当壮水之主以镇阳光乃就诊於余果尺脉洪大余卻虚浮遂用补中益气及六味地黄而愈後不守禁其脉复作余谓火令可忧当慎调摄会试且缓但彼忽略至戊戌夏果歿於京

脾胃亏损吞酸暖腐等症【七】

大司马王浚川呕吐宿滯脐腹痛甚手足俱冷脉微细用附子理中丸一服益甚脉浮大按之而细用参附汤一剂顿愈

赵吏部文卿患吐不止吐出皆酸味气口脉大於人迎二三倍速予投剂予曰此食郁上宜吐不须用药乃候其吐清水无酸气寸脉渐减尺脉渐复翌早吐止至午脉俱平复勿药自安後抚陕右过苏顾访倾盖清谈厚过於昔且念余在林下频以言慰之

一儒者面色痿黄胸膈不利吞酸暖腐恪服理气化痰之药大便不实食少体倦此脾胃虚寒用六君加炮姜木香渐愈更兼用四神丸而元气复此症若中气虚弱者用人参理中汤或补中益气加木香乾姜不应送左金丸或越鞠丸若中气虚寒必加附子或附子理中汤无有不愈

一上舍饮食失宜胸腹膨胀暖气吞酸以自知医用二陈枳实黄连苍术黄柏之类前症益甚更加足指肿痛指缝出水余用补中益气加茯苓半夏治之而愈若腿足浮肿或焮肿寒热呕吐亦用前药

儒者胡济之塲屋不利胸膈膨闷饮食无味服枳术丸不时作呕用二陈黄连枳实痰涌气促加紫苏枳壳喘嗽腹胀加厚朴腹皮小便不利加槟榔蓬术泄泻腹痛悉属虚寒用六君加姜桂二剂不应更加附子一钱二剂稍退数剂十愈六七乃以八味丸全愈

一上舍呕吐痰涎发热作渴胸膈痞满或用清气化痰降火前症益甚痰涎自出余曰呕吐痰涎胃气虚寒发热作渴胃不生津胸膈痞满脾气虚弱须用参芪归术之类温补脾胃生发阳气诸病自退彼不信仍服前药虚症悉至复请治余曰饮食不入吃逆不絶泄泻腹痛手足逆冷是谓五虚烦热作渴虚阳越於外也脉洪大脉欲絶也死期迫矣或曰若然殁於日乎夜乎余曰脉洪大当殁於昼果然

余母太宜人年六十有五己卯春二月饮食後偶闻外言忤意呕吐酸水内热作渴饮食不进惟饮冷水气口脉大而无伦面色青赤此胃中湿热郁火投之以药入口即吐第三日吐酸物第七日吐酸黄水十一日吐苦水脉益洪大仍喜冷水以黄连一味煎汤冷饮少许至二十日加白术白茯苓至二十五日加陈皮三十七日加当归炙甘草至六十日始进清米饮半盏渐进薄粥饮调理得痊

一妇人吞酸暖腐呕吐痰涎面色纯白或用二陈黄连枳实之类加发热作渴肚腹胀满余曰此脾胃亏损未传寒中不信仍作实治肢体肿胀如蛊余以六君加附子木香治之胃气渐醒饮食渐进虚火归经又以补中益气加炮姜木香茯苓半夏兼服全愈

一妇人性沉静多虑胸膈不利饮食少思腹胀吞酸面色青黄用疎利之剂余曰此脾虚痞满当益胃气不信仍用之胸膈果满饮食愈少余以调中益气加香砂炮姜渐愈後以六君芎归贝母桔梗炮姜而愈

仙云家母久患心腹疼痛每作必胸满呕吐厥逆面赤唇麻咽乾舌燥寒热不时而脉洪大衆以痰火治之屡止屡作迨乙巳春发热频甚用药反剧有朱存默氏谓服寒凉药所致欲用参术等剂余疑痛无补法乃请立斋先生以折中焉先生诊而叹曰此寒凉损真之故内真寒而外假热也且脉息弦洪而有怪状乃脾气亏损肝脉乘之而然惟当温补其胃遂与补中益气加半夏茯苓吴茱萸木香一服而效家母病发月余竟夕不安今熟寐彻晓洪脉顿敛怪脉顿除诸症释然先生之见盖有本欵家母余龄皆先生所赐杏林报德没齿不忘谨述此乞附医案谅有太史者采入仓公诸篇以垂不朽将使後者观省焉嘉靖乙巳春月吉日陈湖眷生陆仙顿首谨书

一妇人年三十余忽不进饮食日饮清茶三五碗并少用水果三年余矣经行每次过期而少余以为脾气郁结用归脾加吴茱萸不数剂而饮食如常若人脾肾虚而不饮食当以四神丸治

之

一妇人年踰二十不进饮食二年矣日饮清茶果品之类面部微黄浮肿形体如常仍能步履但体倦怠肝脾二脉弦浮按之微而结滞余用六君加木香吴茱下痰积甚多饮食顿进形体始瘦卧床月余仍服六君之类而安

妇人患此见女科撮要

脾肾亏损停食泄泻等症【八】

进士刘华甫停食腹痛泻黄吐痰服二陈山栀黄连枳实之类其症益甚左关弦紧右关弦长乃肝木尅脾土用六君加木香治之而愈若食已消而泄未已宜用异功散以补脾胃如不应用补中益气升发阳气凡泄利色黄脾土亏损真气下陷必用前汤加木香肉蔻温补如不当补其母宜八味丸

光禄柴黼庵善饮泄泻腹胀吐痰作呕口乾此脾胃之气虚先用六君加神麴痰呕已止再用补中益气加茯苓半夏泻胀亦愈此症若湿热壅滞当用葛花解酲汤分消其湿湿既去而泻未已须用六君加神麴实脾土化酒积然虽为酒而作实因脾土虚弱不可专主湿热旧僚钱可久素善饮面赤痰盛大便秘此肠胃湿痰壅滞用二陈芩连山栀枳实乾葛泽泻升麻一剂吐痰甚多大便始实此後日以黄连三钱泡汤饮之而安但如此稟厚者不多耳

一儒者善饮便溺溇食减胸满腿足渐肿症属脾肾虚寒用加减金匱肾气丸食进肿消更用八味丸胃强脾健而愈

一男子清晨或五更吐痰或有酸味此是脾气虚弱用六君送四神丸而愈若脾气郁滞用二陈加桔梗山栀送香连丸若郁结伤脾用归脾汤送香连丸若胸膈不舒归脾加柴胡山栀送左金丸若胃气虚津液不能运化用补中益气送左金丸

一羽士停食泄泻自用四苓黄连枳实麴蘖益甚余曰此脾肾泄也当用六君加姜桂送四神丸不信又用沉香化气丸一服卧床不食咳则粪出几至危殆终践余言而愈盖化气之剂峻厉猛烈无经不伤无脏不损岂宜轻服

嘉靖乙未绍患肝木克脾面赤生风大肠燥结炎火冲上久之遂致脏毒下血肠鸣溇泄腹胀喘急驯至絶谷濒于殆矣诸医方以枳实黄连之剂投之展转增剧乃求治于立斋先生先生曰尔病脾肾两虚内真寒而外虚热法当温补遂以参术为君山药黄芪肉果姜附为臣茱萸骨脂五味归苓为佐治十剂俾以次服之诸医皆曰此火病也以火济火可乎绍雅信先生不为动服之浹旬尽剂而血止诸疾遄已先是三年前先生过绍谓曰尔面部赤风脾胃病也不治将深予心忧之而怠缓以须疾发又惑於衆论几至不救微先生吾其土矣呜呼先生之术亦神矣哉绍无以报盛德敬述梗槩求附案末以为四方抱患者告庶用垂惠於无穷云长洲

朱绍

脾胃亏损停食痢疾等症【九】

崔司空年踰六旬患痢赤白里急後重此湿热壅滯用芍药汤内加大黄二钱一剂减半又剂全愈惟急重未止此脾气下陷用补中益气送香连丸而愈

罗给事小腹急痛大便欲去不去此脾肾气虚而下陷也用补中益气送八味丸二剂而愈此等症候因痢药致损元气肢体肿胀而死者不可枚举少宗伯顾东江停食患痢腹痛下坠或用疎导之剂两足胀肿食少体倦烦热作渴脉洪数按之微细余以六君加姜桂各二钱吴茱萸五味各一钱煎熟冷服之即睡觉而诸症顿退再剂全退此假热而治以假寒也

太常边华泉呕吐不食腹痛後重自用大黄等药一剂腹痛益甚自汗发热昏愤脉大余用参术各一两炙甘草炮姜各三钱升麻一钱一锤而苏又用补中益气加炮姜二剂而愈

廷评曲汝为食後入房翌午腹痛去後似痢非痢次日下皆脓血烦热作渴神思昏倦用四神丸一服顿减又用八味丸料加五味吴茱萸骨脂肉?二剂全愈

判官汪天锡年六十余患痢腹痛後重热渴引冷饮食不进用芍药汤内加大黄一两四剂稍应仍用前药大黄或半数剂而愈此等元气百无一二

通府薛允頤下血服犀角地黄汤等药其血愈多形体消瘦发热少食里急後重此脾气下陷余用补中益气加炮姜一剂而愈

一上舍患痢後重自知医用芍药汤後重益甚饮食少思腹寒肢冷余以为脾胃亏损用六君加木香炮姜二剂而愈

一老人素以酒乳同饮去後似痢非痢胸膈不寬用痰痢等药不效余思本草云酒不与乳同饮为得酸则凝结得苦则行散遂以茶茗为丸时用清茶送三五十丸不数服而瘥

一老妇食後因怒患痢里急後重属脾气下陷与大剂六君加附子肉?煨木香各一钱吴茱萸五分骨脂五味各一钱五分二剂诸症悉退惟小腹胀闷此肝气滯於脾也与调中益气加附子木香五分四剂而愈後口内觉鹹此肾虚水泛与六味地黄丸二剂顿愈

先母年八十仲夏患痢腹痛作呕不食热渴引汤手按腹痛稍止脉鼓指而有力真气虚而邪气实也急用人参五钱白术茯苓各三钱陈皮升麻附子炙甘草各一钱服之睡觉索食脉症顿退再剂而安此取症不取脉也凡暴病毋论其脉当从其症时石阁老太夫人其年岁脉症皆同彼乃专治其痢遂致不起

橫金陈梓园年六十面带赤色吐痰口乾或时作泻癸卯春就诊谓余曰仆之症或以为脾经湿热痰火作泻率用二陈黄连枳实神麴麦芽白术柴胡之类不应何也余脉之左关弦紧肾水不能生肝木也右关弦大肝木乘尅脾土也此乃脾肾亏损不能生尅制化当滋化源不信余谓其甥朱太守阳山曰令舅不久当殁於痢至甲辰夏果患痢而歿

产後痢疾见女科撮要

脾胃亏损症疾寒热等症【十】

冬官朱省庵停食感寒而患症自用清脾截症二药食後腹胀时或作痛服二陈黄连枳实之类小腹重坠腿足浮肿加白术山查吐食未化谓余曰何也余曰食後胀痛乃脾虚不能尅化也小腹重坠乃脾虚不能升举也腿足浮肿乃脾虚不能运行也吐食不消乃脾胃虚寒无火也治以补中益气加吴茱炮姜木香肉桂一剂诸症顿退饮食顿加不数剂而痊大凡停食之症宜用六君枳实厚朴若食已消而不愈用六君子汤若内伤外感用藿香正气散若内伤多而外感少用人参养胃汤若劳伤元气兼外感用补中益气加川芎若劳伤元气兼停食补中益气加神麴陈皮若气恼兼食用六君加香附山梔若咽酸或食後口酸当节饮食病作时大热躁渴以姜汤乘热饮之此截症之良法也每见发时饮啖生冷物者病或少愈多致脾虚胃损往往不治大抵内伤饮食者必恶食外感风寒者不恶食审系劳伤元气虽有百症但用补中益气汤其病自愈其属外感者主以补养佐以解散其邪自退若外邪既退即补中益气以实其表若邪去而不实其表或过用发表亏损脾胃皆致绵延难治凡此不问陰阳日夜所发皆宜补中益气此不截之截也夫人以脾胃为主未有脾胃实而患症痢者若专主发表攻里降火导痰是治其末而忘其本前所云乃症之大略如不应当分六经表里而治之说见各方

大尹曹时用患症寒热用止截之剂反发热恶寒饮食少思神思甚倦其脉或浮洪或微细此阳气虚寒余用补中益气内参芪归术各加三钱甘草一钱五分加炮姜附子各一钱一剂而寒热止数剂而元气复

一儒者秋患寒热至春未愈胸痞腹胀余用人参二两生姜二两煨熟煎顿服寒热即止更以调中益气加半夏茯苓炮姜数剂元气顿复後任县尹每饮食劳倦疾作服前药即愈大凡久症乃至元气虚寒盖气虚则寒血虚则热胃虚则恶寒脾虚则发热陰火下流则寒热交作或吐涎不食泄泻腹痛手足逆冷寒战如栗若误投以清脾截症二饮多致不起

一上舍每至夏秋非停食作泻必症痢霍乱遇劳吐痰头眩体倦发热恶寒用四物二陈芩连枳实山梔之类患症服止截之药前症益甚时或遍身如芒刺然余以补中益气加茯苓半夏内参芪各用三钱归术各二钱十余剂少愈若间断其药诸病仍至连服三十余剂全愈又服还少丹半载形体充实

一妇人症久不愈发後口乾倦甚用七味白术散加麦门五味作大剂煎与恣饮再发稍可乃用补中益气加茯苓半夏十余剂而愈凡截症余常以参术各一两生姜四两煨熟煎服即止

或以大剂补中益气加煨姜尤效生姜一味亦效

东洞庭马志卿症後形体骨立发热恶寒食少体倦用补中益气内参芪归术各加三钱甘草一钱五分炮姜二钱一剂而寒热止数剂而元气复

一妇人久患寒热服清脾饮之类胸膈饱胀饮食减少余用调中益气加茯苓半夏炮姜各一钱二剂而痊一妇人劳役停食患症或用消导止截饮食少思体瘦腹胀余以补中益气倍用参芪归术甘草加茯苓半夏各一钱五分炮姜五钱一剂顿安又以前药炮姜用一钱不数剂元气复而全愈

产後症疾见女科撮要

脾肺亏损咳 痰喘等症【十一】

大参李北泉时唾痰涎内热作渴肢体倦怠劳而足热用清气化痰益甚余曰此肾水泛而为痰法当补肾不信另进滚痰丸一服吐泻不止饮食不入头晕眼闭始信余用六君子汤数剂胃气渐复却用六味丸月余诸症悉愈

鸿胪苏龙溪咳 气喘鼻塞流涕余用参苏饮一剂以散寒邪更用补中益气汤以实腠理而愈後因劳怒仍作自用前饮益甚加黄连枳实腹胀不食小便短少服二陈四苓前症愈剧小便不通余曰腹胀不食脾胃虚也小便短少肺肾虚也悉因攻伐所致投以六君加黄芪炮姜五味二剂诸症顿退再用补中益气加炮姜五味数剂全愈

地官李北川每劳咳 余用补中益气汤即愈一日复作自用参苏饮益甚更服人参败毒散项强口噤腰背反张余曰此误汗亡津液而变瘥矣仍以前汤加附子一钱四剂而痊感冒咳若误行发汗过多喘促呼吸不利吐痰不止必患肺痈矣

侍御谭希曾咳 吐痰手足时冷余以为脾肺虚寒用补中益气加炮姜而愈

职方王用之喘 作渴面赤鼻乾余以为脾肺有热用二陈加芩连山梔桔梗麦门而愈

金宪阮君聘咳 面白鼻流清涕此脾肺虚而兼外邪用补中益气加茯苓半夏五味治之而愈又用六君芎归之类而安

司厅陈国华素陰虚患咳 以自知医用发表化痰之剂不应用清热化痰等药其症愈甚余曰此脾肺虚也不信用牛黄清心丸更加胸腹作胀饮食少思足三陰虚症悉见朝用六君桔梗升麻麦门五味补脾土以生肺金夕用八味丸补命门火以生脾土诸症渐愈经云不能治其虚安问其余此脾上虚不能生肺金而金病复用前药而反泻其火吾不得而知也

中书鲍希伏素陰虛患咳 服清氣化痰丸及二陳苓連之類痰益甚用四物黃柏知母玄參之類腹脹咽啞右關脈浮弦左尺脈洪大余曰脾土既不能生肺金陰火又從而克之當滋化源朝用補中益氣加山茱麥門五味夕用六味地黃加五味子三月余喜其慎疾得愈武選汪用之飲食起居失宜咳 吐痰用化痰發散之藥時仲夏脈洪數而無力胸滿面赤吐痰腥臭汗出不止余曰水泛為痰之症而用前劑是謂重亡津液得非肺癰乎不信仍服前藥翌日果吐膿脈數左三右寸為甚始信用桔梗湯一劑膿數頓止再劑全止面色頓白仍於忧惶余曰此症面白脈濇不治自愈又用前藥一劑佐以六味丸治之而痊

錦衣李大用素不慎起居吐痰自汗咳 發熱服二陳苓連枳殼山梔之類前症不減飲食少思用四物二陳苓連黃柏知母玄參之類前症愈甚更加胸腹不利飲食益少內熱晡熱加桑皮紫蘇杏仁紫苑桔梗之類胸膈膨脹小便短少用豬苓澤瀉白朮茯苓枳殼青皮半夏黃連蘇子胸膈痞滿脇肋膨脹小便不通加茵陳葶苈喘促不卧飲食不進余診之六脈洪數肺腎二部尤甚余曰脾土既不能生肺金而心火又乘之此肺癰之作也當滋化源緩則不救不信後唾膿痰復求治余曰胸膈痞滿脾土敗也喘促不卧肺金敗也小便不通腎水敗也脇肋膨脹肝木敗也飲食不化心火敗也此化源既絕五臟已敗然藥豈能生耶已而果然

絲客姚荃者素郁怒年近六十脾胃不健服香燥行氣飲食少思兩脇脹悶服行氣破血飲食不入右脇脹痛喜用手按彼疑為膈氣痰飲內傷余曰乃肝木剋脾土而脾土不能生肺金也若內有瘀血雖單衣亦不敢著肉用滋化源之藥四劑諸症頓退彼以為愈余曰火令在還當補脾土以保肺金彼不信後復作另用痰火之劑益甚求治左關右寸滑數此肺內潰矣仍不信乃服前藥果吐穉膿而歿

學士吳北川過飲痰壅舌本強硬服降火化痰藥痰氣益甚肢體不遂余作脾虛濕熱治之而愈

上舍史瞻之每至春咳 用參蘇飲加苓連桑杏乃愈乙巳春患之用前藥益甚更加喉瘡就治左尺洪數而無力余曰此是腎經陰火刑剋肺金當滋化源遂以六味丸料加麥門五味炒梔及補中益氣湯而愈

儒者張克明咳 用二陳苓連枳殼胸滿氣喘侵晨吐痰加蘇子杏仁口出痰涎口乾作渴余曰侵晨吐痰脾虛不能消化飲食胸滿氣喘脾虛不能生肺金涎沫自出脾虛不能收攝口乾作渴脾虛不能生津液遂用六君加炮姜肉果溫補脾胃更用八味丸以補土母而愈一男子夏月吐痰或 用胃火藥不應余以為火乘肺金用麥門冬湯而愈後因勞復 用補中益氣加桔梗山梔片苓麥門五味而愈但口乾體倦小便赤濇日用生脈散而痊若咳而屬胃火有痰宜竹葉石膏湯胃氣虛宜補中益氣加貝母桔梗若陰火上沖宜生脈散送地黃丸以保肺氣生腎水此乃真臟之患非滋化源決不能愈

一婦人患咳 脇痛發熱日晡益甚用加味逍遙散熟地治之而愈年余因怒氣勞役前症仍作又太陽痛或寒熱往來或咳 遺尿皆屬肝火血虛陰挺痿痺用前散及地黃丸月余而痊

表弟妇咳 发热呕吐痰涎日夜约五六碗喘 不宁胸痞躁渴饮食不进崩血如涌此命门火衰脾土虚寒用八味丸及附子理中汤加减治之而愈【详见妇人血崩】一妇人不得於姑患咳胸膈不利饮食无味此脾肺俱伤痰郁於中先用归脾汤加山梔抚芎贝母桔梗诸症渐愈後以六君加芎归桔梗间服全愈

一妇人咳 早间吐痰甚多夜间喘急不寐余谓早间多痰乃脾虚饮食所化夜间喘急乃肺虚陰火上冲遂用补中益气加麦门五味而愈

一妇人饮食後因怒患症呕吐用藿香正气散二剂而愈後复怒吐痰甚多狂言热炽胸脇胀痛手按少止脉洪大无伦按之微细此属肝脾二经血虚以加味逍遥散加熟地川芎二剂脉症顿退再用十全大补而安此症若用疎通之剂是犯虚虚之戒矣

上舍陈道复长子亏损肾经久患咳 午後益甚余曰当补脾土滋化源使金水自能相生时孟春不信乃服黄栢知母之类至夏吐痰引饮小便频数面目如绯余以白术当归茯苓陈皮麦门五味丹皮泽泻四剂乃以参芪熟地山茱为丸俾服之诸症顿退复请视余以为信遂用前药如常与之彼仍泥不服卒致不起

产後咳 见女科撮要

各症方药【十二】

四物汤 治肝脾肾血虚发热或日晡热甚头目不清或烦躁不寐胸膈作胀或脇作痛宜用此汤若脾气虚而不能生血宜用四君子汤若脾气郁而虚宜用归脾汤若肾水涸而不能生肝血宜用六味丸当归【三钱】熟地黄【三钱】芍药【二钱】川芎【一钱五分】

右水煎服

加味四物汤即前方加白术茯苓柴胡丹皮

四君子汤 治脾胃虚弱饮食少进或肢体肿胀肚腹作痛或大便不实体瘦面黄或胸膈虚痞痰 吞酸若因脾胃虚寒而致宜香砂六君子若因脾经郁结而致宜归脾汤若因肝木侮脾胃而致宜用六君加木香芍药若命门火虚而致宜用八味丸

人参 白术 茯苓【各二钱】甘草【炙一钱】

右姜枣水煎服

异功散 治久咳不已或腹满少食或面肿气逆又治脾胃虚弱饮食少思等症即前方加陈皮

六君子汤即四君子加半夏陈皮 治脾胃虚弱饮食少思或久患疟痢若见内热或饮食难化作酸乃属虚火须加炮姜其功甚速

香砂六君子汤即前方加香附藿香砂仁

人参理中汤 治脾胃虚弱饮食少思或去後无度或呕吐腹痛或饮食难化胸膈不利或疟疾中气虚损久不能愈或中气虚弱痰气不利口舌生疮加附子名附子理中汤治中气虚寒而患前症又治入房腹痛手足逆冷或犯寒气或食冷物

人参 白术 乾姜【炮】 甘草【炙各等分】

右每服五七钱或一两水煎服

附子理中汤

治脾胃虚寒手足厥冷饮食不入或肠鸣切痛呕逆吐泻即前方加附子等分照前服

八珍汤 治气血虚弱恶寒发热烦躁作渴或不时寒热眩晕昏愤或大便不实小便赤淋或饮食少思小腹胀痛等症即四物四君合方

十全大补汤 即八珍加黄芪肉桂治症同前又治遗精白浊自汗盗汗或内热晡热潮热发热或口乾作渴喉痛舌裂或胸乳膨胀脇肋作痛或脐腹陰冷便溺余滴或头颈时痛眩晕目花或心神不宁寤而不寐或形容不充肢体作痛或鼻吸气冷急趋气促此皆是无根虚火但服此药诸症悉退

人参养荣汤 治脾肺俱虚发热恶寒四肢倦怠肌肉消瘦面黄短气食少作泻若气血虚而变见诸症莫能名状勿论其病勿论其脉但用此汤其病悉退白芍药【钱半】 人参 陈皮 黄芪【蜜炙】 桂心 当归 白术 甘草【炙各一钱】 熟地黄 五味子【炒杵】 茯苓【各七分半】 远志【五分】

右姜枣水煎服

当归补血汤 治气血俱虚肌热恶寒面目赤色烦渴引饮脉洪大而虚重按似无此脉虚血虚也此病多有得於饥饱劳役者

黄芪【炙一两】 当归【二钱酒制】

右水煎服

当归六黄汤

当归 黄芪【炒】 生地黄 熟地黄【各一钱】 黄芩 黄连 黄柏【各炒焦五分】

独参汤 治一切失血恶寒发热作渴烦躁盖血生於气故血脱补气阳生陰长之理也

人参【二两】

右枣十枚水煎服

归脾汤 治思虑伤脾不能摄血致血妄行或健忘怔忡惊悸盗汗或心脾作痛嗜卧少食大便不调或肢体重痛月经不调赤白带下或思虑伤脾而患疟痢人参 白术 白茯苓 龙眼肉 酸枣仁 黄芪【各二钱】 远志 当归【各一钱】 木香 甘草【炙各五分】

右姜枣水煎服

加味归脾汤即前方加柴胡山梔

加减八味丸 治肾水不足虚火上炎发热作渴口舌生疮或牙龈溃烂咽喉作痛或形体憔悴寝汗发热五脏齐损即六味丸加肉桂一两

六味丸【一名地黄丸一名肾气丸】 治肾经不足发热作渴小便淋秘气壅痰 头目眩晕眼花耳聋咽燥舌痛齿牙不固腰腿痿软自汗盗汗便血诸血失音水泛为痰血虚发热等症其功不能尽述

熟地黄【八两杵膏】 山茱萸肉 乾山药【各四两】 牡丹皮 白茯苓 泽泻【各三两】

右各另为末和地黄加炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前滚汤下

八味丸 治命门火衰不能生土以致脾胃虚寒饮食少思大便不实脐腹疼痛夜多漩溺等症即六味丸加肉桂附子各一两

补中益气汤 治中风虚弱四肢倦怠口乾发热饮食无味或饮食失节劳倦身热脉洪大无力或头痛恶寒自汗或气高而喘身热而烦脉微细软弱自汗体倦少食或气虚不能摄血或饮食劳役而患疟痢等症因脾胃虚而久不能愈或元气虚弱感冒风寒不胜发表宜用此代之若病後脾胃久虚四脏不能相生或洒淅恶寒情惨惨不乐目慌慌不明阳气郁遏者急加附子以回阳

黄芪【炙一钱五分】 甘草【炙】 人参 当归【酒拌】 白术【炒各一钱】 升麻 柴胡【各三分】 陈皮【一钱】

余方见下卷

薛氏医案卷一

卷二

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二

明 薛己 撰

内科摘要

脾肾亏损头眩痰气等症

阁老梁厚斋气短有痰小便赤澹足跟作痛尺脉浮大按之则澹此肾虚而痰饮也用四物送六味丸不月而康仲景先生云气虚有饮用肾气丸补而逐之诚开后学之蒙瞶济无穷之夭枉肾气丸即六味也

都宪孟有涯气短痰晕服辛香之剂痰盛遗尿两尺浮大按之如无余以为肾家不能纳气归源香燥致甚耳用八味丸料三剂而愈

孙都宪形体丰厚劳神善怒面带阳色口渴吐痰或头目眩晕或热从腹起左三脉洪而有力右三脉洪而无力余谓足三阴亏损用补中益气加麦门五味及加减八味丸而愈若人少老态不耐寒暑不胜劳役四时迭病皆因少时气血方长而劳心亏损或精血未满而御女过伤故其见症难以悉状此精气不足但滋化源其病自痊又若饮食劳役七情失宜以致诸症亦当治以前法设或六淫所侵而致诸症亦因真气内虚而外邪乘袭尤当固胃气为主盖胃为五脏之根本故黄栢知母不宜轻用恐复伤胃气也大凡杂症属内因乃形气病气俱不足当补不当泻伤寒虽属外因亦宜分其表里虚实治当审之

昌平守王天成头晕恶寒形体倦怠得食稍愈劳而益甚寸关脉浮大此脾肺虚弱用补中益气加蔓荆子而愈後因劳役发热恶寒谵言不寐得食稍安用补中益气汤而痊

大尹祝支山因怒头晕拘内筋挛时或寒热日晡热甚此肝火筋挛气虚头晕用八珍加柴胡山梔牡丹皮二十余剂而愈

上舍顾桐石会饮於周上舍第问余曰向孟有涯陈东谷俱为无嗣纳宠已而得疾皆头晕吐痰并用苏合香丸惟有涯得生何也余曰二症因肾虚不能纳气而为头晕不能制水而为痰涎东谷专主攻痰行气有涯专於益火补益故耳後余应杭人之请桐石房劳过度亦患前症

或用清气化痰愈甚顾曰我病是肾虚不能纳气归源治者不悟而歿惜哉

一男子素厚味胸满痰盛余曰膏粱之人内多积热与法制清气化痰丸而愈彼为有验修合
馈送脾胃虚者无不受害

先兄体貌丰伟唾痰甚多脉洪有力殊不耐劳遇风头晕欲仆口舌破裂或至赤烂误食姜蒜
少许口疮益甚服八味丸及补中益气加附子钱许即愈停药月余诸症仍作此命门虚火不
归源也

肝肾亏损血燥结核等症【二】

儒者杨泽之性躁嗜色缺盆结一核此肝火血燥筋挛法当滋肾水生肝血不信乃内服降火
化痰外敷南星商陆转大如碗余用补中益气及六味地黄间以芦荟丸年余元气渐复而肿
消

一男子素善怒左项微肿渐大如升用清痰理气而大热作渴小便频浊余谓肾水亏损用六
味地黄补中益气而愈亦有胸脇等处大如升斗或破而如菌如榴不问大小俱治以前法

一男子颈间结核大溃年余一男子眉间一核初如豆粒二年渐大如桃悉用清肝火养肝血
益元气而愈举人江节夫颈臂脇肋各结一核恪服祛痰降火软坚之剂益甚余曰此肝胆经
血少而火燥也彼执前药至明年六月各核皆溃脉浮大而濇余断以秋金将旺肝木被尅必
不起後果然

脾肾亏损小便不利肚腹膨胀等症【三】

大尹刘天锡内有湿热大便滑利小便濇滯服淡渗之剂愈加滴沥小腹腿膝皆肿两眼胀痛
此肾虚热在下焦淡渗导损阳气陰无以化遂用地黄滋肾二丸小便如故更以补中益气加
麦门五味兼服而愈

州守王用之先因肚腹膨胀饮食少思服二陈枳实之类小便不利大便不实咳痰腹胀用淡
渗破气之剂手足俱冷此足三陰虚寒之症也用金匱肾气丸不月而康

州同刘禹功素不慎起居七情以致饮食不甘胸膈不利用消导顺气肚腹痞闷吐痰气逆用
化痰降火食少泄泻小腹作胀用分利降火小便濇滯气喘痰涌服清气化痰丸小便愈滯大
便愈泻肚腹胀大肚脐突出不能寝卧六脉微细左寸虚甚右寸短促此命门火衰脾肾虚寒
之危症也先用金匱加减肾气丸料内桂附各一钱五分二剂下瘀秽甚多又以补中益气送
二神丸二剂诸症悉退五六又用前药数剂并附子之类贴腰脐及涌泉穴寸脉渐复而安後
因怒腹闷惑於人言服沉香化气丸大便下血诸症悉至余曰此陰络伤也辞不治果歿

一富商饮食起居失宜大便乾结常服润肠等丸後胸腹不利饮食不甘口乾体倦发热吐痰服二陈黄连之类前症益甚小便滴沥大便泄泻腹胀少食服五苓?麦之类小便不通体肿喘嗽用金匱肾气丸补中益气汤而愈

一儒者失於调养饮食难化胸膈不利或用行气消导药咳嗽喘促服行气化痰药肚腹渐胀服行气分利药睡卧不能两足浮肿小便不利大便不实脉浮大按之微细两寸皆短此脾肾亏损朝用补中益气加姜附夕用金匱肾气加骨脂肉果各数剂诸症渐愈再佐以八味丸两月乃能步履却服补中八味半载而康

一男子素不善调摄睡痰口乾饮食不美服化痰行气之剂胸满腹膨痰涎愈盛服导痰理脾之剂肚腹膨胀二便不利服分气利水之剂腹大脇痛睡卧不得服破血消导之剂两足皆肿脉浮大不及於寸口朝用金匱加减肾气丸夕用补中益气汤煎送前丸月余诸症渐退饮食渐进再用八味丸补中汤月余自能转侧又两月而能步履卻服大补汤还少丹又半载而康後稍失调理其腹仍胀服前药即愈

一男子患前症余为壮火补土渐愈彼欲速服攻积之剂下血甚多余诊之曰此陰络伤故血内溢非所宜也後果歿

一男子胸膈痞闷专服破气之药余曰此血虚病也血生於脾上若服前药脾气弱而血愈虚矣不信又用内伤之药反吐血余曰此阳络伤也後果然

大方世家湖鄉离羣索居山妻赵氏忽婴痰热治者多以寒凉偶得小愈三四年余屡进屡退于是元气消烁庚子夏遍身浮肿手足麻冷日夜咳 烦躁引饮小水不利大肉尽去势将危殆幸遇先生诊之脉洪大而无伦按之如无此虚热无火法当壮火之源以生脾土与金匱肾气丸料服之顿觉小水溃决如泉俾日服前丸及大补之药二十余剂而愈三四年间平康无恙迄今甲辰仲春悲哀动中前症复作体如焚燎口肉尽腐胸腹肿满食不下咽者四日夫妇相顾束手待毙而已又承先生视之投以八味丸二服神思清爽服金匱肾气丸料加参芪归术未竟夕而胸次渐舒陡然思食不三日而病去五六矣嗣後日用前二丸间服逾日而起至秋初复患痢又服金匱肾气丸料加参芪归术黄连吴茱萸木香痢遂止但觉後重又用补中益气加木香黄连吴茱萸五味数剂而全愈大方自分寒素命亦蹇剥山妻抱病沉痾本难调摄苟非先生援救填壑未免今不肖奔走衣食於外而可无内顾之忧矣然则先生之仁庇固不肖全家之福亦不肖全家之感也斯言也当置之座右以为子孙世诵之不肖尝侍先生之侧检閱医案始知山妻奏效巔末遂秉书纪二丸药之圣且彰先生用药之神万一云吴门晚学生沈大方履文再拜顿首谨书

脾胃亏损暑湿所伤等症【四附食生冷入房】

大司徒李蒲汀南吏部少宰时患黄疸当用淡渗之剂公尚无嗣犹豫不决余曰有是病而用是药以茵陈五苓散加芩连山梔二剂而愈至辛卯得子公执余手而笑曰医方犹公案先设

君避毀譽殘喘安得享余年而遂付托之望哉由是禮遇益厚

應天王治中遍身發黃妄言如狂苦於胸痛手不可近此中焦畜血為患用桃仁承氣湯一劑下瘀血而愈太守朱陽山弟下部蓄血發狂用抵當湯而愈

一儒者每春夏口乾發熱勞則頭痛服清涼化痰藥浮喘煩躁用香茹飲神思昏憤脈大而虛此因閉藏之際不遠帷幕為患名曰注夏用補中益氣去柴胡升麻加五味麥門炮姜一劑脈益甚仍用前藥加肉桂五分服之即蘇更用六味丸而痊

一儒者體肥善飲仲秋痰喘用二陳芩連益甚加桑皮杏仁盜汗氣促加貝母枳殼不時發熱余以為脾肺虛寒用八味丸以補土母補中益氣以接中氣而愈一男子夏月入房食水果腹痛余用附子理中湯而愈有同患此者不信別用二陳芩連之類而死

一男子盛暑發熱胸背作痛飲湯自汗用發表之藥昏憤譫語大便不實吐痰甚多用十全大補一劑頓退又用補中益氣加炮姜二劑全愈

肝脾腎虧損頭目耳鼻等症【五】

給事張禹功目赤不明服祛風散熱藥反畏明重听脈大而虛此因勞心過度飲食失節以補中益氣加茯神棗仁山藥山茱五味頓愈又勞役復甚用十全大補兼以前藥漸愈却用補中益氣加前藥而痊東垣云諸經脈絡皆走於面而行空竅其清氣散於目而為精走於耳而為听若心煩事冗飲食失節脾胃虧損心火太甚百脈沸騰邪害孔竅而失明矣況脾為諸陰之首目為血脈之宗脾虛則五臟之精氣皆為失所若不理脾胃不養神血乃治標而不治本也

少宰李蒲汀耳如蟬鳴服四物湯耳鳴益甚此元氣虧損之症五更服六味地黃丸食前服補中益氣湯頓愈此症若血虛而有火用八珍加山梔柴胡氣虛而有火四君加山梔柴胡若因怒就聾或鳴實用小柴胡加芎歸山梔虛用補中益氣加山梔午前甚用四物加白朮茯苓久須用補中益氣午後甚用地黃丸

少司馬黎仰之南銀台時因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脇痛用小柴胡合四物加山梔陳皮而瘥尚寶劉毅齋怒則太陽作痛用小柴胡加茯苓山梔以清肝火更用六味丸以生腎水後不再發

一儒者日晡兩目緊澁不能瞻視此元氣下陷用補中益氣倍加參芪數劑全愈

一男子亦患前症服黃柏知母之類更加便血此脾虛不能統血肝虛不能藏血也用補中益氣六味地黃而愈

一儒者兩目作痛服降火祛風之藥兩目如緋熱倦殊甚余用十全大補湯數劑諸症悉退服

补中益气兼六味丸而愈复因劳役午後目濇体倦服十全大补而痊一男子房劳兼怒风府胀闷两脇胀痛余作色慾损肾怒气伤肝用六味地黄丸料加白术当归一剂而安一儒者酒色过度头脑两脇作痛余以为肾虚而肝病亦用前药顿安

一男子面白鼻流清涕不闻馨秽三年矣用补中益气加麦门山梔而愈

一男子年二十素嗜酒色两目赤痛或作或止两尺洪大按之微弱余谓少年得此目当失明翌早索途而行不辨天日衆皆惊异余与六味地黄丸料加麦门五味一剂顿明

妇人症见女科撮要

脾肺肾亏损小便自遗淋瀝等症【六】

大司徒许函谷在南银台时因劳发热小便自遗或时不利余作肝火陰挺不能约制午前用补中益气加山药黄栢知母午後服地黄丸月余诸症悉退此症若服燥剂而频数或不利用四物麦门五味甘草若数而黄用四物加山茱黄栢知母五味麦门若肺虚而短少用补中益气加山药麦门若陰挺痿痺而频数用地黄丸若热结膀胱而不利用五淋散若脾肺燥不能化生用黄芩清肺饮若膀胱陰虚阳无以生而淋瀝用滋肾丸若膀胱阳虚陰无以化而淋瀝用六味丸若转筋小便不通或喘急欲死不问男女孕妇急用八味丸缓则不救若老人陰痿思色精不出而内败小便道澁痛如淋用加減八味丸料加车前牛膝若老人精已竭而复耗之大小便道牵痛愈痛愈欲便愈便则愈痛亦治以前药不应急加附子若喘嗽吐痰腿足冷肿腰骨大痛而目浮肿太阳作痛亦治以前药若痛愈而小便仍瀝宜用加減八味丸以缓治之【详见褚氏遗书精血篇但无治法耳】

司徒边华泉小便频数瀝滯短赤口乾唾痰此肾经阳虚热燥陰无以化用六味滋肾二丸而愈

司马李悟山茎中作痛小便如淋口乾唾痰此思色精降而内败用补中益气六味地黄而愈

考功杨村庵口舌乾燥小便频数此膀胱阳燥陰虚先用滋肾丸以补陰而小便愈再用补中益气六味地黄以补脾肾而安若汗多而小便短少或体不禁寒乃脾肺气虚也

司空何燕泉小便赤短体倦食少缺盆作痛此脾肺虚弱不能生肾水当滋化源用补中益气六味丸加五味而安

商主客素膏粱小便赤数口乾作渴吐痰稠粘右寸关数而有力此脾肺积热遺於膀胱用黄芩清肺饮调理脾肺用滋肾六味二丸滋补肾水而愈

一儒者发热无时饮水不絕每登厠小便瀝痛大便牵痛此精竭复耗所致用六味丸加五味

子及补中益气喜其谨守得愈若肢体畏寒喜热饮食用八味丸儒者杨文魁病後两足浮肿胸腹胀满小便短少用分利之剂遍身肿兼气喘余曰两足浮肿脾气下陷也胸腹胀满脾虚作痞也小便短少肺不能生肾也身肿气喘脾不能生肺也用补中益气汤加附子而愈半载後因饮食劳倦两目浮肿小便短少仍服前药顿愈甲戌年七月余奉侍武庙汤药劳役过甚饮食失节复兼怒气次年春茎中作痒时出白津时或痛甚急以手紧捻才止此肝脾之气虚也服地黄丸及补中益气加黄栢柴胡山梔茯苓木通而愈至丁酉九月又因劳役小便淋沥茎痒窍痛仍服前汤加木通茯苓胆草泽泻及地黄丸而愈

大尹顾荣甫尾闾作痒小便赤濇左尺脉洪数属肾经虚热法当滋补彼不信乃服黄栢知母等药年许高骨肿痛小便淋沥肺肾二脉洪数无伦余曰子母俱败无能为矣後果歿

余甲辰仲夏在横金陈白野第会其外舅顾同厓求余诊脉左尺澁结右寸洪数余曰此肺金不能生肾水诚可虑果至季冬茎道澁痛如淋愈痛则愈欲便愈便则愈痛而歿

脾肺肾亏损虚劳怯弱等症【七】

庶吉士黄伯邻发热吐痰口乾体倦自用补中益气汤不应余谓此金水俱虚之症兼服地黄丸而愈後背患一疔烦痛寒热彼因前月尝偕往视郭主政背疽郭不经意余决其殒於金旺之日果符余言已而郭氏妻孥感其毒皆患恶疮伯邻所患与郭患同心甚恐余曰此小疮也憎寒等症皆陰虚旧症果是疮毒亦当补气血余在第就以地黄丸料煎与服之即睡良久各症顿退自後常有头面耳目口舌作痛或吐痰眩暈之类服前药即愈後任都宪督盐法道出於苏必垂顾焉

少司空何瀟川足热口乾吐痰头晕服四物黄连黄栢饮食即减痰热益甚用十全大补加麦门五味山药山茱而愈

一儒者或两足发热或脚跟作痛用六味丸及四物加麦门五味玄参治之而愈後因劳役发热恶寒作渴烦躁用当归补血汤而安

儒者刘允功形体魁伟冬日饮水自喜壮实余曰此陰虚也不信一日口舌生疮或用寒凉之剂肢体倦怠发热恶寒余用六味地黄补中益气而愈

一男子腿内作痛用渗湿化痰药痛连臀肉面赤吐痰脚跟发热余曰乃肾虚陰火上炎当滋化源不信服黄栢知母之类而歿

余甥居宏年十四而娶至二十形体丰厚发热作渴面赤作胀或外为衄血内用降火肢体倦怠痰涎愈多脉洪数鼓指用六味丸及大补汤加麦门五味而痊余甥凌云汉年十六庚子夏作渴发热吐痰唇燥遍身生疥两腿尤多色黯作痒日晡愈炽仲冬腿患疮尺脉洪数余曰疥肾疳也疮骨疽也皆肾经虚症针之脓出其气氤氲余谓火旺之际必患瘵症遂用六味地黄

十全大补不二旬诸症愈而瘵症具仍用前药而愈抵冬娶妻至春其症复作父母忧之俾其外寝虽其年少谨疾亦服地黄丸数斤煎药三百余剂而愈

其弟云霄年十五壬寅夏见其面赤唇燥形体消瘦余曰子病将进矣癸卯冬复见之曰子病愈深矣至甲辰夏胃经部分有青色此木乘土也始求治先以六君加柴胡芍药山梔芩黄炒黑黄连数剂及四味肥儿六味地黄二丸及参苓白术归芍山梔麦门五味炙草三十余剂肝火渐退更加胆草柴胡三十余剂乃去芍加肉桂三十余剂及加減八味丸元气渐复而愈

脾肺肾亏损遗精吐血便血等症【八】

少宰汪涵斋头晕白浊余用补中益气加茯苓半夏愈而复患腰痛用山茱山药五味萆薢远志顿愈又因劳心盗汗白浊以归脾汤加五味而愈後不时眩暈用八味丸全愈

南银台许函谷因劳发热作渴小便自遗或时闭澹余作肝火血虚陰挺不能约制午前用补中益气加山药山茱午後服地黄丸月余诸症悉退

司厅陈石镜久患白浊发热体倦用补中益气加炮姜四剂白浊稍止再用六味地黄兼服诸症悉愈

光禄柴黼庵因劳患赤白浊用济生归脾十全大补二汤间服而愈

司厅张检斋陰?肿痛时发寒热若小腹作痛则茎出白津用小柴胡加山梔胆草茱萸芍归而愈

朱工部劳则遗精齿牙即痛用补中益气加半夏茯苓芍药并六味地黄丸渐愈更以十全大补加麦门五味而痊

一男子白浊梦遗口乾作渴大便闭澹午後热甚用补中益气加芍药玄参并加減八味丸而愈

一男子茎中痛出白津小便秘时作痒用小柴胡加山梔泽泻炒连木通胆草茯苓二剂顿愈又兼六味地黄丸而痊

一男子发热便血精滑○一男子尿血发热○一男子发热遗精或小便不禁俱属肾经亏损用地黄丸益气汤以滋化源并皆得愈

一男子鰥居数年素勤苦劳则吐血发热烦躁服犀角地黄汤气高而喘前病益盛更遗精白浊形体倦怠饮食少思脉洪大举按有力服十全大补加麦门五味山茱山药而愈

儒者杨啓元素勤苦吐血发痧不知人事余以为脾胃虚损用十全大补汤及加减八味丸而痊愈再用归脾汤而血止

一儒者因饮食劳役及恼怒眉发脱落余以为劳伤精血陰火上炎所致用补中益气加麦门五味及六味地黄丸加五味眉发顿生如故

一男子年二十巔毛脱尽用六味地黄丸不数日髮生寸许两月复旧○吴江史万湖云有男女偶合眉发脱落无药调治至数月後复生

一童子年十四发热吐血余谓宜补中益气以滋化源不信用寒凉降火愈甚始谓余曰童子未室何肾虚之有参芪补气奚为用之余述丹溪先生云肾主闭藏肝主疏泄二脏俱有相火而其系上属於心心为君火为物所感则易於动心动则相火翕然而随虽不交会其精亦暗耗矣又精血篇云男子精未滿而御女以通其精则五脏有不满之处异日有难状之疾遂用补中益气及地黄丸而瘥

一男子咳 吐血热渴痰盛盗汗遗精用地黄丸料加麦门五味治之而愈後因劳怒忽吐紫血块先用花蕊石散又用独参汤渐愈後劳则咳 吐血一二口脾肺肾三脉皆洪数用补中益气六味地黄而全愈

辛丑夏余在嘉兴屠内翰第遇星士张东谷谈命时出中庭吐血一二口云久有此症遇劳即作余意此劳伤肺气其血必散视之果然与补中益气加麦门五味山药熟地茯神远志服之而愈翌早请见云每服四物黄连山梔之类血益多而倦益甚余得公一?吐血顿止神思如故何也余曰脾统血肺主气此劳伤脾肺致血妄行故用前药健脾肺之气而噓血归源耳後率其子以师余余曰管见已行於世矣子宜览之

肝脾肾亏损下部疮肿等症【九】

通府黄廷用饮食起居失宜两足发热口乾吐痰自用二陈四物益甚两尺数而无力余曰此肾虚之症也不信仍服前药足跟热痒以为疮毒又服导湿之剂赤肿大热外用敷药破而出水久而不愈及用追毒丹疮突如桃始信余言滋其化源半载得瘥

儒者章立之左股作痛用清热渗湿之药色赤肿胀痛连腰脇腿足无力余以为足三陰虚用补中益气六味地黄两月余元气渐复诸症渐退喜其慎疾年许而瘥府庠鍾之英两腿生疮色黯如钱似癰者三四痒痛相循脓水淋漓晡热内热口乾面黧此肾虚之症用加味六味丸数日而愈此等症候用祛风败毒之剂以致误人多矣

一男子素遗精脚跟作痛口乾作渴大便乾燥午後热甚用补中益气加芍药玄参及六味丸而愈

余症见外科枢要

脾肺肾亏损大便秘结等症【十】

一儒者大便素结服搜风顺气丸後胸膈不利饮食善消面带阳色左关尺脉洪而虚余曰此足三陰虚也彼恃知医不信乃服润肠丸大便秘结肢体倦怠余与补中益气六味地黄月余而验年许而安若脾肺气虚者用补中益气汤若脾经郁结者用加味归脾汤若气血虚者用八珍汤加肉苁蓉若脾经津液涸者用六味丸若发热作渴饮冷者用竹叶黄芪汤若燥在直肠用猪胆汁导之若肝胆邪侮脾者用小柴胡加山栀郁李枳殼若膏粱厚味积热者用加味清胃散亦有热燥风燥阳结陰结者当审其因而治之若复伤胃气多成败症一老儒素有风热饮食如常大便十七日不通肚腹不胀两尺脉洪大而虚此陰火内烁津液用六味丸二十余剂至三十二日始欲去用猪胆润而通利如常一妇人年七十有三痰喘内热大便不通两月不寐脉洪大重按微细此属肝肺肾亏损朝用六味丸夕用逍遥散各三十余剂计所进饮食百余碗腹始痞闷乃以猪胆汁导而通之用十全大补调理而安若间前药饮食不进诸症复作

一男子年五十余因怒少食大便不利服润肠丸大便秘结胸脇作痛欲兼服脾约丸肝脾肾脉浮而濇余曰此足三陰精血亏损之症也东垣先生云若人胃强脾弱约束津液不得四布但输膀胱小便数而大便难者用脾约丸若人陰血枯槁内火燔灼肺金受邪土受木伤脾肺失传大便秘而小便数者用润肠丸令滋其化源则大便自调矣如法果验

一儒者怀抱郁结复因場屋不遂发热作渴胸膈不利饮食少思服清热化痰行气等剂前症益甚肢体倦怠心脾二脉濇滯此郁结伤脾之变症也遂用加味归脾汤治之饮食渐进诸症渐退但大便尚濇两颧赤色此肝肾虚火内伤陰血用八珍汤加苁蓉麦门五味至三十余剂大便自润○一男子所患同前不信余言服大黄等药泄泻便血遍身黑黯复求治余视之曰此陰阳二络俱伤也经曰阳络伤则血外溢陰络伤则血内溢辞不治後果然

职方陈莪斋年踰六旬先因大便不通服内疏等剂後饮食少思胸腹作胀两脇作痛形体倦怠两尺浮大左关短濇右关弦濇时五月请治余意乃命门火衰不能生脾土而肺金又尅肝木忧其金旺之际不起後果然

各症方药【十二】

小柴胡汤 治肝胆症寒热往来或日晡发热或湿热身热默默不欲食或怒火口苦耳聋咳嗽发热脇下作痛甚者转侧不便两祛痞满或泄泻咳嗽或吐酸食苦水或因怒而患疟痢等症

柴胡【二钱】 黄芩【一钱五分】 人参 半夏【各七分】 甘草【炙五分】

右姜水煎服

加味小柴胡汤 治血虚大劳大怒火动热入血室或妇女经行感冒发热寒热如疟夜间热甚或谵语即前方加生地黄一钱

黄芩半夏生姜汤 治胆腑发咳呕苦水如胆汁

黄芩【炒】 生姜【各三钱】 甘草【炙】 半夏【各二钱】

右姜水煎服

桔梗汤 治心脏发咳咳而喉中如梗状甚则咽肿喉痹

苦梗【三钱】 甘草【六钱】

右水煎服

芍药甘草汤 治小肠腑发咳咳而失气

芍药 甘草【炙各四钱】

右水煎服

升麻汤 治脾脏发欬欬而右脇下痛痛引肩背甚则不可以动

升麻 白芍药 甘草【各二钱】 葛根【三钱】

右水煎服

乌梅丸 治胃腑发欬欬而呕呕甚则长虫出

乌梅【三十个】 细辛 附子 桂枝 人参

黄栢【各六钱】 乾姜【一两】 黄连【一两五钱】 当归 蜀椒【各四两】

右为末用酒浸乌梅一宿去核蒸之与米饭捣如泥丸桐子大每服三十丸白汤下

麻黄汤 治肺脏发欬欬而喘急有声甚则唾血

麻黄【三钱】 桂枝【二钱】 甘草【一钱】 杏仁【二十个】

右水煎服

赤石脂禹余粮汤 治大肠腑发欬欬而遗尿

赤石脂 禹余粮【各二两并打碎】

右水煎服

麻黄附子细辛汤

治肾脏发欬欬则腰背相引而痛甚则欬涎又治寒邪犯齿致脑齿痛宜急用之缓则不救

麻黄 细辛【各二钱】 附子【一钱】

右水煎服

茯苓甘草汤 治膀胱腑发欬欬而遗溺

茯苓【二钱】 桂枝【二钱五分】 生姜【五大片】 甘草【炙一钱】

右水煎服

异功散 治久欬不已或腹痛少食面肿气逆又治脾胃虚弱饮食少思等症

人参 茯苓 白术 甘草 陈皮【各等分】

右每服三五钱姜枣水煎

法制清气化痰丸 顺气快脾化痰消食

半夏 南星【去皮尖】 白矾 皂角【切】 乾姜【各四两】

右先将白矾等三味用水五碗煎取水三碗却入半夏二味浸二日再煮至半夏南星无白点为度晒乾陈皮 青皮【去穰】 紫苏子【炒】 萝葡子【炒另研】 葛根 神麴【炒】 麦蘖【炒】 杏仁【去皮尖炒研】 山查子 香附子【各二两】

右为末蒸饼丸桐子大每服五七十丸临卧食後茶汤下

升阳益胃汤 治脾胃虚弱肢体怠惰或体重节痛口舌乾渴饮食无味大便不调小便频数饮食不消兼见肺病洒淅恶寒凄惨不乐乃阳不和也

羌活 独活 防风【各五钱】 柴胡 白术 茯苓【渴者不用】 泽泻【各三钱】 人参 半夏

甘草【炙各一两】黄芪【二两】芍药 黄连 陈皮【各四钱】

右每服三五钱姜枣水煎早温服如小便愈而病益加是不宜利小便也当少减茯苓泽泻

生脉散 治热伤元气肢体倦怠气短懒言口乾作渴汗出不止或湿热大行金为火制絶寒水生化之源致肢体痿软脚欹眼黑最宜服之

人参【五钱】五味子 麦门冬【各三钱】

右水煎服

清燥汤 治元气虚湿热乘之遍身酸软或肺金受邪絶寒水生化之源肾无所养小便赤少大便不调腿腰痿软或口乾作渴体重麻木头目眩晕饮食少思或自汗盗汗肢体倦怠胸满气促

黄芪【一钱五分】黄连 神麴【炒】五味子【九粒杵炒】猪苓 柴胡
甘草【炙各二分】苍术 白术 麦门冬 陈皮 生地黄 泽泻【各五分】白茯苓 人参 当归
升麻【各三分】黄柏【酒拌一分】

右水煎服

清暑益气汤 治元气弱暑热乘之精神困倦胸满气促肢节疼痛或小便黄数大便溏频又暑热溷痢疟疾之良剂

升麻 黄芪【炒去汗各一钱】苍术【一钱五分】人参 白术 陈皮
神麴【炒各五分】甘草【炙】乾葛【各三分】五味子【九粒杵炒】

右水煎服

香茹饮【加黄连名黄连香茹饮】治一切暑毒腹痛霍乱吐泻或头痛昏愤

香薷 茯苓 白扁豆 厚朴 甘草【各一钱】

右水煎服

麦门冬汤 治火热乘肺欬唾有血

麦门冬【去心】防风【各二钱】白茯苓【二钱】人参【一钱】

右水煎服

二神丸 治脾肾虚弱侵晨五更作泻或全不思食或食而不化大便不实神效

破故纸【四两炒】肉豆蔻【二两生用】

右为末用大红枣四十九枚生姜四两切碎用水煮熟去姜取枣肉和药丸桐子大每服五十丸空心盐汤下

五味子散 治肾泄在侵晨五更作泻饮食不进或大便不实不时去後为丸尤效

五味子【炒二两】吴茱萸【炒五钱】

右为末每服二钱白汤调

四神丸 治脾肾虚弱大便不实饮食不思

肉豆蔻 补骨脂 五味子 吴茱萸【各为末】生姜【四两】红枣【五十枚】

右用水一碗煮姜枣去姜水乾取枣肉丸桐子大每服五七十丸空心日前服

保和丸 治饮食停滞胸膈痞满或吞酸腹胀

神麴【炒】半夏 茯苓【各一两】山楂【取肉二两蒸】萝卜子【炒】陈皮
连翘【各五钱】

右为末粥丸加白术二两名大安丸

越鞠丸 治六郁胸膈痞满或吞酸呕吐饮食不化苍术 神麴 抚芎 麦芽【炒】香附 山楂
山栀【各等分】

右为末水调神麴麦芽末糊丸桐子大每服六七十丸滚汤下

茵陈五苓散 治酒积分利其湿

茵陈 白术 猪苓【各一钱】桂【三分】泽泻【一钱五分】

右水煎服

葛花解酲汤 治酒积上下分消

白豆蔻 砂仁 葛花【各半两】 木香【五分】 青皮【三钱】 陈皮 白茯苓 猪苓
人参【各一钱半】 白术 神麴【炒】 泽

泻 乾姜【各二钱】

右为末每服五钱白汤调得微汗酒病去矣

益黄散 治脾土虚寒寒水反来侮土而呕吐不食或肚腹作痛或大便不实手足逆冷等症

陈皮【一两】 青皮 阿子肉 甘草【炙】 丁香【各二钱】

右每服四钱水煎服

人参安胃散 治脾胃虚热呕吐或泄泻不食

人参【一钱】 黄芪【二钱】 生甘草
炙甘草【各五分】 白芍药【七分】 白茯苓【四分】 陈皮【三分】 黄连【二分】

右水煎服

人参养胃汤 治外感风寒内伤饮食寒热头疼或作疟疾

半夏 厚朴【姜制】 橘红【各八分】 藿香叶 草薢
茯苓 人参【各五分】 甘草【炙三分】 苍术【一钱】

右姜七片乌梅一个水煎服

藿香正气散 治外感风寒内停饮食头疼寒热或霍乱泄泻或作疟疾

桔梗 大腹皮 紫苏 茯苓 厚朴【制各一钱】 甘草【炙五分】 藿香【一钱五分】

右姜枣水煎热服

白虎汤治胃热作渴暑热尤効

知母 石膏【各二钱】 粳米【半合】

右水煎服

竹叶黄芩汤 治胃虚火盛而作渴

淡竹叶【二钱】黄芩 生地黄 麦门冬 当归 川芎 甘草 黄芩【炒】 芍药 人参
石膏【煨各一钱】

右水煎服

竹叶石膏汤 治胃火盛而作渴

淡竹叶 石膏【煨】 桔梗 木通 薄荷叶 甘草【各一钱】

右水煎服

四七汤 治七情郁结心腹绞痛或为膨胀

人参 官桂 半夏【洗七次各一钱】 甘草【炙五分】

右姜水煎服

青州白丸子 治风痰咳嗽或牙关紧急或痰喘体麻南星【三而】 半夏【七两】 白附子【一两】 川乌【半两各生用】

右为末绢袋盛井水摆浸仍换水浸三五日晒乾糯米粉丸如急用以姜汁糊丸亦可

左金丸【一名四金丸】 治肝火脇刺痛或发寒热或头目作痛或大便不实或小便淋秘或
小腹疼痛一切肝火之症

黄连【六两】 吴茱萸【一两汤煮片时用】

右为末粥丸白术陈皮汤下

当归龙荟丸

治肝经实火大便秘结小便澁滯或胸膈作痛陰囊肿胀凡属肝经实火皆宜用之

当归 龙胆草 梔子仁 黄连 黄芩【各一两】 大黄 芦荟
青黛【各五钱】 木香【二钱五分】 麝香【另研五分】

右为末炒神麴糊丸每服二十丸姜汤下

神效黄芪汤 治浑身或头面手足麻木不仁目紧缩小及羞明畏日或视物不明

黄芪【二两】人参【八钱】甘草【炙】白芍药【各一两】蔓荆子【一两】陈皮【五钱】

右每服五钱水煎临卧热服如麻木不仁虽有热症不用黄柏加黄芪

益气聪明汤 治久病或因尅伐脾胃伤损眼目昏暗或饮食失节劳役形体脾胃不足得内瘴耳鸣之患或多年眼目昏暗视物不明此药能令广大聪明久服无内瘴外瘴耳鸣耳聋等症

黄芪 甘草【炙】人参【各五钱】蔓荆子【一钱五分】升麻 葛根【各三钱】芍药 黄柏【酒炒各一钱】

右每服五钱水煎临卧并五更服

芍药清肝散 治眇多眊燥紧澁羞明赤脉贯睛脏腑秘结

白术 甘草 川芎 防风 荆芥 桔梗 羌活【各三分】芍药 柴胡 前胡 薄荷 黄芩【各二分半】山梔 知母 滑石 石膏【各二分】大黄【四分】芒硝【二分半】

右水煎食後热服

黄连天花粉丸 治症同上

黄连 菊花 川芎 薄荷【各一两】天花粉 连翘 黄芩 梔子【各四两】黄柏【六两】

右为末滴水丸桐子大每服五十丸加至百丸食後临卧茶汤下

鼻通气散 治眼肿胀赤昏暗羞明癰澁疼痛或风痒鼻塞头痛脑酸外翳攀睛眇泪稠粘

鵞不食草【二钱】青黛 川芎【各一钱】

右为末含水满口每用如米许?鼻内泪出为度

选奇汤 治风热上壅眉棱骨痛或头目眩晕

羌活 防风【各三钱】甘草【二钱夏生冬炒】黄芩【酒制冬去之热甚用】

右每服三钱水煎时时服

助阳活血汤 治眼睫无力常欲垂闭余治同上黄芪 甘草【炙】 防风 当归【各五分】 白芷【四分】 蔓荆子【四分】 升麻【七分】

右水煎食後热服

益陰肾气丸 治症同上

熟地黄【三两】 当归【酒洗】 柴胡 五味子 乾山药 山茱萸【去核各半两】 茯苓 泽泻【各二钱半】 生地黄【酒炒四两】

右为末炼密丸桐子大每服百丸茶汤下日二三服

连翹饮 治目中溜火恶日与火癰澁小角紧久视昏花迎风有泪

蔓荆子 生甘草 连翹【各三钱】 柴胡【五钱】 黄芩【酒制五分】 生地黄 当归 红葵花 人参【各三分】 黄芪【五分】 升麻【一钱】 防风 羌活【各二分】

右水煎服

地芝丸 治目不能远视能近视或妨近视

生地黄【焙乾四两】 天门冬【去心】 枳殼【麸炒】 真甘菊花【各二两】

右为末炼蜜丸桐子大每服百丸茶清或温酒下

定志丸 治目不能近视反能远视

白茯苓 人参【各二两】 远志【去心】 菖蒲【各一两】

右为末炼蜜丸桐子大以朱砂为衣每十丸至三十丸米饮食後下日三服

大芦荟丸【一名九味芦荟】 治大人小人下疳溃烂或作痛又治肝疳食积口鼻生疮牙龈蚀烂

胡黄连 黄连 芦荟 木香 白芫荑【炒】 青皮 白雷丸 鹤虱草【各一两】 麝香【三钱】

右为末蒸饼糊丸如麻子大每服一钱空心米饮下

四味肥儿丸【一名小肥儿丸】治诸疳发热目生云翳口舌生疮或牙龈腐烂肌肉消瘦遍身生疮等症与地黄丸兼服

黄连【炒】茺萸【炒】神麴【炒】麦芽【炒各等分】

右各为末水糊丸桐子大每服二三十丸空心白汤下

阿魏膏 治一切痞块更服胡连丸

羌活 独活 玄参 官桂 赤芍药 川山甲 生地黄 两头尖 大黄 白芷 天麻【各五钱】

槐柳桃枝【各三钱】红花【四钱】木鳖子【二十枚去壳】乱发【如鸡子大一块】

右用香油二斤四两煎黑去渣入发煎化仍去粗徐下黄丹煎软硬得中入朴硝阿魏苏合油乳香没药各五钱麝香五钱调匀即成膏矣摊贴患处内服丸药黄丹须用真正者効凡贴膏药先用朴硝随患处铺半指厚以纸盖用热熨斗熨良久如硝耗再加熨之二时许方贴膏药若是肝积加芦荟末同熨

桃仁承气汤 治血结胸中手不可近或中焦蓄血寒热胸满漱水不欲咽善忘昏迷其人如狂

桃仁【半两】大黄【一两】甘草【二钱】桂【三钱】芒硝【三钱】

右每服一两姜水煎

抵挡汤 治下部蓄血腹内作痛手不可近或发狂少腹满硬小便自利大便反黑如狂者在中发狂者在下也

大黄 水蛭【炒各半两】蟅虫【去翅足】桃仁【各三钱】

右每服五钱水煎服如作丸炼蜜和之

花蕊石散

硫黄【上色明净者四两】花蕊石【一两】

右各为末拌匀先用纸筋和盐泥固济瓦罐一个泥乾入药仍用泥封口候乾用炭周叠煅赤罐冷取出为细末每服一钱童便酒下

搜风顺气丸 治痔漏风热闭结

车前子【两半】大麻子【微炒】大黄【五钱半生半熟】牛膝【酒浸】郁李仁?丝子【酒浸】枳壳 山药【各二钱】

右为末炼蜜丸桐子大每服三十丸白汤下

五淋散 治膀胱有热水道不通淋澁不出或尿如豆汁或成沙 或如膏汁或热佛便血

赤茯苓【一钱五分】赤芍药 山梔【各一钱】当归 甘草【各一钱五分】

右入灯心水煎服

加味逍遥散 治肝脾血虚发热或潮热晡热或自汗盗汗或头痛目澁或怔忡不宁或颊赤口乾或月经不调肚腹作痛或小腹重坠水道澁痛或肿痛出脓内热作渴等症

当归 芍药 茯苓 白术【炒】柴胡【各钱】牡丹皮山梔【炒】甘草【炙各五分】

右水煎服

逍遥散即前方去山梔牡丹皮

还少丹 治脾肾虚寒饮食少思发热盗汗遗精白浊又治真气亏损肌体瘦弱等症

肉苁蓉 远志【去心】?香 巴戟 乾山药 枸杞子 熟地黄 石菖蒲 山茱萸【去核】牛膝 杜仲【去皮姜制】楮实子 五味子 白茯苓【各一两】

右各另为末和匀用枣肉百枚并炼蜜丸桐子大每服五七十丸空心温酒或盐汤下日三服

交加散 治食疟神效

肉豆?【二个一生一煨】草豆?【二个一生一煨】甘草【二钱半炙半生用】厚朴【二钱半制用半生用】生姜【一两煨五钱生五钱】

右姜水煎发日五更服

仲景白虎加桂枝汤 治温疟

知母【六钱】甘草【炙二钱】石膏【五钱】桂枝【一钱】粳米【一合】

右水煎服此太阳阳明经药也

柴胡桂姜汤 治寒多微有热或但寒不热名曰牝疟桂枝 黄芩 牡蛎 甘草【炙】 乾姜【各一钱】 栝蒌根柴胡【各二钱】

右水煎服汗出即愈此少阳经药也

桂枝羌活汤 治疟处暑以前发头项痛脉浮恶风有汗

桂枝 羌活 防风 甘草【各一钱五分】

右水煎发而服如吐加半夏麴

麻黄羌活汤 治疟如前但恶风而无汗

麻黄【去节】 羌活 防风 甘草【各半两】

右如前服加法同上二方太阳经药也

白芷汤 治疟病身热目痛热多寒少脉长先以大柴胡下之余热不尽当服此汤

白芷【一两】 知母【一两七钱】 石膏【四两】

右依前服此阳明经药也

桂枝芍药汤 治疟寒热大作不论先後此太阳阳明合病寒热作则必战栗经曰热胜而动也发热汗出不愈内热也此汤主之

桂枝【五分】 黄芩 知母 石膏 芍药【各二钱】

右水煎此太阳阳明经药也

桂枝黄芩汤 如服前药转剧三阳合病也宜此和之柴胡【一钱五分】 黄芩 人参 甘草【各八分】 半夏 石膏知母【各五分】 桂枝【二分】

右依前服如外邪已解而内邪未已从卯至午发者宜大柴胡下之从午至酉发者邪气在内也宜大承气下之从酉至子发者或至寅发者邪气在血也

桂枝石膏汤 治疟隔日发先寒後热寒少热多

桂枝【五钱】 黄芩【一两】 石膏 知母【各一两五钱】

右水煎分三服此太阳阳明经药也

麻黄黄芩汤 治疟发如前而夜发者

麻黄【一两去节】甘草【炙三钱】桂【二钱】黄芩【五钱】桃仁【三十个去皮尖】

右依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血骤则肝气燥经所谓肝苦急急食甘以缓之故桃仁散血缓肝谓邪气深远而入血故夜发此汤发散血中风寒乃三阴经药也

香连丸 治痢疾并水泻暑泻甚效

黄连【净二十两】吴茱萸【去枝梗十两】

右先将二味用热水拌和入磁器内置热汤顿一日同炒至黄连紫黄色去茱萸用连为末每末四两入木香末一两淡醋米饮为丸桐子大每服二三十丸滚汤下久痢中气下陷者用补中益气下中气虚者用四君子下中气虚寒者加姜桂

三黄丸 治热痢腹痛或口舌咽喉齿痛及一切实火症

黄芩 黄连 黄柏【各等分】

右各另为末水丸桐子大每服七八十丸白汤下

芍药汤 治便血後重经曰溲而便脓血知气行而血止也行血则便自愈调气则後重自除

芍药【一两】当归 黄连【各半两】枳实 木香
甘草【炙各二钱】桂【二钱五分】黄芩【五钱】

右每服半两水煎如痢不减加大黄

加减济生肾气丸

治脾肾虚腰重脚肿小便不利或肚腹肿胀四肢浮肿或喘急痰盛已成蛊症其效如神

白茯苓【三两】附子【半两】川牛膝 肉桂【去皮】泽泻 车前子 山茱萸
山药【各一两】牡丹皮【一两】熟地黄【四两酒抹搯辟朽膏】

右为末加炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心白汤下

三因当归散 治脾土不能制水水气盈溢渗透经络发为水肿

木香 赤茯苓 当归 桂 木通 赤芍药 牡丹皮 诃榔 陈皮 白术 【各等分】

右每服五钱水煎服

不换金正气散 治脾气虚弱寒邪相搏痰停胸膈致发寒热或作疟疾

厚朴 【去皮姜制】 藿香

半夏 【姜制】 苍术 【米泔浸】 陈皮 【各一钱】 甘草 【炙五分】

右姜枣水煎服

七味白术散 治中气亏损津液短少口舌乾燥或口舌生疮不喜饮冷或吐泻後口乾最宜服

人参 白术 木香 白茯苓 甘草 藿香 【各五分】 乾葛 【一钱】

右水煎服

参苓白术散 治脾胃不和饮食少进或呕吐泄泻凡病後宜此调理

人参 茯苓 白扁豆 【去皮姜汁半炒】 白术 【炒】 莲肉 【去心皮】 砂仁 【炒】 薏苡仁 【炒】 桔梗 【炒】 山药 甘草 【炙各二两】

右为末每服二三钱用石菖蒲汤下或作丸

半夏汤 治胆腑实热精神恍惚寒热泄泻或寝寒增风善太息

半夏 【一钱五分】 黄芩 【一钱】 远志 【一钱】 生地黄 【二钱】 秫米 【一合】 宿姜 【一钱五分】 酸枣仁 【三钱炒】

右长流水煎服

犀角地黄汤 治血虚火盛血妄行吐衄便下若因忿怒而致加山梔柴胡

犀角 【镑末】 生地黄 白芍药 牡丹皮 【各一钱半】

右水煎倾出入犀末服之

人参平肺散 治心火刑肺金患肺痿咳嗽喘呕痰涎壅盛胸膈痞满咽喉不益

人参【四分】青皮【四分】茯苓【七分】天门冬【四分】陈皮【五分】地骨皮【五分】甘草【炙五分】知母【七分】桑皮【一钱】五味子【一十粒杵碎】

右姜水煎服

清凉饮 治实热便秘或喉中肿痛

当归 赤芍药 甘草【炙】 大黄【蒸各等分】

右每服五钱水煎服

清胃散 治醇酒厚味唇齿作痛或齿龈溃烂或连头面颈项作痛

黄连【炒一钱半】 当归 生地黄 牡丹皮【各一钱】 升麻【二钱】

右水煎服

犀翘清胃散前方加犀角连翘甘草

凉膈散 治实热喉舌肿痛便溺秘结

大黄 朴硝 甘草 栀子仁 黄芩 薄荷叶【各一两】 连翘【四两】

右为末每服四五钱竹叶蜜少许煎服仍量加減

润肠丸 治伏火风热大肠乾燥若因失血或因肾不足当滋肾最忌此丸

麻子仁 桃仁【去皮尖另研各一两】 羌活 当归尾 大黄【煨】 皂角仁 秦艽【各五钱】

右另研为末炼蜜丸猪胆汁丸尤妙每服三十丸食前滚汤下若燥在直肠用猪胆汁导之亦忌前药

滋肾丸 治热在血分不渴而小便不利或肾虚尺热腿膝无力不能履地

知母 黄柏【各酒炒二两】 肉桂【二钱】

右各另为末水丸桐子大每服二百丸空心百滚汤下

黄芩清肺饮 治肺热小便不利宜用此药清之

黄芩【一钱】 山梔【二钱】

右水煎服不利加盐?二十粒

清心莲子饮 治热在气分口乾作渴小便白浊夜不安昼热或治口舌生疮咽乾烦躁作渴小便赤淋黄芩【炒】 麦门冬 地骨皮 车前子【炒】 甘草【各一钱半】 石莲肉 茯苓 黄芪 柴胡 人参【各一钱】

右每服五钱水煎服

调中益气汤

治湿热所伤体重烦闷口失滋味二便清数或痰嗽稠粘热壅头目体倦少食等症

黄芪【一钱】 人参【去芦】 甘草 苍术【各五分】 柴胡 橘皮 升麻 木香【各二分】

右水煎空心服

三生饮 治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂并痰厥气厥

南星【一两生用】 川乌【去皮生用】 附子【去皮生用各半两】 木香【二钱】

右每服五钱姜水煎

秦艽升麻汤 治风寒客手足阳明经口眼喎斜恶见风寒四肢拘急脉浮紧

升麻 乾葛 甘草 芍药 人参 秦艽 白芷 防风 桂枝【各三钱】

右每服一两葱白二根水煎

愈风丹 治诸风肢体麻木手足不随等症

天麻 牛膝【同酒浸焙乾】 羌活【另研细】 玄参【各六两】 杜仲【七两】 羌活【十四两】 当归 熟地黄【自制】 生地黄【各一斤】 独活【五两】 肉桂【三两】

右为末炼蜜丸桐子大常服五七十丸病大至百丸空心食前温酒或白汤下

地黄饮子 治肾气虚弱舌瘖不能言足废不能行熟地黄

巴戟【去心】 山茱萸【去核】 肉苁蓉【酒浸焙】 石斛 附子【炮】 五味子 白茯苓 石菖蒲 远志【去心】 麦门冬【去心】 官桂【各等分】

右每服三钱入薄荷少许姜枣水煎服

余方见上卷

薛氏医案卷二

卷三

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷三

明 薛己 撰

女科撮要

经候不调

经曰饮食入胃游溢精气上输於脾脾气散精上归於肺通调水道下输膀胱水经四布五经并行故心脾平和则经候如常苟或七情内伤六淫外侵饮食失节起居失宜脾胃虚损则月经不调矣若先期而至者有因脾经血燥有因脾经郁滞有因肝经怒火有因血分有热有因劳役火动其过期而至者有因脾经血虚有因肝经血少有因气虚血弱主治之法脾经血燥者加味逍遥散脾经郁滞者归脾汤肝经怒火者加味小柴胡汤血分有热者加味四物汤劳役火动者补中益气汤脾经血虚者人参养荣汤肝经血少者六味地黄丸气虚血弱者八珍汤盖血生於脾土故云脾统血凡血病当用苦甘之剂以助其阳气而生陰血俱属不足大凡肝脾血燥四物为主肝脾血弱补中益气为主肝脾郁结归脾汤为主肝经怒火加味逍遥为主

治验【肝经怒火风热等症】

一妇人内热作渴饮食少思腹内近左初如鸡卵渐大四寸许经水三月一至肢体消瘦齿颊似疮脉洪数而虚左口尤甚此肝脾郁结之症外贴阿魏膏午前用补中益气汤午後以加味归脾汤两月许肝火少退脾土少健仍与前汤送六味地黄丸午後又用逍遥散送归脾丸又月余日用芦荟丸二服空心以逍遥散下日晡以归脾汤下喜其谨疾调理年余而愈

一妇人腹内一块不时上攻或痛作声吞酸痞闷月经不调小便不利二年余矣面色青黄相兼余作肝脾气滞以六君子加芎归柴胡炒连木香吴茱萸各少许二剂却与归脾汤下芦荟丸三月余肝脾和而诸症退又与调中益气加茯苓丹皮中气健而经自调

一妇人发热口乾月经不调两腿无力服祛风渗湿之剂腿痛体倦二膝浮肿经事不通余作肝脾肾三经血虚火燥症名鹤膝风用六味八味二丸兼服满月形体渐健饮食渐进膝肿渐消不半载而痊前病若脾肾虚寒腿足软痛或足膝枯细用八味若饮食过多腿足或臂内酸

胀或浮肿作痛用补中益气加茯苓半夏主之一妇人性沈静勤於女工善怒小腹内结一块或作痛或痞闷月经不调却服伐肝之剂内热寒热胸膈不利饮食不甘形体日瘦牙龈蚀烂此脾土不能生肺金肺金不能生肾水肾水不能生肝木当滋化源用补中益气六味地黄至仲春而愈

松江太守何恭人性善怒腹聚一块年余形体骨立倏热往来腭蚀透腮成泥春旺木克土仍行伐肝时季春肝脉洪数按之弦紧余脉微弱余曰洪数弦紧肝经真气虚而邪气实也自保不及何能克土况面色青中隐白乃肾水不足肝木亏损肺金克制惟虑至春木不能发生耳勉用壮脾胃滋肾水之剂肝脉悉退後大怒耳内出血肝脉仍大按之如无烦躁作渴此无根之火以前药加肉桂二剂肝脉仍敛热渴顿退复因大怒以致饮食不进果卒於季冬辛巳日此木衰弱而金刑克信夫

一妇人经候过期发热倦怠或用四物黄连之类反两月一度且少而成块又用峻药通之两目如有所蔽余曰脾为诸陰之首目为血脉之宗此脾伤五脏皆为失所不能归於目矣遂用补中益气济生归脾二汤专主脾胃年余寻愈

一妇人两眉棱痛後及太阳面青善怒余作胆经风热用选奇汤合逍遥散加山梔天麻黄芩半夏黄芩而愈此症失治多致伤目或两耳出脓则危矣

一妇人耳鸣内热经行不调肢体倦怠饮食无味余以为肝脾虚热用四君加柴胡山梔丹皮甘草而愈一妇人素勤苦冬初患咳 发热久而吐血盗汗经水两三月一至遍身作痛或用化痰降火口噤筋挛谓余曰何也余曰此血虚而药益损耳遂用加減八味丸及补中益气加麦门五味山药治之年余而痊

一妇人耳内或耳後项侧作痛寒热口苦月经不调余以为肝火气滯而血凝用小柴胡加山梔川芎丹皮治之诸症悉退

一妇人年四十素性急先因饮食难化月经不调服理气化痰药反肚腹膨胀大便泄泻又加乌药蓬术肚腹肿胀指按成窟脉沈细右寸为甚余曰此脾肺之气虚寒不能通调水道下输膀胱渗泄之令不行生化之气不运即东垣所云水饮留积若土之在雨中则为泥矣得和风暖日水湿去而阳化自然万物生长喜其脉相应遂与金匱加減肾气丸料服之小便即通数剂肿胀消半四肢渐温自能转侧又与六君加木香肉桂炮姜治之全愈後不戒七情饮食即为泄泻仍用前药加附子五味而安

一妇人饮食每用碗许稍加非大便不实必吞酸暖腐或以为胃火用二陈黄连枳实加内热作呕余曰此未传寒中故暖气吞酸胀满痞闷不信仍作火治虚症并至月经不止始信余以六君加炮姜木香数剂元气渐复饮食渐进又以补中益气加炮姜木香茯苓半夏数剂全愈後因饮食劳倦兼之怒气饮食顿少元气顿怯用前药更加发热诚似实火脉洪大按之而虚两尺如无此命门火衰用补中益气加姜桂及八味兼服两月余诸症悉愈此症若因中气虚

弱者用人参理中汤或六君子加木香炮姜不应用左金丸或越鞠丸虚寒者加附子或附子理中汤无有不愈

一妇人素有头晕不时而作月经迟而少余以为中气虚不能上升而头晕不能下化而经少用补中益气汤而愈後因劳而仆月经如涌此劳伤火动用前汤加五味子一剂服之即愈前症虽云亡血过多气无所附实因脾气亏损耳

一妇人年四十劳则足跟热痛余以为陰血虚极急用圣愈汤而痊後遍身搔痒误服风药发热抽搐肝脉洪数此乃汗家血虚火盛而生风以天竺胆星为丸用四物麦门五味芩连炙草山梔柴胡煎送而愈

一妇人两足发热日晡益甚小便自遗或时不利余以为肝热陰挺不能约制午煎用白术茯苓丹皮泽泻各五分乾山药山茱麦门各一钱熟地四钱酒炒黑黄柏七分知母五分不数剂而诸症悉愈若用分利之剂愈损真陰必致不起

一妇人月事未期而至发热自汗服清热止汗之剂反作渴头痛手掉身麻此因肝经风热用柴胡炒芩连炒山梔归芍生地丹皮各一钱参芪苓术各一钱五分川芎七分甘草五分二剂其汗全止更以补中益气而愈凡发热久者阳气亦自病须调补之

一妇人经行後劳役失调忽然昏愤面赤吐痰此元气虚火妄动急饮童便神思渐爽更用参芪各五钱芎归各三钱玄参柴胡山梔炙草各一钱一剂又用逍遥散加五味麦门稍定但体倦面黄此脾土真虚之色也又以十全大补加五味麦门治之而愈若投以发散之剂祸在反掌慎之

西宾钱思习子室年三十尚无嗣月经淋?无期夫妇异处者几年矣思习欲为娶妾以谋诸余余曰此郁怒伤肝脾虚火动而血不归经乃肝不能藏脾不能摄也当清肝火补脾气遂与加味归脾逍遥二药四剂送至其家仍告其姑曰服此病自愈而当受胎妾可无娶也果病愈次年生子

一妇人多怒经行或数日或半月即止三年後淋?无期肌体倦瘦口乾内热盗汗如洗日晡热甚余用参芪归术茯神远志枣仁麦门五味丹皮龙眼肉炙草柴胡升麻治之获痊此症先因怒动肝火血热妄行後乃脾气下陷不能摄血归源故用前药若胃热亡津液而经不行宜清胃若心火亢甚者宜清心若服燥药过多者宜养血若病久气血衰宜健脾胃

一妇人年五十内热晡热经水两三月一来此血虚而有热用逍遥散用山茱治之而愈若兼有痰作渴或小便不调或头晕白带宜用肾气丸

一妇人气血素虚经行不调饮食少思日晡热甚用十全大补加山茱山药丹皮麦门五味而愈次年秋患寒热或用清脾饮而元气愈弱余仍以前药而愈

一妇人生七胎矣月经不调两足发热年余而身亦热劳则足酸痛又年许唇肿裂痛又半年唇裂见血形体瘦倦饮食无味月水不通唇下肿如黑枣或用通经丸等药而死

一妇人善怒经不调唇肿裂服消毒药唇胀出血年余矣余曰当培养脾胃以滋化源不信仍服前药及追蚀状如翻花瘤而死

一膏粱之妇产後月经不调唇裂内热每熅作服寒凉之剂後不时出水余用加味清胃散而愈後值春令兼怒唇口肿胀寒热作呕痰甚少食用小柴胡加山梔茯苓桔梗诸症顿愈但内热仍作乃以加味逍遥散调理而安

一妇人性善怒产後唇肿内热用清热败毒唇口肿胀日晡热甚月水不调用降火化痰食少作呕大便不实唇出血水用理气消导胸膈痞满头目不清唇肿经闭用清胃行血肢体倦怠发热烦燥涎水涌出欲用通经之剂余曰病本七情肝脾亏损数行攻伐元气益虚故耳法当补陰益阳遂以加味归脾汤加味逍遥散补中益气汤如法调治元气渐复唇疮亦愈後因怒寒热耳痛胸膈胀闷唇熅肿甚此是怒动肝火而血伤遂用四物合小柴胡加山梔顿愈後又怒脇乳作胀肚腹作痛呕吐酸涎饮食不入小水不利此是怒动肝木克脾土乃用补脾气养脾血而愈又因劳役怒气饮食失时发热喘渴体倦不食亡血如崩唇肿炽甚此是肝经有火脾经气虚遂用补中益气加炒黑山梔芍药丹皮而愈此症但治其疮不固其本而死者多矣

经漏不止

经云陰虚阳搏谓之崩又云阳络伤血外溢陰络伤血内溢又云脾统血肝藏血其为患因脾胃虚损不能摄血归源或因肝经有火血得热而下行或因肝经有风血得风而妄行或因怒动肝火血热而沸腾或因脾经郁结血伤而不归经或因悲哀太过胞络伤而下崩治疗之法脾胃虚弱者六君子汤加当归川芎柴胡脾胃虚陷者补中益气汤加酒炒芍药山梔肝经血热者四物汤加柴胡山梔苓术肝经怒火者小柴胡汤加山梔芍药丹皮脾经郁火者归脾汤加山梔柴胡丹皮哀伤胞络者四君子汤加柴胡升麻山梔故东垣丹溪诸先生云凡下血症须用四君子以收功斯言厥有旨哉若大吐血後母以脉诊当急用独参汤救之其发热潮热咳 脉数乃是元气虚弱假热之脉也尤当用人参之类此等症候无不由脾胃先损而患故脉洪大察其中有胃气受补可救设用寒凉之药复伤脾胃生气使血反不归源也

治验【吐血等症附】

一妇人年将七十素有肝脾之症每作则饮食不进或胸膈不利或中腕作痛或大便作泻或小便不利余用逍遥散加山梔茯神远志木香而愈後忧女孀居不时吐紫血每作先倦怠烦热以前药加炒黑黄连三分吴茱二分顿愈复因怒吐赤血甚多燥渴垂死此血脱也法当补气乃用人参一两苓术当归各三钱陈皮炮黑乾姜各二钱炙草木香各一钱一剂顿止信药有回生之功不可委於天命也

一妇人年六十有四久郁怒头痛寒热春间乳内时痛服流气饮之类益甚不时有血如经行又大惊恐饮食不进夜寐不寧乳肿及两脇焮痛如炙午後色赤余以为肝脾郁火血燥先以逍遥散加酒炒黑龙胆一钱山梔一钱五分二剂肿痛顿退又二剂而全消再用归脾加炒梔贝母诸症悉愈

一妇人久患血崩肢体消瘦饮食到口但闻腥臊口出津液强食少许腹中作胀此血枯之症肺肝脾胃亏损之患用八珍汤乌贼鱼骨圆兼服两月而经行百余剂而康寧如旧矣

一妇人性急躁瘵後吐血发热两脇胀痛日晡为甚余以为怒气伤肝气血俱虚遂朝用逍遥散倍加炒黑山梔黄柏贝母桔梗麦门五味夕以归脾汤送地黄丸诸症并愈

一妇人素勤苦因丧子饮食少思忽吐血甚多而自止此後每劳则吐数口瘵症已具形体甚倦午前以补中益气午後以归脾汤送地黄而愈

一女子素郁结胸满食少吐血面赤用地黄丸及归脾加山梔贝母芍药而愈

一妇人面黄或赤时觉腰间或脐下作痛四肢困倦烦热不安其经若行先发寒热两肋如束其血如崩此脾胃亏损元气下陷与相火湿热所致用补中益气加防风芍药炒黑黄柏间以归脾汤调补化源血自归经矣一妇人因怒崩血久不已面青黄而或赤此肝木制脾土而血虚也用小柴胡合四物以清肝火生肝血又用归脾补中二汤兼益脾气生肝血而瘵此症若因肝经有风热而血不寧者用防风一味为丸以兼症之药煎送或肝经火动而血不寧者用条芩炒为丸以兼症之药煎送无有不效

一妇人性急每怒非太阳耳项喉齿胸乳作痛则胸满吞酸吐泻少食经行不止此皆肝火之症肝自病则外症见土受克则内症作若自病见用四物加白术茯苓柴胡炒梔炒龙胆若内症作用四君加柴胡芍药神麴吴茱炒过黄连诸症渐愈惟月经不止是血分有热脾气尚虚以逍遥散倍用白术茯苓陈皮又以补中益气加酒炒芍药兼服而调

乾内钱氏年五十岁辛丑患崩诸药罔效壬寅八月身热肢痛头晕涕出吐痰少食衆作火治转炽絶粒数日淹淹伏枕仅存呼吸兄方浙归诊之谓脾胃虚寒用八味丸料一剂使急煎服然胃虚久始下咽翌早遂索粥数匙再剂食倍热减痛止兼服八味丸良愈癸卯秋因劳役忧怒甲辰春夏崩复作六月二十日胸饱发热脊痛腰不可转神气怫郁或作内伤或作中暑崩水沸腾兼以便血烦渴引饮粒米不进至七月十三日昼夜晕愤时作时止计无所出仍屈兄诊之脉洪无伦按之微弱此无根之火内真寒而外假热也以十全大补加附子一剂晕止食粥三四匙崩血渐减日服八味丸始得全愈乾山妻两构危疾命悬须臾荷兄远救诚解倒悬之急处方神良知无出此野人怀思姑俟後日玉环之报云尔嘉靖甲辰季秋表弟方乾顿首拜书

大化内患月事不期崩血昏愤发热不寐或谓血热妄行投以寒剂益甚或谓胎成受伤投以

止血亦不效乃敬延先生诊之曰此脾气虚弱无以统摄故耳法当补脾而血自止矣用补中益气加炮姜不数剂而验惟终夜少睡惊悸另服八物汤更不效叩诸先生曰杂矣乃与归脾汤加炮姜以补心脾遂如初谨叙其梗槩以附医案俾後之患者得有所取法云嘉靖甲辰孟冬晚生归火化顿首拜书

经闭不行

夫经水陰血也属冲任二脉主上为乳汁下为月水其为患有因脾虚而不能生血者有因脾郁伤而血耗损者有因胃火而血消烁者有因胃损而血少者有因劳伤心而血少者有因怒伤肝而血少者有因肾水不能生肝而血少者有因肺气虚不能行血而闭者治疗之法若脾虚而不行者调而补之脾郁而不行者解而补之胃火而不行者清而补之脾胃损而不行者调而补之劳伤心血而不行者静而补之怒伤肝而不行者和而补之肺气虚而不行者补脾胃肾虚而不行者补脾肺经云损其肺者益其气损其心者调其荣卫损其脾者调其饮食适其寒温损其肝者缓其中损其肾者益其精审而治之庶无误矣

治验

一妇人停食饱闷发热或用人参养胃汤益甚再用木香槟榔丸泄泻吐痰腹中成块饮食少思又用二陈黄连厚朴之类前症益甚腹胀不食月经不至余以为中气亏损用补中益气加茯苓半夏三十余剂脾胃健而诸症愈又二十余剂而经至前症若脾虚不能消化饮食者宜用六君子汤补而消之虚寒者加砂仁木香炮姜温而补之其食积成形者以前药煎送保和丸大抵食积痞块症为有形所谓邪气胜则实真气夺则虚惟当养正辟邪而积自除矣虽然坚者削之客者除之胃气未虚或可少用若病久虚乏者则不宜用

一妇人饮食後或腹胀或吞酸服枳实丸吞酸益甚饮食日少胸膈满腿内酸痛畏见风寒又服养胃汤一剂腿内作痛又二剂腿浮肿月经不行余以为郁结所伤脾虚湿热下注侵晨用四君芎归二陈午後以前汤送越鞠丸饮食渐进诸症渐愈又用归脾八珍二汤兼服两月余而经行

一妇人性沈多虑月经不行胸满少食或作胀或吞酸余以为中气虚寒用补中益气加砂仁香附煨姜二剂胸膈和而饮食进更以六君加芎归贝母桔梗生姜大枣数剂脾胃健而经自调矣

一妇人素有胃火服清胃散而安後因劳役躁渴内热肌肉消瘦月经不行此胃火消烁陰血用逍遥散加丹皮炒栀以清胃热用八珍汤加茯苓远志以养脾血而经自行矣

一妇人久患疟形体怯弱内热晡热自汗盗汗饮食少思月事不行服通经丸虚症悉具此因虚而致疟疾因疟而致经闭用补中益气及六味地黄丸各百余剂疟愈而经自行

一妇人久患疟作则经不行形虚脉大头痛懒食大便泄泻小便淋漓口乾唇裂内热腹膨皆元气下陷相火合病用补中益气汤治之寻愈惟不时头痛乃如蔓荆子而痛止又兼六味地黄丸而经行

一妇人因劳耳鸣头痛体倦此元气不足用补中益气加麦门五味而痊二年後得子因饮食劳倦前症益甚月经不行晡热内热自汗盗汗用六味地黄丸补中益气汤顿愈前症若因血虚有火用四物加山梔柴胡不应八珍加前药若气虚弱用四君子若怒耳便聋或鸣者实也小柴胡加芎归山梔虚用补中益气加山梔若午前甚作火治用小柴胡加炒连炒梔气虚用补中益气午後甚作血虚用四物加白术茯苓若陰虛火动或兼痰甚作渴必用地黄丸以壮水之主经云头痛耳鸣九窍不利肠胃之所生也脾胃一虚耳目九窍皆为之病

一妇人胃气虚弱为哭母吐血咳 发热盗汗经水三月不行余以为悲则伤肺思则伤脾遂朝服补中益气加桔梗贝母知母夕用归脾汤送地黄丸而愈

帶下

或因六淫七情或因醉饱房劳或因膏粱厚味或服燥剂所致脾胃亏损阳气下陷或湿痰下注蘊积而成故言帶也凡此皆当壮脾胃升阳气为主佐以各经见症之药若属肝则青小柴胡加山梔或湿热壅滯小便赤澀龙胆泻肝汤属心则赤小柴胡加黄连山梔当归属肺则白补中益气加山梔属脾则黄六君子加山梔柴胡不应归脾汤属肾则黑六味地黄丸若气血俱虚八珍汤阳气下陷补中益气汤湿痰下注前汤加茯苓半夏苍术黄柏气虚痰饮下注四七汤送肾气丸

治驗

一妇人年踰六十内热口乾劳则头晕吐痰帶下或用化痰行气前症益甚饮食愈少肢体或麻略服祛风化痰肢体常麻手足或冷或热日渐消瘦余曰症属脾气虚弱而不能生肺祛风之剂复损诸经也当滋化源遂用补中益气加茯苓半夏炮姜二十余剂脾气渐复饮食渐加诸症顿愈

一孀妇腹胀脇痛内热晡热月经不调肢体酸麻不时吐痰或用清气化痰喉间不利帶下青黄腹脇膨胀用行气之剂胸膈不利肢体时麻此郁怒伤损肝脾前药益甚也朝用归脾汤以解脾郁生脾气夕用加味逍遥散以生肝血清肝火兼服百余剂而诸症愈

一妇人症久兼之帶下发後口乾倦甚余用七味白术散加麦门五味作大剂煎与恣饮再发稍可仍用补中益气加茯苓半夏十余剂而愈凡截疟余常以参术各一两生姜四两煨熟煎服即止或以大剂补中益气加煨姜其功尤捷

一妇人头晕唾痰胸满气喘得食稍缓苦於白帶二十余年矣诸药不应余曰此气虚而痰饮

也饮愈而带始愈遂用六味地黄丸不月而验

一妇人耳鸣胸痞内热口乾喉中若有一核吞吐不利月经不调兼之带下余以为肝脾郁结用归脾汤加半夏山栀升麻柴胡间以四七汤下白丸子而愈

一妇人吞酸胸满食少便泄月经不调服法制清气化痰丸两膝渐肿寒热往来带下黄白面黄体倦余以为脾胃虚湿热下注用补中益气倍用参术加茯苓半夏炮姜而愈若因怒发热少食或两腿赤肿或指缝常湿用六君加柴胡升麻及补中益气

一妇人带下四肢无力劳则倦怠余曰四肢者土也此属脾胃虚弱湿痰下注遂以补中益气济生归脾二药治之而愈

一妇人年踰六十带下黄白因怒胸膈不利饮食少思服消导利气之药反痰喘胸满大便下血余曰此脾气亏损不能摄血归源也用补中益气加茯苓半夏炮姜四剂诸症顿愈又用八珍加柴胡炒栀而安

血分水分

二症或因饮食起居失养或因六淫七情失宜以致脾胃亏损不能发生统摄气血乖违行失常道若先因经水断絶後至四肢浮肿小便不通血化为水名曰血分宜用椒仁丸治之若先小便不利後至身面浮肿经水不通水化为血名曰水分宜用葶苈丸治之此属形气不足邪淫隧道必用此药以宣导其邪而佐以辅补元气庶使药力有所仗而行则邪自不能容而真气亦不至於复伤矣

治验

一妇人月经不调晡热内热饮食少思肌体消瘦小便频数服济陰丸月经不行四肢浮肿小便不通余曰此血分也朝用椒仁丸夕用归脾汤渐愈乃以人参丸代椒仁丸两月余将愈专用归脾汤五十余剂而痊一妇月经不调小便短少或用清热分利之药小便不利三月余身面浮肿月经不通余曰此水分也遂朝用葶苈丸夕用归脾汤渐愈乃用人参丸间服而愈已上二症作脾虚水气用分利等药而殁者多矣惜哉

小便出血

妇人小便尿血或因膏粱炙搏或因醉饱入房或因饮食劳役或因六淫七情以致元气亏损不能统摄归源若因怒动肝火者用加味逍遥散调送髮灰肝经风热者送子芩丸久而血虚者用八珍送髮灰若膏粱积热者用清胃散加槐花甘草房劳所伤者用六君加柴胡升麻风热所伤者用四君加防风枳殼凡久而亏损元气者用补中益气为主郁结伤脾者用济生归脾为主

治验

一妇人尿血因怒气寒热或头痛或脇胀用加味逍遥诸症稍愈但头痛此阳气虚用补中益气加蔓荆子而痊後郁怒小腹内痛次日尿血热甚仍用前散加龙胆草并归脾汤将愈因饮食所伤血仍作彻夜不寐心忡不寧此脾血尚虚用前汤而痊

一妇人尿血久用寒凉止血药面色痿黄肢体倦怠饮食不甘晡热作渴三年矣此前药复伤脾胃元气下陷而不能摄血也盖病久郁结伤脾用补中益气以补元气用归脾汤以解脾郁使血归经更用加味逍遥以调养肝血不月诸症渐愈三月而痊

热入血室

妇人伤寒或劳役或怒气发热适遇经行以致热入血室或血不行或血不止令人昼则明了安静夜则谵语如见鬼状用小柴胡加生地黄血虚者用四物加生地柴胡切不可犯胃气若病既愈而血未止或热未已元气素弱用补中益气脾气素郁用济生归脾血气素弱用十全大补庶无误矣

治验

一妇人经行感冒风寒日间安静至夜谵语用小柴胡加生地治之顿安但内热头晕用补中益气加蔓荆子而愈後因怒恼寒热谵语胸脇胀痛小便频数月经先期此是肝火血热妄行用加味逍遥加生地而愈一妇人因怒寒热头痛谵言妄语日晡至夜益甚而经暴至盖肝藏血此怒动火而血妄行用加味逍遥散加生地治之神思顿清但食少体倦月经未已盖脾统血此脾气虚不能摄用补中益气治之月经渐止

一妇人怀抱素郁感冒经行谵语服发散之剂不应用寒凉降火前症益甚更加月经不止肚腹作痛呕吐不食痰涎自出此脾胃虚寒用香砂六君脾胃渐健诸症渐退又用归脾汤而全愈

师尼寡妇寒热

宋褚氏疗师尼寡妇别制方药谓独陰无阳致血气交争乍寒乍热如疟或腰背作痛而寒热其肝脉弦出寸口是其症也若室女出嫁愆期而寒热亦然盖男子精盛则思室女子血盛以怀胎此天地自然之理也治以小柴胡加生地久而血虚佐以加味逍遥散若兼亏损肝经而寒热者佐以八珍汤若兼亏损元气而寒热者佐以补中益气汤若兼郁伤脾气而寒热者佐以济生归脾汤此症多兼经候不调当详孰为缓急而治之

治验

一寡妇因怒致不时寒热久而不已肝脉弦紧用小柴胡加生地治之而愈但见风寒热仍作此是脾胃气虚用加味归脾补中益气二汤兼服而止

一妇人因夫经商久不归发寒热月经旬余方止服降火凉血反潮热内热自汗盗汗月经频数余曰热汗气血虚也经频肝脾虚也用归脾汤六味丸而愈常治兼症既愈而寒热当仍用本症药

一室女寒热左手脉弦长而出寸口用小柴胡加生地乌梅治之而愈既嫁而诸症悉退

一室女久患寒热月经不调先以小柴胡加生地治之少愈更以生地黄丸而痊

一放出宫女年踰三十两胯作痛肉色不变大小便中作痛如淋登厕尤痛此瘀血渍入隧道为患乃男女失合之症也难治後溃不敛又患瘰?而殁此妇为吾乡汤氏妾汤为商常在外可见此妇在内久怀忧郁及出外又不能如愿是以致生此疾愈见瘰?流注乃七情气血损伤不可用攻伐皎然矣按精血篇云女人天癸既至踰十年无男子合则不调未踰十年思男子合亦不调不调则旧血不出新血误行或渍而入骨或变而为肿或虽合而难子合多则?枯虚人产乳衆则血枯杀人观其精血思过半矣

一室女年十七?久不愈天癸未通发热咳 饮食少思或欲用通经丸余曰此症潮热经候不调者不治所喜脉不濡且不潮热尚可治但养气血益津液其经自行惑於速效仍用之余曰非其治也此乃慄悍之剂大助阳火陰血得之则妄行脾胃得之则愈虚经果通而不止饮食愈少更加潮热遂致不救

历节痛风【即白虎历节风】

历节痛或因饮食起居失节或因七情六淫失宜以致脾胃亏损腠理不密外邪所侵或为肝火内动肝血耗损或为肢体疼痛或为肢节难伸或为卒然掣痛或为走痛无常或内热晡热自汗盗汗或经候不调饮食不甘其治法属风邪者小续命汤走注疼痛者漏芦散骨节疼痛者四生丸湿热痛者清燥汤兼痰佐以二陈肝火者加味逍遥散加羌活川芎脾郁者加味归脾加羌活川芎血虚者四物加羌活川芎气虚者四君加羌活川芎气血俱虚者八珍加羌活川芎月经先期而痛者加味逍遥散为主月经过期而痛者补中益气为主大抵痛而不敢按者属病气元气俱实也手按而痛缓者病气元气俱虚也若劳役而作痛者元气虚也饮食失宜而作痛者脾胃虚也怒恼而作痛者肝火也经行而作痛血虚也凡此皆固元气为主而佐以治病之药

治验

一妇人自汗盗汗发热晡热体倦少食月经不调吐痰甚多二年矣遍身作痛天陰风雨益甚用小续命汤而痛止用补中益气加味归脾二汤三十余剂而愈自汗等症皆郁结伤损脾气

不能输养诸藏所致故用前二汤专主脾胃若用寒凉降火理气化痰复伤生气多致不起

一妇人因怒月经去多发热作渴左目紧小头项动掉四肢抽搐遍身疼痛此怒动肝火肝血虚而内生风用加味逍遥加鈎藤数剂诸症渐愈又用八珍汤调理而痊

一妇人月经先期素有痛症每劳必作用衆手重按痛稍止此气血虚而有火用十全大补加独活治之而痛痊用六味丸逍遥散而经调

一妇人历节作痛发热作渴饮食少思月经过期诸药不应脉洪大按之微细用附子八物四剂而痛止用加味逍遥而元气复六味丸而月经调

一妇人体肥胖素内热月经先期患痛风下身微肿痛甚小便频数身重脉缓症属风湿而血虚有热先用羌活胜湿汤四剂肿痛渐愈用清燥汤数剂小便渐清用加味逍遥十余剂内热渐愈为饮食停滯发热仍痛面目浮肿用六君加柴胡升麻而愈又因怒气小腹痞闷寒热呕吐此木侮脾土用前药加山梔木香而安惟小腹下坠似欲去後此脾气下陷用补中益气而愈後因劳役怒气作呕吐痰遍身肿痛月经忽来寒热用六君加柴胡山梔以扶元气清肝火肿痛呕吐悉退用补中益气以升阳气健营气月经寒热悉痊

一妇人饮食少思畏见风寒患痛风呕吐寒热脉弦紧用附子八物四肢痛愈用独活寄生腰痛亦痊惟两膝肿痛用大防风而消用加味归脾逍遥而元气复

流注

妇人流注或因忧思郁怒亏损肝脾或因产後劳役复伤气血以致营气不从逆於肉理或因腠理不密外邪客之或湿痰流注或跌扑血滯或产後恶露盖气流而注血注而凝或生於四肢关节或流於胸腹腰臀或结块或漫肿皆属虚损急用葱熨及益气养荣汤则未成自消已成自溃若久而肿起作痛肢体倦怠病气有余形气不足尚可治若漫肿微痛属形气病气俱不足最难治不作脓或脓成不溃气血虚也用八珍汤憎寒畏寒阳气虚也十全大补汤晡热内热陰气虚也四物加参术作呕欲呕胃气虚也六君加炮姜食少体倦脾气虚也补中益气加茯苓半夏四肢逆冷小便频数命门火衰也八味丸小便频数痰盛作渴肾水亏损也六味丸月经过期多日不止肝脾虚也八珍汤加柴胡丹皮凡溃而气血虚弱不斂者更用十全大补汤煎膏外补之久溃而寒邪凝滯不斂者用豆豉饼祛散之其溃而内有脓管不斂者用针头散腐化之自愈若不补气血不节饮食不慎起居不戒七情或用寒凉剋伐皆不治

治验

一妇人左臂患之年许不溃坚硬不痛肉色不变脉弱少食月经过期日晡发热劳怒则痛遂与参芪归术川芎芍药熟地贝母远志香附桔梗丹皮甘草百余贴而消

一妇人暴怒脇下肿痛胸膈不利时或气走作痛与方脉流气饮数剂而止更以小柴胡对四物加香附贝母月余而愈

一妇人因怒脇下肿痛胸膈不利脉沈滞以方脉流气饮数剂少愈以小柴胡对二陈加青皮桔梗贝母数剂顿退更以小柴胡对四物二十余剂而痊

一妇人因闪肭肩患肿遍身痛遂以黑丸子二服而痛止以方脉流气饮二剂而肿消更以二陈对四物加香附枳壳桔梗而全愈

一妇人腿患筋挛骨痛诸药不应脉迟紧用大防风汤二剂顿退又二剂而安○又一妇患之亦然先用前汤二剂更服黑丸子而痊此二患若失治溃成败证一妇人溃後发热予以为虚彼不信乃服败毒药果发大热竟至不救夫溃疡虽有表证发热宜以托里为主佐以表散之剂何况瘰?流注乎若气血充实经络通畅决无患者此证之因皆由气血素亏或七情所伤经络郁结或腠理不密六淫外侵隧道壅塞若不审其所因辨其虚实鲜不悞人

瘰?

妇人瘰?或因胎产血崩亏损肾肝或因忧思郁怒伤损肝脾或因恚怒风热肝胆血燥或因水涸血虚筋挛则累累然如贯珠故多生於耳前後项侧胸脇间若寒热肿痛乃肝经气动而为病用柴胡栀子散以清肝火为主而佐以逍遥散以养肝血若寒热既止而核不消乃肝经之血亦病用加味四物汤以养肝血为主而佐以柴胡栀子散以清肝火若初生如豆粒附着於筋肉色不变内热口乾精神倦怠久不消溃乃肝脾亏损用逍遥散归脾汤六味丸健脾土培肝木切不可轻用散坚追毒之剂外台秘要云肝肾虚热则生?矣病机云瘰?不系膏粱丹毒因虚劳气郁所致补形气调经脉其疮当自消散误下之先犯病禁经禁若久溃脉浮大邪火盛也面色?白金尅木也皆不治若赤脉贯瞳子有几条则几年死

治验

一妇人久而不愈或以为木旺之症用散肿溃坚汤伐之肿硬益甚余以为肝经气血亏损当滋化源用六味地黄丸补中益气汤至春而愈此症若肝经风火暴病元气无亏宜用前汤若风木旺而自病宜用泻青丸虚者用地黄丸若水不能生木亦用此丸若金来尅木宜补脾土生肾水火凡风木之病但壮脾土则木自不能尅矣若行伐肝则脾胃先伤而木反来尅土矣

一妇患之恐不起致少寐年余?破脓水淋漓经水或五十日或两月余一至误服通经丸展转无寐午前恶寒午後发热余以为思虑亏损脾血用归脾汤作丸午前以六君子送下午後以逍遥散送下两月余得寐半载後经行如期年余而疮愈

一?妇溃後发热烦躁作渴脉大而虚以当归补血汤六剂而安热退又以圣愈汤数剂而全愈更以八珍加贝母远志三十余剂而敛

一妇人项结核寒热头痛脇乳胀痛内热口苦小便频数症属肝火血虚用四物加柴胡山梔胆草而愈又用加味逍遥散而安

一妇人瘰?後遍身作痒脉大按而虚以十全大补加香附治之而愈大凡潰後午前痒作气虚午後痒作血虚若作风症治之必死

一妇人项核肿痛察其气血俱实先以必效散一服下之更以益气养荣汤补之三十余剂而消常治此症若必欲出脓但虚弱者先用前汤待其气血稍充乃用必效散去其毒仍用补药无不效未成脓者灸肘尖调经解郁及隔蒜灸多自消有脓即针之若气血复而核不消却服散坚之剂月许不应气血不损须用必效散其毒一下即多服益气养荣汤如不应亦灸肘尖如疮口不斂者更用豆?饼琥珀膏若气血俱虚或不慎饮食七情者不治然此症以气血为主气血壮实不用追蚀之剂亦能自腐但取去使易於收敛耳血虚而用追蚀不惟徒治适足以败矣

乳痈乳岩

妇人乳痈属胆胃二腑热毒气血壅滞故初起肿痛发於肌表肉色焮赤其人表热发热或发寒热或憎寒头痛烦渴饮冷用人参败毒散神效瓜蒌散加味逍遥散治之其自消散若至数日之间脓成溃窍稠脓涌出脓尽自愈若气血虚弱或误用败毒久不收斂脓清脉大则难治乳岩属肝脾二臟郁怒气血亏损故初起小核结於乳内肉色如故其人内热夜热五心发热肢体倦瘦月经不调用加味归脾汤加味逍遥散神效瓜蒌散多自消散若荏苒日渐大□岩色赤出水腐溃深洞用前归脾汤等药可延岁月若误用攻伐危殆迫矣大凡乳症若因恚怒宜疏肝清热焮痛寒热宜发表散邪肿焮痛甚宜清肝消毒并隔蒜灸不作脓或脓不溃补气血为主不收斂成脓稀补脾胃为主脓出反痛或发寒热补气血为主或晡热内热补血为主若饮食少思或作呕吐补胃为主饮食难化或作泄泻补脾为主劳碌肿痛补气血为主怒气肿痛养肝血为主儿口所吹须吮通揉散成痈治以前法潮热暮热亦主前药大抵男子多由房劳耗伤肝肾妇人郁怒亏损肝脾治者审之【若以孕妇患此名曰内吹然其所致之因则一惟用药不可犯其胎耳】

治验

一妇人内热脇胀两乳不时作痛口内不时辛辣若卧而起急则脐下牵痛此带脉为患用小柴胡加青皮黄连山梔二剂而瘥

一妇人因怒两乳肿兼头痛寒热用人参败毒散二剂表症已退用小柴胡加芎归枳殼桔梗四剂而消一妇人久郁右乳内肿硬用八珍汤加远志贝母柴胡青皮及隔蒜灸兼服神效瓜蒌散两月余而消

一妇人左乳内肿如桃不痛不赤发热渐瘦用八珍加香附远志青皮柴胡百余剂又兼服神

效瓜蒌散三十余剂脓溃而愈

一妇人郁久左乳内结核如杏许三月不消心脉濡而脾脉大按之无力以八珍加贝母远志香附柴胡青皮桔梗五十余剂而溃又三十余剂而愈

一妇人禀实性躁怀抱久郁左乳内结一核按之微痛以连翘饮子二十余剂少退更以八珍加青皮香附桔梗贝母二十余剂而消

一妇人发热作渴至夜尤甚两乳忽肿肝脉洪数乃热入血室也用加味小柴胡汤热止肿消

一妇人因怒左乳作痛发热表散大过肿热益甚用益气养荣汤数剂热止脓成不从用针肿胀热渴脓大泄仍以前汤月余始愈此症若脓成未破有薄皮剥起者用代针之剂其脓自出不若及时用针不致大溃若脓血未尽辄用生肌反助其邪慎之

一妇人因怒左乳作痛胸膈不利以方脉流气饮加木香青皮四剂而安

一妇人脓清肿硬面黄食少内热晡热自汗盗汗月经不行此肝脾气血俱虚用十全大补加远志贝母及补中益气各三十余剂外用葱熨患处诸症寻愈

一妇人脓成胀痛余欲针之不从数日始针出败脓三四碗许虚症蜂起几至危殆用大补两月余而安若元气虚弱不作脓者用益气养荣汤补之脓成即针若肿痛寒热怠惰食少或至夜热甚用补中益气汤兼逍遥散补之为善

一产妇因乳少服药通之致乳房肿胀发热作渴以玉露散补之而愈夫乳汁乃气血所化在上为乳在下为经若冲任之脉盛脾胃之气壮则乳汁多而浓衰则淡而少所乳之子亦弱而多病又有屡产无乳或大便濡滞乃亡津液也当滋化源

一妇人右乳内结三核年余不消朝寒暮热饮食不甘此乳岩以益气养荣汤百余剂血气渐复更以木香饼熨之喜其谨疾年余而消

至英内年二十有五素虚弱多郁怒时疫後脾胃愈虚饮食愈少又值气忿右乳脇下红肿应内作痛用炒麸皮熨之肿虽少散内痛益甚转侧胸中如物悬坠遂与加減四物汤内肿如鷺卵外大如盘胸脇背心相引而痛夜热势甚治者皆以攻毒为言叩诸先生乃云此病後脾弱而复怒伤肝治法惟主於健脾气平肝火则肿自消而病自愈矣承惠方以八物加陈皮黄芩柴胡山梔白芷服八剂病减六七去白芷加青皮木香桔梗又六剂而全愈奏功之奇获效之速盖出於寻常万万也感激厚恩昕夕不忘錄此乞附医案以诏後之患者毋为攻毒者之所惑也晚生尤至英顿首再拜书

一妇人乳内结核年余晡热少食余欲用益气养荣汤治之彼以为缓乃服行气之剂其势愈

甚潰而日出清脓而殁

郭氏妾乃放出宫女乳内结一核如栗亦服流气等药大如覆碗坚硬如石出水而殁

血风疮

妇人血风疮因肝脾二经风热郁火血燥所致其外症身发疙 或如丹毒痒痛不常搔破成疮脓水淋漓其内症月经无定小便不调夜热内热自汗盗汗恶寒憎寒肢体倦怠饮食不甘寒热往来若发热作痛乃肝经风热血燥用当归饮加柴胡山梔若体倦食少口乾潮热乃肝经郁火伤血用加味逍遥散若疙 痛痒寒热往来乃肝经风热伤血用小柴胡加山梔黄连若夜间发热作渴谵语乃热入血室用小柴胡加生地黄血虚四物合小柴胡汤若无寐盗汗内热晡热乃脾经血虚用归脾汤兼寒热加山梔熟地若用风药复伤陰血反致他症

治验

一妇人素清苦四肢患此误用败毒寒凉晡热内热自汗盗汗月经不调口乾咽燥此郁结伤脾四肢者脾主之用归脾汤数剂後兼逍遥散五十余剂而愈

一妇人性躁寒热口苦脇痛耳鸣腹胀溺澹年余矣症属肝火用四君加柴胡炒山梔炒龙胆数剂乃与逍遥散兼服而疮愈又与六味丸及逍遥散七十余剂诸症悉退若有愈後身起白屑搔则肌肤如帛所隔此气血虚不能营於腠理用大补之剂若有愈後发热身起疙 痒痛搔破脓水淋漓经候不调此肝火血热用四物加柴胡山梔白术茯苓丹皮甘草

一妇人日晡身痒月余口乾又月余成疮服祛风之剂脓水淋漓午前畏寒午後发热殊类风症余谓此肝经郁火外邪所搏用补中益气加山梔鈎藤又以逍遥散加川芎贝母而愈

一妇人搔痒发热日晡益甚肤见赤?月经过期此血虚有热以逍遥散倍加熟地热止痒退更以四物加柴胡参芪炙草茯苓调理遂愈

一女子十二岁善怒遍身作痒用柴胡川芎山梔芍药以清肝火以生地当归黄芩凉肝血以白术茯苓甘草健脾土而愈半载後遍身起赤?或时眩暈此肝火炽甚血得热而妄行是夜果经至

廉疮

妇人两廉生疮或因胎产饮食失宜伤损脾胃或因忧思郁怒亏损肝脾以致湿热下注或外邪所侵外廉属足三阳可治内廉属足三陰难治若初起发肿赤痛属湿毒所乘用人参败毒或槟苏败毒散若漫肿作痛或不肿不痛属脾虚湿热下注用补中益气或八珍汤或脓水淋漓体倦少食内热口乾属脾气虚弱用补中益气加茯苓酒炒芍药若午後头目不清属陰火

用前汤加酒炒黑黄栢若午後发热体倦属血虚用前汤加川芎熟地若怀抱不乐而甚用归脾汤加山梔柴胡若恚怒气逆而甚用补中益气加川芎山梔若内热体倦痰涎口疮属脾肾虚热用六味丸若肢体畏寒饮食少思属脾肾虚寒用八味丸火抵色赤属热毒易治色黯属脾肾虚寒难治设误用攻伐复伤胃气难保其生

治验

一妇人患之四畔微赤作痛重坠脓水淋漓胸脇不利饮食少思内热口苦夜间少寐此属脾虚郁伤用归脾汤解郁结而生脾血用补中益气加茯苓半夏补脾气而除湿热寻愈

一妇人久不愈色赤微热日晡焮肿形体虚弱饮食少思劳则喘渴恶寒发热此脾虚下陷用补中益气汤而愈

一妇人三年矣色黯肿硬恶寒发热饮食少思形体消瘦作渴饮汤饮食稍多或腹胀或泄泻或作呕或吞酸此脾气虚寒用补中益气加乾姜肉桂五十余剂而愈一妇人因入【缺】朝步履恶寒发热倦怠懒食疮口出血此劳伤元气不能摄血归经用补中益气汤而愈一妇人因怒寒热头眩或耳项胸脇胀痛或小腹陰道闷坠或小便频数下血此属肝火血热先用小柴胡汤加炒黑山梔川芎当归车前二剂诸症顿退又用加味逍遥散补其陰血而愈後因饮食劳倦前症复作疮口出血用补中益气汤治之而愈

一妇人患将两月焮赤肿痛小便频数饮食如常用活命饮二剂诸症悉退又用八珍汤而痊

一妇人患此焮痛恶寒发热用檳苏败毒散而寒热退用仙方活命饮而焮痛止再用补中益气汤而形气健

陰疮【交接出血陰挺陰痒陰虫附】

妇人陰疮乃七情郁火伤损肝脾湿热下注其外症有陰中舒出如蛇俗呼陰挺有翻突如饼俗呼陰菌亦有如鸡冠花亦有生诸虫亦有肿痛湿痒溃烂出水胀闷脱坠者其内症口乾内热体倦经候不调饮食无味晡热发热胸膈不利脇肋不调小腹痞胀赤白帶下小水淋瀝其治法肿痛者宜用四物加柴胡山梔丹皮胆草湿痒者宜用归脾加山梔丹皮柴胡淋瀝者宜用龙胆泻肝加白术丹皮溃腐者宜用加味逍遥散肿闷脱坠者宜用补中益气加山梔丹皮佐以外治之法备见治验

治验

一妇人胸膈不利内热作渴饮食不甘肢体倦怠陰中闷痒小便赤瀝此郁怒所致用归脾加山梔而愈後因怒患处并小腹胀痛用小柴胡加山梔芎归芍药而愈但内热晡热用逍遥散加山梔而愈後因劳役发热患处肿胀小便仍瀝用补中益气加山梔茯苓丹皮而愈一妇人

陰中突出如菌四围肿痛小便频数内热晡热似痒似痛小腹重坠此肝脾郁结之症盖肝火湿热而肿痛脾虚下陷而重坠也先以补中益气加山梔茯苓车前青皮以清肝火升脾气渐愈更以归脾汤加山梔茯苓川芎调理更以生猪脂和藜芦末涂之而收入一妇人陰中挺出一条五寸许闷痛重坠水出淋漓小便澀滯夕与龙胆泻肝汤分利湿热朝与补中益气汤升补脾气诸症渐愈再与归脾加山梔茯苓川芎黄柏兼服调理而愈後因劳役或怒气下部湿痒小水不利仍用前药即愈亦有尺许者亦有生诸虫物者皆用此治一妇人腐溃脓水淋漓肿痛寒热小便赤澀内热作渴肢体倦怠胸膈不利饮食少思三月余矣用补中益气内柴胡升麻各用一钱加茯苓一钱炒山梔二钱数剂少愈又与归脾加山梔川芎茯苓三十余剂诸症悉退惟内热尚在再与逍遥散倍用山梔而愈

一妇人素性急陰内或痛小便赤澀怒则益甚或发热或寒热治以芎归炒梔柴胡苓术丹皮泽泻炒芍炒车前炒连生草数剂渐愈乃去黄连泽泻又数剂而全愈一妇人素郁闷陰内痒痛不时出水饮食少思肢体倦怠用归脾加丹皮山梔芍药柴胡生草主之而安一妇人陰内痒痛内热倦怠饮食少思用参芪归术陈皮柴胡炒梔炒车前升麻芍药丹皮茯苓治之而痊若陰中有虫痒痛亦属肝木以桃仁研膏和雄黄末纳陰中以杀之仍用清肝解郁有以鸡肝纳之者乃取虫之法也

一妇人交接违理出血作痛发热口乾误服寒凉之药前症益甚不时欲呕饮食少思此症属肝经而药复伤脾也先用六君子加柴胡而脾胃渐愈乃用加味逍遥散而患处亦痊

一妇人每交接辄出血作痛敷服皆凉血止痛之剂不时出血甚多此肝伤而不能藏血脾伤而不能摄血也用补中益气济生归脾二汤而愈若交接出血用熟艾热裹入陰中若交接违理而出血用乱发青布烧为末敷之血自止若出血过多而见他症但用前药调补肝脾诸症自愈矣

一妇人陰肿下坠闷痛出水胸腹不利小便频数内热晡热口苦耳鸣先用小柴胡加车前胆草苓术升麻二剂稍缓又用加味逍遥加升麻数剂稍愈乃以加味归脾加升麻柴胡并补中益气加山梔数剂渐愈仍用加味逍遥加味芎归二药调理而痊

一妇人热痛用寒凉败毒饮食不入时欲呕吐小腹重坠似欲去後此脾胃亏损元气下陷症属虚寒先用补中益气加炮姜二剂重坠如失再用前汤加茯苓半夏二十余剂而愈乃以归脾少加柴胡升麻六味地黄丸调理两月余而康

附方并注

保和丸 治饮食停滯胸膈痞满或作吞酸等症神麴【炒】半夏茯苓【各一两】萝卜子【炒】陈皮 连翘【各五钱】山楂【取肉二两蒸】

右为末粥丸加白术二两名大安丸

越鞠丸 治六郁胸膈痞满呕吐吞酸或湿热腹胀腿脚酸疼等症

苍术【炒】神麴【炒】香附 山楂 山梔【炒】抚芎 麦芽【炒各等分】

右各另为末水调炒麴麪糊为丸如桐子大每服五七十丸白滚汤下

右金丸【一名四今丸】治肝火胸脇刺痛或发寒热或头目作痛小便淋秘或小腹疼痛一切肝火之症

黄连【六两】吴茱萸【一两汤煮片时用】

右为末粥丸白术陈皮汤下

椒仁丸 治先因经水断絶後至四肢浮肿小便不通血化为水

椒仁 甘遂 附子【炮】续随子【去皮研】郁李仁 黑牵牛 五灵脂【研碎】当归【各五钱】吴茱萸【五钱】延胡索【五钱】芫花【酸浸一钱】石膏 胆矾 人言【各一钱】斑猫【十个糯米炒黄去米不用】蛭青【十枚去头翅足同糯米炒黄去米不用】

右为末面糊为丸如豌豆大每服一丸橘皮汤下此方药虽峻利所用不多若畏而不服有

养病害身之患常治虚弱之人亦未见其有

误也

血分葶?丸 治先因小便不利後至身面浮肿经水不通水化为血

葶?【研炒】续随子【去殼各半两研】乾笋末【一两】

右为末枣肉丸如桐子大每服七丸煎扁竹汤下如大便利者减续随子葶?各一钱加白术五钱

人参丸 治经脉不利化为水流走四肢悉皆肿满名曰血分其候与水相类若作水治之非也宜用此人参 当归 桂心 瞿麦穗 赤芍药

白茯苓【各半两】葶?【炒另研一钱】大黄【湿纸裹饭上蒸熟去纸切炒】

右为末炼蜜丸桐子大每服十五丸至二三十丸空心饮汤下

栝子仁丸 治血虚有火月经耗损渐至不通日渐羸瘦而生潮热慎母以毒药通之宜栝子仁

丸泽兰汤主之

柏子仁【炒研】牛膝【酒拌】卷柏【各半两】泽兰叶
续断【各二两】熟地黄【用生者三两酒拌蒸半日忌铁器杵膏】

右为末入地黄膏加炼蜜丸桐子大每服三十丸空心米饮下

泽兰汤 治症同前

泽兰叶【三两】当归【酒拌】芍药【炒各一两】甘草【五钱】

右为粗末每服五钱水二锺煎至一锺去粗温服

独参汤 治一切失血恶寒发热作渴烦躁并宜此药补气盖血生於气阳生陰长之理也用人
参二两枣十枚水煎服

玉露散 治乳脉不行身体壮热头目昏痛大便澁滯等症人参 白茯苓 桔梗 川芎 白芷
当归芍药【各一钱】甘草【五分】

右水煎服 若热甚大便秘量加炒大黄

圣愈汤 治血虚心烦睡卧不寧或五心烦热

当归【酒拌】黄芪【炒各一钱】生地黄【酒拌】川芎 人参
熟地黄【酒拌蒸半日各五钱】

右水煎服

当归饮 治血热癰 痒痛脓水淋漓发热等症当归 白芍药 川芎 生地黄
白蒺藜【各一钱】防风 荆芥【各五分】黄芪【一钱】何首乌 甘草【五分】

右水煎服

龙胆泻肝汤 治肝经湿热下部肿焮作痛小便澁滯陰挺如菌或出物如虫等症

车前子【炒】木通【各五钱】泽泻【一钱】生地黄【酒拌】当归尾【酒拌】山梔【
炒】黄芩 生甘草【各五分】龙胆草【酒拌炒黄一钱】

右水煎服

乌贼鱼骨丸 治妇人血枯胸膈四肢满妨於食饮病至闻腥臊臭气先唾血出清液或前後泄血目眩转月事衰少不来

乌贼鱼骨【去甲四两】 蔘茹【一两】

右为末以雀卵和成剂丸如小豆大每服五丸加至十丸以鲍鱼煎汤下以饭压之

青州白丸子 治风痰咳 或牙关紧急不知人事或痰滞作麻

南星【三两】 半夏【七两】 白附子【二两】 川乌【半两各生用】

右为末绢袋盛井水摆浸仍换水浸三五日晒乾糯米粉丸如急用以姜汁糊丸亦可

四七汤 治七情郁结咽间如有一核吞吐不利或中脘痞满痰涎壅喘或恶心少食

紫苏叶【一钱】 厚朴【一钱五分】 茯苓【一钱】 半夏【姜制七分】

右姜枣水煎服

若白带以此汤送前丸其效如神

当归龙荟丸 治肝经症脇下作痛或有积块或下疳便痢小便淋瀝或瘀血凝滞小便作痛

当归【酒拌】 梔子仁【炒】 黄连 龙胆草【酒拌炒】 青皮

黄芩【各一两】 大黄【酒拌炒】 芦荟 青黛

柴胡【各五钱】 木香【二钱五分】 麝香【五分另研】

右为末炒神麴糊丸每服二三十丸姜汤下

阿魏膏 治一切痞块

羌活 独活 玄参 官桂 赤芍药 穿山甲 生地黄 两头尖 大黄 白芷 天麻【各五钱】

红花【四钱】 槐柳桃枝【各三钱】 木鼈子【二十枚去殼】 乱髮【如鸡子大一块】

右用香油二斤四两煎黑去粗入发再煎化仍去粗徐下黄丹煎软硬得中方入芒硝阿魏苏合油乳香没药五钱麝香三钱调匀成膏矣摊贴患处内服芦荟丸等黄丹须真正者効凡贴膏药先用朴硝随患处铺半指厚以纸盖用热熨斗熨良久如硝耗再加熨之熨二时许方贴膏药若是肝积加芦荟末同熨

芦荟丸 治肝疳口舌生疮牙龈腐烂或遍身生疮等症

大皂角 青黛 芦荟【研】 朱砂【研】 麝香【研各一钱】 乾虾蟆【用皂角各等分烧存性为末一两入前项药】

右为末蒸饼糊丸麻子大每服五七十丸米饮下

局方小续命汤 治历节痛风痰盛口禁腰背反张等症

防己 肉桂【去粗皮】 黄芩 杏仁【去皮尖炒黄】 白芍 甘草 川芎 麻黄【去节】 人参【去芦各一两】 防风【一两五钱】 附子【炮去皮脐半两】

右为粗末每服三钱姜枣水煎服

调中益气汤 治体怠嗜卧不思饮食或痰 泄泻等症

黄芪【一两】 人参【去芦头】 甘草 苍术【各五分】 柴胡 橘皮 升麻 木香【各五分】

右姜枣水煎空心服

佛手散 治妊娠伤胎下血

当归【三钱】 川芎【二钱】

右水煎食前服

木香饼 治一切气滞结肿或痛或闪肭及风寒所伤作痛并效

木香【五钱】 生地黄【一两】

右木香为末地黄杵膏和匀量患处大小作饼置患处以热熨斗熨之

隔蒜灸法 治一切疮毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒随火而散盖火以畅达拔引郁毒此从治之法也有回生之功用大蒜头去皮切三文钱厚安疮头头用艾装於蒜上灸之三装换蒜复灸未成者即消已成者亦杀其大势不能为害如疮大用蒜捣烂摊患处将艾铺上烧之蒜败再换如不痛或不作脓及不起发或陰疮尤宜多灸灸而仍不痛不作脓不起发者不治此气血虚极也

神效蒜熨法 治虚怯人肢体患肿块或作痛或不痛或风袭於经络肢体疼痛或四肢筋挛骨

痛又治流注跌扑伤损肿痛用葱头细切杵烂炒热敷患处冷易之再熨肿痛即止其效如神

豆豉饼 治疮?肿硬不溃及溃而不斂并一切顽疮恶疮用江西豆豉为末唾津和作饼子如钱大厚如三文置患处以艾装於饼上灸之乾则易之如背疮用漱口水调作饼覆患处以艾铺饼上灸之如未成者即消已成者能消其毒如有不效气血虚败也

益气养荣汤 治抑郁癰?或四肢患肿肉色不变或日晡发热或溃而不斂

人参 茯苓 陈皮 贝母 香附【酒拌】 川芎 黄芪【塩水拌炒】 熟地黄【酒拌】 当归【酒拌】 芍药【炒各一钱】 甘草【炙】 桔梗【炒各五分】 白术【炒一钱】

右姜水煎服

人参养荣汤 治溃?发热恶寒四肢倦怠体瘦少食面黄短气不能收敛若大疮愈後多服之不变他症白芍【一钱五分】 人参 陈皮 黄芪【蜜炙】 桂心 当归【酒拌】 白术 甘草【炙各一钱】 熟地黄【酒拌】 五味子【炒】 茯苓【各七分半】 远志【去心炒五分】

右姜枣水煎服

方脉流气饮子 治脑怒胸膈胀满或肢体作痛或结壅肿血气无亏者

紫苏叶 青皮 苦梗 半夏【煨】 当归 芍药 乌药 茯苓 川芎 黄芪 枳殼【去穰麸炒】 防风【各半两】 甘草 橘皮【各五分】 大腹皮 木香【各三分】

右姜枣水煎服

泻青丸 治肝经郁火实热脇乳作痛大便秘结及肝经一切实火症

当归 龙胆草 川芎 山梔 大黄 羌活 防风【各等分】

右为末蜜丸桐子大每服一二丸

人参败毒散 治疮?焮痛发寒热或拘急头痛等症

人参 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 枳殼 茯苓 川芎 甘草【各一钱】

右水煎服

生地黄丸 治师尼寡妇乍寒乍热肝脉弦长而出鱼际

秦艽 黄芩 生地黄【一两酒拌杵膏】 硬柴胡【各五钱】 赤芍药【一两】

右为细末入地黄膏加炼蜜少许丸桐子大每服三十丸乌梅煎汤下日进二服亦治室女患此

连翹饮子 治乳内结核

连翹 川芎 瓜蒌仁【研】 皂角刺【炒】 橘叶
青皮【去白】 甘草【节】 桃仁【各一钱半】

右水煎服

必效散 治瘰癧未成脓者自消已溃者自敛

南硼砂【二钱五分】 轻粉【一钱】 白栝榔【一个】 斑猫【四十个糯米同炒熟去头翅】 麝香【五钱】 巴豆【五粒去壳心膜】

右为细末每服一钱五更用滚汤调下如小水澹滯或微痛此毒欲下也进益元散一服即下此方斑猫巴豆似为峻厉然用巴豆乃解斑猫之毒用者勿畏

琥珀膏 治颈项瘰癧及脇下初如梅子肿结硬强渐如连珠不消不溃或溃而脓水不絶经久不瘥渐成漏症

琥珀【一两】 木通 桂心 当归 白芷 防风 松脂
朱砂【研各五钱】 木鳖子【肉五钱】 麻油【二斤】 丁香 木香【各三钱】

右先用琥珀丁香桂心朱砂木香为细末其余药入油内煎焦黑滤去粗徐徐入黄丹再煎软硬得中即成膏矣

神效瓜蒌散 治乳痈初起肿痛及一切痈疽或脓出後余毒亦宜用之

当归【半两】 生甘草【半两】 没药【一钱另研】 乳香【一钱】 黄瓜蒌【子多者一个】

右酒水煎服

薛氏医案卷三

卷四

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷四

明 薛己 撰

女科撮要

保胎

妊娠若元气不实发热倦怠或胎动不安用当归散因气恼加枳壳胸膈痞闷再加苏梗或作痛加柴胡若饮食不甘或欲呕吐用六君子汤加紫苏枳壳若恶阻呕逆头晕体倦用参橘散未应用六君子汤若恶阻呕吐不食烦闷亦用参橘散之类若顿仆胎动腹痛下血用胶艾汤未应用八珍加胶艾若顿仆毒药腰痛短气用阿胶散未应煎送知母丸若顿仆胎伤下血腹痛用佛手散未应用八珍送知母丸若心惊胆怯烦闷不安名子烦用竹叶汤未应血虚佐以四物气虚佐以四君子若下血不止名胎漏血虚用二黄散血去多用八珍汤未应用补中益气汤若因事而动下血用枳壳汤加生熟地黄未应或作痛更加当归血不止八珍加胶艾若不时作痛若小腹重坠名胎痛用地黄当归汤未应加参术陈皮或因脾气虚用补中益气汤若面目虚浮肢体如水气名子肿用全生白术散未应用六君子汤下部肿甚用补中益气倍加茯苓或因饮食失宜呕吐泄泻此是脾胃亏损用六君子汤若足指发肿渐至腿膝喘闷不安或足指缝出水作呕少食余谓寒热头痛肝火上冲也脇胀腹痛肝气不行也作呕少食肝侮脾胃也小便见血肝火血热也用小柴胡加芍药炒黑山栀茯苓白术而愈

一妊娠六月体倦食少劳役见血用六君子加当归熟地升麻柴胡而愈

一妊娠每三四月胎便作痛余用地黄当归汤治之不日而愈

一妊娠三月饮食後因怒患症连吐三次用藿香正气散二剂随用安胎饮一剂而愈後因怒痰甚狂言发热胸胀手按少得此肝脾气滞用加味逍遥散加川芎二剂顿退四剂而安

一妇人每怒发热脇胀小便淋瀝每月经行旬余未已受胎三月因怒前症复作朝用加味逍遥散夕用安胎饮各二剂而安五月又怒复作下血如经行四日未止仍用前药而愈

一妊娠将三月呕吐恶食体倦嗜卧此恶阻之症用人参橘皮汤二剂渐愈又用六君子加紫苏

二剂而安一妊娠吞酸恶心欲作呕吐此饮食停滞用六君子加麴蘖炒黑子芩枳壳香附治之而愈

一妊娠饮食後恼怒寒热呕吐头痛恶寒胸腹胀痛大便不实而色青小便频数而有血余曰当清肝健脾为主不信乃主安胎止血益甚问余曰何也余曰大便不实而或青此是饮食既伤脾土而兼木侮小便频数而有血此是肝火血流於胞而兼挺痿也用六君子加枳壳紫苏山梔二剂脾胃顿醒又用加味逍遥散加紫苏枳壳二剂小便顿清更节饮食调理而安

一妊娠每至五月肢体倦怠饮食无味先两足肿渐至遍身後及头面此是脾肺气虚朝用补中益气夕用六君子加苏梗而愈凡治妊娠毋泥其月数但见某经症使用某药为善

一妊娠因怒吐血块四日不止两脇胀痛小便淋瀝此怒而血蓄于上部火炎而随出也脇胀腹痛小便淋瀝肝经本病也用小柴胡合四物四剂而止却用六君子安胎饮调理而安

一妊娠气喘痰甚诸药不应问治於余询之云素有带下始於目下浮两月余其面亦然此气血有痰饮也用六味丸料数剂而愈

凡妇人气血方盛乳房作胀或无儿饮痛胀寒热用麦芽二三两炒熟水煎服立消其耗散血气如此何脾胃虚弱饮食不消方中多用之一云麦芽最消肾若气血虚而乳汁自出者宜十全大补汤其子多不育

小产

小产重於大产盖大产如栗熟自脱小产如生采破其皮殼断其根蒂岂不重於大产但人轻忽致死者多矣治法宜补形气生新血去瘀血若未足月痛而欲产芎归补中汤倍加知母止之若产而血不止人参黄芪汤补之若产而心腹痛当归川芎汤主之胎气弱而小产者八珍汤固之若热血过多而发热圣愈汤汗不止急用独参汤发热燥躁肉瞤筋惕八珍汤大渴面赤脉洪而虚当归补血汤身热面赤脉沈而微四君姜附东垣云昼发热而夜安静是阳气自旺於阳分也昼安静而夜发热躁是阳气下陷於陰中也如昼夜俱发热者是重阳无陰也当峻补其陰王太?云如大寒而甚热之不热是无火也热来复去昼见夜伏夜发昼止时节而动是无火也如大热而甚寒之不寒是无水也热动复止倏忽往来时动时止是无水也若阳气自旺者补中益气汤阳气陷于陰者四物二连汤重阳无陰者四物汤无火者八味丸无水者六味丸

治验

一妊娠五月服剪红丸而堕腹中胀痛服破血之剂益甚以手按之益痛余曰此峻药重伤脾胃受患用八珍倍人参黄芪半夏乳香没药二剂而痛止数剂而全愈吴江庠友史万湖仲子室年二十余疫疾堕胎时咳服清肺解表喘急不寐请治余以为脾土虚不能生肺金药损益

甚先兴补中益气加茯苓半夏五味炮姜四剂渐愈往视之又与八珍加五味及十全大补汤全愈大儿妇张氏素怯弱嘉靖癸卯四月生女自乳中患疥疮年余不愈遂致羸困甲辰五月遭先母大故以姑病勉强代执丧礼旬月每欲眩仆一日感气忽患心脾高肿作疼手不可按而呕吐不止六脉微细之极余以为脉虽虚而病形则实误认诸痛不可补气乃用青皮香附吴茱萸等药而愈继复患症且堕胎又投理气行血之药病去元气转脱再投参芪补剂不应矣六脉如丝欲絶思非附子不能救非立翁不能投迎翁至诊云皆理气之剂真损之误也连投参芪归术附子姜桂六剂间用八味丸五日眠食渐甘六脉全复翁云心脾疼痛时即当服此等药症亦不作矣姑妇皆翁再造敢述奇功附於此门之尾以为初知药性者之戒制生陈逊稽顙谨识

保产

妊娠欲产之时但觉腹内转动即当正身仰卧待儿转身向下时作痛试捏产母手中指中节或末节跳动方与临盆即产矣若初觉不仰卧以待转胞或未产而水频下此胞衣已破血水先乾必有逆生难产之患若横生者儿先露手臂令母正卧以手徐推儿臂下体令其正直复以中指摩其肩勿令脐带攀系即生逆生者儿先露足令母正卧以手徐推其足仍推儿转正即生偏生者儿头偏在一边亦照前法徐正其头即生或儿头後骨偏在谷道旁徐推近上即生碍产者儿头虽正但不能下盖因胎转脐带攀肩所致用中指按儿两肩理脱脐带即生坐产者儿将欲生其母疲倦久坐椅褥抵其生路急用巾带高悬令母以手攀之轻轻屈足良久儿顺即生盘肠生者临产母肠先出此难於收上以萆薢子四十九粒研烂涂产母头顶待肠收上急洗去设或为风吹乾不能收者以磨刀水少许温热拭润其肠再用磁石煎汤服之即收上磁石须陰阳家用有验者俗以水喂母面背惊而肠亦收之盖惊则气散恐反致他症戒之若胎衣破而不得分娩者用保生无忧散以固其血自然生息如血已耗损用八珍汤料一斤益母草半斤水数碗煎熟不时饮之亦有得生者凡孕妇只腹痛未产也若连腰痛甚者将产也盖肾候於腰胞系於肾故也华佗治横逆产难用蛇脱二条蝉壳二十八个胎髮二丸各烧灰每服二钱酒调连进二服即卧片时儿即顺生如无此药令产母仰面正卧以小针刺儿手脚心三五次用盐涂之手脚即缩上待儿身转顺即生○若以蜀葵子四十九粒白滑石三钱顺流水煎服即顺生或用好京墨浓磨服之墨水裹儿即下○或败笔头一个煨过以藕节自然汁温汤和下○或紫苏叶当归各三钱长流水煎服即下○凡孕家宜预请稳婆有仁心识见者当施恩惠以结其心先与说知倘有生息不顺只说未产或遇双胎只说胎衣未下恐惊则气散愈难生息余家亲验之大抵难产多患於郁闷安佚富贵之家治法虽云胎前清气产後补血不可专执若脾胃不实气血不充宜预调补不然临产必有患难○如因难产或大寒时急以大油纸捻徐徐烧断其脐带虽儿已死令暖气入腹多得复生切勿用刀断之

治验

荆妇孟冬分娩艰难产子已死元气劳伤用油纸捻烧断脐带取其阳气以补之俄闻儿啼作声即鹄儿也若以刀物如常断之其母亦难保生此儿嗣後一二岁间并无伤食作泻之症可见前法之功其稳婆又喜平日常施少惠得其用心能安慰母怀故无虞耳○此稳婆云止有

一女分娩时适当巡街侍御行牌取我视其室分娩女为此惊吓未产而死後见侍御更以威言分付迨视产母胎虽顺而头偏在一边若以手入推正可保顺生已畏其威不敢施手但回禀云此是天生天化非人力所能立俟其母子俱死

子死腹中

夫子死腹中者多因惊动太早或触犯禁或抱腰太重或频探试水胞衣先破血水先尽而胎乾涸故耳其候产母唇舌皆黑者子母俱死若舌黑或胀闷甚者然其子已死矣先以平胃散一两酒水各半煎却投朴硝半两【即熟皮硝】服或用硝一两以童便调下亦妙

治验

一稳婆之女勤苦负重妊娠腹中陰冷重坠口中甚秽余意其胎必死令视其舌果青黑与朴硝半两许服之随下秽水而安

一妇人胎死服朴硝而下秽水肢体倦怠气息淹淹用四君为主佐以四物姜桂调补而愈

胎衣不出

有因恶露入衣胀而不能出有因元气亏损而不能送出其恶露流衣中者腹中胀痛用牵牛丹或失笑散以消瘀血缓则不救其元气不能送者腹中不胀痛用保生无忧散

治验

俱详妇人良方十八卷第四

交骨不开陰门不闭子宫不收

交骨不开产门不闭子宫不收皆元气素弱胎前失于调摄以致血气不能运达而然也交骨不开陰气虚也用加味芎归汤补中益气汤产门不闭子宫不收气血虚也用十全大补汤

治验【余详妇人良方十七卷第四】

一妇人分娩最易至四十妊娠下血甚多产门不开亦与前汤一剂又用无忧散斤许一剂煎熟时时饮之以助其血而产

一产妇陰门不闭发热恶寒用十全大补加五味子数剂而寒热悉退又用补中益气加五味子数剂而敛若初产胀肿或焮痛而不闭者当用加味逍遥散若肿既消而不闭者当用补中益气汤切忌寒凉之剂

一妇人脾胃素弱兼有肝火产後陰門肿痛寒热作渴呕吐不食敷大黄等药服驱利之剂肿及於臀虚症蜂起此真气虚而作先用六君子以固脾胃乃以补中益气汤升举不数剂而消

一产妇失治肿溃不已形体消瘦饮食少思朝寒暮热自汗盗汗半年矣用补中益气加茯苓半夏以健脾胃脓水渐少饮食渐进用归脾汤以解脾郁共五十余剂元气复而疮亦愈矣

一产妇陰門不闭小便淋?腹内一物攻动脇下或胀或痛用加味逍遥散加车前子而愈

一妇人子宫肿大二日方入损落一片殊类猪肝已而面黄体倦饮食无味内热晡热自汗盗汗用十全大补汤二十余剂诸症悉愈仍复生育血滯成痼方见後

产後腹痛

产後小腹作痛俗名儿枕块用失笑散行散之若恶露既去而仍痛用四神散调补之若不应用八珍汤若痛而恶心或欲作呕用六君子汤若痛而泄泻用六君子汤送四神丸若泄泻痛而或後重用补中益气汤送四神丸若胸膈饱胀或恶食吞酸或腹痛手不可按此是饮食所致当用二陈加白术山查以消导若食既消而仍痛或按之不痛或更加头痛烦热作渴恶寒欲呕等症此是中气被伤宜补脾胃为主若发热腹痛按之痛甚不恶食不吞酸此是瘀血停滯用失笑散以消之若止是发热头痛或兼腹痛按之却不痛此是血虚用四物加炮姜参朮以补之病机要云胎产之病从厥陰经论之无犯胃气及上二焦为之三禁不可汗不可下不可利小便发汗者同伤寒下早之症利大便则脉数而已动于脾利小便则内亡津液胃中枯燥制药之法能不犯三禁则荣卫自和而寒热止矣如发渴用白虎气弱用黄芪血刺痛则用当归腹中痛则加芍药宜详察脉症而用之丹溪先生云产後当大补气血为先虽有杂症从未治之一切病多是血虚皆不可发表

治验

一产妇腹痛发热气口脉大余以为饮食停滯不信乃破血补虚反寒热头痛呕吐涎沫又用降火化痰理气四肢逆冷泄泻下坠始信谓余曰何也余曰此脾胃虚之变症也法当温补遂用六君加炮姜二钱肉桂木香一钱四剂诸症悉退再用补中益气之剂元气悉复一妇人产後腹痛後重去痢无度形体倦怠饮食不甘怀抱久郁患蠱唇寐而盗汗如雨竟夜不敢寐神思消烁余曰气血虚而有热用当归六黄汤内黄芩连栢炒黑一剂汗顿止再剂全止乃用归脾汤八珍散兼服元气渐复而愈

一产妇小腹作痛服行气破血之药不效其脉洪数此瘀血内溃为脓也以瓜子仁汤二剂痛止更以太乙膏下脓而愈产後多有此病纵非痼患用之更效

一产妇小腹疼小便不利用薏苡仁汤二剂痛止更以四物加桃仁红花下瘀血而愈大抵此症皆因荣卫不调或瘀血停滯所致若脉洪数已有洪脉但数微有脓脉迟紧乃瘀血下之即

愈若腹胀大转侧作水声或脓从脐出或从大便出宜用蜡矾丸太乙膏及托里药一产妇小腹作痛有块脉芤而濡以四物加玄胡索红花桃仁牛膝木香治之而愈

一妇人产後小腹患痛服瓜子仁汤下瘀血而痊凡瘀血停滞宜急治之缓则腐化为脓最难治疗若流注关节则患骨疽失治多为败症

一妇人因经水多服濡药止之致腹作痛以失笑散二服而瘳

产後血晕并失血

产後元气亏损恶露乘虚上攻眼花头晕或心下满闷神昏口禁或痰壅盛者急用失笑散主之若血下多而晕或神昏烦乱者大剂芎归汤补之或芸薹子散或童子小便有痰加二陈汤若劳心力而致者宜补中益气加香附若因气血虚极不省人事用清魂散继以芎归汤及大补气血之剂凡产可预烧称锤令赤以器盛之急至床前以醋沃之或以醋涂口鼻闻之即醒或用破旧漆器或乾漆烧烟薰之或用半夏末冷水和丸入鼻孔中并无前患丹溪先生云血晕因气血俱虚痰火泛上宜以二陈导痰或加减朱砂安神丸以麦门冬汤下亦可大凡产後口眼喎斜等症当大补气血为主而兼以治痰若脾胃虚而不能固者用六君子汤至五七个月宜服安胎饮至八九个月再加大腹皮黄杨脑如临产时更宜服保生无忧散庶无前患

治验

一产妇月余矣因怒两脇胀痛忽吐血甚多发热恶寒胸腹胀满用八珍加柴胡丹皮炮姜而安却用十全大补仍加炮姜而愈前症因脾肺气血亏损而胸腹虚痞虽投大补若非姜桂辛温助其脾肺以行药势亦无以施其功而反助其胀耳

家人妇产後小腹作痛忽牙关紧急灌以失笑散良久而苏又用四物加炮姜白术陈皮而愈

一产妇筋挛臂软肌肤掣动此气血俱虚用十全大补汤而愈

一产妇两手麻木服愈风丹天麻丸遍身皆麻神思倦怠?热作渴自汗盗汗此气血俱虚也用十全大补加炮姜数剂诸症悉退却去炮姜又数剂而愈但内热此血虚也用逍遥散而痊

产後发瘥【屋当作瘥】

产後发瘥因去血过多元气亏极或外邪相抐其形牙关紧急四肢劲强或腰背反张肢体抽搐若有汗而不恶寒者曰柔瘥若无汗而恶寒者曰刚瘥然产後患之实由亡血过多筋无所养而致故伤寒汗下过多溃疡脓血大泄多患之乃败症也若大补血气多保无虞若攻风邪死无疑矣

治验

一产妇牙关紧急腰背反张四肢抽搐两目连割余以为去血过多元气亏损陰火炽盛用十全大补加炮姜一剂而苏又数剂而安

余在吴江史万湖第将入更时间喧攘云某家人妇忽仆牙关紧急已死矣询云是新产妇出直厨余意其劳伤血气而发瘕也急用十全大补加附子煎滚令人推正其身一人以手夹正其面却挖开其口将药灌之不咽药已冷令侧其面出之仍正其面复灌以热药又冷又灌如此五次方咽下随灌以热药遂苏

产後便血

产後便血或饮食起居或六淫七情以致元气亏损阳络外伤治法若因膏粱积热用加味清胃散若因醇酒湿毒葛花解酲汤若因怒动肝火六君加柴芍芍归若因郁结伤脾加味归脾汤若因思虑伤心妙香散若因大肠风热四物加侧柏荆防枳殼槐花若因大肠血热四物加芩连若因肠胃虚弱六君子加升麻柴胡若因肠胃虚寒六君加肉?木香若因元气下陷补中益气加茯苓半夏若因气虚用六君升麻若因血虚用四物气血俱虚用八珍俱加柴胡升麻大凡病久或元气虚弱见病百端皆因脾胃亏损内真寒而外假热但用六君子或补中益气加炮姜温补脾气诸症悉退若四肢畏冷属阳气虚寒急加附子病因多端当临症制宜庶无误矣

治验

一产妇粪後下血诸药不应饮食少思肢体倦怠此中气虚弱用补中益气加茱炒黄连五分四剂顿止但怔忡少寐盗汗未止用归脾汤治之而痊

一妇人但怒便血寒热口苦或胸脇胀痛或小腹痞闷此木乘土用六君加柴胡山梔而愈用补中益气加味逍遥二药而不复作

一妇人久下血在粪前属脾胃虚寒元气下?用补中益气加连炒吴茱一钱数剂稍缓乃加生吴茱五分数剂而愈

一妇人产後便血口乾饮汤胸脇膨满小腹闷坠内热晡热饮食不甘体倦面黄日晡则赤洒淅恶寒此脾肺气虚先用六君加炮姜木香诸症渐愈用补中益气将愈用归脾汤全愈後饮食失节劳役兼怒气发热血崩夜间热甚谗语不絶此热入血室用加味小柴胡二剂而热退用补中益气而血止用逍遥散归脾汤调理而康

产後大便不通

产後大便不通因去血过多大肠乾涸或血虚火燥乾涸不可计其日期饮食数多用药通之润之必待腹满觉胀自欲去而不能者乃结在直肠宜用猪胆汁润之若服苦寒药润通反伤中焦元气或愈加难通或通而泻不能止必成败症若属血虚火燥用加味逍遥散气血俱虚八珍汤慎不可用麻子杏仁枳殼之类

治验

一产妇大便不通七日矣饮食如常腹中如故余曰饮食所入虽倍常数腹不满胀用八珍加桃杏二仁至二十一日腹满欲去用猪胆汁润之先去乾粪五七块後皆常粪而安

一产妇大便八日不通用通利之药中脘作痛饮食甚少或云通则不痛痛则不通乃用蜜导之大便不禁呃逆不食余曰此脾肾复伤用六君加吴茱肉果骨脂五味数剂喜其年壮不然多致不起

产後寒热

产後寒热因气血虚弱或脾胃亏损乃不足之症经云陰虚则发热阳虚则恶寒若兼大便不通尤属气血虚弱切不可用发表降火若寸口脉微名陰气不足陰气上入于阳中则恶寒用补中益气汤尺部脉弱名陰气不足阳气下陷于陰中则发热用六味地黄丸大抵陰不足阳旺从之则阳内陷而发热阳不足陰往从之则陰上入而恶寒此陰阳不归其分以致寒热交争故恶寒而发热也当用八珍汤若病後四肢发热或形气倦怠此元气未复湿热乘之故耳宜补中益气汤若肌热大渴引饮目赤面红此血虚发热用当归补血汤若认为热则误矣

治验

一产妇恶寒发热用十全大补加炮姜治之而愈但饮食不甘肢体倦怠用补中益气而安又饮食後犯怒恶寒发热抽搐咬牙难候其脉视其面色青中隱黄欲按其腹以手护之此肝木侮脾土饮食停滯而作用六君加木香一剂而安

一产妇恶寒发热余欲用八珍加炮姜治之其家知医以为风寒用小柴胡汤余曰寒热不时乃气血虚不信仍服一剂汗出不止谵语不絕烦热作渴肢体抽搐余用十全大补二剂益甚脉洪大重按如无仍以前汤加附子四剂稍缓数剂而安

产後咳

产後咳 或因陰血耗损或因肺气亏伤或陰火上炎或风寒所感主治之法若陰血虚者用芎归熟地参术肺气伤者用四君芎归桔梗陰火上炎者六味地黄加参术风寒所感者补中益气加桔梗紫苏若瘀血入肺发喘急用二味参苏饮多有得生者若兼口鼻起黑或鼻出血急用前散亦有得生者然而所患悉因胃气不足盖胃为五臟之根本人身之根蒂胃气一虚

五臟失所百病生焉但患者多谓腠理不密所致殊不知肺属辛金生于巳土亦因土虚不能生金而腠理不密外邪所感其陰火上炎亦壮土金生肾水以制火为善若径治其病则误

治验

一产妇咳 声重鼻塞流涕此风寒所感用参苏饮一鍾顿愈六七乃与补中益气加桔梗茯苓半夏一剂而痊又与六君加黄芪以实其腠理而安

一产妇朝吐痰夜发热兼之无寐泥用清痰降火肌体日瘦饮食日少前症益甚余曰早间吐痰脾气虚也夜间发热肝血虚也昼夜无寐脾血耗也遂用六君子汤加味逍遥散加味归脾汤以次调补不月而痊

一产妇咳 痰盛面赤口乾内热晡热彻作无时此陰火上炎当补脾肾遂用补中益气汤六味地黄丸而愈一产妇咳而腹满不食涕唾面肿气逆此病在胃关于肺用异功散而愈

时疫堕胎咳 见小产

产後症疾

产後症疾因脾胃虚弱饮食停滯或因外邪所感或郁怒伤脾或暑邪所伏审系饮食用六君加桔梗苍术藿香如外邪多而饮食少用藿香正气散如外邪少而饮食多用人参养胃汤饮食劳役用补中益气汤气血虚弱用十全大补加炮姜虚寒用六君加姜桂元气脱陷急加附子大凡久症多属元气虚寒盖气虚则寒血虚则热胃虚则恶寒陰火下流则寒热交作或吐泻不食腹痛烦渴发热谵语或手足逆冷寒战如栗虽见百症当峻温补其病自退若误用清脾截疟之类多致不起

治验

一产妇患症发热作渴胸脇胀满遍身作痛三日不食咽酸暖气此是饮食所伤脾胃不能消化用六君加神麴山查四剂而不作酸乃去神麴山查又数剂而饮食进其大便不通至三十五日计进饮食七十余碗腹始闷令用猪胆汁导而通之其粪且不甚燥

一产妇患症久不愈百病蜂起其脉或洪大或微细或弦紧或沈伏难以名状用六君加炮姜二十余剂脉症稍得又用参术煎膏佐以归脾汤百余剂而痊

一产妇朝寒暮热或不时寒热久不愈用六君子补中益气兼服百余剂而寻愈

产後症疾心脾痛见小产

产後泻痢【二症治同兼呕吐】

产後泻痢或因饮食伤损脾土或脾土虚不能消食当审而治之若米食所伤用六君加谷蘖若麴食所伤用六君加麦蘖若肉食所伤用六君加山楂神麴凡兼呕吐皆加藿香若兼咽酸或呕吐用前药送越鞠丸若肝木来侮脾土用六君加柴胡炮姜若寒水反来侮土用钱氏益黄散若久泻或元气下?兼补中益气汤以升发阳气若泻痢色黄乃脾土真气宜加木香肉果若属脾土虚寒当用六君加木香姜桂若脾肾虚寒用补中益气及四神丸若属命门火衰而脾土虚寒用八味丸以补土母若小便澹滞肢体渐肿或兼喘咳用金匱肾气丸以补脾肾利水道若胃气虚弱而四肢浮肿治须补胃为主若久而不愈或非饮食所伤而致乃属肾气亏损盖胞胎主於任而系於肾况九月十月乃肾与膀胱所养必用四神六味八味三药以补肾若用分利导水之剂是虚其虚也

治验

一产妇泻痢发热作渴吐痰甚多肌体消瘦饮食少思或胸膈痞满或小腹胀坠年余矣余以为脾肾泻朝用二神丸夕用六君子汤三月余而痊

一妇人产後泄泻兼呕吐咽酸面目浮肿此脾气虚寒先用六君加炮姜为主佐以越鞠丸而咽酸愈又用补中益气加茯苓半夏而脾胃康

一产妇泻痢年余形体骨立内热晡热自汗盗汗口舌糜烂日吐痰三碗许脉洪大重按全无此命门火衰脾土虚寒而假热然痰者乃脾虚不能统摄归源也用八味丸补火以生土用补中益气汤兼补肺金而脾胃健一产妇腹痛後重去痢无度形体倦怠饮食不进与死为邻此脾肾俱虚用四神丸十全大补汤而愈但饮食难化肢体倦怠用补益汤调理而康

一妇人五月患痢日夜无度小腹堕痛发热恶寒用六君子汤送香连丸二服渐愈仍以前汤送四神丸四服全愈至七月终怠惰嗜卧四肢不收体重节痛口舌乾燥饮食无味大便不实小便频数洒淅恶寒凄惨不乐此肺之脾胃虚而阳气寒不伸也用伸阳益胃汤而痊

附方并注

加味逍遥散 治血虚有热遍身搔痒或口燥咽乾发热盗汗食少嗜卧小便澹滞等症

甘草【炙】当归【炒】芍药【酒炒】茯苓白术【炒】柴胡【各一钱】牡丹皮山梔【炒各五钱】

右水煎服

逍遥散即前方去丹皮山梔

归脾汤 治脾经失血少寐发热盗汗或思虑伤脾不能摄血妄行或健忘怔忡惊悸不寐或心脾伤痛怠惰嗜卧饮食不思

人参 白术 白茯苓 黄芪【炒】 当归 龙眼肉 远志
酸枣仁【炒各一钱】 木香【五分】 甘草【炙五分】

右姜枣水煎服

加味归脾汤即前方加柴胡 山梔

补中益气汤 治元气不足四肢倦怠口乾发热饮食无味或饮食失节劳倦身热脉洪大而无
力或头痛发热或恶寒自汗或气高而喘身热而烦

黄芪【炙钱五分】 甘草【炙】 人参
当归【酒拌】 白术【炒各一钱】 升麻 柴胡【各三分】 陈皮【一钱】

右姜枣水煎服

六君子汤即异功散加半夏

十全大补汤 治诸臟亏损气血俱虚恶寒发热或自汗盗汗便血吐血或大便不实饮食少思
或胸腹作痛口舌生疮或耳目不明牙齿不固

人参 白术 白茯苓 黄芪 当归 熟地【酒洗蒸焙】 川芎 白芍药【炒各一钱】 肉桂
甘草【炙各五分】

右姜枣水煎服

八珍汤 治脾胃亏损气血俱虚乃内伤之症盖人之生以脾胃为主脾胃一虚诸臟失所百病
生焉即前方大补汤去黄芪 肉桂

当归补血汤 治肌热躁热目赤面红烦渴引饮昼夜不息脉洪大而虚重按全无此脉虚血虚
也若误服白虎汤必死

当归【三钱】 黄芪【炙一两】

右水煎服

加味清胃散 治脾胃有热口内生疮或齿作疼或龈腐烂即前方加犀角 连翘 甘草

小柴胡汤 治肝胆经症寒热往来或晡热朝热不欲饮食或口苦耳聋咳 发热或脇痛脘满转侧不便或泻痢咳 呕吐酸水

柴胡【一钱】 黄芩【一钱五分】 半夏【一钱】 人参【一钱】 甘草【炙五分】

右姜枣水煎服

加味小柴胡汤 治妇女经行感冒发热热入血室寒热如疟昼则安静夜则发热妄语或素血虚大劳大怒火动热入血室亦能致此即前方加生地黄

当归六黄汤 治气血虚而发热盗汗等症

当归【二钱】 黄芪【炒】 生地黄
熟地黄【各一钱】 黄连【炒焦】 黄芩【炒焦】 黄柏【炒焦各五分】

右水煎服

黄芩清肺饮 治肺热而小便不利

黄芩 山梔【各一钱】

右水煎服不利加盐豉二十粒

六味丸一【名地黄丸加肉桂两名加減八味丸】 治肾虚发热作渴吐痰小便淋沥头晕眼花咽燥唇裂齿不坚固腰腿酸软自汗盗汗便血诸血失瘖水泛为痰之圣药血虚发热之神剂

熟地【八两杵膏】 山茱萸【肉】 乾山药【各四两】 牡丹皮 白茯苓 泽泻【各三两】

右各另为末和地黄加炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前白滚汤下地黄须自制

八味丸 治命门大衰不能生土以致脾胃虚寒饮食少思或脐腹疼痛或多漩溺即前方加桂附各一两

加減八味丸即六味丸加肉桂一两

加減济生肾气丸 治脾肾虚腰重脚肿湿饮留积小便不利或肚腹肿胀四肢浮肿气喘痰甚或已成水症其效如神

白茯苓【三两】附子【半两】川牛膝 桂 泽泻 车前子 山茱萸 山药
牡丹皮【各一两】熟地黄【四两搗碎酒拌杵膏】

右为末和地黄膏加炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心米饮下

四物二连汤 治血虚发热或口舌生疮或昼安夜热当归 川芎 芍药 熟地黄 胡黄连
宣黄连【各一钱】

右作一剂水煎服

白虎汤 治胃热作渴暑热尤效

知母【一钱五分】石膏【四钱】粳米【一合】

右作一剂水煎服

钱氏益黄散

治脾土虚寒寒水反来侮土而呕吐不食或肚腹作痛或大便不实手足逆冷等症

陈皮【一两】青皮 诃子肉 甘草【炙】丁香【二钱】

右为粗末每服四钱水煎服

二神丸 治脾肾虚弱侵晨五更作泻或全不思食或食而不化大便不实神效

破故纸【四两炒】肉豆蔻【二两生用】

右为末用大红枣四十九枚生姜四两切碎同枣用水煮熟去姜取枣肉和药丸桐子大每服
五十丸空心盐汤下

人参理中汤 治脾胃虚寒呕吐泄泻饮食少思肚腹膨胀

人参 白术 乾姜【炮】甘草【炙各一钱】

右姜枣水煎服

若因肝木尅脾土而致宜加柴胡芍药若命门火衰而患宜兼八味丸

异功散即前汤加陈皮治脾胃虚弱饮食少思或久患咳 或腹满不食面浮气逆等症

人参橘皮汤 治脾胃虚弱气滞恶阻呕吐痰水人参 陈皮 白术
麦门【去心各一钱】甘草【三分】厚朴【制】白茯苓【去皮各五分】

右用淡竹茹一块姜水煎温服

若因中脘停痰宜用二陈枳壳若因饮食停滞宜用六君若因脾胃虚宜用异功散

竹叶汤 治妊娠心惊胆怯烦闷不安名曰子烦

白茯苓 麦门 黄芩【各三两】

右每服四钱竹叶五片水煎服

若因血虚烦热宜兼用四物若因中气虚弱宜兼四君

紫苏饮 治妊娠失调胎气不安上?作痛名子悬大腹皮 川芎 白芍 陈皮 苏叶
当归【各一两】人参 甘草【各半两】

右姜葱水煎服

若肝脾血气虚而有火不安宜兼逍遥散若脾气虚弱而不安宜用四君芎归

胶艾汤 治妊娠顿仆胎动不安腰腹疼痛或胎上抢或去血腹痛

阿胶【两炙】艾叶【数茎】

右二味以水五升煮取二升分三服

阿胶散 或顿仆或因毒药胎动不安或脇痛腹痛上抢短气

熟地黄 艾叶 白芍 川芎 黄芪 阿胶当归 甘草【炙各一两】

右每服四钱姜枣水煎

枳壳汤 治胎漏下血或因事下血

枳壳【炒】黄芩【炙半两】白术【一两】

右为末每服一钱白汤调下

二黄散 治胎漏下血或内热哺热或头痛头晕或烦躁作渴或脇肋胀痛等症

生地黄 熟地黄

右为末每服三钱煎白术枳壳汤下

前四症若因脾胃虚弱宜用补中益气汤加五味若因脾胃虚陷宜用前汤倍用升麻柴胡若因哺热内热宜用逍遥散

知母丸 治妊娠顿仆胎动不安或欲堕产用知母一味炒为末丸梧桐子大每服二十丸白汤下或嚼咽之

地黄当归汤 治血虚胎痛

当归【一两】 熟地黄【二两】

右每服五钱水煎

若因脾胃弱而血虚者宜用四君芎归气血俱虚者宜用八珍汤

全生白术散 治妊娠面目虚浮四肢肿如水气名曰胎肿

白术【一两】 生姜皮 大腹皮 陈皮 白茯苓【各半两】

右各为末每服二钱米饮下

若未应佐以四君子汤

天仙藤散 治妊娠自三月之後足指发肿渐至腿膝饮食不甘状似水气或脚指间出黄水名曰子气香附【炒】 陈皮 甘草 天仙藤【洗略炒】 乌药【各等分】

右每服三五钱生姜木瓜各三片紫苏三叶水煎食前日进三服

若因脾气虚弱宜兼六君子中气下陷须用补中益气汤

安荣散 治妊娠小便澀少遂成淋沥名曰子淋麦门冬【去心】 通草 滑石【各二钱】 当归 灯心 甘草【各五钱】 人参 细辛【各一两】

右为末每服二钱煎麦门汤调下

若因肺经蕴热宜用黄芩清肺饮若因膏粱厚味宜用清胃散若因肝经湿热宜用加味逍遥散

羚羊角散 治妊娠虚风颈项强直筋脉挛急语言蹇塞痰涎不利或时发搐或不省人事名曰子癇羚羊角【镑】川独活 酸枣仁【炒】五加皮【各五钱】薏苡仁 防风 当归 川芎 茯神 杏仁【各四分】木香 甘草【各二分半】

右每服五钱姜水煎

若因肝经风热或怒火所致须用加味逍遥散

安胎饮 治妊娠五七个月用数服可保全产

白术 人参 当归 川芎 熟地黄 白芍 陈皮 甘草 紫苏 炙黄芩【各一钱】

右用姜水煎服

若因中气虚弱须用四君子加陈皮紫苏若阴虚内热宜用四物黄芩白术

二陈汤 治妊娠失调脾胃不和呕吐痰涎或饮食不思

陈皮 茯苓【各钱五分】半夏【一钱】甘草【五分】

右姜水煎服

若因脾胃虚弱用六君子若因气滞用紫苏饮

麦门冬汤 治妊娠失於调养内热口乾或胎动不安麦门冬【去心】 防风 白茯苓【各二钱】 人参【一钱】

右作一剂水煎服

若血虚有热用逍遥散气虚有热用四君加黄芩紫苏

鲤鱼汤 治胸满腹胀小便不通遍身浮肿

白术 茯苓 当归 芍药【各三两】

右细剉用鲤鱼一头煮取汁 药四钱入汁一盞半姜七片橘皮少许煎服

若脾胃虚佐以四君子汤

达子散 治妊娠八九月服数剂甚效

紫苏【梗叶】 人参 甘草【炙】 陈皮【各五分】 大腹皮【用黑豆汁洗晒三钱】

右水煎入黄杨叶七茎葱五叶煎服

春加川芎夏加黄芩冬依正方或有别症以意消息加减

保生无忧散 临产服之补其血顺其气使易产又治小产瘀血腹痛

南木香 当归 川芎 白芍药 枳壳 乳香 血余【即乱髮煨】

右等分每服二三钱水煎日二服

若胞衣既破其血已涸或元气困惫急用八珍汤斤许水数碗煎熟时饮救之饮尽再制亦有得生者

芎归补中汤 治气血虚半产

艾叶【代姜】 阿胶【炒】 川芎

五味子【杵炒】 黄芪【炙】 当归 白术【炒】 芍药【炒】 人参

杜仲【炒各一钱】 甘草【炙五分】

右每服五钱水煎服

若脾气虚弱须用补中益气汤若气虚而有火宜用安胎饮

人参黄芪汤 治小产气虚血下不止

人参 黄芪【炒】 当归 白术【炒】 白芍【炒】 艾叶【各一钱】 阿胶【炒二钱】

右作一剂水煎服

芸薹散 治孕妇九窍出血或作晕欲死

芸薹子 当归【焙各一钱】 芍药 官桂【各半钱】

右为末每服三钱以酒并童便各半盏调灌下立瘥或一味童便温饮尤效

前二症若脾胃气虚不能统血宜用四君芎归中气下陷补中益气汤若血脱须补气为主

当归川芎汤 治小产後瘀血心腹疼痛或发热恶寒当归 川芎 熟地黄
白芍药【炒】 玄胡索【炒】 桃仁 红花 香附 青皮【炒】 泽兰 牡丹皮

右水煎入童便酒各小半盏服

若以手按腹愈痛此是瘀血为患宜用此药或失笑散消之若按之反不痛此是血虚宜用四物参苓白术若痛而作呕此是胃虚宜用六君子若痛而作泻此是脾虚宜六君子送二神丸

四物汤 治产後及诸症血虚发热或口舌生疮或齿龈肿溃或日晡发热

当归 熟地【各三两】 芍药【炒三钱】 川芎【一钱半】

右作一剂水煎服

若因气虚不能生血而患前症宜补脾胃

加味四物汤即前方加白术茯苓柴胡丹皮

四神散 治产後血虚或瘀血腹痛

当归【二钱】 川芎 芍药【炒各一钱】 炮姜【五分】

右水煎服

当归散 治产後气血虚恶露内停增寒发热宜服此去之

当归 白芍【炒】 川芎 黄芩【各一两】 白术【五钱】

右为细末温童便调下二钱

失笑散 治产後心腹绞痛欲死或血迷心窍不知人事及寻常腹内瘀血积血作痛

五灵脂 蒲黄【俱炒等分】

右每服三钱酒煎热服

若瘀血去多而元气虚损所致宜用四君芎归炮姜

解语汤 治风客心脾舌强不言

附子【炮】 防风 天麻 酸枣仁【各一两炒】

右每服二三钱水煎服

若因脾胃风热用秦艽升麻汤

抱胆丸 治心惊不语或癫痫等症

水银【二两】 黑铅【五钱】 朱砂【细研】 乳香【各一两另研】

右将铅入铫下水银成砂次下朱砂乳香乘热用木槌研匀丸鸡头大每服一丸

若因心气虚用妙香散

二母散 治产後恶露上攻留於肺经咳 喘促知母 贝母 白茯苓 人参 桃仁 杏仁【并去皮尖各一两】

右每服五钱姜水煎

若瘀血既去而 仍作宜补中气

二味参苏饮 治产後瘀血入肺咳 喘急

人参【一两】 苏木【二两】

右作一剂水煎服

若既愈更当用六君子以补脾胃若口鼻黑气起急用此药加附子五钱亦有得生者

清魂散 治产後元气虚瘀血逆行作晕

泽兰叶 人参【各一两】 荆芥穗【四两】 川芎【二两】 甘草【炙八钱】

右为末热汤温酒各半调下二钱

若因瘀血去多宜四物加参苓白术不应血脱也急补其气

朱砂安神丸 治产後血晕心神惊悸等症

朱砂【飞过五钱】黄连【酒洗六钱】甘草【炙五分】生地黄【一钱半】当归【一钱五分】

右为末饭糊为丸每服十五丸

若因中气虚宜用四君芎归兼思虑伤脾须用归脾汤

夺命丹 治瘀血入衣胞胀满难下急服此药血即消衣自下

附子【半两炮】牡丹皮【一两】乾漆【一两碎之炒令烟尽】

右为细末好醋一升大黄末一两同?成膏和药丸如桐子大温酒吞五七丸

花麝石散 治胎衣不下其效如神及打扑伤损腹中瘀血胀痛欲死服之血化为水其功不能尽述硫黄【上色明净者四两捣为末】花麝石【一两捣为细末】

右二味相拌和匀先用纸筋和盐泥固济瓦罐子一个候泥乾入药再用泥封口候乾安在四方砖上虚书八卦五行字用炭三十斤周叠煨之罐冷取出为细末每服一钱童便调下

平胃散 治肠胃寒受湿下血等症

苍术 厚朴 陈皮 甘草【炙】

右姜枣水煎服

益母草丸 五月采陰乾石器为末炼蜜丸弹子大临产以童便和温酒化下

加味芎归汤 治分娩交骨不开或五七日不下垂死者

川芎 当归【各一两】生男女妇人髮【一握烧灰存性】自死龟殼【一个如无占过者亦可酥矣】

右为末每一两水煎服良久不问生死胎自下

芎归汤 治产後去血过多晕烦不省用川芎当归二味等分每剂半两水煎服

若腹疼加桂腹痛自汗头晕少气加羊肉若不应用八珍汤

七味白术散 治中气虚口乾或吐泻等症

人参 白术 木香 白茯苓 甘草 藿香 乾葛 【各一钱】

右作一剂水煎服

选奇汤 治风热上壅眉棱骨痛头目或眩晕等症羌活

防风 【各二钱】 甘草 【二钱夏生冬炒】 酒黄芩 【冬去之热甚用】

右每服三钱水煎时时饮之

葛花解酲汤 治酒积上下分消其湿

白豆蔻 砂仁 葛花 【各五钱】 木香 【五分】 青皮 【三钱】 陈皮 白茯苓 猪苓
人参 【各一钱半】 白术 神麴 【炒】 泽

泻 生乾姜 【各一钱】

右为细末每服五钱白汤调下

藿香正气散 治外感风寒内停饮食头疼寒热或霍乱泄泻或作疟疾

桔梗 大腹皮 紫苏 茯苓 白芷 半夏麴 陈皮 白术
厚朴 【制各一钱】 甘草 【炙五分】 藿香 【一钱五分】

右作一剂姜枣水煎热服

清燥汤 治元气虚湿热乘之遍身酸软絶寒水生化之源小便赤少大便不调等症

黄芩 【一钱五分】 五味 【九粒杵炒】 黄连 神麴 【炒】 猪苓
柴胡 甘草 【炙各二分】 苍术 生地黄 泽泻 【各五分】 白茯苓 人参 麦门冬 陈皮 白术
当归 升麻

【各三分】 酒栢 【一分】

右作一剂水煎服

人参养胃汤 治外感风寒内伤饮食寒热头疼或作疟疾

半夏 厚朴【制】 橘红【八分】 藿香叶 草果
茯苓 人参【五分】 甘草【炙三分】 苍术【一钱】

右作一剂姜七片乌梅一个水煎服

大防风汤 治足三阴虚患鹤膝风历节痛风等症不问或肿而不痛或溃未斂

白术【炒】 羌活 人参【各二钱】 川芎【一钱五分】 防风【二钱】 甘草【炙各一钱】
牛膝【一钱酒浸】 黄芪【炙二钱】 当归【酒拌二钱】 白芍【炒二钱】 杜仲【姜制二钱】 熟地黄【生者自制】 附子【炮去皮脐一钱】

右作一剂水煎服

独活济生汤 治鹤膝及历节痛风等症

白茯苓 杜仲 当归【酒洗】 防风 白芍药 人参 细辛 桂心 熟地黄 牛膝 秦艽 芎藭 寄生草
甘草【炙二两】 独活【三两】

右每服一两姜水煎

羌活胜湿汤 治痛风血虚肿痛身重脉缓等症羌活 独活【去芦一钱】 藁本 防风 川芎
甘草【炙】 蔓荆子【各五分】

右作一剂姜水煎服

附子八物汤

治历节作痛发热作渴饮食少思等症附子【炮】 乾姜【炮】 芍药【炒】 茯苓 人参
甘草【炙各钱半】 肉桂【一钱】 白术【二钱】

右作一剂水煎食前服

四生散 治膝腿生疮或癣疥等症

白附子 黄芪 羌活 沙苑蒺藜

右各等分为末每服二钱用猪腰子批开入药湿纸包裹煨熟细嚼盐汤下风癖酒下

妙香散 治心脾亏损大便下血又治心气不足精神恍惚少睡盗汗

人参 桔梗 甘草【各五钱】 远志【去心】 山药【姜汁炙】 茯苓【去皮】 黄芪【各一两】 辰砂【三钱另研】 麝香【一钱另研】 木香【煨二钱半】 茯神【一两】

右为末每服二钱温酒调服

漏芦散 治血风走注作痛无定处

漏芦 当归 牛膝【各三分】 桂心 地龙【去土】 防风 羌活 白芷 没药【研各半两】 甜瓜子【半两】 虎胫骨【酥炙】 败龟【各一两炙】

右为细末每服二钱热酒调下

薛氏医案卷四

卷五

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷五

明 薛己 撰

保婴粹要

寒热瘰癧

小儿瘰癧乃肝胆三焦经风热或肝疳食积或胎气所致其症发於项腋或耳前後累累如贯珠当分表里而治若作痛或赤肿风热也用人参败毒散若作痛或寒热肝火也用加味小柴胡汤若隐於肉里而色不变肝疳食积也用九味芦荟丸若脓成不溃或溃不敛脾气虚也用益气养荣汤凡女子颈腋不问有无结核但作寒热肝脉长出鱼际乃血盛无偶之症用生地黄丸治法虽清肝火须兼滋肾水以生肝木否则多变为瘰症眼中有赤脉上贯瞳神见几条则几岁死无则可治

治验

阁老梁厚斋侄患此脓水淋漓其核未消发热憎寒此肝经血气虚而有热用补陰八珍汤为主间以清肝益荣汤而愈後复结核日晡热甚小便赤濇发热作渴此肝经血虚所致用参芍柴苓汤为主佐以六味丸加柴胡山梔治之而消

阁老杨石斋子年十五岁发热作渴日晡颊赤脉数无力症属陰虚有热用补陰八珍汤五十余剂又加参芪二十剂而溃但脓水清稀肌肉不生此脾气虚也以参芪归术为主佐以白芍药熟地麦门五味气血乃复遂以必效散一服癰毒去而疮敛矣

阁老张罗峯孙患此掌院公投以化痰削坚之剂夜热吐痰甚剧邀余治之时值季夏脉浮大按之而濇余曰症属於肝而反见肺脉当甚於金旺之际至期果卒其嗣中书患劳瘵公以火治之虽少愈而晡热未止复嘱余治其时孟冬脉洪数余谓水亏火旺不宜於夏公愈忌余寻构谤余由此而归後季夏中书竟不起翁乃服前言不妄盖二症皆属陰虚设滋化源犹可冀其生奈何见之不早也

张光禄子十三岁患此三年未愈不时寒热饮食少思此肝火而脾血虚也用益脾清肝散佐

以九味芦荟丸而痊年十六复患茎痿或谓肾气虚寒服温补之药窍出臭津旧痕肿痛予用清肝火药而愈

大尹周应昌子十五岁患此恪用化痰等剂虚症悉至余曰小便频数肝经陰虚也两目连劓肝经风热也作呕懒食胃气虚弱也泄泻後重脾气虚陷也用补中益气汤六味地黄丸而痊

举人杜克宏子颈肿发热四肢发搐口噤痰涌此肝胆经症即急惊风也先用泻青丸一服又用六味丸二服诸症顿退乃以小柴胡加芎归山栀鉤藤鉤而安却用补中益气汤而愈

一小儿十四岁患二年矣脓水清稀肌体骨立晡热盗汗口乾欬痰此肾水不能生肝木用补中益气汤六味地黄丸三月余元气复而疮渐愈

周世菊子十一岁眉间生一核如赤小豆出血如注发热倦怠食少体瘦此肝经血热脾经气虚用柴芍参苓散九味芦荟丸而愈

一女子十六岁经事不调项侧两臂胸乳脇肋两股两腿内外廉有核如榛如豆不计其数隐於肉里其色不变大按则痛或投以降火消毒不按自痛发热作渴日晡益甚经水过期左关脉数此肝火血燥也用清肝益荣汤六十余剂诸症已愈惟项核未消以当归龙荟丸数服及八珍汤加柴胡山栀三十余剂而痊

一女子耳下结核焮痛寒热此属肝经风热用栀子清肝散一剂诸症悉愈後因怒耳前後并额两角作痛寒热此兼少阳经症仍以前药加羌活二剂而痊

一女子十五岁项患五核时常寒热肝脉弦长而出寸口此血盛无偶之症也用小柴胡汤加生地乌梅治之而愈舍亲吴海槎子十五岁肝胆经部分结数核每服化痰之剂乙巳春形体消瘦脓成不溃脉洪数无力余用大补之剂元气顿复溃者渐愈肿者脓成惑於衆论服内消之剂吐泻大作而死余治肝胆经症数人至乙巳风木之年实者得痊虚者必歿

惊搐瘰癧

小儿因惊搐项侧肉里结核属肝脾之症当治其本而末自退假如因外邪而致者清表为主木旺而致者清肝为主停食而致者消导为主脾伤而致者调中为主大凡肝木自病惊搐痰壅目瞤抽搐等症是为有余宜凉肝生血实脾土则火自息而风自定矣若肝木侮脾土而致前症是为不足宜滋肾水实脾土则肝得血而热自退风自息矣其食积致痰而患者当调补脾胃脾胃既健则食化痰清而核亦自消矣若用金石香燥之剂脾损陰消不惟结核不散适足以成慢惊矣

治验

冬官朱小溪子项间结核面色痿黄肌体消瘦咬牙抽搐头摇目割此肝木尅脾土用六君子汤九味芦荟丸而愈

谢吏部子项间及四肢结核久溃形体骨立大便不调小便频数此肝脾之症用九味芦荟丸补中益气汤而愈

吴侍御子项久结核目割唇动摇抽搐此风木凌脾土用阜角子丸补中益气汤渐愈九味芦荟丸而愈下堡顾斐斋玄孙甫周岁项间结核两臂反张索败毒之药余意其症属肝经血燥未敢付药翌早请治询之尝患惊风或用朱砂等剂服之以致此耳遂与六味丸滋其肝血一服而愈盖朱砂金石之药大助阳火况小儿脏腑脆软不可用也尝观周礼注以朱砂雄黄等为五毒内经以石药之气为慄悍宋史以火炼朱砂牙硝生犀等为化毒丹薛居正服之而暴卒夫何今人执古偏方用金石之药耶或用抱龙丸及黄连大寒诸药皆遭其毒予不能不为之惻然也因并及之

儒者王文远子痰盛发搐服金石香散之剂手足筋挛此肝血复伤即急惊风也遂用加味小柴胡加钩藤钩山梔芎归一服六味丸料加五味门冬而安

一小儿病後遇惊即痰盛咬牙抽搐摇头作渴却服脑麝朱砂等药以致慢惊而卒

流注

小儿流注或因闪跌瘀血滞於隧道或因脾虚湿痰流於经络或因肝火气逆结於肢节或因元气虚弱外邪抟於肉里或因脾经积热或因禀赋所致乃不足之症也治法闪跌气滞者和血定痛丸湿痰湿热者健脾渗湿汤肝热风热者九味芦荟丸食积脾热者四味肥儿丸禀赋郁火者九味芦荟丸间以补元气扶脾胃则未成者自散已成者自溃若脓成而未溃者元气虚也先补而针之庶使脓毒不致内攻气血不致陷脱若脓出而反痛气血虚也八珍汤作呕少食胃气虚也四君子汤欲呕不食或腹胀有痰脾胃伤也六君子汤口噤搐搦等症气血虚极而变症也十全大补汤内伤晡热陰血虚於内也四味参苓白术表热恶寒者阳气浮於外也十全大补汤仍审其传变兼变而治之若热来复去昼见夜伏昼伏夜发或时节而动是谓虚热当亟补元气色赤肿硬而脓稠尚可治不赤肿破而脓清脉大寒热发渴不受补者皆不治

治验

鸿胪杨国威子年十二左脇下患此或用流气败毒之剂至半载而溃又用十宣托里之类年余不斂左右脉数而无力左关脉弦而细短此胆经之症盖胆属肝因肾水不足肝木血燥而然遂用六味地黄丸以补肾水用九味芦荟丸以清肝火而愈

通府李振之子十六岁腰患之三年不愈色黯下陷此肾经之症寒气逆於肉里其腰必伛矣

内宜滋化源以生肾水外宜散寒邪以接阳气可保其生不信仍以杂治元气益虚七恶蜂起始从余言而果验

州守陈克明子闪右臂腕肿痛或用流气等药加发热恶寒饮食少思口舌乾渴肿痛愈炽形气益疲此脾气复损遂以助脾胃壮气血为主佐以外治之法而愈地官黄北盘子腿患之肿痛发热作湿毒治之虚症悉至余谓元气虚外邪所乘用十全大补汤如圣饼而愈吴江龐氏子臂肘肿硬或用流气饮肉色不变饮食少思余曰此肝脾虚症先用六君子加桔梗薄桂饮食渐进又用补中益气加桔梗薄桂茯苓半夏及如圣饼而消

一小儿腋下肿年余而溃形体日瘦○一小儿股内结核如桃坚硬如石寒热作渴饮食少思○一小儿小腹一块三月而溃延及左脇出脓不止○一小儿耳前结核溃而不愈又结三核○一小儿乳间颈下及缺盆各肿一块○一小儿脇下患肿久而不溃俱用补脾胃之药及九味芦荟丸并愈余北仕时有留都贾学士子年十六患二载矣公陞北宗伯邀治诊其脉洪大而数脓清热渴食少体倦夜间盗汗午前畏寒余曰真气不足邪气有余治之无功公闻之改容曰宦寓留都如大旱之望云霓今得君一诊冀吾儿之必生何固辞也悬治午前以四君加芎归炙草午後以四君加麦门五味参芪两月诸症遂可一二公喜曰是吾儿也余曰未也有一远医自荐以渗利之剂保其必生公窃喜未几公奉使荆襄此医治已三月形体骨立公还大骇复悬於余余奉命南下辞不治後果歿

一小儿闪腿腕壅肿形气怯弱余欲以补气血为主佐以行散之剂反内服流气饮外敷寒凉药加发热恶寒形体愈虚复求治余曰恶寒发热脉息洪大属气血俱虚治之无功後内溃沥尽气血而亡

鹤膝风

小儿鹤膝风其腿渐细而膝愈粗如鹤之膝故名之因禀赋不足外邪乘之初则膝内作痛外色不变伸屈艰难一二月间焮肿而作脓者可治肿硬而不作脓者难治或三四月或半载後脓成自破者尤难治其初起肿硬脓成未溃者用大防风汤为主佐以益气养荣汤脓溃者用益气养荣汤为主佐以大防风汤和血定痛丸切不可用十宣流气等药若禀赋不足气血不荣肌肉消瘦膝骨粗大乃由肾气不能生髓故不荣於骨也当用加味地黄丸补之若不溃或溃不斂或有发热等症皆为气血两虚须以补益为主否则必变他症慎之

治验

地官王天成侄患此大溃不斂体倦食少口乾发热日晡尤甚用十全大补汤五剂以补元气复用大防风汤一剂以散其邪月余诸症悉退遂用补中益气为主佐以大防风汤而斂

儒者胡济之侄患此溃而不斂不时寒热小便赤澀用十全大补汤加麦门五味诸症顿退乃去桂常服佐以和血定痛丸间用独活汤而愈

胎毒发丹【一名胎瘤】

小儿丹毒乃禀毒於胎胎或风热相搏或频浴热汤或着烘衣其赤晕游走者乃血随风热也其微赤而兼白者外寒束其腠理也若禀热毒风热者用败毒散化毒丹大便秘者用大连翘饮频浴或烘衣者用清热凉血饮甚者必用砭法令人多吮患处取毒聚一处方砭而泄之若发於四肢毒入腹者难治治法虽多惟砭有回生之功亦有女子年十五六经未行而常患此血热也以四物黄芩柴胡荆防或加味逍遥散行经自愈

治验

少参史南湖孙乙未生丙申正月陰囊赤肿余作胎毒治之而瘥後患发热痰热等症诊其母有鬱火血热用解郁凉血之药子母俱服而愈至六月初患吐泻小便赤澀两眼瞤动投参朮之类不应以为慢惊然欲用附子之药请余议视其寅卯关脉赤此属风热用柴胡清肝散加鈎藤鈎木贼草一剂即愈至丁酉正月初旬颈患热毒脓出贴药感风发热翌日头面黯肿如大斗两耳厚寸许此风热上攻血得热而然急砭两额出黑血二盞许次砭面额亦如之随用清热化毒汤肿黯十退七八翌日又砭各处血不甚黑乃止仍用前药去牛蒡子加熟地黄而愈此症若砭缓则血凝滯或为破伤风皆致死

刘钦天之子腿如霞游走不定先以麻油涂患处砭出恶血其毒即散用九味解毒散一剂而安

一小儿患之外势虽轻内苦便闭此患在脏也服大连翘饮敷神功散而瘥

一小儿遍身皆赤砭之投解毒药而愈○一小儿不从砭治毒入腹而死

一小儿臀患之赤晕走散令人频吮患处使其毒聚於吮所乃砭出黑血余晕涂以加味神功散时以金银花甘草节为末用人乳汁调服而愈月余後两足赤肿仍治以前法而瘥数日後两足复赤或用犀角解毒之类乳食不进其腹膨胀此复伤其脾胃也仍敷前药服补中益气汤加茯苓而瘥

一小儿腿患之神思如故乳食如常此毒发於肌表余谓砭泄其毒不必服药其家不信外敷寒凉内服峻厉伤其脾胃腹乃膨胀乳食不进而歿夫寒凉凝结瘀毒峻剂复伤生气不死何待

一女子赤晕如霞作痒发热此肝经血热用小柴胡加生地连翘丹皮而愈凡女子天癸将至妇人月经不调被惊着恼多有此症治当详审

一女子十二岁善怒睡中抽搐遍身作痒饮食少思此肝火风热脾土受侮仍用柴参朮苓汤以清肝火凉肝血健脾胃而愈半载後遍身起赤痕或时眩晕余曰肝火炽盛血得热而妄行

也其夜果经至

伤食发丹

小儿伤食发丹乃因脾胃之气不足为患用四君加山梔柴胡神麴若赤既退而仍热此脾胃之气未复用四君加当归芍药若因脾经风热相抟而患用人参消风散加连翘山梔若脾虚发热而患用四君加川芎苍术芍药用发散以攻其末必至慢惊矣

治验

张仪部子每停食身发赤晕用清中解郁汤而愈越月忽摇头咬牙痰盛发搐吐出酸腐待其吐尽翌日少以七味白术散次日又以参苓白术散调理脾胃遂不复患大抵吐後儿安不必更服药也

杜钦天之子停食大便不通四肢赤色用枳实厚朴山查黄连神麴便通赤止更头晕咳 此脾气虚而不能生肺金用六君子汤而愈

张廷评子停食面赤用清热发散之剂腹胀痰喘倦怠恶寒此脾胃伤而不能生肺金用六君桔梗以补脾肺山查神麴以消余食顿愈

举人余时正子患此服发表之剂手足抽搐服抱龙丸目瞤气喘痰甚此脾胃虚弱而慢惊也无风可祛无痰可逐乃虚象也遂用六君加附子一剂而安再剂而痊一小儿停食服通利之剂作呕腹胀此脾胃复伤用补中益气汤而愈

秀才夏忠斋子停食服辛热之剂腹胀如蛊脉洪而数内作脓也不信果便脓而死

癰疹

小儿癰疹或因风寒收敛腠理湿热拂郁或因新浴见风相抟为患盖癰发於肤外则多痛疹隐於肉内则多痒疹而痒者消风散痛者犀角散癰而痛者清解散便秘者解毒散洁古先生云二者并出小儿难禁防患他症切不可下必用安里之药为主若便秘则微?之身温为顺身凉为逆大要外不宜敷贴寒凉内不宜剋伐元气海藏先生云此症首尾俱不可下为癰未见於表下之则邪气不得伸越故禁首不可下也为癰毒已显於外下之则癰气逆陷故禁尾不可下也

治验

司厅徐东白子瘙痒发热体倦少食此脾肺气虚外邪相抟先用消风散二剂随用补中益气汤加茯苓芍药而愈

乔秋官子作痛发渴乃服发表之剂其症益甚形气倦怠脉浮而数此邪在经络误散表而损其真也用人参安胃散补中益气汤而愈若主祛风必成慢惊矣丰考功子作痒发热用犀角消毒散一剂顿作吐泻此邪气上下俱出其疹果消勿药自愈

五脏疳疮【五脏痞块同治】

小儿头面耳项等处或如疮疥或如结核乃五脏受病而发於外或有积块成形於腹内者名五疳之症盖疳乾也或哺食太早或恣食甘肥或因峻利之药重亡津液虚火炽甚或因乳母饮食起居七情所致但调补其内诸病自愈若口蚀烂身体壮热颧唇赤色或作肿痛胃膈虚烦或咽乾饮水掌热便赤盗汗作渴嚙齿虚惊名曰心疳宜用安神丸之类若鼻外生疮眼目赤烂肢体似癰两耳前後项侧缺盆两腋结核或小腹内股玉jing陰囊辜丸肿溃小便不调摇头侧目白膜遮睛恶明畏日肚大青筋口渴下痢名曰肝疳宜用地黄芦荟二丸主之若头不生髮或生疮痂或髮成穗或人中口吻赤烂腹大吐逆饮食不化口乾嗜土泻下酸臭小便白浊或合目昏睡恶闻木音名曰脾疳宜用肥儿丸主之若鼻外生疮咽喉不利颈肿齿痛咳嗽寒热皮肤皱错欠伸少气鼻痒出涕鼻?目黄小便频数名曰肺疳宜用地黄清肺饮主之若脑热吐痰手足如水寒热往来滑泄肚痛口臭作渴齿龈溃烂瓜黑面黧身耳生疮或耳出水名曰肾疳宜用地黄丸主之大凡疳火上炎或痘毒上攻为患甚速名为走马疳急敷雄黄散服大茺萸等汤轻则牙龈腐烂唇吻肿痛可治重则牙齿蚀落颧颊透烂饮食不入不可治

治验

职方陈莪斋孙三岁面颊患疮将蚀两目此肝疳之症用大茺萸汤二剂而愈

陈司厅子遍身生疮面色痿黄腹胀内热大便不调饮食少思倦怠口乾病属肝脾用大芦荟丸不月而愈俞廷评子目割面青食少体倦大便滑泄此木乘土用芍药参苓饮而愈

工部陈樺亭长孙腹内一块小便不调或用行气破血等药发热口乾体瘦懒食几成瘵症面黄兼青此肝脾之疳用补中益气汤煎送大芦荟丸四服又用前汤加车前子煎送六味丸四服又用青肝火生肝血之药而愈

一女子十二岁目生白翳面黄浮肿口乾便泄用四味肥儿丸而痊

一小儿目割畏明年余矣此肝经虚热用地黄丸补肾而痊若肝经实热兼用泻清丸若肝经血少风热亦用地黄丸盖虚则补其母实则泻其子也

一小儿十一岁两耳後脑下各结一核色不变不作痛面色痿黄体倦口乾去後不调用芦荟丸治之诸症顿愈而核亦消

张掌科子未周岁目内有翳余谓此禀母之肝火也询其母乃侍媵素多恚怒且患瘰癧目疾

自乳其子余因并治其母稍愈後张外补医与异治其子遂瞽

一小儿鼻外生疮不时揉擦延及两耳○一小儿视物不明鼻内或痒或生疮用四味肥儿丸并愈

一小儿耳内出水耳外生疮脓水淋漓经岁不愈余用九味芦荟丸而愈

一小儿遍身如疥或痒或痛肌体消瘦日夜发热口乾作渴大便不调年余不愈用芦荟丸而痊

口疮

小儿口疮或母食厚味或儿嗜甘肥喜冷饮食者属实热用泻黄散畏冷饮食者属虚热用补黄散若饮食少思作渴引饮大便不实者脾胃虚弱也用七味白术散若停滯颧颊焮肿者脾胃虚而热郁先用人参安胃散後用七味白术散午後益甚四物加白术茯苓麦门五味如不应用补中益气汤或以茱萸末涂脚心若疳积虚火炎上齿龈腐烂当从口疳论治若马牙重舌但以线针刺出血即愈不必服药若口疮兼弄舌舒舌其因不同弄舌者微露即收此得於病後脾气亏损也急用补中益气汤补之舒舌者出长收缓此乃心脾有热少与泻黄散主之

治验

地官李北泉子十岁每口舌生疮服凉药即愈年至十五复患之服四物加黄栢方愈

吏部姚海山子口内生疮用寒凉之剂更加发热饮汤不絶余用补中益气加炮姜一剂而愈

工部张颐斋子二岁口舌生疮症属胃火敷柳华散加味解毒散而愈後因伤食吐泻不时弄舌用四君子汤而愈此症亦有发搐痰喘者皆中气受伤而虚热也亦用前汤即愈

唐仪制子口舌生疮延及头面胸臂脓水淋漓此胎毒之症内用牛黄解毒丸外以当归膏调黄栢末涂之而愈

郑司谏子口舌生疮齿龈腐烂延及头面脓水淋漓体瘦瘙痒此脾经疳热用肥儿丸及大枫膏而愈

疮疡【与痘疮参看】

小儿疮?乃胎中遗热或母食厚味所致若肿焮疼痛宜消毒热渴便秘宜?导不消散不成脓宜托里大凡肿起或结核作痛者用犀角消毒丸肿焮痛甚者用活命饮若肿硬色白用如圣饼肿硬色赤用隔蒜灸若脓成而不溃宜托里有脓即刺之若肉赤而不敛用四物参术以补

血肉白而不斂用四君加芎归以补气食少体倦而不斂用六君加芎归升麻以补脾若烦躁时嗽腹痛渴甚大便无度小便如淋脓毒痛甚目视不正喘粗恍惚嗜卧不食服药而呕四肢浮肿此脾胃虚损血气亏极之恶症并用补中益气或六君子亦可转危而安若动息自宁饮食知味便利调匀脓溃肿消神彩精明语声清朗此血气无亏之善症也善候多而恶候少或脉微濡迟缓者易愈恶候多而善候少或脉洪大粗散者难治余尝治七恶并至但用前二汤补其脾胃多有复生者故丹溪先生云但见肿痛参之脉症虚弱便与滋补气血可保终吉若用驱逐败毒虚虚之祸不免矣

治验

太常边华泉子三岁面生小疮内服发散外敷蚀药面目肿焮视其寅关脉青而微赤此风热也症轻而剂重表里皆伤俾洗去前药用补中益气加白芷桔梗一剂而愈

王通府子腿患毒脓已成肿痛发热作呕少食用托里散而脓溃翌日吐泻发搐乃脓溃而脾气复虚也余用姜术补中汤而安仍用托里而愈

戚侍御子颈间患毒脓成不溃此气虚也当刺之不从至胀痛始针脓出即安此症若脓已成急刺去用纸捻蘸麻油絛疮口以膏药贴之儿安不必服药凡小儿疮毒不愈或愈而复发多因母食厚味或有热症宜於治母药中加漏芦令母服之并痊

南都叶太守孙两臂患毒敷服皆寒凉两臂肿硬当助胃壮气以解凝寒乃用补中益气加茯苓半夏薄桂服之更以如圣饼熨之而愈凡患肿硬不拘赤白不问痛否但未成脓者用如圣饼或热葱熨其效如神

儒者陈方洲女十岁左耳下连项赤肿头痛此少阳胆经火症用梔子清肝散而消○一小儿所患相同作呕懒食此木尅脾土用小柴胡去黄芩加茯苓芍药治之而消○一小儿患亦同前因误服寒凉亏损脾胃以前药更加木香而消

一小儿缺盆患之发热作痛此脓内溃所致症属肺经喜其左颧白右颧黄而乃脾土生肺金也遂针出脓用托里药而愈

都宪王涵峯幼子项患毒脓成不出两颧皆白余曰此肝胆虚热之症今颧白乃肺金尅肝木也当急用针并调补脾气不信余言果内溃而歿

疮疥

小儿疮疥有膏粱积热有肝热肾热有父母遗热治法若遗热用化毒丹厚味用肥儿丸肝热用九味芦荟丸肾热用六味地黄丸若兼项侧有核用九味芦荟丸兼齿龈溃烂用六味地黄丸

治验

南都刘太守子患此肌体消瘦便滑寒热龈烂口渴此肾疳也用六味地黄丸更搽解毒散而愈

刘鸿胪子头面初起似癣非癣不时作痒久则焮赤脓水淋漓延及遍身用加味消毒散及搽清凉散解毒散而愈

阁老靳介庵子三岁或痛或痒脓水淋漓此胎毒为患用牛黄解毒丸更以当归膏调黄栢末涂之乳母以解毒散加漏芦服之而愈

一小儿遍身生疮久而不愈疹其乳母有肝火血燥之症用加味逍遥散更加漏芦治之用当归膏调山梔黄栢末涂儿患处俱愈

痘毒

小儿痘疹余毒轻则肌表津淫瘙痒重则肢节壅肿作痛若发热而大便秘结者犀角消毒散发热而大便调和者清热消毒散大便调和而渴者麦门冬饮肿痛发热而渴者仙方活命饮大凡根赤而作痒者血虚也四物加牡丹皮色白而作痒者血虚也四君加当归芍药色赤而作痛者血热也四物加连翘金银花色白而不焮痛者血气虚也托里散不成脓或不腐血气俱虚也八珍汤脓既溃而不斂脾气虚也六君子汤按之随指复起者内有脓也即刺之勿使内攻脓出儿安不必服药如脓清稀或反作痛或倦怠热渴或作痛等症皆属气血虚甚急以参芪归术之类补之若虚中见恶症者不可救实中无恶症者多自愈辛卯南畿患痘甚衆十死八九壮年者亦然云服朱砂痛苦顿解食毒物肢体如锥大人且然小儿岂能胜哉当深戒之丹溪先生云痘痛多是余毒血热王海藏先生云肝虚则入目肺虚则为疥发於骨节者肾之虚发於肌肉者脾之虚发於口齿咽喉肿痛者各随本经见症治之

治验

进士曹时子痘疳蚀陷敷以雄黄铜绿及服加味解毒散而愈○一小儿遍身脓水淋漓以经霜茅草研末铺於寝席更服前散而愈用神效当归膏调敷之尤妙南都姚太守子腿膝肿痛此因脾胃虚而毒流注先用活命饮四剂肿痛顿减再用补中益气汤及六味地黄丸而痊

表侄方位两臂腿腕焮赤肿强不能举动俱以为痼疾余用黄豆末热水调敷服活命饮二剂而消

表侄方位两目赤肿痛不可当此肝火为患用四物合小柴胡山梔牛蒡子生甘草倍用谷精草数剂而愈一小儿腿膝肿溃而脓水不止内热晡热体倦肌瘦此元气复伤也用补陰八珍汤六味丸三月余而愈

天疱疮

小儿天疱疮乃脾肺二经风热而发若发热焮痛者用人参败毒散发热咳嗽者加味抱龙丸发热寒热者清气消毒散热渴便秘者用加味清凉饮此肌肤之症当去毒水以黄栢蚯蚓屎敷之用当归膏亦善儿既安不必服药

治验

刘司厅子患此焮赤发热敷金黄散服大连翘饮三剂少愈更用加味解毒散而痊

一小儿焮痛发热挑去毒水以金黄散敷之更服荆防败毒散而愈更用柴芍参苓散而安

考功杨璞庵幼子服败毒之剂喘嗽唇白此药伤脾肺先用补中益气加茯苓麦门五味一剂诸症悉退後去门冬五味加桔梗白芷二剂全愈

杨梅疮【近时名】

杨梅疮乃天行湿毒有传染而患者有禀赋而患者受症在肝经故多在下焦发起治失其法多至蚀伤眼目腐烂肾茎拳挛肢节原其初起有上体多者先用荆防败毒散下体多者用龙胆泻肝汤大便秘者用大连翘饮後用换肌消毒散为主若蚀眼目兼以九味芦荟六味地黄二丸肢节拳挛者兼用蠲痹解毒汤若脾胃亏损而不能愈者先用六君子汤若气血虚弱而不能愈者先用八珍汤後用换肌消毒散若槩用轻粉等剂多致不起

治验

一周岁小儿染此误薰银朱之药昏愤不乳遍身无皮余用菉豆黄栢末遍铺於蓆令用睡卧更用金银花生甘草末白汤调服渐愈若疮乾燥更用当归膏若误用轻粉亦以前法解之

一小儿患此年余形体消瘦日晡热甚余晨用八珍汤夕用换肌散并太乙膏三月余而愈

一小儿三年不愈肌体消瘦脓水淋漓此因元气虚耗而兼肝症用换肌散九味芦荟六味地黄二丸两月余愈

黄水粘疮

小儿黄水粘疮属脾肺二经风湿热所致若邪在表而痒痛者轻则用犀角消毒散重则连翘防风汤邪在内而大便秘者轻则用九味解毒散重则用连翘饮若头目不清憎寒壮热便秘表里俱有邪也用加味清凉饮治之

治验

毛通府子患此卯关脉黄两目时割形体困倦此土虚木旺当用和肝补脾汤及服败毒散前症益甚更加吐泻不食遍身发泡余仍用前汤拨去泡水以菉豆甘草末频铺蓆上任其睡卧後用神效当归膏而痊

沈尚宝子发疮 或用大连翘饮致腹胀少食此表症而反泻其里致元气复损也余用补中益气汤治之渐愈

一小儿疮 作痒发热既破脓水淋漓此肝火血热用加味逍遥散而愈

一女子十四岁遍身疮 搔破成疮脓水淋漓发热烦躁日晡益甚乃血气虚而有热用加味逍遥散而愈

痔疮

小儿痔疮或因胎热或因热痢或因厚味所致盖肛门肿痛者湿热也作痛者风热也便秘者火盛也清脓者热炽也湿热者加味槐花散之类风热者秦艽苍术之类便秘者润燥汤清之脓溃者黄芩散托之

治验

侍御陆钧雪子患此彼执用寒凉之药肢体倦怠饮食少思肛门重坠大便不实余曰此脾胃伤而中气陷故尔用补中益气汤加酒炒白芍药白术茯苓而康倪二守孙肛门肿痛出血水年余矣忽吐血便血皆紫而成块此肠胃积热用犀角地黄汤顿止更用金银花炙甘草末白汤调服半载而痊

肛门作痒

小儿肛痒或嗜甘肥大肠湿热壅滞大便秘结或湿毒生虫而蚀肛门若湿热壅滞者用四味肥儿丸大便秘结者用清凉饮虫食肛门者先用化?丸後用四味肥儿丸外以雄黄散纳肛内若因病不食虫无所养而食脏食肛者其齿龈无色舌上尽白四肢倦怠当视其上唇内有疮唾血如粟心内懊懔此虫在上食脏若下唇内有疮此虫在下蚀肛门若食肛透内者不治道藏经云诸虫惟上半月头向上可用药追之望後头向下患者亲自烹飪虫闻香味头即向上亦可追之

治验

一小儿肛门作痒余以为大肠经风热用槐角丸○一小儿连肛门连陰囊痒余以为肝经湿

热用龙胆泻肝汤芦荟丸○一小儿吐呕青沫腹胀筋青唇口紫黑余以为肝木尅脾土用火芦荟丸并愈

疔痛

小儿囊痈属肝经湿热或胎禀热毒初起肿痛用龙胆泻肝汤三四剂如不消用托里以速其脓若脓未溃而小便不利毒壅滞也当渗之脓已成而不利者脓壅塞也当针之脓去而痛不减者当解毒脓去而反痛者当补托甚者阴囊尽溃辜丸悬露亦不为害若疝气误服热剂阴囊肿痛亦治以前法

治验

司徒李杏冈仲子小便澀滞肿痛寒热此肝经湿热用龙胆泻肝汤而消但内热倦怠此兼脾气虚弱用四君子加柴胡山栀芎归而愈

林侍御子二岁肿痛寒热尅伐过多不能成脓用托里清肝散而溃又用托里散而敛後寒热如疝小便闭塞亦属肝火用小柴胡加山栀龙胆草车前子而愈鲍尚宝子三岁大溃痛甚烦躁饮冷此余毒尚在与活命饮二剂肿痛顿退与四君加柴胡山栀四剂诸症既退再以托里散而敛

下疳并阴痿

小儿下疳阴痿属肝火湿热若下疳肿痛发热用九味柴胡汤小便赤澀用小龙胆泻肝汤其肾茎萎软乃肝火湿热盖肝火属木得雨露则森立遇酷日则痿软若误为虚寒投以热剂轻则囊茎生疮重则腐而不敛皆宜滋肾水生肝木清肝火经云肝气热则筋痿故宗筋弛纵肾茎肿胀或出白液或痒痛或里急筋缩挺纵不收或精随便下名筋疝俱属肝火与肾无干也

治验

宗伯黄久庵子春初生时母弃淹於水逾日不死始收之遂成喘嗽又颌腋臂背股各结块核溃而色紫若误触之痛应於心服辛温化毒等剂绵延不愈时已弱冠询治於予予曰初生而喘嗽者乃饮冷伤肺也既长而喘嗽者乃肝火刑肺也故结核俱在肝胆部分始用补中益气汤後用九味芦荟丸不月诸症咸愈此禀父母之肝火而患也

吴江庠生史玄年自乳儿时即患目疾年二十岁目割头摇用六味丸加五味子而安一日前症复作目忽生翳余用聪明益气汤并前丸即愈既而前症反甚形气消瘦脉洪大数用补中益气汤及前丸而肺症悉平後因赴选劳役患痢形气愈弱肺洪大弦长按之微细仍用前汤送香连丸而痢止再用六味丸料加五味子而元气复

侍御吴东隅子下疳溃烂发热作痛日晡尤甚先用补中益气汤後用九味芦荟丸治之诸症悉愈

太常边华泉子二岁茎痿湿痒出白津余以为肝火不信乃温补肾经果陰囊焮肿茎中作痛余用龙胆泻肝汤用六味地黄丸而痊

刘武库子辜丸作痛小便赤澁寒热作呕用小柴胡汤加山梔车前子茯苓而愈

一小儿辜丸肿硬小便黄澁用小柴胡汤加山梔车前子并芦荟丸而消

一小儿腹内一块或作痛或上攻小便不调用龙胆泻肝汤芦荟丸而愈後形气消烁发热作渴此肝木制伏脾土用补中益气汤及芦荟丸而愈

一小儿自脱胎时两目赤肿或作痒或生翳此稟赋之肝火也用芦荟六味二丸而愈

一女十五岁患瘰癧身发赤晕形气倦怠此肝火血虚所致用加味逍遥散而赤晕愈用益气汤六味丸兼服而瘰癧消

一小儿下疳溃烂发热作痛 一小儿茎中作痒不时搔捻

一小儿肾茎中溃痛小便秘澁日晡尤甚 一小儿目痒出水或项间结核或两眼连割或陰囊搔痒年余矣俱属肝火用九味芦荟丸并愈

附方并注

人参败毒散【加荆芥防风名荆防败毒散】治疮?焮痛寒热或拘急头痛邪在表者

人参 羌活 独活 前胡 柴胡

桔梗 枳殼 茯苓 川芎 甘草【各五分】

右水煎服

益气养荣汤 治气血损伤四肢颈顶等处患肿不问软硬赤白痛否日晡发热或溃而不斂

人参 茯苓 陈皮 贝母

香附 当归【酒拌】 川芎

黄芪【盐水拌炒】 熟地黄【酒拌】 芍药【炒各五分】 甘草【炙】 桔梗【炒】

柴胡【各三分】白术【炒一钱】

右姜水煎服大人倍用

九味芦荟丸 治疳积癰癥结核耳内生疮或疝气囊痛下疳溃烂或茎出白津股腹有疮或体瘦热渴大便不调牙龈蚀落颊頤腐烂等症

胡黄连 黄连 芦荟 木香

白茺萸【炒】青皮 白雷丸 鹤虱草【各一两】麝香【三钱】

右为末蒸饼糊丸如麻子大每服一钱空心米汤下

生地黄丸 治室女寡妇师尼恶风体倦乍寒乍热面赤心烦或时自汗症类时疫但肝脉弦长

生地黄【一两酒拌杵烂】黄芩 硬柴胡【各半两】

赤芍药 秦艽

右为末加炼蜜少许丸桐子大每服二三十丸

九味柴胡汤 治肝胆经热毒癰癥或耳内耳下生疮发热潮热或肝经湿热下注囊痛便毒肿溃或小腹脇股结核凡肝胆经部分一切疮?发热并用之柴胡 黄芩【炒各五分】人参 山梔

半夏 龙胆草 当归 芍药【各三分】甘草【三分】

右水煎服

地黄丸【加肉桂一两名加減八味丸】治小儿肝经虚热血燥或风客淫气而患癰癥结核或四肢发搐眼目抽动痰涎上涌凡伤损出血多抽搐发热又治牙疳脑热消瘦手足如冰寒热往来滑泄肚胀口臭乾渴齿龈溃烂爪黑面黧遍身两耳生疮或耳内出水成发热自汗盗汗便血诸血失瘖等症其功不能尽述【即六味地黄丸】牡丹皮 白茯苓 泽泻【各三两】熟地黄【八两杵膏】乾山药 山茱萸肉【各四两】

右为末和地黄炼蜜丸桐子大每服三五十丸空心白滚汤下地黄须自制

薄荷汤 治风热癰癥初起元气无亏者

薄荷 皂角【去皮弦】连翘 三棱【煨】

蔓荆子【一两】豆豉【三两五钱】荆芥穗【一两】何首乌【米泔水没】

右为末醋糊丸桐子大每服二十丸食後滚汤下量儿加减

皂角子丸 治肝胆经风热颈脇两侧等处结核连翘【八钱】当归
柴胡【各一两】皂角子【炒二两】芍药 山梔【炒】川芎【各一两】桔梗

甘草【炒】 龙胆草【酒炒黑各半两】

右为末米糊丸菉豆大量儿大小用之

必效散 治瘰癧元气无亏用此以去之若瘰既去而不收敛服益气养荣汤若元气怯弱宜先补後服瘰毒已下仍服前汤庶无他患

轻粉【一钱】南硼砂【二钱五分】巴豆【五个去皮心膜】

白槟榔【一个】斑猫【四十个去头翅同糯米炒】麝香【五分】

右同研极细取鸡子二个去黄用清调药仍入殼内以湿纸数重糊口入饭甑蒸熟取出曝乾研末每服五分用炒生姜酒五更初调服如觉小腹痛用益元散一服其毒俱从大肠出

隔蒜灸法 治鹤膝风流注等症肿硬每日灸二三十壮痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒随火而散盖火以畅达拔引郁毒此从治之法有回生之功其法用大蒜去皮切三文钱厚安疮处用艾壮於蒜上灸之三壮换蒜复灸未成即消已成者亦杀其毒如疮大用蒜杵烂摊患处将艾铺上烧之蒜败再换如不痛或不作脓及不发起或陰疮尤当多灸凡疮不痛不作脓不起发气血虚极也不治惟患在头面不宜多灸

神效葱熨法 治流注结核骨痛鹤膝等症肿硬或先已隔蒜灸而愈肿未消最宜用熨以助气血行壅滯有益无损其功甚大又为跌扑伤损止痛败血消肿之良剂其法用葱白头捣烂炒热频熨患处冷再换

出头散 治一切顽疮瘀肉不化或瘰核不消疮口不合

赤石脂【半两】乳香【二钱】白丁香【二钱】砒【生用】

黄丹【各一钱】轻粉 麝香【各五分】蜈蚣【一条炙】

右为末搽瘀肉上其肉自化若疮口小或痔疮用糊作条陰乾紙之凡疮久不合者内有脓管须用此药腐烂兼服托里之剂方效

琥珀膏 治瘰癧不潰或潰而脓水不絕变成漏症

琥珀【一两】木通 桂心 当归

白芷 防风 松香 朱砂

木鳖子 丁香 木香【各二两】

右先用琥珀丁香桂心朱砂木香松香为细末其余为咀以麻油二斤六两慢火煎白芷焦黄滤去徐下淨黄丹一斤以柳枝不住手搅煎至黑色滴水中捻硬软得中却入琥珀等末搅匀於磁器盛之用时取少许摊贴

和血定痛丸【一名黑丸子】治流注膝风或扑跌瘀血或六淫所伤肢节肿痛服之自消若潰而发热与补药兼服自斂

百草霜【五两】白芍药【二两】赤小豆【八两】川乌【炮一两五钱】白斂【八两】白芨【二两】当归【二两】南星【炮三两】牛膝【三两】骨碎补【四两】

右为末酒糊丸桐子大每服二三十丸白汤下

神效太乙膏 治痈疽疮毒溃烂

玄参 白芷 当归 肉桂

赤芍药 大黄 生地黄【各一两】

右用麻油二斤八两铜锅内煎至黑滤去徐入淨黄丹一斤再煎滴水中捻软硬得中即成膏矣

乳香定痛散 治一切疮疡溃烂疼痛

乳香 没药【各三钱】滑石【七钱】寒水石【一两煨】冰片【二钱】

右为细末搽患处痛即止甚效

如圣饼 治一切疮?硬肿不能消散

乳香 没药 木香 血竭 当归

麝香【少许】

右各另为末酒糊和为饼炙热频熨患处

健脾渗湿汤 治疮?初起焮肿作痛或湿毒下注或环跳穴痛

人参 白术 苍术【盐炒】 防己【酒拌】

黄栢【酒炒】 川芎【各一钱】 陈皮【酒拌】 当归

茯苓 木瓜 柴胡稍 甘草【三分】

右水煎服如三剂不退加桂少许或用酒煎小便澀倍用牛膝有热加黄连身痛加羌活量儿大小用

化?丸 治诸疳生虫不时啼哭呕吐清水肚腹胀痛唇口紫黑肠头湿?

芫荇 青黛 芦荟 虾蟆【烧灰】 川芎

白芷 胡黄连

右等分各另为末猪胆浸糕丸如麻子大每服一二十丸食後并临卧杏仁汤下

芦荟丸 治肝疳口舌生疮牙龈腐烂体瘦生疮虚热往来或发稀腹胀小便白浊饮食无度泻痢无时或两眼生翳摇头揉目不时咬指或口乾作渴嗜卧食土腹大胸高呕食吐虫非此药不能治

史君子【肉煨】 芍药【炒各半两】 乾蟾【半两炙黑】 黄连【炒】

芫荇【炒】 神麴【炒】 麦芽【炒各一两】 芦荟【三钱】

右为末神麴糊丸黍米大每服五七分空心米汤下

大芦荟丸 治三焦肝胆经风热目生云翳或疳热瘰癧耳内生疮寒热作痛肌体消瘦发热作渴饮食少思肚腹不调或牙龈蚀落颊颧腐烂下部生疮等症芦荟 胡黄连 当归 龙胆草【酒浸炒】 芍药 川芎 芫荇【各一两】 木香

甘草【各三钱】

右为末茯神糊丸麻子大每服三五十丸滚汤下

东垣大茺萸汤【一名梔子茯苓汤】治黄疸土色【为湿为热】当利小便【今反利已黄色中为燥胃经热】发黄脱落【知膀胱肾俱受土邪乃大湿热之症】鼻下断作疮【土逆行营气伏火也】能乳【胃中有热也寒则食不入】喜食土【胃不足也】面黑色【为寒为痹】大便清【寒也】褐色血黑色【热蓄血中】间黄色【肠胃有热】治当滋营润燥外致津液

山梔仁【二分】黄蘗

甘草【炙各二分】大茺萸【五分】黄连【二分】麻黄【不去根节】羌活柴胡【各三分】防风【一分】白术【五分】茯苓当归【各四分】

右水煎服仍量儿大小

大肥儿丸 治脾疳饮食少思肌肉消瘦肚大颈细发稀成穗项间结核发热作渴精神倦怠便去酸臭爱食泥土或口鼻头疮或肚见青筋啮齿下利便白五疳即肥儿丸加乾蟾一两茺萸五钱

肥儿丸 治食积五疳颈项结核或白秃肌瘦肚大筋青髮稀成穗发热作渴等症或母食厚味致儿为患黄连 神麴 木香【各一两半】肉豆蔻【二两炮】槟榔【二十枚】麦芽【炒】史君子【酒浸去皮各四两】

右为末面糊丸麻子大每服三五十丸米饮下

四味肥儿丸【一名小肥儿丸】治食积脾疳目生云翳口舌生疮牙龈腐烂发热瘦怯遍身生疮等症

黄连【炒】茺萸【炒】神麴 麦芽【炒等分】

右为末水糊丸桐子大每服二三十丸空心白汤下

地黄清肺饮 治肺疳咳嗽

明阿胶【一钱面炒】马兜铃

甘草【各五分】生地黄杏仁【七枚去皮】糯米【炒十粒】鼠粘子【三分炒】

右水煎服量儿加減

朱砂安神丸 治心痞怔忡心下痞闷

朱砂【四钱】 黄连【半两】 生地黄【半两】 生甘草【二钱五分】

右为末蒸饼糊丸如米大每服十丸连津送下

茯神丸 治心痞

茯神 芦荟 琥珀 川黄连

赤茯苓 钩藤皮 远志【姜制焙乾】 虾蟆灰【各一钱】 麝香【少许】 菖蒲【一钱】

右为末粟米糊丸麻子大每服十丸白汤下

天麻丸 治肝痞眼目生翳昏花湿烂等症

青黛 川黄连 天麻 五灵脂

川芎 夜明砂【微炒】 芦荟【各一钱】 龙胆草

蝉蜕【去足】 防风【各一钱】 全蝎【二枚焙】 麝香【少许】

右为末猪胆汁浸糕丸麻子大每服二三十丸白滚汤下

阿魏膏 治一切痞块不拘年月远近甚者口齿蚀伤更服芦荟丸

羌活 独活 玄参 官桂

赤芍药 穿山甲 生地黄 两头尖

大黄 白芷 天麻【各五钱】 槐柳桃【枝各三钱】 红花【四钱】 乱髮【如鷄子大一块洗去膩】 木鳖子【廿枚去殼】

右用香油二斤四两煎至黑色去查入髮再煎待髮化尽去查徐下黄丹一斤煎至软硬得中方入芒硝四钱阿魏五钱苏合油麝香各三钱乳香没药各五钱调匀即成膏矣摊贴患处内服消积丸药黄丹须真正者效凡贴膏药先用朴硝随患处大小铺之约半指厚以纸盖之用热熨斗熨良久如硝耗再加熨之熨二时许方贴膏药若是肝积加芦荟末同熨

加味逍遥散 治妇人陰虚发热儿饮其乳以致患疮

甘草【炙】 当归【炒】 芍药【酒炒】 茯苓

白术【炒】 柴胡【各一钱】 牡丹皮【六分】 山梔【炒五分】

右水煎服

大防风汤 治膝风肿痛不问已溃未溃

附子【炮去皮】 牛膝【酒浸】 甘草【炙各一钱】 羌活

人参 杜仲【姜制】 当归【酒浸】 防风

白芍药【炒】 黄芪 熟地黄【用生者酒拌蒸半日忌铁器各二钱】 川芎【一钱五分】

右每服三五钱姜水煎空心服进三五剂更服六味地黄丸二三服

独活汤 治鹤膝风不问肿溃疼痛及腰背不便四肢不仁

独活【五分】 当归【酒洗】 白术 黄芪【炒】

薄桂 牛膝【各三分】 甘草【炙二分】

右姜葱水煎服量儿加减

托里散 治流注鹤膝及一应疮毒已成不溃已溃不敛或脓出反痛发热

人参【五分】 黄芪【炒一钱】 白术【六分】 陈皮【五分】

甘草【炙三分】 当归【七分】 川芎 芍药【酒炒】

熟地黄【酒拌】 白茯苓【各五分】

右水煎服

加味地黄丸 治小儿赋禀肾经虚热耳内生疮或肌肉消瘦骨节皆露名节疳即地黄丸加鹿茸牛膝各一两五味子四两若颅解不合牙齿不生眼睛不黑腿软难行最宜此药

砭法 治小儿丹毒赤色游走不定口吮毒聚在一处用细磁器击碎取其有芒者一块以筋一根劈开头尖夹之用线缚定两指轻撮筋稍令磁芒正对聚处悬寸许再用筋一根频击筋头

令毒血遇刺皆出毒入腹者不救症轻者止用口吮出毒用药敷之如患在头皮不用砭法止宜用针卧倒挑患处出毒血

消热消毒散 治一切痈疽阳症肿痛发热作渴黄连 山梔 连翘 当归【各五分】川芎 生地黄 芍药【炒各六分】金银花【一钱】甘草【二分】

右水煎服

托里消毒散 治疮疡先用消解之剂不退宜服此药助其成脓

人参 黄芪 陈皮 白术

当归【各一钱】金银花 皂角刺【炒】甘草【各四分】

右水煎服

神功散 治一切疮毒未成脓者用之内消加乳没尤好

黄栢【炒】 草乌【炒】 血竭【等分】

右为末唾津水调搽赤肿既退洗净搽後方二味解毒散

化毒丹 治小儿热毒咽乾口舌生疮口齿出血或惊惕狂躁睡卧不寧并宜用之

玄参 桔梗【各五钱】茯苓【二两五钱】人参

牙硝 青黛【各一两】甘草【七钱半】麝香【一字】

金银箔【各十片】

右为末炼蜜丸豆大每一岁服一丸白汤化下

犀角消毒散【一名犀角散】 治小儿丹毒发热痛痒及疮疹等毒

牛蒡子【炒】 甘草 荆芥 防风【各五分】犀角【二钱末】金银花【三分】

右水煎熟倾出入犀角服

加味四物汤 治小儿血热丹毒

当归 川芎【各一钱】 芍药 生地黄【各七分】 柴胡 山梔【炒各五分】

右水煎服

消风散 治小儿瘾疹搔痒

荆芥穗 甘草【炙】 陈皮【各半两】 人参

白僵蚕 茯苓 防风 芎藭

藿香 蝉蜕【各二分】 厚朴【三分姜制】 羌活

右水煎服

清解散 治风热瘾疹发热作渴及痘毒

连翘 荆芥穗 甘草【各三分】 牛蒡子【炒五分】 玄参【四分】 金银花【二分】

右水煎服

解毒散 治瘾疹痒痛寒热甚者烦躁谵语并痘毒发热咽乾

犀角【镑五钱】 连翘【三钱】 薄荷【一钱】 牛蒡子【炒二钱】 甘草【五分】

右为末每服一二钱滚汤调下

一方 治虚热口内生疮白矾二两杵碎滚汤三碗入

在内频浸儿脚

牛黄解毒丸 治胎毒

牛黄 甘草【等分】

右为末用炼蜜丸量儿服

泻黄散 治脾胃实热口舌生疮喜饮冷物又治脾热吐舌若不时出舌名弄舌属心脾虚热宜用人参安胃散

藿香叶【七钱】石膏【煨五钱】甘草【三钱】防风【去心炒】

山梔仁【炒各一两】

右用蜜酒同炒为末每服二钱水煎服

补黄散 治脾胃虚热口舌生疮畏寒冷饮食

人参 白术【炒各一钱】白芍药【炒】陈皮【各五分】甘草【炒五分】

右姜枣水煎服

四顺清凉饮【加山梔牛蒡子名加味清凉饮】治小儿痘疮後脏腑秘结实热惊掣

当归 赤芍药 甘草【炙】 大黄【蒸各三分】

右水煎服大黄非实热便秘不宜用

人参安胃散 治小儿因服峻厉损其脾胃口舌生疮或因伤热乳而致吐泻或作慢惊口鼻气热或胃中风热伏火呕吐泄泻

人参【一钱】黄芪【二钱】生甘草

炙甘草【各五分】白芍药【七分】白茯苓【四分】黄连【二分】

右为末每服三五钱水煎服

温中丸【一名人参理中丸】治中气虚热口舌生疮不喜饮冷肢体倦怠饮食少思

人参 甘草 白术【各炒等分】

右为末用姜汁糊丸菉豆大每服三五十丸

补中益气汤 治中气伤损恶寒发热肢体倦怠饮食少思或头痛身热烦燥作渴气高而喘或微细软弱自汗倦怠饮食不甘等症

人参 黄芪 甘草【炙各一钱】白术

当归身 陈皮【各五分】柴胡 升麻【各二分】

右姜枣水煎服

七味白术散【一名钱氏白术散】治中气虚热口舌生疮不喜饮冷或吐泻口乾

人参 白术 木香 白茯苓

甘草【炙】 藿香【各五分】 乾葛【一钱】

右水煎服

香连丸 治痢疾并水泻暑泻甚效

黄连【净十二两】 吴茱萸【去核梗十两】

右先将二味用热水拌和入磁器内置热汤顿一日同炒黄连至紫色去茱萸用连为末每净末四两入木香净末一两淡醋米饮为丸桐子大每服二三十丸滚汤下中气下陷用补中益气汤下中气虚用四君子汤下中气虚寒加姜桂

参苓白术散 治脾胃不和饮食不进或呕吐泄泻凡病後宜此调理

人参 茯苓 白扁豆【去皮姜汁拌炒】

白术【炒】 莲肉【去心皮】 砂仁【炒】 薏苡仁【炒】

桔梗【炒】 山药 甘草【炙各二两】

右为末每服一钱白汤下或作丸服

柴胡参苓汤 治肝火血热遍身瘙痒或起赤晕柴胡 山梔【炒】 川芎
芍药【炒各五分】 熟地黄 当归【各八分】 茯苓【八分】 甘草【炒五分】

右水煎服

柴芍参苓散 治肝胆经部分结核瘰癧等症或肝血燥热脾气虚弱发热少食

柴胡 川芎 白术 人参

茯苓 白芍 当归【各五分】 牡丹皮

甘草 山梔【炒各三分】

右姜枣水煎服

清肝益荣汤 治肝胆经风热血燥筋挛结核或作瘕子

柴胡 山梔【炒各五分】 当归【六分】 龙胆草【酒炒五分】 川芎
芍药【各六分】 甘草【三分】 薏苡仁【五分】

右水煎服

清热凉血饮 治风热血燥丹毒等症大便秘结当归 川芎 芍药【炒】
生地黄【各一钱】 黄连【炒五分】 荆芥【六分】

右水煎服大便秘量加大黄

清中解郁汤 治脾气虚弱饮食停滞鬱热生痰或身发热赤晕

白术 茯苓 陈皮 山梔【炒】

山楂 神麴【炒】 麦芽【炒】 川芎

桔梗 甘草【炒各五分】

右姜水煎服

芍药参苓饮 治肝木尅脾土目眦面青食少体倦

芍药【炒】 柴胡 山梔 茯苓

白术 陈皮【各七分】 甘草【炙五分】

右姜水煎服

姜术补脾汤 治元气虚寒呕吐不食腹痛泄泻等症

乾姜【炒】 白术 人参 茯苓

陈皮 半夏 甘草【炒各五分】 当归

黄芪【炒各四分】

右姜枣水煎服

和肝补脾汤 治风热疮疹脾土不及肝木太过

人参 陈皮 川芎【各五分】 白术

茯苓 芍药【各七分】 柴胡 甘草【炙各三分】

山梔【炒四分】

右水煎服

益脾清肝散 治肝经之症或寒热体痛脾胃虚弱

人参 白术 茯苓 甘草

川芎 当归 黄芪【各五分】 柴胡【三分】

牡丹皮【四分】

右水煎服

梔子清肝散

治三焦及足少阳经风热耳内作痒或生疮出水或脇肋胸乳间作痛或寒热往来

柴胡 牡丹皮 梔子【各一钱】 茯苓

川芎 芍药 当归 牛蒡子【炒各七分】 白术 甘草【各五分】

右水煎服

柴胡清肝散 治肝胆三焦风热怒火或项胸作痛或增寒发热

柴胡 黄芩【炒】 人参【各三分】 山梔【炒】

川芎【各五分】 连翘 桔梗【各四分】 甘草【三分】

右水煎服

加味消毒散 治一切疮?丹毒游风等症

玄参 连翘【各五钱】 升麻 芍药

当归 羌活 生地黄 牛蒡子【炒各三钱】 黄芩 甘草【各二钱】

右为末每服一钱薄荷灯心汤下或用蜜为丸

十全大补汤 治诸疮血气虚弱不散解不溃斂或脓出发热恶寒汗出烦弦口眼歪斜或肌瘦少食发热口乾等症须多服为善即四君四物加黄芪肉桂

四物汤 治发热烦躁或日晡发热若因脾胃虚弱而不能生血宜用四君子之类最忌此药

熟地黄 当归【各三钱】 芍药【二钱】 川芎【一钱半】

右水煎服

四君子汤 治脾胃虚热唇口生疮不消散不溃斂或食少作呕大便不实若因肝木乘脾上而致加柴胡芍药

人参 白术 茯苓 甘草【炙一钱】

右姜枣水煎服

六君子汤 治脾胃虚弱饮食少思或大便不调肢体消瘦面色痿黄即四君子汤加陈皮半夏

八珍汤 治气血俱虚肿溃不愈或恶寒发热或晡热作渴饮食少思即四君四物姜水煎服

补阴八珍汤 治属足三阴虚热渴体倦小便频数即八珍汤加酒炒黑黄栢知母各三四分

加味八珍汤

治元气虚弱不能溃斂或内热晡热肌体消瘦即八珍汤加牡丹皮五味子炙甘草各三四分

当归补血汤 治溃疡肌热躁热面赤烦渴脉洪大而虚重按全无此脉虚血虚也误服白虎汤必死黄芪【二钱炒】 当归【一钱酒制】

右水煎服

大连翘饮 治风热热毒表里皆受患者

连翘 麦 荆芥 木通

赤芍药 蝉蜕 甘草 防风

柴胡 滑石 山梔【炒】 黄芩【炒】

当归【各等分】

右量儿大小水煎服

立効散 治眉疮耳疮及一切疮疥

定粉 松香 黄栢 黄连【各五钱】 枯矾【二钱】

右为末用清烛油调搽

犀角消毒丸 治一切疮毒焮肿热痛用三五服不消乃欲成脓也宜用托里之剂

犀角 薄荷 连翘 玄参【各二钱】 牛蒡子【二钱】 金银花【一钱】 甘草【三分】

右为末炼蜜丸麻子大每服三十丸滚汤下

韶粉散 治痘疮已愈疮痂不落或凹或凸

韶粉 轻粉【各二两】

右为末入猪脂油调涂亦无瘢痕神効

雄黄散 治走马疳并痘毒疳虫蚀肛门

雄黄 铜绿【各二钱】

右为末掺疮上

柳华散 治热毒口疮

黄栢【炒】 蒲黄 青黛 人中白【煅等分】

右为末敷之

败草散 治痘疮?搔成脓淋漓

屋烂草【用盖墙烂草亦可要多年者佳】

右为末糝之若浑身脓水粘衣难以卧坐用一二升摊於蓆上令儿坐卧即安其草经年霜雪雨露受天地陰阳之气能解疮毒

谷精草散 治痘後眼有翳膜或癰澁出泪

谷精草【一两】生蛤粉【一两】

右为末用猪肝一叶以竹刀批开糝药在内缚定磁器内煮熟食之

治痘毒用黄豆为末温水调涂以水润之脓未成自消又方 治症同前

贝母 南星 殭蚕 天花粉

白芷 草乌 大黄【各四两】猪牙皂角【四两】寒水石【煨八两】

右各为末醋调敷

加味小柴胡汤 治痘疹炽盛或大便下血或昏愤不食或发疔毒甚效又治肝火等症

软柴胡 人参 黄芩 甘草【炙各五分】

半夏【二分】生地黄【一钱】

右姜水煎服

犀角地黄汤 治痘出稠密热渴赤痛大便秘结小便赤澹或结痘毒或便血?血急服之以凉血解毒犀角【一钱如无升麻代之】生地黄【五分】赤芍药

牡丹皮【各一钱】

右水煎服

麦门冬饮 治痘毒发热作渴咽痛

黄芩【三分】甘草【五分】人参
玄参【各三分】金银花【五分】麦门冬【去心四分】

右水煎服

射干散 治痘毒咽喉肿痛

升麻 甘草 桔梗 射干【各五分】鼠粘子【四两炒香】

右水煎服

加减抱龙丸 治风痰壅盛惊搐昏睡等症

雄黄 辰砂【各二钱】天竺黄【四钱】麝香【五分】

天麻【六钱】牛胆南星【八钱】

右为末煮甘草糊丸阜角子大每一丸薄荷汤下

解毒散 治一切疮疡风疹痒痛

黄栢【炒】山梔【等分】

右为末水调搽若破而脓水淋漓用当归膏或烛油调搽

清凉解毒散 治症同前或作焮痛

大黄 黄栢 山梔 寒水石【煨等分】

右各另为末调搽当归膏尤好

大枫子膏 治一切疮疥脓窠等疮

大枫子肉【杵细二两】白矾【枯末二两】真轻粉【一两】

柏油【六两】

右将柏油溶化入三味和匀用之

黄金散 治天疱疮止痛消毒

滑石 甘草【等分】

右为末挑破去水敷之

换肌消毒散【一名?藓散】治杨梅疮不拘初起溃烂并效土茯苓【五钱】当归 白芷 皂角子

薏苡仁 甘草【各五分】白藓皮 木瓜【不犯铁器】

木通 金银花【各三分】

右水煎食前并空心服

痲痺解毒散

姜黄 羌活 白芷 赤芍药

当归【各四分】白术【五分】土茯苓【一钱】白芷

皂角子【炒各三分】

右水煎服

龙胆泻肝汤

治肝经湿热玉jing患疮或便毒悬痈囊痈肿痛或溃烂作痛小便澁滯或辜囊悬挂

车前子【炒】木通 生地黄【酒拌】当归尾【酒拌】山梔【炒】黄芩【炒】
甘草【各五分】龙胆草【酒拌炒黄】泽泻【各一钱】

右水煎服

九味解毒散 治一切热毒肿痛或风热搔痒

黄连【三分】金银花 连翘

漏芦【各五分】山梔【四分】白芷【六分】当归【八分】防风【三分】

甘草【三分】

右水煎服

升麻除湿汤 自上而下者引而升之

升麻 柴胡【各五钱】 苍术【一钱】 陈皮

甘草 神麴 防风 大麦蘖【各三分】 猪苓 泽泻 半夏【各五分】

右姜枣水煎服胃寒肠鸣加益智仁【五分】

神效当归膏 治杖扑汤火等疮毒不问已溃未溃殊有神效

当归 黄蜡【各一两】 生地黄【一两】 麻仁【六两】

右先将当归地黄入油煎黑去渣入蜡溶化候冷搅匀即成膏矣白蜡尤好治症详见正体治验

四苓散【加桂名五苓散】 治下焦湿热小便不利

猪苓 泽泻 白术 茯苓【各五分】

右水煎服

加味槐花散 治肠风下血痔疮肿痛发热

槐花 熟地黄 白术 青皮

荆芥穗 川芎【各二分】 当归身 升麻【各五分】 枳壳 条芩【炒各二分】

右水煎服

秦艽苍术汤 治痔漏大便坚硬小便频数【阙】

作渴秦艽【五分】 苍术【三分】 泽泻【二分】 防风【三分】

桃仁 皂角子【炒】 当归尾 黄柏【酒炒】

槟榔 条芩【炒】 山栀【炒】

右水煎服

润燥汤 治痔疮大肠风热血燥秘结不通

生地黄 麻子仁【研】 山梔【各五分】 川芎

羌活 黄栢 条芩【各三分】 郁李仁

赤芍药 当归尾 甘草【各四分】 泽泻【二分】

右水煎服

黄芩散 治痔疮并一切痈毒溃後补虚去客热茯苓 黄芩【各五分】 当归
川芎【各四分】 白芍药 白芷【各三分】 升麻 山梔【炒各二分】

右水煎服

枳殼散 治痔疮肿痛或下血

枳殼【去 炒】 槐花 荆芥 皂角子【炒】

蛴螬皮【炙各等分】

右为末每服一钱滚汤下作丸亦可

加味槐角丸 治症同前

槐角 枳殼 当归 黄芩

皂角仁 蛴螬皮【炙】 秦艽 白芷

右为末蜜丸量儿大小服

消毒膏 治痛消毒

羊胆【一个】 冰片【五分】

右将冰片为末以羊胆调涂之

小龙胆泻肝汤

治肝经湿热陰囊肿痛小便赤澀发热作渴等症如三四剂不退必欲作脓也用托里之剂

泽泻 柴胡 车前子【炒】 木通【各五分】 生地黄 黄芩【炒】 当归尾【酒洗】 龙胆草【酒浸炒黄】 赤茯苓【各五分】 山梔【一钱】 甘草梢【三分】

大龙胆泻肝汤 治囊痈热毒炽盛肿胀便秘即前汤加防己连翘大便秘更加大黄如大便通而肿不退或愈加胀痛内有脓也用托里之剂及时针之最易收敛

当归龙荟丸 治肝胆二经一切有余火症

草龙胆 当归 大梔子 黄连

黄芩【各一两半】 大黄 芦荟 黄柏【各半两】 麝香【少许】 木香【二钱半】

右为末面糊丸桐子大量儿服

附避难止小儿啼

用绵为小球随大小为之但使满口不闭其气置儿口中使吮其味儿口中有物自不能作声但软物不伤儿口亦可凡避寇匿山谷中多为儿啼卒不免难由是避者预将儿弃之哀哉兹大司成邱公以此方梓行於世特取以附之庶或可以推广其仁心也

薛氏医案卷五

卷六

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六

明 薛己 撰

保婴金镜录

全幼心监云小儿半岁之间有病当於额前眉端髮际之间以名中食三指横按之儿头在左举右手在右举左手食指为上中指为中名指为下若三指俱热主感受风邪鼻塞气粗发热欬嗽若三指俱冷主外感内伤发热吐泻若食中指热主上热下冷名中指热主夹惊食指热主胸膈气满乳食不消○窃谓额间赤色主心经风热烦躁惊悸若发热作渴饮水或发叫哭属本经实热用泻心汤以清心火微赤则困卧而悸发热作渴饮汤属虚热用秘旨安神丸以生心血青黑主惊风腹痛或瘈瘲啼叫青黑甚主心腹疼此寒水胜心火为贼邪用益黄散以补脾胃微黄皮燥主惊疳此心经疳症用秘旨安神丸以养心血骨蒸作渴盗汗头髮乾黄此为肾疳用地黄丸以滋补肝肾○左脸青或兼赤乃肝经风热项强顿闷发搐目眦瘈瘲用柴胡清肝散主之虚热用地黄丸补之青黑主肝剋脾虚寒惊搐腹痛用六君姜桂温之微赤主潮热血虚心躁用秘旨安神丸佐以地黄丸○右脸赤主大肠实热气粗欬嗽发热饮水用泻白散若哽气出气唇白气短属虚热用五味异功散脾热所传用清胃散心火所刑用人参平肺散淡赤主潮热心躁或大便坚秘用宣明柴胡饮子以疎导其热如潮热未止更用钩藤饮以清肝补脾色青白主欬 恶心先用惺惺散解其表邪健其脾土继以六君子汤调补中气色青黑主惊风腹痛盘肠内吊此肝木侮脾土用六君子汤加钩藤钩以调补元气不宜治肝○鼻色赤主脾胃实热身热饮水饮食如常用泻黄散清热理脾微赤主脾经虚热饮食难化而不思食用五味异功散以补中健脾色深黄主小便不通鼻中乾燥气粗衄血乃脾热传於肺肾先用济生犀角地黄汤清热养血後用地黄丸以滋益肾水色淡白乃脾气虚弱主泄泻饮食不化用六君子以调补中气青色主脾土虚寒肝木所胜用五味异功散加木香炮姜温中平肝○颧间色赤主肾与膀胱陰虚有热而小便不通用四物汤加山梔以养血清热赤甚主膀胱气滯而热结用五淋散以分利其邪若鼻準微黄兼右腮微赤乃脾肺燥热不能化生肾水用黄芩清肺饮膀胱陰虚阳无所生用滋肾丸若颧间微赤乃膀胱阳虚陰无所化用六味地黄丸若兼小腹胀满或陰囊肿胀属陰虚湿热壅滯用六味丸加车前子牛膝兼脾肺气虚不能通调水道者亦用前药其小便赤色久而尿血亦属肝肾气虚有热用六味地黄丸主之不应则用补中益气汤益脾肺生肾肝若小便後出白津或茎作痛者属肝经湿热先用龙胆泻肝汤後用六味地黄丸○印堂色青黑主腹痛夜啼此脾经虚寒脾属至陰故夜间腹痛而啼用钩藤饮色淡白主泄泻饮食不化属脾气虚弱用五味异功散加木香主之○目内色

青主肝经风热发惊若直视叫哭属肝经实热用抑肝散兼咬牙顿闷属虚热用六味地黄丸色赤主心肝二经发热抽搐烦躁若小便赤属小肠实热用导赤散若惊悸倦怠属肝经血虚用六味地黄丸色黄主脾积少食夜间发热用四味肥儿丸饮食停滞吐泻并作用胃苓散去桂加茵陈山栀自解发搐眼眨属风热相抟先用柴胡栀子散后用六味地黄丸眼胞微肿主久咳恶心或脾疳食积用五味异功散补脾肺兼肥儿丸以消积滞或目视不明或雀目揩拭眉眼此欲生风也急用抑肝散以解之睛尾红丝乃肝木胜脾土先用四君子加柴胡山栀后用地黄丸○人中色黄主伤食青主乳食不化噯噯酸腐此脾虚停滞用平胃散以消积和中色青赤主惊肝气伤脾用五味异功散加柴胡以平肝补中○唇色白主吐涎呕逆或吐血便血乃脾气虚弱不能摄涎统血归源急用六君子汤调补中气则诸病自愈切忌凉药若色赤乾燥而皱者主脾经有热发热作渴口中气臭大便不通燥烦不寐先以清胃散治其热更以六君子汤加黄连山栀兼补其脾色黄主脾经食积泄泻饮食不化以六君子汤温补中气色赤兼白主衄血乃脾肺虚热不能摄血用圣济犀角地黄汤以清热补血兼用六君子以补脾气久不愈用麦门冬散或人参补肺汤○口畔色黄主脾经积热用清胃散以理脾清热若唇口搐动主惊热不安用五味异功散加山栀钩藤钩以补脾平肝若口流涎唇色紫乃胃气虚寒也用益黄散若腹中痛口吐涎水者乃虫痛也先用茺萸散后用调中丸不吐涎者乃积痛也但用五味异功散调补胃气手足并冷用理中汤加乌梅温补中气则虫不动而痛自止矣亦有积痛者或吐后痛止或去后痛止者宜用消积丸消导积滞佐以异功散调补胃气○耳前微赤此少阳经风热也用柴胡栀子散生肝血清肝火微黄主睡中惊悸咬牙因肝脾虚热宜用四君子加芍药以安神耳轮乾燥主骨疳蒸热为肾经虚热也用六味地黄丸补之若小便后出白津或阴茎痒痛者属肝经湿热也先用龙胆泻肝汤后用六味地黄丸若禀父不足或早近女色致小便澹滞或作痛如淋者急用六味地黄丸补中益气汤滋其化源或大小便道牵痛者尤为虚也亦用前药加牛膝车前子肉桂救之如手足逆冷或畏寒饮食阳气虚寒也急加附子多有生者大抵小儿之症多因禀赋脏气不平或乳食寒暑失宜或妊娠饮食起居六淫七情所致若初病元气无亏乳食如常发热壮热二便秘结作渴饮水卧不露睛者悉属形病俱寔当治邪气若病久元气已亏食少发热口乾饮汤呕吐泄泻肢体畏寒卧而露睛者悉属形病俱虚当补正气况今之小儿元气与昔不同用药失宜脾胃先伤岂可泥古方而施治哉余故考诸名家宗诸东垣于凡诸症各补以方药治者能即色以验其病察病以固其本斯无失矣是以古之治病望色为先也且惊则气散脉乱不可专诊故必兼察色心监云若面色未尽当参之以指脉指脉未尽当参之以面色色脉兼尽无余蕴矣

治验

一小儿瘦癯啼叫额间青黑此惊风肝木乘脾腹中作痛也先用六君子汤加木香柴胡钩藤钩啼叫渐缓更加当归又二剂而安

一小儿呕吐不食手足搐搦痰涎上涌手足指冷额黑唇青此肾水胜心火也用五味异功散加木香炮姜顿安乃去炮姜再剂而愈

一小儿烦躁惊悸热渴饮冷额间色赤此心经实热所致先用泻心汤一服稍缓又用柴胡栀

子散而瘥一小儿四肢消瘦肚腹渐大寒热嗜卧作渴引饮余曰症属肝脾名为丁奚哺露也以白术散为佐佐以徐氏十全丹月余诸症渐愈乃以异功散加当归及六味丸又月余寻愈

一小儿患前症诸瘡悉具热如火炙病状不能尽述朝用异功散夕用四味肥儿丸月余诸症稍愈佐以地黄丸自能行立遂朝以地黄丸夕以异功散及虾蟆丸数服而全愈

一小儿四肢消瘦肚腹胀大行步不能状如蜘蛛颇能饮食作渴发热去後臭秽此脾藏伤也以十全丹数服诸症渐愈又用异功散肥儿丸调理肢体如常

一小儿发热拘急或四肢痠痠左颧色赤此心肝二经风热相抟先用柴胡清肝散以清心肝之热次用六味地黄丸以生肝肾之血顿安

一小儿发搐啼叫手足指冷左颧青黑此肝脾虚弱肾水反侮脾土用六君子汤加姜桂一剂顿安又以四君子加芎归及补肝散而愈

一小儿潮热烦躁左颧青赤此心肝血虚用秘旨安神丸及四物汤加防风酸枣仁治之寻愈又用六味地黄丸调补肝肾而瘥

一小儿潮热发搐痰涎上涌手足指冷左颧至申酉时青中隐白手足时搐此肝经虚弱肺金所胜而潮搐脾土虚弱而手足冷也用补中益气汤以调补脾肺用六味地黄丸以滋补肝肾而愈盖病气有余当认为元气不足若用泻金伐肝清热化痰则误矣

一小儿发热咳 右颧色赤此肺金有热用泻白散而愈复感冒风邪前症更作又加声重流涕用参苏饮加杏仁桑皮而愈但右颧仍赤兼额微赤此兼心火乘肺金也用人参平肺散一剂遂瘥

一小儿五岁作渴右腮鼻準微赤或饮冷水或服凉药即时呕吐余曰右颧微赤肺经虚热也鼻準微赤胃经虚热也此胃虚不能生肺耳先用四君子加升麻一剂服之而不吐又用白术散二剂而不渴再用四君子四剂而安

一小儿潮热烦渴大便乾实气促咳 右颧色赤此肺与大肠有热用柴胡饮子一服诸症顿退後因微惊又发搐咬牙顿闷此肝脾气血虚也用四君子加芎归鈎藤鈎而愈

一小儿咳 恶心鼻塞流涕右颧色青白此脾肺气虚而外邪所乘先用惺惺散咳 顿安但饮食不思手足指冷此外症虽去而元气尚虚也用六君子少加升麻一剂而瘥

一小儿腰曲啼叫右颧色青黑此脐腹内痛即盘肠内吊也因脾土虚寒肝木来乘故耳用六君子加木香鈎藤鈎顿瘥

一小儿发热饮食少思大便不实常服芦荟等丸视其鼻赤此寒凉之剂复伤脾土而虚热也用五味异功散数剂而元气复

一小儿小便不利鼻乾衄血鼻间色赤属脾肺有热用济生犀角地黄汤前症已愈後颊间常赤作渴有痰此禀赋肾气不足用地黄丸而诸症皆瘥

一小儿发热作渴用泻黄散大便重坠口角流涎仍欲泻火余曰鼻準青白多而黄色少属脾胃虚寒肝木所侮盖口角流涎胃气不能统摄也大便重坠脾气不能上升也不信另用凉剂果有眉唇微动四肢微搐余曰此虚极而变慢脾风也用六君子加当归木香炮姜钩藤钩二剂益甚意欲更剂余曰此药力未及也设前药不对其症祸在反掌矣仍以前药加炮附子一片服之即安乃去附子又二剂调理而愈

一小儿小便不利服五苓散之类不应颊间及左颧色赤乃肝肾虚热用四物汤加山梔而愈後因感冒悞用发汗小便仍前不利余用补中益气汤加麦门五味调补脾肺而愈

一小儿小便不利及茎中澀痛或尿血石此禀父肾热为患先用五淋散以疏导又用滋肾丸地黄丸补其肝肾渐愈出痘後小便短赤颊间石顙或赤或白属肺肾气虚而热也用补中益气汤六味地黄丸而瘥

一小儿印堂青黑至夜啼搐余谓脾土虚寒用钩藤饮而安後因惊发搐夜啼用钩藤饮前症顿止又用异功散而愈

一小儿八岁腹肿胀脐凸出大便下血粪亦似痢小水短少面目皆黄两腮兼赤此食积伤脾又兼肝木所侮脾土盖脾病则肺气虚而不能生肾水矣故有是症当先消导其积滞遂用越鞠丸末加三棱?术三钱以淡姜汤调和入酒二匙服之腹中鸣动二便顿利再服二钱腹脐顿消却用大安丸末二钱腹脐全消便血亦止自进薄粥杯许腹中顿痞恶心吐痰不出此脾虚不能腐化而成痰滞也用六君子末二钱以姜汤和服调补胃气饮食渐进但日晡热倦腹中觉胀此脾虚故陰分而作用补中益气汤而瘥後复伤食发热腹胀小便下血服保和丸四服而愈

一小儿目内色青发搐目直上视叫哭不已或用牛黄清心丸不愈反咬牙顿闷小便遗泄此肝经血气虚甚故耳余用补中益气汤及六味地黄丸而瘥

一小儿发搐目割属肝胆经风热先用柴胡清肝散以清其肝後用六味地黄丸以补其肾而瘥

一小儿眼胞微肿欬 恶心小便泔白余谓脾痞食积脾气虚甚也以五味异功散为主佐以四味肥儿丸而愈後不禁饮食视物不明余曰此脾胃复伤须补养为主不信乃服峻厉之剂後变风症竟为不起

一小儿唇中青黄暖腐酸气用平胃散一服宿滞顿化余云不必多药但节其饮食自愈不信复伤食而暖腐另用尅滞之药更加吐泻以致不救惜夫

一小儿伤食呕吐服尅伐之药呕中见血用清热凉血之药又大便下血唇色白而或青问其故於余余曰此脾土亏损肝木所乘而然也令空心用补中益气汤食远用异功散以调补中气使涎血各归其源而愈一小儿五岁食粽後咬牙欲吐顷间腹胀昏愤鼻青黄赤此脾土伤而心肝所动食积发厥也先令鸡翎探吐出酸物顿醒节其饮食勿药而愈

一小儿生旬日面目青黄此胎黄症妊娠胃热也用泻黄散乳调少许即愈後复身黄吐舌仍用前散而安一小儿四岁发热饮冷口内生疮额鼻黄赤吐舌流涎余谓心脾有热用导赤泻黄二散而愈後复作余因他往用清热化痰等药前症益甚更弄舌余用异功散加钩藤钩而安又用六君子汤而愈盖吐舌者为脾经实热而舌长出也弄舌者乃脾脏虚热也令舌时舒而即收也治者审之

一小儿三岁言步未能牙髮犹少体瘦骨立面赤作渴服肥儿丸不应余谓此肾虚疳症乃禀父精气不足故也盖肥儿丸脾胃经之药也久服则肾益虚而疳益甚不信果牙髮渐落余用六味地黄丸加鹿茸五味子半载元气健而诸症愈

水镜诀云陰阳运合男女成形以分九窍四肢乃生五臟六腑部位各分逆顺难明若凭寸口之浮沉必乃横亡於孩子须用虎口辨别三关消详用药必无差误未至三岁看虎口及三关若脉见风关初病则易治交气关则难治交命关则病深死症又当辨其色如兽惊三关必青水惊三关必赤人惊三关必黑若紫色主泻痢黄色是雷惊三关脉通度是极惊之症必死或青或红有纹如线直者是母食伤脾左右一樣者是惊与积齐发纹有三条是肺生风痰或作?声色青是伤寒主痰 色红主泻有黑相兼主下痢红多者赤痢黑多者白痢有紫相兼虎口脉乱乃脾胃不和盖脉纹见有五色由其病甚纹色更

变至於纯黑者不可得而治矣又当参辨脉形

主之

十三指形主症

[子部,医家类,薛氏医案,卷六

愚谓古人云小儿为芽儿如草之芽如水之沤然也盖因臟腑脆嫩口不能言最难投剂是以首察面色而知其所属次验虎口以辨其所因矣然犹未足以尽病之证故余复注十三指形实为治法之简便尔若流珠形者主饮食所伤内热欲吐或肠鸣自痢烦躁啼哭用胃苓膏消饮食分陰阳若食既消而仍吐泻肠鸣用香砂助胃膏温补脾胃环珠形主脾虚停食胸膈胀满烦渴发热用五味异功散加山楂枳实健脾消食後用六君子汤调养中气○长珠形主脾

伤积滞肚腹作痛寒热不食先用大安丸消其积滞次以五味异功散健其脾气○来蛇形主脾胃湿热中脘不利乾呕不食此疳邪内作用四味肥儿丸治疳用四君子补脾去蛇形主脾虚食积吐泻烦渴气短喘急不食困睡先用六君子汤加山楂枳实健脾消积次以七味白术散调补胃气○弓反里形主感冒寒邪哽气出气惊悸倦怠四肢稍冷小便赤色咳 吐涎先用惺惺散助胃气祛外邪後以五味异功散加茯神当归养心血助脾气若外邪既解而惊悸肢冷乃脾气尚虚宜七味白术散补之若闷乱气粗喘促哽气者难治肺虚甚也○弓反外形主痰热心神恍惚夹惊夹食或食瘤风瘤脾肺气虚而风热痰盛也先以天麻防风丸祛外邪又用五味异功散调中气○枪形主风热生痰发搐惊风先用抱龙丸如未应用牛黄清心丸若传於脾肺或过用风痰之药而见一切诸症者专调补脾胃其病自愈○鱼骨形主惊痰发热先用抱龙丸如未应属肝火实热少用抑青丸随用六味地黄丸或发热少食或痰盛发搐乃木尅脾土也用六君子加柴胡调补脾土而制肝木○水字形主惊风食积胸膈烦躁顿闷少食或夜啼痰盛口噤搐搦此脾胃虚弱饮食积滞肝木尅脾土也初患用大安丸消导饮食次以六君子汤加钩藤钩补中清肝若已服消食化痰等剂反伤元气者用四君子加升麻柴胡钩藤钩以升补脾胃平制肝木○针形主心肝热极生风惊悸顿闷困倦不食痰盛搐搦先用抱龙丸祛风化痰次用六君子汤加钩藤钩平肝实脾○透关射指主惊风痰热聚於胸膈乃脾肺亏损痰邪乘聚先用牛黄清心丸清脾肺化痰涎次用六君子汤加桔梗山药补脾土益肺金透关射甲主惊风脾土亏损肝木克制之败症急用六君子汤加木香钩藤钩官桂以温脾土未应即加附子以回阳气多得生者

流珠只一点红色环珠差大长珠圆长已上非谓圈子总皆红脉贯气之如此来蛇即是长珠散一头大一头尖去蛇亦如此分上下朝故曰来去角弓反张向里为顺向外为逆枪形直上鱼骨分开水字即三脉并行针形即过关一二粒米许射甲命脉向外透指命脉曲里虽然余常治之亦有不专执其形脉而投剂者盖但有是症即服是药而已

流珠形症

一小儿发热吐泻腹胀不乳其纹如流珠此脾胃气伤先用香砂助胃膏後用六君子汤全愈

长珠形症

一小儿寒热作呕饮食不入按其腹乃哭脉纹如长珠此饮食停滞也先用大安丸吐泻宿滞遂安但唇目搐动大便稀黄此肝邪去而虚热所迫也用六君子汤加钩藤钩而愈

环珠形症

一小儿胸腹膨胀发热顿闷脉纹如环珠以手按腹即哭此属脾胃虚而饮食停滞也先用保和丸一服前症如失更加烦渴按其腹不哭矣此宿食去而脾胃复伤也用五味异功散加柴胡治之顿瘳

来蛇形症

一小儿不时乾呕乳食不进肚腹膨胀其形如来蛇此脾胃虚而成疳也用四味肥儿丸治疳佐以四君加芫荇健中而痊後伤饮食吐泻完谷形气甚困四肢微搐视其纹如去蛇余曰且不用药次日吐止但搐而泻青黄此脾土虚而肝木胜用六君子加鈎藤鈎而痊

去蛇形症

一小儿未及周岁气短喘急乳食少进时或吐乳视其形如去蛇乃脾伤而食积先用六君子加山查枳实渐愈後乳食复伤吐泻作渴候二日不止与胃苓膏以治吐泻七味白术散生胃气而愈

弓反外形症

一小儿睡卧惊悸发热痰盛脉形如弓之向外此因惊木旺伤脾而食不消也先以天麻防风丸祛风定惊後用五味异功散壮脾止搐而痊

弓反里形症

一小儿沉默昏倦肢冷惊悸其纹如弓之向里此脾肺气虚而外感寒邪也先用惺惺散以解外邪调胃气诸症顿愈但手足逆冷又用六君子汤调补元气而安

枪形症

一小儿患咳 服牛黄清心丸加喘促腹胀余视其右脸赤脉纹形如枪属脾气复伤用六君子汤顿安

鱼骨形症

一小儿沉困发热惊搐不乳视其脉纹如乱鱼骨此风热急惊之症也先用抱龙少许祛风化痰後用六君子汤加柴胡壮脾平肝而愈

针形症

一小儿咳 发热右脸赤色作渴烦闷倦怠少食肚腹作胀脉纹如针此风邪伤肺而饮食伤脾也先用六君子汤加桔梗杏仁柴胡一剂诸症少愈後去杏仁柴胡再剂而安

水字形症

一小儿发热夜啼乳食不进昏迷抽搐痰盛口禁脉纹如水字此脾肺气虚风木所乘痰食积於胸腹也先用大安丸後用六君子加鈎藤鈎而痊

透关射指形症

一小儿发热右脸赤咳 痰盛其脉纹透关射指余以为风邪蘊结於肺而痰作用二陈汤加桑皮杏仁桔梗治之自用发散降火之剂风痰不退发势益甚余曰此脾肺俱虚治失其宜遂用五味异功散加桔梗四剂渐愈又用六君子汤而痊

透关射甲形症

一小儿停食发热服苓连三棱厚朴等剂饮食日少胸腹膨胀其纹透至指甲用补中益气汤加木香鈎藤鈎温补脾气制肝木数剂渐效又用六君子汤加炮姜治之而安其泛用金石脑麝祛逐之剂变惊而殁者不能枚举惜哉

愚谓凡小儿在月内外者调补之药每服亦不过二三匙若表散攻伐之剂则每服只可匙许而已过多则反伤元气余当量大小虚实加减若乳母之疾致儿为患当治母为主子少服之後仿此

钱氏泻青丸 治肝经实热急惊抽搐

羌活 大黄【煨】 川芎 山梔仁【炒】 龙胆草【酒炒】 当归 防风【各等分】

右为末炼蜜丸芡实大每服半丸煎竹叶汤入砂糖化下

愚按前方足厥陰经解散肌邪疏通内热之火也若大便秘结烦渴饮冷饮食如常者属形病俱实宜用此以泻之若大便调和烦渴饮冷属病气实而形气虚宜用抑肝散平之若大便不实作渴饮汤饮食少思肢体倦怠者属形病俱虚宜用地黄丸补之大抵前症若肝经血虚风热先用四物汤加鈎藤鈎以生肝血继用四君子汤以补脾土若因肝经血燥痰盛用地黄丸滋肾水生肝木四君子加芍药实脾土生肺金若因肺金克肝木用六君子汤加芍药实脾土以平肺金若屡行攻伐而脾土虚寒者急服六君子汤加丁香补脾胃以培阳气若因乳母恚怒肝火致儿为患者母服加味逍遥散子亦吮数滴

钱氏地黄丸 治肝疳白膜遮睛浮血失音身瘦疮疥又治肾怯不言解颅行迟等症一名六味地黄丸熟地【八钱酒洗】 山茱萸【肉】 乾山药【各四钱】 泽泻 牡丹皮 白茯苓【各三钱】

右为末用地黄膏量加米糊丸桐子大每服二三十丸空心白汤化下其地黄用生者自制杵膏

愚按前丸治肝经血虚燥热或肾经虚热作渴小便淋秘痰气上壅或风客淫气患瘰癧结核或四肢发搐眼目瞤动或咳 吐血头目眩晕或咽喉燥痛口舌疮裂或自汗盗汗便血诸血或禀肾不足肢体瘦弱解颅失音或畏明下窜五迟五软肾疳肝疳或早近女色精血亏耗五脏齐损凡属肾肝俱虚不足之症皆宜用此以滋化源其功不能尽述

泻白散 治咳 痰喘面肿身热

甘草【炒五钱】地骨皮【一两】桑根白皮【炒黄一两】

右为末每服一二钱入粳米百粒水煎

愚按活人方云喘者肺气盛而有余然气盛当认作气衰有余当认作不足盖肺气盛者肺中之火盛也有余者肺中之邪有余也其脉右寸必浮而有力右颊色赤前药所以泻之世之多不用人参盖泥於肺热还伤肺之说以致误人多矣前症若乳母感冒风寒肺经蕴热致儿为患用十味参苏饮若乳母膏粱醇酒积热致儿为患用加味清胃散

钱氏泻黄散【一名泻脾散】治脾热吐舌

藿香【七钱】石膏 甘草【炒各五钱】防风【二两】山梔仁【炒一两】

右?酒微炒为末每服一二钱水煎

愚按前方治脾胃寔热之法也若作渴饮水肢体壮热元气无亏者宜用之若作渴饮热弄舌体温元气虚弱者宜五味异功散

钱氏泻心汤 治心经实热

黄连

右为末每服一钱临卧温汤调下

愚按前症若仰面而卧叫哭发热饮水或发抽搐属心经实热宜用前方若合面而睡惊悸上窜咬牙属心经虚热宜用导赤散若因乳母膏粱醇酒致儿发热者用加味清胃散令母服子亦饮数滴

钱氏益黄散【一名补脾散】治脾胃虚冷吐泻

陈皮【一两】青皮【五分】诃子肉【五分】甘草【炙五分】丁香

右为末每服二钱水煎

愚按前症若脾土虚寒或寒水侮土而呕吐泄泻手足并冷或痰涎上涌睡而露睛不思乳食宜用此方若因脾土虚弱吐泻者用六君汤加柴胡如不应或手足俱冷属虚寒也更加木香炮姜若因乳母脾虚肝侮亦治以前药若乳母鬱怒致儿患前症母服加味归脾汤

东垣人参安胃散 治脾虚伤热乳食呕吐泻痢人参【一钱】黄芪【二钱】生甘草炙甘草【各五钱】白芍药【七分】白茯苓【四分】陈皮【三分】黄连【炒二分】

右为末每服二钱水煎

愚按东垣先生云益黄散内有丁香青皮辛热盖为寒水侮土而设也若因热药巴豆之类损其脾胃或因暑热伤乳食而成吐泻口鼻气热而致慢惊者宜服前方

钱氏异功散 治吐泻不食凡虚冷症先与数服以正胃气

人参 茯苓 白术 甘草【炒】 陈皮【各等分】

右为末每服二三钱姜枣水煎

愚按前方治脾胃虚弱吐泻不食或惊搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虚弱咳 吐痰或虚热上攻口舌生疮弄舌流涎若母有症致儿患此者母亦当服之

十全丹 治丁奚哺露

青皮 陈皮 莪术【煨】 川芎 五灵脂 白豆蔻?榔 芦荟【各五钱】 木香 史君子 虾蟆【炙各一钱】

右为末猪胆汁浸糕糊丸麻子大每服二十丸米饮下

愚按汤氏云前症因乳哺不调伤损脾胃不思饮食气血日损四肢日瘦肚腹渐大是名丁奚呼吸少气汲汲苦热谓之哺露属形病俱虚治以前药宜佐以异功散壮脾胃以行药势庶可得效也

平胃散 治乳食过伤腹鸣呕吐或米谷不化

厚朴【姜汁制】 陈皮【各三两】 甘草【炙二两】 苍术【米泔浸五两】

右为末每服二钱姜汤调

愚按前方若乳食停滯暖腐吞酸嘔哕恶心者宜服是方若饮食既消脾胃虚弱嘔吐恶心者宜用四君子汤

四君子汤 治脾气虚损吐泻少食

人参 白术 茯苓 甘草【各等分】

右每服二钱姜枣水煎

愚按前方若脾胃虚弱或因剋伐之剂致饮食少思或食而难化或欲作嘔或大便不实者尤宜用之若兼痰 气逆肢体倦怠面目浮肿宜六君子汤

六君子汤即四君子加陈皮半夏治脾胃气虚吐泻不食肌肉消瘦或肺虚痰 喘促恶寒或肝虚惊搐眩暈自汗诸症并宜服此以滋化源

二陈汤 治脾虚中脘停痰嘔吐恶心

半夏【炮】 陈皮【各五钱】 茯苓【二钱】 甘草【炙一钱】

右每服二钱姜水煎

愚按前方若脾虚痰饮嘔吐恶心用之良验若因饮食伤胃所致宜用六君子汤调补中气

胃苓汤【为末蜜丸名胃苓膏】 治肠胃受湿嘔吐泄泻

白术 茯苓 泽泻 厚朴 猪苓 陈皮 甘草【各等分】 桂【少许】

右为末每服二钱姜水灯心陈皮煎汤调

愚按前方若停食吐泻小便短少腹胀作痛宜用此以分利之更用六君子汤以调补脾胃

钓藤饮子 治一切惊风潮搐目视昏迷

独活 防风 天竺黄 羌活 川芎【各三钱】 升麻 麻黄 草龙胆
甘草【炙各二钱】 钓藤钩【三钱】 蝉壳【五个】

【去翅足】

右为末每服二钱水煎

愚按前方若外感风邪形病俱实者宜用之若形气虚而病气实者宜用惺惺散加钩藤麻黄若外邪既去而形病俱虚者宜用异功散

肥儿丸 治肝疳食积肢体消瘦二便不调

诃榔【二十个】黄连 神麴

木香【各一两五钱】麦芽【炒四两】史君子【酒浸去皮四两】肉豆蔻【二两煨】

右为末神麴糊丸麻子大每服二三十丸米饮下愚按前方若食积五疳发热口渴大便不调小便不清或颈项结核髮稀成穗寒热作渴宜用之若脾胃稍虚者用五味异功散兼服虚甚者异功散为主佐以前药

济生犀角地黄汤 治肺胃鬱热衄血吐血

生地黄【五分】犀角【镑】赤芍药 牡丹皮【各一钱】

右水煎服如无犀角暂以升麻代之

愚按前方若肝脾虚热吐血衄血便血或发热作渴大便秘小便赤宜用之若热既退而渴血未止或日晡益甚者陰血虚也四物汤加参术主之若热既退而饮食少思肢体倦怠者胃气虚也四君子加当归主之

徐氏惺惺散 治外感风寒鼻塞痰 身体发热桔梗 细辛 人参 白术
甘草【炙】瓜蒌根白茯苓【各等分】

右为末每服二钱入薄荷五叶水煎

愚按前方若感寒邪时气风热痰壅咳 或抽搐瘈瘲痰气喘促用之若外邪解而病益甚或更兼他症但调补元气

徐氏加减抱龙丸 治风痰咳 【去天麻即钱氏抱龙丸】

雄黄 辰砂【各二钱】天竺黄【四钱】麝香【五分】天麻【六钱】牛胆南星【八钱】

右为末煮甘草糊丸皂角子大三岁一丸薄荷汤下愚按前方若风热痰 或急惊发搐昏睡咬牙形病俱实宜用此方若初冒风寒咳 痰盛气喘者属客邪内作也先用十味参苏饮若邪既解而腹胀吐泻或发搐咬牙睡而露睛属脾肺气虚也用五味异功散切忌祛痰表散若过服而致前症者尤宜温补脾肺

十味参苏饮 治感冒发热头疼伤风咳 伤寒痰饮凝滞

人参 紫苏【各八分】 茯苓 陈皮 半夏 前胡 枳壳【麸炒】 葛根
桔梗【炒各六分】 木香【五分】 甘草【炒五分】

右每服二三钱姜水煎

愚按前方虽有参苓补气而表散之味或多若病久元气虚弱者以六君子加桔梗乾葛补而散若因感外邪而喘 腹胀或饮食少思大便不实者此脾肺之气虚也必用六君子之类庶无误矣

秘旨安神丸 治发热惊啼颊赤壮热

牙硝 白茯苓 乾山药
麦门冬【去心焙】 寒水石【煨】 甘草【各五钱】 朱砂【一两】 龙脑【二分半】

右为末炼蜜丸芡实大每服半丸滚汤化下

愚按前方若口舌生疮吐舌饮水发热惊搐啼哭烦躁面赤属心经实热宜用此泻之若目劓搐搦面青寒热属肝经风热用六味地黄丸若恶寒饮汤属脾气虚弱用异功散若前症益甚兼手足并冷睡而露睛属脾胃虚寒用六君子加木香炮姜补之

四物汤 治肝脾血虚发热惊搐瘰癧丹毒

当归 川芎【各一钱】 芍药 熟地黄【各七分】

右水煎服

愚按前方若血虚发热或因尅伐或因久病致晡热内热或烦躁不安皆宜服之经又云血生于脾若脾虚不能生血者宜用四君子加当归酒炒白芍以补脾

白术散 治积痛和胃气生津液

人参 白术 藿香叶 木香 甘草 白茯苓【各一两】 乾葛【二两】

右每服二钱水煎

愚按前方若脾胃气虚作渴饮汤或因吐泻津液亏损烦渴引饮或脾胃虚弱腹胀泻渴弄舌流涎手足指冷宜服之以温补脾气化生津液

人参平肺散 治心火剋肺金咳 发热口渴痰盛入参 陈皮 地骨皮 茯苓
甘草【各一钱】五味【杵炒四分】知母【炒七分】桑白皮【炒一钱】青皮
天门冬【去心各四分】

右水煎服

愚按前方若心火剋肺传为肺痿咳 喘呕痰涎壅盛胸膈痞满咽嗑不利宜用之若因肝木
太过而致当补肺金若因肾水不足当补脾肺若因心火旺而自病当利小便

黄芩清肺饮 治肺火燥热口渴便秘

黄芩【炒二钱】梔子【三个杵碎炒】

右水煎服

愚按前方治肺经陰虛火燥而小便不通若因脾经有热当清其脾若因心火剋肺当制其心

滋肾丸 治禀父肾虚火燥小便秘赤

黄栢【酒炒】知母【酒炒各一两】肉桂【二钱】

右为末丸桐子大每服百丸空心白滚汤下

愚按前方若禀父肾虚发热便赤或足热腿软热在下焦血分最宜此药如不应或脾肺燥热
所致并宜六味丸以滋其化源

清胃散 治胃火牙痛或连头面

升麻【五分】生地黄 牡丹皮 黄连【炒】当归【各三分】

右水煎服

愚按前方治脾胃实火作渴口舌生疮或唇口肿痛齿龈溃烂焮连头面或恶寒发热或重舌
马牙吐舌流涎之类子母并宜服若因胃气虚弱或因寒凉剋伐胃气虚热而口舌生疮或弄
舌发热饮食少思或呕吐困睡大便不实流涎龈烂者用五味异功散

补中益气汤 治中气虚弱体疲食少或发热烦渴等症

人参 黄芪【各八分】白术 炙甘草 陈皮【各五分】升麻

柴胡【各二分】当归【一钱】

右姜枣水煎空心午前服

愚按前方若因药尅伐元气虚损恶寒发热肢体倦怠饮食少思或兼饮食劳倦头痛身热烦躁作渴脉洪大弦虚或微细软弱右关寸独甚亦宜用之大凡久病或过服尅伐之剂亏损元气而诸症悉具者最宜前汤调补若母有前症致儿为患者尤宜用之

天麻防风丸 治惊风身热喘粗多睡惊悸手足搐掣天麻 防风

人参【各三两】蝎尾【去毒半两】甘草

朱砂雄黄【各一钱半】牛黄【一钱】麝香【五分】僵蚕【炒一钱半】

右为末炼蜜丸樱桃大朱砂为衣每一丸薄荷汤下愚按前方若因外邪所感风痰壅盛而患急惊者宜用此药驱散之若因肝脾气虚风痰壅盛而患似前症用异功散调补之若因脾气虚肝木所乘而患慢惊者宜用异功散加姜桂温补之不应急加附子

五淋散 治膀胱有热水道不通或小腹肿胀者赤茯苓

赤芍【各五分】山梔【炒】当归【各三分】甘草【二分】

右用灯心十茎水煎服

愚按前方果因积热壅滞而小便不通者宜用是药治之若过用寒凉损其阳气而不能化生者用四君子以滋脾肺若禀赋足三阴虚损而患前症者宜用六味地黄丸加车前子补而通之未应更加牛膝最忌疎导

消积丸 治食积面黄大便酸臭

砂仁【十二个】丁香【九个】乌梅【三个】巴豆【二粒去油取霜】

右为末糊丸黍米大每服二三丸温水下

愚按前方温胃消导之若食积既去重剂而脾气亏损发热作渴肢体倦怠饮食少思者当参前五味异功七味白术二方按法主治

温脾散 治脾气虚寒口角流涎

半夏麴 丁香 木香【各一两】乾姜【炮】白术 陈皮【各半两】

右为末每服二钱米汤调

愚按前方温补脾胃之良剂若口渴饮热肢体倦怠而流涎者宜用异功散加炮姜若肢体发热作渴饮水而流涎者宜用泻黄散

保和丸 治饮食停滞胸膈痞满暖气吞酸或吐泻腹痛【加白术即大安丸】

神麴【炒】 山楂 半夏 茯苓【各一两】 陈皮 连翘萝卜子【炒各五钱】

右为末粥丸桐子大每服二三十丸白汤送下愚按前方行气尅滞之剂若元气未亏暴停乳食而致斯症者宜用此消导之若元气虚弱而乳食所伤者必调补胃气为主而佐以消导若乳食已消而作呕者乃胃气被伤当用异功散补之不宜仍用前药重损胃气治者审之

助胃膏 治脾胃虚寒吐泻等症

人参 白术【炒】 白茯苓 甘草【炙】 丁香【各五钱】 砂仁【四十个】 木香【三钱】 白豆蔻【十四个】 乾山药【一两】 肉豆蔻【四个煨】

右为末蜜丸芡实大每服十丸米饮化下

愚按前症若吐泻酸秽是乳食内停也宜用保和丸以消导之若吐泻乳食难化是脾胃虚弱也用异功散以调补之若吐泻少食腹痛恶心脾胃俱虚也用六君子加木香以培补若睡而露睛手足并冷或寒战咬牙脾胃虚寒也用六君子加木香炮姜以温补如不应宜急加附子以回阳

牛黄丸 治风痼昏闷抽搐潮热

牛黄【胆制】 全蝎 蝉蜕【各二钱半】 防风 白附子
天麻僵蚕【炒各钱半】 麝香【少许】

右为末煮枣肉杵丸菉豆大煎荆芥生姜汤下愚按前方兼治风痰咳喘促发热惊悸不宁实祛风化痰散气之药审有是症而用之其功效如响也若脾肺气虚而痰涎壅盛肝脾血虚而惊痼抽搐必当以固本为主不可泛用恐虚其虚而益其患也治者慎之

柴胡饮子 治一切肌热积热或汗後余热【即宣明柴胡饮子】 黄芩【炒】 甘草
大黄【炒】 芍药【炒】 柴胡 人参 当归【各等分】

右姜水煎服

愚按前方若肠胃壅滞大便秘结作渴饮水表里实热者用之若汗後发热属血虚气无所附而浮於外切不可用治者审焉

归脾汤 治脾血亏损健忘惊悸等症

人参 黄芪 茯神【去木各一钱】 甘草【炒五分】 白术【炒一钱】 木香【五分】 远志【去心】 酸枣仁【炒】 龙眼肉 当归【各一钱】

右水煎服

愚按前方若乳母忧思伤脾血虚发热食少体倦或脾不能摄血以致妄行吐下或健忘怔忡惊悸少寐或心脾作痛自汗盗汗或肢体肿痛大便不调或经候不准哺热内热或蟹唇流注等症致儿为患者用之令子母俱服

八味地黄丸即六味地黄丸加肉桂附子各一两愚按前方治禀赋命门火衰不能生土以致脾土虚寒或饮食少思或食而不化脐腹疼痛夜多漩溺等症经云益火之源以消阴翳此之谓也或乳母命门火衰儿饮其乳致前症者子母并宜服之

加减八味丸即六味地黄丸加肉桂一两五味子四两愚按前方治禀父肾阴不足或吐泻久病津液亏损口乾作渴或口舌生疮两足发热或痰气上涌或手足厥冷等症

八珍汤即前四君四物二汤合方也

愚按前方治气血俱虚阴火内热或因剋伐之剂脾胃亏损肌肉消瘦等症

十全大补汤即八珍汤加黄芪肉桂

愚按前方治气血虚弱或禀赋不足寒热自汗食减体瘦发热作渴头痛眩晕最宜用之

加味逍遥散【去牡丹皮山梔名逍遥散】 治肝脾血虚等症

当归 甘草【炙】 芍药【酒炒】 茯苓 白术【炒】 柴胡【各一钱】 牡丹皮 山梔【炒各七分】

右水煎服

愚按前方若乳母肝脾血虚内热或遍身搔痒寒热或肢体作痛头目昏重或怔忡颊赤口燥咽乾或发热盗汗食少不寐或口舌生疮耳内作痛或胸乳腹胀小便不利致儿为患尤宜用之

九味龙胆泻肝汤 治肝经湿热或囊痈下疳便毒小便澀滞或阴囊作痛小便短少【愚制】

车前子【炒】木通当归尾泽泻【各五分】甘草黄芩【炒】生地黄
山梔【各三分】龙胆草【酒炒五分】

右水煎服【即龙胆泻肝汤】

抑肝散 治肝经虚热发搐或发热咬牙或惊悸寒热或木乘土而呕吐痰涎腹胀少食睡卧不安【愚制】软柴胡甘草【各五分】川芎【八分】当归
白术【炒】茯苓钩藤钩【各一钱】

右水煎子母同服

梔子清肝散【一名柴胡梔子散】治三焦及足少阳经风热耳内作痒生疮或出水疼痛或
胸乳间作痛寒热往来【愚制】

柴胡 梔子【炒】丹皮【各一钱】茯苓川芎芍药当归
牛蒡子【炒各七分】甘草【三分】

右水煎服若太阳头痛加羌活

柴胡清肝散 治鬢疽及肝胆三焦风热怒火之症或项胸作痛疮毒发热【愚制】

柴胡【一钱半】黄芩【炒】人参川芎【各一钱】山梔【炒一钱半】连翘
甘草【各五分】桔梗【八分】

右水煎服

小柴胡汤【加山梔牡丹皮名加味小柴胡】治伤寒温热身热恶风头疼项强四肢烦疼往
来寒热呕哕痰实中暑疟疾并服之【阎注】

柴胡【二钱】黄芩【炒一钱半】人参半夏【各七分】甘草【炙五分】

右姜水煎服

愚按前方若肝胆经风热肝火癰癰寒热往来日晡发热潮热身热不欲饮食或怒火口苦耳
聾咳 或脇痛脘满小便不利或泻泄吐酸苦水或肢体搐动唇目抽掣并宜用之

砭法 治丹毒疔疮红丝走散或时毒瘀血壅盛或色赤走散用细磁器击碎取有锋芒者以筋
劈开头夹之麻线纏定两指轻撮筋稍令磁芒正对患处悬寸许再用筋频击之令毒血遇刺
即出凡毒血凝滯於外真气不能胜散者急用此法以去之否则为害甚矣

茺萸散 治虫动腹痛

白茺萸【炒】 乾漆【炒烟尽各等分】

右为末每服三五分发时米饮调下

愚按前症乃臟腑虚弱或胃冷胃热而动往来攻心作痛叫哭仰身挥手心神闷乱吐涎沫或清水肌瘦沉默皆其症也保生方云蛔虫乃九虫之一人腹中皆有之其外症腹上青筋恶心吐水面无正色唇缓而白目无睛光若虫食上部则上唇内有白点虫食下部则下唇内有白点腹中诸虫朔日後其头向上望日後其头向下如急於用药先以肉物近儿烹炙使闻香味虫头亦向上则药易效

调中丸 治泄泻青白腹痛肠鸣呕吐酸水不思乳食

人参 甘草【炒】 白术【炒各五钱】 乾姜【四钱炒】

右为末姜汁麵糊丸菉豆大每服二三十丸米饮下愚按前方一名温中丸即人参理中丸也若肾水侮土而虚寒者加半夏茯苓陈皮或呕吐更加藿香泄泻加木香

香连丸 治诸痢并水泻

黄连【二十两净】 吴茱萸【十两净】 木香

右将前二味用热水拌和入磁器内置热汤中同炒黄连至紫色去茱萸用黄连为末每末四两入木香末一两和匀淡醋糊丸黍米大每服二十丸白汤下

朱砂安神丸 治心痞及怔忡心下烦躁

朱砂【四钱】 黄连【五钱】 生地【五钱杵膏】 生甘草【二钱五分】

右为末用米糊丸黍米大每服十丸白汤下

人参补肺汤 治肺症因肾水不足虚火上炎咳吐脓血发热作渴小便不利

人参 黄芪 白术 茯苓 陈皮 当归 山茱萸【肉】 山药 五味子【杵炒】 麦门冬 甘草【炒各五分】 熟地黄 牡丹皮【一钱】

右作二三服水煎

补肝散 治肝经气虚吐血衄血或两脇胀满筋急面青小腹胀痛或两目不明不时叫噉

山茱萸【肉】当归 五味子【杵炒】山药 黄芪【炒】川芎木瓜【各五钱】熟地黄
白术【各二钱】独活 酸枣仁

【炒各一钱】

右为末每服一钱水煎

越鞠丸 治乳母六鬱传儿为患或胸满吐酸齿痛疮疥等症

苍术 神麴【炒】香附子 山楂 山梔【炒】抚芎麦芽【炒各等分】

右为末水调神麴糊丸桐子大每服二三十丸白滚汤下子母并服

麦门冬散 治脾肺气虚有热吐血衄血久不愈者麦门冬 黄芪【炒一两】当归 人参
生地黄【各五钱】五味子【杵炒十粒】

右分五服水煎

杨氏十全丹 治丁奚哺露【说见前十全丹下】

诃榔 枳殼【麸炒】青皮 陈皮 三棱【煨】?术
砂仁【各一两半】丁香【二钱半】木香【二钱】香附【一两】

右为末神麴糊丸黍米大每服二十丸米饮下

四味肥儿丸【一名小肥儿丸】治食积脾疳目生云翳或两耳出脓或口舌生疮牙根腐烂
身瘦生疮或小便澄白腹大筋青一切疳症

黄连【炒】茺莢【炒】神麴 麦芽【炒各等分】

右为末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滚汤下

蟾蜍丸 治无辜疳症一服虚热退二服烦渴止三服泻痢愈

蟾蜍【一枚夏月沟渠中取腹大不跳不鸣身多?者】

右取粪蛆一杓置桶中以尿浸之却将蟾蜍跌死投与蛆食一昼夜用布袋盛蛆置急流中一

宿取出瓦上焙乾为末入麝香少许粳米饭丸麻子大每服二三十丸米饮下其效如神

柳华散 治热毒口疮

黄栢【炒】蒲黄 青黛【真正者】人中白【煨各等分】

右为末敷之

抱龙丸 治伤风温疫身热昏睡风热痰实壅 又治惊风潮抽及蛊毒中暑

雄黄【二钱五分】辰砂【另研五钱】天竺黄【一两】牛胆南星【四两】麝香【五分另研】

右为末煎甘草膏丸芡实大每服一丸白汤化下愚按前方化痰祛邪清热之功居多属肝心实热而致者用之殊效若脾肺虚热而见昏睡痰 当用宝监天麻散调补元气

制附子法

附子重一两三四钱有莲花瓣头圆底平者先备童便五六碗将附子放在竈上炙良久乘热投童便中浸五七日候润透揭去皮切四块仍浸二三日用粗纸数层包之浸湿埋灰火半日取出切片检有白星者瓦上炙至无白星为度如急用即切大片用童便煮二三沸热瓦熟用之

薛氏医案卷六

卷七

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷七

明 薛己 撰

原机启微

淫热反尅之病

膏粱之变滋味过也气血俱盛禀受厚也亢阳上炎陰不济也邪入经络内无御也因生而化因化而热热为火火性炎上足厥陰肝为木木生火母妊子子以淫胜祸发反尅而肝开窍於目故肝受尅而目亦受病也其病眇多眊躁紧澁赤脉贯睛臟腑秘结者为重者芍药清肝散主之通气利中丸主之眇多眊躁紧澁赤脉贯睛臟腑不秘结者为轻轻者减大黄芒硝芍药清肝散主之黄连天花粉丸主之少盛服通气利中丸目眶烂者内服上药外以黄连芦甘石散收其烂处兼以点眼春雪膏龙脑黄连膏?鼻碧云散攻其淫热此治淫热反克之法也非膏粱之变非气血俱盛非亢阳上炎非邪入经络毋用此也用此则寒凉伤胃生意不上升反为所害病岂不治而已也噫审诸

风热不制之病

风动物而生於热譬以裂火焰而必吹此物类感召而不能违间者也因热而召是为外来久热不散感而自生是为内发内外为邪惟病则一淫热之祸条已如前益以风邪害岂纖止风加头痛风加鼻塞风加肿胀风加涕泪风加脑颠沉重风加眉骨酸疼有一於此羌活胜风汤主之风加痒则以杏仁龙胆草泡散洗之病者有此数证或不服药或悞服药翳必随之而生翳如云雾翳如丝缕翳如秤星翳如秤星者或一点或三四点而至数十点翳如螺盖者为病久不去治不如法至极而至也为服寒凉药过多脾胃受伤生意不能上升渐而至也然必要明经络庶能应手翳凡自内眦而出为手太阳足太阳受邪治在小肠膀胱经加蔓荆子苍术羌活胜风汤主之自銳眦客主人而入者为足少阳手少阳手太阳受邪治在胆与三焦小肠经加龙胆草藁本少加人参羌活胜风汤主之自目系而下者为足厥陰手少陰受邪治在肝经心经加黄连倍加柴胡羌活胜风汤主之自抵过而上者为手太阳受邪治在小肠经加木通五味子羌活胜风汤主之热甚者兼用治淫热之药?鼻碧云散俱治以上之证大抵如开锅盖法?之随效然力少而銳宜不时用之以聚其力虽然始者易而久者难渐复而复渐复而又复可也急於复者则不治今世医用磨翳药者有之用手法揭翳者有之噫翳犹疮也奚斯愈

乎庸者用此非徒无益增害犹甚愚者受此欣然而不悞可叹也哉故置风热不制之病治法

七情五贼劳役饥饱之病

陰阳应象大论曰天有四时以生长收藏以生寒暑燥湿风寒暑燥湿风之发耶发而皆宜时则万物俱生寒暑燥湿风之发耶发而皆不宜时则万物俱死故曰生於四时死於四时又曰人有五藏化为五气以生喜怒忧悲恐喜怒忧悲恐之发耶发而皆中节则九窍俱生喜怒忧悲恐之发耶发而皆不中节则九窍俱死故曰生於五藏死於五藏目窍之一也光明视见纳山川之大及毫芒之细悉云霄之高尽泉沙之深至於鑒无穷为有穷而有穷又不能为穷反而聚之则乍张乍敛乍动乍静为一泓一点之微者岂力为强致而能此乎是皆生生自然之道也或因七情内伤五贼外攘饥饱不节劳役异常足阳明胃之脉足太陰脾之脉为戊巳二土生生之原也七情五贼总伤二脉饥饱伤胃劳役伤脾戊巳既病则生生自然之体不能为生生自然之用故致其病曰七情五贼劳役饥饱之病其病红赤睛珠痛痛如刺刺应太阳眼睫无力常欲垂闭不敢久视久视则酸疼生翳皆成陷下所陷者或圆或方或长或短或如点或如缕或如锥或如凿证有印此者柴胡复生汤主之黄连羊肝丸主之痛睛甚者当归养荣汤主之助阳活血汤主之加減地黄丸主之决明益陰丸主之加当归黄连羊肝丸主之龙脑黄连膏主之已上数方皆羣队升发阳气之药其中有用黄连黄芩之类者去五贼也?鼻碧云散亦可见用最忌大黄芒硝牵牛石膏梔子之剂犯所忌则病愈振

血为邪胜凝而不行之病

血陰物类地之水泉性本静行其势也行为阳是陰中之阳乃坎中有火之象陰外阳内故行也纯陰故不行也不行则凝凝则经络不通经曰足阳明胃之脉常多气多血又曰足阳明胃之脉常生气生血手太阳小肠之脉斜络於目眦足太阳膀胱之脉起於目内眦二经皆多血少气血病不行血多易凝灵兰秘典论曰脾胃者仓廩之官五味出焉五味淫则伤胃胃伤血病是为五味之邪从本生也又曰小肠者受盛之官化物出焉遇寒则阻其化又曰膀胱者州都之官津液藏焉遇风则散其藏一阻一散血亦病焉是为风寒之邪从未生也凡是邪胜血病不行不行渐滯滯则易凝凝则病始外见以其斜络目眦耶以其起於目内眦耶故病环目青眦如被物伤状重者白睛亦眦轻者或成斑点然不痛不痒无泪眵眊羞澁之证是曰血为邪胜凝而不行之病此病初起之时大抵与伤风证相似一二日则显此病也川芎行经散主之消凝大丸子主之睛痛者更以当归养荣汤主之如此则凝复不滯滯复能行不行复行邪消病除血复如故志此无所不愈也不志於此无所愈也

气为怒伤散而不聚之病

气阳物类天之云雾性本动聚其体也聚为陰是阳中之陰乃离中有水之象阳外陰内故聚也纯阳故不聚也不聚则散散则经络不收经曰足阳明胃之脉常多气多血又曰足阳明胃之脉常生气生血七情内伤脾胃先病怒七情之一也胃病脾病气亦病焉陰阳应象大论曰足厥陰肝主目在志为怒怒甚伤肝伤脾胃则气不聚伤肝则神水散何则神水亦气聚也其

病无眵泪痛痒羞明紧澁之证初但昏如雾露中行渐空中有黑花又渐覩物成二体久则光不收遂为废疾盖其神水渐散而又散终而尽散故也初渐之次宜以千金磁朱丸主之镇坠药也石斛夜光丸主之养补药也益陰肾气丸主之壮水药也有热者滋陰地黄丸主之此病最难治饵服上药必要积以岁月必要无饥饱劳役必要驱七情五贼必要德性纯粹庶几易效不然必废废则终不复治久病光不收者亦不复治一证因为暴怒神水随散光遂不收都无初渐之次此一得永不复治之证也又一证为物所击神水散如暴怒之证亦不复治俗名为青盲者是也世病者多不为审槃曰目昏无伤始不经意及成世医亦不识直曰热致竟以凉药投殊不知凉药又伤胃况不知凉为秋为金肝为春为木凉药又伤肝往往致废而然後已病者犹不以药非而委之曰命也医者犹不自悟其药而赘之曰病拙吁二者俱此谁其罪乎予累见也故兼陈凉药之误

血气不分混而遂结之病

轻清圆健者为天故首象天重浊方厚者为地故足象地飘腾往来者为云故气象云过流循环者为水故血象水天降地升云腾水流各宜其性故万物生而无穷阳平陰秘气行血随各得其调故百骸理而有余反此则天地不降升云水不腾流各不宜其性矣反此则陰阳不平秘气血不行随各不得其调矣故曰人身者小天地也难经曰血为荣气为卫荣行脉中气行脉外此血气分而不混行而不阻也明矣故如云腾水流之不相杂也大抵血气如此不欲相混混则为阻阻则成结结则无所去还故隐起於皮肤之中遂为疣病然各随经络而见疣病自上眼睫而起者乃手少陰心脉足厥陰肝脉血气混结而成也初起时但如豆许血气衰者遂止不复长亦有久止而复长者盛者则渐长长而不已如盃如盞如碗如斗皆自豆许致也凡治在初须择人神不犯之日大要令病者食饱不饥先汲冷井水洗眼如水勿使气血得行然後以左手持铜筋按眼睫上右手翻眼皮令转转则疣肉已突换以左手大指按之弗令得动移复以右手持小眉刀尖略破病处更以两手大指甲捻之令出则所出者如豆许小黄脂也恐出而根不能断宜更以眉刀尖断之以井水再洗洗後则无恙要在手疾为巧事毕须投以防风散结汤数服即愈此病非手法则不能去何则为血气初混时药自可及病者则不知其为血气混也比结则药不能及矣故必用手法去去毕必又以升发之药散之药手皆至庶几了事

热积必溃之病

积者重叠不解之貌热为阳阳平为常阳淫为邪常邪则行行则病易见易见则易治此则前篇淫热之病也深邪则不行不行则伏因伏而又伏日渐月聚势不得不为积也积已久久积必溃溃始病见病见则难治难治者非不治也为邪积久比溃已深何则溃犹败也知败者庶可以久其病隐澁不自在稍觉眊瞶视物微昏内眦穴开窍如鍼目按之则沁沁脓出有两目俱病者有一目独病者目属肝内眦属膀胱此盖一经积邪之所致也故曰热积必溃之病又曰漏睛眼者是也竹叶泻经汤主之大便不鞭者减大黄为用密剂解毒丸主之不然药悞病久终为枯害

阳衰不能抗陰之病

或问曰人有昼视通明夜视罔见虽有火光月色终为不能覩物者何也答曰此阳衰不能抗陰之病谚所谓雀盲者也问曰何以知之答曰黄帝生气通天论曰自古通天者生之本本於陰阳天地之间六合之内其气九州九窍五藏十二节皆通乎天气又曰陰阳者一曰而主外平旦人气生日中而阳气隆日西而阳气已虚气门乃闭又曰阳不胜其陰则五藏气争九窍不通故知也问曰阳果何物耶答曰凡人之气应之四时者春夏为阳也应之一日者平旦至昏为阳也应之五臟六腑者六腑为阳也问曰阳何为而不能抗陰也答曰人之有生以脾胃中州为主也灵兰秘典曰脾胃者仓廩之官在五行为土土生万物故为阳气之原其性好生恶杀遇春夏乃生长遇秋冬则收藏或有忧思恐怒劳役饥饱之类过而不节皆能伤动脾胃脾胃受伤则阳气下陷阳气下陷则於四时一日五臟六腑之中阳气皆衰阳气既衰则於四时一日五臟六腑之中陰气独盛陰气既盛故阳不能抗也问曰何故夜视罔见答曰目为肝肝为足厥陰也神水为肾肾为足少陰也肝为木肾为水水生木盖亦相生而成也况怒伤肝恐伤肾肝肾受伤亦不能生也昼为阳天之阳也昼为阳人亦应之也虽受忧思恐怒劳役饥饱之伤而阳气下陷遇天之阳盛陰衰之时我之阳气虽衰不得不之升也故犹能昼视通明夜为陰天之陰也夜为陰人亦应之也既受忧思恐怒劳役饥饱之伤而阳气下陷遇天陰盛阳衰之时我之阳气既衰不得不之伏也故夜视罔所见也问曰何以为治答曰镇陰升阳之药决明夜灵散主之问曰病见富贵乎贫贱者乎答曰忧思恐怒劳役饥饱富贵者甚乎惟其贫贱者不能免甚也问者称善

陰弱不能配阳之病

五臟无偏胜虚阳无补法六腑有调候弱陰有强理心肝脾胃肾各有所滋生一臟或有余四臟俱不足此五臟无偏胜也或浮或为散是曰阳无根益之欲令实翻致不能禁此虚阳无补法也膀胱大小肠三焦胆包络俾之各有主平秘永不危此六腑有调候也衰弱不能济遂使阳无御反而欲匹之要以方术盛此弱陰有强理也解精微论曰心者五臟之专精目者其窍也又为肝之窍肾生骨骨之精为神水故肝木不平内挟心火为势妄行火炎不制神水受伤上为内障此五臟病也劳役过多心不行事相火代之五臟生成论曰诸脉皆屬於目相火者心包络也主百脉上榮於目火盛则百脉沸腾上为内障此虚阳病也膀胱小肠三焦胆脉俱循於目其精气亦皆上注而为目之精精之窠为眼四府一衰则精气尽败邪火乘之上为内障此六腑病也神水黑眼皆法於陰白眼赤脉皆法於阳陰齐阳俾故能为视陰微不立阳盛即淫陰阳应象大论曰壮火食气壮火散气上为内障此弱陰病也其病初起时视觉微昏常见空中有黑花神水淡綠色次则视岐覩一成二神水淡白色可为冲和养胃汤主之益气聪明汤主之千金磁朱丸主之石斛夜明丸主之有热者泻热黄连汤主之久则不覩神水纯白色永为废疾也然废疾亦有治法先令病者以冷水洗眼如水气血不得流行为度用左手大指次指按定眼珠不令转动次用右手持鸭舌鍼去黑睛如米许鍼之令入白睛甚厚欲入甚难必要手準刀完重鍼则破然後斜回鍼首以鍼刀刮之障落则明有落而复起者起则重刮刮之有至再三者皆为洗不甚冷气血不凝故也障落之後以棉裹黑豆数粒令如杏核樣使病目垂闭覆眼反上用软帛纏之睛珠不得动移为度如是五七日才许开视视勿劳也亦须

服上药庶几无失此法治者五六不治者亦四五五臟之病虚阳之病六腑之病弱陰之病四者皆为陰弱不能配阳也噫学者慎之

心火乘金水衰反制之病

天有六邪风寒暑湿燥火也人有七情喜怒悲思忧恐惊也七情内召六邪外从从而不休随召见病此心乘金水衰反制之原也世病目赤为热人所共知者也然不审其赤分数等各治不同有白睛纯赤如火热气炙人者乃淫热反尅之病也治如淫热反尅之病有白有赤而肿胀外睫虚浮者乃风热不制之病也治如风热不制之病有白睛淡赤而细脉深红纵横错贯者乃七情五贼劳役饥饱之病治如七情五贼劳役饥饱之病有白睛不肿不胀忽如血贯者乃血为邪胜凝而不行之病也治如血为邪胜凝而不行之病有白睛微变青色黑睛稍带白色白黑之间赤环如带谓之抱轮红者此邪火乘金水衰反制之病也此病或因目病已久抑鬱不舒或因目病悞服寒凉药过多或因目病时内多房劳皆能内伤元气元气一虚心火亢盛故火能尅金金乃手太陰肺白睛属肺水乃足少陰肾黑睛属肾水本尅火水衰不能尅反受火制故视物不明昏如雾露中或睛珠高低不平其色如死甚不光泽赤带抱轮而红也口乾舌苦眵多羞澁稍有热者还陰救苦汤主之黄连羊肝丸主之川芎决明散主之无口乾舌苦眵多羞澁者助阳活血汤主之神验锦鸠丸主之万应蝉花散主之有热无热俱服千金磁朱丸镇坠心火滋益肾水荣养元气自然获愈也噫天之六邪未必能害人也惟人以七情召而致之也七情匿召六邪安从反此者岂止能避而已哉犹当役之而後已也

内急外弛之病

陰阳以和为本过与不及病皆生焉急者紧缩不解也弛者寬纵不收也紧缩属阳寬纵属陰不解不收皆为病也手太阳肺为辛为金也主一身皮毛而目之上下睫之外者亦其属也手太陰心为丁手太阳小肠为丙丙丁为火故为表?故分上下而目之上下睫之内者亦其属也足厥陰肝为乙乙为木其脉循上睫之内火其子也故与心合心肝小肠三经受邪则阳火内盛故上下睫之内紧缩而不解也肺金为火尅受尅者必衰衰则陰气外行故目之上下睫之外者寬纵而不收也上下睫既内急外弛故睫毛皆倒而刺里睛既受刺则深赤生翳此翳者睛受损也故目所病者皆具如羞明沙澁畏风怕日沁烂或痛或痒生眵流泪之证俱见有用药夹施於上睫之外者欲弛者急急者弛而睫毛无倒刺之患者非其治也此徒能解厄於目前而终复其病也何则为不审过与不及也为不能除其原病也治法当攀出内睑向外速以三棱鍼乱刺出血以左手大指甲迎其鍼锋後以黄耆防风饮子主之无比蔓荆子汤主之决明益陰丸主之菊花决明散主之?鼻碧云散亦宜兼用如是则紧缩自弛寬纵渐急或过不及皆复为和药夹之治忍勿施也徒为苦耳智者宜审此

奇经客邪之病

人之有五臟者犹天地之有五岳也六腑者犹天地之有四渎也奇经者犹四渎之外别有江湖也奇经客邪非十二经之治也十二经之外别有治奇经之法也繆刺论曰邪客於足阳蹻

之脉令人目痛从内眦始啓玄子王冰注曰以其脉起於足上行至头而属目内眦故病令人目痛从内眦始也鍼经曰陰蹻脉入?属目内眦合於太阳阳蹻而上行故阳蹻受邪者内眦即赤生脉如缕缕根生於瘀肉瘀肉生黄赤脂脂横侵黑睛渐蚀神水此阳蹻为病之次第也或兼銳眦而病者以其合於太阳故也銳眦者手太阳小肠之脉也銳眦之病必轻於内眦者盖枝蔓所传者少而正受者必多也俗呼为攀睛即其病也还陰救苦汤主之拨云退翳丸主之梔子胜奇散主之万应蝉花散主之磨障灵光膏主之消翳复明膏主之朴硝黄连卢甘石泡散主之病多药不能及者宜治以手法先用冷水洗如鍼内障眼法以左手按定勿令得动移略施小眉刀尖剔去脂肉复以冷水洗淨仍将前药饵之此治奇经客邪之法也故并置其经络病始

为物所伤之病

志於固者则八风无以窥其隙本於密者则五臟何以受其邪故生之者天也召之者人也虽生弗召莫能害也为害不已召之甚也生气通天论曰风者百病之始也清淨则肉腠闭拒虽有大风苛毒弗之能害陰阳应象大论曰邪风之至疾如风雨故善治者治皮毛夫肉腠固皮毛密所以为害者安从其来也今为物之所伤则皮毛肉腠之间为隙必甚所伤之际岂无七情内移而为卫气衰惫之原二者俱召风安不从故伤於目之上下左右者则目之上下左右俱病当总作除风益损汤主之伤於眉骨者病自目系而下以其手少陰有隙也加黄连除风益损汤主之伤於额者病自抵过而上伤於耳中者病自銳眦而入以其手太阳有隙也加柴胡除风益损汤主之伤於额交巔耳上角及脑者病自内眦而出以其足太阳有隙也加苍术除风益损汤主之伤於耳後耳角耳前者病自客主人斜下伤於颊者病自銳眦而入以其手少阳有隙也加枳殼除风益损汤主之伤於头角耳前後及目銳眦後者病自銳眦而入以其足少阳有隙也加龙胆草除风益损汤主之伤於额角及巔者病自目系而下以其足厥陰有隙也加五味子除风益损汤主之诸有热者更当加黄芩兼服加減地黄丸伤甚者须从权倍加大黄泻其败血六节藏象论曰肝受血而能视此盖滋血养血复血之药也此治其本也又有为物暴震神水遂散更不复治故并识之於此

伤寒愈後之病

伤寒病愈後或有目复大病者以其清阳之气不升而余邪上走空窍也其病癰澁赤胀生翳羞明头脑骨痛宜作羣队升发之剂饵之数服斯愈伤寒论曰冬时严寒万类深藏君子固密不伤於寒触冒之者乃名伤寒其伤於四时之气者皆能为病又生气通天论曰四时之气更伤臟腑五臟六腑一病则浊陰之气不得下清阳之气不得上今伤寒时病虽愈浊陰清阳之气犹未来复浊陰清阳之气未复故余邪尚炽不休邪气上攻致为目之害也是以一日而愈者余邪在太阳二日而愈者余邪在阳明三日而愈者余邪在少阳四日而愈者余邪在太陰五日而愈者余邪在少陰六日而愈者余邪在厥陰七日而复是皆清阳不能出上窍而复受其所害也当为助清阳上出则治人参补阳汤主之羌活胜风汤主之加減地黄丸主之?鼻碧云散亦宜用也忌大黄芒硝苦寒通利之剂用之必不治

强阳搏实陰之病

强者盛而有力也实者坚而内克也故有力者强而欲搏内克者实而自收是以陰阳无两强亦无两实惟强与实以偏则病内搏於身上见於虚窍也足少陰肾为水肾之精上为神水手厥陰心包络为相火火强搏水水实而自收其病神水紧小渐小而又小积渐之至竟如菜子许又有神水外围相类虫蚀者然皆能靚而不昏但微觉眊躁羞澁耳是皆阳气强盛而搏陰陰气坚实而有御虽受所搏终止於边鄙皮肤也内无所伤动治法当抑阳缓陰则愈以其强耶故可抑以其实耶惟可缓而弗宜助助之则反胜抑阳酒连散主之大抵强者则不易入故以酒为之导引欲其气味投合入则可展其长此反治也还陰救苦汤主之疗相火药也亦宜用?鼻碧云散然病世亦间见医者要当识之

亡血过多之病

六节藏象论曰肝受血而能视宣明五气篇曰久视伤血气厥论曰胆移热於脑则辛頰鼻渊传为衄蔑瞑目繆刺论曰冬刺经脉血气皆脱令人目不明由此推之目之为血所养者明矣手少陰心生血血荣於目足厥陰肝开窍於目肝亦多血故血亡目病男子衄血便血妇人产後崩漏亡之过多者皆能病焉其为病睛珠痛珠痛不能视羞明癰澁眼睫无力眉骨太阳因为酸疼当作芎归补血汤主之当归养荣汤主之除风益损汤主之滋陰地黄丸主之诸有热者加黄芩妇人产漏者加阿胶脾胃不佳恶心不进食者加生姜复其血使其所养则愈然要忌咸物宣明五气篇又曰咸走血血病无多食咸是忌

癰疹余毒之病

东垣李明之曰诸癰疹皆从寒水逆流而作也子之初生也在母腹中母呼亦呼母吸亦吸呼吸者阳也而动作生焉饥食母血渴饮母血饮食者陰也而形质生焉陰具阳足十月而降口中恶血因啼即下却归男子生精之所女子结胎之处命宗所谓玄牝玄关者也此血僻伏而不时发或因乳食内伤或因湿热下溜营气不从逆於肉理所僻伏者乃为所发初则膀胱壬水夹脊逆流而尅小肠丙火故颈项已上先见也次则肾经癸水又尅心火故胸腹已上次见也终则二火炽盛反制寒水故胸腹已下後见也至此则五臟六腑皆病也七日齐七日盛七日谢三七二十一日而愈者七为大数故也愈後或有病疽病疮者是皆余毒尚在不去者今其病目者亦然所害者与风热不制之病稍同而异总以羚羊角散主之便不鞭者减硝黄未滿二十一日而病作者消毒化癰汤主之此药功非独能於目盖专於癰者之药也不问初起已着服之便令消化稀者则不复出方随四时加减

深疔为害之病

卫气少而寒气乘之也元气微而饮食伤之也外乘内伤酿而成之也父母以其纯阳耶故深冬不为裳父母以其恶风耶故盛夏不解衣父母以其数饥耶故饲後强食之父母以其或渴耶故乳後更饮之有愚戇而为父母者又不审其寒暑饮食也故寒而不为暖暑而不能凉饮

而不至渴食而不及饥而小儿幽玄衔默抱疾而不能自言故外乘内伤因循积渐酿而成疳也渴而汤饥能食而瘦腹胀下利作 声日远不治遂生目病其病生翳睫闭不能开眇泪如糊久而脓流竟枯尔目何则为阳气下走也为阴气反上也治法当如阴阳应象大论曰清阳出上窍浊阴出下窍清阳发腠理浊阴走五臟清阳实四肢浊阴归六腑各还其原不反其常是其治也当作升阳降阴之剂茯苓泻湿汤主之升麻龙胆草饮子主之此药非专於目并治已上数证然勿後後则危也为父母者其审诸

薛氏医案卷七

卷八

钦定四库全书

薛氏医案卷八

明 薛己 撰

原机啓微

君臣佐使逆从反正说

君为主臣为辅佐为助使为用置方之原也逆则攻从则顺反则异正则宜治病之法也必热必寒必散必收者君之主也不宣不明不授不行者臣之辅也能受能令能合能力者佐之助也或击或发或劫或开者使之用也破寒必热逐热必寒去燥必濡除湿必泄者逆则攻也治惊须平治损须温治留须收治坚须溃者从则顺也热病用寒药而导寒攻热者必热阳明病发热大便鞭者大承气汤酒制大黄热服之类也寒病用热药而道热去寒者必寒少陰病下利服附子乾姜不止者白通汤加人尿猪胆之类也塞病用通药而导通除塞者必寒脑满烦惊小便不利者柴胡加龙骨牡砺汤之类也通药用塞药而导塞止通者必通太阳中风下利心下痞鞭者十枣汤之类也反则异也治远以大治近以小治主以缓治客以急正则宜也至真要论曰辛甘发散为阳酸苦涌泄为陰咸味涌泄为陰淡味渗泄为阳六者或收或散或缓或急或燥或湿或栗或坚所以利而行之调其气使其平故味之薄者为陰中之阳味薄则通酸苦咸平是也气之厚者为阳中之阳气厚则热辛甘湿热是也气之薄者为阳中之陰气薄则发泄辛甘淡平寒凉是也味之厚者为陰中之陰味厚则泄酸苦咸寒是也易曰同声相应同气相求水流湿火就燥云从龙风从虎圣人作而万物覩本乎天者亲上本乎地者亲下则各从其类也故置方治病如後

芍药清肝散方治眇多燥紧澁羞明赤脉贯睛臟腑秘结者

白术【三分】川芎【三分】防风【三分】甘草【炙二分半】荆芥【二分半】桔梗【三分】羌活【三分】芍药【二分半】柴胡【二分】前胡【二分半】薄荷【二分半】黄芩【二分半】山梔【二分】知母【二分】滑石【三分】石膏【三分】大黄【四分】芒硝【三分半】

共十八味通?咀都作一服水二鍾煎至一鍾食後热服

右为方治淫热反尅而作也风热不制之病热甚大便鞭者从权用之盖苦寒之药也苦寒败胃故先以白术之甘温甘草之甘平主胃气为君次以川芎防风荆芥桔梗羌活之辛温升散

清利为臣又以芍药前胡柴胡之微苦薄荷黄芩山梔之微苦寒且导且攻为佐终以知母滑石石膏之苦寒大黄芒硝之大苦寒祛逐淫热
为使大便不鞭者减大黄芒硝此逆则攻之治法也大热服者反治也通气利中丸 治证上同

白术【一两】白芷【半两】羌活【半两】黄芩【一两半】滑石【取末另入一两半】
大黄【二两半】牵牛【取末一两半】

除滑石牵牛另研极细末外余合为细末入上药和匀滴水为丸如桐子大每服三十丸加至百丸食後临睡茶汤送下

右方以白术苦甘温除胃中热为君白芷辛温解利羌活苦甘平微温通利诸节为臣黄芩微苦寒疗热滋化滑石甘寒滑利小便以分清浊为佐大黄苦寒通大便泻诸实热牵牛苦寒一说味辛利大便除风毒为使逆攻之法也风热不制之病热甚而大便鞭者亦可兼用然牵牛有毒非神农药今与大黄并用者取其性猛烈而快也大抵不宜久用久用伤元气盖从权之药也量虚实加減

黄连天花粉丸 治同前

黄连【一两】天花粉【四两】菊花【一两】川芎【一两】薄荷【一两】连翘【二两】黄芩【四两】梔子【四两】黄蘗【六两】

为细末滴水为丸如梧桐子大每服五十丸加至百丸食後临睡茶汤下

右方为淫热反尅臟腑不秘结者作也风热不制之病稍热者亦可服以黄连天花粉之苦寒为君菊花之苦甘平为臣川芎之辛温薄荷之辛苦为佐连翘黄芩之苦微寒黄蘗梔子之苦寒为使合之则除热清利治目赤肿痛

黄连卢甘石散 治眼眶破烂畏日羞明余治上同

卢甘石【一筋】黄连【一两】龙脑【量入】

先以卢甘石置巨火中煨通红为度另以黄连用水一碗磁器盛贮纳黄连於水内却以通红卢甘石淬七次就以所贮磁器置日中晒乾然後同黄连研为细末欲用时以一二两再研极细旋量入龙脑每用少许并花水调如 糊临睡以筋头蘸付破烂处不破烂者点眼内眦銳眦尤佳不宜使入眼内

右方以卢甘石收湿除烂为君黄连苦寒为佐龙脑去热毒为使诸目病者俱可用病宜者治病不宜者无害也奇经客邪之病量加朴硝泡汤滴眼瘀肉黄赤脂上

龙脑黄连膏 治目中赤脉如火溜热炙人余治上同

黄连【半筋】 龙脑【一钱】

先剉黄连令碎以水三大碗贮磁器内入黄连於中用文武火慢熬成大半碗滤去滓入薄磁碗内重汤顿成膏半 许龙脑以一钱为率用则旋量入之以筋头点入眼内不拘时

右方以黄连治目痛解诸毒为君龙脑去热毒为臣乃君臣药也诸目痛者俱宜用

蕤仁春雪膏 治红赤羞明眵燥痒痛沙澁

蕤仁【去油四钱】 龙脑【五分】

先以蕤仁研细入龙脑和匀用生好真蜜一钱二分再研调匀每用筋头点内眦锐眦

右方以龙脑除热毒为君生蜜解毒和百药为臣蕤仁去暴热治目痛为使此药与黄连卢甘石散龙脑黄连膏子并用

鼻碧云散 治肿胀红赤昏暗羞明癢澁疼痛风痒鼻塞头痛脑酸外翳攀睛眵泪 粘

鷲不食草【二钱】 青黛 川芎【各一钱】

为细末先嚙水满口每用如米许入鼻内以泪出为度不拘时候

右方以鷲不食草解毒为君青黛去热为佐川芎大辛除邪破留为使升透之药也大抵如开锅盖法常欲使邪毒不闭令有出路然力少而锐之随効宜常以聚其力诸目病俱可用

羌活胜风汤 治眵多眵燥紧澁羞明赤脉贯睛头痛鼻塞肿胀涕泪脑巅沉重眉骨酸疼外翳如云雾丝缕秤星螺盖

白术【五分】 枳殼 羌活 川芎 白芷 独活 防风 前胡 桔梗 薄荷【各四分】 荆芥 甘草【各三分】 柴胡【七分】 黄芩【五分】

作一服水二盏煎一盏去滓热服

右方为风热不制而作也夫窍不利者皆脾胃不足之证故先以白术枳殼调治胃气为君羌活川芎白芷独活防风前胡诸治风药皆主升发为臣桔梗除寒热薄荷荆芥清利上焦甘草和百药为佐柴胡解热行少阳厥陰经黄芩疗上热主目中赤肿为使又治伤寒愈後之病热服者热性炎上令在上散不令流下也生翳者随翳所见经络加药翳凡自内眦而出者加蔓

荆子治太阳经加苍术去小肠膀胱之湿内眦者手太阳足太阳之属也自锐眦而入客主人斜下者皆龙胆草为胆草味苦与胆味合小加人参益三焦之气加藁本乃太阳经风药锐眦客主人者足少阳手少阳手太阳之属也凡自目系而下者倍加柴胡行肝气加黄连泻心火目系者足厥阴手少阴之属也自抵过而上者加木通导小肠中热五味子酸以收敛抵过者手太阳之属也

杏仁龙胆草泡散 治风上攻眵燥赤痒

龙胆草 当归尾 黄连 滑石【另研取末】 杏仁【去皮尖】 赤芍药【各一钱】

以白沸汤泡顿蘸洗冷热任意不拘时候

右方以龙胆草黄连苦寒去热毒为君当归尾行血杏仁润燥为佐滑石甘寒泄气赤芍药苦酸除痒为使惟风痒者可用

柴胡复生汤 治红赤羞明泪多眇少脑巅沉重睛珠痛应太阳眼睫无力常欲垂闭不敢久视久视则酸疼翳陷下所陷者或圆或方或长或短如缕如锥如凿藁本【三分半】川芎【三分半】白芍药【四分】蔓荆子【三分半】羌活【三分半】独活【三分半】白芷【三分半】柴胡【六分】炙草【四分】薄荷【四分】桔梗【四分】五味子【二十粒】苍术 茯苓 黄芩【各五分】

作一服水二盏煎至一盏去滓食後热服

右方以藁本蔓荆子为君升发阳气也川芎白芍药羌活独活白芷柴胡为臣和血补血疗风行厥阴经也甘草五味子为佐为协诸药敛藏气也薄荷桔梗苍术茯苓黄芩为使为清利除热去湿分上下实脾胃二土疗目中赤肿也此病起自七情五贼劳役饥饱故使生意下陷不能上升今主以羣队升发辅以和血补血导入本经助以相协收敛用以清利除热实脾胃如此为治理可推也睛珠痛甚者当归养荣汤主之

当归养荣汤 治睛珠痛甚不可忍余治并全上防风【七分半】白芷【七分半】白芍药【一钱】熟地黄【一钱】当归【一钱】川芎【一钱】羌活【七分半】

作一服水二盏煎至一盏去滓食後热服

右方以七情五贼劳役饥饱重伤脾胃脾胃者多血多气之所脾胃受伤则血亦病血养睛睛珠属肾今生意已不升发又复血虚不能养睛故睛痛甚不可忍以防风升发生意白芷解利引入胃经为君白芍药止痛益气通血承接上下为臣熟地黄补肾水真阴为佐当归川芎行血补血羌活除风引入少阴经为使血为邪胜睛珠痛者及亡血过多之病俱宜服也服此药後睛痛虽除眼睫无力常欲垂闭不减者助阳活血汤主之

助阳活血汤 治眼睫无力常欲垂闭余治全上黄耆【五分】炙草【五分】当归【五分】白芷【四分】蔓荆子【四分】防风【五分】升麻【七分】柴胡【七分】

作一服水二盏煎至一盏去查稍热服

右方以黄耆治虚劳甘草补元气为君当归和血补血为臣白芷蔓荆子防风主疗风升阳气为佐升麻导入足阳明足太阴脾胃柴胡引至足厥阴肝经为使心火乘金水衰反制者亦宜服也有热者兼服黄连羊肝丸

黄连羊肝丸 治目中赤脉红甚眵多余治全上

黄连 白羯羊肝【一个】

先以黄连研为细末将羊肝以竹刀刮下如糊除去筋膜入搗盆中研细入黄连末为丸如梧桐子大每服三五十丸加至七八十丸茶清汤下

右方以黄连除热毒明目为君以羊肝肝与肝合引入肝经为使不用铁与刀者忌铁器也金尅木肝乃木也一有金气肝则畏而不受盖专治肝经之药非与羣队者比也肝受邪者并皆治之睛痛者加当归

决明益阴丸 治畏日恶火沙澁难开眵泪俱多久病亦不痊者并皆疗之余治全上

羌活【五钱】独活【五钱】黄连【酒制一两】防风【五钱】黄芩【一两】归尾【酒制五钱】五味子【五钱】石决明【煅三钱】草决明【一两】甘草【炙五钱】黄蘗【一两】知母【一两】

为末炼蜜丸桐子大每服五十丸加至百丸茶汤下右方以羌活独活升清阳为君黄连去热毒当归尾行血五味子收敛为臣石决明明目磨障草决明益肾疗盲防风散治祛风黄芩去目中赤肿为佐甘草相和诸药黄蘗助肾水知母泻相火为使此盖益水抑火之药也内急外弛之病并皆服之

川芎行经散 治目中青眵如物伤状重者白睛如血贯

枳壳【六分】炙草【六分】白芷【四分】防风【四分】荆芥【四分】薄荷【四分】独活【四分】川芎【六分】当归【六分】红花【少许】柴胡【六分】茯苓【三分】蔓荆子【四分】羌活【四分】桔梗【五分】

作一服水二盏煎至一盏去查大热服食後

右方以枳殼甘草和胃气为君白芷防风荆芥薄荷独活疗风邪升胃气为臣川芎当归红花行滯血柴胡去结气茯苓分利除湿为佐蔓荆子羌活引入太阳经桔梗利五臟为使则胃脉调小肠膀胱皆邪去凝行也见热者以消凝大丸子主之

消凝大丸子 治证全上或有眵泪沙澁者并皆疗之川芎 当归【各七钱】 防风 荆芥 羌活 藁本 薄荷【各半两】 桔梗【七钱】 甘草【七钱】 滑石 石膏 白术 黄芩 山梔【各一两】 连翘 菊花【各七钱】

先将滑石石膏另研余作细末和匀炼蜜为剂每剂一两分八丸每服一丸或二丸茶汤嚙下

右方消凝滯药也君以川芎当归治血和血臣以羌活防风荆芥藁本薄荷桔梗疗风散邪引入手足太阳经佐以白术甘草滑石石膏调补胃虚通泄滯气除足阳明经热使以黄芩山梔连翘菊花去热除烦淫反尅风热不制者俱宜服也

千金磁朱丸 治神水寬大渐散昏如雾露中行渐覩空中有黑花渐覩成物二体久则光不収及内障神水淡綠色淡白色者

磁石【吸针者二两】 辰砂【一两】 神麴【四两】

先以磁石置巨火中煨醋淬七次晒乾另研极细二两辰砂另研极细一两生神麴末三两与前药和匀更以神麴末一两水和作饼煮浮为度搜入前药炼蜜为丸如梧桐子大每服一十丸加至三十丸空心饭汤下

右方以磁石辛咸寒镇坠肾经为君令神水不外移也辰砂微甘寒镇坠心经为臣肝其母比子能令母实也肝实则目明神麴辛温甘化脾胃中宿食为佐生用者发其生气熟用者敛其暴气也服药後俯視不见仰視渐覩星月者此其効也亦治心火乘金水衰反制之病久病累发者服之则永不更作空心服此午前更以石斛夜光丸主之

石斛夜光丸 治证上全

天门冬【焙】 人参 茯苓【各二两】 五味【炒半两】 乾菊花【七钱】 麦门冬【一两】 熟地黄【一两】 兔丝子【酒浸七钱】 乾山药 枸杞【七钱】 牛膝【浸七钱半】 杏仁【去皮尖七钱半】 生地黄【一两】 蒺藜 石斛 苁蓉 川芎 炙草 枳殼【麸炒】 青葙子 防风 黄连【各半两】 草决明【八钱】 乌犀【镑半两】 羚羊角【镑半两】

为细末炼蜜丸桐子大每服三五十丸温酒盐汤任下

右方美补药也补上治下利以缓利以久不利以速也故君以天门冬人参兔丝子之通肾安

神强陰填精也臣以五味子麦門冬杏仁茯苓枸杞子牛膝生熟地黄之斂气除湿凉血补血也佐以甘菊花蒺藜石斛肉苁蓉川芎甘草枳殼山药青葙子之疗风治虚益气祛毒也使以防风黄连草决明羚羊角生乌犀之散滯泄热解结明目也陰弱不能配阳之病并宜服之此从则顺之治法也

益陰补气丸 治证上全

熟地黄【三两】归尾【酒制半两】牡丹皮 五味子 乾山药【各半两】茯苓
泽泻【各二钱五分】生地黄【酒制炒四两】山茱萸【半两】柴胡【半两】

为末炼蜜丸如桐子大水飞辰砂为衣每服五七十丸空心淡盐汤下

右方壮水之主以镇阳光气为怒伤散而不聚也气病血亦病也肝得血而後能视又目为心之窍心主血故以熟地黄补血衰当归尾行血牡丹皮治积血为君茯苓和中益真气泽泻除湿泻邪气生地黄补肾水真陰为臣五味子补五臟乾山药平气和胃为佐山茱萸强陰益精通九窍柴胡引入厥陰经为使蜜剂者欲泥膈难下也辰砂为衣者为通於心也然必兼千金磁朱丸服之庶易为效

滋陰地黄丸 治证上全眇多眊者并皆治之黄连【一两】黄芩【半两】归身【酒制半两】生地黄【酒制两半】熟地黄【半两】五味子【三钱】人参【二钱】天门冬【焙三钱】炙草【三钱】地骨皮【二钱】枳殼【三钱】柴胡【三钱】

为细末炼蜜丸如桐子每服百丸食後茶汤下日三服

右方治主以缓缓则治其本也以黄连黄芩苦寒除邪气之盛为君当归身辛温生熟地黄苦甘寒养血凉血为臣五味子酸寒体轻浮上收神水之散大人参甘草地骨皮天门冬枳殼苦甘寒泻热补气为佐柴胡引用为使也亡血过多之病有热者亦宜服

防风散结汤 治目上下睫隐起肉疣用手法除病後服之

防风 羌活 白芍药 归尾【各五分】红花 苏木【各少许】茯苓 苍术 独活 前胡
黄芩【各五分】炙草 防己

作一服水二盞煎至一盞热服查再煎

右方以防风羌活升发阳气为君白芍药当归尾红花苏木破凝行血为臣茯苓泻邪气苍术去上湿前胡利五臟独活除风邪黄芩疗热滋化为佐甘草和诸药防己行十二经为使病在上睫者加黄连柴胡以其手少陰足厥陰受邪也病在下睫者加藁本蔓荆子以其手太阳受邪也

竹叶泻经汤 治眼目癰澁稍觉眊瞤视物微昏内眦开窍如鍼目痛按之浸淫脓出

柴胡 梔子 羌活 升麻 炙草【各五分】 赤芍药 草决明
茯苓【各四分】 车前子【四分】 黄芩【六分】 黄连【五分】

大黄【五分】 青竹叶【一十片】 泽泻【四分】

作一服水二盏煎至一盏食後稍热服

右方逆攻者也先以行足厥陰肝足太阳膀胱之药为君柴胡羌活是也二经生意皆总於脾胃以调足太陰足阳明之药为臣升麻甘草是也肝经多血以通顺血脉除肝邪之药膀胱经多湿以利小便除膀胱湿之药为佐赤芍药草决明泽泻茯苓车前子是也总破其积热者必攻必开必利必除之药为使梔子黄芩黄连大黄竹叶是也

蜜剂解毒丸 治证上全

杏仁【去皮尖二两另研】 山梔【一十两末】 石蜜【炼一筋】 大黄【五两末】

蜜丸如梧桐子大每服三十丸加至百丸茶汤下右方以甘润治燥为君为燥为热之原也山梔子微苦寒治烦为臣为烦为热所产也石蜜甘平温安五臟为佐为其解毒除邪也大黄苦寒性走不守泻诸实热为使为攻其积不令其重叠不解也

决明夜灵散 治日至夜则昏虽有灯月亦不能视石决明【另研二钱】 夜明沙【另研二钱】 猪肝【一两生用不食猪者以白羯羊肝代之】

二药末和匀以竹刀切肝作二片以上药铺於一片肝上以一片合之用麻皮纏定勿令药得泄出淘米泔水一大碗贮沙罐内不犯铁器入肝药於中煮至小半碗临睡连肝药汁服之

右方以决明镇肾经益精为君夜明沙升阳主夜明为臣米泔水主脾胃为佐肝与肝合引入肝经为使

冲和养胃汤 治内障初起视觉微昏空中有黑花神水变淡綠色次则视岐覩一成二神水变淡白色久则不覩神水变纯白色

柴胡【七钱】 人参【一两】 当归【酒浸一两】 五味子【二钱】 白芍药【六钱】 白茯苓【三钱】 羌活【一两半】 炙草【一两】 防风【半两】 黄芪【一两半】 白术【一两】 升麻【一两】 葛根【一两】 乾生姜【一钱】

每服六钱水三盏煎至二盏入黄芩黄连各一钱再煎至一盏去滓稍热食後服

右方因肝木不平内挟心火故以柴胡平肝人参开心黄连泻心火为君酒制当归荣百脉五味敛百脉【阙】沸心包络主血白芍药顺血脉散恶血为臣白茯苓泻膀胱之湿羌活清利小肠之邪甘草补三焦防风升胆之降为佐阴阳皆总於脾胃黄芪补脾胃白术健脾胃升麻葛根行脾胃之经黄芩退壮火乾生姜入壮火为导为使此方逆袭从顺反异正宜俱备

益气聪明汤 治证上全并治耳聋耳鸣

黄芪【半分】人参【半分】甘草【炙五分】升麻【三分】葛根【三钱】蔓荆子【钱半】芍药【一钱】黄柏【酒炒一钱】

每服四钱水二盏煎至一盏去查临睡热服五更再煎服

右方以黄耆人参之甘温治虚劳为君甘草之甘平承接和協升麻之苦平微寒行手阳明足阳明足太陰之经为臣葛根之甘平蔓荆子之辛温皆能升发为佐芍药之酸微寒补中焦顺血脉黄蘗之苦寒治肾水膀胱之不足为使酒制又炒者因热用也或有热可渐加黄蘗春夏加之盛暑倍加之加多则不效脾胃虚者去之热倍此者泻热黄连汤主之

泻热黄连汤 治内障症全上有眵泪眊瞤

黄芩【酒炒一两】黄连【酒洗一两】柴胡【酒炒一两】生地黄【酒洗一两】升麻【半两】龙胆草【三钱】

每服三钱水二盏煎至一盏去滓午食前热服午後服之则阳逆不行临睡休服为反助陰也

右方治主治客之剂也治主者升麻主脾胃柴胡行肝经为君生地黄凉血为臣为阳明太陰厥陰多血故也治客者黄连黄芩皆疗湿热为佐龙胆草专除眼中诸疾为使为诸湿热俱从外来为客也

还陰救苦汤 治日久病白睛微变青色黑睛稍带白色黑白之间赤环如带谓之抱轮红视物不明昏如雾露中睛白高低不平其色如死甚不光泽口乾舌苦眵多羞澁上焦应有热邪

升麻【半两】苍术【半两】甘草【炙半两】柴胡【半两】防风【半两】羌活【半两】细辛【二钱】藁本【四钱】川芎【一两】桔梗【半两】红花【一钱】归尾【七钱】黄连 黄芩 黄蘗 知母 生地黄 连翹【各半两】龙胆草【三钱】

每服七钱水一盏煎至一盏去滓热服

右方以升麻苍术甘草诸主元气为君为损者温之也以防风柴胡羌活细辛藁本诸升阳化滯为臣为结者散之也以川芎桔梗红花当归尾诸补行血脉为佐为留者行之也以黄连黄

芩黄蘗知母连翘生地黄龙胆草诸去除热邪为使为客者除之也奇经客邪之病强阳转实陰之病服此亦具验

菊花决明散 治症上全

草决明 石决明【东流水煮一伏时另研极细入药】木贼草 防风 羌活 蔓荆子 甘菊花 甘草【炙】 川芎石膏【另研极细入药】 黄芩【各半两】

为细末每服二钱水盞半煎八分连末服食後右方以明目除翳为君者草决明石决明木贼草也以散风升阳为臣者防风羌活蔓荆子甘菊花也以和气顺血为佐者甘草川芎也以疗除邪热为使者黄芩石膏也内急外弛之病亦宜其治

神验锦鸠丸 治症上同兼口乾舌苦眵多羞澁上焦邪热

甘菊花【半两】 草决明【三两】 蕤仁【去皮三两】 牡砺【洗火煨粉半两】 黄连蒺藜【炒去尖五两】 防风【五两】 羌活【三两】 细辛【五两】 麦【三两】 白

茯苓【四两】 肉桂【二两】 斑鸠【一个跌死去皮毛肠嘴爪文武火连骨炙乾】 羯羊肝【一个竹刀薄批炙令焦忌用鉄刀】 蔓菁子【二升淘淨绢袋盛甑蒸一伏时晒乾】

为细末炼蜜为剂杵五百下丸如桐子大每服二十丸加至三五十丸空心温汤下

右方以甘菊花草决明主明目为君以蕤仁牡砺黄连蒺藜除湿热为臣以防风羌活细辛之升上麦茯苓之分下为佐以斑鸠补肾羊肝补肝肉桂导羣药入热邪为使此方制之大者也肾肝位远服汤药散不厌频多之义也

万应蝉花散 治证上全

蝉蛻【去上半两】 蛇蛻【炙三钱】 川芎 防风 羌活 炙草【各一两】 苍术【四两】 赤芍药【二两】 当归【一两】 白茯苓【一两】 石决明【东流水煮一伏另研极细两半】

为细末每服二钱食後临卧时浓米泔调下热茶清亦可

右方制之服者也奇之不去则偶之是为重方也今用蝉蛻又用蛇蛻者取其重蛻之义以除翳为君也川芎防风羌活皆能清利头目为臣也甘草苍术通主脾胃又脾胃多气多血故用赤芍药补气当归补血为佐也石决明镇坠肾水益精还陰白茯苓分陰阳上下为使也亦治奇经客邪之病

黄芩防风饮子 治眼棱紧急以致倒睫拳毛损睛生翳及上下眦赤烂羞澁难开眵泪 粘

蔓荆子【五分】细辛【二分】葛根【一钱半】炙草【一钱】黄芩【一钱】防风【一钱】黄芩【五分】

作一服水二盏煎至一盏去滓大热服

右方以蔓荆子细辛为君除手太阳手少阴之邪肝为二经之母子平母平此实则泻其子也以甘草葛根为臣治足太阴足阳明之弱肺为二经之子母薄子单此虚则补其母也黄芩实皮毛防风散滞气用之以为佐黄芩疗湿热去目中赤肿为之使也

无比蔓荆子汤 治证上全

黄耆【一钱】人参【一钱】黄连【七分】柴胡【七分】蔓荆子【五分】当归【五分】葛根【五分】防风【五分】生草【一钱】细辛叶【三分】

作一服水二盏煎至一盏去滓稍热服

右方为肺气虚耶黄耆人参实之为君心受邪耶黄连除之肝受邪耶柴胡除之小肠受邪耶蔓荆子除之为臣当归和血葛根解除为佐防风疗风散滞生甘草大泻热火细辛利九窍用叶者取其升上之意为使也

拨云退翳丸 治阳蹻受邪内眦即生赤脉缕缕根生瘀肉瘀肉生黄赤脂脂横侵黑睛渐蚀神水锐眦亦然俗名攀睛

川芎【一两五钱】菊花【一两】蔓荆子【二两】蝉蜕【一两】蛇蜕【炙三钱】蜜蒙花【二两】薄荷叶【半两】木贼草【去节二两】荆芥穗【一两】黄连【半两】楮桃仁【一两】地骨皮【一两】天花粉【六钱】炙草【三钱】川椒皮【一钱】当归【一两五钱】白蒺藜【去刺炒一两半】

为细末炼蜜成剂每两作八丸每服一丸食后临睡细嚼茶清下

右方为奇经客邪而作也八十一难经曰阳蹻脉者起于跟中循外踝上行入风池风池者脑户也故以川芎治风入脑以菊花治四肢游风一疗其上一平其下为君蔓荆子除手太阴之邪蝉蜕蛇蜕木贼草蜜蒙花除翳为臣薄荷叶荆芥穗白蒺藜诸疗风者清其上也楮桃仁地骨皮诸通小便者利其下也为佐黄连除胃中热天花粉除肠中热甘草和协百药川椒皮利五臟明目诸所病处血亦病故复以当归和血为使也楮桃仁即楮实子也

梔子胜奇散 治症全上并有眵泪羞澁难开

蛇蜕 草决明 川芎 荆芥穗 蒺藜【炒】 谷精草 菊花 防风 羌活 蜜蒙花

甘草【炙】蔓荆子 木贼草 山梔子 黄芩【各三分】

为细末每服二钱食後临睡热茶清调下

右方以蝉蜕之醃寒草决明之醃苦为味薄者通通者通其经络也川芎荆芥穗之辛温白蒺藜谷精草之苦辛温菊花之苦甘平防风之甘辛为臣为气辛者发热发热者升其阳也羌活之苦甘温蜜蒙花之甘微寒甘草之甘平蔓荆子之辛微寒为佐为气薄者发泄发泄者清利其诸关节也以木贼草之甘微苦山梔子黄芩之微苦寒为使为厚味者泄泄者攻其壅滞有余也

磨障灵光膏 治症上全

黄连【剉如豆大一两童便浸一宿晒为末】黄丹【水飞三两】当归【取细末二钱】麝香【另研末五分】乳香【另研末五分】轻粉【另研一钱】硃砂【另研末一钱】白丁香【取末一钱】龙脑【少许末】海螵蛸【取末一钱】卢甘石【六两另以一两黄连剉置水中烧卢甘石通红淬七次】

先用好白沙蜜一十两或银器沙锅内熬五七沸以净纸搭去腊面除黄丹外下余药用柳木搅匀次下黄丹再搅慢火徐徐搅至紫色却将乳香麝香轻粉硃砂和匀入上药内以不粘手为度急丸如皂角刺大以纸裹之每用一丸新汲水化开旋入龙脑少许时时点翳上

右方以黄连去邪热主明目为君以黄丹除热除毒卢甘石疗湿收散为臣以当归和血脉麝香乳香诸香通气轻粉杀疮为佐以硃砂之能消海螵蛸之磨翳白丁香之主病不移龙脑之除赤脉去外障为使也

消翳复明膏 治症上全

黄丹【水飞四两】青盐【一两另研】白沙蜜【一筋】诃子【八个去核取末】海螵蛸【三钱取末】

先将蜜熬数沸净纸搭去腊面却下黄丹用棍搅匀旋下余药将至紫色取出

黄连【十两】?仁【半两】木贼草【一两】龙胆草【二两】杏仁【七十五个去皮尖】

通入磁器内水一斗浸之春秋五日夏三日冬十日入锅内文武火熬至小半升滤去渣重汤顿成膏子却入前药?之搅成紫色入龙脑一钱每用少许点上药乾净水化开用

右方以黄连为君为疗邪热也?仁杏仁龙胆草为臣为除赤痛润烦燥解热毒也黄丹青盐龙脑白沙蜜为佐为收湿烂益肾气疗赤肿和百药也诃子海螵蛸木贼草为使为澁则不移

消障磨翳也

除风益损汤 治目为物伤者

熟地黄 当归 白芍药 川芎【各一钱】 藁本 前胡 防风【各七分】

作一服水二盏煎至一盏去滓大热服

右方以熟地黄补肾水为君黑睛为肾之子此虚则补其母也以当归补血为目为血所养今伤则血病白芍药补血又补气为血病气亦病也为臣川芎治血虚头痛藁本通血去头风为佐前胡防风通疗风邪俾不凝留为使兼治亡血过多之病伤於眉骨者病自目系而下以其手少阴有隙也加黄连疗之伤於?者病自抵过而上伤於耳者病自锐眦而入以其手太阳有隙也加柴胡疗之伤於额交颠耳上角及脑者病自内眦而出以其足太阳有隙也加苍术疗之伤於耳後耳角耳前者病自客主人斜下伤於颊者病自锐眦而入以其足少阳有隙也加龙胆草疗之伤於额角及巅者病自目系於下以其足厥阴有隙也加五味子疗之凡伤甚者从权倍加大黄泻其败血眵多泪多羞澁赤肿者加黄芩疗之

加减地黄丸 治症上全

生地黄【半筋】 熟地黄【半筋】 牛膝

当归【各三两】 枳壳【二两】 杏仁【一两】 羌活 防风【各一两】

为细末炼蜜为丸如桐子大每服三十丸空心食前温酒送下淡塩汤亦可

右方以地黄补肾水真阴为君夫肾水不足者相火必盛故生熟地黄退相火也牛膝逐败血当归益新血为臣赅炒枳壳和胃气谓胃为多血生血之所是补其原杏仁润燥谓血少生燥为佐羌活防风俱升发清利大除风邪为七情五贼饥饱劳役之病睛痛者与当归养荣汤兼服伤寒愈後之病及血少血虚血亡之病俱宜服也

人参补阳汤 治伤寒余邪不散上走害窍其病癰澁赤胀生翳羞明头痛骨痛

羌活 独活【各六分】 白芍药 生地黄 泽泻【各三分】 人参 白术 茯苓 黄耆 炙草 当归【各四分】 柴胡 防风【各五分】 熟地黄【酒洗炒四分】

作一服水二盏煎至一盏去查热服

右方分利阴阳升降上下之药也羌活独活为君导阳之升也茯苓泽泻为臣者导阴之降者也人参白术大补脾胃内盛则邪自不容黄芩防风大实皮毛外密则邪自不入为之佐也当归熟地黄俱生血谓目得血而能视生地黄补肾水谓神水属肾白芍药理气柴胡行经甘草

和百药为之使也

抑阳酒连散 治神水紧小渐如菜子许及神水外围相类虫蚀者然皆能覩物不昏微有眊躁羞澁之证生地黄 独活 黄栢 防风 知母【各三分】 蔓荆子 前胡 羌活 白芷 生草【各四分】 黄芩【酒制】 寒水石 梔子【各五分】 黄连【酒制五分】 防己【三分】

作一服水二盏煎至一盏去滓大热服

右方抑阳缓陰之药也以生地黄补肾水真陰为君独活黄栢知母俱益肾水为臣蔓荆子羌活防风白芷羣队升阳之药为佐者谓既抑之令其分而更不相犯也生甘草黄芩梔子寒水石防己黄连不走之药为使者惟欲抑之不欲祛除也诸用酒制者为引导也

当归补血汤 治男子?血便血妇人产後崩漏亡血过多致睛珠疼痛不能视物羞明酸澁眼睫无力眉骨太阳俱各酸痛

熟地黄 当归【各六分】 川芎 牛膝 白芍药 炙草 白术 防风【各五分】 生地黄【四分】 天门冬【四分】

作一服水二盏煎至一盏去滓稍热服恶心不进食者加生姜煎

右方专补血故以当归熟地黄为君川芎牛膝白芍药为臣以其祛风续絶定痛而通补血也甘草白术大和胃气用以为佐防风升发生地黄补肾天门冬治血热谓血亡生风燥故以为使

羚羊角散 治小儿癰疹後余毒不解上攻眼目生翳羞明眵泪俱多红赤肿闭

羚羊角【镑】 黄芩 黄芩 草决明 车前子 升麻 防风 大黄 芒硝【各等分】

作一服水一盏煎半盏去滓稍热服

右方以羚羊角主明目为君升麻补足太陰以实内逐其毒也黄芩补手太陰以实外御其邪也为臣防风升清阳车前子泻浊陰为佐草决明疗赤痛泪出黄芩大黄芒硝用以攻其固热为使然大黄芒硝乃大苦寒之药智者当量其虚实以为加减未滿二十一日而目疾作者消毒化癰汤主之

消毒化癰汤 治小儿癰疹未滿二十一日而目疾作者余症上同

羌活【五分】 藁本【二分】 细辛【一分】 黄连【三分】 黄芩【一分】 酒芩【二分】

酒黄栢【三分】生地黄【二分】麻黄【五分】升麻【五分】白术【一分】苍术【二分】生甘草【一分】吴茱萸【半分】陈皮【一分】红花【半分】苏木【一分】当归【三分】连翘【三分】防风【五分】川芎【二分】葛根【一分】柴胡【二分】

作一服水二盏煎至一盏去滓稍热服

右方功非独能於目盖专於疔者而置也今以治疔之剂治目者以其毒尚炽盛又旁害於目也

薛氏医案卷八

卷九

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷九

明 薛己 撰

原机啓微

论目为血脉之宗

内经曰诸脉者皆属于目目得血而能视鍼经曰五臟六腑积气皆上注於目而为之精精之窠为眼骨之精为黑眼血之精为络其窠气之精为白眼肌肉之精则为约束里擗筋骨血气之精而与脉并为系上属于脑後出於项中故邪中於项因逢其身之虚其入深则随眼系入於脑则脑转脑转则引目系急目系急则目眩以转矣邪中其精其精所中不相比也则精散精散则视岐故见两物目者五臟六腑之精荣卫之所常营也神气之所主也故神劳则散志意乱是故瞳子黑眼发於陰白眼赤脉发於阳故陰阳合传而为精明也目者心之使也心者神之舍也故神精乱而不转卒然见非常之处精神散不相得故曰惑也东垣曰夫十二经脉三百六十五络其血气皆上走於面而走空窍其清阳气上散於目而为精其气走於耳而为听因心烦事冗饮食失节劳役过度致脾胃虚弱心火太盛则百脉沸腾血脉逆行邪害空窍失明则日月不明矣夫五臟六腑之精气皆禀受於脾上贯於目脾者诸陰之首也目者血脉之宗也故脾虚则五臟之精气皆失所司不能归明於目矣心者君火也主人之神宜静而安相火化行其令相火者包络也主百病皆荣於目既劳役运动势乃妄行又因邪气所并而损血脉故诸病生焉凡医者不理脾胃及养血安神治标不治本是不明正理也

按此论目为臟腑血脉精气之宗至为详悉岂但世俗拘之於五轮八廓而已也

论目昏赤肿翳膜皆属于热

原病式曰目昧不明目赤肿痛翳膜眦疡皆为热也及目膜俗谓之眼黑亦为热也或平白目无所见者热气鬱之甚也或言目昧为肝肾虚冷者误也是以妄谓肝生於目肾主瞳子故妄言目昧为虚而冷也然肾水冬陰也虚则当热肝木春阳也虚则当冷肾陰肝阳岂能同虚而为冷者欤或通言肝肾之中陰实阳虚而无由目昧也俗妄谓肝肾之气衰少而不能至於目也不知经言热甚目瞑眼黑也岂由寒尔耶而仲景言伤寒病热极则不识人乃目盲也正理论曰由热甚怫鬱於目而致之然也若目无所见耳无所闻悉由热气怫鬱玄府闭塞而致气

液血脉荣卫精神不能升降出入故也各随鬱结微甚而有病之轻重也故知热鬱于目无所见也故目微昏者至近则转难辨物由目之玄府闭小也隔縑视物之象也或视如蝇翼者玄府有所闭合者也或目昏而见黑花者由热气甚而发之於目亢则害承乃制而反出其泣气液昧之以其至近故虽微而亦见如黑花也及冲风泣而目暗者由热甚而水化制之也故经言厥则目无所见夫人厥则阳气并于上陰气并於下阳并于上则火独光也陰气并于下则足陰足陰则胀也天一水不能胜五火故目眦而盲是以冲风泣下而不止夫风之中於目也阳气内守於睛是火气燔目故见风泣下

按此论热甚怫鬱陰阳并厥玄府闭密致目病之由为详盖一主於火热之化也若由饮食辛热七情所动六气淫鬱气血虚实则东垣子和陈无择辈论亦已详然亦有痰热湿热与夫服食金石燥热之药致者或久病後荣卫虚弱肝气肾陰不足或元气精气虚衰及脱营为病皆有虚热实热之殊并宜分治

论眼证分表里治

机要曰在腑则为表当除风散热在臟则为里宜养血安神暴发者为表而易治久病者在里而难愈

论目疾宜出血最急

子和曰圣人虽言目得血而能视然血亦有太过不及也太过则目壅塞而发痛不及则目耗竭而失明故年少之人多太过年老之人多不及但年少之人则无不及年老之人其间犹有太过者不可不察也夫目之内眦太阳经之所起血多气少目之銳眦少阳经也血少气多目之上纲太阳经也亦血多气少目之下纲阳明经也血气俱多然阳明经起於目两旁交頰之中与太阳少阳俱会于目惟足厥陰经连于目系而已故血太过者太阳阳明之实也血不及者厥陰之虚也故出血者宜太阳阳明盖此二经血多故也少阳一经不宜出血血少故也刺太阳阳明出血则目愈明刺少阳出血则目愈昏要知无使太过不及以养血目而已凡血之为物太多则濫太少则枯人热则血行疾而多寒则血行迟而少此常理也目者肝之外候也肝主目在五行属木虽木之为物太茂则蔽密太衰则枯瘁矣夫目之五轮乃五臟六腑之精华宗脉之所聚其白人属肺金肉轮属脾土赤脉属心火黑水神光属肾水兼属肝木此世俗皆知之矣及有目疾则不知病之理岂知目不因火则不病何以言之白轮变赤火乘肺也肉轮赤肿火乘脾也黑水神光被翳火乘肝与肾也赤脉贯目火自甚也能治火者一句可了故内经曰热胜则肿凡目暴赤肿起羞明癢澁泪出不止暴寒目瞶皆太热之所为也治火之法在药则咸寒吐之下之在鍼则神庭上星 会前顶百会血之翳者可使立退痛者可使立已昧者可使立明肿者可使立消惟小儿不可刺 会为肉分浅薄恐伤其骨然小儿水在上火在下故目明老人火在上水不足故目昏内经曰血实者宜决之又经曰虚者补之实者泻之如雀目不能夜视及内障暴怒大忧之所致也皆肝主目血少禁出血止宜补肝养肾至於暴赤肿痛皆宜以?鍼刺前五穴出血而已次调盐油以涂发根甚者虽至于再至于三可也量其病势以平为期

按此谓目疾出血最急於初起热痛暴发或久病鬱甚非三棱鍼宣泄不可然年高之人及久病虚损并气鬱者宜从毫鍼补泻之则可故知子和亦大略言尔於少阳一经不宜出血无使太过不及以养血目而已斯意可见

论内障外障

龙木论曰眼疾有七十二般内障二十三候外障四十九候病状一一不同其疾状认识既不差错治疗少有所凭

谨按诸候详见本论然内障为黑水神光昏翳外障则有翳膜者是今论中虽具诸候而所用药多本风热故并略云然内障有因於痰热气鬱血热阳陷陰虚脱营所致种种病因皆略之不议况外障之翳有起於内眦外眦睛上睛下睛中当视其翳色从何络而来如东垣治例魏邦彦夫人目翳从下而上病自阳明来也緑非五色之正殆肺肾合而为病也乃就画家以墨调膩粉合成色谛视之与翳色同矣肺肾为病者无疑乃泻肺肾之邪而以入阳明之药为之使既效而他日复病作者三其所从来之经与翳色各异因询此必经络不调目病未已问之果然如所论治之疾遂不作若此凭其色其所兼所本之因处治而不愈者盖邪蘊日久而实元气陰气不足所致也当以王道论治庶可但世俗不能守此理遂致失明者多矣悲夫

论瞳子散大

东垣曰瞳子散大者由食辛热之物太甚故也所谓辛主散热则助火上乘於脑中其精故散精散则视物亦散大也夫精明者所以视万物者也今视物不真则精衰矣盖火之与气势不两立故经曰壮火食气壮火散气手少陰足厥陰所主风热连目系邪入中人各从其类故循此道而来攻头目肿闷而瞳子散大皆血虚陰弱故也当除风热凉血益血以收耗散之气则愈矣

论倒睫赤烂

东垣曰夫眼生倒睫拳毛者两目紧急皮缩之所致也盖内复热则陰气外行当去其内热并火邪眼皮缓则眼毛立出翳膜亦退用手法攀出内睑向外速以三棱鍼出血以左手爪甲迎其鍼锋立愈

目眶岁久赤烂俗呼为赤睛是也当以三棱鍼刺目眶外以泻湿热而愈

按已上所论可谓深達病情然是证亦多是血热陰虚火动所致盖血所以滋经脉养毛发者也故当外治以泻其瘀热内治以杜絕其源可也

论目不能远视为陰气不足

东垣曰能远视不能近视者阳气不足陰气有余也乃气虚而血盛也血盛者陰火有余气虚者气弱也此老人桑榆之象也能近视不能远视者阳气有余陰气不足也乃血虚气盛血虚气盛者皆火有余元气不足火者元气穀气真气之贼也元气来也徐而和细细如线邪气来也紧而强如巨川之水不可遏

谨按阳气者犹日火也陰气者金水也先儒所谓金水内明而外暗日火内暗而外明者也然人目眼备臟腑五行精华相资而神明故能视即此理之常也虽经曰目得血而能视殊不言气者盖血得气为水火之交而能神明之也否则陰虚不能远视阳乏不能视近是为老人桑榆之渐然学者於目病能求诸此则思过半矣

论目疾分三因

陈无择云病者喜怒不节忧思兼并致臟气不平鬱而生涎随气上厥逢脑之虚侵淫眼系?注于目轻则昏濇重则障翳眵泪努肉白膜瞞睛皆内所因或数冒风寒不避暑湿邪中於项乘虚循系以入於脑故生外翳医论中所谓青风緑风紫风黑风赤风白风白翳黄翳等随八风所中变生诸症皆外所因或嗜慾不节饮食无时生食五辛热啖炙燔驰骋田猎冒涉烟尘劳动外情丧明之本皆不内外因治之

按论中所言致证之因至为详悉惜乎其方多本於风热及水臟阳虚处治而未备学者当自为通变矣

论偷鍼眼

巢氏曰凡眼内眦头忽结成疱三五日间便生脓汁世呼为偷鍼此由热气客在眦间热转於津液所成但其势轻者小小结聚汁溃热歇乃瘥

谨按世传眼眦初生小疱视其背上即有细红点如疮以鍼刺破眼时即瘥故名偷鍼实解太阳经结热也人每试之有验然巢氏但具所因而不更分经络其诸名实所过者多矣

先哲治验

东垣云戊申六月徐总管患眼疾上眼皮下出黑白翳二点癰澁难开两目紧缩而不痛两寸脉细紧按之洪大而无乃足太阳膀胱为命门相火煎?逆行作寒水翳及寒膜遮睛呵欠善悲健忘嚏喷眵泪时泪下面赤而白能食大便难小便数而欠气上而喘以拨云汤治之

论瞳子散大【并方】

戊戌冬初李叔和至西京朋友待之以猪肉煎饼同蒜醋食之後复饮酒大醉卧於煖亢翌日病眼两瞳子散大於黄睛视物无的以小为大以短为长卒然见非常之处行步踏空多求医

疗而莫之愈至己亥春求治於先师曰内经有云五臟六腑之精气皆注於目而为之精精之窠为眼骨之精为瞳子又云筋骨气血之精而为脉并为系上属於脑又瞳子黑眼法於陰今瞳子散大者由食辛热之物过多故也所谓辛主散热则助火上乘於脑中其精故散精散则视物亦散大也夫精明者所以视万物者也今视物不真则精衰矣盖火之与气势不两立故经云壮火食气壮火散气手少陰足厥陰所主风热连目系邪之中人各从其类故循此道而来攻头目肿闷而瞳子散大皆血虚陰弱故也当除风热凉血益血以收耗散之气则愈矣滋陰地黄丸【方见前】内经云热淫所胜平以咸寒佐以苦甘酸收之以黄连黄芩大苦寒除邪气之盛为君当归身辛温生熟地黄苦甘寒养血凉血为臣五味子酸寒体轻浮上收瞳子之散大人参甘草地骨皮天门冬枳殼苦甘寒泻热补气为佐柴胡引用为使也忌食辛辣物而助火邪及食寒凉物损胃气药不能上行也

丹溪一壮年人早起忽视物不见就睡片时略见而不明食减倦甚脉缓大重则散而无力意其受湿所致询之果卧湿地半月遂以白术为君黄芪茯苓陈皮为臣附子为使十余贴而愈

丹溪一老人忽盲他无所苦予以大虚治之急煎人参膏二筋服二日一医与磁石药予曰今夜死矣果然丹溪一人形实好饮热酒忽目盲脉濡此热酒所伤胃气污浊之血死其内而然以苏木作汤调人参末服二日鼻及两掌皆紫黑予曰滞血行矣以四物加苏木桃仁红花陈皮煎调人参末服数日而愈【已上治验三条见丹溪纂要】谦甫云郎中张子敬年六十七岁病眼目昏暗微黑色皮肤不泽六脉弦细而无力一日出视治眼二方问予曰可服否予曰此二方以黄连大苦之药为君诸风药为使且人年五十胆汁减而目不明内经云土位之主其泻以苦诸风药亦能泻土人年七十脾胃虚而皮肉枯重泻其土使脾胃虚而不能营运荣卫之气滋养元气胃气不能上行隔气吐食诸病生矣又况年高衰弱此药不服可也只宜慎言语节饮食惩忿窒慾此不治之治也子敬以为明年春除关西路按察使三年致仕回还精神清胜脉遂平和此不可妄服寒凉之剂也内经云征伐无过是谓大惑解之可也

海藏妻侄女形肥笄年时得目疾每月或二月一发发则红肿难开如此者三年服除风散热等剂左目反有翳从銳眦遮瞳人右目亦有翳从下而上经云从内走外者少阳病从下上者阳明病予谓此少阳阳明二经有积滞也脉短滑而实鼓晨则似短澁洁古有云短为有积滞遏抑臟腑宜下之遂用温白丸减川芎附子下之二多加龙胆草黄连如东垣五积法从二丸加起每日加一丸如至大利然後减丸又从二丸加起忽一日於利中下墨血块若干如黑豆大而硬坚从此渐痊而翳尽去【见医学纲目】

楼全善先生曰夏枯草治目珠疼至夜则疼甚者神效或用苦寒药点之反疼者亦神效盖目珠者连日本又各系属厥陰之经也夜甚及用苦寒药点之反甚者夜与寒亦陰故也丹溪云夏枯草有补养厥陰血脉之功其草三四月开花遇夏至陰生则枯盖禀纯阳之气也至哉斯言故治厥陰目疼如神者以阳治陰也予男至夜目珠及连眉棱骨作疼头半边肿痛用黄连膏点之反大痛百药不效灸厥陰少阳疼随止半日又作又灸又止月余遂以夏枯草二两香附末二两甘草四钱同为细末每服一钱半用清茶调服下咽则疼减大半至四五日良愈

一男子六十余岁所患与前证皆同但黑睛有白翳二点诸药不效亦以此药与东垣选奇汤加四物汤及黄连煎间服并灸厥阴少阳而安

附方

治风之剂

局方蜜蒙花散 治风气攻注两眼昏暗眵泪羞明并暴赤肿

羌活 白蒺藜【炒】 木贼 蜜蒙花 石决明【各一两】 菊花【二两】

右为末每服二钱茶清食后调下

三因羌活散 治风毒上攻眼目昏澁翳膜生疮及偏正头疼目小黑花累累者

羌活 川芎 天麻 旋覆花 青皮 南星【炮】 藁本【各一两】

右为末每服二钱水煎入姜三片薄荷七叶

按已上并足太阳厥阴药也

东垣明目细辛汤 治两目发赤微痛羞明畏日怯风寒怕火眼睫成纽眵糊多癢澁而难开眉攒肿闷鼻塞涕唾 粘大便秘澁

麻黄 羌活【各三钱】 防风【二钱】 藁本【一钱】 白茯苓【一钱】 当归尾【一钱】 川芎【五分】 细辛【五分】 蔓荆子【五分】 荆芥穗【钱半】 生地黄【一钱酒制】 椒【八个】 桃仁【二十个】 红花【少许】

右?咀分作四服每服水煎食后热服

按此足太阳厥阴手少阴药也

机要四物龙胆汤 治目赤暴发云翳疼痛不可忍四物汤【半两】 羌活 防风【各三钱】 龙胆草【酒拌炒焦】 防己【各二钱】

右?咀作数服水煎

按此足厥阴太阴太阳药也

防风饮子 治拳毛倒睫

黄芪 甘草 人参【各一钱】 葛根【五分】 细辛叶 蔓荆子
防风【各五分】 当归【七分半】

右?咀作一服水煎食後服

按此足太阳阳明手足太陰药也

治热之剂

局方洗心散 治风壅壮热头目昏痛热气上冲口苦唇焦咽喉肿痛心神烦燥多渴五心烦热
小便赤澀大便秘滯

大黄【煨】 甘草 当归 芍药 麻黄 荆芥穗【各六钱】 白术【半两】

右为末每服二三钱生姜薄荷汤煎服

按此足太阳阳明厥陰手足太陰经药也今人多用之故收入然以白术合大黄入心故名洗
心而从以麻黄荆芥亦是表里药

济生羊肝丸 治肝经有热目赤睛疼视物昏澀

羊肝【一具生用局方用白羊肝】 黄连【去须为末】

右先将羊肝去筋膜於沙盆内捣烂入黄连末杵和丸如梧子大每五十丸用熟水送下

按此手少陰足太陰厥陰药也

东垣泻热黄连汤 治眼暴发赤肿疼痛

黄芩【酒制炒】 黄连【同上制】 龙胆草
生地黄【各一两】 升麻【半两】 柴胡【一两】

右?咀每服四钱水煎去查於日午前飯後热服按此手少陰太陰足阳明少阳少陰药也

治风热之剂

局方明目流气饮 治风热上攻眼目视物不明常见黑花当风多泪癢澀难开

大黄【煨】牛蒡子【炒】川芎 菊花 白蒺藜【炒】细辛防风 玄参 山梔 黄芩
甘草【炙】蔓荆子荆芥 木贼【各一两】草决明【两半】苍术【泔汁炒二两】

右为末每二钱临卧用温酒调下

按此手足三陰足阳明太陰药也

洗肝散 治风毒上攻暴作赤目肿痛难开癰澁眵泪薄荷叶 当归 羌活 防风 山梔仁
甘草 大黄 川芎【各二两】

右为末每二钱食後煎水调下

按此足太阳厥陰手足太陰药也

钱氏泻青丸 治目暴发赤肿疼痛

当归 川芎 山梔 龙胆草【酒拌炒焦】 大黄 羌活防风

右为末蜜丸鷄头子大每一二丸

按此足太阳少阳太陰厥陰药也

东垣连翹饮子 治目中溜火恶日与火癰澁小角紧久视昏花迎风有泪

蔓荆子 生甘草 连翹【各三分】柴胡【二分】黄芩【酒制五分】生地黄 当归
人參【各三分】红葵花【三分】黄芩 防风 羌活【各五分】升麻【一钱】

右?咀作一服水煎食後热服

按此足三阳少陰厥陰药也

神芎丸 治湿热内甚目赤肿或白睛黄色

大黄 黄芩【各二两】 牵牛 滑石【各四两】 黄连 薄荷川芎【各半两】

右为末水丸如小豆大温水下十丸至十五二十丸按此足阳明厥陰药也

东垣龙胆饮子 治肝眼流脓生疳翳湿热为病麻黄【一钱半】黄芩【炒】青蛤粉 羌活
龙胆草【酒拌炒焦各三钱】蛇退皮 穀精草 川鬱金 炙甘草【各五分】升麻【二钱】

右为细末每二钱食後茶调服

按此足太阳阳明手足太陰药也

已上六方宜随表里而轻重之亦不可例用理血之剂

局方明目地黄丸 治男女肝肾俱虚风邪所乘热气上攻目翳遮睛目澁多泪

牛膝【酒浸三两】石斛

枳殼【炒】杏仁【去皮炒】防风【各四两】生熟地黄【各一筋】

右为末炼蜜丸如梧子大每服三十丸白水下按此出太阳例又气药也

简易加减驻景丸 治肝肾气虚两目昏暗视物不明熟地黄 当归【各五两】楮实子 川椒【炒各一两】五味子【二两】枸杞子【二两】兔丝子【酒制半筋】车前子【炒二两】

右为末蜜糊丸如梧子大每三十丸食前温酒下谨按肝为相火有泻无补况陰水虚而阳火实病目者多故此二方盖补肝之陰虚也颇有理故收入

地芝丸 治目不能远视能近视或亦妨近视

生地黄【焙乾】天门冬【去心各四两】枳殼【二两炒】甘菊花【二两】

右为细末炼蜜为丸如桐子大茶清送下百丸食後

理气之剂

局方定志丸 治眼不能近视反能远视者

白茯苓 人参【各三两】远志【去心】菖蒲【各二两】

右为细末炼蜜为丸如梧子大以朱砂为衣每服七丸至二三十丸温米饮下食後日三服

按已上二方手太陰少陰药也

济生桑白皮散 治肺气壅塞毒气上攻眼目白睛肿胀日夜疼痛

玄参 桑白皮 枳殼【炒】升麻 杏仁【炒】旋覆花 防风 赤芍 黄芩 甘菊花

甘草【炙】甜葶

芡【炒各一两】

右为末每服三钱食前滚白水调下

按此又治风热之剂也出太阳例

养阳之剂

东垣神效黄芪汤

治浑身麻木不仁或头面或手或腿脚麻木不仁两目紧急缩小及羞明畏日或视物无力

黄芪【二两】人参【八钱】炙甘草【一两】蔓荆子【三钱】白芍【一两】陈皮【半两】

右?咀每五钱水煎临卧热服

益气聪明汤 治饮食不节劳役形体脾胃不足得内障耳鸣或多年目昏暗视物不能此药能令人目广大久服无内外障耳鸣耳聋之患

黄芪 甘草 人参【各半两】升麻 葛根【各三钱】蔓荆子【钱半】芍药 黄柏【酒炒各一钱】

右?咀每服三钱水煎临睡热服近五更再服之得肿更妙如烦闷或有热渐加黄柏春夏加之盛暑夏月倍之若此一味多则不效

人参补胃汤

治劳役所伤饮食不节内障昏暗前黄芪汤减陈皮芪再减半加黄柏【一两酒拌透】

右?咀每服三四钱水煎食远稍热服後两目广大视物如童时觉两脚踏地不知高低盖冬天多服升阳药故也病减住服

按已上手足太陰少陰药也

滋陰之剂

东垣连栢益陰丸

羌活 独活 甘草 当归尾【制】 防风【半两】 五味子【半两】 草决明【一两】 石决明【烧三钱】 细黄芩 黄栢 知母 黄连【酒拌炒各一两】

右件为细末炼蜜为丸如菉豆大每服五十丸渐加至百丸食远茶清送下常多服补阳汤少服此丸

滋陰肾气丸此壮水之主以镇阳光

熟地黄【三两】 牡丹皮【半两】 生地黄【四两】 泽泻【二两半】 茯苓【二两半】 当归尾 山茱萸 柴胡 五味子 乾山药【各半两】

右件於石臼中杵为细末炼蜜为丸如桐子大每服五七十丸盐汤空心服

按已上并少陰药也

养阳滋陰之剂

局方菊睛丸 治肝肾不足眼目昏暗常见黑花多泪枸杞子【三两】 苁蓉【酒浸炒】 巴戟【去心各一两】 甘菊花【四两】

右为末炼蜜为丸如梧子大每五十丸温汤盐汤食远任下

东垣滋陰地黄丸 治眼目瞳子散大於黄睛视物无的或卒然见非常之处

熟地黄【一两】 生地黄【两半】 柴胡【八钱】 天门冬 炙甘草 枳殼【各三钱】 人参【二钱】 地骨皮【二钱】 黄连【三钱】 五味子【三钱】 黄芩【半两】 归身【半两酒拌焙】

右件为细末炼蜜为丸如菉豆大每百丸温茶清送下日进三次忌辛辣生冷之物

按此二方足少陰之剂也前方主右肾此主左肾之药故亦异尔

补阳汤 治阳不胜其陰乃陰盛阳虚则九窍不通今青白翳见於大眦及足太阳少陰经中鬱遏足厥陰肝经气不得上通於目故青白翳内阻也当於太阳少陰经中九原之下以益肝中阳气冲天上行此乃先补其阳後於足太阳太陰标中【标者头也】 泻足厥陰肝经火下伏於阳中乃次治也内经云陰盛阳虚则当先补其阳後补其陰此治法是也每日侵晨以腹中无宿食服补阳汤临卧服益陰丸若天色变大寒大风并劳役预日饮食不调精神不足或气弱俱不得服候时气和平天气如常服之乃先补其阳使阳气上升通於肝经之末利空窍於目矣

羌活 独活 甘草 人参 熟地黄 黄芩 白术【各一两】 泽泻【研为末】 陈皮【各半两】 生地黄【炒】 白茯苓【去皮】 知母【炒各三钱】 柴胡【去苗三两】 防风 白芍药【半两】 肉桂【去皮一钱】 当归身【去芦酒制三钱】

右同为麤末每服半两水三盏煎至一盏去滓空心宿食消尽服之

冲和养胃汤 治内障眼得之脾胃元气衰弱心火与三焦俱盛饮食失节形体劳役心不得休息故上为此疾服之神効

柴胡【七钱】 防风【半两】 羌活 炙甘草 黄芩【各一两半】 当归【制】 白术 升麻 人参 葛根【各一两】 白芍【六钱】 白茯苓【三钱】 乾姜【一钱】 五味子【二钱】 黄芩 黄连【各七钱】

右?咀每五六钱水煎食远稍热服

按已上足三阳手足太陰药也

治障翳诸方

龙木论还睛丸

治眼内赤澁有花或黑或白或红皆因肝臟积热肺受风邪初患之时宜令鍼治诸穴内服此

人参 桔梗 黄芩 熟地黄 防风 茺蔚子 车前子 知母【各二两】 玄参【半两】 细辛 五味子【各二两半】

右为末炼蜜为丸如梧子大空心茶下十丸

按本论治内障诸方与此相类者数多姑存此法

局方蝉花无比散 治大人小儿风毒伤肝或为气攻一切眼目昏暗渐生翳膜或久患头风牵搐两眼渐渐细小连眶赤烂

茯苓 甘草【炙】 防风【各四两】 川芎 石决明【盐水煮研如粉】 羌活 当归【各三两】 赤芍【十两炒】 蒺藜【炒半筋】 蝉退【一两】 苍术【十二两】 蛇退【一两】

右为末每三钱食後米泔调服茶清亦得

按此足三阳太陰厥陰药也

蝉花散 治肝经蕴热毒气上攻眼目赤肿多泪羞明一切风热昏翳

谷精草 菊花 蝉退 羌活 甘草【炙】 白蒺藜【炒】 草决明 防风 山梔 川芎 蜜蒙花 木贼 荆芥穗 黄芩 蔓荆子

右为末每二钱食後茶清调下

按此足太阳少阴厥阴手太阴药也

本事方羊肝丸

兔丝子 车前子 麦门冬 决明子 茯苓五味 枸杞子 茺蔚子 苦葶苈 蕤仁 地肤子 泽泻 防风 黄芩 杏仁【炒】 细辛 桂心【各一两】 青箱子【一两】 熟地黄【一两半】 白羯羊肝【只用于肝一片薄切新瓦上炒乾】

右为细末炼蜜为丸如梧子大每服三四十丸温水下日【阙】

按此足太阳少阴手太阴少阴药也

秘方拨云退翳丸皇统年间医官刘昌祖传于世瓜蒌根 枳实 甘草【炙】 蔓荆子【焙】 薄荷【各半两】 川芎 木贼【浸一宿焙】 蜜蒙花 荆芥穗 地骨皮 羌活 白蒺藜【各一两】 甘菊花【一两】 蛇退 黄连【各三钱】 川椒【七钱半炒去目】 当归【一两半酒浸焙乾】 蝉退【三钱】

右为细末炼蜜为丸每两作十丸每服一丸食後临卧日进三服翳者米泔水下睛暗当归汤下内障木香汤下

按此足太阳厥阴手少阴药也然翳膜之疾有气血虚实或夹痰热七情六淫或阴火动湿热致者种种不同皆宜求责但已上法不能以尽病情之变学者宜扩充焉

点洗诸方

局方汤泡散 治肝经风热上壅眼目赤澁睛疼多泪

赤芍 当归 黄连【各等分】

右为末每二钱汤顿调热洗日三五次御药院方加荆芥

三因立胜散 治风热攻眼隐澁羞明肿痛

黄连 秦皮 防风 黄芩【等分】

右?咀水煎热用新羊毫笔蘸刷洗眼

金露膏除昏退翳截赤定疼

蕤仁【槌碎】黄丹【各一两】黄连【半两】蜜【六两】

右先将黄丹炒令紫色入蜜搅匀下长流水四升以嫩柳枝五七茎一把定搅之次下蕤仁候滚十数沸又下黄连用柳枝不住手搅?至升七八合罩篱内倾药在纸上慢慢滴之勿令尘污如有瘀肉加硃砂末一钱上火上慢开入前膏子内用

龙木论云患伤寒热病後切不可点恐损眼也斯言可以为药禁云

宝监春雪膏 治风热上攻眼目昏暗痒痛癰澁难开多眵泪羞明疼痛或生翳膜

黄连【四两剉用童便二升浸一宿去连用淬甘石】好黄丹【六两水飞】硃砂【一钱细研水调在盏内顿乾为度】白丁香【五分】乳香 当归【各三钱】麝香轻粉【各少许】乌鱼骨【烧存性三钱】南芦甘石【十二两淬便汁浸】

右各研另贮先用好蜜一筋四两炼去蜡却下甘石末不住手搅次下丹次下诸药末不住手搅至紫金色不粘手为度掐作錠子每用一粒新水磨化时时点之忌酒湿面荞麦

拔萃方?药 治偏头疼眼疾

苍耳头 薄荷叶 盆硝 石膏【各一钱乱文者】乳香 华细辛 贯芎【各五分】

右为极细末早午夕三时?鼻

宝监方无苍耳乳香细辛有荆芥桔梗

蟾光膏 治远年病目不通道路退去云膜须用十二月开成日合

白砂蜜【四两用隔年葱根去须皮切短与蜜一同?去白膜候葱熟为度以绵滤淨纸取蜡面】黄丹 蜜陀僧【各水飞三钱生用】芦甘石【火煨五钱水飞】

已上三味研极细倾入前蜜中桃柳无节者各一枝搅匀

川芎【半两】当归 赤芍 黄连【去芦淨二两】杏仁【汤泡去皮尖各半两】秦皮

诃子皮 防风 石膏 玄精石 井泉石 无名异 玄参 代赭石 石决明

已上十味各三钱?咀用雪水或长流水五升於银器内?至二升滤去滓淨再?至一升倾入前药蜜内银器内慢火?紫金色时再下後药勿令过火乳香 没药 琥珀 朱砂 蕤仁【各三钱】

已上五味先乾研极细入蕤仁研细水飞澄清极细方倾入前药一同复?以筋点药於水中不散为度勿令过与不及取下於土中埋七日取出置於银器或磁器中如法收贮便再添入後细药以桃柳枝搅匀

南鹏砂 珍珠 龙脑 珊瑚枝【各一钱】麝香【五分】右五味研极细入药中封定如有取不尽药用淨水斟酌洗渲熬过另於洗眼或膏子稠了倾些小调解

灸雀目疳眼法

宝监云小儿雀目夜不见物灸手大指甲後一寸内廉横文头白肉际灸一炷如小麦大

小儿疳眼灸合谷二穴各一壮炷如小麦大在手大指次指两骨间陷者中

按灸法详见资生等经兹不备録

附东垣诸先生治法

拨云汤 治法见前东垣先生治徐总管条

黄芪【一分】细辛叶【五分】柴胡【七分】生姜【五分】荆芥穗【一钱】羌活防风【各一钱半】藁本 生甘草 升麻【各一钱】葛根

川芎【各五分】知母 归身【各一钱】黄蘗【一钱半】

作一服水煎稍热服食後

助阳活血汤 治眼发之後犹有上热白睛红上壅无疼痛癰澁难开多眵泪

防风 黄芪【各五分】炙甘草【五分】蔓荆子【二分】归身【酒制五分】白芷【三分】升麻【七分】柴胡【五分】

作一服水煎临卧稍热服

神効明目汤 治眼棱紧急致倒睫拳毛损目及上下睑赤烂睛赤疼痛昏暗冷泪常流夜则眼

澁难开眇淚皆满眼

葛根【一钱半】甘草【炙二钱】防风【一钱】蔓荆子【五分】细辛【二分】

一法加黄芩【一钱】

作二服水煎临卧稍热服

广大重明汤 治两目脸皆焮热赤肿作痛楞生疮多眇泪癰澁不能开视及眼脸痒搔之至破者并皆治之草龙胆【酒炒】防风 生甘草 细辛【各一钱】

各杵如麻豆大内甘草不剉只作一定先以水一碗半煎草龙胆一味至一半再入余三味煎至少半碗滤去滓用清带热洗以重汤坐令热日用五七次每洗毕合目须臾如努肉泛长及痒亦验

五秀重明丸 治翳膜遮睛癰澁昏花常服清利头目乾菊【开头五百朶】荆芥穗【五百穗】楮实子【五百粒】木贼【去节五百茎】川椒【五百粒炒去口】

为末炼蜜为丸弹子大每服一丸细嚼徐徐咽下

升阳柴胡汤

羌活 独活 甘草根 归身【各一两】熟地黄【一两】人参 黄芩 白术【各半两】泽泻【三钱】白芍药【一两】陈皮白茯苓 防风【各三钱】肉桂【五分】柴胡【一钱半】生地黄【酒炒半两】楮实子【酒拌半两】知母【酒制三钱夏月加至五钱】

每服五钱水煎稍热服食後另合一料炼蜜为丸如桐子大食远茶清送下五十丸每日与前药各一服如天气热甚加五味子三钱或五钱天门冬五钱更加芍药楮实子各五钱

芎辛汤 治两目昼夜癰澁难开羞明畏日目赤视物昏暗神效

芎藭【五分】蔓荆子【五分】细辛【二分】防风【一钱半】甘草 白芷【各一钱】

作一服水煎临卧稍热服

羌活退翳丸 治内障右眼小眦青白翳大眦微显白翳脑痛瞳子散大上热恶热大便时难小便如常遇天热暖处头痛睛胀能食日没後天陰则昏暗此证亦可服滋陰地黄丸

熟地黄【八钱】 生地黄【酒制】 归身【酒制焙】 黄蘗【制各半两】 川芎【三钱】 芍药【一两二钱】 防己【二钱酒制】 知母【三钱酒制】 茺蔚子【半两】 牡丹皮【三钱】 丹参【半两】 寒水石【一身生用】 柴胡【半两】 羌活【三钱】 黑附子【一钱炮】

为细末炼蜜为丸如小豆大每服五七十丸白汤送下随以食压之忌言语【已上俱见东垣试効方】

保命当归汤 治风热上攻瞳子散大

当归身【二钱】 黄芩【二钱】 黄连【一钱】 柴胡【一钱】 熟地黄【三钱】 芍药【二钱】 甘草【炙三钱】

分三服水煎临卧温服

瑞竹四神丸 治肾经虚损眼目昏花补虚益损及云翳遮睛

甘州枸杞子【一筋?色赤滋润者作四分用酒一杯润之】 一分川椒【一两同炒】 一分小茴香【一两同炒】 一分用芝麻【一合同炒】 一分独炒用

炒过将川椒等筛去不用再加熟地黄白术白茯苓各一两共为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服五七十丸空心温酒送下或加甘菊花一两【见医学纲目新增】

补肝散 治肝风内障不痛不痒眼见花发黄白黑赤或一物二形难辨

羚羊角 防风【各二两】 羌活 人参 车前子 茯苓 细辛 玄参 黄芩【各一两】

为末食後米饮调服一钱

简要补肝散 治肝虚目睛疼泪出不止筋脉痛及羞明怕日

夏枯草【四两】 香附子【一两】

为细末每服一钱茶清调下

羚羊角饮子 治绿翳内障头旋额痛眼内痛澁者羚羊角 防风 知母 人参 茯苓 玄参 桔梗【各二两】 细辛【三两】 黄芩 车前子【各一两】

为末每服三二钱水煎食後温服

腎臟風眼

四生散 治腎風上攻眼目作痒或作昏花

白附子 黃芪 獨活 蒺藜【各等分】

為末每服二錢用豬腰子一枚批開入藥濕紙包裹煨熟細嚼鹽湯下風癰酒下

小兒五臟目疾

天麻丸 治小兒肝疳風疳眼疳

青黛 黃連 天麻

五靈脂【去石】夜明砂【炒】川芎 芦荟【各一錢】龍胆草【酒拌炒焦】防風
蟬蛻【各錢半】全蝎 麝香【少許】乾蟾頭【二錢炙焦】

為末豬胆汁浸糕丸如麻子大每服十丸薄荷湯下

生犀散 治小兒心經虛熱目內淡紅

犀角【鎊末二錢】地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛【各一两】甘草【半兩】

為末每服二三錢水煎熟入犀角食後服

浮黃散 治小兒胃熱眼目作痛

藿香【七錢】山梔【一两】石膏【半兩】甘草【七錢五分】防風【四兩】

用蜜酒拌微炒為末每服二三錢水煎服

生熟地黃丸 治小兒疳蝕眼患閉合不開羞明畏日或生內障

生地黃【一两】熟地黃【一两】當歸【二錢半】麥門冬【去心半兩】枳殼【米泔洗
炒】防風 杏仁【去皮炙炒】甘草 赤芍藥【各二錢半】

為末每服三二錢黑豆七粒煎豆熟去查服

三味芦荟丸 治黑水凝翳內障不痛不痒微有頭旋脹澀者

芦荟 甘草【各一钱】 羚羊角【蜜炙二两】

为细末炼蜜为丸如梧桐子大空心茶清下十丸

九味芦荟丸 治三焦及肝胆经风热目生云翳或癰癤耳内生疮寒热作痛或肝火肌体消瘦
发热作渴饮食少思肚腹不调或肝疳口内生疮牙龈溃烂或牙齿蚀落颊颧腐烂发热口渴
饮食少用下部生疮等症芦荟【半两】 胡黄连 当归 龙胆草【酒浸炒】 芍药 川芎
羌活【各一两】 木香 甘草【炙各三钱】

右为末茯神糊丸麻子大每服五七十丸滚汤下

地黄丸 治小儿肝肾虚热眼目生翳或赤烂等症如变疳症当兼服芦荟肥儿二丸【详见家
居医录卷六】

熟地黄【搗碎秤八两酒拌杵膏】 山药【四两】 山茱萸肉【四两】 白茯苓泽泻
牡丹皮【各三两】

右各另为末入地黄膏和匀加炼蜜少许丸如梧桐子大量儿大小空心服

肥儿丸 治食积发热眼目生翳等症

黄连【炒】 羌活【炒】 神曲【炒】 麦芽【炒】

右各另为末等分水和丸量儿大小空心服

通顶散 治小儿脑热脑枕骨疼闭目不开或头风痛攢眉啼哭并赤目

川芎 薄荷【各半两】 茵陈 甘草【各四钱】 朴硝【三钱甜硝亦可】

为末用少许吹鼻中即效如要 喷加踑躅花一钱只用朴硝吹鼻亦止

一方用好坏臙脂子水调涂眼眶

决明散 治痘疹入眼

决明子【钱半】 赤芍药【钱半】 甘草【一钱】

为末每服一钱蜜水调服【已上方见小儿?珍方】

蜜蒙散 治小儿痘疹及诸毒入眼

蜜蒙花【钱半】青箱子【一钱】决明子 车前子【各五分】

为末羊肝一片破开掺药在内仍合之湿纸数重包裹灰中煨熟空心食之

通圣散 治小儿疮痘入眼及生翳障

白菊花【一两】绿豆皮【一两】谷精草【去根一两】

为末三岁一钱乾柿一枚生粟米泔一盞同煎候泔尽将柿去蒂核不时食之日用二三枚近者五七日远者半月全効

蛤粉散 治小儿疮痘入目

谷精草 蛤粉【各等分】

为末三岁一钱猪肝二两批开掺药在内以竹叶包裹以线束定水一碗煮熟入磁瓶内薰眼至温取食之

蛇皮散 治小儿疮痘入目成翳

括萎根 蛇皮【炙黄等分】

为末三岁一钱羊子肝一片批开入药末在内以线束定米泔水煮熟食之

蝉蜕散 治小儿癰疮入眼半年以里者一月取效猪悬蹄甲【二两礮子内盐泥固济烧存性】蝉殼【一两】羚羊角【一分】

为末三岁一钱猪肝汤调下食後服日三服一年之外难治

二粉散 治小儿斑疮入眼

轻粉【五分】粉霜【一钱】

右研匀用绵裹如人患左眼塞入左耳内患右眼塞入右耳内所患眼便开得其疮自愈【已上方见全婴集】

海藏云东垣先生尝治癰後风热毒翳膜气障遮睛以泻青丸治之大効初觉易治保命集云

非癰後翳膜亦能治之浮青丸減大黃一半用之【已上方見醫學綱目】

羌菊散 治小兒肝臟壅熱眼生浮翳

羌活 防風 山梔【各一分】 甘草 菊花 白蒺藜【炒去尖各半兩】

爲末三歲五分食後蜜湯調下日三服

二草散 治小兒疳眼睛疼并赤眼腫痛

甘草 龍胆草【酒炒】 當歸 細辛【各一錢】

爲末三歲一錢水半盞砂糖少許煎三分食後服三黃丸亦治疳赤眼若因浮痢後疳眼昏澁大便不實者用六神丸六甲丸并暖疳藥

鷄肝散 治小兒疳眼不赤不腫不疼但開畏明光此藥治之

川烏【大者去皮一枚生】 好壞子【一字】

爲末五歲一錢雄鷄肝一具淨洗去筋膜竹刀薄切開摻藥在內箬葉包裹麻皮扎定用米泔水半盞磁器中煮熟切作片空心臨冷食之將煮肝湯送下又有腦熱閉目鼻內乾燥用通頂散治之【方見前】

小兒雀盲眼

還明飲 治小兒每至夜不見物名曰雀目

夜明沙 井泉沙 谷精草 蛤粉【各等分】

爲末煎黃蜡丸鷄豆肉大三歲一丸豬肝一片切開置藥於內麻皮扎定沙餅內煮熟先薰眼後食之

合明散 治小兒雀目至夜不見物

楮實子 覆盆子【酒浸】 車前子【酒蒸】 石斛【各兩】
沉香【別研半兩】 青鹽【別研半兩】

爲末煉蜜爲丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下

小儿肝脾等眼疾

养肝丸治小儿肝血不足眼目昏花或生眵泪

当归【酒浸】车前子【酒蒸焙】防风【去芦】

白芍药 熟地黄【酒蒸杵膏】?仁【别研】

川芎 楮实子【各等分】

为末炼蜜为丸如桐子大每服七十丸滚汤下不拘时服

车前子散治小儿肝经积热上攻眼目额逆生翳血灌瞳子羞明多眵

蜜蒙花 羌活 菊花 粉草

白蒺藜 草决明 车前子【炒】 黄芩

龙胆草【洗净各等分炒】

为末每服二钱食後饭汤调服【已上四方见袖珍方】

草龙胆散治小儿暴赤火眼昼夜澁痛作肿泪多

草龙胆 木贼 荆芥 菊花

防风 草决明【半生半炒】 甘草【各等分】

每服二钱水煎温服痛甚加羌活乳香

明目饮治小儿脾蕴热肝受风邪致两目羞明经久不愈

山梔仁 香附子【净各一两】 夏枯草【半两】

每服二钱入蜜一匙水煎服【已上方见治幼心新书】

飞丝尘垢入目

治飞丝入目用头垢点入目中即出神效

飞丝入眼用柘树浆点了用绵裹筋头蘸水於眼上缴拭涎毒

又方飞丝入目以火麻子一合杵碎井花水一碗浸搅却将浸水中涎抹自出神效

一方茄子叶杵碎加麻子法尤妙

丹溪飞丝落入眼红肿如眯痛澁不开鼻流清涕用京墨浓磨以新笔涂入目中闭目少时以手张开其丝自成一块看在眼白上却用绵轻轻拭出则愈如未尽再治眯目盐与?置水中浸之视水其查立出【孙真人方】千金活稻麦芒入眼以新布覆眼上将蛭螬从布上摩之其芒自着布上

山居物落眼中用新笔蘸水缴之

又方浓研好墨点立出

薛氏医案卷九

卷十

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷十

明 薛己 撰

口齿类要

茧唇一

内经云脾气开於口又云脾之荣在唇盖燥则乾热则裂风则瞶寒则揭若唇肿起白皮皱裂如蚕茧名曰茧唇有唇肿重出如茧者有本细末大如茧如瘤者或因七情动火伤血或因心火传授脾经或因厚味积热伤脾大要审本症察兼症补脾气生脾血则燥自润火自除风自息肿自消若患者忽略治者不察妄用清热消毒之药或用药线结去反为翻花败症矣

治验

州守刘克新患茧唇时出血水内热口乾吐痰体瘦肾虚之症悉具用济陰地黄丸年许而愈

一儒者因劳役感暑唇生疮或用四物加黄柏知母之类而愈後复作彼仍用前药益甚腹中陰冷余用补中益气汤加茯苓半夏治之而愈

儒者杨国华因怒唇口两耳肿痛寒热余谓怒生热热生风用柴胡山梔散数剂而愈

一男子素善怒唇肿胀服清胃等药时出血水形体骨立余用补中益气加半夏茯苓桔梗月余唇肿渐消元气渐复又以四物加柴胡炒梔丹皮升麻甘草数剂乃去梔加参术而痊

一妇人怀抱久鬱或时胃口嘈辣胸膈不利月水不调而衰少日晡发热食少体倦唇肿年余矣余用归脾汤加姜汁炒黄连山梔少佐吴茱萸嘈辣?去饮食少进乃去黄连加贝母远志胸膈通利饮食如常又用加味逍遥散归脾汤间服百余剂月水调而唇方愈

一妇人怀抱久鬱患茧唇杂用消食降火虚症悉具盗汗如雨此气血虚而有热也用当归六黄汤内黄芩连栢俱炒黑二剂而盗汗?止乃用归脾汤八珍散兼服元气渐复更以逍遥散归脾汤间服百余剂而唇亦瘥一妇人唇裂内热二年矣每作服寒凉之剂时出血水益增他症

余用加味清胃散而愈後因怒唇口肿胀寒热而呕用小柴胡加山梔茯苓桔梗诸症顿愈复用加味逍遥散而康

一妇人善怒下唇微肿内热体倦用化痰药食少作呕大便不实唇出血水用理气消导胸膈痞满头目不清唇肿经闭用清胃行血肢体愈倦发热烦躁涎水涌出余曰此七情损伤肝脾误行剋伐所致遂用济生归脾汤食进便实用加味逍遥散肿消热退用补中益气汤脾健涎止後因怒寒热耳痛胸膈胀闷唇焮肿甚此怒动肝火而伤陰血用四物合小柴胡加山梔顿愈又因怒脇乳作胀肚腹作痛呕吐酸涎饮食不入小水不利此怒动肝木而剋脾土用补中益气加川芎芍药而愈又劳役怒气饮食失节发热喘渴体倦不食下血如崩唇肿焮甚此肝经有火不能藏血脾经气虚不能摄血用补中益气加炒黑山梔芍药丹皮而愈

一男子内热作渴咳唾痰涎大便乾澁自喜壮实问治於余余曰此脾肾陰虚阳旺之症当壮水之主不信自服二陈芩连之类次年下唇渐肿小便赤濇执守前药唇出血水大便黑块小便淋?请余往治余曰大便结黑小便淋?肝肾败也唇口肿白脾气败也辞不赴竟歿

一妇人月经不调两足发热年余後而身亦热劳则足腿酸疼又年余唇肿痛裂又半年唇裂血出形体瘦倦饮食无味月水不通唇下肿如黑枣余曰此肝脾血虚火症彼不信用通经等药而死

一妇人善怒唇肿或用消毒之药唇胀出血年余矣余曰须养脾胃滋化源方可愈彼执用前药状如翻花瘤而死

口疮二

口疮上焦实热中焦虚寒下焦陰火各经传变所致当分别而治之如发热作渴饮冷实热也轻则用补中益气汤重则六君子汤饮食少思大便不实中气虚也用人参理中汤手足逆冷肚腹作痛中气虚寒也用附子理中汤晡热内热不时而热血虚也用八物加丹皮五味麦门发热作渴唾痰小便频数肾水亏也用加減八味丸食少便滑面黄肢冷火衰土虚也用八味丸日晡发热或从腹起陰虚也用四物参术五味麦门不应用加減八味丸若热来复去昼见夜伏夜见昼伏不时而动或无定处或从脚起乃无根之火也亦用前丸及十全大补加麦门五味更以附子末唾津调搽涌泉穴若槩用寒凉损伤生气为害匪轻

治验

秋官赵君言口舌生疮劳则体倦发热恶寒此内伤气血之症用补中益气加五味麦门而愈

进士刘华甫口舌生疮午前热甚脉数而有力用清心莲子饮稍愈更以四物二连汤全愈後因劳役日晡发热脉数而无力用四物加参术柴胡少瘥但体倦口乾再用补中益气汤而愈

武库刘君口舌生疮口乾饮汤乃胃气虚而不能化生津液也用七味白术散而痊

廷评曲汝为口内如无皮状或咽喉作痛喜热饮食此中气真寒而外虚热也用加减八味丸而愈

儒者费怀德发热口舌状如无皮用寒凉降火药面赤发热作呕少食痰涎自出此脾胃复伤虚寒而作也用附子理中汤以温补脾胃用八味丸补命门火乃愈一男子口糜烂脉数无力此血虚而有火用四物加茯苓白术少用黄柏知母治之而愈

地官李孟卿子新婚口舌糜烂日晡益甚用八珍汤加五味麦门而口疮愈更用加减八味丸而元气实一男子唇舌生疮口苦作呕小便淋瀝此肝脾火动以小柴胡加山梔酸枣仁远志麦门诸症渐愈但晡热体倦用四物柴胡山梔而愈又加白术茯苓炙草而安一儒者口苦而辣此肺肝火症先以小柴胡加山梔胆草茯苓桑皮而渐愈更以六君加山梔芍药而全瘥若口苦脇胀小便淋?此亦肝经之病用六味丸以滋化源

一男子口臭牙龈赤烂腿膝痿软或用黄柏等药益甚时或口鹹此肾经虚热余用六味丸悉瘥

一妇人口苦脇胀用小柴胡山梔黄连少愈更以四君子加芍药当归柴胡而瘥

一妇人每怒口苦发热晡甚以小柴胡合四物二剂更以四物加柴胡白术茯苓丹皮而愈

一妇人每怒则口苦兼辣头痛脇胀乳内刺痛此肝肺之火用小柴胡加山梔青皮芍归桑皮而安後劳兼怒口复苦经水顿至用四物加炒芩炒梔炒胆草一剂更以加味逍遥散而康

齿痛三

齿者肾之标口者脾之窍诸经多有会於口者齿牙是也徐用诚先生云齿恶寒热等症本手足阳朋经其动摇脱落本足少陰经其虫疳龈肿出血痛秒皆湿热胃火或诸经错杂之邪与外因为患治法湿热甚而痛者承气汤下之轻者清胃散调之大肠热而龈肿痛者清胃散治之重则调胃丸清之六鬱而痛者越鞠丸解之中气虚而痛者补中益气汤补之思虑伤脾而痛者归脾汤调之肾经虚热而痛者六味丸补之肾经虚寒而痛者还少丹补之重则八味丸主之其属风热者独活汤大寒犯脑者白芷散风寒入脑者羌活附子汤病症多端当临症制宜

治验

宗伯毛三江胃经虚热齿牙作痛用补中益气加熟地丹皮茯苓芍药寻愈

廷尉张中梁齿动或用清胃散肢体倦怠饮食少思牙齿作痛余曰此脾肾亏损用安肾丸补中益气汤兼服外用羌活散而愈或牙根溃烂如喜寒恶热者乃胃血伤也用清胃散若恶寒喜热者胃气伤也用补中益气汤

杨考功齿痛作渴属脾胃虚弱陰火炽盛用补中益气加酒炒黑黄柏四剂又服加减八味丸诸症顿愈又用补中益气汤而全愈

王侍御齿摇龈露喜冷饮食此胃经湿热先用承气汤以退火又用清胃散以调理而齿固继用六味丸以补肾水羌活散以祛外邪而寻愈

王吏部患齿痛或用祛风等剂更加寒热体倦懒食欲呕彼以火盛余曰病因元气不足前药复伤遂用补中益气加茯苓半夏元气复而诸症愈

郭职方善饮齿痛腮颊焮肿此胃经湿热用清胃散加乾葛荆防而愈

郑吏部仲冬牙痛连脑此肾经风寒所犯用羌活附子汤一服即愈此症不问冬夏肾虚者多患之急用此药可瘳缓则不救

朱工部午後有热遇劳遗精其齿即痛此脾肾虚热先用补中益气送六味丸更以十全大补汤而愈

党吏部齿根肿痛焮连颧颊此胃经风热用犀角升麻汤即愈

表兄顏金宪牙痛右寸後半指脉洪而有力余曰此大肠积热当用寒凉之剂自泥年高服补陰之药呻吟彻夜余与同舟赴京煎凉膈散加荆防石膏与服一锤即愈

大尹余时正素善饮齿常浮痛腹痛作泻此酒积伤脾食後用清胃散食前用解醒汤而愈

膳部鍾复斋每劳心则齿缝胀而不能咀嚼此元气虚弱先用补中益气汤而痊更用十全大补汤虽劳不作儒者柴济美善饮牙蛀不生或时作痛用桃仁承气汤二剂又以清胃散加山梔葛根外搽升麻散其牙复出一男子晡热内热牙痛龈溃常取小虫此足三陰虛火足阳明经湿热先用桃仁承气汤二剂又用六味地黄丸而愈

一男子患齿痛饮食难化大便不实此脾肾不足用还少丹而愈

一男子每足发热牙即浮痛此足三陰虛火用加减八味丸而不复作

一男子齿浮作痛耳面黧色口乾作渴日晡则剧此脾虚弱也用补中益气汤加减八味丸而愈

一妇人因怒齿痛寒热作呕用清胃等药益甚此肝火伤胃寒药复伤用六君子加芍药柴胡山梔而愈一妇人胃中嘈辣甚则热痛後患齿痛此胃火生痰也用二陈加芩连下越鞠丸而瘳

一妇人发热齿痛日晡益甚月水不调此脾经血虚所致用逍遥散加升麻寻愈後因怒复痛仍以前药加川芎而痊

一妇人因怒牙痛寒热用小柴胡加芎归苓术山梔而疼痛止用加味逍遥散而寒热退

荆妇每产後齿根皆动必踰日乃止後复怀妊临月时立斋翁偶至言及此症留十全大补汤二剂令产後煎服齿不复动矣果如言愚奇其神异敢缀数言附之卷末後有作者皆得观法焉则先生之德垂之永久矣後学吴江史羊生顿首谨书

貌云叔父芝岩先生齿根浮肿痛不可忍命貌求治於立翁先生翁曰齿痛龈浮而不动属於坤土乃足阳明脉所贯络也因胃有湿热故尔用清胃散加山梔玄参进一服应手而瘳貌谨记其梗槩以附医録将俾後之学医者有所准则云嘉靖丁未仲秋晚眷生郁貌顿首拜书

舌症四

经言舌乃心之苗此以窍言也以部分言之五臟皆有所属以症言之五臟皆有所主如口舌肿痛或状如无皮或发热作渴为中气虚热若眼如烟触体倦少食或午後益甚为陰血虚热若咽痛舌疮口乾足热日晡益甚为肾经虚火若四肢逆冷恶寒饮食或痰甚眼赤为命门火衰若发热作渴饮冷便闭为肠胃实火若发热恶寒口乾喜汤食少体倦为脾经虚热若舌本作强顙颊肿痛为脾经湿热若痰盛作渴口舌肿痛为上焦有热若思虑过度口舌生疮咽喉不利为脾经血伤火动若恚怒过度寒热口苦而舌肿痛为肝经血伤火动病因多端当临时制宜凡舌肿胀甚宜先刺舌尖或舌上或边傍出血泄毒以救其急惟舌下廉泉穴此属肾经虽宜出血亦当禁针慎之

治验

工部徐检斋口舌生疮喜冷饮食或咽喉作痛大便秘结此实热也用清凉饮治之而愈

仲侍御多思虑舌作痛用苦寒降火药发热便血盗汗口乾肢体日瘦此脾气亏损血虚之热用加味归脾汤而愈

一男子不慎酒色冬喜饮冷舌常作痛小便频数舌裂痰盛此肾水枯涸陰火无制名下消用加減八味丸而愈若寸脉洪数有力多饮少食大便如常口舌生疮大渴引饮者名上消是心移热於肺用白虎汤加人参治之若关脉洪数有力喜饮冷小便黄大便硬而自汗者名中消调胃承气汤下之

学士吴北川过饮舌本强痛言语不清痰气涌盛肢体不遂余作脾经湿痰治之而愈

秋官郑【缺】

过饮舌本强痛言语不清此脾虚湿热用补中益气加神麴麦芽乾葛泽泻而愈

一膏粱之人患舌痛敷服皆消毒之药舌肿势急余刺舌尖及两傍出紫血杯许肿消一二更服犀角地黄汤一剂翌早复肿胀仍刺出紫血杯许亦消一二仍服前汤良久舌大肿又刺出黑血二杯许肿渐消忽寒热作呕头痛作晕脉洪浮而数此邪虽去而真气愈伤与补中益气倍用参芪归术四剂而安又数剂而愈

一妇人善怒舌痛烦热用降火化痰等药前症益甚两脇作胀服流气饮肚腹亦胀经行不止此肝虚不能藏血脾虚不能统血用加味归脾加麦门五味而愈若因暴怒而患前症用小柴胡加丹皮山梔血虚者用八珍加参术柴胡山梔丹皮虚甚须加炮姜

一男子舌下牵强手大指次指不仁或大便秘结或皮肤赤晕此大肠血虚风热用逍遥散加梔角秦艽而愈一妇人冬患脑疽肿痛热渴脉洪数实余用清热消毒散溃之而愈次年三月其舌肿大偏身患紫疔如葡萄不计其数手足尤多各刺出黑血服夺命丹七粒出臭汗疮热益甚便秘二日与大黄芩连各三钱升麻白芷山梔薄荷连翘各二钱生草一钱水煎三五沸服大小便出臭血甚多下体稍退乃磨入犀角汁再服舌本及齿缝出臭血诸毒乃消更与犀角地黄汤而愈

一妇人善怒舌本强手臂麻余曰舌本属脾土肝木剋之故耳治以六君子加柴胡芍药而愈

先兄口舌糜烂痰涎上壅饮食如常遇大风欲仆地用补中益气汤及八味丸即愈间药数日仍作每劳苦则痰盛目赤漱以冷水舌稍愈顿间舌益甚用附子片噙之即愈服前二药诸症方痊

喉痹诸症五

喉痹谓喉中呼吸不通语言不出而天气闭塞也咽痛噤痛者谓咽喉不能纳唾与食而地气闭塞也喉痹咽噤痛者谓咽喉俱病天地之气皆闭塞也当辨内外表里虚实而治之若乡村所患相同者属天行运气之邪治法当先表散大忌酸药搽点寒药下之恐鬱其邪於内而不得出也其病有二

其一属火经云少阳所致为喉痹又云少阳司天之致三之气炎暑至民病喉痹用仲景桔梗汤或面赤斑者属阳毒用阳毒诸方汗之可也

其二属陰湿经云太陰之胜火气内鬱成喉痹又云太陰在泉湿淫所胜病噤肿喉痹用活人半夏桂枝甘草汤或面青黑者属陰毒法可汗之

萧山先生云喉痹不恶寒及寸脉大滑实於关尺者皆属下症宜硝石青黛等寒药降之或胆?等酸剂收之韩祗和先生云寸脉大於关尺者宜消阳助陰东垣先生云两寸脉实为阳盛陰虛下之则愈故予遵此法以治前症如鼓应桴也

陈无择治喉痹不语用小续命加杏仁七个煎服甚效本草治中气急喉痹欲死白殭蚕为末姜汁调下立愈丹溪云殭蚕属火而有土与水得金气而成治喉痹者取其火中清化之气以从治相火散浊逆结滯之痰陈藏器每治臟寒咽闭吞吐不利用附子去皮脐炮裂以蜜涂炙蜜入内含之勿咽云

孙押班治都知潘元从喉闭孙以药半钱吹入喉中少顷吐出脓血立愈潘诣孙谢曰大急之患非明公不能救救人之急非药不能疗赠金百两愿求方以济非常之急孙曰用猪牙皂角白?黄连各等分置新瓦上焙乾为末既授其方不受所赠谦甫云戊辰春乡村病喉痹者甚衆盖前年终之气及当年初之气二火之邪也用甘桔汤加芩连半夏殭蚕鼠粘子葛根等剂发之虚加参芪当归之类水浆不入先用解毒雄黄丸醋化灌之痰出更灌姜汁服前药无不神验若用胆?酸寒点过者皆不治盖邪鬱不出故也以上治法内经秘旨救生之良法故録之见医学纲目

治验

廷评张汝翰患喉痛日晡益甚此气血虚而有热用八珍汤而愈後每入房发热头痛用补中益气加麦门五味及六味丸常服後不复作

秋官叶常蕃素陰虚因怒忽喉肿寒热头痛项强目直小便自出此皆肝火之症肝主筋膜火主肿胀火旺则血涸筋挛目系紧急颈项如拔陰挺痿痹则小便自遗遂刺患处出毒血用四物柴胡山梔玄参甘草而苏再用六味丸料以生肝血滋肾水诸症悉愈

太守叶【缺】咽喉肿痛痰涎不利手足发热喜冷饮食用清咽利膈汤二剂不应刺少商穴喉少寬痰从鼻出如胶患处出紫血稍寬至七日咳出秽脓而愈

一儒者三場毕忽咽喉肿闭不省人事喘促痰涌汗出如水肢体痿软脉浮大而数此饮食劳役无根虚火上炎用补中益气加肉桂一剂顿苏

义士顾克明咽喉作痛至夜发热此肝肾陰虚之热用四物加酒炒黑黄栢知母麦门五味治之而愈後因劳咽喉肿闭刺患处出血用桔梗汤吐痰而消至仲夏乾咳声嘶作渴发热日晡足热用滋肾丸加减八味丸间服三月余喜其年富谨疾得愈

喉痛六【附乳蛾悬痛杨梅疮】

丹溪先生云咽痛属血虚用四物加竹?陰虚火上炎者必用玄参气虚加人参竹?又云咽喉

肿痛有陰虚阳气飞越痰结在上者脉必浮大重取必澁去死为近宜人参一味浓煎细细饮之如作实症治之祸在反掌此发前人未发救无穷之夭枉余更以上焦风热积热及膀胱陰虚等症一二於後

治验

通府李朝用咽喉肿痛口舌生疮此上焦风热先用荆防败毒散二剂喉痛渐愈又以玄参升麻汤口舌遂愈地官黄比盘喉痛作渴饮冷大便不通此上下表里实热用防风通圣散治之顿愈

地官胡诚甫咽喉燥痛此肾经膀胱虚热用四物加黄栢知母玄参四剂少愈更以人参固本丸一剂不复发职方卢抑斋咽喉肿痛两目蒙昧小便赤澁此膀胱湿热用四苓散加黄栢黄连知母茵陳防己治之而顿愈又用六味地黄丸而痊

儒者王文远咽喉肿痛口舌生疮劳则愈甚余为脾肺气虚膀胱有热以补中益气加玄参酒炒黑黄栢知母稍愈乃去黄栢知母加山茱山药乃痊

一儒者年踰五十咽喉痛服凉药或过劳痛愈甚此中气虚热以补中益气加炒黑芩连四剂而愈乃去芩连又数剂全愈

一儒者脚发热则咽喉作痛内热口乾痰涎上涌此肾经亏损火不归经用补中益气加麦门五味及加減八味丸而全愈

一老人咽喉痛小便数而赤日晡尤甚此膀胱陰虚当滋化源以补中益气加酒炒黑黄栢知母二味四剂咽痛稍可乃去二味加以山茱山药麦门五味顿愈一男子咽喉肿痛药不能下针患处出紫血少愈以破棺丹噙化更用清咽利膈散而愈

一男子素善饮咽喉作痛内热作渴小便不利饮食如常此膀胱积热用四苓散加茵陳大黄四剂诸症渐退又用清心莲子饮而安

一星士劳而入房喉痛渐闭痰涎上涌四肢乍热此陰虚阳气飞扬用补中益气加附子煎灌而愈

宪副姜时川癸卯冬就诊于余右寸浮数有力口中有疮余曰此胃火传於肺也当薄滋味慎起居甲辰秋复就诊尺脉洪数而无力余曰此肺金不能生肾水宜静养以滋化源彼云今喉间及耳内不时燥痛肢体不时发热若无根之火殒无疑矣後谓刘古峡云立斋谓我之病可疑至乙巳孟春古峡谓余曰姜公之病已如尊料遂同余往视喉果肿溃脉愈洪大或用泻火之药反速其殁

云间吴上舍年踰五十咽喉肿痛或针去血神思虽清尺脉洪数而无伦次按之微细如无余曰有形而无痛阳之类也当峻补其陰今反伤陰血必死已而果歿盖此症乃肾气亏损无根之火炎上为患惟加減八味丸料煎服使火归源庶几可救

府庠归云桥之内产後患喉痛服清热等剂益甚余诊之属膀胱经血虚也盖膀胱之内脉上行至颈而还用八珍汤加牡丹皮柴胡酒炒黑黄栢二剂而愈

嘉靖辛丑仲秋大方凭几执笔就书咽喉间偶有痰涎遂左顾吐之口未及合而颈骨如摧莫能转视至夜增剧夜发盗汗手足麻冷卧起必藉人扶持稍动则痛连心腹苦楚万状不可胜数如是者三四日得立斋先生视之曰此怒动肝火胆得火而筋挛缩以六味地黄丸料山梔子柴胡以清肝火生胆血一剂未竟日而谈笑举动一一如常矣接见宾从俱以为前日之病者罔也先生之神妙类多若此惜乎不肖踈怠蹇拙不能尽述姑以其亲试者笔之以为明验耳吴门晚学生沈大方履文再顿首谨书

一妇人喉间作痛两月後而溃徧身筋骨作痛余以为杨梅疮毒先以萆薢汤数剂而平更以四物加萆薢黄芪二十余剂诸症悉退

一弥月小儿口内患之後延徧身年余不愈以萆薢为末乳汁调服母以白汤调服月余而愈余见保婴粹要一男子先患喉痛後发杨梅疮用轻粉等剂愈而复发仍服前药後又大发上腭溃烂与鼻相通臂腕数颗其状如桃大溃年余不斂虚症悉见余以萆薢汤为主兼以健脾之剂月余而安余见外科枢要

诸骨稻谷髮鯁七

治诸骨鯁用苧麻根杵烂丸弹子大将所鯁物煎汤化下

一方鱼骨鯁用细茶五倍子等分为末吹入咽喉立愈一方以犬吊一足取其涎徐徐咽之即消

又方白萼花根捣烂取汁徐徐咽之不可着牙

治稻芒糠谷鯁喉将鹅吊一足取涎徐徐咽下即消治吞钉铁金银铜钱等物但多食肥羊脂诸般肥肉等味随大便而下

一方吞钱烧炭末白汤调服数匙即出 或服蜜升许或食茨菇其钱自化

治吞髮绕喉不出取自乱髮作灰白汤调服一钱治吞铁或针用饴糖半斤浓煎艾汁调和服之

一方磁石磨如枣核大鑽眼以线穿令吞喉间针自引出或吞银钱金铜铁磁石须陰阳家用验者

治诸鲠呪法八

子和云大凡鱼骨麦芒一切竹木刺鲠于喉间及髮绊不能下用道藏经中一呪法取东方无根水一碗先以左手结三台印将水置印上後将右手持一剑诀于水上虚书一龙字密呪九遍

呪曰吾从东方来路傍一池水水里一条龙九头十八尾问君治何物专用此间水连诵九遍患者饮之即愈

误吞水蛭九

治误吞水蛭食蜜即愈试以活蛭投蜜中即化为水屡验一书云井中生蛭以白马骨投之即无试之亦验夫蛭即蚂蝗也虽死为未见水复活人吞之为害不小治以前法无不愈者

诸虫入耳十

治百虫入耳用蓝汁灌之或葱汁尤良或绪肉少许炙香置耳孔边亦出或用细芦管入耳内口吸之虫随出蜒蚰入耳以盐少许搽耳内即化为水

蜈蚣入耳以鸡肉置耳边自出凡虫毒入腹作胀饮好酪二升许化为水而毒亦消矣

蛇入七窍及虫咬伤十一

凡虫入七窍劈开蛇尾纳川椒数粒以纸封之其蛇自出更间人参汤饮之或因酒食蒜以解内毒如被蛇咬食蒜饮酒更用蒜杵烂涂患处加艾於蒜上灸之其毒自解凡虫毒伤并效

男女体气十二

治腋气五更时用精猪肉二大片以甘遂末一两拌之挟腋下至天明以生甘草一两煎汤饮之良久泻出秽物须在荒野之处则可恐秽气传人故也依法三五次即愈虚弱者间日为之其他蜜陀僧胡粉之类皆塞窍以治其末耳

附方并注

清胃散 治胃火血燥唇裂或为茧唇或牙龈溃烂作痛

黄连【炒】生地黄 升麻【各一钱】牡丹皮【八分】当归【一钱二分】

右水煎服

加味清胃散 即前散加芍药柴胡治脾胃肝胆经热柴胡清肝散
治肝经怒火风热传脾唇肿裂或患茧唇

柴胡 黄芩【炒各一钱】黄连【炒】山梔【炒各七分】当归【一钱】川芎【六分】生地黄【一钱】升麻【八分】牡丹皮【一钱】甘草

右水煎服若脾胃弱去芩连加白术茯苓

济陰地黄丸 治陰虛火燥唇裂如茧

五味子 麦门冬 当归 熟地黄【自制杵膏】肉苁蓉 山茱萸【去核】乾山药 枸杞子 甘^廿菊花

巴戟肉【各等分】

右为末炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前白汤送下

归脾汤【一名济生归脾汤】治思虑伤脾血耗唇皱及气鬱生疮咽喉不利发热便血盜汗
晡热等症

人参 白术 茯苓 黄芪【炒】当归 龙眼肉 远志 酸枣仁【炒各一钱】木香
甘草【各三分】

右水煎服

加味归脾汤

即前方加柴胡丹皮山梔治思虑动脾火元氣损伤体倦发热饮食不思【阙】血牙疼等症

补中益气汤 治中气伤损唇口生疮或齿牙作痛恶寒发热肢体倦怠食少自汗或头痛身热
烦燥作渴气喘脉大而虚或微细软弱

人参 黄芪【炒】甘草【各钱五分】白术 当归 橘红【各一钱】柴胡 升麻【各五分】

右姜枣水煎服

羌活散 治风热传脾唇口皴皱或头痛目眩或四肢浮肿如风状

羌活 茯苓 薏苡仁【各等分】

右每服三五钱水煎入竹?一匙服

人参理中汤 治口舌生疮饮食少思大便不实或畏寒恶热作呕腹痛此中气不足虚火上炎

人参 白术 乾姜【炮】 甘草【炙各等分】

右每服五七钱或一两水煎服

附子理中汤 治症同上但四肢逆冷或呕吐泄泻附子 人参【各二钱】 茯苓
白芍药【各三钱】 白术【四钱】

右水煎服

香砂六君子汤 治口舌生疮服凉药过多以致食少作呕或中气虚热所致

人参 白术 茯苓 半夏 陈皮【各一钱】 甘草【炒六分】 藿香 宿砂仁【炒各八分】

右姜水煎

人参安胃散 治胃经虚热口舌生疮喜热饮食甘草【炙】 陈皮【各五分】 人参
白茯苓【各一钱】 黄芩【二钱】 黄连【三】 芍药【七分】

右水煎服

七味白术散 治虚热口舌生疮不喜饮冷吐泻口乾人参 白术 木香 白茯苓
甘草【炙】 藿香【各五分】 乾葛【一钱】

右水煎服

四君子汤 治口舌生疮脾胃虚弱饮食少思肚腹不利

人参 白术 茯苓【各一钱】 甘草【炙五分】

右姜枣水煎服

六君子汤 治胃气虚热口舌生疮或寒凉尅伐食少吐泻

人参 白术 茯苓【各一钱半】 陈皮 半夏 甘草【各一钱】

右姜枣水煎服

二陈汤 治脾胃虚弱口舌生疮或中脘停痰呕吐恶心饮食少思等症

陈皮 茯苓 半夏【各一钱半】 甘草【炙五分】

右姜枣水煎服

葛花解醒汤 治酒积口舌生疮或呕吐泄泻

白豆蔻 缩砂仁 葛花【各五分】 木香【二分】 青皮【二分】 陈皮 茯苓 猪苓 人参 白术
神麴【炒】 泽泻 乾姜【各三分】

右水煎服得微汗酒病去矣

龙胆泻肝汤 治口苦或生疮

柴胡【一钱】 黄芩【七分】 甘草 人参
天门冬【去心】 黄连【炒】 山梔【炒】 龙胆草【酒拌炒焦】 麦门冬
知母【各五分】 五味子【二分】

右水煎服

小柴胡汤 治肝胆经风热侮脾土唇口肿痛或寒热往来或日晡发热或潮热身热或怒而发
热脇痛甚者转侧不便两脇痞满或泻利咳 或吐酸苦水柴胡【一钱】 黄连【一钱半】
半夏 人参【各一钱】 甘草【炙五分】

右姜枣水煎服怒动肝火牙齿痛寒热加山梔黄连

梔子清肝散

治三焦及足少阳经风热口舌生疮或耳内作痒出水疼痛或胸间作痛或寒热往来柴胡
山梔 丹皮【各一钱】 茯苓 川芎 芍药 牛蒡子【炒】 当归【各七分】 甘草【五分】

右水煎服

人参败毒散【加防风荆芥名荆防败毒散】治一切表症疮疡痲痛发寒热或拘急头痛脉细有力者

人参 羌活 独活 柴胡 前胡 茯苓 川芎 桔梗 枳壳 甘草【各一钱】

右水煎服

夺命丹 治喉闭或疔疮发大毒或麻木或呕吐重者昏愦若疔毒牙关紧急用三五丸为末水调灌下有夺命之功

蟾酥【乾者酒化】轻粉【各五分】枯白? 寒水石【煨】铜绿乳香 没药 麝香【各一钱】朱砂【三钱】蜗牛【二十个另研无亦效】

右为细末用蜗牛或酒糊为丸如菉豆大每服一二丸温酒或葱汤下

东垣白芷汤 治大寒犯脑牙齿疼痛

麻黄 草豆蔻【各一钱】黄芪 升麻【各二钱】吴茱萸白芷【各四分】当归 熟地黄【各五分】藁本【三分】桂枝【二分半】羌活【八分】

右另为末和匀搽之

东垣牢齿散 治牙龈露肉牙疳肿痛或牙齿动摇欲落或牙齿不长牙黄口臭

升麻【四两】羌活 地骨皮【各一两】胆草【一两半酒浸】

右为末以温水漱口每用少许擦之

独活散 治风毒牙痛或齿龈肿痛

独活 羌活 川芎 防风【各五钱】细辛 荆芥薄荷 生地黄【各二钱】

右每服三五钱水煎漱口

谦甫加減泻白散 治膏粱醇酒劳心过度肺气有伤以致气出腥臭涕唾稠粘咽嗑不利口苦乾燥桑白皮【二钱】地骨皮 片黄芩 甘草【炙各一钱】知母【七分】五味子【十粒】麦门冬【五分】桔梗【一钱】

右姜枣水煎服

犀角升麻汤 治阳明经风热牙疼或唇颊肿痛犀角【镑】升麻 防风
羌活【各一钱】白附子【五分】川芎白芷 黄芩【各七分】甘草【三分】

右水煎熟入犀末服

玄参升麻汤 治心脾壅热口舌生疮或木舌重舌或两颊肿痛

玄参 赤芍药 升麻 犀角【镑】桔梗 贯仲黄芩【炒各一钱】甘草【五分】

右水煎服

二黄丸 治实热口舌生疮作渴喜冷或齿龈肿痛等症

黄芩 黄连 黄柏【各等分】

右为末水糊丸桐子大每服七八十丸白汤下

安肾丸 治肾虚牙痛腰疼

补骨脂【炒】葫芦芭【炒】茴香【炒】川练子肉【炒】续断【炒各三两】桃仁
杏仁【炒】山药 茯苓【各二两】

右为末蜜丸桐子大每服五十九空心盐汤下

八味丸 治肾气虚寒牙齿作痛面色黧黑精神憔悴脚膝无力饮食少思或痰气上升小便频
数齿不坚固或口舌糜烂畏饮冷水即後方每料加肉桂附子各一两

六味丸【加五味肉桂各一两名加減八味丸】治肾经虚热齿不固密或作疼痛或发热渴
淋痰气壅 头晕眼花咽燥唇裂腰腿痿软自汗盗汗便血诸血失瘖水泛为痰之圣药血虚
发热之神剂

茯苓【四两】熟地【八两杵膏】山茱萸【肉】乾山药【各四两】牡丹皮泽泻【各三
两】

右为末入地黄炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前滚汤下地黄须自制

滋肾丸

治肾经陰虚齿痛或苏蚀色黑日晡发热脚膝无力小便不利肚腹胀满【详见内科摘要】

肉桂【二钱】知母 黄栢【各酒炒二两】

右为末水丸桐子大每服二百丸空心白滚汤下

清心莲子饮 治口舌生疮烦躁作渴小便赤澁口乾便浊夜间安静昼则举发此热在血分

黄芩 石莲 茯苓 黄芩【炒】 柴胡 人参【各一钱】 麦门冬 地骨皮
车前子【炒】 甘草【各一钱半】

右水煎服

还少丹 治脾肾虚弱牙齿作痛或不坚固又补虚损生肌体进饮食之圣药

肉苁蓉 远志【去心】 茴香 巴戟【去心】 乾山药 枸杞子 熟地黄 石菖蒲
山茱萸【去核】 杜仲【去皮姜制】 牛膝 楮实子【炒】 五味子 白茯苓【各等分】

右为末枣肉并蜜丸桐子大每服七十丸温酒日三服

羌活附子汤 治冬月大寒犯脑令人脑齿连痛名曰脑风为害甚速非此莫能救

麻黄【去节】 黑附子【炮各三】 羌活 苍术【各五分】 黄芩【一分】 防风 甘草 升麻
白僵蚕【炒】 黄栢 白芷【各三分】 佛耳草【有寒 者用之如无不用】

右水煎服

十全大补汤 治气血俱虚牙齿肿痛或口舌生疮或恶寒发热自汗盗汗食少体倦或寒热作渴头痛眩晕或似中风之症

白茯苓 人参 当归 白术 黄芩
川芎 白芍药【炒】 熟地黄【生者自制】 甘草【炙各一钱】 肉桂【五分】

右姜枣水煎服

八珍汤 治气血俱虚口舌生疮或齿龈肿溃恶寒发热或烦躁作渴胸脇作胀或便血吐血盗汗自汗等症

人参 白术 白茯苓 当归 川芎 白芍药 熟地【各钱】 一甘草【炙五分】

右为枣水煎服

越鞠丸 治六鬱牙齒痛口疮或胸满吐酸饮食少思苍术【炒】神麴【炒】香附子 山楂 山梔【炒】 抚芎麦芽【炒各等分】

右为末水调神麴丸桐子大每服五七十丸滚汤下

四物汤【加牡丹皮柴胡山梔名加味四物汤】治血虚发热口舌生疮或牙龈肿溃或日晡发热烦躁不安或因怒而致

当归 熟地【各三钱】 芍药 川芎【各一钱】

右水煎服

当归补血汤 治口舌生疮血气俱虚热渴引饮目赤面红其脉洪大而虚重按全无

黄芪【炙一钱】 当归【酒制二钱】

右水煎服

元戎四物二连汤 治血虚发热口舌生疮或昼寒夜热当归 生地黄 白芍药 川芎 黄连 胡黄连【各一钱】

右水煎服

犀角地黄汤 治火盛血妄行或吐衄或下血

犀角【镑】 生地黄 白芍药 黄芩 牡丹皮 黄连【各一钱】

右水煎热入犀末服若因怒而患加柴胡山梔

当归六黄汤 治陰虚内热盗汗

当归 熟地黄【自制】 生地黄
黄芪【炒】 黄连【炒黑】 黄芩【炒黑】 黄栢【炒黑各一钱】

右水煎服

逍遥散 治血虚有热口舌生疮或口燥咽乾发热盗汗食少嗜卧

甘草【炙】 当归 芍药【炒】 茯苓 白术【炒】 柴胡【各一钱】

右水煎服

加味逍遥散 治肝脾有火血虚即前方加山梔丹皮 兼甫解毒雄黄丸
治纏喉风肿闭或卒倒死牙关紧急

雄黄【一钱】 鬱金【一分】 巴豆【十四粒去油皮】

右为末醋糊丸菉豆大用热茶送下七丸吐顽痰立苏末吐再服若死而心头犹热灌下更生

兼甫龙麝聚圣丹 治心脾客热咽喉肿痛或成痈不消或舌本肿胀口舌生疮

川芎【一两】 生地黄 犀角【镑】 羚羊角 琥珀 玄参连翘【各五钱】 人参 赤茯苓
马牙硝 片脑

麝香【各三钱】 桔梗 升麻【各五分】 铅白霜【五钱】 朱砂
牛黄【各二钱】 南硼砂【一两】 金箔【五十片】

右为末蜜丸龙眼大金箔为衣薄荷汤化下或噙咽之

拔萃桔梗汤 治热肿喉痹

桔梗 甘草 连翘 山梔 薄荷 黄芩【各一钱】

右入竹叶水煎服

无择玉屑无忧散 治喉风痰壅或口舌生疮或骨鲠不下

玄参 管仲 滑石 缩砂仁 黄连 甘草 茯苓 山豆根
寒水石【煨】 硼砂【各三钱】 荆芥穗【各五钱】

右为末每服一钱清水调下此药又去邪辟瘟止渴

甘桔汤 治咽喉肿痛

甘草【六钱】 苦梗【三钱】

右水煎服

白虎汤 治胃热作渴暑热尤效

知母 石膏【各二钱】 粳米【半合】

右水煎服

调胃承气汤 治中热大便不通咽喉肿痛或口舌生疮

大黄【一两】 甘草【一钱五分】 芒硝【四钱五分】

右每服五七钱水煎

桃仁承气汤【加当归一钱名当归承气汤】 治瘀血停滞腹内作痛或发热发狂大便秘结

桂枝 芒硝 甘草【炙各一钱】 大黄【二钱】 桃仁【五十粒去皮尖研】

右水煎空心服

清热补气汤 治中气虚热口舌如无皮状或发热作渴

人参 白术 茯苓 当归【酒拌】 芍药【炒各一钱】 升麻 五味子 麦门冬 玄参
甘草【炙各五分】

右水煎服如不应加炮姜更不应加附子

清热补血汤 治口舌生疮体倦少食日晡益甚或目濇

当归【酒拌】 川芎 芍药【各一钱】 熟地黄【酒拌一钱】

知母 五味子 麦门冬【各五分】 玄参【七分】 柴胡 牡丹皮【各五分】

右水煎服如不应用补中益气汤加五味治之

清热化痰汤 治上焦有热痰盛作渴口舌肿痛贝母 天花粉
枳实【炒】 桔梗【各一钱】 黄芩 黄连【各钱二分】 玄参
升麻【各七分】 甘草【五分】

右水煎服

升麻柴胡汤

芍药 柴胡 山梔子 升麻 木通【各一两】 黄芩 大青 杏仁【各五钱】 石膏

右每服四五钱水煎

凉膈散 治实热口舌生疮牙齿作痛或喉舌肿痛便溺秘赤或狂言妄语大便秘结

大黄 朴硝 甘草【各两】 一连翘【四两】 山梔 黄芩 薄荷叶【各一两】

右为末每服五七钱水煎服如未应当加之

防风通圣散 治风热炽盛口舌生疮大便秘结或发热烦躁疮毒作痒等症

防风 当归 川芎 芍药 大黄 芒硝 连翘 薄荷 麻黄 桔梗 石膏 黄芩【各一两】 白术
山梔子 荆芥【各二钱半】 甘草【二两】 滑石【三两】

右每服五七钱水煎或为末白汤调下

清咽利膈汤 治积热咽喉肿痛痰涎壅盛烦躁饮冷大便秘结

金银花 防风 荆芥 薄荷
桔梗【炒】 黄芩【炒】 黄连【炒各钱半】 山梔子【炒研】 连翘【各一钱】 玄参
大黄【煨】 朴硝 牛蒡子【研】 甘草【各七分】

右水煎服

金钥起 治喉闭喉风痰涎壅塞

焰硝【一两五钱】 硼砂【五钱】 脑子【一字】 白僵蚕【一钱】 雄黄【二钱】

右各为末以竹管吹患处痰涎即出如痰虽出咽喉不利急针患处以去恶血

润喉散 治气鬱咽喉闭塞

桔梗【二两五钱】 粉草【四钱】 草紫 荷花【四钱】 香附【三钱】 百药煎【一钱五分】

右为末敷口内

又方薄荷叶蓬砂各五钱冰片一钱为末吹患处甚效破棺丹【一名通关散】治咽喉肿痛

水谷不下

青盐 白矾 礞砂【各等】

右为末吹患处有痰吐出

小续命汤 治陰毒喉痹

麻黄【五分】 防风 芍药 白术 人参 川芎 附子【生】 防己 黄芩【各二分】 桂枝 甘草【各五分】

右水煎服

仲景半夏汤治伤寒喉中生疮不能发声

半夏 桂枝 甘草【各等分】

右每服七八钱水煎候冷细细咽之

萆薢散【一名换肌消毒散】 治杨梅疮不拘初起溃烂或发於舌间喉间并效

当归 白芷 皂角刺 薏苡仁【各二钱】 白藓皮 木瓜【不犯鉄器】 木通 金银花【各七分】 甘草【五】 萆薢【一名土茯苓又名冷饭团五钱】

右水煎服

清咽消毒散 治咽喉疮肿痰涎壅盛或口舌生疮大便秘结即荆防败毒散加芩连硝黄

人参固本丸 治肺气燥热小便短赤或肺气虚热小便澹滯如淋此治虚而有火之圣药也

生地黄【酒拌】 天门冬【去心】 麦门冬【去心各一两】 人参【五钱】 熟地黄【用生者酒拌铜器蒸半日】

右除人参为末余药捣膏加炼蜜少许丸桐子大每服五十丸空心盐汤或温酒下中寒人不可服

刺少商穴法 穴在手大指内侧去爪甲针如韭叶刺入二分许以手自臂勒至刺处出血即消若脓成者必须针患处否则不治

薛氏医案卷十

卷十一

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷十一

明 薛己 撰

正体类要上

正体主治大法

一脇肋胀痛若大便通和喘咳吐痰者肝火侮肺也用小柴胡汤加青皮山梔清之若胸腹胀痛大便不通喘咳吐血者瘀血停滯也用当归导滯散通之内经云肝藏血脾统血盖肝属木生火侮土肝火既炽肝血必伤脾气必虚宜先清肝养血则瘀血不致凝滯肌肉不致遍溃次壮脾健胃则瘀肉易溃新肉易生若行剋伐则虚者益虚滯者益滯祸不旋踵矣

一肚腹作痛或大便不通按之痛甚瘀血在内也用加味承气汤下之既下而痛不止按之仍痛瘀血未尽也用加味四物汤补而行之若腹痛按之不痛血气伤也用四物汤加参芪白朮补而和之若下而胸脇反痛肝血伤也用四君芎归补之既下而发热阴血伤也用四物参朮补之既下而恶寒阳气伤也用十全大补汤补之既下而恶寒发热气血俱伤也用八珍汤补之既下而泄泻脾肾伤也用六君肉果破故纸补之若下後手足俱冷昏愦出汗阳气虚寒也急用参附汤吐泻手足俱冷指甲青者脾肾虚寒之甚也急用大剂参附汤口噤手撒遗尿痰盛唇青体冷者虚极之坏症也急投大剂参附汤多有得生者

一肌肉间作痛营卫之气滯也用复元通气散筋骨作痛肝肾之气伤也用六味地黄丸内伤下血作痛脾胃之气虚也用补中益气汤外伤出血作痛脾肺之气虚也用八珍汤大凡下血不止脾胃之气脱也吐泻不食脾胃之气败也苟预为调补脾胃则无此患矣

一作痛若痛至四五日不减或至一二日方痛欲作脓也用托里散若以指按下复起脓已成也刺去其脓痛自止若头痛时作时止气血虚也痛而兼眩属痰也当生肝血补脾气

一青肿不消用补中益气汤以补气肿黯不消用加味逍遥散以散血若焮肿胀痛瘀血作脓也以八珍汤加白芷托之若脓溃而反痛气血虚也以十全大补汤补之若骨节接而复脱肝肾虚也用地黄丸肿不消青不退气血虚也内用八珍汤外用葱熨法则瘀血自散肿痛自消若行血破血则脾胃愈虚运气愈滯若敷贴凉药则瘀血益凝内腐益深致难收拾

一发热若出血过多或溃脓之後脉洪大而虚重按全无此阴虚发热也用当归补血汤脉沉微按之软弱此阴盛发躁也用四君姜附若发热烦躁肉瞤筋惕亡血也用圣愈汤如汗不止血脱也用独参汤其血脱脉实汗後脉躁者难治细小者易治外台秘要云阴盛发躁欲坐井中用附子四逆汤加葱白王太仆先生云凡热来复去昼见夜伏夜见昼伏不时而动者名曰无火此无根之虚火也

一作呕若因痛甚或因剋伐而伤胃者用四君当归半夏生姜或因忿怒而肝伤者用小柴胡汤加山栀茯苓若因痰火盛用二陈姜炒黄连山栀若因胃气虚用补中益气汤生姜半夏若出血过多或因溃後用六君子汤加当归

一喘咳若出血过多面黑胸胀或胸膈痛而发喘者乃气虚血乘於肺也急用二味参苏饮若咳血衄血者乃气逆血蕴於肺也急用十味参苏饮加山栀芩连苏木一作渴若因出血过多用四物参术如不应用人参黄芪以补气当归熟地以养血若因溃後用八珍汤若胃热伤津液用竹叶黄芪汤胃虚津液不足用补中益气汤胃火炽盛竹叶石膏汤若烦热作渴小便淋瀝乃肾经虚热非地黄丸不能救

一出血若患处或诸窍出者肝火炽盛血热错经而妄行也用加味逍遥散清热养血若中气虚弱血无所附而妄行用加味四君子汤补益中气或元气内脱不能摄血用独参汤加炮姜以回阳如不应急加附子或血蕴於内而呕血用四物加柴胡黄芩凡损伤劳碌怒气肚腹胀闷误服大黄等药伤阳络则为吐血衄血便血尿血伤阴络则为血积血块肌肉青黯此脏腑亏损经隧失职急补脾肺亦有生者但患者不悟此理不用此法惜哉

一手足伤损若元气虚弱或不戒房劳或妄行攻伐致死肉上延或腐而不痛黑而不脱者当大补元气庶可保生若手足节断去者无妨骨断筋连不急剪去若侵及好肉则不治若预为调补脾气则无此患大凡脓疮内焮者即针之而投托里散或口噤遗尿而似破伤风者急用十全大补汤加附子多有生者

一腐肉不溃或恶寒而不溃用补中益气汤发热而不溃用八珍汤若因剋伐而不溃者用六君子汤加当归其外皮黑坚硬不溃者内火蒸炙也内服八珍汤外涂当归膏其死肉不能溃或新肉不能生而致死者皆失於不预补脾胃也

一新肉不生若患处夭白脾气虚也用六君芎归患处绯赤阴血虚也用四物参术若恶寒发热气血虚也用十全大补汤脓稀白而不生者脾肺气虚也用补中益气汤脓稀赤而不生者心脾血虚也用东垣圣愈汤寒热而不生肝火动也用加味逍遥散晡热而不生肝血虚也用八珍牡丹皮食少体倦而不生脾胃气虚也用六君子汤脓秽而不生者阴虚邪火也用六味地黄丸四肢困倦精神短少而不生者元气内伤也用补中益气汤如夏月用调中益气汤作泻用清暑益气汤秋令作泻用清燥汤

一伤重昏愠者急灌以独参汤虽内瘀血切不可下急用花蕊石散内化之恐因泻而亡阴也

若元气虚甚者尤不可下亦用以前散化之凡瘀血在内大小便不通用大黄朴硝血凝而不下者急用木香肉桂末三二钱以热酒调灌服血下乃生如怯弱之人用硝黄须加肉桂木香同煎假其热以行其寒也

一大便秘结若大肠血虚火炽者用四物汤送润肠丸或以猪胆汁导之若肾虚火燥者用六味地黄丸肠胃气虚用补中益气汤

一伤损症用黑羊皮者盖羊性热能补气也若杖疮伤甚内肉已坏欲其溃者贴之成脓固速苟内非补剂壮其根本毒气不无内侵外非砭刺泄其瘀秽良肉不无伤坏若受刑轻外皮破伤者但宜当归膏敷贴更服四物芩连柴胡山梔白术茯苓又丁痂不结伤肉不溃死血自散肿痛自消若槩行罨贴则酝酿瘀毒矣

一跳跃撻胷闪挫举重劳役恚怒而胷腹痛闷喜手摸者肝火伤脾也用四君柴胡山梔畏手摸者肝经血滞也用四物柴胡山梔桃仁红花若胸脇作痛发热晡热肝经血伤也用加味逍遥散若胸脇作痛饮食少思肝脾气伤也用四君芎归柴梔丹皮若胸腹胀满饮食少思肝脾气滞也用六君加柴胡芎归若胸腹不利食少无寐脾气鬱结也用加味归脾汤若痰气不利脾肺气滞也用二陈白术芎归梔子青皮若咬牙发搐肝旺脾虚也用小柴胡汤川芎山梔天麻钩藤钩或用风药则肝血益伤肝火益甚或饮糖酒则肾水益虚肝火愈炽若用大黄等药内伤阴络反致下血少壮者必为痼疾老弱者多致不起

一破伤风河间云风症善行数变入脏甚速死生在反掌之间宜急分表里虚实而治之邪在表者则筋脉拘急时或寒热筋惕搐搦脉浮弦用羌活防风汤散之在半表半里者则头微汗身无汗用羌活汤和之传入里者舌强口噤项背反张筋惕搐搦痰涎壅盛胸腹满闷便溺闭赤时或汗出脉洪数而弦以大芎黄汤导之既下而汗仍出表虚也以白术防风汤补之不时灌以粥饮为善前云乃气虚未损之法也若脓血太泄阳随阴散气血俱虚而类前症者悉宜大补脾胃切忌祛风之药一发痉仲景云诸痉项强皆属於温又云太阳病汗太多致痉风病下之则痉复发汗则拘急疮家发汗则痉是汗下重亡津液所致有汗而不恶寒曰柔痉以风能散气也宜白术汤加桂心黄芩无汗而恶寒曰刚痉以寒能凝血也宜葛根汤皆气血内伤筋无所营而变非风也杖疮及劳伤气血而变者当补气血未应用独参汤手足冷加桂附缓则不救

扑伤之症治验

血脱烦躁

有一患者两脇胀闷欲欬不欬口觉血腥遍身臀腿胀痛倦怠不食烦渴脉大此血脱烦躁也与童便酒及砭患处出死血糜肉甚多忽发热烦躁汗出投以独参汤三剂少止又用补气血清肝火之药数剂饮食稍进後用独参汤间服诸症悉退饮食颇加但不能多寐以归脾汤加山梔竹茹四剂而熟睡因劳心遂烦渴自汗脉大无力以当归补血汤二剂而安又以十全大

补去川芎加麦门五味牡丹地骨麻黄根炒浮麦数剂而汗止死肉且溃又二十余剂而新肉生

血虚发躁

有一患者烦躁面赤口乾作渴脉洪大按之如无余曰此血虚发躁也遂以当归补血汤二剂即止後日晡发热更以四物加柴胡牡丹地骨黄栢知母治之热退而疮敛东垣云发热恶寒大渴不止其脉大而无力者非白虎汤症此血虚发躁也宜用当归补血汤治之裴先生云肌热躁热目赤面红其脉洪大而虚此血虚也若误服白虎汤轻则危重则毙

气虚血热

有一患者头额出汗热渴气短烦躁骨痛瘀肉不溃遂割去之出鲜血服芩连之药益甚其脉洪大而微此气血俱虚邪火炽盛所致以四物加参芪术炙草少用柴胡炒芩二剂头汗顿止又加麦门五味肉桂二剂诸症悉退後用参芪归术炒芍熟地麦门五味十余剂瘀血溃而脓水稠矣但新肉不生以前药倍用白术而敛

瘀血泛注

有一患者瘀血流注腰臀两足俱黑随饮童便酒砭出瘀血糜肉投以小柴胡汤去半夏加山梔芩连骨碎补以清肝火用八珍茯苓以壮脾胃死肉溃而新肉生後疮复溃得静调治年余而痊

有一患者瘀血攻注阴囊溃而成漏脓水清稀所服皆寒凉之剂诊其肝脉短濡余脉浮而无力此肝木受肺金剋制又元气虚不能收敛遂用壮脾胃生气血之方元气少复後终歿於金旺之日

瘀血作痛

有一患者肿痛发热作渴汗出余曰此阴血受伤也先砭去恶秽以通壅塞後用四物柴胡黄芩山梔丹皮骨碎补以清肝火而愈

有一患者伤处揉散惟肿痛不消余曰此瘀血在内宜急砭之不从余以萝卜自然汁调山梔末敷之破处以当归膏贴之更服活血之剂而瘥数年之後但遇天阴仍作痒痛始知不砭之失

有一患者臀腿黑肿而皮不破但胀痛重坠皆以为内无瘀血惟敷凉药可以止痛余诊其尺脉濡而结此因体肥肉厚瘀血蓄深刺去即愈否则内溃有烂筋伤骨之患余入针四寸漂黑血数升肿痛遂止是日发热恶寒烦渴头痛此气血俱虚而然也以十全大补之剂遂瘥

肝火作痛

有一患者瘀血内胀焮痛发热口乾作渴饮食不甘四肢倦怠余曰此肝火炽盛脾土受制故患前症喜其稟实年壮第用降火清肝活血之剂而愈

肝火忿怒

有一患者患处胀痛悲哀忿怒此厥陰之火为七情激之而然耳遂砭去瘀血以小柴胡汤加山梔黄连桔梗而安後用生肝血养脾气之药疮溃而斂

肝火脇胀

有一患者患处胀痛发热欲呕两脇热胀肝脉洪大余曰肝火之症也但令饮童便并小柴胡汤加黄连山梔归梢红花诸症果退此症若左关脉浮而无力以手按其腹反不胀者此血虚而肝胀也当以四物参苓青皮甘草之类治之若左关脉洪而有力胸脇胀痛者按之亦痛此怒气伤肝之症也以小柴胡芎归青皮芍药桔梗枳殼主之盖此症不必论其受责之轻重问其患处去血之曾否但被人扭按甚重努力恚怒以伤其气血瘀血归肝多致前症甚则胸脇胀满气逆不通或血溢口鼻卒至不救

肝胆虚症

有一患者愈後口苦腰脇胀痛服补肾行气等药不愈余按其肝脉浮而无力此属肝胆气血虚而然耳用参芪芎归地黄白术麦门五味治之而愈

血虚腹痛

有一患者杖後服四物红花桃仁大黄等剂以逐瘀血腹反痛更服一剂痛益甚按其腹不痛余曰此血虚也故喜按而不痛宜温补之剂遂以归身白术参芪炙草二剂痛即止

气虚不溃

有一患者瘀血已去饮食少思死肉不溃又用托里之药脓稍溃而清此血气虚也非大补不可彼不从余强用大补之剂饮食进而死肉溃但少寐以归脾汤加山梔二剂而寐因劳心烦躁作渴脉浮洪大以当归补血汤二剂而安

寒凝不溃

有一患者受刑太重外皮伤破瘀血如注内肉糜烂黯肿上彻胸背下至足指昏愒不食随以黑羊皮热贴患处灌以童便酒薄粥更以清肝活血调气健脾之剂神思稍苏始言遍身强痛

又用大剂养血补气之药肿消食进时仲冬瘀血凝结不能溃脓又用大补之剂壮其阳气其脓方熟遂砭去洞见其骨涂以当归膏及服前药百余剂肌肉渐生

脾虚不敛

有一患者溃而不敛以内有热毒欲用寒凉之药余曰此血气俱虚而不能敛耳非归术参芪之类培养脾土则肌肉何由而生岂可复用寒凉剋伐之药重损气血耶遂用前药治之而愈

血虚筋挛

有一患者腹胀呕吐眩晕用柴胡黄芩山栀紫苏杏仁枳壳桔梗川芎当归赤芍红花桃仁四剂而定後又出血过多昏愤目黑用十全大补等药而苏时肌肉溃烂脓水淋漓筋挛骨痛予切其脉浮而濡沉而弱此因气血耗损不能养筋筋虚不能束骨遂用养气血之药治之而愈

肾虚气逆

有一患者杖疮愈後失於调理头目不清服祛风化痰等药反眩晕服牛黄清心丸又肚腹疼痛杖痕肿痒发热作渴饮食不思痰气上升以为杖疮余毒复作诊左尺脉洪大按之如无予曰此肾经不足不能摄气归源遂用人参黄芪茯苓陈皮当归川芎熟地山药山茱萸五味麦门炙草服之而寻愈後因劳热渴头痛倦怠少食用补中益气汤加麦门五味而痊

湿热乘肝

有一患者愈後腿作痛余意脓血过多疮虽愈肝经血气尚未充实而湿热乘虚也遂以八珍加牛膝木瓜苍术黄柏防己炙草以祛湿热养阴血痛渐止乃去防己黄柏服之遂瘳

肝经郁火

有一患者瘀血失砭胀痛烦渴纵饮凉童便渴胀顿止以萝卜细捣涂之瘀血渐散已而患处作痒仍涂之痒止後口乾作渴小腹引阴jing作痛小便如淋时出白津此肝经郁火也遂以小柴胡汤加大黄黄连山栀饮之诸症悉退再用养血等药而安夫小腹引阴jing作痛等症往往误认为寒症投以热剂则诸窍出血或二便不通以及危殆轻亦损其目矣

痛伤胃呕

有一患者痛甚发热呕吐少食胸膈痞满用行气破血之剂益甚口乾作渴大便不调患处色黯余曰此痛伤胃气所致遂以四君当归炒芩软柴藿香二剂诸症渐愈又用大补之剂溃之而瘳

药伤胃呕

有一患者发热熉痛服寒凉药更加口乾作渴肚腹亦痛自以为瘀血欲下之余按其肚腹不痛脉微细而迟饮食恶寒此凉药伤胃而然也急用六君加芍药当归炮附子各一钱服之前症益甚反加谵语面赤余意其药力未至耳前药再加附子五分服之即睡觉来诸病顿退而安

气血不损

有一患者瘀血虽去饮食形气如故但热渴熉痛膈痞有痰以小柴胡汤加天花粉贝母桔梗山梔二剂少愈又加生地归尾黄芩柴胡山梔花粉而愈余治百余人其杖後血气不虚者惟此一人耳治者审之

行气之非

有一患者服行气之剂胸痞气促食少体倦色黯脓清此形气俱虚之症也先用六君桔梗二剂胸膈气和後用补中益气去升麻加茯苓半夏五味麦门治之元气渐复而愈若用前剂戕贼元气多至不救

下血之非

有一患者去其患处瘀血用四物柴胡红花治之熉痛顿止但寒热口乾饮食少思用四物白术茯苓柴胡黄芩花粉四剂寒热即退用六君芍归藿香而饮食进腐肉虽溃脓水清稀以前药倍用参芪归术茯苓二十余剂腐肉俱溃脓水渐稠悞服下药一锤连泻四次患处色黯喜其脉不洪数乃以十全大补倍加肉桂麦门五味数剂肉色红活新肉渐生喜在壮年易於调理又月余而愈否则不救凡杖疮跌扑之症患处如有瘀血止宜砭去服壮元气之剂盖其气血已损切不可再用行气下血之药复损脾胃则运气愈难营达於下而反为败症怯弱者多致夭枉

寒药之非

有一患者肿痛敷寒凉之药欲内消瘀血反致臀腿俱冷瘀血并胸腹痞闷余急去所敷之药以热童便酒洗患处服六君木香当归敷回阳膏臀腿渐温又以前药去木香加川芎藿香肉桂四剂瘀血解乃刺之更以壮脾胃养气血得痊盖气血得温则行得寒则凝寒极生热变化为脓腐溃深大血气既败肌肉无由而生欲望其生难矣

不砭之非

有一患者发热烦躁用四物黄芩红花软柴山梔花粉烦热已清瘀血深蓄欲针出之不从忽

牙关紧急患处作痛始针去脓血即安用托里养血新肉渐长忽患处瘙痒此风热也用祛风消毒之剂而痊

不补之非

有一患者臀腿胀痛发热烦躁刺去死血胀痛少宽热躁愈甚此血脱邪火旺而然也急用独参汤补之少愈又以健脾胃养气血药治之腐肉渐溃遂愈大抵此症宜预调补以顾收敛切不可伐其气血不行补益以至不能收敛矣

破伤风表症

有一患者仲夏误伤手腰背反张牙关紧急脉浮而散此表症也遂用羌活防风汤一剂即解此症若在秋冬腠理致密之时须用麻黄之类以发汗此乃暴伤气血不损之治法也

破伤风里症

有一患者杖处略破而患此脉洪大而实此里症也用大芎黄汤一剂大便微行一次悉退若投表药必死宜急分表里虚实而治之庶无误矣

脓内焮类破伤风

有一患者寒热口乾用四物参芪白术软柴炒芩麦门五味四剂少退余欲砭去瘀血不从後怔忡不寐饮食少思牙关牵紧头目疼痛恶寒发热此脓内焮也遂砭去之即安以八珍枣仁麦门五味二十剂前症渐愈又用前药及独参汤瘀肉渐溃後因劳又少寐盗汗以归脾汤麦门五味远志而痊後牙关胀闷面目焮赤又似破伤风仍以为虚用八珍等药亦安

脓溃类破伤风

有一患者腹痛喘促作渴寒热臀腿糜烂与死血相和如皮囊盛糊用童便煎四物桃仁红花柴胡黄芩麦门花粉服之顿退彼用黑羊皮贴之益甚後砭去脓血甚多气息奄奄唇口微动牙关紧急患处色黯或欲用破伤风药余曰此气血虚而变症也用参芪芎归白术并独参汤人乳汁元气复而诸症愈乃用十全大补汤调理而安此症若脓瘀内焮者宜针之若溃後口噤遗尿而类破伤风等症者乃气血虚极也急用大补之剂若素多痰患风症者宜清痰降火若因怒而见风症者宜清肝降火若人不慎房劳而忽患前症此由肾水不足心火炽甚宜滋阴补气血为主若误作风症治之即死

内虚变瘥【瘥当作瘥】

有一患者内溃针出脓三五碗遂用大补之剂翌日热甚汗出足冷口噤腰背反张衆欲投发

散之剂余曰此气血虚极而变瘥也若认作风治则悞矣用十全大补等药而愈此症多因伤寒汗下过度与产妇溃疡气血亏损所致但当调补气血为善若服剋伐之剂多致不救

有一患者两月余矣疮口未完因怒发瘥疮口出血此怒动肝火而为患耳用柴胡芩连山栀防风桔梗天麻钩藤钩甘草治之顿愈刘宗厚先生云瘥有属风火之热内作者有因七情怒气而作者亦有湿热内盛痰涎壅遏经络而作者惟宜补虚降火敦土平水清痰去湿

坠跌金伤治验

瘀血腹痛

有一患者仲秋夜归坠马腹内作痛饮酒数杯翌早大便自下瘀血即安此元气充实挟酒势而行散也一男子跌伤腹痛作渴食梨子二枚益甚大便不通血欲逆上用当归承气汤加桃仁瘀血下而瘥此因元气不足瘀血得寒而凝聚也故产妇金疮者不宜食此一男子孟秋坠梯腹停瘀血用大黄等药其血不下反加胸膈胀痛喘促短气余用肉桂木香末各二钱热酒调服即下黑血及前所服之药而苏此因寒药凝滞而不行故用辛温之剂散之

脾伤腹痛

陈侍御坠马腿痛作呕服下药一剂胸腹胀痛按之即止惟倦怠少气诊其脉微细而濡余曰非瘀血也乃痛伤气血复因药损脾气而然耳投养脾胃生气血之药而愈

血虚脇胀

李进士季夏伤手出血不止发热作渴两脇作胀按之即止此血虚也用八珍加软柴胡天花粉治之顿愈更用养气血之药调理而瘥

血虚烦躁

吴给事坠马伤首出血过多发热烦躁肉瞤筋惕或欲投破伤风药余曰此血虚火动所致当峻补其血为善遂用圣愈汤二剂即安又养气血而瘥

亡血出汗

张进士季秋坠马亡血过多出汗烦躁翌日其汗自止热躁益甚口噤手颤此阴血虚阳火乘之而汗出为寒气收敛腠理故汗不得出火不得泄怫郁内甚而益增他症也余用四物加柴胡黄芩山栀四剂少止又用四物参芪软柴胡五味麦门治之而瘥

亡血昏愤【二条】

一妇人孟冬伤足亡血头汗内热作渴短气烦躁不时昏愦其脉洪大按之微弱此阴血虚於下孤阳炎於上故发厥而头出汗也以四物合小柴胡汤一剂汗即止以四物去川芎加参芪麦门五味炙草少用肉桂四剂诸症悉去又三十余剂血气复而愈

一男子孟夏折腿出血过多其初眩晕眼花後则昏愦此阴血伤损阳火炽甚制金不能平木木旺生风所致急灌童便更用人参当归各五钱荆芥川芎柴胡芍药白术各二钱山梔黄栢黄芩桔梗各一钱甘草五分服之随爽又用四物参芪各三钱生地柴胡各一钱四剂烦躁悉去

湿痰作痛【三条】

大宗伯沈立斋孟冬闪腰作痛胸间痰气不利以枳殼青皮柴胡升麻木香茴香当归川芎赤芍神麴红花四剂而瘥但饮食不甘微有潮热以参芪白术陈皮白芍各一钱归身二钱川芎八分软柴胡地骨炙草各五分十余剂而康

刘尚宝体微臂闪作痛服透骨丹反致肢节俱痛下体益甚以二陈南星羌活防风牛膝木瓜苍术黄芩黄栢治之身痛遂安以前药再加归尾赤芍桔梗治之而瘥郑吏部素有湿痰孟冬坠马服辛热破血之药遍身作痛发热口乾脉大而滑此热剂激动痰火为患耳治以清燥汤去人参当归黄芪加黄芩山梔半夏黄栢热痛顿去患处少愈更用二陈羌活桔梗苍术黄栢姜制生地当归遂瘥

肝火作痛

杨司天骨已入 患处仍痛服药不应肝脉洪大而急余曰此肝火盛而作痛也用小柴胡汤加山梔黄连二剂痛止用四物山梔黄栢知母调理而康

血虚作痛

一妇人磕臂出血骨痛热渴烦闷头晕日晡益甚此阴虚内热之症用八珍加丹皮麦门五味骨碎补肉桂及地黄丸治之悉愈却去桂加牛膝续断二十余剂而疮愈

骨伤作痛【二条】

一小儿足伤作痛肉色不变伤在骨也频用炒葱熨之五更用和血定痛丸日间用健脾胃生气血之剂数日後服地黄丸三月余而瘥

一小儿臂骨出 接入肿痛发热服流气等药益甚饮食少思余以葱熨之其痛即止以六君黄芪柴胡桔梗续断骨碎补治之饮食进而肿痛消又用补中益气加麦门五味治之气血和而热退愈矣

气虚血滞

戴给事坠马腿肿痛而色黯食少倦怠此元气虚弱不能运散瘀血而然耳遂用补中益气去升麻柴胡加木瓜茯苓芍药白术治之而痊

气虚不溃

少宗伯刘五清廉伤一块微痛少食用六君子汤倍加当归黄芪其痛渐止月余瘀血内涸而不溃公以为痊余曰此阳气虚极须用调补不从至来春头晕痰涎壅塞服清气化痰病势愈盛脉洪大而微细欲以参芪归术附子之类补之不信至秋初因怒昏愤而厥

气虚壅肿【三条】

一妇人闪臂腕肿大已三月手臂日细肌瘦恶寒食少短气脉息微细属形病俱虚也遂投补中益气加肉桂引诸药以行至臂再加贝母香附以解久病之郁间服和血定痛丸以葱熨之肿消二三因怒患处仍胀胸膈两脇微痛以前汤更加木香山梔半夏桔梗服之少可复因惊不寐少食盗汗以归脾汤加五味麦门二十余剂而安肿消三四手臂渐肥但经水过期而少此心脾之血尚未充足而然也乃用八珍加五味麦门丹皮远志香附贝母桔梗四十余剂诸症悉愈後因怒发热谵语经水如涌此怒动肝火以小柴胡汤加生地黄二钱一剂遂止以四物加柴胡调理而康

州守陈克明子闪右臂腕肿痛肉色不变久服流气等药加寒热少食舌乾作渴余曰伤损等症肿不消色不变此运气虚而不能愈当助脾胃壮气血为主遂从余法治之不二月形气渐充肿热渐消半载诸症悉退休臂如常

一小儿闪腿腕壅肿形气怯弱余欲治以补气血为主佐以行散之剂不信乃内服流气饮外敷寒凉药加寒热体倦余曰恶寒发热脉息洪大气血虚极也治之无功後内溃泄尽气血而亡

瘀血肿痛

一男子闪伤右腿壅肿作痛余谓急砭去滞血以补元气庶无後患不信乃外敷大黄等药内服流气饮後涌出秽脓数碗许其脓不止乃复请治视其腿细而脉大作渴发热辞不治後果歿

窗友王汝道环跳穴处闪伤瘀血肿痛发热作渴遂砭去瘀血知其下焦素有虚火用八珍加黄栢知母牛膝骨碎补四剂顿止用十全大补汤少加黄栢知母麦门五味三十余剂而敛

筋伤壅肿

李考功子十四岁脚腕闪伤肿而色夭日出清脓少许肝脉微瀦此肝经受伤气血虚而不能溃难治之症也急止剋伐之剂不信乃杂用流气等药後果出烂筋而死

肺火衄血

张地官坠马伤腿服草乌等药致衄血咳 臂痛目黄口渴齿痛小便短少此因燥剂伤肺与大肠而致余用生地芩连黄栢知母山梔山药甘草以润肺之燥而生肾水小便顿长诸症并止以山药五味麦门参芪芎归黄栢黄芩知母炙草以滋阴血养元气而疮敛

肝火出血【三条】

俞进士折腿骨已接三月尚发热出血不止正体医治不应左关脉洪数此肝火炽甚血得热而妄行也遂投小柴胡汤加山梔芍药生地防风血止热退又用八珍五味麦门治之疮口即愈

田宗伯侄仲秋因怒跌仆遍身作痛发热衄血肝脉弦洪余曰久衄脉弦洪乃肝火盛而制金也至春则肝木茂盛而自焚或戕贼脾土非易治之症当滋肾水以生肝木益脾土以生肺金乃杂用泻肝火等药歿於仲春之月

一妇人因怒仆地伤面出血痰盛昏愤牙关紧急余曰此怒动肝火气逆拂郁神明昏冒而卒倒也两手脉洪大而无伦次以小柴胡汤加黄连山梔芎归橘红茯苓姜汁治之而苏

胃火作呕

一膏粱之人跌腿青肿作痛服辛热之药反发热作喘患处益痛口乾唇揭余曰膏粱之人内多积热更服辛热之剂益其胃火而使然也频饮童便以清胃散加山梔黄芩甘草治之顿止患处以葱熨之肿即消散

阴虚作喘

举人杜克弘坠马服下血药反作喘日晡益甚此血虚所致耳非瘀血为患遂以四物加参芪五味麦门治之其喘顿止又用补中益气加五味麦门而愈此症果系瘀血蒸薰於肺而喘只宜活血行血亦不可下若面黑胸胀或膈痛作喘当用人参一两苏木二两作一剂水煎急服缓则不治产妇多有此疾

阴虚发热

杨进士伤手指焮痛发热服寒凉之药致饮食顿减患处不溃余用托里养血之药食进疮溃後因劳每日晡发热此阴虚而内热也以四物软柴胡地骨皮乃退更用养血气之药而疮敛

气血虚热

一男子坠马腹有瘀血服药下之致发热盗汗自汗脉浮濡余以为重剂过伤气血所致投以十全大补汤益甚时或谗语此药力未及而然也以前药加炮附子五分服之即睡觉来顿安再剂而痊

血不归经【二条】

大尹刘国信金疮出血发热烦躁属阴虚为患用圣愈汤治之虚火息而血归经矣

梁阁老侄金疮肿痛出血不止寒热口乾此气虚血无所附而血不归经也用补中益气五味麦门主之阳气复而愈

气无所附

举人余时正金疮焮痛出血不止恶寒发热用败毒等药愈甚此亡血过多气无所附而然耳遂以四物黄柏知母软柴胡玄参五味麦门治之即愈

气血俱虚

余北仕时有留都贾学士子年十六患流注已二载公陞北宗伯邀余治诊其脉洪大而数脓清作渴食少盗汗朝寒暮热余曰此气血俱虚也先以固气血为主午前以四君芎归炙草午後以四物参芪麦门五味两月诸症遂可一二有一医用渗利之剂保其必生治之三月气血极虚而形体骨立复悬治余被命南下後果歿

阳气脱陷

梁阁老侄跌伤腿外敷大黄等药内服破血之剂遂致内溃余针出秽脓三碗许虚证悉具用大补之剂两月余少能步履因劳心手撒眼闭汗出如水或欲用祛风之剂余曰此气血尚未充足而然也急以艾炒热熨肚脐并气海穴处以人参四两炮附子五钱煎灌良久臂少动又灌一剂眼开能言但气不能接续乃以参芪归术四味共一斤附子五钱水煎徐徐服之元气渐复饮食已进乃去附子服之而疮愈

胆经血少

一女子年十七闪右臂微肿作痛寅申时发热余决其胆经血虚火盛经水先期而至先以四物合小柴胡汤四剂热退更以加味四物汤加香附地骨皮山梔各五分芩连炙草各三分二十余剂其肿亦消乃去黄连山梔又五十余剂经水调而元气充矣

肾经虚怯【二条】

儒者王清之跌腰作痛用定痛等药不愈气血日衰面耳黧色余曰腰为肾之府虽曰闪伤实肾经虚弱所致遂用杜仲补骨脂五味山茱萸蓉山药空心服又以六君当归白术神麴各二钱食远服不月而瘥

一三岁儿闪腰作痛服流气等药半载不愈余曰此禀肾气不足不治之症也後果歿

痛伤胃呕

一妇人伤指手背俱肿微呕少食彼以为毒气内攻诊其脉沉细此痛伤胃气所致也遂刺出脓碗许先以六君藿香当归而食进继以八珍黄芪白芷桔梗月余而疮愈

气遏肉死【二条】

一男子修伤足指色黑不痛而欲脱余曰此因阳气虚不能运达於患处也急去之速服补剂以壮元气否则死肉延足必不救矣不信果黑烂上脛而死大抵手足气血罕到之地或生疮或伤损若戕其元气邪气愈盛溃烂延上必死不溃而色黯者亦死若骨断筋皮尚连者急剪去之

一女年数岁严寒上京两足受冻不仁用汤泡溃至春十指俱烂牵连未落予用托里之剂助其阳气自溃脱得保其生此因寒邪遏绝运气不至又加热汤泡溃故死而不痛也余尝见人之严寒而出冻伤其耳不知痛痒若以手触之其耳即落当以煖处良久或热手熨之无恙若以火烘汤泡其耳即死至春必溃脱落矣北方寒气损人若此可不察之

凉药遏经

云间曹子容为室人中风灌药误咬去指半节焮痛寒热外敷大黄等药内服清热败毒患处不痛不溃脓清寒热愈甚余曰此因凉药遏绝隧道而然也遂敷玉龙膏以散寒气更服六君子汤以壮脾胃数日後患处微痛肿处渐消此阳气运达患处也果出稠脓不数日半指溃脱更服托里药而敛

上舍王天爵伤足焮肿内热作渴外敷内服皆寒凉败毒患处益肿而不溃且恶寒少食欲作呕吐余曰此气血俱虚又因寒药凝结隧道损伤胃气以致前症耳遂用香砂六君子芎归炮姜外症悉退惟体倦晡热饮食不甘以补中益气汤加地骨皮五味麦门治之而愈州守王廷用伤指即用帛裹之瘀血内溃焮肿至手余谓宜解患处以出瘀血更用推陈致新之剂不信乃敷凉药痛虽少止次日复作又敷之数日後手心背俱溃出瘀秽脓水尚服败毒之剂气血益虚色黯脓清饮食少思仍请余治投以壮脾胃生气血之剂由是脓水渐稠而愈

汤火所伤治验

火毒刑肺金

一男子孟冬火伤臂作痛喘 发热此火毒刑肺金之症用人参平肺散治之喘 乃止因劳又恶寒发热此气血虚也以八珍汤加桔梗白芷治之而退再加薄桂三分以助药势温气血坏肉溃之而愈○若初起焮赤作痛用神效当归膏敷之轻者自愈重者自腐生肌神效○或用侧柏叶末蜡油调敷亦效若发热作渴小便赤色其脉洪数而实者用四物茯苓木通生甘草炒黄连脉虽洪数而虚者用八珍若患处不溃而色黯者四君芎归黄芪之类若肉死已溃而不生肌者用四君黄芪当归炮姜若愈後而恶寒阳气未复也急用十全大补切不可用寒凉反伤脾胃

火毒焮作

一男子因醉被汤伤腿溃烂发热作渴饮水脉洪数而有得此火毒为患用生地当归芩连木通葛根甘草十余剂诸症渐退却用参芪白术芎归炙草芍药白芷木瓜新肉将完因劳忽寒热此气血虚而然也仍用参芪之药加五味子酸枣仁而安又月余而疮痊

火毒行於下焦

一男子火伤两臂焮痛大小便不利此火毒传於下焦用生地黄当归芍药黄连木通山梔赤茯苓甘草一剂二便清利其痛亦止乃以四物参芪白芷甘草而坏肉去又数剂而新肉生

火毒乘血分

一妇人汤伤胸大溃两月不斂脉洪大而无力量口乾发热日晡益盛此阴血虚火毒乘之而为患耳用四物汤加柴胡丹皮热退身凉更用逍遥散加陈皮以养阴血壮脾胃腐肉去而新肉生矣

薛氏医案卷十一

卷十二

钦定四库全书

薛氏医案卷十二

明薛己撰

正体类要下

方药

四君子汤

治脾胃虚弱或因尅伐肿痛不散或溃而不斂或饮食少思或欲作呕大便不实等症

人参 白术 茯苓【各二钱】 甘草【炙一钱】

右作一剂姜枣水煎服

小柴胡汤 治一切扑伤等症因肝胆经火盛作痛出血自汗寒热往来日晡发热或潮热身热咳嗽发热脇下作痛两胁痞满

柴胡【二钱】 黄芩【一钱五分】 半夏【一钱】 人参【一钱】 甘草【炙五分】

右姜水煎服

神效葱熨法 治跌扑伤损用葱白细切杵烂炒热敷患处如冷易之肿痛即止其效如神

八珍汤 治伤损等症失血过多或因尅伐血气耗损恶寒发热烦躁作渴等症

人参 白术 白茯苓 白芍药 当归

熟地黄 川芎【各一钱】 甘草【炙五分】

右姜枣水煎服

犀角地黄汤 治火盛血热妄行或吐衄不止大便下血如因怒而致加山梔柴胡

犀角【镑末】 生地黄 白芍药 黄芩 牡丹皮 黄连【各一钱五分】

右水煎熟倾於鍾内入犀末服之

十味参苏饮

治气逆血蘊上焦发热气促或咳血?血或痰嗽不止加黄芩山梔即加味参苏饮

人参 紫苏 半夏 茯苓 陈皮 桔梗前胡 葛根 枳殼【各一钱】 甘草【炙五分】

右姜水煎服

二味参苏饮 治出血过多瘀血入肺面黑喘促

人参【一两】 苏木【二两】

右水煎服

四物汤 治一切血虚日晡发热烦躁不安者皆宜服之

当归【三钱】 熟地黄【三钱】 芍药【二钱】 川芎【一钱五分】

右水煎服加白术茯苓柴胡丹皮即加味四物汤

桃仁承气汤【加当归即归承汤】 治伤损血滯於内作痛或发热发狂等症

桃仁 芒硝 甘草【各一钱】 大黄【二钱】

右水煎服大黄更量虚实

加味承气汤 治瘀血内停胸腹胀痛或大便不通等症

大黄 朴硝【各二钱】 枳实 厚朴【各一钱】 甘草【五分】 当归 红花【各一钱】

用酒水各一鍾煎至一鍾服仍量虚实加減病急不用甘草

独参汤 治一切失血与疮疡潰後气血俱虚恶寒发热作渴烦躁者宜用此药补气盖血生於气阳生陰长之理也用人参二两枣十枚水煎服

归脾汤 治跌扑等症气血伤损或思虑伤脾血虚火动寤而不寐或心脾作痛怠惰嗜卧怔忡

惊悸自汗盗汗大便不调或血上下妄行其功甚捷

白术 白茯苓 黄芪【炒】 当归 龙眼肉

酸枣仁【炒】 远志【各一钱】 木香【五分】 甘草【炙三分】 人参【一钱】

右姜枣水煎服加柴胡山梔即加味归脾汤

润肠丸 治跌扑等症或脾胃伏火大肠乾燥或风热血结等症

麻子仁【一两】 羌活 当归尾

大黄【煨】 皂角刺秦艽【各五钱】 桃仁【一两去皮尖研】

右为末炼蜜丸桐子大猪胆汁丸尤妙每服三五十丸食前白滚汤送下凡怯弱人先用猪胆导之不通宜补气血

当归补血汤 治杖疮金疮等症血气损伤肌热大渴引饮目赤面红昼夜不息其脉洪大而虚重按全无此病多得於饥渴劳役者若悞服白虎汤必死黄芪【炙一两】 当归【二钱酒制】

右水煎服

圣愈汤 治杖疮金疮痈疽脓血出多热躁不安或晡热作渴等症

熟地黄【酒洗】 生地黄【酒洗】 川芎 人参【各一钱】 当归【酒洗】 黄芩【各五分】

右水煎服

十全大补汤 治杖疮气血俱虚肿痛不消腐而不溃溃而不敛或恶寒发热自汗盗汗饮食少思肢体倦怠若怯弱之人患处青肿而肉不坏者服之自愈若有瘀血砭刺早者服之自消或溃而脓水清稀肌肉不生或口乾作渴而欲饮汤者尤宜服之

白茯苓 人参 当归 白术 黄芪

川芎白芍药【炒】 熟地黄【生者自制】 甘草【炙各一钱】 肉桂【五分】

右姜枣水煎服

参附汤 治金疮杖疮失血过多或脓瘀大泄阳随陰走上气喘急自汗盗汗气短头晕等症

人参【四钱】附子【炮去皮脐三钱】

右水煎服阳气脱陷者倍用之

清胃散 治血伤火盛或胃经湿热唇口肿痛牙龈溃烂或发恶寒等症

生地黄【五分】升麻【一钱】牡丹皮【五分】黄连【五分】当归【酒洗五分】

右水煎服如痛未止黄芩石膏大黄之类皆可量加

清燥汤 治跌扑疮疡血气伤损或溃後气血虚怯湿热乘之遍身酸软或秋夏湿热太甚肺经受伤絶寒水生化之源肾无所养小便赤澁大便不调或腰腿痿软口乾作渴体重麻木或头目眩晕饮食少思或自汗体倦胸满气促或气高而喘身热而烦

黄芪【一钱五分】苍术【一钱】白术 陈皮 泽泻【各五分】五味子【九粒】人参 白茯苓 升麻 麦门冬 当归 生地黄 神麴【炒】猪苓 酒栢【各五分】柴胡 黄连 甘草【炙各三分】

右姜水煎服湿痰壅盛参芪归地之类可暂减之

生脉散 治金疮杖疮等症发热体倦气短或汗多作渴或溃後睡卧不宁阳气下陷发热烦躁若六七月间湿热大行火土合病令人脾胃虚弱身重气短或金为火制絶寒水化源肢体痿软脚重眼黑并宜服人参【五钱】五味子【一钱】麦门冬

右水煎服

二妙散 治下焦湿热肿痛或流注游走遍身疼痛

苍术 黄栢【各等分】

右为末每服二三钱酒调服作丸亦可

四斤丸 治肝肾精血不足筋无所养挛缩不能步履或邪淫於内筋骨痿软

肉苁蓉【酒浸】牛膝【酒洗】天麻 乾木瓜 鹿茸【炙】熟地【生者自制】兔丝子【酒浸煮杵】五味子【各等分】

右为末用地黄膏丸桐子大每服五七十丸空心温酒送下

补中益气汤 治跌扑等症损伤元气或过服剋伐恶寒发热肢体倦怠血气虚弱不能生肌收敛或兼饮食劳倦头痛身热烦躁作渴脉洪大弦虚或微细软弱自汗倦怠饮食少思

黄芪【炙】人参 白术 甘草【炙各一钱五分】当归【一钱】陈皮【五分】柴胡 升麻【各三分】

右姜枣水煎服

四生散

治肾脏风毒遍身瘙痒或脓水淋漓耳鸣目痒或鼻赤齿浮口舌生疮妇人血风疮更效

白附子 独活 黄芪 蒺藜【各等分】

右为末各等分每服二钱用腰子一枚劈开入药湿纸包裹煨熟细嚼盐汤下酒服亦可

竹叶黄芪汤 治气血虚胃火盛而作渴者

淡竹叶【二钱】黄芪 生地黄 麦门冬 当归 川芎 甘草 黄芩【炒】石膏【煨】芍药 人参【各一钱】

右水煎服

竹叶石膏汤 治胃火盛而作渴者

淡竹叶 石膏【煨】桔梗 木通 薄荷 甘草【各一钱】

右姜水煎服

人参平肺散 治心火剋肺咳嗽喘呕痰涎壅盛咽喉不利等症

人参 陈皮 甘草【各一钱】地骨皮 茯苓

知母【各八分】五味子 青皮 天门冬 桑白皮【各五分】

右水煎服

滋肾丸 治肾经阴虚发热作渴足热腿膝无力等症凡不渴而小便闭者最宜用之

肉桂【三钱】知母【酒炒】黄柏【酒炒各二两】

右为末水丸桐子大每服七八十丸空心白滚汤下

六味地黄丸【加肉桂五味各一两名加減八味丸】治伤损之症因肾肺二经虚弱发热作渴头晕眼花咽燥唇裂齿不坚固腰腿痿软小便频赤自汗盗汗便血诸血失瘠水泛为痰之圣药血虚发热之神剂若损重伤骨不能言如瘠者用此水煎服之亦效

熟地黄【八两杵膏自制】山茱萸肉 乾山药【各四两】

牡丹皮 白茯苓 泽泻【各三两】

右为末和地黄丸桐子大每服七八十丸空心食前滚汤下

清心莲子饮 治发热口渴白浊夜安宁而昼发热等症

黄芩【一钱】麦门冬 地骨皮 车前子【炒】甘草【各一钱半】石莲肉 茯苓
黄芪【炒】柴胡 人参【各一钱】

右水煎服

七味白术散 治脾胃虚弱津液短少口乾作渴或中风虚热口舌生疮不喜饮冷最宜服之

人参 白术 木香 白茯苓 甘草【炙】

藿香【各五分】乾葛【一钱】

右水煎服

黑丸子【一名和血定痛丸】治跌扑坠堕筋骨疼痛或瘀血壅肿或风寒肢体作痛若流注膝风初结服之自消若溃而脓清发热与补气血药兼服自敛

百草霜【一两】白芍药【一两】川乌【炮三钱】赤小豆【一两六钱】白芷【一两六钱】白芨 当归【各八钱】南星【泡三钱】

牛膝【焙六钱】骨碎补【焙八钱】

右各另为末酒糊丸桐子大每服三十丸塩汤温酒送下孕妇不可服

白丸子 治一切风痰壅盛手足顽麻或牙关紧急口眼歪斜半身不遂等症

半夏【七两生用】南星【二两生用】川乌【去皮脐生用五钱】

右为末用生姜汁调糊丸桐子大每服一二十丸姜汤送下

六君子汤 治金疮杖疮等症因元气虚弱肿痛不消或不溃敛或服剋伐伤脾或不思饮食宜服之以壮营气此方即四君子汤加陈皮白术更加香附藿香砂仁香砂六君子

回阳玉龙膏 治跌扑所伤为敷凉药或人元气虚寒肿不消散或不溃敛及痈肿坚硬肉色不变久而不溃溃而不敛或筋挛骨痛一切冷症并効

草乌【二钱】南星【一两煨】军姜【一两炒】白芷【一两】肉桂【五钱】赤芍药【一两炒】

右为末?汤调涂热酒亦可

复原活血汤 治跌扑等症瘀血停凝脇腹作痛甚者大便不通

柴胡 当归 红花【各二钱】穿山甲【炮五分】大黄【酒炒一钱】桃仁【二十枚】甘草【五分】瓜蒌根【一钱】

右酒水各半煎服

复原通气散 治打扑伤损作痛及乳痈便毒初起或气滞作痛

木香 茴香【炒】青皮【去白】穿山甲【酥炙】陈皮

白芷 甘草 漏芦 贝母【各等分】

右为末每服一二钱温酒调下

愚按前方治打扑闪错或恼怒气滞血凝作痛之良剂经云形伤作痛气伤作肿又云先肿而後痛者形伤气也先痛而後肿者气伤形也若人元气素弱或因叫号血气损伤或过服剋伐之剂或外敷寒凉之药血气凝结者当审前症大法用温补气血为善

神效太乙膏 治痈疽发背杖疮及一切疮疽溃烂玄参 白芷 当归 肉桂 赤芍药

大黄 生地黄【各一两】

右用麻油二筋入铜锅内煎至药黑滤去粗徐入净黄丹十二两再煎滴水中捻软硬得中即

成膏矣

乳香定痛散 治杖疮金疮及一切疮疡溃烂疼痛没药

乳香【各五钱】滑石【一两】寒水石【一两煨】冰片【一钱】

右为末搽患处痛即止甚效

猪蹄汤 治一切痈疽杖疮溃烂消肿毒去恶肉白芷 当归 羌活 赤芍药

露蜂房【蜂儿多者佳】生甘草【各五钱】

右用猪蹄一只水五碗煮热取清汤入前药煎数沸去粗温洗随用膏药贴之

神效当归膏 治杖扑汤火疮毒不问已溃未溃肉虽伤而未坏者用之自愈肉已死而用之自溃新肉易生搽至肉色渐白其毒始尽生肌最速如棍杖者外皮不破内肉糜烂其外皮因内瘀乾缩坚硬不溃爬连好肉作痛故俗云丁痂皮致脓瘀无从而泄内愈胀痛腐溃益深往往不待其溃就行割去而疮口开张难以溃敛怯弱之人多成破伤风症每致不救若杖疮内有瘀血者即用有锋芒磁片於患处砭去涂以此药则丁痂自结死肉自溃脓秽自出所溃亦浅生肌之际亦不结痂又免皴揭之痛殊有神效盖当归地黄麻油二蜡主生肌止痛补血续筋与鲜肉相宜此方余已刊行治者亦多用之

当归【一两】麻油【六两】黄蜡【一两】生地黄【一两】

右先将当归地黄入油煎黑去粗入蜡溶化候冷搅匀即成膏矣白蜡尤妙

托里散 治金疮杖疮及一切疮毒因气血虚不能成脓或脓成不能溃敛脓水清稀久而不瘥

人参【一钱气虚多用之】白术【炒七分】黄芪【盐水拌炒一钱】陈皮【七分】当归身【酒拌】芍药【酒炒】熟地【生者自制】白茯苓【各一钱】

右水煎服

加味芎归汤 治跌扑坠堕皮肤不破瘀血入胃作呕芎藭 当归 百合【水浸半日】白芍药 荆芥穗【各二钱】

右酒水煎服

当归导滞散 治跌扑瘀血在内胸腹胀满或大便不通或喘咳吐血

大黄 当归【各等分】

右为末每服三钱温酒下气虚须加桂

花蕊石散 治打扑伤损腹中瘀血胀痛欲死服之血化为水其功不能尽述

硫黄【明色者四两】花蕊石【一两】

右为末和匀先用纸筋和盐泥固济瓦罐一个候乾入药再用泥封口安在砖上虚书八卦五行用炭三十筋煅之罐冷取出每服一钱童便调下

愚按前方若被伤炽盛元气亏损内有瘀血不胜疎导者用前药一服其血内化又不动脏腑甚妙甚妙

经验方 治跌扑瘀血作痛或筋骨疼痛

黄栢【一两】半夏【五钱】

右为末用姜汁调涂患处以纸贴之加乾姜汁润之周日易之

消毒定痛散 治跌扑肿痛

无名异【炒】木耳【炒】大黄【炒各五分】

右为末蜜水调涂如内有瘀血砭去敷之若腐处更用当归膏敷之尤好

药蛆方

治杖疮溃烂生蛆用皂矾煨过为末乾掺其内蛆即死如未应佐以柴胡梔子散以清肝火

洗药 凡伤重者用此淋洗然後傅药

荆芥 土当归 生葱【切断一方用生姜】

右煎汤温洗或止用葱一味煎洗亦可

黑龙散 治跌扑伤损筋骨碎断先用前汤淋洗以纸摊贴若骨折更以薄木片夹贴以小绳束三日再如前法勿去夹板恐摇动患处至骨坚牢方宜去若被刀箭虫伤成疮并用姜汁和水调贴口以风流散填涂

土当归【二两】丁香皮【六两】百草霜【散血入六两】

穿山甲【六两炒黄或煨存性】枇杷叶【去毛入半两一云山枇杷根】

右焙为细末姜汁水调或研地黄汁调亦好

至宝丹一名济陰丹 治伤损焮痛并接断

天花粉【三两】姜黄 白芷 赤芍药【各一两】

右为末茶汤调搽患处

治金伤出血不止用牛胆石灰掺之即止以腊月牛胆入风化石灰悬当空候乾用

又方金疮出血不止以五倍子生为末乾贴如不止属血热宜用犀角地黄汤之类大凡金疮出血不止若素怯弱者当补气若素有热当补血若因怒气当平肝若烦热作渴昏愤当补脾气若筋挛搐搦当养肝血不应用地黄丸以滋肾水

又方皮破筋断者以百胶香涂之或以金沸草汁频涂自然相续

没药降圣丹 治伤损筋骨疼痛或不能屈伸肩背拘急身体倦怠四肢无力

没药【别研】当归【酒洗炒】白芍药 生地黄 骨碎补【搯去毛】川乌【去毛脐泡】川芎【各一两五钱】自然铜【火煨醋淬十二次研为末水飞过焙一两】

右为细末每一两作四丸以生姜自然汁与炼蜜为丸每服一丸槌碎用水酒各半锤入苏木少许煎至八分去苏木空心服

愚按脾主肉肝主筋若因肝脾二经气血虚弱或血虚有热而不愈者当求其本而治之

万金膏 治痈疽及坠扑伤损或筋骨疼痛

龙骨 鼈甲 苦参 乌贼鱼骨 黄栢 黄芩黄连 猪牙皂角 白芨 白蔹 厚朴

木鼈子仁 草乌 川芎 当归 白芷【各一两】没药【另研半两】乳香【另研半两】清油【四斤】黄丹【一斤半炒过净】槐枝柳枝【各四寸长二十一条】

右除乳没黄丹外诸药入油内煎至黑色去之称净油每斤入丹半斤不住手搅令黑色滴水不粘手下乳没再搅如硬入油些少以不粘手为度

接骨散 治骨折碎或骨出 先整端正却服此药如飞禽六畜所伤亦能治

鹏砂【一钱五分】水粉 当归【各一钱】

右为末每服二钱煎苏木汤调服後但饮苏木汤立効

本事接骨丸 治打折伤损

接骨木【半两即蒴藿也】乳香【半两】赤芍药 当归 川芎自然铜【各一两】

右为末用黄蜡四两熔入前末搅匀衆手丸龙眼大如打伤筋骨及闪痛不堪忍者用一丸热酒浸开热呷痛便止若大段伤损先整骨用川乌草乌等分为末生姜汁调贴之挟定服药无不効者

愚按前三方俱効验者备録之以便修用

没药丸 治打扑筋骨疼痛或气逆血晕或瘀血内停肚腹作痛或胸膈胀闷

没药 乳香 川芎 川椒 芍药 当归 红花 桃仁 血竭【各一两】自然铜【四钱火煨七次】

右为末用黄蜡四两融化入前末速搅匀丸弹子大每服一丸酒化服

愚按接骨散没药丸元气无亏者宜用若肾气素怯或高年肾气虚弱者必用地黄丸补中益气汤以固其本为善

羌活防风汤 治破伤风邪初在表者急服此药以解之稍迟则邪入於里与药不相合矣

羌活 防风 甘草 川芎 藁本 当归 芍药【各四两】地榆 细辛【各二两】

右每服五钱水煎

防风汤 治破伤风表症未传入里急宜服之

防风 羌活 独活 川芎【各等分】

右每服五钱水煎调蜈蚣散服大効

蜈蚣散

蜈蚣【一对】鰮【三钱】

右为细末用防风汤调下

羌活汤 治破伤风在半表半里急服此汤稍缓邪入於里不宜用

羌活 菊花 麻黄 川芎 石膏 防风 前胡 黄芩 细辛 甘草 白茯苓
蔓荆子 枳壳【各一两】 薄荷 白芷【各五钱】

右每服五钱水煎

地榆防风散 治风在半表里头微汗身无汗不可发汗兼治表里

地榆 防风 地丁香 马齿苋【各等分】

右为细末每服三钱米汤调服

大芎黄汤 治风在里宜疎导急服此汤

川芎 羌活 黄芩 大黄【各一两】

右五七钱水煎温服脏腑通和为度

白术防风汤 治服表药过多自汗者

白术 黄芪【各一两】 防风【二两】

右每服五七钱水煎服脏腑和而自汗者可服若脏腑秘小便赤者宜用大芎黄汤下之

白术汤 治破伤风汗不止筋挛搐搦

白术 葛根 升麻 黄芩 芍药【各二钱】 甘草【二钱五分】

右每服五钱水煎无时服

谦甫朱砂丸 治破伤风目瞪口呆不语手足搐搦项筋强直不能转侧目不识人

朱砂【研】 半夏【洗】 川乌【各一两】 雄黄【五钱】 凤凰台【三钱】 麝香【一字】

右为末枣肉丸桐子大每服一丸或二丸冷水下以吐为度如不吐加一丸或吐不住煎葱白汤止之汗出为效

左龙丸 治直视在里者

左盘龙【野鸽粪也】白僵蚕 鳔【各炒五钱】雄黄【一钱】

右为末烧饭丸桐子大每服十五丸温酒下如里证不已当用前药末一半加巴豆霜半钱烧饭丸桐子大每服加入一丸如此渐加以利为度利後服和解药

江鳔丸 治破伤风传入里症惊而发搐脏腑秘澁江鳔【剉炒半两】野鸽粪【炒半两】雄黄【一钱】白僵蚕【半两】

蜈蚣【一对】天麻【一两】

右为末作三分二分烧饭丸桐子大朱砂为衣一分入巴豆霜一钱亦用烧饭丸每服朱砂者二十丸入巴豆者一丸渐加至利为度後止服前丸

养血当归地黄散

当归 地黄 芍药 川芎 藁本 防风 白芷【各一两】细辛【五钱】

右依前煎服

广利方 治破伤风发热

瓜蒌子【九钱】滑石【三钱五分】南星 苍术 赤芍药 陈皮 炒栝 黄连 黄芩 白芷 甘草【各五分】

右姜水煎服

右二方用竹沥瓜蒌实辈治破伤风热痰脉洪者前方用南星半夏草乌川乌辈则治破伤风寒痰脉无力者

白丸子 治一切风痰壅盛手足顽麻或牙关紧急口眼歪斜半身不遂等症

半夏【七两生用】南星【二两生用】川乌【去皮脐生用五钱】

右为末用生姜汁调和丸桐子大每服一二十丸姜汤下

本事玉真散 治破伤风及打扑伤损项强口噤欲死【南星有防风制其毒不麻人】

天南星【汤泡七次】防风【等分】

右为末先以童子热小便洗净疮口拭乾掺之良久浑身作痒疮口出赤水是效又以温酒调下一钱如牙关紧急腰背反张用药二钱童子小便调服至死心头微温者急灌之亦可救累试累效

治打扑伤损肿痛伤风者

天南星 半夏 地龙【各等分】

右为末用生姜薄荷汁调搽患处

薛氏医案卷十二

卷十三

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷十三

明 薛己 撰

外科枢要一

论疮疡二十六脉所主

浮脉之诊浮於指下按之不足举之有余再再寻之状如太过瞥瞥然见於皮毛间其主表症或为风或为虚浮而大散者心也浮而短濇者肺也浮而数者热也而反恶寒者疮疽之谓也洪脉之诊似浮而大按举之则泛泛然满三部其状如水之洪流波之涌起其主血实积热疮肿论曰脉洪大者疮疽之病进也如疮疽结脓未成者宜下之脓溃之後脉见洪大则难治若自利者不可救也

滑脉之诊实大相兼往来流利如珠按之则累累然滑也其主或为热或为虚此阳脉也疮疽之病浓未溃者宜内消也脓溃之後宜托里也所谓始为热终为虚也数脉之诊按之则呼吸之间动及六至其状似滑而数也若浮而数则表热沉而数则里热也又曰诸数为热仲景云脉数不时见则生恶疮也又云肺脉俱数则生疮也诊诸疮洪数者里欲有脓结也

散脉之诊似浮而散按之则散而欲去举之则大而无力主气实而血虚有表无里疮肿脓溃之後而烦痛尚未痊退诊其脉洪滑粗散者难治以其正气虚邪气实也又曰肢体沉重肺脉大则毙谓浮散者也

长脉之诊按之则洪大而长出於本位其主阳气有余也伤寒得之欲汗出自解也长而缓者胃脉也百病皆愈谓之长者则易治也

芤脉之诊似浮而按之中央空两边实其主血虚或为失血疮肿之病诊得芤脉脓溃後易治以其脉病相应故也

牢脉之诊按之则实而弦且沉且浮而有牢坚之意若癰癥结肿诊得牢脉者不可内消也

实脉之诊按举有力而类结曰实经曰邪气胜则实久病虚人得此最忌疮疽之人得此宜急

下之以其邪气与臟腑俱实故也

弦脉之诊按之则紧而弦其似紧者为弦如按弦而不移紧如内绳而转动以此为异春脉浮弦而平不时见则为饮为痛主寒主虚疮疽论曰内寒外热欲发疮疽也

紧脉之诊似弦而紧按之如切绳而转动其主切痛积癖凡疮肿得之气血沉滞也亦主痛也濡脉之诊按之则散而复来举之则细而不足脉濡则气濡也亦主血虚疮肿溃後得之无妨也

短脉之诊按举则不及本位内经曰短则气病以其无胃气也诸病脉短者皆难治疮肿脉短真气短也细脉之诊按之则萦萦如珠丝而欲絕举之如无而似有细而微其主亡阳衰也疮肿之病脉来细而沉时值者里虚而欲变症也

微脉之诊按之则软小而极微其主虚也真气後者生邪气胜者危疮肿溃後脉微而匀举自瘥也

迟脉之诊按举来迟呼吸定息方得三至其状似【阙】而稍迟痼疾得之则善新疾得之则正气虚急疮肿得之溃後自瘥

缓脉之诊按之似迟而稍駛於迟仲景云阳脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰阳同等谓之长缓脉见长缓百疾自瘳凡疮肿溃後其脉濡迟缓者易愈以其脉病相应是有胃气也

沉脉之诊举之不足按之方见如烂绵其主邪气在脏也水气得之则逆此陰脉也疮肿得之邪气深也伏脉之诊比沉不同伏于筋下推筋而後见与沉相类而邪气益深矣

虚脉之诊按之不足极大而软轻举指下豁然而空经曰脉虚则血虚血虚生寒阳气不足也疮肿脉虚宜托里和气养血也

软脉之诊按之则如帛在水中极软而沉细亦谓之软其主胃气弱疮肿得之宜补虚排脓托里

弱脉之诊似软而极微来微而似有仲景云微弱之脉绵绵如泻漆之絕其主血气俱虚形精不足大抵疮家沉迟濡弱皆宜托里

促脉之诊按之则去数来时一止而复来仲景云阳盛则促主热蓄於里也下之则和疮肿脉促亦宜下之结脉之诊按之则往来迟缓时一止而复来仲景云陰盛则结经曰促结则生代则死

代脉之诊其止有常数而不忒如十动一止虽数十次皆见於十动之後如二十动一止虽数

十次皆见於二十动之後代者气衰也诸病见之不祥凡疮肿之病脉促结者难治而况见代脉乎

动脉之诊见於关上无头尾如豆大厥厥然而动摇者是也脉经曰陰阳相搏故谓之动动于阳则阳气虚而发厥动于陰则陰气虚而发热是阳生于尺而动于寸陰生於寸而动於尺不可不辨也

谨按脉者人生之造化病机之外见医家之準绳不可不精究而熟察至於太谿冲阳又为诊法之要生死之机也故十二经脉皆系於生气是气者人之根本寸口脉平而死者生气独絶於内也难经云上部有脉下部无脉其人当吐不吐者死上部无脉下部有脉虽困无能为害是脉有根本人有元气也夫人之受气於谷乃传於脏腑清者为荣浊者为卫荣行脉中卫行脉外陰阳相贯如环无端周流一身昼夜各有常度其不相应者病也病至於甚脉道乃乖抑尝治雀啄屋漏之类若因药餌剋伐所致急用参芪归术姜附之剂多有复生者不可遂弃而不治也

论疮疡五善七恶主治

疮疡之症有五善有七恶五善见三则瘥七恶见四则危夫善者动息自宁饮食知味便利调匀脓溃肿消水鲜不臭神彩精明语声清朗体气和平是也此属腑症病微邪浅更能慎起居节饮食勿药自愈恶者乃五臟亏损之症多因元气虚弱或因脓水出多气血亏损或因汗下失宜荣卫消烁或因寒凉剋伐气血不足或因峻厉之剂胃气受伤以致真气虚而邪气实外似有余而内实不足法当纯补胃气多有可生不可因其恶遂弃而不治若大渴发热或泄泻淋闭者邪火内淫一恶也竹叶黄芪汤气血俱虚八珍汤加黄芪麦门五味山茱萸如不应佐以加减八味丸煎服脓血既泄肿痛尤甚脓色败臭者胃气虚而火盛二恶也人参黄芪汤如不应用十全大补汤加麦门五味目视不正黑睛紧小白睛青赤瞳子上视者肝肾陰虚而目系急三恶也六味丸料加炒山梔麦门五味如不应用八珍汤加炒山梔麦门五味喘粗短气恍惚嗜卧者脾肺虚火四恶也六君加大枣生姜如不应用补中益气汤加麦门五味心火刑剋肺金人参平肺散陰火伤肺六味丸加五味子煎服肩背不便四肢沉重者脾肾亏损五恶也补中益气汤加山茱萸山药五味如不应用十全大补汤加山茱萸山药五味不能下食服药而呕食不知味者胃气虚弱六恶也六君子汤加木香砂仁如不应急加附子声嘶色败唇鼻青赤面目四肢浮肿者脾肺俱虚七恶也补中益气汤加大枣生姜如不应用六君子汤加炮姜更不应急加附子或用十全大补汤加附子炮姜腹痛泄泻咳逆昏愤者阳气虚寒气内淫之恶症也急用托里温中汤後用六君子汤加附子或加姜桂温补此七恶之治法也此外更有潰後发热恶寒作渴或怔忡惊悸寤寐不宁牙关紧急或头目赤痛自汗盗汗寒战咬牙手撒身热脉洪大按之如无或身热恶衣欲投於水其脉浮大按之微细衣厚仍寒此血气虚极传变之恶症也若手足逆冷肚腹疼痛泄利肠鸣饮食不入吃逆呕吐此阳气虚寒气所乘之恶症也若有汗而不恶寒或无汗而恶寒口噤足冷腰背反张颈项劲强此血气虚极变痉之恶症也急用参芪归术附子救之有可生者大抵虚中见恶症者难治实症无恶候者易治宋时齐院令虽尝纂其状而未具其因皇明陶节庵虽各立一方亦简而未悉予故补其缺

云

论疮疡当明本末虚实

疮疡之作皆由膏粱厚味醇酒炙?房劳过度七情鬱火陰虛阳痿精虛气节命门火衰不能生土荣卫虚弱外邪所袭气血受伤而为患当审其经络受证标本缓急以治之若病急而元气实者先治其标病缓而元气虚者先治其本或病急而元气又虚者必先治其本而兼以治标大要肿高臀痛脓水稠粘者元气未损也治之则易漫肿微痛脓水清稀者元气虚弱也治之则难不肿不痛或漫肿黯黑不溃者元气虚甚治之尤难者也主治之法若肿高焮痛者先用仙方活命饮解之後用托里消毒散漫肿微痛者用托里散如不应加姜桂若脓出而反痛气血虚也八珍散不作脓不腐溃阳气虚也四君加归芪肉桂不生肌不收敛脾气虚也四君加芍药木香恶寒憎寒阳气虚也十全大补加姜桂晡热内热陰血虚也四物加参术欲呕作呕胃气虚也六君加炮姜自汗盗汗五臟虚也六味丸料加五味子食少体倦脾气虚也补中益气加茯苓半夏喘促咳 脾肺虚也前汤加麦門五味欲呕少食脾胃虚也人参理中汤腹痛泄泻脾胃虚寒也附子理中汤小腹痞足胫肿脾肾虚也十全大补汤加山茱山药肉桂泄泻足冷脾肾虚寒也前药加桂附热渴淋秘肾虚陰火也加減八味丸喘 淋秘肺肾虚火也补中益气汤加減八味丸大凡怯弱之人不必分其肿溃惟当先补胃气或疑参芪满中间有用者又加发散败毒所补不偿所损又有泥於气质素实或有痰不服补剂者多致有误殊不知疮疡之作缘陰阳亏损其脓既泄气血愈虚岂有不宜补者哉故丹溪先生云但见肿痛参之脉症虚弱便与滋补气血无亏可保终吉

论疮疡用针宜禁

疮疡之症毒气已成者宜用托里以速其脓脓成者当验其生熟深淺而针之若肿高而软者发於血脉肿下而坚者发於筋脉肉色不变者附於骨也小按便痛者脓浅也大按方痛者脓深也按之而不复起者脓未成也按之而复起者脓已成也脓生而用针气血既泄脓反难成若脓熟而不针腐溃益深疮口难敛若疮深而针浅内脓不出外血反泄若疮浅而针深内脓虽出良肉受伤若元气虚弱必先补而後针其脓一出诸症自退若脓出而反痛或烦躁呕逆皆由胃气亏损宜急补之若背疮热毒炽盛中央肉黯内用托里壮其脾胃外用乌金膏涂於黯处其赤处渐高黯处渐低至六七日间赤黯之界自有裂纹如刀划然黯肉渐溃矣当用鉗针利剪徐徐去之须使不知疼痛不见鲜血为妙虽有裂纹脓未流利及脓水虽出而仍痛此皆未通於内竝用针於纹中引之患於背脾之间肉腐脓出肿痛仍作此内有毒筋间隔脓未通耳尤宜引之若元气虚弱误服尅伐患处不痛或肉将死急温补脾胃宜有生者後须纯补之药庶可收敛若妄用刀针去肉出血则气无所依附气血愈虚元气愈伤矣何以生肌收敛乎

论疮疡作呕欲呕

疮疡作呕不可泥於毒气内攻而槩用败毒等药如热甚焮痛邪气实也仙方活命饮解之作

脓焮痛胃气虚也托里消毒散补之脓熟胀痛气血虚也先用托里散後用针以泄之焮痛便秘热蕴於内也内疏黄连汤导之若因寒药伤胃而呕者托里健中汤胃寒少食而呕者托里益中汤中虚寒淫而呕者托里温中汤肝木乘脾土而呕者托里益清汤胃脘停痰而呕者托里清中汤脾虚自病而呕者托里益黄汤鬱结伤脾而呕者托里越鞠汤若不详究其源而妄用攻毒之药则痼者不能溃溃者不能敛矣丹溪虽曰肿胀时呕当作毒气攻心治之溃胀时呕当作陰虚补之殊不知此大槩言之耳即内经诸痛痒疮皆属心火之意况今之热毒内攻而呕者寡脾内虚寒而呕者多岂可执前圣之言而药今人之病欤

治验

进士张德泓背疽微肿微赤饮食少思余用六君等药脓成而溃再用大补阳气之类肉生而敛忽寒热作呕患处作肿候其脉浮大鼓指按之若无形气殊倦余谓之曰此胃气虚急非疮毒也彼云果因侵晨登厕闻秽气始作信夫先生胃气之说也用补托而敛

一男子腹患痈肿硬不溃乃阳气虚弱呕吐少食乃胃气虚寒法当温补脾胃假如肿赤痛甚烦躁脉实而呕为有余当下之肿硬不溃脉弱而呕为不足当补之若痛伤胃气或感寒邪秽气而呕者虽肿胀犹当助胃壮气彼不信仍服攻伐药而果歿

论疮疡用汗下药

仲景先生治伤寒有汗吐下三法东垣先生治疮疡有疏通托里和荣卫三法用之得宜厥疾瘳矣假如疮疡痼硬木闷烦热便秘脉沉而实其邪在内当先疏其内以下之焮痼作痛便利调和脉浮而洪其邪在表当先托其里以汗之元戎云荣卫充满抑遏而为痈者当泄之以夺盛热之气荣卫虚弱壅滞而为痈者当补之以接虚怯之气又东垣先生云疮疡虽面赤伏热不得攻里里虚则下利仲景先生云疮家虽身体疼痛不可发汗汗之则发痉苟不详审妄为汗下以致血气亏损毒反延陷少壮者难以溃敛老弱者多致不救

治验

给事钱南郭腹患痈已成余用托里之药渐起发彼惑於衆论用行气破血以图内销形体甚勘饮食益少患处顿陷色黯坚硬按之不痛余用大补之剂色赤肿起脓熟针之再用托里肿硬渐消而愈

一男子腹内作痛腹外微肿或用药汗之外无形色脉数无力此元气亏损毒不能外起遂与参芪归术之类数剂渐发於外又数剂脓成而欲针之惑於人言用大黄白芷穿山甲之类引脓从便出以致水泻不止患处平陷自汗盗汗发热作渴不食仍用前药加半夏陈皮姜桂四剂形气渐复又数剂针去其脓仍用补剂喜年幼未婚而痊

论疮疡围寒凉之药

内经云五臟不和九竅不通六腑不和留结为痈又云形伤痛气伤痈此则臟腑不和疮发於外也明矣涂贴寒凉岂能调和臟腑宣通气血耶设使痈痛热渴脉滑数而有力属纯阳宜内用济陰丹外用益阳散则热毒自解瘀滯自散若似痈非痈似痛非痛似溃不溃似赤不赤脉洪数而无力属半阳半陰宜内用冲和汤外用陰阳散则气血自和瘀滯自消若微痈微痛或色黯不痛或坚硬不溃脉洪大按之微细软弱属纯陰宜内服回阳汤外敷抑陰散则脾胃自健阳气自回丹溪先生云敷贴之剂应酬轻小热症耳若不辨其陰症阳症之所由分而妄敷寒凉之剂迷塞腠理凝滯气血毒反内攻而肉反死矣况运气得寒而不健瘀血得寒而不散瘀肉得寒而不溃新肉得寒而不生治者审焉

治验

阁老翟石门子耳下作痛内服外敷皆寒凉败毒更加痈痛项间痈硬肉色如故内焮连胸余适考满到京邀视之虽痈坚而脉滑数此脓内溃也虽足三阳热毒之症为寒凉凝结不能外溃先用六君子补中益气各二剂调补脾胃升发阳气患处赤软针出瘀脓甚多仍服至数剂而愈

秋官李北山腿患痈内外用败毒寒凉因痛极刺出脓瘀方知为痈疮口开张肉紫冷陷外无痈势此阳气虚寒而不能收敛用豆豉饼六君子加藿香砂仁炮姜饮食进而患处煖再以十全大补汤元气复而疮口愈一男子腿痈一块经年不消饮食少思强食则胀或作泻日渐消瘦两尺脉微细此命门火衰不能生土以致脾胃虚寒以八味丸治之饮食渐进痈患亦消

论疮疡泥用定痛散

疮疡之作由六淫七情所伤其痛也因气血凝滯所致假如热毒在内便秘而作痛者内踈黄连汤导之热毒炽盛焮肿而作痛者黄连解毒散治之不应仙方活命饮解之瘀血凝滯而作痛者乳香定痛散和之作脓而痛者托里消毒散排之脓胀而痛者针之脓溃而痛者补之若因气虚而痛四君加归芪血虚而痛四物加参芪肾虚而痛六味地黄丸口乾作渴小便频数者加減八味丸此皆止痛之法也丹溪先生云脓出而反痛此为虚也宜补之秽气所触者和解之风寒所逼者温散之若泥用乳没斯执方矣

治验

鸿胪苏龙溪小腹内痈胀作痛大小便秘结作渴饮冷脉洪数而实用黄连解毒二剂痈痛顿止二便调和用活命饮而全愈

一儒者臀患痈痈焮痛甚用活命饮隔蒜灸而消後因饮食劳倦肿痛恶寒发热头疼用补中益气汤频用葱熨法两月余而消

一妇人脇下作痛色赤寒热用小柴胡汤加山梔川芎以清肝火而愈但经行之後患处作痛

用八珍汤以补气血而安若肝胆二经血燥气逆所致当用小柴胡汤加山梔胆草芎归主之若久而脾胃虚弱用补中益气为主若兼气郁伤脾而患间以归脾汤若朝凉暮热饮食少思当以逍遥散为主

论疮疡用生肌之药

夫肌肉者脾胃之所主收敛者气血之所使但当纯补脾胃不宜泛敷生肌之剂夫疮不生肌而色赤甚者血热也四物加山梔连翘色白而无神者气虚也四君加当归黄芪晡热内热陰血虚也四物加参术脓水清稀者气血虚也十全大补汤食少体倦脾气虚也补中益气汤烦热作渴饮食如常胃火也竹叶黄芪汤不应竹叶石膏汤热渴而小便频数肾水虚也用加减八味丸料煎服若败肉去後新肉微赤四沿白膜者此胃中生气也但用四君子汤以培补之则不日而敛若妄用生肌之药余毒未尽而反益甚耳殊不知疮疡之作由胃气不调疮疡之溃由胃气腐化疮疡之敛由胃气荣养东垣先生云胃乃生发之源为人身之本丹溪先生亦谓治疮疡当助胃壮气使根本坚固诚哉是言也可不慎哉

治验

银台郑敬斋腿患痈疮口不敛余考绩到京请治者皆用十宣散之类云旬日收敛至今未应何也余诊其脉浮大按之微细此因脾气虚弱遂用补中益气加茯苓半夏壮其脾胃不数日而疮敛矣

崑庠王子大背患疽年余疮口少许不敛色黯陷下面色痿黄形气怯弱脉浮缓而澁此脾肺气虚也用十全大补汤加附子少许数剂而元气渐复却去附子又三十余剂全愈而领乡荐

论疮疡去腐肉

疮疡之症脓成者当辨其生熟浅深肉死者当验其腐溃连脱丹溪先生云痈疽因积毒在臟腑当先助胃壮气为主使根本坚固而行经活血佐之令其内消余尝治脉症虚弱者用托里之药则气血壮而肉不死脉证实热者用清热之剂则毒气退而肉自生凡疮聚於筋骨之间肌肉之内皆因血气虚弱用十全大补汤壮其脾胃则未成自散已成自溃又何死肉之有若不大痛或木痛或不赤或内脓不溃或外肉不腐乃气血虚弱宜用桑枝灸及十全大补加姜桂壮其阳气则四畔即消疮头即腐其毒自解又何待於针割若脾胃虚弱饮食少思用六君倍加白术壮其荣气则肌肉受毒者自活已死者自溃已溃者自敛若初起或因尅伐或犯房事以致色黯而不痛者乃阳气脱陷变为陰症急用参附汤温补回阳亦有可生

治验

吴庠史邦直之内仲夏患背疽死肉不溃发热痛甚作呕少食口乾饮汤脉洪大按之如无此内真寒而外假热当舍时从症先用六君加炮姜肉桂四剂饮食顿进诸症顿退复用十全大

补汤仍加姜桂之类五十余剂而死肉溃又五十余剂而新肉生斯人气血充盛而疮易起易敛使医者逆知预为托里必无此患

论疮疡未溃用败毒之药

疮疡之症当察经之传受病之表里人之虚实而攻补之假如痃痛热渴大便秘结者邪在内也疏通之痃焮作痛寒热头疼者邪在表也发散之痃痃痛甚者邪在经络也和解之微痃微痛而不作脓者气血虚也补托之漫痃不痛或不作脓或脓成不溃者气血虚甚也峻补之色黯而微痃痛或脓成不出或腐肉不溃者阳气虚寒也温补之若泥其未溃而槩用败毒复损脾胃不惟痃者不能成脓而溃者亦难收敛七恶之症蜂起多致不救丹溪先生云痃痃内外皆壅宜以托里表散为主如欲用大黄宁无孟浪之非溃痃内外皆虚宜以托里补接为主如欲用香散未免虚虚之失治者审之

治验

一男子不慎房劳背胛痃高三寸许濶径尺余自汗盗汗内热发热口乾饮汤脉浮大按之弱濇此精虚气节为患用十全大补加五味麦门山茱山药四剂诸症悉退因余他往别用流气饮一剂虚症悉具肿硬如石余仍以前药六剂而愈

一儒者背痃一块按之则软肉色如故饮食如常劳则吐痰体倦此脾气虚而痰滞用补中益气加茯苓半夏少加羌活外用陰阳散以姜汁调搽而消後因劳头晕作呕仍以前药去羌活加生姜蔓荆子而愈

崑庠马进伯母左脾连脇作痛遣人索治余意此鬱怒伤肝脾用六君加桔梗枳殼柴胡升麻彼别用疮药益甚始请治其脉右关弦长按之软弱左关弦洪按之濇滞乃脾土不及肝木太过因饮食之毒七情之火也遂用前药四剂脉症悉退再加芎归全愈此等症误用败毒行气破血导痰以致不起者多矣

论疮疡用针勿忌鬼神

针灸之法有太乙人神周身血忌逐年忌神逐日人神而其穴有禁针禁灸之论犯之者其病难瘳理固然也但疮疡气血已伤肌肉已坏宜迎而夺之顺而取之非平人针灸之比何忌之有外科精义云疮疡之症毒气无从而解脓瘀无从而泄反攻於内内既消败欲望其生岂可得乎危恶之发於致命之所祸在反掌腹痛囊痃二便不通胸腹胀闷唇疔喉痹咽喉痃塞其祸尤速患者审之

论疮疡阳气脱陷

疮疡阳气脱陷或因剋伐之剂或因脓血大泄或因吐泻之後或因误而入房若发热头痛小

便淋瀝或滑数便血目赤烦喘自汗发热气短头晕体倦热渴意欲饮水投水恶寒憎寒身热恶衣扬手掷足汗出如水腰背反张郑声不絕此无根虚大之假热症若畏寒头痛咳逆呕吐耳聩目蒙小便遗难泻利肠鸣里急腹痛玉jing短缩冷汗时出齿牙浮痛肢体麻痹或厥冷身痛或咬舌啮唇舌根强硬此阳气脱陷之真寒症皆勿论其脉勿论其疮但见一二急用参附汤补之多有复生者大凡溃後劳役元气亏损或梦遗精脱或滑数便血或外邪乘之或误用寒凉气血脱陷而致斯症治以前药亦有复生者

治验

内翰杨臯湖孟夏患背疽服剋伐之剂二旬余矣漫腫坚硬重如负石隔蒜灸五十余壮背遂轻以六君加砂仁二剂涎沫涌出饮食愈少此脾虚阳气脱陷剂用温补反呕不食仍用前药作大剂加附子姜桂又不遂以参芪各一斤归术陈皮各半斤附子一两煎服三日而尽流涎顿止腐肉顿溃饮食顿进再用姜桂等药托里健脾腐脱而疮愈矣

少参史南湖之内夏患疽不起发脉大而无有力发热作渴自汗盗汗用参芪大补之剂益加手足逆冷大便不寬喘促时呕脉微细按之如无惟太冲不絕仍以参芪白术当归陈皮茯苓计斤许加附子五钱水煎二鍾作一服诸症顿退脉息顿复翌日疮起而溃仍用前药四剂後日用托里药调理两月余而消

逊妇卧床十三年矣嘉靖癸卯遭回禄益加忧鬱甲辰三月右肩下发一块焮腫如瓠中赤外白先用凉药一剂不解次用十宣散四剂加痛略红迎徐南楼视之连投参芪丁桂防芷之剂脓溃徐云无恙矣辞後眩暈呕逆恶寒战栗顶陷脓清偶检翁外科发挥至发背门云若初起一头如黍不腫不赤烦躁便秘四五日间生头不计其数疮口各如含一粟名曰莲房发云云始骇为恶症治法虽详不諳於行迎翁至诊云辛凉解散气血两虚者忌之连投参芪归术地黄姜附大剂腫高脓稠兼絀乌金膏数日果腐落筋如脂膜者数片人参每服加至八钱日进二服逾两月平复立斋翁术之渊微他医孰能知之病妇非翁必误入鬼錄矣谨附此以告後人毋为时医之误当知翁术之奇布在方册德泽普济与天地全悠久矣晚生陈逊顿首识

论疮疡发热烦躁

疮疡发热烦躁或出血过多或溃脓大泄或汗多亡阳或下多亡陰以致陰血耗散阳无所依浮散於肌表之间而非火也若发热无寐血虚也用圣愈汤兼汗不止气虚也急用独参汤发热烦躁肉瞤筋惕气血虚也用八珍汤大渴而赤脉洪大而虚陰虚发热也用当归补血汤肢体微热烦躁面赤脉沉而微陰盛发躁也用四君加姜附东垣云昼发热而夜安静是阳气自旺於阳分也昼安静而夜发热是阳气下陷於陰中也如昼夜俱发热者重阳无陰也当峻补其陰故王太仆云如大寒而甚热之不热是无火也当治其心如大热而甚寒之不寒是无水也热动复止倏忽往来时动时止是无水也当助其肾故心盛则生热肾盛则生寒肾虚则寒动於中心虚则热收於内又热不胜寒是无火也寒不胜热是无水也夫寒之不寒责其无水热之不热责其无火热之不久责心之虚寒之不久责肾之弱治者当深味之

治验

操江都宪伍松月背疮愈後大热误为热火用苦寒药一锤寒热益甚欲冷水浴身脉浮大按之全无余曰此阳气虚浮於肌表无根之火也急用六君子加附子一剂而愈

春元沈霓川之内暑月面生痤疮乘凉入风面目浮肿越二日左臂肿痛癰疹如丹背脇髀股等处发肿块三四肉色不红痛甚昼夜号呼寒热往来饮食不思服活命饮及行气败毒之剂其势愈炽肝脉浮濇脾脉弦弱此属二经荣气不从风邪乘虚流注经络为患先以八珍加黄芪柴胡青皮数剂肿处渐渐红罅又以十全大补加金银花白芷龙胆草贝母十余剂脇腿二处溃浓碗许余瑰渐平仍服十全大补汤调理月余而安向使专於祛风攻毒鲜不败事矣

一儒者患流注发热作渴头痛自汗脉洪大按之无力此气血虚寒也用十全大补加麦门五味治之其症益甚仍用前药加附子一钱四剂诸症悉退却去附子加肉桂二十余剂气血渐复又因劳心发热恶寒饮食减少此脾胃复伤元气下陷用补中益气加附子一钱二剂热止食进仍用大补元气而安後因考试不利怀抱不舒更兼劳役饮食日少形气日衰吐痰作渴头痛恶寒或热来复去或不时而动仍用补中益气数剂诸症渐愈元气渐复乃去附子再加肉桂五分百余剂而愈一男子背疮不敛小便赤澀臀肿发热口乾体倦脉洪数而无力用参芪归术熟地芍药陈皮麦门五味炙草肉桂以补元气引火归经脉症益甚此药力未能及也再剂顿退却去肉桂又数剂而愈此症因前失补元气故耳

论疮疡轻症用重剂

人生气血有虚实疮疡所发有轻重治疗之法有攻补元戎云若人气血壅盛荣卫充满抑遏不行腐化而为痈者当泄之以夺盛热之气若人饮食少思精神衰弱荣卫短濇寒搏而为痈者当补之以接虚怯之气丹溪先生云痈疡内外皆虚宜以补接行散为主大抵用药之法如执权衡当察病势轻重邪畜表里疮毒肿溃元气虚实若不详究其因率尔投治实虚七恶之祸不能免矣治者审之

治验

吴庠盛原博掌後患疔红丝至腕恶寒发热势属表症与夺命丹一服红丝顿消又用和解之剂大势已退彼别服败毒药发热口乾红丝仍见脉浮大而虚此气血受伤而然以补中益气汤主之而愈盖夺命败毒性尤猛烈疮邪已散而复用之是诛伐太过失内经之旨矣一儒者元气素弱余补其气血出脓而愈後因劳役疮痕作痒乃别服败毒药一剂以致口噤舌强手足搐搦痰涎上涌自汗不止此气血伤而发痉也用十全大补加附子一钱灌服而苏一男子患疔服夺命丹汗不止而疮不痛热不止而便不利此汗多亡阳毒气盛而真气伤矣用参芪归术芍药防风五味二剂诸症悉愈惟以小便不利为忧余曰汗出不宜利小便汗既止阳气复而自利矣仍用前药去防风加麦门倍用当归黄芪四剂便行疮溃而愈

论疮疡当舍时从症

经云诸痛痒疮疡皆属心火若肿赤烦躁发热引冷便秘作渴脉洪数实是其常也虽在严寒之时必用大苦寒之剂以泻热毒若脉细皮寒泻利肠鸣饮食不入呕吐无时手足逆冷是变常也虽在盛暑之时必用大辛温之剂以助阳气内经曰用寒远寒用热远热有假者反之虽违其时必从其症

论疮疡大便秘结

东垣先生云疮疡热毒深固呕哕心逆发热而烦脉沉而实痃硬木闷大便秘结此毒在臟宜疎通之故曰疎通其内以絶其源又曰疮疡及诸病面赤虽伏火热不得妄攻其里而阳气拂鬱邪气在经宜发表以去之故曰火鬱则发之凡大便不通者乃直肠乾涸也宜用猪胆汁导之若肠胃气虚血涸而不通者宜用十全大补汤培养之若疮症属阳或因入房伤肾而不通者宜用前汤加姜附回阳多有得生者经云肾开窍於二陰藏精於肾津液润则大便如常若溃疡有此因气血亏损肠胃乾涸当大补为善设若不审虚实而一於疏利者鲜有不误

治验

舍亲居宾鸥仲夏患发背黯肿尺余皆有小头如铺黍状四日矣此真气虚而邪气实遂隔蒜灸服活命饮二剂其邪顿退乃纯补其真又将生脉散以代茶饮疮邪大退余因他往三日复视之饮食不入中央肉死大便秘结小便赤浊余曰中央肉死毒气盛而脾气虚也大便不通肠虚而不能传送小便赤浊脾虚而火下陷治亦难矣彼始云莫非间断补药之过予曰然乃急用六君子加当归柴胡升麻饮食渐进大便自通外用乌金膏涂中央三寸许四围红痃渐消中央黑腐渐去乃敷当归膏用地黄丸与前药间服将百剂而愈

一男子腿患痛因服尅伐亏损元气不能成脓余为托里而溃大补而敛但大便结燥用十全大补汤加麦门五味而润月余仍结惑於人言乃服润肠丸而泻不止余用补中益气送四神丸数服而止

论疮疡大便泻痢

疮疡大便泄泻或因寒凉尅伐脾气亏损或因脾气虚弱食不化或因脾虚下陷不能升举或因命门火衰不能生土或因肾经虚弱不能禁止或因脾肾虚寒不能司职所主之法若寒凉伤脾用六君加木香砂仁送二神丸脾虚下陷用补中益气送二神丸命门火衰用八味丸料送四神丸肾虚不禁用姜附汤加吴茱萸五味脾肾虚寒用参附汤送四神丸病机云脉沉而细身不动作睛不了了饮食不下鼻准气息者姜附汤主之身重四肢不举者参附汤主之仲景先生云下痢肠鸣当温之脉迟紧痛未止当温之大孔痛当温之心痛当救里可与理中附子四逆辈精要云痢疽呕泻肾脉虚者不治此发内经之微旨也凡此实难治之症如按前法治之多有可生者

治验

御医王彭峯之内年踰四十背疽不起发泄泻作呕食少厥逆脉息如无属阳气虚寒用大补剂加附子姜桂不应再加附子二剂泻愈甚更以大附子姜桂各三钱参芪归术各五钱作一剂腹内始热呕泻乃止手足渐温脉息遂复更用大补而溃再用托里而敛十年後仍患脾胃虚寒而歿

论疮疡小便淋漓频数不利

疮疡小便淋漓频数或茎中澀者肾经亏损之恶症也宜用加減八味丸以补陰足胫逆冷者宜用八味丸以补阳若小便频而黄者宜用四物汤加参术麦門五味以滋肺肾若小便短而少者宜用补中益气加山药麦門五味以补脾肺若热结膀胱而不利者宜用五淋散以清热若脾气燥而不能化者宜用黄芩清肺饮以滋陰若膀胱陰虛阳无以生者宜用六味丸若膀胱阳虛陰无以化者宜用滋肾丸肾虚之患多传此症非滋化源不救若用黄栢知母反泻其阳以速其危若老人陰痿思色精内败茎中痛而不利者用加減八味丸加车前牛膝不应更加附子多有复生者若精已竭而复耗之大小便中牵痛愈痛则愈便愈便则愈牵痛以前药加附子亦有复生者王太仆云无陰则阳无以化无阳则陰无以生当滋其化源苟专用淡渗复损真陰乃速其危也

治验

职方王的塘背疽溃後小便淋漓或时自遗作渴引饮烦热不寐疮口焮赤时或如灼时或似遗余曰此肾虚之恶症用加減八味丸加麦門数剂而痊

太守朱阳山患背疽漫肿色黯微痛作渴疮头数十左尺洪数按之有力此肾虚之症先用活命饮二剂以杀其毒午前以参芪归术之类壮气血午後以加減八味丸料固肾气喜其未用败毒之药元气未损故数日脓出肉腐而愈

驾部林汝玉冬不衣绵作渴饮冷每自喜壮实晒余衣绵诊其脉数大无力余曰至火令当求余也三日间果背热便秘脉澀用四物加芩连山梔数剂大便稍和却去芩连加参术茯苓二十余剂及前丸半斤许渴減六七背热亦退至夏背发一疽纯用托里之剂而敛封君袁怀雪背疽发热作渴脉数无力用四物加黄栢知母玄参山梔连翘五味麦門银花背疽渐退又加白芷参芪腐肉尽溃因停药且劳热渴仍作乃以参芪归芷炙草山药山茱茯苓泽泻肉桂而愈又以六味丸十全大补而敛

论疮疡作渴

疮疡作渴若焮痛发热便利调和者上焦热也用竹叶石膏汤肿痛发热大便秘澀者内臟热也用四顺清凉饮焮肿痛甚者热毒蘊结也用仙方活命饮漫肿微痛者气血虚壅也用补中

益气汤若因胃火销烁而津液短少者用竹叶黄芪汤若因胃气虚而不能生津液者用补中益气汤若因胃气伤而内亡津液者用七味白术散若因肾水乾涸作渴或口舌乾燥者用加減八味丸或先口乾作渴小便频数而後患疽或疽愈後作渴饮水或舌黄乾硬小便数而疽生者尤其恶也苟能逆知其因预服加減八味丸补中益气汤以滋化源可免是患

论疮疡出血

疮疡出血因五臟之气亏损虚火动而错经妄行也当求其经审其因而治之若肝热而血妄行者四物炒梔丹皮芩术肝虚而不能藏血者六味地黄丸心虚而不能生血者四物炒连丹皮芩术脾虚热而不能统血者四君炒梔丹皮若脾经鬱结用归脾汤加五味子脾肺气虚用补中益气加五味子气血俱虚用十全大补陰火动用六味丸加五味子大凡失血过多见烦热发渴等症勿论其脉急用独参汤以补气经云血生於气苟非参芪归术甘温等剂以生心肝之血决不能愈若发热脉大者不治凡患血症皆当以犀角地黄汤为主

治验

翰林屠渐山年四十患湿毒疮疾误用轻粉之剂亏损元气久不能愈一日将晡之际诊之肝脉忽洪数而有力余曰何肝脉之如此侵晨疮出黯血三四碗体倦自汗虽甚可畏所喜血黯而脉静余曰此轻粉之热血受其毒而妄行轻粉之毒亦得以泄邪气而真气虚也当急用独参汤主之余重其为人体恤甚笃但惑於他言不果致邪气连绵不已惜哉

一男子背疮出血烦躁作渴脉洪大按之如无此血脱发躁用当归补血汤二剂少愈又以八珍加黄芪山梔数剂全愈

一妇人溃後吐鲜血三碗许余用独参汤而血止用四君熟地芎归而疮愈此血脱补气阳生陰长之理也若用凉血降火沉陰之剂脾胃生气复伤不惟血不归源而死无疑矣

一老妇手大指患疔为人针破出鲜血手背俱腫半体皆痛神思昏愤五日矣用活命饮始知痛在手疮势虽恶不宜大攻再用大补剂又各一剂外用隔蒜灸喜此手背赤腫而出毒水又各一剂赤腫渐溃又用托里药而瘥

南仪部贺朝卿陞山西少参别时余见其唇鼻青黑且时搔背问其故曰有一小疮耳余与视之果疽也此脾胃败坏为不治之症余素与善悲其途次不便殓殮遂托其僚友张东沙辈强留之勉与大补但出紫血虚极也或谓毒炽不能为脓乃服攻毒药一鍾以致呕逆脉脱果卒於南都

金宪张碧崖腰患疽醉而入房脉洪数两尺更大余辞不治将发舟其子强留顷间吐臭血五六碗余意此肾经虚火而血妄行血必从齿缝出将合肉桂等补肾制火之药各用罐别煎熟听用血止拭齿视之果然遂合一鍾冷服之热渴顿止少顷温服一鍾脉细欲脱气息奄奄得

药则脉少复良久仍脱其子疑内有脓欲刺之余曰必无乃以鹅翎管絛内果如余言次日脉脱脚寒至膝腹内如冰急用六君加姜附腹始温脓始溃疮口将完彼因侍者皆爱妾又患小便不通此陰已痿而思色以降其精精内败不出而然耳用加减八味丸料加参芪白朮一剂小便虽愈疮口不斂而殮

薛氏医案卷十三

卷十四

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷十四

明 薛己 撰

外科枢要二

脑疽

脑疽属膀胱经积热或湿毒上涌或陰虛火炽或肾水亏损陰精消涸初起肿赤痛甚烦渴饮冷脉洪数而有力乃湿热上涌当用黄连消毒散并隔蒜灸以除湿热漫腫微痛渴不饮冷脉洪数而无力乃陰虛火炽当用六味丸及补中益气汤以滋化源若口舌乾燥小便频数或淋漓作痛乃肾水亏损急用加減八味丸及前汤以固根本引火归经若不成脓不腐溃阳气虚也四君加归芪不生肌不收敛脾气虚也十全大补汤若色黯不溃或溃而不斂乃陰精消涸名曰脑烁为不治若攻补得宜亦有可愈治者审焉

治验

一妇人患前症口乾舌燥内服清热外敷寒凉色黯不聾胸中气噎此内真寒而外假热也彼疑素有痰火不欲温补余以参芪各五钱姜桂各三钱一剂顿然溃又用大补药而愈

一妇人冬间患此肿痛热渴余用清热消毒药溃之而愈次年三月其舌肿大遍身发疔如卜萄不计其数手足尤多乃脾胃受毒也先各刺出黑血随服夺命丹七粒出臭汗疮热益甚便秘二日与大黄芩连各三钱升麻白芷山梔薄荷连翘各二钱生甘草一钱水煎三五沸服之大小便出臭血甚多下体稍退乃磨入犀角汁再服舌本及齿缝出臭血诸毒乃消更以犀角地黄汤而愈

耳疮

耳疮属手少阳三焦经或足厥陰肝经血虛风热或肝经燥火风热或肾经虛火等因若发热焮痛属少阳厥陰风热用柴胡梔子散若内热痒痛属前二经血虛用当归川芎散若寒热作痛属肝经风热用小柴胡汤加山梔川芎若内热口乾属肾经虛火用加味地黄丸如不应用加減八味丸余当随症治之

治验

文选姚海山耳根赤肿寒热作痛此属三焦风热也但中气素虚以补中益气加山梔炒黄芩牛蒡子治之而愈

一儒者因怒耳内作痛出水或用祛风之剂筋挛作痛肢体如束此肝火伤血也用六味丸料数服而愈举人毛石峯子年二十耳内出水或作痛年余矣脉洪数左尺益甚此属肝肾二经虚热也用加减八味丸料一剂而愈

一男子每入房耳内或作痒或出水常以银簪探入甚喜陰凉此属肾经虚热也用加减八味丸而愈

一妇人因怒发热每经行即两耳出脓两太阳作痛以手按之痛稍止怒则胸脇乳房胀痛或寒热往来或小便频数或小腹胀闷此皆属肝火血虚也先用梔子清肝散二剂又用加味逍遥散数剂诸症悉退又以补中益气加五味而全愈

一妇人经行後因怒气劳役发热寒热耳内作痛余以经行为血虚用八珍汤加柴胡怒气为肝火用加味逍遥散劳役为气伤用补中益气汤加山梔而愈

一妇人耳内作痛或肿聾寒热发热面色素青黄经行则变赤余以为怒气伤肝郁结伤脾用加味归脾汤加味逍遥散而愈

一妇人耳内痼痛寒热口苦耳内出水焮连颈项饮食少思此肝火盛而伤脾也用小柴胡汤加山梔牡丹皮调补肝脾而全愈

一孀妇或耳内外作痛或项侧结核内热晡热月经不调唾痰少食胸膈不利余以为郁怒伤肝脾朝用归脾汤以解脾郁生脾气夕用加味逍遥散以清肝火生肝血而愈

太卿魏庄渠癸卯仲冬耳内作痛左尺洪大而澁余曰此肾水枯竭不能生肝木当滋化源彼不信仍杂用直补之剂余谓其壅遏时若曰庄渠不能生肾水来春必不能起至明年季春十八日复请治昏愤不语颐耳之分已有脓矣且卵缩便数方信余言求治辞不克用六味丸料一鍾陰茎舒出小便十減六七神思顿醒余曰若砭脓出庶延数日为立嗣之计否则脓从耳出死立待矣或谓不砭可生者余因辞归翌日果耳内出脓至二十一日己未火日而卒

宪副姜时川癸卯冬右手寸口浮数而有痰口内若有疮然余曰此胃火传於肺也当薄滋味慎起居以御之甲辰秋尺脉洪数而无力余曰此肺金不能生肾水无根之火上炎也宜静调理滋化源以治之彼云今喉耳不时燥痛肢体不时发热果是无根之火殒无疑矣後会刘古峡云姜公之病已如尊料遂拉同往视喉果瘰癧脉愈洪大又误以为疮毒而投苦寒之剂卒于仲春二十八日乃药之促其亡也否则尚能延至仲夏

鬢疽【男妇同用】

鬢疽属肝胆二经怒火或风热血虚所致若发热作渴者用柴胡清肝散肿髻痛甚者用仙方活命饮若大势已退余毒未散用参芪归术为主佐以川芎白芷金银花以速其脓脓成仍用参芪之类托而溃之若欲其生肌收敛脾虚者六味丸血虚者四物加参芪或血燥或水而不能生木者用四物汤六味地黄丸气虚者用补中益气汤皆当滋其化源为善

治验

侍御朱南臯患前症肿痛发热日晡尤甚此肝胆二经血虚火燥也用四物汤加玄参柴胡桔梗炙草治之而愈又因劳役发热畏寒作渴自汗用补中益气汤去柴升加五味麦门炮姜而瘥

州守胡廷器年七十患前症肿焮作痛头目俱胀此肾水不足肝胆火盛而血燥也用六味丸料四剂疮头出水而愈後因调养失宜仍瘡痛烦热喘渴脉洪大而虚此脾胃之气伤也用补中益气以补脾胃用六味地黄丸以补肾肝而瘥

癰癧【妇人症见妇人良方小儿症见小儿撮要】

夫癰癧之症属三焦肝胆二经怒火风热血燥或肝肾二经精血亏损虚火内动或悲怒气逆忧思过甚风热邪气内搏於肝盖怒伤肝肝主筋肝受病则筋累累然如贯珠也其候多生於耳前後项腋间结聚成核初觉憎寒恶热咽项强痛苦寒热焮痛者此肝火风热而气病也用小柴胡汤以清肝火并服加味四物汤以养肝血若寒热既止而核不消散者此肝经火燥而血病也用加味逍遥散以清肝火六味地黄丸以生肾水若肿高而稍软面色痿黄皮肤壮热脓已成也可用针以决之及服托里之剂若经久不愈或愈而复发脓水淋漓肌肤羸瘦者必纯补之剂庶可收敛否则变成九癰内经曰陷脉为癰留连肉腠即此病也外用豆?饼琥珀膏以驱散寒邪补接阳气内服补中益气汤六味丸以滋肾水培肝木健脾土亦有可愈者大抵肝胆部分结核不问大小其脉左关弦紧左尺洪数者乃肾水不能生肝木以致胆火燥而筋挛须用前药以滋化源是治其本也外台秘要云肝肾虚热则生癰病机云癰癧不系膏粱丹毒火热之变因虚劳气郁所致止宜补形气调经脉其疮自消散盖不待汗之下之而已也其不详脉证经络受病之异者下之则犯经禁病禁虚虚之祸如指诸掌若脉洪大元气虚败为不治若面眇白为金尅木亦不治若眼内赤脉贯瞳人见几条则几年死使不从本而治妄用伐肝之剂则误矣盖伐肝则脾土先伤脾伤则损五脏之源矣可不慎哉

治验

阁老杨石斋子年十七发热作渴日晡頰赤左关尺脉大而浮此肝肾陰虚用补陰八珍汤五十余剂又加参芪二十余剂而溃但脓水清稀肌肉不生乃以参芪归术为主佐以芍药熟地麦门五味脓水稠而肌肉生更服必效散一剂癰毒去而疮口敛

容台张美之善怒孟春患此或用伐肝之剂不愈余以为肝血不足用六味地黄丸补中益气汤以滋化源至季冬而愈

一儒者愈後体瘦发热昼夜无定此足三陰气血俱虚用八珍加麦门五味二十余剂又用补中益气加麦门五味及六味丸而愈

儒者杨泽之缺盆间结一核余谓此肝火血燥而筋挛法当滋肾水生肝血彼反用行气化痰外敷南星商陆益大如碗余用补中益气汤六味地黄丸以滋肾水间用芦荟丸以清肝火年余元气复而消

儒者张子容素善怒患此久而不愈疮出鲜血左关弦洪重按如无此肝火动而血妄行症属气血俱虚用补中益气汤以补脾肺用六味丸以滋肾肝而愈

一男子颈间结核大溃一妇人左眉及髮际结核并用梔子清肝散海藻散坚丸以清肝火养肝血益元气而愈此症亦有大如升斗者亦治以前药可愈

陆子温两耳下瘰疬硬用伐肝软坚之剂益甚其脉左关弦紧左尺洪数此肾水亏损而筋挛也当生肺金滋肾水则肝得血而筋自舒矣彼不悟仍服前药竟致不起

时毒

夫时毒者为四时邪毒之气而感之於人也其候发於鼻而耳项咽喉赤瘰无头或结核有根寒热头痛恍惚不宁状如伤寒五七日之间亦能杀人治宜精辨之若脉浮数者邪在表也用葛根牛蒡子汤解毒升麻汤之类以发之脉沉濡者邪在里也用梔子仁汤大黄汤之类以下之表里俱病者犀角升麻汤甚者砭出恶血并用通气散?鼻内取嚏以泄其毒十日外自消若?药不嚏者不可治之如嚏出脓血者治之必愈至七八日之间大小便通利头面瘰起高赤者可服托里散黄芪散此病若五日已前精神昏乱咽喉秘塞语声不出头面赤瘰食不知味者必死之候凶荒劳役患之安里为主用普济消毒饮最善然而此症有陰有阳有可汗有可下若误认为热毒而用寒药则谬矣

治验

少宰李蒲汀用发散之药耗损元气患处不消体倦恶寒食少口乾余用益气汤加桔梗及托里消毒散而愈秋官陈同野元气素弱脉微细而伏此形病俱虚也用参术芎归陈皮柴胡升麻炙草以升举阳气用牛蒡玄参连翘桔梗以解热毒二剂瘰顿消而脉亦复矣苟以脉微细为属陰以瘰赤为属阳而药之鲜有不误者一妇人溃後瘰赤不消食少体倦脓清色白乃脾肺气虚也先用六君加桔梗芎归後用益气汤加桔梗而敛春官袁谷虚之妹表散过度瘰硬不食脉浮大按之而短此真气絕也辞不治後果歿

疔

疔 属足阳明胃经或外因风热所乘或内因积热所致若疔痛寒热者白芷胃风汤内热疔痛者升麻黄连汤外疔作痛内热口乾者犀角升麻汤内伤寒凉不能消溃者补中益气汤发热作渴大便秘结者加味清凉饮表里俱解而仍肿痛者欲作脓也托里散若饮食少思胃气虚弱也六君子汤肢体倦怠阳气虚弱也补中益气汤脓毒既溃疔痛不减热毒未解也托里消毒散脓出而反痛气血虚也人参内托散发热晡热陰血虚也八珍汤恶寒发热气血俱虚也十全大补汤若疔焮痛连耳下者属手足少阳经当清肝火若连颐及耳後者属足少陰经虚火当补肾水患此而有不治者多泥风热执用剋伐之药耳

治验

地官陈用之服发散之剂寒热已退肿痛不消此血凝滯而欲作脓也用托里消毒散而脓成又用托里散而脓溃但脓清作渴乃气血虚也用八珍加麦门五味三十余剂而愈

上舍卢懋树左尺脉数症属肾经不足误服消毒之剂致损元气而不能愈余用补中益气六味丸料而痊上舍熊栋卿颐後患之脓清体瘦遗精盗汗晡热口渴痰气上涌久而不愈脉洪大按之微细属肾气亏损所致遂用加減八味丸料并十全大补汤而愈

一妇人素内热因怒耳下至颈疔痛寒热此肝胆经火燥而血虚用柴胡栀子散而疔痛消用加味逍遥散而寒热退用八珍汤加丹皮而内热止

发背【男妇同用】

发背属膀胱督脉经或陰虚火盛或醇酒厚味或郁怒房劳所致若疔赤痛甚脉洪数而有力热毒之症也为易治漫肿微痛色黯作渴脉洪数而无力陰虚之症也为难治不疔不痛或漫肿色黯脉微细阳气虚甚也尤为难治若疔焮作痛寒热作渴饮食如常此形气病气俱有余也先用仙方活命饮後用托里消毒散解之漫疔微痛或色不赤饮食少思此形气病气俱不足也用托里散调补之不作脓或脓成不溃阳气虚也托里散倍加肉桂参芪脓出而反痛或脓清稀气血俱虚也八珍汤恶寒形寒或不收敛阳气虚也十全大补汤晡热内热或不收敛陰血虚也四物加参术作呕欲呕或不收敛胃气虚也六君加炮姜食少体倦或不收敛脾气虚也补中益气汤加茯苓半夏肉赤而不敛血热也四物加山梔连翘肉白而不敛脾虚也四君加酒炒芍药木香小便频数者肾陰亏损也加減八味丸若初患未发出而寒热疼痛作渴饮冷此邪气内蕴也仙方活命饮口乾饮热漫疔微痛此元气内虚也托里消毒散饮食少思肢体倦怠脾胃虚弱也六君子汤如未应加姜桂其有死者乃邪气盛真气虚而不能发出也在於旬余之间见之若已发出用托里消毒散不腐溃用托里散如不应急温补脾胃其有死者乃真气虚而不能腐溃也在於二旬之间见之若已腐溃用托里散以生肌如不应急温补脾胃其有死者乃脾气虚而不能收敛也在於月余见之此三证虽不见於经籍余尝治而历验

治验

都宪周弘冈背患疽瘡而不溃脉大而浮此阳气虚弱而邪气壅滞也用托里散倍用参芪反内热作渴脉洪大鼓指此虚火也用前散急加肉桂脉证顿退仍用托里而愈若以为热毒而用寒药则误矣

太仆王的塘初起因大劳又用十宣散之类加喘渴内热脉大无力此阳气自伤不能升举下陷於陰分而为内热也余以补中益气加酒炒芍药麦门冬五味子治之而愈

上舍张克恭患此内服外敷皆寒凉败毒遍身作痛欲呕少食晡热内热恶寒畏寒余曰遍身作痛荣卫虚而不能营於肉里也欲呕少食脾胃虚寒而不能消化饮食也内热晡热陰血内虚而阳气陷於陰分也恶寒畏寒阳气虚弱而不能卫於肌肤也此皆由脾胃之气不足所致遂用补中益气汤诸症渐退更以十全大补汤腐肉渐溃又用六君子汤加芎归肌肉顿生而愈府庠彭碧溪患腰疽服寒凉败毒之药色黯不痛疮头如铺黍背重不能安寝耳聩目白面色无神小便频澀作渴迷闷气粗短促脉浮数重按如无余先用滋肾水之药一剂少顷便利渴止背即轻爽乃砭去瘀血以艾半筋许明灸患处外敷乌金膏内服参芪归术肉桂等药至数剂元气稍复自疑肉桂辛热一日不用手足并冷大便不禁仍加肉桂及补骨脂二钱肉豆蔻一钱大便如常其肉渐溃更用当归膏以生肌肉八珍汤以补气血而愈

儒者周两峯怀抱久郁背脊患疽肝脉弦洪脾脉浮大按之微细以补中益气汤加桔梗贝母少用金银花白芷二剂肝脉顿退脾脉顿复乃以活命饮二剂脓溃肿消肝脉仍弦此毒虽去而胃气复伤仍用补中益气汤加茯苓半夏而愈

上舍蔡东之患此余用托里之药而溃疮口尚未全敛时值仲冬兼咳 余曰疮口未敛脾气虚也咳 不止肺气虚也法当补其母一日与其同宴见有羊肉余曰补可以去弱人参羊肉之类是也最宜食之遂每日不啻旬余而疮敛 亦顿愈矣

宪副屠九峯孟春患此色黯漫腫作渴便数尺脉洪数此肾水乾涸当歿於火旺之际不信更用苦寒之药复伤元气以促其歿

京兆柴黼庵仲夏患之色黯微腫发热烦躁痰涎自出小腹陰实手足逆冷右关脉澀两尺微细余曰此陰虚之症也王太仆云大热而不热是无火也决不能起恳求治之用大温补之药一剂流涎虽止患处不起终不能救

举人顾东溪久作渴六月初腰患疽不慎起居疮溃尺许色黯败臭小便如淋唇裂舌刺七月终请治右尺洪数左关浮濇余谓先渴而患疽者乃肾水乾涸虚火上炎多致不起然脓水败臭色黯不痛疮口张大乃脾气败而肌肉死也小便如淋痰壅喘促口乾舌裂乃脾肺败而肾水絕也左尺洪数肾无所生也左关浮濇肺剋肝也况当金旺之际危殆速矣二日後果歿盖此症既发於外两月方歿者乃元气虚不能收敛也若豫为调补使气血无亏亦有得生者

乳痈乳岩结核【妇人症见妇人良方女科撮要】

乳房属足阳明胃经ru头属足厥阴肝经男子房劳恚怒伤於肝肾妇人胎产忧郁损於肝脾若焮痛寒热当发散表邪痃焮痛甚当清肝消毒并宜隔蒜灸不作脓或脓成不溃托里散为主不收敛或脓清稀补脾胃为主若脓出反痛或作寒热气血虚也十全大补汤体倦口乾中气虚也补中益气汤晡热内热陰血虚也八珍汤加五味子欲呕作呕胃气虚也香砂六君子汤食少作呕胃气虚寒也前汤加藿香食少泄泻脾虚寒也前汤加炮姜若劳碌肿痛气血未复也八珍汤倍用参苓归术若怒气痃痛肝火伤血也八珍汤加柴胡山梔若肝火血虚而结核者四物汤加参术柴胡升麻若肝脾气血虚而结核者四君子加芎归柴胡升麻郁结伤脾而结核者归脾汤兼瓜蒌散若郁怒伤肝脾而结核不痒不痛者名曰乳岩最难治疗苟能戒七情远厚味解郁结养气血亦可保全

治验

封君袁阳泾左乳内结一核月余赤肿此足三陰虚兼怒气所致用八珍汤加柴梔丹皮治之诸证渐退又用清肝解郁汤而愈时当仲秋两目连割肝脉微弦此肝经火盛而风动也更加龙胆草五味并六味地黄丸而愈若用清热败毒化痰行气鲜有不误者

一儒者两乳患痃服连翘饮反坚硬食少内热胸脇作痛日晡头痛小便赤涩此足三陰虚而兼郁怒前药复损脾肺先用六君加芎归柴胡山梔四十余剂元气复而自溃乃作痛恶寒此气血虚也用十全大补汤六味丸而愈

一儒者两乳作痛两脇作胀久服流气饮瓜蒌散後左脇下结一块肉色不变劳则寒热用八珍加柴胡远志贝母桔梗月余色赤作痛脓将成矣後针出脓碗许顿然作呕此胃气虚而有痰也令时嚼生姜服六君子汤呕止加肉桂而疮愈後出仕每劳怒胸乳仍痛或发寒热服补中益气汤加炒山梔即愈

疔疮

内经曰膏粱之变足生大疔多由膏粱厚味之所致或因卒中饮食之毒或感四时不正之气或感蛇虫之毒或感死畜之秽各宜审而治之其毒多生於头面四肢形色不一或如小疮或如水泡或疼痛或麻木或寒热作痛或呕吐恶心或肢体拘急并用隔蒜灸并服解毒之剂若不省人事或牙关紧急者以夺命丹为末葱酒调灌之若生两足者多有红丝至脐生两手者多有红丝至心生唇面口内者多有红丝入喉皆急用针挑破其丝使出恶血以泄其毒若患於偏僻之处药所难导者惟灸法大有回生之功然疔之名状虽有十三种之不同而治法但审其元气虚实邪之表里而庶无悞人於夭札也若专泥於疏利表散非惟无益而反害之凡人暴死多是疔毒急取灯照其身若是小疮即是其毒宜急灸之并服夺命丹等药亦有复苏者

治验

长洲庠苏子忠鼻梁患之症属表邪但气血俱虚不胜发散遂用补中益气为主佐以防风白芷而愈

一男子小指患之或为针刺出血敷以凉药掌指皆瘡三四倍色黯神昏此邪气郁遏余先以夺命丹一服活命饮二剂稍可余因他往或为遍刺其手出鲜血碗许臂瘡如瓠指大数倍用大剂参芪归术之类及频灸遍身而瘡消但大便不实时常泄气此元气下陷以补中益气加骨脂肉?吴茱五味又日以人参五钱麦门三钱五味二钱水煎代茶饮又用大补药五十余贴而愈设此症初不用解毒之剂後不用大补之药死无疑矣白莲泾陈伯和子唇患之有紫脉延至口内将及於喉余曰紫脉过喉则难治矣须针其脉并疮头出恶血以泄其毒则可彼不信别用解毒之剂遂至头面俱瘡复求治口内瘡胀针不能入乃砭面唇出黑血碗许势虽少退终至不起惜哉

肺疽肺痿【妇人症见妇人良方】

夫肺者五脏之华盖也处於膈中主於气候於皮毛劳伤气血腠理不密外邪所乘内感於肺或入房过度肾水亏损虚火上炎或醇酒炙?辛辣厚味薰蒸於肺或咳唾痰涎汗下过度重亡津液之所致也其候恶风咳 鼻塞项强胸脇胀满呼吸不利咽燥作渴甚则四肢微瘡咳唾脓血若吐痰臭浊脓血腥秽胸中隐隐微痛右手寸口脉数而实者为肺疽若吐涎沫而无脓脉数而虚者为肺痿也若咳 喘急者小青龙汤咳 胸胀者葶苈大枣泻肺汤咳脓腥浊者桔梗汤咳喘短气或小便短少者佐以参芪补肺汤体倦食少者佐以参术补脾汤咳吐痰壅者肾虚水泛也六味地黄丸口乾咽燥者虚火上炎也加减八味丸此症皆因脾土亏损不能生肺金肺金不能生肾水故始萌则可救脓成则多死若脉微紧而数者未有脓也紧甚而数者已有脓也内经曰血热则肉败荣卫不行必将为脓大凡肺疮咳吐脓血久久如粳米粥者难治若吐脓而不止者亦不可治也其吐脓而自止者自愈其脉短而濇者自痊面色当白而反赤者此火之尅金皆不可治苟能补脾肺滋肾水庶有生者但恐专攻其疮脾胃益虚鲜有不误者矣

治验

一儒者患肺痛鼻流清涕咳吐脓血胸膈作胀此风邪外伤也先用消风散加乱髮灰二服而鼻利又用四君加芎归及桔梗汤而愈後因劳役咳 吐脓小便滴沥面色黄白此脾土不能生肺金肺金不能生肾水也用补中益气汤六味地黄丸而愈

一儒者因素善饮咳脓项强皮肤不泽此脾肺气虚外邪所乘而成肺痛也先用桔梗汤後用人参补肺汤而痊

一男子咳吐痰脓胸腹膨胀两寸与右关脉皆洪数此火不能生土而土不能生金也用桔梗

汤为主佐以补中益气汤而愈

一男子不时咳 作渴自汗发热便数自用清肺降火理气渗利之剂服之反小便不通面目赤色唇裂痰壅脾肺肾三脉浮大按之而数此足三阴亏损不能相生当滋化源否则成痈矣不信仍用分利之药后果患肺痈余用桔梗汤及六味丸而愈

一男子面赤吐脓发热作渴烦躁引饮脉洪数而无伦次先用加减八味丸加麦门大剂一服热渴顿止即熟睡良久觉而神爽索食再剂诸症顿减仍用前药更以人参五钱麦门二钱五分五味二钱水煎代茶日饮一剂月余而安此症面赤者当补肺肾面白者当补脾肺治者验之

一妇人素血虚发热咳 或用痰火之剂後吐脓血面赤脉数其势甚危此脓成而血气虚也余用八珍汤以补元气用桔梗汤以治肺症脉症渐愈

一妇人感冒风寒或用发表之剂反咳 喘急饮食少思胸膈不利大便不通右寸关脉浮数欲用通利之剂余曰此因脾土亏损不能生肺金若更利之复耗津液必患肺痈矣不信仍利之虚证悉至後果吐脓余朝用益气汤夕用桔梗汤各数剂吐脓渐止又朝仍用前汤夕用十全大补汤各五十余剂喜其善调理获愈一妇人咳 吐痰胸膈作痛右寸关浮滑项下牵强此脾胃积热成痰非痈患也以二陈汤加山栀白术桔梗治之而痊

一妇人素血虚内热时咳甲辰孟冬两尺浮洪余曰当防患肺症丙午孟春果咳 左右寸脉洪数此心火刑剋肺金而成肺痈也脓已成矣夏令可忧余用壮水健脾之剂稍愈彼不慎调摄果歿於仲夏

胃脘痛

圣济总录云胃脘痛由寒气隔阳热聚胃口寒热不调故血肉腐坏以气逆於胃故胃脉沉细以阳气不得上升故人迎热甚令人寒热如疟身皮甲错或咳 或呕脓吐血若脉洪数脓成也急排之脉迟紧瘀血也急下之否则其毒内攻腐烂肠胃矣丹溪先生云内疽者因饮食之毒七情之火相郁而发用射干汤主之愚常以薏苡仁汤牡丹皮散太乙膏选用之亦效若吐脓血饮食少思助胃壮气为主而佐以前法不可专治其疮

治验

一男子寒热作渴不时咳吐血内血腥又五日吐脓身皮甲错用射干汤四剂脓血已止但气壅痰多以甘桔汤而愈

一男子用射干汤之类将愈但气喘体倦发热作渴小便频数此肺气不足用补中益气山药山茱麦门五味时仲夏更以生脉散代茶饮而愈

一妇人素食厚味吐脓已愈但小便淋沥此肝肾气虚用补中益气加麦门五味及加减八味丸而愈若膏粱之人初起宜用清胃散

肠痈

孙真人云肠痈为病小腹重强按之则痛小便如淋时时汗出复恶寒身皮甲错腹皮急如瘰甚者腹胀大转侧有水声或绕脐生疮或脓从脐出或从大便下盖因七情饮食所致治法脉迟紧者未有脓也用大黄汤下之脉洪数者已有脓也用薏苡仁汤排之小腹疼痛小便不利脓壅滞也牡丹皮散主之若大便或脐间出脓者不治内经云肠痈为病不可惊惊则肠断而死故患是者其坐卧转侧理宜徐缓时少饮薄粥及服八珍汤固其元气静养调理庶可保全其生

治验

通府张廷用患之两月余矣时出白脓体倦恶寒此邪气去而中气虚也余用托里散兼益气汤徐徐呷之又令以猪肚肺煮烂取其汤调米粉煮时呷半盏後渐调理而痊

一男子里急後重下脓胀痛此脾气下陷用排脓散蜡?丸而愈後因劳役寒热体倦用补中益气汤而安一妇人小腹胀痛小便如淋时时汗出此瘀血凝结於内先以神效瓜蒌散二剂少愈更以薏苡仁汤而愈一妇人小腹胀痛而有块脉芤而涩此瘀血为患也以四物加玄胡索红花桃仁牛膝木香二剂血下而痊一妇人小腹胀痛大便秘濇转侧有水声脉洪数此脓瘀内溃也以梅仁汤一剂下瘀血诸症悉退再以薏苡仁汤二剂而痊

一妇人脓成胀痛小便不利脉洪数此脓毒内溃也服太乙膏三钱脓下甚多更以瓜蒌散蜡?丸及托里散而安【如用云母膏尤妙】

一妇人产後恶血不止小腹作痛服瓜子仁汤下瘀血而痊凡瘀血停滞宜急治之缓则腐化为脓最为难治若流注关节则为败症

腹痛【男妇同用】

腹痛谓疮生於肚腹或生於皮里膜外属膏粱厚味七情郁火若漫肿坚硬肉色不变或脉迟紧未成脓也四君加芍归白芷枳壳或托里散瘰软色赤或脉洪数已成脓也托里消毒散脓成而不外溃者气血虚也卧针而刺之瘰焮作痛者邪气实也先用仙方活命饮隔蒜灸以杀其毒後用托里以补其气若初起欲其内消当助胃壮气使根本坚固而以行经活血之药佐之若用剋伐之剂欲其消散则瘰者不能溃溃者不能敛若用疎利之药下其脓则少壮者多为难治老弱者立见危亡亦有食积疝气类此者见保婴撮要

治验

司马李梧山患此腹痛而势已成用活命饮一剂痛顿止用托里消毒散瘡顿起此脓将成也用托里散补之自溃而愈

锦衣掌堂刘廷器正德辛未仲夏腹患痈溃而脓清热渴腹胀作呕不食或以为热毒内攻皆用芩连大黄之剂病愈甚余曰当舍时从症投以参芪姜附等药一剂呕止食进再用托里等剂而疮愈

进士边云庄腹痛恶寒脉浮数余曰浮数之脉而反恶寒疮疽之症也不信数日後复请视之左尺洪数余曰内有脓矣仍不信至小腹痛胀连及两臂始悟余曰脓溃臂矣气血俱虚何以收敛急服活命饮一剂臂溃一孔出脓斗许气息奄奄用大补药一剂神思方醒每去後粪从疮出痛不可当小腹间如有物上挺即发痒不省人事烦躁脉大举按皆实省而诊之脉洪大按之如无用十全大补倍用参芪至四斤更加附子二枚煎膏服而痒止又用十全大补汤五十余剂而疮斂

上舍周一元腹患痈三月不愈脓水清稀朝寒暮热服四物黄蘗知母之类食少作泻痰涎上涌服二陈枳实之类痰涎愈甚胸膈痞闷谓余曰何也余曰朝寒暮热血气虚也食少作泻脾肾虚也痰涌胸痞脾肺虚也悉因真气虚而邪气实也当先壮其胃气使诸脏有所禀而邪自退矣遂用六君加黄芪当归数剂诸症渐退又用十全大补汤肌肉渐斂更用补中益气汤調理而疮上舍毛体仁素陰虚春初咳 胸中隐痛肾脉数而无力肺脉数而时见此肾气亏损陰火炽盛用六味丸料一剂服之病势虽减内痈已成盖因元气虚而未能发出火令可畏不信服痰火之剂两月後乳间微瘰脉洪数而无力余曰脓内溃矣当刺出其浓以免内攻之祸不信又月余请治但针得一孔脓?不利仍复内攻唇舌青赤余曰脏腑已坏吾何能治之後果歿

从侄孙年十四而毕姻乙巳春年二十四腹中作痛用大黄等药二剂下血甚多胸腹胀满痰喘发热又服破气降火药一剂汗出如水手足如冰余他往适归诊之左关洪数右尺尤甚乃腹痛也虽能收敛至夏必变而成瘰疽用参芪各一两归术各五钱陈皮茯苓各三钱炙草炮姜各一钱二剂诸症少退腹始微赤按之觉痛又二剂作痛又二剂瘰痛脉滑数针出脓瘰更用大补汤精神饮食如故因遗精患处色黯用前药加五味山茱山药骨脂吴茱等剂疮口渐斂瘰症悉具其脉非洪大而数即微细如无惟专服独参汤人乳汁少复良久仍脱余曰当备後事以俟火旺乃祷鬼神巫者历言往事如见更示以方药皆峻利之剂且言保其必生敬信服之後果歿经曰拘於鬼神者不可与言至德而况又轻信方药於邪妄之人耶书此以警後患

流注【妇人症见妇人良方女科撮要小儿症见小儿撮要】

流注或因饮食劳倦脾胃伤损或因房劳陰虚阳气凑袭或因营气不从逆於肉理或因腠理不密外邪客之或暴怒伤肝或郁结伤脾或湿痰流注或跌扑血滯或产後恶露皆因气虚血注而凝也或生於四肢关节或生於胸腹腰臀或结块或漫瘰或作痛皆由元气亏损所致也

悉宜葱熨及用益气养荣汤固其元气则未成者自消已成者自溃若久而不敛佐以豆?饼琥珀膏祛散寒邪补接阳气若内有脓管而不敛者用针头散腐化之经云形伤痛气伤痈又曰真气夺则虚邪气胜则实若不补气血节饮食慎起居戒七情而专用寒凉剋伐其不死者幸矣

治验

侍御朱东溪左脇下近腹肝胆经部分结一块四寸许漫痃不赤按之则痛余曰此当补脾胃彼谓痃?宜表散乃服流气饮後胃气顿虚始信余言遂用四君子加芎归酒炒芍药姜桂胃气复而恶症退乃去乾姜加黄芪数剂微赤微痛又三十余剂痃大痛此脓内溃也遂针之用补中益气加減八味丸而愈

一男子元气虚弱臀痃硬而色不变饮食少思如此年余矣此气血虚而未能溃也先用六君子汤加川芎当归芍药元气渐复饮食渐进患处渐溃更加黄芪肉桂并用葱熨之法月余俟脓熟而针之又以十全大补汤及附子饼熨之而愈

一男子腿患痃肉色不变亦不作痛此真气虚也以补中益气加茯苓半夏少佐以枳殼木香外用香附饼熨之彼谓气无补法乃服流气饮胃气愈虚余用六君子加芎归数剂饮食少进再用补剂月余而消

一男子脇痃一块日久不溃按之必痛脉微而澹此形症俱虚也当补不当泻乃用人参养荣汤及热艾熨患处脓成以火针刺之用豆?饼十全大补汤百剂而愈一男子腹患此痃硬不溃脉弱时呕欲用败毒等药余谓痃硬不溃乃阳气虚弱呕吐少食乃胃气虚寒法当温补脾胃彼不信仍用攻伐而呕愈甚复请治脉微弱而发热余曰热而脉反静脱血脉反实汗後脉反躁者皆为逆也辞不治後果歿

余北仕时有留都贾学士子年十六患此二载矣公陞北宗伯邀余治脉洪大而数脓清热渴食少体倦夜间盗汗午前畏寒余曰真气不足邪气有余治之无功矣余午前以四君子加芎归炙草午後以四君子加五味麦门参芪两月诸症遂可一二又有用渗利之剂保其必生者三月後形体骨立复求余治余时被命南下後竟不救

鹤膝风【妇人症见妇人良方小儿症见保婴撮要】

鹤膝风乃调摄失宜亏损足三陰经风邪乘虚而入以致肌肉日瘦内热减食肢体挛痛久则膝大而腿细如鹤之膝故名之若伤於脾胃者补中益气汤为主伤於肝肾者六味丸为主若欲其作脓或溃後十全大补汤为主皆佐以大防风汤初起须用葱熨可以内消若津涸口乾中气不足也补中益气汤加五味子头晕头痛阳气不升也补中益气汤加蔓荆子发热晡热陰血虚弱也用四物参芪白术畏寒憎寒阳气虚弱也用十全大补汤饮食少思胸膈膨胀脾胃虚痞也用四君子汤面色痿黄饮食少思脾胃虚弱也用六君汤脓水清稀肌肉不生气血

俱虚也用八珍汤热来复去有时而动无根虚火也用十全大补汤形瘦嗜卧寢息发热痰盛作渴小便频数五脏虚损也用六味丸脐腹疼痛夜多漩溺脚膝无力头晕吐痰肾气冷败也用八味丸发热大渴不欲近衣面目赤色脉大而虚血虚发躁也用当归补血汤或有利後而患者亦治以前法余当临症制宜

治验

州守张天泽左膝痠痛胸膈痞满饮食少思时欲作呕头晕痰壅日晡益倦此脾肺气虚用葱熨法及六君加炮姜诸症顿退饮食少思用补中益气加蔓荆子头目清爽间与大防风汤十余剂又用补中益气三十余剂而消

通府刘国威先筋挛骨痛右膝漫痠用化痰消毒之剂痠痛益甚食少体倦加祛风消毒等药寒热作呕大便不实用二陈除湿之类痠起色赤内痛如锥余诊其脉滑数而无力此脓已成元气虚而不能溃也用十全大补汤四剂佐以大防风汤一剂而溃又百余剂而得痊一儒者腿筋弛长月余两膝痠痛此陰虚湿热所乘也用六味丸为主佐以八珍汤加牛膝杜仲间以补中益气汤三月余而消

一男子腿痛膝痠脉浮按之弦紧此肝肾虚弱也用大防风汤二剂已退彼惑於附子有毒乃服治疮之药日渐消瘦虚症渐至复求治余曰倦怠消瘦脾胃衰而不能荣运也小便不禁膀胱虚而不能约制也燥热虚痞胃气弱而不能化也惚恍健忘精神失而溃乱也恶症蜂集余辞之果後歿

天泡疮

天泡疮属元气不足邪气所乘亦有传染而患受症在肝肾二经故多在下体发起有先筋骨痛而後患者有先患而後痛者初起脉浮数邪在脾肺经也先用荆防败毒散解散之脉弦数邪在肝胆经也先用龙胆泻肝汤清解之脉沉数邪在脏腑也先用内疎黄连汤通导之後用换肌消毒散为主愈後再无筋骨疼痛之患若疮凸赤作痛热毒炽盛也疮微作痛毒将杀也疮色白而不结痂阳气虚也色赤而不结痂陰血虚也搔痒脉虚浮气不能相荣也搔痒脉浮数血不能相荣也臀背间或颈间作痒膀胱陰虚也陰器间或股内痒肝经血虚也陰囊作痒重坠肝经陰虚湿热也小便频数短少色赤肝经陰虚也小便频数色白短少脾肺气虚也面目搔痒或搔变赤外邪相转也眉间痒或毛落肝胆血燥也饮食少思口乾饮汤胃气虚也饮食难化大便不实脾气虚也侵晨或夜间泄泻脾肾虚也若治失其法有蚀伤眼目腐烂玉jing拳挛肢体者但用九味芦荟丸以清肝火六味丸以生肾水蠲痹解毒散以养血祛邪亦有可愈者若误用轻粉等剂反为难治

治验

一儒者患前症先玉jing作痒出水後陰囊股内小腹脇臂发小?或乾脓窠误服祛风等药肢

体倦怠恶寒发热饮食渐减大便不实左尺洪数左关弦数右关浮缓按之微弦余曰此患属肝胆经也左关脉弦左尺脉浮数者肾水少而虚热传於肝也右关脉浮缓脾胃之气弱也按之而弦者肝木乘脾土也用六味地黄丸补中益气汤为主佐以换肌消毒散而愈

一儒者患前症色焮赤作痛大便秘而不实服祛风败毒等药舌痛口乾脉浮而数此邪气去而陰虚所致用六味丸料加山梔当归四剂脉症顿退又用八珍汤加山梔丹皮疮色渐白後用四君加归芪而愈

一患者服攻毒等药患处凸而色赤作痛肢体倦怠恶寒发热脉浮而虚此元气复伤而邪气实也用补中益气汤二剂而痊

一儒者患之误服祛风消毒之药复伤元气因劳役过度内热口乾齿龈作痛右关脉洪数而虚此脾胃受伤而火动用清胃散之类而愈

进士刘华甫患之数月用轻粉朱砂等药头面背臂各结一块二寸许溃而形气消弱寒热口乾舌燥唇裂小便淋漓痰涎上涌饮食少思此脾胃伤诸脏弱而虚火动也先用六君子二十余剂又用补中益气汤加山茱山药麦门五味服之胃气复而诸症愈惟小便未清痰涎未止用加減八味丸而痊

一儒者患之头面搔痒或成粒或成片或出水脾肺脉俱洪数此风邪所伤先用荆防败毒散加萆薢鈎藤鈎数剂渐愈但口乾内热用四物加山梔鈎藤金银花甘草节而愈后遍身搔痒内热口乾治以六味丸而瘥一士人每劳役饮酒後则遍身生疮服祛风败毒散而面目胸背臂脇结一块如桃栗凹凸痒痛脓水淋漓气血虚甚寒热往来作渴痰壅此湿热壅盛元气虚而不能愈也外敷当归膏内服补陰八珍加萆薢五钱并换肌消毒散加乾葛鈎藤鈎各一钱二十余剂诸症渐退仍以前药为主佐以调理之剂两月余血气复而疮愈

赤白游风

赤白游风属脾肺气虚腠理不密风热相搏或寒闭腠理内热拂郁或陰虚火动外邪所乘或肝火风热血热治法若风热用小柴胡汤加防风连翘血热用四物加柴胡山梔丹皮风热相搏用荆防败毒散内热外寒用加味羌活散胃气虚弱用补中益气汤加羌活防风及消风散血虚用加味逍遥散陰虚逍遥散六味丸若肝肾虚热用六味丸则火自息风自定痒自止若用祛风辛热之剂则肝火愈燥风火愈炽元气愈虚腠理不闭风客内淫肾气受伤相火翕合血随火化反为难治矣

治验

一男子秋间发疙瘩此元气虚而外邪所侵也先用九味羌活汤二剂又用补中益气加羌防而愈後不慎起居盗汗晡热口乾吐痰体倦懒言用补中益气汤加減八味丸而愈

一妇人身如丹毒搔破脓水淋漓热渴头晕日晡益甚用加味逍遥散而愈

一妇人患赤白游风晡热痒甚余用清肝养血之剂不信乃服大麻风药臂痛而筋挛又服化痰顺气之剂四肢痿弱而歿

一妇人患前症数用风药煎汤泡洗以致腹胀而歿一女子赤晕如霞作痒发热用加味小柴胡汤加生地连翘丹皮而愈

疥疮

疥疮属脾经湿毒积热或肝经血热风热或肾经阴虚发热其体倦食少为脾经湿热用补中益气汤饮冷作痛为脾经积热用清热消毒散搔痒发热为脾虚风热用人参消风散搔痒作痛为风热用当归饮子便秘作痛为热毒用升麻和气饮热渴便利为脾肺虚热用竹叶黄芪汤内热晡热或时寒热属肝经血虚风热用加味逍遥散六味丸体倦少食或盗汗少寢为脾气郁结用加味归脾汤逍遥散地黄丸若发热盗汗或吐痰口乾者为肾经虚热用六味丸料煎服

治验

稽勲李龙冈遍身患此腿足为甚日晡益熉口乾作渴小便频赤此肾经虚热用补中益气汤六味丸而痊一儒者善嚏患痒余以为内有湿热腠理不密外邪所乘也与补中益气汤加白芷川芎治之不从自服荆防败毒散盗汗发热作渴熉痛脓水淋漓仍用前汤倍加参芪五味而痊

一儒者患在臂脚日晡或痒或胀形体倦怠自服败毒散痛处发瘡小便赤涩此肺肾陰虚余用补中益气加五味麦门冬而愈

一儒者患此误用攻伐之剂元气虚而不能愈用补中益气汤加茯苓其疮顿愈又因调养失宜日晡益甚用八珍汤加五味麦门五十余剂而愈

一男子色黯作痒出黑血日晡益甚其腿日瘡夜消余以为气血虚而有热朝用补中益气汤夕用加味逍遥散而愈

一男子时疫愈後所患如前用药补养而愈有同患用砭法出血而死此因陰虚血热色黑作痒也何乃反伤陰血哉

一妇人久不愈食少体倦此肝脾亏损而虚热先用补中益气汤加川芎炒山梔元气渐复更以逍遥散而疮渐愈若夜间谵语此热入血分用小柴胡汤加生地黄治之血虚者四物合小柴胡汤热退却用逍遥散以补脾胃生陰血亦有寒热如疟亦治以前药

附骨疽

附骨疽有因露卧风寒深袭於骨者有因形气损伤不能起发者有因剋伐之剂亏损元气不能发出者有因外敷寒药血凝结於内者凡此皆宜灸熨患处解散毒气补接阳气温补脾胃为主若饮食如常先用仙方活命饮解毒散郁随用六君子汤补托荣气若体倦食少但用前汤培养诸脏使邪不得胜正若脓已成即针之使毒不得内侵带生用针亦无妨如火针亦不痛且使易斂其隔蒜灸能解毒行气葱熨法能助阳行壅滯此虽不见於方书余常用之大効其功不能尽述惟气血虚脱者不应

治验

南司马王荆山腿疽作痛寒热发渴饮食如常脉洪数而有力此足三阳经湿热壅滯用槟苏败毒散一剂而寒热止再剂而疽痛消更用逍遥散而元气复两月後因怒疽痛如锥赤晕散漫用活命饮二剂而痛缓又用八珍汤加柴胡山梔丹皮而痛止复因劳役倦怠懶食腿重头晕此脾胃气虚而不能升举也用补中益气汤加蔓荆子而安一儒者左腿微疽肉色如故饮食少思此真气虚而湿邪内袭也盖诸气皆稟於胃法当助胃壮气遂用六君加藿香木香当归数剂饮食渐进更以十全大补元气渐复而愈

一儒者两腿疽痛肉色不变恶寒发热饮食少思肢体倦怠脾气不足湿痰下注也以补中益气加半夏茯苓芍药二剂寒热退而疽痛消又十余剂脾胃壮而形体健

一男子患此入房两臂硬疽二便不通余谓肾开窍於二阴乃肝肾亏损也用六味丸料加车前牛膝而二便利用补中益气而肿硬消喜其年少得生

一上舍内痛如锥肉色如故面黄懶食痛甚作呕此痛伤胃也用六君子以壮其脾胃用十全大补以助其脓而针之更用前汤倍加参芪芎归麦门五味远志贝母而疮斂

一男子因负重饮食失节胸间作痛误认为疮毒服大黄等药右腿股疽肉色如故头痛恶寒喘渴发热脉洪大而无力此劳伤元气药损胃气而然耳用补中益气汤四剂又用十全大补汤数剂喜其年少而愈

多骨疽

多骨疽者由疮疡久溃气血不能营於患处邪气陷袭久则烂筋腐骨而脱出属足三阴亏损之症也用补中益气汤以固根本若阴火发热者佐以六味丸壮水之主以镇阳光阳气虚寒者佐以八味丸益火之源以消阴翳外以附子饼葱熨法祛散寒邪补接荣气则骨自脱疮自斂矣夫肾主骨若肾气亏损其骨渐疽荏苒岁月溃而出骨亦用前法若投以剋伐之剂复伤真气鲜有不误者

治验

举人于廷器腿患流注年余出腐骨少许午前畏寒午後发热口乾吐痰小便频数余以为足三阴亏损朝用补中益气汤夕用六味丸料加黄芪当归五味子各三十余剂外用豆豉饼诸症渐愈又以十全大补之类喜其慎疾而愈

一儒者患附骨疽失于调理疮口不斂日出清脓少许已而常出三腐骨其脉但数而无邪此气血虚疮结脓管而未能愈繼以乌金膏日服十全大补汤而愈上舍王廷璋患前症三年未愈肢体消瘦饮食难化手足并冷大便不通手足阴冷余谓此阳气虚寒用补中益气汤八味丸及灸其患处而痊

一男子上腭肿硬年余方溃内热作渴肢体消瘦六脉洪大左手尤甚用补中益气汤六味丸出腐骨一块仍服前药诸症悉去疮口亦斂

一男子十六岁间足瘡黯溃而露骨体瘦盗汗发热口乾用十全大补汤六味地黄丸各五十余剂而愈不然多变瘰癧?沥尽气血而亡

一妇人年三十余素弱左手背渐瘡二年後溃出清脓瘡黯连臂内热晡热自汗盗汗经水两月一至此肝脾气血亏损朝用归脾汤夕用逍遥散肿处频用葱熨法两月余诸症渐愈疮出腐骨仍服前药前後共三百余剂得愈

翻花疮

翻花疮者由疮疡溃後肝火血燥生风所致?疮口赘肉突出如菌大小不同?出如蛇头长短不一治法当滋肝补气外涂藜芦膏赘肉自入须候元气渐复脓毒将尽涂之有效不然虽入而复溃若误用刀针蚀药灸法其势益甚或出血不止必致寒热呕吐等症须大补脾胃为善

治验

判官张承恩内股患痈将愈翻出一肉如菌余曰此属肝经风热血燥当清肝热养肝血彼为不然乃内用降火外用追蚀蚀而复翻翻而复蚀其肉益大元气益虚始信余言遂内用栀子清肝散外用藜芦膏而痊一上舍素膏粱善怒耳下结一核从溃而疮口翻张如菌焮连头痛?胸脇作胀或内热寒热或用清热消毒之药年余未瘥余用补中益气汤六味地黄丸而寻愈一男子背疮斂如豆许翻出肉寸余用消蚀割系法屡去屡大此肝经血虚风热余用加味逍遥散三十余剂涂藜芦膏而消又用八珍散倍用参芪归术而斂一妇人素善怒臂患痈疮口出肉长二寸许此肝脾郁怒气血虚而风内动用加味逍遥散涂藜芦膏而愈後因怒患处胀闷遍身汗出如雨此肝经风热风能散气故耳仍用前散并八珍汤而愈

一男子项患肿痰涎涌甚用散坚行气等剂肿硬愈甚喘气发热自汗盗汗体倦食少余曰此

属足三阴亏损当滋化源不信反追蚀患处开翻六寸许?巘色赤日出鲜血三月余矣肝脉弦洪紧实余用大补汤加麦门五味五十余剂诸症渐愈血止三四复因怒饮食顿少其血涌出此肝伤不能藏脾伤不能摄也用补中益气汤为主加五味麦门其血顿止再以六味丸加五味子常服疮口敛至寸许遂不用药且不守禁而歿

薛氏医案卷十四

卷十五

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷十五

明 薛己 撰

外科枢要三

臀痈【男妇同用】

臀膀胱经部分也居小腹之後此陰中之陰其道远其位僻虽太阳多血气运难及血亦罕到中年後尤虑此患治者毋伤脾胃毋损气血但当固根本为主若瘡硬作痛者形气虚而邪气实也用托里消毒散主之微瘡微痛者形气病气俱虚也用托里散补之欲作脓用托里羌活汤若痛甚用仙方活命饮大势既退亦用托里消毒散若脾虚不能消散或不溃不斂者六君子加芎归黄芪若陰虚不能消散或作渴便淋者六味丸加五味子若阳虚不能溃或脓清不能斂者用补中益气汤气血俱虚者十全大补汤若瘡硬未成脓者用隔蒜灸活命饮溃後豆饼补中益气十全大补二汤若灸後大势已退余毒未消频用葱熨以补其气以消余毒为善

治验

巡抚陈和峯脾胃不健常服消导之剂左腿股及臀患瘡余曰此脾气虚而下注非疮毒也当用补中益气倍加白术彼惑於衆论云白术能溃脓乃专以散毒消毒为主而瘡益甚体益倦余用白术一味煎饮而消儒者杨启元左臀患此敷贴凉药肿彻内股服连翘消毒散左体皆痛余以为足三陰亏损用补中益气汤以补脾肺用六味丸加五味以补肝肾股内消而臀间溃又用十全大补汤而疮口斂

一儒者瘡焮痛甚此邪毒壅滯用活命饮隔蒜灸而消後因饮食劳倦瘡痛仍作寒热头疼此元气虚而未能复也与补中益气汤频用葱熨法两月而愈

一男子漫瘡而色不变脉滑数而无力脓将成矣余用托里而欲针彼畏针而欲内消误用攻伐之药顿加恶寒发热自汗等症余用十全大补汤数剂瘡起色赤仍外针内补而愈

崑庠吴辅之父患此内溃瘡胀发热口乾饮食少思此脾胃虚弱也先用六君加芎归芪数剂而溃又用十全大补汤倍加参芪五十余剂而愈

南濠沈克章子年三十脉如屋漏雀啄肿硬七天脓水清稀误服败毒之药余曰此足三陰亏损而药复伤也余用六君加归芪附子一钱二剂瘡潰色赤又减附子五分数剂元气复而瘡愈

一男子硬痛发热此膀胱气虚而湿热壅滯用内托羌活汤二剂热痛悉退後用托里消毒散而潰又用托里散四十余剂而斂

平湖袁上舍患痔外敷寒凉内服消毒攻潰於臀脓水清稀脉洪大而数寒热作渴余辞不治後果歿此足三陰亏损之症失滋化源以致真气益虚邪气愈甚矣不死何俟

囊痈【谓陰囊患痈】

囊痈属肝肾二经陰虚湿热下注若小便澀滯者先分利以泄其毒继补陰以令其自消若湿热退而仍瘡痛宜补陰托里以速其脓脓焮而便秘者热毒壅闭也先用托里消毒散後用针以泄之脓去即解若脓去而瘡痛不减者热毒未解也用清肝养荣汤口乾而小便数者肾经虚热也六味丸内热晡热者肝经血虚也四物加参术体倦食少者脾气虚热也补中益气汤脓水清稀者气血俱虚也十全大补汤此症虽大潰而辜丸悬露治得其法旬日肉渐生而愈若专攻其疮陰道始虚则瘡者不能潰潰者不能斂少壮者多成痼疾老弱者多致不起亦有患痔漏久而串及於囊者当兼治其痔切忌寒药剋伐亏损胃气

治验

给事陆贞山瘡赤胀痛小便澀滯寒热作渴此肝肾陰虚湿热下注也当清肝火除湿毒遂用柴胡炒龙胆吴茱萸炒黄连当归银花皂角刺赤芍药防风木通甘草节一剂瘡痛渐退少加防风木通川芎茯苓作饮下滋肾丸以补陰其热瘡俱退但内有一条筋不消此肝经血气虚损也当滋肾水用六味丸料去茯苓加五味二剂再用补中益气加茯苓作饮送滋肾丸筋顿消而愈京兆朱二峯陰囊胀痛彼以为疝余诊其脉数而滑此囊痈也因肝肾二经陰虚湿热所致脓已成矣服活命饮一剂而潰更用补陰托里而斂

知州王汝道先晡热发热肢体倦怠入房则腿足酸软足心热至腿膝六脉洪数两尺为甚余以足三陰虚欲滋补化源彼反服苦寒降火之剂後陰囊瘡胀用治疝之药瘡胀益甚形气愈虚服温补之剂瘡痛上攻小便不利两尺脉洪滑按之虚甚余曰此囊痈也因气血虚而不能潰先用补中益气汤加山药山茱萸车前子柴胡山梔一剂肿胀顿消随用六味丸料加车前牛膝柴胡山梔一剂小便渐通乃用活命饮与前二药消息兼用至二十余剂囊裂出秽脓甚多乃用托里消毒散六剂脓秽清又用托里散数剂脓水渐少更用补陰托里散及十全大补五十余剂而瘡

儒者陈时用考试不利一夕饮烧酒入房妻不纳翌日陰囊瘡胀焮痛遣人求治余以除湿热清肝火之剂城门夜闭不及归服翌早报云夜来陰囊悉腐玉jing下面贴囊者亦腐此肝火挟

酒毒而湿热炽盛也仍以前药加参芪归木四剂腐肉尽脱辜丸悬挂用大补气血并涂当归膏囊茎全复而愈

一膏粱之客陰囊腫脹小便不利此中焦积热乘虚下注先用龙胆泻肝汤加黄柏知母黄连牛膝四剂渐愈後用补陰八珍汤加柴胡山梔而愈後不守禁忌前症复作仍用补陰八珍汤补中益气汤六味丸而痊又因劳发热自用四物黄柏知母之类虚症悉具疮口开大余谓五脏气血俱虚也朝用补中益气夕用六君子加当归各五十余剂疮口渐敛又用六味丸调补全愈府庠李达卿素肾虚发热久服黄柏知母之类形体渐瘦遗精白浊晡热唾痰余曰此肾水亏损虚火内炽用补中益气之类加五味麦門前症将愈又别用清热凉血之剂饮食少思唾痰不止余以为脾肺复虚不能摄涎归源仍用前汤加茯苓半夏而愈後入房头晕吐痰腰骨作痛大小便道牵痛余曰此精已耗而复竭所致危殆之症也遂朝用前汤加麦門五味夕用六味丸料加五味子萆薢五十余剂诸症顿退後又入房陰囊陰茎作痛别用淡渗之剂陰囊内溃余用补陰托里之剂出脓甚多喜瘡消痛止竟不善调养以致大便不通小便如淋痰涎上涌余曰肾虚之症复作矣诚为可虑有保其可生者用礞石滚痰丸牛黄清心丸之类吐痰愈加余曰非惟无以保其生而反促其危矣固辞不治後果歿

一男子醉而入房陰囊腫脹大如斗小腹胀闷小水淋赤发热口乾痰涎壅甚此膀胱陰虛酒毒所乘也用六味丸料加车前牛膝作饮下滋肾丸诸症顿退再加五味麦門二剂而愈却以补中益气加麦門五味调理而康若用淡渗复损真陰决致不起

悬痈

悬痈谓疮生於玉jing之後谷道之前属足三陰亏损之症轻则为漏沥尽气血而亡重则内溃而即殒若初起湿热壅滯未成脓而作痛或小便瀯滯用龙胆泻肝汤瘡焮痛甚仙方活命饮并以制甘草佐之如此虽患亦轻虽溃亦浅若不能成脓或脓成不溃者八珍散补之若脓已成者急针之欲其生肌收敛肾虚者六味地黄丸血虚者四物加参术气虚者四君加芎归脾虚者补中益气汤气血俱虚者八珍汤并十全大补汤若用寒凉消毒则误矣

治验

尚宝鲍希传日发热服四物黄柏知母之类年余患囊痈唾痰作渴饮汤其热至膝更加芩连二陈热痰益甚谓余曰何也余曰此足三陰亏损水泛为痰寒凉之剂伤胃而甚耳遂先用补中益气夕用六味丸间佐以当归补血汤半载乃愈

赵州守患此症瘡多作痛五月余矣晡热口乾盗汗食少体倦气短脉浮数而无力此足三陰气血亏损用补中益气加制甘草五味麦門三十余剂食进势缓又用六味丸料五十余剂脓溃疮敛後因怒作痛少食脇痛发热仍用前药赖其稟慎疾而愈

通府张敬之患前症久不愈日晡热甚作渴烦喘或用四物汤黄柏知母之类前症益甚更体

倦少食大便不实小便频数谓余曰何也余曰此脾虚之症前药复伤而然也遂用补中益气加茯苓半夏数剂饮食渐进诸症渐愈更加麦门五味调理乃痊经云脾属至阴为阴土而主生血故东垣先生云脾虚元气下陷发热烦渴肢体倦怠等症用补中益气汤以升补阳气而生阴血若误认为肾虚辄用四物黄柏知母之类反伤脾胃生气是虚其虚矣况黄柏知母乃泻阳损阴之剂若非膀胱阳火盛而不能生阴水以致发热者不可用也一儒者患此服坎离丸及四物黄柏知母之类不应脉浮洪按之微细余以为足三阴虚用托里散及补阴托里散渐愈又用六味丸补中益气汤调补化源半载而痊大凡疮疡等症若肾经阳气亢盛致阴水不能化生而患阴虚发热者宜用坎离丸取其苦寒能泻水中之火令阳气衰而水自生若阳气衰弱致阴水不能化生而患阴虚发热者宜用六味丸取其酸温能生火中之水使阳气旺则阴自生况此症属肾经精气亏损而患者十有八九属肾经阳气亢盛而患者十无一二然江南之人患之多属肾经阴血亏损元气下陷须用补中益气汤升补阳气使阳生而阴长若嗜慾过多亏损真水者宜用六味丸补肾经元气以生精血仍用补中益气汤以培脾肺之生气而滋肾水经云阴虚者脾虚也但多误以为肾经火症用黄柏知母之类复伤脾肺绝其化源反致不起惜哉

上舍刘克新溃後作痛发热口乾小便赤澀自用清热消毒之药不应左尺洪数余以为阳气盛而阴气虚也先用四物汤加黄柏知母等诸剂泻其阳气使阴自生服数剂诸症渐愈後用补中益气汤六味地黄丸补脾肺滋肾水而疮口愈

一儒者小便赤澀劳则足软痠痛发热口乾舌燥食少体倦日晡益甚此气血虚而未能溃也遂用八珍汤加麦门山药倍用制甘草数剂诸症悉退但患处痠痛此脓内焮也又五剂脓自涌出又五十余剂而疮口将完又因劳役且停药寒热作渴痠痛脓多用补中益气汤加炒山梔二剂少愈又以八珍汤加麦门五味百余剂痠痛悉去喜其慎起居节饮食常服补剂而安但劳则出脓一二滴後惑於他言内用降火外用追蚀必其收敛致患处大溃几至不起仍补而愈

便痢【一名便毒一名 痢】

便痢属厥阴肝经内热外寒或劳倦过度或房慾不节或慾心不遂或强固其精或肝经湿热而致治法内热外寒者双解散劳倦过度者补中益气汤房慾不节者六味丸料慾心不遂者先用五苓散加大黄疏其精滯後用地黄丸以补其肝肾强固其精或湿热壅滯者宜用龙胆泻肝汤疏肝导滯夫便痢血痢也属厥阴肝经之络脉冲任督脉之隧道故妇人患此多在两拘痠痛或腹中结块小便澀滯苟治者得法患者又能调摄何难敛之有若槩用大黄等剂以求其内消或令脓从便下损其气血及不慎起居饮食者皆为不治

治验

府庠沈尼文年二十左拘患之余以肝肾阴虚先用托里药溃而将愈因入房发热作渴右边亦作痛脓水清稀虚症悉至脉洪大而无力势甚可畏用十全大补加附子一钱脉症顿退再

剂全退後用大补汤三十剂而愈

一儒者瘰癧便涩用八正散二剂清肝火导湿热而瘰癧愈再以小柴胡加芍归泽泻山栀二剂清肝火补脾血而小便利

一男子溃而瘰癧不止此余毒未解用活命饮一剂而痛止再剂而瘰癧消

一男子痛甚发热用前饮一剂痛止再以神效瓜蒌散加山栀柴胡二剂而消

一男子瘰癧而不溃余谓此因阳气虚弱用参芪归术以补托元气用白芷皂角刺柴胡甘草节以排脓清肝数剂而溃以八珍加柴胡补其气血数剂而愈

一男子已溃而痛不止小便秘涩此肝火未解也与小柴胡汤加黄柏知母芍归痛止便利更以托里当归汤而疮敛若毒未解而痛不止者须用活命饮

一妇人素清苦因郁怒患前症或用败毒寒凉之药反哺热内热自汗盗汗月经不行口乾咽燥余谓此郁气伤脾因药复损先以当归汤数剂後兼逍遥散各五十余剂而诸症皆愈

一妇人小腹内如有所梗两拗并人门俱瘰癧小便淋涩经候不调内热作渴饮食少思腹内初如鸡卵而渐大脉洪数而虚左关尤甚属肝脾郁结之症也用加味归脾汤肝火退而脾土健间以逍遥散下芦荟丸而愈一妇人两物瘰癧腹内一块不时上攻月经不调小便不利余以为肝脾气滞以四君加芍归柴胡山栀而愈後因郁怒前症复作却兼胸脇胀满盗汗此肝木甚而伤脾土用加味归脾汤下芦荟丸而痊

一妇人小腹内或作痛或痞闷两拘瘰癧内热寒热胸膈不利饮食不甘形体日瘦此肝气滞而伤脾气朝用补中益气汤夕用六味丸渐愈更用芦荟丸而全愈一妇人两拘瘰癧小腹痞胀小便时数白带时下寒热往来小水淋漓余谓肝气滞而血病用龙胆泻肝汤渐愈又用加味逍遥散六味丸而全愈

一妇人患前症胸脇胀闷或小便不利或时作痛小便澹滞服疏气豁痰等药益甚余谓肝火气分之病用龙胆泻肝汤以清肝热又用加味逍遥散以生肝血六味丸以滋肾水而愈

一妇人患前症余谓此肝脾郁怒之症不信别服化痰利气之剂胸腹胀闷又服峻利疏导之剂变脾虚发瘰之症而歿

一妇人两拘瘰癧内热作渴饮食不甘肢体倦怠陰中作梗小便赤涩为肝脾陰虚湿热用加味归脾汤而愈後因怒复作小腹瘰癧胀小便不利用小柴胡加山栀芍归以清理肝火胀痛顿止又以加味逍遥散调补肝火而痊

一妇人两拘作痛寒热内热小便赤涩胸脇不利此肝火动而脾气伤用补中益气汤加茯苓数剂少愈又与加味归脾汤诸症悉退再用加味逍遥散而全愈一妇人小腹痞闷小便不利内热体倦懒食此气血虚而兼肝火用八珍汤加柴梔胆草治之而安

一妇人陰中如梗两拘痠痛寒热不食小便频数小腹重坠余以为肝脾郁结所致先以补中益气汤加山梔茯苓车前子青皮以清肝火升脾气更以加味归脾汤二十余剂调理脾郁而愈

下疳疮【妇人陰疮等症见女科撮要妇人良方】

下疳属肝经湿热下注或陰虛火燥治法痠痛发热者血虛而有热也四物汤加柴胡山梔痠痛寒热者肝经湿热也小柴胡汤加龙胆草黄连痠痛便涩者湿热壅滯也龙胆泻肝汤痠痛腐溃者气血虛而有火也八珍汤加山梔柴胡日晡热甚者陰血虛而有热也小柴胡汤加参朮归日晡倦怠者阳气虛而下陷也补中益气汤其经久不愈而发寒热者肾水不能生肝木也用六味丸若筋缩纵或为痒痛或出白津此筋疝也用龙胆泻肝汤气虛者补中益气加炒山梔炒龙胆陰虛火燥者用六味丸茎中痒出白津用补中益气汤与清心莲子饮间服盖此症肝经陰虛为本肿痛寒热等症为标须用六味丸以生肝血凡脾土虛不能生金水而见一切肝症者当佐以补中益气汤加麦门冬以滋化源

治验

庶吉士刘华甫或茎中作痛或窍出白津或小便秘涩先用小柴胡汤加山梔泽泻黄连木通胆草茯苓二剂以清肝火导湿热诸症渐愈後因劳倦忽然寒热此元气复伤也用补中益气而安又用六味丸以生肝血滋肾水而全愈

州守姜节甫患前症脓水淋漓作渴吐痰午前恶寒午後发热余曰午前恶寒属阳气虚弱午後发热属陰血不足不信反服二陈黄栢知母之类饮食益少大便不实又日晡热渴小腹重坠患处焮痛仍用四物黄栢知母之类饮食亦不思余以脾气虛而下陷先用补中益气汤调养脾胃以升阳气诸症渐愈又用六味丸滋补肾水以生肝血而痊

一小儿十五岁患前症杂用消毒之药虚症悉具二年余矣询之乃稟所致用萆薢汤月余诸症渐愈又用补陰八珍补中益气二汤而痊

一儒者茎中作痒发热倦怠外皮浮腫二年矣用八珍加柴胡山梔及六味地黄丸而愈有兼陰毛间生虫作痒者用桃仁研烂涂之

一儒者因劳而患焮痛寒热体倦头疼小便赤涩用补中益气汤加车前牛膝山梔而愈

一儒者陰茎腐烂痠痛不止日晡热甚口乾体倦食少欲呕此肝脾血虛也先用六君子加柴

胡升麻脾胃醒而诸症退更以补中益气加炒山梔肝火退而瘰癧瘰癧

痔瘡【男婦同治】

痔屬肝脾腎三經故陰精虧損者難治多成漏症若肺與大腸二經風熱濕熱者熱退自愈不守禁忌者亦成漏症此因醉飽入房筋脈橫解精氣脫泄熱毒乘虛流注或淫極強固其精以致水乘火勢而侮金或炙厚味或勞傷元氣陰虛火熾所致初起癢痛便秘或小便不利者宜清熱涼血潤燥疏風若氣血虛而寒涼傷損者調養脾胃滋補陰精若破而久不愈多成痔漏有穿臀穿陰穿腸者其腸頭瘰癧者濕熱也作痛者風熱也便結者火燥也潰膿者熱勝血也大便秘者潤燥除濕肛門墜痛者瀉火除濕小便澀滯者清肝導濕其成漏者養元氣補陰精為主經云因而飽食筋脈橫解腸澀為痔其屬肝脾腎也明矣若有患痔而兼疝患疝而兼下疳皆屬肝腎不足之變症但用地黃丸益氣湯以滋化源為善若專服寒涼治火者無不致禍

治驗

進士周希輔素有疝痔勞則小腹作痛莖出白津痔亦癢痛若飲食勞倦起居失宜則發寒內熱肢體疲倦服十全大補湯諸症并退彼欲去病根乃用攻病生肌之藥肌體骨立余用益氣湯地黃丸元氣漸復但自弛調攝不能全愈

一儒者膿血淋漓口乾作渴晡熱便血自汗盜汗余謂此腎肝陰虛也不信仍服四物栢知連之類食少瀉嘔余先用補中益氣湯加茯苓半夏炮姜脾胃漸醒後用六味丸朝夕服兩月余諸症悉愈

儒者楊舉元素陰虛勞則肢體倦怠兩足發熱服清熱等劑熱至腰膝大便秘滯飲食過多則瀉至年余作渴吐痰患痔出膿仍不節勞則忽惡寒發熱復患痢膿水不止氣血虛甚余用六味丸補中益氣湯滋養化源喜其慎疾年余而瘳

一男子患此服寒涼之劑侵晨去後不實食少體倦口乾作渴小腹重墜余用補中益氣湯而下墜頓止用四神丸而食進便實用地黃丸而瘳尋愈

一膏粱酒色之人患之作痛服苦寒之藥致臀瘰癧硬又加大黃腹脹頭痛此足三陰虧損而藥復傷余用補中益氣湯升補陽氣加參苓半夏木香以助脾氣數劑而愈

上舍陸子藩時仲冬患痔作痛右手浮大左尺洪數余曰冬見夏脈當壯水之主以鎮陽光彼以為迂別服苓連之劑越明年六月九日復邀視之痰涎上涌日夜不寐脈洪大而數按之無力左尺全無足手肩膊逆冷余曰事急矣彼云但求少延數日以待嗣子一見耳勉用參芪歸朮炮姜之類及六味丸料加肉桂至本月丁酉日果歿五行之理信然

侍御王两湖长子患痔作渴发热尺脉洪数按之无力余曰此肝肾陰精亏损而虚火妄动当滋化源彼不信後吐痰声嘶面赤体瘦而歿

便血【妇人症见女科撮要】

经云邪在五脏则陰脉不和陰脉不和则血留之陰气内结阳络外伤渗入肠间故便血也针经云阳络伤则血外溢而衄血陰络伤则血内溢而便血皆因饮食失节起居不时七情六淫失宜内伤外感所致若外感则血鲜名肠风内伤则血浊名脏毒外感而元气实者人参败毒散加槐花荆芥以祛邪气内伤而元气虚者亦用六君子汤以补胃气元气下陷者补中益气汤以升举之忧思伤脾者济生归脾汤以解之粪前见血者益气汤加吴茱萸粪後见血者加黄连陰血不足者宜用四物汤病因多端不能尽述当临症制宜庶无误矣丹溪先生云精气血气出於谷气惟大便下血当以胃气收功治者审之

治验

一儒者素善饮不时便血或在粪前或在粪後食少体倦面色痿黄此脾气虚而不能统血以补中益气汤加吴茱萸黄连三十余剂而再不发

一男子每怒必便血或吐血即服犀角地黄汤之类余曰此脾虚不能摄血恐不宜用此寒凉之药仍服之日加倦怠面色痿黄更用四物芩连丹皮之剂饮食少思心烦渴热吐血如涌竟至不起若用四君芎归补中益气汤多有得生者

脱肛【男妇同治】

脱肛属大肠气血虚而兼湿热有久痢气血俱虚而脱者有因肾虚而脱者有中气虚而脱者有因血虚而脱者湿热者升阳除湿汤血热者四物加条芩槐花血虚者四物加白术茯苓兼痔而痛者四物加槐花黄连升麻久痢者补中益气汤加酒炒芍药中气虚陷者前汤加半夏炮姜茯苓五味肾虚者六味丸虚寒者八味丸肺与大肠为表里肛者大肠之门肺实热则秘结肺虚寒则脱出肾主大便故肾虚者多患此症

治验

举人于时正素有痔每劳役便脱肛瘡痛出水中气下陷者用补中益气汤加茯苓芍药十余剂中气复而愈後复脱作痛误服大黄丸腹鸣恶食几危余用前汤加炮姜芍药诸症渐愈後去姜加熟地五味三十余剂而愈

一男子脾胃素弱或因劳倦或因入房肛門即下瘡闷痛甚用补中益气汤加麦門五味兼六味丸而愈後因过饮下坠瘡痛误用降火消毒虚症蜂起余用前汤加炮姜木香一剂再用前汤并加減八味丸两月而安一儒者面白神劳素畏风寒饮食喜热稍多必吞酸作泻吸气觉

冷便血盜汗余以为脾肾虚寒用补中益气加炮姜肉桂五十余剂八味丸筋许诸症悉愈

肾脏风疮【男妇同治】

肾脏风属肾虚风邪乘於腠腧以致皮肤如癬或渐延上腿久则延及遍身外症则搔痒成疮脓水淋漓眼目昏花内症则口燥舌乾腰腿倦怠吐痰发热盜汗体疲治法用六味丸为主佐以四生散若脾胃虚弱者用补中益气为主佐以六味丸四生散为善

治验

钦天薛循斋六十有一两膝患之脓水淋漓发热吐痰四年矣此肾脏风症也与六味丸四生散而瘥年余复作延及遍身日晡益甚痰渴盜汗唇舌生疮两目昏赤皆肾经虚火而水泛为痰用加减八味丸而愈三年後小便淋漓茎中澼痛此思色精不出而内败也用前丸及补中益气汤加麦门五味而愈

膝疮【妇人症见女科撮要妇人良方】

膝疮生於两膝初起赤肿久而腐溃或津淫搔痒破而脓水淋漓盖因饮食起居亏损肝肾或因陰火下流外邪相搏而致外膝属足三阳湿热可治内膝属足三陰虚热难治若初起恶寒壮热痼作痛者属湿热用枳苏败毒散若漫肿作痛或不痼不痛者属陰虚用补陰八珍汤若脓水淋漓体倦食少内热口乾者属脾虚用补中益气加茯苓酒炒白芍药若午後热或作痛头目不清者属陰火前汤加酒炒黑黄柏及六味地黄丸若午後发热至子时分方止是血虚前汤加芎归熟地若郁结伤脾而甚用归脾汤加柴胡山梔若怒动肝火而甚用补中益气汤加川芎山梔黄芩内热口乾肢体倦怠或痰涎上升或口舌生疮属脾肾虚热用六味地黄丸补中益气汤若患处黑黯肢体畏寒饮食少思属脾肾虚败用八味地黄丸若误用攻伐复损胃气絕其化源治亦难矣

治验

鸿胪翟少溪两膝生疮渐至遍身发热吐痰口燥咽乾盜汗心烦溺赤足热日晡益甚形体日瘦此肾经虚火也用六味丸不月诸症悉退三月元气平复

一男子左腿痼肉色如故寒热恶心饮食少思此脾气不足而为外邪所感也用六君加藿香桔梗川芎而寒热止又用补中益气汤而痼痛消

陈湖陆懋诚素因陰虚过饮入房发热腿痛似膝疮用发表之剂两腿痼黯热气如雾欲发痼脉皆洪数两尺尤大余曰属足三陰虚酒湿所乘元气损而邪益甚耳用十全大补加山药山茱萸附子一剂脉症顿退却去附子又二剂全愈

一男子先於两膝後及遍身生疮似疥非疥时或脓水淋漓两腿为甚肢体倦怠作痒烦热年余不愈余作肾经虚火用加減八味丸而痊

一男子腿患痛服剋伐之药亏损元气不能成脓余为托里而潰大补而斂若大便结燥用十全大补汤加麦門五味而润月余仍结自服润肠丸而泻不止余用补中益气汤送四神丸数服而愈

足跟疮【妇人症详见妇人良方】

足跟乃督脉发源之所肾经所过之地若饮食失节起居失宜亏损足三陰经则成疮矣若漫腫寒热或体倦少食属脾虚下陷也用补中益气汤若晡热作痛头目不清属脾虚陰火也前汤并六味丸若痰涎上升或口舌生疮属肾水乾涸也前汤并加減八味丸凡此皆当滋其化源若治其外则误矣俗云兔啮疮者盖猎人被兔咬足跟久而不斂气血沥尽而死

治验

大尹陈汝邻两腿酸软或赤或白足跟患腫或痛或痒後痛而或如无皮或如皴裂日晡至夜胀痛焮热用补中益气汤加八味丸料补其肝肾而愈

一男子足跟作痛热渴体倦小便如淋误用败毒散致头痛恶寒欲呕不食吐痰咳嗽此足三陰亏损而药复伤余用十全大补汤加減八味丸各五十余剂而愈一男子素不慎起居内热引饮作渴体倦两足发热後足跟作痛或用清热除湿之剂更加发腫又服败毒之药焮赤痛甚略用祛毒清热潰裂番张状如赤榴热痛如锥内热晡热此因足三陰亏损朝用十全大补汤夕用加減八味丸外敷当归膏两月余而愈其服消毒等药而殁者不能枚举

一男子亦患此服消毒散搽追蚀药虚症叠出其形体骨立自分必死余用十全大补兼山茱山药两月余而愈

一膏粱之人两脚发热作渴左尺脉数而无力余谓此足三陰亏损防患疽不信反服清热化痰之药更加晡热头晕又服四物黄栢知母日晡热甚饮食渐少觉足面发疽余用补中益气六味地黄丸百余服而愈不信患疽以致不起者多矣

一妇人劳则足跟热痛余以为足三陰虚用八珍汤而痊後遍身搔痒误服风药发热抽搐肝脉洪数此肝家血虚火盛而生风以天竺胆星为丸用四物麦門五味芩连炙草山梔柴胡煎送下而愈

一妇人两足发热两跟作痛日晡热甚余以为肝肾血虚用加味逍遥散六味地黄丸五十余剂诸症悉愈一妇人素血虚因大劳两足发热晡热月经过期或用四物黄连饮食少思胸痞吐痰用二陈枳实黄连大便不实吐痰无度足跟作痛余曰足热晡热月经过期乃肝脾血虚

也胸痞吐痰饮食少思脾胃虚也盖胃为五脏之根本胃气一虚诸症悉至先用补中益气汤加白茯苓半夏脾胃渐健乃佐以六味地黄丸以补脾肾不两月而痊

一妇人经候不调发热晡热胸膈不利饮食少思服清热宽中消导之剂前症益甚更兼肢体酸痛服除湿化痰等药经候两月一至服通经降火等剂两足跟指作痛其热如炙余以为足三阴亏损用补中益气六味地黄丸两月诸症渐退又用前汤并八珍散两月而康一妇人足跟患瘡两腿酸软或赤或白或痒或痛後或如无皮或如皱裂日晡至夜胀痛焮热此足三阴亏损用加減八味丸及逍遙散加熟地川芎百余剂而愈

脚发【男妇同治】

脚发之症属足三阴经精血亏损或足三阳经湿热下注若色赤瘡痛而溃脓者属湿热下注为可治若色微赤微瘡而脓清者属精血亏损为难治若黑黯不瘡痛不溃脓烦热作渴小便淋漓者陰敗末傳惡症也为不治其法湿热下注者先用隔蒜灸活命饮以解壅毒次服益气汤六味丸以补精气若色黯不痛者着肉灸桑枝灸以行壅滯助阳气更用十全大补汤八味丸壮脾胃滋化源多有复生者若专治其瘡复伤生气吾未见其生者

治验

阁老靳介庵脚指缝作痒出水瘡焮脚面敷止痒之药不应服除湿之剂益甚余以为陰虛濕熱下注用六味地黄丸补中益气汤而愈

大参李北溪左足赤瘡作痛此足三阳经湿热下注先用隔蒜灸活命饮一剂其痛顿止灸患处出水赤瘡顿消次用托里消毒散四剂灸患处出脓而愈

儒者杨举元患此微瘡痛微赤焮此足三阴经陰虛濕熱下注用隔蒜灸托里散而起发用十全大补汤而脓成又与加減八味丸料百剂而斂

一儒者患此瘡硬色白两月余矣此足三阴经亏损为外寒所侵用大防风汤及十全大补兼服而消後場屋不利饮食劳倦前症复作盜汗内热饮食不化便滑肌瘦此脾土虛寒而命門火不能相生用八味丸益氣湯百余剂喜其年壯得愈

一男子脚心发热作渴引饮或用四物芩连栝知母之类腹痛作呕烦热大渴此足三阴亏损前药复伤脾胃也先用六君加炮姜数剂而脾胃醒再用补中益气加茯苓半夏而脾胃健乃以加減八味丸兼服半載而愈一儒者脚心发热作痒以滾湯浸漬潰而出水肌体骨立作渴吐痰此脾腎虛而水泛为痰也服益氣湯六味丸年余元氣復而諸症愈

少宗伯顾东江面鰲作渴余曰此腎經亏损当滋化源以杜後患彼虽然之而终不服次年九月内左足面患疽色黯不痛脚腿沉重用隔蒜灸三十余壯足腿即轻瘡出血水数日而消瘡

色仍黯时公将北行贺万寿余诊之曰脾脉衰惫阳气虚极不宜远行公曰余得梦屡验向梦羣仙待我此毒徵也至河间驿聚仙堂病笃叹曰立斋岂能留我果卒於此亦异数也

脱疽

脱疽谓疗患於足或足指重者溃脱故名之亦有患於手患於指者因醇酒炙煇膏粱伤脾或房劳损肾故有先渴而後患者有先患而後渴者若色赤作痛自溃者可治色黑不溃者不治色赤作痛者元气虚而湿毒壅盛也先用隔蒜灸活命饮托里散再用十全大补汤加減八味丸色黯不痛者肾气败而虚火盛也隔蒜灸桑枝灸亦用十全大补汤加減八味丸则毒气不致上侵元气不致亏损庶可保生亦有因修手足口咬等伤而致者若元气虚弱或犯房事外涂寒凉内服剋伐损伤脾胃患处不溃若黑黯上延亦多致死重者须当以脚刀转解周 轻泄去之则筋随骨出而毒得泄亦不痛否则毒筋内断虽去而仍溃且偏僻之处气血罕到药难导达况攻毒之剂先伤脾胃不若灸法为良重者须解去为善故孙真人云在肉则割在指则截盖亲之遗体虽不忍伤而遂至夭歿则尤伤矣况解法无痛患者知之

治验

一男子足指患之瘡焮痛赤此三阳经虚而外邪所乘也用隔蒜灸人参败毒散加银花白芷大黄二剂而痛甚又二剂痛止又与十宣散加天花粉金银花去桂数剂而愈又有足指患之者色紫不痛此三阳经热毒壅滞隔蒜灸五十余壮又明灸百壮始痛投活命饮四剂更以托里药溃脱而愈

一男子患前症赤痛作渴此足三陰虚而火内动用隔蒜灸活命饮三剂而溃更服托里药及加減八味丸溃脱而愈若早用前法不至於此

一男子瘡痛色赤发热作渴大小便秘结其脉浮数按之沉实此足三阳经积热内外俱受患也先用隔蒜灸及人参败毒散加银花白芷大黄而溃更以活命饮而痊

一膏粱之人先作渴足热後足大指赤痛六脉洪数而无力左尺为甚余为此足三陰虚当滋化源为主固服除湿败毒等剂元气益虚色黯延足余乃朝用补中益气汤夕用补陰八珍汤各三十余剂及桑枝灸溃而脓清作渴不止遂朝以前汤送加減八味丸夕用十全大补汤三十余剂而痊是时同患此症服败毒之药者俱不救

瘤贅【附结核凡结核当与瘰癧参看】

内经云肝统筋而藏血心统血而主脉脾主肉而统血肺主气而司腠理肾统骨而主水若怒动肝火血涸而筋挛者其自筋瘰起按之如筋久而或有赤缕名曰筋瘤用六味地黄丸四物山梔木瓜之类若劳役火动陰血沸腾外邪所搏而为瘰者其自肌肉瘰起久而有赤缕或皮俱赤名曰血瘤用四物茯苓远志之类若郁结伤脾肌肉消薄外邪所搏而为瘰者其自肌肉

瘰癧起按之实软名曰肉瘤用归脾益气二汤若劳伤肺气腠理不密外邪所?而壅瘰者其自皮肤瘰癧起按之浮软名曰气瘤用补中益气汤之类若劳伤肾水不能荣骨而为肿者其自骨瘰癧起按之坚硬名曰骨瘤用地黄丸及补中益气汤主之夫瘤者留也随气凝滞皆因脏腑受伤气血乖违当求其属而治其本大凡属肝胆二经结核八珍加山梔胆草以养气血清肝火六味丸以养肺金生肾水若属肝火血燥须生血凉血用四物二地丹皮酒炒黑胆草山梔中气虚者补中益气兼服若治失其法脾胃亏损营气虚弱不能濡於患处或寒气凝於疮口荣气不能滋养於患处以致久不生肌而成漏者悉调补脾胃则气血壮而肌肉自生矣若不慎饮食起居及七情六淫或用寒凉蚀药蛛丝纏荒花线等法以治其外则误矣

治验

长洲庠王天爵辛丑春左腿近环跳患之状如大桃按之濡软略服除湿流气化痰之剂恶寒发热食少体倦形气俱虚脉洪大而虚气瘤也肺主之盖胆属木肺属金然发於胆经部分乃肺金侮肝木元气亏损而其脓已内溃矣遂用十全大补汤数剂出青白稀脓甚多顿加寒热烦渴头痛殊类伤寒状余谓此因脓泄而血气益虚耳仍用前汤其势益甚脉洪数大按之如无乃加附子一钱其势愈甚而脉复如前此虚甚而药未能及也更加附子二钱三剂诸症顿退乃朝用补中益气汤夕用十全大补汤各三十余剂出腐骨五块疮口将完後因不慎起居患处复溃诸症更发咽间如焚口舌无皮用十全大补加附子一钱服之诸症即愈二日不服内病悉至患处复溃二年後又患服前药不应诊其尺脉微细如丝此属命门火衰用八味丸为主佐以十全大补汤稍愈至乙巳仍患虚寒之症而歿

一男子左腿外侧近臀瘰癧一块上有赤缕三年矣饮食起居如常触破涌出血脓发热恶寒此胆经受症故发於腿外侧诊其脉左尺洪数左关弦洪此肾水不能生肝木用补中益气汤六味地黄丸而痊

一男子小腹患之脓水淋漓此足三阴之症用补中益气加麦门五味以培脾土用六味地黄丸以生肾水更用芦荟丸以清肝火而斂

一老儒眉间患之二年其状如紫桃下坠盖目按之如水囊此肝脾之症脓瘀内溃而然耳遂刺出血脓目即开以炒黑胆草山梔芎归芍药柴胡白术茯苓等类而愈

举人江节夫两耳下两臂两肋结核略服祛痰降火软坚之剂益甚余曰此胆经血虚火燥也盖胆经行人身之侧前药必致亏损至明年七月复请视各核皆溃脉浮大而濇时金旺於秋木受金剋必不治果卒

嘉善周上舍两耳下项间筋挛壅瘰坚硬咳嗽气喘内热盗汗所服皆化痰散坚行气之剂势益甚予诊之左关弦涩左尺洪数此怒气伤肝房劳损肾须滋肾水生肝血慎调摄至水旺之际庶可愈矣彼欲速效乃外敷商陆石灰等药内服海藻蓬术之类至秋金旺之际元气愈虚其瘰愈甚而歿

镇江孙上舍缺盆间瘡如覆瓿坚硬色赤内热晡热自汗盗汗就治於余曰贱疾皆以散坚行气降火破血之剂欲其内消而反甚其脉左尺洪数按之而弱左关洪数按之而涩此怒气伤肝血涸而筋挛也因其急於仕进余辞不能治彼亦不信後果歿此症若补脾肺滋肝肾则木得水而敷华筋得血而滋润多有得生者

疣

疣属肝胆少阳经风热血燥或怒动肝火或肝客淫气所致盖肝热水涸肾气不荣故精亡而筋挛也宜以地黄丸滋肾水以生肝血为善若用蛛丝纏螳螂蚀着艾灸必多致误大抵此症与血燥结核相同故外用腐蚀等法内服燥血消毒则精血愈虚肝筋受伤疮口翻突开张卒成败症

治验

府庠朱宏仁年二十右手背近中指患五疣中一大者如黄荳余皆如聚黍拔之如丝长三四寸许此血燥筋缩用清肝益荣汤五十余剂而愈

府庠沈姬文幼嚙指甲及长不能自禁余曰此肝火血燥也又颈侧常生小疣子屡散屡发又臂生一块如菉豆大若触碎如断束缕扯之则长纵之则缩後两鬓发白点求治余曰子素肝病此部亦属肝胆经也夫爪为筋之余胆行人身之侧此与嚙爪生?等症相应须滋补肾水以生肝胆则诸病自愈矣乃与六味地黄丸服之二年白点自退疣亦不生

一男子脸患疣初如赤椹杂用敷贴之药翻张如菌又用腐蚀焮大如瘤此足三陰经虚症悉具治以补脾肺生肝肾等剂而寻愈

一男子小腹中一块不时攻痛或用行气化痰等药不应尤以为血鼈服行气逐血之剂後手背结一?子渐长寸许形如鼈状肢节间如荳大者甚多彼泥鼈生子发於外亦用行血虚症悉至左尺洪数关脉洪数弦余以为肾水不能生肝木以致肝火血燥而筋挛用六味地黄丸生肾水滋肝血三月余诸症悉愈

一男子因劳役过度面色青黑发热咳嗽面生疣子腹内一块攻上攻下作痛口乾小便秘涩服消剋之药愈甚察其脉左右关俱弦洪元气弱甚此肝脾受病而筋挛也投以加味逍遥散合地黄丸料元气遂复若误以为血鼈之类消之必致不起

一男子素膏粱醇酒先便血便结惊悸少寐後肛门周生小颗如疣子如鼠乳大小不一用清热败毒等药半载之间腿内股亦然又用化痰之药内热吐痰颈间俱作肝肾脉浮数按之而弱余以为足三陰经血虚火炽法当滋化源彼不信别服四物黄栢知母之类诸症蜂起此胃气复伤各经俱病也先用补中益气汤三十余剂诸症渐愈乃朝用前汤夕用八珍汤又各五十余剂诸症寻愈於是夕改用六味丸加五味子又半载诸症悉愈

一妇人左手背并次指患五六枚如熟椹内热晡热月经素不及期余曰此因肝脾血虚而有热也当调补二经使陰血生而诸症自愈不信乃用艾灸手肿胀发热手指皆挛两脇项及胸乳间皆患疣经行无期余用加味逍遥散少加炒黑黄连数剂渐愈乃去黄连更佐以归脾汤各患渐愈又百余剂经行如期再用地黄丸三料而痊

一妇人小腹内一块或时上攻或时下坠寒热胸痞小便淋漓或用行气化痰等剂前症愈甚月经两月余而一行或以为内有肉鼈啖饮其血而经不行服驱逐之剂下血甚多两手背结一疣如大荳许两月渐长寸许又两月余又患数枚疑以鼈子行於外仍行驱逐两耳下各患瘰又疑为疮毒余曰此属肝火血燥也用加味逍遥加味归脾二药兼服佐以六味丸三月余而愈一妇人患之用蛛丝纏芫花线螳螂啖毒药蚀着艾灸大溃瘰痛发热出血余曰此陰血虚也不信仍服降火之药而歿

发瘰【瘰当作瘰】

疮疡发瘰因气血亏损外邪所?或内虚郁火所致其形牙关紧急四肢劲强或腰背反张肢体抽搐其有汗而不恶寒者曰柔瘰风能散气故有汗也其无汗而恶寒者曰刚瘰寒能濇血故无汗也皆由亡血过多筋无所养故伤寒汗下过多与溃疡产後多患之乃败症也若大补气血多有复生者若作风治速其危矣

治验

秋官张同野旧有流注因暴寒睡炕口目抽搐手足战掉余以为气血虚热而然用参芪归术川芎山梔柴胡半夏天麻炙草治之而愈

吴给事瞻之坠马伤首出血过多发热烦躁肉瞤筋惕或作破伤风欲发汗祛风余曰此亡血火动也无风可祛无汗可发当峻补其血用圣愈汤二剂顿愈又用健脾胃养气血而全愈

一儒者背疮将愈发热烦躁自用降火之剂项强口噤自汗恶寒此汗多内亡津血筋无所荣也用补气血之剂及地黄丸而愈

一男子素勤苦早行遍身发疙瘩口噤目直脉弦紧此劳伤气血内热外邪所?也用补中益气加山梔羌活川芎而瘰半载後遍身作痒搔破成疮发热作渴脉洪大而虚复以前汤加芍药麦门熟地天麻而愈

一儒者善怒患瘰癧复因大怒跳跃忽仆地两臂抽搐唇口喎斜左目紧小此肝火血虚内热生风用八珍散加牡丹皮钩藤山梔而愈次年春前病复作兼小便自遗左关弦洪而数余以为肝火血燥用六味丸加钩藤五味麦门芎归治之渐愈又用补中益气加山梔钩藤牡丹皮而安

一癰婦因怒仆地瘡口出血語言蹇澀口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿或用驅風之劑六脈洪大肝脈尤甚此肝火熾甚也用加味逍遙散加鉤藤及六味丸尋愈一婦人患內痔因勞出血甚多不時發瘡飲食少思形体倦怠其面色白余謂此氣傷而不能統血也用補中益氣湯加寒熱出血此陽氣虛寒也仍以前湯加炮姜四劑寒熱漸止飲食漸進又四劑而血頓止後因勞役或怒氣即便血或發瘡投以補中益氣湯加鉤藤而愈一婦人素性急患遍身搔痒或項間結核常服搜風順氣之劑後大怒吐血唇口牽緊小便頻數或時自遺此怒動肝火而血妄行也用小柴胡湯加山梔牡丹皮而愈

一癰婦因勞兼怒四肢拳屈煩痛自汗小便短少畏見風寒脈浮弦緩此氣血虛而風寒濕熱相搏也先用東垣清燥湯漸愈再用加味逍遙散及八珍湯加牡丹皮而瘡

一婦人素有肝火兩拘間或腫痛或寒熱忽然昏潰癰癰抽搐善伸數欠四肢筋拳痰涎上升此肺金燥甚而血液衰少也用清燥丸六味丸兼服尋愈

一婦人因大勞患癰瘡發瘡搔碎成瘡日晡熱甚或口噤發搐或頭目眩暈此肝脾氣血虛而內熱以八珍散加柴胡山梔治之諸症少愈復因怒前症復作經行不止此肝脾血熱用加味逍遙散漸愈又用八珍散加柴胡山梔而瘡

一婦人發瘡日晡熱甚月經先期或頭目昏眩或寒熱發熱或四肢抽搐此肝經風熱血燥用加味逍遙散治之尋愈後因怒前症復作口噤遺尿此火炎血燥也用加味小柴胡湯治之漸愈又夜間發熱譫語此血分有熱也用小柴胡湯加生地而愈更用加味逍遙散調理而安

一婦人患蜇唇月經先期余以為肝火血熱不信乃泛用降火之劑反致月經過期復因勞怒口噤呻吟肢體不隨六脈洪大面目赤色用八珍麥門五味山梔丹皮數劑漸愈兼用逍遙散六味丸料各三十余劑全愈一婦人經行遇怒其經即止甚則口噤筋拳鼻衄頭痛痰涌搐溺瞳子上視此肝火熾甚以小柴胡湯加熟地黃山梔鉤藤鉤而愈

一婦人素陰虛患遍身搔痒誤服祛風之藥口噤抽搐肝脈洪數余曰肝血為陰為水肝氣為陽為火此乃肝經血虛火盛耳宜助陰血抑肝火遂用四物麥門五味柴胡山梔生草熱搐頓止又以八珍加黃芪麥門五味鉤藤炙草調理而愈

一婦人久患流注脾胃虛弱忽痰壅氣喘頭搖目劓手揚足擲難以候脈視其面黃中見青此肝木乘脾土也用六君加柴胡升麻治之而蘇更以補中益氣加半夏茯苓而安

類破傷風症

大凡痈疽潰後筋癰肉爛膿血大泄陽隨陰散或筋脈拘急惡寒惕搦甚者舌強口噤項背反張痰涎壅甚便閉汗出不時發熱此氣血俱虛而傳變雖與破傷風相類而主治之法當大補氣血若果系風症亦須以大補氣血為本而兼以治風之藥設若不審是非而妄藥之則誤矣

风症治见後方

治验

司徒边华泉肩患痈溃而发热目直或瞶殊类中风日晡热甚脉益数此足三陰气血亏血虚火妄动用参芪归术炙草加酒炒黑黄栢五味麦门肉桂四剂而愈又数剂而敛

陆大行背疮内溃出脓二碗许用托里之剂痛止瘡消停药忽寒热作渴头痛自汗此元气虚而未能复也用十全大补加麦门五味肉桂二剂益甚诊其脉如故此药力未及仍用前药加附子一钱三剂诸症悉愈乃去附子加肉桂数剂而敛

一儒者患腿痛深蓄於内肉色不变久不穿溃针出脓瘀五碗许恶症骈臻全类中风此脾胃虚而变症也用四君子加当归炮姜及圣愈汤各四剂而安又劳心不寐用归脾汤而愈

一儒者伤寒後患流注瘡痛潮热用十宣败毒等剂出稀脓五六碗许发热恶寒烦躁作呕殊类破伤风症而歿

一男子背疮未痊乃以膏药剪孔贴之患破伤风症而歿此先失於内补外邪袭其虚耳余见此症贴膏药剪孔欲其通气而反患破伤风搽敛药生肌欲其收口而反助其余毒以致歿者多矣

论疮?随症加减用药

内经云形伤痛气伤肿先肿而後痛者形伤气也先痛而後肿者气伤形也东垣先生谓胃为五脏之本源人身之根蒂丹溪先生云痈疽因积毒在脏腑宜先助胃壮气以固其本夫然则气血凝结者自散脓瘀已成者自溃肌肉欲死者自生肌肉已死者自腐死肉已溃者自敛若独攻其疮脾胃气虚七恶蜂起其不死者幸矣故凡前症须用托里消毒散为主若高肿焮痛热毒也加黄连漫肿微痛气虚也去金银花连翘二味加参术头痛发热邪在表也本方加川芎羌活若外邪在表而元气实者暂用人参败毒散头痛恶寒表虚也去五味加参芪发热饮冷便秘内热也去参芪归术加大黄发热饮热便秘内虚也去二味加参芪归术寒热饮冷小便澹滯肝热也去参芪加柴胡山梔不作脓瘀不溃气虚也去二味及白芷加参术肉桂如不应暂用十全大补汤肿赤作痛血凝滯也本方加乳香没药如不应暂用仙方活命饮脓出反痛气血虚也去三味即银花连翘白芷後放此加参芪归地肉赤而不敛血虚而有热也去三味加熟地牡丹皮肉黯而不敛阳气虚寒也去三味加参芪白朮官桂漫肿不痛或肉死不溃脾气虚也去三味加人参白朮如不应加姜桂更不应急加附子肉白而不敛阳气虚也去三味加参芪归术脓多而不敛气血虚也去三味加参芪归术熟地如不应暂用十全大补汤饮食少思而不敛胃气虚也去三味加参芪如不应暂用补中益气汤饮食难化而不敛脾气虚也去三味加参术如不应暂用六君子汤又不宜佐以八味丸脓多而带赤血虚也去三味加归地参术如不应暂用八珍汤加牡丹皮忿怒晡热而出血肝火血虚也去三味加牡丹皮熟

地炒黑山梔如不应暂用八珍汤送六味丸面青脇胀而出血肝气虚而不能藏血也去三味加山茱山药五味子如不应兼六味丸食少体倦而出血脾气虚而不能摄血也去三味加参芪归地兼郁结少寐更加远志酸枣仁茯神龙眼肉如不应暂用归脾汤欲呕作呕或外搽内服寒凉或痛甚或感寒邪秽气而呕胃气虚也去三味加藿香参术饮食少思膈鸣腹痛腹冷泄泻脾气虚寒也去三味加炮姜木香手足逆冷脾血虚寒也更加附子煎送四神丸饮冷作渴热毒也加赤小豆知母如不应暂用竹叶黄芪汤善食作渴胃火也加石膏山梔如不应暂用竹叶石膏汤脓多而作渴气血虚也去三味加熟地黄五味子如不应暂用十全大补汤加五味子麦门冬口乾舌燥肾气虚也去三味加熟地山茱山药如不应兼六味丸又不宜佐以补中益气汤自汗内热口乾胃气虚也去三味加参芪归术如不应暂用六君子汤盗汗内热口乾陰血虚也去三味加熟地麦门五味如不应暂用当归六黄汤茎中痛而小便不利精内败也去三味加山茱山药泽泻如不应佐以六味丸愈便则愈痛愈痛则愈便精复竭也去三味煎送六味丸食少体倦口乾饮热小便黄短脾肺虚热也去三味加五味子山茱萸如不应暂用六味丸劳役而小便黄元气下陷也去三味加升麻柴胡午後而小便黄短肾虚热也去三味加升麻柴胡如不应煎送六味丸口燥作渴小便频数肾水亏也去三味加五味山茱山药熟地如不应兼用六味丸四肢逆冷肾气虚寒也去三味加桂附如不应佐以八味丸食少体倦作渴胃气虚也去三味加参芪白术如不应暂用补中益气汤体倦头痛或眩晕中气虚也去三味加柴胡升麻如不应暂用补中益气汤加蔓荆子日晡头痛或眩晕陰血虚也去三味加熟地黄如不应佐以六味丸梦泄遗精头晕头痛或痰喘气促肾虚不能纳气也去三味并川芎佐以六味丸如不应是虚寒也用八味丸面目赤色烦热作渴脉大而虚血脱发躁也去三味加黄芪当归如不应暂用当归补血汤身热恶衣欲投於水脉沉微细气脱发躁也去三味加肉桂附子如不应暂用附子理中汤善思体痛无寐盗汗脾血虚也去三味加茯苓远志酸枣仁圆眼肉如不应暂用归脾汤寢寐而汗出肾气虚也去三味加五味子煎送六味丸饮食而出汗胃气虚也去三味加参芪归术五味子如不应暂用六君子汤睡觉饱而出盗汗宿食也去三味加参术半夏如不应暂用六君子汤胸满多痰脾气虚也去三味加桔梗半夏如不应暂用六君子汤加桔梗枳殼晡热多痰脾血虚也去三味加归地参术如不应暂用六君子汤加芎归熟地咳嗽唾痰肾亏津液泛上也去三味加山茱山药熟地如不应佐以六味丸忿怒胸痞肝气滞也去三味加桔梗山梔如不应暂用补中益气汤加桔梗枳殼倦怠胸痞中气虚也去三味加参术茯苓如不应暂用八珍汤加柴胡口苦寒热往来肝火血虚也去三味加柴胡熟地因怒寒热往来肝火血虚也加柴胡黄芩如不应暂用八珍汤加炒山梔炒酸枣仁酒炒黑胆草体倦寒热往来肝脾气滞也去三味加参芪归木如不应暂用补中益气汤内热晡热或寒热往来陰血虚也去三味加芎归牡丹皮柴胡如不应暂用八珍汤加牡丹皮畏寒或寒热往来胃气虚也去三味加参苓白术升麻如不应暂用补中益气汤脇痛痞满或寒热往来肝气滞也去三味加青皮木香如不应属气血虚也更加芎归参术若妇人劳役恚怒或适经行发热谵语或夜间热甚在血分也去三味加生地丹皮柴胡如不应暂用加味四物汤若误尅伐或脓血大泄或因吐泻或误而入房或劳损元气或梦泄遗精或外邪乘入以致发热头痛小便淋瀝或滑数便血目赤烦喘气短头晕体倦热渴意欲投水身热恶衣扬手掷足腰背反张郑声自汗此阳气脱陷之假热症也若畏寒头痛咳逆呕吐耳瞶目蒙小便自遗泻利肠鸣里急腹痛玉jing短缩齿浮痛肢体麻痹或厥冷身痛或咬舌啮唇此阳气脱陷之真寒症也凡此危候勿论其脉勿问其症但见有其一二亦去三味急加桂附补之庶有复生

之理大抵用药之法当分元气虚实标本缓急若病急而元气实者先治其标病缓而元气虚者先治其本若病急而元气又虚者当治其本为主而兼以治标东垣先生云形气有余病气有余当泻不当补形气不足病气不足当补不当泻丹溪先生云但见肿痛参之脉症虚弱便与滋补气血无亏可保终吉治者审焉

薛氏医案卷十五

卷十六

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷十六

明 薛己 撰

外科枢要四

治疮?各症附方

托里消毒散 治胃气虚弱或因尅伐不能溃散服之未成即消已成即溃腐肉自去新肉自生若腐肉既溃而新肉不能收敛属气虚者四君子汤为主属血虚者四物汤为主气血俱虚者十全大补汤为主并忌寒凉消毒之剂

人参 黄芪【盐水拌炒】 当归【酒拌】 川芎
芍药【炒】 白术【炒】 茯苓【各一钱】 金银花
白芷【各七分】 甘草【炙五分】 连翘【五分】

右水煎服

托里散 治疮疡因气血虚不能起发腐溃收敛及恶寒发热者宜用此补托其属六淫七情或诸经错杂之邪而为患者当各审其因而参以主治之剂其属胃气虚弱者当以六君子汤为主

人参【气虚者多用之】 黄芪【炒各二钱】 白术【炒】 陈皮 当归 熟地黄【白制】 茯苓
芍药【酒炒各一钱半】

右水煎服

清热消毒散 治一切痈疽阳症肿痛发热作渴黄连【炒】 山栀【炒】 连翘
当归【各一钱】 川芎
芍药【炒】 生地黄【各一钱五分】 金银花【二钱】 甘草【一钱】

右水煎服

黄连消毒散 治脑疽背疽肿焮疼痛或麻木

黄连【制】羌活【各一分】黄芩 黄栢【各五分】生地黄 知母【制】独活 防风
当归尾 连翘【各四分】藁本 防己 桔梗【各五分】黄芩 苏木 陈皮
泽泻【各二分】人参 甘草【各三分】

右水煎服

清凉饮 治疮疡烦躁饮冷焮痛脉实大便秘结小便赤澀

大黄【炒】赤芍药 当归 甘草【各二钱】

右水煎服

破棺丹 治疮疡热极汗多大渴便秘谵语发狂

大黄【二两五钱半生半熟】芒硝 甘草【各二两】

右为末炼蜜丸如弹子大每服一丸童便酒化下白汤亦可

黄连解毒汤 治疮疡焮痛烦躁饮冷脉洪数或发狂言

黄芩 黄栢【炒】黄连【炒】山梔【各一钱五分】

右水煎热服

内疏黄连汤 治疮疡发热而呕大便秘结脉洪而实黄连 芍药 当归 枳榔 木香 黄芩 梔子
薄荷 桔梗 甘草【各一钱】连翘 大黄【各一钱五分】

每姜水煎仍量虚实治之

托里荣卫汤 治疮疡外无焮肿内便调和乃邪在经络宜用此药

黄芩 红花【各一钱】桂枝【七分】苍术【米泔浸】柴胡 连翘 羌活 防风
当归身【酒拌】甘草【炙】黄芩 人参

【各一钱】

右酒水煎服

内托复煎散 治疮疡肿焮在外其脉多浮邪气胜必侵於内宜用此托之

地骨皮 黄芩【炒】 茯苓 白芍药【炒】 人参 黄芪【盐水拌炒】 白术【炒】 桂
甘草【炙】 防己【酒炒】 当归【酒拌各一钱】 防风【二钱】

右先以苍术一升水五升煎去术入药再煎至二升终日饮之

人参败毒散 治疮?焮痛寒热或拘急头痛脉细有力

人参 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 枳壳 茯苓 川芎 甘草【各一钱】

右水煎服

仙方活命饮 治一切疮?未成脓者内消已成脓者即溃又止痛消毒之圣药也

白芷 防风 没药 穿山甲【蛤粉炒黄】 甘草 赤芍药 当归尾 乳香 天花粉
贝母【各一钱】 金银花 陈皮【各三钱】 皂角刺【一钱】

右酒一碗煎数沸服

清心汤

治疮?肿痛发热饮冷脉沉实睡语不宁即防风通圣散每料加黄连五钱每剂一两水煎服

夺命丹 治疗疮发背等症或麻木或呕吐重者昏愆若疔毒牙关紧急用三五丸为末水调灌
下有夺命之功

蟾酥【乾者酒化】 轻粉【各五分】 枯矾 寒水石【煨】 铜绿 乳香 没药
麝香【各一钱】 朱砂【三钱】 蜗牛【二十个另研无亦効】

右为末用蜗牛或酒糊丸菉豆大每服二三丸温酒葱汤下

东垣圣愈汤 治脾胃亏损脓水不止或金疮出血心烦不安眠睡不宁五心烦热饮食少思

地黄【酒拌蒸半日】 生地黄【酒拌】 川芎
人参【各五分】 当归【酒拌】 黄芪【盐水浸炒各一钱】

右水煎服

济陰汤 治疮属纯阳肿痛发热

连翹 山梔【炒】 黄芩【炒】 黄连【炒各二钱】 芍药【一钱五分】 金银花【二钱】 甘草【一钱】 牡丹皮【一钱二分】

右水煎服大便秘量加大黄

抑阳散 治疮属纯阳肿痛发热

天花粉【三两】 黄姜白芷 赤芍药【各一两】

右为末茶汤调搽患处

冲和汤 治疮属半陰半阳似溃非溃似肿非肿此因元气虚弱失於补托所致

人参【二钱】 黄芪 白术 当归 白芷【各一钱半】 茯苓川芎 皂角刺【炒】 乳香 没药【各一钱】 金银花【一钱】 陈皮【二钱】 甘草【一钱】

右水酒各半煎服

陰阳散治疮属半陰半阳

紫荆皮【炒五两】 独活【去节炒一两】 赤芍药【炒二两】 白芷【二两】 石菖蒲【二两】

右为末葱酒调搽

回阳汤治脾肾虚寒疮属纯陰或药损元气不肿痛不腐溃或腹痛泄泻呕吐厥逆或阳气脱陷等症乾姜【炮】 附子【炮各二钱】 人参 白术 黄芪【各三钱】 当归 陈皮 甘草【炙各二钱】 柴胡 升麻【各五分】

右酒水煎服不应姜附倍之

抑陰散治疮?元气虚寒焮肿不消或不溃斂或筋挛骨痛一切冷症

草乌【二两】 白桂【五钱】 赤芍药【炒】 南星【煨】 白芷

右为末葱汤调涂热酒亦可

托里温中汤 治疮?脓溃元气虚寒或因剋伐胃气脱陷肠鸣腹痛大便溏泄神思昏愦此寒变内陷缓则不治

羌活【四钱】附子【炮去皮脐】乾姜【炒三钱】益智 丁香 沉香 木香 茴香
陈皮【各一钱】甘草【炙二钱】

右姜水煎服

附子理中汤 治疮?脾胃虚寒或误行攻伐手足厥冷饮食不入或肠鸣腹痛呕逆吐泻

附子 人参 茯苓 白芍药【各三钱】白术【四钱】

右水煎服

姜附汤 治疮?真阳亏损或误行汗下或脓血出多失於补托以致上气喘急自汗盗汗气短
头晕人参【一两】乾姜【炮】白术【各五钱】附子【炮去皮脐一两】

右作二剂水煎服

参附汤 治失血过多或脓瘀大泄或寒凉汗下真阳脱陷上气喘急自汗盗汗气短头晕等症
急服以救元气缓则不治

人参 附子【炮去皮脐各五钱】

右姜五片水煎服不应倍之

独参汤 治一切失血或脓水出多血气俱虚恶寒发热作渴烦躁盖血生於气故血脱补气阳
生陰长之理也用人参二两枣十枚姜十片水煎徐徐服

人参理中汤 治疮?脾胃虚寒呕吐泄泻饮食少思肚腹作胀或胸膈虚痞饮食不入

白术 人参 乾姜 甘草【炙各等分】

右姜枣水煎服

竹叶黄芪汤 治痈疽气血虚胃火盛而作渴

淡竹叶【二钱】黄芪 麦门 当归 川芎 甘草 黄芩【炒】芍药 人参 半夏
石膏【煨各一钱】生地黄【一钱】

右每服三五钱水煎服

竹叶石膏汤 治痈疽胃火盛肿痛作渴

淡竹叶 石膏【煨】 桔梗 木通 薄荷 甘草【各一钱】

当归川芎散 治手足少阳经血虚疮症或风热耳内痒痛生疮出水或头目不清寒热少食或妇女经水不调胸膈不利脇腹痞痛

当归 川芎 柴胡 白术 芍药【各一钱】 山梔【炒一钱二分】 牡丹皮 茯苓【各八分】 蔓荆子 甘草【各五分】

右水煎服

若肝气不平寒热加地骨皮肝气实加柴胡黄芩气血虚加参芪归地脾虚饮食少思加苓术脾虚胸膈不利加参芪痰滞胸膈不利加术半肝气不顺胸膈不利或小腹痞满或时攻痛加青皮肝血不足胸膈不利或小腹痞满或时作痛加熟地肝血虚寒小腹时痛加肉桂日晡发热加归地

梔子青肝散【一名柴胡梔子散】 治三焦及足少阳经风热耳内作痒生疮或出水疼痛或胸乳间作痛或寒热往来柴胡 牡丹皮 梔子【炒各一钱】 茯苓 川芎 芍药 当归 牛蒡子【炒各七分】 甘草【五分】

右水煎服若太阳头痛加羌活

柴胡清肝散 治鬢疽及肝胆三焦风热怒火之症或项胸作痛或疮毒发热

柴胡【一钱五分】 黄芩【炒一钱】 人参【一钱】 山梔【炒一钱五分】 川芎【一钱】 连翘 桔梗【八分】 甘草【五分】

右水煎服

小柴胡汤 治肝胆经症风热瘰癧结核或肿痛色赤或寒热往来或日晡发热或潮热身热默默不欲饮食或怒火口苦耳聋咳嗽或吐酸食苦水皆用此药柴胡【二钱】 黄芩【一钱】 人参 半夏【各七分】 甘草【炙五分】

右姜水煎服

补陰八珍汤 治瘰癧等疮属足三陰虚者

当归 川芎 熟地 芍药 人参 白术 茯苓 甘草 黄栢【酒炒黑】 知母【酒炒各七分】

右水煎服

泻青丸 治肝经实热癰癤肿痛寒热或脇乳作痛大便秘结

当归 龙胆草【酒炒】川芎 山梔 大黄【炒】羌活防风【各等分】

右为末蜜丸鸡头子大每服一二丸白汤化下若血虚者四物加山梔柴胡或逍遥散若肾水亏损不能生肝木而自病筋挛结核或肢节拳挛或似中风宜用六味丸加五味子

散肿溃坚汤 治癰癤坚硬气血无亏宜用之

柴胡【四分】升麻【三分】连翘【三分】龙胆草【酒炒五分】黄芩【酒炒四分】甘草【炙二分】桔梗【五分】昆布【五分】当归尾【酒拌】白芍药【炒】黄柏【酒炒】葛根【各三分】知母【酒炒五分】三棱【酒拌微炒】广术【各三分】瓜蒌根【五分】

右水煎服

益气养荣汤 治怀抱抑郁或气血损伤四肢颈项等处患肿不问软硬赤白肿痛或溃而不敛

人参 茯苓 陈皮 贝母 香附 川芎 黄芪【盐水拌炒】生地黄【酒拌】芍药【炒各一钱】甘草【炙】桔梗【各五分】白术【炒二钱】柴胡【六分】

右姜水煎服

必效散 治癰癤气血虽无亏损内有癰核未去而不能愈

南硼砂【二钱五分】轻粉【一钱】麝香【五分】巴豆【五个去皮心膜】白槿榔【一个】斑猫【四十个去头翅同糯米炒】

右同研极细末取鷄子二个去黄用清调药仍入殼内以湿纸数重糊口入饭甑候熟取出曝乾研末虚者每服五分实者一钱用炒生姜酒五更初调服如觉小腹痛用益元散一服其毒俱从大便出胎妇勿饵毒去後多服益气养荣汤疮口自合

针头散 治一切顽疮内有瘀肉癰核不化疮口不合宜用此药腐之

赤石脂【五钱】乳香

白丁香【各三钱】砒【一钱】黄丹【一钱】轻粉麝香【各五分】蜈蚣【一条炙乾】

右为末搽瘀肉上其肉自腐若疮口小或痔疮用糊和作条子陰乾紙之凡疮久不合者内有脓管须用此腐之内服托里之剂

神仙隔蒜灸法 治一切痈疽肿毒前论言之详矣凡大痛或不痛或麻木痛者灸至不痛不痛灸至痛其毒随火而散此拔引郁毒从治之法也信有回生之功其法用大蒜头切三分厚安疮头上用艾炷於蒜上灸之五炷换蒜再灸未成即消已成杀其大势疮患大以蒜杵烂摊患处将艾铺蒜上灸之蒜败再换疮色紫或白而不起发不作脓不大痛不问日期最宜多灸

神效葱熨法 治流注结核骨痛鹤膝等症肿硬或先已隔蒜灸而余肿未消最宜用熨以助气血而行壅滯其功甚大又为跌扑伤损止痛散血消肿之良法用葱白头捣烂炒热频熨患处冷再换

神效桑枝灸 治发背不起或瘀肉不溃此阳气虚弱用桑枝燃火着吹熄焰用火灸患处片时日三五次以助肿溃若腐肉已去新肉生迟宜灸四畔其陰疮瘰癧流注膝疮恶疮久不愈者亦宜用之大抵此法未溃则解热毒止疼痛消瘀肿已溃则补阳气散余毒生肌肉其阳症肿痛甚或重如负石初起用此法出毒水即内消其日久者用之虽溃亦浅且无苦楚惜患者不知有此治者亦不肯用此也

乌金膏 治发背中央肉死涂之即腐未死涂之即生若初起肿痛用点数处其毒顿消若肉腐涂之即溃若恶疮顽疮元气无亏久不收敛者内有毒根以纸捻蘸紙其内有等发背因元气虚弱或因剋伐元气胃气亏损毒气散漫中黯外赤不腐不溃服大补之剂中涂三四寸许至五六日间赤黯之界自有裂纹如刀划之状中央渐溃渐脱须用纯阳之药以接其元气庶能收敛若妄用刀针去肉出血阳随陰散元气愈伤或涂凉药则毒气不解气血愈虚非徒无益而又害之其方用巴豆一味去殼炒黑研如膏点于患处临用合之已上三法虽不出于方书余推其意而制用之良有奇验

砭法 治丹毒疔疮红丝走散或时毒瘀血壅盛用细磁器击碎取有锋芒者一块以筋一根劈开头尖夹之用线缚定两手指轻撮筋梢令磁芒正对患处悬寸许再用筋一根频击筋头令毒血遇刺皆出毒入腹膨胀者难治

豆饼 治疮?肿痛硬而不溃及溃而不敛并一切顽疮恶疮用江西豆豉饼为末唾津和作饼子如钱大厚如三文置患处以艾壮於饼上灸之乾则易之如背疮用漱口水调作饼覆患处以艾铺饼上灸之如未成者即消已成者亦杀其大毒如有不效气血虚败也

乳香定痛散 治一切疮?溃烂疼痛

乳香 没药【各五钱】滑石【一两】寒水石【一两】冰片

右为细末搽患处痛即止甚效

青龙汤 治肺受风寒咳嗽喘急

半夏【汤泡七次二两五钱】乾姜【炮】细辛 麻黄【去节】肉桂 芍药
甘草【炙各三两】五味【二两 炒】

右每服五钱姜水煎服

葶苈大枣泻肺汤 治肺症胸膈胀满上气喘急或身面浮肿鼻塞声重用甜葶苈炒黄色研末
每服三钱枣十枚水二钟煎一钟去枣入药再煎七分食後服

桔梗汤 治肺症咳嗽胸膈两脇作痛咽乾口燥烦闷作渴时出臭浊

桔梗【炒】贝母【去心】当归【酒浸】瓜蒌仁 枳壳【麸炒】薏苡仁【微炒】桑白皮
【炒】甘草节【各一钱】防己【去皮一钱】黄芩【盐水拌炒】五味子【捣炒】百合
【蒸各一钱五分】葶苈【炒】地骨皮 知母【炒】杏仁【各五分】

右姜水煎服

人参补肺汤

治肺症咳喘短气或肾水不足虚火上炎痰涎涌盛或吐脓血发热作渴小便短澀人参 黄芩
白术 茯苓 陈皮 当归【各一钱】山茱萸【肉】山药【各二钱】五味子【五分】麦门
冬【七分】甘草【炙五分】熟地【自制一钱五分】牡丹皮【八分】

右姜枣水煎服

人参平肺散 治心火剋肺传为疽痿咳嗽喘呕痰涎壅盛胸膈痞满咽噎不利若因肝木太过
而致当补肺若因肾水不足而患当补脾肺若因心火旺而自病当利小便

人参 陈皮 甘草 地骨皮 茯苓【各一钱】知母【炒七分】青皮【四分】五味子【杵炒
四分】天门冬【去心各四分】桑白皮【炒一钱】

右水煎服

参芪补脾汤

治肺疽脾气亏损久咳吐脓涎或中满不食必服此药补脾土以生肺金否则不治

人参 白术【各二钱】黄芩【二钱五分】茯苓 陈皮 当归

【各一钱】升麻【三分】麦门冬【七分】五味子【四分】桔梗【六分】甘草【炙五

分】

右姜枣水煎服

射干汤 治胃痛吐脓血

射干【去毛】 山梔仁 赤茯苓 升麻【各一钱】 白术【五分】 赤芍药【一钱五分】

右水煎服

薏苡仁汤 治风热唇口瞤动或结核或浮肿

薏苡仁【炒】 防己 赤小豆 甘草【炙各等分】

右水煎服

瓜子仁汤 治产後恶露或经行瘀血作痛或作痛患薏苡仁【四钱】 桃仁【去皮】 牡丹皮 瓜蒌仁【各一钱】

右水煎服

梅仁汤 治肠痈壅痛大便秘澁

梅仁【九个去皮尖】 大黄【炒】 牡丹皮 芒硝【各一钱】 犀角【镑末一钱】 冬瓜仁【研三钱】

右水煎入犀末服

大黄汤 治肠痈小腹坚肿按之则痛肉色如故或焮赤微肿小便频数汗出憎寒脉迟紧脓未成急服之大黄【炒】 朴硝【各一钱】 牡丹皮 瓜蒌仁【炒】 桃仁【去皮尖各二钱】

右水煎服

牡丹皮散 治肠痈腹濡而痛时下脓

牡丹皮 人参 天麻 白茯苓 黄芪【炒】 薏苡仁 桃仁【去皮尖】 白芷 当归【酒拌】 川芎【各一钱】 官桂 甘草【炙五分】 木香

右水煎服

失笑散 治跌扑产後心腹绞痛或不知人事或经行瘀血作痛成痼

灵脂 蒲黄【俱炒等分】

右每服二三钱酒水煎热服

防风汤 治破伤风表症未传入里急服此

防风 羌活 独活 川芎【各等分】

右每服五钱水煎调蜈蚣散服

蜈蚣散

蜈蚣【一对炙】 鱉【三钱煨】

羌活汤 治破伤风在半表半里间宜和解急服此汤稍缓则邪入於里不可用矣

羌活 菊花 麻黄 川芎 石膏 防风 前胡 黄芩 细辛 甘草 枳殼
白茯苓【各一两】 蔓荆子【一两】 薄荷 白芷【各五钱】

右每服五钱姜水煎日二三服

大芎黄汤 治破伤风邪传於里舌强口噤项背反张筋惕搐搦痰涎壅盛宜急服之

川芎 羌活 黄芩 大黄【各一两】

右每服五七钱水煎服

白术防风汤 治破伤风服表药过多而自汗者

白术 黄芪【各一两】 防风【二两】

右每服五七钱水煎服腑脏和而自汗者可服此药若脏腑秘小便赤而自汗者急服大芎黄汤下之

六味丸【一名六味地黄丸】此壮水之剂夫人之生以肾为主凡病皆由肾虚而致此方乃天一生水之剂无有不可用者世所罕知若肾虚发热作渴小便淋秘痰气壅

盛咳嗽吐血头目眩晕小便短少眼花耳聋咽喉燥痛口舌疮裂齿不坚固腰腿痿软五脏齐损肝经不足之症尤当用之水能生木故也若肾虚发热自汗盗汗便血诸血失痞水泛为痰之圣药血虚发热之神剂也

熟地黄【用生者自制八两】山茱萸【肉】山药【各四两】茯苓 牡丹皮
泽泻【各三两】

右地黄杵膏余为末蜜丸桐子大每服七八十丸滚汤下

八味丸 治命门火衰不能生土以致脾土虚寒而患流注鹤膝等症不能消溃收敛或饮食少思或食而不化脐腹疼痛夜多漩溺即前方加肉桂附子各一两经云益火之源以消阴翳即此方也

加减八味丸 治症同上即六味地黄丸加肉桂五味子各一两

八珍汤

治脾胃伤损恶寒发热烦燥作渴或疮?溃後气血亏损脓水清稀久不能愈即四君四物合方

十全大补汤 治疮?气血虚弱肿痛不愈或溃疡脓清寒热自汗盗汗食少体倦发热作渴头痛眩晕似中风状即八珍汤加黄芪肉桂

补中益气汤 治元气虚损或因剋伐恶寒发热肢体倦怠饮食少思或不能起发消散生肌收敛或兼饮食劳倦头痛身热烦燥作渴脉洪大弦虚或微细软弱

黄芪 人参 白术 甘草【炙各一钱五分】当归【一钱】陈皮【五分】升麻
柴胡【各三分】

右姜枣水煎空心午前服

生脉散 治胃气亏损阴火上冲口乾喘促或肢体倦怠肌肉消瘦面色痿黄汲汲短气汗出不止食少作渴或脓水出多气血俱虚烦燥不安睡卧不宁或湿热大行火土合病脾胃虚弱身重气短或金为火制绝寒水生化之源肢体痿软脚欹眼黑等症

人参【五钱】麦门冬【二钱】五味子【一钱】

右水煎服如不应倍之

人参养荣汤 治脾胃亏损气血俱虚发热恶寒四肢倦怠肌肉消瘦面色痿黄汲汲短气食少作渴凡大病後最宜用此

人参【一钱】 陈皮【一钱】 黄芪【蜜炙】 白芍药【一钱半炒】 桂心 当归 白术
甘草【炙各一钱】 熟地黄 五味子【炒杵】 茯苓【各七】

【分半】 远志【五分】

右姜枣水煎服

四君子汤 治脾胃虚弱或因尅伐肿痛不散溃敛不能宜用此以补脾胃诸症自愈若误服攻毒七恶随至脾胃虚弱饮食少思或食而难化或欲作呕或大便不实若脾胃气虚疮口出血吐血便血尤宜用之盖气能摄血故也若气血俱虚之症宜于前汤但加当归脾胃无损饮食自进陰血自生若用四物汤沉陰之剂脾胃复伤诸症蜂起若命门火衰而脾土虚寒必用八味丸以补土母

人参 白术 茯苓【各二钱】 甘草【炙一钱】

右姜枣水煎服

六君子汤 治脾胃虚弱或寒凉尅伐肿痛不消或不溃敛宜服此汤以壮营气诸症自愈即前方加陈皮半夏

异功散 治脾胃虚弱饮食少思即四君子汤加陈皮四物汤 治血虚发热或因失血或因尅伐或因溃後致晡热内热烦躁不安皆宜服之经云血生於脾若脾虚不能生血者宜用四君子加当归酒炒白术以补脾

当归【三钱】 熟地黄【三钱】 芍药【二钱】 川芎【一钱五分】

右水煎服

归脾汤 治忧思伤脾血虚发热食少体倦或脾不能摄血以致妄行吐下或健忘怔忡惊悸少寐或心脾作痛自汗盗汗或肢体肿痛大便不调或妇人经候不准晡热内热或唇疮流注等症不能消散溃敛白术 白茯苓 黄芪【炒】 当归 龙眼肉
远志酸枣仁【炒】 人参【各一钱】 木香【五分】 甘草【炙三分】

右姜枣水煎服

当归补血汤 治脾胃损伤或服峻剂致血气俱虚肌热大渴引饮目赤面红昼夜不息其脉洪大而虚重按全无此病多得於饥饱劳役者若误服白虎汤必死

当归【三钱】 黄芪【炙一两】

右水煎服

六一汤

黄芪【炙六钱】甘草【炙一钱】

右水煎服

加味逍遥散 治肝脾血虚内热发热或遍身搔痒寒热或肢体作痛头目昏重或怔忡颊赤口燥咽乾或内热盗汗食少不寐或口舌生疮耳内作痛或胸乳腹胀小便不利

甘草【炙】当归 芍药【酒炒】柴胡 茯苓 白术【炒各一钱】牡丹皮
山栀【炒各七分】

右水煎服

黄芩清肺饮

治肾经陰虛火燥而小便不通若因脾经有热当清其脾若因心火尅肺当制其心

黄芩【一钱】栀子【三个打碎】

右水煎服

滋肾丸 治肾经陰虛发热作渴便赤足热腿软等症凡不渴而小便秘热在下焦血分也最宜此药经云无陰则阳无以化若脾肺燥热所遗当滋其化源知母 黄栢【各酒炒一两】肉桂

右为末水丸桐子大每服百丸空心白滚汤下

五苓散 治下部湿热疮毒小便赤少

泽泻 猪苓 肉桂 白术 赤茯苓【各等分】

右为细末每服三二钱热汤调下

犀角地黄汤 治胃火血热妄行吐衄或大便下血者犀角【镑末】生地黄 赤芍药
牡丹皮【各一钱半】升麻黄芩【炒各一钱】

右水煎熟入犀末服

若因怒而致加山梔柴胡若脾气虚而不能摄用归脾汤若肝脾火动而妄行用加味逍遥散若脾气虚而不能统用补中益气汤加炮黑乾姜若血虚有火而妄行用四物加炮姜若肾经虚火而血妄行用六味丸料不应急加肉桂以引虚火归源

清胃散 治膏粱积热唇口肿痛齿龈溃烂焮痛连头面或恶寒发热

升麻【二钱】生地黄 牡丹皮 黄连 当归【酒洗各一钱】

右水煎服痛未止石膏之类可量加

润肠丸 治脾胃伏火大肠乾燥或风热血结宜用此丸通之若结在直肠宜猪胆汁导之盖肾主五液开窍於二陰若津液滋润大便通调若津液不足脾气亏损必当培补犹忌前药

麻子仁 桃仁【去皮尖各一两】羌活 归尾 大黄【煨】 皂角刺 秦艽【各五钱】

右各另研为末炼蜜或猪胆汁丸桐子大每服三四十丸白汤下若用猪胆汁导之而不结燥急补元气

四神丸 治脾肾虚弱大便不实饮食少思或小腹作痛或产後泄泻肚腹作痛不思饮食

肉豆蔻【二两】五味子【二两】补骨脂【四两】吴茱萸【浸炒一两】

右为末水二碗生姜八两红枣一百枚煮熟取枣肉和末丸桐子大每服五七十丸空心食前白汤下

二神丸 治脾肾虚寒不思饮食或侵晨五更泄泻或饮食少思大便不实其功甚效如不应乃命门火衰急用八味丸补火而生土

破故纸【四两炒】肉豆蔻【二两生用】

右为末用大红枣四十枚生姜四两水煮熟去姜取枣肉和药丸桐子大每服五十丸空心盐汤送下

越鞠丸 治六郁牙齿作痛口舌生疮或胸膈痞满呕吐吞酸或腹胀腿酸等症

苍术【炒】神麴【炒】香附 山楂 山梔【炒】 抚芎 麦芽【炒各等分】

右为末水调麴蘖麴糊丸桐子大每服七十丸白汤下

二陈汤 治脾虚中脘停痰呕吐恶心或头目不清饮食少思等症

陈皮 半夏 茯苓【各一钱】 甘草【炙五分】

右姜水煎

钱氏白术散 治胃气虚或因尅伐或因吐泻口乾作渴饮食少思

藿香 白术【炒】 木香 白茯苓 甘草【炒】 人参【各一钱】 乾葛【二钱】

右水煎服

生地黄丸 治师尼寡妇室女乍寒乍热而患疮?等症肝脉弦长而出鱼际

生地黄【一两酒拌杵膏】 秦艽 黄芩 硬柴胡【各五钱】 赤芍药【一两】

右为末入地黄膏加炼蜜少许丸桐子大每服三十丸乌梅煎汤下日进二服

加味地黄丸

治肝肾陰虚疮症或耳内痒痛出水或眼昏痰气喘嗽或作渴发热小便赤澀等症

乾山药 山茱萸 牡丹皮 泽泻 白茯苓熟地黄 柴胡 五味【各另为末等分】

右将二地黄搗碎酒拌湿杵膏入前末和匀加炼蜜为丸桐子大每服百丸空心白汤送下不应用加減八味丸

琥珀膏 治颈项瘰癧及脇下初如梅子肿结硬强渐如连珠不散不溃或溃而浓水不絕经久不瘥渐成漏症

琥珀【一两】 木通 桂心 当归 白芷 防风 松脂 朱砂【研各五钱】 麻油【二筋】 丁香 木香【各三钱】 木鳖子【肉五钱】

右先用琥珀丁香桂心朱砂木香为末其余药入油内煎黑滤去粗徐徐入黄丹再煎软硬得中即成膏矣

人参黄芪汤 治溃疡饮食少思无睡发热

人参 麦门冬 陈皮 白术 苍术【各五分】 黄芪【一钱】 黄柏【炒四分】 升麻 归身【各五分】

右水煎服

托里当归汤 治溃?气血俱虚疮口不斂或晡热内热寒热往来或妇人诸症经候不调小便频数大便不实等症

当归 黄芪 人参 熟地黄 川芎 芍药【各一钱】柴胡 甘草【各五分】

右水煎服

人参内托散 治疮?溃脓而作痛者

人参 黄芪 当归 川芎 厚朴 防风 桔梗 白芷 官桂 紫草 木香 甘草

右入糯米一撮水煎服

霍香正气散 治外感风寒内停饮食头疼寒热或霍乱泄泻或作疟疾等症

桔梗 大腹皮 紫苏 茯苓 白芷 半夏 陈皮 白术
厚朴【各一钱】炙甘草【五分】霍香【一钱五分】

右姜枣水煎服

升阳除湿汤 治脾胃虚弱不思饮食肠鸣腹痛泄泻无度小便赤黄四肢困倦

甘草 麦芽 陈皮 猪苓【各三分】泽泻 益智仁 半夏 防风 神麴 升麻 柴胡 羌活【各五】
【分】苍术【一钱】白术【二钱】茯苓【七分】

右姜枣水煎服

十宣散 治疮疡脉缓涩体倦恶寒或脉浮紧细用之以散风助阳气也

人参 当归 黄芪 桔梗 炙草 白芷 川芎【各一钱】厚朴 防风 肉桂【各五分】

右水煎服

参术膏 治中气虚弱诸药不应或因用药失宜耗伤元气虚症蜂起但用此药补其中气诸症自愈人参 白术

右水煎稠汤化服之

清燥汤 治元气虚弱湿热乘之肢体酸软或头目眩晕饮食少思口乾作渴或自汗盗汗胸满气促小便赤少大便不调等症

黄芪【一钱五分】五味子【九粒】黄连【二分】苍术 白术 麦门冬 生地黄 陈皮 泽泻【各五分】茯苓 人参【去芦】当归【酒洗】升麻【各三分】神麴【炒】猪苓 柴胡 炙草【各二分】黄柏【酒洗一分】

右水煎服

补真丸 治真陰亏损诸症

葫芦芭【炒】附子 阳起石【煨】肉苁蓉【酒浸焙乾】五味子 肉苁蓉 川乌 兔丝子【洗净酒浸】沉香 鹿茸【酒浸】

【炒】巴戟天【去心】鍾乳粉【各一两半】

右为末用羊腰子两对治如食法酒煮捣烂入酒糊丸如梧桐子大每服七十丸空心米饮盐汤任下

托里健中汤 治疮疡元气素虚或因凉药伤胃饮食少思或作呕泻等症

人参 白术 茯苓【各二钱】半夏 炮姜【各一钱】炙草【五分】黄芪【一钱五分】肉桂【三分】

右姜枣水煎服

托里益中汤 治中气虚弱饮食少思或疮不消散或溃而不斂

人参 白术 陈皮 半夏 茯苓 炮姜【各一钱】木香 炙草【各五分】

右姜枣水煎服

托里益青汤 治脾土虚弱肝木所侮以致饮食少思或胸膈不利等症

人参 白术 茯苓 半夏【各一钱】芍药 柴胡【各五分】陈皮【一钱】甘草【五分】

右姜枣水煎服

托里益黄汤 治脾土虚寒水反侮土以致饮食少思或呕吐泄泻等症

人参 白术 陈皮 茯苓 半夏【各一钱】 炮姜 丁香 炙草【各五分】

右姜枣水煎服

托里越鞠汤 治六郁所伤脾胃虚弱饮食少思等症 人参 白术【各二钱】 陈皮 半夏【各一钱】 山梔 川芎 香附 苍术【各七分】 炙草【五分】

右姜枣水煎服

乳香止痛散 治疮痈痛不止

粟壳【三钱】 白芷【一钱五分】 炙草 陈皮【各一钱】 乳香【五分】 没药【五分】 丁香【三分】

右作二剂水煎服

济生犀角地黄汤 治郁热不解衄血便血等症 犀角 生地 白芍药 牡丹皮【各等分】

右每服五七钱水煎服 加减全上亦治便血

痔疮方

雄黄【五分细研】 五灵脂【去石烧过断烟】 五倍子【泡过各一钱】 白矾【半飞半生】 没药【二钱半明净者】

右为细末研令极细用纸花子贴疮口上

猪蹄汤

香白芷 黄芩 赤芍药 生甘草 当归 羌活 露蜂房【取有蜂儿者】

右先将猪蹄一只用水数碗煮熟取清汁分作十数次每次用前药一两煎十数沸去滓无风处淋洗死肉恶血随洗而下极效

神效瓜蒌散 治乳痈初起者自消脓成者自溃及一

切痈疽或溃後余毒亦宜用之

黄瓜萎【一枚】当归【五钱】生甘草【五钱】乳香 没药【各一钱】

右用水酒煎服

清肝解郁汤 治肝经血虚风热或肝经郁火伤血乳内结核或为肿溃不愈凡肝胆经血气不和之症皆宜用此药

人参【一钱】柴胡【八分】白术【一钱五分】牡丹皮【八分】茯苓【一钱】陈皮【八分】甘草【五分】当归【一钱五分】贝母【一钱】川芎【八分】山梔【炒】芍药【炒】熟地黄【各一钱】

右水煎服

清肝益荣汤

治肝胆小肠经风热血燥筋挛结核或耳项胸乳脇肋作痛或作瘕子并一切肝火之症山梔 当归 木瓜【不犯铁器】茯苓【各一钱】柴胡 川芎 芍药【炒各七分】龙胆草【八分】白术【二钱】熟地【一钱五分】炙草【五分】

右姜水煎服

益元散

滑石【六两】甘草【一两】

右为末每服一钱酒调下

神效开结散 治瘕疾不问年岁极验

沉香 木香 猪戾肉子【生於豚猪项下】橘红【四两】珍珠【四十九粒砂锅内泥封口煨过丝一枚如枣大取四十九】

右为末每服一钱临卧冷酒调搽徐徐咽下轻者三五服重者一料全愈修合用除日效忌咸酸油腻渣

气等物

海藻散坚丸 治肝经瘕瘤

海藻 昆布【各二两】龙胆草【二两】小麦【四两醋煮炒乾】

右为末炼蜜丸桐子大每服二三十丸临卧白汤送下并噙化咽之

普济消毒饮 治天行时毒头面瘡痛或咽喉不利若饥饑之後患之最宜用仍当固胃气

黄芩 连翹【各五钱】 人参【三钱】 陈皮 玄参 甘草 柴胡 桔梗【各一钱】 牛蒡子 马勃 板蓝草根【各七分】 白僵蚕 升麻【各五分】

右水煎服大便秘量加大黄

通气散 治时毒瘡甚取 以泄其毒

玄参【一钱五分】 猪牙皂角 川芎【各一钱】 藜芦【五分】 羊躑躅花【二钱五分】

右为末用纸捻蘸少许入鼻内取 为度

防风通圣散

治时毒热毒便秘热燥若时毒饥饑之後胃气亏损者须当审察非大满大实不用

防风 当归 川芎 芍药 大黄 芒硝 连翹 薄荷 麻黄 桔梗 石膏 黄芩【各一两】 白术 山梔 荆芥【各二钱五分】 甘草【二两】 滑石【一两】

右水煎服或为末白汤调下仍量人虚实

葛根牛蒡汤 治时毒肿痛而便利调和者

葛根 贯仲 甘草【又名国老】 豆豉 牛蒡子【半生半炒各二钱】

右水煎服

犀角升麻汤 治时毒或风热头面瘡痛或咽喉不利或风热鬢疽疔 等症

犀角 升麻 防风 羌活【各一钱】 白芷 黄芩【各五分】 白附子【五分】 国老【六分】

右水煎服

白芷胃风汤 治手足阳明经气虚风熟面目麻木或牙关紧急眼目瞤动

白芷【二钱五分】 升麻【二钱五分】 葛根

苍术【米泔炒各八分】 灸草【一钱五分】 当归【一钱五分】 草豆蔻 柴胡 黄柏 藁本

羌活【各四分】 蔓荆子【三分】 白僵蚕【三分】 麻黄【去节七分】

右水煎服

升麻黄连汤治胃经热毒腮瘤作痛或发寒热

升麻 川芎 当归【各一钱半】 连翘 黄连 牛蒡子 白芷【各一钱】

右水煎服 煨连 太阳加羌活 连耳後加山梔 柴胡

梔子仁汤 治时毒瘤痛大便秘结

郁金 枳殼 升麻 山梔【炒各一钱】

右水煎服

双解散 治便痢内蕴热毒外挟风邪或交感失宜精血交错以致瘤痛大小便秘结先用此药通解更用调补之剂

辣桂 大黄 白芍药 泽泻 牵牛【杵炒】 炙草 桃仁 乾姜【各五分】

右水煎服

制甘草法 治悬痈不拘肿溃

右每用大甘草一两切五寸许用润水一碗浸透以慢火炙乾仍投前水浸透再炙至水乾为度却挫细用水二鍾煎八分空心服

大芦荟丸【一名九味芦荟丸】 治肝火下疳溃烂或作痛焮肿或治小儿疳膨食积口鼻生疮牙龈蚀烂等疮并虫蚀肛门痒痛

胡黄连 芦荟 黄连 木香 白芨 青皮 白雷丸 鹤虱草【各一两】 麝香【一钱】

右为末蒸饼糊丸桐子大每服一钱空心米汤下

八正散 治下疳便毒小便淋漓脉症俱实者

大黄 车前子 瞿麦 扁蓄 山梔 木通【各二钱】 滑石【二两】 甘草【一钱】

右水煎服

内托羌活汤 治臀痈肿痛两尺脉紧按之无力者羌活 黄栢【各一钱】 防风 藁本 肉桂 连翘 炙草 苍术 陈皮 黄芪【各一钱五分】

右水酒煎服

大防风汤 治足三阴经亏损外邪乘虚患鹤膝风或附骨疽肿痛或肿而不痛不问已溃未溃用三五剂後更用调补之剂

附子牛膝【各一钱】 白术 羌活 人参 防风 川芎【一钱五分】 辣桂 黄芪 白芍药 杜仲 熟地 甘草【炙各五分】

右水煎服

加味龙胆泻肝汤 治肝经湿热或囊痈便毒下疳悬痈肿焮作痛小便澹滯或妇人阴疮痒痛或男子阴挺肿胀或出脓水

龙胆草 泽泻【各一钱】 车前子 生地黄 木通 当归尾 山梔 枯黄芩 炙甘草【各五分】

右水煎服

清心莲子饮

治膀胱气虚湿热玉茎肿痛或茎窍澹滯口苦咽乾小便色赤或白浊夜安静而昼发热黄芩 麦门冬 地骨皮 车前子 炙甘草【各一钱五分】 石莲肉 白茯苓 黄芪 柴胡 人参【各一钱】

右水煎服

五淋散 治膀胱有热水道不通或尿如豆汁或如沙石或如膏汁或热沸便血

赤茯苓【一钱五分】 赤芍药 山梔【各一钱】 当归 甘草【各一钱五分】

右用灯心二十根煎服

清肺饮 治渴而小便不利乃肺经有热是绝寒水生化之源宜用此药以清化源其水自生而便自利矣茯苓【二钱】 猪苓【三钱】 泽泻【五分】 琥珀【五分】 灯心【一分】 木通【七分】 通草【六分】 车前子【一钱】 麦【五分】 扁蓄【七分】

右为细末每服五钱水煎服

肾气丸 治肾经阳虚陰无所化以致膀胱淋漓或脾肺气虚不能通调水无所化而膀胱癃闭或肾气虚热干於厥陰之络陰挺痿痹而溺频数或肾水虚弱陰亏难降使津液败浊而为痰水又治肾虚便血及诸见血发热自汗盗汗等症之圣药也 六味丸方见前

还少丹 治足三陰经虚损患偏风等症又补脾肾进饮食之良剂也

肉苁蓉【去甲酒浸】远志【去心甘草汤泡去骨】茴香【炒】巴戟【去心】枸杞子 山药 牛膝 熟地黄【为膏】石菖蒲 杜仲五味子 白茯苓 猪实子 山茱萸【各等分】

右为末用红枣肉同蜜为丸桐子大每服七十丸温酒送下每日三服白汤送下

不换金正气散 治脾气虚弱寒邪相抟痰停胸膈寒热少食

厚朴 藿香 半夏 苍术 陈皮 甘草【各等分】

右姜枣水煎服

槐花散 治肠风湿毒下血

槐花 青皮【各六分】当归【一钱】荆芥 熟地黄 白术【各六分】川芎【四分】升麻【二钱】

右水煎服

四生散 治膝腿疮淫不愈或目昏花名肾脏风并治风癬疥癩血风疮症

白附子【真者生用】黄芪 独活 蒺藜【各等分】

右为末每服二钱用猪腰子一枚批开入药湿纸包裹煨熟空心连腰子细嚼盐汤送下

消风散【一名人参消风散】治风热癰疥搔痒发热或头皮肿痒头目昏眩鼻流清水 喷声重耳作蝉鸣

荆芥穗 炙草 人参 白僵蚕 白茯苓 防风 芎藭 藿香 蝉蜕【各二两】陈皮 厚朴【姜制】羌活【各五分】

右为末每服三钱茶清调下疮癬温酒下

升麻和气饮 治风癰疮疥热结大便不通

当归 陈皮【各一钱半】芍药【酒炒】枳壳【麸炒各八分】半夏【姜制】苍术【米泔浸炒】桔梗【炒黄色】白芷【浸软切片】乾葛【浸软切片】白茯苓炙草【各一钱】乾姜【炮黑】大黄【各五分】升麻【三分】

右水煎服

换肌消毒散 治时疮不拘初起溃烂

土茯苓【五钱】当归【酒洗】白芷 皂角刺【各一钱】薏苡仁【一钱】白藓皮 木瓜【不犯铁器】木通 金银花【各七分】炙草【五分】

右水煎服

九味羌活汤 治风热郁遏疮痍作痛或遍身作痛或拘急不利又治头痛恶寒脊强脉浮紧又治非冬时天有暴寒人中之头痛寒热宜用此以代麻黄汤此神药也

羌活 防风 苍术【各一钱半】川芎 白芷 生地黄 芩【煮软切片】细辛 甘草

右水煎服衣覆之取微汗湿陰天加苍术天淫雨亦加如渴加石膏三钱知母一钱不渴不加

加味羌活散【即前汤加金银花连翘】

当归饮子 治风湿所伤以致疮疥等症

当归 黄芪 芍药 荆芥穗 防风 蒺藜何首乌 生地黄 川芎 甘草【各等分】

右水煎服

黑丸子【一名和血定痛散】治跌扑坠堕筋骨疼痛或瘀血壅肿或外感风寒肢体作痛苦流注膝风初结服之自消若溃後气虚而发热与补剂兼服自斂

百草霜【一两】白芍药【一两】川乌【炮三钱】赤小豆【一两五钱】白歛【一两六钱】白芨 当归【各八钱】南星【炮三钱】牛膝【焙六钱】补骨脂【焙八钱】

右各另为末酒糊丸桐子大每服三十丸盐汤温酒任下孕妇不可服

太乙膏 治一切疮瘍并宜贴之若元气无亏用隔蒜灸更服活命饮以收全功

玄参 白芷 当归 肉桂 大黄 赤芍药 生地黄 【各一两】

右用麻油二筋入铜锅内煎至黑滤去渣入黄丹十二两再煎水中捻软硬得中即成膏矣

藜芦膏治一切疮疽肉突出不问大小长短用藜芦一味为末以生猪脂和研如膏涂患处周日易之治便血括云四两吴茱四两连一同锅炒不同研粪前红用茱调酒粪後红用酒调连元气亏损者当以补药加之方效二味用热汤拌湿顿滚汤中半日药气相和炒焦各出听用甚妙即制茱萸黄连法也

黄矾丸 治金石发疽及一切疮疽解毒止痛

明白矾 【一两】 黄蜡 【五钱】

右熔蜡和矾末急和匀衆手丸桐子大每服十丸渐渐加二十丸滚汤下如服金石发疽别用白末一两作三五服温酒调下有人遍身生疮状如蛇头服之即效此药能解毒气内攻须多服有效治蛇毒咬熔滴伤处痛止毒出仍服两许

当归膏 治发背痈疽汤火等症去腐肉生新肉其肉未坏者用之自愈肉已死而用之自溃新肉易生搽至肉色渐白其毒始尽生肌最速其外肉焮乾爬连好肉作痛用之即愈亦不结痂又免皴揭之痛殊有神效盖黄蜡主生肌止痛补血续筋性味甘温非偏胜毒药故与新药相宜此方余已刊行近之治者亦多用之

川当归 【一两】 麻油 【真正者四两】 淮庆生地 【一两】 黄蜡 【一两如白蜡止用五钱】

右先用当归地黄入油煎黑去渣入蜡熔化候温搅匀即成膏矣用涂患处将纸盖之发背痈疽汤火等症溃烂用之尤妙凡死肉溃烂已尽好肉有些须尚连宜用利刀剪之盖死肉有毒去迟则伤新矣如洗拭换膏必须预备即贴之若死肉去尽尤宜速贴然新肉畏风尤甚不可忽也

蠲痹消毒散治时疮肢节筋挛

姜黄 土茯苓 独活 【各五钱】 白术 当归 【各一钱半】 赤芍药 【一钱】 白芷 【五分】

右水煎服

右肩尖肘尖二穴图 【即肩髃肘髎】

此穴治瘰癧之秘法盖瘰癧属肝胆二经故患耳前後项腋之间男子多因恚怒亏损肝经之

血陰火內作或不慎起居耗損腎水不能生肝血婦女多因恚怒傷肝火動血燥或郁結傷脾火動血耗或患於胸乳間亦屬於前經此症若因恚怒傷肝氣血壅遏而不愈者宜灸此穴疎通經絡若因久於郁怒元氣虧損而不愈當推其所属而調補化源如取其穴當以指甲掐兩肘兩肩四所患处覺酸麻方是其穴

薛氏醫案卷十六

卷十七

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷十七

明 薛己 撰

疔疮机要

内经云风气与太阳俱入行诸脉俞散於分肉之间与卫气相干其道不利故使肌肉愤?而有疔卫气有所凝而不行故其肉有不仁也有荣卫热腑其气不清故使鼻柱坏而色败皮肤疡溃风寒客有脉而不去名曰疔风其治法当刺肌肉骨髓以洗荣卫之沸热灵枢经以锐针刺肿上出恶血近代先哲云感天地肃杀恶气所致其上体先见或多者毒在上也下体先见或多者毒在下也盖气受邪则上多血受邪则下多气血俱受则上下齐见若?毛先落毒在肺面发紫泡者毒在肝脚底先痛或穿者毒在肾遍身如癣者毒在脾目先损者毒在心此五脏受症之重也一日皮死麻木不仁二日肉死针刺不痛三日血死烂溃四日筋死指脱五日骨死鼻柱坏此脏受伤之不可治也若声哑目盲尤为难治大抵此症多由劳伤气血腠理不密或醉後房劳沐浴或登山涉水外邪所乘卫气相搏湿热相火血随火化而致故淮扬岭南闽间多患之治当辨本症兼症变症类症陰阳虚实而治焉若妄投燥热之类脓水淋漓则肝血愈燥肾水愈伤相火愈旺反致败症矣

本症治法

一疔疮所患非止一脏然其气血无有弗伤兼症无有弗杂况积岁而发现於外须分经络之上下病势之虚实不可槩施攻毒之药当先助胃壮气使根本坚固而後治其疮可也经云真气夺则虚邪气胜则实凡云病属有余当认为不足

一疔疮当知有变有类之不同而治法有汗有下有砭刺攻补之不一盖兼症当审轻重变症当察先後类症当详真伪而汗下砭刺攻补之法又当量其人之虚实究其病之源委而施治之盖虚者形气虚也实者病气实而形气则虚也

一疔?砭刺之法子和张先生谓一汗抵千针盖以砭血不如发汗之周遍也然发汗即出血出血即发汗二者一律若恶血凝滯在肌表经络者宜刺宜汗取委中出血则效若恶毒蘊结於脏非荡涤其内则不能痊若毒在外者非砭刺遍身患处及两臂腿腕两手足指缝各出血其毒必不能散若表里俱受毒者非外砭内泄其毒决不能退若上体患多宜用醉仙散取其内

蓄恶血於齿缝中出及刺手指缝并臂腕以去肌表毒血下体患多宜用再造散令恶血陈虫於谷道中出仍针足指缝并腿腕隔一二日更刺之以血赤为度如有寒热头疼等症当大补血气

一疔?服轻粉之剂若腹痛去後兼有脓秽之物不可用药止之若口舌瘡痛秽水时流作渴发热喜冷此为上焦热毒宜用泻黄散若寒热往来宜用小柴胡汤加知母若口齿缝出血发热而大便秘结此为热毒内淫宜用黄连解毒汤若大便调和用济生犀角地黄汤若秽水虽尽口舌不愈或发热作渴而不饮冷此为虚热也宜用七味白术散

一疔疡手足或腿臂或各指拳挛者由陰火炽盛亏损气血当用加味逍遥散加生地黄及换肌散兼服一疔疡生虫者五方风邪翕合相火制金木盛所化内食五脏而症见外也宜用升麻汤送泻青丸或桦皮散以清肺肝之邪外灸承浆以疏阳明任脉则风热息而虫不生矣肝经虚热者佐以加味逍遥散六味地黄丸一疔?久而不愈有不慎起居饮食内火妄动者有臟腑伤损气血疲乏者有用攻伐之药气血愈亏者有不分兼变相杂用药失宜者有病人讳疾忌医者

一疔疡愈而复发有不戒厚味内热伤脾者有不戒房劳火动伤肾者有不戒七情血气伤损者有余毒未尽兼症干动者有气虚六淫外乘者古人云此症百无一生正谓此耳

兼症治法

一头目眩晕若右寸关尺脉浮而无力脾肺气虚也用补中益气汤若左关尺脉数而无力肝肾气虚也用六味地黄丸若右寸尺脉浮大或微细阳气虚也用八味地黄丸血虚者四物汤加参苓白术气虚者四君子汤加当归黄芪肝经实热者柴胡清肝散肝经虚热者六味地黄丸脾气虚弱者补中益气汤脾虚有痰者半夏白术天麻汤衄血过多者芎归汤发热恶寒者圣愈汤大凡发热则真气伤矣不可用苦寒药恐复伤脾胃也一口喎目斜若手足牵搐或?棱痒动属肝经血虚风热用加味逍遥散六味地黄丸以生肝血滋肾水若寒热往来或耳聋脇痛属肝木炽盛先用小柴胡合四物汤以清肝火生肝血若筋挛骨痛或不能动履用六味地黄丸补中益气汤以滋化源若因服燥药而致者用四物汤加生甘草金银花以解热毒益陰血凡此俱属肝经血燥所致须用六味地黄丸补中益气汤为主若因怒气房劳而甚者用六味地黄丸十全大补汤为主若因劳伤形体而甚者用补中益气汤十全大补汤为主一夏秋湿热行令若饮食不甘头目眩晕遍身酸软或两腿麻木口渴自汗气促身热小便黄数大便稀溏湿热伤元气也用清燥汤如在夏令用清暑益气汤若自汗盗汗气高而喘身热脉大元气内伤也用补中益气汤若呕吐少食肚腹痞闷大便不实脾胃受伤也用六君子汤若胸腹不利饮食少思吐痰不止脾胃虚痞也用六君汤若形气倦怠肢体麻木饮食少思热伤元气也用人参益气汤

一热渴便浊若夜寒昼热者热在气分也用清心莲子饮昼安夜热者热在血分也用四物二连汤俱佐以六味地黄丸若寒热往来者肝经血虚也用加味逍遥散六味地黄丸

一小便不利若因服燥药而致者用四物汤加炒黑黄栢知母生甘草以滋陰血若频数而色黄者用四物汤加参朮麦门五味子以生气血若短而色黄者用补中益气汤加山药麦门五味以滋化源经云无陰则阳无以生无阳则陰无以化

一大便不通若血虚内热而澁滯者用四物汤加麦门五味子以生血润燥若因燥热之药而患者用四物汤加连翹生甘草以生血清热若服剋伐之药而致者用四君汤加芎归以助气生血若作渴饮冷者热淫於内也用竹叶石膏汤以清胃火若作渴饮汤者肠胃虚热也用竹叶黄芪汤以补气生津若内热作渴面赤饮汤者用四物汤送润肠丸以凉血润燥若肠胃满胀燥在直肠而不通者用猪胆汁导之肠胃气虚血涸而不通者用十全大补汤若肝胆邪盛脾土受侮而不能输化者用小柴胡汤加山梔郁李仁枳殼治之

一怔忡无寐或兼衄血便血若内热晡热作渴饮汤肢体倦怠此脾血虚而火动也用四君子加芎归若思虑伤脾动火而致用归脾汤加山梔若发热晡热用八珍汤加酸枣仁茯神远志若因心血虚损用栢子仁散大抵此症皆心脾血少所致但调补胃气则痰清而神自安不必专於清热治痰

一发热恶寒若肢体倦怠烦躁作渴气高而喘头痛自汗者此内伤气血也用补中益气汤加五味麦门倦怠食少大便不调小便频数洒淅恶寒者此脾肺气虚也用升阳益胃汤烦躁作渴体倦少食或食而不化者此脾气虚热也用六君子汤

一发热在午前脉数而有力者气分热也用清心莲子饮脉数而无力者阳气虚也用补中益气汤午後脉数而有力者血分热也用四物汤加牡丹皮脉数而无力者陰血虚也用四物汤加参朮热从两脇起者肝虚也用四物汤加参朮黄芪从脐下起者肾虚也用四物汤加参朮黄栢知母五味麦门肉桂或六味丸其热昼见夜伏夜见昼止或去来无定时或起作无定处或从脚起者此无根虚火也须用加減八味丸及十全大补汤加麦门五味更以附子末唾津调搽涌泉穴若形体恶寒喜热饮食者阳气虚寒也急用八味丸

一口乾若恶冷饮食者胃气虚而不能生津液也用七味白朮散若喜饮冷食者胃火盛而消烁津液也须用竹叶石膏汤夜间发热口渴者肾水弱而不能上润也当用六味地黄丸若因汗下之後而有前患胃气虚也宜用八珍汤主之

一作渴若烦躁饮冷者属上焦实热用凉膈散兼大便秘结者属下焦实热用清凉饮若用剋伐之药而渴者气血虚也急用八珍汤六味丸

一耳聋耳鸣若左寸关脉弦数者心肝二经虚热也用四物汤加山梔柴胡生陰血右寸关脉浮大者脾肺二经虚热也用补中益气汤加山梔桔梗培阳气若因怒便作用小柴胡汤加山梔芎归清肝清血若午前甚用小柴胡汤加参芪归朮补气清肝午後甚用四物汤加酒炒黑黄栢知母五味补陰降火如两足心热属肾虚用六味丸以壮水之主两足冷属阳虚用八味丸以益火之源

一项强口噤腰背反张者气血虚而发痉也仲景张先生云足太阳病发汗太多则痉风病下之则痉复发汗则加拘急痉家发汗则痉盖风能散气故有汗而不恶寒曰柔痉寒能涩血故无汗而恶寒曰刚痉皆因内虚复汗亡津血筋无所养而然悉属虚象非风症也当大补气血为主故产妇溃疡劳伤气血湿热相火误服剋伐之剂者多患之其义可见【近以痉为瘥传写之误也】

一妇女经闭若因鬱火伤脾以归脾汤加山梔丹皮气血俱虚以八珍汤加山梔丹皮若因服燥药伤血以四物汤加生甘草若经候过期而来者气血虚也八珍汤倍用参朮先期而来者血虚热也四物汤倍加参朮牡丹皮将来而作痛者气虚血滞也四物汤加茯苓白朮香附色紫而成块者血热也四物汤加山梔丹皮作痛而色淡者血气虚也用八珍汤其血崩之症肝火不能藏血者用加味逍遥散脾虚不能统血者用补中益气汤凡此皆六淫七情亏损元气所致当审其因而调补胃气为善

变症治法

一身起疙瘩搔破脓水淋漓若寒热往来者肝经气血虚而有火也用八珍散加丹皮柴胡寒热内热者血气弱而虚热也用八珍散倍用参朮若恶寒形寒者阳气虚寒也用十全大补汤若肌肤搔如帛隔者气血不能外荣也用人参养荣汤若面部搔之麻痒者气血不能上荣也用补中益气汤若痿软筋挛者血气不能滋养也用补中益气汤佐以六味地黄丸

一口舌生疮或咽喉疼痛若饮食喜冷大便秘结者实热也用四顺清凉饮肌热恶热烦渴引饮者血虚也用当归补血汤饮食恶寒大便不实者虚热也用十全大补汤热从下或从足起者肾虚热也用加减八味丸若饮食难化四肢逆冷者命门火衰也用八味地黄丸一牙齿作痛或牙龈溃烂若喜寒恶热属胃火加味清胃散为主恶寒喜热属胃虚补中益气汤为主

一自汗盗汗盖自汗属气虚盗汗属血虚自汗用补中益气汤送六味地黄丸盗汗用当归六黄汤【内芩连黄栢炒黑用】送六味地黄丸若因劳心而致以归脾汤倍用茯神酸枣仁

一吐痰或作喘若右寸脉浮缓者肺气虚也用六君子汤加桔梗右寸脉洪滑者肺经有热也用泻白散右寸关脉浮缓迟弱者脾肺气虚也用六君子汤加桔梗黄芩右寸关脉洪滑迟缓者脾热传肺也用泻白泻黄二散右尺脉微弱者命门火衰而脾肺虚也用人参理中丸如不应用八味地黄丸右寸脉洪数者心火剋肺金也用人参平肺散如不应用六味地黄丸左寸关脉洪弦数者心肝二经有热也用柴胡清肝散如不应佐以牛黄清心丸清其风热仍用六味地黄丸以镇阳光左尺脉数而无力者肾虚而水泛上也用六味地黄丸加五味子以滋陰如脉微细或手足冷或兼喘促急用八味地黄丸以补阳

一舌赤裂或生芒刺兼作渴引饮或小便频数不时发热或热无定处或足心热起者乃肾水乾涸相火亢盛用加减八味丸主之佐以补中益气汤若误用寒凉之剂必变虚寒而歿

一口舌生疮作渴不止不时发热或昼热夜止或夜热昼静小便频数其热或从足心或从两脇或从小腹中起外热而无定处者此足三陰亏损之症也用加減八味丸为主佐以十全大补汤若误用寒凉治火之剂复伤脾胃胸腹虚痞饮食少思或大便不实小便不利胸腹膨胀肢体患肿或手足俱冷者此足三陰亏损之虚寒症也急用加減金匱肾气丸亦有复生者

一肚腹肿胀若朝寬暮急属陰虚暮寬朝急属阳虚朝暮皆急陰阳俱虚也阳虚者朝用六君子汤夕用加減肾气丸陰虚者朝用四物汤加参朮夕用加減肾气丸真阳虚者朝用八味地黄丸夕用补中益气汤若肚腹痞满肢体肿胀手足并冷饮食难化或大便泄泻口吸气冷者此真阳衰败脾肺肾虚寒不能司摄而水泛行也急用加減肾气丸否则不救也

一发热恶寒若寸口脉微名阳气不足陰气上入阳中则恶寒也用补中益气汤尺部脉弱名陰气不足阳气下陷於陰中则发热也用六味地黄丸若暑热冷而肢体倦怠此湿热所乘属陰气虚而病气实也当专补阳气用补中益气汤若发热大渴引饮目赤面红此血虚发热属形病俱虚也当专补陰血用当归补血汤一发热作渴若右寸关脉浮大而无有力者脾肺之气虚也用补中益气汤数而有力者脾肺之气热也用竹叶石膏汤寸脉微数而无有力者肺气虚热也用竹叶黄芩汤尺脉微细或微数而无有力者命門火衰也用八味地黄丸左寸关脉数而有力者心肝之气热也用柴胡梔子散数而无有力者心肝之气虚也用六味地黄丸尺脉数而无有力者肾经虚火也用加減八味丸大凡疮愈後口渴或先渴而患疮或口舌生疮或咽喉肿痛或唇裂舌黄目赤痰涎上涌者皆败症也非此丸不能救一眼目昏弱或内障黑花或血虚神劳用滋陰肾气丸若视物无力或见非常之状属陰精虚弱用滋陰地黄丸若视物无力或视物皆大属阳盛陰虚用六味地黄丸若目紧体倦或肌肤麻木属脾肺气虚用神效黄芪汤若至夜目暗灯下亦暗属阳虚下陷用决明夜灵散若眼暗体倦内障耳鸣属脾胃气虚用益智聪明汤盖五臟六腑之精气皆稟受於脾土上贯於目脾为诸陰之首目为血脉之宗当补脾土为善

一 血吐血若左寸关脉数而无有力血虚也四物加参朮浮而无有力气虚也补中益气汤尺脉数或无力肾虚也六味地黄丸右寸关脉数而有力者肺胃热也犀角地黄汤数而无有力者肺胃虚热也先用济生犀角地黄汤後用四物汤加参朮白朮尺脉数无力陰虚也用六味地黄丸若面黄目赤多手麻者脾肺虚也用黄芪芍药汤

一饮食少思若因胃气虚而不能食用四君子汤若因脾气虚而不能化用六君子汤大便不实或呕吐者脾气虚寒也用六君子汤加乾姜木香若作呕口渴或恶冷饮食者胃气虚热也用五味异功散喜冷饮食者胃气实热也用泻黄散

一带下因经行产後外邪入胞传於五臟而致之其色青者属于肝用加味逍遥散加防风湿热壅滯小便赤澀用前散加炒黑龙胆草肝血不足或燥热风热用六味丸逍遥散色赤者属于心用小柴胡汤加黄连山梔当归思虑过伤者用妙香散六味丸色白者属于肺用六味丸补中益气汤加山梔色黄者属于脾用六味丸六君子汤加山梔柴胡不应用归脾汤色黑者属于肾用六味丸气血俱虚用八珍汤阳气下陷用补中益气汤湿痰下注前汤加茯苓半夏

苍术黄柏气虚痰饮四七汤送六味丸若病久元气下陷或尅伐所伤但壮脾胃升阳气为善若拘於人之肥瘦而用燥湿泻火之药反伤脾胃为患不浅

一二便下血若右关脉浮数气虚而热也用四君子加升麻当归尺脉浮大或微弱元气下陷也用补中益气汤左关脉洪数血虚也用四物汤加炒山梔升麻秦艽脉迟缓或浮大气虚也用四君子汤加升麻炮姜尺脉洪数或无力者肾虚也用六味地黄丸若因房劳伤损精气陰虛火动而小便下血诸血病者不问脉症百端但用前丸料煎服为善

一泄泻在五更或侵晨乃脾肾虚五更服四神丸日间服白术散或不应或愈而复作急用八味丸补命门火以生脾土其泻自止

一大便不通属脾肺亏损大肠津液乾涸或血虛火烁不可计其日期饮食数多必待腹满胀自欲去而不能乃热在直肠间也用猪胆汁润之若妄服苦寒辛散之剂元气愈伤或通而不止或成中痞之症若气血虛者用八珍汤加麻子仁肠胃虛者用补中益气汤加麻子仁肾液不能滋润用六味地黄丸加麻子仁若厚味积壅小便淋秘者肝肾虚也用六味地黄丸以滋肾水用补中益气汤以补脾胃若发热晡热用六君子汤加味逍遥散养陰血清风热若兼筋骨痛先用透经解挛汤秦艽地黄汤後用八珍散加牡丹皮柴胡主之若误服风剂而伤陰血者用易老祛风丸若两股或陰囊或两足必用四生散地黄丸为善若误服草乌川乌之类或敷巴豆砒石等味脱肉腐溃反成疔症治者审之一面赤搔痒或?毛脱落属肺经风热用人参消风散桦皮散气虛用补中益气汤加天麻僵蚕血虛用加味逍遥散加鈎藤鈎面发紫泡或成块或?毛脱落属肝经风热先用小柴胡汤加山梔丹皮鈎藤鈎後用加味逍遥散凡症属肝经血燥生风但宜滋肾水生肝血则火自息风自定痒自止

一遍身疙瘩或癰疹搔痒此风热伤血用羌活当归散气虛者佐以补中益气汤加山梔鈎藤鈎血虛者佐以加味逍遥散加鈎藤鈎若手足皴裂不问黯白或在手足腿腕搔起白皮此风热而秘濇用清胃散加芍药盖肾开窍於二陰精血不足则大便秘塞而不通矣须用六味地黄丸补中益气汤以滋化源

一小便不利若不渴而不利者热在下焦血分也用滋肾丸渴而不利者热在上焦气分也用清肺散肾经陰虛而不利者用六味地黄丸热结膀胱而不利者用五苓散元气虛而不能输化者用补中益气汤脾肺之气燥而不能化生者用黄芩清肺饮若转筋便闭气喘不问男女孕妇急用八味丸缓则不救

一白浊足三陰经主之属厚味湿热所致者用加味清胃散肝肾虚热者用六味地黄丸为主佐以逍遥散脾肾虚热者用六味丸佐以六君子汤肝脾鬱滯者六味丸佐以归脾汤脾肺气虛者六味丸佐以补中益气汤湿痰下注者益气汤佐以六味丸

疔疮类症【类症者与疔形状相似而所因不同也】

一两膝如癬搔痒久则脓水淋漓或搔起白皮者名肾臟风也用四生散以祛风邪用六味地黄丸以补肾水若头目不清内热口乾体倦痰热血燥秋间益甚故俗名鴈来风宜用羌活白芷散加味逍遥散气虚者佐以补中益气汤加皂角刺鈎藤鈎血虚者佐以八物汤加柴胡牡丹皮或加味逍遥散兼服

一肢体或腿臂腕间患??而游走不定者赤日赤游风白日白游风为血虚陰火内动外邪所搏之症白用人参消风散赤用加味逍遥散气血俱虚用八珍汤晡热内热用加味逍遥散六味地黄丸

一遍身或头面起疙瘩或如霞片或破而脓水淋漓或痒痛寒热乃肝火血虚也用加味逍遥散若口苦脇痛小便淋?肝火血热也用柴胡清肝散若妇女夜间谵语发热热入血室也用小柴胡汤加山梔生地黄血虚者四物合小柴胡汤病退却用逍遥散以健脾胃生陰血此症多有因怒气而发者治当审之

一妇人肢体癢疹疙瘩搔破成疮脓水淋漓热渴眩暈日晡益甚者用四物汤加柴胡山梔丹皮清肝火补肝血若烦热体倦头目不清用八珍散加丹皮山梔补脾气生陰血若自汗盗汗月水不调肚腹作痛用八珍汤六味丸若食少体倦心忪盗汗经闭寒热用八珍汤佐以加味逍遥散若病久元气怯弱用十全大补汤佐以归脾汤

一女子十三四或十六七而天癸未至或妇人月经不调发赤癢痒痛此属肝火血热用小柴胡汤加山梔生地黄牡丹皮防风

一生虫者乃相火制金不能平木而化耳非风邪所生也但滋肾水生肝血或佐以炙甘草浆之类说见本症一敷砒霜患处作痛或腐溃用湿泥频涂换之若毒入腹胸膈苦楚或作吐泻饮冷米醋一二杯即止多亦无妨生菥豆末芝麻油亦可

一敷贴雄黄药闷乱或吐泻用防己煎汤解之一服辛热药而?髮脱落者乃肝经血伤而火动非风也用四物汤六味丸以滋肝血生肾水一服川乌草乌等药闷乱流涎或昏愤呕吐或出血吐血用大豆远志防风甘草任一味煎汤解之大凡服风药过多皆宜用之未应急用甘草生姜汁

一敷贴巴豆之药患处作痛肌肉溃烂以生黄连为末水调敷之若毒入内吐泻等症更以水调服一二钱大小豆菖蒲汁俱可

一敷贴藜芦毒入内煎葱汤解之

一服祛风尅伐之药呕吐少食胸膈不利或形气倦怠等症用六君子汤以补阳气若烦躁作渴饮食不思或晡热内热面赤发热用四物汤加参朮以生陰血余从各门治之

本症治验

一男子冬间口苦耳鸣陰囊湿痒来春面发紫块微肿麻木至冬遍身色紫不知痛痒至春紫处俱大至夏渐溃又至春落指溃此患在肝胆二经令刺手指缝并臂腿腕出黑血先与再造散二服下毒秽更以小柴胡合四物汤加白芷防风天麻角刺渐愈又与换肌散但遍体微赤此血虚有火因家贫未得调理秋间发热至春面仍发块用前散并养血药喜年少谨疾得愈一膏粱之人鼻坏落指脱体溃热渴晡甚用四物汤加酒炒黑黄栢知母五味麦门白芷天麻角刺三十余剂热渴少止时仲夏精神倦怠气喘身热小便黄数大便溏泄此元气虚而时热胜也用补中益气汤顿安乃与换肌散及益气汤兼服两月更以生脉散代茶饮疮少退时至仲秋眩暈少食自汗体重大便溏数此亦时湿之症用清燥汤调理而愈又用补中益气汤少加酒炒黑黄栢知母角刺天麻两月余而瘥又因劳倦耳聾热渴误服祛风药病气益剧身发赤疹与益气聪明汤月许而愈

一男子赤痛热渴脓水淋漓心烦掌热目昧语澹怔忡不宁此心经受症也用安神丸兼八珍汤少加木通炒黑黄连远志元气渐复却行砭刺外邪渐退但便燥作渴用柴胡饮并八珍汤而愈再用换肌散而瘥

一男子肚见青筋面起紫泡发热作渴寅卯时甚脉弦数腿转筋小便澹此肝经火症先用柴胡饮热退便利却用小柴胡合四物汤加龙胆草炒山梔三十余剂及八珍汤加柴胡山梔养其气血乃用换肌散去其内毒而安年余因劳役饮食失宜寒热头痛遍身赤疹自用醉仙散而殁

一男子面发紫疙瘩脓水淋漓睡中搔搦遍身麻木渐发赤块劳怒则痒肝脉洪大砭刺臂腿腕各出血用清胃汤加大黄角刺四剂煎下泻青丸肝脉少退以升麻汤数剂下前丸诸症少愈却用宝监换肌散斤许又用小柴胡合四物汤加参术天麻角刺百余剂及六味地黄丸半载而愈後因劳遍身麻痒脉微而迟此气血俱虚不能荣於腠理用十全大补汤加五味麦门调理年余而安

一男子面赤发紫泡下体痒痛午後发热大便燥黑此火盛而血虚也用再造散及四物汤加防己胆草及刺腿指缝出毒血而便和仍以前药加白术白芷茯苓羌活独活而便黄仍以四物去胆草防己少用独活加玄参萆薢五十余剂而疮退却用补中益气汤加天麻麦门而气血渐充时仲秋霪雨遍身酸痛用清燥汤而安随用换肌散胡麻散八珍汤兼服而愈

一上舍面发肿肌如癰後变疙瘩色紫搔之出水此脾肺之症也先用清胃汤以清胃热解表毒又用四物汤加山梔黄芩柴胡皂角刺甘草节以养陰血祛风热及砭臂腿腕手足指缝并患处去毒血疎通隧道乃与八珍汤加白芷皂角刺五加皮全蝎及二圣散兼服月余以养陰血治疮毒又与补气泻荣汤少愈再与换肌散而全愈後因劳倦遂发赤晕日晡尤甚以四物汤加丹皮柴胡山梔并用补中益气年余虽劳而不发一男子遍身如癰搔痒成疮色紫麻木搯之则痛小便数而少此脾胃受症邪多在表用清胃散更砭刺患处并臂腿腕出黑血神

思渐爽但恶寒体倦口乾此邪气去而真气虚也以大剂参芪芎归芪?桔梗数剂元气顿复却用八珍汤加黄芪白芷芪?天麻软柴胡及二圣散治之其疮渐愈後用换肌散八珍汤等药调理半载而疮後仍发误用剋伐攻毒患两感伤寒而死一男子遍身疙瘩搔则痒搔则痛便闭作渴此邪在内也治以再造散二服微下三次用桃仁承气汤加当归四剂及砭出黑血渐知痛痒但形体倦怠用培养之剂复其元气又用二圣散其疮顿愈更大补年余而康後患痰涎壅盛舌强语澁用二陈苍术黄栢知母泽泻四剂而愈再用补中益气汤调理而安

一男子素清苦?尽落病在肝胆二经也乃刺臂腿腕及患处出黑血空心服八珍汤加五味胡麻首乌威灵食後服换肌散喜其无兼变之症又能笃守禁忌不半年而痊

一儒者脚心或痒痛或麻痒或肿胀二年後身体作痒渐变疙瘩发热耳鸣日晡益甚此属肾虚也乃砭刺臂腿腕及手足指缝去其瘀血用六味地黄丸料五味柴胡五十余剂以补肾又用换肌散祛风丸以治疮各斤许疮渐愈得滋补守禁而痊

一上舍遍身患之形病俱虚余谓须用调补元气完复方治其疮不信略服蛇酒以攻内毒更敷砒霜等药以蚀外毒顿加呕吐清水体痛如锥或以为毒气外发余曰脾主肌肉此因毒药脾伤而然也反服祛毒之剂吐泻不止而歿

一男子用药汤薰洗汗出不止喘 不食腹鸣足冷肢体抽搐余谓此因热伤元气腠理不密汗出亡阳耳是日果卒

类症治验

钦天薛天契年踰六旬两膝脓水淋漓发热吐痰数年不愈属肾藏风症用四生散而瘥年余复作延及遍体日晡益甚痰渴盗汗唇舌生疮两目皆赤此肾经虚火用加减八味丸诸症悉愈三年後小便淋?茎道澁痛此陰已痿思色而精内败也用前丸及补中益气汤加麦门五味而愈

翟鸿臚两膝生疮渐至遍身各大寸许肿而色黯时出血水吐痰咽乾盗汗心烦溺赤足热日晡益甚形体消瘦左尺脉洪数无力余以为肾经虚火用六味丸不月诸症悉退三月元气顿复

松江掌教翟立之素善饮遍身疙瘩搔起白屑上体为甚面目焮肿成疮结痂承浆溃脓眼赤出泪左关脉洪数有力或作疔风治之脓溃淋漓余谓肝火湿毒以四物汤加乾葛连翘山梔柴胡芩连一剂诸症悉退四剂全退两睛各显青白翳一片亦属肝火再剂翳去乃用六味丸而愈

一儒者身发疙瘩时起赤晕憎寒发热服疔风之药?落筋挛後疙瘩渐溃日晡热甚肝脉弦洪余脉数而无力此肝经血虚风热也先以小柴胡合四物汤加牡丹皮酒炒黑黄栢知母肝脉

渐和晡热渐退又用八珍汤加山梔寒热顿去再与加味逍遥散加参术钩藤钩木贼服两月疮悉愈而?渐生後因怒复作用小柴胡汤加芍归钩藤钩木贼而愈後劳役发热误用寒剂不时风痒日晡赤晕早与补中益气汤加五味麦门山药午後与加减八味丸寻愈後食炙?等物痰盛作渴仍发疙瘩小便白浊右关脉滑大有力用补中益气汤加山梔诸症悉退

一男子愈後肌肤作痒口乾饮汤此中气虚不能化生津液荣养肌肤午前服七味白术散补中益气汤午後服参芪芍归五味麦门少愈又用十全大补汤加五味麦门全愈

一男子愈後因劳恶寒头痛体倦余谓恶寒乃胃气虚不能护卫肌表头痛乃清气虚不能上升巅顶用补中益气汤加五味麦门益甚更兼口噤脉微细如无又加附子五分四剂而瘥

一男子愈後每早吐痰碗许形体倦怠此中气虚而不能剋化饮食以参芪白术陈皮半夏麴为丸临卧服早间服补中益气汤不月而愈盖胃为五谷之海脾为消化之器若脾气健旺运行不息痰自无矣

一男子愈後恶寒头晕食少体倦属中气虚弱用补中益气汤加蔓荆子并十全大补汤加五味子血气充而愈

一男子面起赤晕时或发肿臂手亦然搔起白屑服防风药内热体倦脉大而虚此因元气虚而陰血复伤用六味地黄丸补中益气汤而寻愈

一男子两目俱赤遍身痒痛搔起白皮此肝肺陰虚误服祛风燥剂鼻赤面紫身发疙瘩搔出血水用升麻汤下泻青丸数服又用加味逍遥散数剂身鼻渐白疙瘩渐消又用四物汤加参芪柴胡山梔并换肌散各百余服喜其年少谨疾全愈

一男子愈後寒热往来体瘦倦怠饮食不甘此因元气虚而变症也午前用补中益气汤加麦门五味午後用四物汤加麦门五味而愈

一男子遍身搔痒後成疮出水洒淅恶寒皮肤皱起?毛渐落大便秘结小便赤少此属肺火为患用补气泻荣汤四剂诸症渐退但倦怠恶寒小便清少此邪气去而真气虚也用补中益气汤兼换肌散半载元气复而诸症退时仲秋忽大便不实小便频数体倦食少洒淅体重此湿邪乘虚而作用东垣益胃汤二剂顿安仍用前药调理三月余全愈

一儒者遍身作痒搔破脓水淋漓?毛脱落如疔风症久服祛风等药致元气亏损余用补中益气汤加茯苓而愈後失调理日晡热甚用八珍汤加五味麦门五十余剂而瘥

一儒者怀抱久鬱先四肢如疔略祛风消毒气血愈虚延及遍身寒热作渴肢体倦怠脉洪大而虚谓余何也余曰始因脾鬱血虚陰火妄动後因药伤脾胃元气下陷遂用补中益气汤培补脾胃升举元气用归脾汤解散鬱火生发脾血更以六味丸益肾肝精血引虚火归源不两

月诸病悉愈

一男子遍身生疮脓水淋漓晡热口乾两足发热形体消瘦杂服风疮药六年未愈尺脉洪数而无力此肾经疮也如小儿肾疳之症用加減八味丸不半载而痊一男子遍身生疮似疥非疥脓水淋漓两腿为甚作痒烦热肢体倦怠年余不愈余以为肾经虚火用加減八味丸而痊

一男子秋间发疙瘩两月余渐高有赤晕月余出黑血此风热血虚所致先用九味羌活汤风热将愈再用补中益气汤而愈後不慎房慾复作盗汗晡热口乾吐痰体倦言用补中益气汤加減八味丸顿愈

一男子两掌每至秋皮厚皱裂起白屑内热体倦此肝脾血燥故秋金用事之时而作用加味逍遥散加川芎熟地三十余剂而愈再用六味丸加五味麦门服之半载後手足指缝臂腿腕皮厚色白搔之则木久服前药方愈

一男子因大怒发热髮顿落盖髮属肾而属肝此肝肾素虚为怒陰火愈盛销烁精血而然也用六味丸料加柴胡山梔黄柏数剂渐生又二十余剂而完一男子遍身搔痒服祛风辛燥之剂髮脱落余谓前药复伤肝肾精血虚而火内炽所致朝用八珍汤加麦门冬五味子夕用六味丸料加当归黄芪治之风热退而髮生矣

一男子染时疮服换肌散之类毛顿落遍身作痒或时赤晕乃燥药损其陰血阳气偏旺而然耳朝用四物汤倍熟地加茯苓白术牡丹皮山梔生甘草夕用六味丸料加当归黄芪治之疮症既愈毫亦生

一男子素不慎房劳其髮忽落或发热恶寒或吐痰头晕或口乾作渴或小便如淋两足发热或冷至胫属足三陰亏损而陰火内炽朝用十全大补汤夕用六味丸料加炒黑黄柏枸杞子治之诸症退而髮渐生

一男子素膏粱醇酒患肾臟风延及遍身服疔药益甚又用捻药於被中薰之呕吐腹胀遍身浮肿溃烂脓水淋漓如无皮而死

一男子足三陰虚患血风疮症误服祛风散毒之剂外敷斑猫巴豆等类肌肉溃烂呕吐腹膨或泄泻足冷或烦热作渴此药复伤脾胃虚败也辞不治不越月而歿一妇人脓水淋漓发热作渴体倦恶寒经水不调久而不愈此肝脾亏损而虚热也先用补中益气汤加川芎炒山梔元气渐复更以逍遥散而疮渐愈

一妇人性急善怒月经不调内热口苦患时疮服败毒之药脓水淋漓热渴头晕日晡益甚用加味逍遥散服之渐愈因大怒月经如涌眼赤出泪用四物汤加山梔柴胡连芩数剂而愈年余手足臂腕起白点渐大搔起白屑内热盗汗月经两月余一至每怒或恶寒头痛或不食作呕或胸乳作胀或腹内作痛或小便见血或小水不利或白帶下注此皆肝木制伏脾土元气

虚而变症也用补中益气汤加炒黑山栀及加味归脾汤间服半年而愈

一妇人久鬱患在四肢腿腕尤甚误用败毒寒凉之剂晡热内热自汗盗汗月经不行口乾咽燥此鬱火伤脾也用归脾汤数剂後兼服逍遥散五十余剂而愈一妇人身如丹毒搔破如疔热渴头晕日晡益甚此属肝经风热血燥用加味逍遥散而愈

一妇人素晡热月经不调先手心赤痒至秋两掌皮厚皱裂时起白皮此皆肝脾血燥用加味逍遥散加荆芥钩藤钩川芎熟地五十余剂又用归脾汤二十余剂乃服六味丸而不再发

一妇人两腿腕紫黯寸许搔破出水或用祛风砭血年余渐胤如掌许乃服草乌等药遍身搔痒时出血水内热体倦饮食无味月经三月一至脉洪而数按之则濡此燥剂愈伤脾血也先以补中益气汤加芍药川芎五味十余剂乃与加味逍遥散加熟地钩藤钩二十余剂再用归脾汤加川芎熟地黄治之而不发

一妇人日晡身痒内外用追毒祛风之剂脓水淋漓午前畏寒午後发热殊类疟风用补中益气汤加山栀钩藤钩又以加味逍遥散加川芎而愈

一妇人手心色赤搔痒发热头晕作渴晡甚服祛风清热之药肤见赤痕月经过期用加味逍遥散倍熟地热止痒退更以四物汤加柴胡参芪炙甘草茯苓头清渴止再用四物汤加参术茯苓山栀赤晕亦消

一妇人素清苦四肢似癬疥作痒出水怒起赤晕服祛风败毒等剂赤晕成疮脓水淋漓晡热内热自汗盗汗月经不行口乾咽燥此鬱伤脾血也用归脾汤逍遥散两月而痊

一妇人遍身疙瘩搔痒敷追毒之药成疮出水寒热脇痛小便不利月经不调服祛风之剂形体消瘦饮食少思此肝火血燥生风前药益伤脾血耳先用归脾汤二十余剂又用加味逍遥散二十余剂诸症渐愈乃用六味丸调理而痊此等症候服风药而死者多矣

一妇人愈後唇肿皱裂食少肌瘦晡热益甚月水过期半年渐闭时发渴躁专於通经降火发渴愈甚唇胀出血此脾经虚热而血愈耗也治以四物汤加参苓芪术升麻丹皮柴胡山栀外症渐愈又用八珍汤加丹皮柴胡五十余剂月水调而诸症痊

一小儿面部浮肿遍身如癬半年後变疙瘩色紫作痒敷巴豆等药皮破出水痛痒寒热大便坚硬脾肺脉洪数而实先用防风通圣散以解表里便利调和又用四物汤加荆防黄芩柴胡皂角刺甘草节以凉血祛毒诸症渐退更以八珍汤加白术荆防角刺五加皮而愈後但劳则上体发赤晕日晡益甚此属气血虚而有火用四物汤加丹皮参术柴胡治之稍退又用补中益气汤加酒炒黑黄柏知母月余全愈

一小儿遍身患疥如疔或痒或痛肢体消瘦日夜发热口乾作渴大便不实年余矣此肝脾食

积鬱火用芦荟丸不月而愈

一女子十三岁善怒遍身作痒出水用柴胡川芎山梔芍药以清肝火用生地当归黄芩以清肝血用白术茯苓甘草以健脾胃而愈半载後遍身起赤痕或时眩晕寒热余曰此亦肝火炽盛血得热而妄行其夜果经至一女子赤晕如霞作痒发热用小柴胡汤加生地连翘丹皮而愈大凡女子天癸未至妇人凡经不调被惊着恼多有此症

一小儿十五岁遍身似疥非疥脓水淋漓晡热口乾形体骨立四年矣此肾肝之症用加減八味丸而痊韩氏子年十四早丧天真面红肿如风状不时举作或误用疔风药内虚发热口燥烦渴甲辰冬邀治因请教焉先生云此内伤不足陰火上炎而类赤游风症也药宜滋其陰则火自降补其本则标自退大经领教用四君加参芪四十剂又用此作丸服斤许不两月而平复若从有余治之则谬误多矣谨錄呈上乞附药案以惠後之患者嘉靖丁未仲春门人朱大经顿首拜书

薛氏医案卷十七

卷十八

钦定四库全书

薛氏医案卷十八

明 薛己 撰

续治诸症

一男子遍身患小疮或时作痒口乾作渴服消风散起赤痒益甚服遇风丹脓水淋漓饮食无度肌肉消瘦尺脉洪数左尺尤甚余谓肾水不足虚火上炎为患先用加减八味丸其渴渐止用补中益气汤加五味子肌肉渐生佐以八珍汤加牡丹皮麦门冬百余剂而痊二年後不节房劳其疮复作惑於人言又服消风散之类其疮复患余仍用前药调治而痊

一男子善怒面青腿内膝患癬类色赤作痒或为砭刺出血发热焮肿作痛服消风散而益甚服遇仙丹愈加发热作渴仍服之脓水淋漓其脉洪数左关为盛余谓肝经血虚火内动复伤其血而疮甚耳先用柴胡清肝散数剂又用四物山梔治之诸症渐愈用八珍汤地黄丸两月余而痊

一男子面赤作渴面常患有疮作痒服祛风药遍身发赤?服花蛇酒更发赤晕遍行砭刺又服消风散发热口渴饮水不止余谓肝经血虚而风热也用梔子清肝散及地黄丸料煎服热渴渐止疮渐结靨又用八珍汤地黄丸疮靨渐脱又服月余疮渐愈

一男子面生粉刺或生小?服消风散疮益甚服遇仙丹加遍身赤痒仍服前药发热焮肿又服旬余溃而出水形体骨立先用四君当归桔梗数剂饮食稍进又用八珍汤数剂而痊

一男子患肾脏风饮烧酒发赤晕砭出血敷追毒之药成疮出水日晡益甚类大麻风服遇仙丹眉毛拆落大便下血虚羸内热饮食甚少势诚可畏余先用圣济犀角地黄汤其血渐止又用五味异功散加当归升麻饮食渐进用四物参术牡丹内热渐减用易老祛风丸脓水渐少又用八珍牡丹皮之类月余疮渐结靨因思虑发热盗汗疮复作痒兼起赤晕用加味归脾汤数剂汗热渐止用加味逍遥散六味地黄丸而痊

一男子嗜膏粱炙?醇酒辛辣之物遍身生??甚为作痒服消风散之类更起赤晕又砭出血其痒益甚敷败毒之剂遂各成疮脓水津淫眉毛渐脱赤痒益甚此脾经积热伤血所致余先用犀角地黄汤诸症稍退乃用济生犀角地黄汤加黄连治之脓水渐止乃以八珍汤加山梔牡丹皮眉毛渐生因饮食失宜胸腹作胀饮食少思或大便下血用五味异功散加升麻饮食渐进又用补中益气汤而血止仍用八珍加丹皮乾葛连翘而痊

一男子内廉作痒色黯搔起白皮各砭刺出血其痒益甚更起赤晕延及外廉津淫不已服祛风之药肢体益然作渴引饮左尺脉洪大数而无力余谓此肾经虚火复伤其血火益甚而患耳先以八珍汤加五味子牡丹皮三十余剂诸症渐愈乃佐以加减八味丸料又百余剂而痊

一男子常咳 腿患白癩风皮肤搔起白屑服消风散之类痒益甚起赤晕各砭出血赤晕开?而痒愈甚服遇仙丹之类成疮出水殊类大麻风咳 吐痰面色皎白时或痿黄此脾肺二经虚热之症先用五味异功散治之虚热稍退又用地黄清肺饮肺气渐清又用八珍汤六味丸而寻愈後又咳 痰喘患处作痒用参苏饮二剂散其风邪又用五味异功散加桔梗补其肺气而痊二年後咳 作渴饮水脉洪大左尺为甚用加减八味丸补肾水而痊

一男子素不慎房劳其髮渐落或发热恶寒或吐痰头运或口乾作渴或小便如淋两足发热或冷至痿属足三陰亏损而陰火内炽朝用十全大补汤夕用加减八味丸诸症退而髮渐生後两腿腕患紫癩风延於两股作痒各砭出血痒处日甚服消风等药患处微肿延及上体两眼昏澁余谓肾臟风先用四生散四服後用易老祛风丸月余用地黄丸两月余而痊後饮食起居失宜肢体色赤服二丸随愈

一男子患白癩风过饮或劳役患处色赤作痒服消风散之类顿起赤晕遍身作痒砭出血服祛风药患处出血恪服遇仙丹患处愈熈元气日虚余先用九味芦荟丸加味羌活汤诸症顿愈用加味逍遥散加味四物汤乃安

一男子不时患疙瘩搔痒成疮脓水淋漓恶寒发热先用羌活当归散而痒止又用易老祛风丸而不发後饮烧酒起赤晕二便不通口舌生疮热渴不安用防风通圣散二便通利但口乾体倦饮食不入用七味白术散去木香四剂而安

一男子患疮疥搔破出脓水面赤作渴大便坚实脉洪数左关寸为甚此水火相抟也先用泻青丸料煎服热势顿减又用梔子柴胡散加味逍遥散而疮愈

一男子患搔痒破而成疮如大麻风服遇仙丹发热作渴大便秘结脉沉实右关为甚此热蓄於内也先用黄连内疏汤而大便通利又用防风通圣散去硝黄而热渴止却用八珍汤而疮愈

一儒者素食膏粱发热作渴饮冷患疮如大麻风大便出黑血服清热祛风等寒药益甚余谓血分有热火也故寒之不寒用四物二连汤以清热凉血用六味地黄丸以补肾生水而热退又用柴胡梔子散调理而痊一男子遍身患疙瘩作痒劳而益甚用参芪归术为君佐以柴胡炒苓桔梗川芎炙草而痊更用补气血之药後不再发

一男子患疙瘩搔痒发热形气虚弱口鼻气热且喜饮冷属外邪也以消风散二剂外邪悉解但倦怠少食更治以参芪归术陈皮炙草五味子而健又以补中益气汤去柴胡升麻加茯苓芍药乃痊

一男子患前症多在臀脚劳役则痒益甚小便色黄服败毒散芩连之剂患处痒痛夜不得寐余谓脾气受伤用补中益气汤加五味麦门少用炒黑黄柏治之而痊凡病日间如故日晡倦怠或劳愈加晨起如故皆元气虚也宜用前药补而治之

一儒者遍身生疮瘙痒脓水淋漓自知医服八珍荆防之类益甚脉洪大按之无力余谓此气血虚热也用八珍汤加牡丹皮治之而愈继娶後两足生疮久不愈尺脉数而无力余用地黄丸八珍汤而痊

余甥凌云汉年十六庚子夏作渴发热吐痰唇燥遍身如疥两腿尤多色黯作痒日晡愈炽仲冬腿患疮尺脉洪数余曰疥肾疳也疮骨疽也皆肾经虚症针之脓出其气氤氲余谓火旺之际必变瘰症用六味地黄丸十全大补二旬诸症愈而瘰症具仍用前药而愈抵冬毕姻至春其症复作仍服地黄丸数斤煎药三百余剂而愈

稽勲李龙冈遍身患此腿足为甚日晡益熅口乾作渴小便频数此肾经虚热用补中益气汤六味地黄丸而痊

一儒者善患疥余以为腠理不密外邪所抟用补中益气汤加白芷川芎治之不从自服荆防败毒散盗汗发热作渴熅痛脓水淋漓仍用前汤倍加参芪五味而痊

一儒者患在臂脚日晡或痒或胀形体倦怠自服败毒散患处发肿小便赤澁此肺肾陰虚余用补中益气汤加茯苓治之其疮顿愈又因调养失宜日晡益甚用八珍汤加五味子麦门冬五十余剂而愈

一男子患疙瘡色黯作痒出黑血日晡至夜益甚其腿日肿夜消余以为气血虚而有热朝用补中益气汤夕用加味逍遥散而愈

一男子时疫愈後遍身发?作痒服补中益气汤而愈有同患者不信余言乃用砭法出血而死此因陰虚血热色黑作痒也何乃反伤陰血哉

一男子患?乾痒作痛以芩连荆防山梔薄荷芍药归梢治之而愈

一儒者应试後遍身瘙痒後成疙瘡此劳伤元气陰火内炽秋寒收敛腠理鬱热内作用补中益气汤加茯苓川芎白芷而愈後复劳仍作惑於人言服祛风败毒药如大风之状又发热作渴倦怠?食余用补中益气汤倍加参芪归木半夏茯苓五味子麦门冬而愈

举人陆世明会试途中劳役胸患癰熅赤作痛头痛发热形倦少食大便或溏或结小便赤澁此劳伤元气而虚火内动投补中益气汤一剂顿退再剂而痊又数剂而元气复

一男子脾肾气血虚热略服四物黄柏知母之类元气愈虚倦热益甚余朝用补中益气汤夕

用六味地黄丸如五味子煎服而愈後至闽为商遍身搔痒时喜热水浴之後患疮?破而出水用风药益甚或赤或白眼作花痒先用胡麻散六味丸痒渐愈用六味丸消风散疮渐愈用八珍汤六味丸而痊次年两股小腹颈项复作痒用四生散六味丸而愈

一妇人经水先期劳役或气恼则寒热作痒服祛风降火等药不劳怒而自痒发热更加痰喘气促服化痰清气之剂形气倦怠食少胸痞身发疮疹服消毒之类脓水淋漓服大麻风药口乾作渴欲水而不敢饮经水又过期眉间若动又服月余眉毛脱落经水淋漓余谓心肝二经风热相抟制金不能平木木尅脾土而不能统血肝火旺而不能藏血也眉间属甲木而主风风动血燥而眉毛脱落又若动也经云水生木遂朝用地黄丸以滋肾水生肝血夕用加味逍遥散以清肝火生肝血月余诸症渐愈又佐以四君芎归牡丹皮月余经水旬日而止又两月余经水五十余日而至乃夕用五味异功散加当归服两月经水四十余日而至因怒恼寒热经水如崩眉棱觉动脉洪数弦肝脾二脉为甚用柴胡栀子散二剂以平肝火用五味异功散二剂以补脾气发热顿退经水顿止更以八珍汤倍加参术及地黄丸两月余经水如期眉毛渐生因饮食停滞腹胀作痛另服祛逐之剂泄泻不止小腹重坠饮食甚少余先用六君子汤送四神丸数剂泻渐止饮食稍进又用补中益气汤倍用升麻数剂重坠渐愈後因劳心发热饮食难化呕吐涎水其热自脐上起觉饥热频作乃用六君子汤加炮姜治之热时饮稠米汤稍安两月余又常服加味归脾补中益气二汤而痊

一妇人秋间肢体作痒时发寒热日晡热甚口苦喜酸月水先期面色常青热甚则赤略服清热凉血後发疙瘩赤痒益甚乃清热败毒破而脓水淋漓余谓肝脾血燥虚热不信仍治疮毒其疮益甚形气倦怠饮食减少余先用补中益气汤间佐以六君当归元气稍复乃以八珍汤倍用参术少用川芎芍药炒焦间佐以补中益气汤诸症渐愈又以四君子汤为主佐以加味逍遥散两月余脓水渐少又服月余疮渐结靨因怒恼寒热腹胀饮食少思患处复甚用六君子汤加山栀柴胡乃用四君子汤为主而疮渐愈又因怒月经甚多发热作渴疮痛出血用柴胡清肝散热退痛止仍用四君子汤而结靨又用八珍山栀牡丹皮而疮愈

一妇人变身搔痒脓水淋漓发热身如虫行月经不调先用升麻汤送泻青丸热痒顿退又用加味逍遥散经行如期用换肌丸而疮愈後因怒经行不止筋骨作痛用秦艽地黄汤易老祛风丸而痊

一妇人遍身患疙瘩发热作痒内服败毒祛风外搽攻毒追蚀各溃成疮脓水津淫形气消瘦饮食日减恶寒发热作渴饮冷脉浮数按之则濡此元气复伤也先用七味白术散数剂其渴渐止饮食稍加乃用八珍汤加柴胡牡丹皮脓水渐乾又用六君芎归丹皮山栀疮渐收敛仍用八珍山栀牡丹皮而疮愈

一妇人每秋间两手心作痒搔起白皮因劳役恼怒则发寒热变身作痒起疙瘩或以为风症内服花蛇等药外敷硫黄之类患处焮溃又服遇仙丹热渴益甚月水不通余谓肝脾二经血燥生风先用加味逍遥散热渴渐减又用八珍柴胡山栀患处少可後因怒气发热脇痛患处焮肿用加味逍遥散四剂而安又用四君芎归山栀牡丹皮半载而痊

一妇人因怒寒热发赤晕服祛风之药发疙瘩或砭出血患处焮肿发热头痛内服外敷俱系风药脓水淋漓服花蛇酒之类前症益甚更加晡热烦渴不寐脉洪大按之如无余谓血脱烦躁先用补血当归汤稍缓用四君子汤数剂得睡但倦怠头运少食用补中益气汤加蔓荆子稍可又用八珍汤少用芍药倍用参术三十余剂而能步履又服月余而痊

一妇人患白癩风误以为大麻风服蛇酒等药患处焮肿经水两三月一行余曰此肝血伤而内风也误服风药必筋脉拘急不信仍作风治果身起白屑四肢拳挛始信余言先用八珍汤四剂又用四君子汤二剂月余乃以四君子汤又用八珍汤二剂又月余诸症渐退元气渐复又以四君子汤为主以逍遥散为佐将两月疮靨脱落又月余而愈

一妇人性急善怒月经不调内热口苦患疙瘩作痒服败毒之药脓水淋漓热渴头晕日晡益甚用加味逍遥散渐愈後因大怒月经如涌眼赤出泪用四物汤加山梔柴胡连芩数剂而愈年余左足臂腕起白点渐大搔起白屑内热盗汗月经两月余一至每怒或恶寒头痛或不食作呕或胸乳作胀或腹内作痛或小便见血或小水不利或白带下注此皆肝木制伏脾土元气虚而变症也用补中益气汤加炒黑山梔及加味归脾汤间服半年而愈後每怒恼患赤晕或以风疾治之发疙瘩又服遇仙丹赤肿作痒出脓水外敷追蚀之药寒热作渴又服胡麻草乌之药遍身搔痒眉毛脱落脓水淋漓咳 发热月经两月一行余用四君子汤牡丹皮月余热渴稍止饮食稍进又服月余咳 稍可却用八珍汤加牡丹皮二十余剂患处渐乾经水如期後因伤食作泻不食用六君子汤饮食渐进又因怒发热作渴患处作痛经行不止用加味逍遥散渐可仍用四君子汤而全愈

一妇人性沉静怀抱不乐月经过期遍身作痒服祛风清火之剂搔破成疮出水不止其痒益甚或用消风散之类眉棱跳动眉毛折落又服遇仙丹患处俱溃咳 发热饮食日少月经先期余作肝脾鬱怒而血燥前药复伤而益甚先用四君子汤芍药归山梔牡丹皮饮食渐进服月余而止又以加味逍遥散加钩藤鈎二十余剂而眉不动乃去钩藤倍加参术当归月余疮渐结靨又以八珍汤加山梔牡丹皮而痊

一妇人患前症脓水淋漓发热作渴体倦恶寒经水不调久而不愈此肝脾亏损而虚热也先用补中益气汤加川芎山梔而元气渐复又用逍遥散而疮渐愈又产後患疥遍身作痒搔起疙瘩破而出脓或出血水误服醉仙散殊类风症余用八珍汤数剂而安又用十全大补汤患处渐乾因恼怒停食腹胀少食发热作渴患处复溃用六君子汤加炒黑山梔数剂饮食渐进又用八珍汤之类而痊

一妇人日晡身痒月余口乾又月余成疮服祛风治疮之剂脓水淋漓午前畏寒午後发热殊类风症余谓此肝火伤脾外邪所抔先用补中益气汤加山梔钩藤又用加味逍遥散兼八珍散而痊

一妇人素清苦因鬱怒患前症遍身发疙瘩晡热内热盗汗自汗月经不行口乾咽燥余用归脾汤数剂诸症稍退後兼加味逍遥散五十余剂而愈

一妇人性躁患??作痒脓水津淫寒热口苦脇痛耳鸣腹胀溺瀉乃肝脾血虚火症用六君柴胡山梔龙胆数剂以逍遥散兼服渐愈又与六味丸逍遥散七十余剂诸症悉退

一妇人患癰症作痒脉浮数以人参败毒散二剂少愈更以消风散四剂而安又用柴胡清肝散而愈

一妇人患癰症痒痛大便秘脉沉实以四物汤加芩连大黄槐花治之而便利用四物二连汤而疮愈

一妇人身如丹毒搔破淋漓热渴头眩日晡益甚用逍遥散加炒山梔丹皮而愈又用八珍柴胡山梔丹皮而痊

一妇人患前症误服大麻风药破而出水烦渴头运诚类风症六脉洪数心肝脾为甚余曰风自火出此因怒动肝火血燥而生风耳非真风症也与逍遥散六味丸以清肝火滋脾血生肾水而愈

一妇人患前症搔破久不愈食少体倦此肝脾亏损陰虚发热也先用补中益气汤加川芎炒梔元气渐复更以逍遥散而疮愈

一妇人身如丹毒後发疙瘩搔破脓水淋漓热渴头运日晡益甚先用消风散二剂又用加味逍遥散而愈一妇人患赤游风晡热痒甚余用清肝养血之剂不信乃服大麻风药臂痛筋挛又服化痰顺气之剂四肢痿弱又一妇患前症数用风药煎汤泡洗以致腹胀并歿一女子月经先期或经行上身先发赤晕微肿作痒若遇气恼赤痒益甚服祛风之剂患处更肿砭出紫血甚多其痒愈作余谓肝火血燥风药复伤血而为患也先用加味逍遥散清肝火益肝血赤痒少止用地黄丸滋肾水生肝木各五十余贴而痊後因恼怒经水不止发热作渴患处赤痒先用加味小柴胡汤二剂诸症顿止又用加味逍遥散而安

一女子二十岁月经先期而或过期或有怒身发赤晕或患疙瘩六七日方退服祛风药赤晕不退搔痒作渴热为风症恪服前药搔破成疮脓水津淫余曰此肝火生风再服是药必致筋挛不悟後两手果挛始信先用地黄丸四物汤月余热渴顿減乃佐以加味逍遥散又月余患处脓少又用四君山梔牡丹皮二十余剂指能伸屈因怒发热经水不止睡中筋脉抽动不安以加味逍遥散加鈎藤鈎治之而痊仍用四物山梔鈎藤鈎牡丹皮而疮结靨乃去鈎藤鈎調理元气复而疮靨脱一女子常患癰疹作痒因怒发热变为疙瘩臀肿痒其余用梔子清肝散治之而愈後又怒患痕起赤晕游走不定自砭出紫血甚痒彻骨其热如炙如大麻风欲用风药余给之曰然乃以当归补血汤四剂其热悉止又用圣愈汤加味逍遥散而痊

一女子赤晕如霞作痒发热用小柴胡汤加生地连翘丹皮而愈後时常发热遍身如虫行因恼怒起赤晕作痒用柴胡清肝散热痒顿止用加味逍遥散热痒全止但见风起赤晕或发癰疹或患疙瘩用胡麻散随愈一女子常患疙瘩时或作痒服消风之类搔破成疮其痒不止延

及头面余先用羌活当归散其痒顿止用加味逍遥散其热顿痊又用当归饮而疮亦愈用八珍柴胡山梔而不再作

一小儿因有食积服尅滯之剂肢体生疮似疥服消毒之药发疙瘩赤色作痒脓水津淫先用五味异功散加柴胡山梔以补脾胃平肝木赤痒渐消又用四味肥儿丸五味异功散治之而食积愈

一女子赤晕作痒寒热发搐服风药身发疙瘩搔破出水此肝血风热之症先用加味小柴胡汤後用四味肥儿丸而愈後伤风咳 头面搔痒微肿先用消风散一剂又用梔子清肝散而痊

一小儿遍身生疮小便不调颈间结核两目连割服祛风之剂眉毛脱落余谓肝经风热之症先用大芦荟丸後用四味肥儿丸渐愈後因饮食停滯发热其疮复聾用大芫荽汤四味肥儿丸而痊後每停食遍身发赤作痒服四味肥儿丸即愈

一小儿遍身患疮似疥作痒肌体消瘦发热龈烂口渴饮水大便不实此肾肝之症也先用地黄丸治之又用大芫荽汤而愈後因饮食所伤其疮复熈先用四味肥儿丸後用大芫荽汤而痊

一小儿遍身生疮似疥或痒或痛脓水淋漓眉毛脱落大便酸臭小便澄白余谓肝脾之症先用大芦荟丸後用四味肥儿丸诸症渐愈又佐以五味异功散而痊一小儿遍身生疮头髮成穗眉毛脱落肌肉消瘦大便酸臭小便不调颈间结核肚大青筋余先用五味异功散月余後用四味肥儿丸又用大芫荽汤异功散而痊一小儿先陰茎作痒小便不调後遍身生疮作痒服消风败毒之剂聾如大风之症颈间结核发热如炙余先用柴胡梔子後用大芦荟丸四味肥儿丸诸症少愈又用虾蟇丸四味肥儿丸而痊

一小儿部面浮肿遍身如癰半年後遍疙瘩色紫作痒敷巴豆之药皮破出水痛痒寒热大便坚硬脾肺脉洪数而实先用防风通圣散便利调和又用四物汤加荆防黄芩柴胡皂角刺甘草节诸症渐愈更以八珍汤加白术荆防皂角刺五加皮而愈後但劳则上体发赤晕日晡益甚此气血虚而有火也先用四物汤加丹皮参术柴胡治之稍愈又用补中益气汤加酒炒黑黄栢知母月余全愈後不守禁忌遍身生疮诚如疔风大便酸臭肚大青筋头髮成穗先用肥儿丸月余又用大芫荽汤数剂又用大芦荟丸四味肥儿丸而寻愈

一女子十二岁善怒遍身作痒出水用柴胡川芎山梔芍药以清肝火用生地当归黄芩以凉肝血用白术茯苓甘草以健脾胃而愈半载之後遍身起赤痕或时眩晕寒热余曰此亦肝火炽盛血得热而妄行其夜果经至後因肝经血燥生疮发热作痒搔破出水眉毛脱落用大芦荟丸四物二连汤而热退用五味异功散四味肥儿丸而痊愈

一小儿遍身生疮大便下血发热作渴腹大青筋眉毛渐落余用大芦荟丸五味异功散其疮

渐愈佐以补中益气汤热渴渐止又用异功散为主佐以补中益气汤加吴茱萸所制黄连治之血止疮愈

一小儿十五岁遍身似疥非疥脓水淋漓晡热口乾形体骨立四年矣此肾肝之症用六味丸而痊後陰莖作痒小便澄白患疮疥如大风余用大芦荟丸四味肥儿丸诸症渐愈又用大茺萸汤而寻愈後停食吐泻不食发赤?先用二陈山查麦芽次用异攻散饮食如常又用大茺萸汤而愈

一女子赤晕如霞作痒发热用小柴胡汤加生地黄连翘丹皮而愈

一女子性急多怒月经先期患?色赤作痒搔破脓水不止服祛风药其疮益甚服花蛇酒四肢痠痠眉毛折脱余先用柴胡清肝散加钩藤钩数剂又用加味逍遥散加钩藤钩诸症渐愈又用易老祛风丸而痊一女子素有肝火因怒颈项结核寒热晡热遍身起赤晕作痒服祛风之药搔痒出水唇目摇动余以为脾经血虚内热生风用梔子清肝散加钩藤钩而搔热顿减又用当归川芎散而诸症渐愈乃用加味逍遥散而痊一小儿患赤游风余先用羌活白芷散二剂又用加味逍遥散而愈後伤风热起疙瘩搔破出水或用大麻风药十指拳挛脓水津津余先用秦艽地黄丸手指如常又用易老祛风丸而疮亦痊

一小儿遍身搔痒或如虫行内服胡麻散外敷解毒散患处皆溃诚如麻风之症视其唇或掣动或两目连割此肝木乘脾土用升麻汤煎送泻青丸而渐愈又用桦皮散而痊

一小儿遍身搔痒起赤晕後脓水不止先用归脾饮二剂又用柴胡散而愈後因惊挟食发热起赤晕用越鞠丸一钱枳术蓬术末各五分葱汤调服二次又用消风散一服赤晕顿消又用越鞠丸而痊

薛氏医案卷十八

卷十九

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷十九

明 薛己 订

疔疮机要下

各症方药

通天再造散 治疔风恶疾

鬱金【五钱】 大黄【煨】 皂角刺【炒黑各一两】 白牵牛【六钱半生半炒】

右为末每服五钱日未出时面东以无灰酒调下

宝监醉仙散 治疔风

胡麻子 牛蒡子 枸杞子 蔓荆子【各炒一两】 白蒺藜 瓜蒌根 苦参 防风【各五钱】

右为末每一两五钱入轻粉二钱拌匀每服一钱茶清调晨午各一服至五七日於牙缝中出臭涎令人如醉或下脓血病根乃去仍量人轻重虚实用病重者须先以再造散下之候元气将复方用此药忌一切炙?厚味止可食淡粥时菜诸蛇以淡酒蒸熟食之可以助药势

宝监换肌散 治疔风久不愈或眉毛脱落鼻梁崩坏不月奏效如神

地龙【去土】 当归 细辛 何首乌【不犯铁】 白芷 天麻 蔓荆子 葳灵仙 荆芥穗 菊花 苦参

紫参 沙参 木贼草 白蒺藜 草乌头【炮去皮脐】 不灰木 甘草 天门冬【去心】 赤芍药 九节菖蒲 定风草 胡麻子【炒】 川芎 苍术【一两】 木鼈子【一两】 白花蛇【三两】 黑花蛇【三两酒浸】

右各另为末每服五钱温酒调下日後酒多尤妙

补气泻荣汤 治痲风

升麻 连翘【各六分】 苏木 当归 黄连 黄芪 全蝎 地龙【去土各五分】 生地黄 荆芥【各四分】 人参 梧桐泪【各一分】 桔梗 麝香【少许】 桃仁【三个】 白豆蔻 蜈蚣【去翅足炒三个】 水蛭【炒烟尽三个】

右先将豆蔻麝香水蛭蜈蚣各另为末和匀却将前药用水二鍾煎至一鍾去粗入桐泪前末再煎至七分空心热服

海藏愈风丹

治痲病手足麻木眉毛脱落遍身生疮及痲风瘾疹皮肤燥痒搔破成疮并皆治之

皂角【乙斤剉寸许无灰酒浸一宿以水一碗按成汁去粗以砂器中文武火熬】 土花蛇【二条去肠阴乾酒浸取净肉晒乾为末大风症治之】 苦参【一斤取末四两】 白花蛇乌梢蛇【各一条依前酒浸取肉为末】

右为末入前二味为丸桐子大每服六七十丸空心通圣散送下乾物压之日三服间日浴之汗出为度愚按前方果系痲风用之必效若肝经血热脾经血虚肾经虚火脾肺气虚遍身作痒搔破成疮或内热生风而?鬢脱落或皮肤赤晕或搔起白屑而类痲风者服之反成痲风矣

二圣散 治痲疮

大黄【五钱】 皂角刺【三钱烧灰】

右为末每服二钱白汤调下早服桦皮散中服升麻汤下泻青丸晚服二圣散皆为疎泄血中风热也

清胃散 治热毒在表以此发散之

升麻 白芷 防风 白芍药 乾葛 甘草 当归 川芎 羌活 麻黄 紫浮萍 木贼草【各等分】

右每服五七钱水煎

防风通圣散 治风热炽盛大便秘结发热烦躁表里俱实者

防风 当归 川芎 芍药 大黄【煨】?硝 连翘 薄荷 麻黄 桔梗 石膏【煨】 黄芩【炒各一两】 白术 山栀 荆芥【各五钱五分】 甘草【二两】 滑石【三两】 白芷 蒺藜【炒】 鼠粘子【各五钱】

右为末每服三五钱白汤调下

透经解挛汤 治风热筋挛骨痛

荆芥 红花 苏木 羌活 当归 防风 蝉壳【去土】 天麻
甘草【各七分】 白芷【一钱】 连翘 川芎【各五分】 穿山甲【三钱炮】

右水酒各半煎服

秦艽地黄汤 治风热血燥筋骨作痛

秦艽 生地黄 当归 川芎 羌活 防风 荆芥 甘草 白芷 升麻 白芍药
大力子【蒸】 蔓荆子【各一钱】

右水煎服

羌活当归散 治风毒血热头面生疮或赤肿或成块或瘾 搔痒脓水淋漓

羌活 当归 川芎 黄连【酒浸炒】 鼠粘子【蒸】 防风 荆芥 甘草 黄芩【酒浸炒】 连翘
白芷 升麻

【各一钱】

右酒拌晒乾水煎

羌活白芷散 治风热血燥手掌皱裂或头面生疮或遍身肿块或脓水淋漓

羌活 白芷 软柴胡 荆芥 蔓荆子 防风 甘草 猪牙皂角 黄芩 黄连【酒炒各一钱】

右水煎服

四生散 治肾臟风耳鸣目痒鼻赤齿浮或妇女血风疮

白附子 独活 黄芪 白蒺藜【各等分】

右为末每服二钱用猪腰子劈开入药湿纸裹煨熟细嚼盐汤下风癖酒下为丸亦可

消风散 治风热瘾 痒痛或脓水淋漓或头皮肿痒荆芥穗
甘草【炙各二钱】 陈皮【五钱】 人参 白僵蚕【炒】 茯苓 防风 芎藭

蝉壳【去土】羌活 藿香【各一两】厚朴【姜制五钱】

右每服五七钱姜水煎

九味羌活汤 治一切外因疮毒

羌活 防风 苍术【各一钱五分】川芎 白芷 生地黄 黄芩 甘草【各一钱】细辛【五分】

右水煎服

当归饮 治血热瘾 痒痛或脓水淋漓发热等症当归 白芍药 川芎 生地黄 防风 白蒺藜 荆芥【各一钱五分】黄芩【炒】甘草 何首乌【各一钱】

右水煎服

升麻汤 治风热身如虫行或唇反纵裂

升麻【三分】茯苓 人参 防风 犀角【镑】羌活 官桂【各二钱】

右每服四钱水煎下泻青丸

桦皮散 治肺风疮疥瘾 及风刺粉刺

桦皮【四两炒灰】荆芥穗【二两】甘草【炙五钱】枳壳【四两去穰烧煨存性】杏仁【二两去皮尖另研】

右为末磁器贮之每服四五钱水煎

胡麻散 治风热瘾 搔痒或兼赤晕寒热形病俱实者

胡麻【一两二钱】苦参【八钱】荆芥穗【八钱】首乌【不见铁器八钱】葳灵仙防风 石菖蒲 牛蒡子【炒】甘菊花 蔓荆子 甘草【炒各六钱】白蒺藜【炒去刺同】

右每服三钱酒调

易老祛风丸 治疥癩风疮

黄芩 枳壳【炒】防风 芍药 甘草 地骨皮 枸杞子 熟地黄 生地黄【各酒拌杵膏】

右各另为末入二黄膏加炼蜜丸桐子大每服七八十丸白汤下

白丁香散 治疔风眼中生翳肉

白丁香 贝母

右为末人乳汁调点眼内

子和生?散 治疔风?毛脱落

半夏 羊粪【各等分】

右为末姜汁调涂?棱上如不应当参类症?脱条治之

漂洗疔疮药

何首乌 荆芥 防风 马鞭草 蔓荆子【各等分】

右每用十两水一斗煎数沸无风处洗出汗

解毒散 治风疮解外毒

巴豆肉 皮硝【各一两】 黄蜂巢 黑狗脊【各七钱】 白芷雄黄 牙皂角 羊蹄根 轻粉 蝉壳【去上】 枯

矾 寒水石【各五钱】

右为末腊猪油调搽外毒既去却搽黄连散

愚按洗药虽能疏通腠理而损元气解毒散虽能攻毒而伤良肉不宜多用

黄连散 治疔疮清热解毒

黄连【五两】 五倍子【一两】

右为末唾津调涂之

加味逍遥散 治血虚有热遍身搔痒心烦目昏怔忡颊赤口燥咽乾发热盗汗食少嗜卧

当归【炒】芍药【酒炒】茯苓
白术【炒各一钱】柴胡【五分】牡丹皮甘草【炙】山梔【炒各八分】

右水煎服

当归补血汤 治肌热恶寒面目赤色烦渴引饮脉洪大而虚重按似无此血虚也若误服白虎汤必死黄芪【炙一两】当归【酒制二钱】

右水煎服

补中益气汤 治中气不足或因尅伐四肢倦怠口乾发热饮食无味或饮食劳倦头痛烦躁恶寒自汗气喘身热等症

人参

当归【各一钱】黄芪【炒】白术【各一钱半】甘草【炙一钱半】陈皮【五分】柴胡
升麻【各三分】

右姜枣水煎空心午前服

四君子汤 治脾胃虚弱饮食少思大便不实等症

人参 白术 茯苓【各二钱】甘草【炙一钱】

右姜枣水煎

六君子汤 治脾胃损伤饮食少思或大便不调面色痿黄等症即四君子加陈皮半夏

七味白术散 治中气虚弱津液不足口乾作渴或口舌生疮不喜饮冷吐泻等症

人参 白术 木香 白茯苓 甘草【炙】藿香【各五分】乾葛【一钱】

右水煎服

四物汤 治血虚发热烦躁或晡热作渴头目不清若因脾虚不能生血者用四君子汤

当归 熟地【各二钱】芍药【炒】川芎【各一钱】

右水煎服

归脾汤 治忧思伤脾内热发热或血妄行吐下或健忘惊悸少寐或妇女经候不准晡热内热或唇口遍身疮疥等症

白术 黄芪【炒】 当归 茯神 人参 龙眼肉 远志
酸枣仁【炒各一钱】 木香【五分】 甘草【炙三分】

右姜枣水煎

八珍汤 治气血俱虚恶寒发热或烦躁作渴等症即前四君四物二方相合

十全大补汤 治症同上或更兼自汗盗汗体倦食少等症即八珍汤加黄芪肉桂

圣愈汤 治一切失血或血虚烦渴躁热卧睡不宁或疮症脓水出多五心烦热作渴等症

熟地【生者自制】 生地黄 当归【酒拌各一钱】 人参 黄芪【炒】 川芎【各二钱】

右水煎服

芎归汤 治失血烦热作渴或头痛眩暈

川芎【三钱】 当归【酒拌五钱】

右水煎服

竹叶黄芪汤 治气血虚胃火盛而作渴

淡竹叶 生地【各二钱】 黄芪 麦门冬 当归 川芎 黄芩【炒】 甘草 芍药 人参 半夏
石膏【煨各一钱】

右水煎服

竹叶石膏汤 治胃火盛而作渴

淡竹叶 石膏【煨】 桔梗 木通 薄荷 甘草【各一钱】

右姜水煎

济生犀角地黄汤 治胃火盛血热妄行或吐衄便血形气虚病气实者

犀角【镑】 生地黄 赤芍药 牡丹皮【各一钱半】

右水煎倾出入犀末服若形气病气俱实再加黄芩黄连若因气恼而致加山梔柴胡

桃仁承气汤 治血结胸中手不可近或中焦畜血寒热胸满漱水不欲咽善忘昏迷其人如狂

桃仁【五分】 大黄【一钱】 甘草【三分】 肉桂【五分】

右水煎服

泻青丸 治肝经风热头目昏眩肌肉瞤动或牙关紧急痰涎壅盛或颈项脇肋小腹阴囊腿股作痛凡属肝经有余之症用之

当归 川芎 山梔 龙胆草【酒拌炒焦】 大黄【炒】 羌活防风【各等分】

右为末蜜丸桐子大每服二三十丸白汤下

梔子清肝散

治三焦肝胆经血虚风热耳项胸乳等处痒痛或发热寒热晡热自汗或目唇摇动

柴胡 梔子 丹皮【各一钱】 茯苓 川芎 芍药 当归 牛蒡子【炒各七分】 甘草【五分】

右水煎服

柴胡清肝散 治风热怒火或寒热呕吐等症

柴胡 山梔【炒各钱半】 黄芩【炒】 人参

川芎【各一钱】 连翘 桔梗【各八分】 甘草【五分】

右水煎服

当归川芎散 治手足少阳经血虚风热耳内痒痛或寒热少食头目不清日晡热甚

当归 川芎 柴胡 白术 芍药【各一钱】 山梔【炒钱二分】 牡丹皮

茯苓【各八分】 蔓荆子 甘草【各五分】

右水煎服

小柴胡汤 治肝胆经风热或寒热往来或晡热潮热默默不欲饮食或因怒火口苦耳聋脇痛

等症柴胡【二钱】黄芩【一钱半】人参半夏【各一钱】甘草【炙五分】

右姜枣水煎

大芦荟丸 治疳火下疳或小儿疳膨食积口鼻生疮或牙龈蚀烂或虫蚀肛门痒痛

胡黄连 芦荟 黄连【炒】木香 白茺萸【炒】青皮白雷丸
鹤虱草【各一两】麝香【一钱】

右为末蒸饼糊丸桐子大每服一钱空心米汤下

加味地黄丸 治肾经阴虚耳内痒痛或两目昏花或吐痰气喘作渴发热小便赤澹等症

乾山药 山茱萸 牡丹皮 泽泻 白茯苓熟地黄【自制】生地黄 柴胡
五味子【各另为末等分】

右二地黄捣碎酒拌湿杵膏入前末和匀炼蜜丸桐子大每服百丸空心白汤下

二陈汤 治中脘停痰呕吐恶心或头目不清饮食少思

陈皮 茯苓 半夏 甘草【炙各一钱】

右姜枣水煎

连翹饮子 治目恶日光或癰澹昏花不能久视迎风有泪

蔓荆子 甘草 连翹【各三钱】黄芩【炒】柴胡 黄芩【酒拌五分】生地黄 当归 红葵花
人参【各三分】升麻防风 羌活【各一钱】

右水煎服

四物龙胆汤 治肝经风热眼暴赤痛或生云翳当归 川芎 芍药 生地黄 羌活 防风防己
胆草【酒拌炒焦】

右水煎服

四物二连汤 治血虚五心烦热昼则明了夜则发热当归 生地黄
白芍【炒各一分】川芎【七分】黄连【炒五分】胡黄连【三分】

右每服五钱水煎

地芝丸 治目能近视不能远视此阳气不足阴气有余

生地【焙乾四两】天门冬【去心】枳殼【麸炒】甘菊花【各二两】

右为末炼蜜丸桐子大每服百丸清茶下

定志丸 治目能远视不能近视此阴气不足阳气有余

白茯苓 人参【各二两】远志【去心】石菖蒲【各一两】

右为末炼蜜丸桐子大以朱砂为衣每服二三十丸温酒下日三服

神效黄芪汤 治浑身或头面手足麻木不仁两目紧缩羞明畏日或视物不明

黄芪【二两】人参【八钱】甘草【炙】白芍药 蔓荆子【各一两】陈皮【五钱】

右每服五钱水煎临卧热服如麻木不止更加黄芪虽有热症不用黄柏

益气聪明汤 治脾胃伤损眼目昏暗或饮食劳役脾胃不足致内瘴耳鸣

黄芪 甘草【炙】人参【各五钱】升麻 葛根

黄柏【炒各二钱】芍药【一钱】蔓荆子【一钱七分】

右每服五钱水煎临卧及五更服脾胃虚去黄柏

清凉饮 治实热大便秘结或咽喉肿痛

当归 赤芍药 甘草【炒】大黄【蒸各等分】

右每服五钱水煎

清胃散 治脾胃湿唇齿作痛或齿龈溃烂或连头面作痛或发热恶寒或热药厚味所致

生地黄【酒拌】当归【酒洗】牡丹皮 黄连【各五分】升麻【一钱】

右水煎服如痛未止加石膏之类

凉膈散 治上焦实热烦躁作渴或喉舌肿痛便溺秘赤

大黄 朴硝 甘草 栀子仁 黄芩 薄荷【各一两】连翘【四两】

右每服三五钱水煎

黄连解毒汤 治疮疡痱痛烦躁饮冷脉洪数发狂言

黄芩 黄连 黄柏 山栀【各炒钱半】

右水煎服

泻黄散 治胃经实热呕吐或口舌生疮

石膏【煨】 藿香【各一钱】 山栀【一钱五分】 甘草【五分】 防风【七分】

右水煎服

润肠丸 治脾胃伏火伤血或失血大肠乾燥大便不通或风热血结便秘食少

羌活 当归尾 麻子仁

桃仁【去皮尖另研】 大黄【煨】 皂角仁【各一两】 秦艽【五钱】

右为末炼蜜或猪胆汁丸桐子大每服三五十丸食前滚汤下如燥粪在肛门之间用胆汁导之即通若因津液乾涸不通当补气血

滋肾丸 治不渴而小便不利者乃膀胱经热甚不能生水宜用此药以滋化源

肉桂【三钱】 知母 黄柏【各酒炒黑二两】

右为末水丸桐子大每服二百丸空心白滚汤下

清肺饮 治渴而小便不利乃肺经有热絶寒水生化之源宜用此药

茯苓【二钱】 猪苓【二钱】 灯心【一钱】 木通【七分】 麦【五分】 扁蓄【三分】

右为末作二剂水煎

黄芩清肺饮 治肺燥而小便不利

黄芩 山梔【各一钱】

右水煎服

五淋散 治膀胱有热水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或成砂石或热拂便血

赤芍药 山梔【各一钱】 当归 甘草【各一钱二分】 赤茯苓【一钱五分】

右用灯心二十茎水煎服

清心莲子饮 治热在血分口乾便浊夜则安静昼则发热或口舌咽乾或生疮烦渴小便瀝淋

黄芩 麦门冬 地骨皮 车前子【炒】 甘草【各一钱五分】 石莲肉 茯苓 黄芩【炒】 柴胡 人参【各一钱】

右水煎服

升阳益胃汤 治脾胃虚弱怠惰嗜卧或值秋令体重节痛大便不调小便频数饮食不消洒淅恶寒凄惨不乐面色不和乃阳不升也

羌活 独活 防风【各五钱】 柴胡 白术 茯苓【渴者不用】 泽泻【各三钱】 人参 黄芩【各二两】 半夏 甘草【炒各一两】 芍药 黄连【炒】 陈皮【各三钱】

右每服三五钱姜枣水煎若服後小便愈数而病愈加不宜分利小便当减茯苓泽泻

生脉散 治热伤元气肢体倦怠气短懒言汗出不止口乾作渴等症

人参【五钱】 麦门冬【二钱】 五味子【一钱】

右水煎服如不应倍之

清燥饮 治气血虚弱湿热乘之遍身酸软或湿热行令肺金受邪肾无所养小便赤少大便不调或腰腿酸软体重麻木或头晕食少自汗口乾胸满气促懒於言语

黄芩 苍术【各一钱】 人参 白术 神麴【炒】 陈皮【各五分】 甘草【炙】 黄柏【炒】 麦门冬 当归【各三分】 葛根 泽泻 青皮【各二分】 五味子【九粒】

右水煎服

二神丸 治脾胃不足侵晨作泻或不时去後饮食少思肌肉消瘦

补骨脂【四两】肉豆蔻【二两】生姜【四两】红枣【四十九枚】

右用水一盞煮姜枣至水乾取枣肉和药末杵匀丸桐子大每服五七十丸淡盐汤下

六味丸【一名地黄丸加肉桂五味名加減八味丸】治肾虚发热作渴痰咳头晕喉燥唇裂腰腿酸软或自汗盗汗便血诸血失音水泛为痰小便淋漓等症

牡丹皮 白茯苓 泽泻【各三两】熟地【自制八两】山茱萸【去核】乾山药【各四两】

右为末地黄杵膏加炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前滚汤下

加減金匱肾气丸

治脾胃虚腰重脚肿小便不利或肚腹肿胀四肢浮肿或喘急痰盛已成蛊症其效如神

白茯苓【三两】附子【五钱】川牛膝 肉桂 车前子 泽泻 山茱萸 山药
牡丹皮【各一两】熟地黄【四两酒拌杵膏】

右为末和地黄加炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心米饮下

五味异功散 治脾胃虚弱饮食少思或食而难化大便不实等症

人参 白术【炒】茯苓【各二钱】甘草【炙】陈皮【各一钱】

右水煎服

四神丸 治脾肾虚弱大便不实饮食少思等症肉豆蔻

五味【各二两】补骨脂【四两】吴茱萸【炒一两】

右为末水二碗生姜八两红枣百枚煮熟取枣肉和末丸桐子大每服五七十丸空心食前白汤下

愈风丹 治诸风肢体麻木手足不随等症

天麻 牛膝【酒浸焙】萆薢 玄参【各六两】杜仲【七两】羌活【十四两】当归
熟地黄【自制】生地黄【各一斤】独活【五两】肉桂【三两】

右为末炼蜜丸桐子大每服七十丸温酒下

泻白散 治肺经实热咳

桑白皮 地骨皮【各一两】甘草【五钱】

右为末每服三钱白汤调下

半夏白术天麻汤

治寒气所鬱大便不利或呕不食痰唾稠粘头目眩运喘促气短或头痛身重四肢逆冷

半夏 天麻 黄芩 人参 苍术 陈皮 泽泻 茯苓【各一钱五分】白术
神麴【炒各一钱】大麦芽 乾姜【炒黑各三分】黄柏【酒制二分】

右每服五钱水煎服

牛黄清心丸 治诸风手足不随痰涎壅盛言语蹇澀心忪健忘或发颠狂

防风 白术 白芍药

羚羊角【镑】麝香【另研】龙脑【另研】麦门冬【去心】黄芩【各一两】人参
神麴炒蒲黄【炒各二两】甘草【五两】白茯苓 芎藭 杏仁【去皮尖】桔梗【各一两二钱半】柴胡【两二钱半】雄黄【另研二钱】山药【七钱五分】牛黄【另研一两二钱】白芷 乾姜【各七钱五】当归【酒浸两半】大豆黄卷 阿胶 肉桂

【各两七钱】犀角【二两】大枣【一百枚蒸熟杵】金箔【一千三百片内四百为衣】

右为末和匀同枣肉加炼蜜丸龙眼大以金箔为衣每服二丸白汤化下

人参理中丸 治脾胃虚寒呕吐泄泻饮食少思等症

白术【炒】人参 乾姜【炮】甘草【炙各等分】

右为末丸桐子大每服六七十丸白汤下

人参平肺散 治心火剋肺传为疝痿咳喘 喘呕痰涎壅盛胸膈痞满咽噎不利

人参 陈皮 甘草【炙】地骨皮 茯苓【各一钱】知母【炒七分】五味【杵炒四分】青皮【五分】桑白皮【炒一钱】天门冬【四分去心】

右水煎服

决明夜灵散 治日至夜则昏虽有灯月亦不能睹石决明
夜明砂【各另研二钱】猪肝【一两或羯羊肝亦可】

右以竹刀切肝作二片铺药於内用线缚定砂罐内米泔水煮至半碗临睡连肝服之

人参益气汤 治暑热伤气肢体困倦饮食少思或发热作渴等症

黄芪【八钱】人参甘草【各五钱】炙甘草 升麻
柴胡【各二钱】白芍药【三钱】五味【一百四十粒】

右作四剂水煎服

四七汤 治七情鬱结成痰或如梅核梗於喉间或中脘停痰恶心呕逆

紫苏叶 厚朴【姜制】茯苓【各一钱】半夏【姜制一钱五分】

右姜枣水煎

硫黄散 治紫白癜风

硫黄【一两用醋一碗煎乾再晒】

右为末以生姜蘸药擦患处

神效当归膏 治风疮去腐肉生新肉其肉赤黯毒气炽盛擦至淡赤或其毒已退收功甚速此
膏生肌止痛补血续筋故与新药相宜

当归 黄蜡 生地【各一两】麻油【六两】

右先将地黄当归入油煎黑去粗入蜡溶化候冷搅匀即成膏矣如用白蜡尤好

砭法 治风毒瘀血壅盛或色赤走彻用细磁器击碎取有锋甚者一块以筋一根劈开头夹之
用线缚定两指轻撮筋稍令磁芒正对患处悬一寸许再用筋一根频击筋头令毒血遇刺皆
出

妙香散 治心气不足精神恍惚虚烦少睡盗汗等症甘草【炒一钱】人参
桔梗【各五钱】远志【去心炒】山药【姜汁】茯神
黄芪【各一两】辰砂【另研三钱】麝香【二钱】木香【煨二钱五分】

右为末每服二钱温酒调下

四味肥儿丸 治小儿食积五疳或白痿体瘦肚大青筋发稀成穗或遍身疮疥等症

芡实【炒】神麴【炒】麦蘖【炒】黄连【各等分】

右为末猪胆汁丸黍米大每服一二十丸木通煎汤下米糊丸亦可

地黄清肺饮 治肺肝咳

马兜铃 甘草【各五分】粘米【炒十粒】鼠粘子【三分炒】明阿胶【一钱麴炒】杏仁【七枚去皮尖】

右水煎服量儿加減

蟾蜍丸 治无辜疳症一服虚热退二服烦渴止三服泻痢愈

蟾蜍【一枚夏月沟渠中取腹大不跳不鸣身多?者】

右取粪蛆一枚置桶中以尿浸之却将蟾蜍跌死投与蛆食一昼夜用布袋盛蛆置急水中一宿取出瓦上焙乾为末麝香一字和匀粳米饭丸麻子大每服二三十丸米饮下甚效

小柴胡汤【加山梔牡丹皮名加味小柴胡汤】治伤寒温热身热恶风头痛项强四肢烦疼往来寒热呕哕痰实中暑疟疾并服之【方见前】

愚按前方若肝胆经风热肝火癰?寒热往来日晡发热潮热身热不欲饮食或怒火口苦耳聋咳 或脇痛胸满小便不利或泄泻吐酸若水或肢体搐动唇目抽掣并宜用之

神效太乙膏 治痈疽疮毒溃烂

玄参 白芷 当归 肉桂 赤芍药 大黄 生地黄【各一两】

右用麻油二斤八两铜锅内煎至黑滤去徐入淨黄丹一斤再煎滴水中捻软硬得中即成膏矣

金华散 治乾湿疮癬

黄丹【一两煨】轻粉【三钱】黄柏 黄连【各一两】麝香【一字另研】

右为末洗净掺之乾用猪脂和傅麻油亦可

一方治恶癖以紫贝草根生白矾少许同搗涂患处又一方

剪刀草 黄连 苦参【各五钱】 真轻粉【二钱】

右为末入麻油调敷

大麻子膏 治一切疮疥脓窠等疮

大枫子【肉】 白矾【枯各二两】 真轻粉【一两】 柏油【六两】

右为末将 油溶化和匀用之

加味逍遥散 治肝脾血虚身发赤痕或发热胸乳腹胀或搔痒盗汗心烦体痛或头目昏重怔忡颊赤或口燥咽乾食少嗜卧或妇女月经不调恶寒发热等症【方见前】

归脾汤 治忧思伤脾身发赤痕或搔破成疮健忘怔忡惊悸少寐或心脾作痛自汗盗汗咳吐痰血或肢体作痛大便不调或妇女经候不准哺热内热或唇口生疮流注等症【方见前】

白癩风方

人参 白术

苍术【盐炒】 防己【酒拌】 黄栢【酒炒】 川芎【各一钱】 陈皮【酒拌】 当归 茯苓 木瓜 柴胡稍 甘草【各五分】

右姜水煎服如三剂不退加桂少许或用汤煎小便濇倍用牛膝有热加黄连身热加羌活量儿大小用

化?丸 治诸疳生虫不时啼哭呕吐清水肚腹胀痛唇口紫黑肠头湿?

茺萸 青黛 芦荟 虾蟆【烧灰】 川芎 白芷 胡黄连

右各另为末等分猪胆浸胆成糕丸如麻子大每服一二十丸食後并临卧杏仁汤下

大肥儿丸 治脾疳饮食少思肌肉消瘦肚大颈细发稀成穗项间结核发热作渴精神倦怠便去酸臭爱食泥土或口鼻头疮或吐见素筋啮齿下利便白五疳即肥儿丸加乾蟾一两茺萸五钱

天麻丸 治肝疳眼目生翳昏花湿烂等症

青黛 川黄连 天麻 五灵脂 川芎 夜明砂【微炒】 芦荟 龙胆草 防风
蝉蜕【去足各一钱】 全蝎【二枚焙】 麝香【少许】

右为末猪胆汁浸糕丸麻子大每服二三十丸白滚汤下

阿魏膏 治一切痞块不拘年月远近甚者口齿蚀伤更服芦荟丸

羌活 独活 玄参 官桂 赤芍药 穿山甲 生地黄 两头尖 大黄 白芷 天麻【各五钱】

木鼈子【二十枚去壳】 红花【四钱】 槐柳桃枝【各三钱】 乱发【如鸡子大一块洗去
腻】

右用香油二斤四两煎至黑色去粗入发再煎待发化尽去粗徐下黄丹一斤煎至软硬得中
方入芒硝四钱阿魏三钱苏合油麝香没药各五钱调匀即成膏矣摊贴患处内服消积丸药
黄丹须真正者效凡贴膏药先用朴硝随患处大小铺之约半指厚以纸盖之用熨斗熨良久
如硝耗再加熨之熨二时许方贴膏药若是肝积加芦荟末同熨

大防风汤 治膝风肿痛不问已溃未溃

附子【炮去皮】 牛膝【酒浸】 甘草【炙各一钱】 人参
杜仲【姜制】 当归【浸酒】 羌活 防风 白芍药【炒】 黄芪【各二钱】 川芎【一钱五分】
熟地黄【用生者酒拌蒸一日忌铁器二钱】

右每服三五钱姜水煎空心服进三五剂更服六味地黄丸二三服

独活汤 治鹤膝风不问肿溃疼痛及腰背四肢不仁独活 当归 白术 黄芪【炒】 薄桂
牛膝【各一钱】 甘草【炙五分】

右姜葱水煎服量儿加减

清热解毒散 治痈疽阳症肿痛发热作渴

黄连 山梔 连翘 当归【各五分】 川芎 芍药【炒】 生地黄
金银花【各一钱】 甘草【五分】

右水煎服

神功散 治疮毒未成者用之内消加乳没尤妙

黄栢【炒】 草乌【炒】 血竭【等分】

右各另为末和匀用漱口水调搽小儿丹瘤用之亦效已砭者用之作痛

乳香定痛散 治疮疡溃烂疼痛

乳香 没药【各三钱】 滑石【七钱】 寒水石【一两煨】 冰片【二钱】

右为细末搽患处痛即止甚效

加减抱龙丸 治风痰壅盛惊搐昏睡等症

雄黄 辰砂【各二钱】 天竺黄【四钱】 麝香【五分】 天麻【六钱】 牛胆南星【八钱】

右为末煎甘草膏丸皂角子大每一丸薄荷汤下

解毒散 治一切疮毒风疹痒痛

黄栢【炒】 山梔【等分】

右为末水调搽若破而脓水淋漓用当归膏或烛油调搽

黄金散 治天疱疮止痛消毒

滑石 甘草【等分】

右为末挑破去水敷之

清凉解毒散 治症同前或作焮痛

大黄 黄栢 山梔 寒水石【煨等分】

右各另为末调搽当归膏尤好

制附子法

附子重一两三四钱有莲花瓣头底圆平者先备童便五六碗将附子先埋热草灰中半日乘

热投童便浸五七日揭皮切四块仍浸二三日用粗纸数重包之浸湿埋灰大半日取出切片检视有白星者乃用瓦上炙熟至无白星为度如急用即切火上炙黄用之亦效大凡阳气脱陷子时至午时恶寒未至亥发热如用熟附子不应必用半生半熟更不应急生附一二剂然後量症治之

薛氏医案卷十九

卷二十

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二十

明薛已订

明医杂着

医论

或问仲景东垣河间丹溪诸书孰优学之宜何主曰宜专主内经而博观乎四子斯无弊矣盖医之有内经犹儒道之六经无所不备四子之说则犹学庸语孟为六经之阶梯不可缺一者也四子之书初无优劣但各发明一义耳仲景见内经载伤寒而其变迁反覆之未备也故着论立方以尽其变後人宗之传用既久渐失其真用以通治温暑内伤诸症遂致误人故河间出而始发明治温暑之法东垣出而始发明治内伤之法河间之论即内经五运六气之旨东垣之说即内经饮食劳倦之义仲景非不知温暑与内伤也特其着书未之及河间东垣之於伤寒则遵用仲景而莫敢违矣至於丹溪出而又集诸儒之大成发明陰虚发热类乎外感内伤及湿热相火为病甚多随症着论亦不过阐内经之要旨补前贤之未备耳外感法仲景内伤法东垣热病用河间杂病用丹溪一以贯之斯医道之大全矣或问仲景处方药品甚少及东垣用药多至二十余味丹溪云余每治病用东垣之药效仲景处方庶品味数少则药力专精丹溪何以不法东垣而效仲景耶曰明察药性莫如东垣盖所谓圣於医者也故在东垣则可多他人而效其多斯乱杂矣东垣如韩信将兵多多益善丹溪不过能将十万故不敢效其多

愚按经云治病必求其本本於四时五臟之根也故洁古张先生云五臟子母虚实鬼邪微正若不達其旨意不易得而入焉徐用诚先生云凡心臟得病必先调其肝肾二臟肾者心之鬼肝气通则心气和肝气滯则心气乏此心病先求於肝清其源也五臟受病必传其所胜水能胜火则肾之受邪必传於心故先治其肾逐其邪也故有退肾邪益肝气两方或诊其脉肝肾两臟俱和而心自主疾然後察其心家虚实治之【余仿此详见玉机微义小儿部】

或问人言东南气热可服寒药西北气寒可服温药然今东南之人常服胡椒姜桂不见生病而西北之人畏食椒姜辛热之物何也曰东南虽热然地卑多湿辛热食药亦能劫湿西北虽寒然地高多燥辛热食药却能助燥故耳治病用药者须识此意

愚按异法方宜论云东南之域下卑湿热其人腠理疎通汗液妄泄阳气内虚故宜食椒姜辛热之物以助其阳也西北之域高陵风寒其人腠理致密汗液内固阳气充实不宜食椒姜辛热之物反益其阳也东坡先生仕黄州其民疫疠流行先生以圣散子治之其功甚效是其地卑湿四时鬱热腠理疎通汗液妄泄阳气虚寒是以相宜西北疫疠民用之死者接踵此余之目击也

丹溪先生治病不出乎气血痰故用药之要有三气用四君子汤血用四物汤痰用二陈汤又云久病属鬱立治鬱之方曰越鞠丸盖气血痰三病多有兼鬱者或鬱久而生病或病久而生鬱或误药乱杂而成鬱故余每用此方治病时以鬱法参之气病兼鬱则用四君子加开鬱药血病痰病皆然故四法者治病用药之大要也丹溪又云近世治病多不知分气血但见虚病便用参芪属气虚者固宜矣若是血虚岂不助气而反耗陰血耶是谓血病治气则血愈虚耗甚而至於气血俱虚故治病用药须要分别气血明白不可混淆

愚按经云脾胃为气血之本若阳气虚弱而不能生陰血者宜用六君子汤阳气虚寒而不能生陰血者亦用前汤加炮姜若胃土燥热而不能生陰血者宜用四物汤若脾胃虚寒而不能生陰血者宜用八味丸其余当更推五臟互相生尅而调补之

一儒者每劳役则食少胸痞发热头痛吐痰作渴脉浮大余谓此脾胃虚气而血病也不信服二陈四物黄栢知母之类腹痛作呕脉洪数而无伦次先以六君子汤加炮姜痛呕渐愈又用补中益气汤而痊一儒者素勤苦因饮食失节大便下血或赤或黯後非便血则盗汗非恶寒则发热六脉浮大心脾则瀦此思伤心脾不能摄血归源也盖血即汗汗即血其色赤黯便血盗汗皆火之降降微

牛黄抱龙丸 治风痰壅盛或咳 发热或发惊搐等症

牛黄 雄黄 辰砂 天竺黄【各四钱】 麝香【一钱】

右为末甘草汤糊丸皂子大每服二丸姜汤下

柴芍参苓散 治脾胃不和饮食少进或呕吐泄泻凡病後宜用此调理

柴胡 芍药 人参 白术 茯苓 陈皮 当归【各五分】 甘草 丹皮 山梔【炒各三分】

右为末每服一钱白汤下或作丸服

五味子汤 治咳 皮肤乾燥唾中有血胸膈疼痛等症

五味子【炒】 桔梗【炒】 紫苑 甘草【炒】 续断【各五分】 竹茹【一钱】 赤小豆【一撮】 生地黄【二钱】 桑白皮【炒二钱】

右水煎服

人参平肺散 治心火剋肺咳 喘呕痰涎壅盛胸膈痞满

右为末每二钱空心小麦汤调下

姜附赤石脂朱砂丹 治小便数而不禁怔忡多忘魔梦不已下元虚冷遗尿精滑或阳虚精漏不止或肾气虚寒脾泄肾泄等症

附子【生】乾姜【各半两】赤石脂【一两半水飞】

右为细末酒糊丸菉豆大每十五至二三十丸大便不和米饮下小便不禁茯苓汤下

茯苓丸 治心肾俱虚神志不守小便淋?不禁或赤或浊或不利并宜服之

赤茯苓 白茯苓【等分】

右为末以新汲水按洗澄去新沫控乾别取熟地黄汁与好酒同於银石器内?成膏搜和丸弹子大空心盐酒嚼下一丸

人参救肺散 治咳血吐血等症

升麻【一钱】柴胡【一钱】当归尾【二钱】熟地黄【二钱】白芍药【一钱】苏木【五分】黄芪【二钱】人参【二钱】甘草【半钱】苍术【一钱】陈皮【五分】

右每服五钱水二盏煎至一盏去粗食前温服

麦门冬饮子 治吐血久不愈或肺气虚而短之伤药要须识此吾妻尝胎漏忽日血大崩遂晕去服童便而醒少顷复晕急煎服荆芥随醒随晕服止血止晕之药不效忽然呕吐予以童便药汁满於胸膈也即以手揉吐之少间吐出米饭及羹菜碗许询问其由适方午饭後着恼故即崩而不止予悟曰因方饱食胃气不行故崩甚血既大崩胃气益虚而不能运化宜乎服药而无效也急宜调理脾胃遂用白术五钱陈皮麦芽各二钱煎服之服未半而晕止再服而崩止遂专理脾胃服十数剂胃气始还然後加血药服之而安若不审知食滞而专用血崩血晕之药岂不误哉

愚按人以脾胃为本纳五谷化精液其清者入荣浊者入胃陰阳得此是谓之橐龠故阳则发於四肢陰则行於五臟土旺於四时善载乎万物人得土以养百骸身失土以枯四肢东垣以饮食自伤医多妄下清气下陷浊气不降乃生?胀所以胃脘之阳不能升举其气陷入中焦当用补中益气使浊气自降不治自安窃谓饱食致崩者因伤脾气下陷於肾与相火协合湿热

下迫而致宜用甘温之剂调补气则血自归经而止矣若误用寒凉复损胃气则血无所羁而欲其止不亦难哉大凡脾胃虚弱而不能摄血宜调补脾气为主○一妇人崩漏面黄或赤时觉腹间脐下痛四肢困倦烦热不安其经行先发寒热两肋如束此脾胃亏损元气下陷与相火湿热下迫所致用补中益气汤加防风芍药炒黑黄栢兼服归脾汤而愈

凡妇人产後陰血虚阳无所依而浮散於外故多发热治法用四物汤补陰血而以炙乾姜之苦温从治收其浮散使归依於陰然产後脾胃虚多有過於饮食伤滯而发热者误作血虚则不效矣但遇产後发热若胸膈饱闷暖气恶食泄泻等症只作伤食治之若发热而饮食自调者方用补血正法

愚按新产陰血暴伤阳无所附而外热宜用四物炮姜补陰以配阳若因误服寒凉剋伐之剂而外热此为寒气隔阳於外宜用四君子加姜桂如不应急加附子若或肌肤发热面目赤色烦渴引饮此血脱发躁宜用当归补血汤若胸膈饱闷暖腐恶食或吞酸吐泻发热此为饮食停滯宜用四君子加厚朴山柎若胸膈饱闷食少发热或食而难化此为脾气虚弱宜用六君子加炮姜若用峻厉之剂腹痛热渴寒热呕吐等症此为中气复伤急用六君子加炮姜若认为热投以他剂则误矣

凡伤寒时气大病热退之後先服参芪甘温之药一二服以扶元气隨後便服滋陰生津润燥之药盖大病後汗液外耗水谷内竭必有小便赤澁大便秘结等症须识此意预防之

愚按大病後谷消水去精散卫亡多致便利枯竭宜当补中益气为要盖脾为中州浇灌四傍与胃行其津液者也况大肠主津小肠主液亦皆禀气於胃胃气一充津液自行矣燥甚者别当以辛润之以苦泄之

凡泄泻病误服参芪等甘温之药则病不能愈而变为黄疸盖泄属湿甘温之药能生湿热故反助病邪久则湿热甚而为疸矣惟用苦寒泻湿热苦温除湿寒则愈泄止後脾胃虚弱方可参芪等药以补之

愚尝治少宰李蒲汀庚寅冬湿热泄泻因未生子惑於人言淡渗之剂能泻肾而服参芪等药後变黄疸小便不利腹胀胸痞余曰有是病必用是药须以淡渗疏导其湿热遂用茵陈五苓散诸症顿退至辛卯冬生子

南方人称发热为劳发盖谓劳苦而发热即东垣内伤之旨也此病轻者一二发自愈重者用东垣法补之甚则加熟附子若因劳力辛苦而发热切不可误作外感轻易发汗也

愚按内伤发热者因饮食过时劳役过度而损耗元气陰火得以乘其土位故翕翕然而发热宜用补中益气汤以升其阳若因劳力辛苦入房不节亏损精血虚火妄动而发热者宜用六味地黄丸以补其陰不可认作有余之火而用黄栢知母之类也

东垣论饮食劳倦为内伤不足之症治用补中益气汤遯?集中又论不足之中又当分别饮食伤为有余劳倦伤为不足予谓伤饮食而留积不化以致宿食鬱热热发於外此为有余之症法当消导东垣自有枳术丸等治法具於饮食门矣其补中益气方论却谓人因伤饥失饱致损脾胃非有积滯者也故只宜用补药盖脾胃全赖饮食之养今因饥饱不时失其所养则脾胃虚矣又脾主四肢若劳力辛苦伤其四肢则根本竭矣或专因饮食不调或专因劳力过度或饮食不调之後加之劳力或劳力过度之後继以不调故皆谓之内伤元气不足之症而宜用补药也但须於此四者之间审察明白为略加减则无不效矣

愚按饮食劳倦颇同而理异也王安道先生曰劳倦伤饮食伤二者虽俱为内伤不可混而为一夫饮食受伤而留滯不化则有余矣有余者泻之伤饥失饱致损脾胃非有积滯则不足矣不足者补之如东垣枳术丸之类虽曰消导固有补益於间然亦施於不甚伤者耳元非以为通行之药也盖停滯之物非枳术丸之力所能去者若泥於消导而弗知变则不善用前人之意矣

内伤发热是阳气自伤不能升达降下陰分而为内热乃阳虚也故其脉大而无力属肺脾陰虚发热是陰血自伤不能制火阳气升腾而为内热乃阳旺也故其脉数而无力属心肾经曰脉大而无力为阳虚脉数而无力为陰虚无力为虚有力为实

愚按阳虚发热者宜用补中益气汤以升补阳气陰虚发热者宜用六味地黄丸以培补陰血总论二症虽有陰阳气血之分实则皆因脾胃阳气不足所致其发热属形病俱虚余故禁服黄栢知母恐复伤阳气耳 阁老李序庵有门生馈坎离丸喜而服之余曰前丸乃黄栢知母恐非所宜服者内经有云壮火食气少火生气今公之肝肾二脉数而无力宜滋其化源不宜泻火伤气也不信服将两月脾气渐弱发热愈甚小便澁滯两拘肿痛公以为疮毒余曰此肝肾二经亏损虚火所致耳当滋补二经为善遂朝用补中益气汤夕用六味地黄丸诸症悉愈予见脾胃素弱肝肾陰虚而发热者悉服十味固本丸与黄栢知母之类反泄真阳令人无子可不慎哉

伤寒发热是寒邪入卫与阳气交争而为外热阳气主外为寒所伤而失其职故为热其脉紧而有力是外之寒邪伤卫也治主外

愚按前症反覆变迁若治失其宜命在反掌盖寒邪自表入里治法虽有三阳之异然不可拘泥日数亦有其邪终止一经而不传他经者尝治陈湖一男子患伤寒仰卧一月且耳聋余意其病尚在少阳故脇痛不能转侧及耳聋也与小柴胡汤加山梔一剂即能转侧尾闾处内溃皆蛆耳亦有闻盖少阳属风木而风木能生虫也其在少阳明矣

伤暑发热是火邪伤心元气耗散而邪热入客於中故发为热汗大泄无气以动其脉虚迟而无力是外之热邪伤荣也治主内

愚按夏月阳气浮於外陰气伏於内法当调补阳气为主而佐以解暑此推内经舍时从症之

良法也故前症当究其所因而治之不可泛用香薷饮之类走散阳气导损真陰而益其病也又有夏间用薄荷煎汤以代茶殊不知散人之真气即久用川芎汤今人暴死之类也【详见後】

病有感有伤有中感者在皮毛为轻伤者兼肌肉稍重中者属臟腑最重寒有感寒伤寒中寒风有感风伤风中风暑有感暑伤暑中暑当分轻重表里治各不同又如中湿中气中毒皆云中中者中也谓邪直入於中也故为重病

凡治心腹疼痛但是新病须问曾何饮食因何伤感有无积滯便与和中消导之药若日数已多曾多服过辛温燥热之药呕吐不纳胸膈饱闷口舌乾燥大小便濇虽则内有鬱热或原有旧病因感而发绵延日久见证如前者俱用开鬱行气降火润燥之药如川芎香附炒山梔黄连姜汁之类甚者再加芒硝治心腹久痛须於温散药内加苦寒咸寒之药温治标寒治其本也愚按腹痛若脾胃虚弱饮食不化或间腹中作痛用六君子汤若饮食过多停滞未化或兼腹痛用人参养胃汤若饮食既化脾胃【阙】伤或兼腹中作痛用六君子加当归若胃中【阙】热心腹中脘作痛呕吐用二陈汤加黄连山梔若脾胃虚弱少食心腹作痛用六君子汤脾胃虚寒亦用前汤加炮姜大凡腹满痛按之不痛为虚痛者为实余当临症制宜○副郎李孟卿尝患腹痛每治以补中益气加山梔即愈一日因怒腹痛脉弦紧以前汤吞左金丸三十粒而愈○一妇人心腹痛诸药不应余用炒黑山梔桔梗治之而愈○儒者沈尼文内停饮食外感风寒头痛发热恶心腹痛用人参养胃汤加芎芷麴蘖香附桔梗一剂诸症悉退次日腹痛甚可畏喜手按痛即止此脾气虚弱客寒乘之而作是内虚寒而外假热也用香附六君子加木香炮姜服之痛减六七又以前药去二香一锤而愈○府庠徐道夫母胃脘当心痛剧右寸关俱无左虽有微而似絶手足厥冷病势危笃察其色眼胞上下青黯此脾虚肝木所胜用参术茯苓陈皮甘草补其中气用木香和胃气以行肝气用吴茱萸散脾胃之寒止心腹之痛急与一剂俟滚先服煎热再进诸病悉愈

昔人有云我但卧病即於胸前不时手写死字则百般思虑俱息此心便得安静胜於服药此真无上妙方也盖病而不慎则死必至達此理者必能清心克己凡百谨慎而病可获痊否则虽有良药无救也世人遇病而犹恣情任性以自?贼者是固不知畏死者矣又有一等明知畏死而怕人知觉讳而不言或病已重而犹强作轻浅态度以欺人者斯又知畏死而反以取死尤可笑哉

愚按心之官则思而脾则主於思病者有思则心火妄动而五火翕然随之脾气益伤诸藏仍病故书死字以自譬则百虑息而天君泰然虽有疾病勿药自愈矣故古人谓讳疾忌医骄恣不论於理之类为不治之疾有由然矣

发热论

世间发热症类伤寒者数种治各不同外感内伤乃大关键张仲景论伤寒伤风此外感也因风寒之邪感於外自表入里故宜发表以解散之此麻黄桂枝之义也以其感於冬春之时寒

冷之月即时发病故谓之伤寒而药用辛热以胜寒若时非寒冷则药当有变矣如春温之月则当变以辛凉之药如夏暑之月则当变以甘苦寒之药故云冬伤寒不即病至春变温至夏变热而其治法必因时而有异也又有一种冬温之病谓之非其时而有其气盖冬寒时也而反病温焉此天时不正阳气反泄用药不可温热又有一种时行寒疫却在温暖之时时行温暖而寒反为病此亦天时不正陰气反逆用药不可寒凉又有一种天行温疫热病多发於春夏之间沿门闾境相同者此天地之疠气当随时令参气运而施治宜用刘河间辛凉甘苦寒之药以清热解毒已上诸症皆外感天地之邪者若夫饮食劳倦为内伤元气此则真阳下陷内生虚热故东垣发补中益气之论用人参黄芪等甘温之药大补其气而提其下陷此用药以补气之不足者也又若劳心好色内伤真陰陰血既伤则阳气偏胜而变为火矣是谓陰虛火旺劳瘵之症故丹溪发阳有余陰不足之论用四物加黄柏知母补其陰而火自降此用血药以补血之不足者也益气补陰皆内伤症也一则因阳气之下陷而补其气以升提之一则因阳火之上升而滋其陰以降下之一升一降迥然不同矣又有夏月伤暑之病虽属外感却类内伤与伤寒大异盖寒伤形寒邪客表有余之症故宜汗之暑伤元气为热所伤而耗散不足之症故宜补之东垣所谓清暑益气者是也又有因时暑热而过食冷物以伤其内或过取凉风以伤其外此则非暑伤人乃因暑而自致之之病治宜辛热解表或辛温理中之药却与伤寒治法相类者也凡此数症外形相似而实有不同治法多端而不可或谬故必审其果为伤寒伤风及寒疫也则用仲景法果为温病及温疫也则用河间法果为气虚也则用东垣法果为陰虛也则用丹溪法如是则庶无差误以害人矣今人但见发热之证一皆认作伤寒外感率用汗药以发其表汗後不解又用表药以凉其肌设是虚证岂不死哉间有颇知发热属虚而用补药则又不知气血之分或气病而补血或血病而补气误人多矣故外感之与内伤寒病之与热病气虚之与血虚如水炭相反治之若差则轻病必重重病必死矣可不畏哉凡酒色过度损伤脾肾真陰咳 吐痰衄血吐血咳血咯血等症误服参芪等甘温之药则病日增服之过多则不可治盖甘温助气气属阳阳旺则陰愈消前项病症乃陰血虚而阳火旺宜服苦甘寒之药以生血降火世人不识往往服参芪以为补子见服此而死者多矣

愚按前论治验见於各类

补陰丸论

人之一身陰常不足阳常有余况节慾者少过慾者多精血既亏相火必旺火旺则陰愈消而劳瘵咳 咯血吐血等症作矣故宜常补其陰使陰与阳齐则水能制火而水升火降斯无病矣故丹溪先生发明补陰之说谓专补左尺肾水也古方滋补药皆兼补右尺相火不知左尺原虚右尺原旺若左右平补依旧火胜於水只补其左制其右庶得水火相平也右尺相火固不可衰若果相火衰者方宜补火但世之人火旺致病者十居八九火衰成病者百无二三且少年肾水正旺似不必补然慾心正炽妄用太过至於中年慾心虽减然少年斷丧既多焉得复实及至老年天真渐絕只有孤阳故补陰之药自少至老不可缺也丹溪先生发明先圣之旨以正千载之讹其功盛哉今立补陰丸方备加减法於後

黄蘗【去皮酒拌炒褐毛】知母【去皮毛酒拌炒忌铁】龟板【酥炙透各三两】锁阳【

酥炙乾】枸杞子【各二两】五味子【一两】地黄【酒拌蒸忌铁五两】天门冬【去心二两】白芍药【酒炒二两】乾姜【炒紫色三钱寒月加至五钱】

右为末入炼?及猪脊髓三条和药末杵匀丸桐子大每服八九十丸空心淡盐汤送下寒月可用温酒下

愚按前症设若肾经陰精不足阳无所化虚火妄动以致前症者宜用六味地黄丸补之使陰旺则阳化若肾经阳气燥热陰无以生虚火内动而致前症者宜用八味地黄丸补之使阳旺则陰生若脾虚不能生肾陰阳俱虚而致前症者宜用补中益气汤六味地黄丸培补元气以滋肾水若陰阳络伤血随气泛行而患诸血症者宜用四君子加当归纯补脾气以摄血归经太仆先生云大寒而盛热之不热是无火也大热而盛寒之不寒是无水也又云倏忽往来时发时止是无水也昼见夜伏夜见昼止不时而动是无火也当求其属而主之无火者宜益火之源以消陰翳无水者宜壮水之主以镇阳光不可泥用沈寒之剂

若梦遗精滑病者加牡蛎【童便煨】白术【各一两】山茱萸【肉】椿根白皮【炒各七钱】若有赤白浊病者加白术白茯苓【各一两半】山梔仁黄连【炒各五钱】

愚按前症属足三陰亏损所致盖肾主闭藏肝主疏泄若肝肾虚热者用四物加柴胡山梔山茱萸山药脾胃气虚者用补中益气加山茱萸山药思虑伤脾者兼用归脾汤加山茱萸山药肝肾亏损者六味丸真阳虚败八味丸心肾不交用萆薢分清饮心气虚热者清心莲子饮○朱工部素陰虚劳则遗精齿痛用补中益气汤加半夏茯苓芍药山茱萸山药治之少愈更以十全大补加五味麦门悉愈○一儒者患此兼脚跟作痛口乾作渴大便乾燥午後热甚用补中益气加芍药玄参并加減八味丸而愈

若脚软弱无力者加牛膝【酒洗二两】虎胫骨【酥炙透一两】防己【酒洗】木瓜【各五钱】

愚按前症多因足三陰虚亏损若脾肾不足而无力者用还少丹肝肾虚热而足无力者用六味丸如不应急用八味丸○大尹徐克明因饮食失宜日晡发热口乾体倦小便赤澀两腿酸疼彼知医自用四物黄柏知母之剂反头眩目赤耳鸣唇燥寒热痰涌大便热痛小便赤澀又用四物芩连枳实之类胸膈痞满饮食少思汗出如水再用二陈芩连黄柏知母麦门五味言语譫妄两手举拂余谓汗多亡阳神无所依用参芪各五钱归术各三钱远志茯神酸枣仁炙草各一钱服之熟睡良久四剂稍安又用八珍汤调补而愈 一儒者因毕婚脚腿软痛面黑食減恶寒足肿小腹胀痛上气痰喘余以为少陰亏损阳气虚寒之症用八味丸料煎服诸症顿除又服丸剂半载元气渐充形体如故 一妇人发热口乾月经不调半载後两腿无力服祛风散湿之剂腿益肿痛体更倦怠经事不通余作肝脾肾虚寒用六味八味二丸兼服两月诸症渐愈

若有疝气病者加苍术【盐水炒一两半】黄连【姜汁炒】山梔【炒各六钱】川芎【一

两】吴茱萸【炒】青皮【去穰各五钱】

愚按疝症专主肝经者多如运气或在泉寒胜木气挛缩禁於此经或司天燥胜木气抑鬱於此经或忿怒悲哀忧抑顿挫结於经或药淋外固闭尾缩精壅於此经其病差别如此且夫遗溺闭隆陰痿瘰精滑白淫皆男子之疝也不可妄归之肾冷血涸不月月罢腰膝上热足臂噤乾癯闭少腹有块或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不谓之疝而为之瘕若年少而得之不计男子妇人皆无子故隐蔽委曲之事了不干脬肾小肠之事乃足厥陰之症也窃谓前症若因肝经湿热当用炒山梔茯苓黄柏泽泻川芎当归吴茱萸黄连山查若肝肾二经湿热当用六味地黄丸料加柴胡山梔若肝脾二经陰虛热宜补中益气加炒山梔炒黑黄连吴茱萸盖疝名有七形症所因不同治法亦异当详玉机微义

若脾气虛弱畏寒易泄者加白朮【三两】陈皮【一两】乾姜【炒加至七钱】

愚按前症亦有脾胃虛弱有脾胃虛寒有命門火衰者脾胃虛弱畏寒易泄者用六君子加补骨脂肉豆蔻治之脾胃虛寒畏寒易泄者用六君子肉果木香调之命門火衰不能生脾土者用八味丸补之○沈大尹每五更即泄余以为肾泄用五味子散数服而愈後不慎起居不节饮食其泄复作日夜无度畏寒饮食且难消化肌体日瘦余曰乃变火衰之症也遂与八味丸泻止食进

若眼目昏暗加当归【酒洗】川芎菊花【各一两】柴胡黄连【酒炒】乌犀角【各五钱】蔓荆子防风【各三钱】

愚按目者五臟之华上荣於目得气血之精者若昏暗或有黑花皆肾经不足也用滋陰肾气丸若视物散大或见非常之状者皆陰血虛弱也用滋陰地黄丸若两目昏暗四肢倦怠者乃脾虛五臟之精不能上腾用东垣益气聪明汤若两目紧小羞明畏日或视物无力肢体倦怠或头面麻木者乃脾肺之气虛不能上行也用东垣神效黄芪汤若病後或日晡或灯下不能观物者乃阳虛下陷陰盛故也用决明夜光丸或镇陰升阳汤

若兼气虛之人加人参黄芪【?炙各二两】若左尺既虛右尺亦微命門火衰阳事不举加黑附子【小便浸炮去皮】肉桂【去皮各七钱】沉香【五钱】

愚按前症果尺脉虛宜用六味地黄丸以滋水之源若右尺脉虛宜用八味地黄丸以益火之主

劳瘵

男子二十前後色慾过度损伤精血必生陰虛火动之病睡中盗汗午後发热哈哈咳 倦怠无力饮食少进甚则痰涎带血咯吐出血或咳血吐血衄血身热脉沉数肌肉消瘦此名劳瘵最重难治轻者必用药数十服重者期以岁年然必须病人爱命坚心定志絕房室息妄想戒

恼怒节饮食以自培其根否则虽服良药亦无用也此病治之於早则易若到肌肉销铄沉困着床沉伏细数则难为矣又此病大忌服人参若曾服过多者亦难治今制一方于後治色慾证先见潮热盗汗咳 倦怠趁早服之

生地黄【酒洗】甘草【炙】乾姜【炮各五分】川芎
熟地【各一钱】陈皮【七分】当归 白术【各一钱三分】黄蘗【?水浸炙七分】白芍
药【炒一钱三分】知母【?水浸拌炒】天门冬【去心皮各一钱】

生姜三片水煎空心温服

愚按前方治火盛陰虛之法也大抵此症属足三陰亏损虚热无火之症故昼发夜止夜发昼止不时而作当用六味地黄丸为主以补中益气汤调补脾胃若脾胃先损者当以补中益气为主以六味地黄丸温存肝肾多有得生者若误用黄柏知母之类则复伤脾胃饮食日少诸藏愈虚元气下陷腹痞作泻则不可救矣夫衄血吐血之类因虚火妄动血随火而泛行或阳气虚不能摄血归经而妄行其脉弦洪乃无根之火浮於外也大抵此症多因四五月为火土大旺金水衰涸之际不行独宿淡味保养二藏及十一二月火气潜藏不远帟幙戕贼真元故至春末夏初患头疼脚软食少体热注夏之病或少有老态不耐寒暑不胜劳役四时迭病皆因气血方长而劳心亏损或精血未满而早斲丧故其见症难以名状若左尺脉虚弱或细数是左肾之真陰不足也用六味丸右尺脉迟软或沈细而数欲絕是命门之相火不足也用八味丸至於两尺微弱是陰阳俱虚也十补丸此皆滋其化源也仍参前发热及後咳 诸症治法用之○州同韩用之色慾过度烦热作渴饮水不絕小便淋?大便秘结唾痰如涌面目俱赤满舌生刺两唇燥裂遍身发热或身如芒刺而无定处两足心如烙左三部脉洪而无伦此肾陰虛阳无所附而发於外盖大热而甚寒之不寒是无水也当峻补其陰遂以加減八味丸料一筋肉桂用一两以水顿煎六碗水冷与饮半饔熟睡至晚又温饮一碗诸症悉退翌日畏寒足冷至膝诸症仍至是无火也当补其阳急以八味丸四剂诸症顿退○举人陈履贤色慾过度孟冬发热无时饮水不絕痰涎上涌遗精不止小便淋?或用四物二陈之类胸膈不利饮食少思大便不实余朝用四君子汤加熟地当归夕用加減八味丸更以附子唾津调搽涌泉穴渐愈【详见内科摘要】○府庠王以道元气素弱丙午丁未二年以科场岁考积劳致疾至十二月间其病盛作大热泪出随凝目赤面黯扬手露胸气息沉沉几絕脉洪大鼓指按之如无舌乾扪之如刺此内真寒而外假热也遂先服十全大补汤余曰既服此汤其脉当收敛为善少顷熟睡觉而恶寒增衣脉顿微细如丝此真寒之真象也余以人参一两加熟附三钱水煎顿服而安夜间脉复脱余以参二两熟附五钱仍愈後以大剂参术归身炙甘草等药调理而安

右药此敬臣所亲试者虽昏聩中固知必此药然後可治必立斋然後能识此病能用此药因尊信服之卒致痊愈向使悞投寒凉之剂能不殆哉今留余生皆立翁所赐也感激之余因附数语言药案之末以告世之患者

一男子吐血遇劳即作余以为劳伤肺气血不归源与补中益气加麦门五味山药熟地茯神

远志服之而愈○一男子咳 吐血热渴痰盛盗汗遗精余以为肾水亏损用地黄丸料加麦门五味以壮水而愈後因劳怒忽紫血成块上涌先用花蕊石以化之又用独参汤以补之仍用前药调理遂愈後每劳则咳 有痰吐血脾肺肾三脉皆洪数用补中益气加贝母茯苓山茱山药麦门五味与前药间服而愈○一星士谈命良久不时吐血一二口余谓此劳伤肺气与补中益气汤加麦门五味山药熟地茯神远志服之而愈○一童子年十四岁发热吐血余以补中益气宜以滋化源不信乃服寒凉降火前症愈甚或谓曰童子未室何肾虚之有参芪补气奚为用之余述丹溪先生云肾主闭藏肝主疏泄二藏俱有相火而其系上属於心心为君火为物所感则相火翕然而起虽不交会而其精亦已暗耗矣又褚氏精血篇云男子精未满而御女以通其精则五臟有不满之处异日有难状之疾正此谓也遂用补中益气汤及地黄丸而痊○一妇人素勤苦冬初咳 吐痰发热久而吐血盗汗经水两月或三月一至遍身作痛或用清热化痰等药口噤筋挛余用加减八味丸及补中益气加麦门五味山药治之年余而痊○一妇人年将七十素有肝脾之症每作则饮食不进或胸膈不利或中脘作痛或大便作泻或小便不利余用逍遥散加山梔茯神远志木香而愈後因忧思吐紫血成块每作先倦怠後烦热以前药加炒黑黄连三分吴茱萸二分顿愈复因怒吐多色赤躁渴垂死乃用人参一两白术白茯苓当归各三钱陈皮炮黑乾姜各二钱炙甘草木香各一钱一剂顿止

若咳 盛加桑白皮马兜铃瓜蒌仁各七钱五味子十粒

若痰盛加姜制半夏贝母瓜蒌仁【各一钱】

愚按前二症肾气虚弱火盛水涸津液涌而为痰者用六味丸肾经阳气虚惫者用八味丸脾肺气虚不能摄涎归源而痰盛咳 者用六君子汤加桔梗虚寒者更加炮姜

若潮热盛加桑白皮沙参地骨皮【各七分】

愚按前症若寅卯辰时潮热者肝经燥热也用六味丸补肾水以生肝血若午未时潮热者心经虚热也用六味丸壮水之主以制阳光申酉戌时潮热者肺经虚热也用补中益气汤培脾土以生肺金亥子丑时潮热者肾涸虚热也用六味丸兼手足逆冷者肾经虚败也用六味丸大凡潮热发热晡热者五臟齐损也须用六味丸气血亏损者须用十全大补汤

若梦遗精滑加礞龙骨山茱萸【各七分】

愚按前症若肾气不足用益志汤金锁正元丹肝肾虚热者用六味丸加味逍遥散脾虚热者用六味丸补中益气汤凡此悉属不足之症宜用十全大补汤或用萆薢分清饮送八味丸

若盗汗多加牡蛎酸枣仁【各七分】浮小麦【一撮】

愚按前症若阳气虚弱汗出不止肢体倦怠用芪附汤上气喘急盗汗气短头晕者用参附汤肾气虚弱盗汗发热者用六味丸若肾气虚乏盗汗恶寒者用八味丸气血俱虚而盗汗者用

十全大补汤阳盛陰虛者当归六黄汤心腎虛弱者斑龙丸

若赤白浊加白茯苓【一钱】黄连【三分炒】

愚按前症若脾肺虛热者用补中益气汤送六味丸肺腎虛热者用黄芩清肺饮送六味丸肝腎虛热者加味逍遥散送六味丸劳伤心腎者清心莲子饮鬱结伤脾者归脾汤若鬱怒伤肝脾者加味逍遥散若心腎虛弱者小温金散若思慮伤心腎者茯兔丸梦遺精滑赤白二浊治法当互参用之○一男子年踰二十早於斷喪梦遺精滑睡中盜汗唾痰见血足热痿軟服黄柏知母之类余曰此阳虛而陰弱也当滋其化源不信恪服之前症益甚其头渐大額门渐开视物皆大吐痰叫喊余以如法调补诸症渐退头額渐敛而安

若兼衄血咳血出於肺也加桑白皮【一钱】黄芩山梔【各五分炒】若兼 血痰血出於脾也加桑白皮贝母黄连瓜蒌仁【各七分】

若兼呕吐血出於胃也加山梔黄连乾姜蒲黄【炒各一钱】韭汁【半盞】姜汁【少许】

若兼咯吐血出於腎也加桔梗玄参侧柏叶【炒各一钱】愚按前方惟上古之人形病俱实者宜用之今之患者多属形病俱虛治者当求其属而主之若前症鬱热伤肺而衄血者用黄芪益气汤肺气虛热不能摄血而衄者用四君子加芎归五味子鬱结伤脾而 吐血者用归脾汤胃经有热而 吐血者用犀角地黄汤胃气弱而 吐血者用四君子加芎归升麻腎经虛热陰火内动而咯吐血用六味丸补中益气汤怒动肝火而见血者用加味逍遥散腎涸肝火动而见血者用六味丸虽曰血得热而错经妄行亦有卫气虛不能统摄荣血而为妄行者不可不察已上诸症皆属足三陰亏损虛火内动所作非外因所致者宜六味丸补中益气汤滋其化源是治本也其因甚多不能枚举治者当临症而制宜庶无悞矣

若先见血证或吐衄盛大者宜先治血治法轻少者凉血止血盛大者先消瘀血次止血凉血盖血来多必有瘀於胸膈不先消化之则止之凉之不应也葛可久十药神书方可次第检用方内惟独参汤止可用於大吐血後昏倦脉微细气虛者气虽虛而复有火可加天门冬【五钱】若如前所云陰虛火动潮热盜汗咳 脉数不可用

愚按刘宗厚先生云荣者水谷之精也和调於五臟洒陈於六腑乃能入於脉也源源而来生化於脾总统於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身是以出入升降濡润宣通者由此使然也故经云气主嘘之血主濡之又云肺朝百脉之气肝统诸经之血气血为人身之橐龠也观此多因饮食起居六淫七情失宜亏损元气以致诸经失职不能司摄法当调补脾肝之气使血各归其源诸病自愈矣若潮热咳 而脉数者元气虛弱假热之脉也尤当用甘温调补脾胃为善

若病属火大便多燥然须节调饮食勿令泄泻若胃气复坏泄泻稀溏则前项凉寒之药难用了急宜调理脾胃用白术茯苓陈皮半夏神麴麦芽甘草等药俟胃气复然後用前本病药收

功保後可合补陰丸常服之及用葛可久方

愚按内经云肾开窍於二陰大小便也若肾经津涸者用六味丸脾肺气虚者补中益气汤脾经鬱结者加味归脾汤气血虚者八珍汤若发热作渴饮冷用竹叶黄芪汤若膏粱厚味积热者加味清胃散○一儒者大便素结服搜风顺气丸後胸膈不利饮食善消面戴阳色左关尺脉洪大而虚余曰此属足三陰虚症也彼不信乃服润肠丸大便不实肢体倦怠余以补中益气六味地黄月余而验年许而安○一儒者怀抱鬱结发热作渴胸膈不利饮食少思服清热化痰行气等剂前症益甚肢体倦怠心脾二脉滯滞余用加味归脾汤饮食渐进但大便尚滯两颧赤色用八珍汤加苡蓉麦门五味至三十余剂大便自润○一男子所患同前不信余言服大黄等药泄泻便血遍身黑黯复求治余视之曰此陰阳二络俱伤也经曰阳络伤则血外溢陰络伤则血内溢内外俱伤其死奚待辞不治後果然○一儒者口乾发热小便频浊大便秘结盗汗梦遗遂致废寝用当归六黄汤二剂盗汗顿止用六味地黄丸二便调和用十全大补汤及前丸兼服月余诸症悉愈

枳术丸论

人之一身脾胃为主胃阳主气脾陰主血胃司受纳脾司运化一纳一运化生精气津液上升糟粕下降斯无病矣人惟饮食不节起居不时损伤脾胃胃损则不能纳脾损则不能化脾胃俱损纳化皆难元气斯弱百邪易侵而饱闷痞积关格吐逆腹痛泄痢等症作矣况人於饮食岂能一一节调一或有伤脾胃便损饮食减常元气渐惫矣故洁古制枳术之丸东垣发脾胃之论使人常以调理脾胃为主後人称为医中王道厥有旨哉近世论治脾胃者不分陰阳气血而率皆理胃所用之药又皆辛温燥热助火消陰之剂遂致胃火益旺脾陰愈伤清纯中和之气变为燥热胃脘乾枯大肠燥结脾臟渐絕而死期迫矣殊不知脾胃属土属湿位居长夏故湿热之病十居八九况土旺四季寒热温凉各随其时岂可偏用辛热之剂哉今举枳术丸方立加減法於後

白术【二两】枳实【一两麸炒】

右为细末荷叶包饭烧取出杵烂和药杼匀丸菉豆大每服五六十丸清米汤下此法一补一消取饮食缓化不令有伤东垣加陈皮一两名枳术橘丸治老幼元气衰弱饮食少进久服令人多食而不伤愚按经云脾为消化之器薰蒸腐熟五谷者也若饮食自倍肠胃乃伤则不能运化其精微故噎气吞酸胀满痞闷之症作矣故用此丸消之实非专主补养若脾胃虚弱者宜用四君子汤脾胃虚寒者宜用四君子加炮姜命门火衰者用八味丸○廷评张汝翰饮食难化服枳术丸体瘦发热脉浮大余以为命门火衰而脾胃虚寒用八味丸不月而饮食进三月而形体充○工部陈禅亭患前症服消导之药益甚余曰此火衰而不能生土故脾病也当益火则土自实而脾安矣不悟仍服前药後遂歿

若元气素弱饮食难化食多即腹内不和疼痛泄泻此虚寒也加人参白芍药【酒炒】神麴【炒】大麦芽【炒杵去皮一两】愚按前方乃饮食所伤之治法也东垣先生云亦有六淫

而致泻者有七情而致泻者又有饮食所伤而致泻者有因胃气下流而致泻者有因风而成
飧泄者有因痰积於上焦以致大肠不固而泄者有因脾胃气虚而泄者治法外淫所伤当调
六气七情所伤当平五臟饮食所伤当消停滞胃气下流当升举之因风而成当解散之痰积
於上焦当去其痰而不治其泄脾胃气虚者当补益之○丹溪先生谓饮食毕而肠鸣腹痛泻
尽食物者脾虚食泻用理中汤加炮姜攻刺腹痛洞下水谷名寒泄用理中汤送大戊己丸寒
甚者附子桂香丸恶食者八物汤粪色青黄肛门痛烦燥作渴小便不利者名热泻用五苓散
香连丸泻而恶食而气噫腐臭者名食泻治中汤加砂仁或送感应丸

金宪高如斋饮食难化腹痛泄泻用六君子加砂仁木香治之而痊愈後复作完谷不化腹痛头
疼体重困倦余以为脾虚受湿用芍药防风汤而愈○太仆杨举元先为饮食停滞小腹重坠
用六君子加升麻柴胡渐愈後饮食难化大便不实里急後重数至圉而不得用升阳除湿防
风汤而痊愈後心腹作痛饮食不甘用和中丸倍加益智仁而寻愈○光禄杨立之元气素弱饮
食难化泄泻不已小便短少洒淅恶寒体重节痛余以为脾肺虚用升阳益胃汤而痊愈大凡泄
泻用分利调补等剂不应者此肝木鬱於脾土必用升阳益胃之剂庶能保生其五臟胜负所
致者见第二卷泄泻各条下

若素有痰火胸膈鬱塞咽酸噎气及素有吞酸吐酸之症或有酒积泄泻结痛此皆湿热也加
黄连【姜汁炒】白芍药【酒炒】陈皮【各一两】石膏生甘草【各五钱】缩砂木香【
各一钱】川芎【四钱】

愚按前症吐酸吞酸大略不同吐酸者湿中生热吞酸者虚热内鬱皆属脾胃虚寒中传未症
故内经以为火者指其病形而言也东垣以为胃寒者指其病本而言也凡患此者先当辨其
吞吐而治以固本元为主若复寒凉复伤胃气则实实虚虚者矣复审其脾气虚而饮食不能
输化浊气不能下降者须用六君子汤补养脾胃为主少佐越鞠丸以清中故东垣先生云邪
热不杀谷若误认为实热而妄用寒凉必变败症

若伤食饱闷痞塞不消加神麴麦芽山楂【各一钱】有食积痞块在腹者再加黄连厚朴【
俱姜制各五钱】积坚者再加蓬术【醋煮】昆布【各三钱】

愚按前症若脾胃素实止因倍食暴伤而患者宜用前药否则慎用也东垣云脾胃之气壮则
多食而不伤过时而饥前症若因脾气虚弱不能腐化者宜培补之若脾胃虚寒者宜温养
之若命门火衰者宜温补之大凡食积痞块症为有形所谓邪气胜则实真气夺则虚惟当养
正则邪积自除矣虽云坚者削之客者除之若胃气未虚元气尚实乃可用也或病久虚羸或
元气素弱者亦当固本为主而佐用前法不然反致痞满不食而益其病矣然古人立法皆备
其常也而为按图索骥可乎学者推此而用其庶几乎

若伤冷食不消腹痛溏泄加半夏【姜制一两】缩砂乾姜神麴【各炒】大麦芽【各五钱
】

愚按前症若伤性热之物者用二陈加黄连山查伤湿面之物者用二陈加神麴麦芽伤米食者用六君加谷蘖伤麴食者用六君加麦蘖伤肉食者用六君加山查伤鱼腥者用六君倍加陈皮伤角黍炊饭者用六君倍加酒麴若物已消而泻未愈者此脾胃受伤也宜用六君子汤若饮食减少或食而难化者属脾胃虚寒也加炮姜木香肉果不应加五味吴茱萸骨脂脾肾虚寒者须服八味丸否则多患脾虚中满之症其神麴麦芽虽助戊土以戊熟水谷麦芽一味余以治妇人丧子乳房胀痛欲成痈者用一二两炒熟煎服即消其破血散气可矣丹溪云麦芽消肾妇人良方云神麴善下胎皆剋伐之功多而补益之功少亦不宜轻用○唐仪部胸内作痛月余腹亦痛左关弦长右关弦紧面色黄中见青此脾胃虚弱肝邪所乘以补中益气汤加半夏木香二剂而愈又用六君子汤二剂而安○李仪部常患腹痛余以补中益气汤加山梔即愈一日因怒肚腹作痛胸脇作胀呕吐不食肝脉弦紧面色青黄此肝乘脾也仍用补中益气吞左金丸一服即愈

若人性多气恼夹气伤食气滞不通加川芎香附【炒各七钱】木香黄连【姜炒各五钱】

愚按前症若因中气虚弱不能运行者宜用六君子加山梔木香如不应送保和丸○太守朱阳山因怒腹痛作泻或两脇作胀或胸乳作痛或寒热往来或小便不利或饮食不入呕吐痰涎神思不清此肝木乘脾土用小柴胡加山梔炮姜茯苓陈皮制黄连一剂即愈【制黄连即黄连吴茱萸等分用熟水拌湿罨二三日同炒焦取黄连後仿此】阳山之内素善怒胸膈不利吐痰甚多吞酸暖腐饮食少思手足?热所服非芩连枳实必槟苏厚朴左关弦洪右关弦数余以为肝火血燥木乘土位也朝用六味地黄丸以滋养肝木夕用六君子加当归芍药以调补脾土不月而愈後因恚怒前疾复作或用二陈加石膏服之吐涎如涌外热如灼脉洪大按之如无余曰脾主涎乃脾损发热而涎泛溢也用六君子加姜桂一服即睡觉而诸症顿失又数剂而康若服理气化痰等药必变腹胀喘促腿浮膝肿淋?等症急用济生加减肾气丸救之多有得生者详见各方

若胸膈不利过服辛香燥热之药以致上焦受伤胃脘乾燥呕吐噎膈反胃加黄连【姜炒】山梔仁【炒各五钱】白芍药当归【各一两】桔梗生甘草石膏【各三钱】胸膈顽痰胶结及大便燥秘再加芒硝【五钱】

愚按王安道先生曰内膈呕逆食不得入是有火也若病而吐食入反出是无火也治法若脾胃气虚而胸膈不利者用六君子汤壮脾土生元气若辛热之剂而呕吐噎膈者用四君子加芎归益脾土以抑陰火胃火内格而饮食不入者用六君子加芩连清热养胃若病呕吐食入而反出者用六君子加木香炮姜温中补脾若服耗气之剂血无所生而大便燥结者用四君子加芎归补脾生血若火逆冲上食不得入者用四君子加山梔黄连清热养血若痰饮阻滞而食不得入者用六君子加木香山梔补脾化痰若脾胃虚寒饮食不入或入而不化者用六君子加木香炮姜温补脾胃更非慎房劳节厚味调饮食者不治年高无血者亦不治○一男子食少胸满手足逆冷饮食畏寒发热吐痰时欲作呕自用清气化痰之剂胸腹愈胀呼吸不利吐痰呕食小便淋漓又用五苓散之类小便不利诸症益甚余曰此脾土虚寒无火之症故食入不消而反出非气膈所致遂用八味丸补中益气加半夏茯苓姜桂旬日乃愈○秀才杨

君爵年将五十胸痞少食吐痰体倦肌肉消瘦所服方药皆耗气破血化痰降火余曰此气鬱所伤阳气不能升越属脾经血虚之症当用归脾汤解鬱结生脾血用补中益气壮脾气生发诸经否则必为中满气膈之患不信仍服前药後果患前症而歿

若素有痰火者加半夏【姜炒】橘红白茯苓【各一两】黄芩【炒】黄连【姜炒各五钱】

愚按前症亦有因脾气不足者有因脾气鬱滯者有因脾肺之气亏损者有因肾气虚不能摄水泛而似痰者有因脾气虚不能摄涎上溢而似痰者有因热而生痰者有因痰而生热者有因风寒暑湿而得者有因惊而得者有因气而得者有因酒而得者有因食积而得者有脾虚不能运化而生者有胸中痰鬱而似鬼附者各审其原而治之

若人能食好食但食後反饱难化此胃火旺脾陰虚也加白芍药【酒炒一两五钱】人参【七钱】石膏【火炼一两】生甘草【五钱】黄连【炒】香附【炒】木香【各四钱】

愚按东垣先生云胃中元气盛则能食而不伤过时而饥脾胃俱旺则能食而肥脾胃俱虚不能食而瘦或少食而肥虽肥而四肢不举又有善食而瘦者胃中火邪於气分则能食而肉削今能食而难化者脾气虚弱不能腐化水谷故前药不应或加热渴呕吐或腹胀泄泻等症者乃是脾胃复伤急用六君子加芍药木香炮姜补之亦有属脾气鬱结者当解鬱健脾若用清凉降火以致中气虚痞而不食或食而食反出又以为膈噎用行气化痰者必不能疗也

若年高人脾虚血燥易饥易饱大便燥难用白芍药当归【各一两】人参【七钱】升麻甘草【炙各四钱】山查大麦芽桃仁【麩皮尖另研各五钱】此老人常服药也

愚按前症属形气病气俱不足脾胃虚弱津血枯涸而大便难耳法当滋补化源又有脾约症成无已云胃强脾弱约束津液不得四布但输膀胱小便数而大便难者是也宜用脾约丸陰血枯槁内火燔灼肺金受邪土受木剋脾肺失传大便秘而小便数者宜用润肠丸病气有余之治法也经云脾为至陰已土而主陰然老弱之人当补中益气以主陰血○职方陈莪斋年踰六旬先因大便不通服内疏等剂後饮食少思胸腹作胀两脇作痛形体倦怠两尺浮大左关短濇右关弦濇时五月此乃命门火衰不能生脾土而肺金又剋肝木决其金旺之际不起後果然一老妇痰喘内热大便不通两月不寐此肝肺肾亏损朝用六味丸夕用逍遥散各三十余剂计所进饮食百余碗腹始痞闷乃以猪胆汁导而通之用十全大补汤调理而安若间断前药饮食不进诸症复作

化痰丸论

痰者病名也人之一身气血清顺则津液流通何痰之有惟夫气血浊逆则津液不清薰蒸成聚而变为痰焉痰之本水也原於肾痰之动湿也主於脾古人用二陈汤为治痰通用者所以实脾燥湿治其标也然以之而治湿痰寒痰痰饮痰涎则固是矣若夫痰因火上肺气不清咳

时作及老痰鬱痰结成粘块凝滞喉间吐咯愚按前症若形病表里俱实而痰邪痞闷者宜用本方若脾肺气虚痰涎不得运化而痞闷者宜用六君子少加桔梗枳壳若脾胃虚弱不能摄涎归源而痞闷者宜用六君炮姜

若时气发热变为黄病所谓瘟黄也治宜内泻湿热茵陈 黄连【姜水炒】山梔仁 白茯苓 厚朴【姜水炒】木通 白术 人参【各一钱】木香【七分】白芍药【酒炒】乾葛【各一钱半】

右姜水煎食前服查继服

愚按前症若因湿热壅滞所致者宜用此方若因病久元气益虚而脾之正色见於外者宜用补中益气加茵陈茯苓若中气虚寒四肢厥冷或浮肿黑黄者用人参理中汤加茯苓茵陈观东坡任黄州用圣散子正谓此意土人不知反用槟榔导损真气疎泄腠理外邪易感病由是作若节饮食慎起居适寒暑固元气以却外邪虽患是症亦为轻浅嘉靖甲申春南都大疫煎圣散子普济老幼并服子素不善调摄吐痰口乾饮食不美服化痰行气之剂胸满腹膨痰涎愈盛服导痰理脾之剂肚腹膨胀二便不利服分气利水之剂腹大脇痛睡卧不得服破血消导之剂两足皆肿两关脉浮大不及於寸口余以脾土虚而生痰朝用金匱加減肾气丸夕用补中益气汤煎送前丸月余诸症渐退饮食渐进再用八味丸补中益气汤月余乃能转侧又两月而能步履却服十全大补汤还少丹又半载而康後稍失调理其腹仍胀随服前药即愈○一武职形体魁梧素不围炉不喜热食行则喘促自谓气实老痰服碑记丸攻伐之诊其脉洪数重按全无余谓命门火衰脾肺虚寒与八味丸一服痰喘稍止数服全止遂能亲火喜热饮食盖碑记丸出自西域洺方外人所制者经云西域水土刚强其民不衣而褐荐其民华色而脂肥故邪不能伤其形体其病生於内其治宜毒药由此观之恐不可概用也○太仓陆中舍以肾虚不能摄水肚腹胀大用此丸未数服而歿于京今之专门治蛊者即此方也又名黑丸子用之无不速亡○机房蔡一素不慎起居患症同前更加手足逆冷恶寒饮食余用补中益气汤加附子一钱先回其阳至数剂诸症渐愈余因他往或用峻厉之剂下鲜血甚多亦致不起

若此等老痰饮酒之人多有之酒气上升为火肺与胃脘皆受火邪故鬱结而成此方用天麦冬黄芩泄肺火也海粉芒硝咸以软坚也瓜蒌仁润肺清痰香附米开鬱降气连翘开结降火青黛降鬱火故皆不用香燥之剂

愚按前症若饮食少思或胸膈不利者此中气虚弱也宜用补中益气汤为主中气既健其痰自运化若肾气亏损津液难降败浊为痰者乃真臟之症宜用六味地黄丸为主肾气既壮津液清化而何痰之有哉亦有因脾胃亏损中焦气虚不能运化而痰者亦有因峻厉过度脾气愈虚不能运化津液凝滞而为痰者凡此皆当健脾胃为主

备用要方

若夏月伤暑发热汗大泄无气力脉虚细而迟此暑伤元气也服後方

人参 黄芪【炙】 麦门冬【去心】 白芍药【各一钱】 陈皮【一钱】 白茯苓【一钱】
黄连【炒】 甘草【炙各五分】 黄栢【三分】 白术【一钱五分】 香薷知母【各七分】

右姜水煎食前温服

愚按东垣先生曰暑热之时无病之人或避暑热纳凉於深堂大厦得之者名曰中暑其病必头痛恶寒身形拘急肢节疼痛烦热无汗为房室陰寒之气所遏名曰中喝以大顺散热药主之若行人或农夫於日中得之者名曰劳役中热其病必苦头痛躁热恶热肌热大渴汗泄懒动为天热外伤肺气以苍术白虎汤凉剂主之若人元气不足用前药不应宜补中益气汤主之大抵夏月阳气浮於外陰气伏於内若人饮食劳倦内伤中气或酷暑劳役外伤阳气者多患之法当调补元气为主而佐以解暑若中喝者乃陰寒之症法当补阳气为主少佐以解暑故先哲多用姜桂附子之类此推内经舍时从症之良法也今患暑症歿而手足指甲或肢体青黯此皆不究其因不温补其内而泛用香薷饮之类所误也夫香薷饮乃散阳气导真陰之剂也须审有是症而服亦何患哉若人元气素虚或犯劳过度而饮之者适所以招暑患痞也【其暑热伤元气而类风症者见第四卷首治验】

若夏秋暑热因过用冷物茶水伤其内又过取凉风伤其外以致恶寒发热胸膈饱闷或饮食不进或兼呕吐泄泻此内外俱伤寒冷也

人参 乾姜【炒紫色】 厚朴【姜水炒】 白术【各一钱五分】 陈皮羌活 枳实
白茯苓【各一钱】 甘草【炙五分】

右姜水煎食前温服

愚按前症如未应宜用藿香正气散若内外已解寒热未退或饮食未进宜用六君子汤保命集云霍乱属阳明症宜用和中平胃建中或四君子汤若脉浮自汗四君子加桂枝主之脉浮无汗四君子加麻黄吐利转筋脇下痛脉弦者木剋土也用平胃散加木瓜或建中加柴胡木瓜吐利转筋腹中痛体重脉沉而细者四君子加白芍药良姜吐利而四肢拘急脉沉而迟属少陰四君子加姜附厚朴吐利而四肢厥冷脉微缓属厥陰建中加归附吐利头痛而身热多欲饮水者五苓散寒多不欲饮水者理中丸主之元戎云太陰症霍乱者理中加橘红吐下腹痛手足逆冷理中加熟附吐利後转筋者理中加火煅石膏一两○进士刘华甫夏月食生冷果品患前症余用附子理中汤一服顿安○上舍徐民则夏月入房及食水果面食而患腹痛余曰此陰寒之症也须用附子理中汤以回阳不信别用二陈枳实黄连香薷饮之类而死

若夏暑在途中常服以壮元气清热驱暑服之免中暑霍乱泄泻利疾等症

人参【一钱二分】 白术【一钱五分】 黄芩【炒三分】 五味子【十粒杵碎】 甘草【炙

五分】麦门冬【去心】白芍药【炒】白茯苓【各一钱】知母 陈皮 香薷【各七分】

右姜水煎食前温服

愚按前症若人元气虚弱宜用补中益气去柴胡升麻加麦门五味或少加炒黑黄栢人参养气汤亦可用○一儒者季夏患泄泻腹中作痛饮食无味肢体倦怠余用补中益气汤八味地黄丸月余而痊後彼云每秋间必患利今则无恙何也余曰此闭藏之月不远帟幙妄泄真阳而然前药善能补真火火能生土脾气生旺而免患也

若遇劳倦辛苦用力过多即服後方三二服免生内伤发热之病此方主於补气

人参

麦门冬【去心】 陈皮【各一钱】 黄芪【二钱半?炙】 白术甘草【炙】 五味【各五分】

右姜枣水煎食前温服劳倦甚加熟附子四五分愚按前论开世俗之蒙瞶济无穷之夭枉内附子若素畏寒饮食者尤宜用若素喜寒饮食者以肉桂或炮姜代之亦可但世所鲜用耳○一妇人因劳役发热倦怠唾痰欲呕或以为火症用清热化痰等药反大便不实无气以动余以寒凉复伤中气形病俱虚用前方加附子治之而痊後复劳经水数日不止衆以为附子之热所致用四物芩连槐花之类凉而止之前症愈甚更加胸膈痞满饮食日少余仍用前方去门冬更加茯苓半夏炮姜数剂渐愈又用当归芍药汤而经止但四肢逆冷饮食难化不时大热此命门真火衰脾土虚寒之假热也用八味丸半载而痊又服六味丸三载而生子

薛氏医案卷二十

卷二十一

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二十一

明 薛己 订

明医杂着

泄泻

泄本属湿然多因饮食不节致伤脾胃而作须看时令分寒热新久而施治治法补脾消食利小便亦有升提下陷之气用风药以胜湿亦有久泄肠胃虚滑不禁者宜收澀之

主方

陈皮【一钱】甘草【炙五分】白术【二钱】白茯苓
白芍药【炒各一钱五分已上三味乃泄泻必用者】

若伤食泻黄或食积加神麴麦芽山查【各一钱】黄连【炒七分】若腹中穿狭再加厚朴枳实以消停滞

愚按前症若饮食已消而泄泻未止此脾胃之气伤也宜用五味异功散若泄泻而腹中重坠此脾胃之气下陷也宜用补中益气汤若服剋滯之剂而腹中穿狭此脾气虚痞也宜用六君子汤若脇胀少食善怒泻青此脾虚肝所乘也宜六君子加柴胡升麻木香若少食体倦善噫泄黄此脾虚色陷也宜用六君子加升麻柴胡大凡诸症若脾脉弦长者肝木乘脾土也当补脾平肝若脾脉沈弦者寒水侮脾土也当温中补肾夫黄连枳实虽消停滞开痞闷若人脾胃充实暴患实痞宜暂用之若人屡患屡服或脾胃虚痞者而用之则脾胃反伤而诸症蜂起矣故东垣先生云脾胃实者用黄连枳实泻之虚者用白术陈皮补之须分病之虚实人之南北而治之後仿此

若小便赤澀短少加猪苓泽泻【各一钱】以分利之夏月加茵陈【七分】山梔仁【炒四分】

愚按前症若津液偏渗於大肠大便泻而小便少者宜用此药分利若陰阳已分而小便短少

者此脾肺气虚而不能生水也宜用补中益气汤加麦门五味陰火上炎而小便赤少者此肺气受伤而不能生水也用六味地黄丸加麦门五味肾经陰虛阳无所生而小便短少者用滋肾丸肾气丸肾经阳虛陰无所化而小便短少者用益气汤六味丸若误用渗泄分利复伤阳气陰无所生而小便不利或目睛凸出腹胀如鼓或腿膝肿硬或皮肤断裂者先用滋肾丸益气汤每见元气虚而复用泽泻猪苓之类因损真陰以致前症益甚者急投金匱加減肾气丸多有复生者若反复牵牛大黄峻剂而通之是速其危也

若口渴引饮加乾姜【一钱五分】人参麦门冬【各一钱】升麻【四分】乌梅肉【五个】

愚按前症若胃气伤而内亡津液者用七味白术散胃气弱而津液少者用补中益气汤气血俱虚而津液少者用十全大补汤腎虛津液短少者用六味地黄丸腎水不足而虛火上炎者用加減八味丸若腎水不足之人患泄瀉或服分利之剂过多而患口渴者若不用前药以固其本源则肺腎复伤多变小便不利肚腹水肿等危症矣○宪副屠九峯先瀉而口渴尺脉数而无力略用解酒毒利小便之剂不应余曰此腎陰亏损虛火熾盛宜急壯水之主不然必发疽而不能收斂也不信别服降火化痰之剂果患疽而歿

若夏秋之间湿热大行暴注水瀉加黄连苍术泽泻【各一钱】黃疸小便赤加茵陳【一钱】山梔木通【各五分】

愚按东垣云若值秋燥行令湿热少退体重节痛口舌乾燥飲食无味二便不调不欲飲食或食不化兼洒淅惡寒凄慘面惡此肺之脾胃虛而阳气不伸也用升阳益胃汤治之前症若湿热内作脾胃不能通调而致者宜用此药分利之湿热已去脾胃虛弱而致者宜用六君子当归调补之湿热已去脾气下陷而致者宜用补中益气汤升举之其黃疸若小便不利四肢沈重渴不欲飲此湿胜於热用大茵陳汤大便自利茵陳梔子黄连汤若往来寒热身黃者宜用小柴胡加梔子若因劳伤形体飲食失节而身黃者用小半夏汤盖黃疸为内伤不足之症宜调补脾胃元气为主若妄用驱逐复伤元气多致不起

若久瀉脾胃虛弱飲食難化加黃芪【炙】人参【各二钱】神麴麦芽【各一钱二分】木香【煨】乾姜【炙各五分】

愚按前症或作嘔或飲食少思属脾胃虛弱用四君子加半夏木香或兼作嘔或腹作痛属脾胃虛寒用六君子加炮姜木香若麦芽善損腎神麴善化胎消腎不宜轻用大抵此症多由泛用消食利水之剂損其真陰元气不能自主持遂成久泄若非补中益气汤四神丸滋其本源後必胸痞腹胀小便淋?多致不起

若久泄腸胃虛滑不禁加肉豆蔻诃子皮赤石脂【各一钱】木香【煨】乾姜【炙各五分】

愚按东垣先生云中焦气弱脾胃受寒冷大便滑泻腹中雷鸣或因误下未传寒中复遇时寒四肢厥逆心胃绞痛冷汗不止此肾之脾胃虚也用沈香温胃丸治之窃谓前症若脾胃虚寒下陷者用补中益气汤加木香肉豆蔻补骨脂若脾气虚寒不禁者用六君子汤加炮姜肉桂若命门火衰而脾土虚寒者用八味丸若脾肾气血俱虚者用十全大补汤送四神丸若大便滑利小便闭澀或肢体渐肿喘 唾痰为脾肾气血俱虚宜用十全大补汤送四神丸若大便滑利小便闭澀或肢体渐肿喘 唾痰为脾肾亏损宜用金匱加减肾气丸

若饮酒便泄此酒积热泻也加黄连【炒】茵陈乾姜【各一钱】木香【五分】

愚按前症若酒湿未散脾气未虚宜用此药分利湿热若湿热已去中气被伤宜用六君子调补中气若误服克伐分利之剂胸膈渐满小便短少或腿足与腹渐肿者急用加减金匱肾气丸调补脾胃多有生者夫酒性大热乃无形之物无形元气受伤当用葛花解醒汤分消其湿往往反服大热酒症丸重泻有形陰血使阳毒大旺元气消亡折人长命金匱要略云酒疸下之久而为黑疸每见善饮服酒症丸者多患疸症不悟其因反服分利化痰以致变症而歿者多矣【详见奇效方】○秀水卜封君善饮腹痛便泄服分利化痰等剂不应其脉滑数皮肤错甲余谓此酒毒致肠痈而溃败也辞不治不信仍服前剂果便脓而歿○光禄柴黼庵善饮泄泻腹胀吐痰作呕口乾余谓脾胃气虚先用六君子加神麴痰呕已止再用补中益气加茯苓半夏泻胀亦愈○旧僚钱可久素善饮面赤痰盛大便不实余以为肠胃湿痰壅滞用二陈苓连山梔枳实甘葛泽泻升麻一剂吐痰甚多大便始实此後日以黄连三钱炮汤饮之而安

若寒月溏泄清冷腹痛伤生冷饮食加神麴麦芽【炒】乾姜【炙各一钱】缩砂益智木香【各七分】

愚按前症若脾肾虚寒宜用四神丸若脾肾虚脱用六君姜桂如不应急补命门火以生脾土○一儒者小腹急痛溏泄清冷大便欲去不去余谓此命门火衰而脾土虚寒也用八味丸月余而愈向後饮食失宜前症仍作小腹重坠此脾气下陷也用补中益气汤而痊

痢疾

痢是湿热及食积治者别赤白青黄黑五色以属五脏白者湿热伤气分赤者湿热伤血分赤白相杂气血俱伤黄者食积治法泻肠胃之湿热开郁结之气消化积滞通因通用其初只是下下後未愈随症调之痢稍久者不可下胃虚故也痢多属热然亦有虚与寒者虚者宜补寒者宜温年老及虚弱人不宜下

主方

甘草【炙三分】?榔【一钱】木香 枳殼【炒五分】黄芩【炒】黄连【炒各五分】白芍药【炒二钱已上三药痢疾必用者】

右姜水煎服

若腹痛加当归【一钱五分】缩砂【一钱】再加木香芍药【各五分】愚按前症若因湿热郁结後重不利宜用此方若饮食停滞用二陈汤加山楂送香连丸仲景先生云脉沈而有力者属里实也宜下之沈而无力者属里虚也宜补之元气虚滑者宜温之澁之脉滑而数者有宿食也当下之脉浮大此为虚而强下之故也脉浮革者因而肠鸣当温之下痢腹坚者当下之下痢谵语有燥屎当下之下痢三部脉皆平按之心下坚急下之下痢脉大浮弦当自愈下痢腹满痛为实当下之治者审焉

若後重加滑石【炒五分】再加枳殼?榔芍药条芩各五分愚按痢而便脓血者乃气行而血止也行血则便脓自愈调气则後重自除若大肠积滞壅实而後重法当疏导若大肠气虚下陷而後重法当升补○司马王荆山患痢後重服枳殼?榔之类後重益甚食少腹痛余以为脾胃伤而虚寒也用六君木香炮姜而愈○太常边华泉呕吐不食服痛後重服大黄之药腹痛益甚自汗发热昏愤脉大余以为胃气复伤阳气虚寒脱陷也以参术各一两炙草炮姜各三钱升麻一钱一剂而苏又用补中益气加炮姜二剂而愈

若白痢加白术白茯苓滑石【炒】陈皮【各一钱】初欲下之再加大黄【五钱】兼食积加山楂枳实【各一钱】

愚按前症若腹痛後重怕手按腹或脉洪实为积滞闭结宜用此方疏通之若腹痛後重喜手按腹或脉微细为阳气虚寒宜用六君乾姜温补之○少宗伯顾东江停食患痢腹痛下坠或用疏导之剂两足肿胀食少体倦烦热作渴脉洪数按之微细余以六君子加姜桂各二钱吴茱萸五味各一钱煎熟冷服即睡觉而诸症顿退再剂而安此内真寒而外假热治以热剂而冷饮东垣先生治假寒热之症投以假寒热之剂○廷评曲汝为食後接内患腹痛去後似痢非痢次日便脓血烦热作渴神思昏倦用四神丸二服顿减又用八味丸料加吴茱萸五味骨脂肉蔻二剂全愈

若红痢加川芎当归桃仁【各一钱五分】初欲下之再加大黄【五钱】愚按前症若病日久或误服疏通之药而不能愈者当调补脾胃大凡血症久而不愈多因阳气虚而不能生血或因阳气虚而不能摄血故丹溪先生治此症久而不愈用四君汤以收其功○判官汪天锡患痢腹痛後重渴欲饮冷饮食不进用芍药汤内大黄一两四剂稍应仍用前药但大黄减半数剂而愈○通府薛允頤下血服犀角地黄汤其血愈多发热少食里急後重余以为清气下陷用补中益气汤加炮姜一剂而瘳

若红白相杂加川芎当归桃仁【各一钱五分】以理血滑石陈皮苍术【各一钱五分】以理气有食积者加山楂枳实以消导愚按前症若气滞食积湿热所致宜用此方治之若脾虚饮食停滞宜用六君子汤送香连丸调补之经云脾主血肺主气前症乃气血俱受病也若因脾肺血伤所致宜用四物汤加白术茯苓煎送香连丸若因脾肺气伤所致宜用四君汤加当归川芎煎送香连丸

若白痢久胃弱气虚或下後未愈去?榔枳殼減芩连芍药【各七分】加白术【一钱五分】黄芩陈皮茯苓【各一钱】缩砂乾姜【炙各五分】

愚按前症若数至圉而不能便或少有白脓者乃土不能生金肺与大肠气伤而下坠也当用升阳益胃汤举其阳气则陰自降而二便自愈矣饮食不入发热作渴其势危甚用十全大补汤如不应送二神丸

若红痢久胃弱血虚或下後未愈減黄芩黄连【各五分】加当归川芎熟地阿胶陈皮【各一钱】白术【一钱五分】

愚按前症若脾经血热下注而不愈者用四物汤加白术茯苓若脾经气虚不能统血而不愈者用四君子加川芎当归若中气下陷不能摄血而不愈者用补中益气汤

若赤黑相杂此湿胜也及小便赤澁短少加木通泽泻茯苓【各一钱】山梔仁【炒五分】以分利之

愚按初患湿盛而小便赤澁者宜用前药若病久而阳气下陷或老弱者宜用升阳除湿防风汤若脾土亏损寒水来侮先用六君子汤加姜桂以温而补之後用补中益气汤加茯苓半夏以升而补之

若血痢加当归川芎生地黄桃仁槐花【炒各一钱】久不愈減芩连【各七分】去?榔枳殼再加阿胶珠侧柏叶白术【各一钱五分】乾姜【炒黑】陈皮【各一钱】

愚按前症亦有因脾气虚弱者有因脾气下陷者有因肝气虚弱者有因肝血虚热者○祠部李宜散患血痢胸腹膨胀大便欲去不去肢体殊倦余以为脾气虚弱不能摄血当源用补中益气汤加茯苓半夏治之渐愈後因怒前症复作左关脉弦浮按之微弱此肝气虚不能藏血用六味丸治之而愈

若痢已久而後重不去此大肠坠下去?榔枳殼用条芩加升麻【一钱】以升提之

愚按前症亦有因大肠气滯者有因大肠气陷者有因大肠血虚者有因脾肾虚寒者若大肠气滯坠下宜用四君子送香连丸若大肠气虚陷下宜用四君子加柴胡升麻送香连丸若大肠血虚後重宜用四物汤加参术送香连丸东垣先生云里急者腹中不寬快也亦有虚坐而大便不行者皆血虚也血虚则里急後重

若呕吐食不得下加软石膏【一钱五分】陈皮【一钱】山梔仁【炒五分】生姜【六分】缓呷之以泻胃口之热

愚按前症若脾胃素有实热或过食厚味辛辣而暴患之宜用此方若胃气虚膈气逆而作呕

吐者用六君子加生姜若胃气虚寒亦用前药加炮姜木香

有一樣风血虚而痢者用四物汤加人参白术陈皮黄芩黄连

愚按前症若脾气虚而血弱宜用四君子汤若胃气虚而血弱宜用补中益气汤若久病气血俱虚宜用八珍汤大凡此症久而不愈或变症百出但守前法久之自愈

有一样寒痢用黄连木香芍药【酒炒】当归乾姜【炒】缩砂厚朴肉桂

愚按东垣先生云前症若脉沈细而身不动作睛不了了饮食不下鼻準气息者用姜附汤身重四肢不举者用术附汤暴下无声身冷自汗小便自利大便不禁气难布息脉微呕吐者用浆水散○先太安人年八十仲夏患痢腹痛作呕不食渴饮汤水按腹痛稍止脉鼓指而有力余谓真气虚而邪气实也用人参五钱白术茯苓各三钱陈皮升麻附子炙甘草各一钱服之睡觉索食脉症顿退再剂而安○横金陈子复面带赤色吐痰口乾或时作泻或用二陈黄连枳实之类不应余脉之左关弦急右关弦大此乃肾水挟肝木之势而尅胜脾土也不信後交夏果患痢而亡

若得痢而误服温热止澁之药则虽稍久亦宜用前法以下之下後方调之○若得痢使用前症法下之而未应又用前调理法治之久而不愈此属虚寒而滑脱可於前补虚寒温二条用择更加龙骨石脂芎藭栗殼乌梅肉收澁之药

愚按前症若脾气虚寒下陷宜用补中益气汤加栗殼姜桂如不应急用附子若气血虚弱宜用十全大补汤加附子栗殼若命门火衰用八味丸以补土母若腹痛作渴饮汤手按腹痛稍止者俱温补脾胃

疟疾

疟是风暑之邪有一日一发有二日一发有三日一发有间一日连二日发有日与夜各发有汗有无汗有上半日发有下半日发有发於夜者治法邪从外入宜发散之然以扶持胃气为本又须分别阳分陰分而用药邪疟及新发者可散可截虚疟及久者宜补气血若过服截药致伤脾胃则必延绵不愈矣

主方

乾葛【一钱二分】陈皮【七分】甘草【炙五分】柴胡白术
苍术【泔浸一钱已上三味疟疾必用之者】

愚按前症皆因先伤於暑次感於风客於荣卫之间腠理不密复遇风寒闭而不出舍於肠胃之外与荣卫并行昼行於阳夜行於陰并则病作离则病止并於阳则热并於陰则寒浅则日

作深则间日在气则早在血则晏按本经曰疟脉自弦弦数者多热弦迟者多寒弦短者伤食弦滑者多痰弦而紧者宜下浮大者宜吐弦迟者宜温此治疟之大法其病热多寒少心烦少睡者属心名曰温疟用柴芩汤但寒少热腰疼足冷者属肾名曰寒疟用桂附二陈汤先寒而後大热咳者属肺名曰瘧疟用参苏饮热长寒短筋脉揪缩者属肝名曰风疟用小柴胡加乌药香附寒热相停呕吐痰沫者属脾名曰食疟用清脾饮疟愈之後陰阳两虚梦遗咳不善保养遂成劳瘵若能清心养体节食避风如此调治无不愈矣

若一日一发及午时发者邪在阳分加枯芩茯苓半夏【各一钱】熟甚头痛再加川芎软石膏【各一钱】口乾加石膏知母麦门冬【各一钱】

愚按刘宗厚先生云从卯至午发者邪在大肠小肠也宜大柴胡汤下之从午至酉发者邪亦在心与肾也宜大承汤下之此皆邪入於内也从酉至子发者邪在心与胆也或至寅发者此邪在气在血也宜用桃仁承气汤微下之更以小柴胡汤彻其余邪若身热目痛热多寒少其脉实长者先以大柴胡汤下之余热不尽再用白芷汤若甚寒微热或但寒不热者名曰牝疟用柴胡桂枝汤以解表

若间日或三日发或午後夜发者邪入陰分加川芎当归芍药【酒炒】熟地黄知母【酒炒各一钱】红花【酒洗】黄蘗【酒炒】升麻【各四分】提起阳分可截之

愚按仲景先生云疟无他症但隔日发而先寒後热寒多热少用桂枝石膏汤发於夜麻黄黄芩汤窃谓前症若中气虚而间日发者用补中益气汤若气血俱虚而三日一发者用十全大补汤大抵邪气在阳分者浅而易治邪气在陰分者深而难治

若间一日连发二日或日夜各发者气血俱病加人参黄芪白茯苓【各一钱】以补气川芎当归芍药熟地黄【各一钱】以补血

愚按此条治法当以前後论参看用药调治

若阳疟多汗用黄芪人参白术以敛之无汗柴胡苍术白术黄芩乾葛以发之

愚按仲景云处暑以前疟发而头项痛脉浮恶风有汗者桂枝羌活汤若恶风无汗者麻黄羌活汤若久而汗多腠理开泄阳不能固必补敛之无汗则腠理致密邪不能解必发散之若属饮食所伤用六君子汤为主劳伤元气用补中益气汤为主

若陰疟多汗用当归白芍药熟地黄连黄蘗黄芪以敛之无汗柴胡苍术川芎红花升麻以发之故曰有汗者要无汗扶正为主无汗者要有汗散邪为主

愚按前症若寒热大作不论先後此太阳阳明合病寒热作则必战经曰热胜而动也发热则必汗泄又曰汗出不愈知内热也阳盛陰虚之症当内实外虚不治恐久而传陰经也宜用桂

枝芍药汤若病久须大补脾胃为主盖养正邪自除矣

若病人胃气弱饮食少或服截药伤脾胃而少食者加人参【一钱五分】芍药【酒炒】大麦芽【各一钱】

愚按前症若用寒凉止截脾胃伤损必致连绵不已若非培养元气决不能愈然芍药麦芽善损脾肾恐不宜多用○洞庭马志卿母疟後形体骨立发热恶寒自汗盗汗胸膈痞满日饮米饮盍许服参术药益胀卧床半年矣余以为阳气虚寒用大剂补中益气加附子一钱二剂诸症渐退饮食渐进又二剂全愈

若伤食痞闷或有食积者加神麴麦芽枳实【炒各一钱】黄连炒【五分】

愚按前症若脾胃无亏饮食过多而患暴怒胸膈痞闷者宜用此方以消导宿滞若饮食既消而胸膈痞闷者宜用六君子汤以调补脾胃若劳伤元气兼停饮食用补中益气加半夏茯苓以升补脾胃若感怒兼食用二陈参术木香香附山梔以补脾平肝○冬官朱省庵停食感寒而患疟自用清脾截疟二药食後腹胀时或作痛服二陈黄连枳实之类小腹重坠腿足浮肿加白术山相吐食未化余曰食後胀痛脾虚不能克化也小腹重坠阳气不能升举也腿足浮肿胃气不能运行也吐食不消脾胃虚寒也治以补中益气汤加吴茱萸姜桂木香不数服而痊○一妇人饮食後患疟呕吐属内停饮食外感风寒用藿香正气散而愈後因怒吐痰甚多狂言热炽胸膈胀痛手按少止脉洪大无伦按之微细余谓肝脾二经血少火旺用加味逍遥散加熟地川芎二剂顿退再用十全大补而安

若痰盛加半夏【姜制】南星枳实【各一钱】黄芩【炒】黄连【各六分】愚按前方非膏粱积热实火为痰者不宜用若中气虚而痰甚用补中益气汤加茯苓半夏如未应用一味姜汁尤好

若欲截之加?榔黄芩青皮常山【各一钱】乌梅肉【三个】愚按前症若血气俱虚用人参生姜各一两煎服顿止不问新久并效若咽酸口酸且节饮食其病潮作时虽大渴只与姜汤乘热饮之此亦截疟之良法每见饮啖生冷物者病或少愈多致脾虚胃损反为难治若病势正炽一二发间未宜遽截恐邪气不去正气反伤耳此法有益无害○一上舍每至夏秋非停食作泻必疟痢霍乱遇劳吐痰头眩体倦发热恶寒杂用四物二陈芩连之类患疟服止截之药前症益甚时或遍身如芒刺然余谓中气虚热用补中益气汤加茯苓半夏内参芪各用三钱归术各二钱四十余剂全愈

若日久虚疟寒热不多或无寒而微热者邪气已无只用四君子合四物汤加柴胡黄芩陈皮以滋补气血愚按前症若因胃气虚用四君加升麻当归若脾血虚用四君加川芎当归若因中气下陷用补中益气汤加茯苓半夏大凡久疟多属元气虚寒盖气虚则寒血虚则热胃虚则恶寒脾虚则发热陰火下流则寒热交作或吐涎不食战栗泄泻手足逆冷皆脾胃虚弱但补中益气其诸症悉愈○一妇人疟久不愈发热口乾倦甚此脾胃虚热用七味白术散加麦

门五味作大剂煎与恣饮再发稍可乃用补中益气汤加茯苓半夏十余剂而愈○一妇人久症寒热服清脾饮之类胸膈饱胀饮食减少【用补中益气汤加茯苓半夏炮姜各一钱而痊】

咳

咳谓有声肺气伤而不清 谓有痰脾湿动而生痰 咳者因伤肺气而动脾湿也病本虽分六气五臟之殊而其要皆主於肺盖肺主气而声出也治法须分新久虚实新病风寒则散之火热则清之湿热则泻之久病便属虚属郁气虚则补气血虚则补血兼郁则开郁滋之润之敛之则治虚之法也

主方

橘红【七分】五味子 桔梗 甘草【炙各五分】杏仁【去皮尖】白茯苓【各一钱】

春多上升之气宜润肺抑肝加川芎芍药半夏【各一钱】麦门冬黄芩【炒】知母【各五分】

春若伤风欬 鼻流清涕宜辛凉解散加防风薄荷黄芩【炒】麦门冬【各一钱】

愚按前症若因风寒所伤咳 声重头痛用金沸草散咳 声重身热头痛用局方消风散盖肺主皮毛肺气虚则腠理不密风邪易入治法当解表兼实肺气肺有火则腠理不闭风邪外乘治宜解表兼清肺火邪退即止若数行解散则重亡津液邪蕴而为肺疽肺痿矣故凡肺受邪不能输化而小便短少皮肤渐肿咳 日增者宜用六君子汤以补脾肺六味丸以滋肾水○一儒者素勤苦恶风寒鼻流清涕寒栗 喷服祛风之药肢体麻木倦怠痰涎自出殊类中风余以为风剂耗散元气陰火乘其土位也遂以补中益气汤加麦门五味治之而安 一儒者每至春咳 用参苏饮之类乃愈後复发仍用前药反?瘖左尺洪数而无力余以为肾经陰火刑克肺金以六味丸料加麦门五味炒山梔及补中益气汤而愈

夏多火热炎上最重宜清金降火加桑白皮知母黄芩【炒】麦门冬石膏【各一钱】

愚按王太仆云壮水之主以制阳光前症若喘急而 面赤潮热其脉洪大者用黄连解毒汤热躁而咳用梔子仁汤咳唾有血用麦门冬汤俱兼以六味丸夏月尤当用此壮肾水以保肺金周上舍每至夏患咳 服降火化痰之剂咳 益甚脾肺肾脉皆浮而洪按之微细余曰此脾土虚不能生肺金肺金不能生肾水而虚火上炎也朝用补中益气汤夕用六味地黄丸而痊後至夏遂不再发○一男子夏月唾痰或 用清胃火药不应余以为火乘肺金用麦门冬汤而愈後因劳复 用补中益气汤加桔梗山梔片芩麦门五味而愈但口乾体倦小便赤澹日用生脉散而痊愈

秋多湿热伤肺宜清热泻湿加苍术桑白皮【各一钱】防风黄芩山栀【炒各五分】

愚按前症若咳而身热自汗口乾便赤脉虚而洪者用白虎汤身热而烦气高而短心下痞满四肢困倦精神短少者香薷饮若病邪既去宜用补中益气加乾山药五味子以养元气柴胡升麻各二分以升生气

冬多风寒外感宜解表行痰加麻黄桂枝半夏乾姜防风【各一钱】肺金素有热者再加酒炒黄芩知母【各五分】若发热头痛鼻塞身重再加藁本川芎前胡柴胡【各一钱】愚按果系前症若风寒外感形气病气俱实者宜用麻黄之类所谓从表而入自表而出若形气病气俱虚者宜补其血气而佐以解表之药若专於解表则肺气益虚腠理益疎外邪乘虚易入而其病愈难治矣若病日久或误服表散之剂以致元气虚而邪气实者急宜补脾土为主则肺金有所养而诸病自愈若人老弱或劳伤元气而患前症误用麻黄枳殼紫苏之类而汗出亡阳者多患肺痈肺痿治失其宜多致不起○一男子神劳冬月患咳 服解散之剂自以为便余曰此因肺气虚弱腠理不密而外邪所感也当急补其母是治本也始服六君子汤内去参术反加紫苏枳殼之类以致元气益虚生肺痈而歿○太守钱东圩先患肩疽属足三陰虚火不归源用壮水之主以制阳光而愈余曰疮疾虽愈当屏去侍女恐相火一动其精暗流金水复竭必致变症後果喘 痰出如涌面目赤色小便淋瀝又误认为外感风寒用麻黄汤表散汗出不止迎余视之其脉已脱惟太冲未絶余曰此脾虚不能摄涎肾虚不能生水肺虚不能摄气水泛为痰虚寒之症也辞为难治勉以益火之源以消陰翳而愈继又劳伤神思外邪乘之仍汗出亡阳以致不起

若有痰加半夏枳殼风痰再加南星【姜汁炒】湿痰脾困少食加白术苍术有痰而口燥咽乾勿用半夏南星宜加知母【?水拌炒】贝母瓜蒌仁黄芩【炒】

愚按前症若因脾气虚而为湿痰者宜用补中益气汤若因肾经虚热而口燥咽乾者宜用六味丸

若夏月热痰或素热有痰加黄芩黄连知母石膏愚按前症若心火乘肺轻则用麦门冬汤重则用人参平肺散若上焦实热用凉膈散虚热用六君子汤中焦实热用竹叶石膏汤虚热用竹叶黄芪汤下焦虚热用六味丸○一武职因饮食起居失宜咳 吐痰用化痰止 之药时仲夏左尺洪数而无力胸满面赤唾痰腥臭自汗余曰肾虚水泛为痰而反重亡津液得非肺痈乎不信仍服前药翌日吐脓脉数右寸为甚用桔梗汤一剂数脉与脓顷減又二剂将愈佐以六味丸而痊

上半日咳者胃中有火加贝母石膏黄连五更咳者同上

愚按前症若胃中热甚为患者宜用本方泄之若胃中微热为患者当用竹叶石膏汤清之若胃中虚热所致者须用补中益气汤补之俱少佐以治痰之剂其五更咳 者当作脾虚宿食为痰治之一儒者咳 用二陈芩连枳殼胸满气喘侵晨吐痰加苏子杏仁口出痰涎口乾作

渴余曰清晨吐痰脾虚不能消化饮食也胸满气喘脾虚不能生肺金也涎沫自出脾虚不能收摄也口乾作渴脾虚不能生津液也用六君子加炮姜肉果温补脾胃更用八味丸以补土母而安

若咳 久肺虚益气补血加人参黄芪阿胶当归生姜天门冬款冬花马兜铃芍药【酒炒】之类肺热喘咳去人参用沙参此兼补血气也

愚按肺属金生於脾土凡肺金受邪由脾土虚弱不能生肺乃所生受病治者审之

若昏咳者火浮於肺不可正用寒凉药宜加五味子五倍子诃子皮敛而降之

愚按前症属脾肺气虚以致肾经阳虚陰弱而虚火上炎或房劳太过亏损真陰为患法当补脾肺生肾水不可专主於肺也

若午後 者属陰虚即劳 也宜补陰降火加川芎当归芍药熟地黄柏知母竹?姜汁天门冬瓜蒌仁贝母此专补陰血也

愚按前症属肾气亏损火炎水涸或津液涌而为痰者乃真臟为患也须用六味地黄丸壮肾水滋化源为主以补中益气汤养脾土生肺肾为佐设用清气化痰则误矣○司厅陈国华素陰虚患咳 自谓知医用发表化痰之剂不应用清热化痰等药愈甚余以为脾肺虚不信用牛黄清心丸反加胸腹作胀饮食少思遂朝用六君桔梗升麻麦門五味补脾土以生肺金夕用八味丸补命門火以生脾土诸症渐愈○中翰鲍羲伏患陰虚咳 服清气化痰丸及二陈芩连之类痰益甚用四物黄柏知母之类腹胀咽哑右关脉浮弦左尺脉洪大余朝用补中益气汤加山茱麦門五味夕用六味地黄丸加五味子三月余喜其慎疾得愈

若火郁 为痰郁火邪在中宜开郁消痰用诃子皮香附【童便浸】瓜蒌仁半夏麴海石青黛黄芩为末?调为丸嚙化仍服前补陰降火药失治则成劳

愚按前症若因肺胃蘊热痰气不利宜用前药若因脾肺不清气郁痰滯用二陈加山梔枳殼桔梗若因郁结伤脾气血虚损用济生归脾加山梔桔梗若因怒动肝火脾土受克用四君子加山梔柴胡若劳役失宜伤损元气用补中益气加山梔桔梗○一妇人不得於姑患咳胸膈不利饮食无味此脾肺俱伤痰郁於中先用归脾汤加山梔抚芎贝母桔梗诸症渐愈○一妇人咳 脇痛发热日晡益甚用加味逍遥散加熟地治之而愈後因劳役多怒前症仍作又少阳寒热往来或咳 遗尿皆属肝虚火旺陰挺痿痺用前散及地黄丸而痊

若痰积食积作咳 者用香附瓜蒌仁贝母海石青黛半夏麴软石膏山查枳实黄连【姜炒】为末?调嚙化愚按前症若因饮食停滯胃口湿热所化者宜用本方若因脾胃气虚而痰积滯用六君子加枳殼木香若因脾胃气虚而食积滯用六君子加神麴麦芽夫早间吐痰咳 属食积喘促咳 属肺气虚火旺大抵当助胃壮气为主不可专攻其痰

若劳 见血加阿胶当归芍药天门冬知母贝母桑白皮亦於前肺虚陰虚二条择用大抵咳见血多是肺受热邪气得热而变为火火盛而陰血不宁从火上升故治宜泻火滋陰忌用人参等甘温之药然亦有气虚而咳血者则宜用人参黄芪款冬花等药但此等症不多耳

愚按前症亦有劳伤元气内火妄动而伤肺者亦有劳伤肾水陰火上炎而伤肺者有因过服天门生地寒药损伤脾胃不能生肺气而不愈者有因误用黄柏知母之类损伤阳气不能生陰精而不愈者凡此皆脾肺亏损而肾水不足以致虚火上炎真臟为患也须用补中益气汤补脾土而生肺金用六味地黄丸滋肾水而生陰精否则不救○一武职素不慎起居吐痰自汗咳 发热服二陈芩连山梔之类前症不减饮食少思用四物二陈芩连之类前症愈甚反添胸膈不利食少晡热加桑皮杏仁紫苏之类胸膈膨胀小便短少用四芩枳殼之类小便不通饮食不进余视之六脉洪数肺肾二部尤甚余曰脾土既不能生肺金而心火乘之必变肺痈之症也不信仍服前药後吐痰吐脓复求治余曰胸膈痞满脾土败也已而果歿

因咳而有痰者咳为重主治在肺因痰而致咳者痰为重主治在脾但是食积成痰痰气上升以致咳 只治其痰消其积而咳自止不必用肺药以治咳也

愚按前论治法最是仍分六淫七情及五臟相胜脾肺虚实以治之否则恐成肺痈之症○一男子脾胃不和服香燥行气之剂饮食少思两脇胀闷服行气破血之药致饮食不入右脇胀痛喜手按之余曰乃肝木克脾土而脾土不能生肺金也用滋化源之药四剂诸症顿退余又曰火令在迯当再补脾土以养肺金不信後复作吐脓而歿

痰饮

痰属湿热乃津液所化因风寒湿热之感或七情饮食所伤以致气逆液浊变为痰饮或吐咯上出或凝滯胸膈或留聚肠胃或客於经络四肢随气升降遍身上下无处不到其为病也为喘为咳为恶心呕吐为痞隔壅塞关格异痞为泄为眩晕为糟杂怔忡惊悸为颠狂为寒热为痛肿或胸间辘辘有声或背心一点常如冰冷或四肢麻痹不仁皆痰所致百病中多有兼痰者世所不知也痰有新久轻重之殊新而轻者形色清白气味亦淡久而重者黄浊稠结咳之难出渐成恶味酸辣腥臊咸苦甚至带血而出治法痰生於脾胃宜实脾燥湿又随气而升宜顺气为先分导次之又气升属火顺气在於降火热痰则清之湿痰则燥之风痰则散之郁痰则开之顽痰则软之食积则消之在上者则吐之在中者下之又中气虚者宜固中气以运痰若攻之太重则胃气虚而痰愈甚矣

主方

橘红 半夏【汤炮】 白茯苓 甘草【炙】 生姜

右方总治一身之痰如要下行加引下药上行加引上药

若湿痰多软如身体倦怠之类加苍白术寒痰痞塞胸中倍加半夏甚者加麻黄细辛乌头之类

愚按痰者脾胃之津液或为饮食所伤或因七情六淫所扰故气壅痰聚谚云肥人多痰而在瘦人亦有之何也盖脾统血行气之经气血俱盛何痰之有皆由过思与饮食所伤损其经络脾血既虚胃气独盛脾为已土胃为戊土戊癸化火是以湿因气化故多痰也游行周身无所不至痰气既盛客必胜主或夺於脾之大络之气则倏然仆地者此痰厥也升於肺者则喘急咳迷於心则怔忡恍惚走於肝则眩晕不仁脇肋胀痛關於肾不哈而多痰唾留於胃脘则呕泻而作寒热注於胸则咽膈不利眉棱骨痛入於肠则漉漉有声散则有声聚则不利窃谓若脾气虚弱不能消湿宜用补中益气汤加茯苓半夏若因脾气虚弱湿热所致宜用东垣清燥汤若因胃气虚弱寒痰凝滞宜用人参理中汤若因脾胃虚寒而痰凝滞者宜用理中化痰丸若因脾虚而痰滞气逆宜用六君子加木香若因脾胃虚弱而肝木乘侮宜用六君子加柴胡头痛宜用半夏白术天麻汤若因脾肾虚弱寒邪所乘以致头痛宜用附子细辛汤

若风痰加南星枳殼白附子天麻僵蚕猪牙皂角之类气虚者更加竹?气实加荆?俱用姜汁

愚按脉诀云热则生风故云风自火出若风邪气滞痰蕴於胸中者宜用之若因肺经风热而生痰者宜用金沸草散若因风火相抟肝经风热炽盛而生痰者宜用牛黄抱龙丸或牛黄清心丸若因肝经血燥而生痰者宜用六味地黄丸若因热盛制金不能平木而生痰者宜用柴胡栀子散若因中气虚弱不能运化而生痰者宜用六君柴胡鈎藤

若热痰加黄芩黄连痰因火盛逆上降火为先加白术黄芩软石膏黄连之类眩晕 杂者火动其痰也亦加山梔黄芩黄连

愚按前方若肺胃实者宜用之若风寒郁热宜用参苏饮加山梔片芩若中气虚热宜用补中益气加半夏桔梗若肾虚陰火炎上宜用六味丸若肾气虚寒痰上涌用八味丸

若血虚有痰者加天门冬知母瓜蒌仁香附米竹?姜汁带血者再加黄芩白芍药桑白皮血滞不行中焦有饮者取竹?和生姜韭菜自然汁服三五盞必胸中烦燥不宁後自愈

愚按前方苦寒甘寒辛辣降火化痰行气破血之剂须审有是病而乃服是药可也病去六七即当止之过剂则反伤中气而病益甚大凡内因之症原属脾胃虚弱当审所致之由而调养之若稍重其剂复伤胃气虚症蜂起

若气虚有痰者加人参白术脾虚者宜补中气以运痰降下加白术白芍药神麴麦芽兼用升麻提起内伤挟痰加人参黄芪白术之类姜汁传送或加竹?尤效愚按前症若脾肺气虚不能运化而有痰者宜用六君子加术香若肺气虚弱不能清化而有痰者宜用六君子加桔梗若因脾经气滞而痰中有血者宜用加味归脾汤若因肝经血热而痰中有血者宜用加味逍遥散若因肝肾陰虚而痰中有血者宜用六味地黄丸若因过服寒凉之剂而吐痰有血者必用

四君子汤之类以主之

若食积痰加神麴麦芽山楂黄连炒枳实以消之甚者必用攻之宜丸药若兼血虚者用补药送下中焦有痰者食积也胃气亦赖所养若攻之尽则虚矣

愚按前症若元气素实偶因饮食过多而致者宜用主方消导宿滞盖食痰多因脾虚食难消化而作痰也血虚者多因脾气衰弱不能生血也皆当调补脾胃之气则无食积之患而血自生矣故东垣云脾胃之气实用黄连枳实泻之虚用白术陈皮补之其方内用神麴麦芽说见上卷○府庠沈文姬母食湿面吞酸呕吐絶食服芩连等剂加寒热口乾流涎又食冬瓜一星而呕吐愈甚余谓此脾气虚寒也急用盐艾附子炒热熨脐腹又以其子口气接其母气神气少苏以参术附子陈皮为末丸如粟米大津咽五七粒次日加至十余粒渐服煎剂一二匙乃思粥饮又以参术等药五十余剂而愈【详见内科摘要】

若喉中有物咯不出咽不下此痰结也用药化之加鹹药软坚之类宜瓜蒌仁杏仁海石桔梗连翘香附少佐朴硝姜汁炼?和丸嚙服之脉濡者卒难开必费调理气实痰热结者吐难得出或成块吐咯不出气滞者难治

愚按此方治形症充实之法也前症有因脾经郁结而伤陰血者有因肾水亏损而陰火上炎者有因脾肺火郁而生痰者治法若因七情郁结痰涎滞於喉间者先用局方四七汤调和滞气後用归脾汤调补脾血脾火伤血用加味归脾汤肾水亏损用六味地黄丸肺经郁火用知母茯苓汤若妇人患此而兼带下皆由郁结伤损肝脾当优以四七汤送青州白丸子此等症候属脾胃气虚为本而气滞痰结为末也古方用十枣汤控涎丹神佑丸滚痰丸异香枳实利膈涤痰透罗破饮降气化痰等汤苏合香丸之类皆形病充实之药也西北人用之多有效验其属虚弱者皆致肚腹胀满而歿○大参李北泉时吐痰涎内热作渴肢体倦怠劳而足热余曰此肾水泛而为痰法当补肾不信另服化痰汤滚痰丸吐泻不食头晕眼闭余用六君子汤数剂胃气渐复用六味丸诸症渐愈○一儒者咳 痰盛胸腹不利饮食少思肢体倦怠脉浮大按之微弱服二陈枳殼等药愈甚余曰脾肺肾虚也用补中益气汤六味地黄丸而愈

若痰在肠胃间可下而愈枳实甘遂巴豆大黄芒硝之类痰在脾里膜外非姜汁竹?不能及在四肢非竹?不开在经络中亦用竹?必佐以姜韭汁膈间有痰或癲狂或健忘或风痰俱用竹沥与荆?同功气虚少食用竹?气实能食用荆?痰在脇下非白芥子不能达

愚按前症多因饮食起居七情失宜耗损元气内火动而为患者当求其属而治其本可也前法乃慄悍之剂非灼见形气俱充实者决不可用必先察其病形脉症则知所挟之邪随其表里上下虚实以治之若夫挟虚挟寒之症不可不论也○一儒者脾气虚弱呕吐痰涎因怒胸腹膨胀饮食少思尤关脉弦长按之无力右关脉弦长按之微弱此木克土也用六君子加柴胡山梔木香治之而愈○一妇人脾胃虚弱饮食素少忽痰壅气喘头摇目劓手扬足掷难以候脉视其面色黄中兼青此肝木乘脾胃也用六君子加柴胡升麻治之而苏更以补中益气加半夏调理而痊

若老痰用海石半夏瓜蒌仁香附米连翘之类五倍子优他药大治顽痰宜作丸服

愚按前症若脾气壅滞痰客中焦者宜先用此方以治其痰後用六君子以调补脾气其痰自消若始末悉治其痰则脾气益虚津液不行而痰益盛矣○一男子吐痰胸膈不利饮食少思服海石瓜蒌之类不应余曰此脾气虚弱不能消导而为痰当健脾为主彼不信又服驱逐之剂其痰如涌四肢浮肿小腹胀胀小便澁滞余曰此复损脾肾所致也先用金匱加减肾气丸补中益气汤治之诸症渐减又用八味丸兼前汤而愈○一男子素吐痰遇怒其痰益甚胸膈痞满此肝木制脾土也用六君加木香治之而痊○一妇人素郁结胸膈不宽吐痰如胶用加味归脾汤乃瘥○一妇人吐痰头晕带下青黄用四七汤送白丸子小柴胡加白术茯苓治之而安

人身上中下有块是痰也问其平日好食何物吐下後方用药

若头面颈颊身上有结核不痛不红不作脓者皆痰注也宜随处用药消之

愚按前症若脾肺气逆而痰滞於肉里或散或作肉色不变亦不作痛按之不硬此为痰核宜推其因而治其本则痰自消若因郁怒亏损肝脾或因暴怒触动肝胆经火以致血病结核或筋挛於项侧耳前後或胸脇肿痛或发寒热此为瘰癧宜用柴胡清肝散加钩藤鈎山梔以养血清肝火若肉色不变晡热内热属肝经血虚火旺宜用逍遥散加龙胆草以养肝血清肝火或结於肢节或累累如贯珠其色不变亦为肝火血燥而筋挛宜用柴芍参苓散加鈎藤以养血气优以六味丸以生肾水○儒者杨泽之性躁好色缺盆结一核此肝火血燥筋挛法当滋肾水生肝血不信乃内服降火化痰外敷南星商陆转大如碗余用补中益气及六味地黄间以芦荟丸年余元气渐复而肿消○一妇人经事不调肝胆经分结核如榛如豆不计其数肉色不变大按方痛或投化痰消毒之药不按自痛发热作渴日晡益甚余谓属肝火之症用养血解郁清肝之药百余剂诸症已退惟项核未消更以当归龙荟丸数服及四物柴胡山梔而愈○一妇人耳前後结核耳内微肿寒热口苦用小柴胡山梔桔梗川芎四剂而愈後因恚怒耳前後头两角俱痛发热憎寒以小柴胡山梔川芎桔梗羌活二剂而愈【详见外科枢要】

滚痰丸攻泻肠胃痰积及小儿食积痰急惊风痰甚者最为要药常宜合备但须量人虚实而用之

愚按滚痰丸夺旗斩关回生起死之剂必痰滞胸膈秘结不利形气病气俱实者乃可用之或脾气不能摄涎而上泛或肾气不能摄水而上溢苟误认为实痰而用之祸在反掌江南人尤慎之一妇人元气素弱痰气时作或咽间不利或胸痞等症余以为郁结伤脾用加味归脾汤治之而愈後遇恚怒前症仍作惑於衆言以为痰饮妄用祛痰之剂吐泻数次变诸异症口禁不醒余以为脾胃复伤日用六君子一剂米饮浓煎常服匙许至四日渐进粥食乃服前药间以归脾汤喜其善调养两月余诸症悉愈

拟治岭南诸病

春秋时月人感山岚瘴雾之气发寒热胸膈饱闷不思饮食此毒气从鼻口入内也治当清上焦解内毒行气降痰不宜发汗

主方

黄连【姜炒】黄芩 木香 厚朴【姜制】枳实【麸炒】半夏【汤洗】桔梗 柴胡 川芎 木通【各一钱】生甘草【七分】升麻 苍术【泔浸盐水炒各一钱五分】

右姜水煎食前热服

愚按岭南炎方濒海地卑土薄故阳气常泄阴气常盛四时放花冬无霜雪一岁之间暑热过半穷腊久晴或至摇扇人居其间气多上壅肤多汗出腠理不密盖阳不反本而然也阳燠既泄则使人本气不坚阳不下降常浮而上气浮而不坚则玄府开疎汗液易泄故内寒外热上热下寒之症由生也治当固阳气实腠理为主若多用表散之药则阳气愈虚风邪益盛鲜有不悞者矣苟系外邪为患则当解散之外邪既解而病仍作肺气伤也用补中益气汤若头目不清胃气不能上升也加蔓荆子若饮食少思胃气虚也用四君子汤若食而难化脾气虚也用六君子加芍药当归若胃寒冷饮食或作吞酸脾气虚寒也前药更加炮姜不应再加吴茱萸四分黄连二分余各当推而治之岭南瘴疔为患诸症详见卫生篇凡宦游此地者当备此书而尝览之

若寒温失节汗身脱衣巾感冒风寒之天气闭发热头疼此则伤寒类也但岭南气温易出汗故多类症重则寒热不退轻则为疟南方气升故岭南人得此病者卒皆胸满痰涎壅塞饮食不进与北方伤寒只伤表而里自和者不同治当解表清热降气行痰此方用於寒凉时月及虽在温暖时而感冒风寒者

羌活 苍术【泔浸】柴胡 黄芩 橘红 半夏【汤洗】枳实 甘草【炙】川芎【各一钱】

右姜水煎食前服查随服取汗出止服

愚按前症若内停饮食外感风寒用藿香正气散若脾气虚弱而寒热作呕用金不换散盖岭南之地湿热薰蒸腠理不闭津液妄泄阳气内虚法当调补肺气为主盖肺主气而司腠理肺气虚则腠理不密故津液妄泄多患前症若外邪既去当补脾土以生肺金

瘴疟时症寒热往来

苍术【泔浸】黄芩【酒炒】乾葛 陈皮
半夏【汤洗】川芎【各一钱】甘草【七分炙】柴胡 知母【各一钱五分炒】

右姜三片乌梅三个水煎侵晨午前服

愚按前症若因外邪未解而寒热往来者宜用原方解散之若因脾气素弱或服前药外邪既去而寒热不止或欲呕少食者脾气亏损也宜用补中益气汤加半夏乾葛茯苓调补之若午前寒热属气虚用四君子加当归升麻若午後寒热属血虚用八珍汤加柴胡升麻大凡病久气虚而血弱者必发热须用四君之类调补脾胃脾胃一健气血自生若悞认为血虚而用四物沈陰之剂径生其血则脾土复伤诸臟皆病虚症蜂起反为难治甚致不救

症久者加人参【一钱五分】当归【一钱】汗多者去苍术换白术加白芍药【酒炒一钱五分】

愚按症久不愈属中气虚不能滋养诸臟但调补脾胃诸病自退其汗自出者乃阳气虚而不能卫固於腠理也用四君加归芪陈皮未应加姜桂手足逆冷急加附子盗汗者陰虚而腠理不密也宜用八珍加肉桂五味子烦热作渴暂用当归六黄汤其中三黄俱妙黑倍加参芪汗既止仍用八珍散之类若肾气素虚发热作渴宜六味丸手足逆冷或痰气上攻宜用八味丸若邪气既散而寒热仍作此真气虚也即用补中益气汤若气虚而寒热者用八珍汤若治失其宜则元气亏损变症百出不但久症而已矣

症後变成痢疾宜从虚治故用补脾胃药

黄连【炒】木香 宿砂 黄芩【炒】橘皮
白术【各一钱】甘草【炙五分】白芍药【炒二钱】当归【酒洗一钱】

右姜水煎食前服

愚按前症乃病气有余血气不足而变症也宜用原方以清解脾胃邪热若病气形气俱不足而不能愈宜补中益气汤滋养诸臟自愈

若温暑之月民病天行瘟疫热病治宜清热解毒之剂兼治内外愈後随当调理脾胃以壮元气

枯黄芩 升麻 乾葛 知母【酒炒各一钱】人参 白芍药 石膏【各一钱半】黄连【酒炒四分】甘草【七分】羌活【二钱】生地黄【酒洗五分】

右姜水煎食前热服查继服

愚按前症若邪在足阳明表里不解者宜用本方和解之若疎通过度胃气亏损而发热烦渴者用竹叶黄芩汤以生津液若悞汗亡阳而发热烦口者用升阳益胃汤若悞下亡陰而发热烦燥者用理中汤

若胸膈痞闷痰涎壅塞者加枳实半夏【各一钱】生姜汁四五匙脾胃不实加白术【一钱半】

难出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺气被郁故其津液之随气而升者为火薰蒸凝浊郁结而成岁月积久根深蒂固故名老名郁而其原则火邪也病在上焦心肺之分咽喉之间非中焦脾胃湿痰冷痰痰饮痰涎之比故汤药难治亦非半夏茯苓苍术枳壳南星等药所能治也惟在开其郁降其火清润肺金而消凝结之痰缓以治之庶可效耳今制一方于後

天门冬【去心】黄芩【酒炒】海粉 橘红【各一两】青黛【另研三钱】桔梗 连翘【各五钱】芒硝【另研三钱】瓜蒌仁【取肉另研一两】香附【杵碎淡盐水浸炒五钱】

右为细末炼蜜入姜汁少许和药杼极匀丸小龙眼大噙化一丸或嚼烂清汤细咽之或丸如黍米大淡盐汤送下五六十丸

愚按前方味属甘苦咸寒之剂虽能软坚开郁化痰降火而不无损胃之祸乎若脾土大过气滞郁热而生痰者用之得宜若脾土不及气痞虚热而生痰者用之必致中满吞酸肚腹肿胀小便不利而殁治者审之○一南来者接踵死者塞途良可哀悯殊不知此方因岭南风土而作且浙之与广相去万里殊域异方天时人事大不相侔岂有槩一治疗而无悞者哉

薛氏医案卷二十一

卷二十二

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二十二

明 薛己 订

明医杂着

续医论

喘与胀二症相因必皆小便不利喘则必生胀胀则必生喘但要识得标本先後先喘而後胀者主於肺先胀而後喘者主於脾何则肺金司降外主皮毛经曰肺朝百脉通调水道下输膀胱又曰膀胱者州都之官津液藏焉气化则能出矣是小便之行由於肺气之降下而输化也若肺受邪而上喘则失降下之令故小便渐短以致水溢皮肤而生胀满焉此则喘为本而胀爲标治当清金降火爲主而行水次之脾土恶湿外主肌肉土能尅水若脾土受伤不能制水则水湿妄行浸溃肌肉水既上溢则邪反侵肺气不得降而生喘矣此则胀爲本而喘爲标治当实脾行水爲主而清金次之苟肺症而用燥脾之药则金得燥而喘愈加脾病而用清金之药则脾得寒而胀愈甚矣近世治二症但知实脾行水而不知分别脾肺二症予故为发明之

愚按前症若肺中伏热不能生水而喘且渴者用黄芩清肺饮以治肺用五淋散以清小便若脾肺虚弱不能通调水道者宜用补中益气汤以培元气用六味地黄丸以补肾水若膏粱厚味脾肺积热而喘者宜清胃散以治胃用滋肾丸以利小便若心火尅肺金而不能生肾水者用人参平肺散以治肺用滋陰丸以滋小便若肾经阴亏虚火烁肺金而小便不生者用六味地黄丸以补肾水用补中益气汤以培脾土若脾气虚弱不能相制而喘者用补中益气汤以培元气用六味地黄丸以生肾水若肝木尅脾土不能相制而喘者用六君柴胡升麻以培元气六味地黄丸以补肾水若脾胃虚寒不能相制而胀者用八味丸以补脾肺生肾水若脾肾虚寒不能通调水道而胀者宜用金匱加减肾气丸补脾肺生肾水若酒色过度亏损足三阴而致喘胀痰涌二便不调或大小便道相牵作痛者亦宜用此丸多有生者○一富商饮食起居失宜大便乾结常服润肠等丸後胸腹不利饮食不甘口乾体倦发热吐痰服二陈黄连之类前症益甚小便滴沥大便泄泻腹胀少食服五苓?麦之类小便不通体肿喘嗽用金匱肾气丸补中益气汤而愈○一儒者失於调养饮食难化胸膈不利或用行气消导药咳嗽喘促用行气化痰肚腹渐胀用行气分利睡卧不能两足浮肿小便不利大便不实肺肾脉浮大按之微细两寸皆短朝用补中益气汤加姜附夕用金匱肾气丸加骨脂肉果各数剂诸症渐愈再佐以八味丸两月乃能步履却服补中八味半载而康

气虚补气用四君子汤血虚补血用四物汤虚甚者俱加熟附子盖四君四物皆和平寛缓之剂须得附子健悍之剂行之方能成功附子热药本不可轻用但当病虽在暑热时月亦可用也予尝治一仆人五月间病热口渴唇乾谵语诊其脉细而迟用四君子汤加黄芪当归芍药熟附子进一服热愈甚狂言狂走或曰附子差矣诊其脉如旧仍增附子进一大服遂汗出而热退脉还四至矣又尝治一妇人亦夏间病热初用平调气血兼清热和解之剂服二三服不应热愈甚舌上焦黑膈间有火嗽水不咽诊其脉两手皆虚微而右手微甚六七日内谵语撮空循衣摸床恶症俱见後用四物汤加黄芪人参白术陈皮麦门知母熟附子服之一二时汗出而热退次日复热再服仍退又次日复发知其虚极也遂连进十服皆加附子而安

愚按前论正所谓舍时从症舍症从脉真有定见者也○一男子发热烦渴头痛误行发汗喘急腹痛自汗谵语用十全大补加附子治之热睡唤而不醒及觉诸症顿退再剂而痊○黄武选饮食劳倦发热恶寒误用解表神思昏愤胸发赤斑脉洪数而无力余曰此内伤元气非外邪也急用温补之剂彼不从後果歿

饮食过伤变为异常急暴之症人多不识尝有一壮年人忽得暴病如中风状口不能言语目不识人四肢不举急服苏合香丸不效余偶过闻之因询其由曰适於陪客饮食後忽得此症遂教以煎生姜淡盐汤多饮探吐之吐出数碗而醒後服白术陈皮半夏麦芽调理而愈大抵此等症多因饮食醉饱之後或感风寒或着气恼而致饮食填塞胃气不行内伤特重若误作中风中气症而用驱风解表行气散气之药则胃气重伤死在旦夕内经虽有暴病暴死之症但恐多有因於食者前辈不曾明言故人不识耳今後遇有此等急症须要审问明白若方饮食醉饱或累伤饮食重复受伤但觉胸膈有食滯只作伤食治之

愚尝治赵吏部患吐物出皆酸味其脉气口大於人迎者二三倍僚友速余投剂余曰此实邪在上候其吐尽酸味不药自愈翌早吐止而安○一妇人饮食後因怒忽患血崩四肢逆冷抽搐口禁如发痉然吐痰如涌灌以二陈柴胡山梔枳殼吐出酸味神思稍醒药止次日进薄粥少许但乳脇胀痛寒热欲呕四肢倦怠余以为悉属肝火炽盛致脾气不能运化先用六君柴胡山梔钩藤鈎诸症顿退惟四肢不遂血崩如初或又以为肝火未息欲投清肝凉血之剂余以为肝脾气血俱弱先用补中益气汤培其脾土而血气归经又用四物参术柴胡养肝筋而四肢便利【余见异症名要】

久头痛病略感风寒便发寒月须重绵厚帕包裹者此属鬱热本热而标寒世人不识率用辛温解散之药暂时得效误认为寒殊不知因其本有鬱热毛窍常踈故风寒易入外寒束其内热闭逆而为痛辛热之药虽能开通闭逆散其标之寒邪然以热济热病本益深恶寒愈甚矣惟当泻火凉血为主而佐以辛温散表之剂以从法治之则病可愈而根可除也

愚按前症多主於痰痛甚者乃风毒上攻有血虚者有诸经气滯者有气虚者有四气外伤有劳役所伤有可吐者有可下者当分虚实寒热兼变而治之若夫偏正头风久而不愈必内挟痰涎风火鬱遏经络气血壅滯甚则目昏紧小二便秘澁宜砭出其血以开鬱解表余尝治尚宝刘穀斋但怒则两太阳作痛先用小柴胡加茯苓山梔後用六味丸以生肾水而不再发○

譚侍御每頭痛必吐清水不拘冬夏吃姜便止余作中氣虛寒用六君當歸黃芪木香炮姜而瘥○商儀部勞則頭痛余作陽虛不能上升以補中益氣加蔓荊子而瘥

眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用若寒辛涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼之藥以散其邪故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其性辛甚故借以拔出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼或用乾姜末生姜汁點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪也然火邪既客於目從內出外若外用寒涼以阻逆之則鬱火內攻不能散矣故點眼用辛熱而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也世人不知冰片為劫藥而誤認為寒常用點眼遂致積熱入目而昏暗瘴翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒涼而妄將冷水冷物冷藥挹洗致昏瞎者有之

愚按前症若體倦少食視物昏花或飲食勞倦益甚者脾胃虛也用補中益氣湯多緊澁赤脈貫睛或臟腑秘結者用芍藥清肝丸若赤翳布白畏日羞明或痛如刺者上焦風熱也用黃連飲子若久視生花畏日遠視如霧者神氣傷也用神效黃芪湯大凡午前甚而作痛者東垣助陽活血湯午後甚而作痛者黃連天花粉丸午後甚而不痛者東垣益陰腎氣丸能近視不能遠視地芝丸能遠視不能近視定志丸故東垣先生云五臟六腑之精氣皆稟受於脾土貫於目脾者諸陰之首也目者血脈之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也主百脈皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因邪氣所并而損血脈故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本是不明正理也若槩用辛涼苦寒之劑損傷真氣促成內障之疾矣○給事張禹功目赤不明服祛風散熱益甚畏明重听脈大而虛此因勞心過度飲食失節以補中益氣湯加茯神酸棗山藥山茱萸五味頓愈又勞役復甚用十全大補湯兼以前藥漸愈却用補中益氣湯加前藥而瘥

耳鳴証或鳴甚如蟬或左或右或時閉塞世人多作腎虛治不效殊不知此是痰火上升鬱於耳中而為鳴郁甚則壅閉矣若遇此症但審其平昔飲酒厚味上焦青赤痰火只作清痰降火治之大抵此症多先有痰火在上又感惱怒而得怒則氣上少陽之火客於耳也若腎虛而鳴者其鳴不甚其人多慾當在勞怯等症

愚按前症若血虛有火用四物加山梔柴胡若中氣虛弱用補中益氣湯若血氣俱虛用八珍湯加柴胡若怒便聾而或鳴者屬肝胆經氣實用小柴胡加芎歸山梔虛用八珍湯加山梔若午前甚者陽氣實熱也小柴胡加黃連山梔陽氣虛用補中益氣湯加柴胡山梔午後甚者陰血虛也四物加白朮茯苓若腎虛火動或痰盛作渴者必用地黃丸經云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也脾胃一虛耳目九竅皆為之病○少宰李蒲汀耳如蟬鳴服四物湯耳鳴益甚余以為足三陰虛五更服六味地黃丸食前服補中益氣湯頓愈○少司馬黎仰之因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脇痛用小柴胡合四物加山梔茯神陳皮而瘥

鼻塞不聞香臭或但遇寒月多塞或略感風寒便塞不時舉發者世俗皆以為肺寒而用解表通利辛溫之藥不效殊不知此是肺經素有火邪火鬱甚則喜得熱而惡見寒故遇寒便塞遇

感便发也治法清肺降火为主而佐以通气之剂若如常鼻塞不闻香臭者再审其平素只作肺热治之清金泻火清痰或丸药噙化或末药轻调缓服久服无不效矣此予所亲见而治验者其平素原无鼻塞旧症一时偶感风寒而致窒塞声重或流清涕者自作风寒治

愚按前症若因饥饱劳役所伤脾胃发生之气不能上升邪害空窍故不利而不闻香臭者宜养脾胃使阳气上行则鼻通矣按东垣云胆移热於脑则辛頰鼻渊治之以防风汤大抵胃气不和之所致者多矣○一男子房劳兼怒风府胀闷两脇胀痛余作色慾损肾怒气伤肝用六味地黄丸料加柴胡当归一剂而安○一男子面白鼻流清涕不闻香臭三年矣余以为肺气虚用补中益气加麦门山梔而愈

牙床肿痛齿痛摇动或黑烂脱落世人皆作肾虚治殊不知此属阳明经湿热盖齿虽属肾而生於牙床上下床属阳明大肠与胃犹木生於土也肠胃伤於美酒厚味膏粱甘滑之物以致湿热上攻则牙床不清而为肿为痛或出血或生虫由是齿不得安而动摇黑烂脱落也治宜泻阳明之湿热则牙床清宁而齿自安固矣愚按齿痛若因手足阳明经湿热用东垣清胃散若因风寒入脑脑痛齿亦痛用羌活附子细辛汤若因思虑伤脾用归脾汤若因鬱火所致用越鞠丸若因酒面炙煨而?用清胃散若因饮食伤脾用六君子汤若因劳伤元气用补中益气汤若因脾胃素弱用六君当归升麻若因肾经阴虚用六味丸若因肾经阳虚用八味丸若阴阳俱虚用十补丸若脾肾虚寒用安肾丸徐用诚先生云凡齿病恶寒热等症属手足阳明经齿摇断脱属足少阴经齿蚀肿痛出血皆胃火所致也亦有诸经错杂之邪与外因为患者廷尉张中梁齿动摇用安肾丸考功杨仲玉齿动用补中益气汤侍御王济川齿摇龈露用承气汤文选郑伯兴齿脑痛用羌活附子汤顔金宪齿痛用凉膈散郭职方过饮用清胃散党吏部风热用犀角升麻汤朱工部血气虚用十全大补汤沈大尹头脑齿痛头重手足厥冷此风寒入脑用麻黄附子细辛汤并愈

小便不禁或频数古方多以为寒而用温澁之药殊不知属热者盖膀胱火邪妄动水不得宁故不能禁而频数来也故年老人多频数者是膀胱血少阳火偏旺也治法当补膀胱阴血泻火邪为主而佐以收澁之剂如牡砺山茱萸五味子之类不可用温药也病本属热故宜泻火因水不足故火动而致小便多小便既多水益虚矣故宜补血泻火治其本也收之澁之治其标也愚按经云膀胱不约为遗溺小便不禁常常出而不觉也人之漩溺赖心肾二气之所传送盖心与小肠为表里肾与膀胱为表里若心肾气亏传送失度故有此症治宜温暖下元清心寡欲又有产辱不顺致伤膀胱若内虚寒者秘元丹韭子丸之类若内虚湿热者六味地黄丸或加五味杜仲补骨脂年老者八味丸产辱收生不谨损破尿胞者参术补胞汤加猪羊胞煎之窃谓肝主小便若肝经血虚用四物山梔若小便澁滯或茎中作痛属肝经湿热用龙胆泻肝汤若小便频数或劳而益甚属脾气虚弱用补中益气汤加山药五味子若小便无度或淋沥不禁乃阴挺痿痹也用六味地黄丸若小便澁滯或补而益甚乃膀胱热结也用五淋散其脾肺燥不能化生者黄芩清肺饮膀胱阴虚阳无所生者滋肾丸膀胱阳虚阴无所化者六味丸若阴痿思色精不出茎道澁痛如淋用加減八味丸料加车前牛膝若老人精竭复耗大小便牵痛如淋亦用前药不应急加附子多有生者○刘大参年踰六旬形气瘦弱小便不禁或频数内热口乾或咳痰喘晕余以为肺肾气虚用六味丸益气汤以滋化源彼不信反服补

阴降火澁精之剂阴窍作痛或小便不利仍服前药不两月而愈○大尹刘天锡内有湿热大便滑利小便澁滯服淡渗之剂愈加滴沥小便腿膝皆肿两眼胀痛此肾经虚热在下反服淡渗导损阳气阴无以化遂用地黄滋肾二丸小便如故更以补中益气汤加麦门五味兼服而愈○州守王用之肚腹膨胀饮食少思服二陈枳实及淡渗之类小便不利大便不实咳嗽腹胀手足俱冷余谓足三阴虚寒用金匱肾气丸而康

男子阴痿不起古方多云命门火衰精气虚冷固有之矣然亦有鬱火甚而致痿者经云壮火食气譬如人在暑热而倦怠痿弱遇冬寒而坚强也予尝亲见一二人肾经鬱火而有此症令服黄柏知母清火坚肾之药而效故须审察不可偏认作火衰也

愚按阴jing属肝之经络盖肝者木也如木得湛露则森立遇酷热则萎悴若因肝经湿热而患者用龙胆泻肝汤以清肝火导湿热若因肝经燥热而患者用六味丸以滋肾水养肝血而自安○学士徐崦西口乾有痰欲服琼玉膏余曰此沈阴降火之剂君面白口乾而有痰属脾肺气虚也当用温补之剂不信仍服两月余大便不实饮食少思且兼阴痿始信余言先用补中益气加茯苓半夏二味以温补脾胃饮食渐加大便渐实乃去二味服月余而痿更服六味丸三月余阴道如常矧琼玉膏固本丸坎离丸此辈俱是沈寒泻火之剂非肠胃有燥热者不宜服若足三阴经阴虚发热者久而服之令人无子盖谓损其阳气则阴血无所生故也屡验

梦遗精滑世人多作肾虚治而用补肾澁精之药不效殊不知此症多属脾胃饮酒厚味痰火湿热之人多有之盖肾藏精精之所生由脾胃饮食化生而输归於肾今脾胃伤於浓厚湿热内鬱中气浊而不清则其所化生之精亦得浊气肾主闭藏阴静则寧今所输之精既有浊气则邪火动於肾中而水不得宁静故遗而滑也此症与白浊同丹溪论白浊为胃中浊气下流渗入膀胱而云无人知此也其有色心太重妄想过用而致遗滑者自从心肾治但兼脾胃者多须审察

愚按遗精有四有用心过度心不摄肾而致者有因色慾不遂精气失位输精而出者有色慾太过滑泄不禁者有年壮气盛久无色慾精气满溢者有小便出多不禁者或不出小便而自出或茎中出而痒痛常如欲小便者宜辰砂妙香散或威喜丸大抵调补元气为主圣人教人收心养性厥有旨哉○少宰汪涵斋白浊用补中益气汤加茯苓半夏倍白术愈而复作饥体消瘦不时眩暈用八味丸而痊○司?陈石镜属脾虚用补中益气六味地黄而愈○光禄柴黻庵因劳赤白浊如注用归脾汤而愈○司?张检斋小腹不时作痛茎出白淫用小柴胡加山梔龙胆草山茱萸归而愈

妇人女子经脉不行有脾胃损伤而致者不可便认作经闭血死轻用通经破血之药遇有此症便须审其脾胃如何若因饮食劳倦损伤脾胃少食恶食泄泻疼痛或因误服汗下攻伐药伤其中气以致血少而不行者只宜补养脾胃用白术为君茯苓芍药为臣佐以黄芪甘草陈皮麦芽川芎当归柴胡等药脾旺则能生血而经自行矣又有饮食积滯致损脾胃者亦宜消积补脾若脾胃无病果有血块凝结方宜行血通经

愚按经曰饮食入胃游溢精气上输於脾脾气散精上归於肺通调水道下输膀胱水精四布五经并行又曰二阳之病发心脾有不得隐曲女子不月二阳谓阳明胃与大肠也故心脾平和则百骸五臟皆润泽而经候如常苟或心脾受伤则血无所养亦无所统而月经不调矣是故调经者当理心脾为主丹溪先生亦曰先期而至者血热也後期而至者血虚也窃谓先期而至者有因脾经血燥有因脾经鬱火有因肝经怒火有因血分有热有因劳役火动过期而至者有因脾经血虚有因肝经血虚有因气虚血弱主治之法脾经血燥者加味逍遥散脾经鬱火者归脾汤肝经怒火者加味小柴胡汤血分有热者加味四物汤劳役火动者补中益气汤脾经血虚者人参养荣汤肝经血虚者六味地黄丸气虚血弱者八珍汤盖血生於脾土故云脾统血凡血病当用苦甘之剂以助阳气而生阴血大凡肝脾血燥四物为主肝脾血弱补中益气为主肝脾鬱火归脾汤为主肝经怒火加味逍遥散为主病因多端不能悉举治当临症制宜可也○一妇人晡热肢体瘦倦食少无味月经不行或血衄或血崩半载矣或用顺气清热止血等剂不应更加寒热且时欲作呕余以为鬱怒亏损脾胃虚火错经妄行而然耳遂朝用补中益气汤夕用六味地黄丸各数剂半载而痊○一妇人素沉静晡热内热月经不调後每一二月或齿缝或舌下或咽间出血碗许如此年余服清热凉血调理之药益甚问治於余余谓肝脾气鬱血热上行先用加味归脾汤後用加味逍遥散摄血归源而经自调前症顿愈○一室女年十七腿外膝忽肿起一红点作痒搔破日出鲜血如注及飞小虫甚多审其由每先寒热两耳下或结核盖外膝耳下俱属胆经胆为肝之腑肝主风热生虫血得风而妄行肝火旺而血出其肝胆阴阳俱虚矣凡病虚则补其母肾乃肝之母用六味丸滋肾水以生肝木四物柴胡山栀钩藤生肝血以抑风热而瘥

妇人半产多在三个月及五月七月除跌扑损伤不拘外若前次三个月而堕则下次必如期复然盖先於此时受伤故受至期必应乘其虚也遇有半产者产後须多服养气血固胎元之药以补其虚损下次有胎先於两个半月後即用固胎药十数服以防三月之堕至四个半月後再服八九服防过五月又至六个半月後再服以防七月及至九个月内服丹溪達生散十数服可保无虞其有连堕数次胎元损甚者服药须多久则可以留方用四物汤加白术人参陈皮茯苓甘草阿胶艾叶条芩多气加香附缩砂有痰加姜制半夏调理妊娠在於清热养血条实黄芩为安胎圣药清热故也暑月宜加用之养胎全在脾胃譬如钟悬於梁梁软则钟下坠折则堕矣故白术补脾为安胎君药若因气恼致胎不安者宜用川芎陈皮茯苓甘草多加缩砂少佐木香以行气

愚按半产重於大产大产如瓜熟自落栗熟自脱半产如生采其皮殼断其根蒂岂不重於大产但人轻忽致死者多矣治法宜补形气生新血去瘀血若未足月痛而产芎归补中汤倍加知母止之若产而血不止人参黄芪汤补之若产而心腹痛当归川芎汤主之胎气弱而小产者八珍汤固之若下血过多而发热圣愈汤汗不止急用独参汤发热烦躁肉瞤筋惕八珍汤大渴面赤脉洪而虚当归补血汤身热面赤脉沉而微四君子姜附○一妇人胎已六月每怒气便见血甚至寒热头疼脇胀腹痛少食作呕余谓寒热头疼肝火上冲也脇胀腹痛肝气不行也少食作呕肝侮脾胃也小便见血肝火下流也用小柴胡加芍药炒黑山栀茯苓白术而愈○一妇胎及六月形体倦怠饮食少思劳役便血胎动不安用六君生熟地升麻柴胡而愈○一妇人每胎三四月作痛欲堕余以为痛胎用当归二钱熟地黄三钱而愈

东垣丹溪治病多自制方盖二公深明本草药性洞究内经处方要法故能自制自宋以来局方盛行人皆遵用不敢轻率自为局方论症治病虽多差谬丹溪曾辩论之然方皆名医所制其君臣佐使轻重缓急大小多寡之法则不差也近见东垣丹溪之书大行世医见其不用古方也率皆效顰治病辄自制方然药性不明处方之法莫究卤莽乱杂反致生无甚有变症多端遂难识治耳且夫药之气味不同如五味子之味厚故东垣方少者五六粒多者十数粒今世医或用二三钱石膏味淡薄故白虎汤用半两今世医不敢多用补上治上剂宜轻小今不论上下率用大剂丸散汤液各有攸宜今不论缓急率用汤煎如此类者多矣今之医者若不熟读本草深究内经而轻自制方鲜不误人也

愚按方仿也仿彼而準此也至於应用更贵权宜非曰确然不可移而屹然不可动者也是以素问无方难经亦无方汉时才有方盖仿病因以立方也

或问今人有言东垣之法宜用於北丹溪之法可行於南如何曰东垣北医也罗谦甫传其法以闻於江浙丹溪南医也刘宗厚世其学以鸣於陕西果如人言则本草内经皆神农黄帝岐伯之说亦止宜於北方耶夫五方所生异病及治之异宜内经异法方宜论五常正大论已详言之矣又如北方多寒南方多热江湖多湿岭南多瘴谓其得此气多故亦多生此病非谓北病无热南病无寒也至於治寒以热治热以寒则五方皆同岂有南北之异耶但人之臟腑火各居二天之六气热居三分又半故天下之病热多而寒少观内经至真大论病机一篇可见又湿热相火致病甚多自太仆注文湮没以致局方偏用湿热之药故丹溪出而阐内经之旨辨局方之偏论湿热相火之病以补前人之未备耳後人不识见其多用芩连梔柏等苦寒之药遂以为宜於南浅矣哉

愚按前论内云火症固多但虚实不同治法亦异故王太仆先生曰大寒而甚热之不热是无火也大热而甚寒之不寒是无水也昼见夜伏夜见昼止不时而动是无火也大抵病热作渴饮冷便秘此症属实为热故也或恶寒发热引衣蜷卧或四肢逆冷大便清利此属真寒或躁扰狂越欲入水中不欲近衣此症属虚外假热而内真寒也故虚劳发热之症治以寒药而不愈者为此故也由此观之则热症常少而寒症常多矣故无火者当用八味丸益火之源以消阴翳无水者用六味丸壮水之主以镇阳光然其所以致疾者皆由气血方长而劳心亏损或精血未满而纵情恣欲根本不固火不归经以致见症难名虽宜常补中阴以制其火然而二尺各有阴阳水火互相生化当於二臟中分各阴阳虚实求其所属而平之若左尺脉虚弱而细数者是左肾之真阴不足也用六味丸右尺脉迟软或沉细而数欲絶者是命门之相火不足也用八味丸至於两尺微弱是阴阳俱虚用十补丸此皆滋其化源也设使槩服黄柏知母沉陰泻火之药反戕脾胃多致不起【详见玉机微义治验见内科方】暑病【第一卷内备用治暑方并入於此以便观覽】

夏至日後病热为暑暑者相火行令也夏月人感之自口齿而入伤心包络之经其脉虚或浮大而散或弦细扎迟盖热伤气则气消而脉虚弱其为症汗烦则喘渴静则多言身热而烦心痛大渴引饮头疼自汗倦怠少气或下血发黄生癍甚者火热致金不能平木搖擗不省人事治暑之法清心利小便最好暑伤气宜补真气为要又有恶寒或四肢逆冷甚者迷闷不省而

为霍乱吐利痰滞呕逆腹痛泻痢此则非暑伤人乃因暑而自致之病也以其因暑而得故亦谓之暑病治法不同若行人或农夫於日中劳役得之者是动而得之阳症也其病必苦头痛发燥热恶热扪之肌肤大热必大渴引饮汗泄无气以动乃天热外伤元气也宜清暑益气用香薷黄连扁豆人参黄芪五味知母石膏之类暑热发渴脉虚宜用人参白虎汤人参【一钱五分】知母【二钱】石膏【五钱】甘草【二钱】竹叶石膏汤亦好石膏【一两】半夏【二钱五分】甘草【二钱】人参【二钱】麦门冬【五钱】入竹叶水煎

东垣清暑益气汤治长夏湿热蒸人人感之四肢困倦精神短少胸满气促肢节作痛或气高而喘身热而烦心下痞闷小便黄数大便溏而频或痢或渴不思饮食自汗体重黄芪升麻苍术【各一钱】人参白术神麴陈皮【各五】分甘草炙黄柏麦门冬当归【各三分】葛根泽泻青皮五味【各二分】

若暑热之时无病之人或避暑热纳凉於深堂大夏凉台冷馆大扇风车得之者是静而得之阴证也其病必头痛恶寒身形拘急肢节疼痛而烦心肌肤大热无汗此为陰寒所遏使周身阳气不得伸宜用辛温之剂以解表散寒用厚朴紫苏乾葛藿香羌活苍术之类若外既受寒内复伤水水生冷瓜果之类前药再加乾姜缩砂神麴之类此非治暑也治因暑而致之病也若外不受寒止是内伤水水冷物腹痛泄泻或霍乱吐逆宜缩脾饮砂仁草果甘草扁豆乾姜乌梅或理中汤加神麴麦芽缩砂苍术此专治内温中消食也

若吐泻脉沉微甚者不可用凉药可用附子大顺散熟附子甘草乾姜杏仁桂枝附子理中汤加芍药

夏月多食冷物及过饮茶水致伤脾胃吐泻霍乱故治暑药多用温脾消食治湿利小便医者要识此意若既伤暑热复伤生冷外热内寒宜先治其内温中消食次治其外清暑补气而以理脾为主於前陰阳二条内相兼取用东垣清暑益气汤已兼此意其用黄芪升麻人参白术甘草麦门冬当归五味黄柏葛根是清暑补气也苍术神麴陈皮泽泻青皮是治内补脾也愚按前症又当分别中暑中喝脉虚脉沉无汗有汗发热不热作渴不渴或泻不泻饮寒饮热辨其陰阳虚实不可泛投寒凉之剂盖为夏月伏陰在内古人用附子大顺散之类温补阳气厥有旨哉何今之老弱至夏月患食少体倦发热作渴或吐泻腹痛头痛诸症反服香薷饮复伤元气无不招引暑症以致不起至若清暑益气汤内用泽泻猪苓之类必审其果有湿热壅滞方可用之否则亏损其陰而伤其目矣用当审察○仪部李北川仲夏患腹痛吐泻两手足扪之则热按之则冷其脉轻胗则浮大重胗则微细余曰此陰寒之症也急服附子理中汤不应仍服至四剂而愈

注夏病属陰虚元气不足宜补中益气汤去柴胡升麻加黄柏【炒】白芍药挟痰者加半夏陈皮

愚按丹溪先生云天地以五行更迭衰旺而成四时人之五臟六腑亦应之而衰旺四月属巳五月属午为火太旺火为肺金之夫火旺则金衰六月属未土太旺土为水之夫土旺则水衰

况肾水尝藉肺金为母以补其不足古人於夏月必独宿而淡味保养金水二臟经曰冬藏精者春不病温十月属亥十一月属子正火气潜藏必养其本然之真而为来春发生之本若於此时不恣欲以自戕至春升之际根本壮实何病之可言哉○文选姚海山中暑头痛发热气高而喘肢体倦怠两手麻木余谓热伤元气用人参益气汤顿安又用补中益气汤加麦门五味而痊

若夏月伤暑发热汗大泄无气力脉虚细而迟此暑伤元气也服後方

人参 黄芪【?炙】 麦门冬【去心】 白芍药 陈皮【各一钱】 白茯苓【一钱】 黄连【炒】 甘草【炙各五分】 黄柏【三分】 白术【一钱五分】 香薷 知母【各七分】

右姜水煎食前温服

愚按前症有热伤元气而汗出者有劳伤元气而汗出者有因元气素虚腠理不密而汗出者治法暑伤元气者清暑益气汤劳伤元气者补中益气汤元气素虚而自汗者十全大补汤如兼盗汗佐以六味丸加五味子前云大汗无力脉虚细迟属阳气虚弱内黄柏知母恐复伤阳气芍药茯苓恐导损陰气也治者审之

若夏秋暑热因过用冷物茶水伤其内又过取凉风伤其外以致恶寒发热胸膈饱闷饮食不进或兼呕吐泄泻此内外俱伤寒冷也

人参 乾姜【炒紫色】 厚朴【姜水炒】 陈皮 羌活 白茯苓 枳实【各一钱】 白术【一钱五分】 甘草【炙五分】

右姜水煎食前温服

愚按前症宜用此方如未应宜用藿香正气散若内外已解寒热未退或饮食不进宜用六君子保命集云霍乱属阳明症宜用和中平胃建中汤辈或四君子汤脉浮自汗四君子加桂枝主之脉浮无汗四君子加麻黄吐利转筋脇下痛脉弦者木剋土也用平胃散加木瓜或建中加柴胡木瓜吐利转筋腹痛体重脉沉而细四君子加白芍药良姜吐利四肢拘急脉沉而迟属少阴四君加姜附厚朴吐利四肢厥冷脉微缓属厥陰建中加归附吐利头痛发寒热热多欲饮水者五苓散寒多不欲水者理中丸主之元戎云太阴症霍乱者理中加橘红吐下腹痛手足逆冷理中加熟附子吐利後转筋者理中加火煨石膏一两○上舍徐民则夏月入房及食水菓面食而患腹痛余曰此阴寒之症也急用附子理中汤以回阳不信别用二陈枳实黄连香菇饮之类而死○进士刘华甫夏月食生冷菓品患前症余用附子理中汤一鍾顿安【凡方内用木瓜者俱用砂器煎炒恶铁故也余方仿此】

若夏暑在途中常服以壮元气清热驱暑服之免中暑霍乱泄泻痢疾等症

人参【一钱二分】白术【一钱五分】麦门冬【去心】五味子【十粒杵碎】白芍药【炒】白茯苓【各一钱】知母【炒】陈皮
香薷【各七分】黄芩【炒三分】甘草【炙五分】

右姜水煎食前温服

愚按前症若人元气虚弱宜用补中益气去柴胡升麻加麦门五味或少加炒黑黄柏人参益气汤亦可用

若遇劳倦辛苦用力过多即服後方二三服免生内伤发热之病此方主於补气

黄芪【一钱半?炙】人参 麦门冬 陈皮【各一钱】白术【一钱】甘草【炙七分】

右姜枣水煎食前温服劳倦甚加熟附子四五分愚按前论开世俗之蒙瞶济无穷之夭枉内附子若素畏寒饮食者尤宜用若素喜寒饮食者以肉桂或炮姜代之亦可若或因暑热伤气而四肢困倦或手足麻木者先用人参益气汤後用补中益气汤

若人过劳心思虑损伤精神头眩目昏心虚气短即用後方补血为主

人参【一钱】五味子【十五粒杵】当归【一钱酒洗】白芍【炒一钱】麦门冬【去心五分】山梔子【炒五分】茯神【去心一钱】酸枣仁【炒一钱】生地黄【酒洗五分】甘草 陈皮 川芎【各五分】

右水煎服

愚按前症宜用此方不宜多服其麦门冬芍药山梔生地苦寒恐复损脾气若脾胃素虚热而患前症但以补中益气汤加麦门五味亦可若因饥渴劳役或因误行攻伐以致气高而喘身热而烦或自汗此为阳气内伤宜用补中益气汤若因饥饱劳役或因悞出汗以致饥热大渴引饮目赤面红脉洪大按之如无此为血脱烦躁宜用当归补血汤

附滑伯仁先生诊家枢要

脉者气血之先也气血盛则脉盛气血衰则脉衰气血热则脉数气血寒则脉迟气血微则脉弱气血平则脉治又长人脉长短人脉短性急人脉急性缓人脉缓左大顺男右大顺女男子尺脉常弱女子尺脉常盛此皆其常也反之者逆

左右手配藏府部位

左手寸口心小肠脉所出○左关肝胆脉所出左尺肾膀胱脉所出【命门与肾脉通】

右寸肺大肠脉所出○右关脾胃脉所出○右尺心三焦包络脉所出

五藏平脉

心脉浮大而散肺脉浮濇而短肝脉弦而长脾脉缓而大肾脉沉而软滑○心合血脉心脉循血脉而行持脉指法如六菽之重按至血脉而得者为浮稍稍加力脉道粗者为大又稍加力脉道阔软者为散○肺合毛皮肺脉循皮毛而行持脉指法如三菽之重按至皮毛而得者为浮稍稍加力脉道不利为濇又稍加力不及本位曰短○肝合筋肝脉循筋而行持脉指法如十二菽之重按至筋而脉道如筝弦相似稍加力脉道迢迢者为长○脾合肌肉脾脉循肌肉而行持脉指法如九菽之重按至肌肉如微风轻飏柳梢之状为缓次稍加力脉道敦实者为大○肾合骨肾脉循骨而行持脉指法按至骨上而得者为沉次重以按之脉道无力者为软举指来疾流利者为滑

凡此五藏平脉要须察之久久成熟一遇病脉自然可晓经曰先识经脉而後识病脉此之谓也

四时平脉

春弦夏洪秋毛冬石长夏四季脉迟缓

呼吸浮沉定五藏脉

呼出心与肺吸入肾与肝呼吸之间脾受穀味其脉在中心肺俱浮浮而大散者心浮而短濇者肺肾肝俱沉牢而长者肝濡而来实者肾脾为中州其脉在中

因指下轻重以定五藏

即前所谓三菽五菽之重也

三部所主【九候附】

寸为阳为上部主头项以下至心胸之分也关为阴阳之中为中部主脐腹肚脇之中也尺为阴为下部主腰足胫股之分凡此三部之中每部又各有浮中沉三候三而三之为九候也浮主皮肤候表及腑中主肌肉以候胃气沉至筋骨候?及藏也

持脉

凡诊脉之道先须调平自己气息男左女右先以中指定得关位郤齐下前後二指初轻按以消息之次中按以消息之次重按以消息之然後自寸关至尺逐部寻究一呼一吸之间要以

脉行四至为率闰以太息脉五至为平脉也其有太过不及则为病脉看在何部各以其部断之○凡诊脉须要先识时脉胃脉与腑脏平脉然後及於病脉时脉谓春三月六部中俱带弦夏三月俱带洪秋三月俱带浮冬三月俱带沉胃脉谓中按得之脉和缓腑脏平脉已见前章凡人府藏脉既平胃脉和又应时脉乃无病者也反此为病○凡诊脉之际人臂长则踈下指臂短则密下指三部之内大小浮沉迟数同等尺寸阴阳高下相符男女左右强弱相应四时之脉不相戾命曰平脉其或一部之内独大独小偏迟偏疾左右强弱之相反四时男女之相背皆病脉也凡病之见在上曰上病在下曰下病左曰左病右曰右病左脉不和为病在表为阳主四肢右脉不和为病在?为阴主腹臟以次推之○凡取脉之道理各不同脉之形状又各非一凡脉之来必不单至必曰浮而弦浮而数沉而紧沉而细之类将何以别之大抵提纲之要不出浮沉迟数滑澁之六脉也浮沉之脉轻手重手而取之也迟数之脉以已之呼吸而取之也滑澁之脉则察夫往来之形也浮为阳轻手而得之也而乳洪散大长濡弦皆轻手而得之之类也沉为阴重手而得之之类也而伏石短细牢实皆重手得之之类也迟者一息脉二至而缓结微弱皆迟之类也或曰滑类乎数澁类乎迟何也然脉虽似而理则殊也彼迟数之脉以呼吸察其至数之踈数此滑澁之脉则以往来密察其形状也数为热迟为寒滑为血多气少澁为气多血少所谓提纲不出乎六字者盖以其足以统夫表里阴阳冷热虚实风寒湿燥藏府气血也浮为阳为表诊为风为虚沉为阴为?诊为湿为实迟为在藏为寒为冷数为在府为热为燥滑为血有余澁为气独滞也人一身之变不越乎此能於是六脉之中以求之则痰疾在人者莫能逃焉○持脉之要有三曰举曰按曰寻轻手循之曰举重手取之曰按不轻不重委曲求之曰寻初持脉轻手候之脉见皮肤之间者阳也府也亦心肺之应也重手得之脉附於肉下者阴也藏也亦肝肾之应也不轻不重中而取之其脉应於血肉之间者阴阳相适冲和之应脾胃之候也若浮中沉之不见则委曲而求之若隐若见则阴阳伏匿之脉也三部皆然○察脉须识上下来去至止六字不明此六字则阴阳虚实不别也上者为阳来者为阳至者为阳下者为阴去者为阴止者为阴也上者自尺部上於寸口阳生於阴也下者自寸口下於尺部阴生於阳也来者自骨肉之分而出於皮肤之际气之升也去者自皮肤之际而还於骨肉之分气之降也应曰至息曰止也○明脉须辩表里虚实四字表阳也府也凡六淫之邪袭於经络而未入於胃府及藏者皆属於表也?阴也藏也凡七情之气郁於心腹之内不能越散饮食五味之伤流於府藏之间不能通泄皆属於里也虚者元气之自虚精神耗散气力衰竭也实者邪气之实由正气本虚邪得乘之非元气之自实也故虚者补其正气实者泻其邪气经曰所谓邪气盛则实精气夺则虚此大法也○凡脉之至在筋肉之上出於皮肤之间者阳也府也行於肌肉之下者阴也藏也若短小而见於皮肤之间者阴乘阳也洪大而见於肌肉之下阳乘阴也寸尺皆然

脉贵有神

东垣云不病之脉不求其神而神无不在也有病之脉则当求其神之有无谓如六数七极热也脉中【此中字浮中沉之中】有力【言有胃气】即有神矣为泄其热三迟二败寒也脉中有力【说并如上】即有神矣为去其寒若数极迟败中不复有力为无神也将何所恃耶苟不知此而遽泄之去之神将何以依而主耶故经曰脉者气血之先气血者人之神也善夫

脉阴阳类成

浮不沉也按之不足轻举有余满指浮上曰浮为风虚动之候为胀为风为痞为满不食为表热为喘浮大伤风鼻塞浮滑疾为宿食浮滑为饮左寸浮主伤风发热头疼目眩及风痰浮而虚迟心气不足心神不安浮散心气耗虚烦浮而洪数心经热关浮腹胀浮而数风热入肝经浮而促怒气伤肝心胸逆满浮大胸脇胀满尺浮膀胱风热小便赤澁浮大而芤男子小便血妇人崩带浮而迟冷疝脐下痛右寸浮肺感风寒咳嗽清涕自汗体倦浮而洪肺热而咳浮而迟肺寒喘嗽关浮脾虚中满不食浮大而?为宿食浮而迟脾胃虚尺浮风邪客下焦大便秘浮而虚元气不足浮而数下焦风热大便秘沉不浮也轻手不见重手乃得为陰逆阳郁之候为实为寒为气为水为停饮为症瘕为脇胀为厥逆为洞泄沈细为少气沉迟为痼冷沉滑为宿食沉伏为霍乱沉而数内热沉而迟内寒沉而弦心腹冷痛左寸沉心内寒邪为痛胸中寒饮脇痛关沉伏寒在经两脇刺痛沉弦痙癖内痛尺沉肾藏感寒腰背冷痛小便浊而频男为精冷女为血结沉而细胫酸阴痒溺有余沥右寸沉肺冷寒痰停蓄虚喘少气沉而紧滑咳嗽沉细而滑骨蒸寒热皮毛焦乾关沉胃中寒积中满吞酸沉紧悬饮尺沈病水腰脚疼沉细下利又为小便滑脐下冷痛

迟不及也以至数言之呼吸之间脉仅三至減於平脉一至也为阴盛阳亏之候为寒为不足浮而迟表有寒沉而迟里有寒居寸为气不足居尺为血不足气寒则缩血寒则凝也左寸迟心上寒精神多惨关迟筋寒急手足冷脇下痛尺迟肾虚便浊女人不月右寸迟肺感寒冷痰气短关迟中焦寒及脾胃伤冷物不食沉迟为积尺迟为藏寒泄泻少腹冷痛腰脚重

数太过也一息六至过平脉两至也为烦满上为头疼上热中为脾热口臭胃烦呕逆右为頬热目赤左下为小便黄赤大便秘澁浮数表有热沉数里有热

虚不实也散大而软举按豁然不能自固气血俱虚之诊也为暑为虚烦多汗为恍惚多惊为小儿惊风实不虚也按举不絶逼逼而长动而有力不疾不迟为三焦气满之候为呕为痛为气塞为食积为气聚为痢为伏阳在内左寸实心中积热口舌疮咽痛实大头面热风烦躁体疼面赤关实腹脇痛满实而浮大肝盛目暗赤痛尺实少腹痛小便?实而滑淋漓茎痛溺赤实大膀胱热溺难实而紧腰痛右寸实胸中热痰嗽烦满实而浮肺热咽燥痛喘咳气壅关实伏阳蒸内脾虚食少胃气滞实而浮脾热消中善饥口乾劳倦尺实脐下痛便难或时下痢

洪大而实也举按有余来至大而去且长腾上满指为荣络大热血气燔灼之候为表里皆热为烦为咽乾为大小便不通左寸洪心经积热眼赤口疮头痛内烦关洪肝热及身痛四肢浮热尺洪膀胱热小便赤澁右寸洪肺热毛焦唾粘咽乾洪而紧喘急关洪胃热反胃呕吐口乾洪而紧为胀尺洪腹满大便难或下血

微不显也依稀轻细若有若无为血气俱虚之候为虚弱为泄为虚汗为崩漏败血不止为少气浮而微者阳不足必身恶寒沉而微者阴不足主脏寒下利左寸微心虚忧惕荣血不足关微四肢恶寒拘急尺微败血不止男为伤精尿血女为崩带右寸微上焦寒痞冷痰不化中寒

少气关微胃寒气胀食不化脾虚噫气心腹冷痛尺微脏寒泄泻脐下冷痛

弦按之不移举之应手端直如丝弦为血气收敛为阳中伏阴或经络间为寒所入为痛为疟为拘急为寒热为血虚盗汗为寒凝气结为冷痹为疝为饮为劳倦弦数为劳疟双弦脇急痛弦长为积左寸弦头疼心惕劳伤盗汗乏力关弦脇肋痛痙瘕弦紧为疝瘕为瘀血弦小寒瘕尺弦少腹痛弦滑腰脚痛右寸弦肺受寒咳 胸中有寒痰关弦脾胃伤冷宿食不化心腹冷痛又为饮尺弦脐下急痛不安下焦停水

缓不逮也往来迂缓呼吸徐徐以气血向衰故脉体为之徐缓尔为风为虚为痹为弱为痛在上为项强在下为脚弱浮缓为风沉缓血气虚左寸缓心气不足怔忡多忘亦主项背急痛关缓风虚眩晕腹脇气结尺缓肾虚冷小便数女人月事多右寸缓肺气浮言语气短关缓胃弱气虚浮缓脾气虚弱不沉不浮从容和缓乃脾家本脉也尺缓下寒脚弱风气秘滞浮缓肠风泄泻沉缓小腹感冷

滑不澁也往来流利如珠走盘不进不退为血实气壅之候盖血不胜於气也为呕吐为痰逆为宿食为经闭滑而不断经不闭其断者经闭上为吐逆下为气结滑数为结热左寸滑心热滑而实人心惊舌强关滑汗热头目为患尺滑小便淋沥尿赤茎中痛右寸滑痰饮呕逆滑而实肺热毛髮焦膈壅咽乾痰嗽头目昏涕唾粘关滑脾热口臭及宿食不化吐逆滑实胃热尺滑因相火炎而引饮多脐冷腹鸣或时下利妇人主血实气壅月事不通若和滑为孕

澁不滑也虚细而迟往来极难参伍不调如雨沾沙如轻刀刮竹然为气多血少之候为少血为亡汗为血痹痛为伤精女人有孕为胎痛无孕为败血病左寸澁心神虚耗不安及冷气心痛关澁肝虚血散肋胀脇满身痛尺澁男子伤精及疝女人月事虚败若有孕主胎漏右寸澁荣卫不和上焦冷痞气短臂痛关澁脾弱不食胃冷而呕尺澁大便溏津液不足小腹寒足胫逆冷【经云滑者伤热澁者中雾露金革】

长不短也指下有余而過於本位气血皆有余也为阳毒内蕴三焦烦鬱为壮热

短不长也两头无中间有不及本位气不足以前导其血也为阴中伏阳为三焦气壅为宿食不消

大不小也浮取之若洪而浮沉取之大而无力为血虚气不能相入也经曰大则病进

小不大也浮沉取之悉皆损小在阳为阳不足在阴为阴不足前大後小则头疼目眩前小後大则胸满短气紧有力而不缓也其来劲急按之长举之若牵转索之状为邪风激搏伏於荣卫之间为痛为寒浮紧为伤寒身疼沉紧为腹中有寒为风痙左寸紧头热目痛项强紧而沉心中气逆冷痛关紧心腹满痛脇痛肋急紧而盛伤寒浑身痛紧而实痙瘕尺紧腰脚脐下痛小便难右寸紧鼻塞膈壅紧而沉滑肺实咳嗽关紧腹痛吐逆紧盛腹胀伤食尺紧下焦筑痛

弱不盛也极沉细而软怏怏不前按之欲絕未絕举之即无由精气不足故脉息痿弱而不振也为元气亏耗为痿弱不前为痼冷为閤热为泄精为虚汗老得之顺壮得之逆左寸弱阳虚心悸自汗关弱筋痿无力妇人主产後客风面肿尺弱小便数肾虚耳聋骨肉酸痛右寸弱身冷多寒胸中短气关弱脾胃虚食不化尺弱下焦冷痛大便滑

动其状如大豉厥厥动摇寻之有举之无不往不来不离其处多於关部见之动为痛为惊为虚劳体痛为崩脱为泄痢阳动则汗出阴动则发热

伏不见也轻手取之絕不可见重取之附着於骨为陰阳潜伏关膈闭塞之候为精聚为痼痼为食不消为霍乱为水气为荣卫气闭而厥逆关前得之为阳伏关後得之为陰伏左寸伏心气不足神不守常沉忧抑鬱关伏血冷腰脚痛及脇下有寒气尺伏肾寒精虚痼痼寒痛右寸伏胸中气滯寒痰冷积关伏中脘积块作痛及脾有停滯尺伏脐下冷痛下焦虚寒腹中痼冷促阳脉之极也脉来数时一止复来者曰促阳独盛而阴不能相和也或怒逆上亦令脉促促为气涌为狂闷为瘀血发狂又为气为血为饮为食为痰盖先以气热脉数五者或一有留滯乎其间则阴之而为促非恶脉也虽然加即死退即生亦可畏哉

结阴脉之极也脉来缓时一止复来者曰结阴独盛而阳不能相入也为症结为积聚为七情所鬱浮结为寒邪滯经沉结为积气在内又为气为血为饮为痰盖先以气寒脉缓而五者或一有留滯於其间则因而为结故张长沙谓结促皆病脉

芤浮大而软寻之中空傍实傍有中无诊在浮举重按之间为失血之候大抵气有余血不足血不能统气故虚而大若芤之状也左寸芤主心血妄行为吐为衄关芤主脇间血气痛或腹中瘀血亦为吐血目暗尺芤小便血女人月事为病右寸芤胸中积血为衄为呕关芤肠?瘀血及呕血不食尺芤大便血又云前大後细脱血也非芤而何

革沉伏实大如按鼓皮曰革气血虚寒革易常度也妇人则半产漏下男子则亡血失精又为中风寒湿之诊濡无力也虚软无力应手散细如绵絮之浮水中轻手乍来重手却去为气血俱不足之候为少气为无血为疲损为自汗为下冷为痹左寸濡心虚易惊盗汗短气关濡荣卫不和精神离散体虚少力尺濡男为伤精女为脱血小便数自汗多右寸濡关热增寒气乏体虚关濡脾软不化物胃虚不进食尺濡下元冷惫肠虚泄泻牢坚牢也沉而有力动而不移为里实表虚关中气促为劳伤痿极大抵其脉近乎无胃气者故诸家皆为危殆之脉云亦主骨间疼痛气居於表

疾盛也快於数为疾呼吸之间脉七至热极之脉也在阳犹可在阴为逆

细微眇也指下寻之往来微细如线盖血冷气虚不足以充故也为元气不足乏力无精内外俱冷痿弱洞泄为忧劳过度为伤湿为积为痛在内及在下

代更代也动而中止不能自还因而复动由是复止寻之良久乃复强起为代主形容羸瘦口

不能言若不因病而人羸瘦其脉代止是一藏无气它藏代之真危亡之兆也若因病而气血骤损以至人气不续或风家痛家脉见止代只为病脉故伤寒家亦有心悸而脉代者腹心痛亦有结澹止代不匀者勿以为凶盖九痛之脉不可准也又妊娠或有脉代者此必三月余之胎也亦无虑焉

散不聚也有阳无阴按之满指散而不聚来去不明漫无根抵为气血耗散府藏气绝在病脉主虚阳不敛又主心气不足大抵非佳脉也

薛氏医案卷二十二

卷二十三

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二十三

明 薛已 订

明医杂着

风症

问左手臂挛缩不能伸举手指拳缩肩背重坠有似筋牵引作痛伸缩间骨节处筋作痛左足大指中指常欲反张难屈左手指掌时常作麻指缝近掌处但觉有物夹於其间左足底近前高突处如肿硬急胀摸之无形步履时只多如一氈垫者语言短澁拜起头晕口眼喎斜舌根痰纏胸膈痰碍咽中有痰核左肋下有痰核不时打寒噤 喷呵欠便牵动手足之病左耳左面左体使手或粗衣摸擦则皮肤痛左腮左项左脇肋皆时常木而急如有物粘贴其上左体或头项或手足作痒左眼时常有泪流凝不乾左口角似寬纵左面上似虫蚁游行被风吹袭左鼻孔清涕出即打喷嚏等症答大经小络贯串一身谓之脉脉者血之隧道也血随气行周流无停筋者周布四肢百节络联而束缚之此属肝木得血以养之则和柔缓而不急脉皆起於手足指端故十二经皆以手足名之而筋则无处无之皮毛者属肺主外而易於感冒人身之血行於脉络而外充於皮毛渗透肌肉滋养筋骨故百体和运动无碍若气滯则血滯气逆则血逆得热则瘀浊得寒则凝泣衰耗则运行不周渗透不徧而外邪易侵矣津液者血之余行乎脉外流通一身如天之清露若血浊气滯则凝聚而为痰痰乃津液之变如天之露也故云痰遍身上下无处不到盖即津液之在周身者津液生於脾胃水谷所乘浊则为痰故痰生於脾土也所以古人论中风偏枯麻木酸痛不举诸症以血虚死血痰饮为言是论其致病之根源至其得病则必有所感触或因风或因寒或因湿或因酒或因七情或劳力劳心房劳汗出因感风寒湿气遂成此病此血病痰病为本而外邪为标其病中於皮毛血脉经络肌肉筋骨之间而未入脏腑故邪在皮毛肌肉则不知痛痒麻木不仁如有物一重贴於其上或如虫游行或洒洒寒栗或肿胀或自汗遇热则或痒遇阴虚则沉重酸痛邪入血脉经络则手足指掌肩背腰膝重硬不遂难於屈伸举动或走注疼痛所陈诸症皆外自皮毛以至筋骨之病凡脉所经所络筋所会所结气血津液所行之处皆凝滯鬱遏不得流通而致然也亦何必一一强度某病属某经某病属某脏而杂治之哉若邪入脏腑则为危病而难於用药东垣书论之明矣经云知其要者一言而终不知其要流散无穷此之谓也

愚按难经曰邪在气气为是动邪在血血为所生病经云阳之气以天地之疾风名之此风非

外来风邪乃本气病也故诸方多言皆由气体虚弱荣卫失调或七情过度以致真气耗散腠理不密邪气乘虚而入及其中也然左半体者肝肾所居之地肝主筋肾主骨肝藏血肾藏精精血枯槁不能滋养故筋骨偏废而不用也河间曰风病多因热甚俗云风者言末而忘其本也经云汗出偏沮使人偏枯如树木一枝津液不到则此枝枯槁被风所害由此观之实因肝肾二经精血枯槁之所致也前症云云亦当察其形症审其兼变而治之尤不可泥执於风经曰三阴三阳发病为偏枯痿易四肢不举亦未尝必指於风也其真中者当辨其中藏中府而治之眼瞽者中於肝舌不能言者中於心唇缓便秘者中於脾鼻塞者中於肺耳聋者中於肾此五者病深多为难治中血脉者外无六经之形症内无便溺之阻隔肢不能举口不能言用大秦芩汤主之中腑者多兼中脏如左关脉浮弦面目青左脇偏痛筋脉拘急目瞶头目眩手足不收坐踞不得此中胆兼中肝也用犀角散之类如左寸脉浮洪面赤汗多恶风心神颠倒言语蹇舌强口乾怱悸恍惚此中小肠兼中心也用麻黄散之类如右关脉浮缓或浮大面唇黄汗多恶风口喎语澁身重怠惰嗜卧肌肤不仁皮肉瞶动腹胀不食此中胃兼中脾也用防风散之类如右寸脉浮濇而短必鼻流清涕多喘胸中冒闷短气自汗声嘶四肢痿弱此中大肠兼中肺也用五味子汤之类如左尺脉浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俛仰两耳虚鸣骨节疼痛足痿善恐此中膀胱兼中肾也用独活散之类此皆言真中风之症治也其间亦有气血之分焉气虚而中者右手足不仁用六君子汤加钩藤姜汁竹沥血虚而中者左手足不仁用四物汤加钩藤竹沥姜汁气血俱虚而中者左右手足皆不仁用八珍汤加钩藤姜汁竹沥其与中风相类者不可不别如中於寒谓冬月卒中寒气昏冒口禁肢挛恶寒脉浮紧用麻黄桂枝理中汤之类中於暑谓夏月卒冒炎暑昏冒痿厥吐泻喘满用十味香薷饮之类中於湿丹溪所谓因湿土生痰痰生热热生风也用清燥汤之类加竹沥姜汁因於火者河间谓五志过极火盛水衰热气怱鬱昏冒而卒仆也用六味丸四君子汤独参汤之类内有悲怒伤肝阴火上炎者用小柴胡汤之类中於气者由七情过极气厥昏冒或牙关紧急用苏合丸之类食厥者过於饮食胃气不能运行故昏冒也用六君子加木香劳伤者过於劳役耗损元气脾胃虚衰不任风寒故昏冒也用补中益气汤房劳者因肾虚耗气不归源故昏冒也用六味丸此皆类於中风者也夫中风者内经主於风此真中风也若河间主於火东垣主於气丹溪主於湿皆是因火因气因湿而为暴病暴死之症类中风而非真中风也治者审之卒中昏愆口眼喎斜痰气上涌咽喉有声六脉沉伏此真气虚而风邪所乘以三生饮一两加人参一两煎服即苏若遗尿手撒口开鼾睡为不治用前药亦有得生者三生饮乃行经络治寒痰之药有斩关夺旗之功每服必用人参两许以祛其邪而补助真气否则不惟无益适足以取败矣观先哲用芪附参附等汤其义可见○大尹刘孟春素有痰两臂顽麻两目流泪服祛风化痰药痰愈甚臂反痛不能伸手指俱挛余曰麻属气虚误服前药肝火炽盛肝血乾涸筋无所养虚而挛耳当补脾肺滋肾水则风自息热自退痰自清遂用六味地黄丸补中益气汤不三月而痊○一儒者素勤苦恶风寒鼻流清涕寒噤属脾肺气虚反服祛风之药肢体麻倦痰涎自出殊类风症余以为风剂耗散元气阴火乘其土位以补中益气汤加麦门五味子治之而愈○举人干尚之素肾虚积劳足痿不能步履後舌瘡不能言面色黧黑余谓肾气虚寒不能运及所发用地黄饮子治之而愈後不慎调摄而复作或用牛黄清心丸之类发热痰甚诚似中风用祛风化痰之类小便秘澁口舌乾燥仍用前饮及加減八味丸渐愈又用补中益气汤而痊○一膏粱之人素不慎起居忽失音不能语神思昏愆痰涎上壅余谓河间云夫瘡属肾经虚寒其气厥不至医学纲目云少阴气至则嚙舌少阳气至则嚙颊今失音肾气不能上接

清阳之气也不信仍用风药後嚙舌始信余言先用地黄饮子及六味地黄丸而愈○仪部袁补之患前症不信余言数服祛痰之剂後嚙舌而歿○一男子体肥善饮舌本强语澁痰壅口眼喎斜肢体不遂余谓脾虚湿热痰涎所致用六君子煨乾葛山梔神麴而愈○外舅年六十余素善饮两臂作痛余曰此脾虚有湿也不信恪服祛风治痰之药更加麻木发热体软痰壅腿膝拘痛口禁语澁头目晕重口角寛纵痰涎流出两月後遍身如虫行搔起白屑始信余曰臂麻体软脾无用也痰涎涌出脾不能摄也口斜语澁脾气伤也头目晕重脾气不升也痒起白屑脾气不能营也遂用补中益气汤加神麴半夏茯苓三十余剂诸症悉愈又用参术膏而痊○一男子元气素弱或头目眩暈或肢体倦热仲夏因劳役饮食不时两手麻木肢体倦怠余以为暑热伤元气用人参益气汤而愈○一男子卒中口眼喎斜言语不出恶见风寒四肢拘急脉浮而紧此属脾胃受症故舌本强而不能言用秦艽升麻汤治之稍愈乃以补中益气汤加山梔治之而痊○一妇人怀抱鬱结筋挛骨痛喉间似有一核服乌药顺气等药口眼歪斜臂难伸举痰涎愈多内热晡热食少体倦余以鬱火伤脾血燥生风用加味归脾汤加丹皮山梔二十余剂形气渐健饮食渐加又用加味逍遥散十余剂痰热少退喉核少消更用升阳益胃汤数剂诸症渐愈但臂不能伸此肝经血少而筋挛耳用地黄丸而愈○一产妇两手麻木服愈风丹天麻丸遍身皆麻神思倦怠晡热作渴自汗盗汗余谓气血俱虚用十全大补汤数剂诸症悉退又数剂而全愈但内热用加味逍遥散而痊○一产妇筋挛臂软肌肉抽掣皆属气血虚用十全大补汤而痊

问两腿自膝以下或时内热或骨中觉热或有一点酸痛热者何

答此血热也但是风病其血必热惟其血热故风寒之气一袭之则外寒束内热而为痛丹溪论痛风谓血热得寒污浊凝滯所以作痛遇夜痛甚行於阴也遇风雨阴寒痛甚寒湿胜也又风病必血燥风木生火故血热生燥

愚按前论最为切当临川陈先生云医风先医血血行风自减盖肝藏血而至风又肝气为阳为火肝血为阴为水若肝火旺则肝血必虚故凡风病多因肝经风火为患当推五脏相生以益其血经云肾藏精而主骨故肾虚者则骨中热或涌泉穴或两胫两足内热多患骨痿以致不起属足三阴亏损之虚热耳滋其化源庶可保其生也○金宪高如斋两腿逸则筋缓痿软而无力劳则作痛如针刺脉洪数而有力余曰此肾肝阴虚火之象也用六味地黄丸而愈○知州韩廷仪先患风症用疏风化痰养血之药而痊其腿膝骨肉发热作痛服十味固本丸天麻丸益甚两尺脉数而无力余以为肾水虚不能生肝木虚火内动而作非风邪所致也不信又服羌活愈风丹之类四肢痿软遍身麻木痰涎上涌神思不清余曰皆脾气亏损不能营养周身又不能摄涎归源先用六君子加芎归木香数剂壮其脾气以摄涎归源又以八珍汤数剂以助五藏生化之气以荣养周身而诸症渐愈乃朝以补中益气汤培养脾肺夕以六味地黄丸滋补肝肾如此三月余而安○一妇人因怒患痰厥而苏左手臂不能伸手指麻木口喎眼斜痰气上攻两腿骨热或骨中酸痛服乌药顺气散之类诸症益甚不时昏愦更加内热晡热余以为肝经血虚内热生风前药复耗肝血虚火炽盛而益甚也先以柴胡梔子散调养肝经气血数日後用八珍汤加钩藤鈎散诸症稍愈又用加减八味丸料少加酒炒黄柏知母黑色者数剂诸症顿退乃服八珍汤柴胡梔子散半载而痊後劳役即有复作之意柴胡梔

子散随安

问有医教以四物汤二陈汤间服後惑於南星半夏不可轻服之言二陈通不入口专用四物而痰药亦少用枳术丸可专服否

答此少差耳用血药而无行痰开经络达肌表之药以佐之血药属阴性颇凝滞焉能流通经络驱逐病邪以成功也故古人以乌头为半身不遂行经络者此也盖风疾原於血虚血热挟火与痰经络肌表之间病根在矣後因感冒凉风寒气或因过饮助痰火或因恼怒逆肝气遂成半身不遂之症世谓之风病其病成於肌表皮毛筋骨经络之间未入五脏六腑故治之亦兼在外而不专於内若只用四物汤是专补内也此病之痰亦在经络若只用枳术丸是亦专治内也须补养其内以固其本治其外以去邪斯为可耳

愚按前症若因肾虚阴火而肝燥者宜用六味地黄丸生肾水滋肝血若因怒动肝火而血耗者用四物加柴梔丹皮茯苓以清肝火生肝血若因脾经鬱结而血耗者用归脾四物二汤以补脾气生肝血若脾气虚而痰滞者用二陈加白术柴胡健脾气以化痰若因脾虚湿而风痰不利者用二陈加南星苍术防风脾气鬱而滞者用归脾汤加柴胡半夏肾经败液而为痰者用六味丸○顾宪幕年六十不慎饮食起居左半身手足不遂汗出痰壅或用参芪之类汗止神清左腿自膝至足指仍旧肿坠痰多作痛肝肾脾脉洪大而数重按则软濡余以为足三阴虚朝用补中益气汤加黄柏知母数剂诸症悉退但自弛守禁不能全愈○靳阁老夫人先胸脇胀痛後四肢不收自汗如水小便自遗大便不实口紧目瞶饮食难进十余日或以为中脏公甚忧余曰非也若风既中脏真气既脱恶症既见祸在反掌焉能延之乃候其色面目俱赤而或青诊其脉左三部洪数惟肝尤甚余曰胸乳胀痛肝经血虚肝气否塞也四肢不收肝经血虚不能养筋也自汗不止肝经风热津液妄泄也小便自遗肝经热甚阴挺失职也大便不实肝木炽盛尅脾土也遂用犀角散四剂诸症顿愈又用加味逍遥散调理而安後因鬱怒前症复作兼发热呕吐饮食少思月经不止此木盛尅土而脾不能摄血也用加味归脾汤为主佐以逍遥散调补肝脾之血而愈後每遇怒或睡中手足搐搦复用前药即愈○大参朱云溪母於九月内忽仆地痰昧不省唇口喎斜左目紧小或用治痰调血之剂其势稍缓至次年四月初其病复作仍进前药势亦渐缓至六月终病乃大作小便自遗或谓风中於脏以为不治余诊之左关弦洪而数此属肝火血燥也遂用六味丸加五味麦门芎归一剂而饮食顿进小便自调随用补中益气加茯苓山梔钩藤丹皮而安至十月复以伤食腹痛作泻左目仍小两关尺脉弦洪鼓指余以六君加木香吴茱升麻柴胡一剂而痛泄俱缓复以六君加肉果补脂一剂诸脉顿平痛泄俱止余谓左关弦洪由肝火血燥故左目紧小右关弦洪由肝邪乘脾故唇口歪斜腹痛作泻二尺鼓指由元气下陷设以目紧口喎误作中风投以风药以腹痛泄泻误作积滞投以峻剂复耗元气为害甚矣後卧火箱热蒸太过致痰喘误服寒凉之剂益甚後请诊辞不治果歿○一妇人因怒仆地语言蹇澁口眼喎斜四肢拘急汗出遗尿六脉洪大肝脉尤甚皆由肝火炽盛肝主小便因热甚而自遗也用加味逍遥散加钩藤及六味丸寻愈○一老妇两臂不遂语言蹇澁服祛风之药反致筋挛骨痛余谓此肝火血虚所致用八珍汤补气血用地黄丸补肾水佐以排风汤年余而愈○一妇人经行口眼歪斜痰涎上涌此血虚而肝火动用加味逍遥散加牡丹皮治之寻愈後因饮食停滞日吐痰涎此脾气虚而不归经也

用六君子二十余剂而安○一妇人因怒口眼歪斜痰涎上涌口禁发搐此脾肺气虚而肝木旺用六君子加木香钩藤钩柴胡治之渐愈又用加味归脾汤调理而安○一产妇勤於女工忽仆地牙关紧急痰喘气粗四肢不遂此气血虚而发瘕朝用补中益气汤加茯苓半夏夕用八珍汤加半夏各三十余剂不应此虚之未复药力之未及也仍用前二汤各五十余剂寻愈○一妇人素有内热月经不调经行後四肢不能伸舒卧床半载或用风湿痰火之剂不效其脉浮缓按之则濡名曰瘕症属风寒所乘用加味逍遥散加肉桂防风四剂顿愈更以八珍汤调理两月余而瘕○一妇人素经水过期因劳怒四肢不能屈曲名曰瘕症此血虚而风热所乘先用八珍汤加钩藤柴胡渐愈更佐以加味逍遥散调理而瘕○一妇人四肢挛屈烦痛自汗小便短少畏见风寒脉浮弦缓此气血虚而风寒湿热相抟先用东垣清燥汤渐愈再用加味逍遥散及八珍汤加牡丹皮而瘕○一妇人素有痰火忽然昏愤瘕抽搐善伸数欠四肢筋挛痰涎上升此肺金燥甚血液衰少而然也用清燥汤六味丸兼服寻愈○一妇人肢节作痛不能转侧恶见风寒自汗盗汗小便短少虽夏亦不去衣其脉浮紧此风寒客於太阳经用甘草附子汤一剂而瘕○一妇人因怒发搐呕吐痰涎口禁昏愤气口脉大於人迎此气滞而食厥用平胃散加茯苓半夏木香治之而苏更以六君子加木香渐愈乃去木香又二十余剂而瘕

问或谓二陈汤南星半夏一切燥药止能治痰饮湿痰其於阴虚火动之痰殊无相干且与补阴药相反答阴虚火动之痰不宜用南星半夏若中风偏枯麻木症之痰当用南星半夏也盖其感病在肌表经络筋骨之间耳

愚按丹溪先生云痰病之原有因热而生痰者亦有因痰而生热者有因风寒暑湿而得者有因惊而得者有因气而得者有因食积而得者有脾虚不能运化而生者若热病则多烦热风痰多成瘫痪奇症冷痰多成骨痹湿痰多怠惰软弱惊痰多成心痛癫疾饮痰多脇痛臂痛食积痰多成癖块痞满其为病种种难名窃谓前症若因肾水虚弱阴亏难降使邪水上溢故多痰唾宜滋其化源其痰自消若因肝木侮脾土而风痰壅滞者先用南星半夏清其痰後用六君子之类调胃气痰自不生若槩用风药耗其阳气而絶阴血之源适足以成其风益其病也○冢宰刘紫岩因劳下体软痛发热痰盛用清燥汤入竹沥姜汁服之热痛减半再剂而全愈○庠生陈时用素勤苦复因劳怒口斜痰甚脉滑数而软余谓劳伤中气怒伤肝火用补中益气汤加山栀茯苓半夏神麴桔梗数剂而愈○锦衣杨永兴筋骨软痛气粗痰盛作渴喜水或用愈风汤天麻丸更加痰甚体麻余以为脾肾俱虚用补中益气汤加減八味丸三月余而瘕陶天爵妾媵素多时患头晕痰甚劳则肢体痿软筋骨作痛殊类风症余以为肾虚不能纳气归源用加減八味丸而瘕後因房劳气恼头晕项强耳下作痛此肝火之症仍用前药滋肾水生肝血制风火而愈

问倒仓吐痰不尽病根痰又甚作胸膈之上咽喉之下居多夜间更为所苦吐甚难出後服萝卜欲吐之因空腹遂入大肠作痢

答病在肠胃者宜用之肠胃如仓格致余论说明倒仓二字宜玩仓中有陈腐败谷须倒之肠胃中有痰血积滞须涤荡之牛肉属坤土本补脾胃之物非吐下药也特饮之过多满而致吐

下耳此借补以为泻故病去之後胃得补而气发生乃巧法也若病不属肠胃者岂可轻用古人治风初病时痰涎壅塞胸膈阻碍经络药无所施故先吐去其痰方可施法今既倒仓之後岂可复行吐下哉吐下之後再行吐而行下是虚虚也痰久积在胸膈肠胃者固宜吐下之但痰日逐生岂倒仓可尽其根但恐倒仓之後胃虚而痰易生故丹溪先生云宜补中气以运痰也又皮肤经络隧道之间俱为邪所客而阻滞少通则津液行於其间者亦聚而为痰於是日逐饮食入胃所生之津液不得流散而化为痰饮聚於胸膈上升於咽喉宜其多也此亦因外而伤内

愚按前症若因脾气亏损痰客中焦闭塞清道以致四肢百骸发为诸病者理宜壮脾气为主兼佐以治痰则中气健而痰涎自化若倒仓之後而痰反甚此脾气愈虚则津液反为痰者理宜补中益气非参朮二陈之类不能治最忌行气化痰及倒仓之法○州判蒋大用年五十形体魁梧中满吐痰劳则头晕所服皆清痰理气余曰中满者脾气亏损也痰盛者脾气不能运也头晕者脾气不能升也指麻者脾气虚而不能周也遂以补中益气加茯苓半夏以补脾土八味丸以补脾母而愈乾坤生意方云凡人手指麻软三年後有中风之疾可服搜风顺气丸天麻丸秦艽汤之类以预防之彼惑此而恪服之以致大便不禁饮食不进而殁窃谓预防之理当养气血节饮食戒七情远帷幙若服前药以为预防适所以反招风而取中也○秀才刘允功形体魁梧素不慎酒色因劳怒气头晕仆地痰涎上涌手足麻痹时或面赤口乾引饮六脉洪而无力甚数余曰肺主气肾藏气今肾虚不能纳气归源阳独居上故作头晕又不能掇水归源饮停於中故化而为痰阳气虚热而麻痹虚火上炎而作渴当滋化源用补中益气合六味地黄丸料一服而愈後劳役或入房即作用前药随愈

问自倒仓後常觉口中痰甚而有热颇易饥有痰常少用石膏泻之稍可

答倒仓後胃虚不可用石膏脾胃阴血虚则阳火旺火能消食故易饥暂用石膏泻胃火故见效然非正法只以白朮补脾而用白芍药生血甘草缓中泻火陈皮茯苓行痰则王道之治也

愚按倒仓之後而火反旺者乃脾胃虚寒之假象也设认为实热则误矣东垣先生脾胃论言之最详若人气高而喘身热而烦或扬手掷足口中痰甚者属中气虚弱而变症也宜用补中益气汤若人形怯气弱畏恶风寒或肢体蜷挛而痰上涌者属脾气虚弱而不能掇涎也宜用六君子汤若兼口角涎流者属脾气虚寒而不能主涎也用张氏温脾散如不应急用六君子加附子若因命门火衰不能生脾土者急用八味丸若人素肾虚发热或肾虚有痰者兼以六味丸料若人素阳虚恶寒或肾虚有痰者兼以八味丸料○一儒者脾肾素虚而有痰或用导痰之法痰甚作渴头晕烦热余谓中气虚弱而变症用补中益气汤而愈後劳役发热头晕此气虚不能上升也用前汤加蔓荆子而愈後又劳神畏见风寒四肢逆冷口沃痰涎余以为脾气虚寒之真病以六君子加炮姜肉桂而愈○一男子素肾虚而咳痰亦用导痰之法虚症悉具痰涎上涌小便频数余谓足三阴虚而复损也朝用补养脾气汤培养脾肺之气夕用六味丸加五味子收敛耗散之精而愈

问自倒仓後行动颇觉眩晕作痰每晕必於劳役後方作又平日大便常不结实近亦结燥

答倒仓非正对病症故诸风病未见退而痰多便结头眩眼花皆吐下後元气虚故也倒仓大肠亡阳故结燥黄连苦寒性燥苦能燥湿寒能去热黄连能实大肠平日大便常不实者乃肠胃中有湿热因服黄连亦见结实

愚按倒仓之後胃气受伤元气亏损不能化生阴精而虚火内作以致前症也当甘补之经曰土位之主其泻以苦其补以甘是也盖头晕眼花胃气不能上升也大便不实脾虚不能约制也大便结燥者血虚不能濡润也经云肾主大便又云肾主五液若肾气调和津液滋润则大便自然通调矣凡此皆宜实脾土补肺金诸病自愈若因大肠火燥而大便秘结者宜用六味地黄丸若因脾胃虚弱而大便不实用六君炮姜若因脾肾虚弱而大便不实者须用四神丸补中益气汤○大尹陈克明导痰後痰益多大便不实喜极热饮食手足逆冷余谓命门火衰而脾肺虚寒不能摄涎归源用八味丸而寻愈○进士张禹功饮食停滞胸满唾痰或用药导之痰涎上涌眩晕热渴大便秘结喜冷饮食手足发热余谓肾水虚弱津液难降败液为痰用六味丸而愈

问近有欲为温针者乃楚人法其法针於穴以香白芷作圆饼套针上以艾针温之多取效

答古者针则不灸灸则不针未有针而加灸者此後人俗法也此法行於山野贫贱之人经络受风寒致病者或有效只是温经通气而已於血於痰无预也古针法妙甚但今无传恐不得精高之人误用之则危拙出顷刻惟灸得穴有益无害日後宜行之

愚按针灸之法各有所宜亦各有所禁经曰形气不足病气不足此阴阳俱不足也不可刺之刺之则重不足重不足则阴阳俱竭血气皆尽五脏空虚筋骨髓枯老者絶灭壮者不复矣东垣曰脉浮数而发热咽乾面赤时渴者皆热在外也不可灸灸之灾害立生由此观之所禁所宜不可不慎温针之法尤为乖谬若用之於寒气之肿八风之邪其庶几乎

问酒饮数盃则手足和软如无病者医劝煮酒药服之何如

答酒温行气活血故饮少觉好但湿热之味生痰助火实能增病又此等病多有因酒後毛窍开气血热因为寒风凉气所袭而成惟五加皮一味浸酒日逐服数盃於此病有益诸药浸酒惟五加皮与酒相合且味美煮酒时入五加皮於内泥之满月後可服

愚按前方祛风活血之药如不应当求其本而治之

此病治法活血行痰开经络通腠理内固根本外散病邪但今倒仓之後中气未复宜补中气理痰为重为先人参亦可用也近日之药重在理脾理痰故今服四物汤虽多而不应盖血药阴寒凝滞且下行故损胃气胃气者上升之清气也又春宜升而久服降药逆天时矣故云中气虚而痰易生也

愚按经云邪之所凑其气必虚留而不去其病为实若人脾胃充实营气健旺经隧流行而邪

自无所容今倒仓之後脾气愈虚法当补中益气则中气清和而痰自化若因脾土虚寒或命门火衰者须用八味丸若因肾气亏损水泛为痰或头晕口乾者用六味丸○一妇人元气素虚劳则体麻发热痰气上攻或用乌药顺风散祛风化痰丸之类肢体痿软痰涎自出面色痿黄形体倦怠而脾肺二脉虚甚此虚而类风也朝用补中益气汤夕用十全大补汤渐愈又用加味归脾汤调理寻愈○一妇人素性急患肝风之症常服搜风顺气丸秦艽汤之类後大怒吐血唇口牵紧小便频数或时自乏余以为肝火旺而血妄行遂用小柴胡汤加山梔牡丹皮渐愈後大怒吐血误服降火祛风化痰之剂大便频数胸满少食用清气化痰之剂呕而不食头晕口乾不时吐痰用导痰降火之类痰出如涌四肢常冷余曰呕而不食头晕口乾胃气不能升也痰出如涌脾气不能摄涎也四肢逆冷脾气不能运行也用补中益气汤加茯苓半夏治之诸症渐愈又用加味归脾汤兼服而安○鸿臚王继之室素有癰症遇劳役及怒气则发良久自省一日因饮食後劳役失宜发而半日方省不能言语或以为风中於脏用祛风化痰顺气之剂及牛黄清心丸病益甚六脉浮大两寸虚而不及本部且进饮食余曰此脾胃之气伤也若风中於脏祸在反掌彼不信仍用风药後果卒

常避凉风寒露雾湿气身热四肢汗出或脱衣去靴袜之时莫当风取凉最易感也恼怒尤忌之酒後忌当风见凉脱巾袜後使用手多磨擦令毛窍闭此等病寒月固怕寒风暑月外热毛窍开尤易感也

日後若灸火只灸手足上穴治风症者手上如肩窝曲池合谷等是也口歪斜可灸夹车承浆口面上艾炷须小手足上则可粗也灸火须自上灸下不可先灸下後灸上

愚治一妇人口眼歪斜四肢拘急痰涎不利而恶风寒其脉浮紧此风寒客於手足阳明二经先用省风汤二剂後用秦艽升麻汤而愈○一妇人体肥胖头目眩晕肢体麻木腿足痿软自汗声重其脉滑数按之沉缓此湿热乘虚脾气下流於肾肝之部也用清燥汤羌活汤渐愈更佐以加味逍遥散全愈

面上木处可将桂枝为末用牛皮胶和少水化开调敷之厚一二分

愚按前症若属肺气虚弱者补脾土如不应则补其土母

脚?硬木处可将牛皮胶熔化入生姜真汁调和仍入南星末五钱和匀用厚纸摊贴二三分乘半热裹贴脚?上用温火烘之此外治法也胶和姜汁方出内经用治脾病谓风寒湿三气合而成病客於皮肤肌肉之间不知痛痒但不仁如木耳後人治腰硬作痛及手足痺木而兼痛者加入乳香没药或加羌活南星末用之多效煎调要得法则如膏药在手足腰者用热鞋底熨之愚按经云风寒湿三气杂至合而为痺风气胜者为行痺寒气胜者为痛痺湿气胜者为着痺丹溪先生云大率因血虚受热其血已自沸腾或加之以涉水寒湿热血得寒污浊凝滯不得运行所以作痛治以辛温佐以辛凉流散寒湿开通鬱结血行气顺无有不安若因足三阴亏损当补元气为主

敷贴是治皮肤肌肉针灸是治血脉经络滋血是兼治筋骨筋骨无血则不任矣

瘫痪痿软之病此是无血及兼痰火湿热耳古人云不可作风治而用风药谓小续命汤西州续命汤排风汤等药如羌活防风麻黄桂枝乌头细辛等剂皆发散风邪开通腠理之药若误用之阴血愈燥也

愚按前症江南之人所致者多属阴虚气虚湿热相火其瘫痪痿软多属手足阳明等经阴虚湿热治者审之

拟治诸方

治半身不遂手足欠利语言费力呵欠喷 面木口眼歪斜宽弛头目眩晕痰火炽盛筋骨时痛或头痛心悸川芎【一钱二分】当归 熟地黄 生地黄【姜汁水炒】牛膝【酒洗】橘红【盐水洗】黄芩【酒炒】酸枣仁【炒各八分】红花【酒洗】甘草【炙各四分】羌活防风 柳桂【各六分】南星【制】半夏【制】白芍药【酒炒】白茯苓天麻【各一钱】白术【一钱五分】黄柏【酒炒三分】

右水煎入淡竹沥姜汁二三茶匙侵晨服

四物汤加红花牛膝共六钱二分补血凉血活血二陈汤加南星白术黄芩治湿痰风痰火痰再加竹沥姜汁以行肌表经络之痰共五钱九分羌活防风天麻柳桂皆行经络肌表辛温开发之剂引送血药流散邪滞柳桂横行手臂牛膝黄柏行腰腿

白术为君佐以茯苓甘草白芍药橘红半夏又以固脾胃之气血以运行诸药输送各经

酸枣仁佐川芎当归羌活入肝治筋骨酸疼湿痹又佐地黄当归入心治心虚振悸

四物汤得羌活防风柳桂南星半夏为佐使则经络肌表筋骨之血皆补其虚而活其滞矣

南星半夏二味虽燥共止二钱羌活防风柳桂虽辛温三味止一钱四分通共三钱四分温燥之药加於血药六钱二分之一内况又有黄芩黄柏甘草苦寒甘寒药共一钱五分多寡悬绝焉得燥吾之血耶此正君臣佐使分两多少之法痰之为物遍身上下无处不到故古人用二陈汤通治之随其所在而用药引导之今用天麻南星竹沥姜汁导之入手足经加以白术黄芩降其膈上之火痰

冬寒月减黄芩二三分或加炮川乌二分若用川乌减桂只用一二分风病减去可去川乌桂减南星羌活若素有火黄芩不必减

羌活风家要药若寒凉月重有感冒可加至一钱有汗而恶风此真感风症也可加桂枝六七

分病減則減去之川烏桂枝羌活防风南星等药皆行经络开发腠理之剂故治风家必用之风能燥故必用滋血润燥药邪既客於经络肌表之中则津液不得流通凝滯而为痰饮故必用治痰风也血也痰也三者相因但各有轻重先後之不同或先因中风则治风为重或先因血虚血热则治血为重或先因痰则治痰为重

愚按五脏之病相乘伏匿隐显莫测参以徐用诚先生五脏治要尤善详见一卷或问仲景处方药品条内

张仲景小续命汤是论风也刘张丹溪诸说是论血与痰火也要在随症推移消息之耳

愚按前症多因饮食失节起居失宜亏损元气腠理不致外邪所侵或劳伤元气怒动肝火皆属内因所致也前药亦当审而用之○太宜人年七十五遍身作痛筋骨尤甚不能伸屈口乾目赤头眩痰涌胸膈不利小便赤澀而短少夜间痰热殊甚遍身作痒如虫行此肝经气燥而风动也用六味地黄丸料加山梔柴胡治之而愈○一男子时疮愈後遍身作痛服愈风丹半身不遂痰涎上涌夜间痛甚余作风客淫气治以地黄丸而愈○一老妇两臂不遂语言蹇澀服祛风之药筋挛骨痛此因风药亏损肝血用八珍汤补气血用地黄丸补肾水乃佐以愈风丹而愈○一妇人因怒吐痰胸满作痛服二陈四物芩连枳殼之类不应更加祛风之剂半身不遂筋挛痿软日晡益甚内热口乾形气殊倦此足三阴亏损之症也余用逍遥散补中益气六味地黄调治喜其谨疾年余诸症悉愈形体康健

倒仓後脾虚痰盛宜先理中治痰且将风药血药减去俟中气复然後通用

白芍药 白术【各一钱半】 陈皮【八分】 白茯苓 半夏【姜制】 瓜蒌仁 人参【各一钱】 黄芩【酒炒】 枳实【麸炒】 甘草【炙各五分】 桔梗 香附米【盐水炒】 麦门冬 麦芽【炒各七分】 黄连【姜炒四分】

右水煎入竹沥三匙姜汁三匙服

若寒月觉胃中冷易泄加炒乾姜一二分

愚按前云倒仓後脾虚痰盛矣然而方内芩连瓜蒌枳实之类苦寒泄气尅滯之剂虽兼六君子之调补恐所益不偿所损虽加乾姜一二分亦恐未能济其寒也盖痰之为病有因热而生痰者亦有因痰而生热者有因饮食积滯而得者有因肾水亏损津液败浊而似痰者有因肾水不足阴火上炎而生痰者有因脾肺气虚不能摄涎而似痰者不能枚举当各推所因而治之然倒仓之後而痰反盛必因中气复伤所致故治痰用峻厉之剂而痰愈甚者乃脾气愈伤津液不能运化而然耳前症当补脾胃调中气则津液各归其所而为元气矣

倒仓後大便燥结头晕眼花未除加当归身尾桃仁去皮尖各一钱川芎五分山药一钱

愚按前方若因酒麪炙煨致痰胶固脾气无亏者宜用之若因肾气亏损津液不足者宜用六味丸因脾气虚弱者宜用六君子汤因中气虚者宜用补中益气汤因肾气亏损水泛上而为痰者宜用六味丸因脾肾虚寒小水不调肚腹膨胀者宜用金匱肾气丸○儒者王录之素痰甚导吐之後大便燥结头晕眼花等症尺脉浮大按之则濡此肾气虚而兼血虚也四物送六味丸四剂诸症悉退仍用前丸月余而康○金宪高如斋素唾痰服下痰药痰去甚多大便秘结小便频数头晕眼花尺脉浮大按之如无余谓肾家不能纳气归源前药复耗金水而甚用加减八味丸料煎服而愈○儒者杨文魁素唾痰诸药不应服牛黄清心丸吐痰甚多或头晕或热从脇起左脉洪大有力右脉浮大而无力量余曰此足三阴亏损虚火不能归源用补中益气加麦门五味及加减八味丸补其化源而愈○秋官张碧崖面赤作渴痰盛头晕此肾虚水泛为痰用地黄丸而愈○仪制贺朝卿吞酸胸满痰盛作泻饮食少思用清气化痰等药前症益甚两膝渐肿寒热往来余谓脾胃虚湿热下注用补中益气倍参术加茯苓半夏炮姜而愈○余甥范允迪咳嗽痰盛胸腹不利饮食少思肢体倦怠脉浮大按之微弱服二陈枳殼等药愈盛余曰脾肺肾虚也用补中益气六味丸而愈○一妇人吐痰发热遍身作痛小便频数阴中作痒日晡热甚余曰此肝脾血虚气滞而兼湿热也用加味逍遥散加车前子而愈○一妇人怀抱不舒腹胀少寐饮食素少痰涎上涌月经频来余曰脾统血而主涎此鬱闷伤脾不能摄血制涎归源用补中益气济生归脾二汤而愈

专治痰加味二陈汤胃气复後间服理痰

橘红【八分】半夏【姜汁炒】白茯苓 白术【各一钱二分】甘草【炙】连翘 黄芩【炒】前胡【各五分】香附米【盐水炒七分】瓜蒌仁【杵】桔梗【各一钱】大麦芽【炒一钱】

右水煎入生姜汁三匙竹沥两蚬殼半饥温服盖治痰药亦以脾胃为主

愚按前方若因脾土太过营气壅滞宜用之若因脾土不足营气虚痞者宜补中气为主若因肝木乘脾土者宜补脾土为主若脾土虚寒者宜补命门火为主○侍御谭希曾喘咳吐痰或手足时冷此中气虚寒用补中益气炮姜而愈○职坊卢抑齐饮食素少忽痰壅气喘头摇目劄扬手掷足难以候脉视其面色黄中见青此肝木乘脾土如小儿慢惊之症先用六君柴胡升麻而安更以补中益气加半夏而痊○考功杨朴庵呕吐痰涎胸腹膨胀饮食少思左关脉弦长按之无力右关脉弦长按之微弱此木剋土用六君子加柴胡山梔木香而愈○一儒者体肥仲夏患痰喘用二陈芩连桔梗痰喘益甚加桑皮杏仁瓜蒌盗汗气促加贝母枳殼不时发热饮食渐减脉大而无力量余以为脾肺虚寒用八味地黄丸以补土母用补中益气汤以接中气而愈○一妇人早间吐痰甚多夜间喘急不寐夫早间多痰乃脾虚饮食所化夜间喘急乃肺虚阴火上冲用补中益气加麦门五味而愈

加味化痰丸 治痰满胸膈咽喉不利

半夏【汤炮七次姜汁水拌渗透】橘红【盐水洗各三两】桔梗

海蛤粉【另研】瓜蒌仁【另研各一两】枳壳【麸炒】连翘
香附米【淡盐水炒】枯黄芩【炒各五钱】贝母【去心炒一两】诃子皮
枯矾【各二钱五分】

右为末炼蜜姜汁为丸如黍米大淡姜汤下四五十丸不可过服恐伤上焦元气

愚按前症若因鬱伤脾气脾血虚损用归脾汤加炒梔柴胡治之若因怒动肝火脾土受尅用六君子加炒梔柴胡平之若因饮食伤脾营气虚弱用六君子汤调之若因劳伤元气用补中益气汤主之东垣先生云胃为五脏之根本胃气益虚脾无所禀五脏皆虚诸症蜂起矣○二守陈子忠饮食少思吐痰口乾常服二陈枳实黄连之类脾胃受伤乃问於余余述东垣先生曰脾胃之症实则枳实黄连泻之虚则白术陈皮补之彼遂以二味等分为丸常服由是多食而不伤过时而饥○徽州汪商常服二陈枳实黄连青皮厚朴胸腹快利後患腹胀请治脉已脱余曰至暮必歿已而果然故内经千言万语只在人有胃气则生又曰四时皆以胃气为本凡脉促代屋漏之类或暴脱余急用参附等药多有复生者

薛氏医案卷二十三

卷二十四

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二十四

明 薛己 订

明医杂着

脐风

小儿初生百日内脐风方书率用南星僵蚕等风药多不效当作胎毒泻阳明火邪马牙亦是胎毒用针挑破桑树白汁涂之桑汁主小儿鹺口及口疮舌上疮神效初生小儿时时与看频傅桑汁不然舌硬紧渐至撮口难治

愚按曾世显云婴儿一七之内腹肚胀硬脐畔浮肿口撮不开攒眉而叫名脐风或因剪脐带少短或因束缚不紧牵动风入脐中或因铁器断脐冷气入内传於脾络致舌强唇青手足微搐不能吮乳啼声似鸦?痰潮响急搯破口泡去其毒水以艾灸脐中亦有复生者治法多端无如灸法或以天南星一钱生姜自然汁调灌为妙

变蒸

小儿不时变蒸变者异常也蒸者发热也所以变换五脏蒸养六腑须待变蒸多遍气血方荣骨脉始长愚按钱仲阳先生云小儿在母腹中乃生骨气五脏六腑成而未全自生之後即长骨脉五脏六腑之神智自内而长自下而上故生後三十二日一变蒸始即智意异前盖人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十数自生下骨一日十段而上之十日百段三十二日计三百二十段为一变亦日一蒸骨之余气一自脑分入龈中作三十二齿则齿数当与变日相合然而齿有不及三十二数者由变不足其常也有或二十八日即止长二十八齿以下仿此但不过三十二之数凡一周遍乃生虚热诸病如是十周则小蒸毕也计三百二十日生骨气乃全而未壮也故初三十二日一变生肾生志六十四日再变生膀胱其发耳与骭冷肾与膀胱俱生肾水水数一故先变主之九十六日三变生心喜一百二十八日四变生小肠其发汗出而微惊心为火火数二一百六十日五变生肝哭一百九十二日六变生胆其发目不开而赤肝主木木数三二百二十四日七变生肺声二百五十六日八变生大肠其发肤热而汗或不汗肺者金金数四二百八十八日九变生脾智三百二十日十变生胃其发不食腹痛而吐乳此後乃齿生能言知喜怒故云始全也太仓云气入四肢长碎骨於十变後

六十四日长其经脉手足受血故能持物能立能行也经云变且蒸谓蒸毕而足一岁之日也师曰不汗而热者发其汗大吐者微止不可余治全婴方云变蒸者长气血变者上气蒸者发热也轻则体热虚则体冷微汗唇生白泡三日可愈重者寒热脉微腹疼啼叫不能乳食食而即吐晄五日方愈其後与伤寒相似但以唇上白泡验之亦有受胎气壮实不热不惊或无证候而暗变者窃谓此症小儿所不能免不必服药古方以黑散子素丸子主之非惟脏腑不能胜受抑且反伤气血慎之慎之尝见一小儿至二变发热有痰或治以抱龙丸一粒卒至不救可以验矣然父母爱子之心胜稍有疾病急於求医而医者不?病情率尔投剂殊不知病因多端见症相类难以卒辨况古人稟厚方多峻厉之剂缓服可也

潮热

小儿潮热或壮热不退多是变蒸及五脏相胜不必用药又多是饮食停积郁热由中发外见於肌表只理其中清阳明之热而表热自除不可认作外感轻易发汗用小柴胡轻利等药重伤其内又潮热不退恐是出痘亦当审察勿使用药

愚按前症若因饮食停积或腹痛吐泻或肚腹膨胀宜用保和丸以消导健脾若饮食既消或腹痛不食或肚腹膨胀宜用四君子以保养胃气若因误行汗下损伤元气宜用参耆归术陈皮甘草以补中气大凡伤食脾胃必损宜固胃气庶无变症若寅卯辰时热者属肝经也巳午未时热者属心经也申酉戌时热者属肺经也亥子丑时热者属肾经也当详其虚实而治之凡属虚热实热投以攻补之剂其病既不增减乃是病根深固而药力未能及耳须宜多服功力既至诸病悉退切不可改为别治设或药不对症祸在反掌慎之○李阁老子患潮热饮食如故自申酉时甚至子丑时方止遍身似疥大便秘结小便赤澁热渴饮冷余以为脾胃实热传於肺与大肠先用清凉饮四剂结热始退又用四物汤加柴胡黄连数剂其疮渐愈彼欲速效另用槐角丸之类诸症益甚遂求於施院长亦用四物汤加柴胡黄连加桃仁赤芍药至百剂而愈【施院长名监字银台弟】

大小便白

小儿大小便时时审看小便如米泔或澄停少顷变作泔浊此脾胃湿热也若大便泔白色或如鱼练或带红或色黄黑此积滞湿热也宜理脾消滞清中宫去湿热节饮食若忽然变青此是变蒸也不必用药若久不愈用补脾制肝药一二服亦不宜多用

愚按小便如泔或大便泔白宜用肥儿丸若积滞黄黑宜用四君子加黄连木香若色青日久不复或兼泄泻或兼腹痛当用六君子加木香芍药若肌体色黄小便不利发黄脱落鼻下疮痍嗜土少食大便青褐色者须用栀子茯苓汤【详见治疳要药下】

小儿病多属肝脾二经

小儿病大率属脾土肝木二经肝只是有余有余之病似重急而为治却易见效亦速脾只是

不足不足之病似轻缓而为治却难见効亦迟二经为病惟脾居多用药最要分别若肝木自旺则为急惊目直视或动摇手足搐搦风痰上壅等症此为有余宜伐木泻肝降火清心若脾胃虚而肝木来侮亦见惊搐动摇诸症但其势微缓名曰慢惊宜补养脾胃不可错认将脾经慢作肝经治也

愚按急惊乃风火之症脾土受制肝经实热者用泻青丸径伐其肝或导赤散以泻其子肝经虚热者用六味地黄丸以滋肾水补中益气汤以养脾土则风木自息脾土自安矣若因乳食不调脾胃亏损木来侮土似慢惊而见抽搐摇头劄目咬牙等症宜用六君子加钩藤钩若脾胃亏损寒水反来侮土成慢惊而见前症用前药加姜桂如未应更加附子多有复苏者举人杜克宏子发热抽搐口噤痰涌此肝胆经实火之症即急惊风也先用泻青丸一服又用六味丸二服诸症顿退乃以小柴胡汤加芎归山栀钩藤钩而安却用补中益气汤而愈

急惊

急惊是有余之症属肝木心火阳邪太旺宜直泻之降火下痰是也五脏俱有阴阳如肝气为阳为火肝血为阴为水肝气旺则肝之血衰矣火妄动则水被煎沸不宁矣阳旺阴消风火相搏阴血走散势所必至也故亦宜养血急惊虽属肝心然木火旺则肺金受亏不能平木木来尅土斯损矣故亦宜养脾况治惊诸药大率祛风化痰泻火峻厉及脑麝辛散之味易於消阴血损脾胃者故治有余急惊之症先须降火下痰一二服後加养血安神之药若饮食少大便溏或吐泻则当兼补脾胃若脾胃原虚当於直泻药中加补脾药若屡作屡服利惊驱逐之药便宜认作脾虚血散治惊药内加养血补脾药不可用温热丁香等药恐助胃火宜参术芍药等以补脾中气血麦门冬黄连以清金制木

愚按前症若肝经风热抽搐目瞤筋急痰盛等症用四物汤以生肝血钩藤钩以清肝火更用四君子以补脾土若肝经血燥发热惊搐眼瞤痰盛筋挛用六味丸以滋肾水生肝血用四君子加芍药以补脾土生肺金若肺金尅肝木用六君子以实脾土芍药木香以平肺金若屡服利惊之剂而脾胃虚寒者须用六君子以补脾胃加丁香木香以培阳气若脾土虚寒肾水反来侮土而致中寒腹痛吐泻少食等症者用益黄散以补脾土而泻寒水庶几不致慢惊矣治当审察虚实凡症属有余者病气也不足者元气也故有余当认为不足思患预防斯少失矣

急惊变慢惊

急惊屡发屡治用直泻药既多则脾损阴消变为慢惊当主以补脾养血佐以安心清肺制肝之药

愚按前症多因吐利脾胃虚损肝木所乘或肾水反来侮土所致故似搐而不搐先用钩藤饮子如发搐少退乃用宝鉴天麻散若吐利不食急用木香异攻散实其脾土其病自已如未应用六君子加木香炮姜温补脾土更不应急加附子以回阳盖慢惊之症外虚热而内真寒也无风可逐无痰可驱但温补脾胃为主大凡发搐因风则目青面赤因惊则叫呼搐搦因食则

暖吐气闷肺脾虚则生粘痰喉间作锯声乃心火不能生脾土脾土不能生肺金以致肺不能主气脾不能摄涎故涎气泛上而喉中作声耳若用祛风治痰理气之剂则气散陰消而促其危矣○太平王职方子患疟疾恪用化痰之剂虚症悉至殊类惊风谓余曰何也余曰小便频数肝经陰虚也两目连劓肝经风热也作呕懒食胃气虚弱也泄泻後重脾气虚弱也用补中益气汤六味地黄丸而痊○举人余时正子伤食发丹毒服发表之剂手足抽搐服抱龙丸目瞤气喘痰盛余谓此脾胃亏损而变慢惊也无风可祛无痰可逐乃虚象也遂用六君子加附子一剂而安再剂而愈○一小儿病後遇惊即痰盛咬牙抽搐摇头作泻却服脑射朱砂等剂以致慢惊而卒

惊搐

小儿惊抽之症必有痰或因惊而痰聚或因痰而致惊古人治惊方中俱兼痰药必须先治其痰然後泻火清神若痰壅塞胸膈不去则泻火清神之药无所施其功也二陈汤加竹沥入少姜汁最稳痰重者滚痰丸白饼子利惊丸下之滚痰丸下热痰白饼子利惊丸下痰积在上者宜吐之重则用药吐轻则探吐之若不必吐下以二陈为主脾虚有热痰加白术芩连风痰调结加南星贝母枳实胃虚生痰加白术麦芽竹沥

愚按前症若因心肝二经风热炽盛两目连劓四肢抽搐宜治肝清心若因心经蕴热叫呼战栗宜清热安神若因肺感风邪气急喘促宜治痰理肺若因饮食停滞暖吐困睡宜消导健脾若因脾肺虚弱而风痰壅盛以致前症但宜补中益气为主若执用祛风治痰理气之剂则气散陰消而促其危矣○大尹刘应昌子患瘰癧略用化痰之剂虚症悉至殊类惊风又服祛风至宝丹小便频数肢体抽搐或两目连劓咬牙呵欠或作呕懒食大便重坠或泄泻此土伤而木胜也用补中益气汤六味地黄丸而痊○冬官朱小溪子项间结核面色痿黄肌体消瘦咬牙抽搐头摇目劓此肝木尅脾土也用六君子汤九味芦荟丸而愈○宪幕顾斐斋玄孙二周项结核两臂反张索败毒之药余意其症属风热伤肝血燥筋挛未敢付药翌早请治果系前症遂与六味丸一服清晨灌之午後肢体如常○儒者王文远子患瘰癧痰盛发搐服金石香燥之剂手足筋挛此肝血复伤而致急惊风也遂用加味小柴胡加钩藤山梔芎归一剂又以六味丸料加五味麦门煎服而安

小儿忽然惊搐目上视摇头咬牙症候怪异世俗多作肝经有余之症投以惊药岂知饮食停滞痰涎壅积亦多类惊者便须审察有无伤积腹痛胸满呕吐恶食轻则消滯化痰重则探吐滯积而後调之又有因感冒吐泻而发热气血虚为热所迫虽见惊症不可即服惊药但调治吐泻感冒则气自定热自退而惊自除矣愚按前症若因肝木侮脾土用六君子加芍药木香柴胡若因脾土虚而自病用五味异功散大凡饮食停滞痰积壅满而见惊症实因脾土虚弱不能运化所致但健脾胃则食自消痰自化若轻用惊药风药反所以成其风而重其病也况脆嫩脏腑安能受峻厉之剂耶若专治其病则误矣○姚仪部子每停食身发赤晕用清中解鬱汤而愈後患摇头咬牙痰盛发抽吐出酸味待其吐尽翌日少以七味白术散後日以参苓白术散调理脾胃遂不复患大抵吐後儿安不必更服药也○一小儿停食服通利之剂作呕腹胀此脾胃复伤也用补中益气汤而愈○一小儿两目动劓手足发搐数服天麻防风丸之

类以祛风化痰前症不愈其痰益甚得饮食诸症稍愈视其準头及左颊色青黄余曰脾主涎此肝木制脾土不能统摄其涎非痰盛也遂用六君子汤加升麻柴胡钩藤二剂饮食渐进诸症渐愈又用补中益气而安

小儿用药不宜峻厉

小儿惊药皆些小丸散多峻厉取其易於成功以之治肝心有余之症对病则可中病宜即止不可以为常也病势轻浅只用轻剂病退便宜和中调理如牛黄丸三四十味乱杂殊甚凉惊丸非气壮实肝火旺者不宜抱龙丸亦多不见效且麝脑香辛太甚走散真气又伤脾胃元气虚则病愈生矣

愚按小儿之症有余便属肝经不足便属脾经盖有余是病气也不足是元气也凡病气有余元气不足当补不当泻况脆嫩脏腑安能受峻厉之药前论厥有旨哉○一小儿数岁每停食辄服峻厉之剂後患肚腹膨胀或呕吐泄泻余先用六君子汤诸症渐愈又用补中益气汤胃气渐复

惊後目动咬牙

惊後目微动及咬牙固为肝虚亦虚中有热虚者血不足热者气有余水不足无以制火而火动故也但牙床属脾胃胃虚而有热亦见微咬不可专归肝肾当以补脾为主加黄连芍药川芎便是泻肝气补肝血也生地黄凉心血故导赤散宜用之熟地黄补肾血故地黄丸宜用之凡肝肾虚症见者於脾胃药加地黄可也或以目割咬牙为肝肾虚专服地黄丸岂不泥膈生痰适有以妨於脾胃也

愚按前症亦有肝热生风风入於目目系牵动则目连割热入於目筋脉拘紧则目直视若面赤仰卧摇头咬牙此则心热之所致也又当别其虚实肝实则泻青丸虚则地黄丸心实则导赤散虚则粉红丸若脾胃虚热补中益气汤加芍药山栀以实脾土制肝木若肝肾虚热用六味地黄丸以补肾水生肝木○奚氏女六岁忽然发惊目动咬牙或睡中惊搐痰涎壅盛或用化痰祛风等药益甚余曰面青而见前症乃属肝木剋制脾土不能摄涎而上涌也当滋肾水生肝血则风自息而痰自消矣遂用六味丸而愈一小儿患前症痰涎自流用惊风之药其症益甚脾胃益虚视其面色痿黄口吐痰涎用六君子补中益气汤而愈

小儿好睡

小儿时时好睡乃脾虚困倦也不必用温胆汤睡中惊动不安是心血虚而火动也盖心虚则惊动宜清心安神养血降痰又胸膈有痰亦作惊动又脾胃有食鬱滯不清亦惊动不安此又脾胃与痰所致非由心血也宜消食化痰食去痰除则补脾胃

愚按前症若因心脾气虚有痰宜用参术茯苓五味以补心气当归芍药枣仁以养心血橘红

半夏以开痰滞若脾肺气虚胸膈有痰用补中益气汤以补中气用胆星天竺黄以化痰涎若因饮食停滞而作用四君子汤以健脾胃用山楂神麴以消饮食若因脾虚而好睡用五味异功散以补脾气当归芍药以生脾血若因母饮酒致儿醉好睡者以甘草乾葛煎汤解之不应四君子汤○杨永兴子七岁停食吐泻後好睡睡中兼惊久治不愈余曰好睡是脾气虚困也善惊是心血虚怯也盖心为母脾为子也此心火不能生脾土用补中益气汤及六味丸加鹿茸治之而愈

出痘发搐

小儿若因出痘而生惊搐不必治惊若身热耳冷骭冷疑似未明古方服升麻葛根汤痘已出及出完调理气血只依丹溪痘疮法分气血虚实看红紫淡白稠密稀疏及参时令用药常以脾胃为主虚寒用陈文秀温补法实热用解毒法全在活法通变

愚按小儿痘疮未出则补托之已出及出完则调理之更当察色听声辨其多寡表里虚实而治之庶不有误世皆宗丹溪钱氏陈氏三家之论又必会而通之与时宜之不至胶柱而鼓瑟也窃谓黑陷耳骭冷咬牙吐泻者乃脾土虚败寒水反来侮土归肾之恶候也用百祥丸泻之急以四君子丁香陈皮木香厚朴炮姜以温补脾土身热饮水黑陷复起十救一二盖此症因脾土虚败寒水乘侮故陈文秀先生云若治寒水於既侮之後何不保脾土於未败之先此发前人之未发救後世之误妄况痘疮发出成脓收靨即痈疽起发腐溃生肌皆脾土元气使然若黑陷寒战咬牙泄泻喘即痈疽阳气脱陷寒气内淫之陰症急用异功散倍参芪归术姜附温补脾胃不可泥其日期而行解毒托里等法但见其虚弱便宜滋补脾胃以顾收靨观丹溪先生治一叟发热而昏倦其脉大而似数与参芪归术陈皮大料二十剂而痘出又二十剂而脓泡成身无全肤又六十剂而安其义可见

益黄散治病

益黄散治脾胃虚冷故用丁香暖胃二皮理胃消食化痰诃子澁肠胃止泄固气甘草和中仍加白术为当若非虚冷泄泻清白及无食积者去青皮丁香加白术茯苓可也温胆汤除痰止吐加白术芍药黄连便是制肝补脾之药

愚按益黄散乃温补脾胃之剂也若呕吐腹痛泄痢清白口鼻气冷者乃寒水反来侮土也宜用钱氏益黄散若因热药巴豆之类或因暑热伤乳食损其脾胃而成吐泻口鼻气热者乃胃中气虚风热也宜用东垣安胃散

伤风流涕

小儿八岁以下无伤寒虽有感冒伤风鼻塞流涕发热咳 以降痰为主略加微解凡散利败毒非幼稚所宜或冒轻者不必用药候二三日多有自愈

愚按前症若手足冷或腹胀脾虚也用六君子汤加升麻柴胡若腹胀或气喘肺虚也用四君子汤加柴胡升麻经云肺主气而司皮毛肺虚则腠理不密外邪易感凡发表之後其邪既去用补脾肺以实其表庶风邪不能再入往往表散之後热不退复行发表多变坏症○吴江史玄年子伤风用表散化痰之药痰盛咳 肚腹膨大而色?白此脾土虚不能生肺金也余用六君子汤加桔梗一剂顿愈至三日前症仍作鼻中流涕此复伤风寒所致用前药加桑皮杏仁桔梗而愈○史少参季子喘 胸腹膨胀泄泻不食此饮食伤脾土而不能生肺金也用六君子汤一剂诸症悉愈○史木川子六岁感冒咳 发散过度喘 不食用六君子汤加桔梗而愈时四月随其父巡视耕种忽发寒战仍复咳 或用发表之剂痰中有血余曰此成肺痈也次日吐痰兼脓用桔梗汤而愈後元气未复大便似痢或用五苓黄连枳实之类痰喘目割四肢抽搐余曰此脾气败而变慢脾风也辞不治果然

惊搐等症误用药饵

小儿或因惊搐或变蒸或食积或寒热往来误服解表泻痢之剂伤损脾胃气血难以发生面黄饥瘦目动咬牙发稀足弱不能行步此属胃虚非肝肾也当长缓调理复全胃气可也

愚按药饵偏胜之味脾胃非所宜也况小儿之疾多因乳食不调寒温失节亏损脾胃元气根本不固而邪得以致之亦有因乳母六淫七情饮食起居所致苟不明其本末辨其缓急而误用峻厉之药重伤脾胃生生之气变症百出从其夭亡谁之咎也丹溪先生慈幼论言之详矣

风癰及脚指常肿

小儿身常发风?及脚指常红肿此脾经风热也用防风通圣散去硝黄加鼠粘子酒炒黄连为末服之亦用防风白芷薄荷黄芩黄连黄芩黄柏煎汤避风而愈愚按前症若因脾气不足湿热下注宜用参芪归术以补脾气升麻柴胡以升阳气茯苓泽泻以导湿热若因食鬱内热宜用四君子汤以健脾胃山查神麴以消饮食山梔川芎以清肝热若因风邪收斂腠理或浴出见风而患者宜用补中益气汤以补元气加芎芷羌活以散风邪洁古先生云癰发於肤外而多痛 隐於肤内而多痒大抵安里之药为主发表之药为佐○一小儿瘙痒发热体倦少食此脾肺气虚外邪相搏先用消风散二剂随用补中益气汤加茯苓芍药而愈○一小儿患此作痛热渴服发表之剂其症益甚形气倦怠脉浮而数此邪在经络误散表而损其真也用人参安胃散补中益气汤而愈○一小儿作渴发热用犀角消毒散顿作吐泻此邪气上下俱出也其 果消勿药自愈○一小儿陰囊赤肿余作胎毒治之而瘥後患发热痰喘等症诊其母有鬱火血热用解鬱凉血之药子母俱服而愈又患吐泻小便赤澀两目瞶动视其寅卯关脉赤此属风热用柴胡清肝散加鈎藤鈎木贼草一剂即愈○一小儿腿如霞游走不定先以麻油涂患处砭出恶血其毒即散用九味解毒散一剂而安○一小儿患之外势虽轻内苦便秘此患在脏也服大连翘饮敷神功散而瘥

小儿无补肾法

小儿无补肾法盖禀父精而生此天一生水化生之源肾之根也此根日赖脾胃乳食水谷长养男至十六而肾始充满既满之後婚媾妄用亏损则可用药补之若受胎之时禀之不足则无可补禀之原足又何待於补耶

愚按小儿行迟齿迟解颅 填五软鹤膝肾疳齿豁睛白多愁凡此皆因禀受肾气不足当以六味地黄丸如鹿茸补之若因精气未满而御女以通多致头目眩晕作渴吐痰或发热足热腰腿酸软或自汗盗汗二便瀉痛变生诸疾难以名状余常用六味八味二丸及补中益气之剂加减用之无不奏效○一小儿九岁解颅足软两膝渐大不能行履属肾禀不足用六味丸加鹿茸三月而能步履○一小儿十四岁肢体倦怠发热晡热口乾作渴吐痰如涌小便淋沥或面目赤色身不欲衣此亦禀赋不足也用补中益气汤及前丸而愈○一小儿十五岁而御女大小便道牵痛服五苓散之类虚症蜂起与死为邻余用补中益气汤加减八味丸而愈○一小儿十三岁内热晡热形体倦怠食少作渴或用清热等药治之虚症悉具余以为所禀怯弱用六味丸加鹿茸补之不越月而痊盖古今元气虚实不同故也

拟定诸方

治小儿肝经火旺目睛频动痰气上升或壮热惊搐面色红脉有力脾胃无伤宜泻肝火

川芎【八分】当归【酒洗】柴胡 橘红 枳壳【炒】天麻【各六分】甘草【四分】白芍药【炒】茯苓【各八分】黄连【四分炒】薄荷【三分】

右每服二钱姜水煎服

愚按前症若肝经风热而自病宜用本方若肝经血燥而自病宜用六味丸若肝木克脾土宜用四君子汤加升麻柴胡若肺金克肝木宜用泻白散若肾水不能生肝木宜用六味丸若愈後惊悸不寐或寐中发搐咬牙宜用归脾汤加茯苓五味盖有余者邪气实也不足者真气虚也凡病有余当认为不足经云邪之所凑其气必虚○少参王阳湖孙八岁伤股骨正体科续之余视其面青而兼黄口角微掣动此乃肝木侮脾症也且气血筋骨皆资脾土而生但壮脾气则所伤自愈遂用六君子汤加钩藤钩当归三十余剂诸症悉愈○一小儿三岁因惊抽搐发热痰盛久用抱龙丸等药以清风痰反致面色或赤或青余谓此心肝二经血虚风热而生痰不足之象也先用六味地黄丸以滋养肝肾佐以六君子汤少加柴胡升麻以调补脾胃诸症顿退而痊

治小儿脾经不足土败木侮目睛微动四肢微搐或潮热往来脾胃有伤饮食少进或泄泻呕吐而色黄脉无力宜补脾胃

白术【一钱三分】黄芪【?炙】川芎 当归【酒洗】陈皮 人参 肉豆蔻【煨】神麴 乾葛【各五分】黄连 甘草【炙各四分】白芍药【一钱酒炒】半夏 白茯苓【各七分】

右姜水煎服

愚按前症若因脾胃虚弱用五味异功散补之虚寒者加木香或再加炮姜温之若因脾气下陷用补中益气汤举之作渴者用七味白术散主之若因脾胃虚弱寒水侮土用六君子加木香炮姜温之若因脾胃虚弱肝木侮土用补中益气汤加苓芍半夏调之若因肝木太过脾土受制用小柴胡汤加炒山梔平之若因伤鱼肉等物宜六君子汤更加山查砂仁消之若因伤生冷腹痛或泻利清白宜六君子汤加砂仁木香炮姜温之若因伤辛热停滞呕吐酸水或大便积利不快用六君子汤加黄连吴茱萸木香和之若食积去而泄泻不止用四君子汤加肉豆蔻补骨脂木香煨姜以补脾肾若泄泻止而饮食少思宜用白术散以补脾胃○一小儿伤食发热面赤或用养胃汤枳实黄连山查治之更加腹胀午後发热按其腹不痛余以为饮食虽化而脾胃复伤用六君子汤数剂而痊○一小儿伤食发热呕吐面赤服消导清热之剂饮食已消热赤如故余曰此胃经虚热耳用四君子汤加升麻柴胡各二分四剂而痊○一小儿伤食发热面赤抽搐呕吐气喘吐痰余以为饮食伤脾发热肺气虚弱所致耳用六君子汤再加炒黑黄连山梔各三分一剂顿安【余见各类】

治小儿心血虚睡中惊动不安或受惊吓而作主清心安神降痰

人参 半夏【汤泡】酸枣【仁去殼炒】茯神【去心各一钱】当归【酒洗】橘红 赤芍【各七分】五味子【五粒杵】甘草【炙三分】

右水煎入姜汁竹沥少许入牛黄半分尤妙若温暖之月心经多热加生地黄山梔仁【各五分】麦门冬【七分】淡竹叶若方饮食因惊而停滞者须先消饮食然後治惊惊药内仍加白术麦芽以理脾胃盖惊则气散宜收补其气惊则痰聚宜消化其痰

愚按前症若心血不足而心神惊悸者宜用本方若木火太过而心神不寧者宜用导赤散若木火翕合风热相搏而病者用柴胡梔子散若肝心虚弱木火未济而病者用六味丸若因脾胃食鬱生痰惊动不安者宜用四君子汤以健脾神麴半夏麦芽以化痰山梔芍药以清热若因饮食停滞肚腹膨胀或呕吐泄泻宜用六君子汤以健脾用厚朴神麴以消食如有痰搐惊症仍用本方调治如见肝经之症加鉤藤鉤方内赤芍药易以白芍药【治验见各症类】

治小儿食积鬱热发於肌表潮热往来主理中清阳明之热

乾葛【一钱二分】白术【炒】山查 白芍药【炒各一钱】黄连【炒】枳实【麸炒】川芎 香附米【炒】升麻【各七分】乾葛【一钱二分】甘草 炙草【各三分】

右用姜水煎服若食积去後潮热未除减山查枳实香附川芎加入参黄芪陈皮【各五分】再加白术【二三分】有痰加半夏【六分】

愚按前症若食积去而热不退用五味异功散以补胃气若作呕少食用四君子加藿香半夏以安中气若泄泻不食宜用六君子汤加升麻柴胡以升补脾气若久泻不已宜用补中益气汤以升补阳气若虚寒加炮姜木香如不应佐以四神丸以补脾肾若体瘦潮热口乾大便不调宜用肥儿丸以消痞积若不分脾气虚实有无食积槩用克伐消导寒凉清热之剂复伤脾胃主气反为难治之症○儒者薛衡甫子年七岁身羸发热面黄皆以为内伤瘀血欲下之余谓乃脾脏受伤投以六君子汤加煨姜两服饮食顿进数服诸症全愈○一小儿饮食停滞服消导之剂余曰此脾胃气虚故饮食不能克化也法当调补为善若数用克伐之剂脾气益伤饮食愈停矣已而腹内又结一块寒热潮热食少作渴大便不实余用四君子汤饮食渐增又用补中益气汤而愈○一小儿肚腹膨胀饮食即泻手足逆冷余以为脾气虚寒先用人参理中丸後用六君子汤而愈○一小儿常患停滞数服克伐消导之剂以致脾胃虚甚患吐泻慢脾风而卒【余见各症类】

治小儿发热感冒鼻流清涕或咳 吐痰轻者且勿药候一二日多自愈重者用清和之剂

橘红 半夏【炮】 桔梗 川芎【各五分】 甘草 防风【各四分】 白茯苓
桑皮【?炙各七分】 白术 薄荷 枯黄芩【炒各三分】

右每服二钱姜水煎服

愚按前症若腠理不密外邪所感鬱於肺而为患者宜用本方若脾胃气虚不能生肺金而致患者用补中益气汤若脾胃气实肺气壅滞而大肠不利者用泻黄散若心火上炎消铄肺金而致咳 者用六味丸大凡元气素弱或患病日久宜用补中益气汤为主加以半夏茯苓桔梗若见发搐咬牙等症皆虚热所迫亦宜用之若痰盛少佐以抱龙丸若风邪既退而热痰未已但健中气则痰自化而病自愈若用化痰利气之药则中气愈虚痰热愈甚矣○一小儿伤风咳 发热服解表之剂更加喘促出汗余以为肺脾气虚欲用补中益气汤加五味子补之不信乃服二陈桑皮杏仁枳殼桔梗之剂前症益甚又加发搐痰壅余仍用前药更加鉤藤鉤而痊盖小儿脏腑脆嫩气血易虚所用之药虽为平和亦有偏胜之味须审察病气形气虚实表在里之不同而治之可也【治法见伤风鼻流涕条】

治小儿大便色泔白及小便浊或澄之如米泔者此疳病也

白术 黄连【姜水炒】 白茯苓 泽泻 山查 青皮【四分】 甘草 白芍药【炒各一钱】

右姜水煎服

愚按前症若因脾气虚而兼湿热者宜用四味肥儿丸若兼泄泻当以白术散间服

治疳丸小儿要药

胡黄连 芦荟 史君子 黄连【各五钱炒】 神麴【炒一两】 阿魏
青黛【二钱另研】 麝香【少许另研】

右为末稀糊丸黍米大每服十丸清汤下

愚按前方乃肝脾疳症之药也或内疳或疮发於外亦效盖疳乾也或因哺食太早或因恣食甘肥或因峻剂重亡津液虚火上炎或因乳母饮食起居七情劳逸所致○若口内生疮身体壮热颧唇赤色或咽乾饮水掌热便赤盗汗烦热啮齿虚惊此心经内外疳也宜用安神丸主之若鼻疮目烂体瘦疮藓或耳前後项腋小腹内股玉jing陰丸肿溃小便不调摇头侧目白膜遮睛羞明畏日肚大青筋口乾下痢此肝经内外疳也用地黄芦荟二丸主之○若头髮稀少生疮或穗人中口吻赤烂或腹大脚细吐呕泄泻饮食不思口乾嗜土泻下酸臭小便白浊合目昏睡恶闻木音此脾经内外疳也用肥儿丸主之○若鼻外生疮咽喉不利胫肿齿痛咳嗽寒热皮肤皱错欠伸少气鼻痒出涕鼻衄目黄小便频数此肺经内外疳也用地黄清肺饮主之○若脑热身瘦手足如冰寒热往来滑泻肚痛口鼻乾渴齿龈溃烂面黧爪黑遍身生疮耳内出水此肾经内外疳也用地黄丸主之大凡虚火上炎或痘毒上攻名曰走马疳为患甚速敷雄黄散服大芩夷汤此症轻则牙龈腐烂唇吻肿痛重则牙齿蚀落颧颊透烂饮食不入者为不治一小儿二岁茎痿湿痒後陰囊焮肿茎中作痛时出白津余以为肝火用龙胆化肝汤六味地黄丸而痊○一小儿睪丸作痛小便赤澁寒热作呕乃肝脾之症用小柴胡汤加山梔车前子茯苓而愈○一小儿睪丸肿硬小便黄澁用小柴胡汤加山梔车前子并芦荟丸而消○一小儿腹内结块或作痛或上攻小便不调用龙胆泻肝汤芦荟丸而愈後形气消铄发热作渴此肝木制伏脾土用补中益气汤及芦荟丸而愈○一小儿自脱胎时两目赤肿或作痒或生翳此胎内之肝火也用芦荟六味二丸而愈○一女子十五岁患瘰癧身发赤晕形气倦怠此肝火血虚所致用加味逍遥散而赤晕愈用益气汤六味丸而瘰癧消○一小儿下疳溃烂发热作痛一小儿茎中作痒不时搔捻一小儿茎中溃痛小便秘澁日晡尤甚一小儿目痒出水或茎间结核或两腿连割或陰囊搔痒俱属肝火皆用九味芦荟丸并愈【余见各类】

治小儿大病後面黄肌瘦目时动齿微咬髮稀少未能大行因误服解表泻利伤尅诸药而致者宜长缓调理复全胃气

白术【一钱二分】 白芍药【酒炒】 白茯苓【各八分】 人参 陈皮 川芎【各六分】 甘草 黄芪【?炙】 当归【酒洗各四分】 半夏 山楂【各六分】

右用姜枣水煎服

安神鎮惊丸惊退後调理安心神养气血和平预防之剂

天竺黄【另研】 人参 茯神 南星【姜制各五钱】 酸枣仁【炒】 麦门冬
当归【酒洗】 生地黄【酒洗】 赤芍药【炒各三钱】 薄荷 木通 黄连【姜汁炒】 山梔【炒】 辰砂【另研】 牛黄【另研】 龙骨【火煨各二钱】 青黛【一钱另研】

右为末?丸菉豆大淡姜汤送下每服三五丸愚按前二方根本之治防微杜渐之法也但鎮惊丸内多苦寒辛散分利之味病後不宜轻用患复伤胃气而变生他症也皆饮食不节致生他症当消导为主若脾胃损伤而见他症当健中气大凡病後元气未复或因尅伐之剂元气复伤而见前症但用升补阳气为主诸症自愈若专攻其病则误矣○一小儿七岁患急惊将愈而发热惊悸或用祛风化痰之剂更加惊搐吐痰喘 腹膨少食恶寒又用抱龙等丸更加大便似痢寒热往来殊类风症先君视之以为脾气亏损诸经无所资养而然用四君子汤为主少用升麻柴胡以升补阳气而愈

治小儿齿肿流涎腮肿马牙阳明之热

升麻 川芎 白芍药 半夏【炒各七分】 乾葛 生甘草 防风
黄连【酒炒各五分】 石膏【火煨过】 白术【各一钱】 白芷【三分】

右水煎每服二钱若能漱药者则含药漱而吐之漱药不用白术半夏

愚按马牙重舌因胎毒胃热所致若用线针刺破出血即愈不必服药若因饮食所伤脾胃虚热而致宜用七味白术散若服热药损伤脾胃发热而致或口舌生疮宜用人参安胃散若久病脾胃虚热口内如无皮状宜用七味白术散若脾经陰血不足午後益甚宜用四物汤加白术茯苓炙草若脾经阳气下陷午後益甚宜用补中益气汤并用茱萸涂脚心若疳积虚火上炎龈齿腐烂当从疳治亦有滞颐口角流涎此由脾气虚冷不能制其津液也宜用温脾散若脾经实热舌纵涎下宜用泻黄散大凡小儿四时皆以养元气健脾胃为主若屡有痰症屡服驱风泻火之药多患前症其轻者能节饮食慎调理不药自愈

序次丹溪小儿痘疮治法

小儿痘疹大抵与伤寒相似发热烦躁脸赤唇红身痛头疼乍寒乍热喷嚏呵欠 喘痰涎始发之时有因伤风伤寒而得有因时气传染而得有因伤食呕吐而得有因跌扑惊恐畜血而得或为窜眼惊搐如风之证或口舌咽喉肚腹疼痛或烦躁狂闷昏睡或自汗或下痢或发热或不发热证候多端卒未易辨亦须以耳冷骭冷足冷验之盖痘疹属阳肾藏无症耳与骭足俱属於肾故肾之所部独冷又不若视其耳後有红脉赤缕为真於此可以稽验矣调护之法首尾俱不可汗下但温凉之剂兼而济之解毒和中安表而已虚者益之实者损之冷者温之热者平之是为权度借喻而言亦如庖人笼蒸之法但欲其松耳盖毒根於表如苟妄汗则荣卫一虚重令开泄转增疮烂由是风邪乘间变症者有之毒根於里如苟妄下则内气一虚毒不能出而返入焉由是土不胜水变黑归肾身体振寒耳骭反热眼合肚胀其疮黑陷十无一生汗下二说古人深戒以此观之痘疹症状虽与伤寒相似而其治法实与伤寒不同伤寒从表入里痘疹所发从里出表故也如欲解肌乾葛紫苏可也其或气实烦躁热炽大便秘结则与犀角地黄汤或人参败毒散又或紫草饮多服亦能利之故虽云大便不通者少与大黄尤宜仔细斟酌之若小便赤少者分利小便则热气有所渗而出凡热不可骤遏但轻解之若无热则疮又不能发也

凡疮疹春夏为顺秋冬为逆○疮疹分人清浊就形气上取勇怯○凡已发未发并与紫苏饮但觉身热症似伤寒若未见疮疑似未明且先与惺惺散参苏饮或人参羌活辈热甚则与升麻葛根汤人参败毒散但一见红点便忌葛根汤恐发得表虚也○凡痘疮初欲出时身发热鼻尖冷呵欠咳面赤方是痘出之候便宜服升麻葛根汤加山查大力子其疮稀疎而易愈○凡痘初出时或未见时宜服後方多者令少重者令轻方以丝瓜近蒂三寸连瓜子皮烧灰存性为末砂糖拌乾吃入朱砂末亦可又方朱砂为末水调服多者可减少者可无○凡痘疮发热之时便以恶实子为末蜜调贴门上免有患眼之疾○凡初出之际须看胸前若稠密急宜消毒饮加山查黄芩酒洗紫草减食加人参○初出之时色白者便大补气血参芪芍术升麻乾葛甘草木香丁香酒洗当归白芍药若大便泄加诃子肉豆蔻○初起时自汗不妨盖湿热薰蒸而然故也有初起时烦躁谵语狂渴引饮若饮水则後来靨不齐急以凉药解其标如益元散之类亦可用○凡疮已出可少与化毒汤○出不快者加味四圣散紫草饮子紫草木香汤紫草木通汤或快斑散丝瓜汤○出太甚者人参败毒散犀角地黄汤疎则无毒密则有毒以凉药解之虽数贴亦不妨无害眼之患炉灰色白静者作寒看○齐勇者燥者斂发者作热看黑属血热凉血为主○白属气虚补气为主○中黑陷而外白起得迟者则相兼而治○凡痘疮分表里虚实吐泻少食为里虚不吐泻能食为里实里实而补则结痂毒陷伏倒靨为表虚灰白者亦表虚或用烧人屎红活绽凸为表实表实而复补表则要溃烂不结痂○痘疮分气虚血虚用补药气虚者人参白术加解毒药血虚者四物汤中加解毒药痘疮分气血虚实多带气血不足虚则黄芪生血活血之剂助之略佐以风药实则白芍药为君黄芩亦为君佐以白芷连翘续断之类○调解之法活血调气安表和中轻清消毒温凉之剂兼而治之二者得兼而已温如当归黄芪木香辈凉如前胡乾葛升麻辈佐之以川芎白芍药枳殼桔梗羌活木通紫草之属则可以调适矣○黑陷二种因气虚而毒气不能尽出者酒炒黄芪紫草人参辈黑陷甚者亦用烧人屎蜜水调服出子和方○痒塌者於形色脉上分虚实实则脉有力气壮虚则无力虚痒以实表之剂加凉血药实痒如大便不通者以大黄寒凉之药少与之下其结粪○气怯轻者用淡蜜水调滑石末以羽润疮上○疮乾者宜退火止用轻剂荆芥升麻葛根之类○湿者用泻湿乃肌表间湿宜用风药白芷防风之类○上引用升麻葛根下引用榔牛膝助以贝母忍冬草白芷瓜蒌之类○若咽喉痛者大如圣散鼠粘子汤○喘满气壅者麻黄黄芩汤烦渴者甘草散乌梅汤下痢呕逆者木香理中汤○顔色正者如上治将欲成就却色淡者宜助血药用当归川芎酒洗芍药之类或加红花○将成就之际却紫色者属热用凉药解其毒升麻葛根酒炒黄芩黄连及连翘之类甚者犀角大解痘毒○灰白色将靨时如豆殼者盖因初起时饮水多其靨不齐俗呼倒靨不好但服实表之剂消息他大小便如大便秘通大便小便秘通小便○小便赤澀者大连翘饮甘露饮○大便秘结内烦外热者小柴胡汤加枳殼最当或少用四顺清凉○疮疹用药固有权度大小二便一或秘焉则肠胃壅遏脉络凝滞毒气无从发泄眼闭声哑肌肉黧黑不旋踵而告变矣陷入者加味四圣散更以胡蒴酒薄传其身厚传其足喷其衣服并以厚绵盖之若犹未也独圣散入木香煎汤若其疮已黑乃可用钱仲阳宣风散加青皮主之钱氏云黑陷青紫者百祥丸下之不黑者谨勿下余知其所下者泻膀胱之邪也又云下後身热气温欲饮水者可治水谷不消或寒战者为逆余知其脾强者土可以治水也百祥丸太峻当以宣风散代之泻後温脾则用人参茯苓白术等分厚朴木香甘草各半为妙盖疮发肌肉阳明主之脾土一温胃气随畅独不可消胜已泄之肾水乎此钱氏不刊之秘旨也○其坏疮者一曰内虚泄泻二曰外伤风冷三曰变黑归肾○近

时小儿痘疮止宗陈文忠木香散异攻散殊不知彼时立方之时为运气在寒水司天时令又值严冬大寒为因寒鬱遏痘疮不红绽故用辛热之剂发之今人不分时令寒热一槩施治误人多矣时值温热山野农家贫贱之人其或偶中也○丹溪痘疮治法最为明备近世通用陈文忠木香异功等方乃一偏之术若痘疮虚怯淡白色痒塌此属虚寒宜用陈文忠方若发热壮盛齐勇红紫色燥痒此属热毒急宜凉血解毒自陈文忠方盛行後属虚寒者率得生属热毒者悉不救痘自胎毒古人治法只解毒然气血虚则逆毒气不出及不能成就故陈文忠之法亦千载妙诀补前人之未备者但温补之法既行而解毒之旨遂隐故救得一边又害了一边今必详究丹溪二法通用斯无误也○痘疮属虚寒者直可延至十数日後方死属毒盛转紫色者不过七八日盖痘是胎毒自内出外二三日方出齐毒气方在内出至六日则当尽发於表七八九日成脓而结痂矣若毒气盛不能尽出过六日毒反内入脏腑故须於六日以前毒气该出之时急服凉血解毒之药以驱出之六日以後暨无及矣故其死最急若虚弱毒气少者只是气血不足不能贯脓成就故绵延日久而後死此虚实轻重之分也○痘疮多者是毒气多便先宜解毒然多则恐气血周贯不足故隨後亦宜兼补药以助成脓血愚按痘疹之疾乃胎禀之热毒由内发外虽为有余之症当泻不当补然儿体有虚实积毒有重轻又在变而通之考之钱陈二先生虽俱名家然就而折衷之则陈为较优盖钱之用药偏於清凉而陈之治法温凉并行以其深究陰阳造化之妙故於病之真寒假热与夫真热假寒罔不知之真而见之定随症异宜未尝执泥假如病属虚热而元气未至亏损者施之以钱氏之法则固当矣若病气元气俱虚或俱实者而不以陈法治之鲜不致误且小儿之痘疹譬即大人之痈疽治法无异其热毒蘊於内脏致二便不利烦热作渴脉沉实须用托里疏通和荣卫三法观陈氏异功散人参白术散前胡枳殼汤等方其药品深为得宜治者详订而遵之可也

卷二十五

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二十五

明 薛己 订

明医杂着

附方

补中益气汤 治中气不足或误服剋伐四肢倦怠口乾发热饮食无味或饮食失节劳倦身热脉洪大而无力的或头痛恶寒自汗或气高而喘身热而烦脉微细软弱自汗体倦少食或中气虚弱而不能摄血或饮食劳倦而患疟痢或疟痢等病因脾胃虚而不能愈者或元气虚弱感冒风寒不胜发表宜用此代之或入房而後劳役感冒或劳役感冒而後入房者急加附子愚谓人之一身以脾胃为主脾胃气实则肺得其所养肺气既盛水自生焉水升则火降水火既济而成天地交泰之令矣脾胃一虚四脏俱无生气故东垣先生着脾胃内外伤等论谆谆然皆以固脾胃为本所制补中益气汤又冠诸方之首观其立方本旨可知矣故曰补肾不若补脾正此谓也前所言治症槩举其略余当仿此而类推之是矣附方之首并注以表明之

人参 黄芪【炒】 白术【炒】 甘草【炙各一钱五分】 当归【一钱】 陈皮【五分】 柴胡 升麻【各三分】

右姜枣水煎空心午前服

八珍汤 治肝脾伤损血气虚弱恶寒发热或烦躁作渴或寒热昏愦或胸膈不利大便不实或饮食少思小腹胀痛等症

甘草【炙五分】 人参 白术 白茯苓 当归 川芎 白芍药 熟地黄【各一钱】

右姜枣水煎服

十全大补汤 治气血俱虚发热恶寒自汗盗汗肢体倦怠或头痛眩暈口乾作渴又治久病虚损口乾食少咳而下利惊悸发热或寒热往来盗汗自汗晡热内热遗精白浊或二便见血小腹作痛小便短少大便乾澹或大便滑泄肛门下坠小便频数陰茎痒痛等症即八珍汤加黄

芩肉桂各一钱

四物汤 治血虚发热或寒热往来或日晡发热头目不清或烦躁不寐胸膈作胀或脇作痛尤当服之芍药【二钱】川芎【一钱五分】当归 熟地黄【各三钱】

右水煎服

加味四物汤即前方加山梔柴胡牡丹皮

四君子汤 治脾胃虚弱饮食少思或大便不实体瘦面黄或胸膈虚痞痰 吞酸或脾胃虚弱善患疟痢等症

人参 白术 茯苓【各二钱】甘草【炙一钱】

右姜枣水煎服

六君子汤 治脾胃虚弱饮食少思或久患疟痢若觉内热或饮食难化作酸属虚火须加炮姜其功甚速即前方加半夏陈皮

香砂六君子汤即六君加香附子藿香砂仁

归脾汤 治思虑伤脾不能摄血致血妄行或健忘怔忡惊悸盗汗或心脾作痛嗜卧少食或大便不调或肢体肿痛或思虑伤脾而患疟疾大凡怀抱鬱结而患诸症或因用药失宜剋伐伤胃变诸别症者最宜用之

远志【一钱】酸枣仁【二钱】木香【五分】甘草【炙五分】当归 人参白术 白茯苓 黄耆 龙眼肉【各二钱】

右姜枣水煎服

加味归脾汤即前方加牡丹皮山梔【各一钱】治脾经血虚发热等症

加味逍遥散 治脾肝血虚发热或耳内及胸乳腹胀小便不利

当归 白术 茯苓 芍药 甘草 柴胡【各一钱】牡丹皮 山梔【各七分】

右姜水煎服

逍遥散即前方去山梔牡丹皮

六味丸【一名地黄丸一名肾气丸】治肾虚作渴小便淋秘气壅痰涎头目眩晕眼花耳聋咽燥舌痛齿痛腰腿痿软等症及肾虚发热自汗盗汗便血诸血失音水泛为痰之圣药血虚发热之神剂又治肾陰虚弱津液不降败浊为痰或致欬逆又治小便不禁收精气之虚脱为养气滋肾制火导水使机关利而脾土健实

牡丹皮 白茯苓 泽泻【各三两】熟地黄【八两杵膏】山茱萸【肉】乾山药【各四两】

右各另为末和地黄加炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前滚汤下

八味丸 治命门火衰不能生土以致脾胃虚寒饮食少思大便不实或下元冷惫脐腹疼痛夜多漩溺即前方加肉桂附子各一两经云益火之源以消陰翳即此药也

加減八味丸 治肾水不足虚火上炎发热作渴口舌生疮或牙龈溃蚀咽喉作痛或形体憔悴寢汗发热五脏齐损即六味丸加肉桂一两五味子四两

加減金匱肾气丸 治脾肾虚腰重脚肿小便不利或肚腹肿胀四肢浮肿或喘急痰盛已成蛊症其效如神此症多因脾胃虚弱治失其宜元气复伤而变症者非此药不能救

白茯苓【三两】附子【五钱】川牛膝 桂 泽泻 车前子山茱萸 山药
牡丹皮【各一两】熟地黄【四两搗碎酒拌】

【杵膏】

右为末和地黄加炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心米饮下

还少丹 治脾肾虚寒饮食少思发热盗汗遗精白浊又治真气亏损肌体瘦弱等症

肉苁蓉 远志 茴香 巴戟 乾山药 枸杞子 熟地黄 石菖蒲 山茱萸 牛膝
杜仲【姜制】楮实子 五味子 白茯苓【各二两】

右各另为末用枣肉百枚并炼蜜丸桐子大每服五七十丸空心温酒或盐汤下日三服

十补丸 治肾脏虚冷面黑足寒耳聋膝软小便不利等症

附子【炮】五味【各二两】山茱萸 山药 牡丹皮 鹿茸【制】桂心 茯苓
泽泻【各一两】

右为末炼蜜丸桐子大每服六七十丸盐汤下

当归补血汤 治血气损伤或妄服峻剂致气血益虚肌热大渴引饮目赤面红脉洪大而虚重按全无此病多得於饥饱劳役者

黄耆【炙一两】当归【三钱酒制】

右水煎服

人参养荣汤 治脾肺俱虚发热恶寒肢体瘦倦食少作泻等症又治久病虚损口乾食少欬而下痢心惊悸热而自汗等症

人参 陈皮 黄芪【蜜炙】 桂心 当归 白术
甘草【炙各一钱】 白芍药【一钱五分】 熟地黄
五味子【炒】 茯苓【各七分半】 远志【五分】

右姜枣水煎服

参术膏治中气虚弱诸药不应或因用药失宜耗伤元气虚症蜂起但用此药补其中气诸症自愈人参 白术【各等分】

右水煎稠汤化服之

济陰地黄丸 治足三陰亏损虚火上炎致目睛散大视物不的或昏花澁紧作痛畏明或卒见非常之处等症其功效与六味还少丹相似

五味子 麦门冬 当归 熟地黄 肉苁蓉 山茱萸 乾山药 枸杞子 甘菊花 巴戟肉【各等分】

右为末炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心白汤下

滋陰补肾丸 治肝肾阳虚陰弱虚火上炎目视昏花或至夜昏暗紧澁仍治六味丸所主之症

熟地黄【三两】 牡丹皮【五钱】 生地黄【四两】 泽泻 茯苓【各二两半】 当归尾
山茱萸 柴胡 五味子 乾山药【各五钱】

右为末炼蜜丸桐子大每服五七十丸盐汤下

益气聪明汤 治饮食不节劳役形体脾胃不足内障耳鸣或多年目昏暗视物不能此药能令人目光大久服无内障耳鸣耳聋之患又令精神过倍元气自益身轻体健耳目聪明

黄芪 甘草 人参【各五钱】 蔓荆子【一钱五分】 升麻 葛根【各三钱】 芍药

黄栢【酒炒各一钱】

右每服三钱水煎服

神效黄芪汤 治浑身麻木不仁或左右身麻木或头面手臂腿脚麻木不仁者并皆服之如耳目紧急缩小及羞明畏日或瘾澹难开或视物无力睛痛手不得近或目中如火等症

蔓荆子【一钱】橘红【五分】人参【八钱】黄耆【二两】甘草【炙】白芍药【各一两】

右每服五钱水煎临卧服

助阳活血汤 治眼发之後犹有上热白睛赤色瘾澹难开而多眵泪等症

蔓荆子【二分】香白芷【三分】柴胡 黄芪
甘草【炙】当归【酒洗】防风【各五分】升麻【七分】

右水煎服

芍药清肝散 治眵多眊燥紧澹羞明赤脉贯睛脏腑秘结者

白术 甘草 川芎 防风 荆芥 桔梗 羌活【各三分】芍药 柴胡 前胡 薄荷
黄芩【各二分半】山梔 知母 滑石 石膏【各二分】大黄【四分】芒硝【二分半】

右水煎服

黄连天花粉丸 治症同上

黄连 菊花 川芎 薄荷【各一两】天花粉 连翘 黄芩 梔子【各四两】黄栢【二两】

右为末丸桐子大每服五十丸加至百丸茶汤下

连翘饮子 治目赤隐澹紧小久视昏花迎风有泪等症

蔓荆子 生甘草 连翘【各三分】柴胡【二分】黄芩【五分】生地黄 当归 红葵花
人参【各三分】黄芪 防风 羌活【各五分】升麻【一钱】

右水煎服若中气不足而致前症用神效黄芪汤或补中益气汤

地芝丸 治目不能远视能近视或妨近视乃陰气不足阳气有余也宜用此方

生地【焙乾四两】天门冬 枳殼【麸炒】甘菊花【各二两】

右为末炼蜜丸桐子大每服百丸茶清或温酒下

定志丸 治目不能近视反能远视乃阳气不足而陰血有余也宜此主之

白茯苓 人参【各二两】远志 菖蒲【各一两】

右为末炼蜜丸桐子大以朱砂为衣每服十丸至三十丸米饮下

决明夜光散 治目夜昏虽有灯月亦不能视

猪肝【一两生用】石决明 夜明砂【各二钱】

右为末以竹刀切肝二片铺药於内合之用麻皮缚定米泔水一碗砂罐煮至半碗临卧连肝药汁服

柴胡清肝散 治肝胆二经风热怒火颈项肿痛结核不消或寒热往来呕吐痰水又治妇人暴怒肝火内动经水妄行胎气不安等症

柴胡

黄芩【炒各一钱】黄连【炒】山梔【炒各七分】当归【一钱】川芎【六分】生地黄 牡丹皮【各一钱】升麻【八分】甘草【三分】

右水煎服若脾胃弱去芩连加苓

左金丸 治肝火脇肋刺痛或发寒热或头目作痛泄泻淋秘一切肝火之症并皆治之

黄连【六两】吴茱萸【一两汤煮片时用】

右为末粥丸白术陈皮汤下

小柴胡汤

治肝胆经风热或寒热往来或晡热潮热或怒火口苦耳聋咳 泻利脇腹作痛诸症

柴胡【二钱】黄芩【一钱五分】人参 半夏【各七分】甘草【炙五分】

右水煎服

加味小柴胡汤即前方加山梔牡丹皮

犀角升麻汤 治风热头面肿痛或咽喉不利时毒等症

犀角【镑七钱】升麻【五钱】防风 羌活【各五钱半】甘草【一钱五分】白芷 黄芩
白附子【各二钱半】

右每服七钱水煎

越鞠丸 治六鬱饮食少思或胸满吐酸齿痛疮疥等症

苍术【炒】神麴【炒】香附子 山楂 山梔【炒】抚芎麦芽【炒各等分】

右为末水调神麴糊丸桐子大每服五七十丸白滚汤下

平胃散 治胃气壅滞胸膈不利或饮食停滞吞酸噯腐或呕吐不食等症

苍术 厚朴【制】陈皮【各一钱】甘草【四分】

右水煎服

异功散 治脾胃虚弱饮食少思或久患咳 面浮气逆腹满等症

人参 白术【炒】甘草【炒】茯苓 陈皮【各一钱】

右姜枣水煎服

二陈汤 治脾胃虚弱中脘停痰或呕吐恶心或头目不清饮食少思等症

陈皮 半夏 茯苓【各一钱】甘草【炙】

右姜水煎服

小半夏汤 治呕吐风痰水饮

半夏【姜制五钱】茯苓【三钱】

右入姜汁水煎服

丁香茱萸汤 治胃气虚寒致呕吐哕咽膈不通等症丁香 橘皮 柴胡

甘草【炙各五钱】吴茱萸 苍术人参【各一钱】升麻【七分】黄栢【三分】草蔻仁
黄芩【各二钱】

当归【一钱五分】

右每服五钱水煎

理中化痰丸 治脾胃虚寒痰涎内停呕吐少食或大便不实饮食难化咳唾痰涎此属中气虚弱不能统涎归源也

人参 白术【炒】 乾姜 甘草【炙】 茯苓 半夏【姜制】

右为末丸桐子大每服四五十丸白滚汤下

牛黄抱龙丸 治风痰壅盛或咳 发热或发抽搐等症

牛黄 雄黄 辰砂 天竺黄【各四钱】 麝香【一钱】 牛胆南星

右为末甘草汤糊丸龙眼核大每服一丸姜汤下

柴芍参苓散 治脾胃不和饮食少进呕吐泄泻凡病後宜服调理

柴胡 芍药 人参 白术 茯苓 陈皮 当归【各五分】 甘草 牡丹皮 山梔【炒各三分】

右为末每服一钱白汤下或作丸服

五味子汤 治咳 皮肤乾燥睡中有血胸膈疼痛五味子【炒】 桔梗【炒】 紫苑 甘草【炒】
续断【各五分】 竹茹【一钱】 赤小豆【一撮】 生地黄【二钱】 桑白皮【炒二钱】

右水煎服

人参平脉散 治心火剋肺咳 喘呕痰涎壅盛胸膈痞满人参 橘红

甘草【炙】 地骨皮【各五分】 茯苓 知母【炒各七分】 五味子【炒】 青皮
天门冬【各四分】 桑白皮【炒一钱】

右水煎服

麦门冬汤 治火热乘肺咳 有血胸膈胀满五心烦热等症

麻黄【七分】麦门冬 桑白皮【炒】生地黄【各一钱】半夏紫苑 桔梗
淡竹叶【各七分】五味子 甘草【各五分】

右姜水煎服

金沸草散 治肺经受风头目昏疼咳 声重涕唾稠粘等症

荆芥穗【一钱】前胡 麻黄 旋覆花【各七分】甘草 赤芍药 半夏【各五分】

右姜枣水煎服

柴胡桂枝汤 治伤风发热自汗或痰气上攻等症桂枝【二钱】黄芩【炒】人参 白芍药【
炒各钱半】甘草【炙】半夏【姜制】生姜【各一钱】柴胡【四钱】大枣【二枚】

右作二剂水煎服

竹叶归芪汤

治胃气虚热口乾作渴恶冷饮食者竹叶【一钱五分】当归【一钱】黄芪【二钱】白术
人参【各一钱】麦门冬【七分】甘草【炒五分】

右水煎服

竹叶石膏汤 治胃火作渴

石膏 人参 甘草【各一钱】半夏【一钱五分】竹叶 麦门冬【各五分】

右姜水煎服

七味白术散【一名白术散】治中气亏损津液不足舌乾口燥不喜饮冷或吐泻後作渴最
宜服之

人参 白术 木香 白茯苓 甘草 藿香【各五分】乾葛【一钱】

右水煎服

凉膈散 治上焦积热烦渴面赤头昏咽燥齿痛口疮便溺赤澀并宜服之

大黄 朴硝 甘草【各一两】连翘【四两】山梔 黄芩 薄荷叶【各一两】

右为末每服五七钱水煎

梔子仁汤 治时毒肿痛大便秘结等症

鬱金 枳殼【麸炒】升麻 山梔仁【炒各等分】

右每服五钱水煎

润肠丸 治脾胃伏火大便秘澁或乾燥不通不思饮食乃风热血燥二便结秘也宜用此以润燥和血疏风自然通利若因气血虚弱津液乾涸而大便秘结者当以调补元气忌服此丸

羌活 当归尾 大黄【煨】皂角仁 秦艽【各五钱】麻子仁 桃仁【去皮尖各一两】

右为末炼蜜为丸白汤下

升阳除湿防风汤 治脾胃损伤阳气下陷大便泄泻或後重闭塞等症

防风【二钱】白术【炒】白茯苓 白芍药【炒各一钱】苍术【米泔浸四钱】

右水煎服

升阳益胃汤 治脾胃虚弱四肢怠惰时值秋燥之令体重节痛口乾燥饮食无味大便不调小便频数兼见肺病洒淅恶寒面色恶而不和乃阳气不伸故也当以升阳益胃

羌活 独活 防风【各五钱】柴胡 白术 茯苓 泽泻【各三钱】人参【一两】黄芪 半夏 甘草【各一两】芍药 黄连 陈皮【各四钱】

右每服三五钱姜枣水煎服

二神丸 治脾胃虚弱侵晨五更作泻或全不思食或食而不化

破故纸【四两炒】肉豆蔻【二两生用】

右为末用大红枣四十九枚生姜四两切碎水煮熟去姜取枣肉和药丸桐子大每服五十丸空心盐汤下

四神丸 治脾胃虚弱大便不实饮食不思或泄痢腹痛等症

肉豆蔻【二两】 补骨脂【四两】 五味子【一两】 吴茱萸【浸炒一两】

右为末生姜八两红枣一百枚煮熟取枣肉和末丸桐子大每服五七十丸空心或食前白汤送下

五味子汤 治肾泄在侵晨五更作泻饮食不进或大便不实不时去後为丸尤效

五味子【炒三两】 吴茱萸【炒五钱】

右为末每服二钱白汤调下

香连丸 治痢疾赤白并水泻暑泻神效

黄连【净十二两】 吴茱萸【去枝梗十两】

右先将二味用熟水拌和入磁器内置热汤中顿一日同炒至黄连紫黄色去茱萸用连为末每末四两入木香末一两淡醋米饮为丸桐子大每服二三十丸滚汤下

芍药汤 治邪热内结便血後重或气不和里急後重用此行血则便血自愈调气则後重自除

芍药【炒一两】 当归 黄连【炒各五钱】 槟榔 木香
甘草【炙各二钱】 肉桂【二钱五分】 黄芩【炒五钱】

右每服五钱水煎

大承气汤 治表里俱实大便秘结烦渴谵妄脾胃怫鬱留饮不散胸腹高起痛不可忍但呕冷液大渴不能饮强饮不能消脉沉实而有力者

大黄【炒】 芒硝【各五钱】 厚朴【姜制一两】 枳实【麸炒】

右水煎服

桃仁承气汤 治瘀血停滞腹内作痛或发热狂大便秘结等症

桂枝 芒硝【各一钱】 大黄【二钱】 桃仁【五十粒去皮尖】 甘草【一钱】

右水煎空心服

花蕊石散 治瘀血停积腹中作痛或溢口鼻打扑伤损瘀血内结大便不通等症

花蕊石【一斤】硫黄【四两】

右和匀用纸泥封固瓦罐入药仍封固陰乾如急用以焙笼内炙乾煅赤去火次日取出细研每服一钱童便热酒下

清燥汤 治元气虚弱湿热乘之肢体酸软或头目眩晕饮食少思口乾作渴或自汗盗汗胸满气促小便赤少大便不调等症

苍术 白术 麦门冬 陈皮 生地黄

泽泻【各五分】黄芪【一钱五分】五味子【炒九粒】黄连【二分】白茯苓 人参 当归 升麻【各三分】神麴【炒】猪苓 柴胡 甘草【炙各二分】黄栢【酒制一分】

右水煎服

五苓散 治下部湿热小便赤少或淋沥作痛

白术 猪苓【各一钱】茯苓 泽泻【各一钱五分】肉桂【三分】

右水煎服

黄芩清肺饮 治肺金有热不能生肾水而小便不利等症

【阙】

[子部,医家类,薛氏医案,卷二十五]

小温金散 治心肾虚热小便赤白淋沥或不时自汗等症

人参 莲肉【去心】巴戟肉 益智

黄芪【蜜炙】萆薢【酒浸炒】麦门冬【去心】赤茯苓【去皮】甘草【炙各一钱】

右用灯心十茎枣一枚水煎

严氏芪附汤 治气虚阳弱自汗不止肢体倦怠等症

黄芪【蜜炙】附子【炮等分】

右每服四钱姜水煎未应更加之

参附汤 治真阳不足上气喘急自汗盗汗气短头晕等症

人参【半两】附子【炮去皮脐一两】

右分作三服姜水煎

局方石苇散

治膀胱有热水道不通淋沥不出脐腹急痛或劳倦即发或尿如豆汁或出沙石等症芍药
白朮 滑石 葵子 当归 瞿麦【各三钱】石苇 木通【各二钱】甘草 王不留行

右为末每服二钱空心小麦汤调下

姜附赤石脂朱砂丹

治小便数而不禁怔忡多忘魔梦不已下元虚冷遗尿精滑阳虚精漏或肾气虚寒脾泄肾泄

附子【生】乾姜【各半两】赤石脂【一两半水飞】

右为细末酒糊丸菉豆大每服二三十丸大便不和米饮下小便不禁茯苓汤下

茯苓丸 治心肾俱虚神志不寧小便淋沥不禁或赤或浊不利宜服之

赤茯苓 白茯苓【等分】

右为末以新汲水按洗澄去新控沫乾别取熟地黄与好酒同於银石器内?成膏搜和丸弹子
大空心盐酒嚼下一丸

人参救肺散 治咳血吐血

升麻【一钱】柴胡 白芍药 苍朮【各一钱】当归尾 熟地黄 黄芪 人参【各二钱】苏木
甘草 陈皮【各五钱】

右每服五钱水二鍾煎一鍾去查食前温服

麦门冬饮子 治吐血久不愈或肺气虚而短气不足以息或肾虚发热吐痰皮毛枯燥

五味子【十个】当归【身】人参【各五钱】麦门冬【去心半钱】黄芪【一钱】生地
黄【五钱】

右为粗末作一服水二盞煎至一盞去粗稍稍服不拘时【以三棱鍼於气冲出血立愈】

三黄补血汤 治六脉俱大按之空虚必面赤善惊上热乃手少阴心之脉也此气盛多而亡血以甘寒镇坠之剂大泻其气以坠气浮以甘辛温微苦峻补其血

熟地黄【二钱】生地黄【三钱】当归【一钱】柴胡【二钱半】白芍药【半两】牡丹皮【一钱】川芎【二钱】黄蓍【一钱】

右每服五钱水二大盏煎至一盏去滓稍热服补之大过以防血溢上竭两寸脉芤两头则有中间全无而虚曰芤血在上焦或衄或呕血用犀角地黄汤则愈

小建中汤 治虚劳里急悸衄腹中痛失精四肢酸疼手足烦热咽乾口燥等症

桂枝甘草【炙各三钱】大枣【二枚】白芍药【六钱】生姜【二钱】阿胶【炒一钱】

右作二剂水煎服

济生犀角升麻汤 治鬱热不解经络随气涌泄为衄血或清道闭塞流入胃脘吐血或余血停滞面色痿黄大便色黑者

犀角 生地黄 白芍药 牡丹皮【各一钱】

右水煎服

白术芍药汤 治脾经受湿水泄注下体重困倦不欲饮食水谷不化等症

白术【炒】芍药【炒各四钱】甘草【炒二钱】车前子 升麻

右水煎服

滋肾丸 治热在血分不渴而小便不利或肾虚足热腿膝无力等症

知母 黄柏【酒炒各二两】肉桂【二钱】

右各另为末水丸桐子大每服百丸空心白滚汤下

脾约丸 治脏腑不和津液偏渗於膀胱以致小便利而大便秘结者

枳实【炒】厚朴

芍药【各二两】大黄【四两蒸】麻仁【一两二钱半】杏仁【去皮尖炒一两二钱】

右为末炼蜜丸桐子大每服二三十丸白滚汤下

茵陈栀子黄连汤 治黄疸大便自利而黄者

茵陈【二钱】 栀子【一钱】 黄连【一钱】

右水煎服

龙胆清肝汤 治肝经湿热小便赤澀或寒热脇胀痰咳等症凡肝经有余之症并宜服之

柴胡【一钱】 黄芩【七分】 五味子【三分】 龙胆草【酒拌炒焦】 人参 天门冬 甘草
黄连【炒】 山栀【炒】 麦门冬 知母【各五分】

右水煎服

人参养胃汤 治外感风寒内伤饮食寒热头疼或作疟疾等症

半夏 厚朴【姜制】 橘红【八分】 藿香叶 草果
茯苓 人参【五分】 甘草【炙三分】 苍术【一钱】

右姜七片乌梅一个水煎服

不换金正气散 治脾气虚弱寒邪相搏痰停胸膈致发寒热或作疟疾等症

厚朴【姜制】 藿香 半夏【姜制】 苍术【泔浸】 陈皮【各一钱】 甘草【炙五分】

右姜枣水煎服

藿香正气散 治外感风寒内停饮食头疼寒热或霍乱泄泻或作疟疾等症

桔梗 大腹皮 紫苏 茯苓 白芷 半夏 麴 陈皮 白术
厚朴【制各一钱】 甘草【炙五分】 藿香【一钱五分】

右姜枣水煎服

白虎加桂枝汤 治温疟温热等症

知母【六两】 甘草【二两炙】 石膏【一斤碎】 桂枝【三两】 糯米【六合】

右咀以水一斗二升煮米熟去滓煎至三升温服一升日三服汗出愈

柴胡姜桂汤 治疟寒多热少或但寒不热名曰牝疟柴胡【八两】桂枝
黄芩【各三钱】括萎根【四两】牡蛎 甘草【炙】乾姜【各一两】

右咀水煎服一升日三次汗出愈

桂枝芍药汤 治疟寒热不论先後

桂枝【五分】黄芩【炒】知母 石膏 芍药【各二钱】

右水煎服

桂枝黄芩汤 如服前药转极者宜此和之

柴胡【一两二钱】黄芩 人参
甘草【各四钱半】半夏【四钱】石膏知母【各五钱】桂枝【二钱】

右为粗末依前服

桂枝羌活汤 治疟处暑前发头项痛脉浮恶风有汗等症

桂枝 羌活 防风 甘草【等各分】

右每服五钱水煎

麻黄羌活汤 治证如前恶风无汗等症

麻黄【去节】羌活 防风 甘草【各半两】

右如前服

一方 治疟病身热目痛热多寒少脉长先以大柴胡下之微利为度後余热不尽当服白虎汤
以尽其邪白芷【一两】知母【一两七钱】石膏【四两】

右咀末依前服

麻黄桂枝汤 治疟恶风寒无汗等症

麻黄【一两】甘草【二钱】黄芩【五钱】桂枝【二钱】桃仁【三十个去皮尖】

右每服五钱水煎服

桂枝石膏汤 治疟发隔日先寒後热寒少热多等症

桂枝【五钱】石膏 知母【各一两半】黄芩【一两】

右作三剂水煎服

麻黄黄芩汤 治疟因风暑深入於陰分而发乃血受病邪气所舍之尤者也宜用此发散之

麻黄【一两去节】甘草【炒三钱】黄芩【五钱】桃仁【三十枚去皮尖】桂枝【二钱】

右为末依前服

白芷汤 治疟疾下後余热不尽服之

人参 知母【一两七钱】石膏【四两】

右每服五钱水煎服

白虎汤【加苍术名苍术白虎汤】治胃热作渴暑热尤效又治热厥腹满身难转侧面垢谵语遗溺手足厥冷自汗脉沉而滑

知母 石膏【各二钱】粳米【半合】

右水煎服

人参益气汤 治暑热伤气两手麻木四肢困倦饮食少思或发热作渴等证

黄芪【八钱】甘草【五钱】炙草【二钱】人参【五钱】升麻【二钱】白芍药【三钱】柴胡【二钱半】五味子【百四十粒】

右作四剂水煎服

大顺散 治胃暑伏热引饮过多脾胃受湿水谷不分脏腑不调陰阳气逆霍乱呕吐等症

甘草【炒】乾姜【炮】杏仁【去皮尖炒】肉桂

右为末每服二三钱汤调下

消暑丸 治伤暑发热头痛等症

半夏 甘草 茯苓【各半斤】

右为末生姜汁作糊丸桐子大每服五十丸水下

机要浆水散 治暴泄如水周身汗出尽冷脉弱不能语言甚者加吐

半夏【二钱】附子 乾生姜 炙甘草 桂【各半钱】良姜【三分半】

右为末作一服浆水煎服

姜附汤 治霍乱转筋手足厥冷多吐呕逆等症

乾姜【一两】附子【一个生用】

右水煎服

二因木瓜汤 治霍乱吐下举体转筋入腹则闷絶吴茱萸【半两】茴香
炙草【各二钱】乾木瓜【一两忌铁】

右服五钱姜三片苏叶十片水煎

香薷饮【加黄连名黄连香薷饮】治一切暑毒腹痛霍乱吐泻或头痛昏愆等症

香薷 茯苓 白扁豆 厚朴 甘草【各一钱】

右水煎服

十味香薷散 治伏暑身体倦怠神昏头重吐泻等症香薷【一两】人参 陈皮
白术【炒】茯苓 黄芩【炒】木瓜 厚朴【姜制】扁豆 甘草【炒各半两】

右每服一两水煎

半夏白术天麻汤 治寒气所鬱大便不利闷乱大作悞为有热服疏风丸下之元证不减复添

呕逆不食吐痰不止眼澁头旋恶心烦闷气短喘促目不敢开如在风云中头苦疼如裂身重如山四肢厥冷是胃气已损复下两次重虚脾胃名曰痰厥头痛

半夏【一钱】白术 神麴【炒各一钱】天麻 黄芪 人参 苍术 陈皮 泽泻
茯苓【各五分】乾姜【三分】大麦蘖【一钱半】黄栢【酒制二分】

右每服五钱水煎

麻黄附子细辛汤 治感寒脉沉或细微反发热或但欲寐者

麻黄 细辛【各二钱】附子【一钱】

右水煎服

麻黄汤 治心脏中风多汗恶风口乾语澁面垢头痛心神惊悸等症

麻黄 白术 防风 川芎 甘草【炙】 汉防己 当归 人参【各一钱】羌活 远志
茯神【各一钱半】升麻【八分】桂心【五分】

右水煎入竹沥半盏再煎一二沸服

小续命汤 治历节痛风痰盛口禁腰背反张半身不遂语言蹇澁等症

防己 肉桂 黄芩 杏仁【去皮尖炒黄】白芍药 甘草 川芎 麻黄
人参【各一两】防风【一两五钱】附子【炮去皮脐五钱】

右每服三钱姜枣水煎

乌药顺气散

治风气攻注四肢骨节疼痛肢体顽麻及疔瘫痪语澁脚气步履多艰脚膝痿弱等症麻黄

乌药 橘红 川芎 白芷 桔梗

枳殼【麸炒】甘草【炒各一两】乾姜【炮五钱】僵蚕【炒一两】

右每服五钱姜水煎服

犀角散 治肝脏中风筋脉拘挛脇胀膝软面赤语澁等症

犀角【二钱】石膏 羌活 羚羊角【各一钱】人参 甘菊花 独活 黄芩【炒】天麻
枳殼【麸炒】当归 黄芪 芍药 白术 酸枣仁 防风 白芷【各五分】甘

草

右水煎服

独活散 治脐脏中风饥色黧黑骨节酸疼多汗恶风身体沉重等症

独活 附子【炮】 当归【酒洗】 防风 天麻 桂心【各一钱】 川芎 甘菊花
枳壳【麸炒】 山茱萸 黄芪【炒】 丹参 牛膝【酒洗】 萆薢 甘草【炙】 细辛 菖蒲
白术【各五】

【分】

右水煎服

防风散 治中风心神恐惧言语失常

防风 茯神 独活 人参 远志 龙齿 菖蒲 石膏 牡砺【各一两】 秦艽 禹余粮
桂心【各五钱】 甘草【三分】 蛇蛻【一尺炙】

右每服五钱水煎

省风汤 治中风口噤口眼喎斜筋脉挛急抽掣疼痛风热痰实半身不遂等症

黄芩 甘草【各二两】 防风 南星【各四两】 半夏【水浸洗生用】

右水煎服

青州白丸子 治半身不遂口眼喎斜痰涎壅塞手足顽麻等症

半夏【七两】 南星 白附子【各二两】 川乌头【五钱去皮脐】

右为末绢袋盛浸水中数日糊丸桐子大每服十丸姜汤下

秦艽升麻汤 治风寒客手足阳明经口眼喎斜恶见风寒四肢拘急脉浮紧大抵多因太阳一
经之药此方以见风邪有六经之异也

升麻 乾葛 甘草 芍药 人参 秦艽 白芷 防风 桂枝【各三钱】

右每服一两入葱白根水煎

愈风丹 治足三陰亏损风邪所伤致肢体麻木手足不随等症

天麻 牛膝【酒浸焙】 萆薢 玄参【各六两】 杜仲【七两】 羌活【十四两】 当归 熟地黄 生地【各一斤】 独活【五两】 肉桂【三两】

右为末炼蜜丸桐子大每服五七十丸白汤下

牛黄清心丸 治诸风痰瘕语言蹇澁健忘恍惚头目眩晕胸中烦鬱痰塞喘 精神昏愤等症或小儿风痰上壅抽搐发热或急惊痰盛发搐目反口噤或大人伤寒汗下之後燥躁发热不解

牛黄【一两二钱】 麝香 龙脑 羚羊角【各一两】 当归 防风 黄芩 白术 麦门冬 白芍【各一两半】 柴胡 桔梗 白茯苓 杏仁【去皮尖】 芎藭【各两二钱半】 肉桂 大豆黄卷 阿胶【各一两七钱】 蒲黄 人参 神麴【各二两】 雄黄【八钱】 甘草【五两】 白朮【七钱五分】 犀角【二两】 乾山药【七两】 乾姜【七钱】 大枣【一百蒸熟研烂】

右各另为末炼蜜与枣杵匀每两作十丸用金箔为衣每服一丸温水化下

苏合香丸 治气中或卒暴气逆心痛鬼魅恶气等症沉香 麝香 诃子 丁香 青木香 安息香 香附 荜拨 白术 白檀【各二两】 薰陆香 苏

合油 龙脑【各二两】 朱砂

右为末用安息香并炼蜜丸桐子大温水化服四丸每两作十丸熔黄蜡包裹为善

河间地黄饮子 治舌瘖不能言足癱不能步属肾经虚寒其气厥不至宜温之

熟地【生者自制】 巴戟【去心】 山茱萸【去核】 肉苁蓉【酒浸焙】 石斛 附子【炮】 五味子【炒】 白茯苓 石菖蒲 远志【去心】 肉桂 麦门冬

右每服三四钱姜枣水煎入薄荷煎

丁香安胃汤 治呕吐啾胃虚寒所致

丁香【半钱】 吴茱萸【一钱】 草豆蔻 黄芪【二钱】 人参【一钱】 炙甘草【五分】 柴胡【五分】 升麻【七分】 归身【一钱半】 橘皮【五分】 黄蘗【二钱】 苍术【一钱】

右每服半两水煎

茯苓半夏汤 治胃气虚弱身重有痰恶心欲吐风邪羈絆於脾胃之间当先实其脾胃

白术 茯苓 半夏 炒麴【各七钱】 大麦面【半两】 陈皮天麻【各三钱】

右每服半两姜水煎食前服

柴胡半夏汤 治旧有风证不敢见风眼澁头痛有痰眼黑恶心兀兀欲吐风来觉皮肉紧手足重而难举居暖处有微汗便减再见风其病即作【一名补肠汤】 半夏【二钱】 炒麴【一钱】 柴胡【五分】 生姜【十片】 升麻【五分】 苍术【一钱】 藁本【五分】 白茯苓

右用水煎

藿香安胃散 治脾胃虚弱不食呕吐不得腐熟等症

藿香 丁香 人参【各二钱半】 陈皮【五钱】

右为细末每服二钱姜水煎

加减二陈汤 治痰饮呕吐头眩心悸或因食生冷脾胃不和等症

丁香【一两】 半夏 陈皮【各五钱】 茯苓【三两】 甘草【一两五钱】

右每服四钱姜水煎

三味麴末丸 治中脘宿食流饮酸蜚心痛口吐清水等症

神麴【炒三两】 陈皮【一两】 苍术【泔浸三宿洗净日乾炒一两半】

右为末生姜汁煮神麴糊丸姜汤送下

木香宽中散 治七情伤於脾胃以致胸膈痞满停痰气逆或成五膈之病

青皮 陈皮

丁香【各四两】 厚朴【制一斤】 甘草【炙五两】 白豆蔻【二两】 香附【炒】 砂仁 木香【各三两】

右为末每服二钱姜盐汤点服属脾胃亏损之症不可多服当与六君子汤兼服之

防风通圣散 治表里俱实发热烦躁作渴饮冷二便闭塞及一切疮?形症如前

防风 川芎 当归 薄荷 芍药 大黄【炒】 麻黄 连翘 芒硝【各五钱】 石膏 黄芩 桔梗【各一两】 滑石【六两】 山梔 荆芥 白术【各一两】 甘草【二两】

右为末每服二钱姜水煎服仍量儿大小虚实加减

牛黄丸 治小儿惊风中风五癇天癇客忤潮热痰涎壅盛症

白花蛇【酒浸】 白附子 全蝎 川乌 天麻 薄荷雄黄【各五钱】 辰砂【三钱】 牛黄 麝香【各一钱】 片脑【五分】

右各另研和匀用麻黄煎酒调丸芡实大每服一丸薄荷汤下

天麻防风丸 治小儿惊风身体壮热手足抽掣精神昏愤痰涎不利等症

全蝎【去毒炒】 僵蚕 天麻 防风 人参 辰砂雄黄 甘草【炙】 牛黄 麝香【各五分】

右为末炼蜜丸芡实大每服一丸薄荷煎汤下

消风散 治风热上攻头目昏眩鼻塞声重及皮肤顽麻?疹瘙痒等症

荆芥穗 甘草【炙】 陈皮 厚朴【各五两】 僵蚕 人参茯苓 防风 川芎 藿香叶 蛇蜕【去土炒】 羌

活【各二两】

右为末每服二钱清茶调

白饼子 治小儿咳吐痰涎腹中痞癖脏腑积热元气充实者

半夏 轻粉 滑石 天南星 巴豆【二十四个去皮膜水煮】

右研匀为末糯米饭丸小豆大捻作饼子每服一饼白汤下

天麻散 治小儿急慢惊风发热抽搐痰涎壅盛或脾土虚弱肝木乘侮以致前症或吐泻不食嗜卧困倦半夏【七钱】 天麻【二钱半】 甘草【炙】 白茯苓 白术【各三钱】

右为末每服一钱半姜枣汤调

凉惊丸 治小儿急惊抽搐发热痰盛或肝经风热积热抽搐目瞪或连割等症

鉤藤鉤【二钱】 防风 青黛 草龙胆【各三钱】 牛黄 黄连【各五分】 麝香 龙脑【各少许】

右糊丸粟米大每服三五丸薄荷汤下

利惊丸 治小儿惊风及风热生涎咽喉不利脾胃无伤痰涎壅盛者

辰砂 南星【炮去皮脐】 巴豆【去心油各五钱】

右为末蒸饼丸黍米大每服五七丸薄荷生姜煎汤下

泻青丸 治肝经实热生风目睛上视惊搐痰盛发热便秘等症

龙胆草【炒焦】 川芎 当归 梔子【炒】 羌活 防风【各一钱】 大黄【煨五分】

右为末炼蜜丸芡实大每服一丸白汤下

导赤散 治心经有热烦躁惊搐小便赤澀

生地黄 木通 甘草【炙各一钱】

右为末每服一钱竹叶煎汤调服

泻黄散 治脾经有热烦躁惊搐小便赤澀口舌生疮咽乾作渴等症

藿香叶【七钱】 山梔【一两】 石膏【五钱】 防风【四两】 甘草【三两】

右为末每服一钱白汤调

泻白散 治肺经有热咳 痰壅等症

甘草【五钱】 桑白皮 地骨皮【各一两】

右为末每服一钱白汤调

益黄散 治脾土虚寒饮食少思或呕吐作泻腹痛肠鸣或寒水反来侮土以致前症

陈皮【一两】 青皮 诃子肉 甘草【炙】 丁香【各二钱】

右为末每服二钱水煎

陈氏异功散 治元气虚寒痘疮色白寒战咬牙泄泻喘 等症

木香 当归【各三钱半】 官桂 茯苓 白术【各二钱】 人参 肉豆蔻 陈皮
厚朴【姜制】 丁香【各二钱半】 半夏 附

子【炮各一钱半】

右为末每服二三钱姜枣水煎

百祥丸 治痘 黑陷耳冷鼻?咬牙吐泻饮食不进等症

红牙大戟【一两】 青州枣【三十个】

右水煎乾去大戟将枣焙乾为丸白汤下

升麻葛根汤 治痘疮初见发热头痛等症

升麻 葛根 芍药 甘草

右水煎服

清凉饮 治痘後余毒头面患疮目赤咽痛发热饮冷大便不通等症

赤芍药 当归 甘草 大黄【各等分】

右水煎服

柴术参苓散 治肝火风热抽搐不寧肢体搔痒等症柴胡 山栀【炒】 川芎
芍药【炒各五分】 熟地黄 当归【各八分】 茯苓 甘草【炒各五分】

右水煎服

参苓白术散 治脾胃虚弱饮食少思或呕吐泄泻等症病後元气未复亦宜用此药调理

人参 茯苓 白术【炒】 莲肉【去皮心】 砂仁【炒】 薏苡仁【炒】 桔梗【炒】 山药
甘草【炙】 白扁豆【去皮姜汁拌炒】

右为末每服二钱白汤煎服

人参安胃散 治因服峻厉脾胃亏损或成慢惊泄泻呕吐或肠胃有热以致前症

人参【一钱】黄芩【二钱】生甘草
炙甘草【各五分】白芍药【七分】白茯苓【四分】黄连【二分】

右为末每服二钱水煎

温脾散 治脾胃亏损腹脇虚胀乳食不进困倦无力等症

诃子肉 人参【各七钱半】白术 木香 桔梗 茯苓藿香 陈皮
黄芩【各五钱】甘草【二钱半】

右每服二钱姜枣水煎

温胆汤 治胆气怯弱惊悸少寐发热呕痰饮食少思等症

半夏 枳实【各一两】橘红【一两五钱】茯苓【七钱半】甘草【炙四钱】

右每服一二钱姜枣水煎

肥儿丸 治小儿食积五疳或白秃体瘦肚大筋青髮稀成穗或遍身疮疥等症

芫荽【炒】神麴【炒】麦蘖【炒】黄连【各一钱】

右为末猪胆汁丸黍米大每服一二十丸木通煎汤下

九味芦荟丸 治小儿疳脾疳积体瘦热渴大便不调或瘰 结核耳内生疮等症

胡黄连 黄连 芦荟 木香 芫荽【炒】青皮白雷丸 鹤膝草【各一两】麝香【三钱】

右为末蒸饼糊丸麻子大每服一钱空心白汤下

大芫荽汤【一名梔子茯苓汤】治小儿脾疳少食发热作渴大便不调髮黄脱落面黑便清
鼻下生疮能乳食吐等症山梔【三分】黄柏 甘草【炙各二分】芫荽【五分】黄连
防风【各二分】麻黄 羌活 柴胡【各三分】白术【五分】茯苓 当归【各四分】

右每服二钱水煎

桔梗汤 治咳 吐脓痰中有血已成肺痈症

桔梗【炒】 贝母 当归【酒浸】 瓜蒌仁 枳壳【麸炒】 薏苡仁 桑白皮【炒】 百合【蒸各一钱】 五味子【炒】 甜葶苈【炒】 地骨

皮 知母【炒】 甘草节 防己 黄芪 杏仁【各五分】

右水煎服

地黄清肺饮 治肺痈咳 痰喘稠粘等症

马兜铃 甘草【各五分】 糯米【炒十粒】 明阿胶【一钱麪炒】 鼠粘子【三分炒】 杏仁【七枚去皮尖】

右每服一钱水煎

清中解鬱汤 治小儿脾气虚弱饮食停滞鬱热生痰或身发赤晕等症

白术 茯苓 陈皮 山楂【炒】 神麪【炒】 麦芽【炒】 川芎 桔梗 甘草【炒各五分】

右每服二钱水煎

九味解毒汤 治一切热毒肿痛或风热搔痒脾胃无伤者

黄连【三分】 金银花 连翘 漏芦【各五分】 山楂【四分】 白芷【六分】 当归【八分】 防风【三分】 甘草【二分】

右每服二钱水煎

大连翘饮 治风热热毒表里受患脾胃无伤发热作渴大便秘结者

连翘 瞿麦 荆芥 木通 赤芍药 蝉蜕 甘草 防风 柴胡 滑石 山楂【炒】 黄芩【炒】 当归【各等分】

右每服一钱水煎

犀角消毒丸 治疮疡初起焮肿作痛热闷已成欲作脓或脓成已溃者皆不宜用

犀角 薄荷 连翘 玄参【各一钱】 牛蒡子【一钱】 甘草【三分】 金银花

右为末丸桐子大每服一二十丸白汤下

朱砂安神丸 治心神烦乱发热怔忡少寐或寐中惊悸等症

黄连【一钱半】生地黄 当归 甘草【炙各五分】朱砂【一钱另研】

右为末蒸饼丸黍米大每服十丸津咽下

柴胡清肝散 治肝胆三焦风热疮疡或怒火增寒发热或疮毒结於两耳前後或身外侧至足或胸乳小腹下及两股内侧至足等症

柴胡 黄芩【炒】 人参【各三分】 山梔【炒】 川芎【各五分】 连翘 桔梗【各四分】 甘草【三分】

右水煎服

活血散 治痘疹已出未尽烦躁不寧肚腹作疼等症

白芍药【一两酒炒】 紫草茸【一钱半】

右为末每服一匙糯米汤调下

神功散 治一切疮疡肿焮作痛未成者敷之即散已溃者敷之肿痛即消

黄栢【炒】 草乌【炒】 血竭

右为末津调敷患处

惺惺散 治变蒸伤寒头疼壮热目眵多睡咳 喘急或痘疹已出未出疑似之间

人参 白术 茯苓 芍药 细辛 桔梗 甘草 天花粉【各等分】

右水姜煎服

人参羌活散 治伤寒时气头疼或痘疹兼於发表人参 羌活 独活 柴胡 前胡 桔梗 茯苓 枳殼 川芎 天麻 甘草 地骨皮【各三分】

右入薄荷五叶姜水煎服

参苏饮 治感冒风寒发热咳 或痘疮初起未出咳 等症

人参 紫苏 陈皮 半夏 茯苓 枳壳【麸炒】 桔梗【炒】 前胡 乾葛 甘草【各五分】 木香
右姜水煎服

升均汤 治痘疮已出不匀或吐泻发热作渴

升麻 乾葛 芍药【炒】 人参 白术【炒】 茯苓 甘草 紫草【如无红花代之】

右每服三五钱姜水煎

参芪四圣散 治痘疮已出至六七日不起发不生脓不作痒

人参 黄芪【炒】 白术【炒】 茯苓 当归 芍药【炒】 川芎【各五分】 紫草 木通
防风【各三分】 糯米【四十粒】

右水煎服

人参透肌饮 治痘疮虽出不齐隐於肌肤间者人参 紫草 白术 茯苓 当归 芍药 木通 蝉蜕
甘草 糯米【各等分】

右每服三钱水煎

参芪内托散 治痘疮里虚发痒或不溃脓或为倒靥等症

人参 黄芪【炒】 当归 川芎 厚朴【姜制】 防风 桔梗【炒】 白芷 官桂 紫草 木香
甘草【炒】

右入糯米一撮水煎服仍量儿加減

加味参芪术附汤 治痘疮表里俱虚吐泻作渴手足厥冷非犯里虚寒战咬牙吐泻头温足冷
者不可服人参【三钱】 黄芪【二钱五分】 白术【二钱】 附子
木香【各五分】 当归【一钱五分】 川芎 陈皮【炒】 甘草【炙各一钱】 荳蔻【煨一个】
茯苓 乾葛【各一钱半】 诃子【二个】 芍药【一钱五分】 糯米【三十粒】

右每服二钱姜水煎

紫草快斑汤 治痘疹血气不足不能发出色不红活等症

紫草 人参 白术 茯苓 当归 川芎 芍药 木通 甘草 糯米

右每服二钱水煎

人参胃爱散 治痘疮已发未发吐泻不止不思饮食等症

人参 藿香 紫苏 木瓜 丁香 茯苓 甘草 糯米

右每服三钱姜枣水煎

紫草木香汤 治痘疮里虚痒塌黑陷闷乱

紫草 木香 茯苓 白术 人参 甘草【炒】 糯米

右每服三钱水煎

人参门冬饮 治痘疮发热烦渴等症

麦门冬【一两】 人参 陈皮 白术 厚朴 甘草【各五钱】

右每服二三钱水煎

前胡枳壳汤 治痘疮八九日间腹胀大小便不通等症

前胡 枳壳【麸炒】 茯苓 大黄【炒】 甘草【各等分】

右每服二钱水煎服如身温脉微及泻者不可用

射干鼠粘子汤 治痘疮收敛後余毒不尽发热不止或咽喉肿痛或患热毒等症

升麻 射干 甘草【各一两】

右每服三钱水煎

三豆饮 治天行痘疮始觉即服之多者必少少者不出等症

赤小豆 黑豆 菉豆【各一升】 甘草节【五钱】

右水煮熟任儿食之七日自不发

败草散 治痘疮挝搔成疮脓血淋漓谓之斑烂用屋烂草或盖墙烂草多年者佳取为末搽之须多掺蓆上任儿坐卧

紫草木通汤 治痘 出不快

紫草 人参 木通 茯苓 糯米【各等分】 甘草【減半】

右每服二钱水煎

消毒散 治痘疹初起烦热或痘後余毒疮肿

牛蒡子【炒】 荆芥穗 甘草【各五分】

右水煎服

甘桔防风汤 治痘後余热咽膈不利或咽舌生疮等症

桔梗【炒】 甘草 防风【各一钱】

右水煎服

甘露饮子 治积热痘後咽喉肿痛及口舌生疮等症生地黄【炒】 熟地黄 天门冬【去心】 麦门冬【去心焙】 黄芩【炒】 石斛 枳殼【麸炒】 枇杷叶 茵陈 甘草【炙各等分】

右每服二钱水煎

谷精草散 治痘疹已靨翳膜遮障瞳子等症

谷精草【一两】 蛤粉【二两】 黑豆【二两】

右为末用雄猪肝一叶竹刀批开掺药在内以麻线缚定砂罐内水煮熟令儿食之

化毒丹 治胎毒及痘後头面生疮眼目肿痛或口舌生疮口乾作渴大便坚实等症

生地黄【杵膏】 熟地黄【制膏】 天门冬 麦门冬 玄参【各三两】 甘草 甜硝【各二两】 青黛【一两五钱】

右为末炼蜜丸芡实大每服一丸白汤化下

大如圣饮子 治疮疹癰疽毒攻咽噤肿痛热渴或成肿毒不消等症

麦门冬【五钱】 桔梗 甘草 鼠粘子【炒各一两】

右每服二钱水煎

宣风散 治惊风

枳榔【二个】 陈皮 甘草【各等分】 牵牛【四两生半炒半】

右为末每服五分蜜汤调下

木香散 治小儿腹胀泻渴等症

木香 大腹皮 人参 桂心 赤茯苓 青皮 前胡 诃梨勒 半夏【姜制】 丁香
甘草【炙各等分】

右每服二钱姜水煎

雄黄解毒散 治痘疮後牙疳口臭或走马疳龈颊蚀烂或肢体成痘疳凹陷不愈

雄黄【一两】 铜碌【二钱五分】

右为末用米泔水洗净乾渗患处口内不可用

丝瓜汤 治痘疮毒

丝瓜 升麻 芍药【酒浸】 甘草 黑豆 赤小豆 犀角【镑】

右水煎服

四圣散 治痘疹出不快及倒靨

紫草茸 木通 甘草【炙】 枳壳【麸炒】 黄芪【各等分】

右每服二钱水煎

独圣散 治痘疮倒靨陷伏用穿山甲取前足嘴上者烧存性为末以木香汤入少酒服之

快透散 治痘疮出不快等症

紫草 蝉蜕 人参 木通 芍药 甘草【炙各等分】

右每服二钱水煎

鼠粘子汤 治麻疹稠密身热等症

鼠粘子【炒】 当归 甘草【炙各一钱】 柴胡 连翘
黄芩 黄芪【各一钱半】 地骨皮【二钱】

右每服二钱水煎

紫草散 治痘疹黑陷气血虚弱疮疹不起

紫草 甘草 黄芪【炙】 糯米【各一钱半】

右水煎服

益元散 治痘疹初起烦躁作渴等症

滑石【六两】 甘草【一两】

右各另为末每服五六分白汤调下

粉红丸 治心虚困卧惊动痰涎不利或发热痰 等症

天南星 朱砂【一钱五分】 天竺黄【五钱】 龙脑【一钱】 胭脂【一钱】

右用牛胆汁和丸芡实大每服一丸砂糖汤下

制附子法

附子重一两三四钱有莲花瓣头圆底平者先备童便五六碗将附子先放在竈上烟柜中间良久乘热投入童便浸五七日候润透揭皮切四块仍浸二三日用粗纸数层包之浸湿埋灰火半日取出切片检视有白星者乃用瓦上炙熟至无白星为度如急用即切大片用童便煮二三沸热瓦熟用之

薛氏医案卷二十五

卷二十六

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二十六

明 薛己 订

妇人良方

调经门【凡医妇人先须调经故以为首】

月经序论第一

岐伯曰女子七岁肾气盛齿更髮长二七而天癸至任脉通太冲脉盛月事以时下天谓天真之气癸谓壬癸之水故云天癸也然冲为血海任主胞胎二脉流通经血渐盈应时而下常以三旬一见以像月盈则亏也若遇经行最宜谨慎否则与产後症相类若被惊怒劳役则血气错乱经脉不行多致劳瘵等疾若逆於头面肢体之间则重痛不宁若怒气伤肝则头晕脇痛呕血而瘵 痛若经血内渗则窍穴淋无已凡此六淫外侵而变症百出犯时微若秋毫成患重如山岳可不畏哉

愚按血者水谷之精气也和调五脏洒陈六腑在男子则化为精在妇人上为乳汁下为血海故虽心主血肝藏血亦皆统摄於脾补脾和胃血自生矣凡经行之际禁用苦寒辛散之药饮食亦然诗云妇人和平则乐有子和则阴阳不乖平则气血不争故经云平和之气三旬一见可不慎欤

精血篇第二【齐大夫褚澄遗书】

饮食五味养骨髓肌肉毛髮男子为阳阳中必有阴阴中之数八故一八而阳精升二八而阳精溢女子为阴阴中必有阳阳中之数七故一七而阴血升二七而阴血溢皆饮食五味之实秀也方其升也智虑开明齿牙更始髮黄者黑筋弱者强暨其溢也凡充身体手足耳目之余虽针芥之历无有不下凡子形肖父母者以其精血尝於父母之身无所不历也是以父一肢废则子一肢不肖其父母一目亏则子一目不肖其母然雌鸟牝兽无天癸而成胎何也鸟兽精血往来尾间也精未通而御女以通其精则五体有不滿之处异日有难状之疾阴已痿而思色以降其精则精不出而内败小便澁而为淋精已耗而复竭之则大小便牵痛愈痛则愈便愈便则愈痛女人天癸既至踰十年无男子合则不调未踰十年思男子合亦不调不调则

旧血不出新血误行或渍而入骨或变而为肿後虽合而难子合多则?枯虚人产衆则血枯杀人观其精血思过半矣愚按丹溪先生云人受天地之气以生天之阳气为气地之阴气为血故气常有余血常不足夫人之生也男子十六岁而精通女子十四岁而经行故古人必待三十二岁而後嫁娶可见阴气之难成而养之必欲其固也经曰年至四十阴气自半而起居衰矣夫阴气之成止供给得三十年之运用况男子六十四岁而精絶女子四十九岁而经断夫肾乃阴中之阴也主闭藏者肝乃阴中之阳也主疏泄者然而二脏皆有相火其系上属于心心火一动则相火翕然而从之所以丹溪先生只是教人收心养性其旨深矣天地以五行更迭衰旺而成四时人之五脏六腑亦应之而衰旺如四月属巳五月属午为火火旺火为肺金之夫火旺则金衰六月属未为土土旺土为水之夫土旺则水衰况肾水尝藉肺金为母以补其不足古人於夏月必独宿而淡味兢兢业业保养金水二脏正嫌火土之旺尔经又曰冬藏精者春不病温十月属亥十一月属子正火气潜藏必养其本然之真以助来春生发之气则春末夏初无头痛脚软食少体热注夏之病矣窃谓人之少老态不耐寒暑不胜劳役四时迭病皆因气血方长而劳心亏损或精血未滿而早断丧故见其症难以名状若左尺脉虚弱或细数是左肾之真阴不足也用六味丸右尺脉迟软或沈细而数欲絶是命门之相火不足也用八味丸至於两尺微弱是阴阳俱虚用十补丸此皆滋其化源也不可轻用黄柏知母之类设或六淫外侵而见诸症亦因其气内虚而外邪凑袭尤宜用前药

附治验【男子阳痿精耗治验见内科摘要】

一妇人年三十有七早孀居两腿骨作痛晡热体倦月经不调或发寒热数年矣一日颈项两侧结核两脇胀痛此系肝经郁火而成也先用小柴胡汤合四物数剂肝症顿愈又用加味逍遥散加泽兰乳香没药三十剂血症渐痊再用加味归脾等药年余而安一孀妇两腿作痛或用除湿化痰等药遍身作痛而无定处余曰此血症也不信乃服流气饮之类而歿一放出宫人年四十余臀腿内股作痛晡热口乾月经不调此系肝经血少不能养经络而然也宜用加味逍遥散加泽兰叶五十余剂诸症稍缓又以归脾汤兼服二百余剂而痊

一放出宫人臀腿肿痛内热晡热恶寒体倦咳 胸痞月经过期而少彼以为气毒流注服清热理气之剂益甚余曰此乃肝经瘀血停留所致盖肝经上贯膈布脇肋循喉咙下循膻内廉绕阴器抵少腹主治之法但当补其所不胜而制其所胜补者脾也制者肝也经曰虚则补之实则泻之此定法也彼不信仍服前方遂致不起

附方

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

十补丸【方见二十四卷第四论即十全大补汤料炼密为丸】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

四物汤【方见二十四卷第六论】

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

产宝方序论第三

大率治病先论其所主男子调其气女子调其血气血者人之神也然妇人以血为基本苟能谨於调护则血气宣行其神自清月水如期血凝成孕若脾胃虚弱不能饮食荣卫不足月经不行肌肤黄燥而无光泽寒热腹痛难於子息或带下崩漏血不流行则成?症愚按前症若妇人脾胃久虚以致气血俱衰遂而月经不行宜补其胃气滋其化源或患中消胃热津液不生而致血海乾涸宜清胃补脾其经自行矣经曰胃者卫之源脾者荣之本鍼经曰荣出中焦卫出上焦卫不足益之必以辛荣不足补之必以甘甘辛相合脾胃健而荣卫生是以气血俱旺也或因劳心虚火妄动月经错行宜安心补血泻火此东垣先生治法也

王子亨方论第四

论曰经者常候也谓候其一身之阴阳愆伏知其安危故每月一至太过不及皆为不调阳太过则先期而至阴不及则後时而来其有乍多乍少断絶不行崩漏不止皆由阴阳衰盛所致

愚按经云脾统血肝藏血此症多因恚怒伤肝郁结伤脾所致当从二经为主而参以前论治之

月水不调方论第五

妇人月水不调由风邪乘虚客於胞中而伤冲任之脉损手太阳少阴之经盖冲任之脉皆起於胞中为经络之海与手太阳小肠手少阴心经为表里上为乳汁下为月水然月水乃经络之余苟能调摄得宜则经应以时矣

愚按经曰饮食入胃游溢精气上输於脾脾气散精上归於肺通调水道下输膀胱水精四布五经并行东垣先生所谓脾为生化之源心统诸经之血诚哉是言也窃谓心脾平和则经候如常苟或七情内伤六淫外侵饮食失节起居失宜脾胃虚损心火妄动则月经不调矣又丹溪先生云先期而至者血热也後期而至者血虚也愚则谓先期而至者有因脾经血燥有因脾经郁火有因肝经怒火有因血分有热有因劳役火动过期而至者有因脾经血虚有因肝经血少有因气虚血弱主治之法脾经血燥者加味逍遥散脾经郁火者归脾汤肝经怒火者加味小柴胡汤血分有热者加味四物汤劳役火动者补中益气汤脾经血虚者人参养荣汤

肝经血少者六味地黄丸气虚血弱者八珍汤盖血生於脾土故云脾统血凡血病当用苦甘之剂以助阳气而生阴血也

附治验

一妇人发热口乾月经不调两腿无力或用祛风渗湿之剂腿痛体倦二膝浮肿经事不通余作足三阴经血虚火燥名鹤膝风用六味八味二丸兼服两月形体渐健饮食渐进膝肿渐消半载而痊

一妇人月事未期而至发热自汗或用清热止汗之剂作渴头眩手掉身麻余曰此肝经血虚火动火为阳盛则生风用柴胡炒芩连山梔归芍生地丹皮各一钱参芪苓术各一钱五分川芎七分甘草五分二剂汗止更用补中益气而愈

一妇人经行劳役忽然昏愤面赤吐痰余曰此乃去血过多阳无所附故耳急饮童便碗许神思渐爽更用参芪各五钱芎归各三钱玄参柴胡山梔炙草各一钱一剂又用逍遥散加五味麦门二剂如此月余渐愈但体倦面黄又以十全大补加五味麦门治之而愈

一妇人性善怒产後唇肿内热或用清热败毒散唇口肿胀日晡热甚月水不调再用降火化痰遂令食少作呕大便不实唇出血水又用理气消导胸膈痞满头目不清唇肿经闭又用清胃行血肢体倦怠发热烦燥涎水涌出又欲用通经之剂余曰病本七情肝脾亏损又数行攻伐故元气之益虚耳法当补阴益阳遂以济生归脾汤加味逍遥散补中益气汤调治元气渐复诸症悉愈

姜黄散 治瘀血凝滞肚腹刺痛或腹胀发热口乾等症

姜黄 当归【洒拌各二钱】 蓬术【醋炒】 红花 桂心
川芎玄胡索【炒】 牡丹皮【各五分】

右水酒各一半煎服

醋附丸 治元脏虚冷月候不调头眩少食浑身寒热腹中急痛赤白带下心忪气闷血中虚寒胎气不固用醋煮香附半筋焙为末醋糊丸桐子大每服三四十丸米饮下

愚按前症若元脏虚寒手足逆冷用八味丸手足发热用六味丸气血不足用八珍汤中气不足用补中益气汤脾气不足用六君子汤脾气郁结用归脾汤若例用香散之剂恐伤气燥而阴血渐衰也

附方

加味逍遥散

八珍汤

归脾汤【三方见二十四卷第四论】

加味小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

加味四物汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

人参养荣汤【方见二十四卷第三论】

八味丸

六味丸【二方见二十四卷第十一论】

月经不通方论第六

妇人月水不通或因醉饱入房或因劳役过度或因吐血失血伤损肝脾但滋其化源其经自通若小便不利苦头眩痛腰背作痛足寒时痛久而血结於内变为症?若血水相并脾胃虚弱壅滞不通变为水肿若脾气衰弱不能制木水渍肌肉变为肿满当益其津液大补脾胃方可保生

愚按经水阴血也属冲任二脉上为乳汁下为月水其为患有因脾虚而不能生血者有因脾郁而血不行者有因胃火而血消烁者有因脾胃损而血少者有因劳伤心而血少者有因怒伤肝而血少者有因肾水不能生肝而血少者有因肺气虚不能行血者治疗之法若脾虚而不行者调而补之脾郁而不行者解而补之胃火而不行者清而补之脾胃损而不行者温而补之劳伤心血而不行者逸而补之怒伤肝而不行者和而补之肺气虚而不行者补肝胃肾虚而不行者补脾肺经云损其肺者益其气损其心者调其荣卫损其脾者调其饮食适其寒温损其肝者缓其中损其肾者益其精旨当审而治之

附治验

一妇人停食饱闷发热或用人参养胃汤益甚再用木香枳榔丸泄泻吐痰腹中成块饮食少思又用二陈黄连厚朴之类前症益甚腹胀不食月经不至余以为胃气亏损用补中益气加

茯苓半夏三十余剂脾胃健而诸症愈又二十余剂而经自行

一妇人饮食後或腹胀或吞酸彼服枳术丸吞酸益甚饮食日少胸膈痞满腿内酸痛畏见风寒又服养胃汤一剂腿内作痛又二剂腿膝浮肿月经不行余谓郁结所伤脾虚湿热下注侵晨用四君二陈芎归午後以前汤送越鞠丸饮食渐进诸症渐愈又用归脾八珍二汤兼服两月余而经行

一妇人性沈多虑月经不行胸膈少食或作胀或吞酸余以为中气虚寒用补中益气加砂仁香附煨姜二剂胸膈和而饮食进更以六君加芎归贝母桔梗生姜大枣数剂脾胃健而经自调矣

一妇人素有胃火或用清胃散而安後因劳役躁渴内热肌肉消瘦月经不行余谓此胃火消烁阴血用逍遥散加丹皮炒梔以清胃热用八珍汤加茯苓远志以养脾血而经自行矣

一妇人久患疟形体怯弱内热晡热自汗盗汗饮食少思月事不行或用通经丸虚症悉具余曰此因虚而致疟因疟以闭经也用补中益气及六味地黄丸各百余剂疟愈而经自行

一妇人久患疟疟作则经不行形虚脉大头痛懒食大便泄泻小便淋?口乾唇裂内热腹膨盖由久疟正气已虚阴火独旺用补中益气汤治之寻愈惟不时头痛乃加蔓荆子而痛止又兼用六味地黄丸而经行

一妇人因劳耳鸣头痛体倦此元气不足用补中益气加麦门五味而痊三年後得子因饮食劳倦前症益甚月经不行晡热内热自汗盗汗用六味地黄丸补中益气汤顿愈

一妇人胃气素弱为哭母吐血咳 发热盗汗经水三月不行余以为悲则伤肺思则伤脾遂朝服补中益气加桔梗贝母知母夕用归脾汤送地黄丸而愈一 妇少寐经水两月余一至误服通经丸展转无寐午前恶寒午後发热余以为思虑亏损脾血用归脾汤作丸午前以六君送下午後以逍遥散送下两月余得寐半载经行如期年余而疮愈余详见各门

附方

补中益气汤【方见二十四卷第十论】

四君子汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

二陈汤【方见二十四卷第五论】

越鞠丸【方见六卷第七论】

归脾汤

逍遥散

八珍汤【三方见二十四卷第四论】

清胃散【方见二十四卷首论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

养生必用论第七

初虞世云女子十四天癸至任脉通月事以时于是有子天癸者物之自然月者以月至经者有常也其来过与不及皆谓之病若荣血亏损不能滋养百骸则髮落面黄羸瘦燥热燥气盛则金受邪金受邪则为咳为 为肺痈为肺痿必矣但助胃壮气则荣血生而经自行须慎饮食调七情保神气庶可得生若暴怒气逆经闭不行当用行气破血之剂

愚按刘宗厚先生云荣者水谷之精和调於五脏洒陈於六腑乃能入於脉也源源而来生化於脾总统於心藏受於肝宣布於肺施泄於肾灌溉一身目得之而能视耳得之而能听手得之而能握足得之而能步脏得之而能液腑得之而能气注之於脉少则濇充则实常以饮食滋养则阳生阴长变化而为血诸经恃此则百脉长养耗竭则百脉空虚可不慎哉若阴气一伤变症百出妄行於上则吐衄衰涸於下则癰闭血渗肠间则为肠风阴虚阳抟则为崩中湿蒸热瘀则为滞下热极腐化则为脓血火极似水则血紫黑热胜於陰发为疮疡湿滯於血则为痛痒癰疹蓄之在上则善忘蓄之在下则善狂

琥珀散 治心膈迷闷肚腹撮痛月信不通等疾

乌药【二两】当归【酒制一两】蓬术【醋制一两】

右为末每服二钱温酒调

万病丸 治月经瘀闭脐腹作痛及产後症等病

乾漆【炒烟出青白为度】牛膝【酒浸焙各一两】

右为末生地黄汁一升砂器慢火熬膏丸桐子大每服二十丸空心米饮下仍参前论主之

红花当归散 治经候不行腰膝重痛小腹坚硬红花 当归尾【酒拌】 紫葳
牛膝【酒制】 甘草【炙】 苏木【各二钱】 白芷
桂心【各一钱半】 赤芍药【炒一两】 刘寄奴【去根五钱】

右为末每服三钱温酒调

室女月水不通方论第八

论曰夫冲任之脉起於胞内为经脉之海手太阳小肠手少阴心二经为表里女子十四而天癸至肾气全盛冲任流通经血既盈应时而下否则不通也

愚按前症若禀阴血不足用四物参苓怒伤肝血用加味逍遥散郁结伤脾用加味归脾汤肝火拂郁用加味小柴胡汤胃经积热用加味清胃散余当参考前论

附方

四物汤【方见二十四卷第六论】

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

加味小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

加味清胃散【方见二十四卷首论】

室女经闭成劳方论第九

寇宗奭曰夫人之生以气血为本人之病未有不先伤其气血者若室女童男积想在心思虑过度多致劳损男子则神色消散女子则月水先闭盖忧忿思虑则伤心而血逆竭神色先散月水先闭且心病则不能养脾故不嗜食脾虚则金亏故发 肾水绝则木气不荣而四肢乾痿故多怒鬢髮焦筋骨痿若五脏伤遍则死自能改易心志用药扶持庶可保生切不可用青蒿?虫等凉血行血宜用栝子仁丸泽兰汤益阴血制虚火愚按经云五谷入於胃其糟粕津液宗气分为三隧故宗气积于胸中出於喉咙以贯心肺而行呼吸荣气者秘其津液注之於脉化以为血以荣四末内养五脏六腑若服苦寒之剂复伤胃气必致不起

附治验

一室女年十七 久不愈天癸未通发热咳 饮食少思欲用通经丸余曰此盖因禀气不足

阴血未充故耳但养气血益津液其经自行彼惑於速效仍用之余曰非其治也此乃慊悍之剂大助阳火阴血得之则妄行脾胃得之则愈虚後果经血妄行饮食愈少遂致不救

栝子仁丸

栝子仁【炒别研】牛膝【酒制】卷栝【各半两】泽兰叶【一两】

右为末密丸桐子大每服三十丸空心米饮下

泽兰汤

泽兰叶【二钱】当归 芍药【炒各一钱】甘草【炙五分】

右水煎服

劫劳散 治劳 发热盗汗体瘦睡中有红或成肺痿白芍药【炒一钱】黄芪【炒】甘草【炒】人参 五味子【杵炒】当归 半夏【姜制】白茯苓 熟地黄【自制】阿胶【炒各五分】

右姜枣水煎日三服乡人杨元鼎女及笄病此甚危百药无效偶遇名医得此方服三十余剂遂愈不发

血枯方论第十【出骆龙吉方】

腹中论曰有病胸脇支满妨於食病至则先闻腥臊臭出清液四肢清目眩时时前後血病名曰血枯此年少时因大脱血或醉而入房亏损肾肝盖肝藏血受天一之气以为滋荣其经上贯膈布脇肋若脱血失精肝气已伤肝血枯涸不荣而胸脇满妨於食则肝病传脾而闻腥臊臭出清液若以肝病而肺乘之则唾血四肢清目眩时时前後血出皆肝病血伤之症也

愚按前症若饮食起居失宜而脾胃虚损当滋化源而佐以乌贼丸等药若因脾土虚寒而不能生血宜补命门火若服燥药郁火内作而津液消烁宜清热养血若脾胃亏损而气血虚宜补中益气若胃热消中而血液耗损宜清脾胃之火若大便秘澁小便清利而经不行宜清胞络之火若劳伤心火血涸而经不行宜补心养血仍参看前第三论主治

附治验

一妇人久患血崩肢体消瘦饮食到口则闻腥臊口出清液每食少许腹中作胀此血枯之症肺肝脾胃亏损之患用八珍汤乌贼骨丸兼服两月而经行百余剂而安

乌贼鱼骨丸

乌贼鱼骨【去甲四两】?茹【一两】

右为末以雀卵丸小豉大每服五丸加至十丸鲍鱼煎汤下以饭压之

熟地黄汤 治大脱血或醉入房月事不行以致前症熟地黄【自制】泽兰叶 白茯苓 人参 五味子【杵炒】附子【炮】禹余粮【制】当归【酒制各五分】

右为末每服三钱水煎空心服

附方

八珍汤【方见二十四卷第四论】

茯苓补心汤 治妇人心气虚耗不能主血又不能制乎肺金气得以乘乎肝木肝既亏损则血不能藏渐致精血枯涸月事不调此方专补心元之虚抑其肺气调和荣卫滋养血脉

前方参苏饮内除木香与四物汤对匀和每服四钱以姜枣煎温服此方常进用以治宫娥多效【参苏饮方见三三卷首论四物汤方见二十四卷第六论】

月水不利方论第十一

妇人月水不利者由劳伤气血体虚而风冷客於胞内伤於冲任之脉故也若寸脉弦关脉沈是肝病也兼主腹痛孔窍生疮尺脉滑血气实经络不利或尺脉絶不至兼主小腹引腰痛气攻胸膈也

愚按前症属肝胆二经盖肝胆相为表里多因恚怒所伤若本经风热用补肝散血虚用四物加酸枣仁若肾水不足用六味丸若患诸疮疡治见第八卷二十四卷

牛膝散 治月水不利脐腹作痛或小腹引腰气攻胸膈

牛膝【酒制】桂心 赤芍药【炒】桃仁【去皮尖】玄胡索【炒】当归【酒浸】牡丹皮【各一两】木香【三钱】

右为末每服一钱温酒调下或每服三五钱水煎

附方

补肝散【方见七卷第十七论】

四物汤【方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

月水行止腹痛方论第十二

妇人经来腹痛由风冷客於胞络冲任或伤手太阳少阴经用温经汤桂枝桃仁汤若忧思气郁而血滞用桂枝桃仁汤地黄通经丸若血结而成块用万病丸愚按前症若风寒伤胞者六君加炮姜思虑伤血者四物加参术思虑伤气者归脾加柴梔郁怒伤血者归脾逍遥兼服余参前後论治之

附治验

一妇人经行腹痛食则呕吐肢体倦怠发热作渴此乃素禀气血不足用八珍汤二十余剂而愈後生子二年而经不行前症仍作服八珍汤逍遥散百余剂方愈

地黄通经丸 治月经不行或产後恶露脐腹作痛熟地黄【自制四两】?虫【去头翅炒】水蛭【糯米同炒黄去糯米】桃仁【去皮尖各五十枚】

右为末密丸桐子大每服五七丸空心温酒下

万病丸【方见前第七论】

温经汤 治寒气客於血室以致血气凝脐腹作痛其脉沈紧

当归 川芎 芍药 桂心 蓬术【醋炒】牡丹皮【各五分】人参 牛膝【酒炒】甘草【炒各一钱】

右水煎服

桂枝桃仁汤

治经脉顿然不行腹中作痛或上攻心脇欲死或因经脉不行渐成积块脐下如覆杯桂枝 芍药 生地黄【各二钱】桃仁【七枚去皮尖】甘草【一钱】

右姜水煎

若因七情郁结血随气滞者宜服此汤如不瘥用地黄通经丸已成血块者用万病丸【方见

前】

愚按前症若肝经怒气用加味逍遥散若肝经血虚用四物参术柴胡牡丹皮若肝经血热用四物牡丹皮若肝肾虚火用六味地黄丸若肝脾血虚用八珍加牡丹皮若肝脾郁怒用加味归脾汤若气虚血弱用补中益气汤若脾不能摄血用六君子加川芎当归若肝虚不能藏血用补肝散

附方

六君子汤

四物汤【二方见二十四卷第六论】

归脾汤

逍遥散

八珍汤【三方见二十四卷第四论】

月水不断方论第十三

妇人月水不断淋?腹痛或因劳损气血而伤冲任或因经行而合阴阳以致外邪客於胞内滞於血海故也但调养元气而病邪自愈若攻其邪则元气反伤矣愚按前症若郁结伤脾用归脾汤恚怒伤肝逍遥散肝火妄动加味四物汤脾气虚弱六君子汤元气下陷补中益气汤热伤元气前汤加五味麦门炒黑黄栢

附治验

儒者钱思习子室年三十余无嗣月经淋?无期夫妇异处几年矣思习欲为娶妾以谋诸余余意此郁怒伤肝脾虚火动而血不归经乃肝不能藏脾不能摄也当清肝火补脾气遂与加味归脾逍遥二药四剂送至其家仍告其姑曰服此病自愈而当受胎妾可无娶也果病愈次年生子

一妇人性急每怒非太阳耳项?齿胸乳作痛则胸满吞酸吐泻少食经行不止此皆肝火之症肝自病则外症见土受尅则内症作余先以四物加白术茯苓柴胡炒梔炒龙胆清肺养血次用四君加柴胡芍药神麴吴茱萸炒黄连以培土制肺渐愈惟月经不止是血分有热脾气尚虚以逍遥散倍用白术茯苓陈皮又以补中益气加酒炒芍药兼服而安

一妇人多怒经行旬余方止後淋?无期肌体倦瘦口乾内热盗汗如洗日晡热甚皆由肝脾亏

损无以生发元气用参芪归术茯神远志枣仁麦门五味丹皮龙眼肉炙草柴胡升麻治之获痊

一妇人怀抱不舒腹胀少寐饮食素少痰涎上涌月经频数余曰脾统血而主涎此郁闷伤脾不能摄血归源耳用补中益气济生归脾而愈

附方

归脾汤

逍遥散【二方见二十四卷第四论】

加味四物汤

四君子汤

六君子汤

补中益气汤【四方见二十四卷第六论】

妇人杀血心痛方论第十四

妇人血崩而心痛甚名曰杀血心痛由心脾血虚也若小产去血过多而心痛甚者亦然用乌贼鱼骨炒为末醋汤调下失笑散亦效

愚按前症若阴血耗散用乌贼丸收敛之若瘀血不散用失笑散行散之若心血虚弱用芎归汤补养之若郁结伤血用归脾汤调补之

附治验

一妇人血崩兼心痛三年矣诸药不应每痛甚虚症悉具面色痿黄余曰心主血盖由去血过多心无所养以致作痛宜用十全大补汤参术倍之三十余剂稍愈百余剂全愈

附方

失笑散【方见二十卷第五论】

芎归汤【方见十七卷第四论】

归脾汤

十全大补汤【二方见二十四卷第四论】

暴崩下血不止方论第十五

妇人冲任二脉为经脉之海外循经络内荣脏腑若阴阳和平经下依时若劳伤不能约制则忽然暴下甚则昏闷若寸脉微迟为寒在上焦则吐血衄血尺脉微迟为寒在下焦则崩血便血大抵数小为顺洪大为逆大法当调补脾胃为主

愚按经云阴虚阳抟谓之崩又云阳络伤则血外溢阴络伤则血内溢又云脾统血肝藏血治法前症因脾胃亏损不能摄血归源用六君加芎归柴胡若肝经之火而血下行用奇效四物汤或四物加柴梔苓术若肝经风热而血妄行用加味逍遥散或小柴胡梔芍丹皮若怒动肝火而血沸腾亦用前药若脾经郁结而血不归经用归脾加柴梔丹皮若悲伤胞络而血下崩用四君加柴梔升麻故东垣先生云凡下血症须用四君子以收功厥有旨哉若大吐血母以脉论当急用独参汤救之若潮热咳 脉数乃元气虚弱假热之脉尤当用人参温补此等症候无不由脾胃先损故脉洪大察其有胃气能受补则可救苟用寒凉止血之药复伤脾胃反不能摄血归源是速其危也

附治验

大尹王大成之内久患崩自服四物凉血之剂或作或辍因怒发热其血不止服前药不应乃主降火更加脇腹大痛手足俱冷余曰此脾胃虚寒所致先用附子理中汤体热痛止又用济生归脾补中益气二汤崩血顿愈若泥痛无补法则误矣

锦衣杨永兴之内患前症过服寒凉之剂其症益甚更加肚腹痞闷饮食不入发热烦躁脉洪大而虚余曰此脾经气血虚而发躁也当急用八珍汤加炮姜以温补之缓则不救不信乃服止血降火之剂虚症蜂起始信余言缓不及治矣

一妇人面黄或赤觉腰间或脐下作痛四肢困倦烦热不安经行先发寒热两肋如束血涌如崩此脾胃亏损元气下陷与相火湿热所致用补中益气加防风芍药炒黑黄栢间以归脾汤调补而血始归经一妇人因怒崩血久不已面青黄而或赤此肝木制脾土而血虚用小柴胡合四物清肝火生肝血又用归脾补中二汤益脾气生肝血而瘥此症若因肝经风热而血不宁者防风为丸以兼症之药煎送或肝经火动而血不宁者炒条芩为丸以兼症之药煎送若瘀血为患用五灵脂为末烧铁器淬酒调服无不效者

奇效四物汤 治肝经虚热血沸腾而崩久不止当归【酒拌】熟地黄【自制】白芍药川芎阿胶【炒】艾叶【炒】黄芩【炒各等分】

右每服四钱水煎

治血崩血?或经行产後心腹脇痛五灵脂炒烟尽为末每服一钱温酒调或用三钱水酒童便煎服

治风热血崩荆芥穗灯火烧焦为末每服三钱童便调独圣散

治肝经有风血崩用防风去义芦为末每服一钱空心食前酒煮白面清饮调下极验

神应散 治血虚内热血不归源而崩用桂心烧存性为末每服一二钱米饮调下

又方陈槐花一两百草霜半两为末每服一二钱烧红秤锤淬酒下

附方

四君子汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

补中益气汤【方见二十四卷第十论】

四物汤【方见二十四卷第六论】

归脾汤

加味逍遥散

八珍汤【三方见二十四卷第四论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

独参汤【方见三卷第十三论】

附子理中汤【方见二十卷第八论】

带下方论第十六

妇人带下其名有五因经行产後风邪入胞门传於脏腑而致之若伤足厥陰肝经色如青泥伤手少陰心经色如红津伤手太阴肺经形如白涕伤足太阴脾经黄如烂爪伤足少阴肾经黑如衄血人有带脉横於腰间如束带之状病生於此故名为带

愚按徐用诚先生云前症白属气而赤属血东垣先生云血崩久则亡阳故白滑之物下流未必全拘於带脉亦有湿痰流注下焦或肾肝阴淫之湿胜或因惊恐而木乘土位浊液下流或思慕为筋痿戴人以六脉滑大有力用宣导之法此泻其实也东垣以脉微细沈紧或洪大而虚用补阳调经乃兼责其虚也丹溪用海石南星椿根皮之类乃治其湿痰也窃谓前症皆当壮脾胃升阳气为主佐以各经见症之药色青者属肝用小柴胡加山梔防风湿热壅滞小便赤濇用龙胆泻肝汤肝血不足或燥热风热用六味丸色赤者属心用小柴胡加黄连山梔当归思虑过伤用妙香散等药色白者属肺用补中益气加山梔色黄者属脾用六君子加山梔柴胡不应用归脾汤色黑者属肾用六味丸气血俱虚八珍汤阳气下陷补中益气汤湿痰下注前汤加茯苓半夏苍术黄柏气虚痰饮下注四七汤送六味丸不可拘肥人多痰瘦人多火而以燥湿泻火之药轻治之也

附治验

一孀妇腹胀脇痛内热晡热月经不调肢体痰麻不时吐痰或用清气化痰?间不利带下青黄腹脇膨胀又用行气之剂胸膈不利肢体如麻此乃郁怒伤损肝脾朝用归脾汤以解脾郁生脾气夕用加味逍遥散以生肝血清肝火百余剂而愈

一妇人久疟兼带发热口乾体倦用七味白术散加麦门五味大剂煎与恣饮再发稍可乃用补中益气加茯苓半夏十余剂而愈

一妇人头晕吐痰胸满气喘得食稍缓苦於白带二十余年矣诸药不应此气虚而痰饮也痰饮愈而带自愈遂朝用六君子汤夕用六味地黄丸不月而验一妇人耳鸣胸痞内热口乾喉中若有一核吞吐不利月经不调兼之带下余以为肝脾郁结用归脾汤加半夏山梔升麻柴胡间以四七汤下白丸子而愈一妇人吞酸饱满食少便泄月经不调服清气化痰丸两膝渐肿寒热往来带下黄白面痿体倦此脾胃俱虚湿痰下注用补中益气倍用参术加茯苓半夏炮姜而愈

一妇人带下四肢无力余曰四肢者土也此脾胃虚弱湿痰下注以补中益气济生归脾二药治之而愈一妇人带下黄白怒则胸膈不利饮食少思或用消导利气之药痰喘胸满大便下血余曰此因脾气亏损不能摄血归源用补中益气加茯苓半夏炮姜四剂诸症顿减又用八珍加柴胡山梔而痊

附方

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

妙香散【方见三卷第十三论】

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

归脾汤

八珍汤

加味逍遥散【三方见二十四卷第六论】

七味白术散【方见二十一卷第二论】

四七汤【方见十二卷第七论】

白丸子【方见三卷第四论】

崩中漏血生死脉方论第十七

妇人崩中漏下之症已见前论按其寸口脉弦而大弦则为紧大则为芤紧则为寒芤则为虚虚寒相抟其脉为牢妇人半产漏下赤白不止脉小虚滑者生脉大紧实数者死又脉急疾者死迟者生又云尺寸脉虚者漏血脉浮者俱不治

愚按前症阐内经微旨济无穷天札须固胃为善盖胃为五脏之本源人身之根蒂所用治法当参前後论

附治验

一妇人年将七十素有肝脾之症每作则饮食不进或胸膈不利或中脘作痛或大便作泻或小便不利余用逍遥散加山梔茯神远志木香而愈後忧女孀居不时吐紫血其病每作先倦怠而後发热经曰积忧伤肺积思伤脾肺布叶举是令子母俱病不能摄血归经而致前症遂以前药加炒黑黄连三分吴茱萸二分顿愈复因怒吐赤血甚多躁渴垂死此血脱也法当补气乃用人参一两苓术当归各三钱陈皮炮黑乾姜各二钱炙草木香各一钱一剂顿止一妇人年六十有四久郁怒头痛寒热春间乳内时痛服流气饮之类益甚不时有血如经行又因大惊恐饮食不进夜寐不宁此因高年去血过多至春无以生发肝木血虚火燥所以至晚陰旺则发赤经云肝藏魂魄无所附故不能寐先以逍遥散加酒炒黑龙胆草一钱山梔一钱五分二剂肿痛顿退又二剂而全消再用归脾汤加炒梔贝母诸症悉愈

表弟方健甫内五十岁辛丑患血崩诸药罔效壬寅八月身热体痛头晕涕出吐痰少食衆作火治展转发热絶粒数日余诊之曰脾胃久虚过服寒药中病未已寒病复起遂用八味丸料一服翌早遂索粥数匙再服食倍热减痛止乃服八味丸而愈癸卯秋因劳役忧怒甲辰夏病复作胸饱发热脊痛腰疼神气怫郁或作内伤或作中暑崩血便血烦渴引饮粒米不进昏愤时作脉洪大按之微弱此无根之火内虚寒而外假热也以十全大补加附子一剂遂食粥三四匙崩血渐减日服八味丸始得全愈【备见女科提要】

栢叶散 治元气虚弱崩中漏血年久不愈亦治白带栢叶【炒】续断【酒炒】川芎 生地黄 当归 鼈甲【炙】 龟甲 禹余粮【各两五钱】 阿胶【炙】 赤石脂【煨】 牡蛎【煨】 地榆 艾叶【炒】 鹿茸【炙各五钱】

右为末每服二钱粥饮调下

地黄丸 治足三阴亏损经行数日不止或兼带下无子

熟地黄【自制】 山茱萸肉 芡萸仁【各一两】 乾姜【三钱炮】 白芍药【微炒】 代赭石【各一两】 白殭蚕【炒】 厚朴【姜制各三钱】

右为末密丸桐子大每服五十丸空心温酒日三服许学士云凡妇人有白带多致不孕育宜速治之故扁鹊过邯郸闻妇人有此病遂自名带下医以就治之

白芷散 治下元虚弱赤白带下或经行不止等症

白芷【一两】 海漂蛸【二枚烧】 胎髮【一团煨】

右为末每服二钱温酒调下

附方

东垣益胃升阳汤 治血脱当益其气盖先补胃气以助生发之气故曰阳生阴长诸甘药为之先务举世皆以为补气殊不知甘能生血此阳生阴长之理故理胃气则血归於脾矣故曰脾统血

东垣升麻除湿汤【二方见二十卷第九论】

东垣升阳益胃汤 治肺脾胃虚怠惰嗜卧四肢不收身体沈重口乾食无味大便不调小便频数食少食不消洒淅恶寒而或微热崩带不止【方见三卷第十三论】

十全大补汤

逍遥散

归脾汤【三方见二十四卷第四论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人白浊白淫方论第十八

妇人小便白浊白淫由心肾不交水火不济用金锁正元丹若心虚而致用平补正心丹降心丹威喜丸若思虑伤脾用四七汤吞白丸子更以乌沈汤加茯苓益智愚按前症若元气下陷用补中益气汤脾胃亏损六君加升麻柴胡脾经郁结归脾加黄栢山梔肝经怒火龙胆泻肝汤虚则用加味逍遥散宜与带下参看主治

一妇人善怒或小腹痞闷或寒热往来或小便频数时下白淫药久不愈面青口苦余以为积愤而不能发散所致用龙胆泻肝汤而愈用加味逍遥散八珍汤而安

锁精丸 治下元虚弱小便白浊或白带淋漓小便频数

破故纸【炒】 青盐 白茯苓【去皮】 五味子【炒等分】

右为末酒糊丸桐子大每服三十丸盐汤或酒下

固精丸 治胞气虚寒小便白浊或小便无度等症牡蛎【煨】 兔丝子【酒浸蒸炒】 韭子【炒】 龙骨【煨】 五味子【炒】 白茯苓【去皮】 桑螵蛸【酒炙】 白石脂【煨】

右等分为末酒糊丸桐子大每服七十丸空心盐汤下

附方

补中益气汤【方见二十四卷第十论】

六君子汤【方见二十四卷第六论】

归脾汤【方见二十四卷第四论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

妇人天癸过期方论第十九

许学士云妇人经脉过期不尽腰腹疼痛或七七数尽而月经下者宜用当归散治之

愚按前症若肝肾虚热用当归散肝血虚热四物加柴梔丹皮肝火内动小柴胡加山梔丹皮肝火血燥加味逍遥散脾经郁火加味归脾汤肝脾郁火归脾逍遥兼服肝肾亏损归脾六味兼服仍与前後月经不调治验同用

附治验

一妇人年五十内热晡热经水两三月一至此血虚有热用逍遥散加山茱萸治之而愈後有痰作渴或小便不调或头晕白带用六味丸而安

当归散

当归【酒洗】川芎白芍药【炒】黄芩【炒】白术【炒各半两】山茱萸肉【一两半】

右为末每服二钱酒调日三服气虚去芩加桂心一两

附方

四物汤【方见二十四卷第六论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人血分水分肿满方论第二十

妇人经水不通则化为血血不通则复化为水故先因经水断絶後至四肢浮肿致小便不通名曰血分宜用椒仁丸若先因小便不通後身面浮肿致经水不通名曰水分宜用葶苈丸经脉不通而化为水流走四肢悉皆肿满亦名血分其症与水症相类实非水也用人参丸

愚按前症或因饮食起居失养或因六淫七情失宜以致脾胃亏损不能生发统摄气血乖违行失常道若先因经水断絶後至四肢浮肿小便不通血化为水名曰血分宜用椒仁丸治之若先小便不利後至身面浮肿经水不通水化为血名曰水分宜用葶苈丸治之此属形气不足邪淫隧道必用此药以宣导其邪而佐以补辅元气之剂庶使药力有所仗而行则邪自不能

容而真气亦不至於复伤矣大凡月水不通凝结於内久而变为血瘕血水相并亦为水肿

附治验

一妇人月经不调晡热内热饮食少思肌体消瘦小便频数或用济阴丸月经不行四肢浮肿小便不通余曰此血分也朝用椒仁丸夕用归脾汤渐愈服人参丸两月而愈仍专用归脾汤五十余剂而平一妇人面目浮肿月经不通此水分也朝用葶?丸夕用归脾汤渐愈更兼服人参丸而全愈

一妇人素性急先因饮食难化月水不调或用理气化痰药反肚腹膨胀大便泄泻又加乌药蓬术肚腹肿胀小便不利加猪苓泽泻痰喘气急手足厥冷头面肢体肿胀指按成窟脉沈细右寸尤甚余曰此脾肺虚冷不能通调水道下输膀胱渗泄之令不行生化之气不运东垣云水饮留积若土在雨中则为泥矣得和气暖日水湿去而阳化自然万物生长喜其脉相应遂与金匱加减肾气丸料服之小便即通数剂肿胀消半四肢渐温自能转侧又与六君加木香肉桂炮姜治之全愈後不戒七情不节饮食顿作泄泻仍用前药加附子五分而安

椒仁丸 治血分

椒仁 甘遂 续随仁 附子【炮】 郁李仁 黑牵牛 五灵脂【阙】 吴茱萸 玄参 红花【酒炒】

信砒 胆?【钱】 斑猫【糯米阙炒】 芫青【各三十个糯米炒黄去头足】

右为末面糊丸菉荳大每服一丸陈皮汤送下

人参丸 治月经不利而化为水流走四肢悉皆肿痛人参 当归 大黄【蒸熟切焙】 桂心?麦穗 赤芍药 白茯苓【各三两】 葶?【炒研一两】

右为末炼密丸桐子大每服十五丸空心米饮下

葶?丸 治水分

甜葶?【炒别研五钱】 续随仁【五钱别研】 乾笋末【一两】

右用枣肉丸桐子大每服七丸煎扁竹汤下如大便利减续随子葶?各一钱加白术半两

小调经散 治经水失道流入四肢浮肿【方见产後四肢浮肿】

附方

归脾汤【方见二十四卷第四论】

金匱加減肾气丸【方见二十二卷第十论】

六君子汤【方见二十四卷第六论】

衆疾門【经脉不调衆疾生焉故以次之】

产宝方论第一

古人治妇人别着方论者以其胎妊生产崩伤之异况郁怒倍於男子若不审其虚实而治之多致天枉愚按前说诚为精确谚云宁治十男子莫治一妇人宁治十妇人莫治一小儿义可见矣

博济方论第二

夫人将摄顺理则气血调和六淫不能为害若劳伤血气则风冷乘之脾胃一伤饮食渐少荣卫日衰肌肤黄燥面无光泽若入大肠则下利若入关元则絶嗣故妇人病有三十六种皆由冲任劳损而致盖冲任之脉为十二经之会海其病皆见於少陰太阳之经当於此候之

愚按前论精密学者当从此类推之

寇宗奭论第三

妇人虽有别科然亦有不能尽圣人之法岐伯曰凡病察其形气相得则易治形气相失则难治又曰诊病之道观人勇怯骨肉皮肤能知其情以为诊法今富贵之家身处帷幔出手诊候不能尽望闻问切之情率尔投药乌可尽其术乎况医者质问谆谆病家遂谓术业不精而不信岂能使药之奏效耶丹溪云凡人之形长不及短大不及小肥不及瘦人之色白不及黑嫩不及苍薄不及厚而况肥人湿多瘦人火多白者肺气虚黑者肾气足形色既殊脏腑亦异外证虽同法法迥别所以肥人责脉浮瘦人责脉沈躁人疑脉缓缓人疑脉躁以其不可槩观也若夫病势危急必须察色以观其外诊脉以知其内医之道庶乎不至於有误矣

府庠徐道夫母胃脘当心痛极右寸关俱无左虽有微而欲絶手足厥冷余以上部无脉不吐为不治然察其眼胞上下青黯此脾虚肝木所胜以参术茯苓陈皮甘草补中益气以木香和胃气行肝气以吴茱萸散脾胃之寒止心腹之痛遂急与一剂连去二次再进诸病悉愈

通用方序论第四

夫通用方者盖产前产後皆可用也或一方治诸症不可入专门当通变而施治焉乌可泥也

加減四物湯 治血虛月經不調腰腹作痛崩中漏下產後惡露內停或去血過多而痛【方見第八十三論】愚按血虛之症若肝脾血燥用加味逍遙散肝火血燥用八珍湯加山梔牡丹皮肝經風熱血燥用六味地黃丸肝脾火燥血虛用四物柴胡山梔肝經氣血虛弱用四君芎歸熟地腎水涸而肝血虛用六味地黃丸金剋木而肝血虛與心火亢而肝血虛亦用前丸若氣虛而血弱用補心湯胃氣陷而血虛用補中益氣湯脾氣弱而血虛用六君子湯脾氣郁而血虛用加味歸脾湯大凡血虛之症或氣虛血弱或陽氣脫陷或大失血以致發熱煩渴等症必用四君歸芪或獨參甘溫之劑使陽旺則陰生其病自愈若用寒涼降火乃速其危也

交加散 治經脈不調腹中撮痛或結聚症瘕產後中風

生地黃【一筋取汁】生薑【十二兩取汁】

右以地黃汁炒姜粗姜汁炒地黃粗乾為末每服三錢溫酒調加芍藥玄胡索當歸蒲黃桂心各一兩沒藥紅花各五錢尤效

補中丸 治氣血俱虛諸症即八珍湯為丸【方見二十四卷第四論】

附方

加味歸脾湯

加味逍遙散

八珍湯【三方見二十四卷第四論】

六味丸【方見二十四卷第十一論】

四物湯

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯【四方見二十四卷第六論】

獨參湯【方見三卷第十三論】

薛氏醫案卷二十六

卷二十七

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二十七

明薛己订

妇人良方

妇人中风诸症方论第一

夫中风者因内虚而中之也盖风为四时八方之气常以冬至之日自坎而起从其乡来者主长养万物否则名为虚风贼害万物从背而入或中腑或中脏或中血脉经络其症或肢体不遂或手足偏枯或痰涎壅塞或口眼歪斜或牙关紧急或腰背反张若眼开口闭涎流失音者难治如眼闭口开鼾睡遗尿者死中风中气皆用苏合香丸中气用三生饮若作风治百无一生愚按中风者即内经所谓偏枯风痲风懿风痹是也而有中腑中脏中血脉之分焉夫中腑者为在表中脏者为在里中血脉者为在中在表者宜微汗在里者宜微下在中者宜调荣中腑者多着四肢如手足拘急不仁恶风寒此数者病浅皆易治用加减续命汤之类中脏者多滞九窍如眼瞽者中于肝舌不能言者中于心唇缓便秘者中于脾鼻塞者中于肺耳聋者中于肾此数者病深多难治中血脉者外无六经之证内无便溺之阻肢不能举口不能言用大秦芩汤主之中腑者多兼中脏如左关脉浮弦面目青左脇偏痛筋脉拘急日瞶头目眩手足不收坐踞不得此中胆兼中肝也用犀角散之类如左寸脉浮洪面舌赤汗多恶风心神颠倒言语蹇澁舌强口乾怱悸恍惚此中小肠兼中心也用麻黄散之类如右关脉浮缓或浮大面唇黄汗多恶风口喎语澁身重怠惰嗜卧?肤不仁皮肉瞶动腹膨不食此中胃兼中脾也用防风散之类如右寸脉浮濇而短面色白鼻流清涕多喘胸中冒闷短气自汗声嘶四肢痿弱此中大肠兼中肺也用五味子汤之类如左尺脉浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俛仰两耳虚鸣骨节疼痛足痿善恐此中膀胱兼中肾也用独活散之类此皆言真中风也而有气血之分焉盖气虚而中者由元气虚而贼风袭之则右手足不仁用六君子汤加钩藤姜汁竹?血虚而中者由陰血虚而贼风袭之则左手足不仁用四物汤加钩藤竹?姜汁气血俱虚而中者则左右手足皆不仁也用八珍汤加钩藤姜汁竹沥其与中风相类者则有中寒中湿中火中气食厥劳伤房劳等症如中於寒者谓冬月卒中寒气昏冒口噤肢挛恶寒脉浮紧用麻黄桂枝理中汤之类中於暑者谓夏月卒冒炎暑昏冒痿厥吐泻喘满用十味香薷饮之类中於湿者丹溪所谓东南之人多因湿土生痰痰生热热生风也用清燥汤之类加竹沥姜汁中於火者河间所谓非肝木之风内中六淫之邪外侵良由五志过极火盛水衰热气怫郁昏冒而卒仆也用六味丸四君子独参汤之类内有患怒伤肝火动上炎者用柴胡汤之类中於气者由七

情过极气厥昏冒或牙关紧急用苏合香丸之类误作风治者死食厥者过於饮食胃气自伤不能运化故昏冒也用六君子加木香劳伤者过於劳役耗损元气脾胃虚衰不任风寒故昏冒也用补中益气汤房劳者因肾虚精耗气不归根故昏冒也用六味丸此皆类中风者也夫内经主於风河间主於火东垣主於气丹溪主於湿愚之斯论僭补前人之阙也若夫地之南北人之虚实固有不同其男子女人大略相似当与後论参看通变治之

附治验

靳阁老夫人先胸脇胀痛後四肢不收自汗如水小便自遗大便不实口紧目瞶饮食颇进十余日矣或以为中脏公甚忧余曰非也若风既中脏真气既脱恶症既见祸在反掌焉能延之乃候其色面目俱赤而面或青诊其脉左三部洪数惟肝尤甚余曰胸乳胀痛肝经血虚肝气否塞也四肢不收肝经血虚不能养筋也自汗不止肝经风热津液妄泄也小便自遗肝经热甚陰挺失职也大便不实肝木炽盛尅脾土也遂用犀角散四剂诸症顿愈又用加味逍遥散调理而安後因郁怒前症复作兼发热呕吐饮食少思月经不止此木盛尅土而脾不能摄血也用加味归脾汤为主佐以加味逍遥散调补肝脾之气清和肝脾之血而愈後每遇怒或睡中手足抽搐复用前药即愈

大参朱云溪母於九月内忽仆地痰昧不省人事唇口喎斜左目紧小或用痰血之剂其势稍缓至次年四月初其病复作仍进前药势亦渐缓至六月终病乃大作小便自遗或谓风中於脏以为不治余诊之左关弦洪而数此属肝火血燥也遂用六味丸加五味麦门芎归一剂而饮食顿进小便顿调随用补中益气加茯苓山梔钩藤丹皮而安至十月复以伤食腹痛作泻左目仍小两关尺脉弦洪鼓指予以六君加木香吴茱萸升麻柴胡一剂而痛泻俱缓复以六君加肉果故纸一剂诸脉顿平痛泻俱止余谓左关弦洪由肝火血燥故左目紧小右关弦洪由肝邪乘脾故唇口喎斜腹痛作泻二尺鼓指由元气下陷设以目紧口喎误作风中投以风药以腹痛泄泻误作积滞投以峻剂复耗元气为害甚矣後以阳虚恶寒围火过热致痰喘误服寒剂而卒

一妇人因怒仆地语言蹇澁口眼喎斜四肢拘急汗出遗尿六脉洪大肝脉尤甚者由肝火炽盛盖肝主小便因热甚而自遗也用加味逍遥散加钩藤及六味丸寻愈

一老妇两臂不遂语言蹇澁服祛风之药反致筋挛骨痛余谓此肝火血虚所致用八珍汤补气血用地黄丸补肾水佐以排风汤年余而愈

一妇人经行口眼歪斜痰涎壅盛此血虚而肝火动用加味逍遥散加牡丹皮治之寻愈後因饮食停滞日吐痰涎此脾气虚不能摄涎归经也用六君子二十余剂而安

一妇人因怒口眼歪斜痰涎上涌口噤发搐此脾肺气虚而肝木旺用六君子加木香钩藤柴胡治之渐愈又用加味归脾汤调理而安

一产妇勤於女工忽仆地牙关紧急痰喘气粗四肢不遂此气血虚而发痉朝用补中益气汤加茯苓半夏夕用八珍汤加半夏各三十余剂不应此血气之未复药之未及也仍用前二汤又五十余剂寻愈一妇人素有内热月经不调经行後四肢不能伸卧床半载或用风湿痰火之剂不效其脉浮缓按之则濡名曰瘖症属风寒所乘用加味逍遥散加肉桂防风四剂顿愈更以八珍汤调理两月余而痊

一妇人素经行後期因劳怒四肢不能屈名曰瘖症此血虚而风热所乘先用八珍汤加钩藤柴胡渐愈更佐以加味逍遥散调理而痊

一妇人四肢挛屈烦痛自汗小便短少畏见风寒脉浮弦缓此气血虚而风寒湿热相?先用东垣清燥汤渐愈再用加味逍遥散及八珍汤加牡丹皮而痊一妇人素有火忽然昏聩瘖症抽搐善伸数欠四肢筋挛痰涎上升此肺金燥甚血液衰少而然也用清燥汤六味丸兼服寻愈

一妇人肢节作痛不能转侧恶见风寒自汗盗汗小便短少虽夏亦不必表其脉浮紧此风寒客於太阳经用甘草附子汤一剂而痊

一妇人因怒发搐呕吐痰涎口禁昏愤气口脉大於人迎此气滞而食厥用平胃散加茯苓半夏木香治之而苏更以六君子加木香渐愈乃去木香又二十余剂而痊

一妇人元气素虚劳则体麻发热痰气上攻或用乌药顺气散祛风化痰丸之类肢体痿软痰涎自出面色痿黄形体倦怠而脾肺二脉虚甚此气虚而类风朝用补中益气汤夕用十全大补汤渐愈又用加味归脾汤调理寻愈

一妇人体肥胖头目眩晕肢体麻木腿足痿软自汗身重其脉滑数按之沈缓此湿热乘虚也用青燥羌活二汤渐愈更佐以加味逍遥散全愈

一妇人口眼歪斜四肢拘急痰涎不利而恶风寒其脉浮紧此风寒客於手足阳明二经先用省风汤二剂後用秦艽升麻汤而愈

一妇人素性急患肝风之症常服搜风顺气丸秦艽汤之类後大怒吐血唇口牵紧小便频数或时自遗余以为肝火旺而血妄行遂用小柴胡汤加山梔牡丹皮渐愈五年之後又大怒吐血误服降火祛风化痰之剂大便频数胸满少食用清气化痰之剂呕而不食头晕口乾不时吐痰用导痰降火之类痰出如涌四肢常冷余曰呕而不食胃气虚弱也头晕口乾中气不能上升也痰出如涌脾气不能摄涎也四肢逆冷脾气不能运行也用补中益气加茯苓半夏治之诸症渐愈又用加味归脾汤兼服而安

鸿胪王继之室人素有癰症遇劳役怒气则发良久自省一日因饮食劳役失宜发而半日方省不能言语或以为风中於脏用祛风化痰顺气之剂及牛黄清心丸病益甚六脉浮大两寸虚而不及本部且进饮食余曰此脾胃之气伤也若风中於脏祸在反掌彼不信仍用风药後

果卒

妇人吐痰头晕肢体麻木【见第四卷】

娠妇发搐似中风【见第十四卷】

产後发痉似中风【见第十九卷】

男子诸症【见内科摘要】

排风汤 治风邪入脏狂言妄语

白鲜皮 白术 白芍药 桂心 川芎 当归 防风 杏仁【去皮尖炒】 甘草【各二两】 白茯苓 麻黄【去节】

独活【各三两】

三生饮 治卒中不省口眼喎斜痰壅喉响无问外感内伤痰涎食厥气虚眩晕但六脉沈悉有神效生南星 生乌头【去皮尖】 生附子【各半两去皮】 木香【一钱】

右每服半两姜水煎不省人事以细辛皂角末少许吹鼻中得 进药气盛只用南星五钱生姜十四片煎饮之名星姜饮

愚按三生饮乃行经络治寒痰之良药斩关夺旗之神剂每服必用人参两许驱其外邪而补其真气否则不惟无益适以取败观先哲用芪附术附等汤其义可见

加减小续命汤

治中风半身不遂口眼喎斜手足战掉语言蹇澁神思昏乱筋挛骨痛或脚气缓弱陰晦复作

麻黄【去节根】 防己 人参 黄芩【炒】 桂心 甘草【炒】 白芍药 川芎 杏仁【各一两】 附子【炮半两】 防风【一两半】

右每服五钱姜枣水煎精神恍惚加茯苓远志有热去附子加芍药心烦加犀角半两骨冷痛加桂附呕逆腹胀加人参半夏一两躁闷便澁去附子加芍药一两竹?一合脏寒下利去防己黄芩加附子白术一两自汗去麻黄杏仁加白术一两脚弱加牛膝石斛一两身痛加秦艽一两腰痛加杏仁杜仲半两失音加杏仁一两

小引风汤

防风 独活 细辛 川芎 五味子【杵炒】 白茯苓 人参
白芍药【炒】 白术【炒】 甘草【等分】

右每服五钱姜三片杏仁五个水煎服加麻黄苁蓉附子当归羚羊角等分即大引风汤也

必效竹 汤 治中风痰涎壅盛言语塞滞四肢缓纵

秦艽 防风 独活 附子【炮各一钱】

右以水二盏煎半盏入生地汁淡竹?各半盏再煎四五沸作四服病既去以他药调治未愈再服最效

星香汤 治中风痰盛服热药不得者

南星 木香【等分】

右每服四钱姜十片水煎

星附汤 治中风痰涎上攻六脉沈伏不知人事

附子【生用】 南星【生用各一两】 木香【半两】

右每服四钱姜水煎寒甚加天雄川乌多灸关元丹田二穴

附方

三化汤 治中风外有六经之形症先以加减续命汤治内有便溺之阻隔者此方主之

厚朴【姜汁炒】 大黄【酒蒸】 枳实【麸炒】 羌活【各八两】

右每服一两水煎

秦艽汤 治中风外无六经之形症内无便溺之阻隔乃血弱不能养於筋手足不能运口强不能言宜养血而筋自荣也

秦艽 石膏【各二两】 甘草【炒】 川芎 当归 芍药【炒】 羌活 独活 防风
黄芩【炒】 白芷 生地黄 熟地黄【自制】 白茯苓 白术【各一两】 细辛【半两】

右每服一两水煎陰雨加生姜七片春夏加知母一两

省风汤 治中风口噤口眼喎斜筋脉挛急抽掣疼痛风热痰实

防风 南星【生用各四两】半夏【水浸洗生用】黄芩 甘草【生用各二两】

右每服五钱水煎

大八风汤【方见後】

烧竹?法 用新竹截尺许作两片用两砖对立竹仰砖上中以火烧之两头 自出取荆 亦然

乌药顺气散 治风气骨节疼痛遍身顽麻手足瘫痪言语蹇澁宜先疏气道後随证投药

麻黄【去节】乌药 陈皮【去白】川芎 白芷 桔梗
枳殼【去穰麸炒】甘草【炒各一两】乾姜【炮半两】殭?【炒一两】

右每服五钱姜水煎头痛加葱白有汗加薄荷

八味顺气散

白术 白茯苓 青皮 白芷 陈皮【炒】乌药人参【各一两】甘草【炙半两】

右每服五钱水煎

导痰汤

半夏 南星 茯苓 陈皮【炒】枳实【炒】甘草【炒】

右姜水煎服

参苏饮 治痰积中脘晕眩嘈杂怔忡?逆或痰停关节手足痺曳口眼喎斜半身不遂呕吐恶
心头疼发热

人参 紫苏叶 半夏 茯苓 乾葛 前胡【各三钱】甘草【炒】木香
陈皮【炒】枳殼【制】桔梗【各半两】

右每服一两姜水煎腹痛加芍药

附子理中汤 治中寒不语四肢强直昔有武士守边大雪出帐观瞻忽然晕倒又马观文之内
厥逆恶寒腹痛服此悉愈【方见十二卷第八论】

牛黄清心丸【方见後第四论】

秦艽升麻汤 治风寒客於手足阳明经口眼喎斜恶见风寒四肢拘急其脉浮紧

秦艽【二钱】升麻 乾葛 甘草 芍药【炒】人参【各半两】防风 桂枝【各三钱】

右每剂一两连须葱白二茎水煎服

犀角散 治肝脏中风筋脉拘挛手足不收坐踞不得胷背强直脇肋胀满面赤心烦言语蹇澁或风流注四肢上攻头面作痛口眼喎斜脚膝痛乏

犀角屑【二钱】石膏 羌活 羚羊角【各一钱】人参 甘菊花 独活 黄芩【炒】天麻 枳殼【去穰麩炒】当归 黄芪 芍药 白术 酸枣仁【炒】防风 白芷【各五分】甘草【五分】

右水姜煎

薏苡仁散 治肝脏中风

薏苡仁 麻黄【去节各一钱半】防风 附子【炮去皮脐】川芎 栝子仁 桂心 枳殼【麩炒】石膏 细辛 独活 羚羊角【各一钱】

右姜水煎服

射干汤 治肝经受病多汗恶风善悲噎乾目下青黄可治急灸肝脇百壮一黄一白不可治

射干 芍药【各二钱半】薏苡仁【三钱】桂心【五分】牡蛎 石膏【各二钱】

右作一剂水煎服

治肝脏中风心神烦热言语蹇澁不得安卧

竹? 荆? 葛根 生姜汁 白蜜【各一合】

右和匀频服之

麻黄散 治心脏中风多汗恶风善怒心神颠倒言语蹇澁舌强口乾面赤头痛翕翕发热胷背拘急手心热甚偃卧不侧忪悸恍惚或寒鷖心惊悸口喎冒昧好笑

麻黄【去节】白术 防风 川芎 甘草【炙】 汉防己 当归 人参【各一钱】 羌活 远志【去心】 茯神【去木各一钱半】 升麻【八分】 桂心【五分】

右水姜煎入竹?半盏再煎一二沸

茯神散 治同前或四肢沉重精神不安或痰气不利茯神【去木】 羌活 麻黄【去节】 龙齿【另研】 赤芍药 甘草【炙各一钱】 蔓荆子 薏苡仁 麦门冬【去心】 人参【去芦】 防风【去芦】 犀角屑【各七分半】

右水姜煎

加味牛黄散 治症同前或恍惚恐乱睡卧不得志意不定

牛黄 麝香 犀角【镑】 羚羊角【镑】 龙齿【各另研】 防风 天麻 独活 人参 茯神【去木】 升麻 甘草【炙】

白藓皮 远志【去心各二钱半】 天竺黄【三钱另研】 朱砂【另研水飞】 铁粉【另研】 麦门冬【去心各半两】

右为末每服二钱煎麦门冬汤调

远志汤 治症同前或偃卧不侧闷乱冒绝若唇色正赤可治急灸心膻百壮若青黄不定面色??战栗动者不可治

远志【去心二钱半】 人参 石菖蒲 羌活 细辛 麻黄【去根各半两】 赤芍药 白术【各一两】

右为末每服二钱煎小麦汤调日二服

防风散 治脾脏中风多汗恶风身体怠惰四肢不能动色微黄不嗜食舌强语澁口喎斜僻肌肤不仁腹膨心烦翕翕发热神思如醉其脉浮缓胷满痰涎志意昏浊

独活【一钱半】 防风 茯神【去木】 人参 附子【炮去皮脐】 前胡 沙参 半夏【汤洗七次】 黄芪【炒】 旋覆花 羚羊角【镑末】

甘草【炙各一钱】

右水姜煎

白术汤 治症同前或腹满身黄呕吐酸水急灸脾腧百壮目下及手足青者不可治口角两边黄者可治白术 厚朴【姜制】 防风【各二钱】 附子【炮去皮脐】 橘红 白藓皮 五加皮【各一钱】

右水姜煎

细辛散 治症同前或肉热肌肤淫淫如虫行或汗大泄皮肤不泽唇鼻黄色

细辛 白术 独活 附子【炮去皮脐】 肉桂 防风【各一钱】 厚朴【姜制】 麻黄【去节各二钱】 枳实【麸炒】 甘草【炒各一钱五分】

右水煎

防风麻黄散 治症同前或志意恍惚肢体沉重防风 麻黄【去节】 人参 川芎 附子【炮去皮脐】 桂心 黄芪【炒】 赤茯苓 酸枣仁【炒】 白术 独活 桑白皮【炒各一钱】 羚羊角【镑末一钱】 甘草【炒五分】

右水煎服

五味子汤 治肺脏中风胃满短气冒闷汗出噓吸颤掉声嘶体重四肢痿弱其脉浮昼瘥夜甚偃卧冒闷其鼻两边下至口上至眉其色白者急灸肺腧百壮若色黄其肺伤而为血矣撮空拈衣摸床者必死五味子【杵炒】 杏仁【炒去皮尖】 桂心【各一钱】 防风【去芦】 甘草【炙】 赤芍药 川芎【各二钱】 川椒【三分】

右水煎服

独活细辛散 治症同前或头痛项强背痛鼻乾心闷语蹇胸中少气四肢疼痛

独活 细辛 附子【炮去皮脐】 甘菊花 麻黄【去芦】 白芷 五味子【杵炒】 紫苑茸 赤茯苓 肉桂 白术

桑白皮 川芎【各一钱】 甘草【炙五分】 杏仁【麸炒去皮】 防风【各一钱】

右水煎服

独活散 治肾脏中风腰疼不得俛仰或偏枯耳鸣语声浑浊面色浮肿骨节酸疼精神昏愤喜恐好忘而肌色黧黑身体沉重多汗恶风隐曲不利或两脚冷痺头昏耳聋语音浑浊

独活 附子【炮去皮脐】 当归【酒洗】 防风 天麻 桂心【各一钱】 川芎 甘菊花

枳殼【麩炒】山茱萸【取肉】黃芪【炒】丹參
牛膝【酒浸】萆薢【酒浸】甘草【炙】細辛 菖蒲 白朮【各五分】

右水煎服

萆薢散 治症同前或脊骨促痛不能行立肌膚黑色兩脇赤黃如餅者可治急灸腎腧百壯齒黃髮稿面如土色者不可治

萆薢【酒浸】白茯苓【去皮】杜仲【炒去絲】狗脊【各一两】何首烏天雄【去皮臍炮】澤瀉【各半兩】

右為末每服二錢米飲調下

吳茱萸丸 治症同前或惡風多汗面色浮腫腰膝疼痛形色憔悴

吳茱萸 細辛 白茯苓 獨活 山茱萸【取肉】木香 牛膝【酒浸】石斛
萆薢【酒浸各半兩】附子【炮去皮臍】芎藭【各二錢】

右為末酒糊丸桐子大每服二十丸空心鹽湯下日二服

黃芪丸 治症同前或麻痺腫痛少氣肢體乏力黃芪【炒】川椒【炒】茴香【炒】川烏頭【去皮臍】狼毒 防風白蒺藜【炒】川練子肉 地龍【去土炒】黑附子【炮去皮臍】

赤小豆【各等分】

右為末酒糊丸桐子大每服二三十丸溫酒下日二服

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

四物湯【四方見二十四卷第六論】

十全大補湯

八珍湯

加味归脾汤

加味逍遥散【方见二十四卷第四论】

理中汤【方见二十卷第八论】

清暑益气汤

十味香薷饮【二方见七卷第二论】

东垣清燥汤【方见四卷第二论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

独参汤【方见本卷第十三论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

苏合香丸【方见後】

羌活汤【方见後】

甘草附子汤【方见後】

平胃散【方见十一卷第十八论】

妇人中风角弓反张方论第二

论曰妇人气虚风入诸阳之经或产後血虚汗出中风体强口噤腰背反张名为发痉因太阳经先伤风复感寒而致如发瘖状但脉沈迟弦细无汗恶寒名刚痉有汗不恶寒名柔痉无汗者葛根汤小续命汤有汗者去麻黄加葛根

愚按仲景先生云太阳病发汗太多致痉风病下之则痉三因方云气血内虚风寒湿热所中则痉以风能散气故有汗而不恶寒曰柔痉寒能凝血故无汗而恶寒曰刚痉非专於风湿因内虚发汗亡血筋无所荣而然乃虚象也窃谓伤寒汗下过度与产妇溃?等病及因剋伐之剂伤损气血而变若金衰木旺先用泻青丸後用异功散肾水虚用六味丸肝火旺先用加味小柴胡汤次用加味四物汤发热用加味逍遥散若木侮脾土用补中益气加芍药山梔脾经郁结用加味归脾汤脾土湿热用大承气汤大凡病後血气虚弱用参术浓煎佐以姜汁竹?时时用之如不应用十全大补汤更不应急加附子或用参附汤缓则不救仍与後治验参看

附治验

一妇人脾胃虚弱忽痰壅气喘头摇目割手扬足掷难以候脉视其面黄中见青此肝木乘脾土用六君加柴胡升麻治之而苏更以补中益气加半夏茯苓而痊

葛根汤 治刚痉无汗恶风

葛根【一钱】麻黄【去根节】殭?【炒各三分】桂枝
粉草【少】芍药【各五分】大枣【三个】

右水煎出汗为度【凡产後麻黄宜斟酌用】

附术汤 治手足逆冷筋脉拘急汗出项强口噤痰涌附子【炮】白术 独活【各五分】川芎
肉桂【各三分】

右枣水煎服

桂心白术汤 治陰痉手足厥冷筋脉拘急汗出不止白术 桂心 附子【炮】防风 川芎
甘草【各等分】

右每服五钱姜枣水煎

八物白术散 治陰痉手足厥冷筋急脉拘而无汗者白术 麻黄【去根节】茯苓
五味子【杵炒】羌活【各半两】附子【炮】桂心【各三钱】良姜【一钱】

右每服四钱姜水煎【凡用麻黄宜斟酌不可过多】

附方

通关散 治卒然牙关紧急腰背反张药不得咽

细辛 薄荷叶 牙皂角【各等分】

右为末每用少许吹鼻内候得喷 随进汤药

泻青丸【方见二十四卷第三论】

异功散【方见二十二卷第三论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

加味小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

补中益气汤

加味四物汤【二方见二十四卷第六论】

加味逍遥散

十全大补汤

加味归脾汤【三方见二十四卷第四论】

大承气汤【方见後】

参附汤【方见十二卷第三论】

妇人中风口噤方论第三

夫中风口噤乃体虚受风入於颌颊盖手三阳之经结於颌颊上夹於口风邪乘之则筋挛故牙关急而口噤也

愚按前症若风邪客於手足阳明经口眼喎斜用秦艽升麻汤若风热伤气用省风汤当与後方同用

附治验

一妇人因怒经事淋?半月方竭遇怒其经即至甚则口噤筋挛鼻衄头痛痰涎搐搦瞳子上视此肝火炽甚以小柴胡汤加熟地黄山梔钩藤治之後不复发

一妇人素陰虚患遍身瘙痒误服祛风之药口噤抽搐肝脉洪数余曰肝血为陰为水肝气为阳为火此乃肝经血虚火盛耳宜助陰血抑肝火用四物麦门五味柴胡山梔生草热搐顿止又以八珍黄芪麦门五味钩藤灸草调理而痊

天南星散 治中风口噤四肢拘急或痰气上壅天南星【姜汁炒黄】白附子【炮】黑附子【炮】乌蛇肉【酒炙】全蝎【炒等分】

右为末每服五分姜汁温酒调灌

走马散 治中风口噤四肢强直

黑附子【炮】天麻【各半两】桂心 石膏

麻黄【去根节】蝎梢【炒】川乌【炮去皮尖】南星【炮各一钱】麝香【二分另研】

右为末每服三分豆淋酒调灌

附方

秦艽升麻汤

省风汤【二方见本卷第一论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

四物汤【方见二十四卷第六论】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

妇人中风不语方论第四

巢氏云脾脉络胃夹咽连舌本散舌下心之别脉系舌本若心脾受邪则舌强不能言然喉咙者气之上下也会厌者声之户舌者声之机唇者声之扇若风寒客於会厌故卒然而瘖经云醉卧当风使人发瘖

愚按前症若因痰迷心窍当清心火若因湿痰舌强当清脾热若因风热牙关紧急当清肝火若因风痰塞喉当导痰涎若因虚火上炎当壮水之主若因气虚厥逆当益火之源若因肾虚舌瘖而不语当补肾气

附治验

一妇人因怒仆地痰涌不语灌牛黄清心丸稍苏用神仙解语汤加山梔柴胡桔梗渐愈又用六君柴胡山梔枳壳而痊

一妇人忽然不语半年矣诸药不应两尺浮数先用六味丸料加肉桂数剂稍愈乃以地黄饮子三十余剂而痊男子多有此症亦用此药治之

神仙解语丹 治心脾受风言语蹇澁痰唾溢盛白附子【炮】石菖蒲【去毛】远志【去心甘草水煮十沸】天麻 全蝎羌活 南星【牛胆酿如无只炮各一两】木香【半两】

右为末面糊丸桐子大每服二三十丸薄荷汤下

防风汤 治中风内虚脚软语蹇

石斛【一两半酒炒】生地黄 杜仲【去皮切姜汁炒】丹参【各一两】防风 川芎
麦门冬【去心】桂心 独活【各五钱】

右每服五钱枣水煎

竹?汤 治风中肝脾四肢不遂舌强语滞或痰涎上涌

葳灵仙 附子【炮】桔梗 蔓荆子 防风 枳壳【去穰麸炒】川芎 当归【各等分】

右每服四钱姜水煎入竹?半盏日四服忌饮茶

三黄独活汤 治中风手足拘挛半身不遂失音不语

麻黄【去根节】黄芪【半两】黄芩【七钱】独活【一两】

右每服四钱水煎取汗为效

小省风汤 治中风瘫痪口眼喎斜口噤不语手足顽麻

防风 南星【汤炮各三两】甘草【炙半两】

右每服四钱姜十片水煎

秦艽升麻汤【方见本卷第一论】

愈风汤 治诸风肢体麻木手足不随不能动履等症天麻 牛膝【同酒浸焙乾】萆薢【另研
细】玄参【各六两】杜仲【七两】羌活【十四两】当归
熟地黄【自制】生地黄【各一斤】独活【五两】肉桂【三两】

右为末炼蜜丸桐子大常服五七十丸病甚至百丸空心食前温酒或白汤下

地黄饮子 治肾气虚弱舌瘖不能言足废不能行熟地黄【自制】巴戟【去心】山茱萸【
去核】肉苁蓉【酒浸焙】石斛附子【炮】五味子【炒杵】白茯苓 石菖蒲
远志【甘草汤炮】麦门冬【去心】桂心【各等分】

右每服三钱入薄荷少许姜枣水煎服

牛黄清心丸 治诸风痙瘓语言蹇澁健忘恍惚头目眩暈胸中烦郁痰塞喘 精神昏愒或寻常风痰咳 或伤寒阳症汗下不解发热烦渴其效如神牛黄【一两二钱】麝香龙脑【三味另研】羚羊角【镑末各一两】当归【酒洗】防风黄芩白术麦门冬【去心】白芍药【各一两】柴胡桔梗白茯苓杏仁【去皮尖】芎藭肉桂大豆黄卷阿胶【各一两七钱】蒲黄人参【去芦】神麴

【各二两半】雄黄【另研八钱】甘草【五两】白朮【七钱半】乾姜【七钱半】犀角【镑末二两】乾山药【七两】金箔【一千三百片内四百片为衣】大枣【一百枚蒸熟去皮核研烂成膏】

右各另为末炼蜜与枣膏丸每两作十丸用金箔为衣每服一丸温水化下

苏合香丸

治气中痰气上攻牙关紧急不省人事或卒暴气逆心痛鬼魅恶气及一切气滞等症

沉香 麝香 诃子肉 丁香 青木香 安息香 香附 荜拨 白术 白檀【各二两】薰陆香苏合油【各一两】龙脑【另研一两】朱砂【另研】乌犀角【镑末】

右为末用安息香并炼蜜丸桐子大温水化服四丸每两作十丸熔黄腊包裹为善

青州白丸子 治半身不遂口眼喎斜痰涎壅塞手足顽麻

半夏【七两水洗过生用】川乌头【半两去皮脐生用】南星【二两生用】白附子【二两生用】

右为末用绢袋盛之水浸日如急用以糊丸桐子大每服十丸姜汤下

瓜蒂散

瓜蒂【一钱】赤小豆【五分】

右为末每夜於鼻内?之取下黄水内服凉剂

六君子汤【方见二十四卷第六论】

妇人风痺手足不随方论第五

夫妇人风痺手足不随或肌肤疼痛或肢体麻木盖诸阳之经皆起於手足循行肢体因气虚风邪所客而为患也

愚按经云邪之所凑其气必虚前症若风邪淫肝或怒动肝火血燥筋挛用加味逍遥散脾肺气虚肌肤不仁手足麻木用三痺汤若肾水亏损不能滋养筋骨或肝脾血虚而筋痿痺用六味丸服燥药而筋挛者用四物生甘草气血俱虚用八珍汤何医林集要等方新刊丹溪心法附録云若人大拇指麻木不仁或手足少力或肌肉微掣三年内必有大风之症宜先服八风汤天麻丸防风通圣散以预防之殊不知河间云风者病之末也所以中风有瘫痪者非谓肝木之风内中亦非六淫风邪外袭良由五志过极心火炽盛肾水虚衰不能制之则陰虚阳实而热气拂郁心神昏愆筋骨无用而卒倒无知也治当以固元气为要若遽服八风等药则反伤元气适足以招风取中【仍参本卷首论主治】

附治验

一妇人因怒吐痰胸满服二陈顺气化痰之剂半身不遂内热口乾形气殊倦余视之乃肝火炽盛而侮脾土也用逍遥散补中益气汤六味地黄丸喜其慎疾年余而愈

一孀妇胸脇胀痛内热晡热月经不调肢体酸麻不时吐痰或用清气化痰药喉间不利白帶腹胀又用清热理气药胸膈不寬肢体时麻余曰此本郁怒伤脾肝前药伤甚耳朝用归脾汤以解郁结生脾气夕用加味逍遥散以生肝血清肝火百余剂而愈後因怒肢体复麻用补中益气加山梔茯苓半夏而痊後复怒病再作月经如注脉浮洪而数此肝火伤脾不能摄血所致也用六君芎归炮姜一剂而血止用补中益气加炮姜茯苓半夏四剂而胃醒更用归脾汤逍遥散调理而痊

一妇人头晕吐痰用化痰理气药肢体或麻服祛风化痰药肢体常麻手足或冷或热此脾土虚而不能生肺金用补中益气加茯苓半夏炮姜二十余剂脾气渐复诸症稍愈更用加味逍遥散三十余剂而愈後因怒吐痰自服清气化痰丸饮食不进吐痰甚多胸脇胀满余用六君子倍加参朮少加木香数剂而康

三痺汤 治血气凝滯手足拘挛风痺等疾

续断【酒浸炒】杜仲【去皮切姜汁炒】防风 桂心 细辛 人参 白茯苓 当归 白芍药【炒】黄芪【炒】牛膝【酒浸炒】甘草【炒各五分】秦艽 生地黄 川芎 独活【各三分】

右姜水煎服

五痺汤 治风寒湿气客留肌体手足缓弱麻痹不仁片姜黄 羌活 白术 防己【各一钱】甘草【炙五分】

右姜水煎服

附方

东垣羌活汤 治湿热身重或眩晕麻木小便赤澀下焦痿软不能行履

羌活 防风 柴胡【各一钱】 藁本 独活 茯苓 泽泻 猪苓 黄芪【炒】 甘草【炙】 陈皮 黄柏【酒炒黑】 黄连【炒】 苍术 升麻 川芎【各五分】

右水煎服

甘草附子汤 治风湿相搏骨节烦疼不时抽痛不能伸屈抑之则痛剧汗出短气小便不利恶风不欲去衣或微肿痛

甘草【炙一两】 附子【一枚重一两三四钱方是炮去皮尖不真不效】 白术【炒一两】 桂枝【二两】

右每服五钱水煎

八珍汤 治肝脾气血俱虚不能养筋以致筋挛骨痛或不能行履或发热晡热寒热往来等症

加味逍遥散 治肝经风热血燥筋挛肢体不遂内热晡热等症

归脾汤【三方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

四物汤

补中益气汤

六君子汤【三方见二十四卷第六论】

妇人中风自汗方论第六

古方续命排风越痹等汤皆用麻黄取其发汗而散风邪也然而无汗者为宜若自汗者用之则津液转脱反为大害故仲景云中风自汗用桂枝汤发之口眼瞤动遍身出汗用独活汤续命煮散以复荣卫而却风邪愚按前症若腠理不固而自汗者用桂枝汤或防风白术牡蛎汤若过服风药而自汗者用白术防风汤若阳气虚弱而自汗者用芪附汤若兼盗汗用补中益

气汤送六味丸如不应用当归六黄汤

独活汤 治风虚昏愦手足痠痿发热及中风自汗等症

独活 羌活 人参 防风 当归 细辛 茯神【去木】 半夏【姜制】 桂心 白薇
远志【去心】 菖蒲 川芎【各五分】

右姜水煎服

续命煮散 治风气昏愦四肢无力口眼瞤动或时搐搦或津液不足渴饮热汤及产後中风自汗等症防风 独活 当归 人参 细辛 葛根 芍药【炒】 川芎 甘草【炒】 熟地黄【白制】 半夏【姜制】 远志【去心】 荆芥穗【各半两】 桂心【七钱半】

右每服五七钱姜水煎汗不止加牡砺粉五分

防风白术牡砺散 治中风气虚腠理不密自汗不止等症

白术【炒】 牡砺【煨】 防风【等分】

右为末每服二三钱米饮下日三服如不止服黄芪建中汤

附方

柴胡桂枝汤 治伤风发热自汗或鼻鸣乾呕或痰气上攻等症

桂枝【二钱】 黄芩【炒】 人参 白芍药【炒各钱半】 甘草【炙】 半夏【姜制】 生姜【各一钱】 柴胡【四钱】 大枣【二枚】

右作一剂水煎服

白术防风汤 治服表药过多而自汗者

白术【炒】 黄芪【炒各二两】 防风【一两】

右每服五七钱水煎温服未应倍之

芪附汤【方见十九卷第六论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

当归六黄汤【方见十九卷第六论】

妇人筋脉痿痹方论第七【新附】

医学纲目云痿者筋脉急也痹者筋脉缓也急则引而缩缓则纵而伸或缩或伸动而不止者名曰痿痹俗谓之发搐是也凡癫痫风痉破伤风三症皆能痿痹但癫痫则仆地不省风痉痿痹则角弓反张破伤风痿痹则有疮口窃谓痿者属肝经风热血燥或肝火妄动血伤痿者属肝经血气不足或肝火汗多亡血以致手足伸缩不已抽搐不利若因风热血燥用羚羊角散加钩藤钩山梔若肝火妄动用加味四物汤加钩藤钩山梔若肝经血气不足用八珍汤加钩藤钩山梔若肝火亡血用加味逍遥散加钩藤钩山梔如不应须用六味丸以补肾水生肝木为主佐以前剂治之若其脉长弦者是肝之本脉也则易治其脉短澁者是肺金尅肝木也则难治其面色青中见黑者是水生木也当自愈青中见白者是金尅木也必难愈

附治验方

一妇人素口苦月经不调或寒热妊娠五月两臂或拘急或缓纵此肝火伤血所致也用四物加柴胡山梔丹皮钩藤钩治之而愈

一妊妇因怒寒热颈项动掉四肢抽搐此肝火血虚风热用加味逍遥加钩藤钩数剂而痊

附方

羚羊角散【方见十四卷第二论】

加味四物汤【方见二十四卷第六论】

八珍汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人颤振方论第八【新附】

黄帝曰人之颤者何气使然岐伯曰胃气不实则诸脉虚诸脉虚则筋脉懈堕筋脉懈堕则行阴用力不复故为颤因其所在补分肉间医学纲目云颤振与痿痹相类痿痹则手足牵引而或伸或屈颤振则但颤动而不伸屈也胃虚有痰用参术以补气茯苓半夏以行痰如实热积

滞用张子和三法

愚谓颤振者掉眩也易曰鼓万物者莫疾乎风鼓之为言动也大抵掉眩乃风木之摇运也诸风掉眩皆属于肝治法若肝木实热用泻青丸肝木虚热用六味丸肺金尅肝木用泻白散肝木虚弱用逍遥散加参术钩藤钩脾血虚弱用六君子加芎归钩藤钩胃气虚弱用补中益气汤加钩藤钩若产後颤振乃气血亏损虚火益盛而生风也切不可因风为论必当大补斯无误差

附治验方药

一妇人性善怒发热经水非过期则不及肢体倦怠饮食少思而颤振余以为脾气不足肝经血少而火盛也午前以调中益气汤加茯苓贝母送六味丸午後以逍遥散送六味丸两月余而愈

一妇人身颤振口妄言诸药不效余以为郁怒所致询其故盖为素嫌其夫而含怒久矣投以小柴胡汤稍可又用加味归脾汤而愈

附方

海藏愈风汤 治产後一切失血过多及汗後中风搐搦【方见十九卷第十二论】

交加散 治瘈瘲或颤振或产後不省人事口吐痰涎

当归 荆芥穗【等分】

右为细末每服三钱水一盏酒少许煎至七分灌下咽即有生理

增损柴胡汤 治产後或经适断致手足牵搐咬牙昏冒异症

柴胡【八钱】黄芩【炒四钱】半夏【各三钱】石膏【四钱】知母【二钱】黄芪【炒五钱】甘草【炙二钱】

右为粗末每服半两姜五片枣四枚水煎温服

本事青盐丸 治肝肾虚损腰膝无力颤振脚曳茴香【末三两】兔丝子【末四两】乾山药【末二两】青盐【一两】

右先将?丝子洗净无灰酒浸晒七日冬天近火煨炙乾另为细末和匀酒糊丸梧子大每服五七十丸温酒或盐汤下常服壮筋力进饮食一妇人素患足脚曳久服此药履地如故

本事星附丸 治中风能言而手足躄曳脉虚浮而数天南星
半夏【二味薄切片姜汁浸透】黑附子 白附子【炮】川乌【炮】白僵?【炒】没药
人参 白茯苓【各等分】

右用粗末每服二钱酒水各一盏同煎至八分去滓热进三二服汗出即瘥予在桐庐有患此
症用前药三服得汗手足即能举动

三因独活散

治气虚感风或惊恐相乘肝胆受邪使上气不守正位致头招摇手足颤掉渐成目昏独活
地骨皮 细辛 芎藭 菊花【甘味者】防风【去叉】甘草【炙等分】

右为粗末每服三钱水盏半煎至一盏去滓煎取清汁六分入竹?少许再煎一二沸食後温饮
日二服

世传茯苓丸

治手臂抽牵或战掉不能举物服此药立愈又治臂痛如神方见後并注兼治之法

附方

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

加味归脾汤

逍遥散【二方见二十四卷第四论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

妇人风寒臂痛方论第九

妇人臂痛或筋脉挛急遇寒则剧者由肝气虚弱风寒客於经络故其脉紧细宜用栝子仁丸
舒筋汤若臂痛而不能举或痛无定处此脾虚邪气相?中脘伏痰故其脉沈细如此宜用茯苓
丸控涎丹主之

愚按前症若肝血虚用加味逍遥散中气虚用补中益气汤血气俱虚用八珍汤风热血燥用
秦艽地黄汤脾肾虚寒用栝子仁丸脾胃实热用茯苓丸水不能生木用六味丸逍遥散怒动
肝火用小柴胡加川芎当归眩晕晡热用四物柴梔丹皮晡热月经不调用加味逍遥散食少
体倦无寐盗汗用加味归脾汤

附治验

先太宜人遍身作痛筋骨尤甚不能屈伸口乾目赤头眩痰壅胸膈不利小便赤短夜间殊甚遍身作痒如虫行此属肝肾气虚而热也用六味地黄丸料加山梔柴胡而愈

栝子仁丸

栝子仁【二两】熟地黄【自制】茯苓 枳殼【去穰麸炒】覆盆子【炒】五味子【杵炒】附子【炮】石斛【酒蒸炒】鹿茸【酥炙】酸枣仁【炒】桂心 沉香 黄芪【各一两蜜水炙一方等分】

右为末炼蜜丸桐子大每服三十丸空心温酒下

舒筋汤 治风寒所伤肩臂作痛及腰下作痛又名五痹汤

片姜黄【一钱】甘草【炒】羌活【各三分】白术 海桐皮 当归 赤芍药【各五分】

右水煎服

茯苓丸 治脾气虚弱痰邪相停伏中脘以致臂内筋脉挛急而痛

茯苓【二两】半夏【姜制二两】枳殼【半两制】风化朴硝【一两】

右为末姜汁糊丸桐子大每服二十丸食後姜汤下

控涎丹 凡人忽胸背手足头项腰胯牵痛不定或头痛昏倦痰唾稠粘喉中锯声手脚重痹此痰涎伏於胸膈也宜此治之

甘遂【去心】大戟【去皮】真白芥子【各等分炒】

右为末糊丸桐子大临卧姜汤下五七丸痰盛服十丸

白芥子散 治臂痛牵引背脾或辍或作由荣卫循行失度痰滞经络或似瘫痪

真白芥子 木鼈子【各三两麸炒】没药【另研】桂心 木香【各半两】

右为末每服一钱温酒下

愚按前三方脾气虚弱者必佐以六君子汤中气虚弱者必佐以补中益气汤气血虚者必佐

以八珍汤脾气郁滞者必佐以归脾汤肝经怒气者必佐以逍遥散若专用前方治之胃气益虚病气益甚不可不谨

流气饮 治七情气滞胸脇闷痞咽喉不利呕喘面浮二便不调或气攻肩背脇肋作痛或脚气喘急腹胀便闭元气充实者宜用此药慎之

紫苏叶 黄芪【炒】 青皮【去白】 当归 半夏【姜制】 乌药 芍药【炒】 茯苓 桔梗 防风【各三钱】 川芎 陈皮【各七钱五分】 枳实【麸炒】 木香【二钱五分】 甘草【炙五分】 大腹子【一两姜制】

右每服半两姜枣水煎服

交加散【方见前】

四物汤 治血滞中风血虚手足不遂如臂痛加红花煎【方见前】

交加散加木瓜牛膝治冷痺肩背作痛即人参败毒和五积散

乌药顺气散加羌活木瓜治外邪气滞筋骨作痛或痰气不利

附方

秦艽地黄汤 治肝胆经风热血燥肩臂疼痛或筋脉引急或时牵痛其内症发热或寒热晡热月经不调或肢体酸痛等症

秦艽 熟地黄【自制】 当归【各一钱】 川芎 芍药 牡丹皮 白术 茯苓【各一钱五分】 钩藤【一钱】 柴胡 甘草【炙各三分】

右水煎服

逍遥散

加味逍遥散

加味归脾汤

八珍汤【四方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

四物汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

妇人贼风偏枯方论第十

论曰贼风偏枯其状半身不遂肌肉枯瘦骨间作痛经云汗出偏枯使人偏枯如树木一枝津液不到则枯槁被风所害古人有云医风先医血血行风自灭治法当用大八风汤增损茵芋酒续断汤以养其血则风自祛矣

愚按医风先医血此论得之大抵此症多因胎前产後失於调养以致精血乾涸肝木枯槁治法当滋其化源考之生气通天论曰风客淫气精乃亡邪伤肝也陰阳应象大论曰风气通於肝风则热盛热盛则水乾水乾则气不荣故精乃亡此风病之所由作也

附治验

一妇人性善怒常自汗月经先期余以为肝火血热不信乃泛用降火之剂反致月经过期复因劳怒口噤呻吟肢体不遂六脉洪大面目赤色用八珍麦门五味山梔丹皮数剂渐愈兼用逍遥散六味丸各三十余剂全愈

大八风汤 治中风偏枯失音不语时复恍惚或昏愦发热

当归 杏仁【去皮尖麩炒黄】 甘草【炙】 桂心 乾姜【炮各二两】 五味子【杵炒】 升麻【各二两】 川乌【炮去皮尖】 黄芩【炒】 芍药【炒】 防风独活 川芎 麻黄【去节】 秦艽 石斛【去根酒浸】 人参茯神【去木】 石膏 黄芪【炒】 紫苑【各一两】 大豆【三两去皮炒】

右每服五钱水煎服

续断汤

当归【三两】 陈皮 芍药【炒】 细辛【各一两】 生地黄【二两】 续断【酒浸炒】

右每服五七钱水煎脏寒下痢加熟附子一两

金生虎骨散 治半身不遂肌肉乾瘦忌用麻黄发汗恐津液枯竭惟当润筋养血消风

当归【二两】赤芍药 续断【酒浸炒】白术 藁本
虎骨【炙各五两】乌蛇肉【炙半两】

右为末每服二钱酒调骨痛加生地一两自利加天雄半两

虎胫骨酒 治中风偏枯四肢不随一切风痺筋脉挛拳

石斛 石楠叶 防风 虎胫骨【炙】 当归 茵芋叶
杜仲【炒】 牛膝【酒浸炒】 续断【酒浸炒】 芎藭 巴戟【去心】 狗脊【各一两】

右以绢囊盛药用酒一斗渍十日每服一盞温饮

附方

八珍汤

逍遥散【二方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人偏风口喎方论第十一

论曰偏风口喎者因体虚受风而入足阳明胃经盖足阳明之经上夹於口风乘之其筋偏急故也

愚按前症当参本卷首论治之

附治验【方药与前诸治验参看】

一妇人怀抱郁结筋挛骨痛喉间似有一核服乌药顺气等药口眼歪斜臂难伸举痰涎愈多内热晡热食少体倦余以为郁火伤脾血燥生风用加味归脾汤二十余剂形体渐健饮食渐进又用加味逍遥散十余剂痰热少退喉核少消更用升阳益胃汤数剂诸症渐愈但臂不能伸此肝经血少而筋挛耳用六味地黄丸以滋肾水生肝血而愈

附方

升阳益胃汤 治脾胃虚弱肢体怠惰或体重节痛口舌乾渴饮食无味大便不调小便频数饮食不消兼见肺病洒淅恶寒凄惨不乐乃阳气不和也

羌活 独活 防风【各五钱】 柴胡 白术 茯苓【渴者不用】 泽泻【各三钱】 人参 黄连【炒】 陈皮【各四钱】

右每服三五钱姜枣水煎早温服如小便愈而病益加是不宜利小便也当少减茯苓泽泻

加味归脾汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人怔忡惊悸方论第十二

夫心藏神为诸脏之主血气调和则心神安静若劳伤心血外邪乘袭则心神惊悸恍惚忧惧不安用排风汤治之

愚按丹溪先生云惊悸者血虚用朱砂安神丸痰迷心窍用定志丸怔忡者属火属痰思虑便动者属虚时作时止者火动也假如病因惊而致惊则神出其舍痰乘而入矣盖人之所主者心心之所养者血心血一虚神气不守此惊悸之所由作也治当调养心血和平心气而已金氏妇暑月赴筵因坐次失序自愧成病言语失伦两脉弦数余曰当补脾导痰清热不信以数巫者喷水咒之而死或谓病既无邪以邪治之何至於死予曰暑月赴筵外受蒸热辛辣适口内伤郁热而况旧有积痰加之愧闷其痰愈盛又惊以法尺益惊其神而气血不宁喷以法水闭其肌肤而汗不得泄内燔则阴既消而阳不能独立不死何待故滑伯仁先生云若胆气虚寒用茯神汤胆气实热用酸枣仁丸心气虚热用定志丸茯苓补心汤心气实热用朱砂安神丸茯神散

附治验【方药】

文学归云桥内月事不及期忽崩血昏愤发热不寐或谓血热妄行投以寒剂益甚或谓胎成受伤投以止血亦不效余曰此脾气虚弱无以统摄故耳法当补脾而血自止用补中益气加炮姜不数剂而验惟终夜少寐惊悸别服八物汤不效余曰杂矣乃与归脾汤加炮姜以补心脾遂如初

一妇人劳则心跳怔忡寒热往来用归脾汤为主佐以八珍汤诸症渐愈又用加味逍遥散宁志丸而安後复作服归脾定志二药即愈

一妇人患惊悸怔忡日晡发热月经过期饮食少思

用八珍汤加远志山药酸枣仁三十余剂渐愈佐以归脾汤全愈後因劳发热食少体倦用补

中益气汤又因怒适月经去血不止前症复作先以加味逍遥散热退经止又用养心汤治之而痊

一妇人惊悸怔忡无寐自汗盗汗饮食不甘怠惰嗜卧用归脾汤而愈至年余怀抱郁结患前症兼衄血便血仍用前汤而愈

茯神散 治五脏气血虚弱惊悸怔忡宜用此安神定志

茯神【去木】 人参 龙齿【另研】 独活 酸枣仁【炒各三钱】 防风 远志【去心】 桂心 细辛 白术【炒各三钱】 乾姜【炒各三两】

右为末每服四五钱水煎服或蜜为丸服

茯苓补心汤 治心气不足善悲愁怒衄血面黄五心烦热或咽喉痛舌本作强

茯苓【四两】 桂心 甘草【炒各三两】 紫石英【煨】 人参【各一两】 大枣【二十枚】 麦门冬【去心三两】 赤小豆【二十四粒】

右水七升煎二升半分三服

茯神汤 治胆气虚冷头痛目眩心神恐惧不能独处胸中烦闷

茯神【去木】 酸枣仁【炒】 黄芪【炒】 栝子仁【炒】 白芍药【炒】 五味子【杵炒各一两】 桂心 熟地黄【自制】 人参 甘草【炒各半两】

右每服五钱姜水煎

酸枣仁丸 治胆气实热不得睡卧神思不安惊悸怔忡

茯神【去木】 酸枣仁【炒】 远志【去心】 栝子仁【炒】 防风【各一两】 枳壳【麸炒】 生地黄【杵膏各半两】 青竹茹【二钱五分】

右为末炼蜜丸桐子大每服七八十丸滚汤下

定志丸 治心神虚怯所患同前或语言鬼怪喜笑惊悸

人参 茯苓【各两半】 菖蒲 远志【去心各一两】

右为末蜜丸如前服

养心汤 治心血虚惊悸怔忡不宁或盗汗无寐发热烦躁

黄芪【炒】白茯苓 茯神【去木】半夏麴
当归【酒拌】川芎【各半两】辣桂【去皮】栝子仁
酸枣仁【炒】五味子【杵炒】人参【各三钱】甘草【炙四钱】

右每服三五钱姜枣水煎服

朱砂安神丸 治心经血虚头晕心神惊悸等症朱砂【飞过五钱】黄连【酒洗六钱】甘草【炙五分】生地黄 当归【各一钱五分】

右为末饭糊为丸每服十五丸如一二服不应当服归脾汤补之

治要茯苓散 治心经实热口乾烦渴眠卧不安或心神恍惚

茯神 麦门冬【各一两五钱】通草 升麻【各一两二钱五分】紫苑 桂心【各七钱五分】知母【一两】赤石脂【一两七钱五分】大枣【十二枚】淡竹茹【五钱】

右每服一两水煎

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

归脾汤

八珍汤

加味逍遥散【三方见二十四卷第四论】

宁志丸【方见後】

妇人失血心神不安方第十三【原无论】

窃谓前症若脾肝郁热用加味逍遥散脾肝郁结用加味归脾汤脾胃虚弱气血不足用八珍汤十全大补汤脾肺虚弱气血不足用补中益气汤六君子汤痰气郁结用六君桔梗贝母如不应审系气虚但补脾胃如不应用独参汤如恶寒发热属气血俱虚内热晡热属血虚作渴面赤是血脱烦躁皆宜甘苦之剂以补阳气而生陰血经云血脱补气若用寒凉之剂以降火则误矣仍审所属之因而治之

宁志膏 治失血心神不安言语失常不得安睡等症辰砂【另研】酸枣仁【炒】人参

白茯苓 琥珀【另研各五分】 滴乳香【一钱研】

右为末每服一钱煎枣汤空心调下

附方

妙香散 治心气不足精神恍惚虚烦少睡盗汗等症甘草【炒五钱】 远志【去心炒一两】 辰砂【另研三钱】 麝香【二钱另研】 人参【一钱】 木香【煨二钱半】 山药【姜汁炙一两】 茯苓 茯神【去木】 黄芪【各一两】 桔梗【五钱】

右为末每服二钱温酒调

茯神汤【方见前】

温胆汤 治胆虚痰热惊悸不眠

半夏 竹茹 枳实【麸炒各二两】 陈皮 生姜【四两】 甘草【炒二两】

右每服一两水煎

半夏汤 治胆腑实热精神恍惚寒热泄泻或寝汗增风善太息

半夏【一钱五分】 黄芩【一钱】 远志【一钱】 生地黄【二钱】 米【一合】 酸枣仁【炒三钱】 宿砂【一钱五分】

右长流水煎服

独参汤 治元气虚弱恶寒发热或作渴烦躁痰喘气促或气虚卒中不语口噤或痰涎上涌手足逆冷或难产产後不省喘急用好人参二两或三四两炮姜五钱一剂水煎徐徐服盖人参性寒故姜佐之如不应急加炮附子

加味逍遥散

加味归脾汤

八珍汤

十全大补汤【四方见二十四卷第四论】

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

妇人风邪颠狂方论第十四

妇人颠狂由血气虚而风邪所乘若邪并於陰则发狂邪并於阳则发颠夫颠者卒发而意不乐直视仆地吐涌涎沫口喎目急手足撩戾无所知觉良久而苏狂者少卧不饥自高贤自辨智自贵倨妄笑歌乐妄行不休素问云阳厥狂怒饮以铁落【狂怒出於肝肝属木铁落金也以金制木之意】一妇人眼见鬼物言语失常循衣直视或作心病治之无効投养正丹二服煎乳香送三生饮立愈【养正丹三生饮方见本卷第一论】

愚按前症刘宗厚先生云有在母腹中受惊者或有闻大惊而得者盖惊则神不守舍舍空则痰涎归之或饮食失节胃气有伤痰停胸膈而作当寻火寻痰固元气若顽痰胶固上膈必先用吐法若在肠胃亦须下之

窃谓此症若因元气虚弱或痰盛发热等皆是虚象如慢惊症无风可祛无痰可逐但补脾胃生气健旺神智自清痰涎自化若误用辛散祛逐脑麝之剂必为败症

附治验

一妇人素清苦因惊而癲或用风痰等药愈甚余用参芪归术浓煎佐以姜汁竹?三筋余方愈【仍参十八十九卷狂言谵语乍见鬼神方】

防风茯神散 治风颠啼泣歌笑或心神恐惧或语言失常

防风 茯神【去木】 独活 人参 远志【去心】 龙齿 菖蒲【去毛】 石膏
牡砺【煨各一两】 秦艽
禹余粮【煨】 桂心【各五钱】 甘草【炒三分】 蛇蛻【一条炙】

右每服五钱水煎服

排风汤

牛黄清心丸

治诸风缓纵不随言语蹇澁痰涎壅盛怔忡健忘或发癲狂【二方见本卷首论】

妇人飞尸血厥方论第十五

夫飞尸者游走皮肤穿行脏腑每发刺痛变作无常通尸者附骨入肉攻通血脉见尸丧发哀哭便作风尸者淫濯四肢痛而昏沈得风雪便作沈尸者纏骨结脏内肿心脇发而绞痛遇寒冷便作注尸者举身沈重精神错杂时觉昏愤每至节气便作并宜苏合香丸治之愚按丹溪云凡人忽手足逆冷肌肤起如米粒头面青黑精神恍惚或错言妄语或牙关紧急或昏寐仆倒吊死问丧入庙发墓多有此病先以苏合香丸灌之次服调气散平胃散玉机微义云卒厥飞尸客忤鬼击口噤用麻黄汤寒厥表热里寒则下利清谷食入则吐脉沈手足冷用四逆汤热厥腹满身重难转面垢谵语遗溺手足厥冷自汗脉沈滑用白虎汤若人身忽然不动目闭口噤恶闻声音眩冒顷时方寤此由出汗过多气并於血阳独上而不下气壅塞而不行耳气过血还陰阳复通移时方寤名曰郁冒亦名血厥宜服白薇汤仓公散

附治验

锦衣杨永兴举家避眚有仆沈醉失避者既而神思昏昧遍身青伤各煎金银藤汤灌之即愈

一妇人忽昏愤发谵语自云为前谋赖某人银两某神责我将你起解往城隍理问两脚踝膝臀处皆青肿痛不可忍口称苦楚次日方苏痛尚不止用金银藤两许水煎服即愈

一妇人入古墓患前症以紫金锭灌之即苏通政余子华太常汪用之皆因往吊而卒死丧家想即是症

苏合香丸【方见本卷第四论】

白薇汤

白薇 当归【各一两】 人参 甘草【一钱】

右每服五钱水煎

仓公散 治卒中鬼击心腹如刺下血不省及卧魔啮脚指不觉并诸毒等症

皂荚 藜芦 雄黄【研】 矾石【煨研各等分】

右每用少许吹入鼻中未 再吹以得 为度

内鼻散 治尸厥脉动静而若死用石菖蒲末吹鼻中仍以桂末安於舌上【苏合香丸亦可】

硫黄散 治尸厥不省四肢逆冷腹中如雷鸣或痰气不降

焰硝【半两】 硫黄【一两各另为细末】

右每服三分酒调灌之良久再服即苏

附方

麻黄汤 治寒厥或伤寒恶风发热身痛无汗者

麻黄【六钱】 桂枝【四钱】 甘草【炙二钱】 杏仁【二十枚炒】

右作一剂水煎服

调气散 治气厥不省或痰气上壅及治气滞胸膈不利

白豆蔻丁香 檀香 木香【各二钱】 藿香 甘草【炙各六钱】 砂仁【四钱】

右为末每服二钱入盐少许沸汤调下

四逆汤

白虎汤【二方见七卷第二论】

神仙追毒丸【又名紫金锭又名太乙丹又名神仙解毒万病丸】能解一切毒或狐狸莽草毒茵河鲀疫死牛马肉毒或蛇犬恶虫所伤及鬼怪恶疮等毒或二广断肠草蛇毒化等毒文蛤【即五倍子槌破洗焙为末三两】山茨菰【去皮净末二两】千金子【一名续随子去壳研去油一两】麝香【二钱另研】红芽大戟【去芦焙为末一两五钱】

右用糯米浓饮和作四十粒用井华水或薄荷汤磨服利一两次用粥止之修合须端午七夕重阳或天德月德日於净室焚香修制效验不能具述宜珍藏之凡人居家出入不可无此药岭外有妇与旅合阴以定年药置食中且戒之曰子几时来果从其言彼复以药解之可无恙若过期不往必死若遇此毒及前一应诸毒服前药一粒或吐或下即愈昔有女子劳瘵为尸虫所噬磨服一粒吐下小虫更服苏合香丸遂愈若蕈菰子砒石时行瘟疫山岚瘴气自缢溺水打折伤死瘀血内滞心头微温用姜汤磨灌一粒可苏其急喉闭缠喉风脾肿赤眼痛疽发背诸疮汤火所伤用东流水磨并服颠邪鬼气鬼胎煖酒磨服余谓喉闭以下诸症果能灼见形病俱实乃可用之

薛氏医案卷二十七

卷二十八

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二十八

明 薛己 订

妇人良方

妇人血风肢体骨节疼痛方论第一

妇人血风由气血不足腠理不密风冷乘之以致邪正相?故骨节疼痛肢体发热口舌咽乾

愚按东垣先生云饮食失节脾胃虚弱乃血所生病故口中津液不行若火热来乘土位故肢体发热作渴若肝经血热用四物羌活黄芩黄柏肝经血虚用逍遥散山梔川芎风湿兼痰用四物南星半夏羌活苍术风湿伤脾用羌活胜湿汤暑湿伤气用清燥汤气郁肝脾用四君木香枳殼?榔胃气受伤用补中益气汤瘀血流注用四物桃仁红花骨痛筋挛用当归没药丸倦怠无力用补中益气羌活川芎

附治验

一妇人自汗盗汗发热晡热体倦少食月经不调吐痰甚多二年後遍身作痛陰雨益甚此气虚而风寒所乘用小续命汤疼痛顿止用补中益气加味归脾三十余剂诸症悉愈

一妇人月经不调且素有痛风遇劳必作用衆手重按痛稍止此气血俱虚用十全大补加独活而痛痊六味丸逍遥散而经调

一妇人肢体作痛面色痿黄时或赤白发热恶寒吐泻食少腹痛脇胀月经不时或如崩漏或痰盛喘 头目眩痛或五心烦热口渴饮汤或健忘惊悸盗汗无寐等症卧床年许悉属肝脾亏损气血不足所致用十全大补加味归脾兼服月余诸症悉痊

芎藭散

川芎【一钱】 赤茯苓 赤芍药 酸枣仁【炒】 桂心 当归【酒洗】 木香 牛膝【酒洗】 羌活 枳殼【炒】 甘草【各三分】

右水煎服

羚羊角散 治血风身体疼痛手足无力

羚羊角【镑】酸枣仁【炒】生地黄?榔【各一两】五加皮防风 赤芍药
当归【酒洗】骨碎补【炒】海桐皮

川芎【各五钱】甘草【三钱】

右为末每服二钱温酒调下

通灵丸 治血风手足疼痛不可忍者

白附子【一两】全蝎【半两炒】麝香【一字】僵?【一两炒去丝】

右为末炼蜜丸桐子大每服十丸温酒下日三服

当归没药丸 治风血肢体刺痛筋挛骨痹或手足麻木

当归 五灵脂【各一两炒】没药【半两】

右为末醋糊丸桐子大每服三十丸姜汤下

虎骨散 治血风走痛或打扑作痛

虎骨【酥炙】败龟板【酥炙】当归【酒洗】桂心
牛膝【酒洗】漏芦地龙【去土】蕨灵仙 玄胡索【炒】自然铜【制等分】

右为末每服二钱热酒调下

附方

羌活胜湿汤 治头痛脊痛腰似折项似拔

羌活 独活【各一钱】藁本 防风 甘草【炙各五分】蔓荆子 川芎【各五分】

右水煎服如身重腰沈沈然是湿热也加黄柏一钱附子五分苍术二钱

东垣清燥汤【方见後】

四物汤

补中益气汤

四君子汤【三方见二十四卷第六论】

小续命汤【方见十九卷第八论】

逍遥散

加味归脾汤

十全大补汤【三方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人血风白虎历节走注方论第二

妇人血风白虎历节由体虚风邪乘之随血而行或淫溢皮肤或卒然掣痛走注如虎嘯者加减小续命汤主之

愚按东垣云若人身体沉重走注疼痛此湿热相?或风热郁而不得伸附着於有形也是症多因饮食起居失节或因七情劳役失宜脾胃亏损腠理不密外邪所侵以致内热晡热自汗盗汗或经候不调饮食不甘治法湿热肿痛者清燥汤兼痰佐以二陈汤肝火作痛者加味逍遥散脾郁作痛者加味归脾汤血虚作痛者四物汤气虚作痛者四君子汤气血俱虚者八珍汤俱加羌活川芎月经先期而痛者加味逍遥散头眩倦怠而痛者补中益气汤大抵按之痛甚者病气实按之痛缓者元气虚劳役而痛者亦元气虚也饮食失宜而痛者脾气虚也恼怒而痛者肝火盛也若昼轻而夜重者血分病也【与前兼用】

附治验

一妇人历节发热作渴饮食少思月经过期其脉举之洪大按之微细用附子八物四剂而痛止用加味逍遥而元气复用六味丸而月经调

一妇人体肥胖素有热月经先期患痛风下体微肿痛甚则小便频数身重脉缓此风湿血虚而有热用羌活胜湿汤二剂肿痛渐愈用清燥汤数剂小便渐清用加味逍遥散内热渐愈又为饮食停滞发热仍痛面目浮肿用六君加柴胡升麻而愈又因怒气小腹痞闷寒热呕吐用前药加山梔木香而安惟小腹下坠似欲去後此脾气下陷用补中益气而愈後因劳役怒气作呕吐痰遍身肿痛经行寒热此肝木侮脾土用六君加柴胡山梔肿痛呕吐悉退後用补中

益气而安

一妇人饮食少思畏风寒患痛风呕吐寒热脉弦紧用附子八物而四肢痛愈用独活寄生而腰痛渐痊惟两膝肿痛用大防风汤而痛渐愈用归脾逍遥而元气复

漏芦散 治走注疼痛

漏芦 当归【酒洗】牛膝【各三钱】桂心 地龙【去土】防风羌活 白芷 甜瓜子 没药【各半两】虎胫骨 败龟板【各酥炙一两】

右为末每服二钱热酒调下

四生丸 治骨节作痛或浑身麻痺

白僵?【炒去丝】地龙【去土】白附子 五灵脂 草乌【去皮尖各等分】

右为末米糊丸桐子大每服二十丸茶清送下酒调服亦可

麝香丸 治历节诸风走痛或如虫行

大川乌【三个去皮尖生用】全蝎【二十一个】黑豆【二十一粒】地龙【去土五钱】麝香【一字】

右为末米糊丸菉豆大每服十丸温酒下○许学士云予得此方凡历节及不测疼痛一二服便瘥治一贵妇遍身走痛夜如虫啮三服而愈

附子八物汤 治历节痛如鎚鍛

附子【炮】乾姜【炮】芍药【炒】茯苓 人参 甘草 桂心【各五分】白术【一钱五分】

右水煎服一方去桂用熟地黄二钱

独活寄生汤【方见後】

小续命汤【方见後】一妇人两踝作痛上行膝髀肩肘痛如鎚鍛至夜尤剧六脉皆紧一剂而愈又邓安人夏月患此人迎脉虚此因暑而得用酒蒸黄连丸一服亦安

附方

东垣清燥汤 治元气虚湿热乘之遍身酸软或肺金受邪絶寒水生化之源肾无所养小便赤少大便不调腿腰痿软或口乾作渴体重麻木头目眩晕饮食少思或自汗盗汗肢体倦怠胸满气促

黄芪【一钱五分】黄连【炒】神麴【炒】五味子【九粒杵炒】猪苓 柴胡
甘草【炙各二分】苍术 白术【炒】麦门冬【去心】陈皮【炒】生地黄
泽泻【各五分】白茯苓 人参 当归【酒洗】升麻【各三分】黄栢【酒拌一分】

右水煎服

二陈汤【方见二十四卷第五论】

八珍汤

加味逍遥散

加味归脾汤【三方见二十四卷第四论】

四物汤

四君子汤

六君子汤

补中益气汤【四方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

羌活胜湿汤【方见前】

大防风汤【方见二十四卷第九论】

妇人血风？ 瘙痒方论第三

妇人瘙痒？ 五心烦热乃血风攻疰用人参荆芥散消风散逍遥散大抵因体虚风寒相？赤属血分而白属气分也经云汗出见湿乃生痼痲凡人汗出不可露卧沐浴使人身振寒热致生风

愚按前症有身发疙瘩或如丹毒痒痛不常或脓血淋漓发热烦渴或头目昏眩日晡益甚或

寒热发热月经不调皆肝经风热血燥用加味逍遥散为主佐以四君芎归若忿怒身发疙瘩痛痒寒热乃肝火血燥用加味小柴胡汤气血俱虚八珍加柴胡丹皮若夜间发热作渴谵语乃热入血室用小柴胡加生地血虚四物合小柴胡後用加味逍遥散调理若郁结食少体倦内热晡热乃脾经血燥用加味归脾汤寒热加山梔熟地若游走瘙痒乃血风走注用何首乌散血虚逍遥散风热消风散若专用风药复伤陰血必致筋挛等症

附治验

一妇人身?疙瘩或如丹毒痒痛不常搔碎成疮脓水淋漓发热烦渴头目眩暈日晡益甚此血虚内热之症以当归饮加柴胡山梔治之而愈

一妇人患前症肢体疼痛头目不清自汗盗汗月水不调肚腹作痛食少倦怠先用人参荆芥散後用逍遥散治之而痊

一妇人因忿怒身发疙瘩憎寒发热余谓肝火用小柴胡汤加山梔黄连治之而愈後口苦脇痛小便淋?复用前药全愈

一妇人患前症?热夜间谵语此血分有热以小柴胡汤加生地治之而安後用四物汤加柴胡山梔丹皮而热退又用逍遥散全愈

一室女十四岁天癸未至身发赤斑痒痛左关脉弦数此因肝火血热以小柴胡汤加山梔生地丹皮治之而愈若因怒而致者亦宜治以前药【治验余见二十四卷血风门】

何首乌散 治皮肤瘙痒游走无定

何首乌 防风 白蒺藜【炒】 枳殼【麸炒】 天麻 僵?胡麻【炒】 羌蔚子 蔓荆子【各一钱】 茵陈【五分】

右水煎服

附方

四物汤

四君子汤【二方见二十四卷第六论】

加味小柴胡汤

小柴胡汤【二方见二十四卷第二论】

八珍汤

加味归脾汤

加味逍遥散

逍遥散【四方见二十四卷第四论】

消风散【方见二十四卷第七论】

当归饮【方见二十四卷第六论】

人参荆芥散【方见五卷第三论】

妇人虚风头目眩晕方论第四

妇人头眩由气虚风入於脑循脉引於目系目系急而然也邪甚则必癫素问云头痛癫疾下虚上实过在足少阴巨阳甚则入肾狗蒙招摇目瞑耳聋下实上虚过在足少阴厥阴甚则在肝下虚者肾虚也故肾厥则头痛上虚者肝虚也故肝虚则晕徇蒙者如以物蒙其首招摇不定目眩耳聋皆晕之状故肝厥头痛不同也愚按丹溪先生云眩者言其黑运旋转其状目闭眼暗身转耳聋如立舟船之上起则欲倒盖虚极乘寒得之亦不可一途而取轨也若风则有汗寒则掣痛暑则热闷湿则重滞此四气乘虚而眩晕也若郁结生痰而眩晕者此七情虚火上逆也若淫慾过度而眩晕者此肾虚气不归源也若吐衄漏崩而眩晕者此肝虚不能摄血也有早起眩晕须臾自定者元气虚也正元饮下黑锡丹伤湿头晕用肾着汤加川芎有痰用青州白丸子头风风热也久则目昏偏头风相火也久则目紧便澀皆宜出血以开表之窃谓前症肝虚头晕用钩藤散肾虚头晕六味丸头晕吐痰养正丹不应八味丸血虚四物参苓白术不应当归补血汤气虚四君归芪不应益气汤肝木实泻青丸虚用地黄丸不应川芎散脾气虚二陈参术柴胡升麻不应益气汤加茯苓半夏脾胃有痰半夏白术天麻汤风痰上壅四神散发热恶寒八物汤七情气逆四七汤伤湿而晕除湿汤

治验

一妇人素头晕不时而作月经迟而少此中气虚弱不能上升而头晕不能下化而经少用补中益气汤而愈後因劳扑地月经如涌此劳伤火动用前汤加五味子一剂而愈前症虽云气无所附实因脾气亏损耳

一妇人内热口乾劳则头晕吐痰带下详见六卷第十六论

养正丹 治虚风头眩吐涎不已盖此药升降阴阳补接真气非止头眩而已

黑铅 水银 硫黄【研】 朱砂【各一两研】

右用砂器熔铅下水银搅匀离火少时入硫砂再搅候冷为末饭丸菉豆大每服三十丸空心食前枣汤下

钓藤散 治肝厥头晕

钓藤钩 陈皮【炒】 半夏【姜制】 麦门冬 茯苓 茯神【去木】 人参【去芦】 甘菊花 防风【各一钱】 甘草【炙三分】 石膏【煅二钱】

右姜水煎

川芎散 治肝肾虚风头目眩晕或头痛耳鸣目系紧急

小川芎 山药 白茯神 甘菊花【野菊不用】 人参【各半两】 山茱萸肉【一两】

右为末每服二钱酒调日三服

三五七散 治八风五痹肢体不仁或风寒入脑头痛目旋耳内蝉鸣

附子【炮】 细辛【各三两】 乾姜【炮】 山茱萸【各五两】 防风 山药【炒各七两】

右为末每服二钱温酒调

四神散 治血风眩晕头痛寒热睡痰

菊花 当归【酒洗】 旋覆花【去梗叶】 荆芥穗【各一钱】

右葱白三寸茶末一钱水煎

苍耳散 治血风头旋或不知人事用喝起草嫩心陰乾为末酒服二钱其功甚効

治头旋如天动地转名曰心眩胆矾一两细研用面饼剂一个拌匀勒如骰子大瓦上焙乾每服一骰为末灯心竹茹煎汤调下此去痰之法当审而用之

附方

正元饮 治下元虚败痰气上涌头目眩晕脏肺滑泄时或自汗手足逆冷霍乱转筋等症

红豆【炒二钱】人参【去芦二两】茯苓【二两】附子【炮去皮尖一两】甘草【炙二两】肉桂【五钱】川芎 山药【姜汁炒】乌药
乾葛【各一两】白术【二两】乾姜【炮三钱】黄芪【炙一两五钱】

右每服二钱姜枣水入盐少许煎送黑锡丹

黑锡丹 治真阳气败痰气壅塞心火炎炽或赤白带下等症

肉桂 沉香 附子【炮去皮脐】葫芦巴【酒浸炒】破故纸【炒】茴香【炒】肉豆蔻【面裹煨】阳起石【研水飞】金铃子【蒸去皮核】木香【各一两】硫黄
黑锡【去灰各二两】

右将黑锡硫黄入铫内炼结砂子倾出地上去火毒研细余药为末和匀再研至黑光色酒糊丸桐子大陰乾入布袋擦令光润每服四十丸

肾着汤【方见十五卷第八论】

青州白丸子【方见三卷第四论】

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

当归补血汤【方见十九卷第六论】

四物汤

四君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

二陈汤【方见二十四卷第五论】

泻青丸【方见二十四卷第三论】

八物汤【方见二十四卷第四论】

四七汤【方见十二卷第七论】

除湿汤【即肾着汤加川芎】

半夏白术天麻汤【方见四卷第五论】

妇人血风头痛方论第五

许学士云妇人患头风者十居其半每发必掉眩如在车船之上盖因肝经血虚而风邪袭之尔用川芎当归散若头痛连齿时发时止连年不已此风中脑谓之厥逆头痛宜白附子散及灸曲鬓穴在耳掩前正尖上灸七壮左痛灸左右痛灸右

愚按东垣云足太阳头痛脉浮紧恶风寒川芎羌活独活麻黄为主手少阳经头痛脉弦细往来寒热柴胡为主足阳明头痛身热目疼鼻乾恶寒发热脉浮缓而长升麻汤或石膏白芷为主手太阳头疼有痰体重或腹痛为痰癖脉沈缓苍术半夏南星为主足少阴经头痛足寒气逆为寒厥脉沈细麻黄附子细辛汤为主足厥阴头项痛或吐涎沫厥冷脉浮缓吴茱萸汤主之诸血虚头痛当归川芎为主诸气虚头痛人参黄芪为主气血俱虚头痛调中益气少加川芎蔓荆细辛痰厥头痛半夏白术天麻汤厥逆头痛羌活附子汤如湿气在头者以苦吐之不可执方而治若脉杂乱而病见不一宜补胃为主

附治验

一妇人因劳耳鸣头痛体倦用补中益气加麦门五味而痊三年後得子因饮食劳倦前症益甚月经不调晡热内热自汗盗汗用六味地黄丸补中益气汤顿愈经云头痛耳鸣九窍不利肠胃之所生也故脾胃一虚耳目九窍皆为之病

一妇人两眉棱痛後及太阳面青善怒此肝经风热之症用选奇汤合逍遥散加山梔天麻黄芪半夏黄芩而愈此症失治多致伤目或两耳出脓则危矣头痛手掉身麻见一卷第五论

川芎当归散

川芎【一钱】当归【酒拌】羌活 旋覆花 细辛 蔓荆子 防风 石膏【煨】 藁本 荆芥穗 半夏 麴生

地黄 甘草【炙各五分】

右姜水煎

白附子散 治风邪风痰头痛连齿不时举发或连年不愈

麻黄【不去根节】乌头【炮去皮】南星【炮各半两】白附子【炮一两】全蝎【炒五

枚】辰砂 麝香 白姜【炮各一钱】

右为末酒调服三分卧少时

川芎茶调散 治诸风上攻头目昏重偏正头痛薄荷【八两】川芎 荆芥【各四两】羌活 白芷 防风甘草【炙各二两】细辛【一两】

右为末每服二钱食後茶清调

如圣饼子加细辛其效甚速若头痛筋挛骨重少气?噫腹满咳 烦冤其脉举之则弦按之石 坚由肾气不足而逆上谓之肾厥头痛宜玉真丸硫黄丸

硫黄丸 治头风不问新久服此除根屡用屡效

硫黄【二两】硝石【一两】

右为末滴水丸指顶大每服一丸空心细嚼茶清下

一方用生菜菹汁仰卧注两鼻数年之患一注即愈一方 治风邪犯脑患头痛不可忍不问年岁

硝石 人中白 脑子【等分】

右为末用一字吹入鼻中

都梁丸 治产前产後风邪所伤头痛头晕【方见後】

附方

调中益气汤 治气血俱虚而头痛

芍药【三分】升麻【二分】黄芪【一钱】甘草【五分】五味子【七粒】当归白术 人参【各三分】柴胡 橘皮【各二分】

右水煎

半夏白术天麻汤

半夏【一钱五分】白术 神麴【炒各一钱】天麻 黄芪 人参 苍术 陈皮 泽泻

茯苓【各五分】乾姜【三分】大麦

蘖【一钱五分】黄栢【酒制二分】

右每服半两水煎

羌活附子汤

麻黄 黑附子【炮】白芷 白朮 黄栢【各三分】羌活 苍术【各五分】防风 甘草
升麻【各五分】黄芩【五分】

右水煎服

选奇汤 治风热上壅眉棱骨痛或头目眩晕

羌活 防风【各三分】甘草【二钱夏生冬炒】黄芩【酒制冬去之】

右每服三钱水煎时时服

吴茱萸汤

升麻汤

麻黄附子细辛汤【三方见六卷第十二论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

逍遥散【方见二十四卷第四论】

颈项强痛方论第六

夫颈项属足太阳膀胱足少阴肾二经相为表里若感风寒湿气则发热恶寒颈项强急腰背反张瘈瘲口噤脉沈迟弦细新产血虚出汗多患此症若因鼾睡失枕而致用三五七散追风散若风邪所伤用都梁丸木瓜煎

愚按东垣云肩背痛不可回顾此手太阳气郁而不行以风药散之窃谓前症若因肝木自旺用泻青丸精血不足六味丸风热淫肝加味逍遥散怒动肝火加味小柴胡汤肝经血虚加味

四物汤肾不能生肝六味丸膀胱气滞羌活胜湿汤大抵肝火旺则肝血虚而筋燥颈项强急或腰背反张或四肢拳挛或颈项等处结核

附治验

一妇人耳内或耳後项侧作痛寒热口苦月经不调此肝胆经火兼伤脾胃用四君加柴胡升麻黄芪芍药而愈後因劳役怒气呕吐脇胀用六君子汤加山梔柴胡而安

一妇人因怒寒热作渴左目紧小头颈动掉四肢抽搐遍身疼痛此血虚肝热则生风也用加味逍遥加钩藤鈎数剂诸症渐愈又用八珍汤而痊

追风散 治风邪所乘头目眩痛口眼歪斜牙关紧急或百节疼痛鼻塞声重项背拘急皮肤瘙痒面若虫行

川芎 防风 石膏【煨】 川乌【炮去皮脐尖】 甘草【炙】 荆芥穗
白僵?【炒去丝各一两】 天南星 羌活 地龙【去土】 白附子【炮】 全蝎【去尾针】 白芷【各半两】 草乌【炮去皮脐尖】 没药【研】 乳香【研】 雄黄【研各一钱】

右为末每服五分用茶清少许食後临卧调下

都梁丸 治诸风项背不利头目眩晕脑门作痛或产前产後伤风头目昏重血风头痛用白芷末蜜丸弹子大每服一丸细嚼荆芥煎汤下

木瓜煎

木瓜【不犯铁器二个取盖去穰】 没药【二两研】 乳香【一两研】

右以木瓜去核入二药仍盖合之饭上蒸烂研成膏每服三匙生地黄汁半盏无灰酒和服有人患此自午发至夜方止余曰此足少陰之症发必先从足起盖足少陰之筋自足大指起至头筋者肝之合也日中至夜天之阳阳中之陰又曰阳中之陰肺也自离至兑陰旺阳弱之时故灵宝毕法云离至乾肾气絶而肝气弱肝肾二脏受陰气故发於是时予授此方三服而愈

附方

泻青丸【方见二十四卷第三论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

八珍汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

加味小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

加味四物汤

四君子汤【二方见二十四卷第六论】

羌活胜湿汤【方见前】

妇人腰痛方论第七

夫肾主於腰若妇人腰痛由肾气虚弱外感六气内伤七情皆能致之如因风邪所乘用小续命汤加桃仁杜仲如因寒湿所伤五积散肾经虚弱青娥丸如因气血凝滞用牵牛?香之类

愚按陈无择先生云若形体虚羸面色黧黑腿足痿软不能行立此失志所为也腹急脇胀目视??宗筋弛纵白淫下注此郁结所为也肌肉不仁饮食不化肠胃胀满闭坠腰脇此忧思所为也皆属内因若腰冷作痛身重不渴小便自利饮食如故因劳汗出腰 脇痛或坠堕血滞或房劳精竭皆属内外因也窃谓前症失志肾虚热者六味丸肾虚寒者八味丸郁怒伤肝实用龙胆泻肝汤虚用六味丸补肝散忧虑伤脾者归脾汤逍遥散肾着者寒则术附汤虚则肾着汤腰膝痛者寄生汤养肾散瘀血滞者如神汤舒筋汤房劳腰痛者青娥丸十补丸

附治验

一妇人腰痛三年矣每痛必面青头晕目紧余以为肝脾气虚用补肝散而愈三年後因劳役患头痛兼恶心用补中益气汤加茯苓半夏蔓荆子而愈一妇人苦腰痛数年不愈余用白术一味大剂服不三月而痊乃胃气虚闭之症故用白术也

如神汤 治男妇腰痛

延胡索 当归 桂心【等分】

右为末每服二钱温酒调甚者不过数服

独活寄生汤 治足三陰虚风湿所侵脚膝历节作痛独活 桑寄生

续断【酒炒】杜仲【姜汁炒】细辛 牛膝【酒拌炒】秦艽 茯苓 白芍药【炒】桂心 川芎 防风 人参 熟地黄【自制】当归【酒拌】粉草【炙各五分】

右水煎

舒筋散 治风寒伤肾臂作痛或闪挫气滞血瘀亦良玄胡索【炒】杜仲【姜汁炒】官桂【去皮】羌活 芍药【等分】

右为末每服二钱酒调

又方橘核炒木香研酒下

附方

济生术附汤 治寒湿伤肾腰重冷痛小便自利或手足逆冷

附子【炮】白术【各一两】杜仲【姜炒半两】

右每服四钱姜水煎

三因肾着汤

治肾虚为病身重腰冷如水洗状不渴而小便自利饮食如故腰以下冷痛如带数千钱茯苓白术【各四两】乾姜【炮】甘草【炙各二两】

右每服四钱水煎空心服

青娥丸 治肾虚腰痛或外邪所侵腰腿或筋骨作痛胡桃仁【二十枚】蒜【研膏四两】破故纸【酒浸炒八两】杜仲【去皮姜汁浸炒一斤】

右为末蒜膏丸桐子大每服五十丸空心醋汤下蒜不用亦可

六味丸

十补丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

补肝散【方见七卷第十七论】

归脾汤

逍遥散【二方见二十四卷第四论】

养肾散【方见後】

妇人腰脚疼痛方论第八

肾主於腰脚女人胞络系焉若劳伤肾气风冷客於脉络故腰脚作痛也治当补元气为主佐以祛邪之剂愚按前症若真阳衰败寒邪乘袭手足俱冷头痛恶寒或呕吐腹痛等症宜用本方若气血虚弱寒邪所感恶寒发热头痛作渴或呕吐腹痛等症宜用五积散若元气虚弱湿热所伤两胫肿痛寒热身疼或呕吐不食等症宜用?苏败毒散若脾胃虚弱元气下陷寒热呕吐发热头痛喘渴体倦等症宜用补中益气汤若足三陰精血亏损陰火内动内热晡热作渴痰甚小便频数等症宜用六味地黄丸若足三陰阳气虚败恶寒发热手足俱冷吐痰不食二便滑数等症宜用八味地黄丸

附治验

一妇人先腰胯作痛後两腿亦痛余以为足三陰虚寒外邪所伤用小续命汤及独活寄生汤或作或止所用饮食极热腹中方快余曰邪气去而元气虚寒也诊其脉果沈细用养肾散渐愈又用十补丸而痊一妇人所患同前但发热作渴喜冷饮食脉洪数按之迟澹余以为血虚有热用羚羊角散去?榔加白术茯苓数剂更用加味逍遥散而痊

一妇人患前症时或腿膝作痛脉浮数按之迟缓此元气虚而风湿所乘用独活寄生汤顿愈又用八珍汤而安

一妇人因怒患前症寒热往来口苦不食晡热内热余以为肝火血虚先用小柴胡山栀顿愈又用加味逍遥散而瘳

一妇人患前症寒热头痛殊类伤寒此寒邪之症用?苏败毒散而安又用补中益气调补而愈

骨碎补散 治阳气虚弱外寒所侵腰脚疼痛腹脇拘急

骨碎补【炒】萆薢【酒炒】牛膝【酒炒】桃仁【去皮尖】海桐皮 当归【酒拌】桂心?榔【各五分】赤芍药【炒】附子【炮】川芎枳殼【麸炒各三分】

右姜枣水煎

养肾散 治肾经虚弱风寒所侵以致腰脚疼痛不能步履

苍术【一两】乾蝎【三钱】天麻 草乌头【炮去皮尖】黑附子【炮去皮脐各二钱】

右为末每服一钱酒调服麻痺少时随愈孕妇勿服此治风寒伤肾膀胱虚寒之良药用之得

宜殊有神效

附方

五积散【方见後】

苏败毒散【方见二十四卷第十论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

十补丸

六味丸

八味丸【三方见二十四卷第十一论】

小续命汤【方见前】

独活寄生汤【方见前】

羚羊角散【方见前】

加味逍遥散

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

妇人风邪脚气方论第九

妇人脚气乃肝脾肾三经或胞络气虚为风毒所抟而患盖胞络属於肾主於腰脚三经络脉起於足中指若风邪客於足从下而上动於气故名脚气皆由六淫七情或产後或经行风毒相抟其症或头痛身热肢节作痛或大便秘结小便不利或脚膝缓弱足胫肿满或腰膝枯细忪悸呕逆或小腹不仁举体转筋或胸满气急遍体酸痛用香苏散加?榔生姜若寒中三阳必冷用小续命汤若暑中三陰必热用小续命汤去附子大躁者紫雪最良无紫雪以自合薄荷煎冷水调服大便秘用脾约丸麻仁丸三和散补药淋洗皆大禁也

愚按严用和先生云前症初患不觉因他病乃发先从脚起或缓弱痺痛不能行履或两胫肿满或足膝细小或心中怔忡或小腹不仁或举体转筋或见食作呕或胸满气急遍体酸痛其

脉浮而弦者因於风濡而弱者因於湿洪而数者因於热迟而濇者因於寒男子由於肾气亏损女子血海虚弱七情所致窃谓前症若足三陰虚弱用还少丹若脾气虚寒用八味丸若饮食停滞臀腿酸胀浮肿作痛此脾气下陷用六君子少加柴胡升麻不应须用八味丸若发热口渴月经不调两腿无力此足三陰血虚火燥用六味八味二丸兼服前症西方之人多患之因素食乳酪脾胃壅滞胫足肿满至於南方亦有因膏粱厚味湿热下注而患者故古人谓之壅疾所用之方多疏通发散之剂然感於房劳过度亏损三陰治法又当以固本为主故六物附子为元气虚弱寒邪内侵之圣药所属各经等方附後

附治验

一妇人两膝赤痛寒热口苦呕吐懒食面色青黄或赤此肝木乘脾土用小柴胡汤加山梔升麻茯苓二剂顿愈又用六君子汤加柴胡山梔全愈

一妇人饮食劳役两膝兼腿疼痛或时寒热余以为脾虚湿热下陷用补中益气汤加山梔茯苓半夏治之而痊後复作用六君子汤加柴胡山梔全愈一妇人经行後寒热晡热两腿作痛此肝经血虚也用加味逍遥散加山梔治之而愈後因劳日晡内热或用四物黄柏知母之类前症益甚更加食少作泻余以为元气下陷前药复伤先用六君子汤加补骨脂二剂调补脾胃而泻止食进又用补中益气汤升举元气而愈

大腹皮散 治脚气肢节烦疼心神壅闷或头晕喘 不食

大腹皮 紫苏 荆芥 赤芍药【炒】 青皮
木瓜【不犯铁器】 独活【各五分】 枳殼【麸炒一钱】

右姜葱水煎

半夏散 治脚气上攻心腹胀满饮食不下呕吐不止半夏【姜制】 陈皮 人参 大腹皮 桂心【各三分】 ?榔【一钱】 赤茯苓 紫苏【各五分】

右姜水煎

桑白皮饮 治两脚浮肿小便赤澁腹脇胀满或喘 痰涌呕吐不食

桑白皮【炒】 郁李仁【去皮】 赤茯苓【各一钱】 木香 防己【酒拌】 大腹皮 紫苏子【炒】 木通【去节】 ?榔 青皮【各五分】

右姜水煎

附方

大黄左经汤 治四气乘注足阳明经以致膝腿作痛或足胫赤肿呕吐不食大小便秘结或恶食喘急自汗等症

细辛 茯苓 羌活 大黄【煨】 甘草【炙】 前胡
枳壳【麸炒】 厚朴【姜制】 黄芩【炒】 杏仁【去皮尖等分】

右每服五钱姜枣水煎

麻黄左经汤 治风寒暑湿乘注足太阳经以致腰足挛痹肢节重痛或增寒发热自汗恶寒或自汗恶风头疼

麻黄 乾葛 细辛 白术 茯苓 防己【酒拌】 桂心 羌活 甘草【炙】 防风

右每服半两姜枣水煎服

半夏左经汤 治足少阳经为风寒暑湿乘注以致恶寒发热腰腿疼痛或头目眩晕呕吐不食或热闷心烦腿痹不随

半夏【姜制】 乾葛 细辛 白术 麦门冬【去心】 茯苓 桂枝 防风
乾姜【炮】 黄芩【炒】 小草 甘草【炙】 柴胡

右每服半两姜枣水煎热闷加竹沥喘急加杏仁桑白皮

六物附子汤

治四气乘於足太阴经以致骨节烦疼四肢拘急自汗短气小便不利或手足浮肿

附子【炮】 桂枝 防己【各四钱】 甘草【炙二钱】 白术 茯苓【各三钱】

右每服半两姜水煎

换腿丸 治足三阴经为风寒暑湿之气所乘发为挛痹缓纵或上攻胸背下注脚膝疼痛发热行步艰辛薏苡仁 南星 石楠叶 石斛 榔 萆薢【酒拌】 川牛膝【酒浸】 羌活 防风 木瓜【各四两】 黄芪【炒】 当归【酒拌】 天麻 续断【酒炒各一两】

右为末酒糊丸如桐子大每服五十丸盐汤下

五积散 治风寒所伤以致脚气疼痛或寒热拘急呕吐不食等症

当归【酒拌】 芍药【炒】 川芎 炮姜 人参 茯苓 陈皮 桔梗【炒】 厚朴【姜炒】 白芷

苍术 半夏【姜制】 肉桂麻黄 甘草【炒各五分】

右姜枣水煎

当归拈痛汤 治湿热为病肢节烦疼肩背沉重胸膈不利或兼遍身作痛足胫肿痛不可忍者
或湿热流注下部疮疡赤肿

羌活 人参 苦参【酒制】 升麻 乾葛 苍术【各一钱】 甘草【炒】 黄芩【酒炒】 当归
茵陈【酒制各五分】 防风 知母【酒炒】 泽泻 猪苓 白术【各四分】

右水煎服

紫苏子汤 治脚气上攻陰阳交错清浊不分上重下虚中满喘急呕吐自汗无复纪律

紫苏子【微炒】 半夏【姜制】 前胡
厚朴【姜制】 甘草【炙】 当归【酒拌各二两】 桂心 陈皮

右每服四钱入姜枣煎

还少丹【方见二十三卷第四论】

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

加味逍遥散【方见二十四卷第四论】

薛氏医案卷二十八

卷二十九

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷二十九

明 薛己 订

妇人良方

妇人劳瘵各症方论第一

夫骨蒸痿痺复连尸症劳症虫症毒症热症冷症食症鬼症症者注也自上注下与前人相似故曰症其变有二十二种或三十六种或九十九种令人沈沈默默寒热盗汗梦与鬼交遗泄白浊或腹中有块或脑後两边有结核咳 脓血下利羸瘦死而传症甚至灭门更有蜚尸遁尸寒尸丧尸尸注谓之五尸人为其症者不自知所苦虽有狸骨獭肝天灵盖等方未尝见效唯崔氏灸法早用有济若寒热自汗面白目乾口苦神昏善恐不能独卧传在肝也若寒热面黑鼻燥善忘大便秘泻口舌生疮传在心也若寒热面青唇黄舌本硬强言语不出饮食无味羸瘦吐涎传在脾也若寒热面赤鼻白乾燥毛析咯 喘急吐涎脓血传在肺也若寒热面黄耳焦脚脛酸痛小便白浊遗沥腹痛传在肾也

愚按前症诚然有之故葛仙翁用獭肝一具陰乾杵末水下方寸?日三服未愈再作宋宣和间一法师善考讯鬼怪时一妇以疾投状既而如有鬼祟所附曰非我为患乃病人命自衰尔渠今已成虫食肺故令吐血声嘶又屡掠问彼所畏何物云以獭爪为末酒服之则去矣患家如其言得愈獭爪即獭肝之类欤玄珠云虫瘵多有兄弟互相传染甚至絕户此乃冤牵相传及风水所系虽有符文法水下虫之方然虫去而人亦亡若能平素保养亦可免矣窃究济生微旨云益气补肺益精滋肾皆资其化源也盖人之精血常不足加之数夺其真资化失常则胃气不固精气滑脱不能上接阳气故头重或痛气弱而食少元气下陷脉即微弱外散欲絕而虚洪或见损脉此实元气不足之所致非有外感贼邪之病也

附治验

一妇人素勤苦因丧子饮食少思忽吐血甚多而自止此後每劳则吐数口瘵症已具形体甚倦午前以补中益气午後以归脾汤送地黄丸而愈

一女子患前症反其唇视有白点此虫蚀肺也余云急寻獭肝治之不信果咳脓而歿後闻其

兄弟三人皆夭於此症大凡久 当视其两唇若上唇有点虫蚀上部下唇有点虫蚀下部

二十四种蒸病论新附

所谓劳蒸者毛折发焦肌肤甲错其蒸在皮外热内寒身振肉瞤其蒸在肉发焦鼻衄或复尿血其蒸在血身热烦躁痛如针刺其蒸在脉爪甲焦枯眼昏脇痛其蒸在髓头眩热闷涎浊眵泪其蒸在脑男子失精女子白淫其蒸在玉房乍寒乍热中脘烦闷其蒸在三焦小便赤黄凝浊如膏其蒸在膀胱大便秘泄腹中雷鸣其蒸在小肠大腹隐痛口舌乾疼其蒸在大肠口鼻乾燥腹胀自汗睡卧不安其蒸在胃口苦耳聋两脇下痛其蒸在胆里急後重肛门秘澁其蒸在广肠小腹?痛筋脉纵缓陰器自强其蒸在宗筋眩暈下泪躁怒不常其蒸在肝舌黑气短烦闷洒淅其蒸在心唇乾口疮胸腹胀闷畏寒不食其蒸在脾咳 喘满咯痰吐血声嘶音哑其蒸在肺耳轮焦枯脚气酸痛其蒸在肾情想不宁精物时下其蒸在右肾心膈噎塞攻击疼痛俛仰烦冤其蒸在鬲此症虫多嚙心肺治当絶其根也

愚按医林集要云前症若蒸肺用天麦门冬桔梗紫苑乌梅肉若蒸皮石膏桑白皮若蒸气喘促鼻乾身热不安人参黄芩梔子若蒸大肠大黄芒硝若蒸心黄连生地黄当归若蒸脉蒸血皆用生地黄当归童子小便若蒸小肠赤茯苓木通生地黄若蒸脾芍药木瓜苦参若蒸肉芍药若蒸胃石膏粳米大黄芒硝乾葛若蒸胆柴胡瓜蒌若蒸三焦石膏竹叶若蒸肝川芎当归前胡若蒸筋川芎当归若蒸肾生地石膏知母寒水石藁本若蒸脑生地黄防风若蒸髓天门冬当归生地黄若蒸骨髓甲地骨皮当归牡丹皮生地黄若蒸玉房知母黄栢当归芍药若蒸脬泽泻茯苓生地黄沈香滑石若蒸膀胱泽泻滑石凡此诸蒸热病食肉与油腻房劳饮酒而成者久蒸不除变为疳症即死亦有疳疾久而不愈以致咳嗽失治渐成骨蒸劳瘵之症当推标本而治之

崔氏灸骨蒸劳瘵用细绳一条男左女右从足大拇指头齐量起从脚板?当脚跟中心向後引绳循脚肚贴肉直上至曲 中横纹截断又令患者解发分两边见头缝自 门平分至脑後乃平身正坐取前所截绳一头从鼻端齐引绳向上正循头缝至脑後贴肉垂下循脊骨引绳向下至绳尽处当脊骨以黑点记【此黑点不是灸穴】别取一绳令患者合口将绳按於口上两头至吻却钩起绳中心至鼻端根下如人字樣齐两吻截断将此绳展直於前在脊骨上黑点处取中横量勿令高下於绳两头以白圈记之【此是灸穴初灸七壮累灸至百壮】此名患门穴初灸此讫次令其人平身正坐稍缩臂膊取一绳遶项向前双垂与鸠尾齐【鸠尾是心岐骨无是岐骨者胸前两岐骨间量取一寸即是鸠尾也】即截断却背翻绳头向项後以绳中停取心正令当喉咙结骨上第二次墨点处摺中横量绳两头以白圈记之【此是灸穴初灸七壮至百壮】又将第二次量口绳摺中当脊直上下?停中心在第二次墨记上下绳头尽处以白圈记之【此是灸穴初灸七壮累灸至百壮】此纵横四方凡四穴是名曰四花穴初灸各七壮若疮愈其疾未效依法复灸故云累灸至百壮【凡灸时可用灸足二里以泻其火为好】若妇人纏足短小难为量只取膏肓腧灸之【在第四椎下两傍各三寸是穴】次灸四花穴道轩用此法灸之无有不效者

神仙秘法 治劳虫须先择良日焚香祷祝令病人面向福德方服神效

青桑皮 杨柳枝 梅枝 桃枝【俱向东者各七茎】葱白【七茎】阿魏【一钱】青蒿【一握如无以子代】真安息香【一钱】

右用童便一升半煎一升入阿魏再煮数沸入朱砂半两小?榔半两麝香五分五更并天明各进一服下白虫尚可治以淡粥补之用药调理三五月再服以除病根如虫黑已入肾不可救矣

治心胸痛引两脇昏闷声浊热壅鼻衄或痰喘发热桑白皮【炒】枳壳【麸炒】木通子芩【炒】生地黄 白芍药 甘草【各五分】

右水煎服

温金散 治肺嗽恶寒发热唾痰皮毛焦燥

甘草【炒】黄芩【炒】桑白皮【炒】防风【各一两】杏仁【二十七粒制】人参 茯神【各五钱】麦门冬【三钱】

右前五味用米泔浸一宿晒乾入人参等三味每服三钱入蜡一豆大水煎

桔梗饮子 治心气不足解倦溢血或喘嗽痰甚桔梗【炒】甘草【炒】黄芪【炒】麦门冬 人参【各一钱】青皮【三分】

右水煎服

治咽喉痛

百药煎【去黑皮】鹏砂 甘草 生白矾【等分】

右为末每服一二钱食後用米饮调细呷咽之

含化丸 治肺间邪气胸中积血作痛失音痰喘蛤蚧【一双去足炙】诃子【去核】阿胶【粉炒】麦门冬【去心】细辛 甘草【炙】生地黄【各半两】

右为末蜜丸芡实大食後含化一丸

河车丸 治一切劳瘵虚损骨蒸等疾

紫河车【一具初生男胎者尤良洗净杵烂本草云人肉治瘵病胞衣主劳损面?皮黑诸疾瘦悴】白茯苓【半两】人参【一两】乾山药【二两】

右为末面糊和入河车加三末丸梧子大每服三五十丸空心米饮下嗽甚五味子汤下

补肺汤 治劳 五脏亏损晡热发热盗汗自汗唾痰喘嗽

桑白皮【炒】熟地黄【各一钱】人参 紫苑 黄芪【炒】五味子【炒各五分】

右水煎入蜜少许食後服

养正膏 治传尸出汗取虫辟邪

鼈甲【一两醋炒】青蒿【一握】淡豆?【三七粒】葱白【两茎】安息香【一分研】桃柳桑枝【各七茎】天灵盖【用七豇大一片酥炙】桃仁【四十九个去皮尖双仁】

右隔夜以水一升浸至五更煎至半升入童便半升煎取四合调?榔麝香末各一钱日高时顿服以衣覆十指汗出如藕丝泻下如虫状甚者旬日再服

阿胶丸 治劳嗽出血咯血发热晡热口渴盗汗阿胶【炒】生地黄 卷栢叶 山药【炒】大蓟根 五味子【杵炒】鷄苏【各一两】栢子仁 人参 防风 麦门冬【去心各半两】

右为末炼蜜丸弹子大每服一丸细嚼麦门冬煎汤下

四君子汤加秦艽黄蜡水煎服尤妙治劳嗽咯血神授散
治传尸虫用川椒二斤去核并合口者炒为末每服一钱酒糊丸空心米饮下服尽见效

苏合香丸 治传尸骨蒸劳瘵 鬼气心痛【方见三卷第四论】

附方

四君子汤【方见二十四卷第五论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

归脾汤【方见二十四卷第四论】

六味地黄丸【方见二十四卷第十一论】

妇人骨蒸劳方论第二

夫骨蒸劳者由积热附於骨而名也亦曰传尸殭殍复连无辜其名不一此病皆由脾胃亏损所致其形羸瘦腹胀泄利肢体无力传於肾则盗汗不止腰膝冷痛梦鬼交侵小便赤黄传於心则心神忪悸喜怒不时颊唇赤色乍热乍寒传於肺则胸满短气咳嗽吐痰皮肤甲错传於肝则两目昏暗脇下妨痛闭户忿怒五脏既病则难治疗

愚按前症多因经行胎产或饮食起居七情而伤肝脾之所致又或失於调摄或过於攻伐而成东垣先生云发热之症肺热者轻手乃得微按全无日西犹甚乃皮毛之热其症喘嗽寒热轻者用泻白散重者凉膈散白虎汤地骨皮散心热者微按之皮肤之下肌肉之上轻手乃得微按至皮毛则热少加力按之则全不热是热在血脉也日中太甚其症烦心心痛掌中热而哕用黄连泻心汤导赤散朱砂安神丸脾热者轻手扪之不热重手按至筋骨又不热不轻不重在轻重之间此热在肌肉遇夜尤甚其症怠惰嗜卧四肢不收无气以动用泻黄散肝热者按之肌肉之下至骨之上寅卯时尤甚四肢满闷便难转筋多怒多惊筋痿不能起於床用泻青丸柴胡饮肾热者轻手重按俱不热加重手按之骨分其热蒸手如火其症骨蒸如虫蚀困热不能起於床用滋肾丸此治实热之法也窃谓肺经虚热者用人参补肺汤脾气虚而不能生肺者用六君子汤脾热遗於肺者用三黄丸心经虚热者用补心汤命门火衰不能生土者用八味丸肝虚不能生心者用补肝散肾尅心者用附子理中汤脾经虚热者用人参黄芪散土尅水者用承气汤脾不能培肝者用六君子汤元气下陷及金不能生水者俱用补中益气汤肺尅肝及肾经虚热与肾不能生肝者俱用六味丸

附治验

一妇人发热晡热盗汗自汗殊畏风寒饮食少思或腹胀吞酸或大便不实此脾胃不足诸经亏损朝用补中益气夕用八珍汤倍用参苓白术各二十余剂诸症渐愈因伤母哀伤患盗汗便血用加味归脾汤数剂而止仍用前二药又五十余剂寻愈月经两月而至适因怒去血过多发热作渴肢体酸倦头目晕痛用逍遥散加味归脾汤二药调补而痊

一妇人盗汗自汗遍身酸疼五心发热夜间益甚或咳嗽咽乾或盗汗自汗月经两三月一至用加味逍遥散六味地黄丸兼服临卧又服陈术丸三月余诸症悉愈其经乃两月一至又服两月而痊【陈术丸即陈皮白术为丸】

一妇人患前症食少倦怠肌肉消瘦日晡发热至夜益甚月水过期渐至不通时发渴躁误用通经之剂热倦愈重饮食愈少余用八珍汤加升麻丹皮山梔柴胡治之热渐退又用八珍丹皮软柴胡调理而愈一妇人饮食少思胸膈不利或胸中作痛或大便作泻或小便不利用逍遥散加山梔茯神远志木香而愈後因怒寒热往来倦怠烦热以前药加炒黑黄连三分顿愈用八珍汤调理而愈後因怒吐血躁渴用人参五钱苓术当归各三钱陈皮甘草各一钱治之而愈

一妇人胸脇作痛内热晡热月经不调余谓郁怒伤损肝脾朝用归脾汤以解郁结生脾气夕用加味逍遥散以生肝血清肝火半载而愈後因饮食失调兼有怒气月经如注脉浮洪而数用六君子加芎归炮姜一剂而血止用补中益气加炮姜茯苓半夏治之而元气复又用归脾汤逍遥散调理而康

一妇人内热口乾头晕吐痰带下体倦饮食少思余谓脾气虚弱而不能生肺金用补中益气汤加茯苓半夏脾气渐复饮食渐进诸症渐退再用加味逍遥散治之寻愈

一妇人腹胀脇痛内热晡热月经不调不时吐痰或用化痰行气之剂胸膈不利余谓脾气郁结肝经血虚朝用归脾汤夕用加味逍遥散百余剂而诸症渐愈又因饮食停滞或用峻厉之剂口乾体倦余用七味白术散补中益气加茯苓半夏中气渐愈又以补中益气及八珍汤兼服而痊

一妇人患前症将愈因怒胸膈不利饮食少思服消导利气之药大便下血余曰此脾气复损不能摄血归源用补中益气加茯苓半夏炮姜血止用八珍加柴胡炒梔热退用八珍汤逍遥散而痊

一妇人肌体倦瘦口乾内热盗汗如洗日晡热甚用参芪归术茯神远志枣仁麦门五味丹皮龙眼肉炙草柴胡升麻治之获痊後因丧子怀抱不舒腹胀少寐饮食少思痰涎上涌月经频数余谓郁闷伤脾不能摄血制涎归源耳用补中益气济生归脾渐愈又用八珍汤调理而痊

一妇人发热口乾月经不调肢体无力腿痛体倦二膝浮肿余作足三陰经血虚用六味丸逍遥散兼服两月形体渐健饮食渐进膝肿渐消而痊

一妇人日晡热甚月水不调饮食少思大便不实胸膈痞满头目不清肢体倦怠发热烦躁余谓七情肝脾亏损之症用济生归脾汤加味逍遥散补中益气汤调治元气渐复而愈

一妇人月经不调晡热内热饮食少思肌体消瘦小便频数或用清热生血之剂月经不行四肢浮肿小便淋沥余朝用金匱加减肾气丸夕用归脾汤渐愈又用八珍汤两月而愈

一妇人胸脇膨满小腹胀坠内热晡热饮食不甘体倦面黄日晡则赤洒淅恶寒此脾肺气虚先用六君子加川芎当归诸症渐愈又用补中益气加茯苓半夏诸症全愈後饮食失节劳怒恶寒发热不食用加味小柴胡二剂而热退用逍遥散归脾汤调理而康

天灵盖散 治骨蒸四肢无力晡热颊赤食少心烦天灵盖【酥炙】安息香 地骨皮 当归 山梔仁 人参 贝母【去心】 黄芪 桃仁【去皮尖双仁麸炒黄】 榔【各一两】 鼈甲【醋炙】 柴胡 生地黄 赤茯苓 麦门冬 阿魏

右每服五钱桃柳枝各七寸姜五片葱白五寸童便煎

愚按医学纲目云柴胡本经并无一字治劳热今治劳方鲜有不用者误世多矣凡此症乃真脏亏损而虚热王海藏先生云苟无实热而用柴胡不死何待盖柴胡乃肝胆之药虽能升胃气下陷每剂不过分许而可多用哉产後气血虚热尤宜禁忌

獭肝丸 治骨蒸劳热或潮热发热体瘦烦疼不欲饮食

獭肝【一具】鼈甲【醋炙】柴胡【各一两半】朱砂【另研】桃仁【去皮尖双仁麸炒黄】升麻天灵盖【酥炙】犀角【镑】梔子仁【炒】地骨皮知母【各一两】黄芪【炒】甘草【炒各五钱】麝香【一钱研】

右为末炼蜜丸桐子大每服三十丸空心食前滚水下

黄芪丸 治骨蒸烦热肢羸作痛口乾心躁睡卧不宁等症

黄芪【炒】麦门冬【去心】茯神柴胡生地黄甘草【炒各一两】酸枣仁【炒】郁李仁【去皮尖】杏仁【去皮尖麸炒】枸杞子人参黄芩【炒各三钱】鼈甲【二两制】

右为末蜜丸桐子大每服三十丸食远清粥饮下

煞鬼丸 治骨蒸传尸鬼气伏连

麝香【三分】犀角【镑】木香白术【各一两】鬼箭羽桃仁【去皮尖双仁麸炒黄】辰砂【另研】虎头骨【酥炙】雄黄【各一两五钱】

右为末蜜丸桐子大温水下二十丸此药能辟瘟疾可佩之

地仙散 治骨蒸肌热烦燥劳热口乾能生津液而清肺火

地骨皮麦门冬防风【各五分】甘草【炒三分】

右姜水煎服

十全大补汤 治气血虚热加柴胡地骨皮秦艽秦艽散 治五心烦热颊赤

逍遥散 治血虚五心烦热肢体疼痛头目昏重心忪颊赤口燥咽乾发热盗汗减食嗜卧月水不调脐腹胀痛寒热如疟痰嗽潮热肌体羸瘦渐成骨蒸【方见二十四卷第四论】

枳殼散 治妇人手足烦热盗汗肌痒经候不调烦倦心胷满闷状如劳气

枳殼【去穰麸炒二两】半夏麴 赤芍药【各一两】柴胡 黄芩【炒各一两五钱】

右为末每服三钱姜枣水煎服

华陀解劳生肌进食活血养心石膏每服水和钱许甚验

青蒿散 治体倦虚疼劳热九月采青蒿去梗用童子小便浸三日晒为末每服二钱乌梅一个煎汤调服

清心莲子饮参苏饮加黄芩麦門冬并治五心烦热手足热甚

附方

加味小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

柴胡饮 治肌热积热或汗後余热脉洪实弦数柴胡 人参 黄芩 芍药 甘草 当归 大黄【煨各二钱五分】

右姜水煎服

泻白散 治肺脏气实心胸壅闷咳嗽烦喘大便不利桔梗【炒】地骨皮 甘草【炙】瓜蒌仁 升麻 半夏【姜制】桑白皮【炒】杏仁【去皮尖等分】

右每服四钱姜水煎

导赤散 治心虚蕴热小便赤澁或成淋沥口舌生疮等症

生地黄 木通 甘草【等分】

右每服三钱竹叶水煎

泻黄散 治脾热口臭咽乾或口舌生疮发热作渴石膏 山梔子【炒】防风 甘草 藿香【等分】

右每服三钱水煎

凉膈散 治上焦积热烦躁作渴头目昏瞶咽喉肿痛便溺赤澁语言谵妄等症

大黄【煨】朴硝
甘草【各二两】连翘【四两】栀子仁【炒】黄芩【炒】薄荷叶【各一两】

右为末每服二三钱竹叶七片水煎温服

白虎汤 治胃热作渴暑热尤效又治热厥腹满身难转侧面垢谵语遗溺手足厥冷自汗脉沈滑大便泄清水无度

知母 石膏【各二钱】粳米【半合】

右水煎服

附子理中汤
治脾胃虚寒手足厥冷饮食不入或腹鸣切痛呕逆吐泻【方见二十卷第八论】

朱砂安神丸【方见三卷第十论】

地骨皮散【方见六卷第三论】

黄连泻心汤用一味黄连为末每服二钱以白汤调下泻青丸【方见二十四卷第三论】

承气汤【方见前】

滋肾丸【方见八卷第一论】

人参补肺汤【方见二十四卷第十二论】

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

三黄丸【方见八卷第八论】

补心汤【方见前】

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

补肝散【方见七卷第十七论】

人参黄芪散【方见十三卷第十论】

加味归脾汤

八珍汤

加味逍遥散

逍遥散

归脾汤【五方见二十四卷第四论】

七味白术散【方见二十一卷第二论】

金匱加減肾气丸【方见二十一卷第十论】

妇人血风劳气方论第三

妇人血风劳症因气血素虚或产後劳伤外邪所乘或内有宿冷以致腹中疼痛四肢酸倦发热自汗月水不调面黄肌瘦当调补肝脾气血为主

愚按东垣云喜怒不等起居不时有所劳伤皆损其气气衰则火旺火旺则乘其脾土脾主四肢故困热懒言动作喘乏表热自汗心烦不安当病之时宜安心静坐存养其气以甘寒泻其热气以酸味收其散气以甘温补其倦气经曰劳者温之损者温之要略云平人脉大为劳以黄芪建中汤治之

附治验

一妇人劳则足跟热痛余以为足三陰血虚用圣愈汤而痊後遍身搔痒误服风药发热抽搐肝脉洪数此肝家血虚火盛而生风以天竺胆星为丸用四物麦门五味苓连炙草山梔柴胡煎送而愈

一妇人素清苦勤於女工因感风邪自用表散之剂反朝寒暮热自汗盗汗形气虚甚其脉或浮洪或微细其面或青白或痿黄此邪去而气血愈虚也用十全大补汤三十余剂渐愈又用加味逍遥散兼治半载而痊

人参荆芥散

治遍身疼痛头昏目澁心忪烦倦寒热盗汗颊赤口乾痰 胸满月水不调腹痛癖块荆芥
人参 生地黄 柴胡
鼈甲【醋炙】 酸枣仁【炒】 枳殼【麸炒】 羚羊角【镑】 白术【各七分】 川芎
当归【酒拌】 桂心 防风 甘草【各五分】

右姜水煎日二服

地黄煎 治血虚心忪发热

生地黄 熟地黄【自制等分】

右用姜汁和水拌杵丸桐子大每服五十丸空心白汤下日三服若脏腑虚空早间先服八味丸一服愚按前方肝脾血虚发热内热晡热盗汗作渴体倦筋骨疼痛筋脉拘挛血虚发躁虚热生痰咳嗽之良剂若因肝脾肾精血燥热生痰胸膈痞满喘咳作渴及一切虚火症必用六味丸为主

乞力伽散 治血虚肌热或早虚蒸热或内热寒热白术 白茯苓
白芍药【炒各一钱】 甘草【炒五分】

右姜枣水煎

附方

黄芪建中汤【方见二十卷第四论】

圣愈汤【方见二十四卷第九论】

四物汤【方见二十四卷第六论】

六味丸

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

归脾汤

十全大补汤【二方见二十四卷第四论】

人参养荣汤【方见二十四卷第二论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人冷劳方论第五

妇人冷劳属血气不足脏腑虚寒以致脐下冷痛手足时寒月经失常饮食不消或时呕吐恶寒发热骨节酸疼肌肤羸瘦面色痿黄也

愚按前症有内外真寒然有内外真热亦有内真热而外假寒者又有内真寒而外假热者若饮食难化大便不实肠鸣腹痛饮食畏寒手足逆冷面黄呕吐畏见风寒此内外真寒之症也宜用附子理中汤以回阳八味地黄丸以壮火若饮食如常大便坚实胸腹痞胀饮食喜冷手足烦热面赤呕吐不畏风寒此内外真热之症也宜用黄连解毒汤以消陰六味丸以壮水若饮食如常大便坚实胸腹痞胀饮食喜寒手足逆冷面黄呕吐畏见风寒此内真热而外假寒也亦用解毒汤六味丸若饮食少思大便不实吞酸暖气胸腹痞满手足逆冷面赤呕吐畏见风寒此内真寒而外假热也亦用附子理中汤与八味丸当求其属而治之经曰益火之源以消陰翳壮水之主以制阳光使不知真水火之不足泛以寒热药治之则旧疾不去新病复生矣夫所谓属者犹主也谓心肾也求其属也者言水火不足而求之於心肾也火之源者阳气之根即心是也水之主者陰气之根即肾是也非谓火为心原为肝水为肾主为肺也大抵寒亦抑心热亦强肾在治者审之

附治验方药

一妇人食少作呕口吐痰涎面黄腹痛月经不调手足逆冷余谓此内外俱寒之症遂以六君加附子木香治之而愈

先太宜人忽呕吐酸水内热作渴饮食不进惟喜冷水面色青赤投之以药入口即吐此内外真热之症积十余日以黄连一味煎汤饮之徐加白术茯苓仍加陈皮当归炙草至月余始进米饮稀粥调理而愈一妇人内热作渴大便秘结畏恶风寒手足逆冷余以为内真热而外假寒先用黄连解毒汤後用六味丸而愈

大方室赵氏初患痰喘热渴医以降火散气治之肌日削而气日索延至甲辰木旺痰盛身热口腐腹胀神昏絶食几死先生诊之云此乃虚热无火投以壮水生土之剂随服随效得以不死窃喜久安忽值戊申夏初坐则头坠不能起视卧则背冷觉风透体烦热晕眩咳呕痰涌手足麻冷病势危殆自分必死得先生枉诊之曰此内真寒外假热之症也遂以大补姜附之剂饮之不三四服而大势已平仍以前药加減而愈则其他以有余之火治之无怪乎其展转增剧也微先生则山妻不死於甲辰之春难免於戊申之夏矣大方感慨不已援笔备述求附卷

末庶几医者之不昧病者之得全先生之惠垂诸无穷岂一世一人之幸哉长洲沈大方顿首拜书

八味丸

六味丸【二方见二十四卷第十一论】

附子理中汤【方见二十卷第八论】

黄连解毒汤【方见六卷第十一论】

六君子汤【方见二十四卷第六论】

薛氏医案卷二十九

卷三十

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷三十

明 薛己 订

妇人良方

妇人热劳论第一

妇人热劳由心肺壅热伤於气血以致心神烦躁颊赤头疼眼澁唇乾口舌生疮神思昏倦四肢壮热饮食无味肢体酸疼心怔盗汗肌肤日瘦或寒热往来当审其所因调补气血其病自愈矣

愚按前症乃壮火食气虚火煎熬真阴之所致也王太仆云如大寒而甚热之不热是无火也热来复去昼见夜伏夜发昼止是无火也当治其心如大热而甚寒之不寒是无水也热动复止倏忽往来时动时止是无水也当助其肾心盛则生热肾盛则生寒肾虚则寒动於中心虚则热收於内窃谓前症若肝脾血虚用四物参术肝脾鬱怒小柴胡合四物汤脾胃气虚补中益气汤肝脾血虚加味逍遥散肝经风热加味小柴胡汤心经血虚天王补心丹肺经气虚人参补肺汤肝经血虚加味四物汤大抵午前热属气分用清心莲子饮午後热属血分用四物参术丹皮热从左边起肝火也实则四物龙胆山梔虚则四物参术黄芪热从脐下起阴火也四物参术黄柏知母酒拌炒黑五味麦门肉桂如不应急用加減八味丸不时而热或无定处或从脚心起此无根虚火也用加減八味丸及十全大补汤加麦门五味主之附治验

一妇人经行不调饮食少思日晡热甚余以爲肝脾气血俱虚用十全大补加山茱山药丹皮麦门五味而愈次年秋寒热如疟仍用前药而愈

一妇人生育多胎月经不调两足发热年余其身亦热劳则足酸痛又年许唇肿裂痛又半年唇裂见血形体瘦倦饮食无味月水不行此气血俱衰之症彼误用通经丸等药复伤气血遂致不起惜哉

黄芪散 治发热羸瘦心燥口乾不欲饮食或盗汗晡热

人参 黄芩【炒焦】 当归【各三钱】 柴胡【五分】 黄芪【炒】 地骨皮 白茯苓

麦门冬【去心】生地黄 白芍药【炒各一钱】甘

草【炒三分】

右水姜煎

猪肚丸 治热劳羸瘦

柴胡 赤茯苓 人参 黄芪【各一两】黄连【炒三两】地骨皮
木香【各五钱】桃仁【去皮尖】鼈甲【各一两】

右爲末用嫩猪肚一枚入药缝合蒸熟研烂丸桐子大每服三五十丸食前米饮下日二服

附方

清心莲子饮 治热在气分口乾小便白浊夜间安静昼则发热又治口舌生疮或口苦咽乾烦
躁作渴小便赤澀下淋不止或茎中作痛

黄芩【炒】麦门冬【去心】地骨皮 车前子【炒】甘草【各一钱半】石莲肉 茯苓
黄芪【炒】柴胡【去苗】人参【各一钱】

右每服五钱水煎

补中益气汤

加味四物汤

四物汤【三方见二十四卷第六论】

加味小柴胡汤

小柴胡汤【二方见二十四卷第二论】

十全大补汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

天王补心丹 宁心保神益血固精壮力强志令人不忘清三焦化痰涎祛烦热除惊悸疗咽乾
育养心神人参【去芦】茯苓 玄参 丹参 桔梗 远志【各五钱】当归【酒浸】五味

麦门冬【去心】天门冬 栝子仁 酸枣仁【炒各一两】 生地黄【四两】

右爲末炼蜜丸桐子大用朱砂爲衣每服二三十丸临卧竹叶煎汤送下一方多石菖蒲熟地黄杜仲百部茯神甘草此方内天麦门冬玄参生地虽能降火生血化痰然其性沉寒损伤脾胃尅伐生气若人饮食少思大便不实者不宜用

人参补肺汤【方见二十四卷第十二论】

加减八味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人客热方论第二

妇人客热由元气虚而外热乘之以致口燥心烦四肢壮热肌肉消瘦治法当审其因而调补之

愚按前症若客邪所侵用补中益气加川芎防风肝虚血少六味地黄丸胃火饮冷钱氏泻黄散胃虚饮汤七味白术散潮热时热八珍汤晡热内热逍遥散发热体倦补中益气汤恚怒发热小柴胡汤鬱怒发热加味归脾汤寅卯酉戌时热升阳益阴汤

附治验

一妇人素有胃火服清胃散而安後因劳役躁渴内热肌肉消瘦月经不行此胃火消烁阴血用逍遥散加丹皮炒梔以清胃热用八珍汤加茯神远志以养脾血元气充足而经自行矣

麦门冬散 治四肢倦痛烦闷不食或寒热往来麦门冬【去心】柴胡 赤茯苓 羚羊角【镑】 赤芍药桑白皮【炒】 黄芩【炒各四分】 生地黄 甘草【炒各三分】

右姜水煎

附方

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

泻黄散【方见五卷第三论】

七味白术散【方见二十一卷第二论】

八珍汤

加味归脾汤

逍遥散【三方见二十四卷第四论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

升阳益胃汤【方见三卷第九论】

清胃散【方见二十四卷首论】

妇人寒热方论第三

经曰阳不足则先寒後热阴不足则先热後寒皆由劳伤气血阴阳不调寒热如疟也当分气血虚实而治之愚按前症若寸口脉微名曰阳不足则阴气上入於阳中用补中益气汤若尺部脉弱名曰阴不足则阳气下陷入阴中用益阴肾气丸若因气血俱虚用八珍汤若因怒动肝火用小柴胡汤若阴阳俱不足则气血不归其本部以致寒热交争也

附治验

一妇人年六十有四久鬱怒头痛寒热春间乳内时痛服流气饮之类益甚时有血如经行又大惊恐饮食不进夜寐不宁两乳肿胀两脇焮痛午後色赤余以爲肝脾鬱怒火燥先以逍遥散加酒炒黑龙胆一钱山梔一钱五分服二剂肿痛顿愈又二剂全愈再用归脾汤加炒梔贝母诸症悉愈

地骨皮散 治血风气虚时作寒热或晡热内热柴胡

地骨皮【各一两】桑白皮【炒】枳殼【麸炒】前胡 黄芪【炒各五分】白茯苓 五加皮 人参 甘草 桂心 白芍药【各三分】

右姜水煎服

柴胡散 治寒热体痛口乾心烦饮食少思肌体消瘦柴胡 黄芪【炒】赤茯苓

白术【各一钱】人参 地骨皮 枳殼【麸炒】生地黄 苦梗

桑白皮【炒】赤芍药【各三分】鼈甲【炙二钱】麦门冬【去心一钱】甘草【三分】

右水姜煎服

益阳肾气丸 治诸脏亏损发热晡热潮热盗汗或寒热往来五心烦热或口乾作渴月经不调

或筋骨酸倦饮食少思或头目不清痰气上壅咳嗽晡甚胸膈痞闷或小便赤数两足热痛或脚足痿软肢体作痛等症此壮水之主以制阳光之剂也

泽泻 茯苓 生地【酒拌杵膏】牡丹皮 山药 茺萸【肉】当归
五味子【炒杵】熟地【自制杵膏】

右爲末入二膏加炼蜜丸桐子大朱砂爲衣每服五十丸空心淡盐汤下

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第二论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

八珍汤

逍遥散

归脾汤【三方见二十四卷第四论】

寡妇寒热如疟方论第四

仓公传与褚氏论皆云师尼寡妇独阴无阳慾心萌而不遂是以恹恹成病以致乍寒乍热而类疟状久则爲劳又有经闭白淫痰逆头风膈气痞闷面?瘦瘠等证皆寡妇之病诊其脉独肝脉弦出寸口而上鱼际皆血盛而致经云男子精盛则思室女人血盛则怀胎观其精血思过半矣

愚按前症若肝脉弦出鱼际用生地黄丸血虚佐以四物汤若兼怒动肝火而寒热佐以加味逍遥散若亏损肝经而寒热佐以八珍汤若亏损元气而寒热佐以补中益气汤若鬱伤脾气而寒热佐以济生归脾汤

附治验

一寡妇不时寒热脉上鱼际此血盛之症用小柴胡汤加生地黄治之而愈但畏风寒此脾胃气虚用加味归脾补中益气二汤兼服而止

一妇人因夫久出经商发寒热月经旬日方止服降火凉血药内热益甚自汗盗汗月经频数余曰内热自汗乃脾气虚弱也月经频数乃血不归脾也用归脾汤六味丸而愈

一室女寒热肝脉弦长而出寸口用小柴胡汤加生地乌梅治之而愈既嫁而诸症悉痊

一室女久患寒热月经失期以小柴胡汤加生地治之少愈更以生地黄丸而痊

生地黄丸 许学士云有一师尼恶风体倦乍寒乍热面赤心烦大小柴胡汤杂进其病益剧予
诊视之曰三部脉无寒邪但肝脉弦长而上鱼际服此丸而愈柴胡 秦艽
黄芩【各半两】赤芍药【一两】生地黄【二两酒湿杵膏】

右爲末炼蜜丸桐子大每服三十丸乌梅汤下日三服

附方

补中益气汤

四物汤【二方见二十四卷第六论】

加味逍遥散

八珍汤

加味归脾汤

归脾汤【四方见二十四卷第四论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人恶寒方论第五

妇人恶寒有阴阳二证发热而恶寒者发於阳也无热而恶寒者发於阴也发於阳者脉浮数
宜解表发於阴者脉沉细宜温里凡恶寒不可过覆衣被及近火热若寒热相转令人寒甚若
寒气入腹血室结聚最难治疗愚按前症若怠惰嗜卧洒淅恶寒乃阳不能伸发用升阳益胃
汤若劳伤形气而恶寒乃无阳以护卫用补中益气汤若饮食伤脾胃而恶寒乃元气虚损用
六君子汤若加烦躁妄言或欲饮水仍进前剂但加姜桂若体倦烦渴头痛自汗用补中益气
加五味麦门东垣云昼则发热恶寒是阴气上溢於阳分也夜则恶寒是阴血自旺於阴分也
海藏云六月大热之气反得大寒之症当舍时从症治以姜桂之类丹溪云久病恶寒乃痰鬱
於脾抑遏阳气不得外泄治当解鬱

附方

升阳益胃汤【方见三卷第九论】

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

妇人血风烦闷方论第六

妇人血风烦闷由劳伤气虚而风邪乘之血气不和以致肢节热疼口乾不卧而烦闷也当调补元气爲主愚按前症多属肝脾血虚发热当参照前寒热方论主治

赤芍药散 治烦闷不食体倦头眩身体疼痛等症赤芍药【酒炒】白茯苓【各一钱】甘草【炒】柴胡【各五分】

右姜枣水煎

妇人血风攻脾不食方论第七

夫脾爲中州意智之脏也诸经皆赖其养与胃爲表里胃主司纳脾主腐化若劳伤真气外邪乘之诸症生焉愚按经云胃乃脾之刚脾乃胃之柔伤胃则脾无所禀受伤脾则不能爲胃运化是以脾胃爲之表里藉饮食以滋养百脉者也窃谓前症若饮食所伤六君子汤劳役所伤补中益气汤若风寒所伤用人参理中汤木旺乘土六君加柴胡呕吐腹痛或大便不实前汤加木香胸膈虚痞或肚腹不利六君子汤鬱怒伤损肝脾归脾汤命门火衰八味仍审诸经错杂之邪而治之假如不能食而肌肉削乃脾胃经本病右关脉缓而弱乃脾胃之本脉若见弦紧或四肢满闭淋瀝便难转筋此肝之脾胃病也若兼洪大或肌热烦热面赤此心之脾胃病也若兼浮澁或气短而急咳嗽痰盛此肺之脾胃病也若兼沉细或善恐善欠此肾之脾胃病也各当於本经药中加兼症之药此东垣先生之治法也

治附验方药

一妇人停食饱闷或用人参养胃汤木香槟榔丸而泄泻吐痰腹中成块又与二陈黄连厚朴反加腹胀不食余以爲脾胃气虚不能消磨用补中益气加茯苓半夏五十余剂脾胃健而诸症痊

一妇人饮食每用碗许若稍加非大便不实必吞酸暖腐或用二陈黄连枳实反加内热作呕余曰此未传寒中不信仍作火治虚症悉至月经不止余用六君加炮姜木香数剂诸症渐退又以补中益气加炮姜木香茯苓半夏数剂全愈後因饮食劳倦兼以怒气饮食顿少元气顿

怯仍用前药更加发热脉洪大按之而虚两尺如无此命门火衰用补中益气加姜桂及八味丸兼服两月余诸症寻愈此症若因中气虚弱用人参理中汤或六君子加木香炮姜不应用左金丸或越鞠丸虚寒加附子理中汤无有不愈一妇人饮食後或腹胀或吞酸自服枳术丸饮食日少胸膈痞满腿内酸痛畏见风寒或用养胃汤腿痛浮肿益盛月经不行余以爲鬱结所伤脾虚湿热下注侵晨用四君芎归二陈午後以前汤送越鞠丸诸症渐愈又用归脾八珍二汤兼服两月余而经行一妇人胸满少食或腹胀吞酸或经候不调此中气虚而不能施化也用补中益气加砂仁香附煨姜而饮食进更以六君芎归贝母桔梗而经自调

一妇人年三十余忽不进食日饮清茶水菓三年余矣余谓脾气鬱结用归脾汤加吴茱萸四剂遂饮食如常若人脾肾虚而不饮食当以四神丸治之一妇人不进饮食二年矣日饮清茶菓品之类肝脾二脉弦浮按之微而结滞余谓肝脾气鬱用六君木香吴茱萸下痰积甚多饮食顿进形体始瘦卧床月余仍服六君之类而康

越鞠丸 治鬱伤气滞以致胸膈痞闷或肚腹膨胀或咽喉不清或痰气不爽或饮食少思或吞酸不腐宜用此药清之若人脾胃虚弱用六君子汤爲主大凡中气虚弱变症百出难以名状但用四君补其脾胃元气渐复诸症自退若用治病之药则误矣

香附 苍术【炒】 川芎 梔子【炒】 神麴【炒】 山楂【各等分】

右爲末用神麴糊丸菉豆大每服六七十丸食远白汤送下

四君子汤

六君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

人参养胃汤【方见七卷第六论】

二陈汤

左金丸【方见七卷第十七论】

人参理中汤

附子理中汤【二方见二十卷第六论】

归脾汤

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

二神丸

四神丸【二方见八卷第八论】

妇人梦与鬼交方论第八

人禀五行秀气而生承五脏神气而养若调理失节血气虚衰则鬼邪干其正隐避而不欲见人时独言笑或时悲泣是其候也脉息迟伏或如鸟啄或绵绵而来不知度数面颜不变亦其候也

愚按前症多由七情亏损心血神无所护而然也宜用安神定志等药则正气复而神自安若脉来乍大乍小乍短乍长亦爲鬼祟也宜灸鬼哭穴【以患人两手拇指相并用线紧扎当合缝处半肉半甲间灼艾灸七壮若果是邪祟病者即乞求免灸云我自去矣】

茯神散 治妄有所见言语杂乱时或昏昧痰热茯神【一两半炒】茯苓 人参 石菖蒲【各一钱】赤小豆【五分】

右水煎服

桃仁丸 治与鬼魅交通

辰砂【另研】槟榔 当归 桃仁【各三钱】水银【一钱枣肉一个研令星尽】麝香 阿魏【面裹煨】沉香【各半两】

右爲末炼蜜丸桐子大每服十丸空心桃仁汤下

辟瘟丹

虎头骨【二两】朱砂 雄黄 雌黄 鬼臼 皂荚 芫荽仁 鬼箭羽 藜芦【各一两】

右爲末炼蜜丸弹子大囊盛一丸男左女右系臂上及用一丸当病人户前烧之一切邪鬼不敢近

妙香散 治心气不足精神恍惚梦与鬼交语言错乱先服此以补气血镇心安神然後以前方治之【方见三卷第十三论】

妇人伤寒伤风方论第九

伤寒之症若气口脉紧盛即下之人迎紧盛即汗之左关浮紧亦当发其汗若犯胃热谵语喜忘小腹满小便自利用抵当汤胃实谵语用承气汤脉紧无汗名伤寒脉缓有汗爲伤风热病脉洪大爲中暑用香薷饮脉细弱爲中喝用白虎汤胃实用承气汤伤寒先服黄龙汤不分男女但妊娠用药宜清凉不可轻用桂枝半夏桃仁朴硝等类凡用药病稍退则止不可尽剂此爲大法愚按前症当宗仲景先生治法但胎前产後须以安胎补益爲主须临症审之

黄龙汤即小柴胡汤去半夏

桂枝红花汤 治伤寒发热口燥舌乾经脉不来

桂枝 芍药 甘草【炒各一钱】 红花【二钱】

右姜枣水煎服良久再进汗出可解

黄芩芍药汤 治妇人内热口燥咽乾腹满不食黄芩【炒】 芍药【酒炒】 白术【各一钱】 熟地黄【自制一钱】

右水煎寒加生姜

当归汤 治伤寒喘急烦燥或战而作寒此阴阳俱虚不可下宜服此药

柴胡【一钱】 白术【炒七分】 人参 甘草 赤芍药
当归【各五分】 五味子【杵炒】 木通【各三分】

右水姜枣煎

泻心三黄汤 治伤寒六七日内有燥屎大便秘结谵语目赤毒气闭塞

大黄【煨】 黄芩【炒】 黄连【炒各一钱】

右水煎服取微利如目赤睛疼加赤茯苓竹叶

烧棍散 治女子病新瘥与男子交者名曰阴易其症则里急胯痛头重不举目中生花或头面烘热耳中蝉鸣胸中烦闷甚者百节解散用男子旧棍裆着左腹者剪取一块烧灰每日三服白汤下男子病则以女人者如不应用参附汤

妇人热入血室方论第十

妇人伤寒伤风发热经水适来昼则安静暮则谵语有如疟状此爲热入血室治者无犯胃气及上二焦宜服小柴胡汤若脉迟身凉当刺期门穴下针病人五吸停针良久徐徐出针凡针期门穴必泻勿补肥人二寸瘦人寸半也

愚按前症若因劳役或怒气发热适遇经行而患前症者亦用小柴胡加生地黄治之血虚用四物加柴胡若病既愈而热未已或元气素弱并用补中益气汤脾气素鬱用济生归脾汤血气素虚用十全大补汤

附治验

一妇人经行感冒风邪昼则安静夜则谵语此热入血室也用小柴胡加生地治之顿安但内热头晕用补中益气加蔓荆子而愈後因怒恼寒热谵语胸脇胀痛小便频数月经先期此肝火血热妄行用加味逍遥加生地黄而愈

一妇人因怒寒热头痛谵语妄言至夜益甚月经暴至此怒动肝火用加味逍遥散加生地黄治之神思顿清又用补中益气汤而痊

一妇人经行感冒谵语或用发散寒凉之剂前症益甚月经不止肚腹作痛呕吐不食痰涎自出此热入血室而药复伤胃也用香砂六君及归脾而痊

乾姜柴胡汤 治妇人伤寒经脉方来热入血室寒热如疟或狂言见鬼

柴胡【一钱】桂枝【三分】括萎根【五分】牡蛎【煨】乾姜【炮】甘草【炒各二分】

右水煎汗出而愈

海蛤散 治妇人伤寒血结胸膈宜服此药及针期门穴

海蛤 滑石【煨水飞】甘草【各二分】芒硝【一两】

右爲末每服二钱用鷄子清调下小肠通利其结血自散更用桂枝红花汤发其汗则愈【方见前】

附方

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

四物汤

香砂六君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

归脾汤

十全大补汤

加味逍遥散【三方见二十四卷第四论】

妇人咳嗽方论第十一

夫肺爲四脏之华盖内统诸经之气外司腠理皮毛若外邪入於肺中故令咳嗽当以脉息辨之浮而弦者起於风濡而弱者起於湿洪而数者起於热迟而澁者起於寒风者散之湿者燥之热者凉之寒者温之虚者补之

愚按丹溪云春是木气上升夏是火气炎上秋是湿热伤肺冬是风寒外来当发散行痰开腠理用二陈汤加麻黄桔梗杏仁痰饮随症加药劳嗽宜四物加竹沥姜汁乾咳嗽难治此症乃痰鬱火邪也用苦梗开之夏用补阴降火不已则成劳上半日多嗽者胃火也用贝母石膏午後嗽者阴虚也用四物加炒黑黄栢知母黄昏嗽者火气浮於肺也用五味子五倍子五更嗽者饮食之火流於肺也以贝母软石膏肺胀而嗽或左或右不得眠此痰挟瘀血气滞而病宜养血疎肝清痰用四物加桃仁诃子青皮竹沥之类嗽而脇下痛宜疏肝气以青皮挟痰实者白芥子之类血碍气作嗽者桃仁大黄姜汁丸服治嗽多用生姜以其辛散故也痰因火动逆上作嗽者先治火次治痰以知母止嗽清肺滋阴降火夜嗽用清阴分之剂若嗽多用粟殼不必疑但要去病根此乃收後药也窃谓前症午前嗽属胃火盛用竹叶石膏汤胃气虚用补中益气加炒山梔午後嗽属阴血虚用四物黄栢知母二味酒拌炒黑肾水虚用六味地黄丸黄昏嗽用四物五味麦门并前丸五更嗽用六君子不得眠及内胀而痛用六味地黄补中益气若因气虚腠理不密六淫所浸当去外邪而实脾土若因心火太过当伐肝木而滋肺金若因肺金气虚当补脾土而生肺气若因肾水亏损虚火炎上当补肺肾以滋化源大抵风邪胃火此实热爲患易治惟肺肾亏损此真脏爲患最难调治

附治验

一妇人素勤苦冬初咳 发热吐血盜汗遍身作痛或寒热往来用化痰降火之药口噤筋挛此血本虚而药复损之耳余用八味丸爲主佐以补中益气麦门五味山药年余而痊

一妇人咳嗽发热呕吐痰涎日夜约五六碗喘咳胸痞燥渴不食崩血如涌此脾土虚寒用八味丸及附子理中汤而愈【全见女科撮要】

一妇人不得於姑患嗽胸膈不利饮食无味此脾肺俱伤痰鬱於中也先用归脾汤加山梔抚芎贝母桔梗诸症渐愈後以六君加芎归桔梗间服全愈一妇人咳 早间吐痰甚多夜间喘急不寐余谓早间多痰乃脾虚饮食所化夜间喘急乃肺虚阴火上冲用补中益气加麦门五味而愈

一妇人患咳嗽脇痛发热日晡益甚余曰此肝脾虚热而伤肺也用加味逍遥散加熟地治之而愈後因怒气劳役前症仍作兼太阳痛或寒热往来或咳嗽遗尿此肺气虚而尿脬失制也仍用前散及地黄丸而瘥

一妇人久咳嗽而色痿黄或时?白肢体倦怠饮食少思稍多则泻此脾土虚而不能生肺金朝用补中益气汤夕用六君子汤爲主间佐以八珍汤三月余渐愈後感寒邪喘嗽胸腹作胀饮食不入四肢逆冷此中气尚虚不能充皮毛腠理司开阖之所致也遂用六君加生姜桔梗而愈

附方

法制清气化痰丸 顺气快脾化痰消食

半夏 南星【去皮尖】 白矾 皂角 乾姜【各四两】

右先将白矾等三味用水五碗煎取水三碗却入半夏二味浸二日再煮至半夏南星无白点爲度晒乾陈皮 青皮 紫苏子 萝卜子【炒另研】 杏仁【去皮尖炒研】 葛根 神麴【炒】 麦蘖【炒】 山查子 香附子

右爲末蒸饼丸桐子大每服五七十丸临卧茶汤任下

茯苓汤 治胸中有痰饮吐水心胸虚满不能进食茯苓 人参 白朮【炒各三两】 枳实【炒二两】 橘皮【二两半】 生姜【四两】

右用水六升煮取二升分三服

加减小柴胡汤 治咳嗽寒热往来

柴胡 半夏 黄芩【炒各一钱】 甘草【炒】 乾姜【炮各五分】 五味【炒杵三分】

右水煎服

黄连解毒汤 治一切实火喘咳脉洪大或狂言烦躁口乾饮冷喘急郑声目睛赤痛

黄连 黄芩 梔子 黄柏【各二钱】

右水煎服

梔子仁汤 治喘咳发热潮热发狂烦躁面赤咽痛梔子仁 赤芍药 大青
知母【各一钱】 升麻 黄芩 石膏 甘草
杏仁【各二钱】 柴胡【二钱五分】 豆豉【百粒】

右水煎服

麦门冬汤 治火热乘肺咳嗽有血胸脇胀满五心烦热

麦门冬【去心】 桑白皮【炒】 生地黄【各一钱】 半夏 紫苑 桔梗 淡竹叶
麻黄【各七分】 五味子【杵】 甘草【各五分】

右姜水煎服

二陈汤【方见二十四卷第六论】

竹叶石膏汤【方见十三卷第十论】

补中益气汤

四物汤

六君子汤【三方见二十 卷第六论】

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

附子理中汤【方见二十卷第八论】

归脾汤

加味逍遥散

八珍汤【三方见二十四卷第四论】

咳嗽用温药方论第十二【初虞世】

经曰微寒爲嗽寒甚爲肠澼古人立方多用乾姜桂心细辛之属若热在上焦而咳虚则爲肺痿实则爲肺痛或因气血不足或因酒色厚味或因重亡津液燥气焚金故脉数发热咳嗽脓血宜辛温建中之属若用柴胡鼈甲门冬葶苈等药则误矣

愚按丹溪云阴分嗽者多属阴虚肺胀不得眠者难治肺痿专主补气养血清金肺气有余者宜泻之以桑白皮爲主半夏茯苓佐之泻其有余补其不足肺燥者当润之属热者桔梗大力子知母鷄子清声哑者属寒细辛半夏生姜肺虚者人参膏阿胶爲主阴不足者六味地黄爲要药或知母茯苓汤阴虚气喘四物加陈皮甘草以降其气补其阴窃谓前症嗽而鼻塞声重风邪伤肺也用参苏饮面赤喘嗽火剋肺也人参平肺散寒热交作肝气不和也四君加知母柴胡桔梗咳喘短气肺虚也人参补肺汤体倦少食脾虚也参术补脾汤口乾咽燥虚火上炎也六味丸大凡发热喘嗽或咳唾脓血饮食不入急补脾肺滋肾水多有得生者脉浮大而面色赤者皆难治脉浮短濇者可疗

参苏饮 治外感风寒咳嗽气逆血蕴上焦发热气促或咳血 血或痰嗽不止加黄芩山梔名加味参苏饮

人参 紫苏【叶去梗】半夏【姜汁拌炒】茯苓 陈皮 桔梗葛根 前胡
枳殼【麸炒各一钱】甘草【炙五分】

右姜水煎服

金沸草散 治肺经受风头目昏疼咳嗽声重涕唾稠粘

荆芥穗【一钱】前胡 麻黄 旋覆花【各七分】甘草【炙】赤芍药 半夏【各五分】

右生姜枣水煎服

定喘汤 治痰喘胸满坐卧不安声重鼻塞头昏半夏麴 明阿胶【炒】甘草【炒各五分】罌粟殼【一钱制】五味子【杵炒】桑白皮【炒】麻黄【去节】人参【各三分】

右姜三片乌梅半个水煎临卧服

金不换正气散 治肺胃虚弱咳嗽不已喘满涎盛杏仁【制】甘草
枳殼【各五分】罌粟殼【一钱制】

右生姜乌梅水煎

録驗橘皮湯 治肺傷冷濕咳嗽喉中作聲上氣頭痛陳皮 紫苑 麻黃
杏仁【制】當歸【各一錢】桂心甘草【炒】黃芩【各五分炒】

右水煎

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽聲重胸膈煩滿頭目昏眩蘇子【炒】陳皮 赤茯苓
桑白皮【炒】麻黃【各一錢】甘草【五分】

右姜水煎服

千金五味子湯 治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸脇疼痛

五味子【杵炒】桔梗【炒】紫苑
甘草【炒】續斷【各一錢】竹茹【三錢】赤小豆【一撮】生地黄 桑白皮【各五錢】

右水煎服

知母茯苓湯 治咳嗽不已往來寒熱自汗喘促或肺痿

知母 茯苓【各一两】五味子【杵】人參 薄荷 半夏 柴胡 白朮 款花 桔梗
麥門冬【去心】黃芩

【炒各五錢】川芎 阿膠 甘草【炙各三錢】

右每服一两姜水煎

小青龙湯 治肺感寒咳嗽喘息加杏仁煎有汗去麻黃細辛發熱頭疼脈沉細或嘔或欬或利
或噎或小便不利小腹滿脹喘 之聖藥

淸白散

桔梗湯

人參平肺散

人參補肺湯

參朮補脾湯【五方見二十四卷第十二論】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

四物汤

四君子汤【二方见二十四卷第六论】

劳嗽方论第十三

经曰感於寒微则爲咳甚则爲泄盖肺主气合於皮毛邪伤皮毛则咳爲肺病传於各脏以时受邪肺爲嫩脏邪易伤而难治其嗽有肺心脾肾肝风寒支饮胆之十种亦有劳嗽者华陀谓之邪嗽孙真人谓之注嗽此因酒色过度劳伤肺经重者咯唾脓血轻者时发时瘥或先呕血而後嗽或先咳嗽而吐血此又挟邪传症孙真人用通气丸梦与鬼交用四满丸蛤蚧天灵盖桃柳枝安息香之类若肺中有虫入喉痒嗽须以药含化其虫即死嗽即止

愚按仲景先生云咳而两脇痛不能转侧两胛满属於肝脏用小柴胡汤咳而呕苦水属胆腑黄芩半夏生姜汤咳而喉中如梗状甚则咽肿喉闭属心脏桔梗汤咳而大便失气属小肠腑芍药甘草汤咳而右胁痛阴引肩背甚则不可动动则咳剧属脾脏升麻汤咳而呕呕甚则出长虫属胃腑乌梅丸咳而喘息有声甚则唾血属肺脏升麻汤咳而失尿属大肠肺麻黄附子细辛汤咳而遗溺属膀胱茯苓半夏汤咳而不止三焦受之其状腹满不食涕唾面目浮肿气逆异功散用之对证其效如神仍参五卷看

附治验

一妇人患前症晡热内热寒热往来作渴盗汗小便频数其经两三月一行此肝脾气血虚损用八珍汤六味丸各六十余剂诸症渐愈其经两月一行仍用前二药间以加味逍遥散各三十余剂後患怒适经行去血过多诸症悉至饮食少思腹胀气促用十全大补汤数服渐愈仍用前药调补渐愈复因丧子胸腹不利食少内热盗汗便血无寐用加味归脾汤仍兼前药而愈

一妇人患前症不时发热或时寒热或用清热之剂其热益甚盗汗口乾两足如炙遍身皆热昏愤如醉良久热止方苏或晡热至旦方止此阴血虚而阳气弱也余朝用六味丸料夕用十全大补汤月余诸症稍愈更兼以补中益气汤两月余而愈

深师四满丸 治上气嗽饮嗽燥嗽冷嗽邪嗽谓之五嗽

乾姜【炮】 桂心 踯躅花 芎藭

紫苑【各二两】 芫花根皮【二分】 蜈蚣【一枚去头足炙】 细辛 甘草【炙】 鬼督邮 人参 半夏【洗各一两】

右爲末炼蜜丸大豆许每服五丸米饮下日三服未应加至七八丸

温金散 治劳嗽喘闷咯痰中有血【方见前劳瘵类】

阿胶丸 治劳嗽并嗽血咯血【方见前劳瘵类下补遗】

团鱼丸 治骨蒸劳嗽累効

贝母 前胡 知母 杏仁 柴胡【各等分】生团鱼【二个】

右药与鱼同煮熟取肉连汁食之将药焙乾爲末用骨更煮汁一盞和药丸梧子大每服二十丸煎黄芩六一汤空心送下病既安仍服黄芩六一汤调理附方

地骨皮散

知母【炒】柴胡 甘草【炒】人参 地骨皮 茯苓半夏【姜制各一钱】

右姜水煎服

海藏紫苑散 治咳中有血虚劳肺痿

人参 紫苑 知母【炒】贝母 桔梗【炒】茯苓

阿胶【炒各一钱】五味子【杵三分】甘草【炙五分】

右姜水煎服

参术调中汤 泻热补气止嗽定喘和脾胃进饮食黄芩【四分】桑白皮【五分】人参
炙甘草 青皮 白茯苓 白术【各三分】五味子【杵五分】地骨皮
麦门冬陈皮【各五分】

右水煎服

二陈汤

治脾胃虚弱中脘停痰或呕吐恶心或头目不清饮食少思【方见二十四卷第五论】

异功散【方见二十四卷第五论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

八珍汤

加味逍遥散

十全大补汤

加味归脾汤【四方见二十四卷第四论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

喘满方论第十四

岐伯曰夜行则喘出於肾淫气病肺有所堕恐喘出於肝淫气害脾有所惊恐喘出於肺淫气伤心度水跌仆喘出於肾与骨皆因外邪所感而致太阳病则脉浮无汗而喘用麻黄汤阳明病则汗出腹满喘而潮热承气汤表邪未解喘促汗出葛根黄芩汤微喘桂枝厚朴杏仁汤汗出而喘麻黄杏仁甘草石膏汤表邪未解小青龙汤去麻黄加杏仁感寒伏热而喘九宝汤气鬱痰盛喘促四七汤涎多而喘干縻汤不得卧而喘神秘汤寒热喘咳枣膏丸上气喘促神授汤上盛下弱吞黑锡丹若四肢逆冷脉息沉细或寸或尺小胸胀冷汗大便频数上气喘促此虚极挟寒之阴症急用返阴丹

愚按东垣云肺金受邪由脾胃虚弱不能生肺乃所生受病故咳嗽气短气上皮毛不能御寒精神少而渴情惨不乐皆阳气不足阴气有余也治法若肺气虚弱用四君枳壳半夏脾虚不能生肺补中益气汤七情气结四七汤脾经鬱结归脾汤脾气虚弱人参补肺散肺经火盛人参平肺散肾水败浊六味丸真阳虚损八味丸或兼小便不利爲害尤速非二丸不能救仍与前十一十二论互用

附治验

一妇人伤风寒作喘或用表散愈而复患仍用前药其症益甚饮食少思胸腹不利此因脾肺气虚也予先用六君子汤加桔梗渐愈又用补中益气汤全愈一妇人患前症属命门火虚不能生脾土用补中益气汤八味地黄丸而痊後复患其喘益甚用前药不应遂用黑锡丹二服喘止仍用前二药而诸症痊凡属邪气有余者其症易识治效亦速其属元气不足者变症不一效非可以旦夕期也

神秘汤 治水气乘肺作喘或支饮喘满痰嗽不食陈皮【去白】紫苏叶 人参 桑白皮 生姜【各一钱】

右水煎服

千缙汤

半夏【七枚炮制】甘草【炙一寸】生姜【如指大】皂角【去皮尖弦一寸】

右姜水煎服

枣膏丸 治息贲在右脇下大如杯令人洒淅寒热喘咳

甜葶苈【炒研】陈皮 苦梗【各等分】

右为末煮枣肉丸桐子大每服数丸白汤下许学士云余常停饮水积食已必 渐喘觉肺系急服此良验

神授汤 治上气喘急不得卧

橘红 苦梗 紫苏 人参【各一钱】五味子【杵炒三分】

右姜水煎服

九宝汤 治伏热咳嗽喘急虚劳自汗者不可服薄荷 紫苏 大腹皮【洗】甘草【炒】杏仁【去皮尖】陈皮【各一钱】

右姜十片乌梅一个水煎

四磨汤 治七情鬱结上气喘急满闷痰涎上涌

人参 枳 榔 沉香 乌药

右四味各浓磨白沸汤少许温服

五味子汤 治咳嗽皮肤乾燥睡中有血胸脇疼痛五味子【杵炒】桔梗【炒】紫苑 甘草【炒】续断【各五分】竹茹【一钱】赤小豆【一撮】生地黄【二钱】桑白皮【二钱炒】

右水煎服

附方

六君子汤

四君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

四七汤【方见十一卷第七论】

归脾汤【方见二十四卷第四论】

人参补脾散

人参平肺散【二方见二十四卷第六论】

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

黑锡丹【方见四卷第四论】

妇人风痰积饮咳嗽方论第十五

妇人脾胃虚弱风邪外侵以致痰滞咳嗽眼昏头眩经云九窍不利肠胃之所生也无择云凡属风热三生饮化痰丸属寒冷金沸草散属暑热消暑丸属气鬱四七汤在上瓜蒂散吐之在下控涎丹利之仍观人之勇怯脉之虚实

愚按前症若肝经恚怒用小柴胡汤肝经风热用钩藤散肝肾气虚用川芎散脾经鬱结用济生归脾汤鬱怒伤肝脾用加味逍遥散脾虚痰逆用白术半夏天麻汤脾气虚弱用六君子益气汤肺气鬱滞用二陈贝母桔梗阴亏水泛六味地黄肾虚阴火加減八味丸肾虚火不归源八味地黄丸仍与前按互相用之

附治验

一妇人内热口乾劳则头晕吐痰带下或用化痰理气药前症益甚肢体或麻又用祛风化痰药肢体常麻手足或冷或热此脾土不能生肺金也余用补中益气加茯苓半夏炮姜二十余剂渐愈又用加味逍遥散三十余剂全愈後因怒吐痰胸痞或用清气化痰丸食少痰甚胸脇胀满脉或浮大或微细余以六君倍用参术少加木香而康

一妇人咳嗽脇痛或用止 化痰降火等药久不愈更加内热晡热若两脇或小腹内热其咳益甚小便自遗余曰此属肝经血虚火动用六味丸加五味子滋肾水以生肝血用补中益气生脾土以滋肺金而寻愈

旋覆花汤 治风痰呕逆饮食不下头目昏闷等症旋覆花 枇杷叶 川芎 细辛 赤茯苓【各一钱】 前胡【一钱五分】

右水姜枣煎

大半夏汤 治痰饮脾胃不和咳嗽呕吐饮食不入

半夏 白茯苓 生姜【各二钱】

右姜水煎服胃痞加陈皮如不应四七汤亦善

导痰汤 治痰涎壅盛胸膈痞塞或咳嗽恶心饮食少思

半夏【二钱】 南星 枳实【麸炒】 茯苓 橘红【一钱】 甘草【五分】

右姜十片水煎

附方

川芎散 治肝肾气虚头风眩运

小川芎 山药 白茯苓 甘菊花 人参【各五钱】 山茱萸【肉一两】

右每服一两食前空心水煎服或为末酒调日三服

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

钓藤散【方见四卷第四论】

归脾汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第五论】

白术半夏天麻汤【方见四卷第五论】

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

二陈汤【方见後】

六味丸

八味丸【三方见二十四卷第十一论】

妇人心膈嘈杂方论第十六

妇人嘈杂此脾胃鬱火亡其津液泪汗而成用猪血炒食之乃以血导血而使之归源尔旋覆花汤尤善愚按前症若因食鬱用六君子汤山查山梔若因胃热用二陈姜炒芩连若因六鬱用越鞠丸若因气滞用四七汤桔梗枳殼大抵此症属病气元气俱不足须用六君子爲主少佐以治痰之药若以火治之必变吞酸中满

附治验

一妇人饮食少思胸中嘈杂头晕吐痰此中气虚而有热用六君子汤加炒黑山梔桔梗而愈後因劳碌头晕发热吐痰不食用补中益气加半夏茯苓天麻而痊

一妇人中脘嘈杂口中辛辣或咳嗽吐痰发喘面色或白或赤此脾气虚而肺中伏火也用六君子加山梔桔梗柴胡及炒黑片芩治之寻愈

一妇人嘈杂吞酸饮食少思大便不实此脾气虚寒而下陷用补中益气汤加茯苓半夏炮姜渐愈又常服人参理中丸则安

一妇人饮食後嘈杂吞酸此食鬱爲痰用六君子汤送越鞠丸渐愈又用加味归脾汤而痊後因怒两脇胀痛中脘作酸用四君汤送左金丸渐安仍用六君子汤送越鞠丸而痊

旋覆花汤 治脾胃虚寒中脘停痰汪洋嘈杂肠鸣多睡呕吐不食脇肋胀痛脉沉迟弦细

旋覆花 细辛 橘红 桂心 人参 甘草【炒】 苦梗 白芍药
半夏【各五分】 赤茯苓【三分】

右姜水煎服

余治妇人心胸嘈杂用茯苓补心汤治之而愈【方见前】

附方

补中益气汤

四君子汤

六君子汤【三方见二十四卷第六论】

二陈汤【方见二十四卷第五论】

越鞠丸【方见前第七论】

四七汤【方见十卷第七论】

归脾汤【方见二十四卷第四论】

人参理中汤【方见二十卷第八论】

薛氏医案卷三十

卷三十一

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷三十一

明 薛己 订

妇人良方

妇人呕吐方论第一

妇人呕吐良由脾胃不调外邪乘之或胃中虚冷或胃口有热或中脘停痰或胃经血弱治法胃冷者丁香散理中丸胃热者小柴胡汤竹茹汤胃虚者藿香正气散停痰者半夏茯苓汤二陈汤血虚者十全大补汤加陈皮半夏藿香

愚按东垣先生云前症内有故寒与新谷俱入於胃新故真邪相攻气并相逆复出於胃故爲嘔补手太阴泻足少阴又云胃因气逆爲嘔夫呕吐嘔者俱屬於胃以其气血多少爲异耳如呕者阳明也阳明多血多气故有声有物血气俱病也仲景云呕多虽有阳明症慎不可下孙真人云呕家多服生姜爲呕家之圣药也气逆者必散之故以生姜为主吐者太阳也太阳多血少气故有物无声为血病也有食入则吐以橘皮去白主之嘔者少阳也多气少血故有声无物乃气病也以姜制半夏为主若脾胃虚弱寒邪所客饮食所伤者用六君丁香藿香生姜之类若胃中有热膈上有痰用二陈山栀黄连生姜若久病胃虚呕而不纳谷者用生姜参术黄芪香附之类亦有痰膈中焦食不得下者有气逆而呕者有气鬱於胃口者有食滯於心肺之分而复出者有胃口有火与痰而呕者若注船大吐渴饮水者即死童便饮之最妙前论云血不归源而呕用十全大补汤诚发前人之未发愚常用屡效此论与王安道先生源回集所论少异仍宜参看之

附治验

太守阳山之内素善怒胸膈不利吐痰甚多吞酸暖腐饮食少思手足发热数年矣所服非芩连枳实必?苏厚朴左关弦洪右关弦数此肝火血燥木乘土位朝用六味地黄丸以滋养肝木夕用六君归芍以调补脾土而愈乙巳夏因大怒吞酸暖腐胸腹胀满或用二陈石膏治之吐痰如涌外热如灼脉洪大按之如无余曰此脾胃亏损虚阳发越於外脾败而涎泛出也用六君加姜桂一鍾即睡觉而诸症如失又数剂而康

先太宜人饮食後闻外言忤意呕吐酸水内热作渴惟饮冷水气口脉大而无伦面色青赤此肝脾鬱火投之以药入口即吐第三日吐宿食第七日吐酸黄水十一日吐苦水脉亦洪大仍喜饮冷以黄连煎汤冷饮少许至二十日加白术茯苓二十五日加陈皮三十七日加当归炙草至六十日始进米饮半盏渐进薄粥调理得痊

一妇人食後因怒患症呕吐用藿香正气散而愈後复怒吐痰狂言热炽胸脇胀痛手按少得脉洪大无伦按之微细此属肝脾二经血虚以加味逍遥散加熟地川芎二剂脉症顿退再用十全大补汤而安矣府庠沈姬文母患脾虚中满痰 发热又食湿麪冷茶吞酸呕吐絶食误服芩莲青皮等药益加寒热口乾流涎不收闻食则呕数日矣迎治余曰脾主涎此脾虚不能约制也欲用人参安胃散惑於衆论以爲胃经实火宿食治之病日增剧忽思冬瓜食如指甲一块顿发呕吐酸水不止仍服前药愈剧复邀视之则神脱脉絶濒死矣惟目睛尚动余曰寒淫于内治以辛热然药不能下矣急用盐艾附子炒热熨脐腹以散寒回阳又以口气补接母口之气又以附子作饼热贴脐间时许神气少苏以参术附子爲末仍以是药加陈皮煎膏爲丸如粟米大入五七粒于口随津液咽下即不呕二日後加至十粒诸病少退甘液不止五日後渐服前剂一二匙胃气少复乃思粥饮後投以参术等药温补脾胃五十余剂而愈

丁香散 治脾胃气弱呕吐水谷不消

丁香 白术 缩砂 草菓【各三钱】 人参【一两】 当归 白豆蔻 藿香 甘草【各半两炒】 橘皮【三分】 神麪【炒】 呵子【各半两】

右为末每服二钱姜枣汤调

竹茹汤 治胃热呕吐

乾葛【二钱】 半夏【姜制三钱】 甘草【五分】 竹茹【一弹子大】

右姜枣水煎服

许学士先生云胃热者手足心热也政和中一宗人病伤寒得汗身凉数日忽呕吐药食不下用丁香藿香滑石等药下咽即吐余曰此正汗後余热?胃脘正宜竹茹汤用之即愈

许仁则半夏丸 治胃冷呕逆不食

半夏【洗去滑一斤】 小麦面【一斤】

右水和丸如弹子大水煮熟初服四五丸二服加至十四五丸旋煮间服

七味人参丸 服前丸不应可服此药

人参 白术【各五两】 厚朴【姜制】 细辛【各四两】 生姜 橘皮【三两】 桂心【二两】

右爲末炼蜜丸桐子大米饮下十丸渐加至二十丸

青金丸 治呕吐不已

硫黄【二钱】 水银【一钱】

右入铔内慢火化以木片拨炒成砂研至黑不见白星姜汁糊丸菉豆大每服二三十丸米饮下

附方

人参安胃散 治脾胃虚热呕吐泄泻或饮食不入人参【一钱】 黄芪【炒二钱】 生甘草 炙甘草【各五分】 白芍药【七分】 白茯苓【四分】 陈皮【三分】 黄连【炒】

右水煎服

六君子汤【方见二十四卷第六论】

加味逍遥散

十全大补汤【二方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

藿香正气散【方见二十一卷第九论】

妇人霍乱方论第二

论曰呕吐而利者名霍乱也因肠胃虚弱饮食过度触冒风冷清浊相干所致或先腹痛而吐或先吐而痛或吐利并作当分寒热而治之饮冷者五苓散饮汤者理中丸四肢逆冷脉微细者用通脉四逆汤加猪胆汁中暑霍乱烦渴饮冷转筋者用香薷散脉浮洪者易治微迟者难治

愚按贾元良先生云暑者相火行令也夏月人感之自口齿而入伤心胞络之经其症头疼口乾面垢自汗倦怠少气或背寒恶热甚者迷闷不省或霍乱吐利呕痰腹痛或下血发黄生斑等症治法清心火利小便爲主若自汗热甚用白虎汤若头疼恶寒用十味香薷散泄泻烦渴饮水吐逆用五苓散热甚烦渴用益元散清之若表解里热甚者用黄连解毒汤脉微下利作

渴喜温或厥冷不省人事宜竹叶石膏汤加熟附半枚冷饮次以来复丹五苓散治之故东垣云脾胃虚弱遇夏月淫雨身重短气甚则四肢痿软脚欹眼黑当滋肺气以补水之源是以五月常服五味子人参麦门冬之剂爲热伤元气故耳丹溪所谓夏月伏阴在内也盖人之腹属地已月六阳尽出於地之上矣是人之阳气亦浮于肌表散于皮毛而腹中之阳虚矣又加以凉台水館大扇风车寒泉水菓冰凉之物自内及外不用温热病所由生陈无择云凡中喝切不得用冷药惟用温养得冷即死道途无汤即以热土熨脐中溺以热尿即苏槩可见矣内经曰脉虚身热得之伤暑难经曰伤暑得之爲正邪火自病也当恶臭其病身热而烦心痛其脉浮大而散伤寒论曰太阳中喝者身热疼痛而脉微弱或发热恶寒而脉微细乳迟大抵寒伤形热伤气盖伤气而不伤形则气消而脉虚弱故先哲立法夏月宜补良有以也前症若内有所积外有所感用二陈加减治之或萝卜子捣碎服而吐之若饮米汤即死云云同前论若转筋不住男子以手挽阴女子以手牵乳近两边此千金妙法也乾霍乱不得升降死在须臾当以盐汤吐之後以二陈汤加川芎苍术防风白芷姜煎服若登圉而不通加枳壳若食瓜果饮冷乘风霍乱用六和汤倍加藿香凡中暑而亡者皆因元气虚弱而暑热乘之以致泄泻阳气暴脱实爲阴寒之症宜急补其阳庶得保生缓则不救其他执爲暑热投以寒药鲜不误事愚故以回阳固本之方继之於後

附治验

进士李通甫之内冬间开衣箱其内衣裳乃夏月所晒者开时觉暑气所侵良久患霍乱足指足跟俱转筋甚恶自分必死用香薷饮一剂急煎下咽即愈

加减理中丸 治肚腹疼痛手足逆冷饮食不入等症

人参 白术 乾姜 甘草【各等分】

右爲末炼蜜杵匀每两作五丸每服一丸白汤化下呕吐加枳实泄泻加乾姜吐泻乾呕加半夏体冷微汗腹寒加炮附子水煎服

四顺附子汤 治霍乱吐利腹痛手足厥冷脉微絶【方见八卷第十一论】

四逆汤加猪胆汁名四逆猪胆汁汤

甘草【二两】 乾姜【三两】 附子【一枚生】

右每服五钱水煎入猪胆汁半合作二服

香薷散 治吐利腹疼发热头痛或霍乱转筋拘急

香薷【二钱】 白扁豆 厚朴【姜制】 茯苓【各一钱】

右水煎冷服连进二三剂加黄连名黄连香薷饮附方

十味香薷散 治伏暑身体倦怠头疼恶寒或吐泻等症

香薷【一两】人参 陈皮 白术【炒】茯苓
黄芪【炒】木瓜【不犯铁器】厚朴【姜制】甘草【炒各半两】

右每服一两水煎

清暑益气汤 治长夏湿热所蒸四肢困倦精神短少懒於动作胸满气促支节作疼或气高而喘身热而烦心下膨闷小便黄数大便溏频或泻痢作渴不思饮食自汗体重

黄芪【炒】苍术 升麻【各一钱】人参 白术 神麴【炒】陈皮【各五分】甘草【炙】
黄栢【炒】麦门冬【去心】当归【各三钱】葛根【二分】泽泻【五分】青皮【二分】
五味子【九粒炒杵】

右水煎服

白虎汤 治胃热作渴暑热尤効又治热厥腹满身难转侧面垢谵语不时遗溺手足厥冷自汗脉沉滑知母 石膏【各三钱】粳米【半合】

右水煎服

人参白虎汤 治暑热发渴脉虚等症

人参【一钱五分】知母【二钱】石膏【半两】甘草【一钱】

右入粳米一合水煎服

人参益气汤 治暑热伤气四肢困倦嗜卧少食两手指麻木

黄芪【炒八钱】甘草【七钱内炙一钱】人参【半两】升麻【二钱】白芍药【炒三钱】
五味【百四十个杵炒】柴胡【二钱半】

右?咀分作四服

大顺散 治冒暑伏热引饮过多脾胃受湿水谷不分清浊相干阴阳气逆霍乱呕吐脏腑不调

甘草【炒】乾姜【炮】杏仁【去皮尖炒】桂【去皮】

右爲末每服二三钱汤点服

消暑丸 治伤暑发热头疼或呕吐泄泻二便不分

半夏 甘草【炒】 茯苓【各半斤】

右爲末生姜汁和丸桐子大每五十丸水下易简方姜汁好醋煮半夏末作糊丸服

姜附汤 治霍乱转筋手足厥冷汗出呕逆腹痛脉欲絶者

乾姜【炮一两】 附子【一个生用】

右爲末每服五钱水煎服

通脉四逆汤 治霍乱恶寒腹痛身冷自汗脉沉微如欲絶

吴茱萸【二两炒】 附子【炮一两】 桂心 通草 细辛
白芍药【炒】 甘草【炙各半两】 当归【三钱】

右每服四钱水酒生姜煎如不应更加倍服之以効爲度

半夏解毒汤 治一切暑热毒五心烦躁口舌咽乾

黄栢【炒】 黄芩【炒】 山梔子【炒】 半夏【等分】

右每服五钱水煎

六和汤 治冒暑伏热烦闷霍乱转筋吐泻寒热交作头目昏痛嗜卧倦怠小便赤澁不问胎产并服之缩砂 半夏【汤炮七次】 杏仁【去皮尖】 人参 甘草【炙各一两】 赤茯苓 藿香 木瓜【各二两】 香薷 厚朴【姜制】 白扁豆【姜汁略炒各四两】

右每服一两姜枣水煎服

益元散 治中暑身热小便不利或发热体痛口乾作渴

滑石【六两】 甘草【微炒一两】

右爲末每服三钱加蜜少许汤水任下

二陈汤【方见二十四卷第五论】

来复丹

五苓散【二方见二十一卷第十论】

竹叶石膏汤【方见十三卷第十论】

妇人翻胃吐食方论第三【论新增】

愚按病机云前症有三曰气积寒也皆从三焦论之上焦吐者从於气气者天之阳也其脉浮而洪食已暴吐渴欲饮水大便燥结气上冲胸发痛其治法当降气和中中焦吐者从於积有阴有阳食与气相假爲积而痛其脉浮而匿其症或先痛而後吐或吐而後作痛治法当以小毒药去其积?榔木香行其气下焦吐者从于寒地之道也其脉沉而迟其症朝食暮吐暮食朝吐小便清大便秘而不通治法当以毒药通其闭塞温其寒气大便渐通复以中焦药和之不令大便秘结而自愈也王太仆曰食不得入是有火也食入反出是无火也又发明曰噎者六腑之所主阳也气也塞者五脏之所主阴也血也二者皆由阴中伏火而作也刘宗厚先生曰若三焦传化失常所致主於气也若血亏胃脘乾稿所致因於血也塞犹填塞不通之义故发明有治幽门不通噎塞不便通幽汤例盖阳无阴不能通化阴之失位而阳伏其中传化不变而反上行矣故前症或由饮食起居七情亏损脾胃痰饮停滯中气不运当以补中益气汤爲主若鬱结伤脾用归脾汤加枳殼桔梗若恚怒伤肝用小柴胡加梔苓参术脾气虚弱用六君加山梔枳殼气血俱虚用八珍汤加山梔半夏若用行气之药胸膈痞闷用六君芎归之类若过用香燥之剂而大便结燥用四物参术之类若饮食不能入用六君山梔吴茱萸制黄连若食入而反出用六君炮姜白豆?黄连制吴茱萸若痰滯而食反出六君枳壳桔梗若饮食少思大便不实胸膈痞闷吞酸暖腐食反不化是爲脾胃虚寒用东垣固真丸或八味丸若发热烦热身恶风寒腹畏热食或手足俱冷胸满腹胀是内真寒外假热用神效附子丸或八味丸大凡呕吐善食喜饮冷水是爲有火呕吐少食喜饮热汤是爲无火当审其因而治之

附治验

一妇人患前症胸腹痞闷得去後或泄气稍寛余曰此属脾气鬱结而虚弱也当调补爲善不信乃别用二陈枳实黄连之类不应又用香燥破气前症益甚形气愈虚余用加味归脾汤调治半载而痊

一妇人患前症胸脇胀闷或小腹不利或时作痛小便滯滯余曰此肝火血虚也当清肝火生肝血养脾土生肺金以余言爲迂别服利气化痰等剂前症益剧虚症蠡起余用加味逍遥散加味归脾汤兼服寻愈

一妇人患吐痰甚多手足常冷饮食少思余曰此肝脾鬱怒兼命门火衰不信另服化痰利气

之剂胸腹愈胀又服峻利疎导之剂余曰非其治也必变脾虚发肿之症急服金匱加减肾气丸庶有可救仍不信反服沉香化气等丸果发肿而歿

白垩散 治虚热翻胃用白垩土一斤米醋一升煨土赤入醋内再煨再入以醋乾爲度取土一两入炮姜一钱爲末每服一钱米饮下甚者二钱须服四两有效

治实热翻胃用黄连五钱生姜汁浸炒山查三钱保和丸三钱同爲末糊丸麻子大胭脂爲衣每服六十丸煎人参汤入竹沥下之

太仓丸 治胃弱翻胃

肉豆蔻 砂仁【各二两】丁香【一两】陈仓米【一升土炒】

右爲末姜汁糊丸桐子大每服六七十丸姜汤下

青金丹 每服三十丸生姜陈皮煎汤送下【方见前呕吐类】

附方

东垣补真丸

肉苁蓉【酒浸焙】葫芦巴【炒】附子【炮去皮】阳起石【煨】肉豆蔻【麪裹煨】川乌【炮去皮】沉香 兔丝子【净酒浸蒸】五味子【各五钱】鹿茸【酒浸炒】巴戟【去心】锤乳粉【各一两】

右爲末用羊腰子两对治如食法葱椒酒煮捣烂入酒糊丸如梧子大每服七十丸空心米饮盐汤任下

神效附子丸 治脾肾虚寒呕吐或翻胃膈噎用黑附子重一两四五钱端正底平尖圆一枚灰火炮皮裂入生姜自然汁内浸润晒乾仍炮再入汁浸润仍晒再炮用尽姜汁半碗爲度却去皮脐爲末以人参煎膏丸黍米大每服数丸津唾咽下胃气稍复饮食稍进投以温补之剂

六君子汤

补中益气汤

四物汤【三方见二十四卷第六论】

归脾汤

加味归脾汤

八珍汤

加味逍遥散【四方见二十四卷第四论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

二陈汤【方见二十四卷第五论】

金匱加減肾气丸【方见二十二卷第十论】

妇人血膈方论第四

愚按前症若气逆而血滯用流气饮若恚怒而血逆用小柴胡山梔丹皮血虚用四物参术柴胡山梔丹皮若鬱结而血伤用加味归脾兼加味逍遥散脾虚不能生血用六君归芎胃虚不能生血用益气汤若肝虚而不能藏血用补肝散如不应兼以六味丸若因脾肺虚用补中益气汤如不应用六君加芎归附治验

一妇人患前症胸膈痞闷余曰此属脾经血虚遂用四君芎归调补脾气寻愈又因怒兼两脇痞闷头目不清月经旬余未竭用加味逍遥散加鈎藤治之复瘥

一妇人患前症胸膈作痛面青目割小便频数或时寒热此肝气滯而血凝先用失笑散二服痛止又用加味逍遥散而愈

一妇人所患同前泛用行气破血之剂以致不起

神功散 治血滯胸腹作痛

五灵脂【炒二两】 莪术 桂心 芸薹子【炒各半两】

右每服二钱酒水煎

附方

流气饮【方见三卷第七论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

加味归脾汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

四物汤

补中益气汤

四君子汤

六君子汤【四方见二十四卷第六论】

补肝散【方见本卷第十七论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

失笑散【方见二十卷第五论】

制吴茱萸黄连法用二味等分用热汤拌湿和匀重汤顿煮使气相通同炒焦各拣出听用

妇人鼻血方论第五

妇人气血调和则循环经络若劳伤元气阴虚火动气逆於肺则血随鼻而?产後尤不可治陈无择曰亦有因怒气而得者赵恭人鼻?先用苏合香丸四粒次用五苓散浓煎白茅花汤调服即止又用芎归汤调理而安一富男鼻血六脉洪数讯之云曾服丹药遂用芩连大黄爲末水调服解之而愈

愚按前症若热鬱於胃经用犀角地黄汤若伏暑於内用黄连香薷饮若大怒血蓄于上用小柴胡汤若脾损不能摄血归源用归脾汤大凡杂症见血多因阴分鬱热或内有所伤皆属五志所动经曰诸见血身热脉大者难治是火邪胜也身凉脉静者易治是正气复也仍与後症同用

附治验

一妇人经素不调因怒?血此肝火炽盛用加味小柴胡加红花二剂血止又用加味逍遥散八珍汤兼服三十余剂经行如期

一妇人鬱结而患前症用加味归脾汤其血渐止饮食渐进用加味逍遥散元气渐复寒热渐止後因怒仍?寒热往来用小柴胡汤加芎归丹皮而愈一妇人因劳?血服凉血之剂更致便

血或以血下爲顺仍用治血余曰此因脾气下陷而血从之当升补脾气庶使血归其经不信果血益甚余朝用补中益气汤夕用加味归脾汤而愈此症用寒凉止血不补脾肺而死者多矣

刺蓟散 治血热鼻?

刺蓟 生地黄【各二钱】 桑耳 乱髮灰 艾叶【炒各一钱】 蒲黄【五分】

右水煎服

犀角地黄汤【方见後】

又方用白茅根汁一合饮之即止

又方用生葱心塞鼻中血即止若刀斧所伤用之血亦止

四物汤加侧柏生地黄治虚热吐血甚效若脾经血虚须用四君加芎归若脾经气鬱须用归脾汤若肝肾亏损须用六味丸若气血俱虚须用十全大补汤附方

济生犀角地黄汤 治热鬱不解泛行经络或流肠胃随气涌泄以致?血吐血或爲便血并皆治之犀角【镑如无升麻代】 生地黄 白芍药 牡丹皮【各一钱】

右每服四五钱水煎若实热炽甚加炒黄芩若去血过多或脾肺之气亏损不能摄血归源者急用四君子汤怀抱鬱结者用归脾汤

枇杷叶散 治暑毒攻心?血呕血或吐泻作渴香薷【二钱】 厚朴【姜制钱半】 甘草【炙】 麦门冬【去心】 木瓜【不见铁器】 白茅根【各一钱】 枇杷叶 陈皮 丁香【各五分】

右末每服三五钱姜水煎

黄连香薷饮 治伏暑?血便血不拘四时【方见本卷第二论】 小柴胡汤

加味小柴胡汤【二方见二十四卷第二论】

归脾汤

加味逍遥散

八珍汤

加味归脾汤【四方见二十四卷第四论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

妇人吐血方论第六

妇人吐血者由脏腑伤损所致夫气血外行於经络内荣於脏腑若六淫七情饮食起居有所损伤行失常道逆则吐血也

愚按前症若脾经鬱热用犀角地黄汤脾胃伏暑用黄连香薷饮心脾鬱热用生地黄汤心气耗损用茯苓补心汤脾气劳伤用鷄苏散思虑伤脾用归脾汤暴怒肝火用加味小柴胡汤久怒肝伤六味地黄丸脾肺虚热用麦门冬饮肝肾虚热用六味地黄丸气血俱虚用十全大补汤经云肺朝百脉之气肝统诸经之血必用甘温之剂补其阳气使血各归其经如大吐血病母论其脉急用独参汤救之若潮热咳 而脉数者元气虚而假热之脉也皆由脾胃先损须用人参之类本草云人参治脾胃不足补中温中泻脾肺中火东垣先生云脾胃虚者心火亢甚而乘土位脾气受邪须用黄芪最多人参甘草次之脾胃一虚肺气先絶故用黄芪以益皮毛而闭腠理尝治气血虚弱用十全大补最善若用寒凉止血胃气反伤无不致祸

附治验

一老妇每作先饮食不进或胸膈不利或中脘作痛或大便泄泻或小便不利余以爲肝脾之症用逍遥散加山梔茯神远志木香而愈後鬱结吐紫血每作先倦怠烦热以前药加炒黑黄连三分吴茱萸二分顿愈复因怒吐赤血甚多燥渴垂死此血脱也法当补气乃用人参一两苓朮当归各三钱陈皮炮黑乾姜各二钱炙甘草木香各一钱一剂顿止又用加味归脾汤调理而痊

一女子怀抱素鬱胸满食少吐血面赤用六味丸及归脾加山梔贝母芍药而愈

一妇人爲哭母吐血咳嗽发热盗汗经水不行此悲伤肺思伤脾朝服补中益气加桔梗贝母知母夕用归脾汤送六味丸而愈

柔脾汤 治虚热吐血?血汗出

甘草【炒】白芍药【炒】黄芪【各半两】熟地黄【自制一两五钱】

右每服五钱水酒煎 一妇人月经不利忽妄行呕血察其形脉如常用四生丸即安一女子饱食负重而吐血用前汤及青饼子而愈世治吐血并用竹茹地黄藕汁亦不可拘泥如阳乘於阴血得热则流散经水沸溢理宜凉解地黄犀角之类如阴乘於阳所谓天寒地冻水凝成冰须当温散乾姜肉桂之类

四生丸 治阳乘於阴以致吐血?血

生荷叶 生艾叶 生栝叶 生地黄【各等分】

右研丸鷄子大每服一丸水煎服陈日华云先公尝游灵石寺主僧留饭设卓一僧见卓不稳急俯稳之举首即呕血明年到寺问旧呕血者何如主僧言服得四生丸遂愈自得此方屡治有效愚意前症乃内热暴患用之有效若人病久本元不足须补脾以滋化源否则虚火上炎金反受尅获生鲜矣

犀角地黄汤【方见前】

姜草汤 若阴乘於阳寒而呕血

甘草【炒】 乾姜【各一钱】

右水煎服理中汤亦妙

花蕊石散 治瘀血积於内以致大小便不通或血蓄於上而吐不止一妇人苦吐血百药不效童便酒调不数服而愈【方见胎衣不下】

如圣散 治吐血不已每服二钱米饮下【方见十七卷催生中】

附方

济生鷄苏散 治劳伤肺经唾中有血咽?不利鷄苏叶 黄芪【炒】 生地黄 阿胶【炒】 贝母 白茅根【各一钱】 桔梗【炒】 麦门冬【去心】 蒲黄【炒】 甘草【炒各五分】

右姜水煎服

生地黄散 治鬱热?血咯血吐血阴虚而不能愈者枸杞子 柴胡 黄连【炒】 地骨皮 天门冬 白芍药【炒】 甘草【炒】 黄芩【炒】 黄芪【炒】 生地黄 熟地黄【自制各五分】

右水煎下血加地榆

三因茯苓补心汤 治面色黄瘁五心烦热咳嗽吐血半夏 前胡 紫苏 茯苓 人参 枳殼【麸炒】 桔梗【炒】 甘草【炒】 乾葛【各五分】 当归【一钱】 川芎 陈皮 白芍药【各一钱】 熟地黄【自制一钱五分】

右姜枣水煎服

麦门冬饮子 治气虚吐血或气虚不能摄血者五味子【杵十粒】麦门冬【去心】黄芪【炒各一钱】当归身 人参生地黄【各半钱】

右水煎服

十全大补汤 治胃气虚弱吐血?血便血不止以致外症恶寒发热自汗盗汗食少体倦或寒热作渴头疼眩晕而似中风或气血俱虚胸腹脇痛或骨节作痛经候不调或寒热往来发热晡热或五心发热咽乾舌燥或痰嗽喘促胸膈虚痞或呕吐泄泻手足冷热等症

归脾汤

加味逍遥散【三方见二十四卷第四论】

加味小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

独参汤【方见三卷第十一论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

黄连香薷饮

枇杷叶散【二方见本卷前】

妇人痃癖诸气方论第七

妇人痃癖因元气虚弱而邪气积聚盖痃者在腹内近脐左右有筋脉急痛如臂如指如弦之状癖者僻在两肋之间有时而痛皆阴阳不和经络痞隔饮食停滞冷气固结而成也

愚按前症因饮食起居七情失宜亏损脏腑气血乖违阴络受伤循行失度所致罗谦甫先生曰养正邪自除必先调养使荣卫充实若不消散方可议下但除之不以渐则必有颠覆之害若不守禁忌纵嗜慾其有不丧身者鲜矣

附治验

一妇人内热作渴饮食少思腹内初如鷄卵渐大四寸许经水三月一至肢体消瘦齿颊似疮

脉洪数而虚左关尤甚此肝脾鬱结之症外贴阿魏膏午前用补中益气汤午後用加味归脾汤两月许肝火少退脾土少健午前以补中益气下六味丸午後以逍遥散下归脾丸又月余日用芦荟丸二服空心以逍遥散下日晡以归脾汤下喜其谨疾调理年余而愈一妇人腹内一块不时上攻或作痛有声或吞酸痞闷月经不调小便不利二年余矣面色青黄余以爲肝脾气滞以六君加芎归柴胡炒连木香吴茱萸各少许二剂却与归脾汤下芦荟丸三月余肝脾和而诸症退又与调中益气加茯苓丹皮中气健而经自调

一妇人性多鬱善怒勤於女工小腹内结一块或作痛或痞闷月经不调略服伐肝之剂内热寒热胸膈不利饮食不甘形体日瘦牙龈蚀烂此脾土不能生肺金肺金不能生肾水肾水不能生肝木当滋化源用补中益气六味地黄至仲春而愈

松江太守何恭人性善怒腹结一块年余上脘蚀透血气虚极时季冬肝脉洪数按之弦紧或用伐肝木清胃火之药余曰真气虚而邪气实也恐伐肝木至春不能发生耳用八珍汤以生气血用地黄丸以滋肾水肝脉顿退因大怒耳内出血肝脉仍大烦热作渴此无根之火也仍以前药加肉桂二剂脉敛热退复因大怒果卒於季冬辛巳日乃金尅木故也一妇人经候过期发热倦怠或用四物黄连之类反两月一度且少而成块又用峻药通之两目如帛所蔽余曰脾爲诸阴之首目爲血脉之宗此脾伤五脏皆爲失所不能归於目也遂用补中益气济生归脾二汤专主脾胃年余而愈

麝香丸 治疰瘕冷气心腹作痛

麝香【二钱另研】五灵脂【炒】阿魏【五钱麝裹煨令麝熟】桃仁
三棱【各二两醋制】芫花【醋炒】?榔【各一两】莪术【醋制】桂花 没药 木香
当归【各半两】

右爲末饭丸桐子大每服十丸淡醋汤下

治疰瘕神效以獾猪肝一具重十余两用芭豆仁五十枚入肝内用酃醢三碗慢火熬乾研烂量入三棱末丸桐子大每服五丸食前热酒下

罗安人每经行脐腹痛甚以桃仁桂枝汤一剂而瘥【方见第一卷十二论】

治经来腹先痛用局方七气汤送来复丹局方积气丸疰瘕症瘕诸气亦效

附方

芦荟丸

治疰瘕肌肉消瘦发热潮热饮食少思口乾作渴或肝疰食积口鼻生疮牙龈蚀烂等症

芦荟 胡黄连 黄连【炒焦】 木香 白芫荇【炒】 青皮【各五钱】 当归 茯苓 陈皮【各一两五钱】 甘草【炒七钱】

右爲末米糊丸桐子大每服七八十丸米汤下

阿魏膏 治一切痞块更服胡连丸

羌活 独活 玄参 官桂 赤芍药 川山甲 生地黄 两头尖 大黄 白芷 天麻【各五钱】 槐柳桃枝【各三钱】 红花【四钱】 木鼈【十枚去殼】 乱髮【如鷄子一团】

右用香油二斤四两煎黑去粗入髮煎髮化仍去粗徐下黄丹煎软硬得中入芒硝阿魏苏合油乳香没药各五钱麝香三钱调匀即成膏矣摊贴患处内服丸药黄丹须用真正者效凡贴膏药先用朴硝随患处铺半指厚以纸盖用热熨斗熨良久如硝耗再加熨之二时许方贴膏药若是肝积加芦荟末同熨

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

八珍汤

加味归脾汤

归脾汤

逍遥散【四方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

调中益气汤【方见四卷第五论】

妇人疝瘕方论第八

妇人疝瘕之病由饮食不调气血劳伤或胎产经行风冷相抟所致盖疝者痛也瘕者假也脉弦急者生虚弱者死尺脉濡浮牢爲血实气虚腹痛逆气上行此爲胞中有恶血久则结成症也

愚按子和先生云遗溺闭癃阴痿睢痹精滑白淫皆男子之疝也若血涸月事不行行後小腹有块或时动移前阴突出後阴痔核皆女子之疝也但女子不谓之疝而谓之瘕

附治验

一妇人小腹痞胀小便时下白带小水淋漓此肝经湿热下注用龙胆泻肝汤而愈

一妇人小腹胀痛小水不利或胸乳作痛或脇肋作胀或气逆心吻余以爲肝火而血伤脾用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈

一妇人小腹痞闷小便不利内热体倦懒食用八珍汤加柴胡山梔龙胆草治之而安

乾漆散 治疝瘕脇肋疼痛

乾漆【炒令烟尽】木香 芫花【醋炒】赤芍药 桂心 当归 川芎
琥珀【各半两】大黄【二两炒】牛膝【一两】桃仁【去皮尖一】

【两另研】麝香【一钱】

右爲末每服一钱温酒调下

蟠?散 治前症属寒气不散疼痛甚效【方见二十四卷第八论】

附方

宝监蒺藜汤 治阴疝小腹作痛小便不利手足逆冷或脇腹闷痛

蒺藜【去刺】附子【炮】梔子【去皮各半两】

右末每三钱水煎食前温服

丹溪定痛散 治寒疝疼痛速效

枳殼【十五个】山梔子【炒】唐球子 吴茱萸【炒过】荔枝核【炮各等分】

右末用长流水调下一二钱空心服

三因失笑散 治小肠疝气痛或血疝肚腹作痛【方见二十卷第五论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

四物汤【方见二十四卷第六论】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

妇人八瘕方论第九

妇人脏腑调和经脉循环则月水以时故能生子而无病若乘外邪而合阴阳则小腹胸脇腰背相引而痛月事不调阴中肿胀小便淋沥而色黄黑则瘕生矣八瘕者黄青燥血脂狐蛇鼈是也千金外台言之详矣愚按经曰气主嘘之血主濡之若血不流则凝而爲瘕也瘕者中虽硬而忽聚忽散多因六淫七情饮食起居动伤脏腑而成当与瘀癖诸症治同慎不可复伤元气

桃仁煎 治血瘕

桃仁 大黄【炒各一两】?虫【半两炒黑】朴硝【一两】

右爲末以醇醋一鍾石器中煮三分下前三味不住手搅煎至可丸下朴硝丸桐子大不吃晚食五更初温酒下五丸日午下秽物如未见再服仍以调气血药补之予向在毗陵一妇人小便不通脐腹胀甚予诊之曰此血瘕也用前药一服腹痛下血块血水即愈此药猛烈大峻气血虚者斟酌与之

大硝石丸 治七症八瘕当用此药去之不令人困

硝石【三两】大黄【四两】人参【一钱】甘草【八分】

右爲末苦酒一升石器中先入大黄煎膏入余药丸梧子大每服三十丸米饮下三日一服宜下赤物

妇人腹中瘀血方论第十

妇人腹中瘀血者由月经闭积或产後余血未尽或风寒滞瘀久而不消则爲积聚症瘕矣

愚按前症若鬱结伤脾用加味归脾汤若恚怒伤肝用加味逍遥散若产後恶露用失笑散若肝脾亏损用六君柴胡以补元气爲主胃气虚弱用益气汤加茯苓半夏爲主大凡腹中作痛畏手按者此内有瘀血若形体如常属病气元气俱实用桃仁承气汤直下之若痛而肢体倦怠饮食少思此脾胃受伤属病气有余元气不足用当归散调和之若痛而喜手按腹形体倦怠饮食少思此形气病气俱不足用六君炮姜芎归纯补之若痛而大便不实饮食难化此脾肾虚寒用六君炮姜肉果温补之若痛而作呕少食此脾胃虚弱用六君炮姜藿香若痛而呕吐不食泄泻用六君加姜桂若兼手足逆冷自汗更加附子此症多有因攻伐而致者

附治验

一妇人耳下肿赤寒热口苦月经不调小腹内一块此肝火气滞而血凝也用小柴胡加山梔川芎丹皮治之诸症悉退

一妇人久患腹痛去瘀血方止而复大痛诸药不纳予以脾胃之气虚寒用参朮炮姜丸如黍每用数粒津咽下後以二味浓煎渐呷而愈

桃仁丸 治瘀血不利月水不调发热作渴心腹满急或肚腹中作痛

桃仁 大黄【炒各三两】?虫【炒去翅足】水蛭【炒焦各四十枚】

右爲末炼蜜丸桐子大每服五六丸空心热酒下附方

桃仁承气汤 治瘀血小腹急痛大便不利或谵语口乾漱水不咽遍身黄色小便自利或血结胸中手不敢近腹或寒热昏迷其人如狂

桃仁【半两】 大黄【炒一两】 甘草【二钱】 肉桂【一钱】

右姜水煎发日五更服

附方

加味归脾汤 治瘀血已去或脾经失血小腹作痛无寐发热盗汗或脾伤不能摄血或心脾伤痛嗜卧少食或忧思伤脾血虚发热或肢體肿痛大便不调或经候不准晡热内热

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

失笑散【方见二十卷第五论】

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

当归散【方见後卷第五论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

妇人症痞方论第十一

妇人症痞由饮食失节脾胃亏损邪正相搏积于腹中牢固不动故名曰症得冷则作痛冷入

子藏则不孕入胞络则月水不通

愚按前症若脾胃虚弱用六君子加芎归若肝脾虚弱用补中益气及归脾汤若肝火鬱滞佐以芦荟地黄二丸外贴阿魏膏患者须慎七情六淫饮食起居治者不时审察病机而药之庶几有效

附方

穿山甲散 治症痞瘀血心腹作痛

穿山甲【灰炒燥】鼈甲【醋炙】赤芍药
大黄【炒】乾漆【炒令烟尽】桂心【各一两】川芎
芫花【醋炒】当归尾【各半两】麝香【一钱】

右爲末每服一钱酒调下

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

归脾汤【方见二十四卷第四论】

六味地黄丸【方见二十四卷第十二论】

芦荟丸

阿魏膏【二方见本卷第七论】

妇人食症方论第十二

妇人食症由脏腑虚弱经行不忌生冷饮食或劳伤元气所致陈无择云经不行者宜先导之然後固元气爲主

愚按前症若形气虚弱须先调补脾胃爲主而佐以消导若形气充实当先疏导爲主而佐之补脾胃若气壅血滯而不行者宜用乌药散散而行之若脾气虚而血不行者宜用四君芎归补而行之若脾气鬱而血不行者宜用归脾汤解而行之若肝脾血燥而血行者宜用加味逍遥散清而行之大抵食积痞块之症爲有形盖邪气胜则实真气夺则虚当养正辟邪而积自除矣虽然坚者削之客者除之胃气未虚或可少用若病久虚乏者不宜轻用

乌药散【方见後】

妇人积年血症方论第十三

妇人积年血症由寒温失节脾胃虚弱月经不通相结盘牢久则腹脇苦痛宜用三棱煎主之

愚按前症多兼七情亏损五脏气血乖违而致盖气主嘘之血主濡之脾统血肝藏血故鬱结伤脾悲怒伤肝者多患之腹脇作痛正属肝脾二经症也窃谓罗谦甫先生云养正积自除东垣先生云人以胃气爲本治法宜固元气爲主而佐以攻伐之剂当以岁月求之若欲速效投以峻剂反致有误右七症方药当互相参用

附方

三棱煎 治血症血瘕食积痰滞

莪术【醋浸炒】三棱【各三两】青皮【去白】半夏 麦芽【炒各一两】

右用好醋一鍾煮乾焙爲末醋糊丸桐子大每服三四十丸淡醋汤下痰积姜汤下

妇人血气心痛方论第十四

妇人血气心痛由脏腑虚弱风冷所乘盖心爲诸脏之主若心受伤名真心痛朝发夕死夕发旦死若心络伤故痛发乍轻乍甚而成斯症也

愚按前症若寒邪所伤温散之饮食停滞消导之肝火妄动辛平之脾气鬱结和解之仍与後六症方药同用

附治验

一妇人久患心痛饮食少思诸药到口即吐予以爲脾土虚弱用白术一味同黄土炒去土每服一两以米泔煎浓徐服少许数日後自能大饮用三斤余而安

上舍陈履学长子室素怯弱产後患疥疮年余不愈因执丧旬月每欲眩仆一日感气忽患心脾高肿作疼手不可按而呕吐不止六脉微细或见其形实误认诸痛不可补气乃用青皮木香五味吴茱萸等药而愈继复患症且堕胎又投理气行血之药病虽去元气转脱再投参芪补剂不应矣六脉如丝欲絶迎予至诊之曰形虽实而脉虚极反用理气之剂损其真气故也连投参芪归术附子姜桂二剂间用八味丸五日寢食渐甘六脉全复此症若心脾疼痛时即服此等药症亦不作矣

附方

乌药散 治血气壅滞心腹作痛

乌药 莪术【醋浸炒】 桂心 当归 桃仁 青皮 木香【各等分】

右爲末每服二钱热酒调下

灵苑方 用生五灵脂爲末每服一钱沸汤下日三服八味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人血气心腹疼痛方论第十五

妇人血气心腹疼痛由脏腑虚弱风邪乘之真邪相抟随气上下故心腹作痛也

愚按前症若气滞血瘀用没药散劳伤元气用四物汤肝脾鬱结用四七汤怒动肝火用小柴胡汤肝脾血虚用四物汤脾肺气虚用四君子汤中气虚弱用补中益气汤气血俱虚用八珍汤

附治验

一妇人每怒心腹作痛久而不愈此肝火伤脾气也用炒山栀一两生姜五片煎服而痛止更以二陈加山栀桔梗乃不发

一妇人怀抱鬱结不时心腹作痛诸药不应用归脾汤倍加炒山栀而愈

陈湖陆小村母久患心腹疼痛每作必胸满呕吐手足俱冷面赤唇麻咽乾舌燥寒热不时月余竟夕不安其脉洪大衆以痰火治之屡止屡作迨乙巳春发频而甚仍用前药反剧此寒凉损真之故内真寒而外假热也且脉息洪弦而有怪状乃脾气亏损肝木乘之而然当温补胃气遂用补中益气汤加半夏茯苓吴茱萸木香一服熟寐彻晓洪脉顿斂怪脉顿除诸症释然

附方

琥珀散 治气滞心腹撮痛或月经不行小腹疼痛

乌药 莪术【醋浸炒各二两】 当归【一两】

右爲末每服二钱温酒调下

蠲痛散 治血气刺痛

荔枝核【烧存性半两】香附子【一两】

右爲末每服二钱塩酒调下

菖蒲丸 治血积心脾作疼【男六德续添】

九节菖蒲【六两】吴茱萸【炒】香附子【各四两】

右爲末醋调神麴糊丸桐子大每服四五十丸淡姜汤调下

没药散 治血气不行心腹作痛或行注疼痛或月经不调发热晡热并用之

红花 没药 当归 玄胡索【炒各等分】

右爲末每服二钱童便酒调下

木香枳术丸 破滯气消饮食开胃进食消化痰涎

木香 枳实【炒各一两】白术【二两】

右每服五钱姜枣水煎服

木香化滯汤

治脾胃虚弱饮食停滯腹胀作痛或心下痞满不思饮食若忧怒饮食而致者尤宜用之

木香 红花【各三钱】橘皮 当归稍【各二钱】柴胡【四钱】草豆蔻
甘草【炙半两】半夏【一两】枳实【炒二钱】

右每服三五钱姜水煎服

补中益气汤

四君子汤

四物汤【三方见二十四卷第六论】

四七汤【方见十一卷第七论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

八珍汤

归脾汤【二方见二十四卷第四论】

二陈汤【方见二十四卷第五论】

妇人血气小腹疼痛方论第十六

妇人小腹疼痛由胞络受冷搏於血气结於小腹因虚发动故痛也

愚按前症若气寒血结用葳灵仙散气滞血凝用当归散肝经血虚用四物汤加参术柴胡肝经湿热用龙胆泻肝汤肝脾气虚用六君子汤加柴胡芍药肝脾虚寒用六君子汤加柴胡肉桂若兼呕吐加木香四肢逆冷再加炮姜

附治验

通府张孟威云其妹小腹痛服附子理中汤附子服过八十余枚此乃沉寒痼冷之甚不多有者

附方

葳灵仙散 凡冷气滞血小腹疼痛或经行遇怒腹胀痛宜用之

葳灵仙【一两】当归 没药 木香 桂心【各半两】

右爲末每服一钱热酒调

当归散 凡血积小腹疼痛或因气逆月经不行肚腹作痛

当归【炒】赤芍药 刘寄生 没药 枳殼【麸炒】玄胡索【炒各等分】

右爲末每服一钱热酒调下

四物汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

附子理中汤【方见二十一卷第九论】

妇人两脇胀痛方论第十七

妇人两脇胀痛因脏腑虚弱气血不调风冷客於胞络相搏壅塞故也

愚按东垣先生云胸脇作痛口苦舌乾寒热往来发呕发吐四肢满闷淋瀝便难腹中急痛此肝木之妄行也窃谓前症若暴怒伤血用小柴胡芎归山梔气虚用四物参术柴梔若久怒伤气用六君芎归山梔若气血俱虚用六味地黄丸若经行腹痛寒热晡热或月经不调发热痰咳少食嗜卧体痛用八珍柴胡丹皮若脇胀发热口渴唾痰或小便淋瀝颈项结核或盗汗便血诸血失音用六味丸若两脇作胀视物不明或筋脉拘急面色青小腹痛或小便不调用补肝散若槩用香燥之剂反伤清和之气则血无所生诸症作焉丹溪先生云右脇痛用推气散小龙荟丸当归芦荟丸控涎丹抑青丸十枣汤皆病气元气俱实之剂用者审之

附治验

一妇人性急吐血发热两脇胀痛日晡益甚此怒气伤肝气血俱虚也朝用逍遥散倍加炒黑山梔黄栢贝母桔梗麦门冬夕以归脾汤送地黄丸而愈一孀妇内热晡热肢体酸麻不时吐痰或用清气化痰药?间不利白带腹胀用行气散血药胸膈不利肢体时麻此鬱怒伤肝脾而药益甚也予则朝用归脾汤以解脾鬱生脾气夕用加味逍遥散以清肝火生肝血百余剂而愈後因怒饮食日少肢体时麻此乃肝火侮土用补中益气加山梔茯苓半夏而痊又饮食失调兼有怒气肢体麻甚月经如注脉浮洪而数此脾受肝伤不能统血而致崩肝气亏损阴血而脉大继用六君加芎归炮姜而血崩止又用补中益气加炮姜茯苓半夏而元气复更用归脾汤逍遥散调理而康

附方

葳灵仙散 治冷气血滞两脇作痛【方见前】

人参紫荆皮散 治心腹刺痛胸膈饱满不进饮食紫荆皮 苍术
石菖蒲【各一两】香附子【二两】人参【半两】木香【三钱】

右爲末米糊丸桐子大每服三十丸食後姜汤下

左金丸【一名四金丸】治肝火胸脇胀痛或发寒热或头目作痛或大便不实或小便淋秘或小腹疼痛及一切肝火之症

黄连【炒六两】吴茱萸【一两汤煮片时用】

右爲末粥丸白术陈皮汤下

当归龙荟丸 治肝经实火胸脇胀痛或大便秘结小便澀滯凡属肝经实火皆宜用之

当归 龙胆草【炒焦】 梔子仁【炒】 黄连【炒】 黄芩【炒各一两】 大黄【炒】 芦荟
青黛【各五钱】 木香【二钱五分】 麝香【另研五分】

右爲末用神麴糊丸桐子大每服二十丸姜汤下

补肝散 治肝肾二经气血亏损脇胀作痛或脇胀头晕寒热发热或遍身作痛经候不调

当归 山药 五味子【炒杵】 山茱萸肉 黄芪【炒】 川芎
木瓜【各半两】 熟地黄【自制】 白术【炒各一钱】 独活 酸枣仁【炒各四钱】

右爲末每服五钱枣水煎服

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

四物汤

补中益气汤

六君子汤【三方见二十六卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

八珍汤

逍遥散

归脾汤

加味逍遥散【四方见二十四卷第四论】

妇人心腹胀满方论第十八

妇人心腹胀满由心脾虚损邪气乘之此足少阴肾经之脉起於足小指贯肾络膀胱入肝肺
出络於心若邪转三经并结於脾脾虚则心腹胀满矣

愚按前症脾胃虚痞用六君子汤脾胃虚寒者用人参理中汤鬱结气滞者用归脾汤肝侮脾土用六君柴芍脾气壅滞用平胃散肺气壅滞用紫苏饮宿食壅滞用养胃汤脾血虚痞用四物参术【右六症当互相参用仍与六卷第七论同用】

附治验【呕吐心腹痛见七卷第一论】

一妇人胸膈不利饮食少思腹胀吞酸或用疏利之药反致中满不食予以爲脾土虚而肝木胜用补中益气汤加砂仁香附煨姜又以六君子加芎归桔梗而愈

吴江史玄年母久病之後遇事拂意忽胸腹胀满面目微肿两腿重滞气逆上升言语喘促所服皆清气之剂不效予曰此脾肺虚寒也先用六君子汤一剂病势顿减後用补中益气加茯苓半夏乾姜二剂形体顿安後以七情失调夜间腹胀乃以十全大补加木香治之而痊

附方

白术散 治脾胃气滞心腹胀满不欲饮食

白术【炒】草果 诃子 茯苓 榔 桂心【各五分】陈皮
厚朴【姜制】人参【各一钱】甘草【炒三分】

右姜枣水煎服

愚按前方治胸膈气滞饮食内停之良剂若脾血虚痞须用四物参术脾气虚痞须用四君芎归

补遗治心腹胀满予尝独用厚朴姜汁炒每服五钱姜七片水煎温服不拘时候间服沉香降气汤得效此病气元气壅实之治法也

附方

平胃散 治脾气壅滞胸腹不利或饮食不进停滞呕吐

苍术 厚朴【姜制】陈皮【各一钱五分】甘草【炙五分】

右姜枣水煎服

人参养胃汤 治脾气壅滞胸膈不利或饮食壅滞胸腹胀闷或兼外感风寒头痛呕吐等症【方见二十一卷第九论】

四物汤

六君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

人参理中汤【方见二十卷第八论】

十全大补汤

归脾汤【二方见二十四卷第四论】

紫苏饮【方见十二卷第八论】

调中益气汤【方见四卷第九论】

薛氏医案卷三十一

卷三十二

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷三十二

明 薛己 订

妇人良方

妇人小便淋沥不通方论第一

妇人淋沥由肾虚而膀胱热也盖膀胱与肾为表里主於水行於脬者为小便也若肾虚则小便频数膀胱热则小便淋沥甚则不通腹胀喘急当速治之

愚按前症若膀胱热结用五淋散若脾肺虚热用补中益气汤加山药五味麦门若脾经鬱热用加味归脾汤若肺经郁火用黄芩清肺饮若肝经湿热用龙胆泻肝汤血虚用加味逍遥散陰虚用六味丸加柴胡山梔大抵不渴而不利者热在下焦血分也用滋肾丸渴而不利者热在气分也用清肺饮尺脉数而无力者陰火盛而阳不能化也用六味丸滋肾丸为主尺脉浮而无力者阳气虚而陰气弱也用加减八味丸滋肾丸为主

附治验

一妇人素有前患内热体倦余以为肝火血少脾气虚弱用八珍逍遥二散兼服月余而小便利又用八珍汤而气血复

一妇人患前症面青脇胀投之诸药不应予以为此肝经气滯而血伤用山梔川芎煎服数剂而愈一妇人小便不利小腹并水道秘闷或时腹脇胀痛余以为肝火用加味逍遥散加龙胆草四剂稍愈乃去胆草佐以八珍散加炒黑山梔兼服而瘥

石韦汤 治小便实热气滯淋沥

石韦 黄芩【炒】 木通 榆白皮 葵子?麦甘草【各五分】

右姜水煎服

鸡苏散 治血热淋沥

鸡苏叶 木通【各二两】 生地黄 滑石【各三两】 刺蓊根【一两】

右每服半两淡竹叶三七片水煎

桃仁煎 治血瘕小便如淋脐腹胀痛【方见血瘕门第七卷第九论】 火府丹
治心经积热小便澁及五淋【加甘草名导赤散】

生地黄【二两杵膏】 木通【为末】 黄芩【炒各一两】

右加蜜丸桐子大每服三十丸木通煎汤下

许学士云一卒病渴日饮水斗许不食者三月心中烦闷时已十月余谓心经有伏热与火府丹数服越二日来谢云当日三服渴止又三服饮食如故此本治淋用以治渴可谓通变也

一方牛膝一合水煎入麝香少许服之鄞县耿武尉梦得其内患淋下砂石剥剥有声甚为苦楚一服而愈附方

滋肾丸 治热在血分不竭而小便不利或肾虚足热腿膝无力不能履地又下焦陰虚小便不利肚腹肿胀或皮肤胀裂眼睛突出此神剂也

知母【酒炒】 黄栢【酒炒各二两】 肉桂【二钱】

右各另为末水丸桐子大每服二百丸空心百滚汤下

黄芩清肺饮 治肺热小便不利宜用此药清之

黄芩【炒】 山梔【炒各一钱】

右水煎服不利加盐豉二十粒

五淋散 治膀胱有热水道不通淋沥不出或尿如豆汁或成砂石或如膏汁或热沸便血

赤茯苓【一钱五分】 赤芍药 山梔【各一钱】 当归 甘草【各一钱二分】

右入灯心水煎服

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

八珍汤

加味归脾汤

加味逍遥散【三方见二十四卷第四论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

加減八味丸

六味丸【二方见二十四卷第十一论】

妇人脬转小便不利方论第二

妇人脬转或内热传搏於胞或忍小便气逆於内以致小腹急痛不得小便甚者至死

愚按前症不问男女孕妇转筋小便不利命在反掌非八味丸不能救余参前後论主治

附治验

一妇人小便淋澀小腹胀闷胸满喘急诸药不应余视为转筋之症用八味丸一服小便如涌而安一妇人因鬱怒小便滴沥渐至小腹肿胀痰咳喘促余用八味丸料煎服小便即利而痊

一妇人素善怒小便淋沥不利月经不调半载矣或两脇胀闷或小腹作痛或寒热往来或胸乳作痛或咽喉噎塞或两脚筋挛或肢节结核面色青黄不泽形气日瘦左关弦洪右关弦数此鬱怒伤肝脾血虚气滯为患朝用加味归脾汤以补脾气解脾鬱祛肝火夕用滋肾丸生肝散滋肾水以生肝血抑肝火舒筋膜兼服月余而愈

滋肾生肝饮

山药 山茱萸【肉各一钱】 熟地黄【自制二钱】 泽泻
茯苓牡丹皮【各七分】 柴胡【三分】 五味子【杵炒五分】 白术 当归甘草【各三分】

右水煎服

葱白汤 治气滯小便不通腹胀欲死

橘皮【三两】 葵子【一两】 葱白【一茎】

右水煎分三服

八味丸

治脬转小便不通殊有神效但世所不用以致误人多矣【方见二十四卷第十一论】

滑石散 治脬转小便数日不通

滑石【一两】 寒水石【二两】 葵子【一合】

右为末以水一斗煮至五升时服一升即利

又方

乱髮【烧灰】 葵子 车前子【各等分】

右为末每服二钱酒调下

石韦汤 治脬转小便不通【方见前】

治强忍小便致脬转尿不利困笃欲死

滑石【二两】 乱发灰【一两】

右为末每服三钱桃白皮一筋细切熟杵入水三盏绞取汁调服

千金翼用杏仁【二十粒去皮尖】 麝炒黄嚙细水送下立通一方皂角为末吹鼻内取

妇人小便数方论第三

小便乃肾与膀胱主之盖肾气通於陰若二经虚而热乘之则小便澁滯虚则频数也

愚按前症若肝经火动用逍遥散加龙胆草车前子膀胱火动六味丸加麦门五味肝肾湿热龙胆泻肝汤鬱伤肝脾加味逍遥散加味归脾汤肝脾肺气虚补中益气加麦门五味肝经血虚加味逍遥散肾气虚败鹿茸散如不应用八味丸

附治验

一妇人患前症小便频数日晡热甚此肝脾血虚气滯而兼湿热也用加逍遥散加车前子而愈

一妇人患前症发热烦躁面目赤色脉洪大而虚余谓此血虚发躁用当归补血汤数剂而痊

一妇人久患前症泥属於火杂用寒凉止血之剂虚症悉具余曰此脾胃亏损而诸经病也当补中气为主遂以六君子补中二汤兼服两月余寻愈

方药

桑螵蛸散 治肾气虚寒小便数少或时频数或夜间尤数

桑螵蛸【三十枚炒】鹿茸【炙】牡蛎【煨】甘草【炒二两】黄芪【炒】

右为末每服二三钱食前空心用姜汤调下日二服

缩泉丸 治脬气虚寒小便频数或遗尿不止小儿尤效

乌药 益智仁【等分】

右为末酒煎山药末为糊丸桐子大每服七十丸盐酒或米饮下

鹿茸散 治肾气虚寒便溺数甚或夜间频数遗溺鹿茸【炙】桑寄生 当归 乌贼鱼骨 龙骨【煨各二两】白芍药【炒】附子【炮各三钱】桑螵蛸【炙三钱】

右为末每服二钱空心并食前用温酒调下作丸服亦可凡用附子重一两三四钱底平顶平周围有瓣者方是

附方

当归补血汤

八味丸

六味丸

加減八味丸【四方见二十四卷第十一论】

逍遙散

加味逍遙散

加味归脾汤【三方见二十四卷第四论】

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

妇人遗尿失禁方论第四

经云膀胱不利为癃不约为遗溺乃心肾之气失其常度也故有便道澁而遗者有失禁而不知自遗者亦有生产伤膀胱不时而遗者有脬寒臌冷遗而不知者愚按内经曰胞移热於膀胱则癃溺血膀胱不利为癃不约为遗溺注曰膀胱为津液之府水注由之然足三焦脉实约下焦而不通则不得小便足三焦脉虚不约下焦则遗溺也灵枢经曰足三焦者太阳之别也并太阳之正入络膀胱约下焦实则闭癃虚则遗溺窃谓前症若肝肾虚热挺孔痿痹用六味丸如不应用加減八味丸阳气虚惫膀胱积冷用鹿茸丸如不应用八味丸若脾气虚弱不能禁止用补中益气汤加山药山茱五味若肺气虚寒前汤加桂附此症属虚热者多真寒者少治宜审察

附治验

一妇人小便自遗或时不利日晡益甚此肝热陰挺不能约制用六味丸料加白术酒炒黑黄栢七分知母五分数剂诸症悉愈若误用分利之剂愈损真陰必致不起

一老妇患前症恶寒体倦四肢逆冷余以为阳气虚寒用补中益气加附子三剂不应遂以参附汤四剂稍应仍以前药而安附子计用四枚人参三斤许一妇人病愈後小便出屎此陰阳失於传送名大小肠交也先用五苓散二剂而愈又用补中益气汤而安

鹿茸丸 治阳气虚寒小便白浊滑数不禁或脐腹陰冷大便不实

鹿茸【炙】椒红 桂心 附子【炮】牡蛎【煨】补骨脂【炒】石斛
肉苁蓉【酒浸】鸡?胫【炙】沈香【各一两】桑螵蛸【炙三钱】

右为末酒糊丸桐子大每服三十丸空心温酒下

秘元丹 治阳气虚小便不禁或夜多小便频数

白龙骨【煨三两】诃子【十个去核】缩砂【去皮一两】

右为末糯粥丸桐子大每服五十丸空心盐酒下

又方鹿角镑炒为末每服三五钱空心热酒调下又方鸡?胫炙为末每服二三钱空心酒调下日二三服

又方桑螵蛸酒炒为末每服二钱空心姜汤调下

附方

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

六味丸

加减八味丸

八味丸【三方见二十四卷第十一论】

参味汤【方见十九卷第六论】

五苓散【方见二十一卷第九论】

妇人小便出血方论第五

心主於血通行经络循环臟腑若得寒则凝澁得热则妄行失其常道则溢渗於脢则小便出血也

愚按前症肝经血热者加味逍遥散怒气血伤者加味逍遥散调送髮灰若肝经风热用前散送子芩丸气血俱虚者八珍散送髮灰膏粱积热者清胃散加槐花甘草风热伤胃者四君子加防风枳殼胃气不能摄血者补中益气汤郁结伤脾不能摄血者济生归脾汤

附治验

一妇人尿血因怒寒热或头疼或脇胀此肝血虚而肝火盛用加味逍遥散而血胀止补中益气加蔓荆子而头痛痊後郁怒腹痛尿血仍用前散加龙胆草并归脾汤治之将愈又因饮食所伤复作心忡不宁彻夜不寐仍用前汤而痊

一妇人尿血面黄体倦饮食不甘晡热作渴此脾胃气虚不能摄血归经用补中益气以补胃气用归脾汤以解郁结更用加味逍遥散以调养肝血而痊一妇人小便出血服四物蒲黄之类更加发热吐痰加芩连之类又饮食少思虚症蜂起肝脉弦而数脾脉弦而缓此因肝经风

热为沈陰之剂脾伤不能统摄其血发生诸臟而然也余用补中益气汤六味地黄丸而痊

鹿茸散 治劳损尿血发热内热或寒热往来口乾作渴

鹿茸【炙】当归 熟地黄【自制】 葵子【炒】 蒲黄【炒】 续断【酒炒等分】

右为末每服二钱酒调下

髮灰散 治起居所伤小便尿血或忍尿脬转脐下急痛小便不通又治肺疽心?内崩吐血舌上出血用乱髮烧灰【本草云能疗瘀血通关隔利水道破症瘕痈肿狐疝刺痛疰杂疮疗脬转通大小便止?嗽鼻衄】

右每服二钱以米醋汤调服

生地黄散 治血热小便出血

生地黄【二钱】 黄芩【炒五钱】 阿胶【炒】 栝叶【炒各一钱】

右水煎服

当归散 治血分有热小便出血或时尿血

当归 羚羊角【镑】 赤芍药【各半钱】 生地黄 刺藟叶【各一钱】

右水煎服

又方治血分有热用生地黄杵取汁每用一小盞日三服

又方治血分有热小便尿血用炒蒲黄末每服二钱温酒调下滚汤亦可

又方肾虚鹿角胶二两炙黄为末作二服长流水调

附方

八珍散

加味逍遥散

归脾汤【三方见二十四卷第四论】

子芩丸【方见十二卷第六论】

清胃散【方见二十四卷第一论】

四君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

妇人大便不通方论第六

夫大便不通者由臟腑不调寒热之气结於肠胃或经水过多内亡津液宜用三脘散或四物加青皮或七宣丸麻仁丸选而用之

愚按前症或大肠津血乾涸或血虚火铄不可计其日期饮食数多必待腹满胀自欲去而不能者乃用猪胆汁润之若妄服苦寒辛散之剂元气愈伤或通而不止或成中痞之症大抵血虚火燥用加味逍遥散气血俱虚用八珍汤燥药伤血用四物连翘甘草剋伐伤气用四君川芎当归内热作渴饮汤脉实用竹叶黄芩汤内热作渴饮冷脉濇用四物送润肠丸肝胆剋脾土而不能输送用小柴胡加山梔郁李仁肠胃气虚而不能传送用补中益气加芍药厚味积热而秘结用清胃散加芍药其有热燥风燥阳结陰结皆不宜损中气治者审之

附治验

一妇人痰喘内热大便不通两月不寐脉洪大重按微细此属肝脾肾亏损朝用六味丸夕用逍遥散各三十余剂计所进饮食百余碗腹始痞闷正前所谓血虚火铄也以猪胆汁导而通之用十全大补汤调理而安

通神散 治大便实热不通其证心腹胀痛手不得近心胸烦闷而欲饮食者

大黄【炒】芒硝 槟榔 桃仁【杵】郁李仁【汤浸去皮微炒各一两】

右为末每服二钱粥饮调

大麻仁丸

治肠胃风结大便常秘而欲饮食者大麻仁【别研如膏】大黄【炒各二两】?榔 木香 枳殼【麯炒各一两】

右为末入麻仁炼蜜丸桐子大每服二十丸温水下

皂角丸 治大肠经有风大便秘结而不坚实者

皂角【炙去子】枳殼【麸炒等分】

右为末炼蜜丸桐子大每服七十丸空心米饮下

苏麻粥顺气滑肠用紫苏子麻子仁水研取汁煮粥食之

润肠丸 治伏火风热大肠乾燥若因失血或因肾虚当滋肾水最忌此丸

麻子仁 桃仁【去皮尖另研各一两】羌活 当归尾 大黄【煨】 皂角仁 秦艽【各五钱】

右另研为末炼蜜丸每服五十丸空心白汤送下如直肠乾澁用猪胆汁导之亦忌前药

附方

加味逍遥散

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

补中益气汤

四物汤

四君子汤【三方见二十四卷第六论】

竹叶石膏汤【方见十三卷第十论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

清胃散【方见二十四卷第一论】

疮科竹叶黄芩汤【方见二十四卷第四论】

妇人老弱风人便秘戒用利药方论第七

初虞世云肺主气肺气不降则大肠不能传送宜用杏仁枳殼诃子等药若老弱风人津液短少大便秘澁用胡麻杏仁麻仁阿胶皂角之类每见用駮利之药大便虽通精血复伤反致他病一男子病风淫末疾或用駮药利之患肺痿咯脓血至大便不通而死惜哉

愚按前症若胃强脾弱津液不得四布但输膀胱小便数而大便难者用脾约丸若陰血枯槁

内火燔灼脾肺失传大便秘而小便数者用润肠丸此丸若用之於热甚气实与西北稟厚者无有不效若用於东南及虚热而气血不足者则脾愈弱而肠愈燥反致虚痞矣此东垣先生之治法也其搜风顺气丸中贵及西北人用之多效东南人用之无不致害

附治验

一老妇大便欲去而难去又不坚实腹内或如故或作胀两关尺脉浮大余以为肠胃气血虚弱每服十全大补汤加肉苁蓉去後始快若间二三日不服腹内仍胀大便仍难

搜风顺气丸 治痔漏肠风风热闭结元气充实者车前子【一两五钱】大麻子【微炒】大黄【五钱半生半熟】牛膝【酒浸】郁李仁【汤泡】兔丝子【酒浸蒸杵晒为末】枳壳【麸炒】山药【各二钱】

右为末炼蜜丸桐子大每服三十丸空心白汤送下

子和脾约丸

麻仁【一两二钱半】枳壳【麸炒】厚朴【姜制】芍药【各一两】大黄【四两蒸】杏仁【去皮尖炒一两二钱】

右为末入杏仁膏炼蜜丸梧子大每服三二十丸空心用滚汤送下内杏仁研烂

妇人泄痢秘结方论第八

经云春伤於风夏必飧泄盖木刑土也土不能渗泄则木气胜故津液燥而秘不可专以风治张氏母年七十患痢频数腰脚拘挛百方不愈用蒺藜酸枣仁治之即愈黄鲁直苦秘结亦用前药而愈故受症有不同也愚按前症若因足三阴亏损发热作渴胸膈不利饮食善消面带阳色脉洪而虚肢体倦怠者用补中益气汤六味地黄丸脾肺气虚补中益气汤脾经郁结用加味归脾汤气血俱虚者八珍加肉苁蓉肾经津液不足者六味地黄丸胃火消铄津液竹叶黄芪汤肝木侮土小柴胡加山梔郁李仁枳壳膏粱积热清胃散加山梔郁李仁枳壳若燥在直肠用猪胆导之附治验

一老妇大便月余不通痰喘内热不得就枕脉洪大重按微细朝用六味丸夕用逍遥散各五十剂计进饮食百余碗小腹始闷此火燥而消铄也以猪胆汁润之用十全大补而安後仍不通用八珍倍加苁蓉常服而通

治风人大便秘

皂荚子【三百粒破作两片慢火炒燥入酥一枣大又炒燥又入酥至焦黑为度】

右为末蜜丸桐子大每服三十丸煎蒺藜酸枣仁汤空心下良久未利再服渐加至百丸以通为度

蒺藜汤用蒺藜炒杵去刺三两酸枣仁炒香一两每用五钱水一盞煎七分去滓送下前丸

大五柔丸 治臟气不调大便难利或为秘结坚硬大黄【饭上蒸焙末】枳殼【去穰面炒】白芍药【末】葶苈【炒为末】牛脂【熬油】苁蓉【酒浸焙各一两】桃仁【百枚去皮尖研】杏仁【四十枚去皮尖麩炒黄别杵】

右和匀炼蜜丸桐子大米饮下三十丸日三服以和为度

二仁丸 安康郡太守苦风秘予处此方用之甚效杏仁【去皮尖麩炒黄】麻仁【别研】枳殼【去穰麩炒为末】诃子【炒去核为末】

右用炼蜜丸桐子大每服二三十丸温水下未利增之

蜜兑法用好蜜四五两石器中微火熬不住手搅候可丸以蛤粉涂手捏如指长三寸许入大孔内以手掩良久即通未通再作文潞公泄利求速效用石脂龙骨等药便秘累日甚苦余告曰此燥粪在直肠药所不及请以蜜导之下结粪四五十枚而愈

通气散 治虚人忧怒以致伤肺与大肠不能传送

陈皮 苏叶 枳殼【麩炒】木通【各一钱】

右水煎服

皂角丸苏麻粥亦佳【见前】

附方

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

加味归脾汤

八珍汤

逍遥散

加味逍遥散

十全大补汤【五方见二十四卷第四论】

竹叶黄芩汤【方见二十四卷第四论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

清胃散【方见二十四卷首论】

妇人泄泻方论第九

论曰泄泻之症因肠胃虚冷而邪气乘之经云春伤於风夏必飧泄盖风伤肝肝木旺而尅脾土属外因也若七情不平脏气受伤属内因也若饮食生冷伤脾属不内外因也大法寒者温之热者凉之滑者澀之湿者燥之

愚按前症若生冷所伤用六君木香砂仁辛热所伤用二陈炒连山梔面食所伤用六君神麴米食所伤用六君谷蘖饮食不时而伤用四君子汤饮食过多而伤用六君子汤饮食停滞人参养胃汤脾气虚弱者六君升麻柴胡脾气虚寒六君木香炮姜肝木乘脾者六君柴胡芍药肝火尅脾者六君芍药山梔中气虚而下陷者补中益气汤鬱结伤脾者济生归脾汤肾气虚者五味子散脾虚者二神丸脾肾虚者四神丸命门火衰者八味丸真阳虚败者固真丸仍与滞下方参用

附治验

侍御沈东江之内停食腹痛作泻以六君加木香炮姜而愈後复作传为肾泄用四神丸而安侍御徐南湖子室泻属肾经不信余言专主渗泄以致不起一妇人年踰五十不食夜饭五更作泻二十年矣後患痢午前用香连丸午後用二神丸各二服而痢止又以二神丸数服而食夜饭不月而形体如故吴江史玄年母素有血疾殆将二纪平居泄泻饮食少思面黄中满夏月尤甚治血之药无虑数百剂未尝少减余以为脾肾虚损用补中益气汤送二神丸复用十全大补汤煎送前丸食进便实病势顿退若泥中满忌参术痰痞忌熟地便泄忌当归皆致误事

桂香丸 治虚寒滑泄腹痛或呕吐不食手足逆冷附子【炮】肉苳?【炮】丁香 桂心 白茯苓【各一两】木香【炮】白乾姜【炮各两半】

右为末米糊丸桐子大每服五十丸空心米饮下

胃苓散 治脾胃所伤吐泻不止水谷不分即五苓散合平胃散

右每服五七钱用姜枣水煎空心服仍节饮食

木香散 治臟腑虚寒下泄米谷口舌生疮或呕吐不食

木香【煨】破故纸【炒各一两】良姜
缩砂【炒】厚朴【制各三钱】赤芍药【炒】橘红 桂心 白术【各半两】胡椒
吴茱萸【泡各一钱】肉荳蔻【煨】槟榔【一个】

右为末每服三钱用猪肝四两批薄以药掺拌量入水醋盐葱姜煮乾空心顿食或丸桐子大每服百丸粥饮下日三服 府博赵宜人患泄泻诸药无效诊之曰此肝肾虚也服前散而愈经曰泄痢前後不止肾虚也又曰诸厥固泄皆属於下下谓下焦肝肾之气也门户束要肝之气也肝气厥而上行故下焦不能禁固而泄痢肾为胃关门户不要故仓廩不藏也

香连丸 治痢疾并水泻暑泻腹痛不问赤白神効

黄连【淨二十两】吴茱萸【去枝梗十两】

右先将二味用热水拌和入磁器内置热汤顿一日同炒至黄连紫黄色去茱萸用连为末每末四两入木香末一两淡醋米饮为丸桐子大每服二三十丸滚汤下久痢中气下陷者用补中益气下中气虚者用四君子下中气虚寒者加姜桂

三黄丸 治热痢腹痛或口舌生疮咽喉齿痛及一切实火之症

黄芩 黄连 黄柏【各炒等分】

右各另为末水糊丸桐子大每服七八十丸白汤下

芍药汤

治热痢便血後重经日澁而便脓血此气行而血止也行血则便自愈调气则後重自除

芍药【炒一两】当归 黄连【炒各半两】槟榔 木香
甘草【炙各二钱】桂【二钱五分】黄芩【炒五钱】

右每服半两水煎如不减加大黄此症多有因中气虚弱脾气郁结者治当审察

二神丸【加五味二两吴茱萸四两名四神凡】治脾肾虚弱侵晨五更作泻或全不思食或食而不化大便不实神効

破故纸【四两炒】肉荳蔻【二两生用】

右为末用大红枣四十九枚生姜四两切碎同枣用水煮熟去姜取枣肉和药丸桐子大每服五十丸空心盐汤下

五味子散 治肾经虚弱大便不实或夜间或五更泄漏

五味子【炒二两】吴茱萸【半两】

右为末每服二钱空心米饮调下其效如神米糊为丸亦可

白术芍药汤 治脾经受湿水泄注下体重腹满形体倦怠不欲饮食或暴泄无数水谷不化

白术【炒】芍药【炒各二钱】甘草【炒一钱半】

右水煎服

茯苓汤 治湿热泄泻或饮食伤泻

白术【炒】茯苓【各五钱】

右用水煎食前服一方有芍药等分名白术散

渗湿汤 治寒湿所伤身重腰冷如坐水中或小便秘澁大便溏泄此症多因坐卧湿地或陰雨所袭而致苍术

白术【炒】甘草【炒各一两】乾姜【炮】茯苓【各二两】陈皮丁香【各二钱半】

右每服四五钱枣水煎

防风芍药汤 治飧泄身热脉弦腹痛及头痛

防风芍药【炒】黄芩【炒各二钱】

右用水煎服

六君子汤

四君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

人参养胃汤【方见七卷第十八论】

十全大补汤

济生归脾汤【二方见二十四卷第四论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

东垣补真丸【方见七卷第七论】

妇人脇热下痢方论第十

论曰下利赤黄米谷不化作渴呕逆小便不利心胸烦躁脉虚大而数此胃经虚热津液不分并於大肠所致先用五苓散次用玉粉丹四味阿胶丸主之

愚按前症若胃气虚弱用补中益气汤肝木侮脾土用六君子汤郁结伤脾土用归脾汤命门火衰用八味地黄丸余参各论主之

附治验

一妇人五月间患痢日夜无度小腹坠痛发热恶寒余以为脾气虚弱用六君子汤送香连丸二服渐愈仍以前汤送四神丸四服全愈至七月终怠惰嗜卧四肢不收体重节痛口舌乾燥饮食无味大便不实小便频数洒淅恶寒凄惨不乐此肺之脾胃虚而阳气不伸也用升阳益胃汤而痊

玉粉丹

蛤粉 硫黄【等分】

右为末米糊丸桐子大每服五十丸用米饮下

四味阿胶丸

黄连【炒】 赤茯苓【二两】 芍药【炒三两】 阿胶【炒燥一两】

右为末以醋丸桐子大每服三十丸食前米饮下附方

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

归脾汤【方见二十四卷第四论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人滞下方论第十一

经云春伤於风夏生飧泄盖风喜伤肝然春时肝木反克脾土以致滞下赤白里急後重先服神术散次用五苓散之类烦渴腹痛小便赤澀脉洪数为热用白头翁汤之类脉虚弱为伏暑用香薷散之类如风邪下血用胃风汤腹痛呕逆手足俱冷六脉微细为臟腑虚寒急服四顺附子汤灸气海丹田二穴久痢肠滑用理中汤加肉果诃子或十全大补加木香肉果之属若一方一郡所患相类者乃属疫症

愚按东垣云太陰经受湿水泻变脓血脾传於肾者谓之贼邪难愈先痢而後泻者谓之微邪易痊若厥陰经下痢脉沈迟手足厥逆用麻黄小续命汤汗之若身冷自汗小便自利脉微呕吐用浆水散温之若脉疾身动下迫声响用白术芍药汤脉沈身静饮食不入用姜附汤身体沉重四肢不举用术附汤窃谓前症若饮食停滯用六君子汤以补脾胃消饮食若胃气下流用补中益气汤以补脾胃升元气若风伤肠胃宜用神术散以补脾胃解外邪若痰积中焦宜用六神丸以补脾胃化痰滯大凡脾胃虚弱宜补中气调饮食

附治验

一老妇食後因怒患痢里急後重肛门脱下此脾气下陷用大剂六君加附子肉?煨木香各一钱吴茱五分骨脂五味各一钱五分二剂诸症悉退惟小腹胀闷此肝气滯於脾也与调中益气加附子木香五分四剂而愈後口内觉鹹此肾虚水泛与六味地黄丸二剂顿愈又以饮食失宜大便不实四肢逆冷此脾胃复伤与六君加附子五分八味丸而愈

先太宜人仲夏患痢腹痛去後无度烦渴饮汤手按腹痛稍止脉鼓指而有力此真气虚而邪气实也急用人参五钱白术茯苓各三钱陈皮炙草附子升麻各一钱服之即睡觉而索食脉症顿退再剂而安此取症不取脉也其时同患是症服痢药者俱致不起惜哉

神术散 治春伤於风夏生飧泄或伤风头痛项背拘急鼻流清涕

苍术【炒二钱】藁本 川芎【各一钱】羌活 粉草【炒一钱五分】细辛【五分】

右用姜水煎服欲发汗加葱头

四顺附子汤

生附子【去皮脐】白乾姜【炮】甘草【炒】人参【各一两】

右每服四五钱水煎吐泻腹痛加肉桂半两小便不利加茯苓半两若体寒自汗手足逆冷六脉虚弱背寒面垢或面如涂油齿乾烦闷躁渴引饮此为伏暑宜用小柴胡汤五苓散酒蒸黄连丸

加减参附汤 治寒痢阳气脱陷呕吐不食手足俱冷

大附子【炮】大人参【各二钱】丁香【十五粒】

右用姜十片米一撮水一钟煎服如不应再加之

治禁口痢甚妙石莲肉为末每服二钱陈米饮调下又方乾山药半生半炒黄为末不拘时陈米饮调下

附方

胃风汤 治风冷乘虚客於肠胃以致水谷不化泄泻注下或肠胃湿毒下如豆汁或下瘀血

人参 白茯苓 芎藭 肉桂 当归 白芍药【炒】白术【炒各等分】

右每服三二钱入粟米数粒水煎空心食前热服

水煮木香丸 治久痢里急後重日夜无度其效如神罌粟殼【去穰三两】青皮【去白二两四钱】甘草【炒各二两四钱】诃子【炮去核八两】当归 木香【各六两】

右为末炼蜜丸弹子大每服一丸水煎化空心服

戊巳丸 治胃经受热泄痢不止或饮食不入腹痛不止

黄连【炒】吴茱萸【去梗炒】白芍药【各五两】

右为末面糊丸桐子大每服三十丸米饮食前下

真人养脏汤 治下痢赤白里急後重腹痛脱肛罌粟殼【蜜炙三两六钱】人参【六钱】白术【六钱】肉桂【八钱】诃子皮【一两二钱】当归【六钱】木香【煨二两四钱】肉豆蔻【面煨半两】白芍药【炒一两半】甘草【炒一两八钱】

右每服四钱用水煎臟寒加附子一两

升阳除湿防风汤如大便闭塞或里急後重数至圉而不能便或有白脓或兼下血此郁结而不通也以此汤举其阳则陰气自降矣慎勿利之

苍术【米泔浸四钱】防风【二钱】白术【炒】白茯苓白芍药【炒各一钱】

先将苍术用水一鍾半煎至一鍾内诸药同煎至八分食前热服夫饮食入胃其气上升输心肺然後下降若脾胃有伤不能上升下流肾肝而成泄利法宜升补中气不可疏下此东垣发前人所未论也

调中益气汤夫脉弦洪缓而沈按之中下不得一澁其证四肢满闭肢节烦疼难以屈伸身体沈重烦心不安忽肥忽瘦四肢懒倦口失滋味大小便清利而数或上饮下便或大便澁滯夏月飧泄或便後见血或下白脓胸满短气咽膈不通嗜睡无力饮食少思【方见四卷第五论】

麻黄续命汤

防风杏仁【去皮尖各二两】麻黄【去节二两】人参
黄芩【炒】甘草【炙】芍药【炒】防已肉桂【各一两】附子【炮去皮脐五钱】

右每服半两用姜水煎

白术芍药汤治太陰脾经受湿水泄注下体重微满困弱无力不欲饮食或暴泄无数水谷不化宜此汤和之

白术【炒】芍药【炒各一两】甘草【炒五钱】

右每服一两水煎

浆水散治暴利如水周身汗出一身尽冷脉微而弱气短难言甚者吐血此为恶病急用此药缓则不救半夏【一两炮洗】附子【半两炮】乾姜【一作乾生姜】肉桂
甘草【炙各五钱】良姜【二钱五分】

右为末每服三五钱浆水煎和滓热服不应加之

姜附汤治霍乱转筋手足厥冷或吐逆身冷脉微急用此药救之

乾姜【一两】附子【一个生用】

右每服半两水煎

术附汤 治下痢脾气脱陷肢体不动汗出身冷气短喘急或呕吐不食等症须急用之

白术 生附子【须用好者】

右为末每服五钱姜枣水煎和粗服如不应倍用之

六神丸 治食积赤白痢疾或腹痛不食或久而不止神麴【为糊】 麦芽【炒】 茯苓 枳壳【麸炒】 木香 黄连【炒赤各等分】

右为末用神麴糊丸桐子大每服五十丸白汤送下

香连丸

六君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

五苓散【方见二十一卷第十论】

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

妇人痢後呕哕方论第十二

滯下咳逆呕逆古人谓之哕此胃气虚寒之危症也用橘皮乾姜汤半夏生姜汤丁香柿蒂汤热证欬逆用小柴胡汤橘皮竹茹汤尝治一痢欬逆脉沈弱投退陰散两服而愈又一痢後咳逆灸期门穴三壮而愈【其穴在第六卷】愚按东垣云如泄痢而呕者胃气不和也上焦不和用生姜橘皮汤中焦不和用芎归桂苓下焦不和而寒治以轻剂热甚而治以重剂亦有胃火上冲而呕者有积滯而呕者有陰虚而呕者丹溪云下痢吃逆自下冲上属火之象古方悉以胃弱言之殊不知胃弱者脾陰弱也故久病变之乃胃弱脾寒之危症用半夏一两生姜半两或理中汤加枳壳茯苓半夏不效更加丁香柿蒂各十枚胃热咳逆用橘皮竹茹汤别病忽然而致半夏茯苓汤加枳实半夏木香调气散最佳

附治验

一妇人痢後呕哕服降火化痰等剂愈甚脉洪大按之虚细作渴饮汤诸药到口即呕余以为脾胃虚寒不能司纳以参术炮姜末各一钱以饭作丸米饮不时过三五粒至三两许闻药不呕乃以六君加炮姜三十余剂而安

一妇人患前症饭食少思胸腹膨胀大便不实所见之症悉属虚寒假热遂朝用补中益气汤加炮姜木香夕用六君子送四神丸渐愈又用八味丸料煎送四神丸而痊

一妇人因怒呕哕时或昏愦口噤或时举体肉动其面色或青或赤余以为肝火炽盛脾土受侮用小柴胡汤加山梔钩藤治之渐愈又用加味归脾逍遥二药调理而痊

橘皮乾姜汤 治胃寒呕哕不食或吐痰腹痛兼泻橘皮 通草 乾姜【炒】 桂心 甘草【炒一钱】 人参【各一钱】

右水煎服

橘皮竹茹汤 治哕逆

橘皮【二钱】 竹茹 甘草【炒】 人参 半夏【各一钱】

右姜枣水煎

猪苓汤 治咳而呕渴心烦不得眠

猪苓 赤茯苓 泽泻 阿胶【炒】 滑石【各一钱】

右水煎服

半夏汤 治哕欲死

半夏【一两】 生姜【切二两】

右水煎为二服

丁香柿蒂汤 治欬逆

丁香【十粒】 柿蒂【十五个】

右水煎热服

生姜橘皮汤 治呕哕手足厥冷

橘皮【一钱】 生姜【四钱】

右水煎服

退陰散 治陰毒伤寒手足逆冷或逆咳不止脉沈细头痛腰重急进三服若伤冷每服一字入正元散内同煎入盐一捻

乾姜【炮】川乌【炒黄等分】

右每服一钱盐一捻水煎

仓廩汤 治痢疾心烦手足温头痛此热毒上冲宜用此汤即败毒散每服四五钱入陈仓米百粒姜五片枣一枚煎若脉微弱或胸腹虚胀手足厥冷或因服罌粟乌梅过多以致作呕者宜用山药半生半炒为末米饮调下日二三服

附方

木香调气散 治气滞呕吐或胸膈不利心服刺痛饮食不思

木香 白豆蔻 丁香 檀香【各二两】藿香 甘草【炒各六两】砂仁【四两】

右为末每服二钱白汤调服

半夏茯苓汤【方见十二卷第三论】

补中益气汤

竹叶石膏汤

六君子汤【三方见二十四卷第六论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

妇人大便下血方论第十三

妇人臟腑损伤风邪所入以致大便下血或如豆汁或腹中作痛若粪後下血其来远粪前下血其来近远近者言病在上下也若面无血色时寒时热脉浮弱按之如丝者是前症也

愚按前症或饮食起居或六淫七情失宜以致元气亏损阳络外伤若膏粱积热加味清胃散怒气伤肝六君柴芍芎归郁结伤脾加味归脾汤脾气虚弱六君子汤思虑伤心妙香散大肠风热四物侧柏荆防枳殼大肠血热四物丹皮柴胡中气下陷补中益气茯苓半夏心脾不能

摄血必补脾肺之源举下陷之气

附治验

一妇人下血不已面色痿黄四肢畏冷此中气下陷用补中益气汤送四神丸数服而愈

张淑人下血烦躁作渴大便重坠後去稍缓用二黄汤加大黄至四两方应後用三黄汤又二十余剂而愈此等元气百中一二韩地官之内脾胃素弱因饮食停滞服剋伐之剂自汗身冷气短喘急腹痛便血或用诸补剂皆不应余用人参炮附子各五钱二剂稍应却用六君子每剂加炮附子三钱四剂渐安又用前汤每加附子一钱数剂乃瘥

一妇人因怒胸痞饮食少思服消导利气之药痰喘胸满大便下血余用补中益气加茯苓半夏炮姜四剂诸症顿愈又用八珍加柴胡炒梔全愈

一妇人瘀血腹痛便血见前

加减四物汤 治肠风下血

侧柏叶【炒】 荆芥 槐花【炒】 甘草【炒各五分】 枳壳【麸炒】 生地黄 当归 川芎【各一钱】

右姜水煎

肠风黑神散 治肠风下血腹疼後重或肛门脱出

败棕【烧】 木馒头【烧】 乌梅【去核】 粉草【炙各一钱】

右水煎服

愚按前二症若病久中气虚弱者必用培补脾胃为主

地榆汤陰结便血【骆龙吉方】

地榆【四两】 甘草【炒一两半】 缩砂仁【四十七粒】

右每服三钱水煎

防风如神散 治风热气滞粪後下血

防风 枳殼【麩炒各等分】

右每服三钱水煎

愚按前二症若胃气虚不能统血而下用四君中气下陷用补中益气汤脾气郁结用归脾汤
气血虚弱用八珍汤气血虚寒用十全大补汤

治久下血成片用头髮烧灰每服一二钱水调下妙香散治心气下血温酒调下

附方

加味清胃散【方见二十四卷第六论】

四君子汤

六君子汤

四物汤

补中益气汤【四方见二十四卷第六论】

八珍汤

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

二神丸

四神丸

三黄丸【三方见前第八论】

妇人痔瘻方论第十四

妇人痔瘻因郁怒风热厚味膏粱所致其名有五肛边如乳出脓者为牝痔肿胀出血者为牡
痔痒痛者为脉痔肿核者为肠痔登廨出血者为血痔治宜审之愚按前症妇人多因胎产经
行饮食起居六淫七情失调所致男子多因醉饱入房筋脉横解精气脱泄热毒乘虚而患或
入房强固其精木乘火势而侮金或炙煖厚味陰虚湿热宜凉血润燥疏风溃後当养元气补
陰精不愈即成痔漏有串臀串陰穿肠者其肠头肿块者湿热也作痛者风也便燥者火也溃
脓者热胜血也大便秘结者润燥除湿肛门坠痛者泻火导湿小便澹滯者清肝导湿经云因

而饱食筋脉横解肠澼为痔症属肝肾不足故用加味地黄及六味丸有效慎勿敷毒药及服寒凉之剂

鼈甲散 治五种痔漏脓血淋漓或肿痛坚硬下坠鼈甲 露蜂房 蛇蛻 蝟皮 猪後悬蹄【五味烧成性各二钱】麝香【一分】

右为末每服一钱空心生地黄酒煎汤调下更傳之

又方热痛用寒水石朴硝为末以津调搽

附方

六味丸【方见二十四卷第十一论】

加味地黄丸【方见二十四卷第六论】

妇人脱肛方论第十五

夫脱肛者大肠之候也大肠虚寒其气下陷则肛门翻出或因产努力其肛亦然也

愚按前症若大肠湿热用升阳除湿汤若血热用四物条芩槐花血虚用四物白术茯苓兼痔痛用四物槐花黄连升麻中风虚弱用补中益气芍药白术中气虚寒加半夏炮姜五味肾虚用六味丸虚寒用八味丸夫肺与大肠为表里肛者大肠之门肺实热则秘结肺虚寒则脱出肾主大便故肺肾虚者多有此症

附治验

一妇人脱肛用补中益气加味归脾各百余剂而愈後因分娩复脱仍以前药各二百余剂始愈

姚和衆以铁粉传之良【圣惠方亦治陰脱陰肿】

集验方以生铁三斤水一?煮至五升取水洗日二次孙真人用虾蟆皮瓶中烧烟熏功效玄微

一方用五倍子煎汤洗以赤石脂末掺上托入或脱长者以两床相并中空尺许以磁瓶盛汤令病人仰卧浸瓶中逐日易之收尽为度

附方

升阳除湿汤 自下而上者引而竭之

升麻 柴胡 防风 神麴【炒】 泽泻 猪苓【各半两】 苍术【一两】 陈皮
甘草【炙】 大麦蘖【各三钱】

右每服五钱水煎空心服胃寒肠鸣加益智仁半夏各半钱姜枣同煎

四物汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

妇人陰肿方论第十六

妇人陰肿因胞络素虚风邪客之乘於陰部血气相搏故也

愚按前症若气血虚弱用补中益气汤举而补之肝经湿热用龙胆泻肝汤渗而清之若陰肿
陰痒陰冷陰挺当与後论互相参看

附治验

一妇人陰中肿闷小便涩滯两脇作肿内热晡热月经不调时或寒热此因肝脾郁怒元气下
陷湿热壅滯朝用归脾汤加柴胡升麻解郁结补脾气升元气夕用加味逍遥散清肝火生肝
血除湿热各数剂诸症悉愈又用四君芎归丹皮调补肝脾而经水如期

菖蒲散治月水涩滯陰间肿痛

菖蒲 当归【各一两炒】 秦艽【二两】

右每服五钱入葱白水煎

白矾散 治陰肿坚痛

白矾【半两】 甘草【半钱】 大黄【一两】

右为末水和用枣大绵裹内陰中日两换以愈为度附方

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第四论】

妇人陰痒方论第十七

妇人陰痒为三虫在肠胃之间因臟虚而蚀陰中微则为痒甚则为痛也

愚按前症属肝经所化当用龙胆泻肝汤逍遥散以主其内外以桃仁研膏和雄黄末或鸡肝纳陰中以制其虫

附治验

一妇人胸膈不利内热作渴饮食不甘肢体倦怠陰中闷痒小便赤澀此郁怒伤肝脾所致用归脾汤加山梔而愈复因怒患处并小腹胀痛用小柴胡加山梔芍药痛止用逍遥散加山梔而愈又因劳役患处肿胀小便仍澀用补中益气加山梔茯苓丹皮而痊

一妇人陰内痛痒不时出水食少体倦此肝脾气虚湿热下注用归脾汤加丹皮山梔芍药柴胡生草主之而安

一妇人陰内痒痛内热倦怠饮食少思此肝脾郁怒元气亏损湿热所致用参芪归术陈皮柴胡炒梔车前升麻芍药丹皮茯苓而瘥若陰中有虫痒痛亦属肝木以桃仁雄黄研纳陰中以杀之仍用清肝解热之药有以鸡肝纳之者乃取虫之法也

一方捣新桃叶绵裹纳陰中日三两易

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

逍遥散【方见二十四卷第四论】

妇人陰冷方论第十八

妇人陰冷因劳伤子臟风冷客之用五加皮乾姜丹参蛇床子熟地黄杜仲各三两鍾乳粉四两天门冬一两地骨皮二两酒十五升渍二宿每服一盞空心食前饮之

愚按前症属肝经内有湿热外乘风冷所致若小便澀滯或小腹痞痛用龙胆泻肝汤若内热寒热或经候不调用加味逍遥散若寒热体倦饮食少思用加味四君子若郁怒发热少寐懒食用加味归脾汤附治验

一妇人陰中寒冷小便黄涩内热寒热口苦脇胀此因肝经湿热用龙胆汤祛利湿热用加味逍遥散调补血气而安

一妇人所患同前更寒热呕吐两股肿痛先用小柴胡加山梔一剂寒热呕吐顿止次用龙胆泻肝汤一剂肿痛顿消

一妇人陰中寒冷小便澄清腹中亦冷饮食少思大便不实下元虚寒治以八味丸月余饮食渐加大便渐实又月余诸症悉愈

八味丸 治血弱不能荣养臟腑津液枯涩风寒客於子臟以致陰冷

愚按此丸果系肝脾肾虚殊有神效

附方

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

加味四君子汤【方见二十四卷第六论】

妇人陰挺下脱方论第十九

妇人陰挺下脱或因胞络伤损或因子臟虚冷或因分娩用力所致

愚按前症当升补元气为主若肝脾郁结气虚下陷用补中益气汤若肝火湿热小便清滞用龙胆泻肝汤

附治验

一妇人陰中突出如菌四围肿痛小便频数内热晡热似痒似痛小便重坠此肝脾鬱结盖肝火湿热而肿痛脾虚下陷而重坠也先以补中益气加山梔茯苓车前子青皮以清肝火升脾气更以加味归脾汤调理脾胃外以生猪脂和藜芦末涂之而收

一妇人陰中挺出五寸许闷痛重坠水出淋?小便濇涩夕与龙胆泻肝汤分利湿热朝与补中

益气汤升补脾气诸症渐愈再与归脾汤加山梔茯苓川芎黄柏间服调理而愈後因劳役或怒气下部湿痒小水不利仍用前药即愈

又方治前症用麻子仁研涂顶中自吸入即洗去

附方

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

归脾汤

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

妇人陰中生疮方论第二十

窃谓前症乃七情郁火伤损肝脾湿热下注其外症陰中出如蛇如菌或如鸡冠状或生虫湿痒或溃烂出水或肿闷坠痛其内症体倦内热经候不调或饮食无味晡热发热或胸脇不利小便痞胀或赤白带下小水淋瀝其治法肿痛者四物汤加柴梔丹皮胆草湿痒者归脾汤加柴梔丹皮淋瀝者龙胆泻肝汤白术丹皮溃腐者逍遥散山梔川芎肿闷坠痛者补中益气汤山梔丹皮佐以外治之法

一妇人腐溃脓水淋漓肿痛寒热小便赤瀋内热作渴肢体倦怠胸脇不利饮食少思余以为肝脾亏损用补中益气内柴胡升麻各用一钱加茯苓一钱山梔二钱数剂少愈又与归脾汤加山梔川芎茯苓三十余剂诸症悉退惟内热尚在再与逍遥散倍用山梔而愈

一妇人素性急陰内痛小便赤瀋怒而益甚或发热或寒热此肝经湿热所致用芎归炒梔柴胡苓术丹皮泽泻炒芍车前炒连生草数剂渐愈乃去黄连泽泻又数剂全愈

附方

四物汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

逍遥散

归脾汤【二方见二十四卷第四论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

女人交接伤丈夫头痛方第二十一

愚按前症当用补中益气六味地黄以滋化源为主

来复丹交接相伤四肢沉重头痛昏晕米饮下

右每服五十丸【方见二十五卷第十论】

附方

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

女人交接辄血出痛方第二十二

一妇人每交接出血作痛此肝火动脾而不能摄血用补中益气济生归脾二汤而愈若出血过多而见他症但用前药调补肝脾

千金方治交接血出

桂心 伏龙肝【各等分】

右为末酒服钱许

附方

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

济生归脾汤【方见二十四卷第四论】

妇人交接他物所伤方第二十三

一妇人交接出血作痛发热口渴欲呕或用寒凉之药前症益甚不时作呕饮食少思形体日瘦余曰症属肝木而药复伤脾所致也先用六君加山栀柴胡脾胃健而诸症愈又用加味道

遥散而形气复一妇人陰肿下坠闷痛出水胸腹不利小便频数内热晡热口苦耳鸣此肝脾火症用小柴胡加车前胆草苓术升麻二剂稍愈又用加味逍遥加升麻数剂渐愈乃以加味归脾加升麻柴胡并补中益气加山梔数剂顿愈仍用加味逍遥加味归脾二药调理全愈

一妇人患前症热痛或用寒凉败毒药饮食不入时欲作呕小腹重坠余谓此脾胃复损元气下陷先用补中益气加炮姜二剂重坠顿愈又加茯苓半夏二十余剂而愈乃以归脾汤少加柴胡升麻并六味地黄丸而康

又方割鸡冠血涂之以赤石脂末掺之五倍子末亦良

附方

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

加味逍遥散

加味归脾汤

归脾汤【三方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

治小户嫁痛方第二十四

愚按前症当从二十一论互相主治

千金方疗小户嫁痛

甘草 生姜【各五分】 白芍药【四分】 桂心【三分】

右以酒二升煎三四沸服

又方海螵蛸烧为末酒服方寸匕日三服

又方小麦甘草等分煎汤洗甚效

薛氏医案卷三十二

卷三十三

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷三十三

明 薛已 订

妇人良方

求嗣门【疾病既无须知求嗣故以次之】

陈无择求子论第一

有夫妇则有父子婚姻之後必求嗣续故古人谓不孝有三无後为大者言嗣续之至重也凡欲求子当先察夫妇有无劳伤痼疾而依方调治使内外和平则有子矣

愚按丹溪先生云人之育胎者阳精之施也陰血能摄之精成其子血成其胞胎孕乃成今妇人无子者率由血少不足以摄精也血之少也固非一端然欲得子者必须补其精血使无亏欠乃可以成胎孕若泛用秦桂丸之剂薰戕臟腑血气沸腾祸不旋踵矣窃谓妇人之不孕亦有因六淫七情之邪有伤冲任或宿疾淹留传遗臟腑或子宫虚冷或气旺血衰或血中伏热又有脾胃虚损不能营养冲任审此更当察其男子之形气虚实何如有肾虚精弱不能融育成胎者有禀赋元弱气血虚损者有嗜欲无度陰精衰惫者各当求其原而治之至于大要则当审男女之尺脉若左尺微细或虚大无力者用八味丸左尺洪大按之无力者用六味丸两尺俱微细或浮大者用十补丸又巢氏谓夫妻年命制克坟墓不利者理或有之若误用辛热燥血不惟无益反受其害【今以素不生育病愈後而得子者附于左】

治验【余见医学纲目求嗣部】

一妇人月经淋?愈而生子【见一卷月水不断】

一妇人患阳气虚寒愈而生子【见五卷冷劳第四症】

一妇人患结核愈而生子【见二十四卷结核类第三症】

一妇人禀弱经行腹痛愈而生子【见一卷经行腹痛】

一妇人素虚弱患鹤膝风愈而生子【见二十四卷膝风】一妇人患瘰癧愈而生子【见二十四卷瘰癧一症】

一妇人患蜚蠊愈而生子【见二十四卷瘰癧第一症】

褚尚书求男论第二

建平孝王妃姬皆丽无子择民家未笄女子入御又无子问曰求男有道乎澄对曰合男女必当其年男虽十六而精通必三十而娶女虽十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰阳完实然後交而孕孕而育育而子坚壮强壽今未笄之女天癸始至已近男色陰气早泄未完而伤未实而动是以交而不孕孕而不育而子脆不壽此王之所以无子也然妇人有所产皆女者有所产皆男者大王诚能访求多男妇人至宫府有男之道也王曰善未再期生六男夫老阳遇少陰老陰遇少阳亦有子之道也

无子论第三

又无子者其因有三一坟墓风水不利二夫妇年命相尅三夫妇疾病坟墓不利年命相尅此非药力可致若夫妇疾病必须药餌然妇人无子或劳伤血气或月经闭塞或崩漏带下右尺浮则为阳絕或尺微濇或少陰脉浮紧或尺寸俱微弱者皆致絕产若调摄失宜饮食不节乘风袭冷结於子臟亦令无子也

千金翼求子方论第四

论曰妇人之居幽阃类多血气不调胎妊生产崩伤之异比之男子十倍难疗其或七情失宜或饮食无度或胎疮未愈而遽合或登厕风入陰户便成痼疾若欲求子交感之时必天日清明神思清爽气血谐和与天德福德相合夫妇本命五行相生并本命帝旺而生者则壽而贤否则不可得也

交会禁忌第五

凡求子宜吉良日交会当避丙丁及弦望晦朔大风雨雾寒暑雷电霹?天地昏冥日月无光虹蜺地动日月薄蚀及日月火光星辰神庙井竈園厠塚墓屍柩之傍若交会受胎多损父母生子残疾夭枉愚顽不孝若交会如法则生子福德智慧验如影响可不慎哉

男子受胎时日法第六

凡男女受胎皆以妇人经絕一日三日五日为男仍遇月宿在贵宿日若以经絕後二日四日六日泻精者皆女过六日皆不成胎又遇旺相日尤吉夜半入房生子者贤明贵壽余时皆凶

推支干旺相日法第七

春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸春寅卯夏己午秋申酉冬亥子

推每月宿日第八

正月

初一初六初九初十十一十二十四二十一二十四二十九日

二月

初四初七初八初九初十十二十四十九二十二二十七

三月

初一初六初七初八初十十七二十二二十五

四月

初三初四初五初六初八初十十五十八二十二二十八

五月

初一初二初三初四初五初六初十十二十三十五十六二十二二十五二十八二十九三十

六月

初一初三初十十三十八二十三二十六二十七二十八二十九

七月

初一十一十六二十一二十四二十五二十六二十七二十九

八月

初五初八十三十八二十一二十二二十三二十四二十五二十六

九月

初三初六十一十六十九二十二十一二十二二十四日

十月

初一初四初九十四十七十八十九二十二二十二二十九日

十一月

初一初六十一十四十五十六十七十九二十六二十九日

十二月

初四初九十二三十四十五十七二十四二十七日

若春合甲寅乙卯夏合丙午丁巳秋合庚申辛酉冬合壬子癸亥与上件月宿日合者佳

求子服药须知第九

论曰夫人求子服药须知次第男服七子散女服荡胞汤紫石英门冬丸及坐导药则无不效矣

七子散 主丈夫气虚精衰少无子

牡荊子 五味子 兔丝子 车前子 冀子山药 石斛 熟地黄 杜仲 鹿茸 远志

【各八分】附子【炮】蛇床子 川芎【各六分】山茱萸
天雄【各五分】桂心【十分】白茯苓 牛膝 人参
黄芩【各五分】巴戟【十二分】苁蓉【七分】鍾乳粉【八分】

右为末每服钱许日二服酒调一方加覆盆子二钱

庆云散 主丈夫阳气不足不能施化

覆盆子 五味子【各二升】兔丝子【一升】白术【炒】 石斛【各三两】麦门冬
天雄【各九两】紫石英【二两】桑寄生【四两】

右为末食後酒服钱许日三服或米饮调冷去桑寄生加细辛四两阳事少去石斛加槟榔十五个

荡胞汤 治妇人全不生育

朴硝 牡丹皮 当归 大黄【蒸一饭久】桃仁【各三两】细辛 厚朴 苦梗 赤芍药 人参
茯苓 桂心 甘草 牛膝
陈皮【各二两】附子【炮一两半】?虫【炒焦去翅足】水蛭【炒各十枚】

右每服六钱酒水合盏半煎日三服夜一服少顷下血脓力弱者用一二服恶物不尽方用坐
导药

坐导药 治妇人全不产及断续更服荡胞汤

皂角【去皮一两】吴茱萸 当归 大黄 晋矾【枯】 戎盐 川椒【各二两】五味子 细辛
乾姜【各三一 方无两 茱萸有 葶苈苦瓢各三分】

右为末以绢袋盛如指状入阴中如欲小便去之一日仍易之如子宫有冷水天阴则痛须候
下尽而止药每日早晚用苦菜煎汤薰洗着药後一日服紫石英丸

紫石英丸

紫石英 天门冬【各三两】紫葳 牡蛎【各二两】粉草【一两半】桂心 川芎 卷栢
乌头【炮】熟地黄【乾】 辛夷仁 禹余粮【煨醋淬】 当归 石斛【各三两】 乌贼骨
牛膝 薯蓣【各六分】 桑寄生 人参 牡丹皮 乾姜 厚朴 续断 食茱萸
细辛【各五分】 栢子仁【一两】

右为末蜜丸桐子大每服二十丸温酒下

续嗣降生丹 治妇人五臟虚损子宫冷惫不能成孕当归 桂心 龙齿 乌药 益智 杜仲
石菖蒲 吴茱萸【各一两半】 茯神 牛膝 秦艽 细辛 桔梗 半夏 防风
白芍药【各三钱】 乾姜【一两半生】

【半炒】附子【重一两者作一窍入朱砂一钱湿面裹煨为末】 川椒【二两焙】 牡蛎【
二两童便浸四十九日却用硫黄末一两醋调涂用纸裹之米醋润湿盐泥固济用炭煨赤】

右为末用糯米糊丸桐子大每服三十丸至百丸空心淡醋温酒盐汤任下日二服及治男子
精寒不固阳事衰弱白浊梦泄妇人带下寒热诸虚百损盗汗气短预服此药者无不感应

愚按前五方多慄悍之味治当审察病因不可轻用又秦桂养真白薇茱萸地黄紫英石阳起
石暖宫济阴丹汤药数方尤为慄悍不可轻服未敢悉录

窦禹钧夜梦其亡祖父谓之曰汝缘无子又且不壽宜修善行自是佩服乃训复梦祖父谓曰汝名挂天曹以有陰德特延筭三纪胤锡五子悉皆荣显

张庆司狱惟务方便年五十始生子亨有一道人丐於门谓庆曰汝本无嗣今闻婴儿声非若子乎庆曰偶得一子道人曰信乎陰德未易量尔之积累善事非一朝一夕今不但有嗣又喜子孙文学之贵宜善保之後果如其言

冯商其妻每劝置妾商取一女已成闻其父因官纲运欠折鬻女以偿之商恻然不忍犯更益以资装送还其父明年生冯京後登状元

马默未有嗣知登州日奏活沙门岛罪人不致枉死一日梦中见符使挟一男女乘空来其前呼曰尔本无嗣以活人数多上帝特赐男女各一言讫不见果如其言时邦美之父老而无子置一妾对暗室悲泣问之乃曰父卒於官鬻妾欲办丧耳时遂携金偕往其家殡葬而归未几生邦美後举进士官至吏部

袁韶父为郡吏年五旬置一妾乃宦家女也父歿家贫鬻而归葬袁知其故即送还更以囊资益之明年生韶既长为参知政事

马涓之父无子置一妾闻其父丧官所无力归葬故鬻此女即日访其母而归之且厚资助夜梦一羽衣曰天锡尔子庆流涓涓明年生一子因名曰涓既长及第人之无嗣或因丈夫阳气之不足不能施化或因妇人陰血衰惫百疾攻之以致然也故先贤立方垂训以启後人或者用计百端妾媵无数及皓首终身不能如其意者是皆心行有亏非命也苟能革心之非所行向善积德累功施恩布惠则上天之报施自然庆流後裔此温隐居求嗣篇之所由作也予尝读圣朝为善陰隲书因览窦禹钧等数人所履皆言此事历历可监谨录附赘于此以为求嗣者劝诫之一助云可尔

温隐居求嗣保生篇第十

昔东京焦公三世无嫡嗣为商旅游翫名山寻访至人问其因至京都遇一老僧声清而神朗谈论甚异焦怪而问之曰贫家三世无嫡嗣柰何僧曰无嗣者有三一祖宗无德自身无行二夫妻年命恐犯禁忌三精神不守妻妾血寒焦公曰血寒有何法术愿闻一言僧曰先修德後修身三年之後到台山当授异方说毕忽不见焦一遵其言後赴五台见一行童手持一书言曰老师传语大夫功成行满赐方药名续嗣降生丹依方服之当生富贵之子焦员外子生子不肖亦赴五台见行童曰老师昨日见员外何必来问我但依尔父所行愚者自贤焦曰愚岂能贤乎行童曰昔窦氏五子皆不全形後行恩布德悉登科第焦氏拜谢而归奉行雕板印施方书不及二十年子孙数人皆贵显後人收得此行状及方受持行用求药者获其子孙皆有德行余躬受此方不敢緘默并录篇论以告诸贤庶不致异方湮没耳正统间合肥人罗某年六十无子因连坐谪保安州为民将至居庸解者逃回罗赴关自告或者曰放流絕域人所不堪今解者既去君可无往也罗曰吾罪本为人所累使予归复以此累人吾不忍也且皇法不

可轻追遂至州夜有二盜疑其有所携乃穿穴以取之其妻觉预置沸汤俟其入则沃之既穴二人将入罗起諭之乃去次日罗至市忽有二人俯伏道傍罗问之乃夜穿穴者也二人曰吾輩相戏几被伤殞赖公曉諭二命得生公所賜也後罗凡出外二人必为之守护未几罗妻卒妾生一子任延安守一女适隆庆卫指挥使王钦礼部尚书沈立斋云有二老一有子而富一无子而贫居址相邻因居高冈其上有茔墓二老欲掘墓开窑以取利贫者以告其妻妻曰冈後有墓开以为窑不惟烧损地脉坏人风水且近坟穴不可为也遂已之富者开冈见尸则焚之後见骸骨甚多悉弃於水因致巨富乃起岑楼以蓄财物每夜家之眷属皆居於上去其梯以示贼不能犯不意贼有刘六者卒然昼至其属不及登楼者则投井而死其登楼者被焚而死人以为焚尸於火弃尸於水之报也其贫者後致巨富生一子益其家业云

弘治间京师有黄刚者因无子每岁夏秋修合痢疾药施之忽邻里於静夜闻人言黄公积善久矣送以一嗣後果有子

弘治间有张某自太医院恩生仕至县尹老而无子在县笃於惜民已而陞为郡守民深感其惠在郡生子亦德政之所致也

正德间夏诚字纯夫吴江县人锦衣卫籍中顺天府乡试任武城县尹爱民甚笃因忤上司遂归老於家旧民到京者怀其德惠怜其清苦莫不以财帛助之垂老得子後有继其政者甚丰斂县民於中途刼之子女皆被其害

黄善贫而无子佣工为业富民倪五命其开窑取土因锄土见尸棺以旧土揜之乃从远地担土而归後倪贫而黄富亦开窑倪亦佣工於黄家黄甚惜之与之共食倪因患时疮为人憎弃遂投水而死黄闻之遂收其尸而殡之遂有子且继其富作善降祥信不诬矣窃闻之书曰惠迪吉从逆凶惟影响又曰作善降祥作恶降殃子之有无自王宫至於庶民亦在乎陰德而已岂可专泥於药哉

薛氏医案卷三十三

卷三十四

钦定四库全书

薛氏医案卷三十四

明薛已订

妇人良方

胎教门【求嗣已明须知胎教故以次之】

妊娠总论第一

巢氏病源论妊娠一月名胎胚足厥阴脉养之二月名始膏足少阳脉养之三月名始胎手心主脉养之当此之时血不流行形象始化未有定仪因感而变欲子端正庄严常口谈正言身行正事欲生男宜佩弦执弓矢欲生女宜佩韦施环佩欲子美好宜佩白玉欲子贤能宜看诗书是谓外象而内感者也四月始受水精以成其血脉手少阳脉养之五月始受火精以成其气足太阴脉养之六月始受金精以成其筋足阳明脉养之七月始受木精以成其骨手太阴脉养之八月始受土精以成肤革手阳明脉养之九月始受石精以成毛发足少阴脉养之十月五臟六腑关节人神皆备此其大略也又五臟论有称耆婆者论一月如珠露二月如桃花三月男女分四月形象具五月筋骨成六月毛髮生七月游其魂儿能动左手八月游其魄儿能动右手九月三转身十月受气足更有颇 经云一月为胎胞精血凝也二月为胎形成胎也三月阳神为三魂四月阴灵为七魄五月五行分五臟也六月六律定六腑也七月精开窍通光明也八月元神具降真灵也九月宫室罗布以定生人也十月受气足万象成也今推究数说如五臟论者类皆浅鄙妄托其名至於三藏佛书且涉怪诞漫不可考今按颇 经三卷云中古巫方所撰其巢氏论妊娠至三月始胎之时欲谈正言行正事佩弦韦执弓矢施环佩佩白玉读诗书之类岂非胎教之理乎尝试推巢氏所论云妊娠脉养之理若厥阴肝脉也足少阳胆脉也为一臟腑之经余皆如此且四时之令必始於春木故十二经之养始於肝所以养胎在一月二月手心主心胞络脉也手少阳三焦脉也属火而夏旺所以养胎在三月四月手少阴手太阳乃心脉也以君主之官无为而尊也足太阴脾脉也足阳明胃脉也属土而旺长夏所以养胎在五月六月手太阴肺脉也手阳明大肠脉也属金而旺秋所以养胎在七月八月足少阴肾脉也属水而旺冬所以养胎在九月又况母之肾臟系於胎是母之真气子之所赖也至十月儿於母腹之中受足诸臟气脉所养然後待时而生此论奥微而有至理世更有明之者亦未有过於巢氏之论矣余因述其说

受形论第二【娠子即妊娠也故以後受形名篇并附其论】

巢氏论曰阳施陰化精气有余两胎有俱男俱女者道藏经云妇人月信止後一日三日五日值男女旺相日阳日阳时交合有孕多男若男女稟受皆壮则男子一或怯弱则少子颇 经云阳盛发陰当孕成男六脉诸经皆举其陰又云三阳所会则生男三陰所会则生女葛仙翁肘後方云男从父气女从母气圣济经云天之德地之气陰阳之至和流薄於一体四气而左动则属阳阳资之则成男因气而右动则属陰陰资之则成女易称乾道成男坤道成女此男女之别也凡妊娠有疾投以汤药衰其大半而已使病去母安胎亦无损矣愚按东垣丹溪云经水断後一二日血海始净精胜其血感者成男四五日後血脉已旺精不胜血感者成女盖父精母血因感而会精之施也血能摄精故成子此万物资始於乾元也血之行也精不能摄故成女此万物资生於坤元也陰阳交媾胚胎始凝所藏之处名曰子宫一系在下上有两歧一达於左一达於右精胜其血则阳为之主受气於左子宫而男形成精不胜血则陰为之主受气於右子宫而女形成此二先生之确论也若夫妊娠药餌宜禁当参本门考之

受形篇第三

褚氏云男女之合二精交暢陰血先至阳精後冲血开裹精精入为骨而男形成矣阳精先入陰血後参精开裹血血入为本而女形成矣阳气聚面故男子面重溺死者必伏陰气聚背故女子背重溺死者必仰走兽溺死仰伏皆然陰阳均至非男非女之身精血散分骈胎品胎之兆父少母老产女必羸母壮父衰生男必弱古之良工首察乎此气受偏痺与之补之补羸女则养血壮脾补弱男则壮脾节色羸女宜及时而嫁弱男宜待壮而婚此疾外所务之本不可不察也

论胎教第四【马益卿先生】

论曰胎教产图之书不可谓之迂而不加信然亦不可狎犯之方今俚俗之家与不正之属将息避忌略不如仪或药毒不消或产於风露无产厄而子母均安者亦幸有之若保胎之法须多方豫养方无後患如隣家有所兴修亦或犯其胎气令儿破形殒命如刀犯者形必伤泥犯者窍必塞打击者色青黯系缚者相拘挛如此等验有如指掌不可不慎也

孕元立本章第五

有泰初有泰始混沌一判既见气矣故曰泰初既立形矣故曰泰始气初形始天地相因生生化化品物彰矣故曰大哉乾元万物资始至哉坤元万物资生

吴禔注云混沌未判则气形俱泯混沌既判则气形已分既见气矣是为太初既立形矣是为太始太初者凡有气之所本故天得之以统元气太始者凡有形之所本故地得之以统元形天地交泰相因为气形生生者得所以生化化者得所以化品物流行而形色名声彰矣大哉乾元太初之所寓也故以万物之资始为言至哉坤元太始之所寓也故以万物资生为言惟万物资始资生於乾坤故乾元则兆象至坤元然後形无不成

有生之初虽阳予之正育而充之必陰为之主

薛左丞注陰阳离合论曰天覆地载万物方生未出地者命曰陰处名曰陰中之陰出地者命曰陰中之阳阳予之正陰为之主王冰谓阳施正气万物方生陰为之主羣形乃立字说始而生之者天地也育而克之者人也

因形移易日改月化坤道之代终也

列子周穆篇尹文先生曰因形移易谓之化庄子曰予方篇混元曰消息盈虚一晦一明曰改月化曰有所为而莫见其功易坤卦文言曰地道无成而代有终也地之承天其无成而有终也岂迫於不得已耶盖道之所在万物失之则死得之则生有生之类听命於此故无成而代有终者以道言之也

谓之姪阳既受始陰壬之也壬子谓之姪字说

壬一阳也二陰也阳既受始陰壬之而谓之姪解曰壬阳水之干也位在亥子之间陰至亥极矣阳复受始而谓之姪於壬至子然後生

谓之胞已为正阳陰包之也

已正阳也而陰能包之陰与阳更用事故也已者孟夏之月於卦为乾纯阳用事故诗谓之正月正月者正阳之月也陰方用事而为物之主则虽正阳亦在所包而退听焉

谓之坯未成为器犹云坯也

说文瓦未烧者谓之坯胎妇孕一月也字说坯未成为器犹坯也

谓之胎既食於母为口以也

说文胎妇孕二月也字说元胎既食於母为口以焉

若娠则以时动也

字说女娠以时动

若怀则以身依之也

字说心所怀则身依焉目隶焉

天之德地之气陰阳之至和相与流薄於一体

灵枢经曰天之在我者德地之在我者气德流气薄而生者也

唯能顺时数谨人事勿动而伤则育之道得矣

自一月积之至於十月所谓时数也保卫辅翼防闲忌慎适其宜所谓人事也

观四序之运生长收藏代出万物仪则咸备而天地之气未始或亏者盖陰阳相养以相济也

陰阳离合论曰天覆地载万物方生阳予之正陰为之主故因春生因夏长因秋收因冬藏失常则天地四塞庄子天地篇曰流动而生物物生成理谓之形形体保神各有仪则谓之性者曾不知此乃欲拂自然之理谬为求息之术方且推生死於五行薪补养於药石以伪胜真以人助天虽或有子孕而不育育而不壽者衆矣昔人论年老有子者男不过尽八八女不过尽七七则知气血在人固自有量夫岂能逃陰阳之至数哉

天真论帝曰有其年已老而有子者何也岐伯曰此其天壽过度气脉常通而肾气有余也此虽有子男不过尽八八女不过尽七七而天地之精气皆竭矣注虽老而生子子壽亦不能过天癸之数

凝形殊禀章第六

天地者形之大也陰阳者气之大也惟形与气相资而立未始偏废

庄子则阳篇太公调曰天地者形之大者也陰阳者气之大者也气以形载形以气克惟气与形两者相待故曰相资而立未始偏废

男女构精万物化生天地陰阳之形气寓焉

系辞曰天地絪縕万物化醇男女构精万物化生

语七八之数七少阳也八少陰也相感而流通故女子二七天癸至男子二八而精通则以陰阳交合而兆始故也

岐伯曰女子二七而天癸至任脉通冲脉盛月事以时下故能有子男子二八肾气盛精气溢洊陰阳和故能有子传曰女子十四有为人母之道四十九絕生育之理男子十六有为人父之道六十四絕阳化之理

语九十之数九老阳也十老陰也相包而赋形故陰穷於十男能围之阳穷於九女能方之则

以陰阳相生而成终故也

字说陰穷於十围之者男阳穷於九方之者女九有变也女足以方之十无变也男足以围之解曰男有室所以围陰於外女有家所以方阳於内易曰妇人之吉从一而终也夫子制义从妇凶也围圆也君道也夫道也圆则可以制义而行方仁也臣道也妇道也方则从一而已男从围与规从夫同意女从仁与臣从仁同意

元气孕毓皆始於子自子推之男左旋积岁三十而至巳女右旋积岁二十而至巳巳为正阳陰实从之自巳怀壬男左旋十月而生於寅女右旋十月而生於申申为三陰寅为三阳而生育之时着矣其稟赋也体有刚柔脉有强弱气有多寡血有盛衰皆一定而不易也十九难曰男生於寅寅为木阳也女子生於申申为金陰也杨氏注云元气起於子人之所生也男从子左行三十女从子右行二十俱至於巳为夫妇怀妊也古者男子三十女年二十然後行嫁娶十月而生者男从巳左行至寅为十月故男行年起於丙寅女从巳右行至申为十月故女行年起於壬申

以至分野异域则所产有多寡之宜吉事有祥则所梦各应其类是故荆扬薄壤多女雍冀厚壤多男熊罴为男子之祥蛇虺为女子之祥是皆理之可推也

周官职方氏扬州其民三男五女荊州其民一男二女雍州其民三男二女冀州其民五男三女诗斯干篇名吉梦维何维熊维罴维虺维蛇大人占之维熊维罴男子之祥维虺维蛇女子之祥

胎化之法有所谓转女为男者亦皆理之自然如食牡鸡取阳精之全於天产者带雄黄取阳精之全於地产者

千金方转女为男丹参丸用东门上雄鸡头又方取雄黄一两缝囊盛带之本草丹雄鸡补虚温中通神杀毒其肝补肾其冠血益阳雄黄人佩之鬼神不能近毒物不能伤

操弓矢藉斧斤取刚物之见於人事者气类潜通造化密移必於三月兆形之先盖方仪则未具阳可以胜陰变女为男理固然也

巢氏论云妊娠三月始胎形象始化未有定仪见物而变欲得男者操弓矢食雄鸡

气质生成章第七

具天地之性集万物之灵陰阳平均气质完备咸其自尔然而奇耦异数有衍有耗刚柔异用或强或羸血荣气卫不能逃於消息盈虚之理则稟质之初詎可一槩论耶是以附赘垂疣骈拇枝指侏儒跛蹙形气所赋有如此者疮疡痈肿聋盲瘡癰瘠瘵瘵瘵气形之病有如此者然则胚胎造化之始精移气变之後保卫辅翼固有道矣

孝经云天地之性人为贵书泰誓曰惟人万物之灵

天有五气各有所凑地有五味各有所入所凑有节适所入有度量凡所畏忌悉知戒慎资物为养者理固然也故寝兴以时出处以节

六节藏象论曰天食人以五气地食人以五味王冰云天以五气食人者臊气凑肝焦气凑心香气凑脾腥气凑肺腐气凑肾地以五味食人者酸味入肝苦味入心甘味入脾辛味入肺鹹味入肾也

可以高明可以周密使雾露风邪不得投间而入因时为养者理固然也故必调喜怒寡嗜慾

礼记月令仲夏之月可以居高明可以处台榭脉要精微论云冬日在骨蛰虫周密君子居室夏则顺阳在上故可以高明冬则顺阳气之伏藏故可以周密

作劳不妄而气血从之皆所以保摄妊娠使诸邪不得干焉

天真论岐伯曰上古之人其知道者不妄作劳故能形与神俱而尽终其天年通天论曰圣人陈陰阳筋脉和同骨体坚固气血皆从

苟为不然方授受之时一失调养则内不足以为中之守外不足以为身之强气形弗充而疾疚因之

脉要曰五臟者中之守也得守者生失守则死又曰五臟者身之强也得强则生失强则死

若食?唇缺食犬无声食杂鱼而生疮癬之属皆以食物不戒之过也

孙真人养胎法云妊娠食兔肉令子缺唇食犬肉令子无音声食乾鲤鱼令子患疮癬异法方论云食之使人热中注云鱼发疮

心气大惊而癲疾

奇病论帝曰人生而病癲疾者何岐伯曰名为胎病此得之在腹中时其母有所大惊气上不下精气并居故令子发为癲疾也

肾气不足而解颅

巢氏云解颅者言小儿年虽长而 囟门不合头缝开解是皆由肾气不成故也肾主骨髓而脑为髓海肾气不成则脑髓不足不能成故头颅开解

脾胃不和而羸瘦

巢氏曰夫羸瘦不生肌肤皆为脾胃不和不能饮食故血寒衰弱不能荣於肌肤也凡小儿在胎而遇寒或生而伏热皆令儿不能食故羸瘦也

心气虚乏而神不足皆由气血不调之故也诚能推而达之使邪气无所乘兹乃生育相待而成者

病源曰肺主气心主脉而血气通荣臟腑循行经络产则血气伤损臟腑不足而心统领诸臟使其劳伤不足则令惊悸恍惚是心气虚也

故曰天不人不因

法言云天不人不因人不天不成

转女为男法第八

若妇女怀妊未满三月男女未定形象未成故药饵方术可以转令生男者理或有之其法以斧置妊娠床下系刃向下勿令人知恐不信试令鸡抱卵时依此置窠下一窠尽出雄鸡又自初觉有娠取弓弩弦缚妇人腰下满百日去之此紫宫玉女秘法也又妊娠三月已前以雄鸡尾尖上长毛三茎潜安妇人卧蓆下又取夫髮及手足甲潜安卧蓆下俱勿令知之又妊娠才满三月要男者以雄黄半两衣中带之要女者以雌黄带之以上诸法试之良有验也

薛氏医案卷三十四

卷三十五

钦定四库全书

薛氏医案卷三十五

明薛己订

妇人良方

候胎门

脉例第一

王子亨云若妊娠其脉三部俱滑大而疾【在左则男在右则女】经云陰搏阳别谓之有子搏者近也陰脉逼近於下阳脉则出於上阳中见阳乃知阳施陰化法当有子又少陰脉动甚者妊子也手少陰属心足少陰属肾心主血肾主精精血交会投识於其间则有娠又三部脉浮沈正等无病者有妊也余病如脉经说左手尺脉浮洪者为男胎也右手尺部浮洪者为女胎也两手尺部俱洪者为两男俱沈实者为两女又云中指一跳一止者一月胎二跳二止者二月胎也

诊妇人有妊歌第二

肝为血兮肺为气血为荣兮气为卫陰阳配偶不参差两藏通和皆类例血衰气旺定无妊血旺气衰应有体肝藏血为荣属陰肺主气为卫属阳陰阳配偶者是夫妇匹配偶合构精乃有子也若血少气盛则无妊孕若血盛气少则有孕也

寸微关滑尺带数流利往来并雀啄小儿之脉已见形数月怀犹未觉

寸脉微关脉滑尺脉带数及流利雀啄皆是经脉闭塞不行成胎已上之脉皆是血多气少之脉是怀小儿之脉已见形状也

左疾为男右为女流利相通速来去两手关脉大相应已形亦在前通语

左手脉疾为怀男右手脉疾为怀女及两脉流行滑利相通疾速来去是或两手关脉洪大相应是其胎已有形状也

左脉带纵两个男

纵者夫行乘妻水行乘火金行乘木即鬼贼脉也名也名曰纵见在左手则怀两个男儿也

右手带横一双女

横者妻乘夫也是火行乘水木行乘金即所胜脉也名曰横见于右手则怀一双女儿也

左手脉逆生三男

逆者子乘母也是水行乘金火行乘木即已生脉也名曰逆见于左手则怀三个男儿也

右手脉顺还三女

顺者母乘子也是金行乘水木行乘火即生已之脉也名曰顺见于右手则怀三个女儿也

寸关尺部皆相应一男一女分形证

寸关尺部脉大小迟疾相应者是怀一男一女形证之脉也谓关前为阳关後为陰陰阳脉相应故怀一男一女也

有时子死母身存或即母亡存子命

此二句之文无辩子母存亡之法

往来三部通流利滑数相参皆替替阳实陰虚脉得明遍满胷堂皆逆气

若寸关尺三部通行流利皆替替有力而滑数皆是阳实陰虚之脉主妊妇逆气遍满胷堂而不顺也

左手太阳浮大男

左手寸口为太阳其脉浮大则是怀男子

右手太陰沈细女

右手寸口为太陰其脉沈细是怀女脉也

诸阳为男诸陰女指下分明长记取

诸阳脉皆为男即为大疾数滑实之类也当怀男子诸陰脉三即沈细之类是也当怀女子

三部沈正等无絶尺内不止真胎妇

寸关尺三部脉沈浮正直齐等举按无絶断及尺内举按不止住者真的怀胎妇也

夫乘妻兮纵气雾

经云纵者夫乘妻也水行乘火金行乘木即鬼贼脉也纵气雾雾者露也又上下也谓夫之阳气乘妻之阴气二气上下相逐如雾润结子也

妻乘夫兮横气助

横者妻乘夫也见前注谓两傍横气相佐助也

子乘母兮逆气参

逆者子乘母也谓子气犯母气相乘逆行之气相参合也

母乘子兮顺气护

是母气乘于子气为顺气相护卫也凡胎聚纵横逆顺四气以荣养方以成形也

小儿日足胎成聚身热脉乱无所苦

妇人怀小儿五个月是以数足胎成就而结聚也必母身体壮热当见脉息燥乱非病苦之症谓五月胎已成受火精以成气故身热脉乱是无病也

汗中不食吐逆时精神结备其中住

谓妊娠受五行精气以成形禀二经以荣其母怀妊至五月其胎虽成其气未备故胎气未安上冲心胃则汗出不食吐逆名曰恶阻俗呼选饭唯思酸辛之味以调胎气也

滑疾不散三月胎

妊娠三月名始胎此是未有定仪心胞脉养之故脉见滑疾流利为少气多血不散为血气盛则始结为胎也

但疾不散五月母

其脉但疾数而不散者是五个月怀胎之母也

弦紧牢强滑利安沈细而微归泉路

孕妇之脉宜弦紧劳强滑利为安吉之脉若沈细而微谓脉与形不相应故云死也前文虽云太陰沈细又云诸陰为女其说似有相违谓三部脉皆不沈细及微故不同也

愚按前论与脉诀所云不同观者当自推之

验胎法第三

妇人经脉不行已经三月欲验有胎川芎生为末空心浓煎艾汤调下二钱腹内微动则有胎也

胎杀避忌产前将护法第四

凡受孕之後切宜避忌胎杀所游如经云刀犯者形必伤泥犯者窍必塞打击者色青黯繫缚者相拘挛甚至母殒祸如反掌

月游胎杀

立春在房床 惊蛰在户【单扇】

清明在门【双扇】 立夏在竈

芒种在母身 小暑在竈

立秋在碓【按京本云在正北方子云】 白露在厨前

寒露在门 立冬在户及厨

大雪在炉及竈 小寒在房母身

十干日游胎杀

甲巳日占门 乙庚日占碓磨

丙辛日占井竈 丁壬日占厨解

戊癸日占米仓

十二支日游胎杀

子丑日占中堂 寅卯辰酉日占竈

己午日占门 未申日占篱下

戌亥日占房

六甲旬游胎杀

甲子旬游牕碓 甲戌旬游正厅

甲申旬游中庭 甲午旬游房内

甲辰旬游房中 甲寅旬游

太史局日游胎杀

每遇癸巳甲午乙未丙申丁酉五日在房内北庚子辛丑壬寅三日在房内南

癸卯一日在房内西

甲辰乙巳丙午丁未四日在房内东

六戌六己日在房内中 余日在外无占

凡游在房内不宜于方位上安床帐及扫舍皆凶

又有小儿杀及本年三杀及产母身黄定命皆不可犯凡妊娠之後将此贴于房内常照见之切不可穿凿修掘移钉繫篱壁重物展压之类犯之重则胎死腹中母亦不利轻则子受其殃成人之後必定破形拳挛跛缩瘡痍犯之极验

食忌论第五

一受孕之後切宜忌不可食之物非惟有感动胎气之戒然于物理亦有厌忌者设或不能戒忌非特延月难产亦能令儿破形母损可不戒哉

食鸡肉糯米合食令子生寸白虫

食羊肝令子生多厄

食鲤鱼鱠及鸡子令儿成疳多疮

食犬肉令子无声音

食兔肉令子缺唇

食鼈令子项短及损胎

食鸭子共桑椹同食令子倒生心寒

食螃蟹令子横生

食雀肉合豇酱食之令子面生?黠黑子

食豇酱合藿香食之堕胎食水浆絶产

食雀肉令子不耻多淫

食山羊肉令子多病

食生姜令子多指生疮

食虾蟇鱖鱼令儿瘡癰

食驴骡马肉延月难产

如此之类无不验者则知圣人胎教之法矣

孕妇药忌歌第六

蛭 水蛭地胆虫 乌头附子配天雄

踯躅野葛蜈蚣类 乌啄侧子及?虫

牛黄水银并巴豆 大戟蛇蛻及蜈蚣

牛膝藜芦及薏苡 金石锡粉并雌雄

牙硝芒硝牡丹桂 蜥蜴飞生及?虫

代赭蚱蝉胡粉麝 莞花薇蓟草三棱

槐子牵牛并皂角 桃仁蛭螬和茅根

□根 砂与乾漆 亭长波流萆草中

瞿麦?茹蟹爪甲 蝟皮赤箭赤头红

马刀石蚕衣鱼等 半夏南星通草同

乾姜蒜鸡及鸡子 驴肉兔肉不须供

切须妇人产前忌 此歌宜记在心胷

薛氏医案卷三十五

卷三十六

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷三十六

明 薛己 订

妇人良方

妊娠疾病门【胎後已明须知妊娠疾病故以次之】

妊娠诸病忌毒药余当对症依法治之

妊娠随月服药将息法第一

千金云妊娠一月名始胚饮食精熟酸美受御宜食大麦母食腥辛是谓谗正是月足厥陰脉养不可针灸其经此经内属于肝肝主筋血一月之内血行否涩不为力事寝必安静母令恐惧况一月陰阳新合为胎寒多为痛热多卒惊举重腰痛腹满胞急卒有所下当预安之宜服乌雄鸡汤

乌雄鸡汤方

乌雄鸡【一只治如食法】 吴茱萸【一两】 茯苓
阿胶【各二两炒】 生姜甘草【各一两】 人参 药
白术【各三两】 麦门冬【五合去心】

右以水一斗二升煮鸡取汁六升下药煮取三升内酒三升并胶等取汁三升分三服

补胎汤 若曾伤一月胎者当预服此药

细辛【一两】 防风【二两】 乌梅【升】 吴茱萸 生地黄
白术【各一两】 大夹夕【五合】 生姜【四两】

右以水七升煮取汁二升半分三服寒多倍细辛茱萸热多去细辛茱萸加括萎根二两有所思去大麦加栝子仁三合一方有人参一两忌生菜茺萸桃李雀肉等物

妊娠二月足少阳脉养不可针灸其经此经内属于胆胆主精是时儿精成于胞里当谨护勿惊动况二月始陰阳踞经有寒不成有热即萎卒中风寒有所动摇心满脐下悬急腰背强痛卒有所下乍寒乍热艾叶汤主之

艾叶汤方

丹参【三两】当归 人参 麻黄【去节】艾叶
阿胶【炙各二两】甘草【一两炙】大枣【十二枚擘】生姜【六两】

右以酒三升水一?内药煮减半去滓内胶煎取三升分三服忌海藻菘菜

黄连汤 若曾伤二月胎者当预服此药

黄连 人参【各一两】吴茱萸【五合】生地黄【五两】生姜【三两】

右以醋浆七升煮取三升分四服日三夜一每十日作一剂若觉不安加乌梅一升加乌梅者不用浆直用水忌猪肉冷水茺萸一方加当归半两

妊娠三月名始胎当此之时未有定仪见物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠玑欲子美数视璧玉欲子贤良端正清虚是谓外象而内感者也是月手心主脉养不可鍼灸其经此经内属于心母悲哀思虑惊动盖三月为定形有寒则大便清有热则小便难不赤即黄卒惊恐忧愁瞋恚喜顿仆动于经脉腹满绕脐苦痛腰背痛卒有所下宜服雄鸡汤

雄鸡汤方

雄鸡【一只治如食法】甘草【炙】茯苓 人参 阿胶【各二两炒】黄芩 白术【各一两】 药【四两】大枣【十二枚擘】生姜【一两切】麦门冬【去心五合】

右以水一斗五升煮鸡减半内药煮取一半入清酒三升并胶再煎取三升分三服日饮尽忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等一方有当归川芎二两无黄芩生姜

茯神汤 若曾伤三月胎者当预服此药

茯神 丹参 龙骨【各一两】阿胶【炒】当归 甘草【炙】人参【各二两】赤小豆
大枣【十二枚擘】

右酢浆一斗煮取三升分四服七日後服一剂腰痛加桑寄生二两深师方有薤白二两麻子一升忌同前

妊娠四月以受水精始成血脉其食稻粳其羹鱼鴈是谓成血气以通耳目而行经络是月手少阳脉养不可针灸其经此经内输三焦其时儿六腑顺成当静形体和心志节饮食盖四月为离经有寒心下温温欲呕胸满不食小便如淋脐下苦急卒中风寒颈项强痛寒热或惊动身躯腰背腹痛或时胎上胸烦不安卒有所下宜服菊花汤主之

菊花汤方

菊花【如鸡子大一枚】麦门冬【去心一升】麻黄【去节】阿胶【炙各三两】生姜【五两】甘草【炙】当归半夏【洗各二两】人参【一两五钱】大枣【十二枚擘】

右以水八升煮减一半内清酒三升并阿胶煎取三升分三服温卧当汗以粉扑之护风寒四五日忌食如前

调中汤

药【四两】甘草【炙】芎藭续断【各一两】柴胡白术【各三两】乌梅【一升】李根白皮【三两】当归【一两五钱】生姜【四两】厚朴【炙】枳实【炙各二两】

右以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日再服一剂一方有半夏二两忌海藻菰菜桃李雀肉

妊娠五月始受人精以成其气晏起沐浴浣衣居处必厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麦其羹牛羊和菜莢调以五味是谓养气以定五臟是月足太陰脉养不可鍼灸其经此经内输于脾其时儿四肢成无大饥无甚饱无食乾燥无自炙热无大劳倦盖五月毛发初生有热苦头眩心乱呕吐有寒则腹满痛小便数卒有恐怖四肢疼痛寒热胎动无常处腹痛顿欲仆卒有所下宜服阿胶汤又名旋覆花汤主之

阿胶汤方

阿胶【四两炙】人参【一两】生姜【六两】麦门冬【去心一升】吴茱萸【七合】旋覆花当归 药甘草【炙】黄芩【各二两】

右以水九升煮取一半内清酒三升并阿胶微火煎取三升半分四服日三夜一先食後服便愈不差更服忌海藻菰菜

安中汤 若曾伤五月胎者当预服此方

甘草【炙】 药【各三两】当归人参生地黄芎藭【各二两】五味子【五合】生姜【六两】麦门冬【去心一升】大麻仁【五合】大枣【三十五枚擘】黄芩【一两】

右以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日再服一剂忌如前

安胎当归汤 若妊娠五月举动愕胎不安小腹痛引腰络小便下血

当归 阿胶【炒】 芎藭 人参【各一两】 大枣【十二枚】 艾【一把】

右以酒水各三升煮至三升去滓内胶令烊分三服一方有甘草无参枣

妊娠六月始受金精以成筋身欲微劳无得静处出游于野数视走犬走马食忌鸷鸟猛兽之肉是谓变腠理纫筋以养其力以坚背膂是月足阳明脉养不可针灸其经此经内属于胃主其口目盖六月之时儿口目皆成调五味食甘美毋大饱六月卒有所不安寒热往来腹内胀满体肿惊怖忽有所下腹痛如欲产手足烦疼宜服麦门冬汤

麦门冬汤方

甘草【炙】 人参【各一两】 生地黄【三两】 麦门冬【去心一升】 黄芩【二两】 阿胶【炒四两】 生姜【六两】 大枣【十五枚擘】

右以水七升煮减半内清酒二升并胶煎取三升分三服如人行三四里进糜粥忌海藻菰菜茺荑

柴胡汤 若曾伤六月胎者当预服之

柴胡【四两】 芍药【一方作紫藏】 白术 甘草【炙各二两】 麦门冬【三两去心】 苁蓉【一两】 芎藭【二两】 生地黄【五两】 生姜【六两】 大枣【三十枚擘】

右以水一斗煮取三升分四服日三夜一仍进糜粥七日更服一剂忌海藻菰菜茺荑桃李雀肉等一方有黄芩二两

旋覆花汤【亦名阻病】 集验疗妊娠六七月胎不安常处旋覆花【一两】 厚朴【制】 白术 枳壳 黄芩【炒】 茯苓【各三两】 半夏【炒一方无】 药 生姜【各二两】

右以水一斗煮取二升半先食分五服日三夜二忌羊肉饴醋桃李雀肉等千金同

妊娠七月始受木精以成骨劳身摇肢无使定止动作屈伸以运血气自此後居处必节饮食避寒暑食粳稻以密腠理是谓养骨而坚齿是月手太阴脉养不可鍼灸其经此经内属于肺主皮毛是时儿皮毛已成无大言无号哭无薄衣无洗浴无寒饮若忽惊恐摇动腹痛卒有所下手足厥阴脉若伤寒烦热腹满短气常苦颈项腰背强宜服葱白汤

葱白汤方

葱白【十五枚】半夏【细切炒】麦门冬【去心一升】人参【一两五钱】生姜【八两】甘草【炙】当归 黄芪【炒各三两】阿胶【炒四两】黄芩【一两】旋覆花【一把】

右以水八升煮减半内清酒三升并胶煎取四升温服一升日三夜一温卧当汗出无汗加麻黄二两秋後勿强汗忌羊肉饴海藻菰菜等

杏仁汤 若曾伤七月胎者当预服

杏仁【去双仁皮尖碎】甘草【炙】钟乳【研】麦门冬【去心】吴茱萸【各一升】五味子 粳米【各五合】紫苑【一两】

右以水八升煮取三升半分四服日三夜一七日报一剂忌海藻菰菜

妊娠八月始受土精以成肤革和心静息无使气极是谓周密腠理光泽颜色是月手阳明脉养不可针灸其经此经内属于大肠大肠主九窍是时儿九窍皆成无食燥物无辄失食无忍大气若中风寒有所犯触身体尽痛乍寒乍热胎动不安苦头眩痛绕脐下寒时时小便白如米汁或青或黄寒栗腰背苦冷痛而目视茫茫宜服 药汤

芍药汤方

芍药【四钱】人参 当归

甘草【炙各二两】白术【一两】厚朴【二两制】薤白【切一升】生姜【切四两】

右以水五升酒四升煮取三升分四服日三夜一忌海藻菰菜桃李雀肉等类

葵子汤 若曾伤八月胎者当预服

甘草【炙】柴胡 白术【各二两】厚朴【姜制炒】 药

葵子【二升】生姜【六两】大枣【二十枚擘】

右以水九升煮取三升分四服日三夜一日服一剂忌猪肉冷水茺萸桃李雀肉酢物等类

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百节莫不具备饮醴食甘缓带自持而待之是谓养毛发多才力是月足少阴脉所养不可针灸其经此经内属于肾肾主续缕皆成无处温冷无着炙衣若卒下痢腹满悬急上冲腰背痛不可转侧短气宜服半夏汤

半夏汤方

半夏【泡炒五合】麦门冬【去心五合】乾姜【炮一两】当归
吴茱萸阿胶【炙各三两】大枣【十二枚擘】

右以水九升煮取三升去渣内白蜜八合微火温分四服痢即止忌生血物饧

猪肾汤 若曾伤九月胎者当预服

猪肾【一具】茯苓 桑寄生 乾姜【炮】生地黄
芎藭【各三两】白术【四两】麦门冬【一升去心】附子【大者一枚炮】

右以水一斗煮猪肾熟去之内诸药煎三升半分四服日三夜一十日更一剂忌猪肉茱萸桃
李雀肉酢物

妊娠十月五臟俱备六腑通纳天地气于丹田故使关节人事皆备但俟时而生

愚按妊娠所禁之法皆传自上古当永为遵守其方药用须斟酌

芎藭补中汤 治怀孕血气不能荣养以致半产予尝治一妊娠不足月而损坠服此药遂安

乾姜【煨】阿胶【炒】芎藭
五味子【各五分】黄耆【炒】当归白术【炒】杜仲【炒】白芍药【各一钱】木香
人参 甘

草【炙各五分】

右水煎服

妊娠恶阻方论第二

妊娠恶阻病产宝谓之子病巢氏病源谓之恶阻由胃气怯弱中脘停痰脉息和顺但肢体沈
重头眩择食惟嗜酸醎甚者寒热呕吐胸膈烦满半夏茯苓丸主之愚按前症若中脘停痰用
二陈汤加枳殼若饮食停滞用六君子加枳殼若脾胃虚弱用异功散若胃气不足用人参橘
皮汤兼气恼加枳殼胸脇痞闷再加苏梗脇痛再加柴胡若饮食少思用六君子加紫苏枳殼
头晕体倦用六君子汤若脾胃虚弱呕吐不食用半夏茯苓汤盖半夏乃健脾气化痰滯之主
药也脾胃虚弱而呕吐或痰涎壅滯饮食少思胎不安必用茯苓半夏汤倍加白术然半夏白
术茯苓陈皮砂仁善能安胎气健脾胃予常用验矣

附治验

一妊妇呕吐恶食体倦嗜卧此胃气虚而恶阻也用人参橘皮汤二剂渐愈又用六君子加紫苏二剂而安

一妊妇吞酸恶心时欲作呕此因脾胃虚而饮食停滞用六君子加枳壳香附治之而愈

一妊妇停食腹满呕吐吞酸作泻不食余以为饮食停滞兼肝木伤脾土用六君子汤以健脾胃加苍术厚朴以消饮食吴茱萸所制黄连以清肝火诸症悉愈又以六君子加砂仁调理而脾土乃安

白术汤 治胃虚恶阻吐水甚至十余日粥浆不入

白术【炒一钱】 人参【五分】 丁香 甘草【炒各二分】

右姜水煎服

人参橘皮汤 治阻病呕吐痰水饮食少思肢体倦怠人参 橘红

白术【炒】 麦门冬【去心】 白茯苓【各一钱】 厚朴【制】 甘草【炙五分】

右加竹姜水煎服

保生汤 治妊娠恶阻少食呕吐或兼吐泻作渴人参【一钱】 甘草【炒】 白术 香附 乌梅 橘红【各五分】

右姜水煎服

安胎饮 治体倦恶食?胎动腹痛或下血发热甘草【炒】 茯苓 当归 熟地黄【自制】 川芎 白术【炒】 黄耆【炒】 白 药【炒】 半夏【汤泡】 阿胶【切炒】 地榆【各五分】

右姜水煎服

又方缩砂仁为末每服二钱姜汤或米饮调下

附方

二陈汤【方见二十四卷第五论】

六君子汤【方见二十四卷第六论】

异功散【方见二十二卷第三论】

半夏茯苓汤【方见後】

妊娠痰逆不食方论第三

妊娠呕逆者乃水饮停积为痰轻者妨食呕逆甚者腹痛伤胎皆由胃气不健或风冷外乘所致也

愚按前症因食停滯用半夏茯苓汤加枳殼兼气恼更加柴胡因痰壅滯用半夏茯苓汤加白术因风寒外伤用参苏饮饮食腹胀用香砂六君子汤寒热呕吐人参养胃汤

附治验

一妊妇呕吐脇胀或寒热往来面色青黄此木旺而尅脾土用六君子加柴胡桔梗枳殼而安

一妊妇呕吐酸水胸满不食此脾土虚而肝木所侮用六君子加芍药而愈又用四君子加枳殼桔梗而安

一妊妇胸腹膨胀吐痰不食此脾胃虚而饮食为痰用半夏茯苓汤渐愈又用六君子加枳殼苏梗桔梗而饮食如常後因恚怒脇胀不食吐痰恶心用半夏茯苓汤加柴胡山梔而愈

半夏茯苓汤 治妊娠脾胃虚弱饮食不化呕吐不止半夏【泡炒黄】陈皮【各一钱】白茯苓【二钱】砂仁【炒一钱】甘草【炒五分】

右用姜枣乌梅水煎服一二剂後用茯苓丸

茯苓丸 治妊娠烦闷头晕闻食吐逆或胸腹痞闷赤茯苓 人参 桂心 乾姜【炮】半夏【泡洗炒黄】橘红【各一两】白术【炒】葛根 甘草【炒】枳殼【麸炒各二两】

右为末蜜丸桐子大每服五十丸米饮下日三服

四七汤【方见十一卷第七论】

附方

参苏饮【方见六卷第十三论】

六君子汤

四君子汤

香砂六君子汤【三方见二十四卷第六论】

人参养胃汤【方见八卷第十八论】

胎动不安方论第四

妊娠胎动或饮食起居或冲任风寒或跌仆击触或怒伤肝火或脾气虚弱当各推其因而治之若因母病而胎动但治其母若因胎动而母病唯当安其胎轻者转动不安重者必致伤坠若面赤舌青是儿死也面青舌赤吐沫是母死唇口色青两边沫出是母子俱死也察而治之

愚按前症胎气郁滞者用紫苏饮脾气虚弱者六君子汤加苏壳郁结伤脾者归脾汤加柴梔郁怒伤肝脾者四七汤加芎归怒动肝火者加味小柴胡汤若胎已死急用平胃散加朴硝腐化之

附治验

一妊妇内热脯热或兼寒热饮食少思其胎或下坠或上攻此肝经血虚而火动耳先用加味逍遥散数剂次用六君子加柴胡枳壳各数剂而愈

一妊妇因怒寒热胸脇胀痛呕吐不食状如伤寒此怒动肝火脾气受伤也用六君子加柴胡山梔枳壳牡丹皮而愈但内热口乾用四君子加芎归升麻柴胡而安

钓藤汤 治妊娠胎动腹痛面青冷汗气欲绝者钓藤钩 当归 茯神【去木】 人参【各一钱】 苦梗【一钱五分】 桑寄生【一钱】

右水煎服烦热加石膏

黄耆汤 治气虚胎动腹痛下水

糯米【一合】 黄耆【炒】 川芎【各一两】

右水煎分三服

顺气饮子 产前服之安胎

紫苏叶 木香【炮】 人参 草豆蔻 茯苓【各一两】 甘草【炒五钱】 大腹子【一两气弱不用】

右每服三钱苕根三寸糯米少许水煎服

安胎寄生汤 治妊娠下血或胎不安或腰腹作痛

桑寄生 白术【各五分】 茯苓【四分】 甘草【一钱】

右水煎服

又方好银煮取水入葱白作羹食之

又方川芎二两葱白五两水三碗煮二碗半分三服四物汤加熟艾阿胶茯苓或芎藭补中汤杜仲丸皆妙方并见前

附方

紫苏饮【方见十二卷第八论】

六君子汤

四君子汤【二方见二十四卷第六论】

加味小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

平胃散【方见七卷第十八论】

加味逍遥散

归脾汤【二方见二十四卷第四论】

妊娠漏胎下血方论第五

妊娠经水时下此由冲任气虚不能约制盖心小肠二经相为表里上为乳汁下为月水故妊娠经水壅之以养胎蓄之以为乳若经水时下名曰胞漏血尽则毙矣愚按前症若因风热用防风黄芩丸若因血热用加味逍遥散若因血虚用二黄散若因血去太多用八珍汤未应补中益气汤若因肝火用柴胡山梔散若因脾火用加味归脾汤若因事下血作痛用八珍汤加阿胶熟艾若因脾胃虚弱用补中益气汤加五味子若因脾胃虚陷用前汤倍用升麻柴胡若脯热内热宜用逍遥散

附治验方药

一妊妇下血服凉血之药下血益甚食少体倦此脾气虚而不能摄血余用补中益气汤而愈後因怒而寒热其血仍下此肝火旺而血沸腾用加味逍遥散血止用补中益气汤而安

一妊妇下血发热作渴食少体倦属脾气虚而肝火所侮用四君子加柴胡山梔血止因怒复作用六君子加柴胡山梔升麻而安

二黄散 治胎漏下血或内热晡热或头痛头晕或烦躁作渴或脇肋胀痛等症

生地黄 熟地黄【自制】

右为末每服三钱煎白术枳殼汤调下二黄须杵膏为丸庶药不枯槁而有力也

防风黄芩丸【方见後】

加味归脾汤

加味逍遥散

八珍汤【三方见二十四卷第四论】

四君子汤

补中益气汤

六君子汤【三方见二十四卷第六论】

柴胡山梔散【方见二十四卷第三论】

妊娠卒然下血方论第六

妊娠下血因冷热不调七情失宜气血不和所致若伤于胎则痛而下血甚则胎堕矣

愚按前症若因气怒用小柴胡汤若因风热用一味防风丸若因血热用一味子芩丸若因脾气虚弱用六君子汤若因中气下?用补中益气汤若气血盛而下血者乃因儿小饮少也不必服药

附治验

一妊妇六月每怒下血甚至寒热头痛脇胀腹疼作呕少食余谓寒热头痛乃肝火上冲脇胀

腹痛乃肝气不行作呕少食乃肝侮脾胃小便下血乃肝火血热用小柴胡加 药炒黑山栀茯苓白术而愈一妊妇六月体倦食少劳役下血用六君子加当归熟地升麻柴胡而愈

安胎散 治卒然腰痛下血

熟地黄【自制】艾叶白 药【炒】川芎黄耆【炒】阿胶【炒】当归甘草【炒】地榆【各五分】

右姜枣水煎服

附方

子芩丸

治肝经有热妄行用细条黄芩炒为末每服一钱以秤锤烧赤淬酒热调服若脾胃虚不宜用

防风丸 治肝经有风以致血得风而流散不归经用防风为末每服一钱白汤调服

防风黄芩丸 治肝经有风热致血崩便血尿血用条芩炒焦防风等分为末酒糊丸桐子大每服三五十丸食远或食前米饮或温酒送下

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

妊娠惊胎及僵仆方论第七

妊娠惊胎者乃怀妊将满胎神已具坠仆伤胎甚至下血不醒若欲验其子母安否当参第四论治之

愚按前症或因怒跌仆或手足抽搐用钩藤汤若因气滞用紫苏饮若因脾胃气虚用六君子加苏梗若郁结伤脾用归脾汤若郁怒伤肝脾用四七汤加芎归若去血过多用佛手散如不应胶艾汤气血虚八珍加胶艾

神妙佛手散 治胎痛服之即安胎损服之立下【即芎归汤】

当归 川芎【各五钱】

右水酒煎血崩昏晕用水煎服

治妊娠从高坠下腹痛下血

生地黄【二钱】益母草【二钱】当归 黄耆【炒各一钱】

右姜水煎服

胶艾汤 治妊娠顿仆胎动不安腰腹疼痛或胎上抢或去血腹痛

阿胶【一两炙】熟艾叶【数茎】

右以水三碗煮取二碗分三服

又方川芎末二钱酒下二三服胎生即安胎死即下又方失所胎动或子烦饮竹沥一升立愈

又方缩砂和皮炒为末每服二钱米饮下腹热即安秦艽汤【方见前】

安胎散 治顿仆胎动腰腹痛【方见前】

附方

四七汤 治七情郁结成痰或如梅核哽于喉间或中脘停痰气痞或痰壅气喘或痰饮中脘呕逆恶心紫苏叶 厚朴【姜制】茯苓【各一钱】半夏【姜制一钱五分】

右加姜枣水煎白浊送青州白丸子极妙

加味四物汤 治症同前

又方治寒邪所犯心腹作痛

桂枝 芍药【炒】半夏【各一钱】茯苓
厚朴【姜制】枳壳【麸炒】甘草【炒各五分】人参 紫苏【各一钱】

右姜枣水煎服

钓藤汤【方见前】

紫苏饮【方见後】

六君子汤【方见二十四卷第六论】

归脾汤

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

妊娠胎上逼方论第八

妊娠将养如法则血气调和胎得其所而产亦易否则胎动气逆临产亦难甚至危矣

愚按前症若气逆胎上用紫苏饮饮食不甘兼以四君子若内热晡热兼以逍遥散若胃火所致用四君子黄芩枳壳柴梔若脾郁所致用归脾汤加柴梔枳壳

附治验

一妊妇每因恚怒其胎上逼左关脉弦洪乃肝火内动用小柴胡加茯苓枳壳山梔而愈但体倦不食用六君子调养脾土加柴胡枳壳调和肝气乃瘥一妊妇胎上逼胸满暖气饮食少思此脾气郁滞用紫苏饮顿安又用四君子加枳壳柴胡山梔而瘥

紫苏饮 治子悬腹痛或临产惊恐气结连日不下或大小便不利

当归 甘草【炒】 大腹皮【黑豆浸水泡】 人参 川芎 橘皮
白芍药【炒各五分】 紫苏【一钱】

右姜葱水煎○一孕妇累日不产催药不验此坐草太早心怀畏惧气结而血不行也用前饮
一服便产○一妇人孕七月止冲腹痛面不赤舌不青乃子悬也亦用前饮而胎母俱安

当归汤 治胎动烦躁或生理不顺唇口青黑手足厥冷

当归 人参 阿胶【炒】 甘草【炒各一钱】 连根葱白【一握】

右水四碗煎四味至半去滓下葱煎至一碗分二服

大圣散 治妊娠忪悸梦惊心腹胀满连脐急痛白茯苓 川芎
麦门冬【去心】 黄耆【炒】 当归【各一钱】 人参 甘草【炒】 木香【各五分】

右姜水煎服

又方 治胎上逼热痛下血或烦闷困笃用葱二十茎水浓煮饮胎未死即安胎已死即下未效

再服若唇口青黑手足厥冷须佐以当归汤

白术汤 治遍身痛或冲心痛欲死【方见後】

附方

四君子汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

逍遥散

归脾汤【二方见二十四卷第四论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

妊娠下如豆汁胎动腹痛方第九

愚按前症肝脾湿热用升阳除湿汤肝脾风热用加味逍遥散肝脾郁怒用加味归脾汤脾胃气虚用钱氏白术散若脾气下陷用补中益气汤肝经风热用防风黄芩丸风入肠胃用胃风汤

附治验

一妊妇因怒胸膈不利饮食少思服消导顺气之剂脾胃愈弱饮食愈少大便不实且无度久而便黄水?带白视其面色黄中隐白余曰黄色脾虚也白色肺虚也朝以补中益气汤升补胃气夕以六君子汤培补脾气而愈

治妊娠忽然下如豆汁等物或胎动腹痛

糯米【五升】黄耆【炒六两】

右水煎分四服

补遗用野苳根二两好银三五两或金银首饰水酒各半煎服

附方

胃风汤 治风邪乘虚客于肠胃水谷不化泄泻下注腹脇虚满肠鸣作痛及肠胃虚热下如豆

汁或瘀血日夜无度【方见第八卷第十论】

东垣升阳除湿汤 治妇人女子漏下恶血月事不调或暴崩不止多下水浆之物皆由饮食失节或劳伤形体或素患心气不足因饮食劳倦致令心火乘脾其脉缓而弦急按之洪大皆脾土受邪也

柴胡 羌活 苍术 黄耆【炒各一钱五分】 防风 甘草【炙】 升麻
藁本【各一钱】 蔓荆子【七分】 独活 当归【各五分】

右水煎食前服

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

防风黄芩丸【方见前】

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

钱氏白术散【方见二十一卷第二论】

妊娠误服毒药胎动方第十

愚按前症若因毒药用甘草黑豆淡竹叶若因顿仆用阿胶散未应煎送知母丸若因顿仆下血腹痛用佛手散未应用八珍汤送知母丸血出过多用八珍汤斤许益母草四两水煎徐徐与服若胎死以朴硝或平胃散下之

夺命丹 治小产或毒药唇口爪青黑其胎已死牡丹皮 白茯苓 桂心
赤芍药【各为末】 桃仁【去皮尖研如泥】

右等分蜜丸弹子大每服一丸醋汤速进两丸立愈

阿胶散 治妊娠跌仆或毒药致胎不安

熟地黄【二钱自制】 白芍药 艾叶 当归 甘草【炒】 阿胶【炒】 黄耆【炒各一钱】

右姜枣水煎服

药毒胎动甘草乌豆淡竹叶等分用水浓煎服

附方

知母丸【又名一母丸方见十三卷第九论】

佛手散【方见前】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

平胃散【方见八卷第十八论】

妊娠心痛方论第十一

妊娠心痛乃风邪痰饮交结若伤心正经为真心痛朝发夕死夕发旦死若伤心支络则乍安乍作若伤于子臟则胎动而血下

愚按前症若饮食所伤用平胃散加枳殼山查若因错杂诸邪当审其因而治之

附治验

一妊妇心痛烦热作渴用白术散即愈後因停食其痛仍作胸腹膨满按之则痛此因饮食停滞用人参养胃汤按之不痛乃脾胃受伤以六君子补之而愈一妊妇心腹作痛胸脇作胀吞酸不食此肝脾气滞用二陈山查山梔青皮木香而愈又因怒仍痛胎动不食面色青黄肝脉弦紧脾脉弦长此肝乘其土用六君子汤加升麻柴胡木香而愈

治妊妇卒心痛气欲絕

川芎 当归 茯苓 厚朴【制各一钱】

右水煎服

白术汤 治妊娠内热心痛

白术【四钱】 赤 药【三钱】 黄芩【二钱炒】

右水煎忌桃李雀肉

雷公炮炙论云心痛欲死急觅延胡

又方青竹茹一升酒二升煮二升分二服

又方破鸡子一枚调酒服之

紫苏饮【方见前】

附方

人参养胃汤

平胃散【二方见七卷第十八论】

二陈汤【方见二十四卷第五论】

六君子汤【方见二十四卷第六论】

妊娠心腹痛方论第十二

妊娠心腹痛或宿有冷疾或新触风寒或痰饮相搏若痛伤胞络必致动胎甚则伤堕

愚按前症若风寒痰饮用金沸草散胎气郁滞加香附川芎若饮食停滞用六君子加紫苏枳壳若怒动肝火用前药更加柴胡山梔若郁结伤脾用归脾汤加枳壳山梔

附治验

一妊妇心腹作痛吐痰恶心胎气上攻饮食少思此脾虚气滞而为痰用六君子加柴胡枳壳诸症渐退饮食渐进又用四君子加枳壳山梔桔梗而安後因怒两脇气胀中脘作痛恶寒呕吐用六君子加柴胡升麻木香一剂而愈

当归芍药汤 治妊娠心腹急痛或去血过多而眩晕白 药【炒】当归 茯苓 白术【炒】泽泻【各一钱】川芎【二钱】

右水煎服

阿胶散 治胎动腹痛

白茯苓 白术【炒】川芎 阿胶【各一钱炒】当归 陈皮【各二钱】甘草【炒三分】

右水姜枣煎服

治胎动腹痛欲落上等银一斤茅根二斤去黑皮水五碗煮取三碗入清酒一碗并茅根煎数沸徐徐服立安金银首饰亦可

附方

金沸草散【方见六卷第十二论】

紫苏饮【方见前】

四君子汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

归脾汤【方见二十四卷第六论】

妊娠中恶方论第十三

妊娠若忽然心痛闷绝欲死者谓之中恶盖因气血不足精神衰弱故邪毒得以中之也

愚按前症当调补正气为善用金银藤一味煎汤饮之

又方治前症

生地黄【二钱】枳壳【一钱】木香【三分】

右酒煎服

又方苦梗一两姜半两水煎服

又方心腹痛或吐血衄血熟艾如拳大煮汁服

又方用盐一盞水调服以冷水嚥之吐出即安

又方竈心土为末每服二钱白汤调

妊娠腰腹背痛方论第十四

肾主腰足因劳役伤损其经以致风冷乘之腰腹相引而痛盖妇人肾以系胞妊娠痛甚则胎堕也

愚按前症若外邪所伤用独活寄生汤劳伤元气用八珍杜仲砂仁胶艾脾肾不足以前药加白术补骨胎气血郁滞用紫苏饮加桔梗枳壳肝火所动用小柴胡汤加白术枳壳山梔肝脾郁结用归脾汤加柴胡枳壳

附治验

一妊妇颈项强直腰背作痛此膀胱经风邪所致用拔萃羌活汤一剂而愈又用独活寄生汤及八珍汤以祛邪固本而痊

通气散治肾虚腰痛神妙破故纸炒为末空心每服二钱嚼核桃肉半个以温酒下

杜仲丸

治妊娠腰背痛杜仲炒续断酒浸等分为末煮枣肉丸桐子大每服七十丸酒下米饮亦可

胶艾汤 治腰腹疼痛胎动欲落即前妊娠下血补遗内安胎散

附方

独活寄生汤【方见四卷第七论】

八珍汤

归脾汤【二方见二十四卷第四论】

紫苏饮【方见前】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

羌活胜湿汤【方见四卷第一论】

妊娠小腹痛方论第十五

妊娠小腹痛由胞络虚风寒相搏痛甚亦令胎动也愚按前症若风寒所搏用紫苏饮加生姜气血虚用八珍汤脾气虚用六君子汤中气虚用补中益气汤若腹胀痛用安胎饮加升麻白术不应兼补中益气汤

附治验方药

一妊妇小腹作痛其胎不安气攻左右或时逆上小便不利用小柴胡汤加青皮山梔清肝火

而愈後因怒小腹胀满小便不利水道重坠胎仍不安此亦肝木炽盛所致用龙胆泻肝汤一剂诸症顿愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

紫苏饮【方见前】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

四君子汤

六君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

安胎饮【方见前】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

妊娠心腹胀满方论第十六

夫妊娠心腹胀满者由脾胃虚寒复因冷饮相搏所致也

愚按前症若外感风寒内伤饮食用藿香正气散若食伤脾胃用六君子汤若阳气壅滞用紫苏饮

附治验

一妊妇饮食停滞心腹胀满?用人参养胃汤加青皮山楂枳壳其胀益甚其胎上攻恶心不食右关脉浮大按之则弦此脾土不足肝木所侮余用六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞闷用补中益气汤升举脾气乃瘥

下气汤 治心腹两脇胀闷饮食少思四肢无力羌活 赤 药【炒】甘草【炒】槟榔 青皮 大腹皮桑白皮【炒】赤茯苓 半夏【姜制】陈皮【各五分】桂心【二分】紫苏茎【一钱】

右水煎服

局方枳壳散保风散紫苏饮藿香正气散皆良

附方

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

人参养胃汤【方见七卷第十八论】

薛氏医案卷三十六

卷三十七

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷三十七

明 薛己 订

妇人良方

妊娠数堕胎方论第一

夫胎乃阳施陰化荣卫调和经养完全十月而产若血气虚损不能养胎所以数堕也凡妊妇腰痛多堕胎愚按丹溪先生曰阳施陰化胎孕乃成血气虚乏不能荣养其胎则坠譬如枝枯则果落藤痿则花坠尝治贾氏妇每有孕至三月前後必坠诊其脉左右大而无力量重则濇知其血虚也补其中气则血自荣时正初夏教以浓煎白术汤下黄芩末二钱与数十贴得保而生因而思之堕于内热而虚者于理为多曰热曰虚盖孕至三月上属相火所以易堕不然何以黄芩熟艾阿胶等为安胎之妙如此也大抵治法须审某月属某经育养而药之

附治验

一妊妇五月服剪红丸而胎堕及腹胀痛乃服破血之剂痛益甚手不敢近予曰此峻药重伤脾胃也用八珍倍加参耆半夏乳香没药二剂而痛止数剂而安

吴江庠史万湖仲子室年二十余疫疾堕胎时咳服清肺解表之药喘急不寐予以为脾土虚而不能生肺金药复损而益甚也先与补中益气加茯苓半夏五味炮姜四剂渐愈後往视之用八珍加五味及十全大补汤而愈

一方鲤鱼二筋者一尾粳米一升用盐酱煮食甚善月食三次

芎藭补中汤杜仲丸治气虚而胎坠【方见十二卷第一论】

附方

十全大补汤

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

妊娠不长方论第二

夫妊娠不长者因有宿疾或因失调以致臟腑衰损气血虚弱而胎不长也当治其疾疾益其气血则胎自长矣

愚按前症更当察其经络审其所因而治之

附治验

一妊妇胎六月体倦懒食面黄晡热而胎不长因劳欲坠此脾气不足也用八珍汤倍加参术茯苓三十余剂脾胃渐健胎安而长矣

一妊妇因怒寒热往来内热晡热脇痛呕吐胎至八月而不长此因肝脾郁怒所致用六君子加柴胡山梔枳殼紫苏桔梗病愈而胎亦长矣

黄耆汤 治妊娠不长更安胎和气

黄耆【炒】白术【炒】陈皮 麦门冬【去心】白茯苓 前胡人参【各五分】川芎甘草【炒三分】

右姜枣水煎服

集验用鲤鱼长尺许如食法饮其汁其胎渐大而长矣

附方

六君子汤【方见二十四卷第六论】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

妊娠胎动不安下方论第三

夫人以胃气壮实冲任荣和则胎得所如鱼处渊若气血虚弱无以滋养其胎终不能成也宜下之以免其祸愚按前症宜用第十二卷十四方论主之其胎果不能安者方可议下慎之慎之

附治验

鸿胪张淑人痢疾後胎动心神不安肢体殊倦用八珍散二十余剂渐愈因劳加烦热头痛以大剂补中益气汤加蔓荆子治之热痛顿止仍用前散又五十余剂而安其後生产甚易

桂心散 治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心 瓜蒌 牛膝 麦【各五分】 当归

右水煎

又方牛膝一两酒一鍾煎七分作二服

小品方用麦蘖一升搗碎水二升煮一升服之神效观麦蘖能损气破血如此脾胃虚弱饮食不化者不宜用明矣

文仲取鸡子一枚盐三钱服之立下

佛手散服之胎死者即下生者亦安【方见十二卷第七论】

附方

八珍汤【方见二十四卷第四论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

妊娠堕胎後血下方论第四

堕胎後复损经脉而下血不止甚则烦闷至死皆以调补胃气为主

愚按前症若肝经血热用四物参术山梔肝经风热用防风黄芩丸肝经怒火用加味逍遥散脾经气虚用四君子归地脾经郁滞用加味归脾汤气滞不和用紫苏饮胃气下陷用补中益气汤

附治验

一妊妇堕胎昏愦不时吐痰自用养血化痰之剂昏愦不省自汗发搐痰涎涌出彼以为中风欲用祛风化痰予曰此属脾气虚寒所致遂用十全大补汤加炮姜二十余剂寻愈

治妊娠损动下血腹痛

阿胶【一两炒】艾叶【半两】

右水一大盏煎

因堕胎下血烦满寒热狂闷镑鹿角炒为末每服三钱水调下日三服或家鸡翎烧为末每服二钱温酒下良久再服以效为度

附方

四物汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

紫苏饮【方见十二卷第八论】

防风黄芩丸【方见十二卷第六论】

加味逍遥散

加味归脾汤

十全大补汤【三方见二十四卷第四论】

妊娠未足月欲产方论第五

妊娠未足月而痛如欲产或应产而难或为子烦用知母一味蜜丸桐子大粥饮服之或槐子蒲黄等分为丸酒服或蒲黄水调钱许并效

愚按小产重于大产盖大产如瓜熟自脱小产如生采断其根蒂岂不重哉而人轻忽死于是者多矣大抵治法宜补形气生新血去瘀血为主若未足月痛而欲产用芎归补中汤倍加知母止之产而血不止人参黄耆汤补之产而心腹痛当归川芎汤主之元气弱而欲产八珍汤固之出血过多而发热圣愈汤治之若汗不止或昏愤喘咳急用独参汤若发热烦躁或肉瞤筋惕用八珍汤大渴面赤脉洪而虚者用当归补血汤身热面赤脉沈而微者用四君子姜附以回其阳可也

附治验方药

一妊妇八月胎欲坠如产卧久少安日晡益甚此气血虚弱朝用补中益气汤加茯苓半夏随愈更以八珍汤调理而安

当归川芎汤 治小产後瘀血心腹疼痛或发热恶寒当归 川芎
熟地黄【自制】白芍药【炒】元胡索【炒】红花 香附 青皮 泽兰 牡丹皮 桃仁

右水煎入童便酒各小半盏服

若以手按腹愈痛此瘀血为患宜用此药或失笑散消之若按之不痛此是血虚宜用四物参
苓白术若痛而作呕此是胃虚宜用六君子若痛而作泻此是脾虚宜六君子送二神丸

芎归补中汤 治气血虚而欲产

艾叶【代姜】阿胶【炒】川芎
五味子【杵炒】黄耆【炙】当归白术【炒】芍药【炒】人参
杜仲【炒各一钱】甘草【炙五分】

右每服五钱水煎服

若脾气虚弱须用补中益气汤若气虚而有火宜用安胎饮

人参黄耆汤 治小产气虚血下不止

人参 黄耆【炒】当归 白术【炒】白 药【炒】艾叶【各一钱】阿胶【炒二钱】

右作一剂水煎服

当归散 治产後气血虚弱恶露内停增寒发热宜服此药

当归 白芍药【炒】川芎 黄芩【炒各一两】白术【五钱】

右为细末温童便调下二钱

圣愈汤【方见二十四卷第九论】

独参汤【方见三卷第十三论】

当归补血汤

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

断产方论第六

易曰天地之大德曰生然妇人有临产艰难或生育不已而欲断之故录验方以备所用若服水银?虫水蛭之类不惟孕不复怀且祸在反掌

愚按前云用蚕故纸尺许烧灰为末产後酒服之血虚者终不复孕大抵断产之剂多用峻厉往往有不起者是则产之害未若断产之害也吾闻阁老张罗峯太常李恒斋俱因服断产之剂自谓形体俱怯遇劳必病有由然矣

千金断产用油煎水银一日方息空心服枣大一丸永断其孕且不损人

千金去胎大麴五升清酒一斗煮二沸去滓分五服隔宿勿食旦再服其胎如糜母无所苦千金不传

四物汤每服五钱加芸薹子二撮于经行後空心温服

妊娠咳 方论第七

夫肺内主气外司皮毛皮毛不密寒邪乘之则咳 秋则肺受之冬则肾受之春则肝受之夏则心受之其 不已则传于腑妊娠病久不已则伤胎也

愚按前症若秋间风邪伤肺用金沸草散夏间火邪尅金用人参平肺散冬间寒邪伤肺用人参败毒散春间风邪伤肺用参苏饮若脾肺气虚用六君芎归桔梗若血虚四物桑皮杏仁桔梗肾火上炎用六味丸加五味子煎服脾胃气虚风寒所伤用补中益气加桑皮杏仁桔梗盖肺属辛金生于巳土 久不愈者多因脾土虚而不能生肺气而腠理不密以致外邪复感或因肺气虚不能生水以致陰火上炎所致治法当壮土金生肾水为善诸臟腑 见六卷第十一等论

附治验

一妊妇气喘痰甚诸药不效素有带下始于目下浮两月余其面亦然此气虚而有痰饮也用六味丸料数剂而愈

一妊妇 则便自出此肺气不足肾气亏损不能司摄用补中益气汤以培土金六味丸加五味以生肾气而愈

一妊妇咳 其痰上涌日五六碗许诸药不应予以为此水泛为痰用六味丸料及四君子汤各一剂稍愈数剂而安

一妊妇因怒咳 吐痰两脇作痛此肝火伤肺金以小柴胡汤加山梔枳壳白术茯苓治之而愈但欲作呕此肝侮脾也用六君子加柴胡升麻而痊

桔梗散 治风寒咳 喘急不食

天门冬【去心】赤茯苓【各一钱】桑白皮
桔梗【炒】紫苏【各五分】麻黄【去节三分】贝母 人参 甘草【炒】

右姜水煎

马兜铃散 治咳 气喘

马兜铃 苦梗 人参 甘草 贝母【各五分】陈皮【去白】大腹皮【黑豆水浸洗】紫苏 桑白皮【各五钱】五味子【五分】

右姜水煎

百合散 治咳 胃膈烦闷

川百合 紫苑 麦门冬 桑白皮 苦梗【各五分】甘草【三分】竹茹【二分】

右姜水煎

治妊娠伤寒涎多咳

知母 杏仁 天门冬 桑白皮【各五分】

右姜水煎服

旋覆花汤治感冒喘 胸满痰盛【方见二十二卷第四论】

华盖散治症同上或项背拘急鼻塞头眩时发寒热【方见六卷第十二论】

参苏饮加杏仁五味子治症同上

附方

金沸草散【方见六卷第十二论】

人参平肺散【方见二十四卷第十二论】

人参败毒散【方见二十四卷第十论】

补中益气汤

四君子汤

六君子汤【三方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十二论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

妊娠吐血衄血方论第八

妊娠吐血由七情臟腑所伤气逆于上致血上溢不止心闷甚者多死或堕胎也宜用局方必胜散

愚按前症若肝经怒火先用小柴胡山梔生地次用前药合四物後用加味逍遥散肝经风热防风子芩丸心经有热朱砂安神丸心气不足补心汤思虑伤心妙香散胃经有火犀角地黄汤膏粱积热加味清胃散郁结伤脾加味归脾汤肺经有火黄芩清肺饮因气郁滞紫苏饮子气不摄血用补中益气汤肾经虚火加味六味丸仍以七卷第五论互用

附治验方药

一妊妇因怒吐血两脇胀痛小便淋瀝此怒而血蓄于上随火出也用小柴胡合四物四剂血止用六君子安胎饮调理而安

紫苏饮 治妊娠失调胎气不安上攻作痛或气逆失血【方见十二卷第八论】

若肝脾气血虚而有火不安宜兼逍遥散若脾气虚弱而不安宜用四君芎归

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

四物汤

补中益气汤

六君子汤【三方见二十四卷第六论】

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

防风子芩丸【方见十二卷第六论】

朱砂安神丸【方见三卷第十论】

养心汤【方见三卷第十论】

妙香散【方见三卷第十一论】

安胎饮【方见十二卷第一论】

犀角地黄汤【方见七卷第六论】

加味清胃散【方见二十四卷第一论】

黄芩清肺饮【方见八卷第一论】

加味六味丸【方见二十四卷第十一论】

妊娠子烦方论第九

论曰妊娠苦烦闷者以四月受少阴君火以养精六月受少阳相火以养气若母心惊胆寒多有是症产宝云是心肺虚热或痰积于胸若三月而烦者但热而已若痰饮而烦者吐涎恶食大凡停痰积饮寒热相搏吐甚则胎动不安

愚按前症若因内热用竹叶汤气滞用紫苏饮痰滞用二陈白术黄芩枳壳气郁用分气饮加川芎脾胃虚弱用六君紫苏山栀

附治验

一妊妇烦热吐痰恶食恶心头晕此脾虚风痰为患用半夏白术天麻汤以补元气祛风邪渐愈惟头晕未痊乃用补中益气汤加蔓荆子以升补阳气而愈

竹叶汤 治子烦

防风 黄芩【炒】 麦门冬【各一钱】 白茯苓【二钱】

右竹叶数片水煎服

人参散 治热乘心脾烦热乾渴

人参 麦门冬 赤茯苓 地骨皮 乾葛 黄芩【炒】 犀角【镑各一钱】 甘草【五分】

右水煎

竹茹汤 治妊娠烦躁或胎不安淡竹茹一两水煎服益母丸知母炒为末枣肉丸弹子大每服一丸人参煎汤下

附方

分气饮 治脾胃虚弱气血不和胃膈不利或痰气喘 饮食少思

陈皮 茯苓 半夏【炒】 桔梗【炒】 大腹皮

紫苏梗枳壳【麸炒】 白术【炒】 山梔【炒各一钱】 甘草【炙五分】

右姜枣水煎

紫苏饮【方见十二卷第八论】

二陈汤【方见二十四卷第五论】

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

妊娠烦躁口乾方论第十

足太陰脾之经其气通于口手少陰心之经其气通于舌若臟腑不调气血不和以致内热乘于心脾津液消烁故心烦口乾也与子烦大同小异宜用益母丸愚按前症若胃经实火用竹叶石膏汤若胃经虚热用人参黄耆散若胃经气虚用补中益气汤若肺经虚热用紫苏饮若肝经火动用加味逍遥散若脾气郁结用加味归脾汤若肾经火动加味地黄丸

附治验

一妊妇烦热兼咽间作痛用知母散加山梔以清肺经而愈後内热咳 小便自遗用补中益气加麦冬山梔以补肺气滋肾水而痊

知母散治烦躁闷乱口乾

知母 麦门冬 黄耆【炒】 子芩【炒】 赤茯苓【各一钱】 甘草【五分】

右水煎入竹沥一合更煎二沸而服

人参黄耆散 治身热烦躁口乾

人参 黄耆【炒】 葛根 秦艽 赤茯苓 麦门冬【各一钱】 知母 甘草【五分】

右姜三片竹叶二七片水煎

补遗人参白术散黄耆六一汤皆良

附方

竹叶石膏汤

石膏【一钱】 半夏【一钱五分】 甘草 人参【各一钱】 麦门冬 竹叶【各五分】

右姜水煎服

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

紫苏饮【方见十二卷第八论】

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

六味地黄丸【方见二十四卷第十一论】

薛氏医案卷三十七

卷三十八

钦定四库全书

薛氏医案卷三十八

明薛己订

妇人良方

妊娠中风方论第一

论曰四时八方之气为风也常以冬至之日候之若从其乡来者长养万物否则名为虚邪贼害万物体虚中之客于皮肤则顽痺不仁入于筋脉则挛急喎僻若兼湿热则弛纵痿软若入臟腑气随所伤经络而为诸病妊娠中之必须早治庶免堕胎之患

愚按病机机要云风本为热热胜则风动宜以静胜其燥是亦养血也治法须少汗亦宜少下多汗则虚其卫多下则损其荣虽有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者多着四肢之间则脉浮恶寒拘急不仁中臟者多着九窍之中则唇缓失音耳聋鼻塞目瞽便秘中腑者宜汗之中臟者宜下之表里已和宜治在经当以大药养之此中风之要法也妊妇患之亦当以此施治而佐以安胎之药仍参三卷首论主治之为是

防风散 治妊娠中风卒倒口噤肢强或痰气上升防风 桑寄生 葛根【各五分】 家菊花 细辛 防己 秦艽 当归 桂心 茯神 甘草 羚羊角【镑各三分】

右水煎入竹沥半合服

白术酒 治妊娠中风口噤不语

白术【一两半】 独活【一两】 黑豆【一合炒】

右酒煎分四服灌之得汗即愈

补遗治妊娠中风排风汤续命汤参苏汤【加羌活】

引风汤皆可选用【方见第三卷中风类】

妊娠风痉方论第二

论曰妊娠体虚受风而伤足太阳经遇风寒相搏则口噤背强甚则腰反张名之曰痉须臾自醒良久复作又名子痫子冒当审察其因而治之

愚按前症若心肝风热用钓藤汤肝脾血虚加味逍遥散肝脾郁怒加味归脾汤气逆痰滞紫苏饮肝火风热钓藤散脾郁痰滞二陈姜汁竹沥若兼症相杂当参照子烦门

附治验

一妊妇出汗口噤腰背反张时作时止此怒动肝火也用加味逍遥散渐愈又用钓藤散而止更以四君加钓藤山栀柴胡而安

一妊妇因怒忽仆地良久而苏吐痰发搐口噤项强用羚羊角散渐愈用钓藤散始痊又用归脾汤而安

羚羊角散 治妊娠冒闷角弓反张名曰子痫风痉羚羊角【镑】独活 酸枣仁【炒】五加皮 薏苡仁【炒】防风 当归【酒浸】川芎 茯神【去木】杏仁【去皮尖各五分】木香甘草【炙各二分】

右姜水煎

附方

钓藤汤【方见十二卷第四论】

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

紫苏汤【方见十二卷第八论】

钓藤汤【方见四卷第四论】

二陈汤【方见二十四卷第五论】

四君子汤【方见二十四卷第六论】

妊娠瘕瘕方论第三【新附】

窃谓瘕者筋脉急而缩也瘕者筋脉缓而伸也一缩一伸手足相引搐搦不已大抵与婴孩发

搐相似谓之瘈瘲也此症多属风盖风主摇动骆龙吉云心主脉肝主筋心属火肝属木火主热木主风风火相炽则为瘈瘲也治法若因风热用钩藤汤加柴胡山梔黄芩白术以平肝木降心火养气血若风痰上涌加竹沥南星半夏若风邪急搐加全蝎僵蚕亏损气血用八珍汤加钩藤山梔为主若无力抽搐戴眼反折汗出如珠者肝气绝也皆不治

附治验【方药】

一妊妇四肢不能伸服祛风燥血之剂遗尿痰甚四肢抽搐余谓肝火血燥用八珍汤加炒黑黄芩为主佐以钩藤汤而安後因怒前症复作小便下血寒热少寐饮食少思用钩藤散加山梔柴胡而血止用加味逍遥散寒热退而得寐用六君子汤加芍药钩藤饮食进而渐安

八珍汤【方见二十四卷第四论】

六君子汤【方见二十四卷第六论】

妊娠胎方论第四

夫人臟腑调和则血气充实精神健旺若荣卫虚损精神衰弱妖魅之类乘之亦如怀妊之状故曰鬼胎也愚按前症因七情脾肺亏损气血虚弱行失常道冲任乖违而致之者乃元气不足病气有余也若见经候不调就行调补庶无是症治法以补元气为主而佐以雄黄丸之类行散之若脾经郁结气逆者用加味归脾汤调补之若脾虚血不足者用六君芎归培养之肝火血耗者用加味逍遥散滋抑之肝脾郁怒者用加味归脾逍遥二药兼服肾肝虚弱者用六味地黄丸

附治验

一妇人经闭八月肚腹渐大面色或青或黄用胎症之药不验余诊视之曰面青脉濡寒热往来肝经血病也面黄腹大少食体倦脾经血病也此郁怒伤脾肝之症非胎也不信仍用治胎散之类不验余用加味逍遥归脾二药各二十余剂诸症稍愈彼欲速效别服通经丸一服下血昏愤自汗恶寒手足俱冷呕吐不食余用人参炮姜二剂渐愈又用十全大补汤五十余剂而安

雄黄丸 治鬼胎瘀血腹痛

雄黄 鬼白【去毛】 獭肝【炙黄】 丹砂【细研】 巴豆【去油皮】 莽草蜥蜴【一枚炙黄】 蜈蚣【一条炙黄】

右为末蜜丸桐子大每服二丸空心温酒下日二服下如蛇虫之类其病乃除

治鬼胎及血气痛不可忍

斑猫【去头翅足制】延胡索【炒各等分】

右为末以温酒调下半钱以下秽物为度

附方

加味归脾汤

加味逍遥散

十全大补汤【三方见二十四卷第四论】

六君子汤【方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

妊娠伤寒方论第五

夫时令严寒体虚所伤即成伤寒轻者洒淅恶寒翕翕发热微咳鼻塞数日而愈重者头疼体痛寒热交作久而不愈者多致伤胎也

愚按前症为害匪轻当审其经络表里而治之不可轻忽

加减四物汤 治妊妇腹痛或月事不调胎气不安产後血块或亡血过多或恶露不下

当归 川芎 白芍药【炒】熟地黄【各一两】

右每服四五钱水煎日二三服下血加艾叶阿胶虚热口乾加括萎根麦门冬恶血腹痛加当归 药血崩血淋加熟地蒲黄因热生风加川芎柴胡头昏项强加柴胡黄芩大便秘结加大黄桃仁呕吐恶心加白术人参虚烦不眠加竹叶人参烦躁大渴加知母石膏水停吐逆加猪苓茯苓虚烦伤寒加人参柴胡防风

阿胶散 治时气先服此以安胎却以主药间服阿胶【炙】白术【炒】桑寄生 人参 白茯苓

右为末等分每服一钱用糯米饮调下日三服

前胡汤 治伤寒头痛壮热肢节烦疼

石膏【一钱】 前胡 甜竹茹 梔子【炒】 黄芩【炒】 大青知母【各五分】

右用葱白水煎服

苏木汤 治伤寒时行洒淅寒振或兼嘔者

赤 药 橘红 黄芩【炒】 黄连 甘草 苏木【各五分】

右用水煎服汗出即瘥如胎不安兼服阿胶汤

黄龙汤 治妊妇寒热头疼嘿嘿不食脇痛呕痰及产後伤风热入胞宫寒热如疟或经水适来劳复热不散

柴胡【二钱】 黄芩【炒】 人参 甘草【各一钱】

右用水煎服

柴胡石膏汤 治头痛恶寒身热拘急口乾

柴胡【二钱】 甘草【一钱】 石膏【三钱】

右用姜水煎服气虚加人参

枳实散 治伤寒四日至五六日腹胀少食腹疼体重

枳实【炒三钱】 陈皮【一钱】 麦门冬【一钱五分】

右用生姜葱白水煎服

旋覆花汤 治伤寒头目旋疼壮热心躁

旋覆花 赤 药 甘草【各五分】 前胡 石膏【各一钱】 白术 人参 麻黄【去根节】 黄芩【各三分】

右用姜水煎服

麦门冬汤 治伤寒壮热呕逆头疼胎气不安

人参 石膏【各钱半】 前胡 黄芩【各五分】 葛根 麦门冬【一钱】

右姜枣竹茹一分用水煎服

梔子大青汤 治发斑变黑尿便血

升麻 梔子【一钱】 大青 杏仁 黄芩【各一钱】

右用葱白三寸水煎服

白术汤 治伤寒烦热头痛胎动或时吐逆不食白术 橘红 麦门冬 人参 前胡 赤茯苓川芎
甘草 半夏【各五分】

右用生姜竹茹一分水煎服

良方白术散 治伤寒

白术 黄芩【炒各二钱】

右用姜枣水煎服若四肢厥逆陰症也不可用

芎苏散 治外感风寒壮热头疼心胸烦闷

紫苏叶 川芎 白术 白 药 麦门冬【去心】 陈皮 乾葛【各五分】 甘草【炙三分】

右用生姜葱白水煎

参苏饮【去木香】 治证同前【方见六卷第十二论】

妊娠时气方论第六

论曰四季之间非其时而有其气谓春寒夏冷秋热冬煖之不正也所感者不拘长少其症相
类故云时气妊娠患之重者多致伤胎

愚按前症与前伤寒互相主治

秦艽散 治时气五六日不得汗口乾饮水狂言呕逆秦艽

柴胡【各五分】 石膏【一钱】 犀角【镑】 赤茯苓 前胡甘草 葛根 升麻
黄芩【各四分】

右用淡竹茹一分水煎服

葛根饮子 治时气烦热口乾头痛

乾葛 麻黄【去节根各半两】石膏【一两】豉【一合】白米【半合】栀子【二七粒】葱白【二茎】

右用水煎分三服汗出为效

消热饮子 治时气六七日大小便不利

芒硝【一两细研】葵子【二两】

右如前煎服以利为效芒硝即朴硝

人参败毒散【方见二十四卷第十论】

妊娠热病方论第七

冬时触冒严寒即病为伤寒藏于肌骨夏至发为暑病即热症也妊娠患之多致堕胎热病与中暑相似但热病者脉实中暑者脉虚治当审察不可槩施

愚按此症与前後三症同治

治妊娠热病头痛呕吐烦闷

人参【一方无】竹茹
葛根【各一两】知母【三两】芦根【二两】麦门冬【去心一两半】

右每服四钱连根葱白三寸水煎

栀子仁饮 治热病发斑黑色小便如血气喘急胎欲落

栀子 升麻 石膏 生地黄【各二两】黄芩 大青【各一两】

右每服半两葱白七寸豉四十九粒水煎

大黄饮 治热病六七日大小便秘涩

大黄【微炒】石膏【各两】知母 赤茯苓 前胡【各三分】梔子 甘草 黄芩【各半两】

右每服五钱生地黄一分煎服

又方伏龙肝细研每服一钱水调下【外用水调涂脐下】

又方葛根煮汁时服一盞

补遗芦根汤 治热病头疼心烦呕吐

知母【四两】青竹茹【三两】

右每服五钱生芦根一握糯米一撮水煎

梔子五物汤 治妊妇伤寒壮热头痛

梔子 前胡 知母【各二两】黄芩【一两】石膏【四两】

右每服五钱用水煎服

升麻六物汤 治伤寒斑黑溺血

升麻 梔子【各二两】大青 杏仁 黄芩

右每服五钱葱头水煎

妊娠伤寒热病防损胎方论第八

论曰非节之气伤于妊娠热毒侵损胞胎若不早治多致堕胎漏血则子母之命亦不能全矣

愚按前症当分察六经为主而参于前後方论

治妊娠伤寒身痛壮热

葱白【切一升】前胡 葛根

石膏【各十分】青黛【六分】升麻【八分】梔子【十二个】

右用水煎分三服

治妊娠伤大小便秘结

前胡【十分】 大黄 石膏【各二十分】 梔子【十枚】 知母 黄芩 茯苓 生姜【各八分】

右用水煎分三服

治妊娠伤寒发斑忽黑小便如血胎欲落

梔子 升麻【各四两】 青黛【二两】 生地黄【二十枚】 石膏【八两】 葱白【切片】
黄芩【三两】

右用水煎分三服忌热物

又用井中泥涂心下乾则易【二方出本事再录有効】

补遗治妊娠热病先以白术散安胎【方见前】

妊娠热病胎死腹中方论第九

论曰热病以致胎死不能出者但服黑神散胎自下矣愚按陈无择先生曰前症当视产母若面赤舌青知其子死面青舌赤知母死子生唇青吐沫子母俱死若双胎?一死一活用黑神散窃谓前症宜补助产母使其胎自下黑神散恐其太热不宜轻用果一胎已死者用平胃散朴硝水银下之最为稳当庶不并伤生者【平胃散方见後】

黑神散【又名乌金散灵苑方名肉桂散】

桂心 当归 药甘草【炙】 乾姜【炒】 生地黄【各一两】 黑豆【炒去皮二两】 附子【泡去皮脐半两】

右为末每服二钱空心用温酒调下

补遗胎死用红花酒煮汁饮二三碗

又方伏龙肝为末温酒调下二钱白汤亦可

又方朴硝末童子小便和热酒调下三钱立出

妊娠疟疾方论第十

论曰妊娠病症乃夏伤于暑客于皮肤至秋而发阳盛则热陰盛则寒陰阳相离寒热俱作其发晏者由风邪客于风府循膂而下卫气至一日一夜常大会于风府故发日晏与早者卫气之行风府日下一节二十一日下至尾骶二十二日入脊内上注于伏卫之脉其行九日出缺盆其气既止故发更早其间日发者风邪内搏五臟横连募原其道远其气深其行迟不能日作也妊娠而发多伤于胎

愚按前症因脾胃虚弱饮食停滯或外邪所感或郁怒伤脾或暑邪所伏审系饮食停滯用六君子加桔梗苍术藿香外邪多而饮食少用藿香正气散外邪少而饮食多用人参养胃汤劳伤元气用补中益气汤若郁怒所伤用小柴胡兼归脾汤若木侮土久而不愈用六君子为主佐以安胎药乃参三陰三阳经而治之

附治验

一妇人因怒患症举发无期久而不已胸腹不利饮食少思吞酸吐痰用六君子加柴胡山梔二十余剂寻愈但晡热少食又用四君子加柴胡升麻为主佐以逍遥散而痊

一妇人症久不已暖气下气胸腹膨胀食少欲呕便血少寐此属肝脾郁怒用归脾汤加柴胡山梔渐愈又用六君子汤加柴胡山梔升麻而愈

一妊妇患症已愈但寒热少食头痛晡热内热此脾虚血弱也用补中益气汤加蔓荆子头痛顿止又用六君子汤加芎归饮食顿进再用逍遥散加参术而寒热愈

七宝散 治症疾一日一发或一日两发或间一日发常山 厚朴【姜制】 青皮 陈皮【并去白】 甘草【炒】 槟榔 草菓【等分】

右每服半两酒水各一碗煎至一盞去粗露一宿发时面东温服良久再服一妊妇先寒後热六脉浮紧用前散一剂而愈

人参养胃汤 治妊娠症疾寒多热少或但寒不热头痛恶心身痛面色青白脉弦迟者又有驱邪散治证亦同【方见七卷第十八论】

清脾汤 治妊妇症疾寒少热多或但热不寒口苦舌乾大便秘涩不进饮食脉弦数者

青皮 厚朴【姜制】 白术【炒】 草菓 茯苓 半夏【炒】 黄芩 柴胡 甘草【炙各五分】

右用姜水煎

附方

交加散 治食症神效

肉豆蔻【二个一生一煨】草豆蔻【二个一生一煨】甘草【二钱半炒半生】厚朴【二钱半炒半生】生姜【一两半煨半生】

右用姜水煎发日五更服

仲景白虎加桂枝汤 治温症

知母【六钱】桂枝 黄芩【各一钱】栝蒌根【二钱】甘草【炙】牡蛎乾姜【各一钱】

右用水煎服汗出即愈此少阳经药也

桂枝羌活汤 治症处暑以前头痛脉浮恶风有汗

桂枝 羌活 防风 甘草【各一钱五分】

右水煎发服吐加半夏麴

麻黄羌活汤 治症如前但恶寒无汗

麻黄【去节】羌活 防风 甘草【各半两】

右如前服加法同二方太阳经药也

白芷汤 治症身热目痛热多寒少脉长先以大柴胡下之微利为度余热不尽当服此汤

白芷【一两】知母【一两七钱】石膏【四两】

右粗末依前服阳明经药也

桂枝 药汤 治症寒热不论先後此太阳阳明合病寒热作则必战经曰热胜而动也发热则必汗泄经曰汗出不愈知内热也乃陰盛阳虚之证此汤主之否则久而传于陰经矣

桂【五分】黄耆【炒】知母 石膏 药【各二钱】

右粗末水煎此太阳阳明经药也

桂枝黄芩汤 如服前药转甚三阳合病也宜此和之柴胡【一钱五分】黄芩 人参

甘草【各八分】半夏石膏知母【各五分】

右每粗末依前服如外邪已解而内未已再服下药从卯至午发大柴胡下之从午至酉发邪气在内也大承气下之从酉至子发或至寅发邪气在血也桃仁承气汤下之微利後更以小柴胡汤彻其邪气按此太阳阳明少阳经药也以上诸方并系发风寒暑热之气自外而入中于三阳之经者也

桂枝石膏汤 治疟疾隔日先寒後热寒少热多

桂枝【五钱】石膏【一两五钱】知母【一两五钱】黄芩【一两】

右分三服水煎此太阳阳明经药也隔日发者邪气所舍深者也

麻黄黄芩汤 治疟发如前症而夜发者

麻黄【一两去节】甘草【炙三钱】黄芩【五钱】桂【二钱】桃仁【三十个去皮尖】

右依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血骤则肝气燥经所谓肝苦急急食甘以缓之故桃仁散血缓肝谓邪气深远而入血故夜发乃陰经有邪此汤发散血中风寒治风暑深入陰分乃血受病邪气所舍尤深者也麻黄桂枝桃仁等乃太阳经血药非三陰经药也

附方

四君子汤

六君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

藿香正气散【方见二十一卷第十论】

人参养胃汤【方见七卷第十八论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

妊娠霍乱方论第十一

夫饮食过度触冒风冷陰阳不和清浊相干谓之霍乱其间或先吐或腹痛吐利是因于热也若头痛体疼发热是挟风邪也若风折皮肤则气不宣通而风热上冲为头痛若风入肠胃则泄利呕吐甚则手足逆冷此阳气暴竭谓之四逆妊娠患之多致伤胎也

愚按前症若因内伤饮食外感风寒用藿香正气散若因饮食停滞用平胃散果脾胃顿伤阳气虚寒手足逆冷者须用温补之剂治当详审毋使动胎也

附治验

一妊妇霍乱已止但不进饮食口内味酸泛行消导寬中余曰此胃气伤而虚热也当用四君子汤彼不信乃服人参养胃汤呕吐酸水其胎不安是药复伤也仍与四君子汤俾煎热令患者先嗅药气不作呕则呷少许恐复呕则胎为钩动也如是旬月而愈

人参散 治脾胃虚寒霍乱吐泻心烦腹痛饮食不入人参
厚朴【姜制】橘红【各一钱】当归 乾姜【炮】甘草【炙各五分】

右用枣水煎服

人参白术散 治脾胃虚弱吐泻或吐泻作渴不食白术 茯苓 人参 甘草【炒】木香
藿香【各五分】乾葛【一钱】

右用水煎服吐甚加生姜汁频饮之

缩脾饮 解伏热除烦渴消暑毒止吐泻宜沈冷频服

草薢仁【四两】乌梅肉【三两】甘草【炒二两半】

右每服半两用姜十片水煎

木瓜煎 治吐泻转筋闷絕

吴茱萸【汤泡七次】生姜【切各一分】木瓜【木刀切两半】

右每服二三钱用水煎

治霍乱其效神速一方有黄连无扁豆仍与第二论通用妊妇霍乱腹痛四肢冷逆汗脉细理中汤治之伤食加陈皮寒甚脉欲絕陰症悉具加炮附子方见二十卷

竹茹汤治霍乱热渴脉数【见七卷呕吐门】

附方

藿香正气散【方见二十一卷第十论】

平胃散【方见七卷第十八论】

四君子汤【方见二十四卷第六论】

人参养胃汤【方见七卷第十八论】

五苓散【方见二十一卷第十论】

理中丸【方见二十卷第八论】

香薷饮【方见七卷第二论】

薛氏医案卷三十八

卷三十九

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷三十九

明 薛己 订

妇人良方

妊娠泄泻方论第一

论曰妊娠泄泻或青或白水谷不化腹痛肠鸣谓之洞泄水谷不化喜饮呕逆谓之协热下利并以五苓散利小便次以黄连阿胶丸或三黄熟艾汤以安之若泻黄有沫肠鸣腹痛脉沉紧数用戊己丸和之暖腐不食胃脉沉紧用感应丸下之後调和脾胃若风冷水谷不化如豆汁用胃风汤寒冷脐下阴冷动泄用理中汤治中汤伏暑心烦渴泻水用四苓散伤湿泄泻小便自利用不换金正气散胃苓汤此四证之大略也仍参第八卷第八论主之

愚按米食所伤用六君加谷麋面食所伤用六君加麦麋肉食所伤用六君加山楂若兼寒热作呕乃肝木侮脾土用六君加柴胡生姜兼呕吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加姜桂不应用钱氏益黄散若元气下陷发热作渴肢体倦怠用补中益气汤若泄泻色黄乃脾土之真色用六君加木香肉果若作呕不食腹痛恶寒乃脾土虚寒用六君加木香姜桂若泻在五更侵晨饮食少思乃脾肾虚弱五更服四神丸日间服白术散如不应或愈而复作或饮食少思急用八味丸补命门火以生脾土为善不可忽也

附治验

边太常侧室妊娠泄泻自用枳术黄连之类腹闷吐痰发热恶寒饮食到口即欲作呕强匙许即吞酸不快欲用祛痰理气余曰此因脾胃伤而痰滞中脘若治痰气复伤脾胃矣遂以参术炮姜为末丸如黍粒不时含咽三五丸渐加至三日後日进六君子汤而寻愈

进士王缴徵之内怀妊泄泻恶食作呕余曰脾气伤也王君忧之强进米饮余谓饮亦能伤胃且不必强俟脾胃醒宿滞自化饮食自进不信别用人参养胃汤饮之吐水酸苦又欲投降火寒药余曰若然则胃气益伤也经云损其脾胃者调其饮食适其寒温後不药果愈

厚朴丸 治洞泄寒中

乾姜【炒】厚朴【去皮等分】

右水拌炒为末水糊丸梧子大每服五十丸米饮下

草果散 治虚寒泄泻腹痛无度

厚朴【姜汁拌炒二两】肉豆蔻【十个面煨】草豆蔻【十个煨】

右每服三钱用姜水煎

附方

附子理中汤【方见二十卷第八论】

理中丸

五苓散【二方见二十一卷第十论】

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

钱氏益黄散【方见二十一卷第九论】

四神丸【方见八卷第八论】

七味白术散【方见二十一卷第二论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

妊娠下麻黄水方论第二

论曰妊娠饮食生冷脾胃不能克化致令心腹疼痛若血分病则色赤气分病则色白血气俱病则赤白相杂若热乘大肠血虚受惠则成痢也

愚按治痢之法当参前篇其下黄水乃脾土亏损真色下陷也当升补中气若黄而兼青乃肝木克脾土宜平肝补脾若黄而兼白乃子令母虚须补脾胃若黄而兼黑是水反侮土矣必温补脾胃若黄而兼赤乃心母益子但补中益气若肠胃虚弱风邪客之用胃风汤或胎气不安急补脾胃而自安矣凡安胎之药当临病制宜不必拘用阿胶艾叶之类

附治验

地官胡成甫之内妊娠久痢自用消导理气之剂腹内重坠胎气不安又用阿胶艾叶之类不应余曰腹重坠下元气虚也胎动不安内热盛也遂用补中益气而安又用六君子汤全愈

治妊娠利黄水

厚朴【姜汁炙二两】黄连【二两】肉豆?【五个连皮】

右用水煎徐徐服忌如前【已上六方并出产宝】

治妊娠热痢

黄连【一升】黄蘗【一升】梔子仁【二十枚】

右用每服五钱水煎呕加橘皮生姜

治妊娠下痢腹痛小便澀滯

糯米【一合】当归【炒】黄芪【各一两】

右用水煎分四服

治临产下痢用梔子炒为末每服二钱白汤调甚效

附方

胃风汤【方见十二卷第九论】

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

妊娠大小便不通方论第三

夫妊娠大小便不通由脏腑之热所致若大肠热则大便不通小肠热则小便不利大小肠俱热更推其因而药之

愚按前症若大肠血燥用四物汤加条芩桃仁大肠气滯用紫苏饮加杏仁条芩肠胃气虚用六君子加紫苏杏仁肝脾蕴热用龙胆泻肝汤心肝虚热用加味逍遥散加车前子

附治验

亚卿李蒲汀侧室妊娠大小便不利或用降火理气之剂元气反虚肝脉弦急脾脉迟滞视其面色青黄不泽余曰此郁怒所致也用加味归脾汤为主佐以加味逍遥散而安

主政王天成之内妊娠痢疾愈後二便不通其家世医自用清热之剂未效余诊其脉浮大而濇此气血虚也朝用八珍汤加桃仁杏仁夕用加味逍遥散加车前子而瘥

当归散 治妊娠因怒肚腹胀痛四肢浮肿气急作喘大便难小便澁产门肿

当归【五分】 赤茯苓 枳殼【麯炒】 白芍药
川芎【各一钱】 白姜【炮】 木香【煨】 粉草【各三分】

右用姜水煎气弱枳殼減半大便秘加蜜同煎

治妊娠大小便不通腹胀痞闷不思饮食

大黄【炒】 木通
?榔【各一两】 枳殼【麯炒三钱】 诃梨勒【四个去核半生半煨】 大腹子【三枚】

右为末用童便一盞葱白二寸煎六分调服二钱

初虞世治妊娠风气大便秘澁

枳殼【三两麯炒】 防风【二两】 甘草【炙一两】

右为末每服一二钱空心用白滚汤调日三服

小品治妊娠小便不利气急服猪苓散不瘥用甘遂为末蜜和服豆许微利之未利再服利後仍服猪苓散

猪苓散 治妊娠小便澁痛及胎水猪苓去皮为末白汤调下钱许加至二钱日三夜二服

又方车前子一两大黄半两为末每服三钱蜜汤调

附方

四物汤

四君子汤【二方见二十四卷第六论】

紫苏饮【方见二十四卷第八论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

加味逍遥散

加味归脾汤

八珍汤【三方见二十四卷第四论】

妊娠小便不通方论第四

夫妊娠小便不通为小肠有热传於脬而不通耳若兼心肺气滞则致喘急陈无择云妊娠胎满逼胞多致小便不利若心肾气虚清浊相干而为诸淋若胞系了戾小便不通名曰转胞若胞满尿出名曰遗尿

愚按丹溪先生转脬小便闭多因胎妇虚弱忧闷性躁食味厚古方用滑利疏导药鲜效若脬为胎所堕而不通但升举其胎胞系疏而小便自行若脐腹作胀而小便淋闭此脾胃气虚胎压尿胞四物二陈参术空心服後探吐数次自安窃谓前症亦有脾肺气虚不能下输膀胱者亦有气热鬱结膀胱津液不利者亦有金为火烁脾土湿热甚而不利者更当详审施治

附治验

司徒李杏冈仲子室孕五月小便不利诸药不应余曰非八味丸不能救不信别用分利之药肚腹肿胀以致不起

儒者王文远室患此小腹肿胀几至於殆用八味丸一服小便滴?再以前丸之料加车前子一剂即利肚腹顿宛而安

八味丸 治妇人饮食如故烦热不得卧反倚息因脬系了戾不得溺名转脬但利小便则愈盖此药有茯苓故也缓则不救【方见二十四卷第十一论】

古今録验妊娠小便难饮食如故

当归 贝母【去心炒】 苦参【各三两】 滑石【半两】

右为末炼蜜丸小豆大每服二三十丸米饮下

治妊娠小便不通脐下妨闷心神烦乱

葵子【研】榆白皮【切各一两】葱白【七茎】

右水煎分三服

古今録验妊娠不得小便杏仁去皮尖炒黄捣丸灯心汤吞七粒

又方滑石末水和涂脐下

又方用车前草汁调滑石末涂脐周围四寸热易之又方捣杏仁入滑石末饭丸小豆大每服二十丸白汤下

又方用紫苑为丸井花水调下二钱

葵子散

治妊娠小便不利身重恶寒眩晕及水肿用葵子五两赤茯苓五两为末每服二钱米饮调

附方

四物汤【方见二十四卷第六论】

二陈汤【方见二十四卷第五论】

妊娠子淋方论第五

妊娠小便淋者乃肾与膀胱虚热不能制水然妊妇胞系於肾肾间虚热而成斯症甚者心烦闷乱名曰子淋也

愚按前症若颈项筋挛语澹痰甚用羚羊角散若小便澹少淋?用安荣散若肝经湿热用龙胆泻肝汤若肝经虚热用加味逍遥散腿足转筋而小便不利急用八味丸缓则不救若服燥剂而小便频数或不利用生地茯苓牛膝黄栢知母芎归甘草若频数而色黄用四物加黄柏知母五味麦门玄参若肺气虚而短少用补中益气加山药麦门若陰挺痿痹而频数用地黄丸若热结膀胱而不利用五淋散若脾肺燥不能化生宜黄芩清肺饮若膀胱阴虚阳无所生用滋肾丸若膀胱阳虚陰无所化用肾气丸

附治验

一妇人每怒发热脇胀小便淋澹如遇经行旬余未已受胎三月因怒前症复作朝用加味道

遥散夕用安胎饮各二剂而安五月又怒复下血如经行四日未止仍用前药而愈

一妊娠饮食後因恼怒寒热呕吐头痛恶寒胸腹胀痛大便不实其面青色小便频数时或有血服安胎止血之剂益甚余曰寒热呕吐而腹胀此肝木尅脾土而元气伤也大便不实而面青此饮食伤脾兼肝侮土也小便频数而有血此肝热传胞而兼挺痿也用六君子加枳殼紫苏山梔二剂脾胃顿醒又用加味逍遥散加紫苏枳殼二剂小便顿清後节饮食调理而安

地肤大黄汤 治子淋

大黄【炒三两】地肤草【三两】知母 黄芩【炒】猪苓 通草赤芍药 升麻
枳实【炒】甘草【各二两】

右每服四五钱水煎服

安荣散 治子淋甚妙

麦门冬【去心】通草 滑石 当归 灯心 甘草 人参 细辛【各五分】

右水煎服

治小便淋痛心烦闷乱

?麦穗 赤茯苓 桑白皮 木通 葵子【各一钱】黄芩【炒】芍药 枳殼
车前子【炒各五分】

右水煎服

治子淋小便澀痛

冬葵子 滑石 木通【各等分】

右每服四五钱葱白七寸水煎

猪苓散 疗子淋小便澀痛【方见本卷第三论】

附方

羚羊角散【方见四卷首论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

加味逍遥散

四物汤【二方见二十四卷第四论】

肾气丸【即六味丸】

六味丸

八味丸【三方见二十四卷第十一论】

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

五淋散

滋肾丸

黄芩清肺饮【三方见八卷第一论】

安胎饮【方见十二卷第二论】

妊娠遗尿方论第六

妊娠尿出不知用白薇芍药为末酒调下或白矾牡蛎为末酒调二钱或鷄毛灰末酒服一匕或炙桑螵蛸益智子仁为末米饮下

愚按前症若脬中有热宜用加味逍遥散若脾肺气虚宜用补中益气汤加益智若肝肾陰虚宜用六味丸

附治验方药

一妊妇遗尿内热肝脉洪数按之微弱或两太阳作痛脇肋作胀余以为肝火血虚用加味逍遥散六味地黄丸寻愈後又寒热或发热或恚怒前症仍作用八珍散逍遥散兼服以清肝火养肝血而痊

附方

加味逍遥散

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

六味地黄丸【方见二十四卷第十一论】

妊娠尿血方论第七

妊娠尿血内热乘於血分以致血热流渗於脬名子淋用葵子一升研细水五升煮二升分三服或生艾叶一斤酒五升煮二升分三服或生地黄一斤酒四升煮二升分三服亦治落产後下血

愚按前症因怒动火者宜小柴胡加山梔因劳动火者宜补中益气汤若因厚味积热宜用加味清胃散若因肝经血热宜用加味逍遥散若因脾气下陷宜用补中益气汤若因脾虚血热宜用加味逍遥散

附治验

一妊妇因怒尿血内热作渴寒热往来胸乳间作胀饮食少思肝脉弦弱此肝经血虚而热也用加味逍遥散六味地黄丸兼服渐愈又用八珍汤加柴胡丹皮山梔而痊

续断汤 治妊娠下血及尿血

续断【半两】赤芍药【五钱】当归 生地黄【各一两】

右为末每服二钱空心用葱白煎汤调下

治妊娠尿血

阿胶【炒为末四两】熟地黄【用生者四两酒拌蒸熟杵膏】

右和丸桐子大每服七八十丸空心粥饮下

五苓散【去桂加阿胶炒同为粗末】每四钱用车前子白茅根水煎温服

又方白茅根浓煎汤吞酒蒸黄连丸

附方

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

加味清胃散【方见二十四卷第一论】

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

妊娠胎水肿满方论第八

产乳集云妊娠三月足肿至腿出水饮食不甘似水肿谓之子气至分?方消者此脾胃气虚或冲任经有血风名医録云宋少主元徽与徐文伯微行学鍼法文伯见一妊妇足肿脉之少主曰此女形也文伯曰此鬼胎也在左而黑遂用鍼胎下果然亦有脾虚水气流溢或因泻痢脏腑虚寒或因疟疾饮水脾虚湿渍或因水渍於胞不能分利皆致腿足肚腹肿症也

愚按前症若胸满腹胀小便不通遍身浮肿用鲤鱼汤脾胃虚弱佐以四君子若面目虚浮肢體如水气用全生白术散如未应用六君子汤脾虚湿热下部作肿用补中益气加茯苓若饮食失宜呕吐泄泻用六君子汤若腿足发肿喘闷不安或指缝出水用天仙藤散脾胃虚弱兼四君子汤如未应用补中益气汤若脾肺气滯用加味归脾汤佐以加味逍遥散

附治验

一妊娠每胎至五月肢體倦怠饮食无味先两足肿渐至遍身後及头面此是脾肺气虚朝用补中益气夕用六君子加苏梗而愈凡治妊娠母泥月数但见某经症即用本药为善

天仙藤散 治妇人有水气而成胎以致两腿足浮肿天仙藤【洗略炒】香附子【炒】陈皮甘草 乌药【软白者辣者良各五分】

右每服五钱生姜木瓜苏叶各三片水煎日三服

泽泻散 治妊娠遍身浮肿上气喘急大便不通小便赤澀

泽泻 桑白皮【炒】木通 枳殼【麸炒】?榔 赤茯苓【各五分】

右姜水煎服

防己散 治脾虚遍身浮肿腹胀喘促小便不利防己【三钱】桑白皮【炒】紫苏茎叶赤茯苓【各五分】木香【二分】

右姜水煎

千金鲤鱼汤 治妊娠腹小胎间有水气

白术【五两】茯苓【四两】当归 芍药【各三两】

右先以小鲤鱼一头如食法煮取汁每汁二盏入药五钱姜七片橘皮少许煎七分空心服

肾着汤 治妊娠腰脚肿

茯苓 白术【各八分】乾姜【炮】甘草【各一钱】杏仁【五分】

右用水煎服

五丸散 治胎水肿满

大腹皮 桑白皮【炒】生姜皮 橘皮 茯苓皮【各一钱】木香

右水煎服

治妊娠脚浮肿因脾衰血化成水用生料平胃散姜枣水煎服或为末用苏叶汤调下每服二钱

全生白术散 治妊娠面目浮虚四肢肿如水气名曰胎气名曰胎肿

白术【一两】生姜皮 大腹皮 陈皮 白茯苓【各半两】

右各为末每服二钱米饮下

附方

四君子汤

六君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

加味归脾汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

妊娠腹内钟鸣方论第九

治孕妇腹内鸣用鼠窟中土为末入麝香酒调下二钱立愈或黄连浓煎汁母常呷之

愚按产宝云小儿在腹中哭其治法亦用空房中鼠穴土或黄连煎浓饮之即止想即是症又云脐带上疙瘩儿含口中因妊妇登高举臂脱出儿口以此作声令妊妇曲腰就地如拾物仍入儿口即止然黄连性寒麝香开窍当酌量用之

龚彦德孕痛方第十

治孕痛用乌药五钱水一钟煎七分入牛皮胶一两煎化温服或薏苡仁煮汁饮之

愚按孕痛即是腹内患痛如前法不应宜用牡丹皮散或薏苡仁汤【治验见二十四卷】

妊娠不语论第十一

孕妇不语不须服药临产月但服保生丸四物汤产下便语黄帝问曰人有重身九月而瘖何也岐伯对曰胞络繫於肾肾脉贯系舌本故不能言十月分娩後自为之言也

愚按前症果内经穷理之言人有患此当调摄以需之不必惊畏而泛用药也

妊娠伤食方论第十二

经曰饮食自倍肠胃乃伤又云陰之所生本在五味陰之五宫伤在五味故妊娠伤食最难调治者

愚按东垣先生云脾胃之气壮则过时而不饥多食而不伤盖胃主司纳脾主消化五脏之本也然食倍而伤者乃脾气虚而不化也若投以峻剂则脾胃复伤而胎亦损矣当审其所因而调治之若饮食停滯或肚腹作痛用平胃散呕吐恶心加枳殼砂仁吞酸暖腐加黄连三分吴茱萸二分腹满泄泻用六君子汤停滯肉食倍加山楂停滯面食倍加麦蘖停滯糯食用白酒麴末一味米食停滯倍加谷蘖鱼腥所伤倍加陈皮伤辛热之物加黄连伤性冷之物加砂仁木香如不应更加肉豆蔻补骨脂再不应用四神丸若脾气下陷用补中益气汤凡暖觉药气且戒药餌节饮食经云损其脾者调其饮食适其寒温大凡脾胃虚弱饮食难化以白术陈皮为末等分陈麴糊丸常服最善枳术丸但可暂用枳实峻厉能耗真气治者慎之

附治验

一妊娠因停食服枳术丸胸腹不利饮食益少更服消导宽中之剂其胎下坠余谓此脾气虚而不能承载也用补中益气及六君子汤中气渐健其胎渐安又用八珍汤加柴胡升麻调理而痊

木香丸 治妊娠脾胃虚弱饮食不消肚腹膨胀或呕吐泄泻

木香【二钱】白术【炒】人参 白茯苓【各等分】

右为末面糊丸菉豆大每服三四十丸熟水下

白术散 治妊娠脾胃虚弱气不调和饮食易伤白术【炒】紫苏【各一两】人参
白芷【各三钱炒】川芎 青皮诃子皮【各半两】甘草【炒一钱】

右每服二钱姜水煎

附方

平胃散【方见七卷第十八论】

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

四神丸【方见八卷第八论】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

妊娠脏燥悲伤方论第十三

许学士云一妇无故数次悲泣是为脏燥用大枣汤而愈又程虎卿内妊娠五月惨戚悲伤亦投大枣汤而愈愚按前症或因寒水攻心或肺有风邪者治当审察

附治验

一妊妇无故自悲用大枣汤二剂而愈後复患又用前汤佐以四君子加山梔而安

一妊妇悲哀烦燥其夫询之云我无故但自欲悲耳用淡竹茹汤为主佐以八珍汤而安

大枣汤

甘草【三两】小麦【三两】大枣【十枚】

右水六锺煎三锺分三服亦补脾气

淡竹茹汤 治妊娠心虚惊悸脏燥悲伤或作虚烦麦门冬【去心】小麦
半夏【汤炮各一钱五分】人参 白茯苓【各一钱】甘草【五分】

右姜枣并竹茹少许水煎

治胎脏燥悲哭用红枣烧存性米饮调下

附方

四君子汤【方见二十四卷第六论】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

薛氏医案卷三十九

卷四十

钦定四库全书

薛氏医案卷四十

明薛已订

妇人良方

坐月门【妊娠疾病既明须知坐月避忌故以次之】

产宝方周頔序第一

頔闻至灵者人最重者命人皆知命之重而不知养命之方以致年未衰迈疾病攻夺仓卒寻医多致有误况妇人病惟产难为急子母命悬片时故产二三楼者脏腑未衰血气未减疾病易治若孕育过多复自乳子血气愈伤尤难治若产後血气未复胃气益伤诸症蜂起此古人所以专着产乳方论余故偏采产宝等方兼拾咎氏之遗作为论说萃为一编刊行于世以救危急云时丁巳岁秋八月吉日周頔谨序

将护孕妇论第二

凡妊娠至临月当安神静虑时当步履不可多睡饱食过饮酒醴杂药宜先贴产图依位密铺床帐预请老练稳婆备办汤药器物欲产时不可多人喧閤惶惶但用老妇二人扶行及凭物站立若见浆水腰腹痛甚是胎离其经令产母仰卧令儿转身头向产门用药催生坐草若心烦用水调服白蜜一匙觉饥吃糜粥少许勿令饥渴恐乏其力不可强服催药早於坐草慎之

愚按前论当慎守之此先哲好生之德防患於未萌者也仁哉

滑胎例第三

凡妊娠十月宜服滑胎汤药

滑胎枳殼散令胎瘦产易河阳公主每产累日不下南山道人进此方

商州枳殼【麯炒二两】粉草【炒一两】

右为末每服二钱空心沸汤调日三服凡孕六七月宜服之温隐居加当归广木香各等分

易产兼治诸疾下气宽膈

枳壳【麸炒五两】甘草【一两半】香附子【三两炒去毛】

右为末每服二钱用白汤调服

内补丸治妊妇冲任脉虚补血安胎

熟地黄【二两用生地酒拌蒸熟杵膏】当归【一两炒为末】

右为末和丸梧子大每服三四十丸温酒或滚汤下许学士云大率妊娠唯在抑阳助阴然胎前药唯恶羣队阴阳错杂别生他病唯枳壳散所以抑阳四物汤所以助阴尔然枳壳散其味多寒若单服恐致胎寒腹痛更以内补丸佐之则阳不至强阴不至弱阴阳调和有益胎嗣此前人未尝论及也

易产滑胎车前子为末或酒或饮服寸匙诗云茱萸能令妇人乐有子矣陆机注云治妇人产难愚详孔子序诗云乐然则生易於生育即此谓也

神寝丸 临月服之神效【蕲州施少卿方蕲州徐太丞传】

通明乳香【半两别研】枳壳【一两麸炒】

右为末炼蜜丸梧子大每服三十丸空心温酒下

榆白皮散 治妊娠滑胎易生

榆白皮 甘草【各二两】葵子【一两】

右为末每服五钱水煎

孕及九月将产猪肚一具煮烂徐徐自食尽易产保元散

治宽气进食瘦胎易产或居处失宜顿仆胎动若胎痛胎漏兼服佛手散【见通用方】

香附【四两】山药【二两】砂仁【一两】木香【四两】粉草【一两】益智
紫苏叶【各半两】

右为末每服二钱白汤调下

神寝丸枳壳散见前此三药入月宜常服

保产无忧散

治妊妇身居安逸口厌甘肥忧乐不常食物不节致胞胎肥厚根蒂坚牢入月服之则易生矣

当归 川芎 白芍药 枳壳【麸炒】 乳香【各三钱】 木香 甘草
血余【即发灰以獾猪心血和之各一钱半】

右为末每服三钱水煎日二服神效

月空方位例第四【出太平圣惠方外台秘要同】

正月 三月 五月 七月 九月 十一月在丙壬 二月 四月 六月 八月 十月 十二月在甲庚

逐月安产藏衣忌向方位第五

凡安产藏衣方位并於卧舍内分布太平圣惠方云凡妊妇初入月便写产图一本以朱书某月某日空贴在某位如正月在丙壬可於壬位安产妇床帐丙位藏衣之类贴产房北壁若值闰月只看节气用之又云每月产图有雷公招摇运鬼力士天狗轩辕大时咸池丰隆吴时白虎大夫天候狂虎凡此十三神并从月建易其位所谓月空者按内经云月廓空无写主冰注云论月轮中空日也即非十三神之数今太平圣惠方以六阳月在丙壬以六陰月在甲庚正如外台所言正月在丙壬至十二月在甲庚之类其理一也但外台言之详圣惠言之简今人多从其简或云凡逐月安产藏衣并向月德月空方位所有十三神杀并从节气更换若交次月节便作次月用书产图者非也假如正月十四日立春若妊妇十三日乳卧岂可作去年十二月用必依月分用之乃是若依节气使换则天德月德所在差矣然月空与任谓之中天空颇相类议者以为天空者非十三神之数盖课中有天乙贵人其位无可与对者故此空是谓天空值此神百事不宜止宜安产妇床帐藏衣之类耳集圣历云天德正月在丁二月在坤三月在壬四月在辛五月在乾六月在甲七月在癸八月在艮九月在丙十月在乙十一月在巽十二月在天又堪輿历有游年白虎杀神在太岁後一辰如太岁卯则白虎在寅余仿此推之若产及藏衣犯之则母子皆不利

王子亨云难产逆生论称犯一切神杀固有是理然亦有自然难产儿自逆生者及有产肠俱下者产已则复如故此非疾病所致血气所主天下之理盖有

不可穷诘者亦宜知之

安产藏衣十三神吉凶方位

藏安运雷招斩咸丰天狂天大白

衣产鬼公摇辕池隆狗虎侯夫虎

吉吉力大吴

方方士时时

正月 壬丙艮寅寅卯辰辰辰午申酉戌

二月 坤【甲寅】 乾亥卯子丑未巳酉巳戌亥

三月 丙壬坤申辰酉戌戌午子寅亥子

四月 甲庚巽巳巳午未丑未酉亥子丑

五月 丙壬艮寅午卯辰辰申子申丑寅

六月 庚甲乾亥未子丑未酉卯巳寅卯

七月 丙壬坤申申【子酉】 戌戌戌子寅卯辰

八月 【庚艮】 甲巽巳酉【酉午】 戌丑亥卯亥辰巳

九月 丙壬艮寅戌卯辰辰子午申巳午

十月 庚甲乾亥亥子丑未丑卯巳午未

十一月 【壬巽】 丙坤申子酉戌戌寅午寅未申

十二月 庚甲巽巳丑午未丑卯酉亥申酉

推妇人行年法第六

生气方 产妇宜向之坐卧及产帐向之开门大吉反支月
遇此月即铺灰上用牛皮或马驴皮讫铺草勿令恶血污地吉

祸害月 不得於其上产又不得向之二便避之大吉絶命方
不得於其上产又不得向之大小便避之大吉

悬尸日 遇此日产不得攀绳宜悬马辔攀之大吉闭肚方
临月至满月并不得向之大小便及弃不净之水谨之吉

八?方产帐不得向之开门忌之大吉

生反祸絶悬闭八产卧宜

气支害命尸肚?母宜唤

方月方方日方方

十三岁行年在庚申坤【正七月】离巽【辰戌日】

在正西偏北辛 在正东偏北甲 黄色衣西南首西南方黄衣师看产

十四岁行年在己未【二八月】坤兑【卯酉日】

在正北偏西壬 在正北偏东癸 赤色衣正南首正南方赤衣师看产

十五岁行年在戊午坎【三九月】乾艮【丑未日】

在正东偏北甲 在正北偏西壬 黑色衣正北首正北方黑衣师看产

十六岁行年在丁巳震【四十月】艮乾【丑未日】

在正东偏北甲 在正西偏北辛 青色衣正东首正东方青衣师看产

十七岁行年在丙辰艮【五十月】震艮【子午日】

在正东偏南乙 在正南偏南庚 黄色衣东北首东北方黄衣师看产

十八岁行年在乙卯乾【六十二月】坎震【己亥日】

在正南偏东丙 在正南偏西丁 白色衣西北首西北方白衣师看产

十九岁行年在甲寅兑【正七月】巽离【辰戌日】

在正南偏西丁 在正南偏东丙 白色衣正西首正西方白衣师看产

二十岁行年在癸丑巽【二八月】兑坤【卯酉日】

在正西偏南庚 在正东偏南乙 青色衣东南首东南方黄衣师看产

二十一岁行年在壬子坤【三九月】离巽【寅申日】

在正西偏北辛 在正东偏北甲 黄色衣西南首西南方黄衣师看产

二十二岁行年在辛亥离【四十月】坤兑【丑未日】

在正北偏西壬 在正北偏东癸 赤色衣正南首正南方赤衣师看产

二十三岁行年在庚戌坎【五十一月】乾艮【子午日】

在正北偏东癸 在正北偏西壬 黑色衣正北首正北方黑衣师看产

二十四岁行年在己酉震【六十二月】艮乾【己亥日】

在正东偏北甲 在正西偏北辛 青色衣正东首正东方青衣师看产

二十五岁行年在戊申艮【正七月】震坎【辰戌日】

在正东偏南乙 在正西偏南庚 黄色衣东北首东北方黄衣师看产

二十六岁行年在丁未乾【二八月】坎震【卯酉日】

在正南偏东丙 在正南偏西丁 白色衣西北首西北方白衣师看产

二十七岁行年在丙午兑【三九月】巽离【寅申日】

在正南偏西丁 在正南偏东丙 白色衣正西首正西方白衣师看产

二十八岁行年在乙巳巽【四十月】兑坤【丑未日】

在正西偏南庚 在正东偏北乙 青色衣东南首东南方青衣师看产

二十九岁行年在甲辰坤【五十一月】离巽【子午日】

在正西偏北辛 在正东偏南甲 黄色衣西南首西南方黄衣师看产

三十岁行年在癸卯离【六十二月】坤兑【己亥日】

在正北偏西壬 在正北偏东癸 赤色衣正南首正南方赤衣师看产

三十一岁行年在壬寅坎【正七月】乾艮【辰戌日】

在正北偏东癸 在正北偏西壬 黑色衣正北首正北方黑衣师看产

三十二岁行年在辛丑震【二八月】艮乾【卯酉日】

在正东偏北甲 在正西偏北辛 青色衣正东首正东方青衣师看产

三十三岁行年在庚子艮【三九月】震坎【寅申日】

在正东偏南乙 在正西偏南庚 黄色衣东北首东北方黄衣师看产

三十四岁行年在己亥乾【四十月】坎震【丑未日】

在正南偏东丙 在正南偏西丁 白色衣西北首西北方白衣师看产

三十五岁行年在戊戌兑【五十一月】巽离【子午日】

在正南偏西丁 在正南偏东丙 白色衣正西首正西方白衣师看产

三十六岁行年在丁酉巽【六十二月】兑坤【己亥日】

在正西偏南庚 在正东偏南乙 青色衣东南首东南方青衣师看产

三十七岁行年在丙申坤【正七月】离巽【辰戌日】

在正西偏北辛 在正东偏东甲 黄色衣西南首西南方黄衣师看产

三十八岁行年在乙未离【二八月】坤兑【卯酉日】

在正北偏西壬 在正北偏东癸 赤色衣正南首正南方赤衣师看产

三十九岁行年在甲午坎【三九月】乾艮【寅丑日】

在西北偏东癸 在正北偏西壬 黑色衣正北首正北方黑衣师看产

四十岁行年在癸巳震【四十月】艮乾【丑未日】

在正东偏北甲 在正西偏北辛 青色衣正东首正东方青衣师看产

四十一岁行年在壬辰艮【五十一月】震坎【子午日】

在正东偏南乙 在正西偏南庚 黄色衣东北首东北方黄衣师看产

四十二岁行年在辛卯乾【六十二月】坎震【己亥日】

在正南偏东丙 在正南偏西丁 白色衣西北首西北方白衣师看产

四十三岁行年在庚寅兑【正七月】巽离【辰戌日】

在正南偏西丁 在正南偏东丙 白色衣正西首正西方白衣师看产

四十四岁行年在己丑巽【二八月】兑坤【卯酉日】

在正西偏南庚 在正东偏南乙 青色衣东南首东南方青衣师看产

四十五岁行年在戊子坤【三九月】离巽【寅申日】

在正西偏北辛 在正东偏北甲 黄色衣西南首西南方黄衣师看产

四十六岁行年在丁亥离【四十月】坤兑【丑未日】

在正北偏西壬 在正北偏东癸 赤色衣正南首正南方赤衣师看产

四十七岁行年在丙戌坎【五十一月】乾艮【子午日】

在正北偏东癸 在正北偏西壬 黑色衣正北首正北方黑衣师看产

四十八岁行年在乙酉震【六十二月】艮乾【己亥日】

在正东偏北甲 在正西偏北辛 青色衣正东首正东方青衣师看产

四十九岁行年在甲申艮【正七月】震坎【辰戌日】

在正东偏南乙 在正西偏南庚 黄色衣东北首东北方黄衣师看产 坐产时更用後法

体玄子借地法第七

东借十步 西借十步 南借十步

北借十步 上借十步 下借十步

壁方之中四十余步安产借地或有秽污或有东海神王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有日游将军白虎大夫远去十丈轩辕招摇举高十文天符地轴入地十丈令地空闲产妇某氏安居无所妨碍无所畏忌诸神拥护百邪速去急急如律令勅【前项借地法於入月一日朱书一本贴产妇房内墙壁上更不须避忌神杀也】

禁草法第八 铺草及氍毹讫即呪曰

铁铁汤汤非公所当是王一言得之铜一言得之铁母子相生俱蔑铁急急如律令

禁水法第九 欲产时贮水呪曰

南无三宝水

水在井中为井水 水在河中为河水

水在器中为淨水 水在法中为真水

自知非真莫当真水

以淨持浊 以正治邪 日游月杀 五土将军青龙白虎 朱雀玄武 招摇天狗
轩辕女娲天吞地吞 悬尸闭肚 六甲禁讳 十二神王土符伏神 各安所在 不得动静
不得忌干若有动静 若有忌干 施以神呪 当摄汝形阿佉尼阿毗罗莫多梨娑地梨娑诃

入月预备药物第十

愚按前所预备内佛手保气枳殼榆皮黑神大圣蕊石七散神寢保生理中三丸催生黑虎二丹及催生神符又葵子生地黄羌活竹茹乌梅雌雄石燕甘草海马衔铁大枣陈皮姜钱黑豆白蜜无灰酒童子小便酸醋白米汤瓶锅铤断脐线剪之类可谓周恤之至矣内花蕊石散为血入胞衣胀大不能下或恶露上攻不能苏醒佛手散治血虚之危症加味芎归汤治交骨不开草麻子治胎衣不能上下失笑散治恶露腹痛不省人事蜡油调滑石涂入产门为滑胎之药清魂散治血晕等症平胃散朴硝水银为腐化死胎之剂八珍汤补血气虚损已上诸方皆为紧要之药必不可缺其断脐带先用线近脐扎紧帛裹咬脐如天气风寒或难产母子劳伤元气者先扎脐带以油纸捻烧断此又为回生起死之要法也故治者当审其宜不可槩信而用之

催生灵符第十一

灵符宜以水飞朱砂书之贴於房内北壁上至坐蓐之时将符以针割就盏内化之温水调服

治产难横生逆产胞衣不下灵符见後【出圣惠方局方同】

谨按前所着方论图向符诀一帙自夫人泛视之似为迂远然艰於得子者恒相质问则惟此书为要屡试有明验也余每观其护孕之方极为曲当易产之药悉有根据至於图向之趋避吉凶所关符诀之玄微神妙显用其诚有得於诸先哲者乎不然王太仆诸公深於奥理者也岂谬论耶则是书也诚妊娠良方家户之所当珍藏考究者使舍此而施治於妊妇鲜不有误矣观者勿以为迂远云

薛氏医案卷四十

卷四十一

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷四十一

明 薛己 订

妇人良方

产难门【坐月既明须知产难故以次之】

产难论第一

妇人以血为主惟气顺则血和胎安则产顺今富贵之家过於安逸以致气滞而胎不转动或为交合使精血聚於胞中皆致产难若腹或痛或止名曰弄胎稳婆不悟入手试水致胞破浆乾儿难转身亦难生矣凡产直候痛极儿逼产门方可坐草时当盛暑倘或血运血溢当饮清水解之冬末春初产室用火和煖下部衣服尤当温厚方免胎寒血结若临月洗头濯足亦致产难愚按丹溪先生曰余族妹苦於产难遇胎则驱之予甚悯焉盖其形肥而勤女工形肥则气虚久坐则气不运而儿在胞胎因亦不能自运耳当补其母之气则儿健易产故後有孕至五六月遂以紫苏饮加补气药与之数十贴而产甚快大要在随母之禀性若胎胞破早血水先乾或难产劳伤气血者煎八珍汤或十全大补汤加益母草不时与服以協济之或以黄芪数筋芎归四五筋许大釜水煎药气氤氲满室使产妇口鼻俱受其气脐带以油纸捻烧断补接其阳气稳婆须择老练者当先施惠预说与知倘有生息不顺只说是未产或是双胎只说胎衣未下恐惊则气散愈难生息

附治验方药

荆妇孟冬分娩艰难伤劳元气产子已死用油纸捻烧断脐带藉其气以煖之俄顷忽作声此儿後无伤食作泻之症可见前法之功不诬世用刀器断脐带子母致危者竟不知其由矣且稳婆又喜平日常施小惠得其用心兼以安慰母怀故无虞耳一稳婆云我止有一女正分娩时适当巡街侍御行牌取我视其室分娩女用惊赫未产而死後见侍御更以威颜分付迨视产母胎顺而头偏在一边以致难产因畏其威不敢施手由是其母子俱不能救

紫苏饮【方见十二卷第八论】

十全大补汤

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

杨子建十产论第二

凡生产先知此十证庶免子母之命折於无辜也世之收生者少有精良妙手多致倾命予因伤痛而备言之

一曰正产

正产者言怀胎十月陰阳气足忽然作阵疼痛胎至谷道浆破血下儿即正产

二曰伤产

伤产者言怀胎未足月有所伤动以致忽然脐腹疼痛或服催药过早或产母努力太早逼儿错路不能正生凡分娩须待儿身转顺头对产门努力一送儿即正生

三曰催生

催生者言欲产时儿头至产门方服药催之或经日久产母困倦难生宜服药以助其血气令儿速生

四曰冻产

冻产者言天气寒冷产母血气迟滞儿不能速生故衣裳宜厚产室宜煖背心亦宜温和庶儿易生

五曰热产

热产者言盛暑之月产妇当温凉得宜热甚产母则头疼面赤昏晕若产室人衆热气蒸逼亦致前患名曰血晕若夏月风凉陰雨亦当谨避

六曰横产

横产者言儿方转身产母用力逼之故也凡产母当令安然仰卧稳婆先推儿身顺直头对产门以中指探其肩不令脐带羈扳方用药催之继以产母努力儿即生

七曰倒产

倒产者言儿未能转身产母努力故也当令产母仰卧稳婆推入候儿自顺若良久不生令稳婆手入产户一边拨儿转顺近产门却服催药并努力即下

八曰偏产

偏产者言儿回身未顺生路产母努力逼儿头偏一边产虽露顶非也乃额角耳当令产母仰卧稳婆轻手正其头向产门却令产母努力子即下若儿顶後骨偏挂谷道露额令稳婆以绵衣灸煖裹手於谷道外傍轻手推正令产母努力儿即生

九曰碍产

碍产者言儿身已顺门路已正儿头已露因儿转身脐带绊其肩以致不能生令产母仰卧稳婆轻推儿向上以中指按儿肩脱脐带仍令儿身正顺产母努力儿即生

十曰坐产

坐产者言儿之欲生当从高处牢系手巾一条令产母以手攀之轻轻屈坐令儿生下不可坐抵儿生路

十一曰盘肠产

赵都运恭人每临产则子肠先出然後产子其肠不收名曰盘肠稳婆以醋水各半盞默然喂产妇面背才收不可不知

愚按前症古方以蓖麻子仁四十九粒研涂产母头顶肠收上急洗去其肠若乾以磨刀水少许温润之再用磁石煎汤服之即收上磁石须陰阳家用有验者若以水喂母面背恐惊则气散

治盘肠产以半夏为末搐鼻中肠自上

又方大纸捻以麻油润灯吹灭以烟薰产妇鼻中肠即上

又方肠出盛以洁淨漆器浓煎黄芪汤浸之肠即上

催生方论第三

五行论命以年月日时支干五行相生相值以推其贵贱其间最切要者时也得其时则终身富贵失其时则一世贫贱然则命稟於有生之初岂可催乎世之催生之说盖为产难而设也今开历验数方于後

催生柞木饮子 治产难或胎烂腹中腹闷其效如神

生柞木【一尺剉】甘草【大者五寸剉五段】

右用水三鍾纸封罐口煎一鍾半候胎顺产门徐徐温服即时分娩更无诸苦切不可早於坐草及稳婆下手催逼

催生如神散 治逆产横生其功甚大

百草霜 白芷【不见火各为末等分】

右每服三钱至胎顺产门以童便米醋和如膏加沸汤调下或童便酒煎进二服然血得黑则止此药大能固血又免血乾甚妙

如圣散用黄蜀葵花焙为末热汤调下二钱若漏血胎胞乾澁难产并进三服即产如无花用葵子末半合调温酒服尤妙若打扑胎死红花酒调下

顺生丹 治症同上

兔脑髓【去皮膜研如膏】明乳香【一两细研】母丁香【末二两】麝香【一钱研细】

右以兔脑髓丸鸡头大陰乾每服一丸温水下男左女右手握出【兔脑腊月者尤佳】

又方通明乳香一块如皂子大为末腰痛时用冷水醋少许调服扶立令两手拿石燕二个念医灵药圣三遍行数步坐草便生更无痛楚神效

愚按前法观之似迂其用者云甚验

治产不顺

蛇蛻【一条全者】蚕蛻纸【一张无则一方】

右入新瓦瓶内盐泥固济存性为末煎榆白皮汤下一钱三服觉痛便生

又方用伏龙肝研末每服一钱酒调下儿头戴土而下又方吞槐子十四粒即下

又方当归为末酒调一钱服良久再服

一方用鱼胶一尺许新瓦上煨灰陈醋调服立下又方大朱砂於端午日晒起以百日为度研

为细末用腊月兔脑髓丸绿豆大欲产时粥饮下一丸良久便生其药男左女右手中握出晒朱砂不得着雨

又方腊月兔头煨为末葱白煎汤调二钱立生或腊月兔血纸袋盛挂当风处陰乾为末煎乳香汤调下二钱或兔皮和毛烧为末酒调服二钱即产如胎衣未下再服

神妙乳砂丹用明乳香为末腊月兔血丸桐子大朱砂为衣陰乾每服二丸嚼碎冷酒下良久未生再服○难产以莲叶蒂七个水煎化服二丸良久未生再服○胞浆先乾胎不得下急服大料四物汤滋其血气并浓煎葱汤薰洗产户更用油烛涂产户内却服前药○胎死不出用朴硝五钱滚汤调下或平胃散一服胎衣未下酒水服一丸○横逆不顺先用如神散【方见前】产门不开用加味芎归汤仍服二丸须月初上辰日修合盐涂儿足底急搔摩之即产

应急方 好墨新汲水浓磨服之墨水裹儿出

又方清油同蜜等分入滚汤少许调服或油煎一盞服之或路傍破草鞋一只取鼻络小绳烧灰酒调服

交骨不开产门不闭方论第四【新附】

窃谓交骨不开产门不闭皆由元气素弱胎前失於调摄以致血气不能运达而然也交骨不开陰气虚也用加味芎归汤补中益气汤产门不闭气血虚也用十全大补汤

附治验

地官李孟卿娶三十五岁女为继室妊娠虑其难产索加味芎归汤四剂备用果产门不开止服一剂顿然分娩

上舍怀德之室产门不开两日未生服前药一剂即时而产怀德传服此方用者无有不验

一妇人分娩最易至四十妊娠下血甚多产门不开与前汤一剂又以无忧散筋许煎热时时饮之以助其血而产

一产妇陰门不闭发热恶寒用十全大补加五味子数剂而寒热退又用补中益气加五味子数剂而陰户敛若初产肿胀或焮痛而不闭者用加味逍遥散若肿既消而不闭者用补中益气汤切忌寒凉之剂一妇人脾胃素弱兼有肝火产後陰门肿痛寒热作渴呕吐不食敷大黄等药服驱利之剂肿及於臀虚症蜂起此真气虚也先用六君子以固脾胃乃以补中益气汤升举而消

一产妇失治肿溃不已形体消瘦饮食少思朝寒暮热自汗盗汗半年矣余用补中益气加茯

芩半夏以健脾胃脓水渐少饮食渐进用归脾汤以解脾郁共五十余剂元气复而疮亦愈矣

一产妇阴门不闭小便淋沥腹内一物攻动脇下或胀或痛用加味逍遥散加车前子而愈

一妇人子宫肿大二日方入损落一片殊类猪肝面黄体倦饮食无味内热晡热自汗盗汗用十全大补汤二十余剂诸症悉愈仍复生育

加味芎归汤 治交骨不开不能生产

川芎 当归【各一两】 自死龟板【一个酥炙】 妇人头发【一握烧存性】 右为散每服五钱水煎服约人行五里即生如胎死亦下灼过龟板亦可

十全大补汤【方见二十四卷第四论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

郭稽中产难方论第五

论曰产难者因儿转身将儿枕血块破碎与胞中败血壅滞儿身不能便利是以难产急服胜金散消散其血使儿自易生陈无择云多因儿未转顺坐草太早或努力太过以致胞衣破而血水乾产路澁而儿难下宜先服催生如神散以固其血设或逆生横产当用前法针刺之

胜金散

麝香【末一钱】 豆豉【一两】

右每服一钱用秤锤烧赤淬酒下催生如神散亦可用

产难子死腹中方论第六

产难子死腹中多因惊动太早或触犯禁忌其血先下胎乾涸而然也须验产母舌若青黑其胎死矣当下之故产室坐卧须顺四时方向并遵五行避忌则吉

附治验

一稳婆之女勤苦负重妊娠腹中阴冷重坠口中甚秽余意其胎已死令视其舌青黑与朴硝半两许服之化下秽水而安

一妇人胎死服朴硝下秽水肢体倦怠气息奄奄用四君子为主佐以四物姜桂调补而愈

一方水银半两桂末一钱作一服温酒调下粥饮亦可又方以利斧煅赤置酒中待温饮之其子便下

又方以锡粉水银各一钱枣肉丸大豆许水吞下立出又方朴硝三钱温童便调下猫犬牛畜用之皆验又方平胃散五钱酒水各一盞煎至一盞投朴硝五钱再煎三五沸温服其胎即化水而出宝庆方云凡欲断脐带先以系物坠下後可断之否则胞衣上即冲心而死

附方

四君子汤

四物汤【二方见二十四卷第六论】

产难生死诀第七

欲产之妇脉离经

难经云一呼三至曰离经此是阳加於陰一倍也一呼一至亦曰离经此是陰加於阳四倍也注云经者常也胃脉离常络之处周即言之一呼脉再至一吸脉再至曰脾和之脉故一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸一日一夜一万三千五百息脉行八百一十丈乃于一周复从始之经再行今一呼脉三至一吸脉三至呼吸定息脉行九寸一日一夜脉行通计一千二百一十五丈过於平脉之数不在所起之经再起故曰离经若一呼一至脉行寸半一吸一至脉行寸半呼吸定息脉行三寸一日一夜通计脉行得四百单五丈乃谓一周是不及平脉之数周而复始亦不在所起之经再起亦曰离经也

沉细而滑也同名

临产之妇脉见沉细而滑者乃肾脏本脉之形然肾系胞胎见此脉者亦与离经之脉同名也

夜半觉痛应分娩来日日午定知生

若妊妇夜半时觉腹痛定知来日午时当分娩也圣惠方云夜半子时觉腹痛来日午时必定生产谓子午相半正半日观数也

身重體热寒又频舌下之脉黑复青反舌上冷子常死腹中须遣子归冥

凡妊妇身有沉重者胃气絶也又体热寒臛头并者王气衰陰气盛也若舌卷下脉青黑色也及舌反卷上水冷不温者子母俱死之候

面赤舌青细寻看母活子死定应难

凡妊妇面色赤是荣气流通母活之候舌上青色是妊脉络絶胎死之候

唇口俱青沫又出子母俱死总高判

若妊妇唇口俱青色者荣卫气絶也又口中吐出痰沫者是脾胃之气俱絶此是子母俱死之候也

面青舌青沫出频母死子活是知真不信若能看应验寻之贤哲不虚陈

凡妊妇面与舌皆青色又吐痰沫者是产妇荣卫俱絶胎气冲上之候此是子活母死之候产下子母必死也此古贤哲应验之文不虚妄陈其说也

新产之脉缓滑吉实大弦急死来侵

凡妇人新产之後其脉来缓滑者为气血通利调和是生活安吉之兆也若见牢大弦急之脉则凶必死之脉也

若得沉重小者吉忽若坚牢命不停

若产妇诊得沉重微小者此是形虚相应故云吉兆之脉忽然诊得坚硬牢实之脉是脉盛形衰相反性命不可停留必死也

寸口澹疾不调死

若产後寸口脉澹疾大小不调匀者此是血气衰絶之脉故云死也

沉细附骨不絶生

若重手按之乃得其脉沉细附着於骨不断絶有力者此生活之兆也

审看此候分明记长须念此向心经

凡为医者宜详审脉证分明记於心?也

愚按前论与脉诀刊误所云不同观者审之

薛氏医案卷四十一

卷四十二

钦定四库全书

薛氏医案卷四十二

明薛己订

妇人良方

产後门【产难既明须知产後疾病故以次之】

产後将护法第一

妇人产毕饮热童便一盏闭目少坐上床倚故立膝仰卧不时唤醒及以醋涂鼻或用醋炭及烧漆器更以手从心膈至脐下使恶露不滞如此三日以防血晕血逆酒虽行血亦不可多恐引血入四肢且能昏晕宜频食白粥少许一月之後宜食羊肉猪蹄少许仍慎言语七情寒暑梳头洗足以百日为度若气血素弱者不计日月否则患手足腰腿酸痛等症名曰蓐劳最难治疗初产时不可问是男女恐因言语而泄气或以爱憎而动气皆能致病不可独宿恐致虚惊不可刮舌恐伤心气不可刷牙恐致血逆须血气平复方可治事犯时微若秋毫成病重如山岳可不戒哉

产後调理法第二

产後将息如法脏腑调和庶无诸疾苦须先服黑神散四物汤四顺理中丸七宝散若壮热头痛此乳脉将行用玉露散头目不清是血晕用清魂散粥食不美是胃气虚用四顺理中丸

愚按丹溪先生云肉汁发陰经之火易成内伤之病当归丸当归建中汤四顺理中丸虽滋补悉犯桂附乾姜僭热之剂脏腑无寒何处消受若夫儿之初产母腹顿宽便啖鸡子火盐不思鸡子难化火盐发热展转为病医者不识妄指他病率尔用药宁不误人予每见产妇之无病者皆不用黑神散与鸡子火盐诸般肉食每白粥调理间以些小石首鱼乾淡食之至半月以後少食虽鸡子亦豁开煮之方能养胃却痰彼富贵之家娇姿之妇率有白带头风气痛膈满痰逆口乾经事不调发脱体热皆因失於调理所致也

产後通用方第三

愚按前方即产後诸症各门自有方论主治故不再錄

胞衣不出论第四

郭稽中曰胎衣不下者因气力疲惫不能努出或血入衣中胀大而不能下以致心胸胀痛喘急速服夺命丹血散胀消其衣自下牛膝散亦效

愚按前症若出而气虚不能入用补中益气汤或萆麻子仁一两研涂母头顶心即上若胎衣不下用萆麻子仁涂右脚心胎衣下急洗之缓则胎衣仍入益母丸亦效若胎衣未下若欲断脐带须先以少物系坠然後断之

附治验

一妇人胞衣不出胸腹胀痛手不敢近用滚酒下失笑散一剂恶露胎衣并下

一产妇胎衣不出腹作痛手按痛稍缓此气虚而不能送出也用无忧散而下前症常询诸稳婆云宜服益母草丸或就以产妇头发入口作呕胎衣自出其胎衣不出者必死授与前法效

夺命丹

附子【半两炮】牡丹皮【一两】大黄【末一两】乾漆【一钱炒烟尽】

右为末醋煎大黄成膏丸桐子大温酒吞五七丸

花蕊石散 治产後败血不尽血迷血晕腹中胎衣不下至死心头煖者急用一服化水即出其效如神花蕊石【一斤】上色硫黄【四两】

右和匀先用纸泥封固瓦罐一个入二药仍封固陰乾如急用以焙笼内炙乾用炭煨赤去火次日取出细研每服一钱童便热酒下

牛膝散 治胎衣不出腹中胀急服此药腐化而下缓则不救

牛膝 川芎 朴硝

蒲黄【各三两】当归【一两五钱】桂心【五钱】右每服五钱姜三片生地黄一钱水煎

附方

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

失笑散【方见十六卷第五论】

无忧散【方见十六卷第三论】

益母草丸【方见十三卷第九论】

又方用竈下土三四钱好醋调和纳脐中续煎生甘草汤半盏或以醋汤饮之即出

又方用苘麻子仁研烂涂足心下即洗去

又方用红花一两酒煮浓汁服

又方用鹿角镑三钱为末煮葱白汤调服

又方取产母鞋底灸热熨小腹上下二七次

又方用浸苙水浓煮温饮二碗立下

又方用皂角棘烧为末每服一钱温酒调

产後血晕方论第五

产後血晕乃血入肝经甚至眼花昏闷用黑神散主之下血过多用清魂散补之或以醋汤细饮或预烧秤锤以醋沃之或酹醋涂口鼻或烧漆器薰之使产母鼻吸其气庶无此患

愚按前症若恶露上行用失笑散血下过多芎归汤若过劳所伤补中益气汤气血虚极用清魂散大凡产後口眼喎斜等症当大补气血为主而兼以治痰若脾胃虚弱用六君子汤苟於七月之前服安胎饮至八九月间加大腹皮黄杨头元气虚弱八珍汤临产用无忧散则无前患

附治验

一妇八月胎下坠或动面黄体倦饮食少思此脾气虚弱用补中益气汤倍白术加苏梗三十余剂而安产後眩暈胸满咳嗽用四物加茯苓半夏桔梗而愈一妊妇因产饮酒恶露甚多患血晕口出酒气此血得酒热而妄行虚而作暈也以佛手散加煨甘葛二钱一剂而痊酒性慄悍入月及产後不宜饮恐致前症产室人衆气热喧攘亦致此症

夺命丹 治血晕腹痛没药血竭末等分每服二钱热童便热酒下

牡丹皮散 治产後恶露闷絕

牡丹皮 芒硝 大黄【蒸各一两】 冬瓜仁【三七粒去皮尖】

右每五钱水煎服

清魂散 治产後气血暴损虚火妄动血随火上以致心神昏乱口噤眼花甚至闷絕而苏

泽兰叶 人参【各一钱】 荆芥【三钱】 川芎【一钱】

右各另为末和匀每服一二钱热汤和酒调灌之

当归芍药汤【方见十二卷第十二论】

一方五灵脂末半生半炒每服二钱温酒灌入喉即愈一方荆芥为末童便调

一方神麴末每服二钱热水调

一方菹菜切入瓶内注热醋以瓶口对鼻气入即醒一方用红花末五钱酒调服

一方半夏为末丸豆大入鼻中即省亦疗五絕

一方赤小豆为末东流水和服钱许不瘥再服

佛手散 治产後去血眩暈欲絕【方见十二卷第七论】

又方松烟墨二钱烧赤窖灭为末温酒调半匕京墨亦可或烧漆器取烟薰之

附方

失笑散【方见二十卷第五论】

补中益气汤

六君子汤

四物汤【三方见二十四卷第六论】

安胎饮【方见十二卷第二论】

无忧散【方见十六卷第二论】

产後颠狂方论第六

产後颠狂乃败血上冲用大圣泽兰散加砂仁末三分煎酸枣仁汤调下或朱砂二钱研细以乳汁调和入紫项活地龙一条滚二三沸去之入酒再用重汤煮温分三服愚按前症乃血虚神不守舍非补养元气不可仍参後各门互用

附治验

一产妇患前症或用大泽兰汤而愈後又怔忡妄言其痰甚多用茯苓散补其心虚顿愈又用八珍散加

远志茯苓养其气血而瘥

一产妇亦患此用化痰安神等药病益甚神思消烁余以为心脾血气不足用大剂参术芎归茯神酸枣仁四筋余而安乃以归脾汤五十余剂而愈

附方

隐居泽兰汤【方见二十卷第六论】

茯苓散【方见十九卷第三论】

八珍汤

归脾汤【二方见二十四卷第四论】

产後狂言谵语方论第七

产後狂言谵语乃心血虚也用朱砂末酒调下龙虎丹参丸琥珀地黄丸亦可如惊悸歌哭颠狂等症当参十九等卷治之

愚按前症当固胃气为主而佐以见症之药为善若一於攻痰则误矣

附治验

一产妇形体甚倦时发谵语用柏子仁散稍愈又用加味归脾汤而愈又因怒仍狂言脇痛小便下血用加味逍遥散以清肝火养肝血顿瘥又佐以加味归脾汤而安

治败血上冲发热狂走脉虚大者

乾荷叶 生地黄 牡丹皮【等分】

右浓煎汤调生蒲黄二钱服之即止

妙香散 治产後语言错乱用生地当归煎汤调服立効【方见六卷第八论】

附方

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

栝子仁散【方见十九卷首论】

加味归脾汤【方见二十四卷第四论】

产後不语方论第八

产後不语因心气虚而不能通於舌则舌强不能言语者宜服七珍散余当推其所因而治之可也

愚按经云大肠之脉散舌下又云脾之脉是动则病舌本强不能言又云肾之别脉上入于心系舌本虚则不能言窃谓前症若心肾气虚用七珍散肾虚风热地黄饮大肠风热加味逍遥散加防风白芷脾经风热秦艽升麻汤肝经风热柴胡清肝散加防风白芷脾气郁结加味归脾汤加升麻肝木太过小柴胡加钩藤钩脾受土侮六君加升麻白芷钩藤钩肝脾血虚用佛手散脾气虚用四君子气血俱虚八珍汤如不应用独参汤更不应急加附子补其气而生其血若竟用血药则误矣

附治验

一产妇不语用七珍散而愈後复不语内热晡热肢体倦怠饮食不进用加味归脾汤为主佐以七珍散而愈後因怒不语口禁腰背反张手足发搐或小便见血面色或青或黄或时兼赤余曰面青肝之本色也黄者脾气虚也赤者心血虚也用八珍汤加钩藤钩茯苓远志渐愈又用加味归脾汤而痊

七珍散

人参 石菖蒲 生地黄 川芎【各一两】 细辛【一钱】 防风 辰砂【别研各半两】

右为末每服一钱薄荷汤调

胡氏孤凤散 治产後闭目不语用生白矾末每服一钱热水调下

治产後不语

人参 石莲肉【不去心】 石菖蒲【等分】

右每服五钱水煎

附方

地黄饮【方见三卷第四论】

加味逍遥散

加味归脾汤

八珍汤【三方见二十四卷第四论】

秦艽升麻汤【方见三卷第一论】

清肝散【方见二十四卷第三论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

六君子汤

四君子汤【二方见二十四卷第六论】

佛手散【方见十二卷第七论】

独参汤【方见三卷第十三论】

薛氏医案卷四十二

卷四十三

钦定四库全书

薛氏医案卷四十三

明薛己订

妇人良方

产後乍见鬼神方论第一

产後如见鬼神或言语谵妄皆由血气亏损阴虚发热或瘀血停滞以致心神烦躁而然也宜以调经散治之愚按前症若败血停滞用调经散若血虚发热用八珍加炮姜若心血虚损用柏子仁散大抵此证皆心脾血少所致但调补胃气则痰清而神自安矣若果系鬼祟所附即灸鬼哭穴可愈其或不起者多因豁痰降火攻伐之过也【仍参第三卷产後谵语乍见鬼神方论】

附治验

一产妇患前症或用调经散愈而复作仍服前散益甚痰涎上涌朝寒暮热余朝用八珍散夕用加味归脾汤各五十余剂而愈

调经散 治血虚经闭心神烦躁浑身疼痛或时见怪没药 琥珀【并细研】 桂心【各一钱】 芍药【炒】 当归【各一钱】 细辛【五分】 麝香【少许】

右为末每服五分姜汁温酒各少许调服下即愈

柏子仁散 治产後元气虚弱瘀血停滞狂言乱语柏子仁 远志 人参 桑寄生 防风 琥珀【另研】 当归【炒】 生地黄【焙】 甘草【炒等分】

右用白羊心一个水三盏煮清汁七分入药五钱煎服

附方

八珍汤

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

鬼哭穴【方见六卷第八论】

产後心神惊悸方论第二

产後心神惊悸恐惧或目睛不转口不能言乃心气虚而六淫内侵诊其脉动而弱者惊悸也动则为惊弱则为悸矣

愚按人之所主者心心之所主者血心血一虚神气不守此惊悸所由作也当补血气为主【仍参三卷第十论】

附治验

一产妇患前症二度服琥珀地黄丸局方妙香散随効再患服之其症益甚而脉浮大按之如无发热恶寒此血气俱虚余用十全大补加味归脾二汤各百余剂而愈後遇惊恐劳怒复作仍服前药而安

琥珀地黄丸 治产後恶露未尽胸腹作痛或小便不利

琥珀【另研】延胡索【糯米同炒赤去米】当归【各一两】蒲黄【四两炒香】生地黄【研取汁留滓】生姜【各二斤研取汁留滓生姜汁用银石器内炒地黄滓以地黄汁炒生姜滓各乾为末】

右为末炼蜜丸如弹子大每服一丸当归煎汤化下

治血虚惊悸少寐及产後败血停留少腹作痛等症

辰砂【另研】琥珀 没药【并研细】当归【为末等分】

右为末每服二钱空心日午临卧用白汤调下

产後惊悸乱语精神不定用好朱砂为细末酒调服钱许

附方

局方妙香散【方见三卷第十三论】

茯苓补心汤【方见三卷第十论】

十全大补汤

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

产後中风心惊方论第三

产後眼张口噤肢体强直腰背反偃言语错乱如癰者此气虚风邪所伤而成痉也

愚按仲景先生云有汗为柔痉用桂枝汤无汗为刚痉用麻黄汤然产後得此血气俱虚之败症也不可与伤寒例看丹溪先生云产後当大补气血为主可用十全大补汤以补元气如不应急加附子更不应是药力弗逮也仍用参附汤多服余常治大虚之症参芪数筋附子数枚方应

附治验

一产妇患此不省人事言语妄甚恶风寒喜热饮形气倦怠脉虚浮无力余谓血气虚寒用十全大补汤二十余剂不应又二十余剂稍缓乃渐加附子至一钱服数剂诸症减一二又二十余剂十退三四乃去附子五分数剂诸症顿退而安後又发仍服前药加附子三五分而愈

茯苓散 治产後心虚忪悸言语错乱健忘少睡或自汗盗汗

人参 甘草【炒】 芍药【炒黄】 当归 生姜【各八分】 远志【去心】 茯苓【各一钱】 桂心【六分】 麦门冬【去心五分】 大枣【二枚】

右水煎服

抱胆丸 治产後遇惊发狂或遇经行发狂

水银【二两】 黑铅【一两五钱】 朱砂【一两细研】 乳香【一两另研】

右将黑铅入铉内火熔下水银结成砂子下朱砂乳香末乘热用柳木槌研匀丸鸡头子大每服一丸空心薄荷汤下得睡勿惊觉来即安妙香散亦善

附方

妙香散【方见三卷第十三论】

十全大补汤【方见二十四卷第四论】

参附汤【方见後第六论】

产後中风恍惚方论第四

产後恍惚因元气俱虚心经血少或外邪所侵以致心神恍惚怔忡不宁

愚按前症当大补血气为主而佐以後方为善盖风乃虚极之假象也固其本源诸病自退若专治风则速其危矣

附治验

一产妇患前症盗汗自汗发热晡热面色黄白四肢畏冷此气血俱虚用八珍汤不应更用十全大补加味归脾二汤始应後因劳怒发厥昏愤左目牵紧两唇抽动小便自遗余谓肝火炽盛用十全大补加钩藤山梔而安再用十全大补汤辰砂远志丸而愈

辰砂远志丸 治产後中风惊狂起卧不安或痰涎上涌

石菖蒲 远志【去骨芦甘草煮】 人参 茯神【去木】 辰砂【各三钱】 川芎 山药 铁粉 麦门冬【去心】 细辛 半夏【汤泡】 天麻 南星 白附子【各一两】

右为末姜汁糊丸菉豆大别以朱砂为衣每服三十丸临卧姜汤下

附方

八珍汤

十全大补汤

加味归脾汤【三方见二十四卷第四论】

产後虚极生风方论第五

产後生风因去血过多气无所主以致唇青肉冷汗出目眩神昏急服济危上丹若投以风药则悞甚矣愚按前症若心脾血气俱虚用十全大补汤如不应加附子钩藤钩若肝经血虚用逍遥散加钩藤经云脾之荣在唇心之液为汗若心脾二脏虚极急用参附汤救之

附治验

一妇人患前症或用诸补剂四肢逆冷自汗泄泻肠鸣腹痛余以阳气虚寒用六君子姜附各加至五钱不应以参附各一两始应良久不服仍肠鸣腹痛後灸关元穴百余壮及服十全大补汤方效

济危上丹

乳香【研】五灵脂 硫黄 玄精石【同研极细】阿胶 卷柏桑寄生 陈皮【等分】

右将上四味入石器内微火炒再研入余末用生地黄汁丸桐子大每服二十丸食前温酒或当归酒下

当归建中汤 治产後腹痛拘急痛连腰背自汗少食当归
桂心【各三两】白芍药【六两炒焦黄】甘草【炙二两】

右每服五钱姜枣水煎入饴糖一匙服如未应加之

附方

参附汤【方见本卷後】

十全大补汤

逍遥散【二方见二十四卷第四论】

六君子汤【方见二十四卷第六论】

独参汤 治一切失血恶寒发热作渴烦躁或口噤痰鸣自汗盗汗或气虚脉脱手足逆冷盖血生於气故血脱补气阳生陰长之理也【方见三卷第十三论】

产後虚汗不止方论第六

产後汗不止者皆由阳气顿虚腠理不密而津液妄泄也若遇风则变痉纵虚乏短气则身体消瘦唇口乾燥久则经水断絶由津液竭故也

愚按前症属血气俱虚急用十全大补汤如不应用参附芪附等汤若汗多亡阳发痉尤当用前药王海藏先生云头汗出至颈而还额上偏多盖额为六阳之所会也由虚热薰蒸而出窃谓前症当以部位分之额左属肝额右属肺鼻属脾颐属肾额属心治者审之【仍参三卷第六论】

附治验

一产妇略闻音响其汗如水而昏愤诸药到口即呕余以为脾气虚败用参附末为细丸时含三五粒随液咽下乃渐加之至钱许却服参附汤而痊一产妇盗汗不止遂至废寐神思疲甚

口乾引飲余謂血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩連柏炒黑倍加人參五味子二劑而愈

麻黃根湯 治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安當歸 麻黃根 牡蠣【煨為粉】人參 甘草【炒等分】

右每服四錢水煎

一方 治產後自汗盜汗胃氣虛弱服別藥則嘔吐不能入

當歸 黃芪【各一两】麻黃根【二兩】

右每服三錢水煎

治產後氣脫汗不止小便短少四肢難以屈伸

甘草【炙一两】附子【炮五錢】桂心 芍藥【炒各一两半】

右每服三錢姜枣水煎服虛甚更加以效為度

止汗散

牡蠣【為末半兩】小麥麴【八兩炒黃為細末】

右每服三五錢用猪肉汁調

人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等症

人參 當歸【等分】

右為末以猪腰子一枚切片水二鍾糯米半合葱白二根煮取汁八分入藥三錢煎服

附方

當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗不止不應加人參白朮心血不足加酸枣仁炒

當歸 熟地黃【自制】黃芪【炒各二錢】生地黃 黃柏【炒黑】黃芩【炒黑】黃連【炒黑各一錢】

右水煎服

参附汤 治阳气虚寒自汗恶寒或手足逆冷大便自利或脐腹疼痛吃逆不食或汗多发痉等症人参【一两】附子【炮五钱】

右作一服姜枣水煎徐徐服去人参加黄芪名芪附汤

当归补血汤 治肌热躁热目赤面红烦渴引饮昼夜不息脉洪大而虚重按全无者

当归【三钱】黄芪【炙一两】

右水煎服

十全大补汤【方见二十四卷第六论】

芪附汤

治阳气虚脱恶寒自汗或口噤痰涌四肢逆冷或吐泻腹痛饮食不入及一切虚寒等症

黄芪【一两】附子【炮五钱】

右作一剂姜枣水煎服如不应倍加附子方得全济

产後冒闷汗出方论第七

产後忽冒闷汗出者因阴血亏损阳气郁暴故也急吞鷄子三枚未醒饮童便或时复发宜服竹沥五合愚按前症属大虚宜固元气为主其汗不止必变柔痉东垣先生云妇人分娩及半产漏下昏冒目瞑盖因血暴亡而火上炽但补其血则神自昌若常时血下当补而升举其气阳得血而神安则目明矣今立一方以补手足厥阴之血兼益阳气名曰全生活血汤

全生活血汤 治发热自汗盗汗目??四肢无力口乾头晕行步欹侧

柴胡 当归【各二钱】生地黄【炒】熟地黄【各一钱】川芎藁本【各一钱半】防风羌活独活葛根甘草【炒各二钱】细辛【五分】蔓荆子【五分】升麻芍药【炒各三钱】红花【三分】

右每服五钱水煎热服

产後汗多变痉方论第八

产後汗多变痉因气血亏损肉理不密风邪所乘其形口噤背强如癰或摇头马嘶不时举发气息如絕宜速灌小续命汤若汗出两手拭不及者不治

愚按前症因去血过多元气亏极或外邪相搏以致牙关紧急四肢痉强或阴火内动或腰背反张肢体抽搐若有汗而不恶寒者曰柔痉若无汗而恶寒者曰刚痉血亡过多筋无所养故伤寒汗下过多溃脓血大泄多患之乃败症也急以十全大补汤治之如不应急加附子多有复苏者亦有六淫七情所致者治法见第三卷第三论

附治验

一产妇牙关紧急腰背反张四肢抽搐两目连翳此去血过多元气亏损陰火炽盛用十全大补加炮姜一剂而苏数剂而安

余在吴江史万湖第时将入更闻喧攘询云家人妇产後出直厨忽仆而死余意其劳伤血气而发痉也急用十全大补加附子煎滚令人正其面开其口灌之久不能下令侧其面而出之换以热药如此五次方得下咽遂苏

小续命汤 治刚痉或脚气痺弱不能转舒行步欹侧或口眼喎斜牙关紧急角弓反张

麻黄 桂心 甘草【各半两】 防风【三两】 芍药【炒】 白术【炒】 人参 川芎 附子【炮】 防己【酒拌】 黄芩【炒各等分】

右每服五钱水煎入姜汁少许温服若自汗为柔痉去麻黄有热去附子减桂一半盛冬初春去黄芩

十全大补汤【方见二十四卷第四论】

产後口噤腰背反张方论第九

产後口噤由血气虚而风邪乘於手三阳经也盖手三阳之筋循结於颌得风冷则筋急故致口噤腰背挛急角弓反张者是风邪入於诸阳之经也

愚按前症因气血耗损腠理不密汗出过多而患之者乃虚象也宜固气血为主佐以本方丹溪云产後当大补气血为先虽有他症以未治之如恶寒发热等症乃气血虚甚之极也宜大剂参芪归术肉桂以培养之如不应急用炮附子再不应用人参一两炮附子二三钱名参附汤借犹未应乃药力未能及也宜多用之

愈风散 治前症用荆芥略焙为末每服三钱豆淋酒下童便亦可其效如神牙紧灌口鼻

清顺散又名交解散【方见第三卷第五论】

治妇人产後不省人事吐涎痙瘓

当归 荆芥穗【等分】

右每服三钱水一盏酒少许煎灌下咽即苏愚按前症如有未应者急用大补气血为主

产後中风白藓皮一两或共独活三两酒水煎服张仲文用白术四两以酒煎顿服

小续命汤 治产後口噤角弓反张【见前】

产後中风方论第十

产後中风或血气未复风寒所感以致筋挛拘急口眼喎斜或肢体缓弱入脏则恍惚惊悸郭稽中云产後强力下床或误入房或忧怒内伤脏腑陈无择曰当以脉辨而治之若努力下床月内入房忧怒受伤非中风类乃蓐劳火邪之症也

愚按前症果外邪所属形气不足病气有余当补元气为主稍佐以治病之药若强力下床月内入房属形气病气俱不足当纯补元气多有复苏者若悞投风药乃促其危也仍参照第三卷诸论主之

治产後身背拘急妄言发热四肢拘挛不时惊悸川芎 羌活
羚羊角【屑】 酸枣仁【炒】 芍药【炒黄各四两】 桑白皮【六分】 防风【五分】

右水煎分三服

治产後中风唇青鼻黑用小续命汤连进三服即愈产後中风烦渴用红花子【五合炒研】
水煎徐呷之

独活寄生汤 治前症亦良仍与第三卷中风类通看【方见後】

产後四肢筋挛方论第十一

产後中风筋脉挛急乃血气俱虚或风邪客於皮肤则顽痹羸乏若入於筋脉则四肢挛急皆由大经空虚风寒乘虚而渐入也

愚按肝属木而主筋前症若肝经风热血燥用加味逍遥散如不应当用六味地黄丸以补肾水经云风客淫气精乃亡邪伤肝也仍参第三卷诸论主之

附治验

一产妇筋挛臂软肌肉掣动此气血俱虚而自热也用十全大补汤而安

一产妇手麻服愈风丹遍身皆麻神思倦怠余谓气血虚弱用十全大补加炮姜数剂渐愈去姜又数剂及逍遥散而痊

治产後气血不足风邪所袭肢节挛痛背项强直防风【一两】赤芍药【炒】桂心【各半两】羚羊角 川芎 羌活当归 酸枣仁【炒】牛蒡子【炒各三钱】

右每服四钱水酒煎

愚按前方如未应当用八珍汤更不应用十全大补汤汤

加味逍遥散

十全大补汤【二方见二十四卷第四论】

六味地黄丸【方见二十四卷第十一论】

产後瘕瘕方论第十二【新附】

窃谓瘕者筋脉拘急也瘕者筋脉张纵也经云肝主筋而藏血盖肝气为阳为火肝血为阴为水前症因产後阴血去多阳火炽盛筋无所养而然耳故痛疽脓水过多金疮出血过甚则阳随阴散亦多致此治法当用八珍散加丹皮钩藤以生阴血则阳火自退诸症自愈如不应当用四君芎归丹皮钩藤以补脾土盖血生於至阴至阴者脾土也故小儿吐泻之後脾胃亏损亦多患之乃虚象也无风可逐无痰可消若属阳气脱陷者用补中益气加姜桂阳气虚败者用十全大补加桂附亦有复生者此等症候若肢体恶寒脉微细者此为真状若脉浮大发热烦渴此为假象惟当固本为善若无力抽搐戴眼反折汗出如珠流者皆不治

附治验

一产妇因劳两臂不能屈服苏合香丸肢体痿软汗出如水余谓前药辛香耗散真气腠理虚而津液妄泄也先用十全大补汤加五味子补实腠理收敛真气汗顿止又佐以四君子调补元气渐愈用逍遥散大补汤调理而痊

一产妇先胸脇乳内胀痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遗左三部脉弦余谓此肝经血虚而风火所致不能养筋先用加味逍遥散治之臂能屈伸又以补肝散六味丸诸症悉愈

一妇人发癎遗尿自汗面赤或时面青饮食如故肝脉弦紧余曰此肝经血燥风热名癎也肝主小便其色青入心则赤法当滋陰血清肝火遂用加味逍遥散不数剂诸症悉退而安

附方

海藏愈风汤一名举卿古拜散 治一切失血筋脉紧急产後与汗後搐搦

荆芥【为细末】

右先以炒大豆黄卷以酒沃之去黄卷取清汁调前末三五钱和滓饮之轻者一服重者二三服中病即止其效如神气虚者忌服一方用童便调下本事方云此药委有奇效神灵之功大抵产室无风为佳不可衣被帐褥太煖太煖即汗出汗出则腠理开易於中风便昏冒一妇人产後遮护太密更生旺火睡久及醒则昏昏如醉不省人事用此药佐以交加散服之即睡睡中必以左手搔头觉必醒矣良久果验

交加散 治癎瘖或颤振或产後不省人事口吐痰涎

当归 荆芥穗【等分】

右为细末每服二钱水一盏酒少许煎至七分灌下神效

增损柴胡汤 治产後或经适断致手足牵搐咬牙昏冒异症

柴胡【八钱】 黄芩【炒四钱】 人参
半夏【各三钱】 石膏【四钱】 知母【二钱】 黄芪【炒五钱】 甘草【炙二钱】

右为粗末每服半两姜五片枣四枚水煎温服

四君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

产後脚气方论第十三

论曰产後脚气因元气内虚六淫外侵所致其状发热瞽闷搐掣惊悸心烦呕吐气上用小续命汤治之若以为败血攻之则误矣

愚按前症当补气血为主佐以小续命汤寄生汤如不应用大防风汤仍参第一卷九论主之已上十一症诚似小儿慢惊风无风可逐无痰可清但专补元气庶保其生

附治验

一产妇患前症或用独活寄生汤而症後复作服之其汗如水更加口噤吐痰余用十全大补汤培养血气渐愈後饮食日少肌体日瘦吐痰如涌此命门火衰脾土虚寒用八味丸及加味归脾汤诸症渐退肌肉渐生

独活寄生汤 治风邪内攻两胫肿痛或缓纵挛痹等症【方见四卷第七论】

小续命汤【方见前】

大防风汤【方见二十四卷第九论】

十全大补汤

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

八味丸【方见十五卷第十一论】

薛氏医案卷四十三

卷四十四

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷四十四

明 薛己 订

妇人良方

产後遍身疼痛方论第一

产後遍身疼痛者由气虚百节开张血流骨节以致肢体沉重不利筋脉引急发热头痛宜用
趁痛散治之陈无择云若兼感寒伤食宜用五积散若误作伤寒发汗则筋脉抽搐手足厥冷
则变为痙当大补气血为主愚按前症若以手按而痛益甚是血瘀滞也用四物炮姜红花桃
仁泽兰补而败之若按而痛稍缓此是血虚也用四物炮姜人参白术补而养之

附治验

一产妇身腹作痛发热不食烦躁不寐盗汗脇痛服解散祛血之药不时昏愤六脉洪大如无
用补中益气加炮姜半夏一剂顿退二三四剂寢食甘美但背强而痛用八珍散大补汤调理
而安

一产妇遍身头项作痛恶寒拘急脉浮紧此风寒之症也用五积散一剂汗出而愈但倦怠发
热此邪气去而真气虚也用八珍汤调补而全愈

趁痛散

治产後骨节疼痛发热头重四肢不举牛膝【酒炒】甘草【炒】薤白【各一两】当归
桂心白术【炒】黄芪【炒】独活生姜【各半两】

右每服半两水煎

五积散【方见四卷第九论】

附方

四物汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

八珍汤

十全大补汤【二方见二十四卷第四论】

产後腰痛方论第二

肾主腰脚产後腰痛者盖肾为胎胞所系此因产劳伤肾气以致风冷客之若连背脊痛久未已後遇有娠必至损动

愚按前症真气虚邪乘之者用当归黄芩汤或十全大补为主佐以寄生汤如不应须十全大补加附子附治验

一产妇腰痛腹胀善噫诸药皆呕余以为脾虚血弱用白术一味炒黄每剂一两米泔煎时饮匙许四剂後渐安服百余剂而愈

治产後风邪头眩腰痛不可转侧四肢沈重行步艰难独活 川芎 芍药【炒黄】 桂心 续断 桑寄生 生姜【各六分】 当归 防风【各八分】

右水煎服

四神汤即生料五积散加桃仁逐败血去风湿产後恶露不尽腰重痛或两股痛如锥刺宜服桃仁汤如若作痛用五香连翘汤

桃仁汤 治产後恶露不尽腹中作痛或流注腿股作痛急用此汤治之如未应多变作痛须用五香连翘汤

桃仁【去皮尖】 苏木 生地黄【各半两】 䟽虫【去足翹炒】 水蛭【炒各三十个】

右每服五钱姜水煎空心热服以恶露下为度

五香连翘汤

木香 丁香 沈香 乳香 麝香 升麻 独活 桑寄生 连翘 木通【各二两】

右每服五钱水煎入竹?少许服

当归黄芩汤 治腰痛不可转侧或汗出壮热气短

黄芩【炒】 芍药【炒各二两】 当归

右每服四钱水煎

附方

十全大补汤治症同前又治自汗盗汗或内热晡热潮热发热或口乾作渴喉痛舌裂或胸乳膨胀脇肋作痛或脐腹陰冷二便不调或头颈时痛眩暈目花或心神不寧恍惚不寐或形容不充肢体作痛或鼻吸气冷急趑气促或因饮食劳役起居失宜或更有一切虚热之症但服此药补其根本诸症悉退【方见二十四卷第四论】

独活寄生汤【方见四卷第七论】

产後恶露不絕方论第三

产後恶露不絕因伤经血或内有冷气而臟腑不调故也

愚按前症若肝气热而不能主血用六味地黄丸若肝气虚而不能藏血用逍遥散若脾气虚而不能摄血用六君子汤胃气下陷而不能统血用补中益气汤若脾经郁热而血不归源用加味归脾汤若肝经怒火而血妄行用加味四物汤若气血俱虚用十全大补汤若肝经风邪而血沸腾用一味防风丸附治验

一产妇恶露淋?体倦面黄食少恶寒昼夜不寐惊悸汗出此脾经虚热用加味归脾汤而痊後因怒脇胀作呕少食用六君加柴胡治之而痊

一方用蒲黄二两水煎顿服

一方贯衆醋蘸炙乾为末每服二钱米饮调下

返魂丹【一名益母草丸】治产後恶露不絕及胎前产後诸症【益母草四五月采取陰乾用药及子○子名茺蔚子不许犯鉄器】为末炼蜜丸弹子大每服一丸细嚼米饮下临产腹痛或胎动不安或漏血当归汤化下死胎或胎衣不出或牙关紧急或血暈血热烦闷如见鬼神并童子小便入酒少许化下恶露腹痛或淋?或月水不调当归酒化下

附方

六味丸【方见二十四卷第十一论】

加味逍遥散

加味归脾汤

十全大补汤【二方见二十四卷第四论】

补中益气汤

六君子汤

加味四物汤【三方见二十四卷第六论】

一味防风丸【方见十二卷第六论】

产後恶露不下方论第四

产後恶露不下因臟腑劳伤气血虚损或风冷相搏所致

愚按前症若恶露不下用失笑散若气滯血凝用花蕊石散若因去血过多而烦热不止宜参第七论主治

附治验【方药】

一产妇患前症服峻厉之剂恶露随下久而昏愠以手护其腹余曰此脾气复伤作痛故用手护也以人参理中汤加肉桂二剂补之而愈

失笑散【方见後】

人参理中汤【方见後】

花蕊石散【方见十八卷第四论】

返魂丹【方见前】

产後恶露上攻心痛方论第五

产後心痛为陰血亏损随火上冲心络名曰心胞络痛宜大岩蜜汤治之若寒伤心经名曰真心痛朝发夕死夕发朝死无药可救

愚按前症若阳气虚寒用岩蜜汤温之瘀血上冲用失笑散散之血既散而痛仍作用八珍汤补之大凡肚腹作痛以手按之却不痛此血虚也须用补养之剂

附治验

一产妇患前症昏愦口禁冷汗不止手足厥逆用六君子加附子一钱以回其阳二剂顿苏又以十全大补汤养其血气而安

一产妇患前症手不敢近腹用失笑散一服下瘀血而愈次日复痛亦用前药而安

一产妇患前症用大黄等药其血虽下复患头痛发热恶寒次日昏愦自以两手坚护其腹不得诊脉视其面色青白余为脾气虚寒而痛也用六君子汤加姜桂而痛止又用八珍汤加姜桂调理而安

大岩蜜汤 治产後阳气虚寒心腹作痛不食呕吐四肢厥逆

生地黄 当归 独活 吴茱萸 芍药【炒】 乾姜【炒】 甘草【炒】 桂心
小草【各一两】 细辛【半两】

右每服半两水煎

失笑散 治产後恶血上攻心腹作痛或牙关紧急一服可愈

五灵脂 蒲黄【各钱】

右醋水煎一味灵脂尤妙

六君子汤【方见二十四卷第六论】

十全大补汤

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

产後恶露腹痛方论第六

产後腹痛或因外感五邪内伤六淫或瘀血壅滞所致当审其因而治之

愚按前症若瘀血内停用失笑散风寒外感用五积散

附治验

一妇产後小腹痛甚牙关紧急此瘀血内停灌以失笑散下血而苏又用四物加炮姜白术陈皮而愈一妇人经水来比常度过多不止遂服瀉药止之致腹作痛此乃气血凝滯也用失笑散二服而愈

隐居泽兰汤 治产後恶露腹痛或胃满少气

泽兰 生地黄 当归 芍药【炒】 生姜【各一钱】 甘草【炒五分】 大枣【四个】

右水煎服

四物汤【方见二十四卷第六论】

五积散【方见第四卷九论】

失笑散【方见前】

产後儿枕腹痛方论第七

产後儿枕者乃母胎中宿血也或因风冷凝滯於小腹而作痛

愚按前症若宿血作痛失笑散行之既散而仍痛四神散调之若恶心作呕此属气虚用六君子健其胃气若发热头痛或腹痛按而不痛此属血虚用四物炮姜参术补其脾气

附治验

一产妇患前症或用驱逐之剂昏愤口噤手足发搐此血气虚极之变症也用八珍汤加炮姜二钱四剂未应又以十全大补汤加炮姜一钱二剂而苏

一方用山查浓煎汁入砂糖少许再煎热服

失笑散【方见前】

四神散【方见第四卷第四论】

六君子汤

四物汤【二方见二十四卷 六论】

八珍汤

十全大补汤【二方见二十四卷第四论】

产後小腹痛方论第八

产後小腹作痛由恶露凝结或外寒相搏若久而不散必成血瘕而月水不调

愚按前症若因气滞用延胡索散若因外寒用五积散若因怒气用四物加木香柴胡若因血虚用四物参术炮姜若因阳气虚弱用四君当归炮姜若因脾虚血弱用六君当归炮姜治之

附治验

一产妇患前症或作呕或昏瞶此脾气虚寒用人参理中汤渐愈又以补中益气汤加茯苓半夏全愈後复作痛而兼喘仍用补中益气汤培补脾肺而瘥

延胡索散 治产後恶血凝滞脐下作痛或作寒热

延胡索 桂心【各半两】 当归【一两】

右为末每服二钱食前用热酒调下失笑散尤效

当归养血丸 治产後瘀血心腹胀痛或腰脚疼痛当归 赤芍药 牡丹皮
延胡索【炒各二两】 桂心【一两】

右为末炼蜜丸桐子大每服三四十丸温酒下附方

人参理中汤 治阳气虚弱小腹作痛或脾胃虚弱饮食少思或去後无度或呕吐腹痛或饮食难化胸膈不利【加附子名附子理中汤】

人参 白术 乾姜【炮】 甘草【炙各等分】

右每服五七钱或一两水煎服

五积散【方见四卷第九论】

四物汤

四君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

产後寒疝腹痛方论第九

产後脐腹作痛乃冷气乘虚也用当归建中汤治之陈无择云若产当寒月人门脐下胀痛手不可近者用羊肉汤治之

愚按前症若脾胃虚弱寒邪所侵用蟠葱散若肝经湿热小便不利用龙胆泻肝汤仍参前论恐有瘀血为患

附治验

一产妇小腹作痛小便不利内热晡热形体倦怠余用加味逍遥散以清肝火生肝血用补中益气汤补脾胃升阳气而痊

羊肉汤 治产妇脾虚寒邪所乘以致腹痛或头眩脇脐急痛

精羊肉【四两】当归 川芎【各半两】生姜【一两】

右以水十盏煎至四盏分四次空心服

蟠葱散

龙胆泻肝汤【二方见二十四卷第八论】

加味逍遥散

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

产後两脇胀痛方论第十

产後两脇胀痛因恶露不尽或肝经血虚或肝经气滞当分而治之

愚按前症若肝经血瘀用玄胡索散若肝经气滞用四君青皮柴胡若肝经血虚用四物参术柴胡气血俱虚用八珍柴胡若肾水不足不能生肝用六味丸若肺金势盛尅制肝木用泻白散仍参照前各论主之

附治验

一产妇因怒两脇胀痛吐血甚多发热恶寒胸腹胀痛余以为气血俱虚用八珍加柴胡丹皮炮姜而血顿止又用十全大补汤而寒热渐退此症苟非用姜桂辛温助脾肺以行药势不惟无以施其功而反助其胀耳

经效方 治产後肝经气滞不平脇肋腹痛或寒热往来内热晡热

当归【一钱五分】芍药【炒】苦梗【炒】枳壳【麸炒】?榔【各八分】桂心青木香柴胡【各六分】

右水煎服

当归散

治产後陰血虚弱或气滞血凝以致发热腹痛或腹脇胀满以当归乾姜等分每服三钱水煎

抵圣汤 治血滞腹痛或腹闷满呕吐不食【方见後卷第八论】四君子汤

四物汤【二方见二十四卷第六论】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

泻白散【方见五卷第二论】

玄胡索散【方见前】

产後积聚症块方论第十一

夫积者陰气也五臟所生聚者阳气也六腑所成然积为陰陰性沈伏故痛不离其部聚为阳性浮动故痛无常处皆由饮食不节起居失宜产後血气虚弱风冷所乘搏於脏腑耳

愚按前症乃真气亏损邪气乘之况产後得之尤当固元气为主若求旦夕之效而攻其邪则速其危矣当参前六七论及七卷痃癖诸论治之

附治验方药

一产妇腹中似有一鼈或时作痛而转动按之不痛面色痿黄痛则皎白脉浮而濇余谓此肝气虚而血弱也不信乃行破血行气痛益甚转动无常又认以为血鼈专用破血祛逐之药痛攻两脇肚腹尤甚益信为鼈确服下虫等药去血甚多形气愈虚肢节间各结小核隐於肉里

以为鼈子畏药而走於外余云肝主血而养诸筋此因肝血复损筋涸而挛结耳盖肢节胸项皆属肝胆部分养其脾土补金水以滋肝血则筋自舒遂用八珍汤逍遥散归脾汤加减调治而愈

一妇月经不调两拘肿胀小便澁滯腹中一块作痛或上攻脇腹或下攻小腹发热晡热恶寒肌肤消瘦饮食无味殊类瘵症久而不愈余谓肝脾血气亏损用八珍汤逍遥散归脾汤随症互服而愈

逍遥散

八珍汤

归脾汤【三方见二十四卷第四论】

产後血瘀方论第十二

产後瘀血与气相搏名曰瘕谓其痛而无定处此因夙有风冷而成轻则否澁重则不通

愚按前症乃寒邪乘客气血壅结此因气病而血病也当补养胃气调和月经寛缓静养为善难经云任脉之病男子为七疝女子为瘕聚当参前後各论治之

治血瘕作痛脐下胀满或月经不行发热体倦

当归【八分】桂心 芍药【炒】 血竭 蒲黄【炒各六分】 延胡索【炒四分】

右为末每服二钱空心酒调下

葛氏方治症同前用桂心为末每服一钱空心酒调下

产後余血奔心烦闷方论第十三

产後瘀血奔心盖因分?後不饮童便以致虚火上炎所致宜用後方主之

愚按前症当与前第五论同治

金黄散 治恶热上冲肚腹作痛或发热作渴

延胡索 蒲黄【各一两】 桂心

右为末酒调服

一方用炒蒲黄每服三钱水煎服失笑散亦佳

产後虚热发热方论第十四【原无论】

窃谓前症乃阳随陰散气血俱虚若恶寒发热烦躁作渴急用十全大补汤若热愈甚急加桂附若作渴面赤宜用当归补血汤若误认为火症投以凉剂祸在反掌王太仆先生云如大寒而甚热之不热是无火也热来复去昼见夜伏夜发昼止不时而热是无火也当治其心如大热而甚寒之不寒是无水也热动复止倏忽往来时动时止是无水也当助其肾故心盛则生热肾盛则生寒肾虚则寒动於中心虚则热收於内又热不胜寒是无火也寒不胜热是无水也治法前症无水者六味丸无火者八味丸气血俱虚者八珍汤与十全大补汤

附治验

大尹俞君之内产後发热晡热吐血便血兼盗汗小便频数胸脇胀痛肚腹痞闷余曰此诸臟虚损也症当固本为善自恃知医用降火之剂更加泻利肠鸣吐呕不食腹痛足冷始信余言诊其脉或浮洪或沈细或如无其面或青黄或赤白此虚寒假热之状时虽仲夏当舍时从症先用六君子加炮姜肉桂数剂胃气渐复诸症渐退更佐以十全大补汤半载全愈儒者杨敬之内人所患同前但唾痰涎或用温补化痰之剂不应面色黧黑两尺浮大按之微细此因命门火虚不能生脾土脾土不能生诸臟而为患也用八味丸补土之母而痊

人参当归汤 治产後虚烦短气烦闷

人参 当归 麦门冬 桂心

生地黄【各二钱】大枣【四枚】粳米【一合】淡竹叶【二钱】芍药【炒黄一钱】

右水煎服

蒲黄散 治症同上方见前儿枕病

四物汤加茯神远志治产後虚烦十全大补汤尤效六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

八珍汤

十全大补汤【二方见二十四卷第四论】

六君子汤【方见二十四卷第六论】

薛氏医案卷四十四

卷四十五

钦定四库全书

薛氏医案卷四十五

明薛已订

妇人良方

产後口乾痞闷方论第一

论曰产後口乾痞闷因食米麪乾饭太早脾胃不能消化热郁所致慎不可下但服见现丸则愈无择云若内积忧烦外伤燥热宜四物汤去地黄加人参乌梅可愈愚按前症若宿食停滯用六君枳实神麪若因肉食所致更加山楂若因鱼鱠之类加陈皮其物既消而仍痞或反作痛作呕此脾胃受伤用六君子汤或咽酸暖腐加炮姜作泻更加升麻如不应佐以四神丸或间用补中益气汤为是

附治验

一妇人食角黍烦渴痞闷腹痛大便欲去不去服消导等药不应饮食日减饥体日瘦半年矣余谓此食积为患用大酒麪炒为末温酒调服二钱俄间腹鸣良久仍下粽而愈

一妇人食鱼鮓腹痛患痢诸药不应用陈皮白术等分为末以陈皮汤送下数服而愈

见现丸

姜黄【炒】三棱【错炒】芫澄茄 陈皮 良姜 人参 莪术【酒炒各等分】

右为末用萝卜汁糊丸桐子大每服三十丸白汤下

产後心烦发渴宜清心莲子饮【方见六卷首论】

附方

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

四神丸【方见八卷第八论】

产後血渴方论第一

窃谓前症若出血过多虚火上炎用童子小便或四物白术麦门丹皮若胃气虚而有热用竹叶归芪汤若血虚发热用八珍加麦门五味若血脱发热烦躁用当归补血汤若胃气虚弱用补中益气汤或七味白术散

附治验

一产妇患前症朝寒暮热肚腹作痛以手按之不痛余以为血气俱虚用八珍之类治之彼反行逐血更加发热烦躁余用当归补血汤热躁渐止用八珍麦门五味气血渐复

附方

十味白术散 治中气虚弱津液短少口乾作渴或因吐泻所致

人参 白术【炒】 木香 白茯苓 甘草【炒】 藿香 乾葛【各一钱】

右水煎服

竹叶归芪汤

治胃气虚热口乾作渴恶冷饮食者竹叶【一钱五分】 当归【一钱】 黄芪【二钱】 白术 人参【各一钱】 甘草【炒五分】 麦门冬【去心七分】

右水煎服

四物汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

当归补血汤【方见二十四卷第十一论】

产後乍寒乍热方论第三

产後乍寒乍热由血气虚损陰阳不和若陰胜则乍寒阳胜则乍热宜用增损四物汤若因败血不散腹内作痛宜用夺命丹後用增损四物汤随病加减无择云败血流闭诸陰则寒流闭

诸阳则热用大调经散五积散愚按前症若因阳气不足陰气上入於阳中而恶寒者用补中益气汤若因陰气不足阳气下於陰中而发热者用六味地黄丸若气血不足而恶寒发热者用八珍汤若病後寒热倦怠者用补中益气汤若肌热大渴目赤面红者用当归补血汤

附治验

一产妇恶寒发热余以为血气虚寒用十全大补加炮姜而寒热愈用补中益气而肢体安又食後犯怒恶寒发热抽搐咬牙面色青中隐黄此肝木侮脾土饮食停滯用六君子加木香一剂而安

一产妇恶寒发热余以为气血俱虚不信反用小柴胡汤致汗出谵语烦热作渴肢体抽搐余用十全大补二剂益甚脉洪大重按如无此药力不能及乃加附子四剂稍缓数剂而安

增损四物汤

人参 当归 芍药【炒】 川芎 乾姜【炒各一两】 甘草【四钱】

右每服四钱水姜煎

大调经散 治产後恶露未消寒热自汗或肚腹作痛

大豆【一两五钱炒去皮】 茯神【一两】 真琥珀【一钱】

右为末每服二钱空心浓煎【阙】 紫苏汤调下附方

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

当归补血汤【方见二十四卷第十一论】

八珍汤

十全大补汤【二方见二十四卷第四论】

六味地黄丸【方见二十四卷第十一论】

产後疟疾方论第四

郭稽中云产後乍寒乍热者多是败血为害或陰阳不和若槩作疟疾治之误矣陈无择曰产後寒热或一二日或二三日一发或先寒後热或先热後寒或寒多热少或热多寒少或纯寒纯热者皆是疟疾最难治疗可用草菓饮生熟饮四兽饮选用之

愚按前症当与第十四卷第十论参看用药以补胃气为主佐以草菓饮之类若胃气稍充以草菓饮为主佐以补胃之剂大抵产後疟疾因脾胃虚弱饮食停滯或外邪所感或郁怒伤脾或暑邪所伏审系饮食用六君加桔梗苍术藿香如外邪多而饮食少用藿香正气散如外邪少饮食多用人参养胃汤劳役所伤用补中益气汤气血虚弱用十全大补加炮姜中气虚寒用六君加姜桂元阳脱陷急加附子盖气虚则寒血虚则热胃虚则恶寒胃气下陷则寒热交作或吐泻不食腹痛烦渴发热谵语或手足逆冷寒战如栗虽见百症但温补脾胃其病自退若误用清脾截疟之类多致不起

附治验

一产妇患疟发热作渴胸膈胀满遍身作痛三日不食咽酸暖气此是饮食所伤脾胃不能消化用六君加神麴山查四剂而不作酸乃去神麴山查又数剂而饮食进其大便不通至三十五日计进饮食七十余碗腹始闷令用猪胆汁导而通之其粪且不甚燥一产妇患疟久不愈百病蜂起其脉或洪大或微细或弦紧或沈伏难以名状用六君加炮姜二十余剂脉症稍得又用参朮煎膏佐以归脾汤百余剂而瘥一产妇朝寒暮热或不时寒热久不愈用六君子补中益气兼服百余剂而寻愈

产後疟疾心脾痛见小产

产後蓐劳方论第五【阙文】

愚按蓐劳盖产後虚弱元气不复所致故寒热食少头目四肢腹痛若脾虚而不能生血者用六君子汤加当归若脾肺气虚而咳嗽口乾用补中益气加麦门五味若因中气虚而口乾头晕用补中益气加蔓荆子若肝经血虚而肢体作痛用四物参朮若因肝肾虚弱而自汗盗汗寒热往来者用六味丸加五味子若因脾虚血弱肚腹作痛月经不调用八珍汤倍加白朮若因脾虚血燥皮肤瘙痒用加味逍遥散大抵此症多因脾胃虚弱饮食减少以致诸经疲惫而作当补脾胃饮食一进精气生化诸臟有所倚赖其病自愈矣仍照虚烦发热方论主治

增损柴胡汤 治产後虚弱寒热如疟食少腹胀柴胡 人参 甘草【炒】 半夏【炒】 陈皮 川芎 白芍药【炒各等分】

右每服五钱水姜枣煎日二服

白茯苓散 治产後蓐劳头目四肢疼痛寒热如疟白茯苓【一两】 当归 川芎 桂心 白芍药【炒】 黄芪【炒】 人参【各半两】 熟地黄【半两自制】

右先以水三盏入猪肾一双姜枣各三事煎二盏去之入前药半两煎一盏服

猪腰子粥 治产後蓐劳发热用猪腰子一枚去膜切片用盐酒拌先用粳米一合入葱椒煮粥盐醋和将腰子铺碗底以热粥盖之如作蠡生状空心服

黄芪建中汤 治产後诸虚不足发热或恶寒腹痛黄芪【炒】肉桂【各一两】甘草【炒七钱】白芍药【炒二两】

右每服五钱用姜枣水煎日三二服虚甚须加附子附方

六君子汤

补中益气汤

四物汤【三方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

八珍汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

产後虚羸方论第六

产宝云产後虚羸者皆由产後亏损血气所致须当慎起居节饮食六淫七情调养百日庶保无疾若中年及难产者母论日期必须调养平复方可治事否则气血复伤虚羸之症作矣

愚按前症产伤气血者用八珍汤饮食伤胃者用四君子汤停食伤脾者用六君子汤劳伤元气者用补中益气汤若暖气觉有药味者此药复伤胃也但用四君子汤徐徐少饮以调脾胃若胃气一健血气自生诸症自愈矣

黄雌鸡汤 治产後虚羸腹痛

小黄雌鸡【一只去头足翅羽肠肚细切】当归 白术【炒】熟地黄【自制】桂心 黄芪【炒各半两】

右先以水七锺煮鸡至三锺每用汁一锺药四钱煎日三服

十全大补汤 治产後气血未复形体虚弱发热恶寒等症【方见二十四卷第四论】

产後风虚冷劳方论第七

产後气血劳伤脏腑虚弱若风冷乘之血气愈虚形气羸损风冷入臟令人无子谓之风虚冷劳也

愚按前症若血气虚弱用八珍汤血气虚寒用十全大补汤胃气虚弱用补中益气汤脾气虚弱用六君子汤命门火衰用八味丸肝脾血虚用加味逍遥散肝脾郁怒用加味归脾汤

产宝方治产後虚羸不生肌肉

黄芪【炒】当归 芍药【炒】人参【各三钱】桂心 甘草【炒】川芎
生姜【各四钱】大枣【十二枚】

右水煎分三服

又方猪肾一双煮入葱?作臠如常食之

产後腹胀呕吐方论第八

产後腹胀满闷呕吐者因败血散於脾胃不能运化而致宜用抵圣汤治之

愚按前症若败血散於肠胃宜用前方若饮食停於脾宜用六君厚朴若饮食伤於胃宜用六君子汤大凡损其脾者当节其饮食为善

附治验

一产妇患前症或用抵圣汤败血已下前症益甚小腹重坠似欲去後余谓此脾气虚而下陷用补中益气汤加炮姜温补脾气重坠如失又用六君子汤而安

抵圣汤

赤芍药 半夏 泽兰叶 人参 陈皮 甘草【炒各一钱】

右用生姜焙乾半两水煎

愚按前方最宜用之

附方

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

产後呕逆不食方论第九

经云胃为水穀之海以养臟腑因产後胃气虚弱饮食所伤必致呕逆故不食也

愚按前症若因饮食过时用四君子汤饮食过多用六君子汤饮食过时而兼劳役用补中益气若因饮食停滯用人参养胃汤脾胃气虚用六君子汤胃气虚寒加炮姜木香寒水侮土用益黄散肝木侮脾土用六君升麻柴胡命门火衰不能生土用八味丸呕吐泄泻手足俱冷或肚腹作痛乃阳气虚寒急用附子理中汤多有生者

附治验

一产妇朝吐痰夜发热昼夜无寐或用清痰降火肌体日瘦饮食日少前症愈甚余曰早间吐痰脾气虚也夜间发热肝血虚也昼夜无寐脾血耗也遂用六君子汤加味逍遥散加味归脾汤以次调补而痊

开胃散 治产後胃虚呕逆胸满不食

诃子肉【两半】 人参【一两】 甘草【炒半两】

右每服五钱姜水煎

治产後胃虚呕逆

橘红【一两】 半夏 甘草【炒各半两】 藿香【三两】

右每服五钱姜水煎

治产後呕逆不食白术【五钱】 姜【六钱】 水煎徐徐温服

石莲散 治产後胃寒咳逆呕逆不食或腹作胀

石莲肉【两半】 白茯苓【一两】 丁香【五钱】

右为末每服二钱不拘时用姜汤或米饮调下日三服

附方

钱氏益黄散 治脾土虚寒水反来侮以致呕吐不食或肚腹作痛或大便不实手足逆冷等症

陈皮【一两】 青皮 诃子肉 甘草【炙】 丁香【二钱】

右为粗末每服四钱水煎服

人参养胃汤 治外感风寒内伤饮食寒热头疼作疟疾

半夏 厚朴【制】 橘红【八分】 藿香叶 草薢
茯苓人参【五分】 甘草【炙三分】 苍术【一钱】

右姜七片乌梅一个水煎服

四君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

附子理中汤【方见二十卷第八论】

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见二十四卷第四论】

产後霍乱方论第十

产後霍乱因臟腑虚损饮食不消触冒风冷所致若热而饮水者五苓散寒而不饮水者理中丸虚冷者加附子来复丹尤妙

愚按此症当与後卷第十一论互相主治

附治验

一产妇停食霍乱用藿香正气散之类已愈後胸腹膨胀饮食稍过即呕吐或作泄泻余谓此脾胃俱虚用六君子汤加木香治之渐愈後因饮食失调兼恚怒患霍乱胸腹大痛手足逆冷用附子散又用八味丸以补土母而康设泥痛无补法而用辛散或用平补之剂必致不起

一产妇吐泻咽酸面目浮肿此脾气虚寒先用六君加炮姜为主佐以越鞠丸而咽酸愈又用补中益气加茯苓半夏而脾胃康

白术散 治脾胃伤吐泻腹痛烦渴手足逆冷或大便不实

白术 橘红 麦门冬【去心】 人参 乾姜【炮各一两】 甘草【半两】

右每服四钱姜水煎

附子散 治脾胃虚寒吐泻腹痛手足逆冷或自汗口噤

附子【炮】 白术【炒】 当归 吴茱萸 丁香 橘红 甘草【炒各半两】

右为末每服二钱粥饮调若脾胃虚用参苓白术散附方

藿香正气散 治外感风寒内停饮食头疼寒热或霍乱泄泻或作疟疾

藿香【一钱五分】 桔梗【炒】 大腹皮 紫苏 茯苓 白芷 半夏 麴 陈皮
白术【炒】 厚朴【制各一钱】 甘草【炙五分】

右姜枣水煎热服

五苓散

白术【炒】 猪苓【各一钱】 桂【三分】 泽泻【二钱五分】 茯苓【一钱】

右水煎服

理中丸 治脾胃虚寒呕吐泄泻饮食少思肚腹膨胀

人参 白术【炒】 乾姜【炮】 甘草【炙各一钱】

右为末米糊丸弹子大每服一丸嚼细白汤下

来复丹 治伏暑泄泻身热脉弱其效如神仓卒间须用此药

硝石【一两同硫黄火上微炒用柳条搅结砂子不可火大】 太陰玄精石
舶上硫黄【各一两】 五灵脂【去砂石】 青皮 陈皮【各二两】

右为末醋糊丸小豆大每服三十丸空心米饮下易简方云硝石性寒佐以陈皮其性疎快硫黄性寒味澁若作煖药以止泻误矣盖由啖食生冷或冒暑热之气中脘闭结挥霍变乱非此药不能通利三焦分理陰阳其功益速

六君子汤【方见二十四卷第六论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

薛氏医案卷四十五

卷四十六

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷四十六

明 薛己 订

妇人良方

产後寒热方论第一

产後发热头痛身疼虽如伤寒时气虽当用麻黄亦不可轻易如早起劳动为寒所伤则渐渐恶寒翕翕发热头项肩背骨节皆痛至七八日乃差若大便坚作呕不能食用小柴胡汤加生姜地黄主之

愚按病机要云治胎产之病从厥陰经论之无犯胃气及上中二焦为之三禁不可汗不可下不可利小便发汗者同伤寒下之早证利大便则脉数而已动於脾利小便则内亡津液胃中枯燥制药之法能不犯三禁则荣卫自和而寒热止矣

附方

人参当归散 治去血过多内热短气头痛闷乱骨节作痛或虚烦咽燥

人参 当归 生地黄 桂心 麦门冬【去心各一两】 白芍药

右粳米一合竹叶十片水二鍾煎一鍾去之入药五钱枣二枚煎服虚甚用熟地黄

小柴胡汤 治伤风四肢烦热头疼若头不疼而作烦二物黄芩汤【方见二十四卷第二论】

二物黄芩汤

黄芩【半两】 苦参【一两】 生地黄【二两】

右每服四钱水煎

增损柴胡汤 治虚弱寒热少食腹胀等症【方见劳蓐】竹叶防风汤
治产後伤风发热面赤气喘头痛淡竹叶【半把】防风 人参 桂枝 苦梗
甘草【各半两】葛根【一两五钱】

右每服五钱姜枣水煎汗出项强加附子呕加半夏

治恶露不尽昼则明了暮则谵语寒热如见鬼此热入血室用柴胡地黄汤或四物加柴胡【方见六卷十五论】

产後头痛方论第二

夫头者诸阳之会也产後胃气虚弱饮食少思阳气微弱不能上升故头痛若因败血黑龙丹言之甚详愚按前症若中气虚用补中益气汤加蔓荆子若血虚用四物加参术血气俱虚用八珍汤若因风寒所伤用补中益气汤加川芎

附治验

一产妇患头痛日用补中益气汤不缺已三年矣稍劳则恶寒内热为阳气虚以前汤加附子一钱数剂不发

一妇人产後头痛面青二年矣日服四物等药余谓肾水不能生肝木而血虚用六味丸加五味子两月而痊

芎附散 治气虚头痛用大附子一枚去皮脐切四片拌醪醋一碗炙附蘸尽同川芎一两为末每服二钱清茶调服

治血虚头疼当归川芎每服五钱水煎

产後头痛都梁丸亦可治【方见四卷第六论】

附方

补中益气汤

四物汤【二方见二十四卷第六论】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

产後咳嗽方论第三

夫肺主於气产後肺气虚故外邪感而咳嗽所由作也若食盐醯之类而致者难治若因面积滯而致者服黑神散五积散可愈

愚按前症若陰血虚四物汤加参术陈皮桔梗肺气虚四君加芎归桔梗陰火上炎六味地黄丸加参术风寒所感补中益气汤加桔梗紫苏若瘀血入肺发喘兼口鼻起黑或鼻出血急用二味参苏饮亦有得生者然而所患悉因胃气不足盖胃为五臟之根本胃气一虚五臟失所百病生焉经云肺属辛金生於巳土脾土既虚不能生金则腠理不密外邪易感矣治当壮土金生肾水以制火为善

附治验

一产妇朝吐痰夜发热无寐泥用清痰降火之药肌体日瘦饮食日少余曰朝间吐痰脾气虚也夜间发热肝血虚也昼夜无寐脾血耗也遂用六君子汤加味逍遥散加味归脾汤以次调补不月而痊

一产妇咳嗽见风则喘急恶寒头痛自汗口禁痰盛余谓脾肺气虚腠理不密用补中益气加肉桂数剂而安

一产妇咳嗽声重鼻塞流涕此风寒所感余用参苏饮一锤顿愈与补中益气加桔梗茯苓半夏一剂将痊又与六君黄芪以实腠理全愈

一产妇咳嗽痰盛面赤口乾内热晡热彻作无时此陰火上炎余用补中益气汤六味地黄丸而愈一产妇咳而腹满不食涕唾面肿气逆此病在胃而关於肺用异功散而愈

知母散 治恶露上攻咳嗽不已

知母 贝母 白茯苓 人参【各五钱】 桃仁 杏仁【并生去皮尖各一两】

右每服五钱水煎

治风寒咳嗽

甘草 桔梗【各六分】 款冬花【四分】 麦門冬 生地黄【各一钱二分】 葱白【一握】

右水煎服

旋覆花汤 治咳嗽最良【方见下有汗者去麻黄】

附方

异功散 治脾胃虚弱饮食少思或久患咳嗽或腹满不食面浮气逆等症

人参 白术【炒】 甘草【炒】 茯苓 陈皮【各一钱】

右姜枣水煎服

六君子汤

四物汤

四君子汤

补中益气汤【四方见二十四卷第六论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

二味参苏饮【方见後】

参苏饮【方见六卷第十一论】

产後喉中气急喘促方论第四

产後喉中气急喘促因荣血暴竭卫气无主独聚于肺名曰孤阳最为难治若因败血停凝服夺命丹若因荣血暴絶服芎藭汤若因风寒所伤服旋覆花汤若因气郁结服小调经散若因伤饮食服见现丸

愚按前症若脾肺气虚弱用六君桔梗若兼外邪更加紫苏若中气虚寒用补中益气加炮姜肉桂若阳气虚脱更加附子若瘀血入肺急用二味参苏饮附治验

一产妇喘促自汗手足俱冷常以手护脐腹此阳气虚脱用参附汤四剂而愈

二味参苏饮 治产後血入於肺面黑发喘欲死者

人参【一两】 苏木【二两】

右水煎顿服

旋覆花汤 治伤风寒暑湿喘嗽太盛坐卧不寧旋覆花 赤芍药 前胡 半夏麴 荆芥穗甘草 茯苓 五味子 杏仁 麻黄【各等分】

右每服四钱姜枣水煎【有汗者莫服】

五味子汤 治产後喘促脉伏而厥

五味子【杵炒】 人参 杏仁【各二钱】 麦門冬【去心】 陈皮【各一钱】

右姜三片枣二枚水煎服

芎藭汤【方见後】

附方

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

参附汤【方见十八卷第六论】

产後口鼻黑鼻衄方论第五

产後口鼻起黑气及鼻衄者盖阳明经脉之海起於鼻交额中还出頰口交人中左之右右之左此产後气虚荣血散乱胃絶肺败之症也急取緋线一条并产妇顶心髮两条紧系中指节更无药可疗

愚按胃脉侠口绕承浆盖鼻準属脾土鼻孔属肺金诚胃虚肺损气脱血死之症急用二味参苏饮加附子五钱亦有得生者【方见前】

产後咳噫方论第六

夫肺主於气而稟於胃盖产後脾胃伤损风冷所搏故咳噫也急灸期门三壮必愈此穴乃胃之大络【穴见六卷第十五论】

愚按前症属胃气虚寒之恶候如用後方未应急投参附汤亦有复生者【方见十八卷第六论】

丁香散 治心烦咳噫

丁香 白荳?【各五钱】 伏龙肝【一两】

右为末煎桃仁吴茱萸汤每服一钱调下

羌活散 治咳逆

羌活 附子【炮】 茴香【炒各半两】 木香 白姜【炮各一钱】

右为末每服二钱水一盞盐一捻煎服

一方用桂心五钱姜汁三合水煎服

产後血崩方论第七

产後血崩因经脉未复而劳伤或食酸咸之味若小腹满痛肝经已伤最为难治急服固经丸主之

愚按前症若血滯小腹胀满用失笑散血少小腹虚痞芎藭汤肝火血妄行加味逍遥散脾郁不统血加味归脾汤脾气虚不摄血补中益气汤厚味积热伤血清胃散加槐花风热相搏伤血四君子防风枳殼附治验

一产妇血崩小腹胀痛用破气行血之剂其崩如涌四肢不收恶寒呕吐大便频泻余用人参炮黑姜四剂稍愈又十全大补三十余剂而痊

一产妇血崩因怒其血如涌仆地口禁目斜手足抽搐此肝经血耗生风余用六味丸料一剂诸症悉退但食少晡热佐以四君柴胡牡丹皮而愈

固经丸

艾叶 赤石脂【煨】 补骨脂【炒】 木贼【各半两】 附子【一个炮】

右为末饭丸桐子大每服二十丸温酒或米饮下

芎藭汤

芎藭 当归 芍药【各等分】

右每服五钱水煎

附方

失笑散【方见二十卷第五论】

十全大补汤

加味逍遥散

加味归脾汤【三方见二十四卷第四论】

补中益气汤

六君子汤

四君子汤【三方见二十四卷第六论】

清胃散【方见二十四卷首论】

六味丸【方见二十四卷第十二论】

产後月水不调方论第八

产後月水不调由血气虚损风邪所客邪正相搏以致经候失期或多或少而不得其平也

愚按前症若过期而作痛者气血俱虚也八珍加柴胡丹皮不及期而来血热也四物山梔柴胡将来而作痛血实也四物加桃仁红花过期而来者血虚也四物加参术紫黑成块者血热也四物加炒梔炒连丹皮作痛而色淡者痰多也四物合二陈治当临症制宜

附治验

一产妇月经不调内热燥渴服寒凉之剂其血如崩腹胀寒热作呕少食用六君子二十余剂诸病悉愈以加味逍遥散调理而安

琥珀散 治经脉不调饮食少思日渐消瘦

琥珀 牛膝 生地黄 当归【各一两】 桃仁 赤芍药【各半两】

右每服五钱水姜煎

附方

八珍汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

四物汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

二陈汤【方见二十四卷第五论】

产後月水不通方论第九

产後乳子周岁而经不行是其常也若半岁而经行此血有余也若一二岁不行而无疾不必服药若肢体倦怠食少内热是血少也宜健脾胃以药通之则误矣愚按前症脾胃虚弱用六君子汤若兼郁火伤脾用归脾汤加牡丹皮山梔若怒火伤血宜用四物合小柴胡气血俱虚用八珍牡丹皮仍参前论主之

附治验方药

一产妇月经年余不通内热晡热服分气丸经行不止恶寒作渴食少倦怠胃满气壅朝用加味逍遥散夕用四君子汤月许诸症稍愈佐以八珍汤兼服两月而愈

六君子汤

四物汤

四君子汤【三方见二十四卷第六论】

归脾汤

加味逍遥散

八珍汤【三方见二十四卷第四论】

小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

产後四肢浮肿方论第十

产後四肢浮肿者乃败血乘虚流注宜用小调经散陈无择云若风邪所乘於气分皮肤肿而浮虚乃气也若皮肤肿如熟李乃水也盖气肿者宜发汗水肿者宜利小便

愚按前症若寒水侮土宜养脾肺若气虚浮肿宜益脾胃若水气浮肿宜补中气当参第一卷水分血分主治

附治验

一产妇饮食少思服消导之剂四肢浮肿余谓中气不足朝用补中益气汤夕用六君子汤而愈後因怒腹胀误服沈香化气丸吐泻不止饮食不进小便不利肚腹四肢浮肿用金匱加减肾气丸而愈

一产妇泄泻四肢面目浮肿喘促恶寒余谓脾肺虚寒用六君加姜桂而泄泻愈又补中益气而脾胃健

小调经散

没药 琥珀 桂心 芍药 当归【各一钱】

右为末每服五分姜汁温酒调

大调经散最治肿满喘急烦渴小便不利【方见二十一卷第三论】汉防已散 治水肿

汉防已 猪苓 枳殼【麸炒】 桑白皮【各一两】 商陆 甘草【各三钱】

右每服四钱水煎

治血虚气肿水肿

泽兰叶 防已【等分】

右为末每服二钱温酒调下醋汤亦可

金匱加减肾气丸 治脾肾虚寒腰重脚肿湿饮留积小便不利或肚腹肿胀四肢浮肿气喘痰甚或已成水症其效如神

白茯苓【二两】 附子【半两】 川牛膝 肉桂 泽泻 车前子 山茱萸 山药 牡丹皮【各一两】 熟地黄【四两搥碎酒拌杵膏】

右为末和地黄膏炼蜜丸桐子大每服七八十丸空心米饮下

附方

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

产後腹痛泻利方论第十一

产後腹痛泻利因腸胃虚怯寒邪乘袭或水谷不化洞泄肠鸣或手足逆冷用调中汤治之陈无择云若六淫七情而致者当随所感而治之

愚按前症若胸膈饱胀或恶食吞酸此饮食停滯用六君枳实山查以消导若食既消而仍痛更或头痛热渴恶寒欲呕此中气被伤用补中益气半夏茯苓以健脾胃

附治验

一产妇腹痛发热恶食余以为饮食伤脾彼反服破血之剂加寒热头痛呕吐涎沫用化痰理气四肢逆冷泄泻下坠余用六君加炮姜肉桂木香再用补中益气汤而愈

一产妇腹痛後重去痢无度形体倦怠饮食不甘唇肿盗汗竟夜不寐此脾经虚热之症用当归六黄汤内黄芩连栢炒黑一剂汗止乃用归脾八珍兼服而愈

调中汤

良姜 当归 桂心 芍药 附子【炒】 川芎【各一两】 甘草【炒五钱】

右每服三钱水煎服

附方

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

当归六黄汤【方见十九卷第六论】

归脾汤

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

产後赤白痢方论第十二

产後痢疾因饮食六淫七情伤於脾胃或血渗大肠皆为难治若饮食不进谓之虚痢气宇不顺谓之气痢治法热则凉之冷则温之冷热相?则温凉调之滑者澁之虚者补之水谷不分者分利之性情执滯者和顺之未有不安者也

愚按前症白属气分而赤属血分也若米食所伤用六君加谷蘖若麪食所伤用六君加麦蘖若肉食所伤用六君加山查神麪凡兼呕吐俱加藿香若兼咽酸或呕吐用前药送越鞠丸若肝木尅脾土用六君加柴胡炮姜若寒水反来侮土用钱氏益黄散若久泻或元气下陷兼补中益气汤以升发阳气若泻痢色黄乃脾土真气宜加木香肉豆?若属脾土虚寒用六君加木香姜桂若脾肾虚寒用补中益气及四神丸若属命门火衰而脾土虚寒用八味丸以补土母若小便滯滞肢体渐肿或兼喘咳用金匱肾气丸以补脾肾利水道若胃气虚弱而四肢浮肿须补胃为主若久而不愈是肾气亏损也必用四神六味八味三药以补足三陰若用分利导水之剂是虚其虚也

一产妇泄痢腹痛年余形体骨立内热晡热自汗盗汗口舌糜烂日吐痰三碗许脉洪大重按全无此命门火衰脾土虚寒而不能摄痰归源用八味丸补火以生土用补中益气汤兼补肺金而痊

一产妇食鸡子腹中作痛面色青黄服平胃二陈更下痢腹胀用流气饮子又小腹一块不时上攻饮食愈少此脾胃虚寒肝木尅侮所致用补中益气加木香吴茱萸渐愈又用八珍大补兼服调理寻愈

五味子散 治产後泄泻或肾泄在侵晨五更作泻饮食不进或大便不实不时去後为丸尤效

五味子【炒三两】 吴茱萸【炒五钱】

右为末每服二钱白汤调

四神丸 治脾胃虚弱大便不实饮食不思

二神丸【二方见八卷第八论】

六君子汤

补中益气汤【二方见二十四卷第八论】

香连丸【方见八卷第八论】

八味丸

六味丸【二方见二十四卷第十一论】

金匱肾气丸【方见前】

八珍汤【方见二十四卷第四论】

薛氏医案卷四十六

卷四十七

钦定四库全书

薛氏医案卷四十七

明薛已订

妇人良方

产後痢疾作渴方论第一

产後下痢作渴者乃内亡津液或胃气虚不能生津液但止其渴痢自差

愚按前症若渴而不喜冷饮属胃气虚不能生津液宜用七味白术散夜间发热口渴属肾水弱而不能润宜用六味丸并佐以益气汤以滋化源

附治验方药

一产妇泻痢发热作渴吐痰肌体消瘦饮食少思或胸膈痞满或小腹胀坠年余矣余以为脾肾之泻朝用二神丸夕用六君子三月余而痊

一产妇患前症形体倦怠饮食不进与死为邻此脾胃俱虚也用四神丸十全大补汤数剂而愈

附方

七味白术散【方见二十一卷第二论】

六味丸【方见二十四卷第十一论】

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

十全大补汤【方见二十四卷第四论】

四神丸

二神丸【二方见八卷第八论】

产後大便秘澁方论第二

产後大便秘澁因肠胃虚弱津液不足若小腹胀满宜服麻仁丸润之若用寒药则促其危矣

愚按前症若计其日期饮食数多即用药通之祸在反掌之间必待腹满觉胀欲去不能者乃结在直腸宜用猪胆汁润之若服苦寒疎通反伤中气通而不止或成痞症若去血过多用十全大补血虚火燥用加味四物气血俱虚用八珍汤虽数日不通饮食如常腹中如故仍用八珍加桃仁杏仁治之若泥其日期饮食数多而通之则误矣

附治验

一产妇大便七日不通饮食如常腹中如故此腹未满也用八珍加桃仁杏仁至二十一日腹满欲去用猪胆汁润去而安

一产妇大便不通或用通利之药中脘胀痛饮食甚少又用蜜导之大便不禁吃逆不食余以为脾肾复伤用六君加吴茱肉果骨脂五味数剂喜其年壮而愈不然多致不起

一产妇大便秘结小腹胀痛用大黄等药致吐泻不食腹痛胸痞余用六君子加木香炮姜治之而愈一妇人大便秘澁诸药不应苦不可言令饮人乳而安

麻仁丸

大麻仁【研如泥】枳殼 人参【各四分】大黄【二分】

右为末入麻仁炼蜜丸桐子大每服二十丸空心温酒下未通渐加不可过服

阿胶枳殼丸 治产後大便秘澁以阿胶枳殼二味等分为末蜜丸桐子大滑石末为衣温水下二十丸如或未通再服

附方

十全大补汤

八珍汤【二方见二十四卷第四论】

加味四物汤【方见二十四卷第六论】

产後大小便不通方论第三

产後大小便不通因肠胃虚弱津液燥竭故也

愚按前症当参前後论及八卷八论主治

附治验

一产妇大小便不通诸药不应将危矣令饮牛乳一日稍通三日而痊人乳尤善

桃花散 治膀胱气滞血澁大小便秘

桃仁 葵子 滑石 槟榔【等分】

右为末每服二钱空心葱白汤调下

通气散治产後大小便不通【方见八卷第七论】

产後遗粪方第四

产後遗粪取故燕窠中草烧为末或枯矾牡蛎或白蘧芍药各等分为末俱用酒调服或用固肠丸亦可愚按前症若脾肾虚弱用还少丹仍以补中益气汤为主虚寒加肉豆蔻补骨脂或四神丸若脾肾虚寒用八味丸兼四神丸仍佐以前二方

附治验【小便出尿方药附】

一产妇大便不实饮食少思五更或侵晨遗尿此中气虚寒脾肾不足用补中益气送四神丸而痊一产妇小便出粪名大小肠交乃气血俱虚失行常道先用六君子汤二剂又用五苓散二剂而痊循常肠交亦可用

附方

还少丹 治脾肾虚寒饮食少思发热盗汗遗精白浊又治真气亏损肌体瘦弱等症

肉苁蓉 远志【去心】 茴香 巴戟 乾山药 枸杞子 熟地黄 石菖蒲 山茱萸【去核】 牛膝 杜仲【去皮姜制】 楮实子 五味子 白茯苓【各一两】

右各另为末用枣肉百枚并炼蜜丸桐子大每服五七十丸空心温酒或盐汤下日三服

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

四神丸【方见八卷第八论】

八味丸【方见二十四卷第十一论】

五苓散【方见二十一卷第十论】

产後诸淋方论第五

产後诸淋因热客於脬虚则频数热则澀痛气虚兼热血入胞中则血随小便出而为血淋也

愚按前症若膀胱虚热用六味丸若陰虚而阳无以化用滋陰肾气丸盖土生金金生水当滋化源仍参第八卷小便淋?频数类

附治验

一产妇小水淋?或时自出用分利降火之剂二年不愈余以为肺肾之气虚用补中益气汤六味地黄丸而痊

滑石散 治热淋

滑石【五分研】 通草 车前子 葵子【各四分】

右为末以浆水调服

治小肠有热小便澀痛或为血淋

?麦 黄芩 冬葵子【各二两】 通草【三两】 大枣【十二枚】

右以水七升煎二升半分二服

治脾气不利小便不通橘红为末每服二钱空心温酒下

治肺气不利小便不通杏仁十四枚去皮尖炒食之治脬转小便不利滑石一钱半寒水石一钱水煎服

附方

六味丸【方见二十四卷第十一论】

滋陰肾气丸

补中益气汤【二方见二十四卷第六论】

产後小便频数方论第六

产後小便数者乃气虚不能制故也

愚按前症若因稳婆不慎以致胞损而小便淋?者用八珍汤以补气血若因膀胱气虚而小便频数当补脾肺若膀胱陰虚而小便淋?须补肺肾仍参第八卷小便频诸类

附治验

一产妇小便频数时忽寒战乃属脾肺虚弱用补中益气加山茱山药为主佐以桑螵蛸散而愈後患发热晡热盗汗自汗月水不调用加味逍遥散而安一产妇患前症吐痰发热日晡作渴此膀胱陰虚用补中益气汤佐以六味丸而愈又患痢後小便频数手足俱冷属阳气虚寒用前汤及八味丸而瘳

桑螵蛸散 治阳气虚弱小便频数或为遗尿

桑螵蛸【三十个炒】鹿茸【酥炒】黄芪【各三两】牡蛎【煨】人参 厚朴
赤石脂【各二两】

右为末每服二钱空心粥饮调下

又方用益智仁为末米饮下

附方

八珍汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

补中益气汤【方见二十四卷第六论】

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

产後小便不禁方第七

广济治产後小便不禁用鸡尾烧灰千金翼用白薇芍药为末俱用温酒下日三服或桑螵蛸半两龙骨一两为末每服二钱粥饮调下

愚按前症若脾肺阳虚用补中益气汤若肝肾陰虚用六味地黄丸若肝肾之气虚寒用八味地黄丸附治验

一产妇小便不禁二年不愈面色或青赤或黄白此肝脾气血虚热用加味逍遥散为主渐愈佐以六味丸而痊後因怒小便自遗大便不实左目顿紧而色顿赤乃用前散佐以六君子汤以清肝火生肝血培脾土而瘳

补脬饮 治胞破小便淋?

生绢【黄色者一尺】白牡丹【用根并皮】白芨【各一钱】

右水一碗煎至绢烂温服服後忌言语否则无效

鸡内金散治气虚溺床用雄鸡?脰并肠烧为末温酒调服

附方

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

六味丸

八味丸【二方见二十四卷第十一论】

加味逍遥散【方见二十四卷第四论】

产後小便出血方论第八

产後小便出血者因虚热血滲於脬也以乱髮洗净烧为末米饮调服或滑石末一钱生地黄

汁调下

愚按前症若膏粱积热用加味清胃散醇酒湿毒葛根解醒汤怒动肝火加味小柴胡汤郁结伤脾加味归脾汤思虑伤心妙香散大肠风热四物侧柏槐花大肠血热四物炒连槐花肠胃虚弱六君升麻柴胡元气下陷补中益气茯苓半夏胃气虚弱六君升麻血虚四物升麻气血俱虚八珍柴胡升麻大凡元气虚弱而发热者皆内真寒而外假热也但用六君或补中益气加炮姜温补脾气诸症悉退若四肢畏冷急加附子

附治验方药【大便下血附】

一产妇尿血面黄脇胀少食此肝木乘脾土也用加味逍遥补中益气兼服而愈後为怀抱不乐食少体倦惊悸无寐血仍作用加味归脾汤二十余剂将愈惑於衆论服犀角地黄汤诸症复作仍服前汤而愈一产妇粪後下血食少体倦此脾气虚热用补中益气加吴茱炒黄连五分四剂顿愈用归脾汤而痊一妇人怒则便血寒热口苦或胸脇胀痛或小腹痞闷此肝木乘脾土用六君柴胡山梔而愈用补中益气加味逍遥而不复作

一妇人久下血在粪前属脾气虚寒用补中益气加连炒吴茱一钱数剂稍缓乃加生吴茱五分数剂而愈【黄连炒吴茱萸法见七卷第五论】

一产妇大便後血口乾饮汤胸脇膨满小腹闷坠内热晡热食少体倦日晡面赤洒淅恶寒此脾肺气虚先用六君加乾姜木香渐愈用补中益气将愈用归脾汤全愈後劳役兼怒发热血崩夜间谵语此热入血室用加味小柴胡二剂而热退用补中益气一剂而血止用逍遥散归脾汤调理而安

葛花解醒汤 治酒积上下外消其湿

白豆蔻 砂仁 葛花【各五钱】 木香【五分】 青皮【三钱】 陈皮 白茯苓 猪苓 人参【各一钱半】 白术 神麴 泽泻 生乾姜【各二钱】

右为末每服五钱白汤调下

加味清胃散【方见二十四卷首论】

加味小柴胡汤【方见二十四卷第二论】

加味归脾汤

归脾汤

八珍汤

逍遥散

加味逍遥散【五方见二十四卷第四论】

妙香散【方见六卷第八论】

四物汤

六君子汤

补中益气汤【三方见二十四卷第六论】

产後陰脱玉门不闭方论第九

产後陰脱玉门不闭因坐产努力举动房劳所致或脱肛陰挺逼迫肿痛小便淋?

愚按玉门不闭气血虚弱也用十全大补汤肿胀焮痛肝经虚热也加味逍遥散若因忧怒肝脾气血伤也加味归脾汤若因暴怒肝火血伤也龙胆泻肝汤仍参第八卷末诸论

附治验

一产妇玉门不闭发热恶寒用十全大补加五味子数剂而寒热退用补中益气加五味子数剂而玉门闭

一妇人脾胃素弱兼有肝火产後玉门肿痛寒热作渴呕吐不食外敷大黄等药内用驱利之剂肿及於臀诸症蜂起此真气虚而邪气盛也先用六君子以固肠胃次用补中益气以升阳气不数剂而全愈一产妇患此失治肿溃不已形体消瘦饮食少思朝寒暮热自汗盗汗半年矣用补中益气加茯苓半夏脓水渐少饮食渐进用归脾汤共五十余剂而愈一产妇玉门不闭小便淋?腹内一块攻走脇下或胀或痛用加味逍遥散加车前子而愈

一产妇陰脱便闭下坠形气倦甚用十全大补汤而上因怒仍脱重坠寒热小便淋?用补中益气汤加山栀龙胆草一剂重坠減而小便利仍用前汤去二味倍加参芪升麻而痊

一产妇陰脱肿痛小便淋漓此因元气甚虚而肝火旺也用补中益气汤加山栀车前子四剂而肝症悉尽退仍用前药去二味加茯苓而小便利又用十全大补汤而肿痛遂渐消

一产妇元气充实初产玉门不闭肿焮作痛小便不利余谓肝经湿热壅滯欲以加味逍遥散

加车前子牛膝治之不信乃服十全大补汤肿痛益甚仍用前药更加泽泻一剂而愈

一产妇陰脱肿痛脉又滑数欲作脓也余用十全大补汤三四剂而脓成又数剂而脓始溃但小便频数而患处重坠痛甚此因元气虚弱而致下陷也又用补中益气汤数剂而瘥

一妇人子宫肿大二日方入损落一片殊类猪肝面黄体倦饮食无味内热晡热自汗盗汗用十全大补汤二十余剂诸症悉愈仍复生育

硫黄散 治产後阳气虚寒

硫黄 乌贼骨【各五钱】 五味子【五钱】

右为末操患处日三易

一方蛇床子一升炒热帛裹熨患处亦治陰痛

一方子宫脱出以?麻子仁十四枚研涂顶心入即洗去

附方

十全大补汤

加味逍遥散

加味归脾汤

归脾汤【四方见二十四卷第四论】

龙胆泻肝汤【方见二十四卷第八论】

补中益气汤

六君子汤【二方见二十四卷第六论】

妇人陰蚀疳方论第十

妇人少陰脉数而滑者陰中有疮名曰匿或痛或痒如虫行状脓水淋?亦有陰蚀几尽者皆由心神烦郁脾胃虚弱气流血滯耳内当补心养胃外以药敷洗乃可愚按前症乃肝脾郁结之症木旺生虫耳宜解郁清肝备见八卷陰中生疮类

附治验

一产妇素有肝火患此内溃痒痛食少热渴小水淋?用五味逍遥散加味归脾汤兼服间以芦荟丸外以鹤虱草煎洗而愈

治疳虫蚀下部用蒲黄水银研匀傳入内

平胃散加贯衆末二钱以熟猪肝拌药内陰中

附方

加味归脾汤

加味逍遥散【二方见二十四卷第四论】

芦荟丸【方见七卷第七论】

产後乳少或止方论第十一

妇人乳汁乃气血所化若元气虚弱则乳汁短少初产乳房焮胀此乳未通若怒气乳出此肝经风热若累产无乳此内亡津液盖乳汁资於冲任若妇人疾在冲任乳少而色黄者生子则怯弱而多疾

愚按前症若气血虚弱而不能化生宜壮脾胃怒动肝胆而乳肿汁出宜清肝火夫乳汁乃气血所化在上为乳在下为经若屡产无乳或大便滯滞当滋化源

附治验

一产妇因乳少服药通之致乳房肿胀发热作渴余谓血气虚以玉露散补之而愈

涌泉散 能下乳忌食姜椒辛辣饮食

王不留行?麦 麦门冬 龙骨【各二钱】

右用猪蹄汁一碗酒一杯煎服以木梳於乳上梳下

治气血虚鍾乳粉每服二钱煎漏芦汤调

附方

玉露散 治乳脉不行身体壮热头目昏痛大便澁滯等症

人参 白茯苓 桔梗【炒】 芍药【各一钱】 甘草【炙六分】

右水煎服

产後乳出方论第十二

产後乳汁自出乃胃气虚宜服补药止之若乳多满痛用温帛熨之未产而乳自出谓之乳泣生子多不育愚按前症气血俱虚用十全大补汤肝经血热用加味逍遥散肝经怒火用四物参术柴梔肝脾郁怒用加味归脾汤

附治验

一产妇劳役忽乳汁如涌昏昧吐痰此阳气虚而厥也灌以独参汤而苏更以十全大补汤数剂而安若妇人气血方盛乳房作胀或无儿饮胀痛增寒发热用麦芽二三两炒熟水煎服立消其耗散血气如此何脾胃虚弱饮食不消方中多用之

十全大补汤

加味逍遥散

加味归脾汤【三方见二十四卷第四论】

独参汤【方见三卷十一论】

四物汤【方见二十四卷第六论】

产後吹乳方论第十三

产後吹乳因儿饮口气所吹令乳汁不通壅结肿痛不急治多成痈速服括萎散及敷南星更以手揉散之愚按前症用药切不可损其气血治验见二十四卷

括萎散乳香二钱括萎一个酒煎服用南星温汤调涂一方用陈皮一两甘草一钱水煎服

产妇妬乳方论第十四

妬乳因儿未能饮余乳蓄结以致肿痛初不吮通之必致成痈若ru头生疮浸淫名妬乳宜赤龙皮汤天麻汤飞鸟膏飞鸟散傳以黄连胡粉散

愚按乳盛或无子饮乳以致肿痛炒大麦芽煎服其乳即散若成疮当从乳痈类治若皮肤津淫成疮当用本方

治乳初肿痛内消方用瓜蒌【一个】粉草【一寸】生姜【一块半生半炒】酒二碗煎服少顷去败乳再服即愈

赤龙皮汤槲皮三升水一斗煮五升温洗之

麻草汤以天麻草五升水煎洗之此草叶若麻叶冬生夏花赤如鼠尾花亦洗浸淫湿痒陰蚀等疮

飞鸟散用烧朱砂作水银上黑烟【各维粉者三两】枯矾一两傅之诸热浸淫丈夫陰蚀痒湿小儿头疮疳蚀疮等症

黄连胡粉膏【治症同前】

黄连【二两末】胡粉【一钱】水银【一两同研令消散】

右皮裹熟按和合傅之

一方ru头裂破秋茄子裂开者陰乾烧存性水调涂之

薛氏医案卷四十七

卷四十八

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷四十八

明 薛己 订

妇人良方

疮?门

妇人茧唇方论第一【诸骨木梗等咽见口齿类要】

内经云脾气开於口又云脾之荣在唇盖燥则乾热则裂风则皴寒则揭若肿起白皮皱裂如蚕茧名曰茧唇有肿重出如茧者有本细末大如茧如瘤者其因或胎产经行而陰血损或七情动火而荣血亏或心火传授脾经或厚味积热伤脾大要审本症察兼症补肾水生脾血则燥自润火自除风自息肿自消若患者忽略治者不察内用清热消毒之药外用追蚀线结之法反为败症慎哉

附治验

一妇人怀抱久鬱时胃口嘈辣胸膈不利月水不调晡热食少体倦唇肿年余此脾经鬱火伤血用归脾汤加姜汁炒黄连山梔少佐吴茱萸嘈辣顿去饮食稍进乃去黄连加贝母远志胸膈通利饮食如常又用加味逍遥散归脾汤间服百余剂月水调而唇疮愈

一妇人怀抱久鬱患茧唇杂治消痰降火虚症悉具盗汗如雨余谓此气血虚而有热也用当归六黄汤内黄连黄栢俱炒黑二剂而盗汗顿止仍用归脾汤八珍散兼服元气渐复更以逍遥散归脾汤间服百余剂而唇亦瘥

一妇人唇裂内热二年每作服寒凉之剂时出血水益增他症此胃火伤血药伤元气也余用加味清胃散而愈後因怒唇口肿胀寒热作呕此属肝木乘脾土用小柴胡加山梔茯苓桔梗诸症顿愈复以加味逍遥散调补元气而愈

一妇人因怒唇肿内热体倦用化痰药食少作呕大便不实唇出血水用理气消导胸膈痞满头又不清唇肿经闭用清胃行血肢体愈倦发热烦躁涎水涌出余以七情伤肝脾攻伐反致

他症遂用济生归脾食进便实涎止用加味逍遥肿消热退体健後因怒寒热耳痛胸膈胀闷唇焮肿甚此怒动肝火而伤血用四物合小柴胡加山梔顿愈又因怒胸乳胀腹痛呕吐酸涎饮食不入小水不利此怒动肝木尅脾土也用补中益气加川芎芍药而愈又劳役怒气伤食发热喘渴体倦不食下血如崩唇肿焮甚此为肝经有火不能藏血脾经气虚不能摄血用补中益气加炒黑山梔芍药丹皮而愈

一妇人月经不调两足发热年余而身亦热劳则足腿酸疼又年余唇肿裂痛又半年唇裂出血形体瘦倦饮食无味月水不通唇下肿黑余谓肝脾血虚火症也彼不信用通经药而歿

一妇人忿怒唇肿或用消毒之药唇胀出血年余矣

余曰此肝木尅脾土而血伤也须养脾胃化源为主彼执用前药状如翻花瘤而歿

一妇人口苦脇胀此肝火症也用小柴胡加山梔黄连少愈更以四君子加芍药当归柴胡调补脾胃而瘥

一妇人每怒口苦发热晡热此肝火盛而血伤也以小柴胡合四物二剂以清火而生血更以四物加柴胡白术茯苓丹皮生血健脾而愈

一妇人每怒则口苦兼辣胸痛脇胀乳内或时如刺此肝肺之火也用小柴胡加山梔青皮芎归桑皮而安後又劳怒口复苦经水顿至此属内火动血得热而妄行用四物加炒芩炒梔胆草一剂而血止更以加味逍遥散而痊

一妇人因怒齿痛寒热作呕用清胃等药益甚余以为此肝火伤胃寒药复伤故也用六君子加芍药柴胡山梔而愈

一妇人胃中嘈辣甚则热痛後患齿疼此胃中痰火也用二陈加芩连下越鞠丸而瘳

一妇人发热齿痛日晡益甚月水不调此脾经血虚用逍遥散加升麻寻愈後因怒复痛仍以前药加川芎而痊

一妇人因怒牙疼寒热此肝火侮脾土用小柴胡加芎归苓术山梔而疼痛止用加味逍遥散而寒热退一妇人每产後齿龈皆动踰日乃止此气血虚而火动也後复怀妊临月余付十全大补汤二剂令产後煎服其齿不动如故

一妇人善怒舌痛烦热或用降火化痰药前症益甚两脇作胀又服流气饮肚腹亦胀经行不止此肝虚不能藏血脾虚不能摄血而前药复伤也以加味归脾汤加五味子而愈

一妇人冬患脑疽肿痛热渴脉洪数实膀胱湿热上壅用清热消毒散溃而愈次年舌肿遍身

患紫疔如葡萄手足尤多各刺出黑血此脾胃积热毒也服夺命丹七粒出臭汗疮热益甚便秘二日与大黄芩连各三钱升麻白芷山梔薄荷连翘各二钱生草一钱水煎三五沸服之大小便出臭血下体疔稍退入犀角汁再服舌本及齿缝出臭血诸毒乃消更与犀角地黄而愈

一妇人善怒舌本强手臂麻此肝本尅脾土治以六君子加柴胡芍药而愈

一妇人产後喉痛服清热等剂益甚此膀胱经血虚也盖膀胱之内脉上行至喉而还用八珍汤加牡丹皮柴胡酒炒黑黄栢二剂而愈

一妇人喉间作痛旬余突肿如赤杨梅状二月後而肿遍身筋骨作痛余以为此时行杨梅疮也先以萆薢汤数剂而平更以四物加萆薢黄余剂诸症悉退附方药

清胃散 治醇酒厚味唇齿作痛或齿龈溃烂或连头面颈项作痛

黄连【炒一钱半】当归 生地黄 牡丹皮【各一钱】升麻【二钱】

右水煎服实热便秘加大黄

加味清胃散即前方加犀角连翘甘草

凉膈散 治积热烦渴面赤内热头昏咽痛便溺赤澁狂言谵妄睡卧不安

大黄 朴硝 甘草【各一钱】连翘【二钱】栀子 黄芩薄荷【各一钱】

右水煎服

补黄散 治脾胃虚热口舌生疮畏冷饮食

人参 白术【炒各一钱】白芍药【炒黄】陈皮 甘草【炒各五分】

右姜枣水煎服

四顺清凉饮【加山梔牛蒡子名加味清凉饮】治脏腑实热秘结口舌生疮

当归 赤芍药 甘草 大黄【各一钱】

右水煎服

人参安胃散 治服峻剂损脾胃口舌生疮

人参【一钱】黄芩【炒二钱】生甘草
炙甘草【各五分】白芍药【七分】白茯苓【一钱】黄连【炒五分】

右水煎服

温中丸【一名人参理中丸】治中气虚热口舌生疮不喜饮冷肢体倦怠饮食少思

人参 甘草【炒】白术【炒各等分】

右为末姜汁糊丸桐子大每服五十丸白汤下

柳华散 治热毒口疮

黄栢【炒】蒲黄 青黛【真正者】人中白【煨等分】

右为末敷之

四物汤 治血热口舌生疮或牙龈肿溃或日晡发热烦躁不安【方见本卷第六论】

加味四物汤【即四物汤加丹皮柴胡山梔】

当归补血汤 治气血俱虚口舌生疮热渴引饮目赤面红其脉洪大而虚重按全无【方见本卷第十一论】

四物二连汤 治血热口舌生疮或夜发寒热

当归 熟地黄 白芍药【炒】川芎 黄连【炒】胡黄连【各一钱】

右水煎服

清咽利膈汤 治积热咽喉肿痛痰涎壅盛烦躁饮冷大便秘结

金银花 防风 荆芥 薄荷 桔梗【炒】黄芩【炒】黄连【炒】
山梔【炒】连翘【各一钱】玄参 大黄【煨】朴硝 牛蒡子【研】甘草【各七分】

右水煎服

龙麝聚圣丹 治心脾客热咽喉肿痛或成痈不消或舌本肿胀口舌生疮或诸物骨鲠

川芎【一两】生地黄 犀角【镑】羚羊角【镑】琥珀 玄参连翘【各五钱】人参
赤茯苓 马牙硝 片脑 麝香【各三钱】桔梗 升麻【各五钱】铅白霜【五钱】朱砂
牛黄【各二钱】南硼砂【一两】金箔【五十片】

右各另为末和匀蜜丸龙眼大金箔为衣薄荷汤化下或噙咽之

拔萃桔梗汤 治热肿喉痹

桔梗【炒】甘草 连翘 山梔【炒】薄荷 黄芩【各一钱】

右竹叶水煎服

甘桔汤 治咽喉肿痛

甘草【六钱】苦梗【三钱】

右水煎服

解毒雄黄丸 治纏喉风肿闭或卒倒死牙关紧急

雄黄【一钱】鬱金【一钱】巴豆【十四粒去油殼】

右为末醋糊丸菉豆大用热茶送下七丸吐顽痰立苏

夺命丹 治喉闭或疔毒或麻木或呕吐重者昏愆若疔毒牙关紧急用三五丸为末水调灌下
诚有夺命之功

蟾酥【乾者酒化】轻粉【各五分】枯白矾 寒水石【煨】铜礞乳香 没药
麝香【一钱】朱砂【三钱】蜗牛【二十个另研如无亦効】

右为末用蜗牛或酒糊为丸如菉豆大每服一二丸温酒或葱汤下

换肌消毒散 治时疮不拘初起溃烂【一名萆薢汤】

土茯苓【五钱】当归 白芷 皂角刺【炒】薏苡仁【各一钱五分】白藓皮
木瓜【不犯鉄器】金银花 木通【各一钱】甘草【五分】

右水煎服

七味白术散【一名钱氏白术散】治中气虚热口舌生疮不喜饮冷或吐泻口乾【方见二十一卷第二论】

四君子汤治脾胃虚热唇口生疮食少作呕大便不实若肝木乘脾土所致加柴胡芍药【方见本卷第六论】

六君子汤【方见本卷第六论】

二陈汤【方见本卷第五论】

越鞠丸【方见六卷第七论】

补中益气汤【方见本卷第十论】

清热消毒散【方见本卷第五论】

犀角地黄汤【方见本卷第二论】

当归六黄汤【方见十九卷第六论】

逍遥散

八珍汤

归脾汤

十全大补汤【四方见本卷第四论】

小柴胡汤【方见本卷第二论】

妇人耳聾痛方论第二

耳疮属手少阳三焦或足厥陰肝经血虚风热或怒动肝火而致若发热焮痛属三焦厥陰风热用柴胡清肝散若内热痒痛或胀痛属肝火伤血用梔子清肝散若寒热作痛或作呕吐属肝火伤脾用益脾清肝散若口乾足热为肝肾陰虚用益陰肾气丸若月经先期为血热用加味逍遥散过期为血虚用八珍汤食少体倦为鬱火用加味归脾汤恶寒发热肢体倦怠为气血俱虚用十全大补汤慎不可专治其外复伤气血也

附治验

一妇人耳内外肿痛胸脇不利寒热往来小便不调余以为肝火伤血先用龙胆泻肝汤四剂诸症顿退又用加味逍遥散而愈又因怒复作用小柴胡汤而痊

一妇人经行後因劳怒发寒热耳作痛余以经行为血虚用八珍汤加柴胡怒气为肝火用加味逍遥散劳役为气伤用补中益气加山栀愈

一妇人素鬱怒耳作痛肿焮寒热面色青黄经行则变赤用加味归脾汤加味逍遥散而愈

一妇人性素鬱因怒耳作肿痛经行不止寒热发热面青赤肝脉弦数余谓久鬱伤脾暴怒伤肝先用加味小柴胡汤随用加味逍遥散而痊

一妇人因怒发热每经行两耳出脓两太阳作痛胸脇乳房胀痛或寒热往来或小便频数或小腹胀闷皆属肝火血虚先用栀子清肝散二剂又用加味逍遥散数剂诸症悉退乃以补中益气加五味而痊一妇人耳内肿痛出水寒热口苦焮连颈项饮食少思此肝火甚也用小柴胡汤加山栀牡丹皮稍愈用加味逍遥散渐愈用八珍汤加柴胡丹皮山栀调补肝脾而全愈

一妇人耳内外肿痛胷脇不利寒热往来小便不调此肝经湿热也用龙胆泻肝汤四剂诸症顿退用加味逍遥散而全愈又因怒复作用柴胡清肝散而痊一妇人耳内胀痛内热口乾劳则头晕吐痰下带此肝脾气虚也朝用补中益气夕用加味逍遥散而痊一寡妇耳内外作痛不时寒热脉上鱼际此血盛之症用小柴胡加生地以抑其血而愈又项间结核如贯珠寒热晡热用加味归脾汤加味逍遥散调补肝脾而愈

一妇人耳内外或作痛或赤肿或寒热月经旬日而止潮热内热自汗盗汗余以为肝脾气血俱虚而有热用归脾汤六味丸而愈

一妇人性急或耳内作痛或耳外赤肿发热脇胀日晡益甚此怒气伤肝气血俱虚朝用加味逍遥加黄栢桔梗夕用归脾汤送地黄丸而愈

一孀妇耳内外作痛或项侧结核内热晡热月经不调吐痰少食胸膈不利余以为郁怒伤肝脾朝用归脾汤以解脾郁生脾气夕用加味逍遥散以清肝火生肝血而愈

一女子耳下肿赤寒热口苦月经不调小腹内结一块此肝火气滞而血凝也先用小柴胡加山栀川芎丹皮又用柴胡清肝散而痊

附治验方药

小柴胡汤 治肝胆经症寒热往来晡热潮热身热默默不欲饮食或怒火口苦耳聋咳嗽发热脇下作痛甚者转侧不便两脇痞闷或泻利咳嗽或吐酸食苦水皆用此药主之

柴胡【二钱】黄芩【炒一钱】人参 半夏【各七分】甘草【炙五分】

右姜水煎服

加味小柴胡汤 治加陰经发热耳前後肿痛或结核焮痛或寒热晡热或经饮不调等症即小柴胡加山梔牡丹皮

益脾清肝散 治肝经之症寒热体痛脾胃虚弱人参
白术【炒】胡荽【各一钱】甘草【炒五分】川芎
当归黄芪【各一钱】柴胡【五分】牡丹皮【七分】

右水煎服

梔子清肝散 治三焦及肝胆经风热耳内作痒或生疮出水或脇肋胸乳作痛寒热往来

柴胡 牡丹皮 山梔【炒各一钱】茯苓 川芎 芍药 当归
牛蒡子【炒各七分】白术【炒】甘草【各五分】

右水煎服

柴胡清肝散 治肝胆三焦风热怒火以致项胸作痛或头目不清或耳前後肿痛或寒热体疼

柴胡 黄芩【炒各五分】人参
山梔【炒】川芎【各一钱】连翘 桔梗【各八分】甘草【五分】

右水煎服

犀角地黄汤 治上焦有热口舌生疮发热或血妄行或吐衄或下血

犀角【镑】生地黄 白芍药 黄芩【炒】牡丹皮 黄连【炒各一钱】

右水煎服若因怒而患加柴胡山梔

犀角升麻汤 治阳明经风热牙疼或唇颊肿痛或手足少阳经风热连耳作痛

犀角【镑】升麻 防风 羌活【各一钱】白附子【五分】川芎 白芷
黄芩【炒各七分】甘草【五分】

右水煎熟入犀末服

益陰腎氣丸【方見六卷第三論】

婦人瘰癧方論第三

婦人瘰癧或因忧思鬱怒或因胎产经行则肝胆脾肾受伤以致前症盖肝伤则血燥血燥则筋挛累累如贯珠多生耳前後胸脇间若寒热肿痛乃肝气动而为病用柴胡栀子散以清肝火为主佐以逍遥散以养肝血若寒热既止而核不消乃肝经之血亦病矣宜用加味四物汤以养肝血为主佐以柴胡栀子散以清肝火若初生如豇附着於筋肉色不变内热口乾精神倦怠久不消溃乃肝脾亏损用逍遥散归脾汤六味丸以健脾土培肝木切不宜用散坚追毒之剂故外台秘要云肝肾虚热则生瘰癧矣病机云瘰癧不系膏粱丹石之毒因虚劳气鬱所致补形气调经脉其疮当自消散若误下之先犯病禁经禁矣若久溃不斂脉浮大邪火盛也面色㿔白金尅木也皆不治凡瘰癧赤脉贯瞳子有几条则几年死无则可治

附治验

一妇人患前症久而不愈或以为木旺之症不宜於春预用散肿溃坚汤肿硬益甚余以为肝经亏损用六味地黄丸补中益气汤至春而愈此症若肝经风火自病元气无亏可用散坚泻青之剂若肝自损亏或水不生木用地黄丸若金来尅木须补脾土生肾水若行攻伐则脾胃伤而反致木尅土矣

一妇人患之少寐年余而溃脓水淋漓月经或五六十日一至悞服通经丸展转无寐午前恶寒午後发热余谓思虑伤脾用归脾汤作丸午前以六君子送下午後以逍遥散送下两月余得寐半载後经行如期年余而疮愈

一妇人溃後发热烦躁作渴脉大而虚此血虚也以当归补血汤六剂而寒热退又以圣愈汤数剂而全愈更以八珍加贝母远志而疮斂

一瘰癧妇面黄体倦咽酸暖气余谓中气虚弱欲用补中益气加茯苓半夏不信反降火利气胸膈痞满疮肿痛又散坚利气暖气不絕大便不实四肢时冷余曰今变中气虚寒矣用六君加姜桂少用升麻柴胡渐愈佐以补中汤寻愈

一妇人患此暖气用降火清胃食少吞酸胸膈痞闷用利气消导吐痰气促饮食日少用清热化痰大便坚澁内热身瘦余曰吞酸暖气脾胃气虚也胸痞痰喘脾肺气虚也大便坚澁内热日瘦脾肺血虚也遂以补中益气加炒黑吴茱萸三分数剂佐以六味丸诸症顿退乃用归脾汤逍遥散间服而愈

一妇人患前症遍身作痒脉大而虚此气血俱虚不能荣於腠理以十全大补汤治之而愈大凡溃後午前痒作气虚午後痒作血虚若作风症治之则必死一妇人项核肿痛察其气血俱实先以必效散一服去之更以益气养荣汤三十余剂补之而消盖此症初起而血气虚弱者

先用前汤待气血稍充乃用必效散以去毒仍用补药无不效若已成脓即针而补托之气血复而核不消服散坚之剂不应而气血如故仍以必效散养荣汤又不应灸肘尖肩髃二穴用豆豉饼琥珀膏自愈若气血壮实不用追蚀亦能自腐用药以腐之者使易於收敛耳若血虚而用追蚀不惟无益适以取败凡不慎饮食七情者不治附方药

当归川芎散 治手足少阳经血虚疮症或风热耳内痒痛生疮出水或头目不清寒热少食或经水不调胸膈不利腹脇痞痛小便不调

当归 川芎 柴胡 白术【炒】 芍药【炒各一钱】

山梔【炒一钱二分】 牡丹皮 茯苓【各八分】 蔓荆子

甘草【各五分】

右水煎服

若肝气不平寒热往来加柴胡地骨皮肝气实热加柴胡黄芩肝脾气血虚热加参芪熟地脾虚饮食少思倍加白术茯苓脾虚胸膈不利加人参黄芪脾虚痰滞胸膈不利加半夏肝气不顺胸膈不利加木香肝虚小腹痞满或时作痛加熟地脾血不足小腹作疼加肉桂日晡发热加熟地

加味地黄丸 治肝肾陰虚诸症或耳内痒痛出水或眼昏痰喘或热渴便澀等症

乾山药 山茱萸【肉】 牡丹皮 泽泻 白茯苓熟地黄【自制】 生地黄 柴胡 五味子【各另为末等分】

右将二地黄酒拌杵膏加蜜丸桐子大每服百丸空心白汤下如不应用加減八味丸

人参养荣汤 治溃?寒热四肢倦怠体瘦少食而黄气短不能收敛大疮愈後多服之庶不变他症也白芍药【一钱五分】 人参 陈皮 黄芪【炒】 桂心 当归 白术【炒】 甘草【炙各一钱】 熟地黄【自制】 五味子【杵炒】 茯苓【各七分】 远志【去心炒五分】

右姜枣水煎服

泻青丸 治肝经实火脇乳作痛或恶寒发热大便秘结

当归 龙胆草【炒黑】 川芎 山梔【炒】 大黄【炒】 羌活 防风【各等分】

右为末蜜丸桐子大每服三四丸白汤下若陰血不足肝火血燥用四物加山梔柴胡或逍遥

散加丹皮山梔若腎水虧損不能生肝木而筋挛結核或肢節拳攣或似中風涎痰上涌用六味丸料煎服

生地黄丸 治師尼寡婦室女乍寒乍熱或頸間結核肝脈弦長而出魚際

生地【一兩酒拌杵膏】秦艽 黃芩 硬柴胡【各五錢】

赤芍藥【一兩】

右為末入地黄膏加煉蜜少許丸桐子大每服三十丸烏梅煎湯下日進二服

連翹飲子 治肝胆經氣滯癰瘰結核或乳內結核者連翹 川芎 瓜蒌仁【研】 皂角刺 橘葉 青皮 甘草 節 桃仁【各一錢】

右水煎服

散腫潰堅湯 治癰瘰堅硬氣血無虧者宜用

升麻 連翹 當歸尾【酒拌】 白芍藥【炒】 黃栢【酒炒】 葛根 三棱【酒拌微炒】 廣朮【各三分】 龍胆草【酒炒】 桔梗【炒】 昆布

知母【酒炒】 瓜蒌根【各五分】 柴胡【四分】 甘草【炙五分】 黃芩【酒炒四分半】

右水煎服

必效散 治癰瘰未成者消已潰者斂須元氣無虧者可服若孕婦禁餌

南鵬砂【二錢五分】 輕粉【一錢】 斑貓【四十枚去頭翅同糯米炒熟去米】 巴豆【五粒去殼心膜】 麝香【五錢】 白胡椒【一個】

右為末每服一錢五更用滾湯調下如小水澀滯或微痛此毒欲下也進益元散一服即下此方斑貓巴豆似為峻厲然用巴豆乃解斑貓之毒用者勿畏

益元散

滑石【末六錢】 甘草【末一錢】

右每服一錢白滾調

琥珀膏 治颈项或腋下初结小核渐如连珠溃而脓水不絕或漏症者

琥珀【一两】 丁香 桂心 朱砂 木香 松香 白芷 防风 当归
木鼈子【肉】 木通【各五钱】 麻油【二斤】

右先用琥珀等六味为末其余药入油煎焦黑滤去渣徐徐入黄丹再煎软硬得中入前末即成膏矣

针头散 治一切顽疮内有瘀肉或?核不化疮口不合宜此药腐之

赤石脂【五钱】 乳香 白丁香 砒霜【生用】 黄丹【各一钱】 轻粉
麝香【各五钱】 蜈蚣【一条炙乾】

右为末搽瘀肉上其肉自化若疮口小用糊和作细条陰乾絰之凡疮久不合者内有脓管必须用之

逍遥散

归脾汤【二方见本卷第四论】

柴胡清肝散

梔子清肝散【二方见本卷第二论】

补中益气汤【方见本卷第十论】

四物汤

加味四物汤

六君子汤【三方见本卷第六论】

六味丸

当归补血汤【二方见本卷第十一论】

圣愈汤【方见本卷第九论】

益气养荣汤【方见本卷第五论】

灸肩髃肘尖法【见本卷末】

妇人结核方论第四

妇人结核皆因郁怒亏损肝脾或因胎产经行失於调养或因暴怒触动胆火若结於项侧耳前後或胸脇肿痛或发寒热属胆经风热怒火宜用柴胡清肝散加钩藤山梔以养血气清肝火若结於肉里其色不变晡热内热属肝火血虚宜用加味逍遥散加龙胆草以养肝血清肝火或结於肢节或累累如贯珠其色不变亦肝火血燥而筋挛宜用柴芍参苓散加钩藤以养血气佐以六味丸以生肾水若时消时作此气滞而痰结也用归脾六君二汤以调和脾肺之气并佐以海藻丸若溃而核不腐或肉不生或脓水清稀肌寒肉冷自汗盗汗寒热内热面色痿黄食少体倦便利不调者五脏皆虚也但用补中益气加味六君子二汤调补脾胃以滋诸臟则各症自退故经云形伤则痛气伤则肿慎不可轻用行气破血之剂以复伤也

附治验

一妇人项结核寒热头痛脇胀乳痛内热口苦小便频数属肝火血虚用加味四物而愈又用加味逍遥散调补肝脾而安

一妇人经事不调肢体结核如榛如豆不计其数隐於肉里其色不变三年余矣大按则痛或投以降火消毒乃不按自痛发热作渴日晡益甚经水过期左关脉数此肝火血燥用清肝益荣汤六十余剂而愈惟项核未消又以当归龙荟丸数服及八珍加柴胡山梔三十余剂而痊

一妇人久鬱怒胸脇内股外膝各结核寒热往来经候不调胸膈不利饮食少思大便不调左关弦洪左寸弦数右关弦紧右寸弦浮余谓左关弦洪肝经热也左寸弦数木生火也右关弦紧肝剋脾也右寸弦浮木侮金也法当生肝血遂用加味四物汤而诸症退用加味逍遥散而经候调用加味归脾汤而全愈一妇人因怒肢体结核睡中发搐左关弦洪余曰此为肝火血燥筋挛当清肝火养元气遂用加味小柴胡汤加味逍遥散渐愈又用八珍汤加牡丹皮柴胡山梔钩藤而愈

一妇人肢体结核胸腹痞闷气泄稍宽余谓此肝脾鬱滞不信服降火行气化痰病愈甚而气愈虚余用加味逍遥加味归脾间服半载而痊

一妇人项间结核不时寒热左目紧小头项振掉四肢抽搐此肝火血虚风热也用加味逍遥加钩藤数剂诸症渐愈又用八珍汤调理而痊

一妇人耳内耳後项侧结核作痛寒热口苦月经不调此肝胆经火而伤脾胃也用四君柴胡丹皮及六味地黄而愈

一妇人因怒结核经行不止发热昼安静而夜谵语此血分有热也用小柴胡加生地顿安其

核尚在经候先期肝脉弦数此肝火血涸而筋挛也用加味逍遥加生地月经如期而核消

一妇人项臂结核头痛寒热乳内时疼两脇焮痛余以为肝脾鬱火而血燥先以加味逍遥散再用加味归脾汤而愈

一妇人素鬱怒患前症内热晡热久而不愈若而色痿黄则月经过期而少若面色赤则月经先期而多余日面黄过期脾经虚弱也面赤外期脾虚火动也朝用补中益气升举脾土以益气血夕用加味逍遥滋养肝血以息陰火复以归脾汤解鬱结半载元气复而瘥又有患前症因脾虚下陷而发热乃专治其瘥变療而歿

一女子耳下结核焮痛寒热此属肝经风热用梔子清肝散一剂诸症悉愈後因怒耳後并额两角作痛寒热此兼少阳经症仍以前药加羌活二剂而瘥一妇人项患五核时常寒热肝肺弦长而出寸口此血盛无耦之症也用小柴胡汤加生地乌梅治之而愈

一妇人腹中结块误认血鼈服驱逐之药下血甚多致肢节间结核【治法见二十卷第十一论】

附方药

八珍汤 治脾胃伤损恶寒发热或烦躁作渴或因脾胃亏损脓水清稀久不能愈等症即四君四物二汤相合【方见本卷第二论】

十全大补汤 治疮疡胃气虚弱肿痛不消或溃而不斂或自汗盗汗食少体倦或寒热作渴头痛眩暈或似中风又治气血俱虚胸腹脇痛或作胀满或骨节作痛经候不调或寒热晡热五心烦热或吐血咽乾头痛眩暈眼目昏澁或痰嗽喘促胸膈虚痞或呕吐泄泻手足冷热即八珍汤加黄芪肉桂

加味逍遥散 治肝脾血虚有热遍身搔痒或口燥咽乾发热盗汗食少嗜卧小便澁滯等症又治瘰?流注虚热等疮

甘草【炙】当归【炒】芍药【酒炒】茯苓白术【炒各一钱】柴胡牡丹皮山梔【炒五分】

右水煎服

逍遥散即前方去丹皮山梔

归脾汤 治脾经失血少寐发热盗汗或思虑伤脾不能摄血以致妄行或健忘怔忡惊悸不寐或心脾伤痛嗜卧少食或忧思伤脾血或发热或肢体作痛大便不调或经候不准晡热内热

或癰?流注不能消散潰斂

人參 白朮【炒】 黃芪【炒】 白茯苓 龍眼肉 當歸 遠志 酸棗仁【炒各一錢】 木香 甘草【炙各五分】

右姜棗水煎服

加味歸脾湯【即前方加柴胡山梔】

柴朮參苓湯 治肝火血熱遍身瘙癢或起赤暈或筋攣結核

白朮【炒】 人參 茯苓【各一錢】 柴胡 川芎 山梔【炒】 芍藥【炒】 甘草【炒各五分】 熟地【自制】 當歸【各八分】

右水煎服

柴芍參苓散 治肝胆經部分結核癰?瘤瘕等症或肝血燥熱脾氣虛弱發熱少食

柴胡 芍藥【炒】 人參 茯苓 白朮【炒】 山梔【炒】 陳皮 當歸 牡丹皮 甘草【各五分】

右姜棗水煎服

清肝益榮湯 治肝胆經風熱血燥筋攣結核或作瘕子

柴胡 山梔【炒各五分】 當歸【一錢】 龍胆草【酒拌炒黑五分】 川芎 芍藥【炒各一錢】 熟地黃【自制】 白朮【炒】 木瓜【不犯鐵器】 茯苓【各五分】 甘草【三分】 薏苡仁【五分】

右水煎服

清熱涼血飲 治風熱血燥丹毒等症大便秘結 當歸 川芎 大黃【炒】 芍藥【炒】 生地黃【各一錢】

神效開結散 消癰塊甚效

沉香 木香【各二錢】 橘紅【四兩】

珍珠【四十九粒入砂罐內以塩泥封固煨赤取出去火毒用】

猪厌肉子【四十九枚用豚猪者生项间如枣子大】

右为末每服一钱临卧酒调徐徐咽下患小者三五服大者一剂可愈切忌酸酖油腻滞气之物须用除日於静室修合

海藻散坚丸 治肝经癭瘤

海藻 昆布【各二两】 小麦【四两醋煮晒乾】 柴胡【二两】

龙胆草【酒拌炒焦二两】

右为末炼蜜丸桐子大每服二三十丸临卧白汤送下噤化咽之尤好凡患癭?服调治之药未应宜佐以前二药

丸味柴胡丸【方见本卷第八论】

梔子清肝散

柴胡清肝散【二方见本卷第二论】

生地黄丸【方见本卷第三论】

妇人流注方论第五

妇人流注或因忧思鬱怒亏损肝脾或因产後劳役复伤气血以致营气不从逆於肉理腠理不密外邪客之或湿痰流注或跌扑血滯或产後恶露则气流而注血注而凝或生於四肢关节或流於胸腹腰臀或结块或漫肿皆属虚损急用葱熨及益气养荣汤则未成者自消已成者自溃若肿起作痛起居如常饮食如故属病气有余形气未损者尚可治若漫肿微痛起居倦怠饮食少思属形气病气俱不足最为难治不作脓或脓成不溃气血虚也用八珍汤憎寒畏寒阳气虚也十全大补汤晡热内热陰血虚也四物加参术作呕欲呕胃气虚也六君加炮姜食少体倦脾气虚也补中益气加茯苓半夏四肢逆冷小便频数命门火衰也八味丸小便频数痰盛作渴肾水亏损也六味丸月经先期不日而止肝脾虚弱也月经过期多日不止肝脾虚热也八珍汤加柴胡丹皮凡溃而寒凝疮口不斂者用豆豉饼祛散之其溃而有脓管不斂者用针头散腐化之若不补气血不节饮食不慎起居不戒七情或用寒凉剋伐者俱不治

附治验

一妇人左臂患之年许不溃坚硬不痛脉弱少食月经过期日晡发热劳怒则痛此形气虚而逆於肉里也与参芪归术川芎芍药熟地贝母远志香附桔梗丹皮甘草百余贴而消

一妇人因暴怒而腰肿一块或胸膈不利或走气作痛此营气鬱滞与方脉流气饮数剂而止更以小柴胡对四物加香附贝母月余而愈

一妇人因怒脇下肿痛胸膈不利脉息沉滞此营气鬱遏而为肿用方脉流气饮数剂少愈以小柴胡对二陈加青皮桔梗贝母数剂顿退更以小柴胡对四物二十余剂而痊

一妇人因闪肭肩肿遍身作痛用黑丸子二服而痛止又用方脉流气饮二剂而肿消更以二陈对四物加香附枳壳桔梗而愈

一妇人患此遇劳必痛衆手按之痛止属气血俱虚用十全大补汤六味丸逍遥散而痊

一妇人先肢体作痛後患流注发热恶寒食少脇胀月经不调痰盛喘嗽五心烦热健忘惊悸盗汗无寐悉属肝脾亏损气血不足用十全大补加当归脾兼服诸症悉痊

一妇人素头晕患流注月经迟少此属中气虚弱用补中益气汤而愈後因劳仆地月经如涌此劳伤火动用前汤加五味子一剂而愈

一妇人患前症用行气化痰药胸膈不利饮食少思用疎利之药大便作泄中满不食余谓脾胃复伤用补中益气汤加煨姜脾胃健饮食进用六君加芎归百余剂而愈

一妇人素鬱结肩臂各肿如覆杯余以肝脾亏损用加味逍遥散百余剂元气复而肿消後劳役怒气经行不止服凉血之剂其血如崩余以此因脾气复伤下陷而血从之朝用补中益气夕用加味归脾而愈一妇人怀抱鬱结不时心腹作痛寒热倦怠服行气化痰等剂遍身结核大小不一二十余枚诸药不应余用加味归脾汤而愈

一妇人腿患筋挛骨痛诸药不应脉迟紧此肝脾气血虚弱而寒气之变也用大防风汤二剂顿退又二剂而安又一妇患之亦然先用前药二剂更服黑丸子而痊此二患若不早治以致内溃必成败症矣一妇人患前症溃後发热余以为气血俱虚不信乃服败毒表散之药果发热竟至不救夫溃疡虽有表症发热宜以托里为主佐以表散之剂况於瘰?流注乎

附方药

仙方活命饮 治一切疮疡未成者即散已成者即溃又止痛消毒之良剂也

白芷 贝母 防风 赤芍药 当归尾

甘草节 皂角刺【炒】 穿山甲【炙】 天花粉 乳香没药【各一钱】 金银花 陈皮【各三钱】

右用酒一大碗煎五七沸服

托里消毒散

治疮疽元气虚弱或行收伐不能溃散服之未成即消已成即溃腐肉即去新肉即生人参
黄芪【盐水拌炒】当归 川芎 芍药【炒】白术【炒】茯苓【各一钱】金银花
白芷【各七分】甘草【五分】

右水煎服

托?散 治疮疡因气血俱虚不能起发或腐溃不能收斂及恶寒?热者

人参【气虚多用之】黄芪【炒各一钱】白术【炒】陈皮 当归 熟地黄【自制】茯苓
芍药【酒炒各一钱】

右水煎服

益气养荣汤 治怀抱抑鬱瘰?流注或四肢患肿肉色不变或日晡发热或溃而不斂

人参 茯苓 陈皮 贝母 香附 当归【酒拌】川芎 黄芪【盐水拌炒】熟地黄【酒拌】 药
【炒各一钱】甘草【炙】桔梗【炒各五分】白术【炒二钱】

右姜水煎服

木香饼 治气滞结肿闪肭风寒所伤作痛

木香【五钱】生地黄【一两】

右木香为末地黄杵膏和匀量患处大小作饼置患处以热熨斗熨之肿痛悉退

二陈汤 治中脘停痰饮食少思呕逆等症

陈皮【去白】茯苓 半夏【各一钱】甘草【炙五分】

右水煎服

方脉流气饮

治恼怒胸膈胀满或肢体作痛或结壅肿血气无亏【方见第三卷第七论等症】

隔蒜灸法 治一切疮毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒随火而散

用大蒜头去皮切三分厚安疮头上用艾壮於蒜上灸之三壮换蒜复灸未成者即消已成者亦杀其大势不能为害如疮大用蒜捣烂摊患处将艾铺上烧之蒜败再换仍服托里之剂如不痛或不作脓不起发者不治此气血虚极也

神效葱熨法 治虚怯人肢体患肿块或不痛或作痛或风袭於经络肢体疼痛或四肢筋挛骨痛又治流注跌扑伤损肿痛用葱头细切杵烂炒热敷患处冷易之再熨肿痛即愈其效如神此外补阳气而运散壅滞之法也

豆豉饼 治疮?肿硬不溃或溃不斂并一切顽疮恶疮用江西豆豉为末唾津和作饼大如钱厚如三文置患处加艾壮於上灸之乾则易之若背疮大者用漱口水和饼覆患处铺艾於上灸之如未成者则消已成者能杀其毒有不效者乃气血虚也为不治

大防风汤【方见本卷第九论】

八珍汤【方见本卷第三论】

十全大补汤【方见本卷第九论】

六君子汤

四物汤【二方见本卷第六论】

补中益气汤【方见本卷第十论】

八味丸

六味丸【二方见本卷第十一论】

针头散【方见本卷第三论】

小柴胡汤【方见本卷第二论】

黑丸子【一名和血定痛丸方见本卷第九论】

妇人血风疮论第六

妇人血风疮因肝脾肺经风热或鬱火血燥所致其外症或身发疙瘩搔痒或如丹毒痒痛或搔破脓水淋漓其内症月经失常小便不调夜热内热自汗盗汗恶寒增寒肢体倦怠饮食不甘寒热往来若发热作痛属肝经风热用当归饮加柴胡山梔若寒热作痛属肝脾鬱火用小

柴胡加山梔黄连若疥瘡瘙癢属肺经风热用清热消风散若经候失常内热晡热属肝脾血虚用加味逍遥散若肢体倦怠寒热往来属肝脾气虚用加味四君子加柴胡丹皮若夜热作渴或兼谵语乃血分有热用小柴胡加生地黄血虚用四物合小柴胡若无寐盗汗内热晡热乃脾经血虚用归脾汤兼寒热加山梔若愈後身起白屑搔则肌肤如帛所隔此气血虚不能荣於腠理用十全大补汤若用风药以治其外则陰血复伤反致他症矣

附治验

一妇人素清苦四肢患之误服败毒药晡热内热自汗盗汗月经不行口乾咽燥夫四肢者脾之所主当调养脾血其病自愈用归脾汤数剂而愈

一妇人性躁患之寒热口苦脇痛耳鸣腹胀溺澹年余矣此属肝火伤脾用四君子加柴胡炒山梔炒龙胆数剂更与逍遥散兼服而疮愈又与六味丸及逍遥散七十余剂而愈

一妇日晡身痒月余口乾又月余成疮服祛风治疮药脓水淋漓午前畏寒午後发热殊类风症余谓肝火伤脾外邪所搏先用补中益气加山梔钩藤又以逍遥加川芎贝母而愈

一妇瘙癢发热日晡益甚皮肤赤晕月经过期此血虚而热也以逍遥散加熟地热止痒退更以四物柴胡参芪炙草茯苓调理遂愈

一妇怀抱久鬱患前症脓水淋漓服连翘消毒散食少胸痞服清气化痰汤作呕吐痰服清热化痰丸烦热畏寒四肢焮热面目赤色脉大无力余谓脾胃亏损而虚寒隔阳气於外用六君子汤加炮姜治之诸症稍愈饮食顿进佐以四物汤诸症渐愈又以四君子每味一钱四物汤每味五分诸症全愈後因劳晡热体倦懒食小腹痞坠小便澹滯自用四物黄柏知母晡热尤甚更烦渴眩暈余以脾气下陷用补中益气汤渐愈乃佐以逍遥散而安後月经至如崩前症复作此脾气伤而不能统血血虚而陰火动也仍用补中益气而痊

一女十二岁善怒遍身作痒用柴胡川芎山梔芍药以清肝火以生地当归黄芩以凉肝血以白术茯苓甘草以健脾土而愈半年後遍身起赤痕或时眩暈此肝火炽甚血得热而妄行是夜果经至

附方药

当归饮 治血热癰疹痒痛脓水淋漓发热等症当归 白芍药 川芎 生地黄 白蒺藜【炒】 黄芪【各一钱】 防风 荆芥 何首乌【不见鉄器】 甘草【各五分】

右水煎服

四君子汤 治胃气虚弱或因尅伐以致肿不消散溃不收斂者宜用此药调补脾胃诸症自愈

若误用攻毒七恶随至若饮食少思或食难化或欲作呕或大便不实疮口出血吐血便血尤宜用之凡气血俱虚之症宜用前汤但加当归则脾胃健饮食进陰血生若用四物沉陰则脾胃复伤反致他症若命门火衰而脾土虚寒者必用八味丸以补土母

人参 白术 茯苓【各二钱】 甘草【炙一钱】

右姜枣水煎服

加味四君子汤即前方四君子加川芎当归

六君子汤 治症同前即四君子汤加陈皮半夏各一钱若中气虚寒假热误服寒凉尅伐以致四肢发热口乾舌燥呕吐此因寒气隔阳於外须臾加姜桂不应急加附子

四物汤 治血虚或因失血或因尅伐或因潰後以致晡热内热烦躁不安若脾虚不能生血者宜四君加当归并酒炒白术以补脾土其血自生若血虚发热误服寒凉尅伐之剂以致发热作渴目红面赤脉洪大而虚此血脱烦躁急用当归补血汤

当归【酒拌一钱】 熟地黄【三钱自制】 芍药【炒一钱】 川芎【一钱】

右水煎服

加味四物汤即四物加柴胡牡丹皮山梔

神效当归膏 治一切疮疡搔痒疼痛去腐肉生新肉其效如神如洗拭换膏必须预备即贴之新肉畏风故也如用白蜡尤好此药生肌止痛补血续筋故与新肉相宜

当归 生地黄 黄蜡【各一两】 麻油【六两】

右先将当归地黄入油煎黑去渣入蜡溶化候冷搅匀即成膏矣【如用白蜡減半】

滋陰肾气丸【方见六卷第三论】

小柴胡汤【方见本卷第二论】

归脾汤

逍遥散【二方见本卷第四论】

六味丸【方见本卷第十一论】

补中益气汤【方见本卷第十论】

妇人赤白游风方论第七

妇人赤白游风属肝经怒火血燥生风或脾经鬱结血虚生热或腠理不密风邪外袭其症或疙瘩瘙痒或脓水淋漓白属气而赤属血因得风而游行也若肝经血燥用柴胡清肝散肝经怒火用栀子清肝散肝经血热用加味四物汤肝火血虚用六味地黄丸脾经鬱热用加味归脾汤肝脾血虚风热用加味逍遥散若因风邪鬱热所致用荆防败毒散或专用祛风之剂肝血愈燥则血随火化反为败症矣

附治验

一妇人素清苦因鬱怒患前症晡热内热自汗盗汗月经不行口乾咽燥余谓此鬱气伤脾乃以归脾汤数剂诸症稍退後兼逍遥散五十余剂而愈

一妇人患此性躁寒热口苦脇痛耳鸣腹胀溺澀乃肝脾血虚火旺也用六君加柴胡山栀龙胆数剂更与逍遥散兼服渐愈又与六味丸逍遥散七十余剂诸症悉退

一妇人患前症误服大麻风药破而出水烦渴头晕诚类风症六脉洪数心肝脾为甚余曰风自火出此因怒火脾胃受邪血燥而作非真风症也与逍遥散六味丸以清肝火滋脾血生肾水而愈

一妇人患前症久不愈食少体倦此肝脾亏损陰虚发热也先用补中益气加川芎炒栀元气渐复更以逍遥散而疮渐愈

一妇人身如丹毒搔破脓水淋漓热渴头晕日晡益甚用加味逍遥散而愈

一妇人患赤游风晡热痒甚余用清肝养血之剂不信乃服大麻风药臂痛筋挛又服化痰顺气之剂四肢痿弱又一妇患前症数用风药煎汤泡洗以致腹胀并殁

一女子赤晕如霞作痒发热用加味小柴胡加生地

连翘丹皮而愈大凡女子天癸未至妇人月经不调受惊着恼多有此症

附方药

消风散 治风寒瘾疹痒痛或脓水淋漓头皮肿痒荆芥穗 甘草【炙】 陈皮 人参 茯苓 白僵蚕【炒】 防风 芎藭 藿香 羌活 蝉蜕【各一钱】 厚朴【姜制五分】

右水煎服

大连翘饮 治风热热毒或赤白游风表里皆受患者连翘?麦 荆芥 木通 赤芍药 蝉蜕甘草 防风 柴胡 滑石 山梔【炒】 黄芩【炒】 当归【各一钱】

右水煎服

当归饮 治风热赤白游风作痒作瘙破脓水淋漓等症

四物汤 治赤白游风血虚发热或晡热头目不清或烦躁不寐或胸脇作痛等症

六君子汤 治脾气亏损皮肤瘙痒或瘾疹不消【三方见本卷第六论】

加味小柴胡汤治肝胆经风热怒火赤白游风或寒热往来晡热潮热身热或口苦耳聋等症【方见本卷第二论】

加味逍遥散 治血虚有热遍身搔痒赤白游风发热晡热等症

逍遥散即前方去丹皮山梔

归脾汤 治脾经血虚瘙痒发热少寐盗汗等症【三方见本卷第四论】

荆防败毒散【方见本卷第十论】

妇人 疝方论第八【一名便痈一名便毒俗名?子】

妇人 疝或肝经湿热下注或鬱怒伤损脾肝其外症或两拘小腹肿痛或玉门焮肿作痛或寒热往来憎寒壮热其内症或小便澀滯或腹内急痛或小腹痞闷或上攻两脇或晡热重坠若两拘小腹肿痛肝经湿热壅滯也用龙胆泻肝汤玉门肿胀肝火血虚也用加味逍遥散及龙胆泻肝汤加木香若槩投散血攻毒之剂则误甚矣

附治验

一妇人拘中赤肿胀痛此脓内作用托里消毒散加柴胡数剂溃而脓清寒热乃气血复虚用托里散而寒热止用十全大补百余剂而斂

一妇人腹拘肿痛寒热口苦或时带下此肝经湿热不利也用龙胆泻肝汤而肿痛消用加味逍遥散而寒热退

一妇人腹拘肿痛小水不利时或胸乳作痛脇腹作胀此肝火气滞用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈一妇人拘中作痛小腹痞闷小便不利内热体倦饮食少思此肝火内动脾胃受伤也用加味归脾汤柴胡清肝散而安

一妇人拘中肿胀小腹作痛服下血之剂其痛益甚更吐泻少食余以为肝脾复伤用六君子汤加升麻柴胡而愈

一妇人两拘肿痛腹内一块不时上攻月经不调小便不利余以为肝脾气滞而血伤以四君加芎归柴胡山栀而愈後因鬱怒前症复作兼胸满腹胀盗汗此肝木甚而伤脾土也用加味归脾汤下芦荟丸而痊

一妇人小腹内或作痛或痞闷两拘肿痛内热寒热胸膈不利饮食不甘形体日瘦此肝气滞而脾气伤也朝用补中益气汤夕用芦荟丸渐愈更用六味地黄丸全愈

一妇人两拘肿痛小腹痞胀白带时下寒热往来小水淋?余作肝气滞而血病用龙胆泻肝汤渐愈又用加味逍遥散六味地黄丸全愈

一妇人患前症胸脇胀闷或小水不利或时腹痛此肝火气病先用龙胆泻肝汤以清肝热又用加味逍遥散以生肝血六味地黄丸以滋肾水而愈

一妇人患前症余以为肝脾鬱怒不信另服化痰利气之剂胸腹愈胀又服峻利疏导之剂变脾虚发肿而歿

一妇人患前症内热作渴饮食不甘肢体倦怠陰中作梗小便赤澀此脾经鬱结肝经湿热用加味归脾汤而愈後因怒复作小腹胀痛用小柴胡加山栀芎归痛止又用加味逍遥而愈

一妇人两拘作痛寒热内热小便赤澀胸脇不利此肝火动而脾气伤也用补中益气汤加茯苓数剂少愈又与加味归脾汤诸症悉退再用加味逍遥散而愈

一妇人小腹痞闷溺澀内热体倦懒食此肝火动而脾血伤也用八珍加柴胡山栀胆草而安

一妇人陰中如梗两拘肿痛寒热不食小便频数小腹重坠余以为肝脾鬱怒所致先以补中益气加茯苓山栀车前子青皮以清肝火升脾气更以加味归脾汤调理脾鬱而愈

附方药

龙胆泻肝汤 治肝经湿热两拘肿痛或腹中疼痛或小便澀滯等症

龙胆草【酒拌炒黄】泽泻【各一钱】车前子【炒】木通

生地黄【酒拌】当归【酒拌】山梔【炒】黄芩【炒】甘草【各五分】

右水煎服

九味柴胡汤

治肝经湿热下注便毒肿痛或小腹脇肋结核凡肝胆经部分一切疮疡或风热结核瘰?柴胡
黄芩【炒各一钱】人参 山梔【炒】半夏 龙胆草【炒焦】当归
芍药【炒】甘草【各五分】

右水煎服

芦荟丸 治肝气不和尅侮脾胃而患诸症或三焦肝胆经风热目生云翳或疳热瘰?耳内生
疮寒热作痛肌体消瘦发热作渴饮食少思肚腹不调或牙龈蚀落颊頤腐烂下部生疮等症

芦荟【五钱】胡黄连 当归 芍药【炒】龙胆草【酒浸炒焦】川芎
芫荽【各一两】木香 甘草【炒各三钱】

右为末用米糊丸麻子大每服五十丸滚汤下

加味小柴胡汤

小柴胡汤

治肝经下部肿胀小便不利或寒热往来或晡热潮热或胸脇作痛【二方见本卷第三论】

加味逍遥散 治肝脾血虚湿热流注下部诸症发热晡热寒热

加味归脾汤

治脾肝鬱怒下部诸症寒热晡热少食无寐或经候不调【二方见本卷第四论】

补中益气汤 治元气下陷下部重坠或晡热寒热少食体倦或因过服寒凉之药所致【方见
本卷第十论】

加味四物汤【方见本卷第六论】

八珍汤 治气虚寒热晡热或寒热往来下部诸症【二方见本卷第三论】

妇人鹤膝风方论第九

妇人鹤膝风症因胎产经行失调或鬱怒亏损脾肝而为外邪所伤或先腿脚牵痛或先肢体

筋挛既而膝渐大腿渐细如鹤之膝故名之也若肿高赤痛者易治漫肿不赤痛者难治二三月溃而脓稠者易治半载後溃而脓清者难治设用攻伐已损元气尤为难治也大要当固元气为主而佐以大防风汤若食少体倦者六君子汤为主晡热内热者逍遥散为主寒热往来者八珍汤为主发热恶寒者十全大补汤为主少寐惊悸者归脾汤为主月经过期者补中益气为主月经先期者加味逍遥散为主凡溃後当大补脾胃若脓出反痛或寒热烦渴等症皆属气血亏损一於培补庶保终吉

附治验

一妇人久鬱怒胸脇不利内热寒热经候不调遍身酸痛余谓胃气亏损先用补中益气汤加半夏茯苓二十余剂胃气渐醒又用大防风汤与归脾汤膝肿渐消用加味逍遥散大防风汤而全消又用八珍汤加牡丹皮调理气血而安

一妇人患前症肿痛寒热先用大防风汤一剂又用加味逍遥散四剂月余肿痛渐退惑於速效另服祛风败毒虚症蜂起仍用大防风为主佐以十全大补而消又服大补汤两月余而痊

一妇人患前症两拘中腿股筋牵作痛内热寒热此肝火气滞之症先用加味小柴胡汤四剂後以加味逍遥散为主佐以大防风汤而消又患痢後两膝肿痛寒热往来用十全大补汤为主佐以大防风汤而仍消

一妇人患之虽溃而肿不消朝寒暮热饮食不思经水三四月一至此属肝脾气血俱虚也用补中益气加味归脾二汤各三十余剂肿渐消而寒热止又佐以大防风月余而能步履再月余经行如期又服六味丸八珍汤三月而敛

附方药

大防风汤 治陰虚邪袭腿膝肿痛等症

防风 附子【炮】 牛膝【酒浸】 白术【炒】 羌活 人参【各一钱】 川芎【一钱五分】 肉桂【一钱】 黄芪【炒一钱】 芍药【炒】 杜仲【去皮姜汁拌炒】 甘草【炙各五分】 熟地黄【自制一钱五分】

右水煎服

黑丸子【一名和血定痛丸】 治跌扑坠堕筋骨疼痛或瘀血壅肿或外感风寒肢体作痛若流注膝风初结服之自消若溃而脓清与补气血药自敛孕妇勿服

百草霜【一两】 白芍药【一两】 南星
川乌【各炮三钱】 白蔹赤小豆【各一两六钱】 白芨 当归

骨碎补【焙各八钱】牛膝【焙六钱】

右为末酒糊丸桐子大每服三十丸盐汤温酒任下

圣愈汤 治血虚心烦睡卧不宁或五心烦热

地黄【酒拌蒸半日】生地黄【酒拌】黄芪【炙】人参川芎当归【各一钱】

右水煎服

六味丸【方见本卷第十论】

逍遥散

加味逍遥散

八珍汤

十全大补汤

归脾汤【五方见本卷第四论】

补中益气汤【方见本卷第十论】

四物汤

六君子汤【二方见本卷第六论】

妇人下注疰疮方论第十

妇人两疰生疮或因胎产饮食失宜伤损脾胃或因忧思鬱怒亏损肝脾以致湿热下注外邪所搏外疰属足三阳可治内疰属足三阴难治若初起发肿赤痛属湿热所乘用人参败毒散或苏败毒散若漫肿作痛或不肿不痛属脾虚湿热下注补中益气汤气血俱虚八珍汤若脓水淋漓体倦少食内热口乾属脾气虚弱补中益气加茯苓酒炒芍药若午後头目不清属脾虚陰火用前汤加熟地芍药若午後发热倦怠属气虚血弱用前汤加川芎熟地若怀抱鬱怒属脾气不舒用归脾汤加川芎山梔若内热体倦痰涎口疮属脾肾虚热用六味丸若肢体畏寒饮食少思属脾肾虚寒用八味丸大抵色赤属湿热易治色黯属虚寒难治设误用攻伐复伤胃气多变瘵症

附治验

一妇人两膝生疮渐至遍身发热吐痰口燥咽乾盗汗心烦足热小便赤澀日晡益甚此肾足三陰虛火也用加味逍遙散六味丸而愈

一妇人患前症四畔微赤作痛重坠脓水淋漓胸膈不利饮食少思内热口苦夜间少寐此鬱结伤脾血也用归脾汤解鬱结生脾血用补中益气加茯苓半夏补脾气除湿热寻愈

一妇人久不愈色赤微热日晡焮肿形体虚弱饮食少思劳则喘渴恶寒发热此为脾虛下陷用补中益气汤而愈

一妇人患已三年色黯肿硬恶寒发热饮食少思形体消瘦作渴饮汤饮食稍多或腹胀或泄泻或作呕或作酸此脾气虛寒也用补中益气加乾姜五分五十余剂而愈

一妇人患此因步履劳复恶寒发热倦怠懒食而疮出血此元氣虛而不能摄血归经也用补中益气汤而愈

一妇人患之因怒寒热头眩或耳项脑脇胀痛或小腹陰道闷坠或小便频数下血此属肝火血热先用小柴胡加炒黑山梔芎归车前二剂诸症悉退又用加味逍遙而愈後因饮食劳倦前症复作疮口出血用补中益气汤而安

一妇人患将两月焮肿赤痛小便频数饮食如常此湿毒甚而氣血虛先用活命饮二剂去其湿毒又用八珍汤调補氣血而愈

一妇人患此焮痛恶寒发热此湿热乘於足三阳经分用?苏敗毒散而寒热退用仙方活命饮而焮痛止再用补中益气汤而形氣健

附方药

人参敗毒散 治疮瘍焮痛寒热或拘急头痛

人参 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 枳殼【麩炒】 茯苓 川芎 甘草【各一钱】

右水煎服

?苏敗毒散即人参敗毒散加?榔紫苏

补中益气汤 治元氣虛損或因剋伐恶寒发热倦怠少食或不能消散生肌或兼饮食劳倦烦热作渴黄芩【炒】 人参 白术 甘草【炙】 当归【各一钱】 陈皮【五分】 柴胡

升麻【各三钱】

右姜枣水煎空心午前服

乌沉汤 生气血补心肾上损者服之其效胜大建中汤

人参 当归 白术【炒各二两】 乌药

沉香【各半两】 附子【炮去皮尖】 白茯苓【各一两】 肉桂【去皮半两】

右为末每服三钱姜枣水煎空心服

金鎖正元丹 治真气不足四肢怠惰脚膝酸疼目暗耳鸣自汗盗汗一切虚损之症

五倍子【二两】 紫巴戟【去心四两】 补骨脂【酒浸炒二两半】 朱砂【七钱另研】 肉苁蓉【焙四两】 葫芦巴【炒四两】 茯苓【去皮二两】 龙骨【一两煨】

右为末酒糊丸桐子大每服二十丸空心温酒或盐汤下

平补镇心丹 治心血不足时或心忪惊悸梦如高坠常服安心肾益荣卫

朱砂【细研半两为衣】 人参【五钱】 龙齿【一两五钱】 白茯苓

五味子【炒】 车前子【炒】 茯神 麦门冬【去心杵膏】 肉桂【各一两二钱五分】 远志【去心甘草制】 天门冬【去心杵膏】 山药【制各一两五钱】

酸枣仁【去皮尖二钱五分】 熟地黄【酒蒸五钱杵膏】

右为末蜜丸桐子大每服三十丸空心温酒下

威喜丸 治小便白浊

黄蜡【四两】 白茯苓【四两一块同猪苓一两於磁器内煮二十沸取出晒乾不用猪苓】

右白茯苓为末熔蜡丸弹子大每服一丸空心细嚼津液咽下小便清利为度忌食米醋

小柴胡汤【方见本卷第八论】

加味逍遥散

八珍汤

归脾汤【三方见本卷第四论】

仙方活命饮【方见本卷第五论】

六味丸

八味丸【二方见本卷第十一论】

妇人足跟疮肿方论第十一

妇人足跟足指肿痛足心发热者皆因胎产经行失於调摄亏损足三陰虛熱所致若肿痛或出脓用六味丸为主佐以八珍汤胃虛懶食佐以六君子汤寒熱內熱佐以逍遙散晡熱益甚頭目不清佐以補中益氣湯痰盛作渴或口舌生疮亦用前二藥以滋化源大凡發熱晡熱內熱自汗盜汗等症皆陰虛假熱也故丹溪謂火起九泉陰虛之極也蓋足跟乃督脈發源之所腎經所過之地若不求其屬而泛用寒涼則悞甚矣然俗謂為兔啮疮者蓋獵人被兔咬足跟久而不斂氣血?盡其人必死男子酒色過度者多患此症

附治驗

一婦人素血虛因大勞兩足發熱晡熱月經過期或用四物芩連飲食少思胸痞吐痰用二陳枳實黃連大便不實吐痰無度足跟作痛余曰足熱晡熱月經過期肝脾血虛也胸痞吐痰飲食少思脾胃氣血也蓋胃為五藏之根本胃氣一虛諸病悉至先用補中益氣加茯苓半夏脾胃漸健乃佐以六味丸補脾腎不兩月而痊

一婦人經候不調發熱晡熱胸膈不利飲食少思服清熱寬中消導之劑前症益甚更兼肢體酸痛服除濕化痰等藥經候兩三月一至服通經降火之劑足跟足指作痛其熱如炙余以為足三陰虧損用補中益氣六味地黃兩月諸症漸退又用前湯并八珍湯兩月而康

一婦人足跟患腫兩腿酸軟或赤或白或痛或痒後或如无皮或如皺裂日晡至夜脹痛焮熱此屬足三陰虛損用加減八味丸及逍遙散加熟地川芎百劑而愈

一婦人勞則足跟熱痛余作陰血虛用八珍而痊後遍身搔痒服風藥發熱抽搐肝脈洪數此肝家血虛火盛而生風以天竺胆星為丸用四物麥門五味芩連炙草山梔柴胡煎送而愈

一婦人兩足發熱足跟作痛日晡熱甚余謂腎肝血虛用逍遙散六味丸五十餘劑諸症悉愈

附方藥

當歸補血湯 治脾胃損傷或因服峻劑致血氣俱虛發渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大

而虛重按全無若悞服白虎湯必死

黃芪【炙一兩】當歸【二錢酒制】

右水煎服

六味丸【一名六味地黃丸】此壯水制火之劑夫人之生以腎為主人之病多由腎虛而致者此方乃天一生水之劑無不可用若腎虛發熱作渴小便淋瀝痰壅失音咳嗽吐血頭目眩暈眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟五藏虧損自汗盜汗便血諸血凡肝經不足之症尤當用之蓋水能生木故也此水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑又治肝腎精血不足虛熱不能起牀即八味丸去附子肉桂

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化或臍腹疼痛夜多漩溺經云益火之源以消陰翳即此方也

熟地黃【自製八兩】山茱萸肉 山藥【各四兩】肉桂【用三分厚者去皮取肉分許方能補腎引虛火歸源】附子【用一兩五錢重者切四塊用童便浸數日火煨切看無白星為度】

右為末蜜丸桐子大每服七八十丸滾湯下

六君子湯【方見本卷第六論】

補中益氣湯【方見本卷第十論】

八珍湯

逍遙散【二方見本卷第四論】

婦人肺癰方論第十二【仍參外科樞要】

婦人肺癰因外邪內蘊或七情鬱火誤行汗下重亡津液以致肺氣受傷而惡風咳嗽鼻塞項強胸脇脹滿呼吸不利吐痰臭濁膿血腥穢若咳嗽喘急寒邪在表也小青龙湯咳嗽胸脹寒邪內壅也葶?大棗浮肺湯脇脹咳唾腥臭膿已成也桔梗湯咳喘短氣或小便短少肺氣虛也佐以參芪補肺湯體倦少食或喘嗽短氣脾肺虛也佐以參朮補脾湯作渴飲冷午前嗽甚胃火盛也竹叶石膏湯作渴內熱午後嗽甚陰血虛也六味丸四物湯口乾飲湯體倦少食胃氣虛也補中益氣湯加五味麥門口乾內熱咳唾痰涎腎水虛也六味丸益氣湯黃昏熱或嗽甚陰火熾也六味丸四物湯加五味麥門五更嗽或痰甚脾肺虛也六君子湯嗽而不得眠及兩脇痛肝火血虛也六味丸益氣湯大凡前症因外淫所侵當祛邪而實上因心火太過當伐木

而补金若肺气虚弱当补脾土而生肺金若陰火上炎当补脾肺以滋肾水然而发热喘嗽咳唾脓血饮食不入皆脾土不能生肺金肺金不能生肾水之败症苟能纯补脾土而生诸藏多有复生者若用寒凉脾胃复伤则肺金失养肾水益涸虚火上炎薰蒸於肺吾未见其能生之者其唾脓血脉浮大面色赤者俱难治若陰火妄动或劳嗽吐脓血者尤难治若脓自止脉浮短濇及始萌者易治

附治验

一妇人素血虚发热咳嗽服痰火之剂後吐脓血面赤脉数其势甚危此脓成而气血虚也余用八珍汤补元气桔梗汤治肺痈而愈

一妇人感冒风寒或用发表之剂反咳嗽喘急饮食少思胸膈不利大便不通右寸关脉浮数欲用疏通之剂余曰此因脾土亏损不能生肺金若更利之复耗津液必患肺痈矣不信仍利之虚症悉至後果吐脓余朝用益气汤夕用桔梗汤各数剂吐脓渐止又朝仍用前汤夕用十全大补汤各五十剂喜其善调理获愈

一妇人咳嗽吐痰胃膈作痛右寸关浮滑项下牵强此脾胃积热之痰非痈患也以二陈山栀白术桔梗治之而痊

一妇人素血虚内热时咳甲辰孟冬两尺浮洪以脾胃不健请治余曰当防患肺症丙午孟春果咳嗽左右寸脉洪数肺痈也脓已成左寸脉仍洪数乃心火剋肺金夏令可忧余用壮水健脾之剂稍愈彼遽自忽不事调摄果歿於夏令

附方药

青龙汤 治肺经受风寒咳嗽喘急

半夏【汤泡】乾姜 细辛 麻黄【去节】肉桂
芍药甘草【炙各一钱】五味子【炒五分】附子【炮五分】

右水煎服

葶?大枣泻肺汤 治肺痈胸膈胀满上气喘急或身面浮肿鼻塞声重用葶?炒黄研末每服三钱先用枣十枚水煎去枣入药再煎食後服

桔梗汤 治肺痈咳而胸膈隐痛两胁肿满咽乾口燥烦闷作渴浊唾腥臭

桔梗【炒】贝母【去心】当归【酒拌】瓜蒌仁
枳殼【麸炒】薏苡仁【微炒】桑白皮【炒】甘草节 防己【去皮各一钱】黄芪【塩水

拌炒】百合【蒸各一钱半】五味子【杵炒】甜葶【炒】地骨皮
知母【炒】杏仁【各五分】

右姜水煎服

人参补肺汤 治肺痈肾水不足虚火上炎咳唾脓血发热作渴小便不调

人参 黄芪【炒】白术 茯苓 陈皮
当归【各一钱】山茱萸【去核】山药【各二钱】五味子【杵】麦门冬
甘草【炙各七分】牡丹皮【一钱】熟地黄【自制一钱五分】

右姜水煎服

参芪补脾汤 治肺症因脾气虚弱咳唾脓涎中满不食宜兼服此药以补脾土生肺金

人参 白术【各二钱】黄芪【炙二钱半】茯苓 当归
陈皮【各一钱】升麻【三分】五味子【四分杵】炙甘草【五分】

右姜水煎服

人参平肺散 治心火剋肺金患肺痿咳嗽喘呕痰涎壅盛胃膈痞满咽嗑不利

人参 青皮 茯苓 天门冬 陈皮【各一钱】地骨皮【一钱】甘草【炙五分】知母【七分】
五味子【十粒杵】桑白皮【炒一钱】

右姜水煎服

竹叶石膏汤 治胃火盛而作渴者

淡竹叶 石膏【煨】桔梗【炒】木通 薄荷 甘草【各一钱】

右姜水煎服

竹叶黄芪汤 治痈疽气血虚胃火盛而作渴

淡竹叶【二钱】黄芪【炒】麦门冬【去心】当归 川芎
甘草【炒】黄芩【炒】芍药【炒】人参 半夏 石膏【煨】生地黄【各一钱】

右水煎服

二陈汤【方见本卷第五论】

六味丸【方见本卷第十一论】

补中益气汤【方见本卷第十论】

四物汤

六君子汤【二方见本卷第六论】

十全大补汤

八珍汤【二方见本卷第四论】

妇人肠痈方论第十三

妇人肠痈因经行产後瘀血或七情饮食所致其症小便如淋发热恶风身皮甲错腹皮肿急按之软如肿状或腹胀大转侧有水声或绕脐生疮或大便出脓其脉迟紧者脓未成用活命饮以解其毒脉滑数者脓已成用云母膏以下其脓若二年间遍身微肿大肠与脐出脓此息积之症也多致不救内经云肠痈为病不可惊惊则肠断而死其坐卧转侧宜徐缓时尝少饮薄粥静养调理庶可保生

附治验

一妇人小腹肿痛小便如淋此毒结於内用神效瓜蒌散二剂少愈又薏苡仁汤二剂乃痊

一妇人小腹痛而有块脉芤而澀此瘀血为患以四物加玄胡索红花桃仁牛膝木香二剂血下而愈一妇人小腹胀痛大便秘澀转侧有水声脉洪数以梅仁汤一剂顿下诸血诸症顿退以薏苡仁汤二剂而痊

一妇人小腹胀痛小便不利脉滑数此脓已成也服太乙膏五钱脓下甚多胀痛顿退以瓜蒌散蜡矾丸托里药而安

一妇人因经水多服药止之致腹作痛以失笑散二服而瘳又用加味逍遥散数剂而经调

一产妇恶露停滯小腹作痛服瓜仁汤下瘀血而痊凡瘀血停滯急宜行之缓则腐化为脓最为难治若流注关节则患骨疽多为败症

附方药

瓜子仁汤 治产後恶露未尽经行瘀血停滯小腹作痛或成痼患

薏苡仁【四两】桃仁【去皮尖】牡丹皮 瓜蒌仁【各一两】

右每服五七钱水煎

败酱散 治脉数身无热腹无积聚按之软濡此为肠痈久积陰冷所成

薏苡仁【二两半】附子【炮半两】败酱草【一两二钱五分】

右每服四钱水煎以小便利为度

牡丹汤 治肠痈腹软而痛时下脓血

牡丹皮 人参 天麻 白茯苓 黄芩【炒】 薏苡仁 桃仁【去皮尖】 白芷
当归【酒炒】 川芎【各一钱】 官桂 甘草【炙各五分】 木香【三分】

右水煎服

大黄汤 治肠痈小腹坚肿按之则痛肉色如故或焮赤微肿小便频数汗出憎寒脉迟紧未成脓者宜服之

大黄【炒】 朴硝【各一钱】 牡丹皮 瓜蒌仁【炒】 桃仁【去皮尖各二钱】

右水煎服

梅仁汤 治肠痈壅痛大便秘澁

梅仁【九个去皮尖】 大黄【炒】 牡丹皮
芒硝【各一钱】 冬瓜仁【研三钱】 犀角【镑末一钱】

右水煎入犀角末服

神仙太乙膏 治一切痈疽不问脓之成否并宜贴之更作丸服

玄参 白芷 当归 肉桂 生地黄 赤芍药 大黄【各一两】 净黄丹【十三两】

右用麻油二斤入铜锅内煎黑滤去渣入黄丹十二两再煎滴水中捻软硬得中即成膏矣如软更加丹云母膏固效卒难修合太乙膏亦可

神效黄矾丸 最解毒止痛

白矾【末一两明亮者】黄蜡【半两黄色者熔开一方用七钱】

右和衆手丸桐子大每服三十丸滚汤下如服金石发疽更用白矾末一两作三五服以温酒调下若遍身生疮如蛇头服之尤效此药能解毒气内攻也须多服方验亦治蛇咬熔化乘热滴伤处毒即出痛即止仍服两许

失笑散 治产後心腹绞痛或血迷心窍不知人事及寻常腹内瘀血积血作痛

五灵脂【去砂土炒】蒲黄【炒各等分】

右为末每服

活命饮【方见本卷第五论】

神效瓜蒌散【方见本卷第十四论】

四物汤【方见本卷第六论】

加味逍遥散【方见本卷第四论】

乳痈乳岩方论第十四

经云ru头属足厥陰肝经乳房属足阳明胃经若乳房忽壅肿痛结根色赤数日之外焮痛胀溃稠脓涌出脓尽而愈此属胆胃热毒气血壅滞名曰乳痈为勿治若初起内结小核或如鼈棋子不赤不痛积之岁月渐大巉岩崩破如熟榴或内溃深洞血水滴?此属肝脾鬱怒气血亏损名曰乳岩为难疗治法焮痛寒热宜发表散邪肿焮痛甚宜疏肝清胃或不作脓脓成不溃宜用托里或肌肉不生脓水清稀宜补脾胃或脓出反痛恶寒发热宜补气血或肿焮作痛晡热内热宜补陰血或饮食少思时作呕吐宜补胃气或饮食难化泄泻腹痛宜补脾气或劳碌肿痛宜补气血怒气痛肿宜养肝血慎不可用剋伐之剂复伤脾胃也乳岩初患用益气养荣汤加味逍遥加味归脾可以内消若用行气破血之剂则速其亡

附治验

一妇人内热脇胀两乳不时作痛口内不时辛辣若卧而起急则脐下牵痛此带脉为患也用
小柴胡加青皮黄连山梔二剂而差

一妇人因怒两乳肿兼头痛寒热此肝经气症也用人参败毒散二剂表症已退用小柴胡加

芎归枳壳桔梗四剂而愈

一妇人久鬱右乳内肿硬此肝经血症也用八珍加远志贝母柴胡青皮及隔蒜炙兼神效瓜蒌散两月余而痊

一妇人先热渴至夜尤甚後两乳忽肿肝脉洪数乃热入血分用加味小柴胡汤而愈

一妇人因怒左乳作痛发热因表散太过肿热殊甚用益气养荣数剂热止脓成因不即针益肿胀热渴针之脓大泄仍服前汤月余而愈

一妇人因怒左乳作痛胃膈不利此属肝脾气滞以方脉流气饮加木香青皮四剂而安

一妇人脓清肿硬面黄少食内热晡热自汗盗汗月经不行此肝脾气血俱虚也用十全大补加远志贝母及补中益气各三十余剂外用葱熨法而消一妇人脓成胀痛余欲针之不从至数日针出败脓三四碗许虚症蜂起几至危殆用大补之剂两月余始愈

一妇人素弱多鬱患时疫後脾胃愈虚饮食愈少因怒右乳脇红肿应内作痛或用炒麸皮熨之内痛益甚服加减四物汤肿势愈大胸脇背心相引而痛余谓病後脾弱怒复伤肝用八珍加陈皮黄芪柴胡山栀白芷八剂稍愈去白芷加青皮木香桔梗又六剂而安

一妇人左乳内肿如桃不痛不赤发热渐瘦此肝脾鬱怒也用八珍加香附远志青皮柴胡百余剂又兼神效瓜蒌散三十余剂脓溃而愈

一妇人久鬱左乳内结核如杏三月不消心脉濡脾脉大按之无力此肝脾气血亏损以八珍加贝母远志香附柴胡青皮桔梗五十余剂而消

一妇人稟实性躁怀抱久鬱左乳内结一核按之微痛此皆气血鬱滞以连翘饮十余剂少退更以八珍加青皮香附桔梗贝母二十余剂而消【已上皆乳痛】一妇人右乳内结三核年余不消朝寒暮热饮食不甘此肝脾气血亏损内服益气养荣汤外以木香饼熨之年余血气复而消

一妇人乳内结核年余晡热少食余谓此血气不足欲用益气养荣汤彼反服行气之剂溃出清脓而歿又一妇乳内结核如栗亦服前药大如覆碗坚硬如石出血水而歿【已上皆乳岩】

附方药

神效瓜蒌散 治乳痛及一切痈疽初起肿痛即消脓成即溃脓出即愈

瓜蒌【一个烂研】生粉草 当归【酒洗各半两】乳香 没药【各一钱】

右用酒煎服良久再服若肝经血虚结核久而不消佐以四物柴胡升麻白术茯苓甘草若肝脾气血虚弱佐以四君芎归柴胡升麻若忧鬱伤脾气血亏损佐以归脾汤

玉露散 治产後乳脉不行或身体肚热头目昏痛大便澁滯等症 水煎服

人参 白茯苓 桔梗【炒】 川芎 白芷 当归 芍药【各一钱】 甘草【五分】

灸肩尖肘尖二穴图【即肩髃肘髎】

此穴治瘰?之秘法盖瘰?属肝胆二经故患耳前後项腋之间男子多因恚怒亏损肝经之血陰火内作或不慎起居耗损肾水不能生肝血妇女多因恚怒伤肝火动血燥或鬱结伤脾火动血耗或患於胸乳间亦属於前经此症若因恚怒伤肝气血壅遏而不愈者宜灸此穴疏通经络若因久於鬱怒元气亏损而不愈当推其所属而调补化源如取其穴当以指甲掐两肘两肩四所患处觉酸麻方是其穴【男子治验见外科枢要妇人见校注妇人良方小儿见保婴粹要】

薛氏医案卷四十八

卷四十九

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷四十九

明 薛己 撰

敖氏伤寒金镜录

凡伤寒热病传经之邪比杂病不同必辨其脉 舌表里汗下之庶有不误况脉者血之府属陰当其得病之初正气相搏若真气未衰脉必滑数而有力病久热甚气衰脉必微细而无力方数甚也但可养陰退阳此识脉之要也或初病即恶寒发热後必有渴水燥热之证或逆厥而利此热 传经之邪也若始终皆热 惟热而不恶寒故伤寒为病初则头痛必无发热恶寒渴水之症一病便有逆厥泄利或但恶寒而无发热此寒 也此识 之妙也如舌本者乃心之窍於舌心属火主热象离明人得病初在表则舌自红而无白胎等色表邪入于半表半里之间其舌色变为白胎而滑见矣切不可不明表 故邪传於里未罢则舌必见黄胎乃邪已入於胃急宜下之胎黄自去而疾安矣至此医之不依次悞用汤久失於迟下其胎必黑变 蚌起此为难治若见舌胎如漆黑之光者十无一生此心火自炎与邪热二火相乘热极则有兼化水象故色从黑而应水化也若乃臟腑皆受邪毒日深为 必作热症虽宜下之乃去胃中之热否则其热散入络臟之中鲜有不死者譬如火之自炎初则红过则薪为黑色炭矣此亢则害承乃制今以前十二舌明着犹?未尽诸 复作二十四图并方治列於左则区区推源寻流寔可决生死之妙也【清碧学士杜先生着】

伤寒用药说

夫医者何犹防之将也凡视人疾在究其浅深之异而疗之且疾之袭人若寇之侵境方其至也必瞰其势之强弱先以安抚次以讲和戒严守御以防其返也如坚然不退至再至三恣强肆侮意谋土地当此之际柰何必选将练兵克期至战寇灭乃已若仓皇无措则土地陷矣岂非将者不识韬略不知合变以致悞也可胜叹哉夫今之医不閱方书不察脉理临 茫然当解而不解当吐下而不吐下畏首畏尾颠倒错乱助病日深殊不知医乃司命其可轻忽如此大抵病之轻浅者即为和解深重者使便攻撃故曰用药之时胆欲大而心欲小毋使君臣失职佐使不当反嫁疾焉苟能如将之用兵进退合宜操存有法何疾之不愈也余每察脉用药觉有疑滞幸承先师之诲故始撮其要领以告後人云至正改元一阳吉日永和三仙至人萧璜鸣书

验证舌法

夫人之受病伤寒为甚伤寒之治仲景为详人皆知之而未必能行之者岂非以其法浩繁有难卒贯者乎旧有敖氏金镜录一篇专以舌色视病既图其状复着其情而後别其方药开卷昭然一览具在虽不期乎仲景之书而自悉合乎仲景之道可谓深而通约而要者矣予昔承乏在留都尝?之太医官舍本皆绘以五采恐其久而色渝因致谬误乃分注其色於上使人得以意会焉

舌

舌见白胎滑者邪初入里也丹田有热胸中有寒乃少阳半表半里之证也宜用小柴胡汤栀子豉汤治之小柴胡汤【方见後】

栀子豉汤【方见後】

舌见红色热蓄於内也不问何经宜用透顶清神散治之

透顶清神散

猪牙皂角 细辛 白芷 当归

右为末等分和匀令病人先噙水一口以药少许吹鼻内吐去水取 为度未 仍用药吹入凡瘟疫之家不拘已未患者皆宜用之

舌见纯红内有黑形如小舌者乃邪热结於里也君火炽盛反兼水化宜凉膈散大柴胡汤下之

凉膈散【方见後】 大柴胡汤【方见後】

舌见红色而有小黑色者热毒乘虚入胃蓄热则发癰矣宜用玄参升麻葛根汤化斑汤解之玄参升麻葛根汤【即玄参升麻汤加葛根方见後】

化斑汤【即白虎汤加人参方见後】

舌见淡红中有大红星者乃少陰君火热之盛也所不胜者假火?以侮脾土将欲发黄之候也宜用茵陈五苓散治之

茵陈五苓散【方见後】

舌见红色尖见青黑者水虚火实肾热所致宜用竹叶石膏汤治之【方见後】

舌见淡红色而中有一红晕沿皆纯黑乃余毒遗於心胞络之间与邪火鬱结二火亢极故有是证也以承气汤下之【方见後】

舌见红色更有裂纹如人字形者乃君火燔灼热毒炎上故发裂也宜用凉膈散

凉膈散【方见後】

舌见红色更有红点如虫蚀之状者乃热毒炽盛火在上水在下不能相济故也宜用小承气汤下之

小承气汤【方见後】

舌见红色内有乾硬黑色形如小长舌有刺者此热毒炽甚坚结大肠金受火制不能平木故也急用调胃承气汤下之

调胃承气汤【方见後】

舌见红色内有黑纹者乃陰毒厥干肝经肝主筋故舌见如?形也用理中合四逆汤温之

四逆汤

乾姜【半两炮】附子【一枚去皮生作八片】甘草【六钱二字半】

右每服五钱水一鍾煎六分不拘时温服

理中汤【服法如前】

人参 甘草【炙】 乾姜【炮】 白术【炒】

舌见黑色水尅火明矣患此者百无一生治者审之余在留都时地官主事郑汝东妹婿患伤寒得此舌院内医士曾禧谓当用附子理中汤人咸惊骇遂止亦莫能疗困甚治棺曾与之隣往视之谓用前药犹有生理其家既待以死?从之数剂而愈大抵舌黑之症有火极似水者即杜学士所谓薪为黑炭之意也宜凉膈散之类以泻其阳有水来尅火者即曾医士所疗之人是也宜理中汤以消陰翳又须以老生姜切平擦其舌色稍退者可治坚不退者不可治弘治辛酉金台姜梦辉患伤寒亦得此舌手足厥冷吃逆不止衆医犹作火治几致危殆判院吴仁斋用附子理中汤而愈夫医之为道有是病必有是药附子疗寒其效可数奈何世皆以为必不可用之药寧视人之死而不救不亦哀哉至於火极似水之症用药得宜效应不异不可便

谓为百无一治而弃之也

敖氏伤寒金镜録图方

舌见尖白根黄其表证未罢也须宜解表然後方可攻之如大便秘者用凉膈散加硝黄泡服小便澀者用五苓散加木通合益元散加姜汁少许以白滚汤调服凉膈散

生甘草【二两】连翹【四两】山梔【一两】大黄【二两】黄芩
薄荷【叶】朴硝【各一两】

右每服一两水二盏淡竹叶二十余片煎至一盏去粗入生蜜少许热服以利为度

五苓散【加茵陈即茵陈五苓散】

泽泻【二钱五分】茯苓猪苓白术【各一两五钱】桂【五钱】木通滑石
甘草【炙各一两】

右为末每服五钱入姜汁并蜜各少许白滚汤调下

舌见弦白心黑而脉沉微者难治脉浮滑者可汗沉实者可下始病即发此色乃危殆之甚也速进调胃承气汤下之

调胃承气汤

甘草【三钱】大黄【六钱】硝【二钱】

右用水一鍾半先煎甘草大黄将熟去粗下硝再煎三五沸顿热服

舌尖白胎二分根黑一分必有身痛恶寒如饮水不至甚者五苓散自汗渴者白虎汤下利者解毒汤此亦危证也

五苓散【方见後】

白虎汤

知母【一钱五分】甘草【炙一钱】石膏【四钱】粳米【一撮】

右每服一两用水一鍾半入糯米先煎下诸味再煎去粗服之加人参亦可

解毒汤

黄连【一两】黄栢【五钱】黄芩【五钱】山梔子【二十个】

右每服五钱水一鍾半煎至一鍾去粗顿热服

舌见白胎中有黑小点乱生者尚有表证其病来之虽恶宜凉膈散微表之表退即当下之下用调胃承气汤凉膈散【方见前】

调胃承气汤【方见前】

舌见如灰色中间更有黑晕两条此热乘肾与命门也宜急下之服解毒汤下三五次迟则难治如初服量加大黄酒浸泡

解毒汤【方见後】

舌见微黄色者初病即得之发譫语者由失汗表邪入里也必用汗下兼行以双解散加解毒汤两停主之双解散加解毒汤

防风 川芎 当归 芍药 大黄 麻黄 连翘 硝【各半两】石膏 黄芩 桔梗【各一两】滑石【三两】甘草【二两】荆芥【半两】白术 山梔【各半两】

右每服一两水一鍾半姜三片煎八分服不拘时一云有桂枝二两

舌中见白胎外则微黄者必作泄宜服解毒汤恶寒者五苓散

五苓散【方见前】

解毒散【方见前】

舌见微黄色者表证未罢宜用小柴胡汤合天水散主之可下者大柴胡汤下之表里双除临证审用之小柴胡汤

柴胡【四钱】黄芩 甘草 人参 半夏【泡各二钱】

右每服一两水一鍾半姜三片枣一枚煎一鍾温服

天水散

甘草【炙一两】 桂府滑石【六两】

右各另为末每服五钱入生姜汁并蜜各少许用白滚汤任意调服如发表用豆蔻葱头煎汤调服

大柴胡汤

柴胡【四钱】 黄芩 芍药【各一钱五分】 半夏 大黄【二钱五分】 枳实【麸炒二钱】

右?咀每服八钱水一锺半姜三片枣一枚煎一锺温服

舌见黄色者必初白胎而变黄色也皆表而传里热已入胃宜急下之若下迟必变黑色为恶证为亢害鬼贼邪气深也不治宜用调胃承气汤下之

调胃承气汤【方见前】

舌左白胎而自汗者不可下宜白虎汤加人参三钱服之

舌右白胎滑者病在肌肉为邪在半表半里必往来寒热宜小柴胡汤和解之

小柴胡汤【方见前】

舌左见白胎滑此臟结之证邪并入臟难治

舌见四围白而中黄者必作烦渴呕吐之证兼有表者五苓散益元散兼服须待黄尽方可下也

益元散【方见前】

五苓散【方见前】

舌见黄而有小黑点者邪遍六腑将入五臟也急服调胃承气汤下之次进和解散十救四五也

调胃承气汤【方见前】

和解散

藁本 桔梗 甘草【炙各五钱】 苍术【三钱】 陈皮 厚朴【姜制各一钱】

右水一鍾半姜三片枣二枚煎七分去查不拘时服

舌见黄而尖白者表少里多宜天水散一服凉膈散二服合进之脉弦者宜防风通圣散

天水散【方见前】 凉膈散【方见前】 防风通圣散【方见前】

舌见黄而色有膈瓣者热已入胃邪毒深矣心火烦渴急宜大承气汤下之若身发黄者用茵陈汤下血用抵当汤水在脇内十枣汤结胸甚者大陷胸汤痞用大黄泻心汤

大承气汤

厚朴【姜制三钱】枳实【麸炒二钱】大黄【三钱】芒硝【二钱】

右每服一两水一鍾半先煎枳实候熟入大黄再煎数沸入芒硝煎三五沸去粗热服

茵陈汤

茵陈【五钱】大黄【三钱】山栀子【七枚】

右每服一两水一盞半先煎茵陈半熟次入二味再煎去粗通口热服

抵当汤

大黄【三钱】水蛭【糯米炒七个】蟅虫【炒去羽足七个】

右作一服水一盞半煎一鍾去粗通口服

十枣汤

芫花【醋浸炒】大戟 甘遂【煨各等分】

右每服二钱弱人減半以水一鍾半大枣十枚劈碎煎取八分去粗通口服

大陷胸汤

大黄【七钱】芒硝【三钱】甘遂【四分】

右用水二鍾先煎大黄至一鍾去粗下芒硝煎三五沸再下甘遂沫温服取利

大黄泻心汤

大黄【五钱】 黄连 黄芩【各三钱五分】

右作一服水二锺煎一锺去粗通口温服若有宿食痰饮者加半夏麴二钱

舌见四边微红中央灰黑色者此由失下而致用大承气汤下之热退可愈必三四下方退五次下之而不退者不治

大承气汤【方见前】

舌见黄而黑点乱生者其证必渴譫语脉实者生脉濇者死循衣摸床者不治若下之见黑粪亦不治下宜大承气汤

大承气汤【方见前】

舌见黄中黑至尖者热气已深两感见之十当九死恶寒甚者亦死不恶寒而下利者可治宜用调胃承气汤主之

调胃承气汤【方见前】

舌见外淡红心淡黑者如恶风表未罢用双解散加解毒汤相半微汗之汗罢急下之如结胸烦躁目直视者不治非结胸者可治

双解散【方见前】

解毒散【方见前】

舌见灰色尖黄不恶风寒脉浮者可下之若恶风恶寒者用双解散加解毒汤主之三四下之见粪黑不治双解散【方见前】 解毒汤【方见前】

舌见灰黑色而有黑纹者脉实急用大承气汤下之脉浮渴饮水者用凉膈散解之十可救其二三

舌根微黑尖黄脉滑者可下之脉浮者当养阴退阳若恶风寒者微汗之用双解散若下利用解毒汤十生七八也

双解散【方见前】

解毒汤【方见前】

舌根微黑尖黄隐见或有一纹者脉实急用大承气汤下之脉浮渴饮水者用凉膈散解之十可救其二三已上三十六舌乃伤寒验证之捷临证用心处之百无一失

薛氏医案卷四十九

卷五十

钦定四库全书

薛氏医案卷五十

明薛已订

钱氏小儿直诀一

脉法

脉弦急【气不和】脉沉缓【伤食】脉促结【虚惊】脉浮【为风】脉沉细【为寒】脉乱【不治】

薛按脉者人身之造化病机之先见用药之準绳不可不先明诸心者也全幼心监云小儿一岁以前看虎口食指寅卯辰三关以验其病脉纹从寅关起不至卯关者易治若连卯关者难治若寅侵卯卯侵过辰者十不救一其脉纹见有五色如因惊必青浮痢色紫当以类而推之一岁後则可用一指转侧辨其三部脉弦急浮沉四五岁後脉七八至而细数者为平九至者伤十至者困六至五至者为虚为寒弦紧者为风痼弦急为客忤其变蒸者脉必散乱骨间有热脉则沉数若浮而不调为鬼祟浮大而数为风热伏结为物聚微细为疳积为腹痛浮而洪为有虫浮而迟为胃寒此论脉之大要耳然小儿血气未实惊则气散气散则脉乱矣又当参以三部五脉三部者乃看面上气色虎口脉纹寸口一指脉五脉者上按额前下诊太冲并前三部谓之五脉也治法虽分虚实然实者病气实而形气虚也虚者形气病气俱虚也经云真气夺则虚邪气胜则实又云虚则补其母实则泻其子东垣先生云形病俱实当泻之形病俱虚当补之【详见後图下】

面部症

左腮为肝右腮为肺额上为心鼻为脾颊为肾若色赤者热也宜随症治之

薛按左腮属肝其色青者为顺白者为逆若色赤主肝经风热发热拘急青黑主惊风腹痛痰赤主潮热痰 右腮属肺其色白者为顺赤者为逆若赤色甚者主咳 喘急闷乱饮水传於肾则小便赤澀或淋闭不通额上属心其色赤者为顺黑者为逆若青黑主惊风腹痛瘈瘲啼哭微黄主盗汗头髮乾燥惊疳骨热鼻属脾其色黄者为顺青者为逆若色赤主脾经虚热饮食少思深黄主小便秘而鼻燥衄血颊属肾其色黑者为顺黄者为逆若色赤主肾与膀胱有热而小便不通

目部症

目内色赤者心实热导赤散淡红者心虚热生犀散青者肝实热泻青丸淡青者肝虚热地黄丸黄者脾实热泻黄散微黄者脾虚热益黄散白而混者肺实热泻白散目无睛光者肾虚也地黄丸主之

薛按目者五脏之精华各有所主白睛属肺黑睛属肝上下眼胞属脾红脉属心瞳人属肾此五脏之正色也然白睛本属肺而见红色此心剋肺之贼邪也见青色此肝乘侮之微邪也见黑色此肾乘肺之实邪也见黄色此脾乘肺之虚邪也余仿此

五脏虚实寒热

心主惊实则叫哭?热饮水而搐虚则困卧而悸心热则合面睡或上窜咬牙者导赤散主之○心气实而喜仰卧者泻心汤主之

薛按前症若心小肠实热宜治以前药若心肝血虚用五味异功散加当归若因心血不足用秘旨安神丸若肝心血燥用柴胡栀子散若因肝心血虚用六味地黄丸若因脾虚食郁生痰而惊悸不安者宜用四君子以健脾神麴麦芽以消导山栀柴胡以清热如用前方病气虽去前症仍作急调补元气或反甚急温补元气凡此多因妊娠厚味七情或小儿乳哺失宜或乳母饮食郁怒所致病气既见形气已虚必当推其所因而以助胃壮气为主佐以治病之剂为善余仿此

肝主风实则面青目直叫哭壮热项急顿闷虚则咬牙呵欠○肝热则手寻衣领及乱捻物泻青丸主之壮热饮水喘闷泻白散主之

薛按前症若肝木实热生风而自病肺金实热而剋木者宜用前二药以泻其邪气之实若肝经风热而目直等症者用柴胡栀子散以清肝火加味四物汤以养肝血若肾虚而咬牙诸症者用六君子汤以健脾土六味地黄丸以滋肾水苟不审其症之虚实而妄用前药则虚虚之祸不能免矣

肝有风则目连劄得心热则?搐或筋脉牵繫而直视用泻青丸以治肝导赤散以清心○肝热则目赤或兼青?搐者亦用前二药风甚则身反张强直用地黄丸以补肾泻青丸以治肝

薛按前症若肝经实热而自病宜用泻青丸若肝经血燥而自病用抑肝散肾水虚不能生肝者宜用地黄丸若脾土虚不能培木者宜用六君子汤凡肝经既病风火相搏则肝脏亏损若不固根本必变他症百出也

脾主困实则身热引饮用泻黄散虚则吐泻生风用异功散
面白腹痛口中气冷不思饮食或吐清水以益黄散温补脾虚下利用调水丸

呵欠多睡者脾气虚而欲发惊也

薛按前症若发热作渴喜冷饮食或泄泻色黄睡不露睛属形病俱实宜用泻黄散疏导之若发热口乾恶冷饮食或泄泻色白睡而露睛属形病俱虚宜用异功散调补之若脾气下陷者补中益气汤升补之寒水侮土者益黄散温补之肝木剋土者六君柴胡平补之若目睛微动潮热抽搐吐泻不食宜用秘旨保脾汤凡小儿诸病先当调补脾胃使根本坚固则诸病自退愚治沈氏子吐泻腹痛手足并冷余谓此脾土虚弱寒水所侮先用益黄散一剂诸症顿愈手足稍冷此寒水退而脾土虚弱也用异功散少加木香一剂却去木香再剂而痊

一小儿伤食?热吐泻腹痛欲服益黄散余曰内有丁香良姜非其所宜前症乃脾胃受伤而无寒症不信仍服前药其痛益甚二便不通口舌糜烂而歿

肺主喘实则闷乱气急喘促饮水虚则哽气出气肺热则手搯眉目鼻面用甘桔汤主之○肺盛复感风寒则胸满气急喘 上气先用泻白散以清肺气後用大青膏以散风寒○肺脏怯则唇白用阿胶散补之闷乱气粗喘促哽气者难治肺虚甚也

薛按前症若腠理不密外邪所感而肺病者用清肺丸若脾胃气虚不能相生而肺病者用六君子汤若脾胃气实大肠不利而肺病者用泻黄散若心火炎烁肺金而肺病者用地黄丸

肾主虚若胎虚怯神气不足目无睛光面白颅解此皆难育虽育不寿或更加色慾变症百出愈难救疗或目畏明下窜者盖骨重而身缩也咬牙者肾水虚而不能制心火也皆用地黄丸

薛按洁古先生云下窜者肾气不足两足?热故不喜衣覆也盖脐以下皆肾之所主缘心气下行於肾部也所以宜用地黄丸壮水制火而补肾故凡此必待精血完固而後嫁娶庶可以免前患精血篇云男子精未滿而御女以通其精则五体有不满之处异日有难状之疾今小儿禀赋不足岂有不本於此哉【详见精血篇】

变蒸

小儿在母腹中乃生骨气五脏六腑成而未全自生之後即长骨脉五脏六腑之神智也变生易也自内而长自下而上又身热故以生之日後三十二日一变蒸即智意有异於前何也长生脏腑智意故也何谓三十二日长骨添精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十数自生下骨一日十段而上之十日百段而三十二日计三百二十段为一遍亦曰一蒸骨之余气一自脑分入龈中作三十二齿而齿牙不及三十二数者由变不足其常也或二十八日即长二十八齿已下仿此但不过三十二之数也凡一周遍乃生身热诸病如是十周则小蒸毕也计三百二十日生骨气乃全而未壮也故初三十二日一变生肾生志六十四日再变生膀胱其?耳与骭冷肾与膀胱俱主於水水数一故先变生之九十六日三变生心喜一百二十八日四变生小肠其发汗出而微惊心为火火数二一百六十日五变生肝哭一百九十二日六变生胆其?目闭而赤肝主木木数三二百二十四日七变生肺声二百五十六

日八变生大肠其?肤热而汗或不汗肺者金数四二百八十八日九变生脾智三百二十日十变生胃其?不食腹痛而吐乳此後乃齿生能言知喜怒故云始全也太仓云气入四肢长碎骨於十变後六十四日长其经脉手受血故能持物足受血故能行立也经云变且蒸谓蒸毕而足一岁之日也师曰不汗而热者?其汗大吐者微止不可余治是以小儿须变蒸蛻齿者如花之易苗所谓不及三十二齿者由变之不及齿当与变日相合也年壮而视齿方明

薛按小儿变者变其情态蒸者蒸其血脉故三十二日一变每变毕则情态异常全婴方论云变蒸者以长气血也变者上气蒸者?热也轻则体热虚惊耳冷微汗唇生白泡三日可愈重者寒热脉乱腹痛啼叫不能乳食食即吐衄五日方愈古方以黑散子紫丸子主之窃谓此症小儿所不免者虽勿药可也况前药乃属峻厉非惟脏腑不能胜抑且反伤气血慎之慎之余尝见一小儿至二变?热有痰投以抱龙丸一粒卒至不救观此可验矣若不热不惊略无症候而暗变者盖受胎气壮实故也

五脏相胜症治

肝脏病秋见肝强胜肺而肺怯也宜阿胶散以补肺益黄散以补脾泻青丸以治肝

薛按洁古张先生云肝胜肺则身热?搐喘促气短病见於申酉戌时此受所制而不能胜谓之真强若心乘肝为实邪壮热而搐有力利惊凉惊二丸主之肺乘肝为贼邪呵欠而搐无力以地黄丸补肝以泻白散治肺肝乘脾为贼邪多睡体重发抽泻青丸主之肾乘肝为虚邪憎寒呵欠而搐羌活膏主之大凡肝之得病必先察其肺肾然肾者肝之母金者木之贼非肾水不能相生必肺金鬼邪来尅故其源在肺先治其肺攻其鬼也其源在肾先补其肾滋其本也然後察其本脏之虚实而寒温之徐用诚滑伯仁先生亦云然

心脏病冬见心强胜肾甚则下窜不语当以地黄丸补肾以导赤散治心

薛按洁古云若喘而壮热此肺乘心也为微邪用泻白散若风热相搏此肝乘心也为虚邪用大羌活汤下大青丸吐泻身热此脾乘心也为实邪用泻黄散若恐怖畏寒肾乘心也为贼邪用安神丸大凡心脏得病必先调其肝肾肾为心之鬼也肝气通则心气和肝气衰则心气之此心病先求其肝清其源也五脏既病必传其所胜则肾之受邪必传於心故先治其肾逐其邪也若肝肾平和而心自病然後察其虚实而治之

肺病春见肺胜肝也以泻白散治肺若目淡青或目赤者当发搐为肝怯也以地黄丸补肝

薛按洁古云肺病喘 气盛见於寅卯辰时当补肝泻肺若肺病久 宜补脾清心若心乘肺为贼邪热而喘 用地黄丸导赤散阿胶散若肝乘肺为微邪恶风眩冒昏愤用羌活散若肾乘肺为实邪憎寒咳 清利用百部丸若脾乘肺为虚邪体重吐痰泄泻咳 用人参白术散大凡肺之得病必先察心脾二脏治之若心火亢盛上炎烁肺而肺为病宜先抑心气若肺气不足腠理不密风邪所感宜先补脾气若中焦痞实大肠壅?热气上蒸宜先理脾气若心脾平

和则治其本经

肾病夏见水胜火肾乘心也甚则悸动?搐宣风散主之

薛按洁古云心乘肾者为微邪?热不恶风寒用桂枝丸肺乘肾者为虚邪喘 皮肤寒澁用百部丸肝乘肾者为实邪拘急发搐身寒用理中丸脾乘肾者为贼邪体重泄泻恶寒用理中丸大抵五行之间惟肾一脏母盛而子反受邪然物之性有不可以一槩论者肺肾是也何则肺主气肺有热则热得气而上蒸不能下生於肾而肾受邪矣此肾之病源於肺也又有脾经之湿相刑於肾者法当解肺热去脾湿若本经自病者宜滋补之

脾病见四傍皆仿此治之顺者易治逆者难治脾怯当面目黄五脏相乘随症治

薛按洁古云凡脾之得疾必先察其肝心二脏之虚实而治之盖肝者脾之贼心者脾之母也肝气盛则贼邪胜心气亏则脾气虚故肝乘脾则风泻而呕茯苓半夏汤主之若心气实而壮热体重泄泻羌活黄芩苍术甘草汤主之若肺乘脾而咳 便秘饮食如常者煎枳榔大黄汤下葶?丸若肾乘脾而恶寒泄泻理中丸之类主之窃谓五脏之症相乘伏匿隐显莫测然病机不离五行生剋制化之理况小儿未有七情多因形体怯弱血气未全故有五脏胜乘之病更当调治其母若专治其子多致误矣

急惊风症治

小儿急惊因闻大声或惊而?搐搐止如故此热生於心身热面赤引飲口中气热二便黄赤甚则?搐盖热盛生风阳盛而陰虚也宜以利惊丸除其痰热不可用巴豆之药

薛按秘脏保婴集云急惊之候牙关紧急壮热涎涌窜视反张搐搦颤动口中气热颊赤唇红脉浮洪数者此肝经血虚火动生风盖风生则陰血愈散陰火愈炽火动则肺金愈亏肝木愈盛宜滋肝血养脾气若屡服祛风化痰泻火辛散之剂便宜认作脾虚血损急补脾土若风火相搏发热抽搐目瞤筋挛痰盛者用四物鈎藤鈎以生肝血清肝火用四君子加当归以补脾土生肺金若肝经血燥发热惊搐目瞤筋挛痰盛者用六味丸以滋肾水四君子以补脾上若肺金剋肝木用六君子汤以实脾土加芍药木香以平肺金若屡服惊药而脾胃虚寒者须用六君子汤以补脾胃丁香木香以培阳气否则必变慢惊愚治一小儿因惊?热抽搐顿闷咬牙作渴饮冷大便秘结面色青赤然印堂左颧赤甚此心肝二经风热相转乃形病俱实之症先用泻青丸料加炒黄连煎服一剂大便随利抽搐顿减用抑青丸一服诸症悉退但面色痿黄形气倦怠饮食少思此病气去而形气虚也用补中益气汤及地黄丸而安

一小儿发热抽搐口噤痰涌此急惊风也先用泻青丸一服六味丸二服诸症顿退又用小柴胡汤加芍药归山梔鈎藤鈎而安?以补中益气汤而愈

一小儿六岁忽然?搐目动咬牙或睡中惊搐痰涎涌盛或用化痰祛风面色青黄此肝木剋制

脾土不能摄涎而上涌也当滋肾水生肝血则风自息而痰自消用六味丸而愈

一女子十二岁善怒睡中惊搐遍身作痒饮食少思此肝火风热脾土受侮用参术柴苓汤以清肝火凉肝血健脾胃而愈

一小儿三岁患急惊面赤?热作渴饮冷先君已用泻青丸一服?去大半翌早又自用前丸一服即吐泻?搐面色青白手足指冷余以为脾胃受伤用六君子汤加姜桂升麻柴胡一剂顿安前哲谓小儿易为虚实攻伐之药中病即止不可过剂我先君盖守此法一小儿三岁因惊抽搐?热痰盛久用抱龙丸等药面色或赤或青此肝心二经血虚风热用六味丸滋养肝肾佐以六君加柴胡升麻调补脾胃而愈嘉兴王举人女七岁因跌伤腿膝两膝肿溃左颧色青左关脉无余意惊则气散而风热郁滞先用四君子加升麻柴胡钩藤钩一剂其脉即见再用四物加柴胡防风钩藤生血补肝而愈

慢惊风症治

小儿慢惊因病後或吐泻或药饵伤损脾胃而肢体逆冷口鼻气微手足痿痹昏睡露睛此脾虚生风无阳之症也温白丸主之

薛按保婴集云急惊屡?屡用直泻则脾损陰消而变为慢惊者当补脾养血佐以安心清肺制木之药最为切当切谓前症多因脾胃亏损肝木所胜但用五味异功散加当归佐以钩藤饮子以补脾土平肝木亦多得效如不应用六君加炮姜木香温补脾土更不应急加附予以回阳若用逐风驱痰之药反促其危也每见小儿脾胃弱者一病即成慢惊不可泥为久病误药而後成也内经云为慢脾风言脾虚受病也其意可见矣

王氏子患吐泻或用药下之睡而露睛痿痹身冷此慢惊也即用括萎汤治之而目开身温但二便不利或用八正散身复冷不食即用益黄散史君子丸温补脾胃诸症悉愈後又不语用地黄丸以补肾半月而愈愚治一小儿停食吐泻先用尅?之剂更加咬牙?搐面色青白手足指冷眉唇抽动余以为脾胃虚弱因药复伤肝木所乘而成慢惊矣遂用六君子加木香柴胡升麻二剂顿安大凡伤食停?虽见?搐等症且勿用药待宿食化尽胃气渐健而自愈设若强与饮食或误用药饵不惟甚其所有而且生其所无矣举人余时正子伤食?丹服?表之剂手足抽搐服抱龙丸目瞶痰盛余谓脾胃亏损而变慢惊矣用六君加附子一剂而安再剂而愈

一小儿患抽搐痰涎自流或用惊风之药益甚视其面色黄白余用六君子补中益气二汤而愈

小儿初生壮热吐衄身体强直手足抽掣目反直视是胎惊风症也

薛按前症多因娠妇忿怒惊恐调摄乖常或挟外邪内伤於胎盖母有所触胎必感之当用猪乳膏拭儿口中或用惺惺散加漏芦令母煎服使药通乳中儿病自愈矣

发搐症治

惊癇?搐男则目左视无声右视有声女则右视无声左视有声相胜故也故有?时之症

薛按前症多因胎中受惠或乳母郁怒传儿或小儿乳伤自病其症吐乳面青若痰实壅积则壮热面红当兼调治其母切不可损其元气若欲验逆顺男则握拳拇指义入食指中为顺於外为逆女则义入食指为逆於外为顺仍参吮乳不能类以治其母後仿此

王驸马子五岁目直视而不欲食或以为鬼祟用符水喷之反加?搐此肝经实火之症也用泻青丸而愈愚治少参王阳湖孙跌伤股骨正体科接之余视其面青而兼黄口角微掣动此肝木侮脾症也且气血筋骨皆资脾土而生但壮脾气则所伤自愈遂用六君子加钩藤钩当归三十余剂诸症悉愈

李寺丞子三岁病搐?而目右视大叫哭师曰逆也凡男目右视有声金木相战故也当泻其强而补其弱遂用泻肺汤肺病退又用地黄丸补肾用凉惊丸泻青丸泻心肝而愈此症男反女故男易治於女也假令女?搐目左视肺之胜肝又病在秋即肺旺肝不能任故哭叫当大泻其肺然後治心续肝所以言男目右视者木反侮金肝旺胜肺当泻其肝若更病在春夏金气极盛又当补其肺慎勿泻也

愚治一小儿两目连劄手足?搐频服天麻防风丸之类益甚得饮食则稍愈视其鼻準及左颊色青黄此肝木制脾土用六君子加升麻柴胡钩藤钩二剂而愈又用补中益气汤而安

若寅卯辰时身体壮热目上视手足动摇口出热涎颈项劲强此肝旺也当补肾治肝用地黄丸泻青丸主之薛按前症若烦热作渴饮冷便结者宜用泻青丸若?热饮温大便不结者宜用柴芍参苓散若自汗盗汗肾虚液不归源也用地黄丸若服峻剂或久病流涎脾虚涎不归源也用六君子汤所云肝旺者乃肝虚而邪气旺也故先补其母後泻其子

一小儿寅卯时?热或兼搐有痰服抱龙泻青二丸而愈後复患仍用前药以致咳 气喘不时?搐面兼赤色或青黄或浮肿或流涎余谓咳 气喘脾肺气虚也不时?搐木乘土也面青赤黄肝入心脾也浮肿流涎脾气虚也用益智丸以补心气补中益气汤以养脾肺而愈

若己午未时?搐心神惊悸甯视睛赤牙关紧急口中流涎手足动摇此心旺也以地黄丸补肝导赤散凉惊丸治心

薛按前症属邪气实而真气虚故用地黄丸其流涎不止为心火虚而脾土弱也佐以六君子汤

广亲七太尉病潮热师曰七使将安八使预防明午惊搐既而果然遂用药泻心肝补肾水而愈盖见其坐石机目直视而腮赤乃心肝俱热午时者心肝用事也愚治一小儿己午时?热惊

悸等症?时形气倦怠面黄懒食流涎饮汤余以为心气不足所致不信反服凉心药更加吐泻睡而露睛几至慢脾风先用六君子加姜桂佐以地黄丸而愈

一小儿七岁因惊久患搐热後已午未时益甚形气倦怠热定饮汤余谓心脾气虚朝用补中益气汤加益智仁夕用六君子加当归钩藤钩而寻愈後因饮食过多吐泻或用保和丸治之加寒热?搐此脾土复伤而肝木所侮余用六君子柴胡治之寒热止而饮食进但已午未时去後用补中益气汤加茯苓半夏钩藤钩而愈

若申酉戌时微搐而喘目微斜身似热睡而露睛手足逆冷大便淡黄肺旺也当用益黄散以补脾导赤散以治心泻青丸以治肝

薛按前症属脾土真寒不能生肺气而假热故宜益黄散以补肺金之母如用六君炮姜尤效若手足不冷属虚弱用五味异功散木香其导赤散泻青丸初病元气未虚者酌量用之若久病元气已虚者必用六君子汤秘旨安神六味地黄二丸主之

徐氏子三岁日晡?搐身微热目微斜露睛作喘四肢逆冷大便微黄师曰此肝实?搐也晡热肺用事也身温肺虚也目斜露睛肝肺相胜也四肢逆冷脾气虚寒也若脾肺虚而木乘土之症当先用益黄散阿胶散以补脾肺後用泻青丸导赤散凉惊丸以治心肝如法而愈

一小儿潮热自申酉时热至子丑时方止遍身似疥大便秘结小便赤澁热渴饮冷此脾胃实热而传肺大肠也先用清凉饮四剂结热始退又用四物加柴胡黄连数剂其疮渐愈彼欲速效另用槐角丸之类诸症益甚遂请施院长治之亦同余药惟加桃仁赤芍二味至百剂乃愈

一小儿先停?饮食服剋伐之药致面色痿黄体倦少食申酉时潮热余欲用调补之药不信更用清热消导益加泄泻余用六君子数剂又用补中益气汤而愈

一小儿酉戌时热面赤腹中作痛按之益甚服峻厉之剂下五七次?搐吐痰作渴腹痛按之却不痛此脾胃复伤而变症也用七味白术散补中益气汤顿安

一小儿饮食停?服消导之药余曰此因脾胃虚而食停?也当补脾为善已而申酉戌时潮热食少作渴大便不实用四君子汤而饮食进又用补中益气汤而诸症愈

若亥子丑时微搐身体?热目睛紧斜喉中有痰大便白色多睡不省当用益黄散以补脾导赤散凉惊丸以治心

薛按前症属形病虚寒宜用六君子加炮姜温补脾土用清心安神丸六味丸调补心血洁古张先生云此症皆因大病後脾胃亏损所致其旨明矣若非六君子汤以固本必变慢脾风也

朱监簿子五岁夜半?热晓则如故用凉药解之反多涎喜睡大便青白作渴引饮师曰此当健

脾胃则诸症退遂用白术散一两水煎恣饮二剂稍愈三剂渴止涎消又投阿胶散二服而安

愚治一小儿亥子丑时?热泄泻用益黄散而愈後复?服前药嗜卧露睛作渴少食太便频黄余谓肝胜脾虚元气下陷用补中益气汤佐以地黄丸而寻愈

若伤风?搐口中气热呵欠顿闷手足动摇当以大青膏?之

薛按洁古先生云伤风?搐当辨有汗无汗用大青膏小续命汤窃谓前症若口中气热搐而有力属形病俱实宜用大青膏以散风邪若口气不热搐而无力属形病俱虚宜用异功散以补脾土六味丸以滋肝木钩藤饮以清肝火若因风邪郁热而变见诸症当理肺经清风邪若外邪既解而诸症不愈当实脾土补肺金若径治其肺恐脾气复伤诸症蜂起矣一小儿伤风鼻塞流涕服药过重?搐呵欠顿闷汗出气喘久不愈其母因劳役?热余用补中益气汤时以五七滴与儿饮之母子并愈

一小儿伤风?搐痰盛喘急余谓此脾肺气虚腠理不密而外邪所乘用六君加柴胡升麻桑皮杏仁一剂痰喘悉退又一剂去桑杏加钩藤钩而安乃用异功散数剂後不复发此症若不补脾胃腠理专治痰邪鲜有不误

若伤食後?搐身温多睡或吐不思食者宜先定搐搐止用白饼子下之後用安神丸主之

薛按前症若饮食停?呕吐不食腹胀便秘者属实热宜用白饼子下之若下後搐热益甚呕吐不食者属虚热用异功散补之若脾胃既伤肝木所胜用六君加钩藤钩以健脾气平肝木大凡饮食既消而不愈者但调补脾胃则诸邪自退矣

一小儿七岁?热惊悸服祛风化痰药更恶寒吐痰喘 腹痛少食又服抱龙丸大便似痢寒热往来殊类风症先兄以为脾气本伤药复损之诸经无所资养而然也用四君子汤少用升麻柴胡以升补阳气而愈

一小儿伤食?热抽搐呕吐气喘痰 属脾肺气虚以六君子加炒黑黄连山梔各二分一剂而顿安一小儿三岁停食吐泻或用尅?之剂更咬牙?搐面色青白鼻准青而兼黑手足指冷眉唇搐动此脾胃虚弱而肝木乘之用六君子加木香柴胡升麻二剂顿安

百日内?搐真者不过两三次必死假者频?不死真者内生惊癇假者外伤风冷血气未实不能胜任故?搐口中气热用大青膏涂 浴体二法

薛按前症多因胎中受惠或乳母郁怒传儿或儿脾伤自病当固元气为主而兼调治其母仍参吮乳不能类治之後仿此

李司户孙百日?搐日三五次或作胎惊治之不应即用大青膏豆许并? 浴体二法三日而

愈盖婴儿血气未实不能胜外邪而?搐故用浴体法凡搐频者风在表易治宜?散搐稀者风在脏难治宜补脾

愚治一小儿百日内患抽搐痰涎自流用惊风药益甚视其面色黄白仍用六君子补中益气二汤而愈一小儿面青黑或痿黄审其母素有鬱怒所致用加味逍遥散加味归脾汤治其母其子亦愈

一小儿月内?搐鼻塞余以为风邪所伤以六君子加桔梗细辛子母俱服更以葱头七茎生姜一片细搐摊帛上两掌护温贴子 间半晌鼻利搐止一小儿未两月?搐呕乳腹膨作泻余以为乳多伤脾胃用五味异功散加漏芦母服之子服数滴而寻愈

癲癇症治

凡治五癲皆随脏治之每脏各有一兽之形并用五色丸治小病也?而重者死病甚者亦死若反折上窜其声如犬症属肝也若目瞪吐舌其声如羊症属心也若目直腹痛其声如牛症属脾也若惊跳反折手纵其声如鸡症属肝也若肢体如尸口吐涎沫其声如猪症属肾也

薛按妊娠若遇惊恐则必内应於胎故一月足厥陰脉养惊则肝受病二月足少陰脉养惊则胆受病三月手少陰脉养惊则心受病四月名为离经五月足太陰脉养惊则脾受病六月足阳明脉养惊则胃受病七月手太陰脉养惊则肺受病八月手阳明脉养惊则大肠受病九月足少陰脉养惊则肾受病是脏腑纳气於丹田自肝至肾十经滋养而生此则胎中所致也若既生之後或惊恠所触或乳哺失节或乳母饮食起居六淫七情脏气不平亦致是症须察见症属於何经更别陰阳虚实以调补脾胃为主否则不时举?甚至不救

愚治一老生子周岁秋初暴冷勿?搐似癲搐过则气息淹淹此元气虚弱所致用补中益气汤而安一小儿十岁一小儿七岁各有癲症岁?二次後因出痘及饮食停?举?频数并用六君子补中益气二汤顿安

一小儿六岁忽然?癲目动咬牙或睡中惊搐口流涎沫服化痰祛风之药益甚而面色兼青乃属肝木剋制脾土而不能摄涎故上涌也当滋肾水生肝血则风自息痰自消矣用六味丸而愈

一小儿十三岁因惊患癲服朱砂丸之类而愈後每?輒服前丸不应或谓风涎内积服药下之?作日频略服镇惊等剂益甚余以为心脾二经气血亏损而痰涎留滞朝用补中益气汤夕用断癲丹渐愈出痘疮後其癲复作仍用补中益气汤为主佐以八珍汤及蝉蜕钓藤饮而愈

附面部三指诊候图

小儿半岁之间有病以名中食三指曲按额前眉上髮际之下若三指俱热感受风邪鼻塞气

粗三指俱冷感受风寒脏冷吐泻若食中二指热上热下冷名中二指热夹惊之候食指热胸膈气满乳食不消【附】

附虎口三关脉症图

水镜诀云陰阳运合男女成形已分九窍四肢乃生五脏六腑部位各分逆顺难明若凭寸口之浮沉必乃横亡於孩子须明虎口辨别三关消详用药必无差误未至三岁看虎口三关若脉见风关尚易治交气关则难治交命关为死症又当辨其色如兽惊三关必青水惊三关必赤人惊三关必黑若紫色必泻痢黄色是雷惊三关脉通度乃极惊之症必先有纹或青或红如线直者是母食伤脾左右一样者是惊积齐?纹有三条主肺伤风痰或??声青主伤寒及红主泻泄有黑相兼主下痢红多白痢黑多赤痢有紫相兼虎口脉乱乃气不和也盖脉纹见有五色由其病甚色能加变至於纯黑者不可得而治矣【附】

五脏疮疹证治

小儿在胎食五脏血稊伏於命门若遇天行时热或乳食所伤或惊恐所触则其毒当出初起之候面燥腮赤目胞亦赤呵欠顿闷乍凉乍热咳 嚏喷手足稍冷惊悸多睡宜?其何脏所?察其何因所起令乳母亦须节饮食慎风寒○五脏各有一症肝脏水泡色青而小肺脏脓疱色白而大心脏斑色赤而小脾脏疹小次?故色赤黄浅也先?脓疱後?疹子者顺先疹子後?子者顺反此为逆惟肾无候但见骭冷耳冷是也若寒水来侮故黑陷而耳骭反热为逆也急用百祥丸牛李膏各三服不愈者死○如?潮热三日以上出不甚多而热不止者未尽也潮热随出如早食潮热不已为水疱之类也一?便出尽者重疮夹疹者半轻半重也出稀者轻里外微红者轻外赤里黑者微重外白里黑者大重也疮端里黑点如针孔者?最剧也青乾紫陷昏睡汗出烦躁热渴腹胀啼喘二便不通者困也有大热利小便解热毒若紫黑乾陷或寒战咬牙或身黄肿紫者急以百祥丸下之复恶寒不已身冷出汗耳骭反热者死症也此肾气大旺脾虚不能制故耳下後身热气温饮水者可治以脾土胜肾寒去而温热也不黑者不可下下则内虚归肾大抵疮疹属阳在春夏为顺秋冬为逆冬月肾旺盛寒病多归肾变黑又当辨春脓疱夏黑陷秋?子冬疹子者十活四五黑者十难救一○身热烦渴腹满而喘便澁面赤闷乱大吐此当利小便不瘥者宣风散下之若能食而痂头焦起或未焦而喘实亦可下之若五七日痂不焦是内热也宣风散导之生犀汁解之○?疹作搐为脾虚而肝所乘心火妄动风热相抟也当用括萎汤泻心肝补脾土 疮黑而便忽脓血并痂皮者乃脾气实肾邪退而病安也及泻而乳食不化者脾虚不能制肾故难治

薛按痘疹大要与痈疽治法无异宜辨表里虚实寒热盖表虚而用?表之剂轻则斑烂重则不能起?而死里实而用托里之剂轻则患痘毒重则喘急腹胀而死里虚而用疏导之剂轻则难以贯脓结痂重则不能结靥落靥则死治者可不慎哉若唇赤?热疼痛而作渴饮冷便秘此形气病气俱实也虽在严冬必用四顺清凉饮以救其陰若黑陷不食呕吐泄泻寒战咬牙手足逆冷此脾土虚败寒水所侮也虽在盛暑必用六君姜附或十二味异功散以回其阳此内经舍时从症之法也若起?迟不红活不作脓不结痂或?热作渴饮食少思此脾胃虚弱也用参

芪四圣散以补之若虽起而色白虽贯脓而不满虽结痂而不落或痒塌作渴饮汤腹痛不食呕吐泄泻此脾胃虚寒也用十一味木香散以温之其在四五日之间死者毒气盛真气虚而不能起也六七日之间死者元气虚而不能贯脓也旬日之外死者邪气去脾胃败而元气内脱也治者但能决其死而不知其死必本於血气亏损苟能逆推其因而豫为调补岂断无生理哉盖起?贯脓结痂三者皆由脾胃营养不可妄投剋伐之剂以致其夭枉也至於大人患此治法迥异昔丹溪尝治一老人初患痘昏愤不知极用大补四十余剂遂出痘而愈观此可见

陆亲一大王病疮疹先用抱龙丸解之彼另用药下之其疹稠密余曰疮疹始出未有他症但用平和之药解之如三日不出或出而不快宜微?之更不出当再?之出而不多脉平和无他症者疮本稀少不可更?若疮起?能食者大黄丸下一二行若初起就用下剂则里虚疮不能尽出而稠密难治至三日其疮黑陷喜不寒战遂用百祥丸牛李膏各一服疮复红活而愈盖黑者归肾也肾旺胜脾故脾虚寒战则难治所用百祥丸泻膀胱之邪自不盛也

五大尉因坠秋千患急惊?搐或用表散之药不愈此急惊当先退其热以大黄丸玉露散惺惺丸加牛黄丸麝解之至三日肌肤尚热余曰再二日不愈必??疮已而果然用必胜散七日而愈此乃初因误?其表内热不止而?自生也

十太尉疮疹未出呵欠顿闷惊悸乍凉乍热手足冷面颧赤咳 时 此五脏症具也以其别无他候故未?出若已出则归一脏也用抱龙丸数服疮疹出而诸症愈【治见校注痘疹方】

丹瘤

丹瘤之症因热毒客於腠理搏於气血?於皮肤当以白玉散涂之

薛按前症或命门所禀或风热相抟或频浴热汤或频着烘衣或伤食?热或乳母膏粱厚味七情郁火皆能致者其赤晕游走者乃血随风热者若禀胎毒用化毒丹风热者败毒散频浴烘衣者四物连翘山梔饮食?热者四君柴胡神麴母食厚味者加味清胃散母有郁火者加味逍遥散俱加漏芦母子俱服白玉散其性太寒能解热毒若毒?於四肢而轻浅者宜用若延及胸背脇腹者为重须用活命饮令人用力於各患处遍吮毒血各聚於一处急砭出之若肚腹膨胀二便不通毒入内也用大连翘饮亦有生者

愚治史少参孙丙申正月陰囊赤肿余作胎毒治之而瘥後患?热痰热等症诊其母有郁火血热用解郁凉血之药子母俱服而愈至六月初患吐泻小便赤澁两眼瞷动投参术之类不应或以为慢惊余视其寅卯关脉赤当属风热用柴胡清肝散加鈎藤鈎木贼草一剂即愈至丁酉正月颈患热毒溃而脓出感风?热翌日头面黯肿如斗急砭出黑血二盏许随用清热化毒汤肿退七八翌日又砭各处血不甚黑仍用前药去牛蒡子加熟地黄而愈此症若砭缓则血凝?或为破伤风而死

一小儿患之外势虽轻内苦便闭此患在脏也服大连翘饮敷神功散而瘥

一小儿臀患之赤晕走偏令人频吮使其毒各聚一处乃砭出黑血涂以加味神功散时以金银花甘草节为末人乳汁调服而愈月余後两足赤肿仍治以前法而痊数日後两足复赤或用犀角解毒之类乳食不进肚腹膨胀此复伤脾胃也乃敷前药服补中益气汤加茯苓而痊【神功散甚效但砭处微痛用太乙丹亦效】

一小儿腿患之神思如故乳食如常此毒?於肌表余谓宜砭泄其毒不必服药不信外敷寒凉内服峻厉致腹膨胀乳食不进而歿夫寒凉外伤脾气峻剂内伤生气不死何俟

一小儿两足常患肿似丹毒而不聾?饮水痰盛两颧赤色先兄以为禀肾经虚火用地黄丸料母子俱服而愈○一小儿两足生疮疥赤晕如丹久而不愈亦用地黄丸而痊○一小儿腿如霞游走不定先以麻油涂患处砭出恶血其毒即散更用九味解毒散一剂而安

一小儿因母酒後饮其乳因睡不醒遍身如丹瘤状余以为酒毒传儿为患令母子俱服葛根解醒汤而愈

一女子赤晕如霞作痒?热此肝经血热用小柴胡加生地连翘丹皮而愈凡女子天癸将至妇人月经不调被惊着恼多有此症亦治以前药

伤风兼变症治二

伤风贪睡口中气热呵欠顿闷用大青膏?散之若饮冷不止而善食者用大黄丸微下之余不可下也○伤风手足冷者脾脏怯也当以益黄散温脾胃以大青膏散风邪○伤风自利脾脏虚怯也亦用益黄散大青膏未痊用调中丸有下症用大黄丸後服温惊丸○伤风腹胀或作喘脾脏虚也当先?散仍补脾○伤风兼肝则?搐顿闷兼心则惊不安兼肺则喘 哽气兼脾则困睡兼肾则目畏明各随补其母○伤风多睡能食引饮吐泻大便色黄此胃虚热也当先用白术散以生津後用大青膏以?散○伤风吐沫泻色青白闷乱不渴哽气出气睡而露睛先用益黄散後用大青膏伤风或凉或热多睡气粗大便黄白呕乳不消不时咳 先用大青膏後服益黄散慎不可下○伤风误用下药而作渴饮水者此胃无津液而虚热也多用白术散热渴自止

薛按大青膏乃表散之剂必外邪蕴结於肺而肺气未亏损者方可用之大黄丸乃疏利之剂其食痰积?於胃而胃气尚充实者乃可施之况前症属脾肺气虚腠理不密外邪所乘又当临症制宜必以固脾胃为主若兼肢冷自利腹胀喘 者脾肺虚寒也六君子加木香升麻桔梗若兼惊悸痰甚饮食少思属心脾脏虚也四君子加芍药酸枣仁若兼肢体倦怠喘 哽气脾肺气虚也六君子加升麻桔梗若兼目畏明白睛多肾气虚也六味丸加五味鹿茸如未应更用补中益气汤加五味子乾山药以补肾母若多睡能乳饮水吐泻大便色黄脾气虚而下陷也补中益气汤升补元气若吐沫泻青睡而露睛脾虚木所乘也六君子加升麻柴胡调补脾气若乍凉乍热喘 气粗大便黄白呕乳不消脾肺气虚而有邪也先用惺惺散後用四君子汤若误用下药而作渴者脾胃之气伤也用白术散或六君子补中益气二汤补之大凡前症若病邪

急而元气无亏者先用原方或用轻清表散之剂若元气不足者当如前法固其元气则外邪自退若因病久或因服剋伐之药而未愈或更加变症者但调补脾胃诸症自愈其小儿伤风?热鼻塞或痰壅?搐多因乳母鼻吹 风但服惺惺膏或用葱头三五茎细切搗烂以纸寸余摊葱在上两掌合葱待温贴於 风其邪即解乃去其葱却用绢段寸余涂以面糊仍贴 风永无伤风之患

吴江史安卿子伤风用表散化痰之药反痰盛咳 肚腹膨胀面色?白此脾肺俱虚用六君子加桔梗一剂顿愈至三日前症又作鼻流清涕此复伤寒也仍用前药加桑皮杏仁而愈

史玄年子喘 胸腹膨胀泄泻不食此饮食伤脾土而不能生肺金也用六君子汤一剂诸症顿愈史孔修子六岁感冒咳 风散过度喘促不食痰中有血余曰此成肺痈也次日吐痰而兼脓用桔梗汤而愈後元气未复大便似痢或以为痢用五苓黄连枳实之类痰喘目割四肢抽搐此脾败而变慢脾风也果歿

诸经?热症治三

潮热者时间?热过时即退来日依时而?此欲?惊也○壮热者常热不已甚则?惊癇也○风热者身热而口中气热乃风邪外感也○温壮者肢体微热也○?热而不欲饮水者胃气虚热也用白术散?热而饮水作渴喜冷饮食者胃气实热也用泻黄散

薛按秘藏保婴集云小儿潮热或壮热不退多是变蒸及五脏相胜不必用药又多食积郁热由中?外见於肌表只理其中清阳明之热而表热自除不可认作外感用小柴胡轻利等药重伤其内又潮热不退恐是出痘亦当审察勿使用药窃谓?热饮水者热在内不饮水者热在外也又当以此辨之其诸热症说见各类

朱监簿子五岁忽?热腮唇色赤烦躁饮热或用牛黄丸及一物泻心汤加倦怠不食便利黄水师谓心经虚热而误下之也先用白术散以生胃中津液後用生犀散以治心经虚热再与黄连丸而愈

郑人齐姓者子忽脏热症自用青金膏三服连泻五行加困睡?惊再一服又泻二行益加口乾身热虚羸师先煎白术散与时服之後用香瓜丸而愈

曹宣德子三岁面黄时?寒热不食饮水或用牛黄麝香二丸不愈用止渴乾葛散反吐师谓食伏於胃脘先以白饼子下之又以消积丸磨之而愈

愚治一小儿先壮热便秘服清凉饮之类愈而复作服地骨皮散而潮热不已服四物芩连之类不时而热甚余曰不时而热或昼见夜伏昼伏夜见是虚火也当滋化源不信仍服寒凉愈甚余夕用六味丸加五味子朝用补中益气加山药山茱萸而瘥

一小儿五岁?热作渴右颧鼻準微赤或与冷冰凉药即时呕吐余曰右颧微赤肺经虚热也鼻準微赤胃经虚热也此胃虚不能生肺耳先用四君子加升麻三分一剂而不吐又用白术散二剂而不渴再用四君子四剂而顿安

一小儿?热作渴用泻黄散大便重坠口角流涎仍欲泻火余曰鼻準青白脾虚肝木所侮也口角流涎胃气不能摄涎也大便重坠脾气不能升也不信另服凉剂果眉唇微动四肢微抽余曰此元气虚极而变慢脾风也用六君子加炮姜当归木香钩藤钩二剂益甚彼欲更剂余曰此药力不及也设药不对其症祸在反掌仍以前药加炮附子一片服之即安乃去附子又二剂而愈

薛氏医案卷五十

卷五十一

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷五十一

明 薛己 订

钱氏小儿直诀二

吐泻兼变症治

五月二十五日已後吐泻壮热此臟腑中九分热也伤热乳食吐而不消泻色深黄玉露散主之 六月十五日已後吐泻身温臟腑六分冷也呕吐乳食不消泻色黄白口乾作渴者食前少服益黄散食後多服玉露散 七月七日已後吐泻身凉三分热七分冷也不乳多

睡闷乱哽气出气睡卧露睛唇白多哕亦用益黄玉露二散主之 八月十五日已後吐泻身冷不乳乾哕泻青褐水无阳也当用益黄散吐泻乳食不化时时下痢肌肉消瘦此脾胃虚寒也用木香丸夏月不可服如有冷症则少服之其身温壮热或泻痢红黄赤黑此脾胃实热也用黄连丸冬月不可服如有热症则少服之薛按前法即内经用寒远寒用热远热之本旨又云有假者反之虽违其时以从其症盖胃伤则呕吐脾伤则泄泻脾胃俱伤则吐泻并作前症若伤辛热停滞呕吐或大便下痢者用六君子加黄连吴茱萸木香若停滞已去泄泻不已用四君子加肉蔻骨脂若伤生冷腹痛泻痢青白用六君子加砂仁木香炮姜若伤鱼肉等物用六君子加山查砂仁若泻红黄赤黑诸臟皆热也先用香连丸後用补中益气汤送香连丸若泻痢青白乳食不化者用人参理中丸若吐泻昏睡而露睛者用五味异功散睡而不露睛者用玉露散若吐而手足俱热或喜冷饮食或睡不露睛者用泻黄散或手足冷或恶冷饮食或睡而露睛者用六君子木香然木香黄连二丸虽能攻剋病邪不无伤损脾胃治者审之

五太尉患吐泻米谷不化时六月或用温补之药更加呕吐此热伤胃也当用石膏汤解之不信又服丁香散师曰三日外必腹满身热饮水吐逆果如所言遂用白虎汤三服後以白饼子下之又与白虎石膏二汤各一服而愈

七太尉七月病吐泻不食昏睡觉而闷乱哽气乾呕不渴衆作惊治师以为脾虚先用史君子丸以补脾後用石膏汤以退热次日以水银硫黄末一字姜水调下间用温补脾胃而愈

冯承务子五岁吐泻壮热不思饮食目睛多白面色无神师曰此肾经虚弱下之则愈虚遂以

消积丸磨之渐愈大凡伤食不下则成癖下後即与补脾无不效者愚治一小儿白睛多唇色白七月间停食吐泻困睡惊悸久治不愈余曰惊悸心血虚怯也困睡脾气虚弱也乃因禀赋不足所致耳用补中益气汤及六味丸加鹿茸治之而愈

一小儿盛暑吐泻米谷不化或用黄连香薷饮类腹胀作痛手足并冷此脾气虚而伏陰在内也用五味异功散加木香治之而愈先君尝云凡暑令吐泻手足?热作渴饮冷者属阳症宜清凉之剂若手足并冷作渴饮汤者属阴症宜温补之剂故大人属阴者误用寒凉之药死後手足青黯甚则遍身皆然於此可验

若吐乳泻黄伤热乳也吐乳泻青伤冷乳也皆当下之吐泻昏倦睡不露睛者胃实热也吐痰涎及绿水者胃虚冷也

薛按前症若儿自受惊或乳母恚怒致儿吐泻青色者宜用异功散加柴胡若母食厚味而乳热者用东垣清胃散母饮酒而乳热者用葛花解醒汤子服一二匙若饮烧酒而乳热或子母身赤或昏愤服冷米醋三五杯多亦无妨儿服一二匙若母停滯生冷而乳冷者母服养胃汤子服调中丸若母停滯而变热乳者母服大安丸子服五味异功散若母郁怒伤肝脾而乳热者用归脾汤逍遥散若母脾虚血弱而乳热者用六君子加芍药归若母气血虚而乳热者子母俱服八珍散若母劳役?热而乳热者子母俱服补中益气汤若因怒动肝火而乳热者用五味异功散加柴胡山梔其吐痰涎及白绿水者肝木乘脾土之虚寒症也用六君子加柴胡木香大凡吐乳泻青色者属惊法当平肝补脾吐泻青白色者属寒法当温补脾土前诸症若手足指热者属实手足指冷者属虚此亦验法也

愚治一小儿每饮食失节或外惊所忤即吐泻?搐服镇惊化痰等药而愈後?搐益甚饮食不进虽参术之剂到口即呕余用白术和土炒黄用米泔煎数沸不时灌半匙仍呕次日灌之微呕再日灌之欲呕此後每服二三匙渐加至半杯不呕乃浓煎服而愈一小儿停食吐泻後身热作渴泻下红白或青黑服黄连丸之类将愈而复热手足指却冷余谓始为实热终为虚寒用补中益气汤加木香肉果治之而愈一小儿伤食吐泻不已泻色青绿或溏白睡而露睛手足指冷额黑唇青余谓泻痢青绿肝胜脾土也或时溏白脾土虚寒也额黑唇青寒水侮土也悉属中气虚寒用五味异功散加升麻柴胡木香附子一剂而愈

一小儿伤食呕吐?热面赤服消导之剂饮食已消热赤未退余以为胃经虚热用六君子加升麻柴胡各二分四剂而愈

一小儿目睛缓视大便臭秽乃饮交感时乳所致用四君子加木香藿香治之而安

一小儿吐酸乳食用四君吴茱黄连木香补脾平肝而愈後口中有酸水仍用前药随愈後睡苦水口中味苦用龙胆汤清肝火佐以四君子以补脾土乃瘥一小儿吐黄水或口甘所食之物悉皆甘味用泻黄散愈後停乳食服克伐之药口甘不食形气殊弱用补中益气汤而愈

初生十日内吐泻壮热不乳或乳不消或白色先用白饼子下之後用益黄散和之

初生下吐因秽恶下咽故也用木瓜散主之凡初生急须拭净口中否则啼声一?秽物咽下致生诸病薛按芽儿初生之患多因乳母不慎七情不节厚味传儿为病当审其因以调治其母前所用之药恐臟腑脆嫩不能胜受治者审之

咳 兼变症治【附喘 治验】

夫 者肺感微寒之症也八九月间肺气大旺咳 面赤痰盛身热当以葶?丸下之若久病不可下也十一月十二月 者乃伤风 也风从背?第三椎肺俞穴而入当以麻黄汤汗之有热症面赤饮水咽喉不利者兼用甘桔汤治之

若五七月间身热甚唾粘者以漏银丸下之若无热症而但 者以葶?丸主之後用化痰药咳而後喘面肿者肺火盛也用泻白散泻之咳而哽气喉中有声或 久肺亡津液者皆肺虚也

并用消胶散补之痰盛者先实脾土後用漏银丸微下涎退即补肺 而吐青绿水者百祥丸下之 而吐痰涎乳食者白饼子下之 而咯脓血者甘桔汤主之 而痰实面赤饮水者漏银丸下之治初 下之久则补之更量虚实以意增损

薛按前症或儿自因腠理不密外邪内蕴或因乳母七情厚味郁热若风邪外伤者用麻黄汤表散郁热内蕴者用葶?丸疏导鼻流清涕或头痛声重者用参苏饮散之更用四君子以固肺气若心火刑肺用人参平肺散以清肺金用六味地黄丸以滋肾水若 而吐青绿水者用六君子加柴胡桔梗平肝补脾若 而吐痰乳者用六君子加桔梗补土生金若 而吐脓血者用桔梗汤排脓理肺洁古先生云 而两脇痛肝火侮肺也用小柴胡汤 而呕苦水胆汁溢上也用黄芩半夏生姜汤 而喉中作梗心火刑金也用甘桔汤 而下气小肠失约也用芍药甘草汤 而喘急风邪伤肺也用麻黄汤 而呕长虫胃气虚也用乌梅丸 而痰涎壅盛风伤脾也用升麻汤 而遗尿大肠气虚也用赤石脂禹余粮汤不止猪苓汤 而腰背痛痛甚则咳涎风邪伤肾也用麻黄附子细辛汤 而遗尿膀胱气虚也用茯苓甘草汤 而腹满而肿不食脾虚气逆也用五味异功散丹溪先生云上半日 者肾中陰火也大抵咳 之症多因肺气虚腠理不密外邪所乘若风中於卫则呼气不出热至於荣则吸气不入风热相搏血气稽留於肺若寸口脉数而虚为肺痿脉数而实为肺疽此因汗下过度重亡津液所致其麻黄汤乃?汗解表之剂葶?丸乃内疏通利之剂白饼子亦疏利之剂审有是症方可暂用之苟泛投施治重亡津液必致败症

杜氏子五岁仲冬咳 吐痰此风寒伤肺也用麻黄丸以泻肺後用阿胶散以实肺如此者三其病愈虚师曰泻肝而肝病不退补肺而肺病犹存无能为矣果大喘而歿

李运使孙八岁咳 胸满短气或谓肺经有热用竹叶汤牛黄膏各二服三日加喘师曰此肺气虚而寒邪所乘用补脾肺之药而愈盖竹叶牛黄治心药也用以治肺误矣

张氏孙九岁喘 闷乱饮水不止食不能下或用凉药月许无效师曰此凉药寒胃也以益胃散补脾土以泻白散泻肺金而愈

段斋郎子四岁病 身热吐痰数日咯血或用甘桔汤防己丸其涎上攻吐喘不止用漏银丸一服下之复以补肺散治之或曰症属肺虚何以下师曰肺经咯血而有热故也况痰实上攻亦使?搐故宜先下其痰随补脾肺而愈

愚治一小儿停食服克伐之药唾痰腥气面赤气喘此复伤肺气内亡津液而变肺痈也不信已而果唾脓用桔梗汤痰脓顿止其喘益甚余谓因脾虚不能生肺而然也用五味异功散加杏仁薏苡仁百合治之而愈後小便澁滞误服八正散二剂小便愈澁咳 吐痰面赤盗汗此前药复损肾气虚火烁肺而为患耳余用五味异功散调补脾土用地黄丸滋养肾水而痊

愚治一小儿感冒咳 散过度喘促不食痰中有血用桔梗汤愈後因元气未复大便似痢或用五苓散黄连枳实之类痰喘目劓四肢抽搐变慢脾风而歿

一小儿伤风咳 热服解表之剂加喘促出汗余以为脾肺气虚欲用补中益气汤加五味子补之不信乃服二陈桑杏桔梗枳殼前症益甚又加?搐痰涌余仍用前药更加鈎藤鈎而痊

一小儿母有哮喘因劳即?儿饮其乳亦 用六君子加桔梗桑杏治其母子常服数滴而愈大凡乳下婴儿有疾必调治其母为善

一小儿伤食?热抽搐呕吐气喘痰 属脾肺气虚而有热以六君子加炒黑黄连山梔各二分一剂顿安

一小儿咳 因其母素食膏粱炙煇所致用东垣清胃散而愈後其母因怒咳 脇痛其子亦然母服小柴胡汤其子亦愈

一小儿伤风咳 或行表散化痰反加痰盛肚腹膨胀面色?白余谓此因脾肺气虚而复伤用六君子加桔梗一剂顿愈三日後仍 鼻流清涕此复伤风寒而作仍用前药加桑皮杏仁而愈

一小儿咳 痰涎上涌服清气化痰药反五更痰 余以为脾虚食积为痰也用六君子加神麴山楂桔梗而愈若因痰积而咳 者但健脾消食其痰自化若用克滯之剂中气愈虚其痰愈盛

一小儿喘 胸腹膨胀泄泻不食此因饮食伤脾而不能生肺也用六君子汤一剂而愈

一小儿痰涎上涌则咳 面色黄白服清肺之药不应服下痰之药益甚余曰面色痿黄乃脾虚不能化食而为痰也令节饮食用六君子汤而痊大抵因 而生痰者当治其肺因痰而致

者当理其脾

薛氏医案卷五十一

卷五十二

钦定四库全书

薛氏医案卷五十二

明薛已订

钱氏小儿直诀三

五臟内外疳症主治

凡小儿疳在内目肿胀泻痢青白体渐瘦弱疳在外鼻下赤烂频揉鼻耳或肢体生疮鼻疮用兰香散诸疮用白粉散 肝疳一名筋疳白膜遮睛或泻血而瘦用地黄丸

心疳面黄颊赤身体壮用安神丸

脾疳一名肥疳体黄瘦削皮肤乾澁而有疮疥腹大嗜土用益黄散

肾疳一名骨疳肢体瘦削遍生疮疥喜卧湿地用地黄丸

肺疳一名气疳喘 气促口鼻生疮用益黄散 若患潮热当先补肝後泻心若妄以硝磺诸药利之若患癖当消磨若误以巴豆硼砂下之又伤寒误下皆能成疳其初病者为热疳用黄连丸久病者为冷疳用木香丸冷热相兼者用如圣丸津液短少者用白术散凡此因大病脾胃亏损内亡津液所致当固脾胃为主而早为施治则不变败症也

薛按疳症或哺食早或嗜食甘肥或服峻厉之药重亡津液虚火炽盛或因禀赋或乳母厚味七情致之当各调治其内 若口舌蚀烂身体壮热唇赤色或作肿痛腹膈烦闷或掌热咽乾作渴饮水便赤盗汗啮齿虚惊此心经内外疳也用安神丸之类主之若鼻外生疮眼目赤烂肢体似癬两耳前後项侧

缺盆两腋结核或小腹内股玉jing陰囊辜丸肿溃小便不调或出白津或咬指甲摇头侧目白膜遮睛羞明畏日肚大青筋口乾下血此肝经内外疳也用地黄芦荟二丸主之 若头不生髮或生疮痂或髮成穗或人中口吻赤烂腹痛吐逆乳食不化口乾嗜土泻下酸臭小便白浊或合目昏睡恶闻木音此脾经内外疳也用肥儿丸主之 若鼻外生疮咽喉不利颈肿齿痛咳嗽寒热皮肤皱错欠伸少气鼻痒出涕衄血目黄小便频数此肝经内外疳也用地黄清肺饮主之 或内热吐痰手足逆冷寒热往来滑泻肚痛口臭作渴齿龈溃烂爪黑面黧身耳生疮或耳出水或食自发此肾经内外疳也用地黄丸主之凡疳热上攻或痘毒上升为患甚速名为走马疳急敷雄黄散服蟾蜍丸轻则牙龈腐烂唇吻肿痛可治重则牙龈蚀落腮颊透烂不治【世传方有云有无辜等疳一十二症补注蟾蜍丸下】愚治陈职方孙面颊患疮将蚀两目或用清热之药久而不愈余用大芫荽汤二剂清其肝火而愈陈司厅子遍身生疮面色痿黄腹胀内热大便不调饮食少思倦怠口乾用大芦荟丸治其肝脾不月而愈

俞廷评子目割面青食少体倦大便滑泄此木乘脾土用芍药参苓饮而痊

陈工部孙腹内一块小便不调或以血痞久服行气破血等药?热口乾体瘦懒食几成瘵症余谓面黄兼青乃肝脾痞症用补中益气汤煎送大芦荟丸四服又用前汤加车前子煎送六味丸四服又用清肝生血之药而愈

一女子十二岁目生白翳面黄浮肿口乾便澁滞肝脾之症用四味肥儿丸而愈

一小儿九岁目割畏明深不愈或以为实火服泻青丸之类益甚求治於余仍欲泻肝余谓肝经虚火用地黄丸补之而愈夫肝气为阳为火肝血为阴为水肝经之症若非肝火血燥而生风必因肝血虚而火动其初患而病气形气俱实者宜少与泻青丸泻之其久患而病气形气俱虚者当与地黄丸补其肾肝盖此症原因肝经血少而生风耳不可辄用泻青峻剂经云凡病虚则补其母实则泻其子前症果肝经实热宜用柴胡黄连之类以治心火者审焉一小儿鼻外生疮不时揉擦延及两耳又一小儿视物不明鼻内或痒或生疮用四味肥儿丸渐愈一小儿耳内出水耳外生疮脓水淋漓经岁不愈余用九味芦荟丸以治肝用地黄丸以生肾水乃瘥一小儿遍身如疮或痒或痛肌体消瘦日夜?热口乾作渴大便不调年余不愈用芦荟丸以治肝兼五味异功散以补脾而愈

一小儿数岁脑後并结二核肉色如故而不髻肿正属膀胱经观其形状审其粪色兼属肝脾肾三经用九味芦荟丸以清肝脾佐用地黄丸以补肾水形体渐健不两月而消

一小儿腹内结块小便不调余以为肝经内痞症用芦荟丸为主佐以龙胆泻肝汤而消

一小儿自脱胎即两目赤肿或作痒或作翳此胎禀肝火耳用六味芦荟二丸而愈

一小儿患瘵?小便频数两目连割或作呕少食泄泻後重此肝经热盛而脾土受邪也用补中益气汤六味地黄丸而痊

一小儿面色痿黄眼胞微肿作渴腹胀饮食少思腹中一块或移动小便澄白大便不实此脾痞之患用四君子加山栀芩薏兼四味肥儿丸而愈

一小儿嗜食泥土困睡泄泻遍身如疥此脾经内外痞也用六君子汤及四味肥儿丸而痊

一小儿面黄颊赤?热作渴睡中惊悸此心经内痞症用四君加炒黑黄连芎归为主佐以秘旨安神丸而痊

一小儿所患同前兼掌心?热遍身如疥此心经内外痞症用肥儿丸为主佐以秘旨安神丸而愈一小儿咳 寒热咽喉不利鼻上有疮久不生痂此肺经痞症用地黄清肺饮四味肥儿丸而愈

一小儿下疳溃烂爪黑面黧遍身生疥此肾经内外疳症用地黄丸为主佐以四味肥儿丸而痊

史少参幼子二岁项後结核不时仰首或以为热疮内溃用针决之服消毒之药後曲腰啼哭余谓此无辜外吊症也曲腰而啼内吊症也果歿

腹痛肿胀诸症

小儿腹痛体瘦面色?白目无睛光口中气冷不思饮食或呕利撮口此脾土虚而寒水所侮也用益黄散调中丸主之若口中气温而色黄白目无睛光或多睡恶食或大便酸臭此积痛也用消积丸甚者白饼子下之後以白术散调补胃气若腹胀而闷乱喘满者实也用紫霜丸白饼子若不闷乱喘满者脾虚也误下之以致目胞腮面四肢浮肿肚腹愈胀以塌气丸主之因下而喘脾气益虚也脾虚不能胜肾水随肺气行於四肢如水状若侵浮於肺即大喘也

薛按腹痛不食口中气冷下利撮口等症属形病虚寒也用六君子加炮姜温补之食积多睡口中气温恶食面黄白等症属病气实而元气虚也用六君子加神麴山查消导之剂若腹胀喘满脾肺虚而气不归源者用补中益气汤若因下脾肺气虚而面目四肢浮肿等症者用金匱加减肾气丸况此症有因乳母脾胃宿积饮食伤脾所致其白饼子紫霜丸必形病俱实方可用也塌气丸亦非调补之剂宜审用之愚治一小儿每停食腹痛?赤晕用清中解鬱汤而愈後患摇头咬牙痰盛?搐吐酸腐待其吐尽翌日少以七味白术散次日又以参苓白术散调理脾胃遂不复患大抵吐後儿安不必更服他药恐复伤元气也

一小儿伤食腹胀呕吐?热面赤服消导清热之剂饮食已消热赤未退用六君子加升麻柴胡各二分升补胃气四剂而愈

一小儿五岁停食腹痛?热面赤或用养胃汤枳实黄连更加腹胀午後热甚按其腹不痛余以为脾虚而药伤用六君子汤数剂而痊

一小儿数岁每停食辄服峻厉之药後肚腹膨胀呕吐泄泻先用六君子汤诸症渐愈又用补中益气汤而安

一小儿肚腹胀饮食即泻手足逆冷此脾气虚寒也先用人参理中丸後用六君子汤而愈

一小儿伤食腹胀胸满有痰用异功散而痊後复伤食腹胀兼痛或用下剂痛虽止而胀益甚更加气喘此脾益伤而肺益虚也用六君子汤加桔梗调补而愈

一小儿腹胀恶食?热恶心殊类外感余曰此饮食所伤脾肺虚热也用保和丸一服诸症顿退但腹仍胀用异功散而痊

一小儿伤食腹胀服克伐之剂小便澹滯又服五苓散之类饮食渐减小便不通四肢顿肿余朝用加减肾气丸夕用异功散而愈

若肾热传於膀胱热甚逆於脾肺脾胃虚而不能制肾水流走四肢而身面皆肿若上胜则刑於肺故令喘也薛按肺主气肾主水前症因禀赋不足或因大病後或误行汗下致脾虚不能制水而溢皮肤肺虚不能摄气而气上逆宜用六味丸补中益气汤治之如小便不利用金匱加减肾气丸肾经虚火上炎肺热作喘者用六味地黄丸心火炽盛肺热作喘者用人参平肺散凡此皆属肾经陰虚热症用六味丸壮水为主若用清热分利之药则误矣

一小儿禀父肾热小便赤澹服五苓散之类後患停食服克伐之药四肢面目浮肿小便不利渐至气喘此误行渗利脾肺气虚不能摄水而患肿脾肾虚寒不能制水而气喘用六味丸加牛膝车前及补中益气汤而愈

若口吐痰沫或吐清水面?白心腹痛而有时者虫痛也与癰相似但目不斜手不搔也用安虫散主之薛按虫乃湿热所生或木气而化有因臟腑虚弱有因胃冷胃热为入身之固有者其为患往来攻痛或吐涎水肌体消瘦而无正色但当调补脾胃为主若虫食上部则上唇有白点虫食下部则下唇有白点腹中之虫朔日之後其头向上望日之後其头向下如或用药先以肉物近儿烹炙使闻香味虫头皆向上则药易於奏效丹溪先生云冬月吐虫多是胃气虚寒用钱氏白术散加丁香二粒补之可见小儿之虫皆饮食伤脾所致患疮疥内生虫虱者皆肝木所主也

辛氏子五岁病虫痛或用巴豆礞砂之类哭而俛仰按腹大叫面青黄而时白目仍青师曰此病大困更加泻则不救次夜大泻并下前药师曰今面青作泻此肝木乘脾形病相反当五日笃七日死已而果然

愚治一小儿虫动心腹痛先服芫荇散下之更加作呕食少口渴饮汤右颧鼻準白中兼黄此脾肺气虚也余用异功散二服少愈仍加炮姜一服而安一女子年十三岁面色青黄头左生疔颈项结核寒热往来大便不利余谓此肝木侮脾元气亏损所致寒热非客邪便秘非内实不信仍服杂药後作泄泻疔内出虱余用六君子加升麻柴胡芫荇为主佐以九味芦荟丸诸症悉退颈核顿消

一小儿面色青黄心腹作痛时欲呕吐或小便淋漓或陰茎湿痒余以为肝经风热侮脾不信後遍身生疥出虫虱余用四味肥儿丸六君子汤之类寻愈

若腹中有癖不食但饮乳是也当渐用白饼子下之盖小儿病此良由乳食不消伏於腹中乍冷乍热饮水过多即荡涤肠胃亡失津液脾胃虚弱不能传化水谷以致四肢羸瘦肚腹渐大而成疳矣

愚按此症或因小儿乳食过多致伤脾胃或乳食起居七情六淫失宜所致必先调补元气为

主佐以消散之剂若除之不以渐则必有颠覆之患常治食积既去而热不退或作呕吐少食用五味异功散脇胀少食善怒泻青用六君子汤加升麻柴胡少食体倦泻黄用补中益气汤手足冷加炮姜木香如不应佐用四神丸体瘦潮热口乾大便不调用肥儿丸兼颈项结核口齿腐烂当参前疳条主之

愚治一小儿腹中痞塞略服二陈枳实黄连其痞益甚余谓属脾经血虚用六君子加当归数剂胃气渐复乃朝用异功散加升麻夕用异功散加当归而愈一小儿素嗜肉食腹中作痛大便不调半载之後肚腹膨胀右脇内结一块不时转移又三月左脇内亦结一块胸腹亦胀跟溃作渴小便赤澁或澄白大便色秽不一又半载颌下结核三五枚服消块行滞等药元气益虚其块益甚余用四味肥儿丸五味异功散之类随症进退治之热渴渐止又月余腹胀渐消更佐以九味芦荟丸齿龈渐愈乃用四君子为主佐以芩薤丸之类而痊

一小儿饮食不节或作泻或腹痛或腹胀腹中一块大便不调作渴发热龈烂口臭专服消导尅滯前症益甚形体益瘦余曰面色黄中隐青脾土亏损而肝木所侮也法当调补中气平肝木则脾气自旺虚火自退诸症自愈遂用冲和汤及大芩薤之类果愈一小儿患痞服克滯之药余谓形气有余病气有余者当泻不当补形气不足病气不足当补不当泻前症属形病俱虚非调补中气不愈不信仍行克伐元气亏损虚火上炎齿龈蚀烂颌下结核余用大芩薤汤及异功散之类寻愈

五臟杂症主治

自汗者厚衣卧而额汗出也盗汗者肌肉虚而睡中汗出也用止汗散遍身汗用香瓜丸胃虚汗者上至项下至脐也用益黄散六阳虚汗者上至头下至项难治薛按前症因小儿元气未充腠理不密或因饮食停滞鬱热或厚衣温煖臟腑生热而津液妄泄也其自汗属心经血热用导赤散血虚用團参汤其盗汗属肾经虚热用五味异功散气血虚弱用人参养荣汤若寒水侮土用益黄散设泛行施治误损脾胃多成疳瘵其六阳虚汗乃禀赋不足若用参附芪附二汤亦有生者大凡汗多亡阳必至角弓反张颈项劲强若用十全大补之剂多有生者

张氏三子大者汗出遍身与香瓜丸次者上至项下至胸与益脾散小者但额有汗与石膏汤各五日而愈若概用麦煎散治之误矣

愚治一小儿其面色或白或青或恶寒或发热鼻间微黄兼白盗汗自汗胸膈不利饮食少思常怀畏惧余以为脾肺气虚不信又用朱砂安神之类前症益甚更往来寒热泄泻不食余用六君子汤加黄芪当归为主佐以八珍汤之类而痊

一小儿五岁腹痛泄泻盗汗鼻间左颧皆白此属脾肺气虚而食积所致用六君子加山查神麴四剂腹痛顿止去二味又四剂而大便调用四君归芪二剂而盗汗止

一小儿十二岁形气瘦弱右颧白两颊赤鼻间隐青盗汗久不愈此禀足三陰虚而然也朝用

补中益气汤夕用六味丸而愈

一小儿三岁盗汗少食闻药即呕此胃伤也用浮麦炒为末每服少许以乳调服旬余呕止乳进佐以六君子汤而愈

一小儿停食腹痛夜间盗汗此脾虚食积所致用六君子汤数剂腹痛渐愈盗汗亦止後复停食服消积丸作泻不止自汗盗汗饮食甚少睡而露睛四肢发搐此脾土虚而肝木所胜用六君子少加柴胡治之饮食渐进诸症渐愈但盗汗不止属肾虚也佐以地黄丸愈

一小儿发热呵欠顿闷咬牙盗汗属肝胆火症用小柴胡汤加山梔二剂又前用地黄丸料煎服而愈

夜啼者小儿筋骨血脉未成而多哭脾臟冷而痛也当与温中药或花火膏主之若虚怯为冷所乘则唇青薛按前症多因小儿禀赋不足或乳母饮食七情亏损所致若面色白白睛多者属肾气不足至夜则陰盛而腹痛也用六味丸若脸青唇白或小便黄短属脾气不足至夜则陰盛而腹痛也用钩藤鈎散若脸红舌白或小便赤濇小肠热也用导赤散加辰砂如不应属肾火用地黄丸唇色青白口中气冷或肢体冷或泄泻曲腰或泄泻不乳此脾肾虚弱用六神散兼呕吐用六君子汤大便不化乳少腹胀用五味异功散加漏芦令母服之儿病自愈儿亦服四五滴尤妙儿大数滴

愚治一小儿停食腹痛夜啼用大安丸而愈後乳食虽入其腹仍痛用六君子加山查神麴痛少止乃去二味又四剂痛全止

一周岁儿痰 啼哭或用抱龙丸未止余视其右颧白左颧青此肺肝二经相胜先用泻白散以祛肺邪次用柴胡梔子散以平肝火又用地黄丸以滋肾水而痊

一小儿三岁夜啼面色白黑睛少小便清此肾脾气虚朝用补中益气汤加山药五味子夕用地黄丸顿愈

惊啼者邪气乘心也当以安神主之

愚按哭而不啼多泪是惊悸也啼而无泪是痛也若因心血不足用秘旨安神丸心火炽盛用导赤散水火相搏用柴胡梔子散肝血不足用六味丸所云十啼者盖亦大同小异耳

愚治一小儿白睛多面色赤时作啼此禀肾不足用地黄丸半载後忤其意虽哭面色不赤丹溪先生云小儿忽大叫必死即此义也

若浴後拭脐不乾风入作疮令儿撮口甚者是脾虚也若频撮口是气不和也益黄散主之

愚按前症果因浴後拭搥不乾用枯矾为末搽之即愈若兼乳母肝脾有热助儿为患当用加味逍遥散以治其母若风入作疮邪传於脾撮口者其害匪轻七日内患者其厄尤速

弄热舌者脾臟微热令舌络牵紧时时舒热当少用泻黄散或饮水者脾胃虚而津液少也兼面黄肌瘦五心烦热者疳瘦也用胡黄连丸大病未已而弄舌者凶愚按小儿舌微露而即收名弄舌属心脾亏损用温脾散补之舌舒长而收缓名吐舌乃心脾积热少用泻黄散主之兼口舌生疮作渴饮冷属胃经实热用泻黄散作渴畏冷属胃经虚热用四君子汤食少作渴或大便不实脾胃虚弱也用七味白术散口角流涎或颧颊患肿胃虚风热也先用人参安胃散後用七味白术散若午後甚者脾血虚也四物汤多加参术茯苓未应用补中益气汤及审相胜其疳瘦症当参诸疳门【七味白术散即人参白术散】

解颅者生下颧门不合也长必多愁少笑目白睛多面色?白肢体消瘦皆肾虚也

愚按肾主髓脑为髓之海前症因父母精血不足不能荣养宜用地黄丸补之有至七八岁或十四五岁气血既盛而自合若纵恣食色慾戕贼真陰亦不能尽其壽矣此症若在乳下当兼补其母更以软帛紧束儿首使其易合亦有颧陷颧填俱属稟不足或五疳久病元气亏损者仍参後小便不通类主之愚治一小儿颇解足软膝大不能行履用六味丸加鹿茸治之三月而能步履

一小儿年十四岁而近女色发热吐痰至有室两目羞明头觉胀大仍不断慾头渐大颧门忽开用地黄丸益气汤之类断色慾年余而愈

一小儿十三岁患前症内热晡热形体倦怠食少作渴余以为所稟怯弱用六味丸加鹿茸补之不越月而痊

一小儿十四岁解颅自觉头大视物皆大畏日羞明先兄以为肾稟怯弱用六味丸加五味鹿茸及补中益气加山药山茱萸半载渐愈二载而颧合後毕姻觉颧门开解足心如炙喜其断色慾戒厚味日服前药二剂三载而愈

胎肥者生下丰厚白睛粉红大便乾难时出涎水胎热者生下有血色时叫哭身热淡黄目睛多赤大便色黄急欲食乳并用浴体法主之 胎怯者生下面白肌肉瘦弱大便白水身无血色哽气多哕亦用浴体法薛按浴体之法乃开发腠理疏泄阳气者也其胎气果热在暑月庶几可用其或胎怯而用前法恐复伤真气也然此症属有余者胎肥胎热也因母食膏粱厚味或怒火郁热胎怯弱者因父精不足或母气虚弱用八珍汤父精不足用地黄丸俱加漏芦令母服之子亦服之

急欲乳不能食者此风邪由脐而蘊热心脾致舌厚唇燥不能吮乳也

薛按前症果因外邪而唇口撮紧者名为脐风多不能救若心脾有热舌尖痛不能吮乳舌本

痛不能送乳者以柳华散敷之若舌下肿如小舌者或舌络牵痛或齿龈患白星俱用线针刺出毒血亦敷前散若唇肿痛或裂纹作痛以当归膏调前散敷之若暴病发热作渴饮冷大便秘结用泻黄散疏导其热若病後发热口渴饮汤大便不实用异功散调补胃气若服攻伐之剂兼呕吐或腹痛脾胃复伤也用四君子汤或口角流涎或痰气壅盛脾不能摄也用六君子汤若儿自食甘肥或母食酒面致儿口舌生疮用清胃散以清热若作呕少食泄泻用白术散以补脾若手足并冷或腹痛恶寒用六君炮姜以温中若因乳母饮食劳役失宜发热致儿用补中益气汤因乳母肝脾二经血虚内热传儿用加味逍遥散八珍汤因乳母肝脾郁怒血伤内热致儿为患用加味逍遥散加味归脾汤俱加漏芦子亦服数滴仍参前弄舌类【凡针重舌以针直刺不可横挑恐伤舌络则言语不清】

龟胸龟背者由儿生下风客於脐入於骨髓致成龟背若肺热胀满攻於胸膈即成龟胸并用龟尿点其骨节自愈【取尿法用青莲叶安龟在上用镜照之其尿自出】

薛按小儿元气未充腠理不密风邪乘之或痰饮蕴热於肺风热交攻而致或坐早风入骨髓治当调补脾肺为主若因乳母厚味辛辣而致者当兼治其母若因禀父肝肾虚热者用六味地黄丸若禀肾气不足者用八味地黄丸

若患吐泻或大便後虽有声而不能言又能咽物者非失音此肾怯不能上接於阳也当以地黄丸主之凡口噤不止则失音语迟

薛按前症多因禀肾不足盖肾脉繫於舌本非地黄丸不能治故患此症者若仰首呵欠则如未应须兼以补中益气汤滋其化源若陰火上炎肺金受伤而失音者亦治以前法保婴集云小儿五六岁肾气不足而不能言者用菖蒲丸口噤不能言者用地黄丸

愚治一小儿言迟患泄泻声音不亮杂用清热等剂声音如瘖饮食少思去後多在侵晨朝用地黄丸加五味子夕用补中益气汤其泄顿止却专服前丸不两月其言渐亮而愈

一小儿白睛多而黑睛少吐泻後喉瘖口渴大便不实朝夕悉服地黄丸而瘖後患泻其喉复瘖仍服前丸遂愈

若大病後身目皆黄者黄病也身痛背强大小便澁一身尽黄小便黄赤此黄疸也泻者难治若百日或半年不因病而身黄者胃热胎疸也若淡黄兼白者胃怯也

薛按大病後身目皆黄或肢体黄胖者脾气亏损而真臟为病宜用六君子汤参苓白术散调补元气病後发渴者脾气虚而津液少也用七味白术散若脾经湿热壅滞二便秘结理不得疏泄而为患者名为黄疸用茵陈汤初生身黄壮热不乳便秘此为胎热用地黄汤若二便赤濇腹胀面赤饮水用茵陈汤调五苓散若清便自调四肢并冷用益黄散淡黄白用调中丸

愚治一小儿旬日内先两目发黄渐及遍身用泻黄散服之瘥

一小儿因母食郁饱胀咽酸而患遍身皆黄余以越鞠丸治其母以泄黄散治其子并愈

长大不行行则脚软 齿久不生生则不固 髮久不生生则不黑皆胎弱也

愚按前症即五迟之症也盖肾主骨齿者骨之余髮者肾之荣也良由父母精血不足肾气虚弱不能荣养而然耳有肝肾虚长而不能行者有肝气虚而手足拳挛者有肝肾虚而脚不能伸展者并用地黄丸滋补之有心气虚而不能言语用团参汤补中益气汤培养之若久病或五疳所致者但调补脾胃为主全婴方云头项手足身软谓之五软症皆禀肾气怯弱也

愚治一小儿体瘦腿细不能行步齿不坚固髮稀短少属足三陰虚用六味地黄丸补中益气年余诸症悉愈形体充实

一小儿三岁言步未能牙髮稀少体瘦骨立发热作渴目黑睛少服肥儿丸不应此肾虚疳症也前丸乃脾胃经之药久服则肾益虚而疳益甚不信果牙髮渐落用六味丸加鹿茸五味子半载而愈

一小儿七岁左腿细短寸许不良於行目睛白多或出盗汗髮黄成穗用地黄丸加鹿茸五味子为主佐以补中益气汤半载行履如故

一小儿脱肛半载恪服升补元气之药而愈

薛氏医案卷五十二

卷五十三

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷五十三

明 薛己 订

钱氏小儿直诀四

泻青丸 治肝经实热急惊搐搦

羌活 大黄 川芎 龙胆草【炒】 山梔仁 当归 防风【各等分】

右为末炼蜜丸芡 大每服半丸煎竹叶汤入砂糖化下

薛按前方足厥陰肝经解散肌邪疏通内臟之苦寒药也若大便秘结烦渴饮冷饮食如常属形病俱实宜用此泻之若大便调和烦渴饮冷属病气实而形气虚宜用抑青丸平之若大便不实作渴饮汤饮食少思肢体倦怠属形病俱虚宜用地黄丸补之若肝经血虚生风先用四物汤加鈎藤鈎以生肝血继用四君子汤以补脾土若因肝经血燥生痰用地黄丸生肾水益肝血若土不能培木用四君子汤加当归以补中用地黄丸以滋肾若因肺金尅肝木用六君子汤加芍药木香实脾土以平肺金若因心虚夺母之气或肾水虚不能生肝木者并用地黄丸主之若屡服峻剂而脾胃虚寒者必用六君子汤加丁香木香补脾胃以培阳气若因乳母恚怒肝火妄动致儿为患者母服加味小柴胡汤若因乳母肝脾血虚发热致儿为患者母服加味逍遥散子亦服数滴

抑青丸即前方去山梔大黄

抑肝散 治肝经虚热发搐或发热咬牙或惊悸寒热或木乘土而呕吐痰涎腹膨少食睡卧不安者软柴胡【五分】 川芎【八分】 当归 白术【炒】 茯苓【各一钱】 甘草【五分】 鈎藤鈎【一钱】

右水煎子母同服

泻心汤 治心经实热

黄连

右为末每服五分临卧温水化下

薛按前症若叫哭发热作渴饮水抽搐有力仰面而睡者属心经实热宜用泻心汤或导赤散若发热饮汤抽搐之力惊窜咬牙合面而睡者属心经虚热用补心散若喘 面赤壮热饮水肺乘心也用泻白散若头摇目劓身热抽搐肝乘心也用柴胡清肝散若合目昏睡泄泻身热脾乘心也用泻黄散若审视惊悸咬牙足热肾乘心也用安神丸若因乳母致症亦用前药以治其母

导赤散 治小肠实热小便秘赤

生地黄 木通 甘草【炒各等分】

右为末每服一钱入淡竹叶水煎

薛按泻心汤导赤散泻心小肠实火之剂盖心为脾母脾为心子然心既病则脾土益虚矣用者审之

生犀散 治心经虚热

地骨皮 赤芍药 柴胡 乾葛【各一两】 甘草【五分】 犀角【二钱镑】

右为末每服一二钱水煎

薛按前方云治心经虚热然其所用多属泻心泻肝脾之剂盖虚热二字恐传写之误假如心经自病而血虚热者用秘?安神丸脾虚夺心之气而热者用秘旨补脾汤肝木不能生心火而虚热者用地黄丸

秘?安神丸 治心血虚而睡中惊悸或受惊吓而作人参 半夏【汤泡】 酸枣仁【炒】 茯神【各一钱】 当归【酒洗】 橘红赤芍【炒各七分】 五味子【五粒杵】 甘草【炙三分】

右为末姜汁糊丸芡 大每服一丸生姜汤下

泻黄散 治脾胃实热

山梔仁【一两】 石膏【五钱】 藿香叶 甘草【各七钱五分】 防风【二两】

右用蜜酒微炒为末每服一二钱水煎

薛按前症若作渴饮冷卧不露睛手足热甚或遍身发黄属胃经实热宜用泻黄散若作渴饮汤卧而露睛手足并冷属胃经虚热宜用异功散若面青搐搦乳食少思肝乘脾也用秘?补脾汤若面赤惊悸身热昏睡心乘脾也用秘?安神丸若面白喘 肢体倦怠肺乘脾也用补中益气汤若唇黑泄泻手足指冷肾乘脾也用益黄散病後津液不足口乾作渴宜用七味白术散若乳母膏粱厚味七情郁火所致当审其因而治其母

五味异功散 治脾胃虚弱吐泻不食

人参 茯苓 白术 甘草【炒】 陈皮【各等分】

右为末每服三钱姜枣水煎

薛按前方补脾胃之圣药也况人之一身以脾胃为主若小儿乳食失节寒凉失宜或乳母六淫七情失调儿饮其乳诸病顿起当专以此药治之其应如响

益黄散 治脾土虚寒呕吐泄泻

丁香【二钱】 陈皮 青皮 诃子肉【各五钱】 甘草【炙三钱】

右为末每服一二钱水煎

薛按前症若因脾土虚弱而吐泻者用五味异功散若因肝木侮脾土而吐泻者用六君子加柴胡如不应或手足指冷属脾胃虚寒也更加木香炮姜若因乳母脾土虚而肝木侮亦治以前药若乳母郁怒致儿患前症母服加味归脾汤

人参安胃散 治因服峻厉脾胃亏损或成慢惊泄泻呕吐或肠胃有热以致前症

人参【一钱】 黄芪【二钱】 生甘草

炙甘草【各五分】 白芍药【七分】 白茯苓【四分】 黄连【二分】

右为末每服二三钱水煎

七味白术散 治吐泻或病後津液不足口乾作渴人参 白术 木香 白茯苓
甘草【炙】 藿香叶【各一钱】 乾葛【二钱】

右为末每服二三钱水煎

薛按胃伤则呕脾伤则泻故用前药调补胃气以化生津液如无他症只因胃气虚而津液不足者用四君子汤尤效

秘?补脾汤 治久病面黄肌瘦咬牙目割頭髮稀少误药所致

人参 白术【各一钱】 白芍药【酒炒】 白茯苓【各八分】 陈皮 川芎【各六分】 甘草【炙】 黄芪【蜜炙】 当归【酒洗各四分】

右每服二三钱姜水煎

泻白散 治肺经实热咳 痰喘

甘草【炙五钱】 地骨皮【一两】 桑根白皮【炒一两】

右为末每服一二钱入粳米百粒水煎

薛按活人方云喘者肺气有余也气盛当认作气衰有余当认作不足肺气盛者乃肺中之火盛也有余者肺中之邪有余也故用前药以泻之若土虚不能生肺用补中益气汤火来克金用人参平肺散肾水夺母之气或陰火上炎用地黄丸若肺虚肝木乘侮先用阿胶散後用泻青丸若因乳母肺经受症致儿为患母服前散若因乳母感冒风寒肺经郁热致儿为患用十味参苏饮若因乳母膏粱醇酒积热致儿为患用加味清胃散

阿胶散 治肺虚咳 口乾作渴

马兜铃【五钱】 甘草【炙一钱】 糯米【一两】 杏仁【七个去皮尖】 明阿胶【一两麩炒】 鼠粘子【二钱五分】

右为末每服二钱水煎

薛按前症若因脾胃弱而肺气虚者宜用补中益气汤若肺金自虚者宜用四君子汤

地黄丸 治肾虚解颅或行迟语迟等症

泽泻【三钱】 牡丹皮【三钱】 白茯苓【三钱】 熟地黄【八钱酒洗】 山茱萸【肉】 乾山药【各四钱】

右地黄杵膏余为末加炼蜜丸桐子大每服二三十丸空心白汤下

薛按前丸治肾经虚热作渴小便淋秘痰气上壅或肝经血虚燥热风客淫气而患癰?结核或四肢发搐眼目瞤动或肺经虚火咳 吐血头目眩晕或咽喉燥痛口舌疮裂或心经血虚有火自汗盗汗便血诸血或脾虚湿热下刑於肾腰膝不利或疥癬疮毒等症并用前药为主而佐以各臟之药大抵此药为天一生水之剂若稟赋不足肢体瘦弱解颅失音或畏明下窞五

迟五软肾疳肝疳或早近女色精气亏耗五臟齐损凡诸虚不足之症皆用此以滋化源其功不能尽述

四君子汤 治脾气虚弱饮食不化肠鸣泄泻或呕秽吐逆

人参 白茯苓 白术 甘草【炙各五分】

右水煎服

四物汤 治肝经血虚发热日晡益甚或烦躁不寐白芍药【一钱】川芎【五分】当归 熟地黄【各二钱】

右作二剂水煎服

八珍汤 治气血俱虚或因失血过多或因克伐元气以致内热发热肢体瘦瘁即四物四君子二汤合服

十全大补汤 治气血虚热或因病後恶寒发热或自汗盗汗食少体倦或发热作渴头痛眩运等症即八珍汤加黄芪肉桂

六君子汤 治脾胃虚弱体瘦面黄或久患疟痢不思乳食或呕吐泄泻饮食不化或时患饮食停滞或母有前症致儿为患

人参 白术 茯苓【各二钱】陈皮 半夏 甘草【炙各一钱】

右每服二三钱姜枣水煎

补中益气汤 治中气不足困睡发热或元气虚弱感冒风寒诸症或乳母劳役发热致儿为患

黄芪【炙】人参 白术【炒】甘草【炙】当归 陈皮【各五分】升麻 柴胡【各二分】

右姜枣水煎

香砂助胃膏 治胃寒吐泻乳食不化

人参 白术【炒各五钱】白茯苓【五钱】甘草【炙】丁香【各一钱】砂仁【四十个】乾山药【一两】白豆蔻【十四个】肉豆蔻【四个煨】

右为末炼蜜丸芡 大每服二三丸米饮磨化

人参养胃汤 治外感风寒内伤生冷寒热如疟或呕逆恶心

人参 厚朴【姜制】 苍术【制】 半夏【汤泡】 藿香
草果仁 茯苓【各五钱】 甘草【炙二钱】 橘红【二钱五分】

右每服二三钱姜三片乌梅一个水煎

大芫荇汤

治小儿脾疳少食发热作渴大便不调髮黄脱落面黑便清鼻下生疮能乳嗜土等症

芫荇 山梔【各五分】 黄柏 甘草【炙】 黄连 防风【各二分】 麻黄 羌活
柴胡【各三分】 白术 茯苓 当归【各四分】

右作二剂水煎

肥儿丸 治食积五疳颈项结核髮稀成穗发热作渴等症

黄连【炒】 神麴【炒各一两】 木香【一两五钱】 槟榔【二十个】 豆蔻【二两炮】 史
君子【酒浸】 麦芽【炒各四两】

右为末面糊丸麻子大每服四五十丸米饮下良久用五味异功散一服以助胃气

九味芦荟丸 治小儿肝脾疳积体瘦热渴大便不调或瘰癧结核耳内生疮等症

芦荟 胡黄连 黄连 木香 芫荇【炒】 青皮 白雷丸 鹤虱草【各一两】 麝香【三钱】

右为末蒸饼糊丸麻子大每服一二钱空心白汤下

黄连丸 治疳癆

瓜蒌根 乌梅肉 杏仁【浸去皮焙】 石莲【各二钱】 黄连【五钱胆汁浸晒】

右为末牛胆汁浸糊丸麻子大每服一二十丸煎乌梅姜蜜汤下

木香丸 治冷疳

木香 青黛 槟榔 肉豆蔻 麝香【各钱五分】 续随子【一两去油】 虾蟆【三个烧存性】

右为末蜜丸菉豆大每服三五丸煎薄荷汤下愚按前方消疳清热逐水破气之剂然云冷疳

者乃阳气虚而脾胃冷也其槟榔续随子恐导损真陰尅伐阳气治当审之

胡黄连丸 治热疳

胡黄连 黄连【各五钱】朱砂【二钱另研】

右为末填入猪胆内以线扎悬挂铫中淡浆水煮数沸取出研入芦荟麝香各二钱饭和丸麻子大每服一二十丸米饮下

愚按前症当以本方为主佐以四君子加茺萸脾胃虚甚者以四君子加茺萸为主以前丸为佐

如圣丸 治冷热疳泻

胡黄连 川黄连 白茺萸【炒各二两五钱】麝香【五分另研】乾虾蟆【五个酒煮杵膏】

右为末以虾蟆膏杵丸麻子大每服一二十丸煎人参汤下

薛按疳之为患乃肝脾虚热津液乾涸之症前方乃专於治疳清热之剂若脾胃虚弱者当佐以六君子汤调补胃使邪气退庶可收全功也

兰香散 治鼻疳赤烂

铜青 轻粉【各五分】兰香叶【二钱烧灰】

右为末乾贴

白粉散 治诸疳疮

海螵蛸【三分】白芨【二分】轻粉【一分】

右为末先用浆水洗拭乾贴

薛按前二方治表之药如未愈用四味肥儿丸以治其内

四味肥儿丸 治食积脾疳目生云翳口舌生疮牙根腐烂发热瘦怯遍身生疮又治小便澄白腹大青筋一切疳症

黄连【炒】茺萸【炒】神麴 麦芽【炒各等分】

右为末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滚汤下

蟾蜍丸 治无辜疳症一服虚热退二服烦渴止三服泻痢愈

蟾蜍【一枚夏月沟渠中取腹大不跳不鸣身多?者】

右取粪蛆一杓置桶中以尿浸之却将蟾蜍跌死投与蛆食一昼夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出瓦上焙乾为末入麝香一字粳米饮丸麻子大每服二三十丸米饮下其效如神

芫荇散 治虫动口内流涎

白芫荇 乾漆【炒各等分】

右为末每服五六分米饮下

安虫散 治虫动心痛

胡粉【炒黄】 槟榔 川练子 鹤膝【各三钱】 枯白矾【二钱五分】

右为末每服五六分痛时米饮调下

薛按虫动之因多属胃气虚弱或闻饮食气味而动前二方乃化虫之剂若因脾胃虚弱者须当调补中气

史君子丸 治臟腑虚滑及疳瘦下痢腹脇胀满不思乳食

史君子【肉一两面煨】 甘草【炙】 厚朴【姜汁炙】 青黛【五钱】 陈皮【二钱五分】 诃子肉【半生半煨】

右为末炼蜜丸芡 大每服三五丸米饮化下

白玉散 治丹瘤

白土【二钱五分】 寒水石【半两】

右为末用米醋或新水调涂

薛按前方性味寒凉六腑受患毒发於表二便调和乳食如常固为可用若胃气虚弱者反凝滯瘀血益增其患重者须吮毒血各聚於一处砭出以泄之遍身者当随其患处各吮聚砭之

更服仙方活命饮大便不通者更加大黄如不应用大连翘饮治法虽多无如砭法为良百日
内患者难治

神功散 治疮疡肿臀作痛未成者敷之即散已溃者敷之即愈丹瘤用之尤妙但砭缝作痛

黄栢【炒】 蒲黄 青黛【真正者】 人中白【煨各等分】

右为末敷之

仙方活命饮 治一切疮毒未成内消已成即溃能消毒排脓止痛之圣药也若脓出而肿痛不
止者元气虚也当补之

穿山甲 白芷 防风 没药 甘草 赤芍药 当归尾 乳香 天花粉 贝母【各钱】
金银花 陈皮【各三钱】 皂角刺【三钱】

右每服二三钱酒水各半煎

塌气丸 治肚腹虚胀

胡椒【一两】 蝎尾【五钱去毒】

右为末面糊丸粟米大每服一二十丸陈米饮下薛按前症属脾肺虚水气泛而喘急浮肿必
兼温补脾土以生肺金而气自运行矣但前药性属辛热虽能祛散寒邪而恐真气反伤不可
过剂

消积丸 治食积大便酸臭发热

丁香【五个】 缩砂【十二个】 乌梅肉【三个】 巴豆【二粒去皮心膜】

右为末面糊丸黍米大每服五七丸温水下

薛按前症若食积既去而热不退或作呕少食宜用五味异功散以补胃气或用四君子加藿
香半夏以安中气若兼泄泻用六君子汤如不应加升麻柴胡以升补脾气若久泻不已宜用
补中益气汤以升补阳气若虚寒加炮姜木香如不应兼以安神丸以补脾肾若体瘦潮热口
渴大便不调宜用肥儿丸以消痞积

保和丸 治食积

山楂【二两】 神面【二两】 半夏 茯苓【各一两】 陈皮 连翘 萝卜子【各五钱】

右为末粥糊丸桐子大每服一二十丸白汤下

清中解郁汤 治脾气虚弱饮食停滞郁热生痰或身发赤晕

白术【炒】茯苓 陈皮 山梔【炒】 山楂 神麴【炒】 麦芽【炒】 川芎 桔梗
甘草【炒各五分】

右每服二三钱水煎

四神丸 治脾肾禀虚泄泻不食或不时去後不实或乳母患此致儿为患

肉豆蔻【二两】 补骨脂【四两】 五味子【二两】 吴茱萸【一两】

右为末用水二碗生姜八两红枣一百枚煮熟取枣肉和末丸麻子大每服二三十丸空心食
前白汤下子母并服

香连丸 治赤白痢疾并水泻暑泻

黄连【净二十两】 吴茱萸【去梗十两】

右先将二味用热水拌和入磁器内置热汤中顿一日同炒至黄连紫黄色去茱萸用连为末每
末四两入木香末一两淡醋米饮为丸如麻子大每服四五十丸白滚汤下

五苓散 治霍乱吐泻躁渴饮水小便不利

泽泻【五钱】 猪苓 官桂 赤茯苓 白术【各三钱】

右为末每服一二钱白汤调下

薛按前症若津液偏渗於大肠大便泻而小便少者宜用此药分利若陰阳已分而小便短少
者此脾肺气虚而不能生水也宜用补中益气汤加麦门五味虚火上炎而小便赤少者此肺
气受伤而不能生水也用地黄丸加麦门五味

大黄丸 治风热便秘饮水

川芎【五钱】 甘草【炙二钱五分】 大黄【一钱酒洗蒸晒】 黑牵牛【五钱半生半炒】

右为末糊丸麻子大每服数丸温蜜水下

薛按前方乃内疏之峻剂审其因果属臟内实热方可用

白虎汤 治伤暑烦躁身热痰盛头痛口渴大渴知母【一两五钱】石膏【四两】白粳米【八钱】甘草【炙五钱】

右为末每服一二钱水煎

羌活散 治风邪所伤头目昏眩痰涎壅滞肢节烦疼羌活 前胡 麻黄 白茯苓 川芎 黄芩 甘草【炙】 蔓荆子 枳壳【麸炒】 细辛 石膏【另研】 菊花 防风【各一两】

右为末每服一二钱水煎

地骨皮散 治壮热作渴

地骨皮 茯苓 甘草 柴胡 半夏 人参 知母【各等分】

右为末每服一二钱水煎

大羌活汤

羌活 独活 防己 防风 黄芩 黄连 苍术 白术 甘草【炙】 川芎 细辛【各二钱】 知母 生地黄【各一钱】

右为末每服一二钱水煎热服

人参羌活散 治伤寒时气头疼发热

人参 羌活 独活 柴胡 前胡 桔梗 茯苓 枳壳【麸炒】 川芎 天麻【各二分】 地骨皮【二分】 甘草【炒一分】

右入薄荷三叶水煎

薛按前方乃解肌发表化痰利气之剂然元气虚者宜用清肺散

秘?清肺散 治感冒发热鼻流清涕或咳 吐痰轻者勿药自愈重者用此轻和之剂

橘红 半夏【炮】 桔梗【炒】 川芎【各五分】 白茯苓【七分】 甘草【炙】 防风【各四分】 薄荷 白术【一钱】 桑白皮【蜜炙各七分】 枯黄芩【炒各三分】

右每服二三钱姜水煎

薛按前症若风邪退而痰热不止但健中气则痰自化而病自愈若专用化痰利气则中气愈虚痰热愈甚矣

败毒散 治伤风时气寒热咳

人参 茯苓 甘草【炒】 前胡 川芎 羌活 独活 桔梗 柴胡 枳壳【麸炒各等分】

右为末每服一二钱生姜薄荷水煎

薛按秘?云小儿虽有感冒伤风鼻塞流涕发热咳 以降痰为主略加微解凡散利败毒非幼稚所宜或冒轻者不必用药候一二日自愈窃谓前症若手足冷或腹胀脾虚也用六君子汤加柴胡升麻若腹胀或气喘肺虚也用四君子汤加柴胡升麻盖肺虚则凑理不密外邪易感发表之後其邪既去即补脾肺以实其表庶无变症矣

百部丸 治肺寒壅 微喘

百部【炒】 麻黄【各三分】 杏仁【四十个微炒水煮】

右为末用蜜丸皂子大每服一二丸姜汤化下

麻黄汤 治伤风发热无汗咳 喘急

麻黄【去节三钱水煮去沫漉出晒乾】 肉桂【二钱】 甘草【炙一钱】 杏仁【七个去皮尖麸炒黄研膏】

每服一钱水煎服以汗出为度自汗者不宜服薛按前方乃发表出汗之剂审其寒邪在表宜用若邪既去宜补脾肺以实其表庶风邪不能再入往往表散之後热 不退复行发表多变坏症

地黄清肺饮 治肺疴咳 痰唾稠粘

阿胶【一钱面炒】 马兜铃

甘草【炙各五分】 鼠粘子【二分炒】 杏仁【七枚去皮尖】 糯米【十粒炒】

右每服一钱水煎

葶苈丸 治伤风咳 面赤身热痰盛喘促

黑牵牛【炒】杏仁【炒黄研膏】汉防己【各一两】甜葶苈【隔纸略炒】

右为末入杏膏蒸枣肉捣丸麻子大每服十丸姜汤下

薛按前方行气导湿之峻剂若脾肺虚热而致诸症者当调补中气为主若果系前症宜用惺惺散参苏饮清肺丸茯苓半夏汤选用之

惺惺散 治伤寒时气风热痰壅咳

桔梗 细辛 人参 甘草【炙】白茯苓 白术【炒】瓜蒌根【各等分】

右为末每服二钱入薄荷五叶水煎

参苏饮 治感冒风寒或腹胀少食泄泻呕吐或手足并冷喘促痰涎

人参 紫苏 陈皮 半夏 茯苓 枳壳【麸炒】桔梗【炒】前胡 乾葛 甘草【炒各五分】木香【三分】

右为末每服一二钱水煎

茯苓半夏汤 治胃气虚弱痰涎恶心或饮食不化呕吐发搐或睡卧不宁口流痰涎或乳母脾胃虚弱饮食不节以致儿患前症亦宜用此药主之

白术【炒】茯苓 半夏 神麴【炒各一钱】大麦【炒五钱】陈皮天麻【各三钱】

右每服一二钱水煎

甘桔散 治咳吐热涎咽喉不利

甘草【炒二两】桔梗【一两米泔浸焙】

右为末每服二钱入炮阿胶半斤水煎服

薛按前症若风热蕴於肺而咳脓血用桔梗汤若心火克於肺而吐痰涎用人参平肺散

桔梗汤 治咳 吐脓痰中有血已成肺痛症

桔梗【炒】贝母 当归【酒浸】瓜蒌仁 枳壳【麸炒】薏苡仁 桑白皮【炒】百合【蒸各一钱五分】五味子【炒】甜葶苈【炒】地

骨皮 知母【炒】 甘草节 防己 黄芩【炒】 杏仁【各五分】

右每服一二钱水煎

人参平肺散 治心火剋肺咳 喘呕痰涎壅盛胸膈痞满

人参 橘红 甘草【炙】 地骨皮【各五分】 茯苓 知母【炒各七分】 五味子【炒】 青皮 天门冬【各四分】 桑白皮【炒一钱】

右每服一二钱水煎

小柴胡汤 治伤寒温热患身热恶风头痛项强四肢烦疼寒热往来呕哕痰实及治中暑病症

柴胡【八钱】 半夏【汤炮】 黄芩 人参【各三钱】 甘草【炙二钱】

右每服一二钱姜枣水煎

加味小柴胡汤

治乳母肝火发热等症致儿为患即小柴胡加山梔牡丹皮水煎子母并服以下仿此

加味逍遥散 治乳母肝脾气血虚弱发热致儿为患当归 白术 茯苓 芍药【炒黄各一钱】 柴胡 牡丹皮 山梔【炒】 甘草【炒各五分】

右水煎服

柴术参苓汤 治肝火血热遍身瘙痒或起赤晕或筋挛结核

白术【炒】 人参 茯苓【各一钱】 柴胡 川芎 山梔 芍药【炒】 甘草【炒五分】 熟地黄【自制】 当归【各八分】

右水煎服

芍药参苓散 治肝木剋脾土目割面青食少体倦芍药【炒】 人参 茯苓 白术 陈皮【各七分】 柴胡 山梔【炒】 甘草【炒各五分】

右姜水煎

梔子清肝散 治三焦或足少阳惊风热耳内作痒生疮或出水疼痛

柴胡 梔子【炒】 丹皮【各一钱】 茯苓 川芎 芍药 当归 牛蒡子【炒各七分】 甘草

右水煎服

龙胆泻肝汤 治肝经湿热或囊痈便毒小便澀滞车前子【炒】 木通 当归尾 泽泻【各三分】 甘草 黄芩 生地黄 山梔 龙胆草【酒炒五分】

右水煎服

茵陈汤 治身热鼻乾汗出二便赤澀湿热发黄

茵陈【六钱】 梔子【二个】 大黄【二钱】

右每服一钱水煎

大连翘饮 治积热大小便不利或痘後余毒肢体患疮或丹瘤游走不止

连翘 麦 荆芥 木通 赤芍药 当归 防风 柴胡 滑石 蝉退 甘草【各一钱】 山梔【炒】 黄芩【炒各五分】

右每服一二钱水煎

清凉散 治消中能食体瘦口乾自汗大便结燥小便频数

羌活 柴胡 炙甘草 知母【酒制】 黄芪 黄芩【酒制各一钱】 生甘草 防己 生地黄【酒制】 防风【各五分】 当归【六分】 红花【少许】 桃仁【五个】 杏仁 升麻【四分】 石膏 黄柏 龙胆草【各一钱五分】

右每服一二钱水煎入酒少许服

四顺清凉饮

治臟腑有热颊赤作渴四肢惊掣大便秘澀或风热结核头面生疮目赤咽痛一切有余之症

赤芍药 当归 甘草 大黄【各等分】

右每服一钱水煎

黄连香薷饮

香薷【四两】厚朴【二两】黄连【一两】

右每服一二钱将朴连同生姜炒令紫色入香薷水酒各一钱煎冷服

金匱加减肾气丸 治脾肾虚腰重脚肿小便不利或肚腹肿胀四肢浮肿或喘急痰盛已成蛊者此症多因脾胃虚弱治失其宜元气复伤而变者非此药不救

白茯苓【三两】附子【炮五钱】川牛膝 肉桂 泽泻 车前子 山茱萸 山药 牡丹皮【各一两】熟地黄【四两搥碎酒拌杵膏】

右为末和地黄膏加炼蜜杵丸桐子大每服一二十丸空心米汤下

五色丸 治五癰

朱砂 真珠【各五钱】水银?黄【各一两】黑铅【三两同水银结成砂】

右为末炼蜜丸麻子大每服三四丸煎金银薄荷汤下

愚按前症有因惊因风因食之不同虽痰迷心窍然当补脾气为主

断癰丹 治癰差後变症不止

黄芪【蜜炙】鈎藤鈎 细辛

甘草【炙各五钱】蛇退【三寸酒炙】蝉蜕【去土四个】牛黄【一字另研】

右为末煮枣肉为丸麻子大每服五七丸人参煎汤下

宣风散 治惊风

槟榔【二个】陈皮 甘草【各五钱】牵牛【四两半生半炒】

右为末每服三五分蜜汤调下

愚按肝气为阳为火肝血为陰为水故肝气热则生风风热搏则惊搐而肝血必损也然有余当认为不足若屡服利惊宣风之剂未免亏损脾胃以成慢惊矣慎之

褊银丸 治风涎膈热及乳食不消腹胀喘促

巴豆

水银【各五钱】麝香【五分另研】黑铅【二钱半水银煎】京墨【八钱火烧醋淬研】

右为末陈米粥丸菉豆大每服二三丸煎薄荷汤下愚按前方治癫痫惊搐消积下痰之药也其用牵牛巴豆等盖以痰饮癖积结聚坚固非此不能除故洁古先生云为斩关夺旗之将形病俱实者用之诚有回生起死之功必须详审不可轻率

牛黄丸 治惊热消积疳

雄黄【研水飞】牵牛【各一钱】天竺黄【二钱】

右为末面糊丸粟米大每服五七丸薄荷水下

紫霜丸 治惊积

代赭石【二钱水飞】杏仁【廿一个去皮尖】巴豆【二十一粒去皮心膜】

右为末饭丸粟米大每服五七丸煎皂角仁汤下

利惊丸 治急惊

天竺黄【二钱】轻粉 青黛【各一钱】黑牵牛【炒五钱】

右为末炼蜜丸豌豆大每岁一丸薄荷水化下

白饼子 治腹中有癖但饮乳 而吐痰涎

滑石 轻粉 半夏【汤浸焙】南星【各一钱】巴豆【二十四粒去皮膜水煮另研】

右为末糯米饭丸菉豆大捻作饼每服二三饼煎?白汤下

薛按前四方乃斩关夺门起死回生之重剂也必审形病俱实方可施之恐至失手命在反掌经云邪之所凑其气必虚留而不去其病乃实实者病气实而形气则虚也东垣先生云形病俱实者当泻不当补形病俱虚者当补不当泻治者审焉

凉惊丸 治惊疳

龙胆草【炒焦】防风

青黛【各三钱】钩藤钩【二钱】黄连【炒钱二分】龙脑【一钱】牛黄
麝香【各二分】

右为末面糊丸粟米大每服十丸煎金银花汤下薛按前丸心肝二经清热祛风化痰散气之寒剂盖痞者津液乾涸之症不宜多服恐伤胃气无以滋肾水生肝血也

羌活膏 治脾虚肝热热盛生风或吐泻或误药变为慢惊之症

羌活 川芎 人参 白附子【炮各五钱】 赤茯苓【五钱】 天麻【一两】 白僵蚕【酒炒】 白花蛇【酒浸焙乾】 乾蝎【炒去毒】 雄黄 辰砂【另研各一分】 附子【炮】 防风 麻黄【去节】 肉豆蔻 鸡舌香 藿香叶 沉香 木香【各二钱】 轻粉 珍珠牛黄【各钱五分】 龙脑【二分】 麝香【一钱各另研】

右为末炼蜜丸豆大每服一二丸薄荷汤化下薛按前方药味杂乱果脾气虚而成慢惊者当审用之恐发散真气重损阴血故也

抱龙丸 治伤风温疫身热昏睡风热痰实壅 又治惊风潮搐及蛊毒中暑

雄黄【二钱五分】 辰砂【五钱另研】 天竺黄【一两】 牛胆南星【四两】 麝香【五分另研】

右为末甘草汤丸皂子大每服一丸白汤化下薛按前丸化痰祛邪清热之功居多属肝心实热而致者用之殊效若脾肺虚弱而见昏睡痰嗽当用实监天麻散以调补元气

小续命汤治中风不省人事涎鸣失音肢体反张或时厥冷

麻黄【去节】 人参 黄芩

川芎 芍药 甘草【炒】

杏仁【去皮尖研】 汉防己 官桂【各五钱】

防风【七钱五分】 附子【炮去皮脐二钱】

右各另为末和匀每服一钱姜枣水煎有热减桂附

宝监天麻散 治急惊脾胃虚弱或变慢惊者

半夏【七钱】 天麻【二钱五分】 甘草【炙】

白茯苓 白术【各二钱】

右入生姜三钱磁器内水煮候乾为末每服一钱五分姜枣汤调下

钓藤钩饮 治吐利脾胃亏损虚风慢惊

钓藤钩【三分】蝉壳 防风【炒】人参 麻黄 白僵蚕【炒】天麻
蝎尾【去毒炒各五钱】甘草【炙】川芎【各二钱五分】麝香【一钱另研】

右为末每服一二钱水煎

薛按慢惊之症属脾胃亏损所致前方乃辛温散表之药而无调补之功须审用之

大青膏 治伤风吐泻身温凉热

天麻 青黛【各一钱】白附子
乾蝎【去毒】朱砂【五分】天竺黄【二钱】麝香【二分】乌梢蛇【肉酒浸焙】

右为末生蜜和膏每服一豆粒许月中儿用半粒薄荷汤化服

愚按大青膏乃表散之剂也必外邪蕴结於肺而肺气之未损者乃可施之况前症属脾肺气虚而邪之所凑必以固脾胃为主否则虚虚之祸恐不能免矣

温白丸 治泻泄瘦弱冷疳洞利及久病而成慢惊天麻【五钱】白僵蚕【炮】白附子
乾蝎【去毒】天南星【汤炮焙各二钱五分】

右为末面糊丸菉豆大每服十丸米饮下

愚按前症属脾气虚寒无阳之症无风可散无痰可逐当兼用六君子汤十二味异功散木香散

参芪四圣散 治痘疮已出至六七日不起发不成脓人参 黄芪【炒】白术【炒】茯苓
当归 芍药【炒】川芎【各五分】紫草 木通 防风【各三分】糯米【一百粒】

右作二剂水煎服

陈氏木香散

木香 大腹皮 人参 桂心 赤茯苓 青皮 前胡 诃梨勒 半夏【姜制】丁香
甘草【炙各等分】

右每服二三钱姜水煎

薛按前方若豆疮已出未愈之间其疮不光泽不起发不红活五七日内泄泻作渴或肚腹作胀气促作喘或身虽热而腹胀足指冷或身热作渴或惊悸腹胀或汗出不止或寒?咬牙疮不结痂此皆脾胃虚寒津液衰少急用此药治之若误认为实热用寒凉之药及饮蜜水生冷瓜果之类必不治

十二味异功散

木香【二钱半】官桂【二钱】当归【三钱半】茯苓白术【各二钱】人参 陈皮
厚朴【姜制】半夏【姜制】丁香【各二钱半】肉豆蔻【二钱半】附子【炮一钱半】

右每服二三钱姜枣水煎

薛按前方若痘疮不光泽不起发不红活不结靨谓之表里俱虚宜用此药治之若闷乱烦渴吐泻不食腹痛腹胀痰喘气急谓之表里虚寒急用此药送豆蔻丸或十日至十一日当靨不靨烦渴咬牙手足并冷饮沸汤而不知热此阳虚脱陷急用此汤救之亦有复生者

百祥丸 治痘疮黑陷及 而吐青绿水

红芽大戟【陰乾浆水煮软去骨复入元汁中煮】

右焙乾为末水丸粟米大每服十丸赤脂麻汤下薛按前方治痘疮黑陷耳骨冷咬牙吐泻者乃脾土虚败寒水反侮归肾之恶候也用百祥丸泻之急以四君子加丁香陈皮木香厚朴炮姜以温补脾土身热饮水黑陷复起十救一二盖此症因脾土虚败寒水乘侮陈文秀先生云若治寒水於既侮之後何不保脾土於未败之先此发前人之未发况前药必藉脾胃之气连及於肾而才泻之吾恐胃气先伤而莫能及然非钱公之明见不敢投非古昔之元气不敢用治者慎焉

牛李膏 治痘疮黑陷

牛李子

右杵汁石器内熬膏每服皂子大煎杏胶汤化下

雄黄散 治痘後牙龈生疳蚀疮

雄黄【一钱】铜绿【二钱】

右同研细量疮大小乾糝其上

化毒丹 治胎毒及痘後头面生疮眼目肿痛

生地黄 熟地黄 天门冬 麦门冬 玄参【各三两】 甘草
甜硝【各二两】 青黛【一两五钱】

右为末炼蜜丸芡 大每服一丸白汤化下

薛按前方生血凉血解毒寒中之剂用之得宜殊有良验

括萎汤 治慢惊

括萎根【二钱】 白甘遂【一钱】

右慢火炒黄为末每服二三分煎薄荷麝香汤下薛按徐用诚云钱氏治慢惊用括萎汤恐传写误耳盖惊主风木甲木属阳病急易治乙木属陰病缓难治况小儿五臟之气未实神气未完而自病慢惊之症非病後及吐泻脾胃虚损而得者慎勿用此峻厉之剂

温惊丸 治慢惊风症

朱砂【一钱五分】 天竺黄【五钱】 龙脑【一钱】 紫朮脂【一钱】 牛胆南星【四两】

右各另为末用黄牛胆汁丸芡 大每服半丸砂糖汤化下

薛按慢惊属脾胃无阳肝木所胜之寒症故用温惊丸以温之但所用之药乃辛散阳气祛逐痰涎治者审之

人参理中丸 治中气虚热

人参 白朮【炒】 甘草【炙各等分】

右为末姜汁糊丸菉豆大每服二三十丸白汤下

调中丸 治脾胃虚寒

白朮 人参 甘草【炒各五钱】 乾姜【四钱炮】

右为末用蜜丸菉豆大每服二三十丸白汤下薛按前二方本经自病之药即人参理中丸也

若肾水侮土而虚寒者当加半夏茯苓陈皮或呕吐更加藿香泄泻加木香

张氏温脾散 治脾胃亏损腹脇虚胀乳食不进困倦无力

诃子肉 人参【各七钱】白术 木香 桔梗 茯苓藿香 陈皮
黄芪【各五钱】甘草【炙二钱半】

右每服二三钱姜枣水煎

薛按前方治脾肺虚弱之症若肺病已去前症未已但用六君子汤以调补脾胃

归脾汤 治乳母脾经气郁致儿为患

人参 白术 茯神 黄芪 龙眼肉【各二钱】远志【一钱】酸枣仁 木香 甘草【炙三分】

右姜枣水煎服加柴胡山梔名加味归脾汤

越鞠丸 治乳母六郁传儿为患或胸满吐酸齿痛疮疥等症

苍术 神麴【炒】 香附子 山楂 山梔【炒】 抚芎麦芽【炒各等分】

右为末水调神麴糊丸桐子大每服二三十丸白滚汤下子母并服

清心丸 治惊热烦躁

人参 茯神 防风 朱砂 柴胡【各二钱】金箔【三十片】

右为末炼蜜丸桐子大每服一二丸竹沥调下

安神丸 治邪热惊啼心肝壮面黄颊赤

牙硝 白茯苓 乾山药

麦门冬【去心焙】 寒水石甘草【各五钱】朱砂【一两】龙脑【二分半】

右为末炼蜜丸芡 大每服半丸砂糖水化下薛按前方降火化痰辛散寒凉之剂不宜过服恐反伤脾胃也若睡中惊悸不安宜用秘?安神丸若因乳母脾气郁热致儿为患者宜用加味逍遥散若因乳母怒气肝经发热致儿为患者宜用加味小柴胡汤若因乳母饮酒胃经发热致儿为患者宜用葛花解醒汤

右为末每服二钱姜枣水煎

六神散 治面青啼哭口出气冷或泄泻不乳

人参 山药 白术【各五钱】 甘草【二钱】 白茯苓 扁豆【各一两炒】

右为末每服一钱姜枣水煎

当归散 治夜啼不乳

当归 白芍药 人参【各二钱半】 甘草【炙一钱二分】 桔梗 陈皮【各一钱】

右为末每服一二钱水煎灌之

蝉蜕钩藤散 治肚疼惊啼

钩藤 天麻 茯苓 川芎 白芍【各一钱】

右每服一钱灯心水煎

羚羊角丸 治行迟

羚羊角【镑】 生地黄【焙】 酸枣仁 虎胫骨【醋炙黄】 白茯苓【各五钱】 肉桂 防风 当归 黄芪【各钱】

右为末炼蜜成剂每服一皂子大白汤化下

葛花解醒汤 治乳母酒後乳儿遗热为患

白豆蔻 砂仁 葛花【各五钱】 乾生姜 白术 泽泻 神麴【炒各二钱】 白茯苓 陈皮 人参 猪苓【各一钱半】 木香【五分】 青皮【三钱】

右为末每服二钱白汤调服

薛按前汤气味辛散不得已而用之耳盖酒病服之虽效频服则陰损元气折人长命可不慎哉

花大膏 治夜啼

灯花【一颗】

右涂乳上令儿吮之

薛按前症有因停乳腹痛者有因陰盛发躁者有因寒盛腹痛者有因乳母鬱闷怒气传儿者有因乳母停滞传儿者治法说见本论

鈎藤饮 治夜啼

鈎藤鈎【二半】 茯神 茯苓 川芎 木香 当归【各一钱】 甘草【五分】

菖蒲丸 治心气不足不能言语

人参【五钱】 丹参【二钱】 石菖蒲
赤石脂【各三钱】 天门冬 麦门冬【各去心一两焙】

右为末蜜丸菉豆大每服十丸若病後肾虚不语宜服地黄丸

止汗散 治睡而自汗

故蒲扇【烧】

右为末每服三钱温酒调下

香瓜丸 治遍身汗出

胡黄连 川大黄【煨】 柴胡 鼈甲【醋炙黄】 黄柏 黄连 芦荟 青皮【各三分】

右为末将黄瓜一个去穰纳药煨熟杵和面糊丸菉豆大每服三五丸新水下

薛按自汗属阳虚盗汗属陰虚若心经血虚用团参汤肾经虚热用地黄丸血气虚用人参养荣汤之类胃气虚用六君子汤或用一味白术炒为末以浮麦炒浓煎汤调服

当归六黄汤 治血气不足虚火内动盗汗不止当归 熟地黄
黄芪【炒】 黄柏【已下俱炒黑】 黄芩 黄连 生地黄【各等分】

右每服二钱水煎

团参汤 治心血虚热自汗盗汗

人参 当归【各等分】

右用猪心一片每服三钱水煎服

芪附汤 治禀赋气虚阳弱自汗不止肢体倦怠或大病後阳气亏损并急服之多有生者

黄芪【蜜炙】 附子【炮等分】

右每服一钱姜水煎

参附汤 治禀赋不足上气喘急自汗盗汗或病久阳气脱陷急宜服之

人参【一钱】 附子【炮一两】

右每服一钱姜水煎

人参养荣汤 治脾肺俱虚发热恶寒肢体瘦倦食少作泻或久病虚损口乾食少欬而下痢惊热自汗白芍【一钱五分】 人参 陈皮 黄芪【蜜炙】 桂心
当归 白术【炒】 甘草【炙各一钱】 熟地黄 五味子【杵炒各七分】 远志【五分】

右每服二三钱姜枣水煎

玉露散 治伤热吐泻黄色

石膏【煨】 寒水石【各五钱】 甘草【二钱五分】

右为末每服五分白汤调下

薛按前症若饮食如常作渴饮冷属胃经实热宜用此药若食少体倦或善噫泻黄此脾虚色陷也宜用六君子加柴胡升麻若泻而变青更兼腹胀或善怒此脾虚肝所乘也宜用前汤更加木香

木瓜丸 治生下吐

木瓜 麝香 膩粉 木香 槟榔【各等分】

右为末面糊丸黍米大每服一二丸甘草汤化下薛按前症多因妊娠胃经有热或鬱痰所致当审其母而兼治之

涂顙法

麝香 牛黄 青黛【各二分半】 蝎尾【去毒一分半】 薄荷【二分】

右为末生枣肉杵膏涂帛上贴顙中以手烘热频熨之

薛按前法辛凉发散开窍祛风之剂当审用之余每以葱头三五茎细切搗烂摊纸上以两掌护热贴顙门良久其邪即解诸病自退乃去其葱却以段帛寸余涂糊仍贴顙门护之春夏常用绢帛秋冬用紵丝以护贴之永无伤风之患亦因有母病致儿发搐者治验见前

浴体法 治胎肥胎热胎怯

麝香【二半分】 天麻【二钱】 白?
乌蛇肉【酒浸焙】 青黛【各三钱】 蝎尾【去毒】 朱砂【各五分】

右为末桃枝一握水煎浴之勿浴背

薛按前法乃开发腠理疏泄阳气若小儿所禀虚怯或妊母所致各说见本论

神效当归膏 治跌扑汤火等疮不问已溃未溃

当归 黄蜡 生地【各一两】 麻油【六两】

右先将当归地黄入油煎黑去渣入蜡熔化候冷搅匀即成膏矣

砭法 治丹毒赤色游走不定以口吮毒聚在一处用细磁器擊碎取有锋芒者一块以筋劈开头尖夹之用线缚定两指轻撮筋稍令磁?正对聚处悬寸许再用筋一根频擊筋头令毒血遇刺皆出毒入腹者不救症轻者止用口吮出毒用药敷之如患在头额不用砭法止宜用卧针倒挑患处以出毒血其赤自退

制附子法

取附子重一两三四钱有莲花瓣头圆底平者先备童便五六碗将附子放在竈上烟柜中良久乘热投入童便浸五七日候润透揭去皮切四块仍浸二三日用粗纸数层包之浸湿埋灰火半日取出切片检视有白星者仍用瓦上炙熟至无白星为度如急用切作大片用童便煮二三沸热瓦焙熟即可用

薛氏医案卷五十三

卷五十四

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷五十四

明 薛己 订

保婴撮要一

初诞法

小儿在胎禀阴阳五行之气以生脏腑百骸藉胎液以滋养受气既足自然生育分娩之时口含血块啼声一出随即咽下而毒伏於命门遇天行时气久热或饮食停滞或外感风寒惊风发热等因发为疮疹须急於未啼时用软帛裹指挖去其血用黄连豆?朱蜜甘草解之後虽出痘亦轻矣有咽入即时腹胀呕吐短气不乳者用茯苓丸治之但黄连性寒若禀母气膏粱积热者宜服若滋味淡薄胎气元弱者又不宜用其朱砂固能解毒恐金石鎮坠不若只以牛黄分许蜜调与吮为佳世多用犀角解毒丸其胎气虚寒虚弱者反伤脾胃生气甚致不育又有婴儿因其难产或冒风寒而垂危者切不可便断脐带急烘绵絮抱抱怀中急以胎衣置火中煨烧更用大纸捻於脐带上往来燎之使暖气入腹须臾气复自苏尤戒洗浴恐腠理不密元气发泄而外邪乘之也

黄连法临月用黄连细切为末绵裹百沸汤拭口甘草法预以甘草细切少许临产时以绵裹沸汤泡盏内覆温收生之际以软绵裹指蘸甘草汁拭其口次用黄连法朱蜜法

朱蜜法用黄连细切沸汤泡良久泸净拭儿口中吐去恶汁更与朱砂一大豆许细研以蜜一蚬壳抹儿口服之非独鎮心定魄安神解毒更能益肝胆除烦热辟邪气也

又牛黄法与朱蜜同少加牛黄能益肝胆除热定精神止惊邪辟恶气除小儿百病

茯苓丸

赤茯苓 黄连【胎冷易芍药】 枳壳【炒各等分】

右为末炼蜜丸桐子大每服一丸乳汁化下

护养法

巢氏云小儿初生肌肤未实宜用旧絮护其背不可太煖更宜数见风日则血气刚强肌肉致密若藏於重帟密室或厚衣过煖则筋骨软脆不任风寒多易致病衣服当随寒热加减但令背煖为佳亦勿令出汗恐表虚风邪易伤乳哺亦不宜过饱若宿滞不化用消乳丸治之陈氏所谓忍三分寒吃七分饱频揉肚少洗澡要肚煖头凉心胷凉皆至论也须令乳母预慎七情六淫厚味炙煖则乳汁清宁儿不致疾否则陰阳偏胜血气沸腾乳汁败坏必生诸症若屡用药餌则脏腑陰损多变败症可不慎欵大抵保婴之法未病则调治乳母既病则审治婴儿亦必兼治其母为善

消乳丸

缩砂仁 陈皮 京三棱【煨】 蓬术【煨】 神麴 麦芽【各半两】 香附子【炒一两】

右为末面糊丸麻子大每服二三丸白汤下

噤风撮口脐风

小儿初生噤风者因胎中受热毒流心脾生下复为风邪所抟致眼闭口噤啼声不出舌上如粟口吐白沫在百日内见撮口者因胎热兼风自脐入於心脾致面目黄赤气息喘急啼声不出舌强唇青聚口撮面腹胀青筋吊肠牵痛吐白沫者不救法当疏利脐风者因断脐之後为水湿风邪入於心脾致腹胀脐肿四肢柔直啼不吮乳甚者发搐先用龙胆汤天麻丸之类以去痰涎後用益脾散之类补脾胃若脐边青黑手拳口噤是为内搐不治受病之源皆因乳母七情气郁厚味积热所致若爪甲黑伸引努力脐突者用大连翘饮子之类又断脐不盈尺多患此者以旧绵烧灰掺之齿龈有泡如粟以绵裹指蘸温水擦破口即开不用药七日内患者百无一生古人治法大率如此又田氏治噤风用天南星末一钱片脑少许以指蘸姜汁擦龈立开丹溪用赤足蜈蚣去足炙为末以猪乳调五分徐徐灌之或用牛黄以竹沥调服一字随以猪乳滴於口中圣惠方用郁金藜芦瓜蒂为末水调搐鼻中钱氏云撮口因浴後拭脐风邪所入而作用益黄散补之无择云视其齿龈有泡擦破口即开用真白僵蚕为末蜜调涂口内保婴集云小儿百日脐风马牙当作胎毒泻足阳明火用针挑破以桑树白汁涂之又云初生小儿时时宜傅桑汁不然多有舌硬撮口之症窃谓脐风果因浴拭外伤皮肤者用绵灰或枯矾擦抹之即愈若因乳母肝脾郁怒致儿为患当治其母若因剪脐短少或因束缚不紧或因牵动风入脐中或因铁器断脐冷气传於脾络以致前症者口内有小泡急掐破去其毒水以艾灸脐中亦有生者

千金龙胆汤 治月内脐风撮口四肢惊掣发热吐乳及变蒸客忤鬼气惊癇加人参当归

龙胆草【炒黑】 鈎藤鈎 柴胡 黄芩【炒】 桔梗 甘草 芍药【炒】 茯苓
大黄【煨各二钱五分】 蜣螂【二枚去翅足】

右为末每服一二钱水煎量儿加减

天麻丸 治钓肠锁肚撮口

天南星【炮二钱】白附子 牙硝 天麻
五灵脂全蝎【焙各一钱】巴豆霜【一字】轻粉【半钱】

右为末每服一字薄荷汤调下

定命丹 治天钓撮口通利痰热

全蝎【七枚】天麻
南星【炮各二钱半】朱砂【钱半】白附子【二钱半】青黛【一钱五分】轻粉
麝香【各五分】片脑【一字】

右为末米糊丸菉豆大每服一丸荆芥薄荷汤下先研半丸吹入鼻中

朱银丸 治胎风壮热痰盛翻眼口噤或胎中蕴毒水银【和枣肉研】全蝎 南星
朱砂【各一钱】白附子【钱半】牛黄 芦荟【各三分】铅霜【半钱和水银研】片脑【
一字】麝香【五分】真僵蚕【炒七个】

右为末米糊丸芥子大每服三丸薄荷汤下

紫霜丸 治变蒸发热不解或食痢先寒後热或乳哺失节宿滞不化腹痞呕吐或大便酸臭

代赭石【煅用醋淬七次】赤石脂【各一两】杏仁【五十个面炒】巴豆仁【三十枚去
膜油心】

右先将杏仁巴豆研成膏入代赭石脂末研匀汤浸蒸饼丸粟米大每服三五丸米饮送下

消食丸【方见黄疸】

控痰散 治风噤先用此药吐风涎次与益胃散和胃又与辰砂膏利惊握拳噤口者不治

蝎尾 铜青【各五分】朱砂【一钱】膩粉【一字】麝香【少许】

右为末每服一字茶清调下轻者勿用或以甘草汤吐之

甘草汤 治撮口

甘草【生一钱】

右水煎以绵球蘸吮令出痰涎却以猪乳点入口中即瘥

益脾散

白茯苓 人参 草果【煨】 木香【湿纸裹煨】 甘草
陈皮 厚朴【姜制】 紫苏子【炒各等分】

右为末每服一钱姜枣水煎

辰砂膏 治眼闭口噤啼声不出吮乳不得口吐白沫辰砂【三钱】 鹏砂【钱半】 马牙硝【钱半】 元明粉 全蝎 真珠【各一钱】 麝香【一分】

右为末每服一荳许诸惊薄荷汤下潮热甘草汤下月内用乳汁调涂ru头令吮之

葱号散 治初生小儿七日不食便

葱白【三四寸】 人乳

右同捣如泥傅儿口内即与吮乳

蚕号散 治初生儿七日不食名撮口

僵蚕【四个去嘴略炒】 茯苓【少许】

右为末蜜调傅儿口内

僵蚕膏 治撮口用真僵蚕二枚去嘴略炒为末蜜调擦口中

撮风散 治撮口

钩藤钩 朱砂 真僵蚕【焙】 赤脚蜈蚣【半条】 蝎稍【各一钱】 麝香【一字】

右为末每服一字竹沥调下

瓜蒂散 治脐风撮口

瓜蒂【七个】 赤小豆 秫米【各七粒】

右为末用一荳许吹两鼻内令出黄水更调服吐黄水即瘥

大连翘汤 治胎热脐风小便不通及诸般疮毒连翘?麦 荆芥 木通 赤芍药 当归 防风 柴胡 滑石 蝉壳 甘草【炒各一钱】山梔子黄芩【各五分】

右为末每服二钱加紫草水煎热甚加大黄更详症加减

安脐散

羚羊角【一钱略炒】乱发【一团烧令存性】蜈蚣【一寸赤脚者炙】

右为末断脐後即傅之以绵帕紧束恐犯风也

脉法

钱仲阳云小儿之脉气不和则弦急伤食则沉缓虚惊则促急风则浮冷则沉细脉乱者不治水镜诀云陰阳运合男女成形已分九窍四肢乃生五脏六腑部分既别逆顺难明若凭寸舌之浮沉必乃横亡於孩子须明虎口辨别三关消详用药始无差误未至三岁看虎口食指第一节名风关脉初见易治第二节名气关脉见病深难治第三节名命关脉见死不治三关青是四足惊赤是水惊黑是人惊紫色泻利黄色雷惊三关通度是极惊之症必死或青或红有纹如线一直者是乳食伤脾必发惊热左右一樣者是惊与积齐发有三条或散是肺生风痰或似麤?声有赤是伤寒及 如红火是泻红黑相兼主下痢青多白痢红多赤痢紫色相兼加渴虎口脉纹乱主胃气不和青是惊与积青黑发慢惊脉入掌乃内钩指纹曲里风感弯外食积此论三岁以上之法若三岁以下更用一指按高骨乃分三关定其息数呼吸八至为平脉九至不安十至危困浮主风沉迟主虚冷实主有热紧主癰瘤洪主热盛沉缓主虚泻微迟有积有虫迟瀯主胃脘不和沉主乳食难化沉细主乳食停滞紧弦主腹中热痛牢实主大便秘沉而数者骨中有热弦长是肝膈有风紧数乃惊风为患四肢掣颤浮洪乃胃口有热沉紧主腹痛有寒虚濡者有气又主慢惊乳主大便利血四岁以下用一指袞转寻三部以关为准七八岁移指少许九岁次第依三关部位寻取十一十二岁亦同十四十五岁依大方脉部位胛视凡看脉先定浮沉迟数陰阳冷热沉迟为陰浮数为阳更兼看部位青主惊风白主虚泻赤主痰热黑色病甚黄主脾疳以此相参察病治疗庶无误矣又全幼心监云小儿半岁之际有病当於额前眉端发际之间以名中食三指曲按之儿头在左举右手在右举左手食指为上中指为中名指为下三指俱热主感风邪鼻塞气粗发热咳 若三指俱冷主外感风寒内伤饮食发热吐泻若食中二指热主上热下冷名中二指热主夹惊之疾食指热主胸满食滯又当参辨脉形主之流珠形主饮食所伤内热欲吐或肠鸣自利烦躁啼哭用助味膏消饮食分陰阳若食消而病仍作用香砂助胃膏以补脾胃 环珠形主脾虚停食胸膈胀满烦渴发热用五味异功散加山查枳实健脾消食後用六君子汤调养中气

长珠形主脾伤饮食积滯肚腹作痛寒热不食先用大安丸消其疾滯次以异功散健其脾气来蛇形主脾胃虚热中脘不利乾呕不食此疳邪内作先用四味肥儿丸治疳後用四君子汤

补脾 去蛇形主脾虚食积吐泻烦渴气短喘急不食困睡先用六君子汤加枳实健脾消积次以七味白术散调补胃气 弓反里形主感冒寒邪哽气出气惊悸倦怠四肢稍冷小便赤色咳吐涎先用惺惺散助胃气祛外邪後以五味异功散加茯神当归养心血助胃气若外邪既解而惊悸指冷脾气受伤也宜用七味白术散补之若闷乱气粗喘促哽气者难治脾虚甚故也 弓反外形主痰热心神恍惚夹惊夹食风痼痰盛先以天麻防风丸祛外邪又用五味异功散调中气 枪形主风热生痰发搐先用抱龙丸如未应用牛黄清心丸若传於脾肺或过用风痰之药而见一切诸症者专调补脾胃 鱼骨形主惊痰发热先用抱龙丸治之如未应属肝

火实热少用抑青丸以清肝随用六味丸以补肝或发热少食或痰盛发搐乃肝木尅脾土用六君子汤加柴胡补脾土以制肝木 水字形主惊风食积胸膈烦燥顿闷少食或夜啼痰盛口噤搐搦此脾胃虚弱饮食积滞而木尅土也先用大安丸消导饮食次以六君钩藤钩补中清肝若已服消食化痰等剂而病不愈者用四君升麻柴胡钩藤钩升补脾气平制肝木 针形主心肝热极生风惊悸顿闷困倦不食痰盛搐搦先用抱龙丸祛风化痰次用六君子加钩藤钩平肝实脾 透关射指形主惊风痰热聚於胃膈乃脾肝亏损痰邪乘聚先用牛黄清心丸清脾肺化痰涎次用六君子汤加桔梗山药补脾土益肺金 透关射甲形主惊风肝木克制脾土之败症急用六君木香钩藤钩官桂温补脾土未应即加附子以回阳气多得生者尝闻古人云小儿为芽儿如草之芽水之沤盖因脏腑脆嫩口不能言最难投剂当首察面色而知其所属次验虎口以辨其所因实为治法之简要也

[子部,医家类,薛氏医案,卷五十四]

[子部,医家类,薛氏医案,卷五十四]

流珠只一点红色环珠差大长珠圆长已上非谓圈子总皆红脉贯气之如此来蛇即是长珠散一头大一头尖去蛇亦如此分上下朝故曰来去角弓反张向里为顺向外为逆枪形直上鱼骨分开水字即三脉并行针形即过关一二粒米许射甲命脉向外透指命脉曲里虽然余尝治之亦有不专执其形脉而投剂者盖但有是症即服是药而亦多验

治验

一小儿发热吐泻腹胀不乳其纹如流珠此脾胃气伤先用香砂助胃膏後用六君子汤全愈

一小儿寒热作呕饮食不入按其腹乃哭脉纹如长珠此饮食停滞也用大安丸吐泻宿滞遂安但唇目抽动大便稀黄此病邪去而虚热所迫也用六君子汤加钩藤而愈

一小儿胃腹膨胀发热顿闷脉纹如环珠以手按腹即哭此属脾胃虚而饮食停滞也先用保和丸一服前症如失更加烦渴按其腹而不哭此宿食去而脾胃复伤也用五味异功散加柴胡治之顿瘳

一小儿不时乾呕乳食不进肚腹膨胀脉形如来蛇此脾胃虚而成疳也用四味肥儿丸治疳佐以四君加芩蒺健中而痊後伤饮食吐泻完谷形气甚困四肢微搐视其纹如去蛇余曰且勿用药次日吐止但搐而泻青黄此脾土虚而肝木胜也用六君子加鈎藤鈎而痊

一小儿未及周岁气短喘急乳食少进时或吐乳视其形如去蛇乃脾伤而食积先用六君子加山查枳实渐愈後乳食复伤吐泻作渴先与胃苓膏继与白术散而愈

一小儿睡卧惊悸发热痰盛脉形如弓之向外此因惊木旺伤脾而食不消也先以天麻防风丸祛风定惊後用五味异功散壮脾止搐全痊

一小儿沉默昏倦肢冷惊悸其纹如弓之向里此属胃气虚而外感寒邪也先用惺惺散以解外邪调胃气诸症顿愈但手足逆冷又用六君子汤调补元气而安

一小儿患咳 服牛黄清心丸加喘促腹胀余视其右脸色赤纹指如枪属脾气复伤用六君子汤顿安一小儿沉困发热惊搐不乳视其脉纹如乱鱼骨此风热急惊之症也先用抱龙丸少许祛风化痰後用六君子汤加柴胡壮脾平肝而愈

一小儿咳 发热右脸赤色作渴烦闷倦怠少食肚腹作胀脉纹如针此风邪伤肺而饮食伤脾也先用六君子汤加桔梗杏仁柴胡一剂诸症少愈後去杏仁柴胡再剂而安

一小儿发热夜啼乳食不进昏迷抽搐痰盛口噤脉纹如水字此脾肺气虚风木所乘痰食积於胃腹也先用大安丸後用六君子加鈎藤鈎而愈

一小儿发热右脸赤咳 痰盛其脉纹透关射指余以为风邪蘊结於肺而痰作也用二陈加桑皮杏仁桔梗治之自用发散降火之剂风痰不退发热益甚余曰此脾肺气虚治失其宜遂用五味异功散加炒桔梗渐愈又用六君子汤而痊

一小儿停食发热服芩连三棱厚朴等剂饮食日少胃腹膨胀其纹透至指甲用补中益气汤加木香鈎藤鈎温补脾气平制肝木数剂渐效又用六君子汤加炮姜治之而安其间泛用金石脑麝祛逐之剂变惊而歿者不能枚举惜哉

香砂助胃膏【方见热吐】

五味异功散【方见内钩】

六君子汤【方见内钩】

太安丸【方见虚羸】

四味肥儿丸【方见呕吐】

四君子汤【方见内钩】

七味白术散【方见腹痛】

惺惺散【方见咳 】

天麻防风丸【方见咳 】

抱龙丸【方见伤寒】

牛黄清心丸【方见急惊】

抑青丸【方见惊啼】

六味丸【方见肾脏】

保和丸【方见虚羸】

胃苓汤【方见霍乱吐泻】

二陈汤【方见寒冷呕吐】

变蒸

巢氏云小儿变蒸者以长血气也变者上气蒸者体热仲阳云变者易也又云变蒸者自内而长自下而上又身热故每变毕即觉性情有异於前何者长生脏腑意智故也何谓三十二日长骨添精神人有三百六十五骨以象天数以应朞岁以分十二经络自初生至三十二日一变生癸属足少阴经肾脏精与志六十四日二变一蒸生壬属足太阳经膀胱腑其发耳与聃冷肾与膀胱合俱主於水地六成之至九十六日三变生丁属手少阴经心藏神其性为喜至一百二十八日四变二蒸生丙属手太阳经小肠腑其发汗出而微惊心与小肠合为火地二生火天七成之至一百六十日五变生乙属足厥阴经肝藏?喜哭至一百九十二日六变三蒸生甲属足少阳经胆腑其发目不闭【一作开】而赤肝与胆合主木天三生木地八成之至二百四十四日七变生辛属手太阴经肺脏魄主声至二百五十六日八变四蒸生庚属手阳明经大肠腑其发肤热而汗或不汗肺与大肠合主金地四生金天九成之至二百八十八日九变生己属足太阳经脾脏意与智至三百二十日十变五蒸生戊属足阳明经胃腑其发不食腹痛而吐乳脾与胃主土天五生土地十成之又手厥阴经心包络为脏手少阳经三焦为腑此一脏一腑俱无状故不变而不蒸也前十变五蒸乃天地之数以生成之此後

始生齿能言知喜怒故云始全也大仓云气入四肢长碎骨於十变後六十四日为一大蒸计三百八十四日长其经脉手受血故能持物足受血故能行立经云变且蒸谓蒸毕而足一岁之日有余也师曰不汗而热者发其汗大吐者微止不可别治又六十四日为二大蒸计四百四十八日又六十四日为三大蒸计五百一十二日至五百七十六日变蒸既毕儿乃成人也变者生五脏也蒸者养六腑也变者上气蒸者发热每经一变一蒸情态即异轻则发热微汗其状似惊重则壮热脉乱而数或汗或吐或烦啼躁渴轻者五日解重者七八日解其候与伤寒相似亦有变蒸之余续感寒邪者但变蒸则耳冷骭冷上唇发泡若浊珠若寒邪搏之则寒热交争腹中作痛而啼叫之声日夜不絕变者易也蒸於肝则玄眴微赤蒸於肺则 毛耸凡五脏六腑筋脉骨循环各有证应其治法平和者微表之实热者微利之可服紫霜丸黑散子柴胡汤有寒无热并吐泻不乳多啼者当归散调气散主之变蒸之外小儿体貌情态自然平和大抵人得中和之道以为纯粹陰阳得所刚柔兼济气血和而百脉顺所以心智益通精神俱备脏腑充实形体固壮齿细发黑声洪睡稳此乃受气充足稟性得中而无疾尔前症盖小儿所不免者虽勿药亦可也前药峻厉非惟脏腑之不胜抑且反伤血气余尝见一小儿至一变发热有痰投抱龙丸一粒卒至不救观此可验慎之慎之其有不热不惊略无症候而暗变者盖受胎气壮实故也

紫霜丸【方见撮口】

紫阳黑散 治变蒸解利热气

麻黄【二两不去节】 大黄【半两】 杏仁【去皮二分半研】

右以前二味和一处杵碎略烧存性後入杏仁膏和之密盛贮每用一豆许乳汁和咽之

柴胡汤 治变蒸骨热心烦啼叫不已

人参【一钱】 甘草【微炙二钱】 柴胡【五分】 麦门冬【去心二钱】 防风
龙胆草【酒炒黑各一钱】

右每服一钱水煎

当归散 治变蒸有寒无热

当归【二钱】 木香 官桂【辣者】 甘草【炙】 人参【各一钱】

右每服一钱姜枣水煎

调气散 治变蒸吐泻不乳多啼欲发慢惊

木香 香附子 人参 橘皮 藿香 甘草【炙各一钱】

右为末每服一钱姜枣水煎服

肝脏

钱仲阳云肝主风实则目直大叫项急顿闷虚则咬牙呵欠气热则外生风气温则内生风大青膏散之若能食饮水不止用大黄丸微下之肝热则目直不搔手寻衣领及乱捻物泻青丸主之壮热饮水喘闷泻白散主之肝病秋见肺怯不能胜肝也当用益黄散补脾泻青丸治肝肝有风则目连眨得心热则搔用泻青丸治肝导赤散治心甚则身反张目直不搔心不受热也当地黄丸补肾泻青丸治肝唇白者不治又张洁古云肝主风自病则风搔拘急若心乘肝为实邪肺乘肝为贼邪肾乘肝为虚邪凡肝得病必先察其肺肾肾者肝之母肺者肝之贼今肝之得病若非肾水不能相生必是肺金鬼邪来克故其来在肺先治其肺攻其鬼也其来在肾先补其肾滋其源也然後审其本脏之虚实而寒温之窃谓前症若肝经实热而外生风者宜用大青膏散之若既服而前症仍作或益甚者此邪气已去而脾气亏损也宜用异功散加芍药补之若肝经虚热或因克伐而内生风者宜用异功散地黄丸补之若风邪入脏能食饮冷大便秘结者此邪气内实也宜用大黄丸下之若既下而食少饮汤或腹作胀者此脾气内虚也宜用白术散补之气血素弱或因病後或服攻伐之剂而手寻衣领咬牙呵欠目淡青者乃肝经虚甚也急用地黄丸以补肾肝哽气短气长出气乃肺经虚甚也急用异功散以补脾肺若申酉时叫哭直视呵欠顿闷项急惊悸手足摇动发热饮水者此风木相搏而胜肺金也用柴胡梔子散以治肝火生肝血用异功散补脾土生肺金若唇白者为脾绝不治夫婴童之症多因妊娠厚味七情或儿乳哺失宜或乳母饮食郁怒所致病气既见形气已虚当推其所因用药加漏芦以治其母儿饮一二匙後仿此

大青膏 治伤风痰热发搐

天麻 青黛【各一钱】白附子【煨】乌蛇【酒浸取肉焙】蝎尾【各五分】天竺黄 麝香【各一字】

右为末生蜜丸如豆大每服用半粒薄荷汤化下

大黄丸 治风热里实口中气热二便秘赤饮水不止黑牵牛【一半生一半炒】川芎【各半两】甘草【一钱】大黄【一两酒洗饭上蒸】

右为末糊丸麻子大每服数丸温蜜水乳後服以溏利为度大小用

愚按前症既属里实二便秘法当踈下若初服虽未通利而病势已退不可再服如二便未利病势未退当减数丸研化服之恐过剂则元气伤而变病也

泻青丸 治急惊发搐眼赤睛疼

当归 龙胆草【炒】 川芎 防风 大黄【炒】 羌活 山梔仁【各等分】

右为末炼蜜丸芡实大每服一丸砂糖汤化下愚按前方足厥陰经解散肌表疏通内热之药也若大便秘结烦渴饮冷饮食如常者属形病俱实宜用此以泻之若大便调和烦渴饮冷目淡青色属病气实而形气虚宜用抑肝散平之若大便不实作渴饮汤饮食少思肢体倦怠者属形病俱虚宜用地黄丸补之大抵前症若因肝经血虚风热先用四物汤加鈎藤鈎以生肝血次用四君子汤以补脾土若因肝经血燥痰盛用地黄丸滋肾水生肝木四君加芍药实脾土以平肝木若因攻伐而致脾土虚寒者急用六君子汤加丁香木香温补脾土否则必变慢脾风也

抑肝散

治肝经虚热发搐或发热咬牙或惊悸寒热或木乘土而呕吐痰涎腹胀少食睡卧不安

软柴胡 甘草【各五分】 川芎【八分】 当归 白术【炒】 茯苓鈎藤鈎【各一钱】

右水煎子母同服如蜜丸名抑青丸

小柴胡汤【加山梔牡丹皮名加味小柴胡】 治肝胆经风热瘰癧寒热往来日晡发热潮热身热不欲饮食或怒火口苦耳聋咳 或脇痛胃满小便不利或泄泻吐酸苦水或肢体搐动唇目抽劓并宜用之【方见变蒸】

异功散【方见天钩】

地黄丸【方见肾脏】

白术散【方见积滞】

柴胡梔子散【方见诸热】

导赤散【方见心脏】

四物汤【方见急惊】

四君子汤【方见内钩】

六君子汤【方见内钩】

加味清胃散【方见天钩】

补中益气汤【方见虚羸】

心脏

钱仲阳云心主惊实则叫哭发热饮水而搐虚则困卧惊悸不安又云热则睡中口气温及上窜咬牙而合面卧有就冷之意皆心热也导赤散主之若仰面卧者乃心气实气不得上下流通也泻心散主之心病冬见火胜水也当补肾治心轻者病自愈下窜不语者肾虚怯也又张洁古云心主热若肺乘心为微邪肝乘心为虚邪脾乘心为实邪肾乘心为贼邪凡心脏得病必先调其肝肾肝气通则心气和肝气滞则心气乏此心气先求其肝清其源也五脏受病必传其所胜肾之邪必传於心故先治其肾逐其邪也若肝肾脉俱和然後察其心家虚实治之窃谓仰面卧者因其心胃实热故喜仰面而向虚也合面卧者因心胸虚热故喜合卧而就实也实则调治心肝虚则调补脾肺二者别之尽其状矣其咬牙等症多有雷同不必拘泥如用泻心导赤等剂邪气虽去而病仍作当调补元气或反甚急温补元气其心气冬见或亥子时病益甚或下窜不语者乃肾水虚而心火甚也用地黄丸其乳下婴儿须母服之钱氏泻心散治心经实热

黄连

右为末每服五分临卧温水化下

愚按前症若叫哭发热作渴饮水抽搐有力仰面而睡者属心经实热宜用泻心散或导赤散若发热饮汤抽搐乏力惊窜咬牙合面而睡者属心经虚热用补心散若喘 面赤壮热饮水肺乘心也用泻白散若摇头目劓身热抽搐肝乘心也用柴胡清肝散若合目昏睡泄泻身热脾乘心也用泻黄散若窜视惊悸咬牙足热肾乘心也用安神丸若因乳母致症亦用前药以治其母

导赤散 治小儿实热小便秘赤

生地黄 木通 甘草【等分】

右为末每服一钱入淡竹叶水煎

愚按泻心散导赤散泻心小肠实火之剂盖心为脾母脾为心子然心既病则脾土益虚矣用者审之

钱氏生犀散 治心经虚热

地骨皮 赤芍药 柴胡 乾葛【各一两】甘草【五钱】犀角【二钱镑】

右为末每服一二钱水煎【新增】

愚按前方云治心经虚热其所用药多属泻心泻肝脾之剂虚热二字恐鲁鱼也如心经自病而血虚热者用秘旨安神丸脾夺虚心之气而热者用秘旨补脾汤肝木不能生心火而虚热者用地黄丸

秘旨安神丸 治心血虚而睡中惊悸或受惊吓而作人参 半夏【汤泡】酸枣仁【炒】茯苓【各一钱】当归【酒洗】橘红赤芍药【炒各七分】甘草【炙三分】五味子【五粒杵】

右为末姜汁糊丸芡实大每服一丸生姜汤下

地黄丸【方见肾症】

补心散【方见惊啼】

泻白散【方见肺脏】

柴胡清肝散【方见热症】

泻黄散【方见脾脏】

秘旨补脾汤【方见惊啼】

脾脏

钱仲阳云脾主困实则困睡身热饮水或不饮水虚则吐泻生风脾胃虚寒则面?白目无精光口鼻气冷肌体瘦弱吐水腹痛不思乳食用益黄散下利用调中丸伤风手足冷者脾脏怯也先用益黄散补脾後用大青膏发散脾病见四季皆仿此顺者易治逆者难治脾怯当面赤黄若兼五脏相胜随症治之又张洁古云脾主湿自病则泄泻多睡体重昏倦若肝乘脾为贼邪心乘脾为虚邪肺乘脾为实邪肾乘脾为微邪凡脾之得病必先察其肝心二脏盖肝是脾之鬼心是脾之母肝气盛则鬼邪有余心气亏则生气不足当用平肝气益心气若诊其脉肝心俱和则脾家自病察其虚实而治之窃谓前症实者病气实而形气虚也若面色?白吐泻腹痛口鼻气冷属寒水侮土宜用益黄散若面青唇黯吐泻手足并冷此脾土虚寒用乾姜理中汤若面色痿黄手足不冷此脾土虚弱用人参理中汤若伤风手足并冷吐痰咳 吐泻腹胀此脾肺气虚用五味异功散实脾气加防风升麻散外邪若发於寅卯之时用六君柴胡升麻补脾土平肝木若面黄者脾之本色也面赤者火生土为顺面青者木克土为逆当平其所胜以

补元气为善

大青膏【方见肝脏】

调中丸【方见脾胃虚寒】

人参安胃散 治脾胃虚弱伤热乳食呕吐泻痢人参【一钱】黄芪【一钱】生甘草 炙甘草【各五分】白茯苓【四分】陈皮【二分】黄连【炒二分】白芍药【酒炒七分】

右为末每服二钱水煎

愚按东垣云益黄散内有丁香青皮之辛热盖为寒水侮土而设也若因热药巴豆之类损其脾胃或因暑热伤乳食而成吐泻口鼻气热而致慢惊者宜用前散

益黄散 治脾虚吐泻不食米谷不化困倦力少滑肠夜起并疳虚盗汗涎流口角

陈皮【一两】丁香【二钱】诃子【炮去皮】青皮【去白】甘草【炙各半两】

右为末每服一钱水煎服

愚按前症若脾土虚寒或寒水侮土而呕吐泄泻手足并冷或痰涎上壅睡而露睛不思乳食宜用此方若因脾土虚弱吐泻者用六君子汤加柴胡如不应或手足俱冷属虚寒也更加木香炮姜若因乳母脾虚肝侮必治以前药若乳母郁怒致儿患前症母服加味归脾汤

钱氏泻黄散【一名泻脾散】 治脾热吐舌

藿香叶 甘草【各七分】山梔仁【一两】石膏【五钱】防风【二两】

右用蜜酒微炒为末每服一二钱水煎

愚按前症若作渴饮冷卧不露睛手足热甚或遍身发黄属胃经实热宜用泻黄散若作渴饮汤卧而露睛手足并冷属胃经虚热宜用异功散若面青搐搦乳食少思肝乘脾也用秘旨补脾汤若面赤惊悸身热昏睡心乘脾也用秘旨安神丸若面白喘 肢体倦怠肺乘脾也用补中益气汤若唇黑泄泻手足指冷肾乘脾也用益黄散病後津液不足口乾作渴宜用七味白术散若乳母膏粱厚味七情郁火所致当审其因而治其母

人参理中汤【方见伤寒表里】

五味异功散【方见天钩内钩】

六君子汤【方见天钩内钩】

肺脏

钱仲阳云肺主喘实则闷乱喘促或饮水虚则硬气出气短气若肺盛复感风寒则胃满气急喘 用泻白散肺热则手掐眉目鼻面用甘桔汤肺虚热则唇色深红少用泻白散肺怯则唇色白用阿胶散若闷乱气粗喘促哽气者难治肺病久唇白者此脾肺子母皆虚也若白如猪脂者吉白如枯骨者死如肺病春见肺胜肝也用地黄丸补肝肾泻白散以治肺目淡青必发惊更有赤者当搐为肝怯也又张洁古云肺主燥自病则喘 燥则润之若心乘肺为贼邪肝乘肺为微邪肾乘肺为实邪脾乘肺为虚邪凡肺之得邪必先观心脾二脏之虚实若心火铄金当抑心滋肺若脾气虚冷不能相生而肺气不足则风邪易感宜补脾肺若脾实中痞热气上蒸於脾宜泻脾气若心脾平和而肺自病当察虚实治之窃谓肺经郁热用泻白散肺气自虚用四君子汤外邪所乘用参苏饮心火炎铄用人参平肺散中焦实痞用大承气脾不能生肺用异功散夫肺气盛者肺中之邪气盛也其脉右寸必浮而有力宜用泻白散以泻之若肺虚而有热者执肺热伤肺之说而不用人参误矣仍参其症治之

泻白散 化痰止 宽气进食

地骨皮 桑白皮【炒各一两】 甘草【炙一钱】

右为末每服一二钱入糯米百粒水煎

愚按活人方云喘者肺气盛而有余然气盛当认作气衰有余当认作不足盖肺气盛者肺中之火盛也有余者肺中之邪有余也其脉右寸必浮而有力右颊色赤用前药以泻之前症若乳母感冒风寒肺经蕴热致儿为患用参苏饮若乳母膏粱醇酒积热致儿是病用清胃散

甘桔汤 治风热上攻咽喉疼痛及喉痹妨闷

桔梗【一两】 甘草【炒二两】

右每服二钱水煎

阿胶散 治肺虚咳 喘急或咳而哽气喉中有声阿胶【一两蛤粉炒】 鼠粘子【二钱半炒香】 甘草【一钱炙】 马兜铃【半两炒】 杏仁【七个去皮尖】 糯米【一两】

右每服一二钱水煎

愚按前方乃直治肺金之剂经云虚则补其母若前药未应当用五味异功散以补脾

地黄丸【方见肾脏】

四君子汤【方见内钩】

参苏饮【方见诸热】

人参平肺散【方见咳 】

大承气汤【方见伤寒表里】

异功散【方见天钩内钩】

清胃散【方见天钩内钩】

肾脏

钱仲阳云肾主虚无实症惟痘疮实则黑陷更当分别症之虚实假如肺病又见肝症咬牙呵欠者易治肝虚不能胜肺也若目直视大叫哭项急烦闷者难治盖肺病虚冷肝强实而胜肺也视病新久虚实虚则补其母实则泻其子夫肾虚者由胎气不盛则神短顙开目多白睛面色?白此皆难养纵长不过八八之数若恣色慾不及四旬而亡或有因病而致肾虚者又云肾气不足则下窜盖肾虚骨重惟欲坠下而缩身也肾水陰也肾虚则目无光畏明皆用地黄丸肾病见夏乃水胜火也轻者病自退重者当惊发搐又张洁古云肾主寒自病则足胫寒而逆肾无实疮疹黑陷乃实是水制火也若心乘肾为微邪肺乘肾为虚邪肝乘肾为寔邪脾乘肾为贼邪本脏虚弱正令不行鬼贼尅害当补本脏之正气假令肺病喘 见於初春当补肾见於夏救肺见於秋救脾见於冬补心泻本脏乃名寒 大抵五脏各至本位即气盛不可更补到所尅位不可更泻然五行之中惟肾水一脏母盛而反受邪何则肺属金射於皮毛所主者气肾属水主於骨髓所藏者精气之轻浮能上而不能下精之沉重能下而不能上此物性之自能今肺气得热而上蒸则不能下生於肾而受邪矣急服凉药解之此肾病必先求肺或脾经之湿刑克於肾宜去脾湿若脾肺平和而肾自病则察其本脏而治之窃谓下窜等症足不喜覆者盖腰以下皆肾所主乃心气下行於肾部也法用地黄丸壮肾水以制心火若因脾肺虚而不能生肾水者用补中益气汤六味地黄汤以滋化源其疮疹黑陷乃肾虚而邪气实也尤当用地黄丸

地黄丸

熟地黄【八钱杵膏】山茱萸【肉】乾山药【各四钱】泽泻 牡丹皮 白茯苓【各三钱】

右为末入地黄膏量加米糊丸桐子大每服数丸温水空心化下行迟鹤膝加鹿茸牛膝五加皮

愚按前丸治肾肝血虚燥热作渴小便淋秘痰气上壅或风客淫气患瘰结核或四肢发搐眼目瞤动或咳 吐血头目眩晕或咽喉燥痛口舌疮裂或自汗盗汗便血诸血或禀赋不足肢体瘦弱解颅失音或畏明下窜五迟五软肾疳肝疳或早近女色精血亏耗五脏齐损凡属肾肝诸虚不足之症宜用此以滋化源其功不可尽述

补中益气汤【方见虚羸】

薛氏医案卷五十四

卷五十五

钦定四库全书

薛氏医案卷五十五

明薛已订

保婴撮要

面上症

钱仲阳云左腮为肝右腮为肺额为心鼻为脾颧为肾色青主惊积不散欲发风候红主痰积惊悸黄者食积症伤欲作疳癖白主泄泻水谷更欲作吐黑主脏腑欲绝
印堂青主初患惊泻红主大惊夜啼黑主客忤山根青主二次惊泻後发躁黑黄甚者死
年寿平?主夭青主发热生惊黑主利死红主躁死微黄曰平黄甚曰霍乱
承浆青主食时被惊黄主吐逆亦主血利黑主惊风
白眼黑睛黄主有热白睛黄主食积疳疔白睛青主惊风黑睛青主伤寒
眉上青吉忽红主烦躁夜啼黄主霍乱久病红者死
风气二池青主风候紫主吐逆或发热黄主吐逆赤主烦躁夜啼两颧赤主肺有客热
两太阳青主二次受惊青自太阳入耳者死红主血淋
两脸青主客忤黄主痰溢赤主风热两颊赤主伤寒两颐青主吐虫两金匱青主第三

次惊风黑遶口二日死青连目入耳七日死

两风门红主风热黑主疳青主水惊黑从眉入耳即日死唇黑不食者死

面青眼青肝病面赤心病面白肺病面黄脾病面黑肾病 额间赤色主心经有热烦躁惊悸若
饮水或叫哭属本经实热用泻心散以清心火微赤困卧惊悸热渴饮汤属虚热用秘旨安神
丸以生心血青黑主惊风腹痛或痙瘕啼叫用五味异功散加木香柴胡钩藤钩补脾肝青黑
主心腹作痛此寒水乘心用益黄散微黄主惊疳用安神丸 左脸青或兼赤主肝经风热项强
顿闷目劓痙瘕用柴胡清肝散色微赤倏热咬牙属虚热用地黄丸青黑主肝克脾而惊搐腹
痛用六君子加姜桂微赤主潮热血虚心躁先用秘旨安神丸次用地黄丸 右脸赤主风邪气
龕咳 发热饮水为实热用泻白散若哽气出气唇白气短属虚热用五味异功散若脾热所
传用清胃散心火所刑用人参平肺散淡赤主潮热心躁或大便坚秘用宣明柴胡饮子以疏
导如潮热未止更用钩藤饮以清肝色青白主咳 恶心先用惺惺散解表邪健脾土更以六
君子汤调补中气色青黑主惊风腹痛盘肠内钓用六君钩藤钩平肝补脾 鼻微黄为平赤主
脾胃实热身热饮水乳食如常用泻黄散清热理脾微赤主脾经虚热身凉饮汤乳食少思用
五味异功散补中健脾色深黄主小便不通鼻中乾燥气龕衄血乃脾热传於肺肾先用济生
犀角地黄汤後用地黄丸色淡白乃脾虚泄泻乳食不化用六君子汤调补中气青色主脾土

虚寒肝木所胜用五味异功散加木香炮姜温中平肝黑为死候 颊间色赤主肾与膀胱气滞热结而小便不通用五苓散以分利鼻準微黄兼右腮微赤乃脾肺燥热不能化生肾水用黄芩清肺饮膀胱陰虚阳无所主用滋肾丸若颊间微赤乃膀胱阳虚陰无所化用六味地黄丸若小腹胀满或陰囊肿胀属陰虚湿热壅滞用六味丸加车前牛膝脾肺气虚不能通调水道者亦用前药其小便赤色久而尿血亦属肝肾气虚有热用六黄地黄丸如不应则用补中益气汤益脾肺生肝肾若小便後出白津或茎中作痛属肝经湿热先用龙胆泻肝汤後用六味地黄丸 印堂青黑主腹痛夜啼此脾气虚寒也脾为至陰故夜间腹痛而啼用鈎藤饮色淡白主泄泻乳食不化属脾气虚弱用五味异功散加木香 人中黄主伤乳胃逆青主下痢乳食不化暖气酸腐此脾虚停滞先用大安丸消食後用异功散健脾黑主蛔虫咬痛唇色白主吐涎呕逆或吐血便血乃脾气虚弱不能

摄涎统血归源急用六君子汤色赤乾燥而皱者主脾经热渴大便不通烦热不寐先以清胃散治其热次以四君黄连山梔调其脾黄主食积泄泻乳食不化以六君子汤健脾赤色兼白主衄血乃脾肺虚热不能摄血归源用圣济犀角地黄汤清热补血用四君子汤以补脾气如久不应用麦门冬散或人参安胃散 口畔色黄主脾经积热用清胃散久病用四味肥儿丸以治疳热唇口抽动主惊热不安用异功散加山梔鈎藤鈎补脾平肝若口流涎唇色紫乃脾气虚寒用异功散加炮姜木香若腹中痛口吐涎乃虫作痛先用芜荑散後用调中丸不吐涎是积痛也用异功散手足厥冷用理中汤加乌梅温补中气而痛自止或吐後或大便去後而痛止者先用下积丸後用异功散 白主失血死青主惊风死黑色绕口者不治耳微微赤此少阳经风热用柴胡饮子清肝生血微黄主睡中惊悸咬牙用四君子加芎归升麻以调理脾气 耳乾燥主骨痞蒸热作渴盗汗用地黄丸若小便後出白津或玉茎痒痛属肝经湿热先用龙胆泻肝汤後用地黄丸若禀赋肾气不足或早近女色致小便泄滞或作痛如淋者急用地黄丸补中益气汤滋其化源或大小便去後谷道牵痛者其虚尤甚用前丸加牛膝车前肉桂如手足逆冷或畏寒少食阳气虚寒也急加附子多可得生大抵多因禀赋脏气不平或乳食寒暑失节或妊娠乳母饮食起居六淫七情所致若初病元气无亏乳母如常发热壮热二便秘结作渴饮水睡不露睛者悉属形病俱实当治邪气若病久元气已亏食少发热口乾饮汤呕吐泄泻肢体畏寒而露睛者悉属形病俱虚当补正气更宜审胎气之虚实脏腑之相胜而治之庶无悞矣

泻心散【方见心脏】

秘旨安神丸【方见心脏】

五味异功散【方见内钩】

朱砂安神丸【方见发搐】

柴胡清肝散【方见诸热】

地黄丸【方见肾脏症】

六君子汤【方见内钩】

泻白散【方见肺脏】

清胃散【方见内钩】

补中益气汤【方见虚羸】

人参安胃散【方见脾脏】

宣明柴胡饮子【方见发热】

钩藤饮【方见慢惊】

惺惺散【方见咳 】

泻黄散【方见脾脏】

济生犀角地黄汤【方见便血】

五苓散【方见五淋】

发搐

钱仲阳云惊癇发搐男左视无声右视有声女右视无声左视有声此相胜也盖左为肝部右为肺部金木相胜故耳若寅卯辰时身热目上视手足动口流涎项强急此肝旺也已午未时身热发搐心神惊悸目上视牙紧流涎手足搐动此心旺也申酉戌时身热微搐而喘目微斜睡露睛手足冷大便淡黄水此肺旺也亥子丑时微搐卧而不安身微热目紧斜喉中有痰大便色白困睡流涎此肾虚也若握拳拇指在内女为顺拇指在外男为顺顺则易治逆则难愈若涎入心肝则不能言用凉心镇惊下痰逆搐者不治吐泻後变症者亦不治如手足冷汗搐眉搐肚日夜不止名真搐当用人参汤川乌全蝎等药平其胃气伤风发搐口中气热呵欠手足动者名假搐用大青膏发散风邪伤食後发搐身热困睡呕吐不思乳食者当先定搐後用白丸子下之百日内发搐真者内生风二三次必死假者外生风虽频发不死外伤风者用大青膏涂额门及浴体法 寅卯辰时搐而发热作渴饮冷便结属肝胆经虚热用柴芍参苓散作渴引饮自汗盗汗属肝胆经血虚用地黄丸口吻流涎属肝木克脾土用六君子汤 己午未时发搐若兼作渴饮水属风火相搏以地黄丸补肝导赤散凉惊丸治心若作渴饮汤体倦不乳土虚而木旺也用地黄丸以补肾六君子汤以补脾 申酉戌时微搐留喘目微斜身似热睡而

露睛大便淡黄属脾肺虚热用异功散手足逆冷或喘泻不食属脾肺虚寒用六君炮姜木香久病而元气虚者用六君子六味丸二药主之亥子丑时微搐身热目睛紧斜吐泻不乳厥冷多睡

属寒水侮土用益黄散未应用六君姜桂伤风发搐口气不热肢体倦怠用异功散补脾土钩藤饮清肝木若因风邪内郁发热而变诸症者当理肺金清风邪若外邪既解而内症未除当理肺补脾若肺经亏损而致惊搐等症者当补脾肺以平肝心则惊搐自止矣若停食发搐呕吐乳食者宜用消食丸若食既消而前症仍作或变他症者脾土伤而肝木乘之也用六君子加钩藤钩以健脾平肝若百日内搐者因胎气所禀亦有乳母七情厚味所致者当兼治其母而以固胃为先不可迳治其儿也

治验

一小儿寅卯时发热痰搐服抱龙丸而愈後复患因自用前药更加咳喘不时发搐面赤或青黄或浮肿或流涎余谓咳喘乃脾肺气虚不时发搐乃木乘土位面青而黄赤乃肝助心脾浮肿流涎乃脾气虚弱用益智丸以补心神补中益气汤以养脾肺顿愈

少参王阳湖孙跌伤股骨正体科已续余视其面色青黄口角微动此肝木侮脾之症且气血筋骨皆资脾土以生但壮脾气则所伤自愈遂用六君钩藤当归三十余剂诸症悉痊

一小儿两目连劓手足发搐服天麻防风丸之类每发饥时益甚得饮食稍定此肝木制脾土也用六君升麻柴胡钩藤钩二剂而病痊又用补中益气汤而全效

一小儿己午时搐热惊悸发时形气倦怠而黄懒食流涎饮汤此心火虚而不能生脾土也不信自服凉心之药更加吐泻睡而露睛几成慢脾风用六君姜桂佐以地黄丸而愈

一小儿七岁惊搐发热不已己午未时益甚形气殊倦热定饮汤此心脾气虚朝用补中益气汤加益智仁夕用六君当归钩藤钩寻愈後饮食过多复作吐泻或治以保和丸反加寒热发搐此脾土复伤而肝木所侮也用六君柴胡寒热止而饮食进但午未时仍泻用补中益气汤加茯苓半夏钩藤钩而愈一小儿百日内患搐痰涎自流用惊风药益甚视其面色黄中隐白乃脾虚不能摄涎也用六君子补中益气二汤而愈後复患兼气喘自欲表散行痰余谓此肺虚不能纳气归源耳用五味异功散加钩藤钩柴胡调补脾肺清理肝火而安

一小儿患前症面青黑或痿黄审其母素有郁怒用加味逍遥散加味归脾汤治其母而子亦愈

一小儿月内发搐鼻塞乃风邪所伤以六君子汤加桔梗细辛子母俱服更以葱头七茎生姜一片细搐摊纸上合置掌中令热急贴额门少顷鼻利搐止一小儿未满月发搐呕乳腹胀作泻此乳伤脾胃用五味异功散加漏芦令母服之子亦服匙许遂愈一小儿惊悸痰盛泻乳不

消此感风邪夹惊肝侮脾而气虚先以天麻防风丸祛风定惊後用五味异功散壮脾止搐而愈

一小儿发热拘急四肢痠痿左腮赤此心肝二经风热先用柴胡清肝散次用六味地黄丸而愈

一小儿发搐啼叫手足指冷左腮青黑此脾土虚弱肾水反所侮也用六君姜桂一剂顿安又以四君芎归及补肝散而愈

一小儿发热作渴用泻黄散大便重坠口角流涎仍欲泻火余曰鼻準青白多而黄色少属脾胃虚寒肝木所侮盖口角流涎脾气虚而不能摄也大便重坠脾气陷而不能升也不信另用凉惊之剂果眉唇微动四肢微搐余曰此虚极而变慢风矣始用六君当归木香炮姜钩藤钩二剂未效意欲更药余曰此药力未至也仍加附子一片服之即安後去附子又二剂而愈

一小儿目内青色发搐目直上视叫哭不已或用牛黄清心丸更加咬牙顿闷小便自遗余谓此肝脾虚甚用补中益气汤六味地黄丸而愈

一小儿发搐目割属肝胆经风热先用柴胡清肝散以清肝後用六味地黄丸以补肾而愈

凉惊丸 治惊痞热搐心神惊悸白睛赤色牙关紧急潮热流涎手足动搐

黄连【五钱】龙脑【一钱研】防风 龙胆草【酒拌炒黑】青黛【研三钱】牛黄
麝香【各一字】钩藤钩子【二钱】

右各另为末麪糊丸粟米大每服三五丸至一二十丸煎金银汤下

愚按前方治心肝二经风热若心肝虚而见惊搐潮热用秘旨安神丸肝木乘脾者用异功散加柴胡钩藤钩心脾虚弱而潮热流涎者用异功散若虚寒更加木香不应更加炮姜【详见滞颐】

擦牙通关散 治风搐搦关窍不通痰塞中脘留滞百节

南星【二钱】麝香【一字】牙皂【二钱烧存性】赤脚蜈蚣【一条】僵蚕【各二钱】

右为末姜汁蘸药少许擦牙或调服二三点涎自出

至圣保命丹 治胎惊内钓腹肚紧硬啼叫不安及急慢惊风眼目上视手足抽掣不省人事

全蝎【十四个去毒】防风【二钱】白附子 炮南星 蝉壳天麻

僵蚕【去丝嘴炒】朱砂【各一钱】麝香【五分】金箔

右为末米糊和每两作四十丸每服一丸白汤化下有热者以胆星易炮星

白饼子

治伤食呕吐肚疼暖气先用此药一服推下食积却用惺惺散加减参苏饮不可服冷药

滑石 半夏 胆南星【各一钱】轻粉 巴豆【二十四粒去皮膜用水一升煮乾研烂】

右以三味为末入巴豆轻粉研匀饭丸菉豆大每服三五丸紫苏汤下忌热物量儿加减

十味安神丸 治惊

人参 茯苓 麦门冬 山药【各二钱】片脑【二分】朱砂 甘草
寒水石【各五分】龙齿【一钱】金箔【二片】

右为末蜜丸鸡豆大灯心汤调下一方有马牙硝

浴体法

天麻【二钱】蝎尾【去毒】朱砂【各五分】乌蛇【肉酒浸焙】白矾【各二钱】麝香
【一字】青黛【二钱】

右为末每用三钱水三碗桃枝一握煎至数沸温浴之勿浴背

涂额法 治发搐

麝香【一字】蝎尾【去毒】薄荷叶【三分】蜈蚣 牛黄 青黛末【各一字】

右同研用熟枣肉剂为膏新绵上涂匀贴 上四方可出一指许火上炙手频熨百日里外小儿可用此

浮青丸【方见肝脏】

导赤散【方见心脏】

地黄丸【方见肾脏】

益黄散【方见脾脏】

苏青膏【方见慢惊】

大青膏【方见肝脏】

目睛瞤动

目者肝之窍也肝胆属风木二经兼为相火肝藏血血不足则风火内生故目睛为之瞤动经曰曲直动摇风之象也宜用四物益其血柴胡山梔清其肝陰血内荣则虚风自息矣若因肝经血燥而自病者用六味丸以滋其源因肺金克肝木者用泻白散以平金邪若眼眶瞤动者肝木乘脾土也用抱龙丸若愈後惊悸不寐或寐中发搐咬牙目睛瞤动者血虚不能荣筋脉也用补中益气汤或归脾汤加茯苓五味盖有余者邪气实也不足者真气虚也凡病气有余当认为不足况此症兼属肝脾多为漫惊之渐尤当审之

治验

一小儿三岁因惊抽搐发热久服抱龙丸等药面色或赤或青余曰始因肝有实邪故宜用前药今面色青赤乃肝经虚热传心矣遂用六味丸以养肝肾佐以六君升麻柴胡以补脾胃诸症顿痊

大尹周应昌子患瘰癧恪服化痰之剂虚宜用六君子汤加小柴胡汤若四肢微搐或潮热往来或泄泻呕吐面色痿黄皆脾胃有伤也宜用白术黄芪川芎当归人参陈皮肉豆蔻神麴乾葛白芍药黄连炙甘草白茯苓以补胃气若脾胃虚弱者用六味异功散虚寒加木香炮姜若脾气下陷者用补中益气汤以升其阳作渴者用七味白术散以生津液若肝木侮脾者用补中益气汤加茯苓半夏芍药以制肝补脾

治验

一小儿伤食发热唇动或用养胃汤枳实黄连山查之类更加腹胀午後发热按其腹不痛余以为服前药饮食虽化而脾胃复伤也用六君子汤数剂而痊一小儿伤食发热呕吐唇口服消导清热之剂饮食已消热赤如故余曰此胃经虚而安

泻青丸【方见肝脏】

六味丸【方见肾脏】

四君子汤【方见天钩】

泻白散【方见肺脏】

唇口蠕动

唇为脾之华口乃脾之窍又阳明之脉环唇口而交人中阳明胃也是以脾胃虚者多有此症不独病後而已夫脾主涎脾虚则不能收摄多兼流涎或误认为痰而用祛逐之药则精液益枯不能滋养筋脉遂致四肢抽搐病势愈甚原其治法与慢脾风相同当用大补脾胃之药加升麻柴胡切勿用青皮龙胆草之类兼察其色黄者脾弱也青者肝胜也青黄不泽木来克土也青赤相兼木火风热也黑为寒水反来侮土白为气虚亡阳凡此宜用六君子汤加小柴胡汤若四肢微搐或潮热往来或泄泻呕吐面色痿黄皆脾胃有伤也宜用白术黄芪川芎当归人参陈皮肉豆蔻神麴乾葛白芍药黄连炙甘草白茯苓以补胃气若脾胃虚弱者用五味异功散虚寒加木香炮姜若脾气下陷者用补中益气汤以升其阳作渴者用七味白术散以生津液若肝木侮脾者用补中益气汤加茯苓半夏芍药以制肝补脾

治验

一小儿伤食发热唇动或用养胃汤枳实黄连山楂之类更加腹胀午後发热按其腹不痛余以为服前药饮食虽化而脾胃复伤也用六君子汤数剂而痊一小儿伤食发热呕吐唇动服消导清热之剂饮食已消热赤如故余曰此胃经虚热耳用四君升麻柴胡四剂而愈

一小儿素面白忽然目唇微动时面色青黄良久其唇口手足亦微动此脾虚而肝侮之也用五味异功散加鉤藤鉤白附子一剂而面青少退再二剂唇口动亦止又用异功散加升麻柴胡四剂而痊

一小儿暑月吐泻目唇微动面色青白手足并冷仍用玉露散余谓已变慢脾风也当温补脾胃不信後果歿

五味异功散【方见天钩内钩】

补中益气汤【方见虚羸】

七味白术散【方见积痛】

六君子汤【方见天钩】

小柴胡汤【方见瘥症】

四君子汤【方见天钩】

惊搐目直

小儿忽然惊搐目直者皆肝之风热也若肝虚生风则目连劄而不搐及多欠咬牙若肝经风实则目直大叫呵欠项急顿闷若肝经有热则目直视不搐得心热则搐气热则外生气温则内生其症手寻衣领及乱捻物宜用泻青丸壮热饮水喘闷宜用泻白散凡病之新久皆能引肝风风内动则上入於目故目为之连劄若热入於目牵其筋脉两眦俱紧不能转视故目直也亦有饮食停滞中焦致清阳不升浊阴不降肝木生发之气不得升致生虚风者须详审之若胃满腹痛呕吐恶食轻则消导化痰重则探吐滞积更须审其所伤寒物热物亦有因感冒吐泻致使土败木侮而生虚风者不可遽服惊药宜用六君子加芍药木香柴胡制肝补脾若因脾土虚而自病者用五味异功散凡饮食停滞痰涎壅满而见惊症者寔因脾土虚弱不能生金金虚不能平木故木邪妄动也宜健脾消食其症自愈若辄用惊风之药反成其风而益其病也况脏腑脆嫩不可投以峻厉之剂治者慎之

治验

姚仪部子每停食则身发赤晕此饮食内停不消郁热发外用清中解郁汤而愈後患摇头咬牙痰盛发搐吐出酸味伺其吐尽翌日少以七味白术散调理脾胃遂不复患

一小儿停食服通利之剂作呕腹胀此脾胃复伤也用补中益气汤而愈

一小儿两目动劄手足发搐数服天麻防风丸之类前症不愈其痰益甚得饮食稍愈视其準头及左颊色青黄余曰脾主涎此肝木克脾土不能统摄其涎非痰盛也遂用六君升麻柴胡钩藤二剂饮食渐进诸症渐愈又用补中益气汤而安

九味养脾汤 治小儿大病後面黄肌瘦目动咬牙发少未能强步因误服解表泻利伤克诸药而致者宜长缓调理全复胃气

白术【一钱二分】白芍药【酒炒】白茯苓【各八分】人参
陈皮川芎【各六分】甘草【炙】黄芪【蜜炙】当归【酒洗各四分】半夏山查
麦门冬【各六分】

右用姜枣水煎服

六君子汤【方见天钩】

五味异功散【方见天钩】

清中解郁汤【方见丹毒】

七味白术散【方见积痛】

参苓白术散【方见虚羸】

补中益气汤【方见虚羸】

天麻防风丸【方见伤风咳 】【

睡中惊动

小儿睡中惊动由心肾不足所致盖心主血与神肝藏血与?肺主气与魄肾主精与恐小儿脏腑脆弱易为惊恐恐则气下惊则心无所依神无所归且夫人之神气寤则行於目寐则栖於肾今心肾既虚则不能宁摄精神故睡中惊动也治宜清心安神用茯苓补心汤加酸枣仁茯神五味亦有惊吓而作者因击动其肝故魂不安也治宜鎮惊定魂用安神鎮惊丸若饮食间因惊而停滞者用六君子加神麴厚朴食既消而惊未定用茯苓补心汤若木火太过而心神不寧者用导赤散风热相搏者用柴胡梔子散食郁生痰惊动不安者用四君以健脾神麴半夏以化痰山梔芍药以清热

治验

一小儿夜睡忽然惊动如搐大便酸臭而色青此饮食伤脾而肝旺也先用异功散加柴胡升麻山梔又用四味肥儿丸而愈

一小儿不时睡中惊动发搐作渴饮冷左颞青额间赤先用柴胡清肝散加鈎藤鈎四剂以治肝火後用五味异功散以健脾又用地黄丸补肾肝而安

导赤散【方见心脏】

柴胡梔子散【方见诸热症即梔子清肝散】

六味丸【方见肾脏】

四君子汤【方见天鈞】

六君子汤【方见天鈞】

五味异功散【方见天鈞】

茯苓补心汤【方见瘡】

安神鎮惊丸【方见急惊】

目动咬牙

小儿惊後目微动咬牙者皆病後亡津液不能荣其筋脉也亦有肝经虚热而生风者当审其气血有余不足而治之其日中发热饮冷而动者气有余也用泻青丸夜间盗汗及睡不宁而动者血不足也用地黄丸或因肝经风邪传於脾肾者亦令咬牙先用柴胡清肝散次用五味异功散六味地黄丸若因脾胃虚热用补中益气汤加芍药山栀实热用泻黄散盖牙牀属手足阳明故也若肝肾热用六味地黄丸

治验

奚氏女六岁忽然发惊目动咬牙或睡中惊搐痰涎壅盛或用化痰祛风等药益甚余曰面青而见前症乃属肝木尅脾土不能摄涎而上涌也当滋肾水生肝血则风自息而痰自消矣遂用六味丸而愈一小儿患前症痰涎自流用惊风之药其症益甚脾胃益虚视其面色痿黄口中吐痰用六君子补中益气汤而愈

导赤散【方见心脏】

地黄丸【方见肾脏】

泻青丸【方见肝脏】

补中益气汤【方见虚羸】

六味地黄丸【方见肾脏】

六君子汤【方见天钩】

摇头便血

经曰诸风掉眩皆属肝木木得风则摇动乃肝经火盛而生虚风也汤氏治郑都承子摇头便血七年用祛风药止血药百试无効此肝经风热所乘土受木克不能摄血而溃入大肠故便血不止遂制清肝益胃汤以平肝益脾祛风热兼服胃风汤旬余诸症悉愈便血者风木摇动则土受凌虐而不能统血也或食酸味过多以益其肝致令陰结经曰结陰者便血一升再结二升三结三升又邪在五脏则陰脉不和陰脉不和则血留之结陰之病陰气内结不得外行渗入肠间故便血也间亦有乳母恚怒风热炽盛或肝木伤脾使清气不升或风邪侵入大肠者治法若因风热用柴胡清肝散若因怒火用加味小柴胡汤若清气不升脾气下陷者用补中益气汤若风邪侵於大肠者用清肝益胃丸肝经血热妄行者用六味地黄丸脾土不能培肝木者用六君柴胡鈎藤鈎肝木胜脾土者用四君芍药鈎藤鈎结陰者用平胃地榆汤

治验

一小儿伤风咳 痰涌余谓脾虚肺弱腠理不密风邪外乘用六君子汤加桔梗桑皮杏仁而愈後饮食停滯作泻腹胀仍用六君子加山查厚朴而安又停食作泻服消导之药更加咳余谓当调补脾土不信自用发表克滯前症益甚更加摇头余以天麻散倍加鈎藤鈎及异功散而愈

一小儿项间结核面色痿黄肌体消瘦咬牙抽搐头摇目劓此肝木尅脾土也用六君子汤及九味芦荟丸顿愈

一小儿病後遇惊即痰甚咬牙抽搐摇头作泻略服脑麝朱砂等药以致慢惊而卒

清肝益胃丸

犀角屑 甘草 全蛇蛻【炙黄】 鈎藤鈎子 麻黄【去节一钱】 黄芪【蜜炙】 羌活 防风 白芍药 天花粉【各半两】

右为末枣肉杵丸桐子大每服五十丸食後薄荷汤下

海藏食疗云蛇蛻主去风邪明目治小儿一百二十种惊癇寒热等症蛊毒安胎炒用又治风癇弄舌摇头故前方用之

平胃地榆汤 治结陰便血

白术 陈皮 茯苓 厚朴 葛根【各五分】 地榆【七分】 乾姜【五分】 炙甘草 当归 炒神麴 白芍药 人参 益智【各三分】 升麻 附子【炮各一钱】

右每服一钱水煎服

胃风汤【方见偏风口噤】

柴胡清肝散【方见诸热症】

加味小柴胡汤【方见肝脏】

补中益气汤【方见虚羸】

六味地黄丸【方见肾脏】

泻白散【方见肺脏】

六君子汤【方见天钩】

四君子汤【方见天钩】

天麻散【方见内 】

异功散【方见天钩】

九味芦荟丸【方见疳症】

偏风口噤

小儿偏风者属少阳厥阴肝胆二经证也噤者筋急由风火太甚而乘於脾以胜水湿则筋太燥然燥金主於收敛劲切故也又曰风之为病善行而数变或左或右其因一也治须审而药之若足阳明胃经气虚风邪所乘其筋脉偏急者属外因若足厥阴肝经风热乘脾筋脉偏急者属内因若脾肺虚弱腠理不密外邪所乘或服金石之剂耗损肝血或吐泻後内亡津液不能养肝致口眼歪斜或半身不遂诸症皆属肝血不足肝火生风宜滋肾水养肝血壮脾土治法脾胃虚而动风者异功散加柴胡钩藤钩脾肺虚而外邪所乘者用钩藤饮肝火血燥者用六味地黄丸津液不足者用白术散若兼目紧上视寒热往来小便淋沥面色青洁两脇胀痛之类皆肝经之本病也或唇口歪斜腹胀少食目泡浮肿面色青黄肢体倦怠之类皆肝木乘脾之症也当审五臟相胜而主之说执其见症槩投风药反成坏症者有矣

治验

一小儿口眼喎邪面色或青或赤此肝心风火乘脾也朝用柴胡清肝散夕用异功散加钩藤钩而愈其时有患前症服祛风导痰之药者皆不能起

一小儿痢後患前症发搐面色痿黄肢体倦怠此元气虚克伐多矣余用补中益气汤加钩藤钩子服而渐愈後因乳母七情饮食失宜或儿乳食过多前症仍作服补中益气汤五味异功散而应

钱氏全蝎散 治惊风口眼喎邪言语不正手足偏废不举

全蝎【去毒炒】僵蚕【真者炒】川芎 黄芩 甘草
桂枝麻黄【去节】赤芍药【各二钱】天麻【六钱】天南星【去脐二钱】

右为末每服二三钱姜五片水煎服

胃风汤 治风冷乘虚入客肠胃水谷不化泄泻注下及肠胃湿毒下如豆汁或瘀血日夜无度

人参 白茯苓 芎藭 桂 当归 白芍药 白术 【各等分】

右散每服二钱入粟米数粒同煎食前服

异功散 【方见天钩】

六味丸 【方见肾脏】

白术散 【方见积痛】

柴胡清肝散 【方见诸热】

补中益气汤 【方见虚羸】

角弓反张

钱仲阳曰角弓反张者由风邪客於太阳经也经曰风从上受足太阳主周身之气其脉起於目内眦而行於背肝属木主风所以风邪易侵也夫小儿肌肤未密外邪易伤肝为相火其怒易发若身反张强直发热不搐者风伤太阳也宜用人参羌活散小续命汤若因暴怒而击动其肝火者宜用泻青丸若饮前剂其症益甚者此邪气已去而脾气亏也宜用异功散加芎归补之若因肝经虚热或因克伐真气虚热生风者宜用异功散地黄丸补之若因下而脾气困惫腹肚膨胀者此中气损也宜用白术散补之若气血素弱或服攻伐之剂而手寻衣领咬牙呵欠者肝经虚甚也急用地黄丸以补之仍与肝脏参览

治验

一小儿忽腰背反张目上视面青赤曰青属肝主风赤属心主火此风火相抟用柴胡栀子散倍加钩藤钩顿安而痰如旧又用抱龙丸而愈

一小儿忽腰背反张服治惊之药後不时举发面色黄白肢体甚倦余用五味异功散十余剂而愈後因惊兼饮食不节不时举发随用前药即愈遂日以参木末每服五七分炮姜大枣煎汤调下服至三两而不发已上二症元气虚而病气实也若用攻邪之药皆误矣

一小儿素患前症痰盛面色素白而兼青余谓肺气不能平肝肝气乘脾脾气虚而生痰耳先用抱龙丸二服以平肝随用六君子汤以补脾肺月余而痊半年之後复发谓非逐痰不能全愈遂用下剂痰涎甚多而咽喉如锯声余曰乃脾不能摄涎也咽间鸣乃肺气虚甚也遂用人参五钱炮姜三分水煎服而醒至第四剂後加枣二枚人参服数两而愈後每发非独参汤不

应若执常方鲜不有误者

人参羌活散【方见惊风】

小续命汤【方见五硬】

泻青丸【方见肝脏】

异功散【方见肺脏】

地黄丸【方见肾脏】

柴胡栀子散【方见诸热即栀子清肝散】

抱龙丸【方见伤寒夹惊】

六君子汤【方见天钩】

薛氏医案卷五十五

卷五十六

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷五十六

明 薛己 订

保婴撮要三

急惊

钱仲阳云急惊者因闻大声或惊而发搐搐止如故此热生於心身热面赤引饮口中气热二便黄赤甚则发搐盖热甚生风阳甚而陰虚也宜以利惊丸除其痰热不可用巴豆之药盖急惊者阳症也俱腑受病而属实乃少阳相火旺经曰热则生风风生痰痰热客於心膈间则风火相搏故抽搐发动经所谓木太过日发生其动掉眩颠疾是也当用利惊丸导赤散泻青丸等药搐止与安神鎮惊丸姜全善亦曰急惊属木火土实木实则搐而有力及目上视动劓频睫土实则身热面赤而不吐泻偃睡合睛治法宜凉宜泻而用凉惊利惊等丸亦有因惊而发者牙关紧急壮热涎潮窜视反张搐搦颤动唇口眉眼眨引口中热气颊赤唇红二便秘结脉浮洪数紧此内有实热外挟风邪当截风定搐若痰热尚作仍微下之痰热既泄急宜调养胃气搐定而痰热少退即宜调补脾气东垣云若因外物惊者宜黄连安神丸因气动所惊者宜安神鎮惊丸之类大忌防风丸如因惊而泻青色宜朱砂丸大忌凉惊丸盖急惊者风木旺也风木属肝盛则必传尅於脾欲治其肝当先实脾後泄风木若用益黄散则误矣经曰邪气盛则实正气夺则虚前所云实者乃病气有余而形气不足也当先泄而後补虚甚急当补脾为先少以攻邪之药佐之其所云虚者乃病气形气俱不足也当纯补真气为要若肝经风火相搏抽搐目睛筋急痰盛者当用四物汤以生肝血加鉤藤鉤山梔以清肝火更用四君子以补脾六味丸以滋肾若肺金克木而兼呵欠者用泻白散以泄肺邪地黄丸以益肝血若邪入肝则用柴胡清肝散加龙胆草亦可邪入心用梔子清肝散加炒黄连亦通邪入肾用六味地黄丸邪入肺用地骨皮散邪入脾用六君子加柴胡山梔大抵此症属肝胆经血虚风火相搏而善行数变者为多若不养肝血不补脾气纯用祛风化痰之药则脾益虚血益损邪气延绵必转慢惊矣

治验

一小儿九岁因惊发热抽搐顿闷咬牙作渴饮冷便秘面色青赤而印堂左腮尤赤此心脾二经风热相搏乃形病俱实之症也先用泻青丸料炒黄连一剂大便随利抽搐顿减继用抑青

丸一服诸症悉退但面色痿黄肢体倦怠饮食少思此病气去而脾气未复也用补中益气汤及地黄丸而全安

一小儿发热抽搐口噤痰涌此胆经实火为惊风也先用泻青丸一服六味丸二服诸症即退又用小柴胡汤加芎归山栀钩藤钩次以补中益气汤而愈一小儿忽然发热目动咬牙惊搐痰盛或与祛风化痰药益甚面色青黄乃肝木克脾脾之液为涎虚则涎不能摄上涌而似痰也法当生肝补脾则风自息痰自愈矣遂用六味丸及六君子汤而愈

一女子十二岁善怒睡中抽搐遍身作痒饮食少思此肝经风热脾土受克也用参术柴苓汤以清肝健脾而愈

一小儿三岁患急惊面赤发热作渴饮冷用泻青丸一服热衰大半因见得效翌早又自制一服反加吐泻发搐面色青白手足指冷此热既去而?自伤脾也用六君姜桂升麻柴胡一剂得安是以前哲谓小儿易为虚实攻伐之药衰其大半乃止不可过之罗谦甫约方约囊之论确矣

一小儿三岁因惊抽搐发热痰盛久服抱龙丸等药面色或赤或青此心肝二经血虚风热生痰也用六味丸滋肾生血用六君柴胡升麻调补脾胃而安一小儿潮热发热面色青赤此心肝二经血虚之症也用秘旨安神丸及四物汤加防风酸枣仁治之而愈

一小儿潮热发搐痰涎上涌手足指冷申酉时左腮青色隐白用补中益气汤调补脾肺六味丸滋养肝肾而愈

嘉兴王一山女七岁因跌伤腿膝两膝肿溃面色青洁左关无脉余谓惊则气散而风热郁滞於肝故其脉隐伏用四君升麻柴胡钩藤钩一剂脉至随愈一小儿印堂青黑至夜啼搐余谓脾土虚寒也用钩藤饮而安後因惊发搐夜啼仍用前药一剂诸症复愈又用异功散而痊

一小儿七岁患急惊将愈而发热惊悸误服祛风化痰之剂更加惊搐吐痰喘 腹胀少食恶寒再用抱龙丸大便似痢寒热往来殊类风症先君治之以为脾气亏损诸经无所滋养而然用四君子汤为主少加升麻柴胡以升补阳气而愈

一小儿惊风後痰 不止睡卧不宁诸药无效余用牛黄清心丸少许顿止後复伤风邪痰盛喘急饮食不下仍用牛黄丸少许而安再用异功散加桔梗而愈

利惊丸 治急惊痰盛发热潮搐

青黛 轻粉【各二钱】 牵牛末【半两】

右为末麝糊丸寒豆大每服十丸薄荷汤化下

安神鎮惊丸 惊退後調理安心神养气血和平预防之剂也

天竺黄【另研】人参 茯神 南星【姜制各五钱】酸枣仁【炒】麦门冬
当归【酒洗】生地黄【酒洗】赤芍药【炒各三钱】薄荷木通 黄连【姜汁炒】山梔【
炒】辰砂【另研】牛黄【另研】龙骨【煨各二钱】青黛【一钱另研】

右为末蜜丸菉豆大每服三五丸量儿大小加减淡姜汤送下

四物汤 治血虚发热烦躁或晡热作渴头目不清若因脾虚不能生血者用四君子汤

当归 熟地【各二钱】芍药 川芎【各一钱】

右水煎服

参术柴苓汤

人参 白术 茯苓 陈皮【各一钱】柴胡
升麻【各七分】山梔【炒八分】鈎藤鈎【一钱】甘草【炒五分】

每服一二钱姜枣水煎

黄连安神丸 治心经血虚头运神魂惊悸

黄连【酒洗六钱】甘草【炙五分】生地黄 当归【各一钱五分】朱砂【飞过五钱】

右为末饭糊丸梧子大每服十五丸空心白滚汤下如二三服不应当服归脾汤补之

牛黄清心丸 治诸风痙瘓语言?澁健忘恍惚头目眩运胷中烦郁痰塞喘 精神昏愤等症
或小儿风热上壅抽搐发热或急惊痰盛发搐目反口噤或大人伤寒汗下之後烦躁发热不
解并宜服之

牛黄【一钱二分半】麝香 龙脑 羚羊角【各一钱】当归防风 黄芩 白术 麦门冬
白芍药【各一钱半】柴胡 桔梗 白茯苓 大豆黄卷 芎藭肉桂
杏仁【去皮尖】阿胶【各一钱二分半】蒲黄 人参神麴【各三钱半】雄黄【八分】甘
草【五分】白朮【七分半】犀角【二钱】乾山药【七钱】乾姜【三钱】金箔【一百
三十片】大枣【十个蒸熟烂研】

右为末炼蜜丸每两作十丸金箔为衣每服一丸温水化下

朱砂丸【方见发搐】

泻青丸【方见肝脏】

导赤散【方见心脏】

抑青丸【方见肝脏】

补中益气汤【方见虚羸】

地黄丸【方见肾脏】

小柴胡汤【方见发痉】

六君子汤【方见天钩】

秘旨安神丸【方见心脏】

异功散【方见天钩】

慢惊

钱仲阳云慢惊因病後或吐泻或药饵伤损脾胃肢体逆冷口鼻气微手足痿痹昏睡露睛此脾虚生风无阳之症也温白丸主之盖慢惊者陰症也俱脏受病而属虚因吐泻脾肺俱虚肝木所乘而致痿痹微搐萎全善所谓木虚则搐而无力经所谓木不及曰委和其病摇头是也【谓手足搐动泄泻心悸】火虚则身寒口中气冷土虚则吐泻睡而露睛治宜温补脾胃用六君子汤五味异功散之类徐用诚云乙木属陰乃肝脏病故慢而难治况有夹热夹食夹痰与外感症相似者当宗钱氏方主之保婴集云急惊屡发而屡用直泻之药则脾陰愈消而变为慢惊多矣大率吐泻痰鸣气喘眼开神缓昏睡露睛惊跳搐搦乍发乍静或身热身冷面淡青白或眉唇青赤其脉迟沉数缓是也当温补脾气为主而佐以安心制肝东垣亦云慢惊风由脾胃虚而生脾虚者由火邪乘其土位火旺能实其木木旺故来克土当於心经中以甘温补土之源更於脾土中泻火以甘寒补金以酸凉致脾土中金旺火衰风木自虚矣禀赋不足或久病脾虚及常服克伐之药者多致此病若因土虚不能生金金不能平木木来侮土而致前症者以五味异功散加当归酸枣仁佐以鈎藤饮子补土平木若脾土虚寒者用六君子加炮姜木香不应急加附子以回阳气盖陰血生於脾土宜四君子当归酸枣仁凡元气亏损而致昏愦者急灸百会穴若待下痰不愈而後灸之则元气脱散而不救矣此乃脏腑传变已极总归虚处惟脾受之无风可逐无惊可疗因脾虚不能摄涎故津液泛而似痰者当依前法自效若不审其因泛用祛风化痰之剂则脾气益伤陰血益损病邪益盛而危矣

治验

举人余时正子伤食发丹服发表之剂手足抽搐服抱龙丸目瞶痰盛余谓脾胃亏损而变慢惊也无风可怯无痰可逐只宜温补胃气遂用六君加附子一剂而愈

一小儿抽搐痰涎自流或用惊风之药益甚视其面色黄白余用六君子补中益气二汤补脾肺而愈一小儿伤风咳 痰涌用六君桔梗桑皮杏仁治之而愈後饮食停滞作泻腹胀用六君加山查厚朴而安又复停食作呕或用药下之更加咳 余谓脾肺俱虚宜用调补彼以为缓自服发表尅滞前症益甚头项颤动余用天南星散倍加钩藤钩及异功散而愈

一小儿遇惊即痰盛咬牙发搐摇头作泻恪服脑麝朱砂等药以致慢惊而卒

术附汤

治风湿相搏身体烦疼不能转侧不呕不渴大便坚硬小便自利及风症头目眩重等症

白术【四两】甘草【炒二两】附子【炮去皮脐一两】

右为末入附子每服三钱姜五片枣一枚水煎服愚按附子温中回阳为慢惊之圣药也如元气未脱用之无有不应须用每只重一两三四钱端正不尖底平周围如莲花瓣者佳否则悞用川乌也制法切去皮尖以童便浸之秋冬七日春夏五日每日一换浸毕切作四块以湿草纸包数层微火煨半日取出切开无白星为度如急用炮至裂纹即投童便中良久浸透切片如色白再微灸之气脱甚者急生用亦效

太乙保生丹 治慢惊尚有阳症者

全蝎【青者十四个】白附子【生用】真僵蚕 蝉壳 琥珀防风 牛胆南星
朱砂【各一钱】麝香【五分】

右为末米糊丸桐子大金箔为衣每服一二丸薄荷汤化下

聚宝丹 治慢惊

人参 茯苓 琥珀 天麻 真僵蚕 全蝎【炙】防风 牛胆南星
白附子【生用】朱砂【五分】麝香【少许】乌蛇【肉酒浸焙一钱】

右为末炼蜜丸桐子大每服二丸菖蒲汤下

金箔镇心丸 治风壅痰热心神不宁惊悸烦渴唇焦颊赤夜卧不宁谵语狂妄

朱砂【一两】白茯苓人参甘草【各半两】山药【一两半】片脑
牙硝【一钱半】麝香【五分】金箔【十二贴为衣】草紫河车【二钱半黑豆煎煮】

右为末炼蜜丸每用五钱作十五丸以金箔为衣每服一丸薄荷汤化下含化亦得

温白丸 治驱风豁痰定惊

人参 防风 白附子【生用】真僵蚕 全蝎【各一钱焙】天麻
南星【汤洗七次焙各二钱】

右为末水糊丸桐子大每服三五丸姜汤下

乌蝎四君子汤即四君子汤加生川乌全蝎各少许为末每服半钱姜枣水煎服次服去川乌

天南星散 治慢惊驱风豁痰

南星【重八九钱者一个掘地坑深尺许先用炭五斤烧通红以好米醋一碗洒坑中即投南星以火炭密盖又用盆覆时许取出】

右为末入琥珀全蝎各一钱每服一字煎生姜防风汤下

乌沉汤 治慢惊驱风助胃

天麻【二钱】人参
真川乌【生用】全蝎【焙】南星【焙】木香沉香【各一钱】甘草【炒五分】

右为末每服三五分姜水煎服

沉香散 治助胃气止吐泻

茯苓【二钱】沉香丁香 木香 藿香 厚朴【制】甘草【炙各一钱】

右为末每服一字米饮汤调下

苏青丸

苏合香丸【一分】青州白丸子【二分】

右和匀每服五分姜汤调下

银白散 治胃虚吐泻

糯米【炒二两五钱】 匾豆【蒸二两】 藿香【二钱】 白术【炒一两】 丁香【二钱】 甘草【炙三钱】

右为末紫苏米饮调下直指方加炮白附子全蝎木香石莲姜水煎

钩藤散 治吐利脾胃气虚生风

钩藤钩【二钱】 蝉壳 天麻 防风 蝎尾【去毒】 人参【各半两】 麝香【五分】 麻黄 僵蚕【炒】 甘草【炙】 川芎【各二钱五分】

右为末水煎服虚寒加附子一钱

黑附子汤 治慢脾风四肢厥冷

附子【炒去皮三钱】 木香 人参【各一钱五分】 白附子【一钱】 甘草【炙五分】

右为散每服三钱姜五片水煎若手足既温即止後服

生附四君子汤 治吐泻不思乳食凡虚冷病先与数服以正胃气

人参 白术 附子 木香 茯苓 橘红 甘草【各等分】

右为末每服五七分姜枣水煎服

辰砂膏 治慢脾冷痰壅滞手足冷而微搐者

黑附子【一枚重一两以上者去皮脐顶上穿一孔入辰砂末一钱仍用附子塞之炭火烧存性】 白附子【炮】 五灵脂 蝎稍【各二钱半】 牛胆南星【半两】

右为末炼蜜丸桐子大每服二三钱生姜汁泡汤下

七宝辰砂丹 治风痰奇效慢惊慢脾以辰砂为主木香佐之用开元钱一个背後上下有两月片者放铁匙上炭火内烧少顷成珠子取入盏中作一服用木香煎汤送下人参汤亦可

天麻防风丸【方见脐风】

参苓白术散【方见虚羸】

异功散【即五味异功散方见虚羸】

四君子汤【方见天钩】

益黄散【方见脾脏】

六君子汤【方见天钩】

补中益气汤【方见虚羸】

惊癇

钱仲阳云小儿发癇因血气未充神气未实或为风邪所伤或为惊怪所触亦有因妊娠七情惊怖所致者若眼直目牵口噤涎流肚膨搐背项反张腰脊强劲形如死状终日不醒则为瘥矣如面赤目瞪吐舌嚙唇心烦气短其声如羊者曰心癇面青唇青两眼上视手足挛掣反折其声如犬者曰肝癇面黑目振吐涎沫形体如尸其声如猪者曰肾癇面如枯骨目白反视惊跳反折摇头吐沫其声如鸡者曰肺癇面色痿黄目直腹满自利四肢不收其声如牛者曰脾癇五癇通用五色丸为主仍参以各经之药心癇属血虚者用养心汤发热饮冷为实热用虎睛丸发热饮汤为虚热用妙香散肝癇者虚症用地黄丸抽搐有力为实邪用柴胡清肝散大便不通用泻青丸肾癇者用地黄丸紫河车丸之类肾无泻法故经从虚治之肺癇者属气虚用补肺散面色痿黄者土不能生也用五味异功散面色赤者陰火上冲於肺也用地黄丸脾癇者用五味异功散若面青泻利饮食少思用六君子加木香柴胡若发热抽搐仰卧面色光泽脉浮病在腑为阳易治身冷不搐覆卧面色黯黑脉沉病在脏为陰难治凡有此症先宜看耳後高骨间先有青脉纹抓破出血可免其患此皆元气不足之症也须以紫河车【即小儿胞也】丸为主而以补药佐之设若泛行剋伐复伤元气则必不时举发久而变危多至不救又有惊风食癇三种详见後方仍参惊风胎风治之

治验

一老人生子方周岁秋初暴冷忽发搐似惊癇过则气息奄奄此元气虚弱所致与补中益气汤而愈一小儿十岁一小儿七岁各有癇症岁发二次後因出痘及饮食停滞举发频数用六君子补中益气二汤而愈

一小儿患前症每发吐痰困倦半晌而苏诸药不应年至十三而频发用紫河车生研烂入人参当归末丸桐子大每服三五十丸日进三五服乳化下一月渐愈又佐以八珍汤全愈

一小儿七岁发惊癇每作先君令其恣饮人乳後发渐疎而轻至十四岁复发仍用人乳不应余令用肥厚紫河车研烂人乳调如泥日服二三次至数其而愈後常用加减八味丸而安至二十三岁发而手足厥冷仍用前法佐以八味丸十全大补汤而瘥

五癇丸 治诸癇

雄黄 真珠【各一两研细】朱砂【水飞半两】水银【二钱半用铅三两溶化入水银炒结候冷】

右为末炼蜜丸麻子大每服二三丸金银煎汤下

钱氏蛇黄丸 治惊癇因震骇恐怖叫号恍惚是也蛇黄【真者三个火煨醋淬】郁金【七分一处为末】麝香【另入一匙】

右为末饭丸桐子大每服一二丸煎金银磨刀水化下

牛黄丸 治风癇因汗出解脱风邪乘虚迷闷搐掣涎潮屈指如计数是也

牛胆南星 全蝎【焙】蝉脱【各二钱半】防风 白附子【生】天麻
真僵蚕【炒各钱半】麝香【半字】

右为末枣肉和丸水银半钱研细入药丸菉豆大每服一二丸荆芥生姜汤下

妙圣丹 治食癇因惊而停食吐乳寒热大便酸臭是也

赭石【煨醋淬二钱半】巴豆【三个去心油三钱】雄黄 蝎稍 朱砂【各一钱】轻粉
麝香【各一匙】杏仁【微炒二钱】

右为末枣肉丸梧子大每服一二丸木贼草煎汤送下

星苏散 治诸风口噤不语

天南星【略炮剉】

右每服五七分姜四片紫苏五叶水煎入雄猪胆少许温服

断癇丹 治癇瘥後复作症候多端连绵不除者黄耆【蜜炙】钩藤钩 细辛
甘草【炙各半两】蛇脱【二寸酒炙】蝉退【四个】牛黄【一钱另研】

右为末煮枣肉丸麻子大煎人参汤下每服数丸量儿加减

消风丸 治风癇先宜此药

牛胆南星【二钱】羌活 独活 防风 天麻 人参 荆芥 川芎 细辛【各一钱】

右为末蜜丸桐子大每服二丸薄荷紫苏汤调化下

祛风保安丸 诸风久远治之并验

川乌【去皮尖二钱半生用】五灵脂【半两】

右为末猪心血丸桐子大每服一二丸姜汤化下

雌黄丸 治颠癇搐掣恶声嚼舌

雌黄 黄丹【微炒各半两】麝香【五分】

右为末用牛乳汁三合熬膏杵丸麻子大每服二三丸温熟水下

比金丸 治惊癇先用此药

人参 琥珀 白茯苓 远志【姜制取肉炒】朱砂 天麻 川芎 石菖蒲【细密者】南星 青黛【各一钱】麝香【一匙】

右为末蜜丸桐子大每服一二丸金银薄荷汤下

虎睛丸 治惊癇邪气入心

虎睛【细研】远志【姜汁浸】犀角【钱屑】大黄【湿纸包煨】石菖蒲 麦门冬【各等分】蜣螂【去足翅炒三枚】

右为末米糊丸桐子大每服一二丸竹叶煎汤或金银薄荷煎汤下

清神汤 治惊癇

犀角【镑】远志【姜制焙】白藓皮 石菖蒲 人参 甘草【炒各一钱半】

右为末每服五七分麦门冬煎汤调下

密陀僧散

治心癇不语及诸惊失音用密陀僧为末每服一匙米醋汤调下大人服一钱热酒下

蝎虎散 治惊癇

褐色生蝎虎【一个连血细研】

右入朱砂麝末少许同研用薄荷汤调作一服数年者亦效盖癇疾皆心血虚滯生蝎虎管守其血继服二陈汤若无生蝎以带性雄猪心血代用入代赭石散尤妙

代赭石散 治陰阳癇

代赭石【煅醋淬研为末水飞过晒乾】

右为末每服五分以金银煎汤和金箔银箔调连进二服脚胫上有赤斑乃邪气发出可治无赤斑则难治

化风丹 凉风化痰退热定搐

羌活 独活 防风 牛胆南星 天麻 人参 川芎 荆芥 粉草【各一钱】 全蝎【一个】

右为末炼蜜丸皂角子大每服一钱薄荷汤化下

茯神汤 治胆气虚寒头痛目眩心神恐惧不能独处或是惊癇

茯神 酸枣仁【炒】 栝子仁【炒】 白芍药【炒】 五味子【炒】 黄耆【炒各一两】 桂心 熟地黄【自制】 人参 甘草【炒五分】

右每二三钱水煎

酸枣仁丸 治胆气实热惊癇或睡卧不安惊悸怔忡茯神 酸枣仁【炒】 远志 栝子仁【炒】 防风 枳殼【麸炒各半两】 生地黄【杵膏半两】 香竹茹【二钱五分】

右各另为末蜜丸粟米大每服七八十丸滚汤送下

定志丸 治心神虚怯所患同前或语言鬼神喜笑惊悸

人参 茯苓【各一两半】 菖蒲 远志【各一两】

右各另为末蜜丸如前服

养心汤 治心血虚怯惊癇或惊悸怔忡盗汗无寐发热烦躁

黄耆 白茯苓 茯神 半夏麴 当归 川芎 桂 栝子仁 酸枣仁 五味子
人参【各三钱】甘草【炒四钱】

右每服一二钱姜枣水煎

妙香散 治心气不足惊癇或精神恍惚虚烦少寐盗汗等症

辰砂【三钱】麝香【一钱】木香【煨二钱半】茯苓 山药 茯神远志
地黄【炒各一两】桔梗 甘草【炒】人参【各五钱】

右各另为末每服一钱温酒或白汤调服

八味地黄丸【即六味地黄丸加附子肉桂各一两】治禀赋命门火衰不能生土以致脾土虚寒或饮食少思或食而不化脐腹疼痛夜多漩溺等症经云益火之源以消阴翳盖谓此也或乳母命门火衰儿饮其乳致前症者子母并宜服之【方见惊癇】

加减八味丸 治禀赋肾阴不足或吐泻久病津液亏损口乾作渴或口舌生疮两足发热或痰气上涌或手足厥冷等症【即地黄丸加肉桂一两五味子四两】

地黄丸 治小儿肝经虚热血燥或风客淫气而患瘰癧结核或四肢发搐眼目抽动痰涎上涌又治肾疳脑热肢体消瘦手足如水寒热往来滑泄肚胀口臭乾渴齿龈溃烂爪黑面黧遍身或两耳生疮或耳内出水或发热自汗盗汗便血诸血失音等症其功不能尽述【即六味地黄丸方见肾脏】

八珍汤 治气血俱虚阴火内热或因剋伐之剂脾胃亏损肌肉消瘦等症【即四君四物二汤方见惊癇】

十全大补汤

治气血虚弱或禀赋不足寒热自汗食减体瘦发热作渴头痛眩晕最宜用之【方见热症】

补中益气汤【方见虚羸】

六君子汤【方见内钓】

紫霜丸

天麻丸【二方见脐风】

惊风

惊风者虚惕怔忡气怯神散痰涎来去泄泻色青若惊入心则面赤夜啼用梔子清肝散加黄连入肝则面青眼窜用柴胡清肝散入脾则面黄呕吐虚汗嗜卧用六君加柴胡山梔入肺则面白喘急用异功散加柴胡桔梗入肾则面黑啮你咬牙用六味地黄丸若因乳母恚怒肝火或膏粱积热遗儿为患或儿吐泻伤脾清气不升风木陷入太陰传变等因皆能致此当随主治否则必成慢脾也须预慎防为善

治验

一小儿十五岁御女後复劳役考试失意患癇症三年矣遇劳则发用十全大补汤加味归脾汤之类更以紫河车生研如膏入蒸糯米为末丸如桐子大每服百丸日三五服而痊後患遗精盗汗发热仍用前药及地黄丸而愈此症治不拘男妇老幼皆效一小儿周岁从桌上仆地良久复苏发抽吐痰沫服定惊化痰等药遇惊即复作毕姻後不时发而难愈形气俱虚面色痿黄服十全大补补中益气二汤而愈

至宝丹 治诸惊癇心热及卒中客忤烦躁风涎搐搦或伤寒狂语伏热呕吐

生犀角【镑】生玳瑁 朱砂【水飞】雄黄【水飞】琥珀【各一两】银箔【五十片】片脑【一匙】金箔【五十片半为衣】麝香【一钱】牛黄【半两】安息香【一两半为末酒掬去砂取一两酒煎成膏】

右各另研为末和匀入安息香膏如乾入熟蜜少许丸桐子大每服一二丸人参汤化下量儿加減

神妙夺命丹 七日内取青蒿节内虫入朱砂麝为丸麻子大每服三五丸姜汤下

人参羌活散 治伤风惊热

羌活 独活 前胡 柴胡 川芎 白茯苓 桔梗 枳殼 人参 地骨皮 天麻【各等分】甘草【減半】

右生姜薄荷水煎治惊热加蝉蜕

防风导赤散 治初惊

生地黄 木通【去节】 防风 甘草【各等分】

右每服三钱竹叶少许水煎有热加黄芩赤芍药羌活

蝉蜕鈎藤饮 治肚疼惊啼

鉤藤鉤 天麻 茯苓 白芍药 川芎【各三钱】 甘草 蝉蜕【各一两】

右入灯心水煎

七宝洗心散 治烦热生疮兼治惊风

生地黄 荆芥穗 防风 甘草 黄芩 羌活 赤芍药【各等分】

右为末每服一钱灯心薄荷汤调下

神芎丸 治风热壅滞头目昏眩口舌生疮牙齿疳蚀或遍身疮疥咬牙惊惕怔忡烦躁作渴或大便澁滞或积热腹满惊风潮搐等症

大黄【生】 黄芩【各二两】 滑石【四两】 生牵牛末【一两】 黄连 薄荷叶 川芎【各半两】

右为末水糊丸桐子大每服三四丸温水下

清心丸 治惊热烦躁

人参 茯神 防风 朱砂 柴胡【各二钱】 金箔【三十片】

右为末炼蜜丸桐子大每服一二丸竹?调下

化风丹【方见惊癇】

安神丸【方见心脏】

辰砂膏【方见急惊】

柴胡清肝散【方见热症】

六味地黄丸【方见肾症】

梔子清肝散【方见诸热】

十全大补汤【即八珍汤加黄蓍内桂】

异功散【方见天钩】

补中益气汤【方见虚羸】

六君子汤【方见天钩】

天钩内钩

天钩者发时头目仰视惊悸壮热两目反张泪出不流手足搐掣不时悲笑如鬼祟所附甚者爪甲皆青盖因乳母厚味积毒在胃致儿心肺生热痰郁滞或外挟风邪为患法当解利其邪用钩藤饮上气喘粗者用乌蝎四君子汤内钩者腹痛多喘唇黑囊肿伛偻反张眼尾赤此胎中受风及外惊所致若内脏抽掣作痛狂叫或泄泻缩脚内症一作外症亦然极难调理内症服聚宝丹外症服钩藤饮进乳食者可治若腹痛唇黑囊肿之类用聚宝丹若外惊内脏抽搐之类用钩藤饮若因乳母醇酒厚味积毒在胃用加味清胃散若因乳母郁怒积热在肝用加味逍遥散加味归脾汤俱加漏芦子母俱服凡母食膏粱厚味饲儿之时先挤去宿乳然後吮之

治验

一小儿因乳母受惊发搐时目赤壮热腹痛哭而曲腰用四物加柴胡防风又用加味逍遥散加熟地黄以清肝热生肝血再用地黄丸滋肾水以生肝木母子俱安

一小儿曲腰而啼面青唇黑此寒气所乘内钩腹痛也用五味异功散加木香乾姜一剂与母服之顿愈後因母感寒腹痛而啼用人参理中汤一剂与母服其子亦安

一小儿曲腰乾啼手足并冷用六君加乾姜木香服之未应又加肉桂母子俱服而愈

一小儿忽乾啼作泻睡中搐手足冷此脾土虚寒肝木侮之而作发搐乃内钩也用益黄散一剂而安用四君柴胡升麻乳食渐进而安

一小儿乾啼面青或赤手足并热或用清热之剂久不愈诊其乳母有肝火气滞用加味逍遥散及越鞠丸以治其母时灌子数滴不旬日子母并愈

一小儿患前症服魏香散而愈後复作服祛风镇惊之药上气喘粗此元气虚寒也余先用乌蝎四君子汤稍愈但倦怠殊甚用补中益气汤及五味异功散而痊

一小儿因母每感寒腹痛饮烧酒发热痰盛面赤手足并热属胃经实热之天钩也用清胃散子母服之并愈後因伤乳吐泻面色或青或白手足并冷属脾气虚寒用六君木香乾姜而愈三岁後伤食腹痛唇黑作泻数去後而无粪或粪少而青此气虚寒下陷用补中益气汤渐愈

一小儿啼哭陰囊肿大眼目上翻赤脉流泪此肝热内钩用柴胡清肝散加钩藤钩治之诸症

渐愈又用钩藤饮而痊後复发或用祛病根之药致乳食日少肚中胀痛手足浮肿余先用六君升麻柴胡数剂诸症稍愈又伤乳食吐泻用平胃散一服即愈

一小儿因乳母怀抱郁结腹痛发搐久而不愈用加味归脾汤加漏芦母子并服渐愈又母大怒发厥而苏儿遂食乳腹痛作泻面青作呕先用小柴胡汤二剂母子并服少愈其母又咽酸腹胀用越鞠丸加味归脾汤佐以加味逍遥散而痊

钩藤膏 治腹痛乾啼作呕名盘肠内钩

乳香 没药 木香 姜黄【各一钱】 木鼈子【三个去油】

右为末蜜丸皂角子大钩藤钩汤磨半丸入蜜服未止再服魏香散

魏香散

阿魏【二钱先用温酒溶化】 蓬术【五钱】

右将蓬术浸阿魏酒中一伏时焙乾为末每服二三分紫苏米饮调下

钩藤饮 治小儿脏寒夜啼陰极发躁此方主之钩藤 茯神 茯苓 川芎 当归 木香甘草 芍药【各一钱】

右为末每服一钱姜枣水煎若心经热脸红舌白小便赤澁用钩藤饮去木香加朱砂末一钱木通汤下

乳香丸 治惊风内钩腹痛惊啼

乳香【五分】 没药 沉香【各一钱】 蝎稍【十四个】 鸡心栳榔【一钱五分】

右为末蜜丸桐子大每服二三钱菖蒲钩藤钩煎汤下

木香丸 治病同前

木香 全蝎【各五分】 没药 茴香 钩藤钩【各一钱】

右各别为末以大蒜研烂和丸桐子大晒乾每服二丸钩藤煎汤下

清胃散 治胃火牙痛或连头面

升麻【五分】 生地黄 牡丹皮 黄连【炒】 当归【各三分】

右水煎服加柴胡山梔即加味清胃散

愚按前方治脾胃实火作渴口舌生疮或唇口肿痛齿龈溃烂焮连头面或恶寒发热或重舌马牙吐舌流涎等症子母并宜服之若因脾胃气虚寒凉尅伐或虚热上行口舌生疮弄舌发热饮食少思或呕吐困睡大便不实流涎龈烂者用五味异功散

四君子汤 治脾气虚损吐泻少食

人参 白术 茯苓 甘草【各等分】

右每服二钱姜枣水煎【新增】

愚按前方若胃气虚弱尅伐伤脾饮食少思或食而难化若作呕作泄尤宜用之如兼痰 气逆肢体倦怠面目浮肿者宜六君子汤

六君子汤即四君子加陈皮半夏 治脾胃气虚吐泻不食肌肉消瘦或肺虚痰 喘促恶寒或肝虚惊搐目眩自汗诸症并宜服之以滋化源【方见内韵】

钱氏异功散 治吐泻不食脾胃虚冷者先与数服以益中州之气

人参 茯苓 白术 甘草【炒】 陈皮【各等分】

右为末每服二三钱姜枣水煎

愚按前方治脾胃虚弱吐泻不食或惊搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虚弱咳嗽吐痰或虚热上攻口舌生疮弄舌流涎若母有症致儿患此者子母并服之

加味归脾汤去丹皮山梔即归脾汤 治脾虚弱损捷忘惊悸等症

人参 茯神【去木】 黄耆【各一钱】 甘草
白术【炒一钱】 木香【五分】 远志【去心】 酸枣仁 龙眼肉 当归
牡丹皮 山梔【炒各一钱】

右水煎服

愚按前方若乳母忧思伤脾血虚发热食少体倦或脾虚不能统摄以致陰血妄行或健忘怔忡惊悸少寐或心脾作痛自汗盗汗或肢体肿痛大便不调或妇人经候不调晡热内热或蚘

唇流注等症致儿为患者令子母俱服之

加味逍遥散去牡丹皮山梔即逍遥散 治肝脾血虚等症

当归 甘草【炙】 芍药【酒炒】 茯苓 白术【炒】 柴胡【各一钱】 牡丹皮
山梔【炒各七分】

右水煎服

愚按前方若乳母肝脾血虚内热寒热遍身搔痒肢体作痛头目昏重怔忡頰赤口燥咽乾或
发热盗汗食少不寐或口舌生疮耳内作痛胃乳腹胀小便不利致儿为患尤宜用之又治妇
人陰虚发热儿饮其乳以致患疮者

越鞠丸 治六郁饮食少思或胃满吐酸齿痛疮疥等症

苍术 抚芎 香附 神麴【炒】 山梔【炒】 麦芽【炒】 山楂【各等分】

右各为末水煮神麴麦芽末糊丸粟米大每服百丸白汤送下

鎮心丸 治急惊化痰鎮心

朱砂 龙齿 牛黄【各一钱】 铁粉 琥珀 人参茯苓 防风【各二钱】 全蝎【七个焙】

右为末蜜丸桐子大每服一二丸薄荷汤送下

聚宝丹

乌蝎四君子汤【二方见慢惊】

平胃散

益黄散【方见噤风】

人参理中汤【方见伤寒】

补中益气汤【方见虚羸】

六君子汤【方见内钓】

鈎藤散【方见慢惊】

地黄丸【方见肾脏】

柴胡清肝散【方见热症】

四物汤【方见急惊】

小柴胡汤【方见痙症】

盘肠气痛

小儿盘肠气者痛则曲腰乾啼额上有汗皆由肝经风邪所搏也肝肾居下故痛则曲腰乾啼者风燥其液故无泪也额上有汗者风木助心火也口闭足冷者脾气不营也下利青粪者肝木乘脾也皆由产下澡洗受风冷所致当服鈎藤膏之类若乳母及儿受寒邪者用沉香汤之类若儿额间有汗口闭脚冷乃虚寒也用当归散或沉香降气汤之类若面赤唇焦小便不通小腹胀痛者乃小肠热也用人参汤送下三黄丸若痛不止煎葱汤淋揉其腹就以热葱熨脐腹间良久尿出痛止或以乳香没药木香各少许水煎灌匙许若因乳母饮食停滞者用保和丸怀抱气郁者加味归脾汤怒动肝火者加味逍遥散子母俱服

治验

一小儿曲腰啼叫右腮青黑此肚腹内痛因脾土虚寒肝木乘之也用六君子加木香鈎藤鈎即愈一小儿因乳母大怒亦患前症面赤而啼小便不利用加味逍遥散加木通车前子母子服之并愈一小儿啼叫面赤手足不冷用鈎藤饮随愈後因其母饮酒厚味仍作啼手足发热又用前药加生地黄而愈後又面青手冷啼叫吐泻其粪腥秽用助胃膏一服而安

一小儿患前症曲腰而啼额间出汗足冷唇青粪青先用鈎藤膏治愈後复患仍用鈎藤鈎膏而痛减半又煎葱汤熨洗其腹腹痛遂安

一小儿唇青足冷啼声不絶用助胃膏一服稍安又食生冷之物前症仍作更泄泻不止先用六君子加木香乾姜一剂乃去木香乾姜又二剂其泻顿止又用四君子少加升麻四剂饮食加进

一小儿十四岁腹痛吐泻手足常冷肌体瘦弱余谓所禀命门火虚也用六君子汤八味丸九渐愈毕姻後因房劳勤读感冒发汗继以饮食劳倦朝冷暮热饮食不思用六君子十全大补二汤寻愈後不慎饮食起居午前脐下热起则遍身如灸午後自足寒至腰如水热时脉洪大按之如无两尺微甚寒时则六脉微细如絶汤粥稍离火食之即腹中觉冷此亦禀命门火衰之症也用补中益气汤八味丸各百余服渐愈後大吐血别误服犀角地黄丸一剂病益甚饮食

顿减面色?白手足厥冷或时发热寒时脉微细而短者阳气虚微也热时脉洪大而虚者陰火虚旺也余用十全大补及八珍汤六君子之类但能扶持而血不止复因劳役吐血甚多脉洪大鼓指按之如无而两寸脉短此阳气太虚也用人参一两附子一钱佐以补中益气汤数剂诸症渐退乃减附子五分又各数剂脉症悉退乃每服用人参五钱炮姜五分月余始愈

当归散 治脏寒腹疼面青手冷夜啼不乳

当归 白芍药 人参 甘草【炙二分】 桔梗 橘皮【各一钱去白】

右为末水煎半盏时时少与服

沉香降气汤

治气不升降胸膈痞塞心腹胀满喘促短气乾哕烦闷咳嗽痰涎口中无味嗜卧不食沉香砂仁【各一钱】 甘草【七钱半】 香附子【二两半】

右为末每服一钱入盐少许沸汤点平旦空心服愚按前方若乳母中气郁滞不能升降患此症致儿作痛者亦用之

三黄丸【方见疝气】

加味归脾汤

加味逍遥散

鈎藤膏【三方见天钩】

助胃膏【方见热吐】

魏香散【方见内钩】

方君子汤【方见内钩】

四神丸【方见脱肛】

八味丸

地黄丸【并见肾脏】

补中益气汤【方见虚羸】

胎惊

小儿胎惊风者因妊妇饮酒忿怒惊跌或外挟风邪内伤於胎儿生下即病也若月内壮热翻眼握拳噤口出涎腰强搐掣惊怖啼叫顙缩顙开颊赤面青眼合者当散风利惊化痰调气及贴顙法甚则以朱银丸下之若面青拳搐用保命丹钩藤散之类切不可悞作脾风妄用温药若眉间色赤或虎口指纹曲里者可治用钩藤散全蝎散若眉间青黑或指纹反出外者不治大抵小儿脏腑脆弱不可辄用银粉镇坠之剂反伤真气多致不救者且妊娠每月各有经脉滋养一月属肝二月属胆三月属心四月属小肠五月属脾六月属胃七月属肺八月属大肠九月属肾十月属膀胱多因妊娠时受惠而作也须察其某月受病病在某经和其阴阳调其脾胃兼以见症之药佐之无有不愈

治验

一小儿患胎惊诸药不应用紫河车研烂如泥每用钱许乳化服之更以十全大补汤加钩藤钩漏芦与母服两月余举发渐轻服年余举发渐稀服年余不再发至出痘後复发取紫河车研烂入糯米粉丸小豇大每服百丸以乳送下服二具全瘥毕姻又发仍用前丸及十全大补汤六味丸加当归黄耆肉桂五味子年余喜其能远帷幕得瘥後因劳役更作又用前丸及十全大补等药不应用大剂独参汤服数斤然後举发稍缓乃用人参二两附子一钱数服顿止仍用前药间用独参汤而瘥

一小儿患胎惊用紫河车丸及十全大补汤及钩藤膏而愈毕姻後复发用大剂独参汤六味丸加五味子黄耆当归煎服半载举发稍轻年余不再发後每劳役怒气仍发即用前药随愈又伤寒愈後复作虚症悉具莫能名状用紫河车二具独参煎汤十余斤而瘥後患伤风咳嗽咽乾内热用六味地黄丸料加五味子煎服及十全大补汤而瘥

十全大补汤【即八珍汤加黄耆肉桂四物四君合用方见急惊】

八珍汤【加黄耆肉桂即四君四物二汤是也四君见内钓四物见急惊】

地黄丸【方见肾脏】

朱银丸【方见噤风撮口】

保命丹【方见发搐】

钓藤散【方见慢惊】

全蝎散【方见偏风口噤】

贴額法【方见发搐】

钓藤膏【方见天钩】

紫河车丸【方见前症】

胎风

小儿初生其身有如汤泼火伤者此皆乳母过食膏粱所致也其母宜服清胃散及逍遥散以清其气血儿亦饮数滴可也有身无皮肤而不嫩赤者皆由产母脾气不足也用粳米粉傅之嫩赤发热者皆由产母胃中火盛也用石膏傅之经胃脾主肌肉肺主皮毛故知病脾肺也如脑额生疮者火土相合遂成湿热下流攻击肾水也难治如脚上有疮者陰虛火盛也此不满五岁而毙如未满月而撮口握拳腰软如随者此肝肾中邪胜正弱所致也三日内必不治如男指向里女指向外尚可治眉红亦不可治可治者用全蝎散钓藤散等类治之若因大病亏损胃气而诸脏虚弱所致者用补中益气汤钱氏地黄丸若面唇赤色正属肾水不足肝经陰虛火动而内生风热尔当滋肾水以制阳光其身软者内稟气不足肌肉未坚也当参五软而施治之

清胃散

逍遥散【二方见内钩】

全蝎散【方见口噤】

钓藤散【方见慢惊】

补中益气汤【方见虚羸】

钱氏地黄丸【方见肾脏】

五软

五软者头项手足肉口是也夫头软者脏腑骨脉皆虚诸阳之气不足也乃天柱骨弱肾主骨足少陰太阳经虚也手足软者脾主四肢乃中州之气不足不能荣养四肢故肉少皮寬饮食不为肌肤也口软者口为脾之窍上下龈属手足阳明阳明主胃脾胃气虚舌不能藏而常舒出也夫心主血肝主筋脾主肉肺主气肾主骨此五者皆因稟五臟之气虚弱不能滋养充达故骨脉不强肢体痿弱源其要总归於胃盖胃水谷之海为五脏之本六腑之大源也治法必先以脾胃为主俱用补中益气汤以滋化源头项手足三软兼服地黄丸凡此症必须多用二药仍令壮年乳母饮之兼慎风寒调饮食多能全形

治验

吴江史万湖子七岁患吐泻顙目顿陷天柱骨倒兼面赤色余适在彼先用补中益气汤加附子一剂吐泻止而诸症愈又用钱氏地黄丸料煎服顿安一小儿七岁夏间过食生冷之物早间患吐泻面赤作渴手足并热项软顙陷午後面色顿白手足并冷脉微欲絶急以六君子汤加附子一剂诸症顿退顙顶顿起而安小儿元气易虚易实故虽危症若能速用对病之药亦可回生者

一小儿九岁因吐泻後项软面白手足并冷脉微细饮食喜热余先用六君子汤加肉桂五剂未应更加炮姜四剂诸症稍愈面色未复尺脉未起佐以八味丸月余面色微黄稍有胃气矣再用前药又月余饮食略增热亦大减乃朝用补中益气汤食前用八味丸又月余元气渐复饮食举首如常又月余而肌肉充盛诸病悉愈

一小儿十二岁症疾後项软手足冷饮食少思粥汤稍离火食之即腹中觉冷用六君子汤加肉桂乾姜饮食渐加每饮食中加茴香胡椒之类月余粥食稍可离火又用前药百剂饮食如常手足不冷又月余其首能举後饮食停滞患吐泻项乃痿软朝用补中益气汤夕用六君子汤及加減八味丸两月余而项复举毕姻後眼目昏花项骨无力头自觉大用八味丸补中益气汤三月余元气复而诸症退後每入房劳役形气殊倦盗汗发热服後二药即愈

一小儿十五岁手足痿软齿不能嚼坚物内热晡热小便澁滯如淋服分利之剂小便如淋服滋陰之剂内热益甚服燥湿之剂大便重坠余谓此稟肾气不足早犯色慾所致故精血篇云男子精未滿而御女以通其精五脏有不满之处异日有难状之疾老人陰已痿而思色以降其精则精不出而内败小便澁痛如淋若陰已耗而复竭之则大小便牵痛愈痛则愈便愈便则愈痛正谓此也遂朝用补中益气汤夕用六味丸加五味子煎服各三十余剂诸症渐愈後梦遗诸症复作手足时冷痰气上急用十全大补汤加減八味丸料各八剂二便稍利手足稍温仍用前二药三月余元气渐复饮食如常又饮食停滞吐泻腹痛按之不疼此脾胃受伤也用六君子汤加木香肉荳蔻治之其吐未已左尺右关二脉轻诊浮大按之如无经云肾开窍於二陰用五味子散四服大便顿止後又伤食咽酸作泻大便重坠朝用补中益气汤夕用六君子汤加木香乾姜而痊

一老年得子四肢痿软而恶风寒见日则喜余令乳母日服加減八味丸三次十全大补汤一剂兼与其子年余肢体渐强至二周而能行

一小儿五岁稟父腿软不便於行早丧天真年至十七毕姻後腿软头 自觉开大喜其自谨寓居道舍遂朝服补中益气汤夕用地黄丸料加五味子鹿茸煎服年余而健

一小儿项软服前二药而愈毕姻後患解颅作渴发热以二药作大剂煎熟代茶恣饮两月余而渴热減年余而顙合又年余而肢体强若非慎疾虽药不起

星附膏 治项软

天南星 附子【各?分】

右为末用生姜自然汁调敷项间乾则润之

六君子汤【方见天钩】

加減八味丸【即六味丸加肉桂五味子方见肾脏】

十全大补汤【即八珍汤加黄耆肉桂】

补中益气汤【方见虚羸】

地黄丸【方见肾脏】

五味子散【方见】

五硬

五硬者仰头取气难以动摇气壅作痛连於胃膈脚手心冷而硬此阳气不营於四末也经曰脾主四肢又曰脾主诸陰今手足冷而硬者独阳无陰也故难治若肚筋青急者木乘土位也急用六君炮姜肉桂柴胡升麻以复其真气若系风邪当参惊风治之此症从肝脾二脏受惠当补脾平肝仍参痉症急慢惊风门治之小续命汤

治中风不省人事涎鸣反张失音厥冷麻黄 人参 黄芩 川芎
官桂【去皮】甘草【炒】杏仁【去皮尖炒】汉防已
芍药【各半两】防风【七钱半】炮附子【去皮脐二钱】

每服一钱水煎服

六君子汤【方见天钩】

薛氏医案卷五十六

卷五十七

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷五十七

明 薛己 订

保婴撮要四

风热风症

中风之症西北方有之东南气温腠理疏泄人患之者皆类中风也况小儿元气未充皮毛不固易虚易实外邪乘之则壮热抽掣气粗涎涌甚至昏愦口噤即似中风悞以续命等汤投之多至不救大人且无真中况小儿乎凡有前症当辨其因若阳明经气虚风邪所乘筋脉拘急者为外因足厥阴肝火炽盛筋脉偏急者为内因脾肺虚弱腠理不密外邪乘入或惊风过服金石之剂耗损肝血或吐泻後内亡津液不能养肝致口眼喎斜者皆肝血不足肝火生风之类中风之类症也

治验方药【散见各症】

痉症

发痉之症因伤风汗出悞发汗或湿症汗多所致若项背强直腰背反张摇头掣𤿰口不语发热腹痛病在足太阳也若面目赤色无汗恶寒牙关紧急肢体反张痰涎壅盛昏愦烦渴小便赤澀先谵语而发者名刚痉当发汗若大便滑泄不语不渴有汗而不恶寒先手足厥冷而发者名柔痉并以小续命汤加减主之刚痉去附子用麻黄柔痉用附子去麻黄若壮热谵语口乾手足微寒大便滑泄此兼刚柔无汗用葛根汤有汗用桂枝加葛根汤若痰塞气盛用南星半夏茯苓以消痰枳实陈皮紫苏以顺气更审其热轻者用败毒散热盛者用小柴胡汤壮热有汗胸满口噤咬牙便闭为内热以大承气汤下之後用大柴胡汤解之过三日则难治此皆治六淫外伤元气形病俱实之法也若小儿多因惊骇停食或乳母六淫七情饮食起居失宜所致更当审之兼治其母大要因惊目直呵欠项强顿闷属肝经实热用抑肝散咬牙呵欠手寻衣领属肝经虚热用地黄丸若肺金不能平木用异攻散脾不能养肝用六君子汤水不能生木用地黄丸

治验

一小儿感冒发热咳嗽咬牙余以为脾肺气虚不信乃用解散之药果项强口噤汗出不止手足并冷遂用五味异功散加柴胡木香治之渐愈但日晡微热睡而露睛用补中益气汤而痊

一小儿因惊发热误行表散出汗面白晡发痉先兄谓脾肺气虚而肝胆邪盛以六君子加柴胡升麻治之乃发於寅卯时此肝邪自旺也用加味逍遥散一剂其热顿退又用补中益气汤六味地黄丸而愈一小儿患瘰癧溃而发痉顿闷咬牙寒热此属肝经风热先用柴胡栀子散一剂寒热顿止次用四物参芪白术柴胡渐止又用补中益气汤加芍药茯苓而痊

一小儿头患疮溃而发痉或寒热作渴或手足厥冷其脉洪大浮缓按之皆微细此元气虚而邪气实也用十全大补汤加柴胡山梔数剂诸症渐退而脉渐敛又十余剂而愈

一小儿惊风服抱龙丸保生锭吐涎甚多又汗出发痉仍欲祛痰余曰此肝脾血虚而内生风耳吐痰不止脾肺气虚不能摄涎也汗出发痉脾肺气虚而亡阳也用六君子汤加炮姜木香顿愈又用四君子加归芪而安

一小儿伤风发热服解散之药汗出不止痉症悉具其脉洪大鼓指按之微细此汗多亡阳脾肺气虚之症也用异功散加芍药归黄芪其汗顿止又用补中益气汤而痊

一小儿停食腹痛发热呕吐服峻厉之剂更吐泻汗多手足并冷发痉不止其脉浮洪按之如丝用六君子汤加升麻炮姜痉顿已惟寒热往来又用四君升麻柴胡而愈

少参王阳湖孙女年八岁发痉服降火消导之剂其脉浮洪寒热如疟余用四君子加升麻柴胡炮姜钩藤钩及补中益气汤间服渐愈但脇下作痛去炮姜加木香肉桂而痊

一小儿因乳母大怒发热脇痛亦患前症兼汗出作呕先用小柴胡汤一剂子母俱服顿愈但日晡潮热以异功散加升麻柴胡治之并愈

一小儿因乳母发热吐泻一小儿因乳母食厥昏愤同患前症各治其母而子悉愈

桂枝加乾葛汤 治头疼项背强几几汗出恶风者

桂枝 芍药 甘草 葛根【四钱】

右每服二钱姜枣水煎

小柴胡汤 治身热恶寒风痉项强直急胸脇满痛呕哕烦渴寒热往来或身面皆黄小便不利大便秘澁或惊过不解潮热不除及差後劳复发热疼痛如疟发作有时【方见肝脏】

加味小柴胡汤【即小柴胡加山梔牡丹皮】

保生锭子 治慢惊尚有阳症

全蝎 白附子【炮】 僵蚕 牛胆南星 蝉蜕 琥珀
辰砂【各一钱】 麝香【五分】 防风【一钱】

右为末糊搜和捏成锭子金银箔为衣用薄荷汤磨服

大柴胡汤 治表里热大便秘滞胸满脇痛

柴胡 枳实【各二两二钱】 半夏【一两五钱】 赤芍药【一两八钱】 黄芩【二两】 大黄
【三两七钱五分】

右生姜红枣煎不拘时服

小续命汤【方见五硬】

抑肝散【方见肝脏】

地黄丸【方见肾脏】

败毒散【方见发热】

六君子汤

五味异功散【二方见内钩】

补中益气汤【方见虚羸】

加味逍遥散【方见内钩】

柴胡栀子散【方见发热】

四物汤【方见急惊】

十全大补汤【八珍汤加黄芪肉桂即四君四物二汤合用】

抱龙丸【方见伤寒】

四君子汤【方见内钩】

大承气汤 治刚痉胸满内实口噤咬牙大热发渴大便秘澀

大黄 芒硝【各五钱】 厚朴【一两】 枳实

葛根汤 治太阳病项强几几恶风无汗及恶寒刚痉

葛根【四两】 麻黄【三钱】 桂枝【一两】

右每服二钱水煎

夜啼

夜啼有二曰脾寒曰心热也夜属陰陰胜则脾脏之寒愈盛脾为至陰喜温而恶寒寒则腹中作痛故曲腰而啼其候面青白手腹俱冷不思乳食是也亦曰胎寒用鈎藤散若见灯愈啼者心热也心属火见灯则烦热内生两阳相抐故仰身而啼其候面赤手腹俱暖口中气热是也用导赤散若面色白黑睛少属肾气不足至夜陰虚而啼也宜用六味丸若兼泄泻不乳脾肾虚弱也用六神散若兼吐泻少食脾胃虚寒也用六君炮木香大便不化食少腹胀脾气虚弱也用异功散心血不足者秘旨安神丸木火相抐者柴胡栀子散肝血不足者地黄丸大抵此症或因吐泻内亡津液或禀父肾陰不足不能滋养肝木或乳母恚怒肝火侮金当用六君子汤补脾土以生肺金地黄丸壮肾水以滋肝木若乳母鬱闷而致者用加味归脾汤乳母暴怒者加味小柴胡汤乳母心肝热抐柴胡栀子散仍宜参客忤惊啼览之

治验

一小儿发热夜啼乳食不进昏迷抽搐痰盛口噤此脾肺气虚风木所乘痰食积於胸腹也先用大安丸後用六君鈎藤鈎而痊

一小儿三岁面白夜啼小便青而数此肺肾虚弱朝用补中益气汤加肉桂一分夕用地黄丸而愈大凡小儿面色青黑睛少或解颅足热者出痘多在肾经预用地黄丸补肾气多得无恙者

一小儿二岁夜啼面色赤黑睛色淡小便频赤朝用补中益气汤加山药五味夕用地黄丸而愈

龙齿散 治拘哭肚疼惊热

龙齿 蝉脱 鈎藤鈎 羌活 茯苓【各等分】

右为末每服一钱水煎服

碧云散 治浑身壮热夜啼

栝叶【二分】 南星 僵蚕 全蝎 鬱金 雄黄【各一钱】

右为末每服一字用薄荷汤入蜜调服

六神散 治腹痛面色青口中气冷及四肢俱冷曲腰而啼或泄泻不乳

人参 山药 白术【各五钱】 甘草【炒二钱】 茯苓 扁豆【炒各一两】

右为末每服二钱姜二片枣水煎一方有芍药当归人参各二钱五分甘草桔梗陈皮桂各一钱

愚按前症悉属脾土虚寒元气下陷本方更加柴胡升麻升提元气而补脾土为善

神緑散

全蝎【去足翅不拘多少】 青薄荷【焙乾】

右为末每服五分薄荷汤调下

无择灯花散 治心燥夜啼

灯花【三二颗】

右研细用灯草煎汤调涂口中乳汁送下日三服一法用灯花涂乳上令儿吮之无灯花用灯草烧灰辰砂少许亦妙或用灯花七枚鹏砂一字辰砂少许蜜调涂唇上立安

安神散 治夜啼

蝉蜕【四十九枚只用後半段截去前半段并去足翅】

右为末分四服用钩藤钩汤调下

人参黄连散 治心经蕴热夜啼

人参【二钱半】 黄连【一钱半炒】 炙甘草【五分】 竹叶【二十片】

右姜水煎服

太乙丹 治睡惊夜啼青粪

桔梗【一两五钱】 藿香叶【五钱】 川芎【二钱五分】 白芷【二钱】 白扁豆【五钱炒】

右为末炼蜜丸樱桃大辰砂麝香为衣每服半丸薄荷汤磨下粪色青枣汤下夜啼灯心钓藤汤下加白术茯苓白芍药尤妙

地黄散 治身热口乾咳 心烦

生地黄【半两】 麦门冬【去心七钱】 杏仁【炮去皮尖】 款冬花 陈皮【各三钱】 甘草【炙二钱半】

右为末每服二三钱水煎温服

钓藤散【方见慢惊】

导赤散【方见心脏】

地黄丸【方见肾脏】

六君子汤

五味异功散【二方见内钩】

秘旨安神丸【方见发搐即十味安神丸】

柴胡梔子散【方见诸热症即柴胡清肝散】

加味归脾汤【方见内钩】

小柴胡汤【方见痉症】

大安丸【即保和丸加白术方见内钩】

补中益气汤【方见虚羸】

悲哭

悲哭者肺之声泪者肝之液也若六脉弦紧者先以温汤渍其身取汗次以凉隔散之类清其内热此张子和治法如此若因乳母怒火遗热於肝肝火炎炽反侮肺金金木相击故悲哭有声者宜用六君柴胡山栀以补脾清肝用六味丸以壮水生木有因惊风过服祛风燥血之药而致者有因吐泻内亡津液而致者及禀父肾阴不足不能生肝者治各审之若小儿忽然大叫作声者不治此禀肾阴不足虚火炎上故也用六味丸多有生者仍参览夜啼客忤惊啼重舌口疮天钩内钩等症

治验

一小儿每忽哭白睛多每悲面色赤余谓禀赋肾虚火妄动而然也用地黄丸半载後虽哭而面色不赤诸症皆愈

一周岁儿痰嗽哭不已用抱龙丸少止良久亦然余视其右颧洁白左颧青赤此肺肝二经相击而作先用泻白散祛肺邪次用柴胡栀子散平肝木後用地黄丸滋肾水而痊

一小儿痙瘲啼叫额间青黑此惊风肝木乘脾腹中作痛也先用六君子汤加木香柴胡钩藤钩啼叫渐缓更加当归又二剂而安

一小儿发热夜啼乳食不进昏迷抽搐痰盛口噤脉纹如水字此脾肺气虚风木所乘痰食积於胸腹也先用大安丸後用六君子加钩藤钩而痊

凉膈散【方见疮疡】

防风通圣散【方见风症】

六君子汤【方见内钩】

六味地黄丸【方见肾脏】

抱龙丸【方见伤寒】

泻白散【方见肺脏】

柴胡栀子散【方见发热】

大安丸【即保和丸加白术方见内钩】

胎症

小儿胎症谓胎热胎寒胎黄胎肥胎弱是也胎热者初生旬日之间目闭色赤眼胞肿啼叫惊烦壮热溺黄此在胎中受热及膏粱内蕴宜用清胃散之类胎寒者初生百日内或手足挛屈或口噤不开此在胎母过食生冷或感寒气宜用五味异功散之类胎黄者体目俱黄小便秘澹不乳啼叫或腹膨泄泻此在胎母过食炙煨辛辣致生湿热宜用生地黄汤之类热盛者泻黄散之类胎肥者肌肉稟厚遍身血色弥月後渐瘦五心烦热大便不利口吻流涎此受母胃热所致也乳母服大连翘饮儿用浴体法以疏通其腠理胎弱者面无精光肌体瘦薄身无血色大便白水时时哽气目无精神亦宜用浴体法

消风散 治诸风上攻头目昏眩项背拘急肢体烦疼肌肉颤动耳若蝉鸣鼻塞多 皮肤顽麻瘙痒瘾疹目澹昏困

白茯苓 芎藭 羌活 荆芥穗 防风 藿香叶 蝉蜕【微炒】白僵蚕【炒去丝嘴】甘草 陈皮【炒】厚朴【去皮姜汁制】

右为末每服五分茶清或薄荷汤调下荆芥汤亦可

生地黄汤 治妊娠食酒面五辛积热小儿生下遍体面目皆黄也乳母仍忌酒面五辛等物

生地黄 芍药 川芎 当归【各等分】

右每服五钱水煎产妇服仍滴儿口数滴

大连翘饮【方见噤风撮口】

泻黄散【方见脾脏】

清胃散

异功散【二方见内钩】

浴体法【方见发搐】

解颅 填 陷

钱仲阳云小儿解颅或久不合者因肾气有亏脑髓不足故儿多愁少喜目睛多白而身瘦盖人乏脑髓如木无根有数岁而成废人者服钱氏地黄丸更用南星微炮为末米醋调传绯帛烘热贴之其栝子仁散三辛散封 散俱效夫肾主骨肾气实则脑髓充而 早合骨脉盛而齿早生肾气怯则脑髓虚而 不合此由父母精血不足宜用地黄丸补之若在乳下当兼补其母更以软帛紧束其首使其易合皆虚火上冲当调补脾肾为善 填 陷亦因所禀肾气

不足及乳哺失宜脾胃亏损所致夫脾主肌肉气逆上冲而为填胀元气下陷而为陷也并用补中益气汤地黄丸及用狗头骨炙黄为末以鷄子清调敷 门亦有泻痢气血虚脾胃不能上充者亦用前法若手足并冷前汤加姜桂未应虚寒甚也急加附子缓则多致不救

治验

一小儿解足软两膝渐大不能行履用六味地黄丸加鹿茸治之三月而起

一小儿十四岁解颇自觉头大视物昏大畏日羞明此禀赋肾气怯弱用六味丸加鹿茸及补中益气汤加山药山茱萸半载愈二载而合既婚之後仍觉 门开解足心如炙喜其断色慾薄滋味日服前药二剂三载而愈後入房两腿痿软又教以服前丸守前戒而愈

一小儿年十四岁而近女色发热吐痰至有室两目羞明头觉胀大仍不断慾其头渐大 门忽开用地黄丸益气汤之类断色慾年余而愈

一小儿年十三岁患前症内热晡热形体倦怠食少作渴用六味丸加鹿茸补之不越月而痊

一小儿吐泻发热 陷作渴用七味白术散母子并服而愈

一小儿久病发热其 或陷或填手足或温或冷余用补中益气汤加蔓荆子炮姜治之而安

一小儿 陷吐泻手足并冷用白术散加木香炮姜治之而愈後伤食腹痛手足复冷用六君炮姜治之更加昏愤口角流涎此脾胃虚寒之甚也急加附子遂愈一小儿病後其 或陷或填此脾胃虚热也朝用补中益气汤加蔓荆子炮姜木香治之而平但作泻口乾用白术散以生胃气而愈

栝子仁散 治 门不合

防风【一两五钱】栝子仁【一两】

右为末乳汁调涂 门十日自合

三辛散 治脑角骨大 门不合

细辛 桂心【各半两】乾姜【一钱】

右为末乳汁调涂 上乾时再涂

玉乳丹 治解颅

鍾乳粉【如法制】熟地黄【自法制各半两杵膏】栝子仁【研膏】当归【各半两】防风补骨脂【各一钱】

右各另为末入二膏加炼蜜丸黍米大每服一二十丸煎茴香汤送下加黄芪茯苓亦可

封散【方见发搐】

地黄丸【方见肾脏】

济生当归散【方见黄疸】

目内症

经曰目者五脏六腑之精荣卫魂魄之所常营也神气之所常主也又曰诸脉者皆属于目目得血而能视五脏六腑精气皆上注於目而为之精故白睛属肺黑睛属肝瞳人属肾上下胞属脾两眦属心而内眦又属膀胱五脏五色各有所司心主赤赤甚心实热也用导赤散赤微者心虚热也用生犀散肝主青青甚者肝热也用泻青丸淡青者肝虚也用地黄丸脾主黄黄甚者脾热也用泻黄散淡黄者脾虚也用异功散目无睛光及白睛多黑睛少者肝肾俱不足也用地黄丸加鹿茸昼视通明夜视罔见者因禀阳气衰弱遇夜陰盛则阳愈衰故不能视也用冲和养胃汤凡赤脉翳物从上而下者属足太阳经用东垣选奇汤从下而上者属足阳明经用局方流气饮盖翳膜者风热内蕴也邪气未定谓之热翳而浮於外邪气已定谓之冰翳而沈於内邪气既深谓之陷翳宜升发之退翳之药佐之若上眼皮下出黑白翳者属太阳寒水从外至内者属少阳风热从下至上绿色者属足阳明及肺肾合病也疳眼者因肝火湿热上冲脾气有亏不能上升清气故生白翳?闭不开眵泪如糊久而脓流遂至损目用益气聪明汤茯苓泻湿汤及四味肥儿丸目闭不开者因乳食失节或过服寒凉之药使阳气下陷不能升举故目不开用柴胡复生汤若胃气亏损眼?无力而不能开者用补中益气汤暴赤肿痛者肝火炽盛也用龙胆泻肝汤多泪羞明者肝心积热也用生犀散亦有肝肾虚热者用地黄丸风沿烂眼者膈有积热也用清胃散时时作痒者脓溃生虫也用点药紫苏膏眼?连割者肝经风热也用柴胡清肝散若生下目黄壮热大小便秘结乳食不思面赤眼闭者皆由在胎时感母热毒所致儿服泻黄散母服地黄丸若乳母膏粱积热致儿目黄者令母服清胃散若肢体面目爪甲皆黄小便如屋尘色者难治又有痘 後余毒未尽上侵於目者属肾肝虚也用滋陰肾气丸前症多宜审治其母兼调其儿厥有未尽悉详原机启微集中宜参考之

治验

一女子年十四因恚怒先月经不行寒热脇痛後两目生翳青綠色从外至内余谓寒热脇痛足厥陰之症也翳从外眦起足少阳之症也左关脉弦数按之而濡肝经风热兼血滯也遂以加味逍遥散加防风龙胆草四服而寒热脇痛顿减用六味丸月余而翳消

一小儿十五岁两目白翳腹膈遍身似疥非疥晡热口乾形体骨立此肝疳之症也用六味肥儿丸而痊後陰莖作痒小便澄白疮疥益熈状如大风用大芦荟四味肥儿丸诸症渐愈又用大茺葇汤而痊一小儿白睛多吐痰发搐先用抑青丸四服而痰搐止後用地黄丸年许而黑睛多

一小儿白睛多三岁不能行语声不畅两足非热则冷大便不实朝用补中益气汤加五味子乾山药以补脾肺夕用地黄丸加五味子牛膝鹿茸补肝肾不三月而痊

一小儿眼白腿软两足热面似愁容服地黄丸两月余渐健服年余白睛渐黑出痘无恙

一小儿雀盲眼割服煮肝丸而目明服四味肥儿丸而目不割

一小儿目无光芒视物不了了饮食少思大便不调服大茺葇汤九味芦荟丸而愈後饮食停滞妄用消导剋伐之剂目症仍作至晚尤甚用人参补胃汤渐愈又用五味异功散四味肥儿丸而痊

一小儿九岁素有肝火两目生翳服芦荟肥儿等丸随愈至十四岁後遇用心过度饮食不节即夜视不明用补中益气汤人参补胃汤四味肥儿丸而愈一小儿眼胞微肿咳嗽恶心小便泔白余谓脾疳食积以五味异功散为主佐以四味肥儿丸而愈後不节饮食夜视不明余曰此脾胃复伤须补养为主不信乃服峻厉之剂後变风症竟不起

一小儿因发热表散出汗眼赤发搐审其母素有肝火发热以异功散加柴胡升麻子母并服稍愈又用加味逍遥散其热顿退继用补中益气汤六味地黄丸母子寻痊

一小儿目赤作痛咬牙寒热余谓肝经风热用柴胡饮子一剂而赤痛止又用四物参芪白术柴胡而寒热退又用补中益气汤而饮食加

一小儿眼素白或青患眼赤作痛服降火之剂眼如血贯脉洪大或浮缓按之皆微细用十全大补汤加柴胡山梔数剂外症渐退而脉渐敛又数剂而愈一小儿停食腹痛服巴豆之药更加目赤作痛寒热往来饮食少思手足并冷余用六君升麻炮姜诸症顿愈惟寒热未已用四君升麻柴胡而安

一小儿眼赤痛服大黄之药更加寒热如疟余谓脾胃复伤用四君升麻柴胡炮姜钩藤而寒热愈又用补中益气汤间服而目疾痊

一小儿因乳母恚怒患发热等症儿患目痛兼作呕吐先用小柴胡汤子母俱服顿安但儿晡热仍呕以异功散加升麻柴胡治之痊

一小儿生下目黄三日面赤黄一小儿旬日内目黄而渐至遍身此二者胎禀胃热各用泻黄

散一服皆愈

一小儿旬日面目青黄此胃热胎黄也用泻黄散以乳调服少许即愈後复身黄吐舌仍用前散而安一小儿患目黄知其乳母食鬱身黄所致以越鞠丸治母泻黄散治子并愈

一小儿面青寒热形气瘦弱眼目生翳用九味芦荟丸五味异功散目翳渐退乃以四味肥儿丸五味异功散而肌肉生

一小儿眼每生翳皆因乳母恚怒而作用九味芦荟丸柴胡栀子散母子服之并愈

一小儿乳哺失节服药过剂腹胀少食大便不调两眼生花服治眼之药渐生浮翳余用异功散加当归柴胡饮食渐进便利渐调少佐以九味芦荟丸其眼渐明乃用人参补胃汤肥儿丸而痊

一小儿未周岁目内有翳余谓此稟母肝火所致询其母果素多恚怒见患瘰?目疾自乳其子余用地黄丸治之其母稍愈後彼无此药其子遂瞽

一小儿十二岁伤寒咳嗽发热服发散之药目渐不明服降火等药饮食日少目渐生翳余谓中气虚用人参补胃汤饮食渐进又用千金补肝丸及薰眼之法而痊

一女子十二岁目生白翳面黄浮肿口乾便泄用四味肥儿丸而痊

一小儿目羞明癰澁两足发热大便不实食少时咳仍欲治肝祛风余曰两足发热小便不调肾肝虚也大便不实食少时咳脾肺虚也朝用补中益气汤夕用六味地黄丸元气渐复乃佐以四味肥儿丸又月余而痊

一小儿目痛恪服泻火治肝之药反加羞明癰澁睡中惊悸悲啼此肝经血虚火动伤肺也用五味异功散加山梔补脾肺清肺金用地黄丸滋肾水生肝血而安乃兼服四味肥儿丸而痊

一小儿目青发搐直视叫哭或用牛黄清心丸加咬牙顿闷小便自遗余谓肝经血气虚甚也用补中益气汤及六味地黄丸而痊

一小儿发搐目劓属肝胆经风热先用柴胡清肝散治其肝後用地黄丸补其肾而愈

一小儿目痛兼痒因膏粱积热仍口渴饮冷便秘先用泻青丸疏导肝火更用清胃散煎熟磨生犀角服之以解食毒又用四味肥儿丸以治肝症而痊一小儿目疾久不愈用大茺萸汤五剂蟾蜍丸数服又用四味肥儿丸而愈

一小儿十四岁用功劳苦半载後自汗盗汗形体殊倦朝用补中益气汤加五味子蔓荆子夕

用十全大补汤寻愈 姻後因唾痰头运恪服清痰理气之药忽目不能开余用地黄丸十全大补汤三月余而痊吴江史万湖之孙自乳儿时患目疾年二十目割头搔用金匱肾气丸愈而复作两目生翳用聪明益气汤并前丸既愈而复发形体消瘦脉数洪大用补中益气汤及前丸而痊

一小儿因惊眼割或搔先用加味小柴胡汤加羌黄黄连以清肝热又用地黄丸以滋肾生肝而痊一小儿两目连割或色赤或时拭眉此肝经风热欲作肝疳也用四味肥儿丸加龙胆草而痊

一小儿白睛多吐痰发搔用地黄丸为主佐以抑青丸而搔止後用世传方地黄丸而黑睛多

一女子十四岁两目作痛或发痒或头运或头痛或两脇作痛或寒热内热口渴少食经候不调此肝脾二经气血虚而有热也用补中益气汤柴胡清肝散而愈後左?上结一核如荳许渐大如栗腐而作痛此肝经火燥而血病也用加味逍遥月余腐肉自脱乃用八珍汤及前药而愈

一小儿十三岁日久痛渐生青绿翳後赤烂左关脉弦数用九味芦荟丸加味逍遥散而愈毕姻後复发用滋陰肾气丸为主佐以加味逍遥散而痊

一小儿十五岁因大劳目赤作痛发热作渴脉洪大而虚用八珍汤加炒黑山梔一剂诸症顿退又用补中益气汤而痊後因梦遗目仍赤痛用六味地黄丸料加五味子二剂而痛止又三十余剂而复明

生犀散 治心经虚热

生犀【取末二钱】地骨皮 赤芍药 柴胡 乾葛【各一两】甘草【半两】

右每服二钱水煎

生熟地黄散 治眼初患之时因悞筑到蹙肝受惊风致目肿赤痛痒

生地黄【洗】熟地黄【各一两】麦门冬【半两】当归 甘草【炙】防风 枳殼【米泔浸麴炒】赤芍药 杏仁【汤泡去皮尖用麴炒赤色各二钱五分】

右每服一钱黑豆七粒水煎

犀角饮 治脾火眼疼

犀角【一两】射干 草龙胆【炒】黄芩【炒各半两】人参【二两】茯苓【二钱五分】

甘草【三钱】 钩藤钩【七钱半】

右每服一钱水煎

牛黄丸 治肝受惊遂致患目

牛黄 白附子 肉桂 全蝎 芎藭 石膏【各二钱半】 白芷 藿香【各半两】 辰砂
麝香【各少许】

右各另为末炼蜜丸桐子大每服三丸临卧薄荷汤化下乳母亦忌热物之类

世传方地黄丸 治肾虚目睛多白

鹿茸【半两】 泽泻 茯苓 山茱萸 熟地黄 牡丹皮 牛膝【各一两】

右为末蜜丸桐子大每服二十丸盐汤下

罗氏煮肝丸 治疳眼翳膜羞明大人雀目甚效

夜明砂 青蛤粉 谷精草【各一两】

右为末每服二钱以猪肝批开摊药在内麻纒定米泔水半碗煮肝熟取出汤倾碗内薰眼候
汤温分肝三服嚼吃就用肝汤下一日二服

龙胆饮子 治疳眼流脓生翳此湿热为病

青蛤粉【半两】 炒黄芩【二钱】 羌活
草龙胆【各二钱】 蛇蛻【五分】 麻黄【二钱五分】 谷精草【五分】

右为末每服二钱茶清调下

东垣人参补胃汤 治劳役饮食不节内障眼痛神效黄芪根 人参【各一两】 炙甘草【八钱】
蔓荆子【一钱】 白芍药【炒】 黄柏【各三钱酒拌炒四次】

右每服二三钱水煎稍热服临卧三五服

千金治雀盲

地肤子【五两】 决明子【一升】

右为末以米饮和丸每服二三十丸

世传治雀目

苍术【四两米泔浸切片四两焙】

右为末猪肝二两批开掺药在内用麻击定粟米一合水一碗砂锅内煮熟薰眼候温临卧每服三钱大效

圣【阙】治雀目不计时月用苍术一两为末每服一钱本事治小儿赤热肿眼

大黄 白矾【各等分】

右为末冷水调作饼子贴眼立效

东垣广大重明汤

治两脸或两眦赤烂热肿痛疼及眼胞痒极?之至破烂赤肿眼楞生疮痂目多眵泪隐澁难开

草龙胆 防风 生甘草根 细辛苗叶【各一钱】

右水一碗半煎龙胆至七分入余药再煎至半碗热洗日五七次洗毕合眼须臾瘥

东垣助阳和血补气汤 治发後热壅白睛红多眵泪隐澁此过服凉药而真气不能通九窍也

防风【七分】黄芩【一钱】蔓荆子【二分】白芷【二分】升麻【七分】甘草【炙】
当归身【酒洗】柴胡【各五分】

洁古治眼赤暴发肿

防风 羌活 黄芩【炒】 黄连【炒各等分】

右每服一钱水煎服如大便秘加大黄二分痛甚加川归地黄各二分烦躁不得卧加梔子仁三分

保命点眼药 除昏退翳截赤定痛

当归 黄连【各二钱】 防风【一钱五分】 细辛【五分】 甘草【一钱】

右水一大碗文武火熬滴水中不散为度入熟蜜少许点用

千金补肝散 治目失明

青羊肝【一具去膜薄切以新瓦炙乾】决明子 蓼香【合熬令香】

右为末每服方寸匕日二服久而有验

本事治太阳寒水陷翳膜遮睛

白蒺藜 防风【各一两】羌活【一两半】甘菊【三两】

右为末每服二钱入盐少许百沸汤点服

保命羚羊角散 治水翳久不去

羚羊角 升麻 细辛【各等分】甘草【减半】

右为末一半蜜丸桐子大每服五七十丸一半泔水煎吞送丸子焮发陷翳亦羚羊角散之类用之在人消息若陰虚有热者兼服神仙退云丸

东垣补阳汤 治阳不胜其陰乃陰盛阳虚则九窍不通今青白翳见於大眦乃足太阳少陰经中鬱遏厥陰肝经之阳气不得上通於目故青翳内阻也当於太阳少陰经中是九泉之下以益肝中阳气冲天上行此乃先补其阳後於足太陰标中泻足厥陰之火下伏於阳中内经曰陰盛阳虚则当先补其阳後泻其陰每日空心服升阳汤临卧服泻陰丸须预期调养体气和平天气晴明服之补其阳使上升通於肝经之末利空窍於目矣

羌活 独活 甘草稍 当归身【酒洗焙乾】熟地黄 人参 黄芪 白术【各一两】泽泻 橘红【各半两】生地黄【炒】白茯苓 知母【炒黄色各三钱】柴胡【二两】肉桂【一钱】防风 白芍药【各半两】

右每服半两水煎空心服候药力行尽方可饮食

东垣羌活退翳汤

柴胡 甘草 黄芪【各三钱】羌活 黄连 五味子 升麻 当归【各二钱】防风【一钱五分】黄芩 黄柏【酒浸】芍药 草龙胆【酒洗各五钱】石膏【二钱五分】

右分二服水煎入酒少许临卧热服忌言语

谦甫五秀重明丸 治眼翳膜遮睛隐澁昏花常服清利头目

甘菊花【五百个】木贼【去节五百根】荆芥【五百穗】楮实【五百根】

右为末蜜丸桐子大每服五十丸白汤化下

冲和养胃汤 治内障初起视觉微昏空中有黑花神水变淡绿色次则视岐覩则成二神水变淡白色久则不覩神水变纯白

柴胡【七钱】人参 当归 炙草 乾生姜 升麻 葛根 白术 羌活【各一两】防风【五钱】黄耆【一两半】白茯苓【三钱】白芍药【六钱】五味子【二钱】

右每服二钱水煎

滋陰肾气丸 治神水寬大渐散昏如雾露中行渐覩空中有黑花视物二体久则光不收及内障神水澹白色者

熟地黄【三两】归尾 牡丹皮 五味子 乾山药 柴胡【各五钱】茯苓 泽泻【各二钱半】生地【酒炒四两】

右为末蜜丸桐子大辰砂为衣每服十丸空心滚汤化下

泻热黄连汤 治内障有眵泪眊燥

黄芩 生地黄 黄连【并酒洗】柴胡【各一两】升麻【五钱】龙胆草【三钱】

右每服一钱水煎午後服

柴胡复生汤

治红赤羞明泪多眇少脑愠沉重睛珠痛应太阳眼?无力常欲垂闭久视则酸疼翳陷下者

藁本 蔓荆子 川芎 羌活 独活 白芷【各二分半】白芍药【炒】炙草 薄荷 桔梗【各四分】苍术 茯苓 黄芩【各五分炒】柴胡【六分】五味子【十二粒杵】

右每服二钱水煎食後服

黄连羊肝丸 治目中赤脉洪甚眇

黄连【为末】白羯羊肝【一具】

先以羊肝竹刀刮下如糊除去筋膜再搗细入黄连丸桐子大每服十丸茶清化下

茯苓燥湿汤 治小儿易饥而渴腹胀生疮目痛生翳不开眇泪如脓俗谓疳毒眼

白术 人参 甘草【炒】 枳壳【麸炒】 茯苓 蔓荆子 薄荷【各二分】 苍术 前胡 独活【各三分】 川芎 羌活【各三分半】 柴胡【四分】 泽泻【一分半】

右每服二钱水煎

局方菊睛丸 治脾肾不足眼花昏暗

甘菊花【四两】 枸杞子 苁蓉【酒浸炒】 巴戟【去心各一两】

右为末蜜丸梧子大每服十丸空心白汤化下

抑青丸【方见惊啼】

加味逍遥散【方见内钩】

大茺荑【方见疳症】

九味芦荟丸【方见诸症】

异功散【方见内钩】

小柴胡汤【方见痉症】

柴胡梔子散【方见发热】

蟾蜍丸【方见诸疳】

耳症

耳者心肾之窍肝胆之经也心肾主内症精血不足肝胆主外症风热有余或聾瞶或虚鸣者禀赋虚也或胀痛或脓痒者邪气客也禀赋不足宜用六味地黄丸肝经风热宜用柴胡清肝散若因血燥用梔子清肝散未应佐以六味丸间服九味芦荟丸若因肾肝疳热朝用六味丸夕用芦荟丸若因食积内热用四味肥儿丸若因乳母膏粱积热而致者宜加味清胃散脾经鬱结而致者加味归脾汤肝经怒火而致者加味逍遥散皆令乳母服之兼与其儿少许不可专於治外不惟闭塞耳窍抑亦变生他症延留日久遂成终身之聾矣慎之

治验

一小儿耳内出脓秽不可近连年不愈口渴足热或面色微黑余谓肾疳症也用六味地黄丸令母服加味逍遥散而愈後因别服伐肝之药耳症复作寒热面青小便频数此肝火血燥也用柴胡栀子散以清肝六味地黄以滋肾遂痊

一小儿耳内出脓久不愈视其母两脸青黄属乳母鬱怒致之也遂朝用加味归脾汤夕用加味逍遥散母子皆愈

一小儿十二岁素虚羸耳出脓水或痒或痛至十四稍加用心即发热倦怠两腿乏力八年矣用补中益气汤及六味地黄丸稍愈毕姻後朝寒暮热形气倦怠两足心热气喘唾痰仍用前二药佐以六君子汤而愈因後不守禁忌恶寒发热头运唾痰余谓肾虚不能摄水而似痰清气不能上升而头运阳气不能护守肌肤而寒热遂用补中益气汤加蔓荆附子一钱四剂不应遂用人参一两附子一钱二剂而应乃用十全大补汤百余剂而痊又因大劳入房喉痞痰涌两腿不遂用地黄饮子顿愈仍用十全大补汤而安後又起居失宜朝寒暮热四肢逆冷气短痰盛两寸脉短用十全大补汤加附子一钱数剂而愈乃去附子用人参三钱常服始安

一小儿耳中流脓项中结核眼目或割或赤痛小便或痒或赤涩皆肝胆经风热之症也用四味肥儿丸悉愈

一小儿因乳母恚怒兼经行之後多食炙煿儿遂耳内作痛出脓余先用加味小柴胡汤次用加味逍遥散令其母服之子母并愈

一小儿耳出秽水属肝肾不足先用九味芦荟丸而痊毕姻後面黄发热多病又用黄柏知母等药更胸膈痞满饮食少思痰涎上壅又利气化痰加噫气下气余用六君子补中益气二汤乾姜木香等味治之寻愈

田氏红玉散 治小儿聾耳

枯矾 麝香 乾胭脂【各等分】

右为末研匀先以绵杖子捻脓淨掺入少许

汤氏龙黄散 治如前

枯矾 龙骨 黄丹【各半两】 麝香【一钱】

右制法同前

愚按前二方可以治腑症之轻者若系肝经风热血燥等症必依前方论内服合宜之药外用此以收脓湿亦无不可若专泥外攻而失内治谬矣

六味地黄丸【方见肾脏】

柴胡清肝散

栀子清肝散【方见热症】

九味芦荟丸

四味肥儿丸【方见呕吐】

加味清胃散【方见内钩】

加味归脾汤【方见内钩】

加味逍遥汤【方见内钩】

柴胡栀子散

加味小柴胡汤

六君子汤【方见内钩】

四君子汤【方见内钩】

地黄丸【方见肾脏】

七味白术散【方见积滞】

补中益气汤【方见虚羸】

二陈汤【方见寒吐】

鼻塞鼻?

巢氏云鼻乃肺之窍皮毛腠理乃肺之主此因风邪客於肺而鼻塞不利者宜用消风散或用葱白七茎入油腻粉少许搗摊绢帛上掌中护温贴 门因惊仆气散血无所羈而鼻衄者用

异功散加柴胡山梔左脸青而兼赤者先用柴胡清肝散後用地黄丸右脸赤乃肺大肠实热也用泻白散鼻色赤乃脾胃实热也用泻黄散微赤乃脾经虚热也用异功散加升麻柴胡色深黄用济生犀角地黄汤後用杨氏地黄丸淡白色用六君子汤颊间色赤用四物汤加山梔赤甚用五淋散小便赤色用六味丸补中益气汤唇色白用六君子汤久不愈用麦门冬饮子若初病元气未亏乳食如常发热壮热二便秘结作渴饮水卧不露睛者悉属形病俱实当治邪气若病久元气已亏食少发热口乾饮汤呕吐泄泻肢体畏寒卧而露睛者悉属形病俱虚当补正气为要

治验

一小儿咳嗽恶心鼻塞流涕右腮青白此乃脾肺气虚而外邪所乘也先用惺惺散咳嗽顿愈但饮食不思手足指冷用六君子少加升麻一剂而痊

一小儿潮热鼻衄烦渴便秘气促咳嗽右腮色赤此肺与大肠有热也用柴胡饮子一服诸症顿退後因惊复作微搐顿闷此肝脾气血虚也用四君子加芎归钩藤钩而愈

一小儿遍身生疥空鼻出血因肝脾有热用四味肥儿丸而愈後食炙?鼻血复出疮疥复发先用清胃散二剂又用四味肥儿丸月余而痊

一小儿鼻衄滞颐作渴时汗乃胃经实热也先用泻黄散二服而滞颐止又用四味肥儿丸数服而鼻血愈後鼻不时作痒发渴便血用圣济犀角地黄汤四剂母子并服别令儿更服四味肥儿丸月余而愈一小儿鼻衄发热作渴右腮色青余谓肝火乘脾先用加味逍遥散母子并服热渴渐止另用五味异功散少加柴胡升麻与子服之而愈

一小儿鼻衄服止血之剂反见便血右腮色黄或赤此脾气虚热不能统血也用补中益气汤又用五味异功散加柴胡升麻而愈

一小儿鼻衄久不愈四肢倦怠饮食少思恶风寒此脾肺虚也先用五味异功散而鼻血止又用补中益气汤而不畏风寒继用四君少加柴胡升麻而全愈一小儿鼻衄两颊赤余谓禀赋肾气不足虚火上炎也不信别服清热凉血之药病益甚余用地黄丸果效毕姻後虚症悉至用八珍汤地黄丸料寻愈一小儿鼻衄作渴喘嗽面赤此心火刑肺金也用人参平肺散及地黄丸料加五味子麦门冬煎服而痊

杨氏地黄散 治劳中有热肺壅鼻衄

生地黄 赤芍药 当归身 川芎【各等分】

右每服二三钱水煎熟入蒲黄少许春夏衄入地黄汁蒲黄各少许秋冬?用车前草汁少许

麦门冬饮子 治吐血久不愈者

五味子【十粒】麦门冬【去心】黄芪【各一钱】当归身 人参 生地 黄【各五分】

右水煎服

补中益气汤【方见虚羸】

清胃散【方见内钩】

异功散【二方见内钩即五味异功散】

人参平肺散【方见咳嗽】

柴胡清肝散【方见热症】

泻白散【方见肺脏】

泻黄散【方见脾脏】

犀角地黄汤【即圣济犀角地黄汤方见便血脏血】

五淋散【方见五淋】

四君子汤【方见内钩】

八珍汤【即四君四物二汤合服也四君见天钩四物见急惊】

四物汤【方见急惊】

惺惺散

柴胡饮子【二方见热症】

四味肥儿丸【方见呕吐】

加味逍遥散【方见内钩】

六味地黄丸【方见肾脏】

龟胸龟背

仲阳曰龟胸者肺热胀满攻於胸膈或乳母多食酸辛及儿食宿乳而成当用龟胸丸或松蕊丹百合丹之类治之龟背者令儿早坐因客风吹脊入於骨髓所致以龟尿点背间骨节【取龟尿之法当置龟於荷叶上候龟眼四顾急用镜照之其尿自出】又法当灸肺俞穴【在第三椎骨下两傍各开一寸五分】心俞穴【在第五椎骨下两傍各开一寸五分】膈俞穴【在第七椎骨下两傍各开一寸五分】用艾如小荳大灸三五壮此多因小儿元气未充腠理不密风邪所乘或痰饮蕴结风热交攻而致法当调补脾肺为主而以清热消痰佐之若因乳母膏粱厚味者当以清胃散治其母子亦服少许

龟胸丸

大黄【一钱煨】天门冬【去心焙】百合 杏仁【麸炒】木通
枳殼【麸炒】桑白皮【蜜炙】甜葶苈【炒】朴硝【各半两】

右为末炼蜜丸芡实大每服一丸温水食後化下

枳殼防风丸

枳殼【麸炒】防风 独活 大黄【煨】前胡 当归【酒洗】麻黄【去节各一钱】

右为末麴糊丸黍米大每服十丸食後米汤下

松蕊丹 治龟背

花松 枳殼 防风 独活【各一两】麻黄 大黄 前胡 桂心【各半两】

右为末蜜丸黍米大每服数丸粥饮下量儿加减【新增】

百合丹 治龟胸背

百合【一两】木通 朴硝
桑白皮【蜜炙】杏仁【去皮尖炒双仁不用】大黄【煨】天门冬【各半两】

右为末炼蜜丸菉荳大每服十丸食前温酒化服

薛氏医案卷五十七

卷五十八

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷五十八

明 薛己 订

保婴撮要五

鹤膝行迟

钱仲阳云鹤膝者乃禀受肾虚血气不充致肌肉瘦薄骨节呈露如鹤之膝也行迟者亦因禀受肝肾气虚肝主筋肾主骨肝藏血肾藏精血不足则筋不荣精不足则骨不立故不能行也鹤膝用六味地黄丸加鹿茸以补其血气血气既充则其肌肉自生行迟用地黄丸加牛膝五加皮鹿茸以补其精血精血既足则其筋骨自坚凡此皆肝肾之虚也虚而热者用六味地黄丸虚而寒者用八味丸若手拳挛者用薏苡仁丸足拳挛者用海桐皮散脾胃亏损肾脏虚弱寒邪所乘而膝渐肿者佐以补中益气汤及大防风汤

治验

一小儿体瘦腿细不能行齿不坚髮不茂属足三阴经虚也用六味丸补中益气汤服年余愈

一小儿六岁面色?白眼白睛多久患下痢忽声音不亮腿足无力先用四神丸止其痢後用地黄丸加牛膝五加皮鹿茸补其肾两月余渐能行半载後其声响亮後停食另用消食丸连泻五七次去後益频五更侵晨为甚声音复瘖步履复难而腿足作痛仍服前丸兼补中益气汤而愈

一小儿七岁左腿自膝下至胫细小行步无力用地黄丸加鹿茸五味子牛膝为主佐以补中益气汤半载腿膝渐强而能步毕姻後其腿内热足心如炙唾痰口渴余谓当补脾肾不信另用滋陰丸痰热益甚服四物黄栢知母之类饮食日少服二陈青皮枳殼之类胸满吐血服犀角地黄汤唾血不时大便频数复请视仍泥实火余辞不能治略服犀角地黄汤而唾血益甚不时发热後复恳治余曰两足心热唾痰口乾肾虚水泛也饮食少思胸膈痞满唾血不止脾虚失摄也昼发夜伏夜作昼止不时而热无根虚火也遂用四君子及八珍汤地黄丸间服而愈

四神丸 治脾虚胃弱大便不实饮食不思或泄利腹痛等症【方见惊泻】

薏苡仁丸 治禀受肝气怯弱致两膝挛缩两手伸展无力

当归【焙】 秦艽 薏苡仁 酸枣仁 防己 羌活【各一两】

右为末炼蜜丸鷄豆大每服一丸麝香荆芥汤下

海桐皮散 治禀受肾气不足血气未荣脚指拳缩不能伸展

海桐皮 牡丹皮 当归【酒浸】 熟地黄 牛膝【酒浸各一两】 山茱萸 补骨脂【各五钱】

右为末每服一钱葱白煎汤食前服

五加皮散 治四五岁不能行

真五加皮 川牛膝【酒浸二日】 木瓜乾【各等分】

右为末每服二钱空心米汤调下一日二服服後再用好酒半盏与儿饮之仍量儿大小

益气养荣汤 治气血损伤四肢颈项等处患肿不问𦓐硬赤白痛否日晡发热或溃而不斂者并宜服之 人参 茯苓 陈皮 贝母 香附 当归【酒拌】 川芎 黄芪【塩水拌炒】 熟地黄【酒拌】 芍药【炒各五分】 甘草【炙】 桔梗【炒】 柴胡【各三分】 白术【炒一钱】

右姜水煎服大人倍用

八珍汤【即四君四物二汤四物见急惊四君见内钓】

四神丸【方见惊泻】

六味丸

八味丸【即六味丸加肉桂附子二方见肾脏】

消食丸【方见呕吐乳】

补中益气汤【方见虚羸】

大防风汤【方见鹤膝痛】

四君子汤【方见内钩】

齿迟

经云齿者肾之标骨之余也小儿禀受肾气不足肾主骨髓虚则髓脉不充肾气不能上营故齿迟也用地黄丸主之

治验

一小儿三岁言步未能齿髮尤少体瘦艰立发热作渴服肥儿丸不应余曰此肾虚疳症也盖肥儿丸脾胃经之药久服则肾益虚其疳益甚不信牙髮渐落余用地黄丸加鹿茸五味子半载而元气壮健一小儿体瘦腿细行步艰辛齿不坚固髮稀短少用六味地黄丸补中益气汤年余诸症悉愈形体壮实

芎藭散 治齿生迟或齿嚼物少力

芎藭 生地黄 山药 当归 芍药【炒】 甘草【各等分】

右各另为末每服二钱白汤调

地黄丸【方见肾脏】

补中益气汤【方见虚羸】

咬牙

夫齿属足少陰肾经牙牀属手足阳明经小儿寤寐不时咬牙其所致之经不同或本於心经之热或本於肝经之热或本於脾肺肾经之热若发热饮水叫哭而搐者心经实热也睡困惊悸合面而卧者心经虚热也面青目割呵欠项强烦闷者肝经实热也手寻衣领及乱捻物者肝经虚热也发搐目青面赤肝经风热也烦闷喘促见於申酉时者肺经热也胸满气急喘嗽上气肺感风寒也见於亥子丑时者肾经热也眼目畏明及无睛光或解颅下窜胎禀肾虚也饮水口中气热胃经实热也饮汤口中气冷胃经虚热也发搐呵欠面黄脾虚发惊也心经实热用泻心汤虚热用导赤散肝经实热先用柴胡清肝散治肝火後用六味丸生肝血肝经风热亦用前药虚热则用六味丸肺经实热用泻白散虚热用保肺汤肾经实热用六味丸减茱萸二两以生地易熟地虚用地黄丸胃经实热用泻黄散虚用异功散脾虚发惊用五味异功散若乳母多食膏粱厚味致儿咬牙者用清胃散

治验

一小儿七岁素喜食甘味两手发热夜睡咬牙用泻黄散而愈後不守戒仍作用大黄等药前症益甚更滞颐弄舌手足冷余谓此脾胃复伤而虚甚也用六君子加柴胡升麻治之渐愈又用五味异功散加柴胡升麻而痊

一小儿面素痿黄或时变青饮食过多睡而咬牙服剋伐之剂口舌生疮大便泄青发搐痰盛唇青手冷用六君加木香柴胡升麻数剂而安但饮食後腹膨作暖用四君子汤为细末不时煨姜汤调服少许月余而痊

一小儿十五岁盗汗面赤睡中咬牙自服清胃散前症益甚更遗精晡热口乾倦怠余用六味地黄丸补中益气汤而痊

一小儿十四岁素食膏粱炙?睡中咬牙此脾胃积热先用清胃散及二陈黄连山查犀角各数剂间服补中益气汤而愈

一女子十四岁发热作渴月经先期睡中咬牙此肝脾二经虚热也用加味逍遥散而安後因怒前症俱作用柴胡栀子散而痊

一小儿夜间咬牙或盗汗或便血审其母怀抱郁结又兼便血用加味归脾汤加味逍遥散与母兼服其子亦愈

一小儿因母食膏粱醇酒睡中咬牙或时鼻?右腮鼻準色赤先用加味清胃散加味逍遥散与母服儿亦愈

一小儿病後不语睡中咬牙惊悸饮水困倦少食用化痰镇惊等药益甚余谓属心脾肾陰虚用六味地黄丸为主佐以五味异功散秘旨安神丸诸症顿愈一小儿感冒风邪咳嗽喘逆不时咬牙右腮色赤此肺经客热用洁古黄蓍汤一剂而痊後因停食腹胀咳嗽鼻塞咬牙用六君子汤加桔梗桑皮杏仁一剂而愈

一小儿咬牙审知因母大怒先用小柴胡汤加山栀牡丹皮治之母子并愈

洁古黄芪汤

人参 黄芪 茯苓 白术 芍药【各一钱】 乾姜 陈皮 藿香【各五分】

保肺汤【方见伤风咳嗽】

柴胡栀子散

柴胡清肝散【二方见发热】

补中益气汤【方见虚羸】

小柴胡汤【方见痞症】

二陈汤【方见寒吐】

泻黄散【方见脾脏】

泻心汤

导赤散

秘旨安神丸【三方见心脏】

泻白散【方见肺脏】

地黄丸【方见肾脏】

六君子汤

归脾汤

四君子汤

加味逍遥散

清胃散

异功散【六方见内钩】

语迟

钱氏云心之声 为言小儿四五岁不能言者由妊母卒有惊动邪乘儿心致心气不足故不能言也有禀父肾气不足而言迟者有乳母五火遗热闭塞气道者有病後津液内亡会厌乾涸者亦有脾胃虚弱清气不升而言迟者心气不足用菖蒲丸肾气不足用羚羊角丸闭塞气道用加味逍遥散津液内亡用七味白术散脾胃虚弱用补中益气汤

治验

一小儿言迟泄泻声音不亮杂用分利清热等剂喉音如瘖饮食少思朝用地黄丸加五味子夕用补中益气汤其泻渐止遂专服前丸两月喉音渐响一小儿白睛多泻後喉瘖口渴兼吐大便不实朝夕服地黄丸而瘖後患泻喉复瘖仍服前丸而愈此皆禀赋肾气不足故用是药

一小儿五岁不能言咸以为废人矣但其形色悉属肺肾不足遂用六味地黄丸加五味子鹿茸及补中益气汤加五味子两月余形气渐健将半载能发一二言至年许始音声如常

菖蒲丸 治心虚语迟

石菖蒲 丹参【各一钱】 赤石脂【三钱】 人参【半两】 天门冬【去心焙一钱】

右为末炼蜜丸麻子大食後温水服二三十丸

羚羊角丸 治行迟

羚羊角【镑】 生地黄【焙】 酸枣仁 虎胫骨【醋炙黄】 白茯苓【各五钱】 肉桂 防风 当归 黄芪【各二钱五分】

右为末炼蜜成剂每服一皂子大白汤化下

七味白术散【方见腹痛】

补中益气汤【方见虚羸】

六味地黄丸【方见肾脏】

加味逍遥散【方见内钩】

瘖

经云舌者音声之机也喉者音声之关也小儿卒然无音者乃寒气客於会厌则厌不能发发不能下致其门阖不致故无音也若咽喉音声如故而舌不能转运言语则为舌瘖此乃风冷之邪客於脾之络或中於舌下廉泉穴所致也盖舌乃心之苗心发声为言风邪阻塞其经络故舌不能转运也若舌本不能转运言语而喉中声嘶者则为喉瘖此亦为风冷所客使气道不通故声不得发而喉无音也然或风痰阻塞或因心经气虚或因脾之脉络受风或因风痰滯於脾之络或因脾气不足或胃中清气不升皆足以致瘖大抵此症亦有禀父肾气不足不能言者有乳母五志之火遗儿薰闭清道不能言者或儿病津液耗损会厌乾涸不能言者或肾气不充虚火上炎伤肺不能言者有惊风中风不能言者若遗热与津液耗者用七味白术散清气不升者用补中益气汤禀肾不足与虚火伤肺者用六味地黄丸若仰首咳嗽肢体羸

瘦目白睛多或兼解颅呵欠咬牙等症悉属肾虚非地黄丸不能救也

治验

一小儿面色目睛多白两足胫常热所患之症悉属肾虚毕姻後睡痰口乾头运久浮忽然失音先君云此亦肾虚也用补中益气汤八味四神二丸补之寻愈

一小儿亦面色目睛多白大便频泄侵晨作泻肌体骨立食少睡痰先君谓肾气不足之故不信後加头运声瘖足胫逆冷复请治仍欲祛痰又云头运声瘖中气不能上升也足胫逆冷阳气不能充达也遂用补中益气汤及四神八味二丸以补命门之火而愈一小儿患泄泻声音不亮杂用清热等剂声音如瘖饮食少思去後多在侵晨朝用地黄丸加五味子夕用补中益气汤其泄顿止却专服前丸不两月声亮而愈

一小儿目睛白多黑少吐泻後喉瘖口渴大便不实朝夕悉服地黄丸而瘖後患泻其喉复瘖仍服前丸遂愈

一小儿十一岁形羸骨立面皎口乾白睛多而黑睛少不能顿言用六味地黄丸补中益气汤其形渐充年余而能言

一小儿解 不言其形属肾虚而兼瘖症先用六味地黄丸以补肾水又用补中益气汤以补肺金半载渐愈年余瘖病痊而能言

一小儿喉音不亮至十九岁咽仍不响面色赤白睛多畏明毕姻後头觉胀视物皆大作渴饮冷亦用前二药喜其远帙幙戒厚味二年诸症悉愈其声响亮

世传通关散治惊风愈後声哑不能言者以大南星一个炮为末每服二分猪胆汁调下便能言语

治要茯苓补心汤 治心气不足善悲愁怒?血面黄五心烦热或咽喉痛舌本作强

茯苓【四钱】桂心

甘草【炒各三分】紫英石【煨】人参【各一钱】大枣【二枚】麦门冬【去心一钱】

右水煎服

导痰汤

半夏 南星 茯苓 陈皮【炒】枳实【炒】甘草【炒】

右姜水煎服

防风散 治脾脏中风多汗恶风身体怠惰四肢不能动色微黄不嗜食舌强语澁口眼喎斜或肌肤不仁腹膨心烦翕翕发热神思如醉其脉浮缓胸满痰涎志意昏浊

独活【一钱五分】防风 茯神【去木】人参 附子【炮去皮脐】前胡沙参
半夏【汤洗七次】黄芪【炒】旋覆花 羚羊角【镑】甘草

右水煎服

半夏汤

甘草 半夏 桂枝【各等分】

右水煎细细呷之

鷄头丸 治小儿诸病後不能语

雄鷄头【一个炙】鸣蝉【三个炙焦】大黄【锦纹者湿纸裹煨】甘草【炙一两】木通
人参【各半两】当归 黄芪 川芎 远志【去心姜汁制略炒】麦门冬【去心焙各三分】

右为末炼蜜丸小豆大平旦米饮下五丸日三服儿大者加之久服取效

射干汤 治夏秋暴寒喘咳喉哑失声喉中如梗半夏【五钱汤泡】生姜【四钱泡】杏仁【
三钱去双仁皮尖】射干 甘草【炙】紫苑 肉桂 枳实【炒】当归 橘皮
独活麻黄【去节泡各二钱】

右每二三钱水煎服

菖蒲丸【方见语迟】

钱氏全蝎散【方见偏风噤】

地黄丸【方见肾脏】

七味白术散【方见积痛】

补中益气汤【方见虚羸】

二陈汤【方见吐?】

滞颐

小儿滞颐者涎流出而渍於颐间也脾之液为涎由脾胃虚寒不能收摄耳治用六君子汤加木香凡作渴饮冷者属实热宜泻胃火作渴饮汤者属虚热宜补中气若脾经实热而廉泉不能约制者用牛黄清心丸脾经虚热而廉泉不能统摄者用六君子加木香胃经实热而虫动津液流出者用泻黄散虚热用五味异功散大便秘结用清凉饮中气下陷用补中益气汤食积内热用大安丸仍参口疮颧肿条互览之

治验

一小儿滞颐面色痿黄余谓当调补中气不信用清热之剂更加弄舌乃用五味异功散渐愈後因停乳吐泻复作先用大安丸消其宿乳次用五味异功散补其中气而痊

一小儿滞颐面色赤手指热用泻黄散一服而愈後因乳母饮酒其子复患前症用东垣清胃散加乾葛神麴麦芽母子并服而愈

一小儿停食腹痛用疏导之药痛止左项筋动口角涎流面色痿黄肢体微肿先用六君柴胡升麻山栀四剂次用异功散加升麻而痊

一小儿停食腹痛服峻利之药吐泻自汗厥冷滞颐用六君升麻柴胡而愈

一小儿十一岁滞颐兼暖气下气时常停食服清热之剂大便不实小腹重坠此脾气下陷也用六君升麻柴胡饮食渐进大便渐实又用四神丸而愈一小儿滞颐面色白或黧腹痛手足时冷脉微细此肺肾虚寒也宜先培其脾土用温胃散二服腹痛顿止又六君子汤诸症并愈後停食挟惊吐泻发搐滞颐腹痛复作用六君加柴胡钩藤鈎四剂而痊一小儿吐舌流涎余谓心脾有热用导赤泻黄二散而愈後自服清热化痰等药更加弄舌余用异功散加钩藤鈎而安又用六君汤而愈

一小儿滞颐面色白或赤目劓咬牙此禀肝肾气不足内热而生虚风也用地黄丸以滋肾水异功散以补脾土而安

一小儿滞颐面青手按其腹则叫痛此夹食与惊也用异功散加枳实升麻二剂而愈後又停食吐泻滞颐发搐面色青黄此脾虚而肝木乘之也用异功散加升麻柴胡钩藤鈎而愈

温胃散 治脾冷涎多流滞於颐

丁香【一两】 人参 半夏 肉荳蔻 白术 乾姜 甘草【各半两】

右为末每服一钱姜水煎

愚按此方治脾胃虚寒涎流不止或呕吐腹痛之良剂也脾气稍温但服五味异功散

六君子汤

钱氏异功散

四君子汤

清胃散【四方见内销】

四顺清凉饮

补中益气汤【方见虚羸】

大安丸【保和丸加白术方见虚羸】

泻黄散【方见脾脏】

牛黄清心丸【方见急惊】

四神丸【方见惊泻】

导赤散【方见心脏】

腹痛

小儿腹痛口中气冷不思饮食脾土虚寒也用调中丸主之口中气温大便酸臭积痛也用下积丸治之面赤壮热或手足并热实热也用泻黄散泻之面黄微热或手足并温虚热也用异功散补之若作渴饮汤胃气虚热也用白术散若痛连两脇肝木乘脾也用四君子汤加柴胡芍药若腹痛重坠脾气下陷也用补中益气汤加升麻若手足指冷或吃逆泄泻寒水侮土也用六君炮姜肉桂不效急加附子若服尅滞之药致腹作痛按之不痛脾气复伤也用五味异功散中脘痛者属脾少腹痛者属肾按之痛者为积滞不痛者为里虚积滞者消之里虚者补之

治验

一小儿停食腹痛发热面赤或用养胃汤枳壳黄连山查反加腹胀午後发热按其腹不痛此

脾虚而尅伐伤之也用六君子汤数剂而瘥

一小儿七岁发热惊悸用化痰药反抽搐恶寒吐痰喘嗽腹痛少食用抱龙丸大便似痢寒热往来殊类风症余以为脾气复损用四君子汤少加升麻柴胡治之月余而愈

一小儿肚腹膨痛食後即泻手足逆冷此脾气虚寒也先用人参理中丸後用六君子汤而愈

一小儿九岁常患腹痛至冬月因食生冷之物其腹仍痛服理中丸之类辄效至十六岁秋初毕姻後腹痛又作唇面黯爪甲青余先君用八味丸补火随愈服四两许痛不再作至二十岁外痛复作服前丸不应乃服附子理中汤而止仍用八味丸而安

一小儿腹痛吐舌流涎作渴饮冷便秘用清凉饮下之顿安余谓小儿元气易虚易实病势稍安不必再药不信自用三黄丸一服果吐泻发搐余用白术散加钩藤钩补脾平肝而愈

四七气汤 治七气所伤痰涎结聚心腹作痛不能饮食

半夏【制焙五两】人参 辣桂【去皮各一两】甘草【半两】

右每服三钱姜枣水煎

指迷七气汤 治七情相干陰阳不升降气道壅滞攻冲作痛

青皮 陈皮 桔梗 蓬术 辣桂

益智仁【各一两】香附子【一两五钱】甘草【炙三分】半夏【制三分】

右每服三钱姜枣水煎

异功散 治小儿诸般钩症角弓反张胸高脐凸以透明没药为末姜汤调下【方见内钩即钱氏异功散】

桔梗枳殼汤 治气壅痞结腹脇疼痛

枳殼【炒】桔梗【各二两】甘草【炙半两】

右每服二三钱姜水煎

七味白术散 治积痛和胃气生津液【方见积痛】愚按前方若脾胃气虚作渴饮汤或因吐泻津液亏损烦渴引饮或脾胃虚弱腹胀泻渴弄舌流涎手足指冷并宜服之以温补脾气化生津液【方见积滞】

六君子汤 治脾胃气虚吐泻不食肌肉消瘦或肺金虚痰嗽喘促恶寒或肝虚惊搐眩运自汗诸症并宜服此以滋化源【方见内钩】

泻黄散【方见脾脏】

四君子汤【方见内钩】

补中益气汤【方见虚羸】

八味丸【方见肾脏】

附子理中汤

人参理中丸【二方见冷泻即理中汤】

益黄散【方见脾脏】

调中丸【方见脾胃虚冷】

腹胀

东垣云寒胀多热胀少皆主於脾胃虚者宜用六君子汤若喘而气短者脾肺气虚也用异功散补之若服剋伐之类而喘胀益甚者脾肺之气复伤也用前汤加半夏升麻若既下而不喘则邪气去而肺气寧也不必用药或病久小便不利或四肢浮肿者脾肺之气虚不能通调水道也用金匱加减肾气丸主之或手足逆冷睡而露睛脾胃虚寒也用六君子加炮姜手足不冷睡而露睛脾胃虚弱也用六君子汤若面色青木剋土也用六君木香柴胡更当调治乳母节其饮食恐药餌过剂复伤胃气故也

治验

一小儿腹胀面赤痰喘大便秘壮热饮冷此形病俱实用紫霜丸一服诸症益甚面色顿白饮汤不絕余以为邪气退而真气复伤故面白而喜汤用白术散大剂煎汤令恣饮良久而睡翌日顿安

一小儿伤食腹胀胸满有痰余治以异功散而痊後复伤食腹胀兼痛或用药下之痛胀益甚而加气喘此脾胃伤而致肺虚也用六君子加桔梗调补而痊一小儿腹胀恶食发热恶心症类外感余曰此饮食停滯也用保和丸一服诸症顿退惟腹胀用异功散而痊

一小儿伤食腹胀服剋伐之剂小便澁滯又服五苓散之类饮食渐减小便不通四肢顿肿余

朝用金匱腎氣丸去附子夕用補中益氣湯而安

一小兒傷風咳嗽痰涌用六君桔梗桑皮杏仁而愈復飲食停滯作浮腹脹仍用六君山查厚朴而安後停食作嘔或用药下之更加咳嗽余謂此屬脾肺俱虛欲行調補彼以為緩乃發表尅滯前症益甚更加搖頭余用天麻散倍加釣藤鈎及異功散尋愈一小兒五歲食粽後咬牙欲吐頃間腹脹昏憤鼻青黃赤此脾土傷而食厥也令用鷄翎探吐出酸物頓醒節其飲食勿药而愈

一小兒胸腹脹發熱頓悶以手按腹即哭此飲食停滯也先用保和丸一服前症即愈更加煩渴按其腹不哭此宿食去而脾胃復傷也用五味異功散加柴胡治之頓瘳

一小兒腹脹大便青白腹左一塊面色痿黃齒齦赤爛食少滯頤余用異功散調補中氣為主佐以大芫荽湯清疳治熱月余諸症稍愈仍服異功散及蚘蟆丸外貼阿魏膏兩月塊消左脇微痛用四君子湯九味芦荟丸而愈

褐子丸 治疳腫脹

萝卜子【一兩微炒】 陳皮 青皮【炒】 檳榔 五靈脂 蓬朮【煨】 赤茯苓 黑牽牛【頭末各半炒】 木香【二錢五分】

右為末面糊丸菉荳大每服十五丸紫蘇湯下

金匱加減腎氣丸

熟地黄【八兩】 乾山藥【四兩】 山茱萸【四兩】 白茯苓 牡丹皮 澤瀉【各三兩】 肉桂 附子【炮】 車前子【炮】 牛膝【酒微炒各一兩】

右各另為末米糊丸小豆大每服三四十丸空心食前白湯下

紫霜丸【方見噤風】

大柴胡湯【方見瘕症】

五苓散【方見五淋】

保和丸【方見虛羸】

天麻散【方見百晬內嗽】

大芫荇汤

蚘蟆丸

九味芦荟丸【三方见痞症】

癖块痞结

钱仲阳云癖块者僻於两脇痞结者否於中脘此因乳哺失调饮食停滞邪气相抟而成或乳母六淫七情所致古人多用剋伐痞癖既久饮食减少脾气必虚久而不愈必先以固胃气为主使养正则积自除若欲直攻其结不惟不能善消抑亦损其脾土亏凡脾土亏损必变症百出矣当参各类及随见症而主治之

治验

一小儿患痞服榔蓬术枳实黄连之类痞益甚余曰此脾经血虚痞也不可剋伐遂用六君子加当归数剂胃气渐复诸症渐愈乃朝用异功散加升麻柴胡夕用异功散加当归芍药而愈

一小儿素嗜肉食腹痛大便不调半载後右脇结一块三月後左脇又结一块腹胀食少作渴小便赤澀大便色秽又半载後颌下亦结一核妄服消块行滞等药而元气益虚用四味肥儿丸五味异功散之类热渴渐止腹胀渐可佐以九味芦荟丸结核渐消後用四君子为主佐以四味肥儿丸之类三月余而痊一小儿停食吐泻後饮食不节作泻腹痛膨胀腹中结块作渴发热龈烂口臭服消导剋滞之药而前症益甚形体益瘦视其面色黄中隐青乃脾土亏损而肝木所侮也法当调补中气兼平肝木遂用冲和汤及大芫荇汤之类半载而愈

一小儿患痞结服剋滞之药余谓属形病俱虚当补中气彼不信仍行剋伐遂致虚火上炎齿龈蚀烂颌下结核余用大芫荇汤及异功散加减用之而安一小儿患痞结久而四肢消瘦肚腹渐大寒热嗜卧作渴引饮用白术散为主佐以四味肥儿丸月余诸症渐愈又以异功散加当归并六味地黄丸又月余而愈

一小儿患痞结身热如火病状多端不可尽述朝用五味异功散夕用四味肥儿丸月余诸症稍愈佐以地黄丸自能行立遂朝用地黄丸夕用异功散及虾蟇丸数服而愈

挨痞丸 治乳癖谷症腹中块痛

代赭石【火煨醋淬研细】 青皮 生地黄 木香 蓬术【煨各】

【三钱】 巴豆【去油净六钱】

右为末醋糊丸麻子大每服二三丸食後姜汤下

甘遂破结散

甘遂【二钱五分煨黄】青皮【焙】黄芩【炒】大黄【炒各半两】

右为末每服一钱水煎服仍量儿加减利後以粥补之

进食丸

治乳食不消心腹胀满壮热喘粗呕吐痰逆肠鸣泄泻或食症乳癖瘀气痞结并皆治之

巴豆霜 当归【米泔浸炒】朱砂

代赭石【醋煨淬七次】枳壳【炒】木香【各五钱】麝香【一分】

右为末糊丸麻子大每服一二丸温米饮下更量儿加减

枳术丸

白术【四两】枳实【二两】

右为末荷叶包煨烂饭为丸桐子大每服四五十丸空心白滚汤下

阿魏膏 治一切癖块痞结更服胡连丸

羌活 独活 玄参 官桂 赤芍药 穿山甲 生地黄 两头尖 大黄 白芷 天麻【各五钱】槐柳桃
【枝各三钱】红花【四钱】木鼈【十枚去壳】乱髮【如鷄子大一团】

右用香油二斤四两煎黑去渣入髮煎化仍去渣徐下黄丹煎软硬得中入芒硝阿魏苏合香
油乳香?药各五钱麝香三钱调匀即成膏矣摊贴患处内服丸药黄丹须用正真者效凡贴膏
药先用朴硝随患处铺半指厚以纸覆上用热熨斗熨良久如硝耗再加熨之二时许方贴膏
药若是痞积加芦荟末同熨

六味地黄丸【方见肾脏】

四君子汤

异功散

六君子汤【三方见内钩】

四味肥儿丸【方见呕吐】

大茺黄汤【一名冲和丸】

虾蟇丸

九味芦荟丸【三方见疳症】

白术散【方见积痛】

积滞

经曰五脏之积曰积六腑之积曰聚凡小儿积滞或作痛皆由乳哺不节过餐生冷脾胃不能尅化停滞中脘久而成积或因饱食即卧脾失运化留而成积其症面目黄肿腹痛膨胀肚热足冷嗜卧不思乳食大便酸臭或闼澁小便如油若吐乳泻乳所出酸臭者为乳积腹胀作泻呕吐啰气者为食积初患元气未损之时或腹胀作痛大小便不利者先用白饼子或木香?榔丸下之下後以白术散或五味异功散和之渴加乾葛吐加半夏下而热不退或作呕作泻饮食不思此脾胃俱伤也用六君子汤手足指冷喜饮热汤此脾胃虚寒也前方加炮姜木香面色黄白目无精光脾肺俱虚也用四君子加柴胡升麻腹痛泄利下重或小便不利者用四逆散发热晡热或泻未已脾气下陷也潮热口渴大便不调欲变疳症也并用补中益气汤佐以肥儿丸经云邪之所凑其气必虚留而不去其病乃实必以调脾为主而以消导佐之古人所谓养正积自除正此意也

治验

一小儿每停食身发赤晕用清中解郁汤而愈後患摇头咬牙痰盛发搐吐出酸腐待其吐尽翌日先与七味白术散次与参苓白术散遂不复作若吐後儿安更不必服药也

一小儿饮食积滞患呕吐发热服消导等剂饮食已消而热未退余以为胃经虚热用六君升麻柴胡各二分四剂而愈

一小儿七岁停食後腹痛服尅伐之剂而益加按之不痛此脾气复伤也用六君子汤而愈後复伤食服保和丸及三棱?榔之类而更腹痛服泻黄散体重善噫此脾气虚而下陷也仍用六君升麻柴胡木香而愈

一小儿数岁间每停食辄服峻利之药後肚腹膨胀呕吐泄泻先用六君子汤诸症渐愈又用补中益气汤而安

一小儿腹胀饮食後即泻手足逆冷此脾气虚寒也先用人参理中丸後用六君子汤而愈

一小儿腹痛以手按之痛益甚此乳食停滯也用保和丸末一钱?榔末三分下酸臭粪而安後患腹痛别服峻利之剂其痛益甚手按则已面色黄白此因饮食失宜脾气不调土虚不能生金也用六君子汤而愈

一小儿久患腹痛诊其母右关脉弦缓乃木尅土也用六君子汤加木香柴胡母子并服而愈

一小儿停食腹痛面色白黑睛少手足常冷大便不实口鼻吸气腹中陰冷此禀命门火衰不能温蒸中州之气故脾胃虚寒也用八味丸补中益气汤而愈一小儿患前症服驱逐之剂更恶寒发热余朝用补中益气汤夕用五味异功散寻愈後饮食停滯腹痛便秘别用疏导之剂朝寒暮热大便频数余用五味异功散月余饮食渐进乃佐以八珍汤内芍药炒焦川芎些少又两月寒热渐愈後又伤风服参苏饮汗出喘嗽发热服清热化痰之剂更烦热不寐寻衣撮空先用六味地黄丸料水煎服诸症顿退再剂而安却用五味异功散八珍汤而痊後因伤食吐泻大便欲去而不去欲了而不了先用补中益气汤数剂不应改用人参五钱白术三钱陈皮甘草各七分升麻四分乾葛五分三剂又手足并冷急用人参一两附子五分姜枣水煎一日服二剂手足始温又二剂诸症渐退仍用前人参五钱之方治之而愈

七味白术散 治吐泻作渴

人参【二钱五分】白茯苓 白术
藿香叶【各半两】木香【二钱】甘草【一钱】乾葛【半两渴加一两】

右每服一二钱水煎热渴甚去木香肚痛加芍药

四逆散 治少陰病或腹中痛泄痢下重

枳实【炒黄】甘草【炒】柴胡 芍药

右为细末每服二钱空心米饮调下

白饼子【方见发搐】

木香?榔丸【方见积滯】

五味异功散

六君子汤【二方见内钩】

补中益气汤【方见虚羸】

薛氏医案卷五十八

卷五十九

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷五十九

明 薛己 订

保婴撮要六

发热症

小儿之热有心肝脾肺肾五脏之不同虚实温壮四者之不一及表里血气阴阳浮陷与夫风湿痰食各当详之心热者额上先赤心烦心痛掌中热而哆或壮热饮水已午时益甚肝热者左颊先赤便难转筋寻衣捻物多怒多惊四肢困倦寅卯时益甚脾热者鼻上先赤怠惰嗜卧身热饮水遇夜益甚肺热者右颊先赤手搯眉目喘咳寒热饮水日西热甚肾热者额下先赤两足热甚骨蒸如虫蚀热甚不能起於牀夜间益甚仍当辨其虚实实则面赤气粗口燥唇肿作渴饮冷大小便难或掀衣露体烦啼暴叫伸体而卧睡不露睛手足指热宜用表下虚则面色青白恍惚神缓口中虚冷嘘气软弱喜热恶寒泄泻多尿或乍凉乍温怫鬱惊悸上盛下泄夜则虚汗屈体而卧睡而露睛手足指冷宜用调补壮热者肢体大热热不已则发惊痼温热者肢体微热热不已则发惊搐阴虚则内热阳盛则外热以手轻扪之则热重按之不热此皮毛血脉之热热在表也重按之筋骨之分则热轻手则不热此筋骨之热热在里也不轻不重按之而热此肌肉之热热在表里之间也以虚实分属表里而言之壮热恶风寒为元气不充表之虚热也壮热不恶风寒为外邪所客表之实热也壮热饮汤为津液短少里之虚热也壮热饮水为内火销铄里之实热也若夫内外皆热则喘而渴齿乾烦冤腹满四肢热逢风寒如炙於火能冬不能夏是皆阳盛阴虚也脉尺寸俱满为重实尺寸俱弱为重虚脉洪大或缓而滑或数而鼓此热盛拒阴虽形症似寒实非寒也热而脉数按之不鼓此寒盛格阳虽形症似热实非热也发热恶热大渴不止烦躁肌热不欲近衣其脉洪大按之无力或兼月痛鼻乾者此血虚发躁也当补其血如不能食而热自汗者气虚也当补其气仲景论内外不足发热自汗之症禁不可发汗如饮食劳役虽病发热误发其汗则表必虚也身热而汗出者风也发热身疼而身重黄者湿也增寒发热恶风自汗脉浮胸痞者痰也发热头痛脉数者食也寸口脉微为阳不足阴气上入阳中则恶寒尺脉弱为阴不足阳气下入阴中则发热阴阳不归其分则寒热交争也昼则安静夜则发热烦躁是阳气下陷入阴中也昼则发热烦躁夜则安静是重阳无阴也当亟泻其阳峻补其阴至若身热脉弦数战栗而不恶寒者瘧症也发热恶寒脉浮数也温病也若四肢发热口舌咽乾是火热乘土位湿热相合故烦躁闷乱也若身体沉重走注疼痛乃湿热相抟风热郁而不得伸也心热则用泻心汤导赤散安神丸肝热则用泻

青丸柴胡饮子脾热则用泻黄散肺热轻则用泻白散重则用凉膈散及地骨皮散肾热则用滋肾丸实热则宜疏下虚热则宜调补壮热者导赤散温热者泻黄散若肢体热轻则用惺惺散重则用羌活散之类大便秘者二黄犀角散余热不退者地骨皮散骨节疼痛者梔子仁汤宿滞内作者紫霜丸肝火内热者龙胆草汤陰盛隔阳而热者人参理中汤肝经血虚生风而搐者用四物天麻钩藤钩若热蕴便秘者四顺清凉饮热而二便调和风邪蕴结於表而发者用惺惺散加麻黄汗之汗後血虚而热益甚者六神散加粳米汗後气虚而恶寒发热者补中益气汤汗後陰虚阳无所附而热者用四物汤加参芪汗後阳虚陰无所附而热者用四君汤加芎归婴儿诸热其因别症而作者当从所重而治之或乳母七情厚味饮食停积遗热於儿或儿嗜食甘肥衣衾过煖或频浴热汤积热於内为患者各当详之盖小儿脏腑脆弱元气易虚补泄宜用轻和之剂庶无变症若乳下婴儿当兼治其母仍参诸热症治之

治验

一小儿夜间发热天明如故或小腹作痛饮食少思面色痿黄热时面赤不时饮汤此食积所致用下积丸治之而消又用白术散调理而安

一小儿饮食停滯腹痛作呕用大安丸而愈饮食虽进其腹仍痛用六君山查神麴痛少止余以为脾气伤而饮食难化乃去前二味服六君子四剂而愈後又伤食仍服前药痛止而至暮发热用六君柴胡升麻而痊此由脾虚下陷不能升发故至暮发热也一小儿发热饮食少思大便不实常服芦荟等丸视其鼻赤此寒凉之剂复伤脾至而虚热也用五味异功散数剂而愈

一小儿十三岁内热晡热形体倦怠食少作渴此禀赋怯弱之虚热也用地黄丸异功散补之不越月而痊

一小儿十四岁而近女色发热吐痰至有室两目羞明头觉胀大用地黄丸料加五味子当归黄芪煎服及补中益气汤得慎疾而痊

一小儿十四岁肢体倦怠发热晡热口乾作渴吐痰如涌小便淋沥面目赤色身不欲衣此禀肾不足而虚热也用补中益气汤六味丸而愈

一小儿五岁发热作渴右颧鼻準微赤或与冷水凉药即时呕吐余曰右颧微赤肺经虚热也鼻準微赤胃经虚热也先用四君升麻一剂吐止又用白术散二剂而不渴更用四君子汤四剂而安

一小儿九岁发热作渴用泻黄散大便重坠口角流涎彼欲泻火余曰鼻準青白脾胃虚寒肝木所侮也口角流涎脾气不能摄也大便重坠胃气不能升也不信竟服凉药眉唇微动四肢微搐复求治余曰此虚极而变慢脾风矣用六君炮姜当归木香钩藤钩二剂益甚欲求更剂余曰药力未及耳又加炮附子一片即安後去附子二剂而愈

一小儿四岁停滞腹痛发热用大安丸而饮食进又用六君山查神麴四剂而痛止复伤食至暮复热用六君柴胡山梔升麻而痊此脾虚兼肝火之治法也一小儿发热体瘦夜间遗尿日间频数此禀脾肾不足用补中益气汤加补骨脂及地黄丸加鹿茸治之而痊毕姻後小便频数作渴发热服补阴丸等药发热尤甚小便如淋用补中益气汤六味地黄丸而愈一小儿体瘦腹大发热嗜卧作渴引饮先用白术散为主佐以四味肥儿丸诸症渐愈又用异功散六味丸而愈

一小儿十四岁伤食发热服消食丸胸腹膨胀发热作渴此脾气复伤也先用四君升麻柴胡饮食渐进用补中益气汤而愈後因劳心发热少食用四君升麻柴胡而愈

一小儿伤风咳嗽服参苏饮加痰盛喘急腹胀不食此脾肺虚而复伤也用六君柴胡桔梗一剂诸症顿愈用六君子汤而痊

一女子十四岁发热至夜益甚久不愈左关脉弦数右关脉微按之亦弦此肝火血热脾胃虚弱先用四物二连汤加柴胡山梔牡丹皮二剂热稍退又二剂热顿退再用加味逍遥散白术加三钱数剂而痊嘉靖癸丑闰三月渠下第北归犬子麟孙方病泻不食遍体如焚胸满腹冷痛日夜不成寝或投以山查枳壳中气愈弱泻愈甚不食至累月日进米饮一半瓯或糕饵枣栗少许稍过节度则肢体热益壮腹痛不解奄奄喘息旦暮不保矣立斋先生枉视之则曰此胃虚不能纳脾湿不能运病在戊巳深且久兼木气所乘脱服攻治之药则殆矣亟用补中益气汤数里热稍退泻不食如初先生复曰此勿亟惟胃气渐复湿渐除当自得效耳改用六君兼补中汤仍服八味丸生命门火以滋脾土如是三月诸症悉退纳谷倍常日惟稍遇形役或记诵心劳则潮热遄发先生复授以归脾方加梔柴二种热寻止形气日充甲寅七月偶触暑饮冷前症复作间发疟疾热昼夜不止先生曰此虚寒偏阳法当舍时从症用补中汤多加炮姜益以生姜二两及口而疟止面色青黄相错更患痢或谓参芪炮姜不宜先生晒之且曰此固虚弱自利耳往尝谓戊巳受病木气乘之此青黄二色非正形耶仍用补中益气多加柴胡参术数日而痢止余症亦渐解脱惟吾儿襁褓失母渠每姑息之故其惟外温而中易怒渠少孤遭家多难藜藿恒不充儿幼多病失调养故形怯而胃弱致疾之原其所由来者渐矣先生洞微烛幽知其病深且久而坚持独见以祛攻治之惑吾儿再造之慈何幸得此於先生哉先生之曾大父与先廷评公为中表兄弟先君与先生同宦游京师末年尤敦泉石之雅先生盛德及於犬子能使先人後嗣永存区区志感诚不能尽万分之一也是岁冬十月望眷晚生张慕渠顿首顿首嘉靖甲寅敬臣之女年十二患脾胃素弱自夏入秋时泻时止小腹微痛至八九月间遂成疳积之症发热凡二十余日不止汗泄热解汗已复热自中脘至小腹膨胀坚直大便溏气喘咳嗽作噎俱昼轻夜重彻夜烦躁不睡鼻塞眼暗讞语其母以为必死矣立斋先生诊之曰脉浮大而无根此大虚证也非独参汤不可乃用参一两加熟附三分煨生姜三片日进二剂仍并渣煎服之大下疳积其气甚腥腹渐宽热渐减脉渐敛然手犹寻捻不已鼻孔出血先生曰此肝证也煎六味丸料与一服如脱乃昼服独参参姜附汤夜服六味丸料脉渐有根诸证渐退先此手足恒热至是乃始觉寒先生喜曰此病邪尽退而真气见矣然犹饮食不进乃单用六君子汤加炮姜遂能食咳嗽独甚与补中益气汤嗽遂止夜始有睡凡弱女之得生皆先生力也向非先生卓有定见专治其本而其末自愈则奄奄一息之躯岂堪杂剂之

攻击哉其为丘中之骨盖必然矣敬臣感激之余无由以报敬书施疗之颠末以附医録庶不泯先生之功且以告同患此者幸无所悞亦推广先生一念之仁於万一云尔孟冬望日眷晚生王敬臣顿首拜书

败毒散 治伤风瘟疫风湿头目昏眩四肢作痛增寒壮热项强睛疼或恶寒咳嗽鼻塞声重

柴胡 前胡 川芎 枳殼【炒】 羌活 独活 茯苓 桔梗 人参【各一两】 甘草【半两】

右每服二钱生姜薄荷水煎

滋肾丸 治肾热

黄栢【酒拌炒焦三钱】 知母【二钱】 肉桂【五分】

右为末熟水丸桐子大每服二十丸至三十丸食前百沸汤下

四顺清凉饮 治小儿血脉壅实脏腑蓄热颊赤作渴五心烦热睡卧不安四肢惊掣及因乳哺不时寒温失度令儿血气不顺肠胃不调大小便澁欲发惊癇或风热结核头面生疮目赤咽痛疮疹余毒一切壅滞挟热泄泻不止加木香煨大黄

赤芍药 当归 甘草 大黄【各等分】

右每服一钱水煎作两服

消风散 治小儿解脱致令风邪客於皮毛入於脏腑则令恶风发热胸膈痰涎目澁多睡【方见惊癇胎症】

小柴胡汤 治伤寒温热身热恶风头痛项强四肢烦疼往来寒热脇痛耳聋呕哕痰实中暑疟疾并服之【方见天钧】

愚按前方若肝胆经风热肝火癰癰寒热往来日晡发热潮热不欲饮食或怒火口苦耳聋咳嗽或脇痛脘满小便不利或泄泻吐酸苦水或肢体搐动唇目抽掣及乳母有前症致儿为患者并宜服之

抑肝散 治肝经虚热发搐或发热咬牙或惊悸寒热或木乘土而呕吐痰涎腹胀少食睡卧不安【方见肝脏】

梔子清肝散【一名柴胡梔子散】 治三焦及足少阳经风热发热耳内作痒生疮或腹中作痛或胸乳间作痛寒热往来

柴胡 梔子【炒】 牡丹皮【各一钱】 茯苓 川芎 芍药 当归
牛蒡子【炒各七分】 甘草【三分】

右水煎服

柴胡清肝散 治肝胆三焦风热怒火或乍寒乍热往来寒热发热或头发疮毒等症

柴胡【一钱五分】 黄芩【炒】 人参 川芎【各一钱】 山梔【炒一钱半】 连翘
甘草【各五分】 桔梗【八分】

右水煎服

柴胡饮子 解肌热蒸热积热或汗後余热脉洪实弦数大便坚实

黄芩【七分】 甘草【四分】 大黄【八分】 芍药【七分】 柴胡
人参【各五分】 当归【一钱】

右每服一钱姜水煎

当归补血汤 治肌热躁热目赤面红烦渴昼夜不息其脉洪大而虚重按全无此脉虚血虚也
若悞服白虎汤必死宜此主之

黄芪 当归【各等分】

右水煎服

三黄丸 治三焦积热眼目赤肿头项肿痛口舌生疮心膈烦躁不美饮食大小便秘澁五脏实
热或下鲜血疮疖热症

黄连 黄芩 大黄【煨各等分】

右为末炼蜜丸桐子大每服三十丸白滚汤下量大小加减服

白虎汤 治伤寒或吐或下後七八日邪毒不解热结在里表里俱热时时恶风大渴舌上乾燥
而烦欲饮数升者宜服之又治夏月中暑汗出恶风寒身热而渴

知母【三两】 甘草【一两炙】 石膏【八两另研】 糯米【三合】

右每服二三钱水煎至米熟为度

泻黄散【方见脾脏】

泻心汤【方见心脏】

地黄散【方见肾脏】

清凉饮

柴苓散

二黄犀角散

牛黄散

黄龙汤

牛黄膏

栀子仁汤

六物黄芩汤

五物人参饮

地骨皮散【十方见潮热】

惺惺散

理中汤【二方见咳嗽加人参即人参理中汤】

龙胆汤

紫霜丸【二方见噤风撮口】

四物汤【方见急惊】

六神散【方见夜啼】

白术散【方见积痛】

羌活散【方见惊风】

下积丸【方见积滞】

补中益气汤

大安丸【即保和丸加白术二方】

六君子汤

四君子汤

加味逍遥散

异功散【四方见内钩】

泻白散【方见肺脏】

泻青丸【方见肝脏】

凉膈散【方见疮疡】

八珍汤【方见寒热】

潮热

钱仲阳曰潮热者时间发热过时而退来日依时而有风寒疳积食癖之分陰阳虚实五脏之异如汗出身热呵欠面赤者风热也伤寒时疫陰阳相胜外感热也肌瘦口乾骨蒸盗汗疳热也大小便閼澀汗下不解积热也腹背先热夜发旦止食热也涎嗽饮水乳食不消癖热也又有烦热者气麤喘促心躁不安颊赤口疮兼发瘤症疮疹热者耳鼻尖冷血热者已午间发至夜则凉虚热者困倦少力发於病後阳邪干心则来去不定陰阳相胜则寒热如疟前症在小儿有因乳母或妊娠七情厚味遗热或饮食停积衣衾过煖及频浴热汤而为患若寅卯辰时热而力盛饮水者肝经实热也用柴胡清肝散热而力怯饮汤者肝经虚热也用六味地黄丸已午时热心经也实用导赤散虚用秘旨安神丸申酉戌时热肺经也实用泻白散虚用秘旨保脾汤亥子丑时热肾经也用地黄丸大凡壮热饮水大便秘结属实热用二黄犀角散下之热渴饮汤大便如常属血虚用四物汤补之若下後陰虚阳无所附而仍热用四物参芪汗出阳虚陰无所生而仍热用四君芎归若汗下後烦渴面赤血虚发躁也当归补血汤若见惊搐等症肝血虚而内生风也用四物天麻钩藤鈎颊赤口乾小便赤澀大便焦黄表里俱实热也用清凉饮子如大便已利或热未止表邪未解也惺惺散未应加麻黄微汗之既汗而仍热

此表里俱虚气不归原阳浮於外而虚热也六神散加粳米阳气下陷於陰中而发热者用补中益气汤若乳下婴儿当兼治其母

一小儿潮热烦渴大便乾实气促咳嗽右颧色赤此肺与大肠有热用柴胡饮子一服顿愈後因微惊发搐咬牙顿闷此肝脾气血虚也用四君芎归钩藤钩而愈

一小儿潮热发躁左腮青赤此心肝血虚用秘旨安神丸及四物防风酸枣仁渐愈又用六味地黄丸调补肝肾而痊

一小儿潮热发搐痰涎上涌手足指冷左颧至申酉时青中隐白手足时搐此肝经虚弱肺金所胜而潮搐脾土虚弱而手足冷也用补中益气汤调补脾肺用六味地黄丸滋补肝肾而愈盖病气有余当认为元气不足若用泻金伐肝清热化痰则误矣

一小儿寅卯时发热或兼搐有痰服抱龙泻青二丸而愈後复患服前药兼咳 气喘不时发搐面赤色或青黄或浮肿或流涎余谓咳嗽气喘脾肺气虚也不时发搐肝木乘脾也面青黄肝入心脾也浮肿流涎脾气虚也用益智丸以养心血补中益气汤以补脾气而愈

一小儿腹痛作呕饮食少思至暮腹胀发热此脾虚下?朝用补中益气汤夕用六君柴胡升麻而愈後因劳不时寒热夜间盗汗用十全大补汤而愈一小儿夜间发热腹胀余谓脾虚肝盛朝用五味异功散夕用四味肥儿丸热止乃朝用六味地黄丸夕用异功散而痊

一小儿巳午时发热惊悸发时形气倦怠而黄?食流涎饮汤余谓心气不足所致不信反服凉心之药更加吐泻睡而露睛手足并冷几至慢脾风先用六君姜桂佐以地黄丸而愈

一小儿亥子时患前症用益黄散而愈後复发服前药及清热之剂病发不时嗜卧露睛作渴少食大便频黄予谓脾虚而肝木胜之兼元气下陷也用补中益气汤佐以地黄丸而愈

一小儿先停食服剋伐之药致面色痿黄体倦少食申酉时潮热或用清热消导之剂更加泄泻予先用六君子汤数剂後用补中益气汤渐愈

一小儿申酉时发热面赤腹中作痛或用峻利之剂下之致发搐吐痰作渴腹痛按之即止此脾胃伤而变症也用七味白术散补中益气汤顿安

柴苓散 治壮热来去

柴胡 麦门冬【去心焙】 人参 赤茯苓 甘草【各半两】 黄芩【一两】

右为末每服二钱入小麦二十粒青竹叶三片水煎服

二黄犀角散 治温壮心热神不安大腑秘结

犀角屑 大黄【酒浸蒸】 钩藤钩 梔子仁 甘草黄芩【各半两】

右为末每服五分热汤调下量儿加减

牛黄散 治温壮常热或寒热往来

牛黄【研】 甘草【各半两】 柴胡
梔子【酒炒】 龙胆草【酒炒】 黄芩【炒各二钱五分】

右为末每服五分以金银薄荷汤调下

黄龙汤 治发热不退或寒热往来

柴胡【五钱】 黄芩【炒】 甘草【炙各二钱】 赤芍药【三钱】

右每服一钱姜枣水煎

牛黄膏 治壮热咽喉涎响或不省人事或左右手偏搐或唇口眼鼻颤动此热涎内蓄风邪外感也宜急服之

蝎尾【四十九枚】 巴豆肉【去油膜一钱五分】 梅花脑【半匙】 辰砂【研二钱】 牛黄【少许】 麝香【一匙】 郁金【三钱皂角水煮】

右为末每服一匙蜜水调下量儿虚实用之

梔子仁汤 治阳毒壮热百节疼痛下後热不退者梔子仁【酒炒】 赤芍药 大青
知母【各一两】 升麻 黄芩【酒炒】 石膏【各二两】 柴胡【一两五钱】 甘草【五钱】
杏仁【二两浸去皮面炒微黄】

右每服三钱生姜三片水煎服

六物黄芩汤 治壮热腹大短气往来寒热饮食不化黄芩【酒炒】 大青
甘草【炙】 麦门冬【去心】 石膏【各半两】 桂【三钱】

右每服一二钱水煎服

五物人参饮 治壮热咳嗽心腹胀满

人参 甘草【各半两】 麦门冬【去心】 生地黄【各一两半】 茅根【半握】

右每服二三钱水煎服

益智丸 治脾肾虚热心气不足

益智仁 茯苓 茯神【各等分】

右为末炼蜜丸桐子大每服五六十丸空心白滚汤下亦治白浊

四物二连汤 治血虚劳五心烦热昼则明了夜则发热脇肋并一身尽热日晡肌热

当归 生地黄 白芍药 川芎 黄连 胡黄连【各等分】

右水煎服

地骨皮散 治虚热壮热

知母 柴胡 甘草 人参 地骨皮 茯苓半夏【各等分】

右姜水煎有惊热加蝉退天麻黄芩

抱龙丸【方见伤寒】

六味丸【方见肾脏】

七味白术散【方见积痛】

导赤散

秘旨安神丸【二方见心脏】

浮白散【方见肺脏】

惺惺散

保肺汤【二方见咳嗽】

四物汤【方见急惊】

当归补血汤

柴胡清肝散

清凉饮子【三方见发热】

六神散【方见夜啼】

补中益气汤【方见虚羸】

四君子汤

六君子汤【二方见内钩】

益黄散【方见脾脏】

泻青丸【方见肝脏】

寒热

经曰阳虚则外寒陰虚则内热阳盛则外热陰盛则内寒寒热往来此乃陰阳相胜也故寒气并於陰则发寒阳气并於阳则发热寸口脉微为阳不足陰气上入阳中则恶寒尺脉弱为陰不足阳气下入陰中则发热阳不足则先寒後热陰不足则先热後寒陰阳不归其分则寒热交争也又上盛则发热下盛则发寒阳胜则乍热陰胜则乍寒陰阳相胜虚实不调故邪气更作而寒热往来或乍寒乍热也少阳胆者肝之府界乎太阳阳明之间半表半里之分陰阳之气易於相乘故寒热多主肝胆经症以小柴胡汤加减调之若祇见寒热起居如常久而不愈及大病後元气未复悉属陰虚生热阳虚生寒宜用八珍汤补之甚者十全大补汤有食积为病亦令寒热用保和丸消之若兼呕吐泄泻用六君子汤厥冷饮热人参理中丸作渴不止七味白术散食积既消而寒热尚作者肝邪乘脾所胜侮所不胜也用异功散加柴胡山梔其症寒热详见症门

治验

一小儿十四岁朝寒暮热或时发寒热则倦怠殊甚饮食不思手足指冷朝用补中益气汤夕用六君子汤各二十余剂渐愈後因用功劳役前症复作更加头痛脉虚两寸尤弱朝用补中益气汤蔓荆子夕用十全大补汤两月余而痊但劳役仍复寒热服前二汤稍愈毕姻後又用功过度朝寒遍体如水暮热身如炙朝用补中益气汤加姜桂夕用八味丸加五味子各五十余剂而愈

一小儿十三岁壮热便秘服清凉饮愈而复作服地骨皮散更潮热又服芩连四物不时寒热体倦少食而热或昼见夜伏夜见昼伏予谓肝脾虚热夕用地黄丸加五味子朝用补中益气汤加山药山茱而瘥一小儿寒热不愈诊其乳母左关脉弦数左脇作痛遇劳则遍身瘙痒遇怒则小便不利此因肝经血虚郁火所致也先用小柴胡汤加山梔牡丹皮诸症顿退又用加味逍遥散母子并痊

一小儿发热咬牙乍寒乍热耳内痛痒缘乳母有肝火所致用柴胡清肝梔子清肝二散母子并服而愈一小儿十四岁每日子时分发热遍身如炙午未时则寒足骨如水至膝至子时分热仍作此内真寒而外假热也朝用补中益气汤加参芪各三钱附子三分夕用大剂四君子汤加当归一钱附子五分各二十余剂渐安又用参术各五钱归芪各三钱陈皮甘草各一钱姜桂五分各数剂乃朝用十全大补汤夕用六君子汤渐愈又用五味异功散而寻愈

一女子十五岁寒热月经先期两寸脉弦出鱼际此肝经血盛之症用小柴胡汤加生地黄乌梅治之而愈後寒热消瘦月经过期乃肝脾二经血气虚弱也朝用补中益气汤夕用六味地黄丸而愈

羌活冲和丸 治太阳无汗发热头痛恶寒脊强脉浮紧又治非时暴寒人中之头痛恶寒发热宜此汤治之以代麻黄汤用太阳经之神药也

羌活 防风 苍术【各一钱半】 川芎 甘草 细辛 白芷 生地黄 黄芩【各钱】

右水煎服

八珍汤【四物四君合用四物见急惊四君见内钩】

十全大补汤【方见自汗】

六君子汤

加味逍遥散

异功散【三方见内钩】

人参理中丸【方见冷泻】

保和丸

补中益气汤【二方见虚羸】

地骨皮散【方见潮热】

芩连四物汤【即四物二连汤加黄芩方见潮热】

地黄丸

八味丸【即地黄丸加五味子肉桂二方见肾脏】

小柴胡汤【方见痉症】

柴胡清肝散

梔子清肝散【二方见发热】

伤寒夹惊夹食

钱仲阳云小儿正伤寒者谓感冒寒邪壮热头痛鼻塞流涕畏寒拘急是也夹惊者因惊而又感寒邪或因伤寒热极生风是热乘於心心神易动故发搐也用薄荷散人参羌活散之类解之甚者抱龙丸夹食者或先伤於风寒後复停滯饮食或先停滯饮食而後伤於风寒以致发热气粗噯气壮热头疼腹胀作痛大便酸臭先用解散次与消导不解者大柴胡汤周岁已前伤寒热轻者用惺惺散周岁已後须解表微汗若五六日不除邪入於经络传变多端不可枚举若夫荣卫俱伤者羌活冲和汤主之过此则少阳阳明二经在於半表半里肌肉之间脉不浮沉外症在阳明则目疼鼻乾不得眠脉洪而长以葛根解肌升麻等汤治之在少阳则耳聋脉弦数小柴胡汤加减和之若少阳阳明俱病小柴胡加葛根芍药传入阳明为里脉沉实谵妄恶热六七日不大便口燥咽乾而渴用大柴胡汤重则三一承气汤若兼三焦俱病则痞满燥实宜大承气汤三阳之邪在里为患不头痛恶寒而反渴此为温病当遵仲景法治之其余正伤寒症治自有专方不复赘论其兼惊兼食者各从本症治之

治验【散见各症】

抱龙丸 治复风瘟疫身热气粗痰实壅嗽常服安神镇惊亦治痘疹壮热

牛胆南星【一两】 天竺黄 雄黄 辰砂【二钱】 麝香【少许】

右为末煮甘草汁丸櫻桃大陰乾每服一丸薄荷汤下气喘有痰加枯矾

愚按前方若风热痰嗽或急惊发搐昏睡咬牙形病俱实宜用此方若初冒风寒咳嗽痰盛气喘者属客邪内作先用十味参苏饮客邪既解而腹胀吐泻发搐咬牙睡而露睛属脾肺气虚用五味异功散切忌祛痰表散若过服剋伐之剂以致前症者尤宜温补脾肺

红绵散 治伤风咳嗽鼻塞或流清涕

全蝎【五个】麻黄【去节】僵蚕 白芷 川芎 桔梗 天麻【各二钱】甘草 苏木

右为末每服一钱加红绵少许水煎有热加荆芥

葛根解肌汤 治发热恶寒头痛项强伤寒温病葛根【四分】桂【一分】黄芩 甘草 白芍药【各三分】麻黄

右姜枣水煎服

太乙承气汤 治脏腑积热痞满燥实坚胀

甘草 枳实【麸炒】厚朴【姜制】大黄 芒硝【各等分】

右姜水煎服

升麻汤 治小儿中风头痛增寒壮热肢体疼痛鼻乾不得眠兼治疮痘已发未发皆可服

甘草 白芍药 升麻 乾葛【各等分】

右为末每服一钱水煎服

小柴胡汤

大承气汤

大柴胡汤【三方见瘕症】

惺惺散【方见咳嗽】

葛根解肌汤

抱龙丸【二方见伤寒】

薄荷汤【方见瘰癧】

人参羌活散【方见惊风】

咳嗽

钱仲阳云嗽者肺感微寒八九月间肺气正旺若面赤身热其病为实当用葶苈丸下之久嗽者不宜下若在冬月乃伤风嗽当用麻黄汤汗之面赤饮水咳 唾脓痰咽喉不利者以甘梗汤清之先咳後喘面肿身热肺气盛也以泻白散平之嗽而唾痰涎乳者以白饼子下之洁古云嗽而两脇痛者属肝经用小柴胡汤咳而呕苦水者属胆经用黄芩半夏生姜汤咳而喉中如梗者属心经用甘桔汤咳而失气者属小肠用芍药甘草汤咳而右脇痛者属脾经用升麻汤咳而呕长虫者属胃经用乌梅丸咳而喘息吐血者属肺经用麻黄汤咳而遗尿者属大肠用赤石脂汤咳而腰背痛甚则咳涎者属肾经用麻黄附子细辛汤咳而遗尿者属膀胱用茯苓甘草汤咳而腹满不欲食面肿气逆者属三焦用异功散若咳嗽流涕外邪伤肺也先用参苏饮喘嗽面赤心火刑肺也用人参平肺散及六味地黄丸嗽而吐青绿水肝木乘脾也用异功散加柴胡桔梗嗽而吐痰乳脾肺气伤也用六君子加桔梗若嗽唾脓痰者热蕴於肺而成肺痈也用桔梗汤凡风邪外伤法当表散而实腠理其用下药非邪传於内及胃有实热者不宜轻用面色白脉短濇者肺之本症也易治面色赤脉洪数者火刑金也难治

治验

一小儿潮热烦渴大便乾实气促咳嗽右颧色赤此肺与大肠有热用柴胡饮子一服诸症顿退後又发搐咬牙顿闷此肝脾气血虚也用四君芎归钩藤钩而愈

一小儿咳嗽恶心鼻塞流涕右颧青白此脾肺气虚而外邪所乘也先用惺惺散咳嗽顿愈但饮食不思手足指冷此外邪虽去而元气尚虚也当调补脾土而生肺金遂用六君升麻治之而愈大凡外邪所侵而痰涎壅塞者宜表散之外邪既去而喘嗽未愈或更气促肺气虚也属形病俱虚须用六君子之类调补脾土以生肺金为善设迳补肺气则反益其邪况肺乃脆嫩之脏而司腠理以脾为母若腠理不密风邪外侵蕴结於肺而变咳嗽诸症乃形气不足病气有余也最难调理设或呕吐伤其胃气汗下损其津液必变肺痿肺痈

吴江史万言子六岁感冒咳嗽发散过度喘促不食痰中有血用桔梗汤而愈後因元气未复清气不升大便似痢或用五淋散黄连枳实之类痰喘目劓四肢抽搐变慢脾风而歿

一小儿伤风咳嗽发热服解表之剂加喘促出汗余谓脾肺气虚欲用补中益气汤加五味子补之不信乃自服二陈桑皮枳壳而发搐痰涌余仍用前药加钩藤钩而痊

一小儿有哮病其母遇劳即发儿饮其乳亦嗽用六君桔梗桑皮杏仁治之母子并愈

一小儿伤食发热抽搐呕吐喘嗽属脾肺气虚有热用六君炒黑黄连山梔而愈

一小儿咳嗽因乳母素食膏粱炙?所致用清胃散而愈後其母因怒咳嗽脇痛其子亦然母服小柴胡汤子亦随愈

吴江史万洲子伤风咳嗽或用散表化痰之药反加痰盛腹胀面色?白予谓脾肺气虚也用六君桔梗一剂顿愈三日後仍嗽鼻流清涕此复感於风寒也仍用前药加桑皮杏仁而愈

一小儿发热咳嗽右颧色赤此肺金有热用泻白散而愈次日重感风邪前症复作声重流涕用参苏饮加杏仁桑皮而愈但右颧与额微赤此心火乘肺也用人参平肺散一剂遂痊

一小儿咳嗽发热右脸赤色作渴烦闷倦怠少食肚腹作胀此风邪伤肺饮食伤脾先用六君桔梗杏仁柴胡一剂诸症少愈後去杏仁柴胡又一剂而安一小儿发热右脸赤咳嗽痰盛余谓风邪蕴结於肺而痰作也用二陈加桑皮杏仁桔梗治之将愈自用发散降火之剂风痰不退发热益甚余曰此脾肺俱虚也用五味异功散加桔梗四剂渐愈又用六君子而愈

一小儿三岁痰涎上涌气喘胸满大便不实睡而露睛手足指冷此属形病俱虚也用六君桔梗一剂诸症稍缓至四剂将愈复伤风寒前症仍作又以前药加紫苏杏仁桑皮而安

一小儿伤风咳嗽痰盛杂用化痰等药寒热益甚面色或青或赤此风热相抟也用牛黄清心丸一服又六君桔梗二服而痊

麦煎散 治夹惊伤寒吐逆壮热表里不解气粗喘急面赤自汗或狂语惊叫或不语自汗及治癰疹搔痒往来潮热或时行麻疹余毒未尽痰涎咳嗽或变惊风手足搐搦眼目上视或伤风头疼并宜服之滑石 地骨皮 赤芍药 石膏 白茯苓 杏仁 人参 知母 甘草 葶苈子【炒各半两】麻黄【去节一两五钱】小麦【五六十粒】

右为末每服一钱麦子煎汤调下若久嗽传於五脏或唾痰涎或厥冷惊悸甚则目眶肿黑白睛色赤用生地黄黑豆湿研成膏掩目眶上服麦煎散久嗽成癰服散癰之药

小青龙汤 治伤寒表不解恶寒体热心下停水乾呕咳嗽喘急或肺胀胸满鼻塞清涕噎逆气喘仲景所谓表不解心下有水气乾呕发热而咳或渴或噎或小便不利或小腹胀满此汤主之

麻黄【去节】赤芍药 半夏【汤泡各七钱】细辛 乾姜【炮】甘草【炙】桂枝【各三钱】五味子【半两杵】

右每服二钱水煎

理中汤 治脾胃虚寒胸膈痞满或心腹疼痛痰逆呕吐饮食减少气短羸困或霍乱吐利手足厥冷不喜饮水者

人参 白术 乾姜【炮各等分】甘草【炒减半】

右每服三钱水煎热服或研末白汤调下

惺惺散 治外感风寒鼻塞痰嗽发热

桔梗 细辛 人参 白术 甘草 瓜蒌根 白茯苓

右为末每服二钱入薄荷五叶水煎服

保肺汤 治肺胃受风热痰盛咳嗽喘吐不止及治久嗽不愈

山药 白茯苓 紫苏叶【各一钱】 藿香【五分】

白僵蚕【去丝嘴炒二钱】 百部【六分】 黄芩 防风

杏仁【去皮尖麸炒各一钱】 百合【五分】 五味子【一钱】 桔梗【二钱】

右水煎食後服

天麻防风丸 治惊风咳嗽身体壮热多睡惊悸手足抽掣精神昏愤痰涎不利及风邪温热

天麻 防风 人参 辰砂 雄黄 麝香

甘草【炙各二钱五分】 全蝎【炒】 僵蚕【各半两炒】 牛黄 一方有胆南星无麝香

右为末炼蜜丸桐子大每服一二丸薄荷汤下

麻黄汤 治太阳症头疼发热身头恶风无汗喘满脉浮紧八九日不解当发汗汗已烦闷瞑目者必??乃解所以然者阳气重故也

甘草【半两】 麻黄【去节两半】 桂枝【一两】 杏仁【去皮三十五个】

右每服三钱水煎

柴胡石膏汤 治时行瘟疫壮热恶风头疼体疼鼻塞心胸烦满寒热往来咳嗽涕唾稠粘

桑白皮 黄芩【各三钱半】 升麻【二钱五分】 石膏 前胡 赤芍药 乾葛

柴胡【各五钱】 荆芥穗【三钱】

右为末每服一二钱姜二片淡?十粒水煎

葶苈丸 治脾热薰肺或伤风咳嗽面赤痰盛身热喘促

葶苈子【隔纸略炒】防己 黑牵牛【略炒】杏仁【去皮尖双仁麪炒捣膏一两】

右为末研入杏膏拌匀取蒸枣肉捣和丸麻子大每服五七丸淡姜汤下量儿加减

黄芩半夏生姜汤 治胆腑欬呕苦水若胆汁

黄芩 生姜【各一钱】甘草【炙】芍药【各六分】大枣【二个】半夏【一钱五分】

右水煎服

甘桔汤 治心脏咳咳而喉中如梗状甚则咽肿喉痹

粉草【二钱】苦梗【一钱】

右水煎食後服

芍药甘草汤 治小肠腑欬欬而失气

芍药 甘草【炙各一钱】

右水煎服

升麻汤 治脾脏咳咳而右脇下痛痛引肩背甚则不可以动动则欬涎【方见伤寒】

乌梅丸 治胃腑咳咳而呕呕甚则长虫出

乌梅【三个】细辛 附子【制】桂枝 人参

黄栢【各六钱】乾姜【一两】黄连【一两】当归 蜀椒【各两】

右为末用酒浸乌梅一宿去核蒸之与米饭捣和丸桐子大每服十丸白汤下

赤石脂禹余粮汤 治大肠咳咳而遗尿

赤石脂 禹余粮【各二两并打碎】

右每服二钱水煎

麻黄附子细辛汤

治肾脏咳咳则腰背相引而痛甚则咳涎又治寒邪犯齿致脑齿痛宜急用之缓则不救

麻黄 细辛【各二钱】 附子【一钱】

右每服一钱水煎

茯苓甘草汤 治膀胱咳而遗溺

茯苓【二钱】 桂枝【二钱五分】 生姜【五大片】

右每服二钱水煎

牛黄清心丸【方见急惊】

浮白散【方见肺脏】

二陈汤【方见吐哕】

补中益气汤【方见虚羸】

小柴胡汤【方见痉症】

桔梗汤【方见肺痈】

四君子汤

六君子汤

清胃散

异功散【四方并见内钩】

地黄丸【方见肾脏】

五苓散【方见五淋】

人参平肺散【方见夜啼】

白饼子【方见发搐】

百啐内嗽

百啐内嗽者名乳嗽甚难调理当审其虚实若气粗痰盛口疮眼热先用比金丸呕吐惊悸困倦自汗用补肺散惊嗽用琥珀散乳嗽用天麻丸若脾胃内热者用抱龙丸风邪外感者用惺惺散痰热既去而气粗痰盛或流涎者脾肺气虚也用异功散加桔梗口疮眼热大便坚实者用三黄丸大便不实者用白术散若呕吐不乳困倦自汗或自利腹胀者脾胃气虚也用六君子加柴胡若惊悸困倦痰盛不乳者心脾血虚也四君子加芎归酸枣仁或因乳母食五辛厚味致儿为患者仍参喘嗽诸症

治验

一小儿外感风邪服表散之剂汗出作喘此邪气去而脾肺虚也用异功散而汗喘止再剂而乳食进一小儿咳嗽服抱龙丸反吐泻不乳腹胀发热用六君子汤母子并服而瘥後因母饮酒仍嗽用清胃散加麴蘖母服而子亦愈

一小儿患嗽或用清痰等药反吐乳发热搐搦腹胀此脾胃复伤而内虚热也用异功散加钩藤鈎渐愈又用前药加当归而安

一小儿患咳嗽服牛黄清心丸加喘促腹胀此脾肺气虚也用六君子汤顿愈

补肺散【一名阿胶散】治肺虚恶心喘急久患咳嗽有痰阿胶【一两半炒】鼠粘子【炒】马兜铃【各半两】杏仁【七粒】糯米【一两】甘草【三分】

右每服一钱水煎服

天麻丸 治未滿百啐咳嗽不止

天麻 蝉蜕 白僵蚕【炒】人参 川芎 甘草 辰砂 天竺黄【各二钱】牛胆南星 砒白附子 雄黄【各一钱】金箔【五片】鹏砂【五分】

右为末蜜丸芡实大金箔为衣每服一丸用薄汤下愚按前方乃金石大毒之剂不可轻用况百啐小儿多是乳母饮食厚味或母有肺病传儿昔一妇人服截疟丹内有砒者儿饮其乳良久子母昏愤遍身发赤翌日方苏又一妇人亦服前药其子吐泻大作大人尚不能胜况小儿乎凡服砒石之药中毒遍身发赤昏瞶或吐泻者急灌醋碗许即苏小儿数滴足矣

琥珀散 治急慢惊风涎潮昏冒目瞪惊搐内钓腹痛或惊癇时发

辰砂【一钱五分】琥珀 牛黄 牛胆南星 僵蚕【炒去丝嘴】全蝎 白附子 代赭石 天麻 乳香 蝉壳【各一钱】

右为末每服一二分白汤调下

黄芩清肺饮 治肺燥而小便不通

黄芩【一钱】 梔子【一个打破】

右水煎服不利加盐豉二十粒

异功散

四君子汤

六君子汤

清胃散【四方见内钩】

白术散【方见积痛】

比金丸【方见惊癇】

三黄丸【方见疝症】

惺惺散【方见咳嗽】

抱龙丸【方见伤寒】

牛黄清心丸【方见急惊】

作喘

喘急之症有因暴惊触心者有因寒邪壅盛者有因风邪外客者有因食咸酸痰滞者有因膏粱积热薰蒸清道者然喘与气急有轻重之别喘则欲言不能隘於胸臆气急但息短心神迷闷耳治法因惊者用雄朱化痰定喘丸佐以天麻定喘饮寒伤肺气者用小青龙汤风邪伤肺者用三拗汤加減之食鹹酸伤肺者以生豆腐热伤肺气者当凉肺定喘哮喘喉声如锯者梅花饮兼用半夏丸前症多因脾肺气虚腠理不密外邪所乘真气虚而邪气实者为多若已发则散邪为主未发则补脾为主设槩攻其邪则损真气迺补其肺则益其邪凡喘嗽之症若小便不利则必生胀胀则必生喘要分标本先後先喘而後胀者主於肺先胀而後喘者主於脾盖肺金司降外主皮毛肺朝百脉通调水道下输膀胱肺既受邪则失降下之令故小便渐短致水溢皮肤而生胀满此则喘为本而胀为标也治当清金降火为主而行水次之脾土恶湿而主肌肉土能尅水若脾土受伤不能制水则水湿妄行浸溃肌肉水既上溢则邪反侵肺气不能降而生喘矣此则胀为本而喘为标也治当实脾行水为主而清金次之苟肺症而用燥

脾之药则金燥而喘愈甚脾病而用清金之药则脾寒而胀益增观其症若中气虚弱者用六君子汤中气虚寒者前方加炮姜郁结气滞者用归脾汤加柴胡山梔肝木尅脾土者用六君柴胡山梔肺气壅滞者用紫苏饮加白术食郁壅滞者用养胃汤加木香肺中伏热水不能生而喘者用黄芩清肺饮及五淋散脾肺虚弱不能通调水道者用补中益气汤及六味丸膏粱厚味脾肺积热而喘者用清胃散及滋肾丸心火刑金不能生水者用人参平肺散亦用滋肾丸肾水亏虚火铄金小便不利者用六味丸及补中益气汤肝木乘脾不能相制而喘者用六君柴胡升麻脾胃虚寒脐凸腹胀者用八味地黄丸脾肾虚寒不能摄水如蛊胀者用加减肾气丸凡亏损足三阴而致喘胀或二便不调及牵引侈痛者俱用六味八味加减肾气等丸治之仍参伤风咳嗽症

治验

一小儿呕吐发热胸痞脇痛作喘发搐因乳母恚怒母服加味逍遥散子服异功散加钩藤钩山梔并愈一小儿痰喘鼻塞用惺惺散而愈後因伤乳服消导之剂痰喘腹胀益甚余谓脾虚不能生肺而痰喘脾气不能运化而腹胀用异功散而痊

一小儿患喘服发汗之剂汗不出而喘益甚用异功散顿愈又用六君子汤而全愈後复痰喘服下痰丸前症愈甚更腹胀作呕此脾肺复伤也再用异功散而渐愈半载後患喘嗽面赤此火心尅肺金用人参平肺散及六味地黄丸而痊

一小儿伤风喘急不能卧服参苏饮之类不痊余用小青龙汤一剂而愈後复感寒嗽喘益甚服发表之药手足并冷腹胀少食余谓脾肺俱虚也用六君子加桔梗杏仁而愈

一小儿患喘面赤服牛黄清心丸面色?白手足不热余谓脾胃复伤用六君子汤不半杯而愈又伤风寒而喘面色仍白用五味异功散加桔梗生姜治之顿安

一小儿七岁患前症久不愈或用下痰等药连泻数次饮食不入手足并冷喘急不得卧先用六君姜桂益甚用人参五钱附子一钱二剂少缓又二剂十减三四乃用独参将愈却用四君子汤而痊

雄朱化痰定喘丸 治因惊发喘逆触心肺暴急张口虚烦神困

雄黄 朱砂【各一钱研】 蝉蜕 全蝎 白僵蚕 天南星 白附子【炮各二钱】 轻粉【五分】

右为末糊丸麻子大每服数丸茶清送下

梅花饮 治五脏积热喉中有痰面色赤白鼻流清涕气逆喘急目赤咳嗽或因惊夜啼

硼砂 马牙硝 片脑 人参【各一两】 甘草【五钱】 芒硝 辰砂 麝香【各一钱】

右各另为末磁器收贮每服半匙麦门冬汤调服气急喘嗽桑白皮汤下常服薄荷汤下

天麻定喘饮 治喘嗽惊风

天麻 防风 羌活 甘草【炒】 人参 桔梗 白术 川芎 半夏麴【各等分】

右每服二钱水煎服

三拗汤 治感冒风邪鼻塞声重语音不出或伤风寒头疼目眩四肢拘倦咳嗽多痰胸满气短

麻黄【不去节】 杏仁【不去皮尖】 甘草【生用各等分】

右每服二三钱姜水煎服

半夏丸 治肺气不调咳嗽喘满痰涎壅塞心下坚满及风痰呕吐恶心涕唾稠粘

白矾【一两半焙】 半夏【三两汤泡七次姜汁制一宿】

右为末生姜自然汁丸赤豆大每服十丸姜汤下

紫苏饮子 治肺受风寒喘热痰嗽

紫苏叶 桑白皮 青皮 五味子 杏仁 麻黄 甘草【炙】 陈皮【各二分】 人参
半夏【各三分】

右姜三片水煎温服

小青龙汤

惺惺散【二方见咳嗽】

异功散

清胃散

六君子汤

加味逍遥散

归脾汤【方见内钩】

人参平肺散【方见夜啼】

平胃散【方见胃气虚冷】

八味丸【即六味丸加肉桂五味子方见肾脏】

牛黄清心丸【方见急惊】

养胃汤【方见疟症】

黄芩清肺散【方见百啐内嗽】

五淋散【方见五淋】

滋肾丸【方见发热】

补中益气汤【方见虚羸】

六味丸【方见肾脏】

金匱加減肾气丸【方见腹胀】

黄疸

经曰中央黄色入通於脾故黄疸者脾之色也夫人身之神贵於藏而默用见於外则内虚矣其症皆因脾气有亏运化失职湿热留於肌肤发而为疸钱仲阳所谓身痛背强二便澁滯遍身面目爪甲皆黄是也小便褐色者难治疗法宜固脾为先如专用剋伐寬中澹泄利水之药则鲜有不至危者矣若初生及百日半年之间不因病而身黄者胃热胎黄也腹大食土为脾疳兼作渴饮冷者用泻黄散小便不利者茵陈汤病後发黄肢体浮肿者用白术散清便自调肢冷嗜卧者益黄散身澹黄白者调中丸及补中益气汤加茵陈身热膈满肌肤面目皆黄者加減泻黄散辨其所以若闭目壮热多哭不已大小便赤澁口中热气者廼妊娠厚味胎毒之候也母子并服生地黄汤仍忌酒麪五辛热物设不自慎悞伤脾土急则变为惊风吐泻缓则肢体浮肿小便不利眼目障闭多成疳疾矣又有脾虚发黄者当於脾胃中求之

治验

一小儿旬日内先两目发黄渐及遍身用泻黄散一服而瘥

一小儿生旬日面目青黄此胃热胎黄也用泻黄散乳调服少许即愈後复身黄吐舌仍用前药而安一小儿因乳母食郁而致饱胀咽酸遍身皆黄余以越鞠丸治其母泻黄散治其子并愈

一小儿患前症服五苓散消食丸之类其黄不退作渴饮汤腹膨少食余谓胃气虚津液少故喜饮汤脾气虚故腹胀少食也先用白术散渐愈又用补中益气汤而痊

一小儿饮食不调腹胀身黄小便金色杂用治疸之剂作渴饮水余谓胃气实热先用泻黄散二剂作渴顿止用梔子栝皮汤其黄亦退用白术散而饮食进

茵陈汤 治阳明病发热汗出者此为热越不能发黄也但头汗出至颈而还小便不利渴饮水浆此瘀热在里而发黄也或伤寒七八日小便不通腹微满身黄如橘色者

茵陈蒿【嫩者一两】 大黄【三钱五分】 梔子【大者三枚】

右每服一钱水煎服

犀角散 治黄疸一身尽黄

犀角【一两】 茵陈 葛根 升麻

龙胆草【酒炒】 甘草【各半两】 生地黄【五钱】 寒水石【三钱】

右每服三钱水煎服一方瓜蒌根汁和蜜服

小半夏汤 治黄疸小便色不变自利腹满而喘者不可除热热去必哕

半夏【汤洗七次】

右每服二三钱姜三片水煎服

消食丸 治胸膈气痞乳食不消身後黄者【方见呕吐乳】 茵陈五苓散即五苓散加茵陈每服一钱温水调下日三服

导赤散【二方见五淋】

越鞠丸【方见天钩】

承气汤

小柴胡汤【二方见痉症】

调中丸【即理中丸方见冷泻】

平胃散【方见脾胃虚冷】

史君子丸【方见蚘?】

益黄散【方见脾脏】

地黄汤【即济生地黄汤】

白术散【方见积滞】

四味肥儿丸【方见呕吐】

泻黄散【方见脾脏】

呕吐乳

呕吐皆主脾胃古人谓脾虚则呕胃虚则吐是也呕者有声无物吐者有物无声也盖乳哺过饱则胃不能受而溢出衄乳多食睡则脾不能运而作泻脾胃渐伤疾病?绵甚至慢惊之患矣若手足指热喜饮热汤或睡而露睛皆胃气虚弱也用异功散若手足指热饮冷或睡不露睛属胃经实热也用泻黄散若作渴少食或小便色赤胃经虚热也用七味白术散大凡婴儿在乳母尤当节饮食若乳母停食亦能致儿吐泻故不可不慎也

治验

一小儿伤食呕吐发热面赤服消导清热之剂饮食已消热赤未退余以为胃经虚热用六君升麻柴胡四剂而痊

一小儿伤食呕吐服剋伐之药呕中见血用清热凉血反大便下血唇色白而或青余谓脾土亏损肝木所乘令空心服补中益气汤食远服异功散使涎血各归其源果愈

一小儿吐酸乳食用四君吴萸黄连木香补脾平肝而愈後口中有酸水仍用前药随愈後吐苦水而口亦苦用龙胆汤以清肝火四君子汤以补脾土而痊一小儿吐黄水所食之物悉皆甘味用泻黄散清其胃火而愈後因停食服剋伐之药口甘不食形气殊弱用补中益气汤养其中气而痊

一小儿伤食暖腐用平胃散一服宿滞顿化余云不必多药但节其饮食自愈不信别用尅滞之药更加吐泻以致不救

一小儿伤食发热面赤抽搐呕吐气喘唾痰此饮食伤脾肺气虚弱所致用六君子汤炒黑黄连山栀各二分一剂顿愈

消乳丸 治呕吐消乳食脉沉者伤食不化也

香附子【炒】宿砂仁 陈皮 甘草【炙】神麴【炒】麦芽【炒等分】

右为末米糊丸黍米大每服二十丸姜汤下

又方治百晬内呕吐乳你或大便青色用少妇乳汁一盞入丁香十粒陈皮一钱磁器内煮数沸稍热空心以绵球吮服

杨氏消食丸 治乳食过多胃气不能消化

宿砂 橘皮 三棱?术 神麴【炒】麦芽【炒各半两】香附子【炒一两】

右为末麴糊丸麻子大白汤送下量儿加减

局方观音散 治外感风寒内伤脾胃呕逆吐泻不进饮食渐至羸瘦

人参【一两】神麴【炒】茯苓 甘草【炒】木香 绵黄芪白扁豆
白术【各一钱】石莲肉【去心二钱五分】

右为末每服一钱入藿香三叶枣水煎服

香朴散 治积冷呕吐

藿香叶 陈皮 厚朴【姜汁制各七钱】半夏【一两汤炮七次】甘草【炙一钱】

右每服三钱姜枣水煎泻甚加木香肉豆?

香薷散 治寒温不适饮食失调或外因风寒暑邪致吐利心腹疼痛霍乱气逆发热头痛或转筋拘急或疼痛呕哕四肢逆冷

香薷【一两】茯苓 白扁豆【炒】厚朴【姜汁制各五钱】

右每服二三钱水煎加酒半杯冷服立效

竹茹汤 治胃受邪热心烦喜冷呕吐不止

葛根【七钱五分】半夏【炮半两】甘草【炙三钱】

右每服二三钱入竹茹枣许大姜水煎取清汁微冷细细服加茯苓三钱尤妙

苏合丸 治传尸骨蒸殓殍肺痿疰忤鬼气卒心痛霍乱吐痢惊补客忤等症

苏合香油【入安息香膏内】薰陆香【另研】龙脑【研】木香 白术 白檀香 丁香
朱砂【研水飞】沉香 香附子【炒】乌犀屑 毕拔
安息膏【另为末用无灰酒杵膏】麝香【研】诃黎勒【煨取皮各二两】

右为末研匀用安息香膏并蜜和丸桐子大井花水空心化服一二丸温酒亦得更用腊纸裹
弹子大一丸绯绢袋盛当心带之辟一切邪及治胸膈噎塞肠中虚鸣宿食不消

青州白丸子 治惊风吐乳

天南星【三两】白附子【一两】半夏【浸洗七两】川乌头【去皮脐半两】

右用井花水浸晒过次日早晨再换新水春五日夏三日秋七日冬十日晒乾为末以糯米粉
煎粥清为丸菉豆大薄荷汤调下

泻黄散【方见脾臟】

白术散【方见积痛】

异功散

六君子汤

四君子汤【三方见内钩】

龙胆汤【方见噤风】

平胃散【方见脾胃虚冷】

补中益气汤【方见虚羸】

吐舌弄舌

舌属心脾二经小儿舌微露而即收者名弄舌此属心脾亏损用温胃散补之舌舒长而良久不收者名吐舌乃心脾积热用泻黄散主之或兼口舌生疮作渴饮冷属胃经实热亦用前散作渴饮热属胃经虚热用四君子汤食少作渴或大便不实脾胃虚弱也用七味白术散口角流涎或腮颊患肿胃虚风热也先用人参安胃散次用七味白术散若午後甚者脾血虚也四物多加参术茯苓未应用补中益气汤及审五脏相胜若因疳瘦所致当参诸疳门

治验

一小儿弄舌发搐手指不冷余谓肝脾虚热用异功散加升麻柴胡而愈後伤乳腹胀服尅滯作泻弄舌手指发热审乳母肝火与小柴胡汤加升麻白术治之母子并愈

一小儿乳食过多患吐泻用大剂异功散加柴胡升麻母子服之而愈後因惊服至宝丹之类发搐弄舌几至慢惊余用六君子汤加白附子服而愈

一小儿吐舌发热饮冷额鼻黄赤吐舌流涎余谓心脾实热用导赤泻黄二散而愈後复作别服清热等药更弄舌余用异功散加钩藤鉤而安又用六君子汤全愈

一小儿七岁食生冷之物腹痛便秘服峻利之剂连泻五次噫气腹痛余谓心脾虚寒用异功散加姜桂木香治之不从反治胃火更加吃逆余仍以前药加附子一片一服诸症顿退乃去附子又三剂而愈其时同患是症用清胃化痰者歿而手足俱黯

四物汤【方见急惊】

补中益气汤【方见虚羸】

小柴胡汤【方见痉症】

导赤散【方见心脏】

泻黄散

人参安胃散【二方见脾脏】

七味白术散【方见积痛】

异功散

六君子汤

四君子汤【三方见天钩】

五苓散【方见五淋】

薛氏医案卷五十九

卷六十

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六十

明 薛己 订

保婴撮要七

执吐

经云胃伤则吐小儿热吐者因多食甘甜炙?之物或乳母膏粱厚味胃经积热或夏间暑气内伏於胃所致若肌肉瞤动烦热作渴者暑伤胃气也先用香薷饮次用竹茹汤若吐乳色黄不能受纳者胃经有热也先用泻黄散次用人参安胃散若吐出酸秽者乳食内停也用保和丸吐乳不消者胃气弱也用异功散吐而少食腹痛欲按者脾气虚也用六君子加木香凡诸症当验其手指热则胃热冷则胃寒热用泻黄散寒用理中汤不热不寒异功散调之

治验

一小儿夏月吐乳手指发热作渴饮冷口吐涎水余谓胃气热廉泉开而涎出也用泻黄散而愈後复呕吐另用尅滯之剂口渴饮汤流涎不已余谓胃气虚寒不能摄涎也用理中丸而愈

一小儿七岁呕吐不食面白指冷此胃气虚寒也用理中汤呕吐顿愈又用六君子汤而痊後伤食腹痛发热呕吐流涎先用保和丸一服而痛呕愈再用四君山梔而涎止

一小儿食凉粉而呕吐酸物头痛发热此内伤兼外感也用人参养胃汤末二钱姜汤调服诸症皆愈惟吐酸涎用大安丸一服而止

一小儿伤食发热呕吐酸物手指常冷此胃气虚寒阴盛隔阳於外虚热所致也用保和丸末二钱浓姜汤调肌而吐止再用六君子汤加山梔而安

一小儿呕吐作渴暑月或用玉露饮子之类而愈又伤食吐酸余先用保和丸一服吐止次用五味异功散饮食渐进又用四君子汤而痊

一小儿暑月患吐泻服香薷饮五苓散之类而止但手足并冷睡而露睛饮食不入肠鸣作呕

欲用清凉之剂余曰此始为热终为寒也当舍时从症用人参理中丸以姜汤化二服病势始定次用助胃膏渐安又用六君子汤调理而愈

一小儿饮食多即吐余用五味异功散愈之又腹痛呕吐先服大安丸仍用异功散而愈後症复作另投祛逐之剂吐泻不食腹中痛甚以手按之则止此脾气复伤也先用补中益气汤加茯苓半夏一剂又用六君升麻柴胡二剂饮食顿进後食生冷挟惊吐泻手足并冷唇口搐动用六君钩藤柴胡而愈

一小儿吐酸作渴饮冷腹痛发热用人参养胃汤加黄连一剂吐热稍定又用保和丸一服腹痛顿止後伤食复吐腹胀大便不通用紫霜丸下之寻愈又感冒咳 腹胀另服下药发热作吐腹胀手足并冷睡而露睛发搐用六君钩藤钩而安又用四君加当归川芎而愈後患吐泻手足并冷用助胃膏顿痊一小儿呕吐发热用泻黄散而愈後因乳母饮酒腹胀吐泄用葛花解醒汤子母服之渐愈大便日去五七次用五味异功散加升麻二剂日去三次乃用四君肉豆蔻而痊

一小儿吐酸发热用保和丸渐愈又用四君山查神麴而安後因饮食过多呕吐复作另用下积丸更加作泻腹胀手足发搐余以为肝木侮脾用五味异功散加柴胡钩藤钩而搐止又用六君子汤饮食渐进而痊

一小儿夏间呕吐腹痛大便不通服大黄药而愈又伤食患吐发热服泻黄散等药呕吐腹痛按之即止面色青黄手足并冷此脾胃复伤而虚寒也用异功散加木香愈之後又伤食腹胀作痛或用消食丸吐泻并作小腹重坠午後益甚余朝用补中益气汤夕用六君子加木香而愈

一小儿呕吐发热腹痛面赤手热口乾饮汤按其腹不痛此脾胃气虚也用异功散加木香乾姜一剂而愈复伤食吐而咽酸腹中作痛按之益甚此饮食内停也用保和丸二服而痊

葛花解醒汤 治乳母酒醉後乳儿遗热为患

白豆蔻 砂仁 葛花【各五钱】白茯苓 陈皮 人参 猪苓
木香【各五分】青皮【三分】乾生姜 白术 泽泻 神麴【炒黄各二钱】

右为末每服二钱白汤调服

愚按前汤先哲不得已而用之盖醉酒耗气又服辛散重损真阴折人长命可不慎哉

助胃膏 治脾胃虚寒吐泻等症

人参 白术 白茯苓 甘草【炙】 丁香【各五钱】砂仁【四十个】木香【三钱】白豆蔻

【十四个】乾山药【一两】肉豆蔻【四个煨】

右为末蜜丸芡实大每服十丸米饮化下

香薷散【方见热吐】

竹茹汤

五苓散【二方并见五淋】

玉露散

补中益气汤

大安丸

保和丸【四方见虚羸】

六君子汤

四君子汤【二方见天钩】

泻黄散

人参安胃散【二方见脾脏】

理中丸【方见冷泻】

人参养胃汤【方见疟症】

寒吐?逆

钱仲阳曰寒吐者由乳母当风取凉或风寒客于乳房其症面目胀额汗出脉沈迟微寒气停於胃故胃不纳而吐出也?逆者由胃气虚甚过服剋伐使清气不升浊气不降以致气不宣通而作也风寒在胃者用理中丸胃气虚者六君子汤风凉所致者宜捏去败乳急服理中丸次服酿乳法若呕吐清涎夹乳小便清利用大安丸若因乳母食厚味用东垣清胃散若乳母饮醇酒用葛花解醒汤饮烧酒服冷米醋三五杯乳母食生冷而致者用五味异功散乳母停食者母服大安丸子服异功散乳母劳役者子母俱服补中益气汤乳母怒动肝火者用加味逍遥散乳母郁怒伤脾者用归脾汤乳母脾虚血弱者用六君芎归其子亦服三五滴气血虚而

乳热者子母皆服八珍散仍参热吐霍乱治之

治验

一小儿因停食腹痛服疎导之药而愈後复停食又用前药寒热不食腹胀後重大便频而少此脾气复伤而下陷也先用异功散加升麻数剂後重新渐愈再加当归全愈後因乳母恚怒致儿寒热发搐作呕用六君柴胡山梔以治其母兼灌其儿并愈

一小儿因乳母感冒风寒发热儿患呕吐身发赤晕用东垣人参安胃散而愈又咬牙发搐呕吐酸腐待其吐止自安

一小儿时吐乳食诊其母有郁怒之症用加味归脾汤加味逍遥散治之而愈

一小儿七岁身羸兼吐少食发热面黄余谓脾臟受伤用六君煨姜二剂而饮食进去姜又数剂而愈一小儿吐乳大便臭秽目睛缓视因乳母交感後饮乳所致用六君木香藿香治之而安

一小儿吐乳不食手足搐搦痰涎上涌手足指冷额黑唇青此肾水胜心火也用五味异功散加木香炮姜顿愈去姜又数服而愈

一小儿不时乾呕不乳腹膨此脾胃虚而将成疳也用四味肥儿丸以治疳四君子汤以健中而痊後伤食吐泻完谷形气困惫四肢微搐余曰且勿药次日吐止但搐而泻青黄此脾土虚而肝木胜也用六君鈎藤鈎而痊

酿乳法 治婴儿有胎热症令乳母服之不可遽用冷药恐损脾胃若加呕吐必成大患

泽泻【二两五钱】猪苓【去黑皮】赤茯苓

天花粉【各一两半】生地黄【二两】山茵陈【去梗】甘草【各一两】

右每服五钱水煎食後捏去旧乳服

茯苓半夏汤 治呕?心下坚痞膈间有水痰眩惊悸

半夏【五钱】白茯苓【二两】

右每服三钱姜水煎服

二陈汤 治痰饮呕吐恶心或头眩心悸或中脘不快或因食冷物胃气不和

半夏 橘红【各五钱】 白茯苓【三钱】 甘草【一钱五分炙】

右每服二三钱乌梅一个姜枣水煎服

四味肥儿丸 治呕吐不食腹胀成疳或作泻不止或食积脾疳目生云翳口舌生疮牙龈腐烂
发热瘦怯遍身生疮又治小便澄白腹大青筋一切疳症黄连【炒】 芫荇 神麴
麦芽【炒各等分】

右为末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滚汤送下

东垣人参安胃散

治服峻剂脾胃亏损或成慢惊泄泻呕吐肠胃有热以致前症【方见脾脏】

东垣清胃散【方见内欵】

理中丸【方见咳 】

葛花解酲汤【方见热】

大安丸【即保和丸加白术】

保和丸

补中益气汤【三方见虚羸】

加味逍遥散

加味归脾汤【二方见内钩】

清胃散

六君子汤

异功散

四君子散【四方见内钩】

八珍汤【方见寒热】

人参养胃汤【方见症症】

霍乱吐泻

钱仲阳云吐泻壮热不食或乳不消是伤乳也宜白饼子下之後用益黄散和胃若吐泻身温不乳大便青白此上实下虚也用益黄散加減治之大凡吐泻身温乍凉乍热气粗大便黄白吐乳不消此伤风热也先服大青膏发散後服益黄散和胃若吐泻身热多睡能乳吐痰大便黄水胃虚也先用白术散生津止渴後用大青膏鈎藤饮发散风邪若夏至後吐泻身热或吐乳泻黄此伤热乳也用玉露散之类凡泻乳腹痛按之而哭者食积痛也用白饼子下之按之不哭者脾胃气虚也用五味异功散补之手足指冷者脾气虚寒也用异功散加木香伤风吐泻者风木尅脾土也亦用前药若饮热乳而泻黄者湿热壅滯也用四苓散如不愈或反甚者元气复伤也用白术散泻而腹中重坠者脾气下陷也用补中益气汤若服尅滯之剂而腹中窄狭者脾气虚痞也用六君子汤若面黄泻青脾虚而肝乘之也用六君柴胡升麻木香若多噫泻黄心脾气虚也用六君炮姜升麻生下半月旬日内吐者止宜调治其母恐婴儿臟腑脆弱不胜药餌故也

治验

一小儿盛暑吐泻米谷不化或用黄连香薷饮之类腹胀作痛手足指冷此脾气虚而伏陰在内也用五味异功散加木香治之而愈先君尝云凡暑令吐泻手足指热作渴饮冷者属阳症宜清凉之剂手足指冷作渴饮热者属阴症宜温补之剂故凡病属阴症误用寒凉之药死後手足青黯甚则遍身皆然於此可验

一小儿吐泻乳食色白不化露睛气喘此脾肺不足形病俱虚也先用异功散加柴胡桔梗顿愈再用补中益气汤而安

一小儿吐泻惊悸困倦腹胀此心火虚而脾土怯也用六君茯神酸枣仁而愈又用秘旨保脾汤乃瘥一小儿吐泻惊搐项强乃脾伤而肝侮形气虚而病气实也用异功散加鈎藤鈎补脾平肝而愈

一小儿吐泻呵欠顿闷不语畏明属脾肺不能生肝肾也用异功散补脾肺地黄丸补肝肾遂瘥

一小儿吐泻腹胀不乳此脾胃伤也先用香砂助胃膏而饮食进後用六君子汤而脾胃健

一小儿寒热作呕饮食不入按其腹则哭此饮食停滯也先用大安丸遂安但唇目抽动大便稀黄此病邪去而脾气虚弱也用六君子汤以补脾土鈎藤鈎以平肝木悉愈

一小儿白睛多唇色白停食吐泻困睡惊悸久治不愈余曰惊悸为心血虚怯困睡为脾气虚

弱皆稟脾肾不足所致也用补中益气汤及六味丸加鹿茸而愈

一小儿未周岁气短喘急乳食少进时或吐乳乃脾伤而食积也先用六君山查枳实渐愈後吐泻作渴用胃苓膏以治吐泻白术散以生胃气而安

一小儿四岁每饮食失节或外惊所忤即吐泻发搐服镇惊化痰等药後患益甚饮食不入药食到口即呕余用白术一味和土炒黄用米泔水浓煎不时灌半匙尚呕次日微呕又一日不呕渐加至半杯月余而愈

一小儿停食吐泻身热作渴泻下红白或青黄色服香连丸而愈甚兼手足指冷余谓始为实终为虚也用补中益气汤加木香肉果而愈

一小儿伤食吐泻大便溏泄或青绿色睡而露睛手足指冷额黑唇青此中气虚弱寒水侮土也用五味异功散加升麻柴胡木香附子一剂而愈後患吐泻不已先用胃苓散後用异功散而安

一小儿寒热呕吐或泻青色余谓脾虚肝木所乘也用六君柴胡升麻治之而愈後因惊寒热寅卯时益甚小便频数久而不愈此肝火血虚先以小柴胡汤加白术茯苓当归二剂顿止又用地黄丸而愈

车前子散 治暑月霍乱吐泻烦闷引饮不止小便不利

白茯苓 猪苓 香薷 车前子【炒】 人参【各等分】

右为末灯心汤调下

不换金正气散 治脾胃不和寒热往来臟腑虚热霍乱吐泻

厚朴【姜制】 藿香 陈皮 半夏 苍术【米泔浸】 甘草【炙各等分】

右每服二三钱姜枣水煎服

二顺散 治中暑霍乱吐泻烦闷燥渴小便赤澀便血肚疼

猪苓 泽泻 茯苓 杏仁【去皮尖双仁炒】 甘草【炙】 白术 乾姜 桂【各一两】

右为末每服半钱不拘时水调下或水煎服

又酿乳法 治胃虚吐泻睡中吐舌摇头呕乳额上汗流惊啼面黄令儿饥饮

人參 木香 藿香 沈香 陳皮 神麴 麥芽【各等分】 丁香【減半】

右每服四錢姜十片紫蘇十葉棗三枚水煎每服半盞令乳母食後捏去旧乳方服卧少時却與兒乳

胃苓湯又名胃苓散爲末蜜丸名胃苓膏 治腸胃受濕嘔吐泄瀉

白朮 茯苓 澤瀉 厚朴 猪苓 陳皮 甘草【炒各等分】 桂【少許】

右爲末每服二錢姜水燈心陳皮煎湯調下若停食吐瀉小便短少腹脹作痛用此以分利之更用六君子湯以調補脾胃

益黃散【方見脾脏】

理中湯【方見咳 】

助胃膏【方見熱吐一名香砂助胃】

白餅子【方見發搐】

白朮散【方見積痛】

釣藤散【方見慢惊】

玉露散【方見】

五苓散【方見五淋】

香薷飲【方見嘔吐】

定命飲子【方見】

異功散

六君子湯【二方并見内釣】

大青膏【方見肝臟】

補中益氣湯

大安丸【二方见虚羸即保和丸加白术】

香连丸【方见诸痢】

小柴胡汤【方见痞症】

四苓散【方见五淋五苓散去桂】

四君子汤【方见内钩】

魃病

巢氏云小儿魃病者妇人怀妊时有鬼神触胎所致其状微利寒热往来毛发鬖鬖情思不悦宜服龙胆汤又小儿未断乳母复有胎遂断其乳羸瘦骨立发黄壮热大便不调名【阙】病又名【阙】病也用紫霜丸下之益黄散补之令儿断乳但服消乳丸异功散有妊而抱【阙】儿亦致此症海藏云魃病者因母有妊儿饮其乳致病如疝痢腹大或瘥或发他人相近亦能致之北人有取伯劳鸟羽带之云可愈者窃谓前症因邪气所触而患故用紫霜丸下之若元气被伤吐泻诸症者当随各症治之益黄散【方见脾脏】

消乳丸【方见调护法】

异功散

六君子汤【二方见内钩】

紫霜丸

龙胆汤【二方见噤风撮口】

补中益气汤【方见虚羸】

冷泻

汤氏云冷泻者乃脾胃虚寒水谷不化而泄钱仲阳云小儿不能食乳泻褐色身冷无阳也当用益黄散加减治之大便清白口不烦渴冷积泻也理中汤主之若口鼻吸风寒之气脾胃受生冷之食而作者先用理中汤後用异功散命门火衰不能温蒸中州之气故脾胃虚寒者用益黄散及八味丸脾胃虚弱者五味异功散脾气下陷者补中益气汤脾气虚寒者人参理中汤寒水侮土者益黄散肝木乘脾者四君柴胡散手足并冷者加木香乾姜治者审之

治验

一小儿泻利青白手冷面青或时吃逆余用人参理中汤更加腹痛仍以前汤加木香乾姜二剂稍缓又以五味异功散加木香渐愈又用五味异功散加升麻调理而痊

一小儿腹痛作泻饮食不化小腹重坠用补中益气汤加乾姜为末每服钱许米饮调日二三服旬余稍愈又以五味异功散为末米饮调服旬余渐愈又以四君子汤而痊

一小儿泄泻腹痛手足并冷唇青额黑余谓寒水侮土用益黄散痛止再用六君乾姜漏芦子母服之顿止又用人参理中汤而痊

一小儿久泻兼脱肛小腹重坠四肢浮肿面色痿黄时或兼青诸药到口即呕吐审乳母忧郁伤脾大便不实先用补中益气汤五味异功散及四神丸调治其母不两月子母并愈

一小儿患泻乳食不化手足指冷服消乳丸食乳即泻余用五味异功散加木香母子服之而愈後时搐唇口抽动用异功散加木香钩藤钩补脾平肝而痊一小儿泄泻手足发搐痰涎上涌手足指冷额黑唇青用五味异功散加木香炮姜补心火救脾土而愈一小儿年十四患泄泻小腹重坠饮食甚少先用六君子汤送四神丸数剂泻渐止饮食稍进又用补中益气汤数剂下坠渐愈後因劳发热自脐而起饥则热甚用六君炮姜治之稍安又用加味归脾补中益气二汤而痊

人参理中汤

人参 白术【炒】 乾姜【炮】 甘草【炙各等分】

右每服一二钱水煎蜜丸即人参理中丸加附子即附子理中汤

益黄散【方见脾臟】

理中汤【方见咳 】

四君子汤

六君子汤

五味异功散【三方见内韵】

补中益气汤【方见虚羸】

八味丸【方见肾臟即六味丸加肉桂五味子】

四神丸【方见惊泻】

热泻

汤氏云小儿热泻者大便黄赤有沫乃臟中有积或蕴热所致若小便赤少口乾烦躁当用四苓散热甚者四逆丸右腮色赤饮冷胃经实热也用泻黄散恶冷喜热胃经虚热也用白术散右腮及额间俱赤心脾翕热也用泻黄散加炒黑黄连若左颊右腮俱赤肝火乘脾土也用四君子汤加柴胡若儿暴伤乳食用保和丸乳母尤当忌厚味节饮食若乳母停食所伤致儿吐泻等病当治其母大抵始病而热者邪气胜则实也终变为寒者真气夺则虚也久病而热者内真寒而外假热也久泻元气虚寒当参前症治之

治验

一小儿夏间食粽伤胃吐而腹痛余用保和丸彼以为缓另用重剂吐泻并作腹痛益甚按其腹却不痛余曰此食已消而脾胃虚也当温补之仍行消导昏愤发搐余用异功散加木香治之渐愈後复伤食另用去积丸吐泻不食手足并冷睡而露睛变为疟疾余用六君木香炮姜治之而愈

一小儿泻而大便热赤小便澁少此热蕴於内也先用四苓散加炒黄连一剂其热顿退又用白术散去木香二剂热渴顿止以四君升麻调理而痊

一小儿食炙煨甘甜之物常作泻大便热痛小便赤澁此膏粱积热所致用四苓散清胃散各四服诸症稍退乃用四味肥儿丸而痊

一小儿九岁食炙煨之物作泻饮冷诸药不应肌体消瘦饮食少思余用黄连一两酒拌炒焦为末入人参末四两粥丸小豆大每服四五十丸不拘时白汤下服讫渐愈又用五味异功散加升麻服月余而痊後不戒厚味患疳积消瘦少食发热作渴用丸味芦荟丸为主以四味肥儿丸为佐疳症渐退却以四味肥儿丸为主以五味异功散为佐而痊後又不禁厚味作泻饮冷仍服肥儿丸异功散而愈

一小儿侵晨泄泻服消疳清热之剂不应余谓脾肾虚用二神丸治之不信仍服前药形体骨立复求治用四神六味二丸治之寻愈停药数日饮食渐减泄泻仍作至十七岁毕姻泻渴顿作用前药治之无效乃用补中益气汤八味丸而始应

一小儿因母怒气停食患泄泻服消导之剂更加吐乳先用养胃汤加炒黑黄连一钱吴茱萸三分木香四分治其母子亦灌一二匙悉愈後母伤食患血痢腹痛其子亦然治以四君子加前三味母子俱服因惑於人言但令母服子另服治痢之药加作呕不乳手足并冷余用五味

异功散加木香炮姜漏芦母子并服而愈

一小儿患泻身热作渴泻下秽气此为内热而泻也用香连丸一服而愈後患泻服黄连香薷饮益甚余用六君木香肉果而愈

一小儿患泻作渴饮冷手足并热睡不露睛此为热泻用黄芩汤一剂而愈又用白术散二服而安一小儿患泻面赤饮冷小便赤色先用四苓散香连丸各一服而便利势减又用异功散加木香黄连各二分吴茱萸一分二服而愈

一小儿泻而腹痛按之不痛用异功散加升麻而愈後复泻服消乳丸益加腹痛余谓脾气伤也复用异功散加木香而痊

一小儿吐泻腹痛睡而露睛小腹重坠手足并冷先用六君升麻乾姜四服而痛坠愈又用异功散加升麻木香而悉愈後又伤食腹痛别服祛逐之剂虚症悉具余用理中丸六君子汤而寻愈但噫气下气口角流涎此脾胃虚寒也复用理中六君子二汤而愈

黄芩汤 治下痢头痛胸满口乾或寒热脇痛不时呕吐其脉浮大而弦

黄芩【一两五钱】芍药 甘草【炒各一两】

右每服二三钱姜水煎呕加半夏二钱

玉露散 治吐泻黄色

寒水石 石膏【各半两】甘草【一钱】

右为末每服半钱白滚汤调服

四味肥儿丸【方见呕吐】

异功散【方见内钩】

二神丸

四神丸【二方见惊泻】

八味丸【即六味丸加肉桂五味方见肾臟】

调中汤【即理中汤方见咳 】

白术散【方见积痛】

四苓散【即五苓散去桂方见五淋】

四逆散【方见积滞】

胃苓汤【方见吐泻】

养胃汤【方见疟症】

清胃散

四君子汤

六君子汤【三方见内钩】

保和丸【方见虚羸】

香连丸【方见诸痢】

食泻

东垣云伤食则恶食小儿食泻者因饮食伤脾脾气不能健运故乳食不化而出若暖臭吞酸胸膈胀满腹痛按之益痛者虽作泻而所停滞之物尚未消也用保和丸腹痛按之不痛者乳食已消也用异功散脾气伤而未复不思饮食者用六君子汤所伤生冷之物及喜热者并加木香乾姜乳食已消腹痛已止泻尚未止者脾失清升之气也用补中益气汤余有别症当参各门

治验

一小儿泄泻不食暖腐酸气用平胃散一服而泻止又用五味异功散而饮食增後复吐泄泻喘手足指冷面色黄白余谓脾虚不能生肺也用六君升麻桔梗而愈

一小儿伤食作泻发热服寒凉药热甚作呕此胃经虚热也先用四君升麻而呕止又用白术散而安一小儿乳哺失节泄泻腹痛自用药下之反加痰搐又服化痰止搐之药而痰搐益甚睡而露睛手足微冷余以谓脾胃已虚而重伤之也用异功散加木香钩藤钩母子并服三日而痰搐止五日而泻痛除一小儿伤食泻青发搐余谓肝木胜脾也用六君木香钩藤钩而愈後伤食腹痛别用消食丸唇额顿黑泻益甚此脾气亏损寒水反来侮土也用六君木香乾姜而痊

一小儿面色痿黄伤食作泻面色顿白气喘痰涌余谓脾肺气虚下陷法当升补彼不信别服清化痰之药虚症蜂起余先用补中益气汤一剂诸症顿退又用五味异功散而痊

一小儿泄泻两寸脉或短或伏用补中益气治之顿愈余见患前症不服此药而危者多矣惜哉

一小儿饮食後即泻先用六君升麻神麴山查而止又用五味异功散加升麻而痊後伤食吐泻腹痛用保和丸二服又用异功散调补脾气而安

一小儿伤食作泻腹胀四肢浮肿小便不利先用五苓散加木香旬余诸症渐退又用五味异功散为主佐以加减肾气丸又旬日二便调和饮食渐进浮肿旋消乃以异功散调理而愈

一小儿十三岁伤食作泻服剋伐之剂胸腹膨胀手足并冷余谓当调补中气不信後见睡而露睛唇口搐动乃用六君木香钩藤钩至四剂搐动顿止又二剂饮食加进以五味异功散加升麻柴胡膈宽泻止而愈

调中汤 治伤乳食泻後脾胃虚?吐泻

人参 茯苓 白术 木香 乾姜 藿香 香附【炒去毛】 缩砂仁 甘草【炙】 丁香【各等分】

右水煎食前服

香橘饼 治伤冷积泻

木香 青皮【各一钱】 陈皮【二钱五分】 厚朴 神麴 麦芽【炒各半两】

右为末蜜丸为饼每服一枚米饮调下

保安丸 治伤食泻

白僵蚕 青皮【去穰】 陈皮【去白】 三棱【炮】 蓬术【炮】 甘草【炒各五钱】 砂仁 香附【各一两】

右为末用麦芽米糊丸菉豆大每服二三丸白汤下

四君子汤

六君子汤

异功散【三方并见内钩】

白术散【方见积痛】

平胃散【方见胃气虚冷】

白饼子【方见发搐】

消食丸【方见呕吐乳】

补中益气汤

保和丸【加白术名保和汤二方见虚羸】

胃苓散【即五苓散平胃散合用姜枣煎服又名胃苓汤】

金匱加減肾气丸【方见腹胀】

惊泻

小儿惊泻者肝主惊肝木也盛则必传尅於脾脾土既衰则乳食不化水道不调故泄泻色青或兼发搐者盖青乃肝之色搐乃肝之症也亦有因乳母脾虚受惊及怒动肝火而致者经曰怒则气逆甚则呕血及餐泄法当平肝补脾慎勿用峻攻之药脾气益虚肝邪弥甚甚至抽搐反张者亦肝火炽盛中州亏损之变症也凡见惊症即宜用四君六君异功散等方加白附子定风柴胡平肝引经以杜渐则必不至泻搐而自安矣今已见泻吐惊搐尚不知补脾平肝以保命抱龙镇惊等药治之其亦去生远矣

治验

一小儿因惊久泻面色青黄余谓肝木胜脾土也朝用补中益气汤夕用五味异功散加木香母子俱服而愈

一小儿泄泻惊搐其母面青脉弦先用小柴胡汤加木香漏芦一剂次用四君木香钩藤鈎山梔母子同服而愈

一小儿因其母被惊患泻服药伤胃反致吐乳余用五味异功散炒黑黄连木香治其母时灌子三二匙俱愈後母因郁怒停食下痢呕吐腹痛其子昏愤不食以六君子汤加车前子黄连木香母子俱服而安一小儿久泻青色肠鸣厥冷余曰此惊泄也脾土既亏则肝木来侮须温脾平肝然後可愈彼以为迂自用治惊等药腹胀重坠小便不利四肢浮肿始信前言重复请

治余先用五味异功散加升麻柴胡数剂诸症稍可又以补中益气汤数剂饮食少加又因伤食夹惊吐泻发搐复用异功散加柴胡钩藤钩四剂诸症稍退又伤风咳 腹胀作泻或用发散解痢之剂手足逆冷睡中发搐余谓此脾土虚而肺金受症重伤真气故也用异功散加紫苏一剂以散表邪次以补中益气汤加茯苓半夏调补真气而痊

一小儿因惊吐泻腹胀先用六君木香柴胡治之稍可又以五味异功散而愈後因惊搐痰甚或用镇惊化痰之药倦怠不食而泄益甚先用异功散加木香钩藤钩四剂而愈

四神丸 治脾虚胃弱大便不实饮食不思或泄痢腹痛

肉豆蔻【二两】 补骨脂【四两】 五味子【二两】 吴茱萸【一两】

右为细末用红枣六十五枚生姜六两用水二鍾煮乾取枣肉和丸如桐子大每服五六十丸白汤送下或化服

二神丸

补骨脂【四两】 肉豆蔻【二两生用】

右为末用红枣四十九枚生姜四两用水一鍾煮乾取枣肉和丸桐子大每服二三十丸白滚汤下

朱君散 治吐泻後有此症并粪青者宜服之即四君子汤加辰砂麝香灯心钩藤钩为末每服一钱白汤调下【方见内钩】

太乙丹 常服安神镇惊止夜啼

桔梗【炒一两】 藿香叶 白藊豆【炒各半两】 白芷 川芎【各二钱五分】

右为末蜜丸芡实大辰砂为衣每服一丸薄荷汤磨下粪青者枣汤下夜啼灯心钩藤汤下加白术茯苓白芍药尤妙

补中益气汤【方见虚羸】

六君子汤

五味异功散【二方并见内钩】

小柴胡汤

至圣保命丹【二方并见痉症】

八味丸【即六味丸加五味肉桂方见肾脏】

诸痢

钱仲阳云泻痢黄赤黑皆热也泻痢青白米谷不化皆冷也东垣云白者湿热伤於气分赤者湿热伤於血分赤白相杂气血俱伤也海藏用四君芎归治虚弱之痢四君乾姜治虚寒之痢愚尝治手足指热饮冷者为实热用香连丸手足指冷饮热者为虚寒用异功散送香连丸若兼体重肢痛湿热伤脾也用升阳益胃汤小便不利阴阳不分也用五苓散若湿热退而久痢不愈者脾气下陷也用补中益气汤倍加升麻柴胡泻痢兼呕或腹中作痛者脾胃虚寒也用异功散加炮姜木香或变而为疟者肝剋脾也用六君升麻柴胡钩藤钩若积滞已去痢仍不止者脾气虚也用四君子送下香连丸若因乳母膏粱厚味六淫七情致儿为患者当各推其因仍兼治其母并参冷热泻及积滞腹痛等症览之

治验

一小儿下痢赤白里急後重腹时痛用香连丸而痊後伤食复变痢欲呕少食用五味异功散加木香三分黄连二分吴茱萸一分数剂而愈

一小儿患痢口乾发热用白术散煎与恣饮时以白术散送香连丸而安

一小儿久痢里急後重欲去不去手足并冷此胃气虚寒下陷也用补中益气汤加木香补骨脂倍加升麻柴胡而愈

一小儿久痢作渴发热饮汤用白术散为主佐以人参二两黄连一两炒黑为丸时服数粒尽剂而痊一小儿作泻不乳服剋伐之剂变痢腹痛後重余用补中益气汤送香连丸又用香砂助胃膏六君子汤而愈

一小儿伤乳食不时呕吐杂用消导之药变痢不止先用六君木香渐愈後用七味白术散而痊

一小儿伤乳食吐泻变赤痢後重腹痛先用香连丸而愈又乳食过多腹痛先用保和丸一服痛止又用五味异功散加木香二剂而愈

一小儿下痢腹痛阴冷小便短少用五味异功散加肉豆蔻顿愈复作呕吐咽酸或用巴豆之药连泻五次饮食顿减手足并冷余用五味异功散加木香乾姜饮食少进倍用乾姜又四剂手足温而痢亦痊一小儿痢後腹胀作呕大便不实小便不利诸药不应余先用五味异功散加木香肉果数服二便少调又数剂诸症少愈用八味丸补命门之火腹胀渐消用金匱加減

肾气丸诸症顿退又用四君升麻柴胡而全安

一小儿患痢喘 不已此肺气虚也用六君子加木香为末每服钱许以人参陈米姜汤调服即睡乳食少进又二服而喘 顿安乃用四君子汤而痊

石莲散 治小儿噤口痢呕逆不食

莲肉

右为末每服一钱米饮调一方山药末米饮调下

胃苓汤 治风冷客於肠胃乳食不化泄泻肠鸣腹满而痛或下如豆汁或瘀血日夜无度

白芍药 白术 肉桂 人参 当归 川芎 茯苓

右为末每服二钱入粟米水煎空心热服

香连丸

黄连【十两用吴茱萸五两水拌湿入磁器顿滚汤中半日炒焦黑】 木香【二两】

右为末丸如赤豆大每服二三丸白汤下

地榆饮 治冷热痢腹痛下痢赤白频并

地榆【三分】 甘草 赤芍药【炒】 枳壳【各二分】

右水煎服

黄连解毒汤 治时疾三日汗已解若烦闷乾呕口燥呻吟发热不卧

黄连【炒三钱】 黄柏【炒半两】 栀子【炒四枚】 黄芩【炒二钱】

右每服二三钱水煎未效再服亦治热痢

汤氏异功散 止渴消暑生津

泽泻 猪苓【去皮三钱】 陈皮【二钱半】 白术 茯苓 人参【各五钱】 辰砂【一钱】

右为末蜜丸芡实大每服一丸灯心竹叶汤化下

升阳益胃汤

黄芪【一钱】半夏人参甘草【炙各一钱】独活防风白芍药羌活【各五钱】陈皮茯苓柴胡泽泻【各三分】白术黄连【炒各一钱】

右水二锺姜三片枣二枚煎四分食远服

五苓散【方见五淋】

愚按前症若津液偏渗於大肠大便溏而小便少者宜用此药分利若阴阳已分而小便短少此脾肺虚而不能生水也宜用补中益气汤加门冬五味虚火上炎而小便赤少者此肺气受伤不能生水也用六味加门冬五味不可槩以小便不利而用渗泄之剂也

四君子汤

六君子汤

五味异功散【三方并见内钩】

补中益气汤

保和丸【二方见虚羸】

香砂助胃膏【方见热吐】

白术散【方见积痞】

八味丸【方见肾脏】

金匱加減肾气丸【方见腹胀】

疟

经曰夏伤於暑秋必疟其症先起於毫毛伸欠乃作寒栗鼓颌腰脊俱痛寒去则内外皆热头痛如破渴欲饮冷盖邪气并於阳则阳胜并於阴则阴胜阴胜则寒阳胜则热阴阳上下交争虚实更作故寒热间发也有一日一发二日一发三日一发有间一日连二日发有日与夜各发有上半日发下半日发及发於夜者有有汗有无汗此其略也以详言之当分六经五臟

及痰食劳暑鬼瘴之不同邪中三阴之各异如足太阳之疟令人腰痛头重寒从背起先寒後热熛熛喝喝然热止汗出难已足少阳之疟令人身体解寒不甚热不甚恶见人见人心惕惕然热多汗出甚足阳明之疟令人先寒洒淅洒淅寒甚久乃热热去汗出喜见日月光火气乃快然足太阴之疟令人不乐好太息不嗜食多寒热汗出病止则善呕呕已乃衰足少阴之疟令人呕吐甚多寒热热多寒少欲闭户而处其病难已足厥阴之疟令人腰痛少腹满小便不利如癃状非癃也数便意恐惧气不足腹中悒悒此六经疟也肺疟者令人心寒寒甚热热间善惊如有所见者心疟者令人烦心甚欲得清水反寒多不甚热肝疟者令人色苍苍然太息其状若死者脾疟者令人寒腹中痛热则肠中鸣鸣已汗出肾疟者令人洒淅然腰脊痛宛转大便难目眴眴然手足寒胃疟者令人且病也善饥而不能食食而支满腹大此五臟疟也痰疟者胸膈先有停痰因而成疟令人心下胀满气逆烦呕是也食疟者是饮食伤脾其人噎气吞酸胸膈不和是也劳疟者久而不瘥表里俱虚客邪未散真气不复故疾虽间遇劳即发是也暑疟者其人面垢口渴虽热已退亦常有汗是也鬼疟者进退无时是也瘴疟者感山岚瘴气其状寒热休作有时是也作於子午卯酉日为少阴疟作於寅申巳亥日为厥阴疟作於辰戌丑未日为大阴疟此所谓三阴各异也久而不愈名曰痼疟痼疟老疟也老疟不愈结癖於两脇之间名曰疟母此先失於解散或复外感风寒内伤饮食故纏綿不已也治法风暑之邪从外而入宜解散之解表後即宜扶持胃气故丹溪曰无汗要有汗散邪为主有汗要无汗固正气为主骤发之疟宜解表久发之疟宜补脾寒疟宜温温疟宜和瘴疟宜清挟痰则行痰兼食则消食劳疟宜安暑疟宜解鬼疟宜祛瘴疟宜散此亦其略也更以详言之则热多寒少者小柴胡汤寒多热少者清脾饮子无汗者桂枝麻黄各半汤有汗者柴胡桂枝汤渴而小便不利者五苓散热多汗出腹满便閼者大柴胡汤痰疟者二陈汤加柴胡黄芩甚者加枳实食疟者先用大安丸次用异功散劳疟疟并用补中益气汤暑疟者十味香薷饮鬼疟者鬼哭散瘴疟者四兽饮疟母者鼈甲饮凡脾胃虚而患疟者不拘有汗无汗三阴六经悉以六君子汤为主热多加柴胡山梔寒多加乾姜肉桂有汗加黄耆浮麦无汗加苍术葛根元气下陷及肝木乘脾并加升麻柴胡为善若用青皮草果常山等药以为攻截良法正气益虚邪气益深是多延绵不止而为劳热者有矣若乳母七情六欲饮食不调或寒热似疟肝火炽盛致儿为患者又当治其乳母斯无误矣

治验

一小儿先因停食腹痛服峻厉之剂後患疟日晡而作余以为元气下陷欲治以补中益气汤不信泛行清热消导前症益甚食少作泻余朝用前汤夕用异功散加当归月余而愈

一小儿每午前寒後热久不愈用六君子加炮姜丸芡实大每服一丸旬余而愈

一小儿患疟兼便血盗汗年余矣审乳母素有郁怒寒热便血朝用加味归脾汤夕用加味道遥散儿以异功散加酒炒芍药为末每服三四分米饮下月余母子并痊

一小儿疟发热服消导之剂腹胀作呕四肢浮肿先用五味异功散加木香诸症顿退饮食顿进後因饮食过多作泻用补中益气汤加木香又用五味异功散而痊

一小儿症後腹胀咳 倦怠属脾肺气虚用补中益气汤茯苓半夏寻愈後伤食发热如症服寒凉之剂更加便血用四君升麻柴胡便血顿止又用补中益气汤而愈

一小儿症将愈饮食过多腹胀发热小便不通用消积丸保和丸异功散寻愈後饮食不节寒热吐泻用异功散柴胡升麻愈

一小儿症後少思饮食便血发热腹胀属脾虚不能统血先用异功散加升麻柴胡而血止又补中益气汤饮食顿进仍用异功散而痊

一小儿症後腹胀用五味异功散四味肥儿丸而渐愈用补中益气汤而愈後伤食腹胀大便不实小便不利用五味异功散金匱加減肾气丸而愈

一小儿愈後便瀉用补中益气汤加山梔而小便通因劳发热不食小便不利用补中益气五味异功散加升麻柴胡而痊後每劳心寒热如症用补中益气汤饮食失节如症用五味异功散随愈

一小儿十四岁症後肚腹膨胀小便不利属脾肾虚寒朝用补中益气汤夕用金匱加減肾气丸而痊毕姻後朝寒暮热肌体消瘦服滋阴之剂更痰甚发热腹中作胀小便不利余朝用补中益气汤夕用金匱加減肾气丸而愈

一小儿症疾将愈饮食过多腹胀发热大便不通用消积丸保和丸异功散调理脾胃而愈後饮食不节寒热吐泻先用胃苓散吐泻止又用异功散柴胡升麻寒热愈

一小儿十五岁症後发热吐痰余谓脾气所变不信反服黄栢知母之类诸症悉具谓余曰【阙】火盛而滋水其症益甚何也余曰症在脾阴上喜温和而恶寒湿前所用药悉属沈阴复伤其生气故病愈甚也先用六君柴胡升麻木香四剂诸症顿愈乃佐以异功散加柴胡升麻元气渐充又朝用补中益气汤夕用异功散而愈毕姻後发热如症用补中益气汤寒热益甚手足并冷另用清热等药大便去则小便牵痛小便去则大便先出余谓此阴精已耗而复伤耳乃肾气虚寒之危症也用大剂补中益气汤八味地黄丸喜其远帙幙而生

柴胡桂枝汤 治症身热多汗

柴胡【八钱】 黄芩【三钱】 半夏【二钱半】 芍药 甘草 桂枝【各三钱】

右每服二三钱姜枣水煎

鬼哭散 治症久不止

常山 大腹皮 白茯苓 鼈甲【炙】 甘草【炙各六钱】

右入桃树枝各七寸水煎服

清脾饮子

治痢症脉弦数但热不寒或热多寒少膈满不食口苦舌乾烦渴小便黄赤大肠不利

青皮【炒】厚朴【姜制】白术 草果 柴胡 茯苓 半夏【炮七次】黄芩
甘草【炙各等分】

右每服二三钱姜水煎服

四兽饮 治阴阳相胜结聚涎饮为症兼治瘴症神效半夏 茯苓 人参 白术 草果
橘红【各等分】甘草【减半】

右用乌梅姜枣湿纸裹煨香熟焙乾入药每服二钱水煎服

鼈甲饮子 治症久不愈脇下痞满形容羸瘦腹中结块时发寒热名曰疟母

鼈甲【醋炙】白术 甘草 黄耆 白芍药 川芎

人参养胃汤 治外感风寒内伤生冷寒热如疟或呕逆恶心寒疟加桂枝

人参 厚朴 苍术 半夏【炮】藿香 草薢仁 茯苓【各五钱】甘草【炙】橘红【二钱半】

右每服二三钱姜七片乌梅一个水煎热服

桂枝麻黄各半汤 治发热自汗或无汗

桂枝 白芍药 生姜 甘草【炙】麻黄【各一钱】杏仁【十个炮去皮尖】

右水一鍾大枣二枚煎四分食远服

五苓散【方见五淋】

小柴胡汤

大柴胡汤【二方见瘧症】

二陈汤【方见寒吐】

大安丸【即保和丸加白术】

补中益气汤【方见虚羸】

十味香薷饮【方见呕吐乳】

六君子汤

加味归脾汤

加味逍遥散

异功散【四方见内钓】

薛氏医案卷六十

卷六十一

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六十一

明 薛己 订

保婴撮要八

脱肛

夫肺与大肠相为表里肛者大肠之?门是也巢氏云实热则大便秘结虚寒则肛门脱出此多因吐泻脾气虚肺无所养故大肠之气虚脱而下陷也用补中益气或四君子为主若脱出绯赤或作痛者血虚而有热也用补中益气汤佐以四物牡丹皮微者或作痛者气虚而有热也佐以四君牡丹皮大凡手足指热者属胃气热手足指寒者属胃气寒

治验

一小儿痢後脱肛饮食少思面色青黄余谓脾土亏损肝木所胜也不信另服消导尅滯之剂腹痛膨胀倦怠作呕余曰脾气虚甚矣又不信恪服前药腹益胀重坠四肢浮肿复请治之仍欲尅滯余曰腹胀重坠脾气下陷也先用五味异功散加木香四剂更手足冷又加乾姜四剂而腹胀诸症渐愈後因饮食过多作泻脱肛用补中益气汤加木香及五味异功散而愈

一小儿脱肛半载侵晨便泄两目白多用升补脾气之剂不应余曰肾开窍於二阴此属肾虚也用四神地黄二丸及补中益气汤月余而愈

一小儿痢久脱肛目睛多白面色渐黄余用补中益气汤六味地黄丸调补脾肾而痊

一小儿小便先频数澁滯次下痢脱肛久而不愈余以为禀父肾虚用六味地黄丸寻愈後患泄泻咳 声瘖亦用前丸而痊

一小儿脱肛用寒凉之药肢体倦怠饮食少思肛门重坠此脾气虚而中气下陷也用补中益气汤加酒炒芍药白术茯苓而痊

一小儿肛门肿痛出血水年余未愈忽吐血便血皆成紫块此肠胃积热用圣济犀角地黄汤

顿止更用金银花甘草为末白汤调服半载而痊

一小儿脱肛杂用除湿祛风收澀等药面黄体倦少食便血余欲升补脾气以摄其血反服四物槐花之类而血益甚更加作呕余先用四君木香治之形气渐充便血顿止又用补中益气汤更以萆麻仁涂顶心而愈

一小儿因咳服化痰等药或作或彻服滚痰丸更吐泻手足指冷眉目发搐肛门脱而不赤余朝用补中益气汤夕用六君子汤治之诸症渐愈但脱肛未入恪服补中益气汤而愈

一小儿患痢脱肛色赤或痛用补中益气汤送香连丸而愈後伤食作泻肛复脱不入仍用前汤更以萆麻仁研涂顶门而愈

澁肠散 治小儿久痢肠头脱出

诃子【炮】 赤石脂 龙骨【各等分】

右为末腊茶少许和药掺肠头上【阙】

四神丸【方见惊泻】

地黄丸【方见肾脏】

补中益气汤【方见虚羸】

圣济犀角地黄汤【方见便血尿血即济生犀角地黄汤】

四君子汤【方见内钩】

龙胆泻肝汤【方见疝气】

肛门作痒

小儿肛痒或嗜甘肥大肠湿热壅滞或湿毒生虫而蚀肛门若因湿热壅滞用四味肥儿丸大便秘结者用清凉饮虫食肛门先用化虫丸後用四味肥儿丸外以雄黄散纳肛内若因病不食虫无所养而食臟食肛者其齿龈无色舌上尽白四肢倦怠其上唇内有疮唾血如粟心内懊憹此虫在上食臟若下唇内有疮此虫在下蚀肛门若蚀肛透内者不治诸虫惟上半月头向上可用药追之望後头向下令患者闻烹食香味虫头即向上矣後用药追之

治验

一小儿嗜膏粱甘味患疥疮余谓当禁其厚味急用清胃之药以治其积热不从乃用敷药以治其外更肛门作痒发热疮益甚肌体骨立饮食少思遂用九味芦荟丸五味异功散加柴胡升麻?愈

一小儿肛门作痒耳前後结小核如贯珠隐於肌肉之间小便不便面色青此稟母之肝火为患用九味芦荟丸为主佐以五味异功散加山梔柴胡又以加味逍遥散加漏芦与母服之而愈

一小儿十二岁肛门作痒或脱出或大便血遍身生疮发热作渴腹大青筋用大芦荟丸五味异功散其疮渐愈佐以补中益气汤热渴渐止肛门悉愈又用异功散为主佐以补中益气汤加吴茱萸所制黄连治之而血愈

一小儿十五岁两目白翳遍身似疥非疥肛门作痒晡热口渴形体骨立余以为肝疳之症也用六味地黄丸而痊後阴jing作痒小便澄白服蟠?散肛门肿痛服大黄等药肛门脱出作痒不可忍杂用降火之药不应下唇内生小白疮余以为虫蚀肛门用九味芦荟丸而愈

一小儿肛门作痒悞以为痔服槐角丸等药肢体消瘦鼻下湿烂下唇内生疮此虫食下部也先用化虫丸二服乃用五味异功散四剂却用大茺萸汤四味肥儿丸而痊

一小儿七岁饮食过多即作泻面色青黄服峻利剋剂余谓当节饮食健脾胃为善不信後牙龈赤烂肛门作痒服清热之剂腹痛膨胀复请欲用前剂余曰此元气亏损虚火上炎也乃不信後腮间黑腐余曰此脾气大虚肉死而不知痛也明矣後虽信余已不救矣若初用五味异功散健脾胃为主佐以大芦荟丸四味肥儿丸清脾湿热岂有不治之理哉後之患审之

一小儿肛门作痒属大肠经风热用槐角丸而愈一小儿肛门连阴囊痒出水淋漓属肝经湿热也用龙胆泻肝汤九味芦荟丸治之并愈

一小儿嗜甘肥肛门作痒发热作渴杂用清热之气腹胀少食鼻下生疮余谓脾胃湿热生虫也不信後下唇内生疮先用四味肥儿丸诸症渐愈又用大茺萸汤治之而痊

便血尿血

经云肺朝百脉之气肝统诸经之血又云气主响之血主濡之盖荣血为水谷之精气灌溉五臟六脉四肢百骸若脾胃有伤荣卫虚弱行失常道故上为衄血吐血下为尿血便血矣若外感风邪则血鲜为肠风内伤则血浊为臟毒又热入大肠则大便下血热入小肠则小便出血然小儿多因胎中受热或乳母六淫七情厚味积热或儿自食甘肥积热或六淫外侵而成若因母食厚味者加味清胃散怒动肝火者加味小柴胡汤忧思郁怒者加味归脾汤稟父肾燥者六味地黄丸儿有积热小便出血者实热用清心莲子饮虚热用六味地黄丸大便出血者犀角地黄汤风邪外侵者仓廩散病後元气下陷者补中益气汤粪前见血者四君加黄连制

吴茱萸糞後见血者四君加吴茱萸制黄连若婴儿以治母为主余当临症制宜

治验

一小儿七岁食菱芡过多腹胀发热大便不通小便下血先用消积丸大便即通小便血止又用保和丸及异功散而愈

一小儿因乳母饮酒小便出血用八正散去大黄加乾葛山梔漏芦母子服之并愈

一小儿小便见血或咳血衄血此脾肺虚热食後用圣济犀角地黄汤食前用六味地黄丸顿愈後因食厚味复作用加味清胃散及六味丸而愈

一小儿禀父气不足不时便血用六味地黄丸补中益气汤而愈後因母饮酒炙煨复致前患母服加味清胃散子服地黄丸而愈

一小儿便血两足发热齿龈溃臭朝用六味地黄丸夕用异功散加芩薤月余渐愈乃佐以补中益气汤而愈

一小儿禀父肾虚便血作渴足热形瘦用六味丸?愈後出痘第四日两足发热作渴饮冷以前丸料煎与恣饮三剂後足凉渴止其痘安然而靨

一小儿便血面青脇痛小便频数此肝木侮脾土而不能统摄也用异功散加柴胡炒黑龙胆草二剂肝症顿退仍用异功散而血止

一小儿便血发热作渴饮冷用黄连解毒汤一剂热服诸症顿愈後因饮食过伤下血甚多发热倦怠饮食少思先用补中益气汤元气复而饮食者又用四君加升麻而愈

一小儿便血作渴少食先用七味白术散渴止食进又用补中益气汤而瘥後食生冷腹胀便秘用保和丸二便下血或时发搐此脾气伤而肝火动也用异功散加鈎藤鈎柴胡而搐止又加升麻木香而血止一小儿食生冷果品腹胀作痛发热作渴大便不利小便尿血用茯苓散加黄连二剂大便通而尿血愈一小儿尿血两足发热用六味地黄丸而愈後患痢久不愈复尿血作渴饮冷以前丸料煎服兼用补中益气汤而愈

一小儿尿血面青脇痛小便频数用五味异功散加柴胡炒黑龙胆草次用地黄丸而愈

一小儿久患便血属脾胃虚热也诸药不应用人参二两炒黑黄连吴茱萸各半两为末米糊作丸佐以补中益气汤顿瘥

一小儿便血面黄腹胀用四味肥儿丸及补中益气汤加吴茱萸制黄连木香芩薤三十余剂

而愈至夏间患血痢发热晡热手足浮肿仍用前药而痊一小儿八岁腹胀脐凸大便下血如痢小便色赤似血面目皆黄两腮色赤此食积所伤而肝侮之也盖脾病则肺虚不能生肾故有是症当先消导积滞遂用越鞠丸加三棱蓬术姜汤下四服二便通利又用大安丸二服下血亦止後复伤食发热腹胀小便下血服保和丸四服而愈

一小儿年十一岁因劳发热尿血小便不利先用清心莲子饮二剂後用补中益气汤加山梔而痊一小儿便血服寒药过多腹胀小便不利其血益甚余朝用补中益气汤夕用金匱加减肾气丸而痊

甘露饮 治小儿胃中客热齿龈溃烂时出脓血及目赤肿痛口疮喉肿或身面背黄大便不调小便黄澁熟地黄 枳殼【炒】 茵陈 麦門冬【去心焙】 甘草【炙】 枇杷叶 石斛 黄芩【炒】 生地黄 天門冬【去心炒各等分】

右为末每服二钱水煎服

聚金丸 治大便下血发热烦燥腹中热痛作渴妄言舌澁目昏其脉弦数

黄连【一两水浸晒乾一两炒一两灰火煨一两生用】 黄芩 防风【各一两】

右为末每服二钱水煎服

愚按前方若肝脾积热吐血衄血便血发热作渴大便秘小便赤者宜用之若热既退而作渴下血未止或日晡益甚者阴血虚也用四物参朮主之若热既退饮食少思肢体倦怠脾气虚也用四君当归主之若槩用前方则误多矣

济生犀角地黄汤

治伤寒温病失於表汗致内有瘀血吐血面色黄大便黑及疮痘出多以此解之牡丹皮 犀角【各一两】 生地黄【八钱】 赤芍药【七钱】

右每服二钱水煎服

千金地黄丸 治小肠积热臟毒去血

黄连【四两】 生地黄【半筋搗取汁连滓拌匀晒乾】

右为末炼蜜丸桐子大每服一二十丸食後麦門冬汤下量儿加减

制黄连吴茱萸法

右以黄连吴茱萸各等分熟水拌湿入磁器内热汤中良久俟气味相和取出晒乾炒黄各拣出听用

清心莲子饮【方见白浊】

小柴胡汤【方见瘕症】

加味归脾汤

越鞠丸

四君子汤

清胃散

异功散【五方见内钩】

补中益气汤

保和丸

大安丸【三方见虚羸即保和丸加白术】

加减肾气丸【方见腹胀】

八正散【方见小便不通】

六味丸【方见肾脏】

茯苓散【方见尿白】

下积丸

白术散【二方见积】

四味肥儿丸【方见寒吐】

大便不通

婴童百问云小儿大便不通乃肺与大肠有热以致秘结不通用清凉饮之类若饮食夹惊及积滞而不通者用大连翘饮之类惊风积热而不通者用掩脐法此皆治实热之例也余尝治之因乳母或儿膏粱积热及六淫七情郁火传儿为患者用清邪解郁之剂稟赋怯弱早近色慾大便难而小便牵痛者用滋补肺肾之剂褚氏遗书云男子精未满而御女以通其精则四体有不满之处异日有难状之疾老人阴已痿而思色以降其精则精不出而内败精已耗而复竭之则大小便牵痛如淋今童子即有此患益见今人所稟与古人大径庭矣人之气血厚薄既殊而医之用药疗法又岂可泥执古方而无加減之变乎

治验

一小儿食膏粱之味大便不通饮冷发热用清凉饮加大黄而通後饮食停滯腹痛大便不通用保和丸而痛止再煎槟榔汤送保和丸一服而便通

一小儿食粽停滯大便不通痛不可忍手足发搐用大柴胡汤调酒麴末一钱下滯秽甚多作呕不食用五味异功散加升麻柴胡而愈

一小儿大便不通审乳母饮食厚味所致用清胃散以治母热儿间饮以一二匙而愈後乳母感寒腹痛食姜酒之物儿大便秘结兼便血仍用清胃散每日数匙而愈

一小儿因乳母暴怒大便不通儿亦患之兼用加味小柴胡汤儿先用保和丸二服後用五味异功散加升麻柴胡儿日饮数匙并愈

大柴胡汤【方见痞症】

神芎丸【方见惊风】

六味丸【方见肾臟】

清胃散【方见内钩】

小便不通

东垣云小便不利有在气在血之异夫小便者足太阳膀胱之所主长生於申申者金也金能生水肺中伏热水不能生是絶小便之源也治法用清燥金之正化气薄之药茯苓猪苓泽泻琥珀灯心通草车前瞿麦篇蓄之类皆为淡渗能泄肺中之热而滋水之化源也若不渴热在下焦是热澁其流而溺不泄也须用气味俱厚阴中之阴药治之二者之病一居上焦在气分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有湿故不渴也二者之殊至易分别耳窃谓前症若津液偏渗於肠胃大便溼利而小便澁少者宜分利若热蘊於下焦津液燥而小便不行者宜渗泄若脾胃气澁不能通调水道者宜顺气若乳母肝心二经有热者用梔子清肝散肝经怒火

者用柴胡栀子散若因父母曾服燥剂而致者用四物麦门甘草数而黄者用四物加山茱萸黄栢知母五味麦门肺虚而短少者用补中益气加山药麦门阴挺痿痹而频数者用地黄丸热结膀胱而不利者用五淋散脾肺燥不能化生者用黄芩清肺饮膀胱阴虚阳无以生而淋者用滋肾丸若膀胱阳虚阴无以化而淋者用六味丸若因乳母厚味酒面积热者用清胃散五淋散仍参诸淋览之

治验

一小儿十四岁肢体倦怠发热晡热口乾作渴吐痰如涌小便淋或面目赤色身不欲衣此稟赋肾虚阴燥也用补中益气汤加減八味丸而愈

一小儿五岁小便不利用五苓散分利澹泄之药益加不通小便阴囊渐肿先兄谓前药复损真阴也用六味丸料加牛膝肉桂车前子佐以补中益气汤而痊

一小儿八岁先小便澀滯服五苓散益甚加木通车前之类腹胀吐痰加枳殼海金砂而胸满阴肿遍身发浮余用六味丸煎送滋肾丸而痊此皆稟父气所致其作湿热痰气治之而殁者多矣

一小儿八岁先因小便黄赤服五苓导赤等散後患便血余以为稟赋虚热也用六味丸及补中益气汤而痊

木通散 治小便不通少腹作痛

木通 滑石【各一两】 牵牛【半两炒】

右为末灯心葱白水煎空心服

八正散 治蕴热咽乾口燥大渴引饮心忪面热烦躁不宁目赤睛疼或咽舌生疮小便赤闭及热淋血淋车前子 瞿麦【炒】 大黄【面裹煨】 山梔 滑石 扁蓄 木通 甘草【炙各一两】

右为末每服二三钱入灯心水煎食前服

梔子仁散 治小便不通脐腹胀闷心神烦热

梔子仁【五枚】 甘草【炙二钱】 茅根 冬葵子【各半两】

右为末每服一钱水煎空心服

梔子清肝散

柴胡栀子散【方见发热即柴胡清肝散】

补中益气汤【方见虚羸】

黄芩清脾饮【方见百啐内散】

加减滋肾丸【方见腹胀】

清胃散【方见内钩】

四物汤【方见急惊】

五苓散【方见五淋】

六味地黄丸【方见肾臟】

诸淋

夫小儿诸淋者肾与膀胱热也二经相为表里俱主水道水入小肠下行於胞则为溺若膀胱热则津液内涸水道不通肾气热则小便淋?或少腹引脐而痛夫淋有五石淋者肾热化石内塞水道痛引膀胱气淋者肺气壅寒小腹胀满小便澁滯热淋者三焦有热传入肾膀胱流入于胞小便赤澁血淋者心热血散失其常经溢渗入胞寒淋者膀胱气冷与正气交争寒战气解是也亦有因妊母肝热及乳母恚怒者当分五臟蓄热治之若心臟有热者导赤散加黄连肝臟有热者柴胡栀子散大便不通泻青丸脾臟有热者泻黄散脾气不足异功散脾气下陷补中益气汤肺臟有热者泻白散肺气虚热异功散加炒黑山栀肾臟有热者地黄丸或因乳母肝经热者用栀子清肝散恚怒者用柴胡清肝散乳母厚味者用加味清胃散心小肠热者用清心莲子饮或儿早近色慾小便澁滯或作痛及更去後大小便牵痛者皆属肝肾不足也用六味地黄丸补中益气汤加牛膝车前肉桂未应当参五臟所胜不可轻用渗泄寒凉之药大损胃气仍参前小便不通症览之

治验

一小儿小便不通服五苓之类不应额间及左腮色赤乃肝肾虚热也用四物山栀及地黄丸而愈後因感冒误汗小便仍不利余用补中益气汤加麦门五味而安

一小儿小便不利茎中澁痛时或尿血此稟父肾热为患也先用五淋散以疏导又用滋肾丸地黄丸补肝肾渐愈後出痘色紫小便短赤额间右腮或赤或白用补中益气汤六味地黄丸前症并愈

一小儿小便不利衄血鼻色赤属脾肺有热也用济生犀角地黄汤而愈後颊间常赤作渴有痰此禀赋肾气不足用地黄丸而诸症瘥

一小儿十五岁所赋虚怯且近女色小便滴?误服五苓散之类大小便牵痛几至不起用六味丸而愈

金砂散 治小便淋?不通

郁金 海金砂 滑石 甘草【各等分】

右为末每服一钱煎地肤子汤调下灯心木通亦可

又方冬瓜最治实热小便不通内热口渴

立效散 治小儿诸淋不通茎中作痛

木通 甘草 胡葵 王不留行 滑石 槟榔 海金沙 山梔子【各等分】

右每服一钱水煎

五淋散 治膀胱有热水道不通或小腹肿胀

山梔【炒】 当归【各三分】 甘草【二分】 赤茯苓 赤芍药【各五分】

右用灯心十根水煎

木通散【方见小便不通】

导赤散【方见心臓】

泻青丸【方见肝臓】

泻黄散【方见脾臓】

四物汤【方见急惊】

清胃散

异功散【二方见内钩】

补中益气汤【方见虚羸】

泻白散【方见肺脏】

地黄散【方见肾脏】

柴胡清肝散

梔子清肝散【二方见发热即柴胡梔子散】

滋肾丸【方见腹胀】

清心莲子饮

茯苓散【二方见白浊】

五苓散【方见五淋】

圣济犀角地黄汤【方见尿血便血】

遗尿

巢氏云肾主水与足太阳相为表里经曰膀胱者州都之官津液藏焉卧则阳气内收肾与膀胱之气虚寒不能约制故睡中遗出内经谓膀胱不约为遗是也用破故纸散益智散鷄肠散之类主之亦有热客於肾干於足厥阴之经廷孔郁结而气血不能宣通则痿痺而无所用故液渗入膀胱而漩溺遗失者用六味地黄丸虚热亦用前丸脾肺气虚者用补中益气汤加补骨脂山茱萸

治验

一小儿眼胞微肿咳 恶心小便泔白余谓脾疳食积也用五味异功散佐以四味肥儿丸而愈後不节饮食视物不明余曰目为五臟之精脾胃复伤须补养为主不信乃服峻厉之剂後变慢脾风竟为不起一小儿三岁素遗尿余视其两颧微赤此稟父肾与膀胱二经阴虚也与六味丸服之赤色渐退而遗尿亦愈

一小儿四岁饮食少思便泄腹痛素遗尿额颧青黑虽盛暑而恶风寒余谓经云热之不热是无火也用八味丸治之诸症悉愈

破故纸散 治膀胱虚冷夜间遗尿或小便不禁

破故纸

右为末每服一钱热汤调下

汤氏鸡肠散 治小便不禁睡中遗出

鸡肠草【二两】牡蛎粉【三钱】龙骨【煨】麦门冬【去心】白茯苓桑螵蛸【各半两炙】

右为散每服一钱枣水煎

又方五倍子炒焦为末每服半钱白汤调下或糊丸米汤送下

益智散【方见潮热即益智丸】

补中益气汤【方见虚羸】

异功散【方见内钩】

四味肥儿丸【方见寒热】

六味地黄丸

加减八味丸【二方见肾臟即六味丸加五味子肉桂】

白浊

仁斋曰小儿尿白久则成疳此因心膈伏热或乳哺失节伤脾使清浊不分故也全婴方云小便初溺微赤良久白浊者乃热疳之症也初溺黄白良久白浊者冷疳之症也冷者益黄散热者牛黄丸冷热相兼者芦荟丸纯下白浊者君朴丸诸失津液欲成疳而小便白者茯苓散小便如疳或良久变白亦有脾虚食积湿热下注者先用茯苓散五七服次用四味肥儿丸若乳食少思或腹肚胀大小便频数此脾虚元气下陷也朝用五味异功散夕用四味肥儿丸若肥体色黄小便不调发黄脱落鼻下疮痍嗜土少食大便青褐者用梔子茯苓汤仍审其乳母饮食七情治之

治验

一小儿发热懒食小便良久变白余用四味肥儿丸即愈或误以为积热用清凉祛逐之剂形体顿弱虚症悉至小便如泔用补中益气汤及四味肥儿丸而愈

一小儿面色痿黄眼胞微肿作渴腹胀饮食少思小便澄白大便不实此脾疳之症也用四君子加山楂芩薏兼用四味肥儿丸而愈

一女子小便或黄或白後前阴痒出水此乃肝经湿热先用龙胆泻肝汤一剂又以加味道遥散加龙胆草而愈

一小儿两耳後脑下名经一核小便白浊面色痿黄体倦口乾大便不调用芦荟丸而愈後鼻外生疮作痒小便仍白视物不明用四味肥儿丸而愈

一小儿白浊两耳内耳外生疮脓水淋漓用大芦荟丸而愈後遍身如疥肌体消瘦发热作渴大便酸臭小便白浊用九味芦荟丸五味异功散而愈

一小儿白浊形气甚虚发热作渴余谓肝肾虚羸也用大芦荟丸地黄丸而愈毕姻後小便仍白唾【阙】发热形气益虚用大剂益气汤六味丸各五十余剂而愈

一小儿白浊发热口乾体瘦骨立余谓肾经虚羸朝用补中益气汤夕用六味地黄丸而愈後两目或生白翳面黄浮肿小便仍白此变肝脾疳症用四味肥儿丸月余渐瘥

君朴丸 治小儿小便白浊久则黄瘦不长肌肉

史君子【煨】厚朴【制】黄连【各一两】木香【三钱】

右为末蒸饼糊丸桐子大每服一二十丸米汤下

茯苓散 治乳食伤脾或心经伏热小便白浊

三棱【煨】蓬术【煨】砂仁 赤茯苓【各半两】青皮 陈皮滑石 甘草【各一钱五分】

右为末每服一钱灯心汤调下

三棱散 治小儿尿白久则成疳宜补脾消食化积三棱 蓬术【各一两炒】益智仁 甘草 神麴【炒】麦芽橘皮【各半两】

右为末每服一钱白汤点下

分清散 治小便余?并赤白浊

益智仁 川萆薢 石菖蒲【盐炒】乌药 茯苓 白芍药【各三分】

右入灯心水煎

清心莲子饮 治发热口乾小便白浊夜则安静昼则发热

黄芩 麦门冬 地骨皮 车前子 甘草【各三钱半】 石莲肉 茯苓 黄芪 柴胡 人参【各二钱五分】

右每服二钱水煎服

梔子茯苓汤【即大无黄汤方见诸疳症】

大安丸【即保和丸加白术】

补中益气汤【二方并见虚羸】

龙胆泻肝汤【方见疝气】

加味逍遥散

异功散

四君子汤【三方并见内钩】

益黄散【方见脾臟】

牛黄丸【方见惊癇】

芦荟丸【方见疳症】

疳症

钱仲阳云小儿诸疳皆因病後脾胃亏损或用药过伤不能传化乳食内亡津液虚火妄动或乳母六淫七情饮食起居失宜致儿为患五臟之疳不同当各分辨肝疳者一名风疳其症白膜遮睛或泻血羸瘦心疳者其症面黄颊赤身体壮热脾疳者一名肥疳其症肢体黄瘦皮肤乾涩多生疮疥腹大食土肺疳者一名气疳其症喘 不已口鼻生疮肾疳者一名骨疳其症肢体消瘦遍身疮疥喜卧湿地杨氏云又有疳伤者五臟虫疳也其名甚多姑举其要虫疳者其虫如丝出於头项腹背之间黄白赤者可治青黑者难疗蛔疳者皱眉多啼呕吐青沫腹中作痛腹胀青筋唇口紫黑头摇齿痒脊疳者身热羸黄烦渴下利拍背有声脊骨如锯齿十指皆疮频嚙爪甲脑疳头皮光急满头并疮脑热如火髮结如穗遍身多汗顙肿 高疳渴者日

则烦渴饮水不食夜则渴止疳泻者毛焦唇白额上青纹肚胀肠鸣泻下糟粕疳痢者停积宿滞水谷不聚泻下恶物疳肿者虚中有积肚腹紧胀脾复受湿则头面手足虚浮疳劳者潮热往来五心烦热盗汗骨蒸 喘枯悴渴泻饮水肚硬如石面色如银无辜疳者脑後项边有核如弹丸按之转动软而不疼其内有虫不速针出则内食臟腑肢体痛疽便利脓血壮热羸瘦头露骨高相传儿衣夜露为鸱鸟羽所污亦致此症若手足极细项小骨高尻削体痿腹大脐突号哭胸陷名丁奚若虚热往来头骨分开翻食吐虫烦渴呕哕名哺露若牙齿蚀烂名走马疳盖齿属肾肾虚受热疳火上炎致口臭齿黑盛则龈烂牙宣大抵其症虽多要不出於五臟治法肝疳用地黄丸以生肾心疳用安神丸以治心异功散以补脾脾疳用四味肥儿丸以治疳五味异功散以生土肺疳用清肺饮以治肺益气汤以生金胸疳亦用地黄丸无辜疳用大芩黄汤蟾蜍丸丁奚哺露用肥儿丸大芦荟丸走马疳敷雄黄散服蟾蜍丸若作渴泻痢肿胀劳瘵等类当详参方论而治之盖疳者乾也因脾胃津液乾涸而患在小儿为五疳在大人为五劳总以调补胃气为主

治验

陈职方孙三岁面颊患疮沿蚀两目肚大青筋小便澄白此肝疳之症也用大芩黄汤二剂而愈

陈司厅子遍身生疮面色痿黄腹胀内热大便不调饮食少思倦怠口乾为肝脾疳症用大芦荟丸不月而痊

陈工部长孙腹内一块小便不调或用行气破血等药发热口乾体瘦懒食面黄兼青几成瘵症以补中益气汤煎送大芦荟丸四服又用前汤加车前子煎送六味丸四服又用清肝生血之药而痊

一女子十二岁目生白翳面黄浮肿口乾作泻用四味肥儿丸而痊

一小儿头摇目割口渴下血此肝经血虚风热也用地黄丸而痊若肝经实热兼用泻青丸盖虚则补其母实则补其子也

一小儿十一岁两耳後脑下各结一核色不变不痛而面色痿黄体倦口乾去後不调用芦荟丸治之诸症顿愈

一小儿鼻外生疮不时揉擦延及两耳又一小儿视物不明鼻内或痒或生疮用四味肥儿丸并愈一小儿水入耳内耳外生疮脓水淋漓经岁不愈余谓肝火上炎用大芦荟丸而愈

一小儿遍身如疥或痒或痛肌体消瘦日夜发热口乾作渴大便不调年余不愈用九味芦荟丸而愈一小儿数岁脑後并结二核肉色如故亦不觉痛用大芦荟丸以清肝脾佐以地黄丸补肾水形体健而核自消

一小儿腹内结块小便不调此肝经内疳也用龙胆泻肝汤及大味芦荟丸而痊

一小儿自生後两目赤肿或作痒或生翳此胎禀肝火用芦荟丸六味地黄丸而痊

一小儿患瘰癧小便频数两目连眦作呕少食泄泻後重用补中益气汤六味地黄丸渐愈佐以芦荟丸而痊

一小儿食泥土困睡泄泻遍身如疥此脾经内外疳也用六君子汤肥儿丸而愈

一小儿面黄颊赤发热作渴睡中惊悸此心经内外症也用秘旨安神丸而痊

一小儿患前症兼掌心发热遍身如疥用安神肥儿二丸而愈

一小儿咳 寒热咽喉不利鼻上有疮久不结痂此肺经疳症也用地黄清肺饮而痊

一小儿下疳溃痛爪黑面黧遍身生疥此肝经内外疳也用地黄芦荟二丸而痊

史少参幼子二岁项後结核不时仰叫或以为热疮内溃用针决之服消毒之药後曲腰啼哭余谓此名无辜疳仰身而哭外疳症也腰曲而啼内疳症也元气败矣果歿

一小儿四肢消瘦肚腹渐大寒热嗜卧作渴引饮此肝脾疳症名丁奚哺露用白术散为主佐以十全丹月余诸症渐愈乃以异功散加当归及六味丸而痊一小儿患疳虚症悉具热如火炙病状不能尽述朝用异功散夕用四味肥儿丸月余诸症稍愈佐以六味地黄丸自能行立遂朝以六味地黄丸夕以异功散及蚘蟆丸而痊

一小儿四肢消瘦肚腹胀大行步不能作渴发热去後臭秽以十全丹数服诸症渐愈又用异功散肥儿丸调理渐愈

大芦荟丸 治疳杀虫和胃止泻

胡黄连 黄连 白茺萸【去扇】 芦荟

鹤虱【微炒】 木香白雷丸【破开赤者不用】 青皮【各半两】 麝香【二钱另研】

右为末粟米饭丸菉豆大每服一二十丸米饮下愚按前方肝脾疳积食积发热目生云翳或疳热颈项结核或耳内生疮肌体消瘦发热作渴饮食少思肚腹膨胀或牙龈蚀落颊頰腐烂或阴囊玉jing生疮或胸脇小腹作痛并效内青皮以龙胆草代之麝香不用尤效

六味肥儿丸 消疳化虫退热

黄连 陈皮 神麴【炒】 川练子【去核炒】 麦蘖【炒各一两】 白芨 芩【半两】

右为末糊丸麻子大每服一二十丸空心米饮吞下愚按前方又治脾疳饮食少思肌肉消瘦肚大颈细发稀成穗项间结核发热作渴精神倦怠大便酸臭嗜食泥土或口鼻头疮肚见青筋囓齿下痢便白五疳用此丸加乾蟾一两芩五钱尤妙

蚘蟆丸 治无辜疳症一服虚热退二服烦渴止三服泻痢住

蟾蜍【一枚夏月沟渠中腹大不跳不鸣身多癩者】

右取粪蛆一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不令虫走出却将蟾蜍扑死投蛆中食一昼夜以布袋盛置浸急水中一宿取出瓦上焙为末入麝香一字粳米饭揉丸麻子大每服二十丸米饮下

愚按前方又治无辜疳症面黄壮热不食舌下有虫或脑後有核软而不痛中有粉虫随气流散侵蚀臟腑便滑脓血日渐黄瘦头大发竖手足细软变生天癰獼猴鹅口木舌悬痈重腭着噤脐风撮口重舌龟背龟胸一十二种败症急用蟾蜍丸大芩芩汤治之多有生者

生熟地黄汤 治疳眼闭合不开

川芎 赤茯苓 枳殼【制】 杏仁【去皮】 川黄连 半夏麴 天麻
地骨皮【各二钱半】 甘草【炙二钱半】 生地黄 熟地黄【各半两】

右每服二钱黑豆十五粒姜水煎服

疳散 治疳

芦荟黄连【各一钱】 麝香【少许】 瓜蒂 虾蟆灰 猪牙皂角【各五分】

右为末吹入鼻 则可疗

脂连丸 治五疳潮热腹胀发焦

胡黄连【半两】 五灵脂【一两】

右为末獾猪胆汁丸麻子大米饮下

茯苓丸 治心疳惊疳

茯神 芦荟 琥珀 川黄连【净各三钱】 赤茯苓【三钱】 钩藤皮 远志肉
虾蟆灰【各三钱】 石菖蒲【一钱】 麝香【少许】

右为末粟米丸麻子大薄荷汤下

神效换肌丸 治脾疳肌瘦潮热盗汗 泻糟粕头大腹急

川黄连【炒】 鼈甲【酒制】 肉豆蔻【煨】 史君子【面裹煨】 神麴【炒】 麦芽【炒各半两】 麝香【五分】 诃子肉【一钱五分】

右为末糊丸芥子大米汤下

天麻丸 治肝疳风疳疳眼

青黛 川黄连 天麻 五灵脂 夜明沙【微炒】 川芎 芦荟【各二钱】 蝉退【去足】 龙胆草 防风【各一钱半】 全蝎【二枚焙】 麝香【少许】 乾蟾头【炙焦一钱】

右为末猪胆汁浸糕丸麻子大每服十丸薄荷汤下

化?丸 治诸疳生虫不时啼哭呕吐清水肚腹胀痛唇口紫黑肠头湿?

芫荇 芦荟 青黛【乾】 川芎 白芷稍 胡黄连 川黄连 虾蟆灰【各等分】

右为末猪胆汁浸糕糊丸麻子大每服一二十丸食後临卧杏仁煎汤下其鼻常用熊胆煎汤
笔蘸洗俟前药各进数服却用青黛当归赤小豆瓜蒂地榆黄连芦荟雄黄为末入鼻疮敛

灵脂丸 治脾疳食疳

白豆蔻 麦芽【炒】 五灵脂 缩砂 蓬术【煨】 青皮橘红
史君子【焙各二钱】 虾蟆【炙焦三钱】

右为末米糊丸麻子大每服十丸米汤下

下虫丸 治疳蛔诸虫

新白苦楝根皮【酒浸焙】 木香 绿包贯众 桃仁【浸去皮】 芫荇【焙各二钱】 鹤虱【炒一钱】 鸡心槟榔【二钱】 轻粉【五分】 史君子【五十取肉煨】 乾虾蟆【炙焦三钱】

右为末面糊丸麻子大每服一二十丸天明清肉汁下内加当归川连各二钱五分

龙胆丸 治脑疳脑热疮

龙胆草 升麻 赤茯苓 苦楝根皮【焙】 防风 芦荟
油发灰【各二钱】 青黛【乾】 黄连【淨各三钱】

右为末猪胆汁浸糕糊丸麻子大薄荷汤下仍以芦荟末入鼻

黄连丸 治疳劳

黄连【半两淨猪胆汁浸晒】 石莲 瓜蒌根 杏仁【浸去皮焙】 乌梅肉【各二钱】

右为末牛胆汁浸糕糊丸麻子大煎乌梅姜蜜汤下

香薷丸 治疳泻

黄连【三钱炒】 肉豆蔻 木香 诃子肉【煨】 砂仁 茯苓【各一钱】

右为末饭丸麻子大米饮下

木香丸 治疳痢

黄连【淨三钱】 木香 紫厚朴【制】 夜明沙【隔纸炒各二钱】 诃子肉【炒二钱】

右为末饭丸麻子大乾艾生姜煎汤食前下

十全丹 治丁奚哺露

青皮 陈皮【各去白】 川芎 白豆蔻仁 五灵脂 鸡心槟榔 芦荟【各五钱】 木香
史君子【焙】 虾蟆灰【各三钱】

右为末猪胆汁浸糕糊丸麻子大每服一二十丸米饮下有热薄荷汤下

汤氏十全丹 治前症

槟榔 青皮 陈皮【去白】 枳壳【汤浸去穰麸炒】 丁香
木香【各二钱五分炮】 香附子【一两炒】

右为末神麴糊丸黍米大每服三十丸空心食前米饮下

愚按前症因乳哺不调伤损脾胃不思饮食气血日损四肢日瘦肚腹渐大是名丁奚呼吸少气汲汲苦热谓之哺露属形病俱虚虽用前药宜佐以异功散壮脾胃以行药势

鳖血煎 治疳劳

芫荇 柴胡 川芎【各一两】 人参【半两】 史君子【二十一个】 胡黄连 宣黄连

右用鳖血一盏吴茱萸一两和二黄连淹一宿次早炒乾去茱萸并血用二连入余药末粟粉糊丸麻子大食前热水下

地黄清肺饮 治肺热疳蚀穿孔或生瘰肉或鼻外生疮

紫苏 前胡 防风 赤茯苓 黄芩 当归连翘 天门冬【去心】 桔梗 生地黄 甘草【炙各二钱】 桑白皮【炒半两】

右每服二钱水煎服次用化?丸

九味地黄丸 治肾疳

史君子【肉】 赤茯苓 川练子 山茱萸【肉】 当归 川芎 牡丹皮 山药【各二钱】 熟地黄【四钱五分】

右为丸蜜丸桐子大每服八十丸空心温酒下

东垣大芫荇汤【一名梔子茯苓汤】 治黄疳土色为湿为热当利小便今反利【知黄色中为燥胃经热也】发黄脱落【知膀胱肾俱受土邪乃人湿热之也】鼻下断作疮【上逆行营气伏火也】能乳【胃中有热也寒则食不入】喜食土【胃不足也】面黑色【为寒为痹】大便清【寒也】褐色【热蓄血也】间黄色【肠胃有热】治当滋荣润燥外致津液

黄栢 甘草【炙】 羌活【各二分】 柴胡【三分】 防风【一分】 白术 茯苓 大芫荇【各五分】 山梔仁【三分】 麻黄根 黄连【各一分】 当归【四分】

右水煎服

朱砂安神丸 治心疳怔忡心中痞闷

朱砂【四钱】 生地黄 黄连【各半两】 生甘草【二钱半】 铜青轻粉【各五分】 兰香叶【二钱烧灰】

右为末乾敷上

白粉散 治疳疮

海螵蛸【三分】白芨【二分】轻粉【一分】

右为末先用浆水洗拭乾敷

六君子汤

异功散【二方见内钩】

六味丸【方见肾臟】

四味肥儿丸【方见寒吐】

泻青丸【方见肝臟】

龙胆泻肝丸【方见疝气】

补中益气汤【方见虚羸】

白术散【方见积】

二便色白

秘旨云小儿便如米泔或溺停少顷变作泔浊者此脾胃湿热也若大便泔白色或如鱼冻或带红黄黑者此湿热积滞也宜理脾清滞去湿热节饮食若忽然变青此是变蒸也不必用药若久不愈用补脾制肝若心膈伏热则成疳矣大抵多因乳哺失节脾气有伤元气下陷或乳母饮食七情所致小便如泔或大便泔白者用四味肥儿丸积滞黄黑者用四君子汤加黄连木香色青日久不复或兼泄泻或腹痛者用六君子汤加木香芍药若小便不利大便褐色发黄脱落鼻下疮痍用梔子茯苓汤乳食少思胸腹膨胀大便频数用四味肥儿丸仍审乳母饮食七情主之

治验

一小儿每食停滞大便色白而频先用大安丸异功散少加炒黑黄连一二服後小水澄久如泔发热体倦用四味肥儿丸而愈

一小儿患前症停食发热先用大安丸而愈後患腹胀午後发热用五味异功散而瘥

一小儿患前症兼自痢用异功散加升麻柴胡而愈但日晡微热倦怠用补中益气汤四味肥儿丸而愈一小儿患前症服驱逐之剂手足并冷作渴少食此脾气复伤也用六君升麻柴胡而泻止又四味肥儿丸而愈

四君子汤

六君子汤

加味逍遥散

五味异功散【四方见内钩】

龙胆泻肝汤【方见疝气】

补中益气汤

大安丸【保和丸加白术二方见虚羸】

四味肥儿丸【方见寒吐】

梔子茯苓汤【即大茺萸汤方见疳症】

薛氏医案卷六十一

卷六十二

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六十二

明 薛己 订

保婴撮要九

吐血

经曰清者为荣浊者为卫荣行脉中卫行脉外盖荣者水谷之精气也和调於五脏洒陈於六府故能入於脉夫荣者陰血也所主在心统化在脾藏内在肝宣布在肺输泄在肾灌溉一身滋养百脉诸经由此而生毓焉然血之所统者气也故曰气主响之血主濡之是以气行则血行气止则血止阳生陰长夫倡妇随之道也若气一伤则变症百出故妄行则吐衄衰涸则虚劳降下则便红热则溺赤於肠胃则为肠风陰虚阳搏则为崩漏此皆气有殄戾之乖而血乃生溢之患也然养陰者可不先知养阳之道乎小儿患之多因禀赋积热或食膏粱厚味或乳母七情鬱火所致治法若气虚血弱当以人参补之阳旺则陰生血也若四物汤者独能主血分受伤为气不虚也若左寸关脉数而无力血虚也四物汤加参术浮而无力气虚也补中益气汤尺脉数或无力肾虚也六味地黄丸右寸关脉数而有力者肺胃热也犀角地黄汤後用四物汤加参苓白术尺脉数而无力陰虚也用六味地黄丸若黄目澁眵多手麻者脾肺虚也用黄芪芍药汤

治验

一小儿年十余岁鼻衄肝脉弦数肝藏血此肝火血热而妄行用小柴胡加山梔龙胆草四剂而血止又用四物芩连芦荟山梔甘草作丸服又以地黄丸滋肾水生肝血而愈

一小儿久鼻衄右颧鼻準微赤此脾胃传热於肺而不能统也先用六君桔梗当归山梔而血止次用人参黄芪散以补脾肺而愈

一小儿壮热吐血或兼衄血右颧鼻準赤色乃肺胃积热用济生犀角地黄四剂而血并止後因母饮酒复作用清胃散母子服之而愈

一小儿吐血不止鼻準赤色审其乳母有郁热用加味归脾汤加味逍遥散母子并服各数剂

血少止又用八珍汤加柴胡牡丹皮而愈

一小儿因母屡恚怒发热吐血或时衄用加味小柴胡汤之类治其母并愈後其母因劳役兼怒气致儿患惊搐或用抱龙丸又加吐血予以加味逍遥散母子并愈厥後乳母仍劳役发热此儿即惊搐或吐血或衄血母用补中益气汤子用犀角地黄汤顿愈一小儿十岁因伤厚味吐血用济生犀角地黄汤解食毒清胃热又用四君牡丹皮升麻调补脾胃而愈惟肢体倦怠两手作麻用黄芪芍药汤数剂而安一小儿吐血因乳母火鬱发热两脇作痛後吐血以加味归脾汤加吴茱萸制黄连治母儿不时饮数匙月余并愈後母因怒吐血寒热儿亦吐血先用加味小柴胡汤二剂後用加味逍遥散治其母悉愈一女子年十四岁因惊寒热发搐服镇惊之药更吐血寻衣撮空身如炙烦躁不眠饮食不入脉洪大而无伦次按之豁然而空用加减八味丸料二剂诸症悉退脉息按之如丝无气以动用人参一两煎服不应仍用人参一两附子五钱二剂元气顿复

一女子十三岁因怒吐血咬牙发搐用加味逍遥散加钩藤钩而愈次年怀抱鬱结胸满食少吐血?赤此因肝火动而血热脾气虚而不能摄血也用六味丸及归脾汤加山梔贝母而愈

一小儿十四岁发热吐血属足三陰虚余谓宜补中益气以滋化源不信仍用寒凉降火前症愈甚或谓曰小儿未有室何肾虚之有参芪补气奚为用之余述丹溪先生云肾主闭藏肝主疏泄二脏俱有相火而其系上属於心心为君火为物所感则相火翕然而起虽不交会而其精亦暗耗矣又褚氏云男子精未满而御女以通其精则五藏有不满之处异日有难状之疾正此谓也遂用补中益气汤及六味地黄丸而痊

黄芪芍药汤治衄多岁?黄眼澁多眵手麻

黄芪【三两】甘草【炙】升麻 葛根 芍药【炒黄各一两】羌活【半两】

右每三钱水煎服

愚按此手足太陰阳明药也然血虚久则阳亦虚矣故血不足则麻木陰虚火动变症百出实非风也此出升阳滋陰例

人参黄芪散治虚劳客热消瘦倦怠口燥咽乾日晡潮热五心烦热盗汗胸满食少作渴咳唾时有脓血半夏 知母【炒黄】桑白皮 赤芍药【炒】黄芪【炒】紫苑
甘草【炙各半两】白茯苓 柴胡 生地黄 熟地黄 秦艽
地骨皮【各二两】天门冬【去心三两】人参 桔梗【各一两】鼈甲【醋炙五钱】

右剉散每服三五钱水煎服大人亦得【一方有生姜】

四物汤【方见急惊】

加味小柴胡汤

小柴胡汤【方见瘥症】

清胃散

加味归脾汤

加味逍遥散

四君子汤

六君子汤【五方见内钩】

济生犀角地黄汤【方见便血】

补中益气汤【方见虚羸】

八珍汤【即四君四物二汤合用也】

六味丸【方见肾脏】

虚羸

仲阳云小儿虚羸因脾胃不和不能乳食使肌体瘦弱或大病後脾气尚弱不能传化谷气所致若冷者时时下利唇口清白热者身温壮热肌体微黄更当审其形色察其见证如?赤多啼心之虚羸也?青目劓肝之虚羸也耳前後或耳下结核肝经虚火也颈间肉里结核食积虚热也面黄痞满脾之虚羸也?白气喘肺之虚羸也目睛多白肾之虚羸也仍审相胜而药之又寒热二症不可不辨若腹痛泻利清白不渴喜热此属寒症虽在夏月宜木香丸身热烦躁泻利焦黄作渴喜冷此属热症虽在冬月宜胡黄连丸皆舍时从症之治法也

治验

一小儿十三岁?赤惊悸发热形体羸瘦不时?白暖气下气时常停食服保和丸及清热等药余曰?赤惊悸心神怯也?白暖气心火虚也大便下气脾气虚也此皆禀心火虚不能生脾土之危症前药在所当禁者不信又服枳术丸镇惊等药而诸症益甚大便频数小腹重坠脱肛痰涎饮食日少余先用六君子汤为主佐以补心丸月余饮食进痰涎少止又用补中益气汤送四神而愈毕姻後病复作坠时至仲冬?白或黧色手足冷喜食胡椒姜物腹中不热脉浮按之微细两尺微甚乃用八味丸元气复而形气渐充年至二十苦畏风寒?目赤色发热吐痰唇

舌赤裂食椒姜之物唇口即破痰热愈甚腹中却不热诊其脉或如无或欲絶此寒气逼阳於外内真寒而外假热也仍用八味丸而诸症顿愈

一小儿八岁?常青色或时色赤日间目劄夜睡咬牙二年余矣服清肝降火之药益甚形气日羸余考绩到京求治於余曰肝主五色入心则赤自入则青盖肝属木而生风故肝气为阳为火肝血为陰为水此禀肝肾精血不足虚火内动陰血益虚虚而生风风自火出故变?赤目劄等症耳非外风也遂用地黄丸以滋肾水生肝木两月目劄咬牙悉止又三月许诸症寻愈而元气亦充矣凡肝经之症若肝木实热生风而自病或肺金实热而尅木者宜用清肝降火之剂以泻其邪气若肝经风热而目直等症用柴胡栀子散以清肝火加味四物汤以养肝血若肾虚而咬牙诸症用六君子汤以健脾土六味地黄丸以滋肾水则愈

一小儿脾气虚弱饮食停滯发热作渴服泻黄散不时下痢余先用保和丸二服而愈但不食恶心?青手冷又用六君柴胡升麻四剂?色痿黄食进手温惟形体羸甚倦怠发热小腹重坠肛門脱出用补中益气汤加半夏肉豆?二剂而安凡脾胃之症若发热作渴饮食喜冷或泄泻色黄睡不露睛者属形病俱实宜用泻黄散疏导之若发热口乾恶冷或泄泻色白睡而露睛属形病俱虚宜用异功散调补之若脾气下陷者补中益气汤寒水侮土者益黄散肝木尅脾者六君加柴胡若目睛微动潮热抽搐吐泻不食宜用秘旨保脾汤凡小儿诸病先当调补脾胃使根本坚固则诸病自退非药所能尽祛也

一小儿五岁形气虚羸睡中咬牙夜间遗尿日间频数余以为禀肾气不足用补中益气汤加补骨脂地黄丸加鹿茸以补脾肾而痊毕姻後小便频数作渴发热日晡益甚恪服黄栢知母等药以滋陰降火後患肾痿卧床年许余因考绩北上仍用前药喜其慎疾半载而痊

一小儿年十一岁?白或赤足软不能久行用地黄丸加鹿茸年许而痊毕姻後两目羞明两足仍软用前丸及补中益气汤而痊後病复发增口渴足热头 觉开视物觉大此肾虚瞳人散大而然也服前药远房事则愈因不自保终患肾痿而歿仲阳先生云此症属脑髓不足不能荣养宜用地黄丸补之有至七八岁或十四五岁气血既盛而自合若纵恣色慾戕贼真陰亦不能尽其壽矣

一小儿体素虚弱患咳 痰涎服痰药而痰益甚余以为脾虚食积先用六君神麴山查渐愈後伤风咳 腹胀不食泄泻酸臭此食滯伤脾而肺气虚也用六君桔梗而愈又饮食停滯呕吐痰涎喘 白余谓脾虚不能消化饮食而为痰肺虚不能摄气归源而作喘仍用六君子汤而愈大凡腠理不密外邪所感而肺病者因脾胃气虚不能相生必用六君子汤若脾胃气实大肠不利而肺病者用泻黄散若心火炎烁肺金而喘 者用地黄丸

一小儿形瘦不时咳 自用参苏饮一剂更加喘急惊搐?白或黄余谓此禀脾肺不足而形气虚羸因前剂峻利外邪虽去而肺气益虚肺虚则宜补脾先用异功散加桔梗钩藤鈎一剂痰喘顿定乃去桔梗再半夏当归再剂惊搐亦去又加酸枣仁治之而安年十五岁发热痰盛作渴?赤形体羸瘦用地黄丸加五味子及补中益气汤各百余剂而形气渐壮若认为陰火用黄

栢知母等药复伤生化之源其亦不治者矣

一小儿五岁尚饮乳耳前後颈间至缺盆以手推寻其筋结小核如贯珠隐於肌肉之间小便不调?色青黄形气羸瘦此稟母之肝火为患用九味芦荟丸五味异功散加山梔柴胡与儿饮之又以加味逍遥散与母服之寻愈

一小儿患虚羸耳出秽水左手尺关洪数而无力余为清肝补肾耳中虽愈脉未全敛毕姻後患瘵症误服黄栢知母之类复伤元气不胜寒暑劳役无日不病几至危殆余大补脾肾滋养元气而愈

一小儿患症如前肢体消瘦?色痿黄大便酸臭此脾虚食积用四味肥儿丸五味异功散治之而愈一小儿体瘦腹大寒热嗜卧作渴引饮以白术散为主佐以四味肥儿丸诸症渐愈乃以异功散六味丸而安

一小儿患前症身热如炙此肝疳之症也朝用异功散夕用四味肥儿丸诸症稍愈佐以蚬蟆丸数服而痊

一小儿停食发热服芩连三棱等剂饮食日少胸腹膨胀肢体羸瘦余谓脾虚饮食停滯元气复伤先用补中益气汤加木香钩藤钩数剂渐效又用六君炮姜调理而安

一小儿虚羸昏倦咳 惊悸自用参苏散一剂更加喘急此脾肺气虚而妄发表也用惺惺散微解外邪调和胃气诸症顿愈但手足逆冷又用六君子汤调补元气而安

一小儿九岁吞酸恶食肌体消瘦腹中作痛余谓食积虚羸也用保和丸而愈後腹中数痛皆服保和丸余曰此因脾胃虚而饮食所伤也当调补脾土以杜後患不信後腹痛喜按余用五味异功散二剂因未应自用平胃散等药腹胀作痛余仍以异功散加木香四剂而愈若屡用攻伐之剂陰损元气多致虚羸深可慎也

参苓白术散治脾胃虚弱饮食少思中满痞噎心忪气喘呕吐泄泻

白扁豆【二两半姜汁浸去皮微炒】人参 白茯苓

白术甘草【炒】山药【各三两半】薏苡仁 桔梗【炒黄色】莲肉宿砂仁【各二两】

右为末每服一钱枣汤调下

地黄丸【加肉桂一两名加減八味丸】治小儿肝经虚热血燥或风客淫气而患瘰癧结核或四肢发搐眼目抽动痰涎上涌又治肾疳脑热消瘦手足如冷寒热往米滑泻肚胀口臭乾渴齿龈溃烂爪黑?黧遍身两耳生疮或耳出水或发热自汗盗汗便血诸血失瘖等症其功不可尽述【即六味地黄丸方见肾脏】

补中益气汤治中气虚弱体疲食少或发热烦渴等症人参 黄芪【各八分】白术 甘草 陈皮【各五分】升麻 柴胡【各二分】当归【一钱】

右姜枣水煎空心午前服

愚按前方若因药剋伐元气虚损恶寒发热肢体倦怠饮食少思或兼饮食劳倦头痛身热烦躁作渴脉洪大弦虚或微细软弱右寸关独甚者宜用之凡久病或过服剋伐之剂亏损元气而虚症悉具者最宜前汤若母有脾胃不足之症或陰虚内热致儿为患者尤宜用之

钱氏异功散治脾胃饮食少思吐泻不食凡虚冷症先与数服以正胃气【即五味异功散】

愚按前方治脾胃虚弱吐泻不食或惊搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虚弱咳 吐痰或虚热上攻口舌生疮弄舌流涎若母脾胃虚儿患此症亦当服之

四君子汤治脾气虚损吐泻少食肌肉羸瘦【方见内钩】保和丸治饮食停滞胸膈痞满噯气吞酸或吐泻腹痛【加白术一两即大安丸】

陈皮 连翘 萝卜子【炒五钱】山查 神麴【炒】半夏 茯苓【各一两】

右为末粥丸桐子大每服三十丸白汤送下

愚按前方行气剋滯之剂若元气无亏暴停乳食而致斯症者宜用此消导之若元气虚弱而乳食所伤者必调补胃气为主而佐以消导若乳食已消而作呕者乃胃气被伤当用异功散补之不宜仍用前药重损胃气治者审之

肥儿丸治肝疳食积肢体消瘦二便不调

黄连【一两五钱】神麴【一两五钱】木香【一两五钱】肉荳蔻【二两煨】?榔【二十个】史君子【酒浸去皮】麦芽【各四两】

右为末神麴糊丸麻子大每服二三十丸米饮下愚按前方若食积五疳发热口乾大便不调小便不清或颈项结核髮稀成穗寒热作渴宜用之若脾胃稍虚者用五味异功散兼服虚甚者异功散为主以前药

枳术丸【方见癖块】

六君子汤【方见内钩】

四神丸【方见脱肛】

八味丸【方见肾脏】

柴胡梔子散【方见急惊】

四物汤【方见急惊】

九味芦荟丸【方见疳症】

加味逍遥散【方见内钩】

白术散【方见积滞】

蚘蟆丸【方见疳症】

胃气虚寒

经曰胃为水谷之海六腑之大源也人身气血腑脏俱由胃气而生故东垣之法一以脾胃为主所谓补肾不若补脾正此意也在小儿虽得乳食水谷之气未全尤仗胃气胃气一虚则四脏俱失所养矣故丹溪谓小儿多肝脾之疾也若?色?白目无睛光口中气冷不食吐水肌瘦腹痛此胃气虚寒之症用五味异功散或六君子汤主之若大便不实兼脾虚也加乾姜温之中满不利脾不运也加木香开之喜冷便秘胃实热也用泻黄散凉之命门火衰不能生土者用八味丸补之稟赋胃气不足亦用此丸盖下焦真阳充盛则上生脾元自能温蒸水谷矣

治验

一小儿伤食吐泻不已後便泄青色睡而露睛手足指冷额黑唇青余谓大便青色木胜土也或时溏泄脾气不足也额黑唇青寒水侮土也悉属中气虚寒用五味异功散加升麻柴胡木香附子二剂而愈一小儿盛暑呕吐飧泄服黄连香薷饮益甚用白虎石膏汤而腹胀作痛手足并冷余谓脾气虚寒且夏月伏陰在内也用五味异功散加木香而愈

一小儿因伤乳食杂用消导之药遂变痢久而不愈先用六君加木香而渐痊後用五味异功散而全愈一小儿手足常冷腹中作痛饮食难化余谓胃气虚寒也先用益黄散二服痛止次用六君子汤数剂即愈

一小儿九岁素恶风寒饮食少思至秋冬口鼻吸气陰冷至腹手足如冰饮姜汤及烧酒方快其脉细微两尺如无余谓此稟命门火衰也用还少丹不应改用八味丸旬余诸症即愈

平胃散治脾胃不和不思饮食心腹胀痛口苦短气恶心暖气吞酸?黄体瘦嗜卧体痛霍乱吐泻等症厚朴【姜汁制五两】陈皮甘草【炙各一两】苍术【米泔浸焙八两】

右为末每服二钱姜枣水煎沸汤点服亦得常服调气煖胃化宿食消痰饮辟四时不正之气愚按前症若乳食停滞暖腐吞酸呕哕恶心者宜服是方若饮食既消脾胃虚弱呕吐恶心者则宜四君子汤

调中丸治脾胃虚寒

白术 人参 甘草【炒各五分】

八味地黄丸即六味地黄丸加肉桂附子各一两治禀赋命门火衰不能生土以至脾土虚寒或饮食少思及食而不化腹脐疼痛夜多漩溺等症内经谓益火之源以消陰翳正此药也

钱氏益黄散【一名补脾散】治脾胃虚冷吐泻【方见脾脏】愚按前方若脾土虚寒或寒水侮土而呕吐泄泻手足并冷或痰涎上涌睡而露睛不思乳食者宜用此方若脾土虚弱吐泻者用六君柴胡如不应或手足俱冷者属虚寒加木香炮姜若因乳母脾虚肝侮亦治以前药若乳母鬱怒致儿患前症者其母兼服加味归脾汤

泻黄散【方见脾脏】

观音散【方见呕吐】

银白散【方见慢惊】

归脾汤

异功散

六君子汤【三方见内钩】

食积寒热

小儿食积者因脾胃虚寒乳食不化久而成积其症至夜发热天明复凉腹痛膨胀呕吐吞酸足冷肚热喜睡神昏大便酸臭是也有前症而兼寒热者名曰食积寒热若食在胃之上口者吐之胃之下口者消之腹痛痞胀按之益痛者下之下後仍痛按之则止者补之夹食伤寒者先散之用参苏饮热甚便秘者先利之用大柴胡汤如无外感但只伤食不至於甚保和丸调之盖脾为至陰之藏也故凡脾病者至夜必热热而兼寒则又见所胜者侮所不胜矣食未消者消之则寒热自止食既消者补之则寒热自痊若手足并冷喜热饮食此中州虚寒也宜温之大便欲去不去脾气下陷也宜升之若夜间或侵晨泄泻者脾肾俱虚也用四神丸手足并热作渴饮水者脾胃实热也用泻黄散大便秘结用大柴胡汤手足虽热口不作渴大便不实者用白术散仍参腹痛腹胀积痛积滞治之

治验

一小儿伤食腹胀胸满有痰余用异功散而痊後复伤食腹胀作痛或用药下之痛虽止而胀益甚更加喘粗此脾气伤而及於肺也用六君加桔梗调补而痊

一小儿腹胀恶食寒热恶心症类外感余曰气口脉大於大迎此饮食停滯也用保和丸一服诸症顿退但腹胀未已用异功散而痊

一小儿伤风咳 痰涌用六君桔梗桑皮杏仁而愈後饮食停滯腹泻胀痛又用六君加山查厚朴而安复停食作呕或用药下之更加咳 余谓此脾肺益虚欲行调补彼以为缓乃服发表尅滯之药前症益甚更加摇头余用天麻散倍加钩藤鈎及异功散而愈

一小儿胸腹胀痛寒热顿闷以手按腹即哭此饮食停滯也先用保和丸一服前症即愈更加烦渴按其腹不哭此宿食去而脾气未复也用五味异功散加柴胡治之而瘳

一小儿饮食停滯服消导之剂饮食既消热尚未退此胃经虚热也用六君子加升麻柴胡四剂而愈一小儿先因饮食停滯服尅伐之剂更加腹痛按之则止余用六君子汤而愈後复伤食服保和丸及三棱?榔之类更加腹重善噫此脾气虚而下陷也仍用前汤加升麻柴胡木香而愈

一小儿?色青白饮食难化大便频泄或用消积化痰等药久不愈余谓脾胃虚弱也用六君子汤渐愈或以为食积宜驱逐之遂反作泻痰喘发搐余谓脾气复伤不能生肺肺虚不能平肝而作是症先用六君加钩藤鈎饮食少进又用五味异功散加升麻而愈

一小儿患前症腹痛服攻下之剂发热不已大便不化按其腹不痛与冷水不饮此食积去而脾气虚也用五味异功散加当归升麻而愈

三黄枳术丸治伤肉湿?辛辣味厚之物致填塞闷乱不快

枳实【麸炒五钱】黄连【酒浸炒一两】大黄【湿纸里煨一两】白术【一两】黄芩【五钱】

右为末汤浸?饼为丸如菉豆大每服五十丸白汤下临时量所伤多少加减服之

大柴胡汤【方见瘕症】

四神丸【方见惊泻】

六君子汤

五味异功散【二方见内钩】

泻黄散【方见脾脏】

白术散【方见积滞】

保和丸【方见虚羸】

加减肾气丸【方见腹胀】

天麻散【方见百啐内 即天麻丸】

肿胀

经曰至陰者肾水也少陰者冬脉也其本在肾其末在肺皆积水也又曰肾者胃之关也关门不利故积水而从其类也上下溢於皮肤故肘肿腹大上为喘呼不得卧者标本俱病也丹溪云惟肾虚不能行水脾虚不能制水胃与脾合又胃为水谷之海因虚而不能传化肾水泛滥反得以浸渍脾土於是三焦停滯经络壅塞水滲於皮肤注於肌肉而发肿也其状目胞上下微起肢体重着喘咳忡怔股间清冷小便澁黄皮薄而光手按成窟举手即满是也古方有十种论症以短气不得卧为心水两脇紧痛为肝水大便鹜溏为肺水四肢苦重为脾水腰痛足冷为肾水口苦咽乾为胆水下虚上实为大肠水腹急肢瘦为膀胱水小便闭泄为胃水小腹急满为小肠水又有湿气毒气伤寒後泻痢後气血虚者之五肿及疝气症积鎖肚胸膈作膨蛔气虚冷积者之七胀亦当详之其受湿气者由脾胃之气敦阜四肢头?皆肿也食毒者脾伤积毒停留於胃也伤寒下早者邪气乘虚而入也泻痢後者脾气虚也皆宜先调胃气次可治肿其患七胀皆由血气不足脏腑怯弱表里俱虚邪正相乱以致四肢浮肿腹肚膨满亦当先调荣卫分别陰阳治法宜补中行湿利小便凡有热者水气在表也可汗之身无热者水气在里也宜下之腰已下肿宜利小便腰已上肿宜发汗此仲景之法也若遍身肿烦渴小便赤澁大便秘结此属阳水遍身肿不渴大便溏泄小便清利此属陰水阳水兼阳证者脉必浮数陰水兼陰证者脉必沉迟气若陷下宜用二陈加升提之药如腹胀少加木香调之若朝寬暮急属陰虚朝用四物汤加参朮夕用加减肾气丸朝急暮寬属阳虚朝用六君子汤夕用加减肾气丸朝暮皆急陰阳俱虚也用八珍汤主之真阳虚者朝用八味地黄丸夕用补中益气汤若肚腹痞满肢体肿胀手足并冷饮食难化或大便泄泻呼吸气冷者此真阳衰败脾肺肾虚寒不能司摄而水泛行也急用加减肾气丸否则不治惟调补脾土多有生者

治验

一小儿伤食腹胀服剋伐之剂小便澁滯改服五苓散小便益闭四肢顿肿余谓脾胃虚寒不能通调水道下输膀胱故也朝用加减金匱肾气丸夕用补中益气汤而愈

一小儿患前症小便赤频盗汗发热朝间用补中益气汤午间用五味异功散晚间用六味地黄丸而愈後作功课太劳盗汗发热用八珍汤六味丸而痊一小儿患前症饮食少思大便不实先用补中益气汤又用五味异功散而愈毕姻後复发更手足并冷饮食难化或吞酸噯腐用六君子炮姜而痊後又发用八味地黄丸补中益气汤而痊

一小儿小腹胀坠小便澁滯午前为甚以补中益气汤加木香与朝服以五味异功散加升麻柴胡与夕服两月余而愈後饮食失节腹胀咽酸用五味异功散四味茱萸丸而痊毕姻後复患如前更恶寒腹冷小便清频大便不实手足并冷用补中益气汤八味地黄丸而寻愈

二陈汤【方见寒吐】

五苓散【方见五淋】

八珍汤【即十全大补汤去黄蓯肉桂方见自汗】

六君子汤【方见内钩】

加减肾气丸【方见腹胀】

八味地黄丸【方见肾脏六味丸加肉桂附子】

补中益气汤【方见虚羸】

虯虫

巢氏云虯虫者九虫之一也长尺许或五六寸者因脏腑虚弱及食甘肥而动其动则腹中攻痛或作或辍口吐涎水贯心则死用史君子丸之类下之钱仲阳云吐水不心痛者胃冷也吐沫心痛者虫痛也与癰相似但目不斜手不搔耳安虫散主之田氏云虫痛者啼哭俛仰坐卧不安自按心腹时时大叫?色青黄唇色兼白目无精光口吐涎沫也若因胃冷即吐用理中汤加炒川椒五粒?榔五分煎下乌梅丸古云虫蚀上部则上唇有白点虫蚀下部则下唇有白点腹中诸虫望前其头向上望後其虫向下如欲用药先以猪肝油炙香令儿闻其香味使虫头向上则药易伏若中气虚而虫不安者但调补脾胃自安丹溪先生云冬月吐虫多是胃气虚寒用钱氏白术散加丁香二粒主之

治验

一小儿患虫动心痛先服大茺萸汤下瘀秽反作呕少食右颧鼻準白中兼黄此脾肺气虚也用异功散二服稍应更加炮姜一剂而安

一小儿吐泻将愈心痛吐水手足并冷忽自手按心腹此胃气虚寒类乎虫痛也用益黄散而愈

一小儿病後吐水心间作痛余谓胃气虚寒用五味异功散而愈後每吐凡患病饮食不进手足并冷即吐水心痛余用前散加升麻柴胡即愈或用逐虫之剂前症益甚更加腹痛重坠余用补中益气汤加炮姜治之而愈

史君子丸治五疳脾胃不和心腹膨胀时复作痛不食渐瘦并宜服之

史君子肉【一两】厚朴【制】橘红甘草【炒】白芍药川芎【各一钱】

右为末?丸如皂角子大每服一丸陈米饮化下

安虫散治虫痛

白矾【炒枯二钱半】胡粉【炒二钱】鹤虱【炒二钱】川练子【二钱】?榔【二钱】

右为末每服三五分米饮调下

乌梅丸治蚘厥当吐蚘今反静而复烦此为脏寒蚘上入其膈故须臾复止得食而呕又烦蚘闻臭当自吐及治久痢【方见伤风咳】

理中汤【方见冷泻】

大茺萸散【方见疳症】

异功散【方见内钩】

白术散【方见积痛】

异功散【方见脾脏】

疝气

小儿陰肿疝气者多属肝肾气虚及坐卧寒湿之地或风邪所伤血气相搏或啼叫气逆水道不行或禀父肝经虚热或妊娠肝气鬱结或乳母怒动肝火而致者若儿肝经热用梔子清肝散儿啼躁怒用均气散乳母恚怒用柴胡清肝散肝火气逆用加味逍遥散小腹作痛小便澁滯用龙胆泻肝汤久坐冷地小便不利用四苓散加柴胡山梔车前子不时寒热者加味小柴胡汤经云肝气热则茎痿宗筋弛纵肾茎肿胀或出白液痒痛或里急筋缩挺纵不收或精随

便下者此名筋疝俱属肝火不系於肾宜详治之

治验

一小儿陰囊赤肿余作胎毒治瘥後发热痰盛等症诊其母素有鬱热用加味归脾逍遥二药子母俱服而愈後吐泻小便赤澁两目瞤动视其寅卯【阙】关脉赤此属肝经风热也用柴胡清肝散加鈎藤鈎木贼草而愈

一小儿陰茎作痒小便频数此属肝火之症反服五苓散颈间结核余用柴胡栀子散四味肥儿丸诸症稍愈又用虾蟆丸而痊

一小儿茎痿湿痒後陰囊焮肿茎中作痛时出白津余诊之肝火也用龙胆泻肝汤六味地黄丸而愈一小儿辜丸作痛小便赤澁寒热作呕乃肝脾之疝用小柴胡汤加山梔车前子茯苓而愈

一小儿辜丸肿鞭小便黄澁用小柴胡汤加车前子山梔并芦荟丸而消

一小儿茎中作痒一小儿下疳溃烂作痛发热一小儿茎中溃痛小便秘澁日晡尤盛一小儿目痒出水连劓项间结核陰囊搔痒俱属肝火之症俱用九味芦荟丸而愈

一小儿小便澁滯陰囊肿痛寒热此肝经湿热也用龙胆泻肝汤而消但内热倦怠此兼脾气虚也用四君柴胡山梔芍归而愈

一小儿陰囊赤肿因乳母怒气及饮酒而发余审之因於怒则用加味逍遥散因於酒则用加味清胃散并加漏芦乾葛神麴与母子服之随愈

一小儿陰囊肿痛小便赤澁用加味小柴胡汤加漏芦母子并服而愈

一小儿禀肝肾虚弱辜丸常肿用六味地黄丸料加柴胡母子并服两月余而痊

刘武库子辜丸作痛小便赤澁寒热作呕用小柴胡汤加山梔车前子茯苓而愈

一小儿腹内一块攻痛小便不调用龙胆泻肝汤芦荟丸而愈後形气消烁发热作渴此肝木制脾土也用补中益气汤及芦荟丸而愈

龙胆泻肝汤治肝经湿热两拘肿痛或腹中作痛或小便澁滯等症

龙胆草【酒拌炒黄】泽泻【各二分】车前子【炒】生地黄【酒拌】木通
当归【酒拌】山梔【炒】黄芩【炒】甘草【各二分】

右水煎服

四君子汤

加味逍遥散

加味清胃散

加味归脾汤【四方见内钩】

五苓散【方见五淋】

九味芦荟丸【方见疳症】

补中益气汤【方见虚羸】

加味小柴胡汤【方见痉症】

六味地黄丸【方见肾脏】

梔子清肝散

柴胡清肝散【二方见发热】

四味肥儿丸【方见寒吐】

四苓散【即五苓散去肉桂】

渴症

百问云小儿唇红如丹即发渴红甚焦黑则危笃若三焦虚烦作渴者用三黄汤伤寒後唇口焦者用白虎汤竹叶汤泻痢作渴者用四苓散之类常治暑积心脾烦渴引饮者用白虎汤下利脾虚作渴者用七味白术散热结膀胱小便秘渴者用五苓散上焦虚热者用四君子汤膏粱积热者用清胃散脾胃积热者用泻黄散中气虚热者用异功散肾水虚热者用六味丸其余疳症发热各详本症胎稟所致者当各审其因若误用寒凉降火脾胃复伤则腹胀而为败症矣

治验

一小儿发热作渴用泻黄散大便重坠口角流涎仍欲泻火余曰鼻準青白多而黄色少属脾胃虚寒肝木所侮盖口角流涎胃气不能统摄也大便重坠脾气不能上升也不信另用凉剂果眉唇微动四肢微搐余曰此虚极而变慢脾风矣用六君当归木香炮姜钩藤鈎二剂益甚意欲更剂余曰此药力未及也仍以前药加附子一片服之即安去附子又二剂而愈

一小儿吐泻後患渴症饮食少思肌肉消瘦用七味白术散渴渐止五味异功散加升麻饮食渐进又用补中益气汤肌肉顿生

一小儿嗜膏粱甘味发热作渴小便白浊用四味肥儿丸佐以泻黄散稍愈复伤食吐泻服消食丸胃气复伤饮食少思肢体倦怠而渴先用七味白术散而渴止次用五味异功散而痊

一小儿?目色白患渴症唾痰发热服清热化痰之药大便洞泻小便频数此脾肾虚而复伤也朝用补中益气汤夕用四神丸诸症渐愈又佐以六味地黄丸而愈

一小儿十五岁用心太过两足发热日晡益甚服人参固本丸之类热益甚痰涎上涌体倦更唾痰服化痰滋陰之剂痰热益甚更头目眩运体倦少食请余治仍欲清热化痰滋陰余曰两足发热肾经陰虚也痰涎上涌肾不能摄也头目眩运胃气不能上升也此稟赋不足劳役过度而然耳遂朝用补中益气汤夕用加減八味丸元气渐复诸症渐愈但用心於功课即头运发热用前药即愈毕姻後诸症复作服前药半载而痊後再发更大小便牵痛用补中益气汤八味地黄丸独参汤而得生

竹叶石膏汤

石膏【一钱】半夏【三分】甘草人参【各二分】麦門冬【十粒】竹叶【一握】

右生姜汁一匙水煎服

三黄汤

黄芩 黄连 黄栢【各等分】

右水煎服

白虎汤【方见发热】

五苓散【方见五淋】

七味白术散【方见积滯】

四君子汤

六君子汤

清胃散

异功散

六味丸【方见肾脏】

四苓散【即五苓散去桂】

补中益气汤【方见虚羸】

四味肥儿丸【方见寒吐】

消食丸【方见呕吐乳】

四神丸【方见惊泻】

烦躁

仲景云火入於肺则烦入於肾则躁夫心者君火也火王则金燔水亏而火独存故肺肾合而为躁也活人云但烦热者虚烦也诸虚烦热与伤寒相似但不恶寒鼻不疼故知非伤寒也头不痛脉不紧故知非里寒也不可发汗攻下当与竹叶汤兼呕者与橘皮汤又心虚则先烦而後渴翕翕发热其脉浮紧而大是也盖烦者心中烦扰为内热故属阳躁者肢体躁动或裸身欲入井中为外热故属阴外热者无根之火也是以为虚在小儿当辨其啗煎不安是烦啗啗不定是躁啗煎者心经有热精神恍惚烦满生惊啗啗者心经有风烦燥惊搐也热甚者黄连解毒汤轻者导赤散风热者至宝丹脉数而实便闭有热者神芎丸此皆实热之治法也若烦而头痛短气口乾咽燥不渴者虚也用四君加芎归因药攻伐而作渴者用竹茹汤烦而不得眠者酸枣仁汤心神颠倒烦热欲吐者朱砂安神丸戴阳目内赤六脉洪大按之全无者血虚发躁用当归补血汤若躁而裸体欲入井中脉沉细或浮大按之如无者此皆阴盛发躁也宜用参附汤有回生之功

治验

一小儿烦躁惊悸热渴饮冷额间色赤此心经实热所致先用泻心汤一服稍缓又用柴胡栀子散而瘥一小儿痢後发热烦躁用四君当归升麻柴胡顿安又用补中益气汤而愈又伤食作泻前症复作吞酸先用异功散加吴茱萸木香为末二服吞酸悉止乃去茱萸木香治之而

安

一小儿溃疡烦躁惊搐撮空用六味地黄丸料煎服以滋肾肝用五味异功散以补脾肺渐愈又用八珍汤而痊

一小儿患癍疹服发汗之药烦躁作渴先用当归补血汤及东垣圣愈汤诸症渐安又用八珍汤加麦门冬五味子而愈

一小儿痢後烦躁作渴?赤脉大按之如无此血脱烦躁也先用当归补血汤又用五味异功散加升麻当归而安又伤食作泻不已复烦躁用异功散为主佐以八珍汤而安

一小儿患瘰癧服下毒之药发热烦躁口渴作呕此元气复伤用八珍汤倍加参芪归术治之渐安又用四君当归升麻而安

清热解毒丸治五脏积热毒气上攻胸臆烦闷咽喉肿痛赤眼壅肿头?发热唇口乾燥两颊生疮精神恍惚心忪闷乱坐卧不宁及伤暑毒?赤身热心烦躁而渴饮食不下

寒水石 石膏【各八两】 青黛【四两】

右研末入青黛和匀蒸饼七个水调为丸如芡实大每服一丸食後新汲水化下或细嚼生姜汤下如中诸毒并宜服之及惊风潮热痰涎壅塞心胸烦躁颊赤多渴坐卧不稳每服半粒量大小加減

橘皮汤

橘皮【一两五钱】 甘草【炙半两】 人参【二钱五分】 竹茹【半两】

右每服五钱姜水煎食前服

东垣圣愈汤治诸疮出血多而烦躁不得眠

?地黄【五分】 生地黄【五分】 川芎【五分】 人参【五分】 黄芪【一钱】 当归身【一钱】

右水煎服

泻心汤治心经实热口舌生疮烦躁发渴

宣黄连 犀角【各等分】

右水煎服

黄连解毒汤【方见诸痢】

竹茹汤【方见呕吐乳】

酸枣仁汤【方见惊癇】

朱砂安神丸【方见疳症】

神芎丸

至宝丹【二方见惊风】

导赤散【方见心脏】

异功散

四君子汤【二方见内钩】

注夏

脾为太陰位属坤土喜燥而恶湿故凡脾胃之气不足者遇长夏润溽之令则不能升举清阳健运中气又复少阳相火之时热伤元气则肢体怠惰不收两脚痿弱嗜卧发热精神不足饮食少思口中无味呼吸短乏气促目中视物??小便赤数大便不调名曰注夏此皆禀赋陰虚元气不足之症丹溪补陰论言之详矣育子者其可不知冬月养阳之道乎治法用补中益气汤去升麻柴胡加炒黑黄栢主之若因劳後发热血虚脉大者用当归补血汤气血两虚者八珍汤肝肾陰亏者地黄丸大便作泻者人参理中汤若乳母肝火乘脾寒热少食者柴胡梔子散胃火作渴者竹叶石膏汤小儿多因乳母之气不调而致当戒怒气调饮食适寒温则可以远病矣又如今人夏月皆以香薷汤浸冷代茶饮之殊不知香薷利水大损元阳厚朴剋伐大泻真气况脾性喜温而恶寒夏月陰盛於内冷啜伤脾若胃强有火湿热为病之人固无大害其脾胃虚弱中气不足者必为腹痛少食泄泻寒中之疾矣此大人亦所当戒者况小儿乎慎之慎之

治验

一小儿每春夏口乾发热怠惰嗜卧劳则头痛服清凉化痰之药喘泻烦躁不安服香薷饮脉大神思昏愦余用补中益气汤去升麻柴胡加五味麦门炮姜一剂未愈又加肉桂五分即苏更用六味地黄丸而愈

一小儿禀脾肾虚弱注夏发热二便不调朝用补中益气汤夕用地黄丸而愈後因乳母怒气致儿发热惊搐用柴胡栀子散母子并服而痊

一小儿素有食积注夏发热倦怠少食大便不实朝用五味异功散少加升麻柴胡夕用四肥儿丸而寻愈

一小儿禀赋肾虚患注夏之症因乳母太劳则发热益甚用补中益气汤令母子并服而愈後因乳母多食膏粱又患疮疾烦躁作渴先用竹叶石膏汤及补中益气汤将瘥母着怒气大热发搐用柴胡栀子散加味逍遥散而痊

一小儿注夏食生冷之物腹中作痛之甚则发搐厥冷用人参理中丸而愈

一女子年十四患注夏经行之後发热晡热烦躁作渴?赤脉洪大按之如无此血脱发躁先用当归补血汤四剂又用八珍汤而安

补中益气汤【方见虚羸】

当归补血汤【方见发热】

八珍汤【方见自汗】

地黄丸【方见肾脏】

人参理中汤【方见冷泻】

柴胡栀子散【方见急惊】

竹叶石膏汤【方见泄泻】

五味异功散【方见内伤】

四味肥儿丸【方见寒吐】

薛氏医案卷六十二

卷六十三

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六十三

明 薛己 订

保婴撮要十

自汗

自汗者汗无时而自出也经曰饮食饱甚汗出於胃惊而夺精汗出於心持重远行汗出於肾疾走恐惧汗出於肝摇体劳苦汗出於脾又曰陰虚而阳必腠则发热而自汗阳虚而陰必乘则发厥而自汗东垣云表虚自汗秋冬用桂春夏用黄芪丹溪云汗者心之液也自汗之症未有不由于心肾俱虚而得之者巢氏云虚劳病若阳气偏虚则津液发泄而为汗夫自汗为主阳之藏火也阳主气人身津液随其阳气所在之处而生亦随其火所扰之处而泄则为自汗矣治法当用参芪甘温益气之药使阳气外固而津液内藏则汗止矣若元气虚者夏月用六君子汤加山药山茱萸冬月用加減八味丸十全大补汤血虚者四物加参芪有热者当归六黄汤气血俱虚者十全大补汤心肾虚热者六味丸虚寒者八味丸心经血虚者归参汤胃经气虚者六君子汤饮食劳倦者补中益气汤嗜卧倦怠者升阳益胃汤热伤元气者清燥汤着干心胞络者清暑益气汤外伤风邪者惺惺散虚劳羸瘦者人参养荣汤思虑伤脾者归脾汤怒动肝火者小柴胡汤肝经虚热者加味逍遥散肝经湿热者龙胆泻肝汤泄泻脉微者人参理中汤手足汗者补中益气汤胸腹汗者四君子汤当心一片有汗者茯苓补心汤黄汗者茵陈五苓散血汗者血余散敷之此皆去汗之大法也仍推五脏相胜主之若汗出如油喘而不休此为命絕柔汗发黄此为脾絕汗出不流如贯珠者为絕汗数者并不治若六阳虚则汗出上至头下至项亦难治

治验

一小儿四岁因惊自汗左关无脉以此为忧余曰肝主惊此稟肝气不足因惊则气散脉必在臂腕於尺部尽处候之果得用补中益气汤六味地黄丸半载脉复本位其脉在合谷之间者皆自幼被惊而然也一小儿五岁因惊自汗发热虚症悉具右寸脉短此胃气复伤也用独参汤月余又用补中益气汤仍佐以六君子及加味地黄汤半载而愈

一小儿自汗目直项强顿闷余谓肝经实热先用柴胡栀子散随用六味地黄丸而愈後因惊

自汗咬牙呵欠属肝经虚热生风用六味地黄丸补中益气汤而痊後又惊自汗怔忡?赤发热悉属肝经虚热用六味丸而愈

一小儿自汗?青善怒小便频数睡间惊悸或发搐目直此肝火血燥生风也先用加味四物汤加味逍遥散各四剂与间服诸症渐愈又用四君山栀而愈一小儿自汗盗汗颈间结核两目连劓此兼肝脾痞症也用四味肥儿丸及大芩薤汤而痊後每伤食发热便血自汗用五味异功散加升麻柴胡渐愈又用六味地黄丸而痊

一女子十四岁自汗寒热月经先期余谓肝火血热用加味逍遥散地黄丸而痊後因怒经行不止自汗盗汗先用加味小柴胡汤次用加味逍遥散而愈一小儿自汗叫哭发热作渴饮水抽搐仰睡乃心经实热也用导赤散治之而愈後又自汗发热饮汤抽搐无力惊窜咬牙覆睡?赤心经虚热也用茯苓补心汤而愈

一小儿自汗恶风用补中益气汤加炒浮麦而止因饮食停滞患吐泻用六子汤而愈又用四君当归浮麦而汗止出痘时自汗盗汗用十全大补汤而痘愈後因伤风咳 自汗腹胀余谓脾肺俱虚宜用六君桔梗因惑於人言先服发表之剂更加气喘盗汗余用四君五味子炮姜四剂不应每剂又加人参五钱炮姜一钱稍止又三剂而痊

十全大补汤治诸虚不足自汗不食时发潮热等症白茯苓 人参 当归 白术 白芍药【炒】 黄芪【炒】 川芎 肉桂?地黄 甘草【炒各等分】

右三五钱姜枣水煎服

八珍汤【前方去肉桂黄芪治验见各门】

人参养荣汤治病後时自汗或发潮热口乾食少心虚惊悸欬而下利前方去川芎加陈皮五味子远志

百解散治感冒风邪发热自汗者

荆芥 白芷 麻黄【去节】 陈皮 苍术

甘草【炒各三分】

右姜三片葱白三根水煎服

清暑益气汤治暑邪干卫身热自汗

黄芪【一钱】 苍术【泔浸去皮一钱】 升麻【七分】 人参

白术 陈皮【炒】 神麴【炒】 泽泻【各五分】

甘草【炙】 黄蘗【酒浸炒】 当归身 麦门冬【去心】

青皮【炒】 葛根【各三分】 五味子【九粒杵】

右水煎服

茵陈五苓散治伏暑发黄烦渴小便不利

赤茯苓 猪苓 泽泻 白术 茵陈【各三分】

右水煎服

血余散治汗不止

用男子乱髮一握煨存性为细末以绢袋盛置乾扑之

清燥汤治小儿自汗或因热伤元气大小便秘澁黄芪【炒】 苍术【各五分】 白术【三分】 陈皮【三分】 白茯苓【三分】 泽泻【三分】 人参【三分】 麦门冬【三分】 生地黄【三分】 升麻【三分】 当归身【三分】 神麴【炒三分】 猪苓【三分】 黄栢【酒炒三分】 黄连【炒】 甘草【炙各二分】 五味子【五粒杵】

右姜一片水一鍾煎服

升阳益胃汤【方见诸痢】

六君子汤

加味归脾汤

四君子汤

加味逍遥散

五味异功散【五方见内钩】

柴胡栀子散【方见发热】

小柴胡汤【方见肝脏】

补中益气汤【方见虚羸】

龙胆泻肝汤

人参理中汤

茯苓补心汤【三方见痞】

团参汤

当归六黄汤【二方见盗汗】

惺惺散

四物汤【二方见急惊】

六味丸

加味八味丸【即六味丸加肉桂五味子方见肾脏】

四味肥儿丸【方见寒吐】

大茺萸汤【方见痞症】

导赤散【方见心脏】

盗汗

盗汗者睡则汗出寤则汗收也自汗属阳虚盗汗属陰虚盖阳为卫气陰为荣血血之所主心也所藏肝也热转於心故液不能内敛而外泄於皮肤人卧则静而为陰觉则动而为阳故曰自汗属阳盗汗属陰也多因心肾不交水火不能既济肾虚则闭藏之令失守故有是症宜用六味丸十全大补汤血虚内热者当归六黄汤心经有热者导赤肝经虚热者六味地黄丸血脱盗汗者当归补血汤肝胆风热者柴胡清肝散食积内热者二陈枳实山梔胃气虚热者六君子汤及浮麦散血气俱虚者人参养荣汤余症见自汗当参览之

治验

一小儿十一岁面色青白或恶寒发热鼻间黄白盗汗自汗胸膈不利饮食少思常怀畏惧用二陈黄连酸枣茯神之类不应余以为脾肺俱虚不信自用朱砂安神丸更寒热往来泄泻不食余用六君当归黄芪而愈

一小儿五岁腹中作痛大便不实患盗汗鼻间左腮皆白此脾肺气虚而食积所致也用六君山查神?四剂腹痛顿止去查?又四剂大便调和乃用四君归芪而汗止

一小儿十二岁患盗汗形气瘦弱面色或赤或白右颧白两颊赤鼻间微青此禀足三阴经虚也朝用补中益气汤夕用六味地黄丸而愈

一小儿久患盗汗夜热昼凉饮食少思大便酸臭此食积内作也先用三?散消导积滞又用五味异功散补脾进食而痊

一女子十四岁自汗寒热肝脉弦洪此肝火所致用加味逍遥散而愈後饮食停滞吐痰眩运头?不时汗出两寸脉不及本位用补中益气汤加半夏蔓荆子而痊

一小儿三岁盗汗不食闻药即呕此胃气伤也用浮麦炒为末以乳调服钱许旬余呕止食进佐以六君子汤而愈

一小儿发热呵欠顿闷咬牙至夜盗汗属肝胆火症用小柴胡汤加山栀二剂又用地黄丸料煎服而愈一小儿盗汗甚多久不愈寸口脉沉伏饮食少思稍多食则腹痛汗不止余谓脾虚食积用六君升麻柴胡月余脾气渐健饮食渐加汗亦少止乃佐以异功散而痊

一小儿苦盗汗肢体消瘦因功课劳役更加自汗余用补中益气十全大补二汤而愈次年因劳心前症复作更加梦遗仍用前二汤各五十余剂而愈毕姻後前症俱作手足并冷前药又各加姜桂一钱数剂少应至六十余剂而愈因大劳盗汗如雨手足如水再以前二药加桂附各一钱数剂方愈

当归六黄汤治血虚盗汗内热晡热者

当归 熟地黄【各五分】 黄连【炒黑三分】 生地黄【炒一钱】 黄柏【炒黑】 黄芩【炒黑各三分】 黄芪【炒五分】

右水煎服

团参汤治虚汗盗汗

新罗人参【三两】 当归【三钱】

右为末用雄猪心一个切三片每服以猪心一片煎汤调服二钱

白术散治自汗盗汗

白术【三两】小麦【一合炒】

右用水一钟半煮乾去麦为末以炒黄芪煎汤量儿大小调服忌萝卜辛辣炙博之类乳母尤忌

六味地黄丸【方见肾脏】

人参养荣汤

十全大补汤【二方见自汗】

导赤散【方见心脏】

柴胡清肝散

当归补血汤【二方见发热】

二陈汤【方见寒吐】

六君子汤

四君子汤

五味异功散

加味逍遥散【四方见内钩】

小柴胡汤【方见肝症】

三棱散【方见白浊】

补中益气汤【方见虚羸】

噫气

经曰脾病则面黄善噫噫者寒气客於胃厥逆从下上散复出於胃而为噫又善思善味其症当脐有动气按之牢若痛其病腹胀满食不消体重节痛怠惰嗜卧四肢不收经曰脾主四肢有是者脾也又曰二阳一陰发病主惊骇背痛善噫何谓也窃谓上焦受气於中焦中焦气未和不能消谷故为噫耳中焦亦脾胃之分也脾土虚寒由命门火衰不能温蒸水谷古人有服兔丝子旬日间饮食如汤沃雪亦此义也补脾宜人参理中汤补右肾宜用八味丸胃气虚不能运化水谷者六君子加木香鬱结伤脾者加味归脾汤木尅土者四君柴胡升麻兼嘈襍者加吴茱萸半夏治者审之

治验【仍参虚羸症】

一小儿禀赋虚羸时常作痢年十三岁泄泻不食手足并冷诸药不应余谓命门火衰六君子汤八味丸治之寻愈毕姻後劳心过甚饮食顿少发热下气先用参术各五钱姜枣煎服诸症稍愈又用六君子汤加炮姜肉桂参术各一两一剂诸症顿愈又因劳心发热烦渴用补中益气汤加附子一钱渴止用参芪各一两归术各五钱附子一钱三剂全瘥

一小儿十五岁喜噫面黄腹胀饮食难化用六君益智木香渐愈後因怒兼脇痛少食下气噫气用补中益气汤加附子益智渐愈後饮食过多腹胀吞酸服保和丸热渴痰甚用二陈黄连石膏之剂大便不止吃逆不食手足并冷余用六君附子四剂稍愈又以补中益气汤加附子及八味丸而遂安

一女子十九岁患前症用六君子汤送四味茱萸丸而愈但怒即发服此药亦即愈後因怒气劳役前症复作血崩不止先用柴胡梔子散一剂随用补中益气汤加山梔而痊仍参虚羸治验

本事枳殼散治心下痞闷或作痛多噫

枳殼 白术【各半两】?榔【三钱】 香附子【炒一两】

右为末每服一钱空心米饮调下

四味茱萸丸治腹胀噫气吞酸食不能化

吴茱萸炒黄连【炒】 神? 荷叶【各等分】

右为末水煮神?糊丸桐子大每服二十丸白汤下黄连当量病微甚或炒黑炒黄用之

八味丸【即六味丸加五味子肉桂方见肾脏】

四君子汤

六君子汤

加味归脾汤【三方见内钩】

补中益气汤【方见虚羸】

下气

刘河间云肠胃鬱结谷气内发而不能宣通於肠胃之外故喜噫下气也若癰痼劳瘵气下泄而不止者必死乃真气竭絶腠理闭塞谷气不能宣通於肠胃之外故从肠胃中泄出委全善云下气属心虚经云夏脉者心也心脉不及下气为泄者是也经又云饮食入胃游溢精气上输於脾脾气散精上归於肺通调水道下输膀胱水精四布五经并行此平人也若七情内伤六淫外侵饮食不节房劳过度致脾土之陰受伤转运之官失职不能输化故下气也又曰陰精所奉其人壽阳精所降其人夭陰精者乃五谷之精上荣心肺以降肾肝故曰其人壽阳精者乃胃中之清气陷入肾肝不能升浮上输心肺故曰其人夭若饮食过多肠胃鬱结用平胃散癰痼劳瘵者用补心丸及人参理中汤若下泄不已者不治

治验

一小儿饮食素所不节又食蔽气之物肠胃秘结小便不利而患此以平胃散後用理中汤而愈

一小儿年十五岁劳心太过饮食顿减发热下气先用参术各五钱姜枣煎服诸症稍愈

一女子素稟虚弱後又劳心女工发热烦渴下气余用补中益气汤加附子又用参芪各一两归术各五钱附子一钱三剂全瘥

一小儿十四岁因怒脇痛少食患此用补中益气汤加附子一钱益志一钱而渐愈後因饮食过多腹胀吞酸噫气以保和丸服之热渴痰甚又以二陈汤加黄连石膏之剂大便不止呕逆不食手足并冷余用六君子汤加附子一钱四剂稍愈又以补中益气汤加附子一钱兼服八味丸而遂安

一女子患前症余用六君子汤送四味茱萸丸而愈但因怒气相触前症即发即服前二汤丸其病寻愈後因甚怒兼劳役太过前症复作更又血崩不止余先用柴胡梔子散一剂随用补中益气汤加山梔而痊

一小儿脾土虚寒患此余以人参理中汤加兔丝子一钱以补脾气四剂又以六君汤而安後因劳心功课发热烦渴前症益甚又用柴胡梔子散兼以补中益气汤而愈

一女子年十六患此先用参术之药不应用六君子汤送四味茱连丸而愈後又因怒气劳役前症益甚更兼发热用柴胡栀子散二剂随以补中益气汤而痊

平胃散【方见虚寒】

补心汤【方见瘡】

补心丸【即茯神散为丸方见惊悸】

补中益气汤【方见虚羸】

人参理中汤【方见惊泻】

越鞠丸

六君子汤

加味归脾汤

加味逍遥散【四方见内钩】

本事枳殼散【方见前症】

柴胡栀子散【方见发热】

四味茱连丸【方见噫气】

八味地黄丸【方见肾脏六味丸加肉桂附子】

不寐

经曰阳明胃脉也胃者六腑之海其气亦下行阳明逆不得从其道故不得卧也又曰胃不和则卧不安夫人身之卫气昼则行於阳夜则行於陰阳主动陰主静寤则魂魄志意散於府藏发於耳目动於肢体而为人身指使之用寐则神气各归五官而为默运之妙矣若脾胃气盛则腑脏调和和水谷之精各各融化以为平和之气若胃气一逆则气血不得其宜腑脏不得其所不寐之症由此生焉当用四君远志酸枣仁肝肾虚热者六味丸心血不足者真珠母丸思虑过度者归脾汤精神短乏者人参养荣汤病後余热者酸枣仁汤胆虚不得眠者人参竹叶汤肝火不寧者加味小柴胡汤振悸不得眠者四君生姜酸枣仁夜啼惊哭不寐各详别症当参求之

治验

一小儿患疮溃後饮食少思倦怠不寐先用四君茯神当归陈皮饮食顿加乃佐以八珍散为末时服钱许渐得寐又因惊汗出发热不寐用异功散加柴胡山栀汗热顿止仍服四君八珍之药得寐又饮食停滞腹痛吐痰不寐汗出用六君柴胡升麻山查而安一小儿十四岁勤於功课彻夜不寐饮食无味早间用补中益气汤午後用异功散饮食渐有味夜稍得寐仍用补中益气汤八珍汤而愈毕姻後不寐兼遗精盗汗用补中益气汤六味地黄丸而愈

一小儿痢後不食少寐或兼盗汗先用异功散加升麻当归饮食渐进佐以补中益气汤稍得寐四年後因用心记诵自汗不寐饮食甚少用补中益气汤加味异功散而愈

一女子十七岁丧母过哀不寐发热或寒热此脾血虚而火动也用加味逍遥散加味归脾汤治之寻愈後因饮食怒气不寐腹痛先用六君柴胡升麻而痛止仍用前二药而得寐

仲景酸枣汤治虚劳虚烦不得眠

甘草【五分】知母【炒五分】白茯苓【五分】芎藭【五分】生姜【五分】酸枣仁【炒一钱】

右水煎服

本事鳖甲丸治胆虚不得眠四肢无力

鳖甲 酸枣仁【炒】羌活 黄芪【炒】牛膝【酒炒】

人参【各一两】五味子

右水煎服

秘旨安神丸治心虚而不寐或睡中惊悸或受惊吓而作

人参 半夏【汤泡】酸枣仁【炒】茯神【各一钱】当归【酒洗】橘红 赤芍药【炒各七分】甘草【炙三分】五味子【杵五粒】

右为末姜汁糊丸芡实大每服一丸生姜汤下

人参养荣汤治脾肺俱虚发热恶寒肢体瘦倦食少口乾欬而泻痢惊悸自汗不寐等症

人参 陈皮 黄芪【密炙】桂心 当归 白术 甘草【炙各一钱】白芍药【钱半】?地黄【七

分】五味子【杵炒七分】远志【五分】

右每服二三钱姜枣水煎

四君子汤

六味丸【二方见肾脏】

归脾汤【方见内钩】

人参竹叶汤

加味小柴胡汤【二方见肝症】

八珍散

异功散

六君子汤

补中益气汤【四方见虚羸】

加味逍遥散

加味异功散

八珍汤【三方见内钩】

惊悸

惊悸者心神恐惧邪气乘心也目睛不转口不能言诊其脉动而弱者动则为惊弱则为悸哭而不啼多泪是也宜急调治否则他症随之用四物安神之类丹溪谓亦有属痰者宜用温胆汤加辰砂远志之类若思虑便动虚也用养心汤时作时止痰也用茯苓丸触事易惊心胆虚怯也用温胆汤卧惊多魔血不归源也用真珠母丸梦寐不宁肝魂失守也用定志丸恐惧不能独处胆气虚冷也用茯神汤睡卧烦躁胆气实热也用酸枣仁丸眩运惊悸风痰内作也用本事辰砂远志丸思虑鬱结脾虚气滞用归脾汤前症虽曰属心与肝而血之所统实主於脾脾之志曰思思虑多则血耗损而不能滋养於肝心者脾使之也思虑内动未尝有不役其心者夫心为君火之藏十二官之主也夫君之德不怒而威无为而治故宜镇之以静谧戒之以妄动动则相火翕合煽烁陰精精血既亏则火空独发是以惊悸怔忡之所由生五志之火所

不能制者矣故治脾者不可不知养心养心者不可不知镇静而寡慾然人孰无思也思之正则无妄动之慾矣朱子曰必使道心常为一身之主而人心每聽命焉此善於养心者也

治验

一女子素血虚惊悸出嫁後更怔忡晡热月经过期用八珍汤加远志山药酸枣仁三十余剂渐愈佐以归脾汤全愈後因劳怒适经行不止前症复作先用加味逍遥散热退经止又用养心汤而痊

一小儿十五岁彻夜用功记诵去後少寐仍不戒劳患怔忡发热不止用归脾为主佐以八珍汤诸症渐愈後复作服归脾定志二药即愈

一小儿十五岁因用心太过少寐惊悸怔忡恶寒先用补中益气汤茯苓酸枣仁远志恶寒渐止又用加味归脾汤惊悸稍安又用养心汤而痊

一小儿惊悸睡卧不安发热饮冷用治要茯苓散而愈又因劳役恚怒发热吐痰自汗用温胆汤二剂而安又用归脾汤寧志丸而愈

一小儿十三岁善思多忧体倦发热心怀畏惧必多人相伴乃止用茯神汤佐以归脾汤两月余渐愈毕姻後前症复作加寒热头运先用前二汤而惊悸愈後用十全大补汤补中益气汤诸症渐愈後因科举入場劳役朝寒暮热自服前二汤各三十余剂不应时仲秋脉虚大按之微细面白腹痛亦用前方倍加肉桂乾姜四剂亦不应遂以八味丸料煎服四剂稍缓又四剂渐愈乃八味丸十全大补汤而安

一女子十五岁性沉静被盗所恐遂惊悸腹脇胀痛寒热往来不食无寐善思恐惧用酸枣仁丸归脾汤加味逍遥散而寻愈出嫁後丧子兼大劳惊悸无寐吐痰发热饮食少思胸腹膨胀服化痰药日吐痰四五碗时考绩至京请治余谓脾肺虚寒不能摄涎化食而为痰也用六君乾姜六剂其痰益甚手足并冷用前药每加附子一钱仍不应乃用人参一两附子二钱四剂始稍缓又二剂仍用六君加姜附各五分数剂後易桂治之而愈

温胆汤治心胆虚怯触事易惊或梦寐不祥遂致心惊胆摄气鬱生涎涎与气转变生诸症或短气悸乏或复自汗胆虚不能制脾则脾之水饮作矣

白茯苓【一两五钱】半夏【汤洗二两】甘草【炙一两】枳实【麸炒二两】竹茹【二两】橘皮【去白二两】

右每服四钱水一盞半姜五片枣一枚煎七分食前服

寧志丸治心虚多惊若有痰宜吐之

人参 白茯苓 茯神 栝子仁 琥珀
当归 酸枣仁【温酒浸半日去壳】远志【炒各半两】乳香 朱砂 石菖蒲【各三钱】

右为末蜜丸桐子大每服三十丸食後枣汤下

茯神散治五脏气血虚弱惊悸怔忡宜用此安神定志茯神【去木】人参
龙齿【另研】远志【去心】桂心 防风 独活 酸枣仁 细辛
白术【炒各三钱】乾姜【炮三两】

右为末每服四五钱水煎服蜜丸亦可

治要茯苓补心汤治心气不足喜悲愁怒衄血面黄五心烦热或咽喉间作痛舌本作强【方见瘡】

茯神汤治胆气虚冷头痛目眩心神恐畏不能独处胸中烦闷

茯神【去木】酸枣仁【炒】黄芩【炒】梔子仁【炒】白芍药【炒】五味子【杵炒】
桂心 熟地【自制】人参【各一两】甘草【五钱炒】

右每服五钱姜水煎

酸枣仁丸治胆气实热不得睡卧神志不安惊悸怔忡茯神【去木】酸枣仁【炒】远志【去心】栝子仁【炒】防风【各一两】枳壳【炒五钱】青竹茹【钱半】生地黄【杵膏五钱】

右为末蜜丸梧子大每服七八十丸滚汤下

定志丸治心神虚怯所患同前或语言鬼怪喜笑惊悸人参 茯苓【各一两半】菖蒲
远志【去心各一两】

右为末蜜丸如前服

治要茯苓散治心经实热口乾烦渴眠卧不得心神恍惚茯神【两】麦门冬【两半】通草
升麻【各一两二钱半】紫苑【七钱五分】桂心【七钱五分】知母【一两】大枣【十二枚】淡竹茹【五钱】赤石脂【一两七钱五分】

右每服一两水煎

朱雀丸治心病怔忡不止

白茯苓【二两】沉香【半两】

右为末蜜丸小豆大每服三十丸人参煎汤下

世传蜜陀僧散治惊气入心络不能语者昔有人为狼及犬蛇所惊皆以此而安

蜜陀僧【研极细末如粉】

右茶清调一钱七分

丹溪朱砂丸治劳役心跳

朱砂 当归身 白芍药 侧柏叶【各二钱】川芎 陈皮 甘草 黄连【炒各一钱五分】

右用猪心血为丸粟米大每服百丸龙眼汤下

本事辰砂远志丸消风化痰镇心安神

人参 石菖蒲【去毛】远志【去心】茯神【各一两】川芎 山药 白附子 麦门冬 细辛 铁粉 辰砂【各五钱】

右为末用生姜汁入水糊丸菉豆大以朱砂为衣每服一二十丸临睡生姜汤下

归脾汤

六君子汤

加味逍遥散【三方见内钩】

补中益气汤方【见虚羸】

真珠母丸【方见不寐】

十全大补汤

八珍汤【二方见自汗】

养心汤【方见惊癇】

吞酸

吞酸之症有二热与寒也经曰诸呕吐酸皆属於热东垣曰病机作热攻之误矣浊气不降寒药岂能治之二说似乎矛盾而实一也素问言热者所以指其末也东垣言寒者所以指其本也丹溪用吴茱萸之法亦尝谓之寒矣然亦当分其虚实而治之若烦热作渴好食啖物饮食易化是为实火内炽而胃经热也宜用清凉饮之类若不渴喜食热物饮食难化是为虚火所致而胃经寒也宜用香砂六君子汤之类故东垣云邪热不杀谷苟误认为实热槩用寒凉之剂而变为中满呕吐反胃之症者皆未传寒中之败症也可不慎欤

治验

一小儿吞酸用六君子汤而愈後伤食复作兼泻先用五味异功散加升麻乾姜泻顿止又以六君子煎送四味茱萸丸而愈

一小儿吞酸暖腐发热口渴先用保和丸二服以消宿滞又用六君木香乾姜以温养中气而愈後伤冷粉腹胀痛余用异功散加乾姜诸症渐愈用补中益气汤加木香将愈又伤食吞酸腹痛用六君木香二剂痛止又四剂而愈

一小儿吞酸喘 腹胀面白兼青余谓脾肺之气虚先用补中益气汤加茯苓半夏二剂喘胀悉愈又用六君子汤及五味异功散而愈

一小儿十三岁吞酸每食碗许稍多则泻或腹胀面色黄或青白此乃肺虚肝木所胜用六君乾姜柴胡升麻间佐以补中益气汤而痊毕姻後兼勤於功课仍吞酸唾痰服清热药大便不实嗜卧少食而似肉痿用前药各百余剂而痊

一女子吞酸唾痰恪用清气化痰之药余谓属中气虚不信後觉肚腹胀肿大小便淋?而歿

六君子汤【加木香砂仁名香砂六君子汤】

异功散【二方见内钩】

补中益气汤

保和丸【二方见虚羸】

四味茱萸连丸【方见噫气】

脾弱多困

丹溪云脾具坤静之德而有乾健之运夫胃阳也主气脾陰也主血胃司纳受脾司运化一纳一运化生精气清气上升糟粕下降纳五谷化津液其清者为荣浊者为卫陰阳得此谓之橐龠故东垣以脾胃为五脏之根本也脾气既弱则健运之令不行化生之功已失职而嗜卧多困所由生焉法当温补其脾脾气既旺则脏腑清阳之气升举易於运行又何困倦之有海藏用四君子加木香半夏白术倍之姜枣煎服诚良法也若脾虚好睡多惊则是心血虚而火动之宜安神养血若因心脾气虚有痰者宜用人参五味子茯苓以补心气当归芍药酸枣仁以养心血橘红半夏以开痰若因脾肺气虚胸膈有痰用补中益气汤以健脾胃胆星天竺丸以化痰涎若饮食停滞而作用四君子汤以益脾土山查神?以消饮食若因脾虚而好睡用五味异功散以补脾气当归芍药以生脾血芍药须用酒拌炒黄不则酸寒伤脾此假热以对假寒也若乳母饮酒致儿昏醉好睡者以乾姜陈皮煎汤解之不应异功散加乾葛即愈矣

治验

杨永兴子年七岁嗜卧兼惊久不愈余曰好睡是脾气虚困也善惊是心血虚怯也此心火不能生脾土子母俱病用补中益气汤及六味地黄丸加鹿茸而愈

一小儿因母醉後饮乳困睡不醒遍身如丹瘤先君谓酒毒为患用葛花解醒汤令子母俱服之而愈一小儿病後嗜卧饮食少思面色痿黄中隐青色用五味异功散加柴胡升麻为末每服钱许日二三次月余稍愈又饮食过多更患呕吐手足并冷饮食顿减先用六君子汤加升麻柴胡木香乾姜二剂诸症渐愈又用补中益气汤为末日服二三次月余而安一小儿九岁患痢後嗜卧唾痰服化痰药生痰益甚而卧床三年矣面色痿黄兼白或时青赤右关脉微细左关脉弦数余谓肝火乘脾用六君升麻柴胡三十余剂而稍健乃以补中益气汤间服又各三十余剂而少坐又五十余剂而痊

一女子十一岁患痢後嗜卧唾痰饮食难化胸腹膨胀服化痰利气之剂益甚余谓悉属脾胃气虚而饮食化痰也朝用补中益气汤夕用五味异功散两月而愈又伤食吐泻用六君子汤月余不应乃以人参五钱乾姜五分姜枣煎服百余剂始应仍用补中益气汤异功散而痊

胆星天竺丸治小儿痰涎上壅喘 不休

牛胆南星【一两】 半夏【汤泡去皮脐姜汁制】

白附子【汤泡去皮脐各五钱】天竺黄【三钱】 天麻 防风 辰砂【一钱另研水飞】

右为末甘草汤为丸芡实大每服一丸空心薄荷淡姜汤化下

五味异功散

六君子汤

四君子汤【三方见内钩】

补中益气汤【方见虚羸】

六味地黄丸【方见肾脏】

葛花解醒汤【方见热吐】

寻衣撮空

寻衣撮空许叔微谓之肝热夫肝主筋筋脉血枯而风引之故手指为之撮敛也宜确服六味地黄丸间有回生之功钱仲阳用泻青丸此治肝经实热盖寻衣撮空皆病後之败症耳求其实热则百无一二矣治者审之王海藏治血脱寻衣撮空摸床手扬摇头错语失神脉弦浮而虚血脱内躁热之极也气粗鼻乾此为难治用生地黄黄连汤主之

治验

王少参孙女年十二岁脾胃素弱後成疳症发热小腹膨胀坚直大便溏泻气喘咳 彻夜烦躁不睡鼻塞眼暗谵语其脉大而无根用人参一两附子三分腹胀渐减脉渐敛然犹寻衣撮空鼻孔出血用六味地黄丸料二服如脱乃昼服独参姜附汤及服地黄丸料脉渐有根诸症渐愈又用六君子补中益气汤而痊【详见发热】

一小儿停食夜惊腹痛服消食丸泻数次寻衣撮空面青黄或色白此脾土受伤肺金休囚肝火旺而然耳先用异功散加升麻以补脾土用六味地黄丸料以滋肝血稍定各二剂渐愈却用补中益气汤六味地黄丸间以异功散而痊

一小儿受惊骇恪服镇惊化痰等药忽患前症眼上面痿黄或兼青赤此肝经陰血虚阳气旺而生风耳当滋肝肾益脾肺遂用异功散而痊

一小儿面痿黄患瘰?忽发面色青赤此脾气虚木火相抟而为患也用补中益气汤佐以柴胡山梔散二服加味逍遥散三服诸症渐退又以地黄丸而遂痊

一小儿流注出脓甚多患前症此元气虚弱内热而变耳用八珍汤异功散各数剂方稍缓又数剂而安又补中益气汤而愈

一小儿膝痛误触其膝出血甚多患前症恶寒面白此阳随陰散而虚寒用十全大补汤加附子三分四剂未应用人参一两附子五分姜枣煎服稍退又二剂顿退乃朝用异功散夕用八珍汤而安

一小儿伤风表汗後患前症恶风面白手足冷用补中益气汤五味子汗顿止而诸症渐退又用四剂而安乃十全大补汤而愈

生地黄连汤治血脱寻衣撮空摇头妄语

赤芍药 梔子 黄芩 黄连【各三钱】 生地黄 川芎 当归【各七钱】 防风【一钱五分】

右每服三钱水煎服

加味逍遥散

异功散

六君子汤【三方见内钩】

地黄丸【方见肾脏】

补中益气汤【方见虚羸】

柴胡梔子散【方见发热】

泻青丸【方见肝脏】

八珍汤【四物四君二汤合用】

十全大补汤【方见自汗】

喜笑不休

经曰心藏神有余则笑不休又曰在脏为心在声为笑在志为喜又火大过曰赫曦赫曦之纪其病笑谵狂妄又云少陰所至为喜笑又云精气并於心则喜此数者皆言属心火也若笑不休呻而为腹痛此水乘於火陰擊於阳阳伏热生狂妄谵语不可闻心之损矣扁鹊云其人唇口赤色者可治青黑者死若肾水亏涸不胜心火而喜笑不休者用六味地黄丸肝火炽盛能生心火而喜笑不休者用柴胡清肝散余兼别症各从其症而参治之

治验

一小儿喜笑常作不安面赤饮冷手足并热先用黄连泻心汤未二服稍定又用六味地黄丸料煎服顿愈常服此丸则安月许不服仍前复作又服愈矣一小儿患前症面青赤此肝心二

经风热所致也用柴胡栀子散六味地黄丸渐愈又因乳母大怒发热先用加味柴胡汤又用加味逍遥散母子服之并愈一小儿患前症因乳母大怒患血崩寒热先用加味逍遥散一剂用当归补血汤三剂如此治之各数剂母子并愈

一小儿年十四岁用心过度饮食失节患喜笑不休脉洪大而虚面色赤而或白余用补中益气汤而愈次秋科举饮食劳倦前症复作或兼谵语洪大按之微细如无用人参一两姜枣煎服稍定又三剂而愈又劳役用心自汗作渴烦躁似癰症先用当归补血汤二剂顿安又十全大补汤而寻愈

一女子十六岁面色痿黄素沉静喜笑不休月经先期用柴胡栀子散加味逍遥散而愈次年出嫁不时复作但作时面赤勇力发後面黄体倦朝用补中益气汤夕用加味逍遥散而愈後每发悉用前药即愈

当归补血汤

柴胡栀子散

柴胡清肝散【二方见发热】

黄连泻心汤【方见烦躁】

地黄丸【方见肾脏】

薛氏医案卷六十三

卷六十四

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六十四

明 薛己 订

保婴撮要丸

肿疡

肿疡者以疮疡未溃而言也经云形伤痛气伤肿又云荣气不从逆於肉里乃生痈肿皆因稟受胎毒或乳母膏粱厚味七情阴火或儿食炙?甘美积毒气血不和所致当分其经络所属五脏相胜与元稟亏损预为审用攻补调和之剂速令散溃尤当审其势之肿漫色之赤白与痛有微甚毒有表里若肿高焮痛便利调和邪在表也宜表散之肿硬痛深大便秘澁邪在内也宜下之外无拘急内则便利调和者邪在经络也宜调荣卫肿焮大痛或麻木不痛邪气凝滞也用隔蒜灸及活命饮若烦躁饮冷赤痛发热二便不通者火热内炽也用清凉饮活命饮加大黄尤善若微肿微痛或不痛阳气虚弱也用参芪托里散微黯微赤或不赤阳气虚寒也用加味托里散若恶寒而不作脓若脓熟而不溃者阳气虚也用加味托里散如此则未成者自能消散已成者自能溃腐尤当别其属阴属阳或半阴半阳而治之若泥於肿?禁用辛热之说不分受症之因兼症之经槩行败毒泛扰诸经诛伐无过以致不能起发或不能腐溃收敛变症莫能枚举痈疽论云肿?内外皆壅宜以托里表散为主但见肿痛参之脉症虚弱便与滋补气血无亏可保终吉婴儿有疾兼调其母若肿疡之际治失其法必致溃疡之变症此推内经之微旨而生平之徵验者尤当触类而长愚奚庸赘

溃?

溃疡者以疮疡肿溃而言也脓溃而肿消痛止者为顺若脓溃肿痛或发寒热者气血虚也用十全大补汤脓溃欲呕少食脾胃虚弱也用六君炮姜手足并冷者脾气虚寒也用六君姜桂如不应急加附子脓溃而仍痛或二便秘澁者热毒未解也用清热消毒散热退而渴不退津液不足也用八珍加黄芪麦门山茱萸热止而小便频数肾虚也用加减八味丸料若热不止或肿痛反甚虚热内作也用人参黄芪汤或热退而肌肉不生者气血俱虚也用十全大补汤疮色大白或陷下不敛寒气所袭也用五味异功散佐以豆?饼脓血过多烦躁不安乃亡阳也急用独参汤尤当审其肿之软硬饮食冷热与脓之稀稠多少肉之赤色微甚青黯及疮口之收敛迟速而投托里消毒调补之剂庶无变症痈疽论云溃疡内外皆虚宜以托里补接为主

盖溃疡之变症因由於肿疡之际治失其宜亏损元气之所致治者可不慎哉

胎毒发丹

胎毒发丹者因胎毒内伏或频浴热汤或着烘衣或乳母饮食七情内热助邪为患发头面四肢延及胸腹色赤游走不定古人云从四肢起入腹囊者皆不治当急令人随患处遍吮毒血各聚一处砭出之急服活命饮惟百日内忌砭以其肌肉难任也若发散过剂表虚热而赤不退者用补中益气汤加防风白芷寒凉过剂胃气受伤而热赤不退者用异功散加柴胡升麻或兼发搐等症用四君升麻当归钩藤钩若复行攻毒必致不起头额间患者当卧鎌砭之

史少参孙二岁丙申正月陰囊赤肿余作胎毒治瘥後患发热痰盛等症诊其母有郁火血热用解郁凉血之药子母俱服而愈至六月初患吐泻两眼瞤动或投参朮之类不应以为慢惊欲用附子药请余议视其寅卯关脉赤此属风热伤脾用柴胡清肝散加钩藤钩木贼草一剂即愈丁酉正月初旬颈患热毒脓出贴药忽暴风启户即时发热翌日头面黯肿如斗两耳厚寸许此风邪上攻血得热而沸腾也急砭两额出黑血三盏许随用清热化毒汤黯肿十退七八翌日复砭则血不甚黑矣仍以前药去牛蒡子加熟地黄而愈此症若不行砭法或作破伤风治必死

一小儿四肢患之外势虽轻内则大便秘结此患在臟也服大连翘饮敷神效散而瘥

一小儿患之赤晕走彻遍身难以悉砭令人吮四肢胸背数处使毒血各凝聚而砭之先用活命饮末酒调二服又以金银花甘草节为末用人乳汁调服渐愈月余後两足皆肿仍砭之服前药而瘥数日後两足复赤或用犀角解毒丸之类致乳食不进肚腹膨胀此复伤脾胃而然也敷神功散服补中益气汤加茯苓而瘥一小儿腿如霞片游走不定先以麻油涂患处砭出恶血其毒即散用九味解毒散而安

一小儿臂患之砭出毒血而愈惑於人言服护心散以杜後患服之吐泻腹胀患处复赤手足并冷余谓此脾胃虚弱前药服伤用六君汤一剂顿愈又以异功散加升麻柴胡而瘥

一小儿患此砭之而愈但作呕不食流涎面黄余谓此脾气虚弱用异功散加升麻治之吐止食进又用补中益气汤涎收而安

一小儿患此砭之而愈翌日发搐作呕手足并冷此胃气虚而肝木侮之用异功散加藿香木香诸症顿止又用异功散加升麻柴胡而瘥

一小儿患此砭之而愈但面赤作呕饮冷余谓胃经热毒未解先用仙方活命饮又用清热消毒散各一剂而愈一小儿腿上患之神思如故乳食如常余谓毒发於肌表令急砭出毒血自愈不信外敷寒凉内服峻剂腹胀不乳而死一小儿遍身皆赤砭之投以解毒药而愈

一小儿患此二便不利陰囊肚腹俱胀急用砭法随以活命饮加漏芦木通大黄为末时用热酒调服至两许二便俱通诸症顿退却去三味仍前时服而愈

一小儿患此二便不利腹胀咳 用活命饮加漏芦木通麻黄为末时时热酒调服二便随通遍身出汗诸症顿退鼻息似絶无气以动时或似躁此邪气去而元气虚也急用当归补血汤而愈

砭法治丹毒赤色游走不定令口吮毒血各聚一处用细磁器击碎取有锋芒者以筋头劈开夹之用线缚定两指轻撮筋头稍令磁芒对聚血处再用筋一根频击刺出毒血轻者止用口吮出毒用药敷之如患在头者不用砭法止宜用针卧倒挑患处以出毒血迟则毒血入腹而难起矣

神功散治丹毒最效若砭後毒甚者宜用如毒轻者砭之後不可用恐砭处皮肤既破草乌能作痛也

仙方活命饮

清热化毒汤

清热消毒散

柴胡清肝散

补中益气汤

小柴胡汤

大连翘饮

柴芍参苓饮

九味解毒散

伤寒发丹

伤食发丹者因脾胃之气未充乳食过多不能运化蕴热於内而達於肌表也若因乳食停滯者先用保和丸消之大便秘结量加大黄通之乳食既消而丹尚作者用清中解郁汤治之丹邪既去而乳食不思者用五味异功散补之发热作渴或饮食少思者用七味白术散补之大凡饮食厚味所致者赤晕或行而缓慢若饮烧酒或误吞信石所致者遍身赤晕其行甚速又

有疮疡发焮周围有赤晕其热消散或脓出自退凡此俱忌砭法皆宜安里为主不可攻伐若自吐泻亦不可止之吐泻中有发散之意因饮烧酒者饮冷米醋一二杯解之此神妙之法也因母多食炙?膏粱或饮烧酒或服辛热燥药或鬱怒伤肝脾致儿为患者当参胎热毒疮疡治之

一小儿面色皎白手足常冷伤食患丹余谓此因脾胃虚弱不信另用剋伐之剂更吐泻腹痛吐涎不乳口舌生疮此脾胃复伤而虚寒格阳在外非实热也先用六君乾姜又用五味异功散而愈

一小儿每停食发赤晕此脾虚食鬱用清中解鬱汤而愈越月忽摇头咬牙痰甚发搐呕吐酸腐此食鬱伤脾也待其吐尽翌日少与白术散而愈又服前散月余遂不复患

一小儿停食便秘四肢赤色此饮食蕴毒於内用枳实黄连厚朴山查神?而便通赤解更头晕咳 此脾气虚而不能生肺金也用六君桔梗以补脾肺山查神?以消饮食而痊

一小儿患此服发表之剂手足抽搐服惊风之药目瞤痰甚余谓脾胃亏损肝木所胜之虚象无风可祛无痰可逐用六君子汤一剂而安再剂而痊

一小儿停食服通利之剂患丹作呕腹胀此脾气复伤也用补中益气汤五味异功散而愈

一小儿因母食炙?酒麵两臂前廉各漫肿一块有根四畔赤晕相围余谓患处属胃经因胃经积热而为患也用清胃泻黄二散治之而消设谓丹毒辄用砭法及败毒之药反促其危矣

一小儿停食身发赤晕用清中解鬱汤而愈越月忽摇头咬牙痰盛发搐吐出酸腐待其吐尽翌日少以七味白术散次日又以参苓白术散调理脾胃遂不复患大抵吐後儿安不必服药也

一小儿停食大便不通四肢赤晕余用枳实厚朴山查神?大便遂通赤色亦止更又眩晕咳此乃脾气虚而不能生肺金也用六君子汤而愈

一小儿停食面赤用清热发散之药遂腹胀痰喘倦怠恶寒此亦脾胃伤而肺金不能生仍用六君加桔梗以补脾肺又以山查神?以消余食顿愈

一小儿患此服发表之剂手足抽搐服抱龙丸目瞤气喘痰甚此脾胃亏损而成慢惊也无风可祛无痰可逐此虚象也用六君加附子一剂而安再服全愈

一小儿停食患前症服辛热之药腹胀如蛊脉洪而数内作脓也不信果便脓而死

保和丸【方见虚羸】

五味异功散【方见败毒之药】

清中解鬱汤

七味白术散

六君子汤

清胃散【四方见腹痛】

补中益气汤【方见肌肉不生】

泻黄散【方见头面疮】

胎毒疮疡

胎毒疮疡皆禀於父母胎热或乳母饮食之毒七情慾火所致不可专治小儿亦须兼治乳母
小儿即安疮疡当服和解不宜服峻剂

一小儿患於左耳边渐延头上作痒此禀肝胆经脉数此禀生母肝火所致乳母有肝火而益甚也又数日作吵不安手足时搔此因作脓焮痛而然又三日早间以指微按疮头肿随指复起其脓已成也至午疮顶起薄皮脓已熟也点代针膏将晚出脓儿顿安肿赤顿消此疮家最善症也贴太乙膏以护风寒乳母服逍遥散而愈

一小儿生下臂外廉肿一块寸许月余忽赤肿二寸许外赤晕势欲走散此脓毒内焮针之随出脓赤晕退儿即安诊乳母肝胆脉弦数按之有力先用加味小柴胡汤加黄连二剂去黄连又二剂却用加味逍遥散与乳母服儿寻愈

一小儿生下大腿肿寸许一块面目色白将葦敷药而溃脓水清稀二葦而未愈後呵欠咬牙此禀肾虚朝用补中益气汤夕用地黄丸料与母子同服半杯年余而愈

一小儿生下左脇间一块漫肿无头肉色不变敷铁箍散而脓清欲呕余谓禀肝经气滞而脾气虚不能愈也先用异功散加柴胡升麻以补脾胃又以托里散加柴胡山梔以托里清肝其子亦饮数匙三月而愈

一小儿生下小腹患肿一块年余不溃寒热往来此禀肝火而然也其母果经事不调内热体倦用地黄丸八珍汤与母服子日服半杯寻愈

一小儿生下胸脇间肿赤年余不消余谓禀肝血热但治其母不信另用铁箍散犀角丸作呕

不乳此胃气虚而复伤余用五味异功散救子之胃气用加味逍遥散治母之肝火顿愈

一小儿生下遍身无皮色赤原母素食膏粱之物以寒水石一两炒焦黄栢二两淨黄土四两俱为细末时敷遍身母服清胃散加漏芦五日赤少淡却用黄土五两炒焦黄栢一两敷之母服加味逍遥散又三日赤顿淡水顿少又三日但敷黄土一味母服八珍汤加牡丹皮柴胡而愈

一小儿生下有疥审其母素鬱怒用消毒散以当归膏调敷母服加味逍遥散加漏芦及加味归脾汤而愈後复发为母食膏粱用清胃散及敷前药而愈

一小儿生下有痔疮三岁後作痛服化毒丹犀角丸以治大腸之火更腹痛作泻咬牙呵欠仍欲治火余曰呵欠咬牙属肝经之病内经云因而饱食筋脉横解肠澼为痔此稟肝火为患儿服地黄丸母服逍遥散加漏芦而愈

一小儿陰囊赤痒或时如无皮状两日常闭服化毒丹益甚余曰化毒丹犀角丸治脾胃实火之剂前症乃稟肝肾经陰虚也不信仍服之几危余用六味地黄丸四味肥儿丸母服加味逍遥散而痊

一小儿生下陰囊赤肿余谓稟肾肝陰虚不信另用化毒丹之类前症益甚更呕吐不乳手足并冷此脾胃被伤先用五味异功散母用大剂地黄丸料加炒黑黄栢及漏芦与数剂而消其时患是症服化毒丹敷凉药者俱不救

一小儿生下臀尖微肿寸许一块敷铁箍散服化毒丹越月肿起色赤啼声不絶以指按之随手复起此脓内?而痛也遂针之出稠脓啼声即止余谓血气无亏不必用药彼欲速效另犀角丸致吐泻发搐欲投惊药余曰此因脾胃亏损而内生风耳急以人参一两细切和壮妇乳一锤置粥釜中煮良久取出绞乳汁以绵作ru头様者蘸乳频与儿吮之一日吮尽却服乳化地黄丸母日服八珍汤加漏芦不月而愈

一小儿生下臀内廉赤肿二寸许一块有脓内溃遂针之出浓甚多随眼闭咬牙余谓眼闭脾气虚不能开也发搐咬牙乃脾气虚而肝火动也以人参如前渍乳儿吮母服八珍汤加漏芦月余而疮愈

一小儿生旬余头患毒高寸许有赤晕势危急卧鎌砭出黑血儿即安翌日眉间有患亦有赤晕余意宜即砭之衆议第二日砭之果血凝不出腹胀而歿

敷药铁箍散治一切疮疖痈疽

芙蓉叶 黄栢 大黄 五倍子 白芨

右为末用水调搽四围

按前方乃寒凉解热收敛之剂或有用白蕲商陆根者有用寒水石天花粉者有用苍耳金银花者有用芭蕉赤小豆者有用草乌白芷之类者皆不分寒热温凉之杂饵内经云先肿而後痛者形伤气也先痛而後肿者气伤形也又云五脏不和九窍不通六腑不和瘤结为痈外科精义云凡疮肿高而软者发於血脉肿下而坚者发於筋脉肉色不变发於骨髓盖必有诸中而後形诸外故受症之经与所患之位各有不同岂宜一概外敷凉药惟脾胃无亏血气不和者庶几有效若服化毒之类脾胃复伤运气凝滞亦不能消矣至如疔疮之类正欲宣拔其毒若复用前药肌肉受寒血气凝滞必至毒气入内而不救治法必察其肿之高漫色之赤白痛之微甚作脓之难易出脓之稠薄生肌之迟速以别其属陰属阳或半陰半阳或纯陰纯阳而用相宜之药以凉之热之和之又当审受症之传变五脏之相胜而以调补脾胃为主庶不致变恶症也

五福化毒丹治胎毒及痘後头面生疮眼目肿痛生地黄【杵膏】熟地黄【自制杵膏】天门冬【去心杵膏】麦门冬【去心杵膏】玄参【各三两】甘草甜硝【各二两】青黛【一两五钱】

右为末炼蜜丸如芡实大每服一丸白滚汤化下甜硝即朴硝以滚汤制过者便是按前症服此而发搐痰喘者皆中气受伤而变虚热也急服五味异功散若手足并冷者中气虚寒也前汤加姜桂多有生者

犀角消毒丸治积热及痘疹後余毒生疮

生地黄 防风 犀角屑【镑】荆芥穗 当归【各一两】牛蒡子【杵炒】赤芍药 连翘 桔梗【各七钱】薄荷 黄芩 甘草【各五钱】

右为末炼蜜丸如芡实大每服一丸薄荷汤化下按前二方善损中气伤陰血若大人形病俱实脾胃健旺者庶可用之恐芽儿脏腑脆嫩不能胜此经云气主?之血主濡之气者胃中冲和之元气若胃气一伤不能?濡消散脓已成者不能腐溃脓已溃者不能生肌收敛因而难治甚致不起不可不慎也

八味茯苓补心汤治心气不足血气不和而患疮症【愚制】茯苓 酸枣仁【炒各二钱】五味子【炒一钱】人参【一钱五分】当归【一钱】白术【炒一钱】远志【去心六分】菖蒲【五分】炒甘草【五分】

右作二三服水煎

柴胡栀子散【方见脇?】

托里散【方见热毒】

热毒疮疡

热毒疮疡因食膏粱厚味或乳母七情鬱火所致若肿臀作痛气血凝滞也用仙方活命饮口渴便秘热毒内蕴也用四顺清凉饮佐以如圣饼肿硬色赤热毒凝聚也用活命饮佐以隔蒜灸肿焮不消欲作脓也用托?消毒散不成脓或成脓不溃气血虚也用八珍汤溃而肉赤不斂脾血虚也用四物参朮肉白而不斂脾气弱也用四君芎归食少体倦而不斂脾气虚也用六君当归升麻凡药对症无有不愈设或妄行攻毒元气亏损则变恶症而难治矣大抵疮疡属腑者易治元气无亏者不治自愈属脏者难治元气亏损者则变为恶症误行剋伐元气亏损尤难疗理故切不可用峻厉之剂观东垣丹溪云但见肿痛参之脉症虚弱便与滋补血气无亏可保终吉若用驱逐败毒不免有虚劳之祸矣一小儿患之肿焮敷服败毒之药肿益甚更作呕视其寅关脉青赤此肝经风热之毒中气复伤而然也用五味异功散加柴胡升麻再用补中益气汤加白芷桔梗而愈

一女子十岁余耳下连项赤肿寒热头痛恪敷铁箍散此少阳胆经火症内作非铁箍散所能愈余用栀子清肝散而愈

一小儿所患同前右关脉数按之则弦作呕懒食此肝木剋脾土所致用小柴胡汤去黄芩加茯苓芍药而愈一小儿患之余谓禀肝脾气滞不信用铁箍散犀角丸而呕吐少食手足并冷此脾胃受伤也子用五味异功散加术香母用加味逍遥散加味归脾汤而消

一小儿缺盆患之内外敷服败毒之药发热肿痛按之则软此脓内溃也喜其右腮白左腮黄乃脾肺相生其病易愈遂针出脓用托里散而愈

一小儿头?患之服清胃之药肿痛益甚余谓毒气炽盛而淤血不散也用仙方活命饮二剂而愈後因伤食朝寒暮热头?仍患之服降火之剂口舌赤肿手足并冷余谓胃气复伤而虚寒也用五味异功散而愈一小儿头患疔甚多寒热作痛时季夏乃形病俱实先用人参败毒散加黄连香薷一剂其痛顿止次用仙方活命饮末三服大者出脓小者自消後食厚味复发用清胃散活命饮各一服而愈

一小儿素食炙煨不时患之此膏粱积热所致用清胃泻黄二散将愈又停食服巴豆之药口舌赤烂头?生疮此胃气复伤而内热也用人参安胃散而愈

一小儿不时患之兼颊侧结核此肝疳之症先用龙胆泻肝汤二剂以治肝火又用四味肥儿丸五味异功散加升麻柴胡消疳健脾而愈

一小儿素有疳脾之症患疔甚多用仙方活命饮二剂肿痛顿退又用四味肥儿丸五味异功散加柴胡升麻而愈其时同患此症用犀角丸化毒丹伤其脾胃者俱致不起

一小儿头?患之肿痛焮作属胃经热毒先用仙方活命饮末次用清胃散而痊後口舌生疮别搽末药腹痛重坠作呕不食手足指冷余谓脾胃虚寒用异功散加升麻而痊

一小儿十二岁胸前患此肿焮作痛外敷铁箍散内服犀角丸腹中寒痛验之脓已成先用五味异功散再用托里消毒散脓自出却用托里散而愈

一小儿臂患毒漫肿微痛敷铁箍散时欲呕吐胸腹痞满手足并冷此脾气虚寒也症属半陰半阳铁箍散乃纯阳之药非其所宜遂敷冲和膏服六君乾姜而消盖小儿元气易实易虚用寒药敷贴逼毒入脏而不能救者多矣

仙方活命饮

皂角刺【炒】穿山甲【蛤粉同炒】乳香 没药 白芷防风 当归【各一钱】金银花 陈皮【各三钱】贝母天花粉 甘草节

右每服五钱酒煎服婴儿每服一两母子同服为末酒调服亦可毒在表者加麻黄散下毒在内者加大黄下之当临制宜此解毒回生起死之良剂

托里消毒散治胃经虚弱或因剋伐致疮不能溃散疮未成即消已成即溃腐肉自去新肉自生

人参 黄芪 当归【酒拌】芍药【炒】白术【炒】川芎茯苓【各一钱】白芷 甘草【炒】金银花 连翘【各五分】

右作二剂水煎徐徐服

托里散治疮疡因气血虚不能起发腐溃收敛及恶寒发热宜用此补托之

人参【五分气虚倍用】黄芪【炒五分】当归【五分血虚倍用】白术【倍用】茯苓【各五分】芍药【酒炒五分】熟地黄【一钱生者自制】

右作二三剂水煎服

替针丸治疮疽脓已成不溃者

陈坏米【一钱】礞砂【五钱】雄雀粪【四十九粒直细者是也】

右为末米粥丸麦粒大每用一粒粘疮头上以膏药贴之半晌其脓自出若疮头透而脓不出或出而愈痛或发热血气虚也用托里散或作呕吐痰食少体倦脾气虚也用六君子汤

五福化毒丹治热毒蕴积赤咽乾口舌生疮或头面疮疖谵语不寧【方见胎毒疮疡】

按前方生血凉血解毒寒中之剂形病俱实者殊有良验但一二丸即止不可过多则反伤元气变症不可胜言也

天乌散

天南星 赤小豆 草乌 黄蘗【各等分】

右为末姜汁米醋调贴患处

四物汤治发热烦燥或日晡热若因脾虚不能生血者则用六君子汤之类忌用前药【方见腋痈】

四君子汤治脾胃虚热唇口生疮或疮不消不溃不敛或食少作呕大便不实若因肝木乘脾土而致者宜加软柴胡炒黄芍药【方见腹痛】

六君子汤治脾胃虚弱饮食少思或大便不调肢体消瘦面色痿黄即四君子加陈皮半夏

八珍汤治气血俱虚成者不能溃溃者不能敛或恶寒发热或晡热作渴饮食少思者【即四君子四物二汤合用】

如圣饼治气虚疮疡硬肿不能消散若大人发背等症肉死不知痛加蟾酥【方见流注】

四顺清凉饮

四君子汤【二方见腹痛】

加味归脾汤

小柴胡汤

栀子清肝散【三方见脇痈】

托里冲和汤【方见敷凉药】

五味异功散【方见败毒之药】

加味逍遥散【方见发热不止】

人参败毒散【方见发癍】

四味肥儿丸【方见贴骨痛】

隔蒜灸法【方见流注】

清胃散【方见热毒口疮】

补中益气汤【方见肌肉不生】

胎毒瘰?

胎毒瘰?者乃禀肝胆二经鬱火气滯所致盖肝胆经行人身之侧若因肝火动而受患故发於肝胆二经部分当审其因而药之或因乳母恚怒或血虚内热者当审其所因而调其母不可用峻厉之药恐伤元气也一小儿落草颈间有?五枚审其母素多怒时常寒热或乳间作痛或脇肋微肿悉属肝胆经症先用小柴胡汤加当归芍药寒热顿退又用加味逍遥散母服两月余其儿亦愈

一小儿颈间耳下各结核三岁久服消毒之剂患处益甚元气益虚诊乳母素鬱怒致肝脾血虚而有热用加味归脾汤为主佐以加味逍遥散母热渐退却与儿日各数匙两月余而愈

一小儿自落草时颈间患有四枚至五岁耳前後如贯珠元气虚甚寒热往来饮乳不彻此禀肝胆经气滯之症用八珍逍遥二散与壮年妇人服之儿饮其乳半载之後儿體渐充其核渐消又服地黄丸逍遥散而全愈一小儿颈间结核或发寒热左頬青额间赤此禀肝心二经之症用加味逍遥散加漏芦与母服儿日服半蛤许两月余核渐消後因母怒发热儿病仍作先用加味小柴胡汤加漏芦又用加味逍遥散加漏芦与母服两月余母子俱安

一小儿颈间前後各有一核色如故至周岁母有怒气各核变赤用加味逍遥散加漏芦五十剂将愈後因母大怒寒热往来四肢痠痠其子亦然又用加味逍遥散加漏芦钩藤钩母子并服而安

一小儿生下颈间瘰癧三枚将期敷药延及耳前余谓此禀肝胆二经所致诊其母肝胆脉尚洪数余谓母子一体治其母儿自愈不信另用必效散一服吐泻并至一夕而歿

小柴胡汤

加味归脾汤【二方见脇痛】

加味逍遥散【方见发热不止】

六味地黄丸【方见作渴不止】

热毒瘰?

热毒瘰?乃手足少阳足厥陰二经风热之症或肝疳食积所致其症发於项腋或耳前後或如贯珠当分表?虚实若焮赤肿者肝经热毒也用人参败毒散作痛寒热者肝火内作也用加味小柴胡汤不痛而小便黄肝血虚也用六味地黄丸隐於肉里而色不变者肝疳内作也用九味芦荟丸脓成而不溃或溃而不斂者脾气虚弱也用益气养荣汤凡此肿焮疼痛寒热作渴者属病气有余形气不足治宜清肝火生肝血肿硬不溃溃而不斂者属病气形气俱虚治宜补肾水实脾土若因乳母恚怒肝火遗患者又当随所因而治之

一小儿脓水淋漓其核未消发热憎寒此肝经气血虚而有热也用补陰八珍汤为主间以清肝益荣汤而愈後复结核小便赤澀晡热作渴用参术柴苓汤为主佐以六味地黄丸料加柴胡山梔及四味肥儿丸而愈一小儿十五岁患此发热作渴日晡頰赤脉数无力属陰虚而有热用补陰八珍汤五十剂加参芪又二十剂而溃但脓水清稀肌肉不生此脾气虚弱也以参芪归术为主佐以芍药?地麦门五味气血乃复遂进必效散一服毒下而痊

一小儿十三岁久不愈寒热兼作饮食少思此肝火炽而脾胃虚也用益脾清肝散佐以九味芦荟丸而愈至十六岁陰茎忽痿服温补之药茎窍出臭津旧痕肿痛予用清肝火之药而愈

一小儿十五岁患此恪用攻痰前症益甚虚症悉至仍议前法余曰小便频数肝经陰虚也两目连割肝经风热也作呕懒食胃气虚弱也泄泻後重脾气虚陷也遂用补中益气汤六味地黄丸渐愈又用九味芦荟丸而消

一小儿项间及四肢结核久溃不斂形体骨立大便不调小便频数此肝脾疳症九味芦荟丸补中益气汤而愈

一小儿十四岁患此脓水清稀肌体骨立晡热盗汗口乾咳痰此肾水不能生肝木也用六味地黄丸补中益气汤三月余元气渐复佐以四味肥儿丸而愈毕姻後唾痰体倦发热作渴此脾肺虚不能生肾水水泛而为痰用地黄丸补中益气汤而痊

一小儿患此服剋治之药致寒热腹膨此肝脾疳症先用五味异功散加柴胡升麻佐以九味芦荟丸渐退又用四味肥儿丸五味异功散而消

一小儿患此服化痰散坚之药?色青白少阳三焦部分见青筋又目割出泪此肝胆风热所致脾土虚而肝木所侮也先用补中益气汤柴胡清肝散加茺萸核渐消又佐以五味异功散加茺萸而愈

一小儿九岁患此?色常青肿硬不溃肉色不变乃伐肝化痰余曰当调补肝脾不信果虚症蜂

起复请治仍欲伐肝余曰?带青色肝虚而本色见也?色变白肺虚而本色见也痰涎上涌脾虚而不能摄也两目连劓肝血虚而生风也经云胃为五臟之本当先救胃气遂用五味异功散加升麻柴胡元气稍复乃朝用补中益气汤夕用五味异功散佐以九味芦荟丸?色始黄而核渐消又以四味肥儿丸间服地黄丸而愈

一小儿五岁患此小便白色此肝脾疳症用九味芦荟丸四味肥儿丸而消因食橙橘二便俱白拘间结核亦用前丸而愈後目连劓颈间耳後结核用柴胡清肝散芦荟丸而愈

张阁老侄孙患此久服化痰削坚之剂夜热吐痰时季夏脉大按之而濡余曰夏月肝症而见肺脉至金旺之时其病必进矣至八月疾甚果不治

一女子十四岁耳下患此服化痰泄气药前症益甚诸症并臻余曰此肝胆经虚火之症也前药乃泛扰诸经无脏不伤者不悟仍服之更四肢发搐目闭口噤余曰此肺经虚肝木动而脾土复伤也当补脾土滋肺金养肾水亦不信後果歿

一小儿四岁患此泛服软坚伐肝之剂益甚余曰此禀肝经之虚羸兼乳母鬱怒所致当调补乳母肝脾滋子之肾水不悟仍用前药以致不起

四味肥儿丸治食积脾疳?耳口舌生疮目障云翳牙齿腐烂等症【方见贴骨痈】

柴芍参苓饮治肝火血热遍身瘙痒或起赤晕或筋挛结核

柴胡 芍药 人参 白术 茯苓 陈皮 当归【各五分】 牡丹皮 山梔【炒】 甘草【炒各三分】

右姜枣水煎服

神功散治疮?初起肿焮者用之可消加血竭更好丹毒未砭者亦可用之

黄栢【炒】 草乌【生用】

右各另为末等分用漱口水调敷常漱口水润之

清肝益荣汤治肝胆经风热血燥筋挛结核或作瘕子龙胆草【酒拌炒黑五分】 山梔【炒五分】 柴胡【五分】 熟地黄【自制】 白术【炒】 木瓜【不犯铁器】 茯苓 薏苡仁【各五分】 当归【一钱】 川芎【一钱】 芍药【一钱】 甘草【三分】

右水煎服

加味小柴胡汤山梔牡丹皮治肝胆经风热耳前後肿痛或结核焮痛或寒热晡热口苦耳聋?

症【前方去山梔丹皮即小柴胡汤】

柴胡【二钱】黄芩【炒一钱】人参【七分】半夏【七分】甘草【炙五分】山梔【一钱】牡丹皮【一钱】

右姜水煎徐徐服

九味芦荟丸治肝脾疳热患瘰癧结硬或三焦目生云翳耳内生疮或肢体消瘦热渴少食或肚腹不调牙龈蚀颊腐烂下部生疮等症【方见喉痹】

必效散治瘰癧元气无亏者宜用此方若元气怯弱者宜先补而後服之?毒已下便与滋补庶无他患若孕妇及虚劳气鬱所致者尤不可服世以此方为良故并注之

南鹏砂【二钱五分】轻粉【一钱】巴豆【五粒去皮心膜】白?榔【一个】麝香【五分】斑猫【四十个去头足趺用糯米炒】

右为末取鸡子二个去黄用清调药入壳内以湿纸数重糊口甑蒸熟取出曝乾研细每服五分用炒生姜酒五更调服如毒出小便澁痛用益元散一服其毒出而不痛

益气养荣汤【方见鹤膝风】

梔子清肝散【方见肠痈】

补陰八珍汤【即八珍汤加黄柏知母】

益脾清肝散【方见黄水疮】

惊风结核

惊风结核属肝胆二经风木相火用事木旺生风热同化其病抽掣扰动此乃风热血燥而然耳盖风动则肝火盛火盛则肝血内消血不能养筋故筋挛结核如贯珠然颈项两侧正属肝胆经部分治宜滋肾水清肝火养陰血壮脾土盖肾水旺则肝火自清肝火清则陰血自生陰血生则相火自寧火既寧则无热伤元气火乘土位之疾矣

一小儿因惊项间结核目割唇动摇头抽搐此风木凌於脾土也用皂角子丸补中益气汤渐愈又用九味芦荟丸而痊

一小儿甫周岁项间结核两臂反张索败毒之药余意此属肝经血燥询之果前患惊风曾服朱砂等药遂与六味地黄丸滋其肝血数服而愈

一小儿项侧结核痰盛发搐服金石香燥之剂手足筋挛此肝血复伤即急惊也遂用加味小柴胡汤加钩藤钩山梔芎归六味丸料加五味麦门而痊

一小儿每受惊项间结核发热减食睡间四肢微抽此肝木侮脾土也用五味异功散加柴胡升麻钩藤钩随愈毕姻後腿臂腕间结核误服行气破血药腿臂筋挛肌体消瘦如瘵症余因考绩到京用地黄丸生肝肾之血佐以补中益气汤补脾肺之气而愈

一小儿耳前後结核遇惊即痰盛咬牙抽搐摇头恪服香燥之药以致慢惊而卒

皂角子丸治肝胆经风热项脇两侧结核

皂角子【仁炒二两】连翘【八钱】当归 柴胡 芍药【炒】山梔【炒】川芎【各一两】桔梗【炒】龙胆草【酒拌炒黑】甘草【炒各四钱】

右为末米糊丸菉豆大量儿大小滚汤下

人参败毒散治小儿风热瘙痒顽核毒疮或解脱衣裳风邪所伤恶风发热胸膈生涎头目不清【方见发癍】

九味柴胡汤治肝经热毒下注患便毒肿痛或小腹脇间结核凡肝胆经部分一切疮?或风毒恶核瘰?【炒】

柴胡【五分】黄芩【炒五分】人参 山梔【炒】龙胆草【炒】半夏 当归 芍药【炒各三分】甘草【二分】

右水煎服若肿痛色赤元气无亏者宜用溃後肿消痛止者不宜用大凡肿硬不溃或溃後不愈因元气虚也午前宜用四君归芪升麻午後宜用四君芎归柴胡为主佐以九味芦荟丸若饮食少思者宜用五味异功散专补胃气若脓水清稀而见一切诸症皆因血气内亏但温补脾胃饮食加进血气化生诸症自退设治疮邪是虚其虚也祸不旋踵矣

琥珀膏治瘰癧不溃或溃而不愈变成漏症

琥珀 木通 桂心 当归 白芷 防风 松香 朱砂 丁香 木香 木鼈子【各二两】

右先用琥珀丁香桂心朱砂木香为末其余?咀以麻油二斤六两慢火煎至白芷焦黑滤去渣徐下黄丹一斤以柳枝不住手搅至黑色滴水捻软硬得中却入琥珀等末搅匀於磁器盛之用时取少许摊贴

益脾清肝散治肝火侮脾饮食少思发热或寒热往来疮不能消散【方见黄水疮】

补陰八珍汤治元气虚弱不能溃斂或内热晡热肌体消瘦即八珍汤加酒炒黑黄栢知母

五味异功散【方见败毒之药】

胎毒疮疥

胎毒疮疥因稟胎热或娠母饮食之毒七情之火初如乾癬後则脓水淋漓或结靨成片如发於两耳眉或耳前後发际之间属手少阳经若发於四肢属脾胃经发於两脇属肝经发於额属心经发於脑属膀胱经发於颞頰属肾经当随各经所主五脏胜负及乳母食啖厚味鬱怒所传致而调治之不可彻用化毒犀角等丸设元气复伤传变他症尤为难疗

一小儿遍身患之服牛黄解毒丸皆愈惟头结痂作痒出水此稟肾经虚热用地黄丸解毒散而愈

一小儿患於髮际之间作痒疹其母有肝火用加味逍遥散加漏芦用牛黄解毒丸解毒散而愈【解毒散一名托毒散】一小儿患於左耳髮际渐延上头作痒此稟肝胆二经热毒用柴胡清肝散母子并服而愈後不戒膏粱复发脓水淋漓右颊赤色此胃经有热先用清胃散仍用柴胡清肝散治肝火母子俱服又用立效散牛黄解毒丸而愈

一小儿两眉患之延及遍身四肢为患脓水淋漓寒热往来属肝脾积热用清胃散小柴胡汤立效散而愈後眉间复患两目连割小便白浊用四味肥儿丸九味芦荟丸而愈

一小儿因乳母不戒七情厚味患此久不愈母用清胃逍遥二散子用牛黄解毒丸愈後儿食甘味眉间生疮痛痒目割用四味肥儿丸为主佐以加味逍遥散清胃散而愈

一小儿遍身患之两脇为甚子用四味肥儿丸立效散母用柴胡梔子散加味逍遥散而愈

牛黄解毒丸治胎毒疮疔及一切疮疡

牛黄【三钱】金银花【一两】草紫河车【五钱】甘草

右为末炼蜜丸量儿服

立效散治鬢疮耳疮及一切疮疥

定粉末 松香末 黄栢末 黄连末【各一两】枯矾末【一两】

右各另为末用清油烛油调搽

敷药解毒散治一切毒疮风疹痒痛

大黄 黄栢 山梔 寒水石【煨各等分】

右为末水调搽若破而脓水淋漓用当归膏或清烛油调尤善

柴胡梔子散【即梔子清肝散方见脇痛】

四味肥儿丸【方见热毒瘰癧】

九味芦荟丸【方见诸疳口疮】

金黄散【方见天泡疮】

热毒疮疥

热毒疮疥因乳哺过早或嗜甘肥脏腑积热或母食膏粱厚味或七情内火所致当分脏腑所属之因病之虚实调其血气平其所胜如肝经实热用柴胡清肝散虚热用六味地黄丸心经实热用导赤散虚热用补心汤脾经实热用泻黄散虚热用补中汤肺经实热用泻白散虚热用五味异功散肾经热用六味地黄丸大凡手足冷者属虚寒手足热者属实热脉沉数有力作渴饮冷大便乾实此邪在里宜内疏若脉浮数有力作渴饮冷此邪在表宜发散若脉浮大按举无力或作渴饮汤乳食少思此真气虚而发热也调理脾胃其病自愈切不可用寒凉之剂复损真气婴儿宜调治乳母为主一小儿脇间患此寒热如疟小便频数此禀肝火所致先用柴胡清肝散又用加味逍遥散而愈後因乳母肝火动而复发用加味逍遥散及八珍汤加丹皮山梔母子服之并愈一小儿腹间患此发热便血面黄少食或作呕或作泻手足时冷右关脉弦数此脾土虚弱肝火为患先用五味异功散加升麻柴胡山梔益脾气清肝火後用地黄丸滋肾水生肝血而愈

一小儿腿内股患此色赤不愈发热面色或赤或青此禀肾陰不足而木火炽盛先用柴胡梔子散以清肝心後用地黄丸以补肝肾而愈

一小儿肘间患此作渴饮冷右寸关脉数而无力此胃经积热传於肺经也先用泻黄泻白二散渐愈後用五味异功散四味肥儿丸而愈

一小儿嗜膏粱甘味先患背髀後沿遍身淋漓此饮食之热而伤脾血也先用清胃泻黄二散而愈但形气怯弱用五味异功散而元气复

柴胡清肝散【方见脇痛】

五味异功散【方见用败毒之药】

导赤散

泻白散【二方见臂痛】

泻黄散【方见头?疮】

诸疳疮疥

诸疳疮疥因脾胃亏损内亡津液虚火妄动或乳母六淫七情饮食起居失宜致儿为患当分其因审其经而平之如?青寒热或白翳遮睛肝经之症也?赤身热或作渴惊悸心经之症也?黄体瘦或作渴泄泻脾经之症也?白咳 或鼻间生疮肺金之症也?鰲体瘦或喜卧湿地肾经之症也婴儿宜调治乳母若不审五脏胜负形病虚实妄行败毒多致不救

一小儿患此小便频数左颊青色或时目眦此肝脾之症也先用五味异功散加当归升麻柴胡调补脾气又用九味芦荟丸清理肝火未用地黄丸滋肾水生肝木而疥愈後复发不经意兼两目生翳小便频数大便泄泻此肝邪侮脾而作也用四味肥儿丸五味异功散加芫荽脾气健而肝病愈

一小儿患此?黄作渴大便酸臭腹胀青筋此肝脾之症用五味异功散为主佐以四味肥儿丸而愈

一小儿患此?赤作渴心脉洪大此心经之症内用柴胡栀子散外用六仙散而愈後惊悸发热疥焮作痛先用导赤散二服又用柴胡栀子散与子服母服逍遥散而愈

一小儿患此大便酸臭肚腹膨胀手足时冷此脾经之症用五味异功散四味肥儿丸渐愈後因母食炙?仍发母服清胃散黄连泻心汤子服一味甘草而愈一小儿嗜甘肥之物患之或痒或痛咳 饮冷此脾胃积热传於肺经先用清胃散以治胃热少用泻白散以清肺火渐愈出痘後仍患之口乾饮汤用五味异功散兼大枫膏而愈

一小儿年十五遍身患此腿足为甚发热饮冷两尺脉数洪按之无力此禀肾虚所致用六味地黄丸而愈後用心力学复发尤甚兼盗汗遗精用地黄丸为主佐以补中益气汤八珍汤而愈

一小儿患此发热饮冷痰涎上涌此禀肾虚用地黄丸料煎服月余渐愈又佐以八珍汤而愈次年毕姻後发热唾痰盗汗咳血仍用前药而愈

敷药大枫子膏治疮疥

大枫子肉【二两研膏】真轻粉【一两】黄连【二两】蛇床子【二两】枯矾【一两】柏油【六两】

右各另入大枫膏和匀更入柏油杵百余即成膏矣每用少许?患处

敷药六仙散治诸疳疮疥

苦参 独活 大枫子【去殼去油淨】蛇床子【各一两】枯矾【五钱】

右为细末柏油调敷

五味异功散【方见用败毒之药】

清胃散【方见热毒口疮】

诸疳口疮

诸疳口疮因乳哺失节或母食膏粱积热或乳母七情鬱火所致其症口舌齿龈如生疮状若发热作渴饮冷额间赤色左寸脉洪数者此属心经先用导赤散清心火次用地黄丸滋肾水若寒热作渴左頰青赤左关脉弦洪者属肝经先用柴胡栀子散清肝火次用六味地黄丸生肝血若两腮黄赤牙龈腐烂大便酸臭右关脉洪数按之则缓者属脾经用四味肥儿丸治脾火以五味异功散补脾气若发热咳 右腮色赤右寸脉洪数按之濇者属肺经先用清肺饮治肺火用五味异功散补脾胃若发热作渴两颧黧色左尺脉数者属肾经不足先用六味地黄丸以生肾水次用补中益气汤以生肺气又有走马疳者因病後脾胃气血伤损虚火上炎或痘疹余毒上攻其患甚速急用铜碌散大茺萸汤轻则牙龈腐烂唇吻腮肿重则牙龈蚀露頰頤透烂若饮食不入喘促痰甚此脾胃虚而肺气败也頰腮赤腐不知痛者此胃气虚甚而肉死也并不治

一小儿口疮呕血便血两腮微肿唇白?青此脾土亏损木所乘也朝用补中益气汤食远用异功散而愈一小儿右頤鼻準微赤此肺脾二经虚热用四君升麻及白术散而愈

一小儿口疮久不愈诊其母右关脉弦缓乃木剋土之症先用六君柴胡又用加味逍遥散治其母子自愈一小儿齿龈蚀烂年余不愈用大茺萸汤治其疳邪五味异功散健其脾气寻愈後复作兼项间结核另服败毒药口舌生疮余用四味肥儿丸而愈

一小儿患口疮寒热嗜卧作渴引饮此脾疳气虚发热而津液不足也先用白术散以生胃气用四味肥儿丸以治疳症两月余又用异功散而安

一小儿口疮身热如炙肚腹胀大此脾疳内作朝用五味异功散夕用四味肥儿丸稍愈又以

地黄虾蟆二丸兼服而愈

一小儿齿龈腐烂头?生疮体瘦发热此脾疳所致先用大芦荟丸又用四味肥儿丸大枫膏而愈

东垣大茺萸汤【一名梔子茯苓汤】治黄疸土色为湿为热当利小便今反利【知黄色中为燥胃经热也】髮黄脱落【知膀胱肾俱受上邪乃大湿热之症】鼻下断作疮【上逆行营气伏火也】能乳【胃中有寒也寒则食不入】喜食土【胃不足也】?色黑【为寒为痹】大便清【寒也】褐色【热蓄血中】间黄色【肠胃有热】治当滋荣润燥外致津液

山梔仁【三分】黄栢甘草【炙各二分】大茺萸【五分】黄连麻黄根防风【各一分】羌活【二分】柴胡【三分】当归【四分】白术茯苓【各五分】

右水煎服

葛花解醒汤治乳母酒醉後乳儿遗热为患

白荳?砂仁 葛花【各五钱】白术【二钱】泽泻【二钱】神麴【炒黄二钱】乾生姜【二钱】白茯苓陈皮人参猪苓木香【各五分】青皮【三分】

右为末每服二钱白汤调服

愚按前汤先哲不得已而用之盖醉酒耗气又服辛散重损真陰折人长命可不慎哉

大芦荟丸治疳杀虫和胃止泻

胡黄连 黄连 白茺萸【去扇】白雷丸【破开赤者不用】芦荟 青皮 木香 鹤虱【微炒各半两】麝香【二钱另研】

右为末粟米饭丸菉豆大每服一二十丸米饮下

蚘蟆丸治无辜疳症一服虚热退二服烦渴止三服泻痢住

蟾蜍【一枚夏月沟渠中腹大不跳不鸣身多癩?者】

右取粪蛆一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不令虫走出却将蟾蜍扑死投蛆中食一昼夜以布袋盛置浸急水中一宿取出瓦上焙为末入麝一钱粳米饭揉丸麻子大每服二十丸米饮下

六味肥儿丸消疳化虫退热若脾疳饮食少思肌肉消瘦肚大颈细髮稀成穗项间结核发热作渴精神怠倦大便酸臭嗜食泥土或口鼻头疮肚腹青筋囁下痢便白宜用此丸即四味肥儿丸加乾蟾一两芫荇五钱

四味肥儿丸【方见热毒瘰癧】

地黄丸【方见作渴不止】

热毒口疮

经云手少陰之经通于舌足太陰之经通于口因心脾二经有热则口舌生疮也当察?图部位分经络虚实而药之若元气无亏暴病口生白屑或重舌者用乱髮纏指蘸井花水揩之或刺出毒血敷以柳花散傅之上以肿胀或有泡者并令刺破敷前散或以青黛搽之刺後又生又刺若唇吻热烈者用当归膏调柳花散敷之若元气亏损或服寒凉之药或兼作呕少食者此虚热也用五味异功散加升麻柴胡若泄泻作渴者脾胃虚弱也用七味白术散若腹痛恶寒者脾胃虚寒也用六君姜桂若因母食酒麵煎煇者用清胃散若因母饮食劳役者用补中益气汤肝脾血虚者用加味逍遥散鬱怒内热者用加味归脾汤母子并服若泥用降火必变慢脾风矣仍参吐舌弄舌治之凡针重舌以线针直刺不可横挑恐伤舌络致言语不清也

一小儿口舌生疮手热饮冷属胃经实热用柳花散加味解毒散而愈後因伤食吐血不时弄舌属脾经虚热用四君子汤而痊

一小儿口舌生疮延及头面胸背脓水淋漓此胎毒也内用牛黄解毒丸外以当归膏调黄柏末涂之而愈一小儿发热饮冷口患疮额鼻黄赤吐舌流涎余用导赤泻黄二散而愈後复作自服清热化毒之药益甚更加弄舌余用五味异功散加钩藤鉤及六君子汤而愈盖吐舌为脾之实热也弄舌为脾之虚热也治者审之一小儿患前症久不愈恪服清凉之剂痰喘不已口开流涎手足并冷又欲治痰余谓经云脾主涎肺主气此因脾土虚寒不能生肺金而然非痰火为患也先用温中丸二服痰喘顿止又用五味异功散而痊

一小儿口内生疮用寒凉之剂更发热饮汤不絕此中气虚寒隔阳於外非实热也用补中益气汤加炮姜一剂而愈

陈湖陆钦若子患前症敷服寒剂手足并冷口唇时动余曰此中气虚寒而变慢脾风也後果歿

东垣清胃散治胃经有热齿牙作痛或饮冷作渴口舌生疮或唇口肿痛焮连头?或重舌马牙吐舌流涎若因服剋伐之剂脾胃虚热口舌生疮或弄舌流涎或呕吐困睡大便不实者用五味异功散

生地黄【四分】牡丹皮【三分】当归稍【四分】黄连【三分】升麻【五分】

右水煎服婴儿母亦服

清热消毒散治实热口舌生疮及一切疮疡肿痛形病俱实者

黄连【炒】山梔【炒】连翘 当归【各五分】金银花【一钱】川芎
芍药【炒】生地黄【各六分】甘草【二分】

右水煎服婴儿母同服

四君子汤治脾气虚热口舌生疮或但胃气复伤饮食少思或食而难化若作呕泄泻尤宜用之如兼痰嗽气逆肢体倦怠面目浮肿宜用六君子汤

六君子汤治脾胃气虚吐泻不食肌肉消瘦或肺虚痰喘 喘促恶寒或惊搐口直口噤诸症【二方见腹口】

五味异功治脾胃虚热口舌生疮或因误服剋伐之剂脾胃复伤而口舌生疮或弄舌流涎吐泻不止饮食少思或惊搐痰睡而露睛手足并冷若母有病致儿患者子母并服【方见用败毒之剂】

人参理中汤

人参 白术【炒】 乾姜【炮】 甘草【炙各等分】

右每服一二钱水煎蜜丸即人参理中丸加附子即附子理中汤

四物汤治疮?血虚发热烦躁或晡热作渴头目不清若因脾虚不能生血者用四君子汤【方见腋痛】

柳叶散治热毒口疮

黄栢【炒】 蒲黄 青黛【真正者】 人中白【煅各等分】

右为末敷之

加味解毒散

牛黄解毒丸【二方见胎毒疮疥】

薛氏医案卷六十四

卷六十五

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六十五

明 薛己 订

保婴撮要十

疗疮

诸疮惟疗毒为甚而杀人亦速古云疗有十三种种各不同内三十六疗满其数即不可救亦有不滿其数而死者乃毒气走散故也若痘毒染人发於头面或遍身者又非此类在小儿多因乳母食有毒之物或儿卒中饮食之毒或感四时不正之气皆能致之其疮多生头面四肢形色不一或如小疮或如水泡或痛或痒或麻木不仁外症寒热呕吐恶心肢体拘急大要当分邪之在表在里急用隔蒜灸法并解毒之剂若不省人事牙关紧闭急以夺命丹为末热酒调灌如食生冷之物或用凉水淋洗则轻者难愈重者不治其生於两足者多有红丝至脐生於两手者多有红丝至心生於唇口之内者多有红丝入喉急用针挑出恶血以泄其毒可保无虞其在偏僻之处药难导达者惟灸法有回生之功若投峻厉之剂是促其危矣小儿肌肉脆嫩且不能言痛否灸法须将蒜切薄片着肉一面略剜少空灼艾燃蒜先置大人臂上试其冷热得宜然後移着疮上又别灼蒜如前法试之以待相易勿令间歇

毗陵金文治子将周岁唇上患疗余用活命饮母子并服更欲隔蒜灸彼不从见肿势益盛勉灸数壮余诫以多灸为佳又为人所阻而止头面益肿乃复灸五十余壮肿势渐消时与乳母服活命饮疮出黄水翌日溃而得生

一小儿三岁手患紫疗二颗寒热作痛用仙方活命饮半盃而愈数日後手臂俱肿乃用隔蒜灸服前药而愈一小儿足患之呕吐腹胀二日不食欲用护心散诊气口脉大审其大便所出皆酸秽余曰此饮食停滞耳非疮毒内攻也若用护心等剂则误矣急?保和丸二服及隔蒜灸而愈其时同患是症用护心败毒之剂者俱致不救

一小儿面上患之寒热发搐此热极而肝火动也用荆防败毒散及隔蒜灸搐止热退更服异功散加升麻柴胡桔梗而愈

一小儿患於胷外敷寒凉内服败毒更欲呕不食面色痿黄右关脉浮数按之微细此脾胃复

伤所致也急用隔蒜灸服异功散倍加白术半夏翌日又服活命饮而愈

一小儿患前症服败毒之药作呕不食余谓胃气复伤不信另服护心散呕甚神思沉困手足并冷脉微细如无急用五味异功散加乾姜二服呕止食进去姜又四服而愈夫护心散皆寒凉之药乃宋人为服丹砂蓄热发疽者而设胃气有伤即当温补多因此药停於胃膈惟觉阴冷作呕沉困者世人皆谓毒气攻心而概用之鲜不败事者矣

一小儿手背患此敷服皆寒凉之剂腹胀痰喘泻粪秽臭余谓脾胃复伤而饮食停滞也不信仍服治疮之药而歿

一小儿臂患之色赤肿起恪用化毒丹铁箍散肿处顿平肉色白陷再日色黯痰喘气促余谓疮毒反入於内也辞不治果歿

飞龙夺命丹治疮毒发背脑疽等症

真蟾酥【乾者酒化】轻粉 枯白矾 寒水石 铜碌乳香 ?药 麝香
朱砂【各六钱】蜗牛【四十个另研如无亦可】

右各为末入蟾酥蜗牛或加酒少许糊丸菉豆大每服一二丸温酒或葱汤下重者外用隔蒜灸法

荆防败毒散即人参败毒散加荆芥防风【方见流注】

仙方活命饮【方见热毒疮?】

保和丸【方见发热不止】

五味异功散【方见败毒之药】

时毒【头面赤肿】

小儿时毒因感四时不正之气致鼻面耳项或咽喉赤肿寒热头痛甚者恍惚不宁咽喉闭塞状如伤寒五七日间亦能杀人脉浮数者邪在表脉沉濇者邪在里在表用葛根牛蒡子汤在里用梔子仁汤表里俱病者犀角升麻汤甚则宜砭及用通气散宣泄其毒旬日自消若不消而欲作脓者用托里消毒散欲收敛者用托里散若咽肿不能言头肿不能食者必死

一小儿患此三日二便调和用葛根牛蒡子汤漫肿悉退惟颊间赤肿欲作脓用活命饮二服外用代针膏而脓出再用托里消毒散而愈

一小儿肿赤焮痛此欲作脓也用托里消毒散二剂脓成针之肿痛顿减又二剂渐愈却以柴胡栀子散加白芷升麻与母服之愈

一小儿肿焮作痛药不能下咽先用通气散连作 却用犀角升麻汤乳食少进肿痛渐消仍服数剂而脓血渐少母服加味道遥散而愈

一小儿患之咽喉作痛二便自调用葛根牛蒡子汤三剂甘桔汤四剂肿痛渐愈诊乳母左关脉弦数用加味道遥散母子并服而消

一小儿患之赤肿作渴外敷内服皆寒凉之药余欲洗去敷药急用发散表邪开通腠理之剂不信仍用前药遂至不救

通气散治时毒焮痛咽喉不利取 以泄其毒

玄胡索 猪牙皂角 川芎【各一钱】 藜芦【五分】

羊躑躅花【三分】

右为细末用纸捻蘸少许絰鼻内取嚏为效

甘桔汤治肺经壅热胷隔不利咽喉肿痛痰涎壅盛【方见时毒】

犀角升麻汤治风热口唇颊车连牙肿痛

犀角【镑二钱】 升麻 防风 羌活 川芎 白芷【各五钱】 黄芩 甘草【各一钱】 白附子【四分】

右每服三五钱

栀子仁汤治时毒肿痛大便秘结

郁金 枳壳【麸炒】 升麻 山栀子 牛蒡子【研碎炒】 大黄【炒各等分】

右为细末每服二三钱蜜水调服

葛根牛蒡子汤治时毒肿痛消毒解热

葛根 江西豆? 贯仲 甘草 牛蒡子【半生半炒研碎各等分】

右每服三五钱水煎

柴胡梔子散【方见脇痛】

托里消毒散

代针膏

托里散

仙方活命饮【四方并见热毒疮?】

加味逍遥散【方见发热不止】

流注

小儿流注乃气流而注血滯而凝元气不足之症也或因闪跌墮伤或因肝火气逆或因六淫内侵或因脾虚食积或因禀赋所致结於四肢节 患於胷腹腰臀或结块或漫肿或作痛悉用?熨之法须固元气为主闪跌者和血定痛丸肝火者九味芦荟丸食积者四味肥儿丸药能对症未成自消已成自溃若脓成不溃者元气虚也先补而针之庶使毒气不致内攻气血不致脱陷若脓出而反痛者气血亏也用八珍汤作呕少食者胃气虚也用四君子汤欲呕不食或腹作胀者脾气虚也用六君子汤口噤搐搦者气血虚极而变症也十全大补汤内热晡热陰血虚也四物参芪白术表热恶寒阳气虚也十全大补汤热来复去或昼见夜伏昼伏夜发者虚热也当大补元气若色赤肿起而脓稠者尚可治不赤硬而脓清或脉洪大寒热发渴及不受补者皆不可治

杨鸿胪子年十二左脇下患此服流气饮十宣散之类元气益虚年余不斂左尺脉数而无力左关脉弦而短此肝经之症因禀肾水不足不能滋养肝木血燥火炽而然耳用六味地黄丸以滋肾水九味芦荟丸以清肝火而愈

一小儿九岁患此久不收斂或咳 或寒热皆服清气化痰之药前症益甚至夜作喘口开彻夜不寐手足并冷药餌到口即呕余谓悉因脾气虚甚所致先以人参白术各五钱炮姜五分以米汤煎之时灌数匙次日能服一盃次日又服一剂诸症渐愈至十余剂後朝用补中益气汤夕用异功散而愈

李通府子十六岁腰患之三年不愈色黯下陷余曰此肾经症也宜用六味丸滋化源以生肾水更用如圣饼外散寒邪以接阳气不信别用杂药元气益虚七恶蜂起始信余言仍用前药而愈

陈州守子闪右臂腕肿痛用流气等药发热恶寒饮食少思口舌乾燥肿痛愈炽形气益疲余以助胃壮气为主佐以外治之法而愈

黄地官子腿患之肿痛发热以湿毒治之虚症悉至余谓此元气虚弱外邪乘之也用十全大补汤如圣饼而愈

一小儿臂肘肿硬用流气饮肉色不变饮食少思余曰此肝脾虚症也用六君桔梗薄桂茯苓半夏及如圣饼而消

一小儿腿腕间患此已半载肿硬色白形气俱虚余先用五味异功散加当归三十余剂却佐以八珍汤二十余剂更用熨法肿势渐消中间一块仍肿此欲作脓也当补其血气遂用托里散为主异功散为佐仍用熨法月许针出稠脓仍用前二药及豆豉饼三月余而愈

一小儿腿患之肿硬色白恶寒懒食此脾胃阳气虚而不能成脓也非敷贴败毒所能疗遂用托里散及熨法月余患处胀痛发热脓成针之脓出而安仍用托里散肢体渐健因饮食内伤泄泻忽口噤目闭自汗手冷此脾胃虚寒之恶症也以异功散内用人参一两乾姜一钱半灌之尽剂而苏又以托里散内用人参五钱数剂始能动履却用托里散大补汤熨法豆饼半载而愈

一小儿十五岁早丧天真日晡发热遍身作痛或四肢酸软唾痰头运服祛湿化痰之药腿之内肉色肿硬而不变因服攻毒之药虚症蜂起按褚氏云男子精未满而御女以通其精五脏有不满之处异日有难状之疾正合此论遂用补中益气汤及地黄丸半年而愈此等症候误认为实热而用败毒之药者必致不救贾阁老子年十六患此二载矣脉洪大而数脓清热渴食少体倦夜间盗汗午前畏寒余曰此真气不足邪气有余之症治之无功矣彼恳求治午前勉用四君芎归灸草午後四君麦门五味逾月诸症渐减有用渗利之剂保其必全者彼信服之形体骨立未几而歿

一小儿右腿腕壅肿形体怯弱余欲以补气血为主佐以行散之剂彼不信反内服流气饮外敷寒凉药加发热恶寒形体愈瘠始求治於余余曰恶寒发热脉至洪大乃气血虚败之恶症也不可治矣後溃而不斂沥尽气血而亡

掌教顾东帆子十余岁秋间腰腿隐隐牵痛面色青中兼黑余曰青是肝虚黑是肾虚当急调补脾肾否则春间必患流注矣不信另用行气破血之药至夏腰臀间漫肿五寸许复来请治脉数而滑按之如无此元气虚极而脓内溃不能起也辞不治後果歿

健脾渗湿饮治疮初起焮肿作痛或湿毒下注或环跳穴痛

人参 白术 苍术 防己【酒拌】 黄柏【炒】 川芎 陈皮 当归
茯苓【各五分】 木瓜【不犯鉄器】 柴胡 稍甘草【各三分】

右姜水煎服如三五剂不退加桂少许酒煎亦可小便澀加牛膝身痛加羌活

和血定痛丸【一名黑丸子】治流注膝风或闪跌瘀血肢节肿痛服之自消若溃而发热与补药兼服自效

百草霜【五两】赤小豆【八两】川乌【炮一两半】白芷【八两】白芨南星【炮各二两】芍药当归牛膝【各五两】骨碎补【四两】

右为末酒糊丸桐子大每服二三十丸白汤下

神效?熨法治流注结核或骨痛鹤膝等症先用隔蒜灸若余肿尚存用此熨之以助气行血散其壅滞功效甚速又治跌扑损伤止痛散血消肿之良法也其法用葱细切捣烂炒热频熨患处冷则易之如鹤膝风兼服大防风汤而愈

隔蒜灸法治流注及痈疽鹤膝风等症每日灸二三十壮痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒随火而散盖火以畅达拔引郁毒此从治之法有回生之功其法用大蒜去皮切三文钱厚安患处用艾壮於蒜上灸之三壮换蒜复灸未成即消已成者亦杀其毒如疮大用蒜杵烂摊患处将艾铺上烧之蒜败再易如不痛或作脓或不起发及疮属陰症者尤当多灸凡疮不痛不作脓不发起者皆气血虚也多主不治惟患在头面者不宜灸论中婴儿灸法见疔疮

如圣饼治流注及一切疮?不能消散或溃而不斂乳香?药木香血竭当归【各等分】麝香【減半】

右为末用酒糊和饼二个乘热熨之毒疮加蟾酥

六味丸一名地黄丸此壮水之剂也夫人之生以肾为主凡病皆由肾虚而致其流注癰?属肝肾二经发热作渴小便淋秘痰气壅盛 血吐血头目眩运小便短少眼花耳聋咽喉燥痛口舌疮裂齿不坚固腰膝痿软五臟虚损尤宜用之乃水泛为痰之圣药血虚发热之神剂也【方见发热不止】

当归补血汤治流注及溃?肌热面赤烦渴脉洪大而虚重按全无此血虚症也误服白虎汤必死【方见发热不止】

益气养荣汤治流注气血虚弱不消散或四肢颈项患肿不问坚软赤白或痛或不痛日晡发热或溃而不斂【方见鹤膝风】

十全大补汤治诸疮血气虚弱不能消散溃腐收敛或寒热汗出口眼歪邪肌瘦少食或日晡发热自汗盗汗或朝寒暮热疮口不斂等症【方见便痢】

天蛇毒

手指头生疮俗名天蛇毒然五指各有经络拇指属手太陰肺经食指属手阳明大肠经中指属手厥陰心包络经无名指属手少阳三焦经小指属手少陰心经亦有患於足者足趺属肝胆胃三经大指属肝脾二经次指属胆经小指属膀胱经各当随经而治其致患之由或因胃中积热所发或因乳母膏粱厚味所致或因湿热下流或因风毒外中大率多由所稟足三陰之经虚故邪得以入之也其初患肿痛者先用仙方活命饮次用托里消毒散元气下陷重坠作痛久而不溃者用补中益气汤若服败毒散及敷寒凉之剂则疮口变黑或努肉突出或指皆黑大抵手足为气血难到之处手属於胃足属於脾不可损其真气丹溪以醫居僻位尚言气血罕到况肢末乎故寒凉克伐之药所宜深戒者也一小儿十四岁手大指患之色赤肿痛用夺命丹二粒活命饮一剂将愈因饮酒沐浴而疮复作发热 余谓此毒原属肺经今肺为湿热所攻疮毒乘势妄行故复作耳先用泻白散二剂而痰 除又用托里消毒散而疮愈

一小儿食指患之迸出血水疮口凸肿上连手背久而不愈余曰此元气虚弱风邪袭於患处血气不能运及而然用托里散及葱熨之法诸症悉退又用豆豉饼异功散加升麻柴胡而愈

一小儿患之作痛发热内外皆用寒凉之药手背出脓三月不愈面色痿黄此脾气复伤也先用异功散加升麻柴胡桔梗渐愈又佐以托里散豆?饼而痊

一小儿十三岁素食膏粱足大指患之肿连脚面喜饮冷水右关脉洪大此脾气复伤而积热下注也先用清胃散四剂次用活命饮二剂肿痛渐消又用托里消毒散数剂脓溃而愈

一小儿足大指漫肿上连趺伤色赤肿甚右关脉数而有力此胃经湿热下注也用活命饮一剂大指本节後始发疮头痛亦稍止再剂而漫肿悉退又用消毒散出脓托里散收敛而愈

一小儿足次指患之色赤肿痛上连於腿外涂寒凉之药反致麻木重搯方知此气血难到之所又因寒凉遏絕而然急以活命饮加黄芪五钱煎服外以姜葱汤洗去敷药用隔蒜灸法半晌知痛其肿顿消再用托里散加人参三钱数剂脓溃而愈

一小儿足大指患之内服外敷皆寒药也腹痛恶心手指并冷此脾胃之气复伤而作非疮毒也先用异功散加柴胡升麻白芷及仙方活命饮各一剂诸症顿退又用托里消毒散脓溃而愈

一小儿足大指患之变脓窠之状良久乾硬痛甚小便频数此稟父肾经虚热所致用六味地黄丸而愈一小儿足中指患之耳中肿痛小便频数此稟父肝肾虚热为患用六味地黄丸为主佐以柴胡栀子散而愈一小儿不时生疮 在手足之表年余不愈审其乳母善怒用加味逍遥散母子服而愈

一小儿足大指患之肿痛连脚用活命饮及隔蒜灸其痛不止着肉艾灸数壮方止用活命饮

及托里消毒散而愈

一女子十五岁足拇指痒痛敷败毒之药势益甚而色黯余谓脾经郁结所致彼人略不经意後朝寒暮热饮食顿减患处微肿足胫渐细而歿

钱氏泻白散【方见臂痛】

夺命丹【方见疔疮】

消毒散【方见胎毒发丹】

熨法

托里散【二方见流注】

仙方活命饮

托里消毒散【二方见热毒疮?】

东垣清胃散【方见腹痛】

五味异功散【方见败毒之药】

补中益气汤【方见肌肉不生】

天泡疮

天泡疮状如水泡属肺胃二经风热若发热焮痛邪在表也用人参败毒散发热咳 邪在肺也用加味泻白散热渴便秘邪在内也用加味清凉饮此肌肤之症当去毒水以金黄散或黄柏蚯蚓敷之当归膏亦善既安不必服药若因攻伐过度元气虚而变生别症者当参各门治之

一小儿患此焮赤恶寒发热大小便赤澁此邪在表里之间遂外敷金黄散内服大连翘饮子诸症少愈更加味解毒散而痊

一小儿患之焮痛发热大小便如常此邪在表也挑去毒水敷金黄散用荆防败毒散治其表柴芍参苓散安其里而愈

一小儿患此服败毒之剂喘 唇白此脾肺之气复伤也先用补中益气汤一剂诸症悉退後

加桔梗白芷二剂而愈

一小儿患此服败毒散传寒凉药呕吐泄泻犹索败毒散余佯诺之却以五味异功散加柴胡升麻而吐泻愈又用柴芍参苓散而疮痊

一小儿患此服败毒之药腹痛泄泻余意脾气复伤宜用五味异功散不信仍服败毒之药後果不食作呕流涎泄泻後重余先用补中益气汤次用五味异功散而愈

一小儿患此服败毒散作渴饮汤余与七味白术散治之不信自服败毒之药前症益甚更加呕吐不食来请治余曰呕吐不食手足并冷痰喘气促唇色皎白始见虚寒即当温补反服攻伐元气之药虚而又虚今脾肺败症已见莫能为矣辞之果不治

柴芍参苓散治肝胆经分患天泡等疮或热毒瘰?之类

柴胡 芍药 人参 白术 茯苓 陈皮 当归【各五分】 牡丹皮 山梔【炒】 甘草【各三分】

右每服二钱水煎服

加味解毒散治天泡疮发热作痛即加味消毒散加金银花漏芦

玄参 连翘 升麻 芍药 当归 羌活 生地黄 牛蒡子【炒各三钱】 黄芩 甘草【各二钱】 金银花漏芦【各五钱】

右每服一二钱水煎服或用蜜丸

金黄散治天泡疮消毒止痛

滑石 甘草

右各另为末和匀傅患处如泡挑去水傅之加黄柏尤好

补中益气汤【方见肌肉不生】

五味异功散【方见败毒之药】

加味泻白散【即泻白散加山梔杏仁】

杨梅疮

杨梅疮乃天行时毒亦有传染而患之或禀赋所得者受症在肝故多起於下部治失其宜多致蚀伤眼目腐败肾茎拳挛肢节初起之时上体多者先用荆防败毒散下体多者先用龙胆泻肝汤大便闭者用大连翘饮後用换肌消毒散若蚀伤眼目兼用九味芦荟丸六味地黄丸肢节拳挛兼用蠲脾解毒汤若因脾胃亏损而不能愈者先用异功散後用换肌消毒散若用轻粉之药多致败症也

一小儿周岁传染此疮误薰银朱之药昏愤不乳遍身无皮用菴荳黄柏遍搽席上令儿睡卧更用金银花生甘草为末白汤调服渐愈若疮乾燥更用当归膏误用轻粉者亦以前药解之

一小儿患此年余不愈形体消瘦日晡尤甚朝用八珍汤夕用换肌散并太乙膏三月余而愈

一小儿原有肝痞後染前症脓水淋漓腹胀呕吐小腹重坠余欲用补中益气汤升补中气不信仍服消毒之剂更喘 流涎余谓脾气虚而肺气弱也朝用补中益气汤夕用五味异功散元气渐复仍佐以换肌消毒散寻愈

一小儿因母曾患此症生下即有用换肌散母服五十余剂子用当归膏调金黄散随患处傅之寻愈

一小儿十四岁患此用薰法肢体面目悉皆浮肿数月间遍身皮肤皆溃如无皮状脓水淋漓先用金银花甘草煎汤与之恣饮又为末掺遍身及铺枕蓆令儿卧之半月许皮肤稍愈却佐以换肌散而愈又一小儿二岁用薰法吐痰喘躁不及治而死

换肌消毒散【一名?藓草】治杨梅疮不拘初患日久并效土茯苓【即?藓】当归 白芷 甘草 皂角刺 薏苡仁 白藓皮 木瓜【不犯铁器】

右水煎食前并空心服

又方 治大人之剂如用前方未应或儿长大宜用此方

土茯苓【五钱】当归 皂角刺【炒】薏苡仁 白芷【各一钱】白藓皮 木瓜【不犯铁器】金银花 木通【各七分】甘草连翘 防风【各五分】茯苓【一钱】黄芪【炒二钱】芍药【炒一钱】川芎【八分】生地黄【八分】

右作二三剂水煎出幼者作一剂煎分两三次服

蠲痹解毒汤

姜黄 羌活 白藓皮 赤芍药 当归【各四分】白术【五分】茯苓 白芷 皂角子【炒各三分】

右水煎服

九味芦荟丸【方见喉痹】

当归膏【方见汤火疮】

太乙膏【方见跌扑外伤】

金黄散【方见泡疮】

赤白游风

赤白游风属风热血热盖血得热而游走耳白属气分赤属血分或因腠理不密风热相搏怫郁而成或因乳母食膏粱厚味所致若风热者用小柴胡汤加防风连翘血热者用四物汤加柴胡山梔牡丹皮风热相搏者用人参败毒散内热外寒者用加味羌活散胃气虚弱者用补中益气汤加羌活防风或消风散血虚者用加味逍遥散如未应用逍遥散六味丸若婴儿患此当审其受症之因而调治其母

一小儿患此其色或赤或白或痛或痒询之因母食膏粱厚味所致余用东垣清胃散治其母牛黄散治其儿而愈

一小儿患此因母鬱怒所致母用加味小柴胡汤及加味逍遥散儿热止又以加味归脾汤而愈

一小儿患此嗜膏粱甜味齿龈浮肿渐至蚀烂先用清胃散後以四味肥儿丸间服而愈

一小儿患此色赤作痒脉浮数此肺胃二经风热也用人参消风散而愈又因停食复发色赤作痛先用保和丸後用异功散而消

一小儿患此作痒搔破脓水淋漓寒热往来此肝经血燥而生风先用加味逍遥散肝症顿退倦怠少食用异功散三黄散而愈

一女子十五岁患此色赤作痒寒热脇痛面青或赤此肝火动而血热也先用加味逍遥散加胆草四剂诸症顿退但体倦少食恶寒欲呕此脾为肝木所侮而肺气虚也用五味异功散及加味逍遥散而愈

一女子患此寒热作呕先用加味小柴胡汤二剂而安再用人参消风散而愈後因怒发热经行如崩遍身赤色四肢抽搐难以诊脉视其面色如赭此肝心二经木火相搏而血妄行耳先用柴胡梔子散再加味逍遥散诸症顿退又用八珍汤而痊

一小儿因母感寒腹痛饮烧酒儿遍身皆赤游走不定昏愤发热令乳母时饮冷米醋一二杯亦以二三滴涂儿口内周日而痊

归脾汤治小儿因乳母忧思肠脾血虚发热患前症久不愈食少体倦或便血下血怔忡不宁惊悸少寐或心脾作痛自汗盗汗等症【方见赤游风】

人参消风散治赤白游风或风热隐疹搔痒或寒热作痛

人参【三钱】荆芥穗 甘草【炙】 陈皮【各五钱】 白僵蚕 茯苓 防风 芎藭 藿香 蝉蜕【各三钱】 厚朴【三钱姜制】 羌活【二钱】

右每服一二钱水煎

加味逍遥散【方见发热不止】

三黄散【方见黄水疮】

柴胡栀子散【方见脇痛】

小柴胡汤【方见腋痛】

加味小柴胡汤【方见热毒瘰癧】

牛黄解毒散【方见头面疮】

发癍

洁古云癍疹之病焮肿於外者属少阳相火也谓之?小红 隐於皮肤之中者属少陰君火也谓之疹?疹并出则小儿难禁然首尾俱不可下大抵安里之药多发表之药少小便秘则微疎之身温者顺身凉者逆大忌外敷寒凉内用疎导无此二者可保无虞

一小儿患癍发热体倦少食此脾肺气虚外邪相搏也先用消风散二剂随用补中益气汤加茯苓芍药而愈一小儿患癍作痛热渴服发表之剂益甚形气倦怠脉浮而数此真气复损而然耳遂用人参安胃散补中益气汤而愈

一小儿患癍发热用犀角消毒散一剂吐泻顿作余曰此邪气上下俱出矣勿药自愈未几果安

一小儿素面白患疹作痒鼻塞流涕咳 不止用败毒散脓文淋漓恶寒喘急朝寒暮热余谓

脾肺之气复伤耳用补中益气汤稍愈佐以五味异功散而愈

一小儿患疹寒热搔痒先用消风散治其儿次用加味逍遥散治其母两月而愈

一小儿患癍作渴发热咳 此邪在表宜汗之先用葛根橘皮汤一剂次用玄参橘皮汤而安癍丑岁患此症者余先用葛根橘皮汤後仍用玄参橘皮而全愈一小儿患疹先用抱龙丸解之彼之父母另用以他药下之其疹稠密余曰凡疮疹始出未有他症但须用平和之药以解之如三日不出或出而不快宜微发之更又不出当再发之出而不多脉和平者无他症也若疮疹本稀少者不可更发若疮疹起发而能饮食者以大黄丸下一二次若初起就用下行之剂则里虚而疮疹不能尽发出而稠密难治至三日其疮疹黑陷所喜特不寒战余遂用百祥丸及牛李膏各一服其疮疹复红活而愈

一男儿因戏秋千絶?而坠遂患急惊发搐或用以表散之药不愈余曰此乃急惊当先退其热遂用以大黄丸玉露散及惺惺丸又加以牛黄龙麝解之至三日肌肤尚热余曰再二日不愈必发癍疮也已而果然用服必胜散七日而愈此乃初因误散其表则内热不止而癍疹必自生也若幼小之儿尤宜谨慎

百祥丸治痘疮及癍疹黑陷 吐青绿水

红牙大戟【陰乾浆水煮软去骨复入原汁中煮】

右焙乾为末水丸粟米大每服十丸赤脂麻汤下服後须急以四君子加丁香陈皮木香厚朴炮姜以温补土脾若身热饮水黑陷复起十中可救一二

牛李膏治痘疮癍疹黑陷

牛李子

右杵汁石器内熬膏每服阜子大煎杏胶汤化下

玉露散治伤热吐泻黄色後药为末每服五分白滚汤调下

石膏【煨】寒水石【各五钱】甘草【二钱五分】

人参安胃散治癍疹及服峻剂以致亏损脾胃虚热泄泻呕吐饮食少思等症【方见喉痹】

犀角消毒散治癍疹丹毒发热痛痒及疮疹等症牛蒡子 甘草 荆芥 防风【各五分】犀角【镑二分】金银花【三分】

右水煎熟入犀角倾出服

补中益气汤【方见肌肉不生】

五味异功散【方见败毒之药】

加味逍遥散【方见发热不止】

黄水粘疮

小儿黄水粘疮属肝脾二经风热积热所致邪在表而痒痛者轻则犀角消毒散重则连翘防风汤邪在内而大便秘者轻则九味解毒散重则大连翘饮若头目不清憎寒壮热作渴便秘者表里俱有邪也加味清凉饮若误服剋伐之药而致发热恶寒者肺气伤也用四君桔梗柴胡发热呕吐胃气伤也用异功散发热作泻脾气虚也用六君子汤并加柴胡升麻余当随症裁之一小儿患此脓水淋漓寒热作痛服抱龙丸败毒散更加气喘等症盖气喘发搐乃肝火乘脾咬牙流涎乃脾气虚寒遂朝用补中益气汤夕用五味异功散外敷立效散而愈

一小儿患此发热惊悸倦怠面黄懒食流涎服清凉之药更加吐泻睡而露睛余谓心脾虚热用六君乾姜一剂顿愈又用异功散立效散而愈

一小儿患此或痒或痛脓水淋漓服表散之剂更恶寒发热呕吐发热手足并冷此病气实而元气虚也先用异功散加桔梗藿香而呕吐止又用异功散而寒热除用人参消风散而疮愈

一小儿所患同前服荆防败毒散加喘 腹胀四肢发搐此脾肺气虚而肝木乘之用异功散加柴胡升麻桔梗一剂诸症顿退又服异功散二剂而愈

一小儿患此服抱龙丸之类汗出喘 此肺气虚而为外邪所乘也用异功散加桔梗二剂又伤风发热咳 其疮复甚用惺惺散一服外邪顿退又用异功散而疮毛通府子患此卯关脉青两目时割形体困倦此土虚木旺当用和肝补脾汤反服败毒散前症益甚更加吐泻不食遍身发泡余用前汤刺泡出水用菉豆甘草末频铺席上任儿睡卧後用神效当归膏而愈

沈尚宝子患此咳 恶寒用大连翘饮腹胀少食此表症泻里致元气复损非其治也用补中益气汤而愈一小儿患此作痒发热脓水淋漓面青恶寒此肝火血热用加味逍遥散稍愈又用和肝补脾汤而痊

一女十四岁遍身疙瘩搔破脓水淋漓发热烦躁日晡益甚此血气虚而有热也用加味逍遥散而愈

大连翘饮治风毒热毒发热作痛二便不利表里俱实【方见臂痛】

柴胡栀子散治肝胆风热生疮作痛发热或疮破而脓水淋漓或发寒热晡热即柴胡栀子散【方见脇痛】

犀角消毒散治热毒积毒发于肌表而头面生疮或痛或痒者【方见发癰】

九味解毒散治热毒胎毒而发疮疡之类未溃作痛者黄连【炒三分】金银花 连翘 漏芦【各五分】山栀【四分】白芷【六分】当归【八分】防风【三分】甘草【三分】

右水煎服

黄连消毒散治脑疽背疽肿焮疼痛或麻木者

黄连【制】羌活【各一分】黄芩 黄柏【各五分】生地黄 知母【制】独活 防风 当归尾 连翘【各四分】藁本 防己 桔梗【各五分】黄芪 苏木 陈皮 泽泻【各三分】人参 甘草【各三分】

右水煎服

人参消风散治小儿疮疡脓水淋漓误服表散之剂更兼恶寒发热呕吐不时不思饮食或痒或痛手足并冷元氣甚虚头目拘急肢体烦疼肌肉颤动耳若蝉鸣鼻塞多 皮肤顽麻瘙痒癰疹目澁昏困【方见赤白游风】

连翘防风汤治小儿肝脾风热时毒头面生疮

连翘【研碎】防风 黄连 陈皮 芍药 当归 独活 白蒺藜【炒去刺】荆芥 茯苓 黄芩 甘草 牛蒡子【炒研等分】

右每服二钱水煎服

惺惺散治风寒疮疹痰 发热

桔梗 细辛 人参 白术 甘草 瓜蒌根 白茯苓

右为末每服二钱入薄荷五叶水煎服

和肝补脾汤治风热疮疹脾土不及肝木太过

人参 陈皮 川芎【各五分】白术 茯苓 芍药【各七分】柴胡 甘草【炙各三分】山栀【炒各四分】

右作二剂水煎服

益脾清肝散治肝脾风热疮寒热体痛脾胃虚弱人参 白术 茯苓 甘草 川芎 当归 黄芪【各三分】柴胡 牡丹皮【各二分】

右水煎服

三黄散治风热疳热生疮水浸淫脓流处便湿烂松香 五倍子 黄连 黄丹 海螵蛸【各一钱】轻粉 雄黄【各少许】

右各为细末用猪脂油调涂疮上如疮有脓水者更须以细末乾掺疮上先拭洗脓水而敷之

荆防败毒散治疮发痛或发寒热或头目拘急胀痛邪在表者及脓水淋漓或痒或痛者

人参 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 枳壳 茯苓 川芎 甘草 荆芥 防风【各等分】

右水煎服

立效散治眉疮耳疮及一切疮疥

定粉 松香 黄柏 黄连【各五钱】枯矾【二钱】

右为末清烛油调搽

头面疮

头额疮发者皆属心经耳疮少阳经发两鬓者皆属胆经发於颊前鼻孔及人中左右者皆属大肠经发於鼻之夹孔下唇口反承浆颐後颊车耳前髮际额颅者皆属胃经发於目内眦上额尖至後脑项者皆属膀胱经既察其经即当分治若禀肾火者用六味地黄丸胎毒者犀角消毒丸食积疳者四味肥儿丸乳母膏粱者东垣清胃散至於诸腑受病必兼诸臟故患於额间属心经发热饮冷者为实热用导赤散发热饮汤者属虚热用养心汤左腮属肝经或颈项劲强者为实热用柴胡清肝散或咬牙顿闷者虚热用六味地黄丸右腮属肺经喘 饮冷者为实热泻白散发热咳 者为火刑金用人参平肺散鼻间属胃经发热饮冷大便黄硬者为实热用泻黄散发热饮汤大便青白者为虚热用异功散患於颊及耳轮者属膀胱经肾无实症惟用地黄丸若疮已溃久而不愈则当审其脏气之相胜病邪之传变而以调补脾胃为主若因乳母遗热为患者当先治其母则儿病自愈也

一小儿鬓患一疮肿赤作痛余谓属手足少阳经风热用柴胡栀子散不应疹其母左寸关脉弦洪而数即以前药令母服之儿遂愈

一小儿十三岁右颊患肿作痛饮冷脉沉重重按则数此积热在臟也当疏通其内不信乃泛服杂药兼敷寒凉肿硬下颈内溃复来请治脉已无力矣先用托里散二剂针之又二剂而脓始出恶寒少顷烦躁发热作渴痰喘此溃後变症因气血虚故也先用当归补血汤二剂诸症顿止又用异功散加山梔胃气亦健未用托里消毒散疮敛而愈

一小儿右腮赤肿余谓胃经有热先用泻黄散二剂又用清胃散而愈後复患之敷石灰等药致伤其血疮不能溃余先用活命饮次用托里消毒散而愈

一小儿耳後结数核作痛左腮青赤此肝疳积热所致用四味肥儿丸柴胡清肝散及五味异功散加柴胡升麻而消

一小儿耳赤肿痛寒热往来此肝经热毒也用加味小柴胡汤寒热悉退又用柴胡清肝散而赤肿顿消一小儿颊间赤色作渴目睛白多面常生疮睡而露睛先君谓稟父陰虚用地黄丸补中益气汤而愈後出痘亦无虞设不预为调补肾气则出痘之危其可保耶一小儿四岁太阳连眉不时作痒或生小疮此属胆经风热也先用地黄丸次用柴胡梔子散後专服地黄丸而愈

一小儿面常生疮左颊赤肿或睡中发搐审其母素有鬱怒用加味逍遥散加味归脾汤母子俱服而愈一小儿面白时或变赤生小疮两足发热先君以为稟赋足三陰虚热不信专服清凉之药後出痘果黑陷而歿

一小儿久患前症耳下结核余曰此肝脾疳毒也久而不愈则先用五味异功散加柴胡梔子散清其肝火後用四味肥儿丸治其疳而愈

一小儿患前症耳後结核大便酸臭饮食减少余谓此脾疳所致先用五味异功散为主异功散为佐而愈一小儿患前症头皮光急发热作渴小便频数余谓此肾肝之疳也用地黄丸为主朝用补中益气汤夕用五味异功散而愈

一小儿患左腮肿赤竟以鉄箍散周围涂之遂致肿甚变成为疮出脓月余不愈肿赤不消颈项劲强余谓此乃肝经实热所致也用柴胡清肝散数剂而肿赤渐消外以当归膏而愈

一小儿患前症咬牙顿闷此乃肝经虚热之所致也外以当归膏敷涂患处服以六味丸料渐瘥

一小儿患右腮肿痛初略微细红色後遂日渐红赤肿亦日增更又发热喜饮凉冷喘急咳余谓此乃肺经之实热所致也用泻白散而愈

一女子年十一岁忽患右腮肿痛渐而日甚成疮肿赤不减先用仙方活命饮四剂溃脓但发热咳 不减此肺火刑金用人参平肺散数剂而愈

一小儿年十二岁常患鼻间及鼻孔中生疮常发常愈亦不以为意忽又於鼻孔中顿发一疮月余不愈渐生於外遂觉疼痛身体疲倦更加发热饮食不思日加其痛昼夜咳 欲饮凉冷大便实结粪色黄硬余谓此乃胃经之火实热所致也遂用泻黄散数剂而渐色或青或白此乃胃经之虚热也用异功散而瘥

一小儿患髮际生疮被风入疮口肿痛极甚眼为蔽合身体发热服寒凉之药致饮食顿减患处不溃余用托里养血之剂数服而饮食稍进肿亦渐消而疮亦脓溃後因劳每日晡发热此陰虚而内热也以四物汤软柴胡地骨皮又用养血之药而疮愈

一小儿先患眉炼延及遍身如癩久而不愈手足并热面色常赤此稟母胃火所致子服泻黄散母服竹叶石膏汤加味逍遥散子又用牛黄散拔毒散母子并愈一小儿头患疮如癩或作痒结痂或脓水淋漓二年矣作渴饮冷发热面赤此稟心与小肠表里俱有热也先用导赤散二服却用活命饮拔毒散渐愈子又服牛黄散母服逍遥散而愈後因母食膏粱复发用清胃散母子服之子又服活命饮而愈

一小儿面生疮作渴饮汤服败毒之药致吐泻不食手足并冷余谓脾胃气虚复伤而变症虚寒也先用益黄散而诸症退用异功散而疮症愈

钱氏泻黄散治疮瘍作渴饮冷卧不露睛手足并热属胃经实热宜用泻黄散若作渴饮汤卧而露睛手足并冷属胃经虚热宜用五味异功散若误服攻毒之剂吐泻不食手足指冷脾肾虚寒也宜用益黄散若病後津涸不足口乾作渴胃气虚也宜用七味白术散

藿香叶 甘草【各七钱五分】 山梔仁【一两】 石膏【煨五钱】 防风【二两】

右用蜜酒微炒为末每服一二钱水煎

益黄散治疮瘍属脾胃虚寒吐泻不止手足并冷者陈皮【一两】 丁香【二钱】 诃子【炮去皮】 青皮【去白】 甘草【炙各半两】

右为末每服一钱水煎

养心汤治心气不足虚热上攻而患疮者

黄芪【炒】 白茯苓 半夏麴 当归 川芎 辣桂 柏子仁 酸枣仁【炒】 五味子【杵】 人参【各三钱】 甘草

【炒四钱】

右每服一二钱姜枣水煎为末服亦可

牛黄解毒散治胎毒头面生癩或延及遍身痒痛不安浸淫不愈及眉炼疮

生甘草【一两】牛黄【五钱膏粱之子必用之】金银花【一两】

右各为末每服二三分乳汁调服或用甘草煎膏为丸如芡实大每服一丸白汤化下外傳清金散亦可

拔毒散治症同前及疥癩疮癰

黄芩 黄连 白矾【三味俱生用】雄黄【各五钱】铜礞【三钱痒甚加之】松香

右各另为末乾摻患处或用油调搽疥疮宜加枯矾三钱

梔子清肝散【即柴胡梔子散】治三焦及足少阳经风热耳内作痒生疮出水或脇肋乳间作痛往来寒热【方见脇痛】

仙方活命饮治一切疮毒肿痛或作痒寒热或红丝走彻恶心呕吐等症【方见热毒疮?】

治疗疮等症用金银花杵烂绞汁杯许入热酒半杯徐徐服之用藤叶亦效无鲜者用枯者煮饮亦可

导赤散【方见臂痛】

六味丸【即地黄丸加五味子四两肉桂一两名加減八味丸】

竹叶石膏汤【二方见作渴不止】

清胃散【方见腹痛】

人参平肺散【方见肺痛】

当归补血汤【方见发热不止】

五味异功散【方见败毒之药】

托里消毒散

托里散【二方见热毒疮?】

加味归脾汤

柴胡栀子散【即栀子清肝散】

小柴胡汤【二方见脇痛】

人参消风散【方见赤白游风】

泻白散【方见臂痛】

大枫膏【方见疮疥】

加味逍遥散【方见发热不止】

补中益气汤【方见肌肉不生】

四味肥儿丸【方见贴骨痛】

眉炼【附癩头疮】

眉炼者谓小儿两眉间生疮如疥癬当求其因而药之盖眉属胆经若原禀肝胆经热或乳母肝胆经有热者用柴胡栀子散或乳母食厚味醇酒者用加味清胃散或乳母有郁怒者用加味逍遥散俱与乳母服子亦饮少许仍参前症主之

一小儿患前症用柴胡清肝散母子服之而愈後因母不戒膏粱厚味复发延及遍体脓水淋漓先用清胃散次用柴胡栀子散与母服子用清金散牛黄解毒丸而愈

一小儿嗜膏粱甘味患之渐及肢体两眉为甚脓水淋漓寒热往来内用清胃散加味小柴胡汤外傅立效散而愈後眉间复发两目连劓小便白浊将成肝疳用四味肥儿丸九味芦荟丸而愈

一小儿因乳母不戒七情厚味患此延及遍身久而不愈母先用清胃散次用加味逍遥散子用牛黄散解毒丸立效散而愈後儿食厚味眉间作痒搔破成疮或痒或痛两目连劓用四味肥儿丸佐以加味清胃散而愈一小儿眉间作痒破而成疮延及遍身两脇为甚用四味肥儿丸立效散母服柴胡栀子散加味逍遥散而愈一小儿患此服化毒丹乳食不纳手足俱冷此药伤胃气用五味异功散与母服儿亦时服三五滴母又服加味逍遥散加龙胆草漏芦儿症渐愈

一小儿患此先延两脇後先遍身此肝火乘脾也诊乳母亦有肝火先用加味逍遥散加炒黄

连数剂却去黄连又二十余剂而痊

一小儿患之乳母恼怒其疮益甚眉棱抽动不经意延及遍身乳母甚怒儿面色赤惊悸咬牙兼之发搐此心肝二经风热所致也用加味小柴胡汤加味逍遥散而愈

青金散治小儿疥癣眉炼或延及遍身瘙痒或脓水淋漓经年不愈

松香【二两】真蛤粉【五钱】青黛【二钱五分】

右为末用烛油调搽或乾掺之或加轻粉枯矾各三钱以治前症及胎毒疥癩尤效

立效散【方见黄水痘】

加味逍遥散【方见发热不止】

牛黄解毒散【方见前】

四味肥儿丸【方见贴骨痛】

九味芦荟丸【方见喉痹】

加味清胃散

清胃散【二方见腹痛】

小柴胡汤【方见脇痛】

加味小柴胡汤【方见热毒瘰癧】

导赤散【方见臂痛】

活命饮【方见热毒疮?】

牛黄解毒散

拔毒散【二方见头面疮】

薛氏医案卷六十五

卷六十六

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六十六

明 薛己 订

保婴撮要十一

喉痹【附五臟虚羸传变喉间内溃或鼻中垂出息肉或鼻外患疮】

一小儿喉痹因膏粱积热或禀赋有热或乳母七情之火饮食之毒当分其邪蓄表里与症之轻重经之所主而治之若左腮色青赤者肝胆经风热也用柴胡栀子散右腮色赤者肝经有热也用泻白散额间色赤者心与小肠经热也用导赤散若兼青色风热相?也用加味逍遥散鼻间色黄脾胃间有热也用泻黄散若兼青色木乘土位也用加味逍遥散兼赤色心传土位也用柴胡栀子散颧间色赤肾经有热也用地黄丸凡此积热内蕴二便不通者当疏利之风邪外客而发寒热者当发散之外感风邪大便闭结烦渴痰盛者当内疏外解若因乳母膏粱积热者母服东垣清胃散若因乳母恚怒肝火者母服逍遥散禀赋陰虚者儿服地黄丸大概当用轻和之剂以治其本切不可用峻利之药以伤真气也

一小儿喉间肿痛惊悸饮水服惊风降火之药益甚仍欲攻风痰余曰惊悸饮水心经虚症也盖胃为五臟之本先用五味异功散以补胃加桔梗甘草以消毒诸症顿退後用牛蒡子汤加柴胡而愈

一小儿喉间肿痛左腮色青赤此心肝二经之热也用柴胡清肝散而愈後因惊服至宝丹吐痰发搐手足指冷此肝木虚而肺金乘之用补中益气汤以补脾肺六味地黄丸以滋肝肾而痊

一小儿发热饮冷大便黄色手足并热不能吮乳视口内无患扪其喉间则哭此喉内作痛乃脾胃实热也用泻黄清胃二散各一剂母子并服而愈後因乳母饮酒儿躁不安口内流涎仍用前二散而愈

一小儿喉间肿痛口角流涎手足并热用泻黄清胃二散母子服之而愈後因母大怒儿憎寒发热仍复流涎用柴胡清肝散加漏芦母子服之而愈

一小儿喉间肿痛发热咳 大便秘结此肺与大肠有热也先用牛蒡子汤加硝黄一服大便随通乃去硝黄再剂顿愈审其母有肝火发热用柴胡清肝散母子并服而痊

一小儿嗜膏粱之味喉间肿痛痰涎壅盛服巴豆丸前症益甚口鼻出血唇舌生疮大便不实余用犀角地黄汤解膏粱之热用东垣安胃散解巴豆之毒又用甘桔汤而愈

一小儿喉肿作渴大便乾实右腮赤色此肺与大肠经实热也用柴胡饮子一服而愈後因饮食停滞服峻厉之药喉间仍肿腹中胀痛此脾气复伤也用异功散加升麻当归而痊

一小儿因母忿怒患前症兼咬牙呵欠余谓肝经虚热之症子用甘桔汤加柴胡山梔牛蒡子母服加味逍遥散而愈

一小儿肌体瘦弱嗜土炭煤灰後鼻间不利略服清热之剂肌体愈瘦食少热甚善惊善怒小便良久变白鼻中出息肉二寸许耳下颈间结小核隐於筋肉之间余谓肝脾虚羸之变症不信乃内清肺火外用腐蚀喉间亦腐余先用五味异功散加升麻柴胡芫荇为主更用四味肥儿丸为佐脾气渐健夕用九味芦荟丸为主以五味异功散为佐而愈

一女子六岁喉间肿痛鼻中息肉寒热往来小便频数良久变白此肝疳之症先用加味逍遥散加炒黑焦龙胆草热痒渐退乃去龙胆草佐以四味肥儿丸而愈一女子七岁鼻生息肉搽攻毒之药成疮肿痛外以黄连甘草黄柏末傅之以解药毒更以加味逍遥散清肝火佐以四味肥儿丸而愈

一女子鼻中及下部常出息肉屡用毒药蚀之各挺出一条三寸许先与龙胆草汤为主以加味逍遥散为主而愈

一小儿额间赤足心热喉中常痛服清胃败毒之药余谓禀肾水不足而心火炽甚也当用地黄丸壮水之主以制阳光不悟口舌赤裂小便如淋而歿

一女子十四岁患前症杂用清热败毒等药前症益甚更患陰挺详见下疳疮

牛蒡子汤 治风热上壅咽喉肿痛或生乳蛾

牛蒡子【炒杵】玄参 升麻 桔梗【炒】犀角【镑】黄芩木通 甘草【各等分】

右每服一二钱水煎服

拔萃桔梗汤 治热肿喉痹

桔梗【炒】甘草【炒】连翹 梔子【炒】薄荷 黄芩【各等分】

右为末每服一二钱水煎服

柴胡饮 解肌热积热或汗後余热脉洪实弦数大便坚实者

黄芩【七分】甘草【四分】大黄【八分】芍药【炒七分】柴胡
人参【各五分】当归【一钱】

右每服一钱姜水煎

东垣人参安胃散治脾胃虚热口舌生疮或伤热乳食呕吐泻痢

人参【一钱】黄芪【炒二钱】生甘草 炙甘草【各五分】白茯苓【四分】陈皮【三分】
黄连【炒二分】白芍药【酒炒七分】

右为末每服二钱水煎

三因玉钥匙治风热喉闭及喉风

焰硝【一两半】鹏硝【半两】片脑【一字】白僵蚕【一钱】

右研匀用五分吹入喉中立愈

九味芦荟丸治肝经积热咽喉口舌生疮或牙龈蚀烂两目生翳耳中出水或肝积癰癥下疳
陰肿或茎出白津拘中结核或小水良久变白大便不调肢体消瘦等症

胡黄连 宣黄连 芦荟 木香 白茺萸【炒】 青皮 白雷丸 鹤虱草【各一两】麝香【三钱】

右各另为末米糊丸麻子大每服五分空心米汤下仍量儿大小用

柑桔汤治风热上攻咽喉疼痛及喉痹妨闷

桔梗【一两】甘草【炒二两】

右每服二钱水煎

济生犀角地黄汤治膏粱积毒脾胃有热咽喉肿痛或口舌生疮

犀角 牡丹皮【各一两】生地黄【八钱】赤芍药【七钱】

右每服一二钱水煎

五味异功散【方见败毒之药】

六味地黄丸【方见作渴不止】

柴胡清肝散【方见脇痛即柴胡栀子散】

补中益气汤【方见肌肉不生】

泻黄散【方见头面疮】

腮痈【附耳症】

腮属足阳明胃经其生痈者多因儿食甘甜厚味脾胃积热所致亦有乳母郁怒儿受其患者若因热积於内二便不通者用凉膈散风邪相抟二便如常者用漏芦汤胃经风热或兼咽喉肿痛用升麻防风汤若禀赋陰虚火动颊间或两耳内生疮或出脓不止者宜用地黄丸若因乳母肝火乘脾用加味逍遥散脾经鬱热用加味归脾汤膏粱积热用东垣清胃散脾胃风热用清咽利膈汤仍参口疮治之

一小儿腮肿肉色不变大便不实属胃经虚热用五味异功散加升麻柴胡而愈又乳母饮酒兼怒两腮赤肿憎寒发热用加味清胃散二剂加味逍遥散一剂治其母儿亦饮数滴而愈

一小儿嗜炙?腮肿发热作渴饮冷用加味清胃散而消後仍不戒厚味腮肿赤痛焮连舌本先用泻黄散而退次用加味清胃散而消

一小儿腮患疮作渴饮汤饮食少思服败毒散益甚余谓此胃经虚热先用七味白术散次用五味异功散而渴止後因母怒两腮赤肿作渴发热用加味逍遥散治其母儿患亦愈

一小儿十六岁腮患此三年不愈色黯下陷此胃经症也宜滋化源以生肾水外散寒邪以接阳气不信妄用杂方元气益虚七恶蜂起始信余言後用前药果验一小儿颊肿敷寒凉之药色白肿硬久而不愈此虚而寒邪凝结宜用葱熨法以散寒邪异功散以助元气遂愈若用攻毒之剂则误矣

一小儿酷嗜甘味药餌惟甘者乃服後患腮肿余知其胃症也经曰酸能胜甘当用酸味之药遂以乌梅肉作丸甘草末为衣服至二两许始恶甘味腮肿渐消一小儿腮肿痛外敷铁箍散内服寒凉药日久坚硬其色不变夫药之寒凉者外敷则气色凝滯内服则脾胃有伤故气血有亏而肉不溃色不赤也用四君子加柴胡升麻白芷当归外散寒邪内补脾气更用葱熨法不数日脓溃而愈

一小儿顙颞常焮肿服清热败毒之药更口渴足热面色微黑余谓肾疳症用六味地黄丸与子服母服加味逍遥散而愈後因别服伐肝之药前症复作寒热面青小便频数此肝火血燥耳用柴胡栀子散以清肝六味地黄丸以滋肾遂痊

一小儿顙颞肿痛後耳内出脓久而不愈视其母两脸青黄属鬱怒所致朝用加味归脾汤夕用加味逍遥散母子皆愈

一小儿顙间发热手足并热用清胃泻黄二散而愈後颞间肿痛焮连耳内余谓此肾经所属之地不信杂用降火之药耳出脓水或痒或痛稍加用心即发热倦怠两腿乏力用补中益气汤及六味地黄丸稍愈毕姻後朝寒暮热形气倦怠足心发热气喘唾痰仍用前二药佐以六君子汤而愈後不守禁恶寒发热头晕唾痰余谓肾虚不能摄水而为痰清气不能上升而头晕阳气不能护守肌肤而寒热遂用补中益气汤各加蔓荆子附子各一钱不应乃用人参一两附子二钱二剂而应乃用十全大补汤百余剂而痊

一小儿先颞间肿痛用败毒之药耳中流脓项间结核两目或连割或赤痛小便或作痒或赤澁皆肝胆二经风热用四味肥儿丸悉愈

一小儿顙颞肿痛服败毒药後耳出秽水余谓肝肾之症先用九味芦荟丸而痊毕姻後面黄发热服黄柏知母等药而胸膈痞满食少痰壅乃利气化痰加噫气下气用六君子补中益气二汤加乾姜木香寻愈

一小儿顙肿搽石灰末久而不散余用四君子加升麻白芷及葱熨之法渐消又用仙方活命一剂而瘥夫石灰乃辛热燥血之药小儿气血虚者搽之反致难治慎之

一小儿顙间肿痛用铁箍散败毒散之类出脓久不愈面色黧足心热口舌乾余谓此禀肾水不足之虚症当补肺金滋肾水为主不信仍服前剂脾土益虚絶生气而歿

升麻防风汤治胃经实热咽痛口燥腮痛等症

升麻 防风 黄柏【炒】 茯苓 芍药【炒】 陈皮【各五分】 连翘 当归【各七分】

右每服二钱水煎仍量大小用之

清咽利膈汤治心脾蕴热或咽喉腮舌肿痛

玄参 升麻 桔梗【炒】 甘草【炒】 茯苓 防风
黄芩【炒】 黄连【炒】 牛蒡子【炒杵】 芍药【炒各等分】

右每服一二钱水煎

东垣清胃散【方见腹痛】

异功散【方见用败毒之药】

地黄丸【方见作渴不止】

即效葱熨法【方见流注】

仙方活命饮【方见疮?热毒】

臂痛

臂痛之症当分经络所属受症之因而治之上廉属手阳明经下廉属手太阳经外廉属手少阳经内廉属手厥阴经内之上廉属手太阴经内之下廉属手少阴经或经络热郁风邪外干气血有乖即生痛毒若因心经有热者导赤散加黄连心胞络有热者柴胡栀子散肺经有热者泻白散大肠经有热者大承气汤饮焮肿作痛者气血凝结也用仙方活命饮肿痛不消者欲作脓也用托里消毒散脓熟不出者气血虚也用托里消毒散脓出反痛者气血虚甚也肌肉不生者脾胃气虚也用五味异功散不可外傅生肌散恐反助其邪而肌肉难长也

一小儿臂上生痛肿连肘间此属手少阴三焦二经先用仙方活命饮杀其大势次用柴胡清肝散以清心肝之热诸症顿退又用托里消毒散出脓而愈

一小儿臂外侧患毒此属肺经部分先用神效解毒散加桔梗二剂肿痛顿减次用托里消毒散而脓溃将愈因母食炙?之味患处复肿兼发热咳 子服泻白散母服清胃散而痊

一小儿臂腕漫肿敷寒凉药又常以冷水润之肿热彻上至肩两月余而溃四月余不敛脓出清稀面色痿黄余曰此气血虚不能充荣於肌肉也先用异功散加升麻柴胡脾胃渐健又用托里散而愈

一小儿臂患痛久不愈手足时冷用异功散加木香佐以八珍汤手足温和乃用托里散将敛因饮食停滞伤脾患处肿硬用六君木香及托里散而愈

一小儿臂痛久不愈溃出碎骨饮食少思不时寒热脓水清稀此气血俱虚也用八珍散加肉桂桔梗渐消又用托里散加肉桂及豆?而敛

一小儿臂膊赤肿发热作渴饮冷症属胃火先用加味清胃散而愈後因母食厚味复肿痛先用泻黄散二服再用清胃散母子服之并愈

一女子臂疮肿焮作痛用仙方活命饮痛止成脓用加味八珍汤而脓溃渐敛用加味逍遥散

与母服而痊一小儿因母食膏粱臂疮溃而作痛脉洪数有力用清胃散与母服子服泻黄散渐愈又用加味逍遥散母子俱服而愈

一小儿臂疮服败毒散呕吐腹胀作痛手足并冷用六君姜桂诸症渐退饮食渐进次用五味异功散而愈一小儿臂痈肿硬色白寒热倦怠此血气虚弱而不能溃散先用五味异功散加乾姜其肿渐退饮食渐进又用托里散如圣饼脓溃而愈

一小儿患臂痈肿硬不消食少自汗此脾肺气虚而不能溃先用六君子汤而汗止乃佐以葱熨法而脓成又用八珍汤而脓溃用托里散而疮敛

一小儿臂患疮敷寒凉之药肿硬不消用补中益气汤加木香薄桂及如圣饼助其阳气而消

一小儿臂患疮肿硬作呕面色痿黄饮食少思此脾气虚也用六君子汤呕止食进又用五味异功散如圣饼而消

一小儿臂疮作痛不止肌肉不生先用托里消毒散而痛止用五味异功散托里散而肉生

一小儿臂患疮久而不敛肌肉消瘦日晡体热此脾气虚而不能生肌肉也朝用补中益气汤夕用五味异功散诸症渐愈又用托里散如圣饼而愈

一小儿臂疮肿痛焮赤右颧赤色傅服皆败毒之药余谓此肺胃二经之症也当用泻黄泻白二散主之不信恪用前药泛扰诸经虚症蜂起而殁

神效解毒散治一切疮?初起肿者即消已溃仍肿者即散已溃毒不解者即愈

金银花【一两】甘草节【半两】黄芪皂角刺【炒】当归【各三钱】乳香?药【各二钱】

右为散每服二钱酒煎温酒调服亦可婴儿病乳母亦服如疮已溃肿痛已止者去乳末金银花倍加黄芪甘草

白芷升麻汤治手阳明经分臂上生疮

白芷升麻桔梗【各一钱】黄芩【酒炒】黄芪【炒各二钱】生黄芩【五分】红花甘草【炙各五分】

右水酒半钟煎食後温服

泻白散治肺经有热生疮又化痰止 治气进食

地骨皮 桑白皮【炒各一两】 甘草【炙半两】

右为末每服一二钱入粳米百粒水煎

泻心散治心经实热生疮作渴发热饮冷手足并热者【详见心臟泻心汤】

导赤散治小肠实热生疮作渴发热小便秘赤

生地黄 木通 甘草【各等分】

右为末每服一钱入淡竹叶水煎

大连翘饮即大连翘汤治肺热生疮

连翘 麦 荆芥 木通 赤芍药 当归 防风 柴胡 滑石 蝉壳
甘草【炒】 山梔子 黄芩【各等分】

右为末每服二钱加紫草水煎服之大便不通量加大黄

补中益气汤【方见肌肉不生】

加味逍遥散

六味地黄丸【二方见发渴不止】

十全大补汤【方见便痢】

四味肥儿丸【方见贴骨痛】

九味芦荟丸【方见喉痹】

柴胡梔子散【方见腹痛】

东垣清胃散【方见腹痛】

五味异功散【方见用败毒之药】

托里消毒散

托里散【二方见热毒疮?】

腋痈【谓痈生于脇之前肤之傍白者五下皆是也】

腋痈属足少阳手少阴手厥阴三经小儿患之多稟赋肝火所致初起先用活命饮次用柴胡
梔子散五七日间作脓焮肿作痛者亦用活命饮杀其大势虽溃亦轻而易敛若脓已成用托
里消毒散已出用托里散如有变症当随症治之

一小儿患前症肿痛用仙方活命饮而痛止用托里消毒散而溃因母饮酒复加肿痛母服清
胃散儿服活命饮托里散而愈

一小儿患之因乳母恚怒所致子用仙方活命饮母用柴胡梔子散加味逍遥散并愈後复患
令母仍服前药子服托里消毒散而脓溃用托里散而敛

一小儿腋下常患一枚此稟肝胆怒火也用牛黄解毒丸母服柴胡梔子散逍遥散而愈後每
发即服前药而愈或用荆防败毒散外敷铁箍散以杜後患几至不救一小儿十四岁患之内
外皆用寒凉败毒之药肿硬作痛上连肩 脓成不溃或用针之脓仍不出余曰此气血虚甚
当峻补之不信半载後肩骨溃解惟皮相连?尽气血而歿

一小儿患之恪服败毒之药久不溃色不变肿硬如石余用葱熨之法及托里散二十余剂患
处微赤作痛又数剂肿起针出秽脓气息淹淹用人参一两乾姜一钱枣子十枚四剂仍用前
散寻愈

一小儿患之脓内溃久不出色不变亦不痛余谓气血虚甚当先大补而用火针不信或用冷
针脓果不出更气喘自汗余用独参汤二剂喘汗少止脓仍未出又二剂脓出甚多喘汗大作
又用前汤四剂诸症悉退乃用八珍汤渐愈後因伤风咳 误用表散之药烦躁自汗面目赤
色脉洪大无伦按之如无此血脱发躁也先用当归补血汤诸症顿愈再用八珍汤而安又饮
食过多发厥手足并冷用五味异功散加升麻柴胡生姜一剂而愈

一小儿患之色黯不敛三年不愈用十全大补汤及豆?饼三月余将愈後劳倦怒气腋下肿痛
以加味逍遥散十全大补汤相间服之月余而愈

豆?饼治疮瘍肿痛硬而不溃及溃而不敛并一切顽疮恶疮用江西豆?为末唾津和成饼大
如铜钱厚如三四钱置患处以艾壮於饼上灸之灸乾则再易如疮大作大饼覆患处以艾铺
饼上灸之未成者即消已成者祛毒间有不效者乃气血虚败之症也参疗疮类灸法用之

四物汤治疮?血虚发热日晡益甚或烦躁不寐

当归【二钱】熟地黄【二钱】芍药【炒】川芎【各一钱】

右水煎服

参术柴苓汤治疮?脾气虚弱肝气内动肢体抽动者人参 白术 茯苓
陈皮【各一钱】山梔【炒】鈎藤鈎子【各七分】甘草【炒五分】柴胡
升麻【各三分】

每服一二钱姜枣水煎婴儿用大剂与母服子少服之

黄连安神丸治心经血热发热惊悸不安

黄连【五分】生甘草【二钱五分】生地黄【半两】当归 朱砂【三钱】

右为末饭糊丸小豆大每服十五丸滚汤下如二三服不应当服归脾汤婴儿乳母并服

柴胡梔子散【方见脇痛一名柴胡清肝散】

托里消毒散

托里散【二方见热毒疮?】

清胃散【方见腹痛】

加味逍遥散【方见发热不止】

牛黄解毒丸【方见胎毒疮疥】

十全大补汤【方见便痢】

脇痛

脇肋者足厥陰少阳之经相火之司也乃木之主肝胆之气不平则风火内搏荣逆血郁热聚为脓而痛肿之所由生也亦有禀赋母气肝胆之热恚怒之火而致然初患焮肿作痛者宜用柴胡梔子散未消者用仙方活命饮其热既杀而肿不消者则必成脓也乃用托里消毒散其脓既成以代针膏决之仍用托里散自愈若脓出而痛止肿消则不必用药也

一小儿四岁脇间漫肿一块甚痛色如故服流气败毒等药加寒热作呕食少作泻此禀肝脾气滯之症元气复伤而甚耳乃择乳母气血壮盛者与加味归脾汤加味逍遥散服之儿饮其乳半载而消

一小儿左脇生疮寒热作呕右关脉弦数此肝症传於脾也先用柴胡清肝散次用五味异功散又用托里散疮敛而愈其时同患是症专用败毒者俱致不起一小儿左脇下生疮漫肿色赤此肝胆经形伤气也先用托里散消毒散加味小柴胡汤间服肿痛渐减又用托里消毒散加味小柴胡汤疮溃而愈

一小儿四岁患脇痛色赤肿痛肝脉弦而迟此肝胆经血虚有热先用加味逍遥散数剂大势已消中间成脓又用托里消毒散加柴胡山梔脓溃而敛

一小儿肩患痛甚肿至背乃膀胱经部分血瘀滞也先用仙方活命饮毒解痛止又用加味小柴胡汤加连翘山梔金银花其势渐退乃用加味逍遥散加金银花黄芪漫肿悉消但中间不退此欲作脓也用托里消毒散脓成而溃又用托里散地黄丸补血气滋肾水而痊一小儿患之久不愈左关脉弦数右尺脉按之而弱此禀肾虚而然也用地黄丸为主佐以八珍汤托里散而愈

一小儿未葍脇间赤肿此禀肝火所致用加味逍遥散数剂与母服子日服数匙漫肿悉退佐以托里消毒散加山梔柴胡疮溃而愈後因母恚怒劳役子脇复肿赤用加味逍遥散加味归脾汤母子服之并愈

一小儿脇痛服败脾之药脓清不敛呵欠咬牙饮食少思仍欲伐脾余曰此脾虚之症也胃为五臟之主当补脾胃则肝不侮而肌肉自生矣不信仍伐肝木遂致不救

加味归脾汤治小儿因乳母忧思鬱怒胸脇作痛或肝脾经分患疮?之症或寒热惊悸无寐或便血盗汗疮口不敛等症

人参 茯苓【去木】黄芪【炒各一两】甘草【炒】白术【炒一钱】木香【五分】远志【去心】酸枣仁 龙眼肉 当归 牡丹皮山梔【炒各一钱】

右水煎乳母服儿亦服之

小柴胡汤治肝胆经分一切疮?发热潮热或饮食少思加山梔牡丹皮加味小柴胡汤

柴胡【一钱五分】人参【五分】黄芩【七分】半夏【五分】甘草【炒三分】

作三二服服姜枣水煎

柴胡清肝散治肝经风热或乳母怒火患一切疮?柴胡 黄芩【炒】人参 川芎【各一钱】山梔【炒一钱半】连翘甘草【各五分】桔梗【炒八分】

右水煎母子服之

梔子清肝散【一名梔子柴胡散】治三焦及足少阳经风热生疮或发热耳内生疮作痒或出水疼痛

柴胡 梔子【炒】牡丹皮 茯苓 川芎 芍药【炒】 当归
牛蒡子【炒各七分】甘草【三分】

右水煎母子并服

龙胆泻肝汤治肝胆经有热小腹脇间患疮瘍或玉jing便毒悬痈囊痈肿痛或溃烂作痛小便澁滯或辜丸悬挂【方见下疳陰痿】

加味逍遥散治小儿肝脾血虚内热脇腹作痛头目昏黑怔忡颊赤口燥咽乾或发热盗汗食少不寐或口舌生疮胸乳膨胀小便不利或女子患前症经候不调发热咳 寒热往来等症【方见发热不止】

六味地黄丸治肝经血虚发热或风客淫气癰癥结核或四肢发搐眼目抽动痰涎上涌或伤损出血发热抽搐等症【方见作渴不止】

仙方活命饮

托里消毒散

托里散【三方见热毒疮?】

八珍汤【方见发热不止】

腹痛

腹痛者患於脐下或傍二寸许属脾经近脇属胆经盖因脾经陰虚气滯血凝或因脾虚饮食积热所患若焮肿作痛者泻黄散坚硬肿痛者清胃散肿痛便秘者清凉饮如此而仍痛者瘀血凝滯也活命饮既用此药而不消则内欲作脓也用托里消毒散若脓出而痛不减者毒未解也亦用前药若脓出而反加痛及脓水清稀者气血虚也用参芪托里散若食少体倦者脾气虚也用五味异功散加当归柴胡升麻晡热内热者脾血虚也用四君当归丹皮如有他症当随症治之

一小儿患此漫肿微痛肉色不变面色痿黄饮食少思此脾气虚而食积内热也用五味异功散加升麻当归及如圣饼其肿渐消又用托里散而愈

一小儿患此肿痛寒热活命饮末二服肿痛顿止用托里散如圣饼而肿渐消又用神效散及

托里消毒散数剂而痊

一小儿患之内溃作渴饮食少思属元气虚弱先用托里消毒散四剂脓溃而发热恶寒肢体倦怠此邪气去而真气虚也用八珍升麻补之稍愈又用托里散异功散间服而痊

一小儿腹疮大便秘结发热饮冷此热蓄於里也用内疎黄连汤一剂大便通而痛止又用清热消毒散内热退而疮愈

一小儿腹患疮敷寒凉之药其肿益甚腹中陰痛手足并冷此阳气虚寒之症也余用回阳汤抑陰散而肿渐消毒渐散又用托里散而斂

一小儿患此脓成不溃面色黄白恶心少食发热恶寒大便不实此脾胃虚弱也先用六君升麻柴胡诸症渐退饮食渐进又朝用益气汤夕用异功散而溃又用八珍汤而愈

一小儿腹中作痛肉色不变三月矣胗其脉滑数而有力此腹痛内溃也用托里散大便出脓甚多乃用薏苡仁汤及托里散而愈

一小儿小腹赤肿服流气败毒等药肉色如故食少体倦余谓此肝脾气血虚而药伤之也用六君肉桂及葱熨之法饮食渐进其肿渐消又佐以八珍汤而愈一小儿患此而溃肿不消恪服败毒之药饮食少思脓清发热余谓脾胃之气复伤不信仍行气清热肿痛益甚服消导化痰之药腹胀作泻余先用异功散加升麻柴胡木香佐以二神丸二十余剂诸症渐愈乃用异功散加当归黄芪元气渐复却用八珍汤内芍药炒黄数剂改用托里散而愈次年因劳心发热作渴用当归补血汤而安毕姻後寒热往来患处作痒用十全大补汤六味地黄丸而愈

四君子汤【加陈皮半夏即六君子汤】治脾胃虚弱或因寒凉伤胃致肿不能消或溃而不能斂者但以此药温补脾胃诸症自退如误用攻伐则七恶随至矣若脾胃气虚疮口出血或吐血便血则加当归脾胃充健则血自归经若脾虚血弱不生肌或晡热内热者更加熟地黄不可投四物沉陰之剂能伤脾胃也若胃气虚弱尅伐伤脾饮食少思或食难化若作呕作泻者尤宜用之如兼痰 气逆肢体倦怠面目浮肿者亦因脾虚不能生肺而然也最宜用之

人参 白术【炒】 茯苓 甘草【各等分】

右每服二钱姜枣水煎

清胃散 治脾胃有热生疮或胃火牙痛或连头面升麻【五分】 生地黄 牡丹皮 黄连【炒】 当归【各三分】

右水煎服加柴胡山梔即加味清胃散

六君子汤治疮?脾胃虚弱肿痛不消或不溃敛宜用此药以壮荣气诸症自愈即四君加半夏陈皮

清凉饮治疮?脾胃实热烦躁饮食焮痛脉实大便秘结小便赤澀

赤芍药 当归 甘草 大黄【各等分】

右每服一钱水煎

当归补血汤治疮?肌热面赤烦渴脉洪大而虚重按全无此血虚脉也误服白虎汤必死【方见发热不止】

益气养荣汤治气血损伤四肢颈项等处患肿不问坚软赤白痛否日晡发热或溃而不敛者【方见鹤膝风】

十全大补汤治诸疮血气虚不能溃腐收敛或脓出发热恶寒汗出烦眩口眼歪斜或肌瘦少食发热口乾等症须多服为善【方见便痢】

参芪托里散【方见痘痢】

补中益气汤【方见肌肉不生】

托里消毒散

托里散【二方见热毒疮疖】

五味异功散【方见用败毒之药】

如圣饼【方见流注】

神功散【方见胎毒发丹】

八珍汤【方见发热不止】

臀痢

臀痢属膀胱经湿热或禀赋陰虚若肿硬作痛用内托羌活汤微肿微痛用托里消毒散若初起大痛或五日之间似消不消似溃不溃者先用仙方活命饮後用托里消毒散若已溃食少体倦疮不生肌脾胃虚弱者用五味异功散加柴胡升麻禀赋陰虚小便数而不敛者加減八

味丸气虚久不生肌收口用豆豉饼及补中益气汤培养元气若用解热攻毒及敷围寒凉之剂则气血受伤必成败症矣

一小儿患此肿硬不赤旬余矣面色痿黄饮食少进此脾气虚弱也先用异功散饮食渐进漫肿渐消乃用托里散少加肉桂而溃又用八珍汤而敛

一小儿患此久不收敛四围微黯疮口黑色脓水清稀寒热晡热脉浮而数两寸按之如无此阳气虚而阴血弱也朝用补中益气汤夕用异功散半载而愈

一小儿臀疮溃而不敛面色时赤此禀肝肾阴虚也朝用八珍汤加五味子夕用加减八味丸诸症渐退又用托里散间服而愈

一小儿臀疮久不收敛肢体倦怠晡热作渴此禀足三阴虚也用五味异功散加减八味丸渐愈又用托里散而敛

一小儿臀痛久不生肌面色痿黄仍欲败毒以收敛余曰脾主肌肉脾健则肉生遂朝用补中益气汤夕用五味异功散及葱熨法脾气壮肌肉生而愈

一小儿肿硬不消肉色不变此脾胃之气虚怯不能运及患处耳朝用补中益气汤夕用五味异功散以接虚怯之气月余而消其时同患是症外敷寒凉之药内服犀角丸者无不受害

一小儿十五岁久不愈发热体瘦面白暖气怏服消食清热等药余谓心火虚而脾气弱也先用八味丸为主佐以六君子汤补中益气汤寻愈毕姻後臀後患疽漫肿坚硬肉色不变手足时冷脉浮大按之微细两寸为甚先用八味丸料四剂又用十全大补汤患处色正而消

内托羌活汤治尻臀生痛坚硬肿痛

黄柏【酒制】羌活【各一钱】防风 当归尾 藁本【各五分】肉桂 连翘
甘草【炒】苍术 陈皮【各三分】黄芪【八分】

右作二剂水一锤入酒一杯煎空心服

仙方活命饮

托里消毒散

托里散【三方见热毒疮?】

神效解毒散【方见臀痛】

加味八味丸【方见作渴不止】

八珍汤【方见发热不止】

葱熨法【方见流注】

腿痛

腿痛之症所主之经不同而所治之法亦异发於内侧者属肝脾二经发於外侧者属胆胃二经漫肿坚硬者元气虚弱也用内补黄芪汤肿势高焮者元气未虚也用内托柴胡黄芪汤外用隔蒜熨法若瘀血凝结而不消或不作脓者用活命饮血虚气弱而不能溃及不生肌者用托里散此其梗概云尔

一小儿内膝肿痛恶寒发热此属肝胆经分乃用神效解毒散加柴胡白芷二剂漫肿顿消惟中央一块尚肿又二剂而成脓以托里消毒散脓溃而愈

一小儿腿内侧前膝患毒溃後肿硬色黯脓清不敛面色青黄此脾虚肝旺兼寒邪袭於患处也当壮元气为主先用异功散加柴胡升麻及葱熨法脾气渐复患处渐愈佐以八珍汤豆豉饼而愈

一小儿腿内焮赤大肿发热此血热内鬱而欲为脓耳当先杀其大势用隔蒜灸法灼艾试蒜热移患处二十余炷痛始减再三十余炷肿渐消又用仙方活命饮疮头出水而愈

一小儿腿内侧患此脓内溃恶心倦怠面色痿黄右关脉弦大按之微细此脾胃虚弱肝木所乘也先用六君升麻柴胡四剂元气渐复乃佐以托里散而愈

一小儿腿外侧肿痛肉色如故用托里消毒散二剂而肿始赤又四剂而肿赤亦退又六剂溃而脓出清稀食少体倦用异功散加芎归仍用托里散补其元气而愈一小儿漫肿坚硬肉色不变此阳气虚而不能成脓也用托里散如圣饼肿起色赤用托里消毒散而脓成针之用八珍汤加肉桂渐愈因伤食吐泻患处太白饮食少思先用六君乾姜次用八珍汤及葱熨法而愈一小儿患此久不愈脓水清稀面色痿黄腹大青筋此脾气虚而肝所侮也朝用补中益气汤夕用五味异功散元气稍复乃佐以四味肥儿丸及葱熨之法两月余而愈

一小儿腿外膝肿一块服消毒之药其肿益甚肢体羸瘦饮食少思更加作痛余曰先肿而後痛者形伤气也先痛而後肿者气伤形也当补接阳气不信仍投疏泄之药後果殁机要云荣卫之气充满抑遏不能行故闭塞气血腐而为痈者当泄之以夺盛热之气若人饮食疎精神衰气血弱肌肉消薄故荣卫之气短促而滯滞故寒?腠理闭鬱而为痈者当补之以接虚怯之气信矣

四味肥儿丸治肝脾不和患疮瘍久不愈或兼疳症腹胀作泻或食积脾肝发热瘦怯遍身生疮

黄连【炒】 芡实 神麴 麦芽【炒各等分】

右为末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滚汤送下

附子饼治溃?气虚不能收敛或风邪所袭气血不能运於疮口以致不能收敛者用炮附子去皮脐研末以唾津和为饼置疮口上将艾壮於饼上灸之每日灸数壮但令微热勿至热痛如饼灸乾用唾津再和灸之以疮口活润为度

六君子汤治疮?因脾气虚弱不能生肌以致疮口不敛若脾气既充而疮口不生肌肉者此寒邪所袭也更用豆?饼或附子饼熨之

仙方活命饮

托里消毒散【二方见热毒疮?】

葱熨法

如圣饼【二方见流注】

内托羌活汤【方见臀痈】

五味异功散【方见用败毒之药】

附子饼【方见腹痛】

十全大补汤【方见便痈】

补中益气汤【方见肌肉不生】

八珍汤【即四君四物】

豆豉饼【方见腋痈】

鹤膝风

鹤膝风者其腿渐细其膝愈龕状如鹤膝是以名之此因禀肾经不足外邪所乘而患之初则

膝内作痛外色不变伸屈艰难若一二月间焮肿色赤而作脓者可治肿硬色白而不作脓者难治初起者用大防风汤为主佐以益气养荣汤脓成者用补中益气汤为主佐以大防风汤切勿用十宣流气等药若不溃不敛或发热等症者须调补脾胃为善否则必变败症矣

一小儿九岁患此作痛用葱熨法及大防风汤肿起色赤用仙方活命饮补中益气汤间服肿渐消又以独活寄生汤与补中益气汤间服二三日用葱熨一次至两月余而消

一小儿患此大溃不敛体倦食少口乾发热日晡尤甚此脾气虚甚也用补中益气汤五剂以补元气乃用大防风一剂以治其疮如是月余诸症悉退遂用十全大补汤佐以大防风汤而敛

一小儿患此溃而不敛不时寒热小便赤澀此血气虚也用十全大补汤加麦门冬五味诸症顿退乃去桂令常服佐以和血定痛丸而愈

一女子左腿作痛服流气饮之类左膝肿硬头运吐痰余谓此鹤膝风也其脉弦数而无力乃禀赋脾肝肾三经之症此形气病气俱虚者当先调补脾胃为主不信仍攻邪气诸症蜂起余先用五味异功散加升麻乾姜肉桂脾气稍健又用异功散八珍汤而溃却间服大防风汤地黄丸而痊

一小儿两膝渐肿傅服皆消毒之药足胫赤肿此禀父肾气不足用地黄丸八珍汤而消若用流气败毒等药必致不起

大防风汤治鹤膝风肿痛不消或溃而不敛

牛膝【酒炒】附子【炮各一钱】白术 羌活 人参
防风【各二钱】杜仲【去皮姜制】川芎
肉桂【去皮】黄芪【炒】熟地黄【自制】芍药【炒各一钱五分】甘草【一钱】

右每服三五钱水煎仍量儿大小用之

益气养荣汤治气血虚弱四肢颈项等处患肿不问肿溃日久不敛俱宜服之

人参 茯苓 陈皮 贝母 香附【炒】当归【酒洗】川芎 黄芪【炒】熟地黄【自制】芍药
【炒各一钱】甘草【炙】桔梗【各五分】白术【炒二钱】柴胡【六分】

右每服二三钱姜水煎

独活寄生汤

独活 桑寄生 杜仲【炒】 细辛 牛膝【酒洗去土】 秦艽 茯苓 白芍药【炒】 桂心 川芎
防风 甘草 人参 熟地黄 当归【各等分】

右每服二三钱水煎空心乳母同服

八珍汤【方见发热不止】

十全大补汤【方见便痢】

补中益气汤【方见肌肉不生】

和血定痛丸

葱熨法【二方见流注】

薛氏医案卷六十六

卷六十七

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六十七

明 薛己 订

保婴撮要十二

肺痈肺痿

齐氏云肺痈肺痿因脾肺气虚腠理不密外邪所乘或母食辛辣厚味遗热於儿或儿有病过於汗下内亡津液虚火烁肺或服剋伐之药亏损脾胃不能生肺金其症恶风咳 鼻塞项强呼吸不利甚则四肢微肿咳唾脓血若吐臭秽胸中隐痛脉数而实者为肺痈咳唾涎沫脉数而虚者为肺痿恶寒喘 者寒邪内蕴也小青龙汤咳唾脓?者肺痈内溃也桔梗汤窃谓前症若喘咳短气者脾肺气虚也五味异功散咳唾脓痰左尺脉数而无力者肾气虚也六味地黄丸咳唾脓痰右关脉数而无力者脾气虚也七味白术散若发热喘 唾脓不食者脾肺虚甚也难治大要补脾肺滋肾水为善【仍审五臟相胜乳母七情後症仿此】

一小儿感冒停食吐泻用疏利之剂咳 脓血此中气复伤而变肺痈也用桔梗汤而愈後咳吐血仍用前药佐以异功散而痊

一小儿停食服泻药而变肺痈余先用异功散以救脾肺次用桔梗汤以治肺痈而痊

一小儿停食服剋伐之药唾痰腥气面赤气喘此元气复伤而成肺痈也用桔梗汤脓痰顿止翌日喘甚此脾气虚而不能生肺也用异功散加杏仁百合而愈後小便澁滯服八正散小便愈澁咳 吐痰面赤盗汗余谓肺气虚热前药亏损?陰虛火铄肺金而然用异功散以补脾土地黄丸以滋肾水遂愈

一小儿肺痈愈後咳 面色白或痿黄手足冷小便频此因脾虚不能生金也服参苏饮之类自汗盗汗昏愤发搐遗尿下气手足如水面色青白此阳气脱而虚寒也用人参一两乾姜二钱大枣五枚米泔煎沸先灌一盃将熟又灌二盃连用二剂而苏更朝用补中益气汤夕用异功散而愈

一小儿十五岁因劳伤元气而咳 误用表散之剂复伤肺气成痈咳 脓血用桔梗汤为主

佐以异功散脓渐少专用异功散脓止而愈後因书课过劳自汗时 服外感药咳 益甚胸膈痞满呼吸不利余谓脾肺之气虚甚而然用参芪补脾汤而痊

一小儿咳 服参苏饮而益甚右寸关之脉浮散余谓此风伤皮毛热伤血脉血气稽留蕴结於肺而成痈也不信仍复表散唾咳脓血余曰此因肺虚不能摄气脾虚不能摄涎耳当补脾土以生肺金又不信果歿一小儿感冒咳 发散过度喘促不食痰中有血余用桔梗汤而愈後元气未复大便似痢或用芩连枳实之类变漫脾风而卒

小青龙汤治伤风冒寒咳 喘急肺胀胸满鼻塞流涕或乾呕热 或作渴或作噎或小便不利或小腹胀满【此仲景之法审有是症用之及时殊有良验】

麻黄【去节】赤芍药半夏【各七钱】细辛
乾姜【炮】甘草【炙】桂枝【各三钱】五味子【半两杵】附子【二钱脉浮不用】

右每服二钱水煎

桔梗汤治咳 脓血腥秽已成痈症

桔梗【炒】贝母【去心】知母【炒】桑白皮【炒】枳殼【各一钱】地骨皮瓜蒌仁
薏苡仁杏仁【五分炒】当归黄芪【炒各一钱】五味子【杵炒】百合【炒各一钱五分】防己【一钱】甜葶苈【炒五分】

右每服二三钱水煎

升麻汤治肺痈脓血秽臭胸乳皆痛

升麻桔梗【炒】薏苡仁地榆条芩【炒】牡丹皮芍药【炒】甘草【各等分】

右每服二三钱水煎

排脓散治肺痈此方排脓补肺

黄芪【盐水拌炒】白芷人参五味【炒研碎各等分】

右为末每服一二钱蜜汤调下

射干汤治胃脘痛吐脓血

射干【去毛】梔子仁赤茯苓升麻赤芍药【一两二钱】白术【半两】

右每服三五钱水煎入地黄汁少许再煎服

人参平肺散治心火剋肺金传为肺痈咳 喘呕痰涎壅盛胸膈痞满咽噎不利

人参 陈皮 甘草 地骨皮 茯苓【各一钱】 知母【炒七分】 五味子【炒】 青皮
天门冬【去心四分】 桑白皮【炒一钱】

右每服二三钱

参芪补脾汤治肺痈脾气亏损咳吐脓涎或中【阙】 不食必服此药补脾土以生肺金否则不治

人参 白术【各二钱】 黄芪【炒二钱半】 茯苓 陈皮 当归【各一钱】 升麻【三钱】 麦
门冬【七分】 五味子【杵四分】 桔梗【炒六分】 甘草【炙三分】

右作三服姜枣水煎

人参补肺汤治肺症咳喘短气或肾水不足虚火上炎痰涎壅盛或吐脓血发热作渴小便不
调

人参 黄芪【炒】 白术 茯苓 陈皮 牡丹皮 当归【各一钱】 山茱萸【去白】 山药【各二
钱】 五味子【杵】 麦门冬 甘草【炙各七分】 熟地黄【自制一钱五分】

右姜水煎服

七味白术散治中气亏损津液短少口舌乾渴生疮不喜饮冷或吐泻後口乾或咳唾脓痰右
关脉数无力者脾气虚也最宜服之

人参 白术 木香 白茯苓 甘草 藿香【各五分】 乾葛【一钱】

右水煎服

五味异功散

六味地黄丸

参苏饮

独参汤

补中益气汤

肠痈

孙真人云肠痈为病小肠重强按之则痛小便如淋时时出汗恶寒身皮甲错肚皮急痃甚者肚腹胀大转侧有水声或绕脐生疮或脓从脐出或从大便而下盖因饮食不节所致治法当诊脉迟紧者未有脓也用大黄汤下之脉洪数者已有脓也用薏苡仁汤排之小腹疼痛小便不利脓壅滞也牡丹皮散主之若大便或脐间出脓者不治内经云肠痈为病不可惊惊则肠断而死故患是者其坐卧转侧理宜徐缓时少饮薄粥及八珍汤固其元气庶或可生

一小儿患肠痈先用太乙膏後服牡丹皮散下脓而愈後因跌腹内作痛遍身皆赤良久身黯而殁盖肠断故也

大黄汤治肠痈小腹坚肿按之则痛肉色如常或焮赤微肿小便频数汗出憎寒脉迟紧脓未成也急服之大黄【炒】朴硝【各二钱】牡丹皮瓜蒌仁桃仁【去皮尖各二钱】

右每服二三钱水煎

薏苡仁汤治肠痈腹中痛烦躁不安或胀满不食小便澀滞

薏苡仁 牡丹皮 桃仁【各三两】瓜蒌仁【四两】

右每服四钱水煎

桃仁汤治肠痈腹中痛烦燥不安壅痛大便闭澀亦有绕脐生疮者但用此药无妨

桃仁 大黄【炒】牡丹皮 芒硝 犀角【镑末】冬瓜仁【研各二钱】

右水煎入犀角末服

牡丹皮散治肠痈腹濡而痛时下脓汁或下血

牡丹皮 人参 天麻 白茯苓 黄芪【炒】薏苡仁 桃仁 白芷【炒】当归 川芎 官桂 甘草【各五分】木香【二分】

右每服三五钱

仙方活命饮【方见热毒疮?】

太乙膏【方见跌扑外伤】

八珍汤【方见发热不止】

痔疮

痔疮之症或因禀受胎毒或膏粱食积或母食炙炒厚味所致肿痛者湿热作痒者风热便秘者火盛脓溃者血热湿热加味槐花散风热秦艽苍术汤便秘清燥汤脓溃黄芩散薰洗则葱汤槐角五倍子等药或真蒲黄以猪脂调傅如有兼变之症参各门治之

一小儿患痔赤肿作痛用黄连解毒汤而痛止又用托里清肝散及加味槐角丸而疮愈

一小儿因饮食停滞发热患痔大便不利肿痛寒热不时发搔此脾气伤而肝乘之也先用保和丸末二钱以柴胡山梔煎汤调服食消搔止又用四味肥儿丸数服而愈

一小儿十二岁不戒厚味醇酒不时作痛或大便秘结小便滞澀用龙胆泻肝汤治之而安後饮烧酒前症复发遍身色赤烦躁饮冷醋半鍾赤热悉退肿痛顿减一小儿因乳母食炙之物肛門肿痛用清胃散母子并服子又服四味肥儿丸而愈後因乳母恚怒胸脇作痛频饮糖酒儿病复作发搔母先服加味小柴胡汤二剂次服加味逍遥散儿服四味肥儿丸而愈

一小儿肛門肿痛大便不通服大黄之药肿痛益甚虚症并作仍欲攻疮余曰此因脾气复伤而然也用异功散加升麻柴胡为主佐以加味槐角丸肿痛渐退又用黄连解毒汤而出脓用秦艽苍术汤而疮愈

一小儿肛門肿痛发热饮水口鼻气热此脾肺经实热先用泻黄散二服而热退又用枳殼散而痛止用金银花散而肿痛消後母食膏粱儿患复作母用清胃散而肿痛消

一小儿误吞信石遍身发赤呕吐烦渴肛門肿痛便秘饮冷服冷米醋一鍾赤晕立消肿痛顿止又用黄连解毒汤金银花散而愈

一小儿痔疮不时肿痛服加味槐角丸而愈至十四而复作发热体倦肛門坚肿用地黄丸八珍汤坚肿渐消血气渐愈或间止药餌劳役不节诸症仍作用前药随愈毕姻後肛門肿溃而串臀用补中汤地黄丸臀间渐愈或用追蚀等药坚核虽消痛伤元气疮口不合余用八珍汤地黄丸两月而敛後不守禁忌又且攻毒以至屡发元气日虚而歿古人云善服药不若善保养信夫苦参散治痔疮肿痛发热

枳殼【麸炒】 黄连 大黄 甘草 荆芥 苦参 赤芍药 黄芩

右水煎薰洗

加味槐花散治肠风下血痔漏肿痛发热便秘

槐花 熟地黄 白术 青皮 荆芥穗 川芎【各二分】 当归身
升麻【各四分】 枳壳【麸炒五分】

右水煎服

秦艽苍术汤治痔疮大便坚硬小便频数内热作渴秦艽 苍术【各五分】 泽泻
皂角子仁【炒】 防风 桃仁 当归尾 黄柏 山栀【炒各三分】

右作二剂水煎服

清燥汤治大肠风热血燥秘结不通痔疮等症

生地黄【五分】 山栀【五分】 泽泻【二分】 麻子仁【研五分】 川芎 羌活 黄柏 黄芩
郁李仁 芍药 当归尾 甘草【各四分】

右水煎服

黄芪散治痔疮并一切溃?虚弱发热

茯苓 黄芪【炒】 当归 川芎 白芍药 白芷【各五分】 升麻 山栀【炒各二分】

右水煎服

枳壳散治痔疮肿痛或下血

枳壳【去穰麸炒】 槐花 荆芥 皂角子仁【炒】 蛴螬皮【炙各等分】

右为末每服一钱滚汤下作丸亦可

加味槐角丸治症同前

槐角【炒】 枳壳【麸炒】 当归 黄芩 皂角仁【炒】 蛴螬皮 秦艽 白芷【各等分】

右为末每服一二钱水煎服或蜜丸量儿大小服

又方治痔痛不可忍者

羊胆【一个】冰片【五分】

右以冰片为末羊胆涂之

丹石散治痔疮热痛如神

黄丹 滑石【各等分】

右为末新汲水调涂日三五次

胜雪膏治痔疮热痛不可忍

片脑 铅白霜【各三分】

右为末好酒研成膏涂之随手愈

又方用生栝蒌根研如泥猪油调涂

黄连解毒汤【方见作痛不止】

托里清肝散【方见囊痈】

四味肥儿丸【方见贴骨痛】

加味小柴胡汤【方见热毒瘰癧】

加味逍遥散【方见发热不止】

龙胆泻肝汤【方见下疳疮】

下疳陰痿

下疳陰痿皆属肝火湿热或禀赋肝经陰虚肿痛发热者肝火湿热也先用加味小柴胡汤再用龙胆泻肝汤肿痛便赤者肝火陰虚也用加味逍遥散加龙胆草生地黄溃而肿痛不消者小柴胡汤加芎归黄芪溃而肿痛已消用四物汤加牡丹皮柴胡盖肝属木得雨露则森茂遇酷日则萎软若误谓虚寒投以热剂轻则囊茎生疮重则腐而难敛皆宜滋肾水生肝木清肝火故云肝气热则茎痿宗筋弛纵陰茎肿胀或出白液或痒痛里急筋缩挺纵不收或精出便下此名筋疝俱肝火也黄宗伯季子初生时母弃於水逾日不死复收之遂成喘 颌腋臂股各结块核溃而色紫悞触之痛彻於心服辛温化毒等剂不应时已弱冠予曰初生喘 者形

寒伤肺也既长而喘 者肝火刑肺也故结核俱在肝胆部分始用补中益气汤後用九味芦荟丸不月诸症悉愈此稟母之肝火而患也

一小儿下疳溃烂发热作渴日晡尤甚此肝疳而脾气虚也用补中益气汤後用九味芦荟丸九诸症悉愈一小儿二岁茎痿湿痒时出白津余以为肝火不信或与温补肾经後陰囊焮肿茎中作痛余用龙胆泻肝汤六味地黄丸而痊

一小儿睪丸作痛小便赤澁寒热作呕此肝火湿热不利用小柴胡汤加山梔车前子茯苓而愈【睪丸陰子也】一小儿睪丸肿痛小便黄澁寒热作渴此肝火所致用小柴胡汤加山梔车前子并九味芦荟丸间服而消一小儿陰茎肿痛腹内一块或作痛或上攻小便不调此稟肝火为患用龙胆泻肝汤九味芦荟丸愈後形气消烁发热作渴此肝火制脾土而然也用益气汤芦荟丸异功散而安

一小儿陰茎作痒搔破出水小便赤澁此稟肝肾陰虛火动用龙胆泻肝汤清肝经湿热佐以地黄丸补肾肝陰虛而愈後乳母恼怒小便澁滯两肋肿痛儿陰复痒惊搐困倦用异功散以补脾土用地黄丸以滋肾肝而愈

一小儿十五岁患下疳久不愈形气骨立不时寒热小便不调饮食少思此稟肝疳虚羸也朝用益气汤以培胃气夕用地黄丸以滋肾水为主佐以九味芦荟丸治疳而痊

一女子十五岁面青善怒体瘦作渴天癸未至不时寒热口舌生疮後患陰疮湿痒无寐善惊此稟肝脾虚羸之变症也当先救脾气遂朝用补中益气汤夕用加味归脾汤诸症渐愈却佐以九味芦荟丸而痊

一女子十四岁稟肝经湿热肌体消瘦寒热如疟下部患疮先用加味小柴胡汤寒热顿退但晡热少食用加味逍遥散为主以九味芦荟丸为佐而愈出嫁後前症仍作另用杂药疮口翻出如菌余用龙胆泻肝汤加味逍遥散九味芦荟丸而愈

一小儿十五岁患下疳书课过劳即寒热头痛形气殊倦腿足疲软左关脉洪数左尺脉洪数而无力余谓此稟肝肾陰虛兼饮食劳役之症也宜先调补胃气以滋化源不信或以为陰虛湿热下流恪服四苓四物之类诸症益甚余曰陰虛谓脾经虛也脾为至陰以丁火为母虛则宜补丁火以生已土肾属水以辛金为母腎虛则宜补辛金生癸水也今因脾经阳弱而陰虛反用沉寒之剂复伤阳气以絕化生之源欲保其不危难矣果歿

龙胆泻肝汤治肝经湿热不利下部生疮两拘肿痛或腹中作痛小便澁滯等症

龙胆草【酒拌炒黄】泽泻 车前子【炒】 木通 生地黄【酒拌】 当归【酒拌】 山梔 黄芩【炒】 甘草【各二分】

右水煎食前服

加味小柴胡汤【即小柴胡加山梔牡丹皮】治肝胆经有热下部湿疮寒热晡热潮热等症【方见热毒瘰?】

六味丸治肝肾陰虚下部生疮或发热作渴小便频数或肾水不足而不能生肝木致血燥筋挛颌项肢节等处结核或溃而不能收敛或肝肾虚弱发热盗汗肢体消瘦小便赤澀尿血下血或大小便牵痛气短痰 吐血眩运耳聋口燥齿痛失音腰腿疲软此皆禀赋不足也【方见作渴不止】

敷药必效散治下疳腐溃作痛

轻粉【五分】黄连 黄柏 龙胆草【各一两】

右为末油调搽入片脑更效若用当归膏调傅尤佳

如圣散治下疳腐久不愈

五倍子【二钱】片脑【一钱】黄连【半两】芦甘石【煨二钱】

右各为末乾敷毒未尽者加黄连末【三钱】

丸味芦荟丸【方见喉痹】

加味清胃散【方见热毒口疮】

圣愈汤【方见出血不止】

补中益气汤【方见肌肉不生】

八珍汤【方见发热不止】

加味归脾汤【方见脇痛】

四君子汤【方见腹痛】

仙方活命饮

托里消毒散【二方见热毒疮?】

便痢【附谓两拘小腹两边拘中患之】

便痢因肝火肝痞或禀肝经热毒若初起肿硬作痛者先用龙胆泻肝汤一二剂肿痛不减用仙方活命饮二剂五七日不减肿尚硬亦用前二药各一剂如不消或更痛欲成脓也用活命饮一剂却用托里消毒散加柴胡山梔一二剂若脓已成而不溃者血气虚也用托里消毒一二剂脓已溃而痛不止者毒气不解也用活命饮一剂若脓已出而反痛者益气虚也用内补黄芪汤脓已溃而发热烦躁者气血虚脱也用当归补血汤脓已溃而恶寒发热者血气俱虚也用十全大补汤脓已溃而恶寒者元气虚也用补中益气汤脓已溃而不生肌者脾气虚也用六君子汤若禀赋怯弱或因饮食劳倦而为患者但用补中益气汤加射干自消设使不分经络不别虚实槩行攻伐亏损气血则轻者难治重者必变瘵症甚至不起

一小儿肿痛色赤寒热似疟小便不通此肝经湿热用龙胆泻肝汤一剂小便清利寒热顿除又用加味逍遥散加龙胆草二剂肿痛悉退而愈

一小儿患此肿硬作痛小便澀滞先用龙胆泻肝汤小便顿利又用活命饮一剂而消後复肿赤作痛此欲作脓也先用活命饮二剂杀其大势却用托里消毒散加柴胡山梔三剂以指按之肿随指复起此脓已成也用托里散一剂翌日针之脓出肿消再用托里散而愈一小儿患此服大黄等药泻而肠鸣腹肿硬痛少食此脾胃复伤而变症也用五味异功散加升麻柴胡木香饮食渐进乃去木香加黄芪当归数剂而脓成又用托里散加皂角刺而脓溃乃去皂角刺倍用参芪而愈一小儿疮势已成用消毒之药其肿散漫自汗发热恶寒少食此气血虚甚也用大补汤四剂针之脓出肿消却用托里散八珍汤间服而愈

一小儿脓成不溃误用大黄之类以下脓泄泻不止肿硬色白腹痛欲呕手足并冷此脾气虚而复伤也用异功散加升麻姜桂四剂乃去姜桂加归芪二十余剂脓溃而愈

一小儿溃後咬牙呵欠寻衣捻物此肝经气血虚也先用八珍汤加钩藤钩五味子诸症顿愈又用托里散及八珍汤而痊

一小儿溃後惊悸发搐呵欠咬牙此心肝二经气血俱虚也先用补心汤安神丸虚症寻愈再用八珍汤托里散肌肉渐生却用地黄丸而疮口斂

一小儿患此久不愈头重胸满饮食少思此禀脾胃虚弱也先用补中益气汤加蔓荆子诸症寻愈次用八珍汤佐以五味异功散月余疮口渐斂仍用十全大补汤而痊

一小儿十五岁禀赋虚弱因劳役过度患此寒热如疟用补中益气汤将愈惑於人言误服大黄之药吐泻大作手足厥冷寒热尤甚余用六君子加姜桂诸症稍愈但赤肿不消此欲作脓也又数剂後朝用益气汤夕用大补汤五十余剂而痊

一小儿溃後肿硬肌肉不生疮口不斂余欲滋其化源以生肝血不从仍伐肝清热以致元气

日虛惡症蜂起而歿夫肺者腎之母脾者肺之母今既不滋肺腎以生肝木又傷脾土以絕肺腎之化源其不死者鮮矣一小兒十四歲每飲食勞倦則惡寒發熱兩拘患腫余用益氣湯而愈彼惑於人言乃服大黃之類發搐口噤手足并冷良久少蘇余用大料益氣湯數劑而安又二十余劑而愈

一小兒兩拘患腫小便澄白肢體消瘦?熱眼割此稟肝火之症用龍胆瀉肝湯為主四味肥兒丸為佐各數服腫熱漸退改用四味肥兒丸為主龍胆瀉肝湯為佐又各數服將愈及用地黃丸而痊

一小兒兩拘腫痛小便不利或赤白濁此系肝火熾而脾氣傷也朝用補中益氣湯夕用地黃丸各數劑而愈後因過勞盜汗?熱兩拘仍腫用前藥佐以地黃丸而愈

一小兒每勞則兩拘腫痛小便白濁夜間發熱此稟肝火脾虛而元氣下陷也用補中益氣湯清心蓮子飲後患下疳用四味肥兒丸加味逍遙散而愈

一小兒兩拘腫痛小便赤澀或兼澄白此肝脾疳症先用九味芦荟丸數服諸症漸退次用四味肥兒丸二十余服而愈

一女子兩拘腫痛小腹作痒小便赤澀發熱晡熱月經不調先用加味小柴胡湯四劑腫漸消次用加味逍遙散諸症漸愈佐以四味肥兒丸而痊

一小兒十四歲每飲食勞倦隨患寒熱兩拘腫痛服大黃之類發搐口噤手足并冷良久少蘇余用大劑補中益氣湯數劑而安又二十余劑而腫痛愈

仙方活命飲治一切瘡瘍癰毒未成即消已成即潰潰後腫痛不止元氣虛也當補之

穿山甲 白芷 防風 沒藥 甘草 赤芍藥 當歸尾 乳香 天花粉
貝母【各一錢】 金銀花 陳皮【各二錢】 皂角刺【二錢】

右每服二三錢酒水各一半煎服

清心蓮子飲治兩拘腫痛小便白濁夜間發熱日間安靜發熱口渴此肝火脾虛而元氣下陷也

黃芩【一錢】 麥門冬 地骨皮 車前子【炒】 甘草【各一錢半】 石蓮肉 茯苓
黃芪【炒】 柴胡 人參【各一錢】

右水煎服

当归补血汤治瘡毒已潰而发热烦躁者此脾胃损伤或服峻剂致气虚血脱肌热大渴引饮目赤面红日夜不息其脉洪大而虚重按全无此病多得於饥饱劳役者若误服白虎汤者必死

当归【三钱】黄芪【炙一钱】

右水煎服

六一汤治同前

黄芪【炙六钱】甘草【炙一钱】

右水煎服

秘旨安神丸治心血虚而肿中惊悸或便痢潰後发搐呵欠咬牙此心肝二经气血俱虚也

人参 半夏【汤泡】酸枣仁【炒】茯神【各一钱】当归【酒洗】橘红赤芍药【炒各七分】五味子【五粒杵】甘草【各三分】

右为末姜汁糊丸芡实大每服一丸姜汤下

补中益气汤治稟元气虚弱因劳而拘中作痛或患便痢寒热口乾作渴宜此汤加射干主之如寒热已退而肿不消此欲作脓也宜用十全大补汤【方见肌肉不生】

十全大补汤治稟元气虚弱因劳患便痢或拘中作痛服补中益气汤寒热退而肿不消散此血气虚而不能成脓也宜服此汤已成而不能溃或已溃而不能生肌或寒热不止自汗盗汗脓清不敛者但服此药则元气自复诸症自愈

白茯苓 人参 当归 白术【炒】黄芪【炒】川芎肉桂【去皮】白芍药【炒】熟地黄【自制】甘草【炙各等分】

右每服三五钱姜枣水煎服

内补黄芪汤【方见发热不止】

龙胆泻肝汤【方见下疳疮】

九味芦荟丸【方见喉痹】

四味肥儿丸【方见贴骨痈】

补心汤【方见胎毒疮疡】

六味地黄丸【方见作渴不止】

加味小柴胡汤【方见热毒瘰 】

囊痈【谓阴囊患痈】

囊痈属肝经湿热或禀胎肝热所致初起肿痛小便赤澀者湿热壅滞也先用龙胆泻肝汤如不消用仙方活命饮若肿痛数日不止欲作脓也用托里消毒散若肿未溃而小便不利者毒气壅滞也当分利之脓已成而小便不利毒气未解也当针泄之脓出而反痛者气血虚也当补益之若元气无亏虽阴囊悉溃睾丸悬露亦不为害若乳母恚怒令儿患此者加味逍遥散肝经气血虚者八珍散加味柴胡山梔俱加漏芦子母并服一小儿小便澀滞肿痛寒热此肝经湿热也用龙胆泻肝汤而消但内热倦怠此兼脾气虚弱也用四君子加柴胡山梔芎归而愈

一小儿肿痛寒热服剋伐之药不能成脓用托里清肝散而脓溃用托里散而疮敛後寒热如疰小便闭塞用小柴胡汤加山梔龙胆草车前子而愈

一小儿患此大溃痛甚烦躁饮冷此余毒尚在与活命饮二剂肿痛顿退又用四君柴胡山梔四剂诸症悉退及托里散而痊

一小儿阴囊赤肿作痛针而脓出顿安忽发热作渴此邪气去而真气虚也用圣愈汤及八珍柴胡山梔将愈因乳母恚怒复作用加味逍遥散加漏芦母服其儿顿愈

一小儿阴囊每患赤肿必因其母恚怒及饮酒而发余审其因怒用加味逍遥散加漏芦饮酒用加味清胃散加乾葛神麴与母服之其儿随愈

一小儿阴肿小便赤澀此禀肝经有热也用加味小柴胡加漏芦与母服子日饮数滴四剂而愈

一小儿患此肿硬不消发热作痛大便不实饮食无味此消导过多而脾胃伤也先用异功散数剂元气渐复又用托里散加柴胡山梔而脓成针之脓出发热恶寒此血气俱虚也用大补汤加柴胡山梔寒热顿止又数剂而渐愈後因劳发热肿痛用益气汤托里散疮口渐敛而愈

一小儿十六岁患此脓清晡热遗精盗汗此禀元气虚甚也用大补汤地黄丸料各二十余剂元气稍复又各三十余剂汗止热退犯房事患处顿黯昏溃吃逆手足并冷此脾气虚寒之恶

症用独参汤四剂而苏用大补汤加乾姜四分阳气渐复乃去乾姜又二十余剂而痊一小儿患此溃而肿硬不消服败毒散傳寒凉药肌肉不生疮口开张脓清色黯自汗余谓非补脾则肌肉不生彼欲速效乃外用生肌散反助其邪致生瘀肉填塞疮口半载不愈余用异功散加当归黄芪三十余剂又用托里散隔蒜灸而愈

一小儿囊痈出血久不愈左颊色青赤此心肝二经风热而血不归经也先用加味逍遥散六味地黄丸清肝热滋肾水而血止用托里散而疮愈

一小儿患前症脓清发热久而不敛左颊青两颐赤余谓禀肝肾陰虚而两位青赤脾胃气虚而脓清不敛当补足三陰为善不悟泛用杂药後果歿

一小儿患前症久不愈面赤皎白左颊为甚余谓前症属肝木面白属肺金左颊属肝经乃金来尅木为贼邪况小便如淋乃肝肾二经气絕也辞不治後果歿於金旺之日盖肝为肾之子肾为肝之母设预为调补肾水必不致於危也

托里清肝散

人参 黄芪【炒】 当归 川芎 芍药【炒】 白术 茯苓 金银花 白芷【炒】 甘草【炒】 连翘 柴胡【各七分】 山梔【四分】

右每服二三钱水煎

钱氏蚯蚓散治肾子肿硬先用葱椒汤煎洗次以乾蚯蚓粪津唾调敷须避风冷湿地

世传治小儿陰囊肿大用甘草煎浓汁调蚯蚓粪涂之立效

山药膏治两拘及小腹痛或痒用山药研烂頻傳患处乾则易之

补中益气汤【方见肌肉不生】

异功散【方见用败毒之药】

八珍汤

加味逍遥散【二方见发热不止】

活命饮

托里散【二方见热毒疮?】

加味小柴胡汤【方见热毒疮?】

圣愈汤【方见出血不止】

加味清胃散

四君子汤【二方见腹痛】

地黄丸【方见作渴不止】

足指冻疮【附耳冻疮】

足指冻疮因受稟虚怯故寒邪易乘气血凝滞久而不愈则溃烂成疮治法须壮脾胃温气血则死肉自溃良肉自生若骨脱筋连者宜急剪去否则毒延脚面而死盖肢末之处气血难到又为外邪遏绝则气血不能运行若用汤荡火烘其肉即死而不仁至春必溃腐脱落元气无亏虽患无害如外传寒药内服消毒之剂则元气受伤必成败症凡初冻时热手频熨之为妙北方冻耳若误以手触之其耳即落大寒能裂肤堕指信矣一女子数岁值严寒北上因失所恃而足受冷侍婢用热汤泡之至春月房中秽气其父觉之脱袜方见十指俱烂但未堕耳予用托里之剂助其阳气溃脱以保其生

一小儿仲冬严寒两耳受冻不知痛痒令人以热手徐徐频熨内用温补脾气之剂及敷白蔹散而愈

一小儿七岁冬间足指冻痛用热汤浸洗至春溃脱疮口不敛足跌肿痛余谓此元气虚弱须补胃气以生肌肉不信乃用寒凉消毒之剂肿消黑色自以为愈余曰此脾胃虚极元气不能运及患处也後两腿羸细而殁一小儿扑伤足跌少许速成冻疮作痛不止用火烘之肉死至春足脱脓水淋漓不能收敛而殁此症若能调养脾胃使元气不伤则肌肉自生岂至於死哉

白蔹散

白蔹【一两】黄柏【炒黑五钱】

右为末乾搽患处

汤火疮

汤火之症若发热作渴小便赤澀者内热也用四物加山梔连翘甘草若肉未死而作痛者热毒也用四君加芎归山梔连翘若肉已死而不溃者气血虚也用四君加当归黄芪外传当归膏或柏叶末蜡油调搽至白色其肉自生若因烟薰将死者以生萝卜汁灌之即苏若饮食後

被汤火所伤发热腹胀恶食发搐变症者当参食积惊搐门治之

一小儿火伤两臂焮痛大便不利小便赤澀此火毒蓄於下焦也用生地黄当归芍药木通山梔赤茯苓生甘草一剂二便调和而痛止更以四物加山梔参芪白芷甘草而坏肉腐又数剂而新肉生

一小儿火伤足胫专用败毒之剂脓水淋漓日晡肿胀此脾虚下陷也用补中益气汤及八珍汤而愈

一女子沸汤伤胸两月不斂脉洪大而虚发热作渴此陰虚火毒所乘用四物加柴胡丹皮热渴顿止用加味逍遥散腐肉去而新肉生

一女子被烟薰痰气上壅不省人事用萝卜汁灌之而苏但体倦欲睡仍令噙萝卜汁乃服六君子汤加桔梗山梔而安伤轻者以萝卜捣汁饮之亦可

一小儿火伤臀间误用生肌散陰囊溃脱久而不愈此助其药毒而然也余用当归膏及四君子加芎归旬余肉生而痊

一小儿火伤其足用冷水浸之肿痛益甚服败毒药死肉不溃此脾胃气伤而血滯也用六君子加芎归而愈後因劳役寒热以八珍散加升麻柴胡白芷而痊一小儿火伤腿用寒凉之药久不愈腿细筋挛食少晡热此因生肌药助其邪寒凉损其胃也用益气汤当归膏不月而愈

一小儿热汤伤足久不愈脓水清稀口乾足热患处肿黯晡热盗汗肢体骨立此稟肾气虚弱寒药伤脾而然用益气汤地黄丸三月余佐以托里散如圣饼而愈一小儿沸汤伤腿搽药结痂难於屈伸痛不可忍用四物加白术茯苓及当归膏而愈

一小儿沸汤所伤胸腹皆溃久而不愈喜脉弱按之而有力盖脾主肌肉当调补脾胃为主外敷之药当缓不信恪用敷贴之而歿

一小儿汤伤胫溃而色赤如赭日晡热甚右关脉浮而数按之则弦此肝木乘脾土血虚而然耳乃外傳内服皆於攻毒後果歿

神效当归膏治汤火等疮不问已溃未溃肉虽伤而未坏者用之自愈肉已死者用之自溃新肉易生搽至肉色渐白其毒始尽生肌最速盖当归生地黄麻油二蜡皆主生肌止痛补血续筋与鲜肉相宜此方余已刊行治者多验

当归 生地黄【各一两】 麻油【四两】 黄蜡【一两如白者止用半两】

右先将当归地黄入油煎枯去渣将蜡熔化候冷搅匀即成膏矣用涂患处将细?盖之发背痛

疽杖疮溃烂用之尤效凡死肉溃烂将脱止有些须相连者宜用利刀剪去盖死肉有毒去迟则伤新肉矣死肉去尽尤宜速贴盖新肉最畏风寒不可忽也

乳香定痛散治伤损及一切疮?溃烂疼痛

乳香 没药【各五钱】滑石【一两】冰片【一钱】

右为细末搽患处痛即止甚效

猪蹄汤治一切痈疽杖疮溃烂消肿毒去恶肉润疮口白芷 黄芩 当归 羌活 赤芍药 蜂房【多蜂儿者为佳】生甘草【各半两】

右用猪蹄一只水四五碗煮熟去油查取清汤入前药煎数沸去查温洗随用膏药贴之

四物汤【方见脇痛】

六君子汤【方见肠痛】

如圣饼【方见流注】

翻花疮

翻花疮者由疮?溃後肝火血燥生风所致或疮口胬肉?出如菌大小不同或出如蛇头长短不一治法当滋肝补气外涂藜芦膏胬肉自入须候元气渐复脓毒将尽涂之有效不然虽入而复溃若误用刀针蚀药灸灼其势益甚或出血不止必致寒热呕吐等症须大补脾胃为善

治验

一女子臂痛溃後疮口?肉如菌用毒药蚀之?肉益甚面青寒热经候不调此肝经血燥而生风脾气虚而不能生肌耳先用加味逍遥散五味异功散两月余却用地黄丸托里散而愈

一小儿患前症用药腐去疮口不斂朝恶寒暮发热余谓因气血俱虚而然也法当调补脾胃则气血自生疮口自斂不悟仍攻其疮而歿

一女子十五岁患前症腐去而复生面色青而或赤余谓此肝胆二经风火妄动盖肝血为阴为水肝气为阳为火宜生肾水滋肝血使火自息而风自灭不信乃用祛风之剂致血燥妄行疮口出血不止而死

藜芦膏治疮口胬凸起或出二三寸肉者

藜芦【不拘多少】

右为末以生猪脂搗和搽凸髻肉上

八珍汤

加味逍遥散【二方见发热不止】

补中益气汤【方见肌肉不生】

托里散【方见热毒疮疡】

十全大补汤【方见便痢】

五味异功散【方见败毒之药】

地黄丸【方见作渴不止】

豆?饼

葱熨法【二方见流注】

多骨疽

多骨疽由疮疡久溃脾胃亏损气血不能营於患处邪气陷袭久则筋烂骨腐故骨脱出非稟胎所有也当补脾胃壮元气内用大补汤地黄丸外以附子饼葱熨法祛散寒邪补接元气则骨自脱疮自敛若用剋伐之剂复伤真气鲜有不危婴儿患之当调补乳母外用葱熨以岁月除之尤不可用追蚀之药

一小儿足内患之日流清脓恶寒发热大便去而不了皆元气虚而下陷也先用补中益气汤加乾姜肉桂诸症渐复乃用十全大补汤及如圣饼出碎骨而愈一小儿臂患之时出清脓恶寒发热此元气虚也朝用补中益气汤夕用四君归芪半载常出细骨一块又用六味丸而愈

一小儿患之目睛白多饮食难化手足并冷此稟命门火衰而脾胃虚寒也先用八味丸异功散如圣饼出碎骨乃用六味丸大补汤而愈若攻疮邪不固元气必不活矣

一小儿十四岁闪足腕间服败毒之剂肿硬色黑余谓此元气虚而外寒凝滞也用回阳膏六君肉桂十余剂肿黯渐消又用冲和膏托里散余肿渐软又佐以大补汤针之出清脓甚多即恶寒发热此阳随陰散而气虚也用六君加肉桂参芪各二钱寒热顿止却用八珍汤托里散

豆豉饼而愈

一小儿足跗肿硬肉色不变形气倦怠外傳内服皆败毒耗气之药余谓经云形伤痛气伤肿乃稟赋足三陰虚羸之症也当滋补元气若行攻伐虚虚之祸不免矣彼以为迂仍用前药足跗变黯肿至脚腕余用大补汤异功散各五十剂以调补脾胃及葱熨患处祛散寒邪补接阳气漫肿渐消疮变赤色旬日而溃此元气渐复之善症也然固元气充实瘀肉可腐新肉可生又惑於速效之说傳追蚀生肌之药患处复黯七恶并臻而歿十全大补汤【方见腹痛】

补中益气汤【方见肌肉不生】

八珍汤【方见发热不止】

托里散【方见热毒疮疡】

如圣饼

葱熨法

豆豉饼【三方见流注】

冲和膏【一名陰阳散方见寒凉之药】

八味丸【即六味地黄丸加肉桂附子各一两方见作渴不止】

漏疮

漏疮之症因稟气血不足或久病血气虚弱或儿肝脾食积内热不能生肌或乳母七情不和脾气不能收敛当审其所因调补元气佐以如圣饼葱熨之类为善若用流气破血追蚀等药反为败症矣余当参各门主之一小儿患在臂间肿硬不消面色痿黄脓水清稀此元气亏损之症用八珍汤为主六君子汤为佐渐愈因饮食失节恶寒发热用六君子加升麻柴胡而安用益气汤异功散而斂

一小儿腿内侧患之寒热发渴此肝脾二经气血虚症也盖胃为五臟之本先用五味异功散加升麻柴胡月余胃气始复乃用地黄丸补肾水以生肝血而愈一小儿臂间漫肿按之至骨方痛肉色不变形体消瘦面目多白余谓此稟肾经虚症当补脾肺以滋化源反用寒凉剋伐之药脾气大虚患处肉死又用追蚀之药死肉虽去疮口不斂而歿

一小儿四岁尚解颅余用地黄丸而颅阖至十六颐间肿硬发热唾痰余谓属肾经气不足水泛而为痰气伤而为肿不信反用火针败毒破而出水余曰肾主骨骨而为痈元气亏败余何

能为後果歿惜哉

一小儿患在臂外侧疮口开张肿硬色黯发热恶寒手足时冷此少阳经阳气虚寒不能生肌收敛也当助胃气不信仍行攻疮而歿

一小儿十五岁足跟患之二年不愈日出清脓数滴余谓禀肾气虚弱也不信毕姻後肿硬寒热仍用攻伐之药而歿

如圣饼

葱熨法【二方见流注】

八珍汤【方见发热不止】

六君子汤【方见肠痛】

补中益气汤【方见肌肉不生】

六味地黄丸【方见作渴不止】

五瘤

经云肝主筋心主血脉脾主肉肺主气肾主骨故云肝为筋瘤心为血瘤脾为肉瘤肺为气瘤肾为骨瘤小儿患之多因禀赋不足乳母七情起居饮食失调致儿五臟不和内火沸腾血凝气滞也夫瘤者留也随气凝滞臟腑受伤气血不和所致五瘤之外更有脂瘤粉瘤虱瘤虫瘤髮瘤之类若行气破血或傳寒凉追蚀之药或用蛛丝?芫花线等法以治其外则误矣

一小儿因乳母郁怒臂前廉肿硬皮色如常日出脓水乃脾经之虚症也用加味归脾汤如圣饼三月余肿渐消後因母怒发热儿患处复肿用加味逍遥散母服二十余剂儿日服杯许赤肿渐退仍以前药久服而愈一小儿头後患之久不敛目睛多白此禀肾虚之症母子并服六味丸补中汤外以六味丸料加鹿茸作饼热熨患处每日一次而敛

一女子腿外廉一瘤寸许色赤破而血逆漂甚多发热作渴先用当归补血汤渴热渐愈又用加味逍遥散疮口寻愈

一小儿落草大腿外股如指尖一块肉色如常按之不痛至数月误触破出如粉浆内股焮痛寒热如疟手足抽搐如急惊状此脓水出多气血虚而内生风也先用异功散加鈎藤鈎二剂又用八珍汤加鈎藤鈎而安用托里散而痊

一小儿二岁项间自分娩有一核余谓但调治乳母其儿自愈彼欲速效外涂牡蛎硝黄之类内服海藻蓬术之类脾胃复伤而歿

一小儿九岁项间患之余谓禀肾肝血燥所致当滋水生木不信另用药破之脓水淋漓仍服散坚之药而歿一女子腿前肿一小瘤作痒搔破出虫如蚊而飞去寒热如疟乃肝经之症即虱瘤之类用加味逍遥散而愈又有一种髮瘤破开有髮属肾经之症也

加味归脾汤【方见腹痛】

地黄丸【方见作渴不止】

加味逍遥散

八珍汤【二方见发热不止】

托里散【方见热毒疮疡】

补中益气汤【方见肌肉不生】

五味异功散【方见败毒之药】

如圣饼【方见流注】

薛氏医案卷六十七

卷六十八

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六十八

明 薛己 订

保婴撮要十三

作痛不止

疮?作痛当审邪之所在症之所因如寒热而痛邪在表也用人参败毒散便秘而痛邪在里也用内疏黄连汤肿焮而痛血凝滞也用仙方活命饮作脓而痛者用托里消毒散排之脓胀而痛者针之脓溃而痛者补之气虚而痛则用四君归芪血虚而痛则用四物参芪大抵形伤痛气伤肿不知此数者徒以乳香没药为止痛之方则非所以为法矣仍审五脏相胜相兼之症而治之後仿此

一小儿腿痛溃而作痛服败毒之药肿势益甚更呕腹痛余谓脓出而反痛攻毒而反呕其属胃气虚弱明矣急宜补之或谓痛无补法仍用前药诸症蜂起余用六君乾姜木香胃气渐复再用益气汤托里散而愈东垣丹溪云脓出而反痛此为虚也宜补之秽气所触和解之风冷所逼者温养之信矣

一小儿臂疮溃而作痛脉洪数而有力缘乳母食厚味胃经积热所致母服清胃散子服泻黄散痛止又母子服加味逍遥散而愈

一小儿项患疮焮肿作痛左颊色赤此胆经热毒母用仙方活命饮末一服痛止再服而溃又用加味小柴胡汤加味逍遥散母子俱服而敛

一小儿左脇肿痛赤色而硬此禀胆经?毒所致也子服活命饮母服加味小柴胡汤而软又子服三味解毒散母服加味逍遥散而溃复恶寒不食腹胀吐酸此脾气弱而饮食停滞也用六君子汤脾气渐健用托里散肌肉渐生又呕吐寒热面色青白此脾气虚而肝邪所侮也用异功散加柴胡升麻而安又用异功散加当归黄芪而愈

一小儿臂患疮赤肿作痛服大黄药敷铁箍散肿痛顿消余曰此脾气虚疮内陷不知痛耳非毒退而内消也遂朝用益气汤夕用异功散各数剂色微赤微肿又用葱熨法及托里散而疮

消设或再用前药则患处得寒而愈滞胃气得寒而不生多致不起矣

一小儿臂疮溃而作痛疮口色白面赤饮汤此禀肾?胱陰虚也朝用八珍汤夕用加減八味丸诸症渐退面色顿白此热退而真虚之色见也用托里散异功散而愈

一小儿胸患疮作痛?热大小便秘此邪在里也先用大连翹饮一服热痛顿止更以五味异功散加升麻白芷而愈

一小儿面患疮焮痛?热恶寒此邪在表也先用荆防败毒散解其表邪次用七味白术散固其胃气而愈一小儿背患疮焮肿大痛?热饮冷服败毒之药其痛益甚此?胱经热毒炽盛也用活命饮加麻黄羌活一剂诸症顿退乃去麻黄羌活又二剂而脓溃再用清热消毒饮而疮痊次年腹患痈焮肿作痛大便不通其势虽剧悉属形病俱实用活命饮加硝黄一剂大便即通肿痛顿止又用清热消毒散而痊

一小儿腿痈溃而脓清脉弱面色痿黄自汗有痰余谓当补脾肺彼以为缓遂降火败毒呕吐喘嗽余曰脾肺气絕也不信後果歿

一小儿臂痈溃而面黄痰喘余谓禀脾肾气虚不信乃服四物黄栢知母而歿余治此症用地黄丸补中汤滋其化源多有生者若用四物黄栢之类益伤脾肺乃速其危矣

神效解毒散治一切疮疡作痛不止凡初起肿者服之即消已溃仍肿者服之即退已溃不解者服之即愈婴儿母亦服【自制】

金银花【一钱】甘草节【五分】黄芪【炒】皂角刺【炒】当归【各三钱】乳香没药【各二钱】

右为末每服三钱酒煎为末温酒调服亦可如疮已溃肿痛已止者去乳没金银花倍加黄芪

黄连解毒汤治疮疡烦躁饮冷脉洪数或?狂言

黄芩 黄栢 黄连【俱炒】山梔【各一钱五分】

右每用一二钱水煎热服

内疏黄连汤治疮疡?热而呕大便秘结脉洪而实黄连【炒】芍药【炒】当归【各二钱】槟榔 木香【各五分】黄芩【炒】梔子【炒】薄荷 桔梗【炒】甘草 连翹 大黄【炒各一钱】

每服一二钱姜水煎

乳香定痛散治疮?溃烂疼痛

乳香 没药【各五钱】滑石 寒水石【煨各一两】冰片【一钱】

右为细末乾敷患处

小柴胡汤【加山梔牡丹皮即加味小柴胡汤】治肝胆经部分疮?作痛或身热恶寒颈项强直胸脇作痛【方见脇痛】

三味解毒汤【方见出血不止】

加減八味丸【方见作渴不止】

五味异功散【方见败毒之药】

清胃散

四物汤

四君子汤【三方见腹痛】

大连翘饮【方见臂痛】

荆防败毒散【即人参败毒散加荆芥防风方见发斑】葱熨法【方见流注】

清热消毒散【方见热毒口疮】

仙方活命饮

托里消毒散

托里散【三方见热毒疮?】

七味白术散

八珍汤

加味逍遥散【三方见发热不止】

泻黄散【方见头面疮】

作呕不止

丹溪先生云肿?时呕当作毒气攻心治之溃?时呕当作陰虚补之此论其常耳窃谓前症如肿赤焮痛而呕者热毒甚也用仙方活命饮作脓而呕者胃气虚也用五味异功散脓胀而呕者血气虚也用六君子加归芪便秘而呕者热在脏也用内疏黄连汤寒药服多而呕者胃气伤也用托里健中汤食少胃寒而呕者托里益中汤中虚寒淫而呕者托里温中汤肝气乘脾而呕者托里抑青汤胃虚停痰而呕者托里清中汤胃虚自病而呕者托里益黄汤郁结伤脾而呕者托里越鞠汤徐院令云治痈疽不可一日无托里药?哉是言也盖毒气者热有余也陰虚者脾不足也皆因脾气虚弱以致之但宜调补中气则正气复而邪气自去矣婴童当兼治其母

一小儿臂患疮服消毒之剂作呕少食肿硬不消面色痿黄此脾胃气虚而药复伤也用六君木香乾姜更增腹痛此虚甚也以前药入附子一片诸症顿退後饮食停滯作呕不食先用保和丸一服次用异功散而愈一小儿腿痛脓清作呕疮口不斂肝肾二脉洪数此因禀肾水不足而肝火为患用六味地黄丸以补肾九味芦荟丸以清肝而愈

一小儿手患疮作呕流涎面色痿黄余谓脾气虚寒遂用六君乾姜木香而呕止又用补中益气汤而涎止不数剂而疮愈

一小儿疮痛作呕手足并冷此因痛而胃气复伤也用六君乾姜藿香痛呕顿止又用异功散加升麻柴胡而疮亦消

一小儿面患疮作呕手足并热面赤作痛此胃经热毒所致先用仙方活命饮而痛止又用清热消毒散而疮愈

一小儿腹患疮作呕便秘?热饮冷畜热也用内疏黄连汤而便通呕止又用清热消毒散而疮内消

一小儿腿患疮用护心散呕吐不食手足并冷余曰此非毒气内攻乃胃虚耳宜用异功散补之彼反见疑仍索前药余以异功散为末作护心散与服呕止食进又用托里散脓溃而愈後语其故犹不信其效至此也一小儿臂患疮服护心散呕吐腹胀余曰此脾胃复伤耳不信仍复攻毒益加泄泻余先用托里温中汤一剂次用六君姜桂又用五味异功散而愈

一小儿项患疮作呕面黄?热饮汤余谓胃气虚热不信反清热败毒更加吐泻而歿

一小儿面患疮作呕?热作渴饮汤余谓胃气虚而作呕不能化生津液而作渴不信另用裸药攻毒致吐泻吃逆而歿

托里益黄汤治疮疡因脾胃虚弱寒水反侮土饮食少思呕吐泄泻等症【自制】

人参 白术【炒各七分】 陈皮 茯苓 半夏 炮姜 丁香 炙甘草【各三分】

右姜水煎服

托里越鞠散治乳母郁怒肝脾内热致儿患疮?母子并服【自制】

陈皮【四分】 川芎 人参 白术【炒一钱】 半夏
山梔【炒】 苍术【各三分】 炙甘草【二分】

右姜枣水煎婴儿乳母并服

托里健中汤治疮?阳气虚寒肠鸣切痛大便溏泄呕逆昏愦此寒变而内陷也急用此药缓则不救溃?误服寒剂多患之【自制】

羌活【三分】 木香 附子【炮】 益智 丁香 沉香【各三分】 茴香【五分】 陈皮
炙甘草【五分】

右姜水煎徐徐服之

托里清中汤治疮?脾胃虚弱痰气不清饮食少思等症【自制】

人参 白术【炒】 陈皮
茯苓【各五分】 半夏【三分】 桔梗【二分】 甘草【炒】 柴胡【各二分】

右姜枣水煎服

托里温中汤治疮疡元气虚弱或因凉药所伤饮食少思呕吐泄泻等症【自制】

人参 白术 茯苓【各一分】 半夏 炮姜【各四分】 甘草【炒】 肉桂
黄芪【炒各一钱五分】

右每服三五钱姜枣水煎

托里益中汤治疮?中气虚弱饮食少思或溃而不敛或肿而不消【自制】

人参 白术【炒】 陈皮【炒】 茯苓 半夏 炮姜【各五分】 木香 甘草【炒各三分】

右姜枣水煎

托里益青汤治疮疡脾土虚弱肝木所侮以致饮食少思或胸膈不利【自制】

人参 白术【炒各五分】 陈皮【炒】 茯苓
半夏【各三分】 芍药【炒一分】 柴胡【二分】

右姜枣水煎服

保和丸

六味丸【二方见发热不止】

九味芦荟丸【方见腮痛】

六君子汤【方见腋痛】

补中益气汤【方见肌肉不生】

五味异功散【方见用败毒之药】

清热解毒散【方见热毒口疮】

仙方活命饮

托里消毒散

托里散【三方见热毒疮?】

内疏黄连汤【方见作痛不止】

出血不止【三】

疮口出血有因五脏相胜陰阳不调而血不止者有因乳母六淫七情之气不平而血妄行者若因肝火内动用四物山梔牡丹皮肝经血虚用六味地黄丸心虚不能统血用四物参朮丹皮酸枣仁脾虚不能统血用四君山梔牡丹皮脾气郁滯用归脾汤脾肺气虚用补中益气汤气血俱虚用十全大补汤肾陰不足而肝火内动用六味地黄丸柴胡梔子散加五味子大凡失血过多而见烦热?渴等症勿论其脉不问其症急用独参汤以补其气经云血生於气苟非参芪归朮甘温之药决不能愈若?热脉大者多不治

一小儿十一岁眉间一核似赤小荳许出血如注?热倦怠食少体倦此肝经血热脾经气虚也用柴芍参苓散九味芦荟丸而痊

一小儿流注出血吃逆腹痛手足并冷用六君子及独参汤而益甚此阳气虚寒之甚药力未能骤及也遂连服数剂诸症渐退用月许将愈因饮食失宜寒热?搦血出此脾气虚肝火所乘也用异功散加升麻柴胡而安又用八珍四君而愈後因劳心?热头痛另服清热之剂汗出口噤良久方省服大补汤数剂而安又用八珍汤而愈

一女子臂患疮出血余谓血虚用圣愈汤而愈後因怒复作如前先用圣愈汤又用加味逍遥散将愈因惑於人言别服降火之剂吐泻腹痛余用异功散圣愈汤而愈

一小儿头疮出血睡中?搔审其母素有郁怒?热用加味逍遥散加味归脾汤母服之而子自愈

一小儿头面生疮出血右颞赤色口乾饮冷此胃经有热先用清胃散渐愈又用三味解毒散而愈

一小儿臂疮出血脉浮大按之无力右寸关为甚此脾肺气虚不能摄血归源先用补中益气汤而血止又用托里散而疮愈

一小儿头面生疮出血作痛?热饮冷此胃经热甚而血妄行也先用仙方活命饮诸症顿愈又用清热消毒散疮口渐斂

一女子十四岁患瘰?不时出血面青善怒余谓肝胆经气虚而血不能归经也欲滋肾水以生肝木不信反清热败毒血不止而歿

一小儿患骨疽内溃脓出甚多後疮口出血恶寒体倦脉之如无余谓阳随陰散而气脱用独参汤补之不信而歿

东垣圣愈汤治诸疮脓血出多心烦不安不得眠睡当归 川芎【三分】 熟地黄 生地黄【各二分】 黄芪【炒五分】 人参【三分】

右水煎服

归脾汤治疮?脾气虚不能摄血归经而疮口出血或乳母脾经郁热致儿患疮?热出血或疮口不斂者【方见脇痛】

独参汤治疮?溃後气血俱虚疮口出血或?热恶寒作渴烦躁宜用此药以补气则血自生而归经此阳生陰长之理用人参一两姜十片枣十枚水煎服

三味解毒散治疮?热毒出血或禀热毒金石毒者尤宜用之【自制】

金银花【一两】甘草【五钱】牛黄【一钱量人用之】

右为末每服五分白汤调下

四物汤【方见腋痛】

柴芍参苏饮【方见热毒瘰癧】

柴胡栀子散【方见脇痛即栀子清肝散】

六味地黄丸【方见作渴不止】

加味逍遥散

当归补血汤【二方见?热不止】

补中益气汤【方见肌肉不生】

十全大补汤【方见便痛】

九味芦荟丸【方见喉痹】

四君子汤

清胃散

六君子汤【三方见腹痛】

异功散【方见用败毒之药】

托里散

仙方活命饮【二方见热毒疮?】

清热消毒散【方见热毒口疮】

肌肉不生

肌肉乃脾胃所生收斂皆气血所主二者相济以成者也若肌肉不生而色赤者血热也用四物山梔牡丹皮晡热内热者血虚也用四君归地牡丹皮脓水清稀者气血俱虚也用十全大补汤食少体倦者脾气虚也用补中益气汤烦热作渴起居如常者胃热也用竹叶黄芪汤烦热作渴小便频数者肾虚也用六味地黄丸肉腐而不溃者用乌金膏若肉溃而不斂者用六君子汤秽臭脉洪大而作渴乃真气虚而邪气实也此为难治大凡疮久而不愈者皆元气不足或因邪气凝滞於患处苟能调补脾胃则元气自足元气既足则邪气自消死肉自溃新肉自生而疮自斂矣使不保其本而槩敷生肌之剂是反助其邪後更溃烂耳

一小儿臀痈久不斂日晡倦怠敷追蚀之药腐坏而不斂余谓因脾气虚而不能生长肌肉朝用益气汤夕用异功散月余而痊

一小儿腿痈色赤久不生肌日晡热此脾经血虚也用四君归芍柴胡牡丹皮热渐止而肌渐生後因停食吐泻疮色变此脾气虚弱用益气汤异功散而痊一小儿臀疮久不生肌余曰臀属膀胱乃气血难到之所此稟肾虚而患者当调补脾气滋养陰血遂用五味异功散地黄丸而痊

一小儿臀痈溃而不斂发热作渴小便频数仍欲降火余谓此稟肾经陰虚而火动耳用补中益气汤加減八味丸而愈毕姻後臀复患痈欲速效服败毒散溃而发热脉洪数而无力肾部为甚仍用益气汤八味丸为主佐以八珍汤异功散而愈

一小儿腿疮久不生肌肿痛色赤此脾胃虚而湿热也用益气汤加黄柏防已渐愈又用四君柴胡升麻而痊一小儿臀疮腐而作痛不止肌肉不生口乾作渴右关脉洪数此胃经火盛之恶症先用竹叶黄芪汤二剂而痛止又以四君加升麻白芷而愈

一小儿臀间肿硬色不变面目皎白余谓稟肾不足反行败毒日出清脓而歿

一小儿颈间肿硬余谓稟肝肾不足不信乃用裸药後颐间胸脇膝骨皆肿各用火针出水疮口开张而歿补中益气汤治小儿稟赋不足荣卫之气短促寒薄腠理闭郁而为疮或因疮服剋伐之剂气血亏损而不能消散或已溃气血亏损而不能生肌或恶寒发热烦躁倦怠饮食少思等症

人参 黄芪【炒】 白朮【炒】 甘草【炒】 当归 陈皮【各五分】 柴胡 升麻【各三分】

右姜枣水煎服

神效乌金膏治疮肉死不腐涂之即腐未死涂之即生若初起肿痛搽点数处其毒顿消若患顽疮元气无亏久不收斂内有毒根者以纸捻蘸紙之即斂其方用巴豆仁一味炒黑研如膏点於患处临用修合庶不乾耳此法虽不出于方书余制而用之良有奇验故并籍焉

五味异功散【方见用败毒之药】

四君子汤【方见腹痛】

加减八味丸【即六味丸加五味子四钱肉桂一钱】四物汤【方见腋痛】

十全大补汤【方见便痛】

竹叶黄芪汤

六味地黄丸【二方见作渴不止】

保和丸【方见发热不止】

发热不止

疮疡发热初患乃毒气所熖已成乃内熖作脓已溃乃血气亏损不可槩行败毒以伤元气盖未成者当分邪之在表在里将成者当分邪之可攻可补已成者当分脓之作与未作脓已成者当分脓之浅深高漫脓已溃者当分痛之止与不止若作痛而发热者用仙方活命饮作脓而发热者用托里消毒散脓胀而发热者用加味托里散脓出而发热者用八珍黄芪午前发热者阳气虚也用补中益气汤午後发热者陰血虚也用四物加参芪日晡恶寒发热者阳气下陷於陰分也用补中益气汤发热作渴小便频数者肾气虚弱也加减八味丸脓血多而热者阳无所附也十全大补汤日将晡而热者气血虚也八珍汤若无寐而热者内补黄芪汤烦躁者血脱也当归补血汤自汗而热者胃气虚也四君子汤恶寒发热者肺气虚也补中益气汤或四君黄芪当归主之亦有五脏相胜夹食夹惊或乳母六淫七情所致者不能备述治者临症详之

一小儿腿痛发热肿痛肉色不赤此形气虚而病气实也先用活命饮二剂随用益气汤二剂外用葱熨法而愈

一小儿十五岁眉患痛傳服皆败毒之药腹痛肿硬此脾胃复伤而然也朝用异功散夕用大补汤两月余而愈

一小儿十一岁腿内侧患痛漫肿坚硬肉色不变自汗盗汗此稟肝脾虚羸也用大补汤异功散元气渐复脓溃针之仍服前药而愈

一小儿腿内股患疮发热不愈诊乳母肝脾血虚有热用异功散加柴胡升麻及加味逍遥散与乳母服儿日服数匙两月余而愈

一小儿臀痈肿痛色白余用托里之剂不从反内外用败毒之剂发热不食手足并冷仍欲败毒余曰此脾胃复伤而变症耳若再行攻毒则胃气益损五脏皆虚诸症蜂起矣乃用益气汤佐以异功散而渐安

一小儿溃後发热饮乳不歇面目或赤此胃气虚热津液不足而作渴也用白术散末以乳调服而愈後发热作呕吐酸腹膨此乳食停滞先用保和丸异功散各末一服又用托里散八珍汤而疮敛

一小儿溃後?热懒食日晡益甚此脾气虚弱也先用四君升麻归芪饮食渐进次用八珍牡丹皮发热渐止後用托里散而痊

一小儿腹痈溃後?热作渴手足并冷余谓脾胃阳虚用六君姜桂治之不信反清热败毒果吃逆腹痛而歿一小儿臀痈溃而?热面色青白服败毒药益甚余谓脾气虚寒而隔阳於外非热也用人参理中汤不信後吐泻手足并冷而歿

加味托里消毒散治溃疡余毒?热作痛

人参【一钱】黄芪【炒一钱】当归【酒拌一钱】川芎
芍药【炒】白芷茯苓【各五分】金银花甘草连翘乳香没

药【各三分】

右作二剂水煎服

八珍汤治溃?气血俱虚者用此方主之若因脾气虚弱而不能生血者宜用异功散

当归【一钱】川芎【五分】芍药【炒七分】熟地黄【酒拌】人参
白术【炒】茯苓【各一钱】甘草【炙五分】

右每服三五钱姜枣水煎

加味逍遥散治因乳母肝脾血虚?热致儿患疮或儿肝脾有热致疮不愈

当归甘草【炙】芍药【酒拌】茯苓白术【炒各一钱】柴胡牡丹皮
山栀【炒各七分】

右作四剂水煎服若乳母肝脾血虚内热或寒热遍身搔痒等症尤宜用之

七味白术散治胃气虚弱或因尅伐或因吐泻口乾作渴饮食少思【作渴饮冷者去木香】

藿香 白术 木香 白茯苓 甘草【炒】 人参 乾葛【各等分】

右每二钱水煎服

保和丸治饮食停滯?热者不可多服

神麴【炒】 山楂 半夏 茯苓 陈皮【各一钱】 连翘 萝卜子【各半两】

右为末糊丸小桐子大每服二三十丸白汤送下化服亦可【加白术名大安丸】

当归补血汤治疮?血气亏损或妄服峻剂致血气俱虚肌热大渴喜饮目赤面红昼夜不息其脉洪大而虚重按全无其症似宜服白虎汤但脉不长实为可验耳若服白虎汤必死

黄芪【炙一两】 当归【二钱】

右水煎徐徐服

内补黄芪汤治溃疡脓水出多或过服败毒之剂致气虚血弱发热无寐或兼盗汗内热或不生肌【自制】 黄芪【炒二钱】 人参 白术【炒】 茯苓 陈皮 当归【各一钱半】 五味子【杵】 甘草【炒各五分】 酸枣仁【炒一钱】

右水煎徐徐服

十全大补汤【方见便痢】

葱熨法【方见流注】

补中益气汤【方见肌肉不生】

四君子汤

六君子汤【二方见腹痛】

仙方活血饮

五味异功散

托里散

托里消毒散【四方见热毒疮?】

加減八味丸【方见作渴不止】

大便不通

疮?大便不通初起则审所致之因所见之症而行内疏外表之法已溃则分血气虚实传变之症而用托里滋补之法不可泛用苦寒疏导之剂恐复伤真气则肿者不能消散成脓溃者不能生肌收敛故丹溪先生云肿疡内外皆壅宜托里表散为主溃?内外皆虚宜托里补接为主治者审之

一小儿胸患痈肿痛热渴大便不通脉沉数而有力此形病俱实而邪在内也用凉膈散大便随通而痛顿减又用活命饮焮肿随散疮头出脓又用托里消毒散而愈

一小儿腹痛肿痛大便不通脉洪数而有力两寸关为甚此表里俱有邪也用大连翘饮去大黄一剂大便顿通再用活命饮一剂诸症顿退又用清热消毒散而消一小儿臂痈肿痛大便乾澁用泻黄散但面色痿黄此脾经气血虚也先用补中益气汤加熟地黄两月余大便渐利恶寒发热此邪气去而真气虚也用托里散八珍汤而痊

一小儿臀痈溃而作渴烦热大便不通脉洪大而虚用当归补血汤及四物加黄芪各二剂而便通又用八珍汤托里散而疮敛

一女子患流注大便不通乾澁色赤或黄头运恶寒此脾肺气虚而血弱也用补中益气汤加桃仁杏仁麻子仁而大便润去三仁加蔓荆子而头运又用托里散而疮痊

一女子患瘰癧便结面赤口乾晡热此肝肾陰虚而内热也先用加減八味丸八珍汤两月余大便渐通又用加味逍遥散佐以五味异功散而大便通用九味芦荟丸而疮愈

一小儿十五岁瘰癧二年矣余谓禀肾肝陰虚燥热用地黄丸之类而愈後大便结燥用通幽汤为主佐以八珍汤之类两月余而渐愈彼欲速效另服碑记黑丸子通而不止虚症并臻余仍用前法半载而痊

一小儿流注愈而大便秘结发热作渴两颐赤色余谓肾肝陰虚用地黄丸通幽汤而愈次年毕姻後大便仍秘用润肠丸余曰东垣云少陰不得大便以辛润之以苦泄之不信仍用前药後果歿

一小儿腹痛溃而大便澁滯面赤作渴余谓肾开窍於二陰乃禀肾陰不足不信反用疏导之药泄泻不止而歿

一小儿臂痛溃而大便不利或利而後重或虚坐努力余谓脾气亏损用补中益气汤不悟仍用下利之药吃逆腹痛而歿

凉膈散治实热大便不通或咽肿作痛口舌生疮或便溺赤澁发热谵语睡卧不安

大黄 朴硝 甘草 连翘 山梔 黄芩 薄荷叶【各等分】

右为末每服少许蜜汤调服

大连翘饮【方见臂痛】

清热消毒饮【方见热毒口疮】

加味逍遥散

当归补血汤【二方见发热不止】

补中益气汤【方见肌肉不生】

活命饮

托里散【二方见热毒?】

九味芦荟丸【方见喉痹】

大便不止

疮疡泄泻不止或因脓血出多脾气有伤或命门火衰不能生土或脾气虚寒不能司摄或稟肾虚不能禁固或乳母脾胃亏损元气下陷致儿为患若泻而烦热无寐脾气虚也用东垣圣愈汤泻而口乾饮汤胃气虚也用钱氏白术散泻而烦渴饮水胃经有热也用东垣泻黄散泻而色黄饮食不化或腹中作痛脾气虚弱也用六君加木香泻而色黄小腹重坠或大便去而不了脾气下陷也用补中益气汤泻而色青饮食少思腹中作痛肝木侮土也用六君木香升麻柴胡东垣先生云诊右关脉弦风邪伤脾也用芍药甘草汤之类右关脉洪热邪伤脾也用三黄丸之类右关脉缓本经湿邪伤脾也用平胃散之类右关脉濡燥邪伤脾也用异功散加当归或四君子汤加熟地黄之类右关脉沉细寒邪伤脾也用益黄散理中丸之类寒甚加附子大凡饮沸汤而不知热者阳气虚寒之症也急用四君桂附饮冰水而不知寒者阳气亢热之症也急用清凉饮之类又法以手足并冷者为虚寒用五味异功散加姜桂不应急加附子手足不热者为虚热用五味异功散七味白术散手足并热者为实热用泻黄散多有更生者

一小儿臂痛久溃饮食後即泄泻小腹重坠面色或痿黄或皎白两寸脉短不及本位按之若无此脾气虚寒下陷不能升化而然用八味丸补命门火佐以益气汤以培胃气月余渐愈更佐以二神丸两月余而疮愈一小儿腿痛溃後泄泻饮食少思手足并冷多在侵晨夜间此变脾肾虚寒也用四神丸六君姜桂渐愈以益气汤间服而愈

一小儿便痛久不愈泄泻面黄手足时冷小便重坠此脾气虚弱下陷之恶症也朝用益气汤内人参五钱白术二钱夕用异功散内人参三钱白术二钱更以人参一两煎汤代茶两月余而愈至十七岁毕姻後患便痛泄泻手足并冷几危余谓命门火衰用八味丸益气汤而愈

一小儿流注溃後作泻饮食难化余谓脾气虚弱用六君子汤而愈後因停食泄泻手足并冷用六君姜桂不应用人参一两附子一钱数剂诸症始退却用独参汤月许而愈

一小儿瘰癧泄泻面青腹胀审乳母ru头乳房作痛盖乳房属胃经ru头属肝经乃肝木胜脾土而然耳儿病正属是经乃母子同病也朝用益气汤夕用六君升麻柴胡为主佐以四味肥儿丸母子同服并愈

一小儿瘰?泄泻服分利之剂小便不利面黄少食余谓因脾肺气虚不能分布诸脏朝用益气汤夕用异功散诸症悉愈

一小儿瘰?作泻面青腹胀此脾虚而肝侮也用异功散为主以四味肥儿丸为佐诸症渐愈却用肥儿丸为主异功散为佐而愈

一小儿臂痛久不愈大便泄泻小便不调发热作渴余谓肾开窍於二陰故二便不调此禀肾气虚热而然也用地黄丸益气汤之类诸症渐退肌肉渐生疮口自愈一小儿瘰癧兼泻形气骨立此肝脾痞症用异功散三剂却用蚬螬丸一服月余而愈

一小儿十五岁已近女色患此服十宣散久不愈余谓当大补元气不信致恶寒发热或作渴唾痰或头目眩运或手足发热去後大小便牵痛形体骨立余谓此精血未满而亏损所致用补中益气汤加減八味丸日以人参二两煎汤代茶三月余而愈

一小儿十五岁腿痛将愈而作泻余用补中益气汤及六君子汤而愈後因功课劳神饮食失节或时复泻余谓胃气未复仍用前药不信另服消导之药泄泻不止而歿夫胃气平和饮食入胃精气则输於脾上归於肺行於百脉而成荣卫若饮食一伤起居不时损其胃气则上升精华之气反下降而殒泄非升阳补气决不能愈

八味地黄丸治诸疮因命门火衰不能生脾土致血气虚弱不能生肌而疮口不合或变诸败症又诸疮愈後小便频数大便作泄饮食不入作渴发热肌肉不生之圣药但世人未经试验而不信用惜哉

熟地黄【用生地黄酒浸透砂器内九蒸九晒仍晒乾八两】牡丹皮 白茯苓 泽泻【各三两】山茱萸【酒拌取肉】山药【各四两】炮附子【一两】肉桂【用厚者括去外皮淨一两】

右以地黄酒拌湿杵膏各味为末和匀再入酒糊丸少许量大小白汤送下

四神丸治疮?脾虚胃弱大便不实饮食少思或泄泻腹痛又治肾虚五更初泻

肉苁蓉【二两】补骨脂【四两】五味子【二两】吴茱萸【一两】

右为细末用红枣六十五枚生姜六两水二鍾煮乾取枣肉丸桐子大每服二三十丸白汤送下或化服

二神丸治疮?因脾肾陰虚泄泻

补骨脂【四两】肉苁蓉【二两生用】

右为末用红枣四十九枚生姜四两水一鍾煮乾取枣肉丸桐子大每服二三十丸白滚汤下

补中益气汤【方见肌肉不生】

五味异功散【方见用败毒之药】

六味地黄丸【方见作渴不止】

六君子汤【方见腹痛】

独参汤【方见出血不止】

四味肥儿丸【方见贴骨痛】

蚬蛭丸【方见诸疳口疮即蟾蜍丸】

小便不通

疮?小便不通者其因不一当分经络虚实而药之若心小肠热而不通者用黄连导赤散心经气虚用养心汤肝经实热用龙胆泻肝汤肝经虚热用地黄丸脾经实热用泻黄散脾经虚热用四君子汤肺经实热用黄芩清肺饮肺经虚弱用补中益气汤肾经燥热用滋肾丸肾经虚热用地黄丸设若溃而恶寒发热气血虚也用八珍汤手足并冷阳气虚寒也用四君子汤加

乾姜升麻手足不冷乃脾气虚弱也用四君柴胡升麻半夏寒热往来气血虚也用十全大补汤大便了而不了脾气虚而下陷也用补中益气汤切不可轻用疏导之剂复伤元气致肿者不能起发腐溃者不能生肌收敛须临症制宜而治庶无悞矣

一小儿头患疮小便不利胸满少食此脾肺气虚也先用益气汤饮食顿进又用八珍汤加五味子小便顿利未用托里散而痊

一小儿患腹痛小便不利大便乾实此形病俱实先用八正散一剂二便随通又用加味清胃散二剂再用仙方活命饮一剂而痊

一小儿两脇胸间或两腿内侧患疮?小便不利或作或辍疹乳母肝脾脉洪数母服加味逍遥散子服梔子仁散加柴胡而痊

一小儿臂疮服败毒之药小便不利腹胀作呕此胃气复伤阳气虚弱而然耳先用六君姜桂一剂呕胀顿止再用异功散小便如常後用托里散而疮愈

一小儿患流注小便不利面白口乾手足时冷悉因脾肺气虚之所致也用益气汤加山药五味子诸症渐愈又用托里散而疮愈

一女子臂疮饮食少思小便不利余谓脾肺气虚不能化生先用四君黄芪当归小便寻利又用五味异功散托里散而疮愈

一小儿患便痢误服败毒之剂亏损元气不能成脓余用托里之药溃之而愈後小便不利面色痿黄四肢时冷余谓脾肺气虚不能下输膀胱用补中益气汤不信另服渗利之药呕吐腹痛手足并冷余先用四君姜桂再用补中益气汤之类元气渐复小便渐利

一小儿患腹痛溃而脓清不敛面色青黄余谓肝木侮脾土用六君柴胡升麻及补中益气汤之类而愈後小便频数而少服木通车前之类乃纯陰淡渗之味善伤阳气经曰无阳则陰无以生无陰则阳无以化非纯阳补气之药不救不信後果歿

一小儿腹痛溃而脓水清稀烦躁时 小便如淋仍欲分利余曰此脾肺气虚之恶症分利导损真陰之所致也急补脾肺脾肺气旺则小便自调诸症自愈奈何不悟余言仍服前药以致不起惜哉

梔子仁散治小便不通或兼见血或脐腹胀闷烦躁不安

冬葵子 茅根【各三分】 甘草【二分】 梔子仁【炒五分】

右水煎或为末服亦可

八正散治疮?内蕴热毒大小便不利

大黄【炒三分】 山梔【炒】 篇蓄 车前子【炒二分】 ?麦 滑石 木通【各二分】

右水煎服

海金沙散治下焦湿热不施化而小便不利

海金沙 郁金 滑石 甘草【各等分】

右各为末每服四五分白汤调下

清心莲子饮治发热口乾小便不利或兼白浊夜则安静昼则发热

黄芩【炒】 麦门冬 地骨皮 车前子【炒】 甘草【各三钱半】 石莲肉【捣碎】 茯苓
黄芪【炒】 柴胡 人参【各二钱五分】

右每服二钱水煎

黄芩清肺散治肺燥而小便不调

黄芩【炒一钱】 山梔【一个杵】

右水煎服

滋肾丸治肾热而小便不调

黄栢【酒拌炒黑三两】 知母【炒三两】 肉桂【三钱】

右为末水糊丸麻子大每服三五十丸白汤下水调服亦可

导赤散【方见臂痛】

内疏黄连汤【方见作痛不止】

八珍汤【方见发热不止】

补中益气汤【方见肌肉不生】

活命饮

托里散【二方见热毒疮疡】

六君子汤【方见腹痛】

小便不止

疮?小便不止有膀胱气虚而不能禁止者有膀胱虚热而自遗者有肺经传热遗於膀胱而然者有肺虚不能生肾而然者有禀肾虚早近女色而然者治法膀胱气虚用六味丸六一散膀胱有热用六味丸滋肾丸肺经遗热用清肺散六味丸肺气虚用益气汤六味丸早近女色而小便不止或大小便牵痛者乃肾肝亏损所致作渴饮冷属虚热用六味丸补中益气汤作渴饮热属虚寒用八味丸补中汤精血篇云男子精未满而御女色以通其精五脏有不满之处异日有难状之疾老人陰已痿而思色以降其精则精不出而内败小便澀痛如淋愈痛则愈便愈便则愈痛若不条分缕析而泛投襍药则悞矣

一小儿项腋结核溃而体瘦发热小便不止此禀肝胆之经血气虚热而然也先用加味逍遥散五味异功散为主以地黄丸为佐月余以地黄丸为主五味异功散加当归柴胡为佐诸症渐愈又以四味肥儿丸间服而愈

一小儿陰囊时肿余谓胎禀肝火不信後患便痢溃後小便淋沥或时澄白此肝火为患溃久肝气虚弱而小便如斯也盖虚则补其母肾为肝之母用地黄丸滋肾水以补肝渐愈因功课劳心兼怒不时寒热小便如淋用加味逍遥散而寒热止却用地黄丸为主佐以四味肥儿丸而愈

一小儿流注久溃面白时咳脓水清稀小便短少或如淋不止余谓脾肺气虚不能生肝肾而然用补中益气汤六味地黄丸为主佐以托里散而渐愈又间用豆?饼而斂

一小儿鹤膝风久溃小便频数後淋沥不止面色黑或皎白饮食少思四肢倦怠此肾之脾胃虚也朝用补中益气汤夕用五味异功散饮食渐加肢体渐健却用地黄丸而愈

一小儿早近女色患脇痛溃而小便如淋服分利之剂更加腹胀小便不止茎中作痛大便自遗余谓禀肾陰虚也当急补脾肺以滋化源不信仍服分利之药而歿黄芩清肺饮

滋肾丸【二方见小便不通】

加味逍遥散【方见发热不止】

四味肥儿丸【方见贴骨痛】

豆?饼【方见流注】

八味丸【方见大便不止】

五味异功散【方见用败毒之药】

作渴不止

疮?作渴当分经络所属及血气虚实而治若焮痛发热便利调和者邪在腑也用清热消毒散肿痛发热大便秘澁者邪在脏也先用泻黄散如未应用凉膈散焮痛炽盛邪在经络也用仙方活命饮右关脉洪数有力者胃火消烁津液也用竹叶石膏汤右关脉数无力者胃虚津液短少也用补中益气汤饮食失度胃气内伤而亡津液者用钱氏白术散脓血出多而气血虚弱者用八珍汤加五味子稟肾不足而津液短少者用加减八味丸其余当临症制宜

一小儿右颊患疮作渴饮冷目黄唇烈此脾胃实热也用泻黄散而愈後伤食作渴遍身皆黄少用泻黄散黄退而渴益甚此热退而真气虚也用白术散而痊一女子臂痛口乾饮汤小便频数此脾肺气虚用四君黄芪乾姜及益气汤而愈

一小儿腹痛溃後作渴饮汤此脾胃气虚用六君黄芪当归而渴止用异功散而疮敛

一女子面疮作渴饮汤面赤此脾气虚热也先用异功散又用益气汤而愈

一小儿素食膏粱口舌生疮作渴饮冷手足常热此胃经积热先用竹叶石膏汤二剂又用竹叶黄芪汤二剂渐愈再用白术散去木香而愈又一小儿所患同前先用清胃散再用凉膈散而愈

一小儿患瘰癧面赤作渴余谓肝肾虚热用加减八味丸补中益气汤六味地黄丸月余诸症顿愈佐以九味芦荟丸而愈

一小儿口乾作渴发热泄泻诸药不效皆谓不起右关脉弦数按之沉伏寻揣腹中隐伏一块鷄卵大此肝脾痞也用蟾蜍丸三月而消兼服地黄丸三月诸症渐退却以白术散而愈

清燥汤治一切疮?痈疽溃後气血虚怯湿热乘之遍身酸软或夏秋湿热肺金受伤絶寒水生化之源肾无所养小便赤澁大便不调腰腿痿软口乾作渴体重麻木头目眩暈饮食少思自汗体倦胸满气促气高而喘身热而烦

黄芪【一钱五分】 苍术【一钱】 白术 陈皮 泽泻【各五分】 五味子【九粒】 人参 白茯苓 升麻【各五分】 麦门冬 当归身 生地黄 神麴【炒】 猪苓 酒栢【各五分】 柴胡 黄连 甘草【炙各三分】

右姜水煎服湿痰壅盛参芪归地之类可暂减之

生脉散治金疮等症发热体倦气短或汗多作渴或睡卧不宁阳气下陷发热烦燥或六七月间湿热大行火土合病令人脾胃虚弱身重气短或金为火制绝寒水化源肢体痿软脚欹眼昏宜服之

人参【五钱】五味子【一钱】麦门冬

右水煎服

竹叶黄芪汤治气血虚胃火盛而作渴者

淡竹叶【二钱】黄芪 生地黄 麦门冬 当归 川芎 甘草 黄芩【炒】芍药 人参 石膏【煨各一钱】

右水煎服

竹叶石膏汤治胃火盛而作渴者

淡竹叶 石膏【炒】 桔梗 木通 薄荷 甘草【各一钱】

右姜水煎服

泻黄散治胃经实热患疮口渴饮冷

藿香叶【七叶】石膏【煨五钱】甘草【三钱】防风 山梔仁【炒各一两】

右为末每服二钱水煎入蜜少许婴儿乳母服之

东垣圣愈汤【方见出血不止】

五味异功散【方见用败毒之药】

补中益气汤【方见肌肉不生】

七味白术散【方见发热不止】

清热消毒散【方见热毒口疮】

仙方活命饮【方见热毒疮?】

清胃散【方见腹痛】

敷寒凉药【十一】

疮?敷药当分陰阳虚实而用内治之法不可槩敷寒凉之药若肿痛热渴脉滑数而有力者其症为纯阳宜服济陰汤外敷抑阳散则热毒自消瘀滯自散若似肿非肿似痛非痛似赤非赤似溃非溃脉洪数而无力者其症属半陰半阳宜内服冲和散外敷陰阳散则荣逆自从血郁自散若微肿微痛色黯坚硬肉色如故久而不溃脉按之沉细举指虚浮者其症属纯陰宜内服回阳汤外敷抑陰散则寒气自解阳气自复凡阳气虚寒不能消散腐溃或溃而肿不消口不斂者必内外温补庶可保全若陰寒之症而用寒凉之药则腠理迷塞气血凝滯毒气益深良肉反死疮口不斂恶症蜂起不可复救矣盖胃气得寒则不能运行瘀血得寒则不能消散死肉得寒则不能腐溃新肉得寒则不能化生治者不可不察也

一小儿面疮敷寒凉之药患处坚实头面俱肿此脾胃受寒血气凝滯而不能行耳先用冲和汤陰阳散患处和软次用托里消毒散坚肿顿消又用托里散疮溃而愈

一小儿腹痛敷寒凉之药腹胀吃逆手足并冷此脾胃复伤而虚寒也用回阳汤抑陰散诸症渐退用托里散而溃八珍汤而愈

一小儿溃疡敷寒凉之药肌肉不生脓水不止余谓脾气亏损而然用异功散加升麻白芷渐愈又用托里散而痊

一小儿臂痛敷服皆寒凉之药更加肿硬余谓当助脾胃以解凝寒乃用益气汤加茯苓半夏薄桂及如圣饼熨之而愈大凡疮?久而不愈不问已溃未溃皆因阳气虚不能运行耳用如圣饼或葱熨法为善

一小儿两足胫内外赤肿焮连膝上因痘愈之後或谓痘毒欲用寒剂或谓丹毒欲砭出血余曰非也此足三阳经热毒壅肿耳况痘愈之後元气未复设若砭刺出血则患处愈伤敷贴凉药则荣气愈滯服败毒之药则元气愈虚瘀血愈凝不信竟用前法果两胫溃而色黯疮口不斂大便去後如痢欲用治痢之药余曰此因误用前法元气复伤而下陷也非痢非毒遂用补中益气汤之类而愈

一小儿大腿漫肿不赤服败毒之药手足并冷吐泻不食余曰元气虚而半陰半阳之症也用陰阳散冲和汤肿起色赤此变纯阳之吉症也仍用前药佐以活命饮而消

一小儿臂痛面色痿黄饮食少思脉洪数按之软弱余谓真气虚而邪气凝滯也用白芷升麻汤以清胃经热毒用五味异功散以补胃经元气不信反用寒凉之剂外敷内服肿硬至手肉

色如故腹中作痛脉浮大按之沉细此脾胃之气复伤而变虚寒之症也当祛散寒邪温补脾气仍不信又与败毒吃逆不食手足并冷此寒气逼阳於外无根之火泛行耳果死手足俱青患处皆黑

一小儿足胫肿硬一块年余而溃时出清脓其肿益坚肉色青黯发热烦躁余谓真气虚而邪气实当先调脾胃或以为热毒凝滞敷寒凉之药肿硬至膝肉溃腹胀吐泻而死

托里冲和汤治疮疡属半陰半阳似溃非溃似肿非肿因元气虚弱失於补托所致【自制】

人参【二钱】黄芪【三钱】白术【炒】陈皮 当归【各一钱】甘草【炒五分】

右水煎徐徐服手足冷者加姜桂其热已退而未消溃用仙方活命饮可内消者再用托里消毒散可作脓者再用托里散

陰阳散【即冲和膏】治疮疡元气虚弱似肿非肿似痛不痛似热不热属半陰半阳之症用此以和陰阳内服冲和汤或托里散以助元气

赤芍药【炒】白芷 石菖蒲【各二两】独活【炒三两】紫荆皮【炒五分】

右为末用葱酒调服

托里回阳汤治疮?属纯陰不肿痛不焮赤不腐溃或腹痛泄泻呕吐逆冷阳气既陷急用之多有生者【自制】乾姜 附子【重一两四钱者】 当归 陈皮 白术 黄芪 人参 甘草【炒各二钱】柴胡 升麻【各三分】

右水煎徐徐服之如不应倍加姜附外傳抑陰散【一方名回阳玉龙膏】

抑陰散治疮疡元气虚寒不能消散或腹痛泄泻吐呕不食手足或冷或不溃斂筋挛骨痛或跌扑所伤为敷凉药及痈肿坚硬肉色不变久而不溃溃而不斂一切冷症并效

草乌【二钱】南星【一两煨】军姜【一两】白芷【一两】肉桂【五钱】赤芍药【一两炒】

右为末葱汤调涂或热酒调涂

七味白术散【方见发热不止】

清热消毒散【方见热毒口疮】

清胃散【方见腹痛】

东垣圣愈汤【方见出血不止】

陰阳散【即冲和膏】

抑阳散

冲和散

白芷升麻汤

益气汤【五方见肌肉不生】

异功散【方见败毒之药】

五味异功散【方见败毒之药】

仙方活命饮

托里消毒散

托里散【三方见热毒疮?】

补中益气汤【方见肌肉不生】

八珍汤【方见发热不止】

如圣饼

葱熨法【二方见流注】

服败毒药

小儿疮疡多由胎禀遗热或乳哺积热或乳母七情致热经云五脏不和九窍不通六腑不和留结为痈又云气主嘘之血主濡之治者当察其经络所因表里虚实而调和以固其本假如肿痛热渴大便秘结者邪在内也宜疏通之肿焮作痛寒热头疼者邪在表也宜发散之焮肿痛甚者邪在经络也宜和解之漫肿微痛而不溃者血气虚弱也宜补托之色黯微痛而不溃或溃而不斂者阳气虚寒也宜温补之如是则五脏自和六腑自调气血自生疮毒自解此即

败毒之法也若槩用寒凉之剂复损脾胃则肿者不能消散清者不能收敛七恶蜂起多致不救矣

一小儿臂痛肿硬色白寒热倦怠此因血气虚耳先用五味异功散加木香乾姜诸症渐减去二味又佐以托里散如圣饼脓溃而愈

一小儿臂痛服败毒药肿硬不消汗出不止此脾肺气虚也用异功散加五味子而汗止佐以葱熨法而脓成用托里散而疮愈

一小儿腿痛脓水清稀手足时冷余谓脾胃虚寒先用益气汤加乾姜而手足温用异功散葱熨法而脓稠用八珍汤附子饼而疮愈

一小儿面生疮寒热头痛服大黄等药连泻数度手足并冷疮黯吃逆余曰此邪在表误攻其里下多而亡陰也後果歿

一小儿腿痛服麻黄等药汗出喘急手足并冷余谓此陰虚误汗而亡阳也後果歿

五味异功散治稟赋元气虚弱肌肉消薄荣卫短促而患疮?不能消散或脾肺气虚不能生肌收口大凡诸症因脾气虚而不能愈者皆宜服之调补元气则自愈矣

人参 茯苓 白术【炒】 甘草【炒】 陈皮【各等分】

右为末每服二三钱姜枣水煎

托里散【方见热毒疮疡】

葱熨法

如圣饼【二方见流注】

八珍汤【方见发热不止】

十全大补汤【方见便痛】

补中益气汤【方见肌肉不生】

附子饼【方见贴骨痛】

用刀针法

小儿疮?用针法比之大人尤宜慎重当审经络表里之虚实部分肌肉之厚薄而施之夫肿高而软者发於血脉也肿硬而坚者发於肌肉也肉色不变者发於骨也疮未成者解散以消其毒已成者托里以速其脓脓已成者当验其生熟浅深而後针之以指轻按便痛者脓浅也重按方痛者脓深也按之不起者脓未成也按之即起者脓已成也若脓初生而即针则泄其气血而脓反难成若脓已熟而不针则腐溃益深而不能收敛若疮深而针浅则肉溃不出外血反伤若疮浅而针深则其脓虽出良肉亦伤盖疮?之症气血已伤肌肉已坏当随决其毒不可拘泥人神部分其脓一出诸症自退若脓出反痛或烦躁呕逆者皆由胃气亏损急宜托里调补凡脓已成者宜急刺去以纸捻蘸油紙疮内以膏药贴之儿安不必服药如疮反覆未痊多是乳母食厚味或七情火动而然当审所因而调治其母但药中加漏芦令母服之乳中药过儿疮自愈

一小儿患疮肿硬或用针出血寒热呕吐乃胃气虚而复伤也用异功散而呕止用八珍汤而血止用托里散而疮愈

一小儿项间患毒脓成未溃欲急刺之不从至胀痛始针出脓用托里散而安若及时用针不用药亦可也一小儿项间患毒脓内溃胀痛此脾肺气虚而不能外溃也用大补汤四剂针之清脓滴沥发热恶寒用独参汤四剂脓涌泄乃用大补汤托里散而愈东垣先生云气血壮实脓自涌出信矣

一小儿臂痛用针过深出血不止恶寒口噤脉微细尚可救乃用独参汤灌之良久咽下半晌而苏再剂而能言四剂而脓出又用托里散异功散而愈

一小儿项疮脓成不出两腮皆白余曰此肝胆经之症腮白乃肺经之色金能尅木当急用针并补脾气不信竟歿

五味异功散【方见用败毒之药】

八珍汤【方见发热不止】

托里散【方见疮?热毒】

十全大补汤【方见便痛】

五善七恶

疮?之症齐氏陈氏有五善七恶之论又云五善见三则瘥七恶见四则危窃谓前症各有所属之经各有所主之方盖五善属六腑气血无亏人能调摄不治自愈七恶乃五脏亏损失於滋补所致非疮?自有也调治失宜必致不起如动息自寧饮食知味乃胃气平和一善也便利调匀乃肠胃调和二善也脓溃肿消水鲜不臭乃邪气去而胃气平复三善也神彩精明语言清

亮乃心肺气血无亏四善也体气平和脾胃无亏五善也作渴发热或泄泻淋闭者属胃火内淫一恶也竹叶黄芪汤气血俱虚八珍加黄芪麦门冬山茱萸未应佐以加減八味丸料潰而肿痛尤甚脓色臭败者属胃虚火炽二恶也人参黄芪汤未应十全大补汤加麦门冬五味子目视不正黑睛紧小白睛青赤瞳子上视者属肝肾虚火三恶也六味丸料加山梔麦门冬五味子未应八珍汤加山梔麦门五味喘促气短恍惚嗜卧者属脾肺虚火四恶也六君子加姜枣未应用补中益气汤加麦门五味若心火刑肺人参平肺散陰火伤肺六味丸料加五味子煎服潰後肩背不便四肢沉重者属脾胃亏损五恶也补中益气汤加山茱萸山药五味子如不应用十全大补汤加山茱萸山药五味子食不下咽服药而呕食不知味者属胃气虚弱六恶也六君子汤加木香砂仁未应加附子声嘶色败唇鼻青赤面目浮肿者脾肺俱虚七恶也补中益气汤加姜枣未应加附子若腹痛泄泻咳逆昏愠者阳气虚寒之恶症也用托里温中汤次以六君子汤加附子姜桂若潰後发热恶寒作渴怔忡惊悸寤寐不寧牙关紧急或头痛目赤自汗盗汗寒战咬牙手撒身热脉洪大按之微细厚衣仍寒此气血虚极传变之恶症也若手足逆冷肚腹疼痛泄泻肠鸣饮食不入吃逆呕吐者此阳气虚寒之恶症也若无汗恶寒口噤足冷腰背反张颈项强直此血气虚极转变之恶症也急用参芪归术附子救之夫小儿患之因胃气虚弱或脓血出多虚邪内作或乳母失调血气不和致儿为患能审其所致之因而主之亦有复生者若更与攻毒乃促其亡也

一小儿臂疮肉腐色紫焮痛作渴右关脉洪数此胃火炽盛之恶症用竹叶黄芪汤而痛止用四君升麻连翘白芷金银花而愈

一小儿流注吐泻吃逆腹痛手足并冷余谓阳气虚寒之恶症用六君子独参汤益甚遂以人参五钱附子五分连服数剂诸症渐退复用独参汤月许稍愈後饮食失宜寒热发搐用五味异功散加升麻柴胡而安又因劳发热脉大而虚面赤作渴用当归补血汤十全大补汤而安用八珍汤附子饼而愈

一小儿腹痛潰而肿痛益甚饮食少思此脾胃复伤之恶症先用五味异功散加木香诸症渐愈乃用异功散加当归黄芪元气渐复又用八珍汤托里散而愈次年毕姻後寒热往来患处作痒用大补汤地黄丸而愈一小儿脇肿一块敷寒凉之药益加肿硬腹中陰冷余谓肌肉受寒而患处肿硬脾气受寒而腹中陰冷当急温补脾气不信仍服前药加腹痛泄泻手足并冷余曰变阳气虚寒之恶症用五味异功散加姜桂二剂诸症渐愈乃去二味服之外用葱熨之法患处微肿色赤此陰气散而阳气至遂朝用补中益气汤夕用异功散而消

一女子股间结一核不作痛不变色服散坚之剂患处肿硬更头运吐痰其脉弦数而无力心脾俱虚不信仍用攻伐果吐泻腹痛发搐吃逆余谓变脾土虚寒之恶症也先用五味异功散加乾姜肉桂脾气稍复乃用异功散八珍汤而愈

一小儿腿痛潰後作渴饮汤泻利无度此脾胃气虚之恶症也用益气汤八珍汤而愈後功课用心口乾作渴小便频数用益气汤加五味及黄芪六一汤各五十余剂而痊

一小儿腿痛内溃泄泻自汗腹痛气喘余谓脾胃俱虚之恶症用独参汤喘汗渐止用大补汤诸症悉退後伤食吐泻用五味异功散加乾姜而愈次年毕姻後患腹痛脓清不敛朝寒暮热用益气汤八珍汤各百余剂而愈

一小儿患瘰癧服追毒之药更恶寒发热手足并冷右寸脉浮按之而虚用益气汤百余剂而稍愈彼欲速效另服石膏之类吐泻昏愤脉浮大按之微细乃变阳气虚寒之恶症也用人参二两附子一钱二剂而苏数剂而安更以五味异功散月余而愈

一女子十五岁瘰癧发热晡热左腮赤甚余谓肝火血虚用加味逍遥散五味异功散九味芦荟丸而痊後服斑猫等药恶症蜂起手足并冷用参附汤二剂六君姜附四剂乃朝用益气汤夕用异功散而愈

一女子患疔疮肿痛发热脉洪大而虚此血虚之恶症也用当归补血汤烦热悉止用补中益气汤佐以加味逍遥散及葱熨法而痊

一女子脇间患痈色白漫肿寒热不溃余谓禀肝脾虚羸之恶症用补托之药而愈後因经事过期误服行血之剂发热烦躁先用当归补血汤次用逍遥散八珍汤而愈

一小儿十五岁脇痛脓清晡热盗汗遗精此元气虚甚之恶症也用大补汤地黄丸料元气渐复因犯色慾患处色黯昏愤吃逆手足并冷用独参汤四剂而苏用大补汤加乾姜六剂阳气渐复乃去姜又二十余剂而痊一小儿十四岁面目多白足跟肿硬寸许肉色如常遇劳肿硬宛若一栗口乾面赤余谓禀足三陰经虚症不信外敷内服皆败毒之剂翻如熟榴烦躁时嗽腹痛渴泻小便如淋余曰此脾肺气虚之恶症也不信仍复败毒更黑睛紧小白睛青赤瞳子土看此肝肾亏损之恶症并矣余欲救其胃气以滋五脏又为人所阻用千金消毒散更加喘短气恍惚余曰恶症并臻其何能为或问恶症既甚无乃攻毒之晚耶余曰邪正不并立一胜一负理之自然胃气虚则邪气实也其失在於不预补正气邪气胜则恶症集耳东垣先生云但见肿痛参之脉症虚弱便与滋补气血无亏可保终吉信斯言也一小儿臂间肿硬肉色如故小便短赤而频服分利之剂膝胫骨肿余曰肾主骨此禀肾虚所致前药导损肾陰而骨肿耳当调补脾肺以坐肾水其骨自消不信仍用前药而歿

一小儿腹痛久不敛余欲滋其化源反清热败毒恶症蜂起而歿夫肺者肾之母脾者肺之母前症既不滋肺肾以生肝木又用寒凉之药复伤胃气以絕肺肾之化源不死鲜矣

一小儿贴骨痛作泻余欲施调补不信反复分利两手撮空肝气败也泄泻无度肾气败也痰涎上涌脾气败也喘嗽不止肺气败也额间汗出心气败也辞不治果歿

一小儿腿痛肿痛自汗盗汗体倦食少余用托里之药而脓成欲针之或用大黄之类令脓从大便出致大泻腹痛余谓脾胃虚脱之恶症急服大补之剂不信又服前药而死

一女子十五岁外股肿硬连及内股肉色不变右关脉缓弱按之弦数此脾虚而肝乘之气血虚而色不变也当补脾土为主不信另用流气饮冰黄散泄泻腹痛疮口开张而歿

参附汤

人参【一两】附子【制二钱】

右姜枣水煎不拘时服

余方见各症

薛氏医案卷六十八

卷六十九

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷六十九

明 薛己 订

保婴撮要十四

跌仆外伤

伤损之症若色赤肿痛而血出不止者肝心内热也用柴胡梔子散色白不痛而血出不止者脾肺气虚也用补中益气汤漫肿不消者元气虚弱也用五味异功散黯肿不散者瘀血凝滞也用加味逍遥散肌肉作痛出血多而烦热者血脱发躁也用独参汤因亡血而烦躁不安者营卫俱伤也用八珍汤加柴胡牡丹皮久痛不止者欲作脓也用托里散以指按肿而复起者脓已成也宜刺泄之脓出而反痛者气血内虚也用十全大补汤若骨节接而复脱者肝肾虚弱也用地黄丸如兼余症当参各门治之

一小儿伤臂出血作痛面色青赤此因惊而致肝经火动脾经血伤也用加味逍遥散二剂血止又用异功散加柴胡升麻而愈後因父母责之腹痛作泻面色纯青此因忿怒所致乃肝木乘脾也又用六君加柴胡升麻而痊

一小儿登楼失足堕梯致伤其脇肋外略青肿内不重伤旬余其父母始觉恐为瘀血积内误用桃仁红花大黄诸药而下之去血升余又於肿处敷贴膏药以致膏药贴破皮肤遂成深眼月余不愈余以为去血太多大伤元气用八珍汤四剂而患处渐愈朝用补中益气汤夕用五味异功散服及月余而始全痊

一女子亦如前症之误患处日流脓水惟市膏敷贴两月余不瘥余先用独参汤二剂又用补中益气汤并服异功散而更又以托里散及间服八珍汤而垂愈後因饮食失宜发热患处大溃出脓口噤振颤或瘰癧流涎余谓胃气虚肝火内动先用独参汤四剂仍如前朝服补中益气汤夕服五味异功散加柴胡升麻元气渐复佐以托里散而疮斂

一小儿伤指敷凉药肿至手背脓出清稀饮食少思此血气虚弱故也朝用异功散夕用托里散脓水渐稠患处红活又用八珍汤而愈

一小儿伤脾青肿不消面色痿黄仍欲行气破血余谓此因脾气复伤血滞而不行也不信乃服破血之剂饮食不进寒热如疟余朝用补中益气汤夕用八珍汤及葱熨法而愈

一小儿臂伤溃而寒热用八珍汤渐愈後因饮食所伤吐泻不止摇头咬牙此脾气虚而肝邪内侮也用六君升麻柴胡而安又用十全大补汤而愈

一小儿跌伤腹痛作渴偶食生冷腹痛益甚大便不通血将逆上用当归承气汤加桃仁瘀血下而瘥此元气不足瘀血得寒而凝聚也

一小儿坠楼腹停瘀血用大黄等药其血不下反加胸膈胀痛喘急气短余用肉桂木香末各二钱热酒调服下黑血及前服之药而瘥

一小儿跌扑伤腿青肿作痛余谓宜速砭去滞血急补元气不信遂外敷大黄等药内服流气饮後涌出秽脓数碗其脓不止复求余治见其腿瘦而脉大作渴发热辞不治後果歿

一小儿跌扑损伤患处出血不止惟用敷贴不服饮剂饮食少进身体消瘦发热烦躁余用五味异功散加柴胡升麻当归而安後手足微搐眉唇微动此血虚而肝火内动也用四君芎归钩藤钩柴胡渐愈却用托里散八珍汤而全愈血脱发躁若用四物之类复伤脾气多致不救设误白虎汤其危尤速

一小儿跌伤臂骨出 翌日接入肿痛发热不食用葱熨法其痛即止又用六君黄芪柴胡桔梗续断骨碎补而食进肿消又用补中益气汤加麦门五味数剂热退而愈

一小儿十五岁伤腿内溃针出秽脓虚症悉具用大补之剂渐愈後因劳动手撒眼闭汗出如雨急炒热艾频熨脐腹及气海穴更用人参四两炮附子五钱作一剂水煎徐徐灌服良久臂能少动再剂眼开而能言惟气不接续乃用参芪归术四味共八两附子三钱水煎连进二服气少复乃减附子又三剂元气渐复後用独参汤多服而瘥

一女子闪右臂寅卯时发热作痛余决其胆经血虚而火盛先以四物合小柴胡汤四剂而热退更以四物汤加香附陈皮白术茯苓各一钱山栀五分芩连甘草各三分二十余剂肿消而愈

一小儿闪臂肿痛发热恶寒饮食少思余谓脾胃气虚而壅肿也朝用补中益气汤夕用五味异功散间服八珍汤三月形气渐充而愈

一小儿因跌伤胫漫肿作痛肉色如故服破血流气之药反增腹痛以手按之则痛少止余谓此因脾胃虚弱误服破血流气之剂而然非瘀血也未几患处肿消色黯饮食不入腹痛尤甚手足厥冷余用人参一两附子一钱数剂脾胃渐复饮食渐进患处肿痛肉色变赤盖始因元气不足不能运及故肿消而色黯服药之後元气渐充故胫肿而色赤也次用大补汤托里散

三月余而愈

一小儿闪臂肿痛面目天白恪服流气饮之类益加肿痛余曰此形病俱虚之症也前药所当深戒者彼谓肿痛为气滞血凝非流气饮不能疏导经络非破血药不能消散壅逆余言聱牙而前症益甚发热烦燥始请余治余曰元气虚惫七恶蜂生虽卢扁亦不能起矣遂歿一小儿伤臂肿痛内服外敷皆寒凉止痛之药半载後溃而肿痛余谓此非托里温中不能生也不悟确守前药以致血气沥尽而亡

一小儿跌腿青肿所服皆行气破血之药後骨 内溃青肿益深朝寒暮热余戒之曰此气血俱虚甚矣非调补脾胃不可不信果歿

一小儿闪腰作痛服流气等药外肿不赤余曰此儿虽经闪肭然亦禀赋肾气不足而使之者延久益虚恐为不治彼以迂缓视之後果不起

消肿定痛散治跌扑肿痛

无名异【炒】 木耳【炒】 大黄【炒各五分】

右为末蜜水调涂肿处内有瘀血者砭去敷之患处溃者用当归膏敷之尤效

经验方治跌扑瘀血不散肿痛不止或筋骨伤损疼痛

黄栢【一两】 半夏【五钱】

右各另为末用姜汁调涂患处以纸贴之如乾再用姜汁润之日易新药

神效太乙膏治一切疮疽溃烂

玄参 白芷 当归 肉桂 赤芍药 大黄 生地黄【各一两】

右?咀用麻油四十两入铜锅内煎至药黑滤去渣徐入淨黄丹一筋再煎滴水中捻软硬得中即成膏矣

回阳玉龙膏又名抑陰散治跌扑损伤因敷凉药或人元气虚寒肿坚不散溃腐不斂及痈肿肉色不变或肿而不溃溃而不斂筋挛骨痛一切冷症【方见敷寒凉之药】

乳香定痛散治杖疮金疮一切疮?溃烂疼痛【方见作痛不止】猪蹄汤治一切痈疽杖疮溃烂消肿毒去恶肉润疮口白芷 黄芩 当归 羌活 赤芍药 露蜂房【孔多者佳】 生甘草【各五钱】

右用猪蹄一只水四五碗煮熟去油查取清汤入前药煎数沸温洗随用膏药贴之

跌仆内伤

伤损之症若腹中作痛按之痛甚者瘀血在内也用加味承气汤下之下後按之仍痛者瘀血未尽也用加味四物汤调之按之不痛者血气伤也用四物加参芪白术下後发热胸脇作痛者肝血伤也用四君加川芎当归下後恶寒者阳气虚也用四君加炮乾姜下後发热者陰血伤也用四物加参术牡丹皮下後寒热间作者气血俱伤也用八珍汤加柴胡欲呕作呕者胃气伤也用六君加当归半夏有因乘怒跳跃而胸腹痛闷喜手按摸者肝火伤脾也用四君加柴胡山梔畏手按摸者肝血内滯也用四物加桃仁红花胸脇作痛饮食少思者肝脾气伤也用四君加柴胡丹皮若胸腹胀满饮食不思者脾肝气滯也用六君加柴胡枳殼咬牙发搐者肝盛脾虚也用异功散加川芎山梔钩藤钩天麻若用风药则陰血益伤肝火益盛或饮糖酒则肾水益虚肝火愈炽若用大黄等药内伤陰络反致下血壮实者或成痼疾虚弱者多致不起凡伤损之症有瘀血停滯於内者虽裸体亦以手护腹脇盖畏物触之而痛也世俗槩以内伤陰虚腹痛不辨虚实专用破血之剂以速其危其得不死者亦幸矣

一小儿跌仆腹痛作呕恶心气口脉大此饮食停滯也用保和丸二服吐出酸食恶寒发热倦怠不食此脾胃伤也先用六君子汤次补中益气汤间服而愈

一小儿坠楼良久方苏呻吟不絕自以手护其腹此内伤瘀血停滯也用当归导赤散二钱熟酒调下而呻吟顿止次用四物加柴胡牡丹皮而安

一小儿跌仆瘀血腹痛用导滯散下之瘀血甚多随作烦躁面赤作渴欲饮此血脱也用独参汤而安又用四君当归黄芪及五味异功散而愈

一小儿因怒跳跃胸脇作痛或以为内伤瘀血服大黄之药纯下鲜血其痛益甚按之则痛止此肝脾气血俱伤也用四君加芎归四剂而痛止又以异功散加升麻柴胡而饮食进元气渐复病亦随愈

一女子因怒搥胸腹痛经行如崩作呕不食面色青赤两关脉大而虚此肝经火动脾经血伤也用加味逍遥散二剂血止次用异功散加柴胡升麻而愈後因复怒腹痛作泻面青此肝木乘脾也用六君柴胡升麻而痊一小儿因跌伤臂出血腹痛恶食呕吐发搐咬牙此因惊骇停食肝火内动而侮於脾也先用保和丸二服呕吐腹痛悉止又用异功散加柴胡山梔发搐咬牙亦愈却用托里散患处溃而悉痊

一小儿跌仆发搐吞酸腹痛恶心寸口脉大余谓此饮食内伤也不信服当归导滯散连泻五次目直咬牙手足厥冷此脾胃之气复伤而木火内动也用五味异功散加乾姜一剂稍缓又二剂渐愈乃去乾姜加柴胡再服而全愈

一小儿跌仆因服大黄之药下血发热腹痛呕吐按其腹却不痛用五味异功散加当归升麻二剂腹痛顿止又二剂而血止又二剂而热止又二剂而元气复没药丸治打扑伤损作痛等症筋骨疼痛或气逆血滞肚腹胸脇胀闷

没药 乳香 川芎 川椒 芍药 当归 红花 桃仁
血竭【各一两】自然铜【四钱火煅醋淬七次】

右为末用黄蜡四两熔化入前药急搅匀丸弹子大每服一丸酒一钟煎化服

复原通气散治打扑伤损作痛及乳痈便毒初起或气滞作痛尤效

木香 茴香【炒】 青皮 穿山甲【酥炙】 陈皮 白芷 甘草 漏芦 贝母【各等分】

右为细末每服一二钱温酒调徐徐服

加味芎藭汤治打扑仆坠筋骨疼痛血瘀皮肤不破入胃作呕或为呕血

芎藭 当归 百合【水浸半日】 白芍药【炒】 荆芥 蕙【各二钱】

右作二三剂酒水煎服

当归导滞散治跌扑瘀血在内胸腹胀满或大便不通作喘吐血

大黄 当归【各等分】

右为末每服一二钱温酒调徐徐服

黑丸子【一名和血定痛丸】治跌扑仆坠筋骨疼痛瘀血不散壅肿作痛或风寒所伤肢体疼痛若流注鹤膝风初起服之自消如溃而脓清发热者与补气血之药自敛【方见流注】

舌断唇伤

凡舌断者须乘热接上急用鸡子轻击周围去硬壳取膜套舌上以洪宝丹敷膜上自然接续若良久舌已冷不必用接但以洪宝丹敷之其舌自生【所断唇舌鸡子膜含护恐风寒伤之】外症若寒热作痛用四物加柴胡晡热作痛加地骨皮倦怠少食用四君加芎归柴胡恶寒少食用托里散加参芪若烦渴发热用当归补血汤如不作痛但用四君之类以健脾则肌肉自生旬余可愈不宜用辛热之剂恐助火而益其痛也

一小儿舌断半寸许敷洪宝丹服四物加柴胡定痛血止次服四君加柴胡山梔月余而舌自

完

一小儿十四岁疫病愈後啗舌出血先君谓肾虚则啗舌用地黄丸而愈後吐血咳血发热痰盛仍用前丸而瘥

一小儿唇伤出血不止以药止之唇面肿大揭去其药出血甚多肿亦顿消用托里之剂及当归膏患处溃而愈

一小儿唇伤肿痛发热服清热止痛之剂连泻二次眉目搐动服祛风等药手指俱冷手足搐动余谓脾土被肝木所侮用异功散加升麻柴胡半夏手温而搐止仍用前药佐以托里散而愈

一小儿跌伤唇口发搐咬牙惊哭腹痛此出血过多肝火内动所致也用四物加柴胡山梔而安但焮痛至面此患处欲作脓二用托里散四剂头目肿痛其脉滑数此脓已成气虚而不能溃出也又用托里散二剂脓出肿消若初伤时不遽用收敛疮口之药则无此患也一小儿伤唇出血发搐目直用柴胡梔子散一剂其搐稍定但伤处焮痛外傳洪宝丹内服逍遥散而愈一小儿跌伤面肿连唇颊出血焮痛发热以花蕊石散敷之血止痛定次用当归补血汤而发热顿止又用加味逍遥散八珍汤而溃托里散而敛

洪宝丹【一名济陰丹】治伤损焮痛并接断

天花粉【三两】姜黄 白芷 赤石药【各一两】

右为末茶汤调搽患处

一方用乱发烧灰敷舌上接之又治擦落耳鼻乘热蘸之接上即愈亦须口含以防其冷

当归补血汤治杖疮金疮血气损伤或妄服峻剂致血气俱虚肌热大渴引饮目赤面红昼夜承息其脉洪大而虚重按全无经曰脉虚血虚脉实血实盖血虚发热是也证似白虎汤惟脉不长实为辨耳若误服白虎汤必死此病多得於饥饱劳役者【方见发热不止】

四物汤治一切血虚发热或因失血太多或剋伐太过或溃後发热烦躁不安并宜服之【方见腋痛】

柴胡梔子散【方见脇痛】

花蕊石散【方见後】

八珍汤

加味逍遥散【二方见发热不止】

托里散【方见热毒疮?】

脑骨伤损

脑骨伤损者用轻手捋令端正剪去其发若皮不破敷黑龙散或葱熨法皮破则填乳石散以绢帛包之不可见风着水更用葱杵烂炒热频罨患处为佳

一小儿伤脑出血过多发热烦躁肉瞤筋惕殊类风症欲作风治余曰无风可祛无汗可发法当峻补其血遂用圣愈汤二剂而安又用养血之剂而愈

一小儿伤脑肿痛出血外敷花蕊石散内服八珍汤而安後揭疮痂出血碗许手足发搐寒热痰盛此血虚兼惊肝火内动而生风也今服地黄丸及加味逍遥散而愈

一小儿伤胫骨出血肿痛恶寒少食睡中发搐先用异功散饮食渐进又用逍遥散发搐顿止再用归脾汤母子并服而愈

一小儿被伤手足发搐顿闷咬牙饮食不思此肝经血虚火动生风脾土受侮而然耳用地黄丸异功散诸症渐退用八珍汤托里散疮渐愈

一小儿被伤面青懒食时作腹痛以手按腹却不痛余以为脾气内伤而然不信妄服攻血之药果吐泻作呕手足并冷余先用六君加柴胡升麻生姜又用托里散异功散而愈

一小儿脑侧近耳被伤寒热作痛溃後小敛恪服止痛清热之剂余曰寒热作痛因肝经气血虚也溃而不生肌肉脾经气血虚遂用地黄丸异功散加归芪诸症渐愈又用托里散而愈

谦甫花蕊石散治一切金刃箭镞打扑伤损或死者急搽伤处其血如入脏二便不通用童便和水煎入酒少许调服立效若腹破肠出急宜内入以桑白皮为线缝合掺围疮上如疮乾以津润之

硫黄【明净者四两】花蕊石【一筋】

右为末拌匀入瓦罐内用纸筋和泥固济候泥乾渐添火煨至通红经宿取出细研滋器盛周

加味逍遥散治伤损血虚内热发热或遍身搔痒寒热或肢体作痛头目昏重或怔忡颊赤口燥咽乾或发热盗汗食少不寐或口舌生疮耳内作痛或胸乳腹胀小便不利【方见发热不止】

圣愈汤治杖疮金疮痛疽脓血出多热躁不安或晡热作渴等症【方见出血不止】

十全大补汤治杖疮瘀秽已出气血俱虚肿痛不消或腐而不溃溃而不斂或恶寒发热自汗盗汗饮食少思肢体倦怠若怯弱之人患处青肿肌肉不坏者服之自愈若有瘀血砭刺早者服之自消或溃而脓水清稀肌肉不生或口乾作渴而欲饮汤或砭後发热恶寒头痛目晕口乾作渴有似中风之症皆属气血虚也并宜服之【即四君四物加肉桂黄芪】

八珍汤【一名八物汤】治伤损等症失血过多或误服剋伐之剂血气耗损恶寒发热烦躁作渴或疮疡因气虚肿痛不消不能溃斂或溃瘍恶寒发热脓水清稀久而不愈【即四君四物】

黑龙散治跌扑伤损筋骨碎断先端正其骨以纸摊贴若骨折更以薄木片疎排夹贴却将小绳紧缚三日再用前法勿去夹板恐摇动患处至骨紧牢方不用板若被刀箭虫伤成疮并用姜汁和水调贴如口破以玉珍散填涂

穿山甲【六两炒黄或炼存性】枇杷叶【去毛入半两一云山枇杷根】

右为末姜汁水调或研地黄汁调亦好

地黄丸【方见作渴不止】

腹破肠出

腹破肠出者急复纳入以麻缕缝合外敷花蕊石散如脂已出急以手取去而缝之如已出而复推入则内溃害命矣若肠出乾燥者煮大麦粥取汁洗湿推入不时少以米粥研烂饮之二十日外始可薄粥百日後乃瘥切勿令惊惊则杀人矣【用桑皮线尤佳】

一小儿持碗跌仆腹破肠出即纳入以麻线缝完敷花蕊石散而愈

一小儿持刀而戏仆地刀入腹肠屎并出不救【因肠破故不救也】

一小儿伤腹发热作呕焮痛外敷内服皆止痛清热之剂日晡益甚余谓脾经气血益虚朝用补中益气汤夕用四物参芪归术诸症渐愈乃用托里散疮口自斂一小儿脇伤成疮脓清不斂寒热发渴余朝用补中益气汤培益脾气夕用六味地黄丸滋补肝血渐愈却用托里散异功散而肌肉自生

一小儿伤腹血出发热烦燥先用当归补血汤而安却用圣愈汤患处顿愈又用托里散八珍汤而全愈花蕊石散【方见前】

益气汤【方见肌肉不生】

托里散【方见热毒疮?】

地黄丸【方见作渴不止】

当归补血汤【方见发热不止】

圣愈汤【方见出血不止】

陰囊被伤

陰囊皮破出血作痛者敷当归膏初伤出血不可骤止之血瘀於内则作脓或伤口原小血出不尽而内溃甚至辜丸露出或陰囊尽溃者内服托里之剂外敷当归膏则囊自生其外伤腐溃及内伤瘀血作脓者皆同囊痈治之惟辜丸碎者不治

一小儿伤陰茎出血作痛寒热发搐咬牙顿闷唇口牵动手足时冷欲用破伤风药余谓出血诸症肝经主之唇动诸症肝木侮脾土也遂用异功散加升麻柴胡天麻治之顿愈

一小儿陰囊被伤肿痛不愈朝寒暮热饮食少思余谓脾胃复伤之症当用参术归芪等药治之不信别用清热之药果作泻欲呕手足并冷余先用六君加柴胡升麻而渐愈又用异功散加柴胡升麻而全愈

一小儿持碗仆地误伤陰囊辜丸露出血出不止寒热时搐此肝经血虚而火动耳随敷当归膏服柴胡清肝散加熟地黄芪及六味丸而愈

一小儿被竹?伤破陰囊出血甚多腹痛发搐咬牙流涎七日矣气口脉大於人迎二三倍此因惊停食也切忌风药余用五味异功散加柴胡钩藤钩而安凡伤损之症小儿患之多有夹惊夹食者夹食则气口脉大於人迎或作呕吐吞酸腹痛泻秽等症夹惊则左关弦洪而软或作顿闷咬牙目直项急等症日久不治若成破伤风疾则祸在反掌之间矣

一小儿陰茎被伤断而皮相连寒热作痛血出不止余谓急当剪去调补肝肾二经则热自安痛自止矣遂用补中益气汤加麦门五味子而愈

一小儿因跌小腹皮破服破血之剂陰囊肿胀作痛发热按其腹却不痛余谓当用补血之药不信遂致不起补中益气汤治跌扑等症伤损元气或过用剋伐恶寒发热肢体倦怠或溃後血气虚弱不能生肌收斂或兼饮食劳役头痛身热烦躁作渴脉洪大弦虚或微细濡弱自汗饮食少思尤疮疡虚损之圣药也【方见肌肉不生】

柴胡清肝散【方见脇痛】

地黄丸【方见作渴不止】

金木所伤

伤损之症皆肝经主之若青肿不痛或肿不消者气血虚弱也用十全大补汤血出肿痛或作寒热者血伤而肝火内动也用四物柴胡山梔血出不止或发寒热者气虚而肝火内动也用四君芎归柴胡寒热而内痛益甚者此欲溃脓也用参芪内补散若脓出而反痛者气血虚也用八珍汤疮口赤而肉突者血虚而肝火生风也用柴胡梔子散若脓出不止疮口白而肉突者气虚而寒邪外凝也用补中益气汤若脓溃而仍痛或溃而不斂皆脾胃虚弱也用六君子汤若不固元气或敷服寒凉则肉黯不溃或溃而不斂多成败症矣可不戒哉一小儿伤手肿不消日出脓水少许饮食不思发热恶寒面色痿黄此脾胃气虚也朝用补中益气汤夕用五味异功散加升麻月余渐愈因饮食停滞服剋伐之剂患处漫肿更作呕恶寒余谓脾胃复伤用六君子汤加升麻柴胡治之而愈

一女子因怒仆复伤患处出血经行不止臂面青赤右关脉弦数此肝脾二经火动不能统摄其血也先用小柴胡汤二剂又用加味逍遥散二剂血止而安

一小儿伤内腠成疮色黯久而不愈此肝脾气血虚也先用补中益气汤後用八珍汤加柴胡升麻渐愈再用地黄丸而全愈

一小儿伤臂成疮久而不愈寒热作渴疮口青白不合脓水时流先用参芪归术寒热渐愈又用托里散患处色和再用十全大补汤而愈

一小儿伤足成疮外傳寒凉药内服败毒散久不溃腐余谓至陰之处血气罕到又服剋伐之剂所以难腐也虽腐而不能斂也遂用托里散加肉桂数剂稍知痛而色渐赤减桂又数剂而溃因饮食过多连泻二日乃用五味异功散加升麻柴胡而泻止仍用托里散而愈一女子十五岁伤手成疮日出清脓少许日晡发热此元气虚也先用五味异功散加当归升麻月余元气渐复乃用加味逍遥散及八珍汤异功散而愈

一女子十四岁修指甲误伤焮痛妄傳寒凉及服败毒之药遂肿至手背肉色不变余先用内消托里散手背渐消次以托里散为主八珍汤为佐服两月余而愈其时有同患误伤成疮不固元气专攻其伤者俱至不起没药降圣丹治伤损筋骨疼痛或不能屈伸及外邪内伤筋骨缓纵皮内刺痛肩背拘急身体倦怠四肢无力

没药【另研】当归【酒洗炒】白芍药 骨碎补【搯去毛】生地黄川乌【去皮脐】川芎【各半两】自然铜【火煅醋淬十二次研末水飞净一两】

右为细末以生姜自然汁与炼蜜和丸每一两作十丸每服一丸槌碎用水酒各半锤入苏木少许煎至八分去苏木空心服

万金膏治伤损筋骨疼痛

龙骨 鼈甲【炙】 苦参 乌贼鱼骨 黄栢 黄芩 黄连 猪牙皂角 白芨 白蔹 厚朴 木

鼈子仁 草乌 川芎 白芷

没药【另研】 乳香【另研】 当归【各半两】 清油【四斤】 槐枝

柳枝【各四寸长二十一条】 黄丹【一斤半炒过净】

右除乳没黄丹外将诸药於油内慢火煎黑色去渣每油一斤入丹半斤不住手搅令黑色滴水中不粘手乃下乳没再搅如硬入油些少以不粘手为度

接骨散治骨折碎或骨出 先整端正却服此药飞禽六畜所伤亦能治之

鹏砂【一钱五分】 水粉 当归【各一钱】

右为末每服二钱煎苏木汤调服後但饮苏木汤立効

又方皮破筋断以胶香涂之或以金沸草汁频涂自然相续

生葱【切断一方生姜】 荆芥 土当归

右煎汤温洗或止用葱一味煎洗亦可

洁古没药散止血住痛

定粉【一两】 风化灰【一两】 枯白矾【三钱另研】 乳香【五分另研】 没药【一字另研】

右为末搽之

塞上治扑损瘀血在内烦闷以热酒调服蒲黄二钱胜金丹治肌肤伤损青肿用茄子通黄极大者切如指厚新瓦上焙乾为末临卧酒调服二钱一夜消尽无痕迹也

肘後治骨节伤损瘀血不出生铁一斤酒三升煎取一升饮之若肝经实热血瘀则肝木自甚或兼口眼牵掣手足抽搐者宜用生铁藉其金气制之若血虚肝燥生风宜用四物柴胡钩藤钩补而清之若肝气本虚金来尅木宜用泻白散以清肺六味丸以补肝若肾虚不能生肝亦

用六味丸以滋肾水生肝木不可槩用

本事内消散治打扑伤损及一切痈肿未破

生地黄【研如泥】木香【各等分】

右以地黄膏随肿大小摊纸上掺木香一层又依前摊地黄贴肿上三五度即愈

治金疮出血不止以五倍子为末乾贴即止神效又方用石灰茱萸石榴寄奴五倍之类乃澁滯收敛止血之剂气血未耗内无火者用亦有效若血虚内热宜犀角地黄汤之类凡金疮出血不止素怯弱者当补气素有热者当清血有怒气者当平肝烦热作渴昏愤不寧者当补脾气筋挛搐搦者当养肝血不应用地黄丸以滋肾水自愈

治针入肉不出用蜡蝼蛄槌烂涂上或硫黄中末以纸覆之觉痒时其针即出用双杏仁捣烂以车脂调敷以纸贴之二日一换三五次或乌翎三五枚炙焦为末醋调涂之或用白梅入水研烂调象牙末傅之或以象牙和敷之其针皆即出

治鱼刺入肉嚼吴茱萸封之自烂出

丹溪治破伤风血凝心针入肉游走三症用生寒水石为末调涂之其痛立止

补中益气汤治跌扑等症损伤元气或过用剋伐恶寒发热肢体倦怠或溃後血气虚弱不能生肌收敛或兼饮食劳倦头痛身热烦燥作渴脉洪大弦虚或微细濡弱自汗饮食少思疮?气血损之圣药也【方见肌肉不生】

神应葱熨法治跌扑伤损肿痛用葱头细切杵烂炒热敷患处如冷易之再熨肿痛即止其效如神

二味参苏饮治出血过多瘀血入肺面黑喘促

人参【二两】苏木【二两】

右每服五钱水煎服

桃仁承气汤【加当归即归承汤】治伤损血滯作痛或发热发狂等症

桃仁【研】?硝甘草【炙各一钱】大黄【酒蒸二钱】

右作二剂水煎更量虚实用之

复元活血汤治从高坠下恶血流於脇肋疼痛不已柴胡【五钱】当归【三钱】甘草【二钱】穿山甲

大黄【酒浸一两】桃仁【去皮尖五十个研烂】红花【一钱】瓜蒌仁【二钱】

右每服二三钱水酒煎五分热服以利为度利後痛或不止服乳香神应散

消毒定痛散治跌扑肿痛

无名异【炒】木耳【炒】大黄【炒各五分】

右为末蜜水调涂如内有瘀血砭去敷之腐处更用当归膏敷之尤好

药蛆方治伤损成疮溃烂生蛆用皂矾煨过为末乾掺其内蛆即死

参芪内补散

人参 黄芪 当归 白术【各一钱】白芷 防风【四分】川芎【六分】肉桂 甘草【炒各五分】

右水煎作二三服

八珍汤【方见发热不止】

十全大补汤【方见便痢】

葱熨法【方见流注】

四物汤【方见腋痛】

六君子汤

四君子汤【二方见腹痛】

柴胡栀子散

小柴胡汤【二方见脇痛】

逍遥散【方见发热不止】

地黄丸【方见作渴不止】

托里散【方见热毒疮?】

五味异功散【方见用败毒之药】

漆疮

夫漆属木木生火而能尅土惟脾虚之人多染之若遍身浮肿或呕吐者用小柴胡汤加白术陈皮茯苓若遍身或面目作痒者用前胡汤加连翘山梔若脓水淋漓或痒或痛者用柴胡山梔散若呕吐不食或泄泻腹满者用四君升麻其外治之法当用铁锈末调搽或蟹黄涂之或用麻油或浸芒硝淋塌患处或矾石末紫苏末擦之或人乳汁润之或无名异末水调敷或用好花椒煎汤洗之或生姜汁敷之或乾荷叶浓煎汤洗之并效

风犬伤【附蛇虫痛伤】

丹溪衍义云犬属阳其性热大抵热极生风风热相搏则为颠狂惊骇之状此物理之自然者今人治风犬咬伤反以巴豆斑猫等燥热之剂泻毒从小便出如犬之形状殊不知以热济热血被伤而然非犬之毒也切宜慎之余见吴中凡被犬伤或出血发热者辄服斑猫巴豆等药或至发搐咬牙即以为毒甚服之益坚遂致殒丧殊不知凡被伤受惊之症皆肝经所主肝属木木生火火生风故发搐咬牙之疾被犬惊伤所致为多不必风犬为然也若为风邪所袭牙关紧急腰背反张宜用定风散童便调服更以漱口水洗净伤处搽之若出血不止用灯草贴之其有他症从破伤风法治丹溪之戒不可不知若真为獠犬所伤则斑猫巴豆之药亦当暂用盖以毒攻毒理势自然毒既内中非此不去但病去即止便与调补可保无虞不宜确服耳大凡獠犬之状必吐舌流涎尾垂眼赤诚为易辨其被伤病甚之时必作犬吠亦自不同不可一槩施治也

一小儿犬咬出血抽搐痰盛敷玉珍散服抱龙丸而愈一小儿素怯弱犬咬出血恶寒发热过服斑猫之药殊类破伤风与玉珍散敷之服十全大补汤倍加钩藤钩而愈

一小儿被犬伤面青发搐咬牙此因惊所致或谓风犬致伤用斑猫等药而歿

一小儿犬伤牙关紧急兼热发搐余以为急惊风不信乃服斑猫等药而歿

一方治风犬咬用斑猫七个去头翅足将糯米一撮同炒米黄色为度为末空心用水调服

又法用朱砂雄黄各五钱为末空心香菜油调下玉珍散【一名夺命散】治伤损伤风头疼角弓反张

天南星【炮】防风【去芦梗各等分】

右为末凡破伤风病用药傅贴疮口即以温酒调下一钱服之如牙关紧急童便调服二钱垂死心头温者急服三钱用童便一盞煎服

治蛇蝎蜈蚣等恶虫所伤用大蒜切片置痛处以艾壮於灸之毒气顿解痛即止

又方用白矾於灯上烧汁滴於痛处或用贝母末酒调服之神效或用南星末醋调上擦之或黄蜡烧滴患处亦妙

治蛇入人窍用艾灸蛇尾即出又法以刀破蛇尾少许入花椒自出即用雄黄朱砂为末煎人参汤调灌之内毒即解用白芷末或贝母末酒服尤效

治蛇?人身不解以热汤淋之或就以身卧倒滚转亦可解

治蛇骨刺人毒气作痛烧鼠屎为末敷之或食热酒大蒜亦效

治蜈蚣入咽中被咬未死杀鷄血灌之更灌以香油探吐血虫并出

治误吞水蛭用田中乾泥一块小死鱼三四个去头骨和巴豆十粒去殼研烂入泥为丸菉豆大用田中冷水吞下十丸小儿三五丸须臾泻出却以四物汤加黄芪煎服以生血气自愈

治蠹螋尿?人生疮如粟粒四围赤中有白汁令人恶寒壮热匝身即磨犀角汁涂之或燕窠中土猪脂苦酒敷之立效盐汤浸洗亦可

治蜘蛛咬一身生癩羊乳一味饮之

治蚯蚓呵陰囊肿胀及咬人甚者如大风状眉髯脱落夜闻蚯蚓之声鸣於身浓煎盐汤浸洗即安

治蜈蚣咬用石灰醋和涂之

治毒蚁螫人用雄黄一钱麝香五分研细生麻油调涂之

治蛇虫刺人用猪牙中垢涂痛处

治蜴蜥嚙人用青麻心以手按解取汁涂之

治诸虫入耳用猪肉炙香置耳边虫闻香即出如虫死在耳中用细芦筒或鷺翎管令人吸出

之

疮?发疮

疮?发疮因气血亏损外邪所抔或内虚郁火所致其症牙关紧急四肢劲强腰背反张肢体抽搐有汗不恶寒者名曰柔疮风伤卫故有汗也无汗而恶寒者名曰刚疮寒伤荣故无汗也皆因亡血过多筋无所养伤寒汗下过多及溃疡产後者多患之此乃败症也若大补气血多有复生如作风治速其危矣况在婴儿尤难调理宜审其禀赋及乳母所致者而治之

一小儿疮溃後患此形气殊倦用十全大补汤二剂稍缓佐以补中益气汤数剂而痊

一小儿患瘰癧变疮面青或赤此脾经血虚而有热也用八珍汤加柴胡牡丹皮热汗渐止又用十全大补汤寒热渐止又用托里散附子饼而愈後伤食服尅伐药仍发疮手足如冰余用人参理中丸五味异功散而愈一小儿感冒发散变疮汗出不止手足并冷用补中益气汤加肉桂四剂而愈

一小儿金刃伤脚面出血过多口噤目直此出血过多肝火内动而变症用四物参术钩藤鈎四剂其势稍定又用五味异功散加当归柴胡变症悉愈又用托里散八珍汤患处溃而痊

一小儿伤手出血烦躁口噤昏愤气息奄奄先用东垣圣愈汤而安又用托里散而溃佐以八珍汤而敛一女子十五岁伤手指出血口噤如疮脉浮数肝脾为甚先用加味归脾汤四剂稍缓又数剂渐苏却佐以加味逍遥散月余而苏却用归脾汤为主八珍汤为佐而愈此等症候用祛风化痰之药而死者不可枚举十全大补汤【方见便痛】

补中益气汤【方见肌肉不生】

人参理中汤

五味异功散【方见用败毒之药】

附子饼【方见贴骨痛】

托里散【方见热毒疮?】

归脾汤【方见脇痛】

八珍汤

加味逍遥散【二方见发热不止】

破伤风

洁古云风症者善行而变数入脏甚速死生反掌之间耳急宜分表里虚实而治之邪在表者宜羌活防风汤半表半里者头有汗而身无汗宜羌活汤传入者甚则舌强口噤项背反张筋惕搐搦痰涎涌盛胸腹满闷或便溺赤闭时或汗出其脉洪数而弦者宜大芎黄汤然其汗初出者由风热郁甚於里故表热稍解腠理疎而汗出也宜除热散结若热已退脏腑已和而汗仍出者表虚也以白术防风汤实其表牙关紧急者须撬开口灌之更不时灌以粥饮然小儿患之多因夹惊肝火内热生风所致夫肝主五色属木生风察其面色入肝为青入心为赤入脾为黄入肺为白入肾为黑肝经者用柴胡清肝散心经者用梔子清肝散加黄连肾经者用地黄丸加柴胡脾经者用六君加柴胡山梔为主而佐以大补脾胃之药为善

一小儿十四岁患瘰癧因劳心功课头痛发热目以为伤风用姜葱发汗忽腰背反张口噤不语脉浮大按之如无此气血虚极而变瘵非破伤风也灌十全大补汤一剂良久方苏又数剂而愈後又劳复厥冷汗出如注良久不省用前汤加附子五分一剂而苏乃去附子服至三十余剂而愈

一小儿患流注面色痿黄忽舌强口噤脉洪大而虚按之如无此脾肺气虚而变症也先用补中益气汤四剂稍缓又用十全大补汤数剂而瘵

一小儿臂痛久不收斂因惊发搐口噤用托里散内参术各用三钱柴胡五分钩藤钩一钱五分四剂而安後停食惊骇目直发搐口噤流涎手指逆冷用五味异功散此肝木旺脾土受侮饮食内作而然用五味异功散加钩藤钩木香乾姜而苏

一小儿溃疡变瘵如前面色青赤此心肝二经血虚而有热也先用八珍汤加柴胡牡丹皮稍定又用加味逍遥散加五味子渐愈又用八珍汤而安

一小儿溃?忽汗出不止手足并冷先用补中益气汤加肉桂五味子数剂诸症渐愈又因饮食过多口噤作呕用异功散加升麻四剂而安

一小儿十六岁瘰癧久不斂因过劳口噤目直脉洪数左关脉弦而无力余谓肝经气血虚而火内动也用地黄丸料四剂而安却用补中益气汤以补脾肺用地黄丸以补肾肝为主佐以九味芦荟丸以治肝疳而瘰癧愈

一小儿十六岁流注久不愈因劳兼怒忽仆地昏愤殊类破伤风面色皎白无气以动用补中益气汤内用人参五钱加肉桂一钱不应加乾姜一钱又不应此阳气虚甚药力不能胜之也急加附子一钱稍定乃去附子服十余剂而元气渐复却佐以八珍汤豆豉饼半载而瘵毕姻後因入试場劳伤元气前症复发亦类破伤风脉浮大按之如无用参附汤四剂而苏八珍汤地黄丸料各百余剂而瘵

羌活防风汤治破伤风初病邪在表者急服此药以解之

羌活 防风 甘草【炙】 川芎 藁本 当归 芍药【各四两】 地榆 细辛【各二两】

右每服五钱水煎热服

防风汤治破伤风表症未传入里急服此

防风 羌活 独活 川芎【各等分】

右每服五钱水煎调蜈蚣散大效

蜈蚣散

蜈蚣【一对】 鳔【三钱】

右为末用防风汤调下

羌活汤治破伤风半表半里者急宜服此

羌活 菊花 麻黄 川芎 石膏【煨】 防风 前胡 黄芩 细辛 甘草 枳壳 白茯苓 蔓荆子【各一两】 薄荷 白芷【各五分】

右每服五钱生姜水煎日二三服

地榆防风散治破伤风在半表半里头微汗身无汗不可发汗表里兼治

地榆 防风 地丁草 马齿苋【各等分】

右为末每服三钱温米汤调服

大芎黄汤治破伤风在内急宜服此汤疏导之

川芎 羌活 黄芩 大黄【各一两】

右每服五钱水煎温服以脏腑通和为度

白术防风汤治表药过多有自汗者

白术 黄芪【各一两】 防风【二两】

右每服五七钱水煎温服无时脏腑和而自汗者可服此药若脏腑秘小便赤自汗者宜速下之用大芎黄汤

白术汤治破伤风汗不止筋挛搐搦

白术 葛根【各两】 二升麻 黄芩 芍药 甘草【二钱五分】

右每服五钱水煎服无时

玉真散治破伤风【方见风犬伤】

日凡子治一切风疾壅盛手足顽麻或牙关紧急口眼歪斜半身不遂等症

半夏【七两生用】 川乌【去皮脐生用半两】 南星【二两】

右为末用生姜汁调糊丸桐子大每服一二丸用淡姜汤下

柴胡清肝散治肝胆三焦风热怒火以致项胸作痛头目不清或耳前後肿痛寒热体疼

柴胡 黄芩【炒五分】 人参

山梔【炒】 川芎【各一钱】 连翘 桔梗【各八分】 甘草【五分】

右水煎服

梔子清肝散治三焦及肝胆经风热耳内作痒或生疮出水或脇肋胸乳作痛寒热往来

柴胡 山梔【炒】 牡丹皮【各一钱】 茯苓 川芎 芍药 当归 牛蒡子【炒各七分】 甘草 白术【各五分】

右水煎服

地黄丸【方见作渴不止】

六君子汤

除热散

十全大补汤【三方见便痢】

补中益气汤

托里散

五味异功散【三方见败毒之药】

八珍汤

加味逍遥散【二方见发不止】

瘰癧

瘰者筋脉急而缩也癧者筋脉缓而伸也一缩一伸手足相引搐搦不已大抵与发搐相似者此症多属风盖风主摇动心主脉肝主筋心属火肝属木火主热木主风风火相炽则为瘰癧也

一女子停食服消导之剂伤脾而患此告於余余曰经云脾之荣在唇口又云脾主四肢又云脾主涎此因前药妄下胃气复伤肝木侮土以致前症也当先救胃气以养五脏因衆议不一尚未用药翌早果咬牙呵欠困卧惊悸哽气短气面色?白始信余言遂先用五味异功散次用补中益气汤而愈

一女子瘰癧将愈因勤於女红忽作瘰癧此胃气未实而劳伤筋脉耳用补中益气汤及五味异功散俱加钓藤钩而愈後劳役怒气经行颤振用加味逍遥散及补中益气汤俱加钓藤钩而愈

一小儿仆伤溃後患前症面青或赤服风痰之药咬牙目直仍欲治风余曰凡伤损之症皆肝主之故面色青而瘰癧咬牙目直皆属肝经血气亏损风木翕合火动而生风也无风可祛无痰可逐遂用地黄丸及补中益气汤而愈

一小儿跌伤膝出血误服大黄等药患前症或时烦躁自汗手欲撮空此因肝经血虚肝火炽盛耳用地黄丸补中益气汤而愈【方见前各症】

颤振

颤振与瘰癧相类瘰癧则手足牵引或伸或屈颤振则但颤动而不伸屈也内经云因胃气不实诸脉空虚行陰用不复因其所在补肉分间然小儿疮疡溃腐或损伤脓血出多属脾胃气虚血弱用补中益气汤五味异功散加白术当归升麻主之肝经虚热用六味丸脾血虚弱用

四君子加芎归胃气虚弱用补中益气汤一小儿腿痛内溃出脓碗许即时颤振面白汗出此阳气虚脱非大补不可也遂用人参黄芪当归白术四剂而盗汗颤振渐止又以十全大补汤数剂而痛亦全愈一小儿患流注唾痰气促其父自恃知医用化痰理气等剂半载而溃用托里散等剂脓水淋漓肿痛不消寒热往来饮食少思肌肉消瘦大便不实手足时冷而颤振两脉浮大按之微细余曰此属命门火衰当用八味地黄丸不信乃服参芪归术之类更加痰喘泄泻余以八味丸补中益气汤二方间服年余而痊

一小儿年十三岁患痈肿硬不溃脉弱时欲作呕有欲饮服败毒等药余谓肿硬不溃乃阳气虚弱呕吐而不思饮食患此者乃因胃气虚寒以致若此法当温补脾胃大抵肿赤痛甚烦燥脉实作呕为有余当下之肿硬不溃脉弱作呕为不足法当补之若痛伤胃气或感寒邪秽气而作呕者虽肿犹当助胃壮气彼不信余之言仍服功伐之剂後而果歿

一小儿御女甚蚤素有陰虚背忽患疽用参芪大补而不斂内热发热舌燥唇裂小便频数口乾饮汤呕吐泻利耳闭目盲仰首眩暈颤振脉浮大而数余曰疮口不斂脾土败也舌燥唇裂肾水枯也小便频数脉气衰也内热发热虚火上炎也口乾饮汤真寒之象也呕吐泻利真火衰败也耳闭目盲肝木枯也仰首眩暈颤振肾气已絕也余辞不治後果歿

一女子患瘰癧素性纵食生冷之物者且善怒经水非过期则不及而至肢体发热倦怠饮食少思而颤振不时余以为脾气不足肝经血少之故火盛而致此也余遂用以补中益气汤加钩藤钩炒山梔又用加味逍遥散加钩藤钩而愈又因饮食停滯吐泻酸臭更加发搐用五味异功散加钩藤钩而愈

一女子患流注发热而颤此肝脾气血不足经水过期虚火生风之症也先用补中益气汤加钩藤钩渐愈又用加味地黄丸而全愈

一女子不得继母之心久而郁怒遂患颤振面赤发热先用加味小柴胡汤次用加味归脾汤及加味逍遥散前後间服而寻愈但面色时青又用地黄丸逍遥散而安

一女子腹痛患此手足或急或纵先用四物加柴胡山梔丹皮钩藤钩以养血清肝火又用地黄丸以滋肾生肝血而愈【方见前各症】

薛氏医案卷六十九

卷七十

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷七十

明 薛己 订

保婴撮要十五

痘疹受病之由

痘疹之由因儿在胎食母五脏血秽伏於命门或至天行时气或惊骇跌扑或饮食所伤因而发之状类伤寒其症面燥腮赤目胞亦赤呵欠顿闷乍凉乍热咳 嚏足稍冷耳冷尻冷多睡睡惊耳後有红丝赤脉此其候也五脏各具一证肝藏水疱肺藏脓疱心藏斑脾藏疹归肾变黑盖以太阳起於右肾之下煎熬左肾足太阳膀胱寒水夹脊上流上头下额逆手太阳丙火不得传道逆於面上故显是诸症盖壬癸寒水尅丙丁热火故也凡疮疹初起一发便出尽者必重疮夹疹者半轻半重稀少者轻里外微红者轻外黑里赤者微重外白里黑者大重疮端里黑点如针孔者势剧也青乾紫陷睡昏汗出不止烦躁热渴腹胀啼喘大小便不通者困也

痘疹正状

痘疮正病蒸热一日稍凉现痂一日至三日足心齐渐大如珠结成脓窠饱满渐至苍蜡色自初红痂为始计七日当成靨结痂此则言其大略也人有虚实之不同病有浅深之各异脾胃充实血气调和皆依期而愈若调治失宜亏损脾胃或寒暄失度必致迁延大抵形势既正而无他症不必用药此先哲之格言也郑氏云凡疮痘欲出先发热轻者三日次五日远者不过七日此约法也一日太阳传膀胱二日阳明传胃三日少阳传胆四日太阴传脾五日太阴传肾六日厥阴传肝七日还经五脏六腑传遍故七日而止也又有因伤寒至七日以後或已汗或未汗或吐下後热不除此毒气盛而未发热毒入胃发於皮肤成斑者状如蚊虫所啮赤者十生一死黑者十死一生及有胃热发黄者状如橘色下利者死又有成隐疹者或白泡者此皆伤寒热毒不除多变此疾故发痂不可用表汗药也

痘疮轻重

轻者作两三次出大小不等头面稀少胸前眼中皆无根窠红活肥满光泽形似水珠不渴泻

不烦躁○重者一齐出密如蚕种顶陷如茱萸樣或平头灰白色渴泻烦躁头温足冷身热不除治之如法十全八九

轻变重所犯者七

不忌口味不慎饮食致伤脾胃○先曾泄泻里虚毒气不能发出○冒风寒所谓春夏之气为顺秋冬之气为逆大忌感冒风寒损表○犯房室○饵凉药宜用滋补血气壮脾之药不宜清凉宣利之剂里寒则毒气不能攻出○秽气相触血气闻香则顺闻臭则逆顺则易出易靨逆则难愈○生人辄至恐外人由生产房室或临丧而来或带醉或食腥气因此秽恶之触皆为害也

重变轻所慎者五

谨避风寒及房内有风亦宜避之惟夏不忌如遇狂风辄寒亦宜避之○常和煖寒则添衣热则减去务得中和毋令太过不及○节饮食忌柿橘西瓜菱角水蜜等冷物恐内伤胃气尤忌肥肉油腻恐泄泻忌鹹物恐作渴忌酒葱蒜鱼羊等腥物恐致疮痒务使脾胃充实其疮易出易靨也○大便稠饮食调和致泄泻一日二日一次为调日行二三次为利三四日不行为秘○依方调理避风寒节饮食详症用药庶不致轻变为重矣

不治五症

咳 声哑饮食挫喉○腹胀气促闷乱不宁○渴泻不止咬牙寒战○疮嫩易破痒塌不止○紫黑灰色顶陷喘渴

三日必出定已後身反发热闷乱烦渴者凶

疮已饱满如脓窠将收渐至苍蜡色有等无脓有黄白色自放标一日为始至七日收靨至十日收完此为正病有迁延八九日方靨至十四五日方完亦有之但不泻渴闷乱其疮饱满无陷手按之坚硬皆好将收时渐退红肿或疮中收靨觉有黄蜡色或外面先靨根下皱皮男从面收至头背女从面收至胸腹收後离肉不粘易脱俱好有微渴痒痛有身收完足收迟亦不妨身微热不能食者亦有之只怕疮嫩易破闷乱痒塌者凶

靨

疮疹收靨之後预宜调理就有出外不避风寒不节饮食偏无病者莫非胃实体壮亦宜仔细

後 病初痊脏腑初安脾胃尚弱动止饮食过度复余

病喘咳腹胀必凶又血气尚弱动止太早病复皆凶况肌肉娇嫩冒风易得感寒头痛身热则

症则难治矣

腹胀气促根窠不赤之症

陈文宿先生云痘疮已出未愈之间或泻渴腹胀气促其疮不光泽不起发根窠不红谓之表虚也先与十一味木香散以和五脏之气後与十二味异功散送七味肉豆蔻丸以助脏腑之气窃谓痘疮既出不光泽不起发不红活或泄泻作渴或肚腹作胀或气促作喘寒战咬牙或手足指冷肢体挛缩作渴饮汤阳气亏损内虚寒而外假热也用十二味异功散若作渴饮汤手足不冷者脾胃虚弱也用五味异功散凡痘疮先出不如式後出而红活或成片色赤而秽气者俱无妨

一小儿出痘四日腹胀泻渴脾胃虚寒也用十二味异功散一剂又用参芪内托散贯脓靨而忽寒热咬牙此脓贯而阳气亏损也用参附汤独参汤而愈

一小儿痘四日腹胀泻渴气促体倦此脾气虚也用人参白术散加木香煎送四神丸一服诸症顿止但脓迟作渴此表里血气俱虚用参芪四圣散大补汤而愈一小儿痘疮作渴腹胀小便不利此邪气壅滞也用木通芍药汤一剂诸症稍愈用参芪四圣散其浆渐贯用参芪内托散结靨而愈

一小儿痘疮将愈腹胀手足或冷或热此阳气虚寒也先用十二味异功散手足不冷此阳气渐复也乃用五味异功散加木香而愈

一小儿痘疮大便利而小便秘腹胀作喘手足并冷此脾气虚也先用葶苈木香散一剂又用五味异功散加木香二剂而愈後腹胀不食口角流涎仍用五味异功散而痊

一小儿痘疮将愈忽腹胀泄泻侵晨为甚饮食不化余谓脾肾虚弱朝用人参白术散夕用二神丸而泻止又用参芪内托散兼托里散而靨

一小儿痘疮腹胀泄泻饮食不化此脾肾气虚用人参白术散豆蔻丸而愈

参芪内托散治脾虚发痒疮不溃倒靨

人参 黄芪【炒】 当归 川芎 厚朴【姜制】 防风【各五分】 桔梗 白芷 官桂【各三分】 紫草【五分】 木香 甘草【各三分】

右入糯米一撮水煎量服之【寒战咬牙饮水泻渴亦宜服之】

参芪四圣散治痘疮已出六七日不能长不生脓或痒塌

当归 芍药【炒】 黄芪 川芎【各五分】 白术 茯苓 木通 紫草【如无红花代之】 防风【各三分】 糯米【二百粒】

右水煎母同服

葶苈木香散治大便自利小便澁滯喘嗽腹胀不能食多服为妙

猪苓 泽泻 茯苓 白术 官桂【各五分】滑石【二钱】葶苈 木通 木香 甘草【各五分】

右水煎量大小服之

木通芍药汤治痘疮作渴腹胀小便不利

木通 芍药 白术【各五分】川芎 陈皮 乾葛【各三分】甘草【二分】

右水煎服

十全大补汤

当归 川芎 白芍药【炒】熟地黄 人参 白术 白茯苓
甘草【炒】黄芪【炒】官桂【各等分】

右水煎量儿大小服

参附汤治痘疹阳气虚寒咬牙寒战手足并冷或吐泻不食饮沸汤不知热用独参汤加好真附炮如法者每剂先加一钱未应多加之更不应加至四五钱或等分亦无妨但用之以运其阳气如已脱者不治

独参汤治阳气虚弱痘疮不起发不红活或脓清不满或结痂迟缓或痘痕色白或嫩软不固或脓水不乾或时作痒或畏风寒用好人参一两生姜五片大枣五枚水二鍾煎八分徐徐温服婴儿乳母亦服

胡荽酒

用胡荽一把以好酒二鍾煎一两沸令乳母含喷儿遍身头面并房中须烧胡荽香能辟除秽气使痘症出快若痘疹已出而饮食少思宜用枣子燃炙儿闻枣香尤能开胃进饮食解毒气若因饮食停滯未及消导者不宜用

托里消毒散

托里散【二方见痘痈】

七味白术散【即人参白术散方见痘疮属陰属阳】十一味木香散

十二味异功散【二方见痘灰白色】

五味异功散【方见痘寒战咬牙】

肉豆蔻丸

二神丸

四神丸【三方见泻渴咬牙】

发热口渴烦躁不止之症

陈文宿先生云疮疹始出一日至十日浑身壮热大便黄稠是表里俱实其疮必光泽起发必肥满必易靨而不致损伤也又云痘疮发热口渴烦躁不止者切不可与冷水蜂蜜柿子西瓜等生物及清凉饮消毒散等药恐内损脾胃以致腹胀喘满寒战咬牙则难治窃谓前症若二便自调饮食温和口渴饮汤手足不热是谓虚热不可食生冷之物若二便秘结饮食喜冷口渴饮水手足并热是为实热可与冷水饮之凡痘出而热未止者既出尽则热自止

一小儿腹胀发热密而根颗不明色不红活浆不满先君谓脾气虚而毒未尽也用参芪四味散痘果复出热止红活分明又用参芪内托散而靨

一小儿腹胀作渴发热成片先君谓脾气虚弱痘毒未尽用参芪四圣散二剂先出者贯浆後出者秽气而愈一小儿痘腹胀二便自利手足并冷先君云脾胃虚寒用十二味异功散一服又用五味异功散加木香二剂却去木香又一服而痊

一小儿痘疮发热作渴此痘出未尽脾胃虚而热也用人参麦门冬散一剂痘复出而热渴止用人参白术散而饮食进用参芪四圣散而浆溃用托里散而疮靨一小儿痘腹胀足冷内热作渴此胃气虚而津液不足也余先用五味异功散二剂又用参芪四圣散脓贯用人参白术散而靨

一产妇出痘寒战咬牙腹胀作渴足冷身热此脾胃内虚寒而外假热先用十全大补汤加桂附四剂乃去附易乾姜又四剂却用参芪四圣散五味异功散加归芪而靨

一妊妇出痘发热足冷腹胀此脾气虚弱而毒未发也用紫草木香散及用八珍散而贯脓倍加参芪又数剂而愈

人参麦门冬散【一名麦门冬散】治痘疮发渴

麦门冬【一两】 人参 甘草 陈皮 白术 厚朴【姜制各半两】

右每服三钱水煎量儿大小加減

按前方若因热毒作渴宜用之若因中气虚弱作渴当用人参白术散

紫草木香散治痘疮里虚痒塌黑?发热

紫草 茯苓 甘草 白术 木香 人参【各等分】 糯米

右每服三钱水煎

清凉饮【方见大便不通】

人参白术散【方见发热属陰属阳】

托里散【方见痘痈】

十全大补汤【方见腹胀气促】

十一味木香散

十二味异功散【二方见痘灰白色】

参芪四圣散【方见腹胀气促】

八珍汤【方见顶?灰白色】

痘疮出迟属各经所主

陈文宿先生云痘疮出不快误言毒气壅盛用药宣利解散致脏腑受冷荣卫澁滯则气血不能充贯其疮不起发不光泽不充满不结实不能成痂多致痒塌烦躁喘渴而死窃谓海藏云痘疮出不快如身後出不快者足太阳经也用荆芥甘草防风汤身前出不快者足阳明经也用升麻葛根汤身侧出不快者足少阳经也用防风芍药甘草汤若便利调和而出不快者热在表也宜葛根汤微发之又有上中下三部先上部次中部又次下部才出齐而自愈又有作三次而出者钱氏云三日不快不出用消毒之药仍不出脉平静者本稀也不必服药大凡五六日间当解毒补托以尽发於表七八日间毒气不能尽出而反入於内必用药驱出之痘疹方云疮出迟而小便澁滯咳嗽有痰用仙圣散出而不长隐於肌肤用人参透肌散色赤而出不快用紫草透肌散出而不匀用升均汤出而不长不贯用参芪四圣散出而色不红活用紫

草快癰汤出而小便赤澁用紫草木通汤出而漿不同用參芪內托散若色赤而兼痒者属血虚有热用四物牡丹皮色白而兼痒者属气虚有热用五味异功散加当归木香若发热大便秘者用犀角消毒散发热大便调和者用人参麦门冬饮寒战渴泻饮沸汤口不知热用十二味异功散作渴饮冰雪口不知寒用四顺饮地黄丸手足不冷饮汤温和者用五味异功散或托里散

一小儿发热痘出身凉根颗红活余谓表里血气皆实而不用药後果然凡三四日前先发热而痘出或热一次凉一次而痘出者毒势轻也皆不必用药其血气实而托里血气虚而宣毒者多致有误

一小儿痘出不快色次红活此血气虚弱用参芪四圣散出而色赤再剂色红活起发又用透肌散而靨一小儿第九日痘漿靨而热不止脉滑而数皆为不治先君谓痘未尽耳非败症也遂用快癰汤一剂果出一番至十七日而痂落

一男子发热咳嗽 噴面燥腮颊目胞皆赤遍身赤?余谓此心脏痘疹之状也彼因疑惑而未用药餌旬余赤?皆为脓疱且红活起发余谓痘疹明矣既红活发起不必服药至十七日大便下脓血疮痂而痊

紫草透肌散治痘疮色赤不快或痒塌

紫草 蝉蜕 木通 芍药 甘草【炙各等分】

右每服三钱水煎

人参透肌散治痘疮虚而有热虽能出快而不齐整隐於肌肤间者

人参 紫草【如无红花代之】 白术 茯苓 当归 芍药 木通 蝉蜕 甘草 糯米【各等分】

右每服三钱水一盞半煎半盞徐徐服

紫草木通汤治痘疹出不快小便赤澁

紫草 木通 人参 茯苓 糯米【各等分】 甘草【減半】

右每服二钱水煎

防风芍药甘草汤

防风 芍药 甘草

右每服一二钱水煎

荆芥甘草防风汤

荆芥 甘草 防风【各等分】

右每服一钱水煎

升均汤治痘疮已出不均或吐泻热渴

升麻 乾葛 芍药 人参 白术 茯苓 甘草 紫草茸【如无红花代之】

右每服三五钱姜水煎量服之

四物汤治痘疮血虚发热或烦躁不寐作痒色赤芍药【炒】 川芎【各一钱】 当归 熟地黄【各二钱】

右水煎服

仙圣散治痘出不快小便赤澀咳嗽有痰

紫草 枳殼 黄芪 甘草 木通【各等分】

右每服二钱水煎

十二味异功散【方见顶陷灰白】

葛根汤

参芪内托散【二方见腹胀气促】

升麻葛根汤【方见水痘麻疹】

紫草快癰汤【方见大便不通】

四物汤【方见痘疮出迟】

人参麦门冬散【方见前】

参芪四圣散【方见腹胀气促】

五味异功散【方见寒战咬牙】

犀角消毒散【方见】

清凉饮【方见大便不通】

地黄丸【方见痘疮发热属阴属阳】

泄泻咬牙作渴之症

陈文宿先生云痘疮泻水谷或白色或淡黄者宜服十一味木香散送肉豆蔻丸若泻多津液内耗血气不荣其疮虽起发亦不能结靥如身温腹胀咬牙喘渴者难治缘津液枯耗而饮水不止荡散真气故多死也速与十一味木香散救之如不愈急用十二味异功散窃谓荳蔻丸治阳气虚寒滑泻之澁剂盖肾主大便若因肾气不固而致前症者宜用十一味木香散或六君子汤送四神丸若欲泻不泻脾气虚而下陷也用补中益气汤加肉荳蔻饮食不化手足并冷脾气虚寒也用四君子汤加附子

一小儿出痘泄泻腹胀烦渴饮沸汤而不知热先君谓阳气虚寒用十一味木香散二剂泄泻顿止饮汤嫌热此阳气复也乃用六君乾姜木香归芪而靥

一小儿痘疮愈後泄泻饮食不化此脾肾气虚用六君补骨脂肉荳蔻泻止用参芪四圣散接补元气而痊一小儿发热饮冷唇舌皱烈泻粪秽臭先君以为内蕴用前胡枳殼散一剂稍愈又用竹叶石膏汤加漏芦乳母服之其儿顿安

一小儿痘後作泻久不愈而肌体骨立此脾肾虚弱也用二神丸五味异功散渐愈因停食吞酸作泻肚腹重坠此脾气下陷也先用补中益气汤为主佐以五味异功散渐愈又用参芪四圣散治其疮而痊

一小儿出痘发热燥渴色黯出血足热腰痛此脾肾虚热用圣济犀角地黄汤一剂却用地黄丸料数剂而贯又用参芪内托散而痊

一小儿痘疮将愈侵晨泄泻饮食不化余以为肾泻朝用补中益气汤夕用二神丸而愈

四神丸治脾肾虚弱大便不化饮食不思或泄泻腹疼等症

肉豆蔻【二两】补骨脂【四两】五味子【二两】吴茱萸【浸炒一两】

右为末用水一鍾生姜八两红枣一百枚煮熟取枣肉丸小豆大每服二三十丸食前白汤下去五味子吴茱萸名二神丸

二神丸治疮?因脾肾陰虚泄泻

补骨脂【四两】肉豆蔻【二两生用】

右为末用红枣四十九枚生姜四两水一鍾煮乾取枣肉丸桐子大每服二三十丸白滚汤下

肉豆蔻丸治泻水谷或白或淡黄不能止者

白龙骨【煨】诃子肉【半两】木香

缩砂仁【各二钱】肉豆蔻【半两】赤石脂【七钱半】枯白矾【七钱半】

右为末糊丸黍米大一周岁每服三五十丸三岁儿服百丸米饮下泻甚者煎木香散或异功散送下

竹叶石膏汤治痘疮胸中烦热小便赤澀口乾作渴兼有赤癍者亦宜服犀角散【方见顶陷心烦】

七味白术散【即人参白术散方见後】

六君子汤

四君子汤

十一味木香散

十二味异功散【四方见痘灰白色】

托里散【方见痘痈】

五味异功散【方见寒战咬牙】

前胡枳殼散【方见涕唾稠粘】

痘疮发热属陰属阳之异

陈文宿先生云痘疮之症有阳盛陰虚有陰盛阳虚阳盛者饮冰雪而不知寒陰盛者饮沸汤

而不知热阳盛则补阴用木香散加丁香官桂阴盛则补阳用异功散加木香当归窃谓经云大寒而甚热之不热是无火也当益火之源以消阴翳大热而甚寒之不寒是无水也当壮水之主以镇阳光若前症发热作渴手足并冷大便自利喜饮热汤此阴盛也宜用十二味异功散八味丸若发热作渴大便秘结手足并热喜饮冷水此阳盛也宜用四顺散六味丸若烦热作渴面赤睛白此为肾经虚热宜用地黄丸之类治之及时亦有生者京师小儿出痘或作渴喜饮冷水者恣与饮之再不服药如期而愈亦无痘毒之患盖北方人卧火坑饮烧酒有热与水相构而然也小儿面色目睛多白者乃禀肾气虚也出痘必作渴用地黄丸煎与恣饮多有生者

一小儿痘寒战咬牙泻渴腹胀手足并冷时当仲夏饮沸汤而不知热此脾胃虚寒之极也先用十二味异功散一剂顿安又用六君附子一剂后用五味异功散而愈

一男子出痘色紫作渴饮水腰痛足热耳聋此禀肾气不足用加减八味丸料煎与恣饮热渴顿止佐以补中益气汤加五味子麦门冬滋其化源而愈

一小儿十四岁出痘色黯两足及腰热痛便秘咽乾口渴引饮先君谓禀肾不足用加减八味丸料作大剂煎与恣饮至二筋诸症悉退又佐以益气汤及八珍汤各十余剂而痊

一小儿痘疮发热作渴腹胀寒战咬牙饮冰雪而不知寒悉似火症但两足并冷此阳气虚寒也先用十二味异功散一剂随用五味异功散加姜桂渐愈乃去桂又二剂而痊

六味地黄丸治肾虚痘疮发热作渴等症

熟地黄【八两杵膏】乾山药 山茱萸【肉各四两】泽泻 白茯苓 牡丹皮【各三两】

右为末入地黄膏量加米糊丸如小豆大煎服尤好

七味白术散【一名人参白术散】治胃气虚弱或因尅伐或因吐泻口乾作渴饮食少思如饮冷者去木香

藿香 白术 木香 白茯苓 甘草【炒】 人参 乾葛

右每服五钱水煎徐徐服

八珍汤

十一味木香散

十二味异功散【三方见痘灰白色】

补中益气汤

五味异功散【二方见寒战咬牙】

加减八味丸【即六味地黄丸加五味子肉桂】

清凉饮【方见大便不通】

痘疮大便不通之症

陈文宿先生云痘疮四五日不大便以肥猪脰白水煮熟切豆大五七块与食之滋润脏腑疮痂易落切不可妄投宣利之药恐真气内虚疮毒入里如六七日身壮热不大便其脉紧盛与三味消毒饮微利之窃谓前症若毒在肌肉而未能尽发脉浮而紧者最宜此药疏解其毒若脉沈而紧者宜用前胡枳壳散疏通毒气以绝其源若口舌咽喉肿痛疮毒甚也用射干鼠粘子汤若大便既通作渴饮汤脾胃气虚也用人参白术散凡燥粪在直肠不能下者宜用猪肝汁导之忌用疏利之剂恐复伤胃气则疮未出者不能发出已出者不能贯腠大抵分辨虚实当以手足冷热或饮水饮汤验之一小儿大便不通痘赤作痛发热口渴手足并热此余毒内作用前胡枳壳散一剂大便随通诸症顿退又与六味活血散而愈

一小儿痘疮发热作渴焮赤胀痛大便秘结此热毒在内先用清凉饮一剂诸症稍退又用鼠粘子汤一剂诸症全退再用紫草快癍汤而贯脓更用消毒饮而痘靨一小儿痘赤狂喘大便不利此胃经有热先君治以犀角地黄汤芹艾汁而痊

四顺清凉饮治疳热颊赤作渴四肢惊掣大便秘澁

赤芍药 当归 甘草 大黄【各等分】

右每服一钱水煎

按清凉饮乃苦甘疏泻内热之剂若热毒在内大便不通表无他症宜用之连翘饮乃苦寒发表内疏之剂若表里实热烦渴饮冷大便不通小便秘结者宜用之不可过剂恐妄发则成癍烂妄下则成虚脱也

消毒饮

荆芥【二钱】 甘草【一钱】 防风 牛蒡子【各一钱半】

右水煎量服之

射干鼠粘子汤【方见痘咽痛】

三味消毒散

人参白术散【二方见靨发热】

前胡枳壳散【方见涕唾稠粘】

六味活血散【方见痘痈】

紫草快癍汤

清凉饮

消毒饮【三方见大便不通】

犀角地黄汤【方见顶陷心烦】

欲靨不靨欲落不落之症

陈文宿先生云痘疮自始出至十三日当忌外人恐有卒暴风寒秽恶或狐臭之气触之父母仍忌房事若痘欲靨不靨其痂欲落不落若腹胀烦渴忌食水蜜生冷之物若食之转渴而死急与木香散救之如身热烦渴者宜服人参麦门冬散身热大渴人参白术散如不愈仍服木香散窃谓前症乃脾胃气虚津液不足所致非实热为患也如身热烦躁手足发热脾胃有热也用人参麦门冬散身热作渴手足微冷者脾胃气虚也用人参白术散腹胀泄泻或寒战咬牙脾胃虚寒也用十一味木香散泄泻气促手足并冷脾气脱陷也用十二味异功散凡疮结痂作靨皆由元气充实而内融也若审见虚弱便与滋补血气无亏可保终吉若见不靨而投补剂恐不及而误矣

一小儿十二岁出痘不靨腹胀泄泻不食手足并冷先君谓脾气虚寒用十一味木香散一剂诸症顿愈再剂不时索食但恶寒此脾气犹虚也用五味异功散加木香及六君子汤而诸症愈又用参芪内托散而痂脱一男子三十岁遍身发热作痛有赤颗旬余始知为痘用参芪四圣散托里散各四剂欲靨不靨用十全大补汤数剂而痂脱

一妊妇出痘月余欲靨不靨面赤晡热此肝脾血虚而有热也先用加味逍遥散热退又用八珍牡丹皮而热止但气血皆虚用十全大补汤而痂脱

一小儿出痘贯脓不靨症如实热余谓血气虚甚之假热也用十全大补汤数剂渐愈忽又恶寒余又曰此邪气退而真气遂见虚象也仍用前药内参芪各五钱数剂而愈

十全大补汤治禀赋不足寒热自汗食少体瘦发热作渴头痛眩运【方见气促】

逍遥散【即加味逍遥散去牡丹皮山梔】治乳母肝脾有热致痘疮欲靨不靨欲落不落

当归 甘草【炙】 芍药【酒炒】 茯苓 白术【炒】 柴胡【各一钱】

右水煎母子同服

十一味木香散

十二味异功散【二方见痘灰白色】

六君子汤【方见痘灰白色】

五味异功散【方见寒战咬牙】

人参麦门冬散

人参白术散【方见靨发热】

参芪托里散

托里散【二方见痘痛】

涕唾稠粘大便坚实之症

陈文宿先生云疮痘涕唾稠粘身热鼻乾大便如常小便黄赤用人参清膈散如痰实壮热胸中烦闷大便坚实卧则喘急用前胡枳壳散窃谓前症若肺胃实热气郁痰滞或大便秘结小便赤澀烦渴饮冷宜用人参清膈散表散外邪疏通内热使邪不壅滞若毒蕴脏腑大便秘结用前胡枳壳散疏导其里调和荣卫使邪自解散若痰嗽涕唾鼻塞不利宜用惺惺散或参苏饮发散外邪庶元气不伤痘疮轻而易愈

一小儿痘疮涕唾稠粘鼻塞不利此风邪所伤肺用参苏饮一剂稍愈又用惺惺散而痊

一小儿痘赤壮热痰甚烦躁饮冷此脾肺实热用人参清膈散顿退又用芹菜汁而靨

一小儿痘疮作渴饮冷痰涎不利此上焦热毒所致先君用人参清膈散犀角地黄汤各一剂热退痰清又用四圣散而痘起浆贯用参芪四圣散浆回痂脱

一小儿涕唾稠粘大便黑屎此胃经热毒先君用圣济犀角地黄汤芹菜汁而痊

一小儿痘愈後涕唾口乾饮汤腹胀此胃气虚热而津液不足也先用人参白术散二剂後用五味异功散而愈又用参芪四圣散参芪内托散而痊

一小儿涕唾稠粘痰喘作渴大便不利此热毒蘊於内用前胡枳殼散一剂诸症顿退又用济生犀角地黄汤二剂而愈

前胡枳殼散治涕唾稠涎痰实壮热胸中烦闷大便坚实卧则喘急

前胡 枳殼【麸炒】 赤茯苓 大黄【炒】 甘草【炙各等分】

右每服三钱水煎如身温脉微并泻者不可服按前方若肺实胃热气郁痰滞大便秘结小便赤澁烦渴饮冷脉数宜用此方以表散外邪疏通内脏使邪气不壅滞且痘疮轻而易愈

紫草四圣散治痘疮出迟倒靨或小便赤澁发热

紫草 木通 甘草【炒】 黄芩【炒各等分】

右每服二三钱水煎服加欸冬花桔梗等分名仙圣散

参苏饮治时气伤风发热恶寒咳 未明痘症疑似之间此药甚为稳当

前胡 人参 紫苏叶 乾葛 半夏 茯苓【各三分】 枳殼 陈皮 甘草【炙】 桔梗【各二分】

右水煎服

人参白术散治胃气虚弱涕唾稠涎或因尅伐吐泻口乾作渴饮食少思【方见属陰属阳即七味白术散】

五味异功散【方见寒战咬牙】

人参清膈散【即十六味清膈散】

犀角地黄汤【二方见顶陷心烦】

四圣散【方见发热属陰阳】

参芪四圣散

参芪内托散【二方见腹胀气促】

惺惺散【方见】

顶陷灰白泻渴之症

陈文宿先生云痘疮出二三日始出如粟米状或菉豆大似水珠光泽明净根窠红者不须服药若四五日大小不等根窠光泽明净者亦不须服药如陷顶灰白泻渴者服木香散丹溪先生云痘疮灰白色净者怯者作寒看燥者勇者熨发者作热看若初出之时色白者便须大补气血参芪芎归术芍甘草升麻木香丁香泻者加诃子肉荳蔻若白色将靨如豆壳者盖因初起饮水过多其靨不齐俗呼倒靨不妨但服实表之剂自愈如毒郁於里大小便秘者随通利之窃谓前症不起发不红活者此因脾肺气虚用参芪四圣散顶陷灰白泻渴者脾肺虚寒用木香散异功散若灰白色或痒而脓不贯用紫草四君木香色赤或痒而脓不贯用紫草木通汤贯而脓清稀用参芪内托散不应加附子缓则不救已上危症如出赠痘多有生者

一小儿色淡白痒塌此脾肺气虚血弱也用紫草快癍汤参术各三钱二剂稍应又二剂红活起发又用托里散参术各三钱贯脓而愈

一小儿九岁痘色白手足冷此脾胃虚弱用六君子汤加木香当归紫草四剂又用参芪四圣散加参芪各三钱而靨至十七日发热烦渴脉洪大而虚用八珍汤而愈

一小儿十六岁痘色白脉虚浮按之甚微而短形气倦怠饮食少思此血气虚弱用紫草木香散内人参五钱十剂色微赤又用独参汤而贯乃用十全大补汤补中益气汤共用参二斤余而靨随入科举毕发热痕痒淡赤昏倦不食急灌以独参汤而苏又用斤余却用十全大补汤补中益气汤而安

一小儿痘疮七日变灰白色手足并冷腹痛泻渴先君谓阳气虚寒用十二味异功散不信已而饮沸汤不知热始投前药二剂阳气顿复却用独参汤参芪四圣散而愈

一小儿十五岁因科举劳伤元气出痘色白贯脓不靨眼闭昏愤饮食与之则食手指轻捏不冷重按良久则冷其脉轻诊而浮重按如无不及两寸此阳气虚弱而无邪耳用人参一两乾姜一钱枣五枚二日进四剂结靨眼开又二剂其眼常开呻吟不絶再剂却佐以补中益气汤二十一日始言但气短云遍身痛如锥索食月余而靨始末悉用前二汤更无他饵

一孕妇发热坠胎昏愤遍身见痘灰白色饮食药饵到口即作呕惟灌热汤则饮之乃择壮年妇乳灌之不辍日灌数碗旬余省索食云胸腹胀满此脾气虚而乳食壅滞令细呷浓茶半钟胸满即寛四十余日而靨後因劳心发热如炙用君参芪炮姜而痊

一男子年三十发热头痛四肢拘急服解表之药热益甚遍身红点渐成脓窠已灰白此痘疮

因气虚耳用参芪四圣散托里散色赤脓贯而靨

一小儿第十日不红活浆不满先君谓气血虚弱用参芪托里散数剂出赠痘红活起发又用十全大补汤而愈

十一味木香散

木香 大腹皮 人参 桂心 赤茯苓 青皮 前胡 诃黎勒【去核】 半夏 丁香 甘草【炙各三钱】

右每服三钱生姜三片水煎量大小服

十二味异功散

木香 官桂【各三钱去粗皮】 当归【三钱半】 人参 茯苓 陈皮 厚朴 白术【各三钱】 半夏 丁香 肉豆蔻【二钱半】 附子【炮去皮一钱】

右每服三五钱姜五片枣三枚水煎量大小服此药家传五世累经效验

愚尝治痈疽陰症凡裸症阳气脱陷与寒气逼阳於外者发热烦躁口乾作渴投以姜桂附子之类津液顿生烦热顿退其应如响人但不习而察之耳

八珍汤治痘疮气血俱虚者此方主之若因脾气虚弱而不能生血者宜用异功散

当归【一钱】 川芎【五分】 芍药【炒七分】 熟地黄【酒拌】 人参 白术【炒】 茯苓【各一钱】 甘草【炙五分】

右每服二三钱姜枣水煎

豆蔻丸【方见咬牙】

内托散【即托里散方见痘痈】

紫草快斑汤【方见大便不通】

四君子汤

六君子汤【二方见不靨】

参芪内托散【方见腹胀气促】

紫草木香散【方见大便不通】

补中益气汤【方见寒战咬牙】

四圣散【方见痘出不快】

参芪四圣散

十全大补汤

独参汤【三方见腹胀气促】

紫草木通汤【方见痘出迟】

寒战咬牙饮水泻渴之症

陈文宿先生云痘疮六日至七日肥满红活光泽八日至九日肥满苍蜡色者皆不须服药如身温气促口乾腹胀足冷寒战咬牙饮水泻渴者急用木香散加官桂丁香服之如不愈服异功散盖咬牙者齿稿也窃谓前症若手足并冷渴饮热汤大便泄泻者阳气虚寒也宜热补之手足不冷大便不利渴饮温汤者脾气虚热也宜调补之手足不热大便不利渴饮热汤者脾胃虚弱也宜温补之治者审焉

一小儿出痘寒战咬牙四肢倦缩大便自利手足并冷喜饮热汤此阳气虚寒也用十二味异功散末二钱诸症顿退又用人参白术散参芪四圣散而靨

一小儿十四岁面色忽赤忽黑出痘寒战咬牙作渴烦热喜饮热汤此阳气虚寒也用十全大补汤散烦渴顿止乃以八珍倍加参芪至脓贯又作渴面赤此脓成而血气虚也用当归补血汤八珍汤而靨至月余面赤烦渴或时昏愆痘痕如赭或时作痒脉洪大按之如无此血脱也用大剂当归补血汤而安

一小儿痘疮寒战咬牙内热作渴形气倦怠虽起发而欠红活此阳气虚弱也用参芪四圣散而结痂忽作泻发热此脾气虚也用人参白术散参芪内托散而靨一小儿痘疮咬牙面黄饮汤此阳气虚弱也用五味异功散加木香而愈後仍咬牙面赤作渴至夜为甚此脾肾阴虚也用地黄丸大补汤而愈

一小儿脓不贯兼寒战咬牙腹胀属脾胃虚弱用四君子肉桂归芪肉豆蔻又用参芪四圣散而痊後用托里散四君子汤而靨

一小儿痒塌寒战咬牙喜饮温汤手足不热属阳气虚弱也用参芪四圣散诸症已退用参芪托里散其浆渐贯用十全大补汤其痲顿靨

一小儿十四岁痘将愈忽寒战手足并冷脉微细而不及两寸乃脾气虚热用五味异功散独参汤十全大补汤而愈

一妇人愈後寒战脉浮大按之微细此血气虚也用十全大补汤三十余剂而愈後因劳寒热往来寒时手足如水热时手足如炙脉浮大重按则细此阳气虚甚也朝用补中益气汤加桂附各一钱夕用八味丸料倍加桂附各五十余剂而安

一小儿咬牙作渴面色忽白忽赤脉洪数按之无力左关尺为甚此属肾虚也用地黄丸补中益气汤寻愈後因惊面青目赤呵欠咬牙手寻衣领此肝经虚热用加減八味丸料煎与恣饮顿安又用补中益气汤而痊一小儿咬牙作渴饮冷大便微秘寒战痘赤多在身侧此属胆经虚热也用小柴胡汤柴胡麦门散各一剂又用加味四物汤而痊

当归补血汤治痘疮血气亏损或妄服峻剂致血气俱虚肌热大渴喜饮目赤面红昼夜不息其脉洪大而虚重按全无其症似宜服白虎汤但脉不长实为可验耳若服白虎汤必死

黄芪【炙一两】当归【二钱】

右水煎徐徐服

补中益气汤

人参 黄芪【炒】白术 甘草 当归 陈皮【各一钱】柴胡 升麻【各二分】

右姜枣水煎徐徐服

五味异功散

人参 茯苓 白术【炒】甘草 陈皮

右每服二三钱姜枣水煎为末调服亦可

加減八味丸【即六味丸加五味子四两肉桂一两】治肾经阴虚虚火上炎作渴咬牙或口舌生疮或痰涎涌盛

六味地黄丸【加肉桂附子各一两名八味丸二方见发热属陰属阳】

独参汤【方见腹胀气促】

小柴胡【方见癰症】

十一味木香散

十二味异功散【二方见痘灰白色】

十全大补汤【方见腹胀气促】

八珍汤

柴胡麦门冬散【二方见顶陷灰白】

参芪四圣散【方见顶陷心烦】

七味白术散【方见痘发热即人参白术散】

薛氏医案卷七十

卷七十一

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷七十一

明 薛己 订

保婴撮要十六

不靨闷乱哽气腹胀之症

陈文宿先生云痘疮十一日至十二日当靨不靨身热闷乱不宁卧则硬气腹胀泄泻寒战咬牙急用异功散加木香当归以救陰阳表里助其收靨窃谓前症若手足并冷属脾胃虚寒宜用十二味异功散手足微冷属脾胃虚弱宜用五味异功散加木香若手足热大便秘属脾胃实热宜用清凉饮救其陰以抑其阳

一小儿痘寒战咬牙泻渴腹胀手足冷时仲夏饮沸汤口不知热先君谓脾气虚寒用十二味异功散一剂顿安又用五味异功散调补而愈再用参芪四圣散而愈一小儿痘不结痂发热饮汤哽气腹胀此脾气虚弱用五味异功散参芪四圣散而愈後噫气下气欲服枳殼之类余谓噫气属心火虚下气属脾气虚朝用六君子汤加姜桂夕用补中益气汤而愈

一小儿哽气喘咳腹胀下气手足不冷不热此脾虚不能摄气而腹胀下气肺虚不能摄气而哽气喘咳用五味异功散加升麻而愈

一小儿痘将愈足冷哽气腹痛手冷至臂唇青面白属脾胃虚寒也用五味异功散加附子二剂足稍温又用六君姜桂二剂诸症渐退乃去姜桂服之而痊

一小儿痘不结痂作渴饮冷大便秘结此肠胃有热也先用清凉饮末一钱大便和而顿靨又用人参麦门冬散八珍汤而痊

一小儿痘不结痂用补中益气汤地黄丸料煎服而愈次年毕姻後寒热作渴头运脉洪数按之微细此脾肾虚火上炎也以前药各加肉桂五分引火归经而愈一小儿痘不靨发热因乳母有肝火用加味逍遥散人参白术散母子俱服而热止又用柴胡麦门冬散而痊一小儿十五岁久而结痂寒热往来脉洪数按之无力用十全大补汤而痊後因劳寒热复发用补中益气汤而安

六君子汤治脾气虚弱或因剋伐之剂亏损中气饮食少思或痘疮不起发灌浆结痂

人参 白术【炒】 茯苓 陈皮【炒】 半夏【汤洗】 甘草【炒各等分】

右三五钱姜枣水煎徐徐服

四君子汤【即六君子汤去陈皮半夏】

四顺清凉饮王海藏先生云痘疹脓贯而不焦者由治失清凉之法内外热毒无以收斂辟如五谷得阳气而成熟得阴气而成实用清凉饮下之【方见大便不通】

十二味异功散【方见顶陷灰白】

人参麦门冬散【方见发热口渴】

柴胡麦门冬散【方见作痒搔破】

加味逍遥散【方见欲靨不靨】

补中益气汤

五味异功散【二方见寒战咬牙】

参芪四圣散

十全大补汤【二方见腹胀气促】

人参白术散【即七味白术散】

地黄丸【二方见发热属陰阳】

两目生翳痕黯凹凸之症

陈文宿先生云痘疮十二日至十三日疮痂渐落其瘢犹黯或凹或凸肌肉尚嫩不可洗澡并忌五辛煎?之物恐热毒上薰肝膈眼生瘴翳或有是患用穀精草散治之窃谓前症目为肝之窍或肝经风热或肝经血虚或肝经热毒或肝经寒热相抃或肝疳内热或乳母肝经有热或食膏粱厚味故多犯其目若失於早治多成废疾

一小儿出痘两眼不开先君谓肝经有热用消毒化癰汤母子服之而愈

一小儿两目不开先君谓肝经热毒先用柴胡麦门冬散又用四物汤加山梔而愈

一小儿痘疮目赤肿痛此肝火为患用柴胡麦门冬散谷精散而愈

一小儿痘将靨目不开脉浮而无力右关按之缓弱此脾气虚耳用补中益气汤加蔓荆子二剂去蔓荆子又数剂而愈後每劳役目中作胀不能开合朝用补中益气汤夕用五味异功散而愈

一小儿眼痛不开属肝经风热用柴胡麦门冬散犀角地黄汤加柴胡各一剂开而见赤翳迷漫仍用前药加谷精草而愈

一小儿出痘目闭二十余日用清肝解热之药两目虽开其睛已伤此失於早治也

一小儿目中出痘作痛肝脉弦洪有力先用小柴胡加龙胆草生地黄一剂而痛稍止乃用四物柴胡山梔一剂痛全止再用加味逍遥散蝉菊散而愈

一小儿目中出痘肝脉弦数此木火相抟用四物山梔牡丹皮柴胡二剂再用加味逍遥散二剂肝脉平和又用四物牡丹皮而靨但目有青翳用蛇蛻散三味口精草散而痊

一小儿素食膏粱目中出痘作痛口渴大便坚实左右关洪数有力弦长此形病脉俱实先用柴胡梔子散泻黄散各一服又用柴胡梔子散柴胡麦门冬散而痊一痘儿眼不开肝脉数按之有力同柴胡梔子散子母服之眼渐开又因母劳怒仍闭用加味逍遥散而愈後复闭用柴胡麦门冬散而痊

一小儿目中生翳诊其肝肾痞症用九味芦荟丸六味地黄丸及粉丹散翳渐退又用柴胡麦门冬散而痊羊肝散治痘毒入眼或无辜瘡入目

密蒙花 青箱子 决明子 车前子

右为末用密蒙花末三钱余药各一钱以羊肝一叶薄批掺上湿用纸裹煨熟空心食之

蛇蛻散治痘毒目翳

蛇蛻【二钱为末】瓜蒌仁【五钱研烂】

右为末用羊肝一片批开入末二钱用线紮紧米泔煮熟频与儿食外用粉丹散

三味谷精草散治痘疹翳膜遮睛瘡瞳子

谷精草【一两】 蛤粉 黑豆【各二两】

右为末用雄猪肝一叶竹刀批开掺药在内以麻线缚定砂罐内水煮熟令儿食之

蝉菊散治癰疽入眼或病後生翳障

蝉蜕【洗】 白菊花【各等分】

右每服一钱水煎入蜜少许量儿服

二味谷精草散治痘疮已靨目翳膜障瞳神隐澁泪出久而不退

谷精草【一两】 生蛤粉【二两】

右为末用獐猪肝一叶竹刀批片子掺药在内以绵扎入砂器内水煮令儿熟食之

粉丹散【即吹耳丹】 治眼生翳膜

轻粉 黄丹

右为末竹筒吹耳内左眼有翳吹右耳右患吹左耳即退

通神散治癰疮入目内生翳障

白菊花 菥蓂末【生用】 谷精草【各等分】

右为末每服一钱乾柿一个米泔水一盏 煮乾末不拘时但食柿饼五七次至七日可见效

黄柏膏治痘疮初出就涂面则痘疮不生於面目用之若迟虽出亦稀

黄栢【一两】 菥豆 甘草【各四两生用】

右为细末清油调如膏从耳前眼唇面并涂之日三五度

羊肝丸治痘疮入目不能开

羯羊肝【一具生用】 黄连【炒为末】

右先将羊肝去筋膜於石器内捣烂入黄连末丸如桐子大每服二三十丸食後清茶送下

蝉蜕散治癰疹入目半年已过者一月取效

蝉蜕【一两】猪悬蹄甲【二两瓦罐内用盐泥封烧存性】

右二味为末入羚羊角末五钱每服五分白汤调下

九味芦荟丸治肝经积热面目生翳耳中出水大便不调肢体消瘦等症【方见疳蚀症】

小柴胡汤【方见癰症】

柴胡麦门冬散【方见作痒搔破】

四物汤【方见痘疮出迟】

六味地黄丸【方见痘疮发热属陰属阳】

泻黄散【方见靨後发热咽痛】

消毒化癰汤【即消毒救苦汤方见夹疹痘】

加味逍遥散【方见欲靨不靨】

柴胡栀子散【即柴胡清肝散方见作痒搔破】

补中益气汤

五味异功散【二方见寒战咬牙一名小异功散】

靨後发热咽痛不利之症

陈文宿先生云痘疮收靨之後浑身壮热经曰不除别无他症用柴胡麦门冬散如不退服人参白术散若风热咳嗽咽喉不利用桔梗甘草防风汤窃谓前症有因热毒未解者有因胃气虚热者有因胃气实热者其因不能枚举当临症制宜而药之

一小儿咽痛壮热痘痕色赤手微热此余毒未解用柴胡麦门冬散而安七日之後复热手指初捏似热久捏则冷此脾气虚也用五味异功散而痊

一小儿痘咽痛大便不实口渴饮汤手足不热此脾胃虚弱也用人参白术散而大便实但不时寒热用加味逍遥散而愈

一小儿痘咽痛发热作渴面赤饮冷此胃经实热也用射干鼠粘子汤而愈因食厚味复发手足并热用泻黄散一剂而痊

一小儿痘咽痛发热饮冷大便黄色手足指热此脾胃实热也用泻黄清胃二散各一剂而愈後因乳母食厚味儿口角流涎不能吮乳仍用前药治母而愈

一小儿痘咽痛足热余谓此禀足三阴虚而无根之火上炎也古人有云痘归肾经必不可救当用壮水之剂亦有生者奈彼不悟翌日果腰痛咽哑始信余言乃用大剂地黄丸料加五味子并补中益气汤而愈

一男子出痘上体甚热两足俱冷喉痛作渴疮亦不起发此禀肾经虚热也以六味地黄丸料煎与恣饮渐愈又用八珍汤而痊

一小儿面色素白出痘咽痛发热面赤作渴饮汤手足指冷此禀足三阴虚也用大剂加減八味丸料煎与恣饮又以益气汤助其脾肺以滋化源痛止热退而愈射干鼠粘子汤治痘疹咽喉作痛及痘疹後痛疽疮毒鼠粘子【即牛蒡子】甘草 升麻 射干【各二钱】

右水煎量服之

泻黄散治脾胃实热患疮口渴饮冷

藿香叶【七叶】石膏【煅五钱】甘草【三钱】防风 山梔仁【炒各一两】

右为末每二钱水煎入蜜少许婴儿乳母服之

六味地黄丸【方见痘疮发热属陰属阳】

清胃散【方见痘不结痂】

八珍汤【方见顶陷灰白】

人参白术散【即七味白术散方见痘疮发热属陰属阳】

柴胡麦门冬散【方见作痒?破】

加減八味丸【即六味丸加五味子肉桂】

加味逍遥散【方见欲靨不靨】

五味异功散

补中益气汤【二方见寒战咬牙】

顶陷心烦狂躁气喘之症

陈文宿先生云痘紫色顶陷心烦狂躁气喘妄语或如见鬼神内热便秘者宜用龙脑膏子猪尾膏如无内热大便不实不可轻服窃谓前症多因初起热盛之时失於解利所致亦有因痘毒未尽有因胃经有热有因肺胃有热有因心脾有热烦躁痘裂出血便血衄血尿黑痕赤详见各症大凡作渴发热手足指冷或大便秘结者内有热也切不可禁其饮水观张子和述水中儿事良可验矣盖热极故得水而生也

一小儿痘疹狂喘热渴饮冷痰涎不利先君用十六味清膈饮犀角地黄汤而痊

一小儿痘紫发热小便不利手足发热此肺经有热用人参清肺饮小便随利又用犀角地黄汤而靨

一小儿痘紫作渴手足并热余谓胃经有热用竹叶石膏汤一剂诸症顿退而愈用人参白术散而痊

一小儿痘紫作痛其顶欲陷发热饮冷作渴痰喘小便秘结此肺胃有热用十六味清膈散一剂诸症顿减又用葛根麦门冬散一剂而愈

一小儿出痘发狂作渴饮冷此上焦热炽也用黄连解毒汤芹菜汁而止又用紫草快癍汤将靨因间药饵三日色黑倒靨用紫草散渴止又用人参白术散而痊一小儿出痘喘咳面赤其脉洪数右寸脉尤甚此心火剋肺金用人参平肺散以清心肺再用地黄丸以壮肾水喘嗽顿止

一小儿痘将愈喘躁作渴面赤此禀足三陰虚也用地黄丸料数剂诸症稍可又佐以益气汤诸症渐愈後因沐浴出汗仍喘咳烦躁面赤脉洪大按之如无此汗多亡阳也用当归补血汤而愈毕姻後喘咳音哑用地黄丸益气汤各百余剂得远帙幙而生

一小儿痘愈後时发狂兼喘发过面色黄白手足并冷此脾胃虚弱也余用补中八珍二汤各三十余剂或云当先降火邪而後补元气乃服芩连朴硝之类汗吐不止而歿

十六味清膈散治涕唾稠粘喘 痰盛身热鼻乾大便如常小便黄赤

人参 柴胡 当归 芍药 知母 桑白皮 白术 黄芪 紫苑 地骨皮 茯苓 甘草 桔梗 黄芩【炒半两】 石膏【煨】 滑石

右每服三钱姜水煎量服之

葛根麦门冬汤治痘疹胃经热甚头疼闷烦或痘後余毒

麦门冬 乾葛 人参 赤芍药 升麻 茯苓【各二分】石膏末【五分】甘草【二分】

右水煎服

犀角地黄汤治郁热不解气血涌为衄血或流入胃脘而吐血或余血停滯面色痿黄大便色黑

犀角 生地黄 白芍药 牡丹皮【各一钱】

右水煎乳母同服

人参平肺散治心火剋肺金传为痢痿咳嗽喘呕痰涎壅盛胸膈痞满咽嗑不利

人参 陈皮 甘草 地骨皮
茯苓【各一钱】知母青皮【四分】五味子【炒一钱】天门冬【去心四分】桑白皮

右水煎徐徐服

竹叶石膏汤治痘疮胸中烦闷小便赤澀口乾作渴兼有赤癍又宜服犀角散【方见泄泻咬牙】

龙脑膏子治时气踈痘疮及赤疹子未透心烦狂躁气喘妄语或见鬼神或已发而陷伏宜速治否则毒入脏必死

生龙脑

右研细滴雄猪心血丸菉豆大每服一丸心烦狂躁紫草汤下疮陷伏温酒化下一方加辰砂五分尤妙服後少时心神清爽得睡疮疹发透

猪尾膏治痘疮黑陷倒靨

用小猪尾尖刺血两三点入脑子少许辰砂末一钱同研膏以木香汤化下

紫草快癍汤治痘疹下血不止不能发出血气不足色不红活等症【即紫草汤】

紫草 人参 白术 茯苓 当归 川芎 芍药 木通 甘草 糯米

右每服二钱水煎

人参清肺散【方见痘喘】

八珍汤【方见顶陷灰白泻渴】

黄连解毒汤【方见癰症】

地黄丸【即六味地黄丸】

人参白术散【即七味白术散二方见发热属陰阳】

补中益气汤

当归补血汤【二方见寒战咬牙】

作痒抓破脓水淋漓之症

陈文宿先生云痘疮作痒抓破成疮脓水淋漓者由血气衰肌肉虚也宜用木香散加丁香肉桂及败草散切忌用牛粪灰窃谓前症皆因气血虚弱所致预为调护使气血和平庶无此患又必察其外症色白者用四君之类色赤者用四物之类若因鹹味宜用蝉蜕散之类一小儿口乾作渴脉浮而数此血气虚而有热也用参芪四圣散加蝉蜕而痒止用托里散加蝉蜕而脓贯又用托里散将靨忽发热作渴而痒此血虚也用八珍汤当归补血汤而愈

一小儿痘赤作痒脉弦按之则数此乃肝火血燥生风先用柴胡麦门冬散加蝉蜕而痒止又用托里散而痂脱後仍痒痕白用八珍汤倍加参芪而愈

一小儿痘疮作痒色赤心肝二脉数而弦此风热相持而血热也用四物黄连柴胡丹皮而痒止用八珍汤当归补血汤而疮愈

一小儿痘後作痒夜甚不寐此脾经气血俱虚用四君归芪数剂而止後伤食作泻复痒不寐仍用前药及五味异功散而愈

一小儿痘疮愈後身痒脓水淋漓内热口乾用四君归芪及补中益气汤并六味地黄丸而愈

一小儿痘痕作痒服祛风药遍身皆痒脓水淋漓口禁发搐面色皎白此气血俱虚余用大补汤参芪四圣散而愈

一小儿痘疮已愈而犯色慾遍身作痒痘痕赤色气息淹淹脉洪数无力左尺为甚先用大补汤内用人参五钱数剂形气稍复佐以大剂加料八味丸料又五十余剂而痊

一小儿痘将靨身痒脉浮数按之无力此真气不能荣於腠理用补中益气汤渐愈因功课劳心自汗用六一汤而愈後烦躁面赤自汗如雨用当归补血十全大补二汤而愈

一小儿汗出如雨手足发热作渴饮冷右关洪数有力此胃经实热也用清胃散一剂顿退因食膏粱复痒发热饮冷用泻黄散末一钱渴止又用白术散去木香而痊一女子靨後身痒脉浮大此脾肺气虚也朝用补中益气汤夕用黄芪六一汤而愈经行复痒发热用加味逍遥八珍汤而痊

一男子痘愈而入房身痒昏愤脉大而无伦次按之如无用独参汤十五剂而苏又大补汤二十余剂脉斂又二十余剂脉微细而畏寒此火归经又五十余剂而痊一妇人痘方愈因劳发痒服消风散口噤流涎余谓曰此因元气复伤不信仍服前药更四肢发搐余用十全大补加味逍遥而愈

一小儿痘愈後作痒服消风散四肢发搐口噤流涎余谓脾土亏损而肝木所尅果歿

一小儿痘脓未满面赤作痒余谓气血虚而有热欲行温补不信乃服清热之药而歿

柴胡麦门冬散治肝胆经有热靨後不解

柴胡 麦门冬【各一钱】 人参 玄参 龙胆草【各五分】 甘草【炒】

右水煎量儿大小服

参芪四圣散治痘疮不能长满生脓或色白作痒【方见腹胀气促】五味异功散治禀赋元气虚弱肌肉消薄荣卫短促而患疮疡不能消散或脾肺气虚不能生肌收口大凡诸症因脾气虚而不能愈者皆宜服之调补元气则自愈矣【方见寒战咬牙】

黄芪六一汤治疮疡後气虚作渴愈後复渴尤宜服之

黄芪【炙六钱】 甘草【炙一钱】

右水煎服

柴胡栀子散治肝胆经有热疮毒不愈或发热不止柴胡 牡丹皮 山栀【各一钱】 川芎 芍药 茯苓【各七分】 白术【炒】 甘草【各五分】 当归 牛蒡【炒各七分】

右水煎母子同服

十全大补汤

独参汤

参芪四圣散治痘疮不起不能长满生脓或作痒【三方见腹胀气促】

补中益气汤治痘疮中气虚弱或因尅伐以致身痒恶寒发热烦渴体倦饮食少思或不能结痂作痒者

当归补血汤【二方见寒战咬牙】

加味逍遥散【方见欲靨不靨】

四君子汤【方见不靨闷乱】

六味地黄丸【方见痘疮发热属陰阳】

四物汤【方见痘疮出迟】

托里散【方见痘痈】

八珍汤【即四君四物二方相合】

泻黄散【方见靨後发热咽痛】

加減八味丸【即六味加用五味子肉桂肉】

清胃散【方见痘痈】

风邪抐於肌肉患疳蚀之症

陈文宿先生云痘疹已靨未愈之间五脏未实肌肉尚虚血气未定忽被风邪抐於肌肉肤腠之间则津液滯滞故成疳蚀疮也宜用雄黄散绵茧散治之久而不愈则溃蚀筋骨以致杀人窃谓雄黄散清肝杀?解毒绵茧散治脓水淋漓皆治外之良方内无余毒者宜用此法若因肝脾疳火上炎或食甘肥而胃火内动或手足阳明经蘊热或肾经虚热各有不同皆元气不足病气有余乘虚而发也焮痛作肿用仙方活命饮大芩薏汤疳热为患用大芩薏汤四味肥儿丸肾经虚热用地黄丸当临症制宜分五脏相胜审乳母之气何如扶助胃气为善

一女子患疳症因浴热汤发热如炙体强如瘥此腠理间泄邪热乘虚而内作用十全大补汤一剂顿安同时亦有患此症不用补剂者甚至不救

一小儿痘後遍身津淫作痒此兼因疳为患用大茺萸汤及蟾蜍丸而愈後作渴口中作痛用蟾蜍丸人中白散而安

一小儿痘後毒蚀腮余谓肝脾有热助疳而患也用大茺萸汤大芦荟丸为主以五味异功散为佐月余渐愈却以五味异功散佐以大茺萸汤而瘥

一小儿臀间痘毒蚀烂略敷雄黄散益甚余谓兼肝脾疳也先用大茺萸汤活命饮各二剂又用九味芦荟丸为主以五味异功散为佐月余诸症渐愈

一小儿患前症发热作渴两足晡热余谓禀肾经陰虚不信恪服清热败毒而殁

一小儿痘出甚密先四肢患毒脓溃而愈後口患疳涎蚀牙龈余先用大茺萸汤活命饮各一剂又用蟾蜍丸人中白散而安

一小儿痘毒蚀陷敷雄黄散服加味解毒散而愈一小儿脸患之作痛用仙方活命饮又敷雄黄散大茺萸汤而愈

韶粉散治痘疮毒气未散疮痂虽落其瘢犹黯或凹或凸此药涂之

韶粉【一两】轻粉【一两】

右炼猪脂油拌匀如膏涂之如痘痂欲落不落当用後方

羊 骨髓

右入轻粉研成膏涂之如痘痒搔成疮及疮痂欲落不落用上等白蜜涂之其痂自落亦无瘢痕神效

雄黄散治痘毒牙龈生疳蚀疮

雄黄【一钱】铜绿【二钱】

右研细量疮大小乾掺

绵茧散治痘毒蚀疮脓水不絶

出蛾绵茧【不拘多少】

右用生矾末碎贯茧内以炭灰烧矾汁乾取出为末乾贴之

九味芦荟丸治痘毒成疳齿蚀烂龈或透颊颧或肝脾疳热结核耳内生疮两目生翳耳中出水或小便出津拘中结核或大便不调肢体消瘦等症

胡黄连 宣黄连【炒】 芦荟 木香 白茺萸【炒】 青皮 白雷丸
鹤虱草【各一两】 麝香【三钱】

右各另为末糊丸麻子大每服五分空心米汤下仍量儿用之

大茺萸汤【一名梔子茯苓汤】治痘毒上攻口齿成疳发热作渴大便不调髮黄脱落面黑便清鼻下生疮乳食呕吐等症

山梔仁【三分】 黄栢 甘草【炙各二分】 大茺萸【五分】 黄连
麻黄根【一分】 羌活【二分】 柴胡【三分】 防风【一分】 白术
茯苓【各五分】 当归【四分】

右水煎服

导赤散

生地黄 木通 甘草【各等分】

右为末每服一钱淡竹叶水煎

败草散治痘疮挝搔成疮脓血淋漓用屋烂草或盖墙烂茅年远者佳如无旷野生者尤佳为末搽之如遍身患者须多掺铺蓆上令儿坐卧其疮即愈

丹粉散治痘毒脓水淋漓

轻粉 黄丹【各二钱】 黄连末【三钱】

右研匀搽患处

立效散治一切胎毒疮疥及风疹痛

大黄 黄栢 山梔 寒水石【煨各等分】

右为末用清油烛调搽若破而脓水淋漓用当归膏

大枫膏治一切疮疥

黄连 大枫子肉【研膏各二两】 真轻粉 枯矾 蛇床子【各一两】 柏油【六两】

右各另为末入大枫膏和匀更入柏油杵百余即成膏矣每用少许涂患处

加味小柴胡汤【方见癰疹】

加味逍遥散【方见欲靨不靨】

人参平肺散

犀角地黄汤【二方见顶陷心烦】

柴胡栀子散【方见作痒抓破】

三黄散【方见癰烂】

八珍散【方见顶陷灰白】

地黄丸【方见发热属陰阳】

十全大补汤【方见腹胀气促】

补中益气汤

当归补血汤

五味异功散

竹叶石膏汤【四方见泄泻咬牙】

四味肥儿丸

加味解毒散

人中白散

东垣消毒救苦汤【四方见夹疹痘】

蟾蜍丸

清胃散

仙方活命饮【三方见痘痈】

癰症

陈文宿先生云癰疹之症俗言疹子是肺胃有热或时气所作发於皮肤遍体状如蚊蚤所咬凡色赤者十生一死色黑者十无一生钱氏云癰症初发类似伤寒发热五六日或七八日而出或乍凉乍热或咳嗽泄泻不食面赤眼光如水生眵或嘔 痰涎或热渴乾呕或大便急而小便澁余窃谓前症若身热烦渴者用升麻汤自汗烦渴者化癰汤烦渴热泻白虎苍术汤热盛谵语导赤散咳 不已生地黄散吐血衄血或大小便血犀角汤喉间作痛甘桔防风汤咽喉肿痛玄参升麻汤乍凉乍热小柴胡汤喘嗽不已柴胡五味子汤小便不利柴芩汤热盛乾呕解毒汤停食呕吐或腹胀作泻平胃散大便不通加枳实饮食已消或仍作呕四君子汤大便秘或喘满者先用前胡枳殼汤下之乃用春泽汤瘥後热毒不除葛根黄连汤余毒成疮射干鼠粘子汤消毒饮又有夹痘而出者其势最速乃血乘其势而为患也如大便硬用清凉饮少许下之癰退四君归芪固其元气肢体疼痛用活命饮一服杀其毒气仍用托里散治之

一小儿七日不消头痛发热防其内陷此表邪未解用葛根麦门冬汤一剂顿解再剂而痊

一小儿恶寒发热头痛拘急先用人参羌活散一剂外邪顿散又用五味异功散而安

一小儿月余不消增实壮热头痛拘急此表邪未解也用人参败毒散一剂而表邪退再用惺惺散而痊一儒者年踰二旬患前症烦渴饮冷用竹叶石膏汤化癰汤各一剂热渴顿愈用快癰汤痘疮顿起用八珍汤而痊

一产妇患此乃风热所致用惺惺散而风热散用六味活血汤而疮起发用八珍汤而痊

一小儿患此鼻塞声重发热身痒用人参消风散而表症愈後发热搔破脓水淋漓脉浮大按之无力此脾胃气虚不能荣於腠理朝用补中益气汤夕用黄芪六一汤而愈後因感冒服表散之剂烦躁发热面目俱赤脉大而虚用当归补血汤而痊

一小儿发热作渴二便秘澁用大连翘饮二便随通但呕吐痰涎腹痛不食此邪气去而真气复伤也用五味异功散而痊

惺惺散治风热时气疮疹头疼壮热目澁多睡咳嗽喘促

桔梗 真细辛 人参 甘草 白茯苓 川芎 白术 【各五分】 薄荷

右水一盞姜三片煎服

黄连解毒汤治疹毒吐血乾呕

黄连 黄柏 黄芩 梔子 【各三钱】

右水煎量大小服

柴胡五味子汤治癰疹喘 【即小柴胡汤内加五味子】

小柴胡汤治癰疹乍凉乍热似疟喘嗽

柴胡 【三钱】 人参 黄芩 【各二钱】 半夏 【一钱二分】 甘草 【一钱】

右生姜三片水一盞煎至六分温服

柴苓汤治痘疹小便不利

柴胡 黄芩 猪苓 泽泻 茯苓 白术 【各一钱五分】

右姜水煎量大小服

人参消风散治癰疹等症

人参 【三钱】 荆芥穗 甘草 【炙】 陈皮 【各五钱】 白僵蚕 茯苓 防风 芎藭 藿香 蝉蜕 【各三钱】 厚朴 【姜制三钱】 羌活 【二钱】

右每服一钱水煎服

人参败毒散治癰疹发热恶寒咳嗽等症

人参 茯苓 川芎 羌活 独活 前胡 柴胡 枳壳 【麸皮炒】 桔梗 甘草 【炒各等分】

右每服二三钱水煎

生地黄散治痘疹烦热咳嗽

杏仁 陈皮【各一钱】 生地黄 麦门冬【各一钱半】 甘草【五分】

右水煎服忌酒醋盐酸之物

白虎苍术散治痘疹癰症

玄参升麻汤

化癰汤【三方见水痘麻痘】

升麻葛根汤【方见後】

乾葛麦门冬汤

犀角汤【二方见顶陷心狂】

快癰汤【方见顶陷心烦】

六味活血散

活命饮【二方见痘痛】

大连翘饮

春泽汤

人参羌活散

葛根黄连汤【四方见夹疹痘】

五味异功散

当归补血汤

补中益气汤【三方见寒战咬牙】

黄芪六一汤【方见作痒抓破】

竹叶石膏汤【方见泄泻咬牙】

射干鼠粘子汤【方见靨後发热】

桔梗防风汤【方见痘寒战】

前胡枳殼汤【方见痘涕唾稠粘】

四君子汤【方见不靨闷乱】

四顺清凉饮【方见大便不通】

水痘麻痘

陈文宿先生云水痘之症身热二三日而止或咳嗽面赤眼光如水或嘔咳唾稠粘与痘不同易出易靨不能为害汤民望先生云麻痘乃天行时气热积於胃胃主肌肉故发於遍身状如蚊子所啮色赤者十生一死色黑者十死一生此症亦与癰症不同其癰症如锦纹而但空缺处如云路之状麻症乃遍身而无空处但以疎密之不同耳麻痘渐出咳嗽烦闷呕逆清水眼赤咽喉口舌痘疮用黄连杏仁汤若催出而成斑烂如锦纹或脓水腥臭心胸咳闷呕吐清水不时身热用黄芩知母汤初起发热疑似之间可用升麻汤然麻症始终宜用麻黄汤表之痘症表与下皆不可大抵发热烦渴用升麻葛根汤发热咳嗽人参麦门冬汤发热烦躁小便不通大连翹饮冬寒腠理闭塞葛根橘皮汤

一小儿患之发热作渴遍身作痛大小便乾澁此热毒郁滞於内用葛根麦门冬汤一剂顿安又用解毒散而愈

一小儿患此身痛发热烦躁此风邪抟於表也用玄参升麻汤诸症顿解但倦怠发搐此脾虚为肝所侮也用和肝补脾汤而安

一小儿患此腹痛烦渴面赤咳嗽痰涎用升麻汤一剂遍身如锦用化癰汤一剂而安又用人参麦门冬散而愈

一小儿痘隐於肉里而不现烦渴躁热衄血吐血或便血用解毒汤犀角汤各一剂而血止又用导赤散而愈一小儿患此寒热乾呕先用小柴胡汤加生地黄而寒热止用解毒汤而发用生料四物汤而全愈

一小儿患此五日不消发热烦躁右关脉洪数而有力此胃经实热先用化癰汤一剂又用参滑散而愈三豆饮治天行痘疮始觉即服之多者必少少者不出小赤豆黑豆菉豆【各一百粒】甘草节【五钱】

右水煮熟任食之七日自不发

参滑散治水痘

地骨皮 麻黄【去节一分】 人参 滑石 大黄【煨一分】 知母 羌活 甜葶苈【炒一分】 甘草【炙半分】

右为末每服五分水一小盏小麦七粒煎数沸每服三五匙不可多服

按前方发表散邪疏通内热之峻剂若遍身作痛壮热烦躁作渴饮冷大便秘结小便澀滯喘嗽等症宜用此方然水痘多属表邪或发热引饮小便赤澀者当用升麻葛根汤如无他症不必用药

和肝补脾汤治风热疮疹脾土不及肝木太过

人参 陈皮 川芎【各五分】 白术 茯苓 芍药【各七分】 柴胡 甘草【炙各三分】 山梔【炒四分】

右作二剂水煎服

白虎苍术汤

石膏【四钱】 苍术【一钱五分】 知母【一钱】 甘草【五分】 粳米【一撮】

右水煎服

黄连杏仁汤治麻痘渐出咳嗽烦闷呕逆清水眼赤咽喉口舌生疮作泻

黄连【一两】 陈皮 杏仁【去皮尖麸炒】 麻黄【去节】 枳壳【炒】 葛根【各五钱】

右每服二钱作泻者加厚朴甘草

黄芩知母汤治麻症癰烂隐疹如锦纹或脓腥臭心胸闭闷呕吐清水温壮不时

葛根 知母【洗】 黄芩 麻黄【去节】 陈皮 杏仁【去皮尖】 甘草【各等分】

右每服二钱若不呕逆去陈皮加芍药如吐则用之

升麻葛乾汤治疮疹初起发热咳嗽似伤寒未辨麻疹白芍药 川升麻 甘草 乾葛【各等分】

右水煎每服三钱

化癍汤治癍疹渴热最良

人参 知母【各一钱】 甘草【五分】 石膏末【四钱】

右加粳米一撮水煎量服之

葛根橘皮汤治发癍烦闷呕吐清汁兼治麻痘等症 葛根 陈皮
杏仁【去皮尖】 麻黄【去节】 知母【炒】 甘草 黄芩【各半两】

右每服二三钱水煎

玄参升麻汤治癍疹已发未发或身如锦纹甚则语言烦躁喉闭肿痛

玄参 升麻 甘草【炙各等分】

右每服二三钱水煎服

乌梅丸

乌梅【三十个酒浸肉研烂】 细辛 附子【炮】 乾姜【各一两】 黄连【一两】 当归
蜀椒【各四两】

右为末乌梅肉与米饭和丸桐子大每服数钱白汤下

羌活散【即人参败毒散加天麻地骨皮】

葛根麦门冬汤【方见顶陷心烦】

解毒散

小柴胡汤【二方见癍疹】

四物汤【方见癍痘出迟】

犀角汤【方见顶陷心狂】

升麻葛根汤【方见痘寒战】

人参麦门冬汤【一名麦门冬散方见发热口渴】

大连翘饮【方见夹疹痘】

导赤散【方见疳蚀之症】

痘疮生痛毒治之症

陈文宿先生云痘疹首尾不宜与水吃若悞与之疮靨之後其痂迟落或生痛肿鍼之而成疳蚀以致难愈盖脾胃外主肌肉饮水过多湿损脾胃转於肌肤则津液衰少气血不能周流凝结不散故疮痂迟落而身生痛肿也张洁古先生云痂肿发於身前手阳明经也发於四肢足阳明经也丹溪先生云痘痂多是余毒血热所致当分上下用药而以凉血为主大便燥实加大黄如不应当分经络所属血气虚实其脓成否窃谓前症初起未成脓者用活命饮隔蒜灸治而消之欲成脓者用四君子汤加当归黄芪以补托元气大凡痘疮始末皆系脾肾之气所主若饮食药餌一有失宜必致多变他症凡於饮食少思内热晡热者皆属脾肾气虚血弱之故也宜佐以四君子加川芎当归黄芪升麻或饮食如常有发热作痛亦属气血虚弱余毒为患亦宜佐以射干鼠粘子汤若饮食如常发热作痛大便秘结者系属热毒内蕴宜用大连翘饮如或不应仍用仙方活命饮若根赤而作痒者是血虚也宜用四物汤加以牡丹皮色白而作痒者亦血虚也宜以四君子加当归芍药若色赤而作痛者是血热也宜以四物汤加连翘与金银花若肿而不溃者乃气血两虚之故也须用托毒消毒散若溃而不愈者皆因脾气虚弱也宜用六君子汤以滋补之

一小儿痘毒蚀陷敷以雄黄散及服加味解毒散而愈一小儿痘毒遍身腐溃脓水淋漓以经霜茅草研细末铺於寝席之上令小儿睡卧於上更服九味解毒散顿愈又用神效当归膏敷之而痊

一小儿痘毒之後更患腿膝肿痛极甚此乃脾肾虚而毒流注宜先用仙方活命饮服服过四剂其肿痛顿减大半再用补中益气汤及六味丸而痊

一小儿腿膝肿溃脓水不止内热晡热体倦肌瘦余以为元气复伤用八珍汤兼六味丸服三月而愈

一小儿痘疮已愈两目昏闭余用鼠粘汤加山梔龙胆犀角目开而有赤白翳佐以蛇蛻散外用二粉散而安一小儿痘毒溃而肿不消烦躁作渴小便如淋手数寻空此肝脾虚热也用八珍汤加減八味丸料各二剂而安又用大补汤而愈

一小儿痘毒腿膝肿此脾肾虚而毒流注也用如圣饼及活命饮四剂肿痛顿减再用益气汤地黄丸而痊一小儿腿膝肿溃脓水不止晡热体倦先君谓元气复伤阴虚所致用补陰八珍汤地黄丸而愈

一小儿痘毒敷寒凉药内溃不愈清脓甚多此元气虚也朝用益气汤夕用八珍汤各五十余剂佐以豆豉饼而愈

一小儿腮患毒用活命饮肿痛已退肢体甚倦此邪气去而元气虚也用圣愈汤元气少复用托里散而痊一小儿左耳下连项赤肿作痛此少阳胆经火症用梔子清肝汤治其母用活命饮治其子而痊後复作误服败毒散溃而不斂疮口色白余用托里散而痊

一小儿出痘七日寒热作渴两脇及臂外患痘疔此属胆经也挑出黑血以小柴胡汤加生地黄一剂热渴顿止又用活命饮而痊

一小儿患此面肿肉色如故脉浮而大按之微细余谓此元气虚而邪从之也当补元气为善不信反服犀角丸化毒丸而歿

神效隔蒜灸法治痘痛大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒随火散用大蒜头切三分厚安上用小艾炷於蒜上灸之每五壮易蒜再灸痛不止尤宜多灸小儿须将蒜切片着肉一面略剜小空灼艾燃蒜先置大人臂上试其冷热得宜然後着疮上又别灼如前法试之以待相易勿令歇

仙方活命饮治痘疔痘毒及一切疮毒未成即消已成即溃此消毒败脓止痛之圣药

金银花 陈皮【各三钱】 皂角刺【炒】 穿山甲【用蛤粉炒】 乳香没药 白芷 防风 当归【各一钱】 贝母 天花

粉 甘草节【各七分】

右每服五钱酒煎婴儿母同服为末酒调服亦可若势甚而邪在表者加麻黄散之而毒在内者加大黄下之当临症制宜此解回生起死之剂但元气脱者不治

六味活血散治痈疽疮痛初起红肿不散

当归 川芎 赤芍药 生地黄 红花 苏木【各等分】

右水煎量服之

托里散治痘毒元气虚弱不能溃散未成用之自消已成用之自溃

人参 黄芪【炒各二钱】 当归【酒洗】 白术 陈皮 熟地黄 茯苓 芍药【炒各一钱五分】 甘草【炙五分】

右三五钱水煎服

托里消毒散治痘毒气血虚弱不起发腐溃收敛或发寒热肌肉不生

人参 黄芪 当归【酒洗】 川芎 芍药【炒】 白术 陈皮 茯苓【各一钱】 金银花 连翘 白芷【各七分】 甘草【五分】

右每服三五钱水煎

东垣圣愈汤治脓溃心烦无寐体倦少食

熟地黄【自制者佳】 生地黄【各二分】 川芎 人参【各三分】 当归 黄芪【各五分】

右水煎服

济生归脾汤治脾血虚损健忘惊悸或心气虚不能摄血归源以致妄行或吐血下血或因乳母心脾二经有热疮不结痂或疮痕赤色加柴胡山梔即加味归脾汤

人参 白术 黄芪 白茯苓 龙眼肉 当归 远志 酸枣仁【炒各二钱】 木香【一钱】 甘草【五分】 当归身【一钱】

右姜枣水煎母子同服

东垣清胃散治胃经有热齿牙作痛或饮食作渴口舌生疮或唇口肿痛焮连头面或重舌马牙吐舌流涎若因服尅伐之剂脾胃虚热口舌生疮或弄舌流涎或呕吐困睡大便不实者用五味异功散

升麻【五分】 生地黄【四分】 黄连 牡丹皮【各三分】 当归稍【四分】

右水煎服婴儿母亦服

替针丸治痘痈脓已成不溃

陈坏米【一钱】 礞砂【五钱】 雄雀粪【四十九粒真雄雀粪直者是也】

右为末米粥丸如麦粒大每用一粒粘疮头上以膏药贴之半晌其脓自出若疮头透而脓不出或出而愈痛或发热血气虚也用托里散或作呕吐痰食少体倦脾气虚也用六君子汤

神效太乙膏治一切疮疽溃烂

玄参 白芷 当归 肉桂 赤芍药 大黄 生地黄 【各一两】

右咬咀用麻油四十两入铜锅内煎至药黑摅去查徐入净黄丹一斤再煎滴水成珠捻软硬得中即成膏矣

神效当归膏治痘毒津淫或汤火等症及疮腐不能生肌收敛者

当归 生地黄 黄蜡 【各一两】 麻油 【六两】

先将当归地黄入油煎去渣入蜡熔化候温搅匀即成膏矣

豆豉饼治疮疡肿痛或硬而不溃及溃而不敛并一切顽疮毒疔用江西豆豉为末唾津和成饼大如铜钱厚如三四钱置患处以艾铺饼上灸之未成者即消已成者祛逐余毒间有不效者乃气血虚败之症参疗疮论灸法用之

神功散治疮疡初起肿痛者用之可消加血竭更效

黄栢 【炒为末二钱】 草乌 【生为末二两】

右用漱口水调敷常以漱水润之

飞龙夺命丹治痘疔痘毒痘痛或麻木呕吐重者昏愤咬牙

真蟾酥 【乾者酒化】 轻粉 【各一钱】 枯白矾 寒水石 铜碌乳香 没药
麝香 【各二钱】 朱砂 【六钱】 蜗牛 【四十二个另研】

【如无亦可】

右各为末入蟾酥蜗牛或加酒少许糊丸菉豆大每服一丸温酒或葱汤送下重者外用隔蒜法灸甚者多灸或着肉灸

五福化毒丹治痘毒实热肿痛

生地黄 熟地黄 天门冬 【去心】 麦门冬 【去心】 玄参 【各二两】 甘草
甜硝 【各三两】 青黛 【一两五钱】

右为末蜜丸芡实大每服一丸白汤化下

犀角消毒丸治痘疹余毒一切疮毒

生地黄 荆芥 当归 犀角【屑】 防风 牛蒡子【杵炒】 赤芍药 连翘 桔梗【各七钱】 薄荷 黄芩 甘草

右为末蜜丸芡实大每服一丸白汤化下

按化毒丹降火凉血解毒寒中之剂消毒丸清热解毒破血之剂盖小儿脏腑脆嫩元气易伤况痘後气血皆虚岂能胜当此剂若胃气一伤则未成者不能消散已成者不能腐溃已溃者不能生肌殊不知痘疮乃脏腑所发遍身之血皆化为脓况此方愈而患此乃脾胃虚怯肌肉消弱荣卫短濇所致治者审之

蟾蜍丸

蟾蜍【一枚夏月沟渠中腹大不跳不鸣身多癞者】

右取粪蛆一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不令虫走出却将蟾蜍扑死投蛆中食一昼夜以布袋盛置浸急流水中一宿取出瓦上焙为末入麝一字粳米饭丸麻子大每服二十丸米饮下

八珍汤【方见顶陷灰白】

小柴胡汤【方见癰症加生地黄山梔即加味小柴胡汤】

梔子清肝散【即柴胡梔子散方见作痒搔破】

十全大补汤【方见腹胀气喘】

当归补血汤

补中益气汤【二方见寒战咬牙】

六味地黄丸【加五味子肉桂名加減八味丸】

四君子汤【方见痘不靨闷乱】

加味逍遥散【方见欲靨不靨】

加味归脾汤【方见痘瘡】

加味清胃饮【方见痘不结痂】

大芦荟丸【方见风邪转於肌肤】

人中白散

如圣饼

补陰八珍汤【三方见夹疹痘】

痘疗

痘疗又谓之贼痘或三五枚或五七枚间杂於诸痘之间其色紫黯作痛不宁以致诸症蜂起不能贯脓甚至不救乃热毒势甚并结也用仙方活命饮如二便秘澁量加大黄遍身拘急加麻黄外必用线针挑破出黑血或吮出毒血以泄其毒余痘才得贯脓否则其毒无从而解必致不起如未应急用隔蒜灸若毒气盛者或不知痛者不用蒜隔就着肉灼艾灸之若灸後疮头红肿发焮用针挑破出毒血灼艾尤好虽此法未出方书予屡用屡验者世多用至宝丹之类亦不可恃

一小儿有疗二枚诸痘焮赤作痒而不贯先君以针挑破隔蒜灸至五十余炷而贯又十余壮而痛止用活命饮末二钱热酒调服出紫血又二服疗毒悉退痘浆悉贯更用犀角消毒散而愈

一小儿患痘疗挑出毒血服活命饮而痘愈但疗处或痒或痛用活命饮隔蒜灸而愈用参芪四圣散而靨一小儿痘内有疗数枚虽挑出毒血余毒不解先君用仙方活命饮一剂徐徐灌之毒解浆贯而愈

一小儿患痘疗遍身焮如丹毒内紫色者三枚用活命饮隔蒜灸其势渐退又用活命饮末二钱浆渐贯更用四圣散犀角消毒散而愈

一小儿出痘第七日寒热作渴两脇及臂外侧胆经各患痘疗先用针挑出黑血乃用小柴胡汤加生地黄一剂热渴顿止又用活命饮一剂而痊

一小儿出痘稠密痛甚色赤翌日变黑索水饮之神思稍清先用活命饮末冷酒调服三钱痛虽稍缓其痘如指色赤肿高又用夺命丹一粒肿痛十减六七又用活命饮末一服温酒调又得减三四再服而浆贯却用四圣散而痊

犀角消毒散治癍疹丹毒发热痛痒及疮疹等症牛蒡子 甘草 荆芥
防风【各五分】犀角【镑二分】金银花【三分】

右水煎热入犀角倾出服

仙方活命饮

飞龙夺命丹

隔蒜灸法【三方见痘痢】

四圣散【方见腹胀气促】

小柴胡汤【方见癰症】

夹疹痘

夫疹乃风邪外患痘为胎毒内发二症并作脏腑俱病也二者相杂赤晕发焮痘疮愈盛误谓痘出太密多不可救然此乃疹夹痘也当治以人参羌活散疹毒即解痘势亦退其元气亏损不能结痂当补解胃为急也人参羌活散治时气痘疹兼於发表

人参 羌活 独活 柴胡 前胡 桔梗 茯苓 枳壳 川芎 天麻 甘草 地骨皮【各三分】

右入薄荷五叶姜水煎服

东垣消毒救苦汤治癰疹悉自消化使令不出已出稀者再不生癰十一月立此方随四时加減通造化明药性者能之

麻黄根 羌活 防风 升麻【各五分】 柴胡 川芎 藁本 葛根【各二分】 酒黄芩【二分】 生地黄【二分】 细辛

生黄芩【各一分】 黄连 酒黄栢 红花【少许】 苏木 当归身 吴茱萸【五分】 白术 苍术【二分】 生甘草【一分】 橘皮连翘【半分初出減出太盛者加之】

右每服五钱水煎热服

人中白散

人中白【煨一两】 黄栢【炒黑三钱】

右为末搽口内

如圣饼治一切疮?硬肿不能消散或毒不能解散乳香 没药 木香 血竭 当归【等分】 麝香【少许】

右各另为末酒糊和为饼炙热频熨患处恶疮加蟾蜍等分

四味肥儿丸【一名小肥儿丸】治食积脾疳目生云翳口舌生疮牙龈腐烂发热瘦怯遍身生疮等症或痘後患之黄连【炒】芫荑【炒】神麴【炒】麦芽【炒等分】

右为末水糊丸桐子大每服二三十丸空心白汤下

加味解毒散治痲疹痒痛寒热甚者烦躁谵语并痘毒发热咽乾

犀角【镑五钱】连翘【炒二钱】牛蒡子【炒三钱】薄荷【一钱】甘草【五分】

右为末每服一二钱滚汤调下

补陰八珍汤【即八珍汤加黄栢知母炒黑】

葛根黄连汤治疹後身热不除

葛根【五钱】黄连【三钱】黄芩【二钱】甘草【一钱半】

右水煎服

独参汤【人参一两姜枣同煎】

春泽汤

人参 白术 茯苓 泽泻 猪苓

右水煎服

大连翘饮

连翘 黄芩 瞿麦 木通 滑石 柴胡 防风 荆芥 赤芍药 甘草 蝉蜕 山梔

右每服三四钱水煎服

薛氏医案卷七十一

卷七十二

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷七十二

明 薛己 订

保婴撮要十七

痘稠密

张洁古先生云一发稠密如针头者形势重也轻其表而凉其内连翘升麻汤主之然稠密之处各有经络部分所属额主心面主胃腹与四肢主脾脇主肝两腋主肺下部主肾肩背主膀胱当随见症治之若面色黄大便黑烦躁喘渴或腹胀者瘀血在内也用犀角地黄汤或抱龙丸生犀角汁但根窠分明肥满者无妨窃谓前症若属心经用导赤散之类胃经用犀角散之类肝经用柴胡汤之类大凡稠密者热毒炽盛也若密而不痛用东垣消毒散若密而作痛用仙方活命饮若密而小便不通用八正散若密而大便不通用承气汤若密而恶寒发热用麻黄甘草汤

一小儿十三岁痘疮稠密而痛脉洪数而有力先君用仙方活命饮二剂先出者痛顿止後出者隐於肉里用东垣消毒散二剂隐者悉消又用活命饮一剂脉静身安而痊

一小儿痘稠密身侧尤甚焮赤呻吟饮乳不彻先君谓肝胆之火助邪为患故身侧尤多乃乳母肝火传变也用柴胡栀子散治其母子饮数滴而靨

一小儿痘疮甚密身侧尤甚贯脓不满不红活或云当歿於十二日余以为气血虚弱用八珍汤加糯米百粒数剂至十五日而愈

一小儿痘密而灰白色始末悉用补托之药安後饮食过多呕吐面青白唇目牵动先君以为慢脾风症之渐不信翌日手足时搐用五味异功散加木香乾姜而愈一小儿痘稠密色赤先君以为热毒用东垣消毒散一剂初出者顿起後出者悉没再剂如斯而靨

一小儿稠密色黑烦躁喜冷手足并热先君谓火极似水令恣饮芹汁烦热顿止先用犀角地黄汤次用地黄丸料服之而愈

一小儿稠密出迟用四圣散而起发用参芪内托散而靨後发热恶寒用八珍汤而愈

一小儿痘密而痛用东垣救苦汤一剂痛顿止用紫草木通汤而愈

一小儿痘密身痛如刺用活命饮一剂其痛即止又用犀角消毒散而愈

一小儿痘初出密痛用东垣救苦汤痛顿止又用四圣散而发用犀角消毒散而愈

麻黄甘草汤治表实痘毒愆盛稠密

麻黄 生甘草

右水煎服

柴胡栀子散【方见作痒抓破】

甘桔防风汤【方见痘咳】

紫草甘草枳壳汤【方见痘喘】

东垣消毒散【一名救苦汤方见痘身痛】

紫草木通汤【方见小便不利】

仙方活命饮【方见痘痛】

六味地黄丸【方见痘疮发热属陰阳】

小柴胡汤【方见癰症】

四圣散【方见痘腹胀气促】

紫草散【方见顶陷心烦】

抱龙丸【方见痘癰搐】

犀角消毒散【方见痘疔】

柴胡清肝散【即柴胡栀子散一方见痘潮热】

痘吐泻

痘疹方云痘疹吐泻盖因脾胃不和饮食不调烦渴呕吐泄泻并用白术散然疮疹皆赖脾土脾土实则易出易靨万物得土气温煖而生吐泻则伤脾土遂有更变之症夏月中暑烦渴泻或腹痛或欠筋用五苓散加藿香伤食吐泻用小异功散手足并冷者用益黄散豆豉丸顶陷灰白用木香散疮正出而吐泻者或见血者俱为逆症难治窃谓前症虽因脾胃不和然邪实上焦则宜吐邪实下焦则宜泻如吐泻暖腐吞酸皆宜宣发但微甚不同耳张翼之云若痘疹吐泻少食为里虚陷伏倒靨灰白为表虚二者俱见为表里俱虚合用十二味异功散救之甚至姜附灵砂亦可用若止里虚去官桂止表虚减肉苳豉若能食便秘倒靨为里实而补当用钱氏及丹溪法下之皆为能食为里实里实而补则结痈毒红活绽凸为表实表实而补则溃烂不结痈凡痘见癰便忌葛根汤恐发表虚也如有更变当随症治之一小儿痘初出忽吐泻饮乳不歇属脾胃虚弱用人参白术散作大剂母子并服又用五味异功散为末时以乳调服吐泻止而靨

一小儿出痘作泻手足并冷用十二味异功散稍愈又用五味异功散加姜桂一剂而止又用姜加木香一剂再用参芪四圣而靨

一小儿痘疮愈而作泻不食此脾气内虚先用五味异功散而泻止食进後又伤食吐泻发搐仍以五味异功散加天麻柴胡而愈

一小儿痘後作泻腹中疼痛手足并冷此脾气虚也用五味异功散加乾姜一剂乃去姜又数剂而痛止又用六君子汤加柴胡而泻止

益黄散治疮疹因烦渴饮水过多而伤脾胃吐泻丁香 诃子【煨】 青皮 陈皮 木香【各等分】

右为末每服一钱水煎

橘皮汤治呕吐不止饮食不入

陈皮 生姜【各一钱】 人参【五分】

右水煎作三四次服之

生气散治脾胃气虚吐泻肚腹膨胀饮食不化或腹痛不止

丁香 甘草【各五分】 白术 青皮 木香 人参【各七分】

右水煎徐徐服

五苓散【方见小便不利】

五味异功散【方见寒战咬牙】

对金饮治伤食吐泻【方见不寐闷乱】

豆豉丸【方见泄泻咬牙】

十一味木香散

十二味异功散【二方见发热属阴阳】

参芪四圣散【方见腹胀气促】

六君子汤【方见不寐闷乱】

自汗

痘疹方云初起时自汗不妨盖湿热薰蒸而然也窃谓前症因邪在经络自能发散使邪气外泄若见此症不当用芪桂之属以实腠理且自汗则痘热已轻升麻葛根之类在所当禁恐发泄太甚则津液内耗陰随阳散难以收靨靨後最宜审治若血虚者用当归补血汤气虚者用四君子加黄芪气血不足者十全大补汤若饮食自汗者异功散杨氏云痘疮一见红点升麻葛根便不可用此语甚是但此为表虚及无表症者而论若或邪在表痘赤绽焮者又当用麻黄甘草汤汗之肿焮作痛者用活命饮加麻黄散之盖自汗盗汗为病不同自汗者汗无时而自出也属阳虚盗汗者睡则汗出寤则汗收也属陰虚汗者血之所化陰气不能闭藏所以睡则汗出也痘家当以补血为主若当归补血汤六味地黄丸八珍汤人参养荣汤之类皆可因证施治又有胃虚者宜用四君及浮麦散食积内热者宜用四君麴蘖未靨之际恐致气血虚而不能结痂既靨之後尤防血脱陰虚阳无所附矣

一小儿痘将出自汗作渴发搐此心肝二经热甚用柴胡麦门冬散而热症退用紫草快癍汤痘悉见又用四圣散而结靨

一小儿痘出自汗发搐流涎此木火侮土先用五味异功散加钩藤钩诸症顿减次以五味异功散加柴胡而安

一女子出痘色赤自汗发搐作呕此肝火侮土先用五味异功散加柴胡钩藤钩热搐悉愈又用托里散浆贯而愈

一小儿痘出自汗面赤作渴手足并热大便乾黄此肠胃皆热用泻黄散末一服诸症顿退又

用五味异功散加山梔麦門冬而痊

人参养荣汤治气血俱虚发热恶寒肢體瘦倦食少作泻或久病虚损口乾欬而下痢惊热自汗盗汗人参 陈皮 黄芪【炒】 桂心 当归 白术【炒】 甘草【炙各一钱】 白芍药【炒钱半】 远志【五分】 熟地黄【自制】 五味子【杵炒各七分】

右每服二三钱姜枣水煎

麻黄甘草汤

麻黄 甘草【等分】

右每服一钱水煎

浮麦汤

浮麦不拘多少【炒香】

右每服三五钱水煎

当归六黄汤治血气不足虚火内动烦躁自汗盗汗不止【方见烦躁】

痒塌

陈文宿先生云痘疮痒塌若臟腑调和血气充实外常温暖内无冷气必无此症设服宣利之药所致宜用异功散治之丹溪云痘疹痒塌者於形色脉上分之实则脉有力气壮虚则脉无力气怯虚痒则实之更加凉血药实痒则大便秘结以凉药下之窃谓前症若色赤而兼痒者属血虚有热用四物牡丹皮色白而兼痒者属气虚有热用四君加芍归若发热大便秘结者用犀角消毒散发热大便调和者用麦門冬饮寒战渴泻喘嗽声哑气急先用十一味木香散如未应用十二味异功散外用败草散敷之若寒战咬牙烦热喘渴足冷灰白内陷腹胀渴泻者皆不治

一小儿出痘六日痒塌寒战钱密庵谓血气虚寒用十一味木香散二剂而浆贯用参芪托里散而靨脱後痕作痒用大补汤而痊

一小儿第七日痒塌少食手足俱冷发热恶寒先君谓阳气虚寒用十二味异功散一剂而痒止又用托里散加肉桂四剂而浆贯用十全大补汤而结靨後痕赤作痒此血气虚热用八珍汤二十余剂而愈

一妇人出痘热数日而发见用紫草快癍汤虽红活而痒塌询其素勤劳元气颇不充实用八珍汤烦热渐止又用托里散而靨

一小儿十六岁第九日痘塌口乾发痒手冷腹痛先君谓脾胃气血虚弱用五味异功散加归芪姜桂四剂痒渐止又用十全大补汤六剂浆贯用八珍汤数剂而靨後遍身不时作痒或痘痕色赤用补中益气汤而痊一小儿痘浆不满面赤作痒余谓血气虚而有热欲与温补不信服清热之药至十三日疮痕色赤烦渴腹胀不食手足逆冷而歿

五味异功散治痘疮脾胃气虚痒塌【方见寒战咬牙】

紫草快癍汤【方见顶陷心烦】

四物汤【方见痘疮出迟】

四君子汤【即六君子汤出陈皮半夏方见不靨闷乱】

托里散

犀角消毒散【二方见痘痛】

十全大补汤【方见腹胀】

八珍汤

十一味木香散

十二味异功散【三方见顶陷灰白】

倒靨

丹溪先生云痘疹倒?因真气虚而毒气不能尽出者用黄芪人参紫草酒制治之若将成就之际却淡色者属血虚用当归川芎之类或加红花紫草属热毒者用升麻芩连梗翘之类甚者用犀角屑大解痘毒窃谓前症若热毒方出忽被风寒闭塞肌窍血脉不行身体作痛或四肢微厥癍点不长或变青紫黑色者此为倒靨若胃气虚弱不能补接荣卫出而复没者谓之陷伏误用解毒之药必致陷塌若喜热饮食手足并冷者乃脾胃亏损阳气虚寒之症宜用辛热之剂补之喜冷饮食手足并热乃阳气实热之症宜用苦寒之剂泻之外感风寒者温散之毒入腹者分利之阳气虚者温补之外寒觴犯者薰解之陈宿州先生用十二味异功散以预保脾土於未败之先实发前人之未发开万世之蒙瞶也

一小儿痘将愈忽黑陷余谓气血虚用紫草散加人参当归又用参芪托里散而愈

一小儿将愈而倒靨咬牙寒战手足并冷饮沸汤而不知热用十二味异功散一剂诸症顿退却用五味异功散倍用参术数剂而愈

一小儿痘饮食多而作吐服枳术丸色黑将陷用五味异功散加乾姜二剂贯浆而靨

一男子发热昏愤数日发红点用快癍汤托里散贯浆将靨忽发热恶寒疮黑倒靨手足并冷口渴饮汤此阳气虚寒也用独参汤四剂诸症渐愈而靨

一小儿兼呕手足并冷余谓脾气虚寒欲用十二味异功散不信另用杂药而歿

成都方士禹太和治痘疮黑陷垂死者用壁间喜蛛如黄豆大者一枚搗烂一岁儿用雄黄一分二岁二分十岁者用一钱入蛛蜘内研匀用好烧酒调服愚意此即木香散异功散之类也若因阳气虚寒不能荣运周身以致四肢逆冷腹胀唇青黑陷者宜用烧酒若因元气虚弱色白隐於肌肤而不能起发者宜用陈酒亦不可拘泥於烧酒也若小儿未及周岁或儿大者宜酌量与之不可拘於杯许也又有一等症气血俱虚者或色淡红不光泽不起发或惊悸咬牙者加紫草红花以用之七味白术散【方见发热属陰阳】

十一味木香散

十二味异功散【二方见痘灰白色】

癍烂

闻人氏云痘癍烂之症因当发散而不发散则毒气闭塞以致喘促闷乱不当发散而误发散则毒随阳气暴出於外遍身皮肤溃烂治宜调脾胃进饮食大便调和荣卫健旺毒气自解而无目赤咽痛口疮吐衄等症窃谓前症若发表过甚大便自利急用理中丸豆豉丸以救其里亦有痘疹如蚊所嚙而色黑乃危症也若大小便秘结烦躁用山梔子汤獐豃尾血调脑子治之自利不食者不可用盖毒发於表而妄汗之则腠理开泄荣卫益虚转增疮烂由是风邪乘虚变症者有之若毒根於里而妄下之则内气愈虚毒不能出而返入焉由是土不胜水变黑归肾身体振寒两耳尻冷眼合肚胀其疮黑陷十无一生治者审之

一小儿患此发热作渴手足并冷此脾经热毒先用泻黄散五分又用七味白术散而愈

一小儿患此但恶寒发热体倦头痛人迎脉大於寸口二三倍此风邪外伤用补中益气汤加川芎蔓荆子愈而自靨

一小儿患此口舌生疮手足并冷余谓此中气虚而内热耳用五味异功散议论不一犹豫未

服翌日腹痛口噤余用前药更加乾姜一剂诸症稍缓再剂而愈一小儿患此或痒或痛发热口渴先用白术散次用补中汤而愈後因作课劳心发热头痛痘痕焮赤用补中汤加蔓荆子及八珍汤而愈

一小儿患此作痛喜饮热汤发热恶寒手足并冷余谓此中气虚而外假热也用补中汤加参芪各三钱四剂而愈

一小儿患之多在两脇时发寒热此肝经之症用加味逍遥散而寒热退又二剂而脇痛止及立效散而痊一小儿患之作渴发热额间为甚此心经有热先用导赤散母服渐愈又用柴胡梔子散傳三黄散而痊一小儿患之发热作渴面目多白尺脉数而无力此稟足三陰虚也用地黄丸补中汤寻愈毕姻後患瘵症服黄栢知母等药几危余仍用前药而痊

一小儿患此体倦恶寒此脾胃气虚也用补中益气汤数剂而愈後因饮食停滯发热而痘痕复赤先用参术陈皮神麴山楂消食仍用补中益气汤调补脾胃而愈若误用败毒之剂决不起矣

一小儿痘愈後因劳痘痕作痒搔破脓水淋漓面色皎白脉浮大按之如无余用补中益气汤渐愈或云先攻其邪其後补之乃用消风散变痊汗出口噤而死惜哉山梔子汤治痘疹及癰毒状如蚊蚤嚙毒盛黑色者梔子仁【一两】白藓皮 赤芍药 升麻【各一两】寒水石甘草【炙各五钱】

右为末每服一钱水八分入紫草

三黄散治疔热生疮脓水浸淫脓流处便湿烂

松香 五倍子 黄连 海螵蛸 黄丹【各一钱】轻粉 雄黄

右为末用莹肌散煎洗渗之乾者香油傳

豆?丸【方见泄泻咬牙】

五味异功散

补中益气汤【二方见寒战咬牙】

柴胡梔子散【即柴胡清肝散】

加味逍遥散【方见欲靨不靨】

地黄丸【即六味地黄丸】

七味白术散【二方见发热属陰阳】

泻黄散【方见靨後发咽痛】

导赤散

立功散【二方见风邪搏於肌肤】

痘癰搔

钱氏云痘疹癰搔由内相胜也惟心癰脾疹能作搔盖疹为脾所主脾虚而不胜土风热相搏而动於心神心喜热神气不安因搔成癰癰为心所生心主热热生风风属於肝二藏相搏风火相争故发搔当泻心肝若凉惊用凉惊丸温惊用粉红丸海藏云诸痛痒疮疡皆属心火无论虚实皆从心火土说脾虚则肝气乘之与心火相合耳若脾土实心火旺而逆乘以致癰者此实邪也便结者泻青丸便软者泻心汤洁古云未出而发搔者是外感风邪之寒内发心火之热所作也当用解毒丸犀角地黄丸主之世传云疮疹欲出身热烦躁忽发惊搔宜用驱风膏小如圣饮小便不通八正散痰涎壅盛利惊丸抱龙丸丹溪云欲发疮疹先身热惊跳搔搦此非惊风宜用发散之药窃谓前症痘疹未见而先发搔者乃毒气自心经出也若病势轻缓或形气虚弱者不宜用峻厉之剂恐元气内损则毒气内陷而疮不能起发也或外感风寒之邪内因疮疹之热而相搏或肝血虚火动而内生风当补元气为主佐以见症之剂然前方多峻厉之剂审有是症方可用须察其色赤白而以脾胃为主虚则用温补实则用解毒若先发搔而後发疮多有生意疮已瘥而发搔或吐泻者难治

一小儿痘痂脱尽因其秽气用葱椒煎汤浴之发搔痰喘用八珍加白僵蚕蝉蜕一剂痰喘顿止又用四君芎归钩藤鈎而搔止

一小儿痘疮色赤四肢发搔眉唇牵动此心肝二经热甚乘脾所致也用四君防风钩藤鈎而瘥

一小儿痘後四肢发搔眉棱尤动小便频数脸目青赤此肝经风热用四物柴胡山梔少愈但四肢倦怠饮食少思大便不实此脾气受伤而未复也用四君升麻当归而瘥

一小儿痘後寅卯申酉时热甚或兼搔余谓寅卯时发热此肝火本症申酉时发搔乃肝木侮金先以四物白术茯苓钩藤鈎煎送柴胡二连丸而愈夕用地黄丸朝用四君山梔柴胡及四君子加当归而瘥

一小儿痘疮色赤发搔痰盛服抱龙丸而顿愈又因母大怒儿仍搔母服柴胡梔子散加味道

遥散母子并愈一小儿痘愈後发搐左额青赤唇口牵动余谓肝心二经风热所致先用柴胡
梔子散加钩藤鈎後用加味逍遥散而搐止再用五味异功散而痘愈

一小儿痘将愈发搐痰涌头目不清脾气虚弱肝木侮之先用五味异功散加柴胡钩藤鈎
愈而靨

柴胡二连丸治肝经实火

柴胡 宣黄连 胡黄连

各末糊丸桐子大每服二三十丸白汤下

补中益气汤【方见寒战咬牙】

六君子汤【方见不靨闷乱】

四神丸【方见泄泻咬牙】

十一味木香散【方见顶陷灰白】

痘风

丹溪先生曰痘风分气血虚实虚则黄芪生血之剂主之佐以风药实则白芍黄芩为君连翘
白芷断续之类为佐窃谓前症更当分痘疮已出未出已靨未靨外邪所伤内虚火动若未出
而搐搦热毒内蕴也紫草快癍汤加钩藤鈎已出红绽而搐搦热毒作痛也东垣消毒散加钩
藤鈎贯脓而搐搦血气虚也参芪四圣散加钩藤鈎若靨後而搐搦血气尤虚也八珍汤加钩
藤鈎或目瞤或直视者风火相抟也柴胡梔子散或六味地黄丸加柴胡山梔或口角流涎者
木乘土也五味异功散加升麻柴胡钩藤鈎或目赤眵泪者肝血虚而生风也四物汤加柴胡
钩藤鈎或角弓反张者水不生木也六味地黄丸加柴胡当归随用补中益气汤加天麻钩藤
鈎不可直用治风之药盖风药能燥血散气必验其手足冷热温和三症而用补泻调理之法
庶无误矣如婴儿当审乳母而治之

一小儿痘疮将愈发搐服牛黄清心丸更口噤流涎此脾胃复伤肝木所侮而涎不能归经耳
先用五味异功散加钩藤鈎诸症顿减次以五味异功散加柴胡而安一妇人出痘因怒发搐
痘痕赤色发躁作渴面目皆赤此汗多亡阳血脱而然也先用当归补血汤二剂躁渴顿止又
用八珍柴胡牡丹皮钩藤鈎热搐悉愈又用八珍汤而痊

一妇人痘疮将愈因怒发搐口噤头痛如裂痘痕皎白用补中益气汤加蔓荆子钩藤鈎顿愈
又因怒发搐头运不食先用补中益气汤加天麻又六君柴胡而安当归补血汤治痘疮血气

亏损发搐热渴喜饮脉洪大而虚重按如无者【方见寒战咬牙】

抱龙丸治痘疮风热发搐或痰甚者

胆星【四两】天竺黄【一两】雄黄 朱砂【各五钱】麝香【少许】

右为细末用甘草一筋煎膏为丸每一两作二十丸用薄荷或灯心汤化下

按前方肝经清热豁痰利气祛风之药过剂则脾肺复伤而反甚或更加胃腹作胀食少作呕者宜用人参白术散倍补中气

造牛胆南星法蜡月南星中大者为末用黄牛胆汁拌匀仍入胆壳内以线扎口悬挂当风处陰乾隔年方可用重制二三次者尤妙

小柴胡汤【方见癰症】

柴胡二连汤【方见前】

六味地黄丸【方见发热属陰阳】

四物汤【方见痘疮出迟】

十全大补汤【方见腹胀气促】

痘潮热

张洁古先生云痘疹未有不因潮热而出者观其热之时知自何臟发出寅卯辰时属肝出水泡巳午未时属心出癰疮申酉戌时属肺为脓泡亥子丑时属脾出疹子惟肾独居腑下不受秽浊故无症耳窃谓前症当察其虚实若壮热饮水便秘属实热也少用清凉饮下之发热饮冷大便不秘属虚热也宜人参白术散补之若下而发热愈甚此陰虚而阳无所附也用四物参芪之类补之若下而潮热面赤者血气发躁也用当归补血汤补之若见惊搐等症乃肝虚而内生风也用四物天麻钩藤钩补之用发散之剂而热愈甚此表虚而外热也用四君当归黄芪补之

一小儿先潮热午前甚面青痘赤出而热不止或时发搐手足不热不冷此阳明胃经症为肝木所侮先用补中益气汤加钩藤钩四剂而热止痘色红活乃去钩藤钩又四剂而贯浆用八珍汤而痊

一小儿痘红活寅卯时潮热作渴此肝经风热症用柴胡栀子散末三服热止浆贯又用八珍

汤山梔丹皮而靨

一小儿靨後潮热手足微冷余谓胃气虚弱用五味异功散佐以补中益气汤而愈因饮食过度前症复作更腹胀大便不实小腹重坠此脾虚也用补中益气汤而痊

一小儿痘後不时寒热噫气饮食吞酸服二陈枳实黄连更寒热如?腹坠下气此中气复伤而下陷也朝用补中益气汤夕用五味异功散各加乾姜木香而愈一孺者先潮热出痘面青脇痛此肝经之症用四君柴胡当归山梔二剂脇痛稍缓又佐以加味逍遥散而痛止却用托里散浆贯而靨後又潮热用地黄丸而愈一妇人患此误服寒凉之剂烦躁作渴饮沸汤而不知热脉洪数按之微细此血气俱虚用大剂十全大补汤加姜桂四剂更恶寒咬牙此虚极而药力未能及也於前药内更加附子一片二剂诸症顿退乃去附子又二剂将安去姜桂常服而痊

一小儿痘愈後潮热饮食少思面色痿黄久治不愈热後面与手足如水余谓脾气虚寒当用六君姜桂不信而死手足皆黑惜哉

柴胡梔子散治痘疮肝经有热寅卯时发热或寒热往来或发热惊搐或咬牙不止四肢劲强【方见浓水淋】

加味逍遥散【即逍遥散加牡丹皮山梔】治因乳母肝脾血虚发热致儿发潮热疮不能愈者【方见欲靨不靨】

人参白术散

六味地黄丸【二方见发热属陰阳】

八珍汤【方见顶陷灰白】

清凉饮【方见大便不通】

托里散【方见痘痛】

十全大补汤【方见腹胀气促】

四君子汤【方见不靨闷乱】

当归补血汤

补中益气汤

五味异功散【三方见寒战咬牙】

四物汤【方见痘出迟】

痘吐逆

世传方云痘疮吐逆无痰益黄散有痰二陈汤或橘皮汤半夏汤不止加丁香若吐而泻者亦宜益黄散及陈氏木香散异功散吐而身热烦渴腹满气促大小便澀而赤者当利小便窃谓前症若手足并冷渴饮热汤或腹作痛中气虚寒也宜用益黄散手足不冷吐逆痰涎中气虚弱也宜用橘皮半夏汤手足并热热毒壅滞也宜用导赤散口乾饮乳不彻胃经气热也宜用竹薹汤吐逆不乳或吐乳酸秽此脾气虚而乳食停滞也宜用枳术丸

一小儿痘不红活手足微冷此阳气虚弱也先君用五味异功散加乾姜肉桂二剂乃去姜桂加木香又二剂而愈

一小儿十一岁出痘第九日吐逆不食手足并冷此阳气虚寒之极也用十二味异功散一剂顿愈用五味异功散而安用参芪四圣散而靨

一小儿吐逆作渴手指并热此胃经有热也用竹茹汤而热稍止用人参胃爱汤而吐亦止用化毒汤而贯脓四圣散而结靨

一小儿吐逆作泻腹胀烦渴痘出不快手指微冷用七味白术散而诸症退用四圣散而诸痘出用人参蝉蜕散而诸痘靨

一小儿吐逆腹胀发热作渴大便乾臭此因肠胃实热用竹茹汤加黄连枳壳诸症稍退用紫草快斑汤疮势顿发如期而靨

一小儿痘出甚密呕逆饮冷手足并热此胃经热甚先用葛根麦门冬散一剂热症顿退又用泻黄散未一钱用米饮调服而安用白术散而痊

人参胃爱散治痘疮已发未发吐泻不止不思饮食或吐逆等症

人参 藿香 紫苏 甘草【炒】 丁香 茯苓 木瓜【各等分】 糯米

右每服三钱姜枣水煎

葛根麦门冬散治热毒斑疹头疼壮热必神烦闷乱逆呕者【方见顶陷心烦】

按此阳明胃经之药也外除表邪内清胃火兼补元气若非发热作渴表里俱实者不可用若

表里俱虚而发热作渴宜用人参麦门冬散

七味竹茹汤

橘红 半夏【各等分】 白茯苓【二分】 甘草 竹茹 黄连【姜炒】 葛根【各二分】

右姜水煎服

人参蝉蜕散治小便不利痘疮不发烦躁作渴咬牙喘满

人参 蝉蜕 白芍药 木通 赤茯苓 甘草 紫草茸

右每服三四钱水煎

橘皮半夏汤

橘皮 半夏【等分】

右每服三钱姜水煎

化癍汤【方见水痘麻痘】

紫草快癍汤【方见痘陷心烦】

六君子汤【方见痘腹胀】

导赤散【方见风邪搏於肌肉】

十一味木香散

十二味异功散【二方见痘灰白色】

六味地黄丸

七味白术散【二方见发热属陰阳】

四圣散【方见涕唾稠粘】

五味异功散【方见寒战咬牙】

咳嗽

痘疹方云痘疮未出之先咳嗽升麻汤头疼身热恶寒咳 参苏木呕吐痰涎白术汤时气头疼咳嗽或靨後余毒咳嗽惺惺散疮不起发升麻汤感寒头痛闷乱咳嗽木香散发热嗽甚别无他症生地黄散风热咳嗽五味子汤咽?不利甘桔防风汤窃谓痘疹未出欲出之际乃热毒上薰清道肺气不宁宜用惺惺散若已出之後则属元气虚弱不能固卫腠理风邪乘虚而袭宜用五味异功散加桔梗五味子以补脾肺

一男子咳嗽 喷腮颊赤目胞皆赤遍身赤痛余谓此心臟痘疹彼疑惑而未用药旬余皆红活起发余谓既红活起发不必服药至十七日大便下血未数日而痊一小儿痘疹壮热咳嗽痰甚烦热作渴用人参清脾散

诸症顿退日用芹菜汁旬余而靨

一小儿痘渐愈咳嗽肺脉大而无用参苏饮咳嗽渐愈因母饮酒又复咳用五味异功散加桑白皮杏仁山梔母子并服而愈

一小儿痘疮十二日患咳嗽唾痰胷中隐痛肺脉数滑余曰此兼患肺痈也当用桔梗汤不信翌日果吐脓血用桔梗汤而愈

一小儿十四岁痘愈後咳嗽脉数而无用朝用补中益气汤夕用六味丸料各数剂渐愈毕姻後咳嗽发热仍用前药及八珍等药而痊

一小儿痘将愈咳嗽面色黄白嗽甚则赤用五味异功散调补而愈

生地黄散治小儿癰疹身热口乾咳嗽心烦等症生地黄【半两】杏仁 欵冬花 陈皮【各三钱】甘草【炙二钱半】麦门冬【去心七分】

右每服三五钱水煎徐徐服儿大加之若痰气痘热内作宜用桔梗甘草防风汤若痰上壅者佐以抱龙丸

桔梗汤治久嗽肺气伤而吐痰有血痰或腥秽或咳吐脓血肺痈等症

桔梗【炒】贝母【去心】知母 桑白皮 枳殼【各一钱】地骨皮 瓜蒌仁 薏苡仁 杏仁【各五分】黄芩【微炒】当归【各一钱】五味子【一钱半】百合【炒钱五分】防己【一钱】葶苈【炒五分】

右每服三五钱水煎服

甘桔防风汤治痘症余毒疮毒咽痛

桔梗 甘草 防风

右水煎服

六味地黄丸

七味白术散【二方见发热属陰阳】

五味异功散

补中益气汤

当归补血汤【三方见寒战咬牙】

十六味清膈散【即人参清膈散方见顶陷心烦】

惺惺散【方见?症】

五味子汤【即小柴胡汤加五味子】

参苏饮【方见涕唾稠粘】

喘症

痘疹方若云痘疮已出未靨之间喘渴白术散甚者木香散收靨後腹胀喘渴大便利小便澀
葶苈木香散喘嗽五味子汤喘渴靨後余毒不除大便坚实前胡枳殼散头疼身热恶寒微喘
是有表邪也用参苏饮窃谓前症若因脾肺虚弱宜用白术散脾肺虚寒宜用木香散热毒内
蘊紫草甘草枳殼汤风邪外感用参苏饮内外壅滞人参清膈散大便自利小便澀滯葶苈木
香散大便坚实前胡枳殼散

一小儿痰喘痘赤作痛热渴喜饮冷水大便不利此胃经实热先用前胡枳殼散诸症渐退又
用犀角地黄汤而靨

一小儿面赤有痰口乾作渴右寸口脉洪数此心火刑肺金用人参平肺散一剂又用地黄丸
料四剂而痊一小儿痘赤而痛喘嗽作渴脉洪数左尺右寸为甚此肾火上炎乘肺为患用地
黄丸料煎与恣饮如期而靨一小儿十四岁痘方愈而喘促咳嗽余谓脾肺气虚用五味子汤
而愈後停食发热喘嗽用五味异功散而安用补中益气汤而痊

一男子出痘愈而喘嗽面赤服参苏饮面色痘?皆白此脾肺气虚而复伤也用补中益气五味异功散而痊一小儿喘渴面白手足时冷此脾肺气虚用人参白术散五味异功散而愈

一小儿痘将愈喘渴腹胀大便不结小便澁此脾肺气虚而然也先用葶苈木香散又用人参白术散而愈一小儿痘出气喘大便秘结手足并热作渴饮冷用前胡枳殼散而安但饮食少面白此邪气去而真气虚也用补中益气汤五味异功散而愈

一小儿十四岁痘方愈而喘手足不热余谓脾肺气虚用补中益气汤而愈後停食发热手足不冷余谓脾胃虚热而喘嗽用五味异功散二剂而热退又用补中益气汤而愈

一小儿痘疮狂喘躁热作渴饮冷痰涎不利先君谓热毒壅滞用人参清膈散犀角地黄汤各一剂顿愈又用当归补血汤而愈

一男子痘愈而喘嗽面赤服发表之剂喘嗽益甚面色痘?皆白手足并冷余谓脾肺之气复伤而虚寒也用补中益气汤加乾姜一剂元气渐复却佐以八珍汤而痊

一男子痘愈而患喘发热恶寒余用十全大补汤不信反服清热之剂汗出如两身热如炙面目痘?如赭赤余曰汗多亡阳而虚热也不信後果歿

六味凉血消毒散

牡丹皮 当归 生地黄 赤芍药 犀角【如无用升麻】 生甘草【等分】

右每服三五钱水煎

紫草甘草枳殼汤

紫草 甘草 枳殼【各等分】

右每服一二钱水煎

五味子汤

参苏饮

前胡枳殼散【三方见涕唾稠粘】

六味地黄丸

人参白术散【一名七味白术散二方见发热属阴阳】

圣济犀角地黄汤

人参清膈散【即十一味清膈散方见顶陷心烦】

十一味木香散【方见痘灰白色】

葶苈木香散【方见腹胀气促】

薛氏医案卷七十二

卷七十三

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷七十三

明 薛己 订

保婴撮要十八

小便不利

痘疹方云痘疹未出之先热盛恐欲起惊小便不利导赤散微解之热入膀胱如有血淋犀角汤初出不快小便赤色生圣散已出未愈之间白术散或五苓散加木通收靥之後小便不利烦热而渴猪苓汤窃谓前症当分所因若小肠热结用导赤散肝经热用柴胡麦门冬汤脾经热用犀角汤肺经热用生地黄汤肾经热地黄丸靥後气血虚弱用八珍汤中气虚弱用五味异功散一小儿小便不利口舌生疮乾渴用导赤散加味四物汤而脓贯又用白术散去木香治之而愈

一小儿小便不通口舌如靡作渴面赤左尺脉数此膀胱热结先用五淋散而小便利又用地黄清肺饮参芪四圣散而愈

一小儿小便数而欠利面赤口渴两足发热此禀陰虚也地黄滋肾二丸煎服用四剂而愈又用地黄丸料加黄芪当归而痊愈

一小儿痘将愈小便不利服五苓散之类小便愈少喘咳唾痰此脾肺复伤也先用补中益气汤三剂送滋肾丸却用补中异功二药而痊

八正散治下焦积热大小便不通或小便淋澀脉症俱实者

大黄【酒炒】 车前子【炒】 瞿麦 篇蓄
山梔【炒】 木通【各一钱】 滑石【煅二钱】 甘草【一钱】

右每服二钱水煎

滋肾丸为末水糊

黄栢【炒黑】知母【炒黑各二两】肉桂【二钱】

益元散治痘疹初起烦躁作渴小便不通

滑石【六钱】甘草【一钱】

每服五六分白汤调下

导赤散治小肠实热生疮作渴发热小便秘赤或小便不利者【方见作痒搔破】

柴苓汤治疹泻小便不利【方见癰症】

五苓散

茯苓 猪苓 白术 泽泻【各等分】肉桂【減半】

右为末每服四分白汤下

黄芩清肺饮

黄芩【炒】山梔【炒等分】

右每服二钱水煎

生地黄汤

生地黄【五钱】麦门冬【七钱】杏仁【去皮尖二钱】款冬花
陈皮【各三钱】甘草【二钱五分】

右每服二三钱水煎

紫草木通汤治痘疹出不快小便不利

紫草 人参 木通 茯苓 糯米【各等分】甘草【減半】

柴胡麦门冬散【方见作痒抓破】

犀角汤【方见顶陷心灰】

仙圣散【方见痘疮出迟】

加味四物汤【方见痘入口】

白术散【即七味白术散】

六味地黄丸【二方见发热属陰阳】

痘便血或黑屎

闻人氏云痘疮大便下血或黑粪若睡而不醒是为恶候乃内热盛也用犀角地黄汤抱龙丸小柴胡汤加生地黄主之窃谓前症若寒热作渴小柴胡加生地黄发热体倦用五味异功散加当归口乾作渴用人参白术散大凡作渴引饮发热者属实热作渴饮汤手足不热者属虚热手足逆冷者属虚寒治者审之

一小儿出痘便血痘赤痛如锥或疮内出血余谓肝火炽盛用小柴胡汤加生地黄一剂随用犀角地黄汤一剂而痊

一小儿痘疮下血且不起发先君谓气血不足用紫草快癍汤加参芪归术血顿止疮顿起用八珍汤而愈一小儿痘疮下血小便赤色疮色如赭发热饮冷二便不利先君谓心小肠实热用八正散後用解毒防风汤及饮芹菜汁而痊

一小儿痘疹便血倦怠作渴饮汤余谓倦怠便血脾虚下?也少食作渴津液枯涸也用五味异功散加紫草而愈

一小儿便血腹胀困倦身热口乾饮渴四肢逆冷先君谓脾气虚寒不能摄血用五味异功散加丁香炮姜二剂血止痘贯而靨

一小儿痘将愈而便血面白恶寒大便欲去而不去余谓此元气虚而下陷也用益气汤不信服凉血之剂致吐泻腹痛而歿

一小儿痘将愈患便血面白恶寒手足并冷脉沉细如无余谓阳气虚寒欲用人参姜桂不从翌日而死手足青黑惜哉

解毒防风汤治痘疮毒气炽盛便血

防风 地骨皮 黄芩 白芍药【炒】 荆芥 牛蒡子【各等分】

右每服四钱水煎或为末白汤调下

紫草快癍汤治痘疹下血不能起发出不快色不红活等症【即紫草汤方见顶陷心烦】

圣济犀角地黄汤治热毒内蕴烦躁作渴面色赤大便黑尿或神昏便血【方见痘作渴】

小柴胡汤治肝经有热不能藏血而便血【方见痘身痛】五味异功散治脾胃气虚不能统血而大便下血【方见寒战咬牙】

八珍汤治气血不能摄血而便血【方见顶陷灰白】

八正散治心小肠有热小便赤澀大便下血【方见痘小便不利】七味白术散【即人参白术散方见痘发热】

痘疮焮裂出血

闻人氏云痘疮大便不通小便如血或结痈毒身痘破裂乃内火炽盛失於解利急用犀角地黄汤小柴胡汤加生地黄四顺饮之类治之窃谓前症若心脾热盛用犀角地黄汤心肝热盛用小柴胡汤加生地黄若大便不通先用四顺饮次用犀角汤若色赤焮痛二便不通急用活命饮加硝黄若色赤焮痛恶寒发热用活命饮加麻黄若因乳母怒火用加味逍遥散加味归脾汤一小儿痘根赤色寒热作痛此肝经有热也先用加味小柴胡汤二剂诸症渐退又用加味逍遥散一剂而贯脓未用八珍汤而靨

一男子痘根赤痛发热作渴服紫草饮痘裂出血余谓心肝二经风火相?先用小柴胡汤加生地黄犀角二剂用圣济犀角地黄汤而愈

一小儿患前症大便不利小便赤澀作渴饮冷先君谓脾胃实热先用凉膈散一剂渐愈又用犀角地黄汤芹菜汁而痊

一小儿患此疹乳母有鬱火用加味逍遥散加味归脾汤而痊同时患是症而用杂药者俱致不救凉膈散治上焦实热烦渴面赤咽燥喉痛便溺赤澀狂言谵语睡卧不安

大黄 朴硝 甘草 连翘 山梔 黄芩 薄荷叶【各等分】

右为细末每服少许煎竹叶密汤调乳母同服

加味清胃散【方见痘痛】

加味逍遥散【方见痘潮热】

犀角地黄汤【方见顶陷心灰】

加味小柴胡汤【即小柴胡汤加山梔生地黄方见痘身疼】

八珍汤【方见顶陷灰白】

圣济归脾汤【方见痘痢】

痘?血吐血

痘疹方云若痘发之际正宜微见与发汗同体然血与汗虽殊其源则一盖痘疹乃秽血所发邪结肺胃毒气自然上越也若见此症不可妄投以药恐治失其宜瘀蓄者不出而已出者复伤反生变症也若作渴饮冷手足并热此毒气炽盛而血上溢也宜用圣济犀角地黄汤若肺经热毒而鼻?用地黄清肺饮胃经热毒而吐血亦用圣济犀角地黄汤若肠胃热毒而便血亦用之作渴饮汤手足不热者脾肺气虚不能摄血而妄行也宜用五味异功散若出血作渴烦躁面赤色者血脱也宜用当归补血汤

一小儿出痘三四日大便下血日有数滴至八日不能止疮不能起御医钱春林谓其脾气虚寒用木香散二剂加丁香十一粒人参五钱次日痘起有脓由是血止二十余日而愈

一小儿痘疮红活但不时作痒口渴便血面赤先君谓肠胃有热用圣济犀角地黄汤加柴胡一剂诸症渐退用四君加当归红花而愈

一小儿痘疮赤痛烦热作渴或便血?血先君用犀角地黄汤而血止又用紫草快癍汤而痛愈後疮?色白用四君黄芪当归而痊

一小儿?血右寸脉数此肺金有火也用泻白散而血止但四肢倦怠用益气汤而愈

一小儿痘痛赤色吐血发热此胃经热毒也先用圣济犀角地黄汤诸症渐愈又用五味异功散而痊

一小儿痘後?吐面色黄白因脾肺气虚弱用麦门冬散而愈後因劳?血发热痘?赤色用四君归芪而?血止用五味异功散而热退

一小儿痘後?血发热则?赤热止则?白此脾胃气虚也朝用补中益气汤加乾姜夕用五味异功散加当归而愈

一小儿痘後?血头运唇白恶心此中气虚而清阳不能上升也用补中益气汤加蔓荆子稍愈去蔓荆子又数剂而痊

一小儿痘後非?血即便血痘?赤白靡定手指冷热无常余谓此元气虚而无根之火倏往倏

来也朝用补中益气汤夕用五味异功散各二十余剂而愈後因劳心复发仍用前二药为主佐以十全大补汤而愈泻白散

桑白皮【炒】甘草 地骨皮

右每服二三钱水煎

人参竹叶汤治虚烦不得寐或兼自汗

人参 竹叶 甘草【各二钱】半夏【二钱五分】小麦 麦门冬【各一钱半】

右每服二三钱姜二片粳米一撮水煎服

八珍汤

十一味木香散【二方见顶陷灰白】

五味异功散

当归补血汤【二方见寒战咬牙】

紫草快癰汤【方见便血尿黑】

四君子汤【即六君子汤去陈皮半夏方见不瀉闷乱】

十全大补汤【方见腹胀气促】

痘烦躁

东垣云火入於心则烦入於肾则躁皆心火为之盖火旺则金烁水亏故心肾合而为躁也宜用梔子豆?汤凡痘疮盛作之时必令心火有所导引苟或毒气出而未尽遂生烦躁以生黑豆煎汤或生犀磨汁饮之亦可若津液不足虚烦不得卧者活人酸枣仁汤此症多因脾胃气虚或服克伐之剂所致但当调补中气为善一小儿患此饮冷不止或作胀痛余谓胃火所致用犀角地黄汤芹菜汁而顿愈

一小儿烦躁作渴饮冷不止先君谓脾胃热毒用犀角地黄汤而愈後复作喜饮热汤面目赤色用当归补血汤而痊惟倦怠少食用白术散而愈

一小儿贯脓之际烦躁不宁肝脾脉数用圣济犀角地黄汤一剂稍止用八珍汤加牡丹皮而

止又一剂浆渐贯却用内托散倍用参芪归术而靨

一小儿痘将贯脓烦躁面赤脉数大而虚此气血虚也先用参芪四圣散又用当归补血汤而愈

一小儿出痘烦躁作渴面赤口乾脉洪而大按之无力两尺为甚此稟肾不足陰虚而火动也用大剂地黄丸料加五味子煎与恣饮诸症顿减乃佐以补中益气汤二剂痘齐乃用参芪四圣散而靨

一小儿出痘烦躁作渴饮汤面目赤色脉数无力两尺为甚此稟足三陰虚也用益气汤及地黄丸料加五味子大剂始末服而靨

一男子出痘烦躁作渴虚症不能悉举先君用益气汤地黄丸料加五味子各三十余剂更用人参五筋煎汤代茶饮两月余而靨又用归芪参术各数斤半载始能步履得元气充实且慎调摄而痊

一小儿十五岁痘将愈而烦躁脉数而无力劳则益甚且无寐或惊悸余用归脾补中二汤渐愈後因劳仍作或用四物化痰之剂前症益甚更发热恶寒头运而歿一小儿痘愈後烦躁面赤脉洪大按之如无余谓血虚朝用补中汤夕用归脾汤将愈因饮食过多功课劳心吐泻腹痛头运恶寒反服藿香正气散发热如炙汗出如雨手足并冷而歿

活人酸枣仁汤治痘疹虚烦惊悸不得眠

酸枣仁【炒】甘草【炙】知母【炒】白茯苓 麦门冬【去心】川芎 乾姜【炒各三分】

右水煎服儿大倍之

梔子豆豉汤

山梔【四个】豆豉【半两】

右水二盏先煮梔子一盏内豆豉煎至七分去滓温服得快吐即止後服

当归六黄汤治血气不足虚火内动或烦躁盗汗不止当归 熟地黄
黄芪【炒】黄栢【已下俱炒黑】黄芩 黄连 生地黄

右每服三五钱水煎

八珍汤治气血俱虚或用克伐之剂脾胃虚损肌肉消瘦发热恶寒饮食少思等症【方见顶

陷灰白】

补中益气汤

当归补血汤【二方见寒战咬牙】

六味地黄汤【方见痘发热属陰阳】

圣济犀角地黄汤【方见顶陷心烦】

内托散【即托里散方见痘痛】

七味白术散【方见痘发热属陰阳】

痘腹痛

娄全善先生云痘腹痛多是热毒为患当临症消息之又云痘出腹痛或身痛脉洪数者用解毒凉药加芍药甘草窃谓前症若痘未出而发热烦躁或作渴饮冷大便坚实此热毒壅滞也用疏利之药若痘已出而不热躁不饮冷大便不实此元气虚弱也用白术散之类补之若暖腐吞酸大便秽臭乳食停滞也用保和丸消之凡腹痛作渴饮冷手足并热者属实热作渴饮汤手足并冷者属虚寒虚寒者当温补脾胃虚弱者当调补脾胃

一小儿善食作渴腹痛便秘痘?赤色先用加味四物汤而愈後仍痛恶食此脾胃受伤用白术散而痊一小儿痘将靨腹胀发热面赤午後益甚按其腹不痛余谓脾虚用五味异功散而痊

一小儿出痘腹痛大便似利寒热往来余以为脾气虚用白术散而痊

一小儿出痘腹痛作渴饮食如常光泽红活此胃经实热先用泻黄散一剂顿安又用白术散而痊

一小儿痘後腹痛作渴饮冷便秘用清凉饮末五分顿安後腹痛吐泻发搐用白术散加钩藤钩而愈

一小儿出痘腹痛暖腐吞酸此饮食停滞先用保和丸二服续用五味异功散而痛止又用托里散而靨人参理中汤治脾胃虚寒胸膈痞满或心腹疼痛痰逆呕吐少气或霍乱吐利手足厥冷不喜饮水加附子理中汤【名附子理中汤】

人参 白术 乾姜【炮各等分】 甘草【炒减半】

右每服三钱水煎或研末白汤调下

五味异功散治小儿诸般钩症角弓反张胸膈脐凸以透明没药为末姜汤调下

桔梗枳壳汤治气壅痞结腹脇疼痛

桔梗 枳壳【炒各一两】甘草【炙】

右每服二三钱姜水煎

七味白术散治肚腹作痛和胃气生津液若脾胃气虚作渴饮汤或因吐泻津液亏损烦渴引饮或脾胃气虚腹胀泻渴弄舌流涎手足指冷并宜服之以温补脾气化生津液【方见发热属陰阳】

保和丸治饮食停滞腹痛或恶寒发热不可多服神?【炒】山查 半夏 茯苓 陈皮【各一两】连翘萝卜子【各五钱】

右为末粥饭丸小豆大每服二三十丸白汤送下化服亦可加白术名大安丸

六君子汤治脾胃气虚肚腹作痛或吐泻不食或肺虚痰喘气促恶寒或肝虚惊搐眩暈自汗诸症并宜服即四君子汤加陈皮半夏【方见不瀝闷乱】

泻黄散【方见痘泻渴】

五味异功散【方见寒战咬牙】

圣济犀角地黄汤【方见顶陷心烦】

托里散【方见痘痛】

四物汤【方见痘疮出迟】

清凉饮【方见痘疮大便不通】

痘腰痛

经曰腰者肾之腑若痘疮而见前症者皆因肾经虚怯相火内燥真陰不能胜邪故腰作痛也急服地黄丸以防变黑归肾乃克有济大抵此痘因禀赋肾家精气不足故目睛多白俗谓之拆腰痘是也若平素面白眼白睛多行迟语迟者出痘必归肾经预为调补肾气庶免此患

一小儿十三岁眼睛多白或时面赤常患颈痛尺脉洪数先君谓禀肾气虚用地黄丸料煎服而愈至十五岁出痘先君云须多服前药仍用地黄丸益气汤更作倦怠乃以地黄丸大剂煎与恣饮又用大剂八瓊汤痘渐出如式恪服前药至暮岁二药计十七斤余而愈先君每见婴儿白睛多面色白或色赤令其预补脾肾以防出痘但信者少耳

一小儿出痘腰痛足热发渴此禀肾虚火动也先君用大剂加減八味丸料煎与恣饮诸症渐退佐以大剂八瓊加紫草糯米数剂脓渐贯仍用前药而结痂用八瓊汤而靨

一小儿出痘将愈因停食泄泻作渴腰痛此脾肾虚弱也先君用加減八味丸料及五味异功散渴泻顿止又与六味丸料及八瓊汤而靨

一小儿出痘愈後腰足作痛此禀足三陰虚也用六味丸料煎服及补中益气汤而愈後又伤食作泻腰痛用四神丸六味而愈

一小儿面色常白目睛多白时常腰痛两足时热冬不衣绵年九岁先君谓禀肾虚令每日服地黄丸至十岁出痘腰痛发渴面赤饮冷用地黄丸每剂加肉桂半钱煎与恣饮数剂之後热渴顿止腰痛顿愈却去肉桂仍与服之至五十余剂而靨

一小儿痘愈後腰痛口渴两足生疮饮水不絕此禀足三陰虚先君用地黄丸益气汤至毕姻後不慎起居复患瘰?以致不起

一小儿面素白发热作渴或面生疮先君谓肾虚用加味地黄丸补中益气汤而愈後出痘腰痛仍用前药而痊次年毕姻患肾痿而卒

加味地黄丸

熟地黄【酒浸蒸丸晒乾八两酒拌杵膏】山茱萸【肉】乾山药
五味子【炒各四两】泽泻 白茯苓 牡丹皮 鹿茸【炙各三两】肉桂【厚者去皮取肉一两发热者以此加之引虚火归肾经而热自止也】

右各另为末入地黄和匀量入米糊丸服煎服更好

六味地黄丸【方见发热属陰阳】

五味异功散

补中益气汤【二方见寒战咬牙】

八瓊汤【方见顶陷灰白】

八味丸【即六味丸加附子肉桂各一两方见痘作渴】

二神丸

四神丸【二方见痘作泻】

痘面青

闻人氏云痘疹属火症其面色赤者为顺甚者为热若肝木尅制脾土致面色青者为逆也急用四君升麻柴胡调补脾胃色正才治窃谓前症若伤食而呕吐搐搦脾气受伤而泻利搐搦或厥逆皆慢脾风之渐也用人参理中汤加柴胡钩藤钩治之或有少误多致不起若有痘毒内外鬱蒸发遇风寒相凝滞於肌肉遍身皮肤青色者用透肌散胃伤则生风呕吐脾伤则生风厥逆用五味异功散加天麻若疮密热盛便秘饮冷面赤者用犀角解毒散贯浆之後发热烦躁作渴面赤者用当归补血汤足热腰痛目睛赤者地黄丸皆要法也

一小儿痘疮红活起发因饮食过多吐泻腰痛唇面青色手足并冷此脾胃虚寒而受尅也先君用六君姜桂一剂前病不退痘色欠赤再剂加附子二分诸症顿退翌日用参芪四圣散二剂将愈更用八珍汤内参芪各五钱四剂而靨

一小儿出痘饮冷过多腹痛面青手足并冷此寒邪伤脾而虚寒也用附子理中汤一剂而痛止用人参一两姜一钱二剂而脓贯又用人参煎汤代茶与饮月余而靨

一小儿出痘面青腹痛手足并冷此脾气虚寒也先用五味异功散加木香肉桂又用内托散参芪四圣散贯脓痂靨

一小儿出痘面青腹痛手足并冷此脾土虚寒也先服益黄散末三钱再以六君木香而安又伤食作泻面青用五味异功散而痊

一小儿出痘面色青手足冷此寒水侮土非十二味异功散不能救不信乃服疏通之药歿而遍身皆青悔无及矣

六君子汤

四君子汤【二方见不靨闷乱】

人参理中汤【加附子名附子理中汤方见痘腹痛】

五味异功散

当归补血汤【二方见寒战咬牙】

内托散【即托里散方见痘痛】

十二味异功散【方见顶陷灰白】

参芪四圣散【方见腹胀气促】

六味地黄丸【方见发热属阴阳】

犀角地黄汤【方见顶陷心烦】

痘?赤白

痘?赤白各有所因治法亦异凡?赤而作痒血虚而有热也用四味牡丹皮赤而作痛余热也用四君连翘金银花若发热而大便调和者脾胃虚热也用五味异功散若发热而大便秘结者肠胃内热也用圣济犀角地黄汤若母有肝火用加味逍遥散若母有鬱怒用加味归脾汤佐以加味逍遥散治之?白者多属气虚而血衰也宜固元气为本痒而作渴者气血俱虚也十全大补汤之类乳食减少四肢倦怠者中气虚也五味异功散之类气虚发热者补中益气汤之类血虚发热者当归补血汤之类须参兼变之证治之此症若服药而渐红活者可治色不转者不治虽经年後多患泻痢而死若妄投攻伐祸在反掌

一小儿痘疮如期而愈?赤如赭余谓此乳母有热也诊之果有肝脾郁火先用加味逍遥散四剂与母服之子各饮少许而并愈

一小儿痘?色赤作痛热渴喜冷大便不利先用前胡枳壳散便利渴止再用圣济犀角地黄汤而安又用芹菜汁而靨

一小儿痘?色赤大便不利小便赤澀作渴饮冷此上焦实热也先君用泻黄散一剂顿愈又用济生犀角地黄汤及芹菜汁而痊

一小儿痘愈而?赤作痛内热作渴二便不利先君谓胃经热毒用济生犀角地黄汤及芹菜汁而痊

一小儿痘?色白时痛时痒作渴饮汤大便稀溏此脾胃虚热也用五味异功散加当归黄芪而痊

一小儿十六岁痘?白用独参汤数斤色渐如旧又用地黄丸大补汤而安

一小儿痘後因母怒?赤时或作痛先用加味小柴胡汤加味逍遥散治其母而愈

一小儿因乳母食膏粱之味痘?色赤用清胃散治其母而儿自愈

一小儿痘?色白作痒发热大便不实诸药不应余用五味异功散每剂用人参一两四剂之後其热稍退仍用前药兼服四神丸而愈

一小儿痘?白色时或作痒先君谓气血俱虚不信反服解毒之药後变慢脾风而歿

一男子患此色白作痒搔破脓水淋漓恶寒体倦余谓脾肺气虚不信反祛风败毒果发搐而死

一小儿患此恶寒发热或痒或痛或白或赤余谓气血俱虚不悟反降火祛风发瘥而死

一小儿痘?色白服尅伐之剂致泻不止余谓此脾气下陷也不信果歿遍身如白傅粉信气虚矣

葛花解醒汤治乳母酒醉後乳儿遗热为患

白豆?砂仁 葛花【各五钱】乾生姜 白术【炒】 神麴【炒黄】 泽泻【各二分】 白茯苓 陈皮 人参 猪苓 木香【各五分】 青皮【三分】

右为末每二钱白汤调服

四顺清凉饮治血脉壅实臟腑蓄热颊赤作渴五心烦热睡卧不安四肢惊掣或头面生疮目赤咽痛痘疹余毒【方见大便不通】

四君子汤【方见不瀯闷乱】

加味逍遥散【方见痘潮热】

独参汤

十全大补汤【二方见腹胀气促】

四物汤【方见痘出迟】

犀角地黄汤【即圣济犀角地黄汤方见顶陷心烦】

前胡枳殼汤【方见痘涕唾】

泻黄汤【方见痘泻渴】

六味地黄丸【方见发热属陰阳】

五味异功散【方见寒战咬牙】

圣济归脾汤

清胃散【二方见痘痛】

痘瘡

王海藏先生云痘疹初出後声音洪亮形病而气不病也痘疹未发声音不出形不病而气病也痘疹既发声音不出形气俱病也宜用八风汤或凉膈散去硝黄主之窃谓前症若心火上炎刑烁肺金者宜用人参平肺散若津液不足虚火薰蒸者宜用六味地黄丸凡小儿面素白善哭足热腰痛或解颅面白黑睛淡者出肾虚痘面青善怒或两颐赤者出肝脾虚也盖邪之所凑其气必虚当预为调补若在乳下尤当补其母及慎饮食起居为善此余之亲验者也

一小儿仲冬出痘呻吟烦躁焮痛作渴音哑便实先君谓心肺实热之症令急与水饮之遂恣啜始定大便稍和更食梨子数枚得生夫梨者利也能令人作泻今食之而安乃内有实热而应用也

一小儿痘愈而声瘖面赤足心发热小便赤少先君谓肾经虚热用地黄丸益气汤而愈其时患是症者用清热解毒之药俱致不起

一小儿痘愈而声瘖面白两睛多白两足发热作渴饮汤脉浮数左尺更数而无力余谓禀肾经陰虚朝用益气汤夕用地黄丸加五味子两月余声渐出又服两月余而愈

一小儿出痘声瘖脉息如前余用前药治之声渐复清又饮食过多泄泻复瘖朝用益气汤夕用异功散地黄丸声始如旧

一小儿痘後声瘖半载以为废人余询之但云头运其声即瘖脉浮而缓按之不及两寸此中气虚不能上接清阳之气耳用补中益气汤地黄丸俱加五味子不半载声音渐复

一男子痘後患瘖恶寒体倦劳则头运余谓元气虚而不能上升不信乃服清痰降火之药而歿

一小儿十四岁痘後劳而喉瘖头运脉洪数而无力恶寒发热大便欲去而不去余谓元气下陷也宜用益气汤不悟乃杂用疏导之药泄泻不止而歿

八风散【即八风汤】

藿香【半两去土】白芷【一两】前胡【去芦一两】黄芪【二两】甘草【炙二两】人参【二两】羌活【三两】防风【三两】

右为末每服入薄荷少许煎汤调服

凉膈散【方见痘疮焮裂】

人参平肺散治心火尅肺金而声瘖【方见顶陷心烦】

六味地黄丸治肾虚声瘖【方见发热属陰阳】

补中益气汤治中气不足不能上接清阳之气而瘖五味异功散【二方见寒战咬牙】

痘疮痛

王海藏先生云痘疮出而烦痛用木香五物主之更用芒硝为末以猪胆汁调敷之若身後痛属膀胱经也用羌活荆芥甘草汤身前痛属肺经也用升麻葛根紫草汤身侧痛属胆经也用连翘防风汤四肢痛属胃经也用防风芍药甘草汤以急止之盖恐叫号伤气忍痛伤血而变症也若热毒盛者用东垣消毒散或仙方活命饮食鷄鱼蒲萄酒物者用东垣清胃散生犀汁若发热饮冷大便调和用四物连翘牡丹皮若发热饮冷大便秘结脾胃实热也用清凉饮若发热作渴饮汤者脾胃虚热也用七味白术散大凡痘切不可食毒物恐作痛致伤元气轻者反重重者难治大人亦然

一小儿痘疮作痛色赤饮冷此热毒炽盛也用活命饮末二服痛止用东垣消毒散一服诸症悉退而瘥若非此药必作疔毒之类

一小儿痘焮痛出血诊其母有肝火用小柴胡汤加山梔生地母子服之顿愈又用加味逍遥散而瘥

一小儿痘痛不止色淡欲陷此痛伤元气也先用仙方活命饮一剂而痛止用八珍汤而靨

一妇人时疫将愈出痘发热体倦痛甚昏愦饮汤脉洪数按之如丝用十全大补汤调朱砂末一钱二剂其痛顿止食进体健仍用前汤十余剂而愈

一男子痘疮痛甚先用仙方活命饮一剂其痛顿止又用东垣消毒散一剂精神如常而靨

一小儿痘疮痛甚脉有力此邪气实也用活命饮末二钱痛止起发又用东垣消毒散而靨

一小儿痘赤痛用活命饮末二钱痛止用当归黄芪金银花将愈用四君当归芍药而靨

一小儿痘赤痛发热饮冷大便不通脉洪数而有力用活命饮加大黄一服痛赤顿减更用东垣消毒散一服如期而愈

一小儿痘疮红活焮痛作渴饮冷手足并热余谓此痘属形病俱实非清热解毒不能杀其势当用活命饮化癰汤不信另服鼠粘子汤痘焮胀大其色如赭先用前药二剂肿痛悉止乃用鼠粘子汤而愈

一小儿痘疮焮痛服鼠粘子汤之类患痘疔三枚甚苦用隔蒜灸服活命饮痛止贯脓又用东垣消毒散而靨一小儿遍身发热两足尤甚作渴饮汤脉洪数而无力此禀肾经虚热也用地黄丸料加当归黄芪大剂煎与恣饮三日服数剂热渴全止又数剂而愈

一小儿痘疮热痛服败毒药四肢患痘痈寒热发渴余谓当补元气不信果歿

木香五物汤治出痘烦痛

青木香【四两】丁香【一两】薰陆香 白矾【各一两】麝香【一钱】

右每服五钱水煎热盛加犀角一两施银台常用此方其效如神

鼠粘子汤治痘疮欲出未透皮肤发热眼赤心烦咽痛不利等症【减地骨防风名消毒散】

鼠粘子【四钱炒杵】荆芥【二钱】甘草 防风【五分】地骨皮【一钱】

右为末每服一二钱白汤调下

仙方活命饮治痘疮焮痛热盛者服之顿衰势弱者服之顿愈真圣药也

东垣清胃散

托里消毒散【二方见痘痈】

东垣消毒散【方见灸疹痘一名救苦汤】

射干鼠粘子汤【方见痘咽痛】

羌活荆芥甘草汤【即此三味等分】

柴胡山栀连翘防风汤【即此四味等分】

连翘防风汤【方见痘疗】

防风芍药甘草汤【即此三味等分】

化癍汤【方见水痘麻痘】

清凉饮

消毒散【二方见大便不通】

四圣散【方见痘出不快】

犀角消毒散

隔蒜灸法【二方见痘疗】

痘身疼

经云痒则为虚痛则为实内快外痛为外实内虚外快内痛为内实外虚今痘疮身痛者是肤厚理密或外寒相?或热毒内作或血虚不能荣养若热毒而血瘀者先用活命饮次用东垣消毒散血虚而瘀者用四物汤之类遍身嚙而色黑者毒气壅滞而血凝也乃是危症若二便秘结喘急烦躁用栀子仁汤或猪尾膏血调片脑治之自利不食者不治

一小儿痘未发遍身作痛余谓热毒势盛先用仙方活命饮一剂痛缓痘出用东垣消毒散一剂未用四圣散而靨

一小儿痘未出透遍身作痛此热毒鬱滞而未尽发於外也先用活命饮一剂而痛愈用参芪四圣散而结靨一小儿痘疮遍身作痛用东垣消毒散而痛愈用紫草快癍汤而脓贯用托里散而愈

一小儿痘痈肢体作痛发热恶寒此气虚而寒邪客于表也用人参羌活散而表解用参芪四圣散而起发用参芪内托散而脓溃

一妊妇发热作渴遍身疼痛用活命饮二剂诸症稍愈形气甚倦用紫草木香散痘出少许用白术散贯脓而愈

一男子出痘根窠赤痛发热作渴痘裂出血肝火炽也用小柴胡汤加生地犀角诸症顿减又用圣济犀角地黄汤而结痂

黄芪六一汤治痘疮气虚作渴愈後作渴尤宜服之

黄芪【炙六钱】甘草【炙一钱】

右水煎服

参芪四圣散

参芪内托散治痘疮疼痛或里虚发痒或不溃脓或为倒靨等症【二方见寒战咬牙】

小柴胡汤【加牡丹皮生地黄即加味小柴胡汤】治发热恶风身痛或四肢劲强寒热往来【方见癰症】

紫草快癰汤【方见便出血或黑屎】

七味白术散【方见发热属陰阳】

四物汤【方见痘出迟】

八珍汤

圣济犀角地黄汤【二方见顶陷心烦】

仙方活命饮

托里散

东垣消毒散【三方见夹疹痘】

五苓散【方见小便不利】

制附子法

将附子重一两三四钱有莲花瓣头圆底平者先备童便五六碗将附子放在竈上热处或炭火烘炙乘热投童便中浸五七日候润透揭去皮切四块用粗纸湿裹数层埋灰火中煨候熟取出切片如有白星瓦上炙至无星为度如急用切大片用热瓦炙热亦可

薛氏医案卷七十三

卷七十四

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷七十四

明 薛己 订

外科精要上

疗发背痈疽灸法用药第一

经云诸痛痒疮疡皆属心火前辈又谓痈疽多生於丹石房劳之人凡人年四十已上患发背等疮宜安心早治此症如虎入室御而不善必至伤人宜先用内托散次用五香连翘汤更以骑竹马法或隔蒜灸并明灸足三里以发泄其毒盖邪之所凑其气必虚留而不去其病乃实故痈疽未溃臟腑畜毒一毫热药断不可用痈疽已溃臟腑既亏一毫冷药亦不可用犹宜忌用敷贴之药闭其毫孔若热渴便秘脉沉实洪数宜用大黄等药以泄其毒後国老膏万金散黄矾丸远志酒之类选而用之

愚按前症若热毒蕴於内大便秘结元气无亏者宜用大黄等药泄其热毒若陰虚阳凑精虚气节脾胃虚弱者宜用甘温之剂培其本源若疮不焮肿不作脓者虽未溃仍须温补若疮已溃而肿不退痛不止者仍宜清凉之剂治之若病急而元气实者先治其标病缓而元气虚者先治其本或病急而元气更虚者必先治本而兼以治标大抵肿高焮痛脓水稠粘者元气未损也治之则易漫肿微痛脓水清稀者元气虚弱也治之则难不肿不痛或漫肿黯不溃者发於陰也元气虚甚理所不治若肿高焮痛者先用仙方活命饮後用托里消毒散漫肿微痛者宜托里散如不应加姜桂若脓出而反痛气血虚也八珍散不作脓不腐溃阳气虚也四君加归芪肉桂不生肌不收敛脾气虚也十全大补加姜桂晡热内热陰血虚也四物加参术欲呕作呕胃气虚也六君加炮姜自汗盗汗五臟虚也六味丸加五味子食少体倦脾气虚也补中益气加茯苓半夏喘促咳 脾肺虚也前汤加麦门五味欲呕少食脾胃虚也人参理中汤腹痛泄泻脾胃虚寒也附子理中汤小腹痞足胫肿脾肾虚弱也十全大补加山茱山药肉桂泄泻足冷脾肾虚寒也前药加桂附热渴淋闭肾虚陰火也加減八味丸喘 淋闭肺肾虚火也补中益气汤加減八味丸凡此变症皆因元气亏损失於预补所致故丹溪先生云但见肿痛参之脉症虚弱便与滋补气血无亏可保终吉旨哉斯言盖古今虚实不同因时施治不无少异是集治论义悉类此

附治验

上林陈静 面患疔脉洪数有力属邪气蕴结余用清热消毒散二剂未应或用黄蓍肉桂等药二剂反益其势致耳目唇口俱肿闭头面如斗由邪气外实也前脉按之无力由元气内虚也连进托里消毒之药及数砭患处出黑血碗许已而脓与腐肉并溃而出复用托里之药疮势渐愈七日後复因调护失宜以致烦渴不食两尺脉如丝欲絶急用八味丸料煎服其脉顿复手足自温使非砭以泄其外托里散以补其内八味丸以回其阳则治之失宜必致不救慎之慎之

宪副陈鲁山居官勤苦劳伤元气背患疽漫肿中央色黯四畔微赤微痛脉浮大按之微细左寸短而右寸若无十余日肿未全起此病气元虚寒朝用参蓍姜桂归术陈皮半夏炙草温补其阳夕用加减八味丸滋其肝肾各四剂而腐溃但脓水清稀盗汗自汗内热晡热脉浮而数改用八珍汤复发热而夜阳举此肾虚而火动仍用加减八味丸料煎服而安又因怒动肝火疮出鲜血二盏许左关弦数右关弦弱此肝木侮脾以致肝不能藏血脾不能统血用十全大补兼前药各二剂而血止再用前药调理而痊一武职患脑疽内溃热渴头面肿胀如斗胸背色焮如涂丹烦热便秘此表里俱实若非苦寒之剂内疏外泄不救遂针周项出脓及用清凉饮一剂内大黄用五钱再用消毒散而愈

节推王器之背患疽疮头如黍焮痛背重脉沉而实此毒在内服黄连内疏汤二剂少退更与仙方活命饮而愈

举人刘华甫焮肿作痛脉浮而数此毒蓄於经络用内托复煎散二剂而焮肿减用仙方活命饮四剂而肿痛止更用托里药而痊

一儒者患背疽肿焮痛甚此热毒蕴结而炽盛用隔蒜灸而痛止服仙方活命饮而肿消更与托里药而溃愈

一男子背患疽腐肉虽溃而新肉不生此毒气解而脾胃之气虚也用六君子加芎归五味黄芪渐愈用十全大补汤全愈

一男子背患疽肉腐脓清肌肉不生此邪去而气血俱虚也用十全大补汤月余而敛

一男子背患疽肿痛赤晕尺余背如负石其势当峻攻其脉又不宜遂砭赤处出紫血碗许肿痛顿退更用神功散及仙方活命饮二剂疮口及砭处出血水而消

儒者周在鲁怀抱久鬱背脊患疽肝脉弦洪脾脉浮大按之微细以补中益气加桔梗贝母少用银花白芷二剂肝脉顿退脾脉顿复乃以活命饮二剂脓溃肿消肝脉仍弦此毒虽去而胃气复伤仍用前汤加半夏茯苓而愈用银花白芷非为治疮乃解患者之疑耳

痈疽备论第二

初虞世云凡痈疽始作须以大黄等药亟转利之勿以困苦为念若与其溃烂而死不若利之而死况有生道哉古人立法率用五香连翘漏芦等药贫乏者单煎大黄汤以利之至於脓溃乃服黄芪等药以排脓千金外台备矣世以疮发於外不行转利而死者多矣悲夫愚按前症若肿高焮痛臟腑闭结属内外俱实当用前药泻之若漫肿微痛臟腑不实属内外俱虚当用内托补之若患肿无头肉色不变当助胃壮气令其内消若疼痛不止焮肿不消当用人参黄芪散以托里排脓若饮食少思肌肉不生当用参芪托里散以补养脾胃丹溪云痈疽因积毒在臟腑当先助胃壮气使根本坚固次以行经活血药佐之参以经络时令使毒气外泄治之早者可以内消此内托之旨也又云肿疡内外皆壅宜以托里表散为主如用大黄宁无孟浪之非溃疡内外皆虚宜以补接为主如用香散未免虚虚之失此盖古今气禀不同治宜审之

痈疽灸法论第三

陈无择云痈则皮薄肿高疽则皮厚肿坚初发并宜灼艾惟痈脓成则宜针疽脓成则宜烙当审察其症疏利其毒补托其里然痈疽冠於杂病之首治失次序多致枉夭故集得效灸法以贻学者庶不致妄投也

愚按前症若发热烦渴大便秘结者由邪蓄於内宜黄连内疏汤以泄内毒若头痛拘急发热恶寒者由邪客於外宜人参败毒散以散表邪若肿痛焮赤发热作渴此毒气凝於肉里宜仙方活命饮解散其毒若食少体倦发热恶寒此中气虚弱宜六君子汤以补脾胃

骑竹马灸法第四

治一切疮疡即用此法无有不愈其法令病人以肘凭几竖臂腕要直用一条自臂腕中曲处横纹男左女右贴肉量起有至中指尖尽处截断为则不量指甲却用竹杠一条令病人脱衣正身骑定前後用两人扛起令病人脚不着地又令二人扶之勿令伛偻却将前所量臂从竹杠坐处尾骶骨尽处直贴脊背量至尽处为则用墨笔点定此只是取中非灸穴也却用薄纸作则子量病人中指节相去两横纹为则男左女右截为一则就前所点记处两边各量一则尽处即是灸穴两穴各灸五七壮疽发於左则灸右疽发於右则灸左甚则左右皆灸盖此二穴心脉所过之处凡痈疽皆心火留滞之毒灸此则心火流通而毒散矣起死回生之功屡试屡验

愚按前症若毒既解而肌肉不生当求其属而补之

第三图

先令病人脱去衣服以大竹杠一条跨定令两人徐徐扛起足要离地五寸许两傍更以两人扶定毋令摇动不稳却以第一图则子贴定竹杠从尾闾起贴脊背量至则子尽以墨点定记之非灸穴也此是取中穴止处却以第二图取同身寸则取两寸平摺自中穴量之以中分取两傍各一寸方是灸穴也

论隔蒜灸得效第五

李氏云治疽之法灼艾之功胜於用药盖使毒气外泄譬诸盗入人家当开户逐之不然则入室为害矣凡疮初发一二日须用大颗独蒜切片三分厚贴疽顶以艾隔蒜灸之每三壮易蒜痛者灸令不痛不痛者灸之令痛疮溃则贴神异膏如此则疮不开大肉不败坏疮口易敛一举三得此法之妙人所罕知若头项见疽则不可用此法【五府极观碑载】

愚谓疮疡之症有诸中必形诸外在外者引而拔之在内者疎而下之苟或毒气鬱结瘀血凝滞轻者药可解散重者药无全功是以灼艾之功为大凡灸法未溃则拔引鬱毒已溃则补接阳气每治四肢患疮气血无亏者只以前法灸之皆愈若中气虚弱不灸而服败毒之药复伤中气未有不败者也其头项患者亦宜灸之但艾炷宜小而少其壮数为善

背疽肿漫寻头灸法第六

李氏云凡患背疽漫肿无头者用湿纸贴肿处但一点先乾处乃是疮头可用大蒜十颗淡鼓半合乳香钱许研烂置疮上铺艾灸之痛否皆以前法为度

愚按前症或附骨疽及臀腿诸毒初起未明者寻头用灸多自内消其毒炽盛更服活命饮其功尤捷若气血虚弱必以补托为主若背疽大溃欲验穿透内膜者不可用皂角取 法但以纸封患处令病者用意呼吸如纸不动者未穿透也倘用取 鼓动内膜反致穿透慎之慎之

蒜饼施用分其轻重第七

伍氏曰凡用蒜饼灸者盖蒜味辛温有毒主散痈疽假火势以行药力有只用艾炷灸者此可施於顽疽痼发之类凡赤肿紫黑毒甚者须以蒜艾同灸为妙

愚按前法诚有回生之功若顽疮痼疾脾胃虚弱营气不能滋养患处以致寒邪内袭而不愈宜用小艾炷频灸疮口以祛寒邪补接营气其内补之法说见首论及三十二论

灸法要论第八

伍氏方论曰夫痈疽发背皆有所因前篇言之详矣凡初觉赤肿先从背脊骨第二陷中两傍相去同身寸各一寸五分名热腑穴二处各灸七壮此能疏泄诸阳热气永无痈疽之苦或隔蒜灸不论壮数则邪无所容而真气不损但头项见疮宜用骑竹马法及足三里灸之愚按前论诚为良策其调理之法当求首论中

史氏引证

甲戌年疡医常器之诊太学史氏之母云内有蓄热防其作疽至辛巳六月果背脾微痒疮粒

如黍灼艾即消隔宿复作用膏药覆之晕开六寸许痛不可胜归咎於艾适遇一僧自云病疮甚危尝灸八百余壮方苏遂用大艾壮如银杏者灸疮头及四傍各数壮痛止至三十余壮赤晕悉退又以艾作团如梅杏大者四十壮乃食粥安寝疮突四寸小窍百许患肉俱坏而愈

愚按灼艾之法必使痛者不痛不痛者痛则其毒随火而散否则非徒无益而又害之

附治验

秋官高竹真患背疽色黯坚硬重如负石神思昏愤可畏其亲廷评郑沙村请同往治郑云竹真先任湖广某县时以某河涉险不便竹真为整治有功其民为立生祠凡渡河者无不祷祭竹真患此悉疑立祠致祟余曰不然病因元气虚寒积毒炽盛所致遂以杵蒜摊患处用钱大艾炷灸二十余壮尚不知乃摊蒜补艾灸亦不知乃着肉灸良久方知再灸方痛内服参附大补之剂而起

痈疽灼艾痛痒论第九

伍氏曰凡治痈疽发背疔疮不痛者必灸使痛痛者必灸使不痛若初灸即痛者由毒气轻浅灸而不痛者乃毒气深重悉宜内服追毒排脓外传消毒之药大抵痈疽不可不痛又不可大痛闷乱不知痛者难治

愚按前论惟疔疮一症其状不一其色不同或如小疮或如水泡或作痛或麻木或有红丝或寒热头疼或呕吐恶心或肢体拘急其候多端非前灸法并解毒之剂卒难济事若不省人事或牙关紧急者即以夺命丹为末灌之若生两足多有红丝至脐生于两手多有红丝至心生于唇面多有红丝入喉俱难治若针其红丝出血多有生者若患於肢末之处毒愈凝滞药难导达艾灸之功为大如妄服疏利之剂耗损真气不惟无以去毒而害反随之矣

附治验

操江都宪张恒山左足次指患之痛不可忍急隔蒜灸三十余壮即能举步彼欲速愈自敷凉药遂致血凝肉死毒气复炽再灸百壮服活命饮出紫血其毒方解脚底通溃腐筋烂肉甚多将愈予因考绩北上又误用生肌药反助其毒使元气亏损疮口难敛予回用托里药补之喜其稟实且客处至三月余方瘥表甥居富右手小指患之或用针出血敷以凉药掌指肿三四倍六脉洪大此真气夺则虚邪气胜则实也先以夺命丹一服活命饮二剂势稍缓余因他往或又遍刺出血肿延臂腕如大瓠手指肿大数倍不能消溃乃真气愈虚邪气愈盛余回用大剂参芪归术之类及频灸遍手肿势渐消後大便不实时常泄气此元气下陷以补中益气汤加补骨脂肉豆蔻吴茱萸五味子又以生脉散代茶饮大便渐实手背渐溃又用大补药五十余服渐愈

一男子唇患之有紫脉自疮延至口内余曰此脉过喉则难治矣须针紫脉并疮头出恶血以

泄其毒则可不信乃别用解毒之剂头面俱肿复请治脉洪数按之全无恶症悉具余曰无能为也彼求治甚笃时口内肿胀针不能入为砭肿处出血势虽少退终至不起

脑疽灸法第十

李氏云脑疽及胫项有疽不可用隔蒜灸恐引毒上攻宜灸足三里穴五壮气海穴三七壮仍服凉血化毒之药或以骑竹马穴法灸之凡头项咽喉生疽古法皆为不治若用此法多有生者加五香连翘漏芦等汤国老膏万金散皆可选用

愚按前症属膀胱经或湿热上壅或陰火上炎若因湿热则病气有余元气不足当用黄连消毒散以除湿毒用补中益气汤以滋化源若因陰火则元气病气俱不足当用补中益气汤及六味地黄丸以滋肾水若肾水乾涸中传未症急用加减八味丸及补中益气汤以固根本引火归源若色黯不溃或溃而不敛名曰脑烁不治大凡肿焮痛甚宜活命饮隔蒜灸之解散瘀血拔引鬱毒但艾炷宜小而少若欲其成脓腐溃生肌收敛并用托里为主

附治验

一妇人患头项俱肿痛不可当发热作渴喜冷内服清热外敷寒凉色黯不焮胸中气噎此阳气虚寒彼泥素有痰火不受温补余用参芪各五钱姜桂各二钱一剂肿顿起而溃又用大补药而愈凡疮疽肿高痛甚烦渴饮冷此病气元气俱有余宜用清热消毒散仙方活命饮为主若肿高痛甚口乾饮热此病气有余元气不足宜用托里消毒散参芪四补散为主若漫肿微痛食少体倦此病气元气俱不足宜用六君补中二汤壮其脾胃则未成者消已成者溃已溃者敛矣

儒者胡本中之内冬患之肿痛热渴脉洪数实用清热消毒之药溃脓而愈次年三月其舌肿大遍身患紫疔如葡萄不计其数手足尤多各刺出黑血此脾胃受毒先服夺命丹七粒出臭汗疮热益甚便秘二日与大黄芩连各三钱升麻白芷山梔薄荷连翘各二钱生甘草一钱水煎三五沸服之大小便出臭血甚多下体稍退乃磨入犀角汁再服舌本及齿缝出臭血诸毒顿消更用犀角地黄汤而愈

痈疽既灸服药护臟腑论第十一

李氏云背疽之方虽多得效者殊少今择用验者錄之庶不致误人如护心散凡有疽疾早进数服使毒气外出而无呕吐之患否则咽喉口舌生疮或黑烂如茵若疮发四五日之後宜间用别药治之

愚按护心散乃解金石发疽之药若发热焮肿作渴饮冷而呕者宜用若发热焮肿作渴饮汤而呕者不宜用若脾虚停痰或寒邪内侵或痛伤脾胃宜用六君子汤若喉舌生疮或口乾作渴或小便频数宜用六味丸大凡诸疮作呕若饮冷便秘是热毒也黄连消毒散解之饮冷便

和是胃火也竹叶石膏汤清之懒食饮汤是胃虚也补中益气汤以补之大便不实喜饮热汤是脾胃虚寒也六君加炮姜以温之常见脾胃虚弱者用前散反心间陰冷无不致呕其喉舌生疮乃肾水枯涸虚火炎上其症甚恶急用加减八味丸亦有得生者

附治验

通府张廷仪背患痈作呕焮痛大便秘结口乾作渴此内蕴热毒用竹叶石膏汤二剂诸症顿退用托里消毒散四畔肿消用仙方活命饮疮亦寻愈

上舍李通甫腿患疮作痛少食作呕恶寒余以为痛伤胃气用六君子汤加当归四剂疼痛少止饮食加进又以十宣散加白术茯苓陈皮数剂脓成针而出之又以前散去防风白芷数剂而痊

举人边云衢腋下患毒呕逆不食肠鸣切痛四肢厥冷脉沉而细余谓中气不足寒邪内淫用托里温中汤一剂顿愈更以香砂六君子治之彼谓肿疡时呕当作毒气攻心治之溃疡时呕当作陰虚补之余曰此丹溪大槩之言也即诸痛痒疮皆属心火之意假如赤肿痛甚烦躁脉实而呕为有余法当下之肿硬不痛不溃脉弱而呕为不足法当补之亦有痛伤胃气或感寒邪秽气而作呕者虽肿疡尤当助胃壮气彼执不信用攻伐之药病愈甚复请诊其脉微细而发热余谓热而脉静脱血脉实汗後脉躁者皆难治後果歿

护心散

菉豆末【一两】明乳香【细研半两】

右煎生甘草汤调时时服之令药常在膈间

五香连翘汤

乳香 木香 沉香 丁香 连翘 射干 升麻 黄芪 木通 独活 桑寄生 甘草【各三分】

右水煎服

愚按是方说见前论

凡痈疽不可用生肌敛口之药合用麦饭石膏疮口自敛或因毒药或为刀割重者兼服沉麝汤

愚按前云凡疮不可用收口药者恐毒气未尽反助其恶盖肌肉脾之所主但托里健脾则余毒自解疮口自合若毒发於外气血无亏麦饭石膏亦可倚仗若元气亏损必当补助其脾禁

用刀针说见第四十三

沉麝汤

木香 麝香 沉香 藿香 乳香 连翘【各等分】

右每服二钱水煎

五香去大黄加人参黄芪犀角汤

木香 沉香 乳香 丁香【各五钱】粉草
人参【各四钱】黄芪【一两】犀角末【二钱】麝香【一钱】

右每服四钱水煎

漏芦汤

黄芪 甘草 连翘 沉香 漏芦【各半两】大黄【一两微炒】

右每服二钱姜枣水煎

愚按三方详见首论其敛口之法附见第三十三

柞木饮子治一切痈疽未成自消已成自溃甚效乾柞叶【四两】萱草根 荷叶蒂 甘草节
地榆【各一两】

右每服五钱水煎一碗作二剂早晚进

愚按荷叶蒂去恶血萱草解毒柞叶善祛逐地榆甘草节清血消毒

阿胶饮子治一切痈疽疔毒

牛胶【剉蛤粉炒如珠】粉草【各一两】橘红【半两】

右作三剂水煎服

牛胶饮截治痈疽毒不内攻不传恶症有益无损

牛皮胶【用明者四两】

右用酒一碗重汤煮化服加酒至醉不能饮加白汤愚按二饮消毒殊有良验

神仙黄矾丸服至一两以上最止疼痛不动臟腑

白矾【一两明亮者研】黄蜡【五钱黄色者熔开一方用七钱】

右丸桐子大每服十丸渐加至二十丸熟水或温酒送下未破内消已破自合如服金石所致
更用矾末一两徐以温酒送下有人遍身生疮其状如蛇头服此即效但日服百粒方能御毒
不致内攻又治蛇咬熔矾热滴伤处痛即止毒即出

愚按前法果有良验余常以白矾三钱为末糊丸以葱汤连进二服其功尤速故名千金化毒
汤本用矾末葱汤调下因末难服故作为丸此药解金石固臟腑有益无损用力少而成功多
偏僻之处不可不知

国老膏治一切痈疽预服消肿逐毒其功不能尽述

粉草

右以河水浸二宿揉取汁砂器煎膏服一二匙无灰酒或白汤下最解丹毒

愚按前方诚为解毒之剂但元气虚弱者当深戒之

万金散治一切痈疽已溃未溃者

括萎【一个杵细】大甘草节【二钱】没药【一钱研末】

右用酒二碗煎一碗去查入没药服

愚按前散有消毒破血之功无腐溃生肌之力

远志酒治一切痈疽因忧怒气滞所致

远志【米泔浸洗去土去心】

右为末每服三钱酒一盏调和澄清饮之祖傳患处愚按远志酒诚有解郁消毒之功而无托
里补益之效

忍冬酒治一切痈疽甚效仍以麦饭神异二膏傳贴

忍冬藤【生取五两】大甘草节【一两】

右用水二碗煎一碗入无灰好酒一碗再煎数沸去渣分三服一昼夜用尽病重昼夜两剂至大小便通利为度【另用忍冬藤一把烂研入酒少许傅四围】

又水莲四十九片握去毛研细酒解温服其功与忍冬草同

又龙鳞薜荔一握细研以酒解汁温服利恶物为妙红内消用水砂器煎熟入酒与药相半再煎数沸去渣时时服之查焙为末酒糊丸桐子大每服三十丸空心温酒下为常服之盖力轻故也药产建昌者良

愚按前三药因其简易解毒而用之略无内托之功也若毒既去而真气虚者必须补托以收全功

马益卿先生痈疽论第十二

论曰夫人有四肢五臟一觉一寐呼吸吐纳精气往来流而为荣卫畅而为气色发而为声音阳用其形陰用其精此又常数之所同也至其失也蒸则生热否则生寒结而为瘤赘陷而为痈疽凝而为疮癰愤则结癰怒则结疽又五臟不和则九窍不通六气不和则流结为痈皆经络澁滯气血不流畅风毒乘之而致然也愚按此论可谓善言人身之造化疮疡之情状者矣治法当参详前论

痈疽叙论第十三

论曰痈疽之症若七情亏损气血经络壅结而成者属内因若六淫外侵气血受伤寒化而为痈者属外因若服丹石补药膏粱酒麪房劳所致者属内外因也又曰陰滯於阳则发痈阳滯於陰则发疽脉浮洪滑数为阳沉缓迟濇为陰陰则热治阳则冷治初觉宜清热拔毒已溃宜排脓止痛故用远志大黄甘草此三因之法也治当寒者温之热者清之虚者补之实者泻之导之以针石灼之以艾炷破毒溃坚各遵成法以平为期愚按前症脉沉实大便秘结者属内因也宜疏利之脉浮大便调和者属外因也宜托里之脉不浮不沉者属不内外因也宜调和荣卫此亦治三因法也若焮肿大痛烦热饮冷大便秘结脉洪数实者为纯阳宜苦寒之剂清热拔毒若不肿不痛泻利不食呕吐足冷是为纯陰宜辛热之剂大补阳气【不拘严寒盛暑当舍时从】症若微肿微痛似溃不溃时出清脓者为半陰半阳宜辛热之剂温补胃气此亦治陰阳症法也治验详见首论

素问良用要论第十四

素问云阳气凑袭寒化为热热甚则肉腐为脓凡发背多因服金石而发者有因上伐曾服而发者其候多发於脾起如粟或痛或痒多致不救外面如拳【古人云外面如麻里面如瓜】

有数十孔以手按之诸孔出脓寻时失瘡凡有此症可用净土水调量大小作饼厚分许以艾炷灸之内服五香连翘汤及鉄浆醋调蚌殼灰涂之更以骑竹马法灸之甚良

愚按前症仍参首论主治恐其表里热毒之不同元气虚实之不一也

千金良用备要方论第十五

千金云痈疽始作或大痛或小痛或发如米粒即便出脓宜急断口味利去其毒用骑竹马灸法或就患处灼艾重者四面中央总灸一二百壮更贴寒药其效甚速愚按前症若因元气亏损或因气血相滞而患者更当调补其内

别脉辨症论第十六

伍氏云痈疽之疾有二十余症燔发痼发石发岩发蜂巢发莲子发椒眼发连珠发竟体发有肠痈内发脑背发眉发颧颌发肺痈瓜瓠发大率随病浅深内外施治不可迟缓初发如伤寒脉浮而紧是其候也

愚按前症其名虽殊处治之法详具各论其肺痈胃脘痈别载外科枢要

痈疽脉症第十七

陈无择云痈疽脉数身无热反洒淅恶寒若有痛处乃发为痈以手掩上若热者为有脓不热者为无脓若脉不数不热而疼者发於陰也尤为恶症凡热甚脉数用漏芦散并单煮大黄等汤不甚热脉缓弱投五香连翘汤仍依四节八事次序三因以药之无有不济者也愚按前症洒淅恶寒有属疮之表邪者有属脾肺之气虚者若溃後焮肿作痛恶寒发热烦渴脉数乃真气虚而邪气实也仍参详首论主之

治痈疽用药大纲第十八

李氏云余之所着方论靡不周备但欲使治者一玩味次第用之无有不效今略书用药要领节次于後一初患痈疽便服内托散以免後來口舌生疮仍用骑竹马或隔灸

一服五香连翘汤如大便疏快即止仍量人虚实一痈疽潰後宜服排脓内补散若呕逆用木香汤下一痈疽初作便宜灼艾及麦饭石膏涂四围中留口出毒如疮小通傳之既潰用神异膏贴之

一痈疽已潰日用猪蹄汤淋洗将愈之际三日一次一痈疽将敛宜用神异膏如毒未尽不可遽用生肌之剂

一痈疽将安宜用加味十全汤补其气血庶肌肉易生一背疽多先渴而後发或先疽而後渴不救多矣若服加減八味丸非特杜絕渴疾抑且大滋气血生长肌肉

愚按前症及诸治法各附四十七等论当审用之

一痈疽呕逆有二一因初发不服内托散伏热在心一因脾气不正若因伏热在心者心烦身热焮肿作痛宜用内托散三两服若因脾气不正者则不烦热或闻秽气作呕宜用嘉禾散如有寒热用不换金正气散五更初兼服山药丸以补肾

愚按前症治法当与第十一论参看

论痈疽呕逆症第十九

李氏云痈疽呕逆是毒气冲心非脾胃之冷当服内托散杨氏云鼻?初愈不曾表汗毒在经络则背发大疽自肩下连腰脇肿硬如石其色紫黑以凉药投之终夜大呕连进托里散呕止疮溃赤水淋漓四十日而愈又有患?者痛过彻呕服此即止今有病疽不服此药者故引杨氏之言以解世人之惑

愚按用药之法有是病必用是药但今之脾胃虚寒气逆痰滯而呕吐者十居八九热毒内攻而呕吐者十才一二当参首论及第十一论主之

论痈疽之源第二十

夫痈疽之源因於气或因於热以仆之管见亦有因於膏粱房劳金石等药故治法用菉豆犀角矾石国老膏追毒丸其属毒明矣华陀中藏所言是毒服宣热败毒之药不必疑矣

愚按前症若因金石所致元气充实者诚宜此法若膏粱积热房劳过度脾肾亏损者当滋其化源不可拘执

华陀论痈疽疮肿第二十一

夫痈疽疮肿之作皆五臟六腑蓄毒不流非独因荣卫壅塞而发也其行也有处其主也有归假令发於喉舌者心之毒发於皮毛者肺之毒发於肌肉者脾之毒发於骨髓者肾之毒发於下者陰中之毒发於上者阳中之毒发於外者六腑之毒发於内者五臟之毒故内曰坏外曰溃上曰从下曰逆发於上者得之速发於下者得之缓感於六腑则易治感於五臟则难瘳又近骨者多冷近肤者多热近骨者久不愈则化成血虫近肤者久不愈则传气成漏成虫则多痒少痛或先痒後痛成漏则多痛少痒或不疼不痒内虚外实者多痛少痒血不止则多死溃脓则多生或呕逆无度饮食无时皆痈疽使然症候多端要当详治

愚按疮疡生虫乃肝经风热其成漏乃元气虚弱其出血乃脾虚有火其溃脓乃元气充实至於呕逆等症属脾胃亏损所致当调补元气庶保无虞

论背疽其源有五第二十二

一天行二瘦弱气滞三怒气四肾气虚五饮冷酒食炙?服丹药

愚按前症所因虽殊其治法亦当别经络阴阳虚实表里肿溃以助胃壮气为主使根本坚固庶保无虞

追毒丸

转毒散

单煮大黄汤

神仙截法

秘传连翘汤

千金漏芦汤

六味车螯散

止痛灵宝散

神效麻仁丸

清心内固散

清膻竹叶汤

猪蹄汤

神硝散

圣效散

神仙陷脉散

右方见中卷

麦饭石膏

神异膏

神验血竭膏

压热神白膏

牡蛎地黄膏

大川乌丸

二乌丸

蚣蝎散

琥珀犀角膏

犀角散

内托黄芪丸

不换金正气散

梔子黄芩汤

加减八味丸

忍冬丸

黄芪六一汤

桑枝汤

五味子汤

加味十全汤

人参内补散

神效托里散

内补十宣散

人参顺气散

茯苓开胃散

陷脉散

桂附丸

神效瓜蒌散

立效散

独圣散

梅花散

替针丸

绿云散

宣毒散

小五香汤

塞里散

托里散

清凉膏

碧油膏

神效酒煎散

蜈针法

痈疽经验方

甲疽代指嵌甲方

金疮竹木汤火伤方

右方见下卷

薛氏医案卷七十四

卷七十五

[子部,医家类,薛氏医案]

钦定四库全书

薛氏医案卷七十五

明 薛己 订

外科精要中

痈疽分表里证论第二十三

伍氏曰痈疽皆因喜怒不测饮食不节陰阳不调臟腑不和腠理不密寒气客於经络或荣血受寒则滯而不行卫气从之与寒相抟壅遏不通或阳气蘊积则生寒热寒热不散皆致前症又曰五臟六腑俞穴皆在背凡患疮症易伤臟膜多致不救腑气浮行於表故痈肿浮高为易治臟血沉寒主里故疽肿内陷为难治又曰疔者节也痈者壅也疽者沮也一寸至二寸为疔三寸至五寸为痈五寸至一尺为疽一尺至二尺为竟体疽若脉洪数者难治脉微滯者易治初觉宜清热拔毒已溃则排脓止痛脓尽则长肌敷痂当酌量轻重形证顺逆而审治之

愚按前症若饮食少思用六君子汤以补脾胃如不应加姜桂以温补之使邪气自退其不起者由邪气盛正气虚不能发也於旬日之外见之若已发出用托里消毒散以壮元气助令溃腐不应须温补脾胃其不起者由真气虚不能溃也於二旬之外见之若已腐溃用托里散以补气血生肌肉不应当专补脾胃又不应当须温补脾胃其不起者乃脾气虚不能收敛也於一月之外而见之凡此治法窃尝用验详具首论

察疽发有内外之别第二十四

李氏云疽初发一粒如麻豆发热肿高热痛色赤此为外发势虽炽盛治得其法可保其生若初时不发热体倦怠患处如故数日不肿痛内臟已坏虽有卢扁之药亦末如之何矣

愚按前症有因元气虚而不能发出者有因敷贴寒药而不能发出者有因攻伐过伤气血而不能发出者凡有因热毒内蘊而失疏托者审而治之多有生者

附治验

进士申天益臂患痈寒热头痛形气虚弱此手足阳明经风邪之症用桔梗升麻汤二剂外邪

顿散用托里消毒散二剂肿痛顿退乃用补中益气汤调理形气渐复而愈

秋官钱可容腹患痈焮瘰作痛烦渴饮冷大便不通脉沉数实此热毒蕴於内用清热消毒散加大黄二钱一剂诸症悉退但形气顿虚用托里消毒散去金银花白芷倍加参芪归术而安

一男子股内患毒欲求内消其脉滑数脓已成矣因气血虚而不溃遂针之脓出作痛以八珍汤治之渐可但脓水清稀更以十全大补汤加炮附子五分数剂渐愈乃去附子又三十余剂而愈

一童子腋下患痈久不敛脓清脉大怠倦懒食自汗口乾用内补黄芪汤及豆?饼两月而愈凡疮溃而脓清或疮口不合或聚肿不溃肌寒肉冷自汗色脱者皆气血虚极也非大温补不可

一男子肩患毒焮痛饮冷烦躁便秘脉数而实以清凉饮二剂少愈以金银花散四剂悉退又以十宣散去桂加天花粉金银花数剂疮溃而痊此脉与症皆属有余也

一男子背疮溃而瘀血不散此阳气虚弱也用参芪归术峻补更以桑枝灸又用托里散加肉桂疮口自敛此补接阳气之法也

上舍毛体仁素陰虚春初咳 胸中隐痛肾脉洪数肺脉数而时不见余曰内当结痈先用六味地黄丸料一剂服之翌早来谓余曰昨得良剂嗽愈六七务求一方到监调理余曰此陰火上炎患痈之症第因元气虚弱未能发出因其易忽余辞不能乃别用降火化痰等剂愈甚月余复请诊之脉洪滑而数余曰脓已成矣当请常治者同议针之且免内溃之患仍不决又月余请视他医已先开疮孔偏上兜脓不出仍内溃脉愈洪大余曰脉洪滑而数视其舌青黯内臟已坏无能为矣後果然

辨痈疽陰阳浅深缓急治法第二十五

曾氏云凡痈疽其脉浮数洪紧肿焮作痛身热烦渴饮食如常此六腑不和毒发於外而为痈其势虽急投以凉剂多保全生其脉沉细伏紧初发甚微或无疮头身不热而内躁体重烦疼情绪不乐胸膈痞闷饮食无味此五臟不和毒畜於内而为疽急投五香连翘汤甚者转毒散神仙截法黄矾丸国老膏防托毒气免致变症内攻尤宜当头隔蒜灸若涂毒药迷其腠理投诸凉药虚其真气故其善恶之症在乎医之工拙耳或气噫痞塞咳逆身冷自汗目瞪耳聋恍惚惊悸语言颠倒背恶症也五善见三则瘥七恶见四则危五善并至则善无以加七恶并臻则恶之剧矣

愚按前症善者乃五臟未伤病微邪浅使能慎起居节饮食勿药自愈恶者乃五臟亏损之症前篇虽云不治若能补其脾胃固其根本多有可生者岂可以其恶而遂弃之耶

附治验

邻人苏子遇之内左手指患疔麻痒寒热恶心左半体皆麻脉数不时见余曰凡疮不宜不痛不可大痛烦闷者不治今作麻痒尤其恶也用夺命丹二服不应又用解毒之剂麻痒始去乃作痛肿余曰势虽危所喜作痛但毒气无从而泄欲针之适值望日其家俱言尻神不从势愈肿甚余强针之诸症顿退又用解毒之剂其疮全愈

辛丑孟夏余至四明有屠寿卿氏当门齿忽如所击痛不可忍脉洪大而弦余曰弦洪相抟将发疮毒也先用清胃散加白芷银花连翘一剂痛即止至晚鼻上发一疮面肿黯痛用前药加犀角一剂肿至两额口出秽气脉益洪大恶寒内热此毒炽血瘀药力不能敌也乃数砭患处出紫血服犀角解毒之剂翌日肿痛尤甚又砭患处与唇上并刺口内赤脉各出毒血再服前药至数剂而愈

一妇人背患流注内溃胀痛服流气化痰之剂自汗盗汗脉大而弱此元气亏损之症也与参芪各一两归术各五钱肉桂二钱服而针之至夜半始出稀脓二碗许翌日大汗倦甚烦热作渴扬手气促脉洪大而数仍用前药加附子一钱炙甘草二钱二剂脉症悉退又以六君加姜桂二十余剂始离床褥後因劳复寒热作渴汗出时仲冬寝帟气出如雾用十全大补加桂附二剂而痊

中翰郑朝用疽溃发热吐痰饮食无味肌肉不生疮出鲜血余曰此脾气亏损不能摄血归源也法当补脾彼不信用消毒凉血之剂加恶寒呕吐始悟余言用六君加炮姜半夏茯苓数剂诸症悉退又用十全大补疮口渐敛後因饮食稍多泄泻成痢此脾胃虚寒下?用补中益气送四神丸而痢止继以六君子汤而疮愈

一妇人癸卯冬失物发怒缺盆内微肿甲辰春大如覆碗左肩脾亦肿肉色如故或针出鲜血三碗许腹痛如锥泄泻不止四肢逆冷呕吐恶寒或时发热絶食已七日矣其脉洪大时或微细此阳气脱陷也用六君加炮姜三钱附子二钱早服至午不应再剂加附子五钱熟睡觉来诸症顿退六七少进稀粥再四剂诸症悉退饮食如故缺盆始痛针出清脓二碗许诸症复至此虚极也以十全大补加姜桂附各一钱三剂而安後减乾姜桂附各五分与归脾汤兼服五十余剂而愈

一男子背疮漫肿微痛食少体倦余曰症属形病俱虚法当补元气为主彼不信乃用攻毒之剂中央肉黯五寸许恶症悉具复求治余曰此胃气虚寒而变症作矣当急温补脾胃则恶症自退黯肉自生仍不信乃割死肉祛恶症遂致不起

毛砺庵侧室肚患痈月余矣色黯不肿内痛作呕饮食不入四肢逆冷其脉或脱絶或浮大杂用定痛败毒之剂余曰此气血俱虚而作痛内决无脓不治之症也强用大温补之药二剂痛止色赤饮食少进余谓但可延日而已人皆以为有脓复强针之又用大补之剂始出清脓少许衆仍以为毒结於内用攻脓保其必生殊不知乃速其死耳惜哉

论善恶形症第二十六

问曰五善七恶可得闻乎曰饮食如常一善也实热而大小便濇二善也内外病相应三善也肌肉好恶分明四善也用药如所料五善也渴发而喘眼角向鼻大小便反滑一恶也气绵绵而脉濡与病相反二恶也目不了了睛明内陷三恶也未溃肉黑而陷四恶也已溃青黑腐筋骨黑五恶也发痰六恶也呕吐七恶也

愚按善恶形症治法见附錄

论生死形症第二十七

问曰病有甚而至生有微而至死病症难辨死生何从决乎答曰发背溃透内膜者死【此言肝俞已上】未溃内陷面青唇黑便污者死【此言臟坏便瘀血】溃喉者不治陰患入腹者不治入囊者不治鬢深数寸者不治在颐後一寸三分名锐毒亦不治无此者生流注虽多疗之必愈

愚按前症有因元气虚弱而毒气内陷者有因初作失於内疏托里和荣卫者有因毒盛失於消解者有因虚弱失於补托者有因脓成失於针刺者有因腐溃失於补养者若发背脑疽属湿热上壅者黄连消毒散补中益气汤以除湿毒补脾肺滋肾水若鬢疽锐毒属风热者柴胡山梔散以清肝火养肝血若陰虚用六味地黄丸以生肾水滋化源若患於小腹补足三陰之血养脾胃之气庶可保其生也其流注之症或因饮食劳倦房室陰虚或七情内动六淫外侵以致血虚互相凝滯或产後血瘀随虚流注或结块或漫肿宜用益气养荣汤以固元气佐以葱熨解散凝滯更以豆豉饼祛散寒邪溃久内有瘀肉用针头散腐之多有生者设若不守禁调摄多致不起慎之

形症逆顺务在先明第二十八

论曰痈疽溃後形有逆有顺白睛黑小一恶也不能下食纳药而呕食不知味二恶也伤痛渴甚三恶也体项不便四肢沉重四恶也声嘶色脱唇鼻青黑面目浮肿五恶也烦躁时嗽腹痛渴甚泻利无度小便如淋六恶也脓血大泄肿痛尤甚脓色败臭七恶也喘粗气短恍惚嗜卧八恶也未溃黑陷面青唇黑便污九恶也气噎痞塞咳嗽身冷自汗无时目瞪耳聋恍惚惊悸语言颠倒十恶也又脑为诸阳所会颈项近咽喉肾俞皆致命之所俱不可灼艾

愚按前症未溃黑陷面青唇黯便污者臟腑内溃之恶症也气噎痞塞咳嗽身冷自汗者脾肺虚败之恶症也不食便泻肠鸣耳聋目瞪者脾肾虚败传变之恶症也治法详见附錄

审内症用药附

自泻呕吐不进饮食肾脉最虚如是之疾古人皆以为不治然亦有救疗之理焉耳

愚按前论发内经之微旨开万世之聋聵其惠博矣此症实命门火衰不能生脾土而虚寒以

致自泻呕吐或胸膈不利或食而不化或大便不实宜用八味丸及六君子加姜附若因房劳过度真阳衰败或原禀不足不能生脾土而饮食不进者用补中益气加附子姜桂并东垣补真丸多有得生者若用参苓之类直补脾胃鲜有不误若或以为毒气内攻而治者俱致不起

附治验

通府李廷仪患流注唾痰气促自恃知医用化痰理气等剂半载而溃用托里等剂脓水淋漓肿硬不消寒热往来饮食少思肌肉消瘦大便不实手足时冷两尺脉浮大按之微细余曰此属命门火衰当用八味丸不信乃服参芪归术之类更加痰喘泄泻服八味丸益气汤年余而痊

御医王介之室背疽不起发不焮赤泄泻欲呕饮食少思手足厥冷脉息如无此阳气虚寒用大补之剂加附子二钱姜桂各一钱不应附子加至三钱二剂泄泻愈甚又以附子一枚姜桂各三钱参芪归术各五钱作一剂腹内始热呕吐始止手足始温脉息始复仍用大补加姜附四剂乃溃三十剂得愈六年後仍发虚寒之症

大尹陈国信素陰虚背患疽用参芪大补而不敛内热发热舌燥唇裂小便频数口乾饮汤呕吐泻利耳闭目盲仰首眩暈脉浮大而数余曰疮口不敛脾土败也舌燥唇裂肾水枯也小便频数肺气衰也内热发热虚火上炎也口乾饮汤真寒之象也呕吐泻利真火衰败也耳闭目盲肝木枯败也仰首眩暈肾气絕也辞不治後果歿

一男子患痈肿硬不溃脉弱时呕彼欲用败毒等药余谓肿硬不溃乃阳气虚弱呕吐少食乃胃气虚寒法当温补脾胃大抵肿赤痛甚烦躁脉实而呕为有余当下之肿硬不溃脉弱而呕为不足当补之若痛伤胃气或感寒邪秽气而呕者虽肿疡犹当助胃壮气彼不信仍服攻伐之药而果歿

发背治贵在早论第二十九

伍氏曰夫痈发背者皮薄肿高多有椒眼数十粒疽发背者皮肤顽硬状如牛颈之皮二症皆宜灼艾痈成脓则宜针其针当以马衔鉄为之形如薤叶樣两面皆利可以横直裂开五六寸许取去毒血其病顿轻须先灸而後裂可服神仙追毒丸利去毒根次服排脓托里等药调治疽成脓则宜烙用银篦大寸许长六寸烧赤频烙患处以脓出为效大抵痈疽难於诸科非心传契妙其可以易治耶

愚按前症若气血充实其脓既成宜速针之勿药可愈若气血亏损脓不能出或脓出反痛须托里养胃庶保终吉详见第四十

疮出未辨用津润墨围论第三十

伍氏曰但觉背两脾间赤痒肿痛或有白粒且以津唾时润令湿切勿抓破大抵在背微有赤肿点或因跋涉入浴犯水或因饮酒脍炙而作初未辨症且以津润时用墨围之若肿赤急就围中灼艾最善人皆疑以火热太多致延漫误者衆矣

愚按疽发背胛若有瘀肉腐烂脓水淋漓肿痛仍作者此处有筋一层间隔内脓不出故也宜用针引之老弱者若待其自溃多致不救治者审之

附治验

水部曹文兆背胛患之半月余疮头如粟且多内痛如刺其脉歇止此元气虚而疽蓄於内非灸不可遂灼二三十余壮饮以六君加藿香归数剂疮势渐起内痛顿去胃脉渐至但疮色紫瘀肉不溃此阳气虚也燃桑枝灸患处以解散其毒补接阳气仍以前药加参芪归桂色赤脓稠瘀肉渐腐两月而愈夫邪气沉伏真气怯弱不能起发须灸而兼大补若投以常药待其自溃鲜有不误者

上舍陈履学之内先从左肩下一点寒三日後右肩下发一白肿如瓠中红如酒盏自用消解凉药一剂不散次投十宣散四剂加痛略红次连投参芪丁桂防芷之剂脓溃後恶心呕吐头晕不止厥逆寒战鼓牙虚汗顶平脓清此投解散凉剂之误急洗去围药投以参芪归术地黄姜附大剂一服原从左肩下旧寒一点先热起又进一服遍肿浮热肿高脓稠兼絳乌金膏数日出腐筋如脂膜大小数片日进前药二服参芪投至八钱踰两月始安愈後时以劳厥即投参芪归术姜附大剂乃苏

看色灼艾防蔓论第三十一

伍氏曰疮肿色赤按之色不变者此脓已成矣按之随手赤色者其亦有脓也按之白者良久方赤此游毒已息可就赤白尽处灸断赤肿自消凡痈疽以手按之若牢?未有脓也若半软半?已有脓也又按肿上不热者为无脓热甚者为有脓宜急破之

愚按疮疡毒气已结而不发者法当补其血气使脓速成而针之其脓既溃宜培养脾胃以生肌斂口大凡疮疡脓血既溃当大补血气为先惟有他症当以末治

附治验

二守施希禄项患毒脓已成因畏针焮延至胸色赤如霞其脉滑数饮食不进月余不寐肢体甚倦此气血虚而不能溃也余针之脓出即睡觉而思食用托里药两月而愈

州守胡廷器脓熟不溃倦怠发热余为针之脓遂涌出已而发热恶寒大渴不止此虚之极也服人黄芪汤二剂热愈甚又二剂始应再以当归补血汤数剂渐痊

一老人腿患痈脓自溃忽发昏瞽脉细而微此气血虚极也以大补之剂而苏

一弱人流注内溃出败脓五六碗是时口眼歪斜以独参汤加附子二钱二剂少愈更以十全大补之剂月余而疮大抵疮疡脓血既泄当大补气血为先虽有他症当以未治之

论疮口冷澹难合第三十二

治痈久不合其肉白而脓少者此气血俱虚不能潮运而疮口冷澹也每日用艾叶一把煎汤避风热洗及烧松香烟薰之更以神异膏贴之必须守禁调理否则不效

愚案前症果因寒邪凝滞气血不能荣卫宜用斯法祛散寒邪补接阳气其功甚大若因气血虚弱不能潮会疮口必用补脾胃生气血为善丹溪先生云诸经惟少阳厥阴之生痈疽宜预防之以其多气少血也血少而肌肉难长疮久未合必成败症苟反用驱利毒药以伐其阴分之血祸不旋踵矣

附治验

地官李孟卿环跳穴患疽内服外敷皆败毒寒剂因痛极刺之脓瘀大泄疮口开张其色紫黯右关脉浮大此胃气复伤不能荣於患处也余以豆豉饼六君子加藿香砂仁炮姜数剂由是胃气醒而饮食渐进患处暖而肌肉渐生再以十全大补汤而愈

大尹都承庆患附骨疽内痛如锥外色不变势不可消喜其未用寒剂只因痛伤胃气而不思饮食用六君子汤治之饮食少进更以十全大补三十余剂而脓成针去仍以大补汤倍用参芪归术加麦门五味远志贝母数服脓渐止而疮亦愈按二症盖因湿热滞於肉理真气不能运化其始治宜实脾土和气血隔蒜灸而疽自消矣

治背疽糝药方

李氏云龙游有患背疽者大溃五脏仅隔膜耳自谓必死用鲫鱼去肠实以羯羊粪烘焦为末乾糝之疮口自收此出洪氏方屡用有效故附於此须候脓少欲生肌肉时用之

附治验

黄汝耘患发背用生肌药益溃大便泄泻其脉微缓余谓脾胃虚先用二神丸以止其泻次用大补药以固其本更用猪蹄汤洗患处用黄芪末以涂其外喜其初起曾用艾灸毒不内攻两月而愈

许鸿胪发背十余日肿硬木闷肉色不变脉沉而实此毒在内先以黄连内疏汤更以消毒托里散其毒始发奈欲速愈急用生肌药患处如负石身如火熯遂致不起

用药温凉须防秘泄论第三十三

伍氏曰凡疮家皆宜宣去其毒荡涤陈莖宜用神仙追毒丸六味车螯散五香连翘汤千金漏芦汤更当详辨禀赋强弱临时加减大抵治疮要法须臟腑坚而不秘通而不泄则真气不耗邪无所留如秘结神效麻仁丸凡疮溃後尚觉虚热可与五香汤加大黄朴硝且如治疮温药先用桂以通血脉宣导百药冷药必用地黄补不足益气填髓近用乳香散乳香消毒菥豆清热真良药也

愚按大肠秘结果因血燥胃气不虚最宜前药若因精血枯涸用八珍桃仁麻仁其溃後发热若因气虚用四君黄芪当归血虚用四物白术茯苓气血俱虚用八珍黄芪若大便秘小便赤用四物麦门五味如不应急用加减八味丸或六味丸若下後元气伤而发热用六君当归胃气虚【阙】用补中益气汤大凡二便肝肾主之经云肾【阙】液开窍於二陰若津液滋润大便通利若津液不足必因脾气亏损当培养化源

附治验

儒者顾大有年几六旬仲冬背疽初起入房患处黑死五寸许黯晕尺余漫肿坚硬背如负石发热作渴小便频数两耳重听扬手露体神思昏愤脉沉而细右手为甚便秘廿七日计进饮食百余碗腹内如常衆欲通之余曰所喜者此耳急用大剂六君加姜附肉桂三剂疮始焮痛自後空心用前药午後以六味丸料加参芪归术五剂复用活命饮二剂针出黑血甚多瘀脓少许背即轻软仍用前药便亦通利余他往四日神思复昏疮仍黑陷脓水淋漓饮食不进急以参芪归术各一两炮附子五钱姜桂各三钱服之即索饮食并鸭子二枚自後日进前药二剂肉腐脓溃而愈

锦衣傅允承母年踰七十腰生一?作痒异常脉浮数而反恶寒余曰此疮疽之症也未溃而先弱何以收敛况大便不通则真气已竭治之无功其子恳请不得已用六君加藿香神麴数剂饮食渐进大便始通更用峻补之剂溃而脓清作渴再用参芪当归麦门五味熟地而渴止允承喜曰吾母可无虞矣余曰尚难收敛先日之言也彼疑遂延他医卒致不起

生白痴切护勿触论第三十四

伍氏曰痈溃之後败肉渐去新肉渐生日见堆阜方成白膜新肉当滋养平复无虞大凡疮口未可速合日用猪蹄汤洗去恶浊外敷生肌膏神异膏毒脓出尽可用圣效散以合疮口更慎起居节饮食戒七情否则虚症蜂起多致不救慎之

愚按前症败肉去而新肉生者须先微赤四沿渐生白膜者此胃中生气也用四君子汤以培补之若赤甚者血虚而有火也用四物加参芪白术以调补之若赤而不生膜者气虚也用四君加当归黄芪若色白而无神者气血俱虚也用十全大补加姜桂如不应急加附子大凡疮疽溃後败肉渐去新肉渐生此乃脾胃之气充实也若恶浊已去宜用当归膏

体察爱护论第三十五

伍氏曰痈疽一症病人当自体察凡初作先以墨围患处却视浮沉聚散脓出视其多少肉生视其阔狭饮食视其美恶臟腑防其秘泄疮口防其奢裂宜戒怒节劳调补元气保爱体察慎不可忽

愚按前论即丹溪先生所云痈疽当先助胃壮气使根本坚固东垣先生教人以饮食有节起居有时素问反覆言之可不慎哉大凡泄泻易损元气肿疡犯之不能成脓溃疡犯之不能生肌患者审之

附治验

太守朱阳山之内年五十二四月四日当背心生疽如粟三日渐大根盘五寸许不肿痛不寒热脉微而沉余曰实则痛虚则痒不发不治溃而不敛亦不治乃与大补阳气之剂色白而黯疮势如故神疲食减小便淋瀝乃与大补气血加姜桂二剂疮仍不起十五日涉怒呕泻并作复与大补药一剂疮仍不起留前药二剂昏愤不服或劝之省悟依方连进七剂十六日疮起而溃色红而淡十九日与大补二十余剂後因劳自汗口乾舌强太阳髮际脑顶俱胀此血气俱虚肝胆火上炎用补中益气加山梔芍药顿愈但内热少睡手足发热不时霍热用逍遥散加山梔热退复用归脾汤疮亦愈计疮发及敛凡四十二日未尝一日用攻疮之药

江陰举人陈鸣岐寓京患背疽用大补之剂而愈翌日欲回先期设席作谢对谈如常是晚得家信大拂其意恼怒发热作渴食梨子少许至夜连泻数次早促余视脉已脱矣竟至不起夫梨者利也疏利下行之物凡脾胃虚寒产妇金疮者皆当忌之

用香药调治论第三十六

伍氏曰气血闻香则行闻臭则逆大抵疮疡多因营气不从逆於肉理郁聚为脓得香味则气血流行故当多服五香连翘汤万金散金粉散凡疮本腥秽又闻臭触则愈甚若毒入胃则咳逆古人用之可谓有理且如饮食调令香美以益脾土养其真元可保无虞矣

愚按前症说见第十八十九

饮食居处戒忌第三十七

李氏云病疽之人当戒酒麪炙?腌腊法酒生冷油腻鸡鷺鱼腥之类起居七情尤当深戒卧室洁净馨香使气血流畅仍忌僧道孝子产妇经妇鸡犬猫畜若背疽难於隐几宜用菉豆十斗作一袋隐伏其上解毒凉心也

愚论前论慎起居薄滋味恐病者好动四体甘嗜性热性寒之物使火益炽而胃气益衰则所

患淹滯不愈又谁咎哉不若预为之防当以古人之言为戒如菉豆性寒主丹毒烦热风 或金石所发实热烦渴饮食如常症属纯阳者宜用否则不可用也

论医者更易良方第三十八

李氏云尝见世间医者每有妙方秘而不传或更改以惑人诚可恶也余思西华麦饭石膏守死不传其立心私刻君子责之矣昔赵公宣教字季修来宰龙泉兼程而进患鼻衄日出数升时家兄教以服藕汁地黄膏赵叩诸医云此为戒服之剂乃数易医无效家兄陰饋前汁服三日而疾愈兄曰此即前所献之方赵惊叹曰向非医者谲计以惑我早信此方岂久受此困耶今以屡试屡验不可易者如因热毒冲心而呕用内托散【一名万全散】因脾胃虚弱而呕嘉木散热毒肿痛麦饭石膏陰虛作渴加減八味丸此四方屡为医人眩惑使人勿用深悯患者之受苦故举赵公之事以例之

愚窃以为方者仿也仿病因以立方非谓内经无方也若执古方以治今疾犹拆旧宇以对新宇其长短大小岂有舍匠氏之手而能合者乎设或有合以为亘古不易之方此又先王普济之神术奚必秘而私之耶余尝观太无先生治滇南一僧远游江浙思亲成疾先生惠之以饮食药饵复赠金一鎰以资其归此固我医道之当然也今之医者或泥古或吝秘或嗜利以惑人其得罪於名教多矣

神仙追毒丸【一名圣後丹一名玉枢丹又名解毒丹又名万病丸又名紫金錠】

治症见後

文蛤【即五倍槌破洗焙末三两】山茨菰【去皮净末二两】麝香【三钱另研】千金子【一名续随子去殼研去油取霜一两】红牙大戟【去芦焙乾末一两半】

右用糯米煮浓饮为丸分为四十粒每服一粒用井花水或薄荷汤磨服利一二次用粥止之合时用端午七夕重阳或天德月德日须净室焚香修置效验不可尽述凡人出入不可无此药两广山谷间有草曰胡蔓又曰断肠亦有感蛇毒致生恶菌名为定年药有淫妇与北人交好者别时陰以药置饮食中仍戒之曰子必某时来若依期而至彼复以药解之若过期不往必死故谓之定年药如服前药一粒其病即瘥昔有一女久病劳瘵为尸虫所噬磨服一粒吐下小虫甚衆更服苏合香丸遂愈如菌蕈菰子砒石毒药死牛马河魴鱼及时行瘟疫山嵐瘴气喉闭喉风自縊溺水扑死但心头微温未隔宿者生姜蜜水磨灌一粒即苏痈疽恶疮汤火蛇虫犬兽所伤东流水磨涂并服颠邪鬼气鬼胎暖酒磨服无不效者愚意此药果能有积毒中毒毒虫滯深固诚有神效若病自内出者尤当审其虚实而用之

转毒散治一切痈疽利去毒根以免传变之症

车螯【紫背光厚者以盐泥固济煅赤净末一两】轻粉【五分】甘草【一分】

右每服四钱括萎一枚杵细煎酒五更初调服下恶物为度未应再服功在五香连翘之上缓用五香连翘汤急用神仙截法

愚按前二方果积毒於内元气不虚宜用仍当审之

孙真人单煮大黄汤宣热拔毒治大便秘结热毒蓄於内

锦纹大黄【酒浸去皮】

右水煎服此快利要法也

愚按前方寒凉祛毒之剂仍审元气虚实症属内外而用之

附治验

金宪申天益兄背患疽脉沉而实肿硬木闷大便秘结此毒蓄於内用大黄白芷名万全散一服去瘀血疮顿消

邝进士患痈将痊大便秘结服大黄等药反废饮食余用补气血之剂加桃仁麻仁未效更以猪胆汁深纳谷道续以养血气而愈

神仙截法治痈疽发背一切恶疮预服则毒气不入内

真麻油【一斤银石器内煎熬十数沸候冷】

右用酒两碗入油五盏通口热服一日用尽缓则数日服之吴安世云吾家三世用之无有不验又闻猎者云凡中药箭急饮麻油药毒即消郑学谕德甫屡用之甚验

愚按麻油下三焦热毒通大小肠滞气若疮疡初起毒蓄於内大便秘结者用之以疏通其毒诚为良法大便不实三焦虚热恐非所宜用者审之

秘传连翘汤

连翘 升麻 朴硝【各一两】 玄参 芍药 白芷 防风 射干【各八分】 大黄【一两二钱】 甘草【炙五钱】 杏仁【八十个去皮尖同面炒黄另研】

右每服四钱水煎服下恶物後服内托散之类

漏芦汤治痈疽发背丹 时行热毒赤肿焮痛

漏芦 白芨 黄芩 麻黄【去节】 白薇 枳壳【麸皮炒】 升麻 芍药
粉草【炙各二两】 大黄【蒸三两】

右每服四钱水煎服以利为度若实热而便秘倍加之

千金漏芦汤

漏芦 黄芩 白朮 连翘 枳壳【去穰麸炒】 升麻 粉草
麻黄【去节】 大黄【湿纸包煨】 朴硝【各一两】

右每服五钱姜水煎去查空心服下恶物为妙愚按三方发表攻里行气解毒之剂想当时因有是症而用是药也

六味车螯散

车螯【四个黄泥固济火煨】 灯心【三十茎】 甘草节【二钱】 瓜蒌【一个杵】

右用酒二盏煎八分入蜜一匙车螯二钱膩粉少许空心服下恶血为妙

愚按前方疮疡积毒於内大便秘结元气充实者宜用

止痛灵宝散

鬼系腰【生於陰湿竹篱石岸络石而生者其藤柔细两叶相对形生三角用藤叶一两洗净晒乾】 皂角刺【一两剉新瓦上炒黄】 瓜蒌【大者一个杵炒用仁】 甘草节【五分】 没药 明乳香【各三钱另研】

右每服一两水酒各半煎

愚按前方治肿瘍毒气凝聚作痛之药潰後慎之鬼系腰即薜萝也又名络石

神效麻仁丸

火麻仁【研细】 大黄【煨三两】 人参【二钱】 诃子【煨肉一两】

右为末入麻仁炼蜜丸桐子大每服三十丸滾水下愚按前方润大肠结燥之药血液枯涸者不可用虽有人参诃子亦难倚仗

清心内固金粉散【一名金花散】

辰砂【另研】白茯苓 人参
甘草【各三钱】菉豆【四两】雄黄【一钱】朴硝【另研】豈?仁【各五钱】脑子
麝香【另研各一钱】

右为末每服一钱半蜜汤调

愚按前方若热焮肿痛饮食如常者乃可用之

猪蹄汤治一切溃疡消热毒去恶肉解秽恶甚效白芷 甘草 羌活
露蜂房【有蜂儿者】赤芍药 当归【各等分】

右先将猪蹄一只以水五碗煮取清汤入前药三五两煎数沸去查洗患处

洗药神效散

蛇床子【二两】朴硝【一两】

右每用五钱水二碗煎数沸洗净拭乾糝後散

圣效散

黄栢【炒黑】川山甲【炒黄一两】槟榔 木香 鸡内金【二枚】

右为末每用少许搽疮口内日五七次方效

愚按前方若毒气已尽宜用之否则反益其邪用当归膏为善

神秘陷脉散

黄芪 人参 川芎 当归【酒洗】赤芍药 粉草地骨皮 五加皮 忍冬叶
橘红【各一两】乳香没药【各五钱】

右每服五七钱水酒各半煎连进五七服甚效愚按前方乃托里消毒行气破血之剂也若曰
补益之功实少焉

骑竹马灸法图

内托散

五香连翘汤

沉麝汤

五香汤

漏芦汤

柞木饮

阿胶饮

牛胶饮

黄矾丸

国老膏

万金散

远志酒【已上方见上卷】

薛氏医案卷七十五

卷七十六

钦定四库全书

薛氏医案卷七十六

明 薛己 订

外科精要下

论痈疽用麦饭石膏治效第三十九

李氏云麦饭石膏治发背痈疽神妙惜世罕知有患者因脓不溃以毒药罨之其势益甚毒延咽喉脚膝皆为不治余用此膏一夕顿溃凡疽得脓其毒始解或有不溃者须用此膏故録之俾精择修合以取十全之功也愚按前症属腑属阳而气血未损者用前膏敷之固无不愈然亦有属臟属陰而气血有亏者当审其因而调治其内可也大凡疮疡之作由胃气不从疮疡之溃由胃气腐化疮疡之敛由胃气营养余尝治初结未成脓者托而散之已成欲作脓者托而腐之脓成未溃者托而开之脓已溃者托而敛之东垣先生云胃气乃生发之源为人身之本丹溪先生亦谓治疮当助胃壮气使根本坚固厥有旨哉【详见附録用药加減之法】

麦饭石膏

白麦饭膏【炭大煨醋淬数次研极细二两】鹿角【生取带脑骨者断之用炭大烧烟尽研极细四两】

右用米醋调和入砂器煎以竹片不住手搅?成膏先以猪蹄汤洗净以鷺翎拂涂四围乾则以醋润之若腐烂用布帛摊贴之

论痈疽敷神异膏功用第四十

凡疽症先以麦饭石膏涂之俟疮根渐收却敷神异膏敛之夫痈疽之发有浅深故收敛之功有迟速断不可早用收口之药恐毒气未尽後必复发为患匪轻但麦饭膏难於修合用神异膏亦效

愚按前症若毒已解而不生肌收敛者元气虚也用六君子汤壮其脾胃则肌肉自生设有余毒亦能自解【详见附録用药关键】

神异膏

露蜂房【蜂儿多者一两】玄参【五钱】蛇蛻【盐水洗一两】黄丹【水飞砂五两】麻油【一斤】杏仁【一两】乱髮【男子者如鸡子大】

右先将麻油入砂器煎髮熔尽下杏仁更煎黑入蜂房蛇蛻仍煎黑滤去入黄丹急搅试软硬得中即成膏矣其丹不必拘定前数凡膏药用日久必老硬煎时预取嫩膏少许如硬量和之

愚按神异膏乃解毒生肌之良剂若毒既解而肌不生当治其内不可泥为有余之症率用攻伐以致毒在内者不能发散在外者不能收敛其为祸不浅夫有余者热毒也虚火也不足者陰虚也营气也疮毒特其形耳

家藏神验血竭膏

当归【酒洗】白芷 大黄【生用】黄连 黄蘗 木鼈子【去殼】皂角 露蜂房 杏仁【各一两】乳香 没药 血竭【各三两】乱髮【男子者一两】麻油 黄丹【水飞细者炒晒】

右除乳没血竭余入油煎焦去查入髮熔化下丹将柳枝不住手搅候软硬得中入乳香等搅匀即成膏矣

愚按血竭膏取其以毒攻毒也若瘀恶已去毒气既消宜用神效当归膏以其生肌续筋也

厌热神白膏

大黄 白蔹 黄栢【生用】南星 赤小豆 黑蛤粉【各一两】

右为末用芭蕉汁调涂如乾仍以汁润之

愚按神白膏药味多寒而南星之性辛温佐之有效加草乌尤妙

牡蛎地黄膏

大黄【一两为末】牡蛎【用盐泥封固煅赤出大毒研细二两】生地黄【水浸】

右研生地黄汁调涂患处如乾更用汁润之

愚按前膏苦寒鹹寒之剂症属纯阳用之殊效然此症亦有属纯陰者亦有属半陰半阳者【治法见附錄用药关键】

李氏云疽疾既成先服取毒之药外敷麦饭石膏五七日後病渐减合用川乌二乌丸以活血

气生肌肉排宿脓祛风邪後服内补十宣散

川乌丸治发背活经络

木鼈子【去殼】当归 赤芍药 大川乌【去皮尖】苏木独活
羌活【各一两】没药【另研】五灵脂【去砂微炒】穿山甲【蛤粉炒各一两】

右各另为末酒糊丸桐子大每服三十丸温酒下

二乌丸治发背托里定痛祛风凉血

薄荷叶 羌活【各三两】川芎 玄参 地榆 麻黄【去根节】蔓荆子 旋覆花 荆芥蕙 防风
天麻白芷 白僵蚕【直者去丝足嘴炒用】牛蒡子【炒】甘菊花【各二】

【两】大川乌【去皮尖炮】
何首乌【不见铁器】粉草【炙各四两】蝉蜕【洗去土足半两】

右为末炼蜜丸弹子大每服一丸细嚼茶酒任下愚按前二丸用之对症固善然病有多端而
所因不同恐不可槩施也治者审之

论痈疽口紧小硬论第四十一

李氏云大抵疽口紧小而硬者盖因风毒所胜合用蜈蚣散掺疮口以神异膏贴之

蜈蚣散

赤足蜈蚣【一条去头足】全蝎【三个去足生用】

右为末用猪蹄汤净洗搽之

愚按前症乃风寒滯於疮口而未传於内也凡伤损之症尤多此患经云风症善行数变入臟
甚速死生在乎反掌当急分表里虚实而治之其邪在表者善伸数欠筋脉拘急恶寒惕搦脉
浮而弦宜羌活防风汤和解之传於里者舌强口噤项背反张筋惕搐搦痰涎壅盛胸腹满闷
或便溺闭赤时或汗出脉洪数而弦宜大芎黄汤疏导之其汗初出者由风热鬱於里亦宜大
芎黄汤之类下之若热既退臟腑已和而汗仍出者表虚也宜白术防风汤以实其表然解散
和解疏导三法此治暴患之症气血未损者若脓瘀内焮而见前症者宜针之急投十全大补
或口噤遗尿乃气血虚极亦用十全大补加炮附子大抵此症若因脓血去多宜以补中益气
加羌活主之或人素多痰因伤损而见风症宜二陈白术芎归梔子芩连气虚加四君血虚加
四物血气俱虚内热甚而生风者宜四物参术柴芩梔子若因怒伤而见前症宜小柴胡汤倍

加川芎山梔天麻釣藤鈎若患破伤风至三五年忽然复发或跌扑而患者皆气虚有痰所致也用二陈参朮芎归主之【治验见正体部】

论痈疽喉舌生疮如菌第四十二

李氏云痈疽不服内托散或失宣内毒致咽喉口舌生疮甚则生红黑菌害人甚速当用琥珀犀角膏治之向有患此症者诸法不效余用此药一日而安

愚按前症多因酒色过度亏损肾水虚火上炎或五疳元气消烁虚火上攻而致治当滋其化源最忌黄栢知母之类恐复伤胃气也

附治验

大尹王汝邻两足发热吐痰如涌左尺数而无力余谓足三陰虚彼反服四物二陈黄栢知母之类喉舌作痛又服清热败毒之剂其舌如赤桃脉洪数而无力此脾肺复伤肾经亏甚虚火上炎水泛而为痰也当滋化源以生肾水遂用补中益气汤六味地黄丸而愈

二守韩宗器不慎起居舌胀如菌痰涌便秘服芩连二陈之类脉浮而数欲针出血余谓此足三陰亏损之症且有形而不痛者阳之类也法当峻补其陰母损其血况虚浮之脉乎遂朝补脾肺夕滋肾肝而愈後因大劳面目俱赤遍身搔痒时已仲冬余曰大热而甚寒之不寒是无水也乃用制火壮水之剂而愈摇城金允文舌胀吐痰反服降火化痰针刺出血便秘痰甚余诊之左尺关洪数右寸关弦数用滋肾水生肝血益脾胃之剂诸症少愈因近火顿面赤身痒六脉弦数余谓此水竭火升之象难免于春二月矣於次年清明日果卒

琥珀犀角膏

真琥珀【研】犀角【镑各一钱】辰砂【研极细】茯神【去皮心各二钱】片脑【研一字】人参【三钱】酸枣仁【去皮炒二钱】

右为末炼蜜丸弹子大每服一丸麦门冬煎汤化下愚按前方虽有人参茯神酸枣仁安神补气但琥珀等四品气味辛散恐亏损真气须审症而用之可也

李氏云痈疽之症不服托里之药热毒内攻喉舌生疮甚至黑烂当服犀角散以解其毒

犀角屑 玄参 升麻 黄芪 赤芍药 麦门冬【去心】 生粉草 当归【各一两】 大黄【微炒三两】

右为粗末每服三钱水煎

愚按前方破血降火内疏之剂也若其脉沉实大便秘结发热作渴喜饮冷者属热蓄於内方可用之若其脉虚浮大便不结发热作渴畏饮冷者乃属血虚於外可用当归补血汤若尺脉洪数而无力发热作渴小便频数者属肾水不足虚火上炎宜用加減八味丸盖此症多因肾水亏损虚火上炎故也

论痈疽脓成用替针丸第四十三

曾氏曰痈疽脓熟涂以替针丸疮口自开古人云痈疽能杀人若针药得其宜则生失其宜则死可不慎哉愚按疮疡之症若毒气已结肿赤炽盛中央肉死黯黑者内用托里健脾之剂外用乌金膏涂之则黯处渐低赤处渐起至六七日间赤黯之界自有裂纹如刀划状其黯渐溃若用铍针利剪徐去犹好须使不知疼痛不见鲜血为善若脓未流利宜用针於纹中引之若脓水已出肿痛仍作乃内筋间隔亦用针引之若元气虚弱误服剋伐之剂患处不痛或肉死溃者急温补脾胃亦有复生矣後须纯补脾胃庶能收敛若妄用针刀去肉出血使阳随陰散是速其危也若脓溃而烦痛未痊脉洪滑粗散者真气虚而邪气实也为难治脉微濇迟缓者邪气虚而真气将复也为易治

论痈疽割伤第四十四

李氏云痈疽有悞搽毒药或针刀开割疮口不合不可用湔敛之药宜用猪蹄汤兆艾汤间洗传贴神异膏及服内补十宣散内托黄芪丸

愚按经云脾主肌肉脾健则肉自生然其热炽甚宜用前药以消其毒毒将尽宜用四物汤以养脾【详见附錄用药关键】

内托黄芪丸

治针砭所伤恶寒发热脓水不止肌肉不生疮口不斂

黄芪【八两】当归【洗焙三两】肉桂【去外皮】木香
乳香【另研】沉香【各一两】菉荳末【四两】

右为末用姜汁荳末糊丸熟水下

愚按前症若肌肉伤而疮口不斂用六君子汤以补脾胃若气虚恶寒而疮口不斂用补中益气汤以补脾肺若血虚发热而疮口不斂用四物参术以滋肝脾若脓多而疮口不斂用八珍汤或十全大补汤以养气血经云脾主肌肉如前药未应但用四君归芪以补脾胃更不应乃属命门火衰急用八味丸以壮火生土若脉数发渴者难治以真气虚而邪气实也

论痈疽寒热多汗用药第四十五

李氏云近有数人病背疽或先寒後热先热後寒或连日或间日必呕痰大汗而止皆用柴胡恒山不应余谓此因脾气不正复感寒邪痰盛而作遂先用不换金正气散次用排脓内补散木香汤三日即愈

愚按前症若外邪既去而仍作宜用六君子汤以补脾胃大凡胃气虚而作呕者必喜温热毒内攻而作呕者必喜寒治当辨之【详见附錄用药关键】

家传不换金正气散治感冒风寒或伤生冷或瘴疟或疫疔

苍术【米泔浸炒四两】厚朴【姜汁拌炒四两】粉甘草【炙二两】橘红【焙三两】藿香叶【二两】半夏【姜制二两】木香【湿纸裹煨】人参白茯苓【各一两】

右每服五钱姜枣水煎

论痈疽食毒物发热第四十六

李氏论云凡痈不可食牛羊鸡鹅鰕鱼酒面?炙之物犯之必发热宜服梔子黄芪汤大凡臟腑已利疮毒已溃气血既虚最当调护若发热而服凉药无不致祸梔子黄芪汤

漏芦 连翘 山梔子【炒】防风 苦参【炒】人参犀角【镑】甘草【炒】白茯苓 石苇【如无桑皮代之各三钱半】

右每服五钱水煎

愚按前症若饮食伤脾胃而发热用六君神麴山查若陰血不足而发热用四物参术黄芪若脓血出多而发热用十全大补汤东垣先生云胃为五臟之根本胃气一伤诸臟皆虚七恶蜂起可不慎哉

论痈疽作渴当调补精气第四十七

伍氏云痈疽发热大渴毒气炽盛急用神仙追毒丸驱下恶毒次以清膈汤万金散五香连翘汤六味车螯散千金漏芦汤选用之渴不止用秘传金粉散人参黄芪散内补散之类以补津液生血气其渴自止

愚按前症若脉沉实大便秘结宜用前药驱逐积毒若发热作渴饮食如故大便如常属胃经实热用竹叶石膏汤以清胃热生津液若发热作渴饮食少思大便不实属胃经虚热用竹叶黄芪汤以补胃气生津液若发热恶寒若发热晡热口乾作渴属气血不足用八珍麦门五味以补肝脾生精血【余见附錄用药关键】

论痈疽将安发热作渴第四十八

李氏云凡疽愈後忽发渴而不救者十有八九或先渴而患疽者尤为难治急用加減八味丸可免前患若能久服永不作渴亦无疽症且气血皆壮真神剂也愚按前症属肾水枯涸虚火上炎口乾作渴饮水无度或口黄作裂小便频数或痰气上壅烦躁不宁或二三年先作渴饮水或口舌生疮两足发热痰气上壅或疮愈三四年而口乾作渴小便频数急用前药多有复生者能逆知其因预服前丸可免此患若兼手足厥冷真阳虚也宜服八味丸大凡疮後审其肾水不足用加減八味丸中气虚弱用补中益气汤气血虚弱用十全大补汤阳气虚寒加姜桂如不应用八味丸

加減八味丸

地黄【酒拌九蒸九晒八两杵膏】乾山药
山茱萸【去核】五味子【炒各四两】肉桂【一两】牡丹皮
白茯苓【各三两】泽泻【切片蒸五次焙三两】

右各另为末入地黄膏加炼蜜丸桐子大每服七八十丸五更初未言语前白汤下

李氏云一贵人病疽未安而渴日饮水数升余用前方诸医云此药若能止渴我辈当不复业医矣仍用木瓜乌梅等味渴愈甚用前方三日渴止久服气血益壮饮食加倍

愚按前方非特可治前症夫人之生以肾为主凡病多由肾虚而致此方乃天一生水之剂最宜用之

忍冬丸治渴疾既愈预防发疽先将忍冬草入瓶内後入无灰酒微火煨一宿取出晒乾少加甘草俱为末又以所浸余酒调糊丸桐子大每服六七十丸温酒下又能治五痔诸瘰

黄芪六一散常服终身可免痈疽实治渴补虚之剂也

绵黄芪【六两用淡盐水润饭上蒸】粉草【一两半生半炙】

右为末每服二钱侵晨日午白汤调下不应作大剂水煎服古人号黄芪为羊肉可见其能补也

愚按忍冬丸解热毒消渴之药也六一汤补气虚作渴之药用之无有不验

论痈疽口乾作渴症不同第四十九

李氏云痈疽已安之後或未安之际口舌燥黄如鸡内金者乃肾水枯竭心火上炎此症最恶

古人云玉华池竭七朝亡若误投以丹药祸在反掌急用加減八味丸桑枝煎五味子汤以滋补之

愚按前症若不慎房事亏损真陰而虚火上炎亦多患此若发热作渴或口舌生疮或小便频数或茎中作痛亦宜用前药【详见附錄用药关键】

桑枝方大治口渴取嫩桑枝细切一升炒以水三升煎一升日服五七剂更多尤妙枹朴子云疗风痺乾燥臂痛脚气四肢拘挛上气眩暈久服补肺消食利小便轻身聪明令人光泽其功不能尽述

愚按桑枝补血气生津液轻身明目补肺肾之良剂也

五味子汤治肾水枯涸口燥舌乾

五味子【一两】黄蓯【炒三两】人参【二两】麦门冬【一两】粉草【炙五钱】

右每服五钱水煎日夜服五七剂

愚按前药乃六一散生脉散之复方滋化源之良剂若肾水既涸虚火上炎而口燥作渴者须佐以加減八味丸【详见附录用药关键】

论痈疽发热属肾虚第五十

李氏曰一发背之热未有不自肾虚而得之者必须五更服加減八味丸

愚按前论诚为啓发後人垂惠永久盖发背脑疽皆由肾经湿热虚火上炎中传恶症若非加減八味丸滋肾水以制心火补中益气以生化源欲望其生难矣啓玄子云大寒而甚热之不热是无火也当助其心大热而甚寒之不寒是无水也当益其肾夫寒之不寒责其无水热之不热责其无火热之不久责心之虚寒之不久责水之少窃谓无火者当用八味丸以益其心无水者当用六味丸以滋其肾【治验见前四十二论】

论痈疽将安当补气血第五十一

李氏云疽疾将安每日当服十全大补汤以补气血宜与排脓内补十宣散相间服

愚按前云溃疡属气血俱虚固在所当补若患肿疡而气血虚弱者尤宜预补否则虽溃而不斂矣凡大病之後气血未复多致再发若不调补必变为他症而危或误以为疮毒复发反行攻伐速其不起深可为戒也【详见附錄用药关键】

论痈疽服药捷径第五十二

李氏云凡患疮疽而肾脉虚者急服补药尚恐有误如鹿茸附子之药是犹抱薪救火反益其势而平补之药亦难奏功有一贵人苦疽诸药无效愚谓服山药丸於五更初物欲未接之际肾门未开之时如法服三日脉症平复若肾经沉寒痼冷鹿茸附子之药斯可用矣愚按前方诚有回生之功治法见前论

加味十全汤治痈疽溃後补气血进饮食

黄芪【盐水炒】熟地黄【自制】当归身【酒洗】人参 茯苓【各一钱】川芎【七分】粉草【五分】桂心【三分】橘红【一钱】白芍药【一钱】乌药【五分】白术【炒一钱五分】五味子【五分】

右水煎服

愚按前方若肿疡溃疡气血虚弱者用之有效更审经络时令尤善

人参内补散

芍药【炒】黄芩【炒】茯苓【各一两】粉草【炙一两半】桂心
人参【各一两】麦门冬 当归【酒浸炒】熟地黄【自制】木香【各二两】

右每服五钱姜枣水煎

愚按前方若气血虚弱固宜用之但黄芪泻肺麦门寒中木香行气须有是病而後用是药可也

神效托里散治一切痈疽发背肠痈

黄芪【盐水炙】忍冬叶 当归【各五钱】粉草【二钱】

右酒煎服查敷患处

愚按前方乃托里消毒之良剂也若欲发表攻里各有主方

排脓内补十宣散【一名十奇散一名内补散】治疮疡未成速散已成速溃脓毒自去其效如神

人参 当归 粉甘草【炒】川芎 黄芪【盐水炒各二两】防风【去义】厚朴【姜制】桔

梗【焙各一两】香白芷【五钱】官桂【三钱】

右为末每服三钱无灰酒下日夜数服愈後再服以杜後患木香汤亦可

愚按前症若阳气虚弱风寒鬱滯而不能溃散宜用此方若热毒壅结而不能溃散宜用托里消毒散若气血虚弱而不能溃散宜用参芪托里散

调节饮食当平胃气论第五十三

论曰素问云形不足者温之以气精不足者补之以味大凡疮疽当调脾胃盖脾为仓廩之官胃为水谷之海主养四旁须进饮食以生气血宜用茯苓开胃散人参内补散内补十宣散

人参顺气散治滯气健脾胃进饮食

乌药【一两五钱】白茯苓 真苏子【微炒】人参【各一两】青皮粉草【炙各半两】白术【麸炒】白芷【各一两】

右为末每服三钱姜枣水煎服

愚按前方因脾肺肾气盛壅遏宜用此以疏泄之若气虚壅滯必用益气养荣汤以调补之今之患者多因气血受伤当随症而施之

茯苓开胃散 治胃气不开饮食不进

白茯苓【一两】粉草【炙五钱】枳殼【麸炒黄三钱】

右为末每服一钱盐汤调下

愚按前症若胃气鬱滯宜用前方若胃气虚弱用四君子汤若胃气下陷用补中益气汤若脾气虚弱用六君子汤若脾气鬱结用归脾汤

李氏曰胃气弱不进饮食合服嘉禾散每五两加人参丁香沉香白豆?各二钱有一贵人苦疽用药失序脾虚不食余欲用嘉禾散或云内有丁香沉香乃别服药不效仍用前散饮食顿进

愚按前症详见附錄用药关键

论痈疽成漏脉例第五十四

经云陷脉为漏留连肉腠盖脉得寒则下陷凝滯肌肉故曰留连肉腠是为冷漏须用陷脉散

桂附丸温补之愚按疮疡为漏皆因元气不足营气不从逆於肉里或寒气相抟稽留血脉腐溃既久阳气虚寒外邪乘虚下陷即成是患若治其初患当内用参芪归术温补脾胃外用桑枝葱熨接阳气使自消散若久而不能成脓亦用前二法补助以速之若脓既成而不溃用艾於当头灸数炷以出之却服十全大补汤患者又当慎起居节饮食庶几收敛若用冷针开刺久而内出青脓外色黑黯或误用生肌散速其收敛反助其邪必成败症

陷脉散 治漏疮治远年癰瘤惊惕卧寝不安肢体掣痛

乾姜【炮】琥珀【另研】附子【炮去皮脐】大黄【煨各一两】丹参【三两】石硫黄【另研】白石英【另研】锤乳粉【另研】乌贼鱼骨【研各半两】

右为末用猪脂和傅死肉不消者加朴硝【三两】

神效桂附丸治阳气虚冷漏诸疮

桂心 附子【炮米醋浸碎三五次去脐火乾】厚朴【姜制】粉草【炙】白术【炒各一两】木香【一钱】乳香【另研二钱】

右为末炼蜜丸桐子大每服二三十丸空心米汤下

神效瓜蒌散 治乳痈瘰?与立效散间服

黄瓜蒌【子多者一个杵】当归尾【五钱】没药【一钱另研】甘草节【半两】

右用酒三碗煎一碗分三次服未成即消已成即溃愚按前方乃总治疮疡之良剂若治乳痈当审其因盖乳房属阳明胃经ru头属厥陰肝经若怒动肝火阳明血热宜疎肝清热焮痛寒热宜发表散邪肿焮痛甚宜清肝消毒并隔蒜灸不作脓或脓不溃托里为主不收敛或脓清稀补脾胃为主脓出反痛或发热作痛补气血为主肿焮作痛或晡热内热补血为主饮食少思或作呕吐补胃为主饮食难化或作泄泻补脾为主劳碌肿痛补气血为主怒气肿痛养肝血为主若为儿口所吹而发肿焮痛须吮通探散否则成痈矣亦治以前法若妇人经一二载溃者名曰乳岩不治【详见校注妇人良方外科枢要】

立效散 治痈疽瘰?

皂角刺【半斤细剉炒赤】粉草【二两】乳香【另研】没药【另研各一两】瓜蒌【五个连皮细研】

右为末每服一两好酒煎服

愚按前方治痈疽瘰?解毒止痛通用之良剂也若瘰?寒热焮痛肿赤乃肝经气病当清肝火以养肝血若寒热既止而核不消乃肝经之血亦病也当养肝血以清肝火若初如荳粒着於筋肉色不变内热口乾精神倦怠久不消溃乃肝脾亏损当健脾土培肝木外台秘要云肝肾虚热则生?矣病机云瘰?不系膏粱丹毒因虚劳气鬱所致补形气调经脉其疮自消若误下之必先犯病禁经禁矣【详见校正妇人良方外科枢要】

生肌散 治疮口气滯鬱热肌肉不生而不收敛者

木香 槟榔 黄连【各等分】

右为末敷患处

愚按前症若余毒滯於疮口而不生肌收敛者宜用乌金膏以腐化之若寒邪蘊於疮口而不生肌收敛者宜用豆鼓饼以温散之若因气虚血弱不能运於疮口而不生肌收敛者宜用补中益气汤以培养之

独圣散凡疮疡皆因气滯血凝宜服香剂盖香能行气通血也如疮初作便以此药入茶饮之

香附子【姜汁淹一宿焙乾研碎】

右无时以白汤调服二钱溃後以局方小乌沉汤加甘草少许仍服尤妙

愚按前方气味辛散宜施於形体充实气鬱血凝者若血虚气弱陰虚发热者又当随症制宜不可以例施也

梅花饮子初服防毒内攻

忍冬藤【四两】括萎根 甘葛根 川芎 乌梅 绵黄芪【炒】 甘草 苏木【各一两】

右作四剂水酒煎服

愚按前方乃解消热毒之剂若邪气盛而真气虚者又当补托其内

替针丸 治脓成不溃出者

白丁香?砂【另研】 真没药【另研】 乳香 糯米【阙先用矿灰拳大阙磁碗内量入井水待热气将息以阙灰中良久候米如水晶状取出用阙如米末就再用灰制】

右另为末各一匙入糯米和匀收贮用时饭丸麦粒大每用一粒水湿粘疮头其脓自出

愚按疮疡之症若气血壮实脓成不溃者宜用此方以泄其毒则肌肉易生疮口易敛若气血亏损须用甘温之剂以培根本否则不惟脓不溃出且难收敛若附骨疽及紧要之地应及时针砭为善

綠云散治五毒发疮於背脑或手足

凤尾草【形如凤尾叶背有金星炙乾一两】粉甘草【一钱】

右用酒一碗煎三五沸入冷酒一碗饮之以醉为度立效

愚按前方治金石发疽果有神效设当疏通发散宜分表里若饮排脓生肌必须补托

宣毒散消疮毒收赤晕

小米【一合】赤小豆 南星 草乌【各一两】露蜂房【三两炒焦】白矾【半两】

右为末用淡醋调敷四畔乾则频用醋润之

愚按前方解毒行经毒散血治外之法也

托里散未成则易消已成则易溃既溃则生肌

黄瓜萎【一个】忍冬草 乳香【各一两】苏木【半两】没药【三钱】甘草【二钱】

右每服用酒三碗煎二碗空心日午临睡分三服查为细末酒糊丸弹子大朱砂为衣细嚼当归酒下治打扑伤损尤妙

愚按前方若无汗下二症宜调和荣卫者殊有良验若血气虚弱不能腐溃生肌者还当补托其内

清凉膏治一切疮疡脓去後用之

当归【二两】白芷 白芨 木鳖子【去殼】黄栢 白蔹【去皮】乳香 白胶【各半两】黄丹【净五两】麻油【十二两】

右入油煎黑去查入黄丹以槐柳枝不住顺搅再煎成膏下乳香等药

碧油膏止痛排脓灸後用此

桃枝 柳枝 桑枝 槐枝 乳香【另研】 血竭【各五钱研】 黄丹【净四两】

右用麻油十两煎焦去渣入丹再煎成膏入乳香血竭

愚按前二方药味平易可用之

神效酒煎散治一切疮疡其效如神

人参 没药【另研】 当归尾【各一两】 甘草 括萎【一个半生半炒】

右以酒三碗煎二碗作四服查焙乾加当归末一两酒糊丸桐子大每服五十丸用浸药酒下善消毒活血

愚按前症若脓既去而不生肌者当审其因而补之

治痈疽未成用吴茱萸炒为末鸡子清调搽神效愚按前症若气滞壅肿用此方疏通隧道以散之若气虚壅肿当托裏补接以消之

洪丞相方用蜈蚣针法第五十五

治痈疽初作先以笔管一个入蜈蚣一条以管口对疮头使蜈蚣吮疮脓血其毒即散如疮大须换三四条若吮正穴蜈蚣必死矣累试累效若血不止以藕节上泥涂之若疮头未明以井边泥涂上先乾处即是

愚按痈疽既成毒血凝聚于外可用此法吮去固善但能治其末耳又当审其邪在表里并元气虚实而药之斯内外合一而为万全也

痈疽经验杂方

经验方治金石发痈

黑铅【一斤】 甘草【三两】

右用酒一斗置磁器内先以甘草置在一边另将铅熔投酒一边取铅再熔仍投九度取酒饮醉寝即愈愚按前方治金石发疽之良法也气血亏损者仍当补托可也

肘後方治发背欲死取冬瓜切去一头合疮上瓜烂仍切复合之瓜未尽用而疮已安仍用膏

药贴之

愚按此方若焮肿痛甚其邪在表者最宜用此法宣热拔毒以通其滞若肿痛发渴大便秘结其邪在里者须佐以内疏黄连汤通利臟腑以泄其毒在经络者当佐以托里荣卫汤以调气血斯善

张文仲治耳下石痈不作脓用商陆根杵烂频搽之愚按商陆破气软坚果系石痈宜用此方治之若怒动肝火而肿硬或发寒发热宜用柴胡清肝散加钩藤山梔以养血气清肝火肉色不变晡热内热宜用逍遥散加龙胆草以养肝血清肝火若肝火血燥筋挛或如贯珠宜用柴芍参苓散加钩藤以养血气佐以六味丸以生肾水若时消时作此脾肺之气滞而痰结也须用归脾六君二汤以和之若前药不应当佐以海藻丸以散坚经云形伤则痛气伤则肿不可轻用行气破血之剂【已上治症见外科枢要】

治痈疽疔用生鹿角尖於砂石器内同米醋磨脓涂患处四围涂一二日内消

愚按前方内消之法如未应须审其邪在表里人之虚实而治之不可治外而忘内也

治痈疽用生甘草为末酒调二钱服连进数服自消愚按前方乃清热消毒之剂若因膏粱积热金石蓄毒血气壅滞者最宜用如脾胃虚弱血气痞滞者不宜槩用恐反寒胃气故也

升麻汤治肺痈胸乳间作痛呕吐脓血腥秽

川升麻 苦梗 薏苡仁 地榆 黄芩 赤芍药 牡丹皮 甘草【各等分】

右为散每服一两水煎服

愚按前方乃消毒清热排脓之良剂如未应用桔梗汤咳 短气小便短少者佐以参芪补肺汤体倦食少或咳 短气者佐以参术补胃汤咳 痰涌者肾虚水泛也佐以六味丸口乾咽燥虚火上炎者佐以加减八味丸若发热喘唾脓血饮食不入为败症皆为脾土亏损不能生肺金肺金不能生肾水能补脾肺滋肾水多有得生者若面赤脉大者难治面黄白脉浮濇者易治若呕脓不止不治呕脓自止自愈【治验见妇人良方外科枢要】

治谷道前後生痈谓之悬痈用粉草一两截断以涧水浸润炙令透内细剉用无灰酒煎服有人患此已破服两剂疮即合

愚按前症患於陰莖之後谷道之前属足三陰亏损之症轻则为漏沥尽气血而亡重则内溃而即殒常治初起湿热壅滞未成脓作痛或小便涩滞者用龙胆泻肝汤肿痛焮盛仙方活命饮并以制甘草佐之若不能成脓或不溃者用八珍散主之若脓已成者急针之欲其生肌收敛肾虚者六味地黄丸血虚者四物皆参术气虚者四君加芍归脾虚者补中益气汤气血俱

虚者八珍汤大补汤若用寒凉消毒则误矣【治验见外科枢要】

拾遗【附】

痈疽之疾男子与妇人无异惟妇人有月闭血虚气结三症之异耳余当依常法治之

愚按男子之症多属肝肾女子之症多属肝脾治者亦当辨之

凡小儿属纯阳其痈疽之疾也多因心气热而患之愚按前症亦有因禀赋而致者尝治少参史南湖孙陰囊赤肿余作胎毒治之而瘥後患发热痰 见症不一难以明状遂胗其母有郁火血热之症乃用解毒消肝等药子母俱服而愈【详见保婴撮要】

崔氏方治手足甲疽或因修甲伤肉或因损足成疮溃烂上脚用綠矾置鉄板上煨沸色赤如溶金色者为真沸定取出研末以盐汤洗搽之

愚按前症即脱疽也此方固有良验尤当调元气为善大抵此症先因醇酒炙?膏粱厚味伤脾或房劳亏损肾水故有先渴而後患有先患而後渴者若色赤作痛自溃可治色黑不溃不治色赤作痛者先用隔蒜灸活命饮托里散再用十全汤大补汤加減八味丸色黯不痛者隔蒜灸桑枝灸亦用十全大补汤加減八味丸则毒气不致上侵元气不致亏损庶可保生亦有因修手足口咬等伤者若元气怯弱或犯房事外涂寒凉内服剋伐损伤脾胃患处不溃色黯上延亦多致死重者须解去当以脚力转解周 轻拽之使筋随骨出而毒得泄否则毒筋内断仍上溃虽去无益且偏僻之处气血罕到药难导远况攻毒之剂先伤脾胃反损元气不若灸法为良重者须解去为善故孙真人云在肉则割在指则截虽亲之遗体不忍毁伤然不如是则势必至於夭歿亦非体亲之心也况患处已经散解不痛又何憚而不为乎女子亦有此患多因鬱怒亏损肝脾所致治法当与前同患者知之【治验见外科枢要】

经验方治碰伤磕损跌扑肿痛或出血用葱白切细杵烂炒焦敷患处蒜冷再易神效

愚按医学纲目称前方有神效余尝以治前症青肿不散死肉不溃佐以健脾胃之药其功尤捷此内外所以合一也

百一方治有刺在肉以蛭螬研敷立出

衍义方治有木刺入肉嚼牛膝根罨之即出

肘後方治箭鏃入骨以巴豆肉微炒以蜣螂研匀涂伤处俟痒极拔出

孙真人治箭鏃针刺在咽喉胸膈杵蝼蛄涂患处自出愚按前四方用之果有良验

肘後方治热油及火烧用丹参八两调以羊脂二斤煎三五沸取傅之

至圣膏治汤火疮用鸡子黄置银石器内熬油调胡粉傅之

愚按前症若发热作渴小便赤涩用四物山梔连翘甘草养陰血以消毒若患处肉未死而作痛用四君芎归山梔连翘甘草健脾胃以消毒若患处肉已死而不溃用八珍白芷甘草补气血以排脓如未应加肉桂若患处死肉已溃而不收敛用四君芎归黄芪健脾胃以生肌如未应加炮姜若小儿患之或目割头摇等症用四君加芎归山梔健脾胃以清肝木若食後即有此患或腹胀作痛用四君山梔山楂神麴壮脾气以消导大凡初患此症用神效当归膏敷之轻者自愈重者自腐良肉易生其色赤者乃火毒未尽必搽至色白为度倘患于肢节伸屈之处若敷此且免生痂伤碍新肉复溃难痊倘回禄烟薰致死者以萝卜捣汁灌之即苏以其辛能散气也【治验见正体部】

附治验

锦衣杨永兴厨下夜间回禄凡睡此房已死将死者灌以萝卜汁良久悉愈凡罹此患者以此治之其应如响

骑竹马灸法图

内托散

五香连翘汤

沉麝汤

五香汤

漏芦汤

柞木饮

阿胶饮

牛胶饮

黄矾饮

国老膏

万金散

远志酒

忍冬酒

忍冬草图

已上方见前卷

追毒丸

转毒散

单煮大黄汤

神仙截法

秘传连翘汤

千金漏芦汤

六味车螯散

止痛灵宝散

神效麻仁丸

清心内固散

清膻竹叶汤

猪蹄汤

神硝散

圣效散

神仙陷脉散

漏芦汤

已上方见中卷

附錄

疮疡櫟括关键处治之法

一疮疡用药当审其经络受症标本虚实以治之不可泥于热毒内攻专用寒凉剋伐之剂亏损脾胃气血多致有误若肿高焮痛者邪气实也先用仙方活命饮後用托里消毒散漫肿微痛者真气虚也用托里散如不应加姜桂若不作脓不腐溃阳气虚也用四君子加黄芪肉桂若脓既出而反痛气血虚也用八珍散不生肌不收敛脾气虚也用四君子加芍药木香又当舍时从症如肿痛烦躁发热饮冷便秘脉洪数实是为五实虽在严寒必用大苦寒之剂泻其阳以救其陰若脉细皮寒溼利肠鸣不食呕吐手足逆冷是为五虚虽在盛暑必用大辛热之剂散其陰以回其阳若执其常法则误矣一疮疡作呕如热盛焮痛邪气实也用仙方活命饮解之若因作脓焮痛胃气虚也用托里消毒散主之脓熟胀痛气血虚也用托里散或针以泄之焮痛便秘热蘊於内也用内疏黄连汤导之寒药伤胃者托里建中汤食少胃寒者托里益中汤中虚寒溼者托里温中汤肝木乘脾土者托里益青汤胃脘停痰者托里清中汤脾虚自病者托里益黄散鬱结伤脾者托里越鞠汤一疮疡用围药如肿痛热渴症属纯阳宜内服济陰丹外敷抑扬散若似肿非肿似痛非痛似溃不溃属半陰半阳宜内服冲和汤外敷陰阳散若微肿微痛或色黯不痛或坚硬不溃症属纯阳宜内服回阳汤外敷抑陰散

一疮疡作痛若大便秘结者用内疏黄连汤热毒炽盛者仙方活命饮瘀血凝滯者乳香定痛散作脓而痛者托里消毒散脓胀而痛者针之脓溃而痛者补之血虚而痛者四君归芪血虚而痛者四物参芪肾虚而痛者六味地黄丸口乾作渴或小便频数加減八味丸一疮疡阳气脱陷或误服剋伐或脓血大泄或吐泻劳役或误行房事若发热烦热头痛头晕便血目赤烦喘自汗盗汗气短唾痰体倦热渴意欲饮水投水身热恶寒憎寒恶衣扬手掷足汗出如水腰背反张呻吟音不絕脉浮洪大此无根虚火假热之症若畏寒头痛咳逆呕吐耳瞶目蒙小便自遗或时淋沥溼利肠鸣里急腹痛玉jing短缩冷汗时出齿牙浮痛肢体麻痹或厥冷身痛咬舌嚙唇舌本强硬吃逆喘促脉微沉细此危殆之症但见一二急用大剂参附汤补之多得复生

一疮疡溃後发热烦躁若发热无寐血虚也圣愈汤自汗不止气虚也四君子加黄芪五味子发热烦躁肉瞶筋惕气血虚也八珍汤大渴面赤脉洪大而浮陰虚发热也当归补血汤肢体微热烦躁面赤脉沉微陰盛发躁也四君姜附

一疮疡大便秘结若作渴饮冷其脉洪数而有力者属实火宜用内疎黄连汤若口乾饮汤其脉浮大而无力的属气虚宜用加味八珍汤若饮食虽多肚腹不胀此内火消铄切不可通若腹痞胀而不通者乃因直肠乾涸以猪胆汁导之若误行疏导复伤元气则不能溃斂一疮疡

大便泄泻若因寒凉伤脾六君加砂仁脾气虚弱六君煎送二神丸脾虚下陷补中益气送二神丸命门火衰用八味丸料煎送四神丸肾虚不固姜附汤加吴茱萸五味脾肾虚寒参附汤送四神丸脉沉而细饮食不下用姜附汤多有复生者

一疮疡小便频数或茎中涩痛者乃肾经阳气亏损阴无以化之恶症也用加减八味丸以补阴足胫逆冷者用八味丸以补阳小便频而黄者四物加参术麦门五味以滋肺肾小便短而黄者补中益气加山药麦门五味以补肾若热结膀胱而不利者五淋散以清热脾肺气燥而不化者黄芩清肺饮以滋阴若膀胱阴虚阳无以生者宜滋肾丸膀胱阳虚阴无以化者宜肾气丸若老人阴痿精内败者用加减八味丸加车前牛膝如不应加附子若大小便牵痛愈痛则愈便愈便则愈牵痛以前药加附子多有生者苟用黄柏知母淡渗之剂既泻真阳复损真阴速其危矣

一疮疡作渴焮痛发热便利调和者上焦热也用竹叶石膏汤肿痛发热大便秘澁者内腑热也用四顺清凉饮焮肿痛盛者热毒蕴结也用仙方活命漫肿微痛者气血虚壅也用补中益气汤若因胃火消烁而津液短少者用竹叶黄芪汤若因胃气虚而不能生津液者用补中益气汤若因内气伤而内亡津液者用七味白术散若因肾水乾涸作渴或口舌乾燥者用加减八味丸或先口乾作渴小便频数而後患疽或疽愈後作渴饮水或舌黄乾硬小便数而疽生者尤其恶也苟能逆知其因预服加减八味丸补中益气汤以滋化源可免是患

一疮疡出血因五臟之气亏损虚火动而错经妄行也若因肝热而血妄行者四物加炒梔丹皮芩术肝虚不能藏血者六味地黄丸心虚不能主血者四物加炒连丹皮芩术若脾虚热不能统血者四君加炒梔丹皮若脾经鬱结者用归脾汤加五味子若脾肺气虚者用补中益气加五味子若气血俱虚者用十全大补若阴火动者用六味丸加五味子

一疮疡用针当辨生熟浅深若小按即痛者脓浅也大按方痛者脓深也按之而不复起者脓未成也按之而即起者脓已成也若脓生而即针则徒泄其气血而脓反难成若脓熟而不针则腐溃益深疮口难敛若疮深而针浅则内脓不出外血反泄若疮浅而针深则内脓虽出良肉反伤其元气虚弱必先补而後针不论冗神若脓出而反痛或烦躁呕逆皆由血气亏损宜急补之不论冗神者盖因患处已溃故也

一疮疡肌肉不生若赤色而不生者血热也四物汤加牡丹皮晡热内热血虚也四君子加归地丹皮若脓水清稀气血俱虚也十全大补汤食少体倦脾气虚也补中益气汤烦热作渴起居如常胃火也竹叶黄芪汤烦热作渴日晡热甚肾虚也用加减八味丸

薛氏医案卷七十六

卷七十七

钦定四库全书

薛氏医案卷七十七

明薛己订

小儿痘疹方论

尝谓小儿病证虽多而疮疹最为重病何则疮疹之病盖初起疑似难辨投以他药不惟无益抑又害之况不言受病之状孰知畏恶之由父母爱子急於救疗医者失察用药差舛鲜有不致夭横者文中每思及此惻然於心因取家藏已验之方集为一卷名之曰小儿痘疹方论刻梓流布以广古人活幼之意顾不韪欤

和安郎判太医局兼翰林良医陈文中谨书

论痘疹受病之由

夫小儿在胎之时乃母五脏之液所养成形也其母不知禁戒纵情厚味好啖辛酸或食毒物其气传於胞胎之中此毒发为疮疹名曰三秽液毒○一五脏六腑秽液之毒发为水泡疮○二皮膜筋肉秽液之毒发为脓水泡疮○三气血骨髓秽液之毒发为脓血水泡疮三毒既出发为疹痘疮也子母俱忌食葱韭薤蒜醋酒盐醬獐兔鷄犬鱼腥等物世俗未晓将为发举往往不顾其後误伤者多矣

论痘疹治法

凡小儿疮疹未出已出之间有类伤寒之状憎寒壮热身体疼痛大便黄稠此正病也若无他疾不必服药愚按痘疹若小儿首尾平和自有勿药之喜盖其肠胃软弱易为虚实故必不得已折其太过益其不足可也

凡疗疮疹先分表里虚实如表里俱实者其疮易出易靨表里俱虚者反是表实里虚者其疮易出难靨表虚里实者亦反是若始出一日至十日浑身壮热大便黄稠乃表里俱实其疮必光泽起发满肥且易靨也愚按治痘疹之法与痈疽无异若邪气在里而实热者用前胡枳殼散元气怯而虚热者用参芪四圣散虚弱者用紫草木香汤虚寒者用参芪内托散虚寒内脱者用木香散若邪气在表而实热者用麻黄甘葛汤此要法也余见各症

凡疮疹已出未出之间或泻渴或腹胀或气促谓之里虚急用十一味木香散治之

愚按经云真气夺则虚邪气胜则实实谓邪气实而真气虚也然倒靨泻渴等症若喜热饮食手足并冷或不食呕吐者为阳气虚寒也用辛热之剂补之喜冷饮食手足不冷或唇舌黑裂者阳气实热也用苦寒之剂泻之

凡疮疹已出未愈之间不光泽不起发不红活谓之表虚急用十二味异功散治之

愚按张翼之云吐泻少食为里虚陷伏倒靨灰白为表虚二者俱见为表里俱虚用异功散救之甚至姜附灵砂亦可用若止里虚减官桂止表虚减肉荳蔻若能食便闭而陷伏倒靨者为里实轻用射干鼠粘子汤重用前胡枳壳散下利吐泻能食为里实若用实里则结痈毒红活定凸为表实若用补表则溃烂不结痈凡痘一见斑点便忌葛根汤恐发得表里也

凡痘疮已出未愈之间不光泽不起发不红活或腹胀或泻渴或气促谓之表里俱虚急用十二味异功散送七味肉荳蔻丸治之

愚按前症审系表里虚寒急用前法缓则不救○一小儿出痘不起发红活腹胀泻渴皆以为不治施院使为表里虚寒用十二味异功散一剂即起发红活诸症顿退又用参芪内托散贯脓而靨○儒者薛戒甫子五岁出痘三四日下紫血十数滴至八日不止而疮不起御医钱春林谓脾气虚寒用木香散二剂用丁香十一粒人参五钱一日服之次日痘皆起而有脓由是血渐止二十余日而愈○一小儿起发红活但不时作痒口乾作渴便血面赤发热先君谓肠胃有热先用济生犀角地黄汤加柴胡一剂诸症渐退形体倦怠此邪气去而形气虚弱耳用四君子汤加当归黄芪红花二剂而安○一小儿痘疮赤痛烦热作渴或便血或?血先君用犀角地黄汤而血愈又用紫草快?汤加黄芪芍药而愈後疮痕色白用四君归芪治之而痊○一小儿出痘吐血其痘赤痛如锥或疮出血余谓肝火炽盛用小柴胡汤加生地一剂随用济生犀角地黄汤一剂顿愈又用芹菜汁而痊○一小儿痘疮下血而不起发先君谓气血不足用紫草快?汤加参芪归术治之血止疮起但贯脓迟缓用八珍汤倍加参芪数剂疮靨而根白痒此气血虚而热也用八珍汤二十余剂而愈○一小儿痘疹大便下血小便甚赤疮颗色赤发热饮冷先君谓热毒鬱滞先用八正散一剂後用解毒防风汤一剂顿愈又饮芹菜汁而全痊○一小儿痘正发而便血倦怠少食作渴饮汤余谓倦怠便血此脾虚而不能摄血也少食作渴此脾虚而津液短少也用五味异功散加升麻紫草治之而愈○一小儿便血腹胀困倦发热口乾饮汤四肢逆冷先君以为脾气虚寒不能摄血用五味异功散加丁香十粒炮姜五分二剂血止痘贯而靨○一小儿七岁患痘疮腹胀八九日矣先君云当急补脾主不信仍服消毒之药忽大便下血甚多而歿○一小儿作渴泄泻发热饮冷唇舌皱裂泻粪秽臭先君以为内热所作用前胡枳壳散稍愈又用清凉饮加漏芦乳母服之儿顿安

凡小儿斑驳疹毒之病俗言疹子是肺胃蕴热因时气薰发於外状如蚊蚤所咬赤则十生一死黑则十死一生大抵遇春而生发至夏而长成乃阳气薰蒸故得生成者也脏腑调和血气充实则易出易靨盖因内无冷气外常和暖也凡痘疹热渴切不可与瓜柿蜜水等冷物及清凉饮消毒散等药恐损脾胃则腹胀喘闷寒战咬牙而难治盖咬牙者齿稿也乃血气不荣不可妄作热治

愚按前症若兼吐泻手足指冷者属内虚寒而外假热也急用木香散如不应用异功散若大便不通渴欲饮冷者则前所禁蜜水之类又当用矣但宜审其热之虚实若属虚热者虽欲水拒之而不饮当用人参白术散热渴自止属实热者自甚索水且喜而饮之当以犀角磨水服诸症即解其後亦无余毒之患矣北方出痘不拘冬夏若喜冷者再不用药但与水饮无有不愈盖北方地燥而又睡热炕故也○一妇人患时疫将愈更出痘疮大起发体倦痛甚则昏愤烦渴饮汤不思食用十全大补汤及朱砂末其痛顿止食进体健仍用前汤倍加参芪十余剂而贯脓又数剂而愈○一妊妇发热作渴遍身骨节作痛用仙方活命饮二剂诸症稍愈至十一日出痘百余颗形气甚倦用紫草木香散又出少许但口乾作渴用人参白术散而渴止用八珍汤加丹皮柴胡而贯脓後去丹皮柴胡倍加参芪数剂而痘靨○一男子年将三十出痘根窠赤痛发热作渴服紫草饮之类前症益甚痘裂出血余用小柴胡加生地犀角二剂诸症顿减又用圣济犀角地黄汤而贯脓再用八珍汤而结痂○一小儿烦躁饮冷不止先君用济生犀角地黄汤顿愈後渴而喜热又用当归补血汤而痊惟倦怠少食用七味白术散而瘥○一小儿患此饮冷不止或痘胀痛先君用济生犀角地黄汤并芹菜汁而顿愈

凡痘疮出不快多属於虚若误谓热毒壅盛妄用宣利之剂致脏腑受冷荣卫澹滞不能运达肌肤则疮不能起发充满後不结实成痂痒塌烦躁喘渴而死

愚按前症亦有各经热盛壅遏而出不快者亦有毒甚痘疗而不能起发者亦有余毒而溃痒者当细审其因而药之○一小儿九岁出痘六日痒塌寒战院使钱密庵用十一味木香散二剂贯脓用参芪托里散而靨後痕白作痒用十全大补汤而愈○一小儿痘疮脓未满面赤作痒余谓气血虚而有热欲用温补之剂不信乃服清热之药至十三日疮痕色赤虚烦作渴腹痛不食手足逆冷而歿○一小儿未过岁疮痘焮痛出血哭不能已诊其母有肝火先用小柴胡加山栀生地与母服子饮数滴顿愈又用加味逍遥散而痊○一小儿出痘内有痘疗数枚虽挑破出黑血热毒不解余痘不发皆以为不治先君以仙方活命饮徐灌一剂痘疗解而诸痘亦愈○一小儿痘疗患在臀间色黑大痛挑出黑血仍复坚痛皆以为不治先君用隔蒜灸数壮痛止色淡而软挑出黑血甚多灌以活命饮患处及诸痘贯脓而愈

凡小儿才觉伤风身热是否疮疹便服四味升麻葛根汤

愚按痘疹未明而元气实者最宜前汤若元气虚者又当详治恐发得表虚而痘难出也○一儒者年三十余因劳役倦怠发热服补中益气汤数剂发赤点以为?另服升麻葛根汤一剂更加恶寒仍服益气汤四剂至九日出痘甚多余用八珍汤加黄芪白芷紫草四剂至二十日脓始贯用十全大补汤月余而靨

凡痘疹始出一日至五七日之间虽身热或腹胀足稍冷或身热泻渴或身热惊悸腹胀或身热出汗者服十一味木香散

愚按前症属脾气虚寒假热非此药不救如未应佐以六君子专补脾气更不应加木香补骨脂肉苁蓉兼补肾气○一小儿第五日不红活至九日贯脓不满余谓气血虚弱用十全大补

汤治之庶无後患不信至脱痂痕作痒色白至十四日而歿○一小儿第七日脓清不满形气倦怠饮食少思大便不实用托里散二剂手足指冷咬牙作渴用木香散倍用参芪一剂诸症顿退又用参芪四圣散四剂而愈

凡泻水谷或白色或淡黄煎十一味木香散送七味肉苁蓉丸治之泻止者住服不止者多服

愚按前症若察其外症若唇青指冷睡而露睛口鼻气寒泻色青白脾肾虚寒也用前药六君子汤加补骨脂肉苁蓉若颊赤体热睡不露睛口鼻气热泻色黄赤脾土实热也用泻黄散○一小儿腹胀渴泻气促体倦先君以为表里俱虚用六君子汤加归芪送四神丸一服诸症顿退疮势顿正但脓迟而渴仍用前汤加归芪二剂疮色红活形体颇安任其贯脓而痊

凡泻频津液内耗血气不荣疮虽起发亦不能靨也如身温腹胀咬牙喘渴者难治缘谷食去多津液枯竭饮水荡散真气故多死矣速与十一味木香散救之如不应急用十二味异功散

愚按前症兼手足指冷面色青白等症者属阳气虚寒急用木香散阳气脱陷用异功散脾气虚弱用六君子汤血气虚弱用八珍汤不应用十全大补汤一小儿第九日不红活不贯脓云歿於十三日陈院长谓属虚寒用十一味木香散二剂渐红活贯脓又用紫草木香汤及人参白术散而愈○族侄孙衍庆六岁出痘稀少疮痂悉落至十三日身烦热而畏寒手足逆冷厚衣围火不能温皆谓不治余思大热而不热者是无火也急用人参理中汤煎服一杯肢体顿温更用人参白术散调理而痊○一男子年二十余发热烦躁痘黯出血足热腰痛用圣济犀角地黄汤二剂而贯脓用地黄丸料数剂而疮靨○一男子年将三十出痘色紫作渴饮水腰痛足热耳聋余谓肾虚之症用加减八味丸料煎与恣饮热渴顿止佐以补中益气汤加五味麦门而愈○一小儿十二岁出痘色黯两足及腰热痛便秘咽舌乾渴引饮不絶衆谓肾虚不治先君用加减八味丸料作大剂煎与恣饮至二筋诸症悉退又佐以补中益气及八珍汤各十余剂而痊

凡四五日不大便用嫩猪脂一块以白水煮熟切豆大与食之令脏腑滋润使疮痂易落切不可妄投宣泻之药元气内虚则疮毒入里多伤儿也

愚按前症若因热内蕴宜用射干鼠粘子汤解之或发热作渴或口舌生疮或咽喉作痛并宜用之

凡疮疹初出两日至十三日当忌外人及卒暴风寒秽恶之气轻者三次出大小不一头面稀少眼中无根窠红肥满光泽也重者一齐出如蚕种灰白色稠密泻渴身温腹胀头温足冷也轻变重者犯房室不忌口先曾泻饮冷水饵凉药也重变轻者避风寒常和暖大便稠也

愚按丹溪先生云痘疹密则毒甚用人参败毒散犀角地黄汤或以凉药解之虽数贴亦不妨○一小儿痘疹密甚至九日贯脓不满色不红活或云当歿於十二日余以为气血虚弱用八珍汤内加糯米百粒数剂至十五日脓完色正结痂而愈○一小儿五岁出痘密而色白属虚

弱也始末悉用补托之药而安旬余饮食过多忽作呕吐面白兼青目唇牵动先君以为慢脾风症用五味异功散加升麻柴胡不信翌日手足时?服前药而不应急加木香乾姜二剂而愈○一小儿第五日矣稠密色黑烦躁喜冷先君以为火极似水令恣饮冷芹汁烦热顿止乃以地黄丸料服之至二十余日而愈

凡身热发烦渴者宜用六味人参麦门冬散治之如不应用七味人参白术散

愚按前症若渴而饮冷者脾胃实热宜用麦门冬散若渴而饮汤者气虚热渴宜用白术散若大渴引饮面赤血虚发躁也用当归补血汤

凡痘疮欲靨已靨之间而忽不能靨兼腹胀烦渴者急用十一味木香散

愚按前症若兼恶寒或四肢冷疮毒去而脾胃虚寒也宜用前药若十指逆冷咬牙等症阳气脱陷也用十二味异功散脾气虚陷用六君加川芎当归黄芪主之○一小儿九岁出痘第七日发热烦躁不贯脓色灰白寒战咬牙泻渴腹胀手足冷时仲夏饮沸汤而不热腹中阴冷先用木香散二剂益甚用异功散一剂顿安又用六君子加附子三分二剂後用调补之剂至十四日而愈

凡痘疮欲靨已靨之间忽头面温足指冷或腹胀泻渴气促者急服十二味异功散若十一二日当靨不靨身不壮热闷乱不宁卧则哽气烦渴咬牙者急用十二味异功散加归术以救阴阳表里

凡痘疮已靨烦渴不止或头温足冷或腹胀或泻或咬牙多致难愈急用十一味木香散以救之以上之症若误与蜜水生冷之物则转加热渴而死

愚按前症属脾胃亏损内真寒而外假热耳非温补不救如前药未应用十全大补汤加附子以纯补之○一小儿头生一疔出脓将愈忽疔间肿胀发痘二十余颗遍身赤点用快斑汤而渐出用紫草散倍加参芪而出完用托里消毒散而脓贯用托里散而疮靨○一小儿痘已靨其痕色赤而错纵日食粥七八碗作渴面赤先用白术散二剂渴减五六粥减大半又用四君加芩薏黄连二剂痕平色退乃用八珍汤加芩薏山栀而痊○一小儿痘疮愈後泄泻饮食不化此脾肾气虚用六君加补骨脂肉苁蓉治之而愈○一小儿痘疮将愈患泄泻侵晨为甚饮食不化属脾肾虚也朝用补中益气汤夕用二神丸而愈

凡身壮热经日不除如无他症用六味柴胡麦门冬散治之热退即止如不愈服七味人参白术散

愚按前症若肝胆热毒用柴胡麦门冬散若肝经血虚用四物汤加黄芪柴胡若中气虚热用人参白术散○一男子患痘疮作痛发热不止其势可畏皆以为不起施银台用消毒救苦汤治之诸症顿退予先用仙方活命饮痛全止又用八珍汤加紫草三钱四剂贯脓而靨○一小

凡患痘稠密大痛发热势甚危急先君用消毒救苦汤一剂安卧良久遍身出小痘顿消再剂俱实脓而靨

凡身壮热大便坚实或口舌生疮咽喉肿痛皆疮毒未尽用四味射干鼠粘子汤如不应用七味人参白术散愚按前症若壮热饮冷属热毒在表宜用前汤若兼大便不通属热毒在内少用四顺清凉饮若热毒既去胃气虚而发热用七味人参白术散若因阴血亏损而发热用四物汤○一小儿六岁患痘第七日根颗赤痛大便秘结小便赤澹烦躁饮冷或用清凉解毒之剂未应钱密庵以为热毒内蕴用四顺清凉饮一剂并猪胆汁导下结粪而安又用犀角地黄汤其痘自靨○一小儿痘疮发热作渴焮赤胀痛大便秘结先用四顺清凉饮一剂诸症顿退又用四味鼠粘子汤一剂诸症全退再用紫草汤而贯脓用消毒饮而痘靨○一小儿痘愈而声瘖面赤足心发热小便赤少先君以为肾经虚热用六味地黄丸补中益气汤而愈其时患是症用清热解毒者俱不起○一小儿十一岁患痘第四日根盘红活起发因痛甚不止至七日形气甚倦痘色淡而欲陷此因痛盛而伤元气也先用仙方活命饮一剂而痛止再用八珍汤而贯靨

凡风热咳嗽咽膈不利用三味桔梗甘草防风汤治之如不应用七味人参白术散主之

愚按前症如痘热内作宜用桔梗甘草防风汤如兼痰热咳嗽佐以抱龙丸若气虚痰涎壅上宜用人参白术散以补脾肺○一小儿痘疮十二日患咳嗽十余日不愈所服皆发表化痰余曰此脾肺气虚复伤真气而变肺病也不信仍服前药果吐脓血用桔梗汤而愈○一小儿痘将愈咳嗽面色黄白嗽甚则赤用五味异功散调补而愈

凡涕唾稠粘身热鼻乾大便如常小便黄赤用十六味人参清膈散如不应用七味人参白术散

愚按前症属脾肺蕴热痘邪为患用清膈散解散邪气若脾肺虚热不能司摄用人参白术散调补中气○一小儿痘赤壮热咳嗽痰甚烦热作渴用人参清膈散一剂诸症顿退日用芹菜汁旬余而靨○一小儿痘疮狂喘躁热作渴饮冷痰涎不利先君用十六味清膈散犀角地黄汤各一剂顿愈又用当归补血汤而愈○一小儿痘赤狂喘大便不利先君治以犀角地黄汤芹菜汁而痊○一小儿痘愈後涕唾口乾饮汤鼻塞或腹作胀先用白术散二剂後用六君子汤而愈

凡痰实壮热胸中烦闷大便坚实卧则喘急速用五味前胡枳壳汤治之

愚按前症若因脾胃蕴热宜急用前汤缓则热毒延内多致有悞○一小儿患痘赤痛痰喘作渴大便不利钱密庵用前胡枳壳散一剂诸症顿退又用济生犀角地黄汤二剂月余而愈○一小儿第八日根窠赤肿胀痛作渴大便下黑血烦渴痰喘饮冷呻吟求治施银台以为血热毒蓄於内用圣济犀角地黄汤一剂诸症悉退又用消毒丸及化斑汤而愈○一小儿痘根色赤作痛发热口渴喜冷大便坚实用清凉饮一剂痛热少减再剂便利渴止却用圣济犀角地

黄汤而安用芹菜汁而靨○一小儿痘根色赤作痛热渴喜饮冷水大便不利先用五味前胡枳壳散大便利而热渴减又用圣济犀角地黄汤而安用芹菜汁而靨○一小儿大便不利小便赤澁作渴饮冷先君用凉膈散一剂渐愈又用济生犀角地黄汤及芹菜汁而痊若乳母有肝火儿患此症必用加味逍遥加黄芩犀角兼治其母○一小儿痘已愈而痕赤作痛内热作渴二便不利先君用济生犀角地黄汤及芹菜汁而痊後用四物黄芪而安○一小儿痘痕白或时痒作渴饮汤大便稀溏先君用五味异功散加当归黄芪而痊○一小儿痘痕白时或痒先君以为气血俱虚用八珍汤补之不信自用解毒之剂後卒变慢脾风而歿惜哉

凡饮冰雪不知寒者阳盛陰虚也饮沸汤不知热者陰盛阳虚也阳盛则补陰木香散加丁香官桂陰盛则补阳异功散加木香当归每一两药共加二钱

愚按阳盛者当用清凉饮以补陰陰盛者当用异功散以补阳须审的实而用若或少差死在反掌前云乃传写之误

凡痘疮首尾若误饮冷水疮靨之後其痂迟落或生痈肿或成疳蚀盖脾胃属土而主肌肉水湿所伤则津液衰少荣卫澁滯不能周流故疮痂迟落而生痈肿

愚按痘痈之类属血热未解而内作外邪搏於肌肤之间或余毒蕴结经络轻则肌表津淫痒痒重则肢节壅肿作痛若余毒炽盛先用仙方活命饮以解其毒却用托里消毒散毒气将尽用四君归芪以补托元气大凡痘疮始末皆系脾胃之气所主若饮食药饵失宜多致变症故凡饮食少思内热晡热者属脾胃气虚血弱佐以四君芎归黄芪升麻若饮食如常发热作痛者属气血虚弱余毒为患佐以射干鼠粘子汤若饮食如常发热作痛大便秘结者属热毒内蕴用大连翘饮如不应仙方活命饮若根赤而作痒血虚也四物加牡丹皮色白而作痒血虚也四君加当归芍药色赤而作痛血热也四物加连翘金银花肿而不溃血气虚也用托里消毒散溃而不愈脾气虚也用六君子汤○一小儿痘毒蚀陷敷以雄黄散及服加味解毒散而愈○一小儿痘毒遍身腐溃脓水淋漓以经霜茅草研末铺於寝席更服九味解毒散顿愈用神效当归膏敷之而痊○一小儿痘毒後腿膝肿痛此脾肾虚而毒流注先用活命饮四剂肿痛顿减再用补中益气汤及六味地黄丸而痊○一小儿腿膝肿溃而脓水不止内热晡热体倦肌瘦先君以为元气复伤用补陰八珍汤六味丸三月余而愈○一小儿痘已愈两目昏闭先君用鼠粘子汤加山梔龙胆草犀角目开而有赤白翳佐以蛇蛻散外用二粉散寻愈

凡疮疹已靨未愈之间五脏未实肌肉尚虚血气未复被风邪相搏则津液澁滯遂成疳蚀宜用雄黄散绵茧散等药治之久而不愈则溃多致不起

愚按前症属足阳明胃经其方解毒杀虫之剂若毒发於外元气未伤者用之多效若胃气伤损邪火上炎者用芩黄汤六味丸若赤痛者用小柴胡汤加生地黄肝脾疳症必用四味肥儿丸及人参白术散更佐以九味芦荟丸○一女子痘痂将脱因其秽气以汤浴已而身热如炙四肢强直如发痉然此腠理开泄热毒乘虚而入用十全大补汤一剂顿安○一小儿痘出甚密先四肢患毒脓溃而愈後口患疳涎蚀牙龈先用大芩黄汤活命饮一剂各又用清胃散加

犀角及蟾蜍丸而愈後发热作渴口中作痛服蟾蜍丸搽人中黄而安

类集疹痘已效名方

葛根麦门冬散 治小儿热毒斑疹头痛壮热心神烦闷

葛根【三钱】人参【二钱】石膏【半两】麦门冬【去心四钱】川升麻甘草
茯苓【各二钱】赤芍药【一钱】

右为麤散每服三钱水一大盏煎至六分去滓徐徐温服不拘时量大小增减

愚按前方足阳明胃经之药也外除表邪内清胃火兼补元气若非发热作渴表里有热者不可用若表里俱虚而发热作渴者宜用人参麦门冬散

生地黄散 治小儿癰疹身热口乾咳嗽心烦者生地黄【半两】杏仁 欵冬花
陈皮【各三钱】

甘草【二钱半炙】麦门冬【去心七钱】

右为麤散每服三钱水一大盏煎至六分去滓徐徐温服不拘时量大小加减

愚按前方若肺经有热者宜用此方若痰气上壅佐以抱龙丸

惺惺散七味 治小儿风热疮疹时气头痛壮热目澁多睡咳嗽喘促

桔梗【炒】真细辛 人参 甘草 白茯苓

真川芎 白术【各一两】

右为麤散每服三钱水一大盏薄荷五叶生姜三片同煎至六分去滓徐徐温服不拘时候量大小加减愚按前症方若表虚风热所乘而致诸症者宜用此药若表实内热相搏而致诸症者宜用升麻葛根汤若兼作渴饮冷者须用葛根麦门冬散大凡疮疹已出未出之间多增寒壮热身体疼痛大便黄稠此正病也若无他疾不必服药

四味升麻葛根汤 治初发热痘疹未明宜用此汤以散之

白芍药【炒】川升麻【一两】甘草 葛根【一两半】

右为麤散每服三钱水一大盏煎至六分去滓不拘时徐徐温服

愚按前方胃经发表之剂表实而热毒壅滞於肌肉者须用此药以疏泄之恐虚其表而痘毒不能托出也

十一味异功散

木香 大腹皮 人参 桂心 赤茯苓

青皮 前胡 诃梨勒【去核】 半夏【姜制】 丁香

甘草【炙各三钱】

右为麤散每服三钱水一大盏生姜三片同煎至六分去滓空心温服量大小以意加减

愚按前方治痘疮已出未愈之间其疮不光泽不起发不红活或已出一日至五七日间或泄泻作渴或肚腹作胀气促作喘或身虽热而腹胀足指冷或身热而作渴或身热而惊悸腹胀或身热汗出不止或气急寒战咬牙或渴而饮水愈渴或疮欲靨而不靨或疮痂欲落而不落而反腹胀渴泻足指寒冷或惊悸寒战咬牙此脾胃终变虚寒津液衰少此发内经微旨陰阳蘊奥非神於术者岂能言哉前症乃阳气内虚寒而外假热如痈疽脾胃亏损诸脏虚寒之败症急用前散以救胃气亦有可生者

十二味异功散

木香【三钱半】 当归【三钱半】 人参【二钱半】 官桂【二钱去粗皮】 陈皮 丁香 肉豆蔻 厚朴【姜制各二钱半】

白术【二钱】 半夏【姜制一钱】 茯苓【二钱】 附子【炮去皮一钱半】

右为麤散每服三钱水一大盏半生姜五片肥枣三枚煎至六分去滓空心温服三岁儿作三服五岁儿作两服一周两岁儿作三五服病有大小以意加减此药家传五世累经效验

愚按前方治痘疮已出未出不起发不光泽不红活谓之表虚宜用此药治之若已出未愈疮不光泽或不起发不红活或腹胀作渴泄泻气促谓之表里虚寒急用此药送豆蔻丸或十一日间不靨壮热闷乱不宁卧则烦渴咬牙手足指冷数饮沸汤而不热围火重衾而仍寒悉属表里虚寒也王太仆云大寒而盛热之不热是无火也当益其心火急用前药以回其阳亦有生者

肉豆蔻丸七味治泻水谷或白或淡黄不能止者木香 缩砂仁【三钱】 白龙骨【半两】 赤石脂【七钱半】

呵子肉【半两】肉豆蔻【半两】枯白矾【七钱半】

右为细末稠面糊为丸如黍米大一周岁儿每服三五十丸三岁儿服百丸温米饮下泻甚者煎木香散或异功散送下泻止住服不住多服

愚按前方治阳气虚寒肠滑泻泄之澁剂盖肾主大便若因肾气不固而致前症者宜用木香散送四神丸如不应急煎六君子汤送四神丸补之盖豆蔻丸澁滯之功多补益之功少也

人参麦门冬散 治痘疮微渴【一名麦门冬散】

麦门冬【一两】人参甘草【炙】陈皮白术【半两】

厚朴【姜制各半两】

右为麤散每服三钱水一大盏煎至六分去滓徐徐温服不拘时量大小加減

愚按前方若痘疮热毒气虚作渴宜用之若因气虚弱作渴用人参白术散

消毒散 治痘疮六七日间身壮热不大便其脉紧盛者用此药以微利之【一名消毒饮】

牛蒡子【四两炒杵】荆芥穗甘草【炙各一两】

右为麤散每服三钱水一大盏煎至八分去滓不拘时徐徐温服

愚按前方若毒在肌肉尚未能尽发而致斯症脉浮而紧者最宜此药疏解其毒若痘顿轻脉沉而紧者毒在脏腑宜用前胡枳殼木通以絕其源其痘尤轻

柴胡麦门冬散 治痘疮壮热经日不止更无他症此药治之【即六味柴胡麦门冬散】

柴胡【二钱半】麦门冬【三钱】甘草【炙】人参

黑参【各一钱半】龙胆草【炒一钱】

右为麤散每服三钱水一大盏煎至六分去滓不拘时徐徐温服量大小加減

愚按前方若痘疮表热根盘色赤焮痛作渴饮冷或两目作痛或素有肝火而患痘疮者尤宜用之

射干鼠粘子汤 治痘疮壮热大便坚实或口舌生疮咽喉肿痛皆余毒所致

甘草【炙】升麻射干【各一两】鼠粘子【四两炒杵】

右为麤散每服三钱水一大盏煎至六分去滓徐徐温服

愚按前方若痘疮初出发热焮痛根盘赤盛或咽喉口舌疼痛作渴饮引者宜用若因胃气虚弱发热而致前症者宜用人参麦门冬散

桔梗甘草防风汤 治风热咽喉不利

桔梗【炒】甘草【炙】防风【各等分】

右为麤末每服三钱水一大盏煎至六分去滓徐徐温服不拘时量大小加减

愚按前方若上焦风热或痰涎上攻咽喉不利或口舌生疮作渴引饮者须用此药发散解毒痘虽出亦在轻浅

人参清膈散 治涕唾稠粘身热鼻乾大便如常小便黄赤宜用此方治之

人参柴胡当归芍药【炒】知母【炒】桑白皮【炒】白术【炒】黄芪【炒】紫苑地骨皮茯苓甘草桔梗【炒各一两】黄芩【半两】石膏滑石【各一两半】

右为麤末每服三钱水一大盏生姜三片同煎至六分去滓不拘时徐徐温服量大小加减

愚按前症即痈疽因热毒蕴结於脏腑经络之间者当用此药以疎导托理调和荣卫使邪气退则元气不伤而痘疮易愈也

前胡枳殼散 治痰实壮热胸中烦闷大便坚实卧则喘急

前胡【一两】枳殼赤茯苓大黄甘草【炙各半两】

右为麤散每服三钱水一大盏煎至六分去滓不拘时量大小加减如身温脉微并泻者不可服

愚按前症若属肺胃实热气鬱痰滞大便秘结小便赤澁烦渴饮冷身热脉数者宜用之以表散外邪疏通内脏使邪气不壅滞且痘疮轻而易愈也

人参白术散 治痘疮已靨身热不退此药清神生津除烦止渴

人参白术藿香叶木香甘草

白茯苓【六味各一两】 乾葛【二两】

右为麤散每服三钱水一大盏煎至六分去滓不拘时徐徐服

愚按前症若痘疮已靨身热或津液少而口乾引饮者胃气虚弱也宜用人参白术散若腹胀泄泻口乾足指寒冷者脾气虚弱也宜用十一味木香散若形寒恶寒呕吐不食腹胀泻渴等症乃脾气虚寒下陷也用六君子加胡麻姜桂如不应急加丁香若发热渴躁身热恶衣属血脱发躁用当归补血汤大凡痘疮若脾气虚弱出不快者误以为热毒壅盛用凉药宣利解散致脾胃受伤元气愈虚使疮不起发不充满不结靨不成痂而痒塌烦躁喘渴者死多矣凡痘疮首尾不宜与水则疮靨之後其痂落迟或生壅肿治失其法必成疔蚀疮血水不絕甚则面黄唇白多致难愈盖脾胃属土而主肌肉故也

韶粉散 治小儿痘疮才愈而毒气尚未全散疮痂虽落其瘢犹黯或凹凸肉起当用此药涂之

韶粉【一两】 轻粉【一钱】

右研和入炼猪脂油拌匀如膏薄涂疮瘢上如痘痂欲落不落当用此方

羊 骨髓【一两】

右炼入轻粉一钱研成白膏盞合盛之涂疮上○如痘疮痒悞搔成疮及疮痂欲落不落用上等白蜜涂之其痂自落小无紫黑瘢痕神妙

愚按前症若痘疮痕赤而作痒属血虚而有热也佐以四物牡丹皮若痕白而作痒气虚而有热也佐以四君芎归疮痂欲落不落者脾经血气虚八珍汤若发热而大便秘结者肠胃内热也犀角消毒丸发热而大便调和者肺胃热也麦门冬散脓水淋漓者肌表热也用败草散敷之

雄黄散 治小儿因痘疮牙龈生疔蚀疮

雄黄【一钱】 铜绿【二钱】

右二味同研极细量疮大小乾糝

绵茧散 治小儿因痘疮余毒肢体节 上有疔蚀疮脓水不絕

出蛾绵茧【不拘多少】

右用生白矾槌碎实茧内以炭火烧矾汁乾取出为末乾贴疔疮口内如肿髻作痛更服活命

饮

愚按雄黄散清肝杀虫解毒外治之方也其症所感之经与所致之因各有不同若因手足阳明经蕴热所致者用犀角消毒散若因脾经疳热者用大芫荽汤若因肾经虚热者用地黄丸若因肝经疳热者用芫荽汤送大芦荟丸○其绵茧散总治疮毒脓水淋漓收敛之外剂若果系内无余毒而未痊者宜用敛之若因气血虚而不斂宜用托里散若发热肿痛大便不结用仙方活命饮更以隔蒜灸法若肿痛作渴大便秘结用四顺清凉饮若大便已通肿痛未退仍用活命饮若发热倦怠大便调和用八珍汤加犀角如疳蚀未应急用隔蒜灸若发热口乾肢体倦怠用八珍汤加黄芪若饮食少思肢体倦怠用五味异功散加当归若脓水不絶而发热用四物参芪丹皮若脓水不絶而恶寒用四君归芪恶寒发热者用八珍黄芪若乳母肝经血虚发热用加味逍遥散若肝经因怒发热用加味小柴胡汤【若肝经因鬱发热用加味归脾汤仍参前痘疮首尾误饮水证】

谷精草散 治小儿痘疮已靨眼目翳膜遮障瞳人癰澁淚出久而不退或十二三日疮痂已落其疮痂犹黯或凹或凸此肌肉尚嫩不可澡浴及食炙煖辛辣有毒之物恐热毒薰於肝膈目生翳障若不能守禁而致患者须用此治之

谷精草【一两】生蛤粉【二两】

右为细末以獐猪肝一叶用竹刀批片糝药在内用草绳缚定入甕器内量用水慢火煮熟令儿食之愚按前症若痘疮愈後余毒入於肺经而作痛者宜用此方羊肝散亦效若肝经热毒眼睛作痛佐以小柴胡汤加生地黄或犀角地黄汤

解毒汤 治一切热毒肿痛或风热搔痒脾胃

黄连【三分】金银花连翘【各五分】

右水煎服

愚按前症当审其脏腑部分及各随所因而治之若在乳下必当兼治其母

参汤散 治水痘

麻黄【一分去节】人参【一分】滑石【半分】地骨皮【半分炒】知母羌活【各一分】甘草【炙半分】大黄【一分湿纸煨热】甜葶苈【一分用湿纸炒】

右为末每服五分水一小盏入小麦七粒同煎至十数沸每服三五匙不可多服

愚按前方发表散邪疏通内热之峻剂若遍身作痛壮热烦躁作渴饮冷大便秘结小便澁滯

喘嗽等症宜用此方或前胡枳殼散然水痘多属表邪但若发热饮引小便赤色者当用升麻葛根汤如无他症不必用药也

右小儿疮疹无正方论虽有王谭钱氏之书止见其方未见其源疗之者往往以药宣利解散因耗伤真气遂至不救者多矣深可痛悯文中今将祖父秘传方论集为一卷盖守此方三十余年全活者甚衆百不失一今合广其传使患者无枉夭之祸医者有活人之功此仆之夙心也

附方

三豆饮 治天行痘疮始觉即服之多者必少少者不出等症

小赤豆 黑豆 菉豆 甘草节【半两】

右水煮熟任儿食之七日自不发

紫草木通汤 治痘疹出不快

紫草 人参 木通 茯苓 糯米【各等分】 甘草【减半】

右每二钱水煎服

升均汤 治痘疮已出不匀或吐泻发热作渴

升麻 乾葛 芍药【炒】 人参 白术 茯苓 甘草 紫草【如无红花代之】

右每服三五钱 水煎

参芪内托散 治痘疮里虚发痒或不溃脓或为倒靨等症

人参 黄芪【炒】 当归 川芎 厚朴【姜制】 防风 桔梗【炒】 白芷 官桂 紫草 木香 甘草

右入糯米一撮水煎服仍量儿加減

紫草快斑汤 治痘疹血气不足不能发出色不红活等症【即紫草汤】

紫草 人参 白术 茯苓 当归 川芎 芍药 木通 甘草 糯米

右每服二钱水煎

人参胃爱散 治痘疮已发未发吐泻不止不思饮食等症

人参 藿香 紫苏 木瓜 丁香 茯苓甘草 糯米

右每服三钱姜枣水煎

紫草木香汤 治痘疮里虚痒塌黑陷闷乱

紫草 木香 茯苓 白术 人参 甘草糯米

右每服三钱水煎

大如圣饮子 治疮疹癰疽毒攻咽喉肿痛热渴或成肿毒不消等症

麦门冬【半两】 桔梗 甘草 鼠粘子【炒各一两】

右每服二钱水煎

四圣散 治痘疹出不快及倒靨

紫草茸 木通 甘草【炙】 枳壳【麸炒】 黄芪【各等分】

右每服二钱水煎

独圣散 治痘疮倒靨?伏用穿山甲取前足嘴上者烧存性为末以木香汤入少酒服之

快透散 治痘疮出不快等症

紫草 蝉蜕 木通 芍药 甘草【炙各等分】

右每服二钱水煎

愚按海藏先生云身後出不快足太阳经也用荆芥甘草防风汤身前出不快手阳明经也用升麻葛根汤四肢出不快足阳明经也用防风芍药甘草汤此皆解毒升发之剂也不可不知

鼠粘子汤 治癰疹稠密身热等症

鼠粘子【炒】 当归 甘草【炙各一钱】 柴胡 连翘

黄芩 黄芪【各一钱半】 地骨皮【二钱】

右每服二钱水煎

紫草散 治痘疹黑陷气血虚弱疮疹不起

紫草 甘草 黄芪【炙】 糯米【各一钱半】

右水煎服

益元散 治痘疹初烦躁作渴等症

滑石【六两】 甘草【一两】

右各另为末每服五六分白汤调下

活血散 治痘疹血虚热已出未尽烦躁不宁肚腹疼

白芍药【一两酒炒】

右为末每服一匙糯米汤调下荔枝汤亦可对四君子汤加归芪名参归活血散

参芪四圣散 治痘疮有热出至六七日不能长不生脓或作痒

人参 黄芪【炒】 白术【炒】 茯苓 当归

芍药【炒】 川芎【各五分】 紫草【如无红花代之】 木通

防风【各三分】 糯米【二百粒】

右水一盞煎半盞徐徐服

人参透肌饮 治痘疮虚而有热虽能出快长不齐整隐於肌肤间者

人参 白术 茯苓 紫草【如无红花代之】 当归

芍药 木通 蝉退 甘草 糯米【各等分】

右每服三钱水一盞煎半徐徐服

大连翘饮 治积热大小便不利及痘後余毒不解肢体患疮或丹瘤游走不止

连翘 瞿麦 荆芥 木通 赤芍药 当归 防风 柴胡 滑石 蝉退
甘草【各一钱】 山梔【炒】 黄芩【炒各五分】

右每服三钱水煎一岁每服一二匙三五岁者每服数匙

愚按前方苦寒辛散发散肌表疏通内脏之剂若表里实热烦躁饮冷大便不通小便秘结者最宜用之慎不可过剂恐复伤胃气而变他症也若妄发之则成斑烂下之则成虚脱

胡荽酒 治秽气使痘疹出快

右用胡荽一把以好酒一盞煎一两沸令乳母每含一两口喷儿遍身匀喷头面房中须烧胡荽香能辟除秽气使痘疹出快煎过胡荽悬挂房门上最妙愚按前方最宜用之若痘疹已出而饮食少思宜用枣炙之儿闻枣香尤能开胃气进饮食解毒气若因饮食停滞未及消导遂用此法恐反助其邪以生湿热则成痘毒也

甘露饮子 治积热及痘後咽喉肿痛口舌生疮齿齲宣肿

生地黄【炒】 熟地黄 天门冬【去心】 麦门冬【去心焙】 黄芩【炒】 石斛
枳殼【麸炒】 枇杷叶【去毛】 茵陈 甘草【炙各等分】

右每三钱水煎每服三五匙不可多服

愚按前方凉血解毒除湿清热寒中之剂治者审之

托里散 治痘毒元气虚弱或行尅伐不能溃散用之未成自消已成自溃

人参 黄芪【炒各二钱】 当归【酒洗】 白术 陈皮 熟地黄 茯苓
芍药【炒各一钱五分】 甘草【炙五分】

右三五钱水煎服

托里消毒散 治痘毒气血虚弱不能起发腐溃收敛或发寒热肌肉不生

人参 黄芪【炒】 当归【酒洗】 川芎 芍药【炒】 白术【炒】 陈皮
茯苓【各一钱】 金银花 连翘 白芷【各七分】 甘草【五分】

右每三五钱水煎服

八正散 治下焦积热大小便不通或小便淋沥脉症俱实者

大黄【酒炒】 车前子【炒】 瞿麦 篇蓄 山梔【炒】

木通【各一钱】 滑石【煨二钱】 甘草【一钱】

右每二钱水煎服

凉膈散 治上焦实热烦渴面目赤热头昏咽燥咽痛口疮便溺赤澀狂言谵妄睡卧不安

大黄 朴硝 甘草【各二两】 连翘

梔子仁 薄荷叶【各三钱】

右为末每服一钱竹叶蜜些少煎服

解毒防风汤 治痘疮毒气炽盛

防风 地骨皮 黄芪 白芍药【炒】

荆芥 牛蒡子

右每服四钱水煎服或为末白汤调下

人参理中汤 治中气虚热

人参 白术【炒】 甘草【炙各等分】

右每服一钱姜枣水煎服为末姜汁糊丸菉豆大每服二三十丸白汤下亦可

六君子汤 治脾胃虚弱不思乳食或呕吐泄泻饮食不化或时患饮食停滞

人参 白术 茯苓【各二钱】 陈皮 半夏 甘草【炙各一钱】

右每服二三钱姜枣水煎

补中益气汤 治中气不足困睡发热或元气虚弱感冒风寒诸症

黄芪【炙】 人参 白术【炒】 甘草【炙】 当归 陈皮【各五分】 升麻 柴胡【各二分】

右姜枣水煎

泻黄散 治脾胃实热

藿香叶 甘草【各七钱半】 山梔仁【一两】 石膏【半两】 防风【二两】

右用蜜酒微炒为末每服一二钱水煎

五味异功散 治脾胃虚弱吐泻不食

人参 茯苓 白术 甘草【炒】 陈皮【各等分】

右为末每服三钱姜枣水煎

四君子汤 治脾虚饮食不化或泄泻呕吐

人参 白茯苓 白术 甘草【炙各五分】

右水煎服

四物汤 治肝脾血虚发热日晡益甚或烦躁不宁当归【二钱】 熟地黄【二钱】 川芎【五分】 白芍药【炒一钱】

右作二剂水煎服

桔梗汤 治咳嗽吐脓痰中有血已成肺痈

桔梗【炒】 贝母 当归【酒浸】 瓜蒌仁 枳壳【麸炒】

薏苡仁 桑白皮【炒】 百合【蒸各一钱五分】 五味子【炒】 甜葶苈【炒】 地骨皮 知母【炒】 甘草节 防己 黄芪 杏仁【炒各五分】

右每服一二钱水煎

四顺清凉饮 治积热颊赤作渴四肢惊悸大便秘澹

芍药 当归 甘草 大黄【各等分】

右每服一钱水煎

蟾蜍丸 治无辜疔症一服虚热退二服烦渴止三服泻痢愈

蟾蜍【一枚夏月沟渠中取腹大不跳不鸣身多?者】

右取粪蛆一杓置桶中以尿浸之却将蟾蜍跌死投与蛆食一昼夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出瓦上焙乾为末入麝香一字粳米饭丸麻子大每服二三十丸米饮下甚效

人参败毒散 治伤风时气寒热咳

人参 茯苓 甘草【炒】 前胡 川芎

羌活 独活 桔梗 柴胡 枳殼【各等分】

右为末每服一二钱生姜薄荷水煎

仙方活命饮 治一切疮毒未成内消已成即溃此消毒排脓止痛之圣药也若脓出而肿痛不止元气虚也当用托里散之类

穿山甲 白芷 防风 没药 甘草 赤芍药 当归尾 乳香 天花粉
贝母【各一钱】 金银花 陈皮【各三钱】 皂角刺【二钱】

右每服二三钱酒水各半煎

神效隔蒜灸法 治痘疗毒气炽盛使诸痘不能起发已起发者不能贯脓已贯脓者不能收靥或大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒随火而散京师尝见治此者即以线针挑破出毒血诸毒随时贯脓若挑破不痛不出血者难治若用此法灸之即知痛更用针挑破紫血随出诸痘随贯亦有生者其法用大蒜头切三分厚安痘疗上用小艾炷於蒜上灸之每五壮易蒜再灸若紫血出後肿痛不止尤宜当灸治者审之

神效当归膏治痘毒津淫或汤火等疮不问已溃未溃

麻油【六两】 当归 黄蜡 生地黄【各一两】

右先将当归地黄入油煎黑去查入蜡熔化候冷搅匀即成膏矣

蛇蛻散 治痘毒目翳

蛇蛻【二钱为末】 瓜蒌仁【半两研烂】

右用羊肝一片批开入药末二钱线扎紧用米泔煮熟频与儿食或乳母食

荆芥甘草防风汤 解痘毒

荆芥 甘草 防风【各等分】

右每服一钱水煎

防风芍药甘草汤 解痘毒

防风 芍药 甘草【各等分】

右每服一钱水煎

麻黄甘草汤 治表实痘毒炽盛

麻黄【五分】 生甘草【三分】

右水煎服

轻粉散 治出痘眼内生翳

真轻粉 黄丹【各等分】

右研左眼有翳吹入右耳右眼有翳吹入左耳更以菉豆皮谷精草白菊花各一两为末每服三钱乾柿一枚米泔一盏煎乾将柿去核食之不拘时候日三枚成都方士禹太和云治痘疮黑陷垂死者用壁间喜蛛如黄豆者一枚搗烂若一岁儿用雄黄一厘二岁者用二厘十岁者一钱再同蜘蛛研匀用好烧酒一杯调和徐徐服之余意此方即同前十二味与十一味异功散之相类也若因阳气虚寒不能营运周身以致四肢逆冷腹胀唇青其色黑陷者宜用烧酒若因元气虚乏或色淡白隐隐见於肌肤而不能起发者宜用陈酒亦可不可拘滞於烧酒也若小儿未周岁者宜酌量与饮之亦不可拘於杯许也又有一等气血俱虚者或色淡红而不光泽又不起发或惊悸咬牙用紫草与红花以陈煮酒浓煎与儿服之亦可以保其全生也用者宜审诸

抱龙丸 治痰热喘嗽发热惊悸不安亦能发痘疮胆星【四两】 天竺黄【一两】 雄黄 朱砂【各半两】 射香【少许】

右为细末用甘草一筋煮汁为丸每一两作二十丸用薄荷或灯心草汤化下

造胆星法南星不拘多少腊月腊水浸洗切块晒乾为末用黄牛胆汁拌匀仍用牛胆殼装入填满以线扎口悬挂当风处陰乾隔年方可用

愚按前方清热豁痰利气之药过剂则脾肺复伤而反不愈或更加胸腹作胀饮食作呕者宜用人参白术散培补中气

五福化毒丹 治胎毒及痘後头面生疮眼目肿痛生地黄 熟地黄
天门冬【去心】 麦门冬【去心】

玄参【各二两】 甘草 甜硝【各三两】 青黛【一两五钱】

右为末炼蜜丸芡实大每服一丸白汤化下

愚按前方生血凉血解毒寒中之剂用之得宜殊有良验不过一二丸

犀角消毒丸 治诸积热及痘疹後余毒生疮

生地黄 防风 当归 犀角屑【镑】

荆芥【各一两】 牛蒡子【杵炒】 赤芍药 连翘

桔梗【各七钱】 薄荷 黄芩【炒】 甘草【各半两】

右为末炼蜜丸芡实大每服一丸薄荷汤下

愚按前方清热解表凉血破血消毒损胃之剂多不过一二服大凡痘毒当参前痘疮悞饮冷水韶粉散治法用之余仿此

败草散 治痘疮挝搔成疮脓水淋漓谓之斑烂用屋烂草或盖墙烂草多年者佳如无旷野生者尤佳为末搽之

愚按前症亦有气血虚热而不愈者如遍身患者须多掺铺席上令儿坐卧其疮即愈

羊肝散 治痘毒入眼或无辜疳气入眼

蜜蒙花 青箱子 决明子 车前子【炒】

右为末用蜜蒙花末三钱余药各一钱拌匀用羊肝一大叶竹批掺上湿纸裹煨熟空心早食之

愚按前症若因肝经风热伤血宜用本方若因肝经血虚风燥宜用四物汤加山梔钩藤钩牡丹皮若因肝经血虚生风或肾水不能生肝木宜用六味丸若成肝疳者用六味地黄丸以滋

肝肾用四味肥儿丸加人参白术以补肝脾

一小儿痘疮目生昏翳或作或彻服退翳之药不愈诊之脉弦细而数此乃肝肾有痼症余用九味芦荟丸及六味地黄丸又与轻粉黄丹散寻愈

一小儿患两目赤肿痛不可当此肝火为患用四物合小柴胡加山梔牛蒡子生甘草倍用谷精草数剂而愈

一小儿痘愈後眼痛不开用犀角地黄汤加柴胡汤一剂而开又生赤翳迷满仍用前药加谷精草治之而愈

蝉菊散 治癰疮入眼或病後生翳障

蝉蜕【洗淨去土】白菊花【各等分】

右每服二钱水一盞入蜜少许煎乳食後量儿大小与之

羌菊散 治痘毒上攻生翳并暴赤羞明

羌活 蝉蜕 防风 蛇蜕 菊花 谷精草 木贼 甘草 山梔子 白蒺藜 大黄

黄连 沙苑蒺藜【各等分】

右为末每服一钱清米泔温煖调下

丹粉散 治痘毒脓水淋漓

轻粉 黄丹【各五分】 黄连末【二钱】

右研匀搽患处

羚羊角散 治小儿癰疹後余毒不解上攻眼目生翳羞明眵泪俱多红赤肿闭

羚羊角【镑】 黄芩 黄芩 草决明 车前子 升麻 防风 大黄 芒硝【各等分】

右以水一 煎半 去滓稍热服

消毒化癰汤 治小儿癰疹未滿二十一日而目疾作者余症上同【即消毒救苦汤】

羌活【五分】藁本【二分】细辛【一分】黄连【三分】黄芩【一分】酒芩【二分】
酒栝【三分】生地黄【三分】麻黄【五分】升麻【五分】白术【一分】苍术【二分】
生甘草【一分】吴茱萸【半分】陈皮【一分】红花【半分】苏木【一分】当归【
二分】连翘【三分】防风【五分】川芎【五分】葛根【一分】柴胡【二分】

右作一服水二 煎至一 去滓稍热服

谷精草散 治痘疹已靨翳膜遮障瞳子等症

谷精草【一两】蛤粉 黑豆【各二两】

右为末用雄猪肝一叶竹刀批开掺药在内以麻线缚定砂罐内水煮熟令儿食之

当归补血汤 治血气损伤或妄服峻剂致气血益虚肌热大渴引饮目赤面红脉洪大而虚重
按全无此病多得於饥饱劳役者

黄芪【炙一两】当归【三钱酒制】

右水煎乳母同服

济生犀角地黄汤 治鬱热不解经络随气涌泄为衄血或清道闭塞流入胃脘吐血或余血停
滯面色痿黄大便色黑者

犀角 生地黄 白芍药 牡丹皮【各一钱】

右水煎服乳母同服

四神丸 治脾胃虚弱大便不实饮食不思或泄利腹痛等症

肉豆蔻【二两】补骨脂【四两】五味子【二两】吴茱萸【浸炒一两】

右为末生姜八两红枣一百枚煮熟取枣肉和末丸桐子大每服五七十丸空心或食前白汤
服去五味子吴茱萸名二神丸

四味肥儿丸 治小儿食积五疳或白秃体瘦肚大筋青髮稀成穗或遍身疮疥等症

芫荽【炒】神麴【炒】麦蘖【炒】黄连【各等分】

右为末猪胆汁丸黍米大每服一二十丸木通煎汤下

九味芦荟丸 治小儿肝脾疳积体瘦热渴大便不调或瘰癧结核耳内生疮等症

胡黄连 黄连 芦荟 木香 茺萸【炒】

青皮 白雷丸 鹤膝草【各一两】 麝香【三钱】

右为末蒸饼糊丸麻子大每服一钱空心白汤下

大茺萸汤【一名梔子茯苓汤】 治小儿脾疳少食发热作渴大便不调髮黄脱落面黑便清鼻下生疮能乳食土等症山梔【三分】 黄栢 甘草【炙各二分】 茺萸【五分】 黄连

防风【各二分】 麻黄 羌活 柴胡【各三分】 白术

茯苓 当归【各四分】

右每服二三钱水煎

济生归脾汤 治脾血亏损健忘惊悸等症

人参 黄芪 茯神【各一钱】 甘草【炙五分】

木香【五分】 白术【炒一钱】 远志 酸枣仁【炒】

龙眼肉 当归【各一钱】

右水煎服

愚按前方若乳母忧思伤脾血虚发热食少体倦或脾不能摄血以致妄行吐下或健忘怔忡惊悸少寐或心脾作痛自汗盗汗或肢体肿痛大便不调或经候不准哺热内热或唇疮流注等症致为患者用之令子母俱服

八味地黄丸即钱氏地黄丸加肉桂附子各一两愚按前方治禀赋命门火衰不能生土以致脾土虚寒或饮食少思或食而不化脐腹疼痛夜多漩溺等若病久元气耗损所致尤宜用之或乳母命门火衰儿饮其乳以致前症者母宜服之

加減八味丸即六味地黄丸加肉桂一两五味子四两治禀父肾陰不足眩吐泻久病津液亏损口乾作渴或口舌生疮两足发热或痰气上涌或手足厥冷等症

八珍汤即前四君子四物二汤相合

愚按前方治气血俱虚或因尅伐之剂脾胃亏损肌肉消瘦发热寒热饮食少思等症

十全大补汤即八珍汤加黄芪肉桂

愚按前方气血虚弱或禀赋不足寒热自汗食少体瘦发热作渴头痛眩暈

逍遥散【加牡丹山梔名加味逍遥散】

当归 甘草【炙】 芍药【酒炒】 茯苓 白术

柴胡【各一钱】 牡丹皮 山梔【炒各七分】

右水煎服

愚按前方若乳母肝脾血虚内热或遍身搔痒寒热或肢体作痛头目昏重或怔忡颊赤口燥咽乾或发热盗汗食少不寐或口舌生疮耳内作痛或胸乳腹胀小便不利致儿为患者尤宜用之

九味龙胆泻肝汤 治肝经湿热或囊痈下疳便毒小便澀滯或陰囊作痛小便短少【愚制】

木通 车前子【炒】 当归尾 泽泻【各五分】 甘草 黄芩 生地黄
山梔【各三分】 龙胆草【酒炒五分】

右水煎母子同服

抑肝散 治肝经虚热发搐或发热咬牙或惊悸寒热或木乘土而呕吐痰涎腹膨少食睡卧不安【愚制】 软柴胡 甘草【各五分】 川芎【八分】 当归

白术【炒】 茯苓 钩藤钩【各一钱】

右水煎子母同服

梔子清肝散【一名柴胡梔子散】 治三焦及足少阳经风热耳内作痒生疮或水出疼痛或胸乳间作痛或寒热往来柴胡【一钱】 梔子【炒一钱】 牡丹皮【一钱】 茯苓 川芎

芍药 当归 牛蒡子【炒各七分】 甘草

右水煎子母服若太阳头痛加羌活

柴胡清肝散 治鬢疽及肝胆三焦风热怒火之症或项胸作痛疮毒发热【愚制】

柴胡【一钱半】 黄芩【炒】 人参 川芎【各一钱】

山梔【炒一钱】 连翘 甘草【五分】 桔梗【八分】

右水煎子母同服

小柴胡汤【加山梔牡丹皮名加味小柴胡】 治伤寒温热身热恶风头痛项强四肢烦疼往来寒热呕哕痰实中暑疟疾并服之【阎注】

柴胡【二钱】 黄芩【炒一钱半】 人参 半夏【各七分】 甘草【炙五分】

右姜水煎子母同服

愚按前方若肝胆经风热肝火癰癤寒热往来日晡发热潮热身热不欲饮食或怒火口苦耳聋咳嗽或脇痛胸满小便不利或泄泻吐酸苦水或肢体搐动唇目抽劄并宜用之

砭法 治丹毒疔疮红丝走散或时毒瘀血壅盛或色赤走彻用细磁器击碎取有锋芒者以筋劈开头夹之麻线纏定两指轻撮筋稍令磁芒正对患处悬寸许再用筋频击

神功散 治痘毒肿焮作痛未成者敷之即散已溃者敷之肿痛即消

黄栢【炒】 草乌【炒】 血竭【加】

右为末等分津调敷患处

制附子法

附子重一两三四钱有莲花瓣头圆底平者先备童便五六碗将附子先放在竈上烟柜中间良久乘热投入童便浸五七日候润透揭皮切四块仍浸二三日用粗纸数层包之浸湿埋灰火半日取出切片检视有白星者乃用瓦上炙热至无白星为度如急用即切大片用童便煮二三沸热瓦熟用之

丹溪先生解疮毒药

丝瓜 升麻 芍药【酒炒】 生甘草 山查

黑豆 赤小豆 犀角【镑各等分】

右为麤散每服三钱水一大盏煎至六分去滓不拘时徐徐温服量大小加减

稀痘方

用老鼠去皮取肉水煮熟量儿大小与食数次出痘甚稀未食荤时与食尤效屡试屡验

薛氏医案卷七十七