Classical Problems of QM

——量子力学经典习题——

Author: Zhao H.Q.

2026 年 4 月 18 日

Quantum Mechanics / Spin Dynamics / Larmor Precession

例题 1.

自旋为 $\frac{1}{2}$ 体系随时间的演化设一粒子一开始处于 $S_x = 1/2$ 的本征态，现在加入沿 Z 轴的磁场 $\overrightarrow{B} = B \cdot \overrightarrow{e_z}$

(1): 请问任意 t 时刻粒子处于什么状态？

(2): 请问任意 t 时刻处于 $S_x = 1/2$ 状态的概率是多少？$S_x = -1/2$ 呢？

(3): 任意 t 时刻的 $< \hat{S}_x >$ 是多少？$< \hat{S}_y >$ 和 $< \hat{S}_z >$ 呢？

解: 粒子一开始处于 $S_x = \hbar/2$ 状态，因此：

$$\psi(0) = |+>$$

要求 t 时刻，即:

$$\psi(t) = \hat{U}(t)\psi(0) = e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}\psi(0)$$

其中

$$\hat{H} = -\hat{\overrightarrow{\mu}} \cdot \overrightarrow{B} = -\hat{\mu_s}B = -\gamma_s \hat{S}_z B$$

其中 γ_s 为旋磁比

带入上式：

$$\psi(t) = e^{\frac{i\gamma_s \hat{S}_z B}{\hbar}} \cdot |+> = e^{\frac{i\gamma_s \hat{S}_z B}{\hbar}} \cdot (\frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow>) + \frac{1}{\sqrt{2}}|\downarrow> = e^{\frac{i\gamma_s \frac{\hbar}{2} B}{\hbar}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow> + e^{\frac{i\gamma_s - \frac{\hbar}{2} B}{\hbar}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}|\downarrow>$$

其中：

$$|\uparrow> = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\downarrow> = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

, 在 Z 表象

于是我们可以得到：

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{\frac{i\gamma_s \frac{\hbar}{2} B}{\hbar}} \\ e^{\frac{i\gamma_s - \frac{\hbar}{2} B}{\hbar}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \\ e^{-i\omega t} \end{pmatrix}$$

(2):t 时刻处于 $S_x = \frac{\hbar}{2}$ 和 $-\frac{\hbar}{2}$ 的概率

$$P_{\frac{\hbar}{2}} = |<+|\psi(t)>|^2 = [\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \\ e^{-i\omega t} \end{pmatrix}]^2 = cos^2(\omega t)$$

注：其中用了欧拉公式：$e^{i\omega} = cos\omega + isin\omega$

与上式同理可求得

$$P_{\frac{\hbar}{2}} = sin^2(\omega t)$$

(3):t 时刻 S_z, S_x, S_y 的平均值：

$$< \hat{S}_x > = < \psi(t)|\hat{S}_x|\psi(t) > = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{i\omega t}, e^{-i\omega t}) \cdot \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \\ e^{-i\omega t} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} cos(2\omega t)$$

同理可得：

$$< \hat{S}_y >= \frac{\hbar}{2} sin(2\omega t)$$
$$< \hat{S}_z >= 0$$

相当于粒子在 XoY 平面上做 Lammor 进动

例题 2.
一个质量为 μ 的粒子在一维势场中：

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a \\ -V_0, & |x| < a \end{cases}$$

运动，其中 $V_0 > 0$，求存在且仅存在一个解的条件



图 1: 有限深势井示意图

将上式带入定态薛定谔方程：

$$V(x) = \begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = E\psi(x), & |x| > a \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = (E+V_0)\psi(x) & |x| < a \end{cases}$$

其解为：

$$V(x) = \begin{cases} \psi_1(x) = C_1 e^{\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}x} + C_2 e^{-\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}x}, & |x| > a \\ \psi_2(x) = C_3 e^{\sqrt{\frac{-2m(E+V_0)}{\hbar^2}}x} + C_4 e^{-\sqrt{\frac{-2m(E+V_0)}{\hbar^2}}x} & |x| < a \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \psi_1(x) = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{-\alpha x}, & |x| > a \\ \psi_2(x) = C_3 e^{i\beta x} + C_4 e^{-i\beta x} & |x| < a \end{cases}$$

$$\rightarrow \psi_2(x) = C_5 cos(\beta x) + C_6 sin(\beta x), |x| \leq a$$

这里我们先不带入边界条件求解，我们注意到势场是偶函数，则 $\psi(x)$ 具有确定的宇称 (奇偶不能确定)，下面我们分情况讨论：
(1): 偶宇称：

有边界条件：$\psi(x)$ 在边界处连续，一阶导数在边界处 (非奇异点) 也连续：

$$\begin{cases} C_1 = C_2 = A \\ Ae^{\alpha x}, x > a \\ Ae^{\alpha x}, x < -a \\ C_5 = B \\ Bcos(\beta x), |x| \leq a \end{cases}$$

联立求解我们可以得到：

$$\xi tan(\xi) = \eta$$

其中：

$$\xi = \beta a$$

$$\eta = \alpha a$$

下面我们来考虑奇宇称的情况：(2): 奇宇称：
有边界条件：$\psi(x)$ 在边界处连续，一阶导数在边界处 (非奇异点) 也连续：

$$\begin{cases} C_1 = -C_2 = A' \\ A'e^{\alpha x}, x > a \\ -A'e^{\alpha x}, x < -a \\ C_6 = B' \\ B'sin(\beta x), |x| \leq a \end{cases}$$

联立求解我们可以得到：

$$\xi cot(\xi) = -\eta$$

这里根据 ξ 和 η 的定义，有：

$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{2ma^2V_0}{\hbar^2} = Q^2$$

也就是说 ξ 和 η 应该同时满足超越方程和圆方程：

现在的结果已经比较清晰了，我们只要找到圆和超越方程对应图形的交点即可知道有几个束缚态，下面是示意图：



图 2: 示意图 (蓝色为 tan，绿色为 cot)

结果，当：

$$\sqrt{\frac{2ma^2V_0}{\hbar^2}} < \frac{\pi}{2}$$

时，仅有一个束缚态

例题 3.