

# 信息学中的概率统计：期末考试答案

## 第一题

(1)

$$\frac{dQ}{d\beta} = 2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \beta x_i).$$

令  $\frac{dQ}{d\beta} = 0$ , 得

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

(2)

$$E(\hat{\beta}) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i E(y_i)}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \beta.$$

因此  $\hat{\beta}$  的偏差为 0。对于无偏估计量, 有

$$\text{MSE}(\hat{\beta}) = \text{Var}(\hat{\beta}) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \sigma^2}{(\sum_{i=1}^n x_i^2)^2} = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

## 第二题

(1)  $E(X_i) = \frac{1}{\lambda}$ ,  $\text{Var}(X_i) = \frac{1}{\lambda^2}$ 。因此  $E(Y) = \frac{n}{\lambda}$ ,  $\text{Var}(Y) = \frac{n}{\lambda^2}$ 。

(2) 由切比雪夫不等式,

$$P(Y \geq a) \leq P(|Y - n/\lambda| \geq a - n/\lambda) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{(a - n/\lambda)^2} = \frac{n}{(\lambda a - n)^2}.$$

(3) 注意到  $Y \sim \Gamma(n, \lambda)$ 。根据作业三第六题, 当  $t \geq \lambda$ ,  $M_Y(t)$  不存在。当  $t < \lambda$ ,

$$M_Y(t) = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t) = \left( \frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^n.$$

另一种做法: 注意到

$$M_{X_i}(t) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} \cdot e^{xt} dx = \int_0^\infty e^{-(\lambda-t)x} dx.$$

当  $t < \lambda$ , 有  $M_{X_i}(t) = \frac{\lambda}{\lambda-t}$ 。当  $t \geq \lambda$ , 期望不存在。因此, 当  $t < \lambda$ ,

$$M_Y(t) = e^{Yt} = e^{t \cdot \sum_{i=1}^n X_i} = \prod_{i=1}^n e^{X_i t} = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t) = \left( \frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^n.$$

当  $t \geq \lambda$ ,  $M_Y(t)$  不存在。

(4) 根据 Chernoff bound, 当  $t > 0$ ,

$$P(Y \geq a) = P(e^{Yt} \geq e^{at}) \leq M_Y(t)e^{-at} = \left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^n \cdot e^{-at}.$$

带入  $t = \lambda - n/a$ , 注意到  $0 < t < \lambda$ , 有

$$P(Y \geq a) \leq (\lambda a/n)^n e^{-(\lambda a - n)}.$$

### 第三题

(1) 与作业五第二题第一问一致, 对于任意  $0 < u < 1$ ,

$$f_U(u) = \int_0^1 f_X(x)f_Y(u-x)dx = u.$$

对于任意  $1 < u < 2$ ,

$$f_U(u) = \int_0^1 f_X(x)f_Y(u-x)dx = 2-u.$$

(2) 注意到  $x = v/2$ ,  $y = u - v/2$ . 因此  $\frac{\partial x}{\partial u} = 0$ ,  $\frac{\partial x}{\partial v} = 1/2$ ,  $\frac{\partial y}{\partial u} = 1$ ,  $\frac{\partial y}{\partial v} = -1/2$ .

$$|J| = \left| \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right| = 1/2.$$

因此,

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} 1/2 & u \in (0, 2), v \in [\max\{0, 2(u-1)\}, \min\{2, 2u\}] \\ 0 & \text{其余情况} \end{cases}.$$

(3) 当  $0 < u < 1$ ,

$$f(v|u) = \frac{f_{U,V}(u, v)}{f_U(u)} = \begin{cases} \frac{1}{2u} & v \in (0, 2u) \\ 0 & \text{其他情况} \end{cases}.$$

当  $1 < u < 2$ ,

$$f(v|u) = \frac{f_{U,V}(u, v)}{f_U(u)} = \begin{cases} \frac{1}{2(2-u)} & v \in (2(u-1), 2) \\ 0 & \text{其他情况} \end{cases}.$$

(4)

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = E(2X^2) + E(2XY) - 2(E(X) + E(Y))E(X) = 2E(X^2) - 2(E(X))^2 = \frac{1}{6}.$$

$$\sigma(U) = \sqrt{\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)} = \frac{1}{\sqrt{6}}, \sigma(V) = \sqrt{4\text{Var}(X)} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$\text{Corr}(U, V) = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sigma(U)\sigma(V)} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

## 第四题

(1) 根据提示, 以及服从自由度为 2 的卡方分布的随机变量的期望为 2, 有  $E(X^2) = \theta$ 。因此

$$\hat{\theta}_1 = A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, \quad E(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \theta = \theta。$$

因此  $\hat{\theta}_1$  是无偏估计量以及渐进无偏估计量。

(2)

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln(2x_i) - n \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta}。$$

求导, 得

$$\frac{dL}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta^2}。$$

因此,

$$\hat{\theta}_2 = A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \hat{\theta}_1。$$

(3) 由于  $\hat{\theta}_2$  是无偏估计量, 有  $\text{MSE}(\hat{\theta}_2) = \text{Var}(\hat{\theta}_2)$ 。根据提示, 以及服从自由度为 2 的卡方分布的随机变量的方差为 4, 有  $\text{Var}(X_i^2) = \theta^2 \cdot 4/4 = \theta^2$ 。因此,

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_2) = \text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{\theta^2}{n}。$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{MSE}(\hat{\theta}_2) \rightarrow 0$ , 因此  $\hat{\theta}_2$  为一致估计量。也可以使用大数定律判断一致性。

(4) 令枢轴量

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i^2}{\theta},$$

根据提示有  $G \sim \chi^2(2n)$ 。令  $F(x)$  为  $\chi^2(2n)$  分布的分布函数, 则有

$$P(F^{-1}(\alpha/2) \leq G \leq F^{-1}(1 - \alpha/2)) = 1 - \alpha,$$

因此

$$P\left(\frac{2 \sum_{i=1}^n X_i^2}{F^{-1}(1 - \alpha/2)} \leq \theta \leq \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i^2}{F^{-1}(\alpha/2)}\right) = 1 - \alpha。$$

## 第五题

(1) 令  $f(x)$  为  $Y_n$  的概率密度函数。

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty P(Y_n > x) dx - \int_{-\infty}^0 P(Y_n < x) dx \\ &= \int_0^\infty \int_x^\infty f(y) dy dx - \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^x f(y) dy dx \\ &= \int_0^\infty f(y) \int_0^y dx dy - \int_{-\infty}^0 f(y) \int_y^0 dx dy \\ &= \int_0^\infty f(y) y dy + \int_{-\infty}^0 f(y) y dy \\ &= E(Y_n) \end{aligned}$$

(2) 根据 Chernoff bound 或作业三第五题,

$$P(X_i \geq 10\sqrt{\ln n}) \leq e^{-100 \ln n / 2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

根据 Union bound,

$$P(\max X_i \geq 10\sqrt{\ln n}) \leq 1/n.$$

(3) 根据第一问

$$E(Y_n) \leq \int_0^{10\sqrt{\ln n}} P(Y_n > x) dx + \int_{10\sqrt{\ln n}}^{\infty} P(Y_n > x) dx.$$

注意到, 对于任意  $x > 0$ ,  $P(Y_n > x) < 1$ , 因此第一段最多为  $10\sqrt{\ln n}$ 。对于第二段积分, 根据 Union bound,  $P(Y_n > x) \leq nP(X_i > x)$ , 因此有

$$\int_{10\sqrt{\ln n}}^{\infty} P(Y_n > x) dx \leq n \cdot \int_{10\sqrt{\ln n}}^{\infty} P(X_i > x) dx.$$

根据 Chernoff bound 或作业三第五题,

$$\int_{10\sqrt{\ln n}}^{\infty} P(X_i > x) dx \leq \int_{10\sqrt{\ln n}}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = P(X_i \geq 10\sqrt{\ln n}) \cdot \sqrt{2\pi}.$$

根据第二问, 有

$$\int_{10\sqrt{\ln n}}^{\infty} P(Y_n > x) dx \leq n \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{n^2} = \frac{\sqrt{2\pi}}{n}.$$

因此,

$$E(Y_n) \leq 10\sqrt{\ln n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{n}.$$

另一种 (不在课程范围内的) 做法,

$$E(e^{Y_n t}) = E(e^{t \cdot \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}}) \leq E\left(\max_{1 \leq i \leq n} e^{t X_i}\right) \leq E\left(\sum_{i=1}^n e^{t X_i}\right) \leq n \cdot E(e^{t X_i}) = n e^{t^2/2}.$$

根据琴生不等式,

$$e^{E(Y_n t)} \leq n e^{t^2/2},$$

因此, 当  $t > 0$ , 有

$$E(Y_n) \leq \frac{\ln n + t^2/2}{t}.$$

取  $t = 10\sqrt{\ln n}$  即可。

(4) 注意到

$$E(Y_n) \geq \int_0^{0.1\sqrt{\ln n}} P(Y_n > x) dx - \int_{-\infty}^0 P(Y_n < x) dx.$$

对于第一项, 可以使用下面的粗糙估计

$$P(X_i \geq 0.1\sqrt{\ln n}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{0.1\sqrt{\ln n}}^{0.1\sqrt{\ln n}+1} e^{-x^2/2} dx \geq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\ln n} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}n} \geq \frac{1}{3n}.$$

(上述不等式的另一种证明方法是使用作业三第五题, 得到

$$P(X_i \geq 0.1\sqrt{\ln n}) \geq \frac{0.1\sqrt{\ln n}}{0.01 \ln n + 1} \cdot e^{-0.005 \ln n} / \sqrt{2\pi},$$

而对于充分大的  $n$ , 上式不等号右边至少是  $\frac{1}{3n}$ 。) )

因此,

$$P(Y_n \geq 0.1\sqrt{\ln n}) \geq 1 - \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n \geq 1 - 1/e^{1/3},$$

也即

$$\int_0^{0.1\sqrt{\ln n}} P(Y_n > x) dx \geq 0.1\sqrt{\ln n} \cdot P(Y_n > 0.1\sqrt{\ln n}) \geq (1 - 1/e^{1/3}) \cdot 0.1\sqrt{\ln n}.$$

另外, 对于第二段积分,

$$\int_{-\infty}^0 P(Y_n < x) dx = \int_{-\infty}^0 (P(X_i < x))^n dx \leq \int_{-\infty}^0 P(X_i < x) dx = \int_0^{\infty} P(X_i > x) dx \leq \int_0^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

(注意上面的估计非常粗糙, 事实上可以证明

$$\int_{-\infty}^0 P(Y_n < x) dx \leq \sqrt{\frac{\pi}{2n}},$$

但即使上面的粗糙估计也足够证明本题需要的结论。)

因此

$$E(Y_n) \geq (1 - 1/e^{1/3}) \cdot 0.1\sqrt{\ln n} - \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$