

信息学中的概率统计：作业一

截止日期：2024 年 9 月 27 日（周五）下课前。如无特殊情况，请不要提交电子版！

第一题

对于 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n ，从概率的公理化定义和条件概率的定义出发证明下述结论。

(1) 一般加法公式：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)。$$

(2) 一般 Union Bound：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)。$$

(3) 一般乘法公式：若 $P(A_1 A_2 \dots A_n) > 0$ ，有

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})。$$

第二题

对于三个事件 A ， B 和 C ，若 $P(C) > 0$ ，我们称事件 A 和 B 在事件 C 发生时是条件独立的，当且仅当

$$P(AB | C) = P(A | C)P(B | C)。$$

对于下述命题，从概率的公理化定义和条件概率的定义出发给出证明，或给出反例。

- (1) 事件 A 和 B 在事件 C 发生时是条件独立的，且有 $0 < P(C) < 1$ ，则事件 A 和 B 在事件 \bar{C} 发生时条件独立。这里，事件 \bar{C} 是事件 C 的对立事件。
- (2) 事件 A 和 B 相互独立，则对于任意事件 C ，若 $P(C) > 0$ ，事件 A 和 B 在事件 C 发生时是条件独立的。
- (3) 事件 A 和 B 相互独立，则事件 A 和事件 \bar{B} 相互独立。这里，事件 \bar{B} 是事件 B 的对立事件。

第三题

在课上，我们考虑了如下球与桶模型：有 $n \geq 1$ 个球，每个球都等可能被放到 $m \geq 1$ 个桶中的任一个。用 $P_{n,m}$ 表示每个桶中至多有一个球的概率。在课上，我们已经证明了，

$$P_{n,m} \leq e^{-\frac{n(n-1)}{2m}}。$$

现在, 请证明

$$P_{n,m} \geq e^{-\frac{n(n-1)}{2m}} \cdot \left(1 - \frac{8n^3}{m^2}\right).$$

提示: 证明对于任意 $0 \leq x \leq 1/2$,

$$\ln(1-x) \geq -x - x^2.$$

第四题

将一枚骰子投掷 $n \geq 1$ 次, 求在 n 次投掷中, 六个数字均出现过至少一次的概率。

第五题

某路由器有 A 和 B 两种运行模式。路由器每天有等概率以 A 模式或者 B 模式运行, 且每天的运行模式均独立。当以 A 模式运行时, 有 90% 的概率网络堵塞, 有 10% 的概率网络正常。当以 B 模式运行时, 有 10% 的概率网络堵塞, 有 90% 的概率网络正常。若某两天观测到网络堵塞, 求这两天路由器均以 A 模式运行的概率。

第六题

对于自然数 n, m 和 k , 满足 $m \geq 2k$ 。有 $2n$ 个 $\{1, 2, \dots, m\}$ 的子集 $A_1, B_1, A_2, B_2, \dots, A_n, B_n \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$, 满足

- 对于任意 $1 \leq i \leq n$, 有 $|A_i| = |B_i| = k$;
- 对于任意 $1 \leq i \leq n$, 有 $A_i \cap B_i = \emptyset$;
- 对于任意 $1 \leq i, j \leq n$, 若 $i \neq j$, 有 $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ 。

(1) 考虑一个 $\{1, 2, \dots, m\}$ 的随机排列, 每一种排列均等概率出现。对于任意 $1 \leq i \leq n$, 事件 U_i 表示在随机排列中, 集合 A_i 中的元素均排在 B_i 前面。证明

$$P(U_i) = \frac{1}{\binom{2k}{k}}.$$

(2) 证明 $n \leq \binom{2k}{k}$ 。提示: 考虑事件 $\bigcup_{i=1}^n U_i$ 的概率。

(3) 对于 $n = \binom{2k}{k}$, 构造满足条件的 $A_1, B_1, A_2, B_2, \dots, A_n, B_n \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ 。这里 m 可取任意自然数。