

Определение интеграла Римана через интегральные суммы

26 сентября 2022

$\Pi \subset \mathbb{R}^n$, $f : \Pi \rightarrow \mathbb{R}$ орг.

p – разбиение Π , $= \{\pi_i, i = 1, \dots, N\}$

$\Xi = \{\xi_i \in \pi_i, | i = 1, \dots, N\}$

$\sum(f, p, \Xi) := \sum_{i=1}^N f(\xi_i)v(\pi_i)$ – интегральная сумма Римана

Определение. Если $\exists I \in \mathbb{R} : \forall \{p_k\}_{k=1}^\infty : d(p_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 \ \forall \{\Xi\}_{k=1}^\infty$

$$\sum(f, p_k, \Xi_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} I, \text{ то } f \text{ интегрируема по Риману и } I = \int_{\Pi}$$

Теорема 1.

$$\exists I \ \forall \{p_k\} : d(p_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 \ \forall \{\Xi\} \ \sum(f, p_k, \Xi_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} I \Leftrightarrow \int_{\Pi} = \overline{\int}_{\Pi} = \int_{\Pi}$$

Доказательство.

$$\Rightarrow \varepsilon, p_k : d(p_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 \ \forall \pi \in p_k \ \exists \xi \in \pi :$$

$$f(\xi) - \inf_{\pi} f < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} \text{Получим } \sum(f, p_k, \Xi_k) - L(f, p_k) &= \sum_{\pi \in p_k} (f(\xi(\pi)) - \inf_{\pi} f) \cdot v(\pi) < \\ < \varepsilon \cdot \sum_{\pi \in p} v(\pi) = \varepsilon \cdot v(\pi) \end{aligned}$$

$$\text{По Л. 3 } L(f, p_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \int_{\Pi} \Rightarrow 0 \leq I - \int_{\Pi} \leq \varepsilon \cdot v(\pi)$$

$$\left. \begin{array}{l} \forall \varepsilon \Rightarrow \int_{\Pi} = I \\ \text{Аналогично } \overline{\int}_{\Pi} = I \end{array} \right\} \Rightarrow \exists \int_{\Pi} = I$$

$$\Leftarrow \text{ Пусть } \int_{\Pi} = \overline{\int}_{\Pi} = \int_{\Pi}. \text{ Возьмем произвольные}$$

$$\{p_k\}, d(p_k) \rightarrow 0, \{\Xi_k\} \quad (*) :$$

$$L(f, p_k) \leq \sum(f, p_k, \Xi_k) = \sum_{\pi \in p_k} \underbrace{f(\xi(\pi))}_{(*)} v(\pi) \leq U(f, p_k)$$

$$(*) \quad \inf_{\pi} \leq \dots \leq \sup_{\pi} f$$

$$L(f, p_k) \xrightarrow[\text{Л. 3, } k \rightarrow \infty]{} \int_{\Pi} = \overline{\int}_{\Pi} \xleftarrow[\text{Л. 3, } k \rightarrow \infty]{} U(f, p_k)$$

$$\Rightarrow \sum (f, p_k, \Xi_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} I$$

□

Множество меры ноль

Определение. $E \subset \mathbb{R}^n$ имеет меру ноль, если $\forall \varepsilon > 0 \exists$ покрытие $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k$, где C_k – открытые кубы

$$\sum_{k=1}^{\infty} v(C_k) \leq \varepsilon \quad \mu(E) = 0 \quad - \text{мера}$$

Замечание. Открытые кубы \Leftrightarrow замкнутые

Замечание. $E_1 \subset E, \mu(E) = 0 \Rightarrow \mu(E_1) = 0$

Лемма 4. $\mu(E_k) = 0 \Rightarrow \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow \mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k) = 0$

Доказательство. $\forall k \exists$ покрытие кубами с \sum объемов $< \varepsilon \cdot (\frac{1}{2})^k$

Тогда $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ будут покрыты и \sum объемов $< \varepsilon \cdot \sum_{k=1}^{\infty} (\frac{1}{2})^k = \varepsilon$

□

Определение. $E \subset \mathbb{R}^n$ имеет объем ноль, если $\forall \varepsilon \exists$ конечное покрытие

$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k$, где c_k – открытый куб

$$\sum_{k=1}^N v(C_k) < \varepsilon \quad v(E) = 0$$

Замечание.

1. открытые \Leftrightarrow замкнутые кубы

2. $v(E) = 0 \Rightarrow \mu(E) = 0$

Лемма 5. $[a, b] \subset \mathbb{R}$ не может иметь объем 0

Доказательство. докажем, что если $[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^N C_k$,

$$C_k - \text{отрезки, то } \sum_{k=1}^N v(C_k) \geq b - a$$

база : $N = 1$

$$[a, b] \subset C_1 \Rightarrow v(C_1) \geq b - a$$

$$\left[\underbrace{\left[\begin{array}{c} \text{ } \\ a \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \text{ } \\ b \end{array} \right]}_{c_1} \right] \quad v(c_1) \geq b - a$$
$$a \in U_{k=1}^{N+1} C_k \Rightarrow \exists k : a \in C_k \text{ перенумеруем } C_k \text{ так, чтобы } a \in C_1 = [\alpha, \beta]$$

$$\begin{array}{c} \boxed{\boxed{a} \quad \boxed{b}} \\ \alpha \quad \beta \end{array}$$

$$\sum_{k=1}^{N+1} v(C_k) > v(C_1) = \beta - \alpha \geq b - a$$

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & a \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} b & \beta \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} &(\beta, b] \subset \bigcup_{k=2}^{N+1} C_k \\ \Rightarrow [\beta, b] \subset \bigcup_{k=2}^{N+1} C_k &\xRightarrow{\text{и н д. п.}} \sum_{k=2}^{N+1} v(C_k) \geq b - \beta \\ &v(C_1) \geq \beta - a \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^{N+1} v(C_k) &\geq b - a \end{aligned}$$

3

Доказательство. \Rightarrow очев. (уже доказали)

\Leftarrow Пусть $K \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k$ открытые кубы,

$$\sum_{k=1}^{\infty} v(C_k) < \varepsilon$$

\exists конечное подпокрытие $K \subset \bigcup_{j=1}^N C_{kj}$,

$$\sum_{j=1}^N v(C_{kj}) < \varepsilon \Rightarrow v(K) = 0$$

□

Пример 1. $E = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ – разные точки $[a, b] = \{q_k, k \in \mathbb{N}\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{q_k\}$

$$\mu(\{q_k\}) = 0 \quad \forall k \xrightarrow{\text{Л. 4}} \mu(E) = 0$$

при этом $v(E) \neq 0$

$$\text{Пусть } E \subset \bigcup_{k=1}^N C_k \Rightarrow \bar{E}_{=[0,1]} \subset \bigcup_{k=1}^N C_k \xrightarrow{\text{Л. 5}} \sum_{k=1}^N v(C_k) \geq 1$$

Критерий интегрируемости Лебега

Почти везде \equiv везде, кроме множества точек, имеющего меру 0

$E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ огранич.

$$x \in \bar{E}, \quad \delta > 0$$

$$M_{\delta}(f, x) := \sup_{B_{\delta}(x)} f, \quad m_{\delta}(f, x) := \inf_{B_{\delta}(x)} f$$

$M_{\delta}(f, x) \uparrow, \quad m_{\delta}(f, x) \downarrow$ – имеется в виду возрастание и убывание при росте δ

$$M_{\delta}(f, x) - m_{\delta}(f, x) \uparrow \text{ по } \delta$$

Определение. $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} M_{\delta}(f, x) - m_{\delta}(f, x) = w(f, x)$ – колеб. ϕ -ии f в точке x

Лемма 7. $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ озр. $x \in \bar{E}$

$$f \text{ непр. в точке } x \Leftrightarrow w(f, x) = 0$$

Доказательство.

Расписать непрерывность на языке эпс-дельта, учесть монотонность колебания функции

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_{\varepsilon} > 0 \forall y \in B_{\delta_{\varepsilon}}(x) \cap E |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow M_{\delta_{\varepsilon}}(x) - m_{\delta_{\varepsilon}}(x) \leq 2 \cdot \varepsilon$$

и более того, $\forall \delta < \delta_{\varepsilon} \quad M_{\delta}(x) - m_{\delta}(x) < \varepsilon$

$$M_{\delta}(f, x) - m_{\delta}(f, x) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0^+} 0$$

то есть $w(f, x) = 0$

$$\boxed{\Leftarrow} \quad w(f, x) = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon \exists \delta_\varepsilon : \forall \delta < \delta_\varepsilon$$

$$M_\delta(f, x) - m_\delta(f, x) < \varepsilon$$

$$\forall y \in B_\delta(x) \cap E \quad |f(y) - f(x)| < \varepsilon$$

$$f(y) \xrightarrow{y \rightarrow x} f(x)$$

□

Лемма 8. $F \subset \mathbb{R}^n$ замкн., $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ озр.

$\forall \varepsilon > 0 : F_\varepsilon := \{x \in F \mid w(f, x) \geq \varepsilon\}$. Т. д. F_ε - замкн.

Доказательство. Докажем, что $\mathbb{R}^n \setminus F_\varepsilon$ - откp.

$$\begin{array}{l} 1. x \in \mathbb{R}^n \setminus F \xrightarrow{??} \delta > 0 \quad B_\delta(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus F_\varepsilon \\ 2. x \in F \setminus F_\varepsilon \end{array}$$

$$1. x \in \underbrace{\mathbb{R}^n \setminus F}_{\text{откр.}} \Rightarrow \exists \delta > 0 \quad B_\delta(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus F \subset \mathbb{R}^n \setminus F_\varepsilon$$

$$2. x \in F \setminus F_\varepsilon \Rightarrow w(f, x) < \varepsilon \Rightarrow \exists \delta > 0 : M_\delta(f, x) - m_\delta(f, x) < \varepsilon$$

$$y \in B_\delta(x) \exists \delta' > 0 \quad B_{\delta'}(y) \subset B_\delta(x)$$

$$(\delta' < \delta - \|x - y\|)$$

если $y \notin F$, то $y \in \mathbb{R}^n \setminus F \subset \mathbb{R}^n \setminus F_\varepsilon$

если $y \in F$, то $w(f, y) < \varepsilon$

$$M(f, \delta_1, y) - m(f, \delta_1, y) \leq M(f, \delta, x) - m(f, \delta, x) < \varepsilon$$

$$\Rightarrow w(f, y) < \varepsilon \Rightarrow y \in \mathbb{R}^n \setminus F_\varepsilon$$

Тогда $\forall y \in B_\delta(x)$ верно, что $y \notin F_\varepsilon$ или $B_\delta(x) \cap F_\varepsilon = \emptyset$

$x \in F \setminus F_\varepsilon$, $B_\delta(x)$ полностью лежит в $F \setminus F_\varepsilon$, значит оно открыто, F - замкнуто,
 $F \setminus (F \setminus F_\varepsilon) = F_\varepsilon$ - замкнуто

□

Лемма 9. $\Pi \subset \mathbb{R}^n$, $f : \Pi \rightarrow \mathbb{R}$ озр.

Если $\forall x \in \Pi \quad w(f, x) < \varepsilon$, то \exists разбиение p :

$$U(f, p) - L(f, p) < \varepsilon \cdot v(\Pi)$$

Доказательство. $\forall x \in \Pi \lim_{\delta \rightarrow 0^+} (M_\delta(f, x) - m_\delta(f, x)) = 0$

$$\exists \delta_\varepsilon : M_{\delta_\varepsilon}(f, x) - m_{\delta_\varepsilon}(f, x) < \varepsilon$$

$$\forall x \exists \pi_x \text{ открытый п/п} : \sup_{\pi_x} f - \inf_{\pi_x} f < \varepsilon$$

$$\Pi \subset \bigcup_{x \in \Pi} \pi_x, \Pi \text{ компактен} \Rightarrow \exists \text{ конечное подпокрытие}$$

$$\Pi \subset \bigcup_{k=1}^N \pi_{x_k}$$

разрежем Π гранями всех π_{x_k} , $k = 1, \dots, N$

\Rightarrow получаем разбиение p

$$U(f, p) - L(f, p) = \sum_{\pi \in p} (\sup_{\pi} f - \inf_{\pi} f) v(\pi) < \varepsilon \cdot \sum_{\pi \in p} v(\pi) = \varepsilon v(\Pi)$$

$$\forall \pi \in p \exists k \pi \subset \pi_{x_k}$$

$$\Rightarrow \sup_{\pi} f - \inf_{\pi} f \leq \sup_{\pi_{x_k}} f - \inf_{\pi_{x_k}} f < \varepsilon$$

□

Теорема 2. *Критерий Лебега*

$$\Pi \in \mathbb{R}^n - n/n \ f : \Pi \rightarrow \mathbb{R} - \text{огр}$$

$$D = \{x \in \Pi | f - \text{разрывна в } x\}$$

Тогда:

$$\exists \int_{\Pi} f \Leftrightarrow \mu(D) = 0$$

Доказательство. Пусть $\Pi_\varepsilon = \{x \in \Pi | w(f, x) \geq \varepsilon\}$ - замкнутые по Лемме, ограниченные из ограниченности исходного п/п, значит компактные

$$D \subset \bigcup_{\varepsilon > 0} \Pi_\varepsilon$$

$$\boxed{\Leftarrow} \mu(D) = 0$$

$$\mu(\Pi_\varepsilon) = 0, \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow v(\Pi_\varepsilon) = 0$$

$$\Pi_\varepsilon \subset \bigcup_{k=1}^N \pi_k, \sum_{k=1}^N < \varepsilon, \pi_k - \text{открытые кубы}$$

Разрежем Π гранями $\pi_1 \dots \pi_N$ - получим разбиение P

$$P = P_1 \cup P_2, P_1, P_2 - \text{не разбиения, но состоят из кубов}$$

$$P_1 = \{\pi \in P | \exists k : \pi \in \pi_k\}$$

$$P_2 = P \setminus P_1$$

$$\sum_{\pi \in P_1} v(\pi) \leq \sum_{k=1}^N v(\pi_k) < \varepsilon$$

f - огр, значит $\exists M > 0 : \forall x \in \Pi |f(x)| < M$

$$\sum_{\pi \in P_1} (M_\pi(f) - m_\pi(f)) \cdot v(\pi) \leq 2M \cdot \sum_{\pi \in P_1} v(\pi) \leq 2M \cdot \varepsilon$$

$$\forall \pi \in P_2 : \forall x \in \pi : w(f, x) < \varepsilon$$

$$\exists P(\pi) : U(f, P(\pi)) - L(f, P(\pi)) < \varepsilon \cdot v(\pi)$$

Разрежем Π гранями $\pi' \in P(\pi)$ для всех $\pi \in P_2$

Получим разбиение Π : $P' = P'_1 \cup P'_2$, P'_1, P'_2 - более мелкие по сравнению с P_1, P_2

$$\sum_{\pi' \in P'_1} (\sup_{\pi'} f - \inf_{\pi'} f) v(\pi') \leq 2M \cdot \sum_{\pi' \in P'_1} v(\pi') < 2M \cdot \varepsilon$$

$$\sum_{\pi' \in P'_2} (\sup_{\pi'} f - \inf_{\pi'} f) v(\pi') = \sum_{\pi \in P_2} \sum_{\pi' \in P(\pi)} (\sup_{\pi'} f - \inf_{\pi'} f) v(\pi') < \sum_{\pi \in P_2} \varepsilon \cdot v(\pi) < \varepsilon \cdot v(\Pi)$$

$$U(f, P') - L(f, P') = \sum_{\pi' \in P'} (\sup_{\pi'} f - \inf_{\pi'} f) v(\pi') < \varepsilon \cdot (2M + v(\Pi)) \Rightarrow \exists \int_{\Pi} f$$

$$\boxed{\Rightarrow} \exists \int_{\Pi} f$$

Хотим доказать, что $\mu(D) = 0$

$$D = \bigcup_{k=1}^{\infty} \Pi_{1/k}$$

Если $\forall k : \mu(\Pi_{1/k}) = 0$, то по лемме о мере счётного объединения множеств меры 0 докажем необходимое

Из существования интеграла: $\forall \varepsilon > 0 \exists P : U(f, P) - L(f, P) < \frac{\varepsilon}{k}$

$$P_k = \{\pi \in P \mid \text{Int } \pi \cap \Pi_{1/k} \neq \emptyset\}$$

$$\Pi_{1/k} \subset \bigcup_{\pi \in P_k} \pi$$

$$\forall \pi \in P_k \ \exists x \in \text{Int } \pi : w(f, x) \geq \frac{1}{k}$$

$$\exists \delta > 0 : B_\delta(x) \in \text{Int } \pi \ \sup_{B_\delta(x)} f - \inf_{B_\delta(x)} f \geq \frac{1}{k}$$

$$\sup_{\pi} -\inf_{\pi} f \geq \sup_{B_\delta(x)} f - \inf_{B_\delta(x)} f \geq \frac{1}{k}$$

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{\pi \in P} (\sup_{\pi} f - \inf_{\pi} f) v(\pi) \geq \sum_{\pi \in P_k} (\sup_{\pi} f - \inf_{\pi} f) v(\pi) \geq \frac{1}{k} \cdot \sum_{\pi \in P_k} v(\pi)$$

$$\sum_{\pi \in P_k} v(\pi) \leq k \cdot (U(f, P) - L(f, P)) < \varepsilon$$

$$v(\Pi_{1/k}) = 0$$

□