## Характеристическая функция множества

03 октября 2022

Определение. Характеристическая функция множества

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & x \notin E \end{cases}$$

Лемма 10.  $\{ Toчки \ pазрыва \ \chi_E(x) \} = \delta E$ 

Доказательство.  $x \in \operatorname{Int} E \cup \operatorname{Ext} E$ 

Hа внутренних точках  $\lim \chi_E(x) = 1 = \chi_E(x)$ 

Hа внешних точках  $\lim \chi_E(x) = 0 = \chi_E(x)$ 

На границе разрывна - очев

Определение.  $E\in\Pi,\ \Pi$  -  $n/n,\ f:E\to\mathbb{R}$  - ограничена

 $\int_{E} f = \int_{\Pi} f \cdot \chi_{E}$ 

$$\tilde{f} = f \cdot \chi_E(x)$$

**Лемма 11.**  $\mu(\delta E)=0,\ f:E o\mathbb{R}$  - почти везде непрерывна на E

$$T$$
ог $\partial a \; \exists \int_E f$ 

 $\mathcal{A}$ оказательство. Необходимо доказать, что  $\exists \int_{\mathcal{A}} \tilde{f}$ 

 $\{$ Точки разрыва  $\tilde{f}$  на  $\Pi \} = \{$ Точки разрыва  $\tilde{f}$  на  $\mathrm{Int}\,E \} \cup \{$ Точки разрыва  $\tilde{f}$  на  $\mathrm{Ext}\,E \} \cup \{$ 

{Точки разрыва  $\tilde{f}$  на  $\Pi$ }  $\subset$  {Точки разрыва f на  $\operatorname{Int} E$ }  $\cup$   $\delta E$   $\mu$ ({Точки разрыва  $\tilde{f}$  на  $\Pi$ }) = 0 - по критерию Лебега существует интеграл  $\square$ 

Определение. E - ограничено,  $\mu(\delta E)=0$ 

 $\exists \Pi \in \mathbb{R}^n - n/n : E \in \Pi$ 

$$\upsilon(E)=\int\limits_{E}1=\int\limits_{\Pi}\chi_{E}(x)$$
- Жорданов объём

## Теорема Фубини

Теорема 1. Теорема Фубини

 $\Pi ycmv \Pi = \Pi_1 \times \Pi_2, \Pi_1 \in \mathbb{R}^n, \Pi_2 \in \mathbb{R}^m, f : \Pi \to \mathbb{R}$  — ограничена

$$L_1(x) = \int_{\overline{\Pi}_2} f(x,y) dy$$

$$U_1(x) = \int_{\overline{\Pi}_2} f(x,y) dy$$

$$Ecnu \exists \int_{\Pi} f, mo \exists \int_{\Pi_1} L_1, \int_{\Pi_1} U_1 \ u \ onu \ paвны$$

$$\int_{\Pi} f(x,y) dx dy = \int_{\Pi_1} L_1(x) dx = \int_{\Pi_1} U_1(x) dx$$

$$\int_{\Pi} dx (\int_{\overline{\Pi}_2} f(x,y) dy) = \int_{\Pi_1} dx (\overline{\int_{\Pi_2}} f(x,y) dy)$$

Доказательство. Пусть  $P_1$  - разбиение  $\Pi_1,\,P_2$  - разбиение  $\Pi_2$ 

$$P=P_1 imes P_2$$
 - разбиение П

$$P = \{\pi_1 \times \pi_2 | \pi_1 \in P_1, \pi_2 \in P_2\}$$

$$L(f, P) = \sum_{\pi \in P} inf_{\pi} f \cdot v(\pi) = \sum_{\pi_1 \in P_1 \pi_2 \in P_2} inf_{\pi_1 \times \pi_2} f \cdot v(\pi_1) \cdot v(\pi_2) = \sum_{\pi_1 \in P_1} \left[ \sum_{\pi_2 \in P_2} inf_{\pi_1 \times \pi_2} f \cdot v(\pi_2) \right] \cdot v(\pi_1)$$

$$\forall x \in \pi_1 : \inf_{\pi_1 \times \pi_2} \le \inf_{y \in \pi_2} f(x, y)$$

$$\sum_{\pi_2 \in P_2} inf_{\pi_1 \times \pi_2} f \cdot v(\pi_2) \leq \sum_{\pi_2 \in P_2} inf_{y \in \pi_2} f(x,y) \cdot v(\pi_2) = L(f(x,\cdot),P_2) \leq L_1(x) - L_1 \text{ - sup таких сумм}$$

$$\sum_{\pi_2 \in P_2} \inf_{\pi_1 \times \pi_2} f \cdot v(\pi_2) \le \inf_{\pi_1} L_1(x) = m_{\pi_1} L_1$$

$$L(f, P) \le \sum_{\pi_1 \in P_1} m_{\pi_1} L_1 \cdot v(\pi_1) = L(L_1, P_1)$$

$$U(f,P) \ge U(U_1,P)$$
 — аналогично

$$L(f, P) \le L(L_1, P_1) \le U(L_1, P_1) \le U(U_1, P_1) \le U(f, P)(*)$$

$$L(f, P) \le L(L_1, P_1) \le L(U_1, P_1) \le U(U_1, P_1) \le U(f, P)(**)$$

$$\exists \int_{\Pi} f \Rightarrow \sup_{P} L(f,P) = \inf_{P} U(f,P)$$
  $\sup_{P_1} L(L_1,P_1) \leq \inf_{P_1} U(L_1,P_1) - \mathrm{Всегда}$ 

(\*): 
$$\inf_{P_1} U(L_1, P_1) \le \inf_{P} U(f, P)$$

(\*): 
$$\sup_{P} L(f, P) \le \sup_{P_1} L(L_1, P_1)$$

 $\sup_P L(f,P) \leq \sup_{P_1} L(L_1,P_1) \leq \inf_{P_1} U(L_1,P_1) \leq \inf_P U(f,P)$ — из равенства 1 и 4 всюду равенство

$$\sup_{P_1} L(L_1, P_1) = \inf_{P_1} U(L_1, P_1)$$

$$\exists \int_{\Pi_1} L_1 = \int_{\Pi} f$$

$$\sup_{P_1} L(U_1, P_1) \le \inf_{P_1} U(U_1, P_1) -$$
Всегда

(\*\*): 
$$\inf_{P_1} U(U_1, P_1) \le \inf_{P} U(f, P)$$

(\*\*): 
$$\sup_{P} L(f, P) \le \sup_{P_1} L(U_1, P_1)$$

 $\sup_P L(f,P) \leq \sup_{P_1} L(U_1,P_1) \leq \inf_{P_1} U(U_1,P_1) \leq \inf_P U(f,P)$ — из равенства 1 и 4 всюду равенство

$$\sup_{P_1} L(U_1, P_1) = \inf_{P_1} U(U_1, P_1)$$

$$\exists \int_{\Pi_1} U_1 = \int_{\Pi} f$$