



---

# Physikalische Geodäsie Übung 1



Ausarbeitung im Studiengang  
**Geodäsie und Geoinformatik**  
an der Universität Stuttgart

Nicholas Schneider, 3222199  
Ziqing Yu, 3218051

Stuttgart, December 2, 2020

---

**Betreuer:** Prof. Dr.-Ing. Nico Sneeuw  
Universität Stuttgart

PD Dr.-Ing. habil. Johannes Engels  
Universität Stuttgart

Dr.-Ing. Markus Antoni  
Universität Stuttgart

# Kapitel 1

## Ausarbeitung

### 1.1 Aufgabe 1: Legendre-Funktionen

#### 1.1.1 a

Die unnormierten Legendrepolynome

$$P_3(t) = \frac{2n-1}{n}tP_2(t) - \frac{n-1}{n}P_1(t) = \frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \quad (1.1)$$

$$P_4(t) = \frac{2n-1}{n}tP_3(t) - \frac{n-1}{n}P_2(t) = \frac{35}{8}t^4 - \frac{15}{4}t^2 + \frac{3}{8} \quad (1.2)$$

Normierungsfaktoren:

$$N_{l,0} = \sqrt{(2l+1)} \quad (1.3)$$

$$N_{0,0} = 1, N_{1,0} = \sqrt{3}, N_{2,0} = \sqrt{5}, N_{3,0} = \sqrt{7}, N_{4,0} = 3.$$

#### 1.1.2 b

Um zu untersuchen, ob auch die zugeordneten Legendrefunktionen immer orthogonal zueinander sind, gilt es das Integral des Produktes der Legendre-Polynome zu untersuchen. Hierbei seien die Integralgrenzen -1 und 1. Ergibt das Integral mit den genannten Grenzen 0, so sind die entsprechenden Legendre-Funktionen orthogonal zueinander. Für die Untersuchung ist es vorweg sinnvoll sich auf diejenigen Polynome, die multipliziert miteinander einen geraden Exponenten erzeugen, zu konzentrieren. Das Produkt erzeugt nämlich anschließend einen ungeraden Exponenten nach der Integration. Bei Einsetzen der Integralgrenzen entstehen folglich unterschiedliche Vorzeichen, welche das gesamte Integral ungleich 0 werden lassen könnten. Nun kann man jegliche Untersuchungen durchführen. Notiert wird jedoch diejenige, die beweist, dass nicht alle Legendre-Funktionen orthogonal zueinander sind. Hierfür prüft man das Integral des Produkts aus  $P_{0,0}(t)$  und  $P_{2,2}(t)$ .

$$\int_{-1}^1 P_{0,0}(t) \cdot P_{2,2}(t) = \int_{-1}^1 P_{2,2}(t) \quad (1.4)$$

$$= \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{5}{12}}(1-t^2) \quad (1.5)$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{6} \left[ t - \frac{1}{3}t^3 \right]_{-1}^1 \quad (1.6)$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{6} \left( 1 - \frac{1}{3} - \left( -1 + \frac{1}{3} \right) \right) \quad (1.7)$$

$$= \frac{2\sqrt{15}}{9} \neq 0 \quad (1.8)$$

Durch die obige Berechnung wurde gezeigt, dass nicht alle Legendrefunktionen immer auch orthogonal zueinander sind.

## 1.2 Aufgabe 2: Sphärisch-Harmonische Analyse

$$Y_{n,m}(t) = P_{n,m}(t) \begin{Bmatrix} \sin(m\lambda) \\ \cos(m\lambda) \end{Bmatrix} \quad (1.9)$$

### 1.2.1 a

Für  $f_1$ , weil  $f_1$  nur mit  $\theta$  abhängig ist und  $\int_0^{2\pi} \sin(m\lambda) = 0$ , nimmt man hier nur  $\cos(m\lambda)$

$$f_1(\lambda, \theta) = \cos^2 \theta \implies f_1(\lambda, t) = t^2 \quad (1.10)$$

$$c_{n,m}^{f_1} = \frac{1}{4\pi} \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} N_{n,m} \cdot P_{n,m}(t) \cdot \cos(m\lambda) \cdot f_1(\lambda, t) d\lambda dt \quad (1.11)$$

$$= \frac{1}{4\pi} \int_{-1}^1 N_{n,m} \cdot P_{n,m}(t) \cdot t^2 \left[ \int_0^{2\pi} \cos(m\lambda) d\lambda \right] dt \quad (1.12)$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(m\lambda) d\lambda = \begin{cases} 0 & m \neq 0 \\ 2\pi & m = 0 \end{cases} \quad (1.13)$$

Wenn  $m = 0$ :

$$c_{n,0}^{f_1} = \frac{N_{n,0}}{2} \int_{-1}^1 P_{n,0}(t) \cdot t^2 dt \quad (1.14)$$

Wenn  $n$  ungerade ist, ist Grad von  $t$  von  $P_{n,0} \cdot t^2$  auch ungerade. Weil  $\int_{-1}^1 t^{2n-1} dt = 0$ , muss man nur  $c_{0,0}^{f_1}, c_{2,0}^{f_1}, c_{4,0}^{f_1}$  berechnen.

$$c_{0,0}^{f_1} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{1}{3} \quad (1.15)$$

$$c_{2,0}^{f_1} = \frac{\sqrt{5}}{2} \int_{-1}^1 \left( \frac{3}{2} t^2 - \frac{1}{2} \right) t^2 dt = \frac{2\sqrt{5}}{15} \quad (1.16)$$

$$c_{4,0}^{f_1} = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 \left( \frac{35}{8} t^4 - \frac{15}{4} t^2 + \frac{3}{8} \right) t^2 dt = 0 \quad (1.17)$$

Für  $f_2$ , weil:

$$\int_0^{2\pi} \cos(kt) \sin(nt) dt = 0 \quad (1.18)$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(kt) \sin(nt) dt = \begin{cases} \pi & \text{für } k = n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (1.19)$$

Man muss nur für  $m = 1$  für  $Y_{n,1} = P_{n,1} \sin(\lambda)$  berechnen. Wenn  $n$  gerade ist, ist Grad von  $t$  ungerade. Deshalb sind die Berechnung nur für  $c_{1,1}^{f_2}$  und  $c_{3,1}^{f_2}$  notwendig.

$$c_{1,1}^{f_1} = \frac{1}{4\pi} \int_{-1}^1 (\sqrt{1-t^2})^3 \sqrt{3} \sqrt{1-t^2} \pi dt \quad (1.20)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{-1}^1 (t^4 - 2t^2 + 1) dt \quad (1.21)$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{15} \quad (1.22)$$

$$c_{3,1}^{f_2} = \frac{1}{4\pi} \int_{-1}^1 (\sqrt{1-t^2})^3 \sqrt{\frac{7}{6}} \cdot \frac{3}{2} (5t^2 - 1) \sqrt{1-t^2} \pi dt \quad (1.23)$$

$$= \frac{3}{8} \sqrt{\frac{7}{6}} \int_{-1}^1 (5t^6 - 11t^4 + 7t^2 - 1) dt \quad (1.24)$$

$$= -\frac{4}{35} \sqrt{\frac{7}{6}} \quad (1.25)$$

$$= -\frac{2\sqrt{42}}{105} \quad (1.26)$$

Für  $f_3$ :

Ähnlich wie für  $f_1$ , man nimmt da nur  $\cos(m\lambda)$  und  $c_{n,m}^{f_3} = 0$  wenn  $m \neq 0$ . Man benennt:

$$J_k = \int_{-1}^1 t^k \cosh(t) dt$$

Dann:

$$c_{0,0}^{f_3} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 1 \cosh(t) dt = \frac{1}{2} J_0 \quad (1.27)$$

$$c_{1,0}^{f_3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \int_{-1}^1 t \cosh(t) dt = \frac{\sqrt{3}}{2} J_1 \quad (1.28)$$

$$c_{2,0}^{f_3} = \frac{\sqrt{5}}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}\right) \cosh(t) dt = \frac{3\sqrt{5}}{4} J_2 - \frac{\sqrt{5}}{4} J_0 \quad (1.29)$$

$$c_{3,0}^{f_3} = \frac{\sqrt{7}}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t\right) \cosh(t) dt = \frac{5\sqrt{7}}{4} J_3 - \frac{3\sqrt{7}}{4} J_1 \quad (1.30)$$

$$c_{4,0}^{f_3} = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{35}{8}t^4 - \frac{15}{4}t^2 + \frac{3}{8}\right) \cosh(t) dt = \frac{105}{16} J_4 - \frac{45}{8} J_2 + \frac{9}{16} J_0 \quad (1.31)$$

$$(1.32)$$

$J_0$  kann direkt berechnet werden:

$$J_0 = \int_{-1}^1 \cosh(t) dt = [\sinh(t)]_{-1}^1 = 2 \sinh(1) \quad (1.33)$$

$J_1$  kann via partielle Integration berechnet werden:

$$J_1 = \int_{-1}^1 t \cosh(t) dt \quad (1.34)$$

$$= [t \sinh(t)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \sinh(t) dt \quad (1.35)$$

$$= [t \sinh(t)]_{-1}^1 - [\cosh(t)]_{-1}^1 \quad (1.36)$$

$$= 0 \quad (1.37)$$

$J_2$  bis  $J_4$  werden via partielle Integration rekursive berechnet:

$$J_k = \int_{-1}^1 t^k \cosh(t) dt \quad (1.38)$$

$$= [t^k \sinh(t)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 k t^{k-1} \sinh(t) dt \quad (1.39)$$

$$= [t^k \sinh(t)]_{-1}^1 - k [t^{k-1} \cosh(t)]_{-1}^1 + k(k-1) \int_{-1}^1 \cosh(t) t^{k-2} dt \quad (1.40)$$

$$= [t^k \sinh(t)]_{-1}^1 - k [t^{k-1} \cosh(t)]_{-1}^1 + k(k-1) J_{k-2} \quad (1.41)$$

Wenn  $t$  ungerade ist:  $J_k = 0 - 0 + k(k-1) J_{k-2}$ . Denn  $J_1 = 0$ ,  $J_k = 0$  für alle ungerade  $k$ .

Für gerade  $k$ :

$$J_k = 2 \sinh(1) - 2k \cosh(1) + k(k-1) J_{k-2} \quad (1.42)$$

Ansatz:

$$J_2 = 2 \sinh(1) - 4 \cosh(1) + 2J_0 \quad (1.43)$$

$$= 2 \sinh(1) - 4 \cosh(1) + 4 \sinh(1) \quad (1.44)$$

$$= 6 \sinh(1) - 4 \cosh(1) \quad (1.45)$$

$$J_4 = 2 \sinh(1) - 8 \cosh(1) + 12J_2 \quad (1.46)$$

$$= 2 \sinh(1) - 8 \cosh(1) + 12(6 \sinh(1) - 4 \cosh(1)) \quad (1.47)$$

$$= 74 \sinh(1) - 56 \cosh(1) \quad (1.48)$$

Berechnung von Koeffizienten:

$$c_{0,0}^{f_3} = \sinh(1) \quad (1.49)$$

$$c_{1,0}^{f_3} = 0 \quad (1.50)$$

$$c_{2,0}^{f_3} = 4\sqrt{5} \sinh(1) - 3\sqrt{5} \cosh(1) \quad (1.51)$$

$$c_{3,0}^{f_3} = 0 \quad (1.52)$$

$$c_{4,0}^{f_3} = 453 \sinh(1) - 345 \cosh(1) \quad (1.53)$$

**1.2.2 b**Für  $f_1$ :

$$\sum_n \sum_m c_{n,m}^{f_1} \tilde{Y}_{n,m}(\lambda, t) = c_{0,0}^{f_1} \tilde{Y}_{0,0}(\lambda, t) + c_{2,0}^{f_1} \tilde{Y}_{2,0}(\lambda, t) + c_{4,0}^{f_1} \tilde{Y}_{4,0}(\lambda, t) \quad (1.54)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \cos(0) + \frac{2\sqrt{5}}{15} \cdot \sqrt{5} \cdot \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}\right) \cdot \cos(0) + 0 \quad (1.55)$$

$$= t^2 \quad (1.56)$$

$$= \cos^2(\theta) \quad (1.57)$$

Für  $f_2$ :

$$\sum_n \sum_m c_{n,m}^{f_2} \tilde{Y}_{n,m}(\lambda, t) = c_{1,1}^{f_2} \tilde{Y}_{1,1}(\lambda, t) + c_{3,1}^{f_2} \tilde{Y}_{3,1}(\lambda, t) \quad (1.58)$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{15} \cdot \sqrt{3} \sqrt{1-t^2} \sin(\lambda) - \frac{2\sqrt{42}}{105} \cdot \sqrt{\frac{7}{6}} \cdot \frac{3}{2} (5t^2 - 1) \sqrt{1-t^2} \sin(\lambda) \quad (1.59)$$

$$= \frac{3}{4} \sin \theta \sin \lambda - \frac{1}{4} \sin 3\theta \sin \lambda \quad (1.60)$$

Mit MATLAB ist das maximale Ergebnis von  $\frac{3}{4} \sin \theta \sin \lambda - \frac{1}{4} \sin 3\theta \sin \lambda - \sin^3(\theta) \sin(\lambda)$  im Bereich von  $10^{-16}$  (bis zum  $n = m = 4$ )

Für  $f_3$ :

$$\sum_n \sum_m c_{n,m}^{f_3} \tilde{Y}_{n,m}(\lambda, t) = c_{0,0}^{f_3} \tilde{Y}_{0,0}(\lambda, t) + c_{2,0}^{f_3} \tilde{Y}_{2,0}(\lambda, t) + c_{4,0}^{f_3} \tilde{Y}_{4,0}(\lambda, t) \quad (1.61)$$

$$= \sinh(1) + (4\sqrt{5} \sinh(1) - 3\sqrt{5} \cosh(1)) \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{1}{4} (1 + 3 \cos(2\theta)) \quad (1.62)$$

$$+ (453 \sinh(1) - 345 \cosh(1)) \cdot 3 \cdot \left( \frac{35}{8} \cos^4 \theta - \frac{15}{4} \cos^2 \theta + \frac{3}{8} \right) \quad (1.63)$$

Mit MATLAB ist das maximale Ergebnis von  $\cosh(\cos \theta) - \sum_n \sum_m c_{n,m}^{f_2} \tilde{Y}_{n,m}(\lambda, t)$  im Bereich von  $10^{-5}$  (bis zum  $n = m = 4$ )

### **1.3 Aufgabe 3: Rotation von Kugelflächenfunktionen**