

Physikalische Geodäsie Übung 1



Ausarbeitung im Studiengang
Geodäsie und Geoinformatik
an der Universität Stuttgart

Nicholas Schneider, 3222199
Ziqing Yu, 3218051

Stuttgart, December 2, 2020

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Nico Sneeuw
Universität Stuttgart
PD Dr.-Ing. habil. Johannes Engels
Universität Stuttgart
Dr.-Ing. Markus Antoni
Universität Stuttgart

Ausarbeitung

Aufgabe 1 Somigliana-Pizzetti-Normalpotential

In der ersten Aufgabe dieser Übung soll aus der geozentrischen Gravitationskonstante GM , den Halbachsen a , b des Referenzellipsoides und aus der Rotationsgeschwindigkeit der Erde ω der konstante Potentialwert U_0 des Somigliana-Pizzetti-Referenzpotentials auf dem Referenzellipsoid bestimmt werden.

Die exakte Darstellung des Normalpotentials in ellipsoidischen Koordinaten sieht wie folgt aus:

$$U^{El}(\lambda, \beta, u) = \left(U_0 - \frac{\omega^2 a^2}{3} \right) \frac{Q_{0,0}^* \left(\frac{u}{E} \right)}{Q_{0,0}^* \left(\frac{b}{E} \right)} + \frac{\omega^2 a^2 Q_{2,0}^* \left(\frac{u}{E} \right)}{3 Q_{2,0}^* \left(\frac{b}{E} \right)} P_{2,0}(\sin \beta) \quad (0.1)$$

mit $E = \sqrt{a^2 - b^2}$, und

$$Q_{0,0}^* \left(\frac{u}{E} \right) = \arctan \left(\frac{E}{u} \right)$$

$$Q_{2,0}^* \left(\frac{b}{E} \right) = \frac{1}{2} \left[\left(3 \left(\frac{b}{E} \right)^2 + 1 \right) \operatorname{arccot} \left(\frac{b}{E} \right) - 3 \left(\frac{b}{E} \right) \right]$$

Die Darstellung des Normalpotentials in sphärischen Koordinaten lautet:

$$U^{Sph}(\lambda, \varphi, r) = \frac{GM}{r} \left[1 - \sum_{n=1}^L \left(\frac{a}{r} \right)^{2n} J_{2n} P_{2n}(\sin \varphi) \right] + \frac{\omega^2}{2} r^2 \cos^2 \varphi \quad (0.2)$$

mit

$$J_2 = \frac{e^2}{3} \left(1 - \frac{2}{15} \frac{e' \hat{m}}{q_0} \right)$$

$$J_{2n} = (-1)^{n+1} \frac{3e^{2n}}{(2n+1)(2n+3)} \left(1 - n + 5n \frac{J_2}{e^2} \right) \quad n > 1$$

Des Weiteren gilt:

$$e = \frac{E}{a}, \quad e' = \frac{E}{b}$$

$$\hat{m} = \frac{\omega^2 a^2 b}{GM}, \quad q_0 = Q_{2,0}^* \left(\frac{b}{E} \right)$$

Im ersten Schritt gilt es beide Darstellungen des Potentials mit dem Radius r zu multiplizieren und folglich die Grenzwerte "im Unendlichen" zu betrachten. Somit gilt:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} r \cdot U^{Ell}(\lambda, \beta, u) = \lim_{r \rightarrow \infty} r \cdot \left(\left(U_0 - \frac{\omega^2 a^2}{3} \right) \frac{Q_{0,0}^* \left(\frac{u}{E} \right)}{Q_{0,0}^* \left(\frac{b}{E} \right)} + \frac{\omega^2 a^2 Q_{2,0}^* \left(\frac{u}{E} \right)}{3 Q_{2,0}^* \left(\frac{b}{E} \right)} P_{2,0}(\sin \beta) \right) = GM$$

beziehungsweise

$$\lim_{r \rightarrow \infty} r \cdot U^{Sph}(\lambda, \varphi, r) = \lim_{r \rightarrow \infty} r \cdot \left(\frac{GM}{r} \left[1 - \sum_{n=1}^L \left(\frac{a}{r} \right)^{2n} J_{2n} P_{2n}(\sin \varphi) \right] + \frac{\omega^2}{2} r^2 \cos^2 \varphi \right) = GM$$

Aufgabe 2

1. In dieser Teilaufgabe wird für das Somigliana-Pizzetti-Normalpotential die Konvergenz der Reihenentwicklungen für die Entwicklungsgrade $L = 2, 4, 6, 8$ diskutiert. Anschließend werden die Ergebnisse visualisiert.




Abbildung 0.1: Visualisierung der Ergebnisse

In Abbildung 0.1 sieht man die Ergebnisse der Konvergenz der Reihenentwicklungen für die Entwicklungsgrade $L = 2, 4, 6, 8$ in Abhängigkeit von der Cobreite φ . Der Abbildung ist zu entnehmen, dass tatsächlich die Ergebnisse aller vier Entwicklungsgrade sich nahezu überlagern. Insofern sind keine klaren vier Kurven zu erkennen. Numerische Abweichungen treten zwar auf, sind aber dennoch sehr gering. Daraus kann man also schließen, dass die Variation des Entwicklungsgrades keinen besonders großen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Zudem lässt sich erkennen, dass die Graphen einen Abschnitt einer harmonischen Funktion darstellen. Hierbei ist bei 90° , also am Äquator, das Maximum.

2. Im zweiten Teil dieser Aufgabe wird das Somigliana-Pizzetti-Normalpotential zum Grad $L_{max} = 8$ und das volle Schwerepotential (Modell EGM96 mit dem Entwicklungsgrad $L_{max} = 36$) verglichen. Hierbei werden die Entwicklungen auf einer Kugel um das Geozentrum mit Radius 6371 km ausgewertet. In farbcodierten Erdkarten werden anschließend die Potentiale, sowie deren Differenzen dargestellt. Zuletzt sollen auch die entsprechenden Werte entlang des Meridians durch Greenwich visualisiert werden.




Abbildung 0.2: Somigliana-Pizzetti

Abbildung 0.2 stellt das Somigliana-Pizzetti-Normalpotential zum Grad $L_{max} = 8$ dar.




Abbildung 0.3: EGM96

Abbildung 0.3 stellt das volle Schwerepotential zum Grad $L_{max} = 36$ dar.




Abbildung 0.4: Differenz der beiden Potentiale

In Abbildung 0.4 sieht man die Differenz der beiden Potentiale dargestellt als farbcodierte Erdkarten.