

复分析第五次习题课

彭子鱼

2024 年 5 月 26 日

上次更新: 2024 年 5 月 23 日

1 作业

题 1 (5.1.2). 求函数在给定域上的 Laurent 展开.

(1) $\frac{1}{z^2(z-1)}, D = B(1, 1) \setminus \{1\};$

(3) $\text{Log}\left(\frac{z-1}{z-2}\right), D = B(\infty, 2);$

(5) $\frac{1}{(z-5)^n}, n \geq 0, D = B(\infty, 5).$

解. (1) 由于 $|z-1| < 1$,

$$\begin{aligned}\frac{1}{z^2(z-1)} &= \frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{(1+z-1)^2} \\ &= \frac{1}{z-1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) (z-1)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) (z-1)^{n-1}.\end{aligned}$$

(3) 易验证在 $B(\infty, 2)$ 上 $\text{Log}\left(\frac{z-1}{z-2}\right)$ 可取出单值全纯分支, 只需考虑主支.

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{z-1}{z-2}\right) &= \log\left(1 - \frac{1}{z}\right) - \log\left(1 - \frac{2}{z}\right) \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nz^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{nz^n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - 1}{n} z^{-n}.\end{aligned}$$

故

$$\text{Log}\left(\frac{z-1}{z-2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - 1}{n} z^{-n} + 2k\pi i,$$

其中 $k \in \mathbb{Z}$.

(5) 由于 $|\frac{5}{z}| < 1$,

$$\begin{aligned}\frac{1}{(z-5)^n} &= \frac{1}{z^n} \frac{1}{(1-\frac{5}{z})^n} \\ &= \frac{1}{z^n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} n(n+1) \cdots (n+k-1) \left(\frac{5}{z}\right)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{n-1} 5^k z^{-n-k}.\end{aligned}$$

□

注记. 求 Laurent 级数时, 须注意在何处展开.

题 2 (5.2.2). 求函数 $f(z)$ 的奇点并判断其类型.

(3) $\sin \frac{1}{z-1}$;

(7) $\sin\left(\frac{1}{\cos \frac{1}{z}}\right)$;

(8) $e^{\tan z}$.

解. (3) 可能的奇点为 $1, \infty$. 因为 $\lim_{z \rightarrow 1} f(z)$ 不存在, $\lim_{z \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = \lim_{z \rightarrow 0} \sin \frac{z}{z-1} = 0$, 所以 1 是本性奇点, ∞ 是可去奇点.

(7) 可能的奇点为 $0, \infty, \frac{2}{(2k+1)\pi}$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$. 因为 $\lim_{z \rightarrow \frac{2}{(2k+1)\pi}} f(z)$ 不存在, 所以 $\frac{2}{(2k+1)\pi}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 是本性奇点. 从而 0 是非孤立奇点. 因为 $\lim_{z \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = \lim_{z \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{\cos z}\right) = \sin 1$, 所以 ∞ 是可去奇点.

(8) 可能的奇点为 $\infty, k\pi + \frac{\pi}{2}$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$. 因为 $\lim_{z \rightarrow k\pi + \frac{\pi}{2}} f(z)$ 不存在, 所以 $k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 是本性奇点. 从而 ∞ 是非孤立奇点. □

注记. 须讨论 ∞ 的类型. 注意非孤立奇点的概念.

题 3 (5.3.1). 求所有 \mathbb{C} 上亚纯函数 f , 使得 $|f(z)| = 1$ 对任意 $z \in \partial B(0, 1)$ 成立.

解. 由 f 亚纯且非零, 其在 $B(0, 1)$ 只有有限个零点和极点, 设 f 零点为 z_1, \dots, z_n , 极点为 w_1, \dots, w_m (可重复).

令

$$g(z) = f(z) \prod_{k=1}^n \frac{1 - \bar{z}_k z}{z - z_k} \prod_{l=1}^m \frac{z - w_l}{1 - \bar{w}_l z},$$

则 g 在 $\overline{B(0, 1)}$ 全纯且无零点, $|g(z)| = 1$ 对任意 $z \in \partial B(0, 1)$ 成立. 考虑 $\frac{1}{g}$ 并利用最大模原理, g 为常数, 即 $g(z) = e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$.

故所有满足要求的函数为

$$f(z) = e^{i\theta} \prod_{k=1}^n \frac{z - z_k}{1 - \bar{z}_k z} \prod_{l=1}^m \frac{1 - \bar{w}_l z}{z - w_l},$$

其中 $\theta \in \mathbb{R}$, n, m 为非负整数, $z_1, \dots, z_n, w_1, \dots, w_m \in B(0, 1)$. □

题 4 (5.4.8). 求函数的孤立奇点并求出其留数.

(6) $\sin \frac{z}{z+1}$;

(8) $\frac{e^{\pi z}}{z^2+1}$.

解. (6) 可能的奇点为 $-1, \infty$. 因为 $\lim_{z \rightarrow -1} f(z)$ 不存在, 所以 -1 是本性奇点. 因为 $\lim_{z \rightarrow 0} f(\frac{1}{z}) = \sin 1$, 所以 ∞ 是可去奇点.

由 5.4.3,

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = \lim_{z \rightarrow \infty} z^2 f'(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^2}{(z+1)^2} \cos \frac{z}{z+1} = \cos 1.$$

由留数定理,

$$\operatorname{Res}(f, -1) = -\operatorname{Res}(f, \infty) = -\cos 1.$$

(8) 可能的奇点为 $\pm i, \infty$. 因为 $\lim_{z \rightarrow \pm i} f(z) = \infty$, 所以 $\pm i$ 是极点. 因为 $\lim_{z \rightarrow 0} f(\frac{1}{z})$ 不存在, 所以 ∞ 是本性奇点.

由 $\pm i$ 是 1 阶极点,

$$\operatorname{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z-i)f(z) = \frac{i}{2},$$

$$\operatorname{Res}(f, -i) = \lim_{z \rightarrow -i} (z+i)f(z) = -\frac{i}{2}.$$

由留数定理, $\operatorname{Res}(f, \infty) = 0$. □

题 5 (5.4.9). 设 f, g 在 $B(0, R)$ 中全纯, 在 $\overline{B(0, R)}$ 上连续, g 在 $\partial B(0, R)$ 上无零点, g 在 $B(0, R)$ 中的全部零点 z_1, \dots, z_n 都是 1 阶零点. 求

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{zg(z)} dz.$$

解. 记 $h(z) = \frac{f(z)}{zg(z)}$.

先证明: 若 $z_k \neq 0$, 则对充分小的 $\varepsilon > 0$,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_k|=\varepsilon} \frac{f(z)}{zg(z)} dz = \frac{f(z_k)}{z_k g'(z_k)}.$$

这可分两种情况讨论. 若 $f(z_k) \neq 0$, 则 z_k 是 h 的 1 阶极点,

$$\operatorname{Res}(h, z_k) = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{f(z)}{z} \cdot \frac{z - z_k}{g(z)} = \frac{f(z_k)}{z_k g'(z_k)}.$$

若 $f(z_k) = 0$, 则 z_k 是 h 的可去奇点, 从而 $\int_{|z-z_k|=\varepsilon} \frac{f(z)}{zg(z)} dz = 0$. 总之, 上式成立.

再讨论 0 处情形. 对充分小的 $\varepsilon > 0$, 记

$$I = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\varepsilon} \frac{f(z)}{zg(z)} dz.$$

若 0 不是 g 的零点, 则 0 是 h 的 1 阶极点或可去奇点, 由 $f(0)$ 是否为 0 决定. 和上面类似可知

$$I = \frac{f(0)}{g(0)}.$$

若 0 是 g 的零点, 对 f 在 0 处情况讨论.

若 0 是 f 的至少 2 阶零点, 则 0 是 h 的可去奇点, 从而

$$I = 0.$$

若 0 是 f 的 1 阶零点, 则 0 是 h 的 1 阶极点,

$$I = \text{Res}(h, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} zh(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)/z}{g(z)/z} = \frac{f'(0)}{g'(0)}.$$

若 0 不是 f 的零点, 则 0 是 h 的 2 阶极点,

$$I = \text{Res}(h, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} (z^2 h(z))' = \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{zf(z)}{g(z)} \right)' = \frac{f'(0)}{g'(0)} - \frac{f(0)g''(0)}{2(g'(0))^2}.$$

由 Cauchy 积分定理,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{zg(z)} dz = I + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_k|=\varepsilon} \frac{f(z)}{zg(z)} dz.$$

故

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{zg(z)} dz = \sum_{k: z_k \neq 0} \frac{f(z_k)}{z_k g'(z_k)} + \frac{f(0)}{g(0)} \mathbb{1}_{\{g(0) \neq 0\}} + \left(\frac{f'(0)}{g'(0)} - \frac{f(0)g''(0)}{2(g'(0))^2} \right) \mathbb{1}_{\{g(0) = 0\}}. \quad \square$$

题 6 (5.4.10). 求积分.

$$(1) \int_{|z|=2} \frac{1}{z^3(z^{10}-2)} dz;$$

$$(4) \int_{|z|=R} \frac{z^2}{e^{2\pi i z^3} - 1} dz.$$

解. (1) 易知 f 在 $B(\infty, 2)$ 上全纯, 且 ∞ 为可去奇点. 从而

$$\text{Res}(f, \infty) = 0.$$

故

$$\int_{|z|=2} \frac{1}{z^3(z^{10}-2)} dz = -2\pi i \text{Res}(f, \infty) = 0.$$

(4) 作换元 $w = z^3$. 注意 $z^2 dz = \frac{1}{3} dw$, 换元后变成绕 3 圈, 二者抵消. 因此

$$\int_{|z|=R} \frac{z^2}{e^{2\pi i z^3} - 1} dz = \int_{|w|=R^3} \frac{1}{e^{2\pi i w} - 1} dw.$$

在 $|w| < R^3$, $\frac{1}{e^{2\pi i w} - 1}$ 有 1 阶极点 $0, \pm 1, \dots, \pm n$, 且留数均为 $\frac{1}{2\pi i}$.

故

$$\int_{|z|=R} \frac{z^2}{e^{2\pi i z^3} - 1} dz = 2\pi i \cdot (2n+1) \cdot \frac{1}{2\pi i} = 2n+1. \quad \square$$

题 7 (5.5.1(8)). 计算

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^3} dx.$$

解. 令 $f(z) = \frac{e^{iz}}{(1+z^2)^3}$. 记 $\gamma_R = \{z = Re^{i\theta} : \theta \in [0, \pi]\}$. 由 Jordan 引理,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) dz = 0.$$

由留数定理,

$$\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, i) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{d^2}{dz^2} \frac{e^{iz}}{(z+i)^3} = \frac{7}{8} \pi e^{-1}.$$

令 $R \rightarrow \infty$ 并注意 $\frac{\cos x}{(1+x^2)^3}$ 是偶函数, 取实部得

$$I = \frac{7}{16} \pi e^{-1}.$$

□

题 8 (5.5.1(9)). 计算

$$I = \int_0^{\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx.$$




图 1: 题8的图示.

解. 令 $f(z) = \frac{e^{2iz}-1}{z^2}$. 考虑图1中围道. 则

$$\int_{-R}^{-r} - \int_{\gamma_r} + \int_r^R + \int_{\gamma_R} f(z) dz = I_1 - I_2 + I_3 + I_4 = 0.$$

作换元 $x \rightarrow -x$,

$$I_1 + I_3 = \int_r^R \frac{e^{-2ix}-1}{x^2} dx + \int_r^R \frac{e^{2ix}-1}{x^2} dx = -4 \int_r^R \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx.$$

由 Jordan 引理,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} I_4 = 0.$$

由引理 5.5.9,

$$\lim_{r \rightarrow 0} I_2 = i\pi \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = -2\pi.$$

令 $R \rightarrow \infty, r \rightarrow 0$ 得 $-4I + 2\pi = 0$, 即

$$I = \frac{\pi}{2}.$$

□

题 9 (5.5.1(11)). 计算

$$I = \int_0^\infty \frac{x^p}{1+x^2} dx,$$

其中 $-1 < p < 1$.




图 2: 题9的图示.

解. 一般地, 对 $-1 < a < b-1, b > 0$, 有

$$I = \int_0^\infty \frac{x^a}{1+x^b} dx = \frac{\pi}{b} \csc\left(\pi \frac{a+1}{b}\right).$$

作换元 $y = x^b$,

$$I = \frac{1}{b} \int_0^\infty \frac{y^{(a+1-b)/b}}{1+y} dy.$$

令 $f(z) = \frac{z^{(a+1-b)/b}}{1+z}$, 在正实轴上岸取正值. 考虑图2中围道. 则

$$\int_r^R + \int_{\gamma_R} - \int_{\gamma_1} - \int_{\gamma_r} f(z)dz =: I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 2\pi i \operatorname{Res}(f, -1) = 2\pi i e^{i\pi \frac{a+1-b}{b}}.$$

当 $R \rightarrow \infty$ 时,

$$I_2 = O\left(R^{\frac{a+1-b}{b}-1+1}\right) \rightarrow 0.$$

当 $r \rightarrow 0$ 时,

$$I_4 = O\left(r^{\frac{a+1-b}{b}} r\right) \rightarrow 0.$$

对 $x \in (0, \infty)$,

$$f(x_{\downarrow}) = f(x_{\uparrow}) \exp\left(2i\pi \frac{a+1-b}{b}\right),$$

从而

$$I_3 = I_1 \exp\left(i\pi \frac{a+1-b}{b}\right).$$

令 $R \rightarrow \infty, r \rightarrow 0$, 得

$$b\left(1 - e^{2i\pi \frac{a+1-b}{b}}\right) I = 2\pi i e^{i\pi \frac{a+1-b}{b}}.$$

取虚部可得

$$I = \frac{\pi}{b} \csc\left(\pi \frac{a+1}{b}\right).$$

□

题 10 (5.5.1(15)). 计算

$$I = \int_0^1 \frac{x^{1-p}(1-x)^p}{1+x^2} dx,$$

其中 $-1 < p < 2$.

解. 令 $f(z) = \frac{z^{1-p}(1-z)^p}{1+z^2}$, 在 $(0, 1)$ 上岸取正实数. 考虑图3中围道. 则

$$\int_r^{1-r} + \int_{\gamma_2} - \int_{\gamma_3} - \int_{\gamma_r} + \int_{\gamma_R} f(z)dz =: I_1 + I_2 - I_3 - I_4 + I_5 = 2\pi i (\operatorname{Res}(f, i) + \operatorname{Res}(f, -i))$$

计算留数:

$$\operatorname{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z^{1-p}(1-z)^p}{z+i} = \frac{1}{2i} 2^{p/2} \exp i \left((1-p) \cdot \frac{\pi}{2} + p \cdot \left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = 2^{\frac{p}{2}-1} e^{-\frac{3p\pi i}{4}},$$

$$\operatorname{Res}(f, -i) = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{z^{1-p}(1-z)^p}{z-i} = -\frac{1}{2i} 2^{p/2} \exp i \left((1-p) \cdot \frac{3\pi}{2} + p \cdot \frac{\pi}{4} \right) = 2^{\frac{p}{2}-1} e^{-\frac{5p\pi i}{4}}.$$

当 $R \rightarrow \infty$ 时, 由引理 5.5.15,

$$I_5 \rightarrow 2\pi i e^{i\pi p}.$$

对 $x \in (0, 1)$,

$$f(x_{\downarrow}) = f(x_{\uparrow}) e^{-2i\pi p},$$




图 3: 题10的图示.

从而

$$I_3 = I_1 e^{-2i\pi p}.$$

令 $R \rightarrow \infty, r \rightarrow 0$,

$$(1 - e^{-2i\pi p})I + 2\pi i e^{i\pi p} = i\pi 2^{\frac{p}{2}} \left(e^{-i\frac{3\pi p}{4}} + e^{-i\frac{5\pi p}{4}} \right).$$

取虚部可得

$$I = -\frac{\pi}{\sin p\pi} + \frac{\pi 2^{p/2} \cos \frac{p\pi}{4}}{\sin p\pi}.$$

□

题 11 (5.5.1(21)). 计算

$$I = \int_0^\infty \frac{\log x}{x^2 - 1} dx.$$

解. 令 $f(z) = \frac{\log z}{z^2 - 1}$. 考虑图4中围道. 则

$$\int_r^R + \int_{\gamma_R} - \int_{ri}^{Ri} - \int_{\gamma_r} f(z) dz =: I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0.$$

令 $z = yi$,

$$I_3 = \int_r^R \frac{\log y + \frac{\pi i}{2}}{-y^2 - 1} i dy = \frac{\pi}{2} \int_r^R \frac{dy}{1 + y^2} + \text{虚数}.$$

当 $R \rightarrow \infty$ 时,

$$I_2 = O\left(\frac{\log R}{R^2} \cdot R\right) \rightarrow 0.$$




图 4: 题11的图示.

当 $r \rightarrow 0$ 时,

$$I_4 = O\left(\frac{\log r}{1-r^2} \cdot r\right) \rightarrow 0.$$

令 $R \rightarrow \infty, r \rightarrow 0$ 并取实部得

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^\infty \frac{dy}{1+y^2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

□

题 12 (5.5.1(25)). 计算

$$I = \int_0^\infty \frac{x}{e^x + 1} dx.$$

解. 令 $f(z) = \frac{z^2}{e^z + 1}$. 考虑图5中围道. 则

$$\int_0^R + \int_{\gamma_1} + \int_{R+2\pi i}^{2\pi i} - \int_{\pi i}^{2\pi i} - \int_{\gamma_2} - \int_0^{\pi i} f(z) dz =: I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 - I_6 = 0.$$

令 $z = x + 2\pi i$,

$$I_1 + I_3 = \int_0^R \left(\frac{x^2}{e^x + 1} - \frac{(x + 2\pi i)^2}{e^x + 1} \right) dx = -4\pi^2 \int_0^R \frac{1}{e^x + 1} dx - 4\pi i \int_0^R \frac{x}{e^x + 1} dx.$$

当 $R \rightarrow \infty$ 时,

$$I_2 \rightarrow 0.$$




图 5: 题12的图示.

令 $z = ix$,

$$\begin{aligned} I_4 + I_6 &= \int_0^{\pi-r} + \int_{\pi+r}^{2\pi} \frac{(xi)^2}{e^{xi} + 1} i dx = - \int_0^{\pi-r} + \int_{\pi+r}^{2\pi} \frac{ix^2(1 + \cos x - i \sin x)}{2 + 2 \cos x} dx \\ &= \text{实数} - i \left(\frac{4\pi^3}{3} + \frac{1}{6}(\pi-r)^3 - \frac{1}{6}(\pi+r)^3 \right). \end{aligned}$$

由引理 5.5.9,

$$\lim_{r \rightarrow \infty} I_5 = i\pi \lim_{z \rightarrow \pi i} f(z - \pi i) f(z) = \pi^3.$$

令 $R \rightarrow \infty, r \rightarrow 0$ 并取虚部得

$$-4\pi I + \frac{4\pi^3}{3} - \pi^3 = 0,$$

即

$$I = \frac{\pi^2}{12}.$$

□