【美】金姆·韦斯特(Kim West) 乔安娜·凯南（Joanne Kenen）◎著 李寒◎译

经典权威 循序渐进

最新升级版

0–1.5岁适用

韦氏婴幼儿睡眠圣经

THE SLEEP LADY'S GOOD NIGHT, SLEEP TIGHT

价值8600元早教资料免费下载

金城出版社
GOLD WALL PRESS

涵盖整个儿童期　最实用的家庭礼物
帮助父母解决一个最具挑战性的问题！

孩子不再哭闹，父母不再苦恼！
循序渐进培养孩子良好的睡眠习惯，受益一生

作者分享了很多让宝宝深度睡眠的切身经验，从宝宝出生至五岁，无论有什么特殊情况，家长都能从中找到解决睡眠问题的方法。作者韦斯特建议家长坚持温柔的方式，让孩子渐渐进入深度睡眠状态。

——《出版商务周报》

《韦氏婴幼儿睡眠圣经》是第一本详细解释为什么晚上上床睡觉的时间对于许多孩子和他们的父母而言如此重要的书，并且给出了一种任何人都不会因此感到郁闷的解决方法。

——莫拉·罗兹
《父母》杂志资深编辑

这是给世界各地疲倦的父母们最好的礼物。我强烈向那些存在睡眠问题的婴儿或者小孩们的父母推荐这本书。

——霍华德·班尼特
医学博士，儿科医生，《干干爽爽起床：帮助孩子不再尿床的指导手册》作者

如果做父母的会担心孩子存在睡眠问题，那么这本书就是最好的答案。而且我认为本书相当有助益，并且格外简单易懂。

——安东尼·E·沃尔夫博士
临床心理学家，畅销图书《不公平，杰里米·斯宾赛的父母让他整夜不睡！》作者

就在“男孩还是女孩”之后，新父母们最常听到的一个问题是“孩子睡得好吗？”看过金姆·韦斯特这本没有痛苦、实用而且很容易上手的书之后，他们就能够照实回答说，“当然，睡得无比香甜！”

——阿明·布洛特
《准爸爸》以及其他六本关于父亲的畅销书作者

父母和孩子都应该喜欢这本涵盖了整个儿童时期——从刚出生到五岁为止——睡眠问题的常识性的，有益家庭的指导性图书……这本书能够教父母们学会如何用温和的方式从新生儿时期就开始塑造孩子的睡眠习惯，免去了许多家庭都要经年累月忍耐的睡眠不足之苦。

——大卫·凯斯勒
医学博士，前食品与药物管理局理事，现任加利福尼亚大学旧金山分校医学院院长

这本书能够教父母们学会如何用温和的方式从新生儿时期就开始塑造孩子的睡眠习惯，免去了许多家庭都要经年累月忍耐的睡眠不足之苦。

上架建议：育儿·生活

ISBN 978-7-80251-892-6

9 787802 518926 >

定价：68.00元（全两册）

The Sleep Lady's Good Night, Sleep Tight

0—1.5 岁适用

韦氏婴幼儿睡眠圣经

金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

韦氏婴幼儿睡眠圣经/(美)韦斯特,(美)凯南著;李寒译. —北京:金城出版社,2011.4

ISBN 978-7-80251-892-6

Ⅰ.①韦… Ⅱ.①韦… ②凯… ③李… Ⅲ.①婴幼儿—睡眠—基本知识 Ⅳ.①R174

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 046972 号

THE SLEEP LADY'S GOOD NIGHT, SLEEP TIGHT: Gentle Proven Solutions to Help Your Child Sleep Well and Wake Up Happy by Kim West with Joanne Kenen

Copyright©2010 by Kim West and Joanne Kenen

Simplified Chinese translation copyright©2011 by Gold Wall Press

Published by arrangement with Vanguard Press, a Member of Perseus Books Group through Bardon-Chinese Media Agency

博達著作權代理有限公司

ALL RIGHTS RESERVED

Copyright©2011 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归**金城出版社**所有,未经合法许可,严禁任何方式使用。

韦氏婴幼儿睡眠圣经

作　　者	[美]金姆·韦斯特　[美]乔安娜·凯南
译　　者	李　寒
责任编辑	方小丽
特邀编辑	然晓然
开　　本	880 毫米×1230 毫米　1/32
印　　张	16.75
字　　数	550 千字
版　　次	2011 年 7 月第 1 版　2011 年 7 月第 1 次印刷
印　　刷	三河市鑫利来印装有限公司
书　　号	ISBN 978-7-80251-892-6
定　　价	68.00 元(全两册)

出版发行	**金城出版社**　北京市朝阳区和平街 11 区 37 号楼　邮编:100013
发 行 部	(010)84254364
编 辑 部	(010)84250838
总 编 室	(010)64228516
网　　址	http://www.jccb.com.cn
电子邮箱	jinchengchuban@163.com
法律顾问	陈鹰律师事务所　(010)64970501

书 评

对安睡女士和《韦氏婴幼儿睡眠圣经》的赞誉

“因为从来没有‘教’过女儿应该怎样入睡，我们在不知不觉中遭遇到了孩子的睡眠问题……‘止哭’的方法根本没用，而‘任其哭泣’也并非我们的选择。我们怎么能让孩子自己解决我们为她制造的睡眠问题呢？在金姆·韦斯特的知识和体贴中，我们找到了方法，学会了用柔和的手段让女儿索非亚自己入睡。金姆·韦斯特与大家分享了这么棒的礼物，我们愿意向所有遇到和我们同样困扰的父母介绍她的好方法！”

——美国康涅狄格州斯坦福德市围产学家理查德·维斯卡里欧(Richard Viscarello)与母婴及个人专业护理师雪莉·维斯卡里欧(Shirley Viscarello)

“父母与孩子一样，都很乐于接受这种亲切而有利于家庭的，能帮助孩子从出生到五岁这段时间获得良好睡眠的指导。这本书会教育父母如何以温柔的方式从婴儿期就开始为孩子塑造良好的睡眠习惯，将他们从无数父母都曾经遭受过的经年累月的睡眠不足中拯救出来。稍微大一点的婴儿、初学走路的婴孩和学龄前儿童也许已经养成了不良的睡眠和休息习惯，被命名为‘安睡女士’系统的方法将会帮他们建立更健康的睡眠模式。金姆·韦斯特和乔安娜·凯南都是母亲，她们将自己的经验分享给其他有

·类似经历并愿意尝试这种系统的父母们，帮他们因地制宜，发展出适合自己家庭状况的方法来。”

——戴维·凯斯勒(David Kessler)博士，加利福尼亚大学医学院院长、医学副教授

“我要为金姆·韦斯特喝彩，她为新父母们提供了在晚上帮助婴孩安眠的简单实用的方法！金姆仔细地解释了为什么同样的方法不适合每个孩子，并且富有同情心地鼓励父母们去寻找最适合自己的方法。我强烈推荐这本足以成为整个家庭的福利的书。”

——苏莎娜·班奈特(Shoshana Bennett)，哲学博士、《产后抑郁症概要》(Postpartum Depression for Dummies)作者

“我在两个女儿身上都使用了安睡女士渐进法。之前我曾经尝试过各种方法，可是都没什么用，直到发现了《韦氏婴幼儿睡眠圣经》这本书。我简直无法描述这本书和它传递的概念到底有多棒！感谢你，安睡女士！”

——塔蒂.F(Tati F.)，来自佛罗里达州，两岁与四岁孩子的母亲

“《韦氏婴幼儿睡眠圣经》几乎能教你用爱心、耐心和温柔的方式解决每一类孩子的睡眠问题。在孩子降生之前读读这本书是一个准妈妈能做的最好的事情之一，在孩子成长的过程中，她还会不断地参照这本书，因为书中亦涵盖了较大一点的儿童的睡眠问题。这本书已经成为我参加每一个宝宝聚会时必备的礼物了！”

——珍妮佛·M.(Jennifer M.)，来自加利福尼亚州，两岁孩

子的母亲

“我购买了五本不同的关于儿童睡眠的书进行对比，发现《韦氏婴幼儿睡眠圣经》是其中最好的一本。这本书语言浅显、实用，要点突出。从此我把这本书送给每一个快做妈妈的朋友！如果我能再次做母亲的话，我会在分娩之前好好地再读一下这本书！”

——夏娜·B.（Shawna B.），来自科罗拉多州，两岁和四岁孩子的母亲

“感谢作者！我将《韦氏婴幼儿睡眠圣经》这本书作为照料新生儿的方针。他马上就满12周了，已经能够睡足整晚，并且日间也都能规律地小睡。”

——桑娅·V.（Sonya V.），3个月婴儿的母亲

“五个月大的时候，我儿子只肯含着安慰奶嘴，拉着我的手在我们的大床上入睡。两周之内他就能够躺在婴儿床里自己入睡，并且整晚都不需要安慰奶嘴！我们教育他的时候，他从来都不会哭超过五分钟！有这本书我真是太开心了！”

——来自亚马逊的评论

“我读了这本书，并用书中的方法教育我一岁大的孩子睡眠，结果非常好！作为一个新妈妈，我根本无法用‘费伯睡眠法（Ferberize）’安抚宝宝令她入睡。但现在她已经可以一天小睡两次，并且睡足整晚。我们爱你，安睡女士！”

——莎琳·U.（Charlene U.），来自威斯康星州，一岁孩子的母亲

“由于你的方法，我六个月大的宝宝是一个快乐、健康而且很能睡的小家伙。你的书浅显易懂，你的方法也不会令我产生‘母性的罪恶感’，更不会让人感到不妥。感谢你写了这本精彩的书以及做了那么多工作！”

——杰西卡·G.（Jessica G.），来自纽约

“我觉得自己读了每一本书、看了每一篇网络文章，并和每一个母亲谈过我儿子的睡眠习惯，但都没有作用。在我看到《韦氏婴幼儿睡眠圣经》这本书之前，没人能帮我拟定一个计划或者带给我信心去最终作出必要的改变，来帮助我的儿子度过每个夜晚。就在使用‘安睡女士渐进法’的第九个晚上，雷德足足睡了十个小时。我会向所有那些问我类似问题的人推荐这本书和安睡女士渐进法，我也会在未来继续把这本书当作指导。感谢作者，感谢作者，感谢作者。”

——玛雅·B.（Maya B.），来自科罗拉多州，九个月孩子的母亲

致　谢

首先我要感谢乔安娜·凯南投入此书中的数千小时，倾听并传达我的声音，以及对于安睡女士系统的信任。没有她专业的意见、鼓励和贡献我无法完成本书。

每一个曾经哭过、笑过，和我一起庆祝过他们的努力与进步的家庭对于本书都举足轻重。感谢你们让我走入你们的生活，并允许我了解你们。

我的家庭给予了我特别的帮助，无尽的鼓励和倾听的耳朵，哪怕他们早已听腻了关于睡眠的话题。我要特别感谢我出色的女儿，她是我在睡眠课题上的第一位老师，并且直到今天还在不断地教会我新东西。

最后，感谢罗杰·库珀、大卫·威尔克、洛特臣·施文思和所有信任我和我的课题的同仁。感谢我们的编辑玛丽·巴尔和弗朗辛·拉萨拉，感谢他们付出的耐心、时间和对此书的热爱。

——金姆·韦斯特

我首先要感谢金姆·韦斯特和我分享她的“安睡女士”秘密，并邀请我加入这本书的编写计划。此外，感谢我的朋友和同事——包括黛博拉·扎巴林克、迈克尔·阿库斯、南茜·祖克博德，以及我的母亲瑞吉娜·凯南——她阅读了此书并帮我改善了原稿的部分章节，还有我们的编辑玛丽·巴尔。西尔维亚·斯坦因和安德鲁·尼比利也提出了很重要的建议。我的丈夫肯和儿子

扎克、伊连，大方地忍让着我在家写作。最后，我想感谢无数的父母，感谢他们于百忙之中拨冗与我分享他们的故事和看法。为了保护个人隐私我们改变了他们的名字，但是我希望能保持他们真正的声音与经历，通过他们可以让其他父母与孩子找到最适合自己的睡眠方式。

——乔安娜·凯南

前　言

自《韦氏婴幼儿睡眠圣经》的第一版于2004年上市之后，我收到了来自世界各地数以千计的家庭的感谢，他们都使用了我的“安睡女士”系统帮助他们的新生儿、学步期的孩子和学龄前儿童——甚至于他们自己——获得良好的睡眠。在这个经过修订与勘校的版本中，我的目标是让它阅读起来更轻松。

在本书中，我更新了关于儿童睡眠安全、安慰奶嘴应用以及母乳喂养指南的最新儿科研究成果。（是的，你可以依照自己的意愿进行母乳喂养，同时还能保证家人在夜晚获得良好的睡眠。）我对一些父母反应较为难懂的章节进行了扩充，包括逐步减少夜间哺喂次数以及将学步期幼儿的白天休息次数从两次转变为一次的复杂训练。我增加了一些关于处理几个孩子共同睡眠问题的信息，还有在新生儿哭闹代表的不同含义方面新发现的一些有趣内容。我还加入了一些新的小技巧来帮助父母双方都能安心地与婴儿相处，并帮助婴孩建立起对父母的健康的安全型依恋（secure attachment）。我很高兴海伦·盖拉拜蒂（Helen Garabedian）允许我分享她的著作《宝宝瑜伽》中的部分内容，我想你一定会和宝宝一样喜欢这些内容。我还增加了一个关于产后抑郁症的章节，我希望所有的父母和祖父母都能阅读一下这部分。它可以帮你注意到自己、朋友或者家人产生抑郁症的先兆，也能告诉你如何求助。

由于我在很多家庭中工作过相当一段时间，因此本书中长期坚持讨论的主题之一就是是否要与宝宝“同睡”或者说“同床”，如果要这样做，那么究竟要持续多久。如果你愿意并且安全实现这

种做法的话，我个人支持同床。不过我也了解到许多家庭让宝宝和父母同床睡觉，并不是因为他们选择了同睡，只是因为他们不知道该怎么做而已。所以我给出了许多建议，当你想要停止同床睡觉的时候可以参考；我还讲述了许多（我推荐给了许多一对一合作过的家庭）折衷的方法——同房。这意味着你可以在起初的3～6个月内将宝宝安置在卧室中的另外一张床上，你随时可以够到的地方。如果新生儿就在你身边，会使得夜间的哺喂更方便，也会让你的睡眠得到改善。

如果你看过其他关于父母照料孩子睡眠的书，你会发现那些书通常只包括了婴儿出生的头几个月或者最多一年的时间段。你还得再买一些关于学步期幼儿和学龄前儿童睡眠的书。我觉得这有点不合适。首先，很多家庭不止一个孩子，我不想让你们买两本书！此外，你会发现就算睡眠通常很好的孩子，随着儿童时期的发展都会遇到失眠的时候——比如他们日间的小睡从两次变成一次时，从婴儿床转到儿童床上时，当父母出门旅行时，或者一个孩子有弟妹降生，等等，这些都是常见的例子。并非所有的孩子都能按照严格的作息表生活。幼儿也许会在11个月大时遇到成长中的重要事件，而同样状况的另外一个孩子却有可能在13个月的时候才发生这样的情况，这都很正常。但我并不希望你得翻阅两本书才能找到可以解决你自己特殊问题的答案。当然，这意味着本书会很长！在这个版本中，我尽量让那些睡眠不足的父母们能更轻松地从本书中找到他们需要的信息。你会看到很简单的插文、小技巧和附表！我希望这些都能有所收益。

虽然本书中涵盖了从新生儿到五岁的时间段，但“安睡女士”系统实际上只有两个特殊的阶段。在婴儿的头几个月，我们的重点在于抚慰婴儿的技巧和建立基本节奏与惯例来帮助婴儿学会入睡。这部分略显平常但却非常有效。对于很多婴儿来说，这时建立的基础能够帮助他们自行入睡，并且在四至六个月时能够整夜安眠。另外一些婴儿也许需要更多的帮助，我的“安睡女士渐进

法”提供的睡眠塑造系统相当有组织性而且手段柔和。但这种方法并非为新生儿设计的。通常在宝宝六个月之前我们都不建议使用这种方法。有些父母可能在四个月的健康宝宝身上就成功地使用了“安睡女士渐进法”，但如果此时这种方法不奏效也不要放弃。按照我推荐的适合四五个月的幼儿的方法一步步进行，如果需要的话在宝宝六个月大后再尝试一次渐进法即可。在开始任何睡眠训练方法之前，最好先去造访一下宝宝的医生。

最后一点也绝对是最必要的想法。你知道为什么在房地产行业中最重要的元素就是位置、位置、位置吗？同样的，在父母对婴幼儿的教育中最重要的元素则是一致性、一致性、一致性。对于睡眠尤其如此。花上一点时间让你自己熟悉我的理念和系统。当你准备好付诸行动后，就必须坚持一致性。前后不一对孩子没有好处，那只会让孩子感到迷惑。如果孩子不知道他到底该怎么做，或者你到底希望他怎么做，那会造成为了减少孩子的哭闹，反而导致孩子更多哭闹的状况。这不是我们的本意。如果在某些时候你确实没法坚持，那就让你的配偶或者家人接手。找另外一对父母做你们的睡眠教育伙伴，每早通个电话互相交流一下，比如你打算如何引入新的婴儿食谱或者锻炼计划，等等。研究表明，无论你选择了什么睡眠方法——尽管我希望你能选择我的方法，但我也知道你会有很多种选择——坚持前后一致绝对是成功的最重要因素。

祝好梦

有照临床社会工作者金姆·韦斯特

“安睡女士”

www. sleeplady. com

初版前言

在金姆·韦斯特和乔安娜·凯南的著作《韦氏婴幼儿睡眠圣经》中我最喜欢的部分是:安睡女士的贴心指导,帮助宝宝入睡、熟睡以及睡醒后心情愉快的秘诀是轻声细语(初版)。本书通篇都语言柔和,令读者如沐春风,并且切中肯綮。对于那些耗费无数时间,尝试用无边的爱心让宝宝停止哭闹入睡的父母而言,本书着实算得上一个绝妙而有益的救星。

我现今18岁的儿子孩提时曾经患上了疝气,想要照料他睡觉,我和我的丈夫需要时时抱着他。在开始的几年我一度怀疑自己是否在什么地方做错了。理查德·法伯博士(Dr. Richard Ferber)曾经撰写过《解决宝宝的睡眠问题》一书,我也尝试过他的"任其哭泣"的方法。但是在第一个晚上,我儿子大声地哭泣不休直到失声。一周之后,他确实睡得好了一些,但我心中充满了负疚感。如果那时候我能用金姆·韦斯特的方法该多好。

我曾经做了18年私人儿科医师,在这段时间里,我注意到大部分父母的日常生活步调都显著加快了。这不是巧合,我同时还发现,婴儿的睡眠问题也日益增加,而且在父母们紧张的日程表的影响之下,孩子们遭受的压力丝毫不比父母小。关于这个问题有很多著作出版,大部分都采用了比较激烈的"任其哭泣"的方法,从我个人的体验来看,这种方式让父母们透支了情感,内心充满歉疚。最后我终于发现了一本关于如何处理睡眠问题的图书,并将全力推荐,这就是《韦氏婴幼儿睡眠圣经》——这本书不仅可以指

导父母们，对儿科医师也同样有参考价值。

《韦氏婴幼儿睡眠圣经》涉及许多关于五岁之前儿童的睡眠的话题。每一个年龄段都有相应的章节和指导方针，教父母建立一个计划表改善孩子的睡眠，但同时也建议父母们适当地修订计划从而适合他们的孩子与家庭的生活方式。来自于多个接受过金姆·韦斯特帮助的家庭的真实案例阐释了该方法的特殊步骤，并鼓励了读者的信心。此外，有别于大多数关于儿童睡眠的著作的作者，金姆·韦斯特和乔安娜·凯南也都是母亲，她们分享的不仅是自己专业的经验，还有她们个人的体会。

我作为一个儿科医师，会在每一次健康检查中给出关于哺喂、发育、安全、免疫和行为问题方面的建议。我遇到的很多父母都希望能讨论一下与他们的宝宝的睡眠需求有关的问题。最近有一对父母带着他们十个月大的宝宝上门造访，宝宝正在生乳牙，并且整晚哭闹不肯入睡。母亲担心自己的孩子太过痛苦。经过一番全面的检查，我发现这个宝宝明显需要的是一个有规律的睡眠时间表。我和他们讨论了金姆·韦斯特的方法，并解释了为何许多哭泣行为都与睡眠不足有关。这位母亲终于学会了如何安抚她的孩子，并且很高兴地发现“任其哭泣”的方法不是她唯一的选择。我推荐很多家庭去尝试金姆·韦斯特的私人训练，并希望能将本书推荐给更多人。

——医学博士菲思·A.哈克特(Faith A. Hackett)

美国在职儿科医师爱心协会会员，

约翰·霍普金斯医院、安妮·阿伦德尔医疗中心在职医师

目 录

书 评 /1
致 谢 /5
前 言 /7
初版前言 /11

遇见安睡女士 /1
第 1 章 安睡女士系统 /15
第 2 章 入门指南与成功的小技巧 /31
第 3 章 宝宝瑜伽 /53
第 4 章 睡眠的基本要素 /61
第 5 章 新生婴儿的正确起点 /71
第 6 章 初生到 5 个月 /99
第 7 章 6～8 个月 /143
第 8 章 9～12 个月 /191
第 9 章 13～18 个月 /233

遇见安睡女士

在新任父母们面对的各种问题中，最常见的莫过于“你们家宝宝睡得好吗？”如果宝宝睡得好，那么答案通常就是“是的，她是个乖宝宝。”言下之意，那些不好好睡觉的宝宝就不乖。初为父母已经疲倦到快要超出极限的他们，不得不在面对他们的第一个挫败中努力克制自己的情绪。

当然了，数以千万计的夜晚不好好睡觉的宝宝们绝不是品性有问题。他们只是刚来到这个世界上的小人儿，还没学会怎么睡着而已。学习是个关键词。**我们都知道睡眠是一种生理活动，但通常都意识不到入睡也是需要学习的技能。**所有的孩子都能学会入睡，所有的父母也都能教会他们入睡。但就像生活中司空见惯的那样，有些人可能比其他人需要更多帮助。

我是金姆·韦斯特，有人叫我“安睡女士”，我用了数十年时间去帮助那些疲倦而且睡眼朦胧的家庭。我不敢保证一定不会让孩子哭，但是我的目标确实是尽量减少孩子们的哭泣，而且我也决不会让你简单地关上房门任由宝宝在黑暗中独自哭叫。

我有更柔和的方法，通过在晚上睡觉前、日间小睡时以及整夜的安眠中一步一步进行改变，来帮助你的宝宝习惯独自睡觉，能够自行入睡，以及在确信父母会在身边陪伴并能及时作出响应之后更安稳、更长时间地安睡。睡眠充分的孩子通常照料起来更轻松，性格更好。而睡眠充分的父母（就像在你记忆中很久之前曾经有过的睡眠一样）也会感到更轻松，心情更好，能够让孩子感受到更多的快乐与爱，而不会在夜里每 10 分钟醒来一次之后表现出暴躁与沮丧。

大约在 18 年前，我搬家到马里兰州的安纳波利斯区，随后我在这里以临床社会工作者的身份开了一家综合性治疗诊所。当时对于儿童睡眠方面我并没有什么特殊的兴趣或者经验。但在这一研究课题方面我本人确实有私人的理由。我需要大量、优

质、安稳、连续的睡眠，因此每当想到准备生小宝宝，我就开始紧张。我见过生了宝宝之后严重睡眠不足的朋友，他们眼睛下方有重重的眼袋，声音中全是紧张，我亲眼目睹他们随便因为一点小刺激就会向配偶发火。有时候好像他们唯一的话题就是昨晚睡得多糟糕，而且我还能发现他们心中有不断增加的歉疚感和焦虑。

我相信会有一种更好的解决方法，于是开始从幼儿睡眠的生理学和心理学方面研究对我可能会有用的一切相关内容。我开始将自己学到的关于睡眠周期、觉醒状态以及对睡眠的生理需要与之前了解的儿童发育和行为心理学，尤其是在我们开始教育、塑造孩子的行为模式时对教育原则一致性的需求糅合在一起。

我自己的两个女儿卡利和格雷琴都不是“天使一般的宝宝”，她们总是困得迷迷糊糊才肯安静地入睡。尤其是二女儿，她非常难哄，十分逆反，让我把理论都付诸实践。但是，我用了 8 周时间让卡利可以在夜晚睡足 8 个小时左右，用了 10 周让格雷琴也达到这个目标——而且，我是亲自哺乳她们两个的。慢慢地，我开始帮助朋友们教他们的新生儿和幼儿学会睡眠，然后是朋友的朋友。这口碑很快就传开来，很快就有越来越多困倦的父母带着他们睡不着的宝宝来敲我家的大门了。

考虑到睡眠问题的普遍性——**在每四个五岁以下的孩子中就有一个深受困扰**——找出实用的方法相当困难。睡眠科学领域虽然近几年已经有所发展，但专科医生依旧非常稀少。并非所有的睡眠诊所都接待非常幼小的孩子，又或者他们仅仅接受那些诸如窒息之类与呼吸障碍相关的病例。你确实应该排除任何可能会影响睡眠的身体状况。请跟儿科医师谈谈你的孩子的睡眠问题和哺育模式，并确保说清楚一切问题，包括消化不良、过敏、呼吸杂声以及打鼾等。

不过大部分儿童时期的睡眠问题都来自于心理方面而非生理方面，有些儿科医生接受的关于睡眠问题的训练少得可怜，在他们的医学实习期一般也就花上一两个小时而已。你可能会发现即便是很有爱心、很有能力的医生也可能不会就孩子的行为性睡眠问题给出太多建议。这就误导了很多父母，令他们以为这种不确定的睡眠不足根本没法解决，他们只能等待并且期望孩子们突然间某一天自己长大，解决这个问题。

从某种意义上来说，你确实能得到建议，无论是来自于医生还是好心的朋友或者亲属，这些建议通常是以下两种分类之一。一种是“任其哭泣”的各种变化版本；另一种则属于“依恋理论”，这种方式夸大了同睡与看护的需要，有利于度过婴儿期的起初几个月。这两种方法都不错——如果你觉得对你和你的孩子而言合适的话。但如果你们都感觉不好，如果你的婚姻关系开始紧张，如果这两种方法都不能满足你作为成年人的需求——或者如果这些方法不能帮你的孩子学会自己入睡，独自睡觉的话，那么这两种方法就不算好。

最常见的建议就是任由你的宝宝哭闹，这种方法是在 20 世纪 80 年代中期由著名的波士顿儿童医院睡眠问题专家理查德·费伯博士(Dr. Richard Ferber)提出并风靡一时的。简而言之，“费伯睡眠法”意味着任由一个宝宝哭闹，由一位家长时常快速查看一下孩子的情况，但是查看的间隔应该越来越长。这一理论是指，如果一个宝宝能够学着自己入睡而不需要摇晃、喂奶、拍抚或者唱摇篮曲的话，那么在每个人都会有的短暂而频繁的惊醒——睡得熟的人早上起床后几乎不记得自己曾经醒来过——之后，他依旧能够自己睡着。

安睡女士小提示

当孩子们面对生活中的重大变故时——比如开始上幼儿园，妈妈又开始工作，或者生了一个小弟弟或者小妹妹时——他们可能需要一些睡眠方面的帮助。

还有一种更直接的方法，是由西北大学芬伯格医学院马克·威斯布鲁斯博士(Dr. Marc Weissbluth)提出的，人称“消失法”。这种方法是无论孩子哭闹多久都不要理会，就连费伯博士的方法中让父母时常去查看状况的步骤都省掉了。研究表明，任何一种方法都不是全然有效的，而每一种方法也确实都有数量可观的成功案例——只要父母们能够堵上耳朵，关闭心门，坚持不去理会孩子的哭闹就可以。有趣的是，我认识很多家长，他们虽然通过使用费伯或者威斯布鲁斯的方法，改善了孩子的睡眠，但他们都对那个过程心有余悸。(在一个案例中，丈夫作为强制实施者，任由孩子在晚上哭泣，而性格温柔的妻子则在新英格兰的雪原上漫无目的地驱车游荡，直到估计一切都平静之后才敢回家。)

对于那些情感或者理智上都反对让宝宝哭泣，或者是使用费伯睡眠法不起作用，亦或在孩子三四个月的时候让她哭泣还行，可再大些这法子就不起作用的家庭而言，我的安睡女士法是一种比较温和的选择。我也曾经和一些家庭相处过，他们坚持与宝宝同睡，甚至由妈妈或者爸爸温柔地怀抱着宝宝睡觉，却发现孩子其实睡得并不好。我也帮助过这样一些家庭，他们曾经和孩子们同睡了几个月或者几年，但如今则想要将全家一起睡觉的状况再变回夫妇二人共眠。

我的很多工作对象是那些6～18个月的宝宝，儿科医生认为他们应当整夜安睡才好。我也曾经主办过“新生儿培训班”面向

那些怀孕的夫妇或者刚有了孩子的家庭，包括许多第一个孩子曾经遭遇过睡眠问题，所以想避免第二个孩子也如此的家庭。但如果你的孩子已经大了也不要担心；现在开始改变她的睡眠还不算晚，只不过打破根深蒂固的老习惯可能需要更多一点的时间。我曾经帮助过很多幼儿、双胞胎，以及一些刚刚开始上学的孩子。

本书中包括的年龄段一直到五岁，在此我将给出一个学龄前睡眠习惯改变的概略。哪怕你的孩子已经有了比较健康的睡眠，你也可以在她进入新的发育阶段，需要稍微调整一下睡眠习惯的时候，偶尔翻翻这本书。也许你需要建议，比如：怎样帮助孩子将两次日间小睡合并成一次，何时将她从婴儿床换到正式的儿童床比较合适，等等。当孩子们面对生活中的重大变故时——比如开始上幼儿园，妈妈又开始工作，或者生了一个小弟弟或者小妹妹时——他们可能需要一些睡眠方面的帮助。

谈谈对父母的依恋问题

有很多我曾经合作过的家庭反映说，他们很受“父母依恋”或者说“依恋理论”的影响，所以有必要用一些时间来思考一下“安全型依恋”的问题。我们都希望孩子能对自己产生安全型依恋，这是情感健康的基础。**但是父母，尤其是没有经验的新父母，常常会曲解安全型依恋的含义，而且不知道如何鼓励孩子建立起安全型依恋关系。**一些比较流行的抚育孩子和教育方面的书，即使在如何做有爱心和影响力的父母方面提出了一些观点，但还是会为父母们带来困惑。尤其是在与宝宝同睡和安抚孩子的问题上更是语焉不详。有些父母并不能够像书中教的那样充满自信地养育孩子。他们告诉我，他们甚至还经常感到心神不宁，充满猜疑和歉疚，尤其是当他们采用的方法不允许孩子稍有反复时——

虽然这本来就是他们的期望。人们不想再为了是否会在情感上伤害孩子这种问题没完没了地担忧，于是决定继续忍受经年累月的辛劳，而不是去试试用更柔和的方法来帮助孩子们学会自己睡觉。

依恋理论已经不是新理论了。这种说法可以追溯到20世纪50年代，心理学家玛丽·D. S. 安斯沃斯(Mary D. S. Ainsworth)和著名的儿童精神病学专家约翰·鲍比(John Bowlby)的研究为理解宝宝们如何建立起健康、安全的依恋打下了基础。一个安全型依恋的孩子在与父母的关系中能感受到爱、鼓励、安全与被保护。而且安全型依恋会在从婴儿到孩童、孩童到青少年、青少年到成人的变化过程中展现出健康的社交、情感、认识与运动知觉等方面的发展。

在第6章“初生到5个月”中，我会分享一些从杜克大学儿童与家庭政策中心(Center for Child and Family Policy at Duke University)的丽莎·柏林(Lisa Berlin)与她的同事合著的出色的研究报告中概括出来的小技巧，告诉读者们，妈妈和爸爸如何保护宝宝的情感安全。基本上，就像来自于杜克大学的专家鼓励性告诉我们的一样，我们不必成为完美的父母，虽然我们得到的各种令人内疚的信息都在证明着我们并不完美。我们只要像安斯沃斯几年前提出的那样，“足够好”，并且一切顺其自然即可：给予温暖、感性、正面而且有回应的关心。当我们哺育、安抚、拥抱、微笑，看着宝宝们的眼睛时；当我们满足他们的需求，表达自己的爱意时，我们就能培养出信任感。当孩子们渐渐长大，开始快乐而好奇地探索着他们不断扩展的世界时，我们要带着清楚、坚定、启发式的适当的期望鼓励他们、保护他们——但不要过度保护——并同时进行着心理和生理上的监督。我们不希望孩子们有任何走弯路乃至迷失自我、感到恐慌或者陷入危险的可能，我们也不希望他们遭到过分的挫败。我们希望孩子能够在幼儿园为了拿到一件新玩具而爬行、蹒跚学步或者大步向我们走来，也希望他

们在公园里奔跑着追逐蝴蝶。我们不用买新玩具，不用强迫他们去好奇。我们希望他们能在成长的过程中感到自信，相信自己随时可以回到父母安全的港湾。

在《安全感基础：亲子依恋与健全的人格发展》(*A Secure Base: Parent－Child Attachment and Healthy Human Development*)一书中，鲍尔贝援引了来自一家育幼学校的研究："那些具有最稳定的情感，并且最能掌握住机会的人的父母通常会鼓励自己的孩子自立，但在孩子有需要的时候却依旧会及时有效地作出回应。"换句话说，我们不能束缚住孩子，也不能太过于放纵他们。**我们希望在安全与支持，自信与自由之间能够有一个平衡点。我们需要让孩子们学会慢慢地、柔和地控制诸如挫败、兴奋和愤怒之类的情感与睡眠这样的行为，从而进行自我调节。我们不能代替他们这么做，就像没有哪个教练可以站出来替他的队伍比赛一样。**

我与一些家庭的合作也可以用教练来打比方。一位指导老师可以指导、支持他的队员，却不能替他们比赛，不能帮他们得分，也不能替他们获得更好的成绩。哪怕在队伍失败后，教练可以制定策略以便下次获得更好的成绩，却还是不能替他们比赛。这跟睡眠是一样的。我们能帮孩子学会如何入睡，却不能为他们做更多的事情，除了新生儿之外。当他们遇到睡眠问题时，我们可以体会他们的感受、可以让他们感到安心、可以引导他们、支持他们——但是就像一位教练那样，我们只能帮他们学会在下一次做得更好的技巧。接下来我们就必须放手让他们自己前进。

一些家长告诉我，他们在帮孩子建立组织性，确认方向时总会犹疑不定；在强制性制定规矩或者面对抵触行为时也总会感到紧张不安。我总是能听到家长说"我不想让孩子觉得我不好"或者"我不想伤害她的心灵"以及"我不想让孩子不喜欢我"。比如我的同事皮特·格鲁伯，他是一名临床社会工作者，曾经提醒我

说:“父母们希望被爱,但不幸的是,所谓的爱常常会被误解为没有下限的溺爱。”

大量研究告诉我们,无论白天还是黑夜,孩子们都确实需要组织性、一致性和清晰的界限。进行限制并不代表我们不给孩子选择权或者自由。恰恰相反,这意味着在健康的范围内给予孩子符合他们年龄的选择。比如,你可以让一个小孩决定穿哪套睡衣上床睡觉,或者选择她今晚想抱着哪个娃娃睡觉。但你不能让她决定今晚是不是要刷牙或者几点去睡觉。另外,有些家长会进入另一个极端,他们从不让孩子作出自己的选择,以免他们犯错或者遭受到挫折的打击。我自己的睡眠辅导法提供了一种安全的过渡,一个安全的基础。除了一开始的三个月左右和那些确实需要有人照料才能睡觉的新生儿之外,我们不能无限期地全盘照顾孩子们的睡眠。我建议让他们自己探索如何入睡,但不提倡全部让他们自己完成,或者只是关上房门让他们自己哭叫,而是让孩子们慢慢地、缓和地学会自己入睡。当他们明白哪怕看不到父母的身影,父母也依旧守护在他们身边,爱着他们,随时可以回应他们时,孩子们的自信心就会成长起来。

在我们开始简单地讨论哭闹的问题之前,让我先分享一下来自罗伯特·凯伦(Robert Karen)的著作《充满爱心:最早的人际关系与如何塑造爱的能力》(*Becoming Attached: First Relationships and How They Shape Our Capacity to Love*)中的一些精彩片断:“在爱的讯息中,有一些东西是简单而且常见的——你的孩子在情感的成长中唯一需要的就是你的真情实感和关心。你不需要富有、聪明、有才华或者风趣;你只需在合适的时间呆在合适的地点就可以。对你的孩子而言,除了让你拿出时间和精力来关注他们之外没有什么解决不了的问题。”

理解眼泪的含义

父母们经常会表示他们没法对孩子的哭声无动于衷，他们担心哭泣会影响孩子的身体或者导致情感上的伤害。我比任何人都无法接受一个孤独的、歇斯底里的孩子，我也绝对不会让我自己的孩子在黑暗中哭叫。但在以哭闹作为家常便饭的儿童时代，哭泣其实不算大问题。安睡女士系统的目的就是**将挫折减到最少，将安心放到最大。**通过陪伴，通过给孩子身体和语言上的关心与安抚，我们可以减少自己与孩子的压力，但我们不能消除所有的眼泪。不过，作为父母，只要理解了哭泣是交流方式的一种，并且想想孩子们企图通过哭泣传达出什么信息，我们就可以更轻松地面对泪水。

当婴儿或者孩童哭泣时，他是在告诉你自己的需要或者要求。此时他的脑海里只有这件事。只有你通过满足他的需要才能使他平静下来，他的大脑才能集中到别的东西上。但如果你不能满足他的需要，或者再三忽略他的哭泣，也许就会导致过度刺激，并且令后来的安抚更加困难。一些研究表明，一种被忽略的哭泣实际上会影响到大脑的“传导信号”。一个大脑开始习惯了混乱的婴儿也许会在未来的生活中遇到更多混乱的状况。现在，请注意，我并不是说一点点哭闹就会毁掉你的孩子的身体或者让她无法建立起安全型依恋，我只是在谈论一类长期无人关注的哭泣的情况。比如在你正好洗澡的时候，你的孩子在他的摇篮里(安全的)哭闹，这并不会给他造成终生的伤害。相对大一点的孩子来说，我们自然而然地更无法容忍新生儿的哭泣。这就是为什么我只向那些刚出生几个月的孩子的家长推荐最柔和的睡眠指导技巧，而且在孩子满六个月大之前从不推荐安睡女士渐进法的原因。(有时候在儿科医生的首肯下，一种改良后的方法能够使用四个

月,更多相关内容留待我们到不同年龄段的相关章节再讨论。)

在我的安睡女士系统中,你将学会在孩子还醒着的时候——昏昏欲睡但还没有睡着——在什么时机下如何将孩子放到床上。当然,你一定会面对一阵哭闹。但你能够学会对此作出反应,而且正好就是你的心和大脑(更不用说我们刚刚讨论过的那种关于依恋心理的研究)想要做出的那种反应。对于父母而言,听到孩子哭闹确实很难过。不过这样也许会好一点:你可以把哭闹想像成孩子用自己的方式对你说"为什么我还没睡着就把我放下?我不知道怎么才能睡着!你应该让我睡着的。我累了!你在做什么?为什么你好像变了?这实在让人不愉快,我不太喜欢这样!"**在这个时候你就得记住你自己只是个教练而不是队员。你得付出爱、支持、安慰和保证——在一种安全的基础上。但你却不能帮他调整,不能解救他,也不能替他做完所有事情。**你不能以他的认知与睡眠为代价去消除每一次挫折带来的影响(尽管你的心希望如此)。一旦你给了他一个可以学习和探索的安全放心的空间,睡眠与在幼儿园探险或者追逐蝴蝶相比也就没什么不同了。

看着你的孩子,你会看到他从挫折中走出来;你会看到他学会什么能帮自己入睡,什么感觉不错,什么能让人感到安慰;你会看到他学会吮吸自己的大拇指、摇晃自己的身体或者在柔软的毯子上磨蹭自己的面颊。一旦孩子得到了信心,当他们知道自己拥有这种技能,睡眠就不再困难和神秘时,他就再也不需要哭泣了。教导孩子学会入睡,你并不是在情感上伤害他,而是在帮助他成长。

"他哭的时候,我们觉得自己是糟糕的父母,"有关梅根说她儿子布鲁斯的情况,你可以在第 8 章"9 到 12 个月"中读到:"我们觉得哭泣会让他感到孤独,感觉被抛弃;我们觉得哭泣令他备受折磨。但我们也知道不让他入睡才是真正的伤害。睡眠对于他的成长发育无比重要。你不得不反复提醒自己:他需要入睡;你这样做是对的。"

泰丝对于自己童年时的恐惧还记忆犹新，她和父母共睡到八岁。可就算她白天要在医院照料进行化疗的母亲，晚上还要每一两个小时就起来一次照料10个月大的儿子，累得半死，感情也几乎麻木，她对于杰森的哭泣依旧有一种几乎病态的反应。最后泰丝还是认为杰森需要学会更好的睡觉，即使这意味着他会哭闹得更厉害，于是她把杰森交给丈夫罗恩，自己住进了旅馆。“我对一个朋友说，我觉得自己可能会毁了杰森；她告诉我她认识很多人生一塌糊涂的人，但她不觉得那是因为他们在十个月大时喜欢哭闹造成的。”泰丝笑着回忆说。次日清晨，泰丝流着泪踏进自家前门，以为自己会看到屋子里鸡飞狗跳。可恰恰相反，她看见杰森和罗恩正在起居室里愉快地玩耍。杰森确实哭闹了一阵子，也许还会再哭上两天——但最多也就两天。他学会给予自己与父母都非常需要的睡眠。

有些父母常常会问我他们的孩子要哭闹多久，答案通常是比你想像的少得多。不过，大一点的孩子和学龄前儿童可能会比小婴儿哭闹抗议的时间更久，这只是因为他们不正确的睡眠方式更为根深蒂固一些。特别是那些懂事而敏感的孩子，比如第6章“初生到5个月”中的阿里，可能会比其他孩子哭闹得更厉害，那是因为他们需要更多时间去抵制外界对他们的睡眠造成的影响。在刚开始进行睡眠训练时，孩子们的父母如果态度前后矛盾也会导致更多的哭闹。但看完这本书，你就会发现父母们越坚持前后态度的一致性，就会让生活和睡眠对他们自己和孩子而言，越轻松。

孩子成功学会睡眠

当我和一个家庭合作，为他们制定单独的睡眠计划时，我通常也会了解他们的价值观、生活方式与教育方法。我从不会提出

那些让人觉得自己是个不合格的家长的建议，也不相信会出现奇迹。改变睡眠习惯需要花时间，肯定也需要一致性。就算睡眠减少，起床提早以及临时起夜的状况可能会比正常状态更耗时一些，大部分家庭也都能在两周之内解决他们的睡眠问题。

在本书中你能看到一些家庭经历了极其迅速的改变。但我选择的案例中会包含更多的困难，那些家庭面对的都是挑战和挫折，因为我希望本书能尽可能多地展现各种情况与解决方法。如果你的进度很慢也不要气馁，尤其是如果你的孩子比较大，而且已经睡眠不佳很久了。（我的合著者乔安娜·凯南的儿子伊连就是第二种情况。这个聪明的小家伙即便睡眠非常少，照样精力充沛，他确实算一个相当困难的案例，但是在时间、耐心与一致性的共同作用下，他最终还是能够自己上床睡觉，并声称“我睡得很香。”）

你会发现进度很快，但还是要拿出几周时间来巩固成果，确认过去的睡眠方式渐渐消失。有时候你可能会在几天之内就完成90%的目标，这意味着你的生活会更好过一些，但是完成最后10%的目标则可能会耗费更长的时间。耐心一点，记住学习一种技能——无论是睡眠、走路、使用刀叉或者学会用便盆——都需要时间。包括疾病、活动、旅行或者父母因公出差等反常的情况。都可能会导致暂时的挫折。如果你坚持遵循原则，你的孩子就能承受那些小打击，并且在一段合理的时间内恢复正常。最终，他的睡眠技能会稳定下来，他到任何地方都可以高枕无忧——度假、去祖父母家里、稍大一点时晚点睡、夏天的露营，哪怕是去上大学都不成问题。

在你开始阅读你的孩子所处的年龄段的相关章节之前，请先读一下这部分的其他章节，在此我概述了我的方法，并介绍了一些关于睡眠科学的简单要素，有助于你理解和掌握孩子的自然规律。我的系统是有效的，也一定会对你起作用。预祝你能享受到平静的睡眠！

第1章　安睡女士系统

作为富有爱心和责任感的父母，我相信每个人对自己的孩子都有五点必须尽到的义务：我们要照顾孩子的情绪健康和身体健康；我们要给他们好的营养和好的教育；我们还要保证他们知道如何睡眠。简单，而又重要。

安睡女士系统将向你提供一种架构，帮助你了解孩子的睡眠；提供一种方法，帮助你的孩子改善睡眠行为。我在书中给出了许多特殊年龄段和特殊问题的建议，不过在本章，我将会给出一些可以在大多数年龄段通用的方法概要。我常常告诉那些父母，我需要他们具备三样东西：耐心、统一阵线和一致性。这一章中我们将全面阐述以上三点，尤其是一致性原则这个行为心理学的基础。在下一章中，我同样会给出一些使用的小技巧、小步骤，也许能帮你开始行动，并走上正轨。此外，我还会支持你从父母的视角与本能出发将学到的知识综合在一起，建立更适合你和你的孩子的睡眠优化方案。

安睡女士渐进法

在新生活的第一个月，我们要关注有技巧的安抚手段，并确立一种基本的生活节奏来帮宝宝们学习如何睡眠。我们还没有开始进行大量积极的“睡眠训练”，却是在为好的睡眠打基础。对很多宝宝来说，我们用这些温和的步骤让他们在 3～6 个月的时候内学会入睡、学会有时候自己睡觉已经足够了。从大约 6 个月开始，我的训练计划的主要方向就是安睡女士渐进法。你可以把它想成是和断奶一样的过程。为了给宝宝始终如一的感觉，我们可以在晚上睡觉的时候用这种方法来应对宝宝在午夜醒来的情况，也可以在某些案例中应用于日间小睡。渐进法可以巧妙地从一个年龄段转换到下一个年龄段，我将会在不同年龄段的章节中

向你展示大量的细节。

简单说来，渐进法是这样的：你、你的配偶或者父母，一开始的时候可以坐在宝宝的婴儿床边。在这里，你可以轻松地抚慰他，令他感到安心。每三天你便挪到离他稍微远一点的地方，渐渐到房间中央、门口、客厅中，但仍然是要能够随时安抚他的地方。有时候我会建议父母们用垫子或者睡袋在婴儿房睡几个晚上，作为一种令宝宝放心的前奏。（尽管实际上父母们和宝宝一样需要这种安心！）有些宝宝对这种变化的反应非常快，这时候我会建议父母们尽快完成渐进法的步骤。

最后，如果你每次能至少让他独自待五分钟以上，他也就能够自己睡觉了。对你来说这也许是一个巨大的飞越，但是对他则不然。通过渐进法你给了他大约两周时间做准备。随着你越来越少地抚慰他，宝宝就学会了更多的自我抚慰，吸吮手指、玩弄头发、缩进他的小毯子里，或者抱着他的小熊宝宝。晚上睡觉的时候你放慢脚步，轻轻离开，让他建立起你仍旧在一旁，可以随时回应的认知。当他明白“就算我看不见，妈妈还是在那里的”以及“爸爸就在附近，爸爸爱我”时，只要你觉得可以了，他也就做好了自己睡觉的准备。

在实行渐进法期间你很可能还会面对一些哭闹，但一般都会远远少于使用“任其哭泣”的方法所需要面对的状况。当他要哭闹的时候你过去安抚，所遭到的心理压力也会远远少于上述那些父母。

耐心

在着手进行这一计划的最初几个晚上，你也许会非常困倦，因为在短时间内也许你的睡眠会更少。这是由于当你开始改善

宝宝的睡眠行为时，将会不得不放弃一种在午夜时分出现，通常被称为“负关联”的睡眠支撑，这种睡眠支撑可以让宝宝在短期内再度入睡，却无法防止他在一小时之内又一次醒来。宝宝也许会抵触改变。在他适应了新的生活习惯，适应了新的“正关联”的睡眠支撑之前，在一切都开始变好之前，也许一度状况会恶化。试着抽空打个盹儿，或者试着晚上比平时早一点上床睡觉。每个早上，对自己讲些鼓励的话，暗示自己所做的一切都是值得的，很快你们就会整晚都睡得格外香甜了。

很多父母认为，我的私人诊所最有帮助的特色是频繁的清早电话交流。在第一个五天中，我们每个早上都通电话；然后接下来的两到三周内是每两天一次。这些频繁的电话中，部分是进行良性调节，部分则是鼓舞士气。在最初的训练中，几乎无法坚持下去，马上就要失去耐心和一致性，尤其是你已经数月甚至数年都没有完美的一夜睡眠时，这些电话起了很大的作用。

如果你不想和我通话，也可以去找个富有同情心的好伙伴，每天早上和他聊聊。你的配偶一般也了解安睡女士计划的进程；另外一个已经经历过这段历程的妈妈也可以；和你一样缺乏睡眠，也在进行这个计划的父母同样可以成为你的同伴，相互评论、相互加油、相互支持。你会发现你圈子里的每个妈妈都想加入到这个计划中来！这些清晨的电话的重点在于能够总结前一个晚上的情况，分析你需要作出怎样的调整，分析前晚的行动是奏效还是失败，以及弥补一些你可能疏漏的地方。父母们告诉我说，当他们需要每天早上向别人报告情况的时候，他们会感到更多的责任感，也就更能坚持下去。他们也愿意在艰苦的时候去同情别人，并为了一点点进步和对方一起庆祝。

统一阵线

在你确定想要让孩子建立起怎样的睡眠习惯之前，最好先反思一下你所处的位置。父母双方都要参与，而且其他相关人员、保姆以及祖父母也都不例外。

父母们需要谈谈彼此的目标，确保大家都赞同。比方说，如果妈妈希望孩子能够睡在家人的大床上，但爸爸希望宝宝自己睡在婴儿床里，计划就会无法实行。同样，如果妈妈的理智告诉她宝宝应该睡在婴儿床里，但内心却渴望每晚都能把这些喷香的小宝贝抱在臂弯里时，这也是个问题。好好想想，彻底谈谈，谈谈每个人都能容忍什么程度的哭闹，以及你在底线与一致性方面的教育方式是怎样的。

想想你的孩子的性格、过往和自控能力：什么能让他平静下来？他用什么方式让自己平静下来？如何把这些因素加入他的睡眠习惯？你无法将睡眠从其他一切生活教育方式中剥离出去。如果你制定了一个计划，但作为父母却无法遵守下去，那它就不会有作用，对你的孩子也不公平。如果你是初为父母，当然尚不明了自己的教育方式究竟如何，或者哪些教育方向对于父母双方而言是完全相反的。常常谈谈这些内容，并找出双方的共同之处来。

对于任何年龄段的孩子而言，不一致都是一个大问题，一直到他们进入青少年期为止；如果你们不经常开诚布公地交流的话，就教育孩子方面发生的争论也会成为婚姻中的一个问题。分享教育孩子的责任，共同制定教育决策也会让婚姻更幸福。

·致性

无论是在处理睡眠问题还是在处理孩子其他方面的教育上，作为父母作出的最有破坏性的行动就是前后矛盾。心理学家称之为“间歇性增强”：如果在有些事情上你让步了，有些事情上却没有，就会传达给孩子一种混乱的信息。尤其是对婴儿和学龄前儿童，他们会无法分清自己的哪些行为需要改变，而哪些行为只要耍赖、哭闹或者撒娇就可以获得让步。不一致的增强行为最不容易纠正或者压制。这种行为造成的后果需要更长的时间去改变，它甚至会让我们本想尽力避免的哭闹变得更多。在孩子一岁之后这种行为尤其可怕。有时候父母们对于改变规则、给予例外、作出退步可能会觉得无所谓。我们都这么做过。但是一再打破规则，反映在其他方面就是反作用，在睡眠问题上则加倍严重。

一个很明显我们都见过，而且大部分人都可能会经历的例子，是在超市收银台前结账的队伍里要糖吃的小孩子。一般妈妈（或者爸爸）说不可以，小孩就会很快停下嘟囔——或者嘟囔得更厉害。但是一天，不管什么理由，妈妈居然答应了。也许妈妈累了；也许小孩比平时折腾得更厉害，妈妈只不过是想拯救超市中其他人的耳膜。无论是什么原因，他得到了好处——至少他尝到了甜头。下一次再来超市，当他要求吃糖，而妈妈说不可以的时候，他就不会再老老实实了。孩子知道，妈妈曾经让步过，只要他折腾得足够厉害，妈妈还会再次让步，但他并不能理解如果妈妈不肯让步又会怎样。他也许会很有道理地问自己：“上次我都得到糖了，为什么这一次不能？我该怎么做才能得到糖？”也许他就会尝试他想到的所有方法，这可大大不妙。

现在，想想看在一个环境幽雅、明亮的超市里对付一个精力

充沛的要棒棒糖吃的孩子有多难，再想想看在午夜时分对付一个疲倦却又不知道该怎样入睡的孩子该有多痛苦。一致性是绝对重要的原则。如果你不能坚持一致性，你就会把事情变得很棘手。你会让孩子感到更困难。如果你试图把一个小孩从你的床上移到婴儿床里，你就得让他每天晚上都待在婴儿床上，而不是大多数夜晚。如果你不想在凌晨 3 点到 4 点的时候抱着孩子在客厅里走来走去，你就必须在每个晚上都坚决不抱着孩子踱步，而不是大部分夜晚。孩子会无法理解为什么你在星期二晚上让他躺在你床上，却在星期三晚上任由他哭一个半小时；或者为什么你在凌晨 1 点时不让他躺在你床上，却在凌晨 4 点筋疲力尽的时候不得不这么做。宝宝们可不知道时间！他只知道哭。这就是他说话的方式："嗨，到底怎么回事？太晚了，我累了，我想躺下睡觉。为什么我现在不能躺在你的床上，可是昨天就能？"

决定了在他醒来之后如何反应就要一直坚持下去。也许一开始你会面对一些哭闹，但记住，你没必要不去理会。安抚他，帮助他，告诉他你爱他，哭闹就会停下来。

为什么一致性是关键

时断时续的强化认识确实会让你的孩子更不容易学会自我抚慰和入睡。以下是三个案例：

1 号父母：在睡觉前照料孩子。当宝宝夜间醒来时，有时候是母亲照顾他再度睡去，有时候则是父亲。通常在某一时刻，宝宝会因为困惑与沮丧大哭不休；父母则因为太累无法抑止宝宝的哭泣，只好把宝宝抱到他们自己的床上。同样的混乱场面次日夜晚还会发生。

解决办法：最好在孩子昏昏欲睡但还没有完全睡着的时候把他放在床上(下一章节会有详细的介绍)。在每个晚上孩子醒来的时候都采取相同的反应。

2 号父母：放任宝宝哭泣。有时候大约持续 15 或者 30 分钟，因为妈妈爸爸束手无策，而且有人告诉他们这样做可以止住哭泣。但父母没法忍受哭闹，其中的一个最后还是会抱起宝宝，轻轻地拍他，哄他入睡。他们都没有意识到，这样是在告诉孩子只要他哭得时间够长，声音够大，他的父母就会为他做任何事情来哄他睡觉，这样他会永远都学不会自己睡觉。

解决办法：如果你受不了孩子哭泣，就别用“任其哭泣”的方法！试试我这种柔和的方式，或者采用你可以走进房间检查宝宝情况的“任其哭泣”法的改良版。最好能坚持半小时以上！

3 号父母：只在凌晨 5 点之后才会把宝宝抱到自己的床上。但这有个问题，因为我已经遇见过知道时间的婴儿了。他们会醒得越来越早，而且不理解为什么想要在凌晨 2 点、3 点或者 4 点到妈妈的床上去就不行，在 5 点就可以。那该死的闹钟到底是个什么玩意？

解决办法：在接近你的孩子的年龄段相关章节，按照针对习惯早起的孩子的方法进行尝试。这是一个特别艰难的挑战，因为我们成年人在凌晨 5 点的时候状态都不够好，但一致性还是必须坚持的原则。

爱伦，两个孩子的妈妈，她知道在半夜按照安睡女士的建议行事绝非易事。她很心软，不喜欢看见宝宝哭闹，但她已经非常

非常疲倦了。有时候放弃是如此诱人的想法，比如让詹姆斯再喝一次奶，或者把他放在自己的床上。但爱伦知道她必须坚持，否则她将会在更长一段时间内都如此疲倦——她的孩子也会在付出更多饱含疲倦、挫败感和困惑的泪水之后才能入睡，那正是她本来想要避免的情况。由于我不可能整晚都在她身边鼓励他，于是她选择了下面的好法子。她给自己做了提示卡，并粘在婴儿床边。以下是她卡片上写的文字：

1. 好的睡眠对整个家庭都有益。有付出必有收获。只有在充分的睡眠之下，我们才能更好地胜任父母、伙伴、朋友、员工的角色。
2. 好的睡眠习惯是需要学习的。我，作为一个好妈妈，必须教会孩子们这个技能。
3. 夫妻应该在一起睡觉。健康的夫妻关系对于家庭生活非常重要。一段幸福的婚姻会让孩子更幸福。
4. 有了良好的睡眠，我的孩子才能更好地成长发育。

我将会用可能令你感到惊讶的建议来结束本章节：我不在乎你用的是什么睡眠教育系统。很明显，我本人信任安睡女士法。这种认知来自于我私人的工作经验，来自于我在全国各地的座谈、讲座，来自于数以万计从本书的第一版中找到切实可行、合乎实际，只要几天就能奏效的方法的家庭向我们作出的反馈。我认为通过向读者提供清晰的原则与框架，让他们按照自己家庭的实际情况进行改善可以带来一种完美的平衡。但如果这样并不适合你，就再试试别的方法吧。

你大概已经发现，目前市面上不乏各种关于睡眠系统的理论和图书可供选择。无论你选择了什么方法，都可以尝试一下。不要按照我的建议（或者说，按照任何人的方法）只执行了 12 小时就放弃！一些研究表明，让宝宝独自在他的房间里一直哭泣的

“消失法”快而有效——但仅限于那些能够忍受孩子们哭泣的父母使用。选择什么方法的关键都在于一致性。如果你不能遵循原则，任何方法都不会有效。根据美国睡眠医学会的研究，如果你按照指点行事，大部分方法都会奏效。虽然不是百分之百，但你依然有很大的成功机会，但是只有坚持才行。

记住，当你开始改变对孩子的睡眠模式的反应时，他也许会抵触一段时间（或者几个晚上），在状况好转之前，也许会变得更糟，但如果你继续坚持下去，哭闹就会停止。实际上，孩子们是需要一致性的，而且不仅仅是在睡觉的时候才需要。如果我们的反应是他们可预见的，并能帮助他们知道自己想要如何，以及父母想要他们如何时，孩子们就会感到安心。你越坚持一致，他的回应就越快。你给他混乱的信息越多，他越难适应。所以对你的孩子而言，一致性绝对是最重要的因素，这是成功的关键。

同睡

大量研究与观察表明，同睡的数量正在上升，一部分人是由于有越来越多的女性选择了母乳喂养，这些母亲发现让宝宝待在自己身边会更便于照料。一些家庭刻意选择同睡，从出生几个月的婴儿到几岁大的孩子都在一起，因为他们认为家人分享同一张大床是最能满足情感需求的方式，或者说这种做法与他们的教育模式最为一致。另外一部分人则只是认为让宝宝睡在他们的床上是防止宝宝哭闹最简单的方法。

我将用整整一个章节来讲述同睡的问题（下册第 3 章“这到底是谁的床”）。我鼓励父母们在宝宝出生之前好好思考一下这个问题，或者至少在宝宝刚出生的前几个月想一下。问问你自己，宝宝 2 岁、4 岁或者 6 岁的时候你希望他睡在哪里。想想你

的生活方式如果发生改变会怎样：另外有一个孩子；如果你是单亲家庭，万一找到了新配偶等，这都会改变你家大床上的人员构成或者整个家庭的状态。将同房作为一个备选——把宝宝放在你床边的摇篮中。如果起初的三个月你希望宝宝就在身边，这也是一种常见的做法，我会帮你在 12 周之内完成转变。如果你想和宝宝同睡的时间更久些，但希望宝宝能在两岁时自己睡觉，那么我会劝你尽早开始这种转变。如果她从出生以来一直认为你的床就是她的床，那么什么才能让一个两岁的小孩心甘情愿放弃父母的大床，开始在自己的房间里睡觉呢？

如果无论从情感还是理智上你都选择了全家一起睡觉，如果你认为这就是你自己的教育方式，如果你能遵循所有同睡时要注意的安全事项（详见本书最后的“婴儿的安全睡眠规范”），那我能够理解并支持你的决定。我会在全家同睡的章节中告诉你如何帮助宝宝加强自己的睡眠技能，尤其是在小睡时，就算是同床的大家庭也适用。**但如果你发现，虽然你喜欢同睡，可是大家一直都非常疲倦——如果实现的只是“同”而不是“睡”——那么该考虑一下是不是要做些改变了。如果你打算同睡却没能实现，也不**要觉得自己在早期教育中遭到了失败。如果你常常要强撑着才能张开双眼，那么想做一个完美的、能及时回应孩子快乐的父母其实非常困难，持续的疲劳很容易增加患抑郁症的风险。

安睡女士系统应用案例

我坚信自己的方法的一个原因在于，我无数次看到这方法起了作用。我几乎没法数清楚有多少次听到父母们告诉我他们的孩子不可能改变，我不可能帮助他们，但就在听过他们抱怨的几周之后我就会创造奇迹：宝宝能够安睡了。在一些案例中，尤其

是那些比较大的孩子，在一段短暂的时期内起夜可能会很频繁，但是如果你坚持按照计划进行，他最终还是会改变。偶尔会出现孩子的习惯发生倒退，这可能是因为他的生活习惯被破坏，也可能是因为他进入了一个新的成长阶段，还有可能只是因为他有一些“空白”的日子。不要失望，现在你将会掌握能帮他重建良好作息习惯的工具。

妮可

当人们希望我能展示一些安睡女士系统生效的真实案例时，我常常会想起妮可。当科丽和艾伦上门请教时，妮可只有 11 个月大，而且每晚需要有人两次起来照顾。尽管她每天还有两次 90 分钟的日间睡眠，她的作息时间依然没有规律，就像她早上醒来的时间一样不可捉摸。起先，妮可有一些健康上的问题——食物反流和乳制品过敏，以及频繁的耳部感染——因此科丽与艾伦不想她晚上过多哭泣。“她的哭泣是因为痛苦，而不是行为表现，”科丽说，“让她那么哭我实在无法接受。”

在我遇到这一家人时，妮可的医生已经治愈或者说控制住了她身体上的疾病，但曾经的疾病还是在她身体上留下了痕迹。这让她错过了学会自我抚慰和自己入睡的机会。几个月之后，整个家庭都为之付出了代价。科丽后来吐露，当她登陆我的网站时，忍不住落泪，因为她发现终于能得到帮助了。她回忆当时的感受：“我再也不能那样生活了，我都快要崩溃了。”

在妮可很小的时候，她睡在父母的大床上。“我们很喜欢这样，”她的母亲说，“我可以照顾她，这样做让我感到方便。”在妮可三个月大，科丽重新开始做兼职的收银工作之后这种做法尤其适合。在妮可六七个月时，他们把她放进自己房间的婴儿床里，但让她入睡就变得困难起来，她最终还是会在父母的床上睡着。

不过就在开始和我合作之前，艾伦和科丽已经开始培养一种

很好的睡眠习惯了。大约晚上7点15分他们会开始播放一张古典音乐CD,科丽开始照顾孩子。他们会给宝宝一只安抚奶嘴和她最喜欢的凯蒂熊,然后把宝宝放进婴儿床。有时候,如果父母中的一位留在房间里,她很快就会迷迷糊糊睡着。但通常她需要很长一段时间拍抚。当父母们时不时地试图让她自己待上10分钟,看看她能不能在没有父母的情况下睡着时,她就会开始哭闹。艾伦或者科丽只好返回来,拍着她的后背,坐在她身边直到她睡着。就算这样,只要她听到一丝父母试图离开房间的脚步声就会马上惊醒,大闹不休。“我曾经希望自己会飞。”科丽回忆说,她还曾经踮起脚尖,试着不发出一点声音,但还是失败了。

就算他们终于让妮可睡着,也不会持续太久。有时候在半夜11点半到凌晨1点半之间,妮可会醒来,需要照料。他们也曾经试着改变她的这个习惯,但最终没能坚持下来。(这就是不连续的强化!)他们越关心妮可,这种照料就越无法避免。几分钟之后,困倦的父母还是会放弃,并把她抱回到自己的大床上去。科丽照料好妮可之后,大家才能再次入睡。“这是妮可抵触最少的一种方式。”科丽说。

当我遇到科丽和艾伦时,我们就一些急需改变的问题达成了共识。科丽要在准备睡觉前的一个半小时照料妮可,而不是在上床前,从而削弱照料与睡觉之间的联系。他们在妮可的房间里点上一盏小夜灯,给她更多时间在躺进婴儿床之前熟悉自己房间里的环境。他们要对妮可说出自己的期望。“我们会对孩子说:‘现在是睡觉时间。我们给你关上小夜灯。我们给你拉下窗帘。’孩子比我们想像的知道得更多,然后我们就让她入睡了,而且她也没哭几声。”科丽说。他们也试过渐进法,但甚至都没完成坐在孩子的婴儿床前这第一步。因为妮可几乎是马上就自己睡着,而且睡足了整夜。

尽管科丽和艾伦为妮可如此快速地改善了睡眠状况而感到兴奋，可对于妮可起夜的问题还是有些不安，因为事态的进展比我们每个人预想的都顺利。过去在他们尝试着停止夜间照料的时候，艾伦都会让妮可在自己的臂弯中入睡。但无论他怎么细致地抱着他的“小包袱”，只要一放下，妮可就会马上醒来。在我的帮助下，他学会了如何在女儿睡在婴儿床中时安抚她。只要他一听到女儿有动静就马上作出回应，尽量在她坐起来在婴儿床里活动之前就赶到她身边。艾伦试着抚摸着女儿的背部哄她入睡，而不是抱起她或者把她放在自己的大床上。作为代替的手段，他只是时不时轻抚女儿的后背，并像睡觉之前那样在孩子的耳边轻声细语。

起初的三个晚上很辛苦，但是第四晚他们就获得了安宁。妮可很快就理解并决定，如果自己在半夜醒来并不会得到抚慰，那干脆就不要吵醒任何人。“事情的进展快得令人惊讶。她好像知道我们正打算做些对她有帮助的事情。”艾伦说：“我们曾经人为地做了她本该自己去做的事情。但她如今已经准备好了让我们停止这种做法。”妮可需要她的父母改变他们的行为，好让她也能学着改变自己的行为。

随着妮可的成长，她的作息习惯也改变了。她想要听更多的睡前故事，如今在父母把她放回自己的小床上之前，她会把凯蒂熊和洋娃娃都放在床上。通过制定规则并严格执行，科丽和艾伦把睡觉变成一种温暖惬意的事情，而不是角力一般的战斗。他们也坚持固定妮可的作息时间，哪怕周末亦然。“我们随着她的作息时间调整自己的事情，”科丽说，“而不是让她的作息时间随着我们的行动调整。”

回顾当初，科丽意识到，由于妮可的作息时间问题，自己和艾伦是多么焦虑，而他们又是如何把这种焦虑传递给了自己的女

儿，使得她更难以入睡。“我们曾经这么想：‘哦，不，现在该睡觉了。’”现在科丽和艾伦听到妮可自己念叨着哄自己入睡，彼此相视说：“老天啊，她这样就睡着了。这也太简单了。”

第 2 章　入门指南与成功的小技巧

在你理解了我的观点、方法，明白一致性的重要之后，让我们来回顾一些能助你成功的概念和实用技巧。

睡眠支撑

有很多方法可以帮助新生儿入睡，我们可以给他们喂奶、拍抚他们，抱着他们来回踱步、轻摇，给他们唱歌，轻轻抚摸他们的脊背，握着他们放在婴儿床里的小手，或者把他们抱到自己的大床上去。但等婴儿们长大一些后，大约 3～4 个月，尤其是 6 个月之后，如果我们继续在晚上睡觉时或者他们半夜醒来时如法炮制，就会产生一种负关联现象，不过我更想称之为睡眠支撑。这种说法并不代表上述行为是“负面的”或者是不好的，绝对不是。轻拍、拥抱和唱歌都是非常好的行为。但它们此刻会变成一种问题，或者说一种依赖性，因为这种行为与孩子们的睡眠联系过于紧密，以至于不这样做孩子就无法入睡。在本书中，贯穿始终的问题就是我们要学会如何用正关联来取代负关联，从而帮助婴儿与儿童入睡、熟睡，并且愉快地醒来。

昏昏欲睡

如果你的宝宝每一次日间小睡、每晚睡觉、每一次夜间醒来之后都会在你的臂弯中睡着，那么他就无法找到自己入睡的感觉。我建议你在宝宝“昏昏欲睡”的状态下把他放下，让他能够学会自己入睡到最后一步。当宝宝 6～8 周大（仅限健康而且足月生产的宝宝）的时候，我们就应该开始在晚上睡觉时采取这种方式，平缓地帮他们形成自行睡眠的习惯。如果你打算实行安睡女士渐进法，那么这种做法绝对是必需的。当孩子们再长大一些

时,“昏昏欲睡”也会有不同的表现。对于学步期幼儿与学龄前儿童,我们就要依靠舒缓的睡前儿歌和故事让他们做好睡觉的准备。

如果你觉得观察“昏昏欲睡”这种状态比较困难,不妨设置一个从 1 到 10 的范围,1 表示非常清醒,10 则表示熟睡。你大概要在 7 或者 8 的时候把宝宝放下。这个时候他会很困,但又足够清醒到知道你正把他放进婴儿床里。**如果他很快就睡着了,比如在五分钟或者更短时间之内,那他可能是太困;下一次就要在他更清醒一些的时候再这么做。**

如果孩子晚上还是很频繁地醒来,你可能需要在他还很清醒的时候就哄他睡觉,好让他在夜里醒来之后能更好地自我安抚。就算你在睡意刚好的时候把他放下,他可能也会再度醒来,并在你把他放下的时候反抗、哭闹。别着急,但也别放弃,不用将整个过程再重来一遍。反之,你应该站在孩子身边,运用学到的安睡女士抚慰技巧来安抚他,这样他才能学会从困倦过渡到入睡。

如果你一直都轻拍、摇晃或者抱着你的宝宝踱步来哄他入睡,那你首先应该试着去调整这种行为的时间。你应该搞清楚孩子什么时候非常疲倦却还没有睡熟。观察宝宝的反应并且判断相应的时间段。通常,对一个 6～18 个月大的孩子而言,如果他习惯了被你抱着摇晃 20 分钟,在你突然间只肯抱 10 分钟的时候,他一定会非常愤怒。他会觉得你是在戏弄他。如果孩子的情绪开始激动,他就不会感到困倦。同样的,无论你把上述行为缩减到 1 分钟或者是干脆取消,都会得到一样的结果。你应该轻轻亲吻宝宝,把他放下,把其他所有的安抚技巧都应用到这种全新的睡前习惯中。记住,如果你只能在非常困倦或者非常清醒之间选择的话,那就选择清醒的状态,然后努力去安抚宝宝,让他能在婴儿床中达到一种非常困倦的状态。

如果你通常用母乳或者用奶瓶喂奶来让宝宝入睡——这是目前为止我见过的对待新生儿和婴儿最常用的方式——缩短上床睡觉前最后一次哺喂的时间，并且开着灯喂他，以便能更清楚地注意到他的状态。当他不再用力吸吮和吞咽，而是轻轻地吸吮时，从你的乳房（或者奶瓶）传来一种轻颤，这表明他已经超出了“困倦”的程度。实际上，如果你注意观察，你就会发现他的眼睛已经闭上了。他睡着了，或者几乎睡着了。不要再耽搁，把他放下，下次试着稍微早一点发现他困倦的表现。

如果孩子在你放下他的时候醒过来，看起来还是很饿的样子，并且传达给你这种信息：“嘿，我还不想睡觉呢。”那就再给他一次机会，抱起他或者把奶瓶交回给他。如果他又开始吃，那么好吧，让他吃完，因为他确实还是很饿。但如果他只是焦躁不安地吮吸，那你就被骗了！他并不饿，只是想通过吮吸让自己睡着而已。这时你可以按照下列方法做：

1. 把乳头从他嘴里拿出来，帮他拍拍奶嗝儿，亲吻他，然后把他放到床上，下一次尽量在他昏昏欲睡的时候这么做。

2. 稍微把他弄醒——可能只是换一次尿布或者帮他整理一下衣服。然后把他放回到婴儿床里，让他稍微清醒一点儿，然后再安抚他。

尝试一下控制时间和灯光。你应该试着早点哺喂孩子，比晚上睡觉前更早一点的时候，这样他就不会直接吃着奶睡着了。例如，你一般是先给他洗澡，然后喂奶。看看是不是可以颠倒一下顺序，先喂奶然后洗澡，这样也许能帮你实现让他“昏昏欲睡”的目标。在你喂奶的时候开一盏灯，在孩子开始“犯困”的时候也开着灯，便于你观察他的行为，判断他什么时候能到达预定的困倦标准。开着灯也有助于你削弱他心目中喂奶和睡觉这两者之间的联系。（在午夜喂奶时，开一盏小灯能帮你安抚孩子，也能让你

看清楚他的状况，但却不会让他醒过来。）

安睡女士小提示

在给孩子喂奶的时候开一盏小灯，它能帮你观察孩子的行为，看他是否达到了困倦的标准。这盏小灯还能帮你削弱孩子在人生的最初几个月中在心里建立起的喂奶与睡觉之间的关联。

如果孩子还不困，如果他总能保持清醒，好让你一直在身边为他忙碌，那你无论如何都应该把他放到婴儿床里或者他自己的床上。但要保证孩子的睡觉时间很合适，保证此刻是一个真正美好、放松的夜晚，来帮孩子做好身心双方面的入睡准备，而且还要保证让他有一段和你共处的时间。一旦孩子躺到床上，就可以拿出你全部的抚慰技巧来帮他入睡了。

选择合适的时机

当你预期未来的三周之内不会有任何打扰或者较大的变动，比如旅行、搬家或者生下另一个孩子的时候，就可以选择一个合适的时机来开始睡眠训练了。如果在训练期间有什么预料之外的变故发生，比如疾病，那么就需要尽你最大的努力将训练坚持下去。有一些家庭尝试在暑假或寒假期间进行这些训练，因为此时家长们无需去应付工作中的各种突发状况。这样做很不错，但要注意哪怕没法保证你自己的作息时间，也必须保持孩子作息时间的规律性。比如，假如你打算在圣诞前夜让孩子和祖父母们一起待到夜里 10 点再去睡觉，就不要在这一周做出每晚 7 点半必须上床这种明确的规定；或者如果你打算在国庆节时招待一群活

泼的亲戚在你家院子里露营时也不要这么做。

在你选定时间准备进行睡眠塑造时，要从四五天之前就开始在一个固定的时间叫孩子起床，比如早上的 7 点或者 7 点半。同样还要确保在你开始训练之前的一两天内孩子在白天得到了充分休息，哪怕你违背我提出的所有的日间小睡原则或者依靠我们正打算摒弃的“睡眠支撑”都没问题。

做记录

在你通读本书时，坚持做一到两周的记录。有些家长发现，在孩子的床前做记录最轻松，这样哪怕是凌晨 3 点他们都能迷迷糊糊地写下潦草的记录。最好认真做记录，而不要只是在你严重缺乏睡眠时写下乱七八糟的记事便条，认真的记录有助于你清楚孩子的睡眠习惯和你自己的反应。

在记录中要注意以下几条：

◎婴儿或是儿童在何时何地想要睡觉、打盹儿、喂奶、进食，等等。

◎他何时开始哭泣，哭了多久，有多强烈。（例如，只是抽噎了几声还是大声哭闹。）

◎孩子起夜的时间和频繁度。你用了多长时间才再次把他哄睡？你有否摇晃他、抱着他踱步、喂奶、唱歌、抚摸他的脊背或者是把他放到你自己的床上？

将孩子的日常作息时间表与本书相应年龄段章节中我提出的标准时间表进行对比。如果你已经走上正轨，而且孩子表现得非常好，那么你的部分睡眠训练工作就已经完成了。如果情况相反也不要着急，在相应年龄段的章节中我会帮你处理这些问题。婴儿们进行调整其实非常容易，因为你作息时间表的改变正好符

合他们小身体的需要。

一旦你开始我们的训练计划，切记坚持记录。你的记录可以非常简单，但足以让一切尽在你的掌握中而且足够细致，好让你**能观察到孩子睡眠模式的变化。追踪孩子的睡眠模式有助于你更好地发现他传递给你的细微暗示，比如他感到疲倦了；也能令你清楚何时要把握时机，在婴儿或者学步期的孩子恢复精力，再度开始可怕的哭闹之前帮他入睡。**记录还能帮你发现影响孩子睡眠的状况或者环境，让你可以设法解决或者日后做出补救。

记录还能帮你清楚地看到更多细微生动的进步，这些很可能是每天或者每夜你没有注意到的。看到这些进步能帮你坚持下去。

“我做了很多记录，并将之作为行动的指示。‘按照这个程序。这就是我该做的。’我必须尽力严格地坚持下去。”琳达说。她的女儿差不多快一岁了。阿黛尔的孩子正处于学步期，她发现做一份合宜而详细的记录有助于自己坚持训练计划，她之前曾经尝试过好多种睡眠训练方法可是都失败了。“我可以看着自己的记录，然后一整天都对自己说，这是我应该在凌晨三点做的事。如果我只是在上床睡觉前想想而已，那到了半夜还是记不住该做什么。我必须得先训练自己。”

在你了解孩子的生活习惯和生物钟时，也要注意一下自己的习惯，尤其是从下午 6 点到上床睡觉前这一段时间。在你忙于做晚餐、刷盘子、检查信件或者电子邮件、支付账单或者与配偶讨论你们中的哪一个有时间去干洗店、药房，以及送孩子上幼儿园校车时，你是否忽略了身体发出的睡眠信号？你有没有注意到大一点的孩子，或者所有的孩子都已经同样疲倦，需要你关心呢？你需要推迟一些晚上的事务，等孩子们都睡着了再处理，你可以与配偶分别照顾他们，或者暂时适当地调整一下较大的孩子的生活

习惯，先照料小孩子睡下。但绝对不要让他们在电视机前昏昏欲睡地待上几个小时！

习惯成自然

在此，我所说的生活习惯，并非指那些固定的、绝对不能改变的对于作息时间的严格遵守。我指的是某种程度上的可估计性与稳定性，很多研究表明孩子们需要这种习惯。我将会给出一些详细的建议，告诉你新生儿、婴儿、学步期儿童和学龄前儿童合适的日常生活结构究竟应该是怎样的。如果与你的情况差距过大（你的记录有助于进行对比），那么开始调整吧。对于婴儿乃至于学龄前儿童来说，晚上 11 点都不是合适的睡觉时间，下午 6 点也不太适合小睡。尽管我通常建议人们循序渐进地进行调整，比如一次 30 分钟左右，但有时候对于一个三岁以下的孩子来说，如果你能了解他的生物钟，那么也许很快就能完成改变。（记录能帮你了解孩子的生物钟。例如，如果你孩子 20 个月大，一般晚上 10 点上床睡觉，但你发现他在 7 点半左右就开始困了，你无需耗费时间慢慢进行调整。只要在晚上 7 点半把他放到床上，并且确保你能在次日晚上以及随后的每个晚上都坚持如一即可。）

孩子们起床的时间同样需要坚持。如果你的孩子某天醒得非常早，可次日又醒得非常晚（一般早上 8 点半或者 9 点对于一个婴儿来说算是非常晚了），这就不符合他们的生物钟，会令晚上睡觉的时间混乱，日间小睡的时间则更难把握。孩子大约 5 个月时，你就应该在一个固定的时间叫醒她，一般在早上 7 点到 7 点半之间比较好。早起则是完全不同的问题了，在相应年龄段的章节中，我们会用更多时间来研究这个问题。

安睡女士小提示

很多家长向我询问两个或者更多孩子应该如何进行睡眠训练，或者当你训练大孩子们的小弟弟或者小妹妹时他们会如何反应。当你熟悉了我的训练系统之后，请看下册第4章“帮助双胞胎或兄弟姐妹睡觉”，我建议召开“家庭会议”让大一点的孩子们了解发生了什么事情，以及如何参与进去。重要的一点是：如果你打算给新生的婴孩使用原有的婴儿床，首先要保证至少在新生儿出生的2～4个月之前就先完成让大点儿的孩子到儿童床上睡觉的过渡，以免让他感到自己被取代了。不过更好的做法是，如果学步期或者学龄前的孩子不想放弃婴儿床也不要勉强他。你可以为新生儿借用一张婴儿床或者买一张二手的暂用，直到大孩子接受了现实为止。在下册第1章“一岁半到两岁”和第2章“两岁半到五岁”中我讲述了从婴儿床转到儿童床的过程，也在下册第7章“特殊状况”中提到了如何调整与新的弟妹之间的睡眠关联的问题。

晚上睡觉时间

如果说有一个所有睡眠问题专家都能达成一致的问题，那就是所有的孩子都需要一个安心而且固定的睡觉时间。从新生儿时期一直到上学，孩子们都需要这样一个时间。一些比较安静的活动，比如读书、唱歌或者祷告等可以帮助孩子们在脑海中将“闹钟”与“犯困”联系起来。我的睡觉格言是“让他们又累又困！”，这绝非是进行呵痒、摔跤、枕头大战、讲鬼故事或者其他可能刺激到孩子，让他毫无睡意的活动的时机。我通常鼓励帮孩子对一个

“心爱之物”——比如他非常喜欢的填充动物玩具、小毯子等——产生一种依恋感，这可以帮他在睡觉时安抚自己（一般在孩子 6 个月左右时，他就可以获得一个安全的玩具了）。当你准备让孩子整夜都单独睡觉时，就寝时间的主基调就应该是平静而令人安心的。

如果你的孩子反感某种就寝前的行为，可以提前将之完成。比如，他不喜欢把睡衣从头上套进去，那就在他洗完澡时先做好，而不是在你喂完奶、读了三本书、唱了两支歌儿，让他感到舒服安逸的时候去做。如果他不喜欢刷牙，哪怕你花了大价钱买来紫色粉色相间的魔法美人鱼外形的电动牙刷都不行，那就尽可能在你让他回到自己房间之前就把牙刷好，而不是在他昏昏欲睡地开始祈祷时让他去刷牙。每天就寝时间的关键在于让孩子平静下来，而不是让这些顽固的小家伙泪流满面。

睡眠时间当然也是可以理性判断的。坚持记录并观察你的孩子，学着去发现他生理困倦的迹象，这会帮你判断他生理上的“睡眠时机”，也就是他什么时候开始想要睡觉了。如果你还没有信心能“读懂”他，或者他还没表现出有固定的时间，你也可以在相应年龄段的章节找到更多建议。比如，一个两岁的孩子需要 11 小时睡眠，你两岁大的孩子早上 7 点醒来，就意味着他需要在晚上 8 点睡着，是睡着而不是准备去洗澡。将你每天准备床铺和洗澡所需要的时间全部记录下来，假如你需要 45 分钟，那就在每晚 7 点 15 分开始例行公事。如果你需要 1 小时，则要在 7 点开始准备。最好能额外留出一点时间来营造一种安静、放松的睡前气氛，而不是把时间一缩再缩，让大家都感到忙乱、紧张而且烦躁。

安慰奶嘴

多年以来，关于使用安慰奶嘴的研究与结论一变再变，而且以后可能还会改变，所以我建议你最好与你的儿科医生谈谈这个问题。不过，目前对此的看法是安慰奶嘴不仅能满足婴儿吮吸的内在要求，还能减少初生六个月内婴儿猝死综合征的风险。

一般我会建议父母们在最初的三四周内不要使用安慰奶嘴，而在巩固了母乳喂养之后再用。（一些医生和母乳喂养咨询公司说是六周。最好咨询一下相关专家。）你不需要一天 24 小时使用它。如果它从孩子口中掉落，也不要总是把它放回孩子口中。如果宝宝不想要安慰奶嘴，也不要勉强。因为对婴儿猝死综合征的研究表明，在最初的六个月内有些家长过度使用了安慰奶嘴，还有一些家长在每天晚上差不多要把安慰奶嘴重新放进孩子口中 30 多次之后决定不再使用。我们将会在相应年龄段的章节里谈到如何停止使用安慰奶嘴的问题。

其他一些有用的提示

- 大部分睡眠问题都属于行为方面，而非医学方面，但还是要请你的儿科医师进行检查以便排除身体原因或者未发现的疾病。确保药物，包括非处方药物不会影响孩子的睡眠。
- 下午照射到足够明亮的阳光的孩子们通常在夜间睡得更好。一年中大部分时间这都是非常自然的，但冬季你最好算一下时间。
- 开一盏小夜灯。（我曾经见过的一些孩子在完全的黑暗中

表现更好，但是这样的孩子非常少。）此外，在你进行睡眠训练的时候，你也会需要一些光线以免在黑暗中磕磕碰碰。一些研究人员建议，尽量避免晚上被灯光直射——无论婴儿还是父母都是，因为夜晚的灯光会影响褪黑激素和生理睡眠。诸如琥珀色、橘黄或者红色的灯光比起常见的泛蓝光的节能灯泡更能减少不适感。如果你是一位起夜照顾婴儿之后就很难再度入睡的父母，或者饱受产后抑郁困扰的母亲，可以尝试用琥珀色的眼镜来过滤掉夜间光谱中的某些特定部分。

- 如果你家里非常吵闹，可以考虑使用白噪声发生器或者白噪声风扇。市面上有很多质量好、体积小巧而且廉价的型号。（包括一些可以随身携带的小巧型号，在旅行途中能起到作用。）孩子们可以，也应该学着在日常家庭的噪音中睡着，但有些地方确实特别嘈杂，有些孩子则格外敏感。所以你也可以去试着消除由车水马龙、疾驰的卡车、附近的工地、狂吠的犬只、吵闹的邻居或者其他孩子制造的噪声。
- 如果你能在半夜醒来时看到、听到自己的孩子的状况，也许你的忧虑会减少，而且你也能睡得更好，你可以考虑买一台视频监视器。这种方法让你可以不用急急忙忙冲进孩子的房间，甚至在他正学着自己安抚自己入睡的时候吵醒他；而且也许如果不用起身走到别的房间（或者跑过去！）的话，你可以更轻松地继续睡觉。你可以从监视器上看到孩子一切都好——而且也能及时发现是否真的有需要你去解决的问题。监视器不是必需的，但有时候它能让父母们感觉更安心；你可以自己选择。
- 在房间里安装遮光窗帘，尤其当你的孩子早上醒得很早或

者白天不肯小睡时。

- 许多小孩子可能都醒得特别早，在凌晨 6 点之前。本书中我们也介绍了许多关于这方面的小技巧。一盏唤醒灯或者一首唤醒曲也许能传达给孩子一种信号：什么时候他需要再睡一会儿或者至少呆在自己的床上，什么时候他可以起床开始新的一天。首先你可以尝试唤醒灯。从五金商店购买一款定时装置然后安装在孩子房间的灯上。如果有时候他并未被这盏灯唤醒，那很好，但你应该告诉他（就像帮他发展必要的说话能力一样），在这盏灯亮起来之前他不可以起床。将定时装置设定在清晨 6 点，当他能够一直熟睡到 6 点之后，你就可以渐渐把时间再往后定一些。唤醒灯可以一直使用到上学前。大约在孩子两岁半左右，如果你打算这样训练他，也可以选择用唤醒曲来代替灯——一只收音机闹钟、一只音乐播放器或者一台带定时功能的 CD 播放器都可以。把它放在孩子够不到的地方，或者确保孩子没学会自己关掉它。有些家庭更愿意使用灯光，因为他们觉得这可能不容易吓到孩子，不过这都在于你自己的选择。灯光也好乐曲也好，一定要坚持。一旦你允许孩子在唤醒曲或者唤醒灯之前 15 分钟或者 20 分钟就起床开始新的一天，那么第二天她就不会再认真对待这种做法了。如果你都不坚持，孩子为什么要坚持？

安睡女士小提示

有些家庭喜欢用摇篮曲来掩饰噪音，但是我觉得摇篮曲还是更适合用在晚上睡觉之前，而不是孩子已经睡着的时候，这样他就不会习惯性要求你一个晚上帮他按五次“重播”键了。

- 也许你会很吃惊地发现居然有那么多婴儿和学龄前儿童的房间里都有电视机。我个人强烈反对这种做法。电视机对于成人而言是一种有效的“催眠法”;这也是为什么厂商在制造电视机时会加入定时装置的原因。看电视容易让大脑进入一种轻微恍惚的状态,类似于睡眠的第一阶段。你所需要的就是在没有电视机的情况下,让这种状态在婴儿床或者儿童床上发生。当孩子渐渐长大,学会自己开电视机后,如果电视机就放在儿童房里,你就很难注意到他们什么时候在看电视,在看什么节目了。同样的状况适用于电脑。我不支持把这些东西放在孩子的卧室里,而且你应该把电脑放在一个合适的地方,等孩子大一点时你也能关注到他的使用状况。
- 如果你家里只有一间卧室,同样可以进行睡眠训练,但你必须多一点创造力,去尝试渐渐从婴儿床所处的范围内消失。渐进法开始的头三天晚上,要保持同样的状态。从第四个晚上开始,如果孩子在午夜醒来,你可以走近婴儿床快速查看一番,然后回到自己的床上,用你的声音来安抚他。如果你愿意,也可以坐在床上,好让孩子能看到你。有些父母颠倒了顺序,一开始就把婴儿床放在成人床边,然后慢慢往远处挪。而妈妈则一直保持原位不动!如果你认为让宝宝看得到你就在附近,却无法和你同睡对他而言太残忍的话,还可以尝试把房间隔开,买一架屏风或者挂一张床单都行。
- 如果你的孩子晚上会尿床,或者正处于晚上尿床的阶段,可以把一张大号尿片包在尿布衬垫外面,或者使用超强吸收的夜用型纸尿裤。虽然不是所有商店都有卖,但你要是找还是能找得到。尿布衬垫,又叫“尿不湿”,是一种可以

放在尿片里面的特殊衬垫，供孩子整晚使用，或者在孩子生病的时候使用。当你驾车行驶或者乘坐飞机时间较长时，这种东西就非常方便。如果你是换尿片的快手，那就在孩子熟睡的时候迅速换下湿透的尿片。试试看，尽量不要把孩子抱出婴儿床或者儿童床就完成这项工作吧。

- 有些孩子会在日间小睡或者晚上睡觉前，你正打算把他放在床上的瞬间弄脏他们的尿片——有些家长认为这种行为是故意的，因为孩子们知道这样你就会把他抱出婴儿床。很明显，你需要给孩子换尿布，但尽量安静地去做这件事，并且灯光也越暗越好。你最好能掌握这种技巧：让孩子躺在婴儿床里，就能迅速抽出孩子身下弄脏的尿片换一张新的，不用把他抱起来，不用对他讲话，也不用把他一次次再放回去。如果你在进行安睡女士渐进法时发生这种状况，就按照我说的去换好尿片，把他喜欢的玩具递给他，然后再回到你应该待的位置去。

如果这种情况发生在日间小睡，那么就把这种情况看作是一次非常短暂的小睡，然后按照相应年龄段章节中关于日间小睡的训练建议进行。如果这种情况发生在凌晨 5 点，那么就按照针对早起的孩子的建议进行。孩子们常常会发现，小睡 30 分钟又换过新尿片之后，或者凌晨 5 点左右换过新尿片之后就很难再睡着了。这种时候孩子们通常会哭泣，但你要坚持训练，不要担心。如果你觉得比起平常，孩子可能需要更多安抚才能在换完尿片之后再度睡着，或者你觉得会有帮助的话，晚上也可以坐在离他稍微近一点的地方。但第二天晚上就要回到按照进度你应该待的位置去。

- 很多父母担心，如果让孩子哭泣的时间太久，他们也许会呕吐，尤其是当孩子正在经历食物逆流这种问题时会更严

重。让你留下孩子自己长时间大声哭泣确实是个问题，但我发现当父母们使用我推荐的柔和而平缓的方式待在房间里安抚孩子时，这种情况是鲜少发生的。如果孩子因为食物逆流或者其他原因出现了呕吐的倾向，那就尽量避免在上床睡觉之前哺喂他，好让他有足够的时间消化。（对付食物回流的小技巧，详见第 15 章“医学问题”。）

偶尔有小孩子甚至婴儿故意呕吐，是因为他知道爸爸或者妈妈会把他从婴儿车中抱起，温柔地呵护他。假如你看到孩子试着让自己作呕（他们不用手指就能做到这一点），要坚决说“不可以！”但紧接着就要安抚他。如果他已经吐了，要尽可能快地帮他收拾干净，但不要和他讲话或者过分鼓励他。如果可以的话，使用纸巾、尿片或者毛巾都比从头到脚给他洗澡强。如果你能应付就不要开灯。有些父母会把一张很大的被单丢在地板上准备用于做清洁工作，这样他们可以在打扫完了之后随便把被单揉成一团丢进洗衣篮。如果孩子们想要喝水的话，你可以给他一小口，安抚孩子继续睡觉，但我不建议再次哺喂他们。但要记住，你不能传达给孩子这样的信息，就是如果他呕吐了，就会被你从婴儿床里抱出来，而且不需要再去睡觉了。但这种情况并不常见，所以没必要过分担心。

很明显这种做法不适于那些生病的孩子。如果孩子病了，你就得安慰他，并遵照医生的时刻表给他喂食。以前，有些睡眠专家会告诉父母，就算孩子一直哭到呕吐也不要担心，只要忽视就可以。我从不同意这种做法，我也不认为时下很多主流专家会认可这种态度，哪怕他们的方法可能比我的还要严酷一些。

- 可能的话，和临时保姆或者儿童保育中心的工作人员一起照顾孩子时也要坚持一致性原则，或者至少采取某种没有严重冲突的睡觉规则或者作息时间表。但如果你家那位

热情、慈爱而可靠的保姆不能接受任何方式的睡眠训练，尤其是更加困难的日间小睡训练的话，那就尽可能地配合她，随时去做你应该做的事情。比如，若你没法让保姆完成每日日间小睡训练的话，那就要注意晚上和周末的日间小睡训练。对于儿童保育中心来说，不管他们是不是能灵活配合你也都是一样。优质的儿童保育通常很难发现失败的风险。（更多在儿童保育中心日间小睡的细节详见第16章“特殊状况”。）

- 在进行渐进法训练时，既使你的孩子面对异常艰难的夜晚，也不要停止训练，继续进行。但你要在白天让他多睡，这样他就不至于过度疲劳，从而令第二天夜晚变成更大的挑战。参考相关年龄段章节中我给出的标准时间线，尽量避免额外的日间小睡。让我们假设一下，你八个月大的孩子凌晨5点起床，在平常的一天中，他大概会在上午9点左右小睡，但这天也许他太困倦了，没法撑到9点。不要勉强他。让他在8点就小睡片刻——但绝对不要让他在6点半就开始小睡，导致他的作息时间表跟预定的完全不同。如果他在快傍晚时一共小睡了三次，这很好。或者他一次小睡比其他几次都多睡了半小时，这也很好。同样，如果你的孩子是学龄前，他一般会从下午1点睡到3点，那如果他度过了难眠的一夜或者早上起得太早，让他睡到4点也没问题，但不能让他在晚饭前就不停打盹儿。另外一种处理暂时性睡眠不足的方法是连续几个晚上都让孩子比平时早一点上床睡觉。总之，观察你的孩子，相信你自己的直觉，根据常识进行判断，但是要保证将情况控制在适龄儿童作息表的基本框架内。

安睡女士小提示

孩子们需要早上起床的“仪式”，就像他们晚上睡觉前也需要“仪式”一样。这些固定的程序能帮助他们强化对于起床时间与睡觉时间的理解。

- 设置一种“戏剧性的起床仪式”。突然间拉开窗帘，让阳光照射进来，唱一些欢快的早安歌曲，开始新的一天。很多家庭都把清晨当作是“父亲的娱乐时间”，尤其是那些父亲总是很晚下班回家，很少，甚至无法和孩子一起度过夜晚的家庭。爸爸们也愿意耍一些他们非常擅长的小把戏，也许会导致一段时间的小混乱，但比起晚上上床之前，在清晨玩直升飞机或者火箭的游戏会更好一些。
- 我常常提醒读者们，不要在夜晚的某个特定时间，或者进行渐进法训练的第一个晚上抱起或者搂抱你的宝宝（尽管我确实相信那会带来极大的安慰与身体上的影响）。如果孩子哭得非常厉害，你可以上前短暂地抱起他抚慰，但不要让他在你的怀抱中睡着。禁止拥抱的告诫对于那些生病、做噩梦或者受到惊吓的孩子不适用。你只要尽量别过多按照孩子的期望拥抱他，尤其是在他感觉很好的时候拥抱他就可以。一般说来，我认为在结束同睡之后，你睡在生病的孩子附近的临时床铺上会比让他睡在你的床上更好。但我也知道很多家庭都违背了这一条。只要确保在合适的时机还能回复到原来正常的生活习惯，这样也可以。
- 在你的孩子学会说话之后，你应该避免正面冲突，要鼓励他们“主动提出睡觉”。你想要的是双赢的合作，而不是一

方胜过一方的对抗。比如，不要说，“玛丽，你想现在洗澡吗？”如果她说“不要！”（有些孩子尽管自己想要洗澡，他还是会说不要！）你就造成了一种对抗。更好的说法是：“玛丽，现在到洗澡时间了。你看看这三只玩具，你想要带哪一个陪你洗澡呢？”（或者“这两套睡衣你喜欢哪一套”、“你想让我唱哪首歌给你听”。）你尊重而且鼓励了他正在成长的自主权和自尊心，但仍旧能及时把他带进洗澡间。

- 如果你正在试图停止或者减少夜间哺喂母乳，那么最好的方法是让爸爸来进行睡眠方面的训练。如果宝宝看到妈妈，就会自然而然希望和期待被哺喂，而当这些期望被妈妈拒绝之后他反而会变得更加烦躁。当然，也许爸爸对于眼泪的承受能力并不比妈妈强，但他就算让步，也没法撩起衬衫喂宝宝母乳。
- 父母双方都可以把孩子放到床上。他们不需要用绝对一样的方法，但他们的做法要类似，他们对于孩子发脾气、磨磨蹭蹭等行为都得有类似的反应。一个比较好的方法是，当你们打算进行睡眠训练时，每个家长负责一夜。换句话说，如果你们正在进行安睡女士五晚渐进法的训练，爸爸要在睡觉时或者晚上孩子醒来时坐在自己的椅子上，十分钟之后妈妈才能和爸爸换地方。这样就能刺激和鼓励孩子。而且每个晚上都有一个人在半夜时分“值夜”也是个好方法。不过，有些夫妻是这么做的，他们根据自己的睡眠需要和生理规律互换，也就是说，妈妈负责午夜到凌晨3点，而爸爸负责凌晨3点到6点。

应对非常警醒的孩子们的特殊技巧

在实践中我常常发现一些非常警醒、聪明而且有意识的孩子，在学习睡眠时会遇到更多的麻烦。这些孩子通常会在他们生长发育中的重要时刻，比如刚开始学走路的时候，遭遇到轻微的睡眠障碍。从性格上说，他们是那种知道自己想要什么，什么时候想要，并且能够坚持到实现目的的孩子。这对于成人而言是很棒的品质，但这么一个坚决的小人儿对于家长们而言可能会有点麻烦。

确保你没有误以为一个警醒的孩子比同龄人需要的睡眠更少。他和其他宝宝需要的睡眠一样多——甚至可能比别人还要多些——但是他需要付出更多努力，才能隔绝外部世界进入梦乡。遮光窗帘对于这种婴儿和幼儿是必不可少的；隔音帘也能帮助他们小睡。这些婴儿还需要在光线黯淡、安静的环境里喂奶，因为他们很容易精神不集中。要特别注意他们的睡眠时机，因为他们的睡眠迹象通常都很难看出来。在几年之内，这些孩子可能都容易成为失眠者，所以他们可能对于反常的生活或者旅行格外敏感。在第 16 章“特殊状况”中我给出了一些有帮助的建议。

这些孩子从性格上也有异于其他孩子。但这不是说他们学不会睡眠；我成功过，而且在本书稍后的部分你也能读到一些这类孩子成功的案例。他们也许需要更多时间，他们也许会给你更多考验，而且你也需要极其地有耐心与坚持，如果你坚持下来，就一定能成功。我的第二个孩子，格雷琴，和乔安娜的儿子伊连一样，都是非常警醒的孩子。他们都学会了如何入睡——而他们警醒又好奇的性格也成为了优点而非缺陷。婴儿的高度警觉并不是注意力缺陷/多动障碍症的早期预警信号。

第3章　宝宝瑜伽

全世界不同文化背景下的众多父母都向我咨询过，如何在小睡或者睡觉前帮助孩子安抚自己的身体与意识的同时增进与孩子们的感情。几年前，我结识了海伦·盖拉拜蒂和她的宝宝瑜伽。我和我的女儿都亲身体验过瑜伽的好处，也发现这种宝宝瑜伽练习（也许你也能在家附近找到亲子瑜伽的课程）确实能够帮助父母和他们的小宝宝。我非常高兴海伦允许我在本书中分享一些瑜伽姿势，令读者们可以和自己的宝宝一起在家练习。这种瑜伽与我的安睡女士系统简直是完美的配合。

海伦是一位母亲、作家、有资质的哈达瑜伽（Hatha yoga）老师、婴儿按摩教练，以及婴儿发展运动教育工作者。她的宝宝瑜伽混合了瑜伽姿势、发展运动以及亲子交流。

众所周知，健康的身体活动会让我们睡得更好。在睡觉之前你不应该进行那种激烈的、能加快血液流动速度的有氧运动，但像瑜伽或者伸展这种柔和的每日运动则是非常好的睡前仪式。瑜伽对于小孩子也同样有益。正如海伦所说："瑜伽和心灵放松能够在睡觉前安抚人的身心。和孩子们一起练习宝宝瑜伽的父母会发现，他们的孩子在练习瑜伽之后会睡得更久更好。日间小睡时间延长了一倍，孩子们在晚上也睡得非常久！"对于妈妈们而言，在产后练瑜伽也是一种非常好的自我调整，是一种恢复到产前状态的常规锻炼，伸展动作还可以活动我们在哺乳和照看孩子时总保持拉紧状态的肩部与背部肌肉。

本章中你会学到五式宝宝瑜伽动作，并可以将之轻松地加入到日间小睡和晚上睡觉前的仪式中去。你可以在任何时间开始练习，从初生的婴儿一直到四岁的孩子，都可以进行这种睡前的练习。对于小孩子来说，这些动作能帮他们平静下来并且进入我们追求的"昏昏欲睡"的睡前状态。如果你正在为一个学步期儿童或者小孩实行安睡女士渐进法，那么这些动作可以创造一种平

静的前奏。

在一个安静而放松，毫不紧张的环境中练习瑜伽姿势比较好。比如可以在孩子的房间拉上窗帘后或者刚洗完澡之后进行都很棒！可以使用一张瑜伽垫或者自己喜爱的地毯。这种习惯是一种互利的睡前仪式，有时五分钟就可以（但你和你的孩子可能会非常喜欢这种练习，你们还想练习更长时间）。你可以按照自己的喜好混合搭配各种姿势，采取任何组合或者干脆全做一遍。把这些瑜伽姿势当作小睡或者睡觉前仪式的一部分是非常有益的，也可以更有把握去帮助宝宝入睡得更早更快。就算你偶然间遗漏一次也无需担心——因为一旦你看到宝宝对这种活动的喜爱之情，你就绝不会常常漏掉它。

发自内心温暖的抚触

宝宝的背部和腹部是不会说谎的。学步期儿童可以摆出各种固定的姿势。双手的掌心同时在宝宝的身上摩擦，从而产生热量与爱。想像爱的能量从你心中倾泻到手上。把你的双手放在宝宝肩部，然后慢慢地从头到脚对宝宝进行“发自内心温暖的抚触”。用这种稳定而且能够预料的“发自内心温暖的抚触”的动作爱抚宝宝的身体，坚持一分钟。与此同时温柔呼唤宝宝的名字能增强宝宝的感受。

发自内心温暖的抚触的好处：宝宝的感觉类似于处在母亲子宫中那样。通过皮肤与皮肤的接触加深了亲子之间的联系。如果宝宝早产或者不是很健康，这种姿势能帮助他更健康地增加体重，锻炼肌肉张力和身体的触感。

螺旋式转动

让宝宝仰面躺着，你的拇指放在他大腿后方，食指放在他大腿前方，握住他的大腿。用你的双手帮他的大腿顺时针螺旋式绕圈，同时轻柔地念出（也可以哼唱）“螺旋”这个词。如果宝宝动来动去，你可以给他一个玩具抱住，好继续帮他进行螺旋式转动。持续 5 到 6 秒，保证你的声音和动作流畅而有节奏。

螺旋式转动的好处：帮宝宝排气、缓解便秘、更容易消化，以及促进睡眠。

罗洛式

让宝宝仰躺，脚冲着你的方向。用双手把宝宝的双手放在胸口上。一只手握住宝宝的双手，另一只常用的手握着宝宝的双脚，然后把你的双手放在一起。现在宝宝的手和脚都握在你的双手中。把你的两个大拇指放在宝宝脚踝后方，用食指和中指夹着他的手腕，其他的手指温柔的放在他手腕上方。把宝宝的身体从一边滚向另一边，快慢速度可以按照你用温柔的声音念诵“罗洛”这个词的音节的节奏来。

以年龄为基础的罗洛式变型

- 小婴儿——海伦·盖拉拜蒂建议，在小宝宝能够用手去够到自己的脚之前，大约 5～6 个月时，可以采用一种适应儿童发育的变型动作，这种动作无需将宝宝的手脚集中在一起。将你的拇指和食指放在宝宝的面颊上，用剩下的手掌部分抱住宝宝的肩部，令他的头与脊柱对齐。保持 45 度

角缓和地让宝宝的身体从一侧滚动到另一侧。而抓住宝宝双脚的动作应当在5～6个月时宝宝学会翻滚之后顺其自然地做，这时候就可以把宝宝的手脚集中进行罗洛式动作了。

- 学步期儿童——鼓励你学步期的孩子手脚并用环抱住一只比较大的毛绒玩具，这样更容易完成罗洛式。
- 学龄前儿童——鼓励你的小朋友在你身边或者独处的时候自己完成罗洛式。

罗洛式的好处：发展手眼协调性，缓和中枢神经系统，促进脑脊髓液循环，令孩子放松。

我爱你

让孩子仰躺在地毯上，脚冲着你的方向。把你的大拇指放到孩子掌心，用你其他的手指包裹住他的手。小心注意着孩子的反应同时重复说“我爱你”，尽量缓慢，以便孩子可以和你一起完成下面的动作。

我：把他的拳头放在心脏的部位。

爱：把他的拳头和手臂向两侧打开。

你：把他的拳头放在心脏部位，然后让他左右摇摆，仿佛自己在拥抱自己。

重复五次。

好动的宝宝们能够坐在父母的膝上做。学步期的孩子和学龄前儿童能坐在父母膝上或者面对父母的时候这么做。你还可以问问他今天他喜欢什么，或者他最喜欢的动物是什么等。

我：把你的两只拳头靠向心脏部位。

喜欢：向两侧打开双臂。

孩子的回答：把你的双臂收回然后拥抱自己（或者如果孩子坐在你的膝头，你们可以互相拥抱），左右摇摆。

每次重复时都鼓励你的孩子更加独立地说话并练习这个动作。

这是个让人能平静下来或者概括一天的活动的好方法。

我爱你的好处：穿过身体的中轴线能够帮助整合身体和大脑的左右部分，以便在现在和未来都能更好地集中注意力；增进呼吸能力；增强空间感、组织感和身体的敏感度；安抚孩子，帮他们调节前庭系统（控制平衡的神经系统）；加深亲子联系。

特别的儿歌

这首简单的儿歌与练习动作的组合类似于“如果感到幸福你就拍拍手（If You're Happy and You Know It）”的调子。你可以让孩子躺在婴儿床里和他一起练习，或者让孩子躺在儿童床上和他一起练习。当孩子开始认识他自己的身体时，鼓励他把自己的手放在你选择的身体的部分上（眼睛、头等），然后模仿父母唱儿歌。

唱与做

如果感到幸福你就摸摸头！
（你的手放在孩子的头上。）
如果感到幸福你就摸摸眼！
（你的手放在孩子的眼睛上。）
如果感到幸福你就摸喉咙！
（你的手放在孩子的喉咙上。）

按照这种程序依次摸胸部、肚子、肚脐、腿和脚，可以结束于

“如果感到幸福因为你的小身体!”然后从头到脚稳定而缓和地抚摸一遍孩子的身体,最后给他一个拥抱。你的孩子也可以用自己的手和你一起动作。

“如果感到幸福你就——敬个礼!”(这表示“我的心向你的心表示感谢。”)

和你的宝宝一起分享一下本章节学到的“发自内心温暖的抚触”这个动作。让你正在学步的孩子用双臂和双腿做一个温柔的自我拥抱的姿势。

把你的双手合十放在胸前表示结束。你和孩子可以相互充满爱意地注视并互相弯腰致意。

特别的儿歌的好处:增强身体的触感,增强自尊心,加深亲子关系,给予爱和温柔的触觉鼓励。

如果你很难想像你的孩子能坐下来做瑜伽,或者你认为宝宝太累或者太不开心,在睡觉前无法练习,可以到 www.itsybitsyyoga.com/sleeplady.html 下载一些其他的姿势来安抚不开心的或者顽皮的宝宝。每一次都尝试一点,直到你和宝宝都习惯了练习,并且能从中得到好处为止。

第 4 章　睡眠的基本要素

物理基础

睡眠周期

睡眠分为两种基本类型：REM(rapid eye movement，快速眼动睡眠，也叫做有梦睡眠)和 NREM(non－REM，非快速眼动睡眠)。REM 睡眠是活跃的睡眠，也是轻浅的睡眠。在 REM 睡眠期间，我们四肢柔软，呼吸不均匀，抽搐并且眼皮会快速地运动。

而非快速眼动睡眠则有其本身的几个阶段，分别称为轻度睡眠、真实睡眠与深度睡眠。当我们度过这些非快速眼动睡眠阶段时，我们会从一种睡意朦胧的状态进入到深层次的睡眠中去，在此时如果醒来，我们会感到眩晕和一点迷惑。在非快速眼动睡眠期间，我们的呼吸缓慢而规律，我们的肌肉略微拉紧，而不是像在 REM 睡眠期间那样放松。

儿童也有 REM 和 NREM 睡眠周期，然而他们的睡眠周期还是与成人不同。在头四个月里，孩子的睡眠，尤其是日间的睡眠，与神经方面并没有太多联系。大部分孩子的睡眠都属于浅层 REM 睡眠，此时他们的大脑非常活跃，很容易就会被吵醒。对于一个新生儿来说，每天需要大约 8 小时的 REM 睡眠和 8 小时的非 REM 睡眠。在婴儿四个月左右时，REM 睡眠时间开始慢慢减少，大约到 2 岁时一个孩子的睡眠周期就更接近于成年人的睡眠周期了。REM 睡眠在成人睡眠构成中约占 20%～25%，每个晚上大约在 2 小时左右。

我们都会经过这些睡眠周期，当我们从一个阶段转换到另一个阶段时，大脑活动的变化常常会令我们短暂醒来。这叫做局部觉醒，有时候我们会感到更清醒一些。比如，当我们仍然处于非

常浅层的睡眠中时，大约每 90～110 分钟(对于婴儿则是 50 分钟)，就会有一次局部觉醒。此刻我们并没有完全清醒，但可能会嘟囔两句话或者翻个身，等等。

每 3～4 个小时，我们都会经历一次略为明显的局部觉醒。也许这时候我们会发现自己的枕头掉在地板上，或者想要喝一口水，或者需要重新盖一下被子。通常我们很快就会再度入睡，而且清早起来的时候几乎不记得曾经醒来过。这是因为我们知道要如何再度入睡。而孩子们则不知道该如何做——除非我们教会他们。

当婴儿们经历这种局部觉醒时，他们可能会因为受到惊吓而哭闹、翻来覆去。如果他们有负的睡眠关联或者是睡眠支撑，如果他们需要父母帮助才能入睡，这种局部觉醒就会变成完全清醒。他们可能会对自己说："啊，我有点醒了，我现在是在自己的婴儿床里。我很累，妈妈不来照看我，爸爸不抱着我在走廊里踱步，或者没人帮我找到我的安慰奶嘴的话，我不知道该怎么才能睡着。那现在我就只有一件事情可做。我得哭。"

只要我们帮孩子摒弃这些负关联，他们虽然还会经历局部觉醒，但却再也不需要我们来照料了。他们会张开眼睛几秒钟，意识到在自己的房间里很安全，吮吸自己的大拇指或者摸到自己最喜欢的毛绒玩具、小毯子之类的，然后让自己再度睡着。局部觉醒就只是局部了。

时钟与时机

我们都有一种生理节律，一种生物钟，能够告诉我们什么时候该醒来，什么时候该睡觉。当我们的生物钟设定为"清醒"时还在睡觉，就跟生物钟要求"睡觉"的时候还醒着一样都是对生理节律的违背。当我们用睡眠消除生物钟的警报，或者当我们的生物

钟处于“清醒”模式时，睡眠就无法恢复精力——这意味着我们并不会觉得精力充沛。例如，白天睡觉，晚上从午夜到凌晨 8 点在墓地上夜班的人，通常都没有优质的睡眠，因为他们没有与自己的生物钟同步。或者说，对于一个 2 岁的孩子来说，从下午 1 点到 3 点的午睡就比从傍晚 4 点到 6 点的小睡效果更好。尽管很多社会因素，比如噪音、温度也都会影响生物钟，但生物钟还是主要由光线来支配。这就是我建议在孩子的房间里挂遮光窗帘的原因，尤其是对那些醒得非常早，或者日间睡不着的孩子而言，更需要如此。

作为成年人，我们都知道应该如何调整，至少部分的调整混乱的生物钟。假如我们不得不在某个晚上早于平常的时间睡觉，好在第二天赶上飞机航班或者出席一场很少见的早会，我们会知道应该如何做准备，来命令我们的大脑在一个不太习惯的时刻入睡。我们可以洗个热水澡，看一本好书，听一首轻松的歌曲，或者仅仅是在脑海中想象一片布满了棕榈树的沙滩。但孩子们对于这些技巧一无所知。孩子们需要我们注意“时钟”——无论是外部的时间还是孩子们内部的节奏——从而来保证他们的睡眠。

为了让我们自己的生物钟“运转”得更好，从而保障我们的睡眠，我们应该让睡眠更有规律。**如果我们每天晚上都在差不多同一时间入睡，在早上同一时间醒来，就会睡得更好，感觉也更好。**我们可以在周末改变一下作息时间，但最多浮动一个小时。

儿童甚至更加敏感，尤其是当他们开始困倦之后。**一个休息充分的孩子比一个疲劳过度的孩子，更容易适应睡眠时间的变化。**我们都知道，孩子们需要一种习惯和可预测性来保障他们感情上的安乐和面临全新的世界时的条理性与安全感。同时他们也需要习惯来保证其内部的生物钟正确“运转”，命令他们的大脑通过分泌褪黑激素开始准备睡觉。褪黑激素是一种荷尔蒙，可以

通过放松我们的肌肉来促进睡眠和令我们感到困倦，大约在出生三个月之后就开始分泌。分泌的水平与黑暗有关，也与我们的生理节律有关。

如果你错过了孩子的“睡眠时机”，也就是他自然的睡眠时间，那么他的身体就不会产生出令人平静的褪黑激素。而且结果会完全相反。他的肾上腺会释放出一种激烈的皮质醇，这是一种与压力有关的荷尔蒙激素，能够过度刺激你的孩子，让他“亢奋”，并且出现一种精神焕发的模样。对于小孩子而言，这很可能就像你把一打不加糖的浓咖啡倒进他的奶瓶一样。他会更加激动、更难以安抚，可能需要你用更多时间和精力才能帮他再次平静下来，然后睡着。

因此，如果从自然节律和习惯上来说，孩子一般应该在晚上7点睡觉，而你却让他一直待到8点，那他就很难入睡。而且哪怕就算他睡着了，也常常会伴随着超出一般的哭泣与反抗，在皮质醇和过度疲劳的共同作用之下，让他安稳地睡一觉也会变得格外困难。在得到充分的休息之前，他更有可能在半夜醒来，或者早上过早醒来。

睡眠时机的标志

察觉到宝宝的睡眠时机，在皮质醇产生之前让他上床睡觉是关键。那么你应该去找什么标志呢？

- 揉眼
- 打哈欠
- 活动减缓
- 精神萎靡
- 疲倦
- 面无表情地盯着某个地方，或者目光游离

- 发脾气，发牢骚
- 对于其他人和玩具都失去兴趣

由于孩子们各不相同，所以发现睡眠时机的标志也需要一些锻炼，有些孩子可能会有自己独一无二的标志，比如要求给他们讲故事或者抱起一只特别的毛绒玩具等。但最终的结果必然会是“现在就把我放到床上，不然你会后悔的。”如果你觉得判断孩子的睡眠时机很困难，那就一边关注他，一边关注时钟。当你觉得午睡时间或者睡觉时间就要到了的时候，试着带孩子进到一个安静、光线昏暗的房间，进行一种非常柔和的活动，也许标志很快就会出现。

这种循环也许会导致第二天的日间小睡更少，而这又会导致宝宝在次日晚上睡觉前过度疲劳，从而得不到优质的睡眠。我们可能某些时候在孩子身上见过这种模式，至少我知道我自己就看见过，而他们还都是睡眠比较好的孩子。我们的任务就是要在这种情况变成一种自我保持的恶性循环之前来改变它。

我的合著者乔安娜的儿子伊连在两岁时，如果感到困倦，就会揉他的眼睛，并且要求妈妈为他唱一首特别的儿歌，哪怕这时候他会大声地说自己并不想睡觉。从他揉眼和一般的行为方式上来判断，乔安娜通常就会知道是应该加快还是放慢睡觉前的准备工作，从而精确地调整孩子躺在枕头上的时间。但有时候他依旧能掩饰自己的困倦。如果他突然间开始蹦跳，同时兴奋地大喊：“妈妈，我在床上跳得像只猴子！”乔安娜就知道自己判断错误，睡眠时机已经错过了。

质量和数量

就睡眠而言，父母们就像全都来自于传说中的忘忧国——那里所有的孩子都比同龄人好——人人都这么梦想着。每个人都认为自己的孩子比同龄人需要的睡眠更少。这是大错特错的。睡眠需求确实有几分不同，但生理的区别远远小于父母们想像的那样。这些孩子可以比同龄人睡得更少，但他们实际上的需要远比想像中的多。记住，睡眠产生睡眠。为了帮你精确地估量出孩子的需求，我在每一个相应年龄段的章节一开始就给出了这个年龄段孩子的平均睡眠需求量。

孩子们需要适量的睡眠，也需要适宜的睡眠。质量依赖于数量。好的睡眠应该是连续不间断地长时间睡眠。如果你的孩子频繁醒来，他就没有得到自己所需的优质睡眠。就像我们在睡眠不好的夜晚所经历的那样，散碎的睡眠或者断续的睡眠并不能像连续的睡眠那样让我们感觉休息充分，精力充沛。

安睡女士小提示

如果你的孩子总是在乘车的时候睡着，那他很可能没有得到充足的睡眠。

在婴儿出生的第一个八周之后，好的睡眠同样也意味着在婴儿床、儿童床或者摇篮里面进行的睡眠——而不是在汽车、手推车或者秋千上睡觉。晃动可以“哄骗”我们入睡，但也会让我们处于一种更浅层、更散碎的睡眠状态；如果处于移动中，我们的大脑就决不会进入全面恢复精力的睡眠中。当然，你的宝宝也许会在车里睡着。但要保证这只是偶然现象而非固定习惯。就算你偶尔要用汽车让他入睡，也不要开着车到处闲逛。你可以在他刚睡

着时就尽快把他放进婴儿床，也可以把车停下，坐在车里或者车边，让孩子不需要晃动就能入睡。我就知道有一位妈妈带着笔记本电脑和一堆毯子“住进”汽车里。另一个则把车停在车库前，如果天气不错的话，她会开着车门为自从第一个孩子出生以来就被遗忘了许久的花坛除草。

优质睡眠还意味着睡眠不会被诸如哮喘、过敏、睡眠呼吸暂停、食物逆流或者其他病症导致的不佳的身体状况打扰。详见下册第 6 章“医学问题”，当然也要咨询儿科医生。

第 5 章　新生婴儿的正确起点

当医院的医生和护士把新生的小家伙交到我们手上时，他们会确保我们知道应该如何抱婴儿、如何喂奶、如何为他们包上襁褓、如何换尿布以及如何清洁消毒婴儿们的脐带。但他们很少交代要如何哄宝宝入睡，或者帮我们定义一下真正的睡眠的概念。他们并不会告诉我们，睡眠是一种需要学习的技巧，我们需要教导宝宝建立健康的睡眠习惯。实际上，说不定我们还会得到恰恰相反的建议。他们可能会充满怜悯地谈论到开始的几个月内我们将会如何筋疲力尽，以及那种挫败感是多么常见。

但实际上并不需要这样，至少不会太久。照料新生婴儿确实很费功夫，你可能无法保证 8 小时的充分睡眠。但这与月复一月的过度疲劳——就算非常疲劳，大约 6 周、8 周哪怕 12 周——以及过度透支和焦虑还是有区别的；在过度疲劳的状态下，你几乎无法做任何事，更不用说和子女温柔地聊天、与配偶礼貌地交流了。

正如我先前所说的那样，睡眠训练分为两个不同的阶段。在出生后的最初几个月，我们应该重点去建立基本的规律和习惯，这能帮助宝宝们学会如何睡得更好。我们也学会了一系列的抚慰技巧，这能帮助我们成为更自信的父母，能帮助我们的宝宝感到平静和安全，不会特别依赖父母或者常常需要含着乳头或奶瓶才能入睡。这就是本章和下一章我们将要关注的问题。

这些早期的睡眠塑造方法虽然不显著却非常有效。但在 4 周甚至(在大多数案例中)12 周或者 14 周之内还是不能让你的宝宝整夜安眠。尽管过了初生的几个月之后，或者到第三个月月底时，有些宝宝可能会一口气睡足 6～8 小时，但宝宝们在最初的几个月里是不会老老实实整夜安眠的。不过这些早期的睡眠塑造步骤确实能打好基础，对于很多婴儿来说也足够了。他们会开始自己睡觉，并且在 4～6 个月时开始整夜安眠。其他婴儿可能

需要来自父母的更多帮助才能学会入睡。在后面的章节中，我们将会深入讨论我的安睡女士渐进法和其他睡眠训练方面的问题。

与孩子的联系

有些人在孩子出生的那一刹那就会有一种强烈的血肉联系感。不过还有很多父母并不会立刻产生这样热情的联系——他们一般会觉得愧疚。对你自己好一点；这种负疚感通常会持续数天甚至数周，最长可达7个月，这是一种不断发展的积极的妥协过程，在亲子之间建立一种安全的关联。

在你熟悉自己的宝宝的过程中，没必要去做一个超人妈妈或者超人爸爸来创造这种亲子联系。但还是有一些方法可以帮你推动这个进程。下面有些对你而言比较直观的方法。

1. 建立一种孩子可以期待和依赖的习惯——而且不限于睡觉时间、用餐时间和洗澡时间。给孩子换尿布的时候也可以准备一个特殊的玩具，或者在你开始新的一天时为他唱一首他最喜欢的儿歌。

2. 迅速响应孩子的需求。如果他因为尿湿了尿片而哭闹，就尽快为他更换新尿片。如果他因为饥饿而哭闹，就尽快喂饱他。如果你不能马上回应他的需求，就要明确告诉他，让他明白你已经知道他的需求，并且会尽快满足他。可以的话，当你结束手头的事情时（比如照料另一个孩子），给他一个玩具抱着，然后和他说说话。在孩子初生的九个月内或者其他时候，你都不应该用“积极响应”来溺爱孩子。

3. 培养可预见性。宝宝得知道他们能期待父母，才能感到安全无忧。你的固定习惯和快速反应能满足这种对可预测性的需求。

4. 拥抱孩子。身体上的直接接触非常重要。你可以用婴儿背带把孩子系在胸前或者背在背后，而不是总把他丢在婴儿车里。拥抱他、贴近他、看着他的眼睛，当孩子对你低声呢喃的时候，轻声回应他！反过来讲，你也不必每时每刻都把宝宝“穿在身上”，有时候使用婴儿车也不算什么过错。记住，宝宝们需要并喜欢来自于垫上游戏或者儿童健身用品等处的刺激，所以你不用一直抱着他。

5. 消弭你的内疚感与完美主义。你的内疚感和自我挑剔越少，你就能给予孩子越多的有效情感。对于学步期的孩子来说，如果明白每个人，哪怕是父母都会犯错，但无论如何他们都会被爱，是一件非常好的事情。

记住，父母们需要合作，如果父母两人的方法略有区别，只要你们两个都能给孩子带来温暖、关注、接触和一致性就可以了。

在此，我将告诉你如何让宝宝处于一个正确起点上。如果你遵循了安睡女士的八条婴儿睡眠准则，你的宝宝就能更快学会睡眠，也会睡得更久。如果你能深刻领会这八个正确的步骤的话，那你的生活可能会更简单。你会发现在未来的几年内，婴儿和幼儿将要经历许多睡眠阶段——学会整夜的睡眠，改变日间小睡的作息表，分离焦虑，等等——建立一个好基础能帮助你的宝宝和你的家庭更顺利地经过这些发展的道路。我将会讲述一些可以帮助孩子学会自我安抚的技巧，让他不需要你每天都耗费整晚去抱着他、摇晃他、哺喂他或者抱着他来回踱步。

早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895

前两周

在我们着手之前，我希望能在最开始的部分给出一些鼓励的话语。在前两周内不要担心作息时间表和规则的问题——如果你犯了错也不要过分自责，因为其实根本没什么错误可犯。只要注意从分娩后尽量恢复健康，确保你的奶水以及学会如何母乳喂养即可，如果能开始了解你的宝宝就更好了。尽可能多地接受来自家庭和朋友的帮助，尽可能多地睡觉。不要担心那些脏碟子或者在你“备产”期间弄乱却一直到分娩后都没有机会收拾的衣柜。这一切都不重要。

一开始你的宝宝可能大部分时间都在睡觉，但他不会睡得特别熟。新生儿与神经方面并没有太大关系，这意味着他们的睡眠是很浅的。抱着他，摇晃他，轻拍他，只要在最初的 10～14 天内能够让你感觉不错或者感觉很舒服的事情都可以做。然后，从第三周起，就要开始逐步应用安睡女士睡眠准则，并建立生活规律了。

你不可能看到一种很明显的转变。只要开始向宝宝的生活中引入这些日常惯例与规律就行了。确保你的期望足够现实，这需要过程。在第三周，你看不到孩子的睡眠习惯一夜之间就能产生明显的变化，但你会为未来几周甚至几个月之内的发展打下基础。

安睡女士的婴儿睡眠八条准则

安睡女士睡眠准则 1：建立一种灵活的哺喂与睡眠习惯

当前很多父母对于规律这个词有种畏惧心理，我并不是说要一种刻板的，精确到分钟的生活制度。我指的是对吃饭、休息、睡觉、玩耍和醒来的时间进行比较常见的时间框架的筹划——这种框架还可以随着你对宝宝给出的信号与暗示的理解加深不断进行修改。

很多新家长还会担心生活规律可能会束缚他们或者过度约束他们。正相反，你会发现宝宝如果建立起灵活的生活规律，则意味着你可以有更多选择。你不可能随时想到什么就去做，但你可以更好地计划每一天。你会知道什么时候可以出门、办事、在咖啡馆和朋友见面，或者散步减肥。你还可以在宝宝状态最好、心情最好的时候邀请祖父母来家里，避开他疲倦或者情绪很差的时候。

生活规律会让父母们更轻松。如果你的孩子哭闹，生活规律能帮你明白他想要什么。你可以问自己："他已经醒了多久？他上次什么时候吃的东西？"如果你通过他的作息时间表发现他已经吃饱休息好了，你就可以检查一系列的问题来确定到底是什么在困扰着孩子。太热或者太冷？衣服弄得他不舒服？尿片该换了？他病了？受到了什么刺激？还是他需要一个更安静的环境（昏暗的灯光、安静、人少）？如果你每天都毫无计划地随意度过，你就没法回答这些基本的问题，因为你不知道他是否饿了或者累了。生活无规律会让你更难找出宝宝试图告诉你什么，就难以响应他的需求。

安睡女士小提示

哪怕是很小的孩子都喜欢可预测性。他们会因此而平静;他们会睡得更好,更能安抚自己。

对于很难入睡的下午来说,一个更黑更安静的房间会比较有帮助。

在你努力发展规律的生活时,简单地做一下记录。简略地记下孩子什么时候吃奶,吃了多久。睡觉方面也一样。不要太过纠结这个;你的生活不应该因为家里多了一个新生儿就变得复杂起来。但记录会帮你发觉孩子的生理规律,并据此调整你自己的生活。

卡罗尔和丹尼尔和他们的第一个孩子约夏过得一团糟,于是在约夏15个月大的时候他向我寻求帮助。在他们有了第二个孩子黛博拉后,他们应用了上一次费了一番工夫才学会的技巧。"我尽量去建立起一个作息时间表——不是那种特别严格的,就是一般的时间表。那样的话,如果孩子哭了,我就能问自己'她是不是饿了?'然后就能发现不是,因为她一小时之前刚吃完奶,"卡罗尔回忆说,"她不仅仅是个好带而且乖巧的宝宝,也没有患上疝气。而且我更容易发现她感到疲倦的信号。我认为是我自己在约夏的睡眠方面制造了很多问题。如果约夏哭了,我会在一秒钟之后就匆匆忙忙地给他喂奶。而对于黛博拉,我的本能是安抚她,但我却有了更多的认识;我知道我能让她自己学会睡觉。"

生活的规律意味着一种比较缓和地根据孩子的暗示喂奶的方法(有时候也被称为需求喂养法)。当然,起初的几周你得按照需要喂奶,我当然知道宝宝饥饿的时候需要喂他。问题在于作为

新父母，我们通常不知道什么时候孩子是真的感到饿了。我们可能误以为每一次哭闹都是因为饥饿，然后不停喂奶、喂奶，把我们自己变成“人肉安慰奶嘴”，或者就像一位一个晚上要给四个月大的孩子喂奶五次的母亲自嘲的那种“奶妈”。

我曾经与上千名遇到行为性睡眠障碍的幼儿共处过，到目前为止，最常见的问题是他们从未学会在不含着乳头或者奶嘴的情况下入睡。一开始，我们哺喂新生儿时通常很难估计出他们到底吃了多少——他们是真的在吃奶还是在吸吮，他们是真的想吃奶还是只不过为了要让我们把他们抱在胸前（详见“成功的母乳喂养小提示”）。

作为新父母，我们总是会没完没了地担心孩子是否吃饱了，是否能健康成长，母亲的奶水是否足够，我们是否要添加辅食，等等。一旦不能确定，我们就会喂孩子。如果你也有这类问题，去看一下医生，做一次快速的体重测量就能得出答案。另外一种明智的做法则是多多了解婴儿需要吃多少东西，以及在起初的几个月内食量变化的相关知识（在下一章中我会给出一个细分到每个月的婴儿食量参考）。如果你更频繁地例行公事地喂奶，那就需要停一停，思考一下原因。是孩子更饥饿还是你的惯性思维如此？他还需要什么？

威廉·西蒙斯博士（Dr. William Sammons）在著作《婴儿的自我安抚：教你的孩子学会自我安抚——控制哭泣、烦躁与失眠》（*The Self-Calmed Baby: Teach Your Infant to Calm Itself- and Curb Crying, Fussing, and Sleeplessness*）中给出了大量的建议，“我们通过喂奶来帮助孩子入睡，认为当孩子吸奶的时候，在和母亲身体接触，体温与身体的动作，以及父母们尽力营造出的安静气氛，满足孩子的希望就能实现令他入睡的目的”，可以帮孩子们入睡。我们应该学习一些技巧，以便除了母亲的乳头之外

还有其他方法可以安慰宝宝。和儿科医生常联系，交流孩子的成长状况与你的饮食相关问题(尤其是如果你的孩子早产，没有增加体重，或者出现其他健康问题，都可能会需要更多更频繁的喂奶计划)。

记住喂奶有阶段性，而且也会影响睡眠。一开始宝宝摄入的初乳富含乳糖。随后宝宝摄入的是后乳，也可以叫做乳脂。富含脂肪的后乳抵消了过高的乳糖，也令宝宝更容易昏昏欲睡。但一般喂奶次数多于每两小时一次的宝宝，通常每次仅仅吃几分钟奶。这意味着他们可能会摄入过多的乳糖，缺少可以增加睡意组成部分的乳脂。乳糖的比例不对会导致孩子体内产生更多气体，而且烦恼不安，这也当然不会帮助他们入眠。也许你还会因此喂他们更多次，反而加重问题。

尽量让孩子在一次喂奶中吃饱，你可以在一侧乳房喂他更长时间，好让他得到后乳(当孩子们长大一些后，他们吃奶会更有效率，所以他们也能更快得到后乳)。在两次喂奶之间，如果他想要吸吮，就可以试着给六周以后还坚持母乳喂养的孩子一只安慰奶嘴，这意味着你会感觉更好，这也将成为孩子的顽固习惯。同样的，尽管有些人说这是老派妇女们的做法，但很多喂奶的妈妈们还是发誓如果她们不摄入咖啡因——咖啡、茶、苏打、巧克力——并且削减了乳制品的话(包括许多食物中“隐藏的”乳制品成分——读一下说明标签)，她们的宝宝就不会那么烦躁，而且也睡得更好。如果你确实把某些食物从菜单中排除出去，那别指望能在一个半小时之后就看出区别。至少要过两或三周，这种变化才会对你的孩子产生长远的影响。咨讯一下哺乳顾问，看看是否有应该排除的食物的特殊建议，或者在下一次检查时咨询一下儿科医生。

安睡女士的睡眠准则2：更多地使用安抚技巧而不是单纯哺喂

如果你给宝宝一个机会，他会发展出许多自我安抚的方法来，但一开始的几个月他们确实需要我们的帮助。我们的挑战在于找到抚慰的技巧而不是不停地喂奶，如果孩子总是需要喂奶才能入睡，这就会产生问题。在哈维·卡尔普博士(Dr. Harvey Karp)撰写的一本很有助益的书《这条街上最幸福的孩子：帮助新生婴儿停止哭闹与睡得更久的新方法》(*The Happiest Baby on the Block: The New Way to Calm Crying and Help Your Newborn Baby Sleep Longer*)中推荐了"五要(Five S's)"——要包襁褓、要单侧抱、要学会"吁吁"、要轻摇孩子和要让孩子吮吸——来帮助婴儿度过开始的几个月，也可以称之为怀孕第四季。

成功的母乳喂养小提示

当我有了第一个孩子时，一度非常担心应该多久喂她一次奶——以及怎么才能知道她饿着还是饱了。我将会给出一些细节，告诉你一个婴儿在第一周和第一个月内多久需要吃奶。记住，这只是一般的指导方针，只是一个平均水准——尽管这个指导方针是有用的，但不是每个婴儿都非常适合，而且也并非每一本书或每一个专家都能给你完全一样的回答。(这里的大部分资料来自于美国儿科学会和国际母乳协会)如果你需要更多帮助，或者在孩子的生长和增重过程中，他的行为模式偶有改变也不要过度担心，请咨询医生或者哺乳顾问。下列提示会帮助你找到自信并胜任母乳喂养。

1. 如何才能知道我的新生儿饿了？

一开始宝宝会经常感到饥饿，24 小时之内至少要喂 8 次，直到母乳喂养固定下来为止。频繁地喂奶也有助于刺激妈妈产奶。利用这段时间开始了解孩子饥饿的标志：

- 醒来并且很警惕
- 把手放在嘴边
- 做出吸吮的动作，或者把他的大拇指放到嘴里
- 弯曲他的手臂或者手
- 烦躁地身体活动
- 当你抱着他时，他会去寻找你的乳房

你很快就能更好地“读懂”孩子的意思了。当你发现他饥饿的迹象时，试着在他开始哭闹之前就喂奶。在孩子不吵闹的时候，他会更好地含住乳头。

2. 他真的吃奶了吗？

首先，你需要了解你的宝宝是否正确含住了乳头，这样他才能更好吸吮。如果没有，他就得不到足够的奶水，错过重要的营养。注意观察他：

- 他的嘴是否完全张开
- 在他吞咽时你是否能看到他的耳朵在抽动
- 你是否能听到他的吞咽声
- 他的眼睛是否转来转去像是“醉奶”了

你可能不会发现全部的上述迹象，但如果你发现任何一条，就证明他没有在吃奶；他只是“含着乳头”取乐。你不是人形安慰奶嘴，如果你让他继续这样，乳头就会产生溃疡。这会让你感到不适，让母乳喂养产生痛苦。

3. 我怎么才知道我的宝宝何时吃饱了？

你会发现你的宝宝在每天的某个特定时间吃很长时间

的奶，但在其他时间很快就不吃了。他通常也会通过放开乳头或者迷迷糊糊睡着来让你知道他已经吃饱了（也可能会猛烈吸吮乳头来让自己安心而不是来吃奶）。他的小身体可能会像“软面条”那样软绵绵的。当你有了更多的经验之后，你就会更容易感觉并发现不同之处了。

4. 奶水够他吃吗？

在第一个月中，这里有几个方法可以判断：

- 每天宝宝至少会小便六次，大便三次
- 当宝宝离开你的乳房时，会显得快乐而满足
- 在你哺乳之前乳房会觉得满涨，哺乳之后则会觉得空
- 宝宝的脸色健康，皮肤紧致
- 一次哺喂之后的几小时之内宝宝都会表现得很满足
- 宝宝的体重增长

5. 什么叫做暗示哺喂？

暗示哺喂也就是我们通常说的“需求喂养法”。基本上，这意味着当宝宝们表现出饥饿时就要哺喂他们。我确实支持哺喂饥饿的婴儿，但我们不能总是哺喂。我们不应该假设每一次哭闹或者一点烦躁都代表着宝宝饿了或者认为喂奶是我们唯一可以安抚宝宝的方法。

当你的孩子稍微长大一些后，你就可以开始进行规律性哺喂了（这也可以帮助孩子延长睡眠时间）。当然，如果你的孩子在他的“规律”或者作息时间之外表现出饿了，你也可以喂他；就像如果你在正常的吃饭时间之外真的觉得饥饿，也可以吃东西一样。

6. 如果宝宝在我胸前一直睡着，但我不确定他是不是吃饱了，该怎么办？

叫醒宝宝——但要温柔！轻轻抚摸他的后背，松开他的衣服，甚至可以往他的脸上轻轻吹气，给他换尿布，做一些事情来刺激他能够保持清醒状态直到填满他自己的小肚子（吃空你的乳房）为止。阅读第4条来判断宝宝是否能吃到足够的奶水。不要忘记在喂奶期间应该短暂停顿一下，帮他拍出奶嗝，否则宝宝虽然醒来，但却不会感到满足。

如果你需要帮助，可以咨询儿科医生或者产科医生；另外，在本书的最后部分，我也提供了一些关于母乳喂养的资料来源供参考。

包上襁褓

襁褓带来的压力类似于婴儿们在子宫时的感受，可以安抚宝宝并延长他们的睡眠时间——这种做法通常配合白噪音效果更好。用一条薄薄的可以吸收噪音的毯子紧密地包裹起新生儿，确保毯子没有遮住他的脸，确保他的耳朵、脚趾不会太热。一般，婴儿们喜欢轻轻弯曲他们的臀部。在头三个月中，他们喜欢把自己的手臂放在毯子里。一些父母告诉我，他们喜欢用专用襁褓毛毯来包裹新生儿。在12～16周，孩子们开始喜欢把手臂放在外头，或者试着把一支手臂放在外头。卡尔普博士(Dr. Karp)说，婴儿们有时候碰到自己后，会看起来不怎么高兴，继续用襁褓包裹他，然后过几周再试试看。（对于早产婴儿，卡尔普博士建议将手臂放在襁褓中，这能帮助宝宝发育神经和增强警觉度。）实验几次之后你就会发现怎么包宝宝会令他感到舒适了。我喜欢用环绕的方式包裹婴儿，身体被襁褓裹好，但小胳膊却留在外面，这令他们像长出“翅膀”一样。我就用襁褓紧紧包裹我自己的女儿，在最初的6～8周内，很难安抚孩子的夜晚，我会把他们的双臂放在身侧

或者放在胸前包好。睡觉的时候，我则会稍微把手臂包松一点，让孩子们可以在襁褓中轻微地活动。在生产之前，你可以在医院咨询护士如何用襁褓包裹婴儿，还可以在本地医院参加一个新生儿保育训练班进行基本的联系。

偶尔也有不喜欢包裹襁褓的婴儿。不要勉强他；襁褓并非必需的。父母们通常会询问我，婴儿是否也需要进行襁褓“断奶”。一般的婴儿在可以进行更多运动之后都会明显表示他们不喜欢再被束缚，而你只要停止包襁褓即可。或者当孩子们学会滚动之后襁褓也就没有作用了。但如果你的孩子没有传达给你这种信号，有时候也可以在 4～6 个月之间停止包裹襁褓。你可以试着用一条包裹孩子的毛毯或者睡袋进行过渡，这类物品可以让他们得到更多活动空间，但仍旧会给他们那种怀抱一般的包容感。有些婴儿可能在你作出改变后的几个晚上感到不安，不过我也就只遇到过一次“襁褓依赖症”而已。那个婴儿七个月大，学会翻滚，使得包襁褓开始存在危险。我们需要用好几个晚上逐步在他明显反抗之下解除襁褓，但这种情况实在太少了，所以我完全不担心。

侧卧以及“吁吁”

应尽量让婴儿仰卧睡觉以减少婴儿猝死综合征，或者说减少 SIDS 的风险，但不是所有的婴儿都喜欢仰卧。因为这并非是他们出生之前体验过的姿势，而且可能会引起他们的摩罗反射或者后仰反射。在你把抱着的婴儿放下时，如果稍微倾斜一定角度，让他的脚比头略低一些的话，就有助于减少婴儿的下坠感。

安抚技巧

我常常提醒大家要使用你会的全部安抚的技能，这样你就不会单纯地依赖哺喂来安抚孩子了。贯穿本书，我们一直在谈论安抚的方法，而且许多方法（比如轻摇孩子）都是本能。在此我给出一张概要清单。有些方法，比如包襁褓，我们仅在最初的几个月使用；但另外一些方法，比如轻柔地按摩，则完全可以在孩子的整个童年使用。

记住：要尽快响应你的新生儿，因为一旦当宝宝变得异常兴奋时，他们就很难被安抚。稍后，我们将要尝试达到我提及的在立即响应与让孩子学会自我安抚之间的微妙平衡。但在最初的几个月中，我们的工作是要给他们创造平静。

如果一种方法在10分钟之后还不起作用，就试试另外一种方法。如果你遇到的某个问题令你比孩子还要烦恼，那么就换另外一名家长试试看。如果你是独自一人，并且达到了自己的极限，也可以让宝宝在安全的地方哭几分钟（也就是说，在他的婴儿床或者摇篮等地方），你可以利用这几分钟来让自己平静下来。以下是一些常用的策略：

- 抱起你的孩子
- 摇晃或者轻摆孩子
- 用襁褓包裹孩子
- 重复可以令孩子平静的声音或者音乐
- 给孩子一只安慰奶嘴
- 按摩孩子（在本书最后的资料来源部分我将会推荐一些婴儿按摩的书籍）
- 给孩子提供玩具或者安全的毛毯（在孩子大约六个月之后，使用玩具或者毛毯不会出现窒息的危险时采用）

当孩子们醒着的时候或者你抱着他的时候，他们完全无需仰卧。许多孩子发现侧卧很舒服，尤其是朝左侧卧。你可以用手臂搂着孩子或者让他侧卧在你的膝盖上，如果愿意的话还可以用襁褓包着他，发出温柔的、有节奏的“吁吁”的声音，让孩子回想起出生之前听到的你的心跳声。你还可以轻轻晃动孩子让他感到舒适。抱着孩子，让他侧卧有助于渡过难以安抚的夜晚时段也有助于安抚患上疝气，比一般孩子哭闹得更厉害的婴儿——无论你是否相信，一个孩子每天平均要哭三小时。卡尔普博士认为，抱着孩子摇晃时，最好让孩子处于轻微直立的姿势，这样可以减轻食物逆流，并让孩子能打出奶嗝来。但是，记住你抱着孩子侧卧和把孩子放下睡觉时的侧卧是有区别的。抱着孩子侧卧非常好；但在床上睡觉时侧卧则非常危险。

美国儿科学会告诫家长不要让婴儿侧卧睡觉。如果你认为宝宝侧卧会更舒服，也不要在没有与儿科医生讨论侧卧安全与否的问题之前就擅自改变他的睡姿。当孩子长大一些，采用俯卧或者侧卧睡姿足够安全之后，通常他就可以自己朝两侧稳稳翻滚，如果这种睡姿会让他感到更舒服，你就会发现孩子突然间睡得更熟了。

轻摇

我们轻轻地摇晃孩子是一种本能，几乎不用我多说，这种做法确实会令新生儿安静下来。摇晃婴儿也有利于起初两个月之内让他更好地日间小睡。之后，孩子还是会很喜欢被摇晃，你也可以用这个法子让孩子感到开心舒适，但不要在床上摇晃他。

要想轻松地改正需要轻摇才能入睡的习惯，你可以先按照孩子习惯的速度轻摇他，然后慢慢减速。在孩子睡着之后就停止摇晃。大约在两个月左右时，开始在孩子上午小睡时把他移进婴儿

床。在他的房间开始每一次固定的小睡，如果抱着孩子轻摇有助于他的睡眠，可以先这样做。然后把孩子放进婴儿床。留在孩子身边；轻拍他、抚摸他或者温柔地摇晃他的身体，如果有帮助的话可以一直到孩子迷迷糊糊睡去再停止。他也许需要几天调整。可以在某天的一次小睡时开始这样做，通常是在上午，然后在他准备好后将这种做法加入到第二次日间小睡中。

安睡女士睡眠准则 3：给孩子一个安慰奶嘴来自我安抚和吮吸

“五要”中的最后一点是关于吮吸反射的。婴儿们确实需要吮吸，尤其是在头几周里。这不仅仅是为了获得食物，婴儿们会吮吸他们的手指、小手以及安慰奶嘴。最近有研究显示，安慰奶嘴也能帮助婴儿降低猝死综合征的风险，但我注意到，医生对于安慰奶嘴的认识多年以来一直在变化，现在的这种看法也许还会改变。请和你的医生联系，在孩子长大一些后还要再去拜访医生。如果你开始母乳喂养，那么最好先等 4～6 周，直到母乳喂养习惯已经建立之后再使用安慰奶嘴。用奶瓶哺喂婴儿的做法也可以早些开始。

如果你的宝宝吐出安慰奶嘴，不要下意识地放回去！如果你不断把安慰奶嘴重新放回孩子口中，可能会妨碍他早期想与你沟通的意识，也会干涉你掌握区分孩子不同哭泣声的能力。有时候孩子也可能想要回安慰奶嘴，他一定会让你知道的。但如果你认为他要的不是安慰奶嘴，你也许意识到孩子正在试图告诉你别的东西。你可能会为孩子反复吐出安慰奶嘴而感到惊讶，父母们把安慰奶嘴放回孩子口中，孩子吐出来，父母们再放回去，却不会想想孩子是不是因为某种原因才会把它吐出来的。如果起初的几个月之后，他比你期望的还要长时间的含着安慰奶嘴，你应该尝

试一下其他安抚方法，并通过减少刺激来减少孩子对吸吮的需求。同样，安慰奶嘴对于那些体内气体较多的婴儿不太好，因为他们可能会在吮吸奶嘴的时候咽下更多的空气。

安慰奶嘴为什么有助于减少猝死综合征的原因尚不明确。“第一支烛光”(The First Candle)是致力于防止婴儿猝死的组织，他们提出了一些可能性比较大的解释，其中一条是认为安慰奶嘴可能会防止婴儿在睡觉的时候翻身变成俯卧姿势。吮吸反射也会防止他们睡得太熟或者令他们的舌头处于不会阻塞气管的位置。

即使你在宝宝睡觉时使用了安慰奶嘴，也要注意不要在宝宝醒着而且烦躁的时候一直使用它。在宝宝快要满 6 个月时，你应该重新考虑一下要让他使用安慰奶嘴到什么时候。当婴儿们开始长大，他们可能会开始吸吮大拇指，这是一种很好的自我安抚的方式，也是一种能令他们满足的吸吮本能。有些家长更喜欢大拇指。和安慰奶嘴不同的是，大拇指不会弄丢，也不用担心它会掉到地板上，更不会在出门的时候忘记把它放进妈妈包里！

很多孩子长大之后就不会再吸吮大拇指了，但我的女儿卡利不会。她 5 岁时我们发现了一种完美的行为改变方法，尽管这意味着我们不得不收养她在幼儿园班级里豢养的仓鼠！如果我们有学龄前儿童的话，你可能听说过这种大胆的方法。

安睡女士准则 4：当孩子醒来时就哺喂他

大部分母亲都会连续几个月在睡前采用母乳或者奶瓶喂奶。一个完美的、长时间的哺喂，包括后乳在内，并不能有助睡眠——这恰恰是你在晚上睡觉前想要达到的目的。但你应该尽量避免睡觉与哺喂之间那种过于强烈的关联，因为这很可能在随后导致麻烦。

应该时常在孩子醒来的时候喂奶，而不单单在他睡觉的时候喂。当他在清晨起床时你可以很自然地哺喂他，但也要尽量保证**一天至少一两次在日间小睡醒来时养成这个习惯，而不是在小睡之前。**大多数母亲发现，在清晨和上午第一次小睡醒来后马上就喂奶是最容易做的。但在下午或者傍晚，当孩子感到疲倦和烦躁时这样做不怎么奏效，因为这时候的哺喂能帮助孩子安静下来，准备睡觉。

安睡女士准则 5：一天至少一次在孩子昏昏欲睡的时候把他放下

在最初的几周里，我们通常确实会在晚上和夜间当孩子饥饿的时候通过哺喂哄孩子入睡。不过一旦孩子 4 周大了，就应该开始养成一个习惯，每 24 小时之内至少一次在他昏昏欲睡但是还清醒的时候就把他放下。他不需要太清醒，但也不能在每一次准备睡觉之前喂奶、抱起轻摇或者轻拍的时候完全没有反应。宝宝可能会闹一阵子，但是给他一点儿时间。不要在他第一次哭叫时就把他抱起来；在他让你感到足够吵闹的时候再抱起来。大约 6～8周之间，试着在晚上睡觉之前使用这种方法。

有时候宝宝可能会在哺喂中睡着，这时你当然不能叫醒他。你的目标是哺喂他，让他吃饱，然后昏昏欲睡。接着在他完全睡熟之前轻轻把乳头从他口中拿出来。这也许需要一点耐心，不过今天之内你就能搞定，如果这个晚上这法子没起作用，那么明天晚上再试一次好了。（详见第 2 章“入门指南与成功的小技巧”中的“昏昏欲睡”部分。）

安睡女士准则 6：每天使用一次奶瓶

无论你多么坚定地打算进行长时间的母乳喂养——我就是

亲自母乳喂养自己两个女儿的——大约在第三周时，在母乳喂养已经确立的情况下，都要每天使用一次奶瓶喂奶。由你和你的医生决定这一次是用专门的母乳还是婴儿配方食品，但要尽早让你的宝宝习惯使用奶瓶。这也是为无法预料到的可能情况做准备的常识，比如当你在需要喂奶的时候遭遇严重的交通拥堵而无法及时赶回家或者需要进行紧急的手术治疗，等等。

尽管有些婴儿稍后能很轻松地适应奶瓶，但也有一些婴儿一旦可以区分奶瓶与乳房的区别之后就会拒绝使用奶瓶。如果你没法知道从现在开始的六个月之内你的孩子会如何反应，那么也不妨帮自己和孩子一个忙，让他从现在就开始熟悉奶瓶。有些夫妻也愿意使用临时奶瓶让父亲分享哺喂的感觉。这会给父亲带来一段美好的亲子时光，也会给母亲带来一段休息的时间，或者是非常难得又迫切需要的连续几个小时的睡眠。例如，妈妈可能需要提前用吸奶器把乳汁吸出，然后在晚上 10 点让爸爸用奶瓶喂奶。在我们家，有时候我们也会使用婴儿食品，因为我想确保在可能需要的时候，我的女儿们都能接受婴儿食品。

有些家庭担心如果让婴儿使用奶瓶，他可能就会拒绝乳房。实际上，乳头的构造远比一般人想像得要复杂很多，如果你从一开始，在婴儿学会吮吸乳头和在你学会如何哺喂之前就让婴儿使用奶瓶的话，才可能会产生这方面的问题。当母乳喂养的习惯确立起来的几周之后，每天使用一次奶瓶是没有问题的。

安睡女士小提示

由于婴儿食品需要更长时间消化，有些父母发现睡前让孩子吃一次奶瓶哺喂的婴儿食品，有助于让婴儿因为饥饿而醒来的时间稍微延长一些，从而得到更多的睡眠。但这不一定适用于所有人。如果你想，而且医生也同意的话，不妨试试看。

安睡女士准则 7：创造一个有利于睡眠的环境

我坚决认为环境会影响婴儿的睡眠。我倾向于在婴儿的房间里使用遮光窗帘和安静、柔和的色彩。我不喜欢在婴儿床边有发光的或者有刺激性、可以活动的物体。你可以让孩子在任何地方玩能动的玩具，度过他醒着的时间。但在睡觉时，大脑会传递一种信号，“慢点”，而不是“不要睡着，看着你的亮闪闪的活动小球”。

我也希望婴儿床是专门睡觉的地方，也许在孩子稍微大点之后可以在他醒来时玩几分钟安静的游戏。这绝不是在你洗碗的时候安置孩子的地方，也不是当一个孩子开始学习爬行和走路时关着他的地方。

安睡女士小提示

有些妈妈不知道是不是应该在孩子日间小睡时关掉电话。你可以做任何自己希望做的事情。我自己的方法是关掉楼上接近孩子们房间处的电话，但楼下的电话不关。这样我能听到电话铃声，而且不会惊扰到孩子们。

白噪音与音乐

白噪音发生器、风扇或者隔音屏都可以在起初的几个月起作用，甚至可以更长时间地用于日间小睡。那些对声音格外敏感的婴儿们也很适应白噪音，因为这有助于他们过滤掉外部世界的干扰。我发现白噪音发生器或者风扇比起音乐能够更有效地过滤噪音，但很多父母都更喜欢摇篮曲，这可以理解，而且也不错。

2～3 个月时，在你放下宝宝睡觉之前注意合理地使用音乐。如果你让音乐成为孩子的睡眠支撑，可能就需要用整晚时间在孩

子每次醒来时来来回回地重复播放音乐。你可以在孩子准备睡觉的时候播放音乐，但不要让音乐一直伴随着孩子睡熟，也不要在晚上他醒来的时候反复播放。让音乐在开始睡觉时渐渐放慢，或者干脆关掉，也可以把声音放得非常非常小。当音乐关掉时，孩子也就睡着了，这才是合适的做法。

谢丽尔和加里四个月大的儿子阿瑞就像谢丽尔描述的那样是个“超级警醒”的孩子。“他总能发现什么；他是个心不在焉、活跃的孩子。”为了帮助阿瑞尽可能“屏蔽”外部世界进入梦乡，他们在孩子的每次日间小睡时都尽量采用晚上睡觉前的程序，只不过相比晚上时间短了些。他们开始会在楼下用十分钟时间看一段平和的视频，然后上楼到儿子房间给他讲故事。之后他们还要对儿子房间里的每一样东西说晚安——镜子、诺亚方舟玩具等等。谢丽尔还会唱上一小段摇篮曲，然后把儿子放进他的婴儿床，说“睡觉觉”，才会走出他的房间。

移动睡眠

移动睡眠会令父母感到困扰。婴儿们非常好带，他们可以在任何地方睡着：汽车座椅、儿童推车、秋千、摇椅、吵闹的咖啡厅、商场，或者是你最好的朋友家里，哪怕她的三个孩子正凿得游戏室墙壁咣咣响。但就算是婴儿们能这样，也不表示他们就应该这样。有时候这也是可以的(就像接近傍晚和清早时分)，但从 6～8 周左右开始，最好尽量让他们大部分时间能在一个舒适、安静的婴儿床或者摇篮车中睡觉。

同样的，也不会有人建议说婴儿们不应该在不停移动中睡觉——所以我们来回地走，尤其总让他们在车子里睡着。移动睡眠会令大脑处于轻度睡眠状态，而从婴儿们的成长需要来看，他们需要更深度的睡眠。想想看，从恢复精力的效果上看，你在车

子里打盹儿，能和在床上睡觉一样吗？对你的孩子来说也是一样的，尤其是在孩子出生的头两三个月中。

把孩子从车子里抱出来放进婴儿床，也许意味着你可能好几个礼拜都不能出门——但绝不是永远不能——直到你的孩子建立起更有规律的睡眠习惯为止。如果你确实快要无法忍受了，可以找一个临时保姆每周来几个小时，或者找个朋友和你一起合作轮流照看幼儿。此外，在这件事上你也不用过度紧张。孩子也可以在秋千、婴儿推车或者汽车座椅上睡一会儿，只要别把它变成习惯就可以了。

安睡女士小提示

如果你的宝宝在汽车座椅上睡着了，最好把他抱出车子，放到他的卧室或者至少放到一个安静、适合睡觉的地方。

在5个月大时，莉蒂亚的作息时间依然没变，或者说她根本没有作息时间，还是像一个新生儿一样。尼娜一直都忙个不停，匆匆忙忙喂奶，让婴儿在汽车座椅或者是儿童推车上打盹儿。但莉蒂亚吃得不好，睡得也不好。尼娜知道莉蒂亚需要更好的习惯和更少的刺激。她需要在自己的房间里睡觉，在一个没有光亮、没有噪音、没有打扰的安静的地方睡觉。“她开始变得对周围的环境更敏感；她不能随时随地吃奶、睡觉。”尼娜说：“我意识到我也需要在家好好的休息一下。”

尽早建立起一种睡前仪式，大约6周的时候，这是必需的。开始很简单，你可能会先给孩子洗个温暖的澡，然后来到他灯光昏暗的房间。也许你还会为孩子做几分钟的婴儿按摩。（参加训练班吧！）你可以哺乳孩子或者让爸爸用奶瓶给他喂奶，用襁褓包起他，抱着他或者摇晃他，然后把他放进婴儿床或者摇篮中。等

孩子再大一些后，你可以加上小游戏、故事或者其他你们自己的仪式。但你要一直坚持这种睡前仪式。有规律的仪式不仅仅能安抚婴儿，还能暗示大脑逐渐减缓运动，准备睡觉，就像一本好书能帮助成年人放松一样。如果一个婴儿很疲倦但没有准备好入睡，他可能会大量分泌皮质醇，让他更加难以入睡——这是一个恶性循环。

给爸爸们的亲子小提示

妈妈们天生就有与孩子紧密联系的机会，尤其是如果她们选择母乳喂养的话。但爸爸们也没必要觉得被抛弃了。在此我将为爸爸们提供一些拉近亲子关系的方法：

- 喂奶。母乳喂养的妈妈可以在白天把自己的乳汁用吸奶器吸出来，爸爸可以每天晚上用奶瓶喂宝宝。这会带给妈妈一个可以在夜间连续睡上几个小时的充分休息的机会。
- 洗澡。这种亲密的活动对于爸爸和宝宝来说是个非常棒的机会，也能在晚上给妈妈一些休息的时间（或者照顾大一点的孩子们的时间）。爸爸可能还需要学一些婴儿按摩或者婴儿瑜伽方面的知识。
- 照顾宝宝。买一条前系的婴儿背带，每天把宝宝放在爸爸的胸前散一会儿步。

安睡女士准则 8：认真考虑同床（或者同睡）和同房睡觉的问题

我用了一个章节来讨论同床（或者同睡），以及同房睡觉（详见下册第 3 章“这到底是谁的床”）。很多家庭希望能在头 3～6 个月时让宝宝和他们在一张床上睡觉，或者就在他们身边，好增进感情、便于喂奶，以及减少父母的担心。这样做也很好，但如果

你选择全家都在一张床上的话，确保你知道所有的安全准则，并且考虑一下从现在开始到几个月、一年或者两年之后，你希望宝宝睡在哪里。也可以读读关于同睡时如何帮助宝宝进行日间小睡的小提示，有助于宝宝学到他长大些之后需要的睡眠技巧。

我建议在孩子大约 3～6 个月时，将他转到自己房间中的婴儿床上睡觉，这时一种固定的睡前仪式就会显得非常必要了。这个时期之后，让孩子独睡会变得比较困难，在一岁或者两岁之后则更加困难。一些父母会让婴儿和自己同睡几个月，然后当他们开始让宝宝自己在婴儿床上睡觉时，会在宝宝的房间中单独的床上或者垫子上睡几天或者几周。这都是很好的做法，但要确保你有让自己逐步转移出孩子房间的计划。因为他会比你想像的更依赖你。

有些父母开始同睡是因为发现对他们而言，分开睡觉令人很不舒服，大家都睡不好，容易分心或者很闹。别觉得内疚，你需要睡眠，宝宝也同样需要睡眠，所以把宝宝放进你房间里的摇篮或者婴儿床中，如果条件允许，干脆让他在自己房间里睡觉。我知道我的孩子们在晚上很吵闹。作为新妈妈，我对那些午夜时分从那些小小的喉咙里发出的呼噜声和咕哝感到非常惊讶。如果你需要一些帮助去完成这种转变，可以读一下第 6 章“初生到 5 个月”。

安睡女士小提示

如果你希望宝宝就在附近，又不想让他在你床上睡觉的话，也有不同的“同睡”方案可以采用。其中像卡车挂斗一样能挂在你床边的附加床就能让宝宝靠近你的同时在他自己的空间内睡觉。

许多家庭的夜晚都以所谓的“被动同睡”告终。这意味着婴

儿在他自己的摇篮或者婴儿床中入睡，却在父母的床上醒来，因为这是让夜半醒来的孩子再度入睡的惟一方法。也许父母们只想和宝宝同睡三个月，但一直到第四个月、第五个月他们都不知道该如何停止。选择同睡是一回事；不得不同睡则是另外一回事。如果你遵照我的安睡女士睡眠准则行事，就会发现好几种让你的孩子午夜醒来后能再度入睡，或者整晚安睡的方法，那么上述问题自然也就不存在了。

第 6 章　初生到5个月

父母们通常不知道应该从何时开始训练孩子的睡眠习惯。要我说，越早越好。当然，我们一开始要非常缓和，只要帮助他们分辨白昼与黑夜、明亮与昏暗的区别就可以了。随后我们可以训练他们尽少依靠父母的帮助入睡，训练他们让夜间睡眠的间隔以及日间小睡的时间延长。我将这个方法尽量按月分解成阶段，但这当然也不是死的，有些阶段可能会重叠，也可能会延长几天或者几周，不能一蹴而就。30 天左右的婴儿每两个小时要进食一次，不可能因为他到达了“满月”的临界点，就在 31 天的时候一下子变成每三个小时进食一次。但这种认识也是一种正确的指导。

请注意，我提出的哺喂建议仅限于那些足月的健康婴儿。早产的婴儿可以参考，但你必须先要更频繁地给他补充营养和哺喂，直到他们达到正常出生体重以后才可以在医生同意时，遵照这些时间段进行训练。如果你的孩子没有如预期那样增加体重或者出现其他健康问题，请和儿科医生联系，咨询哺喂相关的问题。

在最初的几个月里，很多家长在睡眠训练方面都充满矛盾。一方面，爸爸妈妈想要睡觉，而且知道婴儿也需要睡觉。另一方面，婴儿在训练时会哭闹，他们不明白为什么要忍受压力，眼睁睁看着孩子流下那么多眼泪。实际上，孩子们的哭泣比你预想的要少很多。在最初的几个月里，我们的睡眠训练会相当缓和，以便你的孩子能够得到足够的安抚、支持和宽慰。

尼娜在女儿 5 个月大时开始着手改造她的睡眠问题。她发现亲子依恋的练习非常有吸引力，她无法放任莉蒂亚哭泣，也不能忍受离开她太远。但她的宝宝不管怎样还是会哭闹，而通过亲子依恋才实现的睡眠却对她的家庭没有什么好处。就在尼娜开始缓和地改良她的处理方法，加入更多的组织性与独立性时，她很激动地发现莉蒂亚变得非常健康了。这个宝宝一度非常疲倦，

甚至在婴儿车中的时候都哭闹不止，现在却时时带着笑容，整晚安睡——而且几乎都不怎么哭闹了。

翠西在照料卢卡斯这个因为食物逆流而过度疲劳的婴儿4个月之后，不得已着手解决他的睡眠问题。她知道推迟这个必然的过程对于解决目前的状况毫无助益。“我的很多朋友都很不好意思地承认，他们的孩子就算到了两三岁睡觉还是不好。”翠西说：“朋友们的坦诚相告确实给了我帮助。我知道我和丈夫不喜欢这种方式。我不能实行这种方法，所以需要一些帮助。我不想因为过度疲劳而无法和宝宝共享幸福。”

当孩子们四五个月大左右，我们就应该稍微加强些管理了，这会帮助孩子晚上睡得更久，不需要夜间哺喂，或者可能只要夜间起来哺喂一次就足够了。在大多数案例中，孩子6个月大之前，我们都不会彻底按照安睡女士渐进法进行完整的“睡眠训练”。有些家庭可能过早执行了这个方法，比如在4个月时，而且也成功了。如果你想尝试，你的家庭医生也认可，也可以在4个月时着手，并主要以晚上为重点。不要期待4个月大的孩子就能成功在日间小睡中完成渐进法训练；力所能及地完成日间睡眠的内容即可。但请先了解，渐进法虽然缓和，但也还是针对稍微大一点的孩子设计的行为修正技巧。如果能在4个月的时候起作用那当然好，这样你就可以好好睡觉了。但如果不起作用，你也先别放弃我的系统方法。我建议你按照这章节中我提出的更缓和的方法进行，然后当你的孩子稍微大一点儿，6个月左右的时候再尝试渐进法。有时候我也遇到过那些让一个只有几周或者几个月的婴儿进行渐进法练习的家庭。安睡女士渐进法并非为这么小的婴儿设计，也不建议对这么小的婴儿使用。不过本章中我提出的步骤能帮你改善婴儿的睡眠。

婴儿如何睡眠

“像个婴儿一样睡觉。”是一句谚语，实际上这种睡眠并不像人们想像的那么好。新生儿需要很多睡眠，大约每天 15～18 小时，但他们的睡眠没有规律，也不成熟。在前 4 个月中，婴儿的睡眠有一半都是 REM 睡眠（快速眼动睡眠），也是最轻的一种睡眠。这意味着比起 REM 睡眠时间较短的大一点儿的孩子或者成人来说，婴儿的睡眠很浅，他们更容易被惊醒。婴儿同样也会在 REM 和非 REM 两种睡眠阶段中循环，但比大一点的孩子和成人更频繁。

婴儿每次在两种睡眠阶段中转换时会有局部的清醒。作为成年人的我们，局部觉醒最多不过持续几秒，早上醒来的时候我们几乎不记得发生过什么。但这种短暂的半清醒状态却会惊吓到婴儿，让他们更清醒。然后他们就会哭泣——我们则会冲到他们身边，疯了一样地尝试各种方法来止住他们的眼泪。

无论是为了孩子好还是为我们自己心安，我都绝对同意对孩子的哭泣作出响应。我们作为父母，需要确保孩子们没问题，他们没有呕吐或者没有被什么东西缠住，他们的尿布没有湿透，等等。但我们决不能做得过火。记得保持安抚我们的孩子与让他们学会自我安抚之间的平衡。这是睡眠训练的主要组成部分。

哺喂

如果你要在夜间哺喂婴儿，尽量别开灯，也不要太影响他：帮他拍拍奶嗝儿，稍微抱抱他，然后把他放回摇篮、婴儿床或者其他任何他可以入睡的地方。这不是游戏时间，也不是玩闹的时间。

有时候他们在局部清醒时会哭闹，发出一些属于婴儿的奇怪声音，然后就会再度入睡。

安睡女士小提示

如果让我们的宝宝们认为只有被抱着、拍着、哺喂着时才能睡觉或者再度睡着的话，这么创造出来的睡眠支撑代表着他们永远都学不会如何在局部清醒之后再度入睡，也永远都学不会如何整晚安睡。

“带我们第一个孩子霍莉的时候，哪怕她哭一声我们都会从床上跳起来冲进她的房间。”玛丽安说，她在三年内生了3个孩子，如今已经被训练成为一个非常熟练的睡眠教练了：“我们后来才明白发出声音并不意味着孩子醒了。当霍莉发出声音时，我们的闯入反而真的把她吵醒了。”

如果孩子确实醒来了，那么可以走上前去安抚他，轻拍他的后背，发出吁吁吁的声音哄他，用襁褓包裹他或者用其他抚慰技巧让他重新入睡。但别做得太过分。也许孩子所需要的仅仅是重新包一下襁褓然后再把他放回床上而已。坐在他的婴儿床边，直到他睡着，假如你觉得这会让他——或者让你——感觉好一点的话。你可以按照我的建议行事，不仅仅在前几个月，一直到孩子长到不再需要夜间哺喂之后为止都可以。

我知道这章节里讲述了太多需要注意的问题，想要遵循全部的建议并非易事，尤其是当你很疲倦，又被所有伴随着父母身份一同出现的情绪、杂务和婚姻方面的变化搞得不知所措的时候。有些来向我请教第一个孩子的睡眠问题的妈妈们赌咒发誓说，到第二个孩子的时候她们绝对不会再做和现在一样的事情了——但结果没几个月还是会不好意思地打电话给我，询问怎样才能把

她们因为重蹈覆辙而带来的不良后果消除！

“我的第一个孩子是收养的，在他6个月大的时候我们收养了他。”爱伦，就是我在第1章“安睡女士系统”中提及的写下那些提示卡片的母亲说：“我的第二个孩子凡妮莎是我亲生的。从她出生，我就立志要帮她从一开始就建立良好的习惯。毕竟我已经有经验了！但是她相当的倔强，而且还有食物逆流症状，我甚至没法去尝试自己的打算。我们只好同时睡在床上，我每两小时哺喂她一次。”

爱伦在孩子8个月大的时候打电话给我。好消息是食物逆流的状况在凡妮莎6个月时有所减轻，我们把她放进婴儿床，并且只用了三个晚上就停止了夜间哺喂。回顾过去，爱伦发现如果她没能忍受那些压力并且继续坚持下去的话，也许会让整个家庭都不得不和她一起承受更多的不眠之夜。

丽莎的经历则不同。她的儿子泰迪在大约7个月大时遇到的睡眠困难是我们见过的最多的。当她的女儿布列塔尼出生后，丽莎马上着手建立她的睡眠习惯。她更加注意哺喂的时间，在女儿昏昏欲睡时把她放下，不让自己总是抱着女儿入睡。如果女儿有时候哭泣她也不会过分的慌张。她的坚持与更自信的教育方式取得了成效，布列塔尼从很小的时候就睡得非常香甜。

你即将看到丽莎更多的经历。但无论你更喜欢爱伦还是丽莎，重点在于——不要被已经做过的事情打败，你应该从现在开始努力做得更好。

第一个月（0～4周）

在第一周，婴儿们一般会睡16～18小时，其中夜间一半，日

间的另一半则会分成四次小睡。在第一个月末，他们平均会睡15.5～17小时，其中夜间睡8.5～10小时，日间则分成三四次小睡，共计6～7个小时。在夜间婴儿们也会醒来两三次吃奶，但很快能够再度睡着。

根据美国儿科学会研究，一旦母亲有了奶水，新生儿就可以每一个半小时哺喂一次，他们绝不能超过三小时不吃奶——24小时之内应当哺喂8到12次。用婴儿食品喂养的孩子进食的频率可能会稍低一些，每三四个小时喂食60～90毫升，每天哺喂6到8次即可。

哪怕是在开始的几周，你的宝宝就已经开始能够感受到你的细微变化与情感了，并意识到他们能影响自己周围的世界。他能分辨出你乳汁的味道，更喜欢柔软的感觉而不是粗糙的，并且会喜欢被温柔地抱起来。突然或者粗暴的动作都会惊吓或刺激到婴儿。

在6到8周时，尽管婴儿还不能明确地分辨出白天与夜晚，但如果你开始把他放在光线之下，他将会很快发挥出这种能力。你当然不愿意让明亮而刺眼的光线照射宝宝的眼睛并吓着他，但你可以在他清晨醒来时拉开窗帘，当他醒着的时候把他放在明亮的房间里，而在他睡觉时把他放在昏暗的房间里。

注意不要过分刺激宝宝，既不要让他太久不睡，也不要把他放在过于嘈杂和热闹的地方。有时候过犹不及——当你试图去安抚孩子的时候，可能反而在不经意间刺激到他。如果你用了30分钟去安抚一个新生儿可他还是哭闹的话，试试看用襁褓包起他，然后把他放在一个光线微弱的房间。他可能很快就自己平静下来了。当新生儿受到太多刺激时，他们可能会慢慢习惯。这意味着他们会进入这样一种状态：看似睡着，但实际上只是处于排斥外界一切的一种模式中。这是婴儿们在6到8周之前会使

用的一种自我安抚模式，这时候他们还没有发展出其他积极应对刺激的方法来。

对于父母来说，有时候区分是不是习惯刺激之后的假寐是很困难的。一个睡着的婴儿受到刺激后，可能会警觉而敏感地醒来；实际上，他会哭闹发怒。而一旦习惯刺激之后，他们就没那么警觉了。你应该避免过多的刺激是因为一旦孩子在日间排斥外界，那么晚上他就可能会醒来更多次。当新生儿醒来时，他们需要适量的安静，如果白天他们在清醒时得不到平和的时间，他们就会在夜间去寻求这种平和。

我还记得曾经带我的大女儿卡利去参加过一次婚礼，那时候她才 5 周大。令我感到麻烦的是，她在本该安静的典礼中哭闹得比平时更厉害——然而，在非常嘈杂，充满了希腊歌舞的环境中她似乎睡着了。接下来她整夜醒着，哭闹不休。后来，当我了解了更多关于婴儿睡眠的知识后，我想起了那场婚礼。我发现卡利对于过度刺激作出了反应，在典礼中哭闹，然后她开始习惯于周遭环境的刺激，用于自我保护，以防感官超载。因此她在夜间才会疲劳过度，表现失衡，哭闹不休。当我的第二个孩子出生后，我更注意保护她的睡眠，也更明白不带她去参加婚礼才是更好的选择！

哺喂的指导方针如下：按需提供。这是目标，并非约束。如果孩子真正在吸吮奶水，而你也试过了一些安抚技巧无效，那么可以继续喂她，尤其是当此刻距离下一次哺喂时间很近的话更应如此。但如果你过于频繁地哺喂孩子，要特别注意她的反应。如果她几分钟之后就停止吸吮，或者含着乳头开始打盹儿，这就是在提示你，她并不是真的饿了，或者是在提示你，你可能奶水不足。如果你发现自己总是要喂奶，而且很频繁地喂奶，实际上却只是孩子需要一些安慰而已的话，可以回顾一下第 5 章“新生婴

儿的正确起点"中关于母乳喂养的内容，有助于发现你的孩子饥饿的信号，并能找到一些可供选择的技巧。

安睡女士小提示

密集哺喂意味着哺喂的时间间隔更小，这在一天中当孩子感到饥饿、烦躁、受到过度刺激以及过度疲劳的时候——大约是从下午3点到7点的时间段内——很有帮助，而且也有助于让你的宝宝在晚上睡得时间更长。

在白天，婴孩每次可能会睡两个小时，有时候三个小时。但就如你不喂奶他就不会睡太久一样，你也没法让他清醒太久。时间通常就限制在两小时。宝宝可能看起来很清醒，看起来很好，但就像很多妈妈千辛万苦才学会的那样，事实是等到我们发现他们看起来不太好的时候就已经晚了。他会感到饥饿，受到了过度刺激，过度疲劳，所有的皮质醇立刻一股脑地散入他的血管，令他更难以入睡。

让孩子最后一次哺喂与睡觉的时间与你的睡觉时间相一致，有时候可以在晚上10点到11点之间(在几个月内孩子的睡觉时间可能会稍微早一些)。在上床睡觉前的两小时之内尽量让他保持清醒。很多婴儿都能够轻松的在这两小时内保持清醒，这会为家庭带来一段和美的时光，尤其是如果妈妈整天都陪着婴儿的话，这段时间对于爸爸们来说就是更加珍贵的亲子时间。有些新生儿可能无法一直坚持到10点。如果你的宝宝疲倦、烦躁，在10点左右也不肯好好地吃奶，那就把上床睡觉的时间稍微提早一点。找出合适的睡觉时间也许需要反复试验，可能出现几次失误，但仔细观察孩子的表现；比起时钟来，他们会告诉你更多信息。一般说来，睡觉的时间调节在一小时或者半小时就可以了，

但我也遇见过很多新生儿，他们本身自然的睡眠起点最早可以达到晚上 8 点。

一个有规律的睡觉时间和一些基本的睡觉规则，就算是在非常幼小的时期也是非常重要的。这就是我们应该怎样开始调节睡眠的方法。最初的几周中，孩子可能会需要你抱着、摇晃着或者哺喂着才能在你的臂弯中入睡，所以每天至少一次使用这些技巧来让孩子出现睡意，而不要等他自己睡着，然后温柔地把他放在婴儿床里，用襁褓包裹着他，让他自己真正入睡。

如果你发现自己一旦想到孩子可能会哭泣就开始紧张的话，那么在你把他放下的时候先来几次深呼吸。如果孩子确实哭了，你可以马上安抚他。在孩子很小的时候，如果有必要的话，你可以把他再抱起来安抚；但要注意别让他总是在你的怀抱中入睡。

如果他醒来之后吃奶的时间很短，就像很多宝宝表现的那样，那么在他再度睡着之前就不需要再哺喂了。你可以尝试其他的安抚方式（见第 5 章“新生婴儿的正确起点”）。哪怕在最初的几周内你选择与宝宝在夜晚同睡，也要让他在婴儿床或者摇篮中进行日间的小睡。你一定不愿意让孩子总是依偎着你才能睡觉；因为这会让未来的几个月的日间睡眠更困难。

安睡女士小提示

记得照顾好自己，在任何能睡觉的时候都要抓住机会睡觉。

腹部练习

你也许听说过让孩子保持“仰姿睡觉”对安全的好处。不过我们宝宝的小肚子同样也需要一些练习来促进健康的运动发展。所以本书第二版的安全标语是“仰姿睡觉，腹部游戏”。在腹部练习时间里，孩子们需要保持清醒，而且要有适当的监督，尤其是在

孩子刚学会翻身的几个月里。

腹部练习对于运动发展必不可少——也有利于睡眠安全。头部和上半身的适度力量与控制能够减少新生儿猝死综合征或者窒息的风险，也有助于宝宝们发育用于翻身、坐起以及最后的爬行所需的肌肉群。

美国儿科学会建议，宝宝在出院回家之后就可以开始进行一些腹部练习。每天可以进行两到三次，每次三五分钟。如果婴儿表现得很喜欢这种练习，就可以逐渐增加练习时间。换尿布之后、刚从日间小睡中醒来时、坐在有弹性的座位上或者汽车座位上时，以及当你用婴儿背带或者吊兜抱着孩子的时候都是不错的练习时间。

当婴儿学会翻身之后，腹部练习就会进行得更自然，一些研究表明，婴儿在进行腹部练习之后会睡得更好。通过翻身，婴儿学会了一种自我安抚的方式，因为他们对身体控制以及舒适程度的掌握都变得更好了。当然，我们在此很难表述这种因果关系。婴儿大约会在三四个月时开始学习翻身——这时由于他们的大脑发育更成熟，睡眠周期也更长了。但尽早开始腹部练习有助于婴儿发展这些早期的运动技能，从而有助于他们更安全地学习翻身。

安睡女士小贴士

如果你的宝宝不喜欢腹部练习，想法子让练习变得有趣一些吧。让孩子趴在你身上，肚子贴着你的肚子；你就会看到他是如何努力抬头去看你的脸。你也可以把一件玩具放在一旁，鼓励孩子去拿。当婴儿长大一些时，把玩具在他身边放成一圈，这种方法非常有助于锻炼肌肉与协调性。在适当监督下，一个稍微大一点的孩子可以在地板上和婴儿温柔地玩耍，这样你就可以让两个孩子都非常快乐了。

第二个月(5～8周)

婴儿通常一共要睡15.5～17小时，其中8.5～10个小时是在夜晚，6～7个小时是在日间，平均分为三或四次小睡。这个月到最后，有些孩子可能在晚上只需要醒来一次哺喂，而其他的可能在未来几周内还需要两次夜间哺喂。

母乳喂养的婴儿仍旧是每两个或者两个半小时需要哺喂一次，不过有一些也可以三小时哺喂一次。

大部分孩子仍然需要在24小时之内哺喂8～12次。大约6周左右他们可以在夜晚一次睡足4～5小时。吃婴儿食品的宝宝大约每3～4小时需要哺喂一次，每次需要大约120毫升食品。在6～8周时他们也能一次睡够大约5个小时。

第二个月的特点是宝宝们第一次露出可爱的微笑，还有强烈的哭闹，尤其是在下午接近夜晚的时候。在6～8周时，婴儿的成熟程度已经让他们无法习惯并自动隔绝外界的刺激了。但他们也还没有掌握自我安抚的方法。在这个章节中，我会给出一些小提示，告诉你如何度过这段很难安抚孩子的时间；还会提出一些建议，告诉你如何开始帮助你的孩子走出睡得更香更久的第一步。一定要记得使用你学会的全部安抚技巧，而不是只会依赖乳房或者奶瓶。

在这个时间点上，正在发育的大脑开始组织夜间的睡眠，婴儿每次可以睡至少4个小时，到第二个月末有时候还能睡得更久。在这个月中，你之前做的帮助孩子分辨光与暗的努力将会开始显露出效果，孩子开始能够分辨白天和夜晚，并建立起自己的自然生物周期，即他的生物钟。

白天，你应该在孩子睡够三小时后把他唤醒，令他在后面几

次小睡中也能得到最好的效果。最好能让他在晚上 8 点到 10 点时保持清醒，这样孩子就能在晚上 10 点左右进行最后一次哺喂，然后上床睡觉。然后他就能一直睡到凌晨 2 点，短暂地醒来吃一次奶，接着再度入睡，直到凌晨 6 点。(一般比较常见并且也可以接受的变化是在晚上 11 点进行最后一次哺喂，凌晨 3 点进行夜间的一次哺喂，然后早上七点醒来哺喂。)尽管一般婴儿都会在早上 6 点到 7 点之间醒来，但在随后的两小时之内他们还是会小睡一次。记得也要让你自己尽可能早地上床睡觉。

在 6～8 周时，孩子开始更多地意识到睡眠习惯与模式。注意睡觉时间，什么时候你的大脑意识到该睡觉了，就可以开始着手在孩子昏昏欲睡的时候把他放到床上了。实际上，让孩子在该睡觉的时候昏昏欲睡是你这个月处理睡眠问题方面的最大目标。在孩子慢慢睡着时站在床边安抚他。确保他不会含着乳头或者奶瓶睡着。如果你使用了安慰奶嘴，可能需要反复把安慰奶嘴放进孩子的口中，你也可以等等看孩子是不是能够在没有安慰奶嘴的时候同样进行自我安抚。(这个时间段的午夜时分，如果孩子含着乳头或者奶瓶睡着你可以不必担心。比如你是在半夜 2 点时哺喂他，那只要把他放回床上，你就可以自己回去睡觉了。)

如果你把孩子放下的时候他哭了，也没必要把一个小人儿独自丢在黑暗里。当我女儿这么大的时候我是做不到的。坐在孩子身边，轻轻拍他，发出温柔的“吁吁”声哄他。虽然你很想把他抱起来，但一定要坚决抵制这种诱惑。不过，如果孩子实在是哭得太厉害，没法自己安静下来，那么还是把他抱起来吧。当他平静下来之后再把他放下，但别等到他真的睡着了再放下。

孩子的大脑需要更多的时间去辨识日间的睡眠，所以在这个月中，日间的小睡还是比较没有规律——而且这种状况很可能会持续到孩子四个月时。他需要睡三到四次——不要纠结于到底

是三次还是四次，也不要纠结于某天白天的小睡是否有变化(尽管你不想一片混乱)。新父母常常会低估婴儿需要睡觉的频率。如果孩子一次清醒的时间超过两小时，他可能就会因为过度疲劳而受到刺激，令日间小睡变得更困难。这意味着如果他早上 7 点醒来，上午 9 点时就得再睡一次。

安睡女士小提示

不要像有些育儿书籍中提出的那样太过频繁地把孩子抱起放下。这种做法容易刺激到婴儿，并让他们更难以入睡。

为了帮孩子做好睡觉的准备，在你想让他睡觉之前的半个小时左右就要把他放到一个安静的环境中去。(也就是如果他会在上午 9 点时小睡，那就在 8 点半开始这一步。)这可能意味着你要哺喂他或者抱着他走动一下，也可以抱着孩子给他唱首儿歌。如果你觉得可以了，就可以开始着手在孩子昏昏欲睡的时候把他放下睡觉了，不过在这个早期阶段，他可能会需要比一般的标准更“困倦”一些才行。

在这个月末，不要再让孩子在移动的汽车，或者秋千等地方入睡，让他在婴儿床或者摇篮里睡觉。一些小睡可能时间很短，只有 45 分钟左右；但渐渐的，一些小睡就能够持续一小时以上了。如果孩子通常在 30 分钟左右就会醒来，可以按照你晚上的方法来安抚他。不过这种方法可能不会一直有效，但第二天最好能拿出十分钟左右再次尝试。这种做法一般在上午比在下午更容易奏效。

夜间哺喂在这个月也应该逐渐减少，在第三个月则一定要减少。如果你发现自己哺喂的次数更频繁了，尤其是晚上，那就反省一下孩子是否常常会饥饿，他最后一次吃奶是什么时候，你是

否给他提供了乳头之外的其他安抚方式，等等。

在本月中，一般从第六周开始，婴儿们的哭声就开始有了各种区别，这能帮助我们判定困扰他们的问题以及如何解决。比如“给我换尿布”、“抱抱我，抱抱我”、“妈妈，我想睡觉了”、“我很难受”、“马上把我的安慰奶嘴还给我”，当然，还有表示饿了的哭声。不要把所有的哭闹都当作是因为饥饿。

“我总是把霍莉的哭声当作她饿了。所以她一哭我就喂，一哭我就喂。先喂奶，然后做其他的事情。”三个孩子的母亲玛丽安说。你将会在第13章“帮助双胞胎或兄弟姐妹睡觉”中再次看到她的故事：“不过在我照料第三个孩子艾莱时，我会在给他喂奶之前尝试其他各种可能。”每次迪恩和艾莱哭闹的时候，玛丽安不再不经思索地给他们喂奶，而是抱着他们走动、摇晃他们、轻拍他们，或者抚摸他们的脊背，并且注意不要太过频繁以免让孩子们把自己的行为当作睡眠支撑。

安睡女士小提示

哪怕在这么小的时候，一些婴儿都会试图通过不睡觉来博得他们父母的关注。他们希望能醒着，和父母玩耍，而在随后的几个月中这种形式会随着他们的分离焦虑感增强到顶峰而越发激烈。

婴儿们的秘密语言

婴儿会有很多不同的哭声。我被普里西拉·邓斯坦(Priscilla Dunstan)关于婴儿声音的研究深深吸引，很多家庭也发现理解他们的孩子的这种前语言交流形式非常有帮助。理解我们的小家伙试图告诉我们什么，这当然会让我们

更容易满足他们的需要。

邓斯坦曾经是一位来自澳大利亚的24岁新妈妈，有一个患上疝气的儿子。她是一位高超的小提琴家，一位专业的歌剧演员，并且对声音有着惊人的记忆力。理解烦躁的儿子的需求让她开始了长达九年的研究之路，最终创作出了《邓斯坦婴儿哭声分类》(Dunstan Classification of Infant Cries)一书。在纸上描述出婴儿的声音着实令人望而却步，不过我会尽力去做，你可能也想要看看邓斯坦的DVD视频“邓斯坦婴儿语言系统”(www.dunstanbaby.com)。

邓斯坦认为，每一声哭泣中都包含着一条信息，她鉴别出五种与婴儿的生理需要相关联的声音：

1. 嗯嗯地哭：表示饿了。
2. 噢噢地哭：表示累了。
3. 呃呃地哭：表示需要打嗝儿。
4. 嗽嗽地哭：表示轻微的风寒(冷气)。
5. 嗬嗬地哭：表示身体不舒服。

这些声音都基于婴儿的生理反应。例如，一个饥饿的婴儿的本能反应就是吮吸。这就产生了“嗯”的发音——实际上就是在说“给我吃的！”如果我们能够提前了解这五种声音的含义(不受文化、人种以及民族的限制)，就是发现所谓的“准备哭”的阶段，就能在强烈的哭泣开始之前理解孩子需要什么——邓斯坦称之为“预警”。如果你能在“准备哭”的阶段，在孩子的声音还很柔和时满足了婴儿的需求，你就能减少家庭成员们的压力，也有助于造就一个满足而快活的孩子。

邓斯坦小组的研究者们还发现，如果婴儿们的父母可以了解这种交流方式的话，这些婴儿就能睡得更长久、更香甜。他们还发现，邓斯坦系统还能通过增强父母的信心，降低他们的疲劳程度来帮助女性降低发生产后抑郁症的风险。尽管并非得到全部教育专家的认同，邓斯坦小组的研究员们还是认为，疝气也有特别的哭泣表达方式，而非一种无法解释的状况；一个需求总是能够得到满足的婴儿不会患上疝气。

婴儿的"烦恼"

在第一个月月末或者第二个月月初，很多婴儿都会进入一种特别烦躁不安的时期。一天中并不是总充满乐趣。对于父母们而言，下午较晚或者刚入夜的时候尤其难熬。整个白天照料一个小娃娃令我们疲倦不堪；我们想要坐在餐桌前吃晚饭，通过与刚刚下班回家的另一半交谈来振奋最后一点精神。可能我们还得照顾其他小孩，他们在一天中的这个时间也是又累又饿；又可能是稍微大一点的孩子，看起来在去看电视之前他们绝对想不到收拾好散落的玩具。记住这种格外烦躁的时期只是一个阶段而不是一辈子的麻烦，可能会对你有所帮助。婴儿们将会在 6 周时达到烦躁不安的顶峰，然后在 12 周左右逐渐减弱。以下是帮你度过这一时段的一些小提示：

- 让婴儿有规律地小睡，避免过度刺激他们。
- 从下午早些时间就开始减少交际与来访者。尽量在一天的早些时候接待亲友（或者雇佣一位保姆、征募一位亲友帮你照看一个小时左右的孩子，好让你有时间招待来访者）。

- 在安静而昏暗的房间里哺喂婴儿，不要被电视、电话或者聊天分散心神。
- 在每天的这个时候尽可能让其他大点儿的孩子远离婴儿。
- 如果可能的话，请爸爸帮忙，和他谈谈，让他不要和孩子玩那种父亲喜欢的大动作的游戏，而是担当“抚慰婴儿的主力”。父亲一般会在婴儿达到烦躁的极点时下班回家，大约在下午 6 点到 7 点左右。这会导致一种令人气馁的困难的状态。

我还记得比尔深信我们的第一个女儿讨厌爸爸。因为每当他一走进家门，张开双臂的时候，女儿就会用号啕大哭来“欢迎”他。有时候她甚至会在刚入夜的时候烦躁不安、大声尖叫差不多一小时左右。比尔后来学会了如何做一个能抚慰女儿的父亲。他会用襁褓包起女儿，抱着女儿走来走去直到她最后安静下来。更夸张的是，我们的第二个女儿比大女儿还要吵闹，完美地反驳了那种第二个孩子比较好带的不实理论！

第三个月(9～12 周)

这一时段的婴儿平均需要 15 小时的睡眠，10 小时夜间睡眠和 5 小时平均分为三次的日间小睡。许多婴儿到这个月的月末都能在夜间一口气睡足 6～8 小时而无需半途哺喂。白天他们仍旧需要每 3 小时哺喂一次，但不用像晚上那次一样多。吃奶粉的婴儿每 3～4 小时哺喂一次，每次应该吃 120～150 毫升。

抚慰技巧

我常常会提醒读者使用自己会的所有抚慰技巧，好让你不至于只能依赖哺喂来安抚你的宝宝。许多技巧都是出于本能，但有时候我们的焦虑和来自于各方相互矛盾的建议往往会淹没我们自己的天性。以下是一个简略的清单，来让你明白自己拥有多少安抚技巧。其中一些，比如用襁褓包裹婴儿，我们通常只在前几个月使用；但还有一些，比如温柔的按摩，在幼儿时期的大部分时间都非常好用。

记得迅速对你的新生儿作出反应，因为一旦婴儿变得歇斯底里，就更难安抚了。随后我们将会努力在之前讨论过的立刻作出反应与让婴儿学会自我抚慰之间找到一个平衡点，但在最初的几个月中，令婴儿平静下来是我们的工作。

如果一种方法十分钟之后还不奏效，试试另一种。如果你甚至比孩子还沮丧，那就让其他家庭成员接手，让自己休息一下。如果你独力支撑，几乎快要到临界点时，最好让宝宝先在安全的地方（比如他的婴儿床或者婴儿椅中）哭几分钟，你先用这个时间安抚一下自己。

以下是一些常用方法：

- 抱起你的宝宝
- 轻轻摇晃他
- 用襁褓包裹他
- 重复播放安神的音乐或声音
- 给他一个安慰奶嘴
- 轻轻为宝宝按摩

在第三个月中，婴儿将会有极大进步，你也能得到更多休息。

我们可以开始着手改善孩子夜间睡眠的数量和质量了，而在这个月的月末甚至可以开始改善日间小睡。在本月月底，婴儿的烦躁不安开始减轻。他们会在白天清醒的时间更长，在夜间则睡觉的时间更多，并开始找到属于他们自己的自然睡眠节奏。你的工作应该是更缓和、精细地将这种节奏调整与塑造成为灵活的时间表。（孩子仍然不能进行安睡女士渐进法的训练，而你也不能过于激进地要求应该“整晚安眠”。你应该能够帮助他每次睡觉时间更长，一些婴儿在本月末也许能够大半夜都睡得很安稳了。）

现在，在孩子的大脑中正在发生有益的变化，他生理上也正在形成更完善的生物钟。一些休息充分的婴儿现在能够在日间一直保持三小时清醒。这也并非一成不变的规定，仔细观察，如果孩子开始表现出疲倦的样子，就把他放在床上哄她睡觉。不要等得时间太久，因为如果你让孩子过度疲劳了，他就会更难以入睡，并变得更烦躁不安。

让日间小睡更有规律。在这个月月末，大约12周左右时，上午的小睡应该开始有规律，持续大约1～1.5个小时，并且应该在每天的同一时间开始。在几周之内，你就能看到通常很难搞定的下午的小睡呈现出一种比较固定的规律来。孩子可能会在下午稍晚的时候开始简短的第三次乃至第四次小睡，时间大约是45分钟到1小时，这主要取决于前面一次小睡的时间与质量。所以当孩子在上午小睡时，你就可以开始在他昏昏欲睡的时候把他放下了（不过下午的小睡仍然比较麻烦）。

安睡女士小提示

在第三个月左右，婴儿们的身体里开始产生褪黑激素，这是一种可以放松肌肉并促进人产生睡意的激素。根据光线明暗不同，褪黑激素的分泌会在夜间增加。通过调节你的孩子的睡眠，帮助他尽可能延长夜间的睡眠时间。你应该帮助他建立良好的激素分泌节奏，更有效地促进他的睡眠。

现在，婴儿应该减少活动以便进行日间的小睡；他们需要一个安静而且熟悉的环境，没有大量光线、噪音以及干扰。婴儿们还需要更深层的睡眠，如果他们处于运动中，大脑就没法实现更好的睡眠。孩子不应该在汽车座椅、婴儿车等移动的处所中睡觉；他需要在家里，在自己的婴儿床或者摇篮中入睡。不过如果是下午的第三或者第四次小睡，孩子在汽车、秋千或者婴儿车里睡着的话，你可以稍微灵活一些处理。

睡觉时间就应该像睡觉的样子，每个晚上都要相差无几，用上 15 分钟左右。当然，有时候也许这法子不会奏效，当你在晚上 9 点打算把孩子放上床时，他却 8 点就睡着了，但你一定不希望时间表变得乱七八糟：头天晚上 7 点睡觉，次日却 11 点睡觉。在这个月的月末，你应该开始观察孩子的自然睡眠时机通常都会在何时出现，并以此来作为指导。

你应该建立起一种睡前的仪式——很简单，洗澡、换睡衣，再加上一些婴儿按摩或者婴儿瑜伽，一首儿歌或者一本简单的图画书——当然这一项要等到孩子大一些才能实现了。给孩子哺喂母乳或者奶粉；如果他还乐意，也可以用襁褓把他包裹起来，然后在孩子昏昏欲睡的时候把他放下。如果他知道如何在睡觉时间让自己入睡，那么对于孩子来说午夜时分从熟睡中醒来，在没有

“安慰性的哺喂”的情况下学会自己再度睡着就会变得比较简单了。

婴儿仍旧需要 6～8 次哺喂，但在夜间需要的哺喂会更少。本月月初时，他可能还需要在夜间 10 点或者 11 点时进行一次哺喂，但渐渐这个时间会提前到大约 8 点。当孩子能够在晚上一口气睡足 8 小时或者当你发现他更早就开始困倦的话，就意味着孩子已经可以更早地上床睡觉了。注意孩子要睡觉的迹象，比如打哈欠、揉眼睛或者开始烦躁不安等。

在这个时间段，婴儿在夜晚能睡多长时间，而且无需哺喂通常会有一个自然的变化——6～10 小时都是正常的。一些婴儿会整晚睡着，另外一些则有可能恰好在一次比较活跃而且有效的夜间哺喂中半醒过来。他们可能只是半醒，吃奶，然后就再度睡着了。

这个月中你的目标应该是增加孩子夜间睡眠的时间。我的两个孩子都是母乳喂养，但他们在这个年龄段时已经都能够整夜安眠了。卡利在 8 周大时可以从晚上 9 点或者 10 点开始一直睡到次日早上 7 点，而格雷琴在 10 周大时也可以从晚上 10 点一直睡到早上 6 点。

如果你的宝宝在夜间频繁醒来要求哺喂，你和你的医生又排除了健康和喂奶的问题，那么你就应该温柔地帮助孩子改变他的生活规律。首先要保证，医生判断你的孩子成长状况很好也足够健康，每晚一次哺喂就足够了。

不管你是母乳喂养还是奶粉喂养，确保孩子在日间能够吃饱吃好，这意味着他在夜晚哺喂时更不容易受到刺激。哺喂要充分，让孩子能吃到前奶和后奶（详见第 5 章“新生婴儿的正确起点”）。不要让她整天都含着奶嘴或者时不时吃奶，因为这样会让孩子养成无论需要与否，都要随时吃奶的习惯。在一个更少刺激

的安静的场所哺喂孩子，让他能够全神贯注进食，不会为周遭环境分心。你应该考虑“集中哺喂”，即你应该在清晨和傍晚时分频繁喂奶。关于如何减少夜间哺喂的次数的问题，你有两个选择。

选择 1 是梦中哺喂。在你准备睡觉之前，叫醒孩子进行最后一次哺喂。这种“梦中哺喂”最理想的时间应该是在晚上 10 点到 11 点之间（主要根据你在睡觉前最后一次哺喂的时间决定）。关着灯，尽可能不要吵醒孩子，哺喂他，然后迅速把他放回床上。此后在晚上就不要再哺喂了；如果他夜间醒来，可以用其他抚慰方式替代哺喂。有些婴儿，就像我第一个孩子，对这种梦中哺喂的反响很好。如果被温柔地唤醒，卡利会很高兴，而且吃得很好，也能很快再度睡着。如果你的孩子和我的第二个女儿一样，那你可能就会发现他被叫醒之后并不怎么吃奶，却会在几个小时之后开始感到饥饿。如果是这样的话，使用第二个方法可能会更好。如果你采用了梦中哺喂法，要注意重点在于迅速地哺喂孩子并让他回到床上睡觉。当他一吃完奶就马上拿出乳头（或者拿走奶瓶），避免任何可能会导致孩子醒来并开始玩耍的可能。

选择 2 是定时哺喂。在夜间设定一个哺喂孩子的时间，然后就只在这个预定好的时间哺喂他。你可以选择在孩子夜间第一次醒来时哺喂他，只要此时距离他睡觉前最后一次哺喂超过四小时即可。或者你可以选择更晚一点的时间，例如孩子的“设定时间”是在他后半夜第一次醒来时（尤其是如果你知道这时候是孩子最饿的时候，或者如果在这之前他对于梦中哺喂的反应都很不好时更应如此）。

有些家长会发现，当他们更严格地执行这种时间表时，他们的孩子反而会主动跳过这最后一次哺喂，反而会在白天吃得更多一些。

无论你选择了哪一种方法，坚持下去；不要反反复复的。如果孩子在晚上的其他时间也会醒来，而且一开始这种情况很少，

你可以用别的抚慰方式来帮他再度入睡。坐在孩子身边安慰他，但一直到凌晨6点之前都不要再哺喂他。如果孩子过分烦躁，可以把他抱起来稍加安抚，但当他安静下来之后要及时把他放下，好让他在自己的床上而不是你的臂弯中入睡，尽量不要反反复复地把孩子抱起又放下。如果你很明白而且能够坚持的话，婴儿通常会在几天之内就不再夜半醒来要求哺喂了。

安睡女士小提示

如果你担心你的婴儿会在巨大的婴儿床里感到渺小和失落，你可以利用这个小技巧把婴儿床变成一个温馨的小窝。把一条或者几条婴儿毛毯或者婴儿毛巾卷成U型，然后紧紧放在床单下面，这样就不会松散开来伤害到婴儿。（我知道一个母亲还用橡皮筋扎牢这些毛毯和毛巾来保证U型卷足够结实。）让婴儿的脚冲着U型的底部。请你的医生检查一下确切的放置位置以便确认不存在窒息或者婴儿猝死综合征的风险。

如果你目前正和孩子同床睡觉，却想把换到他的婴儿床里；或者如果你的孩子正睡在摇篮里，而你想把他换到标准婴儿床里的话，第三个月的月末就是最佳时机。如果孩子还没有在婴儿床里睡觉，那么先在日间小睡的时候把他放进婴儿床。给他大约一周的时间于白天在婴儿床里小睡来适应，然后就可以在夜晚把他移进婴儿床了。要坚持。如果你想让孩子自己在婴儿床里睡觉的话，你就得让他整夜都睡在里面，每一夜都睡在里面。安抚孩子，抚摸孩子，用一切必需的方法安抚他，但一定不要放弃，不要把他再抱回你自己的床上，哪怕你认为这是唯一一种能让他入睡的方法也不行。

第四个月和第五个月

到四个月时婴儿已经可以在晚上直接睡够8小时且无需哺喂了，在五个月大时他们可以睡到10或者11小时。在白天婴儿要睡4～5小时，平均分为三次小睡。在这段时间我们的主要目标之一就是帮助孩子们延长睡眠时间，令睡眠有规律，并且提升日间小睡的质量。

婴儿们仍然需要频繁哺喂，每天至少五次，每3～4小时一次。在五个月时，你应该能够发现时间间隔接近四小时了。不过可能在迅速生长发育期间，孩子会需要每两到三小时哺喂一次。吃婴儿食品的孩子哺喂的频率略低，不过每个月每次哺喂应该增加30毫升的分量。在第五个月月末，吃婴儿食品的孩子每次会吃180～240毫升食物，每24小时需要哺喂四到五次。总量不应该超过每天1000毫升。

我接到过许多13～16周大的婴儿的父母的电话。很多母亲在这个时段都重返工作岗位了，她们被乱七八糟的工作和家庭事务搞得焦头烂额，每天只能睡几个小时——而且还常常被打断。同样的，很多父母都期望婴儿能够在三个月之后开始更好的睡眠，但也只有他们才会认为这种事情总是会奇迹一般的发生，因而才会受到更大的打击。

现在才是绝佳的时机，也是理想的时机，来训练一个婴儿睡得更好。不良的睡眠习惯此时尚未根深蒂固，婴儿也正在体会身体的发展变化，包括不断增长的自我抚慰的能力，这种能力非常有利于建立一种更有规律的生活作息习惯。

发展变化

第四个月和第五个月是一个过渡的时期。疝气与烦躁渐渐平息。婴儿们更加清醒也更加活跃。他们正在体验着一种令人兴奋的认知大爆发，开始能意识到更多的景象与声音，开始能够理解因果关系与物质的恒存性，意识到人和物的存在，哪怕他们此时正处于婴儿的视线之外。这也是婴儿为什么很喜欢藏东西的游戏和躲猫猫，这也是睡觉前可以采用的一种全新的游戏方式。

随着这种对于新与旧，这里与那里，熟悉与陌生的事物的不断认知，一种分离焦虑也渐渐产生。当孩子在夜晚醒来，他可能不再需要哺喂，甚至不再需要依靠只有父母在自己身边才能带来的那种安全感。

从神经学方面来看，婴儿的睡眠特征也是在不断发展的。在第四和第五个月时，褪黑素分泌的增加，非快速眼动睡眠的增加，意味着孩子能够比他在新生儿时期睡得更熟。但是非快速眼动睡眠也代表着每三到四个小时孩子就会有一次局部觉醒，这种状态更明显，孩子也会更清醒。根据孩子对这种变化的判断，他此时可能需要来自父母快速的安慰而不是哺喂。

有些婴儿可能会哭泣，但在你到达他房间门口时就已经自己安静下来了，所以你应该在吵醒他之前悄悄离开。另外一些孩子则有更多的困扰与混乱，仍旧需要你的帮助才能平静下来。帮助孩子，但是不要过分。不要过多拍他，抚摸他或者唱儿歌，否则可能会导致他在没有这一切动作的帮助下就无法入睡。你本意是打算安抚孩子，而不是创造一个新的睡眠支撑。

当你的孩子的睡眠变得更有规律时，就可以开始观察他疲倦的迹象了。这意味着你要一边注意时间一边注意孩子。他是很

活跃还是在打哈欠？他是不是在揉眼睛？他是不是开始频频打盹儿？这些都是睡眠的信号。注意，因为这时候让他睡觉非常合适，无论是白天还是晚上，当孩子开始困倦就让他睡觉总比等他过度疲倦之后再睡好得多。辛西娅的妈妈珍妮发现，把关于睡眠的细节记录下来有助于她学会辨别四个月大的女儿的睡眠迹象与规律，有助于发现何时女儿的“睡眠时机”会出现。“当她开始打哈欠，揉眼睛，并且开始茫然的时候，我就知道在她第二次打哈欠时就应该让她上床睡觉了。”

安睡女士小提示

这个年龄段的婴儿对于习惯的改变非常敏感。比如在格外令人兴奋的一天中，你接待了很多访客，或者来到一个新的地方，都会影响孩子的夜间睡眠。这种状况必然会时常发生。一定要格外注意，让孩子在第二天得到充分的睡眠和一段格外安静的时间，这样你就不会陷入到过度疲劳导致睡眠不足，睡眠不足又导致过度疲劳的恶性循环中去了。

睡觉时间

由于四五个月大的孩子更加警醒，因此需要有一套晚上的固定仪式来帮助他们转换精神关联，放松，做好上床睡觉的准备，睡觉时间应该在晚上 8 点到 9 点之间。不过在孩子五六个月时，由于日间小睡的减少导致他在夜间不会中断的睡眠时间更长，你可能会将这个时间提前到晚上 7 点至 8 点之间。记住要在孩子昏昏欲睡的时候把他放到床上——在这个年龄段这种做法会变得越来越重要。一些婴儿会在你把他们放到婴儿床里的时候哭闹；另外一些则只会打盹儿。如果你的孩子哭了，可以先坐在他的婴儿床边，轻拍他，发出“吁吁”的声音，给他需要的安慰，但也要给

出足够的空间让他平静下来并自己睡着。你要做他的教练而不是他的依靠。

如果孩子总是会在最后一次睡前哺喂中睡着，那就要注意了。他是在告诉你，他需要更早睡觉，所以可以把这个时间每次往前挪 15 或者 20 分钟，直到你找到合适的时间为止。这样他就能在吃完奶之后，在昏昏欲睡的状态下躺在自己的小床上了。

即便他的睡觉时间是正确的，孩子可能还是偶尔会含着乳头睡着，也许他是在利用乳头（或者奶瓶）让自己入睡，这会妨碍你的努力，让你不能在他昏昏欲睡的时候把他放下。记住，如果孩子的眼睛开始转来转去，他可能是在吸吮却没有下咽，这时候你就应该在他完全睡着之前把他抱开并放下了。

有时候把乳头从孩子嘴里拿出来可能会吵醒他，孩子则还想要继续吸吮，差不多就像他在对你说："对不起！我不想这么睡着。我还饿着呢！"既然如此，那就再给他一点时间让他吃饱。你可以通过轻轻抚摸孩子的头或者轻搓他的小手、小脚或者脊背让他保持清醒。如果孩子仍旧是保持吸吮的动作却没有咽下乳汁，假装自己还在吃奶，实际上却是想让自己睡着的话，你还是应该抱开他，拍出他的奶嗝儿，用襁褓包起他，然后迅速把他放到婴儿床里。

在大约五个月时，尼娜和米基就非常注意培养莉蒂亚的吃奶和睡眠模式，他们都作出了极大的努力来创造一种平静而始终如一的睡前仪式。他们会把灯调到很暗，关掉电视。在十分钟的沐浴之后，他们会来到莉蒂亚的房间，为她涂上厚厚的一层宝宝霜来避免尿疹。他们会给莉蒂亚穿上"小睡袋"，这能帮她保温，同时又舒服，还能让他们无需担心有诸如被单纠缠在一起之类的危险。他们会一起玩几个平静的小游戏，回避任何带有"强烈的光亮或者声音"的玩具。尼娜则会坐在莉蒂亚身边的椅子上，为她

读三本同样的小人书，莉蒂亚已经把这当成了自己睡觉仪式中的一部分了。如果尼娜看到莉蒂亚的睡眠信号——打哈欠、揉眼睛，或者向妈妈的胸前倾斜——她就会加速睡眠仪式的进程。尼娜也会哺喂莉蒂亚，却很注意及时把她抱开并在昏昏欲睡的状态下放进婴儿床里。

在五个月时，婴儿们开始实验自己的行为会如何影响到周围的世界了。他们希望探察自己的力量和你的底线。你在睡觉时间能清楚发现这一点。对于这些正在成长中的小探索家们来说，他们最喜欢的实验之一就是“如果我哭了，是否能让妈妈到我的婴儿床边来呢?”请作出回应，并告诉孩子你会这么做，你会过来查看他的状况。但只要安抚过了孩子，就不要再留在他床边了。

哺喂

在白天，你应该做的实际上是注意满足婴儿的营养需求，这样他就不需要在晚上吃奶了。孩子应该能够整晚安眠或者在夜间只哺喂一次即可。集中哺喂，是指在傍晚或者清晨更频繁地进行哺喂。这样有助于安抚孩子，提高他夜间睡眠的质量，也能让你在晚上无需再担心他是否吃饱了。

在数年之内，关于何时开始添加固体辅食的说法一变再变，但近期大部分儿科医师都推荐大米和谷物或者类似的食物作为六个月婴儿的辅食。一些婴儿确实很早就开始吃固体食物了——和你的儿科医生讨论一下，但我认为这只是一种饮食带来的效果，而非睡眠的解决方案。(如果你过早尝试了固体食物，却并不那么顺利，还是最好能在你的儿科医生的认可之下推迟一个月左右。只有当婴儿准备好了你才能得到自然而然的转变。)一些父母很早就开始在睡觉前的一餐中添加谷物米饭类的辅食来让婴儿睡得时间更长。但看过很多家庭尝试这种方法却没有显

著的成效之后，我开始怀疑了。我认为固体辅食只能帮助相对比较少的一部分婴儿延长睡眠时间，因为他们在夜间是真正因为饥饿才醒来的。

安睡女士小提示

随着刚刚产生的对周遭环境的敏感与好奇，你五个月大的孩子会在吃奶的时候更容易分神。如果遇到这种情况，可以尝试在一个安静、昏暗的地方哺喂他，好让他能集中精神，最多只是偶尔停下来看着妈妈笑笑。

对于孩子来说，如果他能更熟练地让自己入睡，或者在夜间醒来之后再度睡着，他就更容易放弃夜间的哺喂。

其实只要能保证婴儿在白天稍微多吃一些食物就能更好地解决夜间睡眠的问题。那样的话，在儿科医生的允许下，白天添加一点谷物辅食，将会有助于改变婴儿的哺喂时间。但如果孩子还是不睡觉，那只是因为他还没有发展出良好的睡眠习惯，如果他需要奶瓶或者乳房来应对局部觉醒状态；或者他知道只要自己一开始哭你就会匆忙地把他抱到自己的床上的话，只是给孩子增加一勺谷物辅食其实并不能解决问题。你需要处理的是孩子的不良睡眠习惯。

四个月时，你的孩子就应该能在晚上睡够 8 小时无需哺喂了。在五个月时，他应该能睡到 10 小时，甚至 11 小时。对于孩子来说，如果他能更熟练地让自己入睡，或者在夜间醒来之后再度睡着，他就更容易放弃夜间的哺喂。他甚至无需你的帮助就能自己达到这个目标。

如果现在孩子还需要半夜起来一次，让自己在半梦半醒之间迅速而有效率地吃完一次奶，然后再睡下的话，我会让孩子独处

到他能很好自行入睡为止。他也许很快就大到不再需要夜间哺喂了。如果并非如此，你就应该学会如何在六七个月时缓和地停止夜间哺喂。

但如果孩子在夜间频繁醒来吃奶，那就必须处理这个问题了。在儿科医生的认可下，你应该设法在夜间只哺喂一次，目标是让孩子在不需要乳房或者奶瓶的情况下将睡眠时间延长到8～10小时。

通常来说，反倒是父母们比孩子更坚持过度的午夜哺喂，因为他们不确定孩子到底会不会饥饿。这是一种可以理解的做法，因为你自从孩子出生以来一直都在注意他的饮食，因此很难准确判断孩子是否真的不需要再多吃一些了。

安睡女士小提示

直到孩子成长到不再需要夜间哺喂之前，你都可以在某些夜晚亲自母乳哺喂他，在另外一些晚上则让爸爸用奶瓶哺喂他，好让自己得到更多的机会休息。

记录孩子的进食与睡眠状况能够帮助你更清楚地发现他何时会饥饿，何时会需要用哺喂来进行安抚，以及他可以多长时间不需要吃东西。抵制住每一次哭泣所带来的哺喂的诱惑——要注意孩子的行为。如果他哭了，你冲上前去，他吃了三分钟奶就睡着的话，那他一定不是饿了。他只是在利用乳房作为睡眠支撑，仅仅是因为他需要利用你的乳房而已。

我将会给你两个选择来停止夜间哺喂，类似于我给三个月大孩子的父母的建议那样。确保你的医生同意这种做法，以及确保你的孩子成长充分，身体健康，睡前哺喂一次就足够了。

选择1是梦中哺喂。这意味着你应该在自己睡觉之前稍微

叫醒孩子，只要能进行睡前最后一次哺喂即可，可能时间是在晚上大约 10 点到 11 点，然后整晚都不要再哺喂；反之，如果孩子醒来，可以使用其他安抚方式令他再睡着。一些婴儿不喜欢在这个时间被唤醒哺喂，在困倦的时候也不能充分进食，所以你很快就会知道梦中哺喂的方法是不是适合自己孩子的喜好与生物钟了。如果你进行了梦中哺喂，注意要很快地完成哺喂然后把孩子放回婴儿床。孩子一吃饱就马上抱开他（或者拿走奶瓶），并且要避免任何其他可能会让孩子清醒过来，并想要和你玩耍或者粘着你的做法。大约在五六个月时，如果孩子还没有自行停止夜间哺喂，在确保他健康而且成长充分，你的儿科医生也支持的情况后，你就可以开始帮他停止了。慢慢缩短喂奶的时间，或者减少奶瓶中的奶量。你也可以采取一下子就停止夜间哺喂的方法。如果在这个过渡时期孩子夜间醒来的话，可以使用其他方法安抚他，让他再度入睡。

选择 2 是定时哺喂。设置晚上哺喂孩子的时间，并且只在这个预定好的时间哺喂他。你可以选择在他第一次醒来时哺喂，只要距离他睡觉前最后一次哺喂超过四小时即可。或者你可以选择晚一点的时间——例如午夜之后他第一次醒来（尤其是如果你知道这时候是孩子最饿的时候，或者如果在这之前他对于梦中哺喂的反应很不好时更应如此）。

这些选择都不错——只要你能坚持下去。选择一种方法坚持到底。每晚只哺喂孩子一次，然后直到凌晨 6 点都不再哺喂了。如果你认输了，就会带给孩子一种间歇性增强的认识，这种混乱的信息只会让孩子在较长一段时间内更难成功。如果他在某个哺喂计划外的时间醒来想要吃奶，可以选择用其他方式来安抚他。短暂的在孩子的婴儿床前安抚他，用一些语言或者行动来让他安心。你也可以通过告诉自己这是一个健康的，营养充分的

婴儿来安慰自己。如果你开始对一个四五个月大的孩子进行安睡女士渐进法的训练，那么如果他在夜间醒来，你就得从头开始。

有些家长发现他们只要坚持作息时间，婴儿们就会主动放弃夜间的哺喂，睡得时间更长，而且可能会在白天吃更多奶水。一般这个年龄段的孩子只要几个晚上就不再会在夜间醒来了。

阿里

“作为一名临床医生，我几乎读过所有相关书籍，不过还是筋疲力尽，束手无策，每个晚上只好哺喂阿里三次或者更多——我几乎是专业的奶牛妈妈。”谢丽尔说。当阿里四个月大时，谢丽尔和加里决定完全停止夜间的哺喂。他们的儿科医生也认为阿里十个小时不吃奶也没有问题。

从专业的角度出发，谢丽尔知道很多关于儿童发育与哭泣的细节，但作为一个荷尔蒙失调，情绪化的新母亲（这是她自己的描述），她没法处理孩子的哭泣，因此她的丈夫只好负担起夜晚的工作。加里需要提前确切地弄明白当阿里醒来时他应该怎么说，怎么做——用一种介入教育的脚本的方式。“他需要了解应该说什么话，什么时候说‘吁吁’，要在摇椅上坐多久，轻拍阿里要拍多长时间。然后他才能照着做。”谢丽尔说。因为这对夫妻已经开始又停下，反反复复试过很多种睡眠系统，阿里都没法像其他四个月大的孩子一样迅速作出反应。不过，在加里上阵后，两周之内阿里就可以按照时间表完美进食和日间小睡了，甚至几乎能够整晚安眠。

莉蒂亚

为了让五个月大的莉蒂亚睡觉，尼娜和米基把她抱到了他们的大床上，每一个半到两小时哺喂一次，轻拍她，搂着她，抱着她来回踱步——而且一般只有当莉蒂亚能够听到后院里的水声这种做法才能奏效！“她是一个摇晃上瘾、吃奶上瘾的小家伙。我

必须得在浴室里打开水龙头，紧紧怀抱着她摇来摇去，才能让她入睡。”尼娜说，对她而言，不得不抱着婴儿摇晃同时喂奶令她的每个夜晚都相当难熬。

尼娜知道莉蒂亚非常健康，而且以她的年龄而言身体已经非常强壮，她并不需要如此频繁地哺喂。但知道是知道，该做的时候就变得很困难了。尼娜曾经咨询过自己所在医院的儿科医生，每个人都给出了不一样的建议，而且没有一条管用。

我让尼娜做的第一件事是严密注意莉蒂亚夜间醒来之后的行为。尼娜马上就注意到婴儿在自己一抱起她时就安静下来。莉蒂亚并不是真的需要哺喂；她妈妈的手臂或者肩膀已经足以安抚她了。这种认识令尼娜和米基接下来的行动变得简单了。

尼娜想起莉蒂亚曾经有一次连续睡了6个小时没有哺喂。既然她曾经做到过，那么父母就知道她应该还能做到，而且最后他们还得到了儿科诊所，包括提倡按需哺喂的哺乳顾问在内大家的赞同，6小时是一个合理的目标。他们知道莉蒂亚差不多总会在凌晨2点醒来，这时正好距离她上床睡觉过了6小时。他们决定在凌晨2点哺喂孩子，或者稍晚一点，但晚上仅仅哺喂这么一次。

如果莉蒂亚哭了——头几天晚上她确实总是断断续续地醒来然后哭泣——米基就会走上前安抚她，帮她再度入睡。一旦她在凌晨2点之后醒来——这是她的“预定时间”——尼娜就开始哺喂。但尼娜会把莉蒂亚放回她自己的婴儿床而非带到父母的大床上去。

莫德

凯瑟琳和米奇一直在忍耐他们的第一个孩子肖恩带来的睡眠不足，直到孩子9个月时使用了马克·威斯布鲁斯博士(Dr. Marc Weissbluth)的任其哭泣法为止。这方法很有效，但孩子的

痛哭流涕让每个人都紧张而且痛苦。轮到第二个孩子莫德时，他们希望有一种更温和而且更早见效的方式。凯瑟琳回到了工作岗位，不知道该如何照料四个月大的“根本不睡觉”的小女儿和凌晨5点就起床的两岁半的儿子。

尽管过了头几个月之后凯瑟琳和米奇试图不再与莫德同睡，但莫德在她自己的婴儿床里很少能睡足一小时。她总是想要吃奶，然后妈妈和宝宝就都要从婴儿房中不同的床上起身——或者压根就没睡。凯瑟琳一直到肖恩19个月才给他断奶，并且希望能哺喂莫德同样长的时间。她知道自己应该停止孩子们的夜间哺喂，但害怕这样会让自己的奶水完全消失。医生建议她可以限制哺喂量而无需彻底停止哺喂，并指导她通过哺喂与吸出奶水用奶瓶喂的方式来帮助孩子进行转变。

凯瑟琳和米奇后来选择了定时哺喂的方式。这意味着可以在午夜哺喂莫德一次，然后直到凌晨6点之前都不用再喂了。第二次做妈妈的凯瑟琳终于知道有些眼泪“并不会为孩子的心灵留下创伤。他们也不会记得这件事，不会到30岁后因此埋怨你。”从感情上而言，虽然开始的两个晚上照旧很不好过。但凯瑟琳和米奇都发现这种方法，非常轻松地把莫德原本能持续40分钟的大哭消弭掉(因为她知道父母就在身边)。在第三天晚上，莫德就不哭了——她也没在午夜醒来吃奶；她一口气睡到了天亮！

凯瑟琳和米奇决定接受孩子的暗示，不再在晚上哺喂她了。虽然此后并没有彻底坚持下去。有些时候孩子睡得很好，有些时候却会醒来；有些时候她可以很快再度睡着，有些时候则会闹上一阵子，但是再也不像第一个晚上那么厉害。就像希望的那样，凯瑟琳未来还可以再母乳哺喂莫德很长一段时间，现在她只在上午和晚上哺喂她，白天把奶水抽出来——而晚上安心睡觉。

很多这么大的婴儿虽然差不多，但都不能完全熟睡到上午。

他们会在大约凌晨 5 点时醒来吃奶，然后再回头睡到 8 点左右。如果你发现孩子醒来的时间没有规律，日间小睡的时间也没有规律，不仅如此，他的哺喂时间也开始接近小睡时间，导致他一直都在打盹儿，那么这就表示你应该改变凌晨 5 点的哺喂时间（尤其是如果你在晚上最后一次哺喂时间比较早的话）。改变时间规律非常困难，你可能会度过几天充斥着泪水的日子。但在这个年龄段，这种日子也不会太久。

如果你还凌晨 5 点起床哺喂的话，早起就会成为根深蒂固、难以改变的习惯了，这会导致你在未来几年都会郁闷无比。如果孩子在 5 点没有吃到东西就开始吵闹的话，记住，你不能让他一直哭下去。你可以留在他身边安抚他。一旦时钟指向 6 点，如果孩子仍旧在哭闹，你可以来一个夸张的唤醒仪式（离开房间，数到 10，然后再回来），叫他起来，给他换尿片，哺喂，然后开始新的一天。（如果孩子又睡着了，那就直到他自己醒来之后再哺喂。）

要坚持——在处理早起的问题上，这一点非常重要。有些婴儿在 6 点会彻底醒来；另外一些则会在吃奶之后继续睡觉。如果你的孩子在 6 点起床，让他自己呆一会儿，以便适应没有在 5 点哺喂的生活。然后尽量让他呆在自己的婴儿床里直到 6 点 15 分，然后 6 点半等等，以 15 分钟为间隔。要坚持这么做直到孩子终于明白他应该起得再晚一点才对——或者直到 7 点至 7 点半左右，这才是一个这么大的婴儿开始新的一天的最好时机。

日间小睡

到这个时候，30 分钟的小睡就足够了。在 4～5 个月时，日间小睡只是时间和规律的问题。记得要通过看时钟和你的孩子的行为来判断何时该将他放下睡觉。在他开始困倦的时候你就应该知道，而不是在他真正开始被睡意笼罩之后才知晓。

这时候最好的做法通常是让孩子在他的婴儿床里小睡。如果你还没来得及把孩子从汽车座椅、推车中抱出来，那就马上去做。孩子现在已经足够大了；在移动中睡觉会使他不能按照身体的需要得到更深更有利于恢复精力的睡眠。

如果你打算未来长期都让孩子睡在你们的大床上，那么我还是要劝告你让他在自己的婴儿床里小睡。有一些家庭，不是全部，和孩子同睡的妈妈们发现她们不得不在三四年之内都要一天躺下至少一两次来陪孩子小睡。这非常麻烦，尤其是在你打算继续工作或者要第二个孩子的情况下更甚。另外，让孩子呆在婴儿床里是比较安全的。绝不要让婴儿在没有人监督的情况下自己在大床上小睡。这不安全，尤其是当他们稍微大一点能够活动的时候。

不要通过哺喂让孩子进行任何一次日间小睡。你可以计划在哺喂前后让孩子小睡。比如，一个婴儿会在凌晨 7 点醒来，哺喂，然后在 9 点小睡，但在他 10 点半醒来之前都不要再哺喂他了。

安睡女士小提示

在孩子很清醒的时候哺喂他，而不是准备上床睡觉之前，这样有助于削弱吃奶与睡觉之间的关联，让孩子更明白他不需要妈妈的乳房或者奶瓶就可以睡着。

你将在下册第 6 章“医学问题”中读到关于翠西和德鲁与他们的孩子卢卡斯的食物逆流问题作斗争的故事，你会发现保持做记录极大地帮助了这对夫妻观察孩子正在成型的自然的日间睡眠规律。由于卢卡斯的睡眠训练进展缓慢而且困难重重，做记录还能帮助这对夫妻看到细微的进步，从而更容易坚持下去。翠西曾经

按照卢卡斯的要求随时哺喂，但现在也开始逐渐注意孩子的进食规律了，因为她发现如果孩子不是每时每刻都在吃奶的话就能够多睡一会儿。“我会尽量让孩子在准备小睡之前吃奶，或者说让他在两次哺喂之间的时间段小睡。当我强行令孩子的小睡有规律时也无需担心他会因为饥饿而醒来；因为我知道他什么时候吃的奶。”

翠西发现要保证一天两次高质量的日间小睡并处理卢卡斯晚上睡觉的问题非常困难，于是他们首先集中精力处理晚上和下午小睡的问题。上午的小睡他们则暂时先尽量保持在45分钟左右。随着卢卡斯夜晚的睡眠更好，上午睡觉的时间更晚，睡眠规律终于产生了多米诺骨牌效应，达到了既定目标。现在卢卡斯可以一直睡到7点或者7点半再起床，这意味着他会保持很长一段时间的清醒，更晚开始上午的小睡。然后，因为上午的小睡时间较晚，所以在下午的小睡之前他就不会过分困倦。这有助于卢卡斯下午睡得时间更长，更能帮他改善夜间睡眠的质量，还能支持第二天获得更好的日间小睡，如此良性循环。

理想状况是，四五个月大的婴孩应当每次小睡90分钟或者更长，上午下午各一次。第三次下午的小睡可能会略短。他应该在10分钟之后醒来一次，然后在20～30分钟后，在预计的时间从小睡中局部地清醒过来。在孩子第一次醒来时不要忙着冲上前去把他从婴儿床里抱起来。看看他是否还能再度自行入睡，或者如果他开始大声哭闹，试着帮他再度入睡。如果你在孩子开始进入真正哭闹的阶段之前就出现在他面前，可能会令他反应更激烈。抚摩孩子的脊背，或者发出“吁吁”的声音哄他，或者用其他安抚方式，看看孩子是否能自我抚慰，再度睡着。

你可能不得不需要实验几次才能发现在每天的这个时段什么类型的安抚对孩子最有效。有些婴儿如果你让他独处，他就能

很快睡着，但如果你试图安抚他，他反而会更清醒。还有些婴儿可能会想要你留在他的房间，但不想你碰触他们。你要耐心一些，至少给孩子 20～30 分钟来让他自己安定下来。他就会用另外 45 分钟的睡眠来回报你。

当孩子能够更熟练地安抚自己之后就不要在他局部觉醒的时候干扰他了。不要让他依赖你的拍抚才能入睡。一旦他的生物钟可以适应较长时间的小睡之后，他就能逐步地学会如何自行度过这种局部觉醒的状态，也不再需要你的帮助了。

谢丽尔和加里曾经在阿里四个月大时小睡的过程中播放 CD 唱片。自然，音乐一般 45 分钟之后就会停下来，此时阿里的大脑恰好进入局部觉醒状态。没错，就该这么做。“我打开他房间的监视器，听到音乐声消失，阿里醒过来，而我就可以高兴地快速走进他的房间‘骚扰’他——我就这么把他叫醒了！后来我知道不应该进去，孩子只是清醒一下，然后还会接着睡。他会悄悄地对自己唱歌——啦啦啦啦——然后就又睡着了。”阿里的妈妈说。

小睡训练可能会暂时无效，但要坚持。大部分处于这个时段的家庭都能在一周或者两周之内看到进展，不过即便这个过程略长也不代表你失败了（或者无法完成这个任务）。如果你就此放弃，如果你无法帮助孩子学会在预定的时间内进行充分地长时间的小睡，那么以后你想要训练他将会更加困难。

布列塔尼

莉萨和泰德的第一个孩子睡眠很差，我直到泰迪七个月大时才开始帮助他们。布列塔尼是他们的第二个孩子，相比起来她的睡眠还不错。莉萨首先将之归功于布列塔尼的性格，认为她是一个快活的，幸福的宝宝。实际上，布列塔尼也有不那么乖巧的时候。她也有食物逆流的问题，并且常常因此影响睡眠。她的妈妈

清楚应该如何更好地处理这个问题；因为她从泰迪身上得到了经验。莉萨按照安睡女士关于婴儿睡眠方面的八项睡眠准则，在母女都没有受到任何困扰的状况下温柔地教会了布列塔尼如何睡觉。“带泰迪的时候我并没有认识到睡眠有多重要，也不理解一个婴儿到底需要多少睡眠。我只是自以为当他困了他自己就会睡的！”她回想说。到了带布列塔尼时，莉萨就开始更注意保护女儿的睡眠了。

在起初的十周内，布列塔尼晚上睡在她父母房间里的一个便携婴儿篮里，这样夜间哺喂很方便。有时候她在这里吃奶，有时候也会在起居室的摇篮里吃奶。莉萨一开始并没有注意到我强调的安静、有利于睡眠的日间小睡环境。不过由于身边总有一个三岁半的男孩子调皮捣蛋，她终于发现自己正在做无用功。“如果家里有个小男孩，我们就没法静悄悄地在婴儿身边活动。而且有时候我在洗衣服，电话铃响个不停，还有客人上门拜访。”但是莉萨在布列塔尼需要小睡的时候总是让她及时睡觉，哪怕这样会让一位希望看到小婴儿张开眼睛的客人失望，她也不会让步。

尽管莉萨对周围环境的噪音持一种放任的态度，但她还是从一开始就强制采取了一些温和的手段与办法。在日间小睡时她从不靠哺喂让布列塔尼睡着，或者不像以前那样总抱着让宝宝睡着。“偶尔我会这么做。谁能忍住不去抱一个香甜的睡着的小宝宝呢？”此外，她还坚决执行“昏昏欲睡”的原则，尤其是在日间小睡时。

莉萨几乎是以一种相当随便的方式带着泰迪跑来跑去。但在布列塔尼建立起固定的日间小睡习惯之后，他们才会在布列塔尼清醒的时候带她出门，并尽量避免让孩子在汽车座椅或者婴儿车里睡着。不可避免的是早上他们要送泰迪上幼儿园，而这时候恰好是布列塔尼应该小睡的时间。如果她在车里睡着了，莉萨就

会把她抱到婴儿床里去。她一般会短暂地清醒一下，辨识出自己身处何方后，她就会再度睡着。莉萨一般会让她稍微哭上一阵子，或者安抚她，帮她睡着。

就像大多数婴儿那样，布列塔尼也有哭闹的时候，两个月时尤其糟糕。不仅如此，布列塔尼甚至会在深夜开始哭闹——这时候恰好是莉萨和泰德准备让大儿子泰迪上床睡觉的时候！莉萨一般会哺喂布列塔尼让她安静下来，但却不会让她在吃奶时睡着。有时候在某个特别吵闹的夜晚，莉萨会抱着布列塔尼哄她入睡，但由于她并不总是这样做，偶然为之还是可以的。莉萨很注意没有让自己的怀抱成为布列塔尼的睡眠支撑，因为她总是能恰好在女儿昏昏欲睡的时候把她放下。到第二个月月末，哭闹渐渐消退。八周时，布列塔尼能够在醒来吃奶之前一口气睡六个小时，而且吃完奶之后很容易就能再睡着。

从泰迪身上，莉萨明白了让一个孩子在困倦而不是过度困倦时上床睡觉的重要性，所以她总是注意着布列塔尼睡眠时机的标志。一开始很简单，当新生儿的布列塔尼准备入睡时会很明显地打哈欠。后来，她虽然还是会像我们一样打哈欠，但这却不再是一个代表她准备睡觉的可靠的信号了。相反，莉萨注意到布列塔尼会在困或者饿的时候吸吮自己的大拇指，如果不困也不饿就不会这么做。由于当时莉萨已经在执行非常严格的作息时间表了，所以只要瞄一眼时钟通常就会知道婴儿是饿了还是困了。由于布列塔尼在过了烦躁的时段之后堪称异常乖巧，莉萨也就知道如果孩子表现得烦躁或者开始哭闹，那一定是应该上床睡觉了。

一旦布列塔尼表现得想要上床睡觉了，那她就是真的可以睡觉了。莉萨为泰迪设计了一套非常好的睡前仪式，她打算照搬到布列塔尼身上——洗澡，换尿布，换睡衣，读书，祷告，关灯等，然后是父母坐在黑暗中的婴儿床边唱一首儿歌。但有时候布列塔

尼困到莉萨都来不及换完尿布就睡着了！“当我帮她换尿布时她就开始哭。她甚至不愿意让我坐下来给她念故事书；她就会在我们经过婴儿床的时候冲那个方向倾斜身体。所以我们经常没法完成整套睡前仪式。当她想睡觉时，最好的做法就是马上把她放到婴儿床上！”像这种情况，我一般会觉得宝宝可能需要再早一点准备上床睡觉，她的父母可能几乎马上就错过她的睡眠时机，并将要面对孩子恢复精神后的可怕阶段。但就布列塔尼而言，她的妈妈确切地了解那就是她的睡眠模式。有些孩子一般都会按部就班从头开始，但布列塔尼则是直接跳到最后一步。

当布列塔尼14周大时，她可以从晚上6点45分直接睡到早上5点半，这时候莉萨也睡足了，可以叫醒孩子并哺喂她。然后布列塔尼会继续睡到7点45分。大约又过了一个月，莉萨停止了早上的这次哺喂，布列塔尼就一直睡下去。如果布列塔尼某天早早起来，而且反常的兴奋，莉萨和泰德也会由她去。一般过了很短一段时间之后她就会再次自己睡着。到五个月大时，布列塔尼晚上能睡够12小时，从晚上7点直到次日早上7点。“我常常会思考泰迪‘睡不着’和布列塔尼‘睡得香’之间的区别。但现在有时候觉得，泰迪婴儿时期‘睡不着’的部分原因可能正是他没有得到充分的睡眠！”莉萨说：“我用心采纳了金姆全部的好建议，我知道正是这些建议让布列塔尼与泰迪有所不同。对我而言也是如此。我现在更坚定地认为应该让孩子有一个固定的作息时间——而且我知道孩子确实也需要如此。”

第7章　6~8个月

在这个年龄段，婴儿们需要平均11小时连续的夜间睡眠和分为两到三次共3个半小时的日间睡眠。

从6个月到8个月，婴儿们开始更加活跃。他们滚来滚去，坐起来，甚至还会在抓住什么东西的时候站起来。很多婴儿可以走上几步或者爬来爬去，第一颗牙齿也会长出来。大部分婴儿可以相当安稳地睡上一整夜，但如果你的宝宝不是这样，那让他们走上正轨也相当简单。你也可能发现在六或者七个月时，原本睡得很好的宝宝可能会开始遇到一些麻烦。

这时候的婴儿会体验到人生中的第一次分离焦虑，他可能开始不乐意在晚上被独自留在婴儿床里，或者开始更频繁地醒来寻找你的身影。本章将会帮助你增强夜间安全感，建立一种有益睡眠的作息时间，并且推荐一些适当的有助于放松的晚上活动。随着婴儿渐渐长大，睡觉时间也会更有趣味，你可以开始和他一起分享一些儿歌和小游戏，创造一种属于全家人的特别仪式。但首先你要先改掉一些习惯。如果你的孩子习惯了被轻拍，抱着走动，哺喂或者需要抚摸才能在午夜醒来后再度入睡的话，你就需要帮他丢弃这些睡眠支撑点。如果孩子的头几个月曾经睡在那些特殊的地方，比如秋千或者汽车座椅中，你还需要帮他转移到婴儿床里。

想要作出改变，你就必须忍耐一些泪水，但你大可不必让孩子哭个没完或者把他独自丢下。坐在他的婴儿床边，轻轻抚摸他的头或者拍拍他的脊背，呢喃温柔的语句。孩子的泪水是一种表达疲倦、挫败的语言，或者对这种改变产生了警觉。但如果你肯帮助他，他就能学会配合、适应以及安抚自己，让自己入睡——这段时间绝对不会长到让你担心。

很多婴儿，也许不是大部分，在这个年龄时的睡眠问题涉及睡眠和进食之间的关联。你不能让孩子在吃奶的时候或者含着

奶嘴的时候睡着，因为这会影响睡眠的独立性，对那些过阵子就要长出来的小牙齿也很不好。你还应该开始树立明确的进食时间，而不是让你的宝宝随时都在吃东西，否则这就是一种会导致他总是要在夜间醒来吃东西的刺激源。婴儿们对有规律的日间进餐反应会很好。一位妈妈告诉我，她曾经感觉自己就好像“一个每天 24 小时营业的牛奶店”。但当她开始建立“有规律的喂奶时间”之后，她的宝宝就减少了吃奶的次数，每一次吃得更香，每天睡觉时间也更长。

在本章节中你将会看到很多家庭的案例，他们的问题可能跟你的很类似。每一个家庭都遵照我的建议行事——但他们也有足够的自由，根据自己家的需求和婴儿们正在成形的个性来调整细节之处。有些家庭可能要在夜间忍受孩子的眼泪，还有些家庭则可能最多花上一两分钟就搞定。他们都找到了最合适自己的方法，你也能。

发展变化

分离焦虑

分离焦虑在这个年龄第一次达到顶点，当婴儿们过度疲劳时它还会被放大。在睡觉的时候，孩子可能会为了和你在一起尽量抵抗睡意，还会为了能看到你更频繁地醒来。在本书中我要教你的柔和的方法，包括利用一件孩子的心爱之物当作睡眠支撑，以及帮助你的宝宝学会如何自我抚慰，这都能减轻他的焦虑感。我几乎不会让你把孩子独自留在黑暗中哭泣，就算不得已需要如此，也不会超过几分钟。当孩子在夜间醒来，你无需用枕头蒙住自己的脑袋，默默祈祷哭泣声停下来。你可以马上作出反应。孩

子会明白他所爱的人就在身边看着自己。

心爱之物

一件心爱之物，比如一件孩子专用的毛绒玩具或者毛毯，有时候可称之为过渡对象。这件物品是非常有用的工具，它能减轻孩子的分离焦虑，削弱其他可能会影响睡眠的夜间习惯。如果你的孩子还没有一件特别心爱之物，你要帮他找到一件才行。**一件心爱之物能帮助婴儿应对夜间的孤独，当你不在身边时还能令他感到安全和放心。**

如果孩子还没有表露出喜欢什么的倾向，你可以帮他选择一件心爱之物，尽管他稍大点之后可能会喜欢上另外一款也没关系。通常一只柔软的毛绒玩具或者婴儿毛毯都很不错，但注意孩子正在成形的性格。打比方说，如果孩子喜欢长长的条状物，那么找一条带长穗子的毛毯或者有同样特征的毛绒玩具，像带长触手的圆形毛绒玩具水母之类都可以。如果孩子喜欢揉捏东西，那就给他一条比较厚的小毯子。科林娜和杰里米拿的是一块干净的纯棉尿布给六个月大的伊尔琳，因为她已经习惯了伏在父母肩头的时候把自己埋在里面。

孩子的心爱之物应该很小很柔软，而且要安全，绝对不能是可能导致婴儿呛住或者窒息的东西，也绝对不能是稍后孩子可能借助它爬出婴儿床的东西。最好让儿科医生帮忙确定一下你选择的物品。

安睡女士小提示

为孩子选择一款容易清洗的心爱之物可以让你的生活更简单(如果你不确定应该怎么清洗,可以试着把它放进枕头套里装好然后轻轻漂洗)。有些家长通常会买上一模一样的两件物品,以防某一件可能会丢掉或者忘在祖母家里,不过,要注意,婴儿们比他们表现出来的聪明得多!他们可以通过触摸或者气味分辨出细微的差别,很有可能不肯接受替代品。

当你给孩子喂奶的时候可以把选好的心爱之物放在你和宝宝中间,从而鼓励宝宝对这件物品产生感情。你还可以把它塞进宝宝的臂弯中,也可以在宝宝日间或者晚上睡觉醒来的时候把它放在宝宝身边。你也可以把这件物品"穿"在你的衣服里几个小时,好让它能够染上更多来自妈妈的舒适而熟悉的气味。你可以和宝宝一起玩这件物品,尤其是在晚上睡觉前,但不要只在睡觉前玩。你可以用它一起玩躲猫猫,或者让这件物品亲吻宝宝,对宝宝说再见,等等。

有些孩子在这个年龄段不会对物品产生感情,尤其是当他们有类似哺喂等其他睡眠支撑时更甚。如果孩子不喜欢,你可以在他稍微再大一点之后反复尝试几次。比如安妮塔还是个婴儿的时候就不喜欢她父母给她选择的小毯子,但当她开始学步之后,她就接受了这个叫作"喜羊羊"的小毛毯。泰迪也差不多,他无视任何父母给她的可爱长毛绒玩具,却在 13 个月大时很高兴地将两只婴儿磨牙玩具当作宝贝,在睡觉的时候一手抓着一只不放。

全新的活动能力

在这个年龄段婴儿们增加的活动能力可能会产生一些新的睡觉时间(或者日间小睡时间)问题。有时候他们会自己翻身到一边去——但却没法子自己翻回来。尽量不要去干涉他们。而是要保证他们在白天能够尽量多地进行一些腹部按摩,比如可以在一张有可爱图案的游戏垫上,多多练习这些动作。

同样的,婴儿们通常会先学会抓着婴儿床的栏杆坐起来或者站起来,却不知道如何自己再躺回去。所以你要在白天给他们一些时间练习;孩子们自己会搞定的。也许这个过程不会那么优美,但孩子们自己会处理,而且你越放任他们,他们就会自己学得越快。把孩子单独留在合适的地方,有可能他会坐着睡着,或者扑通一下跌倒。别担心,他不会受伤的,而且一旦他睡着了,就会自动挪成一个舒服的姿势。

如果你必须介入这个过程,那么只能在我称之为"奇迹时刻"的时候出手,下不为例。换句话说,如果你的孩子自己坐起来,你只能在认为他应该安静躺下的时候出手帮一次忙。如果他又很快坐起来,那就不能再让他躺下了。这样你就可以避免那种坐起躺下的对抗了——一般在这种对抗中家长很难获胜。

安睡女士小提示

如果你担心宝宝可能会自己翻身成俯卧姿势,却又没法自己翻回安全的仰卧姿势的话,可以和医生交流一下,是否应该温柔地把孩子"翻过来";或者孩子是否已经能够完全控制他脖颈的动作,从而保证免于在发展自己的翻身能力时遭遇婴儿猝死综合征的威胁。

建立作息时间

作息时间示例

7：00～7：30

起床。在起床前哺喂奶水，并给一些固体辅食。

9：00 或 9：30

上午的小睡，一个半到两个小时。在起床之前哺喂奶水，并给一些固体辅食。

12：30 或 13：00

下午的小睡，一个半到两个小时。在起床之前哺喂奶水，并给一些固体辅食。

15：30～16：00

（以前一次小睡时间为准）可选择的第三次日间小睡，大约 45 分钟到一小时。

17：00～17：30

喂奶和固体辅食。

18：00～18：30

开始洗澡以及睡觉准备，可能包含一次额外的哺喂。

19：00～19：30

睡觉。

当我向那些新父母问起孩子的作息时间时，有些人看起来非常困惑，好像我问的是一个关于量子力学的玄奥问题一样。其实建立一种作息规律的打算并非那么可怕。一个好的作息时间能让一个疲倦而烦躁的婴儿变成一个精力充沛而且心满意足的孩子。我也不赞成建立绝对严格的作息时间，但我确实认为用几周

时间集中于婴儿的睡眠问题是很必要的。这意味着要围绕着夜间睡眠、日间小睡和婴儿的进食等问题展开一系列其他任务、使命或者活动，而不是在你需要做的一切事情当中随随便便地处理孩子睡觉和吃饭的问题。尤其是日间小睡的训练，绝对需要花上好几个礼拜的时间。

不过此后你就能得到更多的灵活性，当大家都能得到充分休息的时候，计划并享受全家出游甚至带上祖母一起散步都会变得更加简单。不过也不要太过放松，如同我们成年人需要有基本的计划，好让自己感觉有把握，并能将事件实施得更好；同样，婴儿们也需要对未来有一定的预期。如果你的孩子在某天上午 8 点半进行日间小睡，第二天却在 11 点半开始，那么他就不会达到最佳状态；或者如果他会在某天晚上 7 点睡觉，次日却 11 点半才睡的话，可能状态也不会太好。窍门在于让孩子采用适当的作息时间；尽量坚持规律性，但也要知道如何判断孩子的睡眠信号，并据此在适当的时候调整作息时间。有些时候孩子可能睡得多些，有时候则少些，就像你一样（而你甚至已经没有快速生长的时期了）。

科林娜和杰里米一直到伊尔琳 6 个月大时，还在用一种混乱无序的作息时间照顾她。她一天要小睡几次，每次 30～40 分钟，而不是每天两次质量很好的睡眠。她妈妈说，伊尔琳“差不多每次小睡起来没多久，就困得再次睡着”。在晚上，他们必须得抱着伊尔琳走来走去才能让她睡着，伊尔琳的爸爸甚至由于抱着女儿走太久而患上了“网球肘”。

在我的帮助下，我们开始确立有规律的日间小睡和有规律的进食时间，以及有规律的晚上上床睡觉时间。一开始，科林娜几乎要整日呆在家里，按照作息时间表安排自己的生活，不过当一切进入正轨之后，她的生活就灵活了很多。伊尔琳开始吃得更香，睡得更好；而杰里米由于通勤和工作时间都很长，于是调整了

自己的日常生活，如果没能及时回家和伊尔琳一起度过睡前时间，他们就把父女交流的时间改在早晨。

泰迪是另外一个非常少见的生活习惯扭曲的婴儿。可能一部分受分离焦虑影响，他在7～8个月时，起床时间非常早，小睡时间很短，吃奶次数更频繁，而且哪怕他长大一点儿之后，吃奶次数也没有减少。他脾气暴躁，而且只要一进到汽车里就马上睡着。泰德和莉萨后来发现，所有这些典型的特征都是孩子过度疲劳的表现。

莉萨开始更加坚定地执行固定生活作息时间，并且增长了哺喂之间的时间间隔。她还把儿子的日间小睡时间改成了半小时或者45分钟。她开始在上午9点而不是9点45分把儿子放下进行上午的小睡，并在下午1点而非1点45分让儿子开始下午的小睡。“这短短45分钟让整个世界大不同，”莉萨说，“我让孩子保持清醒的时间太久了。我忽略了孩子的睡眠时机，等我开始把他放下，要他睡觉的时候，他却因为过度疲劳反而睡不着了。”

泰迪开始吃得更好，睡得更好，看上去心情也更愉快了。由于日间小睡得到了改善，所以在晚上也睡得更香了，他的父母教会了他一觉睡到早上6点半或者7点，他不用在每天日出时分还要起来吃一次奶然后才睡了。

安睡女士小提示

当旅行、疾病或者特殊事件迫使你脱离正轨时，一定要尽可能及时地恢复到正常的作息时间上来。得到充分休息的孩子比过度困倦的孩子更容易适应作息时间的变化，因为后者的生活总是一片混乱。

实际上，没有什么“万能”作息时间表可以适用于全部婴儿，但我给你的示例是一个很不错的框架。做一些变化是不可避免的；一个从上午 9 点开始小睡 90 分钟的婴儿肯定跟从 9 点半开始小睡两小时的婴儿的作息时间完全不同。但开始于上午 7 点或 7 点半，结束于下午 7 点或 7 点半则没有太多的不同。如果孩子在幼儿园或者一天中会有一段时间由保姆照看的话，就要保证你的家庭作息时间尽量与幼儿园的哺喂和小睡时间一致，一直到这种生活习惯完全被孩子接受了为止。坚持一致才是关键。

以下是理想的作息时间。让我们来看更多的细节。

起床。当你准备开始婴儿的一天时，要先打开灯，拉开窗帘，并且说“早上好”。在安睡女士辞典中，我称之为“戏剧性的起床”。你应该让孩子学会区分白天小睡醒来和夜间醒来，以及白天哺喂和夜间哺喂的区别。

母乳或者奶粉哺喂。当孩子醒来并且玩耍一小会儿之后哺喂。然后给你自己准备早饭，同时给孩子吃一些固体辅食。（到 6 个月大时，婴儿们就可以开始吃固体辅食了。）这也是孩子开始接触早餐的时机。

上午小睡。大约在孩子起床之后的一个半小时到两小时之后，就应该让他小睡一次了。一般，上午的小睡应该始于 9 点或 9 点半，对于起得早的孩子可以稍微早一些。记住，这个时间是孩子应该睡着的时间而不是准备睡的时间。这次小睡应该持续一个半到两个小时。常见的错误是在 10 点或者 10 点半开始小睡。这个时间有点晚了——孩子哭闹烦躁都是他表达自己想要睡觉的一种方式。

注意让孩子的睡眠信号告诉你他何时想要睡觉了。他可能会揉眼睛，打哈欠，活动减少，或者开始烦躁。有些婴儿甚至会做出一些特殊的“现在我要睡觉”的嘈杂声，细心的父母应该学会了

解这些迹象。如果你尚未发现任何疲倦的迹象，可以尝试把婴儿转移到一间安静的房间里。如果他正好在餐厅、游戏室或者其他类似充满活动与刺激的房间，也许他会很好地掩饰自己的睡眠信号。不要在你把孩子放下睡觉前哺喂他。

海蒂回想起自己八个月大的儿子凯文在困倦的时候的样子可谓精神涣散，浑身无力。她开玩笑称之为“软面条小娃娃”。“如果你抱着他，会觉得他像一团果冻，”海蒂笑道，“那绝对是困倦了的标志。”

科林娜和杰里米的女儿伊尔琳会揉搓自己的眼睛和耳朵，发出奇怪的小声音，让她妈妈明白她是在说“让我现在就上床吧，不然你会后悔的”。

清醒的时间与午餐。在上午的小睡结束之后，下午第一次小睡开始之前，要有两到三小时让孩子保持清醒。这是一个绝佳的游戏、散步或者做点其他什么事情，以及吃午餐的时间。

如果你的日常生活需要驾车外出，那么试着在孩子刚刚醒来的时候外出而不是准备睡觉之前。孩子越清醒，在车上睡着并影响到次日作息时间的可能性就越小，就越不会养成在车里而不是在婴儿床里小睡的习惯(在车里小睡可不如在婴儿床里更能让孩子得到充分休息)。有些婴儿可能需要一个奶瓶，并在上午小睡醒来之后很快就要吃午餐；有些则可以再等等。这都由你做主，但不要一直等到准备开始下午的小睡时再给孩子哺喂。你应该明确表示出哺喂与睡觉之间的区别来。

下午小睡。上午小睡醒来之后，最好不要超过三小时就可以开始让孩子准备下午的第一次小睡了。一般应该是从中午 12 点半到下午 1 点半之间开始。你可以一边看时钟一边注意孩子；他会暗示你什么时候感到困了。记得给孩子留一点放松的时间做好入睡的准备。亲吻他几下，也可以轻轻拍几下，然后把他放进

婴儿床里。这次小睡理想的时间是大约一个半到两个小时。

加餐。孩子醒来后可以加一次餐——母乳或者一瓶奶都可以。

可选择的下午小睡。有些婴儿会在下午稍晚的时候短暂地睡第三次，大约 45 分钟到一小时。如果你的孩子白天小睡得很不好，两次主要的日间小睡都只有一小时甚至更少，那么第三次短暂的睡眠就必须进行了，否则他会开始心情忧郁。

如果孩子没有这次小睡，你也无需担心；大部分婴儿九个月时就不会再进行第三次小睡了。尽管我总是建议避免在移动中睡觉，但如果他的这次小睡是在回家的路上，在汽车座椅中睡着的话也没什么问题。如果孩子下午睡得比较晚，比如 5 点或者 5 点半才醒，就要取消这次小睡，不然晚上他很难睡着了。如果孩子一直睡到下午 6 点才醒，你要想让他在晚上 7 点上床睡觉就会非常困难。在晚上睡觉和最后一次小睡之间至少要有两个小时，孩子才能睡着。

晚餐。晚餐也就是第二次哺喂。这和第三次添加固体辅食（如果你的儿科医生这么建议的话）应该在晚上 5 点左右开始。当然，根据孩子下午小睡的时间，晚餐时间可以有少许变动，但不要太晚。除非你因为工作或者照料孩子的原因别无选择，否则不要拖延孩子晚餐的时间一直到父母都回到家为止。所有的那些关于全家人应该更多地在一起进餐这种美好的建议绝对不适合婴儿！实际上，有些夫妻甚至发现早早喂饱了婴儿并让他上床睡觉之后，他们才能有时间坐下来共进晚餐，并且进行真正的私人会话。

上床睡觉时间。上床睡觉时间应在 7 点或者 7 点半。我定义的这个睡觉时间是从孩子开始躺进婴儿床算起，而不是从你准备给他洗澡，穿上睡衣，或者讲个故事开始算起。不要匆忙地进行这一切。你需要时间让孩子做好睡觉的准备，孩子也需要时间

让自己做好准备。在这个年龄段，你一般应该拿出 20～30 分钟来，再加上洗澡和穿睡衣所需的时间才行。

享受睡前的活动还包括温柔的按摩或者宝宝瑜伽，十分钟左右的舒缓音乐，或者看一本简短的图画书等。躲猫猫和其他平和舒缓的小游戏也不错。孩子会很喜欢有趣的小小亲吻，比如你可以亲吻他小小的手指，然后摸摸他的鼻子，等等。记得在任何睡前游戏中都要带着孩子的心爱之物。还可以让这件心爱之物来亲吻孩子的鼻子，或者和孩子玩躲猫猫。

如果你的孩子习惯睡前听音乐，那你就把乐声放缓；用音乐来缓和心情，暗示大脑该睡觉了，但是在孩子躺进婴儿床之前就关掉音乐，或者在一个特定时间之后关掉。你一定不想让孩子过分依赖摇篮曲，以至于没有摇篮曲就睡不着，或者没法在醒来之后再度入睡吧。

如果你一直在孩子睡着后才关掉音乐，那么最好能慢慢降低声音再关掉。把孩子放进婴儿床里，让音乐非常非常缓和地播放。尽量在孩子睡熟前关掉音乐。如果 CD 播放完毕，也不要再重播了。那些带音乐和闪光的玩具的方法处理也一样：如果孩子习惯了，可以带着它们一起准备睡觉，但要在孩子睡熟之前把它们拿走。

安睡女士小提示

有些妈妈发现，如果不在孩子的房间哺喂，睡眠与哺喂之间的区别就很容易建立起来。或者，如果你实在想要呆在孩子的房间里，可以在哺喂的时候把灯光调暗，然后在你想要示意他该睡觉的时候就把灯光关掉。有些家庭也会通过让妈妈先哺喂，然后由爸爸接手，亲吻孩子并把他放进婴儿床里的方式在孩子的脑海中明确哺喂与睡眠的区别。

睡前哺喂。等孩子不再需要睡前哺喂就能自行入睡之后，就可以在睡前哺喂他了，这样你就无需在孩子夜半醒来时哺喂。如果他还需要哺喂才能睡着，在这个年龄这也是比较常见的，可以试着把睡前程序中的最后一次哺喂提前一些，也就是说，在唱儿歌或者讲故事之前哺喂。（不然马上就会在半夜需要哺喂。）尽量不要让孩子在吮吸中睡着；在昏昏欲睡的时候就把他放下。

你的目标是在孩子昏昏欲睡时把他放下（见第 2 章“入门指南与成功的小技巧”）。如果你的宝宝不乐意，那么就先要集中全力在晚上睡觉前把这个问题解决。这一点在下午 2 点时并不重要，但对作为父母的我们而言，比起因为担心孩子可能会半夜醒来哭闹而坚持不睡，如果大家都能好好地睡觉会更轻松一些。一旦你能正确处理睡觉前的这段时间，那么其他时间也就更容易处理了。

安睡女士渐进法

我的安睡女士渐进法是一种柔和的行为修正法，当孩子学习如何在自己的婴儿床里睡觉时，你可以作为一种安慰性的存在陪伴他。

一开始，你应该在孩子身边，在两周左右的时间后渐渐远离，直到能够回到自己房间为止。通常，夜间醒来这种状态会慢慢减少，因为孩子可以将一种更有组织性和规律性的日间生活习惯与这种新学到的入睡能力结合起来。如果孩子在进行渐进法训练的过程中于夜间醒来，假设当晚他正处于训练的开始阶段，你可以回到他入睡前你所在的地方安抚他。你应该快速来到婴儿床前，安抚和拥抱他，然后再迅速回到当晚应处于的位置上去。当我们结束渐进法的整个过程时，在我的“问题与解决方法”这一节中，我们将会谈到导致这个年龄段的婴儿夜间醒来的一些特殊原因和如何安抚他们的方法。

你应该按照渐进法中的时间表变换位置，哪怕你的孩子可能会有一两个晚上过得不好，哭闹或者频繁地醒来。在每一个新阶段的第一晚，如果出现了一些倒退或者抵抗不要惊讶。如果你的孩子在渐进法训练期间生病了，你应该暂停训练并且“卡”在当时的位置上，或者保持这种状态，直到孩子身体好起来为止。你甚至可以在孩子患病期间稍微靠他近一些，给他更多的安全感。但在孩子痊愈之后你就必须重新开始睡眠训练了。

第 1～3 夜。当你们完成洗澡、讲故事、哺喂、唱儿歌，你的宝宝已经昏昏欲睡地躺在他的婴儿床里之后，你就可以坐在他婴儿床边上的一张椅子上。如果孩子烦躁地哭泣，你可以马上轻摇或者轻拍他，但不要太频繁地这么做，不然你就可能创造出一个新的睡眠支撑。（在第一个晚上你可以稍微多一些触摸的动作，然后逐渐减少。）由父母来控制触摸的主动性也很重要。你应该轻轻地拍孩子的身体，而不是让他的手抓着你的手或者手指。确保你对孩子地拥抱不会太紧；应该断断续续地拥抱他。你也不能用一种负关联来替代另外一种负关联，比如用轻拍来代替持续性地抚摸或者你的声音等。不要太过依赖触摸，因为到了第 4 晚，你就会距离孩子很远摸不到他了。（这种不拥抱或者不把婴儿抱起的原则不适用于生病的、受惊的孩子，不过要确保你没有在孩子感觉还不错的情况下就按照他的期望去拥抱他。）

尽量不要抱起孩子，但如果他特别烦躁，也可以上前抱起他，最好只在婴儿床上方抱起。抱着孩子直到他平静下来，但控制时间不要太长。在孩子还醒着的时候就把他放下。你可以唱唱在准备睡觉的阶段唱的儿歌，但只要孩子准备睡觉，你就最好不要再发出“吁吁”的声音或者其他安抚性的声音了。你也可以试着闭上眼睛。这么做可以更轻松地停止对孩子讲话，并能传达出一种困倦的，属于睡觉时间的信息。不要刺激孩子——不要打扰

他，就呆在那里直到孩子睡着。

第 4～6 夜。把椅子移到大门与婴儿床之间。（如果孩子的房间比较小，或者婴儿床离门比较近，那可以直接移到门口，就像第 7 夜时一样。）继续发出安抚性的声音，但要尽量呆在椅子上不动。如果必要的话，还可以轻拍或者轻摇孩子，或者继续使用你前面三夜用过的安抚性声音。同样，还是尽量不要抱起孩子，除非他表现得歇斯底里，而且一旦你抱起他，就要按照我在前三夜说过的方法行事。坐在椅子上直到孩子睡着。如果你放任自己移到婴儿床边上，轻拍孩子直到他睡着，你最终要移走椅子的目的就完全失败了。你就会创造出一个新的睡眠支撑。

第 7～9 夜。把椅子移到门边。你应该尽量把灯光调暗，但还是要让孩子能看到你。继续坐在椅子上使用同样的安抚方法，记得尽可能不要干扰孩子的睡眠。如果孩子稍微哭闹也不要担心；继续平静地安抚他。孩子就会知道你在那里，可以安心地睡着了。

第 10～12 夜。把椅子移到门外，但要开着门好让孩子仍然能看到你。你仍旧可以发出“吁吁”的声音，但不要频繁到让孩子发现爸爸妈妈就在很近的地方，从而回应你们。呆在那里直到孩子睡着。

在前三个夜晚的一些特殊提醒

1. 不要在试图让宝宝躺下的时候和他进行拉锯战——你绝对不可能赢！如果他在婴儿床里坐起来或者站起来，就拍拍床垫，鼓励他自己躺下。保持冷静并且说一些诸如“吁吁”、“天黑黑”或者“宝宝乖，睡觉觉”之类的话来哄他。

2. 你可以间歇地隔着婴儿床的栏杆轻抚、轻拍、摩擦宝宝的身体，或者发出“吁吁”声、唱儿歌给宝宝听。但别不停这样做，直到宝宝睡着，不然这就会变成孩子新的睡眠支撑。

只要孩子开始入睡就马上停下。(有些宝宝不喜欢在睡觉的时候被触碰;按照你的直觉和宝宝的暗示行事吧。)

3. 对宝宝的触碰由父母控制。不要让孩子抓着你的手指或者手睡着,例如,也许他会在你动的时候醒来,那么一切就要从头开始。轻拍或者轻抚宝宝身上不同的部位,或者他的手掌。

4. 如果孩子变得歇斯底里(大部分孩子不会),把他抱起来安抚。呆在他的房间里;不要在屋子里来回踱步,不要让孩子在你的臂弯中入睡。当他安静下来时,亲吻他,把他放回婴儿床,然后坐在他身边的椅子上。发出令孩子安心的声音,轻拍或者轻抚他的身体。如果你抱起孩子,他马上就安静下来,那你就"中招"了。事实不是你训练孩子睡觉,而是孩子训练你学会抱起他来!下一次你可以先等一会儿。相信你自己的直觉和对孩子的了解。在一两个晚上你就能知道,抱起孩子来究竟是会帮助他还是会更刺激他了。

5. 在渐进法开始的前三天中,晚上睡觉时你要呆在孩子的婴儿床边直到他听起来像是睡着了为止,整个晚上他每一次醒来时你也要呆在他床边。如果你在孩子刚好合上眼的那一刻冲进他的房间,就会把他吵醒甚至惊吓到他,那你又前功尽弃了。

6. 回到渐进法中你应该待的位置,在前三个晚上孩子每一次醒来的时候都要遵循这些规则(直到你和你的儿科医生决定停止夜间哺喂为止):走到婴儿床前,亲吻孩子,如果有必要得鼓励他躺下,坐在旁边的椅子上。每一次夜间醒来也要这么做,直到早上 6 点为止。

孩子们很容易就会变得程序化。每三天作出一些变化——或者至少三天。对于你的孩子来说，拖延会令计划更难进行，而不是更简单。如果你在某处停留超过三天，孩子就会期待你在那里待上更长的时间——所以当你试图加长这个距离时，他就会变得烦躁或者恼怒。

第 13 夜及以后。从此时开始，大部分婴儿都开始自己入睡，并能一直睡到天亮了。但很多父母还有最后一步要走：给孩子一个机会，在没有父母的情况下也能入睡。父母们都离开房间，留下孩子一个人入睡也许看上去对你而言是一大步，但对孩子而言却只是一小步。你所坐椅子的不断移动给了孩子将近两个礼拜的准备时间。于是孩子能够丢弃一些负关联，并且开始知道你就在附近。

大部分家长都会留在走廊或者附近的房间里，孩子虽然看不到，却能听到他们的存在。你可以发出一些让孩子安心的“吁吁”声，但不用太频繁，只要能让他知道妈妈或者爸爸就在附近，并且会响应自己就可以。如果孩子哭了，试着在他房间的门口检查他的状况，表示你就在不远处，而且你知道他能够自己入睡。

我发现最后的这一步，让孩子独自入睡，对于父母的难度要比对孩子的大。不要向你的宝宝传递那种对于可能出现的哭闹的焦虑感。给他信心，让他知道渐进法会帮他成功地实现目标。你的孩子真的可以自我抚慰并且自行入睡，如果你给他这个机会的话。偶尔有些婴儿可能会哭上几个晚上，但不要过早地冲上前去安抚他。让他自己平静下来，自己打盹儿。如果你在门口检查他的状况，尽量让自己悄无声息，也不要过于频繁地去检查孩子的状况。你希望的是让孩子平静下来，而不是在每一次靠近的时候过度刺激他，让他更加清醒。很快你就能得心应手了。

问题与解决方法

有些婴儿存在负关联或者睡眠支撑，他们需要用这种方式让自己睡觉，或者在醒来之后再度睡着。他们可能需要哺喂、拥抱、轻摇等方法。在渐进法过程中，你应该尽量在睡觉时或者孩子夜间醒来时消除这些负关联。我给出的方法强调了前三个晚上，也就是当你坐在孩子的婴儿床边安慰他的时间段。从第 4 夜开始，如果你的孩子还没有丢弃他的睡眠支撑，你就要走到他的婴儿床边，尽量迅速地安抚他，然后回到你当晚渐进法一开始所处的位置上去。如果孩子在你走开后时不时会醒过来，我通常会建议你每次迅速地走到他婴儿床边短暂地探察他一次，确保孩子没问题，然后回到走廊上或者你的房间，总是让你感到更舒服的地方就可以。不要忘记给孩子他的心爱之物。

定时检查

有时候我们需要修正渐进法，这是因为一个孩子可能会由于父母频繁的出现在他的婴儿床边而受到过度刺激。他想要吸引你，占有你的注意力，无论你如何安抚，发出“吁吁”的声音哄他，他都会一直试图吸引你的注意力。在这种情况下，你就应该试试“定时检查”法，有些人也认为这是“费伯睡眠法”的一种变体。在睡觉的时候，实行你的晚间惯例程序，在把孩子放到床上之前让他安静下来。然后亲吻他，告诉他你会在离开房间后再来检查他的情况。

关于你应该多长时间检查一次孩子并没有明文规定，你可以多做一些尝试。如果你过于频繁地来检查他的情况，也许孩子会把这当成一种游戏，结果得到过度刺激。如果你很

久才来检查他一次，孩子则可能会生气和不安。

起先你可以每七分钟检查一次，然后渐渐地增长时间间隔，但要相信你自己的直觉，并作出必要的调整。当你检查孩子的状况时，可以直接走到他的婴儿床边，迅速地拍拍他，令他安心。但不要磨蹭：如果你站在他身边，用半小时拍他，让他入睡，你就会让自己前功尽弃。

假如，尽管你按照本章节中的建议做了，可孩子依旧会在夜里醒来，那么可以检查一下孩子睡前仪式的环节。你是不是在他特别困的时候才把他放到床上？如果是的话，在你已经为孩子做了那么多的睡前准备之后，他确实学会了在晚上睡觉时自行入睡；但却依旧在没有你帮助的情况下无法在夜间醒来后自己睡着，那么你可以在晚上睡觉时，孩子略有困倦，但还算清醒的时候把他放在婴儿床上，让他有机会完善那些自我安抚的技巧。你还需要试着将上床睡觉的时间向前挪十五分钟或者半个小时，这样能在睡觉和最后一次哺喂之前创造更多的距离感。试着在你哺喂孩子的时候留下一盏柔和的小灯，这能够帮助他打破睡眠与哺喂之间的关联感。

取消夜间哺喂

我最艰巨的任务之一就是说服那些母亲们，告诉她们大多数健康的，处于一种自然生长曲线上的6～8个月大婴儿都不需要在夜间吃奶。但哪怕是一位聪明而体贴的母亲，就算在脑海中明白这一点，也依旧会在心底担心她的孩子可能会挨饿。“我的宝宝达到标准体重的98%，不过我还是怕她饿着。”一个曾经和我共事过的妈妈这样说。

无可辩驳的事实就是，你的孩子依旧会在夜间起来寻找乳房或者奶瓶的主要原因正来自于你的默许！如果你的宝宝正在发展这种习惯，也不要对自己过分苛刻，你有许多同伴。让你和你的孩子能够在夜间醒来后再度迅速入睡是需要时间的，但现在你可以尝试选择一些可以替代的方法。

和我共事过的一些家庭也想出几种方法来取消夜间的哺喂。选择你感觉合适的方法，哪怕你开始选择一些柔和的手段，也请从头到尾地阅读一下本章节，因为你可能会发现一些有助于安抚孩子或者调整喂奶时间的小技巧。同样，你还是要跟儿科医生核对一下，确保你的孩子不存在医学或者成长中的一些问题，从而需要更频繁地哺喂。比如，一些婴儿仍然存在食物逆流的状况，可能还需要更频繁地少量加餐，但哪怕是面对这样的婴儿，你依旧可以尝试在白天尽可能多地哺喂，不然你就可能会长期忍耐食物逆流导致的副作用——睡眠中断，直到孩子肠胃的问题好转为止。

无论你采用什么方法，只要能调整孩子感到饥饿的生物钟，令他能在白天摄入更多卡路里热量，他就不会在晚上想要吃更多东西了，那么你的行动就会变得更简单。我知道一些婴儿，哪怕在很小的时候，在白天都能相当顽强地抗拒进食，以至于他们整晚几乎一直在吃东西。以下几个步骤的做法可能会对你有所帮助：

- 检查一下你白天哺喂的时间表，并且记录下孩子的食谱。和儿科医生讨论一下，看他吃的奶水与固体食物是否搭配得当。
- 尽量在一个安静、昏暗，没有电视、电话或者其他干扰的地方用母乳或者奶粉哺喂孩子。这会让孩子感觉更像是夜晚的哺喂。这个方法也同样适用于处于快速生长时期的

孩子。也许在这个时间段里的孩子有时候还是需要夜间哺喂，但通过尽量增加日间哺喂，你就可以减少夜间哺喂的次数了。

- 第一天晚上尽量减少夜间哺喂的时间。如果你一般哺喂他 20 分钟，那么现在减少到 15 分钟。接下来的几天每天缩短一点时间，直到孩子做好彻底取消夜间哺喂的准备为止。保证你在孩子刚刚真正吃饱的时候就把他抱开；不要让他只是轻轻地含着乳头打瞌睡。在孩子开始昏昏欲睡的时候及时把他放回床上。
- 用奶粉哺喂的孩子也一样。让他吃奶，但不要让他含着奶嘴玩耍。而且你也应该把夜间喂奶用的奶瓶换成小一号的，放更少奶，或者渐渐冲得淡一些，当奶水开始淡如白水时，也许孩子就会认为不值得在夜间醒来吃了。但当你把哺喂的时间缩短到只剩下 5 分钟，或者奶瓶里的奶水只有三盎司的时候就该停下来了。再少就是逗孩子玩儿了。

假如你想取消夜间哺喂，但无论是你还是儿科医生都认为你的孩子仍然需要在夜间吃一次奶的话，你有两个选择：

选择 1 是梦中哺喂。在你自己上床睡觉前，叫醒孩子进行最后一次哺喂，大约在晚上 11 点左右。然后整晚都不要再喂了。如果孩子半夜醒来，可以使用其他安抚方法。有些婴儿不喜欢在这个时间被唤醒哺喂，而且在很困的时候也吃不好，那么你很快就能知道梦中哺喂的方式是否适合你孩子的性格与生物钟了。如果你决定使用梦中哺喂的方式，那么应该迅速哺喂他，然后把他放回床上。只要孩子一吃完，就拔出乳头（或者拿走奶瓶），避免产生任何可能会导致孩子醒来玩耍或者粘着你的互动作用。

选择 2 是定时哺喂。在夜间定好一个固定哺喂的时间，并且只在这个时间哺喂孩子。你可以选择在他第一次醒来时哺喂，只

要距离睡觉前最后一次哺喂超过四小时就可以。或者你可以选择稍晚的时间哺喂——例如，孩子在过了午夜之后第一次醒来时。（尤其是当你知道这时候是他最饿的时间，或者他对于较早的梦中哺喂反应不够好的时候。）

只要你坚持，这两个方法都不错。选择一种方法坚持做下去。每个晚上只哺喂孩子一次，然后直到次日凌晨 6 点都不再哺喂。如果你让步，就等于给了孩子间歇增强的印象，这些混乱的信息只会让他在长时间内更难完成你的要求。迅速来到孩子的婴儿床前，让他安心，然后回到你应该待的位置上去，用言语和一些肢体动作来安抚他。不断提醒自己，他是一个健康的、营养充分的宝宝，这也会让你安心一些。

有些家长发现，他们如果能坚持按照作息表生活，孩子们就会开始自动跳过这次夜间哺喂，并且睡得更久，也许在白天还会吃得更多。

现在让我们来谈谈，让你和儿科医生都认为孩子准备好一口气睡 11 小时的时候，该如何取消全部的夜间哺喂。以下有三种方法可以在你开始安睡女士渐进法的同时逐步停止夜间哺喂：

选择 1 是梦中哺喂。在你上床睡觉前，按照前面我们说的方法去做。这么做三个晚上就可以停下来了。

选择 2 是按照前面我给出的“设定时间”哺喂的方法做。也只需要做三个晚上就可以。

以上两种方法都给了孩子三天时间从生理上判断在夜间应该摄取多少卡路里的热量。如果他在设定的时间之外醒来（是他自愿醒来），你只要坐在他的婴儿床边安抚他即可。在凌晨 6 点你也开始新的一天之前，不要再哺喂他。别忘了做“戏剧性的唤醒仪式”。

安睡女士小提示

如果孩子在预定的哺喂时间之外醒来并且一直哭闹到预定时间的话，不要马上哺喂他。你肯定不想训练孩子学会哭闹！在你哺喂他之前要先哄他睡上一小会儿。例如，如果孩子在夜里 11 点醒来，一直哭闹到午夜，不要因为时钟指向 12 点就马上抱起他哺喂。这只会教孩子明白哭闹一个小时你就会让步的道理，这也不是抚平眼泪的最好方法。你应该让他入睡，哪怕只有 30 分钟也好，也要等到他再次醒来。也就是说，如果孩子在 11 点醒来，哭闹到 12 点，然后在 12 点 10 分再度睡着，12 点 45 分你就可以叫醒他哺喂了。孩子就会学会在没有食物的情况下睡着。当孩子哭闹的时候，尽量不要抱起他，但如果他开始变得歇斯底里，则可以上前抱着他简单地安抚一下。有些婴儿会在三四天之内调整好自己。有些则需要更长时间，但如果你能坚持下来，孩子的哭闹就会迅速减少，也不再会频繁醒来。

一般，执行渐进法的父母们会在第四晚把椅子从婴儿床边移到稍远的位置，但我们应该在断奶的这一晚略作调整。因此在第四个晚上，你可以呆在婴儿床边。每次他醒来，坐在婴儿床边安抚他，你可以发出温柔而平静的声音，同时轻拍或者抚摸他，但整夜都不要哺喂孩子。有时候如果让父亲在晚上安抚孩子，可能效果会更好，因为婴儿们知道爸爸没法喂奶，就算他想让步也不可能哺喂孩子。

选择 3 尽管并不常见，但相对更加平缓。按照平常那样哺喂孩子——但每次少喂一点。如果你一般母乳哺喂 15 分钟，那就每晚缩减几分钟。如果你用奶瓶喂奶，可以往奶瓶里少放一盎司

左右奶水。每个晚上都缩短一点时间，并且要保证时间一到就马上把孩子抱开。有些家长发现这个方法更温柔，更简单；也有一些家长认为，在午夜非常困倦的时候要看着钟表哺喂，要记着哺喂的时间，好及时把孩子抱开，而且还要30毫升30毫升地测量奶水太过麻烦。不过你总能知道哪种方法更适合自己。

不要拖延。设置一个逐步断奶的预定日期，一般应该在一周之内完成。如果进展迅速当然很好，但不要拖延。

坚持。选择一种方法就要坚持下去！

在7个月大时，安尼塔仍然要在晚上醒来好几次吃奶，在她的婴儿床、汽车座椅和父母的大床之间来回折腾。在她七个月的人生中从未睡过一整夜。佩尼和杰姆试着把每夜哺喂的次数限制在一次——他们把时间定在凌晨4点，但却丝毫没有帮助。安尼塔不知道为什么她只能在凌晨4点吃奶，而不是午夜或者凌晨2点。“现在想想，我才发现这种做法让孩子感到困惑了。”佩尼说。这就是最典型的间歇性增强——用相当频繁的哺喂鼓励了安尼塔，刺激她保持清醒，寻求奶水。佩尼和杰姆意识到如果不改变的话，他们就得不到任何改善。

在我的帮助和儿科医生的支持下，佩尼终于不再就安尼塔是否应然需要在夜间吃奶这个问题纠结下去，并且有自信能做到为安尼塔在晚间断奶，同时不影响日间的哺喂。佩尼仍旧会在睡前喂安尼塔一次，但把时间安排在每晚睡前仪式的最开始，而不是最后，从而削弱了安尼塔意识中哺喂与睡眠之间的关联。

当安尼塔在夜间醒来时，佩尼或者杰姆——他们认为不能把一切事情都丢给杰姆——会抚慰安尼塔，但却不会哺喂她。我给他们的建议是，待在孩子的房间里直到她再次睡着，或者和孩子进行一些肢体接触，然后就离开。佩尼选择了第二种方法，但仅由她自己的感觉来控制。“我可能会走上前去，和孩子一起待一

会儿，然后离开。如果安尼塔哭得很厉害而且越来越强烈，我就会回去再度安抚她。如果她哭得不厉害，而且看上去能够很快自己再睡着，我就不回去。这种方法不是基于严格的时间限制和控制，而是基于我的感觉，以及我所理解的安尼塔的感觉。”

在那些晚上，当佩尼回到安尼塔房间时，她会很注意不抱起孩子来。那只会让安尼塔觉得她可能会吃到奶水，结果当希望破灭时就会产生更多挫败感。而且还会创造出一个新的负关联，让安尼塔在夜间醒来后会期待被抱起来，在轻轻的摇晃中入睡。

改变很快就完成了。安尼塔认为如果自己不能吃到奶，那么就没必要在夜间醒来。在第四个晚上，佩尼只到孩子的房间里检查一次。到第五个晚上，佩尼听到安尼塔醒来之后短暂地闹了一下，然后就又自己睡着了。从此之后，安尼塔就可以心情愉快地睡足整夜了，并且在白天也能得到更好的休息。她甚至开始在白天吃更多东西，大大减少了夜间起夜的刺激源。“我很吃惊，”佩尼说，“这样就可以了！”

逐步取消抱着孩子踱步与轻摇的入睡方式

我们很多人都曾经抱着新生儿来回踱步，轻轻地摇着他哄他入睡，或者当我们发现哺喂再也没法让他们睡着的时候就会开始这种做法。如果你的孩子有6个月大或者更大了，那么就该放弃这种方法了。你要知道，如果你的孩子需要在睡前被抱着踱步超过几分钟，只要你一停下脚步就会马上醒来，或者他每次夜间醒来都要人抱着踱步才能睡着，那就有问题了。轻摇的结果也是一样。

当你非常清醒，注意上床睡觉的时间，并且准备好按照一贯以来的程序哄孩子睡觉时，无论是抱着他踱步还是轻摇，都只能在孩子的房间里，而不是满屋子乱走。这会有助于创造一种在卧

室与睡眠之间的正关联。

相应地缩短你踱步的时间——哪怕在你停下时孩子还没有完全睡着也没关系。换句话说,如果你一般要走 30 分钟,那么可以试着在后面两三天里只走 20 分钟,然后缩短到 15 分钟再走两三天,然后 10 分钟。在孩子昏昏欲睡的时候把他放下。

家长们一般会看着我无法置信地说:“可是如果我把他放下,他会哭呀。”是的,他会哭。你可以坐在孩子的婴儿床边抚慰他。不要太吸引他的注意力,只要轻轻地呢喃一些温柔的话语,时不时地抚摸他就可以。如果你确实想把孩子抱起来,那么尽快安抚他之后就把他放下。不断地表示你的承诺,也许可能还要在他躺着的时候用手轻拍他的小身体。有些这么大的婴儿还能通过包裹襁褓却放开双臂的方式在晚上睡觉时获得满足感,这让他们依然感觉像被你的臂膀拥抱着一样。

伊尔琳就需要被抱着踱步,而且还要不停地走,无论睡觉前还是日间小睡的时候都如此。一开始,她的妈妈科林娜并没有在意——新生儿是如此的柔软,抱着她的每一步都似乎在重温怀孕时的经历。但是伊尔琳越来越重,抱着她踱步也越来越困难。杰里米甚至还为了抱着孩子踱步买了一双特殊的帆布鞋。科林娜则开始感觉手臂疼痛。“我很快就抱不动孩子了,我的胳膊就像断了一样!”科林娜说。

他们并没有按照逐步放弃的方法进行。而是一下子就停下了抱着孩子踱步的行为。但是为了让伊尔琳准备好,他们首先调整了一下作息时间表。孩子的上床睡觉时间原本是晚上 9 点或者 9 点半。他们把这个时间移到晚上 7 点或者 7 点半,此刻孩子还不是很困倦,因此不需要这种睡眠支撑。他们还是让孩子在早上的同一时间起床,却把哺喂的时间和吃固体辅食的时间靠近了,并重新制定了孩子的日间小睡时间,好让她不至于太长时间

得不到休息。

当这对夫妻准备好进行改变时，他们就不再在家里长时间地走动，而是仅仅在孩子的房间里进行了一次简短而平静的漫步，作为孩子晚上睡觉前例行仪式的一部分。他们在孩子醒着的时候就把她放下，坐在婴儿床边，一边开始执行安睡女士渐进法一边安抚她。孩子确实哭泣了一阵子，但并未如他们担心的那样哭个没完。“我原本以为第一天晚上她怎么也得哭两个小时。我让杰里米早早就从公司回家，我们还订了外卖。”科林娜说，“但实际上孩子只哭了半小时，而且从那以后，每个晚上都会比前一天更轻松。”

伊尔琳略有不同，因为她在夜间醒来时并不需要人抱着踱步，她也不是每个晚上都会醒来的。通常那些想要在晚上上床前被抱着踱步的婴儿会在午夜时分需要父母同样这么做。如果你的孩子开始哭泣，马上走到他面前安抚他。轻轻的拍他，发出“吁吁”的声音或者“天黑黑”之类的安抚性声音。但要避免把他抱出婴儿床，并且，绝对不要让步，不要又开始抱着他踱步。

如果，由于你的出现让孩子真正兴奋起来——如果他达到了这样一种状态，即因为哭得太凶，结果反而忘记了自己是因为什么才哭——你可以走上前去抱起他来。帮助孩子平静下来，但要让他呆在自己的房间，在孩子的房间与睡觉之间建立起愉快的关联。不要走到走廊上；不要给他任何机会去建立一个替代踱步的新的睡眠支撑。轻轻地抱一会儿孩子，直到他平静下来为止。在他昏昏欲睡的情况下把他放下，让孩子自己完成入睡的最后一步，这个时候你可以坐在他身边。

堂娜轻轻地摇晃着她8个月大的女儿艾尔莎，让孩子在自己的臂弯中睡着。艾尔莎在夜间要起来吃三次奶，并在每次哺喂后都会醒着等待被妈妈轻轻摇晃才能睡着。她的日间小睡也很不

好，晚上还要用安慰奶嘴。

堂娜开始努力在艾尔莎昏昏欲睡的时候就把她放到床上去，并抚慰她让她在没有安慰奶嘴的情况下入睡。堂娜开始把夜间的哺喂缩减到每五小时一次，大约过了14～15个晚上，她就停止了夜间的哺喂。儿科医生认为这个方法很好；艾尔莎虽然身材娇小但却很健康。堂娜还是会在睡前哺喂艾尔莎一次，但不再在她吃完之后轻轻地摇晃她，而是帮她拍出奶嗝儿，亲吻她，然后把她放进婴儿床里，坐在一边安抚她。

第一周的最后，艾尔莎的起夜就从四五次、乃至六次变成了一次，而且不再需要哺喂、轻摇或者安慰奶嘴就能很轻松地再度睡着。

取消安慰奶嘴

在这个年龄段时当然要看你的选择需不需要放弃安慰奶嘴，而你选择的应该基于孩子在夜间醒来的频率以及你在发现他的安慰奶嘴掉出来后重新帮他放回嘴里的频率。以下是一些选择：

- 让他一直含着安慰奶嘴
- 让他只在日间小睡和晚上睡觉前含着安慰奶嘴
- 让他只在日间小睡时（对于婴儿来说，这个时间比晚上更难进行自我安抚）含着安慰奶嘴，如果你要让孩子含着安慰奶嘴睡觉的话，就得尽量帮他学会自己找到掉出嘴里的安慰奶嘴。如果你注意到孩子能够自己抓住安慰奶嘴并且调整它的位置的话——大部分婴儿都会在6～8个月时学会用手抓东西——你就可以在婴儿床里的几处放上几个安慰奶嘴，好让孩子能够自己找到一个，而不是每次掉出去之后就要你一遍又一遍地来帮他找到并放回嘴里。当然之前你可能要把安慰奶嘴放到他手里几次，直到他学

会握住为止。

安睡女士小提示

通过踱步或者轻摇这种睡眠支撑让婴儿放松是一个很有争议的话题。如果孩子开始哭闹，你只要把他抱起来，他就会马上平静——或者更糟糕的是如果他正好在你的臂弯里睡着了——那你就“中招”了。你原本是要训练孩子睡觉的，结果变成了他训练你学会抱起他。下次你最好等一会儿，相信你的直觉和你对孩子的了解。在一两个晚上你就能知道抱起他究竟是会帮他平静下来还是会过度刺激他，或者只是表示他已经博得了你的注意。

如果你打算让孩子放弃安慰奶嘴，无论安慰奶嘴是否被孩子含在口中都有抚慰的作用。如果你取走安慰奶嘴，就应该学会用一些特殊的安抚方式。看看孩子是否已经找到一件自己的心爱之物。当你准备好面对一些小小的不愉快后，可以选择一个晚上，把孩子放到床上，但不要给他安慰奶嘴。而且前提是你做了一个特别愉快又平静的上床睡觉前的“仪式”，并且尽量让孩子在昏昏欲睡的时候躺到床上。用轻抚或者安慰来替代安慰奶嘴的作用，也可以采用我曾经向那些打算取消夜间哺喂或者踱步的父母们建议的方法。当孩子在夜间每一次醒来都要这么做。如果在孩子哭闹一个小时之后你让步了，就没法教会他在没有安慰奶嘴的情况下入睡，反而教会了他哭上一小时就能获得一只安慰奶嘴。

我曾经遇到过一对双胞胎，很明显他们陷入安慰奶嘴的诱惑中无法自拔了。他们的父母把大量的时间放在没完没了地把一只安慰奶嘴塞进一个孩子嘴巴里，然后再把另一只塞进另外一个

孩子嘴巴里，最后不得不还是把双胞胎从婴儿床里抱出来，安置在他们大床两侧的临时婴儿篮中。但这还不算完——他们这下子倒是不用整晚都往另一个房间跑了，但还是得不停地抬起手把“奶嘴”重新放回孩子嘴里。最后，通过调整孩子们的作息表，把双胞胎再度放回婴儿床，并且改善了睡前仪式帮他们过渡等一系列方法，我们最后成功地淘汰了安慰奶嘴。还用安睡女士渐进法增强了孩子们在没有安慰奶嘴的情况下自行入睡的能力。

特殊的床

有些婴儿习惯于在特殊的地方睡觉，如秋千、汽车座椅等。如果在孩子很小的时候有食物逆流的问题，所以你把他直立地放在汽车座椅中好帮助她消化，那么他就会习惯于在这种地方打瞌睡。也许秋千那种缓慢的摇摆方式有助于孩子放松下来并睡着，但他不可能永远都睡在那里。

我曾经帮助过一个小姑娘，大概 8 个月大，她生命中的每一个单独睡觉的夜晚，以及全部的日间小睡都是在一只摇晃的秋千椅上进行的。如果她在夜间醒来，妈妈会哺喂她然后再把她放回秋千椅中。这孩子实际上成长得很好，在 5 个月时就可以爬，6 个月就能站起来了。但她却完全不了解该如何躺下来入睡。她用了大约三个星期的时间来学习这种技能。

小姑娘的父母使用了安睡女士渐进法。他们先把女儿放进婴儿床，不过她会马上坐起来，坐着睡着，然后她就会躺下，可这样又会惊醒她——真让人发疯。因此，她会再坐起来，再睡着，再躺倒，再醒来。她的父母之一就坐在一边安抚她，但却不会把她从婴儿床中抱起来，直到她真正地放弃。他们按照这种方法坚持了好几天，期间孩子也在夜间几次醒来。最后，当小姑娘累坏了的时候，尽管因此她非常不高兴，但还是躺下来睡着了。接下来

几天，她醒来的频率降低了，而且也没那么烦躁了。如今，她父母只要用 5～10 分钟就可以哄她睡着了。

一开始，小姑娘的妈妈还是会让小姑娘在秋千椅中进行日间小睡，但只要孩子一睡着她就会让秋千停止摇晃，从而逐步削弱摇晃的感觉。到第一周结束时，小姑娘已经有了很大的进步，妈妈把她放进婴儿床，她一样能睡得很好。不过又用了两周，才彻底解决所有的问题。小姑娘的父母发现，她还在婴儿床里进行日间小睡的时候，比起在秋千椅里，还是能得到更充分的休息。

早起的鸟儿

对付早起有时候有一种很简单的解决方法。如果有太多光线射入孩子的房间，买一副遮光窗帘即可（对于日间小睡也同样有效）；如果外面有噪音——路过的垃圾车、唧唧喳喳的鸟儿或者早起上班的爸爸正在洗澡等等——吵醒孩子，你可以试用一下白噪音发生器或者风扇。不过，有时候事情绝非这么简单就能解决。

如果你的孩子通常在早上 6 点或者 6 点半醒来，心情愉快，精力充沛，并且做好了开始新一天的准备——哪怕你还没有——那你很可能就得忍耐。对于一个婴儿或者小孩子来说，从生理学角度而言这是很普通也很合适的起床时间。记住要调整进餐和日间小睡的时间来适应他的早起。第一次日间小睡应该在孩子醒来的一个半到两小时后。

如果孩子现在已经可以整夜安睡，日间小睡也很好，但还是会在早上 6 点醒来的话，你可以试着后移他晚上睡觉的时间，每次向后移 15 分钟，看看是否能让孩子晚点睡觉，但要很小心。孩子可能还是在早上 6 点醒来，但因为之前并没有得到充分睡眠，他可能会表现得疲倦而且暴躁。注意孩子的睡眠时机、睡眠信号与行为。当孩子确实需要睡眠时，不要强迫他保持清醒，否则到了你想要他

睡觉的时候，他反而可能睡不着了。如果你成功地向后延迟了晚上睡觉的时间，那么试着让下午的第三次小睡也稍微后延，以便孩子在当晚睡觉的时候不至于过度疲劳。你也可以用下面我将要列出的方法来对付那些有问题的早起的孩子，但对于那些早起时间适合自己生物钟的孩子来说，这些方法不一定会奏效。

在早上 6 点之前醒来的婴儿；以及早上 6 点或者 6 点半醒来，当时心情不错，可是 7 点左右又开始闹情绪的孩子则是另外一个不同的故事了。你需要进行干涉并教会孩子更晚些睡觉。你越忍耐孩子的早起，要改变他的生活模式就越难，所以我强烈建议你现在就行动起来，哪怕要几个礼拜才能看到成果也没关系。一旦他们越来越大，要看到成效可能就要几个月了。

确保你家那个喜欢早起的孩子在白天有充足的睡眠，因为日间睡眠不足会导致夜间睡眠不好，以及过早起床。你可以试着调整一下早起的孩子上午的小睡时间，半小时半小时地向后挪。一定不能让孩子在上午 8 点之前就开始小睡，还要把这个时间逐渐拖延到 9 点之后才行。这有助于改变他的整体生物钟，并诱导他晚些睡觉。但要注意用你的直觉观察孩子的睡眠时机，因为你也不想过分延迟他的日间小睡，让他在过度疲劳的情况下睡着。如果你认为孩子起得太早是因为他饿了，那么可以采取一种临时措施，试着在晚上 11 点时叫醒他进行最后一次哺喂，也可以尽量让他在白天吃下更多食物。

当你听到早起的小家伙开始活动时，要迅速来到他面前。试着安抚他，给他一个心爱的东西。让他和他的心爱之物一起躺下，而不是把他抱起来。哪怕他并没有再次睡着，在 6 点之前也不要打开灯或者把他抱出婴儿床——哪怕他开始不耐烦地大哭也不要让步。我说 6 点就是 6 点。5 点 45 分或者 5 点 50 分，哪怕 5 点 59 分都不行。让他在天色还没亮的时候早起，只会传达给他一种

早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895

模糊的信息，这也是间歇增强的一种。孩子无法理解为什么自己可以在 5 点 45 分，天黑的时候起床，却不能在同样天黑的 2 点 15 分起来。同样，我遇见过很多父母都领教过这种难题，就是如果他们让孩子在 5 点 45 分起来了，那么孩子就会越起越早。

在这个年龄段，我通常会建议父母们在孩子清晨醒来后再度入睡时待在他们的房间中，但要尽量减少与孩子的互动。你可以坐在椅子上闭上双眼，表示妈妈（或者爸爸）仍然在睡觉，而且表现得像是要宝宝也好好睡觉一样。当时钟的指针指向 6 点时——就像这一刻时间凝固了一般——父母要离开孩子房间一两分钟。孩子可能会哭泣，但也就一分钟左右，因为你马上就会回来了。

无论你是出去了一分钟还是一个小时，当你返回房间时，就要开始戏剧性的起床仪式。打开窗帘，打开灯，唱起欢快的起床歌——一定要跟摇篮曲截然相反。把这件事当作每日例行的程序，就像每天晚上你们做的那样。这种方式能帮助婴儿区分白天和黑夜，认识到什么时候才可以起床并开始新的一天。你传达给孩子的信息必须很清晰："我把你抱出婴儿床因为现在是白天了——而不是因为你哭了。"

安睡女士小提示

如果你觉得自己出现在孩子的房间会鼓励孩子保持清醒的话，可以试着离开他的房间，看他会不会再度自己睡着。在房间外一直等到凌晨 6 点，或者可以在 6 点之前时不时去检查一下他的情况。

早起的孩子

如果你的小家伙总在早上 6 点之前醒来，他很可能是过度疲

劳了。过度疲劳的孩子比起得到充分休息的孩子来，一般都睡眠不好，或者睡得时间不长。他可能是如下情况：

- 日间小睡不充分。
- 在他下午的小睡醒来后到晚上睡觉之间这段时间太长了（尽量不要让这段时间超过四小时）。
- 过了“昏昏欲睡”的阶段才上床睡觉。他可能会过于困倦，因此当他在夜里，包括凌晨 5 点醒来时不知道该如何让自己再度睡着。

日间小睡

日间小睡对于婴儿们来说很困难，对于父母们来说，训练孩子日间小睡也很困难。晚上睡觉时出现的问题通常很快就能解决，但固定的日间睡眠则需要更多耐心和坚持。这是一场旷日持久的拉锯战，而且通常都会伴有哭闹。

婴儿们其实和成人差不多，当天也不够黑的时候都会遇到睡不着的问题。我们的大脑程序化地令我们会在有日光的时候清醒，在黑暗中睡着。此外，婴儿们还不能很好地帮助自己完成从活跃到放松之间的转换。甚至在这么小的时候，他们也能抵抗住睡意。抵抗睡意的原因是孩子们更愿意醒着玩耍、探索，以及和父母相处。这不表示他们有分离焦虑；这只是因为他们对你形成了一种美好而健康的依恋心态。

日间小睡准备。记住，6～8 个月的婴儿在白天需要两次小睡，每次大约一个半到两个小时。下午的第三次短暂小睡，当孩子们在白天略早的时候已经完成了两次很好的小睡后可以酌情选择，但如果他们之前的两次小睡不够充分的话则是必需的。先看看孩子的作息时间，要密切注意，白天的睡眠时机。只要你动作稍慢一点，孩子就已经再次恢复了精力，开始兴奋起来了。

当你在夜间进行安睡女士渐进法时，可以将白天的小睡固定在同一时刻。从夜间的渐进法开始算起，第二天的日间小睡你可以把椅子放在和头天晚上相同的位置，做同样的步骤，采用同样的安抚方式。每三天挪动一次椅子，哪怕这一天孩子小睡得并不安稳也要这么做。

然而，有些家庭选择集中精力改善孩子的夜间睡眠，但却没有同时处理日间小睡。既然如此，无论用什么方法，你都要保证孩子在白天得到充分的睡眠(绝对不能只睡一小会儿)。尽管我一直主张要坚持，但你也没必要每次孩子小睡时都在同一位置，就像孩子在晚上睡觉时以及夜间醒来时那样。在夜间的渐进法完成之后的几天、几周或者几个月之内的任何时间都可以开始日间小睡的训练。

安睡女士小提示

不要直接从充满刺激性的活动中——比如和着最喜欢的音乐节拍抱着孩子旋转——直接把孩子放进婴儿床里。

创造良好的日间小睡环境。无论是在减轻刺激水平上还是物理环境上都一样。给孩子一个逐渐缓和的时间，比如他晚上睡觉前的例行程序的简化版。为孩子读一个故事或者放一段安静的音乐都可以。有时候哺喂也有助于创造这种转换的时间，但不要让孩子在吃奶的时候睡着。记得在孩子昏昏欲睡的时候把他放在床上——尽管这时候他可能比晚上还要迷糊一些。

黑暗而安静的房间。有些婴儿需要几乎全黑才能在白天睡着，就算他们在晚上可能还需要一点亮光。如果你的家特别嘈杂，那就要试试风扇或者买一台白噪音发生器，用较低的音量从婴儿床开始辐射到整个房间。如果你担心孩子可能会过于依赖

这种机器，没有它就无法睡着的话，那么可以只在日间小睡的时候使用并且可以随着他睡眠质量的提高渐渐降低音量。

使用和晚上睡觉前一样的基本习惯。如果孩子在婴儿床里站起来，第一次可以把他放下；如果他又站起来，就不要管了。不要觉得自己必须要在每次日间小睡之前哺喂孩子，尤其是你正准备打破睡眠与进食之间的关联时。如果你之前都用轻摇或者踱步的方法哄孩子睡觉，那么尽量在日间小睡时取消这些做法。一开始可以先把轻摇或者踱步的时间减少一半，在孩子昏昏欲睡的时候把他放到床上。

最长的一个小时。就算你已经为改善孩子的日间小睡做好了一切准备，也别忘了给自己打气。你可能将要拿出接下来整个小时的时间(如果你打算训练孩子进行上午和下午的小睡的话，就是每天两次)来设法让他睡着。

检查。当你在日间小睡中进行渐进法时，可以做任何能安抚孩子的事情，这也能安抚你自己。然而，有时候如果有家长在场的话，孩子可能反而会保持清醒而不是睡着。如果孩子固执地想要吸引你的注意，或者是因为你虽然在他身边却没有按照他的希望做而变得越来越激动的话，那么你就应该离开房间。你可以频繁地回来检查孩子的状况，每 5～15 分钟一次，看你自己怎么样感觉比较好了。尽管我经常要求家长们坚持，但在日间小睡的时候还是可以进行定时检查的，不过晚上就一定不要这么做了。这两种不同时刻的睡眠还是能在孩子心目中留下明显区别的。

科琳娜在日间小睡时也不再抱着伊尔琳踱步，而只是把她放到她的婴儿床里。科琳娜拿本杂志坐在房间的门外，说："好了乖乖，妈妈就在这里。"大约每十五分钟她还会迅速走进房间短暂停留，作为额外的心理安慰。当她能够放下伊尔琳，然后移到走廊上，并在家里其他地方做事的时候，他们就实现了目的。科琳娜

还是每十五分钟去查看一下女儿的状况，却绝不再用一个小时的时间陪她入睡，大约过了几周之后，伊尔琳入睡的速度越来越快了。

拿出一个小时的时间来，但如果你的孩子还是无法睡着，那干脆离开房间一分钟，所谓一分钟就是整60秒，而不是10秒，哪怕她不高兴也要这么做。哪怕你已无法忍受孩子的哭泣，也必须待够60秒。然后再回来，稍微带点戏剧性，稍微夸张一些的动作，把孩子从婴儿床里抱出来，假装日间小睡已经结束了，就像你在早上起床时做的那样。你应该传达给孩子这样一种感觉：现在他可以起床是因为你认为到时间了，而不是因为他的哭闹。

如果在上午孩子一会儿都不肯睡的话，那就尽量让他在下午比平时更早点躺下，因为他很可能会过度疲劳。要密切注意孩子犯困的迹象。在他想要睡觉的时候及时把他放到床上，哪怕他只睡45分钟。

如果你还有个大一点儿的孩子要照顾，你应该离开婴儿的房间，但要定时检查情况。当我第二个孩子还是小婴儿，而第一个孩子已经三岁的时候，我就这么做，因为大一点的孩子下午从幼儿园回到家里后需要妈妈的照顾。对于我而言，这是很困难的事情，因为我觉得自己在被两个孩子扯来扯去，而且格雷琴比我原本以为的要哭得厉害得多。

玛丽安在三年内有了三个孩子，她相信在日间小睡方面每一个孩子都比前一个表现得更好，主要是因为她没有那么多时间去轻摇每个孩子，为他们唱歌，或者是在日间小睡的时候安抚最小的那一个。在日间小睡的时候，她不得不把最小的孩子艾莱留在她的婴儿床里，自己则去面对那些大一点的孩子各种各样需要妈妈注意的小动作。

堂娜在渐进法训练过程中也没法一天抽出两次来坐在艾尔

莎婴儿床边一小时，因为她还有个四岁大的孩子凯特得照顾。有时候艾尔莎的睡眠时机自然而然地会出现在妈妈要送凯特去幼儿园的时候。堂娜会经常检查艾尔莎的状况（更接近费伯法）。照顾任何一个孩子都不容易，往往45分钟的好言哄劝也只能得到45分钟的日间小睡。但哪怕是45分钟的睡眠也比早些时候艾尔莎几乎不睡好得多，而当堂娜在这种情况下尽可能地坚持时，日间小睡的时间就变得越来越长了。在父母二人共同担当照料孩子的责任下，艾尔莎在周末的日间小睡就表现得很好了，而这种更长更轻松的周末日间小睡则又反过来有助于她的全面进步。

打盹儿。 理论上说，你的孩子应该睡一个半小时或者更长时间，但一般婴儿的睡眠都少于45分钟。我称之为不乐观的日间小睡，因为这种小睡不足以构成一个完整的睡眠循环。所有的这种短暂的小睡造成的后果是给孩子恰好足够拒绝睡觉的精力，但很快他们又将开始暴躁而困倦了。

你有几个选择可以试着用来延长这种日间小睡。记住，如果孩子只睡了20或者30分钟就要起来，他实际上可能并没有真的清醒，他可能正在体验一种局部觉醒状态。你最好不要在孩子日间小睡刚结束时就把他从婴儿车里抱出来，而是应该迅速走到他身边安抚他，尽量让他再睡半小时或者一小时。如果这种做法奏效，你可以试着逐渐给孩子更多机会，让他在没有得到你过多帮助的情况下学会让自己再度入睡。一旦孩子发展出这种技能，你就再也用不着一听到孩子哭闹就马上从床上跳起来了。比如从走廊里传来一阵轻声的“吁吁”声就可能起作用。慢慢地在你的帮助与坚持下，孩子就会开始自己睡上更长的时间了。

如果你试了一个小时都没能让孩子再次睡着，他可能一共只睡了20或者30分钟的话，你应该暂时修改一下孩子的作息表，

直到日间小睡的状况有所改善为止。如果他上午睡的时间很短，那么就让她下午早一点睡下。如果孩子一直心情低落，那么他实际上就无法保持三个小时左右的清醒状态一直到下一次小睡，也就无法避免地让你们彼此都抓狂。

在孩子主动睡着之前，你可以利用时钟和他的睡眠诱因来调整他的睡眠。孩子可能需要在上午 11 点半或者正午就开始“下午的”小睡，然后在下午稍晚些时候需要第三次小睡。不要让他的第三次小睡太晚开始，不然就会推迟晚饭时间，以及他晚上睡觉前仪式的时间，最后导致你又重新回到一切问题的开始。在下午 4 点半就可以唤醒孩子。不过你可以灵活掌握这段时间，如果你试着让孩子在上午 9 点或者 9 点半睡觉却没成功，但 10 点或者 10 点半的时候他看上去好像困了，那就要再试着哄她睡觉。

父母们经常问我，孩子睡了两到三次，每次 45 分钟是否合适。在这个年龄段，也许不合适。这主要根据孩子的行为来判断孩子看起来是精力充沛还是困倦无力？开心还是烦躁？她在夜间醒来的次数多吗？过少的日间睡眠常常会导致断断续续的夜间睡眠。

如果你的孩子少了一次日间小睡，抑或只是在上午或者下午短暂地打了个盹儿，你就需要采取一种应急的补救措施来保证他无论如何都能在下午再睡上一段应有的时间。你也应该不希望孩子因为自己没有采用晚上睡觉时的措施——哪怕这些措施可能代表着你要暂时违背我的所有安睡准则，违背睡眠时不应让孩子处于移动中的道理——而导致他睡眠不足，身心备受折磨。把孩子放在汽车座椅上、秋千椅上或者抱着他踱步——无论用什么方法都要让他完成日间的小睡。

不过一旦你打算采取补救措施，就要注意选择合适的方法。不要倒退回你已经取消的旧习惯中去。例如，你好不容易改变了

在夜晚同睡的习惯，那么就算是采取措施补救日间小睡也不要把孩子放到你们的大床上去，你可以把一个临时性的小摇篮放在大床边上；如果你已经取消了夜间抱着孩子轻摇和踱步的做法，那么日间小睡的时候也不要再做。寻找另外一种日间小睡的辅助工具，日后也可以短期之内使用。

日间小睡训练要点

让一个婴儿上午小睡比下午小睡略容易一些。不要错过这个机会。

虽然下午的小睡训练更艰难也别丧气，这很常见。

在日间小睡训练期间要做记录。观察孩子的睡眠时机。

如果在下午 2 点或者 3 点时，孩子小睡得并不好，那么你就需要采取“备用”计划了，比如让孩子在手推车或者汽车中睡着，从而避免孩子过度疲劳导致夜间更多麻烦。

在日间小睡训练中你最好把行动范围局限在家里。如果你觉得这天自己做的一切都是在设法让孩子睡着的话，你就算是做对了！结果则是：一旦你得到一个规律的日间小睡时间表，你就能得到更多自由，以及一个快活的、精力充沛的宝宝。

如果你能找到一位可以帮你进行日间小睡训练的保姆或者婴儿抚育机构人员，那可真是要感谢上天了。如果你的保姆不愿意帮你进行训练，试着简单向她解释一下睡眠科学来说服她，如果还是不行，你应该解释说你的孩子需要完整的“足量睡眠”，哪怕这意味着保姆必须用诸如轻摇之类的睡眠支撑来令孩子入睡或者重新开始一段被打断的简短小睡，都没有问题。

如果移动的睡眠只是短期应急措施的一部分，那么尽量缩小这段时间。如果你用摇晃的方法让孩子入睡，那么一旦他表现出困倦想要小睡的迹象，就要停止摇晃。对于驾车让孩子入睡的方式也一样处理。如果必须的话，你可以驾车四处游荡令孩子平静下来并入睡，但要及时开回家或者停下车，好让孩子能够在汽车没有开动的情况下睡着。如果不会吵醒他，就要把他转移到婴儿床里，或者坐在一边陪伴他——如果天气允许的话，就坐在车外或者秋千附近——好让他能够安心入睡。你可以看书或者打盹儿，如果天气很好的话也可以打理花园。如果让孩子自己睡在车里无人照料，我心里会感到不安，哪怕是在一个很“安全”的小区也是一样。

不幸的是，当你使尽法宝才把孩子哄睡之后，你还不能让他的日间小睡时间太久，不然这个晚上就会比平时更难熬。最晚要在下午 4 点 50 分或者 5 点叫醒孩子，然后按照平常的时间在晚上上床睡觉。

父母们的紧张心理。我合作过的每一对父母都认为日间小睡的训练非常枯燥，但感情反应却各不相同。有些父母在白天忍耐了孩子的哭闹之后，发现在天色不黑的时候似乎更容易忍受孩子的哭声。

佩尼发现比起夜晚，日间小睡的时候她更能容忍安尼塔的哭泣。“我不会特别疲倦；也不会试着催眠自己。”她说，“我知道安尼塔就是累了；我知道她确实需要睡觉。这让我能够面对一些哭声。她曾经连续哭过 45 分钟，但最糟糕也就是这一次了。一般也就是 20～30 分钟，就算这样，十天之后她就不哭了。”安尼塔开始能够睡足整整一个小时，然后渐渐地又把她的日间小睡时间延长到了一个半小时。

可另外一些妈妈的反应则恰恰相反，当她们的另一半离开家

去上班，没法在身边支持她们、鼓励她们时，她们几乎没法呆在屋里独自面对一个号啕大哭的孩子。在家照料孩子的人，无论是保姆还是母亲，通常都会感觉日间小睡的问题或者孩子的哭泣是很难处理的事情。我的建议就是顺其自然。如果对你来说太难，或者对于照料孩子的人来说太难，如果紧张感不仅没有减少反而增加了，那么不要现在就为此担心了——直到孩子的夜间睡眠得到改善之后再来考虑日间小睡的问题吧。

通过替代方法和临时举措，或者补救措施可以让孩子在短期内增加一些日间睡眠的时间。哺喂他，轻拍他，摇晃他，任何方法都可以。但不要完全放弃日间小睡训练或者告诉孩子不需要日间小睡。孩子绝对需要日间小睡，甚至还需要三四年的日间小睡。

但如果现在你没法按照我的建议做也不要觉得郁闷。给你自己（或者保姆）一个机会，让训练从现在开始潜移默化地进行，用你做得到得方法让孩子进行日间小睡，如果睡觉的时间能够有规律则更好。随着夜晚的睡眠渐渐改善，日间的睡眠也会自动调整到合适的位置。如果没有的话，深呼吸之后，在第二个或者第三个月再试着进行一次训练。记得提醒自己，好的日间睡眠会让夜间的睡眠效果也得到提高；这能帮你实现最终的目的。

当哄孩子在白天开始小睡的一些方法不再有用时，也许你已经度过了一个阶段。别紧张。这可能仅仅代表着孩子晚上睡觉的改变和整夜的安眠已经帮他丢弃了原本的睡眠支撑。这可能也意味着你只要稍加训练，他就能马上能够学会更好地进行日间小睡。这就是你开始进行日渐小睡训练的信号。

同睡

如果你一开始和孩子同睡，但发现那不适合自己；或者晚上

刚开始睡觉的时候是让宝宝在婴儿床里，可是即便没有这种打算，迟早孩子还是会睡到你的大床上去，那么你可以翻看下册第3章“这到底是谁的床”。我仍旧会在本章节中讲一些安全原则；此外还会给出一些建议，告诉你如果你仍旧希望继续和孩子一起分享大床，却发现大家都睡不好的话，此时又应该如何改善睡眠。

亚当

从还是婴儿时开始，亚当就需要被抱着踱步、轻摇、蹦跳、拥抱和哺喂才能睡着——而这还远远不够。作为一个足月生产而且看起来很健康的婴儿，亚当实际上有很多发育迟缓和消化问题，只是没有马上表现出来，或者没有及时得到诊断。因为早期他的听力和视力都发育得不是很好，所以在起初的几个月中，他比其他宝宝听到的和看到的东西都少一些。他的食物逆流问题也相当严重，可有时候表现得并不一般，很难诊断出来。他通常并不会把吃下的奶喷吐出来，而是气喘吁吁，就像逆流的酸性液体冲到了他咽喉的下部，堵住他的气管一样。良好的睡眠更是不可能的。“从他五天大的时候我就发现有些东西不对劲，”玛格丽特回忆说：“他十天大的时候，我就开始做记录。我必须得常常抱着他，每天差不多要18～20小时。他每次睡觉从不会超过20分钟。”

6个月过去之后，亚当的食物逆流问题得到了控制，他的听力和视力也有所发展。但之前的这些问题形成了糟糕的睡眠习惯，让他失去了学习自我抚慰的机会。玛格丽特和罗伯特每晚都要用一两个小时的时间进行睡前安抚，最后在8点半或者9点的时候把亚当放到床上。亚当一般会安稳地睡三个小时左右，随后就会在夜晚反复醒来。他的大部分时间都睡在父母的大床上，吃奶、打盹儿，但很少能睡得熟。

白天也很糟糕。亚当的日间小睡很少能超过20分钟。临床

学上对于通宵睡眠的一项研究揭开了这种特殊睡眠模式的神秘面纱。哪怕当亚当看起来似乎像是醒了，而且还表现得很活跃，但实际上从神经学角度来说他依旧还在睡觉。从那时起，他的父母才发现有时候他们觉得自己是在哄孩子睡觉，实际上却是刺激了孩子，让他睡不着。但哪怕是对亚当了解得更多了，可夜晚还是不怎么好过。

在亚当七个半月大时，这个家庭找到了我。在三周之内，我们就让亚当乖乖在他的婴儿床里很快睡着，而且哭闹也变得相当少了。不过这还不算什么，亚当每晚还是会醒来一两次，但现在醒来的时间越来越短，醒来之后的烦躁和混乱表现也越来越轻。每个人都得到了更多休息，心情也更加愉快了。

罗伯特首先开始实行了安睡女士渐进法，他做了几处小调整来适应亚当的需求。我们设计出了一套非常详尽而且有规律的晚上睡觉前的仪式。我们希望罗伯特能给亚当他期待的充分的身体接触，好让他感觉安全；但又不能过多，否则就会影响他改变睡眠模式。罗伯特坐在一张婴儿床边的椅子上，每隔 30 秒就会把手穿过婴儿床的栏杆，轻拍亚当的脊背。期间他会对儿子说："吁—吁，睡觉觉。"每个晚上他都会坚持发出同样的声音。然后罗伯特会停下来，30 秒后再度轻拍亚当 30 秒。当亚当想要站起来时，罗伯特会拿开自己的手，不妨碍孩子的行动。但他会接着说"吁—吁，睡觉觉"，然后再接下一次 30 秒的轻拍。起初两个晚上，罗伯特一直这么做了一个半小时亚当才睡着。当亚当在夜间醒来时，罗伯特也会做同样的举动，确保孩子能够获得完全一样的信息。

到了第三个晚上，罗伯特还按照同样的方法进行，但这一次只用了 45 分钟。第四个晚上，罗伯特每次轻拍亚当 10 秒钟，并且确保两次轻拍之间至少间隔 20 秒。这种拍一停，拍一停的方

式他一共坚持了五分钟。随后，他会继续发出令孩子安心的“吁吁”的声音，但却开始挪动，离亚当越来越远，而且也不再轻拍孩子了。亚当用了半小时就睡着了。（而罗伯特也只在椅子上坐了半小时！）第五个晚上，罗伯特只是在刚走进房间的时候进行了一次发出“吁吁”声后接十秒钟的轻拍的程序。然后他停下来等了整整一分钟，才开始进行下一次十秒钟轻拍的程序，并且又等了整整一分钟。罗伯特如此循环了五次，然后轻轻地坐在亚当房间里的椅子上，偶尔轻声呢喃一下令孩子安心的“吁吁”声。亚当 30 分钟就睡着了。

第六晚和第七晚罗伯特和玛格丽特就可以看到变化了。罗伯特把亚当放下，只说了一次“吁一吁，睡觉觉。”然后就坐在房间里，距离婴儿床几步远。亚当虽然哭了，但是第六晚只用了不到一小时就睡着了——第七晚则只用了 20 分钟。

在接下来的两个晚上，罗伯特就可以把椅子挪到离婴儿床更远的位置了；第九个晚上已经到了门口。他就坐在门口处，坚持了另外四五天（比我通常建议的时间略长），最终能够离开亚当的房间了。亚当虽然还是哭了，但他的妈妈描述他的哭泣就是很正常而且不断减弱的哭声：轻声的呜咽，偶尔夹杂着几声大哭，但声音轻了很多。再也没有夫妻俩之前遇到的那种刺耳的大叫了。而且亚当也就只哭了几分钟，而不是以前的几小时。

受到鼓舞的玛格丽特和罗伯特决定马上就停止在午夜时分亚当醒来时走到他身边的行为，看看孩子是否能自己再度入睡。这就是这对夫妻的转变，以前只要孩子一哭他们就会立刻跑上前去。他们做好了准备——但亚当却只是轻声地哭了五六分钟，然后就又睡着了。他们认为，与其冒着吵醒全家人的风险起床抚慰孩子，倒不如就让孩子哭几分钟，然后再自行入睡的好，后者更不容易中断孩子的睡眠，当然也就不会中断他们自己的睡眠了。亚

当还是会在半夜醒来，但他的呜咽声不会持续很长时间。

罗伯特一家用这种方法一直度过了亚当的学步期。亚当虽然从来都不是一个睡眠良好的孩子，而且仍然存在一些父母希望能在上学之前解决的过敏症状。但评价他们的生活究竟得到了多少改善的最确切标准是，他们决定要第二个孩子了。罗伯特和玛格丽特又生了一个小姑娘——她的睡眠状况就要好得多！

第8章　9~12个月

这个年龄段的婴儿们晚上平均需要 11 小时睡眠，白天则需要 3 小时。在 9 个月时，婴儿们一般会在上午小睡大约一小时，下午则小睡一个半小时到两个小时。大部分孩子都已经不需要短暂的第三次下午小睡了。到了 12 个月，上午的小睡大约是一小时，下午的小睡则是一个半小时。

9～12 个月大的婴儿们出现的很多问题与解决方法都和 6～8 个月大的婴儿们非常接近，但还是存在一些与睡眠有关的生长发育偏差。这个年龄段的孩子有更强的活动能力，可以爬行，抓着婴儿床站起来，以及每天晚上睡觉的时候你把他放下后还会马上跳起来。有些孩子在一岁的时候已经可以走路了，这是孩子生长发育过程中的一个里程碑，还能临时性地干扰睡眠。增强的行动能力会令他们疲倦，所以你要特别注意他们的睡眠时机，何时孩子差不多就准备好睡觉了。有些孩子能够抵抗睡意，并且隐瞒睡眠时机。如果你错过了这个阶段，也可以试着改变上床睡觉的周期。

在这一章节中，很多家庭都会体验到这个年龄段相当典型的问题。很多家庭都预料到他们的孩子可能会尽其所能地强烈抵制改变睡眠习惯，他们也预料到面对孩子的眼泪时可能会更难处理。而所有的人最后都发现，孩子比他们预想的表现要好得多。父母们发现孩子的哭泣并不像他们想像的那样激烈；而当自己陪在孩子身边时，让他们尽情地哭一阵子也没有想像中那样可怕。

“睡眠训练成功的关键是认识到让孩子哭并不表示放弃他们，也不表示折磨他们。”梅根说，“我们发现，睡眠对于孩子的成长发育无比重要，不教孩子学会睡眠才是真正在伤害他们。我们可能觉得如果让孩子哭就是坏父母，但我们也要知道，10 分钟的哭泣并不会伤害到孩子。我们应该意识到孩子没有问题，这会让人感觉更好一点。你应该一遍一遍反复告诉自己——你正在做

的事情才是正确的。”

发展变化

分离焦虑

9个月时，当婴儿们学会爬行或者坐起来时，他们的分离焦虑就达到了一个顶峰；12个月大婴儿的分离焦虑顶峰则发生在他们开始站立、行走和攀爬时。这种身体上的进步常常会使他们在夜间更频繁地醒来；而且他们此时也会暂时由于认知急速发展而对陌生的人、地点或者变化格外敏感。

就在孩子第一个生日时，他们正在经历的高度分离焦虑会让他们开始考验父母，来确认父母的反应。最常见的一种考验就是当父母，尤其是妈妈，夜晚离开儿童房之后才开始嚎哭。他们实际上是在表达：“如果我哭了你会怎么做？我能让你回来继续陪着我吗？”这种反应会让晚上睡觉的时间对于孩子和父母双方都变得格外难过，哪怕是那些在此之前能很容易入睡的孩子也是一样。

艾米在大约5～10个月之间一向都睡得很好。后来一场严重的胃病和一波分离焦虑加在一起，严重地影响了她夜间的睡眠。“不管因为什么，这种状况都表现得格外激烈。”她的妈妈琳达心有余悸地回忆。艾米开始起夜，一次，两次。最后开始拒绝上床睡觉——她想要爸爸和妈妈陪在身边。

“我们试着抱着她踱步，和她说话，轻轻摇着她。可最后孩子的哭叫声越来越可怕，以至于我们中的一个只好带她躲进地下室，躺在沙发上陪着她，另外一个则在房间里争取一些睡眠。”他们的家庭和工作变得越来越紧张。后来他们按照我的方法去做，

才令艾米感觉更安全，并且在晚上睡得好一些。

心爱之物

如果你的孩子还没有一件最心爱的宝贝，现在要鼓励他找到一件了。心爱之物会让孩子感觉安全、放松，尤其是在晚上睡觉时或者半夜他醒来时。把一些毛绒玩具或者小毯子放进婴儿床，看看有哪一件会让孩子格外喜欢。或者选择一件适合孩子习惯和性格的东西。

一位妈妈发现，自己的儿子总是在睡前哺喂的时候揉搓她的手指。所以她为孩子选择了一只毛绒小牛，并且稍加引导，孩子就渐渐从揉搓妈妈的手指转而揉搓玩具上的牛角。从那之后，他就可以在晚上用自己的小牛来自我安抚了。

为了让孩子与心爱之物之间的关联更密切，你可以在哺喂他的时候把这件心爱之物放在你和孩子中间，并让这件心爱之物也加入到睡前游戏中，比如一起玩躲猫猫等。你甚至可以把它用你的衬衫包几个小时，让它沾染上妈妈的味道。如果孩子还是无视你的影响，不肯接受这件物品，那就一两个月之后再试试另外一件——孩子也可能也从他一岁生日时得到的礼物中选出一件自己的心爱之物。

新的活动能力

大多数婴儿现在都可以抓着东西自己站起来了——这就会导致在晚上睡觉前或者日间小睡时产生新的麻烦，当你把孩子放在婴儿床里时，他可能会马上又自己站起来。我一般都会建议家长们不要干涉孩子的行动，或者你可以再一次让他躺下，但只能这么做一次。然后你就可以坐在婴儿床边，拍拍床垫，鼓励孩子自己躺下。如果你坐下，他可能会更愿意坐下，好和你处在同一

水平上。婴儿们一般在学会如何躺下之前，都会先学会如何站起来，所以让他在白天先练习一番。你可以让孩子站到茶几上，然后再扶着茶几下来——但这之前你要先做好安全防护措施，如果需要的话还可以在周围摆一些抱枕。诸如那种绕圈跑的游戏也有利于发展上一下行动能力。但这种练习要在婴儿床外进行，要在刚睡醒后而不是日间小睡或者晚上睡觉之前进行。

吃饭和睡觉

在孩子一岁生日之前，就要让他开始学着使用杯子了，哪怕你仍然还在喂奶，甚至打算继续再喂一段时间奶。当婴儿们渐渐长大，他们可能会从情感上依恋奶瓶或者乳房。这种依恋可能会令奶瓶或乳房变成心爱之物，并且会导致孩子夜间醒来并寻找这两样东西的习惯变得根深蒂固。在预定的时间哺喂孩子，在预定的时间让孩子使用杯子，给他喝水、牛奶、豆浆、奶粉、果汁等医生推荐的饮料。

妈妈们通常会发现，她们自己和孩子们都比较喜欢在早晨和晚上哺喂，而在白天的其他时候用杯子喝水，尤其是在吃固体辅食的时候。不要让孩子含着乳房或者奶瓶睡着，也不要让他们依赖哺喂才能安睡，不然你可能接下来的几个月都得半夜起来哺喂他。为了让孩子从奶瓶到杯子的转换更加轻松，你一定要坚持鼓励孩子找到一件心爱之物(除了杯子本身之外)。

有些妈妈会在孩子 9～12 个月这段时间给他们断奶，无论妈妈是否有意，有些宝宝这段时间也能自行断奶。如果你的孩子在哺喂(或者用奶瓶吃奶)时东张西望，含着乳头却没有吮吸，在你还没有哺喂完时就想要滑下你的膝头溜走，或者表现出不耐烦就像有更好的事情要做一样，这就是孩子传达出来的信号。

无论你打算现在就开始给孩子断奶，还是过几个月再做，断奶都应该是一种自然而然的，轻松的转变过程。但当你面对一个

睡眠不足，过度疲劳的孩子，尤其是一个还没有学会在不含着乳房或者奶瓶的情况下如何入睡的孩子时，任何事都没法变得轻松而自然。

何时应该断奶

断奶应当是一个轻松而自然的转变过程。有些妈妈几个月就给孩子断奶，尤其是当她们准备继续工作的时候。还有一些妈妈则可能要母乳喂养一年或者更长时间。如果你打算在孩子一岁之前为他断奶，你应该先开始对奶瓶的转变。如果你打算在一岁左右断奶，那么我建议你可以从母乳喂养转而让孩子使用杯子。断奶很少影响睡眠，但如果睡眠已经受到影响，孩子已经变得过度疲劳而且心情不好的话，那么就会让断奶更困难。如果孩子还没有学会在没有乳头或者奶嘴的情况下应该如何睡着，那么断奶也会更困难些。在断奶方面，并没有什么方法是“绝对正确”的，但大部分常见的建议是第一周先取消一次日间的哺喂，下一周取消第二次日间哺喂，诸如此类的顺序。（有些妈妈的行动可能还要慢些，这样很好——你要按照自己适合的方法来。）很多妈妈会在孩子一岁之后一大早先哺喂一次，然后晚上睡觉前再哺喂一次。但这么做的唯一问题是当孩子睡不着，或者夜间醒来没法再睡着的时候，得不到你的奶水。（用奶瓶哺喂孩子也有同样的问题。）如果这样的话，你就会面对睡眠问题而不是断奶的问题了。

很多妈妈反馈说，最容易取消的哺喂是日中时的那一次。无论是对妈妈们的身体状况，还是对孩子的心理状况，都相对比较容易。如果你打算先转换到奶瓶，那就让另外一个人把奶瓶交给孩子。如果孩子开始用杯子，那么就开始在

最接近哺喂时间的那一刻给他一杯牛奶，配合其他任何相应的食物都可以。一周之后，用同样的方法处理另外一次哺喂即可。

最后两次母乳喂养通常是清晨起床时的一次和晚上睡觉前的一次。这两次哺喂有些家庭会坚持很久，这要由你的选择而定。当你决定放弃清晨的哺喂时，可以的话，让爸爸在早上叫醒孩子，并给他一奶瓶牛奶和固体辅食（如果你的孩子已经开始吃固体辅食的话）。在孩子吃完早餐之前，妈妈最好都不要出现在孩子面前。

如果你打算结束晚上睡觉前的最后一次哺喂，那么可以让孩子用奶瓶或者儿童鸭嘴杯，然后接着执行孩子习惯的睡前仪式。要保证你在孩子睡前留出了一点额外的时间，这样如果他需要一些额外的安抚时，你有足够的时间做到。如果抽出几天时间来，让爸爸来进行上床睡觉前的最后一步，可能会更有帮助；如果孩子还不会用杯子的话，让爸爸用奶瓶在睡前喂他吃最后一次奶。记住，你不应该让孩子在睡前一直喝奶，那对他的牙齿很不好，最好询问一下医生，什么时候可以开始在晚上给孩子喝水来代替奶水。（果汁也不可以！）

如果你出现胀奶现象，可以用冰袋冷敷乳房。小心乳腺阻塞和乳腺炎的问题，及时向医生反应你的问题，好让症状减轻，避免更严重的后果。

安睡女士小提示

如果你由于疾病问题或者其他紧急状况而不得不突然间断奶，可能的话，可以先用吸奶泵，不过应该在两周之内缓慢地减少泵奶的数量和频率。有些哺乳顾问会建议你喝鼠尾草茶，或者把鼠尾草叶放在沙拉中，因为这种草药可以减少乳汁的分泌。

建立作息时间

作息时间示例

上午 7：00～7：30

叫醒孩子。母乳哺喂或用奶瓶、杯子喝奶。

上午 9：00～9：30

开始上午的小睡。如果你的孩子在夜间可以连续睡 11 到 12 小时的话，他可能一直到上午 10 点都保持清醒（或者在醒来后保持 3 小时的清醒）。有些孩子可能会在上午小睡之后需要一次少量加餐。

上午 12：00～12：30

母乳哺喂或用奶瓶、杯子喝奶。

下午 1：00～2：00

开始下午的小睡。醒后加餐。

下午 5：00～6：00

母乳哺喂或用奶瓶、杯子喝奶。

晚上 7：00～7：30

母乳哺喂或用奶瓶哺喂，并准备上床睡觉。

尽管我不相信有人能执行绝对严格的作息时间表，但小孩子确实需要持续而且有规律的作息。在执行时间表的第一周里，你哪怕严格一些，也好于太过松散。本章节中会就关于如何为这个年龄段的孩子们设计一个时间表的问题为你提出一些细致的建议。（如果你想了解更多关于时间表，以及食物与睡眠之间的关系等相关内容，还可以参考以前章节中的时间表部分。）

对于不同的孩子来说，作息时间表多少会有些变化。一个在早上 6 点半醒来的孩子的作息时间和一个在 7 点半起床的孩子的作息时间总会有少许差异。但上述时间表是个很好的示例，所以尽量不要改变过多。尤其是不要让孩子晚上睡得太晚，不管他看起来多么可爱都不行。

牢记威斯布鲁斯博士的观点：睡眠产生睡眠。一个休息充分的孩子会比过度疲劳的孩子睡得更香。孩子们如果没有在日间小睡时充分休息，或者没有在晚上按时上床睡觉的话，就可能会在午夜更频繁地醒来，也会在早上起得更早。

“金姆首先做的一件事就是告诉我们时间表的妙用——标出不同的时间间隔，何时艾米应该起床，何时应该小睡。这对于我们来说太新鲜了！艾米总是想睡就睡。策划一个实际的时间表是一件大事。”艾米的妈妈琳达说。

时间表的最大区别在于小一点的孩子和大一点的孩子的进食问题。先咨询一下你的医生，不过 9～12 个月处于自然生长曲线中的健康的孩子通常几乎可以在夜间持续 11～12 小时无需进食。如果你的孩子仍旧在晚上频繁醒来进食，你可能需要调整他的生物钟并同时改变他的生活习惯。

将进食时间与睡眠时间区分开来，将正餐与加餐的时间也明显区别开来，而不是让孩子不停地吃东西，这样有助于创造一种有益睡眠的生活节奏。在清晰可辨的进餐时间哺喂孩子：早餐、

午餐和晚餐。很多孩子在上午和下午都有加餐，但你应该注意不能持续地哺喂，不能整天都在让孩子吃东西(整晚也在吃)。如果你的孩子在一餐之后就准备上床睡觉，或者小睡，也要保证在母乳或者奶瓶哺喂与躺在婴儿床上之间有一些缓冲时间。你必须要打破哺乳一睡觉之间的关联，让孩子明白吃奶是进餐时间的一部分，而不是睡觉时间的一部分。

起床。最佳的起床时间是上午 7 点到 7 点半，不过有些孩子还是可能会在前几年中起得比较早。就算你的孩子晚上睡得较晚，通常开始在 7 点半叫他起床也是一个好习惯，这有助于调整他的睡眠节奏，避免将日间小睡和晚上睡觉的时间过分延后。(如果孩子睡得很晚，但日间小睡质量很好，晚上睡得也很好的话，就不要担心这时候叫他起来会太早；当孩子再长大些，需要起床上学前班时，应该给他足够的时间调整。)

就像你也有固定的起床习惯一样，为孩子创造一种他自己的习惯。拉开窗帘，用特殊的游戏或者歌声迎接新的一天。睡眠专家称之为戏剧化的起床，这能帮助孩子更好地在自己的认知中区分起床时间与睡觉时间的不同。早上也是一个适合玩些有激励作用游戏的好机会，比如让孩子飞高高之类爸爸们很喜欢、却不适合在睡觉前五分钟进行的把戏。对于那些下班回家时间很晚的家长们而言，早上也是个充满乐趣，和孩子一起开始新一天的机会。

上午的小睡。给孩子一些逐渐平静下来的时间，好准备他的日间小睡。这段时间不用像晚上睡觉前的仪式那么长，但孩子确实需要一些时间才能从兴奋的清晨活动中进入到上午的睡眠中去。试着让孩子在上午 9 点或者 9 点半躺下——如果他早上起得比较早，那么这个时间可以稍微提前一些；如果他晚上连续睡了 11 或者 12 小时的话，这个时间则可以稍微拖后些。但不要让

孩子连续活动超过三小时。观察孩子的睡眠时机，很多孩子会打哈欠，吮吸大拇指或者揉眼睛。还有些孩子则会表现出一些特殊的迹象，比如绕自己的头发或者表现出一副呆滞而茫然的样子。

“艾米开始揉眼睛，这就是睡眠的迹象了。但她是个不爱睡觉的孩子，她很擅长掩饰自己的睡眠信号。我们不得不学会密切注意她的表现，因为她可能会坚持再坚持，尽她所能地去抵抗睡意，这就可能会让我们误以为她可能还不困倦，还不需要睡觉。实际上她反而需要两三小时睡眠，比我们预想的还要多。她一直都睡眠不足。”琳达说。

一个 9 个月大的孩子在上午应该小睡一个半小时，12 个月的孩子则需要一小时。如果你的孩子上午睡的时间很长，下午仍然睡得很好，晚上还是不错的话，也不要担心。不过，如果孩子上午睡的时间很久，可下午却睡得不好的话，就可能影响晚上的睡眠，所以应该适当将上午的小睡缩减 15～30 分钟。下午的小睡一般时间更长，也更重要，而且如果从现在开始的几个月中孩子上午不需要再睡的时候，下午的这一次睡眠也是仍然应该坚持的。

上午的小睡与午餐之间的时间间隔很适合做一些游戏或者外出玩耍。孩子刚刚睡过一觉，不可能在汽车里或者婴儿推车里打盹儿，因此也不会耽搁下午的小睡。有些孩子在上午小睡醒来之后需要少许加餐，有些则直到午餐之前都不需要吃东西。

午餐。午餐应该在中午 12 点半左右。这个年龄段的孩子通常已经开始添加固体辅食了，伴以母乳哺喂或者用奶瓶喝奶，更好的话可以用杯子喝奶了。试着在午餐之后玩耍或者散步一会儿。午餐不要吃得太晚，也不要吃完就马上进行午睡；你应该试着削弱进餐——尤其是用奶瓶的方式——与睡眠之间的关联。

下午的小睡。下午的小睡一般应该在下午 1 点到 2 点之间开始，或者在上午的小睡结束后三个小时左右开始。记得注意一

下这一次的睡眠时机，给孩子一些缓冲的时间，从一段时间的玩耍和探索中转换到睡眠里去。对于 9 个月的孩子来说，这次小睡应该持续一个半到两个小时；12 个月的孩子则应该睡一个半小时。在睡醒之后孩子很可能需要一次加餐。

晚餐。尽量把孩子的晚餐时间定得早些，在下午 5 点到 6 点之间开始，哪怕这时候父母都不在家，或者还没有准备好全家的晚餐。你的生活应该是正常而健康的，因此如果你让孩子的作息时间比较早，他也会睡得更好。这样孩子还有一种进餐“时机”（就像睡眠时机一样），如果你错过了这个时机，他们就吃不好。也许会导致孩子们在午夜被饿醒，或者是我们在午夜因为担心他们没吃饱而惊醒。

睡觉时间。晚上的睡觉时间应该在晚上 7 点或者 7 点半开始，这里的睡觉时间我指的是孩子躺在婴儿床上的时间，而不是在浴盆或者在你的轻拍下听故事的时间。这个年龄段的孩子们比起小婴儿来，会更激烈地抵抗睡眠。我曾经遇到过一个小孩，在只有 9 个月的幼儿时就会用猛烈的甩头来保持清醒。

拿出足够的时间给孩子放松，并找一些方法对他的大脑进行暗示，告诉他现在已经是该睡觉的时候了。这个年龄段的孩子已经应该开始刷牙了，哪怕还没有多少牙齿。有些家长不喜欢在开始洗澡和上床睡觉的仪式开始之前让孩子刷牙。如果孩子不喜欢刷牙，你就不必把他那种可爱、娇嗲，准备好睡觉的感觉，变成由于他口腔卫生问题而激起的异常强烈的焦躁。

确保睡前的仪式发生在卧室里，而不是在家里四处游荡，尽量在每晚都用相同的游戏和故事做结尾。有些孩子，尤其是当他们稍微大点儿的时候，还会坚持让每个晚上都完全一样，甚至精确到最细节的部分，甚至不允许你讲的故事有丝毫改变。留出大约 15～20 分钟的时间。现在的孩子们对于图画书、简单的民谣

和儿歌更感兴趣，他们也喜欢躲猫猫和其他类似的简单游戏。记住让孩子的心爱之物也参与到游戏中来。

在我接触到克里斯蒂娜和安迪之前，他们已经为莎莉设计了一个非常美好的睡前仪式。我们仅仅是稍作修改，主要是消除了哺喂与孩子上床睡觉的时间过于接近的问题。孩子会先吃晚餐，然后洗澡、讲故事，最后上床睡觉。从大约九、十个月开始，这个仪式一直完美地持续到她19个月大都几乎没有任何改变——只是增加了和爸爸做游戏的一小段时间，并把原来的一个故事变成两个故事。“安迪曾经试着在不讲故事的情况下把孩子放到床上，但她不答应。”克里斯蒂娜笑道，“睡前仪式！我太需要它了。”

你可以播放一些温柔而平静的音乐，用音乐营造一种氛围，暗示大脑该睡觉了，但在孩子躺到婴儿床里之前或者躺下之后就要把音乐关掉。你肯定不想让孩子太依赖摇篮曲，以至于没有摇篮曲就睡不着。如果你之前在孩子睡着之后还播放音乐的话，可以慢慢地把它去掉，降低音量，然后试着在孩子睡熟之前关掉音乐。也可以用同样的方法放弃在睡前使用带有声光的玩具。

如果你还要抱着孩子踱步或者轻摇他，尽量简短而且要在孩子的房间里进行。在孩子昏昏欲睡的时候把他放下，让他学会在最后关头自行入睡。要实现把孩子放下的目标，昏昏欲睡的状态是关键。如果你的孩子做不到，首先你要努力在晚上睡觉时让他开始变得昏昏欲睡。在凌晨2点时让孩子昏昏欲睡非常重要，而如果父母本身并就是半睡半醒的话，坚持到底相对而言就更简单。一旦你在晚上睡觉的时候成功做到了这一点，那么将它推广到其他时间，坚持下去，就更简单了。

睡前哺喂。当孩子不再依赖哺喂才能入睡，也不需要你在夜间醒来的时候哺喂就能自行睡着的时候，在上床睡觉前进行最后一次哺喂（或者用奶瓶喝奶）就没有问题了。如果孩子还是像很

多婴儿一样依赖乳房或者奶瓶才能睡觉，那么尽量将最后一次哺喂安排在睡前仪式中比较早的时间进行。也就是说，要在唱歌或者讲故事之前进行，不要让孩子含着乳头睡着。记住，昏昏欲睡的状态最重要！

有些妈妈发现，如果不在孩子的房间里哺喂，那么建立起睡眠与哺喂之间的区别就更容易一些。看看这个方法对你是否奏效。如果你想待在孩子的房间里，那么在哺喂的时候打开灯，然后当你想要传达给孩子上床睡觉这一信号时再把灯关上。

梅格和约翰没有为布鲁斯设计任何时间表——除非你觉得毫无计划性可言的 20 分钟日间小睡和晚上 10 点上床睡觉的做法也算是时间表的话。但梅根和约翰如果不调整时间表，就没法解决他们遇到的其他问题。

布鲁斯在前四个月时患上了严重的疝气，他的祖母是个非常善良的老人，每天都会过来帮助照看和安抚小孩，给梅根和约翰带来一点喘息的时间。可是当布鲁斯的疝气痊愈，精神恢复之后，祖母还是会每天晚上都过来和他玩耍。如果祖母愿意满足孩子的各种奇思妙想的话，有哪个孩子不愿意兴高采烈地在床上爬来爬去呢？布鲁斯一般会在晚上 8 点左右开始揉眼睛，打哈欠，但从没有人注意到过，哪怕他的睡眠时机是如此的明显。毕竟，他表现得非常清醒，而且非常有趣。“他特别会自娱自乐，整晚都像疯子一样。”梅根说。后来，他们才发现布鲁斯是在清晰地告诉父母自己需要在 8 点上床睡觉，但是没有人作出回应，结果孩子的皮质醇分泌过多，造成了第二次亢奋状态，让孩子一直坚持到晚上 10 点。毫无疑问，当祖母离开之后，想要让孩子去睡觉就特别困难了。

随着睡眠训练的进行，夫妻俩按照一个更加固定的日间小睡时间表让孩子睡觉，并告诉祖母，尽管布鲁斯非常爱她，但她还是

应该在晚上7点就离开，这时候布鲁斯正好在洗澡——或者整晚都留下来照料因她而无法睡着的小孩。

安睡女士渐进法

很多和我合作过的家庭，包括本章节中出现的几家，都用安睡女士渐进法帮助他们的孩子摆脱了负关联的不良影响。我曾经在第一章“安睡女士系统”中介绍过这个概念，但我们在此要重新强调一次，要特别注意这个年龄段孩子的心理需要。当你的孩子在渐进法过程中，在夜晚醒来时，走到他的婴儿床前安抚他一小会儿，然后再回到这晚睡觉前你所处的位置上去，等待孩子再度睡着。我们应该坚持对孩子每一次醒来都作出回应。用我在“问题与解决方法”这一节中提出的技巧来处理孩子的睡眠支撑，改变让他很难在半夜醒来后再度自行入睡的习惯。

你应该按照渐进法的时间表行事，哪怕孩子有一两个晚上比平常更为烦躁不安，醒来得更频繁，也要坚持循序渐进到下一个步骤。在每开始一个新阶段的第一天里，如果孩子出现了一些退步或者抵制也不要大惊小怪。如果孩子在渐进法过程中患病，你就应该暂停一下，“停滞”或者保持你当前所处的位置，直到孩子病情好转。你甚至可以在孩子患病期间挪到一个距离他稍微近一点的地方，好给他更多的安慰。但当孩子痊愈后你就得从头开始再来一遍。

第1～3晚。洗澡、讲故事和唱歌一结束，你就应该坐在孩子婴儿床边的一张椅子上。如果他哭闹起来，你可以马上就抚摸或者轻拍他(尤其是在第一个晚上)，但不要过于频繁地这么做，不然你就会创造出一个新的负关联。在孩子准备好上床睡觉的这一阶段，你可以为他唱儿歌，但一旦到了孩子睡觉的那一刻，就要

发出平静的“吁吁”或者其他有安抚作用的声音。你应该也合上自己的双眼，这有助于控制自己不跟孩子讲太多话，还能传达出一种睡眠的信息。记住，如果孩子在婴儿床里站了起来，只能把他再放下一次。然后就应该拍着床垫鼓励孩子自己躺下了。如果你坐在婴儿床边，和孩子处于同一水平位置，而不是站在一边，那这个方法就会更有效。

由父母掌握与孩子肢体接触的程度也是很重要的，不能让孩子握着你的手或者手指，而应该由你来轻拍他的手。确保你对孩子地抚摸没有过于用力；要时断时续地抚摸孩子。你不应该用一种负关联来替代另外一种，比如用频繁地抚摸或者你的声音来替代抱着孩子轻摇的举动。

在渐进法的任何一个阶段中，都不要很快就把孩子抱起来——但如果他确实非常不安，需要抱起来时，你也可以走上前去抱他，但最好是把他抱起在婴儿床上方即可。抱着孩子直到他平静下来，但是尽量短暂。在孩子仍然醒着的时候就把他放回去。告诉他一切都好，然后继续坐在椅子上等他睡着。

第 4～6 晚。将椅子放到婴儿床和房门之间的位置。（如果房间很小，或者婴儿床很接近大门，那么就直接移到门口，就像在第 7 晚应处的位置。）继续发出安抚性的声音，但是尽量一直待在椅子上。如果必要，可以迅速上前轻拍或者抚摸孩子，或者发出一些你前三个晚上用过的安抚性的声音。

第 7～9 晚。把椅子移到门口，但还在房间里的位置。你应该显得很模糊，但仍旧处于孩子的视野中。继续使用同样的安抚方式，尽可能少地介入孩子的睡眠，尽量多地待在椅子上。如果孩子有一点哭闹也不要担心；安静地抚慰他。孩子就能知道你还在他身边，就能安心入睡了。

第 10～12 晚。再往远处移一点儿，一般可以移到走廊上，但

仍然要处于孩子一眼就能看到的地方。发出“吁吁”的声音，不要太频繁，但要能足以提醒孩子你就在附近，随时可以回应他。待在原地直到孩子睡着。

你要记住几件事。孩子们很容易接受仪式化的生活。每三天变化一点儿——或者天数更少一些亦可。对于孩子来说，拖延会让事情更难做而不是更容易做。如果你给他的时间超过三天，孩子可能就会期待你一直待在现在的位置上，一旦你挪得更远，他可能就会愤怒或不安。

第 13 晚及以后。现在就应该留下孩子自己睡觉了——如果他还不能自己睡着的话。不要紧张，这样做其实对你虽然很难，但对孩子却不然。他已经有了两周的时间做准备。他已经放弃了一些自己的睡眠支撑，更熟悉自己的睡眠技能了。他已经意识到你一直都在支持他，回应他。

现在，你需要离开孩子的房间了。离开多远可以由你来决定。你应该离开孩子的视野，但如果你想待在能听到孩子动静的地方，比如门厅或者隔壁房间都可以。如果孩子偶有抽噎或者哭泣，你可以在卧室的门口安抚他。看看你是否能站在门口用自己的声音令他平静下来。但如果你发现自己必须走到他的婴儿床前，那么就要尽快而且简短。然后再离开孩子的视野，回到走廊上去，但是最好能处在一个近到能让他听到你温柔而平静的声音的地方。相信自己的直觉，几分钟之后，如果你觉得他还是很需要你的话，可以在门口检查他的状况。但尽量不要过分干涉孩子的睡眠，或者放弃你和你的孩子一起做的那么多的努力。很少有孩子会在渐进法的过程中哭泣超过几分钟。记住，孩子已经获得了自信，知道你就在附近，而且会回应他。他已经准备好掌握睡眠的技能了。可以阅读一下前面“给渐进法第三晚的一些特别的提醒”部分的内容。

艾米

艾米的父母让她按照一个更加严格的日间小睡时间表作息，主要是把本来就很好的晚上睡觉前的准备仪式延长了，并且开始实行渐进法。艾米一开始也会哭泣，而且当父母把椅子移到门口的那个晚上她哭了很久。但琳达和米格尔在过去的两个月中已经面对过很多歇斯底里的哭泣，至少现在他们可以看出孩子正在进行自我调整，以便适应新的睡前仪式。在十天之内，他们就走出了艾米的房间，只是用语言鼓励她，并且能在他们自己的房间穿过走廊对艾米讲话。“我们一般都说‘躺下，躺下’，然后她就会躺下睡着了。”琳达说。

通过慎重的安睡女士渐进法的步骤，艾米开始相信她的父母就在附近，他们会检查自己的情况，如果她需要，父母也会出现在她面前。但艾米也算是明白了，她的父母是不会把自己从婴儿床里抱出来的，哪怕她大声哭嚎也没用，所以她只好继续睡觉。

当艾米稍微大点儿之后，大约 15 个月大，她有时候会在开始感到困倦的时候开始进行自己的睡前仪式。“她会爬上我的膝头，指着她的婴儿床！”如果某个晚上，米格尔或者琳达身为父母的直觉捕捉到孩子可能有些焦虑的时候，他们也会灵活地变通一下原则。当然他们不会抱起艾米，也不会退步到过去那种混乱的状态，回到训练最开始的时候。但父母中的一人在晚上睡觉时会间或坐在孩子房门口的地板上，给她一点有必要的特别安慰。这让他们有效地控制住了通常会出现的分离焦虑的顶点，却不会扰乱孩子整体的睡眠习惯。这是个成功的案例，展示了一旦孩子掌握了独自睡觉的基本原理之后，父母们应该如何灵活地响应孩子的需求。

问题与解决方法

无法自行入睡或者无法保持熟睡的婴儿们通常都有负关联或者睡眠支撑的存在。这些东西实际上从本质说也不算是坏习惯;只不过当它们阻碍了睡眠的独立性时就成为负面因素。例如,孩子们本就应该得到父母的拥抱,和他们相互依偎。但如果孩子们通常都会被父母拥抱着或者依偎着直到睡着,或者夜间每次醒来都有人拥抱的话,那么他们就没法学会自己入睡,或者在夜间醒来之后再度睡着。

类似的负关联还包括:安慰奶嘴,这是一种必须要不断重新放回口中的道具;抱着婴孩踱步、轻摇孩子、为他唱儿歌;哺喂,哪怕孩子只是单纯地为了寻求安慰,而不是因为饥饿才吃奶,等等。作为父母,我们的任务就是帮助孩子消除这些有害睡眠的关联,创造出能够帮助孩子得到生长发育和令意识飞速发展所必需的新的正关联。

如果尽管你按照本章节提出的建议行事,可孩子却仍然会在夜间醒来的话,最好再检查一下他的睡前程序。你是否在他过度困倦的时候才把他放到床上?如果是的话,他可能在你已经为他做了那么多睡前准备工作的情况下学会了让自己在晚上定时睡觉,但却不知道在没有你帮助的情况下应该如何在夜间醒来后再度睡着。试着下次睡觉的时候,在孩子稍微有点困倦,相对更清醒的时候就把他放到床上,好让他有机会完善自我安抚的技巧。你还应该试着把上床睡觉的时间稍微提早十五分钟或半个小时,也许还可以在最后一次哺喂和上床睡觉之间创造出更多的区别感来。试着在你哺喂孩子的时候留一盏柔和的小灯,这可能会帮助他打破吃奶与睡觉之间的负关联。

定时检查

有时候我们需要修改渐进法，这是因为一个孩子可能会由于父母在婴儿床或者儿童床边频繁出现而受到过度刺激。他一次又一次地希望能够吸引父母的注意，无论你怎么安抚他，发出“吁吁”的声音，他都会坚持要吸引你的注意。在这种情况下，你应该试着用一下“定时检查”法，这是“费伯睡眠法”的一种变体。在睡觉的时候，先完成你们睡觉前的仪式，让孩子在躺下之前平静下来。然后亲吻他，告诉他你会在离开房间之后再回来检查他的情况。

对于你应该多久检查一次孩子，并没有特殊的规则，你可能需要多尝试几次。如果你检查得过于频繁，孩子可能会认为你在和他玩游戏，结果受到更多刺激。如果你拖延得过长，他可能会生气、不安。

一开始可以每七分钟检查一次，然后渐渐地增加时间，但要信任你自己的直觉，并进行必要的调整。当你检查孩子的状况时，要直接走到他的婴儿床前，飞快地安抚性地轻拍他一下。但是不要磨蹭：如果你站在婴儿床前半小时，轻拍孩子睡着，就会导致你的目标彻底失败。

取消夜间哺喂

很多父母这时候仍然在整夜哺喂一个 9～12 个月大的孩子，当他们来拜访我，听到我说这个年龄段中位于良好生长曲线上的健康的孩子在夜间不需要吃奶时，都抱有强烈的怀疑态度。不是哺喂一次，不是哺喂一点儿，孩子们确实能够睡 11～12 个小时左右而不需要吃奶。

咨询一下你的儿科医生，如果你的孩子仍然会在夜间醒来吃

奶，你面对的就应该是一种习惯而不是一个营养问题。因此，你孩子的生物钟需要进行调整，好让他能够在白天吃得更多，从而不会在夜间肚子饿得咕咕叫，不然孩子就可能会把夜间的哺喂当作一种睡眠支撑。

安睡女士小提示

如果孩子在他“预定的哺喂时间”前醒来，并且哭闹不休，也不要在时钟指针刚指向“预定的时间”前就开始哺喂她。如果你这么做了，就相当于训练孩子学会没完没了地哭闹。反之，在哺喂之前让他躺回去至少再睡一小会儿。比如，如果孩子在晚上 11 点醒来，一直哭闹到午夜，不要在 12 点整的时候立刻把他抱起来哺喂。让他继续睡一会儿，哪怕只睡 30 分钟他就会再度醒来。也就是说，如果孩子在 11 点时醒来，哭闹到 12 点，最后在 12 点 10 分再度睡着，又在 12 点 45 分醒来，那么 12 点 45 分的时候你就可以哺喂他了。这样孩子就能学会在没有食物的情况下入睡。当他哭闹时，尽量不要把他抱起来，但如果他开始变得歇斯底里，可以迅速地抱他一下。有些孩子三四天就能调整好自己；还有一些则可能需要更久一些。你的坚持有助于孩子更快地适应。

在这个年龄段，我通常会建议父母只要单纯地取消夜间哺喂即可。你可以用其他替代方法来安抚孩子，坐在他的床边间歇地轻拍他，发出“吁吁”的呢喃或者其他安慰性的声音。最近有位家长告诉我，她很担心这种“突然中止法”会有不妥。我告诉她无需留下孩子独自哭泣；妈妈或者爸爸可以在孩子身边安慰他。有别于“突然中止法”，我鼓励家长们将我们的方法看作是“温馨中止法”。

不过，如果这种方法对你而言还是显得过于生硬的话，还有两种方法可以帮你在开始安睡女士渐进法的同时取消夜间哺喂：

选择 1：梦中哺喂，进行 2～3 晚。大约在晚上 10 点或者 11 点叫醒孩子进行最后一次哺喂，大概时机应该是在孩子上床睡觉之后的三个小时，在你上床睡觉之前。

选择 2：按照我在前面章节中提出的建议进行一次定时哺喂。进行三晚。

无论你选择了哪一种方法，一直到次日早上 6 点你进行“戏剧性的起床仪式”并开始新的一天之前，都不要再哺喂孩子了。如果他在晚上的其他时间醒来——而且他很可能会在起初的几晚都如此——你可以坐在孩子的婴儿床边安抚他。到了早上，孩子会感到饥饿，这回过头来反而能帮助他在接下来的白天中吃更多东西，也就表示在夜晚到来之前，孩子会更加满足。

一般家长们会在第四晚把自己的椅子从婴儿床边移到渐进法要求得更远一点的位置，但我们在此打算修改一下，好适应断奶。所以在第四晚时，无论你选择了方法 1 还是方法 2，都要继续留在婴儿床边，但整晚都不要哺喂孩子。每一次他醒来，你可以坐在他床边安抚他，无论是发出温柔安静的声音，还是轻拍或者抚摸他都可以。有时候如果让爸爸在晚上安抚孩子，那么这种方法就会更有效，因为孩子知道爸爸不能喂奶——就算他愿意喂，他也做不到。次日就可以把你的椅子搬到下一个三天阶段所处的位置上去了。

我知道很多人都会因为不在晚上哺喂孩子而感到焦虑；我们担心这会伤害孩子，我们可能会让他忍受那种难以表述的，痛苦的饥饿的折磨。其实不会的，孩子们会很好。如果你坚持——这不代表你有的晚上要让步去哺喂孩子——他就很可能会在三四天内主动放弃夜间的哺喂。如果你坚持，一切都不会很难，也不

会持续很久，也不会让孩子感到混乱。

如果你的孩子需要的时间超出三天也不要担心——他没什么问题；你只要安静地坚持，孩子就会进行调整，而且状态良好。（如果对你来说这是一个特别容易产生焦虑的问题，那么你可以回头看看第7章“6～8个月”，在那一章中我给出了更多关于如何增加白天进食量的细节内容。）

格雷塔和马特曾经用费伯睡眠法在他们的第一个儿子乔丹身上取得了很大的成功，但到第二个儿子弗雷德里克的时候，反而让情况更糟糕了。“他能一直哭45分钟，我完全无法忍受。再加上哭泣也刺激了孩子，让他更狂躁。”格雷塔说。但弗雷德里克11个月大的时候，开始“一晚上要吃一百次奶”或者起码要一小时吃一次。他经常会在父母的床上睡着，或者是在妈妈的怀里打盹，而他的妈妈则完全没有办法休息一会儿。

格雷塔和马特将安睡女士渐进法同彻底取消夜间哺喂结合起来。格雷塔在白天仍旧母乳哺喂孩子，但也不再很频繁了。减少的哺喂意味着弗雷德里克会吃更多固体辅食，反过来又代表他需要的母乳哺喂也减少了。放弃了连续的母乳哺喂之后，格雷塔开始寻找可以替代哺喂的安抚方法，并给孩子机会让他发展自我安抚的技能。在睡觉的时候，格雷塔还得训练自己，注意不让孩子含着乳头睡着，而是在他昏昏欲睡的时候把他放到床上。

格雷塔和马特很快就完成了整套安睡女士渐进法，有时候他们把一个三天的阶段换成两天，因为弗雷德里克很容易变得仪式化。换句话说，两个晚上之后，他就会预料到妈妈或者爸爸将要坐在一个特殊的位置，而如果他们移动了椅子的位置，孩子就会感到不安。因此如果他们第三天还如法炮制的话，孩子就更难适应椅子位置的变化了。他们还马上发现，他们应该尽量减少触摸和拍抚，因为这似乎让孩子更警醒而不是更困倦了。“我把手放

在孩子身上并没有什么帮助。如果我站在一边，时不时地说一些话或者碰碰他似乎更有用。”格雷塔说。

晚上的睡眠很快就真正得到了改善，但是夜间醒来的问题则花了更多的时间解决。当弗雷德里克醒来时，马特会很快走进他的房间安抚他。11 天之后，弗雷德里克开始能够整夜安睡了，尽管这结果导致让他上午的小睡时间向后拖延了许久。

白天的断奶对于克里斯蒂娜和莎莉而言很简单，但是 10 个月时，克里斯蒂娜仍然没办法取消她女儿最后两次母乳哺喂。在晚上睡觉的时候，克里斯蒂娜会在一张摇椅中哺喂莎莉，哄她睡觉，并且在摇椅中一直待到孩子睡熟之后，才温柔地把她放到婴儿床上。在凌晨 4 点，莎莉会醒来，克里斯蒂娜和安迪会把她抱到自己的大床上以便再次哺喂。

考虑到无论怎么做都可能会令莎莉不安，克里斯蒂娜非常为难。她完全没法忍耐孩子的泪水，并且把孩子每一声哭泣都理解为饥饿的信号。“她是我的小宝贝，我不能让她哭。”克里斯蒂娜回忆，“我哺喂她的次数太多了；每一次呜咽，我都觉得她是饿了。我从来不让这可怜的宝宝哭。我没意识到哭泣也是她的一种交流方式。”

克里斯蒂娜虽然有些怀疑安睡女士渐进法，并且预料到可能会要忍受泪水，但最后还是承认，她无论对自己还是莎莉来说都不称职，因为没能帮助女儿学会睡眠。她和安迪讨论了由谁来坐在婴儿床边的椅子上，克里斯蒂娜认为听着近在咫尺的莎莉的哭声对自己而言太痛苦了，哪怕是远远地听也是无法忍受的。“我知道如果由我来看着孩子的话，我完全无法判断她的状况是好是坏。”

莎莉是一个典型的很容易仪式化的孩子，她可以用一种睡眠支撑代替另外一种。她放弃了夜间的哺喂——但是在两个晚上

之内她就转而开始要求父母在夜晚不间断地轻拍自己。对于克里斯蒂娜来说，间歇性的触摸莎莉让她很难过；对于莎莉来说，如果妈妈的手没有穿过婴儿床栏杆放在她身上，她也会很难过。克里斯蒂娜还是得拒绝孩子——一开始她没有这么做——当莎莉一次又一次地站起来时，她就要一次又一次地让女儿躺下。莎莉会一直站起来，因为她知道，当妈妈把自己放下的时候，会抚摸和轻拍自己，而且妈妈会一直不断地这么做，因为妈妈停下来她就会哭。

起初三个晚上，莎莉哭了很久，哪怕她的妈妈近在眼前。第一个晚上她哭了45分钟，第二个晚上30分钟，第三个晚上20分钟。（这就是为什么做记录会有帮助，因为20分钟看上去真的没多少变化，除非你检查你的记录，才能发现第三个晚上孩子哭的时间比第一个晚上少了一半。）到了第四晚，轮到克里斯蒂娜把椅子移到门口——一切都开始走上正轨。在这一周剩下的时间中，莎莉夜间醒来的时间变短了，次数也少了。在一周之内，莎莉已经可以整晚安睡了。她的妈妈说："她变成一个很夸张的贪睡的孩子。"

取消抱着孩子踱步、轻摇的方法

当哺喂不再能取得理想的哄孩子睡觉的效果，或者当我们了解到夜间的哺喂会影响孩子的睡眠从而取消了这一部分的时候，有些人就开始改用抱着孩子踱步或者轻摇的方法来哄他们睡觉。睡前用几分钟抱着孩子踱步或者轻摇是不错，但如果孩子要求持续不断地轻摇或者五公里左右的踱步时，或者如果孩子在晚上需要很多次被抱着踱步和轻摇时，你就应该取消这种做法了。

面对这种问题时，最简单的就是在晚上睡觉的时间开始改变，这个时候你更清醒，也更能够坚持下去。从只在卧室而不是

家里的每一个地方踱步或者轻摇孩子开始，来创造一种在房间与睡眠之间的正关联。

每过几天就相应地缩减你抱着孩子踱步或者轻摇他的时间。当孩子的睡眠程度达到七成或者八成时就停下脚步，把孩子放到他的婴儿床上。我们希望孩子在躺到婴儿床上时能比较清醒。而不是想用某种方法悄悄把他塞到床上，或者欺骗他，因为当孩子处于局部觉醒状态下，如果他认为自己本应正躺在你的臂弯中时，却发现自己已经躺在婴儿床上的时候，他就会非常生气。最安全的方法是为他读一本故事书，稍微抱着孩子轻摇一下，同时慢慢走过去关掉他房间的灯。向月亮抛一个飞吻，或者给孩子一个吻和一个拥抱，然后把他放到婴儿床上。

坐在婴儿床边安抚孩子。如果他真的开始歇斯底里，可以短暂地把他抱起，一平静就马上把他放下。如果你刚抱起他不到两秒钟，他就安静下来，那么你就中招了！他并不是你想像的那样迫切需要你抱起来。当孩子醒来时，迅速地安抚他，但不要再用踱步和轻摇的方式了。然后你可以重新回到今晚渐进法应处的位置，坚持下去。

我曾经帮助过一位小女孩，她在白天睡得很少，不过夜间睡得更少。她妈妈哺喂得过于频繁，但到了这个年龄，哺喂已经不一定能让孩子入睡了。因此，她的父母用去了数量惊人的时间，抱着她轻摇哄她入睡。晚上睡觉的时候要摇，白天睡觉的时候也要摇，每次她在夜间醒来的时候还要摇。这是一个异常敏感的婴儿，几乎不肯错过任何一丝动静，她甚至学会了在父母们的“蹦跳”中将要睡着时通过抽搐让自己醒来。

我们用了两天时间将父母摇晃孩子的时间缩减到原先的一半，接下来干脆一下子全部取消。他们会在关掉孩子房间灯的同时轻轻摇晃她，亲吻她，然后把她放进婴儿床。一开始孩子非常

不开心，但她的父母仍然坚持安抚她。幸运的是，这个小姑娘是个聪明的小家伙，很快就学会自己睡觉了！

取消安慰奶嘴

安慰奶嘴确实有用处，但到了这个年龄段，它发挥作用的场地已经不是婴儿床了，除非你的宝宝是那种很少见的靠安慰奶嘴入睡，但却不会在夜半醒来时到处寻找它的孩子——如果真是这样，那么你可以不必看这一节！

如果你像我认识的一位妈妈那样成了整晚捡安慰奶嘴的“自动机器人”的话，你也可以将孩子的安慰奶嘴取消了，或者如果你觉得这么做有点太粗暴或者太困难，也可以让孩子继续使用安慰奶嘴，但要教她学会自己捡起掉下的安慰奶嘴放回嘴里。你可能已经注意到了，孩子可能会捡起掉出去的麦片、香蕉块或者磨牙玩具放回嘴里；所以没道理他学不会捡起安慰奶嘴。为了让这么做变得简单些，你可以在婴儿床里四处多放几个安慰奶嘴，好让孩子更容易就能捡到一个。

如果你的孩子还没有学会如何“自动”捡起安慰奶嘴的话，当你帮他的时候，把捡起的安慰奶嘴放到他手里而不是嘴里。也许你需要用几个晚上去教他把手放到嘴边，但这个年龄段的孩子学东西是非常快的。有些这么大的孩子还想每只手里都有一个安慰奶嘴呢。

如果你确定要让孩子继续使用安慰奶嘴，他可能会把安慰奶嘴当作一种心爱之物，你最终可能还是要更直接地面对如何从孩子手上拿走安慰奶嘴的问题。但有些家长则宁愿多等一段时间，直到他们的孩子再长大些，可以克服这种障碍为止。这时候我更愿意鼓励你将安慰奶嘴的使用限制在婴儿床、汽车等地方，好让孩子可以提前学到其他自我安抚的形式。有些家长会在夜晚把

安慰奶嘴拿走，但在日间小睡的时候留给孩子，因为对于婴孩来说，在日间小睡中自我安抚相对更困难些。

如果你决定放弃安慰奶嘴，或者试着让孩子学会保管自己的安慰奶嘴，但他强烈抵触，而且仍然会在夜间反复醒来寻找安慰奶嘴的话，拿出一个晚上来，做好面对一段不愉快时间的准备吧。确保你进行了一个非常完美而且平静的晚上睡觉前的仪式，尽量让孩子在昏昏欲睡的时候躺到床上。

不要给孩子安慰奶嘴。抚摸或者安抚他，就像你打算为孩子断奶时那样。不能给他安慰奶嘴，而使用其他安抚方法，类似于我之前给那些打算停止夜间哺喂或者抱着孩子踱步的习惯的父母们提出的建议那样。夜间当孩子每次醒来时都这么做。坚持记数。在脑海中牢牢记住，如果孩子哭了一小时后你放弃了，你就没能教他学会在没有安慰奶嘴的时候入睡，反而是教他学会了用哭一小时的方法来得到安慰奶嘴。

不一般的床铺

在早期，很多婴儿睡在各种各样的地方，除了他们的婴儿床——汽车座椅、摇椅、摇篮、摇车，甚至是家里传了好几代的柳条筐。但他们并不能永远都睡在柳条筐或者摇椅中，到你的孩子快要一岁时，他就应该睡在自己的婴儿床里(除非你打算长期和孩子同睡)。如果你的孩子晚上大部分时间仍然睡在那些不一般的地方，现在就改变吧。使用安睡女士渐进法让孩子睡进婴儿床里，让他留在婴儿床里，当他在夜间醒来时也要坚持如此。可以用孩子的心爱之物来让这段时间变得轻松一些。

布鲁斯就是那个每天晚上都要和祖母玩耍的孩子，需要父母抱着他踱步、轻摇、抱紧，然后放到一张特殊的床上的孩子。他的

父母在前四个月几乎是每周七天，每天 24 小时地抱着他——部分是因为他患上了疝气，部分则是因为他们认为这会让孩子成为一个感情充沛的人，还有部分原因则是他们不知道怎么才能忍耐住不去抱起自己这个漂亮的长子。“我们几乎每天都在为他而感到惊喜，我们只想抱着他，凝视着他。”梅根回忆说。

最终，她和约翰还是决定把布鲁斯放下睡觉——但那时候布鲁斯已经有了他自己的对于此事的看法。当然，他在自己的婴儿床里也很好——可以和人交互式的玩耍，能够非常有效地让他兴奋起来而不是平静下去。不过，要说睡在婴儿床里？那还是算了吧。布鲁斯睡在摇椅中，他的父母把这把摇椅放在他们的大床边。即便如此，布鲁斯每晚都还要醒来好几次，他的父母要么摇晃摇椅哄他入睡，要么抱起他踱步，然后尽量“在他发现之前悄悄地把他塞回摇椅中去”。

在布鲁斯一岁生日之际，他的父母下决心一定要放弃某些东西了。他们采用了安睡女士渐进法，尽管不是整晚都那么糟糕，但最糟糕的时候他们一直忍耐了半小时的哭声。在两周之内，布鲁斯就对摇椅说再见了；他很高兴能睡在自己的婴儿床上，而且在那里一睡就是整晚。

早起的鸟儿

如果你的孩子在早上 6 点或者 6 点半就忍不住爬起来，你可能只好认命地起床，哪怕自己还想再多睡一个小时左右。很多孩子确实起得很早，而且这样感觉很好。记住，要调整进餐和日间小睡的时间以适应他早起的时间。

第一次日间小睡应该在起床之后的一个半到两个小时后开始。（对于一个晚上 11 点躺下睡足整晚的孩子而言，如果他在清醒了快三小时，看起来仍然不显疲倦或者暴躁，那么他的第一次

小睡就可以在早上起床之后的三小时后开始。)你也可以将晚上睡觉的时间延后 15 分钟,让孩子稍微晚睡一些,但要慎重。孩子可能还是会在次日早上 6 点醒来,但却会更困倦,因为他头天晚上没有得到足够的睡眠。

注意孩子的睡眠时机和行为。如果他确实需要睡眠,不要强迫他醒着;否则当你想要他睡觉的时候,他可能就睡不着了。遮光帘会有所帮助,如果早上有很多噪音——鸟叫声、垃圾车收垃圾等——白噪音发生器也比较有用。你还可以试试看我在下面为那些不正常早起的孩子们列出的其他方法,但对于一个生物钟适合自己需要,但却不适合你的需要的孩子来说,这些方法不一定会起作用。

对于那些在早上 6 点之前就醒来,以及在 6 点或者 6 点半醒来时精神抖擞,7 点又开始困得东倒西歪的孩子来说,自由放任的方法并不合适。你需要介入孩子的生活,教他学会如何晚睡。格里塔和马特的经验证明,你对早起的孩子忍耐得越久,让他们回到正轨就越难。现在就开始改变他们吧,哪怕可能要几个礼拜才能看到效果也没关系。如果你一直等到婴儿开始学步,或者变成学龄前儿童,改变他就要花更多的时间。确保你早起的孩子能得到足够的日间睡眠,因为日间小睡不足会导致夜间睡眠质量更差,结果他会起得更早。你还应该改变他的日间小睡时间表,让他上午的那次小睡稍微晚些。试着向后挪半小时左右,但不要让孩子过度疲劳,从而导致他过于亢奋而无法入睡。

早起的孩子们

如果你的孩子在早上6点之前就会醒来，那么他很可能会过度疲劳。比起那些得到充分休息的孩子来，过度疲劳的孩子睡不好，睡不长。他很可能是：

- 日间小睡不足。
- 下午的小睡结束之后，到晚上上床睡觉之前，之间保持清醒的时间太久（尽量不要让这段时间间隔超过四小时）。
- 当他错过“昏昏欲睡”的时刻后才上床睡觉。如果他过于困倦，就无法学会让自己在突然清醒过来之后如何再度睡着了——比如早上5点的时候。

当你家早起的小鸟儿开始折腾时，要马上来到他的房间。你可以试着让他尽快再度睡着，而不是让他把自己吵醒。给他心爱的玩具，安抚他，尽量在不抱起他的情况下哄他睡着。哪怕就算是他再也睡不着了——而且大部分孩子一开始也不愿意继续睡——无论他怎么抗议，都不要打开灯或者把他从婴儿床里抱出来，直到早上6点为止。如果你让他较早起床，就会给他一种模糊不清的信息，也就是另外一种间歇增强的反面例子。

在孩子这个年纪时，我一般会建议父母留在房间里准备进行起床的仪式。然而，如果你觉得自己的出现会让孩子更清醒，就像大一点儿的孩子们经常会发生的那种状况的话，你可以试着在安抚孩子之后离开房间一会儿，看他是否会再度自己睡着。你可以每十五分钟检查一次他的情况。如果你留在房间里，尽量让自己的影响减到最小。试着坐在一张椅子上，闭上双眼。当时钟的指针终于指向6点，孩子也没有睡着的时候——似乎过很长时间

才会到 6 点——你就得离开房间一两分钟。孩子可能会哭，但不要为此担心，因为你马上就会再回去。

当你再度回来时，要有一个盛大的“早安”的出场时间，进行戏剧性的起床仪式。早上起床的仪式与晚上睡觉的仪式应该是截然不同的。你的目的是帮助孩子区分白天与黑夜，帮助孩子了解何时才是真正可以起床的时间。你的信息必需很清楚：“我把你抱出婴儿床是因为现在是早上——而不是因为你哭了。”

随着弗雷德里克晚上睡得越来越好，早上就开始变得不那么好了。他会在早上 5 点的时候醒来，发出响亮的尖叫。“这是最难过的时候，因为你知道你很可能再也没法睡觉了。”格雷塔说，声音里的情绪我从很多家长那里都听到过。

格里塔和马特会马上走到孩子面前，让他继续躺下睡觉。有时候弗雷德里克能马上就睡下。有时候他会哭上整整一小时。“完全无法预料。”格里塔回忆说。但是他们并不会抱他起来。等到了 6 点，他们会离开房间两分钟。等他们再回来时，会对孩子说：“早安！”然后表现得就像之前那些不愉快的情景从未发生过一样。

改变这种早起的生活习惯，比停止频繁的夜间哺喂用的时间还要长，但最后弗雷德里克还是能够一直睡到 6 点了。他的父母虽然很愿意让他再多睡一小时，但是他们不断地提醒自己他已经足足睡了 11 个小时——如果弗雷德里克偶尔能再多睡 15～30 分钟，他的父母会非常高兴。

日间小睡

父母们通常会不明白，为什么过度疲劳的孩子反而不容易进行日间小睡。现在你可以知道答案了：过度疲劳的孩子们正是因为太累所以才没法睡着。他们大量分泌的皮质醇让他们感觉更

警醒，甚至变得亢奋起来，哪怕此时他们确实缺乏睡眠。这种状况会发生在那些夜间太晚睡觉、早上起床过早、在运动中的汽车和婴儿推车中睡着、漏掉某次日间小睡、用很短暂的打盹儿代替时间较长的日间小睡的孩子们身上——有些孩子甚至上述情况全都存在。你需要检查一下孩子的作息时间，让他坚持按照日间小睡时间表和他的自然睡眠时机进行小睡。我必须承认，日间小睡训练是所有睡眠训练中我最不喜欢的部分，但也是最基本的部分。

这个年龄段的孩子们依旧需要两次日间小睡——一次在上午，较长的一次在下午。在15～18个月之前，两次小睡变成一次的情况通常不会发生，也不要过早尝试。

如果你让孩子在上午睡得时间过长，下午他可能就很难睡着了，一个9～12个月大的孩子如果从上午的小睡之后一直到晚上睡觉之前都不再休息的话，整个家庭中的其他人必然会为此付出代价。9个月大的孩子上午的小睡应该限制在一个半小时之内，12个月大的孩子则限制在一小时之内，并且不要在上午8点之前就开始。下午的小睡应当在上午小睡结束三小时之后再开始。偶尔的例外是没问题的。假如孩子生病或者头天晚上睡得不好，或者孩子可能为了练习刚刚学会的爬行或走路的技能，度过了一个异常活跃的上午，这种情况下他可能就需要时间较长的一次小睡，但不要变成一种惯例。

9个月时，大部分孩子都不再需要下午稍晚时的第三次短暂的小睡了。如果他仍然还保留着这次小睡的习惯，那么不要让这次睡眠影响晚上的睡觉，也不要太过担心；孩子很快就不需要了。同样，如果孩子上午的小睡都特别不好的话，让他继续保持第三次短暂的小睡，同时你得努力加长并改善他两次主要的小睡了。如果孩子仍然会进行短暂的第三次小睡，却因此影响了正常的晚

上睡觉的话，你就必须解决这个问题，不能让他再在下午较晚的时候睡觉了。

日间小睡的练习绝对称不上有趣，甚至可能会伴随着泪水。有些家长在日间面对一个哭泣的婴儿往往比在夜间更容易处理。我们在白天通常精力更充沛，而且把孩子独自留在不算黑暗的房间里时感觉也不会太糟。但有些父母进行日间小睡训练的时候，如果伴侣不能在家给予精神支持，只能独自面对孩子的话，仍旧会过得很糟糕。

我经常会建议那些家庭尝试一下日间小睡的训练——尽量多尝试一两天。但如果你内心有个声音告诉你，你确实无法做到的话，就顺其自然好了。你可以答应自己停止训练，但这不意味着你就要放弃让孩子进行日间小睡的努力；也不意味着你得告诉自己，孩子不需要日间小睡。孩子绝对需要日间小睡，哪怕 9 个月大的他表现非常好，你也要坚持他还需要小睡。我的合作者的儿子伊连在十个月大时就不再进行日间小睡了。他妈妈没法哄他睡着，他爸爸没法哄他睡着，他最喜欢的保姆，在自己长长的保姆生涯中曾经哄无数孩子入睡的专业人士也没法哄他睡着。有时候伊连会在和妈妈一起去接哥哥扎克放学回家时在汽车里睡着；或者下午的时候坐在他的高脚椅中睡着。他的父母最后的结论是，伊连是那种少见的不需要日间小睡的孩子。其实，他们大错特错了。直到伊连快两岁的时候我才开始与他的家庭合作，但随后我们就让他重新开始日间小睡，平时每次可以睡两小时或者两个半小时，有时候甚至能达到三小时。（因为扎克周末在家，所以此时伊连会非常兴奋，这仍然是个问题。）

这个案例的意义在于，如果你无法忍受孩子哭泣，就无需忍受。但我必须再次声明：**如果对你而言太过为难，你确实不必让孩子进行日间小睡的训练。但你必须保证他的日间小睡，无论采**

用什么方法。把你的全部精力都放到改善孩子夜间睡眠上去，用任何你知道的方法让他在白天小睡，哪怕这意味着违背安睡女士睡眠原则，依赖于部分运动性睡眠。

你会发现当夜间的睡眠改善之后，日间的睡眠也会随之改善。或者你可能会发现你不得不在几周或者几个月之后再开始进行日间小睡的训练。但一旦你发现这些方法确实能改善夜间睡眠，让你的孩子更快乐的话，那么第二次再开始进行日间小睡的训练对你来说就会简单许多了。

以下是对日间小睡训练的简要概括：(如果你想了解更多关于日间小睡的细节问题，并使用渐进法进行日间小睡训练的话，回头去看看第 7 章“6～8 个月”中的“日间小睡”部分内容)。上午小睡时，在孩子昏昏欲睡的时候把他放到婴儿床上，给他一个小时入睡。如法炮制，下午的小睡也是一样。

如果就算要用去一个小时的时间，你也想要陪着孩子进行渐进法训练的话也没关系。不过，如果你感觉到你的存在让孩子变得很清醒的话，还是不要待在他的房间里。离开房间，每十分钟左右回来安抚孩子一次。你还可以坐在他的门口，让他知道你在附近；你可以用这一个小时的时间看书、织毛衣、做伸展运动、抬腿练习或者收发电子邮件，等等。并非所有的婴儿都会用掉整个小时的时间入睡，或者他们可能只在起初的几天要用一小时而已。

如果孩子在上午的这一小时中终究还是没有睡觉，那么下午小睡的时间尽量比平常提前一些，因为他可能会过度疲劳。观察孩子的睡眠迹象，当他准备睡觉的时候及时把他放到床上。第二次小睡开始的时间最短可能就在上午的小睡结束，他起床的 45 分钟之后(或者上午根本就没有睡)。

下午要再给孩子一个小时的时间入睡，但如果一小时之后他

还醒着，就要走进他的房间进行戏剧化的起床仪式，如果他短暂地打盹儿，二三十分钟之后就醒来的话，就要重新安抚他，再次开始给孩子一个小时时间准备入睡。

日间小睡训练要点

让一个孩子上午小睡，比让他下午小睡简单。不要错过这次机会。

下午小睡的训练更为困难，不要气馁，这是很常见的。

在日间小睡训练过程中坚持做记录。

如果下午 2 点或者 3 点时，孩子小睡的效果不好，你可以尝试进行你的“备用计划”，比如在手推车或者汽车中小睡，来避免孩子过度疲劳，影响晚上的睡眠。

在日间小睡训练过程中，你可能会受限于在家庭的范围内活动。如果你觉得自己一整天在做的事就是让孩子进行日间小睡，那就对了！你得到的回报是：一旦建立起一个有规律的日间小睡时间表，你将会得到更多自由（以及一个快乐的、精力充沛的宝宝）。

如果你有一位保姆，或者孩子在幼儿园，可以替你进行日间小睡的训练，那就要感谢老天了。如果你的保姆不愿意帮你进行日间小睡训练，看看是否能够向她简单地解释一下睡眠的科学道理来说服她。如果不行，就告诉她你的孩子需要全面的“大量睡眠”，哪怕这意味着你的保姆必须用某种睡眠支撑，诸如轻摇孩子入睡、进行简短或者不规律的日间小睡等，也都可以。

为下午制定备用计划。任何可以让孩子睡觉的方法，必要的话还可以包括驾车出行，因为如果孩子过度疲倦，就会导致睡眠

不足的恶性循环。

一种常见的错误是在日间小睡之前给孩子进行短暂的“安抚性哺喂”。通常在孩子吃奶之后的15分钟，他就会打盹儿——这是一种含着乳头的同时发生的短暂“有效打盹儿”。这种打盹儿能给孩子恢复足够的精力来抵制真正的日间小睡。妈妈们不应该进行这种小睡前的哺喂，或者应该将这次哺喂的时间再提前一些。

爱琳很快就停止了儿子布拉德的夜间哺喂，并把他从父母的大床搬回到婴儿床，但却用了两个月才完成日间小睡的训练。“保姆不愿意为孩子进行日间小睡的训练，所以当我在家的时候就亲自进行，可我并不是每天都能在家，所以这个训练用了很长时间而且也非常困难。”她说。然而，随着她坚持不懈地付出努力，布拉德终于结束了毫无用处的20分钟短暂睡眠，开始每天两次非常好的日间小睡。当他长大一些后，两次小睡合并为一次的转变也非常顺利，18个月大的时候他每天下午的小睡——无论是和爱琳在一起，还是和保姆在一起——都能达到两三个小时。

虽然布鲁斯的夜间睡眠很快就得到改善，但日间小睡的改善却十分困难。有时候梅根会把他放进汽车座椅中，然后开车到处游荡直到他睡着为止，而且他一般睡的时间还很短。梅根不希望冒着吵醒孩子的风险在寒冷的风中把他从车里抱进房子里，但也不希望一直开着车，因为在运动中孩子的睡眠其实并不是很好。所以她带了很多条毛毯……以及自己的笔记本电脑。当布鲁斯睡着之后，梅根就开车回家，把车停在车库门前，用毯子包住自己，然后做一些工作。

同睡

如果你和孩子同床睡觉，可以阅读下册第 3 章“这到底是谁的床”，如果你想继续与孩子同睡，我也可以帮你改善整个家庭的睡眠。要格外注意帮助你的孩子学会自己进行日间小睡，这一点无论是现在还是未来当他学会更多技能之后都非常有帮助。如果你以前和孩子同睡，但是现在想要分开睡觉的话，我也会给你一些建议，告诉你应该如何去做。如果停止同睡已经列到你未来的日期表上，那么在孩子的分离焦虑达到顶点之后，以及在一岁左右再度出现之前的 9～12 个月时是非常好的停止同睡的机会。

詹森

在开篇中你曾经看过关于泰丝的简略的故事，她曾经为母亲的化疗与儿子的失眠努力过。詹森那时候 10 个月大，经常和泰丝一起睡觉，泰丝的丈夫罗恩因为无法和婴儿同睡，所以自己在客房睡了 8 个月。詹森整晚都要哺喂，还要紧贴着妈妈睡觉。“我就像一种随要随吃的自助餐，而且还整晚服务。”泰丝笑着说，“此外我还是他的踱步、聊天等安抚项目的服务员。”

泰丝知道自己应该做一下改变了，但她希望这种改变能非常柔和，而我也不希望强迫泰丝超出她的情感底限。所以我们只是尝试着取消了凌晨 2 点半的哺喂，试着在她和婴儿之间放置了一只枕头来隔开他们，试着让她晚上穿一种特制的衣服睡觉。“我得从凌晨 2 点起来，一直到 5 点，为了略过 2 点半的这次哺喂，抱着孩子轻摇，迷迷糊糊地闭着眼睛。我非常明白这种方法不可能起作用，但是我需要这样做。这种做法实际上是在对我进行训练。接下来，由于我的母亲生病，我几乎快要崩溃。”

泰丝遭遇到了她自己的感情问题。小时候她曾经经历过夜惊和梦游，而且一直与父母同睡到 8 岁。“无论是待在我自己的

房间还是跑到父母的房间，我都记得很清楚。我觉得如果父母说'不行，你不能进来'的话，我可能会死。我是父母十五年之内生的第三个孩子，所以我得到了许多东西。"在詹森之前，泰丝还经历过两次可怕的流产，所以一切做母亲的可能会有的焦虑感她几乎都产生过。当然，她同时还要照料一个与自己感情深厚的重病的母亲。另外，她知道自己这种不安感有些稍微夸张。"我是个律师，我是个公诉人，我可以做到铁石心肠。但我不能站在那里听我的孩子哭泣。我会发疯的！"

最终她还是准备好采取更多行动，她给了詹森一张可爱的、"松垮垮"的小毯子。她在自己的家里和母亲纽约的家里都放了一条这样的毯子。"他非常爱他的小毯子；无论我们给他什么玩具，他都只要自己的小毯子。"将近两周时间他们都睡在詹森房间的地板上，比我通常建议的时间多出了两三天，但因为当时有很大的环境压力，所以我们也需要特殊的抚平情绪的方法。

到了该把詹森放进婴儿床时，泰丝会把他交给他的爸爸，然后自己住进旅馆，她在旅馆里整晚打电话给朋友聊天，说自己害怕让孩子哭泣会让他觉得自己被抛弃了，搞不好有朝一日就会因此变成一个连环杀手之类的东西。同时，罗恩本人当然也不完全是一个可以面对眼泪的勇士，因此他会邀请一位朋友到家里来做自己的精神支持。

孩子哭了一小时，罗恩就站在房间里，但却没有把他抱起来。不过尽管度过了一个艰难的睡觉时间，詹森还是只在夜里醒来了一次，哭了20分钟。第二个晚上就更简单了——20分钟的睡前哭泣，詹森只需要他爸爸进来简单地检查一次情况并安抚他就没事了。

第三个晚上，泰丝离开了旅馆回到家里。詹森比第一天晚上哭的时间短，但是比第二天哭的时间长，尽管泰丝仍然发现孩子

的哭泣让自己痛苦，但她也用自己律师特有的敏锐眼光发现了一些迹象——孩子并没有受到什么伤害，他还是“平常那个快活的小家伙”，而且他已经睡得很好了。泰丝坐在孩子身边，为他呢喃着“吁吁”和其他安抚性的话语，但是依旧对检查孩子的状况和让孩子哭泣感到有些难过。

过了一周左右，夜晚更加轻松。詹森不再怎么哭闹就可以躺到自己的小床上，夜间也最多醒来一两次，虽然还是会哭却不需要哺喂，在 20 分钟之内就能自己再度入睡。前几个晚上泰丝坐在他的婴儿床边，但随后就发现如果自己只是走进房间看看他是否含着自己的安慰奶嘴，盖好毯子，然后就离开的话，詹森似乎更容易睡着。一般几乎是马上就能睡着。在极少数的夜晚孩子的哭泣会加剧，但那种状况下如果他哭得非常剧烈，一般可能会忘记自己到底因为什么才哭，然后父母中的一人就会上前安抚他，詹森也就会再次睡着了。

“实际上只过了痛苦的十天——尽管感觉上像是过了一年。结果是让人吃惊的转变。三天之内他就从随时都要哺喂，变成整夜都不要哺喂；从和我一起睡变成自己睡在婴儿床里。虽然用了十天才巩固下来这个结果，但是前三天的转变真是让人吃惊。”泰丝说，“我让睡眠问题完全失控是因为我太不愿意让孩子哭了，真正的问题就在于我拖延了太长时间来解决问题。现在想想以前，真是不知道自己当时是怎么想的。”

第9章　13~18个月

这个年龄段学步期的儿童在晚上平均需要 11 小时 15 分钟连续的睡眠，在白天则需要 2 小时 15 分钟到 2 个半小时的睡眠。这个年龄段晚期的孩子需要两次日间小睡，上午下午各一次，但是到了 18 个月时，大部分孩子都会把两次小睡合并成一次午睡或者下午的小睡。

学步期初期的孩子很容易产生行为上的睡眠问题。孩子们不断增加的行动能力（包括走路），一周岁前后的分离焦虑高峰期，以及对诸如奶瓶、安慰奶嘴等物品产生的情感依恋，都能令孩子晚上睡觉变得复杂，并导致在夜间不断醒来。

在 15 个月到 18 个月时，学步期孩子们的两次小睡会变成一次。这是一个相对麻烦的阶段，因为通常孩子只小睡一次不够，而两次又会睡得太多。本章将告诉你一些方法来帮助加快与解决这种变化，但你很可能仍然要面对很多古怪的问题，因为孩子的身体大约需要 3 周左右的时间来适应这一变化。

在这个年龄段，孩子因为睡眠不足而导致乱发脾气的问题会暴露出来。学步期的幼儿开始考验他们的父母。晚上睡觉的时间就是最常见的战场，孩子们会在这里表现出不屈不挠的坚韧意志。对于这个年龄段的孩子而言，一个安抚性的睡前仪式非常重要。坚持这种仪式，设下明确的规则也是必需的——因为下一个阶段将会更困难。

发展变化

分离焦虑

一周岁左右的孩子的分离焦虑将会达到顶点。让孩子们对父母说“晚安”很困难。一个美好的、长时间的过渡仪式，以及和

父母中的一人或两人相聚在一起的专门时间有助于减轻孩子的焦虑感。尽管一岁大的孩子还不会说太多话，但他们已经懂得很多东西了，所以你要对孩子有足够多的口头保证，告诉他你一定会在他附近。

哪怕有些家长已经成功完成了安睡女士渐进法，他们还是可能会在孩子入睡的时候呆在房间里，以减轻分离焦虑。如果你能避免再度退步到任何渐进法完成之前存在的坏习惯中，孩子也不会在夜间一再醒来要求你坐在他身边，那么这种做法也是可以的。如果你选择离开房间，那么向孩子保证你会在附近——而且遵守诺言——就非常必要。比起到看起来距离孩子婴儿床很远的厨房打扫卫生，你应该留在附近的房间里，好让孩子在睡觉的时候觉得你离他很近。

心爱之物

孩子的心爱之物通常是一只特殊的毛绒玩具或者安全的毛毯，这对帮助孩子处理分离焦虑很有用处。很多家庭都曾经告诉我，他们的孩子在第一年内会拒绝父母为他们挑选的所有特殊玩具，但在一岁左右却很快就能喜欢上一样东西。在这个年龄段，孩子可能会自己选择心爱之物，可能会从他收到的一岁生日礼物中选择；还可能会抛弃婴儿时期最喜欢的玩具，转而选择一件新的。

“亚力克斯有整整一个婴儿床的动物玩具，自从他6个月之后，我们就尝试着让他喜欢上某一只。但他完全无视这些玩具，甚至都不去碰它们。当他大一点儿之后，他开始对玩具感兴趣了。我们哄他睡觉时，会选择一个玩具，比如一只可爱的月兔，并且尽量坚持使用这一只。当亚力克斯又长大一些后，他开始要求每晚选择一只不同的玩具。”亚力克斯的妈妈阿黛尔说。这并不

是一种典型的行为方式，但也算是成功的案例。亚力克斯会和自己选择的夜间伙伴开心地依偎在一起。

在 13 个月大时，泰迪突然间喜欢上了两个塑胶磨牙玩具。他这时候还没有长牙——他只是想在睡觉的时候每只手里都抓着一个玩具。问题在于这两个玩具很小，所以总是会从婴儿床的缝隙中掉下去，泰迪就会从梦中醒来大哭，因为他找不到自己的心爱之物了。“爬到婴儿床下去拿出掉落的玩具很麻烦。”丽莎回忆道。她开始努力调整孩子的喜好，让泰迪将自己的注意力从磨牙玩具上转移到一只紫色的小恐龙玩具班尼上。虽然颇用了一些时间，但恐龙玩具最终取代了塑胶磨牙玩具，而且几乎很少会掉到地板上了。

为了增强孩子对于玩具的感情，可以把他的心爱之物包含到晚上睡觉和日间小睡之前的仪式中去。比方说，如果你在晚上睡觉前会和孩子一起玩躲猫猫，那么他的玩具也应该一起和你们玩躲猫猫。如果你会向孩子房间里的每一样他喜欢的东西说晚安，也应该向他的心爱之物说晚安。在晚上睡觉之前和日间小睡时，可以把心爱之物和孩子一起放进婴儿床。有时候你的孩子可能会模仿睡前仪式与玩具互动，给他的喜羊羊或者小熊仔一个晚安吻，然后把它抱在怀中。

就算之前孩子都没有找到专属于自己的心爱之物，我也强烈建议从现在就开始尝试。学步期的孩子通常会从情感上依恋母亲的乳房或者他们的奶瓶、鸭嘴水杯或者安慰奶嘴，他们会在夜间不断地醒来，想要自己的奶瓶或者杯子，这并不一定是因为他们真正感到饥饿或者干渴，而是因为这些东西有助于让他们获得安全感。想要削弱孩子对于乳房、奶瓶等物的依恋，与增强他们对心爱玩具的依恋息息相关——如果你无法减轻孩子之前已经产生的依恋感，就很难培养出他对玩具的依恋感。

如果孩子和他的心爱之物形影不离，有些家长也会感到不安。这可能算是一个小小的不便，因为你得记住随时带上孩子的心爱之物，但我并不认为这真的很麻烦。安慰奶嘴则有小小不同，我不建议让孩子随时带着安慰奶嘴到处走。有时候安慰奶嘴可能会影响孩子的交流能力与语言能力的发展。你应该考虑取消安慰奶嘴的使用，或者尽量把它限制在晚上睡觉或者日间小睡的时候。

进食与睡觉

作为父母，我们应该调整自己的态度，牛奶不再是孩子菜谱上的主要内容了。到一岁之后，孩子们可以从正常的食物或者他们的固体辅食中摄入大部分生长所需的营养和热量。儿科医生们通常也会建议他们喝两三杯牛奶(500～700 毫升)——当然每个医生的建议都不一样，所以要咨询一下你的医生。如果你的孩子吃了很多诸如乳酪之类的乳制品，他也能摄入足够的钙和维生素 D，不需要再喝那么多牛奶了。

记住，孩子已经不再是小婴儿了，所以睡前喝纯牛奶也不会有助于延长他的睡眠时间。相反，这样还可能会刺激他在喝奶与睡觉之间建立负关联，想要整夜都不停地喝奶。而且睡前喝奶还会导致孩子夜里醒来之后大声地号哭，让你知道他的尿布湿透了。如果你还没有让孩子使用杯子，现在可以给他一只了，哪怕你还打算继续哺喂。给孩子一只鸭嘴杯——喝水、喝牛奶、喝奶粉、喝果汁，喝任何医生推荐的液体——每顿饭都喝。

使用杯子

如果你打算给孩子断奶，很多妈妈也打算在一岁左右给孩子断奶，那么我要提醒你，应该直接从母乳过渡到用杯子，而不是用

奶瓶。断奶应该是一个简单自然的转变过程。断奶很少会影响睡眠，但如果孩子的睡眠本来就比较紊乱，那么对于一个过度疲劳，心情不好的孩子来说，断奶就会变得很困难。如果孩子尚未学会如何在没有含着乳房或者奶瓶的情况下入睡，那么断奶则会更加困难。（想要了解更多关于断奶的内容，请看第 8 章“9～12 个月”。）

孩子过了一岁之后，很多妈妈依旧会把哺喂当作早上的第一件事和睡前的最后一件事。当孩子睡不着或者夜间醒来后，在没有母乳的情况无法再度睡着时，这就成了问题。（睡前用奶瓶哺喂也是一样的情况。）既然如此，你面对的就是一个睡眠问题而非断奶问题了，我将会在稍后介绍更多关于如何改变这些生活习惯的方法。

安睡女士小提示

对于断奶来说，没有什么“一定正确”的方法，但是大部分常见的建议是，先用一周时间取消一次日间的哺喂，然后再在下一周取消另外一次哺喂，循序渐进。

如果你的孩子习惯了奶瓶，而不喜欢杯子的话，现在必须帮他转变，尤其是如果奶瓶已经成为睡眠支撑的情况下更应如此。咨询一下你的医生；如果有一些与孩子生长有关的情况，或者医生的建议，需要孩子再使用一段时间奶瓶，你仍然可以消除负关联对睡眠的影响。你可以在孩子日间小睡醒来后给他奶瓶，而不是在日间小睡或者晚上睡觉之前给他。

安睡女士小提示

从奶瓶转换到杯子，应当从早上第一次喂奶开始。只在奶瓶里放三四盎司奶，然后迅速开始让孩子吃早饭。过几天之后就可以给孩子用鸭嘴杯盛牛奶了。然后开始逐渐减少每天午饭和早饭之前（或者之后）你给孩子的奶瓶中的奶量。你可以用一只装了孩子食物的杯子来代替奶瓶。你会发现，如果你在饭后再给孩子奶瓶的话，他并不是很想要了，因为他已经不饿了。

如果孩子在白天开始感到烦躁不安，想要奶瓶的话，看看时间和你的睡眠记录。他是真的饿了，或者只是习惯使然，令他需要奶瓶来安抚自己？你能用其他方法安抚他或者让他转移注意力么？也许孩子感到过度刺激，需要你给他一个温柔的拥抱，或者坐在你的膝上，听你讲几分钟故事。也许他累了，到了该睡觉的时候了。也许孩子是在暗示你他需要比平常早一点上床睡觉。不要认为只有奶瓶才是唯一能使孩子感到平静和愉快的东西。

当你准备好为孩子断掉睡前的哺喂时，也要按照类似的方法进行。每两三天减少一些奶量，从八盎司降到六盎司，然后是四盎司，最后两盎司。

然后用一只装了水的鸭嘴杯替代奶瓶给孩子。有时候当孩子的奶量减少到四盎司的时候，他会不满，因为奶瓶中的液体不足够让他吮吸到入睡。可以用另外的方法安抚他，并要坚持你的计划。

有些家庭会在开始进行睡眠训练之前就先解决从奶瓶到杯子的转换问题，但最好还是同时进行。你可以对安睡女士渐进法做少许修改。例如，你可以增加一个晚上时间，留在孩子的婴儿

床边(也就是说,你可以呆在婴儿床边 4 个晚上,而不是我通常推荐的 3 个晚上)。第 1 晚你可以把奶量减少到六盎司,第 2 晚减少到四盎司,第 3 晚两盎司,第 4 晚把奶瓶拿走,但是你可以留在婴儿床边给孩子一些额外的帮助,让他自我调整。第 5 个晚上,开始渐进法的下一步骤,从婴儿床边移开。当然还有其他处理奶瓶到杯子过渡的方法,你可以略作修改以适应自家的情况,但一定要记住,如果奶瓶成为孩子的睡眠支撑,你必须帮他放弃奶瓶,让他能够学会自我安抚,自行入睡。本章稍后的部分我们还会讨论一些夜间断奶的问题。

建立作息时间

作息时间示例

(如果你的孩子在早上 6 点～7 点之间起床,可以将该表格稍微提早。)

上午 7：00～7：30

起床,吃早餐。

上午 9：00～9：30

如果孩子还在小睡,让他睡一小时。小睡前后他可能需要一次加餐。

中午 11：30～12：30

午餐(由上午的小睡时间决定)。

下午 12：30～1：30

开始下午的小睡。如果是第二次小睡,时间大约一个半小时;如果是一天中唯一的一次小睡,时间大约是两个到两个半小时。醒后加餐。

下午 5：00～5：30

晚餐。

下午 6：00～6：30

开始洗澡/晚上睡觉前仪式。

下午 7：00～8：00

睡觉。

孩子们需要有规律的日间小睡，有规律的夜间睡眠和特征明确的三餐。他们的身体需要按照时间表作息，从而有规律地进行日间和夜间激素循环，来保证他们的生长与自然的生物钟同步。他们的小小心灵与意识也需要必然性与有规律的安全感。但我同样认为应当有一定的灵活性。

示例中的时间表是一个很好的起点，但你可以进行调整。例如，如果你的孩子喜欢早起，就可以把上午的小睡向前移。你也可以对时间表进行更多改动以适应孩子的需要。睡眠时间都是很平均的。有些孩子睡得多，有些孩子睡得少，但一般变化都远小于父母们预想的那样。如果你的孩子日间小睡和夜间小睡都不好，有可能是因为你对他应该有的睡眠时间估计不足。

哪怕你已经做好了一个很有效果的时间表，也不可避免自然而然地发生变化。有些时候孩子可能是吃得或者睡得稍微多些，有时候则会吃、睡得少些。快速生长期，感冒流鼻涕，长新牙齿，或者只是一次坏心情——学步期的孩子和我们一样有情绪低落的日子——都能导致他的日常生活发生小变化。但不要让作息时间表整体变化过大。当你学会如何了解孩子的睡眠关键，孩子也休息得更好时，你就能更轻松地随手弥补变化的时间表。观察孩子日间的行为。如果他轻松满足，那么时间表就可能很有效果；如果他烦躁不安，要求众多，那么可能需要更长时间的日间小

睡、更早的晚上睡觉时间，或者更晚的起床时间——甚至可能需要上述全部条件。

如果你由于医生的建议或者一些其他不可避免的干扰而不得不减少一次孩子的小睡，对于大部分学步期的孩子而言，减掉上午的小睡要远比减掉下午的小睡好。你可以临时将下午的小睡向前推移一点儿，可以稍微弥补一下取消上午小睡的后果。

除了特殊食品和健康要求之外，13～18 个月的孩子应该每天有可以明确辨识的三餐。大部分孩子每天还会加餐两次，一次是上午小睡之前或者之后（通常是在睡前，但主要由你的孩子的作息时间表决定），另一次是下午小睡醒来之后。咨询一下你的儿科医生，但这个年龄段处于自然生长曲线上的健康婴孩在夜间几乎可以 11～12 小时无需进餐。如果你的孩子还是会频繁地在夜间醒来吃东西，你就得调整一下他的生物钟，改变他的睡眠习惯。本章稍后我将会给出一些关于如何调整孩子的生物钟，改变睡眠习惯的小技巧。

比较好的起床时间是在早上 6 点到 7 点半之间。记住，睡眠保健中的一条基本原则是每天要在同一时间醒来，在同一时间上床睡觉。如果你的孩子在 6 点之前就起来的话，接下来“早起的鸟儿”这一节将会帮助你教他学会如何睡眠。

醒来。

有些幼儿可能会超过 7 点半才起床。如果这对你和你的家庭有用的话，所谓有用我是指孩子能够得到良好的日间小睡，和夜间连续至少 11 到 11 个半小时的睡眠，那么就是好现象；随他去。当孩子临近上学前班的年龄时，确保你为他留下足够的时间逐渐调整到一个更早的起床时间。但很多学步期的孩子都不会在上午 8 点半或者 9 点起床。他们的日间小睡时间过晚，或者早晚不一，晚上睡觉太晚，睡得也不好。你可以直接在上午 7 点半把他叫醒，一开始要缓和，或者可以渐渐调整。让他比平时早起

十分钟，连续两三天；然后再早起十分钟，按照这种频率进行。

安睡女士小提示

不要在睡觉前给孩子一瓶奶，指望它能让孩子睡得更久一些——那样的日子已经过去了。

早上的起床仪式，相对于晚上的仪式来说，仍然是让孩子分辨起床时间与睡觉时间的好方法。拉开窗帘，打开灯，唱一些欢快的早安歌曲，开始新的一天。你可以随意选择是马上就哺喂孩子，还是先玩耍一会儿。下班回家比较晚（一般来说，这个人多半是父亲）的父母常常会把早上当作他们专属的特别游戏时间。

上午的小睡。当孩子每天仍然要按照计划进行两次日间小睡时，他上午的小睡应该在 9 点或者 9 点半开始。如果他晚上睡得很好，上午的小睡应当在早上起床后两到三小时之后开始。观察孩子的睡眠时机以判断究竟什么时候最合适。记住给孩子留出放松的时间好准备睡觉，也许读一两本故事书，或者进行一个简化版的晚上睡觉仪式。

孩子可能会睡一个小时或者一个半小时。我不建议上午的小睡时间过长，因为下午的小睡通常才是更重要的，这是孩子可能会保持两三年的生活习惯。如果孩子上午能睡两三个小时，记住要在 90 分钟之后就叫醒他，否则到了下午小睡的时候他可能就很难睡着了。在上午的小睡之后，是一个非常适宜到庭院中玩耍、外出散步或者逛街的时间。孩子可能会感到新鲜，从而减少了在汽车或者婴儿车中打盹儿的可能，也就不会影响下午按时小睡了。

午餐与下午的小睡。很多父母都没有意识到，其实孩子们会比我们饿得更快。午餐一般是 11 点半，吃完之后差不多就到了正午或者 12 点半。午餐之后，下午小睡之前你可以和孩子一起

做些游戏。通常我们的目标应该是让上午小睡与下午小睡之间间隔两三个小时。再次提醒，观察孩子的睡眠信号，然后在合适的时间让他开始小睡。

下午的小睡通常会持续一个半小时。一旦孩子的日间小睡合二为一，你就应该让他在 12 点半到 1 点半之间睡下，他可能会睡两个到两个半小时。一般，最典型的下午小睡会从 1 点到 3 点半，但前后也可能会有半小时左右的差异。当孩子醒来时，应该给他加餐一次，并在晚餐之前玩耍一会儿。

晚餐。早一点吃晚餐，比如下午 5 点或者 5 点半开始，是很明智的，哪怕这意味着孩子不能和父母共进晚餐。他可以在父母吃晚餐的时候也一起吃点儿水果或者餐后甜点。较早的时间表有助于孩子进食和睡眠。我发现孩子吃饭时也有进餐时机，如果你让他太晚吃饭，他们就可能吃不好。可能你最不希望的状况就是孩子晚餐没吃好，结果到了午夜醒来要求加餐。（等孩子到了青少年时期，你可能会对这种状况无奈之极！）

晚上睡觉。目标是让孩子在晚上 7 点到 8 点之间睡着，而不是准备睡觉。观察孩子的样子，相信你的直觉。你可以把睡觉的时候稍微后移，8 点或者 8 点半，但之前你要保证孩子已经开始能够整夜安睡，日间小睡也休息充分，并且补上了所有错过的小睡才行。记住，孩子仍然需要平均 11 小时 15 分钟的夜间睡眠。

学步期的孩子需要很多过渡时间来准备睡觉，因为无论是大脑激素分泌，还是情绪上准备好与父母短暂的分开到次日清晨都需要时间。上床睡觉前的仪式必须有条理而且有规律，绝对不能匆匆带过。留出足够的时间准备。也许你的孩子需要半小时，或者一小时（包括洗澡的时间），并让这段时间变得有趣而充满爱意，让孩子满心欢喜地期待这段时间的到来。

在孩子的房间进行睡前仪式，而不是在家里的其他地方，这

样孩子就能接收到这样的信息，现在是该平静下来，准备睡觉的时间了。当然在客厅里开始一部分睡觉前的仪式也可以，但只要孩子洗完澡，就必须回到自己的房间。从一开始就要把所有可能导致睡前产生不愉快的因素全部摒除在外，这样你才能快乐地度过接下来的平静时光。

正如我所说的那样，孩子已经不需要睡前的哺喂了，但有些孩子可能还想在上床前短暂地吃点儿奶，或者喝杯水。如果他在睡前一般都使用奶瓶，你可以考虑换成杯子，并用水来代替牛奶。如果你愿意，可以慢慢完成这一步，从八盎司的奶瓶换成四盎司奶瓶，最后换成杯子。有些人会用几个晚上逐步稀释牛奶或者奶粉，最后换成水。

如果你还在睡前抱着孩子踱步或者轻摇，那么尽量在孩子的房间里进行，并且缩短时间。如果他仍然要在睡觉的时候听音乐，那么可以在他真正躺进婴儿床之前关掉音乐。然后把昏昏欲睡的孩子放到床上。

有时候睡前仪式相对较小的变化也会对学步期的孩子产生较大的影响。阿黛尔和杰夫以前一般都会在自己的床上为亚力克斯读一本故事书，但他们后来把这个时间转移到孩子自己的房间中去，这有助于亚力克斯开始在自己的婴儿床上睡觉。这样也更加贴近孩子的睡眠时机。“我会加倍小心。他会拉自己的眼皮，我很讨厌这举动。他还会拉自己的头发。有时候他却突然兴奋起来，或者只是发呆和到处走来走去。我慢慢发现，这些行为标志着他需要睡觉了。”亚力克斯的妈妈说。

现在，你的孩子已经可以站立甚至走路了，你可以准备一些婴儿床里适合的活动。很多婴儿会站在婴儿床里；你把他们放倒，他们就会马上跳起来。对于一个一岁大的孩子来说，这就是字面上所说的站起来游戏。但无论孩子觉得这么做多么有趣，你

都要尽量不参与到其中，不然他就会整晚都跟你玩这种“站起蹲下”的游戏。轻拍床垫，只把孩子放下一次，然后轻拍他即可。如果他又站起来，就继续轻拍床垫，向他表示一种信号，但不要主动把他放倒。如果你坐在婴儿床边，而不是站着的话效果会更好。当孩子准备好了就会自己躺下；如果你不让孩子觉得这是一种游戏的话，她可能会更快躺下。

爱伦和乔治从韩国收养了 6 个月大的詹姆斯。他很快就对新父母产生了依恋，但却依然害羞，有时候还会害怕，担心一切变化。他的睡眠也很糟糕，常常会在夜间醒来，并且需要更多的帮助才能再度入睡。严重的慢性耳道发炎让情况变得更严重，因为他常常会由于疼痛和需要安抚而醒来。

在和我共事之前，他们曾经抱着孩子踱步、轻摇或者轻拍他直到他睡着，然后就会试着蹑手蹑脚地把他放回到婴儿床上同时不会吵醒他。我认为通常这都会事与愿违——如果一个学步期的孩子在某处睡着，有时候他就会时不时地醒来看看，如果发现自己到了另外一个地方，他就会突然完全清醒。此外，詹姆斯在韩国的时候一直都是和他的前任养父母同睡。当他到了美国，爱伦和乔治却并不会把他抱到自己的床上，但也没能教他学会自己入睡。在晚上睡觉的时候，当孩子在夜间醒来，他们就必须再次抱起詹姆斯，没完没了地踱步、轻摇或者轻拍。“他几乎完全是依靠我才能睡觉的。”爱伦回忆道。

詹姆斯 18 个月大时，爱伦和乔治请我来帮忙改变孩子的作息时间。他们把 9 点半的晚上睡觉时间改到了 7 点半，但对于之前已经成型的那个特殊而稳定的晚上睡觉前的仪式却改动不大。“我们每晚给他洗澡，而不是每隔一晚再洗；然后我们给他穿上睡衣，给他一杯水，读三个故事——每晚都按照相同的顺序读同样的三个故事。”爱伦说，“我们会放两分钟音乐，然后拥抱他，把他放到婴儿床里。”

安睡女士渐进法

我接触过的很多家庭都使用我的安睡女士渐进法来改变孩子的睡眠习惯，父母们会缓和地渐渐地离开孩子的婴儿床边。让我们看看面对这个年龄段的孩子，应当如何应用这种方法。夜间醒来的状况一般会在渐进法过程中减少，但如果孩子确实醒了，你可以来到婴儿床边轻拍他，安抚他，然后再回到当晚他睡觉的时候你所在的位置去。我们的目标是对孩子的每一次醒来都要作出回应。

哪怕你的孩子有一两个晚上状况不好，哭闹或者更频繁地醒来，你也应该按照渐进法的时间表移到下一个位置去。在每次椅子挪到新的位置的第一天，如果孩子出现了一些退步或者抗议也不要过于惊讶。如果孩子在渐进法期间生病了，你可以暂停并且“停滞”或者保持在原位，直到孩子感觉好了为止。你甚至可以在孩子生病期间挪到离他稍微近一些的地方，方便给他更多安慰。但当他痊愈之后你就要继续开始睡眠的训练了。

第 1～3 晚。 一旦洗澡、讲故事和唱歌等事情完成之后，你就要坐在孩子婴儿床边的一张椅子上。如果他哭闹不安，你可以马上去抚摸或者轻拍他，但不要过于频繁，不然你就会创造出一种新的负关联。第一天晚上你可以多抚摸他几次。在准备上床的阶段你可以为他唱儿歌，但只要到了睡觉的时间，就要发出安抚性的“吁吁”声或者“天黑黑”的声音。你可以试着闭上自己的眼睛。这有助于让你不至于和孩子说太多话，也能传达出一种睡觉时间的信息。呆在那里直到孩子睡着。如果他站起来了，记住不要把他放下去。

确保你要让父母来主导对孩子的触摸，而不是让孩子握着你

的手或者手指，你可以轻拍他。确保你不会过于有规律地抚摸他；偶尔触碰一下就可以了。自己计数也能有所帮助，你可以在触摸孩子的时候数到 10 停下来，然后一直数到 60 才再去碰他，然后再数到 10 停止触碰。你也不要用一种新的负关联，比如频繁地触摸他或者你的声音，等等，来代替原先轻摇之类的负关联。

尽量不要抱起孩子——但如果他确实很烦躁，你可以短暂地抱起他，当他平静下来就立刻放下，不要让孩子在你的怀抱中入睡。告诉他，一切都好，坐在椅子上直到他睡着。孩子每次醒来都要这么做。确保你读过第 7 章“6～8 个月”中的“在头三个夜晚的一些特殊提醒”部分。

第 4～6 晚。把椅子移到婴儿床与房门中间。（如果房间比较小，或者婴儿床靠近门，可以把椅子移到门口，就像第 7 晚的位置。）持续发出安抚孩子的声音，但是尽量待在椅子上。如果有必要你也可以上前去轻拍或者抚摸孩子，或者发出你在前三晚用过的其他一些安抚性的声音。如果你放任自己把椅子移到婴儿床边并且轻拍孩子直到他睡着，你移动椅子的全部目的就彻底失败了。因为你会创造出一种新的睡眠支撑。

第 7～9 晚。把椅子移到门口，但还是在房间里。你可以关掉灯，但还留在孩子的视野中。继续同样的安抚方法，记住尽量不要干涉孩子的睡眠。如果他轻微哭闹几次也不要担心；平静地安抚他即可。他会知道你就在身边，也会自己睡着。

第 10～12 晚。移到走廊上，但打开门好让孩子仍然能看到你。你可以继续发出类似“吁吁”的声音，不要太频繁，但是要能让孩子知道妈妈或者爸爸就在他附近，而且随时可以响应他。待在那里直到孩子睡着。孩子们其实很容易仪式化。每三天进行一点儿变化，时间还可以更短。对你的孩子而言，拖延只会让事情更难而不是更简单。如果一个阶段超过三天，他就会期待你一直待在原地，然后当你试图加大距离时，他就开始愤怒或者不安。

第13晚及以后。大部分家长都会呆在走廊或者隔壁的房间，虽然孩子看不到他们，但他们能够清楚地听到孩子的动静。你可以发出一些安抚性的“吁吁”声，不要太频繁，但保证能让孩子知道父母就在附近，可以随时回应自己。如果孩子哭了，尽量在他房间门口观察他的状况，最好不要走进房间。你要平静、放心。发出一些安抚性的声音，告诉孩子你就在不远处，相信他能够自己睡着。

我发现渐进法的最后一步对于家长们来说很难，对孩子们却不然。尽量不要因为孩子的哭泣就把焦虑传染给他。要给他一种渐进法能帮他成功的信心。学步期的孩子确实能安抚自己，让自己入睡——只要你给他这个机会。偶尔也会有孩子能一直哭上好几天，但不要过早地冲上前去帮助他。让他自己平静下来，自己打盹儿。如果你在门口检查他的状况，尽量不要弄出响动，也不要过于频繁。你应该希望安抚孩子，而不想由于自己每次的出现让孩子受到过度刺激，从而更加清醒。很快你就能轻松地做到这一点了。

大部分家长都要多进行一步，移动到更远的地方，这一步我叫作“职业检查”，这是告诉孩子自己会在什么地方，会做什么，并且承诺会很快回来：“妈妈要去换睡衣。我五分钟之后就会回来。”或者“爸爸要去刷牙，刷完了就会来，还会再亲你一下。”这些检查工作最好能对那些年纪稍微大一点，语言能力已经有所发展的孩子进行。

有些家庭会在这个阶段多停留一段时间；学步期的孩子仍然需要10～15分钟的安慰。还有一些家庭则可以把孩子放到床上说晚安后离开。有时候他们需要转回来在孩子睡着前进行最后一次“谢幕”，但目标只是为了减少检查的次数。相信你的直觉，选择对于孩子最有效的方法。也许有时候你会让他稍微退步一些。比如，如果你留下他独自睡觉，他能做到，但可能还是偶尔需

要一点安慰，那么你也可以在他身边待几个晚上。我并不是说要你回到渐进法开始之前的地步，但你有些晚上也可以在走廊上随便走走，或者回到留下孩子单独睡着之前简短地再检查一次他的状况这个步骤。

有几点要强调：孩子们很容易就能做到仪式化，所以每三天做一些变化，而不是每四天、六天或者八天。对你的孩子而言，拖延会让事情更难而不是更容易。他会习惯于你坐在某个地方，而当你打算增加距离的时候则会开始生气或者害怕。

定时检查

有时候我们需要调整渐进法，因为父母们频繁地出现在孩子的婴儿床或者儿童床前可能会导致他们受到过度刺激。他会希望不断地吸引父母的注意，无论你怎么安抚他，发出“吁吁”的声音，他都会坚持努力地吸引你的注意。在这种情况下，你就应该试着使用“定时检查”的方法，这也是我们通常称之为“费伯睡眠法”的一个变种。在睡觉的时候，完成你们的睡前仪式，让孩子平静下来，然后把他放进婴儿床。亲吻他并告诉他你会在离开房间之后再来看他。

对于你应该以什么频率来检查孩子的状况并没有什么硬性的规定，所以你得自己实验摸索。如果你检查得过于频繁，孩子可能会认为这是个游戏，结果反而得到更多刺激。如果检查的间隔过长，他可能就会清醒过来，并且感到不安。

可以以七分钟为一个间隔，渐渐地加长这个时间，但是相信你自己的直觉，并进行恰当地调整。当你检查孩子的状况时，可以径直走到他的婴儿床前，迅速而安抚性地轻拍一下他。但不要过于磨蹭：如果你站在婴儿床边，用半个小时来拍孩子，直到他睡着，你原本的全部目标就都彻底失败了。

在进行安睡女士渐进法时，黛安娜和彼得与他们13个月大的女儿克洛伊一起度过了艰苦的第一个夜晚，不过，此前他们已经和自己的第一个孩子一起度过了很多个艰苦的夜晚。克洛伊一般都会在妈妈的膝头含着奶瓶睡着，而当黛安娜试图把她放进婴儿床时她就会生气地醒来。虽然克洛伊已经断奶，但她还是需要奶瓶，而且每晚都会醒来好几次讨要自己的奶瓶。

就像我曾经遇到过的很多孩子一样，克洛伊也有食物逆流的问题，而且她的呕吐次数比较多。她的父母没法接受那种“任其哭泣”的方法，因为如果她哭得太厉害，就会开始呕吐。黛安娜说，有时候朋友会告诉她，如果孩子在睡觉的时候呕吐一两次，并不算什么问题，不需要担心，让她哭就可以了。但他们认为，当孩子一天之内已经呕吐过很多次之后，怎么可能做到置之不理，“你不可能任由她再吐一次。”当孩子在婴儿床里呕吐时，无论是父母还是孩子都不可能很快地睡着。频繁的呕吐绝对不是什么好的体验，被单和睡衣都要更换，孩子也需要再洗一次澡。

克洛伊在渐进法开始的那个晚上确实哭了很久，但是由于父母中的一人坐在她婴儿床边，所以她的哭泣一直都没有到歇斯底里的地步，而且也没有呕吐。（我曾经提醒黛安娜，在上床睡觉之前稍微提前一些进行睡前的最后一次哺喂，我认为这可以在睡觉时降低由于哭泣而引发呕吐的几率。）克洛伊站在婴儿床里哭泣，向父母伸出双臂，最后还是因为困倦而“倒下”。然后她会再次站起来，继续哭。

第二晚就好得多了。克洛伊哭泣的时间大幅度减少，只有15分钟，不过这个晚上她还是醒来过几次。到了第四个晚上，她在婴儿床里走来走去，自言自语，但不再歇斯底里。到了第六个晚上，她几乎没怎么抱怨就躺到了婴儿床里，并一觉睡到天明。

日间小睡训练花的时间稍长些，部分原因是由于黛安娜打算

改变原来的睡眠习惯，试图取消孩子下午的小睡而非上午的那一次。这种做法并不是很好，因为一个 13 个月大的孩子几乎很难在一次日间小睡和晚上睡觉之间坚持太长时间。

安睡女士渐进法还帮助了詹姆斯。爱伦和乔治的节奏很慢，因为他们知道孩子本身还有很多关于分离焦虑的问题，一年前詹姆斯被收养的经历严重地颠覆了他的整个世界。

到了第二周，夫妻二人会在 20 分钟之后离开孩子的房间，并且常常回来检查他的状况。爱伦发现，如果他们由于孩子发火而离开房间，然后再回来却不抱起他，詹姆斯一般反而会表现得更好。而且当他们回到孩子的房间，詹姆斯其实并不总是想要父母的触摸；他只是想要父母中的一人安静地呆在身边而已。“他得知道我在他身边，但如果我抚摸他却不把他抱出婴儿床的话，他才会很生气。”爱伦说。这一点也不少见；有些孩子在快要睡着的时候确实不喜欢身体上的接触。

詹姆斯的问题并没有持续整个晚上，但四个晚上之后，爱伦和乔治确实发现孩子开始进步，虽然不足以让他们感觉很轻松——有时候爱伦可能会比詹姆斯哭得还厉害——但也足够让他们知道自己选择的道路是正确的。

从第 16 晚开始，詹姆斯已经连续安睡了五个晚上。大约第 20 或者 21 天后，他已经能够让父母离开房间，自己睡着了。因此爱伦称他为“奥林匹克睡觉选手”，一旦孩子的问题解决了，父母的问题也就解决了。甚至连一个小妹妹的诞生都没能影响他的睡眠。不过两年之后，詹姆斯还是有一个短暂的时期需要在父母睡觉的时候给他一些特别的安慰，这是很多孩子都会经历的一个自然的阶段，即所谓学龄前的“恐慌期”。但他很快就度过了这个阶段，回到了他成型的良好的睡眠习惯上去。

你应该会记得本书第 1 章中出现过的爱伦。她就是那位把

孩子的情况都记录在卡片上，在午夜的时候参考的妈妈。睡眠训练对很多家长来说都很难，对收养孩子的父母来说更是不容易。记录卡片不仅仅提醒爱伦她应该做什么——还提醒了她为何要这么做。“这是我作为父母接受的第一件艰苦的任务，但我认为它不仅仅只是睡觉的问题。它让我感觉就像关于人生的课题。”她说，“我应该教会孩子如何自我安抚；这也是让孩子理解什么是限度的第一步。继续下去我将看到所有父母们将遇到的问题。但这里正是我和我的丈夫开始行动，并且为孩子解决问题的起点。”我必须得称赞他们在处理孩子晚上睡觉、日间小睡、夜间醒来三四次等问题上的坚持，以及令人钦佩的一致态度。

问题与解决方法

那些无法入睡或者无法整夜安睡的孩子们通常都存在睡眠专家提出的负关联或者睡眠支撑问题。这些行为本身并不是不好；但当它们影响了你和你的孩子的睡眠之后就变成不好的行为了。例如，孩子们应该与父母拥抱或者相互依偎，但如果他总是要拥抱着或者依偎着父母才能入睡，而且每次夜间醒来也都要如此的话，他们就永远都学不会如何在没有父母的拥抱和依偎之下自己入睡。而且无论我们多么喜欢拥抱和依偎着我们的孩子，凌晨 3 点也不是一个适当的时间。安慰奶嘴、摇椅、抱着孩子踱步、轻摇或者午夜时分的哺喂都能成为孩子的睡眠支撑。我们的任务就是帮助孩子从这些支撑中解脱出来。

在安睡女士渐进法的过程中，孩子夜间醒来的次数通常会逐渐减少，但一般不会马上消失。我一直强调，在前三个晚上你应该首先处理这些问题，然后再回到孩子婴儿床边坐下，安抚他。从第四个晚上开始，只要迅速到婴儿床前安抚他，然后回到按照

渐进法你应该待的位置上去，这样你才能在孩子每一次醒来后传递给他一种前后一致的信息。如果在渐进法完成之后，你的孩子仍然会在某些晚上醒来，那你最好在门口安抚他，或者迅速地走到婴儿床边安抚地拍拍他然后再回到门口去给他安慰。

如果这些方法依旧无法消除最后的夜间醒来，那可能是因为你在孩子特别困倦的时候才把他放到床上。记住，你本应该在孩子七成或者八成困的时候放下他，但也许你拖到他九成困才这么做。

对于一个学步期的孩子来说，晚上睡觉的时候自行入睡，比午夜醒来之后自己再度睡着要容易得多，尤其是当他在躺下之前已经九成困了的时候。最好能在他稍微比这再清醒一点的时候把他放下，哪怕这意味着他可能会退步，需要更多的时间进行渐进法也没关系。你会发现较早的躺到床上有助于孩子解决夜间醒来的问题。试着把躺到床上的时间向前推移半小时。如果你还会在睡前哺喂的话，尽量让哺喂也更早一点，这样好削弱睡眠与吃奶之间的关联。有时候，在哺喂时将灯光放暗也有助于让孩子削弱睡眠与哺喂之间的关联。

取消夜间哺喂

健康的学步期儿童应该能够从晚餐后一直到次日早餐之间十一二个小时都不需要哺喂了。咨询一下你的医生，如果你的孩子仍旧需要在夜间起来吃奶，那可能是一种习惯，或者他已经把奶瓶或者乳房当作了自己的睡眠支撑。还可能两者皆有。如果他还没有断奶，缩短哺喂的时间，让他确确实实地吃奶，而不只是吮吸或者含着奶嘴打盹儿。调整你的哺喂时间表，让孩子不再含着乳头睡着。如果他在使用奶瓶，可以考虑换成杯子。

对于婴儿来说，我通常会建议逐渐地取消夜间哺喂，但是过

了一岁之后，通常立即停止夜间哺喂才是最好的。当孩子在夜间醒来需要哺喂的时候，坐在他身边，用其他方式来安抚他。轻拍他或者轻拍他身下的床垫。发出“吁吁”的声音告诉孩子现在已经是睡觉的时间了。不要让步又去哺喂他，或者一变再变，间歇性增强，这都会让改变的时间拖长，也会让孩子觉得更困难。

如果你不能忍受完全停止哺喂，可以试试“定时”哺喂三个晚上(详见第 7 章“6～8 个月”)。在第四个晚上就不要哺喂孩子了，只需在他身边多待一个晚上安抚他即可。在这个年龄段，突然断奶，不管原先是母乳喂养还是奶瓶，通常都只要几天就可以。

取消用踱步和轻摇哄孩子睡觉的方法

如果你仍然需要抱着孩子踱步或者轻摇才能哄孩子入睡，而且还不得不整个晚上一次又一次地这么做的话，那么现在可以停下了。有很多更简单的方法可以取代这种超重型锻炼，而且还不会导致严重的睡眠问题！在上床之前几分钟的踱步和轻摇就足够了，这样你就可以把孩子放下，他不会不满，也不会在夜间醒来要求另外一次抱抱。而且如果踱步和轻摇已经成为孩子的睡眠支撑的话，就得马上解决这个问题。现在正是时机。

为了确保你们有一个美好的、长时间而且平静的晚上睡觉前的仪式，你可以抱着孩子踱步和轻摇，但不要让这变成孩子的睡眠支撑。你可以在摇椅上给他讲几分钟故事，或者简短地抱着他在房间里走走，向他最喜欢的玩具们说晚安，这都是很好的举动。然后在孩子昏昏欲睡的时候把他放下。如果他醒来，迅速上前但是不要再抱起他踱步或者轻摇了。坐在他床边轻拍他、抚摸他，呢喃着安慰性的语句，但要让他躺在自己的婴儿床里。让父母中最不可能让步并抱起孩子轻摇的那一位来担任头几天晚上在孩子婴儿床边看护的任务比较好。

安睡女士小提示

如果你晚上睡觉之前没有哺喂孩子，他就会在次日早上醒来的时候感到更加饥饿；如果他早上饿了，就会在白天吃得更多；如果他在白天吃得很多，就不会在晚上因为饥饿而不断醒来。这就是恶性循环的对立面——良性循环。

在 14 个月大的时候，约书亚仍然会在晚上起来很多次，而卡罗尔则会为她自己选择的亲子依恋模式造成的结果而进行一番内心挣扎。每次约书亚醒来，都要用一小时或者一个半小时来哄他再度睡着。

卡罗尔和她的丈夫丹尼尔尝试过各种方法——哺喂、轻摇、拥抱孩子，都不能长期起作用。对于卡罗尔来说，改变是很困难的，因为她总是认为自己应该抱起孩子来哺喂他。任何问题触及底线的时候，卡罗尔都会一败涂地，而且当孩子哭泣的时候她总会觉得很有罪恶感。“我总是会把乳头放进他的嘴里。这能安抚他，但却不是他想要的。”她说，“我是帮了倒忙。”

卡罗尔知道，如果想按照我的方法行事，她必须进行一些困难的情绪调整，她也知道现在必须这么做。她和丹尼尔都失去了健康的生活，约书亚也是一个粘人、脾气暴躁而且死气沉沉的孩子，还总是生病。“我知道那绝非他真正的性格，”卡罗尔说，“不仅我们自己希望能得到一些睡眠，也想让孩子更健康地成长。”

晚上睡觉不是约书亚最大的问题——半夜醒来才是。当约书亚醒来时，丹尼尔会走进他的房间，坐在他身边轻拍婴儿床，一遍遍用平静而温柔的声音对他说：“天黑黑，宝宝睡。”丹尼尔会在约书亚身边一直待到他睡着为止。约书亚仍然会在夜间醒来，但是哭闹逐渐变少了，他也能更快地再度睡着。在几周之内，约书

亚基本上就可以一觉睡到天亮了。

取消安慰奶嘴

大多数儿科医生都会建议在孩子18个月到2岁的时候停止使用安慰奶嘴，但如果你的孩子在夜间会频繁地醒来寻找安慰奶嘴的话，你可以现在就着手处理这个问题。做好可能会有几个不愉快的夜晚的准备。安抚孩子，鼓励他选择一件心爱之物。当你拿走他的安慰奶嘴时，可以说一些诸如“现在不可以用安慰奶嘴，但是泰迪熊会在这里，它想要和你拥抱。”这类的话。这会将孩子的注意力从安慰奶嘴上转移开，并给他带来一种安全的替代品。

如果你还不想拿走孩子的安慰奶嘴，那就得训练孩子学会自己找到它，这样你就不用整晚都爬起来帮他寻找掉出去的安慰奶嘴了。在婴儿床里四处放几个安慰奶嘴，让孩子在午夜醒来，处于半梦半醒中时，也至少能摸到一个。然而我还是要鼓励父母们限制安慰奶嘴在睡眠时的使用，因为研究表明7×24小时使用安慰奶嘴可能会影响孩子某些方面的生长发育，比如语言能力。有些家庭会在晚上取消安慰奶嘴，但在日间小睡时仍然使用。

然而，在这么大时，很多孩子都会经历一种四处乱丢安慰奶嘴的阶段。他们喜欢用力地把安慰奶嘴扔出婴儿床，然后要你帮他们捡回来。不要管这件事，因为如果你不去帮他们捡回安慰奶嘴，孩子可能会很生气；但如果你拣了，他就会马上再扔出去。(如果你不相信我可以试试看！)一直等到孩子的不满到达顶峰，当他看起来似乎准备躺下睡觉的时候，你再告诉他，如果他乖乖地躺下睡觉，你就会为他捡回安慰奶嘴。在这场小小的博弈当中，你可能需要多做几次实验才能掌握节奏；关键是不要鼓励孩子扔安慰奶嘴，并且以此诱使他平静下来。(我曾经遇见过一个家庭，无论我们怎么做，他们家的小女儿都会不停地丢出自己的

安慰奶嘴，然后用尽吃奶的力气喊叫。后来父母们索性用了一顶婴儿床帐。很快就奏效了，婴儿床帐立刻阻止了孩子扔安慰奶嘴的行为，尽管她好几个晚上都因为床帐而哭闹，但很快还是适应了现状，开始整晚安睡。）

哪怕是那些很难忍受孩子哭泣的妈妈们都可以处理这种哭闹的问题，因为孩子们是由于发脾气才哭，而不是由于害怕或者失望才哭。哪怕是最平静、最快乐的婴儿偶尔也会发脾气。我们的任务是学会转移孩子的注意力，并让他们平静下来，而不是让他们更生气。

早起的鸟儿

如果你的孩子在早上 6 点起床，心情振奋而愉快，这对你来说可能就是一种压力，但对他而言却不是什么问题；6 点是这个年龄的小孩子比较普遍的起床时间。如果孩子 6 点醒来，但到了 7 点半开始发脾气，或者他总是会在 6 点之前醒来的话，可能就是睡眠不足的症状了。我知道这听起来有点奇怪，但晚上很晚才睡觉的孩子一般都会很早醒来。尽量让孩子在晚上 7 点到 8 点之间上床睡觉，并确保他能得到充分的日间小睡。你可以将他上午的小睡稍微后移（30 分钟左右即可）。这能帮助孩子调整整体的生物钟，并帮你克服早起的问题。要注意运用你的直觉。这是一场让孩子晚些开始小睡，但又不能过分推迟以免导致他过度疲劳无法入睡的博弈。

但如果孩子在早上 6 点之前就醒来了的话，你就需要教他学会晚些睡觉了。在一岁之后，如果早起成为一种固定的习惯，并且一直坚持了几个月的话，那么你很可能需要用至少三或四周，在父母坚持一致的前提下才能改变这种习惯。有些案例中甚至用了更长时间，对于你来说这是个循序渐进的过程。

当孩子醒来你就要马上作出反应。你的目标是让他很快地再回去睡觉，而不是让他把自己完全叫醒。给孩子他的心爱之物，尽量安抚他，在不抱起他的情况下哄他再次睡着。无论他怎么不愿意(可能还会尽力反抗)，也不要打开灯，或者让他从婴儿床里出来，直到 6 点为止。一定要态度坚定，不然你会发现如果你让他在早上 5 点 55 分起床的话，下一次就会是 5 点 45 分，接下来是 5 点半，最后你会回到你最不希望看到的起点。

凌晨 5 点我们从梦中被唤醒并开始进行睡眠训练，实在是非常困难的事情。应该由你决定是要呆在孩子的房间里还是离开，你得试着找出对于你和你的孩子而言最好的方法。有些家长发现他们的出现会刺激孩子，并令他更加清醒。既然如此，稍稍安抚他一下然后离开，看他是否还能再次自己睡着。如果你愿意的话，可以再回来检查他的状况。

如果你决定留在孩子的房间里，那么尽量不要和他进行互动。你可以坐在一张椅子上，闭上双眼，或者回到渐进法的位置上去。这会有助于让你尽量不和孩子开始“拉锯战”，也会传达出一种信息，告诉孩子现在还是睡觉的时间。有些留在孩子房间里的父母甚至可能会躺在地板上或者临时床垫上，至少这样还能再打几分钟的盹儿。

“早起是我们训练中时间最长的一部分，而且仍然会有所反复；他可能会退步，”约书亚的妈妈卡罗尔说，“如果他在六点之前醒来，我们会走进他房间说，‘还是睡觉觉的时间呢。’最后我们还是达到了目的，我们可以不进入他的房间，他也能自己躺下再睡着，或者安静地玩耍。”

如果当时钟指向 6 点孩子仍然醒着，看上去就好像他准备一直醒着而你离开房间一两分钟孩子又可能会哭，但尽量不要为这个问题烦恼；你马上就会回去的。如果之前你已经离开过房间的

话，现在也可以进来了。再度回来就可以开始你们上午的起床仪式了。拉开窗帘，唱一首欢快的早安儿歌。你可以传递给孩子一个明确信息："我要把你从婴儿床里抱出来，因为现在是起床时间了——而不是因为你在哭。"

正如我所说的，如果你的孩子几个月来一直都保持着早起的习惯，你至少得用几周的时间才能帮他改变。你也许在早上 5 点的时候还要面对一个哭闹的婴儿会感觉很糟，所以要提前做好准备。你可以使用记录卡，常常为自己打气，任何对你有帮助的方法都可以尝试。夫妻二人应该轮流进行，这样就不至于其中一人总是筋疲力尽，满腹牢骚。

早起的孩子

如果你的孩子在早上 6 点之前醒来，他可能会过度疲劳。比起休息充分的孩子来，过度疲劳的孩子睡不好也睡不长。他可能：

- 上床睡觉太晚。
- 日间小睡不充分。
- 在他下午的小睡和晚上上床睡觉之前（尽量不要让这段时间超过四小时），孩子长时间得不到休息。
- 当孩子已经错过"昏昏欲睡"的状态之后才上床。如果孩子过度困倦，他就不知道当自己很清醒的时候应该如何再度睡着了包括早上 5 点。

日间小睡

当你的孩子每天还进行两次日间小睡的时候，上午的小睡应该是一小时左右（最少 45 分钟，最多 90 分钟）。下午的小睡应该在一个半小时左右。少许变化也是可以的，但不要让孩子上午睡

得太久，不然下午他就睡不着了。在18月大时，当孩子两次小睡合并之后，下午的小睡（这一次小睡可能会在转变过程中挪到正午）大约两个半小时。到三岁左右，日间小睡会缓慢地缩减为90分钟左右。

创造一种良好的日间小睡环境。记住，对于孩子来说，在白天转变情绪躺下睡觉是非常困难的，尤其是那些永不疲倦的学步期儿童。在孩子昏暗的房间里，放一些舒缓的音乐，读一两本故事书，或者玩一些柔和的游戏。当孩子昏昏欲睡的时候，甚至比起晚上还要稍微更困一些的时候，再把他放在婴儿床里。

按照与晚上睡觉一样的渐进法原则行事。不要让孩子开始和你玩拉锯游戏。如果他在婴儿床里站起来，你把他放下；如果他再站起来就无视他。不要认为每次小睡之前你都必须得哺喂他，尤其是如果你正在努力打破进食与睡眠之间的负关联时更不要如此。如果曾经你需要在晚上轻摇或者抱着孩子踱步才能把他哄睡，那么现在同样要在日间小睡的时候避免这种方式，并在孩子昏昏欲睡的时候把他放下。

要留在房间里按照安睡女士渐进法的步骤进行并安抚孩子，还是离开房间，都由你决定。如果你在旁边可以安抚孩子，那就留下好了。如果你的存在刺激到了他，那么离开房间，但也别走得太远，每10～15分钟检查一次他的状况。无论怎样都不要和他讲话；只发出一些诸如“吁吁，睡觉觉”的声音即可。不要抱起孩子，除非他濒临“身不由己”的歇斯底里状态，这时候你可以迅速抱起他，并在他平静下来之后立即放下。

给孩子一小时时间入睡。他可能会哭整整一小时，你肯定不喜欢这样，但尽量让自己忍耐。如果你没法承受这一个小时，可以找一些同伴；不要勉强自己超出自己的承受能力。如果孩子在这一小时之内都没有睡着（又或者他一直不停地哭泣，而你完全

无法忍受），离开房间，然后再回来，进行戏剧性的起床仪式，无论他是否睡着了。打开窗帘，来一个隆重的起床仪式。

如果孩子上午没能小睡，尽量让他下一次小睡比平常早一些，否则他可能会过度疲劳。注意孩子的睡眠迹象，了解应该何时再次尝试让他睡下，也许 45 分钟之后就是机会了。

下一次小睡使用同样的方法。 如果孩子下午的小睡也不好，就要采取你的临时预备计划了。必要的话你可以打破非运动的睡眠规则：把孩子放到汽车座椅上，把他放进婴儿手推车，用任何适宜的方法，但尽量避免倒退到你们一开始的睡眠支撑上去。孩子无论如何都需要一次小睡；否则，他可能会过度疲劳，在夜间无法睡着，你也可能会陷入由于睡眠不足而引发更多睡眠不足的恶性循环中。次日要再度开始进行睡眠训练；最后一定要让孩子知道，当你把他放进婴儿床时，就是应该睡觉的时间了。

安睡女士小提示

在孩子学龄前的这些年（有时候时间还会更长）里，可能一直需要下午的这一次小睡，为了保证这次小睡，你可以缩短上午的小睡。可能得用几个月的时间孩子才能准备好取消上午的小睡，你应该逐步缩减上午小睡的时间，并且坚持下午的小睡。

打盹儿。 如果孩子喜欢打盹儿，每次睡眠都少于 45 分钟的话，你就应该尽量延长小睡的时间。如果孩子小睡醒来后还是疲倦而暴躁，你也应该延长小睡的时间。如果在二三十分钟或者 40 分钟之后你就听到孩子醒来的声音，他可能实际上只是局部清醒，而不是完全清醒。你需要温柔地安抚他，帮他再度入睡，这对于孩子来说其实比较困难。你的反应应该足够快，让孩子没有

时间完全清醒;但又要足够温柔,不能刺激到孩子,让他认为日间小睡时间已经结束了。这需要一些小技巧来取得两者之间的平衡,但你很快就会习惯他的哭闹和睡眠节奏。

当你听到孩子醒来,走进他的房间时,可以呆在你渐进法应处的位置,或者站在门口。如果可以,尽量给他一个小时让他再次睡着。如果有必要的话,每天都要这么做,每次上午和下午的小睡也要这么做。如果他睡的时间还是无法延长,就要用你的临时预备计划来保证他至少能在下午进行一次比较好的小睡。

阿黛尔为亚力克斯准备了一个很好的时间表,但让孩子按照时间表行事却是一个艰巨的任务。让孩子入睡至少要用 30 分钟,而且他还必须要在妈妈怀抱里才能睡着。然后阿黛尔还得悄悄把他塞进婴儿床,以防把他吵醒。日间小睡的训练对于阿黛尔来说确实非常艰巨。“这是不可能的任务。”她如此评价说。但阿黛尔知道她再也不能拖延下去了。“亚力克斯能在上午哭整整一小时,下午又哭一小时;我们只好把他放到车里,开车载着他到处走。”

在孩子哭的时候,阿黛尔选择不留在他的房间里;因为他哭泣得太厉害,阿黛尔会忍不住和他讲话或者采取行动。她每 15 分钟左右去检查一次儿子的状况。有些妈妈发现在白天似乎更能容忍孩子的泪水,但对于阿黛尔来说,当她的丈夫离家去上班后,她独自在家面对一个哭泣的孩子是一件非常痛苦的事情。大约用了一个月,亚力克斯的日间小睡才逐渐改善——尽管还是存在一些不足,但他们的进步是巨大的。回顾过去,我们发现当时亚力克斯似乎正处于两次日间小睡即将合并为一次的边缘,当他进入这种过渡阶段时,阿黛尔恰好准备改善他的睡眠习惯,可能正是这个原因让他的睡眠更加困难。幸运的是,训练进行得非常顺利的。

安睡女士小提示

如果你的孩子还不能整夜安睡，你要赶在两次日间小睡合并成一次之前处理好这个问题。当孩子可以连续几周都彻夜安眠时，如果你发现他已经做好准备，就可以开始调整日间小睡的时间表了。

每天一次小睡的转变

这个年龄段比较重大的关于睡眠的时间应该是孩子两次日间小睡合而为一，成为午饭后唯一一次小睡。小睡的合并从生理和心理上来说都是必然的变化，几乎所有的孩子都会经历这种“一次小睡不够，两次小睡过多”的阶段。很多父母对于这种转变都会感到紧张，哪怕是在最乐观的状况下，你可能都会遇到一些奇怪而混乱的问题，时间可能是一周、两周，有时候甚至能达到三周。

你的目标是让孩子的小睡从大约 12 点半或者 1 点开始。这次小睡应该持续两小时十五分钟到两个半小时，不过在随后的两年中这个时间可能会逐渐缩短。当照料孩子的人能够按照一种基本明确而健康的时间表照顾孩子时，你就可以尽量让家庭的作息时间与孩子的同步了。没必要让孩子再去习惯一种专为周末计划的作息时间，否则他可能会为了一周的其他五天不得不“倒时差”。

安睡女士小提示

你的孩子准备好合并两次小睡的表现是：

- 他已经15～18个月大了(过晚或者过早都不常见)。
- 他总是整晚安睡——10～11.5小时不中断的睡眠。如果不是这样，那么在进行日间小睡的改变之前，你要先提高孩子夜间睡眠的质量。
- 孩子需要用越来越长的时间才能在上午睡着；或者虽然很快就能睡着，但也会很快就醒来；或者上午虽然还能如常小睡，但下午却不会再睡(这意味着晚上你要面对一个脾气暴躁的过度疲劳的孩子)。

了解何时孩子准备好可以改成每天下午小睡一次，以及确保他在这个转变过程中不会过度疲劳的秘诀，是观察孩子究竟是正常的发小脾气还是完全由于睡眠不足而导致的暴躁。而在这个转变的过程中，要格外注意孩子夜间的睡眠。如果孩子过度疲劳，他的夜间睡眠也会受到干扰，或者他次日可能会起得非常早，而这反过来也会让他在白天更加疲劳，脾气更暴躁，然后又会让日间小睡更困难。正如你所见的，这就是导致睡眠不好的根本原因。因此你要改用新的日间作息时间，让孩子比平常更早些睡觉，大约在7点或者7点半。留出足够的时间让孩子熟悉并适应晚上睡觉前的新仪式。大部分孩子在十天之内都会完成转变，但要想完全调整好，则可能需要三周左右。如果孩子在日间小睡时有些困难，或者在转变过程中可能频繁地夜间醒来，也不要太焦虑，这很常见，而且只是暂时现象。

当你判断是否应该改变孩子的日间睡眠时间时，记住你在寻找的是一种长期的表现，而不仅仅是某一天的改变。孩子偶尔有

一两次短暂的上午小睡，或者某个下午没有小睡，并不一定表示孩子已经做好了改变的准备；那可能只是在孩子成长的过程中偶然发生的情况。只有当孩子的这种表现越来越明显时，才可能是你应该帮孩子改变的时机来临。如果你不很确定，最好把一两个星期之内孩子日间小睡和醒来的时间都记录下来。

一旦你确认孩子做好了改变的准备，就可以着手了！

选择一个合适的时间进行。就像你开始进行睡眠训练时一样，不要企图改变孩子的整个睡眠习惯，例如当你准备进行一次旅行前，或者当你面临某项工作即将到截止日期时等都不是合适的日子。

逐渐开始，每天进行少许改变，持续 7～10 天。不要马上就作出改变，一下子取消上午的小睡。可以先将上午的小睡稍微推迟。大约推到上午 11 点左右，持续 2～3 天；然后改到 11 点半持续几天；接下来变成正午时分等等。不要停滞在将近中午的时候。你应该让还在 7～10 天之内将小睡的时间定在下午较早的时间段里，哪怕他的身体还要再过一周才能适应，才能完全调整好睡眠节奏也没关系。换句话说，孩子原本是 11 点开始小睡到下午 1 点半醒来。然后再将时间稍微向后推，也就是说，他的小睡从 11 点半开始直到 2 点。有些孩子很快就能调整好，将正午作为小睡开始的时间。还有些孩子则会稍微慢些。你要注意观察孩子；如果到 11 点半他就没法保持清醒的话，证明他需要睡觉了。如果他还是很活泼愉快，则可以试着将小睡的开始时间推迟到正午。

假如孩子只能睡一个小时，醒来后很疲倦，这种现象在转变过程中是很常见的，尽量安抚他，帮他再度入睡。（如果你需要更多帮助，可以回顾一下较小的婴儿们的相关章节中关于日间小睡的小提示，看看对你是否有所帮助。）如果所有的方法都不奏效，

就要使用日间小睡的紧急预备方案了，比如把孩子放进汽车或者婴儿推车中，看看能否让他多睡一会儿。记住，不要让孩子睡到下午 4 点或者 4 点半以后，哪怕他某日的日间小睡比平常都晚，否则就可能推迟他晚上睡觉的时间。晚上睡觉的时间能早不能晚。

如果你已经用了几天时间帮孩子合并两次日间小睡，却发现他似乎有点儿“恍惚”，那孩子也许过于疲劳了，给他一个“两次小睡的机会”让他自我调整一下。我知道，我一直告诉你要坚持，但在这种特殊情况下，你应该优先考虑的是孩子的休息，不要让他陷入过度疲劳导致的亢奋状态。将上午的小睡时间缩短，大约 45 分钟即可，这样你还是能够保证让他在午饭之后进行第二次小睡。次日就可以再度转回到两次小睡合并的进程上来了。

假如只是你认为孩子做好了准备，那么还是尽量不要进行两次小睡的合并；你应该等待孩子向你发出信号。过早地进行合并不会成功。记住，观察你的孩子，而不是机械地去行动。同样，在合并两次小睡的问题上不要走错方向——取消了下午的小睡，保存了上午的就大错特错了！父母们通常会让一个 12 个月大的孩子在上午睡两三个小时。然后到了下午孩子就会拒绝睡觉，但孩子绝对做不到从上午的小睡醒来之后一直到晚上睡觉之前都保持清醒，而不犯困。

尽管卡罗尔在约书亚 14～15 个月大时勇敢地试图改善他的日间小睡，但约书亚的日间小睡仍旧不是很好，尤其是上午的那一次。到约书亚 16 个月大时，不再需要上午的小睡之后，卡罗尔才如释重负。“我们开始略过他上午 9 点时的小睡，这一次小睡无论如何质量都不好；真是让人郁闷。只有一次小睡反而质量变好了。我们将原本下午 1 点的小睡稍微提前（当孩子调整为只有一次小睡之后）就又稍微推后。”她说，“我们尽量定在下午 1 点开

始小睡，但你需要注意孩子什么时候会困倦，如果你没能发现孩子困倦的点，就会错过机会。有时候约书亚 10 点半就会犯困，有时候则一直到 2 点都不困。我现在已经能及时发现他困倦的信号了——我可以从他的眼中看到迹象。他会频繁地眨眼，看上去疲倦而呆滞。”

马修

当利兹特和卡尔凝视着安静地睡在婴儿床里的新生婴儿马修时，他们完全无法了解什么是睡眠不足。马修在三个月时，大部分夜晚都能安睡，四个月时也能几乎每个晚上都睡得非常好。但到了五个月大，经历了十天严重的炎症之后，马修的睡眠状况开始恶化。“在他生病期间，稍有风吹草动我就会冲上前去，而以前我并不会那么做；从那时起孩子的良好睡眠习惯就结束了。”利兹特说，“每次只要他一出声，我就会马上冲过去。”

到了孩子九个月时，他们已经成为典型的睡眠不足的父母了。他们也尝试过费伯睡眠法，但孩子总是坚定地抓着婴儿床的栏杆站起来，牢牢地在婴儿床里站定。第一个晚上，他用杀猪一样的高分贝尖叫了 90 分钟，而第二个晚上时间更长。利兹特和卡尔不得不缴械投降。“我的心都要碎了，我发誓绝对不再这么做了。”利兹特说。结果，他们整晚都得不时出入孩子的房间，轻摇他，给他喂奶，帮他捡起掉落的安慰奶嘴。

如果孩子在晚上 11 点之前醒来三四次，他们会把他抱到自己的大床上；孩子在大床上翻来覆去，又踢又打，令夫妻两人无法入睡，直到他们累极了才把孩子放回婴儿床；但这样又会吵醒小家伙，从而不得不又一次抱着他轻摇、喂奶、捡起安慰奶嘴，如此反复。“只有你想不到的，没有我们没做过的。”利兹特说。利兹特和卡尔告诉自己，孩子的表现很正常，并采用了一种接受现状的态度。

到13个月大时，马修开始体验到常见的分离焦虑，当卡尔应征担任海岸警备队预备役队员，一周只能回家一两次时，他对于父亲的缺席反应非常强烈。利兹特自己很难处理好这个问题，尤其是这个孩子本来睡眠就不好，当他父亲在家的时候他就更加无法入睡。“卡尔会随船在纽约港值勤、巡逻，我常常会哭着和他通电话。情况非常糟糕。”她知道现在必须对某些已经破坏的规则进行调整了。

利兹特向我请教，对马修的睡前仪式进行了几次小调整之后，她开始了安睡女士渐进法。卡尔回家的晚上也会帮忙，并且承担了许多夜间照顾孩子的责任。马修的反应则比利兹特预想的好得多。头两个晚上他哭闹了一阵子，但却没有之前他们留下他独自一人在房间里时哭得厉害。“他只是呜咽，想知道为什么我不抱起他。”利兹特回忆说，“他会抱怨，但不会号啕大哭；和我们当初采用费伯睡眠法的时候完全不一样。我把手放到床垫上，轻声对他说‘躺下，躺下。’”最后马修还是乖乖照做了。

马修在第三个晚上开始抵触。孩子们一般都这样，一旦他们想明白了“这是真的！”“他好像想说‘我才不要听你们的话。’”他的妈妈笑着说。马修把所有的东西都扔出了他的婴儿床——枕头、利兹特放在婴儿床里的五只安慰奶嘴和其他东西。利兹特把必要的东西又放回了婴儿床，而且很小心，她不想让孩子以为这是一种游戏，然后再次把东西扔出去。马修最后睡着了。接下来的三个晚上，当利兹特把大扶手椅挪到房间中央，随后又挪到门口时，孩子虽然依旧表示不满，但每晚的反应都更趋向缓和，到第12晚，利兹特坐在走廊的地板上。“我坐在房间外，口头上安慰他。我说：‘吁吁，天黑黑，妈妈爱宝宝。’有时候我还会唱儿歌，好让他知道我在这儿。知道我在附近是关键。”

马修仍然会在夜间醒来，但次数比以前少了很多，利兹特则

可以待在渐进法当日应处的位置上。马修也仍然需要和父母进行肢体上的接触，但不需要他们冲进房间，抱起他或者轻摇他了。当他听到父母中的一人在走廊上，就会表现得很好。很快，马修开始整晚安睡，甚至开始期待晚上睡觉了。“他会张开双臂，投向自己的婴儿床，希望躺下，喜欢躺下，盼着睡觉。我从来都不敢想像这真的会发生。”

同时，利兹特还努力让马修放弃安慰奶嘴，帮他从使用奶瓶转向使用杯子。她开始在日间小睡之前给孩子一杯水，同时短暂地抱着他轻摇几下。接下来她开始把杯子用在一天的其他时间，只在睡觉前给孩子的奶瓶里装四盎司稀释过的奶粉，在关灯之前给孩子读书的时候让他吮吸一会儿。

遗憾的是，随着夜晚睡眠的改善，早上的睡眠则开始恶化，利兹特发现改善上午的小睡特别困难。“太难了，我不得不在凌晨 5 点起床坐在走廊上，但我们必须得这么做。”她回忆说。但这种状况还是随着时间的推移得到了改善。

日间小睡的训练是利兹特一天中最郁闷的时候。“我一般会非常恼火，日间小睡让我的每件事都一塌糊涂。”上午的小睡好一些了；孩子可以睡得相当好。但是下午的小睡就成了折磨。后来利兹特发现，原来自己错误的理解了马修的睡眠时机。“他在早上能很快平静下来。他会在 6 点半醒来，然后在 9 点或者 9 点半开始小睡，但下午就很难睡下了。我原本以为揉眼睛就代表他准备睡觉了，但实际上揉眼睛已经表示现在睡觉太晚了！我只好多看表，因为马修需要在上午小睡醒来之后的三小时内再睡一次。我估错了孩子需要睡觉的时间和频率。”

有时候利兹特没法让孩子躺下睡觉，孩子会反抗，甚至打妈妈。还有时候他可能只睡 40 分钟，醒来后不知道如何再度自行入睡，因此就开始尖叫。有时候如果利兹特没法让孩子躺下，就

只好驾车带他出门游荡，这不是很好的长期解决方案，但也算是个权宜之计。乘车在外游荡有助于孩子的身体习惯一天两次小睡的节奏。很快，下午的小睡就成了一种习惯，而不是一种斗争。

不过，当利兹特刚解决了日间小睡的问题，就再度遭到了来自“一次小睡太短，两次小睡太长”阶段的打击。“上午让孩子躺下睡觉又给我造成了麻烦。他原本很喜欢在上午小睡的。但就像做了一场梦一样，原本他会在上午睡两小时，下午睡两小时，然后晚上7点准时上床睡觉。突然间他就不想在上午睡觉了。他会在婴儿床里一直玩到9点半或者10点，直到10点半才肯躺下。可这个时间已经晚了，所以到了下午他还是不肯睡觉。”利兹特意识到这就是孩子传递的信号；他已经准备好取消上午的小睡了。于是她开始让孩子上午都保持清醒，然后在正午把他放到床上。马修渐渐地完成了这个转变。

不过有时候马修还是会有很糟糕的日间小睡或者晚上睡眠，有时还会哭闹一阵子。但利兹特学会了时不时地看看时间，这真的很有帮助。“虽然感觉上他似乎哭了很长时间，但如果我看看表就会发现其实只有30秒！”

价值8600元早教资料免费下载

1、最全巧虎宝宝早教视频（2008-2013年高清完整版）

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1371149263

（点击进入下载）

2、《米卡成长天地》高清早教视频下载

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1375243442

3、冯德全早教革命资料大全【汇总】

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1374137001

4、爱探险朵拉全集高清视频（共104集）

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1375843639

5、早教胎教音乐免费下载【汇总帖】

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1373110113

6、《巅峰家教智慧》电子书+视频！！！

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1377832218

7、教宝宝学画画视频教程（全套25集）

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1377395452

8、宝宝不舒服，懂这些推拿就不用担心！+视频演示！！

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1361888556

9、《贝瓦儿歌视频大全》高清 MP4版免费下载

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1373218305

10、布奇乐乐园高清早教视频【1-6岁全套】

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1379249817

11、宝宝故事大全 mp3 免费下载【精华帖】

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1379655700

12、498 元冯德全爱盟幼儿园全套 36DVD 下载

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1379995514

13、贝瓦早教系列全套（MP4+MP3）

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1381029985

14、《大胡子爷爷讲故事教英语》免费下载

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1381387947

15、妈妈必看：一个月到三十六个月的婴幼儿抚触操（图解+视频）

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1361888202

16、《竹兜快乐家庭》早教视频下载（7-36 月）

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1381938995

17、《崔玉涛图解家庭育儿》系列电子书（高清）

http://user.qzone.qq.com/2637884895/blog/1381918817