【美】金姆·韦斯特(Kim West) 乔安娜·凯南（Joanne Kenen）◎著 李寒◎译

经典权威 循序渐进

最新升级版

1.5–5岁适用

韦氏婴幼儿睡眠圣经

THE SLEEP LADY'S GOOD NIGHT, SLEEP TIGHT

给新手父母的最好礼物

真实案例、技巧和训练指南，专业解决婴幼家庭的睡眠苦恼

金城出版社
GOLD WALL PRESS

涵盖整个儿童期　最实用的家庭礼物
帮助父母解决一个最具挑战性的问题！

孩子不再哭闹，父母不再苦恼！
循序渐进培养孩子良好的睡眠习惯，受益一生

作者分享了很多让宝宝深度睡眠的切身经验，从宝宝出生至五岁，无论有什么特殊情况，家长都能从中找到解决睡眠问题的方法。作者韦斯特建议家长坚持温柔的方式，让孩子渐渐进入深度睡眠状态。

——《出版商务周报》

《韦氏婴幼儿睡眠圣经》是第一本详细解释为什么晚上上床睡觉的时间对于许多孩子和他们的父母而言如此重要的书，并且给出了一种任何人都不会因此感到郁闷的解决方法。

——莫拉·罗兹
《父母》杂志资深编辑

这是给世界各地疲倦的父母们最好的礼物。我强烈向那些存在睡眠问题的婴儿或者小孩们的父母推荐这本书。

——霍华德·班尼特
医学博士，儿科医生，《干干爽爽起床：帮助孩子不再尿床的指导手册》作者

如果做父母的会担心孩子存在睡眠问题，那么这本书就是最好的答案。而且我认为本书相当有助益，并且格外简单易懂。

——安东尼·E·沃尔夫博士
临床心理学家，畅销图书《不公平，杰里米·斯宾赛的父母让他整夜不睡！》作者

就在“男孩还是女孩”之后，新父母们最常听到的一个问题是“孩子睡得好吗？”看过金姆·韦斯特这本没有痛苦、实用而且很容易上手的书之后，他们就能够照实回答说，“当然，睡得无比香甜！”

——阿明·布洛特
《准爸爸》以及其他六本关于父亲的畅销书作者

父母和孩子都应该喜欢这本涵盖了整个儿童时期——从刚出生到五岁为止——睡眠问题的常识性的，有益家庭的指导性图书……这本书能够教父母们学会如何用温和的方式从新生儿时期就开始塑造孩子的睡眠习惯，免去了许多家庭都要经年累月忍耐的睡眠不足之苦。

——大卫·凯斯勒
医学博士，前食品与药物管理局理事，现任加利福尼亚大学旧金山分校医学院院长

这本书能够教父母们学会如何用温和的方式从新生儿时期就开始塑造孩子的睡眠习惯，免去了许多家庭都要经年累月忍耐的睡眠不足之苦。

上架建议：育儿·生活
ISBN 978-7-80251-892-6
9 787802 518926 >
定价：68.00元（全两册）

The Sleep Lady's Good Night, Sleep Tight

1.5—5岁适用

韦氏婴幼儿睡眠圣经

【美】金姆·韦斯特(Kim West) 乔安娜·凯南(Joanne Kenen)◎著

李寒◎译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

目 录

第 1 章 一岁半到两岁 /1

第 2 章 两岁半到五岁 /59

第 3 章 这到底是谁的床？/119

第 4 章 帮助双胞胎或兄弟姐妹睡觉 /155

第 5 章 噩梦、夜惊和梦游 /177

第 6 章 医学问题 /189

第 7 章 特殊状况 /215

附 录 婴儿的安全睡眠规范 /241

第1章　一岁半到两岁



18 个月大的孩子夜间平均要睡 11 小时 15 分钟，日间正午或者下午的小睡则平均为 2 小时 15 分钟。到了两岁，睡眠的需求降为夜间平均 11 小时，白天平均 2 小时。到了下一年，睡眠将会降到平均夜间十个半小时，日间一个半小时。记住，这只是平均数字，但变化不应该太大。观察孩子日间的行为，从而获得提示，了解他们是否需要更多睡眠。

学步期的孩子和即将上学前班的儿童都很有趣，但晚上睡觉的时候通常会是一种挑战。他们虽然已经学会遵守一些简单的管束，但仍旧会考验我们的规矩和底线。他们对周围的世界感到好奇，极其渴望去探索发现，这导致了他们更频繁地去考验人们的底线，打破界限。他们会爬高蹦低，摸爬滚打，攀上家具的顶部，踢踹门板，试着爬出婴儿床。然而当他们在不断突破限制的同时，却还需要父母为他们确立界限，从而寻求保障、安慰和安全感。

他们会迅速发展语言技能，但他们能理解的东西要比能说出的东西多，这容易导致他们产生挫败感并且发怒。他们最喜欢的词语似乎是不、我要、我的，他们对于自己的玩具和父母占有欲尤其强烈。随着语言技能的不断发展，他们开始耍赖、讨价还价或者交涉，尤其是在晚上睡觉的时候。

他们会经历一种“害怕”黑暗、打雷、妖怪等东西的阶段。噩梦和夜惊也会开始出现，并在未来几年中成为反复出现的问题。如果你让使用儿童马桶的训练成为一种关于意愿的斗争而不是合作性地探索活动的话，这种训练也会影响晚上睡觉前的行为。为了避免晚上睡觉的时间床上成为战场，请确保你们有一个始终如一的有规律而宁静的睡前仪式。清晰的规则和父母的包容是基本要素，同时还要伴以很多的爱、拥抱与亲吻。

通常，父母们会匆匆忙忙地让孩子们从婴儿床换到普通床上

去，似乎这是一种成就，一种成熟的体现乃至于让孩子们像成年人一样获得成功的标志。一位曾经与我共事过的女士甚至将之当成一种约定俗成的竞赛，看幼儿园中的哪个孩子能首先成功地睡到普通床上去。在很小的时候就开始进行这种转换的孩子睡眠可能会受到干扰，会经历痛苦的睡觉时间，会出现更多的泪水与愤怒。安全感是其中一个原因。我担心很多 20 个月大的孩子可能夜晚会在房间里游荡，拉开抽屉、拔下台灯插头，尝试各种有趣但可能存在危险的探索。

哪怕孩子试图从婴儿床里爬出来，我也总是建议父母们尽可能长地让他们睡在婴儿床里，一直到两岁半之后，到三岁当然更好。那时候，孩子的语言能力已经足够让他了解“大床”的含义，并且当他在晚上第 20 次试图逃避上床时明确地表达出自己的意思。

本章节实际上是为那些在婴儿床里睡觉的孩子编写的，但我承认确实也有一些孩子在很小的时候就成功地转移到了儿童床上，一些读者也已经在认识到这种做法并不理想之前就完成了这种转换。所以我也为那些已经睡在普通床上的孩子们提出了一些建议，尤其是该如何修改安睡女士渐进法建议。你还可以阅读一下后面关于更大一些的孩子的章节，看能否得到更多启发。

为一岁半到两岁大的孩子塑造睡眠习惯最困难的一个方面是父母们常常会怀疑自己是否能改变这些已经根深蒂固的习惯，他们通常会在两年的睡眠不足之后变得过度疲倦，令夜间必需的坚持变得更加难以实现。我就曾经遇到过一些父母，他们在试图进行这些改变的时候，在午夜时分几乎在地板上直接睡着了。但正如你希望的那样，孩子们确实能够学会放弃他们的睡眠支撑；放弃他们的奶瓶，放弃午夜时分的哺喂，放弃被抱着轻摇、踱步或者拥抱才能睡着的习惯。他们能变成睡眠质量非常好的孩子，或

者至少比较好。

发展变化

分离焦虑

分离焦虑会在孩子一岁左右达到最高点，但另外一个高峰则出现在 18 个月时，然后有规律的高低起伏，贯穿整个儿童时期。一个美好的、长时间的、柔和而有规律的睡觉前的准备时间，与非常重视睡前仪式的父母们共处的黄金时间，没有电话、不去洗碗或者计算账单，这些都能帮助孩子安抚焦虑感。

有时候，你的孩子可能会开始清晰地表达出他想要你在睡觉的时候陪在他身边。听到他恳求地说“妈妈，坐下”或者“爸爸，别走”都着实让人心疼。但如果这一幕真的出现了，你要温柔而坚定地对他说晚安。如果你的孩子不再恳求，他很可能仍然会理解你口头上说的，爸爸妈妈多么爱他，会留在他附近的这种话。如果你待在隔壁的房间，而不是家里的另外一层楼时，很多孩子会更容易入睡。他们虽然看不到你，但却知道你在哪里。

有些很小的孩子仍然会在晚上体验到一些分离焦虑，大一点的孩子则可能会担心一旦睡着了就会错过某些让人兴奋的事情，这个年龄段的孩子很擅长在晚上睡觉的时候采用消极抵抗或者拖延的战术。我听到很多医生称之为“谢幕表演”，因为他们旨在让父母一次又一次地回到自己的床边。

当一个孩子一再要求被抱起来、亲吻，给他一条毯子等，超过自然而合理的限度时，父母应该作出一次反应。定义一下你认为什么对你的孩子而言才是合理的底限，你要在他的分离恐惧与操纵人心的天赋中把握平衡！也许你认为说一次晚安就可以了；也

许你不在乎说三四次晚安。但一旦你设置好了你的底线，就要让孩子清楚，并且提醒他："这是最后一次了。"

下一次，如果真的有下一次，你的反应应该是中立而坚定的。要说，"现在必须睡觉了"或者"我爱你，甜心，但你知道现在应该睡觉了。"父母们如果说了"最后一次"，那最好就是最后一次，因为孩子们对于成人的言行不一极其敏感。

心爱之物

心爱之物，通常是一只特殊的毛绒玩具或者小毯子，对于那些已经开始独立但却仍旧需要额外安全感的孩子来说非常重要。心爱之物有助于减轻分离焦虑，克服恐慌，以及消除长期以来对于奶瓶、杯子或者安慰奶嘴的情感依恋。

哪怕孩子过去并不需要心爱之物，可能现在也会找到一个了。他们会喜欢一个来自于书里或者电视里的形象作为心爱之物。在他们奔放的想像力之下，他们还会和心爱之物一起做游戏，一起进行晚上的睡前仪式和日间小睡的仪式。例如，如果你注意到孩子的睡眠时机，然后对小狗或者汽车说晚安，就要让孩子的心爱之物也对小狗和汽车说晚安。让心爱之物加入到孩子的晚上睡觉和日间小睡中去，当他在夜间醒来就会想起自己可以拥抱心爱之物入睡。

然而，如果你孩子的心爱之物是安慰奶嘴、奶瓶、茶杯或者你的乳房，那他就不会轻易接受一个新玩具了。当你为孩子断奶，或者开始削弱哺喂与睡眠之间的关联时，孩子可能会更容易接受一件新的心爱之物，但这需要时间。

父母们也许会担心如果孩子要带着心爱之物到处跑怎么办。如果心爱之物是一只安慰奶嘴，首先要把它限制在只能在家里使用，然后限制到只能在睡觉的时候使用。但如果孩子的心爱之物

是一件玩具或者一条毯子，我并不认为不到两岁的孩子带着它到处跑是个问题。等孩子到了两岁，你可以将心爱之物限制为只能在家里或者车里带着，或者也许在某些特殊场合，比如去看医生或者令人不安的陌生环境等情况下也可以带着。

巴瑞在两岁半大的时候，如果没有抱着他的奶瓶或者手上没有缠绕着妈妈的头发就无法入睡，或者无法在夜间醒来的时候再度睡着，这种固定的习惯在他六个月大的时候就形成了。海琳带巴瑞去一家玩具厂，在那里顾客可以亲手制作自己的泰迪熊玩具；这种玩具通常会在商场或者工艺品商店出售。海琳为巴瑞制作了一只“救火员小熊”，来配合他的救火员睡前仪式，而巴瑞则为他的妈妈选了一只粉色的“希望”小熊。他的兴奋让救火员小熊很容易地加入到了他睡前的仪式中去，也很容易地帮巴瑞忘记了奶瓶和妈妈的头发。“让他自己制作小熊确实让他对玩具更感兴趣了。”海琳说。

后来，巴瑞又把一只长耳朵兔子当作了心爱之物，当然，他会把兔子的耳朵缠绕在手中，心满意足地睡觉。巴瑞自己的头发太短了缠不住，所以当他生病或者特别疲倦的时候还是想要缠绕着妈妈的头发，哪怕后来妈妈剪成了很短的男式发型他也不管。“我不知道为什么他那么喜欢我的头发；他总是对我说‘我喜欢你的头发’。”但尽管这仍然是巴瑞的习惯，却不再是一种会干扰他睡觉的长期需求了。

新动态：从婴儿床到普通床

我总是尽可能长地让学步期的孩子待在婴儿床里，但他们有时候会有自己的发展进程。如果你的孩子开始往婴儿床外爬，可以降低床垫的高度来增加他攀爬的难度，从而阻止他。把枕头摆在婴儿床四周的地面上作为保护，以防他翻越时受伤。把那些可

能会被他当作垫脚的大型玩具或者毛绒玩具拿出婴儿床。

如果孩子确实自己爬了出来，在尽量不与他进行互动的情况下把他马上放回去——而且要对他说“不要爬”，语气坚定但不要对孩子叫喊。你自己尽量待在孩子的房间门外，可能的话保持在孩子的视线之外，时不时地偷偷看一眼他的状况。当他开始再次准备向外爬时你要说“不要爬”，语气就如你要表达的内容一样，如果有必要，可以再次把他放回到婴儿床里。

如果你的孩子看起来仍旧打算出来，尤其是他如果还没到两岁的话，可以试试婴儿床帐，用带拉链的网罩罩住婴儿床，让孩子能看到外面却没法爬出去。这会在将孩子转移到普通床上之前为你多争取几个月的时间。

麦迪逊的父母注意到她在自己的婴儿床里动来动去，因而他们认为婴儿床对于这个活泼的宝宝来说可能空间不够，如果给她更充足的空间也许她能睡得更好。他们在孩子才15个月大的时候就把她移出了婴儿床，给了他一张直接放在地上的床垫。这虽然给了麦迪逊更大的空间，但却没有解决父母的问题，反而产生了很多新问题。孩子仍然到处动来动去，有时候会站着睡着，晚上醒来得也更频繁，而且现在她还要妈妈在床上陪她睡觉。

过早从婴儿床中移出的孩子还没有足够的语言能力去理解睡前的规矩，所以他们会一再地离开床铺，那你就不得不在房门口安装儿童门，或者干脆关上房门来避免这种问题，结果反而可能导致更多的泪水与愤怒，而这些本来都是你想要避免的。

这些孩子还可能会怀念他们在婴儿床时舒适的感觉。我就知道有些家庭过早地将孩子转移到普通床上，结果又想让孩子再回到婴儿床里，尤其是当孩子总是提起自己的婴儿床或者总是试图爬进更小的孩子的婴儿床里时。这不是一种退步。最好听从孩子的意见。

安睡女士小提示

如果你的孩子喜欢从婴儿床里往外爬，可以在晚上睡觉的时候给他穿一件很长的 T 恤衫或者睡衣，这会让他的攀爬变得更困难。

有些小孩确实不喜欢婴儿床，这时候会开始提及“大小伙子”或者“大姑娘”的床。如果他们能清晰地表达出这种意思，那就是一种相当好的表现，说明他们已经有了足以理解在普通床上睡觉的规矩的能力。为了让这种转变更简单，可以看看下一章节中的“新动态：搬到大床上”这一部分内容。如果担心孩子会滚落床下，可以安装护栏。要提醒孩子，搬到大床上的同时就要遵守规矩——诸如整晚都要待在床上这种。

哪怕在婴儿时期，伊连似乎都不喜欢他的婴儿床，也许是因为他非常崇拜的哥哥扎克没有睡在婴儿床里的缘故。在他满两周岁的那年夏天，我第一次遇见他父母的几个星期之前，这个家庭在海边度过了一周时间，他们没有吃力地带上一张便携婴儿床，因为知道孩子不可能待在里面，而是往地板上丢了一张床垫。于是伊连表现得兴高采烈，比在家里的时候睡得还好——换句话说，他在家睡得不好，但也还不到非常糟糕的地步。在海边的一周中，尽管有时候伊连确实想让乔安娜和自己一起睡，但却从未要求过到乔安娜和肯的床上去睡，而在家的时候他常常这么做。

回到家之后的前几天，伊连在婴儿床里度日如年；他大声而清楚地告诉父母自己讨厌回到“监牢中”。那时我刚刚与他们家结识。我们谈论了婴儿床与普通床的优缺点，但他们直觉上认为像在海边那样使用床垫会比较好。伊连虽然只有 22 个月大，但语言能力和幽默的能力都表现得非常出色。

早先他们曾经在纽约待过几天，那时候伊连曾经为那些排成一列从派克大街呼啸而过的救火车而着迷，所以当乔安娜发现一张印着红色救火车的床单时，她就知道伊连一定会非常喜欢。在开始进行睡眠塑造的当晚，他们就把伊连从婴儿床里移了出来。那天一切都非常顺利。伊连扑向大床和印着救火车的床单，并且一口答应了新的睡觉规矩。尽管用了很长时间才让伊连在夜间能够安睡，但我们在几天之内也解决了好几个睡眠的问题，而伊连从一开始就可以整晚待在他的“大小伙子”专用的救火车床上。

安睡女士小提示

对于年龄稍大的孩子来说，贴纸时间表能够成为很棒的激励他们行动的原因，有时候这个年龄的孩子的反应会非常好。孩子们虽然还不能理解什么是时间表，但他们喜欢在早上起床之后得到一枚贴纸。

进餐与睡眠

当我们的孩子还小的时候，我们会尽量让他们吃饱之后再上床睡觉，希望这能帮助他们学会在夜间睡得时间更长。但现在就没这个必要了。那些仍旧母乳喂养的小孩可能还会在睡前需要短暂的哺喂。这也可以，除非他晚上睡觉前、日间小睡前或者在夜间醒来时都必须依靠哺喂才能入睡。（关于当我们处于特殊的睡眠条件之下时，如何缓和地改变夜间哺喂，我稍后将会有更多建议。）

通常，这个年龄的孩子能够从晚饭到次日早饭之间连续 12 甚至 14 小时不需要睡前加餐，最多喝一杯水。大部分儿科医生都会建议将奶水限制在每天最多 18～24 盎司（每次三四盎司，或者六盎司杯）。整天都在喝奶（或者果汁）的孩子在进餐的时候就

不会感到饥饿，也就不会吃下足够的固体食物，或者没法摄入足够量的多种固体食物，来满足他们生长的营养需求。

除非涉及一些与众不同的饮食或者健康原因，18～30 个月的孩子应该每天有明确的三餐，早餐、午餐和晚餐，并且可以在上午十点左右和下午小睡醒来之后适当加餐。有些孩子可能需要第三次加餐，但如果这个时间接近晚餐，就尽量让这一次加餐更健康一些。记住儿童时代健康的进餐规律有助于塑造未来人生中的健康饮食习惯。学步期的孩子和学龄前的孩子开始知道向大人讨要甜食和垃圾食品，但你应该将这些食品当作特殊情况下的食物，而不是正常的主食。

哪怕你仍然在母乳哺喂，如果还没有让孩子用杯子，现在就可以开始着手了。在每餐都给孩子一个鸭嘴杯装水、牛奶、幼儿食品、稀释的果汁等等任何医生推荐的东西。如果他在晚上还使用奶瓶，那就换成杯子；如果他还在睡前喝奶，就换成水。你也不想让奶瓶变成孩子的睡眠支撑，变成那种当他每次要睡觉时都必须存在的东西。如果你需要更多帮助，可以读一下上册第 9 章“13～18 个月”的内容。

从乔的年龄来看，他吃得很少，个头也很小。多萝西非常担心他，直到九个月停止母乳喂养之后很长一段时间，她还会在孩子夜间醒来的时候给他一瓶牛奶。“我的医生说不要整晚哺喂他，但我不相信。我只是很高兴看到乔能摄入热量。”多萝西还承认，作为一个工作的母亲，她承担了更多的罪恶感，哪怕她已经知道孩子在幼儿园能够很开心地用杯子喝水了，也没法放弃那种令人愉快的用奶瓶哺喂孩子的幸福感。

当我说服多萝西，奶瓶必须成为乔的全部进餐与睡眠计划中需要大幅改变的一部分时，她发现让孩子放弃奶瓶比她预料的要简单得多。一个奇怪的副作用——我也在其他一些孩子身上看

到过——是在家的时候孩子也不愿意再用杯子喝牛奶了！乔会在幼儿园用杯子喝牛奶，吃掉他的燕麦，但却不愿意喝妈妈给他的牛奶，哪怕加了巧克力也不喝！多萝西为此采用了一种非常实用的方法，避免这种状况导致的不良后果，她通过其他食物保证孩子能摄入足够的钙。

恐惧

这个年龄段的孩子开始体验到恐惧，并会在晚上睡觉的时候想像出各种妖魔鬼怪。记住，这种恐惧是真实的，哪怕妖魔并不存在。做任何可以安慰孩子的事情，来让他知道没有妖怪，但不要在妖怪的问题上耽搁太久，否则会把晚上睡觉的时间拖得太晚。

没有什么必须遵守的规则，相信你的直觉，看看什么方法有用。可以在壁橱里或者床底下放一只手电筒。用这个小玩意儿帮你看清黑暗中的东西。“看，你的勇敢的小熊说床底下没有妖怪，现在这个勇敢的小熊会和你一起上床睡觉，你们两个都很安全，都没有问题的。”我的一位客户在网上发现了一种可以打败幽灵的“除妖”喷雾剂，你也可以给自己弄点类似的有趣的带香味儿的水。也许你的孩子还能帮你装饰一下喷瓶，这能让他觉得自己比较厉害，能够打败任何企图吓唬他的东西。

当巴瑞有时候感到害怕，并寻求父母安慰时，海琳会和他一起走回他的床边，简单地告诉她：“如果你需要我，我就会马上从客厅那边走过来。”

泰迪在本书中初次出现的时候是七个月大，开始的几个月他睡得很好，但就在第二个生日之后，他开始体验到一些睡觉之前的恐惧。尽管泰迪一般都喜欢在黑暗中入眠，丽莎还是发现目前留一盏小灯会有所帮助。“他会问我‘妈妈，真的有妖怪吗？’我就

告诉他‘妖怪？没有，那只是你想像出来的东西。’我们每天晚上都要这样度过。”他还会抱紧一本名为《没关系！汤姆不怕黑》的书，几个月来丽莎每天晚上都会给泰迪读这本书。

使用儿童马桶的训练

我认为同时进行睡眠训练与白天使用儿童马桶的训练没有任何问题，只要孩子做好准备，力所能及，并且产生浓厚的兴趣之后就可以开始。孩子们通常会在 18～30 个月（时间略晚也是正常的，无需担心）之间出现某种“时机”，此时他们至少开始对如何使用卫生间会产生兴趣，你可以抓住这个机会，否则可能就要再过几个月等待另外一次机会了。

除了建议你在白天进行训练之外，我不打算提出任何不同的关于儿童马桶使用训练的理论和方法。你可以在日间小睡的时候给孩子换尿布或者穿上纸尿裤，直到他至少能在一星期之内保持干爽后再行动。把晚上的训练留到最后。实际上，就我关心的问题而言，你可以让孩子一直到四五岁之前都在晚上使用尿布或者纸尿裤。（在第 6 章“医学问题”中我将会谈到大一点的孩子尿床的问题。）孩子们通常会在适当的时间自然而然地学会在夜间保持自己的干爽，所以在用大量的精力教孩子学会整晚安睡之后，再在半夜把他叫醒让他去洗手间是一种毫无意义的做法！我确实见过一位妈妈在晚上把儿童马桶放到孩子的房间里，好让他的儿子能在需要的时候就近上厕所。

让你的孩子在日间小睡和晚上睡觉之前坐在儿童马桶上（但不要强迫他）。如果孩子开始将“我要上马桶”当作拖延晚上睡觉的战略时，把他带到卫生间一次，只能去一次。还要让上卫生间这件事变得很无聊。没有交谈，没有游戏，没有互动。不要让孩子一再地上马桶，不然你可能会用整个晚上反复地进出卫生间。

为他换上尿布或者纸尿裤，向他保证晚上用纸尿裤也没问题，然后把孩子放到床上。

如果孩子总是在凌晨5点尿湿他的尿布，帮他换掉（如果你的动作足够快，可以在婴儿床里换尿布），但尽量让灯光黯淡，让孩子明确地知道现在还不是早上；他只能在早上起床，而不能因为尿布脏了就可以起床。帮助孩子再度入睡。（我在本章末尾“早起的鸟儿”这一部分中将会给你一些帮助。）

安睡女士小提示

让孩子练习使用儿童马桶，是孩子成长发育中的一个里程碑，所以必然会出现临时性的社交、情感、进餐和睡眠的干扰。你可能偶尔会听说一个孩子练习了几天就学会了，但如果你的孩子用了几个月也无需担心，这也是非常自然的。耐心一点，并为任何一点成就庆贺。

建立作息时间

作息时间示例

（如果你的孩子通常在早上6点到7点之间起床的话，可以将时间稍微提前一些。）

上午7点～7点半

起床吃早餐。

中午12点～12点半

午餐。

中午12点半或1点

开始小睡。醒来之后加餐。

下午 5 点～5 点半

晚餐。

晚上 6 点～6 点半

开始洗澡和睡觉前的仪式。

晚上 7 点～8 点(有时候 8 点半,由年龄和日间小睡时间决定。)

晚上睡觉。

孩子需要有规律的日间小睡,有规律的夜间睡眠以及合理有规律的进餐。他们的身体需要每天进行有规律的日夜荷尔蒙循环,他们的小心灵与精神也需要从规律中获得安全感。但我同样相信也应该适当灵活。睡眠时间是平均数量,但变化往往要比大部分家长预想的少,也许你的孩子需要更多的睡眠也说不定。

哪怕你已经建立了一种有效的作息时间表,还可能会经历一些自然的变化。有些时候孩子的日间小睡或者是醒后加餐可能会多一些,有时候则可能会少一些。当你学会读懂他的睡眠提示,并能及时发现他的睡眠时机时,你就能更轻松地调整作息时间了。如果孩子哭闹而且百般挑剔,那他可能需要更长时间的日间小睡,更早的上床睡觉时间,更晚的起床时间,或者以上三者皆有。

安睡女士小提示

当学步期的儿童逐渐变成学龄前儿童时,他们可能会偶尔错过一次小睡,也不至于导致太严重的后果。不要被误导,认为孩子已经长大,完全不再需要日间的小睡了。直到四岁之前,大部分孩子都还需要一小时或者一个半小时的日间小睡。

起床。给孩子一个戏剧性的起床时间。拉开窗帘,打开灯,

唱一首欢快的早安儿歌，开始新的一天。创造一种起床仪式，就像你晚上睡觉时候做的那样，加强孩子对起床时间和睡觉时间的区分。对于这个年龄段的孩子来说，早上 6 点到 7 点半之间起床是正常的。如果他一直睡到 7 点半以后，可以试着早点叫醒他，让他按照一种比较适合他年龄的时间表作息。通常起床晚的话会把他作息时间表上的其他项目都推后，导致混乱，尤其是当孩子准备上学前班的时候。对于小一点的孩子，我建议改变起床时间的时候以十分钟为一个阶段，每隔几天改一次。在这个年龄段，任何事情的进展如果很快，都得依赖于孩子的反应良好。无论是马上就在 7 点半叫他起床，忍受一两天的小脾气；还是每天调整半小时都可以。

如果你的孩子夜间会起来好几次，为了弥补缺失的睡眠早上会起得很晚的话，可以按照我帮孩子制定的消除夜间醒来的方法去做，从而将他的起床时间提早。但是，如果你的孩子晚上上床的时间越来越晚，睡着的时间越来越晚，但日间小睡仍然按部就班，夜间的睡眠质量也很好，而且对于你的孩子、你的家庭和孩子的幼儿园或者学前班都没有影响的话，可以不用在意晚睡的问题，顺其自然即可。

上午的小睡。到 18 个月时，大部分孩子都只需要一次日间小睡，一般会在下午或者正午。如果你的孩子还没有合并两次小睡也不要担心；这虽然不常见，但也不算反常。看看第 9 章“13～18 个月”中的“每天一次小睡的转变”部分，让这个麻烦的问题稍微简单一些。

午餐与下午的小睡。午餐通常应该在正午左右开始，持续一个小时左右。这个年龄段的孩子下午的小睡通常从 12 点半或者下午 1 点开始，也可能 1 点半开始。到 18 个月时，孩子们的小睡时间为两小时十五分钟；两岁后则变成两小时，到了三岁只有一

个半小时。

有一些小变化也是正常的。如果孩子其他的作息时间都正常的话就无需担心；如果这会导致其他睡眠问题，就应该稍微改变一下日间小睡的时间。例如，如果你 18 个月大的孩子白天睡了三小时，醒来后心情愉快，晚上睡得也很好，就不需要任何改变。但是如果他睡了很长时间之后，晚上不想按时睡觉，就可以逐渐缩短日间小睡的时间，或者将小睡时间稍微提前一些（不过还是要过了正午才行）。对于一个 18 个月大的孩子来说，日间小睡结束到晚上上床睡觉之间的间距应该大约四小时；当孩子将近三岁时，这个时间间隔会接近五小时。

巴瑞，那个喜欢缠绕妈妈头发的孩子，日间小睡的时间很长，然后一直到晚上 10 点都不肯睡觉。在长期反复试验之后，海琳将巴瑞的日间小睡设置在比大部分孩子都晚一点的时间上，而且对于巴瑞的家庭成员来说也很合适，尤其适合劳瑞餐厅经理这份很晚下班的工作。巴瑞会在大约下午 2 点半的时候进行日间小睡，海琳会在 5 点左右叫醒他。否则他可能还会再睡一小时左右。晚上睡觉的时间是 9 点，他能一直睡到次日 7 点。

晚餐。抵制住那种让孩子日间小睡晚点起，好让全家可以一次吃晚餐的诱惑吧。孩子应该在下午 5 点或者 6 点左右吃晚饭，哪怕这意味着他不能和其他家庭成员一起吃饭。较早的时间表更符合孩子进餐和睡眠的自然规律。如果较早的晚饭意味着全家共处的时间减少，可以尝试其他弥补的方法，比如在早上建立更多的亲子交流时间等。没有什么理由规定你不能在早上像晚上一样给孩子读书。而且爸爸们喜欢的那些比较刺激的游戏，就像飞高高等，都更适合黎明玩而不是黄昏。

晚上睡觉。一个宁静的睡前仪式是必要的，因此要留出大量时间让孩子从身体上和精神上做好睡觉的准备。所谓的留出时

间来不仅仅是洗澡、刷牙和换睡衣的时间，还包括安静下来准备和父母在晚间短暂的分离。首先，让我们来谈谈睡前仪式的构成，何时何地，包括一些睡在婴儿床与普通床上时的小区别。然后我们来看看如何平和安静地进入梦乡。

晚上睡觉时间，意味着在床上睡觉，而不是准备上楼，这个时间应该在晚上 7 点到 8 点之间。为你的宝宝寻找一个确切的时间，其中一部分在于寻找孩子的睡眠信号，一部分则在于推算后来的时间。从他平时起床的时间开始，算出他需要的睡眠时间。例如，假如你 18 个月大的孩子在早上 7 点起床，需要 11 小时 15 分钟的睡眠，那么他应该在晚上 7 点 45 分躺下睡觉。因此你应该在晚上大约 7 点或者 7 点 15 分左右把他放到床上，这个时间要由孩子洗澡和睡前仪式时间的长短决定。如果你两岁半的孩子一般会在早上 7 点醒来，他需要的睡眠比 11 小时略少，那就应该让他在晚上 8 点左右上床睡觉，也可以稍晚几分钟，这意味着你应该在晚上 7 点 15 分或者 7 点半左右就开始带他上楼做准备了。这都是平均数。你的孩子可能会有半个多小时或者不到半小时的区别。观察他的睡眠信号，看他何时开始困倦，一定要让孩子在过度疲劳之前躺下。

晚上的睡前仪式应该在孩子的房间进行，而不能在家里四处随意开始，这样他就能知道自己现在应该平静下来准备睡觉了。你还需要让他在昏昏欲睡的时候躺下。就像我提到的，孩子不再需要睡前的哺喂，但有些学步期的孩子仍然喜欢在上床前简单地吃一些奶或者喝一杯水。你只要不用哺喂让他入睡，或者让他把自己的鸭嘴杯当作睡眠支撑就可以。如果你要抱着孩子踱步或者轻摇，也尽量短暂，并且只在他的房间里这么做。在睡前无论放什么音乐都要非常轻柔。用音乐来暗示孩子该睡觉了，但是要在孩子上床之前关掉或者放完，也可以在孩子一上床时就马上关掉。你也应该不希望催眠曲变成孩子的睡眠支撑，不希望他在没

有催眠曲的时候就睡不着，或者无法再度入睡。同样，带音乐或者闪光的玩具也要在孩子睡着之前就把它们拿走。在这个年龄的学步期幼儿通常喜欢在你把他们放到床上之前来一两次重重的拥抱。

小孩子们非常容易接受类似仪式的引导。实际上，你的孩子可能非常需要你每天晚上都为他进行完全相同的仪式。这包括唱同一首歌，玩同一个游戏，或者反复读同一本书。他们关注的点在于你是否试图跳过某一页或者少念一个句子！

我的每个孩子在这个年纪都有他们自己的仪式。卡利喜欢亲吻一只挂在她房间里的长翅膀的小牛。后来我们还开始做“对对碰”的游戏，游戏中我们要说出两样与她今天有关的事物。她喜欢听我讲我小时候的故事，或者她还是个婴儿时候的故事。格雷琴和我也有我们自己的傻傻的小游戏。她喜欢我亲吻她的小手指，然后用它“吹口哨”，发出小蜜蜂一样的嗡嗡声。这个小蜜蜂接下来会亲吻她的鼻子。我总是会告诉两个小姑娘，在我准备睡觉之前，还会再来看她们——我做下的这个承诺一直完美地执行到她们上学。

安睡女士小提示

父母中的任何一个人都应该能够把孩子放到床上，如果两人采用有轻微区别的方式也没关系。但每个人都应该在同一时间把孩子放到床上，并对于各种睡前的行为，比如哭泣、乱扔玩具等作出同样的反应。这种统一战线能够传达出一种清楚明白的信息，阻止孩子的这种不良行为，并且能够为所有需要父母共同参与的行动打下基础。

要告诉孩子他们可以期待什么，尤其当他们长大一些，具备

了更多的语言理解能力时；当你强调规则的时候，要帮助他们用可以预料到的事情来满足他们的渴望。“现在我打算把你抱在怀里，给你一个大大的拥抱，然后你就得去睡觉，做个好梦。”如果他们开始耍赖或者讨价还价，你应该用“把责任推给时钟”的方式来替代与孩子的对抗。例如，如果孩子想再读三本书，你就指着时钟说：“现在差十分八点了，我们马上就得关上灯了。让我看看我们十分钟能读几本书。”

你还可以试着让孩子对睡觉感到有趣，这种方式在接下来的两三年之内会变得更加重要。例如，巴瑞和他的长耳朵兔子喜欢看他房间里的鱼缸，于是海琳答应巴瑞，让鱼儿来决定是开着房间里的灯还是关掉它。在讲故事的时间结束之前，乔安娜总是会提前两三分钟给伊连暗示，然后她会让儿子自己关掉床边的灯（最后，伊连认为应该由他的小手自动去按下电灯开关）。

讲讲白天发生的有意思的事情，或者期待一下明天会发生什么样的好事来减轻睡前的焦虑。你甚至可以帮孩子列出一个可能会在梦中出现的好东西的名单。

乔安娜为伊连准备了两首睡前的儿歌。一首根据“跳跃的灵魂”改编，每晚都会唱，其中加入了他父母、哥哥、姨妈、叔叔、表兄弟和祖父母的名字。另一首改编自伊连从一位在教堂唱圣歌的小孩那里学来的感恩歌。她每晚都会唱其中同样的一段旋律，用来保证每天的一致性与安慰性，但剩下的部分她会按照伊连的心情、白天发生的事件甚至伊连是否应该吃更多好吃的蔬菜来改编。

如果伊连开始揉眼睛，乔安娜就会简单地把歌唱完；如果孩子还是很清醒，她就会加入更多旋律，给孩子更多时间放松。他们会在讲故事的时候相互依偎，但只要关掉灯，乔安娜就会在他们一起唱特殊的儿歌的时候渐渐离开孩子的身体。这种黑暗里

的宁静时光有助于伊连平静下来，并在妈妈的陪伴下开始习惯黑暗的房间。

安睡女士小提示

从大约两岁开始，告诉孩子他睡觉的时候看上去有多么的甜美可爱。孩子们都喜欢听人这么说；这也能安抚孩子，让孩子知道你会在他睡着的时候来看他。

后来当乔安娜不得不重新开始工作时，肯会为孩子唱同一首歌，也会待在房间的摇椅上直到伊连睡着，因为在晚上睡觉时妈妈还没有回家令这个小男孩产生了一些焦虑。肯之所以可以待在孩子身边，则是因为对于伊连来说，爸爸与晚上睡觉或者在夜间醒来之后再度睡着之间的联系还没有那么强烈；也就是说，他的父亲还不足以成为他的睡眠支撑。

即使在晚上睡觉的时候你做对了一切，你的孩子也可能会经历这种阶段：当你把他放到床上时他会马上再爬起来。如果一个还睡在婴儿床里的学步期儿童站了起来，你只要把他再放下一次就行了。如果他像个弹簧娃娃一样一次次地跳起来，就要无视他。如果你不断地作出回应，孩子会认为这很有趣，也会不断地继续跳起来。

到了 18 个月时，大部分孩子都已经知道怎么从站姿躺下。如果他还不会这么做，可能很快也就学会了，哪怕他的姿势可能没那么优美。如果孩子试图从婴儿床里往外爬，可以降低床垫的高度，再看看本章节前面提到的如何让孩子待在婴儿床里的部分内容。

如果孩子已经开始睡在普通床上，并会在说完晚安之后再爬

起来找你，那就用严肃的态度把他送回去。你也不必责骂他，但不要和他玩耍、不要互动也不要说太多话。抱着孩子，或者做任何你觉得能够令他感到安全和舒适的事情，但动作要快；不要拖延。如果孩子反复起床，就在他的房门上安装一个儿童护栏门，或者可以威胁他你准备安装一个儿童门。对于很小就开始睡在普通床上的孩子来说这个方法还算有效。等一下我将会在安睡女士渐进法的部分内容中谈论一下关于儿童门的问题，并会在接下来为较大的学步期儿童和学前班幼儿撰写的章节中提出更多的细节问题。

伊连22个月大的时候，已经非常习惯他的新床和更早上床，以及更有组织性的睡前仪式了。但就在完成安睡女士渐进法之后不久，他就进入了一个新的阶段，他在每晚似乎都有一件很紧迫的事情要做。同样的表达能力，在过去曾经是让他待在床上的方法，如今却成为了他逃下床的新借口！他总是煞有介事地进行他的任务，他的父母和哥哥扎克不得不每晚都很辛苦地忍着笑直到伊连睡着。

“我要去麦当劳。”某天晚上当伊连走出卧室房门的时候很平静地说。这让乔安娜格外吃惊，因为她从未带伊连去过麦当劳。乔安娜把伊连重新放回床上，在心里暗暗记下要和伊连那位非常好的保姆谈谈关于这种薯条汉堡快餐的问题。

“我要去德克士。”伊连在第二个晚上宣布，德克士是孩子们都很喜欢的快餐店，伊连也喜欢。乔安娜简单地向伊连解释说，孩子们从不穿着睡衣去德克士，然后把他放回床上。

第三个晚上，伊连完全放弃了去餐馆的策略，后来的几个晚上，他尝试了一系列运动项目。“我要去打曲棍球”和“我要去放风筝，妈妈”，全都是非常有想象力的想法。

就连运动项目都没有效果时，伊连开始发挥出更多想像力。

他宣布自己打算把妈妈晚上做过的事情都做一遍，他认为如果对于一个成年人来说，这些原因足以让他们忙东忙西的话，也应该可以成为让一个学步期的孩子公平而合理地在晚上到处游荡的借口。“我要去收电子邮件，妈妈。”就是一个让人印象深刻的借口。“我要去浇花，要去做饭。”他的下一个目标是家人每天早上做的事情，这一定给他留下了深刻的印象，因为这都是要起床之后才能做的事。“我要去拿报纸，妈妈。”“我要去煮咖啡。”

当咖啡策略也失败后，伊连发现自己无计可施，从那之后他就终于老老实实地待在床上了。乔安娜保护性地安装了一扇儿童门，以防伊连某天再心血来潮。当时伊连并没有注意到儿童门的存在，尽管那时候他已经三岁了；但当乔安娜开始用儿童门来提醒他要遵守“大孩子”应该待在床上的规矩时，儿童门就成为对伊连的一种刺激。他开始试图攀爬儿童门，或者从上面翻到走廊上去，最后他终于学会了直接打开门锁。

在这个年龄段你还能看到的另外一种耍赖的小把戏：脱衣服。如果孩子总是脱下他的纸尿裤，那干脆给他粘上！或者尝试另外一种比较牢固，可以防止孩子自己脱下的尿不湿。我知道有些家长甚至会用粘扣把睡衣粘上，或者给孩子穿那种后面扣扣子的睡衣，防止他们自己脱掉。

安睡女士渐进法

很多家庭都在使用我的安睡女士渐进法，这是一种缓和而且循序渐进、教孩子学会自己入睡的方式。在这里我将解释一下对于仍然在婴儿床里睡觉的学步期儿童如何使用渐进法，对于那些已经睡在床上的孩子来说这法子也适用，接下来我还会概述一下如何局部修改。同以往一样，我们努力减少孩子的哭泣，但我不

能保证可以让孩子完全不哭。在实施渐进法的时候，不要急匆匆地抱起一个呜咽的孩子，但如果他确实非常不安，尤其是第一个晚上，可以上前简短地抱起他。在渐进法过程中，孩子夜间醒来的情况会逐渐减少，但不会立刻就消失，因此，当孩子在夜间呼唤你的时候，重新回到你在当晚孩子睡着之前应处的位置，安抚他，帮他重新入睡。在你回到睡前位置之前简单地安抚他，或者轻拍婴儿床里的孩子也可以。对于每一次孩子夜间醒来，我们都要给予前后一致的反应。

你应该按照渐进法的时间表行事，哪怕孩子有一两个晚上睡得不好，哭闹或者更频繁地醒来，也要按时进入下一个位置。在每个新阶段的第一个晚上，如果出现了一些小小的退步或者抗拒也不要意外。如果你的孩子在渐进法期间生病了，可以暂停并保持你当前的位置，直到孩子好转。你甚至可以在孩子生病期间稍微靠近他一些，给他更多的安慰。但等他痊愈后就要重新开始渐进法。

第 1～3 晚。一旦洗完澡、讲了故事、唱完儿歌，你就要坐在孩子婴儿床边的椅子上。如果孩子哭闹，可以间歇性抚摸或者轻拍他，但不要连续不断地轻拍，否则他会建立起新的睡眠支撑或者负关联，日后每次睡觉都需要你连续轻拍。（对于在第一个晚上你应该用什么频率来接触孩子，我认为可以比较宽松，但到了第二晚，就要保证你对孩子的肢体接触频率更小了。）你可以闭上双眼，传达一种睡眠时间到了的信息，让孩子更难和你交谈或者试图吸引你的注意，在这个年龄段，孩子很可能会非常努力地尝试让你和他互动。待在婴儿床边直到孩子睡着。孩子每次醒来都这样安抚他。如果他站起来，你要轻拍床垫，叫他躺下。一旦他躺下了，就可以轻拍或者抚摸他，如果孩子喜欢这种安抚方式的话。如果你坐下而不站在婴儿床边，这种方式则更有效。

有些这个年龄的孩子会抵触。这种情况通常不会发生在前

几个晚上;而更可能在他们意识到这不是你偶尔为之,而是他们以后都要面对的新的现实之后。孩子可能会把玩具全部扔到地板上,想让你全部捡回来,再帮他放回婴儿床里。然后他们还会再次扔出来。这既是一种向你表示不满,希望你能接受他的睡眠需求的方式;也是一种吸引你注意力的方法。这时,不要管他。让所有的东西都留在地板上。如果孩子扔出了他的心爱之物或者安慰奶嘴,然后又为之难过时,告诉他只要他躺下,你就会帮他捡回来。你一定要先看看上册第 7 章“6～8 个月”中“渐进法前三天中的一些特殊提醒”部分的内容。

注意不要为孩子创造出新的睡眠支撑。一位妈妈用渐进法教她的儿子学会在不需要整晚轻摇的情况下入睡,她为孩子唱了一首关于夜空的新儿歌,这首歌立即在孩子心目中产生了与轻摇同样重要的心理影响! 几个晚上后,这位妈妈发现自己要唱三次、四次甚至五次,因为只要她一停下唱歌,孩子就会立刻从半睡眠状态清醒过来,然后要求“唱歌! 唱歌! 唱歌!”,他还要求每次晚上醒来都要听到同一首歌。

第 4～6 晚。要解释,尤其是对于一个比较大的,能够很好理解你的话的孩子解释,因为他已经完美地学会了如何睡觉,现在你打算把椅子搬到稍微远点儿的地方,但是仍然会和他在一起,直到他睡着。把椅子搬到婴儿床与门中间的位置。(如果房间很小,或者婴儿床一开始就放在离门很近的位置,你可以把椅子搬到房间正中或者靠近门口的地方。)继续发出安抚性的声音,但尽可能待在椅子上,有必要才上前略微轻拍或者抚摸孩子,或者发出你一贯使用的安抚性的声音。尽量不要抱起孩子,但如果孩子确实非常不安,你也可以径直上前抱起他,但尽量抱起处于婴儿床上方,而不要脱离婴儿床的范围。抱着孩子直到他安静下来,但尽量简短,也不要让他在你的怀抱中或者膝头上入睡。有时候

短暂的深深的拥抱已经足够帮助孩子平静下来。然后继续待在你的椅子上直到孩子睡着。

定时检查

有时候我们需要稍微调整一下渐进法，因为孩子可能会因为父母出现在床边而受到过度刺激。他不断地想要吸引父母的注意，无论你怎么安抚他，怎么发出“吁吁”的声音，他仍旧坚持不懈地吸引你注意。在这种情况下，你应该试试“定时检查”的方法，某种程度上也可以称之为“费伯睡眠法”的变种。在睡觉的时候，完成你们的睡前仪式，让孩子平静下来，然后把他放到床上。亲吻他，告诉他你会在离开房间之前再次过来检查他的情况。

对于你应该多久来检查孩子一次并没有什么硬性规定，你可以多做试验。如果你检查的次数过于频繁，孩子可能会认为这是一种游戏，结果会更受刺激。如果你太久才来检查一次，他也可能会不开心并感到不安。

开始的时候可以每七分钟检查一次，渐渐地增加间距时间，但要相信自己的直觉，并且进行必要的调整。当你检查孩子的状况时，直接走到他的婴儿床前迅速而安抚性的轻拍他一下。但不要拖延时间：如果你站在孩子床前半小时拍他睡觉，你的整个计划就全盘失败了。

第 7～9 晚。还是要对孩子解释你正在进行一项伟大的工作，告诉他你打算再次把椅子往远处挪一下。在你开始挪动椅子之前，可以坐在孩子身边拥抱他一下，但不要太缠绵，否则你就得经过努力才能放开他了。然后把椅子搬到门口，但是还留在房间里的位置。你可以将灯光放暗，留在孩子的视野内。继续使用同

样的安抚方式，但尽可能扩大间歇。孩子可能会稍微哭一阵子，但温柔地安抚他，他就会睡着了。

第 10～12 晚。现在，你可以把椅子搬到走廊上，打开孩子的房门，让他仍然能够看到你。在你行动之前要小心地向孩子解释一下，表扬他变成了一个睡得非常好的好孩子。你可以继续在走廊上发出“吁吁”的声音，不要太频繁，但要足以让孩子知道他的父母就在附近，可以随时作出回应。

第 13 晚。下一步，你可以待在走廊或者隔壁的房间里，孩子虽然看不到你但却能听到你的动静。你仍旧可以发出“吁吁”的安抚性的声音，不要太频繁，但足以让他知道妈妈或者爸爸就在附近，可以随时回应。如果孩子哭了，尽量在他房间的门口检查他的状况，不要踏入他的房间。安抚孩子，发出一些温柔的声音，告诉他你没有走远，也知道他能自己睡着。

到第 7 或者第 10 晚的时候，很多孩子已经开始自己睡着并且整晚安睡了，有些孩子进度可能还要快——但大部分父母还需要再多进行一个步骤，让孩子独自一人待一会儿，每次大约五分钟。告诉孩子你会一直来检查他的状况直到他睡着。留下孩子独自一人对你来说可能是一种很彻底的改变，但想想看：椅子位置的不断变化已经给了他将近两个礼拜的时间做准备。他已经放弃了自己的睡眠支撑，知道“妈妈就在客厅里，虽然我看不到她。”或者“爸爸就坐在我房间旁边，他爱我。”确切地告诉孩子你会待在什么地方，并向他解释，尽管他看不到你，你还是离他很近。

不要离得太远。待在同一层楼或者隔壁房间，你可以在起初的几个晚上读书看报打发时间。孩子可能会哭几分钟，但你要坚持每五分钟才去检查他一次。你没必要留下孩子独自一人超过五分钟，而且这也不像“任其哭泣”的方法，你没必要让间隔太长。实际上，我强烈建议家长们密切关注时间，这样你就不会超过五

分钟的间隔，也不会让孩子感到不安了。他们并不能真正理解五分钟到底是多久，所以你可以按照我的说法“做完……就来”来向稍微大一点儿的学步期的孩子解释。“妈妈要去换衣服了，等我换完衣服就马上来看你。”或者“爸爸要去刷牙，但我刷完牙马上回来。”（如果每次你回来检查，孩子都会受到刺激并且更清醒的话，你应该考虑一下加长时间间隔，或者先从五分钟一次开始，然后逐渐加长时间间隔。）

起初的几个晚上孩子可能会哭一阵子，但熬过了椅子位置逐渐变化的过程之后，很少有孩子哭的时间会超过几分钟。如果他确实哭得很厉害，可以在门口检查一下他的情况。安抚他但是要尽量安静。记住，他已经树立起了你就在附近可以随时响应的自信了。他已经准备好掌握这种能力了。

还有几件事要记住。孩子们很容易仪式化，比如那个要听妈妈唱“夜空”儿歌的孩子。每三天做一些变化，或者时间更短一些。对于孩子来说，拖延只会让事情更难办而不是更简单。如果用的时间超过三天，孩子可能会希望就待在现在的位置，当你试图加长这段距离的时候，他可能就会愤怒或者不安。

睡在普通床上的孩子们适用的渐进法

很早就从婴儿床转移到普通床上的孩子并不一定掌握了足以理解“大小伙子”或者“大姑娘”应该遵守的睡觉规矩的能力。这意味着对于这些在两岁半之前就睡在普通床上的孩子采用渐进法可能会更有挑战性。因此，你要有耐心，要坚持。渐进法的基本部分都是一样的，你可以看看前面为睡在婴儿床里的孩子提出的一些建议。坐在孩子的床边，每三天挪动一次椅子的位置。如果你已经把他的床垫放

在地板上了，或者他睡在一张比较低的儿童床上，你可以坐在附近的地板上，而不是椅子上，向睡在普通床上的孩子解释打算往远处挪动，比向睡在婴儿床上的孩子解释更重要，因为你得让他们理解，他们必须要待在床上。

当孩子感到不安时，尽量待在你的椅子上。不要过去接触他，尽量用有安抚性的话语或者声音。“天黑黑，天黑黑。吁吁。妈妈(或者爸爸)爱你。”不要说得太多；否则他会拉着你开始一场拖延睡眠时间的谈话。闭上双眼可能会有所帮助。但如果孩子确实感到不安，上前短暂地拍抚他一下。如果你打算将他抱起来，尽量短暂，而且要在靠近床的位置。当孩子安静下来就把他放回床上，然后坐回到你的椅子上(或者地板上)。不要让他在你的怀抱里睡着，不要躺在他床上，一分钟都不行。

就像睡在婴儿床里的孩子一样，他可能也会把玩具和毯子丢向你。无视他；除非他保证不这样做了，才把他的心爱之物给他捡回去。然而，他可能还是会下床找你，或者试图爬上你的膝头。

给孩子一个大大的拥抱，然后送他回到床上。如果他再次爬起，还要再把他送回去。但这次不要说话，不要规劝，不要解释，也不要生气。你只要把他放回去，无论多少次都一样。如果他还是坚持要爬上你的膝头，就得将渐进法的进程稍微加快一些了——例如，三天在床边，三天在门口，然后是走廊。当你开始坐到走廊上的时候，孩子能够听到你的动静却看不见你时，面对一个很小就开始睡在普通床上的孩子，你可能要稍微偏离原本的计划。有些孩子对你的位置会表现很好，但有些则会不停地下床跑到你身边；如果你虽然在

附近却不陪着他的话，他确实会非常沮丧。

试着安装一扇儿童门，然后待在客厅里，确保孩子知道你在什么地方，哪怕他看不到你。如果他或站或坐在儿童门边哭泣，你可能需要跳过留在走廊的这一步，直接进行下一阶段，留下孩子一个人在房间，每五分钟来检查他一次。你得明白自己的忍耐程度。如果你不想直接跳到定时检查的步骤，就要告诉孩子，如果他自己回到床上，你就会拥抱他。跨过儿童门，快速拥抱孩子一下，然后再回到客厅去。如果他不断要求更多次拥抱，你可以表现出生气，留在客厅，再也不去拥抱他。呆在原地直到孩子睡着，当然，孩子有可能是在儿童门附近的地板上睡着。你可以在他睡熟之后把他放回床上；孩子们很快就会明智地放弃这种做法了。依赖直觉和你对孩子性格的了解来判断什么方法最好。

有些家长决定直到自己能够确实放心之前，都待在走廊上距离孩子的房间几步远的地方。这也可以，一直待到孩子不到一小时就睡着，而且不需要你整夜时不时地来检查他们的情况为止。还有些父母会渐渐地地离开，慢慢地放弃检查。如果你采用了定时检查或者“做完……就来”的方法的话，可以像你承诺的那样常常过来检查。最后，大部分家庭都能最终实现目的，说完晚安之后孩子就再也不会叫父母；也不需要他们每五分钟来检查一次。

你可能需要多次试验，直到找出一种不会让孩子感到威胁的“借口”为止。

当乔安娜进行到渐进法的走廊阶段时伊连表现得很好，但如果她试图去打扫厨房或者在电脑前工作时伊连就会十分抵触，哭闹不休。他会恳求说：“不要去用电脑，陪着伊连。”某天晚上乔安

娜突然灵光一闪，对伊连说自己要去帮助他最喜欢的大哥哥扎克做家庭作业。23个月大的伊连并不知道什么是家庭作业，但也能明白如果扎克能做好，那一定是很酷的事情。于是他让妈妈离开，一滴泪都没有掉，也没有抗议。这个借口大约用了三个月，直到某一天伊连也突然间明白过来。“不要，妈妈要陪着伊连，”他甜甜地要求，“让爸爸去帮扎克做家庭作业。”

海琳和劳瑞为巴瑞准备了合适的心爱之物，睡觉的时间也很早，这为进行渐进法打下了良好的基础，但他们还是会遇到一些临时状况。他们很小心地向巴瑞解释了他们将要见到“安睡女士”，这位女士会帮助他们制定新的睡觉规则。他们制作了睡眠图表，告诉巴瑞他们打算用更好的方法帮助巴瑞睡觉。巴瑞表现得很大方。“你们没能教会我怎么自己睡觉，但我也不会对你们生气。”小家伙饱含着同情说。

劳瑞采用了渐进法中的大部分内容，因为巴瑞将缠绕妈妈的头发和妈妈同睡变成了负关联。（如果由海琳使用渐进法，巴瑞就会从床上跳下来咯咯地笑。）但巴瑞不喜欢渐进法。如果他的爸爸不打算在他房间里陪着他，他也不会如此要求。“你走吧。”巴瑞对爸爸说，而且他就是这个意思。这就是一个非常好的案例，一对夫妻应该如何依靠自己对孩子的认识来改变渐进法的基本框架。他们直接略过了渐进法的第二个部分，劳瑞在巴瑞视野可及的门口坐了几个晚上，然后就挪到客厅内巴瑞看不到的地方去，接下来就开始采用“做完……就来”的借口。训练进展得非常顺利。有时候巴瑞可能会退步，从床上下来寻找父母，或者想要他的奶瓶。但大部分时间他都会顺利地入睡，并且整晚安睡。

在和我共事之前，乔安娜夫妻要用一个半小时到两个小时，出尽招数才能让伊连睡觉，而且他还会在夜间反复醒来，几乎每一两个小时醒来一次。通过安睡女士渐进法，在改善了家庭晚上

睡觉前的仪式之后(在夫妻二人都工作了很长时间之后,还有一个大一点儿孩子的家庭作业需要帮忙,而他的小弟弟这时候还需要洗澡的话,想要做到这一切非常困难),伊连的睡眠得到了极为有效的改善,夜间醒来的次数也大大减少。他还开始在保姆的照看下进行日间小睡,在妈妈的照看下也能睡,尽管从10个月大开始,除了偶然打个盹儿之外,他就几乎不在白天睡觉了。

但完全消除伊连夜间醒来的情况还是用了很长时间。乔安娜非常不喜欢让孩子在午夜哭泣,因为长时间的哭泣只会让她和伊连都更难再次入睡,因此她不断地减少在夜间对孩子的干涉。将进程不断缩减到只剩下她坐在走廊里发出"吁吁"的声音这一步。尽管伊连是一个非常快乐的孩子,不存在任何反常的分离焦虑,但对他来说,放弃妈妈在午夜时分的一次照看依旧非常艰难。乔安娜不断地告诉伊连,他必须自己待在有救火车图案的床上,并在他长大一些,能理解更多东西之后制定了新的奖励制度。

最后,乔安娜终于可以让伊连整夜安睡。有时候这种愉快的睡眠只能持续几个礼拜,如果下次伊连发烧、耳道发炎或者全家利用周末去旅行的时候,他又会把乖乖睡觉的事情抛在脑后。对于伊连来说,不好的睡眠习惯相当难以彻底摒除。有时候乔安娜只需用一两天时间再次训练他,但有时候则可能还要用几个礼拜。

有趣的是,当伊连最喜欢的保姆离开,他也开始在两岁十个月的时候上幼儿园之后,他的睡眠得到了极大的改善。很多孩子都会在开始上学或者保姆换人的时候在睡眠方面出现退步。但伊连恰恰相反,在环境平等的幼儿园中学到的独立性令他的睡眠更进一步。这种良好的睡眠习惯整整坚持了两个月——直到他的睡眠习惯再一次被打破。

问题与解决方法

很多认可任其哭泣法的专家都认为，一旦孩子学会如何在晚上自己入睡，他们就会不可思议地一觉睡到天亮。但我并没有发现真实的案例。我们还是要处理孩子夜间醒来的问题。如果你的孩子在安睡女士渐进法期间还是会在半夜醒来，那么你应当注意的重要问题就是要在渐进法当夜应处的位置上更及时地回应孩子。到渐进法末期，大部分学步期的孩子都能整夜安睡，或者大部分时间都睡得很好。然而，孩子从出生以来就养成的习惯已经根深蒂固，所以我确实见到许多学步期和学龄前的孩子，比如伊连，虽然很容易就养成了新的独立睡觉的习惯，但要在午夜醒来之后自行入睡还是比较困难。在本章节中，我们会主要研究能帮助这些孩子彻底清除残存的睡眠支撑的工具与方法。

观察孩子的负关联物——奶瓶、安慰奶嘴、你一般在晚上 7 点而不是凌晨 4 点播放的音乐等。排除一切医药因素，确保孩子上床睡觉的时间足够早，睡得足够久，日间小睡的时间也足够长。过度疲劳的孩子在夜间醒来的次数会更多。

你是否在孩子有点过度困倦的时候才把他放到床上？如果是这样，那他可能没有机会学会如何让自己在晚上睡着。在孩子还比较清醒的时候就把他放到床上（详见上册第 2 章“入门指南与成功的小技巧”中“昏昏欲睡”的部分）好让他能够更习惯于自己睡着。

当一个孩子在夜间真正醒来并开始哭闹时，要迅速作出反应。这有助于安抚他，让他感觉安全、可靠和被注意。也就是说，这会让你成为孩子的“保护神”。而且对你来说也会更轻松。去查看孩子的状况还能让你安抚你自己，告诉自己孩子没有生病，

他的小脚丫也没有卡在婴儿床的栏杆里，毛毯没有绕住他的脖颈，尿布也没有湿透，用伊连形容自己袜子滑脱时的话来说，他的袜子也没有“逃走”。你可以确定他的心爱之物触手可及。如果孩子确实需要被抱起来或者拥抱，你也可以抱他，搂着他，但要尽量短暂，当孩子一平静下来就把他放回去。

你的目标是让孩子再度入睡，不是让他自己把自己叫醒。孩子歇斯底里会让大家都感觉很糟，无论是父母还是孩子也都更难以再度睡着。在渐进法期间，如果你希望的话可以快速察看孩子的状况，然后回到你当夜应处的位置上去。但如果他属于那种渐进法完成之后仍然会夜半偶尔醒来的孩子的话，你应该怎样处理，也有几种方法可以选择。你要在让自己感到安心和帮助孩子学会睡觉之间掌握一种平衡：

- 坐在孩子身边或者他房间的椅子上安抚他。不要躺在他身边。尽量用柔和的声音和话语安抚他，少用轻拍或者抚摸的方式。然而，如果你觉得孩子每晚都会连续醒来一两次，好让你出现在他身边的话，如果你发现自己变成了孩子的睡眠支撑，这也很常见，你可以让自己离他稍微远一点儿，比如可以坐在走廊上。
- 迅速进入孩子的房间安抚他，帮他平静下来，然后坐在门口或者走廊上，直到他再度睡着，或者昏昏欲睡，不会因为你离开而哭泣。
- 尽快安抚孩子，但然后要回到你自己的房间去。

如果你觉得孩子很快就能入睡，可以任由他哭一阵子，前提是你能忍受这种方法。我发现很多家庭通常本能地明白，如果他们做得恰到好处的话，比起孩子一哭就冲上前去安慰他，让他自己哭一阵子，能更容易地让他再度入睡。但是在大部分情况下，孩子是否能自行入睡，你得到后来才知道。

无论你选择哪一种方法，记住要尽可能减少与孩子之间的互动，并且方式要轻柔缓和。不要责备孩子。如果你的孩子从床上下来，带他回到床上，为他盖好被子，然后选择上面的某种方法即可。

在向我咨询的时候，希拉和兰迪的女儿苏珊娜已经两岁四个月大了。从孩提时起她就能自己轻松地从床上下来——但在大部分夜晚她仍然会醒来三次。“她就是想说‘啊，妈妈。’”希拉说。通常希拉所做的就是走进她的房间，坐在一边待一段时间，轻轻地拍拍孩子，但每个人的睡眠还是因此都受到干扰。他们试图让孩子自己单独待着，看她能否再次自己入睡，结果却变得更糟。“她会哭得越来越厉害。那时候她还睡在婴儿床里，她会站起来，不肯坐下。一旦事态升级，我们就得花更多工夫才能让她再次睡着。她想从婴儿床里出来，我们必须得抱着她轻摇，可随后把她放下的时候她就又会醒过来。”

在我的帮助下，希拉开始明白苏珊娜是因为太疲倦才无法入睡的！我们研究了苏珊娜的日间小睡和凌晨醒来的原因。希拉同时意识到是时候为孩子取消晚上睡前最后一次喂奶了，苏珊娜再大点儿之后移到了普通床上，他们确保让孩子知道如何拿到水杯、纸巾、安慰奶嘴和泰迪熊，这些东西都放在她床边。

等苏珊娜又长大一些后，就可以理解兰迪和希拉不分白天黑夜，三番两次向她强调的新睡觉规矩了，她开始喜欢上这种在每天的作息表上贴贴纸的方式。当苏珊娜在夜间醒来时，父母中的一人就会来到她房间门口说：“你应该躺下。”如果她能乖乖地再次睡着，那么第二天早上他们就会奖励她一枚贴纸。由于补足了缺乏的睡眠，苏珊娜在晚上越来越不需要依赖妈妈才能睡着了。她夜间醒来的次数也减少了，随后干脆完全不会醒来。（可以在第 2 章“两岁半到五岁”中找到更多关于在作息时间表上贴贴纸

的内容。)

取消夜间哺喂

对于这个年龄的孩子来说,睡前加餐或者牛奶并不能延长或者改善他们的夜间睡眠。相反,还可能会由于孩子每次在夜间醒来都闹着要他们的水杯、妈妈的乳房或者奶瓶而干扰他们的睡眠。也就是说,很多孩子确实仍然保留着睡前喝奶的习惯,这是因为做父母的在他们还是婴儿的时候过于重视这最后一次进食,以至于到他们成为幼儿还仍然不放心取消这个习惯。在这些案例中,哺喂和睡眠之间的联系依旧非常牢固。首先让我们先来谈谈哺喂,然后再说说杯子与奶瓶的问题。

睡前哺喂与哺喂入睡之间有一种微妙却重要的区别。有些妈妈会母乳喂养到孩子两岁乃至更大,睡前可能是他们哺喂最长时间的一次。这时应避免让孩子含着乳头睡着。你既可以哺喂孩子到他昏昏欲睡的时候把他放下,也可以将哺喂当作睡前仪式的一部分而不是最后一部分活动内容进行,对于这个年龄的孩子来说,后一种做法更好些。换句话说,你可以先哺喂孩子,然后刷牙,玩一个安静的游戏,读一本书,或者唱一首儿歌。在哺喂与睡觉之间人为地创造出一个小空间。在哺喂的时候尽量开着灯,好让孩子没那么容易将吃奶与睡觉联系在一起。

你应该让孩子开始从奶瓶换成杯子,从牛奶换成水,从在床上的时候喝换成在上床之前喝。这些变化的速度取决于你和孩子的态度,但你的目的就是在关灯之前给孩子一杯水。(或者最后干脆什么都不喝,但你也不必勉强孩子。)对于某些孩子来说,只要你向他解释了,他就可以在一天之内没有任何问题完成这种转换。还有一些则可能稍微慢些,甚至还会略作抵抗,但哪怕是这种缓慢的转换也不会超过一周到十天。孩子们的反抗越强烈,

他们在情感上就会越依赖杯子或者奶瓶。

如果孩子现在还在睡前喝一奶瓶牛奶，给他换成杯子，当他适应了杯子之后，再把牛奶换成水。你还可以选择在换到杯子之前先把奶瓶里的牛奶减半，然后再完成从牛奶到水的转变。在讲故事的时候将杯子给孩子，不要在关灯之后再给。整晚都不要再给他牛奶，无论用杯子还是奶瓶都不可以。如果孩子确实坚持，可以给他一杯水。

一旦你削弱了晚上睡觉时的食物与睡眠之间的负关联，通常，孩子夜间醒来的情况也会自行停止。一旦有些学步期的孩子发现他们再也得不到牛奶的话，就不愿意在夜间醒来只为了喝一杯水。但是如果睡觉时间的饮品已经转换完毕，可你的孩子仍旧会在夜间醒来的话，帮他调整一下自然的饥饿生物钟。鼓励孩子在白天有规律的三餐中吃更多食物。但你可能还是得更直接地处理夜间醒来的问题。

在这个年龄段，最佳策略通常就是停止夜间哺喂。当孩子从睡梦中醒来想要乳房、杯子或者奶瓶时你可以安抚他。在晚上睡觉的时候，甚至在你开始改变的前几天白天中，你要告诉孩子他现在已经是大孩子了，晚上不再需要喝奶，只在白天才可以喝奶了。告诉他如果不再在晚上起来喝奶的话，他能睡得更好，感觉也会更好，而你会为他感到非常骄傲。

如果孩子确实在夜间醒来之后想要喝奶，可以走进他房间。发出“吁吁”的声音哄他，抚摸他，甚至可以把他抱起片刻，给他一个大大的，深深的，安抚性的拥抱。鼓励孩子抱着他的心爱之物，以此来替代奶瓶。然后把他放下，在他的房间里安静地等到他再度睡着为止。如果你想要尝试更缓和的方法，可以尝试定时哺喂三个晚上(在上册第 7 章“6～8 个月”中有相关内容的概述)。在第四个晚上就不要再哺喂他，而是在他床边多留一夜来安抚他。对于

这个年龄的孩子来说，无论是取消夜间的母乳哺喂还是奶瓶哺喂，通常都用不了几天。

对于这个年龄的孩子来说，有时候更缓和的方法未必有效，你可能会发现自己需要一种更直接的方式，并且会发现孩子适应速度之快令人吃惊。

伊连在婴儿时期出现过食物逆流的现象，所以好几个月都一直保持着新生儿适用的哺喂时间表，因为只有每次哺喂小剂量的食物才能防止他出现食物逆流的状况，因此这种频繁的小量哺喂几乎可以持续一整天。哪怕在食物逆流现象好转之后——一直到十个月之前他的食物逆流都非常严重，有些问题差不多到了他三岁才完全好转——夜间吃奶已经成了一种根深蒂固的习惯。

伊连的父母将他的牛奶换成了水，但这也无法阻止他在夜间醒来。而且他晚上睡觉之前用的水杯容量远远超过他能喝下的水，但这却成了为他夜间带来安全感的东西。作为一个坚持对称性的孩子，伊连会在每只手上都抓住一只杯子才肯上床睡觉，并且称这些杯子为他的“一号杯”、“二号杯”。每次夜间醒来他都要喝水，到他两岁的时候每晚通常要醒来四五次。乔安娜尝试了我和她能想出来的每一种缓和方式。最后，她发现自己必须让伊连停止在夜间喝水，无论是睡前还是午夜醒来后都不可以。伊连一开始，相当抗拒，大哭大闹对乔安娜大发脾气，乔安娜就坐在他身边，拥抱他，安抚他，虽然比预期的稍微困难了一点。但伊连在三个晚上之后终于放弃了夜间喝水。

没过几个月，伊连还是会在夜里醒来要喝水。对于一个两岁大的孩子，你很难说清他到底是退步了，想再次通过两只杯子得到安全感，还是因为晚上吃的西兰花里放了太多酱料确实渴了。伊连还会在生病的时候要求在夜里喝水。如果他非常坚持的话，乔安娜也不能百分之百地确认自己面对的是一个干渴的喉咙还

是缺乏安全感的心灵，这时，她通常就会给伊连水。次日晚上，如果伊连睡得很好，乔安娜就会知道自己做对了，孩子确实是渴了。但如果伊连又重新开始故伎重施，起来寻找自己的一号和二号杯子，乔安娜就知道自己上当了，就会再次开始帮他克服这个毛病。

有时候一些温柔的哄骗也能起作用，或者乔安娜会用伊连的心爱之物来转移他的注意力。但有时候她就必须强硬地再度解决这个问题。每次她都会担心，但事情的发展也总比她想像的顺利，而且每次他们再做这种训练的时候都会感觉过程变得越来越简单。伊连偶尔一两次会在夜间醒来哭泣或者对着妈妈叫喊，但结果是：他再也不会在凌晨三点为了“再给我点儿水，妈妈”而伤心地哭泣。当乔安娜解决午夜醒来喝水的问题时，却从未试着直接打破孩子睡前喝水的习惯，因为这并不会导致更严重的问题。到了三岁，伊连学会在他的杯子里留下一盎司或两盎司的水，并且“委托”他的一只毛绒玩具保管，以备他稍后渴了之后喝。

取消用踱步和轻摇的方式哄孩子入睡

我们中的很多人都会抱着新生儿踱步和轻摇来哄他们入睡，但到了18个月或者24个月，甚至30个月之后，这方法就有些过于陈旧了——而且孩子也会变得很重。我常常会用安睡女士渐进法来打破这种睡觉前的负关联。如果你之前是在午夜抱着孩子轻摇哄他入睡而不是在睡前的话，向孩子解释一下，说你会坐在他房间里，帮他学会自己入睡，但不打算再轻摇他了。就像渐进法那样让你自己慢慢地从孩子房间离开。

我们并不要求你取消拥抱；我们要取消的是作为孩子睡眠支撑的那种拥抱。当你开着灯为孩子讲故事或者唱儿歌的时候，可以让他坐在你的膝头。但不要让他在你的怀抱中或者膝头上睡着；他必须要在自己的床上入睡。

在麦迪逊21个月的时候，妈妈贝丝认为她“书上说的一切不好的睡眠习惯全都有。”他们在晚上7点半会开始一个美好的明确的睡前仪式，但仪式结束后一切努力就全都土崩瓦解。每天晚上贝丝和文斯都必须抱着孩子踱步、轻摇，或者“跳来跳去”大约45分钟才能让她睡着。麦迪逊还要在床上喝奶，并坚持让妈妈陪着她才肯睡觉。就像巴瑞一样，麦迪逊还喜欢缠绕妈妈的头发，而且拒绝妈妈为她选的所有替代品，包括有纱线做成头发的娃娃和带流苏的毯子。

麦迪逊会在睡着三小时后醒来，她的父母则不得不再轻摇她45分钟。又过三小时她再度醒来，她的父母这时候已经疲倦得没法再来一次马拉松一般的轻摇了，所以贝丝最后通常会和麦迪逊一起睡下。但贝丝和一个总是动来动去的孩子躺在一起时，完全得不到足够的睡眠，而且她也希望能和自己的丈夫一起睡觉。

贝丝作为一位主要工作对象是青少年的专业顾问，知道很多东西都是错的，但却不知道应该怎么改成对的。在麦迪逊8个月大的时候她尝试过费伯睡眠法并且取得了不错的成果。但当因为麦迪逊几个月之后生病而停止几天费伯睡眠法之后，他们就再也没法让她重新开始了。第二次尝试费伯睡眠法也无奈地失败了。麦迪逊哭号了几个小时，不但没有哭累了睡着，反而因为哭泣而呕吐。

在我们开始渐进法之前，贝丝已经把麦迪逊睡前的牛奶换成了水，并且不再躺在她身边陪她入睡了。贝丝还想方设法地让自己的头远离麦迪逊，好让她没法缠绕妈妈的头发。在晚上由文斯把麦迪逊放到床上，长头发就不再是问题了。

贝丝他们很快就完成了渐进法，把每个步骤的三天替换成了两天，因为麦迪逊很容易程序化。“她是那种很特别的孩子，假如现在她坐在某张椅子上看了某个电视剧，那么以后每次她看这个

电视剧的时候都必须要坐在同一张椅子上才行。”她的妈妈解释说。他们不想让孩子习惯于某个家长坐在某个特殊的位置，结果到了第四天晚上，孩子因为位置改变而感到不安。一开始，麦迪逊仍然会在晚上醒来一两次，但她需要的只不过是文斯坐在她房间里几分钟而已。她不叫喊，不要喝奶，也不需要抱着轻摇或者依偎着父母。她的起夜问题虽然没有百分之百解决，但却变得短暂而且不那么频繁了。

取消安慰奶嘴

如果安慰奶嘴干扰孩子的睡眠，尤其是在他晚上醒来时会叫你帮他捡起掉下去的安慰奶嘴时，那你就必须帮他改掉这个习惯了。很多儿科医生认为，这个年龄段很容易取消安慰奶嘴。不幸的是，我还没发现有什么轻松温柔的方法可以实现这个目标(尽管我确实有一个后备计划给那些神经质的孩子)。

不管孩子会把安慰奶嘴当作什么角色，都要告诉孩子到了放弃他的安慰奶嘴的时候了。给他一段时间接受这个想法，然后拿出一天来采取行动。当孩子哭闹时，安抚他，哄慰他，轻拍他，抚摸他。做好面对几个难熬的夜晚和日间小睡的准备。确保你同时增强了孩子和他的心爱之物之间的联系。“现在已经不是用安慰奶嘴的时候了，但是泰迪熊还在这里，它想要你抱抱。”这不但能转移孩子对安慰奶嘴的注意，还能提供一种比较安全的替代品。更好的做法是，当你拿走安慰奶嘴的时候，尽量让孩子得到一个全新的心爱之物；新鲜感可能会更容易帮他转移注意力。你甚至可以尝试带孩子去商店，让他选择自己新的睡觉伙伴。

如果孩子足够大了，可以给他读一些故事，关于那些不再使用安慰奶嘴的孩子们的故事，比如《小兔子的安慰奶嘴计划》或者《最后一个小精灵诺诺》。有些儿科医生还建议，父母可以不断地

剪下安慰奶嘴的前端，直到安慰奶嘴残破到孩子不愿意使用为止。我也知道一位妈妈把她儿子的安慰奶嘴放进一只玩具熊里，让孩子抱着玩具熊睡觉！无论你怎么做，只要拿开或者放弃，甚至丢掉了安慰奶嘴，就不要再拿回来，或者在孩子抱怨了一小时之后又给他买了一只新的。

希拉试图让苏珊娜喜欢上一条新买的安全毯，并鼓励小姑娘把她的所有安慰奶嘴都放进一只色彩鲜艳的信封里，寄给朋友家的新生儿。这方法非常有效，但只持续了一天。随后苏珊娜就想要回自己的安慰奶嘴，后来希拉放弃了，决定不在这段时间解决安慰奶嘴的问题，于是造成了一种不常见的断续增强。苏珊娜从未喜欢上那条毯子，希拉的做法令她第二次尝试取消安慰奶嘴变得更加困难。

很多父母在拿走安慰奶嘴时会觉得不安，他们宁愿等等看孩子是否能自己放弃使用安慰奶嘴。最后也许你确实能有一个取消安慰奶嘴的最佳时机，但如果你现在还没有做好准备，我认为你可以把安慰奶嘴的使用时间限制在晚上睡觉和日间小睡时，不要让孩子整天都含着安慰奶嘴。

到目前为止孩子已经足够大了，如果你把几个安慰奶嘴放在他婴儿床里或者床上各个地方，放在他身边，他就能自己找到。如果他能够拿到一只安慰奶嘴，也许就可以在不叫起你的情况下自己睡着。起初的几个晚上，你可能还要站在孩子房间门口提醒他自己去摸索安慰奶嘴。不要帮他拿，或者一开始你可以帮他拿几次，放到他手里，然后让他自己放进嘴里。不要一直这么做；睡前提醒孩子让他自己找安慰奶嘴，必要的时候还可以反复告诉他安慰奶嘴都放在什么地方。你仍然应该鼓励孩子抱着自己的心爱之物；对于他来说抱着心爱之物比安慰奶嘴更有用，也能最终帮助孩子放弃安慰奶嘴。

早起的鸟儿

在这个年龄段，凌晨 5 点或者 5 点半的早起仍然十分常见，那些起得很早的孩子到了上午通常会变得疲倦而烦躁。听起来也许有悖常理，但早起通常是由晚睡导致的。相比那些因为做好了开始新一天的准备而早起的孩子，这一类早起的孩子实际上是睡眠不足的。

从让孩子早点儿上床睡觉开始。每天都把睡觉时间稍微提前一些，直到孩子能在晚上 7 点和 8 点之间睡觉为止，对于大部分孩子来说，直到五岁左右这个时间都是非常理想的。确保孩子白天有足够的睡眠。如果早起已经持续了几个月甚至几年，比起那些同龄却只是偶然早起的孩子来说，可能需要三到四周才能改变这个习惯。

有些家庭发现改变孩子早睡的习惯要用好几个月。父母的坚持是相当重要的。坚持，在这个问题上，意味着绝对的坚持，甚至比起我的方法中其他方面来还要更苛刻一些。对孩子在凌晨 5 点起床这个问题采用间歇增强的方法非常不妥当。有些家长会放弃教孩子早点儿睡觉的尝试，而是认为只要早上能让孩子待在自己房间里安静地玩耍到 6 点就算可以了。这可能对于某些孩子比较有用，但如果你能让孩子多睡半小时或者一小时的话，一般的孩子都会在白天表现得更好，精力也更充沛。

当孩子醒来后呼唤你的时候要迅速响应。让孩子不安或者叫喊只会让他更清醒；你应该教他学会继续睡觉。走到孩子身边说“还不到起床时间”或者“妈妈和爸爸还在睡觉呢。”不要打开灯或者拉开窗帘。让孩子抱着他的心爱之物，安抚他，如果需要，可以给他一个拥抱，但不要把他抱起来。

准备一个应急方案。对于较小的孩子来说，我给父母们的建

议是待在房间里。对于这个年龄段的孩子来说，我则建议你离开房间(尤其是如果孩子睡在床上而不是婴儿床上的时候)，因为你的出现可能会刺激孩子，他会试图保持清醒并且吸引你的注意力，或者想要爬到你的膝头上去。每十五或者二十分钟来检查一次孩子的状况，直到他再度睡着。

你需要使用一盏起床灯，或者用大一点儿的学步期儿童的音乐，来提示孩子何时他可以开始新的一天。你可以将闹钟或者其他计时装置(可以在相关器材商店购买)连接到孩子卧室的灯上，或者使用带闹钟的 CD 播放器或者 iPod。起床灯(音乐)可以告诉孩子是应该继续睡还是至少要呆在床上，以及什么时候才可以起床开始他的一天。把时间设置在早上 6 点，只要孩子能够连续一段时间睡到 6 点才起床，你就可以逐渐将时间再稍微向后拖。将所有的电子设备都放置在安全区域之内，或者至少让孩子没法自己打开。有些家庭喜欢用灯光是因为他们认为如果孩子确实睡着了的话，灯光就不太可能会吵醒孩子，但这还是要由你自己选择。无论是灯光还是音乐，关键在于坚持。如果你让孩子比起床音乐或者起床灯预定的时间早了哪怕十五或者二十分钟起床，开始新的一天的话，那他下一次绝对不会再认真对待起床音乐或者起床灯了。

如果孩子下床来找你，拉着他的手，带他回到自己床上。平静但是坚决地告诉他，“起床灯”(或者音乐)还没有开始，现在仍然是“觉觉”的时间。你很可能会经历几个这样的早晨。对于这个年龄段的孩子来说，要完全理解你的意思比较困难。你应该在把他放回床上之前给他一个深深的，长时间的拥抱，但如果这会让孩子抱着你不放，纠缠着你的话就不要这样做。如果你仍然在使用渐进法，那么可以回到你当晚椅子的位置上去。如果你已经完成了渐进法，但孩子仍然起得很早，那就离开他的房间。

如果孩子反复起床，可以考虑安上儿童门。你可以在儿童门的另外一侧或坐或躺，在留下孩子独自一人与呆在他的房间中做一种折中的处理。孩子们有时候可能会在儿童门附近的地板上睡着，也不要担心，他没事的。你现在要处理的是改变孩子内在的生物钟，一旦实现了这种改变，他自然会想要睡在床上而不是地板上。在下一章节中我将会针对那些睡在普通床上的孩子给出更多的研究结果。

如果你确实觉得自己需要待在孩子房间里，也可以尝试一下。如果孩子平静下来，再度睡着，那很好。但如果你不断地把他放回床上或者无视他用谈话或者行动吸引你注意力的企图的话，他很可能会更加生气。无论你尝试哪种方式，都可能要多做一些尝试，不要躺在孩子身边或者触碰他，为他唱歌，甚至轻拍他直到他睡着。

理想的状况是孩子会再度睡着，如果你运气好的话也可以再多睡一会儿。但通常孩子仍然会保持清醒，还很可能大声地抗议。让他呆在床上，或者至少待在黑暗的房间里直到早上 6 点我说 6 点，就是 6 点，不是 5 点 50 分或者 5 点 40 分，不然你会发现孩子起床的时间会变得越来越早，完全没有得到任何改善。

到了早上 6 点，如果此时你尚在孩子的房间里，就要走出去一两分钟然后再回来。如果你已经在房间外面，那么 6：00 就是该回去的时间了。（如果孩子睡着了，不要叫醒他，如果他醒着但非常沉静，你也可以再稍等一会儿，过了 6 点也可以。）进入房间，进行一种戏剧性的唤醒仪式来开始孩子新的一天。要用夸张的动作打开灯，拉开窗帘。或者让孩子和你一起开灯。

基本上，你应该有一种很好的早上起床仪式，就像你们的晚上睡觉前仪式一样，当然，早上的这一次应该更令人兴奋一些。你应该传达这样一种信心，现在是孩子应该起床的时间，因为时

间是早上，而不是因为他哭了或者向你抱怨了什么。

在这个年龄段中的某些特定时间，通常在孩子两岁半左右，可以尝试采取各种方式使用时钟。为了不让孩子对你发火，你可以把一切问题都推到时钟上！“时钟说现在还不到起床的时间，甜心。你得在床上待着直到时钟说可以起床了为止。”你还可以教孩子学会分辨电子时钟上 6 点的刻度，告诉他在看到那个数字之前不可以下床或者叫你。另外一种变化是将时钟的音乐设定到 6 点，告诉孩子如果他在音乐响起之前醒来的话，就要待在床上。一盏由定时器控制的灯也能达到同样的效果，而且比音乐更安静，不会吵醒其他孩子或者如果孩子 6 点时仍然还在沉睡的时候也不会被吵醒。这些方法对于这个年龄的孩子来说不一定全都会起作用；有些孩子可以接受，有些孩子则必须要到三岁或者三岁之后才能明白。

一旦孩子能够一直睡到 6 点之后，你就可以用同样的方法把时间推迟到 6 点 15 分或者 6 点 30 分，但这种做法并非一直有效——对于小孩子来说 6 点是一个常见而且自然的起床时间。很多早起的孩子会在一两年之后自动开始睡得时间更长，但也并不是绝对的。有些孩子虽然在整个幼儿时期起床都非常早，但当他们偶尔睡觉时间比较晚的时候也能够稍微睡得久一些。

苏珊娜起床的时间就非常早，有时候甚至凌晨 4 点半就会醒来。希拉和兰迪尝试了好几种方法，最终选择了带闹钟的收音机。当苏珊娜早早醒来，他们会精确而始终如一地传递给她同样的信息。“我们会迅速过去，并且告诉她除非她的收音机开始放音乐，否则我们不会让她起床。现在天色还黑着，妈妈和爸爸还在睡觉。”过了几个月，苏珊娜的夜间睡眠和日间睡眠都有所改善之后，她的起床时间也得到了改善。她会待在床上直到听见音乐想起，稍后甚至不再需要收音机，她能一直自己睡到早上 7 点当

苏珊娜偶尔稍微打破睡觉习惯时——比如她刚刚生过一场病或者春秋的季节变化时——她的父母会重新用几天收音机闹钟。由于在早上醒得比较晚，所以苏珊娜在夜间醒来的次数也减少了。

在许多家庭中，学步期的孩子会在早上 6 点醒来，欢快而开心，但习惯于睡到 7 点或者 8 点的父母们通常则会心情不好。如果愿意，你也可以尝试着训练孩子稍微晚点儿睡觉，用我在前面提出的适用于那些起床太早的孩子们的方法。但在一两年或者更长的时间内你还是得接受这个现实，并且尽量让你自己也早点儿睡觉。

你还可以试着教孩子学会待在自己的房间里，安静地玩耍或者看书直到你来叫他起床为止。如果孩子做到了就奖励他，但如果他没能做到也不要恼火或者惩罚他。对于这个年龄段的孩子来说，这仍然是一种比较难学的技能。孩子希望能在整晚和你们分别之后尽快看到妈妈和爸爸，他还可能饿了，或者需要一点帮助才能打开卫生间的灯。

如果孩子在 6 点时醒来，但到 6 点半或者 7 点却开始变得暴躁易怒，那就证明他起得太早了。这是一种睡眠不足的表现，可以使用前面我针对那些早起的孩子提出的建议来训练他多睡半小时或者一小时。确保孩子是在晚上 7 点到 8 点之间睡觉的，确保他在白天也得到了充足的睡眠。

早起的孩子

如果你的孩子在早上6点之前就醒来了，他可能会过度疲劳。比起那些得到充分休息的孩子来说，过度疲劳的孩子睡得不好，睡得也不长。他可能：

- 晚上上床睡觉的时间太晚。
- 白天没有充分休息。
- 在他下午的小睡结束之后到晚上睡觉之前这段时间太久了(尽量不要超过四小时)。
- 当他错过了“昏昏欲睡”的状态之后才上床睡觉。如果孩子过于困倦，他就不知道在自己更加清醒的时候应该如何才能让自己睡着——包括凌晨5点。

有时候在你开始进行睡眠训练之前，可能孩子起得还不算太早。在乔安娜与肯开始和我一起解决问题之前，伊连会固定在早上5点到5点半之间醒来，要求喝一瓶牛奶，稍后又要一杯水。一般说来，在这种时候肯会比乔安娜更容易在做完这一切之后继续睡觉，所以就由他来哄慰伊连，乔安娜则为他拿牛奶和水，然后他们会再度回到自己的大床上睡觉。伊连接下来会一直睡到7点或者7点半，有时候还要更晚。

当我们开始睡眠训练的时候，伊连晚上睡觉变得更容易，日间小睡也得到了改善，夜间睡眠明显变得更好，但早起的状况反而严重了。这让乔安娜非常难以忍受。伊连会在早上5点醒来，乔安娜就得坐在他的房间里，而不是让他到自己的大床上去。她待在孩子的房间里——如果她离开，伊连会发出令人难以接受的痛哭——有时候她能让伊连再度睡着，有时候却无法做到。

乔安娜自己的生物钟从来没有调整到早上5点时醒来。她

是那种在6点起床就一切活动正常，在5点起床却什么都做不了的人。然而如果她在5点左右醒来的话，就很难让自己再度睡着；她大脑中的某些部分开始活跃，并且很难再平静下来了。有时候伊连会再度睡着；但一般都不会，他能让这段时间变得特别不愉快，当乔安娜不肯回应他故意的挑衅，而是试图温柔地让他再睡下的时候他就会要求起床。

三个月之后，乔安娜试图让伊连能够在5点之后和自己一起在他房间的临时床铺上再度睡下。这对他们都勉强奏效了几天。然后伊连就又开始在夜间醒来一次，两次，三次，四次，乃至五次，要求他们都去睡在“大床”上，也就是旁边的临时床铺上。这种状况非常常见——正是我曾经警告过的不要在早上和孩子一起躺下的问题。乔安娜放弃了这种在清早和孩子相互依偎的行为，又改成坐在房间里试图安抚伊连了。最后，伊连重新调整了自己的生物钟，开始大部分时间都能够睡到6点或者6点半了。而且如果在早上5点醒来，他也能更容易地让自己再度睡着。

大约六个月之后，在家庭的作息时间被旅行和疾病打乱后，伊连又开始在早上5点醒来了。乔安娜试图坐在他房间里陪伴他，但却因为太过疲倦而在“大床”上睡着了，然后伊连就会爬上临时床睡在妈妈身边。不过他现在又长大了一些，已经两岁八个月了。乔安娜煞费苦心地向他解释，说这张大床是仅供早上抱抱的特殊大床，但其他时间伊连必须待在他自己的救火车床上。伊连已经掌握了语言能力和认知能力，很容易就接受了这种抽象的观念。

偶尔有一两次伊连会在夜间醒来，要求妈妈“到大床上抱抱”，乔安娜则会说“不行，伊连，回到你自己的救火车床上去。现在还不是我们早上抱抱的特殊时间。”这个做法很有效。伊连不再在夜间醒来要求妈妈抱（至少一直到下次他生病之前都没有），

当他在早上5点或者5点半醒来的时候才会叫妈妈，然后他们会一起倒在大床上很快地再度睡着。这有助于让伊连每天得到额外的一两个小时睡眠，将他从过度疲劳导致更早起床的恶性循环中拯救出来。

伊连开始能大部分时间一直睡到5点15分或者6点半了。如果他过早的醒来，他们也都能很快地再度睡着。在夏末的时候伊连开始突然间一直睡到7点甚至7点半，有一次居然睡到了8点15分。自然，这恰好是在他的大哥哥扎克开始上中学前的一个礼拜开始的，这意味着家里那些需要在6点或者6点半起床的人现在必须得蹑手蹑脚地行动，并且不再使用咖啡机以免吵醒伊连！

日间小睡

大部分这个年龄段的孩子都已经只需要每天小睡一次即可，甚至可能时间更短。（如果你的孩子还没有将日间小睡合并为一次，可以看看上册第9章“13～18个月”中的“转变为每天一次的小睡”部分）。通常，他们的日间小睡大概是从下午1点到3点。就像你已经知道的，日间小睡对于孩子来说很困难，就想让很多成年人在白天睡觉一样困难。他们需要足够的时间来调整节奏。你应该设计一整套仪式，与晚上睡觉的仪式类似但时间短一些。在孩子的房间给他安静地讲故事或者放音乐都是不错的睡前活动。

这个年龄段的孩子仍然需要日间小睡，哪怕他们觉得自己不需要了。你应该训练他们，就像我曾经说过的那样，用那种我最不喜欢的睡眠训练方法。（参考上册第7章“6～8个月”获取更多关于日间小睡训练方法的细节。）

让他在自己的婴儿床或者床上待一小时，无论他有没有睡

着。陪着孩子，坐在他的房间门口，或者每10～15分钟左右检查一次他的状况，无论你感觉如何都要这么做。不要被他吸引注意力，也不要和他交谈，尽量不要把他抱起来，一定要让他待在床上，或者至少待在自己的房间里，待足整整一个小时。

安睡女士小提示

如果你学步期的孩子已经从婴儿床转移到普通床上了，你可能要给他的房间安装儿童门。一位很讨厌儿童门的妈妈选择在儿子卧室对面的房间里读书。如果孩子走出房间，来到走廊上，她就能看见，然后马上把他送回房间里去。

如果你的孩子在一小时之后仍然无法入睡，那么就做一个戏剧性的起床仪式，让他下床。但接下来你就要采用应急后备日间小睡计划，比如开车带孩子出门，好让他睡着。移动中的睡眠并不是最有效的休息方式，但如果能让孩子在进行日间小睡训练的过程中不至于一点儿都没睡也是好的。次日继续尽量让孩子睡着。你可以采用日间小睡的贴纸、讲道理、物质诱惑，无论是什么方法，但要让孩子待在房间里，哄他睡下。

有时候孩子会在某位家长的教育下学会入睡，但那些不愿意帮忙进行日间小睡训练的保姆却无法让孩子学会睡觉。有时候则正相反，孩子和保姆在一起时能很乖地进行日间小睡，却把用来日间小睡的精力留下来对付妈妈。

打盹儿。在这个年龄段打盹儿会少见，但仍然会发生。打盹儿的孩子会小睡几次，但每次都少于45分钟。这并不是一种完善的睡眠循环，也不能让孩子恢复精力。你应该让孩子睡两个小时(到了两岁半，时间可以稍短一些)。如果孩子在30分钟或者45分钟之后醒来，你可以走到他的婴儿床或者床前安抚他。告

诉他现在仍然是日间小睡时间，他得待在床上。如果有用的话可以轻轻抚摸孩子。让他至少在婴儿床里或者床上待一小时，无论他有没有再次睡着。

如果孩子打盹儿的时间超过 30 分钟，但日间小睡的时间仍旧不足的话，用如下方法尝试让他再次睡着。你可以将这种短暂的小睡扩展到 90 分钟或者更长，尤其是当孩子看上去仍旧很疲倦的话。当你的孩子日间小睡不充分的时候，尝试采用后备日间小睡计划，如果他白天睡得很晚，就在 45 分钟之后，或者在下午 4 点时叫醒他。让他晚上早点上床睡觉，大约 7 点左右。

安睡女士小提示

日间小睡训练通常对于那些独自在家，配偶不在家或者没有其他成人支持的父母来说非常困难。哪怕是那些在晚上无法面对孩子哭泣，白天却能更好地处理孩子泪水的父母，日间小睡的训练也似乎有种度日如年的感觉，你不得不在日间小睡的时候在家里四处徘徊。如果日间小睡的训练对你，或者对于照料孩子的保姆来说确实太难，那就干脆暂时放弃这种训练。但要坚持使用你的临时后备解决方案，这样你就不会面对一个过度疲劳的孩子，导致晚上睡觉时间又变得一团糟。几个月之后可以开始再次尝试日间小睡的训练。

海琳开始进行一种更严格的日间小睡训练，包括更注意巴瑞的睡眠时机，在他开始疲倦，还不至于过度疲倦的时候让他睡觉。在此之前，她曾经用了大量白天的时间陪着巴瑞躺下，试图哄他入睡。有时候她得把巴瑞放进车里。现在，她不想再陪着孩子躺下，于是开始让孩子自己在房间里待一个小时。有时候她稍后还

是要开车带巴瑞出门，但当她把巴瑞从车里搬到床上时，巴瑞不再容易醒过来了。

渐渐地，巴瑞自己接受了一种更好的日间小睡习惯，但当拉瑞的工作变成经营一家餐馆之后，他的工作和回家时间开始不确定。巴瑞又开始拒绝日间小睡，因为这意味着可能要错过和爸爸在一起的机会。在那段时间里，海琳和拉瑞试图让巴瑞躺下，但如果他们发现孩子决定要保持清醒后，还是得依靠驾车带他出门才能让他睡着。让巴瑞能够睡着比纯粹的关心他如何睡觉更加重要。“如果他两三天都没有日间小睡就会生病，乃至于他自己都开始明白日间小睡的意义了。”海琳说。

麦迪逊是另外一个不肯日间小睡的孩子。如果她的妈妈在她睡着之前就离开房间的话，她就会声嘶力竭地哭，让自己保持清醒。所以贝丝只好陪着她，如果麦迪逊开始从床上下来，贝丝就会告诉她如果不再躺下妈妈就离开。这方法通常有效，麦迪逊最后也会睡着。有些因素影响了她的作息时间，如一次跨越全国的搬家，在他们家翻新完毕之前借住在祖母的房子里，这些都干扰了麦迪逊的日间小睡。

后来麦迪逊的学前班作息表也干扰了她的日间小睡。如果她错过了自己下午 1 点时分准备日间小睡的机会的话，通常就睡不着了。但在她开始上学前班时，直到下午 1 点之前都没法回家。等她吃完下学后的加餐，安顿好一切之后，就已经 2 点半了。无论是因为她当时已经睡不着了，还是因为她虽然睡着了，但由于时间太晚结果推迟了接下来的全部作息时间，最终的结果都是次日她的睡眠更加糟糕。

在那段时间的下午，贝丝强制执行了安静的休息时间，这种安静的时间对于这个年龄段的孩子来说效果不如日间小睡好，但却能帮她有效地休息。“如果她没有小睡，到下午 5 点时就会开

始闹脾气，但这种麻烦的时间只有持续15分钟，然后直到晚上睡觉之前她都会表现很好。”麦迪逊的妈妈说。贝丝还会在没有日间小睡的时候尽量让麦迪逊早点上床睡觉。

苏珊娜的日间小睡对于希拉来说也是一种挑战，当她快三岁时从婴儿床转移到普通床上之后这种状况变得更糟。这个小姑娘完全没有日间小睡的意向，甚至待在床上尝试小睡都不愿意。希拉试图给她的房间安装儿童门，但“这让她比预计中还要不安”。因此，希拉允许苏珊娜在自己的房间里玩耍，同时她会关上房门，坐在走廊里看杂志。如果苏珊娜跑出自己的房间，希拉会平静地让她回去，并表示如果不听话妈妈就再也不会坐在这附近了。“我不能强迫她小睡，所以我让她在自己的房间里玩耍。有时候她就会在地板上睡着。”她的妈妈说，当苏珊娜开始习惯日间小睡后，甚至也许能从某种水平上理解自己的身体需要日间小睡之后，她放弃了地板，回到床上去睡觉。后来，她在白天休息得越充分，晚上睡觉也就越好。

同睡

很多和孩子同睡的家庭会当孩子在这个年龄段时决定分开睡觉，渐进法可以帮助人们结束同睡。同样的，有些从未打算和孩子同睡的家庭则发现他们学龄前的孩子已经足够大到可以自己跑过来溜到爸爸妈妈的床上睡觉了。也许你从孩子出生以来就开始和他同睡；也许你曾经整夜或者在夜间某些时候把孩子抱到自己床上，因为当时你认为这是唯一能让他睡着的方法，但现在你想结束这种情况，请参考第3章“这到底是谁的床?”。对于那些决定继续和孩子同睡的人来说，这一章也会给你一些小建议，告诉你如何在大家分享大床的情况下改善孩子睡觉的时间和质量。

乔尔

还记得乔尔，那个不喜欢喝妈妈给他的杯子里的牛奶的男孩吗？在乔尔 19 个月大的时候我结识了多萝西和杰克。尽管杰克在第一次婚姻时生的女儿，乔尔同父异母的大姐姐也时常和他们在一起，但乔尔是他们俩的第一个孩子。

乔尔一直都睡得不好，部分是由于他婴儿时耳道常常发炎，多萝西会在他生病的时候抱着他轻摇。他们试图采用任其哭泣的方法，但乔尔如果哭得太厉害会导致呕吐，这根本不是一种缓和而有益于改善睡眠的体验。多萝西和杰克很早就决定不和孩子同睡，但在乔尔 16 个月时，疲倦的多萝西因为自己是一个工作的母亲——需要长时间坐班的工程师而充满罪恶感，并开始时常把乔尔带到他们的大床上一起睡觉。同睡并不能解决乔尔的睡眠问题，反而导致夫妻之间的矛盾。搬到新家，换了新工作，以及杰克的商务出差都增加了这种压力。“我们的关系开始变差。我每次下班回家都有一种罪恶感，希望能尽可能多地补偿。等我下班回家后，自己很累，杰克又不在家，乔尔正生病，我只能把他抱到我们的床上去。我觉得同睡可能也就几天而已，但我没办法停止同睡；如果我把孩子放回他的婴儿床，他就会不停地哭泣。我试着任他哭泣，但他就会呕吐。如果他睡着了，也会每一个半小时醒来一次。你得随时给他奶瓶。”多萝西说。你可以回想一下，她还曾经为乔尔的小个子和营养问题担忧。

多萝西也不喜欢作息时间表。“我回家时间很晚，我很累，想要一些放松的时间，我希望能和我的孩子在一起。我不想把他直接送到床上让他睡觉。”她不喜欢看表或者担心什么时候该上楼哄孩子睡觉。她常常试图让乔尔早早地抱着奶瓶睡下，但如果这种方法不管用，她就会抱着孩子转圈，然后在晚上 10 点左右尝试再给乔尔一瓶奶。

我帮助多萝西了解了一些关于睡眠周期和皮质醇的知识，这让她更容易开始关注时间和乔尔想要睡觉的迹象。她还意识到现在必须让孩子放弃奶瓶了，而且这个改变比她想像的要容易得多；乔尔对奶瓶的需要完全不像多萝西想的那样，或者她认为自己应该给孩子那么多，实际上孩子不需要。我们开始进行安睡女士渐进法，将起初的几晚缩减为直接在乔尔昏昏欲睡的时候把他放进婴儿床里。

头两个晚上很困难，我也不能确定，假如不是担心会失信于杰克，多萝西是否能够坚持到最后。乔尔哭了一个多小时。但他没有呕吐；也从没达到完全歇斯底里的地步。“他在哭，但并不是完全无法安慰。让我陪在他身边看他哭感觉很不一样。”多萝西说，“他最终还是睡着了——人们都说小孩子站着的时候无法睡着，但乔尔就做到了。”多萝西会轻轻地拥抱乔尔，但也按照我的建议非常注意不让孩子产生任何新的负关联。“他会伸出手试图够到我——他现在还会这么做。这很难。在他伸手试图触摸我时，我也希望能抱住他，亲吻他，但我尽量用言语来安抚他。”多萝西还会放一些舒缓的音乐当作背景，但这并不是什么问题，因为对于乔尔来说，音乐是用来调节情绪的，而不是睡眠支撑。音乐有助于乔尔准备睡觉，但他不需要依靠音乐才能入睡，或者夜半醒来要有音乐才能再度睡着。

第三个晚上是截然不同的，很好的体验，因为对于多萝西来说前两个晚上实在太痛苦了。乔尔短暂地哭了一会儿，马上就睡着了，这一次他无任何反抗。我认为部分原因是由于多萝西将新的晚上睡觉前仪式做得特别好，另外还因为她及时发现了乔尔的睡眠信号，把他放到婴儿床上去，那时候他“确确实实是昏昏欲睡。”当多萝西把椅子往远处挪动的时候，乔尔也哭闹了一阵子，但并不长。他仍然会在午夜醒来，但当他们开始渐进法时，多萝

西夫妻会很快地安抚好乔尔，然后就可以离开房间了。“这不是什么难事；他在自己的婴儿床里睡着，我们就能回去睡觉。”渐渐地，乔尔夜间醒来的次数越来越少。他现在偶尔还是会醒来，但次数并不多。

哪怕后来乔尔的作息时间曾经被干扰过——当多萝西作出让步（当乔尔发高烧的时候和他一起睡了几个晚上）；当工作紧张的时候多萝西需要一周工作 80 小时；当杰克还在出差而邻居的怪人夜半去敲每家人的门时——多萝西仍然能够在两个礼拜之内让乔尔重新回到那种香甜的睡眠状态中去。“我知道如果我想要拥抱他，还是可以这么做的，但只能在我们读书的时候，而不是我让他躺下睡觉的时候。我明白了疲倦的孩子与过度疲倦的孩子之间的区别。”她说，“我明白了哪怕我讨厌习惯与坚持，哪怕我发现这很难做到，但乔尔都需要我这么做。”

第 2 章　两岁半到五岁

在两岁到三岁之间，孩子的平均睡眠需要降到夜间十个半小时，外加一个半小时的下午小睡。四岁大的孩子需要十一个半小时的夜间睡眠，并且大部分不再需要日间的小睡，不过他们仍旧需要在下午有大约 45 分钟平静的时间，有时候也可能会小睡。五岁大的孩子夜间一般要睡十一个小时，下午的平静时间仍然对他们的成长有益。

学龄前儿童仍然需要大量睡眠，但他们已经精通找出各种理由来搪塞睡觉了。他们会用令人吃惊的手段拖延和逃避睡觉，对于父母来说，这实在是让人又好气又好笑。他们那种充满哲理的论辨能力堪比青年苏格拉底，他们表现出的好奇心也不亚于小爱因斯坦。“为什么蝙蝠要在晚上飞?”“天空永远都是蓝色的吗?”“上帝早餐喜欢吃什么?”当然，在下午 4 点或者 5 点他们正忙着玩耍的时候，这些想法或者问题绝对引不起他们的兴趣；但当他们一听到睡衣这个词的时候，这些问题马上就会成为迫切得到答案的需求。我就认识一对夫妇，他们称自己的大女儿为“拖延大王”，因为她在拖延睡觉时间方面具有令人惊异的才华。

这个年龄段孩子的睡眠塑造需要将你已经在前面的章节中熟悉的各种方法与为年龄更大，语言能力更好的孩子们设计的新方法糅合在一起。作为父母，我们需要在晚上睡觉的时间加上一些纪律性，但仍然要保持这段时间的温馨与惬意。我们需要帮助孩子克服时常产生的恐惧感，否则即便在孩子没有把拖延变成对抗的情况下，晚上睡觉也会变得更困难。当孩子日间睡眠的时间逐渐减少，最终长大到不需要日间小睡的时候，我们还得不断帮他们补充睡眠，更改作息时间表，为他们加入下午的安静时间，除非你愿意在晚餐之前面对孩子造成的大量麻烦。

想要解决那些从婴儿时期就出现，如今已经根深蒂固的问题需要一些时间。你不可能在三天之内就解决一个四岁孩子晚上

起夜或者依赖安慰奶嘴的问题，所以记住我的建议，要耐心并且坚持下去。如果这个年龄段又出现了一些新问题，比如孩子需要你在晚上睡觉的时候和他一起躺下，等等，就要在它变成一种长期性顽固的行为之前尽快解决。幸运的是，从三岁开始，有时候甚至还要再提前几个月，孩子们会从某种水平上明白他们需要睡觉，明白睡眠不足是一种问题，会让你为此而担忧。然后他们就会在你试图改变某些事情的时候变成你的合作者，并开始“自主”解决问题。

发展变化

分离焦虑

这个年龄段的孩子一般还是会经历长期的分离焦虑，这就是为什么很多孩子需要你在晚上睡觉的时候躺下来陪伴他们，或者跳下床到处寻找你的原因。如果他们已经形成了比较好的睡眠习惯，就能学会用自己的心爱之物、黯淡的(四瓦)夜灯和其他安抚方式更容易地自己解决问题。一个良好而温馨的睡前仪式非常必要。不要敷衍了事，但也不要让孩子有机会拖延、讨价还价或者打破规矩。答应孩子在你上床睡觉之前还会再来看他也是非常有用的。但如果你承诺了要来看他，就要保证自己一定能做到。

安睡女士小提示

孩子们很喜欢听你告诉他们，当他们睡着的时候是怎样蜷起小身体，看起来又是如何可爱、宁静而漂亮的。我认为他们以此来确定你真的会在他们睡着的时候来看他们，检查他们的情况，确定你没有真的离开太远，就像你承诺的那样让他们感到安全可靠。

心爱之物

学龄前儿童、上幼儿园的孩子都不需要拖着安全毛毯、毛绒动物或者喜欢的玩具到处走，除非他们遇到了特殊的压力或者不熟悉的环境。但他们绝对不会因为年龄过大而不需要在睡觉的时候由自己的心爱之物陪伴。我极力鼓励孩子们带着自己的心爱之物一起睡觉。我自己的女儿常年如此。心爱之物能帮助他们处理分离焦虑和夜间恐惧。有些孩子可能一贯对心爱之物没什么兴趣，但很多孩子现在都需要自己的心爱之物，哪怕他们已经不再喜欢小时候的心爱之物，也会换成另外一件。

让孩子的心爱之物也参与到你们睡前的游戏、讲故事和其他仪式中来。要有创造性，给孩子一个选择心爱之物的任务。你们可以一起去购物，一起亲手为孩子制作一件心爱之物，或者在工厂、艺术品商店等地定制。有些孩子可能会不停地变换自己喜欢的伙伴，比如今天晚上睡觉的时候可能喜欢这一件玩具，次日则可能要拿另外一件。这都没有问题，这是孩子们满足他们自己不断发展的品味和需要的方式。一个小男孩长大之后就不再喜欢他婴儿时的心爱之物，而是会将他所有的英雄人物造型玩具在自己的床边排成一圈，从而在夜间保护自己。没有什么妖怪敢越过蜘蛛侠、超人和绿巨人的防线！

如果你的孩子每晚睡觉都需要同一件心爱之物，你就一定要让那件东西和他在一起，并且对他们一起说晚安。如果他喜欢不同的心爱之物，就让他在睡前仪式一开始的时候就选出当晚最喜欢的一件，否则他就又多了一个借口来拖延关灯的时间了。

每天晚上阿瑞拉都会选出一只玩具娃娃来陪她睡觉。而马希则灵光一闪，开始用这些娃娃来说服阿瑞拉待在床上。“我会提醒她待在床上，告诉她玩具娃娃雷切尔需要她。‘如果你起来

了，雷切尔娃娃就没有人陪了。'这让阿瑞拉感觉很好，认为自己很强悍。"

这个年龄段的孩子会有一些属于他们自己的睡前仪式，但需要父母的参与。他们会想缠绕妈妈的头发（惊人地相似）。可能想要做一些古怪的事情，比如用手指捅爸爸的肚脐。尽量帮孩子把这种习惯转移到他的心爱之物上。一位有长长卷发的母亲到一家纺织品商店，为孩子定做了一件带有流苏缎子的心爱之物。还有的家长发现毛绒玩具、小毛毯和有毛或者其他类似卷曲毛发特征的玩具娃娃都可以吸引孩子。孩子可能不会马上就接受这种替代品，但尽量让他放松下来，接受新的心爱之物。可以让孩子进行自己的小仪式，比如在你晚上为他讲故事的时候让他缠绕你的头发，但你要慢慢地开始移开身体，让他逐渐抓住心爱之物来代替你的头发。

新动态：换到大床上去

大部分孩子到了三岁就会转移到普通床上去，尽管我个人认为让孩子在婴儿床里一直睡到四岁都不会有什么问题。如果你希望让孩子在婴儿床里睡得更久一些，尤其是如果孩子的语言水平还不足以理解在床上睡觉的规矩时，你可以回顾一下我在前面的章节中提出的延长婴儿床使用时间的小提示。你可以尝试用一种叫做婴儿床帐的纱网罩覆盖在婴儿床上方。有些孩子讨厌这东西，但还有一些则可以在婴儿床帐的帮助下在婴儿床里多待几个月。但如果你的孩子常常从婴儿床里往外爬，还总是提及想要一个"大小伙子"或者"大姑娘"的床，那就让他如愿以偿吧。

如果你想要分成几步进行这种转变的话，可以先从拆下婴儿床的栏杆开始，在婴儿床的一边放一张小板凳，好让孩子能够自己下床。你应该多拿几个枕头放在床周围的地板上作为安全措

施。你也可以把普通床和婴儿床同时放在孩子的房间，或者搬走婴儿床，把普通床放在原先婴儿床的位置。你可以把普通床放在墙角，这样孩子仍然能找到那种被包围的安全感。一般来说，为普通床安装上栏杆也是个好主意，这样可以防止孩子掉下床，你也可以在床边的地板上放几个枕头或者特殊的毛毯，以防孩子掉下来的时候摔伤。

在孩子的卧室门口安装儿童安全门，至少在孩子刚换到普通床的时候要安装，这种安全门无论是作为训练设备还是安全措施都非常好。安全门可以规划出一个界限，让孩子知道他应该待在床上。还能防止孩子在半夜醒来时在黑暗的家里四处游荡，不慎受伤。

让你的孩子在从婴儿床过渡到普通床上的转变中担任主要角色。让他自己挑选一些很有个性的床单。（无论你自己打算挑选什么样的设计图案，比如你觉得你的小女儿很可能会想要粉色和紫色的床单，你的小儿子想要灭火车的图案。但还是让他们作决定吧。）告诉孩子他可以到大床上睡的同时也要强调规矩。让孩子知道你还是会把他放到床上，但他应该乖乖地待在上面。从一开始就要坚持你的态度。如果他自己下床，就毫不犹豫地把他再放回去。如果他能老老实实地待在床上，也要奖励他。给他足够的机会，让他给祖父母、姨妈或者表兄弟们夸耀自己的新床。

在前面的章节中你已经认识了希拉和兰迪的女儿苏珊娜。在我和他们一起努力之下，苏珊娜的睡眠得到了改善，但这个灵巧的小家伙非常善于从她的婴儿床里“越狱”，她的父母想尽办法也无法阻止。“每天早上我们醒来都会发现孩子站在我们的床边。”她妈妈回忆说。几个月前，苏珊娜就三岁了，她开始对“大姑娘”用的床表现出浓厚的兴趣。现在她睡得很好，语言能力也非常强，所以她的父母决定把她换到普通床上去。

“她认识的很多朋友都已经睡在‘大姑娘’用的床上了。当我们有时候去某些地方玩耍时，她就会到‘大姑娘’睡的床上去玩，所以我告诉她‘你马上也会有一张属于你的大床了。’我们在床边放了很多枕头，防止她晚上掉下来；我为她准备了紫色的带着花和蝴蝶的床单。她非常激动，终于有了自己的‘大姑娘’专用的床。”希拉说。

希拉非常清楚地向苏珊娜解释了‘大床’应该遵守的规矩，并且在苏珊娜可以坚持待在床上，不会自己下来去寻找爸妈时奖励了她。整个转换过程非常顺利。

如果你正准备着手使用我的安睡女士渐进法或者即将进行其他较大的夜间睡眠方面的变化，比如取消孩子的奶瓶或者安慰奶嘴等，可以考虑一下如果你让孩子在婴儿床里多待一段时间的话，这种过程会不会更简单。当你在改变孩子睡眠中的其他方面内容时，婴儿床会给他营造一种安全而熟悉的环境；如果在你正教孩子学习如何更好地睡眠时，无需担心孩子会在半夜自己起床，也许整个过程会更简单些。不过，我也发现，对于很多这么大的孩子来说，如果你一口气把所有的改变都做完，他们反而表现得更好。因为你给了孩子使用新的“大孩子”床的特权，同时也将孩子对睡眠的期望值的变化包含在了睡“大床”的规矩之中。在此并没有什么对错的判别。相信你直觉下的判断，什么方法更好，更适合你孩子的性格。

如果你的孩子都快要四岁了，仍然喜欢睡在婴儿床里，哪怕护栏已经拆下来了也一样，那么不要干涉他。你可以偶尔提及换床的问题。你可以在床和床单上下功夫，但不要强迫孩子，除非你的孩子体重超出了婴儿床承受的范围。当他准备好了就会自己主动完成转换，这个年龄的孩子很快就会做好充分的准备。有些家庭会用幼儿床做临时的过渡，但我不认为有这个必要。如果

孩子确实想要一张幼儿床也可以，但这确实是一种不必要的投入。幼儿床唯一的好处就是对你来说尺寸太小，你没法躺在孩子的身边；而当孩子有了他们自己的大床的时候，他们通常都会要求父母陪着自己躺下。

有些学龄前儿童还会经历这样一个阶段：他们不想睡在自己的床上；他们白天或者晚上想要睡在一张小沙发、一张放在地板上的床垫或者一张软椅等东西的上面。这种情况可能会在孩子刚刚从婴儿床转移到普通床上之后发生，也可能过一段时间才发生。你可以采用一些奖励或者鼓励的方法诱使孩子睡在床上，比如和他一起躺在床上为他讲故事，或者让孩子躺在床上给他进行一次特别的背部按摩，诸如此类。

检查一下是否床上的某些东西让孩子感到害怕。可能他会害怕掉下床，这样的话，你可以在地板上多放几个枕头，或者在床侧安装护栏。但我会问自己这种情况是否真的会导致孩子的焦虑。如果他能够在自己的房间里睡得很好，我就不会担心这个问题，他自己很快就会再回到床上去。

“我花了三百美元定制和安装了专用的遮光窗帘，好让我的儿子乖乖地在白天小睡。”一个妈妈抱怨说，“他确实又开始日间小睡了——但只肯在家里光线最亮的起居室的沙发上睡觉！”

进餐与睡眠

这个年龄的孩子应该有规律的进餐：每日三餐加上上午 10 点左右和下午 3 点左右健康的加餐——如果孩子还在小睡的话，下午加餐应该在小睡醒来之后。这时候的孩子不再需要奶瓶了。晚上睡觉前还用奶瓶喝奶不利于他们的睡眠、牙齿以及总体的营养。如果你的孩子仍然在使用奶瓶喝奶，回顾一下上册第 8 章“9～12 个月”和第 9 章“13～18 个月”中我给出的相关信息。

在晚上睡觉的时候，孩子可以喝一杯水，但不要在睡觉前喝牛奶或者果汁！我建议你在给孩子讲故事或者唱儿歌的时候给他一杯水，而不是关灯之后。如果孩子在晚上睡觉前数次要求你往杯子里加水，你要给他设置明确的限制，向他解释，并且坚持你的态度。整个晚上你可以在孩子床头留下一杯水（我建议使用鸭嘴杯或者运动水壶，而不是婴儿奶瓶或者敞口水杯，除非孩子已经习惯夜间起来摸索他的杯子而不会把水洒出来）。但你要在睡前再次向他解释，并告诉他整晚他只有这一杯水；你也不能够再次回来给他加水。看看乔安娜是如何说服她的小儿子，在夜间只给他杯子里留下几盎司水的。伊连把水都留给了他的毛绒玩具，他的“第二心爱之物”，这只玩具睡在他的床边而不是床里，伊连可以在自己需要的时候抓住它。

拖延与谢幕

那位称他的大女儿为“拖延大王”的父亲非常会总结。这个年龄的孩子确实非常擅长拖延，任何分离焦虑或者夜间恐惧都能锻炼他们的这种技能。最好的应对方法就是明确晚上睡觉时间、搞好良好的睡前仪式，以及当孩子开始问你各种各样的问题，提出各种各样的要求时能温柔地让他放松。

如果你的孩子想让你拥抱他无数次，尽量最多抱他一两次。当你“最后一次”拥抱孩子的时候，告诉孩子你对他的期待。然后坚定态度。你可以在几分钟之后回到他的房间门口，表扬他对你的理解以及遵守睡觉时的规则。等你说完这些表扬和安慰的话后就要在孩子准备一次又一次吸引你注意力之前离开。如果这种做法会让事情变得更糟就放弃。你要自己判断。如果孩子不断从床上溜下来，就关上他房间的门；他会理解你的意思的。

有时候孩子们非常明确妈妈防御最弱的一点在哪里。我就知道一个小男孩，他会溜下床，告诉他妈妈自己肚子疼。而当妈妈把他放回床上时自然就会担心他。半小时之后他会再度下床，这一次却又说他的头发疼！

“她不断地拖延，拖延，拖延。”马希提及阿瑞拉时说，“她太聪明了，她说自己需要这样那样的东西，而且总是能找到我的弱点。她的说法对我来说都很合理——她要求的都是很普通的东西。我会问她是否真的需要一杯水，她就会告诉我，自己没有把嘴里的牙膏都洗干净。她会告诉我自己需要换上干净的尿不湿，她已经尿湿了裤子，睡不着了，所以我就只好回来为她换尿片。她会说自己需要一条小毯子；那样会暖和点儿。我总是试图提前做好准备。试着考虑她在晚上睡觉的时候可能会需要什么，然后为她做个全面的准备。但她总是能找出我遗漏的事情。”

如果孩子说他饿了，父母亲很难拒绝他的要求，并且会为怀疑孩子是否真的饿了而产生罪恶感。如果孩子爱挑食，或者看起来是为了拖延睡觉时间而开始对饮食诸多要求的话，你就得坚定地说：“不行，你已经吃过晚饭了。我们要等明早你起床之后才吃早餐。”如果确实有些反常，你认为孩子真的饿了，可以给他一份少量而健康的加餐，但要仔细地跟他说明，今晚你让他吃东西，但并不是每个晚上都会让他吃。次日晚上，你要提前杜绝这种问题的发生。在你打算让孩子去洗澡并准备上床睡觉之前就先询问他是否还需要加餐，告诉他现在可以，但洗完澡刷完牙后就不可以了。让孩子在白天吃足够的食物，并且让进餐的时间清晰明确。

恐惧

几乎所有这个年龄段的孩子在某些夜晚都会感受到模糊不

明的恐惧:妖魔鬼怪,影子或者他们叫不上名字来的什么东西。你要了解这些恐惧,而不是让孩子们把它变成一种拖延睡觉时间的借口,或者在晚上利用这种机会反复地溜下床来。

尽量淡化这种恐惧。对于孩子而言这并不是笑话。告诉他没有妖怪,并且展示给他看。用一分钟时间检查床下或者壁橱,如果孩子需要你这么做的话。你可以拉着孩子的手一起去检查,除非这么做会增强他的恐惧感。

“韦斯从来没有说过他被鬼怪吓唬的事情,但他很怕黑。我们在他房间、走廊和隔壁房间都留下了夜灯。他总是会抱着自己的心爱之物和一个黑娃娃一起靠向床内侧来获得安全感,这很有用。”阿曼达说。

三岁半的时候,山姆开始说他害怕外面的声音。诺拉认为这可能是孩子的某种拖延睡觉时间的计划,但她首先还是假定这是真的。“我们会锁上所有的门,检查两遍,以此安抚他,然后我们回到楼下去,假装把所有的东西都赶出去。然后我们会到我父母的房间,做同样的事情,并且告诉山姆,祖父母养的狗会把一切坏东西都挡在门外。”

给孩子一些实质性的保障也有助于安抚他。当然不是说给他一件武器,而是一些他可以看到、摸到或者感受到,从而知道自己不会被留在恐惧之中的东西。例如詹姆斯一直以来睡眠都很好,但当他三岁半的时候开始经历睡觉前的焦虑。他是个有柔和声音的小朋友,所以爱伦给了他一只可以放在床边的摇铃。他可以摇响铃铛,知道妈妈或者爸爸马上就能听到铃声。他们甚至在白天做过联系,让詹姆斯看见妈妈和爸爸能在多短的时间内做出反应。

安睡女士小提示

让孩子的心爱之物成为睡前检查队的一分子。让孩子的心爱之物帮助你检查房间，然后把它放进孩子怀抱中说，“看，一切都是安全的。没有妖魔鬼怪。”没有任何他害怕的东西。

另外一些妈妈从网络上找到了一种“除魔”用的喷雾剂，或者你可以用喷瓶和一些加入气味清新的安全物质的水自己做一个。让孩子帮你装饰一下喷瓶，也可以提升他的自信，减轻恐惧感。你们可以在睡觉前一起在房间里喷出喷雾，然后把喷瓶留在孩子的床边，让他在晚上需要的时候可以拿到。你还可以给孩子留下一只手电筒，如果你觉得他可能会整晚都在玩手电筒就算了。看看本书最后我推荐的睡前图书，找些可能帮助消除孩子恐惧感的故事讲给她听。

我给第二个女儿格雷琴的东西是让她可以带在身上的。她婴儿时期曾经把一条毛毯当作自己的心爱之物，甚至当她很小的时候她就喜欢把毯子蒙在头上。当然，这种做法让我紧张了很久，每晚我去检查她的情况时都会把毯子从她头上拿开。我的孩子一般喜欢比较密闭的环境，因为这让她觉得舒服，到她长大会表达之后，她会让我把毯子盖在她头上，好让她有安全感和被拥抱的感觉。

在某年的 12 月，格雷琴三岁半的时候，她看到了《平安夜》故事书中的一幅插图，图上是一个戴着睡帽的男人。我们决定为她设计一顶睡帽，一顶可以带给她安全感，又能让我从每晚都担心格雷琴可能会窒息的噩梦中解脱出来。我找了一块方形的摇粒绒布，将上面的两角向下折，折成信封的形状缝起来。我把这顶

睡帽放在格雷琴枕头边上，她可以把自己的小脑袋钻进“帽檐”下，裹上她的小毯子，抱着她的毛绒玩具入睡。尽管现在格雷琴已经不需要用什么东西来阻挡妖怪，但她仍然非常喜欢戴着这顶睡帽睡觉。很长一段时间内，她都会告诉我说这顶睡帽在帮她阻挡妖魔鬼怪方面立下了大功。

很明显，如果你的孩子真的感到恐惧，就给他些他需要的特殊安慰。你可以坐在他身边轻抚他、拥抱他要比躺在他身边睡觉的效果好得多。如果孩子确实需要很多身体方面的安抚，可以把他抱在你的膝头待一会儿，然后再把他放回床上，慢慢地轻拍他。你还可以在晚上睡觉仪式的最后一步时在房间的灯光下依偎着他，拥抱着他。当孩子入睡时，你可能要在他门口坐上几个晚上，这比留下他独自一人好得多。

安睡女士小提示

如果你的孩子是那种很少见的只需要你躺下来陪他一会儿而不是整晚的孩子，那你就可以按照他的需求行事，但要注意：尽量在孩子完全睡着之前离开他的床，因为你可能正面对孩子很不确定的睡眠状态。

如果你的孩子会做噩梦，那就回到他床边给他一些额外的安慰。帮他把情绪从噩梦转向更愉快的画面中去——就像我的大女儿常常说的“彩虹和花朵”。你马上就会看到丽塔的故事，她常常会让四岁大的伊莎贝尔在床上打转，同时说，“噩梦没有啦！”偶尔做噩梦很正常；所有的孩子都会做噩梦。可以读一下第 5 章“噩梦、夜惊和梦游”来获取更多应对噩梦的方法。

当孩子们越来越了解到周围的世界有多么大时，他们也会开始体验到越来越多的焦虑感，尤其是在刚开始上学的时候。他们

会开始担心被他人欺负、伤害或者抢劫；他们会担心父母或者祖父母中有人可能会生病；开始担心学校、朋友或者宠物；他们甚至会远远超出你的理解被电视新闻或者广播报道中的某个一闪即逝的片断严重惊吓；还会非常担心战争、地震、龙卷风等自然现象，哪怕是发生在很远很远的地方。在经历了“9·11”事件之后，很多小孩子还会或清楚或模糊地担心战争和恐怖活动。

缓和孩子的焦虑有时候很简单，可能只要你和孩子谈谈，把恐惧放到他们不会那么害怕的明面上来说就可以。但程度更严重的儿童焦虑通常容易被忽视。但也不要反应过度——一点儿恐惧和焦虑对于这个年龄段的孩子来说很正常，怕鬼不代表孩子长大之后就会变成一个神经过敏的人。但如果你的孩子看起来极度恐惧，或者有病态性的恐惧，就得和儿科医生、孩子的学前班老师或者学校老师交流一下，考虑他是否需要更专业的帮助。

安睡女士小提示

有时候如果一个孩子感到反常的恐惧时，可能会有几天表现出明显的焦虑不安，然后将这种焦虑转化成形象的鬼魂或者妖怪。这要依赖于他的想像力，你可以找到是什么在困扰他——作息时间的变化、学前班里的某些同学还是即将来临的令他不安的某些事情，等等。

使用儿童马桶的训练

只要你没有把使用儿童马桶的训练变成一场战争，我并不认为改变孩子睡眠模式的同时进行使用儿童马桶的训练会有什么问题。主要在白天进行训练，在日间小睡的时候还是给孩子使用尿布或者尿不湿，直到他能够至少一周之内保持自己不尿裤子为止。我认为晚上让孩子一直用尿布或者尿不湿到四五岁都没问

题;只要你给他们时间,他就能发展出通宵的自控能力。我也不认为这会令孩子产生任何迷惑——如果你正在教他待在床上,就不要紧接着让他半夜的时候起床去上马桶!想要了解更多关于使用儿童马桶训练的内容,可以看第15章"医学问题"。

然而,对于一个刚刚学会使用儿童马桶的孩子来说,马桶本身很可能成为另外一种拖延睡觉的策略。当一个孩子说他想要"上马桶"的时候,你当然会让他从床上下来去上马桶。但一个晚上最多让孩子去一次就可以了,而且一定要尽可能地让孩子上马桶的时间短暂而且有效率。如果他五分钟之后再次提出想上马桶,就要告诉他这次不行,因为刚才上过没多久,他得一直等到明天早上才能再去上。或者你可以让孩子自己去卫生间(也可以陪他去,但不要和他互动,尽快安静地返回)。如果他频繁地上厕所,你可以告诉他,以后晚上睡觉的时候都会给他穿上纸尿裤。记得让孩子在睡觉前第一时间上完厕所——并且要提醒孩子,在睡前上了马桶之后,30分钟之内都不能再要求上马桶了。如果他并非故意拖延,你觉得他自己确实无法肯定自己是不是要在睡前再上一次马桶的话,可以告诉孩子晚上睡觉的时候用尿布或者纸尿裤来保证更长时间的干爽也很好。

与你的孩子合作

父母们有许多方法可以用来帮助他们塑造孩子的睡眠习惯与方式。在这个年龄段,孩子们可以转而开始自己提高睡眠质量,并会在取得成功后为自我价值的实现而感到骄傲。正面地强化这种态度会有很大帮助。

家庭会议

现在你可以开始进行家庭会议了，父母坐在孩子身边，用适合孩子年龄的方式来讨论他的睡眠问题。选择孩子心情很好，容易接受教育的时间。周日上午吃完早餐之后，比非周末的下午 5 点之后更加适宜，因为下午 5 点是取消日间小睡之后的孩子准备吃晚餐的时间。

告诉孩子你请教了安睡女士(或者读了一本书)，学习了如何能让孩子睡得更好。孩子不喜欢的任何改变或者规则你都可以推到我身上。比如，如果你的孩子恳求你和他一起躺下，你可以告诉他，安睡女士说我们不能这么做，但我们可以待在你的房间里陪着你。

有些孩子会对我非常恼火。“安睡女士绝对不能来和我一起玩！”“我不喜欢这个安睡女士。”他们可能会拿起一本书并把它丢出去！但当他们成功地改善了睡眠，开始对新的睡眠技能感觉很好时，通常会想给我打电话，告诉我他们是多么为自己而骄傲！

坚持进行乐观而积极的讨论，你应该不希望让孩子觉得自己是一个问题儿童，或者让他觉得自己做错了什么。相反，你应该表现出这是你自己的问题，是你的原因。“妈妈和爸爸应该早点儿帮你学会怎么自己睡觉的，我们很抱歉我们没有做到。但是安睡女士会帮助我们知道该怎么做，现在我们也要帮你学会睡觉。”

你要告诉孩子，那些晚上睡觉的时候听话不乱发脾气的孩子，那些整晚安睡的孩子，早上起来的时候都会觉得很快乐，而且白天也能得到更多乐趣。鼓励孩子自己思考他应该如何参与进来，比如可以让他自己决定带哪一件东西到床上去抚摸着、拥抱着、依偎着睡觉，或者让他决定如果晚上他睡得很好的话，第二天早上可以玩哪一种特别的游戏。你应该让孩子与成功的改善睡

眠之间产生一种相互关系。

如果你觉得有帮助的话，也可以告诉孩子一些榜样事例，尤其是一位孩子比较尊敬的老朋友或者亲戚的故事。可以这么说："我们要教你学会怎么自己睡着，怎么才能整晚都在你自己床上好好地睡觉，就像约翰尼表哥、珍妮表姐、祖母和雷切尔阿姨那样。"注意，你应该从正面角度来表述这种案例，不能让孩子觉得自己没能按照你的希望去做，或者没能像别的孩子那样做，从而感到羞耻。

安睡女士小提示

你可能会惊讶地发现孩子已经对睡眠问题非常敏感了，也会惊讶地发现他们能很快就接受各种术语。很多孩子在父母提出这种问题的时候都会放下心来。他们知道有些东西是不对的，知道自己的父母为此而很郁闷，希望他们能够改变睡眠的方式，知道你们打算帮他们解决这种问题，他们会很高兴。

四岁时，伊莎贝尔很难睡着，也很少能整夜安睡。她通常会睡在父母身边地板上的一只睡袋里。她的小妹妹迪尔德丽正相反，她可以毫不在意地在婴儿床里待上超过半个小时的时间，直到睡着。丽塔和爱略特一直对这个问题放任自流，直到他们的第三个孩子丽贝卡出生为止，接下来问题变得更棘手，他们要面对三个孩子，其中两个占去了大半时间。丽塔和爱略特召开了一次家庭会议，发现伊莎贝尔已经很清楚自己的问题了。"我告诉她，我和她爸爸准备教她学会如何自己睡着，就像迪尔德丽那样。我们告诉她，我们跟一位女士谈论过这个问题，这位女士是这方面的专家，并且给出了一些建议。伊莎贝尔说她也想像迪尔德丽那

样睡觉。她非常好奇。”丽塔回忆说，伊莎贝尔非常清楚自己的问题，也完全做好了改变的准备，比她父母预料的还好。

向孩子清楚地解释你的家庭将要进行的改变，能够让孩子知道他的目标是什么。告诉孩子一种更早或者更有规律的睡觉时间，或者一个全新的睡前仪式。“爸爸再也不准备和你一起躺下了，但是爸爸会留下来陪着你，直到你睡着。”或者“如果晚上你跑到我们的床上来，我们会说我爱你，给你一个大大的拥抱，然后把你放回你自己的床上，你可以抱着你的泰迪熊一起睡。”可以稍微改动一下这些说辞以适应不同的睡眠问题，但你不必告诉孩子更多细节。可以拿出一张能贴贴纸的表格来，清晰地列出你对孩子的期望。

马西这么描述她三岁大的女儿：“阿瑞拉是一个真正容易程序化的小家伙，所以我总是要为她准备各种变化。如果我某个晚上做了某件事，她就会在第二天晚上也期待我这么做。她会说‘为什么你不把手放在我腿上了？昨天晚上你就是这么做的。’我整天都要为她进行各种变化，让她知道未来可能会有什么变化。我会说‘今晚我们打算这么做，但明天就不这么做了。’如果我没有告诉她，她就会问起明天的打算。”

可贴贴纸的时间表

孩子们喜欢贴纸、印章和小星星，在这个年龄段，这些东西非常有用。作为一种特殊的刺激，你可以让孩子选择他自己喜欢的贴纸。孩子们可以得到刷牙的贴纸、上马桶的贴纸、吃蔬菜的贴纸、收拾玩具的贴纸、在教堂不吵着吃饼干的贴纸，等等。当然，他们还会有好好睡觉的贴纸。但是首先你要从制作一个可以贴贴纸的表格开始。以后你还可以把其他事情都引入到贴纸表格中来(或者混合使用，如果愿意的话，你可以把刷牙当作睡觉贴纸

中的一个项目)。我不建议让孩子们通过一些相对简单的事情,或者至少大人们很容易就能让他们去做到的事情得到贴纸,这样他们就缺少通过去做一些相对困难的事情来得到贴纸的动力了,比如去修改很多年一直不变的睡眠习惯等。而且我也不建议将修改睡眠习惯的行为与其他需要非常努力才能实现的事情,比如自己打扫卫生混为一谈。

你要用多大精力制作这个贴纸时间表要取决于孩子的年纪和性格。有些孩子,尤其是年纪比较小的孩子,非常喜欢在一张纸或者一件他们的 T 恤衫上贴星星或者贴纸,这样他们就可以穿着 T 恤衫或者拿着这张纸整天炫耀了。(记住在洗衣服之前要把那些贴纸拿下来!)稍后你也可以再做一个比较复杂的表格,让孩子可以把它当作房间的装饰。

如果你愿意,可以每周做一页纸的表格,好让孩子能看到自己过去的成绩记录,也许还能在每个礼拜结束的时候给他一点特殊的奖励。比如,阿瑞拉就会得到各种贴纸,但其中最耀眼的金色贴纸则是当她整个礼拜都表现很好的时候才能得到的。要做一张一周的表格,你要先把纸水平放置,将本周的日期放在最上面一样,各种孩子应该做到的内容则放在左侧一列,或者在纸较短的一边成列。你甚至还可以多留一点空间,供自己进行简单的记录:孩子几点上床睡觉,睡了多久,等等。

安睡女士小提示

我喜欢称这种表格为睡眠礼仪表,而不是睡眠规则表。规则意味着判断,乃至于可能存在惩罚。礼仪则意味着你期待孩子每天应该做到的行为。这也暗示着我们应该在一天中的任何时间都要注意礼仪,而不只是为了得到贴纸。

选择三到四种你最希望孩子做到的事情。需要的话你还可以随着时间进行变化，但不要过于频繁，否则会让孩子对你的目标感到困惑。用正面词语来表达这些内容——“应该”而不是“不准”。以下是一些示例：

- “安静地躺在床上。”（这表示不能喊叫；轻声自言自语或者跟毛绒玩具小声说话都是可以的。）
- “自己睡觉”或者“自己睡觉，不用爸爸妈妈陪你躺着。”
- “晚上醒来后再安静地自己睡觉”或者“晚上醒来后再安静地自己睡觉，没有大声叫喊。”
- “在床上安静地睡到或者躺到早上 6 点。”（或者你实际上选择的任何时间）或者“安静地待在床上直到起床灯（起床音乐）亮（响）起来。”
- “半夜不叫爸爸妈妈自己就能再睡着。”
- “日间小睡或者休息时间态度配合。”

一开始可以包含一些相对简单的晚上睡觉规矩，好让孩子总能得到一些正面的表扬。比如，一种说法是“晚上睡觉的时候态度配合”也可以说“主动穿上睡衣，不用妈妈在房间里追着跑！”这就是一种足以表达你意思的说法了。这能帮助孩子感觉他能够做到新规则的预期目标，而不至于对他来说过于困难。

当孩子对简单的要求开始感到满意后，你可以提高标准。对孩子说他做得非常好，可以得到贴纸，所以现在他应该关注新的睡觉礼仪了。让孩子对新的表格产生兴趣——如果有用的话，可以给孩子很多张贴纸当作他前一张表格“毕业”的奖励；或者带着孩子去商店，选择他想要在下一个任务中赢得的贴纸花样。（你可以从网上买贴纸或者邮购贴纸，也可以到本地小商品店购买。）

希拉里赢得她的贴纸奖励时会非常高兴和自豪，但在改善不良睡眠习惯的进程刚刚有一个好开始之后，她的进步就停滞了；

甚至还稍微退步了一些。她的妈妈霍普改变了表格。霍普用“晚上睡觉的时候不大声叫妈妈并且能跟爸爸更配合”来替代原先较为简单的“自己刷牙并穿上睡衣”。希拉里很不高兴，她当晚就大叫了45分钟妈妈(霍普自己数出来的次数)。最后，希拉里还是要了一本书，而不是要妈妈，霍普给她书之后，她还是最终睡着了。

每晚睡前都要给表格一些态度端正的关注，哪怕孩子表现出很不耐烦的样子。你也可以在白天多提及表格的事情，强调孩子的成功，并缓和地提醒他你的期望，但不要谈论他失败的内容。但晚上重温一遍表格是必要的。到了早上，要迅速地给出你的奖励，不仅仅是贴纸本身，还有表扬与拥抱，这些对于孩子比来说那些珍贵的贴纸意义更加重大。如果孩子失败了也尽量不要让他感觉糟糕，可以告诉他今天晚上还有机会努力，你知道他能做到。提醒孩子他曾经自豪的其他一些成绩，无论与睡眠有没有关系。如果孩子确实表现得非常好，你可以给她一张特别的贴纸贴在外套上或者他的手上，让他可以向祖母、保姆、幼儿园老师甚至银行职员炫耀。

奖励

有些父母会向孩子许诺，只要他攒够了一定数量的贴纸，就会给孩子一个奖励，一件礼物或者一次远足。这其实并没有必要——贴纸、奖励、拥抱、成就感已经足够让孩子自我奖励了。如果你确实想要给他一种特殊的奖励，或者如果已经用过很多次贴纸表格，需要一些特殊的刺激，那倒是可以再给孩子一些诱惑，但要从小规模的，现实的东西做起。如果你一开始就答应带孩子去迪士尼乐园，那以后要怎么办？从小奖励开始，你可以在孩子退步的时候有所保留，但你真的会因为孩子在某些晚上醒来后爬到

你床上就取消迪士尼乐园之旅么？你最好只答应带他去动物园！

一些比较少见的孩子，尤其是当他们稍微长大一些之后，可能需要体罚才能获得更多动力——尽管我并不喜欢惩罚，但也许我们还是需要讨论一下用“薄惩”来代替体罚的问题。孩子们还需要一些特别待遇来帮助他们改变睡眠行为。也许是很小的事情，比方说假如孩子在早上6点之前叫醒你的话，就不许他帮你去打开厨房的灯；或者可能不算很小的事情，比方说如果他仍然会在午夜醒来的话，就没收他喜欢的节目录像、取消用电脑的时间或者不许在上午看电视等。我一般会把这种方法当作最后万不得已的手段，而且通常只针对较大一点儿的孩子，我也不会常常使用这些方法。我从不会只对孩子薄惩而不安抚他。当我取消孩子的特权时，还会对他做对的事情给予一些赞扬和正面的评价。

在凯里两岁半时，萝瑞尔不再和他同睡并改善了他的睡眠习惯，但几个月后他又开始反复从床上跳下来。萝瑞尔尝试了各种解决方法，但她并不是一个能够很好限制孩子的管理者，孩子也很清楚这一点。我们尝试着在白天时就很多事情给凯里多种选择——但也让他知道，在晚上睡觉的时候或者日间小睡的时候他没有制定规矩的权利。萝瑞尔最后终于在孩子不配合的时候没收了他的一件玩具。我的建议是，萝瑞尔可以限制孩子的行动或者取消孩子的某项特权，比如不许他看喜欢的DVD节目或者电视节目，而不是没收玩具。我还建议她在晚上关灯之前简单地和凯里谈谈破坏规矩的结果——但不要在他没有礼貌或者从床上下来时把这种谈话变成威胁、责备甚至于争辩。

考虑把全家远足和一些活动当作奖励，而不是玩具或者游戏。告诉你的孩子，如果他获得了足够的睡眠表格上的贴纸，就可以选择是在周日上午出去烧烤还是周六晚上去吃比萨饼。你

可以自由选择类似的奖励，告诉孩子，爸爸会带他去儿童乐园进行一次特殊的旅行，或者一天可以玩两次雪橇，等等。（不要在夏天许诺让孩子坐雪橇；你应该在孩子做出正确行为之后尽快用奖励增强和巩固这个结果。）你可以说妈妈会在下午给他讲三个特殊的故事，或者和他一起看两个特别的节目。当你家里已经有足够多没用的塑料玩具了，和你共处对于孩子来说比任何能在商店买到的玩具都珍贵。

建立时间表

为这个年龄段的孩子建立时间表无需再像为小孩子们做的那样费尽心思，困难重重，这个时间表可能大部分都会被他上幼儿园的时间改变。一般，你应该让孩子在早上 6 点到 7 点半之间醒来。六点比较常见，如果孩子非常疲倦一直睡到七点，这也是完全可以接受的。稍后我将会针对那些坚持在 6 点之前起床的孩子提出一些建议。

一般上幼儿园的孩子上午需要加一次餐，然后大约在正午或者 12 点半左右吃午餐。如果他们仍然还在日间小睡，常见的时间是从下午 1 点睡到下午 3 点。当他们不需要再进行日间小睡时，通常也就是四岁的时候，他们应该在下午三点左右度过一段平静的时间。

由于日间小睡时间减少，晚上睡觉会变得更加容易。如果你三岁的孩子以前都在晚上 8 点半睡觉，那么当他取消了下午的小睡之后，很可能需要在晚上 7 点半左右就准备睡觉了。到了五岁，你可能希望孩子从晚上 8 点一直睡到早上 7 点。当然，你要略作调节，这由家庭的作息时间和孩子上学的时间来决定，但目标是要让孩子每晚至少连续睡 11 个小时。

当你看到孩子的睡眠时机出现后，就要让他准备睡觉。这个年龄段的睡眠表现包括打哈欠、揉眼睛，吮吸大拇指或者安慰奶嘴，或者闹闹小脾气等。如果孩子在地板上睡着了，你很可能没有发现他的睡眠时机！要注意，学龄前的孩子很善于隐藏他们的睡眠时机，所以你必须注意时间。如果你错过了孩子的睡眠时机，让他的皮质醇大量分泌导致再度兴奋的话，那么次日晚上就要让他提前半个小时或者更多时间上床睡觉。这样可以避免孩子因为睡眠不足而导致睡不着的恶性循环。同样，如果孩子在进行睡前仪式中打瞌睡或者在你讲完故事刚一关灯就马上睡着的话，你让他上床睡觉的时间很可能就太晚了。将睡觉时间向前挪 15～30 分钟试试看。

这个年龄段的孩子本身已经开始注意到睡眠时机的概念了。偶尔他们也会说“妈妈，我们应该睡觉了”或者“床床”，也可能干脆就自己爬到床上去。但这并不常见，哪怕再大一点儿的孩子也很少如此。

更有些聪明的孩子可能会注意到睡眠时机的概念，然后试图以此蒙混过关。在伊连三岁的某个晚上，他像平常一样乖巧地上床睡觉，乔安娜在让他们的二儿子扎克上床睡觉之前，与丈夫一起度过了一段少见的平静的时光。她在起居室的沙发上躺下没多久，就看到一个穿着蓝色棒球图案睡衣的金发小家伙正用差不多有一百英里的时速冲进起居室，大声叫道：“我错过我的睡眠时机了，妈妈！”

睡前仪式

对于这个年龄段的孩子来说，睡前仪式是一天中最具代表性的挑战。现在你的孩子又大了一些，你应该试着修改一下他的睡前仪式，但要确保新的仪式仍旧具有安抚性和规律性。睡前的准

备工作应该在孩子的房间里进行(或者初期可以在小一点的弟妹房间里进行),而不能在家里四处游荡。包括讲故事、唱儿歌、安抚而无刺激性的游戏等。确保对于讲几个故事、念多长时间的书都有特别清楚明白、没有谈判余地的规定。避免疯狂、动静很大的游戏和恐怖故事。

留出至少半小时足够的时间,让孩子放松,让他将注意力从你身上转移到睡觉上去。如果你过于匆忙,孩子可能更容易跳下床或者耍赖拖延,甚至巧妙地吸引你在他房间里待更长时间。如果孩子想和你在一起待更长时间,让你讲更多故事或者唱更多儿歌时,就要用时钟当作借口。告诉孩子,时钟要求你必须在 8 点停止读书,所以你们还剩下十分钟。如果夫妻两人轮流参与孩子的睡前仪式,那么可以不用按照完全一致的内容进行,但大致上应该是相似的仪式、方式,并且要对孩子睡前的表现、恐惧和应对手段采用同样的态度。

"在我们开始进行孩子的睡前仪式之前,通常就会到他的房间里玩半小时游戏,但这其实也并不是必需的。"阿曼达说,在儿子韦斯快四岁时,通过淋巴手术治愈了睡眠窒息的症状之后,她开始改造孩子的睡眠问题,这段案例你可以在第 15 章"医学问题"中读到更多内容。"他会回到自己的房间玩耍,然后我们进去陪他玩 10～15 分钟。我们读书、做祷告,并且安静地聊一聊当天发生的事情。这就是他想要的。"

阿瑞拉是一个出色的谈判家,她总是试图说服马西多讲一个故事。对于马西和道尔来说这则是一种窘境,因为他们知道自己应该坚持,但有时候如果他们不同意的话,阿瑞拉就会更加激动和兴奋,结果令上床睡觉变得更加困难。"这会刺激她,让她更清醒。"她的妈妈说。

最近马西开始试着按照我的建议把问题推到时钟上。"我开

始让阿瑞拉看时间，一开始我觉得这可能会让她更紧张，压力更大，但我错了。这真是个好主意。我可以让她看时间，然后告诉她‘你得快点儿，不然读书的时间就要过去了。’”当阿瑞拉大部分睡眠问题都得到解决，她也可以整夜安睡之后，这种拖延的情况却没有完全改善，当然也没有完全失控。承诺一个时间点则是解决这个问题的另外一种有效方法。

在关灯前的一两分钟提醒孩子是个好主意：“等我们念完这几页书，妈妈就要关灯了。”有时候他们喜欢自己关上灯。这是他们可以自己“掌控”睡觉时间的另一种方式。你可以试着把睡前时间推到时钟上。“哦，看！时钟已经 8 点了。关灯时间到了。今天晚上我们不能再读书了。我们明天晚上可以早点上床，那样就可以读更多页了。”

如果你的孩子对于数字反应并不强烈，那可以试用一款收音机闹钟或者计时器。“哦，音乐响了”或者“哦，闹铃响了，现在该睡觉了。”如果闹钟法没有作用的话，那你也可以用我来当借口，没问题！“现在 8 点了。安睡女士说我们现在得关灯了。”

有些孩子会说“我做不到；我没法自己睡着。”告诉他每个人可能都会有睡不着的时候，哪怕妈妈和爸爸也一样，还要告诉他们一些简单的放松技巧，并将之创造性地加以形象化。孩子们通常都会有相当出色而活跃的想像力，他们实际上比我们更善于形象化思考。他们可能不理解“形象化”这个词，但他们肯定知道什么叫作假装和想像。他们会学会在睡前想一些轻松的事情，学会怎么闭上眼睛，假装自己在沙滩上玩耍、堆雪人，和他们远在其他省份的表兄弟们一起在夏天散步，等等。

你可以试着让孩子想像他们最喜欢的图书中的场景，让他们想像自己进到了书里和那些主角们一起玩耍（当然不能是恐怖故事书）。我自己的女儿就非常喜欢在《芭蕾小精灵》（*Angelina*

Ballerina)这本书的想像空间里玩耍。故事书上画的小巧的房子看起来那么诱人而温馨。你的孩子会作出自己的想像,他们的创造力很有可能让你大吃一惊。有一位家长向她的女儿讲了我女儿的芭蕾小精灵游戏。他们也作出了尝试,结果那个小姑娘选择了一本自己喜欢的图书,"进入"到自己的想像空间中。她甚至让她的妈妈打电话给我,向我们推荐她喜欢的这本书。

你还可以教孩子更高级的放松技巧,就是那种在你结束一次愉快的健身课或者准备开始锻炼之前的放松方法!让孩子先放松她的脚趾,接着是脚掌、脚踝、小腿、膝盖,等等,依次放松整个身体。如果你不想亲自做,也可以为孩子播放一张放松的 CD(详见我在本书最后给出的推荐列表或者试试安睡女士的 CD《甜蜜的梦境》(*The Sweetest Dreams*),CD 中是整套放松练习,你可以在 www. sleeplady. com 观看演示)。

孩子们还喜欢利用他们的想像力制作做梦的计划。"今晚我准备做一个打篮球的梦。"或者"今晚我准备做一个在沙滩上堆沙堡的梦。""今晚我准备做一个成为漂亮的芭蕾舞演员的梦。"这有助于让孩子们认为自己对睡着之后可能发生的事情更有把握,尤其是如果他们担心做噩梦时更有效。我的"梦境卡"(同样可以在我的网站上找到)也能帮助孩子对自己的梦境更有把握。卡片能引导孩子们进行高级的放松联系,并提供几个可以利用的场景供孩子们作为梦境的参考,比如树屋、沙滩、花园和彩虹等。我是以自己女儿做梦的经验为基础创造出这种方法的。

安睡女士渐进法

我的安睡女士渐进法对于这个年龄段的孩子而言仍旧是一种有用的工具。但我要警告你,一个睡在普通床上的三四岁的孩

子可不会像睡在婴儿床里的六个月的孩子那样容易接受渐进法。渐进法是缓和而且循序渐进的，但大一点儿的孩子会变得不安并且对抗这种变化。不要生气，但也不要放弃。不断地提醒孩子，他不需要妈妈躺下来陪伴就能够学会在漂亮的“大小伙子”专用床上自己睡着。

渐进法自始至终都在努力减少孩子的泪水，但我不能保证能完全让孩子不哭泣。幸运的是，到我们的孩子三四岁时，大部分都不会再担心哭泣会伤害孩子了。现在我们不可避免地要听到孩子的哭泣，我发现这时孩子的哭泣更容易处理，因为他们已经可以用语言来表达自己的需求和忧虑了。为了减少孩子的泪水，你要给他足够的安慰、爱和表扬。除了每天晚上睡觉之前回顾睡觉的规则和你的期望之外，你还可以在白天给孩子一些赞美。不要强调他在睡眠方面的失败，而是要表扬他的进步。（这些建议主要面对那些睡在普通床上的孩子。如果你的孩子仍然睡在婴儿床里，可以按照前一章中渐进法部分的建议去做，但可以把每一步都向孩子略作解释，这有助于稍微大一点儿的，理解力更强的孩子接受渐进法。）

如果你的孩子在半夜醒来，或者可能会醒来，你可以迅速上前轻拍或者安抚他，然后回到当晚你应处的位置上去，直到孩子再度睡着。我们希望你能在孩子每次醒来都作出回应。稍后我会在本章给出一些小提示，告诉你如何处理特殊的睡觉时间和孩子在午夜醒来后的睡眠支撑。

每三天挪一次位置，哪怕孩子这晚睡得并不好，频繁地醒来或者更加抗拒也不要停止。每次当你挪得离他的床更远一些的时候，都要预料到可能会有一些退步或者抗拒，但坚持住。尤其是对于这个年龄段的孩子来说，不要放弃或者给孩子一种混杂不清的信息是最基本的要求。如果孩子在渐进法期间生病了，你可

以给他额外的拥抱和亲吻，然后维持渐进法此时的原位或者“停滞不动”，如果有必要也可以坐得离孩子近一些。当孩子开始好转时，继续进行渐进法，不要将这个过程拖得时间太久。

在你与这个年龄段的孩子一起进行安睡女士渐进法时，记住你最大的挑战很可能是他们会从床上跳下来，试图爬到你的膝头或者拥抱你、赖在你身边。为了让渐进法更成功也更轻松，要记住：

- 当孩子们知道你的期望后会做得更好，所以要仔细地向他们作出解释。
- 每天早上都温习一遍睡眠要求和你对孩子的期望，当你每次按照渐进法移动位置时都要再次向孩子作出解释。
- 孩子们对于正面强化的反应会很好，所以给他们足够的表扬和鼓励。
- 如果你的孩子在午夜醒来，可以上前迅速安慰他，然后再回到当晚渐进法你应处的位置上去。
- 孩子们会考验你，特别是如果你过去态度不是那么坚硬的话。
- 孩子们可能仍旧喜欢用贴纸的表格作为良好睡眠表现的奖励，当然也可能不喜欢了。

在小学期间，有些孩子可能会喜欢越来越精致的贴纸表格，有些则会因为年龄变大而不再喜欢。他们尤其不喜欢那种用于鼓励他们去做某种自己不喜欢行为的表格——比如自己睡觉！

第 1～3 晚。只要洗澡、讲故事和唱儿歌结束，就要坐在靠近孩子床边的椅子上。如果孩子哭闹，可以时不时地抚摸或者轻拍他，但不要太频繁，不然他会找到一种新的负关联，以后都需要你频繁地轻拍他才能入睡。在第一个晚上你抚摸孩子的频率可以稍微大些，因为对他来说这是一种全新的系统，但是要注意给孩

子营造一种全新的改动很大的睡眠习惯，这你可以从第二个晚上开始实施。这个年龄段的孩子基本上会努力吸引你的注意力。尽量闭上双眼，不仅可以明确地传达出一种睡觉的信息，而且还能比较轻松地拒绝孩子想要和你聊天或者讨论关于宇宙本质之类的平静的哲学话题。待在远处直到孩子睡着。

有些孩子在第一个晚上会因为你不躺在他身边陪着他而变得非常不安。有些父母在无计可施之后可能会把自己的头放在孩子的枕头上，紧紧挨着孩子。尽量不要这么做，如果你只能如此，也要限制在第一个晚上，不然你就会制造出新的负关联。假如你还在与孩子分享同一个枕头，就不可能改变孩子的习惯，或者教他学会新的技能！注意抚摸、轻拍、唱儿歌或者拉着孩子的手都要断断续续地进行，不可以过于频繁，至少在第一个晚上之后就不可以了。否则你也不过就是用一种新的睡眠支撑代替了另外一种。应该由你，而不是孩子，来控制肢体接触的频率。例如，假如孩子握着你的手，你要温柔地把手抽出来，但可以时不时轻轻碰一下他的手。闭上眼睛，对着孩子发出“吁吁”的声音。记住，超过三个晚上你就不应该再坐在他身边，也不能经常触碰他了。你应该从他的睡眠场景中退出，而不是在每次发生改变的时候都增加他的恼怒。

第 4～6 晚。告诉孩子睡眠是多好的一件事，他是个睡得香香的好孩子，以及你为他感到骄傲。向孩子解释你下一步打算移动的位置。告诉他你准备给他一个大大的拥抱，然后把你的椅子移到靠近他房门的地方。告诉孩子你能看到他，他也能看到你。向他保证你会待在房间里直到他睡着，但一旦你关上灯，就不能再和他讲话了。

当你坐在靠近房门的椅子上时，尽量保持安静，但偶尔发出安抚性的“吁吁”声是可以的。待在椅子上，不到必要的时候不要

上前轻拍或者抚摸他。如果孩子感到不安，需要一些帮助才能平静下来的话，你可以走到他身边安抚他，给他一个深深的拥抱。告诉孩子你不会留下他一个人，你会看着他睡着。不要让孩子在你的臂弯或者膝头上睡着，不要躺到他身边。可以不断地告诉他，他的表现非常好，你为他感到自豪，然后回到你的椅子上去。

如果孩子不断地跳下床去找你，或者试着爬上你的膝头，以此来抵制渐进法，给他一个大大的拥抱之后把他放回床上去。如果他又起来，再次把他带回去。不要讲话，不要讲道理，不要解释，不要和他互动。只要安静地把他放回床上即可。

一般孩子累了之后就会待在床上，尤其是如果他们开始相信你会待在房间里直到他们睡着为止。但如果孩子不停地跳下床，你可以站起来详细地向他解释，如果他还这样做，你就只好留下他一个人在房间里了。你可以说一些诸如“假如你不按照睡眠的规则安静地在床上躺下的话，那我就把你一个人留在房间。”之类的话。提醒孩子如果他乖乖呆在床上，按照睡觉的规则去做，你就会按照他的希望留在房间里看着他睡着，然后在你睡觉之前还会再来看他。大部分孩子接下来就会待在床上了。如果你的孩子完全不是这样，你还有两个选择：

- 你可以在门口处安装儿童门，坐在儿童门的另外一侧直到孩子睡着。告诉他如果他自己上床躺好，你就会进到房间里帮他盖被子。如果他在门口附近的地板上睡着了，在他睡熟之后把他移到床上去。
- 这个选择稍微有点儿难，它只是父母们的一个选择，而不是必须。如果你选择了这一种方法，站起身来（孩子就不能爬到你膝头上了）警告孩子如果他不乖乖地上床躺下，你就不再坐在他房间里，你可以短暂地离开房间并关上房门。告诉孩子还有一次机会自己上床，等你数到三如果他

还没有上床，你就会真的离开房间关上房门。数到三，如果孩子没有回到床上，你必须按照你说的做。离开房间，关上房门。站在门外数到十。然后打开门平静地说："回到床上我就会进来坐下。"一般孩子会立刻冲上床；他们想要你坐在自己身边。

有些学龄前的孩子（尤其是如果他们特别敏感或者坚定的话）会考验你看你是否会履行你说出的威胁性质的话，尤其是如果你以前没有按照你说的话做的时候。如果孩子没有回到床上，你就再次数到三然后关上门。不要叫嚷，安静而坚定但不要恼怒或者焦躁。如果关上门会让孩子感到过度不安，变得歇斯底里的话，可以站在门口。

第 7～9 晚。不断地赞扬、正面加强，清楚地解释孩子可以预料到的事件以及你对孩子的期望。要一直表扬他，展望他将来会变成一个睡觉多么好的孩子。坐在走廊上看着孩子。你可以在走廊上发出"吁吁"的声音，不要太频繁，但要足够让孩子知道你在关心他。有些孩子对此很难接受，会不断地跑到走廊上找父母，并请求父母回到自己房间里面。告诉他如果他自己主动回到床上，你就会进去帮他盖被子。如果这种情况反复出现，你可能限制一下给孩子盖被子的次数。如果情况发展得有些过分，考虑一下上面的两种方法，安装儿童门或者试试关门数到十的策略。

第 10～12 晚。继续采取同样的策略——表扬、正面强化以及对下一步做法的解释。现在你应该坐在走廊上，而且离开孩子的视野了。让孩子的房间门开一条缝或者打开几英寸宽。告诉他你就在附近，时不时用你的声音证明你的存在，以此安抚孩子。如果孩子从床上下来，可以采用你前几个晚上用过的方法来处理。

第 13 晚。很多孩子在两周（大一点儿的孩子用的时间要更

长)结束时已经开始自己入睡并整晚安睡了——个别孩子可能进度更快。但大部分家长还得多做最后一步,以五分钟为间隔,留下孩子独处。告诉他你会不断地过来看他,直到他睡着。当你检查孩子的状况时,只要站在房间门口即可;不要走进房间,否则孩子可能更容易再度重新兴奋起来或者不断地试图留住你。

孩子们可能不会真正明白"五分钟"到底意味着什么,对于他们躺在床上的时候这可能是很长的一段时间。如果你向他解释清楚你可能会在哪里,打算做什么,也许更有帮助。有些家长会在客厅里孩子看不到的地方坐几个晚上。还有一些则会用我命名为"做完……就来"的方法。告诉孩子等几分钟你刷完牙、换完睡衣或者其他一些简单但是可以理解的事情之后就来看他,这有助于他明白你会很快回来。如果你要做的"工作"也是你上床睡觉前必需的事项的话,有时候孩子会很喜欢你这么说。一定要如你承诺的那样经常回去看他。

留下孩子独自一个人对你来说可能是一种比较强烈的改变,但要记住孩子已经做了两个礼拜的准备。他已经放弃了一些负关联,并建立起了一些睡眠的独立性。他已经足够大,知道就算看不到你,你也会在他附近。不要离开太远,在开始的几个晚上你可以待在同一层楼、隔壁房间里读书看报。慢慢地你就可以离得稍微远一些。如果孩子哭泣,你可以每五分钟一次过来安抚他。尽量不要小于五分钟的频率,否则孩子可能会因为要每两分钟跟你说一次再见而受到更多刺激,从而更加不安。

有别于任其哭泣法,你安抚孩子的间隔不必长于五分钟。除非你感觉五分钟对于你的孩子而言显得过短,如果让他每五分钟看见一次,却又马上要再分开,从而令他更焦虑的话,那就可以稍做调整。你可以多实验几次,看每十分钟或者十五分钟来检查他一次,是不是会减少对他的干扰。父母们通常都会拒绝这个建

议;他们担心离开会伤害孩子,也不能轻易相信某些特别的孩子确实需要稍微长一点的时间,好自我安抚,再度入睡。

起初几个晚上孩子可能会哭一段时间——他甚至可能在头一两晚哭很长时间。但很少有孩子会在整个渐进法的过程中没完没了地哭。如果他确实一直哭,在房间门口检查他的状况。提醒他抱着自己的心爱之物。你要为他打气,但态度要安静。一定要记住,因为你在附近而且会作出响应,所以孩子已经开始树立信心了。他已经准备好学习睡觉了。

如果你已经用了儿童门,或者会短暂地关上孩子的房门,如果这让你感到很棘手,你可以归咎于我。“安睡女士告诉我们,你在晚上总是醒过来,从你的床上下来,你完全忘记了应有的睡眠礼仪。她让我安上儿童门,这样当你在夜里醒了并且走到门口的时候,它能帮你想起应有的睡眠礼仪,提醒你待在自己的床上。”一个学龄前的儿童可能不会马上就理解你的话,但对于这个年龄段的孩子来说,不断重复才是关键。坚持下去(而且可以一直归咎于我)。你还可以考虑其他的一些刺激——可以暂时取消孩子的某种特权(如果这是你的教育方式的话)然后只要他按照睡眠规矩行事就可以恢复他的特权。或者一旦他用了一周左右获得进步,可以考虑给他一些奖励,特殊的贴纸、特别的活动或者和你相处的时间,等等。(我更倾向于建议你亲自给他一些奖励,而不是从商店买物质奖励或者垃圾食品。)

你还可以尝试对儿童门进行处理,不要让它成为威胁。这并不可怕,我认识的一位妈妈用彩色的丝带装饰了儿童门,结果她的小女儿很喜欢在晚上睡觉的时候关上儿童门。我也遇见过一个小男孩,很喜欢自己的儿童门。他把儿童门当作是自己领地的入口,就像他在电视上看到的动画片《小精灵》里面的大门一样。

直到两岁之前,克里夫的睡眠都相当好,但两岁时他遇到了

一系列的变化，包括多了一个小妹妹、开始上托儿所等，都干扰了他的睡眠。家里房屋的重建则成为导致他睡眠彻底混乱的最后一击。克里夫全家人都暂时住在他的祖母家，妈妈海利和婴儿珍妮丝睡在楼上。克里夫和爸爸哈里一个睡在起居室里的简易床上，一个睡在沙发上。

当他们终于回到自己家里后，克里夫变得更粘人了。有时候他还会做噩梦。他的父母让他一直到晚上9点半才上床睡觉，那时候他已经过度疲劳但却异常亢奋了。好像永远都无法让克里夫睡着，哈里常常会在克里夫睡着之前自己先在儿子的床上睡着了。“海利会在11点半或者午夜时分过来看看，拍着我的肩膀说‘去我们自己卧室睡——孩子已经睡着了。’”哈里回忆说。

大约在克里夫三岁生日前的两个月，海利和哈里告诉克里夫“安睡女士”帮他们制定了新的睡觉规则。“我不喜欢这个安睡女士。”克里夫宣布。他们开始在晚上7点半到8点之间带克里夫上楼，开始洗澡和进行更有组织性的睡前仪式。他们曾经习惯互相拥抱，但现在他们把拥抱改到了睡前仪式开着灯的阶段进行。

当他们开始采取渐进法时，被哈里称为“活力十足的小孩”的克里夫并不高兴。他在前几个晚上表现不错，那时候哈里就在他的床边。克里夫试着把爸爸骗上自己的床，但当哈里拒绝的时候也勉强忍耐。可当父亲开始往远处挪动时，克里夫变得更加不开心了。“当我挪动椅子时，他会恳求我；而且显得很伤心，默默地哭泣。对我来说这比他大喊大叫还让我难受。”但因为他们已经改变了孩子的睡觉时间，改进了他们的睡前仪式，所以克里夫仍然会比平时提前一个小时开始感到困倦。

安睡女士渐进法与“大孩子”专属床的几个小秘诀

1.不要陷入一种强力对抗。对一个睡在普通床上而不是婴儿床的孩子来说，使用渐进法是一种挑战。如果孩子坐起来，无视他；如果他下床，轻拍床垫鼓励他自己躺回去。不要追着他跑，并把他放回床上。

2.你可以在孩子床边间歇性地抚摸、轻拍孩子或者为他按摩。但不要频繁地关注他直到他睡着，否则这将成为他新的睡眠支撑。当孩子开始睡着的时候就停止抚摸他。（有些孩子在入睡的时候不喜欢被触摸；家长只需按照他们的暗示行事。）

3.要由父母控制触碰的频率。不要让你的孩子抓着你的手指或者手入睡，因为当你拿走手指的时候他可能会醒来并且不断再次要求你这么做。轻拍或者抚摸孩子身体的不同部位。如果孩子不断地把自己搭到你身上，或者不停地试图触碰你，就把你的椅子挪开一些。但你还是可以倾斜身体触碰或者安慰孩子。

4.如果孩子变得歇斯底里，让他躺在床上，拥抱他，安抚他，但不要躺在他的床上。不要让孩子在你的怀抱中睡着。这个年龄出现歇斯底里的状况并不常见，哪怕是渐进法后期最难熬的那些夜晚，当你坐在走廊上却仍旧处于孩子的视野中时，孩子也不容易歇斯底里。

5.回到你渐进法应处的位置上，按照每次孩子在夜间醒来的处理原则行事。走到孩子床前给他一个吻，如果必要的话鼓励孩子自己躺好，再坐回椅子上。每次孩子醒来都要这么做，直到凌晨6点。然后用孩子习惯的起床灯光或者音乐叫醒他。

临近渐进法尾声时，哈里站在门口，然后离开，时不时过来检查一番，克里夫开始尖叫并跑出房间。哈里说感觉上克里夫似乎跑来跑去有几百万次，但实际上只不过三次而已。然后克里夫就乖乖地躺到了床上。几周之后，克里夫就不再抵触睡觉时间。他的爸爸每五分钟就会检查他一次，大约两周之后，哈里就注意到在克里夫马上就要睡着的时候如果再检查他的状况很可能会吵醒他，于是哈里改成15分钟来检查一次，如果克里夫表现不错，那么下一次就过20分钟再来，一般20分钟之后克里夫差不多就已经睡着了。

克里夫的夜间醒来问题在渐进法期间也减少了。如果他确实醒了，哈里就会迅速过来检查，确保他一切都好，然后提醒他抱着自己最喜欢的小毯子和毛绒玩具。哈里会告诉克里夫说："安睡女士说你得整晚安睡才行。"这并不会让克里夫喜欢我，但他确实听话了！很快，当克里夫在夜间醒来之后就只需要他爸爸快速地安抚性地看看他，然后就会翻身再度睡着了。

渐进法开始的第一个礼拜，克里夫每晚会醒来两三次。第二个礼拜，一共只醒来两次。第三个礼拜出现了一点点退步；他连续三晚安睡之后，其他晚上都会醒来一两次。就这样，除了生病之外他开始能连续睡一整夜。某些早上他会谈到自己晚上曾经短暂醒来过，但很骄傲能够自己再度睡着。他会说："我没有哭着找你，爸爸。"于是哈里就知道克里夫晚上醒过，抱着他的小毯子，再度睡着了。"我为此给了他很多表扬。"他爸爸说。

孩子们很容易程序化。每三天做一些改变，或者更短时间内。对孩子而言，拖延会让事情变得更难而不是更简单。如果超过三天，他就会期待你在原地待上更长时间，然后你再打算加长距离的时候，他就会更愤怒，更郁闷。

有些家长会在他们坐在走廊里距离孩子房间几英尺的地方

时决定停止渐进法。如果你觉得合适的话，可以试试看，只要孩子不会要求你整晚时不时回到走廊上，并且不到一小时就可以离开。有些家庭则会将五分钟的检查持续一周或者数月，如果这能让大家都感觉不错也可以。只要孩子能够整晚安睡，并很快就睡着；也不会把你的检查当作让自己保持清醒，好一直看到你的理由，那么这样也是成功的。但大部分父母还是直截了当地在他们完成睡前仪式，说过晚安之后就离开孩子的房间。

“即便到了现在，我都无法在韦斯睡着之前下楼。”阿曼达说，结束渐进法的几个月之后，韦斯开始睡得非常好了。“我会在同一层楼的其他地方待着，但做不到下楼去洗碗。幸运的是，楼上也有足够的家务要做。但韦斯喜欢我走到他房间门口检查他的状况；这能让他感到非常安慰。”

有时候哪怕是那些已经从渐进法“毕业”并且睡得很好的孩子也会出现少许退步。比如睡前仪式被干扰、生病或者经历正常的恐惧与不安的情感周期，等等。这时，不要再重新启用你在渐进法之前曾经用过的任何可能拖延或者复杂化睡前时间的方法。尤其要小心不能重新开始和孩子同睡。相反，你可以在孩子的门口安静地坐一两个晚上，让他能看到你。你可以出现在孩子面前安慰他，而不会破坏你已经取得的成果。然后你可以进行渐进法的最后一步。这样一切都会很顺利的。

问题与解决方法

很多睡眠专家都认为，一旦孩子学会了如何在睡觉的时间自己入睡，他们就会整晚安睡了。依我的个人经验来看，确实大部分都如此，但绝非全部孩子都是这样。我发现在开始渐进法之后的一到三周内，夜间醒来会变得十分短暂，也不再那么频繁，孩子

们不需要我们过多的帮助就能很快睡着。但夜间醒来的状况也不会完全消失，尤其是对于稍大点的孩子来说，他们的睡眠习惯可能日积月累了好几年。在这一部分中，我会帮你用一些特殊的方法处理半夜时分的睡眠支撑，这种问题可能会在晚上睡觉的情况得到改善之后仍然顽固地存在好几周时间（也许在你经历渐进法的过程中会更好地明白这一点）。

你的孩子可能仍然想要你在凌晨3点陪他躺着，哪怕他晚上9点的时候不再需要你这么做。他可能会希望在夜间醒来之后能够依偎着你，或者得到一个杯子、一个奶瓶等。他可能还希望看到你急匆匆地为他寻找掉到床下的安慰奶嘴。处于这种学龄前儿童常见的夜间恐惧和不安下的孩子可能醒来之后会说："嘿，妈妈，这只是个考验！我就是想确认你在那里，你应该在那里！"

我建议在孩子需要我们的时候及时作出反应。让他们独自在黑暗中哭叫不会帮他们获得良好的睡眠，我们也得不到好的睡眠。检查孩子的状况会让他感觉更好，也会让我们感觉更好。但我们决不能反应过度。（你要保证孩子在你冲进房间"援助"他之前就真正醒了。如果孩子在局部清醒的状态下呜咽或者哭泣，不要用父母们过度夸张的紧张对待他们，因为此时他也许正准备再度自行入睡呢。）我们希望给孩子足够的安慰，好让他们感觉安全，能够再度睡着，而不是过度反应，令他们没有放弃夜间醒来的理由。确保孩子上床睡觉的时间足够早，并且在白天也得到了他这个年龄应有的充分睡眠。过度疲劳的孩子更容易在夜间醒来。

当你的孩子在渐进法期间的夜间醒来，短暂地安抚性地轻拍他，然后回到当晚睡觉前你的位置上去。有时候在孩子结束渐进法并且睡得很好的阶段，有些事情可能会惊扰他们，那样你就要再面对几次孩子在夜间醒来的情况了。如果孩子下了床，安静地送他躺回去，坐在门口的椅子上或者站在门口。你应该从椅子开

始，一两个晚上之后再挪动到门口，类似于在渐进法过程中你逐渐从孩子午夜醒来后能看到的视野中淡出的过程。

记住不要吸引孩子的注意。要让他感到厌烦。不要把他带到你的床上去。不要躺到他的床上。不要抱起他在房间里走动。在这个特殊的时间，也不要批评、责骂或者对他说可能产生的后果、惩罚或者你的沮丧心情。实际上，除了几句轻柔的“天黑黑，睡觉觉”或者“我爱你，睡觉吧”之外，完全不要和孩子讲话。递上孩子的心爱之物，给他一个快速的拥抱和亲吻，但不要太长时间地拥抱、轻拍和依偎孩子，不然他就会每晚都醒来要求这种固定的拥抱了。在不会导致孩子歇斯底里的情况下尽快离开。

还有一些特殊情况：有些孩子，如果我们毫无反应，任由他们哭泣——不是几个小时而是几分钟的哭泣——他们会表现得更好。还有些孩子就会在你夜间走进他们房间的时候变得更清醒，容易受到更多刺激。我也曾经偶遇过一些夫妻，完全确定他们的孩子在没有父母帮助的情况下就无法再度入睡，但实际上情况恰恰相反，他们不在孩子的房间里时，孩子会睡得更好。但大部分父母都本能地知道他们何时应该让孩子独处，何时应该陪伴在孩子身边，或者至少待在他的房间门口。

铃铛和声音

可能孩子们偶尔会在夜里偷偷爬到你床上，但你可能得过好久才能发现。你可以在房门上挂一只塑料的厨具或者一个铃铛，然后关上门，这样孩子就得推开门才能进入你房间。厨具或者铃铛发出的声音就很可能会吵醒你。你可以提前警告孩子你打算这么做，让他听到那种声音响起来是什么样子的，这样在午夜的时候就不会吓着他了。

一位妈妈说，如果她两岁半大的孩子偷偷爬到她床上并不会

令她感到困扰——她甚至注意不到，因为大家都睡着了。但当她的女儿某天晚上偷偷地爬上一位临时来访的客人的床铺时，她就改变了主意。

儿童门与房门

有些父母会在卧室门上加装儿童安全门，一方面可以防止孩子在晚上睡觉的时候反复跳下床，另一方面也作为一种防止梦游的安全措施。有些孩子会把这种安全门当作边境；他们喜欢这种明显的界线。还有些孩子则会试图翻过儿童门、踢打儿童门或者研究如何打开儿童门上的锁。我还见过一些家庭甚至安装了两道安全门，似乎打算对付那种身手特别敏捷，善于攀爬的小家伙，或者是未来可能出现的“飞贼”。

有些孩子特别讨厌儿童门，哪怕他们的父母从不打算使用这种东西；他们会说：“如果你再从床上下来，我就安上儿童门。”这种方法确实有效。比起威胁来，他们也会使用引诱的方式说。父母们先安上儿童门然后又说：“只要你安静地躺到床上，待着不动，我就拆下这个儿童门。”或者“只要今晚你按照全部的睡觉规则做，我们就在明晚拆了这个门。”

一旦父母们进行到渐进法中走廊的这一阶段，就可以选择或坐或躺在安全门的另外一边作为一个过渡的步骤。这能让你告诉孩子，爸爸或者妈妈就在附近，同时也能对孩子强调关灯之后他必须待在床上的信息。

在两年多的时间里，山姆的睡眠一直都非常好。他的妈妈诺拉是一位助产士，她发现马克·威斯布鲁斯博士的婴儿睡眠周期的理论非常有用，在山姆四个月大的时候她成功地使用了任期哭泣的方法。但在山姆两岁那年，发生了一系列变化：多次旅行、由于父亲工作的变动造成的分离，然后从华盛顿搬家到加利福尼

亚，此后还有更多次旅行。在这些旅途中，他的妈妈发现自己再度怀孕，于是，山姆有了一个“新家”，一个新的睡前仪式和一个“新的”小妹妹。他的睡眠状况开始恶化，尽管诺拉作为护士，非常了解新生儿的相关知识，但山姆的夜间睡眠问题令她相当为难，她也不认为留下山姆自己哭喊能够有什么帮助。

当我们开始渐进法的时候，山姆只有三岁。我们一直顺利地进行到把山姆独自留在房间里这一步。但到这个阶段，父母离开两秒钟之后他就会出现在他们面前。诺拉夫妻试着与山姆讲道理，结果讲道理根本没有用。所以他们采取了“两次机会法”。第一次山姆走出房间时，他们会说“第一次机会”，然后把山姆带回自己的房间。当山姆第二次走出房间时，他们则会说“第二次机会”，然后安上两扇儿童门，一扇叠在另外一扇上面，虽然山姆非常善于攀爬，但他还是不能翻过第二道栅栏门。“他能爬上第一扇门，但不敢翻过两道门。”诺拉说。山姆有时候会抱着他的枕头在门口睡着，他们稍后会把孩子放回床上。

山姆的睡眠得到了改善，但又一次去探访亲友的假期和他小妹妹的诞生再度干扰了他。到目前为止，他已经可以慢慢地翻过两道儿童门了。诺拉只好关上了房间的门。“我关上房门，他就会非常生气。我的丈夫很担心，我的儿子也很害怕。我会把门关上三十秒钟，你应该能发现我终于找到方法了。”接下来，只要诺拉威胁说要关上房门，山姆就会赶紧跳回到床上去了。

但就在莉齐诞生的几个礼拜之后，诺拉的直觉告诉她应该对山姆作出一些让步——但要为结束这种临时性的让步做好预备方案。莉齐和她的父母同睡，所以山姆也会到妈妈和爸爸的房间里去。但他不能睡在父母的床上；他在地板上有一个自己专属的睡觉的地方，那里放着他专属的毛毯、毛绒小猪和一些晚上喝的水。

当莉齐长到夜间只需要一次哺喂的时候，她也会离开父母的大床，诺拉会把两个孩子都放在山姆的房间里。诺拉知道山姆需要再度进行一些恢复睡眠的训练，但她认为最好还是马上就开始做准备工作，她没有把这种恢复性的训练想得过于困难，尤其是山姆的小妹妹还呆在他的房间里。“我让他睡在我们身边是因为这是临时的措施。现在就不会再有孩子在我们的房间里一直睡到天亮了。让不同的孩子遵守不同的规则相对更加简单。”诺拉说，然后补充道，“我认为他会喜欢和妹妹一起待在自己的房间里。他爱他的妹妹，很爱，非常爱；一旦妹妹在房间里，他就可以照顾自己了。”

取消夜间哺喂

如果你的孩子仍然用奶瓶喝奶，那么现在绝对需要取消了。向孩子解释说他已经长大了，不需要奶瓶了。他可能会自己发觉这个问题。在讲故事的时候可以给孩子一杯水，如果他哭闹着要奶瓶，安抚他，劝慰他，转移他的注意力，但不要给他奶瓶。实际上，你应该干脆将奶瓶扔出去，或者至少放在孩子看不到的地方（或者采用下面提到的一些取消奶瓶的策略）。当你准备取消奶瓶时，关键是要增强孩子与他的心爱之物之间的联系，或者让他选择一件新的心爱之物作为奖励。你还可以选择尝试使用我在上册第 9 章“13～18 个月”中针对较小的孩子提出的从奶瓶到杯子之间转换的建议。如果你打算继续母乳哺喂，尽量将哺喂与睡眠分隔开来。在开着灯的情况下哺喂孩子有利于削弱哺喂与睡眠之间的关联。

如果孩子已经开始从感情上接受杯子，并将之变成新的睡眠支撑的话，帮他学会在没有杯子的情况下自行入睡。当孩子在午夜醒来找他的杯子时，走到他身边，要么安静地指着你留在他床

边的杯子，鼓励他少喝几口就睡觉，要么试着安抚孩子，让他能够不用杯子就再度睡着。不要把杯子再倒满。这很可能要用几个晚上，你也很可能要面对一些泪水，但你可以坐在孩子身边，时不时地轻轻抚摸他，发出“吁吁”的声音，用他儿时熟悉的方式抚慰他。作为奖励，你可以给他一张特殊的贴纸来代替他的杯子！

取消抱着孩子踱步或者轻摇哄他入睡的方法

在这个年龄时，孩子们通常不需要父母像对婴儿那样轻摇，但有些孩子仍然喜欢在讲故事时或者讲完故事之后还坐在父母的膝头，被父母哄着入睡。用渐进法来打破这个习惯，就像对待那些要你躺在他们身边陪他们入睡的孩子一样。在孩子的睡前仪式中，当你讲故事或者唱儿歌的时候可以抱着他们轻摇或者踱步，但不要在关灯之后还这么做。如果他试图爬下床，爬上你的膝头，你要让他躺回床上并安抚他。如果孩子在夜间醒来，想要被你抱着轻摇或者踱步的话，你得回到渐进法应处的位置上去。

取消安慰奶嘴

如果你还没有准备好取消安慰奶嘴的话，对于这个年龄段的孩子来说则必须要把它的使用限制在睡觉时间。在白天，要把安慰奶嘴藏起来，至少放在孩子够不到的地方，除了日间小睡和晚上睡觉都不能给他。如果你学步期的孩子在夜间醒来一两次，叫你帮他找回他的安慰奶嘴，那就在他床边放几只备用的安慰奶嘴，或者在他能自己找到的地方留下一个小篮子或者小碗，里面放几只安慰奶嘴。如果他要你帮他拿，你就要温柔地提醒他安慰奶嘴放在什么地方，如果他学会自己去拿了，就要给他奖励。如果孩子完全没法自己找到，那么作为一种临时过渡的方法，你可以帮他找到安慰奶嘴，但要放到孩子手里，让他自己放进自己口

中。孩子再长大几个月后，可以再一次试着教他学会自己找到需要的安慰奶嘴。大部分孩子过了三岁之后都能学会。把这一项也加入到他的贴纸表格里去。

当你的孩子已经掌握了很成熟的表达技巧后，就该考虑完全取消安慰奶嘴了。告诉他这个决定；他已经长大了，不需要安慰奶嘴了。选择一个时机，在孩子相对放松而且精力充沛的时候，不能在他生病的时候开始，也不能在你们旅行的时候开始，孩子上幼儿园的第一个礼拜也不合适。你可以尽量把孩子的注意力转移到一件心爱之物上去，并且把这件心爱之物也包含到孩子的睡前仪式中去。

如果你还没有把安慰奶嘴的使用范围限制到日间小睡和晚上睡觉的时候，那么在你完全取消它之前要先进行这一步。你可能会遭到一点小小的抵抗，但转移孩子的注意力，如果他能够不用安慰奶嘴要表扬他。当孩子白天适应了不用安慰奶嘴之后，继续开始夜间的训练，但可以让孩子在日间小睡的时候多保留安慰奶嘴一段时间。挑选一个“大日子”让孩子完全抛弃安慰奶嘴。给他几天时间提前适应这个问题。孩子可能会同意——但随着大日子的接近，他也会因此感到不安。在当天将安慰奶嘴丢出家门；因为家里再也没有安慰奶嘴了，所以孩子再向你讨要安慰奶嘴你也拿不出来。如果你因为孩子的哭泣而让步，他就会知道你取消安慰奶嘴的决心并不大，下一次如果你再试图帮他放弃安慰奶嘴，他还会哭闹得更厉害。

安睡女士小提示

我很少遇到过睡前不需要父母抱着踱步或者轻摇就能入睡的孩子在午夜醒来时还会想要父母这么做的。如果你的孩子仍然会在夜间醒来，安抚他但不要让他再爬到你的膝头上。（你也应该尽量不要在给他讲故事的时候在他床上睡着，不然他就会期待你每个晚上都这么做了。）

一旦你处理掉了安慰奶嘴，要打起精神面对几次比较难熬的日间小睡和晚上睡觉。孩子很可能会哭泣。把他的心爱之物递给他，再给他一些额外的安抚。在关灯之前稍微长时间地拥抱一下孩子，或者坐在他床边直到他睡着。但这种做法不要超过一星期，不然你可能会被无限期地束缚在孩子床前。如果你已经在他床边坐了几天，那就应该采用简化版的安睡女士渐进法好再次离开他的房间。如果这是第二次（或者第三次！）你使用渐进法，那就把进度加快：每个位置只要一两天，或者直接从他的床边移到门口。用你的直觉和判断力作出决定，但尽量迅速完成这个过程。给孩子足够的夸奖，并且不断鼓励他抱着自己的心爱之物。

我曾经帮助过夏绿蒂的双胞胎宝宝伊桑和纳撒尼尔，那时候他们才几个月大，你可以在第 4 章“帮助双胞胎或兄弟姐妹睡觉”中读到他们的故事。但夏绿蒂和艾德那时候决定暂时不取消安慰奶嘴——这个决定让他们后来后悔不迭！经过了三年不断要捡起两套安慰奶嘴的时光之后，夏绿蒂终于打算在孩子们的三岁生日时扔掉这种东西。“他们还没有用枕头，但他们看到有小朋友把玩具放在枕头下面，就也想要枕头了。我说好的，你们可以用枕头，也可以把玩具放在枕头下面，但你们得先放弃安慰奶嘴。他们同意了我的要求——只有十分钟，然后就又想要回他们

的安慰奶嘴了。我说‘真抱歉，晚了。’事实就是那样。他们很不高兴。我们度过了难熬的夜晚，难熬的日间小睡，但我坚持了下来。双胞胎之一确实连续两个礼拜都哭得歇斯底里，然后他终于说‘好吧，没关系，我还是睡觉吧。’双胞胎中的另外一个也非常难过，一直僵持，几乎不肯再在日间小睡，但最后也还是接受了。”

安睡女士小提示

我听说过许多有创意的方法，来帮助孩子放弃安慰奶嘴，比如把安慰奶嘴寄给刚出生的小孩，或者把它留在烟囱里，好让圣诞老人拿去送给驯鹿，等等。有些孩子会把安慰奶嘴藏在盒子里，留着给他们自己未来的孩子，尽管对于大多数学龄前儿童来说这种说法相当抽象。我甚至听说过一个孩子把自己的安慰奶嘴送给了动物园里的一只山羊，尽管我确定这东西不可能让山羊感到非常高兴。

吮吸大拇指

如果你的孩子仍然在吮吸大拇指，我不认为他将来长大后能自己戒掉这个习惯。我甚至遇见过几个仍然在吮吸大拇指的中学生和青少年，甚至他们还带着矫正牙套。四岁或者五岁是戒除吮吸大拇指习惯的好时机，因为你的孩子现在的语言技能经过几个月的发展已经足够与你进行交流了。他还能够对自己的习惯产生一些自我认识。

我的女儿卡利就是一个坚定的吮吸大拇指爱好者，在她五岁上幼儿园的时候我决定帮她戒除这个习惯。她自从六个月大就开始吮吸大拇指，大拇指都因为吮吸生出了茧子！她有一个心爱之物，是一个她从孩提时就开始用的小枕头，但这个心爱之物并没有取代她吮吸大拇指的习惯，而是变成了一个同伴。当她抱着

自己的小枕头时，大拇指也一定放在她嘴里。

我取得了卡利的牙科医生的支持，鼓励她停止吮吸大拇指，因为她已经变成“大姑娘”，并且开始换牙了，我们希望她的牙齿整齐、结实而漂亮。你要用任何能够打动孩子并得到他支持的语言或者形象。她的父亲和我投入了很多感情，告诉她我们知道停止吮吸大拇指对她来说非常难，但如果她愿意尝试的话，我们会为她骄傲。我们还向其他人求助，包括卡利的祖母，来和卡利分享他们如何在孩提时停止吮吸大拇指的经验，以及他们为之体验到的自豪感。

然而，奖励和鼓励也许只能做到这种地步了。物质引诱可能会产生更大作用。我们问卡利，她想要什么东西作为奖励或者奖品。她一开始选择的是打耳洞，但我坚决要求在几年之后再提这个问题。我让她进行了第二次选择：在幼儿园毕业的时候可以豢养一只良种仓鼠。我并没有对此表示很激动，毕竟好在她要养的不是一条良种蛇。我们找到一张仓鼠的图片，钉在她房间的布告栏上，让她可以在自己的床上看到。我还告诉她很多关于仓鼠的知识，当然她每天上课的时候也能得到更多关于仓鼠的知识。我们还买了一本关于仓鼠的百科大全书，放在我们家的书房，我认为全家人都可以读一读。

我们开始着手戒除日间吮吸大拇指的习惯。孩子们通常在吮吸大拇指的时候并不特别清楚地意识到自己的行动，所以卡利同意让我温柔的把她的手从嘴里拿出来，用以提示。我注意到一些特点：当卡利感到沮丧、不安、过度刺激或者过度疲劳时更喜欢把大拇指放进嘴里。一旦我们成功地戒除了白天吮吸大拇指的习惯，就开始着手停止她在日间小睡时吮吸大拇指——卡利在五岁半时在白天还会时常需要小睡。（我通常会建议人们在戒除日间小睡吮吸大拇指的习惯之前，先完成戒除夜间吮吸大拇指的习

惯，但对于卡利来说我颠倒了这个次序，因为在这个年纪，她的日间小睡是比较分散的，不像夜间睡眠那样有规律而且必需。）当她在白天小睡时，稍后在她晚上睡觉时，我们会用绷带包扎她的每一根手指，而不仅仅是大拇指。卡利在这个阶段非常配合，甚至还自己建议说，如果我们只包扎她的大拇指，她担心自己可能会吮吸其他手指。

就像我预料的那样，第一个不吮吸大指的夜晚相当难熬。卡利一向都睡得很好，但我发现没有熟悉的大拇指和心爱的枕头这对组合，那个晚上对于卡利来说入睡就是一种煎熬。她抱着自己的小枕头，看书，和我聊她想梦到的东西。我告诉她我打算这个晚上时常来检查她的状况，也这么做了。我安慰她，告诉她一定能做到，告诉她她一定会很喜欢自己的小仓鼠。我作为她的妈妈，看着孩子晚上翻来覆去的样子也非常难受，但她最后还是睡着了。

我们用了好几个礼拜的绷带法，然后慢慢开始放开一些手指。卡利告诉我她晚上最喜欢吮吸哪根手指。我们接下来不再用绷带包扎手指，但直到我们晚上检查后发现卡利真的再也不吮吸任何一根手指之后，才把仓鼠买回家。卡利手指上的茧子消失了，指甲也整齐了，她甚至说她的大拇指吮吸起来再也没有那么美味了！（有人曾经告诉我，吮吸过的大拇指和没吮吸过的大拇指味道确实不一样，因为拇指上的皮肤和油脂部分可能产生了某种变化。但我承认，我确实不想再看到任何有关于这个问题的科学研究结果了。）我们最后庆祝了卡利的成功，把仓鼠带回了家。（哎，那只仓鼠死了，它之后的另外两只继任者也难逃同样的命运。）

尽管这个方法对于卡利来说奏效，但还是用了几个月。我们本来可以进行得更快，但我觉得那将会导致更多泪水，更多心理

创伤，而且失败的风险也更大。耐心些，有点创造性。让孩子也加入你的行列，尊重她的意见；可能她才更清楚怎么做有帮助。我没法想像出对一个小孩子这么做，或者对一个还不怎么会说话的孩子这么做会有怎样的结果。

早起的鸟儿

当孩子从婴儿床转移到普通床上之后早起就成为了一种更复杂的问题，因为他们可以不管你是否乐意都自动起床开始他们新的一天。改变孩子的早起是一种非常困难的行为，而且通常会耗费三到四周坚持同样的做法，如果孩子已经超过六个月时间早起了，那么这个过程还要更长。孩子们有时候起得过早是因为他们确实过度疲劳了。还记得我们曾经在第 2 章“入门指南与成功的小技巧”中提到过的睡眠影响睡眠的理论么？如果你能把晚上睡觉时间提前一个半小时或者更多的话，孩子可能会发现多睡一会儿也没有那么难。

每晚睡觉的时候都要提醒孩子，他至少要睡到凌晨 6 点。你可以用起床灯或者起床音乐来提醒他何时开始新的一天。你可以购买一只能播放 CD 音乐、iPod 的普通闹钟，也可以把定时器与孩子房间的灯连接在一起。这能告诉孩子他应该再度入睡，至少要乖乖待在床上，也能告诉孩子什么时候他可以起床开始新的一天了。把闹钟定在早上 6 点，如果孩子能一口气睡到 6 点，你可以渐渐地把时间向后拨。把所有的电子装置都放在安全的地方，或者放在孩子自己打不开的地方。有些家庭喜欢用定时灯光，因为这样在孩子熟睡的时候不容易吵醒他，但选择权在你。无论是灯还是音乐，都要坚持。如果你允许孩子在起床灯或者起床音乐开始前的 15 或者 20 分钟就起床开始新的一天的话，他下次就不会再把这音乐或者灯光当作严肃的问题对待了。

你可以把起床的规则归咎到闹钟身上："闹钟说现在还是晚上睡觉的时间。"或者单纯地告诉孩子起床音乐或起床灯还没有开始，你也可以将这一切归咎到我身上："安睡女士说如果你一直睡到 6 点的话感觉会更好。"贴纸作息表对于那些早起的孩子也很有帮助。不断提醒孩子他不能起床，因为妈妈和爸爸（还有兄弟姐妹们）还在睡觉。如果他知道自己不会错过什么好事就会感觉好一些。

安睡女士小提示

如果一个孩子起得很早，但整天的活动都很有精力，下午三点之后不会打瞌睡，也不会在车里睡着的话，那他可能确实比同龄的孩子需要的睡眠少。你可以慢慢地把睡眠时间向后挪，看他是否会在早上醒得更晚些。但这种孩子很少见，所以在你确实肯定孩子的睡眠需求低于同龄人平均水准之后再做上述尝试。

如果孩子一般会在早上 5 点或者 5 点 15 分醒来，然后去找你或者叫你，你应该用最小的动作把他送回到床上去。提醒他现在还不到起床的时间，他的起床音乐或者起床灯还没有开始。你可以决定是否留在孩子的房间里直到 6 点，或者你可以离开他的房间，然后每 10 或者 15 分钟来检查他一次。你的选择应该主要基于哪种方法能够有效地让孩子回去睡觉——或者能让他至少待在自己的床上。你也不希望在自己离开之后每 30 秒钟孩子就跑过来找你一次，令你必须关上他的房门。你也不希望自己留在孩子房间里导致他不断讲话，不停地试图吸引你的注意力。

你可以用一两天尝试两种方法，看看哪一种更有效，但不要反复改变方法。选择一种方法然后坚持一段时间。你就会发现

混合两种方法似乎更有效。早上在孩子的房间里呆一段时间，也许一两个礼拜左右，来传达出他必须留在床上的信息。然后离开孩子的房间，给他留下更多空间自己再度入睡。

理想的结果是，孩子能够再度入睡直到 6 点或者更晚才醒，你可以在他房间的椅子上、地板上或者干脆回到自己的房间打个盹儿。如果孩子再度睡着，可以在早上 7 点半叫醒他，如果他没有睡着，那你也要一直等到 6 点。然后回到他的房间（如果你已经在房间里了，就要离开一两分钟，但要向孩子解释说你马上就回来），开始你们戏剧化的早上起床仪式。传递出这样一种信息：他可以开始新的一天，因为现在已经是早上 6 点，他的起床音乐开始响了或者起床灯也亮了——而不是因为她哭闹和尖叫了。

早起的孩子

如果你的小家伙在早上 6 点之前醒来，他可能因为过度疲劳。过度疲劳的孩子比起充分休息的孩子来睡得不好，睡的时间也不长。他可能：

- 晚上睡觉太晚
- 白天休息不充分
- 在下午的小睡和晚上睡觉之间时间太长（尽量不要让这段时间超过四小时）
- 当他过了“昏昏欲睡”的阶段才上床睡觉。如果孩子过于困倦，他可能就不知道在自己更清醒的时候要如何让自己再度睡着——包括在早上 5 点的时候。

对于那些睡到 6 点起床而且心满意足的孩子来说，你很可能就只能接受这个现实了。对于小孩子来说这是一个常见而且合适的起床时间，哪怕你可能更希望他们能睡得再晚些。你可以试

着教孩子自己待在房间里，或者在他身边放一些特殊的玩具，供他安静地待在自己的房间里玩耍。然而，如果孩子在早上 6 点醒来，到了 7 点却暴躁而不安，那么他需要睡得时间更久一些。尽量让他在晚上早点儿上床睡觉，或者用前面我们讲过的对待那些早起的孩子的方法帮他睡得更久些。

有些孩子在长大一点儿，不需要日间小睡之后自然而然地就会睡得比较久了。但这种转变要由孩子自己选择，你不能强迫他转变。你不应该取消或者缩短日间小睡，只是为了让孩子早上更晚起床，除非孩子的日间小睡比同龄人时间更长。否则，这种做法通常都会事与愿违，你只能得到一个更疲劳过度的孩子，他还是会起得很早，而且心情也会更加不好。

日间小睡与平静时间

对于这个年龄段的孩子来说，对于睡眠的需要年年都会有变化。随着日间小睡逐渐减少，最后取消，孩子们需要在夜间睡得时间更长一些。你必须调整晚上睡觉的时间，除非他们能够自然而然地在早上起得更晚。**哪怕不再需要日间小睡，下午三点之后或者晚饭前的平静时间对于四岁的孩童来说也是非常必要的，对于五岁的孩子来说也是大有益处的，除非你确实喜欢看到孩子累垮的样子。**

对于两岁半或者三岁的孩子来说，你仍然需要注意他们日间的小睡。孩子可能会偶尔少睡一次，但当晚就要让他早点上床睡觉。日间小睡对于那些岁数稍微大一些，但却不能整晚安睡或者白天明显非常疲累的孩子来说还是很有必要的。你也得进行日间小睡的训练。

对于这个年龄段的孩子，你可以采用渐进法训练日间小睡，也可以把他放在自己的房间，每 10～15 分钟检查一次。每一天，

你都要向孩子承诺只要他从日间小睡中醒来，你就会马上出现在他面前。让孩子在自己的房间里每天待一小时。他可能会抗议，你可以在他房间门口安装儿童门。有些家长会在孩子日间小睡的时候坐在儿童门外看书；这能帮助孩子保持平静并睡着。不要让孩子的日间小睡时间太晚。在日间小睡结束与晚上睡觉之间至少留出四小时间隔，否则他晚上可能就睡不着了。（日间小睡的训练很难。如果你需要更多鼓励与关于备用计划的建议，可以看看针对较小的孩子的日间小睡训练的有关章节。）

你可能会发现孩子不再需要每天的日间小睡，但仍然需要每隔三四天有一个“小睡日”。卡利一直到五岁都还需要小睡日，在上幼儿园的前几个月每两天放学之后都要睡一觉。这就比大部分孩子睡得时间都要长，但我可以从她的行为中判断出她确实需要在下午额外多睡一段时间。我的第二个女儿格雷琴就很可能是更典型的小孩，她三岁半的时候在幼儿园仍然需要日间小睡，但在家就不需要了。

搬家之后，日间小睡对于山姆而言成了一种挑战，诺拉从未找到一种相对理想的解决方案。山姆的房间可以俯瞰到一座高中学校，里面回荡着大声喧哗和频繁的上课铃声，所以诺拉让孩子在自己的房间里午睡，但她觉得这样并不太好。“一旦我哄他睡着，他一般就会睡三个小时。”诺拉说，对于一个三岁的孩子来说三个小时确实时间很长。但要哄山姆睡觉对于诺拉来说其实更困难。“日间小睡简直就是一场战斗。他会发脾气，把自己弄得筋疲力尽。哪怕我给了他时间，他仍然需要发一阵脾气来消耗掉最后一点儿能量才能睡着。”

如果你的孩子已经能够在夜间保持十一小时的连续睡眠，在次日白天看起来也是得到了充分休息的话，那就可以把日间小睡变成平静时间了。你应该每两天缩减一些日间小睡的时间，而不

是马上就取消小睡，不然你可能会发现孩子和他的兄弟姐妹们在一起时或者在幼儿园时能够很好地进行日间小睡，但和你在一起的时候却完全不肯小睡（反之亦然）。以前日间小睡很好，但现在却需要很长时间才能在下午睡着的孩子们可能也已经准备好取消日间小睡，开始安静时间。

安睡女士小提示

判断一个学龄前儿童或者上幼儿园的小孩是否需要日间小睡的最简单的方法就是观察他。如果他晚上睡得很好，白天又显得快乐而自在，那他可能就不需要日间小睡了。如果他表现得暴躁、爱哭，或者很容易累垮，那就很可能还需要至少几个礼拜的日间小睡。孩子在车里的表现也是很重要的线索。如果每次你发动汽车他就开始打盹儿，那可能还是需要在下午小睡片刻。

当凯里两岁九个月大时，罗拉放弃了每天和他进行日间小睡的斗争，但当凯里在保姆的照顾下时，他仍旧睡得很好。几个月之后，罗拉注意到孩子如果白天小睡了，晚上就很难睡着。“我会把他放到床上，他就会起来下床六七次。晚上睡觉比日间小睡还难。”罗拉说，“每个人都很生气——我为此感到非常难过。”尽管我通常都会劝大部分家庭继续进行日间小睡，直到孩子三岁半或者四岁为止，但在这个案例中妈妈的直觉是正确的。当他们取消日间小睡之后，晚上睡觉变得简单而愉快。“我们关灯说晚安，他就能睡着了。”罗拉说。

安静时间就如字面上的意思一样，大约 45 分钟有条不紊的独自玩耍，而且最好是在每天下午的同一时刻开始。对于孩子来说这是个让他们身体休息的时间，在某种程度上也可以看作是让

他们精神休息的时间。这个时间有助于为一段宁静的晚餐时间和轻松的晚上睡觉时间做好准备。好的行为包括看书，看适合孩子年龄段的比较安静的电视节目(把那些快节奏的，充满动作的动画片换到其他时间观看)，绘画或者在孩子的房间玩娃娃、火车、汽车等玩具。这种行为不需要很多大人的干涉或管理，只要确保让孩子待在安全的地方就可以了。

同睡

本节中有些家庭至少在晚上会和孩子同睡一小会儿，而且就像你看到的那样，渐进法有助于结束这种经历。但同睡是一种复杂的话题，所以我专门用一个节作出介绍。如果你自从孩子出生开始就和他们同睡，但现在想要停止；如果你整夜或者夜间的某些时候会把孩子带上你的床，因为你觉得这是唯一能让他睡着的方法的话，请参考第 3 章“这到底是谁的床?”如果你还想继续和孩子同睡，我可以帮你教孩子学会在日间小睡的时候自己睡着的技能，这能在他最终转移到自己的床上睡觉的时候对他有所帮助。

伊莎贝尔

当丽塔与艾略特就伊莎贝尔的问题召开家庭会议时，他们面对的是一项相当棘手的任务。伊莎贝尔四岁了，但从出生以来睡眠就一直很糟，几乎每个晚上都会醒来，并且拒绝在婴儿车之外的任何地方进行日间小睡。在过去的日子里，她的父母不得不又唱又跳地哄她睡觉，编造各种伊莎贝尔喜欢的傻傻的儿歌或者自己改编出各种版本的摇篮曲。即便如此，伊莎贝尔最终还是会在父母房间的地板上睡着，或者有时候爬上父母的大床和他们一起睡觉，即便小妹妹迪尔德丽安稳地睡在她的婴儿床里也无法影响她。

丽塔一直忍耐这种状况，直到她的第三个女儿丽贝卡出生。“我们学会了忍耐，如果她想要睡在地板的睡袋上也可以。但现在一个孩子睡在地板上，一个婴儿在房间里哭叫，对我们来说太糟糕了。”

丽塔一家召开了家庭会议，制作了作息时间表，用小插图来装饰伊莎贝尔的目标，并且开始采用渐进法。“我告诉她我会陪着她直到她做了好梦才走，而不再唱儿歌。我们讨论美梦中可能会出现的东西。”丽塔说。伊莎贝尔只有前两三个晚上抗拒了一下渐进法。通常，当她在早上把自己的贴纸贴到时间表上时“真的非常激动，非常高兴。”

一开始伊莎贝尔在某些晚上还是会醒来并跑去找父母。“我们会把她送回床上。如果她有需要，我们也会坐在她身边。她确实很累，所以唯一做的事情就是爬到床上睡着。如果她确实醒过来，因为某些原因心慌意乱，我就不会再陪着她。”但几个礼拜之内，伊莎贝尔就不再醒来了。

四年生了三个小姑娘，丽塔终于能够得到一种“幸福而简单”的夜晚，这让她欣喜若狂。她照顾伊莎贝尔和迪尔德丽吃晚餐、洗澡，然后为她们讲故事，同时抱着还是婴儿的丽贝卡。她会先把睡觉比较好的迪尔德丽放进婴儿床，说晚安。然后她们一起到伊莎贝尔的房间，为伊莎贝尔读几本妈妈专门为她念的书。“她会躺到床上，我给她深深的拥抱和亲吻，然后向她说晚安。她喜欢我开着她的房间门，但不再需要我留在房间里了。”也不再需要父母唱歌跳舞了。

玛丽·凯瑟琳

玛丽·凯瑟琳系统地执行了渐进法——她一次训练了两个女儿。艾希莉和她的哥哥一样在婴儿时期接受过“费伯睡眠法”的训练，直到她过早地转移到普通床上从而导致睡眠出现问题之

前都睡得非常好。接下来她的小妹妹咪咪出生了。玛丽·凯瑟琳没有和她的前两个孩子同睡，但现在她的全部生活都不一样了；她成为了一个全职母亲，希望能随时和孩子们在一起。她与新生的婴儿同睡，母乳喂养，但艾希莉却不喜欢小妹妹能在楼上和爸爸妈妈一起睡，她却被丢在楼下自己睡。最后，她加入了父母的大床同睡行列。他们都在晚上9点左右上床睡觉，妈妈睡中间，两个女儿各睡一边，都抓着妈妈的头发。爸爸一般只好到客房睡觉。咪咪在用安慰奶嘴。她的睡眠也很差，在第一年之后几乎就不肯再进行日间小睡了，常常处于过度疲劳的状态。

大约一年之后，玛丽·凯瑟琳意识到这并非真正宁静的生活。“女孩子们越来越大了，晚上睡觉很不老实。她们睡觉的时候也都很警醒。当我起身去卫生间时，她们就会跟着我。如果电视开着，她们就会看电视。如果我在床上读书，她们就睡不着。我觉得自己快要窒息了，而且越来越沮丧。”

这个家庭的儿科医生建议她与两个女儿分开睡觉，“从外面锁上门，让她们哭。”对于玛丽·凯瑟琳和凯斯来说这太难以忍受了，所以他们尝试了各种方法——甚至为女儿们买了最新款式的双人上下床。当玛丽·凯瑟琳发现凯斯又睡到床脚，女儿们仍然睡在他们的床上时，她知道一切已经触及到自己的底线了。她打电话给我请求帮助。

夫妻俩和女儿们一起召开了家庭会议，向她们解释了新的睡觉的情景，现在两个女儿一个三岁，一个五岁。玛丽·凯瑟琳送给孩子们崭新的带流苏的缎面枕头，希望她们能把新枕头当作心爱之物，好让她们可以缠绕枕头上的流苏而不是妈妈的头发，并且跟她们解释说二人可以在她们自己的房间里互相做伴。玛丽还为孩子们买了一些类似卷曲的羊毛材质的布料（她自己的头发就非常卷曲）当作备用。崭新的带有芭比娃娃的床单作为额外的

诱因，配合带贴纸的时间表和一整套奖励系统一起使用。艾希莉弄明白了带贴纸的时间表是怎么回事；咪咪还不能完全理解，至少对于她来说一开始这种表格还不是特别有用。

玛丽·凯瑟琳开始进行渐进法，她坐在两个女儿中间，先安抚其中一个，然后是另一个。她还卷起几张毯子，把毯子卷儿放在孩子的床边，好让女儿产生被依偎的感觉，让床铺更像安全的小巢，类似于她们以前习惯的大家挤在一起睡觉的感觉，但床上实际上没有其他两三个人的身体了。起初的五个晚上非常难熬，尤其对于咪咪来说，玛丽·凯瑟琳为女儿们表现出的难过而伤心不已。而且渐进法恰好赶上一个不那么幸运的时机，艾希莉刚刚开始进行哮喘治疗来确保心率正常，并抑制睡眠。但玛丽·凯瑟琳还是坚持了下来，她知道自己需要改变，也知道女儿们会从姐妹身上得到更多的安慰。“艾希莉变成一个小妈妈，她都会安慰咪咪了。”她说。

渐进法进行得非常顺利，尽管当凯瑟琳挪到走廊上的时候遇到了一些问题。女儿们其中一人或者两人还是会跑出房间找她，艾希莉好几次都在走廊上睡着了。如果她们很晚的时候下床或者试图跑到父母的床上时，玛丽·凯瑟琳会安静地送她们回房间。经过几个非常艰苦的夜晚之后，玛丽·凯瑟琳威胁孩子们要关上房门，这个方法有效地让孩子们待在了她们自己的房间里。

用了三个礼拜，凯瑟琳才让两个女儿都能整夜安睡——艾希莉开始缠绕她自己的头发，而且很早就开始了；而咪咪会把艾希莉吵醒，有时候还会跑到姐姐的床上去睡觉。

现在已经过去三年了，女孩们睡得都很好，但玛丽·凯瑟琳仍然很小心地实施着明确的规则，包括下午 6 点之后不能吃甜食。“睡觉前的仪式已经不像我们一开始制定规则的时候那么严格了，但我们仍然还在坚持。”

第 3 章　这到底是谁的床

当我和那些准爸爸准妈妈们合作时，关于同睡或者全家睡在一张大床上的话题是不可避免的。同睡或者同床是近年来在育儿话题中争论非常激烈的部分，也是容易触动人们强烈情感的部分。一部分人认为，同床而睡是一种正确而自然的育儿方式，这会让家庭成员之间产生强烈的感情与更加安全的依恋关系。还有一部分人则会试图说服你这种方式是有风险的、荒谬的，或者纯粹不是家庭所需的。

我的目标不是要和你讨论这个问题，而是帮助你找到对于你和孩子而言都正确而合适的优化睡眠的方法。我还希望能向你推荐一种比较中庸的选择，也就是所谓的“同房而睡”。这种做法是父母们可以让新生儿在几个月甚至一年之内睡在他们的房间里，但不是他们的床上。我在本书前面的一些章节中也提出过这个问题，在此将重点进行阐述，因为我发现对于很多家庭来说，这确实是最好的解决方式。让婴儿睡在你身边的婴儿床里、你伸手就可以碰到的摇篮里，或者可以直接安装在你大床一侧的那种连体婴儿床里，对于亲子双方来说都很好。这样你在晚上可以很轻松地哺喂婴儿，孩子在触手可及的地方也能让你感到放心；而且你不需要担心同床睡眠可能发生的危险，也不用从现在开始就为一两年后可能要面对的同床睡觉带来的麻烦而提前做好心理准备。同房间睡觉对于那些因为剖腹产而导致在起初几个礼拜内夜间起床或者走动有困难的妇女也有很大帮助。当你决定让孩子搬出你的房间时，可以按照稍后我在本章为希望停止同睡的家庭给出的建议行事。（如果孩子将要和兄弟姐妹分享同一个房间时，你可以查看我在第 4 章“帮助双胞胎或者兄弟姐妹睡觉”中给出的建议。）

本章中我打算用较大的篇幅来阐述分享床铺的问题，不是因为我认为这种做法不好，而是因为我认识的很多父母，在想要停

止与孩子同床睡觉的时候都遇到了很多困难。我要声明我并不是预言你一定会遇见很多问题;无数同睡的家庭至少有一部分时间都是安全而幸福的。我认为这对于让婴儿们学会如何自己睡觉非常重要,我通常会给出一些建议,告诉你应该如何帮他们更好地溶入到家族大床的环境中去。但本章节中我的另外一个任务是帮助那些希望做出改变的家庭,帮助那些打算结束同床睡觉却毫无头绪的家庭,或者帮助那些如我前面所提的,虽然一直都在"同床",却没法"睡觉",每个人都严重睡眠不足的家庭。

我建议你作为父母,应该在孩子出生前就决定好是否同床睡觉;假如你的决定对你而言并不是最好的,也要准备好一种不带来任何心理负担的备选方案。尽管有些支持家庭同睡的人可能不同意,但我曾经跟许多夫妻合作过,很多孩子都因为和父母同睡在大床上而导致睡眠不好或者睡得时间不长。实际上,有些父母发现当他们停止与孩子同睡,把孩子转移到她自己的婴儿床上后,孩子反而能睡得时间更长,夜里醒来的次数也更少了。

如果我能帮你找到一种最适合你的方法,哪怕这种方法并不是你计划中的,也不是你希望或者期待的,我都难以表达自己欣慰的心情。如果你总是很疲倦,就没法像你希望的那样担任父亲或者母亲的角色,也没法很清楚地发现孩子传达出的小讯息,回应他的需求。你更有可能变得抑郁起来,这无论对你还是对你的孩子都不好。

同睡分类

我把同睡分成三类:目的明确的同睡,短期的同睡和"我们本来没有打算这样"的同睡。

目的明确的同睡,一般是夫妻二人(更常见的是妈妈一人)选

择全家同睡在一张大床上，将之当成一种人生观和生活方式。很多人都受到了威廉·希尔斯和玛莎·希尔斯鼓吹的亲子依恋理论的影响。很多父母都决定让婴儿（或者以后的所有孩子）和他们一起睡，直到孩子们表达出想要属于自己的床为止，哪怕这样睡觉会持续很多年。

短期的同睡是父母希望婴儿能在起初的几个月与自己睡在同一张床上，尽管前三个月是同睡风险最高的时候（详见附录“婴儿的安全睡眠规范”）。他们喜欢这种亲密关系，喜欢这种新生儿在身边可以随时哺喂的便利。就像新父母通常也是焦虑的父母一样，如果孩子就睡在自己身边，他们的忧虑也会少些。这些父母如果选择分享房间的方法，也许能做得更好，因为这种做法既能满足亲子之间亲密的需要，又能最小化危险。（我曾经由于对这种毫无阻碍的感觉很感兴趣，所以打算在卡利初生的几个月内和她同睡，但我很担心自己在翻身的时候会压到她，以至于都不敢合眼。虽然卡利是个很小巧的婴儿，但却很吵闹。我们很早就把她放到她自己的房间去了，随后她的妹妹也是如此。）我建议如果你选择和新生婴儿短期同睡的话，尽量计划在三个月左右把孩子转移到婴儿床里去。（你可以选择把婴儿床在你房间里再放几个月，也就是说从分享床铺转变成分享房间。）

在你和孩子同睡的三个月里，你应该让孩子经常在他的婴儿床、连体床或者摇篮里进行日间小睡。让孩子在白天自己睡，以后孩子晚上转移到婴儿床里睡觉的过程也会更顺利。这也能帮助孩子和你更容易掌握新生儿自我安抚的技能，详情可以看上册第 5 章“新生婴儿的正确起点”中关于新生儿的部分。

“我们本来没有打算这样”的同睡也被称作被动同睡。这些父母会整夜或者在夜晚的某些时候把孩子抱到自己的床上去，这并不是他们自己的选择或者观点使然，而是因为他们只能通过这

种方法才能让孩子在晚上睡觉，或者在夜间醒来之后再度入睡。有些人开始只打算短期和孩子同睡，但却一直不知道该怎么停止。还有些人则会在晚上睡觉的时候把孩子放进婴儿床，但半夜孩子醒来之后又把他抱到了自己的床上。还有一些夫妻则充满了矛盾，或者是无法决定到底让孩子睡在哪里，或者是其中一人想要让孩子睡在大床上，另外一人则想要把孩子放进婴儿床。意见不一经常会导致孩子时而睡在婴儿床里，时而睡在父母的大床上，这会让每个小婴儿都感到困惑，不知道自己到底应该睡在哪里，怎么睡才是父母希望的。哪怕是最积极的同睡支持者都不建议被动同睡。

怎么做适合你

当你考虑长期与孩子同睡是否合适你时，大量实际而情绪化的问题都会成为支持你的理由。想想你自己的儿童时代，你的噩梦，你感觉是被父母疏远了还是和他们更亲密了，等等。母亲们通常会在受到家庭需要影响的前提下考虑他们是否需要在夜晚和孩子更亲密一些，因为他们总是因为白天不能陪在孩子身边而产生内疚感或担心可能会伤害到孩子的情感。我并不是说所有与孩子同睡的父母都能消除他们的内疚。但了解你自己的动机能帮你做出更明确的选择。还要问问你自己，在晚上身体上的亲近是否真的就是增强你与孩子之间的联系或者依恋的关键。作为一个母亲和一个家庭治疗专家，我不敢说这一定是必要条件；我们的大部分情感、联系和互动都发生在白天。当我们清醒的时候，如何触碰孩子，照料孩子，与孩子一起玩耍，倾听孩子的话，对他们的需求作出回应，以及和孩子一起欢笑，看上去对于形成我们与孩子之间的亲密关系，远比我们在哪里，用怎样的方式与孩

子同睡更加重要。

你还需要仔细考虑一下如何让孩子一直和你同睡而不会影响到你的婚姻。也要考虑一下你应该如何对待一个不断发展的家庭。你能让两三个孩子一起在床上和你睡觉吗？如果你是一位单亲家长，考虑一下当你的孩子和你共享一只枕头的时候，要如何让一名新配偶加入到你们的生活中来。

要记住同睡是一种长期的生活方式，一种你需要坚持到孩子选择去自己的床上睡觉时才会结束的生活经历。有时候这可能会持续一两年，有时候甚至七八年。比如里德和朱莉娅和他们的前两个孩子一起睡，这是很轻松愉快而且令人满足的事情。每个孩子也都能很快地搬到他们自己的床上去。后来他们的第三个孩子托德出生了，托德的睡眠非常混乱，一直到 14 个月都不愿意离开父母的床上，直到我来帮助他们，托德才搬到他自己的房间里去。

还有更多琐事要处理，你的睡眠是轻还是沉？一个睡觉不老实的孩子是否会让你晚上睡不着？孩子和你一起睡或者不和你一起睡，哪种会让你更紧张？你是否希望能在床上开着灯读书，或者在深夜在床上看电视？

如果你在前三四个月内改变了想法，让孩子改变睡觉的地点并不是很难。但过了三四个月之后就会很难了，但也不是不可能。我曾经与很多家庭合作过，他们有的已经与孩子同睡了两年才决定需要改变他们的睡觉安排。我会告诉你应该如何让一个两岁大的孩子搬到它自己的床上去。毕竟，他会把你的床当作他自己的床。我当然不建议你突然结束与孩子同睡，让他搬到单独的房间里，然后你再把一个新生的婴儿带到自己床上。（稍后在本章中我也会给出一些建议告诉你应该如何解决这种问题。）

安全问题与防范措施

在考虑全家同睡的正面和反面理由时，你也应该了解一些安全问题。一些研究发现，同床睡觉很容易导致新生儿产生婴儿猝死综合征。美国儿科医学会和美国消费产品安全委员会（The American Academy of Pediatrics and the U. S. Consumer Product Safety Commission CPSC）就曾经正式建议不要与两岁以下的婴儿同睡，以免可能产生的死亡或者意外伤害的风险。CPSC指出，平均每年有64名两岁以下的婴儿死于成人的床上，包括睡床与坐卧两用床，原因包括窒息与被物品勒颈而死。

在2003年1月的公告中，CPSC指出了与成人同睡的婴儿存在的问题，包括婴儿由于陷入或者卡在床垫与其他物品之间导致的窒息死亡，由于俯卧而被水床上的通气孔闷死，以及被足够婴儿身体穿过，头部却会卡住的床栏杆或者床上的缺口勒死等。第一支烛光（www. FirstCandle. org）是一个致力于减少猝死婴儿数量的学会，他们援引了一些证据，证明同睡的代价是高昂的，大约80%的婴儿猝死都发生在婴儿与父母或者其他成人同睡的时候。同样，还有一些研究表明，当父母与婴儿睡在同一个房间的不同床上时，婴儿猝死综合征发生的几率就会降低。

在家庭的大床上实现良好睡眠

那些和孩子同睡并且幸福而健康的家庭仍然能从我稍后给出的做法中获益，这种做法能提高每个人的睡眠质量。你可以帮助孩子建立良好的睡眠习惯，或者至少能够达到即便全家人睡在一张床上也能独自睡着的程度。

安睡女士小提示

如果你选择了和孩子同睡，最好向你的医生咨询一下最近的安全规范，并做好降低风险的一切准备。有些专家会建议你使用一张结实而平整的床垫，或者一张避开四面墙壁，放在地上的日式床垫。使用尺寸合适，不会轻易被拉扯下来的床单。不要在孩子初生的几个月使用枕头或者毛毯，确保孩子不会陷入到褥子里面。绝对不要使用水床或者其他任何一种柔软的表面。确保床上没有可能会卡住或者令婴儿窒息的缝隙或者柔软的部分。

如果你的床垫不是放在地板上，那就要使用设计完善不会卡住婴儿的床栏。如果你的床靠近墙壁或者其他家具，确保不会有卡住或者让婴儿窒息的空间。或者干脆把你的床搬开，不要靠近任何一面墙壁。

有些专家，包括《没有哭泣的睡眠》(The No-Cry Sleep Solution)的作者伊丽莎白·潘特莉(Eliza beth Pantley)在内，都会建议将婴儿放在母亲与墙壁或者床栏之间，而不是双亲之间。她认为父亲、祖父母、比较大的兄弟姐妹和保姆不会像母亲一样“本能地意识到婴儿的位置”，也不能及时地回应婴儿的需求与位置。潘特莉还说，那些睡得很熟无法及时发现孩子的细微活动的母亲应该尽量避免和孩子同睡。

如果你体重超重，或者曾经酗酒或者使用毒品、药物，都不要和孩子同睡。我在本书的最后列出了一个关于婴儿安全原则的全面列表——给所有的婴儿，而不仅仅是那些和大人同睡的婴儿。请仔细阅读。

正如我所说的，我强烈建议让婴儿在他自己的摇篮或者婴儿

床里进行日间小睡，只将同睡限制在晚上。（偶尔为之的亲子一起日间小睡不会产生什么问题。）这种做法不仅能让孩子养成更好的睡眠习惯，还能给父母更多的自由。如果你的孩子知道如何自己睡着，你就不用每次日间小睡的时候都要陪他躺下，或者每晚的7点都要上床睡觉了。

有些夫妻虽然与孩子同睡，但是又希望能培养出孩子独自入睡的能力，同时也希望能在孩子该睡觉的时候先把他放在婴儿床里，为自己争取一些晚上较早的自由时光。然后他们才会在自己也准备睡觉的时候把孩子移到大床上去，或者在孩子夜间第一次醒来的时候把他抱到大床上去。

记住，睡眠是一种需要学习的技能，不管你的孩子是在你们的床上睡觉还是在他自己的婴儿床里睡觉都一样。帮助孩子学会每次无需哺喂、搂抱或者轻摇就能入睡的本领是一个重要的基础。尽量每天至少一次在孩子昏昏欲睡的时候把他放到床上。回顾一下关于新生儿和婴儿们的一些章节，尤其是上册第5章“新生婴儿的正确起点”和第6章“初生到5个月”，在上午的日间小睡时这样做通常是最简单的。这能抵消同睡带来的副作用，也能削弱婴儿在每一次局部清醒时需要哺喂才能入睡的习惯。

安睡女士小提示

和你的孩子一起日间小睡有时候是很不错的主意，尤其是对于那些因为新生儿而疲倦不堪的时候，但你肯定不希望连续几年都被和孩子一起日间小睡的事情束缚。如果你重新开始工作，或者偶尔要出门的话，这种做法就会导致照料孩子进行日间小睡出现很大的问题。如果你的两个孩子在不同的时间进行日间小睡，或者较小的孩子要你躺下陪着睡觉而较大的孩子则根本不再需要日间小睡，却需要你随时监

督注意的话，那么问题真的就会更加复杂。如果孩子睡在婴儿床里，你还能有一点儿自由在家里随意走动。你也不用必须每分钟都待在房间里确保孩子不会被床单闷死，在他大一点儿之后也不用担心他会从床上滚下来。

尽量不要让你的宝宝整夜含着你的乳头睡觉。哪怕你必须要哺喂他，你要明白孩子不可能总是要吃奶。如果你给他机会的话，孩子完全会接受其他安抚方式。如果对你来说主动停止这种睡觉的方式比较困难，可以尝试穿着 T 恤衫睡觉，或者让爸爸来更多地搂抱孩子，安抚孩子。记住你的乳房绝不是你唯一能安抚孩子的方式，可以回头去看看上册第 5 章“新生婴儿的正确起点”中关于安抚孩子的建议。

如果你的孩子在夜间比白天吃得多，你要记录下他的进食习惯，然后尝试作出改变。查阅一下本书中对应的年龄的章节，找一找如何缩减夜间哺喂次数的方法，哪怕你不希望完全取消夜间哺喂，也要让这种哺喂习惯适应全家同睡的方式。例如，如果你的孩子没有和你们同睡，你应该在把他放到床上之前哺喂他，并且要在哺喂与睡觉这两种活动之间保留一定的间隔。

如果你在床上哺喂孩子，就必须要找到适当的方式来创造这种间隔。哺喂孩子，但要在他还醒着的时候就把乳头从他口中拿走，然后穿上你的 T 恤衫。接着把孩子放到床上，让他背对着你，把他的心爱之物放到他怀抱中。在哺喂完毕，孩子入睡的时候，你还应在自己和孩子之间留出一些空间。安抚孩子，哄他入睡，但不要让他再度找到你的乳房，除非预计的时间间隔已经结束——一个小婴儿也许每隔两小时就需要再哺喂一次，稍微大一点儿的婴儿则可能是间隔四小时。如果孩子醒来想再次吃奶，但

间隔很短，找一种安抚方式来帮助他再度入睡。如果这样做似乎很困难的话，妈妈应该连续几晚在几次哺喂的间隔时睡在别的房间，让爸爸来安抚孩子，和孩子一起睡觉。

从家庭的大床上搬走

许多向我咨询的夫妻一开始都是决心与孩子同睡，但后来就发现这种方式并不适合他们。我也遇到过很多“我们本来没有打算这样”的夫妻最终求助我帮他们打破这种习惯。这些家庭都面临着没有隐私或者无法得到充足睡眠的问题。婴儿们睡眠时可能会很吵闹，而且姿势也很不老实，他们可能会在床上翻滚或者滑到床尾，令你担心他们可能会被寝具蒙住窒息。有些婴儿可能还学不会在大床上和父母好好地睡觉，频繁地哺喂是因为婴儿们总是要吃奶，或者仅仅是因为他们晚上受到了过度刺激，无法在父母身边入睡。这对于那些选择和孩子同睡的夫妻来说可能会造成不小的打击，因为他们相信自己的孩子确实需要他们的陪伴，结果却发现孩子们在没有他们的情况下反而睡得更好。

尽管我已经告诉过你，我个人更倾向于很早就要对于同睡问题作出合理的决定，并且坚持下去，但如果你发现同睡并不适合你，也不要犹豫不决，迟迟不做改变。不要觉得内疚，也不要让任何人令你感到内疚——或者觉得自己不称职。即便是不和孩子同睡，你也能够而且一定会与孩子建立起健康而强烈的感情。我会分享几个家庭的案例来展示一些夫妻是如何处理这种原本会很困难的改变的。这种改变对于不到三四个月大的婴儿来说速度更快，我会从头到尾地向你们解释。对于稍微大一些的孩子来说，应当预料到这种调整可能至少要用三个礼拜的时间，然后还要用两到三个月才能真正将这种转变的成果巩固下来。

我唯一不建议你结束与孩子同睡的时机是在一个新生儿降生的时候。将一个孩子从你的床上挪走，为下一个孩子让地方并不是一种理想的行为，即便是在没有这么剧烈的变化时，这种恐惧、竞争与被取代的感觉仍然非常常见。我知道很多三岁大的孩子可以客气地离开父母的大床，为新的婴儿让地方，但对于他们来说这实在是很过分的要求。父母可以在新生儿到来的前 3～6 个月的最好时机完成改变，或者让大孩子在父母的床上多呆几个月。你可以把新生儿放在摇篮或者附在大床边的连体小床上。同时可以把大一点的孩子转移到他们自己的房间或者你的房间其他地方去。有些夫妻分摊了与孩子同睡的任务，妈妈和新生儿睡一个房间，爸爸则和大一点的孩子睡在另一个房间。他们通常会这样睡几个月，直到新生儿可以整夜安睡之后，就不再和两个孩子一起睡觉了。

当你确实已经让一个孩子离开你们的大床之后，一定要坚持下来。绝对不能让步，时不时地允许孩子再回到你们的床上去，哪怕接近天亮的时候也不可以，不然你就会令他感到困惑。这对于一个喜欢和孩子一起睡觉的家长来说从感情上非常难做到。如果你怀念孩子的小脑袋依偎在脖颈边的那种感觉，可以在白天用其他方式来满足这种特殊的渴望。

当一个孩子已经在父母的床上睡了几个月或者几年之后，我建议可以在几个星期之内用几个阶段完成改变（虽然并非每个家庭都一定要按部就班）：白天让孩子熟悉他自己的房间，日间小睡时陪孩子在他的房间里睡觉，以及用我的安睡女士渐进法在房间里教育孩子学会独立睡觉的多级方案。我会在下面更详细地解释每个阶段。如果你的孩子足够大，可以尝试通过谈论即将到来的变化帮他做好准备。哪怕一个一岁大的孩子能理解的内容也要超出你的想像，当然从 18 个月往后的孩子可以理解的东西就

更多了。让孩子知道什么事情将要发生——让这件事情听起来诱人而且令人激动——这通常有助于孩子的转变。对于一个较大的孩子来说，贴纸时间表和奖励也是非常有效的方法。

阶段 1：白天与游戏时间

开始让你的孩子在白天醒着的时候熟悉他的房间。实际上，他不仅仅是应该熟悉，他还应该喜欢自己的房间。和孩子在房间里玩耍，在房间里给他换衣服，拥抱他，亲吻他。如果孩子需要一些诱惑才敢走进不熟悉的房间，就为他买一些新玩具或者从书房里拿出一些书或者影碟。（如果孩子已经开始在他的房间里玩耍和小睡，你可以跳过这一阶段。）

阶段 2：日间小睡

如果孩子还没有在他自己的房间里进行日间小睡，现在就开始吧。用一两周时间在孩子夜间转移到他自己的房间睡觉之前，让他先习惯于白天在自己的婴儿床或者床上小睡。如果你的直觉告诉你，孩子需要一些额外的帮助，可以他在他的房间里进行两三天的日间小睡。接下来如果他在自己的房间里仍然无法入睡，可以在随后几天中坐在他身边，但表现得要尽量平淡。稍微安抚一下孩子，但不要让他不断吸引你的注意，不然你和孩子之间的互动会成为他不睡觉的借口。几天之后，你可以使用安睡女士渐进法帮助孩子学会自己进行日间小睡。

由你自己决定是先在日间小睡时进行改变，还是同时在日间小睡和晚上睡觉时进行改变——如果你在这一个阶段的白天和夜晚都坐在同样的位置，这就不是什么问题了。如果不使用渐进法，你还可以选择尽量让孩子躺下抱着他的心爱之物进行日间小睡，自己随后离开孩子的房间，每四五分钟回来检查一次，看他是

否哭了。如果你觉得这样过于突然，记住任何一种方法其实都不错，你应该选择让自己感觉最好的，最适合你的孩子的方法。阅读一下适合孩子年龄的章节以了解更多渐进法与日间小睡训练的详细说明。

阶段 3：安睡女士渐进法

当孩子准备好开始夜间睡眠训练（很明确——我们说的是几天或者几周，而不是几个月），你就可以开始使用安睡女士渐进法了，我的方法可以教婴幼儿缓和地学会在不依赖你的情况下自行入睡。

对于大部分婴儿来说，你应该从坐在他婴儿床里或者床边开始渐进法。对于同睡的孩子来说，我要额外增加一个准备阶段。你可以用几个晚上和孩子一起在他的房间里睡觉，从而在家庭的大床与自己睡觉之间建立起一种过渡。在地板上放一张床垫，或者在客床上放一只睡袋，只要对你们两个来说安全而舒服就可以。

现在你可以真正开始渐进法了。开始的三天坐在孩子的婴儿床里或者床边安抚他。如果孩子睡着就离开的态度对于你来说过于突然，也可以在房间里的临时床上睡两三天，这样当孩子醒来时你可以迅速地过去安抚他。但只能待两三个晚上。时间再长的话孩子就会习惯于你的存在，当你打算离开时，会让他更难接受。如果孩子睡在普通床上而不是婴儿床里，他可能会在晚上下床试图和你一起睡觉，你只要单纯地立刻把他放回床上即可，不用说一个字。如果孩子反复下床，或者你夜间醒来时发现他已经躺在你身边了，那么次日早上就要收起临时床，不再睡在孩子的房间里，继续用椅子度过渐进法的进程。

每三个晚上按照渐进法往远处稍微挪动你的位置，让孩子能

够渐渐独立地入睡。移动的路线要穿过整个房间，然后到门口，接着出门来到走廊上。在大约两周之内，你就应该能留下孩子独自睡觉了，常常来检查一下他的情况即可。安睡女士系统中合适的位置会根据孩子的年龄而不同，所以请回顾一下与孩子年龄有关的章节中的指导。

辛希亚(4个月)

可以理解珍妮和保罗作为新父母的紧张感。辛希亚是早产六周的婴儿，她在新生儿特护病房呆了一段时间，回家之后还在使用监视器。她还患上了疝气，是一个吵闹的婴儿，每天晚上都需要父母抱着她踱步三四个小时才能安静入睡。当父母把她放进摇篮时，她会焦躁；试图把她放进婴儿床时她又会不安，所以大部分时间她和珍妮睡在一起——更确切地说，她睡在珍妮的身上。“我是一个很紧张的新妈妈，我睡不着。我必须仰面躺下，把婴儿放在自己的身上。”珍妮回忆说，“我又累又气，还要用白天一半的时间抱着她踱步，哄她开始日间小睡。”

当这对夫妻向我咨询时，辛希亚已经四个月了。我们的第一项任务就是让她睡到婴儿床里去。作为准备，珍妮修改了时间过晚的日间小睡作息表。辛希亚原本会在下午4点到7点这段时间进行日间小睡，这令她受到过度刺激，过度疲劳，在下午两三点本来应该日间小睡的时候脾气暴躁，随后导致晚上睡觉时间更晚。珍妮开始让辛希亚在下午提早进行日间小睡。她会哺喂孩子，然后在孩子昏昏欲睡的时候把她放进婴儿床。为了让婴儿床令一个小家伙感觉舒适而安全，像她习惯的母亲的怀抱一样，珍妮卷起两条婴儿毛毯，用皮筋固定起来，然后放在婴儿床的两头，压在婴儿床的床单下面，使它们不会产生窒息的危险。(如果你

也打算这样做，要向你的儿科医生咨询一下确切的位置。）

就像珍妮期待的那样，辛希亚在妈妈刚把她放下，准备日间小睡的时候开始哭泣。一开始珍妮完全无法面对孩子的哭泣，但现在她已经能够放心地让孩子哭上一小会儿了。实际上，一旦珍妮明白哭泣不会导致孩子产生危险的话，她对于哭泣的容忍度就要高于我认识的很多母亲（如果孩子的哭泣确实超出你能忍受的范围，也不要勉强自己忍耐）。珍妮发现如果自己待在房间里陪着辛希亚，但不把她抱起来，也不哺喂她，辛希亚就会像初生的时候一样产生痉挛。她会哭号，无论珍妮怎么试图安抚她都没有用。但珍妮发现如果自己能够在准备开始日间小睡之前先安抚辛希亚，并且在合适的时间让她开始日间小睡的话，她就可以在把孩子放进婴儿床后离开房间。辛希亚最多哭几分钟，然后就睡着了。

珍妮制定时间表的时候也非常幸运。这种生活方式很适合她，而且她的直觉也早就告诉她，这种时间表也很适合辛希亚的性格。但直到我们坐下来讨论新生儿对哺喂和睡眠的需要及习惯时，她才真正了解如何组织合适的时间表。“辛希亚不是那种会‘顺从他人摆布’的孩子。她疲倦的时候就很难控制自己；她那时候只会很焦躁。我非常想要一个作息时间表。我要知道：这是孩子应该日间小睡的时间，这是孩子应该吃奶的时间，这是我可以计划下一天生活的时间等。”珍妮说。

珍妮和保罗还修改了晚上睡觉前的仪式。他们在晚上6点左右哺喂孩子——几周之前的这时候她还在日间小睡呢。他们会给孩子洗澡、换睡衣，然后给她读儿童图书。（有些新生儿很喜欢图书；有些就不喜欢。）然后他们会把孩子放进婴儿床，在她身边道晚安，轻拍她，安抚她——辛希亚确实会哭。“我认为这很可怕，这可能会伤害她的情感，但我丈夫提醒我说不会伤害她，绝对

不会，她需要睡觉，这是她必须学会的事情。”他们最终会留下辛希亚独自一人，但每 15～20 分钟回来检查一次她的状况。我曾经共事过的家庭中很少有这样的——这种方式与费伯睡眠法区别并不是很大——但他们觉得这样很好，因为辛希亚自己独处时的表现确实要好过和父母在房间里共处时的表现。

珍妮和保罗此时的目标不是让辛希亚整夜安睡。而只是让她能在婴儿床里自己睡觉。所以当辛希亚在夜间醒来时，珍妮会马上哺喂她让她入睡，然后还是会把她放回婴儿床，而不是父母的大床上。到这周周末，辛希亚已经可以不哭不闹地躺进自己的婴儿床，然后一口气睡五个小时了。珍妮准备开始阶段 2，缩减夜间哺喂的次数，鼓励辛希亚整夜安睡。他们把每晚哺喂三次减少到两次，到了辛希亚六个月时就完全取消了夜间的哺喂。“我原本以为她晚上不能不吃奶，但一旦我们取消了夜间的哺喂，就发现这没问题。”珍妮说。如果孩子很早醒来，比如凌晨 5 点之前，他们会走进孩子房间，轻拍她，安抚她，但不会哺喂她或者把她从婴儿床里抱起来，直到 6 点才起床。当孩子早起的时候，他们还是会进行同样的处理，但一般来说辛希亚是个“超级能睡的宝宝”，她在晚上 7 点睡觉，可以整整睡 12 个小时。

六个月以下婴儿从同睡转变成独睡

对于六个月以下的婴儿，你不需要采用渐进法或者过多的准备，你可以在“昏昏欲睡”的状态下把孩子放在他的附加小床上，然后在你的大床上安抚他。当他学会在附加的小床上依靠你少许帮助睡觉后，你就可以把他转移到婴儿床里，然后坐在他床边安抚他，哄他睡觉。不要频繁地轻拍或者抚摸孩子。给他足够的接触，让他能感受到你的爱，感觉安全就可以了，但不要过多的肢

体接触，不然就会产生睡眠支撑——那样他就会需要你整晚睡觉的时候一直待在他身边抚摸他了。接下来你可以慢慢地挪开，采用渐进法的改进版本，或者可以尝试着直接将孩子放到他的婴儿床里去，给他一些爱抚与安慰，然后离开，再每隔几分钟回来察看一下。

等孩子习惯睡在自己的婴儿床里之后，要在至少三个月之内严格保持你的床与婴儿床之间的距离，不然你就得再次重新开始进行一次转变的过程，这对孩子来说很不公平。拥抱他，但不要在你自己的床上。可以选择放置在其他地方的一把舒适的椅子或者沙发上拥抱孩子，也不要让他在你的怀抱中睡着。三个月之后，就可以让孩子偶尔在你的床上和你依偎在一起了，但还是不要让他在你的床上睡着。

如果你的孩子已经从你的床上转移到自己的婴儿床里，但却会在午夜重新被你抱回自己的床上，那你就无法逐步改变这个习惯了。你绝不能再这么做，要坚决停止。在孩子夜半醒来寻找你的时候，你可以抚摸孩子，安慰孩子，和他说悄悄话，在他耳边呢喃，轻拍他，假如你真的希望结束同睡的话就绝对不要让步。这意味着你得每一次都让孩子待在婴儿床里——凌晨 2 点、3 点、4 点，一直到 5 点都如此。如果你早上 2 点、3 点和 4 点都能安抚孩子，让他待在自己的婴儿床里，但却在 5 点把他抱到自己的床上，你就会令孩子感到困惑，并很可能让他学会下一次哭得时间更长，哭的更厉害。婴儿们不认识时间，他无法了解为什么你有时候会把他抱到床上，有时候却不会。这就是间歇强化的典型表现，这只能让你和孩子的生活都更加痛苦。

凯文(8个月)

海蒂和史蒂夫是那种“我们本来没有打算这样”与孩子同睡的父母,尽管凯文出生时是一个健康的、巨大的九磅重婴儿,也不需要整夜哺喂,但在8个月大的时候他仍然会在晚上每小时醒来一次吃奶。凯文的父母把他抱到大床上和他们同睡,是因为比起每一小时起来一次给孩子喂奶,与孩子同睡对他们的睡眠干扰会稍小一点。凯文也不在自己的婴儿床里进行日间小睡,尽管这种做法有助于最后结束同睡。但当海蒂决定停止夜间哺喂,让凯文待在自己的婴儿床里后,通过渐进法,进展比他们预料的要简单。

第一个晚上并不顺利。凯文大哭不休,海蒂坐在他的婴儿床边,他们之间频繁互动,在第一个晚上这样做是没问题,但你要小心不要让孩子习惯于这种互动。海蒂抚摸孩子的后背,和他说话,从婴儿床的栏杆里把胳膊伸进去让凯文抱着入睡。次日晚上海蒂坐在婴儿床与房门之间的位置上,只是偶尔轻拍凯文,与他讲话。当晚凯文只醒来一次。当孩子确实醒来时,海蒂就会安抚他,但把他留在婴儿床里。也不会哺喂他。他们让凯文含着自己的安慰奶嘴入睡,但如果凯文在夜里需要掉出去的安慰奶嘴时,他的父母只是把安慰奶嘴放到他手里,一言不发就离开。

又过了两个星期,凯文夜间醒来的次数逐渐减少,但这对夫妻的情况有些例外,不像一般常见的那样。当凯文确实醒来时,海蒂或者史蒂夫还是会走进他的房间安抚他,但当孩子又长大一些之后,他们发现如果自己走进孩子的房间,孩子就会更清醒,他们之间的互动更多,孩子也更难很快入睡。如果他们让凯文自己解决问题,他可能只哭一两分钟,然后就睡着了。“我现在可以忍耐孩子哭泣了——我知道这永远不会伤害他。”海蒂说,“最多两

分钟——然后他就睡着了。”如果凯文哭的时间比平时长或者比平时哭得厉害，这很不常见，他们就会满足孩子的需求，作出响应。

坎蒂丝(11 个月)

10 个月大的坎蒂丝极端厌恶她自己的房间。她一直和妈妈帕蒂同睡，而爸爸堂则因为害怕晚上把女儿压扁，一直睡在另外一个房间里。当坎蒂丝 6 个月时，她的父母试图恢复原先的夫妻同睡，并采用了“费伯睡眠法”来训练她。那简直就是一场灾难。坎蒂丝一直哭一直哭，她哭得越厉害就变得越清醒。这让她遭受到严重的心理创伤，甚至无法走进自己的房间，也不能在房间里玩耍，即便是在父母的陪伴下也不行。她继续回到父母的大床上，堂也继续回到客房睡觉。五个月又过去了，她的父母最后还是觉得必须要做点什么了。

第一步是让坎蒂丝重新熟悉她的房间。帕蒂在房间里放了很多吸引人的新玩具，他们两个每天都会在房间里玩耍。这个过程持续了两个礼拜。我们实际上改变了正常的顺序，并没有先着手进行日间小睡的训练，因为这对于坎蒂丝来说比较困难，我们先处理了晚上的睡眠。帕蒂把坎蒂丝放进她的婴儿床，自己睡在地板上的充气床垫上。当坎蒂丝不情愿睡下或者是在夜半醒来想要妈妈的时候，帕蒂就会靠近她，但不会把她抱起来。帕蒂的手会穿过婴儿床的栏杆轻拍并安抚她的女儿。

然后帕蒂和堂开始进行安睡女士渐进法。帕蒂注意到坎蒂丝开始学会了自我安抚，自己睡觉的技巧，缠绕她自己的头发，在她的婴儿床里玩耍，不仅会含着她的安慰奶嘴，还会拿着安慰奶嘴玩。

最后，终于到了可以“搬家”的时间了——将坎蒂丝留在自己的房间里，让她能够自己入睡。当帕蒂准备离开时，她告诉坎蒂丝妈妈会去哪里，打算做什么事情。前四五个晚上坎蒂丝确实哭了几次，但绝对没有到歇斯底里，无法自己平静下来的地步，她哭得也不是特别厉害，不到帕蒂和堂无法忍受的程度。在那些晚上，他们每五分钟在门口检查一次坎蒂丝的状况，如果觉得坎蒂丝需要更多的安抚，帕蒂会迅速拥抱女儿一下。这是他们最后的底线。

接下来在帕蒂和堂觉得已经完成训练时，坎蒂丝生病了。他们处理得很好，没有将坎蒂丝重新抱回自己的床上，而是采取了渐进法的第一步，帕蒂会坐在坎蒂丝的房间里，直到孩子非常平静和困倦，但还没有完全睡着为止。当坎蒂丝痊愈之后，他们用了几晚时间在门口观察她的情况。坎蒂丝很快就开始睡得非常好了。不久帕蒂和堂甚至还能留下坎蒂丝和保姆在家，夫妻二人外出晚餐了。“对我们来说这是一个完全不同的世界。”她的妈妈说，“现在她很喜欢在自己的婴儿床里睡觉。”

托德(14个月)

茱莉亚和雷德努力建立起一种亲子间的依恋，非常享受与他们的前两个孩子同睡的感觉，现在两个孩子都已经上学了。除了坚信家庭分享大床是培养亲子关系与安全感育儿方法的重要组成部分之外，茱莉亚还觉得自己可以无需起床走到另外一个房间就能哺喂孩子，对睡眠的影响更小，自己也可以休息得更好。

他们的前两个孩子都是女孩，从初生开始就一直同睡，但当孩子们开始固定下更有规律的睡眠与哺喂习惯之后——她们态度明确地不喜欢时间表的妈妈并没有抱怨什么——茱莉亚和雷

德开始把女儿们放回她们自己的婴儿床，采用适合孩子年龄的睡前仪式与习惯。如果她们在茱莉亚还醒着的时候就醒来需要哺喂，茱莉亚会在一把摇椅上哺喂孩子，然后把她们放回婴儿床。但当姑娘们在凌晨 2 点醒来需要哺喂的时候，雷德就会迅速抱起她们，把她们放到自己的大床上去。茱莉亚就可以迷迷糊糊地完成哺喂，然后每个人都可以安心地一起睡到早上。随着午夜哺喂的时间越来越晚，同睡的乐趣也越来越少。最后，女儿们终于在她们自己的婴儿床里整晚安睡，那时候一个女儿 9 个月，另一个女儿 12 个月。这种转变缓和而且轻松。接下来托德出生了。他们向我咨询的时候托德已经 14 个月大了。一切都很糟糕。

托德有很多健康问题，包括过敏和持续了很长时间的严重的耳道发炎，耳朵的炎症甚至导致他动手术在耳内置入了导管。尽管这些情况恶化了托德原本就很混乱的睡眠状况，但这对夫妻最终也没能完全弄明白睡眠不好的原因。一旦托德的耳朵有所好转，他的过敏又开始严重，于是他仍然无法睡得很长或者睡得很好。他比他的姐姐们需要的哺喂更多更频繁，睡得却更少，性格也更倔强。“托德是一个很难离开人的孩子。我们甚至不得不离开一所合作模式的幼儿园，因为托德没法和我们分开。”他妈妈说。

由于和托德同睡导致夫妻二人都睡眠不足，于是他们在托德 8 个月大的时候第一次试图把他转移到婴儿床里去，但并没能实现目的。结果托德甚至连日间小睡都不肯睡在婴儿床里，朱丽叶不得不用 30 分钟时间用儿童车推着托德在家里绕圈子。“没完没了地在实木地板上绕圈子真是极其无聊。”茱莉亚说。

晚上睡觉的时候也是一种斗争。他们必须得哺喂托德，抱着他轻摇才能让他入睡，如果不是在父母的床上吃奶，被拥抱着，托德就不肯睡觉。“我们不得不在孩子的睡前仪式中加入各种各样

的招数来哄他。”雷德回忆说。同时，他们还要照顾另外两个小孩，满足她们睡前的需要和要求。所以他们只能再把托德放回自己的床上，尽量把麻烦减到最少。

茱莉亚和雷德知道，如果托德愿意的话，他也可以在婴儿床里整晚安睡。托德证明了这一点，当茱莉亚因为肾结石和哮喘做手术时，托德只能用奶瓶喝她挤出来的母乳。托德不喜欢奶瓶，于是干脆整晚睡觉，虽然有些不太高兴。“直到我的乳房回到他的世界之前，他都可以整晚睡觉，乳房才是他想要的。”茱莉亚郁闷地回忆。

当我见到这一家人时，谈论了很多关于他们的教育方式的问题，他们能够做出怎样的改变，什么样的改变是从他们的性格、价值观和生活方式角度出发不能接受的。“我不是一个喜欢按照时间表行事的人——你让我遵守某些时间，我就会更加混乱。”茱莉亚说。她判断了一下什么任务是自己可以做到的，什么是需要交给雷德做的。她答应将托德每天的哺喂限制在六次，并且尽量尝试用其他安抚方式来代替哺喂，面对一个活泼而坚定的14个月大的小孩，这相当不容易，而且当这个孩子感到紧张时，他会试着爬到妈妈身上，掀起她的衬衫钻进去，在妈妈的衣服里面蠕动。他们还把晚饭时间从6点改到5点，这样他们就有足够的时间全家一起吃饭，然后在7点开始托德的晚上睡前仪式，到8点就可以让他躺下睡觉了。在此之前，托德一般都会在9点或者9点半睡觉，这对于一个一岁多点儿的孩子来说太晚了。

在晚上，当我们刚开始进行安睡女士渐进法时，我们希望能在哺喂与睡眠之间创造出明确的区别来。茱莉亚6点半左右会在楼下的阳光房哺喂托德。（大部分我合作过的家庭都会在孩子的卧室哺喂，格外注意不让孩子在哺喂时睡着。在托德的案例中，我们认为这种特殊的区别是必要的。）

茱莉亚知道自己不能进行最初部分的睡眠训练，于是雷德负责这个阶段。托德在第一个晚上比他们预料的更轻松地躺下，他的爸爸坐在他身边。但晚上 11 点托德醒来了，午夜又醒来一次。第二次醒来的时候情况就很糟糕了。托德激烈地哭号了一小时 20 分钟。雷德坐在他身边，安抚他，并且坚持住了。“我知道我可以触摸他，但是不能握住他的手。我知道可以拍他的后背，但拍一下就要停，或者可以轻轻地拍床垫。这么做对我来说比对托德还要艰难，因为你希望的不止如此——你希望能照料你的孩子。但我知道我不能握着他的手，因为几个晚上之后我会挪到更远的地方，等我挪到五步开外的地方后就握不到他的手了。”雷德说。

茱莉亚坐在房间外面，尽量让自己不去注意房间里的动静，最后终于意识到自己不能再听，再看婴儿监控器，并且试着去自己睡觉。

第二个晚上托德几乎要发疯了。雷德则完全心平气和，还记得说：“哦，老天，我家的婴儿床里是个恶魔小宝贝呀！”托德把婴儿床里的东西全部丢出去，还试着爬出婴儿床。他们给托德穿了一件非常大的睡衣，结果他完全迈不开腿。

“我只是不断地重复同样的安抚的话，好像我在教小狗耍把戏一样。‘托德，你可以自己睡觉觉。你可以自己睡觉觉。’到第三个晚上，我简略成‘睡觉觉，睡觉觉。”雷德回忆说。

第三天雷德看到了一些进步。虽然仍然并不轻松，但看看他的记录。雷德发现托德哭了 22 分钟。“这种感觉太强烈了——现在回头看他第一个晚上哭了 1 小时 20 分。我急得团团转，而且一点儿乐趣都没有，但慢慢地情况就变好了。”雷德和茱莉亚在这个时候仍然有些犹疑，并且反复地质问自己，但最后还是决定坚持下去，并给予彼此精神上的支持。

到了雷德应该离开孩子房间的时候，他却变得更乐观了。“我发现下一步其实并不能算是一大步。我相信托德能做到。”雷德每五分钟左右就会回来察看托德一次。当晚由茱莉亚来担任值班的任务，她检查的次数更少，因为如果托德看见她，却得不到哺喂的话会非常愤怒。“有几个晚上真的非常困难，”她回忆说，“但我们知道他必须得做到。”

茱莉亚说自己仍然相信依恋型的亲子关系，并且开始研究西尔斯的理论与育儿方面的建议。但她更能够基于孩子的性格进行修改与选择，如果没有完全按照依恋理论的书籍上的建议做，她也不会担心自己可能会伤害到孩子或者削弱自己与孩子之间的关系。“我是西尔斯理论的拥护者，而且我也愿意信任他的理论。”她说，“但在我们开始进行睡眠训练之前，我发现自己拥有的是一个可爱、聪明但是疲倦的小男孩。当我们结束了训练，我得到了一个可爱、聪明而且精力充沛的小家伙。”他并没有缺乏安全感，没有减少对父母的依恋，没有缺少爱，也没有不开心，他只是没有那么疲倦了。

部分是由于他们对于同睡的问题还有些矛盾感，部分是由于这个家庭在接下来的几个月中经历了很多改变与调整——在世界金融危机大潮中雷德失业了，他们全家周游了很多地方，试图选择新的一处重新安家——他们并不能总是完全地坚持下来。有时候托德在晚上睡觉前完全不哭，有时候可能会哭四五分钟，但从来不会超过五分钟，也不像他在起初两天时哭得那么厉害。托德会说的一句话是“妈妈，躺下，床。”有时候父母中的一人确实会让步，和他一起躺下，尤其是当他们正在旅行或者从一个地方搬到另外一个地方的时候。“我们违反了几次原则，”雷德说，“然后就得用几天再纠正过来。我们学到的内容是你越习惯于一种模式，越坚持这种习惯，孩子就更容易了解他到底该怎么做。”

几个月之后，托德通常只会在酒店里和姐姐们一起睡觉的时候才会哭喊。而且他的爸爸透露说："他之所以这么做只是因为他觉得住酒店太奢侈了。"

亚历克斯(15 个月)

阿黛尔和杰夫在找到我之前几乎读了全部关于睡眠的书籍，并对亚历克斯尝试了各种方法。那时候，亚历克斯已经 15 个月了，并且对于自己应该如何睡觉感到非常困惑。"每种方法都有一点儿用，但都不能完全起作用。"阿黛尔说。他们很早的时候就对亚历克斯使用过"费伯睡眠法"，这方法虽然能帮助他入睡，但却没法让他一直睡着。最后，他们决定任由亚历克斯在午夜时分醒来之后哭泣，但实际上却根本没法忍耐；孩子不停地哭，一口气哭了三四个小时。"我没法忍受。那时候是早上 2 点，他就不停地哭，完全没有停下来的迹象，而且哭泣令他更加清醒。这让我恐慌。所以我还是过去哺喂他，哄他睡觉了。这倒是有用；只要五分钟孩子就睡着了。但我每个晚上都要这样做三四次。"

安睡女士小提示

孩子们通常会睡在某个我们看起来很不舒服的地方——但他们会觉得很好。除非存在某种危险，不然你尽量不要把他搬到其他地方去。如果孩子们确实感到不舒服，他们会表现出来的！(尽量在得到医生的建议之后再选择非传统的睡眠地点，不过这只是以防万一可能导致窒息的危险，孩子会接受那种能保持他呼吸顺畅的睡眠姿势。请阅读第 15 章"医学问题"以获得更多信息。)

随后阿黛尔为亚历克斯断掉了夜间的喂奶，但这是一个漫长的过程，用了大约六个礼拜，部分是由于亚历克斯在此期间生了几次病，当他身体不舒服的时候，阿黛尔只好又开始哺喂他。到了一岁，断夜奶总算结束了，但亚历克斯晚上睡觉的时候仍然会不断醒来，阿黛尔则完全不能忍受孩子哭泣。在无计可施的情况下，阿黛尔把亚历克斯抱到了自己的床上。“我们就这样反反复复在婴儿床与大床之间来来回回。这太糟糕了，我感觉自己完全失败了，因为我是一个坚定的反对与孩子同睡的人。”阿黛尔和杰夫意识到他们不能再用这种临时的解决方法给亚历克斯增添困惑了。他们决定进行安睡女士渐进法，并坚持下去。这并没有耗费他们太多时间。

在我们开始进行渐进法之前，确保让亚历克斯进行了良好的日间小睡，使他不至于在晚上过度疲劳。他在自己的房间里小睡，我们把小睡的时间限制为上午一小时，下午 90 分钟。我们希望能将他的日间小睡时间最大化，好让亚历克斯在晚上做好睡觉的准备。我们希望他晚上感到疲倦，但不至于过度疲倦；有一些精力但不至于精力充沛到可以不睡觉。我们还从渐进法一开始就把日间小睡时抱着他轻摇的时间减半，尤其是上午的那次小睡。

为了准备进行渐进法，杰夫睡在亚历克斯房间的地板上，亚历克斯睡在婴儿床里。在那个地方，杰夫可以在亚历克斯夜半醒来时安抚他而不需要把他带到自己的床上。杰夫还负责渐进法开始后的前几个晚上与亚历克斯一起进行睡前仪式，因为亚历克斯和很多学步期的孩子一样，和爸爸在一起睡觉的时候哭得比和妈妈在一起的时候少。但此后由于工作和起床的时间关系，阿黛尔开始负责平时的晚上，杰夫则负责周末的晚上。“我们每三天挪动一次位置，也就是说要有三天睡在地板上，三天坐在床边，三

天坐在门口附近的椅子上，三天坐在门口，三天坐在门外。就在我们刚刚移到门外的时候，孩子真的很长时间没有在夜间醒来，也没有怎么哭闹。他有点儿焦躁，我上前对他说‘睡觉觉’，他就会躺下睡着。但他的小脑袋会突然间像小乌龟一样抬起来看看是不是还有人在这附近，不过这只是偶尔发生。有些夜晚我听到他会短暂地哭闹一阵，但很快就能再度入睡。”他的妈妈回忆说。

当亚历克斯在夜间醒来时，阿黛尔和杰夫不会把他从床上抱起来，他们非常坚持不把他带回自己的大床。“我会走进他的房间说‘睡觉觉’或者‘天黑黑，睡觉觉’然后轻拍他的后背。我会把他的动物玩具递给他，在第一个礼拜，我会坐在他的房间里或者躺在他房间的地板上。”他的妈妈说。尽管亚历克斯确实在晚上哭过，但也绝不像他们之前经历过的那样一个晚上哭三四次。他最长一次曾经哭过 30 分钟，而且总是需要有一位家长留在他的房间里安抚他。“他是个爱哭鬼；他是爱尖叫的孩子。但他很快就明白哭泣不会改变任何事情。他不会来到我们的床上。他必须睡觉。”

当亚历克斯在夜间醒来时，他通常会叫着站起来。阿黛尔会轻拍床垫，鼓励孩子躺下，但她不会动手帮他躺倒。“他原本站着，然后就会坐下，他会坐着睡着，然后像一棵树那样倒下去。”这并不会吵醒他，阿黛尔和杰夫很快就学会了让亚历克斯独处。在他睡眠周期的某些时刻，亚历克斯会自己爬到一个更舒服的睡觉位置去。但如果他们试图让亚历克斯躺下，或者把他摆直，结果就会事与愿违，亚历克斯就会再次清醒过来。

凯里(两岁半)

劳拉和理查德是那种典型的“我们本来没有打算这样”与孩

子同睡的父母。凯里通常睡在婴儿床里，要么就是没睡在婴儿床里。当他开始哭闹着要妈妈的时候，劳拉就会在自己的卧室或者客房里陪他一起睡觉。凯里很小的时候就从婴儿床搬到了儿童床上去，儿童床的尺寸躺不下他的妈妈，但当他像很多学步期的孩子一样从床上跳下来时，他们通常就会一起睡在地板上。

从理智上说，劳拉并不反对与孩子同睡，但他们一起睡得都不好。“如果我必须和他一起睡——好吧，可以。但和他一起睡并不能解决问题。凯里睡觉极端不安分。他会在床上转90度，踢我的头，滚来滚去。我非常担心他会从床上滚下去，他动得太厉害了，我完全没法睡着。”劳拉说，她是一位临床医学家，了解很多关于较大的孩子行为改变的原因，但却发现“当你对待你自己的情感因素和自己的孩子时就会有太多的不一样”。

在凯里两岁半之前我怂恿他们拆掉了儿童床，把床垫直接放在地板上，因为那才是凯里习惯睡觉的地方。在开始安睡女士渐进法之前，我们大幅度地改变了他的睡前仪式，但并没有缩短亲子相互依偎的时间。他们会洗澡、刷牙，等等，然后劳拉和凯里会依偎在孩子房间的一张小沙发上一起读书。为了让妈妈给他读他的最后一个故事，也是最特殊的一个故事《玩具总动员》，凯里必须得自己上床。“这就是诱因；我们可以诱使他自己躺到床上去。”劳拉说。他们还采用了一种用星星贴纸的时间表来督促孩子实现更好的晚上睡觉的行为。

在给凯里读完故事之后，劳拉会关掉房间的灯，开始进行渐进法，坐在孩子身边的地板上。第一个晚上，她把自己的手放在孩子身上，因为她知道孩子需要这种接触。第二个晚上，她会很小心地控制自己的手时不时地接触一下凯里，以免将之变成另外一个睡眠支撑。前几天晚上当凯里醒来时，她会回到孩子身边轻拍他的小手，但不会在他身边躺下。

自从凯里开始躺在地板上，并习惯劳拉的陪伴之后，劳拉就再也没有用过椅子。她坐在地板上，但还是按照渐进法进行移动，移动到床尾、门口，然后移动到客厅里。但自从凯里习惯关上房门之后，她就开始坐在客厅的另外一头，靠着一扇关闭的房门。“他知道我就在对面。他并不会真的在意具体是什么地方；他已经渐渐地能够自己入睡了。”

凯里的进展很好，在两星期之内就完成了渐进法。但他仍然会在晚上起来找妈妈。劳拉会沉默地把他送回房间。抵制躺在孩子身边陪他睡觉的冲动——当你很累，想要让孩子和自己都能尽快再睡下的时候这是一种非常强烈的冲动——但劳拉还会待在当晚孩子睡觉的时候她应处的地方，直到凯里再度睡着为止。凯里夜间醒来的次数逐渐变少。偶尔还有一些反复，因为每次凯里生病或者旅行都会退步，但总体来说进展相当顺利。

在我开始接触这个家庭几个月之后，当凯里快三岁的时候，我建议劳拉再严格一些，她总是很难对孩子设置限制。我建议她在白天给孩子足够的选择机会，但要在睡觉的时候对孩子的行为执行非常严格而又明确的限制。这意味着偶尔可能会让孩子在睡前发脾气，但劳拉学会了在不至于倒退回与孩子同睡的情况下制定规则与适合孩子年龄的条件。

两个孩子(狄伦，5 岁；莱拉，15 个月)

当莎娜取得硕士学位并开始在一家特殊学前班工作时，已经开始研究不同文化下的儿童教育，并开始相信同睡是正确而自然的育儿方式。当她和尼克有了孩子后，他们被亲子依恋理论吸引。莎娜随时按照狄伦的要求哺喂他，一直母乳哺喂到狄伦差不多两岁半的时候。她与狄伦在一张吊床上同睡，日间小睡的时候

也和孩子躺在一起。尽管他们尝试过让孩子搬到床上去，但并没有成功，狄伦通常还是会和父母呆在一起。到他四岁的时候，莎娜生了他的小妹妹莱拉。

莎娜开始并没有让莱拉一直待在本来就很挤的大床上。相反，她把莱拉放在大床旁边的附加小床上睡了6个月，然后才把女儿放到全家一起睡觉的大床上去。同时，他们开始着手让狄伦搬到他自己的床上去。他们尽量让狄伦离开他们的大床，但其中某位家长最后总是会陪狄伦一起躺在他的床上！或者他们会哄他睡着，然后狄伦自己又爬上父母的大床，又或者原本睡在某个地方的某个人，最后会睡在另外一个人身边的地板上。

被这种状况搞得总是睡眠不足的莎娜设定了一个目标。她希望狄伦能够整夜睡在自己的床上。她希望15个月大的莱拉可以停止夜间哺喂，睡在自己的婴儿床里。在我的帮助下，她和尼克开始同步处理两个孩子的睡眠问题，尼克主要负责狄伦，莎娜则主要负责莱拉，因为莱拉仍然还是在晚上睡觉之前和日间需要母乳哺喂。

他们为了5岁的狄伦召开了家庭会议，并解释了他们对孩子的期望。他们为狄伦做了一张贴纸作息表，上面有五条睡觉的规则。如果狄伦在一周之内赢得了全部五颗星星，他就会得到一样奖品。狄伦同时还得到了来自他同学的精神支持与竞争压力，因为我同时还在帮助另外一个小姑娘。当他们比较彼此赢得的星星数量时，也成为了好朋友。

他们开始进行安睡女士渐进法。“一开始狄伦会哭，会说‘我要妈妈’。然后他会为自己能够平静下来并睡着而感到骄傲。”莎娜说。如果晚上狄伦跑去找他们，其中的一人就会平静地把他送回自己的房间。“我们会坐在他房间门外的一把椅子上，他可以看到我们，但是不能交谈。如果他做了噩梦或者感到害怕，我们

会帮他想想高兴的事情。”莎娜说。

经过了五年的同睡，以及对于同睡一直存在的矛盾情绪，他们两人并不是总能坚持。他们知道和狄伦一起躺下并不明智，但他们还是会故态重萌，有时候他们的心会把他们的头按在小儿子的枕头上，有时候他们只是太累了，实在爬不起来。他们变成了一种混合着堕落的“坚定的同睡支持者”与“我们本来没有打算这样”与孩子同睡的父母。

当尼克越洋旅行时，莎娜正怀着第三个孩子，她允许狄伦在妈妈的床上“暂时睡一夜”。“他会从自己的床上下来走进我的卧室，我就会让他上床——我没法在自己怀孕而尼克又不在家的时候同时处理他和莱拉两个人的睡眠问题。对她来说这太复杂，太无法控制了。”她知道这会对睡眠造成怎样的影响，但也决定面对这个后果，相信等尼克回家之后能够处理好这些问题并得到更多的休息。

同时，莱拉也在进步，主要是由于莎娜决定在下一个孩子出世前就改善莱拉的睡眠。夜间断奶只用了两个晚上。莎娜仍然会在睡前哺喂莱拉，但整夜就只给她一杯水；莱拉对这杯水并不是特别感兴趣，所以干脆不喝。同时，她把孩子睡觉时候的注意力从抚摸妈妈的头发转到一件心爱之物上。

有时候莱拉至少会在晚上有一段时间睡在婴儿床里，但她的婴儿床放在父母的房间里。现在他们把婴儿床挪到了她自己的房间去。莎娜和莱拉第一个晚上一起睡在地板上，但莱拉仍然试图睡在妈妈的胸口。尽管莎娜特有的方式与表现是非常缓慢而平和的，但还是有些原因让她不能够在地板上睡太久，莱拉会开始期待这种睡觉的方式。第二个晚上她在睡前哺喂莱拉，在她昏昏欲睡的时候把她放进婴儿床里，并开始进行渐进法。

在前几个晚上，莎娜坐在莱拉身边时，小姑娘接受了这种合

理的改变，但当妈妈移开椅子的时候，莱拉从婴儿床里站起来，让大家都知道她不高兴了。莎娜一开始尽量让自己成为一种安静而有抚慰性质的存在，但到了周末她意识到如果自己离开房间，莱拉可能会表现得更好。莱拉哭了三分钟——莎娜几乎能数出泪珠儿的数量——然后就自己睡着了，并且一直都睡得很好。但她次日醒来得过早，凌晨5点就醒了，因此这几个早上莎娜都睡在地板的垫子上，她的存在能帮助莱拉再度睡着。稍后如果莱拉醒得太早，莎娜就会走进她的房间轻拍她，安抚她，然后等莱拉再度入睡之后离开房间。

接下来的六个月，莱拉的睡眠很好，但还称不上完美，主要是因为全家人在渐进法完成之后不久的夏天离开了一个月。莱拉很早就开始学着用便壶了，这虽然有好处，但她会叫着“便壶，便壶，便壶！”试图在夜间从婴儿床里出来。她有一段时间能够整夜安睡，但随后就开始在凌晨4点到6点之间再度醒来。两岁之前她还试图爬出婴儿床，但莎娜阻止了她。“我还没准备好让她离开婴儿床。于是只好让她继续呆在里面！”就像很多学步期的孩子一样，莱拉也会经历晚上睡觉时候的分离焦虑阶段，莎娜进行了几次试验，试图减少这种焦虑。她发现有时候莱拉寻求的是妈妈的存在而不是妈妈的触碰。她在夜晚坐在莱拉房间的椅子上，尽管莱拉还是会抗议，她还是会很快就离开孩子的房间，不然她在未来的几年可能都要坐在那个地方，对于怀着第三个孩子的莎娜来说，这绝对不是她的计划。

莎娜和尼克仍然希望同睡，但是决定在养育第三个孩子的时候还是要略加限制。计划同睡四个月，然后把婴儿放进婴儿床里。对于每一个孩子他们都更加注意孩子多长时间吃一次奶，他是否真的需要乳房，还是在表达一些婴儿的需要和要求。“我仍然相信要按照孩子的需要哺喂——但我必须得先学会如何分辨

他需要的是什么，他是否真的饿了。我必须知道什么时候我可以哺喂他，哄他睡觉。”莎娜说。

莎娜还看到了自己态度的进化，并对每个孩子都保持着这种进化的态势。她把狄伦的热情与温柔亲切的性格归功于在他婴儿时期产生的亲子依恋关系上去，并且仍旧无法容忍狄伦的哭泣。“他一哭我们就会上前。”对待莱拉则不同，莎娜可以忍受莱拉的泪水，也不觉得需要给她与狄伦一样多的身体接触。“对于每个孩子，我都非常了解，也有很多经验。我仍然在接受西尔斯理论的引导，我喜欢亲子依恋的人生观，但我也喜欢睡眠科学。这就是我的心与我的大脑在睡眠问题上的矛盾对立。感觉很自然的东西并不一定是最能促进睡眠的；感觉很自然的东西有时候更容易阻碍正确的发展方向。”

第 4 章　帮助双胞胎或兄弟姐妹睡觉

我的安睡女士指导方针，无论你有一个、两个、三个乃至于更多的孩子都可以使用，但当使用对象增加时，难度也会相应成倍增长。父母们需要知道如何协调两个孩子的时间表和睡眠方式，要知道何时孩子们可以共享同一个房间，什么时候应该分开。在本章节中，我会特别关注那些有双胞胎的家庭，同样也会展示几个案例，告诉你们如果一个家庭中有几个孩子，并需要同时处理存在冲突的睡眠需求——尤其是晚上睡觉——的时候应该怎么做。同时可以阅读一下与你的孩子年龄一致的章节，以获得更多关于他们的睡眠与作息时间需要的细节内容。

双胞胎

照料两个新生婴儿是一项艰巨的任务，我鼓励那些有双胞胎的家庭尽可能早使用作息时间表，尤其是哺喂时间。可以先阅读一下上册第 5 章“新生婴儿的正确起点”和第 6 章“初生到 5 个月”来获得更多指导。在孩子 6 周大的时候可以先开始进行新生儿睡眠塑造训练中比较柔和的第一个阶段(如果他们是早产儿，就要按照调整之后的年龄计算，从足月生产的日期向后推算 6 周，而不是从出生的日期开始算)。开始每天至少一次在孩子昏昏欲睡的时候把他放下，并观察他们的睡眠窗口。在早上固定的时间唤醒孩子，或者让一个孩子叫醒另一个，这样你就可以更早让他们开始实现同步生活。有些妈妈会同时哺喂孩子，让他们一人一边乳房。另外一些妈妈则会哺喂先醒来的孩子，然后再叫醒另外一个并哺喂他。这种方式仍然能保证他们在 30 分钟或者 45 分钟之内都醒过来。

如果你的孩子们早产，他们可能需要更长时间才能整夜安睡。但如果他们很健康，体重正常，发育状况也很好的话，时间就

不会特别长。咨询一下你的医生，不过对于他们来说，大约到4个月的时候就能在夜间一口气睡8～10个小时，到6个月的时候整夜安睡（经过调整的年龄）都是合理的。不要自以为是地把他们的早产当作借口，对他们的睡眠需求不加任何控制。

从子宫到房间

这些孩子共享着同一个子宫，因此让他们共享同一个房间也是个好主意。有些家庭甚至会把他们放进同一个婴儿床呆几个月，直到他们学会翻身为止。是的，他们也会咕咕哝哝、呜咽，发出各种婴儿们专有的奇怪声音，但是他们几乎总是睡在彼此发出的声响之中，你应该鼓励他们这么做。要注意别在其中一个孩子发出什么响动的时候急匆匆地做出反应。很多父母都会在一听到有孩子哭叫就马上冲过去，担心一个孩子可能会吵醒另外一个。在你保护睡眠很好的孩子的同时，可能会让睡眠不好的孩子睡得更糟。你的反应会让他知道无论何时只要他一开始吵闹，你就会立刻冲上前把他抱起来，而睡着的那个孩子却可能会被你遗忘；或者他也可能会醒来一下，然后像你一直期望的那样很快就自己再度睡着。三胞胎或者四胞胎的父母也能把这些方法应用到自己的孩子们身上，大部分家长不让孩子们分开进行日间小睡仅仅是因为他们没有足够的房间！一位家长得坐在房间正中，即孩子们的中央，便于安抚他们。孩子们很快就会学会在他们兄弟姐妹们的哭闹声中安睡了。

7个月大的伊桑和纳撒尼尔都是睡眠不好的孩子，他们总是会互相吵醒，然后要求被抱着轻摇。“必须有人抱着他们直到他们睡着。你要是把他们放下，他们就会马上醒过来，然后就开始变得不安，你就又要继续抱着他们轻摇。”夏绿蒂回忆道。晚上对于两个困倦的父母来说情况更糟，而白天夏绿蒂独自在家，想要

同时抱着两个孩子踱步和轻摇哄他们进行日间小睡更是不可能的事情。

安睡女士小提示

我要对所有的家长都提出强烈建议，尤其是那些有双胞胎的家长，一定要进行简单的进食与睡眠记录。想要不写下来就记住一个婴儿的全部睡眠历史是相当困难的；如果是两个婴儿简直就不可能了。记录还能帮助你发现孩子们的睡眠时机，睡眠信号与生物钟的区别以及重合的部分。

与我合作的时候，夏绿蒂和艾德开始设计更好的睡前仪式，学会把儿子们在昏昏欲睡的时候放下。他们虽然会哭，但夏绿蒂会时常过来，坐在房间里帮他们平静下来。她从不会让孩子哭的时间超过十分钟才到他们的房间。然而，在日间小睡的时候，他们会分开两个儿子，并在整个学步期和上学前的时间都一直让他们两人分开小睡。

在那种双胞胎之一睡得很好，另外一个则总是频繁而喧闹地醒来的案例中，醒来的孩子确实会干扰另外一个孩子的睡眠，我承认这种例外，并在夜间进行睡眠训练的时候会将两个孩子分开。等到睡眠不好的孩子可以整夜安睡之后（或者根据年龄需要，而你也乐意如此的话，只需要醒来一次进行夜间哺喂即可），你就可以让他再去和另一个孩子一起分享房间了。将睡眠不好的孩子留在原地，将睡眠很好的孩子移到另外一个房间，必要的话让他睡在便携婴儿床中，通常是个好方法。睡眠好的孩子适应性更强，调整自己的睡眠适应新的睡眠环境也更简单，尤其是如果比起孩子原本的房间，新环境更安静，更昏暗的时候。

仙蒂和乔纳森的双胞胎玛丽莎与萨莎都患上了严重的新生儿疝气，因此而时常发作绞痛。这对夫妻得到了很多帮助，四位祖父母都住在附近，但有时候六个成年人都没法照料好两个疝气绞痛发作的婴儿。当仙蒂刚开始向我咨询时，我告诉她最好等孩子的疝气结束之后再开始进行睡眠训练。到了四个月的时候，疝气终于好转，我们也开始进行睡眠训练了。

一开始女孩子们都睡在同一个婴儿床里，或者睡在他们父母的大床上，后来则换到一对秋千床上。仙蒂把摇晃秋千当作应对疝气的临时措施；从8～12周她常常用这种方法哄孩子们睡觉，然后开始将孩子们待在秋千床和婴儿床里的时间明显地分开。仙蒂和乔纳森还开始尝试让孩子们在秋千床里睡觉的时间间隔加长，同时减少哺喂次数，这是另外一个明智之举，为我们随后的训练做好了铺垫。等孩子们稍微长大一点儿后，仙蒂和乔纳森开始在晚上睡觉的时候把她们放进婴儿床，只在深夜孩子们醒来之后很难再度入睡的时候才把她们放进秋千床。

当我开始与这个家庭共事时，孩子们四个半月大，我们希望能完成让孩子们从秋千床彻底换到婴儿床里的改变，然后将夜间的哺喂、哭泣、捡安慰奶嘴和各种各样其他麻烦的数量都尽量减少。我建议这对夫妻不要太快冲进孩子房间，也不要在孩子们只是稍作试探的时候就把她们从婴儿床里抱起来。仙蒂和乔纳森在双胞胎房间里安装了监视器，但是他们仍然会在明知道没什么问题的时候也冲进孩子们的房间。他们学会用更加精确客观的态度观察监视器。“哪怕孩子只有四个月，我也能看到玛丽莎一边哭泣，一边看看门口，然后哭得更厉害。”仙蒂回忆说，“她希望能看看是不是会有人过来！她只有四个月！这告诉我，我才是被训练的那个人，自那以后，我们真的开始努力去改变这种状况，去训练孩子了。”

夜晚的睡眠得到了改善，尤其是当父母们决定不再整晚帮孩子捡起两套安慰奶嘴之后，那时候孩子们五个月大了。玛丽莎比萨莎睡得更好些。萨莎有时候会开始把她所有的心爱之物和玩具都扔到玛丽莎的婴儿床里，然后开始因为再也没有最喜欢的东西在身边而开始号啕大哭，令玛丽莎不得不醒来，从婴儿床栏杆间把萨莎的毛毯递回去，好让两个人都能睡觉。“她们两个有很多心灵相通的地方，你可以很清楚地发现。”仙蒂说。

日间小睡起先非常困难，因为女孩子们的作息时间不一样，如果一个人把另外一个吵醒了，那么一整天对她们两人来说都会很糟糕，而且还会殃及到第二天。为了延长孩子们日间小睡的时间，并让她们的日间小睡步调一致，仙蒂用了两个月时间在白天让她们两人分开小睡。

日间小睡

尽管我通常会建议在晚上睡觉的时候让双胞胎在一起，但也经常会建议日间小睡的时候把他们分开，因为白天的睡眠对于大部分婴儿来说都是更加困难的挑战。如果有一个玩伴可以令他们分心，或者旁边婴儿床里的孩子会干扰他们的话，对于孩子来说睡觉就更加困难。有些家长会让双胞胎分开日间小睡，从几天到几周不定，还有一些家长则在孩子的整个儿童时代都让他们分开小睡。选择你感觉最好，看上去对孩子也最有效的方法。

双人日间小睡的训练很困难。如果你很幸运的话，一个孩子可能会睡得很好，你只要训练另一个就可以，无论是用我的安睡女士渐进法还是我在相应年龄段的章节中提及的其他日间小睡的训练方法都可以。但如果他们都需要进行日间小睡的训练的话，你就可能不得不先安抚其中一个孩子，然后离开他去安抚双胞胎里的另外一个；接着在十分钟左右再踱回来察看第一个的状

况，过十分钟后再去察看第二个孩子的状况，如此反复。（这绝对是无趣的过程。）如果一个孩子比另一个日间小睡睡得少，你可能还得在晚上睡觉的时候把他更早地放到床上；或者如果孩子不到9个月或者10个月大，还得尝试让他在下午三点之后挤出一段特别短的时间让他小睡作为补救。

7个月大时，赖安睡得很好，但安博就睡得很差。“每次安博醒了，整个家都会被他吵醒。”他们的妈妈梅勒妮回忆说。“赖安很不高兴。”梅勒妮通常会在安博一开始哭叫就冲进他们的房间，担心她会吵醒赖安。她尝试过各种方法，抱着安博，把她放在汽车座椅上，或者偶尔不情愿地让她哭一段时间。有时候梅勒妮唯一能让安博睡着的方法就是背着她。“那简直没法忍受；她越来越大，越来越大，越来越大。”她妈妈说。

当安博开始吃药治疗食物逆流时，她的夜间睡眠得到了相当大的改善，但日间小睡仍然是大麻烦。梅勒妮分开了两个孩子，用我推荐7个月婴儿使用的方法（详见上册第7章“6～8个月”）重点处理安博的日间小睡。

安博非常愤怒，甚至在日间小睡的时候不想让她的妈妈留在身边。在刚开始日间小睡训练的几天中，她能整整哭一个小时。但十天之内，安博就能抱着她的心爱之物，睡一个又好又沉的午觉了。梅勒妮让孩子们在晚上睡觉的时候也和日间小睡一样分开。她们只有在度假的时候才分享一个房间——赖安虽然很享受这种有人陪伴的感觉，但也要为之付出代价，他的姐姐早上很早就会把他叫醒，哪怕他用尽方法想要无视她都不行。

对于6个月或者更大的婴儿来说，如果他们很难入睡，很难熟睡，很多家庭都会使用安睡女士渐进法来帮助他们，我的系统方法是让家长们逐渐淡出晚上的睡觉时间，让孩子们获得能够自己睡觉的信心。按照孩子的年龄选择对应的渐进法。如果只有

一个孩子需要渐进法的帮助，则明显更简单一些，你可以临时性地把双胞胎分开睡觉，直到完成渐进法为止。如果两个孩子都需要渐进法的帮助，那么如果一位家长坐在孩子们婴儿床的中间，依次反复温柔地轻抚、安慰每个孩子，这才是最简单的过程。到了第三或者第四个晚上，你要更多使用自己的声音而不是肢体来安抚孩子们。对于 6 个月以下的婴儿来说，请按照第 5 章“新生婴儿的正确起点”和第 6 章“初生到 5 个月”中给出的关于睡眠塑造的建议行事即可。

晚上睡觉

对于你的双胞胎宝宝来说，晚上睡觉是一种花样百出的事情——有时候非常可笑，确实很像真正的杂耍。例如，梅勒妮知道自己的孩子们需要父母的密切关注，需要听完美而平静的睡前故事。可是这说得容易，做就难。“我可以让一个孩子坐在膝头，但两个就不行了。我放下一个孩子，另一个就马上爬上来。晚上睡觉前应该是一种放松的美好的交流时间，但对于我们来说则非常紧张。”

我通常会告诉双胞胎的父母关上房门，给孩子们换上睡衣，单纯地给他们念书。如果一个孩子起身，要继续读书，尽量吸引他的注意力，但不要勉强他。如果到了关灯时间，无论他们有没有注意听故事都要让他们进到婴儿床里去。

梅勒妮根据孩子们的性格与年龄尝试了各种渐进法的变体。她通常会在开始给孩子们讲故事前让孩子们选择三种位置的其中一种——大家都坐在地板上，分别坐在她身边；都坐在她膝盖上；大家都坐在沙发上，分别坐在她身边。“我不能说每次这三种方法都一定非常有效，但通过三种位置的反复调整，我发现孩子们在读书的时候选择某种位置的次数更多一些。”当孩子们稍微

长大一些后，开始对读哪一本书产生了分歧，于是梅勒妮会先开始给她们读同一本书，但如果安博对赖安的选择表示不屑一顾的时候，她就会让安博假装自己“读”她选择的那本书，反之亦然。“双胞胎之一可以‘读’自己觉得更好的一本书，我则会给另外一个念比较没意思的那一本。”梅勒妮说。

在可以采用时间表之后，有些父母会分担晚上哄孩子睡觉的责任。比如，到了18个月大时，凯拉和查理都从婴儿床里搬了出来，有了自己的房间。他们都会在夜间醒来，要求喝一瓶牛奶（当他们长大一点儿后，遇到了另外一种晚上睡觉前常见的难题，就是想在杯子里装果汁），并想要父母陪他们躺下。查尔斯会给查理一个晚安吻然后去照料凯拉，换莫莉过来照顾查理，因为查理在睡前总会有些喜怒无常。在对查理说晚安之后，莫莉还要在凯拉也上床睡觉之前陪伴她几分钟。凯拉需要更长的时间才能睡着，她在独自睡觉时遇到了更多问题，她需要父母的陪伴，通常，莫莉会坐在走廊的椅子上。某天晚上当查尔斯必须工作到很晚时，莫莉会在同一个房间里给两个孩子讲故事，然后先把容易睡着的查理送到床上，再把凯拉送到床上。

道恩和克拉克尝试着让全家都遵循同一个作息时间。现在已经过去两年半了，孩子们会洗澡，选择三本书，坐在儿童房的沙发上依偎着父母听故事。接下来艾莉森会关上灯。不甘示弱的斯科特又回去打开灯然后回到原位。最后他们都躺到自己的婴儿床里。他们很愿意互相陪伴，也不像大部分这个年龄的孩子们那样不允许父母们偶尔地敷衍和匆匆离开。但有时候艾莉森会觉得弟弟的陪伴还不够。“艾莉森会大叫；你必须得过去，帮她盖好毛毯，轻抚她的后背。我们每天晚上都要这样做三四次。真是受不了，她会一直哭到感觉自己可能不会实现目的了。”道恩说，“斯科特则更平静一些。他躺下，85%的时间都没问题；如果艾莉

森哭了，他只是躺着看她。但一旦斯科特注意到艾莉森的某些细节，你就能听到他说‘我也要换尿布。’他会看艾莉森做些什么，并且在心里记住。”

现在三岁半的纳撒尼尔和伊桑仍然睡在同一个房间里。他们最近从婴儿床换到普通床上了，这就产生了一些新的拖延睡觉时间的借口，问一点儿这个，问一点儿那个——问题非常全面。

夏绿蒂和艾德在执行了一种非常有规律的睡前仪式之后马上就得到了回报，而且这种睡前仪式每一位父母都能做到。给孩子们洗澡、刷牙，在起居室读一两本书，最后上一次卫生间，然后回到卧室唱一首儿歌，喝一杯水，最后关灯。“对着两个三岁的男孩，你也会变成一个监督者的。”夏绿蒂笑着说。“根本没有让步的空间。”

纳撒尼尔最近经历着这样一种阶段，他会醒得非常早，然后他做的第一件事就是叫喊“伊桑，伊桑！”直到他的兄弟醒来为止。他的父母为纳撒尼尔做了一张贴纸作息表；他必须得让伊桑睡到太阳升起为止。如果他获得了整栏的贴纸，就能得到一件玩具。（用兄弟姐妹作为一种威胁通常也是好方法——毕竟他们总是被粗鲁吵醒的那一个！）

作息时间变化

双胞胎也会有不同的睡眠需求，但他们的区别不会特别大，也不会与平均水平有超过一小时的偏差。有些研究发现，比起异卵双胞胎来，同卵双胞胎更有可能需要同样多的睡眠。无论怎样，你都不应该给他们使用完全一样的作息时间表，但你应该让他们很类似。

有一种技巧是确保双胞胎在早上半小时之内叫醒彼此。然后同时开始上午的小睡。例如，如果双胞胎之一早上自然醒来的

时间是7点，另外一个则是8点的话，可以在7点把那个贪睡的小家伙叫醒——或者可以让他睡到7点半，你先哺喂完早起的孩子之后再叫醒还在睡觉的这个。然后他们应该在9点或者9点半左右一起准备开始上午的小睡。同样，如果一个孩子在上午小睡的时候睡得时间比较长，可以稍早些叫醒他，这样他们在下午的小睡时也能保持同步。下午的小睡则是上午睡得比较少的孩子补眠的机会，也就是说需要更多睡眠的孩子可以在下午小睡的时候睡得时间略长些，在日间小睡与晚上睡觉之间你还需要一段比较长的时间间隔来调整，让孩子们同时开始晚上的睡眠。

你还应该定期调整孩子们的作息时间，因为在不同时间，他们需要的睡眠可能会有很大改变，这依赖于何时孩子们会进入快速生长期，或者何时他们能达到生长发育的关键点。

5个月时，艾莉森和斯科特仍然睡在父母房间的摇篮里，靠近克拉克一侧。他们有迥然不同的作息时间，而且谁的作息时间都与父母的不一致。总有一个孩子似乎是醒着在吃奶——或者至少需要父母帮他找到安慰奶嘴。

现在是时候让孩子们离开摇篮和父母的房间，睡到他们自己共享房间的婴儿床里了。我们给了孩子心爱之物，斯科特是一只小老虎玩具，艾莉森是一只小兔子玩具。道恩和克拉克取消了安慰奶嘴，而且是突如其来地取消，然后当双胞胎寻找他们的安慰奶嘴时坐在附近安抚他们。

这些婴儿成长得都很好，表现也很好，不再需要随时哺喂。在咨询过儿科医生之后，我们将夜间哺喂减少为一次。我们用了几个礼拜的时间来修改和调整，但最终还是让他们的作息时间趋于一致，在孩子们渐渐适应新的睡前仪式时也能在没有额外哺喂的情况下安抚他们。“如果一个孩子睡着了，另外一个在哭泣，那我们也会顺其自然。”道恩回忆说，“我们不会冲过去抱起那个哭

泣的孩子，我们要让他们都学会自己再度睡着。”

有时候，哪怕是学步期的孩子，如果一个在早上很早就醒来，也会试图引诱另外一个和自己玩耍，但通常如果克拉克和道恩让他们两个独处的话，每个孩子都能在五分钟之内就再度睡着。“他们会自己寻开心，”道恩说，“你时不时就能在监视器里听到艾莉森说‘斯科特，看这个。斯科特，你试试。’然后你就会听到‘呼呼呼呼！砰砰砰’的声音，你会知道孩子们正在玩着什么东西。”

对于很多家庭来说，时间表的最大的变化会在孩子 15 个月或者 18 个月时出现，此时双胞胎开始将两次日间小睡合并成一次了。如果你只有一个学步期的孩子，这可能只是麻烦；但如果你有两个转变速度略有不同的孩子的话，那这就真的是一种痛苦了。（阅读上册第 9 章“13～18 个月”获取更多日间小睡合并的建议。）

“当一个孩子从上午的小睡醒来时，我们会叫醒另外一个孩子，让他上午的小睡时间略短，这样他们下午的时候就能同时开始小睡了。这个过程很复杂，但只需要几个礼拜就可以。”夏绿蒂说。

道恩回忆起一种类似的体验。“艾莉森睡得不如斯科特多。她喜欢醒着嘟嘟囔囔，斯科特则学会无视他姐姐。但当一个孩子开始转变为一次小睡时，我们只好强行让另一个也开始转变。我们必须施加外力，按照时钟进行小睡。我能看出斯科特确实很困倦；艾莉森也不像平常那样配合。但当斯科特上楼睡觉的时候，艾莉森也会跟着去。”

兄弟姐妹们

对于那些有几个年龄接近的孩子的家庭，本章节前面给出的

一些关于双胞胎的内容还是有用处的。但在这里我还会回答一些经常听到那些有两个或者更多孩子的家庭提出的问题，比如：

- 我怎么哄两个孩子睡觉？
- 父母两个应该怎样分担责任？
- 怎么样进行日间小睡？
- 一个哭泣的孩子会吵醒或者吓到睡着的孩子吗？
- 如果让孩子们分享同一个房间会怎么样？如果一个孩子睡在床上，另一个孩子睡在婴儿床里会怎么样？
- 如果他们要在同一个时间上床睡觉该怎么办？如果他们不在同一个时间上床睡觉怎么办？

晚上睡觉

一般的行事原则是先让最小的孩子上床睡觉。这根据孩子们的年龄、性格、孩子们之间竞争的程度，大哥哥或者大姐姐想不想听弟弟妹妹的故事和儿歌，想不想将对弟弟妹妹说晚安当作睡前仪式中的一个部分等情况而定。如果不是，要确保大一点儿的孩子忙于玩一个安静的游戏或者活动，没时间用吓唬或者刺激弟弟妹妹的方式来干扰他们的睡觉时间。你肯定不希望三岁的孩子（或者比三岁还要大的孩子）常常在你试图哄小一点的孩子睡觉的时候冲进房间。当我第二个女儿格雷琴还是婴儿的时候，睡前需要在一种平和安静的气氛下进行最后一次哺喂，如果他们的爸爸不在家，没法照顾我们的大女儿卡利时，我就会采用这种方法。当格雷琴一岁，卡利三岁时，我会在格雷琴的房间里为两个小家伙一起读一本“幼稚”的图书。然后卡利会在自己的房间里等我把格雷琴放到床上。当格雷琴睡下后（她知道怎么自己入睡，所以我不需要陪着她），我会来到卡利身边，给她读一本“大一点儿”的书，确保她和我能有一个只有我们两人（妈妈－卡利）的

时间。(我接下来马上谈论分享房间的问题。)

如果晚上父母都在家,一个人可以照料小婴儿(如果孩子还在吃奶,通常是妈妈负责),另外一个照料大一点的孩子们。但有时候可以稍加改变,好让每个孩子都知道应该如何与每一位家长一起进行晚上睡觉前的仪式。确保每个孩子都能有一个和父母在一起的特殊的美好夜晚。如果每个人都有机会能让孩子的睡觉前仪式提前一个小时左右开始是很有帮助的——可以稍后再做其他家务事。哪怕你们在家里总是例行公事地完成孩子的睡前仪式,也要看看是否能在你们开始使用作息时间表的时候找到一个机会进行练习,这会让睡前仪式变得更加灵活。如果做不到,看看是否能请祖父母、亲戚或者朋友帮忙。一个人用渐进法帮助婴儿,另外一个则帮助大一点儿的孩子。如果在你训练小孩子的睡眠时让大孩子稍等片刻可能会更加简单。然后你可以用同样的方法训练大孩子。

“我们错开安排孩子们的睡觉时间。”凯瑟琳说,她的孩子莫德和肖恩年龄稍差 26 个月。“对于一位工作的家长来说这很困难,因为莫德一般会在晚上 7 点睡觉,在需要工作的三天里,我只有一个半小时来陪她。但我知道她马上就要睡觉去了;在 9 点或者 9 点半睡觉的孩子更容易乱发脾气。”

当凯瑟琳忙着照顾莫德的时候,大哥哥肖恩知道那是小妹妹与妈妈的特殊时间。他会看 30 分钟电视,那是一个适合晚上观看的安静的节目,或者他和爸爸度过一段特殊的游戏时间。然后他会选择是让爸爸送他上床睡觉,还是要和妈妈在一起度过属于他的时间。另外一个家长稍后会走进他的房间祝他好梦,并给他一个晚安吻。当莫德还是个婴儿,肖恩两岁大的时候,这个家庭就建立起了这种基本的生活规律,一直到肖恩四岁半还在继续执行,当然也做了一些很细微的修改。

格里塔和马特让两个孩子在一起度过了讲故事的时间。当爸爸给大哥哥读书的时候，弗雷德里克会很高兴地站在自己的婴儿床里指着书上的卡车图片。当孩子们每个人都需要更适合年龄的故事时，这个方法不再起作用，父母这才让他们分开度过睡前的时间。

有些孩子会经历这样一个阶段，他们在睡觉前只想和父母中的某人在一起——通常是妈妈。

“我会先哄小宝宝睡觉，但我经常会听到阿瑞拉的声音清楚地在家里回荡；她不想和爸爸呆在一起，她想要我。而佩吉也能听到阿瑞拉的话，于是接下来我只好面对阿瑞拉不肯睡觉，佩吉又大哭的局面。我们确实很努力地尝试让道尔哄女儿睡觉，但阿瑞拉真的马上就需要我陪伴，我则必须陪着佩吉，因为她还在吃奶。”玛茜说。她和道尔仍旧温柔但坚定地让爸爸参与阿瑞拉的睡前仪式。道尔现在可以在某些晚上帮女儿洗澡，哄她吃晚饭，尽管阿瑞拉仍然坚持让妈妈为她讲故事、关灯。同时，为了避免小女儿也出现这种情况，道尔用越来越多的时间在睡前陪伴佩吉，他也会在孩子仍然会在夜间醒来的时候定时去检查女儿的状况。

有时候我们会非常担心小孩子的哭声会吵醒或者惊吓大孩子，所以总是很快地冲上前去。奉劝你尽量不要落入这种圈套，因为你是在不断增强小孩子的睡眠支撑，从而让他不断地在夜间醒来。如果孩子一哭你就飞快跑过去，他就没有停止夜间哭泣的理由了！可以尝试着先短暂地到已经被吵醒的大孩子身边去，而不是到正在大声哭嚎的小孩子那里去。比如，如果你正在训练一个 6 个月大婴儿的睡眠，这个婴儿吵醒了你两岁大的孩子，那就先到两岁的孩子身边安抚他。告诉他小婴儿很好，他应该继续睡觉。然后再去看 6 个月大的婴儿。如果两个家长都在家里，那么

可以分别安抚孩子，每人照料一个。你还可以尝试一下给大一点的孩子安装白噪音发生器。

如果你能告诉大孩子什么是睡眠训练，为什么他的小弟弟或者小妹妹有时候会哭，可能会更有帮助。大部分两岁半左右的孩子都能够理解。我建议父母可以召开家庭会议，来解释你的目的并找到一种方法让大孩子（或者大孩子们）感觉自己也是弟弟妹妹的睡眠教育中的一个部分。

根据大孩子的年龄与睡眠状况，你甚至可以让她自己想想怎么能做小孩子的睡觉榜样。告诉她小婴儿需要学习如何自己睡觉，就像他的大姐姐那样。解释说如果婴儿学会了就不会再常常哭闹了，但现在你得陪着他或者时常检查他的状况。如果大孩子理解了，你也能让她成为你的伙伴，这会让你的计划更轻松。因为，当你最后开始让小孩子自己入睡的时候她也不会总是找出各种理由呼唤你，干扰你的训练了。使用贴纸或者其他小奖励、小礼物都有帮助。你的目标一般说来是防止大孩子感觉被取代了。相反，你应该让她觉得自己更被需要，得到了更多的爱，更重要了。（详见第 7 章“特殊状况”中关于有小弟弟妹妹出生问题的建议。）

有时候如果你的孩子年龄差距比较大，最大的与最小的孩子之有 8～10 年差距的话，看起来生活会相对轻松，因为大孩子能帮助照料小弟弟或者小妹妹，至少能照料他自己。某种程度上这是没错的，但孩子们也确实存在不同的需求——生活、学习、情感——有时候在晚上你会觉得自己已经被分成了好几个部分。有时候，一边帮一个 3 岁的孩子在楼上洗澡，一边要小心不让 12 岁的孩子偷偷用餐厅里的电脑；或者一边要努力让小孩子感到舒服，想要睡觉，一边大孩子每五分钟就会急匆匆的冲进小孩子的卧室问你六年级的数学家庭作业怎么做时，真的非常痛苦。我见

过一些家庭让大孩子帮助哄小孩子睡觉，或者至少在同时假装自己要睡觉，不过大孩子们并不一定愿意，或者可能总是偷懒耍滑。

日间小睡

作息时间可能会在孩子们的日间小睡或者活动之间产生矛盾，这也会导致睡眠障碍。比如，你可能发现 6 个月大的孩子自然的日间小睡时机非常精确，恰好就是在你得去接大孩子放学的时候开始。看看是否能找出拼车的家长来尽量解决这种矛盾。如果你确实得驾车出门，婴儿在车座上睡着，那么要么你就干脆让孩子在汽车婴儿座椅里面一直睡着，要么就是教她学会如何转移到婴儿床里：如果孩子在你挪动她的时候醒来，抚摸并安抚她，让她继续睡觉。然后是大家的午饭和午睡。如果孩子仍然还是每天小睡两次，那么下午小睡结束之后开始每天的游戏比较好；如果孩子合并成一次小睡的话，就在上午开始。

父母们通常会发现，无论他们多么不愿意让第一个孩子哭泣，可在第二个孩子出生之后他们仍然多少要遇到一些冷落第一个孩子的状况。例如，如果你在对 8 个月大的孩子进行日间小睡训练，让 3 岁大的孩子在楼下，让这个学龄前的孩子一个人待着，自己陪婴儿待整整一小时通常是一种很难熬的经历，除非有保姆或者亲戚能常常在孩子日间小睡的时候过来帮忙。就算学龄前的孩子并不介意自己一个人待着（他可能会很介意——一小时是一段很长的时间），你在婴儿的房间里也会坐立不安，胡思乱想着大孩子是否真的安静地待着，还是用手指在起居室的沙发上划来划去。

某些时候有可能的话，你可以留下婴儿哭几分钟，自己则去陪一下 3 岁的孩子。尽量和婴儿一起做一下日间小睡前的仪式，然后在孩子昏昏欲睡的时候把他放下。每 10～15 分钟检查一次

他的情况;你也不希望他一直哭。但仅仅是出于必要的话,你可以稍微采用一点类似费伯睡眠法的方法来训练第二个孩子的日间小睡。

你曾经在新生儿的相关章节中看到过玛丽安和格伦的故事,他们在四年之内生了三个孩子。霍莉的睡眠非常糟糕,迪恩则好得多,当他们生下艾莱后就更简单了。“对于艾莱,我不知道自己做得对不对,或者她做得对不对。”玛丽安说,“她有一些食物逆流,需要吃药治疗,但我们对她做的训练和以前完全不同。我们会让她稍微哭一会儿;每次她哭泣我们都不会抱她起来。我们不能!我们还有两个小孩子要照顾。在日间小睡的时候如果她哭了,我们也不能到她的房间去,我发现她能够马上自己继续睡觉。也许最多哭五分钟。当她醒了,如果我知道她的日间小睡结束了,我会马上过去帮她起床,但如果时间还不到,我就会留下她自己多待五分钟,她也能继续睡觉。”

偶尔,我会遇到那些认为对小孩子进行睡眠训练会让大孩子压力很大的家庭。例如爱伦就在训练凡妮莎睡觉的时候把她非常敏感的儿子詹姆斯送到他祖父母家里。幸运的是,爱伦和凡妮莎在一起要比和詹姆斯在一起轻松得多,睡眠训练也只用了三天就完成。通常这都不是问题,只要了解了大孩子对小孩子的睡眠训练的想法或者让父母中的一人陪伴他,安慰他,告诉他婴儿不会一直哭下去,大孩子就能睡得很好了,有时候可能还会做些美好的梦。

分享房间

当你哄小孩子上床睡觉的时候,可以尝试让大孩子在隔壁的房间里安静地玩耍一会再到他自己床上睡觉。(如果你仍然住在只有一间卧室的公寓里,睡眠训练虽然困难,但也不是做不到。

可以看看上册第2章“入门指南与成功的小技巧”中我给出的建议。)

父母们通常会向我征求意见,是否应该让孩子们分享同一个房间,或者他们多大的时候应该分开睡觉,尤其是一个男孩和一个女孩的情况下(假设这个家庭有足够的房间给每个人)。我不认为有什么一定正确或者错误的答案;只要你觉得好就可以去做,当然,还要看看孩子的表现再做决定。他们足够大的时候能够清晰地表达出自己的观点。

在将小婴儿转移到大姐姐或者大哥哥的房间之前就完成睡眠训练会比较有帮助。训练孩子的时候,你可以让孩子先在你的房间(或者家里的另外一个房间),等训练完成再把他转移到和大孩子共享的房间去。另外一个选择是如果他们已经在同一个房间里了,你可以将大孩子临时从自己的房间转移到你的房间或者家里的另外一个房间。当然,对于那些很容易就会觉得自己被取代的孩子来说这不是一个好方法,一定要向他解释这只是在婴儿学习睡觉的时候采取的临时措施。你甚至可以让这件事听起来有趣一些。

当你已经将婴儿转移到大孩子的房间里之后,教大孩子学会一种好的“睡眠习惯”。不要和婴儿讲话、玩耍或者在他睡着的时候叫醒他。解释一下分享房间是一种特殊情况,好的睡眠习惯则是非常重要的。

你可以在一个房间里对在婴儿床里或者床上的两个或者更多孩子进行训练(我成功地指导了四胞胎的父母这样做),哪怕他们的年龄有轻微差距也没关系。如果父母中其中的一个会负责整晚的任务的话,那么可以坐在孩子们的床或者婴儿床中间,当孩子们需要安抚的时候,从一个孩子开始依次安抚每个人。如果一个孩子在婴儿床上,一个孩子在普通床上,确保大孩子知道只要他躺到床上,就要一直呆在上面。

回顾一下相关年龄章节中关于好的睡眠习惯的小提示。如果两位家长都有空，能够在渐进法的前三天中每人待在一个孩子的床边，那么一切就会更简单。一旦进行到了第 4 个晚上，父母其中的一位就可以将椅子挪到两个孩子都能接受的位置。具体细节可以从“双胞胎”部分的内容中寻找。

第 5 章　噩梦、夜惊和梦游

噩梦、夜惊和梦游是很明显的现象——任何一种都不代表严重的情感困扰或障碍。

噩梦是自然发展的一个部分，在 2～3 岁之间达到最高点。这个年龄段的孩子们有极其丰富的想像力，并在区分现实与想像之间存在一定的困难。噩梦发生在快速眼动睡眠阶段，孩子们醒来之后会感觉焦虑或者害怕，但他能想起父母并寻求安慰。

夜惊相对较少见，只有 5%的孩子会出现这种状况，其中男孩多于女孩，并且能够一直持续到上学。夜惊发生在非快速眼动睡眠阶段，这时候我们并不做梦，所以孩子不会记得恐惧的内容。（如果你想了解快速眼动睡眠与非快速眼动睡眠的相关知识，可以看上册第 4 章“睡眠的基本要素”。）夜惊可能会被夜间来检查孩子状况的父母干扰，但这不是严重的情感困扰或者障碍的标志。你无法完全消除夜惊，但可以逐步削弱这种现象。通常孩子们长大之后夜惊现象就会消失，这种现象很少能一直延续到青春期。

就像夜惊一样，梦游是一种在极度深眠状态下被干扰而出现的局部清醒现象，孩子们第二天完全不会记得。在孩子四处游荡时，会打开门，爬上梯子，安全通常是梦游需要面对的最大问题。

噩梦

噩梦通常会发生在睡眠周期的末尾，孩子能回忆起梦境，或者至少知道自己做了噩梦，他需要一段时间来忘记害怕的东西，然后才能继续睡觉，当然，噩梦通常会在发生很困难的事情或者孩子们经历变故、压力，乃至于体验到一些创伤之后发生。噩梦还会在孩子过度疲劳的时候发生，也可能因为孩子仍然没有学会如何好好睡觉，或者由于疾病、旅行、家庭生活作息时间改变等导致几天的睡眠习惯被扰乱而发生。但有时候噩梦的出现并没有

特殊原因，就像我们成年人也会在没有什么特殊情况或者特别不开心的生活体验的情况下做噩梦一样。

你不可以预防一切噩梦——噩梦是儿童时代的一个部分，就像它也是成年人生活中的一部分一样。但你可以尽量削弱噩梦的影响，并且让它们很少发生。比如，避免看恐怖片、恐怖小说，不玩恐怖游戏，在睡前也不要讲恐怖故事。不要玩恐怖的游戏，如果你的孩子比较胆小，白天也不要玩，除非你可以把它们变成一种并不恐怖的游戏，让你的孩子把恐怖的妖怪变成可笑的妖怪等类似的形象。

当孩子确实做了噩梦时，你应该快速回应他，安抚他，并告诉他他是安全的。如果需要的话可以拥抱着他，哪怕你正处在进行睡眠塑造的过程中或者安睡女士渐进法的过程中需要尽可能减少与孩子的肢体接触也无妨。待在孩子的房间里直到他再度睡着。虽然躺在孩子身边陪着他是一个很诱人的想法，但尽量避免这么做，或者尽可能地简短，尤其是如果你正在努力打破同睡的习惯或者以前曾经同睡过时更要注意。

安睡女士小提示

孩子们会发现更多我们难以注意的吓人的内容，无论是远方的飓风、其他小区的火灾或者世界上各种令人不安的新闻等。通过电视新闻的片段或者成人的交谈，他们可以得到足够令他们害怕的信息，却还无法真正理解这种危险对于他们或者他们爱的人有多么遥远，多么不现实。尽量对孩子可能会听到或者看到的，容易导致他们恐惧和不安的东西保持警觉。通常，当小孩子在场时尽量避免看电视新闻或者收听新闻是比较明智的做法。

丰富的想像力能够创造出噩梦，同样也有助于击败噩梦。比如，很多三四岁的孩子都有想像出来的朋友，你可以帮助孩子支持这些朋友帮他抵挡噩梦或者妖怪。你也可以利用孩子的心爱之物；提醒他心爱之物整晚都陪在他身边，让他感觉自己安然无恙。孩子们还喜欢用他们的想像力来设定梦境的内容。“今晚我要做一个打篮球的梦”或者“今晚我要做一个在海滩堆沙堡的梦”再如“今晚我要做一个变成漂亮的芭蕾舞女演员的梦”，等等。这都有助于让孩子感觉自己对入睡之后可能会发生的事情更有控制力，尤其是在他们正在担心自己会做噩梦的时候。我的“美梦卡”（同样可以在我的网站上找到）能帮助孩子们感觉自己可以控制梦境，这是基于我女儿关于“创造”梦境的经历设计的，卡片可以引导孩子们通过一种不断递进放松的练习，以及为梦境设计形象，比如树屋、海滩美景、花圃和彩虹等。

到了 5 岁，很多孩子都能理解梦境与现实之间的区别了。尽管这种认识是不连续的，孩子们仍然需要温柔的体贴和安抚，就像我们成年人在做了噩梦之后也需要一个特别的拥抱一样。

有时候孩子会因为做噩梦而害怕自己的房间，或者开始更加不喜欢晚上睡觉的时间或者在夜间更频繁地跑出房间。可以在白天用更多时间和他在他房间里玩耍，让他感觉在房间里更舒服，更安全。到了晚上，拿出一点额外的时间在睡觉前进行放松，包括睡觉前将一个关于孩子们战胜恐惧的故事。

回顾一下孩子的睡眠时间表（如果他有的话），提醒他好的睡眠习惯是什么，如果他做到了就要公平地进行奖励。如果他在夜间因为噩梦而醒来，并跑到你的房间，把他送回床上之后可以待在孩子身边，直到他感觉好一些为止。

有时候父母们会在孩子做噩梦之后睡在孩子的房间，但要注意不要太频繁，时间也不要太长。否则这就会变成一种负关联或

者睡眠支撑，孩子会需要你一直陪在他身边。（如果你觉得在孩子的噩梦平息之后，自己能够很快地再度训练孩子摆脱这种习惯的话，那么可以躺在他身边。）

在睡觉的时候，如果孩子担心会做噩梦，告诉他你会在附近，会格外关注他。“妈妈会在自己的房间里读书”或者“爸爸会在客厅整理衣服。”向孩子保证你会经常来察看他的状况，并且一定要实现你的承诺。不仅是因为这种察看会令他感觉安全，还因为这能让孩子待在自己的房间里而不是每过五分钟就尖叫着跑出来寻找你。如果能让孩子感觉好一点的话，可以稍微开着一点儿房门，也可以开着灯，甚至还可以额外打开客厅的灯。如果你的孩子先提起噩梦，可以和他一起讨论，但不要“引起关于噩梦的话题。”换句话说，你不应该提醒孩子昨晚他做了可怕的噩梦，如果孩子晚上跑进你的房间，你第一句话也不应该是“你做噩梦了吗？”你要有同情心——不要在孩子可能因为害怕而从床上下来时对他大喊大叫。

下面还有一些建议，虽然，不是每个办法都能帮助每一个孩子，但你可以试试看哪种方法对你有效，或者哪种方法能帮你和你的孩子找出对你们最有帮助的解决方案：

1. 可以让一只宠物睡在孩子的房间里。

2. 尽量让孩子们分享同一个房间直到他们都养成良好的睡眠习惯，并且能一直保持下去为止。

3. 做一些“驱魔喷雾”的活动，如果你正在教育孩子世界上没有魔鬼的话，孩子可能会不太明白这种喷雾为什么还能驱赶魔鬼，那么就改成“驱赶噩梦喷雾”。

4. 让孩子创造他自己的噩梦防御工具。我遇见过一个比较大的小女孩，大约 8 岁，她在自己的床边布置了一块地方，放满了图画与照片，她觉得这样可以保护自己。另外一个孩子则布置了

一只捕梦笼。我还知道一些孩子在床边摆满了他们的毛绒玩具或者活动人偶，以此来保护自己。我也听说过一位非常有想法的幼儿园老师让自己的孩子们制作了“怪物盒”——用一只盖子就可以捕捉怪物并把它们关起来。

5. 如果你们有宗教信仰的话，可以把一些祈求安全的内容包含进睡前的准备当中，或者干脆自己创造一种特殊的仪式或者咒语。你的孩子可能会想像出一位守护神注视着自己，或者和你一起背诵一段祈祷文，让爱、光与安全围绕着自己。

6. 帮助孩子行动起来，用一种实际的方法赶走不好的念头，这可以让他感觉一切不好的东西都离开了。把它们从窗口丢出去。（确保让孩子看见“不好的东西”都被扔掉了，这样他就不会在早上上卫生间的时候害怕了！）我认识的一位妈妈和上幼儿园的孩子一起做了一棵“害怕树”。她用棕色的建筑绘图用纸制作了树干和树枝，用绿色的即时贴做树叶。每天晚上孩子都从树上扯下一片树叶撕掉，表示对夜晚的恐惧已经消除了。

7. 如果你的孩子已经发展出了充分的语言能力，教他递进的放松技巧，从大脚趾开始收紧再放松肌肉，然后是脚掌，从脚到头进行一遍。如果你不想自己也跟着做，可以播放一张舒缓的 CD。你还可以尝试着创造一个场景，帮助孩子想像和他的堂兄弟们在沙滩上玩耍，或者在公园里散步时树叶改变了颜色，任何可以让他感觉快乐而安静的想像都可以。孩子们有时候喜欢假装自己是最喜欢的一本图书（不是恐怖故事书）里的角色，或者喜欢自己编一个故事，他们是故事里的公主或者王子，又或者是一座美丽的大花园里的魔法小仙女等。

8. 睡前一段时间避免让孩子摄入高剂量的维生素也是一种明智的做法，如果你的孩子在服药，询问一下儿科医生这种药物是否会干扰睡眠，如果是的话能否找一种替代的药物或者至少改

变服药时间。

夜惊

夜惊同于噩梦，尽管它们都会令孩子感到痛苦，但也绝不是心理问题的标志。夜惊区别于噩梦，尽管你的孩子第一次做噩梦或者第一次夜惊的时候你不会马上意识到它们的可怕。

一个孩子在夜惊的时候可能会尖叫、大喊、出汗，心跳加速，焦虑不安，看起来非常难过。他的眼睛可能会睁得很大，他看上去似乎是醒来了，但实际上这只是一种深度睡眠被干扰之后的局部清醒，他实际上仍然还在睡眠中，而且很可能无法认出你来。他甚至可能会推开你或者打你，哪怕这时候他还在喊你。夜惊通常会持续 5～15 分钟然后平息。夜惊通常会令父母更加不安，比经历夜惊的孩子还难以忍受，因为孩子通常不会记得这件事，但父母们会记得。

夜惊通常会发生在非快速眼动睡眠阶段（也就是从深层睡眠中产生）而且通常是在孩子睡着之后的两小时之内发生。夜惊最大的风险因素是可能会导致孩子过度疲劳——夜惊会在孩子进入更深层睡眠之前干扰他。睡眠呼吸暂停也是一种危险的因素，所以要和你的医生讨论一下这种情况发生的可能性。压力可以干扰睡眠，比如大幅改动的睡眠时间，一个新的睡觉地方都能成为诱因。一个睡眠时间不定的孩子通常面临的风险更高。夜惊还会在孩子面临重大的生长发展转折点时或者生病发烧的时候产生。

“我的孩子并不常做噩梦，我也不认为他能梦见任何我知道的标准的鬼怪噩梦。结果某个晚上，他生病了发着低烧，就在他三岁生日前，我在晚上 10 点半或者 11 点左右听到了一阵震耳欲

聋的可怕的尖叫，”这个三岁孩子的妈妈说，“孩子在尖叫‘妈妈，妈妈！’我冲过去告诉他我在他身边时，他时而对我尖叫，时而打我，就像他不认识我，我让他受到了惊吓一样。我把他抱起来紧紧地搂着，后来我才意识到我可能不应该那么做，他一直冲我尖叫，我不断地告诉他我在这里，看起来他在认出我与害怕我之间游移不定。”

“然后突然间一切都结束了。紧张感一下子从他身上消失，他马上又回到了安静的睡觉状态，看起来非常平静而满足。我大为震惊，后来整晚都睡在他房间里，但他一直都很好，白天也再没提起过晚上发生的事情。他没有任何问题，包括后来他又一次着凉肚子疼的时候都没有问题，但过了几个月之后当他又发烧的时候这种情况再次发生。我仍然用了几分钟才意识到发生了什么，但至少我有一点儿心理准备了。但看着孩子的样子我还是觉得有点可怕而无助，不过至少我知道这只是因为发烧，孩子几分钟之后就会没事。”

如果孩子父母中的一人在儿时曾经有过夜惊或者在深度睡眠被干扰之后会出现局部清醒如梦游等症状的话，孩子更有可能出现夜惊现象。如果你的孩子在夜惊时起床四处游走——这种情况偶尔也会在那些没有梦游经历的孩子身上发生——一定要保证孩子的安全。考虑一下在附近的楼梯上安装儿童安全门。

孩子夜惊时，你要跟着他，确保他的人身安全，在夜惊期间要避免他走到比较危险的地方去；但不要打扰他，因为这可能会增强夜惊的程度；尽量不要触碰孩子或者抱起他，因为这可能会延长夜惊的时间。走到孩子身边，待在他的房间，平静地安抚他。早上起来之后不要向他提起夜惊的事情。因为在夜间夜惊主要的作用就是干扰睡眠，让孩子早点上床睡觉，哪怕只提前三十分钟也好。要格外注意让孩子保持一种持续性的睡眠时间。

如果夜惊总是频繁发生，而不是偶然因为发烧或者临时的生活作息改变产生的话，就要做一下睡眠记录来监控夜惊的时间与频率。如果夜惊会在一周内的固定时间(比如睡着之后的两小时之内)发生两三次，尽量在通常夜惊开始前的 15 分钟叫醒孩子。不要让孩子完全醒来，只要叫他，让他能够咕哝、翻身或者活动就可以。然后让孩子继续睡觉，看看你是否能通过干扰睡眠循环而减少夜惊。连续这样进行 7～10 个晚上，如果夜惊还是会发生，就继续唤醒孩子，但这一次要进行整整两个星期，看看你是否能控制这个问题。

梦游

梦游类似夜惊，也是发生在非快速眼动睡眠期间，由于深度睡眠被干扰而产生的局部清醒状态，此刻孩子没有做梦。梦游的发作通常会在孩子睡着之后的两小时内，但梦游完毕之后孩子完全没有印象。一个梦游的孩子看起来像是醒着，但是通常表现得比较茫然，很可能动作笨拙地做一些奇怪的事情。他不需要来自父母的安抚，尽管他可能不会尖叫也不会表现得像产生夜惊的时候那样害怕。梦游和夜惊一般都发生在家里。

你可能会很吃惊地发现梦游实际上非常常见，尽管长期或者频繁的梦游相当少见。在《儿科睡眠问题临床指导：诊断与治疗睡眠问题》(*A Clinical Guide to Pediatric Sleep: Diagnosis and Management of Sleep Problems*)一书中，朱迪·敏德(Judi Mindell)和朱迪思·欧文斯(Judith Owens)指出，15%～40%的孩子都至少有过一次梦游，3%～4%的孩子会频繁梦游。梦游发作的时间从每周、每年到四至八年不等，但大约三分之一的梦游者会在超过一年的时间跨度内发作，大约十分之一的梦游者梦游时间

可能长达十年。

安睡女士小提示

尽管夜惊不代表孩子有心理问题或者生理疾病，你还是应该和你的儿科医生讨论一下这种频繁的夜惊，确保没有什么必须处理的潜在的创伤、疾病或者窒息可能。检查一下，看看孩子在吃什么药物，包括任何非处方药物，这些都有可能干扰他的睡眠，导致夜惊。

最重要的问题当然是安全。你不希望梦游的孩子从楼梯上滚下去，或者爬上任何他本来爬不上去的地方，在地下室绊倒或者直接走出家门。你应该在楼梯上安装儿童门并锁上家里的大门。如果你听到孩子在梦游，不要叫醒他，但尽量温柔地引导他走回去。如果你担心自己可能会听不到孩子的动静，那就考虑安装一个报警器，或者某些临时的装置，比如当孩子打开自己房间门会发出声响的铃铛。睡眠不足是导致梦游的一种危险的因素，所以应该确保孩子有充分的睡眠，并且按照有规律的时间表睡觉。对于梦游的孩子，我确实建议你要咨询一下儿科医生，这要根据孩子梦游发生的频率和他受伤的风险决定如何处理，医生可能会为你开一张短期的睡眠治疗药方。

第 6 章　医学问题

咳嗽、感冒、中耳炎、腹痛，这些都是常见的儿童疾病，都能暂时性地干扰孩子的睡眠，在本书下一章节“特殊情况”中将会帮助你解决这些困难。在此我将谈论一些更为复杂而顽固的医学问题。由于我并非医生，因此联系了我自己的儿科医生菲思·哈克特博士帮我编辑本章。如果你经常采用行为修正的方法，无论选择了我的安睡女士法还是任其哭泣法，你的孩子仍然睡不好的话，请联系你的医生来判断孩子的睡眠问题是否是由于生病引起的，如果有必要还可以请专家诊断。

在咨询儿科医生的时候，要确保你全面地复述孩子的睡眠习惯，包括睡前的习惯，哪怕医生本人没有问到的问题也不要遗漏。给医生提供足够的信息来判断问题所在。做一下睡眠的记录，或者至少记下一些字条，并且还要向医生解释你曾经使用过的行为修正方法。如果你的孩子会有规律地呕吐，你怀疑这是食物逆流征兆的话，尽量记录下孩子呕吐的时间与频率。比如，你可以告诉医生你的孩子每天要吐 5～7 次，进食之后 10 分钟开始呕吐，这就比直接告诉医生孩子“总是吐”有用得多。同样，如果你怀疑孩子可能对什么东西过敏，记录一下他表现出的症状。如果你担心孩子可能会出现呼吸暂停的问题，最好能录下孩子五分钟左右的鼾声、鼻息或者其他在夜晚听起来很响而且很奇怪的声音，让医生亲自听一下。

安睡女士小提示

每一个由于医学问题导致睡眠出现问题的孩子都能从行为修正方法中获益。例如，相比已经开始学习如何延长睡眠时间的同龄婴儿，你的孩子可能因为健康问题需要继续进行夜间哺喂。但是，即便无法消除夜间醒来的问题，你仍然可以在晚上睡觉与日间小睡的时候教孩子学习良好的睡眠习惯。

食物逆流与疝气

吐奶是婴儿常见的现象，这可能会导致你需要清洗衣服，但这并不算是健康问题。然而，当婴儿们过度吐奶或者呕吐时，比如一天吐很多次，他们就可能患上了胃食道食物逆流症。

食物逆流很常见，十分之一的婴儿会受到影响。这可能是由于很多种因素导致，通常是因为很多婴儿的胃食道瓣膜（通俗的说法是处于胃部上方的瓣膜）发育尚不完全，需要更进一步的生长。在一般的案例中，这种现象都表现为孩子的胃灼热症状。而在更严重的案例中，过多的胃酸会把食物，比如母乳、配方婴儿食品等推出孩子的胃，冲上食管，然后冲到嘴里，有时候甚至会冲到鼻腔中。由于呕吐，很多婴儿都出现了与呼吸有关的症状，并有可能面对气管吸入异物的风险。幸运的是，食物逆流通常都可以控制住，你的医生也会告诉你很多方法，可能还包括药物治疗。大部分婴儿长到 6～10 个月的时候这种现象就会消失。

有食物逆流现象的婴儿会出现睡眠问题，甚至在食物逆流症状得到控制之后这些问题还会残存。我接触过的婴儿中有超过三分之一的孩子都如此，或者曾经如此，食物逆流现象会在孩子三四个月的时候出现。（如果食物逆流很早就消失了，你应该能够按照本书相关年龄章节中的睡眠塑造方法开始训练孩子，而无需担心会出现长时间干扰睡眠的因素。）我的第二个孩子格雷琴就有食物逆流的问题，她出现食物逆流之后的前几周很不好过。但在我们医生的帮助下，我们用药物控制住了她的症状，在她 10 周大的时候，我们就得到了一个健康快乐的婴儿——每晚都能睡足 8 小时。

父母们通常都会混淆食物逆流与疝气的区别，其实这两种问

题是截然不同的。食物逆流是一种消化系统的结构性问题，但不是永久性的。疝气表现多种多样，但基本上婴儿都会不断地哭泣，在下午三点之后，晚上六七点钟时哭得格外厉害。差不多有四分之一三个月以下的婴儿都会经历这种混乱的哭泣阶段。但这并不意味着你是一个不好的或者不称职的父母，或者你的孩子正在经受痛苦，他也不是一个焦虑或者忧郁的孩子。有些人相信疝气是孩子受到过度刺激的标志，但如果你尝试安抚孩子则可能会恰得其反。例如，费伯博士认为因疝气而腹疼的孩子并不会回应你的安抚，安抚也不是他需要的。孩子真正需要的是你让他随意哭泣 15～30 分钟，然后再看看他是否能自己平静下来。我个人的看法是你可以回顾一下安抚孩子的技巧，比如用襁褓包裹他或者轻摇他，诸如我在上册第 5 章“新生婴儿的正确起点”中列出的那些方法。记住不要习惯于每次在孩子哭泣的时候都用哺喂的方法让他平静下来。因为哭闹会让你更难看出孩子睡眠时机的出现，你最好注意一下时钟，好知道孩子醒了多长时间。尽量把孩子带到一个安静、昏暗的房间，让他在那里开始感觉到困倦。

如何识别食物逆流

食物逆流现象会出现在很小的婴儿身上。这些现象包括：

- 频繁地呕吐——有时候孩子还可能会非常痛苦地从鼻子里逆流出食物。（有些孩子会有隐性食物逆流，这意味着他们会因为体内的大量胃酸而痛苦，却不会呕吐出来。）
- 缓慢的体重增加或者体重减轻。然而，不是所有出现食物逆流现象的婴儿都会体重不足。
- 不愿意吃奶或者在吃奶的时候表现得很痛苦，比如会身体僵硬，弯曲后背，以及推开乳房或奶瓶。
- 想吃奶，但每次只吃一点儿。

• 频繁地咳嗽(咳嗽也可能是其他因素导致的;咨询一下你的医生)。

• 吸入异物导致慢性鼻炎或者静脉充血。

• 窒息或者恶心。

• 呼吸发出酸臭味。

• 频繁地哭泣——每天数个小时。

• 婴儿会频繁地醒来,通常表现为胃疼或者胸口疼。

如果你的孩子一次就表现出以上症状中的几种也不要太惊慌。你可以从中找出一种规律,确定不是偶尔的发作。如果你确实担心会有问题,可以咨询儿科医生,得到精确的诊断也非常重要。当孩子乳糖不耐受或者胃胀气时,也可能会令你误以为是食物逆流的问题。在很多严重乃至顽固的案例中,医生可能会建议你向儿科肠胃病医学家征求意见。

控制食物逆流

有时候我们可以用一些简单的姿势和哺喂技巧来控制食物逆流,稍后我会介绍。但有时候我们面对的是更复杂的选择,你选择的解决方法可能掺杂了你的价值观、教育方式和医生的建议。例如,如果你决定完全采用母乳喂养,不希望孩子吃婴儿配方食品的话,你可以选择药物治疗并调整自己的食谱,减少或者取消乳制品。相反,如果你不希望让孩子吃药,可以选择取消母乳,使用婴儿配方食品来代替母乳或者当作母乳之外的加餐。有时候你没有选择,你的孩子可能非常需要药物治疗,医生会告诉你为什么。

虽然接下来我给出的建议已经得到了儿科医生们的广泛认可,但无论如何还是要向你的儿科医生确认一下。不是每个儿科医生都一定会同意下列列表中的每一条建议的,你的医生可能会

觉得有些控制食物逆流的方法对于你的孩子来说不恰当、不明智乃至于不安全。要记住有些方法可能会控制剧烈呕吐，但却未必能够控制所有突然出现的痛苦。重力是孩子的良伴，在每一次日间和夜间哺喂之后，可以让你的孩子保持身体正直状态 20～30 分钟以帮助消化，但时间到了之后不要马上就把他放下躺着。你可以先让他坐到一张略有弹性的椅子上或者先抱着他——但不要让孩子开始习惯于在你的臂弯中入睡。计算一下哺喂的时间，保证在哺喂孩子之后你能够抱着他或者让他坐半个小时，然后再在孩子昏昏欲睡的时候把他放到床上。

安睡女士小提示

哪怕没有食物逆流现象，也不是刚刚吃完奶就让婴儿躺着，婴儿们也都会很喜欢有弹性的椅子。有弹性的椅子能够让孩子的坐姿呈某种角度，但又不会像汽车座椅那样“拘”着他们。你也不需要什么铃声、哨声或者精心设计的声光效果；一张简单的椅子就足够了。

• 少量多餐。

• 尽可能在孩子醒来之后哺喂，而不要在睡前哺喂，这样在孩子躺下之前就有足够的时间消化食物。

• 应该在哺喂期间数次帮孩子拍出奶嗝儿，而不是仅在哺喂之后拍一次。

• 尝试不同的婴儿配方食品。有些孩子吃豆制品或者低过敏反应的食品，以及专门针对婴儿食物逆流而制作的更黏稠、更容易留存在胃里的增稠配方食品反应都更好一些。（有些医生会建议你自行将婴儿的食品增稠，比如增加一汤匙干麦片或者两盎司婴儿食品都可以，但在你动手尝试之前最好先咨询一下医生，

尤其是如果你的婴儿年龄非常小的话更要谨慎。)你甚至还可能发现孩子对某一品牌食品的反应比其他品牌的更好;此外也许粉末装的婴儿食品会导致他呕吐,但增稠版(通常会更加昂贵)的已混合罐装婴儿食品则不会出现这种情况。

• 将孩子婴儿床或者摇篮的头部抬高。你可以在婴儿用品商店买一款简单廉价的楔形垫塞到床垫下或者床垫底部(当孩子感冒时这种做法也能让他感觉好一些)。我曾经共事过的一个家庭按照医生的建议将一条婴儿毛毯卷成 U 型,放在头部抬高的婴儿床下方形成隔挡,保证孩子不会滚落到婴儿床尾。从安全的目的出发,他们把 U 型毛毯卡在床单下面,并将婴儿的脚放在 U 型底部的弯曲处。而 U 型毛毯的长度不会超过婴儿的胸部。有些家庭还会使用打褶绳索让婴儿抬高上身,或者使用专用婴儿吊床。这些设备都可以在网络上购买。当然,你要先考虑一下相关产品的安全保护措施。

• 给孩子穿腰部宽松的衣服。

• 当孩子可以安全侧卧睡觉时,尽量让孩子向左侧卧。你应该向医生请教并熟悉避免发生婴儿猝死综合征("婴儿床猝死")的安全保护措施。

• 当孩子学会向两侧翻身,同时婴儿猝死综合征风险也减轻之后(通常在孩子 6 个月左右;向医生确认一下)可以鼓励孩子俯卧睡眠。几项小规模的研究显示,哪怕是患有食物逆流的较小的婴儿俯卧睡眠时表现也很好,有些网站甚至还会建议用这种姿势睡觉来预防食物逆流。然而北美儿科肠胃疾病与营养协会不认可让小婴儿采用俯卧的姿势睡觉,除非在某些个别案例中,极端严重的食物逆流症状导致儿童死亡的风险超过婴儿猝死综合征的风险时才允许特例出现。

• 如果我们能多一点儿幽默感,妈妈或者爸爸的衣柜里全都

换成无需干洗的服装的话也会比较有帮助！你可以在汽车、婴儿推车或者随身的妈妈包里带上很多备用的衣服——你的宝宝和你都用得着！

如何让帮助食物逆流的婴儿入睡

作为父母，我们的自然本能是抚慰一个受伤害的婴儿，这就是我们应该做的。但我们需要注意应该用什么方法抚慰一个食物逆流的婴儿。没有肠胃问题的婴儿可以学会自己轻轻摇晃着入睡，但一个食物逆流并伴以喷射性呕吐的婴儿则没有机会学会自我安抚和自行入睡！当我们安抚孩子的时候，可能会在不经意间就增强了他糟糕的睡眠习惯。然后，哪怕是在食物逆流（或疝气）结束或者得到控制之后，孩子仍然睡不好。那么他们就必须开始学习或者重新学习如何让自己在没有被抱着踱步、轻摇，哺喂，或者睡在秋千、汽车座椅、婴儿手推车上到处游荡的情况下入睡——你知道这种训练的方法。

我会给你两种相互关联的建议：一种是当你和孩子仍然面对严重的食物逆流时如何对待睡眠问题；另一种是当医学方面的问题已经得到控制，或者孩子已经长大，相应的症状减轻之后如何让他建立起良好的睡眠习惯。这两种方法如果你首先在晚上睡觉的时候使用，接着再在日间小睡的时候使用的话，孩子就能做得很好。在日间小睡开始变得有头绪前，可以采用任何方法帮孩子在日间获得一些睡眠，哪怕可能要违背我一向坚持的原则——比如不要让孩子在汽车上睡着——也没关系。如果你因为医疗原因需要在夜间哺喂孩子，不要急着马上改变这个习惯，夜间醒来的状况可能会随着孩子其他方面睡眠问题的改善而逐渐减少。按照在此我给出的信息以及本书前面相关年龄章节中给出的建议进行即可。

对于一个同时还患上疝气的婴儿，解读食物逆流状况下婴儿的睡眠暗示更加困难。我怀疑这是因为他们没有学会如何将自己由于疼痛、呕吐、饥饿和疲倦等各种混淆不清的原因导致的哭泣有区别地表示出来。因此我们就更难以辨识出他们是因为什么而哭泣，也不能及时对他们试图传达给我们的东西做出准确的反应。所以你得更用心注意时间而不是婴孩本身，记录下孩子何时进食。当他长大一些后，你就能够在不会引发孩子更频繁呕吐，尤其是夜间呕吐的情况下更灵活地控制哺喂时间了。你同样还要注意孩子已经清醒了多长时间，确保他能及时进行日间小睡。孩子需要的最后一样东西是补充他因为呕吐而导致过度疲劳的身体。在日间小睡或者晚上睡觉前带他到一个安静昏暗的房间里待一会儿能够有所帮助。这种情况下他可能会更清楚地表现出自己的睡眠信号。同时，安静的环境也能暗示他现在是睡觉时间了。

正如我之前提及的，你的医生很可能会建议你在孩子进食后，抱着他或者让他坐下保持身体正直状态 20～30 分钟，不要一直抱着他让他睡着。你应该也不希望孩子在睡眠和被你拥抱之间建立起一种负关联，否则你就要在每次睡觉的时候都抱着他，日日夜夜，未来的几个月都如此。如果孩子偶尔在你怀抱中睡着倒无需太过担心。只要别教孩子学会你的怀抱是他的床铺就可以，在哺喂与上床睡觉之间要留出足够的时间进行另外一些活动。哺喂孩子，抱着他保持身体正直，然后给他念一本书，洗澡，让他在游戏垫上进行一段时间的俯卧抬头运动. 到了孩子的睡觉时间，在昏昏欲睡的状态下把他放到床上。试着为孩子的白天也安排一个有规律的作息时间表，你应该在孩子早上和日间小睡醒来的时候哺喂他，而不是在他准备日间小睡之前哺喂他，这样能避免出现睡眠与拥抱之间的负关联。还能让孩子在躺下睡觉之

前有时间消化食物，也是一种减少食物逆流的方法。

有些食物逆流的婴孩如果少吃多餐的话反应会很好。比起那些没有食物逆流的婴儿来，这意味着你可能要整夜不断地起来哺喂他，直到他长到食物逆流状况减轻为止。但夜间哺喂也同样会增加孩子的不适，所以最好先和医生交流一下，看看你何时可以停止夜间哺喂。有些时候，夜间哺喂（或者用奶瓶喂孩子）不再是孩子的生理需求，而是开始成为一种干扰睡眠的习惯。一旦这种状况发生，你就要停止夜间哺喂。不要让夜间哺喂的时间持续太久——在孩子一岁生日之前断夜奶比较好。如果没能断掉夜奶，你可能就不得不在接下来的一两年中继续面对孩子在夜间每几个小时就叫醒你一次要求吃奶的问题。

夜间哺喂的婴儿们还更有可能在感情上与杯子或者奶瓶产生关联，就像依赖安慰奶嘴或者泰迪熊玩具一样。有些孩子可能会比你猜测的更容易放弃夜间哺喂，一两个晚上就足够了。有些则需要更长时间。在每一个年龄段相关的章节中，我都给出了关于如何断夜奶的细致建议。对于那些没有食物逆流状况但仍然需要夜间哺喂的大一点儿的孩子来说，我通常建议尽快断掉夜奶——也许不算是突然中止法，但也比较类似。然而，对于那些有食物逆流现象的孩子来说，你应该更平缓而柔和地进行断夜奶。我在相应年龄段的章节中给出了很多断夜奶的建议（在上册第 7 章“6～8 个月”中可以看到最详细的内容）。

在我自己的睡眠训练经历中，我发现曾经有过食物逆流的孩子对环境的变化格外敏感。他们对诸如明亮的光线、人群、食物和材质的反应更大。因此你需要对于他们的敏感更加敏感！（我会在本章稍后的部分对感知处理问题多做些探讨，并给出一些关于注意力缺失症和注意力不足/过度症的参考资源。）此外你还要对孩子的作息时间表更加小心。注意看时间，要经常利用安静而

昏暗的房间帮孩子平静下来。

翠西和德鲁的儿子卢卡斯出生之后不久就被诊断为食物逆流。他的儿科医生为他开了药物雷尼替丁。大家用了一段时间才确定卢卡斯用药的精确剂量和时间，到了四个月的时候，药物治疗和控制食物逆流的方法让卢卡斯的问题得到了控制，但他们都没有注意卢卡斯的睡眠问题。如果有什么区别的话，就是卢卡斯的睡眠变得越来越糟。当其他婴儿已经学会基本的自我抚慰的方法时，卢卡斯还在关注自己不舒服的肠胃。现在他晚上每三四个小时就要醒来一次——情况不好的晚上醒来的次数更频繁。日间小睡也有问题，有时候他还会在清晨之前就醒来。

翠西开始关注孩子的作息时间，并按时哺喂他。她缩短了孩子的哺喂时间，有时候只喂他两三分钟。“我缩短了哺喂时间，并告诉自己这只是为了安抚他，而不是在哺喂他。而孩子则是因为有趣才吃奶！”她说，“我知道他确实不需要这么频繁地吃奶。而且他也不再因为食物逆流而哭泣了——他只是因为不高兴才哭。”在四个月时，儿科医生认为他们应该让卢卡斯在不需要进食的情况下夜间一次睡大约七小时。对于这对睡眠不足的夫妻来说，七小时似乎超出了想像的范围。于是他们向我求助。

翠西仍然在卢卡斯上床睡觉之前母乳哺喂他，大约晚上7点左右。但对于晚上10点或者11点的下一次哺喂，我建议他们用一瓶婴儿奶粉或者提前挤出的母乳（我在上册第6章“初生到5个月”中很详细地谈过“梦中哺喂”的问题）来代替。那个时候他们还要喂孩子吃药。然后直到早上6点都不应该再哺喂孩子了，如果当天孩子睡得比较晚，那么就要坚持到早上6点半。如果孩子抗拒或者哭泣，他们应当陪伴在孩子身边安抚他，但不能哺喂他或者陪他躺下。（他们选择了待在孩子的婴儿床附近安抚他但不把他抱出婴儿床的方式，这种选择可能会让他们的头几个晚上面对更

多的泪水，但我还是建议如果需要安抚孩子的话，还是可以简短地抱他一下。）

“第一天晚上，他哭了很长时间，然后崩溃了。我们安抚他，但没有抱起他。一直用了两个礼拜他才不再一直哭了，但后来的晚上他也不会哭太长时间。”翠西说。两周之后，卢卡斯会在午夜时分醒来一次，大约十分钟或者更短的时间，但因为得不到哺喂，所以醒来的次数就越来越少了。到了 6 个月左右，他们开始进行下一步，并且放弃了梦中哺喂的方法。“非常简单，”翠西说，“他醒来后开始哭闹，我们走上前去说：‘对不起，小家伙！’然后他就可以晚上 7 点躺下整夜安睡直到次日早上 7 点了。”

尽管开始改变的前两个星期很不愉快，但由于翠西和德鲁一直相信卢卡斯需要学会睡得更好，这才让他们更容易坚持下去。到了孩子五个月的时候，随着翠西继续开始工作，他们知道必须马上就开始处理孩子的睡眠问题了。“我们没法留下孩子自己哭泣。待在房间里会简单一些，但我们真的相信如果他能睡着，就会更好地成长。他必须学会如何睡觉。”

翠西的动力还来自于她闺中密友的后悔，他们有些人的孩子到了两三岁仍然会在夜间醒来好几次。她还很清楚，自己需要更多的睡眠才能成为理想中的母亲。“我非常疲倦，不能更好地行使母亲的职责，也不能像我自己期待的那样享受和孩子在一起的时光。”她说。

前几个晚上，翠西让德鲁给卢卡斯一瓶奶，并面对孩子的抗拒。这样避免了让卢卡斯能看到妈妈却无法得到哺喂而产生更多不安。不过也因为翠西确实需要休息。她下楼戴上耳塞睡觉，如此度过了三个晚上。“我觉得自己好像重获新生。”

过敏与哮喘

牛奶敏感，湿疹和环境性过敏都能影响婴儿学会如何睡眠的能力，也能在从婴儿期到儿童期之间的任何时间点上干扰孩子的睡眠。

食物与牛奶过敏

如果你在哺喂孩子，并怀疑他可能对牛奶过敏或者不耐受的话，可以试着排除你食谱中所有的乳制品（检查一下食物成分表，因为乳制品成分可能会不易发觉），并保持三四周时间。确保你有其他摄入钙质的备选途径来保证你和婴儿的需要。有些妈妈错误地以为在几天之内就能看到变化，所以他们并没有坚持调整后的食谱，牛奶过敏可能导致食物逆流，也会导致因鼻塞而发生的窒息。

告诉医生你对孩子进行的乳制品测试，你也可以在医生的指导下尝试使用低过敏性药物、无乳糖或者无豆制品的食物配方。如果你选择母乳哺喂，考虑一下取消或者排除食物中的咖啡因与酒精。由于花生和其他坚果导致的过敏越来越常见，而且很危险，有些医生也会建议母乳哺喂的妈妈们取消食谱中的花生、花生酱或者其他坚果类食物。同样，如果你或者你的丈夫儿时曾经有过食物过敏现象，也要告诉医生。她可能会建议你暂缓引入固体食物，诸如小麦、鸡蛋、柑橘、贝类、浆果类、巧克力或者谷物，或者更改添加固体辅食的时间表。例如，医生可能会建议你每种食物吃一个星期，而不是每几天尝试一种新的食物，这样你才能更容易观察到孩子的反应。

湿疹与皮炎

许多过敏都会导致荨麻疹、皮疹和皮肤瘙痒——如果你痒得发疯，睡眠就会变得很困难。根据北美儿科医生协会的作品《引导孩子睡觉：从初生到青春期》(Guide to Your Child's Sleep: Birth Through Adolescence)一书中的内容来看，过敏的儿童即便是没有发病的症状，在睡眠上也会有问题。有些研究表明，皮肤过敏的孩子患上哮喘的风险更高。对于湿疹及过敏相关的疾病有很多治疗的方法，有些是不需要处方的，有些则需要处方药物治疗，所以你和你的医生应该可以相对比较轻松地控制这种问题。

鼻塞、咳嗽和其他过敏症状

你的孩子可能会有些季节性过敏，或者对尘土、污染物、霉菌以及家养宠物过敏。你也知道当自己感冒的时候睡眠会非常差，所以具有这些过敏症状的孩子也会有同样的感觉。季节性过敏还能导致扁桃体与甲状腺肿大，这反过来也会导致睡眠失调或者睡眠呼吸暂停。

过敏或者哮喘的孩子睡眠通常都容易失调或者质量很差。他们可能在日间需要尽量保持清醒，在学校的表现也很差。有时候他们也可能表现得过度活跃或者行为存在问题，实际上这种躁动只是因为他们想努力保持清醒而已。良好的诊断与处理都能带来更好的睡眠，也让孩子在白天能够获得更好的行为，更活跃的表现。

根据孩子的年龄和症状的严重程度，你的医生可能会建议你使用含盐的喷剂、减充血药物、卧室加湿器或者抗过敏药物。很多无需处方的感冒与抗过敏药都不建议给 6 岁以下的儿童使用，

所以要多加注意并咨询你的儿科医生。

不幸的是，有些哮喘药本身也会干扰睡眠。如果孩子在服用哮喘或者过敏药物的话，要注意他睡眠习惯的改变。你还可以尝试一些不同的药物或者剂量。咨询你的医生，了解一下孩子是否可以在日间早些服药，而不是在睡觉之前服药，看看这样能不能有所帮助。

睡眠呼吸暂停

一个存在睡眠呼吸暂停状况的孩子会在睡觉的时候短暂地停止呼吸，这是因为咽喉后部的上呼吸道被阻造成的。肿胀膨大的扁桃体或者扁桃腺肥大都会导致这种阻碍。（但不是所有肿胀或者肥大的扁桃体都会导致呼吸暂停——很多孩子都会及时地“长大”从而摆脱这种危险。）松懈的颈部肌肉在孩子睡眠期间也能导致呼吸暂停。

哪怕是比较轻微的呼吸暂停都会干扰睡眠，所以可以通过外科手术来改变这种扁桃体肿胀、肥大或者二者皆有的情况。当孩子存在这种障碍，需要获得更多空气的时候，你就能听到很大的打鼾声。如果孩子无法获得空气，他的大脑会令他醒来尽快呼吸，他会醒来移动舌头与喉部的肌肉来扩展空气通道。但他却可能没法在不叫你的情况下自行再度睡着。

较大的呼吸声和持续的鼻腔异响以及鼾声通常都是呼吸暂停的关键症状，录下五分钟时长的这些奇怪的夜间声音是个好主意，这有助于让你的医生作出评估。同样，如果这种状况确实值得好好诊断的话，那么首先要先让你的儿科医生进行判断，其次还要请小儿耳鼻喉科医生作出诊断，不要很快就决定进行外科手术切除扁桃体。有时候切除扁桃体确实有必要，但如果没那么严

重的话，你也应该不希望让孩子接受不必要的外科手术吧。切除扁桃体会减少孩子的感冒和喉咙发炎，或者“治愈”过敏的说法纯属无稽之谈，它甚至对于经常复发的耳道发炎都没有任何帮助。不过根据巴顿·施密特(Barton Schmitl)医生的著作《孩子的健康》(*Your Child's Health*)(2005 年)中的说法，切除扁桃体只可能会对那些由于巨大的扁桃腺导致鼻塞从而引发耳道问题的孩子有所帮助。

如何辨别呼吸暂停

睡眠呼吸暂停在日间或者夜间都会出现症状。

日间症状包括：

- 用嘴巴呼吸
- 鼻塞
- 讲话中有鼻音
- 吞咽困难
- 频繁发炎(耳道炎与鼻窦炎)
- 食欲不振
- 清晨头疼(如果孩子们足够大可以告诉你的话)
- 醒来后疲倦，日间表现得非常困倦
- 行为问题

夜间症状包括：

- 打鼾——通常声音很大(一位专家描述为“像老头子一样”的鼾声)
- 呼吸声很大
- 睡眠中偶有呼吸暂停
- 频繁地夜间醒来——尤其是如果孩子没有任何睡眠支撑还会醒来

• 夜间醒来后感到口渴

• 烦躁不安的睡眠

• 睡眠中出汗(身体为了呼吸更努力地运转),尤其是头上

• 不寻常的睡眠姿势,比如睡在自己的膝盖上,用枕头或者毛绒玩具支撑自己的身体,过度伸展颈部等;这些姿势反映出孩子在努力保持自己的呼吸道通畅

• 孩子已经完成日间的训练,在夜间在进行训练的时候仍然会尿床

• 用嘴巴呼吸

• 比平均需要的睡眠时间短几个小时

如果你在和孩子同睡,而你学步期或者学龄前的孩子夜间会频繁地醒来,你就应该考虑一下睡眠呼吸暂停的问题。如果孩子正在哺喂或者仍然频繁地醒来要求吃奶的话这也许没什么,但如果一个孩子会醒来,自己坐起身改变位置然后再度睡着的话,就有可能是呼吸暂停的表现了。

我曾经遇见过一个两岁大的孩子,他与父母同睡,午夜时分就会突然坐起来,哭泣,然后再扑通一声倒下继续睡觉。他不需要父母做任何事来帮他再度入睡。我们开始改变他的夜间睡眠和日间小睡,用了很多方法减少夜间醒来的次数,但我们仍然无法彻底消除他夜间醒来的状况。他并不打鼾,但却习惯用嘴巴呼吸,并且对牛奶过敏。他的医生最终从 X 光照片上发现了他扁桃体相当肥大,因此最终确认了病因。他接受手术切除扁桃体之后,几乎马上就可以整夜安睡了。

如何帮助睡眠呼吸暂停的孩子睡得更好

如果你的孩子有非常轻微的睡眠呼吸中止,行为修正会帮你结束这种状况。你可以教孩子学会自己在晚上和白天上床睡觉,

但仍需要一段艰苦的时间才能停止出现他在夜间由于身体问题而醒来的情况，因此你需要两种方法同时进行。必要的话还要让孩子接受儿科医生和耳鼻喉科专家的诊断。你还需要带孩子去专门研究夜间睡眠的特殊诊所接受诊断。很少有诊所能够解决小儿行为性睡眠问题，但很多诊所确实可以诊治睡眠呼吸中止或者其他呼吸方面的小病症。有时候治疗可以包括外科手术与脱敏药物治疗，这些都能够解决全部的睡眠问题。然而在很多案例中，你仍然会发现有些行为问题需要解决。按照本书中对相应年龄段的孩子提出的建议行事。你应该能发现，很快孩子的睡眠就会得到改善。

阿曼达和托尼是你在第 1 章“两岁半到五岁”中见过的案例，他们的孩子韦斯进行了我的整个安睡女士渐进法。韦斯很快就学会了心甘情愿地自己睡觉，以及在不需要父母过多干涉的情况下在醒来之后再度入眠。但虽然韦斯在夜间醒来的次数越来越少，可无论阿曼达、托尼和我尝试怎样的行为修正法，都没法让他在夜晚不再醒来，哪怕一两个晚上都不行，而且他还总是在同一时间醒来。

快到韦斯四岁生日的时候，他在白天总是看起来非常疲倦，似乎总是在尽量让自己保持清醒。在我们一次后续的谈话中，阿曼达提到韦斯在夜间呼吸的声音非常非常大。于是我建议他们去看医生。

诊断结果是韦斯出现了过敏，不能完全算是哮喘，但如果情况继续恶化则会严重到需要马上进行急诊治疗的地步。医生同时怀疑他还有睡眠呼吸中止的问题。阿曼达和托尼希望能让韦斯在妥当的诊所中进行一次全面的整夜睡眠检查——但每一次韦斯都非常烦躁，因此他们总是不得不放弃这种尝试回到家里。但耳鼻喉科专家和儿科医生都认为韦斯应当切除极端肥大的扁

桃体。不幸的是，手术在韦斯四岁生日当天进行，这让他度过了非常痛苦的几天。当韦斯开始感觉好转之后，他的父母又开始使用过去的贴纸作息时间表，并且再度和他一起开始安睡女士渐进法与睡觉规则。这一次，韦斯真的开始整夜安睡了。

“他一直都是个快乐而可爱的孩子，但现在他更快乐了。”他的妈妈说，“他需要很多日间小睡，他也很努力，这让我们整个家庭都不一样了。过去，我会在镜子里看着自己，眼前一片模糊——我太疲倦了。现在我觉得更加有耐心了。”

注意力缺失症与注意力不足/过度症

注意力缺失症与注意力不足/过度症并不会在很小的孩子身上出现，但有时候这些症状确实会在学龄前的几年成为问题。孩子们可能会有其他行为或者注意力的问题，包括感知处理问题，尤其是在早期，可能会被错认为是注意力缺失症与注意力不足/过度症。

无论是什么原因，过度活跃的孩子都很难睡着。这些孩子比起其他孩子来需要更多的坚持与坚定父母的管教。设定睡觉前的规则，并要确保孩子能够理解这些是规则而不是建议！给孩子一段非常长的睡前平静期——也许 45 分钟才能达到理想的效果。

尽量不要在下午或者傍晚进行容易产生压力的活动，给孩子留下足够的时间转化到一种平静的状态准备睡觉。刺激性的游戏（包括电脑游戏和 DVD 等）也应该在睡觉之前很早的时间就结束——并且把这些东西拿出孩子的房间。睡前的活动应该是平静、柔和，接近无聊的。患有注意力缺失症与注意力不足/过度症的孩子比起一般的孩子甚至更加容易拖延睡觉时间，吸引父母

的注意，推迟睡觉或者让自己兴奋，他们会做任何让自己保持清醒，并让父母留在自己床边的事情。要有耐心，一定要坚定。

如果你的孩子在服用治疗注意力缺失症与注意力不足/过度症的药物，对他来说也许入睡会更加困难。你要密切配合医生指定的服药时间和剂量，需要控制服药时间，才能帮助孩子度过白天，但药效应该逐渐减弱到不会干扰孩子夜间的睡眠。如果你认为药物令孩子亢奋，或者让他无法入睡的话，可以咨询医生是否能更换药物。

现在有一些药店出售针对注意力缺失症与注意力不足/过度症的药物，如果某种药物对睡眠产生了不良影响，那么可以尝试一下其他药物。也有很多关于注意力缺失症与注意力不足/过度症的好书。我最喜欢的有丹尼尔·阿门(Daniel Amen)撰写的《应对注意力缺失症》(*Healing ADD*)(2002 年)和拉塞尔·巴克利(Russell Barkley)撰写的《控制注意力不足/过度症》(*Taking Charge of ADHD*)(2000 年)。你还可以看看孩子是否存在感知处理的困难，我发现这种问题通常会影响孩子的睡眠。这些感知的问题会包括精神无法集中、对诸如光线、食物、材质、水温、噪音和被触碰等的刺激过度敏感或过度迟钝，等等。目前关于感知处理最好的书籍是卡罗尔·斯托克·克雷诺维兹(Carol Stock Kranowitz)创作的《不同步的孩子》(*The Out－of－Sync Child*)(2006 年)。这是一本非常出色且简单易懂的书。我还很喜欢露西·珍妮·米勒(Lucy Jane Miller)与桃瑞丝·富勒(Doris Fuller)合著的《惊人的孩子》(*Sensational Kids*)(2007 年)。你还可以去请教在感知处理(有时候也称作感知综合)方面的有证职业治疗师。如果你这样做了，可以把对于孩子睡眠方式的观察与关注的问题分享给大家。

尿床

大部分孩子都会在两三岁之间的某些白天开始进行使用马桶的训练，有些孩子可能早些，有些则会晚些。女孩子通常会比男孩子早一些。你可以听听孩子对于学习使用马桶的反应，如果他还没有准备好，训练就不会很顺利。我在日间训练那些善于接受新事物的积极的孩子使用马桶的过程中尚未发现什么问题，同时你还可以进行安睡女士渐进法的训练。但我也并不会强烈推荐将夜间使用马桶的训练与睡眠训练结合在一起。想想看，对于孩子而言这该是多么让人困惑的问题：他正在经历着一种学着上床睡觉并待在床上的行为修正过程，然后你又告诉他让他起床去小便！

一个孩子直到四五岁之后膀胱才会发育到足够容纳夜间产生的尿液，这时他入睡的大脑也才学会如何对他膀胱的需求“满了！”作出反应。应该让孩子养成在睡觉之前上厕所的习惯，但直到四五岁之前都可以让他在夜间继续穿着纸尿裤或者尿不湿。如果孩子能保持干爽，那很好。等他再稍大一些之后，你就能更容易地帮他开始在夜间使用马桶。如果你发现孩子在夜间总能保持干爽，而且他是自然而然学会的，你就可以准备去除纸尿裤或者尿不湿了。

到了五岁，仍然会有十分之一的孩子尿床，其中男孩子的数量通常是女孩子的两倍。尿床的原因至今仍然不是特别明确，但通常尿床会有家族史。现在很多医生认为这可能是熟睡的人在深眠状态之下的一种睡眠干扰现象。有时候尿床——尤其是孩子已经完成了夜间训练却又开始尿床——可能是睡眠呼吸中止的信号，因此最好和你的医生讨论一下这种状况的可能性。

在《干爽地醒来:帮助孩子克服尿床指南》(*Waking Up Dry: A Guide to Help Children Overcome Bedwetting*)(2005 年)一书中,霍华德·贝内特(Howard Bennett)医生说尿床的主要原因包括:

- 家族史——75%的尿床的孩子至少父母中的一人或者一位直系亲属在孩提时代有尿床史
- 较小的膀胱限制了夜间尿液的存储
- 深度睡眠令孩子无法及时对膀胱发出的信号作出反应
- 便秘,导致压迫膀胱并发出混淆不清的信号
- 较轻微的疾病与疲倦

有些家庭会在孩子睡下一两小时之后或者父母准备上床睡觉之前叫醒他去上卫生间,并且反应这样做可以成功地消除尿床,但这并不是万无一失的解决方法。

其他医学问题

很多严重的疾病与综合征都能干扰孩子的睡眠——孤独症谱系、风湿性关节炎、神经性肌肉失调、贫血和脑损伤等,很多病症都包括在内。(嗜睡症和下肢不安综合症在幼小儿童中极为罕见。)这些病症都需要医学专家治疗,这超出了本书涉及的范围。然而,如果让孩子学会更好地睡觉,将有助于他积极应对严重的身体状况,以及随之而来的情绪创伤——也许不会那么完美,但一定会更好。就像阿亚娜的经历表现出的一样,这些孩子们通常会在身体的症状得到控制之后,或者至少限制在合理的范围之内后,就会做出最大的进步,很快就能摆脱一些在生病期间养成的不良的睡眠习惯。

阿亚娜

在阿亚娜生命中的前10个月，她仿佛永远都不会睡觉一样。她咳嗽、窒息还呕吐，她不停地哭泣。她几近疯狂的父母拉克莎与艾尔从不会留下她独自一人。他们睡在阿亚娜身边，看着她呼吸，希望她好起来。到了10个月的时候，阿亚娜被诊断为囊肿性纤维症，这是一种非常严重的肺病。尽管还没有治愈CF，阿亚娜近期已经从治疗与控制的过程中获益良多。在确诊后的一个月中，药物治疗让她的呼吸不再那么费力。她的整体健康也得到了改善。她变得更快乐，但仍然无法好好睡觉。

“自从她被确诊，一切都开始好转了，我们想：‘好吧，她会睡得更好的。’但事实并非如此。”她的妈妈拉克莎说。尽管阿亚娜身体状况变好了，但她已经习惯了夜晚挨着父母睡觉。尽管她的健康状况好转，但却依然脆弱，可以理解父母们也不愿意距离她太远，就算医生一再向他们保证阿亚娜可以也应该待在自己的房间里也没用。

拉克莎和艾尔确实把阿亚娜从他们的大床上搬了下去，但她却被搬进了一张儿童床，就在父母的大床边上。“太方便了，”她的妈妈笑道，“我们得用整晚的时间不停地把她再放回她自己的床上。”此外，阿亚娜服用的一种药物让她更难入睡——她的父母让她太晚睡觉也让情况进一步恶化，直到晚上9点半才睡觉意味着她会在药物与晚睡的双重刺激作用下格外亢奋。一般，阿亚娜要到晚上10点或者10点半才能最终睡着，然后她在夜间会起来好几次，整夜都不停地翻身、打滚、哭闹和尖叫。

这种状况持续了很长一段时间，直到拉克莎的一位同事指出孩子看上去是多么疲倦为止。这位同事恰好是我的哥哥格伦。他把我的电话号码给了拉克莎，她只等了一分钟就打电话给我。

阿亚娜这时候已经两岁半了，拉克莎也极度疲惫。

“我想让她到自己的房间睡觉；我知道这能让她更健康。但我不知道该怎么做。我不想让她一直哭泣。”拉克莎说，“我孩子的生活中已经充斥着太多的哭泣了。我不想让她再哭了。”

我知道拉克莎的期待值很低。她不断地告诉我这可能是我遇到的第一个失败案例。我则让她大吃一惊——或者我帮助阿亚娜让她大吃一惊。拉克莎和艾尔按照安睡女士渐进法进行训练，阿亚娜几乎是马上就作出了反应。实际上，他们甚至没有完成整个渐进法的过程；在一周之内阿亚娜就可以自己入睡了。“我们得提醒她‘不要说话，安静地躺下，嘘嘘，天黑黑。’但这也就是我们要做的全部。”她的妈妈说，“到了早上，她会告诉我们她睡在她的‘大姑娘’的床上。她非常骄傲——因为她得到了一张贴纸。”

让阿亚娜整晚安睡用去的时间稍长，大约两三周。有时候她能够安睡，有时候还会在夜间醒来，希望父母坐在身边。“我们会坐下，她就马上睡着了。都用不了一个小时——一般是 5 分钟，10 分钟，然后她就睡着了。我仍然略有担心。”

阿亚娜是幸运的，她的囊肿性纤维症相对比较轻，最糟糕的部分也得到了控制。但是她仍然常常生病，她的睡眠也会被干扰；比起那些最糟糕的情况也不过是孩子偶尔耳朵疼的家庭来说，她家中的焦虑就很严重了。当阿亚娜生病时，拉克莎和艾尔仍然会陪在她身边，但他们不会把孩子带上自己的大床，也尽量不过多干涉孩子。反之，他们尽量约束自己睡在孩子身边地板上的一张床垫上。当疾病好转后，他们很快就会回到自己的房间，阿亚娜也能顺利地完成转变。到了三岁时，阿亚娜通常能从晚上 8 点半一口气睡到早上 7 点。“我简直不敢相信，”她的妈妈说，“哦，老天爷，我完全回到了过去的生活。现在我也有时间和丈夫相处了，我们的生活不再围绕着孩子的睡眠转圈。我们开始讨论

其他事情而不是昨晚上睡得有多糟糕。”

现在夫妻俩还会偶尔出门，留下阿亚娜和保姆一起在家。她会去姨妈家里参加“堂兄弟姐妹们的睡眠聚会”，拉克莎和艾尔就有了一个自由的夜晚，这对于所有的夫妻来说都很棒，对于那些面对孩子带来压力的夫妻来说尤其难能可贵。后来他们终于放弃了婴儿床，虽然还是时不时会擦掉上面的灰尘，但阿亚娜从来都没在婴儿床里睡过一个晚上。

第7章　特殊状況

无论你如何努力地想要让孩子按部就班，舒舒服服，各种琐事还是不可避免地纷至沓来。例如度假或是周末拜访祖父母，都是可以预先安排好的事情，但另外一些，例如生病和出乎意料的变化，都会把孩子的睡眠搞得一团糟。

在这一章中，我探索出了一种彻底解决旅行、生病、长牙、新婴儿出生和搬家等琐事的方法。我同样提供了一些关于处理生活中重要改变的建议，例如母亲回归工作或是夫妻离婚等。我提供的是一种指导而不是死板的规矩，一些孩子的适应性可能比其他孩子更强一些；也有一些家庭不惜任何代价也要让一切保持正规；而另一些家庭可能会根据现实情况决定临时打破定好的睡眠规矩，但是他们稍后可能会为此付出代价。

当秋天伊连长成一个 3 岁的孩子时，乔安娜日常的每周 3 天工作模式变成了如同一场劳累的马拉松般的每天 15 小时工作制——有时工作时间还会延长——一周工作 5～6 天。伊连在睡前看不到母亲，就会经常在夜晚醒来希望能够看到母亲的面容。她为此感到筋疲力尽，于是决定偶尔与孩子同睡。后来随着紧张工作的结束，乔安娜有了很长一段假期，这时她要花大量的时间去和儿子解释他应该自己睡在那张有救火车床单的小床上。她在睡前一次又一次地拥抱他，站在门口一直看着他睡着，他在一周之内又开始独睡了。

作为一条规则，如果你偏离了轨道，那么最好尽快让一切回归到应有的样子。大多数孩子都能很快适应，特别是他们已经被教育得拥有很好的睡眠能力的时候。但有时你不得不开始新一轮的睡眠训练（经常伴随着大声抽泣或像我喜欢说的那样——“火车汽笛一般的尖叫”），但是这轮训练通常会比你初次训练孩子时要快一些，因为你只是在提醒他们记起已经学会的技能，而不是教给他们全新的本领。在这一章末尾，我会给出一些有助于

进行复习性训练的建议，而且同之前一样，你在推动孩子回到他们的日常程序中的同时依然能让他们感到安慰。

即使和孩子临时同睡时，我依然会提醒他们睡眠的规矩。“当我们在湖边时，你和爸爸妈妈睡在同一个房间里，但是很快我们就会回家，你和你的泰迪熊要回到你的公主床上去，爸爸和妈妈也会回到自己的床上，但是我们还是会每晚来检查你有没有好好睡觉。”或是“我会抱着你直到你睡着，如果这样让你能感觉好一点的话，但是你的肚子疼很快就会好起来，那时你就不需要妈妈这样抱着了。你要重新开始好好睡觉，我会奖励给你很多小星星和贴纸，因为我为你感到骄傲。”即使非常年幼的婴儿也能部分理解上面的话，而大一点的孩子领会起来更快、更多。这有助于不让打破规矩的行为令孩子产生迷惑，并且减轻这些变化对孩子的影响。理解了你的期望后，随着临时改变成为过去，孩子可能会更轻松地重新适应他们旧有的日常习惯。

发展的里程碑

认知、情感和运动能力发展的里程碑往往会对睡眠产生影响。事实上，贝里·布拉泽尔顿(Berry Brazelton)博士在他的著作《接触点：你的孩子的情感和行为的发展，从初生至三岁》(*Touchpoints: Your Child's Emotional and Behavioral Development, Birth to* 3)中提醒了我们，我们可能会发现孩子的某种倒退或是混乱，这不仅发生在睡眠领域，同样也会出现在社会联系、情感和饮食模式等领域。

我发现类似情形往往最显著地发生在孩子学习走路的时候(虽然只是临时性的)。在孩子学会端坐、站立或使用马桶的时候也会出现此类情况。我在相应年龄段的章节中指出了大量的类

似变化，但是关键在于，你要记住学会新技能会让孩子感到兴奋，并改变他们看世界的方式——有时这种“看”正符合其字面意义。举例来说，当你的孩子第一次在婴儿床中站起时，她会发现从那里看出去周围的一切都和以前不一样了！

当然，很难具体判断孩子是否将要迎来一个里程碑。我们看到的只是混乱、退步，然后我们认为一定有事情出了错，甚至迫不及待地想要去找儿科医生。只有事后我们才会发现孩子正在迈出她的第一步。在这种时候，我们必须灵活一些，但是要保持一致性。当孩子生病，或是我们外出旅行，我们免不了要偏离日常的睡眠规则，但是处理这些发展中的里程碑时，如果你坚持这套系统，孩子们可以很快地适应过来。

“我不清楚是否所有的孩子都是这样，但是，对我的两个孩子来说，他们在迎来新的里程碑之前睡眠都会变得很糟糕。两个孩子都会有两三个吵闹的夜晚——通常我不需要介入其中，但是我能听到他们睡得很不安稳。”丽莎这样说，她是泰迪和布列塔尼的母亲，也是一位睡眠记录成功保持者。“接下来孩子们可能会学会翻身，或是站立，或是第一次坐起。”

旅行

如果一个孩子在家里睡得越香，那么当出门旅行时他也很可能睡得越好。如果他很擅长睡眠，那么当回到家中后，他也更容易回到好的睡眠模式中。相反，如果你的孩子最近才能安稳地睡上一整夜或是还会在睡前吵闹上好一阵子，那么你最好把那些可以另行安排的旅行推迟至少 3 周时间。

当你们旅行时，孩子们很可能会有一点退步，但是尽量不要放弃你之前的努力，也不要重新依赖于那些你刚刚成功抛弃掉的

睡眠支撑。举例来说，如果你停止了夜间哺喂孩子，那么不要再次开始哺喂。保持下去，在路上给孩子比在家里更多的安慰和呵护，但是寻找一种适当的安抚方式，不要让自己退回起点，这样你才不会掉入间歇增强的圈套里。你不想让孩子这样想："你在陌生的地方抱起我来照顾我，也许回到家里你还会在我醒来时抱着我！"那时，你就不能因为这样的原因来责备孩子了。

安睡女士小提示

如果你的孩子最近才能安稳地睡上一整夜或是还会在睡前吵闹上好一阵子，那么你最好把那些可以另行安排的旅行推迟至少3周时间。

始终在旅行物品中带上一盏可爱的小夜灯，如果无论如何你都没办法在旅途中同时带上小孩子和夜灯的话，你可以选择一本他喜欢的书或是玩具。很多家庭都会带上婴儿用的席子或毯子。(一些宾馆在床铺方面不提供婴儿床或可移动的婴儿床，所以你必须预先调查清楚，或把相应的床上用品打包进行李中。)你也希望孩子身边的物品能够让他感到习惯和舒适。如果你属于那些习惯把急救用品、旅行药物和婴儿清洁用品单独装入小包的父母，那么也要记得把备用的夜灯和灯泡放在里面，这样你就不用担心出门时把它们忘在家里了。如果你会住在亲戚的房子里或是租用公寓里，你应该考虑带上孩子的监控器，这样你就不至于不得不从晚上7点开始陪孩子一起呆在黑屋子里了！

"我们相当频繁地去看望住在1个小时路程之外的父母，我曾经会带上整套婴儿用品，包括防撞护垫和移动床，不过我现在不那样做了。"珍妮说。她曾在辛西娅4个月大的时候与我一起合作。"她在那边睡在婴儿床里，虽然她经常第一个晚上不会睡

得很好，但是到了第二个晚上就没问题了。我在那边也试着让她保持与在家中一致的作息。我没有取消日间小睡，而且同往常一样按时让她上床。回到家之后她看起来一切都好。”

住在宾馆或汽车旅馆的一个明显弊病在于小孩子经常睡得过早，而你可能不愿意整晚坐在黑暗中。（一些夫妻轮流在休息室甚至在大堂里读书，如果天气允许的话，露台也是个不错的选择。如果你有大一点的孩子，你们夫妻之一可能会想让小孩子睡在旅馆房间内的床上，而另一个负责管好大一点的孩子，可以利用冰淇淋、迷你高尔夫游戏等诸如此类的方式玩耍，然后让他们蹑手蹑脚地走进房间，尽可能安静地上床睡觉。）

考虑一下如何摆放孩子的床铺，这样你在打开小台灯时光线就不会照到她的眼睛上，或者也可以使用小型阅读灯。一些面向长期商业旅行旅客提供套房的宾馆在周末或假日时会给家庭旅客提供不错的折扣。即使住在套房里，当你哄孩子睡觉的时候也会短时间关掉大多数照明灯，不过这样你随后就能获得一点成人空间用于交谈、阅读甚至小声观看电影（套房的小厨房对于带着孩子的旅客也非常有用）。我认识的一位富有创意的母亲在每次带孩子住在宾馆时都会带上一张床单和图钉。这样她就可以用床单在自己的床和婴儿床之间建立一道临时隔墙，孩子也不会认为他会从此开始睡在父母的房间里。

“兰迪因为工作要四处旅行，由于我现在不用工作，所以我们试着一起旅行。我带上了一切工具——毯子、枕头、不止一个泰迪熊，还有玩具和食品。”苏珊娜的母亲希拉说。“我们试着找到一间套房——如果孩子在我们的房间里，那么原来的训练也就失去意义了。”最初，希拉愿意“做任何事”来让苏珊娜在家之外睡个好觉，其中也包括同睡，当他们回到家里，这就带来了一系列问题。随着时间过去，苏珊娜越来越容易适应了，而希拉也能够越

来越得心应手地让旅行时的折中方法不会对在家的睡眠造成长期干扰。

在你们动身前，与宾馆取得联系，搞清那里是否提供婴儿床或移动式婴儿床。如果你去探访长辈，也要考虑到每年是否有足够多的孙辈要去他们那里，是否值得购买一张便宜的婴儿床，甚至是一张小尺寸的折叠床。一些孩子不喜欢睡在那些床垫过薄的可移动式婴儿床里。你很快就能发现孩子的适应性如何，然后就可以据此在随后的旅行中安排打包的内容。

对于那些稍大一点、已经用不上婴儿床的孩子，你可以要求一张折叠床，或者问问能不能在你的房间里获得一张普通的加床。你可以把它放在离墙较近的地方，以保安全。在地板上额外放一个枕头以避免孩子掉下床受伤，或者在地板上放一张床垫，这样就不用顾忌孩子乱滚了。你可能会想把床垫放在自己的床旁，或是放在你和稍大一些孩子的床中间，这样小孩子就能因靠近你而感到安心。

孩子很有可能孩子会从自己的床上溜下来钻进你的被子里，这时，一些父母会把孩子送回到他们自己的床上，另一些则认为在宾馆里这是无济于事的。如果孩子最终和你睡在一起，小心地向他解释他可以在宾馆里（或是祖父的家里，等等）同父母一起睡，但是回到家之后他就得老老实实地回到自己的床上去。伊连迅速理解了这一点，即使他在日常作息时间被打破而没能一觉睡到天亮时，他也明白如果在宾馆或是在祖父母的家中，他可以跑到父母的床上，而如果在家中，他就必须得同毛绒动物玩具朋友睡在自己的救火车床里，而妈妈会同爸爸睡在他们的屋子里。

如果可能的话，试着在整个假期里让孩子有一个固定的睡处。在海滩度过一周比在路上每晚更换不同的宾馆（以及不同的婴儿床）要好。如果你要探访好几个亲戚，可以考虑固定住在某

一家里，而在白天和晚餐前去拜访其他的亲属。举例来说，一对有着 9 个月大孩子的夫妇最初安排了一次 5 天的假期——两天住在一方的父母家，另外两天住在另一方的父母那里，还有一天住在姑妈家里。我温和地建议他们重新考虑行程，因此他们选择了一方的父母家作为“大本营”，并安排让亲属到这里来和他们相见，或是花上一天的部分时间到其他家庭成员家里去。他们向有关的人小心地解释为何他们的孩子需要这样做，并避免了让其他人产生被冒犯的感觉，而且他们迅速让所有人知道，另一方父母的家会在下次拜访中成为“大本营”。

努力保证你的孩子在假期得到充分的休息。各种变化和刺激可能让他们在旅行中无法得到充足的日间小睡。这取决于你有多努力地腾出日间小睡的机会，你可能会有这样一种感觉，只要你坚持和努力，孩子就能入睡。但也有可能是，你花上整个下午的时间留在宾馆里，但孩子就是不肯合眼，因此你不妨还是外出，让自己高兴一点，也许孩子会在童车里睡上一觉。这取决于你的孩子有多大，而你外出的时间又有多长。一个婴儿无疑还需要日间小睡，而一个 3 岁的孩子可能在几天里都不需要小睡，只要你让他在晚上比往常早点上床睡觉即可。

你安排的一些旅行计划很可能和日间小睡时间重叠。如你所知，我通常希望孩子睡在自己的床上，而不是车里，但是在假期旅游时，一次车上小睡可能是你能做出的最佳选择了。此外，如果你们要在车上坐几个小时，让孩子在此期间睡着能让所有人都感到轻松一点。尽可能地早一点回到宾馆(或是亲属的家里)，以便把睡觉时间提早一点。假如孩子整天都无精打采，假期也就不能成为假期了。

“我们在旅途小睡上遇到了一点麻烦。”卢卡斯的妈妈翠西说道。你在上册第 6 章“新生儿至 5 个月”中已经见过她了。“但是我们

发现如果我们不得不打扰他的一天作息时，那么最好把时间安排在早上。他随后会经常睡着，并逐渐恢复过来。”

当你回到家里，一定要将迅速回归到正常的作息规律上作为当务之急。一些家庭会在回到家后的一两天里安排极少量的活动，以便集中精力让日间小睡或上床睡觉时间回到正轨。

跨越时区的旅行

如果你的旅行要跨越时区，那得让孩子在他通常的起床时间醒来，当你开始旅行和回到家中时都要这样做。换句话说，如果他在迈阿密的家中早上 7 点起床，那么在西雅图也要在太平洋时间 7 点的时候叫他起床，当你回到迈阿密，起床时间则是东部时间早 7 点。当你到达度假地点的当天就照此办理，如果你们需要在长时间旅行或夜间旅行后恢复一下，那么可以拖后一天。

在你抵达目的地后的第一天就要把小睡和上床的时间切换到当地时间。如果你们到达的时间比较晚，每个人上床的时间都要晚于平常，导致第二天睡过头的话，第一天小睡显然就不得不取消了。不过不要让孩子小睡太晚，在他最后一次小睡时提前叫醒他，这样你们就能在他通常的睡觉时间送他上床。换句话说，如果你们在午夜抵达西雅图，每个人第二天都会睡到很晚（你肯定希望这样！）。然后与通常下午 1 点～3 点的小睡相比，你的孩子可能直到下午 4 点都睡不着。不要让他小睡得太晚，尽管你把他叫醒时他可能会有一些情绪不稳，但是只有这样你才能让他按照平常的时间在晚上 7 点～8 点时上床睡觉。如果你不能确切地执行这一安排也不要烦躁。在旅行时少量的汽车中或婴儿车中的小睡没什么大不了的，你还是能在回到家后让所有人回到平常的时间安排上。

“带着两个年幼的孩子去夏威夷，我们不得不同他们躺在一

起。我们知道不应该这样做，但是不得不如此。他们起来得实在是太早了——凌晨 1 点半。”凯瑟琳这样说，“肖恩比莫德适应得更快一点，虽然他想要在半夜吃晚饭。当我们回到家里，他们用了 4 个晚上才恢复回来，两个孩子在第三个晚上都哭了，不过只有几分钟而已。”

享受生活

虽然我强调规律和一致性，但我并不希望你过于偏激地看待这一点以至于无法尽情享受自己的生活。如果你不敢保证自己有勇气像凯瑟琳那样带着两个不到 4 岁的孩子飞往夏威夷，但是也不要让你自己落入像琳达和米格尔曾落入的窘境里。在他们让艾米获得良好睡眠的 4 个月后，依然过于谨慎，不敢在周末去拜访住在郊外的亲属。你应该放心大胆地享受假期。

安睡女士小提示

用小睡让你的孩子重新调准在新地点时的生物钟。接受阳光照射，特别是在早上会有助于这种身体调节。而没有什么比宾馆的游泳池能更快地让孩子感到疲倦从而早点睡觉了。

“我害怕打破她的作息规律，我害怕她的生活不正常，她的适应性很可能比我预想的好很多，但是我还是担心让一切回到像过去那样——那太可怕了。”琳达在艾米 15 个月大的时候这样对我说。最终，在几个月之后，他们在惊恐中于周末冒险外出。“她做得很棒！”琳达说，“第一天的小睡几近于无，因为陌生的环境和新的便携婴儿床让她不适应，但是除此之外她做得非常好！”

夏时制变化

当你在春天和秋天依照夏时制的变化改变时钟时，这一改变会立即应用到新时间中。换句话说，如果孩子的上床时间是晚上7点，而你将时钟调节到了晚上8点，那么还是要在7点的时候让她上床睡觉。她可能在随后的几天里起床的时间稍早或稍晚，但是随后她就会调整过来。坚持如此，不要让她在新时间的早上6点开始一天的生活。按照新的时间安排你接下来一天的用餐和活动时间，这一调节过程极少需要超过一周的时间。

如果你认为自己的孩子无法轻松地应对这种1小时的时间变化，那么可以将其分段进行，像上面例子那样，在采用新时间的第一天将睡觉时间调整到晚上7点半，然后逐渐调整到晚上7点。

常见的儿童疾病

你可以对孩子的旅行施加一定的控制，但你无法控制他何时患上耳道感染、肚子疼或是支气管炎。如果他在接受睡眠训练期间患病，就暂停训练直到他康复。不要放弃这一程序，如果可以的话，可以“中止”或是维持渐进法，直到孩子好起来。如果你感觉他确实需要你靠近一点，可以坐在他的婴儿床前，就像你在采用渐进法的前三个晚上所做的那样，然后在他感觉好一点时坐到半个房间之外。不要拖长这段时间，这可能对孩子不利。如果他在完成训练之后不久就生病了，他很可能有一些退步，你可以对他加以简短训练以让他重新睡上整夜。

当你的孩子患病时，你要对他在夜间的啼哭立即作出反应，

做一切你必须做的事情——给他喂药，替他擤鼻子，在呕吐后为他清洁。抱着他，给他你认为他需要的安慰，尽管这会让你的睡眠训练倒退几天。我关于不要在睡眠训练期间抱起哭泣的孩子的建议在他们生病时并不适用。

但也不要做得过火，虽然你想照看好自己的孩子，你希望安抚他们，但是在全面退化和小退步之间存在区别。换句话说，如果你最近结束了同睡，就不要在孩子第一次抽泣时把他抱回到你的床上。坐在他身边，握着他的手，抚摸他或抱紧他，但是不要尝试让他回到你的床上。我会建议你宁可临时在他的房间里支床睡觉也不要让他回到你的床上。

但是很明显，如果你打算在晚上拿走孩子的奶瓶，而他恰好此时开始胃疼的话，你可以给他各种流食，直到他的胃感觉好起来为止。一旦当你基于健康的选择决定给孩子某种饮品时，只要他需要就可以马上给他，不要让孩子为此啼哭。如果年龄合适，在生病时用稍微不同的方式给他喂食。换句话说，如果你刚刚结束对孩子的夜间哺喂，但是他因为生病必须喝奶的话，可以试着用杯子或奶瓶喂奶，而不是直接哺乳。如果他在情感上依赖于一个鸭嘴杯，试着让他从一个“大孩子”用的杯子里小口啜吸。

我们在疾病中偶尔也能发现一些亮点。我知道有一个非常依赖于抚慰奶嘴的 6 个月大孩子，但是当他患上重感冒时，鼻子严重堵塞，无法同时吸奶嘴和呼吸。这样度过了 3 个没有奶嘴的夜晚后，他的父母抓住这一机会让他摆脱了对奶嘴的依赖。

在患病期间和之后，你的孩子可能会在夜间更频繁醒来，重新入睡花的时间也会更多。不要指望非处方感冒药、过敏药或是止疼药可以帮助你的孩子入睡（也不要在未经儿科医师许可的情况下给他们服用这些药物，尤其对于 6 岁以下的孩子更是如此）。这些药物可能会让一些孩子感到困倦，但是也可能会刺激一些孩

子,而且他们可能会极其兴奋,一连几个小时保持清醒。一些母亲发现无染料药物可能会减缓这些问题,但这并非总能生效。而且即使它们能够诱导睡眠,其中大多数药物的效果也会在几小时内失效。

接种疫苗也能让一些孩子失眠一两个晚上,询问你的儿科医生是否需要在接种前给孩子一些泰诺林或类似的止疼药,并且当孩子入睡前或是在晚上因不舒服惊醒时都要给他们更多的抚慰让他们安心。通常孩子会在几天内就会感觉好起来,回归正常的睡眠。

耳道感染会对睡眠造成严重影响,因为孩子躺下时会加剧这种痛苦。事实上,频繁或情绪狂暴地惊醒是孩子患上耳道感染的明显迹象之一。如果你的孩子患上的是慢性感染,请你的儿科医生推荐耳鼻喉科的专家,寻求长期或短期使用抗生素的建议,或是寻找一名擅长嵌入管式外科手术的医师。如果是在进行安睡女士渐进法的过程中孩子患上了耳道感染,先暂停,在孩子服用抗生素两三天之后再继续开始训练(如果他在一天之后就感觉好一点的话,可以加速这一过程)。

出牙期

孩子出牙会影响睡眠,但是这种影响比很多父母预想的要小得多。通常,睡得好的孩子在出牙期间受到的影响也较小。(但如果长臼齿,就会给孩子带来很多痛苦,这大概发生在 1 至 2 岁时。)不过那些过于疲惫或是不知道如何让自己安睡的孩子在出牙期间会遇到更多麻烦。他好像是在说:“我已经很累了,我不知道如何睡着,我现在嘴里很疼,这会让我的状态发生改变,所以我会一直保持清醒大声啼哭。”

想要总结出这些新牙齿在多大程度上干扰了睡眠，需要把孩子在白天的、夜间的行为进行对比。如果孩子通常在白天可以独自一人待着，但在晚上却脾气暴躁而执拗，那么很可能就不是牙齿的问题导致的。如果一个通常很欢快的孩子变得情绪低落，出牙的疼痛可能是原因。这种痛苦通常会在牙齿钻出牙龈之后会平息。请教你的儿科医师是否要使用婴儿泰诺林或类似的止疼药。我还发现让我的女儿在白天咀嚼一些凉东西会起到一些抚慰作用，例如我在冰箱里放了几个小时的凉毛巾。他们也会喜欢咬牙刷。偶尔，我会接触到一些表现出大量症状的孩子——尿布疹、低烧、腹泻、睡眠不稳、口水过多、食欲不振、性情执拗——但是这些都不是关键，而这些问题通常都会在牙齿长出来后很快平息。

如果在你实践安睡女士行为矫正的中期孩子突然出现出牙问题，整个进程可能就会延迟几天，直到牙齿完全长出来，但是过后要坚持下去。你可能想要给孩子更多抚慰，那么可以给他稍多一点的呵护和轻拍，但是不要回归到你想要改变的那些模式中。如果你刚刚开始安睡女士渐进法或者正准备进行其他新的睡眠矫正，而你怀疑孩子的牙可能即将长出来，那么考虑将任何变化延迟一至两天。

搬到新家

很多家庭将搬到新家视为开始改变睡眠的重要转折，但是我建议你谨慎看待这一点。搬家意味着改变和压力，而且你应该不会希望因此影响你孩子开始转变的第一步。

确保你给了孩子大量的时间和足够的注意，因为他们正面对大量的改变。让他们在新卧室里玩，以增强舒适感和熟悉度。在

晚上，婴儿、学龄前儿童甚至学龄儿童都可能需要额外的安慰来使他们适应新环境，因此在睡觉时可以站在他们的房间里或是靠在门口。不要忘记留下一盏夜灯，并让孩子练习找到卫生间的位置！

对于大一些的、甚至3岁左右的孩子，你可能希望让孩子参与安排他的房间，让他选择颜色和饰物有助于让他感觉一切都在他的控制之下，并让搬家过程变得有趣起来。注意让孩子说出他都关心些什么，包括关于他的新作息时间的安排、保姆、学前班或学校等问题。

在里德失业后，他和朱莉娅乘汽车带着三个小孩子去寻找建立新居所的合适地点。他们花费了大量的时间在汽车和宾馆里，孩子们在睡眠问题上也大幅退步。“我们把托德的安慰奶嘴还给了他。”里德说，“我不敢确定这是否会对他有所帮助，但是我想这会有助于我和房地产经纪人打交道。”

当他们最终在一个可爱的南方海滨城市安顿下来后，里德开始了他自己的事业，孩子们显示出了相当典型的行为特征。最大的女儿成为了一名优秀的就寝谈判者，获得了“拖延大王”的绰号；来到这个新州并进入了新幼儿园的二女儿开始在晚上出现在父母的床上；而托德又开始依赖安慰奶嘴了——而且在睡前他的情绪很狂暴，会将奶嘴在屋里乱丢。“这是一种很有趣的意识，如果你不去深入地思考它的话。”里德说，“他丢掉了自己确实需要的东西以让自己入睡。”随着父母给了孩子们安慰，每个孩子都适应了之后，生活自然而然地重归平静，或者说重归于任何有着3个7岁以下孩子的家庭所能获得的“平静”。

对于很小的婴儿来说，搬往新房子或是新公寓是一个把婴儿床从父母房间搬到儿童自己房间的好机会。如果他超过6个月大，你可能想在此时开始安睡女士渐进法（虽然你不想立即开始

所有的事情，举例来说，如果你把他搬进了自己的房间，你可能不想试着同时拿走他的安慰奶嘴）。

如果孩子年龄太小不到 6 个月，还不适合开始渐进法。你可以坐在他的房间里，给他一些额外的抚慰来让他适应。对于大一些的孩子，搬家未必是让他们从婴儿床换到普通小床的好时机。得让他首先适应新的环境，否则你可能遇到更多睡前的冲突。如果房间的设置允许，我建议把婴儿床放在与原来旧房子相对于门的相同位置。

与其他改变一样，如果你的孩子睡得越好，睡得香的时间就越长，搬家所能带来的干扰也就越少。如果你的孩子睡眠状况并不好，而你想要进行一些协调性的睡眠训练，那么需要在搬家后等上几周时间，直到他适应新家。作为父母，如果你能很好地处理完搬家后的第一波混乱情形，那么在处理孩子的睡眠训练方面也能做得更好。

我们在卡利两岁半、格雷琴不到三周时搬了家。（我还是一名新产妇！）由于对睡眠有些过度关注，我让房地产经纪人帮我找出了 4 间卧室中最早照射到阳光的那一间。随后我把孩子们安排在最后射入阳光的房间里。一些人在搬入新家时会先安置厨房，或是先安装大尺寸电视。而我做的第一件事是把遮光布装在孩子们的房间里，并把他们的家具安置就位。

幼儿园的日间小睡障碍

幼儿园有一套独到的日间小睡方法，但虽然整体的看护可以说相当好，可是它对你的每一个孩子未必都能见效。举例来说，很多幼儿园不许孩子在小睡时间在婴儿床里啼哭，为的是怕惊醒其他孩子，因此看护人经常抱起并摇晃孩子让他睡着。

你应该努力改善孩子晚间的睡眠和周末的小睡，而当你对孩子独立入睡的技能有充分自信时，与幼儿园的负责人谈谈。向他解释你的成果，并请他们协助你让孩子保持昏昏欲睡但是清醒的状态时间。可能他们会在其他孩子进来几分钟之前先把你的孩子带到睡眠房或小睡区里，给他一个机会，让他自己在哪里入睡。也许他们只是更短暂地轻摇你的孩子，然后轻拍着他用“吁吁”声助他入睡，而不是像过去那样一直摇晃到他睡着。和他们沟通，以便让他们的小睡时间表可以与你孩子的睡眠时间相协调。与他们分享你关于睡眠的知识，以便从他们那里获得协助。和他们沟通，在幼儿园或学前班中保留特别的玩具、毯子或枕头。最后，请他们协助“填满孩子的睡眠需求”，如果能做到这一点，那么孩子醒来的时候就不会再缺少睡眠了。

我接触过的一个家庭有一名活跃而警觉的 6 个月大孩子，她很难在一间充满光线和其他孩子吵闹声的房间中进行日间小睡。她的幼儿园不容许小睡时有任何哭声，因此那里的员工会抱着她睡觉。而这甚至也无济于事，一旦他们把她放回婴儿床里，她就会醒来开始啼哭。这个孩子最后进行了多次半个小时的短睡，在家长来接她时显得无精打采。随后他们在午饭时间和上床时间如何安抚孩子上遇到了问题，而她开始在夜间更频繁地醒来，因为她过于疲惫了。所幸，另一间好的幼儿园则不会死守他们的睡眠规矩，因此父母带着她转园并雇佣了一名保姆。虽然这样做的花费更高，但是以他们女儿的性情和睡眠类型，他们觉得自己别无选择。那家幼儿园也同意为这个小女孩保留一个位置，而她在 2 岁时重新变成了一个快乐的孩子。

一些幼儿园会在孩子周岁时将他们换到另一个每天只小睡一次的班里。不幸的是，这样做太早了，大多数孩子不会在 15～18 个月大之前过渡到每天只小睡一次。这时得和幼儿园沟通，

让你一岁大的孩子在婴儿房内多留几周，直到他准备好放弃自己在早晨的小睡。

在学步期儿童的班级里，孩子们通常会在一个黑暗的房间里同很多其他孩子一起睡在小床上（而不是婴儿床）。如果这样有效的话，就顺其自然。你可以致力于晚上的睡眠和周末的小睡，并且大多数孩子可以区分在幼儿园和在家里的不同。

关于三岁半到四岁的孩子，你的挑战可能是让幼儿园的看护人员相信他不再需要小睡了，如果让他每天下午都睡上两个小时的话，他就很可能晚上不睡。大多数幼儿园都会提供睡眠报告，如果你孩子所在的幼儿园不提供的话，请他们帮你填写一份。

家庭创伤

很明显，离婚、生病和死亡会让家庭中的所有成员都面对一段沮丧的时光，而你的挑战就是让孩子感到最大限度的舒适和安全。你一定会发现一些干扰睡眠的现象：入睡时更黏人，更容易在晚上惊醒，或者更多噩梦。

在创伤（你和孩子的）得以平息，新的作息习惯建立以前，我不建议尝试任何新的睡眠训练。不管怎样，你要避免在一段充满压力的时期内创造任何新的睡眠支撑。举例来说，你可能试图开始同睡以安慰你的孩子（或是你自己），但是我会建议你睡前在椅子上或走廊里进行大量的拥抱和安慰，而不是建立一个可能日后很难打破的新习惯。

分离和离婚

当面对分离和离婚的时候，同往常一样，维持一个作息时间表能给你的孩子带来更多的安全和安慰。孩子可能会比你预想

的更快适应两套不同的睡眠规则和预期。他们能理解，举例来说，在妈妈家里，妈妈会同他们躺在一起直到他们睡着，而在爸爸家里，爸爸就不会陪在他们身边直到他们睡着，反之亦然。他们对每位父母的习惯都具有一致性，举例来说，如果你周二躺在孩子身边，他就有理由期望你在周五的时候再躺在他身边，而不会去管周三和周四在另一位家长的家里发生了什么。

同样，孩子们在父亲那里共住一个房间而在母亲家里分别拥有自己的房间也很好。如果你需要对他们进行睡眠训练，那么就要临时将他们分开，通常让睡眠较好的孩子睡到临时的房间去是较好的选择，而把要接受训练的孩子留在他原先的房间里（第4章“帮助双胞胎或兄弟姐妹入睡”中提供了更多关于多个孩子睡眠训练的建议）。

一对共同拥有监护权的父母可以独立地进行安睡女士渐进法，而不用管另一位父母在做什么。这可能会花上更长时间，效果也不够完美，但是你还是能看到进展。举例来说，如果你是一位单亲父亲但是不想和你3岁大的女儿同睡，你可以开始让她在你房间地板上的床垫上睡一个周末或是一周。接下来，下一次她到你的房子来时，你可以睡在地板上，让她睡在床上。坚持渐进法，理想情况是父母双方共同执行这一训练，但是对于一对离异夫妇这可能期望过高。即使无法从你的前伴侣处获得协助，也不要丧失对改进睡眠的信心。

失去家庭成员

当你的家庭体验到死亡这一悲伤事件时，请参考前面的建议：对孩子更温柔并给他更多安慰，理想情况下不要创造新的睡眠支撑。不要告诉你的孩子祖父睡着了不会再醒来，这只会加剧孩子在晚上的恐惧心理。将你的信仰融合在对死亡的解释中传

授给你的孩子。如果你的配偶去世，你可能会寻求纾解悲伤的心理咨询并与临床医生讨论关于如何帮助你的孩子规划未来。一些父母可能会决心做任何能自己感觉好一点的事情，但这可能会导致睡眠问题。

学校和工作变动

各种扰乱因素都在影响我们孩子的生活——新幼儿园、妈妈要回到工作中、一位家长因为工作外出旅行，等等。基本上，你需要给孩子更多的抚慰，但不能把整个作息时间丢到九霄云外。保持睡眠的时间表，坚持睡觉的规矩，但是确保你能给孩子提供他所需的安全感。

安睡女士小提示

一些父母在离异的第一年会在设置规矩方面遇到非常严重的问题。他们感到悲伤和内疚，不想因为设置，强制性的规矩或是危险的争执而毁掉同孩子在一起的时间。我必须再一次强调孩子会发现规矩、组织和界限让他们感到安心，特别是在压力重重的时间段里。

“当文斯出门旅行，我坚持着整个计划。如果我改变它哪怕一秒，一切都功亏一篑了。”贝丝说。她的女儿麦迪逊马上就要两岁半了。

在让你的孩子获得足够睡眠方面你要格外用心，因为只有在得到很好休息的前提下他才能更好地应对压力和变化。一些父母喜欢在旅行前给孩子留下一盘录音带或录像带，里面记录了父母唱摇篮曲或是给孩子读最喜欢的睡前书籍的内容。孩子有时喜欢在日历上标记时间，直到妈妈或爸爸回到家里。这很实用，

这样他们可以真切地看到父母回家的日子逐渐接近了。让离开的父母加入睡前的歌谣或祈祷中是个很好的主意。不过在睡前通过电话与孩子交谈时要小心，这可能会让那些不理解父母身在何处的孩子感到混乱。如果你的孩子反应不佳，那么试着把电话时间安排在一天较早的时间段里。

年幼的兄弟姐妹

当家中出现新婴儿时，大多数孩子都会出现一些可理解的退步表现。他们可能会乱发脾气，或是要求一些他们已经不需要的事物，例如尿布、奶瓶和安慰奶嘴，或者是在你看护新婴儿时迫切地需要你的注意。

睡眠也同样会受到影响。如果较大的孩子开始在晚上更频繁地醒来，安静地带他回到床上。如果他是因为听到了婴儿的声音才醒来的，告诉他一切都很正常，新婴儿需要起来吃东西，但是很快小婴儿就会像哥哥或姐姐那样睡上整夜了。如果孩子较大，已经具有足够理解力的话，在白天也要提醒他这些事情。

如果他在睡前需要你更多的关注，早一点上床，让他有更多和你在一起的放松时间（这取决于每个人的哺喂和睡眠时间表，这可能只有在父母双方都在家时才有可行性）。或是让他加入到婴儿的睡前仪式中来。他可以“帮助”你给婴儿读一个简单的故事，或者你可以在哺喂婴儿的同时给他读故事。（参见第 4 章“帮助兄弟姐妹入睡”，你可以获得更多如何协调两套睡眠程序的建议。）

安睡女士小提示

不管你在照看婴儿时有多忙，每天同大一点的孩子有一段一对一的时间是必不可少的。

如果婴儿睡在你的房间里，而大一点的孩子知道他曾经睡在那里，最好向他解释这只是临时安排，婴儿会在几个月内睡到他自己的房间(或者他们分享一个房间)。如果大一点的孩子与你同睡，不要把他从床上赶走来为新婴儿让出空间！让婴儿呆在摇篮里，但是不要增加大孩子的混乱感。一些父亲同大孩子一起睡在孩子的房间，哺乳的母亲则同婴儿一起睡在父母的房间。

如果你打算在新婴儿出生前让孩子转到床上睡觉，至少在婴儿出生前 2～6 个月开始这一转换。如果在孩子出生后你依然打算这样做，也要至少延迟 4 个月时间。请不要因为你需要一张婴儿床而匆忙进行这段转换，特别是当大孩子还不到两岁的时候。如果你的大孩子还是喜欢躺在他的婴儿床里，就让他呆在那里，去买或借一张新的婴儿床或摇篮车给新婴儿使用。

偶尔，较大的孩子在已经睡到床上后还会想回到他的婴儿床。他可能会告诉你，或用行动向你表示，举例来说，爬进他小弟弟的婴儿床里。那么，向他强调“大男孩”床的优越性，指出他开始接触到一些婴儿无法接触的事情——例如去游乐场或吃饼干。羡慕小孩子的婴儿床通常也是大孩子表达自己担心会被取代的一种方式，所以你要给他他所需要的全部保证。但如果大孩子不满两岁半，还没有在他的大床上睡上很久，也可以考虑让他重新回到婴儿床里睡觉。按照大孩子应该待在床上的规则对待新生婴儿可能会让他更容易处理当前的境地。但要告诉孩子你是多

么地喜欢和一个大男孩或者大女孩相处，以及小婴儿有这么一个好哥哥或者好姐姐是多么的幸运。保证来访的客人能够给大孩子和小孩子一样的赞美与关注。

给大孩子一些工作：让他帮你取来干净的尿布，或者帮忙给小婴儿洗脚。也要提醒他注意安全性原则——不要触摸婴儿的脸，不要朝婴儿丢东西或者把婴儿抱起来，当然更不要吵醒小婴儿，或者在他睡觉的时候跑进他的房间。

重新训练

如果孩子的睡眠被干扰，你应该马上处理。无论是在作息时间方面，还是在相应缩短睡前与夜间醒来之后的安抚时间方面，在一开始你就要采取格外坚决的态度。

通常，如果对睡眠的破坏时间越短，程度越低的话，克服这种破坏造成的影响就越简单。例如，24 小时的胃疼比起住院一周对睡眠造成的破坏就更容易克服；在离家车程一小时亲戚家里的一个没有日间小睡的周末，比起两周国外的旅行对睡眠造成的影响来说也更容易克服。但只要这种破坏没有持续一个月，那么比起重新学习睡眠技能来，回忆起如何使用已经学会的技能相对就不麻烦了。

一个睡眠总是被干扰的孩子——比如，父母不规律的作息时间加上频繁的生病——比起一个每年只有一周时间被干扰的孩子来，在睡眠上可能会遇到更多的问题。你应该再度进行安睡女士渐进法，但可以快速完成，每个位置只进行一两个晚上即可。通常你甚至不需要完成整个渐进法的过程；只进行最后几步，坐在走廊上，然后定时检查就足够了。

如果孩子的退步非常明显，并且在你完成渐进法之后的一两周后再度出现退步，你就得从头再开始，从坐在孩子的婴儿床或者床边开始。但然后可以快速进行，每个晚上就改变一次位置，而不需要每三天晚上改变一次位置。有些家庭直接从坐在门口的阶段开始进行渐进法。你会面对一些哭泣，因为打断孩子的习惯相当于间歇增强，哪怕这并非有意或者是不可避免的做法也没法减少哭泣。一般来说，孩子睡眠良好的时间越长，得到充分休息的时间越多，他重新回归安静的夜晚所需的时间就越短。我记得曾经收到过一封来自一位吃惊的家长的电子邮件，她之前曾经和我共处过 6 个月来改善她孩子们的睡眠。他们刚刚从一次旅行中回到家里，发现两个孩子在第一次离开家之后也能整晚安睡，而且在他们回家之后孩子们的生活节奏也完全没有打乱。

有些孩子克服自己的睡眠问题后，能很容易地摆脱日后的睡眠干扰。还有一些孩子则依旧高度敏感——这些孩子通常在新生儿期间就非常警醒，并且很早就遇到生长发育的关键点。患有食物逆流超过 3 个月的孩子们通常需要更长时间才能消除对睡眠的干扰。伊连就是一个非常警醒的孩子，由于合作创作本书，乔安娜很清楚我安睡女士系统的细节部分。旅行不会对他的睡眠造成很大的干扰；他通常会在旅馆里和妈妈一起睡觉，回家之后很轻松地就能再度改回自己原先的睡眠习惯。但哪怕是很小的疾病都会严重影响他的睡眠。

一次，伊连发了整整一个星期的高烧。乔安娜非常疲倦，她总是累得倒头就睡，醒来后发现自己像只小猫一样蜷缩着睡在伊连的床脚。伊连当然希望她能够在次日晚上 3 点也保持这种小猫一样的姿势睡在自己身边。她尝试了无数种不同星星形状的贴纸作息时间表，包括特殊的会在夜间闪光的奖励星星在内都没

有用。一次，乔安娜发现伊连总是希望能在幼儿园门口反复签到（只有成年人才能签到），所以她开始让他每晚在睡觉之前“签到”！只要伊连签到完毕，他就知道自己不能再起床和下床了。你会惊讶这个方法是那么有效。他非常喜欢这种签到的权力。

附　录

婴儿的安全睡眠规范

本章是一些关于婴儿安全的注意事项。大部分信息来自于美国儿科学会。我要先强调这些建议主要针对健康的婴儿，并且要经常与医生交流，尤其当你的孩子早产、有健康问题或者出现其他特殊状况时更应如此。随着我们对儿童安全与发展研究的逐渐深入，有些内容也在不断发生变化，甚至会与以前的结论相悖，所以要经常与医生就婴儿的安全问题多作交流。

1.“仰姿睡眠”。总是让你的孩子以仰卧的姿势入睡——无论是日间小睡还是夜晚睡眠都如此。侧卧、俯卧的姿势都不安全。这是减少婴儿猝死综合征发生风险的基本要素。如果你的孩子时常来回翻滚，就无法保证他一直仰卧，除非他比较喜欢仰卧的睡姿；所以一定要给婴儿留出足够移动的空间，并将不安全的物件清出他的婴儿床。不安全的物件包括被子、松散的毛毯、枕头、柔软或者有弹性的缓冲物、毛绒玩具或者含有容易脱落小配件的玩具、柔软的寝具等。

2.婴儿应当睡在平坦结实的地方，比如在一张床单服贴紧绷并且经过安全检验的婴儿床垫上。绝对不要让你的孩子睡在枕头、棉被、羊皮垫或者其他柔软的表面上。婴儿绝对不宜睡在成人床具、水床、沙发或者柔软的床垫上，哪怕是日间小睡都不行。

3.购买二手或者其他人用过的婴儿床、摇篮车、亲子床时要格外注意，哪怕这些东西已经在别人家中使用过很多年。随着安全标准的不断提高，一些产品已经被召回或者停止销售了。一定

要注意检查亲子床是否如其说明书中写的一样经过安全测试。

4.在商场里你能找到许多专门用于固定婴儿睡姿的装置或者配件,但是很多都未经安全与功效测试,我们并不推荐购买此类产品。如果你特别关注孩子的睡姿或者行动,不妨与医生进行交流。

5.婴儿床应该放在房间比较温暖、黑暗的地方,远离窗户为佳。毛毯不要挂在婴儿床的侧面,壁挂帷幕也要远离婴儿可以够到的范围,以免被他拉扯下来。不要把柔软的物品、玩具以及松散的寝具放在婴儿睡觉的地方。不要把枕头、毛毯、棉被、羊皮垫或者柔软、有弹性的婴儿床缓冲垫放在婴儿睡觉的地方(包裹新生儿的小毛毯例外,但也要保证远离婴儿的面部——详见上册第5章"新生婴儿的正确起点"),因为这一切都有令婴儿窒息的风险。

6.在婴儿6个月大时,将婴儿床周围所有可活动物品或者挂在床侧的玩具全部移走,因为一旦婴儿可以做拉、抓动作时,它们就会变得十分危险。最好是随时让一切可活动的物品远离婴儿床;只有在孩子醒着的时候在某些特定的地方才可以使用。让婴儿床或者婴儿睡觉的区域"空空如也",这也是最安全的。

7.孩子睡觉的时候不要让温度过高。合适的房间温度是成人只穿一件单衣能感到舒适的温度。如果你不再用襁褓包裹婴儿的话,就用睡袋或者婴儿专用的睡毯。如果卧室比较凉,就用两个睡袋,也可以给婴儿穿上睡衣或者连体婴儿服。

8.切记美国儿科学会强烈建议的不要在婴儿附近吸烟,也不要让任何人在婴儿附近吸烟。烟雾会增加婴儿猝死综合征的风险,并有可能导致其他呼吸类疾病。

9.美国儿科学会提醒父母,不要让婴儿与成人或者其他儿童一起睡在床上、沙发上或者扶手椅上。但最好能让婴儿睡在你房

间的附近，尤其是在头几个月中。详见我在第3章“到底是谁的床”中提及的共用房间的问题。如果你因为需要母乳喂养而和宝宝同睡，那么最好在喂完奶之后把他放回到他专属的睡眠区域中，比如摇篮、婴儿床、摇车或者放在床边的亲子床（一种可以附在成人床边的专门的婴儿床）上。当婴儿能够在睡眠中翻身或者滚动后，把他放在标准的婴儿床上会更好——也更安全。对于成人或者青少年而言非常安全而舒适的床对于婴儿来说却有可能充满危险。成人使用的柔软的寝具或者其他物品也可能增加婴儿猝死综合征或者窒息的风险，对于新生儿尤为严重。婴儿或者儿童还可能会从床上跌下来或者被卡在床垫和床架之间（床头、床尾、床侧板和床架）、床和墙壁之间以及床与其他家具之间、甚至会卡在床头或者床尾的栏杆之间。类似的意外死亡曾经发生过。

如果非要婴儿睡在家里的大床上，那么要了解所有与婴儿同睡的安全注意事项，并且一定要遵守。和婴儿一起呆在床上甚至晚上一起睡觉的父母绝对不可以抽烟或者使用药物，比如酒精、毒品（包括会让你沉睡的处方安眠药）等，这些东西会令你不够清醒，无法意识到婴儿的需要或者在床上的位置。

10. 安慰奶嘴可以明显减少婴儿猝死综合征的风险，它也可以安抚婴儿。与你的儿科医生谈谈孩子什么时候开始需要，什么时候应该停止使用安慰奶嘴。很多医生都会建议在将婴儿放到床上，哄他入睡的时候使用干净的安慰奶嘴，但你不能强迫婴儿用它。如果进行母乳喂养，等4～6周之后再开始使用安慰奶嘴。许多父母会在孩子6个月大之后停止使用安慰奶嘴，这样孩子就不会习惯于口中含着东西才能入睡。（近几年医生的说法也许有所改变，所以一定要和医生讨论安慰奶嘴的问题，并在孩子大点以后再进行几次核查。）