




DK科学育儿小百科

宝宝哺乳

EVERYDAY BABYCARE: BREASTFEEDING

- 母乳喂养的好处
- 亲情培养
- 喂奶姿势
- 帮助打嗝儿
- 母乳
- 亲人的支持
- 挤奶
- 断奶
- 呵护自己

[英]乔安娜·莫赫德（Joanna Moorhead）著　飞思少儿科普出版中心 改编





電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

《DK科学育儿小百科》系列，是一套科学、实用、权威的育儿手册。它从医学的角度，浓缩了广大父母的养育经验，历经百年的考验，它能为广大的年轻父母提供专业、科学的育儿知识。

整套书涵盖了养育过程中的各个细节，分类单本来讲述，适合有各种不同需要的父母。





本书涵盖了有关宝宝哺乳的所有关键问题。
汇集了近百年母乳喂养的权威信息和医学指导。
范围涉及从新生儿到断奶阶段。

18.00元

精品科学馆 飞思 科普教育·伴随成长

DK 欲见更多详情，请登录 www.dk.com

赞誉支持 | 当当网 dangdang.com 新浪亲子 腾讯儿童 KID.QQ.COM

飞思少儿科普出版中心总策划
飞思图书专区：http://www.fecit.com.cn；
http://www.tuanbook.com.cn

PHEI www.fecit.net

责任编辑：郭　晶　李娇龙
装帧设计：孙　莹　夏初书装

ISBN 978-7-121-12763-2
9 787121 127632 >

上架指南 家庭教育

定 价：72.00 元（全套 4 册）


DK科学育儿小百科系列

DK科学育儿小百科

宝宝哺乳

[英] 乔安娜·莫赫德（Joanna Moorhead） 著

飞思少儿科普出版中心 改编



電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING



内容简介

DK 科学育儿小百科系列为年轻父母们提供了大量实用的育儿信息、技巧和有价值的专业知识。本书旨在回答父母们可能遇到的有关于宝宝哺乳的所有关键问题，涵盖了关于宝宝哺乳问题的最新信息和医学指导。可供广大初为父母者参考阅读。

Original Title：Everyday Babycare:breastfeeding
Copyright © 2004，Dorling Kindersley Limited，London
本书中文简体版专有出版权由 Dorling Kindersley 授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

'版权贸易合同登记号　图字：01-2010-7347

图书在版编目（CIP）数据


宝宝哺乳 /（英）莫赫德 (Moorh,J.) 著 -- 北京：电子工业出版社，2011.3
（DK 科学育儿小百科）
书名原文：Everyday Babycare:breastfeeding
ISBN 978-7-121-12763-2

Ⅰ.①宝… Ⅱ.①莫… Ⅲ.①婴幼儿－哺乳－基本知识 Ⅳ.① R174

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 004300 号

责任编辑：郭　晶　李娇龙
文字编辑：李银慧
印　　刷：北京画中画印刷有限公司
装　　订：
出版发行：电子工业出版社
　　北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036
开　　本：720 ×1000　1/16　　印张：16　　字数：358.4 千字
印　　次：2011 年 3 月第 1 次印刷
定　　价：72.00 元（全套 4 册）

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。
质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。
服务热线：（010）88258888。



目　录

第一章　母乳喂养的好处 7

母乳喂养能帮宝宝抵御疾病 7

母乳喂养能建立更紧密的亲子情感联结 9

母乳喂养会分泌“爱的荷尔蒙” 9

多展示关爱，建立与宝宝的情感联结 9

母乳喂养对妈妈的好处 10

母乳喂养对母亲健康状况的长期影响 11

坚持母乳喂养的其他理由 12

第二章　母乳是如何产生的 15

母乳的产生是个复杂的过程 15

乳房做好准备了 15

乳房是如何工作的 16

产生乳汁的生理过程 16

怀孕后乳房的变化 17

母乳的不同类型 17

哺乳中的“供应与需求”原理 18

母乳喂养为何有排他性 18

乳汁里有什么 19

母乳是一种活性物质 19

母乳中的其他成分 19

母乳中是否含有污染物 19

第三章　为母乳喂养做好准备 21

提前为母乳喂养找到专业帮助途径 21

来自家庭的支持 21

母乳喂养为何要多与配偶沟通 22

母乳喂养中要多与母亲交流 23

分娩前的哺乳课 24

如何寻求专业援助机构的帮助 25







第四章　开始母乳喂养.....27

第一次为宝宝哺乳.....27
尽早开始哺乳会更容易.....27
哺乳时要放松自己.....27
要不要在医院里逗留.....28
利用住院机会寻求专家帮助.....28
离开医院后，如何寻求哺乳帮助.....29

喂奶时该如何抱宝宝.....30

摆好哺乳姿势.....30
要使自己感觉舒服.....30
其他几种哺乳姿势.....31
“宝宝月”的母乳喂养.....32
隔多久喂一次奶.....33

哺乳时，照顾宝宝的最好方法是什么.....34

要拥有属于自己的时间.....34
要拥有和丈夫独处的时间.....34
注意哺乳期的饮食.....35
可大方接受别人的援助.....35

第五章　宝宝成长期的母乳喂养.....37

吃奶反映出宝宝的性格.....37
哺乳方式的逐步调整.....37
每天需要喂几次奶.....39
如何减少夜间吃奶的次数.....39
哺乳期是否会怀孕.....41
哺乳期丈夫的角色.....42

如何在公共场所给宝宝喂奶.....44

一些公共场所喂奶的小窍门.....44
用哺乳室喂奶.....44
宝宝的需求第一，支持公共场所喂奶.....45

第六章　如何挤奶.....47

什么是“挤奶”.....47
宝宝需要特殊照料时，可挤奶给他吃.....47

挤奶是一门技巧.....48

如何用吸奶器挤奶.....48
如何用手挤奶.....48
重回工作岗位前的挤奶.....50
如何为挤奶工作做计划.....51
如何做好挤奶工作中的各个细节.....51

第七章　宝宝开始吃辅食.....53

宝宝准备吃辅食的特征.....53
辅食最初的作用.....53
宝宝辅食的特点.....53
第一次品尝辅食.....53
宝宝还需要吃多少奶.....54
如何给宝宝手指食品.....55
如何让宝宝乐于吃辅食.....55
为宝宝自制食品.....56
尽量少选择商店里的宝宝食品.....57
注重亲子共餐的时间.....57

第八章　何时给宝宝断奶.....59

宝宝吃奶的喜好变化.....59
如何减少喂奶的次数.....59
断奶进程别太快.....60
给大宝宝喂奶的益处.....61
断奶不必从众.....61
断奶后要寻找新方式亲近宝宝.....61








“本恩是一个可爱、健康的宝宝。他长得很好，每次吃奶时，我都喜欢盯着他看，也正好利用这个机会想一想事情。那种感觉真是不错！”

艾伦，6周大的本恩的妈妈。



1

第一章　母乳喂养的好处

对宝宝来说，母乳喂养为他的生活带来了最好的开端。无论您在哪儿，不要考虑您的处境如何，也不管您的宝宝是足月还是早产，母乳喂养都是您送给宝宝最好的礼物。确定无疑的是，这种礼物也只有您才能给他。

母乳喂养能帮宝宝抵御疾病

对宝宝来说，母乳是最好的食物。经过数千年的检验，母乳已被证明是专门为宝宝准备的天然食物。虽然目前配方奶粉比以前要好得多，但无论配方奶粉有多好，也只能是母乳的替代品，无法达到母乳的水平。为什么会这样呢?因为母乳里含有宝宝需要的各种营养物质。此外，母乳里还含有来自母体的活性抗体和免疫物质，这些物质能让宝宝远离各种感染性疾病。

几百年以来，世界各地的人们都已经认识到母乳能保护宝宝，能帮助宝宝健康成长。最近一些年以来，不少医生和科学家们所进行的大量研究显示，母乳能给宝宝强大的保护力。此类研究一直没有间断，得出的结论都是相同的——母乳喂养能帮助宝宝抵御疾病，从刚出生头几个月一直到整个童年时期。

- 吃母乳的宝宝患胃部疾病的可能性大大降低。每年，都有许多宝宝患胃病住院治疗。
- 母乳喂养能抵御宝宝的呼吸道疾病。一项研究发现，吃奶粉的或是既吃母乳又吃奶粉的宝宝，肺部及呼吸道感染的概率是吃母乳宝宝的2倍。
- 吃母乳的宝宝尿道感染的可能性降低，而吃奶粉的宝宝比前者高出5倍之多。
- 吃母乳的宝宝耳部感染的可能性也小。
- 研究显示，母乳喂养能在某种程度上抵御突如其来的新生儿猝死症。

研究还发现，母乳喂养能够增强宝宝的免疫力，使宝宝在整个生长过程中得到长期的保护。

研究结果


研究显示，母乳喂养的宝宝比其他宝宝的各种发育都要快，尤其是在以下方面：

- 比其他宝宝更早学会爬。
- 比其他宝宝学习语言更快。
- 智商比其他宝宝高。吃母乳的时间在7～9个月左右的宝宝和母乳喂养时间少于7个月的宝宝相比，前者的智商明显高于后者。

- 和吃奶粉的宝宝比，母乳喂养的宝宝一直到7岁为止患呼吸疾病的可能性都要小得多。
- 长期抵御胃部疾病。
- 大大减少患气喘或哮喘病的可能。
- 如果宝宝吃母乳，能减少患糖尿病和白血病的可能。
- 与吃奶粉的宝宝比，母乳喂养的宝宝肥胖的可能性降低。

一项研究显示，早产儿接受母乳喂养，在出生前几周内能明显受益；和没有吃母乳的同龄早产儿相比，他们的智商平均高出8.3分。足月产的宝宝，如果吃母乳的时间在4个月左右，其智商值要比吃奶粉的宝宝高出3.7分。人们普遍认为，之所以出现这种情况，是由于母乳中含有大脑发育所必需的多种不饱和脂肪酸。

另一项研究也表明，吃母乳的宝宝在爬行、咿呀学语以及精细动作技能等方面的发育都比其他宝宝要早。



测量体重

大部分足月的宝宝不需要经常测量体重。如果宝宝很活泼，大小便情况也不错，您就能判断宝宝吃奶吃得很好。



专家提示

母乳喂养能促进宝宝下颚和嘴部肌肉的发育，为宝宝说话做好准备。有趣的是，一些儿童保健方面的专业人士认为，吃母乳的宝宝说话时间要早于用奶瓶吃奶的宝宝。人们普遍认为，宝宝吸吮乳头获取母乳比直接用奶瓶吃奶要费力得多，在这个过程中，面部肌肉和下腭得到了很好的锻炼与提高。

母乳喂养能建立更紧密的亲子情感联结

可以说，喂养宝宝是人类社会中最为亲密的接触方式之一。您和宝宝搂在一起，面对面紧搂着，这能帮您享受与怀中的小宝宝亲密沟通的滋味。母乳喂养是帮助您建立起与宝宝情感联结的绝妙方法。


母乳喂养会分泌“爱的荷尔蒙”

并不是说没有选择母乳喂养的妈妈们就无法与自己的宝宝建立起情感联结。当然，也并非每一次哺乳都是美妙绝伦的。不过，当您顺利地给宝宝喂奶时，这段时光毫无疑问将成为您与宝宝之间的特殊交流时刻。

妈妈在给宝宝喂奶时，体内会分泌出名为“催产素”的荷尔蒙，也就是著名的“爱的荷尔蒙”。科学家们相信，正是这种物质使初为人母的妈妈爱自己的宝宝，而且与宝宝建立起情感联结。这也是使新生宝宝从一开始就得到关爱和照顾的极其自然的方式。

多展示关爱，建立与宝宝的情感联结

尽管您正在用母乳喂养宝宝，但宝宝出生后，母子或母女之间的联结不会马上形成。学会爱宝宝是需要时间的，可能要花上几小时、几天甚至几周。这个过程中，秘密就在于您要放松自己，创造机会，建立起与宝宝的情感联结。如果您已经回到家中，和宝宝睡上一两天，或是待在一起。请记住，喂奶并不仅仅意味着让宝宝吃到足够的奶水，它也是您向宝宝



展示关爱的最好机会。当您给宝宝喂奶时，从宝宝的角度出发，想想对他而言，世界是什么样的。您就是他的一切。

母乳喂养对妈妈的好处

母乳喂养并不是只有益于宝宝，对妈妈也有好处。事实上，就在医生们发现母乳喂养对宝宝有何益处的同时，他们也不断地发现母乳喂养给妈妈带来的诸多益处。

宝宝一出生，母乳喂养就能给妈妈带来好处。给宝宝喂奶能帮助子宫收缩，在数小时或数日内使其恢复到正常状态之中。宝宝出生后，母乳喂养能减少分娩后大出血的可能性。

母乳喂养还能帮您把体重恢复到怀孕前的状态，能使您的体重保持在一定范围之内。一些研究表明，用母乳喂养宝宝的妈妈体重开始下降的时间更早，一般在宝宝



“想到母乳喂养对我和宝宝都有好处就非常开心。我吃得很好，却不用担心体重上升，而且血压也降了下来。”

萨拉赫，3个月大的丽兹的妈妈。

出生后1个月以内。还有一些研究成果表明，如果妈妈继续给宝宝喂奶，3个月后妈妈体重的下降速度会快很多。喂养一个宝宝每天让您多消耗500卡路里热量，也就不奇怪为什么体重下降得如此之快了！


从心理角度分析，母乳喂养还有一个好处，每次喂奶时，您体内产生的“爱的荷尔蒙”是一种天然的镇静剂，能让您在夜里喂完宝宝之后重新安然入睡。

最让人惊奇的一项研究来自日本，这项研究表明，“爱的荷尔蒙”能让正在哺乳期的妈妈变得更聪明！科学家发现这种物质能提高免疫力，使短时记忆得到加强。

母乳喂养对母亲健康状况的长期影响

- 美国的一项研究涉及14 000名妇女，这项研究的结果是，在那些至少哺乳过一名宝宝的女性群体中，患乳腺癌的可能性比没有哺乳过宝宝的女性低22%。负责这项研究的科学家们相信，如果所有的妈妈都给宝宝喂4～12个月的母乳，乳腺癌的发生率会减少11%；如果喂奶24个

母乳喂养的误区



● 奶水不够给宝宝吃

几乎可以肯定地说，您一定会有足够的奶汁给宝宝吃。世界卫生组织的一项统计显示，只有不到3%的女性由于身体的原因无法做到这一点。

● 母乳喂养会带来伤害

母乳喂养不会带来伤害。如果发生了这样的事，那是由于宝宝吸吮的姿势不对。如果您听从建议，采用正确的姿势(见30～31页)，喂奶中和喂奶后您都不会感觉痛苦。有些妈妈在刚开始喂奶时会觉得有些痛，因为她的乳头要慢慢适应宝宝。

● 其他人没有事情可做

您的丈夫和其他家人可以做很多事情——给宝宝洗澡、换尿布，带宝宝出去散步，给宝宝穿衣服等，事情是无穷无尽的。宝宝如果吃母乳，您不能远离他，因为只要他饿了，就需要您赶快回来喂奶，不过您可以不干其他家务活儿。

● 宝宝会整天、每天都想吃奶

宝宝刚出生的那几天，会把很多时间花在吃奶上。这是因为他一次吃不了多大一会儿，而且他也需要时间来学习如何吃奶(您也一样)。在随后的几周里，宝宝开始发生变化，他慢慢地长大了，一次能多吃些母乳，而且也越来越会吃。几周后，他吃奶的次数就会减少，时间也会缩短。

● 现在的配方奶粉和母乳一样好

现在的配方奶粉可能要比过去好得多，但它永远是母乳的“模仿物”。配方奶粉里不含活性细胞，没有可抵御感染的抗体，没有酵素，也没有荷尔蒙。配方奶粉里有丰富的蛋白质，但却都不如母乳的蛋白质好消化。而且，母乳是最适合自己宝宝的，如果孩子是早产儿，母体会根据这个现实，分泌出宝宝需要的含有不同成分的母乳。

月，乳腺癌的发生率会减少25％。当乳腺癌发病率居高不下时，认为人类对这种疾病无能为力，是值得商榷的。

- 患其他癌症的可能性也会减少。一项研究显示，每次分娩后哺乳过两个月的女性患卵巢癌的可能会减少20％～25％。
- 哺乳过宝宝的女性骨质更坚硬。人们发现，生育过宝宝却没有哺乳过宝宝的女性和哺乳过宝宝的女性相比，在晚年更容易骨质疏松。
- 另一项研究显示，哺乳可以减少因风湿性关节炎而导致的死亡。这一研究课题正在进行中。

坚持母乳喂养的其他理由

- **母乳是最方便的理想食物**

母乳随时随地都有，而且温度适中。您不必做特殊准备，也听不到宝宝因饥饿而哭闹的声音。

- **母乳是免费的**

如果用配方奶粉喂养的话，月复一月，年复一年，费用是很可观的。

当然，喂奶的妈妈比不需要喂奶的妈妈需要更多的卡路里，但满足这一需求所花费的钱并不多。





宝宝吃奶十分便捷
如果您没有将宝宝留在家中，宝宝就一定能及时吃到奶。只要宝宝一闹，您就可以发现。

- **母乳喂养使宝宝夜间吃奶更容易，也不会太打扰您和宝宝**

对所有初为人父、人母的爸爸妈妈来说，夜间喂奶是一件很困难的事，但母乳喂养会好得多。事实上，夜间喂奶最能体现母乳喂养的优点——把宝宝的婴儿床放在您的大床右侧，您可以不太费力就把宝宝抱过来喂奶，不会过分打扰您和宝宝。

大多数宝宝如果晚上能吃得好，很少醒来，他就会很安定。如果您就在宝宝身边，奶水足足的，有时您甚至不需要开灯就能喂完奶。

- **出门时，母乳喂养给妈妈带来许多好处**

如果用奶瓶喂宝宝，您得带上大包，里面装上准备就绪的奶瓶，奶瓶还得加热。而要是母乳喂养，旅行就方便得多，只要带上尿布就足够了。

- **从生态学角度出发，母乳喂养也是最好的**

母乳喂养不会消耗地球资源，也无需不必要的包装或浪费。也就是说，它是人类食品中最好的“绿色食品”。

专家提示

母乳喂养能给您带来各种各样的空余时间作为礼物，您无需花费很长时间去准备奶瓶，相反您可以搂着宝宝待会儿，当然您也可以利用这段时间来休息、放松一下，读书、看电视或听收音机。

“给汤姆喂奶是我所做过的最有成就的事情。我知道，这是我的身体给我的本能，但我真的觉得很有成就感。”

杰西卡，6个月大的汤姆的妈妈。



2

第二章　母乳是如何产生的

宝宝哭了，妈妈把他抱起来，把乳头塞进宝宝嘴里，立刻，哭声就无影无踪了。宝宝开始吸吮，乳汁流了出来，小宝宝的世界又恢复了正常。看上去这个过程非常简单，掩藏其后的母乳喂养实际上是个十分复杂的生理现象。

母乳的产生是个复杂的过程

母乳喂养不仅仅涉及妈妈的乳房，还包含有妈妈大脑的荷尔蒙系统以及宝宝的吸吮，甚至在妈妈怀孕前，就已经为以后的母乳喂养埋下了种子。当宝宝的妈妈还在自己妈妈的子宫时，她那小小的乳房就在为以后某一天要进行的母乳喂养做准备了。

那个后来变为妈妈乳房的小乳房在出生7～8周后开始发育。整个童年期，乳房处于潜伏状态，一到青春期来临，小乳房的发育速度一下子就加快了，直到后来发展成含有乳腺、支持性组织和脂肪的乳房。

妈妈怀孕时，乳房的活动加剧——乳腺组织开始代替许多脂肪细胞，所以怀孕的妈妈乳房开始变大、变重。事实上，对许多女性而言，乳房周围产生饱满感应该是怀孕的第一征兆，因为从怀孕的那一刻起，乳房就开始发生变化，为今后的哺乳做准备。

乳房做好准备了


怀孕早期，许多女性出现的另一个变化是乳晕周围出现一个个小包，很容易发现。这些小包里含有腺体，这种腺体能分泌出一种油脂，喂奶时能使乳头润滑，并得到保护。怀孕过程中，乳晕和乳头的颜色变深。乳腺组织由数百个腺泡组成，每个腺泡里都含有小小的“囊”，正是这些物质产生乳汁。“囊”深藏在乳房里，每个“囊”的周围都包裹有小小的肌肉，肌肉能使乳汁固定地沿着一定的管道流向乳头，就像人们用吸管吸杯子里的牛奶一样。从孕期第26周开始，您的乳房就可以产生乳汁。如果宝宝早产，您同样可以喂奶(见48页)。

专家提示

如果您认为自己的乳房太小，请不要着急，因为这并不会影响您的哺乳能力。问题的关键不在于乳房有多大，而是乳房体大小的变化，以及分泌乳汁的组织或腺体组织有多少。一般来说，从乳房的变化可以判断乳汁量的多少。如果您在怀孕末期乳房比刚怀孕时大出1倍，应该含有大量的乳汁。

乳房是如何工作的

怀孕过程中，您的乳头、乳晕变大，颜色越来越深。随着孕周期的增加，乳房也变大、变重。分娩时，产生乳汁所必需的腺体组织已经替代了大部分脂肪组织，通常这些脂肪组织是乳房的组成部分。一切就绪以后，宝宝就能够随时吃到母乳了。



怀孕前的乳房 **孕期和哺乳期的乳房**



产生乳汁

宝宝的吸吮动作激活了大脑中荷尔蒙的释放，它反过来提醒您的身体做好准备，产生并流出乳汁。

产生乳汁的生理过程

全世界成千上万的女性用母乳喂养自己的宝宝，却不知道乳汁产生的复杂生理过程。您不必成为这方面的专家，但如果您想要了解乳汁产生的过程，可以看一看。

乳汁的形成取决于宝宝吸吮的动作。宝宝吸吮时，触动乳头中的神经末梢，这些神经末梢向您大脑中的下丘脑发出信号。下丘脑一收到信号，马上会将它们传递到脑垂体，促使脑垂体释放出两种荷尔蒙：一种是催乳激素，它能刺激乳房开始分泌乳汁；另一种是催产素，它能激活乳房，使乳汁源源不断地流出来。

怀孕后乳房的变化

- 分娩时，每个乳房平均要比平时重680克。许多人发现，在整个哺乳期内自己的乳房一直很大，断奶后才可能恢复到孕前的大小、形状。
- 乳头在整个孕期也会发生变化，但这常常不被察觉——乳头渐渐变大，而且能被拉得更长。这些变化使新生宝宝更容易吃到母乳。
- 孕期，乳头可能分泌出少量的黄色液体，这就是初乳，是宝宝的早期食物，营养特别丰富。分娩后头几个小时或头几天，乳房不会觉得“发胀”，这时，宝宝能吃到质量非常高的母乳，而不是靠吃的次数多。一般来说，大约从第三天开始，乳汁就会“蜂拥而至”。其实，从分娩的第一天开始，乳汁的供应就一直在增多，慢慢取代了原来的初乳。不过，这个过程在宝宝出生后2～5天内才会加速。正是这种加速，使您的乳房发胀，充满了乳汁。许多妈妈(当然并非所有的妈妈)在给宝宝喂奶时会发现，宝宝常常吃得很少，但次数很多。几天后，乳汁的分泌已经定型，开始根据宝宝实际的需要量来确定乳汁的供应量。

母乳的不同类型

母乳并不都是一样的。刚开始喂奶时，流出来的母乳脂肪含量低，比较稀，水分含量大，对宝宝来说，意义也要小一些。这种奶水能帮助宝宝解渴，会让他知道，妈妈乳房里有好东西吃。

宝宝的吸吮动作能刺激催乳激素和催产素的释放(见16页)，催乳激素刺激乳房开始分泌乳汁，而催产素保证乳汁源源不断地流出。乳汁里的成分也越来越多，会富含各种营养物质。这时是哺乳的重要时期，宝宝能得到他所需要的营养物质。您要做的事情就是放松，和宝宝一起享受这段时光!

问与答

乳汁像什么?

初乳，黄色的，滑滑的。分娩三天后，大量乳汁涌出，看上去像水状的，呈蓝白色。随后，宝宝吃奶时，刚开始时的奶(前奶)是水状的，慢慢地奶会变稠，富含卡路里。

乳汁是什么味儿?

可以用手指蘸上一点儿母乳尝尝，一般来说非常甜。

妈妈吃的东西会影响乳汁的味道吗?

母乳中的确能看出您吃过什么东西，这是非常有利的。因为和吃配方奶粉的宝宝不一样，吃母乳的宝宝虽然只吃一种东西，却能领略到不同味道。

哺乳会导致乳房下垂吗?

一些人担心母乳喂养会影响自己的乳房，但事实却是，乳房大小的变化取决于乳房为哺乳所做准备而发生的变化，而不是哺乳本身。

“我已经明白了，您得相信母乳喂养，而且要给宝宝吸吮的时间。结果会证明效果不错，乳汁会不断地流出来。”

萨拉，3岁大的琼的妈妈。

喷射反射

当催产素发挥作用时，您可能会觉得乳房中的乳汁非常充足，而且自由流淌，这就是“喷射反射”。此时，您会发现宝宝的吸吮动作变得非常有节奏，而且很有力。

有时，在宝宝刚出生时，这样足的乳汁对宝宝来说会太多了，淌下的奶水会让宝宝弄得四处都是。

如果您没有觉得乳汁往下淌，也不用着急，因为许多用母乳喂养宝宝的妈妈都有这种感觉。而且，即使是在前几天里有过这种现象，喂奶几周或几个月后，这样的体验也会越来越少。



分泌乳汁

刚开始母乳喂养时，宝宝要吸吮数秒甚至几分钟后才能导致喷射反射。反射一旦形成，就会成为自动化行为。

哺乳中的“供应与需求”原理

吃奶时，奶水的流速会逐渐慢下来，但这并不意味宝宝不在吸吮乳头。这是因为，宝宝吸吮并不仅仅是为了得到他现在所需要的乳汁，而是为了下一次或第二天能够吃到足够的奶汁。

宝宝吸吮乳头时，您的身体会告诉大脑，让大脑产生更多的催乳激素，为以后准备更多的乳汁，这个过程被称为“供应与需求”。它解释了为什么当您认为宝宝应该已经吃饱了时，他却还在不停地吸吮乳头。

正是由于哺乳中的“供应与需求”原理，只要宝宝想吸就应当让他吸，想吸多久就吸多久，这一点非常重要。目前，人们已经普遍认识到，这种需求为母乳喂养奠定了基础。过去，母乳喂养总是每隔4小时一次，许多人发现这样做常常导致奶水不足，只能再给宝宝加吃奶粉。

母乳喂养为何有排他性

“供应与需求”过程同样也解释了，为什么一个正处于哺乳期的妈妈，不需要为宝宝添加其他食品，尤其是在宝宝刚出生几天或几周时。这时您的乳房正在慢慢适应，了解自己需要分泌多少乳汁才能满足宝宝的需求。

给宝宝吃配方奶粉，或按传统方式给宝宝喝糖水都可能扰乱“供应与需求”系统，使整个系统紊乱。甚至给宝宝使用小奶嘴都可能引发一些问题，因为宝宝可能把劲儿都用在了嘬小奶嘴上，到真正吃奶时就没有力气了，这会进一步影响第二天的母乳需求量。

乳汁里有什么

母乳里含有最适合宝宝成长的各种物质。您只要看一眼新生宝宝，就一定会觉得他那么弱小，新生宝宝需要您的保护，需要长得更大、更强壮，母乳就是专门为实现这些目标而设计的。



母乳是一种活性物质

母乳是一种活性物质，和血液一样，由活性细胞组成，专门提供宝宝身体需要的各种物质。最神奇的是，科学家们发现，母乳也根据外界条件的变化而变化。例如，如果宝宝早产，他吃的母乳里含有更多的脂肪和脂肪酸，这些东西能增强体质，促进宝宝大脑的发育。母乳中还含有大量的抗体和其他抗感染物质，这些抗体能帮宝宝保持健康。母乳不仅热量高(每100毫升母乳中含70卡路里)，而且还含有一种特殊的蛋白质，它会被宝宝毫不费力地吸收到自己体内。

母乳中的其他成分

- 充足的钙、锌、铁等微量元素。
- 维生素A、B、C、D、E、K。
- 消化酶和成长素。

母乳中是否含有污染物

母乳中的确含有污染物，但生活中几乎每件东西都含有污染物(包括配方奶粉和牛奶)，因为一些化学物质已经很自然地成为食物链的组成部分。试着不要过分担心母乳中的污染物，因为它们的含量很小。事实上，到目前为止，母乳喂养是养育宝宝最健康安全的方式。

“和那些成功地哺乳自己宝宝的妈妈们交流，能够帮助我树立信心，相信自己也能做到。这样能使一切变得非常自然，而且很有可能。”

瑙米，14 周大的依莫吉的妈妈。



第三章　为母乳喂养做好准备

在读这本书的过程中，您已经迈出了母乳喂养重要的一步。了解母乳喂养的与众不同能增强您的信心，弄清母乳喂养到底是怎么回事能帮您掌握更多的知识，使您在给宝宝喂奶时做到姿势正确。

提前为母乳喂养找到专业帮助途径

当然，您可以做一些其他的准备工作。宝宝出生后，您可以和亲朋好友谈谈，让大家理解您想母乳喂养的决定，并支持您。

另外，您还可以做一件事，找找哪里能为您提供有关母乳喂养的专业帮助。当您需要时，知道去哪里寻求帮助。研究发现，那些宝宝刚出生不久就放弃母乳喂养的妈妈中，绝大多数都希望自己能坚持下去。那些没有放弃的妈妈，是因为得到了相关专家的指导；而那些放弃了的妈妈，是因为在她们需要得到专家指导时没有得到帮助。

来自家庭的支持

研究显示，在开始哺乳的几周之内，有两个人的观点会对您产生很大影响：一个是您的配偶；另一个是您的母亲。当然，这是指您母亲在您的宝宝出生后和您待在一起的情况下。

这两个人在宝宝很小时和您待在一起，他们帮助您，不分昼夜，尤其是刚开始时，一切都是新鲜而陌生的。

如果这两个人能理解您为什么用母乳喂养，他们就能给您提供您所需要的帮助。如果他们不理解，就会提一些毫无帮助的建议，动摇您的决心。特别是，他们会建议您给宝宝用奶瓶，还说这样“能让您休息一会儿”，或者说“奶瓶也没有什么害处”。但实际上，他们完全能用其他办法让您好好休息，例如在您午休时，推车带宝宝出去散会儿步等。对刚出生不久的宝宝来说，奶瓶可能会把宝宝搞糊涂，因为它和妈妈的乳头是有区别的。给宝宝用奶瓶还会打扰“供应与需求”过程(见18页)，导致您乳汁总量的减少。

母乳喂养团体

世界上有各种各样的支持母乳喂养的团体，这些团体对那些想自己哺乳，却又从来没有与有哺乳经验的女性接触过的妈妈非常有用。如果您认为与这些人见见面会对自己有帮助，可以考虑加入一个支持性组织，在宝宝出生前可以参加几次聚会。在宝宝出生之后去，结识几位也在哺乳的妈妈会使您的生活更加丰富多彩。



母乳喂养为何要多与配偶沟通

您的配偶可能对您给宝宝吃奶没什么不同意见，但对许多男士来说，他们对此有非常复杂的情感和想法，因为他们一直只把乳房和性联系在一起，可如今乳房却扮演着新的角色。您需要和他谈谈下列问题：

- 母乳喂养对宝宝和您本人的好处。您可以建议对方读一

乳头的准备

二十多年前，人们建议怀孕的女性在宝宝出生前用毛巾擦自己的乳头，以使乳头“坚硬”；还有建议认为，应该把初乳挤出来，以使“乳汁流入乳房”。

不过，现代研究显示，这两种做法均无任何好处。怀孕时，您的身体自然会为哺乳做准备，乳头也一样，不需要您再多做什么。

当然，您也不必使用任何润滑剂甚至草药之类的东西滋润乳头。乳头的确需要润滑，但是乳房表面的小腺体能完成这项工作。您能做的一件事情是从怀孕6个月或7个月开始，不要使用香皂擦洗乳头，只用清水来保持清洁。香皂非常干燥，而皮肤一旦干燥就容易开裂，那样的话，会特别痛。



“在我还是小宝宝的时候，吸奶器还不常见，所以当我们在商店里很容易地找到它时，妈妈惊讶极了。和妈妈一起去逛商店是个好办法，能让我们好好交流一下，还可以跟她谈谈自己想喂奶的计划。”

琼安娜，怀孕 32 周。

读本书第一章。

- 从情感和实际行动方面如何支持您做出的决定。
- 您给宝宝吃奶时，他该怎么做。
- 他该如何亲近宝宝。他需要知道除了给宝宝喂奶之外，还有其他方式可以和宝宝亲近。有一点非常重要，那就是要向他解释为什么在宝宝刚出生的头几周里，用奶瓶喂奶不是一个好办法，它会把正在吃母奶的宝宝搞糊涂，而且妨碍“供应与需求”过程。
- 他将如何看待您在公共场合给宝宝哺乳。

母乳喂养中要多与母亲交流

您母亲的观点也非常重要——尤其是宝宝出生后，她要陪着您的话。得知您准备自己给宝宝哺乳时，您母亲的反应很可能与自己的经历有关，也就是说她是用什么方式喂养您和您的兄弟姐妹的。如果是母乳喂养，而且喂养得很顺利，她可能成为您强有力的支持者。她知道，这样做没问题，并对此充满信心。



不过，与今天相比，二十多年前母乳喂养并不十分普及，而且人们对这种方法究竟有什么好处也了解得不深。人们不会像今天这样鼓励、提倡母乳喂养，而且也得不到自己需要的专业指导。所以，您母亲最后可能决定不让宝宝吃自己的奶，或是她尝试后由于得不到支持而不得不放弃这一做法。

哺乳用乳罩

如果可能，为自己准备特别合适的哺乳用乳罩。您得确保自己能轻易地解开乳罩，而且它能对乳房起到保护作用。

一览表

可以购买一些能帮您的物品，让您觉得哺乳会容易得多。

必需品

- **哺乳专用乳罩(至少3个)**

孕期7个月或8个月时，您就可以把它们买好。乳罩大小要合适，买之前最好试一试(可以预留一定空间，因为您的乳房在乳汁流出后会变大)。

- **乳垫**

如果乳汁流出来，会把衣服弄湿，尤其在宝宝刚出生时更容易出现这样的情况。乳垫能够使衣服保持干爽。乳垫最好是那种可清洗的，因为可清洗的乳垫透气性好。同时，乳垫还得是可撤换的。

有用的物品

- **吸奶器**

如果您知道自己要和宝宝分开一段时间，准备一个吸奶器非常重要。如果您的乳头往里凹，吸奶器也很有用(见25页)。从本书第49页中，您可以了解到哪种吸奶器最适合您。

- **一个特殊的V型或O型枕头**

在哺乳时，您可以把肩靠在枕头上。

- **脚踏**

使用脚踏能使您在哺乳时感觉更舒适，特别是在宝宝刚出生不久时，能使您的哺乳姿态更加正确。

您得和母亲谈谈，告诉她为什么要自己喂奶。您得告诉她这样做有什么好处，向她说清楚您非常理解她都是为了您好。即使您母亲喂过奶，但她喂奶的时间可能比您计划的要短。过去，给宝宝添加辅食的时间要比今天早得多。和母亲谈谈这些事，向她说明为什么您要长时间给宝宝喂奶。

分娩前的哺乳课

参加听课是准备哺乳的最好办法。分娩前的哺乳课可以成为孕期的一个重要活动。您和配偶可以分别参加，也可以一起参加。这样的培训课通常在医院或您选中的妇幼保健院里都有，一些其他机构也开设这样的课程。您可以和保健医生仔细谈谈，看看您家附近有没有可以上培训课的地方。很多课程是为准妈妈和准爸爸们共同开设的，所以尽量让您的配偶和您一起去。如果他认为只有您才需要了解哺乳知识，可向他解释这种想法是不对的。在宝宝刚出生头几周时您将会特别依赖他，你们双方都有必要多了解这个过程，只有这样才能对宝宝有利。在培训课上，您能学习到以下内容：



乳垫的保护作用
如果您购买的是可撤换的乳垫，一定要注意乳垫里面那层不能是塑料的，那种乳垫容易磨伤乳头。

乳头内陷

乳头内陷并不常见，出现这种情况常常被认为是由于怀孕期间荷尔蒙变化导致的。确实有些女性出现了单侧或双侧乳房的乳头内陷，或是乳头平平的现象。您可以自己检查一下，把拇指和食指放在乳头旁边，轻轻地挤压，如果乳头还是不能够凸出来，手也无法捏住乳头的话，那么您可能就属于乳头内陷。

您仍然可以自己哺乳，不过您需要加倍的毅力和额外的帮助。哺乳前，使用吸奶器对您能有所帮助，它能帮助您把乳头拔出，使宝宝更容易吸吮。

- 哺乳的生理特点。
- 哺乳姿态的重要性。
- 针对您对哺乳的期望、恐惧等问题进行讨论。
- 如何使乳汁顺利流淌，如何贮存乳汁。
- 父亲的角色。
- 如果有机会，您还能和正在哺乳的妈妈一起交流。

如何寻求专业援助机构的帮助

尽管在医院或妇幼保健中心您可能得到了专家的帮助，但宝宝出生后，您可能仍然需要有关哺乳知识方面的咨询服务。在分娩到来前，就可以想一想自己需要什么样的服务。


英国的一些全国性机构和各种网站可以为您提供咨询和帮助，最重要的就是一旦遇到困难，您得知道去哪里寻求帮助，能在很短的时间内得到自己需要的帮助。大多数哺乳问题(见32、41页)在开始时都是很轻微的(乳头有些疼或是乳汁流得不顺畅)，如果能及时得到指导，这些小问题就不会变得太严重。

怀孕时，有些人就知道自己哺乳初期需要专业指导和帮助，所以最好在宝宝出生前就慢慢了解一些哺乳知识，参观一些地方，就哺乳问题进行一些咨询。这些人包括：

- 怀双胞胎或多胞胎的。
- 乳头内陷的(见上栏内容)。
- 计划或很可能剖腹生产的。
- 很可能早产的。
- 过去曾经在母乳喂养方面遇到困难的。

“第一次哺乳是一次很神奇的经历。弗兰蒂出生还不到半小时，我简直无法相信他吸得这么好，我永远也不会忘记。”

拉芮，8周大的弗兰蒂的妈妈。



4

第四章　开始母乳喂养

您等待这个时刻的到来已经很久了。孕期终于结束，您可爱的小宝宝也躺在了您的怀抱中。几个月以来，您用自己的身体和体内的营养孕育了小小的生命，使他成为了一个完美的小宝宝。而从此刻开始，您的乳汁能继续为宝宝提供他所需要的一切。

第一次为宝宝哺乳

哺乳能继续为宝宝和您之间的身体亲密接触、互相依赖提供机会。宝宝的出生使他离开了您的子宫，但您的身体在未来很长一段时间内仍是他最好的营养源。

宝宝第一次吃奶也是增进情感的时刻，您和宝宝都会非常享受彼此相互拥有的那一刻，而且希望有足够的时间细细品味。如果分娩相当顺利，您也很少甚至没有使用过麻醉剂，您可能会发现宝宝非常乐于吸吮您的乳汁。研究已经发现，对这些宝宝来说，在出生的头几个小时之内，吸吮可能是最强的。

宝宝一出生，他要做的第一件事情就是立刻扑到妈妈的怀里吃奶，可能这是天生注定的，这样做能让宝宝在经历了分娩时的辛勤劳动后获得安抚。

但是从目前来看，有许多宝宝在出生时并没有经过自己的辛勤劳动，而且还使用了麻醉剂。对这些宝宝来说，吸吮就不那么容易了。如果你遇到这样的情况，不要惊慌，记住，很多宝宝在出生后都会昏昏欲睡，他们中许多宝宝以后吃奶都没有任何问题。

尽早开始哺乳会更容易

研究发现，越早开始哺乳，哺乳也就越容易。如果可能的话，让分娩时一直陪伴着您的专业人员知道您希望在宝宝出生后马上给她喂奶。许多助产士非常了解这一点，而且会主动提醒您。

哺乳时要放松自己

如果宝宝不能马上理解并自己吃奶，您不用着急。当然，如果这一切能自然地发生最好。如果没有，也不意味着您

专家提示

如果您的宝宝正在吃奶，而您的乳房此时很疼，应该立刻停止喂奶。即使这样会让宝宝很难理解，但从长远角度考虑，您也不能在宝宝吃奶时让自己感觉不舒服。您可以把一个手指轻轻地伸进宝宝的嘴里(见31页)。试上几次，记住，尽管让宝宝姿势正确地吃奶在刚开始时是很浪费时间的，但不可能总是如此。您可以把培养宝宝良好的吃奶姿势所花费的时间当作是一种投资，为以后几个月里您和宝宝之间能愉快合作提前做准备。



学习喂奶姿势
您一定要尽早学会如何用正确的姿势给宝宝喂奶，而且一定要坚持。这样，今后可以为您带来诸多好处。

要不要在医院里逗留

关于这个问题，有不同的看法。从积极的方面看，如果您在哺乳方面需要帮助的话，医院里受过专业训练的护士能为您提供咨询和帮助。例如，哺乳问题常常出现在午夜时分，如果您在医院的话，只需按一下床头的按钮，就能马上得到帮助。

不过，如果您待在产后病房里的话，身边都是新妈妈和她们的宝宝，这意味着您能和一些新妈妈交流，但同时也可能会被其他宝宝的哭声打扰，而且会有许多人不停地在您身边走来走去。

利用住院机会寻求专家帮助

如果能利用住院的机会，获得专家们的指导，了解更多的哺乳技巧是最好的。您可能会在医院里遇到正在值班的咨询人员，如果没有遇到，您可以要求见他们。如果宝宝在吃奶或发育方面有什么问题，也可以直接找医生帮助。

许多人刚做妈妈时总是担心母乳是否充足，尤其是当她们看到那些吃配方奶的宝宝们总是喝下一大瓶奶时，更是着急。事实上，在宝宝出生后的头两三天时间里，您的初乳并不会太多，这是因为新生宝宝注定已经失败——情况远非如此糟糕。许多宝宝只是由于太关注于这个对他来说完全陌生的世界，而忘记了要马上开始吃奶。

目前尚没有研究显示，如果在宝宝出生后的某一段时间内您没有成功地给宝宝喂奶，以后的哺乳就会面临很大困难。最好的建议就是放松自己，您的宝宝在经过一段时间后会做得很好，您也一样。

什么是初乳?

初乳就是在分娩后的头几天中，您乳房中分泌出来的母乳。与看上去更稀的成熟的乳汁不同，初乳很稠，而且滑滑的。初乳中富含蛋白质、少量脂肪和碳水化合物，初乳最大的好处是宝宝容易消化。所以，尽管您可能认为自己没有太多的奶，但一定要记住您给宝宝的是最好的食品。初乳中富含抗体，包括一些宝宝在您子宫内时没有得到的抗体。

不需要太多的液体。他们出生时体内储备了大量的水，出生后这些水分会逐渐消失，这也是为什么宝宝出生后几天内体重会迅速下降的原因。宝宝们真正需要的是母乳中的抗体。

离开医院后，如何寻求哺乳帮助

在医院时，如果哺乳方面有问题，您在24小时内随时都能得到帮助，所以，您可能会害怕离开医院回家。不过，也有许多人发现，回到自己熟悉的环境中，哺乳会更容易。在自己家中，您更容易放松自己，也更舒适。

有一点很重要，那就是您得知道，离开医院后，如果需要的话，自己从哪儿能得到帮助。记住，如果出现问题，在刚开始几小时或几天之内都很容易得到解决。如果遇到下列问题，请寻求帮助：

- 乳房有小肿块。
- 您觉得自己在发烧。
- 乳房上有红斑。

这些症状都可能是乳汁堵塞、不畅的征兆，而这可能导致乳腺炎(见41页)。如果您能及时得到帮助，就完全能够阻止情况的恶化。

分娩的情绪问题

分娩后几天内，您可能会感觉很累，而且很多时候会比较情绪化，遇到一些常见的困难也会觉得非常严重，难以克服。出现这种情况是比较正常的，几乎绝大多数妈妈都能回忆起有过类似的经历。

此时，您要有毅力，而且要努力去相信事情一定会好起来。如果有机会和曾经有过这种经历的人一起聊聊会对您有所帮助。当然，能得到您所信任的人的支持也是非常重要的，这些人可以是您在哺乳方面的顾问、助产士，也可能是病房里的护士。您自己可以决定，谁的帮助对您最有利，然后坚持听取这个人的意见。

如何喂哺双胞胎

- 搞清楚谁会对您同时哺乳两个宝宝持否定态度。对您而言，同时哺乳两个宝宝是绝对不会有问题的，因为哺乳是建立在“供应与需求”原则上的(见18页)，所以两个宝宝通过自己的吸吮能够让您的乳汁满足他们的需求。
- 同时哺乳两个宝宝能让您节约很多时间。不过，有时您可能希望喂完一个后再喂另一个，这样可以帮您逐个地与宝宝建立起情感联结。
- 同时给两个宝宝喂奶的一种好方法就是“托足球式方式”(见右图或31页)，或是让两个宝宝腿交叉地躺在您的前面，或呈V型躺在您的大腿上。
- 使用多用型枕头，这样您会觉得舒服一些。您会发现买那种V字型靠垫会比较好。
- 让两个宝宝交换着吸吮不同的乳头，这样能平衡两人的需求，而且如果一个宝宝吃得比另外一个多的话，这种做法还能使您避免出现乳汁不均匀现象。



喂奶时该如何抱宝宝


好的喂奶姿势是使整个喂奶过程愉快并且达到双方满意的关键。它不仅能保证您和宝宝都感觉舒适，帮您避免出现乳头疼痛的现象，而且还能使乳汁顺利流出，让宝宝的吸吮更加有效。所以您要尽可能多地花一些时间来做好这件事，让宝宝能在正确的姿势下吃到乳汁。



摇篮式抱法
这是一种传统的喂奶姿势。让宝宝的脸部和整个身体朝向您的乳房，宝宝的头应该正好枕在您胳膊比较松软的部位上。您还可以不断地变换方向，让宝宝的头枕在另外一条胳膊上。

摆好哺乳姿势


一直等到宝宝把嘴张到一定程度时，您再把宝宝的嘴凑到自己的乳头上。通常情况下，要把宝宝朝自己的乳房移，而不要将自己的乳房挪向宝宝。好的准备程序应该包括以下几个方面：



- 宝宝的下嘴唇要包住您的乳头下部。
- 宝宝吸吮时，耳部会不停地动。
- 宝宝开始吸吮时，您根本不觉得痛——哪怕极其轻微的疼痛(如果觉得很痛，把宝宝放下来，重新摆姿势。如果喂奶姿势不正确，会让您的乳头疼痛)。

要使自己感觉舒服

正式开始喂奶前，您自己一定要感觉舒服。如果可能的话，在宝宝刚出生几天时，您可以先让其他人抱宝宝，然后自己再坐下，做



准备
用您的乳头轻轻地触摸新生宝宝的嘴唇，诱使他张开嘴巴，把乳头含在嘴里。



保证良好开端
如果您不能确保宝宝姿势正确，把宝宝放下来，重新再试。



成功地喂奶
轻轻地把小拇指放在宝宝的唇角周围，如果乳汁流出，随时堵住。

好准备。应该多预备些靠垫或随手可及的枕头，您可能需要这些东西，让宝宝躺在上面。

只要宝宝的姿势正确，您就可以用空闲的那只手托起自己的乳房，让宝宝吃奶。这一点在宝宝刚出生几天时非常重要，因为您的乳房会很饱满，而且很沉。以后喂奶会更容易一些，您不用想得太多，您的注意力应该全部放在宝宝身上。

用您空闲的那只手圈在乳头周围，这种姿势被称为C式喂奶法。这种姿势要求您的四个手指放在乳头下方，而拇指在上方，成英文字母C的形状。保持手指的位置不变，但不要压得太紧，否则，您可能会压迫乳汁导管。要知道，您是在把乳头引导到宝宝嘴里去，而不是为他挤奶。

其他几种哺乳姿势

与传统的摇篮式抱法(见30页)相辅相成的喂奶方法还包括以下几种：躺式喂奶法(见右图)，足球式托法(在宝宝刚出生几天时，这是一种很好的姿势，能使您更好地控制宝宝的脑袋)。



躺式喂奶法
这是一种很好的喂奶方式，尤其是在剖宫产手术之后。您可以侧身躺下，让宝宝面向您的乳房。宝宝的头应该靠近您乳房的位置，这样他不用太费力就能够得着您的乳头。您应该把宝宝的身体抱过来朝向您这一边。

问与答

我的宝宝出生两天了，我的乳头真的很疼，我该怎么办？

您需要得到帮助，学会使用正确的喂奶姿势（见30～31页），可以向专门的咨询人员请教。如果两侧乳房一边疼得厉害一些，就先给宝宝喂另外一侧。只要乳汁流出，疼痛就会减轻。从感觉很疼的乳房中挤点儿奶出来，也会让您的痛苦减轻一些。

我的乳房像石头一样硬，而且感觉不舒服，为什么会这样？

这是分娩后几天内很常见的现象。因为不知道宝宝到底需要多少乳汁，您的乳房分泌乳汁太多，所以便出现了上述情况。随着时间的推移，情况会有所好转。您可以在喂奶前用热毛巾敷在乳房上，这样能促进喷射反射。在两次哺乳之间，您可以用冷毛巾或冰袋敷一下，这样能帮助您减轻肿胀和疼痛感。有些人发现，将凉凉的生卷心菜叶放在乳罩里也能够减轻不适感。

我的奶水流淌得特别快，宝宝总是快要被呛着似的，我是不是需要特别担心？


分娩以后的几天内，奶水很足是比较常见的，因为此时您的身体还没有“学会”到底需要分泌多少乳汁。因此，作为补偿，它就会分泌特别多的乳汁。在随后的几天或几个星期之内，情况会马上稳定下来。

“宝宝月”的母乳喂养

回到家中，最大的好处就是您终于可以抱着宝宝、轻松地躺在自己的床上了，周围是您所熟悉的环境。此时，您要尽量做到放松自己，享受丈夫给您的各种关怀和体贴。

当您能尽可能地把全部精力都集中在宝宝身上时，哺乳也会很顺利。当然，您可能非常希望丈夫能和刚到家不久的宝宝待在一起。但是，您可能也会觉得需要一段安静的时间，集中精力喂宝宝。在接下来的日子里，您会发现自己在一些喧嚣的环境中也能给宝宝喂奶，但是如果您能在喂奶时将全部注意力都集中在宝宝的身上，整个哺乳过程就会顺利得多。

有时人们把您刚回家的那段时间称为“宝宝月”，在这段时间里，您可以安定下来，尽情享受和宝宝以及丈夫在一起的时光。此时，家里的亲人和朋友会接二连三地打电话，



打嗝儿

打嗝儿能帮助宝宝排出吃奶时吸入的空气。通常，宝宝需要您摸摸或是轻轻地拍拍他的背。

剖宫产之后

如果您是剖宫产，那么在开始哺乳时可能会面临更多的挑战，但这并不意味着您就不能胜任。刚开始喂奶时，由于使用了麻醉剂，药物的作用会使您和宝宝都有发木的感觉。但一定要有耐心，等这种感觉消失后，乳汁就会流出，您马上也会和其他妈妈一样很好地给宝宝喂奶了。

如果您的刀口在头几天很疼，试着使用一些在孕期培训班学到的放松技巧。

下列姿态会对您有所帮助：

- 躺卧(见31页)。
- 让宝宝躺在V字型的靠垫上，这样宝宝吃奶时不会碰到您的刀口。
- 如果不是很疼，坐在床上，可以在膝盖上多放些枕头来托住宝宝。



希望来家里看望新生的宝宝。尽管您是那么急于想让宝宝和大家见面，但一定要记住不能马上接待过多的客人。记住，您今后还有足够的时间让大家一起欣赏宝宝，至于此时此刻，对您的宝宝以及哺乳而言，最为关键的是要集中精力，使哺乳顺利、正确地进行。

请注意，刚给宝宝喂奶时要和他说话。告诉宝宝他做得很好，小声地告诉他您是多么爱他。您所给予宝宝的不仅仅是乳汁，还有无限的爱。所有的一点一滴都是非常重要的，能帮助宝宝慢慢长大，变得更加强壮。

隔多久喂一次奶

人们常常要问，隔多久需要给宝宝喂奶，每次要喂多长时间?然而，最好还是您每次都注意观察并预测宝宝吃的奶量有多少。

- 大多数宝宝在吃饱后会停止吸吮动作，安然入睡或是将嘴巴从您的乳房上移开。专家们并没有提醒人们喂奶时间的长短。您可以让宝宝吃一侧乳房的奶，直到他自己不吃了，然后，等宝宝打完嗝儿再给他另一侧乳房的奶吃。有些宝宝吃一侧乳房的奶用10分钟，有些则要用30分钟。吃奶的时间越长，宝宝就越能吃到更多的、脂肪含量高的奶水。这样能让他有吃饱了的感觉，他就会松开乳房，沉沉入睡。
- 宝宝开始吃奶时，左右乳房轮换着喂，这样能维持奶水的供应量。

专家提示

维持宝宝体液适中非常重要。脱水是幼小宝宝可能遇到的严重问题，而且它可能会在很短的时间内恶化。如果宝宝看上去没有吃奶的兴趣，没精神，眼睛或嘴唇干燥，湿尿布比以前减少了，出现腹泻或经常呕吐，您要立即带宝宝去医院看医生。

哺乳时，照顾宝宝的最好方法是什么

既然您在给宝宝喂奶，宝宝就会完全依赖于您的身体，如同在您子宫里一样，因此，正确地照顾好自己是非常重要的。这并不仅仅意味着照顾好您的身体，如果您的情绪也得到很好的照顾，两者相结合，您就能更好地满足小宝宝的需求，教会他享受生活。



要拥有属于自己的时间

如果您至少拥有一小会儿“我的时间”，并提醒自己暂时忘记做妈妈的角色，您会更好地珍惜与宝宝待在一起的时间。一天中努力争取为自己找到一小会儿时间，在这段时间里，可以让您的丈夫或亲戚朋友来帮助您。下列办法可以考虑：


- 来个热水澡，擦点儿让您全身肌肉放松的护肤品。
- 有人帮您抱宝宝时，给朋友打个电话。
- 从散步中您可以得到一些锻炼。

要拥有和丈夫独处的时间


此时，您和丈夫的生活都集中到了满足新

白天一起休息

尽可能多地得到休息是非常重要的。您的感觉越好，哺乳就会越容易。宝宝白天睡觉时，您也可以抓紧时间和他一起睡。



“忙里偷闲”
如果家里人或朋友愿意帮您照看宝宝，您可以接受他们的帮助，这样能抽出时间来单独和您的配偶待会儿，哪怕是出去 1 小时，喝杯咖啡。这对你们俩来说，就好像是呼吸呼吸新鲜空气。



准备好喝的东西
吃奶时要在您身边随时准备一杯喝的东西，因为您可能会觉得特别渴。不过也不要喝太多，因为只是这样并不能使奶水变多。

生宝宝的需求上，不过，你们也得花点儿时间单独相处。朋友或亲戚可能帮助您，让您和您的丈夫享受自己的两人世界。

注意哺乳期的饮食

吃健康食品总是很重要的，当您在哺乳时，这一点显得格外重要。如果您缺乏某种维生素或矿物质，身体只会把您体内的东西传递给宝宝。还有一点很重要，哺乳时要保证喝足够多的水。不过，每次喝水的量不要太多。

可大方接受别人的援助

有了宝宝后，您需要得到帮助。当亲朋好友愿意伸出援助之手时，您就大大方方地接受，让他们做那些确实需要做的事情。如果他们没有主动提出来要帮您，您可以自己提出来。

- 如果来做客的亲友要帮您抱宝宝，您得特别小心。因为抱宝宝不会太累着您，而给客人冲咖啡会更累。
- 可以列一个单子，看看哪些事情是需要做的，这样如果身边有人可以帮助您，您能马上知道他们能做什么。

“刚开始的几天，我觉得自己总是在给艾迪耶喂奶，可现在他吃奶的时候少多了，他已经知道自己吃多少奶了。”

玛丽，6周大的艾迪耶的妈妈。



第五章　宝宝成长期的母乳喂养

祝贺您，您已经成功地走到了这一步。刚开始喂奶时的那些艰难日子已被您远远地抛在了身后，成为了过去。现在，您已经安定下来，开始享受给宝宝喂奶的时光。能做到这一点是非常关键的，因为它能给您带来信心，享受与信心结合起来就是成功哺乳的关键。

吃奶反映出宝宝的性格

对大多数喂奶的妈妈来说，在刚开始的那些日子里任何挑战都可能出现。到宝宝4～6周大时，这些挑战对您来说已经不是什么问题了，您和宝宝都能很顺利、愉快地完成哺乳和吃奶。

并不是所有宝宝都一样，那些曾给多个宝宝喂奶的妈妈们能证明这一点。宝宝到这个阶段时，您就能从中看出他有哪种性格特点。有些宝宝似乎更喜欢少食多餐，吃相很斯文；有的宝宝却大吃猛嚼，而且只顾吃，完全不在意周围的其他事情。

有的宝宝是非常容易分心的，随时能被周围有意思的事情所吸引。大多数宝宝随着年龄的增长越来越容易这样，因为周围的世界变得越来越有趣，越来越好玩儿。不要简单地做出推论说，“容易分心”的宝宝是不打算再吃奶了，它只能说明这个小宝宝对其他事有浓厚的兴趣，而且他仍然非常愉快地要从妈妈那里获取营养。当周围的一切非常寂静时，这样的宝宝常常会饱餐一顿。这样的事通常发生在清晨或上床之前。

哺乳方式的逐步调整

宝宝长到6周或更大一点儿，他吃奶的方式要比以前更加多样，每天吃的奶量不会完全相同，但基本上会发现他希望多吃、多睡，尤其是在早上时。慢慢地，宝宝吃奶的次数少了，而醒来的时间长了。

随着时间的推移，这种方式还会进一步发展，直到7个月大时，宝宝会把自己白天的休息时间大致固定为上午睡一觉，下午睡一觉。其中上午那一觉的时间往往要长一些。这时，您会发现宝宝总是希望在白天睡觉之前或之后吃奶。尽管在似睡非睡的时候给宝宝喂

乳汁分泌效率提高了

开始，您的乳房很饱满、有胀痛感，但随着宝宝慢慢长大，这种情况发生了变化。这并不是说身体分泌的乳汁少了，而是您“进行了提炼”，也就是说您提高了分泌乳汁的效率，身体能准确地判断出宝宝每次要吃多少奶。

“现在，给艾米喂奶总是让我特别有成就感。我喜欢喂奶时的那种感觉。艾米总是在尽情地享受我的乳汁，全然不管周围发生了什么事情。”

卡特丽娜，5周大的艾米的妈妈。



奶难免会有把他弄醒的“企图”，但随着宝宝慢慢长大，他好像并不太在意这一点。

您需要自己决定是否让宝宝边吃奶边睡觉。许多妈妈喜欢看吃完奶后在自己怀里安然入睡的宝宝模样，有些专家则反对边吃奶边睡觉，他们认为这样会使宝宝在睡觉时只认妈妈的怀抱，换个其他的地方就不行。不过，并没有明显的证据能支持这种观点，您应该自

宝宝吃饱了吗?

这是一个很常见的问题，有许多迹象都可以说明宝宝有没有吃饱，您可以注意观察：

- 每24小时宝宝大约要用6~8个纸尿裤。
- 黄色大便。您一天收拾好几次脏纸尿裤或几天收拾一次都没有关系，总体而言，宝宝每长大1个月，他大便的间隔时间就要长一些。
- 体重缓慢上升。尽管断断续续，但宝宝的体重还是在慢慢上升。在一段时间里宝宝的体重维持不变，并不意味着宝宝的吃奶情况不好，这只不过是暂时现象。
- 基本上来讲，宝宝很精神，眼睛亮亮的，对周围的事情都很感兴趣。
- 宝宝吃完奶以后，您觉得自己的乳房轻松多了，也软了。

如果您和宝宝出现上述现象，您就可以安心了，因为哺乳情况一切正常!

己做丰，找一种对您和小宝宝俩人都有效的方法。

每天需要喂几次奶

据说，最好的哺乳方法就是不要数宝宝吃了多少次奶，因为哺乳是很难量化的，您不可能估计出宝宝到底吃了多少奶。您也不用为此而苦恼，应该放心大胆地哺乳，因为您根本就不用担心宝宝吃了多少奶、是否够吃。

研究显示，宝宝一天中要吃8～12次奶。一些医生有时建议您计算一下宝宝24小时内吃奶的次数，以便弄清楚宝宝是不是处于饥饿状态。在一段时间内，如果宝宝吃奶次数太多，可能他吃奶的效率不高，这可能是宝宝吃奶的姿势不正确；如果吃奶次数太少，可能意味着您需要多喂宝宝一会儿，使他能多吃一点儿奶。

如何减少夜间吃奶的次数

夜间给宝宝喂奶是很累人的，大多数妈妈（下接41页）

宝宝奶量的变化

头一天宝宝还特别开心，可第二天却整天都想吃奶!如果出现这种情况，可能是因为宝宝正处于身体发育的重要时间或是胃口大开，他的身体需要更多的乳汁，所以才会比往常吃得更多。而这又会“告诉”您的身体产生更多的乳汁，在随后的日子里也是如此。

您的身体完全可以为宝宝提供足够的奶水，您所要做的只是为其创造一个机会。要注意下列征兆：看到宝宝比平常吃奶更加频繁，就一定要让他吃。不要只用奶瓶或小奶嘴哄他，也不要坚持不让宝宝吃奶，否则第二天他会觉得更饿。



多关注自己的感受

与一个小宝宝长时间待在一起是一件很美妙的事情。许多时候您会满怀欣赏和自豪地凝视自己的小宝宝，这也说明在短短的时间内，您已经深深地沉浸在新角色的喜悦之中了。

但是，独自照料一个小宝宝是很累的，而且有时还很孤独，但大多数妈妈都是这样的。宝宝是精彩的，但当您不断地和他交谈(这对宝宝也是非常重要的)时，他们却不能和您一起聊天儿，不会和您谈谈您正在看的图书或昨天晚上刚看过的电视节目。您有时会希望有其他人陪在身边，如果您白天常常一整天和宝宝单独待在房间里，可以试试找些谈得来的、想法接近的朋友聊天儿或是见面。

此外，您可以参加或发起一些娱乐性组织，和其他一些妈妈们待在一起。她们的宝宝和您宝宝的年龄相仿，大家可以互相交流，这是一种很好的互相帮助、互相支持的方法。

总之，不要一个人单独支撑一切。如果您觉得自己精疲力竭，如果您觉得早晨起床是件很困难的事，或者您觉得生活毫无意义和乐趣，您可能患上了产后抑郁症。和周围的人谈谈，包括您的配偶、妈妈或是专业人员。应当清楚，如果您陷入这种情绪中，就很难把事情往积极的方面考虑，所以一定要寻求帮助。



和新朋友见面

参加一些小组或团体，能让您找到一些和您想法大致相同的朋友，大家一起聊聊天儿，能给您带来很大帮助。

（上接39页）都希望减少夜间喂奶的次数。下列方法对您会有所帮助：

- 把卧室弄得暗暗的，宝宝醒着的时候尽可能少与他交流。要向宝宝不断地强化这种概念，即晚上大家都需要非常安静，他要做的事情是休息、睡觉，而不是起床、玩耍。
- 宝宝醒着时，轻轻拍打宝宝的背或头，不要把他从床上抱出来，他可能会不吃奶就重新入睡。这样对宝宝的睡眠有利，使他们不会经常醒来。

哺乳期是否会怀孕

宝宝出生后如果持续喂奶几个月，就不可能恢复月经周期，这就意味着您肯定不会产生卵子，所以也就不会孕育一个新生命了。但有一点很重要，如果您真的不想马上怀孕，那么您不能单单把哺乳当成避孕的方法。不过，属于下列情况，哺乳是会起到避孕作用的：

- 您一直没有来月经。
- 宝宝小于6个月。
- 您正处于哺乳期。

这样的话，您怀孕的可能性只有2%。其实，这是很自然的。您的身体“明白”，您要不停地分泌乳汁以满足小宝宝的需求，自身已处于饱和状态，于是便停止排卵，使您不至于马上怀上第二个宝宝，能够休息一段时间。

如果一些女性愿意接受第二个宝宝的话，索性让它顺其自然。此时，您要了解的是，从宝宝6个月开始，您很可能

哺乳中的常见难题

希望您能顺顺利利地度过哺乳期，但如果出现难题，您可以从下列内容中知道自己该怎样做：

● 乳头疼痛

重新读一遍本书中关于宝宝吃奶姿态的内容(见30～31页)。姿势不正确常常是导致乳头疼痛的主要原因。您可以和这方面的咨询人员好好交流，调整好姿势，提高喂奶技巧。有时一个非常简单的建议就能让事情彻底改观。往疼痛的乳头上滴一点儿奶水也是减轻疼痛的好方法。

● 乳房上出现一个或多个小肿块

这可能是导管堵塞所致。您可以多让宝宝吃这侧乳房中的奶，洗个热水澡，对硬块区域进行按摩，或是自己挤出点儿奶，以便奶水流畅。

● 您开始觉得有些发烧或是乳房上出现红斑

这可能是乳腺炎或乳房炎症的开始。您要尽量让宝宝吃出现红斑的那侧乳房中的奶水，保证睡眠，或是活动活动那侧的胳膊，促进血液循环。您应该去看医生，听取医生的意见。

● 宝宝突然开始不吃您的奶水

这说明您的奶水味道发生了变化。您是否服用了药物？是不是正在进行身体锻炼？因为这会导致乳汁中的乳酸含量突然加大。你是不是开始了月经周期，或是不是又怀孕了？因为荷尔蒙的变化也会导致这种情况的发生。不过，奶水变味常常只是暂时现象，您的宝宝马上就会重新开始吃奶。还有另外一个原因，可能宝宝的鼻子不通气了。如果宝宝连续两三次都拒绝吃奶，您就该去医院了。

● 您认为宝宝只是为了贪图嘬奶的那种感觉

如果您认为宝宝是在享受那种嘬奶的感觉，而并没有吃进去多少奶水，事实上可能与您想的不同，宝宝实际吃的奶比您认为的要多。或者是宝宝想通过吸吮，让您的乳房为第二天生产出更多的奶水，以备第二次使用，这就是他的需求。或者，他可能觉得就是想和您这样亲密地待在一起，谁能说这不比吃奶更加重要呢?!



再度怀孕。不过，有些妈妈给宝宝喂奶的时间长达一年，或者两年，而在这段时间中，她们都不会恢复月经周期。

不过，大多数女性还是选择了采用避孕的方法。如果您没有这样做，可以和医生谈谈，或是找一个专家，跟他谈谈您的想法和需要。告诉他们您过去采用什么方法避孕，也许那种方法目前不适合您。

避孕药丸里含有雌激素，它会对乳汁分泌产生不良影响，所以医生常会开那种只含孕酮(或称黄体酮)的避孕药丸。目前没有研究显示这会对宝宝有副作用。尽管如此，仍有一些妈妈在哺乳期间不愿意服用口服避孕药。对她们来说，采用其他避孕工具(如上环)是最好的选择。如果您决定用这些工具，而以前又使用过，您一定要注意，由于生育已经改变了子宫的大小，所以需要重新上环。

哺乳期丈夫的角色

您的丈夫有没有因为您要

齐心协力

您在给宝宝喂奶时，您的丈夫能够帮助您，给您支持。同时，这样做也能使他很快地适应新角色，成为宝宝哺乳过程中的一部分。



让哥哥姐姐一起参与

一旦您对哺乳宝宝充满了自信后，就可以在喂奶时把大孩子叫到一边来和他们说话，让他们不会觉得受到了冷落。

给宝宝喂奶而备受冷落?对这个问题的回答是很复杂的。妈妈和一些正在哺乳期的宝宝之间的关系亲密无间，而往往此时，一些当爸爸的会觉得自己被晾在了一边。其实，他们有很多事情可以做，能给予您和宝宝很大的帮助。特别是他可以花时间抱抱宝宝，和宝宝玩玩，还可以给宝宝换尿布或洗澡，当然还有许多其他事情可做。

您准备给宝宝喂奶时，您丈夫也能够帮助您，让您觉得舒服一点儿，或是在您需要时端杯水或倒一杯果汁。如果宝宝晚上吵闹得您睡不好，他可以在早晨带会儿宝宝，让您多睡一两个小时。他还能采购一些有营养的食品做给您吃。

没有哪个爸爸愿意自己的位置被一个新生宝宝所取代。所以您要注意丈夫的需求——和您一样，宝宝的到来使他的生活与以前也发生了变化。对你们两人来说，最大的好处莫过于彼此可以互相交流，分享新生命带来的喜悦。

一览表

您要避免发生下列情况：

- **酗酒**　研究显示，酒精对宝宝的发育非常有害。哺乳期间，您一定不能饮酒。
- **吸烟**　吸烟会减少乳汁的供应量。而且，尼古丁会“混”进奶水中。想想看，宝宝是那样弱小，每天要面临着烟的折磨会多么可怜。这可能会让您鼓起勇气来戒烟，或者可以找找保健医生，听听他们的意见，看看用什么办法去掉这个坏习惯。不过，如果您继续抽烟，也并不意味着您不能给宝宝喂奶，您的乳汁对宝宝来说仍旧是最好的食品。但应当记住，您每次吸烟时都要远离宝宝，最好是到户外吸，至少也应当到外面的房间去。
- **服药**　如果出于某种原因，您确实需要服用处方或非处方药，需要告诉医生或药店的售货人员，您现在正处于哺乳期。
- **锻炼过量**　过度的运动会增加乳汁中的乳酸含量，这会影响奶水的味道。对大多数妈妈和宝宝来说，这不是问题。
- **饮食**　您要少喝咖啡，也不要吃太辣或太酸的食品。如果家族中有生吃花生米过敏史，您也不能吃花生。

如何在公共场所给宝宝喂奶

第一次在大庭广众之下给宝宝喂奶，您会觉得有些紧张、不自在，这是很正常的。不过，您会发现，时间长了也就容易了。当您习惯了以后就会发现它有很多好处。毕竟，母乳喂养是最方便的。



一些公共场所喂奶的小窍门

在您当着别人的面或是在公共场合给宝宝喂奶之前，自己一定要有信心。您首先一定要有勇气，一定要放松，不要扭扭捏捏。可以和别人待在一起，如果能和另外一位也要给宝宝喂奶的妈妈在一起，是最理想的。

- 找个有大人和小宝宝的地方喂奶，这样您会觉得自己好像是和朋友待在一起。
- 给自己和宝宝换上衣服。
- 喂奶时您会觉得很渴，所以要在包里准备一瓶水。
- 穿上大毛衣或外套，如果奶水滴出来，能盖上而不易被人发现。
- 如果还没有准备喂奶时奶水就流了出来，最好用上臂紧紧压在乳房上，这样可以阻止奶水不断流淌。

用哺乳室喂奶

在有些商店和购物中心专门设有哺乳室，您可以直接把宝宝带到那里去“放心”地喂奶。许多妈妈并不喜欢这种方式，她们认为自己没必要遮遮掩掩；有些妈妈则觉得自己无法

在大庭广众之下喂奶，对这些人来说，哺乳室使他们既能上街逛逛，又能在给宝宝喂奶时找到在家的感觉。

宝宝的需求第一，支持公共场所喂奶

不管您在哪里，也不管您和谁在一起，如果宝宝想吃奶了，您就应该满足他的要求，您身边的人应当尊重这一点。

如果您觉得很不自在，只要简单地说一声“抱歉”，然后就可以找一个地方给宝宝喂奶。记住一点，越多的妈妈选择在公共场所喂奶，就越容易被人接受，也就越“正常”。

还有一点也非常重要，那就是给宝宝喂奶时其实也可以做得很谨慎小心，那些坐在您身边的人甚至可能都不会察觉到，尤其是在您动作非常熟练之后。如果您选择在公共场合喂奶，法律通常是站在您这一边的。

如果友人碰巧注意到您给宝宝喂奶，许多人都会伸出援助之手。如果您的行为引起了公众的注意，很可能积极的方面比消极的方面要多。





从容小心

在公共场合喂奶，您可以把衣服直接往上拉，而不要解开衣扣，因为前者会比后者更不易引起别人的注意。还有一个好办法，你可以带一个披肩备用。

选个好位置

如果您是在餐厅里，选一个不要面对其他顾客的位置，否则您会觉得很别扭。这样，坐在您身边的人可能都不会注意到您正在给宝宝喂奶。

“我把自己的奶水挤出来，蒂姆可以喂给迈特弗吃，我就有了一点儿自由，有了属于自己的时间。”

朱丽娅，4个月大的迈特弗的妈妈。



6

第六章　如何挤奶

您和宝宝不可能永远待在一起。如果遇到这种情况，您还可以有别的办法，不用直接喂奶给宝宝吃。因为某种原因，如果您不得不离开宝宝一会儿，甚至一整天不在宝宝身边，可以把奶挤出来，喂给他吃。

什么是“挤奶”

挤奶是指把乳房中的奶汁挤出来。可以直接用手挤，也可以用电子或人工挤奶器。挤出来的奶可以贮藏在奶瓶或小袋中，放在冰箱或冰柜中，宝宝需要时再喂给他吃。这样一来，您就不用直接给宝宝喂奶了。

有各种各样的原因使您不得不和宝宝分开。例如，宝宝早产，或有病需要马上治疗，他可能需要在新生婴儿看护室待着。

另一个原因可能您得重新开始工作，所以不能把宝宝带在身边。您可以把奶挤出来放好，这样，您不在宝宝身边时，他也能吃到您的奶，您不用因此被迫断奶。

第三种情况是您因为特殊原因需要离开宝宝，委托别人照顾。例如，您要出去休假或是过夜旅行。

宝宝需要特殊照料时，可挤奶给他吃

如果是出于第一种原因，那将是最难的。您虽然也开始适应了新的角色，喂奶给宝宝吃，但和那些想要重新工作的妈妈以及已经有过喂养经验的妈妈不同，您只能用吸奶器。从情感上说，您也可能难以接受，孕期的结束方式完全意料不到。您发现自己和弱小的宝宝要一起在医院里长时间地待着，而您又是那么想自己喂奶给他吃。

在随后的几周里，您在使用吸奶器吸奶时一定很沮丧，因为您特别渴望搂着宝宝，和他亲密接触，并喂奶给他吃。其实吸奶器也能成为您的朋友，如果没有它提供的刺激，当宝宝长大一点儿后，您将很难保证奶量以满足宝宝的需要。

专家提示

用手挤奶(见48页)是每位给宝宝喂奶的妈妈都要掌握的非常有用的技能。例如，您可以在泡热水澡时轻轻地将奶水挤出来一些，以缓解乳房的压力。此外，把挤出来的奶水揉在感觉很痛或破裂的乳头上将会使情况好转。

挤奶是一门技巧

挤奶的技巧取决于您是用吸奶器还是用手挤。记住，多多练习特别重要，这完全是一门可以通过学习获得的技巧，练得越多，做得就越好，您也就越有信心。一些人发现，挤奶前冲个热水澡或在热水中泡上一会儿，能使乳汁流得更快一些。



如何用吸奶器挤奶

不管您用的是电动吸奶器、电池吸奶器还是人工吸奶器，您都得先把杯子或瓶子紧贴在乳头上，杯子尽可能多地把乳晕罩住。

打开吸奶器开关，如果您用的是手动吸奶器，可以直接用手操作。启动吸吮程序，模仿宝宝吸吮乳头的过程，有节奏地从乳房中吸奶，在此之后，奶水开始滴下来。刚开始吸时，您不会吸出太多的奶水。随着时间的推移，您的努力一定不会白费，能为宝宝收集到不少乳汁。

如何用手挤奶

用手挤奶也是非常有用的技巧。开始之前先洗手，然后把拇指放在乳头上方，其他手指放在下面，在乳晕周围形成一个弧形。轻轻地挤压，推动乳晕下面的腺体。用一个消过毒的小碗接奶。用手挤奶很费时间，但是一些妈妈发现自己后来成了这方面的专家，而且能做得和吸奶器一样快。





有特殊需要的宝宝
您要知道，挤奶喂给有特殊需要的宝宝吃是在给他提供最好的营养。

早产宝宝要么不会嘬奶，要么吸吮效果不明显，他们实在太小了，在吸吮反射还没有完全形成之前就出生了。您挤出来的奶水也只能通过导管才能被送到宝宝体内。在整个喂奶过程中，您得一直扶着导管。由于只用吸奶器刺激乳房，您需要定期经常挤奶。保持奶水供应将会是重大挑战。您可以试着做以下事情：

- 为吸奶器准备一种特殊的“双杯”，使您能同时从两侧乳房中挤奶，这能增进乳汁的产量，让您的身体“认为”您在哺乳两个宝宝。
- 夜间起来挤奶。这也会增加奶量，因为您体内的催乳激素水平在夜间较高。
- 挤奶时看宝宝的照片，这能让奶水加速流出。
- 用单杯接奶时，您挤完一侧乳房后，再挤另外一侧。此后，您还得重新再挤原来的那侧乳房。

吸奶器的类型

● 医院使用的电动吸奶器

电动吸奶器对那些宝宝还住在医院里的妈妈们来说最好。这些吸奶器价格昂贵，所以通常是出租的。它们是最好的替代物，能有效地将乳汁从乳房中吸出。如果宝宝在特殊看护室，因太小或太弱而不能直接吃奶，这些吸奶器能确保奶水的供应，直到宝宝长到足够大或足够强壮，自己能吃奶时为止。

● 便携式电动吸奶器

便携式电动吸奶器能帮助那些需要长时间陪伴宝宝在医院里待着的妈妈们在自己家里挤奶。还有一些妈妈已经重新开始工作，需要经常挤奶，这种吸奶器对她们也很有用。

● 电池吸奶器

这种吸奶器的功率没有上述两种强大，但它很轻，便于携带，特别适合那些需要出差的女性。

● 手动式吸奶器

用这种吸奶器很费时间，也要花一定力气，但对那些只是偶尔挤奶的妈妈或是那些想试试挤奶却又不想投入太多钱的妈妈有利。

怎样贮存乳汁?

您得把挤出来的乳汁放在专用的塑料瓶或塑料袋子里。一定要把乳汁放在消过毒的容器中，您可以把容器煮上10分钟，或放进洗碗机中消毒。如果您用瓶子喂宝宝，瓶子一定要仔细清洗。奶水特别容易滋生细菌，一定不要忽视这一点。

贮存在冰箱里的鲜乳汁应在24小时之内喂给宝宝吃，冰冻乳汁可以放上3个月，一旦解冻，最长只能存放24小时。冰冻会破坏乳汁中的一些抗体，所以尽可能用鲜奶。不过，即使是解冻的母乳也比配方奶粉好，营养成分多。可以把盛有冻奶的瓶子或袋子放进盛有温水的碗中解冻，或是把它放进冰箱里，一个晚上就能解冻。不要轻易使用微波炉解冻，因为那样会破坏一些营养物质。尽管您不愿意，但还是应该在每次喂完宝宝后将剩下的奶倒掉，不要留着下一次喂宝宝，因为很可能会滋生细菌。



母乳存放
您可以把挤出的乳汁存放到专用的塑料瓶或塑料袋中。

重回工作岗位前的挤奶

如果您打算恢复工作，而宝宝又比较小(比如说3～4个月)，挤奶是一种比较好的选择。大约6个月以后，宝宝开始吃辅食，您可能希望调整喂奶时间，以便尽可能地在给宝宝喂奶时和他待在一起。在您工作时，可以给宝宝用杯子或瓶子喝配方奶粉。

问与答

8周后我就要重新工作，我是不是应该开始挤奶?

您可以在重新工作前几周开始挤奶，慢慢习惯，这样做可以陆陆续续地储备一些冰冻奶水。如果您感觉已能非常熟练地挤奶，会更加放心地重返工作岗位。知道冰柜里面有足够的奶等着宝宝，您也就不必担心下班回家后还得马上给宝宝喂奶。

我的宝宝得在特殊看护室里至少待1个月，我该隔多长时间挤一次奶?

这取决于您自己生产奶水的能力。有些人需要更多的刺激才能成功地挤出奶水。基本上说，在24小时之内，您大概要挤6～8次。如果奶水有减少的趋势，可以考虑夜间挤奶，因为这样做能促进乳汁分泌。

如果用电动吸奶器，每次大概要吸多长时间?

随着时间的推移，您会慢慢地熟练起来，但用吸奶器每次大约需要30分钟。为了取得最佳效果，最好吸一小会儿，停一会儿，而且要两边乳房轮换着吸。您开始使用吸奶器时，关键在于勤吸，缩短时间间隔。

如何为挤奶工作做计划

挤奶是一项很耗时的事情，而且程序复杂，同时又不能保证宝宝喝到他所需要的奶量。您如果打算在重新开始工作后挤奶给宝宝吃，那需要做一定的准备工作，甚至在怀孕时就应该开始这项工作，为以后奠定基础。

您可以和上司谈谈，解释自己非常热爱这份工作，也很希望用母乳来喂养宝宝。可以告诉他其他一些女性成功地做到了两者兼顾，要让上司相信这不会影响您的工作能力。事实上，许多用挤奶方式给宝宝喂奶的妈妈发现自己很容易把精力集中到工作中，因为她们知道尽管不能和宝宝待在一起，但自己已经尽了最大的努力帮助宝宝。



家庭父亲
如果您已重返工作岗位，孩子要由您的另一半来照料，挤出的乳汁将保证孩子从父亲那里也能得到最充足的营养。

如何做好挤奶工作中的各个细节

如果您要采用这种办法，应当考虑得特别细致。比如说工作时在哪里挤奶?把奶贮存在哪儿?把这些情况都和上司沟通一下。除非您的工作单位里定期总会有人和您一样需要给宝宝喂奶，否则对您的上司而言这是一个新问题。如果您事先能想好怎样回答上司可能提出的问题，那将是最好的。


这些问题也许包括：

- 在哪儿挤奶?您得需要一个舒适的地方完成这项任务。
- 挤出来的奶准备存放在什么地方?您需要一台冰箱。或者考虑投资买一台小冰箱，这样，别的同事不会看到您的乳汁。
- 您把吸奶器放在什么地方，安全吗?
- 您得花多长时间挤奶?

“吃奶仍然是艾丽生活中的重要组成部分。但她也喜欢尝试不同类型的食物。她确实特别喜欢不同食物所包含的社会含义。”

史泰拉,8个月大的艾丽的妈妈。

7



第七章　宝宝开始吃辅食

当单纯吃奶已经无法满足宝宝需求的时候，处于哺乳期的宝宝生活中最重要的时刻就要到来了。宝宝大约长到6个月大时，这一时刻就到了。毫无疑问，您的小宝宝准备进入一个新的世界了。

宝宝准备吃辅食的特征

您可以观察宝宝是否出现了一些特征，表明他已经准备开始吃辅食了：

- 宝宝对您吃的东西表现出浓厚的兴趣，他可能还会试着从您手中或碗里拿过来吃。
- 吃完奶后，宝宝仍然显得意犹未尽。如果这种现象出现在宝宝不足6个月时，您得增加喂奶次数，让宝宝吃饱。至于添加辅助食品，建议最好还是到宝宝半岁时再开始。如果您不能确定到底什么时候开始合适，可以和保健医生谈谈这个问题。

辅食最初的作用

- 能让宝宝知道，除了奶汁之外，还有其他食物。
- 宝宝找到了一个新的好玩儿的地方——那把高高的椅子！
- 宝宝能知道更多的他喜欢吃的东西。

宝宝辅食的特点

- 不能取代母乳。
- 不能让他连续睡上一个晚上，除非他以前就已经能做到。
- 无法在一夜之间就指望宝宝会使用勺子吃东西，他在今后很长一段时间内仍然需要您的乳汁。

第一次品尝辅食

许多爸爸妈妈把宝宝开始添加辅食看作一个重大的、有里程碑意义的时刻，这一时刻的到来证明宝宝正在成长的道路上顺利前进。

然而，在实际生活中，开始添加辅食的头几个星期最重要的是让宝宝了解不同的口味。宝宝长到6个月时，他体内的铁贮备量已经很低，

早期的辅食

传统的早期辅食是米和奶搀在一起形成的米糊。米糊是不错的食品，但宝宝吃过几天以后，就应该添加其他辅食。

无论什么时候添加新的食物，有一点您应当考虑，即宝宝很可能会对新食物产生一定的反应。不过，等到6个月以后再添加辅食，能减少这种情况的发生。其他容易消化的早期添加食物，如胡萝卜或花椰菜泥也是非常不错的，还可以给宝宝吃苹果汁或梨汁。

等宝宝习惯了不同的蔬菜之后，您才能开始试着将不同的蔬菜掺在一起，或是在菜泥中添加肉末。而且，您一定要记住，和把什么东西都混在一起相比，宝宝更喜欢吃单一品种的东西。要在给宝宝吃水果之前给他吃蔬菜，否则宝宝就不愿意吃蔬菜了。

给宝宝吃一些含强化铁的谷类食物会是不错的开端。不过总体而言，如果您认为早期辅食是母乳的替代品，那就错了。它们不是替代品，而是母乳的辅助品，母乳仍然是宝宝的主食。

宝宝还需要吃多少奶

到7个月大时，混合喂养的宝宝可能一天要吃4～5次奶。不过，这并非一成不变，而是因人而异，因为有些宝宝属于那种少吃多餐型，每次都吃得很少；可是，也有一些宝宝一次能吃得很多，喂过一次后就非常满足。

您要做好准备，如果宝宝的生活发生了让他感觉不愉快的变化，他可能拒绝辅食，只吃母乳。感冒或受到感染，周围环境变化或是什么事情让宝宝觉得很焦虑，肯定会使宝宝重新回到您的怀抱中找奶吃。只有这一会儿，他才会觉得踏实、放松。



第一次张开嘴巴
宝宝开始吃辅食是一次全新的探险。

能买有机食品给宝宝吃吗？

许多人都认为，最好不要让宝宝吃从超市里购买的食品，因为这些食品中含有农药和化学成分，而宝宝的免疫系统还没有完全发育成熟，不能和成年人一样吃含有这些物质的食品，喂宝宝吃这些食品，实际上是为他以后的生活埋下危险的种子。我们不可能完全弄清楚这种担忧是否有一个合理的依据，但是有许多人购买安全性比较强的有机食品。有机水果、肉、蔬菜都是非常贵的，但是宝宝吃的量不大。如果您决定只购买几种有机食品，可以选择那些脂肪含量高的日常食品和肉。如果不买有机食品，要尽最大努力将水果和蔬菜洗干净，削皮后再给宝宝吃。



专家提示

除非宝宝早产或是身体有病，他基本上都能够从母乳中摄取到所需的维生素和矿物质，他还有至少可以维持6个月的铁贮备。但是，6个月以后，宝宝继续以母乳为主要食物，就需要补充铁和维生素A及维生素D的滴剂。最好咨询一下保健医生，是否需要补充这些东西?什么时候给宝宝补充合适?

如果出现上述情况，您也不用太在意。您应该感到高兴，因为他知道在什么地方是安全的。不管他对其他食物是不是有兴趣，反正您还能为宝宝提供母乳。

如何给宝宝手指食品

大多数父母开始给宝宝添加辅食时，都是用调羹喂米糊或菜泥给宝宝吃。但不久以后，宝宝就能用自己的小手抓住一些小食品，有时甚至能想方设法地把它送进自己的嘴里。多做些这样的练习，能促进宝宝精细动作技能和眼手协调能力的发展。所以，您一定不要忽视手指状食品，它们能给宝宝带来无限乐趣。

理想的手指食品包括：

- 手指面包片。
- 手指面包块。
- 面包条。
- 香蕉。
- 削皮的细长条形的苹果和梨。

宝宝到7个月大时，您可能会开始给他吃一些面包。这时，您一定要注意，无论是面包还是麦粥，如果吃得太多，宝宝的皮肤上有可能会出现斑疹。所以在头一年里，您只需搭配着给宝宝吃面包和麦粥就可以了。

如何让宝宝乐于吃辅食

给宝宝添加辅食的一个重要目的就是，为宝宝打开一个食品和各种口味的新世界，使宝宝对其充满乐趣。如果您只把食品放在桌子上，宝宝根本无法看见，也不能探索，您这是在限制宝宝的体验。如果您把每次吃饭的时间都当成是一次锻炼、一次培养宝宝形成好习惯的机会，让他端坐在高高的椅子上，尽可能保持清洁，您其实是在限制他的发展。

“人们说宝宝需要学会欣赏自己的食品，凯蒂就做得非常好！她有时把东西弄得一团糟，不过却很让人惊奇！”

玛丽，1 岁大的凯蒂的妈妈。



当然，如果宝宝把食品弄得到处都是，乱成一团，你收拾起来会很麻烦，但是宝宝的成长过程中许多时候都是乱乱的。放开手，让宝宝去摸、去舔、去挤、去压，玩各种不同食物的本身就是体验。可以试着在吃饭时给宝宝一块空间，让他自由活动，随他怎么弄。例如，可以在高高的椅子下面放个塑料垫子，或是在宝宝的脖子上挂一块小兜兜，让他离其他家具远一点儿，以免吃饭时把东西溅到家具上。这样做，即使宝宝弄得一团糟，您也不会太担心，宝宝也尽情享受了自己的用餐时间，而且可能会吃一点儿东西。

应对上述情况还有一种办法，那就是一天中有意制造出一次吃饭时“乱糟糟”的场景。通常情况下，这招还非常有效，吃完后马上来个热水澡！如果房间够暖和，有些妈妈甚至把宝宝脱光了衣服吃饭，这样反正菜饭不会溅到宝宝的衣服上，还节约了洗衣机。

为宝宝自制食品

在这段时间里，花钱买一个手动搅拌器非常有用。这样的话，几乎每次您做的饭菜都会合适(请记住，先给宝宝盛出一碗之后再放盐和辣椒)。可以多做一些，把少部分冻起来留给宝宝。您给宝宝准备的食品质量会比商店里买的婴儿食品好得多。不过，记住宝宝长得很快，他不需要吃太长时间的菜汁和米糊。到8个月的时

候，宝宝就能够吃些东西了，如果调成糊状的话会更好，因为宝宝可以用手吃，也可以用调羹。

尽量少选择商店里的宝宝食品

商店里出售许多宝宝食品。所有的食品都有严格的健康、营养和成分标准。如果完全用这些食品喂养宝宝，当然还有母乳，宝宝是完全能够健康成长的。但您自己准备的食品能让宝宝吃到更多的口味，商店里的食品味道基本上千篇一律。

另一方面，当您不在家的时候，或是您手头事情太多，没有时间给宝宝准备饭菜时，买来的宝宝食品会比较方便。

注重亲子共餐的时间

和大家一起坐在餐桌旁用餐也是一种乐趣。当您把宝宝放在高高的椅子上吃饭时，坐下来和他一起吃饭，或是喝上一点儿东西，聊天——哪怕是一小会儿。即便是宝宝，他也非常高兴您能和他待在一起，他会喜欢这个时刻的到来。用餐时间也是您和宝宝建立情感联结的时间，不要把宝宝坐在高高的椅子上吃饭看作是自己干事情的大好机会。

宝宝1周岁前避免食用的食品

- **太咸的食品**　宝宝的肾还没有发育好。
- **太甜的食品**　没有营养价值，会把宝宝的牙齿弄成“糖牙”。
- **没有成熟的水果**　宝宝不容易消化。
- **茶**　会使铁贮备减少。
- **鸡蛋**　蛋白质含量高，能引起过敏症——建议不要在1岁前喂宝宝。
- **加工食品**　含太多的盐。
- **牛奶**　含太多的盐和蛋白质。建议1岁以后再让宝宝喝。
- **蜂蜜**　含有一种孢子，能导致宝宝出现“肉毒中毒症”。1岁以前，宝宝的消化系统还没有完全发育成熟，孢子能形成细菌，导致疾病发生。
- **花生／果仁**　整花生要到7岁时才能给宝宝吃，因为它容易堵在什么地方。花生仁和其他果仁到3岁以后才能给宝宝吃，因为在此之前可能会引起宝宝过敏。
- **含麸质的食品(小麦、大麦、黑麦，可能还有燕麦)**　6个月以前，对麸质过敏可以导致“乳糜泻”。



“我给萨姆喂了两年奶，那段时间真是非常特别。断奶后，我觉得有点儿难过，但是大多数时间我非常高兴自己所做的事，我知道自己给了他最好的起步。”

艾玛，两岁半的萨姆的妈妈。



第八章　何时给宝宝断奶

尽管美国儿科研究所建议哺乳的时间为一年，但最终决定是断奶还是继续哺乳的人都是您自己。许多宝宝只吃母乳，还有一些宝宝1岁后开始喝牛奶，这些宝宝的妈妈通常希望继续哺乳。许多宝宝1岁后就慢慢地结束了母乳喂养。

宝宝吃奶的喜好变化

如果您既自己喂奶给宝宝吃，又让宝宝使用奶瓶，等他快到1岁时，您就会发现他更愿意用奶瓶吃奶，这是因为用奶瓶吃奶更快、更容易。大一点儿的宝宝如果知道还有一种更快的选择，会表现得更不耐烦。到此时，您就能知道母乳喂养给宝宝带来的极大好处。

如何减少喂奶的次数

从宝宝半岁到1岁之间，您可能会发现非常自然地减少了给宝宝喂奶的次数。宝宝已经吃到了辅食，而且非常乐于坐在高高的椅子上，参加到全家人吃饭的队伍中。不过，此时的宝宝还是经常表现出更愿意躺在您怀抱里吃奶。

到这个阶段，一些妈妈已经准备放弃喂奶。如果您也有这样的考虑，但却感觉宝宝吃的奶量并没有减少，或是不能按照您设想的速度减少喂奶次数，可以试着按以下步骤一步一步来做，以加速断奶进程。

第一步：省去午餐时间的那次喂奶，给宝宝喝点儿东西。

第二步：几天后，省去上午的那次喂奶，给宝宝喝杯水。

第三步：省去晚上的最后一次或早上的那次喂奶。这样一来，您只需偶尔喂一次宝宝。如果他还吃奶，晚上或早上吃得会比较多。

第四步：省去那些不定时的喂奶。您可以在宝宝想爬到您怀抱中吃奶时分散他的注意力。另外一个人，最好是您的丈夫，在宝宝想吃奶时能陪他一起玩会儿。

第五步：省去早上或晚上进行的最后那次喂奶。可以用改变一天作息时间的办法来做到这一点。当然，这时需要您的丈夫或家人帮您分

断奶的误区

什么时候断奶是需要您自己做出的决定。特别要指出的是，如果出现下列情况，您不必马上断奶：

- 宝宝出了第一颗牙齿。
- 宝宝咬您（您可以非常严厉地说“不要这样”，不再让他含着乳头。他马上就会明白咬人意味着自己不能够吃奶，就不会再继续这样做了）。
- 宝宝开始添加辅食。
- 宝宝开始自己吃饭。



分散宝宝注意力的技巧
和宝宝一起看书，既让宝宝觉得离您很近，又能使他忘记自己想吃奶的念头。

专家提示

对您来说，最后一次喂奶是很艰难的时刻，所以，最好不要刻意进行非正式的“最后一顿”。只需不断减少喂奶的次数，直到宝宝很难再吃到奶为止。然后，宝宝再想吃奶，只要努力分散他的注意力。如果您觉得宝宝实在很想，也不要彻底拒绝。这样一来，您会发现不知不觉之中，宝宝就结束了自己的最后一顿。您也不知道究竟是哪天宝宝会爬到您的怀里，要求再吃一点儿奶。

散宝宝的注意力。如果宝宝有自己特别喜欢的小毯子或玩具，这时也会非常有用。您还可以尝试着玩点儿新花样，比如说上床睡觉之前来杯热牛奶，或是给宝宝读一本书。如果是到了早晨的喂奶时间，也可以由宝宝的爸爸抱着宝宝来一个晨练。

断奶进程别太快

如果是循序渐进断奶，对您和宝宝来说都要容易得多；如果进行得很快、很突然，您可能要痛苦得多，因为您自己的身体不能马上对此做出反应。所以要慢慢来，让您的身体得到一个调整。

慢慢断奶对宝宝来说也会好得多，宝宝可能会注意到自己吃奶的次数越来越少了。如果断得太快，宝宝很可能被搞糊涂，而且会因为您无视他的要求而感觉受到了伤害。因为直到此时，您的乳房依然是他最安全的港湾，突然之间让他离开这个港湾会使他焦虑不安。

给大宝宝喂奶的益处

对于蹒跚学步的宝宝来说，他们“不需要”像小宝宝那样出于身体的原因而依恋母乳。不过，有许多研究发现，母乳中特有的免疫优势能继续发挥作用。哺乳还能带来如下好处：

- 宝宝摔倒或伤着自己时安慰他。
- 在宝宝不开心或是觉得世界有点儿不对劲儿时，能偶尔为他提供“一片安全的天空”。
- 继续强化宝宝与您之间的特殊关系。

如果您和宝宝都乐于继续哺乳，就没有问题。许多地方，一些宝宝吃奶要吃到3岁，有时甚至吃到开始要上学的年龄——5岁。

断奶不必从众

不过，在许多西方国家，断奶时间一直在不断提前，很难看到超过6个月的宝宝还在吃奶的现象。这增加了人们的一种感觉，即一到半岁之后，就应该断奶。在公共场合，人们经常看见一些大点儿的宝宝抱着奶瓶喝奶。

如果您决定继续喂宝宝，不要太在意那些风言风语，不断有一些妈妈反映她们常常遭到别人的批评。在挪威，母乳喂养的比率远远超过北美，宝宝直到蹒跚学步还吃奶的现象并不少见。

断奶后要寻找新方式亲近宝宝

断奶以后，您当然想找一些新的方式亲近宝宝。一天中会有一些特殊的时间使您和宝宝亲密地待在一起，比如一起看书就可以取代原来吃奶时的那种亲密接触。请您相信自己不会“丧失”喂奶所建立起来的那种与宝宝的密切关系。相反，您要用自己一生的时间不断地巩固这种关系。

妈妈断奶后的感觉

一些妈妈认为，当自己决定断奶后如释重负，得到了解脱，有了自由的感觉，好像身体又重新属于自己了。这对于认识“宝宝正在长大”这一事实是有帮助的。但对于许多妈妈来说，仍然会有一些遗憾，因为这意味着一个阶段已经结束。

如果您还想要生育宝宝，您可能会期待着几年以后给另外一个新宝宝喂奶。不过，如果您只要一个宝宝或者他已经是您最后一个宝宝，您可能就会觉得有一些伤感，自己生命的一个篇章正在结束，如果您已经哺乳过几个宝宝，尤其会有这种感觉。



断奶
有时，可以用一小杯水来代替喂奶。

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "MTI4MDI3Njcuemlw",
  "filename_decoded": "12802767.zip",
  "filesize": 18140510,
  "md5": "b6ee31e6b14a06e619676d0c14de18da",
  "header_md5": "74175e193795b915991f3c9a4541a439",
  "sha1": "76f64ec9a4f4b26fac1d9e27c35a75ca40a503de",
  "sha256": "d8927e2576c512ff69f5e6c2febabb252ecb7fc0b098bd1914028285c03f4ca8",
  "crc32": 2611585016,
  "zip_password": "julian",
  "uncompressed_size": 19168353,
  "pdg_dir_name": "DK\u2510\u255e\u2564\u00ba\u2559\u00b2\u2562\u2219\u2568\u00ed\u2591\u2518\u2510\u255e\u2592\u00aa\u2592\u00aa\u2593\u2555\u255a\u0398_12802767",
  "pdg_main_pages_found": 61,
  "pdg_main_pages_max": 61,
  "total_pages": 63,
  "total_pixels": 310560768,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}