

Distorting filter: $h[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n - n_0]$

(a) The Z transform of $h[n]$

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n}$$

$$H(z) = 1 - \frac{1}{2}z^{-n_0}$$

The N-pt DFT of $h[n]$: ($N = 4n_0$)

$$H[k] = \sum_{n=0}^{4n_0-1} h[n]W_{4n_0}^{kn_0}, \quad 0 \leq k \leq (4n_0 - 1)$$

$$= 1 - \frac{1}{2}W_{4n_0}^{kn_0}$$

$$H[k] = 1 - \frac{1}{2}e^{-j(\pi/2)k}$$

(b)

$$H_i(z) = \frac{1}{1 - (1/2)z^{-n_0}}, \quad |z| > \left(\frac{1}{2}\right)^{(1/n_0)} \text{ for causality}$$

$$h_i[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n/n_0} \delta[n - kn_0]$$

The filter is IIR.

(c)

$$G[k] = \frac{1}{H[k]} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\pi/2)k}}, \quad 0 \leq k \leq (4n_0 - 1)$$

The impulse response, $g[n]$, is just $h_i[n]$ time-aliased by $4n_0$ points:

$$g[n] = \left(1 + \frac{1}{16} + \frac{1}{256} + \dots\right) \delta[n] + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{32} + \frac{1}{512} + \dots\right) \delta[n - n_0]$$

$$+ \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{64} + \frac{1}{1024} + \dots\right) \delta[n - 2n_0] + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{128} + \frac{1}{2048} + \dots\right) \delta[n - 3n_0]$$

$$g[n] = \frac{16}{15}\delta[n] + \frac{8}{15}\delta[n - n_0] + \frac{4}{15}\delta[n - 2n_0] + \frac{2}{15}\delta[n - 3n_0]$$

(d) Indeed,

$$G[k]H[k] = 1, \quad 0 \leq k \leq (4n_0 - 1)$$

However, this relationship is only true at $4n_0$ distinct frequencies. This fact does not imply that for all ω :

$$G(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = 1$$

(e)

$$y[n] = g[n] * h[n]$$

$$= \frac{16}{15}\delta[n] + \frac{8}{15}\delta[n - n_0] + \frac{4}{15}\delta[n - 2n_0] + \frac{2}{15}\delta[n - 3n_0] - \frac{8}{15}\delta[n - n_0]$$

$$- \frac{4}{15}\delta[n - 2n_0] - \frac{2}{15}\delta[n - 3n_0] - \frac{1}{15}\delta[n - 4n_0]$$

$$y[n] = \frac{16}{15}\delta[n] - \frac{1}{15}\delta[n - 4n_0]$$