

2026 年中考化学终极押题猜想

押题猜想一 物质的变化、性质与用途

—— 试题前瞻·能力先查 ——

1. D

—— 终极猜想·精练通关 ——

1. C 2. A 3. D 4. B 5. C 6. A

押题猜想二 化学实验操作

—— 试题前瞻·能力先查 ——

1. A

—— 终极猜想·精练通关 ——

1. C 2. C 3. B 4. B 5. A 6. B

押题猜想三 化学与生活

—— 试题前瞻·能力先查 ——

1. D

—— 终极猜想·精练通关 ——

1. C 2. D 3. A 4. D 5. D 6. C 7. C

押题猜想四 化学用语

—— 试题前瞻·能力先查 ——

1. A

—— 终极猜想·精练通关 ——

1. D 2. C 3. A 4. D 5. A 6. B

押题猜想五 化学反应模拟图型

● 试题前瞻·能力先查 ●

1. A

● 终极猜想·精练通关 ●

1. B 2. C 3. D 4. C 5. D 6. D 7. C 8. C

押题猜想六 化学实验方案设计与评价

● 试题前瞻·能力先查 ●

1. B

● 终极猜想·精练通关 ●

1. B 2. C 3. D 4. D 5. D

押题猜想七 物质的检验、鉴别与除杂

● 试题前瞻·能力先查 ●

1. C

● 终极猜想·精练通关 ●

1. C 2. D 3. B 4. D 5. C 6. C

押题猜想八 物质的转化与推断

● 试题前瞻·能力先查 ●

1. D

● 终极猜想·精练通关 ●

1. C 2. D 3. B 4. C 5. D 6. D

押题猜想九 与金属、酸碱盐有关的综合

● 试题前瞻·能力先查 ●

1. D

● 终极猜想·精练通关 ●

1. C 2. C 3. D 4. D 5. D 6. C 7. D

押题猜想十 有化学方程式的简单填空

——● 试题前瞻·能力先查 ●——


1. (1) B; (2) 导电性; (3) $3\text{Fe}+2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$ 。

——● 终极猜想·精练通关 ●——

1. (1) A; (2) 氢气难溶于水; (3) $3\text{Fe}+2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$ 。


2. (1) 氢元素;

(2) 瓶中长导管口处有气泡冒出, 澄清石灰水变浑浊。



3. (1) 混合物; (2) $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$; (3) ②③。

4. (1) 增大与氧气的接触面积, 使煤充分燃烧。



(3) SO_2 (或 CO 或粉尘等)。

5. (1) 紫; (2) B;



6. (1) $4\text{P}+5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{P}_2\text{O}_5$ 。 (2) 引燃红磷。 (3) 1。

押题猜想十一 溶液与溶解度

——● 试题前瞻·能力先查 ●——

1. (1) 在 30°C 时, NaCl 和 Na_2CO_3 的溶解度相等; (2) 不饱和;

(3) 玻璃棒、胶头滴管; (4) AB。

——● 终极猜想·精练通关 ●——

1. (1) 9.66g; (2) ②③; (3) 10g; (4) $2a=b+1$ 。

2. (1) 饱和; 66;

(2) ① t_1 ; ② 11: 10; ③ AB。

3. (1) 增大; (2) $20 < t < 30$; (3) 53.9g; (4) BC。

4. (1) 小于; (2) 弱于; (3) B; (4) ABC。

5. (1) 40g; (2) 升高温度;

(3) 5; (4) ①②④。

6. (1) $>$; (2) 饱和; (3) BD; (4) AC。

押题猜想十二 工艺流程

试题前瞻·能力先查

1. (1) 物理;

(2) $2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 4\text{Fe} + 3\text{CO}_2 \uparrow$; 隔绝空气, 防止高温下碳与氧气反应, 保证碳能充分还原氧化铁, 同时防止生成的铁被氧化;

(3) Al^{3+} 、 H^+ 、 Cl^- ;

(4) 4: 1~7: 3。

终极猜想·精练通关

1. (1) 增大反应物的接触面积, 使反应更快、更充分;

(2) Fe^{3+} 、 H^+ ;

(3) 过滤;

(4) $\text{FeSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{FeCO}_3 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$; 避免生成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 沉淀。

2. (1) 过滤。

(2) 将烧渣粉碎; $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{FeO} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 。

(3) Fe、O。

(4) 盐酸是氯化氢气体的水溶液, 在加热蒸发浓缩过程中, 氯化氢会逸出。

3. (1) 增大反应物间的接触面积, 加快反应速率;

(2) $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{MgSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$;

(3) Mg^{2+} 、 H^+ 、 SO_4^{2-} ;

(4) 不会产生有毒的二氧化硫污染空气, 且硫酸的利用率高;



(5) 防止(或减少)过氧化氢分解。

4. (1) 混合物。(2) 氧化。


(3) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ 。

(4) Cu^{2+} 、 Fe^{3+} 、 H^+ 。(5) B。

5. (1) 混合物。(2) H^+ 、 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 。



6. (1) 增大反应物接触面积，反应更快、更充分。



(4) 产生白色沉淀。




押题猜想十三 科学探究

试题前瞻·能力先查

1. (1) 检查装置的气密性；

(2) 将生成的气体完全排入到吸收装置中；


(3) 5: 6: 2；



(5) 偏大。

终极猜想·精练通关

1. (1) 将装置内空气排尽，防止氧气影响实验；(2) 浓硫酸；(3) 一；




(5) $\frac{46a}{197} + \frac{23b}{29}$ 。

2. (1) 用作调味品；(2) C；(3) 有气泡产生；





3. (1) 检查装置气密性；

(2) 不出现气泡；



(4) 使反应生成的水、二氧化碳全部被浓硫酸、氢氧化钠溶液吸收；



(5) ③④。

5. (1) 酒精灯; (2) $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$; (3) 偏小;

$$(4) (m_0 + m_1 + m_2 - m_4 - m_5) < w \leq \frac{29(m_0 + m_1 + m_2 - m_4 - m_5)}{27}$$

押题猜想十四 化学方程式综合计算


试题前瞻·能力先查

1. (1) 烧杯;

(2) 13.0g。

【解析】(1) 由图可知，图 1 中盛放锌粒的仪器名称是烧杯;

(2) 根据质量守恒定律，化学反应前后物质的总质量不变，则生成氢气的质量为： $257.1\text{g} - 256.7\text{g} = 0.4\text{g}$;
设参加反应锌的质量为 x 。



$$\begin{array}{ccc} 65 & & 2 \\ x & & 0.4\text{g} \end{array}$$

$$\frac{65}{2} = \frac{x}{0.4\text{g}}$$

$$x = 13.0\text{g}$$

答：参加反应锌的质量为 13.0g。

终极猜想·精练通关

1. (1) 夹紧乳胶管;

(2) 1.6g。

【解析】(1) 实验结束时首先进行的操作是先取出导气管，停止加热，然后夹紧乳胶管，待试管冷却后取出粉末并用电子天平称量质量。

(2) 根据质量守恒定律，化学反应前后物质的总质量不变，由题中数据可知，生成二氧化碳的质量为： $1.75\text{g} - 1.31\text{g} = 0.44\text{g}$;

设本次实验中参加反应的氧化铜的质量为 x 。



$$\begin{array}{ccc} 160 & & 44 \\ x & & 0.44\text{g} \end{array}$$

$$\frac{160}{44} = \frac{x}{0.44\text{g}}$$


$$x = 1.6\text{g}$$

答：本次实验中参加反应的氧化铜的质量为 1.6g。

2. (1) 不变; (2) 3.4%。

【解析】(1) 催化剂能改变化学反应速率，但本身的质量和化学性质在反应前后不变，二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂，该反应前后二氧化锰的质量不变。

(2) 根据质量守恒定律，化学反应前后物质的总质量不变，则生成氧气的质量为： $320.00\text{g}-319.68\text{g}=0.32\text{g}$ ；设参加反应的过氧化氢的质量为 x 。



$$\begin{array}{ccc} 68 & & 32 \\ x & & 0.32\text{g} \end{array}$$

$$\frac{68}{32} = \frac{x}{0.32\text{g}}$$

$$x = 0.68\text{g}$$

则该过氧化氢溶液中溶质的质量分数为： $\frac{0.68\text{g}}{20.00\text{g}} \times 100\% = 3.4\%$ 。

答：该过氧化氢溶液中溶质的质量分数为 3.4%。

3. (1) 3.3; (2) 5.5%。

【解析】(1) 产生 CO_2 的总质量为： $10.0\text{g} + 150\text{g} - 156.7\text{g} = 3.3\text{g}$ ，

(2) 设所用稀盐酸中溶质的质量分数是 x 。



$$\begin{array}{ccc} 73 & & 44 \\ 100\text{gx} & & 3.3\text{g} \end{array}$$

$$\frac{73}{44} = \frac{100\text{gx}}{3.3\text{g}}$$


$$x \approx 5.5\%$$

答：所用稀盐酸中溶质的质量分数是 5.5%。

4. (1) 14; (2) 24.5%。

【解析】(1) 参加反应的铁的质量为 $20\text{g} - 6\text{g} = 14\text{g}$ 。

(2) 设参加反应的硫酸的质量为 x 。



$$\begin{array}{ccc} 56 & & 98 \\ 14\text{g} & & x \end{array}$$

$$\frac{56}{98} = \frac{14\text{g}}{x}$$

$$x = 24.5\text{g}$$


所用稀硫酸的溶质质量分数为： $\frac{24.5\text{g}}{100\text{g}} \times 100\% = 24.5\%$ 。

答：所用稀硫酸的溶质质量分数为 24.5%。

5. (1) 质量和化学性质； (2) 10%。

【解析】(1) 过氧化氢在二氧化锰的催化下生成水和氧气，催化剂反应前后质量和化学性质都不变；

(2) 设过氧化氢溶液中溶质的质量为 x 。



$$\begin{array}{ccc} 68 & & 32 \\ x & & 3.2\text{g} \end{array}$$

$$\frac{68}{32} = \frac{x}{3.2\text{g}}$$

$$x = 6.8\text{g}$$

$$\text{该溶液中溶质的质量分数} = \frac{6.8\text{g}}{68\text{g}} \times 100\% = 10\%$$

答：该溶液中溶质的质量分数为 10%。


6. (1) Na^+ 、 Cl^- 、 OH^- 。(2) 4.0%。

【解析】(1) 由图 2 可知，a 点时溶液的 pH 大于 7，溶液显碱性，说明氢氧化钠有剩余，此时溶液中的溶质为氯化钠和氢氧化钠。氯化钠在溶液中会解离出 Na^+ 和 Cl^- ，氢氧化钠在溶液中会解离出 Na^+ 和 OH^- ，所以 a 点溶液中的离子有 Na^+ 、 Cl^- 、 OH^- 。

(2) 由图 2 可知，当滴入稀盐酸的质量为 20.0g 时，溶液的 pH 等于 7，此时氢氧化钠与盐酸恰好完全反应。

已知稀盐酸的质量为 20.0g，溶质质量分数为 3.65%，根据溶质质量 = 溶液质量 × 溶质质量分数，可得稀盐酸中溶质氯化氢的质量为 $20.0\text{g} \times 3.65\% = 0.73\text{g}$ 。

设 20.0g 待测 NaOH 溶液中溶质的质量为 x 。



$$\begin{array}{ccc} 40 & & 36.5 \\ x & & 0.73\text{g} \end{array}$$

$$\frac{40}{36.5} = \frac{x}{0.73\text{g}}$$


$$x = 0.8\text{g}, \text{ 可得该 NaOH 溶液中溶质的质量分数为 } \frac{0.8\text{g}}{20\text{g}} \times 100\% = 4.0\%。$$

答：该 NaOH 溶液中溶质的质量分数 4.0%。

7. (1) 99.11%； (2) AB。

【解析】(1) 根据质量守恒定律，化学反应前后物质的总质量不变，由题中数据可知，生成氢气的质量为： $150.00\text{g} + 5.65\text{g} - 155.45\text{g} = 0.2\text{g}$ ；

设该高碳钢样品中铁的质量为 x 。



$$\begin{array}{ccc} 56 & & 2 \end{array}$$

$$x \qquad 0.2g$$

$$\frac{56}{2} = \frac{x}{0.2g}$$

$x=5.6g$ ，则该高碳钢样品中铁的质量分数为： $\frac{5.6g}{5.65g} \times 100\% \approx 99.11\%$

答：该高碳钢样品中铁的质量分数为 99.1%。

(2) A.倒入粉末的快慢，会影响反应放出氢气的速率，但对最终氢气的质量无影响，所以对铁的质量分数的测定结果无影响，故正确；B.若没有干燥管，排出的氢气中会混有水蒸气，导致测量的氢气质量偏大，会造成铁的质量分数测定结果偏大，故正确；C.实验结束后若不鼓入空气，装置内残留的氢气会使反应后装置总质量差偏小，导致测量的氢气质量偏大，会造成铁的质量分数测定结果偏大，故错误。