
a
Cross-arm contact mass (%)
A 9.6 1.2 12.5 6.8 1.8
B 9.6 0.6 7.5 8.6 15.6
C 1.2 0.6 2.5 1.0 0.2
D 12.5 7.5 2.5 13.8 1.7
E 6.8 8.6 1.0 13.8 16.6
F 1.8 15.6 0.2 1.7 16.6
A B C D E F
Arm
% of total cross-arm soft contact
15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0
b
Max split-Rhat
Min ESS
1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00
600 500 400 300 200 100 0
20 50 20 50
c
Pearson r = 0.964
50 ns contact
20 ns contact
0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00
0.00 0.05 0.10
F-F
B-F
D-E
A-D
A-B
d
Arm participation
Weighted degree (%)
25 20 15 10 5 0
E B D F A C
Arm
e
Leading endpoint pairs
V9–V10
V3–V6
V11–V12
V6–V8
V3–V8
V2–V11
V8–V12
V8–V10
V7–V8
V2–V8
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08
Mean sigmoid contact
rep 1 rep 2 rep 3 mean
f
Independent replicas sample persistent, slowly exchanging contact states
rep 1 rep 2 rep 3
Cross-arm sigmoid contact per pair
0.014 0.012 0.010 0.008
10 20 30 40
Time (ns; 5 ns windows)