随机微分方程在求解微分方程中的应用

张家玮

2026 年 4 月 23 日

摘要

随机微分方程（SDE）为求解确定性偏微分方程（PDE）提供了一种概率表示方法，将 PDE 的解析求解转化为随机路径模拟与统计估计问题。本文首先系统介绍了随机过程、布朗运动、伊藤积分、伊藤公式等预备知识，阐述了 SDE 解的存在唯一性、伊藤扩散的无穷小生成元以及 Dynkin 公式等核心理论。随后，通过 Feynman-Kac 公式建立了 SDE 与 PDE 之间的桥梁，并基于 Euler-Maruyama 时间离散化结合 Monte Carlo 模拟，提出了一种高效的数值求解框架。文中分别对经典 Dirichlet 问题、热方程以及金融领域的 Black-Scholes 方程进行了数值实验验证。结果表明：SDE-Monte Carlo 方法在单位圆、正方形、三角形等区域的 Dirichlet 问题以及热方程求解中，平均绝对误差均能够随着 Monte Carlo 模拟路径数的增加而以 $\frac{1}{2}$ 阶的速度降低，与理论收敛速率高度吻合；在 Black-Scholes 期权定价中，该方法同样能有效得到风险中性价格。数值结果证实了该方法在高维问题、复杂边界条件下具有良好的可扩展性与数值稳定性，为工程、物理、金融等领域带噪系统的 PDE 求解提供了实用工具。

关键词：SDE，PDE，Feynman-Kac 公式，EM 方法，Monte Carlo 估计，Black-Scholes 方程

目录

1 绪论 **3**
1.1 研究背景与现状 3
1.2 本文的主要工作 4

2 预备知识 **6**

3 重要定理叙述与数值方法 **15**
3.1 重要定理 15
3.2 数值方法 19
3.3 数值例子 20
3.3.1 经典 Dirichlet 问题求解 20
3.3.2 热方程求解 24

4 SDE 在求解 Black-Scholes 方程中的应用 **26**
4.1 Black-Scholes 方程背景 26
4.2 经典 PDE 解 29
4.3 SDE 方法求解 Black-Scholes 方程 32
4.4 数值模拟 33

5 总结与展望 **35**

A 附录 A **36**

1 绪论

1.1 研究背景与现状

在工程、物理、生物以及金融等众多实际领域中，许多系统的演化过程往往受到随机激励、参数扰动或外部环境噪声的影响，并非完全由确定性规律主导。传统的确定性微分方程虽然能够很好地描述系统的平均行为，但在存在显著不确定性的场合，却难以准确刻画真实的动态变化。例如，在物理系统中，粒子在流体中的布朗运动受分子碰撞的随机力作用；在生物学中，种群动态或基因表达过程常伴随环境噪声；在金融市场中，资产价格的波动也呈现出明显的随机特征。因此，将随机扰动纳入模型，并采用随机微分方程（SDE）作为数学工具，已成为描述和分析这类带噪系统的一种自然且行之有效的方法。

随机微分方程的思想可追溯至 20 世纪初。1900 年，法国数学家 Louis Bachelier 在其博士论文中首次将布朗运动引入金融领域，用以描述股票价格的随机波动，并尝试构建期权定价模型，这被公认为现代金融数学的开端。尽管当时 Bachelier 的模型存在一定局限（如可能导致负价格），但它开创性地将随机过程应用于实际问题。随后，1905 年，Albert Einstein 从物理角度系统研究了布朗运动的统计性质，通过扩散方程与粒子随机位移的联系，证明了原子的存在，并为随机过程的数学描述奠定了基础。1923 年，Norbert Wiener 给出了布朗运动的严格数学构造，即 Wiener 过程，确保了路径的连续性与独立增量性质。1940 年代，日本数学家 Kiyosi Itô 创立了随机微积分，引入伊藤积分与伊藤公式，建立了随机微分方程解的存在性、唯一性及性质分析的严格框架。这一理论突破克服了经典积分对非光滑路径的局限性，为 SDE 的系统研究提供了坚实基础。此后，SDE 迅速成为刻画物理、生物、金融等领域中含噪动力系统的重要数学工具。例如，Langevin（1908）提出的方程描述了粒子在摩擦力与随机碰撞力共同作用下的运动；Ornstein-Uhlenbeck 过程进一步完善了这一模型，用于刻画速度的均值回复特征；Paul Samuelson（1965）提出的几何布朗运动模型 $dS_t/S_t = dt + dB_t$ 则为现代金融衍生品定价提供了坚实基础，避免了价格负值的缺陷，并直接促成了 Black-Scholes 模型的诞生。

与此同时，SDE 还为求解确定性偏微分方程（PDE）开辟了一条全新的概率途径。早在 1931 年，Andrey Kolmogorov 首次揭示了扩散过程与二阶抛物型 PDE 之间的联系，通过前向和后向 Kolmogorov 方程建立了随机过

程的有限维分布与 PDE 解的对应关系。这一发现奠定了随机过程与偏微分方程的理论桥梁。1940 年代，Richard Feynman 在量子力学路径积分工作中隐含了概率表示的思想，他将量子力学中的传播子表示为所有可能路径的加权积分；1949 年，Mark Kac 明确提出了 Feynman-Kac 公式，将热方程等抛物型 PDE 的解表示为相应随机过程的期望值，从而将复杂的 PDE 解析求解转化为随机路径的模拟与统计估计问题。此后，Dynkin 公式、Itô 扩散的无穷小生成元等理论进一步完善了 SDE 与 PDE 的对应关系，使高维、非线性或复杂边界条件的 PDE 求解可转化为随机路径的模拟与统计估计问题。这种概率方法在传统数值方法（如有限差分、有限元）面临"维数灾难"时，展现出显著的优势：它无需在高维空间中构建网格，避免了指数级增长的计算量，尤其适合处理复杂几何边界、非光滑系数或强随机扰动的情形。

在数值实现方面，Euler-Maruyama 方法等时间离散化方案结合 Monte Carlo 路径模拟，使得 SDE 的概率表示从理论走向实用。该方法由 Gisiro Maruyama 于 1955 年提出，作为经典 Euler 方法的随机推广，通过在每个时间步添加布朗增量实现 SDE 的路径模拟，后经 Kloeden 和 Platen 等学者系统分析其强收敛阶和弱收敛阶，已成为 SDE 数值求解的标准工具。近年来，随着高性能计算、GPU 加速和并行计算技术的快速发展，基于 SDE 的 Monte Carlo 方法在高维 PDE 求解、随机控制、数据同化以及金融风险管理等领域得到广泛应用。例如，在金融工程中，它直接用于期权定价的风险中性模拟；在生物医学中，用于种群动态或肿瘤生长模型的随机模拟；在工程控制中，支持含噪系统的鲁棒优化。这些进展显著提升了复杂系统的模拟精度和效率，同时也为机器学习与 SDE 的融合（如神经 SDE）提供了新的机遇。

本文正是在这一历史脉络与现实需求下，系统梳理 SDE 的理论基础，构建其求解经典 Dirichlet 边界值问题、热方程以及 Black-Scholes 期权定价方程的数值框架，并通过具体算例验证方法的有效性、可扩展性与数值稳定性。通过理论与实践相结合，本文旨在为工程、物理、金融等领域中带噪 PDE 的数值求解提供一种高效、稳定的概率计算途径。

1.2 本文的主要工作

本文首先叙述了所需的概率与随机过程的预备知识，以及相关记号的定义，主要包括了测度论基础下概率空间及随机过程的定义，伊藤积分体系

的建立，以及随机微分方程解的性质分析，便于后续内容的展开。后对两个重要定理，Feynman-Kac 公式以及混合 Dirichlet-Poisson 问题解的存在唯一性，进行了叙述与详细证明。前者展示了如何将抛物型 PDE 的解表示为随机过程的期望形式，从而可以将其用于 Black-Scholes 方程的求解；后者通过 Dynkin 公式，证明了带边界条件的 Dirichlet 问题解可以转化为随机停时（如布朗运动首次到达边界的时刻）的泛函期望，这为处理复杂几何区域的边界值问题提供了新思路。

在此之后，本文针对理论上的期望表示，设计了并实现了可落地执行的数值计算框架————SDE Monte Carlo 方法。该数值框架主要包含两个部分，第一个是对随机微分方程的离散化方案，本文采用了 Euler-Maruyama (EM) 方法对连续的 SDE 路径进行时间离散化处理，利用高斯增量模拟布朗运动的随机性，来近似模拟 SDE；第二个则是对期望的估计方案，采用的则是 Monte Carlo 统计估计方法，用于近似估计边界函数作用在伊藤扩散过程上的期望。另外，还给出了该数值框架的收敛分析，并在后续的数值实验中进行了验证。

在下一步的数值实验中，本文运用 SDE Monte Carlo 方法对单位圆区域和单位正方形区域的 Dirichlet 问题进行了求解，并于其对应 PDE 精确解进行了对比与误差分析，发现只要通过将离散化区间数和 Monte Carlo 路径数取得足够大，就能得到足够低的误差，这与收敛性分析一致。因此，对于通常没有精确解的三角形区域上的 Dirichlet 问题，可以利用该方案对其进行求解，本文也对该问题进行了求解并展示了该解。后续还将 SDE Monte Carlo 方法运用到热方程求解上，其误差结果与收敛速率均符合理论预期。

最后将 SDE Monte Carlo 方法对金融领域内期权定价的经典模型————Black-Scholes 方程上。在边界条件分别取欧式看涨期权和欧式看跌期权下，通过 SDE Monte Carlo 方法求得的解与 Black-Scholes 方程 PDE 精确解的误差很小，且各自的实际收敛速率也与理论预期保持高度一致，从而能充分说明 SDE Monte Carlo 方法用于求解 Black-Scholes 方程是十分精准且有效的。

2 预备知识

以下为本文所用到的定义与定理，以及相关记号的定义。

定义、定理等改为如下标准的 latex 语法格式，这样方便引用，如根据**定义2.1**。

{def:Lp_space}

定义 2.1 ($L^p(\mathbb{P})$ 空间) *若 $X:\Omega\mapsto\mathbb{R}^n$ 为一定义在概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量，$p\in[1,\infty)$ 为一常数，定义 X 的 L^p 范数 $\|X\|_p$ 如下*

$$\|X\|_p=\|X\|_{L^p(\mathbb{P})}=(\int_\Omega|X(\omega)|^p\ dP(\omega))^{\frac{1}{p}}$$

对应的 $L^p(\mathbb{P})$ 空间定义为

$$L^p(\mathbb{P})=\left\{X:\Omega\to\mathbb{R}^n;\|X\|_p<\infty\right\}$$

定义 2.1（$L^p(\mathbb{P})$ 空间）

若 $X:\Omega\mapsto\mathbb{R}^n$ 为一定义在概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量，$p\in[1,\infty)$ 为一常数，定义 X 的 L^p 范数 $\|X\|_p$ 如下

$$\|X\|_p=\|X\|_{L^p(\mathbb{P})}=(\int_\Omega|X(\omega)|^p\ dP(\omega))^{\frac{1}{p}}$$

对应的 $L^p(\mathbb{P})$ 空间定义为

$$L^p(\mathbb{P})=\left\{X:\Omega\to\mathbb{R}^n;\|X\|_p<\infty\right\}$$

定义 2.2（随机过程）

随机过程是一组由参数指示的随机变量

$$\{X_t(\omega)\}_{t\in T}$$

这些随机变量定义在一概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$，并取值于 $\mathbb{R}^n$。

若固定 $\omega\in\Omega$，函数

$$t\mapsto X_t(\omega);\quad t\in T$$

称为 X_t 的**样本路径**。

随机过程 $X=\{X_t\}_{t\in T}$ 的（有限维）分布即是定义在 $\mathbb{R}^{nk}$ 上的测度 $u_{t_1,\ldots,t_k}$, $k=1,2,\ldots$

$$u_{t_1,\ldots,t_k}(F_1\times F_2\times\ldots\times F_k)=\mathbb{P}\left[X_{t_1}\in F_1,\ldots,X_{t_k}\in F_k\right];\quad t_i\in T$$

其中 $F_1,\ldots,F_k$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel 集。

定义 2.3（布朗运动）

取定 $x\in\mathbb{R}^n$，定义

$$p(t,x,y)=(2\pi t)^{-n/2}\exp(-\frac{|x-y|^2}{2t}),\quad y\in\mathbb{R}^n,t>0$$

$\forall 0\le t_1\le t_2\le\ldots\le t_k$，定义 $\mathbb{R}^{nk}$ 上一测度 $\nu_{t_1,\ldots,t_k}$

$$\nu_{t_1,\ldots,t_k}(F_1\times\cdots\times F_k)$$

$$=\int\limits_{F_1\times\cdots\times F_k}p(t_1,x,x_1)p(t_2-t_1,x_1,x_2)\ldots p(t_k-t_{k-1},x_{k-1},x_k)dx_1\ldots dx_k$$

其中用记号 $dy=dy_1\ldots dy_k$ 表示 Lebesgue 测度，并约定 x 处的单位点质量为 $p(0,x,y)dy=\delta_x(y)$。

易验证该测度满足 Kolmogorov 扩张定理的两个条件，因此存在一概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P}^x)$ 以及一 Ω 上的随机过程 $\{B_t\}_{t\ge 0}$，使得 B_t 的有限维分布为

$$\mathbb{P}^x(B_{t_1}\in F_1,\ldots,B_{t_k}\in F_k)=\nu_{t_1,\ldots,t_k}(F_1\times\cdots\times F_k)$$

上述定义的随机过程称为从 x 开始的**布朗运动** ($\mathbb{P}^x(B_0=x)=1$)。

特别的，当 $x=0$ 时，将 $\mathbb{P}^0$ 简写为 $\mathbb{P}$。

定义 2.4

设 $\{X_t\}$ 与 $\{Y_t\}$ 为定义在概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的两随机过程，若满足

$$\mathbb{P}(\{\omega:X_t(\omega)=Y_t(\omega)\})=1,\quad\forall t$$

则称 $\{X_t\}$ 为 $\{Y_t\}$ 的一个**版本**（或称为一个修正）。

易计算得 $\mathbb{E}\left|X_t-X_s\right|^4=n(n+2)\left|t-s\right|^2$，由附录 A 中定理 A.2（Kolmogorov 连续性定理），从而布朗运动总有连续版本

在给出伊藤积分的定义之前，需要先给出一些定义。

定义 2.5

设 $\{B_t\}$ 为在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上从 $x=0$ 出发的一维布朗运动，用 $\mathcal{F}_t$ 记为随机变量集合 $\{B_s : s \le t\}$ 生成的 σ 代数，并保证它的完备性。

后文中若无特别指出，布朗运动 B_t 均指从 $x=0$ 出发的布朗运动。

定义 2.6

设 $\{\mathcal{N}_t\}$ 为 Ω 上一递增的 σ 代数族。若一过程 $g(t,\omega) : [0,\infty) \times \Omega \mapsto \mathbb{R}^n$ 满足：$\forall t \ge 0$ 都有函数

$$\omega \mapsto g(t,\omega)$$

是 $\mathcal{N}_t-$ 可测的，则称 $g(t,\omega)$ 是 $\mathcal{N}_t$ **适应的**

定义 2.7

记 $\mathcal{V} = \mathcal{V}(S,T)$ 为一函数族

$$f(t,\omega) : [0,\infty) \times \Omega \to \mathbb{R}$$

满足

(1)$(t,\omega) \to f(t,\omega)$ 为 $\mathcal{B} \times \mathcal{F}$ 可测的，其中 $\mathcal{B}$ 为 Borelσ 代数。

(2)$f(t,\omega)$ 是 $\mathcal{F}_t$ 适应的。

(3)$\mathbb{E}\left[\int_S^T f(t,\omega)^2 dt\right] < \infty$

定义 2.8（基本函数）

称以下形式的函数 $\phi \in \mathcal{V}(S,T)$ 为基本函数

$$\phi(t,\omega) = \sum_j e_j(\omega) \chi_{[t_j, t_{j+1})}(t)$$

其中 $\chi_{[t_j,t_{j+1})}(t)$ 示性函数，t_j 有以下形式

$$t_j = t_j^{(n)} = \begin{cases} j \cdot 2^{-n}, & S \le j \cdot 2^{-n} \le T \\ S, & j \cdot 2^{-n} < S \\ T, & j \cdot 2^{-n} > T \end{cases}$$

由于 $\phi \in \mathcal{V}$，故每一个 $e_j(\omega)$ 都必须是 $\mathcal{F}_{t_j}$ 可测的。

基本函数的伊藤积分定义为

$$\int_S^T \phi(t,\omega) dB_t = \sum_{j \ge 0} e_j(\omega)[B_{t_{j+1}} - B_{t_j}](\omega)$$

有了以上定义后，定义伊藤积分如下。

定义 2.9（伊藤积分）

令 $f \in \mathcal{V}(S,T)$，则 f 在 $[S,T]$ 上的伊藤积分定义为

$$\mathcal{I}[f](\omega) = \int_S^T f(t,\omega)dB_t := lim_{n\to\infty}\int_S^T \phi_n(t,\omega)dB_t$$

以上的极限指的是 $L^2(\mathbb{P})$ 中极限，即

$$lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\left[(\int_S^T f(t,\omega)-\phi_n(t,\omega)dB_t)^2\right] \to 0, \quad n\to\infty$$

$\{\phi_n\}$ 为一基本函数列使

$$\mathbb{E}\left[\int_S^T (f(t,\omega)-\phi_n(t,\omega))^2 dt\right] \to 0, \quad n\to\infty$$

其中基本函数列的存在性由附录 A 中定理 A.4,A.5,A.6 给出。

定义 2.10（鞅）

设一族 $(\Omega,\mathcal{F})$ 中的子 σ 代数 $\mathcal{M}=\{\mathcal{M}_t\}_{t\geq 0}$ 满足

$$0 \leq s < t \Rightarrow \mathcal{M}_s \subset \mathcal{M}_t$$

则称 $\{\mathcal{M}_t\}_{t\geq 0}$ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的一 σ **代数流**。

设 $\{M_t\}_{t\geq 0}$ 为概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的一 n 维随机过程，称其是关于 σ 代数流 $\{\mathcal{M}_t\}_{t\geq 0}$ 的**鞅**，若满足

(1)M_t 是 $\mathcal{M}_t-$ 可测的， $\forall t$

(2)$\mathbb{E}[|M_t|] < \infty$， $\forall t$

(3)$\mathbb{E}[M_s|\mathcal{M}_t] = M_t$， $\forall s \geq t$

在定义了一维伊藤积分的定义后，下给出多元伊藤积分的定义。

定义 2.11（多元伊藤积分）

设 $B=(B_1,B_2,\ldots,B_n)$ 为 n 维布朗运动。记 $\mathcal{V}_{\mathcal{H}}^{m\times n}(S,T)$ 为一组 $m\times n$ 矩阵 $v=[v_{ij}(t,\omega)]_{m\times n}$ 的集合，其中 $v_{ij}(t,\omega)$ 满足：

(1)$(t,\omega)\to v_{ij}(t,\omega)$ 为 $\mathcal{B}\times\mathcal{F}$ 可测的，$\forall 0\leq i\leq m, 0\leq j\leq n$，其中 $\mathcal{B}$ 为 Borelσ 代数。

(2)$\mathcal{H}=\{\mathcal{H}_t\}_{t\geq 0}$ 为 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上一 σ 代数流，使得一维布朗运动 $\{B_t\}$ 是关于 $\mathcal{H}$ 的鞅，且 $v_{ij}(t,\omega)$ 是 $\mathcal{H}_t$ 适应的，$\forall 0\leq i\leq m, 0\leq j\leq n$。

(3)$\mathbb{E}\left[\int_S^T v_{ij}(t,\omega)^2 dt\right] < \infty$，$\forall 0\leq i\leq m, 0\leq j\leq n$

若 $v \in \mathcal{V}_{\mathcal{H}}^{m\times n}(S,T)$，则可用矩阵记号定义 v 的伊藤积分为

$$\int_S^T v dB = \int_S^T \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ v_{m1} & \cdots & v_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dB_1 \\ \vdots \\ dB_n \end{pmatrix}$$

它为一 $m \times 1$ 矩阵，第 i 个变量为

$$\sum_{j=1}^n \int_S^T v_{ij}(s,\omega) dB_j(s,\omega)$$

为了简单记号，当 $\mathcal{H} = \mathcal{F}_{t\geq 0}^{(n)} = \left\{\mathcal{F}_t^{(n)}\right\}$ 时，将 $\mathcal{V}_{\mathcal{H}}^{m\times n}(S,T)$ 记为 $\mathcal{V}^{m\times n}(S,T)$。当 $m=1$ 时，可简写为 $\mathcal{V}_{\mathcal{H}}^{n}(S,T)$（相对地，$\mathcal{V}^{n}(S,T)$）。

另外，为了阐述后续的定义及定理，需要给出以下记号的定义。

定义 2.12

记 $\mathcal{W}_{\mathcal{H}}(S,T)$ 表示一组过程 $f \in \mathbb{R}$，满足
(1)$(t,\omega) \to f(t,\omega)$ 为 $\mathcal{B}\times\mathcal{F}$ 可测的，其中 $\mathcal{B}$ 为 Borelσ 代数。
(2)$\mathcal{H} = \{\mathcal{H}_t\}_{t\geq 0}$ 为 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上一 σ 代数流，使得一维布朗运动 $\{B_t\}$ 是关于 $\mathcal{H}$ 的鞅，且 $f(t,\omega)$ 是 $\mathcal{H}_t$ 适应的。
(3)$\mathbb{P}\left[\int_S^T v_{ij}(t,\omega)^2 dt < \infty\right] = 1$。
记 $\mathcal{W}_{\mathcal{H}} = \bigcap_{T>0} \mathcal{W}_{\mathcal{H}}(0,T)$。

定义 2.13（一维伊藤过程）

令 B_t 为 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上一维布朗运动。**一维伊藤过程**为在 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上有如下形式的过程

$$X_t = X_0 + \int_0^t u(s,\omega) ds + \int_0^t v(s,\omega) dB_s$$

其中 $v \in \mathcal{W}_{\mathcal{H}}$，使得

$$\mathbb{P}\left[\forall t \geq 0, \int_0^t v^2(s,\omega) ds < \infty\right] = 1$$

u 为 $\mathcal{H}_t$ 适应的，且

$$\mathbb{P}\left[\forall t \geq 0, \int_{0,}^t |u(s,\omega)|\, ds < \infty\right] = 1$$

如果 X_t 为以上形式的伊藤过程，则其也可写成更简短的形式

$$dX_t = udt + vdB_t$$

定理 2.14（一元伊藤公式）

设 X_t 为一维伊藤过程，其形式由如下式子给出

$$dX_t = udt + vdB_t$$

设 $g(t,x) \in C^2([0,\infty) \times \mathbb{R})$，则

$$Y_t = g(t, X_t)$$

也为一伊藤过程，且

$$dY_t = \frac{\partial g}{\partial t}(t, X_t)dt + \frac{\partial g}{\partial x}(t, X_t)dX_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t, X_t)(dX_t)^2$$

其中 $(dX_t)^2$ 由以下规则计算

$$dt \cdot dt = dt \cdot dB_t = dB_t \cdot dt = 0, dB_t \cdot dB_t = dt$$

定理 2.15（伊藤积分分部积分法）

设 X_t, Y_t 为 $\mathbb{R}$ 中的伊藤过程，则由伊藤公式易得

$$d(X_tY_t) = X_tdY_t + Y_tdX_t + dX_tdY_t$$

从而有分部积分法

$$\int_0^t X_s dY_s = X_tY_t - X_0Y_0 - \int_0^t Y_s dX_s - \int_0^t dX_s \cdot dY_s$$

定义 2.16（多元伊藤过程）

设 $B(t,\omega) = (B_1(t,\omega), \ldots, B_m(t,\omega))$ 为 n 维布朗运动，设矩阵

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} v = \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ v_{m1} & \cdots & v_{mn} \end{pmatrix}$$

其中 $u_{ij}(s,\omega)$ $v_{ij}(s,\omega)$ 分别满足一元伊藤过程定义中 u,v 的条件，则有以下形式的 n 个伊藤过程

$$\begin{cases} dX_1 = u_1 dt + v_{11} dB_1 + \ldots + v_{1m} dB_m \\ \qquad \vdots \\ dX_n = u_n dt + v_{n1} dB_1 + \ldots + v_{nm} dB_m \end{cases}$$

若记

$$X(t) = \begin{pmatrix} X_1(t) \\ \vdots \\ X_n(t) \end{pmatrix} dB(t) = \begin{pmatrix} B_1(t) \\ \vdots \\ B_n(t) \end{pmatrix}$$

则以上过程可简写为

$$dX(t) = udt + vdB(t)$$

这样的 n 维过程 $X(t)$ 称为 n **维伊藤过程**。

定义 2.17（多元伊藤公式）

设

$$dX(t) = udt + vdB(t)$$

为一 n 维伊藤过程。令 $g(t,\omega) = (g_1(t,\omega), \ldots, g_p(t,\omega))^{\mathbf{T}} \in C^2([0,\infty) \times \mathbb{R}^n)$，则过程

$$Y(t,\omega) = g(t, X(t))$$

为一 p 维伊藤过程。记 $Y(t,\omega) = (Y_1(t,\omega), \ldots, Y_p(t,\omega))^{\mathbf{T}}$, 则有

$$dY_k = \frac{\partial g_k}{\partial t}(t, X(t))dt + \sum_i \frac{\partial g_k}{\partial x_i}(t, X(t))dX_i(t) + \frac{1}{2}\sum_{i,j} \frac{\partial^2 g_k}{x_i x_j}(t, X(t))dX_i(t)dX_j(t)$$

其中 $dB_i dB_j = \delta_{ij} dt, dB_i dt = dt dB_i = 0$

定理 2.18（随机微分方程的存在唯一性定理）

设 $T > 0, b(\cdot,\cdot) : [0,T] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \sigma(\cdot,\cdot) : [0,T] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$ 为可测函数满足

$$|b(t,x)| + |\sigma(t,x)| \le C(1 + |x|); \quad x \in \mathbb{R}^n, t \in [0,T]$$

对某些常数 C 成立，其中 $|\sigma|^2 = \sum |\sigma_{ij}|^2$。还满足

$$|b(t,x) - b(t,y)| + |\sigma(t,x) - \sigma(t,y)| \le D\,|x - y|\,; \quad x, y \in \mathbb{R}^n, t \in [0,T]$$

对某些 D 成立。设 Z 为一与 $\mathcal{F}_\infty^{(n)}$ 独立的随机变量，其中 $\mathcal{F}_\infty^{(n)}$ 为由 $B_s(\cdot), s \geq 0$ 生成的 σ 代数，使

$$\mathbb{E}[|Z|^2] < \infty$$

则随机微分方程

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t, \quad 0 \leq t \leq T, X_0 = Z$$

有唯一 $t-$ 连续解 $X_t(\omega)$ 满足：X_t 适应 σ 代数流 $\mathcal{F}_t^z$,$\mathcal{F}_t^z$ 为由 Z 与 $B_s(\cdot), s \leq t$ 生成的 σ 代数，且

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T |X_t|^2 \, dt\right] < \infty$$

以上存在唯一定理找到的解称为**强解**，这是因为布朗运动的版本 B_t 是预先给定的，并由此构造的解 X_t 是 $\mathcal{F}_t^z$,$\mathcal{F}_t^z$ 适应的。

若只给定函数 $b(t,x), \sigma(t,x)$ 并寻找概率空间 $(\Omega, \mathcal{H}, \mathbb{P})$ 上一对过程 $((\widetilde{X_t}, \widetilde{B_t}), \mathcal{H}_t)$ 使得随机微分方程成立，那么解 $\widetilde{X_t}$ 就被称为**弱解**。这里的 $\mathcal{H}_t$ 为一 σ 代数流使得 $\widetilde{X_t}$ 是 $\mathcal{H}_t-$ 适应的，且 $\widetilde{B_t}$ 为关于 $\mathcal{H}_t$ 的鞅且为布朗运动。这样就允许像先前一样定义伊藤积分，即使 $\widetilde{X_t}$ 不是 $\mathcal{F}_t^z$ 适应的。一强解一定是一弱解，但反过来不一定。

上述存在唯一性定理中的“唯一性”指的是“强唯一性”，即

$$X_1(t,\omega) = X_2(t,\omega), \quad \forall t \leq T, a.s.$$

而“弱唯一性”则指二者分布一样，即有相同的有限维分布。下面的定理说明了随机微分方程解的弱唯一性。

定理 2.19（随机微分方程解的弱唯一性）

若 $b(t,x), \sigma(t,x)$ 满足**定理 2.18** 中的条件，则随机微分方程

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t$$

的一解（强解或弱解）都是“弱唯一”的。

定义 2.20（时齐伊藤扩散）

一随机过程 $X_t(\omega) = X(t,\omega) : [0,\infty) \times \Omega \to \mathbb{R}^n$ 满足以下形式的随机微分方程

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t, \quad t \geq s; X_s = x$$

称为**时齐伊藤扩散**。其中 B_t 为 m 维布朗运动，且 $b:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n,\sigma:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^{n\times m}$ 满足**定理 2.18**，在这里也可以简化为

$$|b(x)-b(y)|+|\sigma(x)-\sigma(y)|\le D\,|x-y|\,;\quad x,y\in\mathbb{R}^n$$

也即 $b(\cdot),\sigma(\cdot)$ 是 Lipschitz 连续的。

将 $X_s=x$ 的时齐伊藤扩散过程 $\{X_t\}$ 记为 $X_t^{s,x}$，特别地，$s=0$ 时简记为 X_t^x。再记 Q^x 为 X_t^x 的概率分布，$\mathbb{E}^x[\cdot]$ 为对应的期望，即有 $\mathbb{E}^x[X_t]=E[X_t^x]$。

定义 2.21（时齐伊藤扩散的无穷小生成元）

设 $\{X_t\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上一时齐伊藤扩散，则其**无穷小生成元** A 定义为

$$Af(x)=\lim_{t\downarrow 0}\frac{\mathbb{E}^x[f(X_t)-f(x)]}{t},\quad x\in\mathbb{R}^n$$

用 $\mathcal{D}_A(x)$ 表示上述极限在 x 处存在的所有 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 组成的集合，用 $\mathcal{D}_A$ 表示该极限对所有 $x\in\mathbb{R}^n$ 都存在的函数集合。

定理 2.22

令 $Y_t=Y_t^x$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上一伊藤过程

$$Y_t^x(\omega)=x+\int_0^t u(s,\omega)ds+\int_0^t v(s,\omega)dB_s(\omega)$$

其中 B_s 为 m 维的。令 $f\in C_0^2(\mathbb{R}^n),i.e.f\in C^2(\mathbb{R}^n)$ 且 f 有紧支集。设 τ 为关于 $\left\{\mathcal{F}_t^{(m)}\right\}$ 的一停时，且假定 $\mathbb{E}^x[\tau]<\infty$。另假设 $u(s,\omega),v(t,\omega)$ 关于 (t,ω) 有界，使得 $Y(t,\omega)$ 在 f 的支集上。则有

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}^x[f(Y_\tau)]=f(x)+\\&\quad\mathbb{E}^x\left[\int_0^\tau(\sum_i u_i(s,\omega)\frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_s)+\frac{1}{2}\sum_{i,j}(vv^{\mathbf{T}})_{i,j}(s,\omega)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(Y_s))ds\right]\end{aligned}$$

定理 2.23

设 $\{X_t\}$ 为一时齐伊藤扩散过程

$$dX_t=b(X_t)dt+\sigma(X_t)dB_t$$

若 $f\in C_0^2(\mathbb{R}^n)$，则 $f\in\mathcal{D}_A$ 且

$$Af(x)=\sum_i b_i(x)\frac{\partial f}{\partial x_i}+\frac{1}{2}\sum_{i,j}(\sigma\sigma^{\mathbf{T}})_{i,j}(x)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}$$

定理 2.24（Dynkin 公式）

设 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n), \tau$ 为一停时，$\mathbb{E}^x[\tau] < \infty$，则有

$$\mathbb{E}^x[f(X_\tau)] = f(x) + \mathbb{E}^x\left[\int_0^\tau Af(X_s)ds\right]$$

3 重要定理叙述与数值方法

3.1 重要定理

定理 3.1.3（Feynman-Kac 公式）

设 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 及 $q \in C(\mathbb{R}^n)$，并假定 q 是有下界的。

(1) 记

$$v(t,x) = \mathbb{E}^x[exp(-\int_0^t q(X_s)ds)f(X_t)]$$

则

$$\frac{\partial v}{\partial t} = Av - qv; t > 0, x \in \mathbb{R}^n$$

$$v(0,x) = f(x); x \in \mathbb{R}^n$$

其中 X_t 为一 n 维伊藤扩散，A 为 X_t 的无穷小生成元。

(2) 进一步，对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}$，若 $w(t,x)$ 在 $K \times \mathbb{R}^n$ 上有界，且 $w(t,x) \in C^{1,2}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$ 满足 (1) 中微分方程及初值条件，则 $w(t,x) = v(t,x)$。

证明：

(1)

设 $Y_t = f(X_t)$，$Z_t = \exp\left(-\int_0^t q(X_s)\,ds\right)$，则

$$dZ_t = -Z_t q(X_t)\,dt$$

注意到 dZ_t 中没有随机微分项，因此根据伊藤公式知 $dY_t \cdot dZ_t = 0$，因此由定理 2.15 知

$$d(Y_t Z_t) = Y_t\,dZ_t + Z_t\,dY_t$$

故根据伊藤公式可知，$Y_t Z_t$ 是一个伊藤过程，从而由定理 2.22 可知 $v(t,x) = \mathbb{E}^x[Y_t Z_t]$ 关于 t 是可微的。

计算

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{r}\big(\mathbb{E}^x[v(t,X_r)]-v(t,x)\big)\\
&\qquad=\frac{1}{r}\mathbb{E}^x\big[\mathbb{E}^{X_r}[Z_tf(X_t)]-\mathbb{E}^x[Z_tf(X_t)]\big]\\
&\qquad=\frac{1}{r}\mathbb{E}^x\Big[\mathbb{E}^x\Big[f(X_{t+r})\exp\Big(-\int_0^t q(X_{s+r})\,ds\Big)\,\big|\mathcal{F}_r\Big]\\
&\qquad\quad-\mathbb{E}^x[Z_tf(X_t)|\mathcal{F}_r]\Big]\\
&\qquad=\frac{1}{r}\mathbb{E}^x\Big[Z_{t+r}\cdot\exp\Big(\int_0^r q(X_s)\,ds\Big)f(X_{t+r})-Z_tf(X_t)\Big]\\
&\qquad=\frac{1}{r}\mathbb{E}^x\big[f(X_{t+r})Z_{t+r}-f(X_t)Z_t\big]\\
&\qquad\quad+\frac{1}{r}\mathbb{E}^x\Big[f(X_{t+r})Z_{t+r}\cdot\big(\exp\Big(\int_0^r q(X_s)\,ds\Big)-1\big)\Big]
\end{aligned}
$$

当 $r\to 0$ 时，上式趋于

$$\frac{\partial}{\partial t}v(t,x)+q(x)v(t,x)$$

这是因为

$$\frac{1}{r}f(X_{t+r})Z_{t+r}\big(\exp\Big(\int_0^r q(X_s)\,ds\Big)-1\big)\to f(X_t)Z_tq(X_0)$$

逐点有界地成立。至此完成 (1) 的证明。

(2)

假设 $w(t,x)\in C^{1,2}(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$ 满足 (1) 中偏微分方程及初值条件，且对每个紧集 $K\subset\mathbb{R}$，$w(t,x)$ 在 $K\times\mathbb{R}^n$ 上有界。则令

$$\widehat{A}w(t,x):=-\frac{\partial w}{\partial t}+Aw-qw=0\quad(t>0,\ x\in\mathbb{R}^n)$$

且

$$w(0,x)=f(x),\qquad x\in\mathbb{R}^n$$

固定 $(s,x,z)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$，定义 $Z_t=z+\int_0^t q(X_s)\,ds$ 以及 $H_t=(s-t,\ X_t^{0,x},\ Z_t)$。则 H_t 是一伊藤扩散，其生成元为

$$A_H\phi(s,x,z)=-\frac{\partial\phi}{\partial s}+A\phi+q(x)\frac{\partial\phi}{\partial z}$$

其中 $\phi\in C_0^2(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n)$。

则由 $\widehat{A}$ 的定义式和 Dynkin 公式，对所有 $t \geq 0$、$R > 0$，取 $\phi(s,x,z) = \exp(-z)w(s,x)$，有

$$\mathbb{E}^{s,x,z}[\phi(H_{t\wedge\tau_R})] = \phi(s,x,z) + \mathbb{E}^{s,x,z}\left[\int_0^{t\wedge\tau_R} A_H\phi(H_r)\,dr\right]$$

其中 $\tau_R = \inf\{t > 0 : |H_t| \geq R\}$。

注意到对此 ϕ 的选择，有

$$A_H\phi(s,x,z) = \exp(-z)\Big[-\frac{\partial w}{\partial s} + Aw - q(x)w\Big] = 0$$

因此

$$\begin{aligned} w(s,x) = \phi(s,x,0) &= \mathbb{E}^{s,x,0}[\phi(H_{t\wedge\tau_R})] \\ &= \mathbb{E}^x\Big[\exp\left(-\int_0^{t\wedge\tau_R} q(X_r)\,dr\right) w(s-t\wedge\tau_R, X_{t\wedge\tau_R})\Big] \\ &\to \mathbb{E}^x\Big[\exp\left(-\int_0^{t} q(X_r)\,dr\right) w(s-t, X_t)\Big], \quad R\to\infty \end{aligned}$$

这是因为 $w(r,x)$ 在 $(r,x) \in K \times \mathbb{R}^n$ 上有界。特别地，取 $t = s$，我们得到

$$w(s,x) = \mathbb{E}^x\Big[\exp\left(-\int_0^{s} q(X_r)\,dr\right) w(0, X_s^{0,x})\Big] = v(s,x)$$

即为所求。 □

定理 3.1.4（混合 Dirichlet-Poisson 问题解的存在唯一性）

设 L 为 $C^2(\mathbb{R}^n)$ 上的半椭圆偏微分算子，形式如下

$$L = \sum_{i=1}^n b_i(x)\frac{\partial}{\partial x_i} + \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}$$

其中 $b_i(x)$ 与 $a_{ij}(x) = a_{ji}(x)$ 均为连续函数，且 $\forall x$，矩阵 $a(x) = (a_{ij}(x))_{n\times n}$ 的特征值均非负。

设 D 为开连通集，假定 $\phi \in C(\partial D)$ 有界，以及 $g \in C(D)$ 满足

$$\mathbb{E}^x\left[\int_0^{\tau_D} |g(X_t)|dt\right] < \infty, \quad \forall x$$

其中 X_t 为一 n 维时齐伊藤扩散，$\tau_D = \inf_{t>0}\{t : X_t \notin D\}$，且 X_t 的无穷小生成元 $A = L$。

设 $w \in C^2(D)$ 有界且满足

(1)$Lw=-g$ 在 D 内

(2)$\lim_{t\uparrow\tau_D} w(X_t)=\phi(X_{\tau_D})\cdot\chi_{\{\tau_D<\infty\}}\quad a.s.Q^x\quad \forall x$

则

$$w(x)=\mathbb{E}^x\left[\phi(X_{\tau_D})\cdot\chi_{\{\tau_D<\infty\}}\right]+\mathbb{E}^x\left[\int_0^{\tau_D} g(X_t)dt\right]$$

证明：

设 $\{D_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是一个开集的递增序列，满足 $D_k\subset D$ 且 $D=\bigcup_{k=1}^{\infty}D_k$。定义

$$\alpha_k=k\wedge\tau_{D_k},\qquad k=1,2,\ldots$$

则由定理 2.24 和 (1) 可得

$$\begin{aligned}w(x)&=\mathbb{E}^x[w(X_{\alpha_k})]-\mathbb{E}^x\left[\int_0^{\alpha_k} Lw(X_t)\,dt\right]\\&=\mathbb{E}^x[w(X_{\alpha_k})]+\mathbb{E}^x\left[\int_0^{\alpha_k} g(X_t)\,dt\right]\end{aligned}$$

由 (2) 可知，$w(X_{\alpha_k})\to\phi(X_{\tau_D})\cdot\chi_{\{\tau_D<\infty\}}$ 逐点有界 $a.s.Q^x$。因此

$$\mathbb{E}^x[w(X_{\alpha_k})]\to\mathbb{E}^x[\phi(X_{\tau_D})\cdot\chi_{\{\tau_D<\infty\}}],\quad k\to\infty$$

此外，

$$\mathbb{E}^x\left[\int_0^{\alpha_k} g(X_t)\,dt\right]\to\mathbb{E}^x\left[\int_0^{\tau_D} g(X_t)\,dt\right],\quad k\to\infty$$

这是因为

$$\int_0^{\alpha_k} g(X_t)\,dt\to\int_0^{\tau_D} g(X_t)\,dt\quad \text{a.s.}$$

并且

$$\left|\int_0^{\alpha_k} g(X_t)\,dt\right|\le\int_0^{\tau_D}|g(X_t)|\,dt$$

而后者是 Q^x-可积的。

因此综上，当 $k\to\infty$

$$\begin{aligned}w(x)&=\lim_{k\to\infty}\left(\mathbb{E}^x[w(X_{\alpha_k})]\right)+\lim_{k\to\infty}\left(\mathbb{E}^x\left[\int_0^{\alpha_k} g(X_t)\,dt\right]\right)\\&=\mathbb{E}^x\left[\phi(X_{\tau_D})\cdot\chi_{\{\tau_D<\infty\}}\right]+\mathbb{E}^x\left[\int_0^{\tau_D} g(X_t)dt\right]\end{aligned}$$

证毕。 □

3.2 数值方法

考虑一时齐伊藤扩散过程

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t, \quad X_0 = x$$

定义在区间 $[0,T]$ 上，初始条件可以是确定性的，也可以是随机的。我们的目标是获取该方程的一个近似解，并对足够多的 f 计算 $\mathbb{E}[f(X_T)]$ 的值。

将区间 $[0,T]$ 等分成 N 个子区间，每个子区间长度为 Δt，即 $N\Delta t = T$。记

$$X_j := X(j\Delta t), \quad j = 0, 1, \ldots, N$$

以上随机微分方程的 Euler-Maruyama 方法为

$$X_{j+1} = X_j + b(X_j)\Delta t + \sigma(X_j)\Delta B_j, \quad j = 0, \ldots, N-1$$

其中 $\Delta W_j = W_{j+1} - W_j$ 表示第 j 个布朗运动增量。这些增量为独立高斯随机变量，期望为 0，方差为 Δt。可将 ΔW_j 写为 $\Delta W_j = \xi_j\sqrt{\Delta t}$，$\xi_j \sim \mathbf{N}(0,1), iid$。Euler-Maruyama 方案可重写为

$$X_{j+1} = X_j + b(X_j)\Delta t + \sigma(X_j)\xi_j\sqrt{\Delta t}, \quad j = 0, \ldots, N-1$$

我们可通过随机数生成器来生成独立同分布的高斯随机变量列 $\{\xi_j\}_{j=0}^{N-1}$，从而提供了一个用于求解以上随机微分方程的算法。

值得指出的是，EM 方案中给出的只是 SDE 的离散时间点解，对于 $[0,T]$ 上的其他点可通过线性插值来获得。

记 $\hat{X}_T$ 为 EM 方案下 SDE 的解，为了计算 $\mathbb{E}[f(X_T)]$ 的值，利用 Monte Carlo 方法生成 M 个 $\hat{X}_T$ 的样本 $\left\{\widehat{X}^m_{N\Delta t}\right\}_{m=1}^M$，再用

$$\mathbb{E}[f(X_T)] \approx \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} f(\widehat{X}^m_{N\Delta t})$$

来估算 $\mathbb{E}[f(X_T)]$。

下通过一个定理说明该数值方法的收敛性。

定理 3.2.1

记 $C_p^k(\mathbb{R})$ 表示所有 C^k 函数（连同其导数）在无穷远处增长至多为多项式的函数空间，$\widehat{X}_j^{\Delta t}$ 表示 EM 方案下 $t = j\Delta t$ 处的解。则 $\forall f \in C_p^3(\mathbb{R})$，当 Δt 足够小时，存在一与 Δt 独立的正常数 β，使得

$$\left|\mathbb{E}[f(X_j)] - \mathbb{E}[f(\widehat{X}_j^{\Delta t})]\right| \le \beta\Delta t$$

取 $j=N, C_1=\beta T$，并由 $\Delta t=TN^{-1}$ 得

$$\left|\mathbb{E}[f(X_T)]-\mathbb{E}[f(\widehat{X}_T^{\Delta t})]\right| \leq \beta\Delta t = C_1 N^{-1}$$

Monte Carlo 算法的收敛性估计如下

$$\left|\mathbb{E}[f(\widehat{X}_T)]-\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} f(\widehat{X}_{N\Delta t}^m)\right| \leq C_2 M^{-\frac{1}{2}}$$

其中 C_2 为一正常数。

从而该数值方法的收敛性估计如下

$$\varepsilon := \left|\mathbb{E}f(X_T)-\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} f(\widehat{X}_{N\Delta t}^m)\right| \tag{3.1}$$

$$\leq \left|\mathbb{E}f(X_T)-\mathbb{E}f(\widehat{X}_T)\right| + \left|\mathbb{E}f(\widehat{X}_T)-\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} f(\widehat{X}_{N\Delta t}^m)\right| \tag{3.2}$$

$$\leq C_1 N^{-1} + C_2 M^{-\frac{1}{2}} \tag{3.3}$$

3.3 数值例子

3.3.1 经典 Dirichlet 问题求解

经典 Dirichlet 问题如下:

设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中一有界开集，ϕ 为 ∂D 上一有界函数，$w\in C^2(D)$ 使得

(1)$\Delta w=0 \quad$ 在 D 内

(2)$\lim_{x\to y, x\in D} w(x)=\phi(y) \quad \forall y\in\partial D$

求解 $w(x)$。

在经典 PDE 理论中，可以通过格林函数等方法找出特定区域上经典 Dirichlet 问题的解析解。

如在半径为 R 的圆形区域上，通过换元

$$x=rcos\theta, y=rsin\theta \quad r\in[0,R), \theta\in[0,2\pi]$$

可得到解析解

$$w(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-r^2}{R^2-2Rrcos(\theta-\alpha)+r^2}\phi(\alpha)d\alpha$$

其中 $w(R,\theta)=\phi(\theta)$ 为边界函数。

又如正方形区域 $(x,y)\in[0,L]\times[0,H]$, 记

$$f_l(y)=w(0,y)$$

$$f_r(y)=w(L,y)$$

$$f_b(x)=w(x,0)$$

$$f_t(x)=w(x,H)$$

解析解为

$$\begin{aligned} w(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}&\left[a_n\sinh(\frac{n\pi(H-y)}{L})+b_n\sinh(\frac{n\pi y}{L})\right]\sin(\frac{n\pi x}{L})\\ &+\left[c_n\sinh(\frac{n\pi(L-x)}{H})+d_n\sinh(\frac{n\pi x}{H})\right]\sin(\frac{n\pi y}{H}) \end{aligned} \tag{3.4}$$

其中

$$\begin{aligned} a_n&=\frac{2}{L\sinh(\frac{n\pi H}{L})}\int_0^L f_b\sin(\frac{n\pi z}{L})dz\\ b_n&=\frac{2}{L\sinh(\frac{n\pi H}{L})}\int_0^L f_t\sin(\frac{n\pi z}{L})dz\\ c_n&=\frac{2}{H\sinh(\frac{n\pi L}{H})}\int_0^H f_l\sin(\frac{n\pi z}{H})dz\\ d_n&=\frac{2}{H\sinh(\frac{n\pi L}{H})}\int_0^H f_r\sin(\frac{n\pi z}{H})dz \end{aligned} \tag{3.5}$$

但像如三角形区域等其他复杂区域，其上的格林函数通常难以找到，因此可以通过以下的 SDE 方法来求解。

将问题重述为:

设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中一有界开集，ϕ 为 ∂D 上一有界函数，$w\in C^2(D)$ 使得

(1)$Lw=0,\quad$ 在 D 内

(2)$\lim_{t\to\tau_D}w(X_t)=\phi(X_{\tau_D})$

其中 $L=\Delta$，X_t 的无穷小生成元 $A=L$，求解 $w(x)$。

由定理 3.1.1 知,n 维布朗运动 B_t 的无穷小生成元 $A=\frac{1}{2}\Delta=\sum_{i=1}^n\frac{\partial^2}{\partial x_ix_j}$，因此可取 $X_t=B_t$，从而由定理 3.1.4 知

$$w(x)=\mathbb{E}^x[\phi(B_{\tau_D})],\quad x\in D$$

其中 $\tau_D = \inf_{t>0}\{t : X_t \notin D\}$。从而可以通过 3.2 节中的数值方法来求解任意有界开集上的经典 Dirichlet 问题。

取 $\Delta t = 10^{-5}, M = 10000$，用 SDE Monte Carlo 方法对单位圆区域以及单位正方形区域 $[0,1]\times[0,1]$ 上的 Dirichlet 问题求解，并与 PDE 精确解对比。

将圆形区域的边界函数取为

$$w(R,\theta) = \phi(\theta) = \theta^3 \tag{3.6}$$

该边界条件下, 单位圆区域 Dirichlet 问题的精确解由以下积分给出

$$w(r,\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rrcos(\theta-\alpha) + r^2}\alpha^3 d\alpha \tag{3.7}$$

计算结果如图1所示，可以看出 SDE Monte Carlo 数值方法与 PDE 精确解在单位圆上的取值相差不大。具体对数误差计算如图2（右）, 误差分布相对均匀, 区域内部相对边界误差更大, 计算得出的平均误差为 3.27×10^{-3}。图2（右）展示了该问题的实际收敛速率与理论收敛速率的对比，从图中可以比较明显看出二者基本吻合。



图 1: 单位圆区域 Dirichlet 问题 SDE Monte Carlo 解（左）与 PDE 精确解（右）

{fig:3.1}

将正方形区域的边界函数取为

$$\begin{aligned} f_l(y) &= w(0,y) = 0 \\ f_r(y) &= w(L,y) = sin(\pi y) \\ f_b(x) &= w(x,0) = 0 \\ f_t(x) &= w(x,H) = sin(\pi x) \end{aligned} \tag{3.8}$$



图 2: 单位圆区域 Dirichlet 问题 SDE Monte Carlo 解对数误差（左）实际收敛速率与理论收敛速率（右）

{fig:3.2}

在该边界条件下，单位正方形区域 $[0,1]\times[0,1]$Dirichlet 问题的解可计算出为

$$w(x,y)=\frac{\sinh(\pi x)\sin(\pi y)+\sinh(\pi y)\sin(\pi x)}{\sinh(\pi)} \tag{3.9}$$

计算结果如图3所示，可以看出 SDE Monte Carlo 数值方法与 PDE 精确解在单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 上的取值相差不大。具体对数误差计算如图4（左），误差分布相对均匀，区域内部相对边界误差更大，计算得出的平均误差为 3.27×10^{-3}。图4（右）展示了该问题的实际收敛速率与理论收敛速率的对比，从图中可以比较明显看出二者基本吻合



图 3: 单位正方形区域 $[0,1]\times[0,1]$SDE Monte Carlo 解（左）与 PDE 精确解（右）

{fig:3.3}



图 4: 单位正方形区域 $[0,1]\times[0,1]$Dirichlet 问题 SDE Monte Carlo 解对数误差（左）实际收敛速率 VS 理论收敛速率（右）

{fig:3.4}

将三角形区域的边界函数取为到原点的距离，SDE Monte Carlo 计算结果如图5所示。

3.3.2 热方程求解

热方程如下：

设 $L=\frac{\partial}{\partial s}+\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}$，$w(s,x)\in C^2(\mathbb{R}^2)$ 使得

(1)$Lw=0\quad (s,x)\in(0,T)\times\mathbb{R}=:D$

(2)$\lim_{s\to T}w(s,x)=\phi(T,x)$

其中，$\phi:\{T\}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为以给定有界函数，求解 $w(s,x)$。

以上热方程可通过 Fourier 变换的方法得到解析解如下

$$w(s,x)=\int_{-\infty}^{\infty}\phi(T,x-y)H_{\frac{1}{2}(T-s)}(y)dy,\quad (s,x)\in(0,T)\times\mathbb{R}$$

其中 $H_t(x)=\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}$。

若记

$$X_t=X_t^{s,x}=(s+t,B_t^x)$$

则由定理 2.17 与定理 3.1.1 可得 X_t 的无穷小生成元 A 恰好为 L，因此可将问题重述为：

(1)$Lw=0\quad (s,x)\in(0,T)\times\mathbb{R}=:D$

(2)$\lim_{t\to\tau_D}w(X_t)=\phi(X_{\tau_D})$



{fig:3.5} **图** 5: 三角形区域 : $[0,0],[1,3],[4,2]$Dirichlet 问题 SDE Monte Carlo 解

因此由定理 3.1.4 可知

$$w(s,x)=\mathbb{E}^{s,x}[\phi(X_{\tau_D})]=\mathbb{E}^{s,x}[\phi(s+\tau_D,B^x_{\tau_D})]$$

而

$$\begin{aligned}\tau_D&=\inf\{t>0:X_t\notin D\}\\&=\inf\{t>0:(s+t,B^x(t))\notin(0,T)\times\mathbb{R}\}\\&=\inf\{t>0;s+t\notin(0,T)\}=T-s\end{aligned}\tag{3.10}$$

故。

$$w(s,x)=\mathbb{E}^x[\phi(T,B^x_{T-s})]$$

从而也可以通过 3.2 节中的数值方法来求解该热方程。

取 $T=1,\phi(T,x)=cos(T\pi x)\cdot\chi_{\{0\le x\le 1\}},N=1000,M=10000$，利用 SDE Monte Carlo 方法求解热方程，结果如图6。从图中直观结果来看，SDE Montle Carlo 对热方程的求解效果十分不错，结合对数误差图7（左）可以看出误差在靠近边界的区域相对较小，而在远离边界的区域较大，但基本在 10^{-3} 的量级，该区域上计算得出的平均绝对误差为 2.17×10^{-3}，与误差图大致相符。



{fig:3.6} 图 6: 热方程 SDE Monte Carlo 求解（左）与 PDE 精确解（右）

图7（右）展示了 SDE Monte Carlo 方法在求解热方程上的实际收敛速率与理论收敛速率对比，从图上可以明显的看出实际收敛速率与理论收敛速率基本一致。因此若想进一步缩小误差，只需增大离散化区间数 N 与 Monte Carlo 路径数 M 即可。



{fig:3.7} 图 7: 热方程 SDE Monte Carlo 解对数误差（左）与实际收敛速率 VS 理论收敛速率（右）

4 SDE 在求解 Black-Scholes 方程中的应用

4.1 Black-Scholes 方程背景

期权定价长期以来是金融理论中的难题。早在 1900 年，法国数学家 Louis Bachelier 在其博士论文中首次尝试运用布朗运动描述股票价格波动，并提出早期期权定价模型，它被公认为是现代金融学的里程碑。

1964 年 Paul Samuelson 对 L.Bcahelier 的模型进行了修正，用股票的

回报替代了原模型中的股票价格。若记 S_t 表示股票价格，则 $\frac{dS_t}{S_t}$ 则表示股票的回报，从而 P.Samuelson 提出的随机微分方程为

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dB_t \tag{4.1}$$

其中 μ 为期望回报率，σ 为波动率，均为 $\mathbb{R}$ 中常数。B_t 为一维标准布朗运动。这个修改克服了原先模型中可能使股票价格 S_t 出现负值的不合理现象。后续几年里，随着现代金融理论的发展，P.Samuelson，Case Sprenkle，James Bones 等学者引入资本资产定价模型（CAPM）思想，对期权定价进行了重要改进，为后续突破奠定基础。

1968 年前后，Fisher Black 与 Myron Scholes 在麻省理工学院开始合作。F.Black 最初尝试将 CAPM 应用于瞬间投资组合，发现通过动态调整持仓可消除风险，从而推导出一个不依赖标的资产期望回报率 μ 的偏微分方程。另外同一时间，Robert C.Merton 作为 Samuelson 的学生，几乎同时独立开展相关研究，并对模型的数学基础进行了严谨拓展。他们共同提出了"Black-Scholes 期权定价模型" 这一名称，三位学者的合作标志着量化金融时代的开端。

经过三年努力，Black 和 Scholes 的论文《The Pricing of Options and Corporate Liabilities》于 1973 年 5-6 月发表于《Journal of Political Economy》。几乎同期，Merton 在《The Bell Journal of Economics and Management Science》（现改名为《The RAND Journal of Economics》）发表扩展论文。这一模型的发表恰逢芝加哥期权交易所（CBOE）于 1973 年 4 月开始交易标准化期权合约，二者相互促进，推动了全球衍生品市场的迅猛发展。1997 年，诺贝尔经济学奖授予 Merton 和 Scholes（Black 已于 1995 年去世），以表彰他们在衍生品估值领域的新方法。

Black-Scholes 模型的核心创新在于动态对冲与风险中性定价思想。Black 和 Scholes 认识到，通过构建适当的投资组合可以消除期权中的随机风险，从而在无套利条件下推导出期权价格必须满足的偏微分方程（PDE）。这一思路不仅解决了长期困扰的定价难题，还为后续风险管理提供了理论工具。

为了严格推导 Black-Scholes 方程，基本假设为：

(1) 原生资产价格 S_t 遵循几何布朗运动

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t \tag{4.2}$$

其中 μ 为期望回报率，σ 为波动率，均为 $\mathbb{R}$ 中常数。B_t 为一维标准布朗运动，

(2) 无风险利率 r 是常数，
(3) 原生资产不支付股息，
(4) 不支付交易费和税收，
(5) 不存在套利机会。

设欧式期权价值为 $V = V(S,t)$, 由定理 2.17，其瞬时变化为

$$dV = (\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2})dt + \sigma S\frac{\partial V}{\partial S}dB_t \tag{4.3}$$

为消除风险，利用 $\Delta-$ 对冲技巧，形成投资组合

$$\Pi = V - \Delta S \tag{4.4}$$

其中 Δ 为原生资产的份额。选组适当的 Δ 使得在 $(t, t+dt)$ 时段内，Π 是无风险的，从而在时刻 $t+dt$，投资组合的回报是

$$\frac{\Pi_{t+dt} - \Pi_t}{\Pi_t} = rdt \tag{4.5}$$

即

$$dV_t - \Delta dS_t = r\Pi_t dt = r(V_t - \Delta S_t)dt \tag{4.6}$$

结合式（7），将其带入式（8）得

$$\begin{aligned}(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - \Delta\mu S)dt + (\sigma S\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta\sigma S)dB_t \\ = r(V - \Delta S)dt\end{aligned} \tag{4.7}$$

由于等式右端是无风险得，因此等式左端随机项 dB_t 的系数必为 0，即选取

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S} \tag{4.8}$$

将其回代回式（12）得

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \tag{4.9}$$

这就是刻画期权价格变化得偏微分方程————Black-Scholes 方程。

为了确定在合约有效期 $[0,T]$ 内期权的价格,就要在区域 $D:\{0 < S < \infty, 0 < t < T\}$ 上求解定解问题:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial V}{\partial t} + \dfrac{1}{2}\sigma^2 S^2\dfrac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\dfrac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \qquad (S,t) \in D \\ V|_{t=T} = \begin{cases}(S-K)^+, & \text{(欧式看涨期权)} \\ (K-S)^+, & \text{(欧式看跌期权)}\end{cases}\end{cases}$$

其中 K 为期权的敲定价。易知上述偏微分方程是一变系数反抛物型方程，并为一倒向定解问题：即在终止时间已知" 终值条件"，在 $0 < t < T$ 时段内求解 $V = V(S,t)$, 使其满足上述偏微分方程和终止条件。

值得注意的是，在 Black-Scholes 方程中不出现原生资产模型中原生资产的期望回报率 μ, 代替它出现在方程中的是无风险利率 r。这表明通过 $\Delta-$ 对冲技巧，Black-Scholes 方程把人们引入一个风险中性的世界，它的定价理论不依赖于每个投资人的偏好以及对未来风险资产的期望值，因此通过求解 Black-Scholes 方程所得到的期权定价是一个风险中性价格。

4.2 经典 PDE 解

可作变换

$$x = lnS, \quad h = T - t \tag{4.10}$$

则原定解问题转化为常系数抛物型方程的 Cauchy 问题：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial V}{\partial h} - \dfrac{1}{2}\sigma^2 \dfrac{\partial^2 V}{\partial x^2} - (r - \dfrac{\sigma^2}{2})\dfrac{\partial V}{\partial x} + rV = 0 \quad (x,h) \in (-\infty,\infty) \times (0,T) \\ V|_{h=0} = \begin{cases} (e^x - K)^+, & (\text{看涨期权}) \\ (K - e^x)^+, & (\text{看跌期权}) \end{cases} \end{cases}$$

做函数变换

$$V = ue^{\alpha h + \beta x} \tag{4.11}$$

可通过适当选取常数 α, β 使得上述偏微分方程转化为热传导方程。由于

$$\begin{aligned} V_h &= e^{\alpha h+\beta x}(u_h + \alpha u), \\ V_x &= e^{\alpha h+\beta x}(u_x + \beta u), \\ V_{xx} &= e^{\alpha h+\beta x}(u_x x + 2\beta u_x + \beta^2 u), \end{aligned} \tag{4.12}$$

将其带入方程，消去 $e^{\alpha h+\beta x}$ 得到

$$u_h - \frac{\sigma^2}{2}u_{xx} - (\beta\sigma^2 + r - \frac{\sigma^2}{2})u_x + \left[r - \beta(r - \frac{\sigma^2}{2}) - \frac{\sigma^2}{2}\beta^2 + \alpha\right] u = 0 \tag{4.13}$$

取

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1}{2} - \frac{r}{\sigma^2} \\ \alpha &= -r + \beta(r - \frac{\sigma^2}{2}) + \frac{\sigma^2}{2}\beta^2 = -r - \frac{1}{2\sigma^2}(r - \frac{\sigma^2}{2})^2 \end{aligned} \tag{4.14}$$

从而原方程变为

$$\frac{\partial u}{\partial h}-\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0 \tag{4.15}$$

相应的初值（以看涨期权为例）为

$$u|_{h=0}=e^{-\beta x}V|_{h=0}=e^{-\beta x}(e^x-K)^+ \tag{4.16}$$

而上述热方程的 Cauchy 问题的解可以用 Poisson 公式表示，即

$$u(x,h)=\int_{-\infty}^{+\infty}K(x-\xi,h)\phi(\xi)d\xi \tag{4.17}$$

其中 $\phi(\xi)$ 为初值，$K(x-\xi,h)$ 为热传导方程的基本解：

$$K(x-\xi,h)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi h}}e^{-\frac{(x-\xi)^2}{2\sigma^2 h}} \tag{4.18}$$

从而上述看涨期权初值的 Cauchy 问题的解可以表示为

$$\begin{aligned}u(x,h)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi h}}e^{-\frac{(x-\xi)^2}{2\sigma^2 h}}\left[e^{-\beta\xi}(e^{\xi}-K)^+\right]d\xi\\&=\int_{\ln K}^{+\infty}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi h}}e^{-\frac{(x-\xi)^2}{2\sigma^2 h}}\left[e^{(1-\beta)\xi}-Ke^{-\beta\xi}\right]d\xi\end{aligned} \tag{4.19}$$

其中 $\beta=\frac{1}{2}-\frac{r}{\sigma^2}$。回到原来的函数 $V(x,h)$

$$\begin{aligned}V(x,h)&=e^{\alpha h+\beta x}u(x,h)\\&=I_1+I_2\end{aligned} \tag{4.20}$$

其中

$$I_1=e^{\alpha h+\beta x}\int_{\ln K}^{+\infty}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi h}}e^{-\frac{(x-\xi)^2}{2\sigma^2 h}+(1-\beta)\xi} \tag{4.21}$$

将式（19）带入上式并整理得：

$$I_1=e^{-rh}\int_{\ln K}^{\infty}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi h}}\exp\left\{-\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi h}}\left[x-\xi+(r-\frac{\sigma^2}{2})h\right]^2+\xi\right\}d\xi \tag{4.22}$$

令

$$\eta=x-\xi+(r-\frac{\sigma^2}{2})h \tag{4.23}$$

则

$$I_1=\frac{e^x}{\sigma\sqrt{2\pi h}}\int_{-\infty}^{x-\ln K+(r-\frac{\sigma^2}{2})h}e^{-\frac{(\eta+\sigma^2 h)^2}{2\sigma^2 h}}d\eta \tag{4.24}$$

再令

$$\omega = \frac{\eta + \sigma^2 h}{\sigma\sqrt{h}}, \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{\omega^2}{2}} d\omega \tag{4.25}$$

即 $\Phi(x)$ 为标准正态分布得累积概率分布函数，从而 I_1 可写成

$$I_1 = e^x \Phi\Big(\frac{x - \ln K + (r + \frac{\sigma^2}{2})h}{\sigma\sqrt{h}}\Big) \tag{4.26}$$

同理

$$\begin{aligned} I_2 &= -Ke^{\alpha h + \beta x} \int_{\ln K}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi h}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{2\sigma^2 h} - \beta\xi} \\ &= -e^{-rh} \int_{\ln K}^{+\infty} \frac{K}{\sigma\sqrt{2\pi h}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 h}\left[x - \xi + (r - \frac{\sigma^2}{2})h\right]^2} d\xi \\ &= -\frac{e^{-rh}K}{\sigma\sqrt{2\pi h}} \int_{-\infty}^{x - \ln K + (r - \frac{\sigma^2}{2})h} e^{-\frac{\eta^2}{2\sigma^2 h}} d\eta \\ &= -Ke^{-rh}\Phi\Big(\frac{x - \ln K + (r - \frac{\sigma^2}{2})h}{\sigma\sqrt{h}}\Big) \end{aligned} \tag{4.27}$$

回到原变量 (S, t)，有

$$\begin{aligned} V(S,t) =& S\Phi\Big(\frac{\ln S - \ln K + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\Big) \\ &- Ke^{-r(T-t)}\Phi\Big(\frac{\ln S - \ln K + (r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\Big) \end{aligned} \tag{4.28}$$

令

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\ln S - \ln K + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \\ d_2 &= d_1 - \sigma\sqrt{T-t} \end{aligned} \tag{4.29}$$

从而对欧式看涨期权，它的定价公式为

$$V(S,t) = S\Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2) \tag{4.30}$$

对于欧式看跌期权，由平价公式

$$c_t + Ke^{-r(T-t)} = p_t + S_t \tag{4.31}$$

其中 c_t 为欧式看涨期权，p_t 为欧式看跌期权。从而

$$\begin{aligned} p_t = c_t + Ke^{-r(T-t)} - S_t &= Ke{-}r(T-t)\left[1 - \Phi(d_2)\right] - S\left[1 - \Phi(d_1)\right] \\ &= Ke^{-r(T-t)}\Phi(-d_2) - S\Phi(d_1) \end{aligned} \tag{4.32}$$

即欧式看跌期权的定价公式为

$$V(S,t) = Ke^{-r(T-t)}\Phi(-d_2) - S\Phi(d_1) \tag{4.33}$$

4.3 SDE 方法求解 Black-Scholes 方程

以欧式看涨期权为例,先将问题重述一遍。设区域 $D:\{0<S<\infty, 0<t<T\}$,求解以下定解问题。

$$\begin{cases} \dfrac{\partial V}{\partial t} + \dfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \dfrac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\dfrac{\partial V}{\partial S} - rV = 0, \quad (S,t)\in D \\ V|_{t=T} = (S-K)^+ \end{cases}$$

令 $h = T-t, U(S,h) = V(S,T-h)$，则由

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial h} &= -\frac{\partial V}{\partial t}, \\ \frac{\partial U}{\partial S} &= \frac{\partial V}{\partial S}, \\ \frac{\partial^2 U}{\partial S^2} &= \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}, \end{aligned} \tag{4.34}$$

变换后的微分方程为

$$\begin{cases} rS\dfrac{\partial U}{\partial S} + \dfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \dfrac{\partial^2 U}{\partial S^2} - rU = \dfrac{\partial U}{\partial h}, \quad (S,t)\in D \\ U|_{h=0} = (S-K)^+ \end{cases}$$

记

$$L = rS\frac{\partial}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2}{\partial S^2} \tag{4.35}$$

为上述偏微分方程的偏微分算子。

设 X_t 为几何布朗运动

$$dX_t = rX_t dt + \sigma X_t dB_t; \quad X_0 = S \tag{4.36}$$

而由定理 3.1.1 知，X_t 的无穷小生成元恰好是 L。因此定理 3.1.3 知上述偏微分方程的唯一解为

$$\begin{aligned} U(S,h) &= \mathbb{E}^S\left[\exp(-\int_0^h rds)(X_h-K)^+\right] \\ &= \mathbb{E}^S\left[e^{-rh}(X_h-K)^+\right] \end{aligned} \tag{4.37}$$

再将变换代回得

$$V(S,t) = \mathbb{E}^S\left[e^{-r(T-t)}(X_{T-t}-K)^+\right] \quad (S,t)\in D \tag{4.38}$$

对于欧式看跌期权，则同理可得到其定价公式为

$$V(S,t) = \mathbb{E}^S\left[e^{-r(T-t)}(K-X_{T-t})^+\right] \quad (S,t)\in D \tag{4.39}$$

由此可以利用 3.2 节中的数值方法求解欧式看涨期权和欧式看跌期权下的 Black-Scholes 方程。

4.4 数值模拟

将 Black-Scholes 方程中各项系数分别取为

$$\begin{aligned} r &= 0.025 \\ \sigma &= 0.2 \\ T &= 1.0 \\ K &= 1.0 \end{aligned} \tag{4.40}$$

并取离散化子区间数为 $N = 1000$（也即 $\Delta t = 0.001$），Monte Carlo 样本数 $M = 10000$，在 $S \in [0,3], t \in [0,1]$ 上利用 3.2 节的数值方法求解 Black-Scholes 方程，并与 PDE 解析解进行对比。

图8与图9分别展示了在欧式看涨期权与欧式看跌期权初值条件下，Black-Scholes 方程的 SDE Monte Carlo 解与 PDE 精确解。从两站张图其实都可以看出，SDE Monte Carlo 解与 PDE 精确解是非常相近的。而图10则直接具体展现了不同初值条件的二者的对数误差分布，从图中可以直接看出，欧式看涨期权的初值条件下，误差大概在直线 $S = 0.5t + 0.5$ 以下区域都是非常低的，而在其上区域则是较高，但也都在 10^{-3} 这个量级之内，通过计算得出的平均相对误差为 2.49×10^{-3}；而相比于欧式看涨期权，欧式看跌期权初值条件下区域内的误差基本都处于 10^{-4} 这个量级，通过计算得出的平均相对误差为 5.32×10^{-4}，且大概在 $S = -1.75t + 3$ 这条线以下误差都非常低。

图11展示两个不同初值条件下 SDE Monte Carlo 解的实际收敛速率与理论收敛速率的对比，可以看出是基本符合 3.2 节中对收敛速率的分析的。因此如想继续降低误差可以通过增大 Monte Carlo 的路径数 M 来实现，且大约是路径数增加两个量级，误差减小一个量级。当然由于还受到离散化误



图 8: 欧式看涨期权 Black-Schole 方程 SDE Monte Carlo 求解（左）与 PDE 精确解（右）

{fig:4.1}



图 9: 欧式看跌期权 Black-Schole 方程 SDE Monte Carlo 求解（左）与 PDE 精确解（右）

{fig:4.2}



图 10: 欧式看涨期权（左）与欧式看跌期权（右）Black-Schole 方程 SDE Monte Carlo 解与 PDE 精确解的对数误差

{fig:4.3}

差的影响，还需同时增大离散化区间数 N，大约是想降低一个数量级的误差，则需将 N 增大一个量级。



图 11: 欧式看涨期权（左）与欧式看跌期权（右）Black-Schole 方程 SDE Monte Carlo 解实际收敛速率与理论收敛速率对比

{fig:4.4}

因此因此通过以上分析足以说明，SDE Monte Carlo 方法在求解 Black-Scholes 方程上的可行性。

5 总结与展望

本文以随机微分方程（SDE）及其在偏微分方程（PDE）求解中的应用为研究核心，系统地完成了从理论推演、算法构建到数值实验的完整研究闭环。在理论研究层面，本文通过对布朗运动性质、伊藤积分构造及伊藤公式的应用研究，成功构建了随机分析的严谨数学基石，深入揭示了随机微分方程作为刻画带噪系统工具的独特优势，并阐明了其对应的无穷小生成元与二阶偏微分算子之间深刻的对偶关系，从而为 PDE 的概率化求解提供了坚实的理论支撑。通过详细论证，本文证明了 Feynman-Kac 公式及 Dirichlet-Poisson 问题解的存在唯一性，并说明其均可转化为扩散过程在随机停时或特定路径下的期望值，这一发现将复杂的算子求解问题有效地简化为随机轨迹的统计平均问题。

在数值实现与应用层面，本文设计并实现了基于 Euler-Maruyama 离散化方案的 Monte Carlo 概率算法。数值实验结果表明，该算法在处理如单位圆、正方形等不同几何区域的 Dirichlet 问题时展现出极高的灵活性，对于像三角形区域上的 Dirichlet 这种通常无显式 PDE 解的问题，可以考虑利用本文的数值方法进行求解。此外，本文将该理论框架成功应用于 Black-Scholes

期权定价模型，实验结果与解析解的高度吻合进一步验证了概率方法在处理金融波动等跨学科实际问题中的准确性与鲁棒性。综上所述，本文的研究工作不仅深化了对 SDE 与 PDE 对等性的理论认识，也为复杂方程的数值求解提供了一种稳定、高效且易于并行化的计算途径。

尽管本文在随机微分方程求解偏微分方程的理论与算法上取得了一定的进展，但仍存在诸多值得进一步深入探讨的方向。首先，在计算效率的进一步优化方面，目前采用的基础 Monte Carlo 模拟在样本量较小时仍存在统计波动，未来研究可尝试引入重要性采样、控制变量法或拟蒙特卡罗方法等高级方差缩减技术，以在保证精度的前提下显著提升收敛速度。其次，本文目前的研究范畴主要集中在线性 PDE 的概率解，对于非线性或高阶偏微分方程（如半线性热方程或复杂的流体力学方程），其对应的随机模型通常涉及更为复杂的倒向随机微分方程或分支扩散过程，探索这些复杂方程的概率数值解法将是未来研究的重要突破口。

此外，随着人工智能技术的飞速发展，将机器学习与随机模拟相结合已成为科学计算的前沿趋势。探索如何利用深度学习的函数逼近能力来辅助 SDE 的路径采样，或是利用深度学习求解 SDE，如，将物理信息神经网络（PINN）运用到求解的 SDE 上等，有望为解决极高维度的物理与金融建模问题提供全新的视角。最后，考虑到随机路径模拟具有天然的并行特性，未来可以进一步探索在 GPU 或分布式计算平台上的算法实现，通过优化并行计算架构，实现对大规模复杂动力系统的高效实时数值模拟。总之，随机微分方程为理解和解决确定性问题提供了一个全新的随机维度，随着计算数学理论与技术的不断进步，这一领域的研究必将在工程实践与科学探索中发挥愈发关键的作用。

A 附录 A

定理 A.1（Kolmogorov 扩张定理）

$\forall t_1 \dots t_k \in T, k \in \mathbf{N}$，对任意 $\mathbb{R}^n$ 上 Borel 集 F_i，令 $\nu_{t_1,\dots,t_k}$ 为 $\mathbb{R}^{nk}$ 上概率测度，使得

$$\nu_{t_{\sigma(1)},\cdots,t_{\sigma(k)}}(F_1 \times \cdots \times F_k) = \nu_{t_1,\cdots,t_k}(F_{\sigma^{-1}(1)} \times \cdots \times F_{\sigma^{-1}(k)})$$

对 $\{1, 2 \dots, k\}$ 的任一排列 σ 均成立，以及满足

$$\nu_{t_1,\dots,t_k}(F_1 \times \cdots \times F_k) = \nu_{t_1,\dots,t_k,t_{k+1},\dots,t_{k+m}}(F_1 \times \cdots \times F_k \times \mathbf{R}^n \times \cdots \times \mathbf{R}^n)$$

则存在一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 以及一 Ω 上随机过程 $\{X_t(\omega)\}_{t\in T}, X_t :\to \mathbb{R}^n$ 使

$$\nu_{t_1,\ldots,t_k}(F_1 \times \cdots \times F_k) = P(X_{t_1} \in F_1, \ldots, X_{t_k} \in F_k)$$

$\forall t_i \in T, k \in \mathbf{N}$ 及任意 $\mathbb{R}^n$ 上 Borel 集 F_i 均成立。

定理 A.2（Kolmogorov 连续性定理）

若随机过程 $\{X_t\}_{t\geq 0}$ 满足：$\forall T > 0$，存在正常数 α, β, D 使得

$$\mathbb{E}\left|X_t - X_s\right|^{\alpha} \leq D\left|t-s\right|^{1+\beta}, \quad 0 \leq s, t \leq T$$

则 $\{X_t\}_{t\geq 0}$ 存在一连续版本。

定理 A.3（基本函数的伊藤等距）

若 $\phi(t,\omega)$ 为一有界基本函数，则有

$$\mathbb{E}\left[(\int_S^T \phi(t,\omega)dB_t)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_S^T \phi^2(t,\omega)dt\right]$$

由此从基本函数出发，通过以下几个引理来定义 $\mathcal{V}$ 中一般函数的伊藤积分。

定理 A.4（从基本函数到有界样本呢路径连续函数）

令 $g \in \mathcal{V}$ 有界，且 $g(\cdot,\omega)$ 对每一个 ω 都是连续的，则存在一 $\mathcal{V}$ 中基本函数列 $\{\phi_n\}$ 使得

$$\mathbb{E}\left[\int_S^T (g-\phi_n)^2 dt\right] \to 0, \quad n \to \infty$$

定理 A.5（从有界样本路径连续函数到有界函数）

令 $h \in \mathcal{V}$ 有界的，则存在一有界样本路径连续函数列 $\{g_n\} \in \mathcal{V}$ 使得

$$\mathbb{E}\left[\int_S^T (h-g_n)^2 dt\right] \to 0, \quad n \to \infty$$

定理 A.6（从有界函数到 $\mathcal{V}$ 中的一般函数）

设 $f \in \mathcal{V}$，则存在一 $\mathcal{V}$ 中有界函数列 $\{h_n\}$ 使

$$\mathbb{E}\left[\int_S^T (f-h_n)^2 dt\right] \to 0, \quad n \to \infty$$

从定义出发有以下两个简单推论。

定理 A.7（一般函数的伊藤等距）

$$\mathbb{E}\left[(\int_S^T f(t,\omega)dB_t)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_S^T f^2(t,\omega)dt\right], \quad \forall f \in \mathcal{V}(S,T)$$

定理 A.8

若 $f(t,\omega) \in \mathcal{V}(S,T)$ 且 $f_n(t,\omega) \in \mathcal{V}(S,T)$，对 $n = 1,2,\ldots$ 且

$$\mathbb{E}\left[\int_S^T (f_n - f)^2 dt\right] \to 0, \quad n \to \infty$$

故

$$\int_S^T f_n(t,\omega)dB_t \xrightarrow{L^2(P)} \int_S^T f(t,\omega)dB_t, \quad n \to \infty$$

定理 A.9（伊藤积分的简单性质）

令 $f, g \in \mathcal{V}(0,T)$ 且 $0 \le S < U < T$，则有

(1)$\int_S^T f dB_t = \int_S^U f dB_t + \int_U^T f dB_t, a.a.\omega$

(2)$\int_S^T (cf+g)dB_t = c\int_S^T f dB_t + \int_S^T g dB_t, a.a.\omega$（c 为常数）

(3)$\mathbb{E}\left[\int_S^T f dB_t\right] = 0$

(4)$\int_S^T f dB_t$ 使 $\mathcal{F}_T-$ 可测的。

定理 A.10（Doob's 鞅不等式）

若 M_t 是（关于自身生成的 σ 代数流）一鞅，且 $t \mapsto M_t(\omega)$ 是连续的 $a.s.$，则 $\forall p \ge 1, T \ge 0, \lambda > 0$，有

$$P[\sup_{0\le t\le T} |M_t| \ge \lambda] \le \frac{1}{\lambda^p}\mathbb{E}[|M_T|^p]$$

定理 A.11（伊藤积分连续版本定理）

令 $f \in \mathcal{V}(0,T)$，则伊藤积分

$$\int_0^t f dB_s; 0 \le t \le T$$

存在一 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的连续版本 J_t 使得

$$P\left[J_t = \int_0^t f dB\right] = 1$$

定理 A.12（伊藤积分的鞅性）

令 $f(t,\omega) \in \mathcal{V}(0,T)$ 对任意 T 成立，则由伊藤积分定义的随机过程

$$M_t(\omega) = \int_0^t f(s,\omega)dB_s$$

是关于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的鞅，且有

$$P[\sup_{0\le t\le T}|M_t| \ge \lambda] \le \frac{1}{\lambda^2}\cdot \mathbb{E}\left[\int_0^T f^2(s,\omega)ds\right]; \quad \lambda, T > 0$$

定理 A.13（伊藤表示定理）

设 $F \in L^2(\mathcal{F}_t^{(n)}, P)$，则存在唯一的随机过程 $f(t,\omega) \in \mathcal{V}^n(0,T)$ 使得

$$F(\omega) = \mathbb{E}[F] + \int_0^T f(t,\omega)dB(t)$$

定理 A.14（鞅表示定理）

设 $B(t) = (B_1(t), \ldots, B_n(t))$ 维 n 维布朗运动，M_t 为关于 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ 的鞅，$M_t \in L^2(P), \forall t \ge 0$。则存在唯一过程 $g(s,\omega) \in \mathcal{V}^n(0,t), \forall t \ge 0$ 使得

$$M_t(\omega) = \mathbb{E}[M_0] + \int_0^t g(s,\omega)dB(s) \quad a.s. \forall t \ge 0$$