



外科 A

题型：A1



1. 乳腺癌最常发生疾病的部位为
 - A. 乳头部位
 - B. 外下象限
 - C. 内下象限
 - D. 外上象限
 - E. 内上象限
2. 乳腺癌最常发生疾病的部位为
 - A. 乳头部位
 - B. 内上象限
 - C. 外上象限
 - D. 内下象限
 - E. 外下象限
3. 关于乳腺炎的治疗方法，哪项**不正确**
 - A. 早期可行局部热敷，使炎症消失
 - B. 脓肿形成后，主要治疗是及时排脓
 - C. 乳腺脓肿均应做放射状切口引流
 - D. 为了使脓肿引流通畅，可在脓肿最低部位另加切口做对口引流
 - E. 脓肿引流后有乳瘘者可应用药物终止乳汁分泌
4. 早期乳癌的最主要临床表现是
 - A. 无痛性多个结节状硬块
 - B. 无痛单发性小肿块
 - C. 乳头或局部皮肤凹陷
 - D. 皮肤出现“橘皮样”外观
 - E. 患侧腋窝触及孤立肿大之淋巴结

5. 关于甲状腺乳头状癌，下列哪项不正确



- A. 女性占大多数
 - B. 较早出现颈淋巴结转移
 - C. 老年人占大多数
 - D. 约占成人甲状腺癌的大多数
 - E. 多中心者占大多数
6. 乳腺纤维腺瘤的治疗方法是
- A. 手术切除
 - B. 药物治疗
 - C. 药物治疗，必要时手术
 - D. 抗感染治疗
 - E. 抗结核治疗
7. 预后最差的乳腺癌类型是
- A. 乳头状癌
 - B. 髓样癌
 - C. 炎性乳腺癌
 - D. 胶样癌
 - E. 腺癌
8. 判断甲亢术前准备病情控制是否理想，下列哪项指标最主要
- A. 每日睡眠达 9 小时
 - B. 体重增加 3kg

- C. 突眼度减少 2mm
 - D. 腺体变实，由Ⅲ° 肿大缩小至Ⅱ° 肿大
 - E. 脉率 80 次/min，血压 15.6/10.4kPa (120/80mmHg)
9. 甲状腺功能亢进术前准备通常不包括
- A. T_3 、 T_4 测定
 - B. 控制心率
 - C. 喉镜检查
 - D. 给予氢化可的松
 - E. 测定基础代谢率
10. 以下不是浸润性非特殊癌的是
- A. 腺癌
 - B. 髓样癌
 - C. 浸润性导管癌
 - D. 硬癌
 - E. 乳头状癌
11. 乳头有鲜红色血性溢液时，最常见于
- A. 乳房结核
 - B. 急性乳腺炎
 - C. 乳房囊性增生病
 - D. 乳房肉瘤
 - E. 乳管内乳头状瘤
12. 乳房囊性增生症的最主要治疗手段是
- A. 增生部位局部切除术
 - B. 全乳腺切除术
 - C. 常规用激素治疗
 - D. 药物治疗
 - E. 放射治疗
13. 甲亢时，下述哪项检查最能反映甲状腺功能
- A. T_4 测定
 - B. 基础代谢率
 - C. 核素扫描
 - D. TSH 测定
 - E. 血清中抗甲状腺球蛋白测定
14. 正常基础代谢率是
- A. $-10 \sim 0$
 - B. $0 \sim +10$
 - C. $0 \sim +20$
 - D. $-10 \sim +10$
 - E. $-20 \sim +20$
15. 甲亢术后 12 小时，出现重度呼吸困难，口唇发绀，鼻翼翕动，颈部肿胀，切口渗血，应立即采用
- A. 吸氧，密切观察呼吸变化
 - B. 应用呼吸兴奋剂

- C. 拆开切口缝线，清除血肿
 - D. 床边气管插管
 - E. 气管切开
16. 为预防甲亢术后出现甲状腺危象，最关键的措施是
- A. 术后用冬眠合剂镇静
 - B. 吸氧
 - C. 术后给予氢化可的松
 - D. 术后补钙
 - E. 术前使基础代谢率降至正常范围
17. 对于乳腺癌微小病灶有较好的检出效果的是
- A. 超声
 - B. 钼靶 X 线摄片
 - C. MRI
 - D. 活组织病理检查
 - E. 红外线
18. 乳腺纤维腺瘤的好发部位
- A. 外下象限
 - B. 外上象限
 - C. 内上象限
 - D. 内下象限
 - E. 中央区
19. 关于结节性甲状腺肿继发甲状腺功能亢进的描述，**错误**的是
- A. 患者年龄多在 40 岁以上
 - B. 双侧甲状腺肿大多不对称
 - C. 可发生眼球突出
 - D. 容易并发心肌损害
 - E. 有手术指征
20. 甲状旁腺素对血液中钙磷浓度的调节作用表现为
- A. 降低血钙浓度，升高血磷浓度
 - B. 降低血钙浓度，不影响血磷浓度
 - C. 升高血钙浓度，降低血磷浓度
 - D. 升高血钙浓度，不影响血磷浓度
 - E. 升高血钙、血磷浓度
21. 乳房肿块质韧，光滑易推动，多考虑是哪种疾病
- A. 乳腺炎
 - B. 乳腺囊性增生症
 - C. 乳腺纤维腺瘤
 - D. 乳腺癌
 - E. 脂肪瘤
22. 患者，男，30 岁，因“原发甲亢”施行甲状腺次全切除术后 6 小时，患者感呼吸困难。查体：面色发绀，颈部敷料呈红色。下列并发症中，可能性最大的是
- A. 喉返神经损伤
 - B. 喉上部神经损伤

- C. 切口内出血
 - D. 甲状腺危象
 - E. 甲状旁腺损伤
23. 应用钼靶 X 线摄影有诊断价值的肿瘤是
- A. 甲状腺癌
 - B. 乳癌
 - C. 肝癌
 - D. 胃癌
 - E. 肾癌
24. 甲状旁腺的功能是调节血液中的
- A. 钙
 - B. 钠
 - C. 镁
 - D. 钾
 - E. 锌
25. 关于甲亢手术治疗的适应证，**不正确**的是
- A. 高功能腺瘤
 - B. 中度以上原发性甲亢
 - C. 甲状腺肿大有压迫症状
 - D. 抗甲状腺药物或放射性 ^{131}I 治疗无效者
 - E. 少年儿童患者
26. 乳腺的基本单位是
- A. 腺小叶
 - B. 腺叶
 - C. 小乳管
 - D. 腺泡
 - E. 乳管
27. 甲亢作次全切除术，主要并发症中最危急的是
- A. 术后甲状腺危象
 - B. 术后呼吸困难或窒息
 - C. 喉返神经损伤
 - D. 手足抽搐
 - E. 喉上神经损伤
28. 检查乳腺时应掌握正确方法，下列**不正确**的是
- A. 患者解开上衣，局部光线要明亮
 - B. 与检查者相对而坐或站位，保持乳腺松弛
 - C. 检查者用平坦的手指掌面循序轻轻触摸
 - D. 触清肿块后测其大小、性质、周边、活动度
 - E. 为了解肿块深度，可抓捏双合诊
29. 乳头血性溢液最常见于
- A. 乳腺小叶增殖症
 - B. 乳腺纤维瘤
 - C. 乳腺导管内乳头状瘤

- D. 男性乳房发育症
 - E. 副乳腺
30. 关于原发性甲亢的手术指征，下列**不正确**的是
- A. 中度以上的原性甲亢；腺体较大，伴有压迫症状
 - B. 药物治疗或核素治疗无效
 - C. 继发性甲亢或高功能腺瘤
 - D. 妊娠早、中期的甲亢患者凡具有上述指征者
 - E. 青少年甲亢患者
31. 青春期甲状腺肿患者，肿大明显时，首选治疗方法是
- A. 口服硫氧嘧啶类药物
 - B. 行甲状腺大部分切除术
 - C. 口服甲状腺素片
 - D. 行同位素碘治疗
 - E. 多食营养丰富食物
32. 甲亢患者，行双侧甲状腺次全切除术，术后并发甲状腺危象，最多是由于
- A. 患者精神过度紧张
 - B. 服用碘剂过久
 - C. 切除腺体过少
 - D. 术中挤压腺体过多
 - E. 甲亢症状未能很好控制
33. 单纯性甲状腺肿中，下列哪项**不是**手术适应证
- A. 压迫气管引起症状
 - B. 胸骨后甲状腺肿
 - C. 核素扫描有冷结节
 - D. 结节性甲状腺肿继发甲亢
 - E. 巨大甲状腺肿影响工作
34. 腋窝Ⅱ组淋巴结位于
- A. 胸大肌外侧
 - B. 胸小肌外侧
 - C. 胸大小肌间
 - D. 胸小肌后
 - E. 胸小肌内侧
35. 乳管壶腹部为哪种疾病的好发部位
- A. 乳腺纤维腺瘤
 - B. 乳腺癌
 - C. 乳腺炎
 - D. 乳管内乳头状瘤
 - E. 乳腺囊性增生
36. 乳房最常见的良性肿瘤是
- A. 乳腺纤维腺瘤
 - B. 乳头状瘤
 - C. 乳腺癌
 - D. 乳腺肉瘤

- E. 乳腺结核
37. 乳房纤维腺瘤的高发年龄
- A. 15~20 岁
 - B. 20~25 岁
 - C. 25~40 岁
 - D. 40~50 岁
 - E. 40~60 岁
38. 中度甲亢的基础代谢率是
- A. $\pm 10\%$
 - B. $\pm 10\% \sim 30\%$
 - C. $+30\% \sim 60\%$
 - D. $+40\% \sim 60\%$
 - E. $+60\%$ 以上
39. 患者甲状腺手术后 1 天发生手足抽搐，处理方法是立即
- A. 测定血清钙浓度
 - B. 静脉注射 10%葡萄糖酸钙 10~20ml
 - C. 口服二氢速固醇
 - D. 口服钙剂
 - E. 行甲状旁腺移植术
40. 甲状腺功能亢进患者的手术禁忌证是
- A. 中度 Graves 病
 - B. 胸骨后甲状腺肿伴甲亢
 - C. 高功能腺瘤
 - D. 妊娠早期重度甲亢
 - E. 青少年患者
41. 患者，女，40 岁，进行乳腺癌普查时，下列检查最为合适的是
- A. 近红外线扫描
 - B. 液晶热图检查
 - C. 细针穿刺细胞学检查
 - D. 超声及钼靶 X 线摄片
 - E. 乳腺磁共振
42. 根据乳癌国际 TNM 临床分期，下列不属于 III 期的是
- A. $T_3N_0M_0$
 - B. $T_2N_2M_0$
 - C. $T_2N_1M_0$
 - D. $T_3N_1M_0$
 - E. $T_1N_2M_0$

题型：A2

43. 一中年妇女，乳腺内可触及大约 $1.5\text{cm} \times 1.5\text{cm} \times 1\text{cm}$ 肿块，活动，边缘欠清，与皮肤无粘连，最应如何处理
- A. 可短期内继续观察
 - B. 中药治疗

- C. 局麻下将肿瘤组织切除一小块，送病理检查，明确诊断后再决定方案
- D. 将肿块连同周围的正常乳腺组织完整地切除送病理检查，以明确诊断
- E. 可作乳腺单纯切除

44. 患者，女，39岁，左乳外上象限扪及2~3cm质硬肿块，与皮肤、胸肌无粘连，活检穿刺细胞学检查见癌细胞，胸骨旁淋巴结肿大，活检穿刺细胞学检查见癌细胞，其余体检未见异常，准备手术治疗，术后无放疗条件，应选择的术式是

- A. 乳腺癌根治术
- B. 乳腺癌扩大根治术
- C. 乳腺癌改良根治术
- D. 全乳房切除术
- E. 保留乳房的乳腺癌切除术

45. 患者，女，57岁。1年前洗澡时无意中扪及右侧乳房一肿块，无痛。查体：在右乳外上象限见局限性皮肤凹陷，该部位能扪及3cm×2cm大小肿块。此处皮肤凹陷最可能由下列何种原因所致

- A. 癌肿浸润乳腺管
- B. 癌细胞堵塞皮内、皮下淋巴管
- C. 癌肿侵犯 Cooper 韧带
- D. 乳房充血水肿
- E. 癌肿浸润乳腺小叶腺泡

46. 患者，女，50岁，左乳外上象限扪及3cm×4cm质硬肿块，与皮肤、胸肌无粘连，左腋窝扪及肿大孤立的质硬淋巴结，活检穿刺细胞学检查见癌细胞，其余体检未见异常，该乳腺癌患者按TNM分期是

- A. T₁N₂M₀
- B. T₂N₁M₀
- C. T₂N₂M₀
- D. T₂N₃M₀
- E. T₂N₂M₁

47. 患者，女，41岁，左乳外上象限扪及4~5cm质硬肿块，与皮肤、胸肌无粘连，左腋窝扪及肿大孤立的质硬淋巴结。该患者最佳的定性诊断是

- A. 穿刺病理学检查
- B. 核磁
- C. 乳腺彩超
- D. 钼靶X线摄影
- E. 乳导管镜

48. 患者，女，66岁，颈前肿物4个月，伴声嘶，右肩痛。查体：颈前偏右见4cm×3cm大小之肿物，随吞咽活动，质硬，表面不光滑，右颈侧部可及1.2cm×1.0cm大小淋巴结，硬，活动度差。临床诊断首先应考虑

- A. 慢性甲状腺炎
- B. 甲状腺癌
- C. 颈部转移性癌
- D. 颈部恶性淋巴瘤
- E. 结节性甲状腺肿

49. 患者，女，25岁。发现心悸、盗汗、易怒1年，伴有饮食量增加、消瘦。查体：BP 110/60mmHg，重度突眼，甲状腺弥漫性肿大，深入胸骨后上纵隔内，心率116次/min。测血T₃、T₄值高于参考值上限一倍。对患者应该尽早手术治疗，其适应证是

- A. TSH 增高
- B. T_3 、 T_4 显著增高
- C. 甲状腺弥漫性肿大
- D. 重度突眼
- E. 甲状腺位于胸骨后

50. 患者，女，35 岁，哺乳期。左侧乳房胀痛、发热 2 天。查体： $T39.8^{\circ}\text{C}$ ， $P103$ 次/min。右乳外上象限 $7\text{cm}\times 5\text{cm}$ 范围红肿，有明显压痛和波动感。急行切开引流术，术后抗感染治疗针对的主要致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 白色葡萄球菌
- C. 表皮葡萄球菌
- D. 腐生葡萄球菌
- E. 溶血性链球菌

51. 患者，女，20 岁，左侧乳房外上象限可触及一肿物，圆形，表面光滑，活动度良好，不伴触痛，大小 $5\text{cm}\times 5\text{cm}$ ，首选治疗方案为

- A. 手术切除肿物
- B. 左侧乳房切除
- C. 左侧乳房象限切除
- D. 左侧乳房切除术
- E. 行乳腺癌基因检测

52. 患者，女，28 岁。双侧乳房胀痛 3 年余，与月经周期有关。检查乳房发现多个结节状肿块，边界不清，可推动。对这种疾病描述，**错误**的是

- A. 患者可有乳头溢液
- B. 该病可仅见于一侧乳房
- C. 其发病与体内女性激素代谢障碍有关，尤其是雌激素、孕激素比例失调
- D. 该病病因为乳腺非典型增生
- E. 乳房胀痛多于月经前 3~5 天加重，月经来潮后减轻或消失

53. 患者，女，26 岁。产后 7 个月，母乳喂养。乳房胀痛，局部红肿，体温 37.6°C 。使用抗菌药首选

- A. 四环素
- B. 青霉素
- C. 红霉素
- D. 链霉素
- E. 甲硝唑

54. 患者，男，35 岁，发现右侧甲状腺肿物 3 个月，生长较快。体检右甲状腺可触及一个 $3.5\text{cm}\times 2.5\text{cm}$ 大小的肿物质硬界清随吞咽上下移动。左甲状腺不大，未及肿物；颈部未及肿大淋巴结。鉴别甲状腺单发结节的性质，下述哪项最重要

- A. 病史
- B. 体检
- C. B 超
- D. 组织病理检查
- E. 甲状腺扫描

55. 患者，女，35 岁，月经正常，因右侧乳腺癌根治术治疗，术后病理结果浸润性导管癌， $1.0\text{cm}\times 1.0\text{cm}$ 大小，双侧腋窝无转移，ER（-），PR（-），HER（-）术后首选治疗是

- A. 卵巢切除
- B. 联合化疗
- C. 口服他莫昔芬
- D. 口服来曲唑
- E. 曲妥珠单抗注射

56. 患者，女，38岁。双侧乳房月经前胀痛，月经后减轻。检查乳房发现双侧乳房多个结节状肿块，边界不清，无明显血流信号。最可能的诊断是

- A. 乳腺纤维腺瘤
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺囊性增生病
- D. 急性乳腺炎
- E. 乳腺肉瘤

57. 患者，女，33岁，哺乳期，左侧乳房胀痛4天，查体左侧乳房外上象限局部红肿，红肿中央区破溃，可见黄绿色液体流出，发热39℃，可触及质硬肿物，局部可触及波动感，B超下呈片状无回声区，可见散在块状钙化，加压后可见液体流动，治疗方案宜选

- A. 抗生素治疗
- B. 切开引流
- C. 局部热敷
- D. 中药治疗
- E. 切除左侧乳房

58. 患者，女，29岁，患者甲状腺功能亢进 Graves 病，突然出现双下肢不能动。查体：双下肢膝腱反射减退，无肌萎缩。血钾测定 2.2mmol/L。最可能的是下列哪种情况

- A. 慢性甲亢性肌病
- B. 周围神经炎
- C. 周期性瘫痪
- D. 重症肌无力
- E. 瘰疬

59. 患者，女，27岁，产后4周，右乳房胀痛1周，伴寒战高热。查体：T39℃，HR110次/min，右乳房红肿，压痛（+），波动（+），穿刺抽出脓液，下列何种处理是**错误**的

- A. 切开引流的切口应按轮辐方向
- B. 为了充分引流，切口在脓腔的最低部位引流的同时，另加切口作对口引流
- C. 若有乳痂，可终止哺乳
- D. 为了防止感染的扩散，引流时不能用手指深入脓腔
- E. 脓肿切开引流的同时，需要全身应用抗生素

60. 患者，女，17岁。疲乏无力，心烦易怒，怕热多汗半年，易饿，体重下降11kg，月经量少，经期仅仅1~2天。查体：BP140/70mmHg，皮肤微潮，手有细颤，轻微突眼，甲状腺Ⅰ度弥漫性肿大，质软，无触痛。该患者最可能的检查结果是

- A. FT₃、FT₄升高
- B. TSH升高
- C. 甲状腺摄¹³¹I降低
- D. 继发性垂体功能降低
- E. 血糖升高

61. 患者，女，40岁。左乳外上象限扪及4~5cm质硬肿块，与皮肤、胸肌无粘连，左腋窝扪及肿大孤立的质硬淋巴结，活检穿刺细胞学检查见癌细胞。首选的治疗方案是

- A. 根治性手术
- B. 放疗
- C. 化疗
- D. 内分泌治疗
- E. 生物治疗

62. 患者，女，28岁。右乳囊性增生疾病史5年，分娩后发现右乳肿块5天，伴疼痛，低热。门诊检查发现右乳外上象限有一直径约5cm的肿块，边界欠清，表面皮肤发红，皮温增高，肿块表面似有波动感，右腋下触及一鸽蛋大小的淋巴结，并有压痛。此时最适当的处理应为

- A. 乳房B超、钼靶等进一步检查
- B. 肿块诊断性穿刺，并作切开引流
- C. 肿块切除活检，根据结果进一步处理
- D. 局部或全身抗生素治疗
- E. 局部热敷

63. 患者，女，49岁，左乳外上象限扪及3cm×4cm质硬肿块，与皮肤、胸肌无粘连，左腋窝扪及肿大孤立的质硬淋巴结，活检穿刺细胞学检查见癌细胞，其余体检未见异常，该乳腺癌患者分期是

- A. 0期
- B. I期
- C. II期
- D. III期
- E. IV期

64. 患者，女，40岁，3年来劳累后气促，曾诊为哮喘，X线片示前上纵隔类圆阴影压迫气管，最可能的诊断是

- A. 淋巴瘤
- B. 神经源性肿瘤
- C. 肺癌
- D. 胸骨后甲状腺肿
- E. 心包囊肿

65. 患者，女，25岁，1个月前自然分娩一男婴，近2日发现右颈部毛囊炎，右乳头有小裂口，轻痛，来门诊。乳房炎的预防措施中，哪项是**不对**的

- A. 及时排空乳汁，防止淤积
- B. 哺乳后清洗乳头，小裂口要及时治疗
- C. 定时哺乳
- D. 应静滴抗生素
- E. 不要让婴儿含乳头睡觉

66. 患者，女，45岁，右侧乳腺癌根治术后4年，现出现腰背部疼痛，逐渐加重，为明确诊断首选的主要检查是

- A. PET-CT
- B. CEA
- C. CA15-3
- D. 同位素骨扫描
- E. 免疫指标检测

67. 一患者行甲状腺次全切除术后出现声音嘶哑。喉镜检查显示左侧声带麻痹，分析手术中可能损伤的结构是

- A. 舌下神经
- B. 喉上神经
- C. 舌咽神经
- D. 左侧喉返神经
- E. 右侧喉返神经

68. 患者，女，25岁，产后3周，左乳房胀痛，皮温高，伴高热，查左乳房外上象限压痛，有波动感，该患者诊断首先考虑

- A. 乳腺纤维腺瘤
- B. 乳腺癌
- C. 乳房脓肿
- D. 乳腺囊性增生症
- E. 乳腺结核

69. 患者，女，32岁。产后1个月出现右侧乳房疼痛，全身畏寒、发热、脉快。查体：右侧乳房皮肤红肿明显，可扪及一压痛性硬块，同侧腋窝淋巴结肿大。下列处理措施中，**不正确**的是

- A. 局部行切开引流
- B. 排空乳汁
- C. 健侧继续哺乳
- D. 应用抗生素治疗
- E. 保持乳头清洁

70. 患者，女，34岁。颈前区肿块10年，近年来易出汗、心悸，渐感呼吸困难。查体：晨起心率105次/min，BP120/60mmHg，无突眼，甲状腺Ⅲ度肿大，结节状。心电图示：窦性心律不齐。初步诊断最可能的是

- A. 继发性甲亢
- B. 单纯性甲状腺肿
- C. 原发性甲亢
- D. 桥本甲状腺炎
- E. 亚急性甲状腺炎

71. 患者，女，42岁，右乳外上象限扪及1.5~2.0cm质硬肿块，与皮肤、胸肌无粘连，活检穿刺细胞学检查见癌细胞，双侧腋窝未触及肿大淋巴结，活检穿刺细胞学检查未见癌细胞，其余体检未见异常，准备手术治疗，以下术式中术后必须辅以放疗、化疗的是

- A. 乳腺癌根治术
- B. 乳腺癌扩大根治术
- C. 乳腺癌改良根治术
- D. 全乳房切除术
- E. 保留乳房的乳腺癌切除术

72. 患者，男，36岁，心悸怕热，手颤乏力1年，大便不成形，3~4次/日，体重下降12kg。查体：P90次/min，BP128/90mmHg，皮肤潮湿，双手细颤，眼球突出，甲状腺弥漫Ⅱ度肿大，闻及血管杂音，心率104次/min，律不齐，心音强弱不等，腹平软，肝脾未触及，双下肢无水肿。为明确诊断，首先检查是

- A. 甲状腺摄碘率
- B. 血TSH、T₃、T₄
- C. T₃抑制试验
- D. TRH兴奋试验
- E. 抗甲状腺抗体

73. 患者，女，56岁，颈前肿大20余年就诊。查体：甲状腺Ⅲ度肿大，质地硬，多个结节，最大结节直径5.0cm，随吞咽活动，气管轻度左移。血T₃、T₄、TSH正常，TgAb、TPOAb阴性。气管正侧位X线片示气管局部受压、向左侧移位。最佳的处理措施是

- A. 长期服用甲状腺素
- B. 定期检测甲状腺功能
- C. 手术治疗
- D. 多食含碘丰富的食物
- E. 禁用含碘药物

74. 患者，女，50岁。甲状腺多发结节3年。颈部超声提示：甲状腺双侧叶多发囊性、实性结节。实验室检查：T₃、T₄、TSH正常。在随访过程中，手术治疗指征不包括

- A. 甲状腺结节增大伴憋气
- B. 甲状腺结节的数量增加
- C. 出现甲状腺功能亢进
- D. 出现胸骨后甲状腺肿
- E. 结节边界不清并细小钙化

75. 患者，女，26岁，工人。初产妇，哺乳期，右乳外上象限包块6cm×4cm大小，表面红，压痛明显。为进一步明确是否形成脓肿，下列最可靠的是

- A. 触诊波动感阳性
- B. 压痛非常明显
- C. 红肿明显
- D. 穿刺有脓汁
- E. B超有液性暗区

76. 患者，男，40岁。在单位普查中发现颈部正中偏右有一直径2.0cm肿物，为进一步治疗，来医院就诊。医生在查体时，首先应确定肿物

- A. 是否随吞咽活动
- B. 软硬度
- C. 大小
- D. 边界是否清楚
- E. 表面是否光滑

77. 患者，女，53岁，左乳外上象限扪及4cm×4cm质硬肿块，与皮肤、胸肌无粘连，左腋窝扪及数枚质硬淋巴结，左侧腋窝扪及肿大、质硬、融合的淋巴结，左侧锁骨上区扪及一枚质硬淋巴结。活检穿刺细胞学检查见癌细胞，其余体检未见异常，该乳腺癌患者按TNM分期是

- A. T₂N₂M₀
- B. T₂N₃M₀
- C. T₃N₂M₀
- D. T₃N₃M₀
- E. T₃N₂M₁

78. 患者，女，43岁。偶然发现左乳房包块半个月，无症状，未见长大。查：左乳外上象限有一2cm×1cm×1cm包块，质硬，无压痛，与皮肤有少许粘连。左腋下可触及直径1cm大小的肿大淋巴结。为明确诊断，进一步应行的检查是

- A. 乳腺钼靶X线摄影
- B. 结核菌素试验
- C. 包块穿刺活检
- D. 乳腺磁共振
- E. 乳管镜检查

79. 患者，女，55 岁。左乳房外上象限扪及一 3cm×2cm 大小肿块，与皮肤粘连，表面皮肤可见红色结节样突出物，左腋窝可触及一肿大淋巴结，可推动。临床诊断为左乳癌，按 TNM 分期法，应为

- A. T₁N₂M₀
- B. T₂N₂M₀
- C. T₃N₁M₀
- D. T₄N₁M₀
- E. TisN₁M₁

80. 患者，女，30 岁，左乳外上象限无痛性肿块，直径 4.5cm，与皮肤轻度粘连，左腋下可触及一枚可推动淋巴结，检查未发现远处转移征象，穿刺病理诊断为“乳腺癌”，按 TNM 分期应为

- A. T₃N₁M₀
- B. T₄N₁M₀
- C. T₂N₁M₀
- D. T₂N₂M₀
- E. T₁N₁M₀

82. 患者，女，18 岁，诊断为弥漫性甲状腺肿，其治疗方案是

- A. 手术
- B. ¹³¹I 治疗
- C. 服碘
- D. 服用小剂量甲状腺素片
- E. 服用抗甲状腺药物

83. 患者，女，22 岁。左侧乳房外上象限可扪及一肿块，约 1.5cm×1.0cm，质似硬橡皮球，边界清楚，可推动。对于该病描述，**错误**的是

- A. 月经对肿块大小无影响
- B. 可服用药物消除肿物
- C. 妊娠前后发现的肿物应手术切除
- D. 手术应将肿物及其包膜整块切除
- E. 肿块常规需做病理检查

84. 患者，女，42 岁。左乳外上象限扪及 4~5cm 质硬肿块，与皮肤、胸肌无粘连，左腋窝扪及肿大孤立的质硬淋巴结，活检穿刺细胞学检查见癌细胞。准备行乳腺癌根治术，以下说法**错误**的是

- A. 手术应包括整个乳房、胸大肌、胸小肌、腋窝及锁骨下淋巴结整块切除
- B. 可采取横行或纵行梭状切口
- C. 皮肤切除范围一般距肿瘤 3cm
- D. 手术范围上至锁骨，下至腹直肌上段，外至背阔肌前缘，内至胸骨旁线或中线
- E. 该术式可清除腋下组（胸小肌外侧）、腋中组（胸小肌深面）两组淋巴结

85. 患者，女，45 岁。右乳房发现一 2cm×2cm 大小之肿物，质硬，界限不清，皮肤正常，右腋窝淋巴结不大。诊断首先应考虑

- A. 乳房纤维腺瘤
- B. 乳腺癌
- C. 乳房囊性增生
- D. 乳腺炎性包块
- E. 乳腺结核

题型：A3

(86~87 题共用题干)

患者，女，26岁，多食、消瘦、善饥1年，平素情绪易激动。查体：甲状腺Ⅰ°大，突眼明显，两手平伸颤动明显，未经特殊治疗来诊。

86. 该患治疗3个月后，症状好转，但甲状腺肿大和突眼反见加重，下一步治疗应采用

- A. 停用所有治疗，继续观察
- B. 改用¹³¹I或碘剂
- C. 加大治疗剂量
- D. 服用普萘洛尔(心得安)
- E. 服用甲状腺素

87. 治疗过程中，甲状腺逐渐肿大，平卧位有明显呼吸困难，此时应

- A. 停用所有治疗，继续观察
- B. 服用碘剂
- C. 加大治疗量
- D. 手术治疗
- E. 服用甲状腺素

题型：B1

(88~91 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 乳腺癌改良根治术
- B. 化学药物治疗
- C. 对症治疗，定期复查
- D. 肿块连同周围少量正常组织切除，病理检查
- E. 放射治疗

88. 患者，女，47岁。双乳房胀痛8个月，月经前胀痛明显，月经来潮后胀痛减轻。双乳房外上象限触及边界不清的肿块，部分有结节，质韧，腋窝淋巴结未触及。应选择何种治疗

89. 患者，女，25岁，已婚。发现右乳房无痛性肿块3个月，未见明显增长。肿块位于外上象限，1.5cm×1.5cm，质韧，表面光滑，活动好，腋窝淋巴结未触及。应选何种治疗

90. 患者，女，60岁，发现左乳房无痛性肿块月余。肿块位于外上象限，2cm×2cm，质硬，表面不光滑，与皮及深部组织无粘连，腋窝及锁骨上下触及淋巴结。患者无高血压、心肌梗死病史，血压及心电图基本正常，手术后诊为乳腺癌，可首先考虑何种治疗

91. 患者，女，46岁。右乳房无痛性肿块2个月，位于外上象限，2.5cm×2.5cm，质硬，表面不光滑，与皮及深部无粘连，右腋窝触及一个杏仁大淋巴结，活动，经穿刺细胞学检查诊为乳腺癌。首选的主要治疗方法是

(92~93 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 轮辐状切口
- B. 乳房上弧形切口
- C. 乳房下弧形切口
- D. 乳晕边缘弧形切口
- E. 乳晕区弧形切口

92. 乳晕下脓肿切开采用

93. 乳房后间隙脓肿切开一般采用

(94~95 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 甲硫氧嘧啶
- B. 普萘洛尔
- C. 卢戈氏液 (碘剂)
- D. 甲状腺素
- E. 地西洋

94. 使甲状腺肿大和动脉性充血的是

95. 减少甲状腺血流量, 使腺体内血供减少, 腺体变硬的是

(96~98 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 乳房肿胀疼痛甚至呈搏动性, 患处出现有压痛的肿块, 表面皮肤红热, 同时可有体温升高
- B. 原发于大乳管内, 渐移行至乳头, 起初乳头刺痒, 灼痛, 接着出现湿疹样病变, 乳头和乳晕的皮肤糜烂、潮湿, 有时覆盖有黄褐色的鳞屑样痂皮
- C. 乳房胀痛呈周期性, 发生于月经前期, 肿块可局限于乳房的一部分, 或分散于整个乳房, 在经期后可能缩小, 腋窝淋巴结不肿大
- D. 发生于大乳管近乳头的膨大部分, 瘤体一般较小, 带蒂且有绒毛, 乳头易出现血液溢液
- E. 常为乳房单发肿块, 好发于外上象限, 质韧, 边界清楚, 表面光滑, 易推动, 月经周期对肿块大小无影响

96. 乳房纤维腺瘤的特点为

97. Paget 病的特点为

98. 乳腺囊性增生病的特点为

(99~100 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 手术切除
- B. 潜行性穿刺抽脓
- C. 刮除术
- D. 切开引流术
- E. 单纯抗结核药物治疗

99. 颈部淋巴结核形成寒性脓肿, 尚未穿破, 应

100. 寒性脓肿继发化脓性感染, 应