

1.下面是间接叩诊法，叩诊的次数哪一项是对的

- A、只需连续叩击 1~2 下
- B、只需连续叩击 2~3 下
- C、只需连续叩击 3~4 下
- D、只需连续叩击 4~5 下
- E、只需连续叩击 5~6 下

正确答案: B

2.凝血因子中半衰期最短的是

- A、VII因子
- B、VIII因子
- C、IX因子
- D、X因子
- E、XI因子

正确答案: A

3.心电图诊断左房增大的标准是

- A、P 波宽度 \geq 120ms
- B、P 波宽度 > 120ms
- C、QRS 波宽度 > 120ms
- D、QRS 波宽度 \geq 120ms
- E、以上均不对

正确答案: B

4.角膜反射的传入神经是

- A、面神经
- B、三叉神经
- C、动眼神经
- D、交感神经
- E、展神经

正确答案: B

5.对 Louis 角叙述不正确的是

- A、两侧分别与左右第 3 肋软骨连接
- B、是计数肋骨顺序的主要标志
- C、是计数肋间隙顺序的主要标志
- D、标志支气管分叉
- E、相当于第 5 胸椎水平

正确答案: A

6.视神经损伤后视野表现

- A、损伤侧眼睛视野丧失
- B、双眼颞侧视野缺损
- C、双眼损伤侧偏盲
- D、双眼损伤对侧偏盲
- E、双眼上 1/4 象限视野缺损

正确答案: A

7.哪种关节炎常伴有尿酸升高

- A、类风湿关节炎

- B、强直性脊柱炎
- C、风湿性关节炎
- D、痛风性关节炎
- E、反应性关节炎

正确答案: D

8.下列各项是意识状态检查, 但应除外哪一项

- A、嘱病人辨别白天、黑夜
- B、嘱病人辨别疼痛的位置
- C、嘱病人计算数字
- D、嘱病人发声、辨别性质
- E、嘱病人图形组联

正确答案: D

9.急性肺脓肿最具特征的症状是

- A、高热畏寒
- B、咳嗽伴咯血
- C、咳大量脓臭痰
- D、咳嗽伴胸痛
- E、呼吸困难

正确答案: C

10.诊断急性腹膜炎中主要环节是进一步明确

- A、感染中毒程度
- B、缺水严重程度
- C、代谢性酸中毒程度
- D、贫血程度
- E、病因

正确答案: E

11.患者疑似大叶性肺炎, 下列哪项是该病最常见的病原体

- A、病毒
- B、支原体
- C、肺炎链球菌
- D、肺炎克雷伯杆菌
- E、金黄色葡萄球菌

正确答案: C

12.下列疾病常引起胸廓局部隆起, 但需除外哪一项

- A、肺气肿
- B、心包积液
- C、主动脉瘤
- D、胸壁肿瘤
- E、肋软骨炎

正确答案: A

13.关于心房纤颤说法错误的是

- A、心律绝对不齐
- B、可闻及大炮音
- C、脉搏短绌

D、二尖瓣狭窄患者可见

E、第一心音强弱不等

正确答案: B

解析: 大炮音可有心脏音强弱不等, 心律缓慢整齐, 见于三度房室传导阻滞。

14.成年女性红细胞参考值为

A、 $(3.0 \sim 5.0) \times 10^{12}/L$

B、 $(3.5 \sim 5.0) \times 10^{12}/L$

C、 $(3.5 \sim 5.5) \times 10^{12}/L$

D、 $(4.5 \sim 5.5) \times 10^{12}/L$

E、 $(4.5 \sim 6.0) \times 10^{12}/L$

正确答案: B

15.S1 减弱可见于下列情况, 但除外哪一项

A、二尖瓣关闭不全

B、心肌收缩力减弱

C、P-R 间期延长时

D、心动过速使舒张期缩短

E、心肌病变

正确答案: D

16.下列哪项不符合呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒的血气分析结果

A、 $PaCO_2$ 升高

B、 HCO_3^- 减少

C、 $AB=SB \leq$ 正常值

D、BE 负值减小

E、pH 明显降低

正确答案: D

17.遗传性血管神经性水肿患者是缺陷哪种成分所致

A、C1q

B、C1r

C、C1s

D、C1INH

E、C3

正确答案: D

解析: 该疾病是由于 C1 移植物的缺乏引起的, 已经可以进行基因诊断。

18.肠鸣音消失常见于

A、大量腹水

B、机械性肠梗阻

C、巨大卵巢囊肿

D、急性胆囊炎

E、肠麻痹

正确答案: E

19.最常见血清铁增高的疾病是

A、缺铁性贫血

B、真性红细胞增多症

C、巨幼细胞性贫血

- D、肾病综合征
- E、慢性肝炎、肝硬化

正确答案: C

20.衰老红细胞代谢过程中, 最普遍进行的生物转化第二相反应是代谢物与

- A、乙酰基结合
- B、葡萄糖醛酸结合
- C、硫酸结合
- D、谷胱甘肽结合
- E、甲基结合

正确答案: B

21.浆膜腔漏出液中下列哪种成分与血清中含量相似

- A、氯化物
- B、葡萄糖
- C、尿素
- D、钙
- E、蛋白质

正确答案: B

解析: 漏出液中葡萄糖含量与血糖相似, 渗出液中葡萄糖常因细菌或细胞酶分解而减少。

22.营养物质消耗增加引起的消瘦有下列原因, 不包括

- A、甲状腺功能亢进
- B、慢性消耗性疾病
- C、大面积烧伤
- D、高热
- E、体制性消瘦

正确答案: E

23.右侧面部痛觉减退见于

- A、右侧面神经损伤
- B、右侧三叉神经损伤
- C、右侧交感神经损伤
- D、右侧舌咽神经损伤
- E、右侧副神经损伤

正确答案: B

24.腰痛伴有尿频、尿急, 见于

- A、尿路感染
- B、附件炎
- C、盆腔炎
- D、卵巢疾病
- E、子宫炎症

正确答案: A

25.识别皮肤上所画的三角形是检查

- A、两点辨别觉
- B、触觉
- C、实体觉
- D、体表图形觉

E、位置觉

正确答案: D

26.连续性杂音最常见于

A、房间隔缺损

B、室间隔缺损

C、动脉导管未闭

D、卵圆孔未闭

E、冠状动静脉瘘

正确答案: C

27.暂时性尿失禁见于下列哪种疾病, 除了

A、尿路感染

B、急性精神错乱性疾病

C、药物反应

D、心理性忧郁症

E、脑卒中

正确答案: E

28.根据中国标准, 肥胖的判定是

A、 $BMI \geq 24 \text{ kg/m}^2$

B、 $BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$

C、 $BMI \geq 27 \text{ kg/m}^2$

D、 $BMI \geq 28 \text{ kg/m}^2$

E、 $BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$

正确答案: D

29.血尿的概念是指离心沉淀后的尿沉渣, 光镜下每高倍视野有红细胞至少

A、1 个以上

B、2 个以上

C、3 个以上

D、4 个以上

E、5 个以上

正确答案: C

30.胸前部计算肋间隙的重要标志是

A、胸骨角与第二肋软骨相连接

B、第三肋软骨与胸骨体连接

C、胸锁关节处

D、胸骨角

E、锁骨

正确答案: A

31.新生儿红细胞参考值为

A、 $(5.0 \sim 7.0) \times 10^{12}/L$

B、 $(6.0 \sim 8.0) \times 10^{12}/L$

C、 $(7.0 \sim 8.0) \times 10^{12}/L$

D、 $(6.0 \sim 7.0) \times 10^{12}/L$

E、 $(6.5 \sim 7.5) \times 10^{12}/L$

正确答案: D

32.下列哪项说法正确低分子肝素首选

- A、APTT 时间监测
- B、华法林首选 APTT 监测
- C、服用阿司匹林患者，血小板聚集实验，使用 AA 作为诱导剂
- D、服用氯吡格雷患者，血小板聚集实验，使用 ATP 作为诱导剂
- E、肝素首选 PT 时间监测

正确答案: C

33.胸部叩诊由何处开始

- A、锁骨上窝
- B、锁骨下窝
- C、第 1 肋间
- D、第 2 肋间
- E、胸锁关节

正确答案: A

34.下列血象中常表现为成熟粒细胞核分叶过多的贫血是哪项

- A、缺铁性贫血
- B、溶血性贫血
- C、急性失血性贫血
- D、再生障碍性贫血
- E、巨幼细胞性贫血

正确答案: E

35.杵状指的病因不包括

- A、肢端缺氧
- B、中毒性损害
- C、代谢障碍
- D、肢端软组织增生
- E、铁缺乏

正确答案: E

36.检查腹部最常用的检查方法是

- A、视诊
- B、触诊
- C、叩诊
- D、听诊
- E、嗅诊

正确答案: B

37.肝颈静脉回流征阳性常见于下列哪种疾病

- A、风湿性心脏病
- B、大量心包积液
- C、高血压病
- D、慢性肺源性心脏病
- E、右心功能不全

正确答案: E

38.下列是关于鼻窦的正确描述，但应除外哪一项

- A、鼻窦为鼻腔周围不含气的骨质空腔

- B、鼻窦共有四对
- C、各鼻窦皆有窦口与鼻腔相通
- D、鼻窦引流不畅时易于发生炎症
- E、鼻窦炎时可出现鼻塞，流涕，头痛和鼻窦压痛等

正确答案: A

39.关于会诊记录说法正确的是

- A、常规会诊意见记录应该由会诊医师在会诊申请发出后 72 小时完成
- B、急会诊时会诊医师应该在会诊申请发出后 10 分钟内到场，并在会诊结束后即刻完成会诊记录
- C、急会诊时会诊医师应该在会诊申请发出后 5 分钟内到场，并在会诊结束后即刻完成会诊记录
- D、常规会诊意见记录应该由会诊医师在会诊申请发出后 24 小时完成
- E、会诊记录无需体现在病程记录中

正确答案: B

40.黏液水肿最常发生在

- A、Addison 病
- B、糖尿病
- C、甲状腺功能亢进症
- D、甲状腺功能减退症
- E、巨人症

正确答案: D

41.符合急性淋巴细胞白血病原始细胞的是

- A、PAS 阳性
- B、非特异性酯酶阳性
- C、中性粒细胞碱性磷酸酶减低
- D、胞浆中可有 Auer 小体
- E、过氧化酶染色阳性

正确答案: A

42.下列哪项不是椎间盘突出的临床特点

- A、青壮年多见
- B、有搬重物及扭伤史
- C、L4、5、S1 多发
- D、腰痛无放射
- E、起病可急骤或隐匿

正确答案: D

43.关于头颅的叙述，下列哪项是错误的

- A、头围测量是以软尺自眉间绕到颅后通过枕骨粗隆，测其周径
- B、小儿囟门若过早闭合可影响智力发育
- C、矢状缝和其他颅缝大多在生后 12 个月内骨化
- D、颅缝骨化过早会影响脑的发育
- E、新生儿的头围约 34cm

正确答案: C

44.下列哪种疾病周围血片上不出现幼稚红细胞

- A、急性粒细胞白血病
- B、急性失血后贫血

- C、再生障碍性贫血
- D、溶血性贫血
- E、骨髓纤维化

正确答案: C

45.呕血的颜色

- A、出血量大时咖啡色
- B、出血速度快时咖啡色
- C、出血量大出血速度快时鲜红
- D、出血量小时鲜红
- E、出血速度慢时鲜红

正确答案: C

46.由金黄色葡萄球菌引起的渗出液特点是

- A、积液浓稠而色深
- B、积液多稀薄呈淡黄色
- C、积液多稀薄而色深
- D、积液浓稠
- E、积液浓稠而带黄色

正确答案: E

47.下列情况可导致肺下界上升，但应除外哪一项

- A、肺不张
- B、鼓肠
- C、肝脾大
- D、气腹
- E、腹腔内脏下垂

正确答案: E

48.对传染性单核细胞增多症有诊断意义的指标是

- A、血液异型淋巴细胞增多
- B、血液白细胞增高
- C、血液T淋巴细胞增高
- D、骨髓粒细胞显著核左移
- E、血清嗜异性凝集试验阳性

正确答案: E

49.下列哪个疾病不容易引起腹泻

- A、甲状腺功能减退
- B、肠易激综合征
- C、小肠吸收不良
- D、炎症性肠病
- E、尿毒症性胃肠炎

正确答案: A

50.肥胖与下列哪种因素无关

- A、遗传因素
- B、内分泌因素
- C、精神因素
- D、药物因素

E、生活方式

正确答案: C

51.阑尾炎的疼痛特点是

A、上腹痛

B、下腹痛

C、左下腹痛

D、右下腹痛

E、转移性右下腹痛

正确答案: E

52.患者，男，40岁，因呼吸困难和水肿入院。查体：颈静脉怒张，肝右缘肋下4cm，表面光滑，轻压痛，双下肢凹陷性水肿。检查心脏时可能发现

A、心尖搏动向左下移位

B、心脏形态呈靴形

C、心尖部舒张期杂音

D、主动脉瓣区粗糙的收缩期杂音

E、主动脉瓣第二听诊区叹气样舒张期杂音

正确答案: C

53.患者，男，35岁，反复发作消化性溃疡，近期反复出现呕吐、腹胀，下列哪项不符合

A、呕吐物有酸臭味

B、呕吐量大、有宿食

C、消瘦、脱水、碱中毒

D、有胃型和胃蠕动波

E、呕吐物有粪臭味

正确答案: E

54.患者，女，20岁，神志昏迷2小时、小便失禁急诊入院，查体：大汗，双侧瞳孔缩小，呼气有大蒜味，考虑最可能病因为

A、脑出血

B、有机磷中毒

C、脑梗

D、脑膜炎

E、脑外伤

正确答案: B

55.患者，女，27岁，少尿，全身水肿1月，查体：血压正常，腹部膨隆，移动性浊音阳性，双下肢凹陷性水肿。24小时尿量380ml，尿蛋白4+，肝功能白蛋白20g/L，她最可能的诊断是

A、急性肾盂肾炎

B、慢性肾炎

C、尿路结石

D、急性肾炎

E、肾病综合征

正确答案: E

56.患者，男，40岁，10年来反复节律性上腹痛，近半月呕吐酸臭隔夜食，腹胀，进食加重。下列体征对本病诊断均有意义，但除外

A、胃蠕动波

B、振水音

- C、上腹中部局限性膨隆
- D、胃型
- E、反跳痛

正确答案: E

57.患者, 青年男性, 2 周前下肢紫癜, 双侧基本对称, 关节周围明显, 入院查血常规: Hb 130g/L, WBC $6 \times 10^9/L$, PLT $101 \times 10^9/L$, 尿蛋白 2+, 诊断考虑

- A、急性皮疹
- B、过敏性紫癜
- C、血小板减少性紫癜
- D、血小板无力症
- E、血友病

正确答案: B

58.患者张某, 男, 55 岁, 腹部持续性剧烈绞痛 5 小时, 伴呕吐, 无排气, 腹部查体可闻及金属音, 肠鸣音 8 次/分, 该患者最可能的诊断为

- A、急性胰腺炎
- B、急性机械性肠梗阻
- C、急性胃炎
- D、幽门梗阻
- E、急性胆囊炎

正确答案: B

59.患儿, 男, 5 岁, 因面部肌肉及肢体快速、不规则、无目的、不对称的不自在运动, 无意识的做鬼脸, 转颈, 耸肩、摆手及伸臂动作送入医院。这种表现符合以下哪一项神经系统体征

- A、阵挛性震颤
- B、运动性震颤
- C、意向性震颤
- D、舞蹈样运动
- E、手足徐动

正确答案: D

60.患者, 男, 28 岁, 寒战、高热、咳嗽, 临床诊断为大叶性肺炎充血期, 下列可能出现的体征是

- A、语音震颤增强
- B、两肺呼吸音强
- C、叩诊过清音
- D、明显支气管呼吸音
- E、两肺散在干性啰音

正确答案: A

61.60 岁, 男, 行纤维支气管镜检查后出现右侧大量气胸, 前胸部可触及皮下气肿, 关于该患者描述正确的是

- A、前胸部可触及握雪感
- B、心尖搏动右移
- C、气管右移
- D、触及胸膜摩擦感
- E、肝肺界下移

正确答案: A

62.患者，男，40岁，8年来反复节律性上腹部疼痛，近半月呕吐隔夜食，呕吐后腹胀减轻，此时最应该注意的腹部体征是

- A、有否反跳痛
- B、肠鸣音亢进否
- C、有否胃蠕动波
- D、季肋点有否压痛
- E、Murphy征是否阳性

正确答案: C

63.患儿，4岁，发热5天，皮疹1天来诊。口腔黏膜检查时，在相当于第二磨牙的颊黏膜处出现帽针头大小的白色斑点，最先考虑是下列哪种疾病

- A、维生素C缺乏
- B、麻疹
- C、猩红热
- D、风疹
- E、伤寒

正确答案: B

64.患者，女，进食油腻食物后，出现右上腹绞痛，阵发性加重，向右肩背部放散，在查体中，最有诊断意义的阳性体征为

- A、右上腹压痛
- B、腹式呼吸受限
- C、Courvoisier's征(+)
- D、Murphy's(+)
- E、肝区叩击痛(+)

正确答案: D

65.患者，男，60岁。上腹隐痛，食少，暖气2年余，轻度贫血。胃液分析BAO 2mmol/h，MAO 3mmol/h，胃液pH 7.4，GI：胃及十二指肠未发现溃疡或肿瘤征象，其最可能的诊断是

- A、慢性浅表性胃炎
- B、慢性萎缩性胃炎
- C、慢性糜烂性胃炎
- D、胃癌
- E、十二指肠球后溃疡

正确答案: B

66.患者，男，43岁，近2个月来下腹疼痛，腹泻、大便为脓血便，排便后腹痛减轻。最可能的诊断是

- A、内痔
- B、溃疡性结肠炎
- C、小肠结核
- D、肠套叠
- E、过敏性紫癜

正确答案: B

67.患者，女，38岁，体重指数38，全身多处可触及皮下结节，有触痛，同时出现停经，伴性功能减退，最可能的诊断是

- A、Dercum综合征
- B、Frohlich综合征

C、Laurence-Moon-Biedl 综合征

D、Stein-Leventhal 综合征

E、Pickwickian 综合征

正确答案: A

68.患者，男，38 岁。因间断心悸 1 天就诊。查体：心率 72 次/分，偶可闻及期前收缩。心电图示：提前出现的 P 波，形态与窦性 P 波略有不同，P-R 间期 0.13s，QRS 波群形态正常，代偿间歇不完全。最恰当的处理是

A、静脉注射阿托品

B、口服美托洛尔

C、口服普罗帕酮

D、寻找和去除病因

E、口服胺碘酮

正确答案: D

69.患者，20 岁，APTT 延长，以下最不可能的考虑是

A、血友病 A

B、血小板减少

C、维生素 K 缺乏

D、低纤维蛋白血症

E、血友病 B

正确答案: B

70.患者，女，30 岁，出现左侧口角低，左侧耳后疱疹。入院后诊断为左侧亨特综合征。神经系统查体不可能出现以下那一项临床体征

A、左侧鼻唇沟浅

B、左侧闭眼不紧

C、左侧口角低

D、左侧舌前 2/3 味觉丧失

E、左侧舌后 1/3 味觉丧失

正确答案: E

71.患儿，男，6 岁，间断发热、双侧鼻出血 2 周，查体肝脾轻度肿大，血常规示：RBC $2.9 \times 10^{12}/L$ ，Hb 98g/L。最可能的诊断为

A、鼻咽癌

B、鼻腔感染

C、流行性出血热

D、白血病

E、肝脏疾病

正确答案: D

(72-74 共用题干) 患者，女，40 岁，近 2 周受凉后出现心悸、多汗、腹泻、体重下降，既往糖尿病病史 5 年，近期血糖水平不详

72.根据患者的病史该患者在查体中除了全面系统的体格检查以外，还应该重点检查下列哪项

A、扁桃体

B、肺部

C、甲状腺

D、腹部

E、神经系统

正确答案: C

73.下列哪项检查对明确诊断最有意义

- A、A-Tg
- B、A-TPO
- C、甲状腺功能
- D、随机静脉血糖
- E、血淀粉酶

正确答案: C

74.该患者查体发现甲状腺Ⅱ度肿大，最可能的诊断是

- A、甲状腺功能亢进症
- B、糖尿病酮症酸中毒
- C、急性胃肠炎
- D、肠易激惹综合征
- E、糖尿病周围神经病

正确答案: A

(75-77 共用题干) 患者，男，27 岁，咽部不适 3 周，尿量减少 1 周。3 周前咽部不适，轻咳，近 1 周双眼睑水肿，晨起时明显，同时尿量减少，200~500ml/日，尿色较红。尿常规：WBC 0~1 个/HP，RBC 20~30 个/HP，偶见颗粒管型。生化检查：ALB 38.2g/L，BUN 8.8mmol/L，Scr 140μmol/L

75.尿沉渣镜检中出现大量非均一性红细胞，提示红细胞来自

- A、肾脏
- B、输尿管
- C、膀胱
- D、前列腺
- E、尿道

正确答案: A

76.进一步检测血清 ASO：800IU/L。该患者最可能的诊断为

- A、急性肾小球肾炎
- B、急性肾盂肾炎
- C、肾病综合征
- D、多发性骨髓瘤
- E、IgA 肾病

正确答案: A

77.为明确临床诊断，下述进一步检查，不必要的是

- A、ANA 谱
- B、必要时行肾活检
- C、肾脏超声
- D、血尿定位
- E、尿浓缩实验

正确答案: E

(78-79 共用题干) 患者，男，65 岁。反复发生晕厥 1 周，既往体健，无不良嗜好，发作前自述有胸闷症状，无心慌、胸痛，每次意识丧失持续约 1 分钟，无肢体瘫痪，无大小便失禁，动态心电图监测示窦性心动过速，偶发房性期前收缩，脑 CT 未见异常

78.为明确诊断最需要的辅助检查是

- A、肺 CTA
- B、脑 MRA
- C、冠状动脉造影
- D、脑电图
- E、心脏彩超

正确答案: A

79.该患者最不可能的诊断是

- A、快速性室性心律失常
- B、急性脑梗死
- C、短暂性脑缺血发作
- D、阿-斯综合征
- E、急性肺栓塞

正确答案: B

(80-81 共用题干) 黄某, 男, 18 岁, 下腰背痛 3 年, 静息时加重, 活动后减轻, 偶有足跟痛。其父有类似病史, 已驼背

80.该患者最有诊断意义的检查是

- A、骨盆平片
- B、腰椎 X 线
- C、跟骨骨密度
- D、ESR
- E、RF

正确答案: A

81.假如查 HLA-B27 阳性, 骨盆平片提示双侧骶髂关节模糊, 间隙变窄。该患者最可能的诊断是

- A、结核性脊柱炎
- B、腰椎间盘突出症
- C、强直性脊柱炎
- D、腰肌劳损
- E、类风湿关节炎

正确答案: C

(82-83 共用题干) 患者, 女, 58 岁, 反复咳嗽、咳痰、气促 20 年, 加重伴低热 1 周。既往高血压病史 10 年, 血压控制满意。查体: T 38.5°C, P 110 次/分, R 24 次/分, BP 160/90mmHg。口唇发绀, 颈静脉怒张, 双肺可闻及哮鸣音和湿啰音, 心率 110 次/分, 律齐, P2、A2, 剑突下可闻及 3/6 级收缩期杂音。肺膨隆, 肝肋下 3cm, 压痛 (+), 肝颈静脉回流征阳性, 双下肢水肿。杵状指

82.该患者最可能的诊断是

- A、冠心病
- B、心肌病
- C、肺血栓栓塞
- D、肺心病
- E、风湿性心脏瓣膜病

正确答案: D

83.对明确诊断, 如下哪项检查最有价值

- A、胸部 X 线片
- B、超声心动图

- C、血气分析
- D、心电图
- E、血 D-二聚体

正确答案: B

(84-86 共用题干) 某患者近期发现肝大 (肋下 4cm), 质硬, 有大小不等的结节, 伴低热、纳差、轻度黄疸, ALT 400U/L, AFP 800μg/L

84.该患者腹部体征不包括

- A、移动性浊音阳性
- B、上腹压痛
- C、墨菲氏征阳性
- D、脾大
- E、双下肢水肿

正确答案: C

85.患者 HBsAg (+), 最可能的诊断是

- A、急性黄疸性肝炎
- B、慢性活动性肝炎
- C、大结节性肝硬化
- D、原发性肝癌
- E、胆汁性肝硬化

正确答案: D

86.患者近期有呕血, 则最有可能出现

- A、食管静脉曲张
- B、贲门撕裂
- C、急性糜烂性胃炎
- D、消化性溃疡
- E、放射性核素铜结合试验

正确答案: A

(87-89) 共用备选答案

- A、完整的入院记录及出院记录
- B、首次病程记录
- C、24 小时内入出院记录
- D、24 小时内入院死亡记录
- E、阶段小结

87.患者入院后不足 24 小时出院的

正确答案: C

88.患者入院后不足 24 小时死亡的

正确答案: D

89.患者住院时间较长, 病情有重大转折或住院超过 1 个月的

正确答案: E

(90-91) 共用备选答案

- A、Apo-A
- B、Apo-B
- C、Apo-C
- D、Apo-D

E、Apo-E

90.高密度脂蛋白的主要成分是

正确答案: A

91.低密度脂蛋白的主要成分是

正确答案: B

(92-93) 共用备选答案

A、右上直肌、左下斜肌

B、右下直肌、左上斜肌

C、左下直肌、右上斜肌

D、左上直肌、右下斜肌

E、左下直肌、右下斜肌

92.眼球左上运动障碍提示以上哪对配偶肌功能异常

正确答案: D

93.眼球右下运动障碍提示以上哪对配偶肌功能异常

正确答案: B

(94-96) 共用备选答案

A、睑内翻

B、Graefe 征

C、眼球下陷

D、Gotttron 征

E、眼压增高

94.甲状腺功能亢进患者可能出现

正确答案: B

95.沙眼患者可能出现

正确答案: A

96.青光眼患者常出现

正确答案: E

97.血尿常见于以下哪些疾病

A、肾结核

B、泌尿系统肿瘤

C、肾盂肾炎

D、泌尿系统外伤

E、溶血性贫血

正确答案: ABCD

98.血小板聚集试验升高可见于

A、心肌梗死

B、心绞痛

C、糖尿病

D、口服避孕药

E、晚期妊娠

正确答案: ABCDE

99.患者 PT 延长提示下列哪些凝血因子缺乏

A、II

B、V

C、VII

D、Fg

E、XII

正确答案: ABCD

100.哪些检验结果不符合 DIC 的诊断

A、BT 延长

B、ELT 延长

C、PT 延长

D、FDP 减少

E、D 二聚体阳性

正确答案: BD

1.肝细胞对胆红素生物转化的实质是

- A、使胆红素与 Y 蛋白结合
- B、使胆红素与 Z 蛋白结合
- C、使胆红素的极性变小
- D、增强毛细胆管膜上载体转运系统，有利于胆红素排泄
- E、主要破坏胆红素分子内的氢键并进行结合反应

正确答案: E

2.下列哪种疾病可引起肝细胞性疾病黄疸

- A、蚕豆病
- B、原发性胆汁性肝硬化
- C、毛细胆管型炎、病毒性肝炎
- D、胆总管结石
- E、中毒性肝炎

正确答案: E

3.腹围的正确测量方法

- A、患者排尿后平卧，用软尺经两髂前上棘绕腹一周，测得的周长为腹围
- B、患者排尿后平卧，用软尺经脐绕腹一周，测得的周长为腹围
- C、患者排尿后平卧，用软尺绕腹一周，测得的周长为腹围
- D、患者排尿后平卧，用软尺经两侧肋弓下缘绕腹一周，测得的周长为腹围
- E、患者排尿后平卧，用软尺经上腹部绕腹一周，测得的周长为腹围

正确答案: B

4.诊断右心衰竭时，最可靠的体征

- A、肝颈静脉回流征阳性
- B、肝大
- C、下肢水肿
- D、腹水
- E、胸水

正确答案: A

5.入院记录应于患者入院后多长时间内完成

- A、6 小时
- B、12 小时
- C、24 小时
- D、36 小时
- E、48 小时

正确答案: C

6.检查腰骶椎的特殊试验是

- A、屈颈试验 (linder 征)
- B、Jackson 压头试验
- C、前屈旋颈试验
- D、旋颈试验
- E、克氏征

正确答案: A

7.有关脊椎压迫症腰背痛的特点，不正确的是

- A、脊柱活动、咳嗽时疼痛减轻

- B、疼痛常沿一根或多根脊神经后根分布区放射
- C、疼痛剧烈，呈烧灼样或绞榨样痛
- D、常有颈背痛或腰痛
- E、有一定定位性疼痛，并可有感觉障碍

正确答案: A

8.关于弥散性血管内凝血，错误的是

- A、出血时间延长
- B、凝血时间延长
- C、凝血酶原时间延长
- D、部分凝血活酶时间延长
- E、外周血小板增多

正确答案: E

9.关于柏油便的描述，下列均正确，但除外

- A、黑色，有光泽，RBC 被破坏所致
- B、服用大量维生素 C 可出现匿血试验假阳性
- C、服用铁剂后排黑便可以隐血试验假阳性
- D、上消化道出血的表现
- E、隐血试验强阳性

正确答案: B

10.E 花环分离法分离淋巴细胞时，能形成 E 花环的细胞是

- A、嗜酸性粒细胞
- B、嗜碱性粒细胞
- C、T 淋巴细胞
- D、单核细胞
- E、B 淋巴细胞

正确答案: C

11.不可能形成脊柱器质性侧凸的原因是

- A、肩部或胸廓畸形
- B、慢性肥厚粘连
- C、先天性脊柱发育不全
- D、坐骨神经性侧凸
- E、肌肉麻痹

正确答案: D

12.关于支气管哮喘的描述哪项是正确的

- A、呈吸气性呼吸困难
- B、呼气位
- C、两肺叩诊呈过清音
- D、语音共振稍增强
- E、Kronig 峡消失

正确答案: C

13.关于体温的描述，错误的是

- A、正常体温受体内外因素的影响稍有波动
- B、剧烈运动后体温略有升高
- C、进餐后体温可略升高

- D、老年人体温相对青壮年偏低
- E、月经前和妊娠期体温略低于正常

正确答案: E

14.以下哪一项是脑膜刺激征检查内容

- A、直腿抬高实验
- B、Babinski 征
- C、Kernig 征
- D、Oppenheim 征
- E、Romberg 征

正确答案: C

15.主动脉瓣狭窄时触诊可见

- A、心尖搏动减弱，呈抬举样，胸骨右缘第 2 肋间可触及收缩期震颤
- B、心尖搏动有力，呈抬举样，胸骨右缘第 2 肋间可触及收缩期震颤
- C、心尖搏动有力，呈抬举样，胸骨左缘第 2 肋间可触及收缩期震颤
- D、心尖搏动有力，呈抬举样，胸骨右缘第 4 肋间可触及收缩期震颤
- E、以上都不正确

正确答案: B

16.急性左心衰患者多采用的体位是

- A、自主体位
- B、被动体位
- C、强迫仰卧位
- D、强迫站立位
- E、强迫坐位

正确答案: E

17.金黄色葡萄球菌一般不引起

- A、败血症
- B、毛囊炎
- C、食物中毒
- D、假膜性肠炎
- E、风湿热

正确答案: E

18.反映红细胞体积异质性的指标是

- A、RDW
- B、MCV
- C、MCH
- D、MCHC
- E、HCT

正确答案: A

19.下列关于 β -受体亢进综合征的叙述正确的是

- A、与自主神经功能紊乱无关
- B、是一种器质性心血管疾病
- C、心得安试验后心电图可恢复正常
- D、当在精神紧张时心悸反而缓解
- E、除心悸、胸闷症状外无心电图改变

正确答案: C

20.检查鼓膜时, 应根据成人外耳道的弯曲而将耳郭向什么方向牵引

- A、前上方
- B、前下方
- C、后上方
- D、后下方
- E、后方

正确答案: C

21.在肝中生成的分路胆红素占

- A、0% ~ 10%
- B、10% ~ 20%
- C、20% ~ 30%
- D、30% ~ 40%
- E、40% ~ 50%

正确答案: B

22.下列符合正常骨髓象特征的是

- A、有核细胞增生活跃
- B、粒红比例 (2 ~ 4) : 1
- C、可见少量网状细胞和肥大细胞
- D、原粒细胞 < 2%, 早幼粒细胞 < 5%
- E、以上都对

正确答案: E

23.不符合脑膜炎球菌标本采集与送检要求的是

- A、采集标本应注意无菌操作
- B、根据该病原菌主要存在部位取材
- C、一般应在使用抗菌药物之前采集标本
- D、采集的标本要立即送检
- E、标本送检过程中要保持低温和干燥

正确答案: E

解析: 专性需氧, 营养要求高。最常用的培养基是巧克力色培养基, 即将血液加热 80℃后制成的血琼脂培养基。初次分离培养时, 还需提供 5% ~ 10%的 CO₂ 气体。

24.以下哪一项检查需要应用淀粉

- A、皮肤划痕实验
- B、竖毛反射
- C、发汗实验
- D、眼心反射
- E、触觉检查

正确答案: C

25.下列是有关瞳孔的正确描述, 但应除外哪一项

- A、瞳孔正常为圆形, 双侧等大
- B、双侧瞳孔散大伴对光反射消失, 多为濒死状态的表现
- C、瞳孔对光反射迟钝或消失, 多见于昏迷的病人
- D、婴儿和老人瞳孔较大
- E、有机磷农药中毒和毒蕈中毒时, 瞳孔缩小

正确答案: D

26.腹式呼吸增强见于

- A、急性腹膜炎
- B、膈肌麻痹
- C、胸腔积液
- D、腹水
- E、腹腔内巨大肿物

正确答案: C

27.用搔弹法可检出至少多少毫升腹水

- A、50ml
- B、80ml
- C、100ml
- D、110ml
- E、120ml

正确答案: E

28.以下因素使血沉加速，但应除外

- A、纤维蛋白原
- B、R 球蛋白
- C、免疫复合物
- D、巨球蛋白
- E、白蛋白

正确答案: E

29.关于胆红素的代谢，下列叙述哪一项是正确的

- A、血中胆红素升高，巩膜均有黄染
- B、胆红素主要来源于骨髓幼稚红细胞
- C、非结合胆红素与白蛋白结合输送，经肾小球滤过
- D、正常情况，尿中无尿胆原
- E、尿胆原大部分氧化为尿胆素

正确答案: E

30.骨髓铁染色表现为有较多的铁颗粒或小珠属于下列哪种情况

- A、缺铁性贫血
- B、巨幼细胞性贫血
- C、铁粒幼细胞性贫血
- D、溶血性贫血
- E、再生障碍性贫血

正确答案: C

31.Rh 阴性的母亲，其胎儿若 Rh 阳性，胎儿生后易患

- A、血友病
- B、白血病
- C、红细胞增多症
- D、新生儿溶血症
- E、巨幼红细胞贫血

正确答案: D

32.斜颈不见于以下哪种疾病

- A、颈肌外伤
- B、瘢痕收缩
- C、先天性斜颈
- D、颈肌痉挛
- E、重症肌无力

正确答案: E

33.下列关于方颅的描述正确的是

- A、以颅骨增大变形为特征
- B、自颅顶到下颌部的长度明显增大
- C、可伴有长骨的骨质增厚与弯曲
- D、可见于佝偻病
- E、见于变形性骨炎

正确答案: D

34.对于腹痛的临床表现下列各项均正确, 但除外

- A、急性腹痛, 病情重, 转变快
- B、慢性腹痛多为间歇性痛
- C、腹痛部位即是病变部位
- D、改变体位可使腹痛减轻或加剧
- E、腹痛性质及程度对诊断病因有帮助

正确答案: C

35.革兰阳性菌的致热物质主要是

- A、全菌体和其代谢产物
- B、脂多糖
- C、肽聚糖
- D、内毒素
- E、全菌体和内毒素

正确答案: A

36.最常见的肠梗阻原因是

- A、蛔虫性肠梗阻
- B、肠扭转
- C、粘连性肠梗阻
- D、肠系膜血管栓塞
- E、嵌顿疝

正确答案: C

37.直接胆红素的特点不包括

- A、为胆红素葡萄糖醛酸二酯
- B、水溶性较大
- C、不易透过生物膜
- D、不能通过肾脏由尿排出
- E、与重氮试剂起反应的速度快, 呈直接反应

正确答案: D

解析: 直接胆红素主要为胆红素葡萄糖醛酸二酯, 水溶性较大, 分子量较小, 当病理状态下血中直接胆红素升高, 可以被肾小球滤过, 通过肾脏由尿排出。

38.最常见血清钙降低的疾病是

- A、甲状腺功能亢进症
- B、慢性阻塞性肺病
- C、甲状旁腺功能减退症
- D、摄入过量维生素 D
- E、多发性骨髓瘤

正确答案: C

39.应用尿素氮与血肌酐比值鉴别肾前性氮质血症和急性肾小管坏死

- A、 $>20:1$ 支持肾前性氮质血症
- B、 $>20:1$ 支持急性肾小管坏死
- C、 $20:1$ 支持肾前性氮质血症
- D、 $10:1$ 支持肾前性氮质血症
- E、 $>1:1$ 支持肾前性氮质血症

正确答案: A

40.巨颅可见于哪些疾病

- A、小儿佝偻病
- B、变形性骨炎
- C、脑积水
- D、肢端肥大症
- E、Marfan 综合征

正确答案: C

41.在中等量胸腔积液上方或肺实变伴有少量胸腔积液部位，听诊时两者均可能出现的常见体征为下列哪一项

- A、支气管语音
- B、胸语音
- C、羊鸣音
- D、耳语音
- E、胸膜摩擦音

正确答案: C

42.MCV 参考值为

- A、 $80 \sim 90\text{fl}$
- B、 $80 \sim 100\text{fl}$
- C、 $88 \sim 98\text{fl}$
- D、 $88 \sim 110\text{fl}$
- E、 $89 \sim 93\text{fl}$

正确答案: B

43.肠鸣音活跃是指

- A、肠鸣音每分钟 $4 \sim 5$ 次
- B、肠鸣音明显少于正常或数分钟才能听到 1 次
- C、持续听诊 $3 \sim 5$ 分钟未听到肠鸣音
- D、肠鸣音每分钟 10 次以上，但音调不特别高亢
- E、次数多且肠鸣音响亮、高亢，甚至是金属音

正确答案: D

44.关于窦性 P 波的组成，以下的描述是正常的

- A、前半部代表窦房结除极，后半部代表心房除极

- B、前半部代表窦房结除极，后半部代表右心房除极
- C、前半部代表心房除极，后半部代表心房复极
- D、前半部代表左心房除极，后半部代表右心房除极
- E、前半部代表右心房除极，后半部代表左心房除极

正确答案: E

45.关于出血性疾病的发病，下列哪项说法是正确的

- A、血管壁功能异常均为获得性
- B、血小板功能异常均为遗传性
- C、遗传性凝血因子缺乏一般多为多种凝血因子缺乏
- D、获得性凝血因子缺乏常为单一凝血因子缺乏
- E、vWD 属于遗传性出血性疾病

正确答案: E

46.下列是肺部叩诊呈鼓音时正确的描述，但除外哪一项

- A、类似击鼓的声音
- B、音调比正常清音低
- C、中等持久性
- D、强度中等
- E、正常人左胸下方可叩得

正确答案: B

47.血涂片进行白细胞分类计数时采用的染色方法是

- A、煌焦油蓝染色
- B、抗酸染色
- C、瑞氏染色
- D、活体染色
- E、荧光染色

正确答案: C

48.下列哪种是膀胱储尿期症状

- A、尿流慢速
- B、尿流分叉
- C、尿急
- D、尿流间断
- E、排尿延迟

正确答案: C

49.血清肌酸激酶增高最常见的疾病是

- A、急性心肌梗死
- B、脊髓侧索硬化症
- C、甲状腺功能亢进
- D、系统性红斑狼疮
- E、脑血管疾病

正确答案: A

50.下列为胸部叩诊时被检者体位姿势正确的描述，但应除外哪一项

- A、坐位或仰卧位
- B、胸部稍前倾
- C、放松肌肉

D、两臂垂放

E、呼吸均匀

正确答案: B

51. 下列不会导致心悸发生的是

A、阵发性室上性心动过速

B、维生素 B1 缺乏

C、Ⅱ度房室传导阻滞

D、 β 肾上腺受体反应亢进

E、甲状腺功能减退

正确答案: E

52. 患者，男，60岁，长期吸烟，持续1个月痰中带血。下列哪项检查为最佳选择

A、痰查结核菌

B、痰查瘤细胞

C、痰细菌培养

D、痰找肺吸虫

E、痰查真菌

正确答案: B

53. 患者，女，45岁，胸闷气短三个月，超声心动图可见大量心包积液，下列体征的叙述哪一项是错误的

A、心尖搏动减弱或消失

B、心脏浊音界向两侧扩大

C、可闻及心包摩擦音

D、颈静脉怒张

E、脉搏细弱，有奇脉

正确答案: C

54. 患者，男，40岁，以低血钾性周期性瘫痪样表现就诊。有尿量增多，骨痛症状。查尿常规正常，血 CO_2CP 18mmol/L，尿 pH 6.5，血钾 3.0mmol/L，血氯 108mmol/L。本例最可能的诊断是

A、肾小管酸中毒Ⅳ型

B、肾小管酸中毒Ⅲ型

C、肾小管酸中毒Ⅱ型

D、肾小管酸中毒Ⅰ型

E、范可尼综合征

正确答案: D

55. 患者，男，40岁。幼年曾头皮发生米粒大毛囊性丘疹，痒。现仍见有丘疹上覆硫黄色痂，有的痂中央有毛发贯穿，并有瘢痕性脱发。应考虑

A、黄癣

B、黑点癣

C、股癣

D、脓癣

E、花斑癣

正确答案: A

56. FEV_1 51%，FVC 50%， FEV_1/FVC 87%，TLC 51%，DLCO 45%，肺功能诊断为

A、阻塞性通气功能障碍

- B、限制性通气功能障碍
- C、混合性通气功能障碍
- D、孤立性弥散功能减低
- E、限制性通气功能障碍伴弥散功能减低

正确答案: E

57.患者，男，24岁，流涕、喷嚏2年余，气喘1天，拟诊支气管哮喘，流涕、喷嚏应属于

- A、主诉
- B、现病史
- C、既往史
- D、系统回顾
- E、个人史

正确答案: C

58.患者，女，19岁，烧伤，创面分泌物呈黄绿色，有生姜味，在焦痂创面上出现虫咬样斑点，应考虑引起创面感染的细菌是

- A、金黄色葡萄球菌
- B、化脓性链球菌
- C、不动杆菌
- D、铜绿假单胞菌
- E、奇异变形杆菌

正确答案: D

59.患者，男，32岁，持续性腹痛阵发性加剧，绞痛，并有恶心，呕吐胃内容物，停止排气排便2天。1年前做过阑尾切除术，术后切口感染，换药2周才愈。查体：腹部轻度膨隆，未见肠型无包块，肠鸣音较亢进，偶闻气过水声。诊断首先考虑

- A、小肠扭转
- B、肠套叠
- C、乙状结肠扭转
- D、粘连性肠梗阻
- E、蛔虫团梗阻

正确答案: D

60.患者李某，腹部查体可见腹壁浅静脉曲张，脐以上血流方向自上而下，脐以下血流由上至下，该患者可能是下列哪种情况

- A、上腔静脉阻塞
- B、下腔静脉阻塞
- C、门脉高压症
- D、髂内静脉阻塞
- E、髂外静脉阻塞

正确答案: A

61.患者，男，52岁，持续胸痛10小时来诊，下列问诊那句话不合适

- A、胸痛后都用过什么药
- B、胸痛一直在持续吗
- C、你为什么不早点来，拖到现在
- D、胸痛前在做什么
- E、胸痛时还有什么不舒服

正确答案: C

62. 刘某，男，12岁，因腹痛5天急诊入院。入院后检查发现尿蛋白2+，并出现双膝关节肿痛。该患者最需关注的体格检查是

- A、淋巴结
- B、皮疹
- C、输尿管点压痛
- D、4字征
- E、浮髌试验

正确答案: B

63. 患者，女，孕8个月，乏力、面色苍白2个月，不发热无出血倾向。查体：睑结膜苍白，心尖部Ⅱ级收缩期杂音，腹膨满，肝脾不大。外周血象：RBC $30 \times 10^{12}/L$ Hb 100g/L，MCV 115fL，MCHC 380g/L，WBC $4.6 \times 10^9/L$ ，PLT $100 \times 10^9/L$ ，RC 0.015。最可能的诊断是

- A、妊娠8个月，急性白血病
- B、妊娠8个月，缺铁性贫血
- C、妊娠8个月，溶血性贫血
- D、妊娠8个月，巨幼细胞性贫血
- E、妊娠8个月，再生障碍性贫血

正确答案: D

64. 患者，男，69岁，既往存在冠心病并行冠脉支架植入术，术后长期服用拜阿司匹林药物，现有皮肤紫癜现象，不会受到影响的是

- A、束臂试验
- B、血小板黏附率
- C、出血时间
- D、血块收缩试验
- E、TM测定

正确答案: E

65. 患者，女，55岁，体检发现血压增高1月来诊，具高血压家族史。则最不可能出现的是

- A、A2减弱
- B、靴形心
- C、心尖区2/6级收缩期杂音
- D、脉压增大
- E、头痛

正确答案: A

解析：患者考虑原发性高血压，则应导致A2增强而不是减弱。

66. 患者，男，60岁，因左侧肢体无力3天入院。神经系统查体发现：左侧口角低，左侧肢体肌力3级，左侧肢体痛觉减退，左侧巴氏征阳性。该患者瘫痪类型属

- A、偏瘫
- B、单瘫
- C、交叉瘫
- D、截瘫
- E、肌肉瘫

正确答案: A

67. 患者，女，88岁，既往吸烟40年，约20支/日，10年前出现咳嗽、咳痰、呼吸困难，明确诊断为阻塞性肺气肿，该患不会出现的异常体征是

- A、肺部散在干啰音

- B、双肺底湿啰音
- C、肺泡呼吸音减弱
- D、呼气延长
- E、吸气延长

正确答案: E

68.患者,男,46岁,几乎每天饮酒22年。腹部检查:肝在右锁骨中线肋缘下3cm,剑突下5cm,表面光滑,质地稍韧,边缘圆钝,无压痛。最可能诊断是

- A、肝淤血
- B、肝脓肿
- C、原发性肝癌
- D、脂肪肝
- E、肝包虫病

正确答案: D

69.患者,男,25岁,突发双下肢紫癜,对称分布,伴关节痛及腹痛,实验室检查:WBC $10.0 \times 10^9/L$, Hb 113g/L, PLT $206 \times 10^9/L$, 该诊断应该考虑

- A、再生障碍性贫血
- B、弥散性血管内凝血
- C、过敏性紫癜
- D、急性白血病
- E、血小板减少性紫癜

正确答案: C

70.患者,男,24岁,数日前去公共泳池游泳,后出现尿急、尿频、尿痛等症状,医生疑为细菌性尿道炎。采集清洁中段尿进行细菌检查,尿细菌定量培养,常用方法为

- A、平板分区划线法
- B、倾注培养法
- C、穿刺平板法
- D、平板涂布法
- E、平板连续划线法

正确答案: B

71.患者,女,30岁,体检发现血小板减少,同时dsDNA抗体阳性,可能出现以下哪项检查结果

- A、CT延长
- B、BT正常
- C、血块收缩良好
- D、骨髓巨核细胞增多
- E、血小板形态偏小

正确答案: D

(72-73 共用题干) 患者,男,45岁,高血压病史8年。饮酒后突发剧烈下胸部疼痛,伴有窒息感,舌下含服硝酸甘油一片,立即躺沙发休息半小时后无缓解

72.考虑最可能诊断是

- A、急性胰腺炎
- B、消化性溃疡穿孔
- C、急性胆囊炎
- D、心绞痛

E、急性心肌梗死

正确答案: E

73.如果进行辅助检查,考虑首先选择的是

A、静息心电图

B、心电图负荷试验

C、腹部 CT

D、腹部 X 线平片

E、超声检查

正确答案: A

(74-76 共用题干) 患者,男,40 岁,因右侧下肢无力 1 小时入院。入院急查胸髓 MRI 提示胸椎骨折,T8 平面脊髓右侧明显受压

74.该患者浅感觉障碍可能是

A、左侧 T10 平面以下痛觉减退

B、左侧 T8 平面以下痛觉减退

C、右侧 T10 平面以下痛觉减退

D、右侧 T8 平面痛觉减退

E、双侧 T8 平面以下痛觉减退

正确答案: A

75.该患者感觉障碍类型属于

A、交叉性感觉障碍

B、分离性感觉障碍

C、偏身型感觉障碍

D、末梢型感觉障碍

E、单一型感觉障碍

正确答案: B

76.该患者深感觉障碍可能是

A、右侧 T8 平面以下震动觉减弱

B、右侧 T10 平面以下震动觉减弱

C、左侧 T8 平面以下震动觉减弱

D、左侧 T10 平面以下震动觉减弱

E、双侧 T8 平面震动觉减弱

正确答案: A

(77-79 共用题干) 患者,男,65 岁,上腹部不适,食欲减退 3 个月。近 1 月来,出现黄疸并进行性加重,伴有低热,无疼痛。查体:全身黄染明显,可扪及肿大胆囊,血胆红素 193mmol/L,尿胆红素阳性

77.首先应考虑下列哪项诊断

A、慢性胆囊炎、胆石症

B、胰头癌

C、病毒性肝炎

D、慢性胰腺炎

E、胰腺囊肿伴感染

正确答案: B

78.下列进一步检查方法应除外

A、CT 检查

- B、PTC
- C、ERCP
- D、MRCP
- E、DSA

正确答案: E

79.应选择下列哪种手术方式为宜

- A、胰头切除术
- B、全胰切除术
- C、胰十二指肠切除术
- D、全胰十二指肠切除术
- E、胆囊空肠吻合术

正确答案: C

(80-83 共用题干) 患者, 男, 17 岁, 有过敏性鼻炎病史, 反复出现发作性咳嗽、呼吸困难, 多于接触花粉后出现, 数小时后可自行好转

80.呼吸困难症状发作时, 下列表述正确的是

- A、吸气性呼吸困难为主
- B、常出现三凹征
- C、呼气性呼吸困难为主
- D、呼吸变慢
- E、吸气相延长

正确答案: C

81.缓解期不应出现以下哪种体征

- A、呼吸频率为 15 次/分
- B、肺部叩诊呈清音
- C、语音共振正常
- D、弥漫性干啰音
- E、呼吸音正常

正确答案: D

82.呼吸困难症状发作时, 肺部听诊最常出现哪种情况

- A、湿啰音
- B、弥漫性干啰音
- C、局限性干啰音
- D、语音震颤增强
- E、呼吸音增强

正确答案: B

83.该患者最可能的诊断是

- A、大叶性肺炎
- B、胸腔积液
- C、气胸
- D、支气管哮喘
- E、慢性支气管炎

正确答案: D

(84-85 共用题干) 患者, 男, 36 岁, 有肺结核病史。现持续性膀胱炎, 经一般抗菌药物治疗后症状不缓解, 怀疑为肾结核

84.若诊断为肾结核，治疗的一线药物包括

- A、异烟肼、氯霉素
- B、利福平、青霉素
- C、利福平、氯霉素
- D、异烟肼、青霉素
- E、利福平、异烟肼、乙胺丁醇、链霉素

正确答案: E

85.诊断分枝杆菌常用的染色方法是

- A、美蓝染色
- B、革兰染色
- C、抗酸染色
- D、稀释复红单染色
- E、奈瑟染色

正确答案: C

(86-88) 共用备选答案

- A、水冲脉
- B、交替脉
- C、奇脉
- D、重脉
- E、细脉

86.主动脉瓣狭窄

正确答案: E

87.伤寒

正确答案: B

88.心包积液

正确答案: D

(89-90) 共用备选答案

- A、碳酸氢钠
- B、甲醛
- C、浓盐酸
- D、麝香草酚
- E、甲苯

89.适用于尿液有形成分检查的防腐剂是

正确答案: B

90.适用于尿液激素测定的防腐剂是

正确答案: C

(91-92) 共用备选答案

- A、少尿伴肾绞痛
- B、少尿伴胸闷气促不能平卧
- C、少尿伴血尿，高血压
- D、少尿伴发热腰痛
- E、少尿伴排尿困难

91.肾结石常表现为

正确答案: A

92.急性肾炎常表现为

正确答案: C

(93-94) 共用备选答案

A、短绌脉

B、脱落脉

C、迟脉

D、细脉

E、二联脉

93.二度房室传导阻滞

正确答案: B

94.主动脉瓣狭窄

正确答案: C

(95-96) 共用备选答案

A、常在右侧颈下部，出现于收缩中期，呈隆隆样高调性质

B、常在右侧颈下部，低调、柔和、连续性杂音

C、常向下颌部放射，出现于舒张中期，呈吹风样高音调性质

D、常在右侧颈下部，高调、连续性杂音

95.颈静脉杂音常见于

正确答案: C

96.颈动脉杂音常见于

正确答案: A

97.个人史包括下列哪些内容

A、受教育程度

B、业余爱好

C、结婚年龄

D、卫生习惯

E、疫区居住史

正确答案: ABDE

98.意识模糊伴瞳孔缩小见于

A、有机磷农药中毒

B、吗啡中毒

C、颠茄中毒

D、毒蕈类中毒

E、苯巴比妥中毒

正确答案: ABDE

99.下列支持Ⅰ型肾小管酸中毒的是

A、高氯性代谢性酸中毒

B、伴有低血钙低血钠及心律失常

C、由近端肾小管酸化功能障碍引起

D、碳酸氢钠重吸收试验中尿 HCO₃⁻ 部分排泄率大于 15%

E、患者曾长期服用含汞制剂

正确答案: AC

100.咯血伴有杵状指的疾病多见于

A、肺栓塞

- B、支气管肺癌
- C、慢性肺脓肿
- D、支气管扩张症
- E、肺结核

正确答案: BCD

1.红细胞的变形能力的大小取决于红细胞的

- A、体积
- B、表面积
- C、数量
- D、比重
- E、表面积与体积的比值

正确答案: E

2.功能残气量与残气量的区别为

- A、都是反应肺容积的指标
- B、功能残气量是呼出气量
- C、残气量是呼出气量
- D、功能残气量是平静呼气后残留于肺内的气量
- E、残气量是平静呼气后残留于肺内的气量

正确答案: D

3.皮肤黏膜出血的基本病因不包括

- A、凝血因子缺乏或活性降低
- B、毛细血管壁的缺陷
- C、红细胞经巨噬细胞系统破坏过多
- D、血液中抗凝物质增多
- E、血小板数量或功能异常

正确答案: C

解析: 红细胞破坏过多可导致贫血、黄疸, 与皮肤粘膜出血无关。

4.Dubin-Johnson 综合征是由于

- A、血清非结合胆红素增加
- B、肝细胞对结合胆红素向毛细胆管排泄障碍
- C、肝细胞摄取非结合胆红素障碍
- D、肝细胞缺乏葡萄糖醛酸转换酶
- E、肝细胞摄取及排泄结合胆红素障碍

正确答案: B

5.骨髓活检最有诊断价值的是

- A、急性淋巴细胞白血病
- B、慢性髓细胞白血病
- C、原发性骨髓纤维化
- D、真性红细胞增多症
- E、急性巨核细胞白血病

正确答案: C

6.成人正常脑脊液蛋白定量为多少 g/L

- A、0.15 ~ 0.45
- B、0.45 ~ 0.65
- C、0.65 ~ 0.85
- D、0.85 ~ 0.95
- E、0.95 ~ 1.15

正确答案: A

7.风湿性心脏病严重二尖瓣狭窄突发大咯血是由于

- A、肺毛细血管破裂
- B、合并肺结核
- C、急性肺水肿
- D、支气管静脉破裂
- E、合并支气管扩张

正确答案: D

8.甲状腺功能减退的面容是

- A、表情淡漠，反应迟钝呈无欲状态
- B、面色晦暗，额部有褐色色素沉着
- C、面色苍白，唇舌色淡，表情疲惫
- D、面色灰暗，双颊发红，口唇发绀
- E、面色苍黄，目光呆滞，眉毛稀疏

正确答案: E

9.病理性血沉增快，不包括下列中哪项

- A、炎症性疾病
- B、恶性肿瘤
- C、贫血
- D、妊娠期间
- E、高胆固醇血症

正确答案: D

10.有关主诉的描述，错误的是

- A、主诉是患者最主要的痛苦或最明显的症状和体征
- B、确切的主诉可以反映病情的轻重与缓急
- C、主诉应尽量包括患者所有的症状
- D、主诉不能使用诊断用语
- E、主诉应反映出患病时间

正确答案: C

11.关于平均心电轴说法错误的是

- A、通常指 QRS 波群电轴
- B、目测法和作图法均可求出
- C、正常人心电轴在 $-30^{\circ} \sim +90^{\circ}$ 之间
- D、心电轴在 -45° 时，III 导联的主波方向为正
- E、电轴位于 $-90^{\circ} \sim -180^{\circ}$ 时称为心电轴不确定

正确答案: D

解析：心电轴在 -45° 时，QRS 电轴左偏，I 导联为较大正向波，III 导联为深大负向波。

12.对下面心电图心律诊断正确的是

- A、窦性心律
- B、心房纤颤
- C、心房扑动
- D、房性心动过速
- E、交界区心律

正确答案: C

13.关于心电图 ST-T，以下说法错误的是

- A、任一导联，ST 段下移一般不超过 0.05mV

- B、任一导联，ST 段抬高不可超过 0.10mV
- C、冠心病患者心电图 ST-T 可以正常
- D、冠心病患者心绞痛发作时心电图 ST-T 可以正常
- E、T 波方向大多与 QRS 主波方向相同

正确答案: B

14.下列哪项说法不正确

- A、正常成人 24 小时尿量约 1000 ~ 2000ml
- B、24 小时尿量少于 400ml 称为少尿
- C、12 小时完全无尿称为无尿
- D、24 小时尿量少于 100ml 称为无尿
- E、24 小时尿量多于 2000ml 称为多尿

正确答案: E

15.生长发育成熟前甲状腺功能减退可导致

- A、垂体性侏儒症
- B、巨人症
- C、呆小病
- D、佝偻病
- E、阉人症

正确答案: C

16.下列疾病均可使潜血试验阳性，但除外

- A、结肠癌
- B、浅表性胃炎
- C、消化溃疡
- D、胃癌
- E、剧烈呕吐

正确答案: B

17.下列哪项不是满月脸典型表现

- A、面如满月
- B、皮肤发红
- C、皮肤黝黑
- D、痤疮
- E、多毛症

正确答案: C

18.下列疾病，均可触及收缩期震颤，但应除外哪一项

- A、主动脉瓣狭窄
- B、二尖瓣狭窄
- C、肺动脉瓣狭窄
- D、室间隔缺损
- E、肥厚性梗阻型心肌病

正确答案: B

19.一患者发热，右侧胸闷，呼吸困难，对确诊胸腔积液进行哪项检查最有意义

- A、血常规
- B、胸部平片
- C、胸部 B 超

D、结核菌素试验

E、痰查结核菌

正确答案: C

20.支气管呼吸音发生在何部位有病理意义

A、胸骨上窝

B、喉头附近

C、在背部 1、2 胸椎附近

D、在正常肺泡呼吸音的部位

E、在背部第 6、7 颈椎附近

正确答案: D

21.可表现为通气功能正常，气道激发试验阳性的疾病为

A、支气管扩张

B、支气管哮喘

C、重症肌无力

D、慢性过敏性肺炎

E、CPFE

正确答案: B

22.肺总量是指

A、平静呼吸时，一次吸入和呼出的气量

B、平静呼气末再尽最大力量吸气所吸入的最大气量

C、平静呼气末再尽最大力量呼气所呼出的气量

D、最大限度吸气后肺内所含气量

E、平静呼气末肺内所含气量

正确答案: D

23.正常人粪便的性状为

A、黏液便

B、米泔样便

C、软泥样圆柱状

D、白陶土样便

E、干结便

正确答案: C

24.以下各项为主动脉瓣关闭不全的体征，但应除外

A、靴形心

B、毛细血管搏动征阳性

C、舒张期叹气样杂音

D、脉压大

E、Graham-steele 杂音

正确答案: E

25.下列中哪项是增生性贫血的骨髓增生程度

A、增生极度活跃

B、增生明显活跃

C、增生活跃

D、增生减低

E、增生极度减低

正确答案: B

26.开瓣音描述错误的是

- A、听诊音调高、历时短促而响亮、清脆，成拍击样
- B、开瓣音存在可作为二尖瓣叶弹性及活动尚好的间接指标
- C、在心尖内侧听诊较清晰
- D、由于舒张晚期血液由左房流入左室所致
- E、是二尖瓣分离术适应证的重要参考

正确答案: D

27.风湿性多形性红斑属于下列哪种皮疹

- A、斑疹
- B、玫瑰疹
- C、丘疹
- D、斑丘疹
- E、荨麻疹

正确答案: A

28.下列情况出现的多尿除哪一项外均属于生理性多尿

- A、慢性心力衰竭水肿病人应用利尿剂后
- B、静脉输注生理下盐水过多时
- C、垂体性多尿
- D、饮水过多时
- E、输注咖啡因时

正确答案: C

29.患者明确诊断为胸腔积液，该患者阳性体征的出现主要与何因素有关

- A、病变形成时间
- B、积液的性质
- C、原发病变性质
- D、单侧或双侧
- E、积液量

正确答案: E

30.病毒的致热物质主要是

- A、全菌体及植物凝集素
- B、全病毒体及血细胞凝集素
- C、全病毒体及裂解素
- D、胞壁肽及血细胞凝集素
- E、全病毒体及内毒素

正确答案: B

31.正常人可将肺活量全部呼出的时间是

- A、3s
- B、4s
- C、5s
- D、6s
- E、7s

正确答案: A

32.正常成人血钾的参考值是

- A、2.25 ~ 2.75mmol/L
- B、2.8 ~ 3.2mmol/L
- C、3.5 ~ 5.5mmol/L
- D、5.6 ~ 7.8mmol/L
- E、8 ~ 11mmol/L

正确答案: C

33.唾液泪液中的抗体主要为哪种类型的免疫球蛋白

- A、IgE
- B、IgG
- C、IgD
- D、sIgA
- E、IgM

正确答案: D

解析: SIgA 系指分泌型的 IgA。

34.vWF 活性测定主要用于何病的分型诊断

- A、血友病
- B、血小板减少症
- C、血管性血友病
- D、获得性凝血功能障碍

正确答案: C

35.关于正常胆红素的检查和代谢的描述错误的是

- A、STBil 1.7 ~ 17.1 μ mol/L
- B、以非结合型胆红素为主
- C、结合型/非结合型比值约为 20%
- D、尿胆红素为弱阳性
- E、胆红素转变成尿胆原后随粪便排出

正确答案: D

36.关于期前收缩,说法正确的是

- A、多源期前收缩是指心电图中出现 2 个及以上形态和联律间期不同的异位搏动
- B、期前收缩都有代偿间歇
- C、完整代偿间歇指期前收缩前后的两个窦性 P 波之间的间距等于正常 PP 间期的两倍
- D、房早的 P'波在 II 导联直立
- E、室性期前收缩必然没有 P'波

正确答案: C

解析: A 答案中没有明确是一个导联中的多个形态的异位搏动, B 答案错在插入性早搏没有代偿间歇; D 答案中低位的房早可能出现逆行的 P'波, E 答案中室早是可能出现 QRS 波群之后逆行的 P'波。

37.下列是机械性延迟所造成的第一心音分裂,但应除外哪一项

- A、右心衰竭
- B、右室充盈时间延长
- C、右束支传导阻滞
- D、肺动脉高压
- E、Ebstein 畸形

正确答案: C

38.心脏左侧浊音界由下列各段组成，但不包括

- A、主动脉结
- B、上腔静脉
- C、左心房
- D、右心室
- E、左心室

正确答案: B

39.震动觉障碍见于

- A、脊髓侧索
- B、脊髓前角
- C、脊髓丘脑前束
- D、脊髓后索
- E、额叶皮质

正确答案: D

40.目前认为所有血细胞均起源于下列哪种细胞

- A、全能干细胞
- B、骨髓系干细胞
- C、淋巴系干细胞
- D、T 淋巴系祖细胞
- E、B 淋巴系祖细胞

正确答案: A

41.回缩涕带血常见于

- A、鼻中隔偏曲
- B、鼻腔感染
- C、高血压
- D、鼻咽癌
- E、血液系统疾病

正确答案: D

42.以下哪项最支持心包积液的诊断

- A、脉压大
- B、奇脉
- C、ECG 肢导电压低
- D、心音弱
- E、心界向两侧扩大

正确答案: E

43.以关节出血为主要特征的出血性疾病是

- A、血小板减少症
- B、过敏性紫癜
- C、白血病
- D、血友病
- E、严重的贫血

正确答案: D

44.肺囊肿直径为 5cm，靠近胸壁，其叩诊音为下列哪一项

- A、过清音

- B、空瓮音
- C、浊鼓音
- D、鼓音
- E、实音

正确答案: D

45.脑脊液呈毛玻璃样混浊，见于

- A、病毒性脑膜炎
- B、化脓性脑膜炎
- C、结核性脑膜炎
- D、梅毒性脑膜炎
- E、隐球菌性脑膜炎

正确答案: C

46.对文化程度低的患者，错误的问诊方法是

- A、理解力差的患者，提问应通俗易懂
- B、文化程度低的患者回答“是”，不一定是同意
- C、理解力低的患者可能影响回答问题及遵从医嘱
- D、患者理解力差，必要时可诱导提问
- E、文化程度低下不妨碍其提供适当的病史

正确答案: D

47.关于功能性便秘的原因以下均是正确的，但除外

- A、肠易激综合征
- B、吗啡类药物的应用
- C、铅中毒
- D、结肠冗长
- E、抗胆碱药物的应用

正确答案: C

48.下列属于肾小球性蛋白尿的成分是

- A、转铁蛋白
- B、尿 T-H 糖蛋白
- C、视黄醇结合蛋白
- D、 α_1 微球蛋白
- E、结合珠蛋白

正确答案: A

49.下列胆红素代谢的参考值错误的是

- A、总胆红素 $1.7 \sim 17.1 \mu\text{mol/L}$
- B、结合胆红素 $0 \sim 7.1 \mu\text{mol/L}$
- C、非结合胆红素 $1.7 \sim 10.2 \mu\text{mol/L}$
- D、结合胆红素 $0 \sim 6.8 \mu\text{mol/L}$
- E、隐性黄疸总胆红素 $17 \sim 34 \mu\text{mol/L}$

正确答案: B

50.下列疾病均可出现肝界下移，但除外

- A、内脏下垂
- B、肺气肿
- C、右侧胸腔大量积液

- D、右侧气胸
- E、亚急性重型肝炎

正确答案: E

51.关于呕吐下列均是正确的, 但除外

- A、贲门上升
- B、膈上升
- C、腹肌收缩
- D、腹压增加
- E、贲门开放

正确答案: B

52.患者, 女, 70 岁, 肺部感染住院, 使用头孢哌酮舒巴坦抗感染之后, 某日查凝血功能检查发现异常, 以下最有可能的情况是

- A、APTT 缩短
- B、PT 延长
- C、BT 延长
- D、血小板数目增加
- E、TT 延长

正确答案: B

53.患者, 男, 30 岁, 拔牙后流血, 检查发现 PT 延长, APTT 正常, 提示可能的问题是

- A、Ⅶ活性下降
- B、Ⅷ活性下降
- C、Ⅸ活性下降
- D、Ⅺ活性下降
- E、Ⅱ活性下降

正确答案: A

54.发现患者左上腹有一包块, 随呼吸上下移动, 考虑来源于以下脏器, 除外

- A、脾脏
- B、肾脏
- C、结肠脾曲
- D、胰腺
- E、胃

正确答案: D

55.老年卵巢癌患者, 因皮肤淤斑、血尿就诊, 查 PT 正常, APTT 延长, APTT 纠正试验不能纠正, 请问原因可能是

- A、Ⅰ因子抗体形成
- B、Ⅱ因子抗体形成
- C、Ⅲ因子抗体形成
- D、Ⅶ因子抗体形成
- E、Ⅷ因子抗体形成

正确答案: E

56.患者, 男, 4 岁, 玩耍时突然出现气紧、唇绀, 呈“三凹征”, 考虑可能为哪种原因

- A、自发性气胸
- B、急性肺水肿
- C、大量胸腔积液

D、气管异物

E、肺栓塞

正确答案: D

解析:“三凹征”常见于大气道阻塞引起的呼吸困难,呼吸辅助肌活动增强。

57.患者重症肝炎,住院期间出现血压降低、皮肤大片淤斑,请问如何判断患者是否合并 DIC

A、I 因子水平

B、II 因子水平

C、VII因子水平

D、VIII因子水平

E、IX 因子水平

正确答案: D

58.患者,男,16岁,上感2周后出现心悸、气促,心电图如下,该心电图的诊断

A、II度II型房室传导阻滞

B、II度I型房室传导阻滞

C、III度房室传导阻滞

D、房性心动过速3:1下传

E、窦性心动过缓

正确答案: C

59.患者,男,34岁。查体发现血糖升高1个月。复查空腹血糖12mmol/L。患者血糖升高的机制包括

A、葡萄糖的利用减少

B、糖异生增多

C、糖异生减少

D、糖原分解减少

E、糖原合成增多

正确答案: B

60.患者,女,35岁,聚餐饮酒后突然上腹部剧烈疼痛,大汗,应想到以下急腹症,应考虑

A、急性胰腺炎

B、缺血性肠病

C、肠易激综合征

D、心肌梗死

E、急性细菌性痢疾

正确答案: A

61.一车祸受伤昏迷非本地患者,需紧急手术挽救生命时,手术同意书应

A、打电话通知家属赶来签字

B、由医院值班负责人签字

C、由医务人员扶着患者的手签字

D、由交通警察签字

E、由同车的未受伤的陌生人签字

正确答案: B

解析:为抢救患者,在法定代理人或被授权人无法及时签字的情况下,可由医疗机构负责人或者授权的负责人签字。

62.患者,男,30岁,VIII活性下降,以下哪种疾病可能出现

A、血管性血友病

- B、ITP
- C、血友病 B
- D、血友病 C
- E、过敏性紫癜

正确答案: A

63.患者,男,88岁,因下肢深静脉血栓,使用肝素抗凝,以下哪种检查结果最不可能出现

- A、IIa 活性下降
- B、Xa 活性下降
- C、血小板减少
- D、FIB 减少
- E、PT 延长

正确答案: D

64.患者,女,6岁,发热伴意识障碍急诊入院。体检:颈项强直,布氏征,克氏征阳性,脑脊液检查:压力增加,直接涂片见大而圆的菌体,有一厚壁,诊断脑膜炎。病原体最可能为

- A、脑膜炎奈瑟菌
- B、新型隐球菌
- C、流感嗜血杆菌
- D、结核分枝杆菌
- E、葡萄球菌

正确答案: B

65.患者,男,27岁,近一周来自觉发热,腰痛、尿呈浓茶色,查体巩膜黄染、睑结膜略苍白、心肺听诊正常,腹软,无压痛、肝脾未触及、实验室检查:血清非结合胆红素明显增加,尿胆红素阴性,最可能的诊断为

- A、自身免疫性溶血性贫血
- B、急性肝炎
- C、胆总管结石
- D、Gilbert 综合征
- E、肝内胆汁淤积

正确答案: A

66.患者,女,25岁,半年来下肢皮肤经常出现淤点,月经量多,血红蛋白 90g/L,白细胞 $7.2 \times 10^9/L$,血小板 $30 \times 10^9/L$,骨髓巨核细胞增多,产板巨核全片 2 个,最可能的诊断为

- A、再生障碍性贫血
- B、免疫性血小板减少性紫癜
- C、过敏性紫癜
- D、急性白血病
- E、慢性白血病

正确答案: B

67.患者,男,25岁,皮肤黄染伴明显瘙痒半月。体检:皮肤、巩膜明显黄染,肝肋下 1cm,脾侧卧可及。TB $120 \mu\text{mol/L}$, CB $62 \mu\text{mol/L}$, ALT 80U/L, ALP 110U/L,尿胆原(+),尿胆红素(-)。

下列哪项最有助于本例黄疸的鉴别诊断

- A、网织红细胞计数
- B、腹部 B 超
- C、血胆固醇测定
- D、肝炎标志检测

E、肾上腺皮质激素治疗试验

正确答案: B

68.一脊髓病患者急诊送入院，接诊医生进行神经系统查体发现患者左侧 T8 平面以下痛觉减退，右侧下肢肌力 3 级，右侧巴氏征阳性。根据阳性体检结果推测损伤以下那一部位

- A、左侧脊髓丘脑侧束
- B、右侧脊髓丘脑侧束
- C、左侧皮质脊髓侧束
- D、左侧皮质脊髓前束
- E、左侧脊髓后索

正确答案: B

69.患者，男，50 岁，脓毒血症，怀疑 DIC，下列不支持 DIC 的结果是

- A、BT 延长
- B、ELT 缩短
- C、PT 延长
- D、FDP 减少
- E、D-二聚体阳性

正确答案: D

70.患者，男，52 岁，8 年来每于春秋季节规律性上腹疼痛，伴餐后痛，无夜间痛，伴反酸，嗝气，近 2 个月来疼痛规律性消失，上腹部压痛，无肌紧张、反跳痛，其诊断为

- A、萎缩性胃炎
- B、慢性浅表性胃炎
- C、胃溃疡
- D、十二指肠溃疡
- E、胃癌

正确答案: C

71.患者因腹泻、呕吐而入院，心电图表现是：ST 段水平压低，T 波倒置，U 波增高，最可能的病因是

- A、以下都不是
- B、低血钾
- C、洋地黄中毒
- D、高血钾
- E、高血钙

正确答案: B

(72-74 共用题干) 患者，男，20 岁，咯血，发热 1 月

72.个人史应问诊内容，除外

- A、有无疫区居住史
- B、父母兄弟有无结核患者
- C、工作劳动环境
- D、有无烟酒嗜好
- E、有无冶游史

正确答案: B

73.围绕主要症状特点，应该问诊哪些内容，除外

- A、体温多少，发热的热型
- B、发热前有无寒战

- C、咯血的诱因
- D、咯血的量
- E、咯血的颜色及性状

正确答案: C

74.有关伴随症状, 应问诊哪些内容, 除外

- A、有无胸痛
- B、有无咳嗽、咳痰
- C、有无恶心、呕吐
- D、有无乏力、纳差
- E、有无盗汗

正确答案: C

(75-76 共用题干) 患者, 女, 25 岁, 发现血尿 3 周, 既往经常有咽炎发作。体查: BP 145/95mmHg 下肢未见凹陷性水肿。血肌酐 $88\mu\text{mol/L}$, 尿 RBC 20 ~ 25 个/HP, 异性红细胞 80%

75.患者肾脏病理结果光镜下可见系膜细胞增生, 基质增多, 呈局灶阶段性分布免疫荧光可见肾小球系膜弥漫颗粒状 IgA 沉积。该患者最可能的诊断是

- A、膜增生性肾炎
- B、IgA 肾病
- C、微小病变性肾病
- D、膜性肾病
- E、新月体肾炎

正确答案: B

76.为明确诊断, 需要进一步采取的检查是

- A、ANCA
- B、肾盂造影
- C、肾活检
- D、腹部立位平片
- E、尿培养

正确答案: C

(77-79 共用题干) 患者, 女, 45 岁, 颜面红斑、关节痛、反复口腔溃疡 1 月就诊。查体示颜面蝶形红斑, 颊黏膜、上颌可见多发溃疡, 关节无红肿畸形。拟诊系统性红斑狼疮, 回答下列问题

77.自身免疫病发病的相关因素不包括

- A、B 细胞被多克隆旁路激活
- B、Th1 和 Th2 细胞失衡
- C、Fas/FasL 表达异常
- D、CTLA-4 表达缺陷
- E、B7 表达过低

正确答案: E

78.致病机制属于

- A、I 型超敏反应
- B、II 型超敏反应
- C、III 型超敏反应
- D、IV 型超敏反应
- E、免疫缺陷病

正确答案: C

79.SLE 患者血清中有许多抗体, 其中最为重要的是

- A、抗 ds-DNA 抗体
- B、抗 Smith 抗体
- C、类风湿因子
- D、抗 ss-DNA 抗体
- E、抗核抗体

正确答案: E

(80-81 共用题干) 患者, 男, 33 岁。有不洁性行为史, 尿痛伴尿道分泌物 3 天。查体: 尿道口红肿、附着分泌物且有触痛, 触压尿道可见尿道口乳白色分泌物流出

80.该患者最可能的诊断是

- A、急性膀胱炎
- B、急性肾盂肾炎
- C、淋菌性尿道炎
- D、急性前列腺炎
- E、软性下疳

正确答案: C

解析: 尿道口红肿、附着分泌物或有溃疡, 且有触痛者, 多见于感染所致的尿道炎; 触压淋病性尿道炎患者的尿道可见尿道口乳白色分泌物流出。

81.患者妻子 1 周后出现了明显的尿频, 尿急, 尿痛和外阴烧灼感, 查体不可能出现的表现是

- A、外阴、阴道、尿道口红肿
- B、尿道旁腺有脓性分泌物溢出
- C、外阴局部溃烂, 见菜花样结节
- D、前庭大腺红肿触痛, 可有痿管形成
- E、宫颈充血红肿, 脓液流出

正确答案: C

解析: 其妻为患者淋病感染传染所致, 表现为尿道, 外阴, 内生殖器的淋球菌感染, 因此可以有各种急性淋病感染的局部改变, 而答案 C 是外阴癌的局部表现。

(82-83 共用题干) 患者, 男, 45 岁, 长期饮酒 20 余年, 近期感腹胀明显, 腹围增大来诊

82.腹部触诊下列哪项正确

- A、肝大、压痛
- B、脾大
- C、揉面感
- D、板状腹
- E、以上都不是

正确答案: B

83.该患者腹部视诊有何改变

- A、可见腹壁静脉曲张及肠型
- B、可见蛙状腹及腹壁静脉曲张
- C、可见蛙状腹及蠕动波
- D、右上腹膨隆
- E、腹壁静脉的血流方向是自下而上

正确答案: B

(84-86 共用题干) 患者, 男, 30 岁, 大量饮酒后出现发热, 头痛, 体温持续 39 摄氏度, 咳嗽,

咳铁锈色痰 3 天

84.当前患者体格检查表述正确的是

- A、病变局部呼吸动度增强，语音震颤渐弱，叩诊清音
- B、病变局部语音共振明显增强，叩诊为浊音或实音
- C、病变局部叩诊为清音，支气管呼吸音渐弱，代之以湿啰音
- D、病变局部语音共振减弱，叩诊为浊音或实音
- E、病变局部叩诊为清音，支气管呼吸音渐弱，代之以干啰音

正确答案: B

85.该患者最可能的诊断是

- A、肺梗死
- B、风湿热
- C、大叶性肺炎
- D、慢性支气管炎
- E、阻塞性肺气肿

正确答案: C

86.入院后该患者明确诊断为大叶性肺炎，目前该患者最可能处于什么时期

- A、充血期
- B、淤血期
- C、实变期
- D、液化期
- E、消散期

正确答案: C

(87-90) 共用备选答案

- A、扁平胸
- B、一侧胸廓塌陷
- C、一侧胸廓膨隆
- D、桶状胸
- E、鸡胸

87.佝偻病最常见改变

正确答案: E

88.广泛胸膜增厚可能出现的改变

正确答案: B

89.慢性阻塞性肺疾病常见改变

正确答案: D

90.胸腔积液最可能出现的改变

正确答案: C

(91-94) 共用备选答案

- A、清音
- B、浊音
- C、实音
- D、鼓音
- E、过清音

91.大量气胸叩诊呈

正确答案: D

92.一侧肺不张叩诊呈

正确答案: B

93.一侧肺实变叩诊呈

正确答案: C

94.慢性阻塞性肺疾病叩诊呈

正确答案: E

(95-96) 共用备选答案

A、远端指间关节易受累

B、近端指间关节易受累

C、听小骨易受累

D、跗骨间关节易受累

E、髌髌关节易受累

95.强直性脊柱炎

正确答案: E

96.类风湿关节炎

正确答案: B

97.动脉杂音可见于

A、周围动脉

B、肺动脉

C、冠状动脉

D、微动脉

E、小动脉

正确答案: ABC

98.有关血清铁, 以下论述正确的是

A、是指血清中与转铁蛋白结合的铁

B、是细胞机体铁含量的一种方法

C、作为衡量铁贮存量则比较准确

D、缺铁性贫血时, 常降低

E、再生障碍常升高

正确答案: ABDE

99.心电图 ST 段压低, 可见于

A、心肌缺血发作

B、变异型心绞痛

C、低血钾

D、急性非 ST 段抬高型心肌梗死

E、急性 ST 段抬高型心肌梗死

正确答案: ACD

100.下列哪些疾病可引起全身淋巴结肿大

A、系统性红斑狼疮

B、胸部肿瘤

C、钩端螺旋体病

D、急性化脓性扁桃体炎

E、白血病

正确答案: ACE

1.诊断鼓音的特点是下列各项，但不包括哪一项(1 分)

- A、音响强
- B、如击鼓声
- C、振动持续时间较长
- D、振动持续时间较短
- E、是一种和谐的乐音

正确答案: D

2.引起左心室后负荷增高的因素(1 分)

- A、肺循环高压
- B、体循环高压
- C、回心血量增加
- D、主动脉瓣关闭不全
- E、血细胞比容增大

正确答案: B

3.下列哪项不是心尖区无害性收缩期杂音(1 分)

- A、生理性杂音
- B、尿毒症患者，HGB 58g/L
- C、伤寒高热期患者
- D、甲状腺功能亢进
- E、风湿性心脏病，二尖瓣关闭不全

正确答案: E

4.内脏痛觉的冲动主要是由下列哪种神经传导的(1 分)

- A、三叉神经
- B、面神经
- C、交感神经
- D、迷走神经
- E、听神经

正确答案: C

5.门诊病历包括下列各项内容，但除外(1 分)

- A、要求简明扼要，重点突出
- B、要求主诉、现病史、既往史
- C、要求初步诊断
- D、要求体征
- E、要求个人史、生活史、婚姻史等

正确答案: E

6.费城染色体实质是由（ ）移位所带来的融合基因(1 分)

- A、染色体 8 和 14
- B、染色体 9 和 22
- C、染色体 11 和 16
- D、染色体 12 和 17
- E、染色体 15 和 19

正确答案: B

7.和单纯性甲状腺肿查体不相符的包括(1 分)

- A、甲状腺弥漫性肿大

- B、可闻及“嗡鸣”样血管杂音
- C、甲状腺肿大突出
- D、一般不能触及甲状腺震颤
- E、甲状腺呈结节性肿大

正确答案: B

8.脊柱疾病常采取的体位是(1 分)

- A、被动体位
- B、强迫仰卧位
- C、强迫侧卧位
- D、强迫俯卧位
- E、角弓反张位

正确答案: D

9.诊断肝包虫病具有意义的体征是(1 分)

- A、肝大
- B、肝震颤
- C、肝区触痛
- D、腹腔积液
- E、肝表面有结节感

正确答案: A

10.引起乳糜尿的主要原因是(1 分)

- A、丝虫病
- B、脂肪栓塞
- C、脂肪组织创伤
- D、先天性淋巴管畸形
- E、结核和肿瘤

正确答案: A

11.患者高热，右侧胸痛、咯铁锈色痰。下列哪种体征对诊断有帮助(1 分)

- A、病侧语颤减弱，叩诊浊音，呼吸音弱
- B、病侧语颤减弱，叩诊过清音，呼吸音弱
- C、病侧语颤增强，叩诊鼓音，呼吸音弱
- D、病侧语颤增强，叩诊浊音，呼吸音弱
- E、病侧语颤减弱，叩诊浊音，支气管语音弱

正确答案: D

12.Dubin-Johnson 综合征是由于(1 分)

- A、血清非结合胆红素增加
- B、肝细胞对结合胆红素向毛细胆管排泄障碍
- C、肝细胞摄取非结合胆红素障碍
- D、肝细胞缺乏葡萄糖醛酸转换酶
- E、肝细胞摄取及排泄结合胆红素障碍

正确答案: B

13.下列哪项反映血液中能中和酸性物质的负离子总量(1 分)

- A、P (A-a) O₂
- B、AG
- C、BB

D、TCO₂

E、CaO₂

正确答案: C

14.下列各项均可能产生断续性呼吸音, 但应除外哪一项(1 分)

A、支气管狭窄

B、肺内局部性炎症

C、代谢亢进

D、寒冷疼痛

E、精神紧张

正确答案: C

15.在癌性阻塞性黄疸时几乎百分之百出现的 ALP 同工酶是(1 分)

A、ALP₁

B、ALP₃

C、ALP₄

D、ALP₅

E、ALP₆

正确答案: A

16.皮肤、黏膜可见黄染时, 血中胆红素浓度增高, 常超过下述哪一项数值(1 分)

A、超过 5mg/L

B、超过 10mg/L

C、超过 15mg/L

D、超过 20mg/L

E、超过 25mg/L

正确答案: D

17.下列描述是大量胸腔积液的体征, 但哪项除外(1 分)

A、气管偏移

B、病侧胸部膨满

C、病变部叩诊浊音或实音

D、可听到支气管语音

E、胸膜摩擦音

正确答案: E

18.发汗实验过程中除了需要在皮肤上涂抹碘酊外还必须涂抹以下哪一种物质(1 分)

A、酒精

B、蓝色颜料

C、淀粉

D、毛果芸香碱

E、阿托品

正确答案: C

19.位听神经检查不包括(1 分)

A、听力检查

B、询问患者有无眩晕

C、询问有否夜行困难

D、观察患者有否眼球震颤

E、耳郭检查

正确答案: E

20.患者排出大量稀水样便, 可见于下列中哪一种情况(1 分)

- A、霍乱、副霍乱患者
- B、艾滋病患者伴发肠道隐孢子虫感染时
- C、肠易激综合征病人腹部绞痛后
- D、婴幼儿消化不良时
- E、慢性胃炎、胃潴留患者

正确答案: B

21.骨髓细胞的发育规律中, 细胞胞体由小变大的是下列哪种细胞(1 分)

- A、红细胞
- B、单核细胞
- C、巨核细胞
- D、淋巴细胞
- E、浆细胞

正确答案: C

22.有助于鉴别良性与恶性淋巴细胞增生性疾病的染色法是下列中哪项(1 分)

- A、铁染色
- B、糖原染色
- C、非特异性酯酶染色
- D、特异性酯酶染色
- E、酸性磷酸酶染色

正确答案: B

23.以下不符合远端肾小管性酸中毒 (I 型) 的一项是(1 分)

- A、低钾血症
- B、代谢性酸中毒
- C、高氯血症
- D、尿中可滴定酸及铵离子 (NH_4^+) 增加
- E、钙磷代谢障碍

正确答案: D

24.高调金属音的肠鸣音亢进最常见于(1 分)

- A、消化道出血
- B、腹泻
- C、急性胃肠炎
- D、机械性肠梗阻
- E、服泻药后

正确答案: D

25.下列中属于粪便的化学检验项目的是(1 分)

- A、隐血试验
- B、白细胞检查
- C、肌肉纤维检查
- D、肿瘤细胞检查
- E、脂肪小滴检查

正确答案: A

26.以 Apo-B 为主要成分的是(1 分)

- A、HDL-C
- B、LDL-C
- C、VLDL
- D、CM
- E、Lp (a)

正确答案: B

27.当毛细血管血液的还原血红蛋白超过以下哪个标准时，皮肤黏膜即出现发绀(1 分)

- A、5g/L
- B、10g/L
- C、15g/L
- D、50g/L
- E、75g/L

正确答案: A

28.下列血象中常表现为成熟粒细胞核分叶过多的贫血是哪项(1 分)

- A、缺铁性贫血
- B、溶血性贫血
- C、急性失血性贫血
- D、再生障碍性贫血
- E、巨幼细胞性贫血

正确答案: E

29.下述不是 B 淋巴细胞表面受体的是(1 分)

- A、膜表面免疫球蛋白受体
- B、Fc 受体
- C、绵羊 RBC 受体
- D、补体受体
- E、小白鼠 RBC 受体

正确答案: C

30.长期卧床的老年人，肺底部易听及，咳嗽后可消失的为下列哪一种附加音(1 分)

- A、大水泡音
- B、中水泡音
- C、小水泡音
- D、捻发音
- E、哨笛音

正确答案: D

31.日晒后鼻梁及两侧面颊出现红色斑块，并高起皮肤表面，见于(1 分)

- A、慢性肝病
- B、黑热病
- C、系统性红斑狼疮
- D、酒渣鼻
- E、二尖瓣面容

正确答案: C

32.下列是关于鼻窦的正确描述，但应除外哪一项(1 分)

- A、鼻窦为鼻腔周围不含气的骨质空腔
- B、鼻窦共有四对

- C、各鼻窦皆有窦口与鼻腔相通
- D、鼻窦引流不畅时易于发生炎症
- E、鼻窦炎时可出现鼻塞，流涕，头痛和鼻窦压痛等

正确答案: A

33.在下列关于动脉血二氧化碳分压的描述中，哪项是错误的(1 分)

- A、是判断呼吸衰竭类型与程度的指标
- B、正常值为 35 ~ 45mmHg
- C、是判断呼吸性酸碱平衡失调的指标
- D、可用来判断代谢性酸碱平衡失调的代偿反应
- E、Ⅱ型呼吸衰竭动脉血二氧化碳分压必须小于 50mmHg

正确答案: E

解析：Ⅱ型呼吸衰竭动脉血二氧化碳分压必须大于等于 50mmHg。

34.诊断典型心绞痛，下列哪项最有特征(1 分)

- A、胸痛多在夜间发作
- B、胸痛发作多在 15min 以上
- C、持续左前胸憋闷感
- D、疼痛时心电图示 ST 段抬高
- E、含硝酸甘油 5min 内疼痛消失

正确答案: E

35.主动脉瓣轻度狭窄时瓣口面积为(1 分)

- A、> 1.5cm²
- B、0.75 ~ 1.0cm²
- C、1.1 ~ 1.75cm²
- D、1.76 ~ 2.0cm²
- E、以上都不正确

正确答案: A

36.主动脉瓣狭窄时视诊可见(1 分)

- A、心尖搏动增强，位置可稍移向左下
- B、心尖搏动减弱，位置可稍移向左下
- C、心尖搏动无变化，位置可稍移向左下
- D、心尖搏动增强，位置变化
- E、以上都不正确

正确答案: A

37.与皮肤弹性无关的是(1 分)

- A、年龄
- B、种族
- C、营养状态
- D、皮下脂肪
- E、组织间隙的液体量

正确答案: B

38.造血干细胞首选的免疫标志是(1 分)

- A、CD45
- B、CD38
- C、CD34

D、CD117

E、HLA-DA

正确答案: C

39.各个阶段均有大量粒细胞、主要为中幼粒细胞和晚幼粒细胞的白血病,是(1分)

A、AML

B、CML

C、ALL

D、CLL

E、MDS

正确答案: B

40.免疫球蛋白独特型表位位于(1分)

A、VH/VL

B、CH/CL

C、VH/CH

D、VL/CH

E、VH/CL

正确答案: A

解析:独特型表位位于可变区。

41.现实实验室开展肿瘤标志物检测,其临床意义不包括哪一项(1分)

A、辅助诊断恶性肿瘤

B、观察化疗效果

C、评估患者的预后

D、排除恶性肿瘤

E、肿瘤普查

正确答案: D

42.在凝血过程中将纤维蛋白原转变为纤维蛋白的凝血因子是(1分)

A、因子Ⅱa

B、因子Ⅲ

C、因子Ⅳ

D、因子XⅡa

E、因子XⅢa

正确答案: A

43.匙状甲的特点不包括(1分)

A、指甲中央凹陷

B、指端末梢增生肥厚

C、指甲边缘翘起

D、指甲变薄粗糙

E、干脆有条纹

正确答案: B

44.用来确定肺下界的垂直线常使用下列哪一项标志线(1分)

A、腋前线,腋中线,肩胛线

B、锁骨中线,腋中线,肩胛线

C、腋后线,后正中线,胸骨中线

D、锁骨中线

E、腋前，中，后线

正确答案: B

45.心脏传导系统的构成不包括(1 分)

- A、房室结
- B、希氏束
- C、左后分支
- D、钝缘支
- E、右束支

正确答案: D

46.下列为按呼吸道腔径大小和腔内渗出物的多少而进行的湿啰音分类，但应除外哪一项(1 分)

- A、粗湿啰音
- B、中湿啰音
- C、细湿啰音
- D、捻发音
- E、哨笛音

正确答案: E

47.可引起皮肤苍白的疾病不包括(1 分)

- A、缺铁性贫血
- B、主动脉瓣关闭不全
- C、雷诺病
- D、一氧化碳中毒
- E、血栓闭塞性脉管炎

正确答案: D

48.S1 减弱可见于下列情况，但除外哪一项(1 分)

- A、二尖瓣关闭不全
- B、心肌收缩力减弱
- C、P-R 间期延长时
- D、心动过速使舒张期缩短
- E、心肌病变

正确答案: D

49.高热伴腰背剧痛、肢体运动障碍，最可能的疾病是(1 分)

- A、腰椎结核
- B、风湿热
- C、化脓性脊椎炎
- D、急性胆囊炎
- E、类风湿性关节炎

正确答案: C

50.呼吸频率增快，可见于下述疾病，但除外(1 分)

- A、贫血
- B、甲亢
- C、心功能不全
- D、发热
- E、小量胸腔积液

正确答案: E

51.下列指标中能反映肝组织发生纤维化的指标是(1 分)

- A、AST
- B、CEA
- C、ALP
- D、PH
- E、LDH

正确答案: D

52.下列哪个部位心肌梗死提示左前降支阻塞(1 分)

- A、前壁
- B、侧壁
- C、下壁
- D、后壁
- E、右室

正确答案: A

53.正常人循环血液中嗜酸性粒细胞占白细胞的比例为(1 分)

- A、0.005 ~ 0.05
- B、0.05 ~ 0.5
- C、0.5 ~ 5
- D、0.005 ~ 0.5
- E、0

正确答案: A

54.关于 AST 同工酶的叙述正确的是(1 分)

- A、ASTs 为线粒体 AST
- B、ASTm 为上清液（胞浆）AST
- C、正常血清中大部分为 ASTs
- D、正常血清中主要为 ASTm，ASTs 占 10%以下
- E、肝细胞受到严重损伤时，血清 ASTs 才升高

正确答案: C

55.以下哪一种检查震动觉方法是正确的(1 分)

- A、震动音叉放置于手掌上
- B、震动音叉放置于腓肠肌上
- C、震动音叉放置于外踝上
- D、震动音叉放置于耳旁
- E、震动音叉放置于肱二头肌上

正确答案: C

56.关于红细胞大小可见下列异常，但不包括(1 分)

- A、小 RBC
- B、大 RBC
- C、椭圆形细胞
- D、巨 RBC
- E、RBC 大小不均

正确答案: C

57.关于血管壁的止血机制描述错误的是(1 分)

- A、增强局部血管收缩反应

- B、激活血小板
- C、激活凝血系统
- D、抑制纤溶
- E、降低局部血粘度

正确答案: E

58.临床医师拟给患者进行膝反射检查，以下哪一做法是错误的(1 分)

- A、坐位时小腿完全松弛下垂与大腿呈直角
- B、卧位时膝关节屈曲约 120 度
- C、叩诊髌骨
- D、叩诊股四头肌肌腱
- E、叩诊胫骨

正确答案: E

59.暂时性尿失禁见于下列哪种疾病，除了(1 分)

- A、尿路感染
- B、急性精神错乱性疾病
- C、药物反应
- D、心理性忧郁症
- E、脑卒中

正确答案: E

60.上腹痛病人下述哪项问诊均正确，但除外(1 分)

- A、你上腹痛有多长时间了
- B、能说出痛的性质与特点吗
- C、痛多在什么情况下发病
- D、腹痛时伴有恶心呕吐吗
- E、腹痛什么情况下疼痛加重

正确答案: D

61.新生儿红细胞参考值为(1 分)

- A、 $(5.0 \sim 7.0) \times 10^{12}/L$
- B、 $(6.0 \sim 8.0) \times 10^{12}/L$
- C、 $(7.0 \sim 8.0) \times 10^{12}/L$
- D、 $(6.0 \sim 7.0) \times 10^{12}/L$
- E、 $(6.5 \sim 7.5) \times 10^{12}/L$

正确答案: D

62.肌张力增高最典型的临床表现是(1 分)

- A、触诊时肌肉松软
- B、作被动检查时阻力增加
- C、可自主活动
- D、轮替动作不协调
- E、有舞蹈样动作

正确答案: B

63.下列属于 TXA₂ 生理功能的是(1 分)

- A、抑制腺苷酸环化酶
- B、使 cAMP 生成增多
- C、抑制血小板聚集

- D、扩张血管
- E、腺苷酸环化酶的抑制剂

正确答案: A

64. 低调干啰音的基音频率为下列哪一项(1 分)

- A、50 ~ 100Hz
- B、100 ~ 200Hz
- C、200 ~ 300Hz
- D、300 ~ 400Hz
- E、400 ~ 500Hz

正确答案: B

65. 造血幼稚细胞中有 Auer 小体，可见于(1 分)

- A、巨幼细胞性贫血
- B、慢性白血病
- C、急性白血病
- D、急性淋巴细胞性白血病
- E、急性非淋巴细胞白血病

正确答案: E

66. 体温常在 39℃ 以上，24 小时内波动范围超过 2℃，但体温始终在正常水平以上，此种热型属于(1 分)

- A、回归热
- B、弛张热
- C、稽留热
- D、不规则热
- E、间歇热

正确答案: B

67. 脑性瘫痪患者可能出现(1 分)

- A、剪刀步态
- B、蹒跚步态
- C、跨阈步态
- D、慌张步态
- E、醉酒步态

正确答案: A

68. 精液中为精子提供能量并维持其活动力的物质是(1 分)

- A、葡萄糖
- B、氨基酸
- C、果糖
- D、糖原
- E、蛋白质

正确答案: C

69. 一女性患者进行发汗实验时发现脐水平以下颜色不变，而脐水平以上呈蓝色。这提示以下哪种情况(1 分)

- A、脐水平以上交感神经功能障碍
- B、脐水平以下交感神经功能障碍
- C、脐水平以上迷走神经功能障碍

D、脐水平以下迷走神经功能障碍

E、脐水平以下感觉神经障碍

正确答案: B

70.一男性患者胸髓 9 ~ 10 节段损伤, 神经系统查体可以发现以下哪个体征(1 分)

A、Hoffmann 征阳性

B、上腹壁反射消失

C、中腹壁反射消失

D、脐水平以上痛觉减退

E、Kernig 征阳性

正确答案: C

71.中心性肺癌, 早期常见表现是(1 分)

A、声音嘶哑

B、胸闷、胸痛

C、高热、呼吸困难

D、咳嗽、痰中带血

E、颜面和上肢肿胀

正确答案: D

72.目前认为所有血细胞均起源于下列哪种细胞(1 分)

A、全能干细胞

B、骨髓系干细胞

C、淋巴系干细胞

D、T 淋巴系祖细胞

E、B 淋巴系祖细胞

正确答案: A

73.额面 QRS 心电轴左偏可见于以下情况, 但除外(1 分)

A、左心室肥大

B、心脏左移

C、左前分支传导阻滞

D、膈肌高位

E、左室前壁心肌梗死

正确答案: E

74.正常成年女性红细胞沉降率 (魏氏法) 为(1 分)

A、0 ~ 10mm/1h

B、0 ~ 15mm/1h

C、0 ~ 20mm/1h

D、0 ~ 25mm/1h

E、0 ~ 30mm/1h

正确答案: C

75.尿比重减低可见于以下情况, 但除外(1 分)

A、脱水

B、慢性肾衰竭

C、急性肾衰竭多尿期

D、急性肾衰竭少尿期

E、尿崩症

正确答案: A

76.负性心尖冲动见于(1 分)

- A、腹主动脉瘤
- B、肺心病右室肥大
- C、升主动脉瘤或主脉弓瘤
- D、Broadbent 征
- E、高血压左室肥大

正确答案: D

77.患者，女，34 岁，血脂升高、大量蛋白尿、高度水肿 1 年。查体有少量的腹腔积液。腹腔积液细胞计数常是(1 分)

- A、 $< 50 \times 10^6/L$
- B、 $< 75 \times 10^6/L$
- C、 $< 100 \times 10^6/L$
- D、 $> 100 \times 10^6/L$
- E、 $> 500 \times 10^6/L$

正确答案: C

78.患者，女，30 岁，四肢皮肤反复淤斑 1 年余。查体：肝、脾未及。检查：血红蛋白 $101g/L$ ，白细胞总数 $5 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ ，骨髓：粒、红系统基本正常，巨核细胞增多。最可能的诊断是(1 分)

- A、再生障碍性贫血
- B、免疫性血小板减少性紫癜
- C、急性白血病
- D、溶血性贫血
- E、骨髓增生异常综合征

正确答案: B

79.患者，男，35 岁，农民，2 周前农田劳作时不慎扎伤手掌，简单包扎后未再重视。1 天前因张口困难、走路不稳来就诊。患者就诊时可能的面容是(1 分)

- A、急性病容
- B、慢性病容
- C、伤寒面容
- D、面具面容
- E、苦笑面容

正确答案: E

80.患者，女，26 岁，反复下腰背痛 3 月，伴白带过多，月经正常，最可能的疾病是(1 分)

- A、痛经
- B、卵巢囊肿
- C、宫颈炎
- D、急性脊椎炎
- E、腰骶椎融合

正确答案: C

81.患者，男，32 岁，持续性腹痛阵发性加剧，绞痛，并有恶心，呕吐胃内容物，停止排气排便 2 天。1 年前做过阑尾切除术，术后切口感染，换药 2 周才愈。查体：腹部轻度膨隆，未见肠型无包块，肠鸣音较亢进，偶闻气过水声。诊断首先考虑(1 分)

- A、小肠扭转

- B、肠套叠
- C、乙状结肠扭转
- D、粘连性肠梗阻
- E、蛔虫团梗阻

正确答案: D

82.患者,男,60岁,高血压20年,服药不规律,门诊查P 180/110mmHg,心电图检查最可能的表现是(1分)

- A、P波高耸
- B、P波双峰
- C、V1 R波振幅大于等于1.0mV
- D、 $RV_1 + SV_5 \geq 1.05mV$
- E、 $RV_5 + SV_1 \geq 4.0mV$

正确答案: E

83.尿液检查结果为:外观呈洗肉水样,蛋白(++),RBC 20~30个/HP,WBC 5~7个/HP,RBC管型 0~2个/HP,透明管型 1~2个/HP结合临床,应首先考虑其诊断为(1分)

- A、急性膀胱炎
- B、慢性肾盂肾炎
- C、急性肾盂肾炎
- D、慢性肾小球肾炎
- E、急性肾小球肾炎

正确答案: E

84.患者,男,发现上腹部包块伴消瘦、贫血3月。你认为下列哪种步骤最适宜(1分)

- A、先确定包块位置、性质与脏器关系
- B、立即行胃镜检查
- C、ERCP检查
- D、立即行B超检查
- E、立即做腹部CT检查

正确答案: A

85.患者,男,20岁,病史2周,发热及出血倾向,骨髓象原始细胞>80%,过氧化物酶(3+),Auer小体(+),最可能诊断为(1分)

- A、急性淋巴细胞白血病
- B、急性粒细胞白血病
- C、急性单核细胞白血病
- D、红白血病
- E、慢粒白血病急淋变

正确答案: B

86.患者,男,50岁,外伤后出血不止,BT时间正常,APTT、PT正常,可能的诊断(1分)

- A、XIII缺乏
- B、I缺乏
- C、II缺乏
- D、III缺乏
- E、VII缺乏

正确答案: A

87.患儿,男,10岁。近8天来食欲缺乏、恶心、呕吐、乏力、尿色黄来院就诊,病前两周曾注

射丙种球蛋白一支。检查：巩膜黄染，肝肋下 2.5cm，脾未及，化验：500U/L，胆红素 85.5μmol/L，抗 HAV-IgM (+)，抗 HAV-IgG (+)，HBsAg (+)，HBeAg (+)，抗 HBc-IgM (+)，应诊断为 (1 分)

- A、急性甲型肝炎，乙肝病毒携带者
- B、急性乙型肝炎，既往感染过甲型肝炎
- C、急性甲型肝炎、乙型肝炎
- D、被动获得甲肝抗体，急性甲型肝炎，乙肝病毒携带者
- E、被动获得甲肝抗体，急性乙型肝炎

正确答案: B

88.患者，男，35 岁，腹胀半年，查体：坐位颈静脉充盈，心界不大，心音低钝，心率 92 次/分，律齐、无杂音、两肺呼吸音清动性浊音，下肢凹陷水肿，腹水检查、微黄、清澈、比重 1.016，蛋白 23g/L，细胞数 50 个/mm³、白细胞 45 个/mm³。最可能的诊断(1 分)

- A、门脉性肝硬化
- B、结核性腹膜炎
- C、慢性充血性心力衰竭
- D、缩窄性心包炎
- E、肝硬化并原发性腹膜炎

正确答案: D

89.某患者大量饮酒后突然出现持续性腹痛，伴有恶心、呕吐，最可能的疾病是(1 分)

- A、急性胃炎
- B、消化性溃疡
- C、急性阑尾炎
- D、急性胰腺炎
- E、心绞痛

正确答案: D

90.患者，82 岁，高血压，此次因右侧肢体无力 2 天入院。入院后头颅 MRI 提示存在脑桥梗死。以下哪一项临床体征最有可能出现(1 分)

- A、右侧周围性面瘫，右侧肢体肌力减弱
- B、左侧周围性面瘫，右侧肢体肌力减弱
- C、右侧面部痛觉减退，右侧肢体痛觉减退
- D、左侧面部痛觉减退，左侧肢体痛觉减退
- E、右侧面部痛觉减退，左侧肢体痛觉减退

正确答案: B

91.患者，女，30 岁，出现左侧口角低，左侧耳后疱疹。入院后诊断为左侧亨特综合征。神经系统查体不可能出现以下那一项临床体征(1 分)

- A、左侧鼻唇沟浅
- B、左侧闭眼不紧
- C、左侧口角低
- D、左侧舌前 2/3 味觉丧失
- E、左侧舌后 1/3 味觉丧失

正确答案: E

92.患者，男，42 岁，体检示乙肝系列抗-HBs 阳性。下列说法错误的是(1 分)

- A、是一种保护性抗体
- B、发病后早期出现

- C、发病后 3~6 个月才出现
- D、可持续存在多年
- E、注射过乙型肝炎疫苗或抗-HBs 免疫球蛋白者可阳性

正确答案: B

93.患者,女,32岁,肥胖伴有性功能减退,食欲波动,血压不稳定,尿量增多,考虑肥胖的原因最可能是(1分)

- A、下丘脑肥胖
- B、单纯性肥胖
- C、垂体性肥胖
- D、库欣综合征
- E、间脑性肥胖

正确答案: E

94.患者,女,28岁,淋雨后出现咳嗽,咳铁锈色痰,发热,右侧胸痛。查体:右肺中上野叩诊实音。该患最可能的诊断是(1分)

- A、肺栓塞
- B、大叶性肺炎
- C、气胸
- D、心绞痛
- E、急性左心衰

正确答案: B

95.患者,男,20岁,1周前着凉后轻咳,低热、右胸刺痛,近日来活动后气短。查体:右下胸部叩诊呈浊音,浊音区上方可闻支气管呼吸音,下方呼吸音显著减弱。最可能的诊断是(1分)

- A、大叶性肺炎
- B、渗出性胸膜炎
- C、肺癌
- D、肺气肿
- E、支气管哮喘

正确答案: B

96.患者,男,35岁,半小时前被钢筋刺入右侧胸壁,自觉胸痛,进行性呼吸困难,不能平卧。该患者最有可能出现的体征是(1分)

- A、右侧胸廓塌陷
- B、右侧语音震颤增强
- C、叩诊呈过清音
- D、气管向左侧移位
- E、听诊右肺可闻及干啰音

正确答案: D

97.患者,女,14岁,月经初潮后月经量多,持续时间长,被诊断为先天性血小板无力症,以下哪个环节出现问题(1分)

- A、血小板黏附异常
- B、VIII活性减低
- C、IX活性下降
- D、狼疮抗凝物阳性
- E、血小板聚集异常

正确答案: E

98.患者，男，23岁。突发抽搐2小时，舌体咬伤出血。查体：双侧瞳孔散大，对光反射存在，心肺无异常，该患者最可能的诊断为(1分)

- A、癔症
- B、癫痫大发作
- C、颅内感染
- D、低钙血症
- E、低镁血症

正确答案: B

99.70岁男性患者，排尿困难，尿量减少，滴沥，应首先考虑(1分)

- A、前列腺肥大
- B、尿崩症
- C、肾结石
- D、肾病综合征
- E、糖尿病

正确答案: A

100.患者，女，23岁，2个月前出现晨起双眼睑水肿，查尿常规示RBC 5个/HP，最可能的原因为(1分)

- A、慢性肝病
- B、贫血
- C、肾炎
- D、营养不良
- E、血管神经性水肿

正确答案: C

101.患者，男，26岁，轻度黄疸，肝肋下3.5cm，Hb70g/L，Coombs试验阳性。诊断应先考虑(1分)

- A、黄疸型肝炎
- B、早期肝硬化
- C、缺铁性贫血
- D、肝炎并贫血
- E、自身免疫性溶血性贫血

正确答案: E

102.患者，女，30岁。月经过多4年。若考虑患者体内缺铁时，最早的表现是(1分)

- A、MCV变小
- B、MCH减低
- C、血清铁降低
- D、血清总铁结合力增高
- E、血清铁蛋白降低

正确答案: E

103.患儿，女，6岁，既往诊断为支气管哮喘，1小时前哭闹后，支气管哮喘急性发作，目前该女童体格检查可出现下列体征，除外(1分)

- A、呼吸运动减弱
- B、呼气性呼吸困难
- C、被迫端坐
- D、呈吸气性呼吸困难

E、双肺弥漫干啰音

正确答案: D

104.患者，男，40岁，既往行阑尾切除术，近2月呕吐频繁，脐周可见蠕动波，听诊可闻及高调肠鸣音，下列疾病中哪种可能性大(1分)

A、幽门梗阻

B、十二指肠淤积症

C、小肠梗阻

D、胃潴留

E、胃癌

正确答案: C

105.患者，女，23岁。患厌食症半年，平时进食极少。查体：消瘦貌，皮下脂肪菲薄，心肺无异常。患者血中含量增加的物质主要是(1分)

A、葡萄糖

B、酮体

C、丙戊酸钠

D、乙酰 CoA

E、胆固醇

正确答案: A

106.患者，男，45岁，因“发现右侧颈部肿块15天”入院。入院后完善甲状腺功能检查未见明显异常，甲状腺彩超提示：甲状腺右叶实性低回声光团，大小约1.5cm×2.3cm，边界较清，内部见多个细小钙化点。关于此患者甲状腺的体查，与之可能不相符的是(1分)

A、右侧甲状腺Ⅱ度肿大

B、右侧甲状腺中下级可触及包块

C、右侧甲状腺质硬

D、右侧甲状腺一定可闻及“嗡鸣”样血管杂音

E、右侧甲状腺可无压痛

正确答案: D

(107-108 共用题干) 患儿，男，6岁，因胸廓骨骼发育畸形就诊，明确诊断为佝偻病

107.下列胸廓外形改变不符合该患者的是(1分)

A、鸡胸

B、桶状胸

C、漏斗胸

D、佝偻病串珠

E、肋膈沟

正确答案: B

108.下列胸廓比例描述可存在于该患者的是(1分)

A、1 : 1.3

B、1.2 : 1

C、1 : 1.5

D、1 : 2

E、以上答案均正确

正确答案: B

(109-111 共用题干) 患者，男，50岁，既往有糖尿病，控制不佳，此次因右侧肢体无力、言语不能1小时送入医院。神经系统查体发现右侧肢体仅能在床头一点，不能抬离床面，能按照医

生命完成简单动作，但不能说话

109.该患者最有可能的病变部位是(1 分)

- A、内囊
- B、小脑
- C、额叶皮层
- D、枕叶
- E、颞叶

正确答案: C

110.该患者言语障碍属于(1 分)

- A、感觉性失语
- B、运动性失语
- C、命名性失语
- D、失读
- E、失写

正确答案: B

111.该患者肌力属于(1 分)

- A、0 级
- B、1 级
- C、2 级
- D、3 级
- E、4 级

正确答案: C

(112-113 共用题干) 患者，你，27 岁，与人殴斗后出现下腹部疼痛，肉眼血尿，此后逐渐出现排尿困难。既往体健

112.为明确诊断，首选的检查手段是(1 分)

- A、泌尿系 B 超
- B、膀胱镜
- C、腹部 CT
- D、腹部 X 线平片
- E、尿常规镜检

正确答案: A

113.首先应采取的处理措施是(1 分)

- A、急诊手术
- B、膀胱造瘘
- C、逆行性尿道造影
- D、急查膀胱镜
- E、试插导尿管

正确答案: E

(114-116 共用题干) 患者，男，67 岁。夜间尿频半年余，排尿困难 2 个月。B 超检查：双肾未见占位性病变，膀胱充盈良好，前列腺 4.5cm×4cm×3cm 大小，残余尿量 120ml

114.如果最大尿流率 < 10ml/s，膀胱顺应性尚好，治疗方法最好采取(1 分)

- A、药物治疗
- B、开放手术
- C、经尿道电切术

D、局部放疗

E、局部理疗

正确答案: C

115.最可能的诊断是(1 分)

A、神经源性膀胱

B、膀胱过度活动症

C、前列腺增生

D、膀胱肿瘤

E、尿道狭窄

正确答案: C

116.首先要做的检查是(1 分)

A、CT

B、MRI

C、经直肠 B 超

D、尿流动力学

E、腹部 X 线平片

正确答案: D

(117-119 共用题干) 患者, 女, 32 岁, 5 年前行剖宫产术, 3 年前行阑尾切除术, 3 天前不洁饮食后感腹胀, 中下腹明显, 呕吐胆汁, 近 1 天未排便, 呕吐物有粪臭

117.为明确诊断, 首选检查(1 分)

A、大便常规

B、腹部 X 片

C、腹部 B 超

D、胃镜

E、肠镜

正确答案: B

118.最可能的诊断是(1 分)

A、急性胃肠炎

B、急性肠穿孔

C、尿路结石

D、幽门梗阻

E、低位小肠梗阻

正确答案: E

119.此时最应注意的腹部体征是(1 分)

A、移动性浊音是否阳性

B、腹部有否包块

C、肠鸣音

D、肝浊音界是否消失

E、胃肠型及蠕动波

正确答案: C

(120-121 共用题干) 患者, 60 岁, 因视力障碍急诊入院。临床一线医生神经系统查体发现患者意识清楚, 言语流利, 右侧肢体肌力 3 级, 右侧偏身痛觉减退, 右侧巴氏征阳性

120.上级医生查房时再次给患者进行神经系统查体发现: 除了右侧偏瘫、右侧偏身痛觉减退外还存在着一个临床体征, 构成了“三偏征”。以下哪一项属于上级医生发现的临床体征(1 分)

- A、双眼右侧同象偏盲
- B、双眼左侧同象偏盲
- C、左侧肢体肌力减弱
- D、左侧痛觉减退
- E、右侧脑膜刺激阳性

正确答案: A

121.该患者最有可能的损伤定位是(1 分)

- A、脊髓
- B、左侧基底节区
- C、右侧基底节区
- D、额叶皮质
- E、枕叶皮质

正确答案: B

(122-123 共用题干) 张某, 男, 40 岁, 双腕关节、双手掌指关节肿胀、疼痛 6 月余, 查 ESR 45mm/h, RF 540IU/ml

122.如果上述患者 X 线检查发现腕关节关节间隙变窄, 则患者最可能的诊断是(1 分)

- A、系统性红斑狼疮
- B、干燥综合征
- C、类风湿关节炎
- D、骨关节炎
- E、风湿性关节炎

正确答案: C

123.最有助于诊断的实验室检查为(1 分)

- A、ANA
- B、ENA 谱
- C、抗 CCP 抗体
- D、HLA-B27
- E、血清铁蛋白

正确答案: C

(124-125 共用题干) 患者, 女, 33 岁。突发左侧外阴部疼痛 2 天, 伴发热, 全身无力。查体: 左侧外阴大阴唇下方, 阴道口前局部红肿热痛明显, 触之有波动感

124.该患者诊断最可能是(1 分)

- A、急性膀胱炎
- B、急性尿道炎
- C、小阴唇炎
- D、急性前庭大腺炎
- E、阴道炎

正确答案: D

125.患者经抗生素治疗后局部症状缓解, 自行停药, 局部形成了 1cm×0.8cm 大小的硬结, 质中, 无痛, 其最可能的原因是(1 分)

- A、局部炎症复发
- B、外阴癌
- C、脓肿形成
- D、囊肿形成

E、阴唇肥大

正确答案: D

(126-128 共用题干) 患者, 男, 16 岁, 1 天前摔到后出现右膝关节血肿, 自幼有反复自发出血史, 体查浅表淋巴结无肿大, 皮肤黏膜无淤点、淤斑, 右踝关节肿胀, 活动受限, 辅检活化部分凝血活酶时间延长, 凝血酶原时间正常

126.如本患者诊断为血友病 B, 则会出现(1 分)

A、FVIII促凝活性明显减低

B、FIX 相关抗原轻度减少

C、FIX 促凝活性明显减低

D、血小板功能异常

E、FIX 促凝活性明显升高

正确答案: C

127.假如此患者为 vWD, 除下列哪项外均正确(1 分)

A、出血时间延长

B、血小板黏附功能降低

C、vWF : Ag 减少

D、vWF : Ag 增多

E、口服阿司匹林、潘生丁均可使出血加重

正确答案: D

128.下列哪组试验对确诊血友病最有价值(1 分)

A、FVIII活性测定, FVIII : Ag 测定, vWF : Ag 测定

B、FVIII活性测定, FIX 活性测定, FXI活性测定

C、FVIII : Ag 测定, vWF 活性测定, vWF : Ag 测定

D、FVIII : Ag 测定, FIX : Ag 测定, vWF : Ag 测定

E、FIX 活性测定, FIX : Ag 测定, vWF : Ag 测定

正确答案: A

(129-131) 共用备选答案

A、开瓣音

B、心包叩击音

C、肿瘤扑落音

D、生理性 S1

E、收缩期喀喇音

129.心房黏液瘤患者可闻及(1 分)

正确答案: C

130.二尖瓣狭窄患者可闻及(1 分)

正确答案: A

131.二尖瓣脱垂患者可闻及(1 分)

正确答案: E

(132-135) 共用备选答案

A、病因诊断

B、病理解剖诊断

C、病理生理诊断

D、疾病的分型与分期

E、并发症诊断

132.风湿性心瓣膜病并发亚急性感染性心内膜炎属于哪种诊断(1 分)

正确答案: E

133.肝硬化失代偿期属于哪种诊断(1 分)

正确答案: D

134.肾小球肾炎属于哪种诊断(1 分)

正确答案: B

135.肠结核属于哪种诊断(1 分)

正确答案: A

(136-138) 共用备选答案

A、Austin Flint 杂音

B、Graham Steell 杂音

C、Kussmaul 征

D、Roth 斑

E、Osler 结节

136.严重主动脉关闭不全合并左室肥大时可闻及(1 分)

正确答案: A

137.二尖瓣狭窄伴肺动脉扩张时可闻及(1 分)

正确答案: B

138.缩窄性心包炎可出现(1 分)

正确答案: C

(139-142) 共用备选答案

A、递增型杂音

B、递减型杂音

C、递增递减型杂音

D、连续型杂音

E、一贯型杂音

139.二尖瓣关闭不全时杂音呈(1 分)

正确答案: E

140.二尖瓣狭窄时杂音呈(1 分)

正确答案: A

141.主动脉瓣关闭不全时杂音呈(1 分)

正确答案: B

142.主动脉狭窄时杂音呈(1 分)

正确答案: C

(143-144) 共用备选答案

A、呕血伴上腹痛

B、呕血伴脾脏肿大

C、两者均有

D、两者均无

143.肝硬化门脉高压(1 分)

正确答案: B

144.消化性溃疡(1 分)

正确答案: A

145.患者，男性，65 岁，饮酒史 30 年，反复厌油、纳差、乏力半年，加重伴腹胀 1 周。B 超示：

肝右叶缩小，门静脉 15mm，腹腔见液性暗区。查体可能出现(1 分)

- A、手掌大小鱼际红斑
- B、上胸部毛细血管扩张
- C、肝震颤
- D、乳房发育
- E、面色灰暗

正确答案: ABDE

146.现病史应包括下列哪些项目(1 分)

- A、起病情况及患病时间
- B、手术情况
- C、主要症状特点
- D、诊疗经过
- E、伴随症状

正确答案: ACDE

147.脉压增大可见于下列哪种疾病(1 分)

- A、甲状腺功能亢进症
- B、主动脉瓣关闭不全
- C、主动脉瓣狭窄
- D、心包积液
- E、严重心力衰竭

正确答案: AB

148.COPD 时常见的心电图表现包括(1 分)

- A、Ⅱ，Ⅲ，aVF 导联 P 波振幅大于 0.25mV
- B、Ⅰ，Ⅱ，aVL 导联 P 波呈双峰型
- C、V1 导联 R/S \geq 1
- D、心电轴右偏 S \geq 90 度
- E、V1~V6 导联呈 rS 型

正确答案: ADE

149.宽 QRS 波可见于(1 分)

- A、室性心动过速
- B、室上性心动过速伴室内差异性传导
- C、室上性心动过速经房室旁路前传
- D、经房室旁路前传的房室折返性心动过速
- E、室上速原来存在室内传导延迟

正确答案: ABCDE

150.正常粪便显微镜检查可见到下列哪些成分(1 分)

- A、白细胞
- B、红细胞
- C、淀粉颗粒
- D、脂肪颗粒
- E、植物纤维

正确答案: ACDE

1.对结核性关节炎，描述错误的是(1 分)

- A、儿童与青壮年多见
- B、不出现关节畸形
- C、伴有低热、盗汗
- D、负重大关节易受累
- E、有时有窦道形成

正确答案: B

2.请问以下哪个凝血因子不是蛋白质(1 分)

- A、Ⅰ因子
- B、Ⅱ因子
- C、Ⅲ因子
- D、Ⅳ因子
- E、Ⅴ因子

正确答案: D

3.心电图一般不能反映心肌细胞的(1 分)

- A、自律性
- B、兴奋性
- C、传导性
- D、收缩性
- E、节律性

正确答案: D

4.肝脏弥漫性肿大常见于哪些疾病除外(1 分)

- A、病毒性肝炎
- B、肝淤血
- C、脂肪肝
- D、血吸虫病
- E、肝硬化

正确答案: E

5.下列哪项属于现病史内容(1 分)

- A、社会经历
- B、职业及工作条件
- C、习惯嗜好
- D、生育史
- E、诊疗经过

正确答案: E

6.新生儿易患呼吸道以及胃肠道感染的原因是(1 分)

- A、补体成分缺陷
- B、联合免疫缺陷
- C、皮肤黏膜的天然屏障差
- D、分泌型 IgA 功能尚未成熟
- E、呼吸道胃肠道发育不良

正确答案: D

解析：强调“新生儿”医患疾病的常见原因。

7.第二心音固定分裂最常见于(1 分)

- A、室间隔缺损
- B、动脉导管未闭
- C、房间隔缺损
- D、右束支传导阻滞
- E、左束支传导阻滞

正确答案: C

8.下列哪项不属于肾性少尿的病因(1 分)

- A、肾病综合征
- B、急性肾小球肾炎
- C、慢性肾小球肾炎
- D、间质性肾炎
- E、急性肾小管坏死

正确答案: A

9.长颅畸形见于(1 分)

- A、甲状腺功能减退症
- B、佝偻病
- C、马方综合征
- D、脑积水
- E、囟门闭合过早

正确答案: C

解析: 长颅(delichocephalia)表现自颅顶至下颌部的长度明显增加, 见于 Marfan 综合征及肢端肥大症。

10.常见可能引起如下心电图改变的药物不包括(1 分)

- A、美托洛尔
- B、地尔硫卓
- C、利多卡因
- D、普鲁卡因胺
- E、地高辛

正确答案: C

11.呼气性呼吸困难形成的机理主要是(1 分)

- A、肺泡弹性减弱和小支气管狭窄阻塞所致
- B、肺部病变广泛, 呼吸面积减少, 影响肺换气功能所致
- C、呼吸肌极度用力, 胸腔负压增大, 形成“三凹征”
- D、迷走神经兴奋性增高, 心肌供血减少, 降低心功能
- E、淤血性肝大, 胸水、腹水使呼吸运动受限

正确答案: A

12.胃溃疡发生癌变时疼痛的特征为(1 分)

- A、饭后痛加剧
- B、空腹痛加重
- C、疼痛节律性不明显
- D、疼痛减轻
- E、夜间痛加重

正确答案: C

13.伤寒患者发病第一周内分离病原菌应采取的标本是(1 分)

- A、血液
- B、尿液
- C、粪便
- D、呕吐物
- E、脑脊液

正确答案: A

解析: 此时为菌血症期。

14.咯血与呕血的鉴别点, 不包括(1 分)

- A、呕血多为呕出, 咯血是咳出
- B、呕血的血液呈酸性, 咯血的血液呈弱酸性
- C、呕血前常有上腹部不适、恶心、呕吐, 咯血前常有喉痒、胸闷
- D、呕血为暗红色、棕褐色, 咯血多为鲜红
- E、呕血后无痰, 咯血后常有血痰数日

正确答案: B

15.下列哪项结果不符合溶血性贫血(1 分)

- A、尿中胆红素阴性而尿胆原增多
- B、红细胞减少, 网织红细胞数明显增高
- C、红细胞形态可正常, 而寿命缩短
- D、骨髓内幼红细胞明显减少
- E、血中胆红素, 黄疸指数增高而肝功能正常

正确答案: D

16.有关问诊的重要性, 错误的是(1 分)

- A、全面问诊适用于住院患者
- B、重点问诊主要应用于门诊和急诊
- C、问诊可以获得有关诊断的大多数线索和依据
- D、感冒、支气管炎、心绞痛等疾病通过问诊就可以诊断
- E、初学者可以从重点问诊开始

正确答案: E

17.ICSH 推荐测定 Hb 的首选方法是(1 分)

- A、沙利氏酸化法
- B、碱羟高铁血红蛋白法
- C、十二烷基硫酸钠法
- D、氰化高铁血红蛋白法
- E、叠氮高铁血红蛋白法

正确答案: D

18.头部外伤后, 常扪及头皮下波动的是(1 分)

- A、皮下血肿
- B、脉状腱膜下血肿
- C、骨膜下血肿
- D、皮下积液
- E、皮下积脓

正确答案: B

19.下列哪项可引起低钾血症(1 分)

- A、钾输入过多

- B、急性肾衰竭
- C、少尿
- D、烧伤
- E、严重腹泻，呕吐

正确答案: E

20.下面哪种情况很少出现 P 波在 II、III、aVF 导联 $> 2.5\text{mm}$ (1 分)

- A、COPD
- B、高钾血症
- C、肺动脉高压
- D、肺栓塞
- E、肺动脉瓣狭窄

正确答案: B

21.膝反射的中枢位于(1 分)

- A、胸髓 7~8 节段
- B、颈髓 6~7 节段
- C、腰髓 2~4 节段
- D、骶髓 1~2 节段
- E、脑干

正确答案: C

22.下列为胸部叩诊方法正确的描述，但应除外哪一项(1 分)

- A、叩诊时板指应平贴于肋间隙并与肋骨平行
- B、叩击力量要均匀，轻重应适宜
- C、以右手中指的指端短而稍快的速度重复叩击板指
- D、正确的叩诊前臂应尽量固定不动
- E、每次叩击 2~3 下，主要由肘关节予以实现

正确答案: E

23.风湿性多形性红斑属于下列哪种皮疹(1 分)

- A、斑疹
- B、玫瑰疹
- C、丘疹
- D、斑丘疹
- E、荨麻疹

正确答案: A

24.肺气肿或肺心病患者可出现(1 分)

- A、 PaO_2 下降
- B、 PaCO_2 上升
- C、 PaCO_2 下降
- D、A 和 B
- E、以上都不是

正确答案: D

25.下列关于方颅的描述正确的是(1 分)

- A、以颅骨增大变形为特征
- B、自颅顶到下颌部的长度明显增大
- C、可伴有长骨的骨质增厚与弯曲

- D、可见于佝偻病
- E、见于变形性骨炎

正确答案: D

26.下列机制中哪种不是心脏杂音产生的机制(1 分)

- A、血流减速
- B、瓣膜口狭窄或关闭不全
- C、异常血流通道
- D、大血管瘤样扩张
- E、瓣膜口关闭不全

正确答案: A

27.下列有关心源性水肿特点错误的是(1 分)

- A、从足部开始，向上延及全身
- B、发展较缓慢
- C、可有体循环淤血的其他表现
- D、伴有心脏增大，心脏杂音
- E、非压陷性水肿

正确答案: E

28.总补体检测的 CH50 试验的曲线为(1 分)

- A、线性直线型
- B、双曲线型
- C、抛物线型
- D、S 形曲线
- E、正态分布曲线

正确答案: D

29.对上消化道出血病人首选的检查手段是(1 分)

- A、吞线试验
- B、钡餐检查
- C、钡剂灌肠
- D、内镜检查
- E、胃液分析

正确答案: D

30.QRS 波增宽大于 () 时需考虑 CRT 治疗(1 分)

- A、110ms
- B、120ms
- C、125ms
- D、130ms
- E、135ms

正确答案: D

31.弥散量是指(1 分)

- A、FEV1
- B、MMEF
- C、PEF
- D、DLCO
- E、MVV

正确答案: D

32.关于柏油样便的叙述, 下列中正确的是见于(1 分)

- A、下消化道出血
- B、镜下可见大量完整红细胞
- C、肉眼为黑色, 有金属光泽
- D、见于直肠癌
- E、见于痔疮

正确答案: C

33.下列各项中合乎要求的主诉是(1 分)

- A、经常头痛、乏力、四肢麻木
- B、反射性呕吐伴腹泻
- C、气管炎 10 年
- D、刺激性咳嗽
- E、反复发作性上腹痛 2 年, 加重 3 天

正确答案: E

34.体温上升期的表现有下列各种, 除外(1 分)

- A、皮肤发红
- B、皮肤苍白
- C、畏寒或寒战
- D、疲乏无力
- E、肌肉酸痛

正确答案: A

35.单一肢体瘫痪为(1 分)

- A、单瘫
- B、交叉瘫
- C、偏瘫
- D、截瘫
- E、肌肉瘫

正确答案: A

36.心包积液听诊特点(1 分)

- A、心音听诊低钝而遥远
- B、听诊胸膜摩擦音
- C、二尖瓣听诊区舒张期喀拉音
- D、三尖瓣听诊区收缩期喀拉音
- E、主动脉瓣听诊区收缩期喀拉音

正确答案: A

37.脊柱的各节段中, 活动度最大的是(1 分)

- A、颈椎段
- B、胸椎段
- C、腰椎段
- D、骶椎段
- E、尾椎段

正确答案: A

38.下列是关于胸骨角的描述, 哪项是不正确的(1 分)

- A、恰与第二肋软骨相连，为计算肋骨顺序的标志
- B、标志着气管分叉
- C、相当于第4胸椎水平
- D、由胸骨柄与胸骨体相交处向前隆起而成
- E、还标志着心房上缘，上、下纵隔交界处

正确答案: C

39.关于肝界叩诊下列各项均正确，但除外(1分)

- A、正常肝上界在右锁骨中线上第5肋间
- B、肝上下径在右锁骨中线上为9~11cm
- C、右腋中线上，其上界为第8肋间
- D、右肩胛线上，其上界为第10肋间
- E、叩诊肝下界比触得的肝下缘高1~2cm

正确答案: C

40.下列疾病常出现干性咳嗽，但除外哪一项(1分)

- A、急性咽喉炎
- B、急性支气管炎初期
- C、胸膜炎
- D、支气管扩张合并感染
- E、间质性肺炎

正确答案: D

41.下列是二尖瓣狭窄杂音听诊的特点，但应除外哪一项(1分)

- A、心尖部舒张中、晚期隆隆样杂音
- B、杂音为递增型，左侧卧位或运动后明显
- C、音调低，常伴有舒张期震颤
- D、杂音可向左腋下传导
- E、可伴有第一心音亢进，或二尖瓣开瓣音

正确答案: D

42.下列局部淋巴结肿大的原因均正确，但除外哪一项(1分)

- A、急性化脓性扁桃体炎
- B、淋巴结结核
- C、恶性肿瘤淋巴结转移
- D、传染性单核细胞增多症
- E、慢性牙龈炎

正确答案: D

43.皮肤定位觉障碍常见于以下哪一部位损伤(1分)

- A、脊髓后索
- B、脊髓丘脑前束
- C、脊髓丘脑侧束
- D、三叉丘系
- E、大脑皮质

正确答案: E

44.Rh阳性是指红细胞膜上含有(1分)

- A、C抗原
- B、A抗原

C、D 抗原

D、E 抗原

E、B 抗原

正确答案: C

45.气管移位的判断，下列哪项不正确(1 分)

A、胸腔大量积液、积气时，气管偏向健侧

B、胸膜肥厚粘连，气管移向患侧

C、纵隔肿瘤，气管可移向健侧

D、肺纤维化，气管移向患侧

E、心脏重度肥大或大量心包积液，气管移向健侧

正确答案: E

46.单侧眼睑闭合障碍见于(1 分)

A、甲状腺功能亢进症

B、面神经麻痹

C、角膜炎

D、结膜炎

E、沙眼

正确答案: B

47.脑脊液若因穿刺损伤引起出血的标本的特点是(1 分)

A、第 1、2、3 管红色逐渐变淡

B、第 1、2、3 管红色逐渐变深

C、第 1、2、3 管红色无变化

D、第 1、3 管红色，第 2 管无色

E、第 1 管无色，第 2、3 管红色

正确答案: A

48.腹部触诊发现肝大时，用手压迫肝脏时出现颈静脉怒张更明显，称为肝-颈静脉回流征阳性，表示存在的疾病的征象是(1 分)

A、右心衰竭肝淤血征

B、肝硬化门脉高压征

C、上腔静脉阻塞综合征

D、下腔静脉阻塞综合征

E、肝静脉阻塞综合征

正确答案: A

49.甲亢眼症哪项应除外(1 分)

A、眼球突出

B、Graefe 征

C、眼睑水肿

D、Stellwag 瞬目减少

E、MoBius 征，辐辏运动减弱

正确答案: C

50.下列哪项不是满月脸典型表现(1 分)

A、面如满月

B、皮肤发红

C、皮肤黝黑

D、痤疮

E、多毛症

正确答案: C

51.肝病面容是(1 分)

A、面色苍白，颜面水肿

B、面色晦暗，额部有褐色色素沉着

C、面色苍白，表情疲惫

D、面色灰暗，双颊发红，口唇发绀

E、表情淡漠，反应迟钝呈无欲状态

正确答案: B

52.骨髓系干细胞在造血微环境及造血刺激因子的调控下，不能分化为下列哪种细胞(1 分)

A、红系祖细胞

B、T 淋巴系祖细胞

C、嗜酸粒祖细胞

D、嗜碱粒祖细胞

E、巨核系祖细胞

正确答案: B

53.以下哪项不是结肠镜检查的适应证(1 分)

A、原因不明的便血

B、原因不明的慢性腹泻

C、X 线钡餐灌肠检查疑有结肠息肉或肿瘤者

D、急性菌痢

E、结肠癌术后随访

正确答案: D

54.下列各项除哪项外均可见嗜碱性粒细胞增多(1 分)

A、慢性粒细胞性白血病

B、骨髓纤维化症

C、慢性溶血

D、脾切除术后

E、寄生虫感染

正确答案: E

55.原发性血小板增多症患者做血小板功能测定时不会出现哪种变化(1 分)

A、对胶原的反应减低

B、血小板致密颗粒减少

C、血浆中 vWF 活性降低

D、血小板膜 α 受体减少

E、环氧化酶代谢途径增强，导致 TXA₂ 增多

正确答案: A

56.眼睑水肿不见于以下哪种(1 分)

A、肾炎

B、血管神经性水肿

C、贫血

D、营养不良

E、甲状腺功能亢进症

正确答案: E

57.血清铁减低, 总铁结合力增高及转运铁蛋白饱和度减低见于(1 分)

- A、海洋性贫血
- B、感染性贫血
- C、缺铁性贫血
- D、再生障碍性贫血
- E、铁粒幼细胞性贫血

正确答案: C

58.易发生 DIC 的白血病是(1 分)

- A、AML-M1
- B、ALL-L2
- C、AML-M5
- D、AML-M3
- E、CML-BC

正确答案: D

59.关于 IgG 的特性, 下列说法错误的是(1 分)

- A、唯一能通过胎盘的抗体
- B、可引起 II、III 型超敏反应
- C、是血清中含量最低的 Ig
- D、再次免疫应答产生的主要抗体
- E、介导 ADCC 作用

正确答案: C

60.最能反映门脉高压的表现是(1 分)

- A、腹水
- B、脾大
- C、痔核
- D、腹壁静脉曲张
- E、食道下段静脉曲张

正确答案: E

61.头皮检查不包括(1 分)

- A、头发
- B、头皮颜色
- C、头皮屑
- D、有无头癣、疖痈
- E、有无外伤、血肿、瘢痕

正确答案: A

62.心电图记录纸一般采用的走纸速度为 (), 横坐标每毫米间距相当于(1 分)

- A、25mm/s, 20ms
- B、25mm/s, 40ms
- C、50mm/s, 40ms
- D、50mm/s, 20ms
- E、25mm/s, 50ms

正确答案: B

63.常见可引起该心电图改变的情况不包括(1 分)

- A、冠状动脉粥样硬化性心脏病
- B、二尖瓣狭窄
- C、肺栓塞
- D、主动脉瓣狭窄
- E、部分正常人可见

正确答案: D

64.胸膜摩擦感可于下列哪个时相触及(1 分)

- A、吸气早期
- B、呼吸两相均可
- C、呼气末
- D、屏气时
- E、咳嗽时

正确答案: B

65.不能作为急性及早期肝损伤的指标是(1 分)

- A、ALT
- B、血清蛋白电泳
- C、AST
- D、GGT
- E、前白蛋白

正确答案: B

66.下列关于发绀的说法中错误的是(1 分)

- A、发绀常发生在皮肤菲薄，色素较少和毛细血管丰富的部位
- B、发绀严重程度能确切反映血氧下降情况
- C、高铁血红蛋白血症常引起明显发绀，但一般无呼吸困难
- D、重度贫血患者常无口唇发绀表现
- E、血液中硫化血红蛋白达到 0.5g/dL 即可出现发绀

正确答案: B

67.不会减慢心率的药物是(1 分)

- A、倍他乐克
- B、地高辛
- C、硝苯地平
- D、维拉帕米
- E、比索洛尔

正确答案: C

68.血浆脂质组成包括(1 分)

- A、胆固醇，胆固醇酯，三酰甘油、LP
- B、胆固醇，三酰甘油，游离脂肪酸
- C、胆固醇，磷脂，三酰甘油， β -羟丁酸
- D、胆固醇，磷脂，三酰甘油、LP
- E、胆固醇，胆固醇酯，三酰甘油，游离脂肪酸

正确答案: E

69.以下哪项最支持心包积液的诊断(1 分)

- A、脉压大
- B、奇脉

C、ECG 肢导电压低

D、心音弱

E、心界向两侧扩大

正确答案: E

70.主动脉瓣关闭不全可出现下述血管体征, 但除外哪一项(1 分)

A、水冲脉

B、毛细血管搏动

C、点头运动

D、射枪音

E、颈静脉搏动

正确答案: E

71.不能刺激机体组织产生自身抗体的抗原是(1 分)

A、经化学修饰的组织抗原

B、与正常组织成分有交叉反应的外来抗原

C、隔绝的体内自身成分

D、自身细胞 HLA-DR 抗原的表达

E、高分化的组织抗原

正确答案: E

72.能引起凝血功能障碍的疾病为(1 分)

A、维生素 K 缺乏

B、维生素 B 缺乏

C、维生素 C 缺乏

D、单纯性紫癜

E、再生障碍性贫血

正确答案: A

73.以下哪项不是造成急性主动脉瓣关闭不全的病因(1 分)

A、主动脉夹层

B、人工撕裂伤

C、胸部顿挫性创伤

D、感染性心内膜炎

E、强直性脊柱炎

正确答案: E

74.关于肝功检查中的参考值正确的是(1 分)

A、TP 60 ~ 90g/L

B、A 30 ~ 55g/L

C、ALT 0 ~ 60u/L

D、G 20 ~ 30g/L

E、A/G 1.5 ~ 2.5 : 1

正确答案: D

75.下列中除哪种情况外均可出现少尿或无尿(1 分)

A、慢性肾盂肾炎

B、心力衰竭

C、休克

D、肾动脉栓塞

E、严重脱水

正确答案: A

76.系统回顾时循环系统应包括哪项(1 分)

A、有无咳嗽、咯血

B、有无腹痛、腹泻

C、有无尿痛、尿急

D、有无头痛、失眠

E、有无四肢麻木

正确答案: A

77.患者，男，70 岁，痰中带血二个月，X 线示右上肺不张。下步哪项检查应为首选(1 分)

A、CT

B、断层

C、纤支镜

D、开胸检查

E、痰细胞学检查

正确答案: C

78.患者，男，62 岁，上腹痛 10 余年，向腰背部放射，弯腰可减轻，左上腹压痛，可能的诊断是(1 分)

A、慢性胆囊炎

B、慢性胰腺炎

C、胰腺癌

D、慢性胃炎

E、肾结石

正确答案: C

79.患者，男，酗酒 20 年，腹部逐渐胀大 1 个月，伴气短，平卧时加重。你认为查体可出现下列体征，但除外(1 分)

A、腹部振水音阳性

B、腹部有液波震颤

C、移动性浊音阳性

D、肝肋下 3 厘米

E、脾大肋下 3 厘米

正确答案: A

80.患者，女，56 岁，意识不清一天，新鲜排出的尿有烂苹果味，提示患者为(1 分)

A、膀胱癌

B、慢性尿潴留

C、慢性膀胱炎

D、苯丙酮尿症

E、糖尿病酮症酸中毒

正确答案: E

81.患者，男，60 岁，吸烟 40 年，反复咳嗽、咳痰 15 年，5 天前出现发热，咳嗽、咳痰加重，呼吸困难。查体：体温 38.6℃，呼吸 23 次/分，心率 101 次/分，血压 148/67mmHg，入院血气分析提示：pH 7.37，PO₂ 55mmHg，PCO₂ 73mmHg，应暂给予何种氧疗(1 分)

A、高流量给氧

B、低流量给氧

- C、间断给氧
- D、面罩给氧
- E、纯氧给氧

正确答案: B

82.患者,男,77岁,吸烟50年,常年咳嗽、咳痰,近10年出现活动性呼吸困难、并进行性加重。明确诊断为慢性支气管炎合并肺气肿,该患者呼吸运动(1分)

- A、一侧加强
- B、双侧加强
- C、一侧减弱
- D、双侧减弱
- E、不对称加强

正确答案: D

83.患者,男,42岁,心累气短3月,查体:BP 145/45mmHg。心界左侧大,主动脉瓣副区舒张早期高调叹气样递减杂音,则下列说法错误的是(1分)

- A、可见水冲脉
- B、心界呈靴形心
- C、可闻及 Austin Flint 杂音
- D、杂音在身体左侧位更加明显
- E、可有头晕、胸痛症状

正确答案: D

解析:患者具有典型的主动脉瓣关闭不全的杂音,故此水冲脉,靴型心,AF杂音均为典型体征,伴有脑部供血不足症状,出现头晕、胸痛。杂音在身体前倾位明显而不是左侧卧位明显。

84.患者,男,43岁,既往健康,餐后突然出现皮肤黏膜青紫,伴意识障碍,无明显呼吸困难,经过吸氧,皮肤黏膜青紫不减,采静脉血化验时,发现其呈深棕色,作首先考虑是下列何种疾病(1分)

- A、脑出血
- B、高铁血红蛋白血症
- C、急性重症胰腺炎
- D、大量误吸
- E、急性肺水肿

正确答案: B

85.患者,男,17岁,近1月疲乏、纳差。就查乙肝系列如下HBsAg、HBeAg、抗-HBc、抗-HBc-IgM、抗-HBe、抗-HBs:++++--最可能诊断是(1分)

- A、HBV复制停止
- B、急性或慢性乙型肝炎,HBV复制活跃
- C、既往HBV感染,未产生抗-HBs
- D、接种乙型肝炎疫苗后
- E、急性HBV感染早期,HBV复制活跃

正确答案: B

86.患者,男,50岁。查体发现血压160/90mmHg。血脂检查正常。则该患者的三酰甘油的测定值可能是(1分)

- A、0.22~0.55mmol/L
- B、0.56~1.7mmol/L
- C、1.8~1.9mmol/L

D、2.0~2.3mmol/L

E、2.4~2.9mmol/L

正确答案: B

87.患者,男,55岁,气短、胸闷15天,查体:气管向左侧移位,右侧胸廓饱满、呼吸运动减弱、语音震颤消失,右侧叩诊呈实音,右侧听诊呼吸音消失。该患者最可能的诊断是(1分)

A、左侧肺不张

B、右侧胸腔积液

C、大叶性肺炎

D、右侧气胸

E、右侧肺不张

正确答案: B

88.患者,女,23岁,半月前发热,治疗2天后体温正常,3天前胸闷、气短,心慌,诊断为心肌炎,最合适的主诉(1分)

A、发热2天,胸闷、气短3天

B、间断发热半月,胸闷、气短3天

C、间断发热半月,心悸、胸闷3天

D、心悸、胸闷3天

E、发热半月,心悸、胸闷3天

正确答案: D

89.老年卵巢癌患者,因皮肤淤斑、血尿就诊,查PT正常,APTT延长,APTT纠正试验不能纠正,请问原因可能是(1分)

A、I因子抗体形成

B、II因子抗体形成

C、III因子抗体形成

D、VII因子抗体形成

E、VIII因子抗体形成

正确答案: E

90.患儿,男,5岁。查体见脊柱后凸,活动受限。该患者最可能的诊断是(1分)

A、佝偻病

B、类风湿性关节炎

C、强直性脊柱炎

D、胸椎结核

E、脊髓退行性变

正确答案: A

91.患者,男,19岁,近1个月来,每次进食后上腹绞痛,伴恶心呕吐胃内容物,膝胸位时腹痛及呕吐明显缓解,最可能的诊断是(1分)

A、急性阑尾炎

B、十二指肠壅积症

C、消化性溃疡

D、急性胰腺炎

E、腹型癫痫

正确答案: B

92.患者,老年男性,进行性黄疸2个月伴中上腹持续性疼痛,夜间平卧明显,消瘦。查体:慢性消耗性病容,皮肤巩膜黄染,腹平坦。脐上偏右深压痛,Courvoisier征阳性,未及异常包块。

该患诊断首先考虑(1 分)

- A、慢性胆囊炎
- B、胆道结石
- C、原发性肝癌
- D、胰头癌
- E、胃癌

正确答案: D

93.患者，男，40 岁，间歇性上腹痛 3 年，未予系统治疗，近日出现呕吐，每天呕吐 3 次，呕吐后自觉舒适，能继续进食，呕吐物有酸臭味。查体：上腹饱满，压之不适，有振水音，诊断考虑为(1 分)

- A、消化性溃疡合并幽门梗阻
- B、十二指肠淤滞症
- C、胃癌
- D、急性单纯性胃炎
- E、神经性呕吐

正确答案: A

94.患者，男，28 岁，寒战、高热、咳嗽，临床诊断为大叶性肺炎充血期，下列可能出现的体征是(1 分)

- A、语音震颤增强
- B、两肺呼吸音强
- C、叩诊过清音
- D、明显支气管呼吸音
- E、两肺散在干性啰音

正确答案: A

95.患者，女，54 岁，因发现心动过缓 20 天来院门诊。查体：心界不大，心率：42 次/分，律齐，有时可闻及 S1 极响似大炮音，最可能的诊断是(1 分)

- A、心房颤动
- B、心房扑动
- C、窦性心动过缓
- D、I°房室传导阻滞
- E、III°房室传导阻滞

正确答案: E

96.患者，女，40 岁，无诱因发热 2 天后热退，出现食欲减退，恶心、厌油、稀便、尿黄来诊。查体：巩黄 (+)，肝大肋下 1.0cm 触痛 (+)，脾未及，胆囊区压痛 (-)，总胆红素 90 μ mol/L，直接胆红素 30mmol/L，尿胆原 (+)，尿胆红素 (+)，最可能的诊断是(1 分)

- A、急性肝炎致梗阻性黄疸
- B、急性肝炎致肝细胞黄疸
- C、溶血性黄疸
- D、DuBin-Johnson 综合征
- E、胆石症致梗阻性黄疸

正确答案: B

97.患者，女，58 岁，无明显诱因下出现骨痛、头痛，伴听力丧失，X 线提示典型 Paget 病征象，该患者最可能出现(1 分)

- A、方颅

- B、小颌
- C、尖颌
- D、变形颌
- E、巨颌

正确答案: D

98.患者，青年男性，30岁，间断发热、咽痛1周就诊，查体：T 37.9℃，咽红，可见双侧扁桃体Ⅱ度肿大，则可见双侧扁桃体(1分)

- A、不可见
- B、不超过咽腭弓
- C、达到咽后壁中线
- D、超过咽后壁中线
- E、超过咽腭弓

正确答案: E

99.患者，男，69岁，既往存在冠心病并行冠脉支架植入术，术后长期服用拜阿司匹林药物，现有皮肤紫癜现象，不会受到影响的是(1分)

- A、束臂试验
- B、血小板黏附率
- C、出血时间
- D、血块收缩试验
- E、TM测定

正确答案: E

100.患者，女，38岁，体重指数38，全身多处可触及皮下结节，有触痛，同时出现停经，伴性功能减退，最可能的诊断是(1分)

- A、Dercum综合征
- B、Frohlich综合征
- C、Laurence-Moon-Biedl综合征
- D、Stein-Leventhal综合征
- E、Pickwickian综合征

正确答案: A

101.患者，男，24岁，反复酱油色尿伴头迷、心悸2年，查体：贫血貌，巩膜黄染，肝脾不大，胆囊区无压痛，血清总胆红素64μmol/L，直接胆红素6μmol/L，尿胆红素(-)，尿胆原(+)，最可能的诊断是(1分)

- A、溶血性黄疸
- B、肝细胞性黄疸
- C、梗阻性黄疸
- D、Rotor综合征
- E、Gilbert综合征

正确答案: A

102.患者，男，64岁。1年中突发心悸2次，此次发作20分钟，心电图示：R-R规则，频率180次/分，QRS时间0.09s，既往曾怀疑预激综合征，则心悸最可能诊断为(1分)

- A、窦性心动过速
- B、阵发性室性心动过速
- C、阵发性室上性心动过速
- D、心房颤动

E、非阵发性交界性心动过速

正确答案: C

103.患者，男，46岁，上腹偏右饥饿痛反复3年，近5天呕宿食。查体：腹部振水音。最可能的诊断是(1分)

- A、胰腺炎
- B、胆囊炎
- C、胃炎
- D、肠梗阻
- E、幽门梗阻

正确答案: E

104.患者，男，58岁。原因不明腹部包块1个月。查体：触及肝肋下4cm，剑突下6cm，边缘厚薄不一，表面高低不平，质硬如石，触痛阳性。首先考虑(1分)

- A、肝硬化
- B、肝淤血
- C、急性肝炎
- D、肝脓肿
- E、原发性肝癌

正确答案: E

105.患者，男，40岁，反复上腹部不适10年，近2月呕吐频繁，查体上腹部可见蠕动波，振水音阳性，其呕吐物的性状是(1分)

- A、黄绿色液体
- B、咖啡色液体
- C、鲜血
- D、酸酵食物
- E、带粪臭味

正确答案: D

106.患者，男，58岁，双下肢水肿、腹围明显增加2周。乙型肝炎病史15年。查体发现腹壁静脉曲张呈海蛇头样。以下体征中最有诊断意义的是(1分)

- A、肝大
- B、颜面水肿
- C、肝颈静脉回流征阴性
- D、移动性浊音阳性
- E、颈静脉怒张

正确答案: C

(107-108 共用题干) 患者，男，70岁，进行性排尿困难10年，夜尿3~4次，从未药物治疗。直肠指检：前列腺体积增大，中央沟消失，表面尚光滑，质地中等。B超：双肾无积水，输尿管未见扩张。最大尿流率10ml/s

107.首先考虑的疾病是(1分)

- A、膀胱结石
- B、膀胱颈部痉挛
- C、前列腺癌
- D、前列腺增生
- E、神经源性膀胱

正确答案: D

108.首选的治疗方法是(1 分)

- A、膀胱造瘘
- B、根治性前列腺切除
- C、口服多杀坐骑+非那雄胺
- D、经尿道前列腺切除术
- E、膀胱切开取石

正确答案: D

(109-110 共用题干) 患者, 男, 65 岁。反复发生晕厥 1 周, 既往体健, 无不良嗜好, 发作前自述有胸闷症状, 无心慌、胸痛, 每次意识丧失持续约 1 分钟, 无肢体瘫痪, 无大小便失禁, 动态心电监测示窦性心动过速, 偶发房性期前收缩, 脑 CT 未见异常

109.为明确诊断最需要的辅助检查是(1 分)

- A、肺 CTA
- B、脑 MRA
- C、冠状动脉造影
- D、脑电图
- E、心脏彩超

正确答案: A

110.该患者最不可能的诊断是(1 分)

- A、快速性室性心律失常
- B、急性脑梗死
- C、短暂性脑缺血发作
- D、阿-斯综合征
- E、急性肺栓塞

正确答案: B

(111-113 共用题干) 患者, 女, 76 岁, 因“乏力伴皮肤淤点 1 月”就诊。查体: 皮肤黏膜苍白, 胸骨无压痛, 四肢及躯干皮肤散在淤点, 肝脾未及肿大, 余无异常

111.问诊时哪一项意义不大(1 分)

- A、是否有诱因及伴随症状
- B、药物使用史
- C、既往疾病史
- D、生育史
- E、家族史

正确答案: D

112.患者的诊断最有可能是(1 分)

- A、过敏性紫癜
- B、免疫性血小板减少性紫癜
- C、再生障碍性贫血
- D、血管性血友病
- E、凝血因子缺乏

正确答案: C

113.患者出血的机制是(1 分)

- A、血管壁缺陷
- B、血小板数量和功能异常
- C、凝血因子活性降低或缺乏

D、血液循环内存在抗凝物质

E、纤溶亢进

正确答案: B

(114-115 共用题干) 患者, 女, 25 岁, 发现血尿 3 周, 既往经常有咽炎发作。体查: BP 145/95mmHg 下肢未见凹陷性水肿。血肌酐 $88\mu\text{mol/L}$, 尿 RBC 20~25 个/HP, 异性红细胞 80%

114.患者肾脏病理结果光镜下可见系膜细胞增生, 基质增多, 呈局灶阶段性分布免疫荧光可见肾小球系膜弥漫颗粒状 IgA 沉积。该患者最可能的诊断是(1 分)

A、膜增生性肾炎

B、IgA 肾病

C、微小病变性肾病

D、膜性肾病

E、新月体肾炎

正确答案: B

115.为明确诊断, 需要进一步采取的检查是(1 分)

A、ANCA

B、肾盂造影

C、肾活检

D、腹部立位平片

E、尿培养

正确答案: C

(116-117 共用题干) 患者, 女, 48 岁, 分娩三次, 曾因尿失禁行尿道悬吊手术治疗, 术后尿失禁症状未解除, 出现明显尿急。患者由此精神极度紧张。尿常规检查正常

116.患者检查残余尿量为 225ml。根据患者情况, 宜采取的治疗方法是(1 分)

A、自我间歇导尿法

B、耻骨上膀胱穿刺引流

C、手术拆除吊带

D、心理治疗

E、口服抗胆碱能药物

正确答案: A

117.首先考虑哪种类型尿失禁(1 分)

A、混合性尿失禁

B、压力性尿失禁

C、充盈性尿失禁

D、急迫性尿失禁

E、真性尿失禁

正确答案: D

(118-119 共用题干) 患者, 男, 40 岁, 与人打仗后就诊, 查体可见右侧前胸壁局部血肿, 胸部 CT 可见右侧大量胸腔积液, 约 800ml, 胸腔内未见气体存在

118.关于该患者, 下列说法正确的是(1 分)

A、气管移向左侧

B、右下肺语音震颤增强

C、右下肺呼吸音增强

D、心尖搏动右移

E、右侧肋间隙缩窄

正确答案: A

119.该患者端坐位右下侧叩诊可闻及(1 分)

- A、清音
- B、过清音
- C、鼓音
- D、实音
- E、浊鼓音

正确答案: D

(120-123 共用题干) 患者, 男, 36 岁, 近 1 年感心悸、怕热、手颤、乏力, 体重下降 11 千克, 近 3~4 天大便不成形。查体: 脉搏 90 次/分, 血压 128/80mmHg, 皮肤潮湿, 双手细颤, 甲状腺弥漫性 II 度肿大, 可闻及血管杂音, 心率 104 次/分, 律不齐, 心音强弱不等, 腹平软, 肝脾肋下未扣及, 双下肢无水肿

120.患者不应出现下列何种眼部体征(1 分)

- A、瞬目减少
- B、眼球下转时上睑不能相应下垂
- C、集合运动减弱
- D、上视时无额纹出现
- E、对光反射消失

正确答案: E

121.患者最可能的诊断是(1 分)

- A、甲状腺功能亢进症
- B、甲状腺腺瘤
- C、甲状腺癌
- D、甲状腺炎
- E、单纯性甲状腺肿

正确答案: A

122.患者可能出现的眼部体征有(1 分)

- A、复视
- B、麻痹性斜视
- C、眼球突出
- D、眼球下陷
- E、眼球震颤

正确答案: C

123.【假设信息】患者一直未服药治疗, 自行出院, 出院后与家人争吵后逐渐出现谵妄, 胡言乱语, 两小时后浅昏迷, 六小时后深昏迷, 再次急诊入院, 此时患者可能出现的重要眼部体征为(1 分)

- A、患者注视 1m 以外的目标, 当目标逐渐移近眼球, 患者双眼逐渐内聚
- B、患者注视 1m 以外的目标, 当目标逐渐移近眼球, 患者瞳孔逐渐缩小
- C、当眼受到光线刺激后, 瞳孔立即缩小, 移开光源后, 瞳孔迅速复原
- D、当眼受到光线刺激后及移开光源后, 瞳孔无明显变化
- E、患者双侧瞳孔不等大

正确答案: D

(124-125 共用题干) 黄某, 男, 18 岁, 下腰背痛 3 年, 静息时加重, 活动后减轻, 偶有足跟痛。其父有类似病史, 已驼背

124.该患者最有诊断意义的检查是(1 分)

- A、骨盆平片
- B、腰椎 X 线
- C、跟骨骨密度
- D、ESR
- E、RF

正确答案: A

125.假如查 HLA-B27 阳性, 骨盆平片提示双侧骶髂关节模糊, 间隙变窄。该患者最可能的诊断是(1 分)

- A、结核性脊柱炎
- B、腰椎间盘突出症
- C、强直性脊柱炎
- D、腰肌劳损
- E、类风湿关节炎

正确答案: C

(126-128 共用题干) 患者, 男, 30 岁, 有尿频、尿急、尿痛等症状, 并且尿道口有脓性分泌物, 脓性分泌物涂片革兰染色镜检发现大量白细胞, 在白细胞内发现革兰阴性双球菌

126.为保证感染组织中有效浓度, 血药浓度应该达到(1 分)

- A、致病细菌 MIC
- B、致病细菌 MIC1 倍以上
- C、致病细菌 MIC2 倍以上
- D、致病细菌 MIC3 倍以上
- E、致病细菌 MIC4 倍以上

正确答案: C

127.下列最适合用于经验治疗的抗生素是(1 分)

- A、青霉素 G
- B、四环素
- C、氨苄西林
- D、大观霉素
- E、阿莫西林

正确答案: D

128.最可能感染的病原菌是(1 分)

- A、金黄色葡萄球菌
- B、淋病奈瑟菌
- C、梅毒螺旋体
- D、溶血链球菌
- E、表皮葡萄球菌

正确答案: B

(129-131) 共用备选答案

- A、假性血小板减少
- B、血小板生成障碍所致血小板减少
- C、血小板破坏加速所致的血小板减少
- D、血小板异常分布和储存
- E、血小板捕获导致的血小板减少

129.脾脏长大导致血小板减少的机制(1 分)

正确答案: D

130.大量输血导致血小板减少的机制为(1 分)

正确答案: D

131.再生障碍性贫血患者血小板减少的机制为(1 分)

正确答案: B

(132-136) 共用备选答案

A、大叶性肺炎

B、支气管哮喘

C、慢性阻塞性肺气肿

D、大量气胸

E、大量胸腔积液

132.青年人，发热 3 天。查体：正常胸廓，左侧语音震颤增强，左肺叩诊呈浊音，左肺听诊呼吸音减弱，左肺可闻及湿啰音。最可能的疾病是(1 分)

正确答案: A

133.青壮年，低热 1 个月，伴有盗汗，右侧胸痛，呼吸困难 7 天，查体：右侧胸廓饱满，右侧语音震颤减弱，右肺叩诊呈浊音，右肺呼吸音减弱，未闻及干湿啰音，最可能的疾病是(1 分)

正确答案: E

134.老年人，常年咳嗽，咳痰，呼吸困难，查体：桶状胸，语音震颤减弱，叩诊过清音，未闻及干湿啰音，最可能得疾病是(1 分)

正确答案: D

135.青年人，剧烈咳嗽后出现右侧胸痛，呼吸困难，查体：瘦长型，扁平胸，右侧语音震颤减弱，右肺叩诊呈鼓音，右肺呼吸音减弱，未闻干湿啰音，最可能得疾病是(1 分)

正确答案: D

136.儿童，发作性呼吸困难，查体：正常胸廓，语音震颤渐弱，叩诊清音，听诊呼吸音减弱，可闻及弥漫干啰音，最可能的疾病是(1 分)

正确答案: B

(137-139) 共用备选答案

A、0 级

B、1 级

C、2 级

D、3 级

E、4 级

137.检查发现患者肢体能抬离床面，但不能对抗阻力。考虑肌力为(1 分)

正确答案: D

138.检查时发现患者肢体仅见肌肉收缩，未见动作。考虑肌力为(1 分)

正确答案: B

139.检查发现患者肢体能对抗一定的阻力，但较正常稍差。考虑肌力为(1 分)

正确答案: E

(140-144) 共用备选答案

A、心悸 3 月，加重 2 天

B、3 年前发现风湿性心脏病

C、吸烟 30 年

D、2 月前心电图提示心动过速，频发室早

E、父亲患高血压

140.属于既往史(1 分)

正确答案: B

141.属于现病史(1 分)

正确答案: D

142.属于个人史(1 分)

正确答案: C

143.属于主诉(1 分)

正确答案: A

144.属于家族史(1 分)

正确答案: E

145.参与咳嗽动作的肌肉有(1 分)

A、咽肌

B、肋间肌

C、膈肌

D、腹直肌

E、腰大肌

正确答案: ABCD

146.下列组合哪项是正确的(1 分)

A、过敏性紫癜-BT 延长

B、血友病 A-PT 延长

C、ITP-凝血酶原消耗不良

D、再障-CT 延长

E、DIC-D 二聚体阳性

正确答案: ACE

147.关于头颅的叙述, 正确的是(1 分)

A、用软尺自前额中点绕到颅后通过枕骨粗隆, 测其周径

B、头颅的发育与年龄相关

C、矢状缝和其他颅缝大多在生后 6 个月内骨化

D、颅缝骨化过早会影响脑的发育

E、头颅的检查应注意大小、外形变化及运动时的异常

正确答案: BCDE

148.有关血清铁, 以下论述正确的是(1 分)

A、是指血清中与转铁蛋白结合的铁

B、是细胞机体铁含量的一种方法

C、作为衡量铁贮存量则比较准确

D、缺铁性贫血时, 常降低

E、再生障碍常升高

正确答案: ABDE

149.个人史包括(1 分)

A、生活习惯

B、烟酒嗜好

C、冶游史

D、长期居住地

E、食物过敏史

正确答案: ABCD

150. 下列支持 I 型肾小管酸中毒的是(1 分)

A、高氯性代谢性酸中毒

B、伴有低血钙低血钠及心律失常

C、由近端肾小管酸化功能障碍引起

D、碳酸氢钠重吸收试验中尿 HCO_3^- 部分排泄率大于 15%

E、患者曾长期服用含汞制剂

正确答案: AC

1.正常心脏传导系统哪一部分传导比较缓慢(1 分)

- A、窦房结
- B、结间束
- C、房室结
- D、左右束支
- E、浦肯野纤维

正确答案: C

2.严重的酸中毒产生的深长呼吸称为(1 分)

- A、Cheyne-Stokes 呼吸
- B、Biots 呼吸
- C、抑制性呼吸
- D、Kussmaul 呼吸
- E、叹息样呼吸

正确答案: D

3.用于监测哮喘患者病情的指标是(1 分)

- A、用力肺活量
- B、PEF 日变异率
- C、支气管激发实验
- D、支气管舒张实验
- E、肺泡通气量

正确答案: B

4.月经史和生育史不包括(1 分)

- A、月经初潮年龄
- B、月经周期和经期天数
- C、经血的量和天数
- D、妊娠与生育次数
- E、配偶健康状况及性生活情况

正确答案: E

5.稍隆起皮肤表面的苍白色或红色的局限性水肿是(1 分)

- A、斑疹
- B、玫瑰疹
- C、丘疹
- D、荨麻疹
- E、疱疹

正确答案: D

6.有关脊椎压迫症腰背痛的特点，不正确的是(1 分)

- A、脊柱活动、咳嗽时疼痛减轻
- B、疼痛常沿一根或多根脊神经后根分布区放射
- C、疼痛剧烈，呈烧灼样或绞榨样痛
- D、常有颈背痛或腰痛
- E、有一定定位性疼痛，并可有感觉障碍

正确答案: A

7.慢性阻塞性肺疾病晚期病人常呈何种胸廓改变(1 分)

- A、扁平胸

- B、漏斗胸
- C、鸡胸
- D、桶状胸
- E、畸形胸

正确答案: D

8.医生检查病人的四肢及关节时要注意的内容可以不包括(1 分)

- A、检查四肢及关节的形态
- B、检查肢体、关节的位置
- C、检查四肢、关节的皮肤变色时间
- D、检查四肢、关节的活动度
- E、检查四肢、关节的运动情况

正确答案: C

9.关于支气管哮喘的描述哪项是正确的(1 分)

- A、呈吸气性呼吸困难
- B、呼气位
- C、两肺叩诊呈过清音
- D、语音共振稍增强
- E、Kronig 峡消失

正确答案: C

10.确定胸腔积液量的多少，最准确的检查是(1 分)

- A、X 线胸片
- B、超声波
- C、体层摄影
- D、胸腔穿刺
- E、叩诊所见

正确答案: B

11.下列中除外哪一项均可见中性粒细胞减少(1 分)

- A、流感
- B、风疹
- C、放射性核素照射后
- D、流行性出血热
- E、水痘

正确答案: D

12.问诊时，下列哪些问题不合适(1 分)

- A、你怎么吃那样脏的食物
- B、你腹痛多长时间了
- C、胸痛的具体位置在哪
- D、有没有呕吐
- E、有没有咽痛

正确答案: A

13.下列关于急性淋巴细胞白血病描述正确的是(1 分)

- A、FAB 形态学分类 L3 型是以小细胞为主，核染色质较粗
- B、POX 染色阳性率 > 3%，NAP 积分降低
- C、骨髓象中以分化较好的小淋巴细胞为主

- D、白血病细胞胞质中较易见到 Auer 小体
E、骨髓象中原始和幼稚淋巴细胞为主，常易见涂抹细胞

正确答案: E

14.下列哪项不是血管内皮细胞分泌的抗凝物质(1 分)

- A、t-PA
B、PGI₂
C、硫酸乙酰肝素
D、vWF
E、TM

正确答案: D

15.关于中性粒细胞减少，下列哪一项正确(1 分)

- A、 $< 2 \times 10^9/L$
B、 $< 1.5 \times 10^8/L$
C、 $< 4 \times 10^9/L$
D、 $< 4 \times 10^8/L$
E、 $< 1.5 \times 10^9/L$

正确答案: E

16.Cullen 征是指(1 分)

- A、脐周围发蓝
B、左腰部呈蓝色
C、下腹部紫纹
D、脐周簇状曲张静脉
E、系腰带部位皮肤发黑

正确答案: A

17.食管癌转移常出现(1 分)

- A、左锁骨上窝淋巴结肿大
B、右锁骨上窝淋巴结肿大
C、腋窝淋巴结肿大
D、颈部淋巴结肿大
E、腹股沟淋巴结肿大

正确答案: A

18.皮肤划痕实验中白色划痕持续超过 5 分钟提示(1 分)

- A、交感神经兴奋性增强
B、迷走神经兴奋性增强
C、交感神经麻痹
D、感觉神经损伤
E、运动神经损伤

正确答案: A

19.斜颈不见于以下哪种疾病(1 分)

- A、颈肌外伤
B、瘢痕收缩
C、先天性斜颈
D、颈肌痉挛
E、重症肌无力

正确答案: E

20.核常偏于一侧，染色质呈车轮状的细胞是(1 分)

- A、淋巴细胞
- B、嗜碱性粒细胞
- C、浆细胞
- D、组织细胞
- E、单核细胞

正确答案: C

21.AFP > 500μg/L 持续升高 1 个月以上时，下列中最有意义的诊断是(1 分)

- A、病毒性肝炎
- B、肝硬化
- C、胆管癌
- D、原发性肝癌
- E、转移性肝癌

正确答案: D

22.关于知情同意书，描述正确的是(1 分)

- A、经治医师可委托实习医师告知
- B、同意书一份放入病历
- C、患者直系亲属无需提供授权委托书
- D、对进行医疗美容的患者，无需签署知情同意书
- E、医师签名不能签缩写

正确答案: E

23.颈部肿块在下列哪个部位应考虑甲状腺腺瘤(1 分)

- A、颈前区中下部，随吞咽上，下活动
- B、颈侧区
- C、颈前区
- D、锁骨上窝
- E、颈前区中区随伸舌而活动

正确答案: A

24.低钙血症患者心电图表现下列哪项描述是错误的(1 分)

- A、QT 间期延长
- B、ST 段延长
- C、T 波不会延长
- D、出现 u 波
- E、心率变快

正确答案: D

25.下列哪种疾病腹部呈蛙腹(1 分)

- A、肝硬化腹水
- B、结核性腹膜炎
- C、巨大卵巢囊肿
- D、足月妊娠
- E、畸胎瘤

正确答案: A

26.下列各种原因引起皮肤黏膜出血的特点均正确，但除外哪一项(1 分)

- A、毛细血管壁缺陷出血多为皮肤的淤点、淤斑
- B、毛细血管壁缺陷出血较少见软组织、血肿及内脏出血
- C、血小板异常所致的出血多表现为软组织血肿
- D、凝血因子缺乏引起的出血常有内脏，肌肉出血
- E、凝血障碍所致出血常有家族史或肝脏病史

正确答案: C

27.不伴有胸膜粘连中等胸腔积液，下列哪项体征是不正确的(1 分)

- A、积液区上方有 Damoiseau 线
- B、积液区后上方可有 Garland 三角
- C、健侧可见 Grocco 三角
- D、病侧可见 Grocco 三角
- E、可有 Skoda 叩响

正确答案: D

28.由凝血障碍引起皮肤、黏膜出血见于下列疾病，但除外哪一项(1 分)

- A、血友病
- B、低凝血酶原血症
- C、维生素 K 缺乏症
- D、过敏性紫癜
- E、严重肝疾病

正确答案: D

29.下列骨髓象描述哪一项最符合巨幼红细胞性贫血(1 分)

- A、增生明显减低
- B、粒红比值增高
- C、红系显著增生出现各阶段巨幼红细胞
- D、成熟红细胞大小不等中空淡染
- E、成熟红细胞中易见小红细胞环形红细胞

正确答案: C

30.关于便血下列叙述哪一项是正确的(1 分)

- A、粪便颜色为黄色可断定无便血
- B、下消化道出血时，血便多为暗红色
- C、上消化道出血时，血便均为柏油样便
- D、服用铋剂、铁剂后粪便隐血试验阳性
- E、急性出血坏死性肠炎粪便呈果酱样脓血便

正确答案: B

31.关于胃肠蠕动下列各项均正确，但除外(1 分)

- A、胃蠕动波自左肋缘下开始
- B、胃蠕动波常于右腹直肌下消失
- C、小肠梗阻蠕动波多见于脐部
- D、结肠远端梗阻肠型多位于腹周边
- E、胃蠕动波常缓慢地向左推进

正确答案: E

32.醋酸纤维膜电泳 γ 球蛋白参考值是(1 分)

- A、0.03 ~ 0.04
- B、0.61 ~ 0.71

C、0.06 ~ 0.10

D、0.09 ~ 0.18

E、0.07 ~ 0.11

正确答案: D

33.下列哪种疾病周围血片上不出现幼稚红细胞(1 分)

A、急性粒细胞白血病

B、急性失血后贫血

C、再生障碍性贫血

D、溶血性贫血

E、骨髓纤维化

正确答案: C

34.下列关于胆红素代谢的叙述, 正确的是(1 分)

A、其乙烯基与葡萄糖醛酸结合

B、在生理 pH 下, 其双葡萄糖醛酸酯有两个阴离子基团

C、葡萄糖醛酸酯在肠中转化

D、在葡萄糖醛酸酶的作用下与葡萄糖醛酸结合

E、血胆红素易通过肾脏排出体外

正确答案: B

35.下列疾病均可出现肝界下移, 但除外(1 分)

A、内脏下垂

B、肺气肿

C、右侧胸腔大量积液

D、右侧气胸

E、亚急性重型肝炎

正确答案: E

36.下列哪项是呼气性呼吸困难的特点(1 分)

A、呼吸频率增快、变浅

B、常有呼吸音减弱或消失

C、常有湿性啰音

D、常表现“三凹征”

E、呼吸时间延长

正确答案: E

37.急性冠脉综合征患者接受肝素抗凝治疗, 请问患者应监测哪一个指标(1 分)

A、纤维蛋白原

B、D 二聚体

C、TT

D、APTT

E、PT

正确答案: D

38.肿大的甲状腺与颈前其他包块的鉴别, 下列哪项最重要(1 分)

A、甲状腺表面光滑

B、甲状腺肿大的程度多在胸锁乳突肌以内

C、甲状腺多呈弥漫性、对称性肿大

D、甲状腺可随吞咽动作向上移动

E、甲状腺位于甲状软骨下方

正确答案: D

39.对系统性红斑狼疮患者的关节痛描述错误的是(1 分)

A、四肢大小关节均可出现肿痛

B、关节伸面有类风湿结节

C、查抗 CCP 抗体阴性

D、不会遗留关节畸形

E、可以伴有晨僵

正确答案: B

40.瞳孔扩大是由下列哪种神经调节的(1 分)

A、副交感神经

B、交感神经

C、视神经

D、展神经

E、三叉神经

正确答案: B

41.下列疾病中除哪种外均可引起粒细胞减少(1 分)

A、Gaucher 病

B、流行性出血热

C、流行性感冒

D、脾功能亢进

E、SLE

正确答案: B

42.患者疑似大叶性肺炎，下列哪项是该病最常见的病原体(1 分)

A、病毒

B、支原体

C、肺炎链球菌

D、肺炎克雷伯杆菌

E、金黄色葡萄球菌

正确答案: C

43.患者明确诊断为右肺中心型肺癌，右肺不张，该患者叩诊音可能为(1 分)

A、清音

B、鼓音

C、过清音

D、浊鼓音

E、实音

正确答案: E

44.以下哪一项是脑膜刺激征检查内容(1 分)

A、直腿抬高实验

B、Babinski 征

C、Kernig 征

D、Oppenheim 征

E、Romberg 征

正确答案: C

45.下述哪一种细胞产生和释放白细胞致热原的量最多(1 分)

- A、单核细胞
- B、嗜酸粒细胞
- C、肝脏星形细胞
- D、淋巴细胞
- E、神经胶质细胞

正确答案: A

46.Chromosome changes in hematologic neoplasms are(1 分)

- A、present in AL but not MPD or MDS
- B、nonrandom
- C、associated with a poor outcome
- D、not usually present
- E、associated with a good outcome

正确答案: B

47.下列何种疾病嗜酸性粒细胞增高的更为显著(1 分)

- A、支气管哮喘
- B、荨麻疹
- C、钩虫感染
- D、湿疹
- E、银屑病

正确答案: C

48.下列属于肠道正常菌群的是(1 分)

- A、大肠埃希氏菌
- B、双歧杆菌
- C、乳酸杆菌
- D、优杆菌属
- E、以上都对

正确答案: E

49.关于头围在发育阶段的变化错误的是(1 分)

- A、新生儿约 34cm
- B、出生后的前半年增加 8cm，后半年增加 3cm
- C、第 2 年增加 5cm
- D、4 ~ 10 岁共增加 1.5cm
- E、18 岁以后几乎不再变化

正确答案: C

50.关于主诉的叙述，下列哪项不恰当(1 分)

- A、患者感受最主要的痛苦
- B、最明显的症状或体征
- C、本次就诊最主要的原因
- D、需要症状加其持续时间
- E、医师对患者的诊断用于

正确答案: E

51.关于大叶性肺炎实变期体征的描述哪项正确(1 分)

- A、气管移向健侧

- B、病侧语颤减弱
- C、患侧胸部膨满
- D、支气管语音增强
- E、肺肝界上移

正确答案: D

52. 机体缺乏 IgM 易患(1 分)

- A、反复呼吸道感染
- B、化脓性感染
- C、巨球蛋白血症
- D、革兰阴性细菌败血症
- E、重链病

正确答案: D

53. 由血小板异常引起皮肤黏膜出血可见于下列哪种疾病(1 分)

- A、血友病
- B、维生素 K 缺乏症
- C、血管性紫癜
- D、遗传性出血性毛细血管扩张症
- E、脾功能亢进症

正确答案: E

54. I 型肾小管酸中毒实验室检查的主要表现(1 分)

- A、高氯性酸中毒、高钾血症、尿呈酸性
- B、高氯性酸中毒、低钾血症、尿呈碱性
- C、高氯性酸中毒、低钾血症、尿呈酸性
- D、高氯性酸中毒、低钾血症、尿呈酸碱不定、氨基酸尿、糖尿
- E、高氯性酸中毒、肾功能不全、尿呈酸性

正确答案: B

55. 符合过敏性紫癜的实验室检查是(1 分)

- A、血小板减少
- B、出血时间延长
- C、凝血时间延长
- D、血块收缩不良
- E、毛细血管脆性试验可阳性

正确答案: E

56. 位于右锁骨中线上的肺肝交界处，下列哪一项是正确的(1 分)

- A、第 4 肋间隙
- B、第 5 肋间隙
- C、第 6 肋间隙
- D、第 7 肋间隙
- E、第 7 胸椎水平

正确答案: C

57. 鉴别药物性黄染与黄疸最有意义的体检部位是(1 分)

- A、手掌
- B、足底
- C、鼻部皮肤

- D、巩膜
- E、前额皮肤

正确答案: D

58.完成动作的协调一致主要靠(1 分)

- A、小脑的功能
- B、大脑的功能
- C、锥体束
- D、迷走神经
- E、垂体功能

正确答案: A

59.最常见的肠梗阻原因是(1 分)

- A、蛔虫性肠梗阻
- B、肠扭转
- C、粘连性肠梗阻
- D、肠系膜血管栓塞
- E、嵌顿疝

正确答案: C

60.右肺肺活量占全肺肺活量的百分数为(1 分)

- A、0.55
- B、0.5
- C、0.45
- D、0.6
- E、0.4

正确答案: A

61.临床表现以对称性小关节肿痛为主的疾病是(1 分)

- A、痛风性关节炎
- B、反应性关节炎
- C、类风湿关节炎
- D、风湿性关节炎
- E、骨关节炎

正确答案: C

62.心电图上 U 波明显增高临床上见于(1 分)

- A、高血钾
- B、高血钙
- C、低血钾
- D、低血钙
- E、低血镁

正确答案: C

63.下列哪一项属于粪便一般性状检验(1 分)

- A、肌肉纤维
- B、便潜血
- C、白细胞
- D、结石
- E、淀粉颗粒

正确答案: D

64.右侧脊髓丘脑侧束损伤可见(1 分)

- A、右侧损伤平面以下触觉减退
- B、右侧损伤平面以下运动障碍
- C、右侧损伤平面以下痛觉减退
- D、左侧损伤平面 2~3 节段以下痛觉减退
- E、右侧损伤平面 2~3 节段以下痛觉减退

正确答案: D

65.胸部叩诊由何处开始(1 分)

- A、锁骨上窝
- B、锁骨下窝
- C、第 1 肋间
- D、第 2 肋间
- E、胸锁关节

正确答案: A

66.上腹进行性疼痛伴黄疸可见于(1 分)

- A、消化性溃疡
- B、慢性胃炎
- C、胆囊炎
- D、胰腺炎
- E、胰腺癌

正确答案: E

67.能表示宫内感染的风疹病毒抗体类型为(1 分)

- A、IgM
- B、IgA
- C、IgE
- D、IgG
- E、IgD

正确答案: A

解析: IgM 在胚胎后期即能合成, 是合成最早的免疫球蛋白。

68.痛风患者耳郭痛性小结节产生的原因是(1 分)

- A、外伤疤痕
- B、风湿性肉芽肿
- C、碳酸盐沉积
- D、尿酸盐沉积
- E、结核感染

正确答案: D

69.关于胆红素的变化叙述正确的是(1 分)

- A、正常人尿中可阳性
- B、肝细胞性黄疸时尿胆红素增加
- C、阻塞性黄疸时尿胆红素阴性
- D、溶血性黄疸时尿胆红素明显增加
- E、严重肾损伤时尿胆红素明显增加

正确答案: B

70.关于甲状腺的触诊下列说法错误的是(1 分)

- A、甲状腺癌时包块可有结节感，不规则、质硬
- B、甲亢时，肿大的甲状腺质柔软，可有震颤
- C、桥本甲状腺炎时可在腺体后缘摸到颈总动脉搏动
- D、甲状腺癌时包块随吞咽动作上下移动
- E、甲状旁腺腺瘤时，可扪及甲状腺肿大，检查时也随吞咽移动

正确答案: D

71.下列各项中除哪项外均为中性粒细胞中毒性改变(1 分)

- A、中毒颗粒
- B、大小不等
- C、空泡变性
- D、棒状小体
- E、核变性

正确答案: D

72.血涂片进行白细胞分类计数时采用的染色方法是(1 分)

- A、煌焦油蓝染色
- B、抗酸染色
- C、瑞氏染色
- D、活体染色
- E、荧光染色

正确答案: C

73.请问以下凝血/抗凝蛋白中哪一种的血浆半衰期最短(1 分)

- A、Ⅶ因子
- B、Ⅷ因子
- C、Ⅸ因子
- D、抗凝血酶Ⅲ
- E、蛋白 C

正确答案: E

74.痛风患者的典型表现为突发的关节红肿热痛，最常累及哪个关节(1 分)

- A、髋关节
- B、膝关节
- C、第一跖趾关节
- D、双手近端指间关节
- E、腕关节

正确答案: C

75.颈静脉搏动最常见于下列哪种疾病(1 分)

- A、主动脉瓣关闭不全
- B、主动脉瓣狭窄
- C、三尖瓣关闭不全
- D、三尖瓣狭窄
- E、二尖瓣狭窄

正确答案: C

76.正常人外周血中最大的血细胞为(1 分)

- A、N（中性粒细胞）

- B、E (嗜酸性粒细胞)
- C、B (嗜碱性粒细胞)
- D、M (单核细胞)
- E、L (淋巴细胞)

正确答案: D

77.患者,男,56岁,有糖尿病史15年,近1月逐渐出现排尿困难,B超示尿潴留,导致患者尿潴留的原因最有可能是(1分)

- A、肾结核
- B、前尿道狭窄
- C、慢性肾盂肾炎
- D、神经源性膀胱
- E、前列腺肥大

正确答案: D

78.患者,女性,38岁。20天前受凉后觉畏寒、发热。每日体温39℃以上,最高可达40℃。咳嗽咳少许脓性痰。近1周痰量明显增加,约260ml/日,痰脓臭并带血。右下肺叩诊浊音,可闻及湿啰音。白细胞总数 $21 \times 10^9/L$,中性粒细胞91%,最可能的诊断为(1分)

- A、肺结核
- B、葡萄球菌肺炎
- C、阻塞性肺炎
- D、克雷白杆菌肺炎
- E、急性肺脓肿

正确答案: E

79.患者,女,45岁,因慢性肾衰竭出现尿毒症,入院接受同种异体肾移植手术。入院前曾接受多次输血和血液透析。患者在硬膜外麻醉下行右侧同种异体肾移植术,手术过程顺利,但在作肾动、静脉吻合并开放血流15分钟后,被移植的肾脏即开始呈现花斑状,张力逐渐减退,搏动减弱。25分钟后肾脏呈紫色,尿流减少。手术医师考虑为超急性排斥反应,即行移植肾摘除术。摘除肾病理检查结果确诊为超急性排斥反应。该患者发生超急性排斥反应的可能原因中,不包括哪一项(1分)

- A、抗HLA抗体
- B、特异性CTL细胞
- C、ABO天然血型抗体
- D、抗血管内皮细胞抗体
- E、抗血小板抗体

正确答案: B

80.患者,男,41岁,诊断重症肝炎,皮肤淤斑、鼻出血、消化道出血,实验室检查有关出血性疾病,试验结果是PT及APTT均延长,下列哪项凝血因子活性可能正常(1分)

- A、II
- B、VII
- C、X
- D、IX
- E、V

正确答案: E

81.脑干梗死患者入院进行神经系统查体发现:伸舌右偏。考虑患者哪一条神经损伤(1分)

- A、右侧舌下神经损伤

- B、右侧舌咽神经损伤
- C、左侧舌下神经损伤
- D、左侧舌咽神经损伤
- E、左侧副神经损伤

正确答案: A

82.某患者，因水肿、腰痛反复发作 20 年来诊，长期复查尿蛋白和尿红细胞阳性。为评定该患肾小球功能，下列哪项检查最合适(1 分)

- A、血 Bun
- B、血 Cr
- C、内生肌酐清除率
- D、肾血浆流量
- E、浓缩稀释试验

正确答案: C

83.患者，男，45 岁，发热 5 天，查体：右肺叩诊呈实音，该患者不可能是下列何种疾病(1 分)

- A、肺炎
- B、肺不张
- C、肺肿瘤
- D、胸腔积液
- E、气胸

正确答案: E

84.患者，男，45 岁。便血、面色苍白 3 个月。血常规：Hb 60g/L，MCV 72fl，MCV 72fl，MCH 27%，WBC $8.0 \times 10^9/L$ ，PLT $138 \times 10^9/L$ ，网织红细胞 0.025。最可能出现的临床表现是(1 分)

- A、酱油色尿
- B、明显颈动脉搏动
- C、皮肤大量淤斑
- D、肝、脾中度肿大
- E、巩膜重度黄染

正确答案: B

85.患者，男，20 岁，新疆人，发现右上腹胀痛 2 月。腹部检查肝肋下 4cm，并可扪及 2 个直径 2cm 大小的囊性结节，浮沉触诊有振动感是(1 分)

- A、肝颈静脉回流征阳性
- B、肝震颤阳性
- C、肝脏有搏动
- D、肝区波动感阳性
- E、肝区有摩擦感

正确答案: B

解析：浮沉触诊有振动感是肝震颤阳性的表现。怀疑有肝包虫囊肿时，可以左手中间三指按压囊肿部位；中指重压，另二指轻压。然后以右手中指反复叩击左手中指，每叩之后应逗留片刻，此时余二指即有细微的震颤感觉，为包囊中多数子囊活动，撞击囊壁形成。

86.患儿，2 岁，前额左右突出，头顶呈方形，出汗多。该患儿可能性最大的疾病(1 分)

- A、佝偻病
- B、脑积水
- C、甲状腺功能低下
- D、结核

E、头颅畸形

正确答案: A

87.患者，女，29岁，贫血、出血、感染，全血细胞减少，外周血未见幼稚细胞，为鉴别非白血病性白血病与再生障碍性贫血，应检查(1分)

A、肝、脾、淋巴结有否肿大

B、网织红细胞多少

C、骨髓增生程度及原始细胞多少

D、皮肤、黏膜有无浸润

E、巨核细胞数量

正确答案: C

88.患儿，女，1岁。前额左右突出夜间易惊醒，出汗多。该患儿最可能出现哪种头颅畸形(1分)

A、小颅

B、方颅

C、尖颅

D、长颅

E、巨颅

正确答案: B

89.患者，男，21岁。因发热，右上腹痛1天入院，无恶心及呕吐，于当地医院诊为“胆囊炎”。给庆大霉素24万单位，静点5天，发热及右上腹痛缓解，但出现少尿，最可能为以下哪种原因(1分)

A、前列腺肥大

B、急性肾衰竭

C、严重脱水

D、休克

E、肾动脉栓塞

正确答案: B

90.患者，男，39岁，大量服用“安定”自杀，现患深昏迷，呼吸过缓，其呼吸频率可能为(1分)

A、8次/分

B、16次/分

C、20次/分

D、26次/分

E、30次/分

正确答案: A

91.患者，女，23岁。不孕症就诊。查体：四肢见肢端肥大表现。心肺未查及异常。该患者最可能的诊断是(1分)

A、甲状腺功能亢进

B、甲状腺功能低下

C、腺垂体功能亢进

D、腺垂体功能低下

E、肢体末端慢性缺氧

正确答案: C

92.患者，女，38岁，颜面水肿1周来诊，下列哪项问诊不合适(1分)

A、你哪里不舒服

B、除过脸肿还有哪里不好

- C、小便有什么变化
- D、有没有尿量减少
- E、水肿什么时候重

正确答案: D

93.患者,老年男性,因冠心病服用阿司匹林后恶心呕吐咖啡样物约 300ml,排黑便 200g,头迷、心悸,无腹痛。查体: P 102 次/min, BP 14/11kPa, 心音低钝, 心律齐, 双肺呼吸音清, 腹软, 上腹正中压痛, 无反跳痛, 肝脾未触及。该患者的出血原因最可能是(1 分)

- A、消化性溃疡
- B、食管静脉曲张破裂
- C、胃癌
- D、Mallory-Weiss 综合征
- E、急性胃黏膜病变

正确答案: E

94.患者,男,19岁,上呼吸道感染后持续发热,胸部 CT 考虑为大叶性肺炎,该患者可有下列体征,除了(1 分)

- A、可闻及胸膜摩擦音
- B、语音共振增强
- C、可闻及湿啰音
- D、可闻及管样呼吸音
- E、硬币叩击征阳性

正确答案: E

95.患者,女,52岁,反复发作胸闷、呼吸困难 20 多年,每次发作与情绪有关,每次发作持续时间不等,从 30 分钟到 1~2 天,以往多次在发作时行心电图检查无异常发现。1 小时前生气后再次发作憋闷,需大口喘气,心电图发现 V2~4 导联可见 U 波,提示(1 分)

- A、过度换气导致呼吸性碱中毒低血钾
- B、急性冠状动脉综合征
- C、急性肺栓塞
- D、突发气胸
- E、支气管哮喘发作

正确答案: A

96.患者,男,38岁,反复大便含黏液及血半年余。便前左下腹痛,排便后可缓解。结肠镜检查:直肠、乙状结肠黏膜充血、水肿、质脆、易出血。其最可能的诊断是(1 分)

- A、溃疡性结肠炎(早期)
- B、阿米巴痢疾
- C、细菌性痢疾
- D、克罗恩病
- E、直肠乙状结肠癌

正确答案: A

解析: 溃疡性结肠炎脓血便多见, 直肠受累常见。克罗恩病有腹泻, 但脓血便少见, 直肠受累少见。

97.患者,女,19岁。近 2 周来发热 38℃左右,伴恶心、呕吐、腹泻。遂出现心悸、胸痛、呼吸困难、晕厥发作。体检发现:面色苍白,精神萎靡。心率 40 次/分,律齐,心尖部第一心音低钝,且可闻及大炮音,临床诊断为病毒性心肌炎。最适宜的治疗措施是(1 分)

- A、静脉注射阿托品

- B、静脉滴注硝酸甘油
- C、皮下注射肾上腺素
- D、临时植入心脏起搏器
- E、心脏复律

正确答案: D

98.患者存在大脑皮层损伤，神经系统查体可以发现患者存在皮质感觉障碍。以下哪一项不属于皮质感觉障碍(1 分)

- A、触觉
- B、皮肤定位觉
- C、两点辨别觉
- D、体表图形觉
- E、实体觉

正确答案: A

99.患者，女，55 岁，因劳累后气短、心悸 2 周入院。查体：面颊部紫红色、口唇发绀、心尖区闻及舒张期杂音。为明确诊断，首先的检查是(1 分)

- A、心电图
- B、胸片
- C、超声心动图
- D、冠脉造影
- E、心脏 MRI

正确答案: C

100.患者，男，18 岁，向心性肥胖，伴有满月脸，皮肤紫纹，痤疮，高血压，骨质疏松，患者最可能的诊断是(1 分)

- A、垂体性肥胖
- B、间脑性肥胖
- C、下丘脑性肥胖
- D、库欣综合征
- E、甲状腺功能减退

正确答案: D

101.患者，女，18 岁，因排尿困难、下背痛 3 天就诊，既往体健，体温 38.7℃，伴有寒战，尿常规检查提示白细胞 > 10/HPF，亚硝酸盐 (+)，该患者最可能的诊断是(1 分)

- A、膀胱炎
- B、淋病
- C、肾盂肾炎
- D、肾脓肿
- E、急性肾炎

正确答案: C

102.患儿，女，5 岁，高热，抽搐多次，意识不清半天，送院查体示面色苍白，昏迷，时有惊厥，双侧瞳孔不等大，光反射迟钝，脉细，呼吸弱。粪便镜检，脓细胞 4 个。血常规示白细胞数 $16 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 75%。脑脊液检查正常，可初步诊断为(1 分)

- A、流行性乙型脑炎
- B、败血症
- C、暴发型流行性脑脊髓膜炎
- D、中毒型细菌性痢疾

E、森林脑炎

正确答案: D

103.患者,男,50岁,因肺炎住院,无出血倾向,某日检查 TT 时间延长,PT 及 APTT 正常,下一步如何进一步完善检查(1 分)

A、甲苯胺蓝纠正试验

B、APTT 纠正试验

C、检查纤维蛋白原

D、查血常规

E、查维生素 K

正确答案: A

104.患者,男,18岁,中等体型,平素体健,3天前受凉后出现发热,咳嗽,咳铁锈色痰,关于该患者目前胸廓表述正确的是(1 分)

A、胸廓前后径略长于左右径,胸部上下长度较短

B、胸廓呈圆桶形,肋骨弓的前下斜度上抬,肋间隙加宽

C、胸廓前后径常小于左右径的一半

D、胸廓前后径与左右径之比约为 1 : 1.5

E、胸廓前后径与左右径约相等

正确答案: D

105.患者,女,30岁。呼吸困难,心绞痛。查体见周围血管征。下列不属于周围血管征得是(1 分)

A、脉搏短绌

B、毛细血管搏动征

C、枪击音

D、水冲脉

E、Duroziez 双重杂音

正确答案: A

106.患者,男,63岁。消瘦,腹胀 1 个月。既往患慢性肝炎,肝硬化 20 余年。查体:腹部膨隆,肝脾触诊不满意,移动性浊音阳性,双下肢水肿。为明确诊断,最恰当的实验室检查是(1 分)

A、BUN、CCr、CO₂CP

B、GGT、ALP、TBIL

C、AFP、CEA、CA199

D、ALT、ALP、MAO、尿胆原、AFP

E、AST、TBIL、BUN、CCr、PH

正确答案: D

(107-110 共用题干) 患者,男,24岁,3天前无明显诱因出现洗肉水样尿,伴乏力,无发热、腰痛、水肿,无尿道刺激征。查:血压 160/95mmHg,扁桃体 II 肿大,血红蛋白 130g/L

107.如果该患者尿镜检示红细胞以均一型为主,肉眼血尿最可能是什么疾病所致(1 分)

A、慢性肾小球肾炎

B、急性肾小球肾炎

C、IgA 肾病

D、紫癜性肾炎

E、ANCA 相关性肾炎

正确答案: E

108.如果该患者尿镜检示红细胞以多形性为主,肉眼血尿最可能是什么疾病所致(1 分)

- A、前列腺炎
- B、精囊炎
- C、出血性膀胱炎
- D、IgA 肾病
- E、慢性肾盂肾炎

正确答案: D

109.鉴别该患者的洗肉水样尿的来源的主要方法是(1 分)

- A、观察血尿颜色
- B、尿潜血试验
- C、尿胆原检测
- D、尿红细胞相差显微镜检查
- E、尿三杯试验

正确答案: D

110.该患者尿中红细胞数最低应大于等于(1 分)

- A、1 个/HP
- B、2 个/HP
- C、3 个/HP
- D、4 个/HP
- E、5 个/HP

正确答案: C

(111-112 共用题干) 患者，男，20 岁。活动后心悸气急 2 月。检查发现肝大，质地中等，表面光滑，有压痛，腹部移动性浊音阳性，下肢凹陷性水肿

111.该患者最可能的诊断是(1 分)

- A、肝硬化腹水
- B、肝癌伴腹水
- C、肺结核伴结核性腹膜炎
- D、肾病综合征伴腹水
- E、右心衰竭、肝淤血伴腹水

正确答案: E

112.该患者最可能出现的体征是(1 分)

- A、颈静脉怒张
- B、腹部揉面感
- C、双肺湿啰音
- D、血尿
- E、巩膜黄染

正确答案: A

(113-115 共用题干) 患者，男，65 岁，反复尿频、尿急、排尿不尽 6 年，近半年加重。伴夜尿增多，偶伴血尿、血精。体查示中度贫血外貌，下腹部压痛 (+)，双下肢轻度凹陷性水肿。血常规示：HB：89g/L。尿常规示尿蛋白 (-)，镜检 WBC (+)，RBC (+++)

113.该患者最可能的诊断是(1 分)

- A、膀胱结核
- B、前列腺增生症
- C、慢性膀胱炎
- D、泌尿系结石

E、前列腺癌

正确答案: E

114.患者可能最有效的治疗方法(1 分)

A、抗炎

B、化疗

C、手术治疗

D、 α -受体阻滞剂

E、抗雄激素药

正确答案: C

115.下列检查对明确诊断最有价值的是(1 分)

A、经直肠前列腺超声

B、盆腔 MRI 检查

C、盆腔 CT 检查

D、前列腺穿刺活检

E、血清 PSA

正确答案: D

(116-117 共用题干) 患者, 男, 45 岁, 头晕 6 个月, 既往有高血压病史。门诊化验血胆固醇、三酰甘油(甘油三酯) 高于正常

116.查体和辅助检查时应格外注意的是(1 分)

A、血电解质水平

B、心率快慢

C、心脏核素检查

D、心脏超声检查

E、血管超声检查

正确答案: E

117.患者的生活方式不妥当的是(1 分)

A、控制体重

B、正常饮食

C、服用药物

D、有氧运动

E、定期体检

正确答案: B

(118-119 共用题干) 患者, 女, 30 岁, 发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛 1 周。既往无类似病史。查体: $T38.3^{\circ}\text{C}$, 心肺检查无异常, 服软, 双肾区有叩击痛

118.患者的实验室检查结果: 尿蛋白 (+), 白细胞 30 ~ 50 个/HP, 可见白细胞管型。该患者最可能的诊断是(1 分)

A、急性肾小球肾炎

B、急性尿道炎

C、急性膀胱炎

D、急性肾盂肾炎

E、尿道综合征

正确答案: D

119.为明确诊断首选的最简单有效的检查方法是(1 分)

A、腹部立位平片

- B、肾功能
- C、尿常规+尿沉渣分析
- D、逆行肾盂造影
- E、肾穿刺活检

正确答案: C

(120-122 共用题干) 患者, 女, 44 岁, 周身高度水肿伴有腹水, 尿常规: 尿蛋白 (++++), 24 小时尿蛋白 > 3.5g, 合并高脂血症, 血浆白蛋白 < 30g/L

120. 【假设】该患者应用强的松 1mg/ (kg·d) 治疗一周后, 临床医生判断此患者对激素治疗有效, 其主要根据是什么(1 分)

- A、患者尿量明显增多, 水肿消退
- B、患者尿中红细胞减少
- C、患者血常规红细胞增加
- D、患者食欲增加
- E、患者血钾降低

正确答案: A

121. 肾病综合征出现大量蛋白尿, 其主要原因是(1 分)

- A、肾小球滤过膜屏障作用受损
- B、肾小管重吸收蛋白质障碍
- C、肝脏合成蛋白质不足
- D、蛋白摄入不足
- E、清蛋白分解代谢增强

正确答案: A

122. 该患者诊断为肾病综合征, 其主要依据是(1 分)

- A、高度水肿伴腹水
- B、尿蛋白++++
- C、24h 尿蛋白 > 3.5g
- D、高脂血症
- E、血浆白蛋白 < 30g/L

正确答案: C

(123-125 共用题干) 患者, 男, 60 岁, 既往有心房颤动病史, 此次因下肢骨折术后长期卧床, 某天突发胸痛、呼吸困难, 体查口唇发绀

123. 首先需要考虑的诊断是(1 分)

- A、肺栓塞
- B、肺部感染
- C、气胸
- D、急性心梗
- E、心脏破裂

正确答案: A

124. 【假设信息】如回报 D-二聚体阳性, 那需尽快完善哪项检查以便确诊(1 分)

- A、心电图
- B、胸片
- C、CT 肺动脉造影
- D、心脏彩超
- E、肺通气功能检测

正确答案: C

125.首先需要筛查的检查是(1 分)

- A、血常规
- B、凝血功能
- C、血清电解质
- D、心肌酶
- E、肌钙蛋白

正确答案: B

(126-128 共用题干) 患者, 女, 35 岁, 发作性尿急、尿痛 2 年, 加重 3 天

126.现病史应该了解哪些内容, 除过(1 分)

- A、询问病因、诱因
- B、发病时间、起病急缓
- C、有无肾结核、肾结石病史
- D、有无发冷、发热
- E、用过何种药物治疗

正确答案: C

127.家族史应该了解哪些内容, 除外(1 分)

- A、兄弟姐妹有无类似疾病
- B、丈夫有无类似疾病
- C、父母有无类似疾病
- D、子女有无类似疾病
- E、有无遗传性疾病

正确答案: B

128.患者既往史应该了解哪些内容(1 分)

- A、药物、食物过敏史
- B、有无腹痛、腹泻
- C、有无月经异常
- D、生育情况
- E、丈夫有无相似疾病

正确答案: A

(129-133) 共用备选答案

- A、肾病综合征
- B、急性肾小球肾炎
- C、慢性肾小球肾炎
- D、急进性肾炎综合征
- E、慢性肾功能不全

129.患儿, 男, 6 岁, 3 周前上呼吸道感染, 1 周前出现肉眼血尿、水肿, 测血压 150/100mmHg, 检查发现血尿、蛋白尿, Scr 145 μ mol/L, C3 轻度下降(1 分)

正确答案: B

130.20 岁男性, 3 天前上呼吸道感染, 1 天前出现肉眼血尿, 查体血压正常, 尿常规: pro3+, bld3+, Scr70 μ mol/L(1 分)

正确答案: C

131.患者 20 岁女性, 发热、皮疹、发现血尿、蛋白尿, 血肌酐进行性升高 2 周(1 分)

正确答案: D

132.青少年男性，水肿起病，查尿常规：蛋白(+++)，潜血(-)；24 小时尿蛋白定量 4g，血白蛋白 28g/L，血 Scr 60μmol/L(1 分)

正确答案: A

133.60 岁女性，诊断糖尿病 20 年，发现蛋白尿 6 年，血肌酐升高 1 年(1 分)

正确答案: E

(134-135) 共用备选答案

A、碳酸氢钠

B、甲醛

C、浓盐酸

D、麝香草酚

E、甲苯

134.适用于尿液有形成分检查的防腐剂是(1 分)

正确答案: B

135.适用于尿液激素测定的防腐剂是(1 分)

正确答案: C

(136-138) 共用备选答案

A、扁平胸

B、桶状胸

C、漏斗胸

D、胸廓一侧隆起

E、胸廓一侧塌陷

136.佝偻病患者常出现(1 分)

正确答案: C

137.慢性阻塞性肺气肿常见(1 分)

正确答案: B

138.大量胸腔积液可引起(1 分)

正确答案: D

(139-140) 共用备选答案

A、动脉枪击音

B、毛细血管搏动征

C、Graham-stell 杂音

D、肝颈静脉回流征阳性

E、心尖区可闻及舒张期奔马律

139.右心衰竭的体征(1 分)

正确答案: D

140.左心衰竭的体征(1 分)

正确答案: E

(141-144) 共用备选答案

A、呼吸音减弱

B、呼吸音增强

C、干啰音

D、湿啰音

E、胸膜摩擦音

141.支气管哮喘急性发作期最常闻及(1 分)

正确答案: C

142.为呼吸外的附加音,断续而短暂,一次常连续多个出现,于吸气时或吸气终末较为明显,部位较恒定,性质不易变(1分)

正确答案: D

143.持续时间较长,带乐性的附加音,音调较高,吸气及呼气均可闻及,但以呼气为主,性质易变,部位易变(1分)

正确答案: C

144.大量胸腔积液(1分)

正确答案: A

145.ITP 可发生(1分)

A、CT 延长

B、BT 延长

C、血块收缩良好

D、骨髓巨核细胞增多

E、血小板形态异常

正确答案: BDE

146.下列各项符合胆汁淤积性黄疸的有(1分)

A、皮肤黄染较轻,呈柠檬色

B、长期服用氯丙嗪可发生

C、粪便颜色呈白陶土色

D、易出现肝性脑病

E、常有寒战、高热

正确答案: BC

147.斜颈可见于以下哪种疾病(1分)

A、颈肌外伤

B、瘢痕收缩

C、先天性斜颈

D、颈肌痉挛

E、重症肌无力

正确答案: ABCD

148.关于干啰音的特点正确的是(1分)

A、持续时间较长带乐性的附加音

B、仅可于呼气时间闻及

C、强度及性质易变

D、呼气相及吸气相均可闻及

E、部位不易变换

正确答案: ACD

149.主动脉瓣关闭不全患者可出现下列哪些体征(1分)

A、主动脉瓣听诊区可闻及叹气样、递减型、舒张期杂音

B、De Musset 征

C、重度反流时可出现 Austin Flint 杂音

D、枪击声

E、Duroziez 杂音

正确答案: ABCDE

150.病原体实验诊断的方法有(1 分)

- A、用已知抗体检测标本中是否有病原体特异性抗原
- B、用已知病原体抗原检测患者血清中是否有相应抗体
- C、分离培养和药敏试验
- D、检测病原体特异性核酸成分
- E、显微镜直接观察病原体的形态、染色性、生长运动方式

正确答案: ABCDE

1.患者，女，可触及水冲脉。该患者最可能是

- A、心包积液
- B、主动脉瓣狭窄
- C、二尖瓣狭窄
- D、肺动脉瓣狭窄
- E、主动脉瓣关闭不全

答案：E

2.深呼吸频率快而浅，并伴有叹息样

- A、支气管异物
- B、急性左心衰
- C、糖尿病酮症
- D、焦虑
- E、有机磷中毒

答案：D

3.新生儿易患呼吸道以及胃肠道感染的原因是

- A、补体成分缺陷
- B、联合免疫缺陷
- C、皮肤黏膜的天然屏障差
- D、分泌型 IgA 功能尚未成熟
- E、呼吸道胃肠道发育不良

答案：D

解析：强调“新生儿”医患疾病的常见原因。

4.“火焰细胞”主要见于浆细胞骨髓瘤的类型是

- A、IgA 型
- B、IgG 型
- C、IgD 型
- D、IgE 型
- E、轻链型

答案：A

5.下列有关心尖搏动的位置叙述均正确，但除外哪一项

- A、矮胖体型、妊娠时、心脏横位，心尖搏动向上移
- B、瘦长体型、心脏垂位，心尖搏动向下移
- C、正常人心尖搏动位于第 5 肋间左锁中线内 0.5~1 厘米处
- D、左室增大，心尖搏动向左下移位
- E、右室增大，心尖搏动向左上移位

答案：E

6.患者，男性，47 岁，心悸 3 年。动态心电图检查示：快心室率心房颤动。曾服用胺碘酮转复为窦性心律并维持。1 个月前心房颤动再发，改用电复律成功。应诊断为

- A、急性心房颤动
- B、阵发性心房颤动
- C、持续性心房颤动
- D、长期持续性心房颤动
- E、永久性心房颤动

答案：C

7.患者，男，30岁，近日来解柏油样便，每日3~4次。既往有反酸、上腹痛史。腹痛多发生在夜间，进食后可缓解。体检：贫血貌，肝脾未扪及，剑突下压痛。最可能的诊断是

- A、胆石症并出血
- B、胃炎并出血
- C、胃癌并出血
- D、溃疡病并出血
- E、肝硬化并胃底食管静脉曲张出血

答案：D

8.患者，男，60岁，有冠心病病史30年，陈旧性心梗病史5年。近1年来反复发作性心悸，心电图检查提示：心房颤动。经胺碘酮及电复律均不能转复，现长期口服比索洛尔控制心室率。应诊断为

- A、急性心房颤动
- B、阵发性心房颤动
- C、持续性心房颤动
- D、长期持续性心房颤动
- E、永久性心房颤动

答案：E

9.能使血沉加快的因素不包括

- A、纤维蛋白原
- B、免疫球蛋白
- C、清蛋白
- D、急性时相反应蛋白
- E、胆固醇

答案：C

10.以下哪一项不是浅反射

- A、角膜反射
- B、腹壁反射
- C、肛周反射
- D、眼心反射
- E、跖反射

答案：D

(主题干)患者，男，70岁。夜尿，尿淋漓不尽5年，加重1月。直肠指诊：前列腺腺体增大，可触及大小不一的质硬结节，中央沟消失

11.应首选的检查是

- A、静脉尿路造影（IVP）
- B、经直肠超声（TRUS）
- C、血清PSA测定
- D、前列腺液涂片
- E、盆腔CT

答案：C

解析：患者直肠指检发现前列腺增大，伴质硬大小不一结节，多数考虑前列腺癌。PSA筛查前列腺癌首选的肿瘤标志物。

12.主动脉瓣狭窄时听诊可闻及典型杂音为以下哪项

- A、胸骨右缘第 3 肋间可闻及收缩期粗糙喷射性杂音
- B、胸骨左缘第 2 肋间可闻及收缩期粗糙喷射性杂音
- C、胸骨左缘第 3 肋间可闻及收缩期粗糙喷射性杂音
- D、胸骨右缘第 2 肋间可闻及收缩期粗糙喷射性杂音
- E、以上都不正确

答案：D

13.皮肤划痕实验中白色划痕持续超过 5 分钟提示

- A、交感神经兴奋性增强
- B、迷走神经兴奋性增强
- C、交感神经麻痹
- D、感觉神经损伤
- E、运动神经损伤

答案：A

14.凝血和纤维蛋白溶解过程叙述正确的是

- A、纤溶始于因子XII被激活，止于 FDP 的形成
- B、因子IXa、V、PF3、Ca²⁺组成凝血活酶
- C、凝血酶激活因子称为凝血酶的自我催化作用
- D、纤维蛋白溶酶的激活始于纤维蛋白的多聚体形成
- E、组织因子凝血过程需要 PF3 参与

答案：E

15.做化学法粪隐血试验时，服用下列哪项不会出现假阳性

- A、肉类
- B、铁剂
- C、维生素
- D、生食蔬菜
- E、含有动物血的食物

答案：C

16.缩窄性心包炎可出现

- A、Austin Flint 杂音
- B、Graham Steell 杂音
- C、Kussmaul 征
- D、Roth 斑
- E、Osler 结节

答案：C

(主题干)患者，女，70 岁。持续胸痛、阵发性加重 4 小时，自服速效救心丸略有缓解。

查体：BP 128/90mmHg，痛苦病容，双肺无异常，心率 65 次/分，律齐，心音低钝，腹部无异常。既往有高血压、冠心病、糖尿病史 5 年

17.若考虑患者存在急性心肌梗死，血清酶中最早升高的是

- A、CK-MB
- B、乳酸脱氢酶
- C、肌红蛋白
- D、AST
- E、肌凝蛋白

答案：C

(主题干)患者，女，70岁。持续胸痛、阵发性加重4小时，自服速效救心丸略有缓解。
查体：BP 128/90mmHg，痛苦面容，双肺无异常，心率65次/分，律齐，心音低钝，腹部无异常。既往有高血压、冠心病、糖尿病史5年

18.为明确诊断需急行的辅助检查是

- A、心脏彩超
- B、心肌酶学检查
- C、动态心电图
- D、核素心肌灌注显像
- E、胸部CT

答案：B

19.患者，女，32岁，肥胖伴有性功能减退，食欲波动，血压不稳定，尿量增多，考虑肥胖的原因最可能是

- A、下丘脑肥胖
- B、单纯性肥胖
- C、垂体性肥胖
- D、库欣综合征
- E、间脑性肥胖

答案：E

20.最常出现眩晕性发作的癫痫类型是

- A、额叶癫痫和顶叶癫痫
- B、顶叶癫痫和枕叶癫痫
- C、枕叶癫痫和前庭癫痫
- D、颞叶癫痫和前庭癫痫
- E、前庭癫痫和额叶癫痫

答案：D

21.支气管哮喘发作时肺部典型体征是

- A、语音震颤减弱
- B、叩诊呈过清音
- C、肺部散在干鸣音
- D、两肺满布哮鸣音
- E、两肺底水泡音

答案：D

22.血象显示红细胞减少比血红蛋白减少更明显的贫血是

- A、缺铁性贫血
- B、溶血性贫血
- C、急性失血性贫血
- D、再生障碍性贫血
- E、巨幼细胞性贫血

答案：E

23.关于腹外疝不正确的是

- A、脐疝多见于婴幼儿
- B、两侧腹直肌闭合不良者可有白线疝
- C、手术愈合不良处可有切口疝
- D、股疝位于腹股沟韧带内侧，多见于男性

E、男性腹股沟斜疝可下降至阴囊

答案：D

24.出血伴 PT 延长最可能的诊断是

A、阻塞性黄疸

B、血友病

C、脾功能亢进

D、血小板减少性紫癜

E、过敏性紫癜

答案：A

25.关于血清 HCV RNA 测定结果评价错误的是

A、血清 HCV RNA 阳性提示 HCV 复制活跃，具有强传染性

B、血清 HCV RNA 阴性可排除丙型肝炎

C、检测 HCV RNA 对研究丙型肝炎的发病机制及传播途径有重要价值

D、结合抗-HCV 连续观察 HCV-RNA 帮助判断预后和抗病毒药物疗效

E、丙型肝炎病毒是输血后肝炎的主要病原体

答案：B

26.患者，男，40 岁，8 年来反复节律性上腹部疼痛，近半月呕吐隔夜食，呕吐后腹胀减轻，此时最应该注意的腹部体征是

A、有否反跳痛

B、肠鸣音亢进否

C、有否胃蠕动波

D、季肋点有否压痛

E、Murphy 征是否阳性

答案：C

27.患者，女，46 岁，近 2 个月来经常眩晕，视物旋转，恶心呕吐胃内容物，伴眼球震颤，最可能的诊断是

A、Meniere 病

B、脑栓塞

C、脑膜炎

D、青光眼

E、急性肝炎

答案：A

28.患儿，明确诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病，可能的胸廓异常改变，除外

A、佝偻病串珠

B、肋膈沟

C、漏斗胸

D、鸡胸

E、桶状胸

答案：E

29.下列关于粪便的叙述，正确的是

A、上消化道出血患者的便往往为鲜血便

B、由于肠腔内胆汁缺如，粪便为白陶土样便

C、霍乱，副霍乱病人的便为稀糊状或稀汁样便

D、柏油样便为黑色，无光泽

E、粪便呈硬球或羊粪样，主要见于肠蠕动亢进

答案：B

30.各种白血病骨髓象共同特点是

A、增生低下或极度低下

B、某一系白细胞明显升高或极度增生具有质的变化

C、红细胞系明显增多（除红白血病外）主要为巨幼细胞多

D、巨核细胞系急性期增多，慢性期不增高

E、增生活跃或明显活跃

答案：B

241.患者，男，50岁。发热、面部水肿、少尿1周。查体：T 38℃，BP 170/110mmHg，颜面部水肿，心肺无异常，双下肢凹陷性水肿。实验室检查：尿常规：尿蛋白（++），24小时尿量小于500ml。患者最可能出现的血清电解质检查结果是

A、血钾 6.0mmol/L，血钠 130mmol/L

B、血钠 150mmol/L，血氯 110mmol/L

C、血钾 5.5mmol/L，血氯 115mmol/L

D、血氯 97mmol/L，血钙 2.69mmol/L

E、血磷 0.7mmol/L，血钠 130mmol/L

答案：A

242.引起乳糜尿的主要原因是

A、丝虫病

B、脂肪栓塞

C、脂肪组织创伤

D、先天性淋巴管畸形

E、结核和肿瘤

答案：A

243.血糖增高性糖尿见于下列疾病，但除外

A、糖尿病

B、甲状腺功能亢进症

C、肢端肥大症

D、家族性糖尿

E、Cushing 综合征

答案：D

244.心源性水肿与肾源性水肿的鉴别要点是

A、水肿部位

B、水肿开始部位

C、水肿程度

D、有无腹水

E、对利尿剂反应

答案：B

245.影响心音强度的主要因素不包括

A、心肌收缩力

B、心率快慢

C、心室充盈程度

D、瓣膜位置

E、瓣膜活动性

答案：B

246.提示心包积液体征的除了

A、Graham-stell 杂音

B、Austin Flint 杂音

C、Ewart 征

D、动脉枪击音

E、毛细血管搏动征

答案：ABDE

247.周围血管征包括

A、奇脉

B、水冲脉

C、动脉枪击音

D、Duroziez 双重杂音

E、毛细血管搏动征

答案：BCDE

248.下列哪种情况可听到重叠型奔马律

A、心房颤动

B、完全性房室传导阻滞

C、心肌病心功能、心率正常时

D、心衰伴心动过速

E、风湿热伴 P-R 间期缩短

答案：D

249.Virchow 淋巴结是指

A、左颈前淋巴结

B、右颈前淋巴结

C、左锁骨上淋巴结肿大

D、右锁骨上淋巴结肿大

E、腹股沟淋巴结肿大

答案：D

250.胃癌转移多的淋巴结区域

A、左颈前淋巴结

B、右颈前淋巴结

C、左锁骨上淋巴结肿大

D、右锁骨上淋巴结肿大

E、腹股沟淋巴结肿大

答案：A

251.肺癌转移多的淋巴结区域

A、左颈前淋巴结

B、右颈前淋巴结

C、左锁骨上淋巴结肿大

D、右锁骨上淋巴结肿大

E、腹股沟淋巴结肿大

答案：B

252.肺下界消失见于下述哪种疾病

- A、肺气肿
- B、大叶性肺炎
- C、腹腔肿瘤
- D、小量气胸
- E、大量胸腔积液

答案： E

253.以下情况中，最易导致患者刺激性干咳的原因是

- A、喉炎
- B、支气管炎
- C、支气管扩张
- D、肺炎
- E、肺脓肿

答案： A

254.关于支气管哮喘的描述下列哪项是错误的

- A、呈呼气性呼吸困难
- B、呈吸气位
- C、两肺满布湿性啰音
- D、两肺叩诊呈过清音
- E、呈呼气音延长

答案： C

255.正常人，当毛细血管内还原血红蛋白超过多少时可出现发绀

- A、10g/L
- B、100g/L
- C、50g/L
- D、150g/L
- E、60g/L

答案： C

256.杵状指（趾）的特点不包括

- A、手足指（趾）末端增生、肥厚
- B、指甲中央凹陷边缘翘起
- C、指（趾）端呈杵状膨大
- D、指甲根与指（趾）端皮肤构成基底角大于 180°
- E、末端指节增宽增厚

答案： B

257.患者明确诊断为中央型肺癌，左侧大量胸腔积液，该患者喜采取的体位是

- A、喜左侧卧位
- B、喜右侧卧位
- C、喜仰卧位
- D、喜俯卧位
- E、喜坐位

答案： A

(主题干)患者，男，28岁，瘦高体型，剧烈运动后突发呼吸困难半小时，伴胸部撕裂样疼痛、干咳、大汗，查体左侧呼吸音和触觉语颤减弱

258.患者就诊时的体位最可能是

- A、自主体位
- B、被动体位
- C、强迫仰卧位
- D、强迫侧卧位
- E、强迫停立位

答案：D

259.患者，男，35岁，反复发作消化性溃疡，近期反复出现呕吐、腹胀，下列哪项不符合

- A、呕吐物有酸臭味
- B、呕吐量大、有宿食
- C、消瘦、脱水、碱中毒
- D、有胃型和胃蠕动波
- E、呕吐物有粪臭味

答案：E

(主题干)患者，男，28岁，瘦高体型，剧烈运动后突发呼吸困难半小时，伴胸部撕裂样疼痛、干咳、大汗，查体左侧呼吸音和触觉语颤减弱

260.最有价值最快速的检查是

- A、血常规
- B、ECG、胸部X片
- C、超声心动图
- D、颈部血管彩超
- E、肺动脉CT三维成像

答案：B

261.以下哪些符合慢性粒细胞白血病的实验室检查结果

- A、外周血嗜碱性粒细胞 7%
- B、骨髓原始粒细胞 1.5%
- C、碱性磷酸酶染色积分 151
- D、染色体核型 46XX, t (9; 22) (q34, q11)
- E、BCR-ABL 融合基因 p210 型阳性

答案：ABDE

(主题干)患者，男，28岁，瘦高体型，剧烈运动后突发呼吸困难半小时，伴胸部撕裂样疼痛、干咳、大汗，查体左侧呼吸音和触觉语颤减弱

262.体检时首先关注

- A、头部
- B、肺部
- C、心脏
- D、血管杂音
- E、生命体征

答案：E

263.痛觉障碍常见于哪一个部位损伤

- A、脊髓后索
- B、脊髓丘脑束
- C、皮质脊髓侧束

D、皮质脊髓前束

E、皮质脑干束

答案：B

264.下列哪一项为支气管呼吸音的正确描述

A、吸入的空气在进入声门、气管或主支气管内即可形成

B、该呼吸音的音响强音调低

C、该呼吸音的呼气相与吸气相大致相等

D、吸气末与呼气初之间连续而无短暂间隙

E、越靠近气管区其音响越强音调越低

答案：E

265.皮肤、黏膜可见黄染时，血中胆红素浓度增高，常超过下述哪一项数值

A、超过 5mg/L

B、超过 10mg/L

C、超过 15mg/L

D、超过 20mg/L

E、超过 25mg/L

答案：D

(主题干)患者，女，48岁，分娩三次，曾因尿失禁行尿道悬吊手术治疗，术后尿失禁症状未解除，出现明显尿急。患者由此精神极度紧张。尿常规检查正常

266.首先考虑哪种类型尿失禁

A、混合性尿失禁

B、压力性尿失禁

C、充盈性尿失禁

D、急迫性尿失禁

E、真性尿失禁

答案：D

267.有关医院感染，以下错误的是

A、指住院病人在医院内获得的感染

B、在住院期间发生的感染

C、包括入院前已开始或者入院时已处于潜伏期的感染

D、医院工作人员在医院内获得的感染

E、在医院内获得出院后发生的感染

答案：C

268.长期干咳，气促伴有杵状指可见于

A、肺间质纤维化

B、肺炎

C、气胸

D、胸腔积液

E、休克

答案：A

269.下列哪项不是由动脉瓣本身病变引起主动脉瓣关闭不全的疾病

A、风湿性心脏病

B、感染性心内膜炎

C、主动脉瓣黏液样变性

- D、梅毒性主动脉炎
- E、先天性二叶主动脉瓣

答案：D

270.强烈提示左心功能衰竭的体征是

- A、心尖部第一心音增强
- B、A2 亢进
- C、舒张早期奔马律
- D、开瓣音
- E、心包叩击音

答案：C

271.“肠源性青紫”是由于下述哪一原因导致

- A、进食含较多亚硝酸盐的食物
- B、由于便秘或其他原因导致体内硫化血红蛋白上升
- C、见于女性，与月经周期相关
- D、右心衰导致消化道吸收功能异常
- E、是一种混合性发绀

答案：A

272.右侧舌下神经损伤后的临床表现是

- A、舌前 2/3 味觉丧失
- B、舌后 1/3 味觉丧失
- C、伸舌偏右
- D、伸舌偏左
- E、右侧咽反射迟钝

答案：C

273.患儿，10 岁，发热 2 天，加重伴皮疹 1 天就诊。查体全身皮肤充血发红，散布着点状充血性红疹，手压全部消退，去压后复现。考虑“猩红热”可能，则伸舌可能见

- A、地图舌
- B、草莓舌
- C、牛肉舌
- D、镜面舌
- E、毛舌

答案：B

274.患者，女，28 岁，系 Rh 阴性的产妇。产后多少小时内注射 Rh 抗体，可有效预防再次妊娠时发生的新生儿溶血

- A、12
- B、24
- C、48
- D、72
- E、96

答案：D

275.Hoffmann 征反射中枢位于

- A、颈髓 7 节段到胸髓 1 节段
- B、颈髓 5~6 节段
- C、胸髓 2~3 节段

D、颈髓 2~3 节段

E、腰髓 1~2 节段

答案：A

276.下列指标中能反映肝组织发生纤维化的指标是

A、AST

B、CEA

C、ALP

D、PH

E、LDH

答案：D

277.患者明确诊断为大量胸腔积液，该患者患侧叩诊音为

A、清音

B、过清音

C、实音

D、浊鼓音

E、空瓮音

答案：C

278.NAP 活性明显增高见于

A、慢粒白血病慢性期

B、急淋白血病缓解期

C、恶性淋巴瘤 IV 期

D、类白血病反应

E、多发性骨髓瘤

答案：D

279.类肝素物质

A、APTT 延长，PT 正常，加正常血浆能纠正

B、APTT 正常或延长，PT 延长，加正常血浆能纠正

C、APTT 延长，PT 延长，TT 延长，加正常血浆不能纠正

D、APTT 正常，PT 正常，TT 延长，加甲苯胺蓝能纠正

E、APTT 正常，PT 正常，TT 延长，加正常血浆能纠正

答案：D

280.阻塞性黄疸

A、APTT 延长，PT 正常，加正常血浆能纠正

B、APTT 正常或延长，PT 延长，加正常血浆能纠正

C、APTT 延长，PT 延长，TT 延长，加正常血浆不能纠正

D、APTT 正常，PT 正常，TT 延长，加甲苯胺蓝能纠正

E、APTT 正常，PT 正常，TT 延长，加正常血浆能纠正

答案：B

281.血友病类出血性疾病

A、APTT 延长，PT 正常，加正常血浆能纠正

B、APTT 正常或延长，PT 延长，加正常血浆能纠正

C、APTT 延长，PT 延长，TT 延长，加正常血浆不能纠正

D、APTT 正常，PT 正常，TT 延长，加甲苯胺蓝能纠正

E、APTT 正常，PT 正常，TT 延长，加正常血浆能纠正

答案：A

282.患者，男，22岁，头昏乏力，鼻黏膜及牙龈出血1周来诊。检验：RBC $3.2 \times 10^{12}/L$ ，Hb 85g/L，WBC $42 \times 10^9/L$ ，BPC $23 \times 10^9/L$ ，外周血片中有幼稚细胞，骨髓涂片增生极度活跃。原始细胞50%，早幼粒细胞及以下阶段共占21%，单核细胞10%，病理性细胞POX染色强阳性，NAP染色(-)，AS-DAE染色部分呈阳性反应，不被NaF抑制，最可能的诊断是

- A、AML-M1
- B、AML-M2
- C、AML-M3
- D、CML
- E、AML-M4

答案：B

283.腹腔积液与腹腔积气鉴别，下列哪项最有价值

- A、腹部外伤
- B、腹壁张力
- C、移动体位时其形态有无改变
- D、肝浊音界改变
- E、移动性浊音

答案：E

284.遗传性凝血功能障碍常见的疾病是

- A、维生素K缺乏症
- B、血小板无力症
- C、血友病
- D、异常球蛋白血症
- E、过敏性紫癜

答案：C

285.确定胸腔积液量的多少，最准确的检查是

- A、X线胸片
- B、超声波
- C、体层摄影
- D、胸腔穿刺
- E、叩诊所见

答案：B

286.内脏痛觉的冲动主要是由下列哪种神经传导的

- A、三叉神经
- B、面神经
- C、交感神经
- D、迷走神经
- E、听神经

答案：C

287.下列各项均为体表标志，但除外

- A、肋弓下缘
- B、腹上角
- C、脐

D、髂前上棘

E、腹壁静脉

答案：E

288.患者，男，43岁，近2个月来下腹疼痛，腹泻、大便为脓血便，排便后腹痛减轻。最可能的诊断是

A、内痔

B、溃疡性结肠炎

C、小肠结核

D、肠套叠

E、过敏性紫癜

答案：B

289.一患儿因误服花生米后，面部青紫来就诊。下列哪项体征不可能出现

A、胸骨上窝凹陷

B、吸气困难

C、锁骨上窝凹陷

D、呼气时间延长

E、肋间隙凹陷

答案：D

290.患者，男，50岁。右下肢骨折半个月。突然出现剧烈右胸部刺痛，伴有呼吸困难，咯血痰及发绀，该患者最可能的诊断是

A、急性心肌梗死

B、急性心包炎

C、食管癌

D、肺梗死

E、胸膜炎

答案：D

291.负性心尖冲动见于

A、腹主动脉瘤

B、肺心病右室肥大

C、升主动脉瘤或主脉弓瘤

D、Broadbent 征

E、高血压左室肥大

答案：D

292.脊柱疾病常采取的体位是

A、被动体位

B、强迫仰卧位

C、强迫侧卧位

D、强迫俯卧位

E、角弓反张位

答案：D

293.关于急性纤维素性心包炎的说法正确的是

A、摩擦感在屏气后可以消失

B、可以没有心包摩擦音

C、叩诊心浊音界向两侧扩大，固定不随体位变化

D、坐位前倾及吸气末更易触及心包摩擦感

E、舒张期更加容易触及

答案：B

解析：心包炎，出现纤维素渗出导致心包摩擦，可以触及摩擦感，听到摩擦音，且呼吸暂停时心包摩擦仍然存在，不会消失。大量心包渗出，脏、壁层心包壁分开则摩擦音和摩擦感都可以消失。心包摩擦在前倾位及呼气末和心脏收缩期更加明显。本题正确答案为 B。

294.中输尿管压痛点位于

A、右肋缘下腹直肌外缘

B、背部第 12 肋骨与脊柱的夹角顶点

C、脐与髂前上棘连线的中外 1/3 交界处

D、脐水平线上腹直肌外缘

E、髂前上棘水平腹直肌外缘

答案：E

295.患者，女，30 岁，出现左侧口角低，左侧耳后疱疹。入院后诊断为左侧亨特综合征。

神经系统查体不可能出现以下那一项临床体征

A、左侧鼻唇沟浅

B、左侧闭眼不紧

C、左侧口角低

D、左侧舌前 2/3 味觉丧失

E、左侧舌后 1/3 味觉丧失

答案：E

296.患者风心病，机械瓣换瓣术后，长期华法林抗凝治疗，请问服药期间需监测哪一项指标

A、D-Dimer

B、纤维蛋白原

C、TT

D、APTT

E、PT

答案：E

297.位听神经检查不包括

A、听力检查

B、询问患者有无眩晕

C、询问有否夜行困难

D、观察患者有否眼球震颤

E、耳郭检查

答案：E

298.下列哪些不是引起便血的小肠疾病

A、小肠血管畸形

B、肠套叠

C、回肠溃疡

D、空肠溃疡

E、阿米巴痢疾

答案：E

299.穿刺损伤出血和蛛网膜下腔出血的主要鉴别要点是

- A、外观
- B、透明度
- C、红细胞的数量
- D、离心观察上清液的颜色及沉淀情况
- E、蛋白质定量

答案：D

300.新生儿红细胞参考值为

- A、 $(5.0 \sim 7.0) \times 10^{12}/L$
- B、 $(6.0 \sim 8.0) \times 10^{12}/L$
- C、 $(7.0 \sim 8.0) \times 10^{12}/L$
- D、 $(6.0 \sim 7.0) \times 10^{12}/L$
- E、 $(6.5 \sim 7.5) \times 10^{12}/L$

答案：D

301.弥散性血管内凝血

- A、出血时间正常，凝血时间延长
- B、出、凝血时间正常，束臂试验阳性
- C、出血时间延长，凝血时间正常
- D、出、凝血时间均延长，血块收缩不良
- E、出、凝血时间正常，束臂试验阴性

答案：D

302.特发性血小板减少性紫癜

- A、出血时间正常，凝血时间延长
- B、出、凝血时间正常，束臂试验阳性
- C、出血时间延长，凝血时间正常
- D、出、凝血时间均延长，血块收缩不良
- E、出、凝血时间正常，束臂试验阴性

答案：C

303.患者，女，26岁，哺乳期，明确诊断为急性乳腺炎，关于该患者描述最不可能出现的是

- A、乳房皮肤呈橘皮样或猪皮样改变
- B、该患可出现发热、寒战
- C、乳房局部红肿
- D、乳房局部可触及质韧的肿块，有压痛
- E、肿块活动性好

答案：A

304.肺下界移动度减弱见于下述情况，但除外哪一项

- A、肺气肿
- B、肺不张
- C、肺纤维化
- D、胸腔大量积液
- E、肺组织炎症

答案：D

305.角膜反射的传入神经是

- A、面神经
- B、三叉神经
- C、动眼神经
- D、交感神经
- E、展神经

答案：B

306.图为铁染色后的骨髓涂片，其中见有较多颗粒和小块状蓝色阳性物。你认为此阳性应该被确认为

- A、细胞内铁
- B、细胞外铁
- C、可靠的细胞内铁
- D、可靠的细胞外铁
- E、细胞内铁和细胞外铁均能确认

答案：B

307.原发性肥胖的叙述正确的是

- A、常有一定的遗传倾向
- B、多由内分泌疾病所致
- C、全身脂肪分布不均
- D、多不属于食饵性肥胖
- E、身体多个部位有异常改变

答案：A

308.下列哪项不是满月脸典型表现

- A、面如满月
- B、皮肤发红
- C、皮肤黝黑
- D、痤疮
- E、多毛症

答案：C

309.下列各种原因引起皮肤黏膜出血的特点均正确，但除外哪一项

- A、毛细血管壁缺陷出血多为皮肤的淤点、淤斑
- B、毛细血管壁缺陷出血较少见软组织、血肿及内脏出血
- C、血小板异常所致的出血多表现为软组织血肿
- D、凝血因子缺乏引起的出血常有内脏，肌肉出血
- E、凝血障碍所致出血常有家族史或肝脏病史

答案：C

310.成人正常脑脊液蛋白定量为多少 g/L

- A、0.15 ~ 0.45
- B、0.45 ~ 0.65
- C、0.65 ~ 0.85
- D、0.85 ~ 0.95
- E、0.95 ~ 1.15

答案：A

311.一平卧男性患者查体时用钝头竹签划足底外侧，由足跟向前至近小足趾跖关节处转向（足母）指侧时发现足跖屈曲。这种临床现象属于以下哪种临床体征

- A、Babinski 征阳性
- B、Gordon 征阳性
- C、Oppenheim 征阳性
- D、正常跖反射
- E、跟腱反射活跃

答案：D

312.不符合典型左心衰表现的是

- A、血压降低
- B、脉压减小
- C、心界左下移位
- D、可出现交替脉
- E、腹部移动性浊音阳性

答案：E

解析：腹部移动性浊音阳性说明体循环淤血，更常见于右心衰。

313.下列哪一项鉴别右心衰与肝硬化有意义

- A、肝功能异常
- B、腹水
- C、双下肢水肿
- D、肝脏肿大
- E、肝颈静脉回流征阳性

答案：E

314.下列疾病常引起胸廓局部隆起，但需除外哪一项

- A、肺气肿
- B、心包积液
- C、主动脉瘤
- D、胸壁肿瘤
- E、肋软骨炎

答案：A

315.患者，男，70岁，高脂血症，长期口服降脂药物，常规体检血常规示血小板计数仅为 $5 \times 10^9/L$ ，查体皮肤未见淤点、紫癜、淤斑。请问该患者血小板计数与临床表现不相符的原因是

- A、毛细血管通透性正常
- B、小动脉收缩能力正常
- C、血小板释放功能正常
- D、EDTA 导致血小板聚集增加
- E、凝血因子正常

答案：D

(主题干)患者，男，77岁，因尿频，活动时不自主流尿及夜间遗尿半年入院。追问病史5年前即出现尿线变细、排尿等待症状，且逐渐加重。体查：一般情况良好，叩诊膀胱底部位于耻骨上8cm。肛门指检：前列腺Ⅲ度增生。尿常规：WBC (+++)，RBC (+)。血肌酐 $155 \mu\text{mol/L}$

316.根据患者情况，诊断和治疗方案应采取

- A、IVU 检查了解上尿路情况
- B、尿培养检查，使用敏感抗生素治疗尿路感染

- C、留置导尿管观察肾功能恢复情况
- D、肾功能改善后行前列腺摘除手术
- E、使用阴茎套

答案：E

(主题干)患者，男，77岁，因尿频，活动时不自主流尿及夜间遗尿半年入院。追问病史5年前即出现尿线变细、排尿等待症状，且逐渐加重。体查：一般情况良好，叩诊膀胱底部位于耻骨上8cm。肛门指检：前列腺Ⅲ度增生。尿常规：WBC (+++)，RBC (+)。血肌酐 155μmol/L

317.该患者尿失禁应属于

- A、压力性尿失禁
- B、急迫性尿失禁
- C、充盈性尿失禁
- D、张力性尿失禁
- E、混合性尿失禁

答案：C

318.患者，女，45岁，因慢性肾衰竭出现尿毒症，入院接受同种异体肾移植手术。入院前曾接受多次输血和血液透析。患者在硬膜外麻醉下行右侧同种异体肾移植术，手术过程顺利，但在作肾动、静脉吻合并开放血流15分钟后，被移植的肾脏即开始呈现花斑状，张力逐渐减退，搏动减弱。25分钟后肾脏呈紫色，尿流减少。手术医师考虑为超急性排斥反应，即行移植肾摘除术。摘除肾病理检查结果确诊为超急性排斥反应。该患者发生超急性排斥反应的可能原因中，不包括哪一项

- A、抗HLA抗体
- B、特异性CTL细胞
- C、ABO天然血型抗体
- D、抗血管内皮细胞抗体
- E、抗血小板抗体

答案：B

319.患儿，女，3岁，误食毒鼠强后，有出血表现，下列哪种情况不太可能出现

- A、血小板数目明显减少
- B、APTT延长
- C、PT延长
- D、BT正常
- E、血小板数目正常

答案：A

320.患者，女，36岁，既往曾发生过晕厥，查体可闻及主动脉瓣区收缩期粗糙的喷射性杂音，主动脉区第二心音减弱，X线检查可见升主动脉扩张及左室增大

- A、非梗阻性肥厚型心肌病
- B、冠心病心绞痛
- C、主动脉瓣狭窄
- D、主动脉瓣关闭不全
- E、高血压性心脏病

答案：C

321.患者因突发剧烈咳嗽就诊。追问病史，述晚餐进食新鲜海虾，餐后约1小时感皮肤痒，继之出现连续剧烈咳嗽。患者自述病史时常因咳嗽中断，其间可闻高调吸气回声。

查体见皮肤大小不等的红色荨麻疹。此患者首先应考虑诊断为

- A、喉头水肿
- B、声带麻痹
- C、气管异物
- D、气管受压
- E、自发性气胸

答案：A

322.常见于酸性尿液中的结晶是

- A、三价磷酸盐
- B、尿酸铵结晶
- C、草酸钙结晶
- D、非晶形磷酸盐
- E、磷酸钙结晶

答案：C

323.叩听法可发现腹水的量至少为

- A、300ml
- B、500ml
- C、100ml
- D、1000ml
- E、120ml

答案：E

解析：仰卧位时叩诊有移动性浊音其腹水量已达 1000 ml 以上，若采用肘膝位移动性浊音叩诊法，腹水量达 500 ~ 600 ml 时移动性浊音即呈阳性。而叩听法可发现腹水的量至少为 120ml。

324.以下哪项可作为贫血治疗疗效判定的指标

- A、白细胞
- B、血小板
- C、网织红细胞
- D、单核细胞
- E、淋巴细胞

答案：C

325.肾结石

- A、血尿伴大量蛋白尿
- B、血尿伴肾小管性蛋白尿
- C、血尿伴发热，皮疹
- D、血尿伴肾绞痛
- E、血尿伴活动后心悸气促

答案：D

326.流行性出血热

- A、血尿伴大量蛋白尿
- B、血尿伴肾小管性蛋白尿
- C、血尿伴发热，皮疹
- D、血尿伴肾绞痛
- E、血尿伴活动后心悸气促

答案：C

327.患者，女，38岁，7年前开始出现面容改变，表现为头颅增大、面部变长、下颌增大、向前突出、眉弓及两颧骨隆起、唇舌肥厚、耳鼻增大。该患者面容改变是

- A、二尖瓣面容
- B、黏液性水肿面容
- C、面具面容
- D、肢端肥大症面容
- E、甲状腺功能亢进面容

答案：D

328.胆汁酸盐的特点不包括

- A、在肝脏由胆固醇合成
- B、为脂类吸收中的乳化剂
- C、抑制胆固醇结石的形成
- D、是胆色素的代谢产物
- E、可经肠肝循环被重吸收

答案：D

(主题干)患者，男，67岁。夜间尿频半年余，排尿困难2个月。B超检查：双肾未见占位性病变，膀胱充盈良好，前列腺4.5cm×4cm×3cm大小，残余尿量120ml

329.如果最大尿流率<10ml/s，膀胱顺应性尚好，治疗方法最好采取

- A、药物治疗
- B、开放手术
- C、经尿道电切术
- D、局部放疗
- E、局部理疗

答案：C

(主题干)患者，男，67岁。夜间尿频半年余，排尿困难2个月。B超检查：双肾未见占位性病变，膀胱充盈良好，前列腺4.5cm×4cm×3cm大小，残余尿量120ml

330.首先要做的检查是

- A、CT
- B、MRI
- C、经直肠B超
- D、尿流动力学
- E、腹部X线平片

答案：D

331.患者，男，18岁，低热1个月，右侧胸痛3天，明确诊断为中等量胸腔积液，下列为该患者叩诊特异性改变，除外

- A、Damoiseau曲线
- B、Garland三角区
- C、Grocco三角区
- D、Skoda叩响
- E、Traube鼓音区

答案：E

332.病毒的致热物质主要是

- A、全菌体及植物凝集素

- B、全病毒体及血细胞凝集素
- C、全病毒体及裂解素
- D、胞壁肽及血细胞凝集素
- E、全病毒体及内毒素

答案：B

333.符合急性淋巴细胞白血病原始细胞的是

- A、PAS 阳性
- B、非特异性酯酶阳性
- C、中性粒细胞碱性磷酸酶减低
- D、胞浆中可有 Auer 小体
- E、过氧化酶染色阳性

答案：A

334.关于便血下列叙述哪一项是正确的

- A、粪便颜色为黄色可断定无便血
- B、下消化道出血时，血便多为暗红色
- C、上消化道出血时，血便均为柏油样便
- D、服用铋剂、铁剂后粪便隐血试验阳性
- E、急性出血坏死性肠炎粪便呈果酱样脓血便

答案：B

335.患者，男，42 岁，醉酒后夜宿马路花坛后出现高热，右侧胸痛、咯铁锈色痰。下列哪种体征对诊断有帮助

- A、右侧语颤减弱，叩诊浊音，呼吸音弱
- B、右侧语颤减弱，叩诊过清音，呼吸音弱
- C、右侧语颤增强，叩诊鼓音，呼吸音弱
- D、右侧语颤增强，叩诊浊音，呼吸音弱
- E、右侧语颤减弱，叩诊浊音，支气管语音弱

答案：D

336.患者，女，23 岁，腹胀，腹痛 3 个月，近 1 个月有发热，盗汗。移动性浊音阳性，实验室检查：腹腔积液常规：比重 1.018，蛋白质定量为 37g/L，白细胞 $680 \times 10^6/L$ ，淋巴细胞占 0.80，HBsAg (+)，肝功能正常，最可能疾病是

- A、结核性腹膜炎
- B、肝硬化并自发性腹膜炎
- C、肝硬化并结核性腹膜炎
- D、卵巢囊肿
- E、腹膜癌

答案：A

337.患者在活动过程中，因呼吸困难和心悸而停止活动并采用蹲踞位或膝胸位，常见于下列哪种疾病

- A、慢性心力衰竭
- B、心绞痛
- C、先天性发绀型心脏病
- D、慢性肺源性心脏病
- E、大量胸腔积液

答案：C

338.下列心源性哮喘临床表现的描述均正确，但除外哪一项

- A、气喘、面色青紫、出汗
- B、有哮鸣音
- C、咳浆液性粉红色泡沫样痰
- D、心率减慢
- E、两肺底有湿啰音

答案：D

339.严重机械性肠梗阻，下列描述错误的是

- A、可见管状隆起排列于中腹部，组成多层梯形肠型
- B、可见明显蠕动波，此起彼伏，运行方向不一
- C、可见明显蠕动波，此起彼伏，运行方向一致
- D、听诊可及高调肠鸣音或金属音
- E、结肠远端梗阻时，其肠型多位于腹部周边

答案：C

340.不属于生理性尿液结晶的是

- A、草酸钙
- B、酪氨酸
- C、尿酸
- D、磷酸盐
- E、马尿酸

答案：B

(主题干)患者，男，30岁，呕血黑便少尿3天入院。既往乙肝病史。查体：血压80/50mmHg，慢性肝病面容，腹膨隆，无腹壁静脉曲张，脾左肋下3cm，肾区无叩痛，移动性浊音阳性。双下肢不肿。24小时尿量300ml

341.请问该患者少尿最可能的原因是

- A、肝肾综合征
- B、血容量不足
- C、心功能不全
- D、急性肾炎
- E、脾脏压迫

答案：B

342.男性，65岁，吸烟40年，近2月时间反复出现干咳，不伴咳痰，近1月渐出现咳嗽和说话声音嘶哑。胸部CT检查发现左上肺包块。其声嘶最有可能的原因为

- A、舌咽神经受损
- B、三叉神经受损
- C、迷走神经受损
- D、喉下神经受损
- E、喉返神经受损

答案：E

343.柏油便与下列哪个物质有关

- A、二氧化硫
- B、硫化亚铁
- C、酸化正铁血红蛋白
- D、含铁血黄素

E、肠道尿素酶

答案：B

344.门脉高压性肝硬化视诊所见蜘蛛痣、肝掌、男性乳房发育是由于

A、门脉高压

B、低蛋白血症

C、肝功能不全

D、垂体性腺功能紊乱

E、雌激素水平升高

答案：E

345.下列均是九区法解剖标志，但除外

A、两侧肋弓下缘

B、两侧髂前上棘

C、腹直肌外侧

D、腹中线

E、脐

答案：E

346.右心衰竭的症状

A、呼吸困难

B、胸痛

C、腹胀

D、肩背部放射痛

E、头痛

答案：C

347.关于测量血压叙述不正确的是

A、测量前安静休息至少 5 分钟

B、测量时肘部置于心脏同一水平

C、测量时声音突然变小而低沉为舒张压

D、气袖下缘在肘窝以上约 2.5cm

E、测量时不能将听诊器体件塞于袖带内

答案：C

348.患者，女，19 岁，明确诊断为支气管哮喘，关于该病急性发作时的描述错误的是

A、呈呼气性呼吸困难

B、胸廓呈吸气位

C、两肺弥漫湿啰音

D、两肺叩诊呈过清音

E、呈呼气音延长

答案：C

349.患者，男，56 岁，咳嗽、气短 10 余年，加重 1 月，胸部 CT 提示矽肺，曾下矿工作应记录在

A、既往史

B、个人史

C、系统回顾

D、现病史

E、家族史

答案：B

350.患者，男，35岁，腹部剧烈绞痛5小时，伴呕吐，不排气，腹胀。腹部查体可闻及金属音，肠鸣音8次/分，该患者最可能的诊断为

- A、急性胰腺炎
- B、急性机械性肠梗阻
- C、急性胃炎
- D、幽门梗阻
- E、急性胆囊炎

答案：B

351.血小板释放的花生四烯酸产物是

- A、二磷酸腺苷
- B、肾上腺素
- C、5-羟色胺
- D、凝血酶
- E、血栓烷 A₂

答案：E

352.下列哪种疾病时不易出现肝大表现

- A、急性病毒性黄疸型肝炎
- B、肝硬化腹水
- C、肝癌并发肝性脑病
- D、肝脓肿合并右侧胸腔积液
- E、右心衰合并下肢水肿

答案：B

353.紫癜伴有黄疸者多见于

- A、严重肝病
- B、尿毒症
- C、过敏性紫癜
- D、血友病
- E、白血病

答案：A

354.下面是间接叩诊法，叩诊的次数哪一项是对的

- A、只需连续叩击1~2下
- B、只需连续叩击2~3下
- C、只需连续叩击3~4下
- D、只需连续叩击4~5下
- E、只需连续叩击5~6下

答案：B

355.下列局部淋巴结肿大的原因均正确，但除外哪一项

- A、急性化脓性扁桃体炎
- B、淋巴结结核
- C、恶性肿瘤淋巴结转移
- D、传染性单核细胞增多症
- E、慢性牙龈炎

答案：D

356.下列哪项是深感觉检查

- A、痛觉
- B、触觉
- C、温度觉
- D、运动觉
- E、皮肤定位觉

答案：D

357.下列为正常人能听到支气管呼吸音的常见部位，但应除外哪一项

- A、喉部
- B、胸骨上窝
- C、肩胛间区 3、4 胸椎水平
- D、背部第 6、7 颈椎附近
- E、背部第 1、2 胸椎附近

答案：C

358.正常人血液 pH 为

- A、 7.50 ± 0.05
- B、 7.30 ± 0.05
- C、 7.60 ± 0.04
- D、 7.40 ± 0.05
- E、 7.20 ± 0.05

答案：D

359.下列关于 β -受体亢进综合征的叙述正确的是

- A、与自主神经功能紊乱无关
- B、是一种器质性心血管疾病
- C、心得安试验后心电图可恢复正常
- D、当在精神紧张时心悸反而缓解
- E、除心悸、胸闷症状外无心电图改变

答案：C

360.可导致转铁蛋白饱和度降低的情况是

- A、口服避孕药
- B、体内铁缺乏
- C、月经过多
- D、溶血性贫血
- E、缺铁性贫血

答案：D

361.下列机制中哪种不是心脏杂音产生的机制

- A、血流减速
- B、瓣膜口狭窄或关闭不全
- C、异常血流通道
- D、大血管瘤样扩张
- E、瓣膜口关闭不全

答案：A

362.患者，男，35 岁，半小时前被钢筋刺入右侧胸壁，自觉胸痛，进行性呼吸困难，不能平卧。该患者最有可能出现的体征是

- A、右侧胸廓塌陷
- B、右侧语音震颤增强
- C、叩诊呈过清音
- D、气管向左侧移位
- E、听诊右肺可闻及干啰音

答案：D

363.下列哪种情况下，可引起周围性发绀

- A、阻塞性肺气肿
- B、大叶性肺炎
- C、室间隔缺损
- D、重度贫血
- E、右心衰竭

答案：E

364.AFP > 500μg/L 持续升高 1 个月以上时，下列中最有意义的诊断是

- A、病毒性肝炎
- B、肝硬化
- C、胆管癌
- D、原发性肝癌
- E、转移性肝癌

答案：D

365.患者咳黄绿色脓痰时，首先考虑感染因素是

- A、铜绿假单胞菌
- B、曲霉菌
- C、金黄色葡萄球菌
- D、大肠埃希菌
- E、厌氧菌

答案：A

366.血尿伴高血压最常见于下列哪种疾病

- A、流行性出血热
- B、肾结核
- C、肾肿瘤
- D、肾小球肾炎
- E、感染性心内膜炎

答案：D

367.关于肾小球性蛋白尿，下列哪项描述错误

- A、是肾小球滤膜损伤所致
- B、以 β_2 微球蛋白增多为主
- C、尿蛋白排出量较多，常 > 2g/24h
- D、急性肾小球肾炎时可见此种蛋白尿
- E、以上都对

答案：E

368.上消化道出血出现黑便的机理是

- A、血红蛋白与肠内细菌分泌的氨基酸氧化酶结合
- B、血红蛋白与肠内细菌分泌的肠激酶类结合

- C、血红蛋白与肠内细菌分泌的尿素酶结合
- D、血红蛋白与肠内硫化物结合形成硫化亚铁
- E、血红蛋白与肠内硫化物结合形成硫化铁

答案：D

369.上述疾病中与碘摄入情况密切相关的是

- A、单纯甲状腺肿
- B、甲状腺功能亢进
- C、亚临床甲状腺炎
- D、甲状腺癌
- E、甲状旁腺瘤

答案：A

370.患者，男，22岁，反酸暖气多年，常于餐前中上腹痛，进食后可缓解，昨起排出黑色柏油样大便，共三次，每次约150~200g。应首先考虑下列哪种疾病引起的柏油样大便

- A、食管静脉曲张破裂
- B、消化性溃疡
- C、急性胃黏膜病变
- D、胃癌
- E、食管贲门黏膜撕裂症

答案：B

解析：中上腹痛注意与胸痛相鉴别

371.患者，女，31岁，因“腰痛1年余，加重伴活动受限2周”入院。查体腰椎曲度变直、腰肌痉挛紧张、腰骶椎棘旁及骶髂关节叩击痛。MRI示双侧骶髂关节炎。为减轻疼痛，患者可能的体位是

- A、被动体位
- B、强迫俯卧位
- C、强迫侧卧位
- D、强迫仰卧位
- E、辗转体位

答案：B

372.患者，女，21岁，低热、盗汗1个月。有大量胸腔积液。痰涂片抗酸杆菌(+)。引起此病胸腔积液的主要病因是

- A、炎症
- B、肿瘤
- C、物理或化学刺激
- D、营养不良
- E、淋巴管阻塞

答案：A

373.肝细胞性黄疸时，符合

- A、尿胆红素阴性，尿胆原阳性
- B、尿胆红素阳性，尿胆素阳性
- C、尿胆红素阳性，尿胆原阴性
- D、尿胆红素阴性，尿胆原阴性
- E、尿胆红素阴性，尿胆素阴性

答案：B

374.不会减慢心率的药物是

- A、倍他乐克
- B、地高辛
- C、硝苯地平
- D、维拉帕米
- E、比索洛尔

答案：C

375.脑性瘫痪患者可能出现

- A、剪刀步态
- B、蹒跚步态
- C、跨阈步态
- D、慌张步态
- E、醉酒步态

答案：A

376.患者，女，62岁，不规则阴道出血1月就诊。经妇科检查怀疑宫颈肿瘤。与宫颈癌发病有关的病原微生物是

- A、衣原体
- B、支原体
- C、HIV
- D、EBV
- E、HPV

答案：E

377.患者，女，58岁，反复右上腹疼痛，发热伴尿黄3年，昨日又出现右上腹绞痛，发冷，尿黄来诊。下列哪项体征对诊断最有意义

- A、Murphy征阳性
- B、季肋点压痛阳性
- C、Courvoisier征阳性
- D、肝脏肿大
- E、腹部移动浊音阳性

答案：A

378.腰背剧痛伴高热、肢体运动障碍，最可能的疾病是

- A、腰椎结核
- B、风湿热
- C、化脓性脊椎炎
- D、急性胆囊炎
- E、类风湿关节炎

答案：C

379.胸骨下端左或右缘

- A、二尖瓣区
- B、肺动脉瓣区
- C、主动脉瓣区
- D、主动脉瓣第二听诊区
- E、三尖瓣区

答案：E

380.胸骨右缘第2肋间

- A、二尖瓣区
- B、肺动脉瓣区
- C、主动脉瓣区
- D、主动脉瓣第二听诊区
- E、三尖瓣区

答案：C

381.下列各种疾病可触到水冲脉，但需除外哪一项

- A、动脉导管未闭
- B、严重贫血
- C、甲状腺功能亢进症
- D、主动脉瓣关闭不全
- E、肺动脉瓣关闭不全

答案：E

382.贫血伴轻度黄疸最可能的诊断

- A、再生障碍性贫血
- B、脾功能亢进
- C、特发性血小板减少性紫癜
- D、溶血性贫血
- E、急性白血病

答案：D

383.患者，男，45岁。腰部疼痛3周。搬重物后出现，疼痛向右下肢放射。查体：腰部活动受限，右侧直腿抬高50°出现右下肢放射性疼痛。腰椎X线片未见异常。该患者最可能的诊断是

- A、腰扭伤
- B、腰椎间盘突出
- C、腰椎肿瘤
- D、腰椎管狭窄征
- E、强直性脊柱炎

答案：B

384.正常骨髓象骨髓增生程度为下列哪种

- A、增生极度活跃
- B、增生明显活跃
- C、增生活跃
- D、增生减低
- E、增生极度减低

答案：C

385.不可能形成脊柱器质性侧凸的原因是

- A、肩部或胸廓畸形
- B、慢性肥厚粘连
- C、先天性脊柱发育不全
- D、坐骨神经性侧凸
- E、肌肉麻痹

答案：D

386.下列中属于中性粒细胞中毒性改变的是

- A、巨多分叶核粒细胞
- B、棒状小体
- C、空泡变性
- D、球形包涵体
- E、异型淋巴

答案：C

387.诊断阑尾炎的重要依据是

- A、早期上腹痛或脐周痛
- B、右下腹压痛
- C、右下腹包块
- D、右下腹麦氏点有显著而固定的压痛与反跳痛
- E、早期上腹痛数小时后转为右下腹痛

答案：D

388.患者，男，77岁，吸烟50年，常年咳嗽、咳痰，近10年出现活动性呼吸困难、并进行性加重。2年前明确诊断为慢性支气管炎合并肺气肿，1小时前剧烈咳嗽后，突然出现胸痛，呼吸困难加重，查体右肺叩诊呈鼓音，该患最可能出现的合并症是

- A、气胸
- B、支气管哮喘
- C、肺栓塞
- D、胸腔积液
- E、大叶性肺炎

答案：A

389.患者为妊娠晚期孕妇，出现胎盘早剥后阴道流血不止2天，2天内输血2000ml，止血效果不佳，同时患者出现皮肤淤斑，解黑便，其出血不止的原因是

- A、大量输血致稀释性血小板减少
- B、急性ITP
- C、并发急性再障
- D、并发DIC
- E、肝功能受损致凝血功能障碍

答案：D

390.患者，女，47岁，慢性乙型肝炎病史17年。近半年右胁胀痛，纳差、乏力、消瘦，腹部检查肝肋下5cm，剑突下4cm，质地坚硬，表面不光滑，肋下可触及多个结节，边缘厚薄不一致，化验AFP 700ng/ml，肝功能ALT < 40U/L，SB < 17μmol/L，A 30g/L，G 40g/L。最可能诊断是

- A、脂肪肝
- B、肝淤血
- C、肝包虫病
- D、原发性肝癌
- E、肝良性肿瘤

答案：D

391.患者，男，70岁。皮肤巩膜黄染10余天，伴全身瘙痒，粪便成白陶土色。体检：TB 108μmol/L，CB 50μmol/L，ALT 68U/L，ALP 130 U/L，GGT 350U/L，尿胆原(-)，

尿胆红素 (+++), B 超肝内胆管扩张及胆总管扩张, 胆总管下端可疑结石。该患者黄疸属于

- A、溶血性黄疸
- B、肝外胆汁郁积性黄疸
- C、肝内胆汁郁积性黄疸
- D、肝细胞性黄疸
- E、先天性黄疸

答案: B

392. 眼心反射检查时发现压迫眼球后脉率反而加速提示

- A、交感神经亢进
- B、交感神经减弱
- C、迷走神经亢进
- D、迷走神经减弱
- E、三叉神经损伤

答案: A

393. 右心衰竭的体征不包括下述哪一种表现

- A、双肺布满中小湿啰音
- B、颈静脉怒张
- C、胸腔积液和腹腔积液
- D、肝大
- E、下肢凹陷性水肿

答案: A

394. 有关体格检查注意事项, 不正确的是

- A、检查过程中注意避免交叉感染
- B、检查手法要轻柔
- C、力求达到全面、系统、重点、规范和正确
- D、首先进行心、肺、腹检查
- E、注意左右及相邻部位的对比检查

答案: D

395. 骨髓异常增生综合征 (MDS) RAEB 型骨髓特点正确的是

- A、原始细胞 < 0.05
- B、环状铁粒幼细胞 > 0.15
- C、原始细胞占 $0.05 \sim 0.19$
- D、原始细胞占 $0.20 \sim 0.29$ 或见 Auer 小体征
- E、幼稚单核细胞增多

答案: C

396. 生理状态下, 关于血小板的止血功能描述正确的是

- A、血小板膜蛋白 II b/III a 与 VWF 结合黏附于血管内皮下胶原
- B、血小板膜蛋白 I b 通过纤维蛋白原等促进血小板聚集
- C、血小板可以参与外源性凝血过程
- D、血小板可以参与内源性凝血过程
- E、谢谢释放 ATP 促进血小板聚集及血管收缩

答案: D

397. 关于柏油样便的叙述, 下列中正确的是见于

- A、下消化道出血
- B、镜下可见大量完整红细胞
- C、肉眼为黑色，有金属光泽
- D、见于直肠癌
- E、见于痔疮

答案：C

398.心脏右侧浊音界由下列各段组成，但不包括

- A、上腔静脉
- B、肺动脉
- C、升主动脉
- D、右心室
- E、右心房

答案：B

399.尿毒症患者口腔有

- A、尿味
- B、大蒜味
- C、腥臭味
- D、鼠臭味
- E、烂苹果味

答案：A

400.精神错乱患者口腔有

- A、尿味
- B、大蒜味
- C、腥臭味
- D、鼠臭味
- E、烂苹果味

答案：D

401.患者，男，40岁，低热2月余伴腹胀就诊。体检：体温37.9℃，浅表淋巴结未及，肝肋下2cm，脾肋下5cm。血常规：RBC $5.5 \times 10^{12}/L$ ，Hb 122 g/L，WBC $125 \times 10^9/L$ ，分类示中性中幼粒细胞为10%、中性晚幼粒细胞为15%、中性杆状核粒细胞为30%、中性分叶核粒细胞为30%、嗜碱性分叶核粒细胞为2%、淋巴细胞为10%、单核细胞为3%，BPC $550 \times 10^9/L$ ，NAP积分为0分。为明确诊断，应进行下述检查，但除外

- A、骨髓涂片检查
- B、染色体核型分析
- C、融合基因检查
- D、肝功能检查
- E、骨髓细胞培养

答案：D

402.患者，男，46岁，疲倦、盗汗、腹胀2个月。外周血白细胞计数 $50 \times 10^9/L$ ，中性0.85，杆状核0.15，最有助于鉴别该病人为类白血病反应或慢性粒细胞性白血病的是

- A、贫血
- B、碱性磷酸酶升高
- C、骨髓粒系统增生为主
- D、血小板 $385 \times 10^9/L$

E、腹部可及包块

答案：B

403.患者，女，42岁，“风心病”病史10年，心慌气短1个月，查心电图：P波消失，代之以大小不等，形状各异的f波，频率为500次/分，心室律绝对不规则，心率130次/分，脉率110次/分，应考虑为

A、室上性心动过速

B、室早二联律

C、心房扑动

D、心房纤颤

E、窦性心律不齐

答案：D

404.不属于女性外生殖器的结构的是

A、阴阜

B、大阴唇

C、小阴唇

D、阴道及阴道前庭

E、会阴

答案：D

405.患者，男，42岁，体检示乙肝系列抗-HBs阳性。下列说法错误的是

A、是一种保护性抗体

B、发病后早期出现

C、发病后3~6个月才出现

D、可持续存在多年

E、注射过乙型肝炎疫苗或抗-HBs免疫球蛋白者可阳性

答案：B

406.患者，女，33岁，无明显诱因，出现巩膜黄染，消瘦，不发热，查体：胆囊增大，无触痛、腹软、无压痛、肝脾未触及，最可能的诊断为

A、胰头癌

B、病毒性肝炎

C、胆石症

D、原发性胆汁性肝硬化

E、原发性肝癌

答案：A

407.患者，女，60岁，近半年来感乏力、厌食、腹胀、便秘，并伴有颜面部水肿，于当地医院完善相关检查，甲功提示：TSH升高明显，FT3及FT4显著下降；甲状腺摄碘率降低。关于该患者的甲状腺触诊，说法不恰当的是

A、甲状腺可触及不到明显增大

B、触诊时应嘱患者做吞咽动作

C、触诊甲状腺可有结节感

D、一般可触及甲状腺震颤

E、甲状腺可无明显压痛

答案：D

408.关于血管壁的止血机制描述错误的是

A、增强局部血管收缩反应

- B、激活血小板
- C、激活凝血系统
- D、抑制纤溶
- E、降低局部血粘度

答案：E

409.下列关于急性淋巴细胞白血病描述正确的是

- A、FAB 形态学分类 L3 型是以小细胞为主，核染色质较粗
- B、POX 染色阳性率 > 3%，NAP 积分降低
- C、骨髓象中以分化较好的小淋巴细胞为主
- D、白血病细胞胞质中较易见到 Auer 小体
- E、骨髓象中原始和幼稚淋巴细胞为主，常易见涂抹细胞

答案：E

31.下列为甲状腺功能亢进的面容，但不包括哪一项

- A、面容惊愕
- B、眼裂增大
- C、眼球突出
- D、目光闪烁
- E、睑厚面宽

答案：E

32.一般经多次检查成年男性红细胞及血红蛋白增多是指

- A、RBC > $5.0 \times 10^{12}/L$ ；HB > 160g/L
- B、RBC > $6.0 \times 10^{12}/L$ ；HB > 170g/L
- C、RBC > $5.0 \times 10^{12}/L$ ；HB > 170g/L
- D、RBC > $6.0 \times 10^{12}/L$ ；HB > 160g/L
- E、RBC > $7.0 \times 10^{12}/L$ ；HB > 170g/L

答案：B

33.下述对发热时机体物质代谢变化的叙述中哪项是错误的

- A、物质代谢率增高
- B、糖原分解加强
- C、脂肪分解加强
- D、蛋白质代谢出现负氮平衡
- E、维生素消耗减少

答案：E

34.关于大叶性肺炎实变期体征的描述，下列哪项是错误的

- A、气管居中
- B、病变部位语音震颤减弱
- C、病变部位叩诊浊音
- D、呼吸音减弱
- E、可以听到异常支气管呼吸音

答案：B

35.患者，男，38 岁。呼吸困难，查体见脉搏在吸气时消失。这种脉搏是

- A、交替脉
- B、无脉
- C、迟脉

- D、奇脉
- E、水冲脉

答案：D

36.正常成人脉率在安静、清醒的情况下是

- A、55~80 次/分
- B、55~100 次/分
- C、60~72 次/分
- D、60~80 次/分
- E、60~100 次/分

答案：E

37.标志着炎症波及壁腹膜的是

- A、腹壁紧张
- B、腹部压痛
- C、反跳痛
- D、逆蠕动波
- E、Murphy 征阳性

答案：C

38.下述关于正常成人发育的指标错误的是

- A、头长为身高的 1/7
- B、胸围等于身高的一半
- C、两上肢平展开的长度约等于身高
- D、坐高等于下肢的长度
- E、臀围等于 2 倍的头围

答案：E

39.杵状指的病因不包括

- A、肢端缺氧
- B、中毒性损害
- C、代谢障碍
- D、肢端软组织增生
- E、铁缺乏

答案：E

40.下述皮肤黏膜出血的基本病因均正确，但除外哪一项

- A、毛细血管壁的缺陷
- B、血小板的数量或功能异常
- C、凝血因子缺乏或活性减低
- D、皮肤黏膜血管栓塞
- E、血液中的抗凝物质增多

答案：D

41.Cullen 征是指

- A、脐周围发蓝
- B、左腰部呈蓝色
- C、下腹部紫纹
- D、脐周簇状曲张静脉
- E、系腰带部位皮肤发黑

答案：A

42.关于肝脏性质的叙述下列哪项是正确的

- A、触及肝脏质地如触鼻尖为质硬
- B、触及肝脏质软多为慢性肝炎
- C、触及肝脏质韧表示正常
- D、触及肝脏质硬多见于肝淤血
- E、肝癌时质地坚硬

答案：E

43.下列哪种疾病引起的器质性杂音较局限不传导

- A、二尖瓣关闭不全
- B、二尖瓣狭窄
- C、主动脉瓣狭窄
- D、肺动脉瓣狭窄
- E、主动脉瓣关闭不全

答案：B

(主题干)患者，男，80岁，明确诊断为右肺中心型肺癌，右肺不张

44.下列体格检查改变符合该患者的是

- A、右侧胸廓饱满
- B、右侧呼吸动度减弱
- C、气管移向左侧
- D、心尖搏动移向左侧
- E、肺肝界下移

答案：B

45.S1 分裂见于下列疾病，但除外

- A、右心衰竭
- B、肺动脉高压
- C、右束支传导阻滞
- D、左束支传导阻滞
- E、Ebstein 畸形

答案：D

46.心包积液听诊特点

- A、心音听诊低钝而遥远
- B、听诊胸膜摩擦音
- C、二尖瓣听诊区舒张期喀拉音
- D、三尖瓣听诊区收缩期喀拉音
- E、主动脉瓣听诊区收缩期喀拉音

答案：A

47.以下关于心包摩擦音的说法不正确的是

- A、在心前区或胸骨左缘第3、4肋间最响亮
- B、坐位前倾和呼气末更明显
- C、与心搏一致
- D、屏气时摩擦音消失
- E、见于各种感染性心包炎

答案：D

48.腹式呼吸增强见于

- A、急性腹膜炎
- B、膈肌麻痹
- C、胸腔积液
- D、腹水
- E、腹腔内巨大肿物

答案：C

49.中性粒细胞碱性磷酸酶活性减低，见于下列哪项

- A、急性淋巴细胞白血病
- B、急性粒细胞白血病
- C、再生障碍性贫血
- D、细菌性肺炎
- E、垂体-肾上腺皮质功能亢进

答案：B

50.患者，男，69岁，既往存在冠心病并行冠脉支架植入术，术后长期服用拜阿司匹林药物，现有皮肤紫癜现象，不会受到影响的是

- A、束臂试验
- B、血小板黏附率
- C、出血时间
- D、血块收缩试验
- E、TM测定

答案：E

51.患者，女，32岁。有心脏病4年，最近感到心悸，听诊发现心率100次/分，律不齐，第一心音强弱不等，心尖部有舒张期隆隆样杂音。为进一步检查心律失常性质应首选

- A、心电图检查
- B、超声心动图
- C、X线胸片
- D、嘱病人左侧卧位听诊
- E、嘱病人屏气后听诊

答案：A

52.心音改变不包括

- A、心音增强
- B、心音减弱
- C、心律不齐
- D、心音性质改变
- E、心音分裂

答案：C

53.Graham Steell 杂音产生的机制

- A、二尖瓣狭窄导致肺动脉高压，肺动脉高压导致肺动脉扩张，肺动脉瓣相对关闭不全所致的功能性杂音
- B、主动脉瓣狭窄导致肺动脉高压，肺动脉高压导致肺动脉扩张，肺动脉瓣相对关闭不全所致的器质性杂音
- C、二尖瓣关闭不全导致肺动脉高压，肺动脉高压导致肺动脉扩张，肺动脉瓣相对关闭不全所致的功能性杂音

D、二尖瓣关闭不全导致肺动脉高压，肺动脉高压导致肺动脉扩张，肺动脉瓣相对关闭不全所致的器质性杂音

E、主动脉瓣狭窄导致肺动脉高压，肺动脉高压导致肺动脉扩张，肺动脉瓣相对关闭不全所致的功能性杂音

答案：A

54.下列是关于心包摩擦音的正确描述，但应除外哪一项

A、性质粗糙，呈搔抓样

B、呈三相声音，即心房收缩→心室收缩→心室舒张均出现杂音

C、与呼吸有关，屏气时摩擦音消失

D、胸骨左缘3、4肋间听诊最清楚

E、坐位前倾时，杂音更明显

答案：C

55.Osler小结多见于

A、结节性多动脉炎

B、感染性心内膜炎

C、肺吸虫病

D、肿瘤皮下转移

E、类风湿关节炎

答案：B

56.下列是关于心前区震颤的正确叙述，应除外哪一项

A、触到震颤，就能听到杂音

B、一定条件下，杂音越响，震颤越弱

C、听到杂音，就可触到震颤

D、震颤产生的机制与杂音相同

E、触到震颤，就说明病人有器质性心脏病

答案：C

57.右心衰竭晚期水肿的特征是

A、双下肢水肿

B、合并胸腹腔积液

C、右下肢水肿

D、肝脏肿大

E、腰骶部水肿

答案：B

58.在下列疾病中，不会出现腹式呼吸减弱或消失的是

A、腹膜炎症

B、胸腔积液

C、急性腹痛

D、膈麻痹

E、大量腹水和腹腔内巨大肿物时

答案：B

59.关于皮肤苍白描述不正确的是

A、常出现于口唇、耳郭和面颊

B、可由寒冷所致

C、可见于各种贫血

- D、可见于肢体动脉痉挛
- E、可见于主动脉瓣关闭不全

答案：A

60.正常心脏传导系统哪一部分传导比较缓慢

- A、窦房结
- B、结间束
- C、房室结
- D、左右束支
- E、浦肯野纤维

答案：C

61.以 Apo-B 为主要成分的是

- A、HDL-C
- B、LDL-C
- C、VLDL
- D、CM
- E、Lp (a)

答案：B

62.小水泡音多发生在下列哪段

- A、气管
- B、右主支气管
- C、细支气管
- D、中等大小支气管
- E、段支气管

答案：C

63.下列有关支气管哮喘的描述，哪项不正确

- A、两肺呼吸运动弱
- B、语颤减弱
- C、叩诊呈过清音
- D、两肺满布干鸣
- E、肺下界移动度增大

答案：E

64.患者，男，30岁，高热2天入院，肺CT示左下肺斑片状影及少量胸腔积液，考虑为大叶性肺炎，其胸腔积液积液/血清总蛋白

- A、<0.3
- B、<0.5
- C、>0.5
- D、>0.7
- E、>0.8

答案：C

65.病人咳嗽，咳出痰液成黄绿色脓痰时，首先考虑感染因素为

- A、铜绿假单胞菌
- B、曲霉菌
- C、金黄色葡萄球菌
- D、大肠埃希菌

E、厌氧菌

答案：A

66.下述为对正常语音语颤的描述，但需除外

A、前胸上部较前胸下部为强

B、右胸上部较左胸上部为强

C、男性较女性为强

D、身高较身矮为强

E、消瘦较肥胖为强

答案：D

67.正常成年人肺下界移动范围是

A、5~7cm

B、5~8cm

C、6~7cm

D、6~8cm

E、7~8cm

答案：D

68.非淋菌性尿道炎

A、HIV

B、梅毒螺旋体梅毒亚种

C、淋病奈瑟菌

D、沙眼衣原体和解脲脲原体

E、HSV 与 HPV

答案：D

69.梅毒

A、HIV

B、梅毒螺旋体梅毒亚种

C、淋病奈瑟菌

D、沙眼衣原体和解脲脲原体

E、HSV 与 HPV

答案：B

70.淋病

A、HIV

B、梅毒螺旋体梅毒亚种

C、淋病奈瑟菌

D、沙眼衣原体和解脲脲原体

E、HSV 与 HPV

答案：C

71.下列属于肠道正常菌群的是

A、大肠埃希氏菌

B、双歧杆菌

C、乳酸杆菌

D、优杆菌属

E、以上都对

答案：E

72.急性淋巴结肿大见于

- A、系统性红斑狼疮
- B、淋巴瘤
- C、坏死增生性淋巴瘤
- D、药物热
- E、艾滋病

答案：D

73.患儿，女，5岁。咳嗽，呼吸困难3天入院，查体：口唇发绀，心率：130次/分，胸骨左缘第三、四肋间闻及Ⅲ度粗糙收缩期杂音，肺动脉第二音稍强，两肺细小水泡音。该患儿诊断是

- A、房间隔缺损并发肺炎
- B、室间隔缺损并发肺炎
- C、动脉导管未闭并发肺炎
- D、法洛四联症并发肺炎
- E、房缺伴肺炎

答案：B

74.患儿，女，早产儿，母乳喂养，出生4月，反复呼吸道感染。主要是因为哪类Ig不足

- A、sIgA
- B、IgG
- C、IgD
- D、IgE
- E、IgM

答案：A

75.一名长期营养不良患者因行走不稳入院治疗。入院后神经系统查体发现 Romberg Test 阳性：睁眼稳，闭眼不稳。推测该患者最有可能累及的是以下哪一部位

- A、大脑皮层
- B、脑干
- C、双上肢周围神经
- D、脊髓侧索
- E、神经根

答案：D

76.检查视盘时，应使检眼镜的光轴位于被检查者视轴的

- A、鼻侧 15°
- B、颞侧 15°
- C、重合
- D、上方 15°
- E、下方 15°

答案：B

77.下列各项是意识状态检查，但应除外哪一项

- A、嘱病人辨别白天、黑夜
- B、嘱病人辨别疼痛的位置
- C、嘱病人计算数字
- D、嘱病人发声、辨别性质

E、嘱病人图形组联

答案：D

78.临床医师神经系统查体发现入院患者存在髌阵挛阳性，那该患者膝反射强度应该记录为几级

- A、0
- B、1+
- C、2+
- D、3+
- E、4+

答案：E

79.有关 Lasague 征错误的是

- A、被检者仰卧，双下肢伸直
- B、检查者将被检者伸直的下肢在膝关节处屈曲
- C、直腿高举试验
- D、正常人下肢可抬高 70°以上，如不到 30°即出现由上而下的疼痛即为阳性
- E、坐骨神经痛、腰椎间盘突出或腰骶神经根炎等

答案：B

80.瞳孔正常直径是

- A、2 ~ 3mm
- B、3 ~ 4mm
- C、4 ~ 5mm
- D、5 ~ 6mm
- E、1 ~ 2mm

答案：B

81.下列检查结果出现于急性阑尾炎造成穿孔时，但除外哪一项

- A、闭孔试验阳性
- B、Murphy 征阳性
- C、反跳痛
- D、Markels 征阳性
- E、髂腰肌试验阳性

答案：B

(主题干)患者，男，55 岁。因心悸伴消瘦 1 周来诊。查体：脉率 84 次/分，血压 148/60mmHg，甲状腺弥漫性 II 度肿大，可闻及血管杂音，肺 (-)，心率 112 次/分，心律绝对不整，心音强弱不等，腹 (-)

82.为明确诊断，首选的检查是

- A、心电图
- B、超声心动图
- C、心肌酶谱
- D、血 T3、T4 测定
- E、冠状动脉造影

答案：D

(主题干)患者，男，55 岁。因心悸伴消瘦 1 周来诊。查体：脉率 84 次/分，血压 148/60mmHg，甲状腺弥漫性 II 度肿大，可闻及血管杂音，肺 (-)，心率 112 次/分，心律绝对不整，心音强弱不等，腹 (-)

83.产生心律失常的最可能原因是

- A、冠心病
- B、甲亢性心脏病
- C、心肌病
- D、高血压病
- E、风湿性心脏病

答案：B

(主题干)患者,男,55岁。因心悸伴消瘦1周来诊。查体:脉率84次/分,血压148/60mmHg,甲状腺弥漫性Ⅱ度肿大,可闻及血管杂音,肺(-),心率112次/分,心律绝对不整,心音强弱不等,腹(-)

84.该患者的心律失常类型是

- A、窦性心动过速
- B、心房颤动
- C、心房扑动
- D、频发期前收缩
- E、二度Ⅱ型房室传导阻滞

答案：B

85.最常见血清钙增高的疾病是

- A、维生素D缺乏症
- B、骨质疏松症
- C、低蛋白血症
- D、胰腺癌
- E、甲状腺功能亢进症

答案：E

86.糖化血红蛋白种类不包括

- A、HbE
- B、HbA0
- C、HbA1
- D、HbA2
- E、HbF

答案：A

87.患者,老年男性,因腹膜后包块行剖腹探查术,术中发现腹膜后包块为血肿,术后出现腹腔引流管引流量大,腹部皮肤切口持续渗血,请问患者出血机制是

- A、血管壁缺陷
- B、血小板数量异常
- C、血小板功能异常
- D、凝血因子活性下降
- E、腹膜后肿瘤浸润

答案：D

88.患者,女,42岁,因皮肤紫癜入院,血小板计数 $65 \times 10^9/L$ 血块收缩不良,其血小板减少与下列哪项无关

- A、药物如苯及其衍生物,噻嗪类,雌激素等
- B、病毒感染
- C、电离辐射

D、自身免疫性疾病如 SLE、Evans 综合征等

E、大量出血如月经过多，痔疮出血等

答案：E

89.患儿，男，11 岁，关节受轻伤后，关节处皮肤出现紫癜和淤斑，同时牙龈流血不止，来医院就诊发现受伤关节内出血，实验室检查：CT 正常；FVIII：C 水平明显低下，血常规：白细胞，红细胞正常，血小板 $65 \times 10^9/L$ 。该患者诊断为

A、白血病

B、血管性血友病

C、A 型血友病

D、B 型血友病

E、ITP

答案：C

90.患者，男，50 岁，脓毒血症，怀疑 DIC，下列不支持 DIC 的结果是

A、BT 延长

B、ELT 缩短

C、PT 延长

D、FDP 减少

E、D-二聚体阳性

答案：D

91.患者诊断淋巴浆细胞淋巴瘤，血清 IgM56g/L，反复鼻出血、碰撞后皮肤淤斑，请问患者出血机制主要为

A、血管壁异常

B、血小板异常

C、凝血因子异常

D、纤维蛋白溶解亢进

E、病理性抗凝物质增多

答案：A

92.慢性粒细胞白血病病人有哪种染色体改变

A、t (15; 1)

B、t (9; 22) (q34, q11)

C、t (8; 14)

D、t (11; 8) (q34, q11)

E、16 号染色体结构异常

答案：B

93.缺铁性贫血哪一项是正确的

A、血清铁降低，总铁结合力增高，运铁蛋白饱和度增高

B、血清铁降低，总铁结合力增高，运铁蛋白饱和度降低

C、血清铁降低，总铁结合力增高，运铁蛋白饱和度正常

D、血清铁降低，总铁结合力降低，运铁蛋白饱和度降低

E、血清铁降低，总铁结合力降低，运铁蛋白饱和度增高

答案：B

94.下列各项除哪项外均可见嗜碱性粒细胞增多

A、慢性粒细胞性白血病

B、骨髓纤维化症

- C、慢性溶血
- D、脾切除术后
- E、寄生虫感染

答案：E

95.正常人外周血中中性粒细胞杆状核与分叶核之间的正常比值为

- A、1：100
- B、1：20
- C、1：15
- D、1：13
- E、1：6

答案：D

96.下列哪项血浆纤维蛋白原含量不增高

- A、糖尿病
- B、多发性骨髓瘤
- C、急性感染
- D、原发性纤溶症
- E、急性心肌梗死

答案：D

97.诊断淤斑最正确的皮肤改变是

- A、皮下出血直径不超过 2mm
- B、皮下出血直径为 3~5mm
- C、皮下出血直径 5mm 以上
- D、片状出血伴有皮肤显著隆起
- E、稍隆起皮面苍白或红色的局限性水肿

答案：C

98.以下不属于诱聚剂的是

- A、ADP
- B、凝血酶原
- C、胶原
- D、瑞斯托霉素
- E、肝素

答案：E

99.病理性血沉增快，不包括下列中哪项

- A、炎症性疾病
- B、恶性肿瘤
- C、贫血
- D、妊娠期间
- E、高胆固醇血症

答案：D

100.急性冠脉综合征患者接受肝素抗凝治疗，请问患者应监测哪一个指标

- A、纤维蛋白原
- B、D 二聚体
- C、TT
- D、APTT

E、PT

答案：D

101.由血小板异常引起皮肤黏膜出血可见于下列哪种疾病

- A、血友病
- B、维生素 K 缺乏症
- C、血管性紫癜
- D、遗传性出血性毛细血管扩张症
- E、脾功能亢进症

答案：E

102.李某，男，15 岁，左膝关节肿痛 1 周，程度剧烈，并出现发热，体温达 39℃，伴畏寒、寒战。体查：左膝关节浮髌试验阳性，拒动。该患者目前最需要进行的检查不包括

- A、关节腔穿刺
- B、血常规
- C、血培养
- D、血尿酸
- E、关节液培养

答案：D

103.患者，男，45 岁，近 4 年来经常腰痛，劳累及气候变冷时加剧，3 天前因搬重物后，腰痛加剧，疼痛放射至左下肢，最可能的疾病是

- A、脊椎结核
- B、类风湿关节炎
- C、强直性脊柱炎
- D、腰椎间盘突出症
- E、骶椎隐裂

答案：D

104.下列属于肩关节特殊检查的项目是

- A、Thomas 征
- B、Dugas 征
- C、Lasegue 征
- D、Lindner 试验
- E、Jackson 压头试验

答案：B

105.患者，男，37 岁，体检发现尿 pH 值 9.8，可能由下列哪种疾病引起

- A、糖尿病
- B、痛风
- C、高热
- D、服用氯化铵等药物
- E、膀胱炎

答案：E

106.某患者，因水肿、腰痛反复发作 20 年来诊，长期复查尿蛋白和尿红细胞阳性。为评定该患肾小球功能，下列哪项检查最合适

- A、血 Bun
- B、血 Cr

- C、内生肌酐清除率
- D、肾血浆流量
- E、浓缩稀释试验

答案：C

107.下列情况出现的多尿除哪一项外均属于生理性多尿

- A、慢性心力衰竭水肿病人应用利尿剂后
- B、静脉输注生理下盐水过多时
- C、垂体性多尿
- D、饮水过多时
- E、输注咖啡因时

答案：C

108.血清肌酸激酶增高最常见的疾病是

- A、急性心肌梗死
- B、脊髓侧索硬化症
- C、甲状腺功能亢进
- D、系统性红斑狼疮
- E、脑血管疾病

答案：A

109.患者，女，55岁，因劳累后气短、心悸2周入院。查体：面颊部紫红色、口唇发绀、心尖区闻及舒张期杂音。为明确诊断，首先的检查是

- A、心电图
- B、胸片
- C、超声心动图
- D、冠脉造影
- E、心脏MRI

答案：C

110.下列哪项是隔膜型二尖瓣狭窄的体征

- A、肺动脉瓣第二心音亢进
- B、二尖瓣开放拍击音
- C、心尖部舒张期震颤
- D、Graham-steell杂音
- E、三尖瓣相对性关闭不全

答案：B

111.下列哪项改变可提示心功能不全

- A、短绌脉
- B、交替脉
- C、水冲脉
- D、奇脉
- E、脉细快无力

答案：B

112.心包积液

- A、水冲脉
- B、交替脉
- C、奇脉

D、重脉

E、细脉

答案：D

113.主动脉瓣狭窄

A、水冲脉

B、交替脉

C、奇脉

D、重脉

E、细脉

答案：E

114.伤寒

A、水冲脉

B、交替脉

C、奇脉

D、重脉

E、细脉

答案：B

115.患者，女，27岁。查体左上肢脉搏消失，右上肢脉搏正常。该患者可能是

A、多发性大动脉炎

B、心包缩窄

C、心力衰竭

D、心肌梗死

E、严重休克

答案：A

116.下列说法错误的是

A、内脏性腹痛一般疼痛部位不确切

B、躯体性腹痛疼痛部位不确切

C、内脏性腹痛常常伴随恶心、呕吐、出汗等

D、牵涉痛定位明确

E、牵涉痛一般疼痛剧烈

答案：B

117.下列有关水冲脉的叙述均正确，但除外哪一项

A、可称为陷落脉或 Corrigan 脉

B、检查时应先将病人前臂抬高过头

C、水冲脉的产生是由于脉压增大所致

D、主要见于主动脉瓣关闭不全

E、也可见于急性心肌梗死时

答案：E

118.关于脉搏的描述，正确的是

A、正常成人 60~80 次/分

B、儿童约 120 次/分

C、正常人平均 72 次/分

D、男性较女性快

E、老年人较快

答案：C

119.以下各项为主动脉瓣关闭不全的体征，但应除外

- A、靴形心
- B、毛细血管搏动征阳性
- C、舒张期叹气样杂音
- D、脉压大
- E、Graham-steell 杂音

答案：E

120.以下哪项不是慢性主动脉瓣关闭不全的病因

- A、风湿性心脏病
- B、感染性心内膜炎
- C、先天性畸形
- D、人工瓣撕裂
- E、主动脉瓣黏液样变性

答案：D

121.关于舒张期奔马律，哪项错误

- A、又称收缩前奔马律，或房性奔马律
- B、为增强的第四心音
- C、该奔马律的发生与心室收缩有关
- D、见于高血压心脏病
- E、音调较低，强度较弱，距 S2 较远，较接近 S1

答案：C

122.周围血管征不包括

- A、毛细血管搏动
- B、明显颈动脉搏动
- C、奇脉
- D、水冲脉
- E、点头运动

答案：C

123.外周感受区病变（胸膜炎症），可能引发咳嗽是由于刺激传入影响

- A、大脑颞叶
- B、大脑枕叶
- C、中脑
- D、丘脑
- E、延脑

答案：E

(主题干)患者，女，58岁，反复咳嗽、咳痰、气促20年，加重伴低热1周。既往高血压病史10年，血压控制满意。查体：T 38.5℃，P 110次/分，R 24次/分，BP 160/90mmHg。口唇发绀，颈静脉怒张，双肺可闻及哮鸣音和湿啰音，心率110次/分，率齐，P2、A2，剑突下可闻及3/6级收缩期杂音。肺膨隆，肝肋下3cm，压痛(+)，肝颈静脉回流征阳性，双下肢水肿。杵状指

124.对明确诊断，如下哪项检查最有价值

- A、胸部X线片
- B、超声心动图

- C、血气分析
- D、心电图
- E、血 D-二聚体

答案：B

(主题干)患者，女，58岁，反复咳嗽、咳痰、气促20年，加重伴低热1周。既往高血压病史10年，血压控制满意。查体：T 38.5℃，P 110次/分，R 24次/分，BP 160/90mmHg。口唇发绀，颈静脉怒张，双肺可闻及哮鸣音和湿啰音，心率110次/分，律齐，P2、A2，剑突下可闻及3/6级收缩期杂音。肺膨隆，肝肋下3cm，压痛(+)，肝颈静脉回流征阳性，双下肢水肿。杵状指

125.该患者最可能的诊断是

- A、冠心病
- B、心肌病
- C、肺血栓栓塞
- D、肺心病
- E、风湿性心脏瓣膜病

答案：D

126.患者，男，3岁，硬币误入气道内入院，查体可见明显三凹征，关于三凹征的描述错误的是

- A、三凹指胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙
- B、上呼吸道阻塞患者可出现
- C、由于气流进入肺内受阻，吸气时呼吸肌收缩，肺内负压极度增高所致
- D、又称为吸气性呼吸困难
- E、呼气相延长为主要表现

答案：E

127.患者，女，反复门诊就诊，述胸闷、头痛、失眠。化验室及X线检查未见异常，可能出现的下列哪项体征

- A、Kussmaul呼吸
- B、呼吸浅慢
- C、Cheyne-Stokes呼吸
- D、叹息样呼吸
- E、抑制性呼吸

答案：D

128.下列哪一项常引起呼气性呼吸困难

- A、喉痉挛
- B、气管异物
- C、慢性支气管炎
- D、肺不张
- E、重症肺炎

答案：C

129.下列哪种疾病时脑脊液中可发现致病菌

- A、病毒性脑膜炎
- B、流行性乙型脑炎
- C、脑肿瘤
- D、化脓性脑膜炎

E、蛛网膜下腔出血

答案：D

130.为纠正肠源性青紫患者发绀，最适宜的治疗措施为立即给予

A、二巯基丙醇

B、解磷定

C、亚甲蓝

D、D-青霉胺

E、硫酸镁

答案：C

解析：肠源性青紫症因为大量进食含亚硝酸盐的变质蔬菜引起的中毒性高铁血红蛋白血症所致。

131.对乙型肝炎病毒的具有保护作用的抗体是

A、抗-HBc

B、抗-HBs

C、抗-HBe

D、抗-HBc-IgG

E、抗-HBc-IgM

答案：B

132.间歇热最常见于下列哪项疾病

A、大叶性肺炎

B、重症肺结核

C、疟疾

D、布鲁菌病

E、伤寒

答案：C

133.诊断艾滋病目前最常用的方法

A、血清学诊断

B、病毒分离

C、直接显微镜检查 HIV

D、PCR 检查 HIV RNA

E、活组织检查

答案：A

134.有关病原体核酸检测技术，以下叙述不正确的是

A、PCR 技术已发展到既能定性又能定量

B、与 PCR 不同的是 LCR，需两对相邻的寡核苷酸引物

C、在 RT-PCR 的反应体系中先加入病毒 RNA 分子作为模板合成 cDNA

D、病毒核酸检测阳性，说明标本中或病变部位一定有活病毒

E、基因芯片技术一次性可完成大量样品 DNA 序列的检测和分析

答案：D

135.下列哪种疾病时脑脊液中白细胞数可达 $1000 \times 10^6/L$ 以上，且以中性粒细胞为主

A、结核性脑膜炎

B、病毒性脑膜炎

C、新型隐球菌性脑膜炎

D、急性脑膜白血病

E、化脓性脑膜炎

答案：E

136.脑脊液呈毛玻璃样混浊，见于

A、病毒性脑膜炎

B、化脓性脑膜炎

C、结核性脑膜炎

D、梅毒性脑膜炎

E、隐球菌性脑膜炎

答案：C

137.右侧动眼神经损伤可见

A、右侧瞳孔直径 5mm

B、右侧瞳孔直径 2mm

C、右侧眼球外展不能

D、右侧眼球向下及向外运动受限

E、右侧眼睛视力丧失

答案：A

138.右侧交感神经损伤可见

A、右侧瞳孔直径 5mm

B、右侧瞳孔直径 2mm

C、右侧眼球外展不能

D、右侧眼球向下及向外运动受限

E、右侧眼睛视力丧失

答案：B

139.患者，男，16岁，走路时重心不稳2月，近期确诊小脑半球星形胶质细胞瘤，该患者的步态是

A、蹒跚步态

B、醉酒步态

C、慌张步态

D、跨阈步态

E、剪刀步态

答案：B

140.脑脊液若因穿刺损伤引起出血的标本的特点是

A、第1、2、3管红色逐渐变淡

B、第1、2、3管红色逐渐变深

C、第1、2、3管红色无变化

D、第1、3管红色，第2管无色

E、第1管无色，第2、3管红色

答案：A

141.下列不属于惊厥发作典型表现的是

A、突然意识模糊或丧失

B、呼吸暂停

C、瞳孔散大，对光反射消失

D、四肢阵挛性抽搐

E、大小便失禁

答案：D

142.以下哪一项是脑膜刺激征检查内容

- A、直腿抬高实验
- B、Babinski 征
- C、Kernig 征
- D、Oppenheim 征
- E、Romberg 征

答案：C

143.患者，男，74 岁，糖尿病病史 25 年，1 月前开始双足背反复出现高出皮面的腔性皮损，腔内含有清凉液体，液体流出或吸收后皮损可自行愈合，应诊断为

- A、斑疹
- B、玫瑰疹
- C、丘疹
- D、荨麻疹
- E、疱疹

答案：E

144.引起甲状腺肿大的常见疾病不包括

- A、甲状旁腺腺瘤
- B、甲状腺癌
- C、桥本甲状腺炎
- D、单纯性甲状腺肿
- E、甲状腺功能减退症

答案：E

145.黏液水肿最常发生在

- A、Addison 病
- B、糖尿病
- C、甲状腺功能亢进症
- D、甲状腺功能减退症
- E、巨人症

答案：D

146.皮肤无汗异常干燥见于下列哪种疾病

- A、风湿病
- B、甲状腺功能亢进
- C、脑炎后遗症
- D、黏液性水肿
- E、结核病

答案：D

147.毛细血管脆性试验，大于多少个出血点为阳性

- A、> 5 个
- B、> 10 个
- C、> 15 个
- D、> 20 个
- E、> 25 个

答案：B

148.患者，20 岁，APTT 延长，以下最不可能的考虑是

- A、血友病 A
- B、血小板减少
- C、维生素 K 缺乏
- D、低纤维蛋白血症
- E、血友病 B

答案：B

149.患者，女，14 岁，月经初潮后月经量多，持续时间长，被诊断为先天性血小板无力症，以下哪个环节出现问题

- A、血小板黏附异常
- B、VIII活性减低
- C、IX活性下降
- D、狼疮抗凝物阳性
- E、血小板聚集异常

答案：E

150.下列关于特发性骨髓纤维化描述错误的是

- A、骨髓巨核细胞和粒细胞显著增生
- B、外周血红细胞形态不规则，可见泪滴状红细胞，并可出现幼红幼粒细胞
- C、可见髓外造血
- D、Ph 染色体检查 90%以上呈阳性结果
- E、是一种克隆性 MPN

答案：D

151.下列哪一种不属于红细胞结构异常

- A、嗜碱性点彩
- B、Howell-Jolly 小体
- C、CABot 环
- D、有核红细胞
- E、棒状小体

答案：E

152.以关节出血为主要特征的出血性疾病是

- A、血小板减少症
- B、过敏性紫癜
- C、白血病
- D、血友病
- E、严重的贫血

答案：D

153.正常骨髓粒细胞与有核红细胞的比例大约是

- A、1 : 1
- B、1 : 2
- C、1 : 4
- D、2 : 1
- E、(2 ~ 4) : 1

答案：E

154.正常人循环血液中嗜酸性粒细胞占白细胞的比例为

- A、0.005 ~ 0.05
- B、0.05 ~ 0.5
- C、0.5 ~ 5
- D、0.005 ~ 0.5
- E、0

答案：A

155.影响血液分析仪红细胞计数值减低的因素不包括

- A、巨大血小板
- B、血小板聚集
- C、红细胞聚集
- D、红细胞大小不一
- E、白细胞极度增高

答案：D

156.患者，女，37岁，下腹部阵发性疼痛，伴有肛门排气减少，有剖宫产史，下腹部有压痛，肌卫不明显，可能的诊断为

- A、急性胆囊炎
- B、肾绞痛
- C、急性胰腺炎
- D、急性肠胃炎
- E、急性肠梗阻

答案：E

(主题干)患者，男，32岁，长期饮酒史。反复中上腹及右侧上腹隐痛3年，进食后可缓解，伴暖气、腹胀

157.某日，该患者大量饮酒后突发剧烈绞痛，伴恶心、呕吐为胃内容物、烦躁不安，急送医院，测BP 80/50mmHg，肝浊音界缩小，最可能的诊断是

- A、急性胰腺炎
- B、幽门梗阻
- C、急性消化道出血
- D、急性穿孔
- E、急性胆囊炎

答案：D

(主题干)患者，男，32岁，长期饮酒史。反复中上腹及右侧上腹隐痛3年，进食后可缓解，伴暖气、腹胀

158.该患者最可能的诊断是

- A、胆囊炎
- B、慢性肠炎
- C、消化性溃疡
- D、胃癌
- E、慢性胰腺炎

答案：C

(主题干)患者，男，32岁，长期饮酒史。反复中上腹及右侧上腹隐痛3年，进食后可缓解，伴暖气、腹胀

159.为明确诊断，首选的检查是

- A、腹部超声

- B、腹部增强 CT
- C、胸片
- D、胃镜
- E、肠镜

答案：D

160.患者，男，50岁，主述右上腹部隐痛2周，食欲缺乏并有呕吐。体检：T 37.6℃，神清，皮肤轻度黄染，腹平，肝肋下1指，质软。可作为黄疸鉴别诊断的实验室检查是

- A、血清总胆固醇与胆固醇酯
- B、血清总胆红素与直接胆红素
- C、血清白蛋白
- D、血清碱性磷酸酶
- E、血清淀粉酶

答案：B

161.下列哪个部位出血可以称之为上消化道出血

- A、鼻
- B、口腔
- C、小肠
- D、食管
- E、以上均不对

答案：D

162.尖腹多见于

- A、心力衰竭
- B、腹膜癌转移
- C、结核性腹膜炎
- D、胰源性腹水
- E、肾病综合征

答案：C

163.面容憔悴、面色晦暗或苍白无华、目光暗淡的是

- A、伤寒面容
- B、急性面容
- C、慢性面容
- D、贫血面容
- E、肾病面容

答案：C

164.呕血是指

- A、屈氏韧带以上的消化器官
- B、幽门以上的器官
- C、十二指肠以上的消化器官
- D、小肠以上的消化器官
- E、结肠以上的消化器官

答案：A

165.关于正常成人肝脏的描述，下列哪项是不正确的

- A、正常成人肝脏一般在右肋下触不到
- B、在右肋下触及肝下缘提示肝大

- C、腹壁松软的瘦人在剑突下可触及肝下缘，但 < 3cm
- D、腹上角较锐的瘦高者剑突根部下可达 5cm
- E、腹壁松软的瘦人深吸气时在右肋下可触及肝下缘，但 < 1cm

答案：B

166.关于胃肠蠕动下列各项均正确，但除外

- A、胃蠕动波自左肋缘下开始
- B、胃蠕动波常于右腹直肌下消失
- C、小肠梗阻蠕动波多见于脐部
- D、结肠远端梗阻肠型多位于腹周边
- E、胃蠕动波常缓慢地向左推进

答案：E

167.下列均为腹部分区九分法的划分方法，但除外

- A、两侧肋弓下缘连线为上水平线
- B、两侧髂前上棘连线为下水水线
- C、两侧腹直肌外缘为两条垂直线
- D、四条线相交将腹部分为 9 个区域
- E、髂前上棘至腹中线连线的中点为两条垂直线

答案：C

(主题干)黄某，男，18 岁，下腰背痛 3 年，静息时加重，活动后减轻，偶有足跟痛。其父有类似病史，已驼背

168.该患者最有诊断意义的检查是

- A、骨盆平片
- B、腰椎 X 线
- C、跟骨骨密度
- D、ESR
- E、RF

答案：A

169.患者，男，55 岁。远足后右足跟疼痛 2 天。查体：右足根部红肿，右跟腱压痛。该患者最可能的诊断是

- A、跟骨骨刺
- B、跖骨头无菌坏死
- C、疲劳骨折
- D、跟腱腱鞘炎
- E、跖筋膜炎

答案：D

170.患者，女，24 岁，反复腰背痛 1 月，劳累后加剧，捶打腰部疼痛可缓解，X 线检查正常，最可能的疾病是

- A、脊柱退行性变
- B、腰肌劳损
- C、脊柱结核
- D、风湿热
- E、强直性脊柱炎

答案：B

171.关于脊柱胸段后凸原因的描述中错误的是

- A、小儿脊柱后凸多为佝偻病引起，仰卧时可以消失
- B、青年脊柱后凸多为胸椎椎体结核引起
- C、发育期姿势不良可引起胸段下部及腰段均匀后凸
- D、强直性脊椎炎所致胸段后凸，仰卧位脊柱可伸平
- E、老年人脊柱后凸常由于骨质退行性变、胸椎椎体被压缩而成

答案：D

解析：成年人胸段成弧形(或弓形)后凸，见于强直性脊椎炎，脊柱强直固定，仰卧位脊柱亦不能伸平。

172.不出现脊柱前凸的疾病是

- A、大量腹水
- B、晚期妊娠
- C、第5腰椎向后滑脱
- D、先天性髋关节脱位
- E、腹腔巨大肿瘤

答案：C

173.T-H糖蛋白来源于

- A、血浆蛋白
- B、膀胱
- C、尿道
- D、前列腺
- E、肾小管

答案：E

174.患者，女，19岁，感冒后出现水肿尿少1周，尿色红。体查：血压160/95mmHg，面部眼睑水肿，尿常规：红细胞++，蛋白++，她最可能的诊断是

- A、急性肾盂肾炎
- B、慢性肾炎
- C、尿路结石
- D、急性肾炎
- E、肾病综合征

答案：D

175.患者，女，29岁，两次经阴道分娩史。第一胎出生后出现咳嗽、提重物时尿液流出，经盆底肌锻炼等治疗后好转，第二胎出生后尿失禁加重，伴尿频、尿急，锻炼盆底肌等治疗效果欠佳。查体：盆底松弛和子宫脱垂。该患者最有可能诊断为

- A、压力性尿失禁
- B、急迫性尿失禁
- C、真性尿失禁
- D、混合性尿失禁
- E、充盈性尿失禁

答案：D

176.下列哪项不属于肾性少尿的病因

- A、肾病综合征
- B、急性肾小球肾炎
- C、慢性肾小球肾炎
- D、间质性肾炎

E、急性肾小管坏死

答案：A

177.尖锐湿疣的临床表现包括

A、包皮过长，有包皮垢

B、阴茎颈部见单个椭圆形质硬溃疡

C、阴茎头出现硬结，伴暗红色溃疡，触痛出血

D、阴茎头部结节呈菜花样

E、阴茎处淡红色小丘疹，乳突状突起

答案：E

178.色素沉着可见于下列疾病，但除外

A、肝硬化

B、尿毒症

C、肢端肥大症

D、黑热病

E、慢性肾上腺皮质功能减退症

答案：B

179.无尿是指 24 小时尿量少于

A、50ml

B、100ml

C、150ml

D、200ml

E、400ml

答案：B

180.下列各种尿中盐类结晶，除哪种外均可出现在碱性尿中

A、三价磷酸盐结晶

B、尿酸铵结晶

C、非晶形磷酸盐

D、磺胺药物结晶

E、磷酸钙结晶

答案：D

181.常见于碱性尿液中的盐类结晶有

A、尿酸结晶

B、非晶形尿酸结晶

C、尿酸铵结晶

D、氨基酸结晶

E、胆固醇结晶

答案：C

182.前列腺增生患者最重要的症状是

A、排尿困难

B、无痛性肉眼血尿

C、尿潴留

D、尿失禁

E、尿频、尿急、尿痛

答案：A

183.下列中除哪种情况外均可出现少尿或无尿

- A、慢性肾盂肾炎
- B、心力衰竭
- C、休克
- D、肾动脉栓塞
- E、严重脱水

答案：A

184.未生育成年妇女的子宫大小是

- A、8cm×5cm×3cm
- B、8cm×6cm×4cm
- C、7cm×5cm×3cm
- D、5cm×4cm×2cm
- E、5cm×3cm×2cm

答案：C

185.下列关于体表采集的心脏电位强度说法正确的是

- A、和心肌细胞数量成反比
- B、和心肌厚度成反比
- C、与体表电极方位与心肌除极的方向构成角度的大小成反比
- D、和探查电极与心肌细胞之间的距离成正比
- E、同心率成反比

答案：C

186.患者，男，35岁。阵发性心悸3年，既往体健。查体：BP 130/80mmHg，双肺未闻及湿啰音，心脏各瓣膜区闻及杂音。心律不齐，心电图示心室率140次/分，P波消失，代之大小不等的f波。该患者最可能出现的体征是

- A、发绀
- B、二尖瓣面容
- C、脉搏短绌
- D、A2亢进
- E、双下肢水肿

答案：C

187.患者，女，35岁，心悸，气短二年，颈静脉怒张，心尖部可闻及舒张期杂音，S1亢进。最早出现水肿的部位是

- A、眼睑、面部
- B、腹部
- C、双下肢
- D、单侧下肢
- E、周身

答案：C

188.交替脉提示

- A、心律失常
- B、心包积液
- C、心功能不全
- D、脉压增大
- E、脉压下降

答案：A

189. 下列为心包摩擦感的正确描述，但应除外哪一项

- A、心包摩擦感的触及与胸膜摩擦感相似
- B、它是心包壁层和脏层相摩擦产生的振动
- C、收缩期和舒张期均可触知
- D、卧位时或吸气末，心包摩擦感明显
- E、心包渗透增多时，摩擦感消失

答案：D

190. 肺梗死痰液为

- A、脓血痰
- B、砖红色胶冻痰
- C、痰中带血
- D、暗红色黏液痰
- E、铁锈色痰

答案：D

(主题干)患者，女，23岁，发作性气喘1天。

191. 个人史应问诊哪些内容，除外

- A、出生地
- B、受教育程度
- C、上次月经时间
- D、职业性过敏原接触史
- E、起居卫生习惯

答案：C

(主题干)患者，女，23岁，发作性气喘1天。

192. 系统回顾应问哪些内容，除外

- A、呼吸系统症状
- B、循环系统症状
- C、消化系统症状
- D、泌尿系统症状
- E、内分泌及造血系统症状

答案：A

(主题干)患者，女，23岁，发作性气喘1天。

193. 针对既往史应该问什么，除外

- A、有无患过传染病
- B、有无外伤、手术史
- C、有无过敏史
- D、有无疫区居留史
- E、有无输血史

答案：D

(主题干)患者，女，23岁，发作性气喘1天。

194. 接诊患者，围绕现病史，还需要问诊哪些内容，除外

- A、有无腹痛、腹泻
- B、气喘时还有哪里不舒服
- C、气喘时用过什么药

D、做过什么检查

E、气喘的诱因

答案：A

195.年青女性，发热 38℃ ~ 39℃，咳嗽，胸痛，呼吸困难。查体：气管向左侧移位，语颤右侧减弱，叩之实音。最可能的诊断是

A、气胸

B、胸腔积液

C、肺气肿

D、支气管扩张

E、支气管哮喘

答案：B

196.患者，男，20 岁，全身乏力，低热、盗汗 3 月，胸片示左上肺出现少许密度高、边缘清晰的结节状阴影。若该患者出现呼吸困难，属于下列哪种类型

A、吸气性呼吸困难

B、呼气性呼吸困难

C、混合性呼吸困难

D、心源性呼吸困难

E、中毒性呼吸困难

答案：C

197.患者，女，22 岁，低热、盗汗 1 个月入院。有大量胸腔积液。痰涂片：抗酸杆菌 (+)。该患者的胸腔积液蛋白定量可能是

A、< 20g/L

B、< 25g/L

C、> 30g/L

D、> 35g/L

E、> 40g/L

答案：C

198.正常成年人语音震颤最弱的部位是

A、肺尖

B、胸骨旁第 1、2 肋间隙

C、肩胛间区

D、肺底

E、腋下

答案：D

199.下列哪项可为诊断慢性阻塞性肺气肿提供线索

A、Biot's 呼吸

B、两肺布满哮鸣音

C、Kussmaul 呼吸

D、叹息样呼吸

E、呼气音延长

答案：E

200.患儿，男，9 岁，突然出现高热、头痛、喷射状呕吐。查体示皮肤出血点，颈项强直。脑脊液检查外观浑浊，脑脊液涂片镜检革兰阴性双球菌。根据以上结果，可初步诊断为

- A、肺炎链球菌性脑膜炎
- B、脑膜炎奈瑟菌性脑膜炎
- C、葡萄球菌性脑膜炎
- D、淋病奈瑟菌性脑膜炎
- E、肠球菌性脑膜炎

答案：B

(主题干)患者，男，33岁。有不洁性行为史，尿痛伴尿道分泌物3天。查体：尿道口红肿、附着分泌物且有触痛，触压尿道可见尿道口乳白色分泌物流出

201.患者妻子1周后出现了明显的尿频，尿急，尿痛和外阴烧灼感，查体不可能出现的表现是

- A、外阴、阴道、尿道口红肿
- B、尿道旁腺有脓性分泌物溢出
- C、外阴局部溃烂，见菜花样结节
- D、前庭大腺红肿触痛，可有瘘管形成
- E、宫颈充血红肿，脓液流出

答案：C

解析：其妻为患者淋病感染传染所致，表现为尿道，外阴，内生殖器的淋球菌感染，因此可以有各种急性淋病感染的局部改变，而答案C是外阴癌的局部表现。

(主题干)患者，男，33岁。有不洁性行为史，尿痛伴尿道分泌物3天。查体：尿道口红肿、附着分泌物且有触痛，触压尿道可见尿道口乳白色分泌物流出

202.该患者最可能的诊断是

- A、急性膀胱炎
- B、急性肾盂肾炎
- C、淋菌性尿道炎
- D、急性前列腺炎
- E、软性下疳

答案：C

解析：尿道口红肿、附着分泌物或有溃疡，且有触痛者，多见于感染所致的尿道炎；触压淋病性尿道炎患者的尿道可见尿道口乳白色分泌物流出。

203.住院病历的既往史，下述仅有一项是对的

- A、药物或食物的过敏史
- B、受教育程度史
- C、烟酒嗜好史
- D、业余爱好史
- E、冶游史

答案：A

204.伤寒患者发病第一周内分离病原菌应采取的标本是

- A、血液
- B、尿液
- C、粪便
- D、呕吐物
- E、脑脊液

答案：A

解析：此时为菌血症期。

205.临床上习惯用的营养状态良好是如下描述，但不包括其中哪一项

- A、肌肉结实
- B、指甲、毛发润泽
- C、肋间肌深浅适中
- D、肩胛肌和股部肌肉丰满
- E、体内中性脂肪过多积聚

答案：E

206.大剂量应用下列哪种药物可引起高铁血红蛋白血症

- A、亚甲蓝
- B、维生素 C
- C、头孢硫脒
- D、普萘洛尔
- E、伯氨喹

答案：E

207.提示肝炎慢性化或肝硬化转变时，最有意义的表现是

- A、ALT 增高
- B、AST 增高
- C、总胆固醇增高
- D、STB 增高
- E、A/G 比值倒置

答案：E

208.皮肤定位觉障碍常见于以下哪一部位损伤

- A、脊髓后索
- B、脊髓丘脑前束
- C、脊髓丘脑侧束
- D、三叉丘系
- E、大脑皮质

答案：E

209.一左侧耳后疱疹并左侧口角低患者来院检查，接诊医生发现患者为亨特综合征。以下哪一项不是其临床表现

- A、左侧舌后 1/3 味觉丧失
- B、左侧舌前 2/3 味觉丧失
- C、左侧口角低
- D、左侧闭眼不紧
- E、左侧鼻唇沟浅

答案：A

210.患者，男，60 岁，既往有脑动脉硬化病史，此次入院后头颅 MRI 确诊存在延髓梗死。神经系统查体不可能出现以下哪一项临床体征

- A、声音嘶哑
- B、饮水呛咳
- C、软腭抬举受限
- D、舌前 2/3 味觉丧失
- E、咽反射迟钝

答案：D

211.患者，女，45岁，间断发作心悸、大汗，发作时伴饥饿感，无黑蒙、眩晕。查体：BP 140/90mmHg，睑结膜无苍白，颈动脉明显搏动。发作时血压与平素无明显变化，心悸反复发作，最可能的病因是

- A、冠心病
- B、甲状腺功能亢进症
- C、主动脉狭窄
- D、重度贫血
- E、低血糖症

答案：B

212.患者，男，80岁。既往有糖尿病、冠心病病史，平素规律应用胰岛素控制血糖，患者1天前无明显诱因开始出现呕吐、腹泻，晨起应用胰岛素后突发意识障碍，呼之不应，伴有皮肤湿冷，心率增快，血压96/63mmHg。其意识障碍最可能的原因是

- A、快速性心率失常
- B、低血糖综合征
- C、病态窦房结综合征
- D、癫痫发作
- E、短暂脑缺血发作

答案：B

213.甲状腺功能减退的面容是

- A、表情淡漠，反应迟钝呈无欲状态
- B、面色晦暗，额部有褐色色素沉着
- C、面色苍白，唇舌色淡，表情疲惫
- D、面色灰暗，双颊发红，口唇发绀
- E、面色苍黄，目光呆滞，眉毛稀疏

答案：E

214.甲状腺功能减退的面容是

- A、面色憔悴，表情忧虑
- B、面色苍白，颜面水肿，目光呆滞
- C、面容灰褐，额部有褐色色素沉着
- D、面肌痉挛，牙关紧咬
- E、表情淡漠，反应迟钝

答案：B

215.单纯性肥胖具有下列哪项特点

- A、无家族史
- B、无营养过度史
- C、多为均匀性肥胖
- D、可有糖尿病
- E、可有甲状腺疾病

答案：C

216.重型地中海贫血多次输血后

- A、血清铁降低，总铁结合力升高，转铁蛋白饱和度降低
- B、血清铁降低，总铁结合力降低，转铁蛋白饱和度正常或降低
- C、血清铁升高，总铁结合力降低，转铁蛋白饱和度升高
- D、血清铁升高，总铁结合力升高，转铁蛋白饱和度升高

E、血清铁升高，总铁结合力升高，转铁蛋白饱和度降低

答案：C

217.患者，女，23岁，ITP患者，以下可能出现的检查结果

A、TT 延长

B、血小板减少，BT 延长

C、APTT 延长

D、骨髓增生活跃，巨核细胞数减少或缺乏

E、PT 延长

答案：B

218.淋巴细胞增多见于下列哪项疾病

A、免疫缺陷病

B、传染性单核细胞增多症

C、丙种球蛋白缺乏症

D、化脓性扁桃腺炎

E、应用肾上腺皮质激素后

答案：B

219.目前认为所有血细胞均起源于下列哪种细胞

A、全能干细胞

B、骨髓系干细胞

C、淋巴系干细胞

D、T 淋巴系祖细胞

E、B 淋巴系祖细胞

答案：A

220.下列实验室检查结果中，支持再生障碍性贫血的是

A、外周血出现有核红细胞

B、外周血淋巴细胞比例减低

C、中性粒细胞碱性磷酸酶积分减低

D、骨髓中巨核细胞减低

E、骨髓中非造血细胞减低

答案：D

221.总铁结合力实际上是反映血浆哪类物质的水平

A、铁蛋白

B、转铁蛋白

C、血清铁

D、血游离原卟啉

E、游离铁

答案：E

222.五种白细胞中，下列哪种细胞核染色质呈疏松网状

A、中性粒分叶核细胞

B、嗜酸性粒细胞

C、嗜碱性粒细胞

D、单核细胞

E、淋巴细胞

答案：D

223.Rh 阴性的母亲，其胎儿若 Rh 阳性，胎儿生后易患

- A、血友病
- B、白血病
- C、红细胞增多症
- D、新生儿溶血症
- E、巨幼红细胞贫血

答案：D

224.急性淋巴细胞白血病与急性粒细胞白血病在形态上无法区别时，最好采用下列哪种方法加以区别

- A、非特异性酯酶染色
- B、糖原染色
- C、中性粒细胞碱性磷酸酶染色
- D、免疫分型
- E、过氧化酶染色

答案：D

225.海洋性贫血引起的红细胞形态异常为

- A、嗜碱点彩 RBC
- B、球形 RBC
- C、RBC 缙钱状改变
- D、镰形 RBC
- E、靶形 RBC

答案：E

(主题干)患者，男，32 岁，6 小时前参加婚宴，1 小时前出现腹痛，伴恶心，呕吐胃内容物，停止排便排气，肠鸣音 1 次/分

226.下列哪项体征最不可能

- A、中上腹压痛
- B、腹式呼吸减弱
- C、左腰部皮肤呈蓝色
- D、蠕动波消失
- E、肠型

答案：E

(主题干)患者，男，32 岁，6 小时前参加婚宴，1 小时前出现腹痛，伴恶心，呕吐胃内容物，停止排便排气，肠鸣音 1 次/分

227.该患者首先考虑诊断

- A、急性胰腺炎
- B、溃疡穿孔
- C、机械性肠梗阻
- D、急性胃肠炎
- E、急性阑尾炎

答案：A

228.患者，老年女性，突发右上腹疼痛，向肩部放散，发热，寒战。查体 T 39℃，巩膜黄染，心肺未见异常，右上腹肌紧张，压痛，反跳痛。最可能的诊断是

- A、急性胰腺炎
- B、肝癌破裂

- C、胆总管结石
- D、胆道蛔虫症
- E、胃肠穿孔

答案：C

229.便血同时可触及腹部肿块见于下列疾病，但除外

- A、小肠恶性淋巴瘤
- B、结肠癌
- C、肠结核
- D、Crohn 病
- E、阿米巴痢疾

答案：E

230.腹部分区九区法左上腹不包括哪个脏器

- A、脾脏
- B、左肾上腺
- C、结肠脾曲
- D、胃
- E、胰体

答案：E

231.患者，女，64岁。手指麻木2个月。双手尺侧感觉减退，伴上肢放射痛，查体：压头试验阳性，该患者最可能的颈椎病类型是

- A、复合型颈椎病
- B、椎动脉型颈椎病
- C、交感神经型颈椎病
- D、神经根型颈椎病
- E、脊髓型颈椎病

答案：D

232.下列哪项不是椎间盘突出的临床特点

- A、青壮年多见
- B、有搬重物及扭伤史
- C、L4、5、S1多发
- D、腰痛无放射
- E、起病可急骤或隐匿

答案：D

233.对结核性关节炎，描述错误的是

- A、儿童与青壮年多见
- B、不出现关节畸形
- C、伴有低热、盗汗
- D、负重大关节易受累
- E、有时有窦道形成

答案：B

(主题干)患者，女，48岁，既往体健。因恶心、呕吐伴大量腹泻2天，尿少1天入院，查体：血压85/50mmHg，神志清晰，查体合作，舌质干，四肢湿冷，心率126次/分，律齐，双下肢不肿，查血常规正常，尿常规：蛋白阴性，比重1.030，尿渗透压550mOsm/Kg·H₂O，尿钠15mmol/L，滤过钠排泄分数小于1

234.为明确病因还应该进一步做哪些检查

- A、血尿酸
- B、血肌酐
- C、内生肌酐清除率
- D、氯化铵负荷试验
- E、碳酸氢钠重吸收

答案：B

(主题干)患者，女，48岁，既往体健。因恶心、呕吐伴大量腹泻2天，尿少1天入院，查体：血压85/50mmHg，神志清晰，查体合作，舌质干，四肢湿冷，心率126次/分，律齐，双下肢不肿，查血常规正常，尿常规：蛋白阴性，比重1.030，尿渗透压550mOsm/Kg·H₂O，尿钠15mmol/L，滤过钠排泄分数小于1

235.患者最可能存在

- A、肾前性急性肾衰竭
- B、肾性急性肾衰竭
- C、肾后性急性肾衰竭
- D、远端肾小管酸中毒
- E、近端肾小管酸中毒

答案：A

(主题干)患者，男，45岁，右侧阴囊肿大3周。自述用力咳嗽或者大便时，阴囊肿大更明显。查体：右侧阴囊肿大，平卧可回纳

236.若患者右侧阴囊透光试验显示阴囊呈橙红色均质的半透明改变。则患者最可能的诊断是

- A、阴囊疝
- B、鞘膜积液
- C、睾丸肿瘤
- D、附睾平滑肌瘤
- E、隐睾症

答案：B

(主题干)患者，男，45岁，右侧阴囊肿大3周。自述用力咳嗽或者大便时，阴囊肿大更明显。查体：右侧阴囊肿大，平卧可回纳

237.患者最可能的诊断是

- A、阴囊疝
- B、鞘膜积液
- C、睾丸肿瘤
- D、附睾平滑肌瘤
- E、隐睾症

答案：A

(主题干)患者，女，20岁，反复出现镜下血尿2月，不伴尿频、尿急，颜面、双下肢无水肿。查体：双侧扁桃体Ⅱ度肿大，双肾无叩击痛。尿常规示尿蛋白(++)，镜检WBC(-)，RBC(+++)，非均一性血尿86%

238.该患者首先考虑的诊断是

- A、泌尿系结石
- B、间质性肾炎
- C、系统性红斑狼疮

D、盆腔炎

E、IgA 肾病

答案：E

(主题干)患者，女，30岁，发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛1周。既往无类似病史。查体：T38.3℃，心肺检查无异常，腹软，双肾区有叩击痛

239.患者的实验室检查结果：尿蛋白(+)，白细胞30~50个/HP，可见白细胞管型。该患者最可能的诊断是

A、急性肾小球肾炎

B、急性尿道炎

C、急性膀胱炎

D、急性肾盂肾炎

E、尿道综合征

答案：D

240.患者，女，30岁。突然右下腹绞痛，伴有恶心。体格检查：腹部平坦，无腹肌紧张，右下腹深压痛，右肋脊点叩痛。实验室检查：血白细胞 $9.8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.4，尿镜检白细胞5个/HP，红细胞10个/HP。最可能的诊断为

A、急性阑尾炎

B、右侧输尿管结石

C、膀胱结石

D、右侧输卵管炎

E、肠梗阻

答案：B