

骨科A

题型：A1

1.诊断骨肿瘤性质极其重要的依据是

- A.化验检查
- B.分层穿刺
- C.X线检查
- D.CT检查
- E.病理切片

2.类风湿性关节炎患者的手部最常见的异常体征是

- A.伸腕功能障碍
- B.伸拇功能障碍
- C.屈拇功能障碍
- D.屈腕功能障碍
- E.伸指功能障碍



3.关于脊髓栓系综合征，不正确的是

- A.终丝变粗
- B.脊髓低位
- C.大小便失禁
- D.下肢感觉障碍
- E.下肢肌肉一般为痉挛性瘫痪

4.膝关节有扭伤及交锁史，最可能的损伤是

- A.膝关节外侧副韧带损伤
- B.胫骨平台骨折
- C.半月板损伤
- D.内侧副韧带撕裂
- E.前十字韧带撕裂

5.颈椎病的鉴别诊断中，肩周炎不可能出现

- A.三角肌萎缩

- B.斜方肌痉挛
- C.肩痛及上臂痛
- D.前臂和手疼痛
- E.大范围活动时，疼痛加剧

6.关于锁骨正确的描述是

- A.外侧1/3凸向前
- B.内侧端扁平
- C.呈横向“S”形
- D.内侧2/3凸向后
- E.内侧端与胸骨颈静脉切迹构成胸锁关节

7.脊柱外伤造成脊髓休克，是由于

- A.因脊髓受血肿等压迫
- B.骨折片刺入脊髓
- C.脊髓神经细胞遭受震荡，产生暂时性功能抑制，发生传导障碍
- D.外伤后脊髓神经细胞遭到破坏
- E.脊髓上、下行传导束断裂

8.在开放性骨折的清创术中，下列步骤**不**适当的是

- A.常规应用止血带
- B.切除1~2mm的污染皮缘
- C.切除失去活力的组织
- D.任何神经均应尽量保留
- E.与周围组织仍有联系的碎骨片应予保留

9.损伤腓总神经**不可能**出现

- A.足尖向下
- B.不能伸趾
- C.足背感觉障碍
- D.足底感觉障碍
- E.足内翻

10.患者，男，27岁，摔伤左上臂，致左肱骨近端（肱骨外科颈下）骨折，骨折端的自然移位方向应为

- A.近侧端外展，远侧端内收及上移
- B.近侧端内收，远侧端外展及下移
- C.近侧端内旋，远侧端外展及上移
- D.近侧端外旋，远侧端内收及下移
- E.近侧端内收，远侧端外展及上移

11.腰椎间盘突出症引起有关描述中，哪项是**错误**的

- A.突出髓核压迫神经根致无菌性炎症
- B.自身免疫反应使神经根发生炎症
- C.破裂的椎间盘组织产生化学性物质的刺激

- D.突出髓核牵张已有炎症的神经根，使其静脉回流受阻
- E.神经根水肿的增加，使疼痛加重

12.骨折愈合过程中，血肿机化演进期约需

- A.1周
- B.2周
- C.4周
- D.2个月
- E.3个月

13.伤后下肢处于短缩、外展、极度外旋位，可能的诊断

- A.股骨颈骨折
- B.股骨粗隆间骨折
- C.股骨上1/3骨折
- D.股骨上中段骨折
- E.股骨髁上骨折

14.关于黄韧带的描述，下列**错误**的是

- A.为相邻两椎弓板之间的弹性结缔组织膜
- B.硬膜外麻醉不需穿经此韧带
- C.厚2~3mm，呈节段性
- D.腰段黄韧带常增厚压迫马尾引起腰腿痛
- E.参与围成椎管的后外侧壁

15.下列关于肩关节周围炎的说法，哪项是正确的

- A.多见于青少年
- B.晚间疼痛减轻
- C.肩关节外展受限
- D.可见典型疼痛
- E.发病急，病程约数周

16.股骨颈骨折，X线表现为外展型骨折，则Pauwels角应为

- A. $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$
- B. $40^{\circ} \sim 50^{\circ}$
- C. $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- D. $< 30^{\circ}$
- E. $> 60^{\circ}$

17.下列转移性骨肿瘤中，血清酸性磷酸酶中高的是

- A.乳腺癌
- B.胃癌
- C.肺癌
- D.前列腺癌
- E.肝癌

18.骨肉瘤单纯使用根治性切除手术治疗，5年存活率不高，其主要原因是

- A.早期髓腔内广泛蔓延
- B.早期血液中发现瘤细胞
- C.早期淋巴管内瘤栓形成
- D.早期广泛侵犯软组织
- E.多见于年轻人

19.肱骨中下1/3骨折，最易损伤的是

- A.尺神经
- B.桡神经
- C.正中神经
- D.肱动脉
- E.肱二头肌

20.临床诊断脊柱结核，下列哪项最有价值

- A.局部疼痛
- B.X线检查
- C.穿刺液送结核菌培养
- D.消瘦、贫血、盗汗、食欲缺乏
- E.结核菌素试验

21.腰椎间盘突出症最重要的体征是

- A.棘突间压痛
- B.椎旁压痛
- C.直腿抬高试验（+），加强试验（+）
- D.腰椎侧凸畸形
- E.跛行

22.对后纵韧带的描述**错误**的是

- A.位于椎管内椎体的后面
- B.比前纵韧带薄且窄
- C.有限制脊柱过度前屈的作用
- D.与椎体的上、下缘和椎间盘紧密相连
- E.上自枕骨大孔后缘，下达尾骨

23.关天肱骨外上髁炎，下列哪项**不对**

- A.易发生于职业网球运动员
- B.是屈腕屈指肌腱止点处的慢性损伤性炎症
- C.症状为肘外侧痛，且向前臂外侧放射
- D.伸腕抗阻力试验阳性
- E.封闭治疗常常有效

24.患者，女，56岁，左桡骨下端粉碎骨折，因骨折不稳定畸形愈合，后期出现伸拇活动障碍，可能的原因是

- A.创伤性关节炎
- B.拇长伸肌腱断裂
- C.下尺桡关节脱位
- D.损伤性骨化
- E.损伤性肌挛缩

25.急性化脓性骨髓炎最常见的致病菌

- A.金葡菌
- B.链球菌
- C.流感杆菌
- D.大肠杆菌
- E.产气荚膜杆菌

26.关于脊柱的叙述，下列**错误**的是

- A.从第1颈椎到第2骶椎，从上至下逐渐加宽
- B.大部分胸椎棘突细长，斜向后下方，呈叠瓦状
- C.从侧面观，颈椎、腰椎凸向前，胸椎、骶椎凸向后
- D.脊柱所承担重力从髋膝关节传至下肢
- E.脊柱可做屈、伸、侧屈、旋转和环转运动

27.患者，女，50岁，颈肩痛伴左手麻木，咳嗽加重。查体：颈部活动受限，左手内在肌萎缩，左拇指及前臂桡侧感觉减退，病理征阴性，双下肢检查未见异常。其治疗哪项最恰当

- A.颈围领护颈
- B.颈牵引治疗
- C.颈部封闭
- D.休息
- E.以上均正确

28.下列股骨颈骨折最易发生股骨头坏死的是

- A.股骨头下骨折
- B.经颈股骨颈骨折
- C.经基底部股骨颈骨折
- D.不完全移位的股骨颈骨折
- E.稳定型股骨颈骨折

29.一青年男性，腰椎间盘突出症，一侧小腿外侧及足背内侧痛觉减退，拇趾背伸肌力减弱，突出的椎间盘定位是

- A.腰2~3间隙
- B.腰3~4间隙
- C.腰4~5间隙
- D.腰5~骶1间隙
- E.骶1~2间隙

30.下列哪一个椎间盘突出能使跟腱反射改变

A.L₂~L₃

B.L₃~L₄

C.L₄~L₅

D.L₅~S₁

E.S₁~S₂

31.关于手的休息位，下列不正确的是

A.腕关节背伸20°~25°

B.手处于自然静止状态

C.掌指关节和指间关节半屈曲位

D.腕关节背伸10°~15°

E.各指尖指向腕舟骨结节

32.关于脊柱区肌层的描述中，正确的是

A.由浅到深大致可分为3层

B.其中最长的为斜方肌

C.第2层有前锯肌、上后锯肌、下后锯肌、夹肌、菱形肌

D.第1层有斜方肌、背阔肌

E.第3层有竖脊肌、肩胛提肌、腹内斜肌后部

33.胸神经共有（）对

A.11

B.12

C.13

D.14

E.15

34.下列哪一神经不是臂丛神经终末支

A.肌皮神经

B.正中神经

C.桡神经

D.副神经

E.尺神经

35.关于强直性脊柱炎的描述错误的是

A.属结缔组织的血清阳性反应疾病

B.早期常累及双侧髋髌关节

C.HLA-B27阳性率高

D.可累及椎间关节，导致关节僵直

E.可累及髋关节，导致关节僵直

36.椎动脉型颈椎病的主要诊断依据为

A.痛温觉分离，肌萎缩

B.四肢麻木，出现病理反射

- C.出现四肢瘫，有脊髓腔梗阻现象
- D.头痛、头晕、颈后伸或侧弯时眩晕加重，甚至猝倒
- E.颈肩部反复发作，手部有放射性痛，牵拉试验阳性

37.脊柱骨折和脱位最基本的辅助检查是

- A.MRI检查
- B.CT检查
- C.X线检查
- D.B超
- E.椎管造影

38.脊髓型颈椎病的诊断主要依据

- A.颈肩部、手麻
- B.一侧或双侧上肢麻，持物不稳
- C.头痛、眼痛、吞咽困难、面部出汗异常
- D.四肢麻或四肢瘫，病理反射，颈段MRI
- E.痛觉、触觉、温度觉分离，肌萎缩

39.慢性骨髓炎死骨摘除的指征是

- A.慢性骨髓炎急性发作
- B.不易自行吸收的死骨
- C.经久不愈的窦道
- D.死骨已分离，包壳已充分形成
- E.不能自行修复的无效腔




40.关于胸椎的描述，下列哪项正确

- A.有肋凹和横突肋凹
- B.棘突呈板状并水平后伸
- C.横突上有横突孔
- D.上、下关节突呈矢状位
- E.椎体横断面呈椭圆形

41.处理开放性骨折时，哪项正确

- A.用毛刷刷刷污染的骨质

- B.失去活动的大块肌肉组织可部分保留
- C.大块的碎骨块可在清洁消毒后放回原处
- D.不能切除创口边缘
- E.已污染的骨膜应完全切除



42. 肱骨外上髁炎（如图）最敏感的压痛点在
- A. 肱骨外上髁上方
 - B. 肱骨外上髁至桡骨颈之间
 - C. 肱骨外上髁后方
 - D. 肱骨外上髁内侧
 - E. 桡骨中段
43. 肱骨外上髁炎的治疗措施中，不妥的是
- A. 理疗
 - B. 伸肌总腱起点剥离松解术
 - C. 压痛点醋酸泼尼松注射
 - D. 加强腕关节背伸抗阻运动练习
 - E. 伸肌总腱起点神经血管束切除结扎术
44. 慢性骨髓炎的手术指征是
- A. 有骨膜反应
 - B. 有死骨
 - C. 病变骨变粗，密度增高
 - D. 局部红肿
 - E. 反复发热，局部疼痛
45. 关于半月板损伤的治疗，下列哪项错误
- A. 急性损伤可用石膏托固定膝部
 - B. 如伴有关节血肿，应抽尽积血加压包扎
 - C. 确诊后，均应行常规半月板全切除术
 - D. 关节镜检查后，根据损伤范围，切除其损伤部分
 - E. 如边缘撕裂，可行缝合术
46. 肱骨外上髁炎首选的治疗方法是

- A.加强功能锻炼
- B.局部封闭
- C.肘关节制动
- D.抗生素消炎
- E.手术治疗

47.能明确脊椎压缩性骨折的是

- A.X线检查
- B.压痛
- C.淤斑
- D.功能障碍
- E.反常活动

48.属于尺骨的结构是

- A.尺神经沟
- B.鹰嘴窝
- C.冠突窝
- D.三角肌粗隆
- E.桡切迹

49.下列在股骨颈骨折最可能的并发症是

- A.动静脉损伤
- B.缺血性肌挛缩
- C.损伤性骨化
- D.缺血性骨坏死
- E.周围神经损伤

50.关节结核有窦道形成伴化脓感染，与慢性化脓性关节炎窦道经久不愈，鉴别诊断的主要依据是

- A.细菌培养
- B.X线检查
- C.血白细胞计数及分类与血沉
- D.详细的病史询问
- E.局部体征

51.对于高龄股骨头坏死的患者，分期Ⅲ或Ⅳ期的患者，较为适用的治疗方式是

- A.人工关节置换术
- B.非手术保守治疗
- C.股骨头钻孔及植骨术
- D.经转子间旋转截骨术
- E.带血供髂骨移植术

52.以下骨折中不易并发神经损伤的有

- A.肱骨髁上伸直型骨折
- B.肱骨干骨折

- C. 桡骨远端骨折
- D. 锁骨骨折
- E. 尺骨上1/3骨折

53. 髋关节脱位最多见的类型是

- A. 后脱位
- B. 前脱位
- C. 中心型脱位
- D. 合并股骨头骨折的脱位
- E. 合并髌臼骨折的脱位

54. 腰椎间盘突出最常见的突出部位是

- A. L₃~L₄、L₄~L₅
- B. L₄~L₅、L₅~S₁
- C. L₂~L₃、L₃~L₄
- D. L₃~L₄、L₅~S₁
- E. L₂~L₃、L₄~L₅

55. 最易合并肱动脉损伤的骨折是

- A. 肱骨外科颈骨折
- B. 肱骨干骨折
- C. 肱骨髁间骨折
- D. 伸直型肱骨髁上骨折
- E. 屈曲型肱骨髁上骨折

56. 骨折的临床表现，下列哪项描述是**错误**的

- A. 骨折的特有体征包括畸形、反常活动及骨擦音或骨擦感
- B. 检查可疑骨折患者时，应尽量诱发骨擦音或骨擦感的出现，以明确诊断
- C. 骨折时可以没有骨擦音或骨擦感
- D. 临床未见有骨折专有体征时，也可能有骨折
- E. 只要发现骨折专有体征的其中一项，即可作出骨折的明确诊断

57. 股骨颈骨折后，下列哪一体征最**不可能**出现

- A. 髋部叩击痛
- B. Bryant三角底边缩短
- C. 患肢外展、内旋、缩短畸形
- D. Shoemaker线相交于脐下
- E. 患肢略长于健肢

58. 下列中**不是**股骨头坏死病因的是

- A. 股骨颈骨折
- B. 没有骨折的髋关节损伤
- C. 减压病
- D. 长期应用肾上腺皮质激素

E.行髋关节置换手术

59.直腿抬高试验阳性表明

A.Schmorl结节

B.马尾神经损伤

C.慢性腰肌劳损

D.腰3~4椎间盘膨出

E.腰4~5或腰5~骶1椎间盘突出症

60.中央型腰椎间盘突出症压迫马尾神经，出现大小便障碍，治疗方法是

A.卧床休息

B.推拿按摩

C.手术治疗

D.骨盆牵引

E.腰背肌锻炼

61.采用非手术治疗颈椎病，下列**错误**的是

A.自我保健疗法

B.颈托和颈围以限制颈椎过度活动

C.理疗可加速炎性水肿消退、松弛肌肉

D.颈枕带牵引适用于各型颈椎病

E.药物治疗，有固定较小痛点时可局部注射皮质类固醇制剂

62.一胫骨下段骨折的患者，经X线照片为粉碎折，无血管，神经损伤，骨折对位尚好。医生决定行外固定治疗。医生向患者说明有可能骨折延迟愈合或不愈合最主要原因是

A.该处骨折最易固定不牢

B.该处骨折不好复位

C.该骨折为粉碎性

D.该处骨折血运最差

E.该骨折部位皮肤薄

63.下列哪项**不是**切开复位的优点

A.有效的内固定可使患者提前下床活动

B.方便护理，减少并发症

C.使手法复位不能复位的骨折达到解剖复位

D.损伤小，不减少骨折部位的血液供应

E.早期功能练习，防止关节僵硬，减少肌肉萎缩

64.下列中，骨盆骨折最严重的并发症是

A.腹膜后血肿

B.尿道或膀胱损伤

C.直肠损伤

D.神经损伤

E.骶髂关节分离

65.在脊柱骨折中，下列叙述不正确的是

- A.绝大多数由间接暴力引起
- B.胸腰段交界处脊柱活动较多，最易受伤
- C.屈曲型脊柱骨折最常见
- D.伸直型脊柱骨折极少见
- E.脊柱骨折可导致脊髓损伤

66.颈椎骨折脱位合并颈髓损伤，早期出现的严重并发症是

- A.胃肠功能减弱
- B.心力衰竭
- C.呼吸衰竭
- D.肢体肌肉萎缩
- E.四肢关节挛缩

67.患者患腰椎间盘突出症2年，逐年加重，已严重影响生活及工作，且出现尿便障碍，其治疗方法是

- A.理疗
- B.按摩
- C.牵引
- D.用药
- E.手术

68.有关肱骨下端的正常解剖关系，应是

- A.肱骨下端的前倾角为 $40^{\circ}\sim 60^{\circ}$ ，前臂完全旋后时，前臂与上臂之间提携角为 $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$
- B.肱骨下端的前倾角为 $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$ ，前臂完全旋后时，前臂与上臂之间提携角为 $25^{\circ}\sim 30^{\circ}$
- C.肱骨下端的前倾角为 $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$ ，前臂完全旋后时，前臂与上臂之间提携角为 $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$
- D.肱骨下端的前倾角为 $15^{\circ}\sim 25^{\circ}$ ，前臂完全旋后时，前臂与上臂之间提携角为 $0^{\circ}\sim 10^{\circ}$
- E.肱骨下端的前倾角为 $20^{\circ}\sim 25^{\circ}$ ，前臂完全旋后时，前臂与上臂之间提携角为 $5^{\circ}\sim 10^{\circ}$

69.患者，男，60岁。半年来双下肢沉重感，走路无力，右腿明显，无头晕头痛。查体：颈部无明显压痛。臂丛牵拉试验阳性。双膝踝反射亢进，右膝髌阵挛阳性。右侧巴氏征阳性。应考虑的治疗是

- A.颈枕吊带牵引
- B.注射激素
- C.按摩
- D.手术
- E.围领和颈托

70.Dugas征阳性见于

- A.肘关节脱位
- B.桡骨头半脱位
- C.肩关节脱位
- D.髋关节后脱位
- E.膝关节脱位

71.Hippocrates法适用于哪种脱位的复位

- A.肩关节前脱位
- B.肩关节后脱位
- C.髋关节前脱位
- D.髋关节后脱位
- E.髋关节半脱位

72.下列关于肘关节脱位的叙述中，**错误**的是

- A.可分为前脱位、后脱位、内外侧方脱位
- B.以后脱位多见
- C.重症后脱位可伴有正中神经、尺神经损伤
- D.多伴有跌倒手撑地外伤史
- E.治疗以长臂石膏固定肘关节屈曲90°位，三角巾悬吊胸前3~4周

73.全关节结核是

- A.关节软骨、骨端及滑膜均受累
- B.骨组织破坏严重
- C.关节的全部滑膜组织有结核病变
- D.关节腔内积液增多并混浊
- E.关节软骨受累

74.脊柱外伤时，关节交锁是指

- A.关节突完全骨折
- B.关节突不完全脱位
- C.上关节突位于下一椎体下关节突的前方
- D.下关节突位于下一椎体上关节突的前方
- E.关节突骨折伴脱位

75.关于肩周炎下列哪项**不对**

- A.系肩周软组织之无菌性炎症
- B.易发生于重体力劳动者
- C.特征为肩痛，活动受限，肌肉萎缩
- D.封闭，理疗，常有效
- E.本症能自愈

76.患者，男，55岁。近半年来颈肩部不适，头向后仰时有左上肢疼痛，伴左拇指、食指麻木。查：颈僵，第5颈椎叩痛，食指感觉减退。X线示：颈5~6钩椎关节增生。首选处理为

- A.围领保护
- B.超短波理疗
- C.吊带牵引
- D.按摩
- E.痛点封闭

77. 2岁小儿外伤致股骨干骨折，较为适宜的治疗是
- A. 切开复位内固定
 - B. 闭合复位外固定支架固定
 - C. 悬吊牵引
 - D. 骨牵引
 - E. 手法复位，石膏外固定
78. 股骨颈骨折导致股骨头缺血性坏死的主要因素是
- A. 股圆韧带的小凹动脉的损伤
 - B. 股骨干滋养动脉升支的损伤
 - C. 旋股内侧动脉的损伤
 - D. 旋股外侧动脉的损伤
 - E. 股深动脉降支损伤
79. 老年人粗隆间骨折常见的并发症是
- A. 股骨头缺血性坏死
 - B. 不愈合
 - C. 髓内翻
 - D. 骨折延迟愈合
 - E. 髋关节僵硬
80. 肱骨外上髁炎时，下列试验可能阳性的是
- A. 神经干叩击试验（Tinel征）
 - B. 搭肩试验（Dugas征）
 - C. 握拳尺偏试验（Finkelstein征）
 - D. 伸肌腱牵拉试验（Mills征）
 - E. 屈腕试验
81. 中央型腰椎间盘突出症与马尾神经瘤最有意义的鉴别方法是
- A. 马鞍区麻痹
 - B. 括约肌功能障碍
 - C. 腰部压痛体征及放散痛
 - D. X线检查
 - E. CT或MRI（磁共振）
82. 化脓性关节炎最常发生于
- A. 髋关节和膝关节
 - B. 肩关节和肘关节
 - C. 膝关节和踝关节
 - D. 肘关节和腕关节
 - E. 踝关节和髌关节
83. 侧面呈银叉样畸形，正面呈枪刺样畸形的骨折见于

- A.Monteggia骨折
- B.Colles骨折
- C.Smith骨折
- D.Galeazzi骨折
- E.Bennett骨折

84.确诊膝关节结核，下列哪项最可靠

- A.滑膜活检
- B.X线示膝关节有骨质疏松
- C.低热、盗汗、食欲缺乏
- D.血沉加快
- E.MRI

85.骨与关节结核大多为

- A.原发性
- B.继发于肺结核
- C.继发于肠结核
- D.继发于胸膜结核
- E.继发于淋巴结核

86.下列治疗方法对骨折愈合的影响因素中，哪种说法是不正确的

- A.一次手法复位未达到解剖复位，则必须行再次复位
- B.切开复位，对骨折愈合不利，有时可导致骨折延迟愈合甚至不愈合
- C.开放性损伤清除过多的碎骨片，可影响骨折愈合
- D.恰当的功能锻炼可促进骨折愈合
- E.牵引过度可影响愈合

87.脱位时X线检查必须与健侧对比的是

- A.肩关节脱位
- B.肘关节脱位
- C.肩锁关节脱位
- D.桡骨头半脱位
- E.髋关节脱位

88.前臂双骨折、桡骨远端1/2段骨折，远端屈曲旋后畸形的主要原因为

- A.肱三头肌牵拉
- B.肱二头肌牵拉
- C.旋后肌牵拉
- D.旋前圆肌牵拉
- E.肱二头肌、旋后肌牵拉

89.桡神经管内的结构是

- A.腋神经
- B.肱深血管

- C.尺神经
- D.尺血管
- E.肱动脉

90.腰椎结核时寒性脓肿流注的部位，下列**错误**的是

- A.腰大肌
- B.髂窝
- C.腰三角
- D.季肋部
- E.腹股沟

91.患者，女，58岁，颈肩痛，左上肢麻木。经拍片检查，第5、6、7颈椎有明显唇样增生。颈6神经根受累的主要表现为

- A.肱二头肌反射减弱
- B.肱三头肌反射减弱
- C.小指感觉减退
- D.中指感觉减退
- E.Hoffman氏症阴性

92.肱骨髁上骨折伸直型骨折的最严重并发症是

- A.正中神经损伤
- B.畸形愈合形成肘内翻
- C.前臂肌肉缺血性挛缩
- D.骨化性肌炎
- E.关节僵硬

93.诊断Colles骨折最有意义的体征是

- A.局部肿胀、淤斑
- B.反常活动
- C.典型畸形
- D.骨擦音和骨擦感
- E.局部压痛

94.一学生跌倒右肘着地后肿、痛、不敢活动。区别肘关节脱位与肱骨髁上骨折的主要体征是

- A.肘部畸形
- B.肿胀程度
- C.肘后三角变化
- D.疼痛程度
- E.肘部功能障碍程度

95.下列踝部骨折的治疗方法中，**错误**的是

- A.坚强内固定
- B.踝穴不宜过大或过小
- C.骨折解剖对位

- D.反复整复，争取闭合复位，避免手术
- E.早期功能锻炼

96.患者，男，34岁，3天前突发腰痛，半天后出现右腿痛，咳嗽加重。查体：腰骶压痛，放射至小腿，右直腿抬高40°阳性，加强试验阳性，小腿前侧和足内侧痛觉迟钝，（足母）背伸力弱。请判断哪一神经根受累

- A.腰2
- B.腰3
- C.腰4
- D.腰5
- E.骶1

97.关于股骨头坏死的病理改变，可以分为5层。以下不属于这5层的是

- A.关节软骨
- B.坏死骨及骨髓
- C.纤维组织
- D.肥厚型新生骨
- E.滑膜组织

98.关于腰椎间盘突出症的临床表现，下列哪项是**错误**的

- A.L₅神经根受累者，感觉改变在小腿的前侧和足的内侧
- B.S₁神经根受累者，感觉改变在外踝和足的外侧
- C.慢性和复发性是本病特点之一
- D.发病年龄50岁以上者，常自诉有创伤史
- E.中央型突出者，可有马鞍区感觉障碍

99.骨与关节结核最常见的发病部位为

- A.髋关节
- B.膝关节
- C.肩关节
- D.肘关节
- E.脊柱

100.股骨颈骨折最易并发

- A.关节僵硬
- B.缺血性骨坏死
- C.坐骨神经损伤
- D.畸形愈合
- E.脂肪栓塞

101.原发性恶性骨肿瘤的主要转移方式是

- A.通过血液循环
- B.通过种植转移
- C.通过淋巴管

- D.沿神经干传播
- E.直接局部蔓延

102.患者，男，30岁，抬重物后感腰部不适，数天后症状加重并出现右下肢放射性痛，从起病到看门诊为期半个月。经有关检查，拟诊为腰椎间盘突出症。**错误**的治疗是

- A.髓核摘除术
- B.完全卧床休息
- C.骨盆牵引
- D.推拿按摩
- E.针灸

103.肱骨外上髁炎的病因主要是

- A.风湿
- B.结核
- C.类风湿
- D.慢性损伤
- E.急性化脓性感染

104.颈椎病颌枕吊带牵引，下列**错误**的是

- A.牵引重量为2~6kg
- B.可使小关节内的滑膜皱襞复位
- C.适用于除交感神经型外的各型颈椎病
- D.牵引时头前屈15°
- E.可解除肌痉挛

105.臂丛外侧束发出的神经是

- A.胸外侧神经
- B.尺神经
- C.胸内侧神经
- D.胸背神经
- E.肩胛下神经

106.第4颈椎骨折脱位，完全性截瘫，伤后早期突然死亡的原因是

- A.窒息
- B.肺炎或肺不张
- C.褥疮发生感染
- D.泌尿系感染
- E.尿潴留

107.胫骨中下1/3段骨折愈合较慢的主要原因是

- A.易损伤附近的主要血管
- B.易损伤附近的周围神经
- C.骨折远端血液供应减少
- D.骨折远端完全丧失血液供应

E.两骨折段血液供应减少

108.开放性骨折最常见的并发症和影响因素是

- A.血管损伤
- B.神经损伤
- C.创口感染
- D.软组织损伤
- E.皮肤胶套伤

109.诊断不稳定骨盆骨折，无意义的是

- A.骨盆挤压，分离引起骨折处痛
- B.骨盆上升时测髂前上棘至内踝距离患侧缩短
- C.一侧髂后上棘也可向右、向上、向中线移位
- D.外伤后下肢移动痛加重
- E.双侧髂前上棘与脐失去等边三角形

110.颈椎病其颈6神经根受压时，下列哪项是正确的

- A.拇指感觉减退
- B.中指感觉减退
- C.肱二头肌腱反射消失
- D.肱三头肌腱反射消失或减弱
- E.小指感觉减退

111.下列关于强直性脊柱炎的说法**错误**的是

- A.发病一般在15岁以后，男性多于女性
- B.早期髋髂关节及下腰部痛，休息时减轻，活动时加重；后期腰部僵硬，活动受限，逐渐向上发展，可有驼背畸形
- C.病变可遍及全身各关节，并出现关节僵硬和强直
- D.X线片示两侧髋髂关节密度增高，椎间小关节硬化，脊柱呈竹节样改变
- E.是属结缔组织的血清阴性反应疾病

112.外伤后骨折段移位，最常见的类型为

- A.成角移位
- B.分离移位
- C.侧方移位
- D.缩短移位
- E.几种移位同时存在

113.关于关节结核的表现，下列哪项**不对**

- A.一般早期无明显全身症状
- B.局部皮肤红肿痛热
- C.红细胞沉降率加速
- D.X线检查早期无明显异常

E.需和类风湿性关节炎鉴别

114.有关锁骨骨折，**错误**的是

- A.好发于青少年，多为间接暴力引起
- B.锁骨中段多发，近端常向上后移位，远端常向前、下移位
- C.儿童青枝骨折及成人的无移位骨折可不作特殊治疗
- D.锁骨外端骨折合并喙锁韧带撕裂可采用手法复位横形8字韧带固定
- E.有时可合并臂丛神经损伤

115.狭窄性腱鞘炎治疗首选

- A.局部按摩
- B.理疗
- C.针灸
- D.局部封闭
- E.手术治疗

116.跟腱断裂的诊断依据中，**不包括**

- A.患足单独站立，足跟不能离开地面
- B.患足不能主动跖屈
- C.跟腱部可扪及凹陷
- D.患足背屈范围超过健侧
- E.在跑跳过程中，突感跟后部剧痛

117.下列属于闭合性骨折的是

- A.耻骨骨折伴膀胱或尿道破裂
- B.尾骨骨折致直肠破裂
- C.腰椎压缩骨折伴腹膜后血肿形成
- D.刀砍伤致左尺骨骨折
- E.枪伤致股骨干骨折

118.关于肩周炎，下列**错误**的是

- A.本病是肩关节周围多种软组织的慢性炎症
- B.特征是肩关节疼痛，活动受限和肌肉萎缩
- C.病变结果为关节外软组织粘连
- D.前屈受限最严重
- E.本病有自愈倾向

119.骨软骨瘤的临床表现

- A.肿瘤生长迅速
- B.局部红肿，疼痛
- C.多数无症状，无意中发现骨性肿块
- D.X片显示骨破坏，膨胀改变
- E.常见部位是手或足的管状骨

120.患者，男，60岁。搬运工人，因间歇性跛行1年、加重1个月来就诊。无烟酒嗜好，亦无外伤史。体格检查最可能发现的是

- A.直腿抬高试验阳性
- B.足背动脉搏动明显减弱
- C.口唇发绀
- D.腰腿部无明显阳性体征
- E.腰臀部明显压痛点

121.引起腰腿痛病因很多，最常见为

- A.非化脓性炎症
- B.感染
- C.肿瘤
- D.退行性变
- E.结构性缺陷

122.肱骨外髁炎可出现

- A.Mills征（+）
- B.Finkelstein征（+）
- C.Phalen征（+）
- D.Tinel征（+）
- E.Hoffmann征（+）

123.关于骨巨细胞瘤，下列哪项是**错误**的

- A.多见于年轻成人
- B.病灶在骨端，局部有骨破坏
- C.骨端膨胀，骨皮质破坏，侵入软组织
- D.常用手术方法是局部刮除，不易复发
- E.若有恶变应截肢

124.患者，男，40岁，车工。反复发作腰腿痛5年，近4个月加重。查体：左直腿抬高30°（+），加强试验（+），左小腿外侧针刺觉减退鞍区感觉正常，左拇背伸力弱，膝跟腱反射正常。腰椎X线片未见异常。下列治疗哪项最重要

- A.卧床休息
- B.骨盆牵引治疗
- C.理疗
- D.按摩治疗
- E.手术治疗

125.颈椎骨折脱位合并截瘫的严重并发症**不包括**

- A.呼吸道感染
- B.心血管系统紊乱
- C.泌尿系感染和结石
- D.压疮

E.高热

126.下列与神经修复关系最密切的是

- A.施万细胞
- B.巨噬细胞
- C.中性粒细胞
- D.淋巴细胞
- E.红细胞

127.股骨头骨软骨病多见于

- A.1~12岁
- B.青少年
- C.中年
- D.股骨颈骨折后
- E.股骨粗隆骨折后

128.桡神经损伤多见于

- A.肱骨上段骨折
- B.肱骨中下1/3段骨折
- C.肱骨下段骨折
- D.尺桡骨上段骨折
- E.桡骨头骨折

129.骨与关节结核的治疗，应特别强调

- A.手术治疗
- B.局部治疗
- C.卧床休息
- D.石膏制动
- E.全身治疗

130.伤后有垂腕表现，可能是

- A.肌损伤
- B.正中神经损伤
- C.桡神经损伤
- D.尺神经损伤
- E.缺血性肌挛缩

131.股骨颈的颈干角平均角度为

- A.15°
- B.20°
- C.55°
- D.90°
- E.127°

132.骨盆骨折的并发症不包括

- A.坐骨神经损伤
- B.尿道损伤
- C.直肠损伤
- D.脊髓损伤
- E.腹膜后血肿

133.影响神经恢复的因素，**错误**的是

- A.无创技术
- B.无张力缝合
- C.损伤平面越低，修复效果越差
- D.时间越长，效果越差
- E.年龄越小，恢复越快

134.脊髓震荡是指

- A.脊髓受压
- B.脊髓挫伤
- C.脊髓裂伤
- D.脊髓血运障碍
- E.脊髓暂时性功能抑制

135.急性血源性骨髓炎最早发生的部位是

- A.短管骨干骺端
- B.扁平骨
- C.关节骨骺
- D.长管骨干骺端
- E.长管骨骨干

136.胫骨Pilon骨折时受到的暴力类型为

- A.重物直接砸伤
- B.垂直压缩
- C.纵向牵拉
- D.剪切力
- E.直接碾挫

137.下列肿瘤的临床表现**错误**的是

- A.骨肿瘤的发现往往在损伤之后
- B.肿瘤近关节，活动功能将受限制
- C.局部肿胀是另一个重要症状
- D.疼痛剧烈持久时，需考虑肿瘤是恶性
- E.脊柱肿瘤可压迫脊髓而瘫痪

138.股骨下1/3段骨折后，骨折远端向后倾斜移位，主要是由于

- A.半膜肌的牵拉

- B.缝匠肌的牵拉
- C.股四头肌的牵拉
- D.腓肠肌的牵拉
- E.臀中肌的牵拉

139.关于腰椎间盘突出症的手术治疗，下列哪项是**错误**的

- A.初发的椎间盘突出症患者
- B.严格非手术治疗而无效者
- C.腰腿痛反复发作
- D.椎间盘中央型突出者
- E.椎间盘中央型脱出者

140.急性化脓性骨髓炎手术的目的是

- A.引流脓液，减少脓毒症症状，阻止急性骨髓炎转变为慢性
- B.减轻疼痛
- C.减轻症状
- D.防止全身症状加重
- E.减少抗生素用量

141.在急性化脓性骨髓炎中，下列哪项选择**错误**

- A.脓肿可进入骨膜下
- B.脓肿可进入软组织中
- C.脓肿可进入关节
- D.脓肿一定不进入关节
- E.脓肿进入骨髓腔

142.腰椎间盘突出症的分型**不包括**

- A.膨出型
- B.突出型
- C.脱出型
- D.Schmorl结节及经骨突出型
- E.脱离型

143.关于臂丛神经正确的描述是

- A.位于腋窝内的是臂丛锁骨上部
- B.下、中干的后股合成后束
- C.上、中干的前股合成外侧束
- D.下、中干的前股合成内侧束
- E.3个束先位于腋动脉的第1段的外侧

144.患者，男，60岁，颈肩痛10年，半年来双下肢沉重感，行走无力，右腿明显，无头晕头痛。查体：颈部无明显压痛，臂丛牵拉试验阴性，双膝踝反射亢进，右膝髌阵挛阳性，右侧巴氏征阳性。应考虑的治疗是

- A.颈枕吊带牵引

- B.注射激素
- C.按摩
- D.手术
- E.围领和颈托

145.腰椎间盘突出症的典型症状是

- A.腰背痛
- B.下肢无力
- C.腰痛伴坐骨神经痛
- D.坐骨神经痛
- E.腰部活动受限

146.如有小腿及足外侧麻木，足趾跖屈力及跟腱反射弱，病变的节段应考虑是

- A.腰1～2
- B.腰2～3
- C.腰3～4
- D.腰4～5
- E.腰5～骶1

147.下列不属于不稳定型脊柱骨折的是

- A.椎体粉碎骨折
- B.第1颈椎半脱位
- C.椎体骨折脱位
- D.腰椎板、关节突骨折
- E.两侧腰及横突骨折

148.下列髋关节后脱位的畸形特点，除外

- A.屈曲
- B.内收
- C.内旋
- D.短缩
- E.外旋

149.小腿胫前扭伤后6个月不愈合，有死骨排出，最可能的诊断

- A.骨结核
- B.局限性骨脓肿
- C.骨巨细胞瘤
- D.慢性骨髓炎
- E.软骨瘤

150.骨关节结核患者，体质虚弱，寒性脓肿混合感染，脓液黏稠。对脓肿最好的处理方法是

- A.单纯非手术治疗
- B.穿刺抽脓，注入抗结核药物
- C.小切口引流

- D.彻底的病灶清除术
- E.脊椎融合手术

151.患者，男，49岁，腰腿痛10年。查体：腰5骶1间压痛，并放射至小腿外侧，左侧直腿抬高试验阳性，加强试验阳性。最可能的诊断是

- A.棘上韧带炎
- B.棘突炎
- C.棘间韧带炎
- D.椎间盘突出症
- E.腰椎管狭窄症

152.全身抗结核加关节穿刺抽脓注射药物治疗，适用于

- A.儿童膝关节单纯滑膜结核
- B.膝关节全关节结核
- C.儿童髌关节单纯滑膜结核
- D.髌关节全关节结核
- E.脊柱结核伴截瘫


153.患者，女，35岁。半年前弯腰提物时突然腰痛，并向左侧臀部放射。查体：腰椎凸向左侧，腰活动困难，左侧腰骶部压痛，直腿抬高30°阳性。X线片示腰椎向左侧弯曲。可诊断为

- A.棘间韧带损伤
- B.急性腰肌损伤
- C.腰椎类风湿关节炎
- D.腰椎间盘突出
- E.腰椎管狭窄

154.腰椎间盘突出症出现踝反射减弱或消失，则突出的间盘为

- A.L₄~L₅
- B.L₅~S₁
- C.L₃~L₄
- D.L₂~L₃
- E.L₁~L₂

155.如图所示，下列对股神经的描述，错误的是



- A.起自腰丛
- B.在肌三角内位于股动、静脉之间
- C.沿髂筋膜深面经肌腔隙入股三角
- D.皮支分布于股前区皮肤
- E.肌支支配股四头肌、耻骨肌、缝匠肌

156.下列征象最支持骨盆骨折的诊断的是

- A.下肢外旋，短缩
- B.骨盆分离挤压试验阳性
- C.局部肿胀，皮下淤斑
- D.直腿抬高试验阳性
- E.髋部屈曲，内收，内旋畸形

157.关于关节突关节的描述中，下列哪项正确

- A.参与构成椎间孔的前壁
- B.前方有黄韧带
- C.后方与椎动脉相邻
- D.由脊神经前分支支配
- E.由上位椎骨的上关节突和下位椎骨的下关节突构成，颈部松弛易脱位

158.骨盆骨折常并发

- A.缺血性肌挛缩
- B.褥疮
- C.膀胱尿道损伤
- D.周围神经损伤
- E.缺血性骨坏死

159.有关骨与关节结核的说法**错误**的是

- A.好发于儿童与青少年
- B.病人常没有肺结核病史或家庭结核病史
- C.原发病灶为肺结核和消化道结核
- D.骨关节结核多发生于原发病已经静止，甚至痊愈多年以后
- E.病变部位疼痛常于活动后加剧

160.关于股骨头坏死，首选的辅助检查是

- A.X线检查
- B.CT检查
- C.MRI检查
- D.超声检查
- E.骨扫描检查

161.最易出现腕下垂的是

- A.锁骨骨折
- B.肩关节脱位
- C.肱骨颈骨折
- D.肱骨干骨折
- E.肱骨髁上骨折

162.桡神经支配的肌肉是

- A.肱二头肌
- B.肱肌
- C.三角肌
- D.肱三头肌
- E.旋前圆肌

163.关于股骨头的血供，下列哪条血管对股骨头的血供最重要

- A.股骨头圆韧带动脉
- B.股骨干滋养动脉
- C.旋股内侧动脉
- D.旋股外侧动脉
- E.支持带动脉

164.腰痛并向下肢放射至小腿，（足母）趾背伸力减弱最常见于

- A.梨状肌综合征
- B.腰椎间盘突出症

- C.小关节紊乱症
- D.腰肌劳损
- E.坐骨神经炎

165.造成骨折不愈合的因素是

- A.高龄
- B.糖尿病
- C.骨折部位血肿
- D.骨折间有软组织嵌入
- E.畸形位置固定

166.早期狭窄性腱鞘炎，最好的治疗方法是

- A.腱鞘切开，松解肌腱
- B.石膏固定休息
- C.醋酸泼尼松龙封闭
- D.加强手指屈伸活动
- E.鞘内注射抗生素

167.髋关节后脱位时，患肢呈现的典型畸形是

- A.患肢缩短，髋关节呈屈曲、内收、内旋畸形
- B.患肢缩短，髋关节呈屈曲、外展、外旋畸形
- C.患肢增长，髋关节呈外展、外旋畸形
- D.患肢增长，髋关节呈过伸畸形
- E.髋关节呈过屈畸形

168.患者，男，24岁，右大腿被汽车撞伤10分钟而入院。伤后患腿肿胀疼痛，不能活动，下列体征哪一项不属于骨折的专有体征

- A.畸形
- B.反常活动
- C.骨擦音
- D.骨擦感
- E.肿胀

169.胸椎骨折脱位，脊髓半横断损伤，损伤平面以下的改变是

- A.两侧肢体运动消失，感觉正常
- B.两侧肢体感觉消失，活动正常
- C.同侧肢体运动障碍，对侧感觉正常
- D.对侧肢体感觉障碍，同侧感觉正常
- E.同侧肢体深感觉和运动障碍，对侧痛觉、温觉障碍

170.急性腰扭伤与腰椎间盘突出症均可有坐骨神经支配区疼痛，其鉴别主要依靠

- A.外伤史
- B.X线照射
- C.股神经牵拉试验

- D.直腿抬高试验
- E.局部痛点普鲁卡因封闭

171.走行于肱骨肌管内的神经是

- A.腋神经
- B.桡神经
- C.尺神经
- D.胸背神经
- E.正中神经

172.患者，女，37岁，腰腿痛半年。请结合图像，选择最佳诊断



- A.L₅~S₁椎间盘变性
- B.L₅~S₁椎间盘向后突出
- C.L₅~S₁椎间盘变性并向后突出
- D.L₅~S₁椎间盘膨出
- E.L₄~L₅椎间盘向后突出

173.腰椎间盘突出最常见的突出和退变间隙依次排列为

- A.L₃~L₄, L₅~S₁, L₄~L₅
- B.L₃~L₄, L₄~L₅, L₅~S₁
- C.L₅~S₁, L₄~L₅, L₃~L₄
- D.L₄~L₅, L₅~S₁, L₃~L₄
- E.L₄~L₅, L₃~L₄, L₅~S₁

174.描述马尾神经损伤的临床表现，错误的是

- A.发生于第2腰椎以下的骨折脱位
- B.表现是受伤平面以下的周围性瘫痪
- C.2~4周后不会演变成痉挛性瘫痪
- D.马尾神经完全断裂者少见
- E.下肢出现病理性锥体束征

175.儿童膝关节全关节结核的治疗，应选择

- A.关节穿刺抽脓注入抗结核药物

- B.单纯病灶清除术
- C.膝关节滑膜切除术
- D.石膏管型固定关节于功能位
- E.病灶清除术+膝关节加压融合术

176.关于股骨头坏死，最早出现的临床症状是

- A.髋关节或膝关节疼痛，在髋部又以内收肌痛出现较早
- B.跛行，行走困难，甚至拄拐行走
- C.髋关节活动受限，以内旋及外展活动受限最为明显
- D.髋关节肿胀，可见窦道形成
- E.下肢外旋外展畸形

177.下肢牵涉痛是由哪部分神经组织受刺激所致

- A.交感神经
- B.脊神经前支
- C.脊神经后支
- D.脊神经前根
- E.脊神经后根

178.手外伤的术后处理不正确的是

- A.抬高患肢防止肿胀
- B.注射破伤风抗毒血清
- C.将桡茎突部的敷料剪开
- D.术后用石膏托将手固定于伸直位
- E.包扎时用纱布隔开手指同时露出指尖

179.早期狭窄性腱鞘炎的初始治疗方法是

- A.腱鞘切开松解肌腱
- B.保守治疗，夹板固定，使用NSAID药物
- C.局部注射醋酸泼尼松
- D.针灸及理疗
- E.使用抗生素治疗

180.可导致马尾神经损伤的是

- A.第10胸椎骨折脱位
- B.第11胸椎骨折脱位
- C.第12胸椎骨折脱位
- D.第1腰椎骨折脱位
- E.第2腰椎骨折脱位

181.棘上韧带损伤多见于

- A.颈段
- B.颈胸段
- C.中胸段

- D.胸腰段
- E.腰段

182.伸直型的肱骨髁上骨折骨折线的方向是

- A.从外下方斜向内上方
- B.从后下方斜向前上方
- C.从后上方斜向前下方
- D.从前下方斜向内上方
- E.从前下方斜向后上方

183.关于粘连性肩关节囊炎，下列哪项是**错误**的

- A.是关节周围多种软组织的慢性炎症
- B.临床上为肩痛，关节活动受限
- C.外展外旋后伸受限明显
- D.自愈后不会遗留功能障碍
- E.具有自限性

184.关于腕管综合征，下列**错误**的是

- A.为正中神经在腕管内受压
- B.发病男多于女，常为单侧
- C.常见病因为滑膜炎和肌腱炎
- D.临床上屈腕试验诊断价值最大
- E.白天疼痛轻，夜间疼痛重

185.对截瘫患者应积极处理，防止并发症褥疮发生，下列**错误**的是

- A.每2小时翻身1次，夜间可适当减少次数，保证患者休息
- B.床褥平软，及时料理，保持皮肤清洁干燥
- C.对骨隆突部位用软垫或气枕垫好，并用25%~50%酒精擦洗，滑石粉按摩
- D.对已发生深的褥疮要及时剪去坏死组织，用920油膏和中药粉治疗
- E.待炎症控制，肉芽新鲜时，作转移皮瓣缝合

186.关于动脉危象，下列**不正确**的是

- A.皮色苍白
- B.皮温降低
- C.毛细血管回流加快
- D.毛细血管回流缓慢或消失
- E.指腹瘪陷

187.患者蹲着工作时，背部受暴力，膝跪地面，此时最可能出现的损伤是

- A.腰椎压缩骨折
- B.髋关节后脱位
- C.半月板损伤
- D.背部软组织挫伤
- E.跟腱断裂

188.腰椎结核临床常见的体征是

- A.拾物试验 (+)
- B.“4”字试验 (+)
- C.Thomas征试验 (+)
- D.Trendelenburg征 (+)
- E.直腿抬高试验 (+)

189.下列哪种类型颈椎病发病率最高

- A.神经根型
- B.脊髓型
- C.交感神经型
- D.椎动脉型
- E.食管型

190.下列哪种类型的脊髓损伤预后最好

- A.脊髓挫伤
- B.脊髓震荡
- C.脊髓和神经根损伤
- D.脊髓裂伤
- E.马尾损伤

191.髌关节全关节结核合并冷脓肿形成，诊断确定后最好应

- A.立即进行切开引流
- B.立即进行病灶消除
- C.应用抗结核药物2~4周后行病灶清除术
- D.应用抗结核药物2~4周后行脓肿搔刮术
- E.髌人字形石膏固定，并应用抗结核药物

192.骨折后出现哪项体征，临床即可确诊

- A.疼痛与压痛
- B.局部肿胀与淤斑
- C.骨擦音和骨擦感
- D.功能障碍
- E.关节盂空虚

193.正中神经的描述中正确的是

- A.在臂部与肱动脉伴行，支配肱肌
- B.起自臂丛内侧束
- C.在腕管内侧进入手掌
- D.支配鱼际肌
- E.在前臂位于指浅、深屈肌之间

194.腰椎间盘突出症多见于

- A.20~50岁
- B.40岁以下
- C.30~40岁
- D.20~30岁
- E.50岁以上

195.在尺神经损伤的临床表现中，下列正确的是

- A.桡侧皮肤感觉迟钝
- B.拇背伸功能障碍
- C.猿手畸形
- D.手的第二蚓状肌麻痹
- E.第三、四蚓状肌及骨间掌、背侧肌麻痹

196.颈椎病颈6神经根受压时，下列哪项是**错误**的

- A.拇指的感觉减退
- B.中指感觉减退
- C.肱二头肌腱反射消失
- D.肱三头肌腱反射消失或减弱
- E.Hoffmann征阳性

197.臂丛内侧束发出的神经是

- A.正中神经
- B.胸内侧神经
- C.腋神经
- D.肌皮神经
- E.桡神经

198.正中神经支配的肌肉是

- A.桡侧腕长伸肌
- B.骨间掌侧肌
- C.指浅屈肌
- D.桡侧腕短伸肌
- E.尺侧腕伸肌

199.脊柱结核易发生于

- A.颈椎
- B.胸椎
- C.腰椎
- D.骶尾骨
- E.胸腰椎

200.下列哪种情况的骨关节结核**不适于**手术治疗

- A.有明显死骨，较大脓肿
- B.经久不愈的窦道

- C.脊柱结核合并截瘫
- D.单纯滑膜结核经药物治疗效果不佳
- E.有混合性感染，体温高，中毒症状明显

题型：A2

201.患者，女，34岁，被汽车撞伤半小时来院。查体：P108次/min，BP9.2/3.9kPa（70/30mmHg），神志清楚，呼吸急促，脸色苍白，左髂、腰部明显肿胀，大片淤斑，左下腹压痛，骨盆挤压试验（+），尿道口有渗血。首先要作的处理是

- A.拍骨盆及腰椎X线片
- B.输血、补液
- C.插导尿管
- D.骨盆兜悬吊牵引
- E.剖腹探查

202.患者，男，27岁，半小时前跌伤致右肘关节后脱位。查体：右肘关节肿胀，半伸位畸形，肢端血运好，无感觉障碍。X线片示右肘关节脱位，未见骨折。首选治疗是

- A.皮肤牵引复位
- B.切开复位
- C.手法复位
- D.骨牵引复位
- E.功能锻炼后切开复位

203.患者，男，20岁，男排运动员，球赛时扭伤左足，现场处理后尚能继续进行比赛。次日左踝明显肿胀，踝前外侧及足背皮下淤血，外踝前下方压痛，左足被动内翻时疼痛加剧，经门诊骨科医师诊断后，决定作石膏托外固定，应将左踝关节固定于哪种位置

- A.呈90°位置
- B.踝外翻位
- C.踝内翻位
- D.踝过伸位
- E.踝过屈位

204.患者，男，60岁，6个月前因车撞伤右大腿，右股骨开放骨折，在当地医院行内固定术后，切口有少量脓液渗出，创口肉芽组织突起。X线下片：骨折断端有层状致密新骨形成，其中骨折片边界清楚，最可能的诊断为

- A.骨折已愈合
- B.骨折延迟愈合
- C.慢性骨髓炎
- D.急性化脓性骨髓炎
- E.局限性骨脓肿

205.患者，男，65岁，腰痛半年，活动后疼痛加重，X线片发现第2腰椎有2cm×2cm溶骨性骨质破坏，一侧椎弓根消失，椎间隙正常。下列诊断哪项可能性最大

- A.腰椎结核
- B.骨巨细胞瘤
- C.转移性骨肿瘤
- D.骨囊肿
- E.内生性骨软骨瘤

206.患者，女，48岁。左肩痛4个月，逐渐加重，不能梳头，左肩外展、后伸受限，三角肌萎缩，无手臂麻木感。最可能的原因是

- A.颈椎病
- B.肩部肿瘤
- C.肩周炎
- D.关节结核
- E.风湿性关节炎

207.某患者脊柱损伤后，跟腱反射消失，膝腱反射正常，可能为脊髓哪一节段损伤

- A.S₁以下
- B.S₂以下
- C.L₂以下
- D.L₅以下
- E.T₁₂以下

208.患儿，女，9岁。8天前突发左髌剧痛，左下肢活动受限，伴畏寒、高热，全身不适，食欲缺乏。查体：急重病容，贫血貌，T38.7℃，P100次/min，左大腿近端肿胀，皮温升高，但外观无异常，腹股沟韧带中点稍下方深压痛。最可能的诊断为

- A.左髌关节急性化脓性关节炎
- B.左髌关节急性风湿性关节炎
- C.左髌关节结核
- D.左大腿软组织炎症
- E.左股骨近端恶性肿瘤

209.患者，男，25岁，胫骨中下段闭合骨折，手法复位持续骨牵引治疗，1年后患肢仍有疼痛，反常活动。拍X光片：骨折端骨质硬化。目前应采用的治疗

- A.再次复位，牵引固定
- B.再次复位，石膏固定
- C.加强营养，促进骨折愈合
- D.加强功能锻炼，促进功能恢复
- E.手术复位，植骨内固定，适当外固定

210.一儿童右膝下疼痛，肿胀并高热10天，局部肿胀，皮温增高，压痛剧烈，疑为胫骨上段急性化脓性骨髓炎住院。以下哪项检查无确诊意义

- A.体温及脉搏
- B.白细胞计数及分类
- C.血培养

- D.局部分层穿刺
- E.X线照片

211.船员，50岁，被船撞伤致右胫腓骨中下1/3段横断骨折，经复位达功能复位标准，夹板固定。3个月后拍片复查，骨痂少，骨折未愈合，最主要的原因

- A.年老体衰
- B.骨折段血液供应不良
- C.不宜用小夹板固定
- D.周围软组织损伤的影响
- E.固定时间不够

212.患者，男，25岁，工人，被预制板砸伤左膝，剧痛，局部肿胀，皮下淤血，有畸形反常活动。首先应行的最重要的检查是

- A.给止痛剂止痛
- B.拍X光片
- C.检查足背动脉搏动
- D.检查有无骨擦音
- E.检查左小腿和足的感觉功能

213.老年患者跌倒后右髌部疼痛，步行至医院拍X光片检查证实为“右股骨颈外展嵌插型骨折”。正确的治疗措施为

- A.持续皮牵引6~8周
- B.急诊手术内固定
- C.小夹板外固定
- D.石膏外固定
- E.不必处理，顺其自然

214.患者，男，马车翻车时砸伤下腹部。查体：耻骨联合处压痛，挤压试验阳性，膀胱胀满，橡皮导尿管插入一定深度未引出尿液，导尿管尖端见血迹。此时应考虑

- A.导尿管插入深度不够
- B.导尿管插入方法不对
- C.骨盆骨折合并尿道断裂
- D.导尿管阻塞
- E.骨盆骨折合并膀胱损伤

215.患者，女，45岁。外伤致右胫骨平台骨折，关节面不平，相差0.8cm，经过治疗，但骨折移位未见改变。根据患者情况，最可能发生的晚期并发症是

- A.骨化性肌炎
- B.骨愈合不良
- C.膝关节僵硬
- D.膝关节外翻畸形
- E.膝关节创伤性关节炎

216.关于肩关节脱位，哪项是不正确的

- A.常为肩外展暴力受力受伤
- B.常为孟下型脱位
- C.可能合并肱骨大结节骨折
- D.可能有三角肌区皮肤感觉减退
- E.常用足蹬法复位

217.患者，男，25岁，2周前因天气炎热安装空调不慎从6米高处坠落，造成胸12压缩性骨折移位，伴完全性截瘫，近2天体温升高达39.5℃，其原因可能为

- A.天气炎热，截瘫患者体温调节功能差
- B.严重创伤反应，骨折部位血肿吸收
- C.泌尿道或呼吸道感染
- D.精神情绪影响
- E.骨折继发感染

218.患者，男，40岁，12小时前左小腿碾压伤，摄片胫腓骨未发现骨折，目前左小腿明显肿胀，皮肤有张力性水泡，足趾屈曲，疼痛明显，皮肤感觉减退，需立即安排的检查是

- A.皮温测定
- B.左小腿筋膜室内压测定
- C.肌电图神经传导速度检查
- D.尿肌红蛋白测定
- E.下肢CT检查

219.患者，男，25岁。高空坠地，神志清醒，第10～11胸椎压痛，剑突以下感觉运动障碍。最恰当的急救搬运是

- A.一人搂抱
- B.一人抬头，一人抬足
- C.一人背运
- D.二人扶架而走
- E.患者平卧木板搬运

220.腰椎间盘突出症患者，检查发现患侧（足母）趾背伸肌力减弱，小腿外侧和小趾根部感觉减退，其病变定位于哪一节段

- A.腰2～3
- B.腰3～4
- C.腰4～5
- D.腰5～骶1
- E.骶1～2

221.患者，25岁，搬重物后腰痛。检查发现腰部活动明显受限，右侧骶棘肌痉挛伴压痛，右直腿抬高45°时，诉腰痛，加强试验（一），感觉肌力反射均正常。诊断应最先考虑

- A.腰椎间盘突出症
- B.腰扭伤
- C.髋关节扭伤
- D.梨状肌综合征

E.第3腰椎横突综合征

222.患者，男，40岁，诉头痛头晕，颈侧弯或后伸位头晕加重猝倒，肱三头肌反射减弱，颈椎斜位片显示颈椎关节增生，首选诊断为

- A.梅尼埃病
- B.体位性眩晕
- C.脊髓肿瘤
- D.椎动脉型颈椎病
- E.有反常活动者可确诊为骨折

223.腰椎间盘突出症，感觉减退出现在外踝部及足背外侧，踝反射异常，压迫的神经根是

- A.腰3神经根
- B.腰4神经根
- C.腰5神经根
- D.骶1神经根
- E.骶2神经根

224.患者，男，25岁，右手绞伤1小时，血运好，第3、4掌骨骨折错位，手背皮肤缺损4cm×3cm，基底为骨，肌腱（3~4伸指肌腱）断裂。最佳治疗方法是

- A.清创，肌腱缝合，手法复位石膏外固定
- B.清创，夹板外固定，肌腱二期处理
- C.清创，骨折内固定，肌腱缝合，腹部皮瓣石膏外固定
- D.清创，骨折内固定，肌腱缝合，植皮，石膏外固定
- E.换药，消炎以后二期处理

225.患者30岁，1小时前被汽车撞伤，右膝部闭合性损伤，伤后右足不能向背侧伸展，其原因可能是

- A.坐骨神经损伤
- B.胫后神经损伤
- C.腓总神经损伤
- D.胫前肌损伤
- E.胫后肌损伤

226.患者，女，50岁，开放性右胫骨中下1/3双段骨折，伤后4小时，清创，超长钢板螺钉固定。拆线时伤口皮肤Ⅱ级坏死，无感染。术后一个月，持双拐下地，患肢被动运动。术后半年照片：对位佳，近折线模糊，远折线较清晰，骨痂少，主要原因是

- A.年龄大
- B.内固定不当
- C.功能锻炼不够
- D.血供不足
- E.小腿软组织条件不佳

227.患儿，男，10岁，3天来突然高烧39℃，右膝及小腿剧痛，膝关节活动痛加重，不能行走，患膝伸直位，膝及小腿上部温度高，无明显红肿，但有深压痛。化验：WBC $1.8 \times 10^9/L$ ，P84%。最可能的诊断

- A.急性蜂窝织炎
- B.急性化脓性膝关节炎
- C.风湿性关节炎活动期
- D.急性化脓性骨髓炎
- E.尤文肉瘤

228.患者，男，42岁，车祸外伤2小时（当时坐于车中），右髌疼痛。查体：右髌强迫于屈曲、内收、内旋畸形位置，不能伸直。X线片未见髌臼及股骨头骨折。治疗选择

- A.骨牵引
- B.手法复位
- C.切开复位
- D.三翼钉内固定术
- E.人工关节置换术

229.患者，男，18岁，因车祸致右股骨转子间骨折及多发性肋骨骨折，入院后仅给予胸带固定及右下肢皮肤牵引处理。对此患者最应警惕和设法防止的并发症是

- A.股骨头缺血性坏死
- B.脂肪栓塞
- C.重要血管神经损伤
- D.坠积性肺炎
- E.损伤性骨化

230.患儿，男，9岁，右股骨干骨折3个月。X线片为中1/3横行骨折，重叠1.0cm愈合，其处理选择是

- A.切开复位钢板内固定
- B.手法整复后骨牵引治疗
- C.不需特殊治疗
- D.切开复位髓内针固定
- E.重新整复小夹板固定内服接骨药

231.患者，女，30岁，左上臂被机器绞伤，肱骨螺旋形骨折。其功能复位要求为

- A.对位对线都好，不允许有畸形
- B.允许稍有畸形，不允许有分离移位
- C.允许稍有旋转移位，不允许有分离移位
- D.允许稍有分离移位，不允许有旋转移位
- E.允许稍有畸形，不允许有缩短移位

232.患者，男，50岁，车祸，右胫腓骨中下1/3开放性粉碎骨折，经消肿、抗感染、治疗、行闭合复位、长腿石膏管型固定。半年后拍X光片，骨折未愈合。你认为影响骨折愈合最主要的原因

- A.年纪大
- B.骨折段血液供应不良
- C.伤口感染
- D.周围软组织损伤重
- E.骨折复位不良

233.患者，52岁。1个月来，左肘部疼痛，向前臂外侧放射，肘关节活动正常，肱骨外上髁部局限性压痛。最好的治疗方法是

- A.手术
- B.理疗
- C.痛点注射醋酸泼尼松龙
- D.按摩
- E.石膏固定

234.患者，女，39岁，摔伤12小时，伤时右手掌着地，前臂肿痛，医生经过检查发现下列情况，即诊为“前臂骨折”。其主要依据是

- A.肿胀明显
- B.局部皮下淤血
- C.活动障碍明显
- D.局部压痛明显，被动活动时诱发剧烈疼痛
- E.局部反常活动

235.属于肱骨的结构是

- A.尺切迹
- B.桡切迹
- C.滑车切迹
- D.内侧髁
- E.冠突窝

236.患儿，男，7岁，突发寒战、高热（T 39.8℃），烦躁不安，诉右膝下方剧痛，膝关节呈半屈曲状，拒动。查体：右小腿近端皮温高，压痛。病变区域穿刺抽出混浊液体，送细菌培养，最可能的结果是

- A.乙型链球菌
- B.金黄色葡萄球菌
- C.大肠埃希菌
- D.链球菌
- E.无细菌生长

237.患者，男，45岁，13小时前自房上坠地摔伤。查体：神清合作，BP 13.3/8kPa（100/60mmHg），P 100次/min，腰、棘突明显后凸，压痛，叩痛，膀胱充盈，腹股沟韧带下痛觉消失，左腿无自主运动，右踝可背屈，X线片显示：L₁椎体压缩骨折（超过1/2），CT显示椎管内有碎骨片。需要采取的处理方法是

- A.卧床牵引
- B.三桌法复位，石膏背心固定
- C.手术减压内固定
- D.手术整复
- E.推拿

238.患者，男，40岁，车工，因近2月以来经常加班劳动而引起腰背疼及活动障碍。约5天前又扭伤腰部，疼痛加剧，且向右下肢后侧放射，咳嗽时加重，跛行，脊柱向左侧凸，腰4～5棘间和棘旁压痛，

右小腿及右足背外侧痛、温觉减退，跟腱反射减弱，右侧直腿抬高试验（+）约25°，加强试验（+），右足趾背伸力减弱，X线照片仅见腰部脊柱变直，根据以上情况初步诊断

- A.腰肌劳损
- B.棘上、棘间韧带损伤
- C.强直性脊柱炎
- D.腰椎间盘突出症
- E.腰椎结核

239.某工人50岁，双下肢发紧、无力3个月，既而行走困难，双手持物力弱。查体：肌张力增高，肌力弱。有不规则感觉减弱区，Hoffman征阳性。可能是

- A.神经根型颈椎病
- B.原发性神经炎
- C.脊髓型颈椎病
- D.椎动脉型颈椎病
- E.脊髓空洞症

240.一位患者因外伤造成耻骨骨折并刺破膀胱，检查见耻骨联合处已塌陷，其骨折分类应属

- A.闭合性骨折
- B.开放性骨折
- C.裂缝骨折
- D.压缩性骨折
- E.骨骺分离

241.一般说来，下列哪项体征不符合腰5～骶1椎间盘突出（后外侧型）

- A.腰5～骶1棘间有压痛
- B.脊柱侧凸
- C.患侧踝反射异常
- D.患侧外踝部和足外侧感觉异常
- E.患侧（足母）趾背伸乏力或不能

242.患儿，男，8岁，3天前从1米高处跳下后即感右膝稍有不适，但能走，未介意。3天后疼痛难忍。右胫骨上端稍上方肿胀，皮温高，但不红，深压痛明显。体温39.5℃。血常规：白细胞 $23 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是

- A.急性踝关节扭伤
- B.踝部骨折
- C.小腿下1/3骨折
- D.内踝上方蜂窝组织炎
- E.急性血源性骨髓炎

243.患者，男，50岁。左小腿被砸伤24小时，左小腿肿胀，压痛，异常活动，皮温略高于对侧，体温37.8℃。最可能诊断为

- A.左胫骨骨髓炎
- B.左小腿软组织蜂窝组织炎

- C.左胫骨干骨折
- D.左小腿血肿
- E.左小腿软组织挫伤

244.鉴别肘关节脱位与骨折的要点是

- A.肘部畸形
- B.反常活动
- C.肘部三点关系的改变
- D.有外伤史，跌倒手掌撑地
- E.局部肿痛，功能障碍

245.患者，男，30岁。从事驾驶员工作5年，近2年反复发作腰痛，放射到右足跟部。腰椎CT提示腰5～骶1椎间盘突出，突向右后方，压迫神经根。以下体征哪项与该诊断不符

- A.腰5～骶1棘突间压痛，向右下肢放射
- B.右下肢直腿抬高试验及加强试验阳性
- C.右足外侧外踝部皮肤感觉减退
- D.右膝反射明显减弱
- E.右趾背伸肌力下降

246.患者，男，28岁，左膝扭伤6周，已消肿，仍疼痛，行走时患膝有弹响，绞锁，关节不稳定。哪项无助于诊断

- A.关节过伸、过屈试验
- B.关节间隙的压痛
- C.浮髌试验
- D.研磨试验
- E.回旋挤压试验

247.图示骨折易发生何种损伤



- A.臂丛神经损伤
- B.膈神经损伤
- C.颈神经根损伤
- D.胸锁乳突肌损伤
- E.副神经损伤

248.患者，男，55岁，冬季路滑扭伤左足，顿时剧烈疼痛，但尚能步行回家。第2天发现左踝明显肿胀，踝关节前外侧足背青紫，外踝前下方压痛，被动内翻时疼痛。此患者最可能的诊断为

- A.左踝外侧副韧带撕裂
- B.左侧外踝骨折
- C.第5跖骨基底骨折
- D.腓骨肌腱脱位
- E.胫骨前唇骨折

249.患者，男，16岁，左肱骨髁上骨折。行手法复位术后，患者前臂高张力肿胀，手指主动活动障碍，被动活动剧烈疼痛，桡动脉搏动触不清，感觉减退。进一步诊治为

- A.继续观察病情发展，若出现SP征时急诊手术减压
- B.应用脱水剂，扩张血管药物
- C.急诊手术减压
- D.行血管超声检查
- E.无需处置，向患者解释此症状为正常术后表现

250.患儿，女，11岁，右大腿下段肿痛2个月，无明显畏冷，发热，疼痛在夜间加剧。查体右膝关节上方肿胀，表面静脉怒张，微热，有压痛。X线检查：右股骨下段溶骨性破坏，有Codman三角可见。其处理原则是

- A.局部整块切除
- B.局部刮除加化疗
- C.关节离断
- D.放疗
- E.截肢加化疗

251.患儿，男，10岁，突然出现高热，T 39.4℃，寒战，右膝关节处疼痛，不愿活动，皮温高。查：右膝处压痛，活动受限，WBC $15 \times 10^9/L$ ，诊断为

- A.急性化脓性骨髓炎
- B.慢性骨髓炎
- C.骨关节结核
- D.骨肿瘤
- E.骨关节炎

252.患者，女，60岁，两天前被自行车撞伤，右髌部肿痛。检查：T38℃，右髌部稍肿，见淤斑，有压痛，活动受限，右下肢呈现外旋位，血白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞70%。其诊断最大可能性为

- A.股骨头坏死
- B.股骨颈骨折
- C.股骨头骨骺骨软骨病
- D.髌关节结核
- E.髌部血肿

253.患者，女，20岁，外伤致骨盆骨折。查体：生命体征平稳。X线片示：耻骨联合分离，右侧骶髂关节向上方移位。下列处理最合适的是

- A.卧硬板床
- B.卧石膏床
- C.手法复位外固定
- D.切开复位内固定
- E.骨折兜悬吊加下肢牵引

254.患者，男，50岁，不慎跌倒，右膝着地，肿痛，活动受限，来急诊，拍X光片证实右髌骨横行骨折，骨折分离移位3mm。最好的治疗方法

- A.切开复位，钢丝环扎术
- B.切开复位，张力带内固定术
- C.髌骨切除，修补伸膝装置
- D.伸膝位石膏外固定
- E.不用特殊处置

255.患者左小腿被撞伤，第2天来诊时肿胀，足趾呈屈曲状，被动伸直时引起剧烈疼痛。其最可能原因是

- A.对疼痛耐受性差
- B.肌肉缺血早期表现
- C.患肢骨折刺激
- D.软组织肿胀所致
- E.肌肉的保护性反应

256.患者，女，67岁。2个月前左手中指活动时发僵疼痛，活动后症状稍好转；近日来左手中指不能伸屈，左中指掌侧掌指关节处有一小硬结，痛。最可能的诊断为

- A.腱鞘囊肿
- B.狭窄性腱鞘炎
- C.神经鞘膜瘤
- D.屈肌腱部分断裂
- E.指关节骨性关节炎

257.患者，女，21岁。2个月前出现右大腿下端肿痛。X线片见股骨下端有境界不清的骨质破坏区，骨膜增生及放射状阴影，两端可见骨膜三角。最可能的诊断是

- A.骨髓炎
- B.骨结核
- C.骨转移
- D.骨巨细胞瘤
- E.骨肉瘤

258.患者，男，68岁，从两米高的平台坠落后，颈部疼痛6小时，结合影像学检查，最可能的诊断是



- A.脊椎结核
- B.椎体压缩性骨折
- C.脊椎转移瘤
- D.化脓性脊柱炎
- E.强直性脊柱炎

259.患者，女，55岁，右手拇指晨起僵硬伴疼痛半年，近2周出现该处的肿胀及活动受限，被动活动患指可出现伴疼痛的弹响。临床诊断最可能是

- A.类风湿关节炎
- B.关节内游离体
- C.骨关节炎
- D.风湿性关节炎
- E.狭窄性腱鞘炎


260.患者，男，24岁，肩部扭伤。拟诊断肩关节脱位时，哪项不应该出现

- A.组成关节骨失去正常对合关系
- B.疼痛
- C.关节囊空虚
- D.弹性固定
- E.异常活动

261.关于棘上韧带的描述，错误的是

- A.腰部最薄
- B.自上向下逐渐变薄
- C.第7颈椎以上延伸为项韧带
- D.位于棘突和棘间韧带后方，为连于棘突尖的纵长纤维索
- E.当脊柱过度前屈时，可损伤此韧带，以腰部多见

262.患者，男，44岁，有外伤史，结合所提供的图像，最可能的诊断是



- A.左髌臼骨折
- B.左髌关节脱位
- C.左髌臼骨折并左髌关节脱位
- D.左髌骨骨折
- E.左坐骨骨折

263.患者，男，56岁，高处坠落伤。查体：颈部压痛，四肢瘫痪，呼吸困难，有较重痰鸣音，X线摄片C₄₋₅骨折脱位。该患者应首先采取下列哪项措施

- A.上呼吸机
- B.气管切开
- C.吸氧
- D.手术复位固定

E.呼吸兴奋剂

264.患者，女，25岁。右肱骨干中段骨折并发桡神经损伤，下列哪项临床表现**不应该**出现

- A.右手垂腕畸形
- B.右拇指不能背伸及外展
- C.右手第2~5指掌指关节不能伸直
- D.右手背虎口区感觉障碍
- E.右拇指不能对掌

265.青年男性，被汽车压伤后立即送来急诊。查体：神志清楚，面色苍白，右上、下肢不能活动，明显肿胀及压痛。X线片示右肱骨、右股骨、右胫腓骨骨折。对此患者应密切注意容易产生下列哪种并发症

- A.休克
- B.重要动脉损伤
- C.缺血性骨坏死
- D.骨折部位感染
- E.泌尿系感染

266.患者，男，35岁。2个月前由高处跌下，发生第1腰椎压缩性骨折，双下肢不全瘫，脊髓造影检查显示脊髓被向后突出的第1腰椎后缘的骨嵴压迫。此时应采用

- A.自身功能复位
- B.双踝悬吊牵引
- C.椎管侧后方减压术
- D.两桌法复位
- E.椎板切除减压术

267.腰椎间盘突出在神经根外侧时，功能性腰椎侧突应是

- A.腰椎无侧凸变化
- B.腰椎凸向健侧
- C.腰椎凸向患侧
- D.腰椎侧凸方向不定
- E.腰椎前凸增加

268.因摩托车造成的右胫骨腓骨中下1/3开放性骨折，广泛皮肤挫伤，皮下组织与肌肉损伤严重，经彻底清创后，正确的伤口处理是


- A.伤口全部闭合，争取Ⅰ期愈合
- B.为减轻伤口内的张力，可以仅缝合皮肤
- C.采用减张与植皮使伤口愈合
- D.延迟伤口闭合，必要时可再次清创
- E.采用转移局部皮瓣或肌皮瓣闭合创面

269.患者，男，30岁，腰疼半年，行走困难一周前来就诊。查体：明显消瘦，胸腰段向后呈角畸形，X片显示胸1腰1椎体骨质破坏，椎间隙消失，首先诊断

- A.椎体转移癌压迫脊髓

- B.骨髓瘤向椎管内转移
- C.椎体边缘性结核
- D.中枢性腰椎间盘突出症
- E.马尾神经瘤

270.患者，男，39岁，从高处坠落后颈部剧痛6小时，结合影像学检查，最可能的诊断是



- A.脊椎结核
- B.化脓性脊柱炎
- C.脊椎转移瘤
- D.脊椎骨折
- E.脊椎退行性变

题型：A3

(271~272题共用题干)

患者，男，58岁，间歇性跛行3年，逐渐加重2周。查体：腰椎4~5间隙压痛，无放射，直腿抬高左右均达70°，两下肢感觉、肌力均正常。

271.根据该患者的症状体征及第4腰椎椎体Ⅱ度滑脱的X线片，最适宜采用哪种治疗方案

- A.卧硬板床休息1个月
- B.长期腰围固定
- C.石膏腰围固定3个月
- D.脊柱手术内固定，不需扩大椎管
- E.后路椎板切除减压

272.如果X线正侧位平片显示，第4腰椎椎体向前Ⅱ度滑脱，通常再进行哪项检查

- A.肌电图检查
- B.核素骨扫描
- C.腰椎CT
- D.X线腰椎左右斜位片
- E.抽血化验抗O、血沉、黏蛋白、类风湿因子

(273~275题共用题干)

患者，男，29岁，建筑工人，工作时腰背部被重物砸伤，后腰痛，伴双下肢感觉运动障碍及大小便失禁。伤后1天入院查体：腰1椎体后突畸形，压痛，腹股沟以下平面感觉运动完全丧失；X线片示腰1椎体压缩1个月，向后成角畸形及半脱位。

273.在下列各项中，最恰当的治疗方法是

- A.卧硬板床休息，腰背下垫枕
- B.卧石膏床休息，不必进行其他处理
- C.双下肢骨牵引整复骨折脱位
- D.手法复位，卧硬板床休息
- E.尽早手术复位、椎管减压及固定

274.为了解脊髓损伤的情况，选择下列哪项影像学检查最好

- A.X线摄片
- B.CT
- C.MRI
- D.神经肌电图检查
- E.腰穿做奎肯试验

275.该病常见并发症应除外

- A.骶尾部感染
- B.泌尿系感染
- C.便秘
- D.泌尿系结石
- E.体温失调

(276~277题共用题干)

患者，男，建筑工，从8米高空坠下，臀部着地，就诊时出汗，面色苍白，血压12/8kPa（90/60mmHg），背痛。

276.通过哪项检查最易确诊

- A.心电图
- B.同位素骨扫描
- C.超声波检查
- D.X线拍片
- E.腰穿奎肯试验


277.脊柱骨折并截瘫患者，早期出现以下哪项体征，估计患者手术预后不好

- A.腱反射
- B.感觉恢复
- C.腹壁反射
- D.勃起反射
- E.提睾反射

(278~280题共用题干)

患者，女，65岁，摔倒时右手撑地，即感右腕疼痛，不能活动。

278.行X线检查如图所示为右桡骨下端骨折，该病例诊断为



- A. Barton骨折
- B. 背侧Barton骨折
- C. 掌侧Barton骨折
- D. Smith骨折
- E. Colles骨折

279.骨折手法复位后石膏固定的位置应为

- A. 中立位
- B. 腕掌屈桡偏位
- C. 腕掌屈尺偏位
- D. 腕背伸尺偏位
- E. 腕背伸桡偏位

280.关于桡骨下端说法，下列哪项不正确

- A. 尺骨与腕骨构成关节
- B. 桡骨茎突比尺骨茎突长约1.0cm

- C. 桡骨下端关节面的掌倾角为 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- D. 桡骨下端关节面的尺偏角为 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$
- E. 桡骨下端指距腕关节3cm左右的桡骨部位

(281~282题共用题干)

患者，男，40岁，提重物时突然腰痛，并向左侧髋部扩散。查体：腰椎凸向右侧，腰活动困难，左侧腰骶部压痛，直腿抬高 30° （+）。X线片见腰椎向左侧弯曲。

281. 其诊断应为

- A. 棘间韧带损伤
- B. 急性腰肌损伤
- C. 腰椎间盘突出症
- D. 腰椎管狭窄
- E. 腰椎类风湿关节炎

282. 应采取的治疗方法是

- A. 卧床休息
- B. 痛点局部封闭
- C. 按摩推拿
- D. 理疗
- E. 手术治疗

(283~285题共用题干)

患者，女，65岁。在浴室滑倒，造成股骨近端骨折。右髋摔伤2小时来院。查体：右下肢稍外旋，屈曲，轴向叩击痛阳性。

283. 首选的辅助检查是

- A. B超
- B. X线
- C. CT
- D. MRI
- E. 骨扫描

284. X线片示股骨颈骨折。最易发生股骨头坏死的是

- A. 头下型
- B. 经颈型
- C. 基底型
- D. 粗隆间
- E. 粗隆下

285. 最适宜的治疗方法是

- A. 牵引至愈合
- B. 手法整复后石膏裤
- C. 手法整复，外固定架

- D.人工关节置换
- E.复位物理治疗

(286~288题共用题干)

患男，28岁。8米高处坠落，2小时后送至医院。自述胸背部疼痛，双下肢不能活动。

286.诊断首先考虑

- A.颅脑损伤
- B.脊柱损伤
- C.双下肢骨折
- D.骨盆骨折
- E.闭合性腹部损伤

287.此时应首先做的检查是

- A.EKG
- B.SEP
- C.X光平片
- D.脑脊液穿刺
- E.EMG

288.最佳治疗方案是

- A.手术减压，脊柱内固定术
- B.高低两点法过伸复位，石膏背心固定
- C.手术切除相应椎板使脊髓得以减压
- D.颅骨牵引并使用激素及脱水药物
- E.手法复位并行推拿治疗

题型：A4

(289~292题共用题干)

患者，男，32岁，1小时前被汽车撞伤左臀及左大腿。急诊检查：神志清楚，脉搏120次/min，左髂部肿胀，皮下淤血，左大腿肿胀畸形，反常活动。

289.此时对患者的处理应立即

- A.急诊手术固定骨折
- B.血管造影检查确定出血部位
- C.测血压，确定血型，开始补液
- D.左臀部B超检查确定肿胀原因
- E.立即送患者作骨盆左股骨X线拍片

290.X线检查左髂骨翼单纯骨折无移位，左股骨髁上骨折。病情稳定后，据以下何种情况行切开复位内固定

- A.骨折断端达1/3端端对位

- B.左膝关节上方血肿过大，复位困难
- C.左足背动脉和胫后动脉搏动消失
- D.骨折前后成角 10°
- E.患者要求解剖复位

291.患者手术切开复位“L”型钢板内固定石膏托保护术后最常出现的并发症是

- A.膝关节创伤性关节炎
- B.股四头肌创伤性骨化
- C.股骨远端缺血性骨坏死
- D.脂肪栓塞
- E.膝关节僵硬

292.为防止可能出现的并发症，术后两天后应进行的预防性治疗应为

- A.有效的石膏外固定（持续不间断）
- B.按摩及局部热敷
- C.股四头肌等长收缩训练
- D.被动伸屈膝关节
- E.针灸或超短波理疗

（293～296题共用题干）

患者，男，28岁，摔倒后致单纯性左肩关节脱位，1小时后来医院就诊。X线片未见合并骨折征象。

293.此时应首先采取哪种治疗措施

- A.局麻后手法复位
- B.局麻后切开复位
- C.全麻后手法复位
- D.切开复位后同时修复关节囊
- E.骨牵引后行外展架固定

294.复位成功的标志是

- A.方肩
- B.疼痛减轻
- C.原肩胛盂处有空虚感
- D.弹性固定
- E.Dugas征阴性

295.复位成功后，可屈肘 90° 用三角巾悬吊上肢

- A.1周
- B.2周
- C.3周
- D.4周
- E.5周

296.该患者解除外固定后，其左侧肩、肘关节活动受限，应如何处理

- A.进行关节各个活动方向的主动锻炼
- B.在麻醉下行手法板正
- C.行关节囊切开松解术
- D.单纯予以理疗
- E.延长外固定1~2周

(297~298题共用题干)

患者，男，44岁，因外伤右髋痛12小时。查体：生命体征平稳，右下肢短缩，髋关节屈曲、内收、内旋畸形。请结合所提供的图像，进行选择。



297.此患者应诊断为

- A.右髋前脱位
- B.右髋后脱位
- C.右髋中心脱位
- D.右股骨颈骨折
- E.右髋臼骨折

298.应选择的治疗方法

- A.Allis法
- B.Knowles针
- C.Ender杆
- D.Braun架
- E.Thomas架

(299~300题共用题干)

患者，男，25岁。3天前抬重物扭伤腰部，服芬必得，卧床休息，腰痛无缓解，出现右腿麻木疼痛，右直腿抬高40°~50°阳性，加强试验阳性，经检查诊断腰4~5椎间盘突出症。

299.此时最合适的处理是

- A.佩带腰围活动
- B.椎间盘摘除术
- C.卧硬木板床，床头牵引
- D.卧床并腰背肌功能练习

E.经皮椎间盘注射激素

300.经半年保守治疗，患者症状无明显缓解，右小腿前侧和内侧痛觉明显减退，伸（足母）长肌肌力2级，椎管造影示腰4～5椎间盘突出，压迫硬膜囊，腰神经根袖未显影。应选择下列哪种治疗

- A.麻醉下推拿
- B.服中药，理疗，牵引
- C.椎间盘内注射泼尼松
- D.全椎板减压术
- E.半椎板减压，髓核摘除，神经根松解

答案：

题型：A1

1.E	2.A	3.E	4.C	5.D	6.C	7.C	8.A	9.D	10.E
11.A	12.B	13.B	14.B	15.C	16.D	17.D	18.B	19.B	20.B
21.C	22.E	23.B	24.B	25.A	26.A	27.E	28.A	29.C	30.D
31.A	32.D	33.B	34.D	35.A	36.D	37.C	38.D	39.D	40.A
41.C	42.B	43.D	44.B	45.C	46.B	47.A	48.E	49.D	50.A
51.A	52.E	53.A	54.B	55.D	56.B	57.E	58.E	59.E	60.C
61.D	62.D	63.D	64.A	65.B	66.C	67.E	68.C	69.D	70.C
71.B	72.E	73.A	74.D	75.B	76.C	77.C	78.C	79.C	80.D
81.E	82.A	83.B	84.A	85.B	86.A	87.C	88.C	89.B	90.D
91.A	92.C	93.C	94.C	95.D	96.D	97.E	98.D	99.E	100.B
101.A	102.A	103.D	104.C	105.A	106.A	107.C	108.C	109.B	110.E
111.C	112.E	113.B	114.D	115.D	116.B	117.C	118.D	119.C	120.D
121.D	122.A	123.D	124.E	125.B	126.A	127.A	128.B	129.E	130.C
131.E	132.D	133.C	134.E	135.D	136.B	137.D	138.D	139.A	140.A
141.D	142.E	143.C	144.D	145.C	146.E	147.E	148.E	149.D	150.C
151.D	152.A	153.D	154.B	155.B	156.B	157.B	158.C	159.B	160.A
161.D	162.D	163.C	164.B	165.D	166.C	167.A	168.E	169.E	170.E
171.B	172.C	173.D	174.E	175.B	176.A	177.E	178.D	179.B	180.E
181.C	182.E	183.D	184.B	185.A	186.C	187.B	188.A	189.A	190.B
191.C	192.C	193.E	194.A	195.E	196.E	197.B	198.C	199.C	200.E

题型：A2

201.B	202.C	203.B	204.C	205.C	206.C	207.D	208.A	209.E	210.E
211.B	212.C	213.A	214.C	215.E	216.B	217.C	218.B	219.E	220.C
221.B	222.D	223.D	224.C	225.C	226.D	227.D	228.B	229.D	230.C
231.B	232.B	233.C	234.E	235.E	236.B	237.C	238.D	239.C	240.B
241.E	242.E	243.C	244.C	245.D	246.C	247.A	248.A	249.C	250.E
251.A	252.B	253.E	254.D	255.B	256.B	257.E	258.B	259.E	260.E
261.A	262.C	263.B	264.E	265.A	266.C	267.C	268.D	269.A	270.D

题型：A3

271.D	272.C	273.E	274.C	275.E	276.D	277.D	278.E	279.C	280.A
281.C	282.A	283.B	284.A	285.D	286.B	287.C	288.A		

题型：A4

289.C	290.C	291.E	292.C	293.A	294.E	295.C	296.A	297.B	298.A
299.C	300.E								