

精神病学 AAAA

题型：A1

1. 共感现象主要见于
 - A. 精神分裂症
 - B. 人格障碍
 - C. 神经衰弱
 - D. 癔症
 - E. 癫痫先兆
2. 下列属于 SSRIs 抗抑郁药物的是
 - A. 利培酮
 - B. 齐拉西酮
 - C. 舍曲林
 - D. 安非他酮
 - E. 马普替林
3. 焦虑症的核心症状为
 - A. 注意力难以集中
 - B. 精神性焦虑
 - C. 躯体性焦虑
 - D. 自主神经功能紊乱
 - E. 睡眠障碍
4. 关于躯体疾病所致精神障碍的治疗原则中，正确的是
 - A. 对于精神障碍的出现，首先要使用精神药物对症治疗
 - B. 使用精神药物时，如症状稳定后，应继续维持原剂量一段时间
 - C. 精神药物的起始剂量应更低
 - D. 对有严重失眠和焦虑的病人，应长期使用镇静催眠药和抗焦虑药
 - E. 抑郁患者有青光眼可使用三环类抗抑郁剂
5. 神经性厌食症描述错误的是
 - A. 担心被别人嘲笑肥胖而故意节食
 - B. 绝大多数为青少年女性
 - C. 即使骨瘦如柴仍觉得身材不好
 - D. 比平均体重值减轻 40%以上
 - E. 常采用过度运动、诱吐、腹泻药等方法避免体重增加
6. 躯体形式障碍的疼痛障碍的病程标准是
 - A. 至少 3 个月
 - B. 至少 6 个月
 - C. 至少 9 个月
 - D. 至少 1 年
 - E. 至少 2 年
7. 关于心境障碍的临床表现，下列说法正确的是
 - A. 心境障碍没有幻觉
 - B. 心境障碍没有妄想
 - C. 心境障碍没有思维散漫
 - D. 心境障碍可伴有幻觉、妄想和思维散漫
 - E. 心境障碍伴有幻觉、妄想和思维散漫，且常有情感不协调
8. 以下哪条不是行为治疗的基本理论

- A.学习理论
 - B.强化作用
 - C.经典条件反射
 - D.操作性条件反射
 - E.精神分析理论
- 9.精神分裂症最常见的感知觉障碍是
- A.视物变形症
 - B.感觉减退
 - C.幻觉
 - D.内感性不适
 - E.错觉
- 10.关于自杀的地域与信仰因素，以下说法**错误**的是
- A.欧洲的斯堪的纳维亚半岛及原苏联加盟共和国自杀率较低，而地中海地区较高
 - B.一般情况下城市高于农村
 - C.我国农村的自杀率高于城市
 - D.宗教对死亡的认识态度及教徒与社会的整合程度，会影响教徒对自杀的态度
 - E.原苏联加盟共和国自杀率较高
- 11.下列哪一项是导致遗忘综合征的最常见病因
- A.一氧化碳中毒
 - B.心脏停搏所致的缺氧
 - C.酒精滥用导致维生素 B₁ 缺乏
 - D.脑血管性疾病
 - E.脑炎
- 12.以下最可能是妄想的现象是
- A.感到别人能够看穿他的心思
 - B.打针后腿疼，认为损伤了神经
 - C.在公共食堂吃饭时看见有人敲饭盆，认为在骂他是饭桶
 - D.声称某国家领导人是自己的大学校友
 - E.声称自己同班的班花暗恋自己
- 13.自杀的将来行为最佳预测因子是
- A.习惯性行为
 - B.日常行为习惯
 - C.偶然行为
 - D.既往自杀行为
 - E.习得性行为
- 14.行为主义理论对于性心理障碍的解释是
- A.明显的内分泌异常
 - B.性心理因为某些挫折而出现退化
 - C.无关刺激与性兴奋的偶然结合而形成了条件联系
 - D.父母对子女的性教育失当
 - E.社会道德文化对儿童的不良影响
- 15.抑郁症患者在进行无抽搐电休克治疗后，最常见的副作用是
- A.记忆力减退
 - B.情绪低落
 - C.焦虑
 - D.失眠

- E.思维迟缓
- 16.躯体疾病所致的精神障碍的处理原则，以下哪项**不对**
- A.首先必须治疗引起精神障碍的原发躯体疾病
 - B.停用可能引起精神障碍的药物
 - C.严重失眠和焦虑的病人，可以短期、小量使用抗焦虑药
 - D.精神症状稳定时，应考虑逐渐减少精神药物剂量
 - E.对精神症状的控制应遵从大剂量、足疗程的原则
- 17.对强迫症最有效的药物是
- A.阿米替林
 - B.氯丙咪嗪
 - C.安定
 - D.奥氮平
 - E.丙咪嗪
- 18.诊断抑郁发作时，其典型症状**不包括**
- A.情绪低落
 - B.兴趣缺乏
 - C.快感缺失
 - D.精力不济或疲乏感
 - E.自杀观念
- 19.危机的类型**不包括**
- A.发展性危机
 - B.境遇性危机
 - C.存在性危机
 - D.疾病危机
 - E.以上都是
- 20.谵妄的特征**不包括**下列哪一项
- A.意识障碍
 - B.注意力不能集中
 - C.情绪低落
 - D.神志恍惚
 - E.对周围环境与事物的清晰度降低
- 21.精神分裂症最常见的妄想是
- A.罪恶妄想
 - B.夸大妄想
 - C.疑病妄想
 - D.被害妄想与关系妄想
 - E.钟情妄想
- 22.急性短暂性精神病性障碍的临床特点是
- A.持续的幻觉，系统的妄想
 - B.持续的幻觉，但是妄想多不系统
 - C.片段的幻觉和妄想
 - D.片段的幻觉，系统的妄想
 - E.持续的幻觉，妄想内容泛化
- 23.哪项**不是** Briquet 综合征的临床特点
- A.女性多见，常在成年早期发病
 - B.临床上以被害、关系、躯体妄想等多见
 - C.临床表现以多种多样、反复出现、时常变化多见

- D.常见的症状有胃肠道不适、异常的皮肤感觉、呼吸、循环系统症状
E.本病为慢性波动性病程
- 24.谵妄的病理机制主要是
- A.感染
 - B.电解质紊乱
 - C.颅脑损伤
 - D.低血压
 - E.脑神经细胞急性代谢紊乱
- 25.下列属于性指向障碍的是
- A.异性症
 - B.摩擦症
 - C.性虐待症
 - D.恋物症
 - E.同性恋
- 26.精神分裂症患者在幻觉妄想支配下的违法行为应评为
- A.完全责任能力
 - B.部分责任能力
 - C.无责任能力
 - D.无行为能力
 - E.以上均不是
- 27.柯萨可夫精神病临床特点为
- A.意识障碍
 - B.定向力障碍
 - C.近记忆缺损突出
 - D.远记忆缺损严重
 - E.虚构和错构
- 28.抑郁症的思维障碍主要是
- A.思维贫乏
 - B.思维迟缓
 - C.思维不连贯
 - D.被害妄想
 - E.对其漠视，不用特殊治疗
- 29.下列对持续性躯体形式疼痛障碍的描述**不正确**的是
- A.有明显的心理因素
 - B.持续严重的疼痛不能用生理过程或躯体障碍予以合理解释
 - C.经检查未发现相应的躯体病变
 - D.躯体任何部位都可受影响"
 - E.虽病程持续 6 个月以上，但疼痛可以缓解
- 30.在神经症的常见症状中，**不包括**
- A.情绪症状
 - B.感觉过敏
 - C.躯体不适症状
 - D.幻觉
 - E.精神易兴奋
- 31.哪项**不是**躯体形式的疼痛障碍的疼痛特点
- A.对称性
 - B.持续性

- C.令人痛苦
 - D.检查无明显异常
 - E.易反复
- 32.下列药物中属于 5-HT_{1A} 受体部分激动剂抗焦虑药物的是
- A.地西泮
 - B.阿普唑仑
 - C.安非他酮
 - D.坦度螺酮
 - E.齐拉西酮
- 33.下述精神症状,对诊断精神分裂症最有意义的一组是
- A.情感高涨、思维加快
 - B.思维散漫、思维破裂
 - C.意识蒙眬、幻觉妄想
 - D.思维迟缓、情绪低落
 - E.反复出现强迫观念及动作
- 34.Jaspers 认为自我意识的特征**不包括**
- A.存在意识
 - B.能动性意识
 - C.统一性意识
 - D.同一性意识
 - E.交接性意识
- 35.下列属于 SSRIs 抗抑郁药物的是
- A.碳酸锂
 - B.帕罗西汀
 - C.利培酮
 - D.奥氮平
 - E.多塞平
- 36.神经性厌食常发生于
- A.青少年女性
 - B.青少年男性
 - C.中年男性
 - D.中年女性
 - E.儿童女孩
- 37.以下说法符合创伤后应激障碍的是
- A.遭受创伤后数日至数月后,罕见延迟半年以上发生,病程至少持续 1 个月以上,一般在 1 年内恢复正常
 - B.遭受心理社会刺激发生后 1 个月内发生,病程至少持续 1 个月,一般不超过 6 个月
 - C.表现为精神运动性兴奋或精神运动性抑制,可有意识模糊
 - D.以抑郁、焦虑、害怕等情感症状为核心症状,有退缩、不注意卫生、生活无规律等行为障碍
 - E.该疾病若应激源被消除,预后良好,缓解完全
- 38.精神分裂症最多见的幻觉是
- A.视幻觉
 - B.听幻觉
 - C.触幻觉
 - D.嗅幻觉
 - E.味幻觉

- 39.关于尼古丁对精神活动的影响叙述**错误**的是
- A.吸烟可以消除烦恼、提高工作效率
 - B.尼古丁的兴奋作用很短
 - C.吸烟不会增加脑力活动
 - D.尼古丁可增加心血管负担
 - E.吸烟习惯本是复杂的条件反射
- 40.以下哪项属于躯体形式障碍
- A.疑病障碍
 - B.惊恐障碍
 - C.强迫障碍
 - D.神经性厌食
 - E.神经性呕吐
- 41.癫痫和分离（转换）性障碍的鉴别诊断中，属于癫痫发作的三个阶段是
- A.发作、强直、缓解
 - B.前兆、发作、缓解
 - C.强直、痉挛、缓解
 - D.强直、痉挛、恢复
 - E.发作、痉挛、恢复
- 42.急性短暂性精神病性障碍的定义
- A.一组起病急、缓解不完全、持续时间短暂的精神病性障碍
 - B.一组起病慢、缓解完全、持续时间长的精神病性障碍
 - C.一组起病急、缓解完全、持续时间短暂的精神病性障碍
 - D.一组起病慢、缓解不完全、持续时间短暂的精神病性障碍
 - E.一组起病急、缓解完全、持续时间长的精神病性障碍
- 43.诊断精神分裂症，**不具有**特征性诊断意义的听幻觉是
- A.评论性幻听
 - B.原始性幻听
 - C.议论性幻听
 - D.命令性幻听
 - E.辱骂性幻听
- 44.患者，男性，35岁，个体。因出现幻觉-妄想综合征、情绪高涨的精神症状住院治疗，在躯体检查时，发现其角膜外缘黄褐色环，出现强直，震颤，运动减少，常规化验中尿铜含量增加，据此诊断患者为
- A.Wilson病
 - B.心境障碍，躁狂发作
 - C.精神分裂症
 - D.多发性硬化
 - E.癫痫所致精神障碍
- 45.分离性抽搐的特点是
- A.发作突然性
 - B.有节律性肢体抽动
 - C.意识未完全丧失
 - D.发作时间短暂
 - E.有咬破唇舌
- 46.注意缺陷多动障碍的最主要的症状是
- A.注意障碍
 - B.活动过多

- C.学习困难
 - D.神经系统症状
 - E.智能障碍
- 47.精神分裂症治疗原则**不包括**
- A.病情好转后即可停药，不需要维持治疗
 - B.强调早期、足量、足疗程
 - C.治疗应从低剂量开始
 - D.系统而规范
 - E.药物剂量应该逐渐加大
- 48.以下哪一项**不是**与分离（转换）性障碍的鉴别诊断
- A.癫痫
 - B.躯体疾病
 - C.精神分裂症
 - D.焦虑症
 - E.急性应激反应
- 49.下列抗精神病药物中，属于多巴胺受体部分激动剂的是
- A.齐拉西酮
 - B.利培酮
 - C.阿立哌唑
 - D.奥氮平
 - E.氯氮平
- 50.使用成瘾物质后吸食者主观上产生某种陶醉感和欣快感主要是因为
- A.细胞内 5-HT 浓度增高
 - B.细胞内 5-HT 浓度降低
 - C.突触间隙 DA 浓度增高
 - D.突触间隙 DA 浓度降低
 - E.突触间隙 5-HT 浓度增高
- 51.关于记忆的说法，正确的是
- A.部分或全部不能再现以往的经验称为记忆错误
 - B.由于再现的失真而引起的记忆障碍称为遗忘
 - C.病人以想象的、未曾亲身经历过的事件来填补亲身经历的记忆称为记忆增强
 - D.将过去经历过的事物在具体时间，具体人物或地点上搞错了，称为错构
 - E.病人把从未见过的人当作熟人或朋友认识，称为虚构
- 52.关于攻击行为的生物学因素的说法中，正确的是
- A.男性明显多于女性
 - B.女性明显多于男性
 - C.不存在家族聚集性
 - D.与神经内分泌无关
 - E.与神经递质关系不大
- 53.急性短暂性精神障碍的共同特点**不包括**
- A.2 周内急性起病
 - B.以精神病性症状为主
 - C.起病前有相应的心因
 - D.通常无幻觉妄想
 - E.在 2~3 月内痊愈
- 54.躁狂发作思维表现有
- A.思维阻塞

- B.思维奔逸
 - C.思维插入
 - D.思维云集
 - E.关系妄想
- 55.对于谵妄患者抗精神病药物的使用，以下哪个说法是正确的
- A.针对精神症状，可给予抗精神病药小剂量、短期治疗
 - B.不能使用苯二氮草类药物治疗
 - C.加强镇静作用，以保证患者的安全
 - D.首先考虑使用非典型的抗精神病药物，如奥氮平、喹硫平、利培酮等
 - E.给予人工冬眠合剂，积极改善患者的精神症状
- 56.对于成瘾物质依赖现象描述**不正确**的一项是
- A.耐受性增加
 - B.尚未产生戒断症状
 - C.可分为躯体依赖和心理依赖
 - D.一组认知、行为、和生理症状群
 - E.一种病理性适应状态
- 57.ICD-10 中，诊断抑郁发作时其主要表现为显著而持久的
- A.情绪低落
 - B.思维迟缓
 - C.意志活动减少
 - D.精神运动性迟滞或激越
 - E.自杀观念
- 58.以下哪个是惊恐障碍的常见症状
- A.听幻觉
 - B.被害妄想
 - C.濒死感
 - D.被洞悉感
 - E.错觉
- 59.以下说法**不符合**急性应激障碍特征的是
- A.可有一定程度的意识障碍
 - B.可出现木僵状态
 - C.有心悸、汗多、面部潮红等副交感神经活动亢进的表现
 - D.可有激越性活动过多，如兴奋、失眠、喊叫
 - E.病程短暂，一般持续几小时到一周，预后良好
- 60.病理性焦虑和恐怖症状的区别在于后者
- A.有无自主神经功能紊乱症状
 - B.有惊恐发作的表现
 - C.意识清楚
 - D.发作时间一般不超过 30 分钟
 - E.有明确的指向对象
- 61.关于孤独症的病程，下列说法中正确的是
- A.一般出生时即起病
 - B.一般 3 岁前起病
 - C.后期人际交往障碍症状减轻
 - D.后期进食问题症状改善不明显
 - E.青春期一般不会出现自伤行为

- 62.在精神检查涉及具体症状时，最重要的是
- A.确定症状的首发时间
 - B.澄清症状的性质
 - C.澄清症状严重程度
 - D.与患者讨论症状真实性
 - E.按预定程序询问以免患者感到疲乏
- 63.哪项表现**不符合**谵妄状态的特性
- A.意识模糊
 - B.恐怖性幻觉和错觉
 - C.不协调性精神运动性兴奋
 - D.事后有遗忘
 - E.情绪高涨
- 64.对神经性厌食患者的治疗原则是
- A.采用认知疗法、行为治疗等心理治疗方法为主
 - B.采用抗精神病药或抗抑郁药等药物治疗方法为主
 - C.采用纠正营养不良的治疗方法为主
 - D.首先纠正营养不良，同时或稍后开展心理治疗以及辅助的药物治疗
 - E.首先开展心理治疗，然后再采取措施纠正营养不良
- 65.关于精神分裂症青春型，下列说法何种**不正确**
- A.主要为思维破裂
 - B.发病多在青春期
 - C.片断幻觉，妄想，可有象征性思维
 - D.起病呈急或亚急性
 - E.预后良好
- 66.某神经症患者在看见或听到“天才”二字时，马上想起“笨蛋”二字；看见或听到“安全”二字时，便想到“危险”二字，此症状称之为
- A.强迫性对立观念
 - B.牵连观念
 - C.强迫意向
 - D.强迫性穷思竭虑
 - E.以上都对
- 67.双相障碍患者频繁发作（每年发作4次以上），发作可以是躁狂、轻躁狂、抑郁或混合发作，称为
- A.快速转变型
 - B.循环型
 - C.快速循环型
 - D.快速发作型
 - E.反复发作型
- 68.酒精在体内的代谢大部分是通过肝内的
- A.微粒体乙醇氧化系统
 - B.乙醇脱羧酶系
 - C.乙醛脱氢酶系
 - D.乙醇脱氢酶系
 - E.乙醛脱羧酶系
- 69.下面哪项内容**不是**对行为治疗的描述
- A.基于实验心理学的成果
 - B.帮助病人消除不良行为

- C.关注病人对事物的理解
 - D.促进良好行为的产生
 - E.可操作性相对较强
- 70.有关心身疾病的描述, 哪项**不对**
- A.也称为心理生理疾病
 - B.是一组与心理紧张有关的躯体疾病
 - C.有器质性病变或确定的病理、生理过程
 - D.冠心病和消化性溃疡不属于心身疾病
 - E.心理社会因素在疾病的发生、发展、治疗和预后中有相对重要的作用
- 71.经典精神分析是在 19 世纪 90 年代, 由 () 创立的
- A.巴甫洛夫 (Pavlov)
 - B.罗杰斯 (Rogers)
 - C.斯金纳 (Skinner)
 - D.弗洛伊德 (S.Freud)
 - E.马斯洛 (Maslow)
- 72.阿尔茨海默病的病程特征为
- A.阶梯式恶化
 - B.只发作一次
 - C.自限性病程, 短期内自行好转
 - D.进行性发展加重
 - E.缓慢发展, 逐渐好转
- 73.关于内感性不适和内脏性幻觉, **不正确的是**
- A.内感性不适性质和部位不明确
 - B.两者均可见于精神分裂症和抑郁症
 - C.内感性不适属于知觉障碍
 - D.内感性不适可继发疑病观念
 - E.内脏性幻觉可继发疑病观念
- 74.关于刺激与反应, 下述哪一项**最正确**
- A.文字刺激只引起心理反应
 - B.化学刺激只产生化学反应
 - C.物理刺激只产生物理反应
 - D.抽象刺激的作用强度大于物理刺激
 - E.从最简单的单细胞生物到最复杂的人类, 都能对刺激作出反应
- 75.ICD-10 中, 关于恶劣心境的诊断标准, 以下描述**错误的是**
- A.慢性的心境低落, 无论从严重程度还是一次发作的持续时间, 目前均不符合轻度或中度复发性抑郁标准
 - B.至少 2 年内抑郁心境持续存在或反复出现, 其间的正常心境很少持续几周
 - C.社会功能受损较轻
 - D.病程中偶可出现轻躁狂症状
 - E.自知力完整或较完整
- 76.心理治疗的主要适应证是
- A.神经症
 - B.抑郁症
 - C.躁狂症
 - D.精神分裂症
 - E.精神发育迟滞
- 77.生物反馈治疗主要适用于

- A.躁狂症
 - B.精神分裂症
 - C.儿童精神病
 - D.疑病症
 - E.焦虑症
- 78.刻板言语或动作主要见于
- A.癔症
 - B.强迫症
 - C.精神分裂症
 - D.器质性精神障碍
 - E.躁狂症
- 79.躁狂发作的睡眠障碍特点是
- A.入睡困难
 - B.多梦
 - C.睡眠需求减少
 - D.早醒
 - E.睡眠过多
- 80.在精神分裂症预后不良的诸因素中，不包括
- A.起病缓慢
 - B.幻觉妄想丰富
 - C.病程迁延
 - D.病前性格缺陷
 - E.缺乏家庭照顾
- 81.关于精神障碍的一级预防，下列说法**错误**的是
- A.是预防精神障碍最积极、最主动的措施
 - B.主要针对病因已经明确的精神疾病
 - C.对易患精神障碍的“高危人群”，如从事高心理压力职业者，采取相应的心理干预措施
 - D.定期进行精神病流行病学调查属于一级预防的主要内容之一
 - E.对确认或可疑的精神障碍者，指导患者及家属及时就诊
- 82.惊恐障碍的发作一般持续多长时间
- A.1~5 分钟
 - B.5~20 分钟
 - C.20~60 分钟
 - D.1~2 小时
 - E.2~24 小时
- 83.病理性醉酒状态下的违法行为一般应评为
- A.完全责任能力
 - B.部分责任能力
 - C.无责任能力
 - D.无行为能力
 - E.以上均不是
- 84.下列药物中属于苯二氮卓类抗焦虑药物的是
- A.舍曲林
 - B.氯硝西洋
 - C.喹硫平
 - D.坦度螺酮

- E.丙戊酸钠
- 85.额叶肿瘤可出现的精神症状表现有
- A.反复发作，幻听、欣快等
 - B.广泛性智能受损、情感障碍、人格改变
 - C.失用、失写、失算、手指失认等
 - D.原始性幻觉
 - E.遗忘综合征
- 86.对广泛性焦虑障碍描述正确的是
- A.患者常常因对危险的事物提心吊胆、紧张不安
 - B.伴有显著自助神经功能紊乱症状、肌肉紧张及运动性不安
 - C.患者往往能够认识到担忧是过渡和不恰当的，可自行控制，并不感到痛苦
 - D.由于焦虑症状导致患者自知力下降，社会功能明显下降
 - E.患者常常出现发作性的濒死感和预期性焦虑，发作间隙完全正常
- 87.关于疑病症下列说法**错误**的是
- A.描述不清的疼痛
 - B.躯体症状的表现涉及身体许多不同区域
 - C.有些患者怀疑自己五官不正
 - D.医生的解释与保证可消除其疑病信念
 - E.病人人格特征多疑、敏感、主观
- 88.失眠症治疗时最常用的药物是
- A.地西洋类
 - B.氯丙嗪
 - C.多塞平
 - D.奋乃静
 - E.阿米替林
- 89.我国的毒品**不包括**
- A.海洛因
 - B.可卡因
 - C.酒精
 - D.苯丙胺
 - E.大麻
- 90.下列哪项**不属于**思维形式障碍
- A.思维迟缓
 - B.思维散漫
 - C.病理性赘述
 - D.思维中断
 - E.牵连观念
- 91.精神障碍的诊断标准就是将疾病的症状按照不同组合，以条理化形式列出的一种标准化条目，其中**不包括**的是
- A.症状学
 - B.病情严重程度
 - C.精神心理量表判定
 - D.功能损害
 - E.病程
- 92.不属于强迫症治疗的一线药物是
- A.氟西汀
 - B.阿立哌唑

- C.舍曲林
 - D.帕罗西汀
 - E.氟伏沙明
- 93.分离性（转换）性障碍的好发年龄是
- A.15~20 岁
 - B.20~30 岁
 - C.30~40 岁
 - D.40~50 岁
 - E.50~60 岁
- 94.下列属于性心理障碍的是
- A.阳痿
 - B.早泄
 - C.易性症
 - D.性乐高潮障碍
 - E.阴道痉挛
- 95.关于孤独症的精神科药物治疗，下列说法中正确的是
- A.有治疗核心症状的特效药物
 - B.抗精神病药物必须应用
 - C.精神症状明显且严重时才可考虑
 - D.抗抑郁药物系统治疗
 - E.不可应用
- 96.精神障碍常用的分类依据是
- A.遗传及神经生理、生化
 - B.影像和实验室检查
 - C.症状评定及量表
 - D.病因、病理和症状
 - E.学派及国际惯例
- 97.关于超价观念，**不正确**的是
- A.常有一定的现实基础
 - B.有一定的人格基础
 - C.有强烈的情感体验及需要
 - D.是一种坚信
 - E.是妄想的早期表现
- 98.除惊恐发作外，神经症的病程标准至少要求达到
- A.2 周
 - B.1 个月
 - C.2 个月
 - D.3 个月
 - E.6 个月
- 99.哪项**不是**躯体形式障碍的共同特点
- A.症状复杂、多样，不能找到明确的器质性依据
 - B.反复检查和治疗，疗效不好，影响医患关系
 - C.诊断名称含糊、多样，可能加重患者的求医行为
 - D.通过检查证实有明确的躯体疾病
 - E.患者往往对躯体不适过分关注，治疗依从性差
- 100.下列哪项**不属于**意识障碍
- A.嗜睡

- B.昏睡
 - C.缄默症
 - D.昏迷
 - E.朦胧状态
- 101.对躯体畸形（虽然根据不足但毫无根据）疑虑或先占观念属于
- A.躯体疾病所致精神障碍
 - B.躯体化障碍
 - C.未分化躯体形式障碍
 - D.分离（转换）性障碍
 - E.疑病障碍
- 102.精神分裂症最常见的幻觉是
- A.味幻觉
 - B.触幻觉
 - C.本体幻觉
 - D.嗅幻觉
 - E.言语性幻听
- 103.以下哪种疾病属于按病因学原则分类的精神疾病
- A.分离（转换）性障碍
 - B.广泛性焦虑障碍
 - C.酒精所致精神障碍
 - D.抑郁障碍
 - E.强迫性障碍
- 104.关于癔症性瘫痪，下列何种说法**不正确**
- A.瘫痪表现为单瘫、截瘫或偏瘫
 - B.瘫痪伴有肌张力增强或弛缓
 - C.无神经系统损害的体征，病理反射阴性
 - D.即使病程持久也不出现失用性萎缩
 - E.催眠、暗示疗法治疗可能有效
- 105.下列属于酒精戒断综合征的是
- A.酒精所致幻觉症
 - B.柯萨科夫综合征
 - C.Wernicke 脑病
 - D.震颤谵妄
 - E.痴呆
- 106.长期大量饮酒者如突然断酒，震颤谵妄常出现在断酒
- A.72 小时后
 - B.24 小时后
 - C.8 小时后
 - D.48 小时后
 - E.12 小时后
- 107.下列哪种成瘾性物质**不属于**阿片类
- A.吗啡
 - B.海洛因
 - C.美沙酮
 - D.哌替啶
 - E.咖啡因

108. Cotard 综合征最常出现于
- A. 晚发精神分裂症
 - B. 阿尔茨海默病
 - C. 匹克病
 - D. 人格解体性神经症
 - E. 老年期抑郁障碍
109. 下列药物中属于苯二氮卓类抗焦虑药物的是
- A. 阿立哌唑
 - B. 米氮平
 - C. 阿普唑仑
 - D. 丁螺环酮
 - E. 碳酸锂
110. 谵妄综合征的主要特征是
- A. 幻视
 - B. 意识障碍昼轻夜重
 - C. 幻听
 - D. 记忆减退
 - E. 错觉
111. 精神疾病的物理治疗一般不包括
- A. 电痉挛治疗
 - B. 经颅磁刺激
 - C. 迷走神经刺激
 - D. 深部脑刺激
 - E. 精神分析治疗
112. 在心理治疗工作中，下列哪项是最重要的治疗原则
- A. 必须详细地收集病史，包括个人成长史
 - B. 与药物配合治疗
 - C. 建立良好，信任的医患关系
 - D. 注意调动病人的主观能动性
 - E. 治疗者必须掌握各种心理治疗的理论
113. 以下哪项不是处于应激状态下的个体的表现
- A. 体内内分泌活动发生改变
 - B. 体内神经递质发生改变
 - C. 可能导致脑功能损害
 - D. 常表现交感神经兴奋
 - E. 常表现为副交感神经兴奋
114. 下列关于躯体疾病所致精神障碍的诊断依据中，正确的是
- A. 只要发生精神障碍时，存在有躯体疾病的依据即可诊断
 - B. 精神症状必须比躯体疾病出现晚
 - C. 当躯体疾病好转，精神障碍可能仍无好转
 - D. 有典型的功能性精神障碍的症状出现
 - E. 躯体疾病在精神障碍的发生、发展、转归等方面有时间上的密切关系
115. 分离性运动和感觉障碍最有效的治疗方法是
- A. 行为治疗
 - B. 镇静药物
 - C. 暗示治疗
 - D. 抗精神病药物

- E.物理治疗
- 116.较容易引起高催乳素血症的是
- A.氯丙嗪
 - B.氟哌啶醇
 - C.喹硫平
 - D.利培酮
 - E.阿立哌唑
- 117.选择性 5-HT 再摄取抑制剂**不包括**
- A.氟西汀
 - B.舍曲林
 - C.帕罗西汀
 - D.马普替林
 - E.西酞普兰
- 118.WHO 的统计数据表明，关于全世界自杀人数的描述，以下正确的是
- A.全世界每年约有 10 万人死于自杀，平均 400s 左右有 1 人死于自杀，每 30s 有 1 人自杀未遂
 - B.全世界每年约有 100 万人死于自杀，平均 40s 左右有 1 人死于自杀，每 3s 有 1 人死于自杀未遂
 - C.全世界每年约有 500 万人死于自杀，平均 200s 左右有 1 人死于自杀，每 15s 有 1 人自杀未遂
 - D.全世界每年约有 1000 万人死于自杀，平均 4s 左右有 1 人死于自杀，每 0.3s 有 1 人自杀未遂
 - E.全世界每年约有 5000 万人死于自杀，平均 4s 左右有 1 人死于自杀，每 0.3s 有 1 人自杀未遂
- 119.精神自动综合征的临床表现**不包括**
- A.假性幻觉
 - B.被控制感
 - C.思维云集
 - D.意识障碍
 - E.被害妄想
- 120.当前广泛提倡的新的医学模式是
- A.生物-心理-社会医学模式
 - B.社会文化模式
 - C.生物医学模式
 - D.心理社会模式
 - E.整体平衡模式
- 121.关于精神分裂症的焦虑、抑郁症状以下说法**不正确的是**
- A.以疾病的早期和缓解后期多见
 - B.以阴性症状为主的患者较多出现
 - C.患者发生自杀行为和物质滥用的可能性增加
 - D.可继发于药物的不良反应
 - E.常常被精神病性症状所掩盖
- 122.下列属于第二代抗精神病药物的是
- A.舍曲林
 - B.阿立哌唑
 - C.氯丙嗪
 - D.氟哌啶醇

- E.碳酸锂
- 123.躁狂病人的精神检查中，最常见的症状是
- A.听幻觉
 - B.夸大妄想
 - C.被害妄想
 - D.钟情妄想
 - E.关系妄想
- 124.渐进性放松训练治疗的主要适应证为
- A.精神分裂症
 - B.抑郁症
 - C.躁狂症
 - D.心身疾病
 - E.器质性精神病
- 125.神经性呕吐的特点是
- A.常伴有明显器质性病变
 - B.不能自控的反复食后呕吐
 - C.体重明显减轻
 - D.害怕体重增加或影响身材
 - E.自发的反复呕吐
- 126.痴呆综合征的症状**不包括**
- A.记忆能力减退
 - B.理解能力减退
 - C.计算能力减退
 - D.意识障碍
 - E.人格改变
- 127.危机评估的内容包括
- A.迅速确定事件、危机的严重程度
 - B.危机评估并确保安全
 - C.制定干预目标并实施干预
 - D.以上均包括
 - E.以上均不包括
- 128.属于基因异常的精神发育迟滞的是
- A.苯丙酮尿症
 - B.半乳糖血症
 - C.戈谢病
 - D.先天性脑积水
 - E.脂质沉积症
- 129.下列哪项是失眠症最常见的病因是
- A.心理生理因素
 - B.精神病的伴发症状
 - C.药物依赖的伴发症状
 - D.睡眠中呼吸困难引起
 - E.酒类依赖的戒断症状
- 130.以下哪一点可作为癫痫发作与分离（转换）性障碍的鉴别诊断
- A.癫痫发作时患者处于意识朦胧状态
 - B.癫痫发作有抽搐、强直和恢复三个阶段
 - C.分离（转换）性障碍抽搐发作时患者脑电图检查有特征性变化

- D.癫痫发作后完全不能回忆
 - E.分离（转换）性障碍抽搐发作时常有大小便失禁
- 131.意志通常的特征**错误**的是
- A.指向性
 - B.目的性
 - C.坚强性
 - D.自觉性
 - E.多变性
- 132.临床表现符合躯体化障碍或者不典型，但病程短于2年，应诊断为
- A.躯体疾病所致精神障碍
 - B.未分化躯体形式障碍
 - C.躯体形式的自主神经功能紊乱
 - D.分离（转换）性障碍
 - E.疑病障碍
- 133.下列有关氯胺酮的说法**错误**的是
- A.氯胺酮粉末又称为K粉
 - B.只能通过鼻吸和气雾法摄取
 - C.可对多个脏器系统造成损害
 - D.滥用者常将氯胺酮与其他药物合用
 - E.滥用者有时连续数天使用
- 134.口服长效的抗精神病药物是
- A.五氟利多
 - B.帕利哌酮
 - C.奥氮平
 - D.利培酮
 - E.氯氮平
- 135.下列哪项提示存在意识障碍
- A.诉凭空听见骂自己的声音
 - B.滔滔不绝，说话难以打断
 - C.看见地上的绳子以为是蛇
 - D.感觉体内有虫子在爬
 - E.感觉自己的手臂变长了
- 136.与心理和社会因素密切相关，以生理障碍为主要临床表现的疾病是
- A.抑郁障碍
 - B.分离性障碍
 - C.心因性精神障碍
 - D.心理因素相关生理障碍
 - E.转换性障碍
- 137.双相障碍快速循环型患者的发作频率是
- A.每年发作2次以上
 - B.每年发作3次以上
 - C.每年发作4次以上
 - D.半年发作3次以上
 - E.半年发作4次以上
- 138.下列药物中属于TCAs抗抑郁药物的是
- A.氟哌啶醇
 - B.奥氮平

- C.艾司西酞普兰
 - D.米氮平
 - E.马普替林
- 139.病人将墙上的污迹看成一只张牙舞爪的老虎，此现象属于
- A.错觉
 - B.幻觉
 - C.虚构
 - D.错构
 - E.感知综合障碍
- 140.以下哪一组症状为抑郁症主要精神症状
- A.抑郁，焦虑，兴趣缺乏，自责自罪
 - B.悲伤，贫穷妄想，内脏性幻觉
 - C.抑郁心境，思维中断
 - D.悲伤，幻听，被害妄想
 - E.情感淡漠，思维贫乏
- 141.广泛性焦虑障碍的描述正确的是
- A.广泛性焦虑障碍的主要临床相是伴有疲劳、抑郁、恐惧等症状
 - B.广泛性焦虑障碍以焦虑为主要表现，其共病率较低
 - C.广泛性焦虑约 2/3 伴有抑郁症状
 - D.焦虑症状的患者害怕死亡，合并抑郁症状，其自杀风险会大幅下降
 - E.广泛性焦虑障碍与惊恐障碍为焦虑障碍的不同类型，共病的可能性较少，大都单独存在
- 142.重度精神发育迟滞患者的违法行为应评定为
- A.完全责任能力
 - B.部分责任能力
 - C.无责任能力
 - D.无行为能力
 - E.以上均不是
- 143.对精神分裂症常出现的意志障碍的描述，哪项不妥
- A.意志增强
 - B.意志减退
 - C.意志坚强
 - D.犹豫不决
 - E.意志缺乏
- 144.强迫观念**不包括**下列哪一种症状
- A.强迫性穷思竭虑
 - B.强迫性计数
 - C.强迫性怀疑
 - D.强迫性对立思维
 - E.强迫性回忆
- 145.关于精神病学的学科地位，以下哪种说法正确
- A.精神病学是生物医学的分支学科
 - B.精神病学是行为医学的分支学科
 - C.精神病学是社会科学的分支学科
 - D.精神病学是临床医学的分支学科
 - E.精神病学是心理学的分支学科
- 146.抑郁发作的生物学特征，一般**不包括**

- A.便秘
 - B.早醒
 - C.情感低落
 - D.食欲和性欲减退
 - E.情绪呈昼重夜轻的节律改变
- 147.有关自杀的动机，以下**不正确**的是
- A.自杀的目的可以是为了摆脱痛苦、逃避现实、实现精神再生
 - B.有人试图通过死后进入天堂，以获得人世间得不到的东西
 - C.自杀可以作为一种表达困境、向外界寻求帮助和同情的手段
 - D.某种目的或信仰，以及保持自己道德上和人格上的完美的努力不会成为自杀动机
 - E.自杀是为了惩罚自己罪恶的行为
- 148.对精神分裂症的研究表明，精神分裂症的阳性症状可能与以下因素有关
- A.皮层下边缘系统 DA 功能亢进
 - B.皮层下边缘系统 DA 功能低下
 - C.5-HT 系统功能亢进
 - D.5-HT 系统功能低下
 - E.去甲肾上腺素系统功能不足
- 149.下列属于第二代抗精神病药物的是
- A.丁螺环酮
 - B.曲唑酮
 - C.五氟利多
 - D.齐拉西酮
 - E.米氮平
- 150.下列关于酒精所致的人格改变，说法**错误**的是
- A.人格不会出现明显的衰退
 - B.对饮酒的需要超过其他一切活动
 - C.日益加重的自我为中心，自私
 - D.为了得到酒而不诚实
 - E.行为标准下降，有时表现为偷窃和诈骗
- 151.伴有癫痫发作的孤独症患儿，宜选用
- A.氯氮平
 - B.氟伏沙明
 - C.氯丙嗪
 - D.丙戊酸钠
 - E.艾司唑仑
- 152.关于妄想，正确的是
- A.妄想都是与事实不相符的信念
 - B.妄想是一种病理性的歪曲信念
 - C.妄想是可以通过摆事实、讲道理说服的信念
 - D.坚信不疑的信念就是妄想
 - E.妄想与患者的文化水平、社会背景相称
- 153.以下哪种神经递质异常可能与谵妄的发生有关
- A.多巴胺功能亢进
 - B.多巴胺合成减少
 - C.5-羟色胺功能亢进
 - D.5-羟色胺合成减少

- E.乙酰胆碱合成减少
- 154.下面关于精神活性物质叙述**错误**的是
- A.能够影响人类的情绪
 - B.能够影响人类的行为
 - C.能够改变人类的意识状态
 - D.有致依赖作用
 - E.一类生物学物质
- 155.精神分裂症的意志与行为障碍主要表现为
- A.强迫性行为
 - B.协调性精神运动性兴奋
 - C.协调性精神运动性抑制
 - D.意志减退和紧张综合征
 - E.冲动、伤人行为
- 156.按照我国《婚姻法》的规定，精神病患者
- A.只要双方同意均可以结婚
 - B.不能结婚
 - C.在疾病未愈的情况下不能离婚
 - D.不能离婚
 - E.可以结婚，但不能生育子女
- 157.在 CCMD-3 中，关于广泛性焦虑症的病期要求是
- A.至少 3 个月
 - B.至少 6 个月
 - C.至少 1 个月
 - D.至少 12 个月
 - E.至少 2 年
- 158.精神分裂症临床表现中**不包括**
- A.感知障碍
 - B.思维及联想障碍
 - C.情感障碍
 - D.意识障碍
 - E.意志与行为障碍
- 159.下列关于精神活动的说法，哪项是**错误**的
- A.精神活动以大脑为基础
 - B.精神活动是以客观现实为基础的
 - C.精神活动包括认知、情感、意志等过程
 - D.病态精神活动与客观现实脱离因此与客观现实无关
 - E.精神活动受到躯体营养代谢状况的影响
- 160.对心电图 QT 间期影响较大的抗精神病药物是
- A.阿立哌唑
 - B.齐拉西酮
 - C.利培酮
 - D.奥氮平
 - E.喹硫平
- 161.目前常用的脱毒治疗替代药物是
- A.可乐定
 - B.美沙酮
 - C.中草药

- D.东莨菪碱
 - E.氯硝西洋
- 162.有关血管性痴呆 (VD) 以下说法**错误**的是
- A.VD 发病与年龄有关, 男性多于女性 VD
 - B.是指由脑血管病变导致的痴呆
 - C.与 AD 比较, VD 较少出现夜间精神紊乱, 但人格改变较多见
 - D.可伴发抑郁、情绪不稳和情感失控等症状
 - E.与 AD 比较, VD 认知功能缺损通常较局限, 记忆缺损可能不太严重
- 163.下列关于肾脏疾病患者透析治疗, 说法**错误**的是
- A.常出现持续性的幻觉、妄想综合征
 - B.可发生透析性痴呆
 - C.透析性痴呆的发生, 可能与透析液含有高铝有关
 - D.可造成持久的神经系统症状, 和智能的进行性下降
 - E.可出现“平衡失调”综合征
- 164.巴比妥类药物诱导的睡眠特点是
- A.缩短快眼动睡眠时相
 - B.延长快眼动睡眠时相
 - C.缩短非快眼动睡眠时相
 - D.延长非快眼动睡眠时相
 - E.与正常睡眠无区别
- 165.严重抑郁症自杀观念强烈者应首先考虑使用
- A.阿米替林
 - B.丙咪嗪
 - C.多塞平
 - D.苯乙肼
 - E.电休克治疗
- 166.精神发育迟滞的治疗原则是
- A.教育一般不会有有效
 - B.康复训练为主
 - C.心理治疗为主
 - D.可长期应用抗精神病药物
 - E.建议放弃治疗
- 167.关于虚构, 正确的是
- A.虚构的内容固定不变
 - B.虚构的内容经常改变
 - C.虚构是病理性谎言
 - D.虚构常见于人格障碍
 - E.虚构就是错构
- 168.关于神经性贪食的临床表现描述正确的是
- A.主要由于神经系统障碍导致的进食障碍, 控制不知的大量进食
 - B.患者一般因为心情较好而大量进食。暴食后感到厌恶、内疚、担忧, 有的为此而产生自杀观念和行
 - C.患者多为青少年男性
 - D.患者常采取多种手段, 如引吐、导泻、服减肥药等以避免体重增加
 - E.大部分患者因大量进食而导致体重明显增加
- 169.躯体化障碍的主要症状是
- A.焦虑

- B.抑郁
 - C.易疲劳
 - D.强迫思维
 - E.反复出现的躯体症状
- 170.医学心理学强调的整体医学模式是
- A.生物医学模式
 - B.生理-心理医学模式
 - C.生物-心理-社会医学模式
 - D.心理-社会医学模式
 - E.生物-社会医学模式
- 171.在精神分裂症的病因中，遗传因素的目前研究发现
- A.患者近亲的患病率与一般人群接近
 - B.同卵双生的同病率是异卵双生的4~6倍
 - C.精神分裂症的母亲所生子女从小寄养于正常家庭环境中，成年后患病率明显降低
 - D.分子遗传学研究已经明确了精神分裂症的基因定位
 - E.与精神分裂症患者血缘关系越近，发病率越低
- 172.以下关于神经性厌食的描述正确的是
- A.神经性疾病造成的厌食
 - B.精神疾病造成的厌食
 - C.过度肥胖使病人产生的厌食
 - D.指有意节制饮食，导致体重明显低于正常标准的一种进食障碍
 - E.以上都不是
- 173.以下关于应激源的说法正确的是
- A.患者只要遭遇了应激源就会出现应激相关障碍
 - B.患者遭遇的应激源越严重、时间越长，所患的应激障碍越严重
 - C.对从事的工作无兴趣、频繁变换工作这些不算应激源
 - D.应激源只有其强度和主观体验超出个体的耐受能力时，才能成为应激相关障碍的治病因素
 - E.以上选项均正确
- 174.精神分裂症发病机制中神经生化假说主要为
- A.5-HT 假说
 - B.ACH 假说
 - C.DA 假说
 - D.NE 假说
 - E.GABA 假说
- 175.正常思维的特征不包括
- A.目的性
 - B.连贯性
 - C.逻辑性
 - D.实践性
 - E.创新性
- 176.以下哪个神经递质系统的异常是惊恐障碍的主要机制
- A.DA
 - B.谷氨酸
 - C.乙酰胆碱
 - D.褪黑素
 - E.γ-氨基丁酸

- 177.关于品行障碍，下列说法中正确的是
- A.男性明显多于女性
 - B.患病高峰期在青春期前
 - C.患病高峰期在成年期
 - D.城市患病率明显低于农村
 - E.一般不会影响公众利益
- 178.关于癌性镇痛，下列叙述**错误**的是
- A.疼痛是癌症患者最普遍的症状
 - B.WHO 专家推荐镇痛三阶梯方法
 - C.长期使用镇痛药可出现耐受性
 - D.镇痛药物应按需给药，避免成瘾
 - E.镇痛药的选择由弱到强
- 179.下列哪项症状对抑郁发作诊断具有特征性意义
- A.情绪呈昼重夜轻的节律变化
 - B.早醒
 - C.便秘
 - D.食欲和性欲减退
 - E.叹息
- 180.关于品行障碍的病因，下列说法中**错误**的是
- A.与遗传因素有关
 - B.与不良家庭环境有关
 - C.与不良社会环境因素有关
 - D.与不良营养状况有关
 - E.与激素及神经递质可能有关
- 181.以下妄想症状对诊断精神分裂症有特殊意义的是
- A.被害妄想
 - B.关系妄想
 - C.夸大妄想
 - D.物理影响妄想
 - E.罪恶妄想
- 182.未分化躯体形式障碍的病程不足
- A.1 个月
 - B.3 个月
 - C.6 个月
 - D.1 年
 - E.2 年
- 183.有环境意识障碍而自我意识存在则为
- A.嗜睡状态
 - B.意识模糊状态
 - C.昏睡状态
 - D.昏迷状态
 - E.意识混浊状态
- 184.我国对于精神障碍的第三级预防，最主要措施是
- A.做好精神障碍患者的康复训练
 - B.建立精神障碍防治康复体系
 - C.对精神障碍患者进行定期随访
 - D.提高精神障碍患者的社会地位

- E.对患者进行合理、系统的药物和心理治疗，争取使疾病达到完全缓解
- 185.以下哪一类**不属于**抗抑郁药
- A.苯二氮草类药物
 - B.三环类抗抑郁药
 - C.四环类抗抑郁药
 - D.单胺氧化酶抑制剂
 - E.选择性 5-HT 再摄取抑制剂
- 186.镇静作用强，抗胆碱能作用明显，对心血管和肝功能影响大，锥体外系不良反应较小，治疗剂量比较大。以上是哪类抗精神病药物的作用特点
- A.中效价抗精神病药物
 - B.高效价抗精神病药物
 - C.低效价抗精神病药物
 - D.所有抗精神病药物
 - E.非典型抗精神病药物
- 187.慢性脑病综合征最主要的临床表现是
- A.意识障碍
 - B.冲动行为
 - C.幻觉、妄想
 - D.记忆障碍
 - E.全面的智能减退
- 188.中国精神障碍分类与诊断标准（CCMD-3 系统）中将精神疾病共分为几大类
- A.1~10 共十大类
 - B.0~9 共十大类
 - C.1~9 共九大类
 - D.1~17 共十七大类
 - E.F00~F99 共十一大类
- 189.抑郁症的主要症状**不包括**
- A.“三无”症状
 - B.“三低”症状
 - C.自杀
 - D.情绪低落昼重夜轻
 - E.情绪低落昼轻夜重
- 190.下列药物中属于 5-HT_{1A} 受体部分激动剂抗焦虑药物的是
- A.碳酸锂
 - B.丁螺环酮
 - C.曲唑酮
 - D.安非他酮
 - E.利培酮
- 191.精神分裂症的情感障碍主要表现为
- A.情感高涨
 - B.情感低落
 - C.情感不协调
 - D.情感不稳
 - E.情感淡漠
- 192.以下哪种疾病**不属于**心身疾病
- A.原发性高血压
 - B.神经性呕吐

- C.糖尿病等
 - D.紧张性头痛
 - E.疑病症
- 193.关于假性幻觉，正确的叙述是
- A.存在于主观空间，随意志控制
 - B.存在于客观空间，随意志控制
 - C.存在于主观空间，不随意志控制
 - D.存在于客观空间，不随意志控制
 - E.是假性痴呆的主要表现之一
- 194.谵妄常由下列哪种疾病引起
- A.感染中毒
 - B.神经症
 - C.精神分裂症
 - D.抑郁症
 - E.癔症
- 195.关于精神分裂症后抑郁，以下说法正确的是
- A.患者诊断为精神分裂症的急性期，同时有抑郁情绪，且抑郁情绪是由幻觉妄想等症状造成
 - B.在患者有抑郁情绪的同时有关系妄想等，抑郁情绪不是由妄想等症状造成
 - C.患者诊断为精神分裂症并服药后精神病性症状明显缓解，后出现持续超过 2 周的抑郁情绪
 - D.患者诊断为精神分裂症的同时伴有严重的抑郁情绪，服药后精神病性症状控制，抑郁情绪尚持续存在
 - E.患者一直有持续的精神病性症状，此次病前有话多、兴奋的表现，此次表现为心情差，情绪低落
- 196.攻击行为的高发阶段是
- A.婴儿期
 - B.儿童期
 - C.青春期
 - D.中年期
 - E.老年期
- 197.精神疾病的概念是
- A.受精神创伤后的情绪悲观
 - B.未达到个人目的的内心矛盾
 - C.以精神活动失调为主要表现的疾病
 - D.以上都不对
 - E.精神疾病实际上是思想病
- 198.下列对躯体形式障碍描述**不正确**的是
- A.多种多样，时常变化的多系统躯体症状
 - B.病人存在明显的抑郁和焦虑情绪
 - C.病人描述症状时往往有夸大
 - D.男病人多于女病人
 - E.病人常常于多家医院就诊
- 199.下列属于窥阴症的是
- A.8 岁的男童由于好奇偷看姐姐洗澡
 - B.19 岁的男性偷看女性如厕并实施了性侵犯
 - C.34 岁单身男性通过望远镜观察隔壁楼上的某陌生夫妻同房以达到性高潮

- D. 29 岁的男性在与妻子性交时观看色情电影以提高情趣
 - E. 21 岁男性大学生在观看成人色情电影时出现性兴奋
200. 吗啡和海洛因等短效药物的戒断反应的极期，常出现于停药后
- A. 8~12 小时
 - B. 12~24 小时
 - C. 24~48 小时
 - D. 48~72 小时
 - E. 8~10 天

题型：A2

201. 患者，女，38 岁，近 2 个月来早醒，疲劳乏力，有时心烦，不能集中注意力做事，不愿与人说话，不参加同事和朋友的聚会，对前途悲观失望，甚至缺乏生活的勇气。查体无异常发现。该患者最可能的诊断是

- A. 神经衰弱
- B. 抑郁发作
- C. 强迫障碍
- D. 精神分裂症
- E. 广泛性焦虑障碍

202. 患者，男，67 岁，结肠癌术后 3 天。手术成功。患者白天昏睡，叫之不醒，或醒后很快再睡。晚上惊惧不安，言语片断凌乱，难以理解。双腿做蹬车状，上肢常伴随凌乱言语挥舞。难以与之对话。对患者当前的临床症状，最贴切的概括是

- A. 幻觉状态
- B. 谵妄状态
- C. 妄想状态
- D. 脱水状态
- E. 缺氧状态

203. 某患者称自己的脑子里有个小人在说话，该患者宜选用的治疗药物是

- A. 拉莫三嗪
- B. 阿普唑仑
- C. 奋乃静
- D. 米安色林
- E. 艾司西酞普兰

204. 一 65 岁的老年男性病人，因颅脑外伤入院。近 4 天来每天在夜间出现行为异常，不肯进自己的病房，说房间的地板上有老鼠，天花板上有蜘蛛，表情恐惧，言语令人费解；白天则较安静，对夜间行为难以回忆，日常生活起居需协助。颅脑 CT 示：顶叶片状出血灶。则目前应考虑该患者目前处于

- A. 焦虑状态
- B. 痴呆状态
- C. 躁狂状态
- D. 抑郁状态
- E. 谵妄状态

205. 男，25 岁，大学教师，从不饮酒。在一次聚餐会时饮白酒二两后，突然兴奋冲动打人毁物，1 小时后又突然瘫在地上呼之不应，最可能为

- A. 普通醉酒
- B. 复杂性醉酒
- C. 病理性醉酒
- D. 急性醉酒

E.山形醉酒

206.患者，女，36岁，3年来认为自己患了绝症，反复到各大医院看专家门诊并进行各项检查，不相信没有病变的检查结果和解释，认为医生在欺骗她，坚信自己只能活1年，情绪低落，多次宣称要跳楼。该患者的症状最可能是

- A.疑病妄想
- B.强迫观念
- C.夸大妄想
- D.被害妄想
- E.影响妄想

207.男性，22岁。听到别人打喷嚏声时就感到皮肤里有一种被电的感觉。该患者的症状最可能是

- A.原始性幻觉
- B.机能性幻听
- C.思维鸣响
- D.反射性幻觉
- E.假性幻觉

208.患者，男，28岁，保安。近3个月几乎每天上白班时睡觉，记忆力减退，思维减缓。患者因上班睡觉被领导批评，夜间睡眠尚可。辅助检查未发现异常。对该患者的治疗，错误的是

- A.尽可能地了解病因，以便对因治疗
- B.用药原则是个体化、不同症状使用不同的药物，严格用药剂量和时间
- C.白天嗜睡可采用小剂量的中枢兴奋剂，如哌甲酯进行治疗
- D.使用兴奋剂后患者夜间睡眠也会变差，可夜间时加用短效安眠药
- E.严格遵守作息时间表，每天准时睡眠和起床，不允许白天睡眠

209.患者女，28岁，经常怀疑做过的事情是否做好，反复的检查，如每次出门都要反复检查门是否关好，煤气是否关掉等。虽意识到应该做好，但仍不放心，反复检查。该患者行为是

- A.强迫思维
- B.强迫性怀疑
- C.强迫性意向
- D.强迫性回忆
- E.强迫性检查

210.患者女，40岁，总担心自己的做的决定会出现错误，反复的询问自己的同事或者家人，让别人帮助自己分析，就算其他人已经给其保证，患者仍反复的询问。患者的行为是

- A.强迫性仪式动作
- B.强迫性怀疑
- C.刻板动作
- D.强迫性询问
- E.强迫性检查

211.某患者经常闻到病房内有很浓的煤气的味道，他认为这是有人在故意毒害自己，该患者宜选用治疗药物是

- A.氟西汀
- B.氯硝西洋
- C.丙戊酸钠
- D.帕罗西汀
- E.阿立哌唑

212.患者声称自己的身体许多器官都不存在了，比如脑袋已经成了空壳了；胃也没有了，感觉不到饿了。皮肤也没有了，感觉不到疼痛了等等。此现象最可能是

- A.人格解体
- B.感觉消失
- C.Cotard 综合征
- D.疑病症状
- E.幻觉

213.患者，男，28岁。患者会不由自主的不断重复想象做过的事情或走过的路等整个详细的经过，虽觉得没有意义，但仍无法摆脱，感到痛苦。该症状为

- A.强迫思维
- B.强迫性怀疑
- C.强迫性意向
- D.强迫性回忆
- E.强迫性联想

214.某孤独症患儿男，8岁，经常重复电视里看到的某一句话，此表现属于

- A.社会交往障碍
- B.语言交流障碍
- C.兴趣范围狭窄
- D.行为刻板
- E.智能障碍

215.患者，女，27岁，说耳边有声音命令她不能吃饭。该患者最可能的诊断是

- A.抑郁症
- B.精神分裂症
- C.焦虑症
- D.脑器质性精神障碍
- E.反应性精神障碍

216.患者，女性，18岁，近半年来回避人际交往，一见到人就满头大汗，面红耳赤，低头不语，迅速转身走开。医生询问原因，患者答：说不清为什么，就是害羞、紧张。该患者最可能的诊断是

- A.社交焦虑障碍
- B.精神分裂症
- C.广泛性焦虑障碍
- D.抑郁症
- E.适应障碍

217.患者18岁女性，从小未离开父母，生活自理能力差，2个月前离开家去外地上大学，近1月出现失眠，闷闷不乐，不愿与同学交往，自卑，注意力不集中。该患者首选的治疗药物是

- A.阿普唑仑
- B.舍曲林
- C.阿立哌唑
- D.多奈哌齐
- E.碳酸锂

218.患者，女性，30岁，言行紊乱半年。下列描述提示该患者有思维内容障碍的是

- A.说话滔滔不绝，主题随环境而改变
- B.说话东拉西扯，缺乏主题
- C.反复思考地球为什么是圆的
- D.坚信现在的父母不是自己的亲生父母，要求做亲子鉴定

E.说话时突然停顿几秒，之后开始另外一个话题

219.李某，24岁，3年前外伤后左手小指缺失，半年前大学毕业后待业在家，常觉左手小指存在并时常疼痛，疼痛难以忍受，反复查看并无异常。前往多家医院诊治，各种检查均未见异常。服用大量止痛药均无明显改善，患者痛苦不堪。该患者可能的诊断是

- A.躯体疾病
- B.躯体形式障碍
- C.精神分裂症前期表现
- D.偏执型精神分裂症
- E.未分化型精神分裂症

220.患者，女，53岁，既往高血压病、糖尿病、腔隙性脑梗死病史。半年前因丈夫下岗，自觉心情郁闷，高兴不起来；现丈夫已经找到新的工作且收入比之前收入还高，但其心情仍无好转。过去爱打麻将，现在麻友相约也不愿意去了，即便是勉强玩几把，赢了也不觉得开心，不愿意活动，不愿意做家务，不愿出门，不愿与人交流，缺乏食欲，体重下降，每天凌晨3~4点就醒了，总觉得一天里早晨最难熬，自觉活着遭罪，拖累家人，想过一死了之，但又舍不得家人、儿女。现由丈夫和女儿带其来精神科门诊就诊，查EEG、ECG、血细胞分析、生化系列、甲状腺系列等均未见明显异常。每日晨起由家人督促服用降压药，现测血压135/82mmHg，心率92次/min，体温36.4℃。表情略呆板，问多答少，自诉睡不着觉，不承认患有精神疾病。门诊诊断：抑郁发作。此诊断应属于CCMD-3中的哪一诊断分类

- A.0 器质性精神障碍
- B.3 心境障碍
- C.4 癔症、应激相关障碍、神经症
- D.5 心理因素相关生理障碍
- E.9 其他精神障碍和心理卫生情况

221.患者试图表达他的想法，但缺乏目的性，叙述过多不必要的细节，很困难地到达想说的主题，这种表现是

- A.语词杂拌
- B.强迫性思维
- C.接触性离题
- D.病理性赘述
- E.思维松弛

222.患者，女性，20岁，因“反复发作性紧张、恐惧，伴胸闷、气促1月”来诊。近1月来10余次发作，反复查各类辅助检查均未见异常。针对该患者的情况，以下治疗方案最合理的是

- A.单用奥氮平治疗
- B.阿普唑仑联合多塞平治疗
- C.艾司唑仑联合奥氮平治疗
- D.阿普唑仑联合氟西汀治疗
- E.电休克治疗

223.患者，女性，37岁，1月前被从普通职员岗位提拔为部门领导后一到当众讲话时就满头大汗，面红耳赤，心跳加速，手足发抖，严重影响工作。该患者最可能的诊断是

- A.急性应激障碍
- B.惊恐障碍
- C.社交焦虑障碍
- D.抑郁症
- E.适应障碍

224.某精神发育迟滞患儿，男，14岁。经常表现为兴奋躁闹，大声说话，无故发脾气，外出时不听父母管教，四处疯跑。该患儿最佳的治疗方案是

- A.抗抑郁药
- B.抗精神病药
- C.情感稳定剂
- D.抗焦虑药
- E.心理治疗

225.某患者经常感到紧张心烦，总是担心一些事情会发生，该患者宜选用的治疗药物是

- A.齐拉西酮
- B.利培酮
- C.喹硫平
- D.拉莫三嗪
- E.地西洋

226.患者，女，29岁，已婚。近3周来无明显诱因出现情绪低落，晨重暮轻，兴趣缺乏，精力减弱，言语减少，动作迟缓，自觉脑子笨，觉得前途暗淡，悲观失望，早醒，食欲减退，便秘，性欲减退，自责，自罪，多次自杀未遂。该患者最可能的诊断为

- A.神经衰弱
- B.反应性精神障碍
- C.抑郁性神经症
- D.抑郁症
- E.隐匿性抑郁发作

227.患者35岁女性，3月前患者和丈夫、儿子自驾游，发生车祸，丈夫及儿子均身亡。近3月患者不断梦见事故的场景，并将丈夫及儿子的物品锁进储物间，不愿意提及关于丈夫及儿子的事情，不与周围人接触，入睡困难、眠浅、易醒。该患者最可能的诊断是

- A.抑郁症
- B.精神分裂症
- C.适应障碍
- D.创伤后应激障碍
- E.急性应激障碍

228.患者，女性，18岁，近1月多次因“突发胸闷、气促伴濒死感”急诊。患者于上课时无明显诱因突然出现紧张、恐惧、心慌、胸闷、气促、手脚冰凉、大汗，伴濒死感，持续20分钟左右可自行缓解。多次查心电图、血常规、电解质、血糖、心脏彩超均未见确切异常。该患者最可能的诊断是

- A.低血糖反应
- B.惊恐障碍
- C.分离转换性障碍
- D.心律失常
- E.急性应激障碍

229.患者45岁女性，某日儿子及儿媳夜晚外出看电影未归，后被警察告知夜里儿子及儿媳被抢劫，均身亡，患者得知消息后跌坐在地，不语、不动，后突然时哭时笑，说儿子及儿媳外出旅游了，不相信警察的话。该患者首选的心理治疗方案是

- A.认知-行为治疗(CBT)
- B.危机干预
- C.催眠治疗
- D.精神分析疗法
- E.眼动脱敏再加工

230.患者男性，57岁，因失眠服用地西洋4个月，两个月前因效果欠佳逐渐加大剂量，近期患者一旦停药或减药，就会出现睡眠差，心慌，烦躁等，对此患者最好的处理是

- A.加用其他镇静催眠药物

- B.加大药物剂量
- C.小剂量缓慢递减药物
- D.马上停止服药
- E.继续服药，不用处理

231.某患者称“天下雨，我吃药，天黑了，那就扫地吧”，该患者宜选用的治疗药物是

- A.卡马西平
- B.帕利哌酮
- C.丁螺环酮
- D.米氮平
- E.曲唑酮

232.女性，25岁，右利手。结婚1个月，某天与丈夫争吵后，对丈夫又踢又咬，随之出现不说话，右臂不能动。最可能的诊断是

- A.明肖森综合征
- B.身体变形障碍
- C.躯体化障碍
- D.分离-转换障碍
- E.做作性障碍

233.男性，21岁，无业人员，曾多次摄取氯胺酮。若该患者出现排尿困难、尿频、尿急、尿痛，辅助检查：尿常规发现白细胞和红细胞，尿细菌和抗酸杆菌培养阴性；尿动力学检测提示膀胱动力学差；B超示双肾积水。则该患者最可能的诊断为

- A.慢性肾炎
- B.慢性膀胱炎
- C.慢性前列腺炎
- D.输尿管结石
- E.全尿路炎性损害

234.某男，28岁，近1年来不敢自己锁门，因为总担心，怀疑门没有锁好，需反复检查，反复锁，明知这样做是多余的，没必要，但控制不住，内心痛苦，主动求治。该病例最可能的诊断是

- A.精神分裂症
- B.恐惧症
- C.焦虑症
- D.强迫症
- E.抑郁症

235.患者在接受检查时不合作，让他眼睛往上看，他往下看，让他张嘴，他紧闭嘴。此为

- A.不合作
- B.被动违拗
- C.作态
- D.主动违拗
- E.刻板动作

236.患者，女性，30岁，近1年来1进入公共场所（街道、火车站、商场等）就出现心慌、胸闷、紧张、大汗，此患者最可能的诊断是

- A.社交焦虑障碍
- B.广场恐惧症
- C.惊恐发作
- D.躯体形式障碍
- E.广泛性焦虑障碍

237.某孤独症患儿对玩具熊有浓厚的兴趣，但患儿并不喜欢熊本身，而是特别喜欢熊身上的绒毛，反复进行抚摸及嗅闻。这个表现最有可能是

- A. 社会交往障碍
- B. 语言交流障碍
- C. 兴趣范围狭窄
- D. 行为刻板
- E. 智能障碍

238.男性，25岁。5年来自认为患有严重“鼻炎”，是不治之症而四处求医，反复多次的医学检查和医生的解释仍不能接受。最可能的诊断是

- A. 躯体疾病所致精神障碍
- B. 躯体化障碍
- C. 疑病障碍
- D. 分离性障碍
- E. 躯体形式的自主神经功能紊乱

239.患者男，28岁，工人。因经常三上夜班，近半年凌晨1点开始上班，中午才开始睡觉。近1月调换至白天，白天上班时无法集中注意力，想睡觉。夜间精力充沛，无法正常入睡。既往体健。该患者的治疗方案主要为

- A. 可采用小剂量中枢兴奋剂如哌甲酯
- B. 也可用阿米替林、丙咪嗪或氯米帕明睡前口服
- C. 逐步调整睡眠节律以达到正常作息时间
- D. 为防止复发，需足量足疗程使用苯二氮卓类药物
- E. 白天使用中枢兴奋剂，晚上使用长效安眠药物

240.女性，45岁，大学教师，平素性格内向，工作严谨。2年前父亲因肝癌过世后，逐渐出现反酸，恶心，干呕，反复打嗝，心慌、出汗。先后就诊于多家医院，行胃镜、肠镜、心电图等多项检查均未见异常。患者担心自己患上绝症，整日忧心忡忡。后在医生建议下就诊精神科，诊断躯体形式障碍。躯体形式障碍最常见的症状是

- A. 胃肠道症状
- B. 呼吸循环系统症状
- C. 泌尿生殖系统症状
- D. 皮肤症状
- E. 疼痛

241.某患者经常能听到一个陌生女人在耳边骂自己，该患者宜选用治疗药物是

- A. 利培酮
- B. 度洛西汀
- C. 氟西汀
- D. 碳酸锂
- E. 地西泮

242.男性，21岁，无业人员，常出入娱乐场所，凌晨1点患者突发精神障碍，表现为欣快、人格解体 and 视觉敏锐。查体：血压降低，心率增快，结膜变红，肌力下降，腱反射亢进。此时首先考虑的诊断是

- A. 苯二氮卓类药物中毒
- B. 苯丙胺类药物中毒
- C. 氯胺酮急性中毒
- D. 急性酒中毒
- E. 大麻中毒

243.患者李某，女，26岁。表现为木僵状态，最不可能是以下哪种疾病

- A. 精神分裂症

- B.抑郁症
- C.脑器质性精神障碍
- D.焦虑症
- E.反应性精神障碍

244.男性，23岁，问他几岁，答：“二十三，二月初三，三月桃花开，开花结果给猴吃，我是属猴的。”此现象最可能是

- A.思维破裂
- B.思维松弛
- C.思维奔逸
- D.强制性思维
- E.思维插入

245.杨某，女，30岁。5年前诊断为精神分裂症，服用利培酮抗精神病治疗。因停药致病情复发第6次入院。该患者目前首选治疗是

- A.心理治疗
- B.换用奥氮平治疗
- C.换用氯氮平治疗
- D.换用帕利哌酮治疗
- E.ECT治疗

246.某患者坚信林志玲对自己情有独钟，非自己不嫁，该患者宜选用的治疗药物是

- A.托莫西汀
- B.阿立哌唑
- C.瑞波西汀
- D.卡马西平
- E.咪达唑仑

247.患者，男，30岁。每次使用“K粉”时感觉飘飘欲仙，很享受，明知毒品危害很大，却难以自拔。与此患者产生快感密切相关的是

- A.甘氨酸系统
- B.多巴胺系统
- C.去甲肾上腺素系统
- D.乙酰胆碱系统
- E.5-羟色胺系统

248.患者，女，15岁。目前诊断为精神分裂症青春型，下列哪项与患者病情特点最不符合

- A.存片段幻觉
- B.联想散漫
- C.情感高涨
- D.急性起病
- E.预后较差

249.患者称自己的脑内有一个“智囊团”，用“无声的语言”告诉自己该做什么或不该做什么，并和他交流对一些事情的看法。此症状属于

- A.错觉
- B.假性幻觉
- C.思维被插入
- D.思维被广播
- E.被控制感

250.某女性患者，25岁，诊断为癔症性抽搐发作。按照精神分析的观点，患者的症状是对心理冲突“压抑”（或潜抑）而导致的，这种心理防御过程是

- A.意识的

- B.没考虑结果
- C.有计划的
- D.有目的的
- E.潜意识的

251.患者，女性，22岁，网络金融工作。因需与国外上班时间一致，近半年凌晨1点开始上班，中午才开始睡觉。近1月调换工作，白天上班时无法集中注意力，想睡觉；夜间精力充沛，无法正常入睡。既往体健。该患者考虑诊断为

- A.嗜睡症
- B.失眠症
- C.轻度躁狂症
- D.神经衰弱
- E.睡眠-觉醒节律障碍

252.患者男，17岁，高一学生。患者最近一年逐渐出现见到楼房就控制不住的去数楼层，看到台阶会边走边数。有时候楼层非常高，患者为数清具体的楼层，甚至耽误上课，经常出现迟到。患者本认为去数楼层没有意义，但不数清楚感到心情烦躁不安。该症状为

- A.强迫性仪式动作
- B.强迫性怀疑
- C.强迫性洗涤
- D.强迫性计数
- E.强迫性检查

253.患者女，35岁，公司职员。诊断为广泛性焦虑症，近3月规律服用帕罗西汀治疗，病情逐渐缓解。患者害怕药物有副反应，想停药。医师建议其进一步的治疗方案正确的是

- A.考虑患者病情逐渐好转，可停药后观察，继续心理治疗
- B.患者应继续巩固治疗至少2~6月，维持治疗至少12个月
- C.患者应维持治疗6~12个月，病情好转就可停药
- D.焦虑症主要的治疗为认知行为治疗，服药时间过长则增加患者心理负担，加重焦虑情绪，减药要慎重，减药需在一周内缓慢减药
- E.广泛性焦虑障碍主要与患者的心理素质、精神疾病知识欠缺和过分要求完美有关。故应主要进行健康教育，服药容易引起患者心理依赖

254.男性，50岁，焦虑障碍患者。若患者出现说话含糊不清，站立不稳，查体：共济失调，眼球震颤，精神状况检查患者表现情绪不稳，且有冲动攻击行为。首先考虑的诊断是

- A.酒精中毒
- B.酒精戒断
- C.镇静催眠药中毒
- D.镇静催眠药戒断
- E.合并躯体疾病

255.某患者称家里的电话铃一响，就能听到有个不认识的女人在骂自己，该患者宜选用的治疗药物是

- A.地西泮
- B.丙戊酸钠
- C.帕利哌酮
- D.拉莫三嗪
- E.帕罗西汀

256.查房时，患者呆坐于角落，对周围强刺激无反应，肌张力高，有时突然出现打人行为。该患者最可能的诊断是

- A.脑器质性所致精神障碍
- B.精神分裂症紧张型

- C.精神分裂症青春型
- D.抑郁症
- E.强迫症

257.患者坚持不在床上睡，因为他感到床在运动，实际上床是静止不动的。此症状是

- A.妄想
- B.感觉倒错
- C.非真实感
- D.运动性幻觉
- E.空间知觉障碍

258.男性，20岁，医生对其进行精神状况检查时不合作，通过观察其动作行为，哪项对精神分裂症的诊断最有价值

- A.反复洗手
- B.坐立不安
- C.无目的模仿别人的动作
- D.走来走去
- E.兴高采烈、手舞足蹈

259.患者，男性，25岁，无业。患癫痫10年，曾出现人际关系紧张、敏感多疑等人格改变，有过多次自杀未遂，目前有幻觉、妄想、情感淡漠，并有焦虑情绪。对该患者应首先注意

- A.预防自杀
- B.服药依从性
- C.预后结果
- D.社会功能减退
- E.智能障碍

260.患者37岁女性，4月前地震，家人均身亡，患者也因受伤毁容，近两月频繁噩梦，梦境中反复呈现地震时的场景，拒绝看和听关于地震的一切信息，几乎每天难以入睡。该患者首选的治疗方案是

- A.镇静处理
- B.心理治疗
- C.抗焦虑抑郁治疗
- D.心理治疗联合药物治疗
- E.改良式无抽搐电休克治疗

261.患儿，女，8岁。完全没有语言能力，不知躲避危险，不认识父母，只会用哭闹尖叫来表达情绪，伴有严重的脑部损害。诊断为精神发育迟滞，最可能的等级是

- A.轻度精神发育迟滞
- B.中度精神发育迟滞
- C.重度精神发育迟滞
- D.极重度精神发育迟滞
- E.边缘智力

262.某患儿，男性，7岁，发音含糊不清，词汇贫乏以致不能完全表达意思，仅会个位数加减法，诊断为精神发育迟滞，他最有可能的等级是

- A.轻度精神发育迟滞
- B.中度精神发育迟滞
- C.重度精神发育迟滞
- D.极重度精神发育迟滞
- E.边缘智力

263.患者，女，25岁，医生对其进行精神状况检查时，下列哪项反应提示精神分裂症的诊断

- A.提到工作不顺利时唉声叹气
- B.提到躯体不适时紧张担心
- C.提到目睹的车祸时四肢发抖、出汗
- D.提到自己被人跟踪时表现愉快
- E.提到自己的工作计划时兴高采烈，自我感觉良好

264.患者，男性，32岁，近1年来进入电梯、飞机、高铁后，只要看到门一关上就立刻紧张不安，呼吸急促，心慌，故尽量回避乘坐上述工具，上下班时宁愿爬楼梯也不坐电梯。当处于不进入上述交通工具时则完全正常。该患者最可能的诊断是

- A.惊恐障碍
- B.广场恐惧症
- C.广泛性焦虑障碍
- D.创伤后应激障碍
- E.适应障碍

265.某患者感觉心情特别低落，对什么都没有兴趣，该患者宜选用的治疗药物是

- A.西酞普兰
- B.齐拉西酮
- C.利培酮
- D.碳酸锂
- E.氟哌啶醇

266.患者贺某，男，40岁。3年前诊断为精神分裂症，坚持服用舒必利治疗，患者现因“少语少动，生活懒散”再次入院，目前最可能诊断分型为

- A.精神分裂症青春型
- B.精神分裂症紧张型
- C.精神分裂症偏执型
- D.精神分裂症未分化型
- E.精神分裂症残留型

267.某患者总是反复考虑门锁有没有锁好，明知没有必要但无法控制，该患者宜选用的治疗药物是

- A.帕利哌酮
- B.帕罗西汀
- C.舒必利
- D.氯丙嗪
- E.地西洋

268.患者45岁女性，3月前与丈夫一起乘坐电梯时发生事故，丈夫身亡，自己轻伤。近1月，患者频繁噩梦，梦境中反复呈现电梯事故惨相，不敢乘坐电梯，几乎每天闷闷不乐，难以入睡。该患者最可能的诊断是

- A.抑郁症
- B.焦虑症
- C.急性应激障碍
- D.创伤后应激障碍
- E.适应障碍

269.男，52岁，因“右肺块影”，经病理检查为“肺鳞状细胞癌”，于1周前行部分肺叶切除术，手术顺利。术后3天起出现无故吵闹，紧张，怀疑有人要害他。夜眠差，半夜吵闹尤甚，称“看到有许多人从窗口进来，拿着刀杀我”，行为较紊乱。该患者的临床表现最可能是

- A.幻觉妄想症候群
- B.躁狂状态

- C.谵妄状态
- D.惊恐发作
- E.痴呆症状群

270.女性，31岁，情绪差3个月就诊。回答医生问题时声音低，思考很久才给出答案，问其原因表示，“变笨了，脑子好像生锈了”。患者的症状是

- A.思维贫乏
- B.思维迟缓
- C.思维松弛
- D.思维中断
- E.思维插入

271.患者，男，26岁。半年前起病，表现为胡言乱语，认为有人跟踪监视他。入院后查体及神经系统检查未见异常，意识清晰，思维松弛，被害妄想，幻听。该患者最可能的诊断是

- A.偏执性精神病
- B.精神分裂症
- C.焦虑症
- D.内分泌疾病所致精神障碍
- E.抑郁症

272.一60岁男性患者出现明显的近记忆力障碍，遗忘、错构和虚构，此为

- A.wernicke 脑病
- B.老年性痴呆
- C.柯萨柯夫综合征
- D.精神发育迟滞
- E.Ganser 氏综合征

273.某孤独症患儿9岁，能说出简单的单词和句子，但不能正确运用你我他等人称代词，这个表现属于

- A.社会交往障碍
- B.语言交流障碍
- C.兴趣范围狭窄
- D.行为刻板
- E.智能障碍

274.某年轻女性，平时很少喝酒，即使喝酒每次量也很少。一次，她喝了一大杯酒后立即出现脸红、出汗、心跳加速。最可能的原因是

- A.酒精与食物中的调味剂发生了某种化学反应
- B.这种自主神经反应是由于强烈的民族文化反对饮酒所致
- C.遗传性乙醛脱氢酶活性低
- D.遗传性P450酶活性低
- E.遗传性乙醇脱氢酶活性低

275.某患者称能在家中看到古代千军万马大战的场景，该患者宜选用的治疗药物是

- A.瑞波西汀
- B.氟西汀
- C.帕罗西汀
- D.奥氮平
- E.米氮平

276.某患者在少量饮酒后对妻子大打出手，事后也对妻子下跪以祈求原谅，但之后又屡次出现类似行为，该患者最有可能的诊断是

- A.酒依赖
- B.冲动型人格障碍

- C.躁狂发作
- D.表演型人格障碍
- E.分离性障碍

277.患者，男性，22岁，神志清楚，步行入院，医生问他：“你来这里干什么？”他答：“我来这里没法说，生活困难，现在就代表一句话，院长就这样，所以我来这里了”。该患者的症状是

- A.思维松弛
- B.思维破裂
- C.病理性象征性思维
- D.思维不连贯
- E.思维奔逸

278.患者女，20岁，近2个月几乎每天白天上课时经常打瞌睡，无法正常学习，成绩下降明显。坐公共汽车也常因睡着而错过下车的车站。夜间睡眠尚可，辅助检查未发现异常。该患者考虑诊断为

- A.睡眠-觉醒节律障碍
- B.嗜睡症
- C.失眠症
- D.睡行症
- E.神经衰弱

279.女性，14岁，中学生，参加运动会百米赛跑，途中不慎跌倒，双手着地。站立起来时，发现双目失明。最可能的诊断是

- A.躯体形式障碍
- B.疑病症
- C.分离（转换）性障碍
- D.焦虑症
- E.恐惧症

280.男性，25岁，公司保安。上班时因与顾客发生冲突，推搡中扭伤右踝致局部红肿，要求公司报销医药费用未果，数日后右踝红肿消退，出现双下肢瘫痪，神经系统检查无阳性发现。最可能的诊断是

- A.周围神经损害
- B.分离（转换）性障碍
- C.应激相关障碍
- D.脊髓损伤
- E.抑郁症

281.某患者称在路上经常有陌生人对自己指指点点的，该患者宜选用的治疗药物是

- A.阿普唑仑
- B.吗氯贝胺
- C.曲唑酮
- D.氯氮平
- E.米氮平

282.某患者经常能看到病房的地面上爬满了毒蛇，该患者宜选用治疗药物是

- A.米氮平
- B.阿普唑仑
- C.丙戊酸钠
- D.奥氮平
- E.曲唑酮

283.某患儿，男性，10岁，表现为学习困难，成绩经常不及格，能进行日常言语交流，但对语言理解使用能力较差，诊断为精神发育迟滞，他最有可能的等级是

- A.轻度精神发育迟滞
- B.中度精神发育迟滞
- C.重度精神发育迟滞
- D.极重度精神发育迟滞
- E.边缘智力

284.患者，男，40岁，目前诊断为精神分裂症，与脑器质性精神障碍最主要鉴别在于前者

- A.自知力丧失
- B.起病缓慢
- C.有智力障碍
- D.意识清醒
- E.出现幻视

285.某精神卫生机构利用“精神卫生日”的机会，走入当地社区，向社区群众宣传精神卫生知识，重点讲解关于自杀的知识和相关疾病。这种针对“自杀”的措施属于

- A.一级预防
- B.二级预防
- C.三级预防
- D.四级预防
- E.无明显预防措施

286.某男性患者喜爱身着女的衣服外出，并可以借此产生性兴奋，该患者最有可能的诊断是

- A.精神分裂症
- B.分离性障碍
- C.恋物症
- D.异性症
- E.异装症

287.姜某，女，19岁，两个月前急性起病，意识清醒，说话难以理解，行为幼稚，本能活动亢进，有片段的幻觉，最可能的诊断是

- A.单纯型精神分裂症
- B.青春型精神分裂症
- C.紧张型精神分裂症
- D.偏执型精神分裂症
- E.未分化型精神分裂症

288.某女性在遭受丧子之痛后企图自杀，被家属及时救下。心理专家针对该女子实施心理干预，帮助其树立生活的勇气和信心，从而避免更多的意外事件出现，这种措施是

- A.一级预防
- B.二级预防
- C.三级预防
- D.四级预防
- E.无明显预防措施

289.患者，女性，17岁，学生，近1月来无明显诱因反复突发心慌、呼吸困难、大汗伴濒死感，持续十余分钟可自行缓解。发作间歇期也心神不宁，担心再发。该患者最适合的心理治疗方法是

- A.认知行为治疗
- B.冲击疗法
- C.暗示治疗
- D.厌恶疗法

E.音乐治疗

290.某精神分裂症患者不语不动、不饮不食，该患者宜选用治疗药物是

A.舍曲林

B.米氮平

C.舒必利

D.地西泮

E.碳酸锂

题型：A3

(291~293 题共用题干)

患者男性，45岁，有长期大量饮酒史。最近一段时间总是听到邻居家有拉枪栓“咔，咔”声和“枪击”声，患者紧闭大门，到处躲藏，多次拨打110报警求助，多次去砸邻居家的大门。体查发现患者有明显眼球震颤

291.该患者有哪些精神症状

A.妄想

B.幻听

C.错觉

D.感知综合障碍

E.语词新作

292.该患者最可能的诊断是

A.酒精性幻觉症

B.Korsakoff 综合征

C.酒精性妄想症

D.酒精性痴呆

E.Wernicke 脑病

293.此患者目前最佳处理方案是

A.抗精神病药治疗

B.解释性心理治疗

C.抗抑郁治疗

D.苯二氮卓类药物

E.暂不用药，注意观察

(294~295 题共用题干)

女性，35岁，精神分裂症，某日声称自己是葛老太太（患者死去的母亲），并说“你说我是谁？我老了，78岁了！牙也没了，头发也白了”。护士说她不是葛老太太，患者说：“你们连我葛老太太也不认识了，你们弄错了，刘某是我死了的女儿，我来代她受罪住院。”两天后患者又转回来声称是刘某而否认是葛老太太，表示前两天确实认为自己就是78岁的母亲，但不知道是什么原因

294.该例患者最可能的症状是

A.人格解体

B.交替人格

C.双重人格

D.人格转换

E.替身综合征

295.按照 Jasper 的意见，该症状属于自我意识的

A.存在性意识障碍

B.能动性意识障碍

C.同一性意识障碍

D.统一性意识障碍

E.界限性意识障碍

(296~298 题共用题干)

患者 28 岁女性，某次去外地被拐卖后被获救，近 1 月，患者常常做噩梦，反复梦到被拐卖的场景，不敢外出，不做家务，不管儿女，整天都担惊受怕，不与周围人接触，难以入睡

296.患者不具有的症状是

A.回避

B.麻木

C.反复重现创伤性体验

D.焦虑

E.被害妄想

297.患者最可能的诊断是

A.精神分裂症

B.抑郁症

C.分离（转换）性障碍

D.创伤后应激障碍

E.急性应激障碍

298.该患者首选的治疗药物是

A.舍曲林

B.氯硝西洋

C.丙戊酸盐

D.坦度螺酮

E.奥氮平

(299~300 题共用题干)

患者男性，52 岁，工人。长期饮酒 20 年，每天饮用高度白酒 500g 左右，最近半年患者总是怀疑妻子与他人有不正当关系，为此多次与妻子发生冲突，还多次跟踪妻子的行踪，尽管没有发现证据，仍然感到很不开心，同时怀疑同事也对他不好，背后讲他坏话。起病以来个人生活可以自理，能坚持工作。既往体健，家族中无类似疾病患者，发育正常，个性偏外向

299.此患者最可能的诊断是

A.精神分裂症

B.抑郁症

C.酒精性妄想症

D.震颤谵妄

E.心因性障碍

300.此患者目前最佳处理方案是

A.抗精神病药治疗

B.解释性心理治疗

C.抗抑郁治疗

D.苯二氮革类药物

E.暂不用药，注意观察

答案：

题型：A1

1.D

2.C

3.B

4.C

5.D

6.B

7.D

8.E

9.C

10.A

11.C	12.C	13.D	14.C	15.A	16.E	17.B	18.E	19.D	20.C
21.D	22.C	23.B	24.E	25.E	26.C	27.C	28.B	29.E	30.D
31.A	32.D	33.B	34.E	35.B	36.A	37.A	38.B	39.A	40.A
41.D	42.C	43.B	44.A	45.C	46.A	47.A	48.D	49.C	50.C
51.D	52.A	53.D	54.B	55.A	56.B	57.A	58.C	59.C	60.E
61.B	62.B	63.E	64.D	65.E	66.A	67.C	68.D	69.C	70.D
71.D	72.D	73.C	74.E	75.D	76.A	77.E	78.C	79.C	80.B
81.E	82.B	83.C	84.B	85.B	86.B	87.D	88.A	89.C	90.E
91.C	92.B	93.B	94.C	95.C	96.D	97.E	98.E	99.D	100.C
101.E	102.E	103.C	104.D	105.D	106.D	107.E	108.E	109.C	110.B
111.E	112.C	113.E	114.E	115.C	116.D	117.D	118.C	119.D	120.A
121.E	122.B	123.B	124.D	125.E	126.D	127.D	128.D	129.A	130.D
131.E	132.B	133.B	134.A	135.C	136.D	137.C	138.E	139.A	140.A
141.C	142.C	143.C	144.B	145.D	146.C	147.D	148.A	149.D	150.A
151.D	152.B	153.E	154.E	155.D	156.C	157.B	158.D	159.D	160.B
161.B	162.C	163.A	164.A	165.E	166.B	167.B	168.D	169.E	170.C
171.B	172.D	173.D	174.C	175.E	176.E	177.A	178.D	179.B	180.D
181.D	182.E	183.B	184.A	185.A	186.C	187.E	188.B	189.E	190.B
191.C	192.E	193.C	194.A	195.C	196.C	197.D	198.D	199.C	200.D

题型：A2

201.B	202.B	203.C	204.E	205.C	206.A	207.D	208.E	209.E	210.D
211.E	212.C	213.D	214.B	215.B	216.A	217.B	218.D	219.B	220.B
221.D	222.D	223.C	224.C	225.E	226.D	227.D	228.B	229.B	230.C
231.B	232.D	233.E	234.D	235.D	236.B	237.C	238.C	239.C	240.A
241.A	242.E	243.D	244.C	245.D	246.B	247.B	248.C	249.B	250.E
251.E	252.D	253.B	254.C	255.C	256.B	257.D	258.C	259.A	260.D
261.D	262.B	263.D	264.B	265.A	266.E	267.B	268.D	269.C	270.B
271.B	272.C	273.B	274.C	275.D	276.B	277.A	278.B	279.C	280.B
281.D	282.D	283.A	284.D	285.A	286.E	287.B	288.C	289.A	290.C

题型：A3

291.B	292.A	293.A	294.B	295.C	296.E	297.D	298.A	299.C	300.A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------