

脑外科A

题型：A1

- 1.硬脑膜外血肿最常发生于
 - A.颞区
 - B.顶区
 - C.额区
 - D.枕区
 - E.矢状窦附近
- 2.不是先天性肿瘤的是
 - A.颅咽管瘤
 - B.畸胎瘤
 - C.肠源性囊肿
 - D.上皮样囊肿
 - E.髓母细胞瘤
- 3.颈内动脉系统主要供血区域是
 - A.基底核区
 - B.小脑和脑干
 - C.眼部和大脑前3/5的脑组织
 - D.大脑各个皮质区
 - E.大脑前3/5脑组织
- 4.关于急性硬脑膜下血肿正确的是
 - A.大多由对冲性脑挫裂伤所致
 - B.好发于颞部及枕部
 - C.病情一般不重，多不需手术治疗
 - D.有中间清醒期
 - E.CT检查示颅骨内板与脑表面之间出现低密度新月形或半月形影
- 5.小脑脑桥角综合征时不出现的症状是
 - A.同侧瞳孔散大
 - B.同侧神经性耳聋，局部麻木和周围性面瘫
 - C.同侧肢体麻木，肌力减退，病理征阳性
 - D.同侧肢体共济失调
 - E.吞咽困难
- 6.对于皮质核束的说法正确的是
 - A.组成内囊后脚纤维
 - B.经内囊前脚下行
 - C.支配对侧半身运动

- D.属于锥体外系
- E.终于对侧的舌下神经核

7.发生小脑幕切迹疝时，引起患者昏迷的直接原因是

- A.脑缺氧
- B.颅内供血不足
- C.呼吸循环障碍
- D.脑干受压
- E.脑脊液循环受阻

8.管理面部的感觉神经是

- A.迷走神经
- B.三叉神经
- C.滑车神经
- D.面神经
- E.副神经

9.最常见的分流后并发症为

- A.分流系统感染
- B.分流系统断裂
- C.分流泵失灵
- D.分流管堵塞
- E.分流过度

10.颅内压增高的典型表现是

- A.头痛、呕吐、视盘水肿
- B.头痛、呕吐、癫痫发作
- C.头痛、呕吐、感觉障碍
- D.头痛、呕吐、运动障碍
- E.头痛、呕吐、意识障碍

11.颅裂、脑膜膨出的病因是

- A.产伤
- B.新生儿窒息
- C.新生儿头皮下水肿
- D.新生儿维生素K缺乏
- E.先天性神经管发育畸形

12.枕骨大孔疝常常是由于下列脑组织的哪一部分疝入枕大孔

- A.小脑蚓部
- B.小脑扁桃体
- C.颞极
- D.颞叶钩回

E.大脑扣带回

13.腔隙性脑梗死最常见的临床表现之一为

- A.纯感觉性卒中
- B.纯运动性偏瘫
- C.共济失调性轻偏瘫
- D.感觉运动性卒中
- E.构音障碍-手笨拙综合征

14.Hunt-Hess分级Ⅱ级的颅内动脉瘤患者可能出现的表现是

- A.一侧肢体偏瘫
- B.瞳孔散大
- C.躁动不安
- D.去大脑强直
- E.昏迷

15.单纯闭合性颅盖线型骨折的治疗原则是

- A.手术复位
- B.手术钢丝固定
- C.仅做外固定
- D.不需特殊处理
- E.清除碎骨

16.对海绵窦的描述，**错误**的是

- A.海绵窦内血液直接注入颈内静脉
- B.左、右海绵窦垂体前、后方相连通
- C.面部感染可借一定途径蔓延到海绵窦
- D.位于蝶鞍两侧，由硬脑膜两层间的腔隙构成
- E.向后与基底静脉丛相交通

17.颅底陷入症与扁平颅底的鉴别要点是

- A.有无颅内高压
- B.有无头颅歪斜
- C.有无颅内肿瘤
- D.有无发育畸形
- E.有无压迫症状

18.相对最容易产生一侧小脑幕切迹疝的是

- A.颞叶占位性病变
- B.阻塞性脑积水
- C.弥漫性颅内压增高
- D.小脑幕下占位性病变
- E.顶叶占位性病变

- 19.对小脑幕切迹疝的描述，正确的是
- A.海马旁回、沟可通过此裂孔移至幕切迹下方
 - B.主要使延髓受压
 - C.主要压迫小脑
 - D.枕叶脑回移至切迹下方
 - E.也称为枕骨大孔疝

- 20.脑出血患者CT图像为
- A.起病后即可见低密度异常影
 - B.起病24~48小时后可见异常高密度影
 - C.起病后即可见高密度异常影
 - D.可见中线结构移位
 - E.起病后24小时内无改变

- 21.关于颅咽管瘤下列不正确的是
- A.约占颅内肿瘤的5%
 - B.多见于成年人
 - C.男性多于女性
 - D.常发生在鞍上区
 - E.囊性变且包膜钙化多见

- 22.对冲伤最常造成
- A.脑干损伤
 - B.弥漫性轴索损伤
 - C.硬膜下血肿
 - D.颞、额叶挫裂伤
 - E.枕叶损伤

- 23.颅盖骨折通常诊断依据是
- A.头颅X线片
 - B.头痛伴呕吐
 - C.脑定位体征
 - D.局部骨擦音
 - E.头部外伤史

- 24.最常见的颅内神经纤维瘤起源于
- A.三叉神经
 - B.面神经
 - C.位听神经
 - D.舌咽神经
 - E.副神经

- 25.急性硬膜下血肿的来源不包括

- A.脑皮层动脉
- B.脑皮层静脉
- C.桥静脉
- D.脑膜中动脉
- E.脑内血肿冲破皮层

26.自发性蛛网膜下腔出血脑膜刺激征常在出血后

- A.当即出现
- B.1~2天出现
- C.1周后出现
- D.一直出现
- E.不出现

27.脑动脉瘤预后的根据为

- A.脑动脉瘤的多少
- B.血压上升程度
- C.脑动脉瘤的大小
- D.有无偏瘫
- E.意识障碍程度

28.颅内压增高可引起头颅X线片上的改变常见有

- A.头颅增大，脑回压迹减少
- B.脑组织移位
- C.血管钙化，脑回变的扁平，大脑镰钙化
- D.颅缝变宽，脑回压迹增多，蝶鞍的前后床突及鞍背骨质吸收
- E.松果体钙化移位

29.颅内压调节中起主要缓冲作用的是

- A.脑组织
- B.脑血流
- C.脑脊液
- D.静脉压
- E.动脉压

30.豆纹动脉由（）发出

- A.颈内动脉
- B.大脑前动脉
- C.大脑中动脉
- D.大脑后动脉
- E.基底动脉

31.对额顶枕区的描述，**错误**的是

- A.皮肤是良好的供皮区

- B.颅骨外膜在颅缝处结合紧密
- C.浅部3层紧密结合常称为“头皮”
- D.浅筋膜内血管损伤易出血
- E.腱膜下感染不易扩散

32.帽状腱膜下血肿的处理，正确的是

- A.均需用切开引流
- B.若血肿巨大需用穿刺抽除积血加压包扎
- C.均需抗生素预防感染
- D.巨大血肿易引起中线移位，故脱水治疗
- E.均需静脉输血抢救休克

33.患儿呈长头畸形可能为

- A.额状缝早闭
- B.冠状缝早闭
- C.矢状缝早闭
- D.鳞状缝早闭
- E.人状缝早闭

34.颅底骨折的诊断主要是依据

- A.颅底X线片
- B.CT
- C.MRI
- D.PET
- E.临床表现

35.水平侧卧位经腰椎穿刺所测得的压力，在成年人其正常值为

- A.0~100mmHg
- B.70~200mmHg
- C.70~120mmHg
- D.200~300mmHg
- E.90~150mmHg

36.在儿童期最少见的肿瘤是

- A.室管膜瘤
- B.颅咽管瘤
- C.星状细胞瘤
- D.髓母细胞瘤
- E.胶质母细胞瘤

37.治疗颅底骨折引起的脑脊液漏时，**错误**的方法为

- A.保持鼻腔和外耳道清洁
- B.用乙酰唑胺
- C.使用棉球填塞鼻腔或外耳道

- D.限制液体入量
- E.头抬高30°卧向患侧

38.左侧小脑幕切迹疝患者的典型临床表现是

- A.昏迷，右侧瞳孔散大，左侧肢体瘫痪
- B.昏迷，左侧瞳孔散大，右侧肢体瘫痪
- C.昏迷，左侧瞳孔散大，左侧肢体瘫痪
- D.昏迷，右侧瞳孔散大，右侧肢体瘫痪
- E.昏迷，双侧瞳孔散大，右侧肢体瘫痪

39.下列关于颈内动脉海绵窦瘘叙述**错误**的是

- A.窦内段颈内动脉因外伤而破裂，多与颅底骨折合并存在
- B.颈内动脉海绵窦瘘因外伤引起者占3/4
- C.体检可闻及血管杂音
- D.眼外肌麻痹以动眼神经损害最多
- E.颈内动脉海绵窦瘘最重要的检查手段是脑血管造影

40.治疗脑水肿最常用的药物为

- A.地塞米松
- B.50%葡萄糖
- C.30%尿素
- D.20%甘露醇
- E.25%山梨醇

41.诊断婴幼儿颅内压增高的可靠依据是

- A.前囟门张力增高或（和）头围增大
- B.嗜睡与惊厥
- C.头痛、呕吐、视盘水肿
- D.躁动不安与呕吐
- E.意识障碍与躁动

42.正常成人脑脊液总量为

- A.40~60ml
- B.70~90ml
- C.100~150ml
- D.160~200ml
- E.250~300ml

43.脑外伤患者伤后意识障碍，对言语无反应，对痛刺激有回避动作，此时意识程度为

- A.清醒
- B.模糊
- C.浅昏迷
- D.昏迷
- E.深昏迷

44. 颅底异常血管网症又被称为

- A. 网状血管病
- B. 颅内血管畸形
- C. 颅底血管畸形
- D. 脑动脉炎
- E. 烟雾病 (moyamoya disease)

45. 急性颅内压增高的患者出现血压升高, 心跳及脉搏缓慢, 呼吸节律紊乱和体温升高等各项生命体征改变是指

- A. Wallenberg syndrome
- B. Brown-Sequard syndrome
- C. Cushing syndrome
- D. Weber syndrome
- E. Locked-in syndrome

46. 高血压脑出血急性期处理的最重要环节是

- A. 立即使用止血药
- B. 控制血压下降至正常以下, 防止再出血
- C. 警惕严重颅内高压的出现
- D. 用镇静药, 防止癫痫发作
- E. 去骨瓣减压

47. 下列**不是**先天性脑积水的病因的是

- A. 颅内出血
- B. 脑膜炎
- C. 肿瘤
- D. Dandy-Walker畸形
- E. 颅内动静脉畸形

48. 患儿头呈长头畸形可能为

- A. 冠状缝早闭
- B. 矢状缝早闭
- C. 额骨缝早闭
- D. 鳞状缝早闭
- E. 人字缝早闭

49. 对第1躯体感觉区的描述, **错误**的是

- A. 感觉传导投影上、下完全颠倒
- B. 管理对侧半身的深浅感觉
- C. 含有6层细胞结构
- D. 感觉投影区大小与该部感觉灵敏程度有关
- E. 位于中央后回和中央旁中叶后部

50. 枕骨大孔疝受累的结构是

- A.小脑蚓部
- B.小脑前叶
- C.绒球
- D.小脑扁桃体
- E.海马旁回和钩

51.调节颅内压的因素有

- A.脑脊液压力
- B.脑血流，脑组织移位和静脉压
- C.脑灌注压
- D.脑组织，脑脊液与血液
- E.血压

52.自发性蛛网膜下隙出血最常见的病因是

- A.动静脉畸形
- B.血管炎
- C.先天性动脉瘤
- D.脑血管肌纤维发育不良
- E.凝血系统异常

53.诊断颅内压增高，需慎重进行的检查为

- A.CT
- B.MRI
- C.DSA
- D.头颅X线摄片
- E.腰椎穿刺

54.对面神经核的叙述正确的是

- A.只管理面肌运动
- B.位于面神经丘深面
- C.管理同侧面肌运动
- D.受双侧皮质核束控制
- E.位于脑桥上部

55.角膜反射的传入神经是

- A.视神经
- B.三叉神经
- C.动眼神经
- D.面神经
- E.展神经

56.对于怀疑动脉瘤所致的动眼神经麻痹患者，最有价值的辅助检查是

- A.头颅CT三维血管显影
- B.数字减影血管造影

- C.头颅CT
- D.头颅MRI
- E.颅骨X线平片

57.脑脊液的产生部位是

- A.蛛网膜粒
- B.椎内静脉丛
- C.硬膜外隙
- D.上矢状窦
- E.脉络丛

58.与听觉反射有关的是

- A.上丘
- B.顶盖前区
- C.下丘
- D.上丘臂
- E.下丘臂

59.诊断慢性颅内压增高常见的临床依据是

- A.意识障碍与头痛
- B.头痛，视力早期减退
- C.意识障碍与呕吐
- D.头痛、呕吐
- E.头痛，伴有进行性视力减退

60.小脑幕切迹疝最有意义的临床定位体征是

- A.患侧肢体活动减少或消失
- B.对侧腹壁反射消失
- C.患侧瞳孔散大
- D.对侧肢体腱反射亢进
- E.患侧下肢病理反射

61.各种脑肿瘤在颅内分布有其相对特殊性，第三脑室内肿瘤最常见的是

- A.神经鞘瘤
- B.多形性胶质母细胞瘤
- C.胶样囊肿
- D.室管膜瘤
- E.髓母细胞瘤

62.不属于内脏运动神经核的核团是

- A.孤束核
- B.上涎核
- C.下涎核
- D.动眼神经副核

E.迷走神经背核

63.头部叩诊听到破壶音是由哪类原因引起的

- A.颅内压增高
- B.头围和头部形态异常
- C.神经功能障碍
- D.静止期脑积水
- E.代偿性脑积水

64.一般颅内压增加的临界容积为

- A.0.05
- B.0.1
- C.0.15
- D.0.2
- E.0.25

65.颅内压增高的对症治疗中，不正确的是

- A.躁动者可给予镇静剂
- B.抽搐者可给予抗癫痫药物
- C.发热者可给予物理降温
- D.剧烈头痛者可给予吗啡镇痛
- E.频繁呕吐者可给予禁食

66.下列颅内压增高临床表现中，错误的是

- A.头痛早、晚较重
- B.头痛以颈枕旁向前方放射至眼眶
- C.头痛剧烈时出现喷射性呕吐
- D.视神经乳头中央凹陷明显
- E.颅内压增高得以解除，视力仍恶化或失明

67.出生半月的脑积水患儿，颅内压增高的主要表现是

- A.头痛
- B.呕吐
- C.视盘水肿
- D.头围明显增大
- E.呛奶

68.属于开放性脑损伤的是

- A.头皮裂伤，颅骨与外界相通
- B.头皮裂伤，颅骨骨折，硬脑膜与外界相通
- C.颅骨凹陷性骨折，骨折片刺破硬脑膜
- D.颅底骨折合并有脑脊液鼻漏
- E.颅骨骨折，骨折片刺破头皮暴露于空气中

69.不经过颈静脉孔的结构是

- A.副神经
- B.面神经
- C.舌咽神经
- D.迷走神经
- E.颈内静脉

70.自发性蛛网膜下隙出血伴一侧动眼神经麻痹提示


- A.小脑幕切迹疝
- B.后交通动脉瘤
- C.前交通动脉瘤
- D.颈动脉海绵窦瘘
- E.枕骨大孔疝

题型：A2

71.患者的病史约3年，初起时曾有发热，后渐出现上背部和腰部疼痛，咳嗽时加重并向右下肢放射，病情时轻时重，于2年半前出现双下肢无力并进行性加重：检查胸1-3水平痛温度觉减退，腰1水平以下痛温度觉消失，左腿较对侧细，无括约肌功能障碍。此患者可定性诊断为

- A.脊髓肿瘤
- B.慢性硬脊膜外脓肿
- C.脊髓蛛网膜炎
- D.脊椎关节病
- E.多发性椎间盘脱出

72.患者，男，37岁。视力模糊，部分视野缺失，伴有头痛、恶心数月，MRI检查如图，最可能的诊断




为

- A.颅咽管瘤
- B.脑膜瘤
- C.蛛网膜囊肿
- D.垂体瘤
- E.表皮样囊肿

73.患者，女，43岁。9小时前被汽车撞倒，右枕着地，昏迷20分钟，醒后头痛，头晕，恶心呕吐，右顶可触及皮下血肿同时可见一2.5cm头皮裂伤。CT颅内未见异常，未见颅骨骨折。该患者最恰当的治疗措施为

- A.12小时内局部清创缝合，抗炎对症治疗
- B.24小时内局部清创缝合，抗炎对症治疗
- C.48小时内局部清创缝合，抗炎对症治疗
- D.抽吸头皮血肿，24小时内局部清创缝合
- E.抽吸头皮血肿，48小时内局部清创缝合

74.患儿，女，5岁，头痛1月余，结合影像图像，最可能的诊断是




- A. 松果体肿瘤
- B. 室管膜瘤
- C. 脑膜炎
- D. 脑转移瘤
- E. 胶样囊肿

75.患者，男，33岁，4个月前无明显诱因出现腰痛，为持续性钝痛，之后出现双下肢麻木，逐渐左下肢不能动。查体：左下肢肌力Ⅱ级，双下肢腱反射亢进，L₁以下深浅感觉障碍，胸正侧位片示T₁₁-T₁₂间隙增宽

- A. T₁₁-T₁₂硬脊膜外占位病
- B. T₁₁-T₁₂硬脊膜内髓外占位病
- C. T₁₁-T₁₂髓内占位病
- D. L₁硬脊膜外占位病
- E. L₁硬脊膜内髓外占位病

76.患者，男，27岁。头痛、眼球震颤、走路不稳半年余，近1周出现呕吐，MRI检查如图，最可能的



诊断为

- A.脑膜瘤
 - B.转移瘤
 - C.髓母细胞瘤
 - D.血管网状细胞瘤
 - E.皮样囊肿
- 77.从高空坠落右枕部着地，患者伤后进行性意识障碍，左侧瞳孔逐渐散大，诊断应首先考虑
- A.左侧枕部急性硬脑膜外血肿
 - B.右侧枕部急性硬脑膜下血肿
 - C.右侧额颞挫裂伤伴急性硬脑膜下血肿
 - D.左侧额颞极挫伤伴急性硬脑膜下血肿
 - E.右侧后颅窝小脑血肿
- 78.患儿，5个月，诊断为狭颅症，常合并下列畸形，除外
- A.脊柱裂
 - B.眼裂
 - C.腭裂
 - D.唇裂
 - E.并指
- 79.患者，女，34岁。4个月内抽搐痉挛5次，发作后不能用语言表达自己的意思，但能听懂别人的语言。CT及MRI显示左额叶占位病均匀一致强化，周围硬脑膜有强化。最可能的诊断是
- A.胶质瘤
 - B.脑膜瘤
 - C.海绵状血管瘤
 - D.转移瘤
 - E.颅内淋巴瘤
- 80.患儿，3岁，因脑积水行脑室-腹腔分流术后3天，出现头痛，头胀，以直立性头痛明显，考虑该患儿头痛的原因可能为
- A.脑内血肿
 - B.分流管梗阻

- C.分流管移位
- D.过度引流
- E.裂隙脑室综合征

81.患儿，女，3岁。出生后头围逐渐增大，伴有头皮静脉怒张，落日眼，智力发育低于同龄儿童，头颅CT检查提示三脑室以上对称性扩大。不适合的治疗方法为

- A.脑室-腹腔分流术
- B.Toykildson手术
- C.脑室-心房分流术
- D.脑室-上矢状窦分流术
- E.腰大池腹腔分流术

82.患者，男，30岁。在3楼擦窗户时不慎自楼上坠下，当即昏迷。送医院就诊，1小时后即清醒，头痛，呕吐，右上肢肌力2级，脑脊液检查有红细胞，CT示左颞顶叶低密度灶，其中有散在点状高密度影。应考虑为

- A.脑震荡
- B.弥漫性轴索损伤
- C.脑挫裂伤
- D.脑内血肿
- E.脑干损伤

83.患儿，男，1岁。3天前无明显诱因出现斜视伴复视，查体头围较正常同龄婴儿增大，前囟膨隆。该患儿最有可能的诊断是

- A.甲亢
- B.先天性脑积水
- C.畸形
- D.颅裂
- E.脑水肿

84.患儿，女，1岁，诊断为先天性脑积水。7天前行脑室-腹腔分流术，术后第1天复查CT脑室较术前缩小。现患儿突发恶心呕吐，意识状态恶化，急查CT示脑室扩张。目前考虑患儿一般情况恶化的原因最可能是

- A.脑内血肿
- B.分流管梗阻
- C.分流管移位
- D.过度引流
- E.脑水肿

85.患者，男，58岁，突然头疼呕吐，伴意识丧失30分钟。查体：神志清楚，颈部抵抗，克氏征阳性。右侧眼睑下垂，右侧瞳孔4mm，对光反射消失。最可能的诊断是

- A.脑梗死
- B.蛛网膜下腔出血
- C.高血压脑出血
- D.颅内动静脉畸形出血

E.颅脑肿瘤

86.患儿，1岁，诊断为狭颅症，该患儿眼部可能出现下列症状，除了

- A.眼球突出
- B.眼球内陷
- C.闭目不能
- D.斜视
- E.眼距异常

87.患者，女，30岁。跑步时突然剧烈头痛、呕吐，一过性意识不清，醒后颈枕部疼痛，右眼睑下垂、瞳孔大，颈项强直，克氏征（+）。最可能的诊断是

- A.脑出血合并脑疝
- B.脑干出血
- C.小脑出血
- D.SAH
- E.急性脑膜炎

88.患者，男，43岁，右眼睑下垂、复视2个月。查体：神志清，右眼睑下垂，右眼球外斜，右侧瞳孔散大，对光反应和调节反应消失，双侧视盘边界清，色淡。既往有蛛网膜下隙出血史。CT扫描增强后发现鞍旁右侧一小圆形高密度影，周围无脑水肿。首先考虑的诊断是

- A.右颈内动脉后交通动脉动脉瘤
- B.右侧颞叶动静脉畸形
- C.右侧脊索瘤
- D.右侧鞍旁脑膜瘤
- E.右侧小脑幕切迹疝

89.患者，男，21岁。2天前骑自行车摔伤枕部，今日出现右耳部皮下淤斑，应首先考虑为

- A.耳后软组织损伤
- B.头皮血肿
- C.颅后窝骨折
- D.颅中窝骨折
- E.脑震荡

90.成年男性，外伤后1小时，CT检查如图，最可能的诊断为



- A.脑出血
- B.脑膜瘤
- C.脑转移瘤
- D.脑挫裂伤
- E.脑胶质瘤

91.患者，男，18岁，体检X片提示：枢椎齿突高于正常水平，查体见：颈项粗短，面颊耳廓不对称，该患者最有可能的诊断

- A.狭颅症
- B.先天性脑积水
- C.颅底陷入症
- D.颅裂
- E.脊柱裂

92.患者，男，76岁，糖尿病史7年。中午睡觉醒来后发现右侧肢体无力，次日症状加重。查体：血压140/90mmHg，右鼻唇沟变浅，伸舌偏右，右上肢肌力3级，右下肢肌力4级，右侧上肢和面部感觉减退。心电图示房性期前收缩。该患者最可能的诊断是

- A.脑出血
- B.脑血栓形成
- C.脑栓塞
- D.颅内硬膜外血肿
- E.脑炎

93.患儿，男，3个月。出生后一直喂养困难，头围较正常同龄婴儿增大。查体：前囟膨隆，叩诊Macewen征（+），该患儿最有可能诊断是

- A.甲亢
- B.先天性脑积水
- C.巨人症
- D.颅裂
- E.脑水肿

94.患者，男，44岁。车祸伤及右侧眉弓和头部，当时右眼上、下睑青紫淤血。半月后右眼球结膜高度水肿视力下降，右眼球突出，CT检查如图，最可能的诊断为



- A.眶内静脉曲张
- B.颈内动脉海绵窦段动脉瘤
- C.海绵窦动静脉瘘
- D.颅内动静脉畸形
- E.硬脑膜动静脉瘘

95.女婴，20天，出生时发现枕部包块，直径约1cm，实质感，透光实验（-），啼哭时张力不变，该患儿最有可能的诊断是

- A.先天性脑积水

- B.颅裂
- C.脑水肿
- D.狭颅症
- E.脑膜瘤

题型：A3

(96~98题共用题干)

患者20岁，体检发现寰枢椎畸形。查体：面颊和耳廓不对称，头部歪斜，眼球运动正常。

96.患者最可能的诊断是

- A.脊柱裂
- B.颅裂
- C.颅底陷入症
- D.狭颅症
- E.脑血管瘤

97.最佳的影像学检查

- A.头部MRI
- B.头部B超
- C.头部X线
- D.头颅血管造影
- E.头部CT

98.患者目前治疗方式首选

- A.暂不处理，加强营养
- B.尽早手术
- C.定时复查
- D.暂不处理，注意避免外伤
- E.暂不处理

(99~100题共用题干)

患儿，男，7个月，出生时发现枕部肿块，逐渐增大。查体：枕部可见3cm×3cm×2cm大小肿块，质硬，透光实验阴性，CT示脑发育不全，枕部颅骨缺损。

99.此患儿最佳的治疗方法为

- A.保守治疗
- B.修补硬脑膜，缝合头皮，颅骨暂不修补
- C.切除囊肿，缝合头皮，硬脑膜不修补
- D.切除囊肿，缝合头皮，修补颅骨及硬脑膜
- E.修补颅骨，硬脑膜不予处理

100.此患儿的诊断为

- A.枕部脑膜膨出
- B.脑膨出
- C.脑膜脑囊状膨出
- D.脑囊状膨出
- E.脑膜囊状膨出

答案：

题型：A1

1.A	2.E	3.C	4.A	5.A	6.E	7.D	8.B	9.D	10.A
11.E	12.B	13.B	14.B	15.D	16.A	17.E	18.A	19.A	20.C
21.B	22.D	23.A	24.C	25.D	26.B	27.E	28.D	29.C	30.C
31.E	32.B	33.C	34.E	35.B	36.E	37.C	38.B	39.D	40.D
41.A	42.C	43.C	44.E	45.C	46.C	47.E	48.B	49.A	50.D
51.D	52.C	53.E	54.A	55.B	56.B	57.E	58.C	59.E	60.C
61.D	62.A	63.B	64.A	65.D	66.D	67.E	68.D	69.B	70.B

题型：A2

71.B	72.D	73.B	74.B	75.A	76.D	77.D	78.B	79.B	80.D
81.E	82.C	83.B	84.B	85.B	86.C	87.D	88.A	89.C	90.D
91.C	92.B	93.B	94.C	95.B					

题型：A3

96.C	97.A	98.D	99.B	100.C
------	------	------	------	-------