

外科（胸外心外） A

题型：A1

- 1.第4~7肋骨容易被折断的主要解剖学原因是
 - A.此处肋骨是胸部的显露位置
 - B.此处肋骨不是浮肋
 - C.缺少肌肉的保护
 - D.肋骨长而薄
 - E.前端与胸骨成弓形连接，弹性较大
- 2.下列哪项为胸腔损伤时行闭式胸膜腔引流术的指征
 - A.胸壁反常呼吸
 - B.多根多处肋骨骨折
 - C.胸内异物存留
 - D.血气胸经穿刺抽吸无效
 - E.肺广泛挫伤
- 3.颈部及上胸部段食管癌多采用
 - A.手术切除
 - B.放疗
 - C.术前放疗+手术治疗
 - D.手术治疗+术后放疗
 - E.联合化学药物治疗
- 4.下列哪项不是法洛三联症的解剖畸形
 - A.肺动脉瓣狭窄
 - B.主动脉骑跨
 - C.室间隔缺损
 - D.左心室肥大
 - E.右心室肥大
- 5.下列叙述与胸腺瘤相关的是
 - A.可压迫脊髓致截瘫
 - B.均为恶性
 - C.以中纵隔多见
 - D.可出现重症肌无力
 - E.治疗以放疗为主
- 6.原发性胸壁肿瘤的治疗原则，正确的是
 - A.密切观察
 - B.内科保守治疗
 - C.预防性使用抗生素

- D.尽快手术治疗
- E.良性肿物不需要手术治疗

7.心包压塞的重要病理生理变化是

- A.失血性休克
- B.急性循环衰竭
- C.急性呼吸衰竭
- D.心肌损害
- E.水电解质和酸碱平衡紊乱

8.慢性脓胸的首选治疗原则是

- A.积极抗感染治疗
- B.消除病因闭合脓腔
- C.反复穿刺抽脓
- D.有效的支持疗法
- E.单纯胸腔闭式引流

9.以下不符合二尖瓣狭窄的体征的是

- A.心尖区第一心音亢进
- B.肺动脉瓣区第二心音增强
- C.心尖区舒张中期隆隆样杂音
- D.胸骨左缘第3~4肋间听到收缩期喷射样杂音
- E.胸骨左缘第3~4肋间可听到二尖瓣开瓣音

10.关于慢性缩窄性心包炎的诊断, 下列**错误**的是

- A.临床检查可存在奇脉
- B.脉压增大
- C.心电图示ST段压低, T波低平
- D.常合并心房纤颤
- E.超声心动图有助于确诊

11.下列哪项是食管癌的最早期症状

- A.进行性吞咽困难
- B.进食后呕吐
- C.进食时胸骨后痛, 烧灼感, 异物感
- D.体重减轻, 衰弱
- E.进食后呛咳

12.早期食管癌患者治疗, 首选是

- A.化学疗法
- B.放射疗法
- C.激光疗法
- D.手术疗法

E.免疫疗法

13.动脉导管未闭的心脏杂音，需要鉴别的疾病是

- A.动脉导管未闭、主动脉-肺动脉间隔缺损、法氏窦瘤破裂、冠状动脉-心腔瘘
- B.冠状动静脉瘘、室间隔缺损合并主动脉瓣关闭不全
- C.二尖瓣狭窄、主动脉瓣关闭不全、缩窄性心包炎、胸主动脉瘤
- D.动脉导管未闭、主动脉-肺动脉间隔缺损、法氏窦瘤破裂、冠状动脉-心腔瘘、冠状动静脉瘘、室间隔缺损合并主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄、主动脉瓣关闭不全、缩窄性心包炎、胸主动脉瘤
- E.动脉导管未闭、主动脉-肺动脉间隔缺损、法氏窦瘤破裂、冠状动脉-心腔瘘、冠状动静脉瘘、室间隔缺损合并主动脉瓣关闭不全

14.食管癌患者行食管部分切除后，最常用下列哪项作为食管替代物

- A.胃
- B.小肠
- C.食管
- D.结肠
- E.人工食管

15.先天性心脏病肺动脉口狭窄，造成的病理生理改变主要是

- A.肺动脉压力升高
- B.左向右分流
- C.左室肥大
- D.右室压力升高
- E.肺淤血

16.中央型肺癌中最常见的症状是

- A.反复大咯血
- B.发烧
- C.刺激性咳嗽
- D.气短
- E.胸痛

17.下列胸骨左缘第2~3肋间听诊体征中，哪项最符合肺动脉口狭窄

- A.收缩期杂音，P₂弱
- B.连续性杂音，P₂无
- C.收缩期杂音，P₂亢
- D.收缩期杂音，P₂正常
- E.双期杂音，P₂无

18.胸部损伤后胸部X线检查对下列意义不大的是

- A.判定有无肋骨骨折，骨折部位和性质
- B.确定胸膜腔内有无积气和肺萎陷
- C.确定胸膜腔内有无积血和容量
- D.判定有无合并损伤及病变

E.确定剖胸手术探索的指征

19.弥漫性恶性胸膜间皮瘤，下面描述正确的是

- A.恶性程度较高
- B.好发于中年
- C.与接触石棉无关
- D.IV期仍可手术切除
- E.患者，女，多于男性

20.中等量血胸的定义是

- A.<500ml
- B.500~1000ml
- C.>1000ml
- D.800~1000ml
- E.500~800ml

21.气胸欲行胸腔闭式引流术的最佳引流位置是

- A.腋前线第6肋间
- B.锁骨中线第6肋间
- C.腋中线第6肋间
- D.锁骨中线第2肋间
- E.锁骨中线第3肋间

22.食管炎与早期食管癌的鉴别，主要方法是

- A.胸骨灼痛
- B.食管钡透黏膜紊乱
- C.脱落细胞检查
- D.免疫诊断方法
- E.试验治疗

23.缩窄性心包炎的临床治疗原则是

- A.抗结核药物治疗
- B.强心利尿
- C.尽早施行手术治疗
- D.心包穿刺或胸腔穿刺
- E.全身支持治疗，不需手术治疗

24.下列表现提示主动脉狭窄的是

- A.左心室肥厚
- B.颈动脉搏动明显
- C.上肢血压明显高于下肢血压
- D.心前区喷射性杂音
- E.间歇性跛行

25.患者胸部损伤后，随呼吸运动有气体进出胸壁伤口。下述哪项诊断是最正确的

- A.进行性血胸
- B.开放性气胸
- C.肺爆震伤
- D.创伤性窒息
- E.张力性气胸

26.闭合性肋骨骨折，提示可能合并张力性气胸是出现

- A.伤侧肺呼吸音减弱
- B.伤侧肺有啰音
- C.伤侧胸部剧痛
- D.伤侧皮下气肿
- E.伤侧胸腔积液

27.进行性血胸的诊断依据不包括

- A.脉搏快，血压持续下降
- B.胸腔引流连续3个小时总量300ml
- C.Hb、RBC反复测定呈持续下降
- D.胸膜腔穿刺抽不出血，但X线示胸内阴影增大
- E.经输血补液后血压不回升逐渐下降

28.关于脓胸渗出期的病理变化，下列**错误**的是

- A.脏层胸膜充血
- B.渗出液稀薄
- C.细胞成分少
- D.胸穿抽脓较易
- E.排出渗液后肺不易复张

29.下列符合进行性血胸的表现的是

- A.输血补液后血压可以维持
- B.血红蛋白，红细胞计数和血细胞比容变化不大
- C.脉搏增快，血压正常
- D.胸膜腔引流量1小时超过200ml
- E.胸穿刺抽不出血液，X线检查显示胸膜腔阴影继续增大

30.在肺癌中较早即可发生远处转移的是

- A.鳞癌
- B.腺癌
- C.肺泡细胞癌
- D.大细胞癌
- E.小细胞癌

31.下列哪项胸部损伤需急诊剖胸探查

- A.多发肋骨骨折，严重反常呼吸
- B.闭合性胸部损伤伴血气胸
- C.心肌挫伤，心源性休克
- D.张力性气胸
- E.左侧血胸，纵隔阴影增宽，疑主动脉破裂

32.下列哪型食管癌最早出现进食哽噎

- A.缩窄型
- B.蕈伞型
- C.溃疡型
- D.髓质型
- E.无明显区别可用

33.下列胸部创伤，不符合立即开胸探查指征的是

- A.食管裂伤
- B.胸内异物存留，严重咯血
- C.进行性血胸
- D.创伤性窒息
- E.气管支气管断裂

34.哪一类来源的血胸多可自行停止

- A.心房破裂
- B.主动脉破裂
- C.肋间动脉破裂
- D.肺组织裂伤出血
- E.右心室破裂

35.风湿性心脏病二尖瓣狭窄出现急性肺水肿，最可能因为

- A.肺泡与毛细血管之间组织增厚
- B.肺毛细血管压力超过正常血浆渗透压（30mmHg）
- C.肺小动脉痉挛
- D.肺血管阻力增高
- E.右心衰竭

36.中心型肺癌最常见的早期症状是

- A.呼吸困难
- B.胸痛
- C.声嘶
- D.发热
- E.刺激性咳嗽

37.胸外伤是常见病，由于伤因不同，损伤程度不同，其症状亦不一，但胸部损伤的最主要的症状是

- A.呼吸困难
- B.胸痛

- C.休克
- D.咳嗽
- E.咯血

38.以下哪项**不是**晚期肺癌临床表现

- A.同侧膈肌麻痹
- B.声音嘶哑
- C.左肺不张合并高热
- D.患侧胸腔积液
- E.压迫食管引起吞咽困难

39.胸外伤反常呼吸最根本的病理生理紊乱是

- A.吸气时伤区下陷
- B.呼气时伤区膨出
- C.回心血量减少
- D.缺O₂和CO₂潴留
- E.胸腔内高压

40.外伤性心包填塞最可靠最合理的诊断办法是

- A.胸部X线片
- B.心脏计波摄影
- C.超声检查
- D.静脉压测定
- E.心包穿刺

41.脓胸致病菌最常见的来源下列哪项

- A.膈下脓肿
- B.肺内感染灶
- C.全身脓毒败血症
- D.外伤污染胸腔
- E.肝脓肿

42.决定冠状动脉搭桥术，依赖的检查是

- A.冠状动脉造影
- B.心脏磁共振成像
- C.心脏CT
- D.心脏彩色超声心动图
- E.心电图

43.下列肺结核手术前后处理措施中，哪项是**错误**的

- A.术前应作系统抗结核治疗，有耐药性的患者应选用新的抗结核药
- B.痰菌阳性者应作支气管镜检查，明确有无支气管内膜结核
- C.有内膜结核者应继续抗结核治疗，直到控制稳定

- D.术后应继续抗结核治疗1个月
- E.肺切除后有胸内残腔且余肺有残留病灶者，可同期或分期加作胸廓成形术

44.下列哪项不是闭式胸腔引流术的适应证

- A.血胸
- B.气胸
- C.血气胸
- D.切开胸膜腔者
- E.结核性胸膜炎

45.胸部开放性损伤，下述哪项是正确的

- A.胸部创口裂开深达肋间肌
- B.伤侧肋骨骨折断端外露
- C.损伤后气胸，伤侧肺压缩60%
- D.伤侧皮下气肿并血气胸
- E.壁层胸膜穿通，空气经伤口出入胸膜腔

46.心尖区听到舒张期隆隆样杂音，除考虑二尖瓣狭窄的诊断外，还有可能是

- A.左心房黏液瘤
- B.二尖瓣关闭不全
- C.三尖瓣关闭不全
- D.主动脉瓣关闭不全
- E.肺动脉瓣关闭不全

47.漏斗胸心脏X线检查和心电图常有

- A.心脏向左移位和顺时针方向旋转
- B.心脏向右移位和顺时针方向旋转
- C.心脏向左移位和逆时针方向旋转
- D.心脏向右移位和逆时针方向旋转
- E.心脏向左移位和向后旋转

48.创伤性窒息的临床特征是

- A.双侧呼吸音减弱或消失
- B.皮下及纵隔气肿
- C.头、颈、上肢毛细血管出血
- D.双侧湿啰音及血痰
- E.呼吸困难

49.胸主动脉瘤不包括

- A.真性动脉瘤
- B.假性动脉瘤
- C.夹层动脉瘤
- D.心脏黏液瘤和法氏窦动脉瘤

E.真性动脉瘤、假性动脉瘤和夹层动脉瘤

50.一前胸部受重物撞击的患者，主诉心悸、气促，ECG示ST段抬高和室性期前收缩，需考虑的诊断是

- A.心脏裂伤、心脏压塞
- B.外伤性室间隔破裂
- C.心脏挫伤
- D.胸骨骨折
- E.创伤性窒息

51.食管癌的治疗与预后同下列因素关系密切，除了

- A.病程的长短
- B.病变的长度
- C.吞咽困难的程度
- D.有无远处转移
- E.肿瘤侵犯的深度及有无局部淋巴结转移

52.关于开放性胸外伤的概念，下述哪项正确

- A.脏层胸膜损伤，胸膜腔经脏层胸膜与外界相通
- B.胸壁有开放创口，深达肌层
- C.壁层胸膜有创口，皮肤完整
- D.壁层胸膜损伤，胸膜腔经胸壁与外界相通
- E.肺有裂口

53.肺癌常见的肺外体征有

- A.指趾端发绀
- B.杵状指（趾）
- C.心率增快
- D.心动过缓
- E.桶状胸

54.进行性吞咽困难患者，突然出现吞咽困难改善或消失，多提示

- A.食管癌穿孔
- B.食管痉挛缓解
- C.水肿及炎症消退
- D.癌肿组织细胞坏死
- E.部分癌肿细胞脱落

55.肺炎在治疗过程中突然体温升高，胸痛剧烈，最大可能是

- A.肺炎并发急性脓胸
- B.并发肺脓肿
- C.并发纵隔炎
- D.炎症波及胸壁
- E.并发膈下感染

- 56.急性脓胸可通过下列哪项检查确诊
- A.体检发现患侧语颤减弱，叩诊浊音
 - B.胸部X线片示患侧呈大片浓密阴影
 - C.胸穿抽得脓液
 - D.胸片示液平面
 - E.胸部B超提示患侧胸腔积液
- 57.肺癌中最早可发生远处转移的是
- A.鳞癌
 - B.腺癌
 - C.肺泡细胞癌
 - D.未分化大细胞癌
 - E.未分化小细胞癌
- 58.张力性气胸患者呼吸困难，最重要的治疗措施是
- A.吸氧
 - B.呼吸机辅助
 - C.气管插管或切开
 - D.开胸手术
 - E.胸腔穿刺抽气减压
- 59.胸部损伤的最主要症状是
- A.呼吸困难
 - B.咯血
 - C.胸痛
 - D.咳嗽
 - E.发绀
- 60.胸部损伤后产生连枷胸的常见于
- A.两根以上肋骨骨折
 - B.多根多处肋骨骨折
 - C.胸骨骨折
 - D.反常呼吸
 - E.纵隔扑动
- 61.缩窄性心包炎最常见的临床表现是
- A.微热、盗汗
 - B.胸前疼痛、干咳
 - C.心界扩大明显
 - D.呼吸困难、胸水
 - E.颈静脉怒张、肝大、腹水
- 62.关于急性脓胸的治疗措施，下列**错误**的是
- A.根据药敏选用抗生素

- B.全身支持疗法
- C.脓胸开放引流术
- D.闭式胸膜腔引流术
- E.反复胸膜腔穿刺抽脓

63.周围性肺癌早期最常见的表现是

- A.胸痛
- B.无症状
- C.咳血丝痰
- D.干咳
- E.发热

64.胸壁结核的临床表现，**错误**的是

- A.常合并明显全身症状
- B.局部病变常无红、肿、热、痛表现
- C.合并细菌感染局部可出现红、肿、热、痛
- D.穿刺常为无臭或干酪样物质
- E.可有骨质破坏

65.关于脓胸的正确定义是

- A.胸膜受致病菌感染
- B.胸膜腔内脏器感染，胸膜腔积液
- C.肺内炎症并胸膜腔积液
- D.胸膜炎的进一步发展
- E.胸膜腔受致病菌感染，产生脓性渗出液积聚于胸膜腔内

66.关于肺棘球蚴病的诊断依据的各项，哪一项**不正确**

- A.患者有绦虫病史
- B.X线胸片可见肺内有密度均匀、边界清楚的圆形阴影
- C.超声显示肺内有囊性病变
- D.Casoni试验阳性
- E.有牧羊犬接触史

67.下列疾病中，哪一种**不会**发展为艾森门格综合征

- A.动脉导管未闭
- B.心房间隔缺损
- C.心室间隔缺损
- D.右室流出道狭窄
- E.部分型房室通道

68.下述哪一项**不是**急性脓胸感染原因

- A.结核
- B.肺部感染
- C.血性感染

- D.膈下脓肿
- E.支气管胸膜瘘

69.下列临床检查发现对慢性缩窄性心包炎的诊断意义重大的是

- A.心脏超声示心包膜回声增强
- B.心脏超声示心包膜增厚
- C.心电图示ST段下移，T波低平
- D.胸片示心脏外形怪异
- E.CT示心包有蛋壳样钙化

70.二尖瓣瓣口面积小于（） cm^2 即可产生临床症状

- A.1
- B.1.5
- C.2.5
- D.3
- E.4

题型：A2

71.一40岁重度吸烟者，胸部X光片正常，3次痰细胞学检查2次查见癌细胞，但2次经口腔纤支镜检查均未发现异常。为了明确诊断，最好应作下列哪项检查

- A.3个月后再作胸部X线和CT检查
- B.经皮肺胸膜活检
- C.纵隔镜检查
- D.检查鼻咽部
- E.肺核素扫描

72.患者，75岁，进行性吞咽困难3个月，吃干食物明显。经X线及内镜活检诊断为食管鳞癌，病变范围在食管中下段并且侵犯贲门部，纵隔发现肿大淋巴结。最适宜采取何种治疗

- A.尽快手术切除病变
- B.化学治疗
- C.营养支持加放射治疗
- D.经内镜安置支架通过狭窄段
- E.用激光电灼瘤组织

73.患者，男，30岁。外伤性血胸2周，出现发热、胸痛等症状。经多次胸穿抽液后，症状无明显改善，胸液混浊。在全身应用抗生素的同时，首选措施是

- A.胸腔内注入抗生素
- B.行胸腔闭式引流术
- C.加强营养增强抵抗力
- D.在X线下定位穿刺
- E.尽早开胸手术

74.患者，女，28岁，因劳力性心慌气急5年，近3个月加重来诊。查体：T 36.8℃，P 108次/min，R 28次/min，唇甲轻度发绀，心尖区可听到隆隆样舒张期杂音。该患者最可能的诊断是

- A.冠状动脉粥样硬化性心脏病
- B.风湿性心脏病二尖瓣狭窄
- C.肥厚性梗阻性心肌病
- D.高血压心脏病
- E.缩窄性心包炎

75.伤员左胸挤压伤，伤后出现呼吸困难，气管右移，左胸部广泛皮下气肿，左侧呼吸音消失，BP16/9.33kPa（120/70mmHg），考虑诊断是

- A.外伤性血胸
- B.血心包
- C.脓胸
- D.肋骨骨折
- E.张力性气胸

76.患者，女，42岁，咳嗽、咳痰伴发热一周，经当地医院抗感染治疗后好转，近3天再现高热，体温39.5℃，伴胸痛、胸闷、气促，转入我院。X线胸片示：左侧胸腔中等量积液，胸腔穿刺抽出黄白黏稠液体，应给予的正确治疗是

- A.抗生素控制感染
- B.行胸腔穿刺抽液
- C.应用抗生素及胸腔闭式引流
- D.胸膜纤维板剥除术
- E.胸膜内胸廓成形术


77.患者，男，66岁，咳嗽，胸疼，痰中带血3个月，胸片示右上肺不张，肺门无肿大淋巴结，余肺野清晰，纤支镜发现右上叶支气管开口处米粒大小菜花样肿物，病理活检为鳞癌。最理想的手术方式是

- A.右全肺切除
- B.右上肺叶切除
- C.右上肺支气管袖状切除
- D.右肺中上叶切除
- E.开胸探查

78.患儿，男，9岁。自幼即发现有心脏杂音，平时不喜活动，体格发育较同龄儿瘦小，喜蹲踞。查体：口唇青紫，杵状指（+），胸骨左缘第2~4肋间收缩期杂音3级，肺动脉瓣区第二心音减弱。胸片见肺血减少，心腰凹陷，心尖上翘，呈靴形心。该患儿最有可能存在的畸形是

- A.房缺+室缺+肺动脉瓣狭窄+主动脉骑跨
- B.右房肥大+室缺+肺动脉口狭窄+主动脉骑跨
- C.室缺+肺动脉口狭窄+主动脉骑跨+右心室肥大
- D.室缺+肺动脉口狭窄+动脉导管未闭+右室肥大
- E.房缺+肺动脉口狭窄+右心室肥大+主动脉骑跨

79.患者，男，23岁，因进食后频繁呕吐入院，入院后行食管镜检查如图所示，取组织活检时可见柱状上皮化生，最准确的诊断是



- A.食管癌
- B.Barrett食管
- C.食管憩室
- D.贲门失弛缓症
- E.食管平滑肌瘤

80.患者，男，25岁，司机，因交通事故胸部受伤，右侧气胸，纵隔及皮下广泛气肿。行闭式胸膜腔引流术后4天，引流管内仍有较多的气体溢出，呼吸困难无明显的改善。应考虑

- A.有小的气管漏气
- B.胸膜腔内感染
- C.肺有裂口
- D.引流不畅
- E.肺、支气管裂伤较大或支气管断裂

81.患者，男，45岁。干咳，痰中带血丝半年。吸烟史20年。体检（一）。胸部X线示：右上肺阻塞性肺炎，支气管纤维镜见：右上肺叶支气管内有菜花样肿块，痰中查到瘤细胞，下列治疗方法中哪项是错误的

- A.手术治疗

- B.放射治疗
- C.抗生素治疗
- D.化学药物治疗
- E.免疫治疗

82.患者，女，45岁，1小时前被小汽车压伤胸部，咯血痰，呼吸困难来诊，查体：血压100/70mmHg（13.3/9.33Kpa），脉搏110次/min，呼吸困难，右腋中线第5肋处有10cm×8cm范围反常呼吸，考虑诊断为

- A.肺挫伤
- B.张力性气胸
- C.闭合性气胸
- D.连枷胸
- E.开放性气胸

83.患者，男，40岁，被汽车撞伤胸部急诊入院。经吸氧后仍有呼吸困难，测血压80/60mmHg，心律120次/min，心音较弱。胸部检查：左胸饱满，左胸壁有骨摩擦音及皮下捻发音，叩诊呈鼓音，呼吸音消失，右肺清晰。最可能的诊断是

- A.左侧肋骨骨折并血胸、失血性休克
- B.左侧肋骨骨折并血气胸、休克
- C.左侧肋骨骨折，血心包，心源性休克
- D.左侧肋骨骨折，张力性气胸，皮下气肿，休克
- E.左侧肋骨骨折并单纯性气胸、感染性休克

84.患儿，女，12岁，出生后发现心脏杂音，无明显症状。查体：无发绀，胸骨左缘第2肋间听到4级粗糙的喷射性收缩期杂音，向左颈部传导，肺动脉瓣区第二心音降低。右心导管检查：右心室与肺动脉收缩压差为10.7kPa。该患儿的诊断应是

- A.室间隔缺损
- B.房间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.肺动脉瓣口狭窄
- E.法洛四联症

85.患者，女，60岁，骑自行车跌下，颈背部着地，X线示第12胸椎压缩性骨折，左下肺见一4cm×3cm分叶状，周围有小毛刺样块影，其余肺野无异常。进一步检查首选

- A.支气管镜检
- B.同位素骨扫描
- C.经皮肺穿刺
- D.痰细胞学检查
- E.纵隔镜检查


86.伤员左胸前锁骨中线第4肋间处一刀刺伤，来院检查发现伤口流血，血压10.67/8.00kPa（80/60mmHg），脉搏115次/min，脉弱气促，心音减弱，颈静脉怒张。X线胸片见心界扩大，最可能的诊断是

- A.张力性气胸
- B.血心包
- C.血气胸
- D.失血性休克
- E.损伤性窒息

87.患者，男，60岁，血丝痰2个月，X线示右上肺大片状阴影，右上叶体积缩小，OT试验阴性，痰查结核菌阴性，首选的检查方法是

- A.肺核素扫描
- B.纵隔镜检
- C.肺CT
- D.行纤维支气管镜检查
- E.经皮穿刺肺活检

88.患者，男，24岁，车祸后呼吸困难，CT检查如图，最可能的诊断是



- A.肺结核
- B.肺转移瘤
- C.肺挫伤
- D.肺撕裂伤
- E.尘肺

89.患者，男，17岁，检查发现心脏杂音4年，活动时心慌、气促3年。血压130/20mmHg，主动脉瓣区舒张期杂音，心脏正位片如图所示，该患者最可能的诊断是



- A.二尖瓣狭窄
- B.主动脉瓣狭窄
- C.二尖瓣关闭不全
- D.主动脉瓣关闭不全
- E.三尖瓣关闭不全

90.患者，男，27岁。左胸腋前被砸伤半小时，疼痛，不敢咳嗽。挤压前后胸部，伤处疼痛加重。首先考虑的诊断是

- A.胸壁软组织挫伤
- B.损伤性液气胸
- C.肋骨骨折
- D.肺挫裂伤
- E.肋间神经损伤

题型：B1

(91~93共用备选答案)

共用备选答案

- A.纵隔扑动，引起体内缺氧和二氧化碳滞留
- B.静脉压升高，心搏微弱
- C.头颈皮肤及眼结合膜出血斑点
- D.吐泡沫痰
- E.颈部皮下气肿

91.外伤性血心包可有

92.多根多处肋骨骨折可有

93.外伤性气胸可有

(94~95共用备选答案)

共用备选答案

- A.室间隔缺损
- B.动脉导管未闭
- C.房间隔缺损
- D.肺动脉口狭窄
- E.法洛四联症

94.患儿5岁，胸骨左缘第2肋间听到2/6级收缩期吹风样杂音， P_2 亢进，固定分裂，最可能的诊断是

95.患儿5岁，胸骨左缘第2肋间可触及收缩期震颤，听诊该部位有4/6级收缩期吹风样杂音， P_2 减弱，最可能的诊断是

(96~100共用备选答案)

共用备选答案

- A.胸骨左缘第2肋间2~3级收缩期杂音， P_2 亢进，固定分裂
- B.胸骨左缘第2~3肋间连续性机器样杂音，外周血管征阳性
- C.心尖区舒张中晚期隆隆样杂音，第一心音亢进， P_2 亢进
- D.胸骨左缘第3肋间闻及舒张早中期叹息样杂音，周围血管征阳性
- E.胸骨左缘第3肋间4级喷射样收缩期杂音， P_2 减弱

96.肺动脉口狭窄的听诊特点是

97.房间隔缺损的听诊特点是

98.二尖瓣狭窄的听诊特点是

99.主动脉瓣关闭不全的听诊特点是

100.动脉导管未闭的听诊特点是

答案：

题型：A1

1.D	2.D	3.B	4.D	5.D	6.D	7.B	8.B	9.D	10.B
11.C	12.D	13.E	14.A	15.D	16.C	17.A	18.D	19.A	20.B
21.D	22.C	23.C	24.C	25.B	26.D	27.B	28.E	29.E	30.E
31.E	32.A	33.D	34.D	35.B	36.E	37.B	38.C	39.D	40.E
41.B	42.A	43.D	44.E	45.E	46.A	47.A	48.C	49.E	50.C
51.C	52.D	53.B	54.E	55.A	56.C	57.E	58.E	59.C	60.B
61.E	62.C	63.B	64.A	65.E	66.A	67.D	68.A	69.E	70.C

题型：A2

71.D	72.C	73.B	74.B	75.E	76.C	77.C	78.C	79.B	80.E
81.C	82.D	83.D	84.D	85.B	86.B	87.D	88.C	89.D	90.C

题型：B1

91.B	92.A	93.E	94.C	95.D	96.E	97.A	98.C	99.D	100.B
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------