

泌尿外科A

题型：A1

1.5岁以内小儿肾盂容量约为

- A.1ml
- B.5ml
- C.10ml
- D.15ml
- E.20ml

2.急性肾盂肾炎时作逆行肾盂造影的目的是

- A.除外梗阻是最重要的
- B.是不必要的
- C.可显示疾病所特有的异常
- D.因输尿管水肿而不能进行
- E.用于局部治疗是有用的

3.下尿路感染，下述哪项是**错误**的

- A.尿频，尿急，尿痛
- B.无明显发热
- C.无明显腰疼
- D.尿中有蛋白管型
- E.尿中有多量WBC少量RBC

4.不在男性直肠与膀胱之间的结构是

- A.输精管壶腹
- B.精囊
- C.前列腺
- D.输尿管
- E.耻骨前列腺韧带

5.有一住院患者，在检查身体时做B超偶然发现右肾有一低回声区，做CT怀疑为小肾癌，为进一步确诊以下哪项检查最有意义

- A.尿细胞学检查
- B.经静脉肾盂造影
- C.肾动脉造影
- D.逆行性肾盂造影
- E.肾图

6.隐睾症最宜手术的年龄是

- A.2岁以前
- B.3~6岁
- C.7~9岁

D.10~13岁

E.14岁以后

7.球部尿道损伤尿外渗部位

A.膀胱周围

B.会阴浅袋

C.会阴深袋

D.阴茎部

E.阴囊部

8.治疗泌尿系感染的目的是

A.消除症状

B.预防复发

C.达到尿液无菌

D.保持尿流通畅

E.缓解精神压力

9.有关隐睾的并发症，下列哪项是罕见的

A.造成不育

B.隐睾恶变

C.睾丸扭转

D.造成两性畸形

E.造成心理不良影响

10.有膀胱刺激症状并向尿道和阴茎头放射性痛，应考虑

A.肾盂结石

B.肾盏结石

C.输尿管上段结石

D.输尿管末段结石

E.输尿管中段结石

11.下列需行肾切除（对侧肾正常）的是

A.肾下极碎裂伤

B.肾上极碎裂伤

C.肾全层裂伤

D.肾严重碎裂伤或肾血管撕裂

E.肾挫伤

12.先天性尿道下裂的手术矫正时机为

A.6个月以内


B.6~18个月

C.1岁以内

D.2岁以内

E.1~2岁

13.不属于睾丸内结构的是



- A. 睾丸小隔
- B. 睾丸网
- C. 精曲小管
- D. 输精管
- E. 精直小管

14.患者，男，每日可产生（）个以上的精子

- A. 10^8
- B. 10^6
- C. 10^7
- D. 10^5
- E. 10^4

15.有助于区别腹膜外膀胱破裂和后尿道断裂的是前者有

- A. 休克
- B. 导尿管易插入膀胱，造影时造影剂漏至膀胱外盆腔内
- C. 排尿困难
- D. 尿道口流出少量血性尿液
- E. 骨盆骨折

16.肾绞痛的特点是

- A. 持续性的胀痛
- B. 突发性剧烈绞痛并沿输尿管向下腹部放射

- C.无其他任何并发症
- D.泌尿系结核典型的临床表现
- E.疼痛持续时间长，不易缓解

17.对怀疑肾癌者，下列检查使诊断最准确的是

- A.IVP
- B.逆行性肾盂造影
- C.同位素肾扫描
- D.CT检查
- E.尿细胞学检查

18.下列哪项**不是**泌尿系结核最常见的临床表现

- A.无痛性血尿
- B.口服头孢后尿路刺激症状明显好转
- C.脓血尿
- D.持续性腰部疼痛
- E.肾区包块


19.肾结核的手术治疗原则，哪项**不正确**

- A.无泌尿生殖系统以外的活动性结核病灶
- B.术前使用足量的抗结核药物
- C.术中尽量保存正常的肾组织
- D.有附睾结核存在，不切除病肾
- E.术后使用足量的抗结核药物

20.在我国泌尿生殖系统肿瘤最常见的是

- A.肾癌
- B.肾盂癌
- C.前列腺癌
- D.膀胱癌
- E.阴茎癌

21.诊断肾积水首先应做的检查是



- A.KUB
- B.IVU
- C.KUB+IVP
- D.逆行造影
- E.B超

22.能用于常规体检，且能发现早期肾癌的检查手段是

- A.排泄性尿路造影
- B.逆行性尿路造影
- C.B超检查
- D.CT检查
- E.MRI检查

23.婴幼儿最常见的肿瘤是

- A.肾肿瘤
- B.肾盂肿瘤
- C.肾母细胞瘤
- D.肾血管瘤
- E.肾上腺瘤

- 24.关于输尿管的说法, 不正确的是
- A.止于膀胱外上角
 - B.跨闭孔动脉、神经的内侧
 - C.沿盆侧壁向后下走行
 - D.女性子宫动脉跨越其前上方
 - E.男性输精管由外向内侧跨越其前上方
- 25.闭合性膀胱损伤的前提条件是
- A.暴力太大
 - B.暴力正对准下腹部
 - C.膀胱胀尿
 - D.腹肌薄弱
 - E.妊娠子宫压迫膀胱
- 26.关于慢性附睾炎, 下列哪项是**错误**的
- A.常由于急性附睾炎未彻底治疗演变而成
 - B.均需作附睾切除治疗
 - C.精索和输精管均匀增粗
 - D.两侧附睾同时感染, 可影响生育
 - E.附睾呈不同程度增厚及肿大
- 27.不作为诊断尿路结石常用的检查方法是
- A.泌尿系超声检查
 - B.KUB
 - C.泌尿系平扫CTU
 - D.泌尿系增强CTU
 - E.静脉尿路造影
- 28.勃起功能障碍 (ED), 病程至少应在 () 以上, 方能诊断
- A.1个月
 - B.3个月
 - C.6个月
 - D.12个月
 - E.24个月
- 29.闭合性肾损伤, 非手术疗法须卧床
- A.至休克纠正后
 - B.至少2~4周
 - C.至血尿转清
 - D.2~3天
 - E.至腹部肿块不再增大
- 30.属于肾皮质的结构是
- A.肾盂

- B.肾盏
- C.肾柱
- D.肾乳头
- E.肾锥体

31.膀胱肿瘤患者预后的决定因素是

- A.血尿的程度
- B.肿瘤的大小和数量
- C.肿瘤生长的部位
- D.治疗方法
- E.肿瘤浸润的深度及细胞的分化程度



32.为了解肾损伤的部位、程度，下列检查不适宜的是

- A.排泄性尿路造影
- B.双肾CT
- C.逆行肾盂造影
- D.肾动脉造影
- E.肾脏B超

33.有关睾丸活检，不正确的是

- A.有一定的损伤性
- B.活检标本用甲醛液固定
- C.双侧小睾丸（容积小于10ml）者不必再作活检
- D.利用睾丸活检的超微结构特点探索男子抗生育机理
- E.主要适用于睾丸体积和血清FSH水平正常的不明原因的无精子症

34.可初步诊断泌尿系统感染的简易检查是

- A.前列腺液
- B.尿常规
- C.排泄性尿路造影
- D.中段尿培养
- E.X线腹部平片

35.区别原发性与继发性精索静脉曲张，主要依据

- A.阴囊坠胀感程度
 - B.阴囊隐痛程度
 - C.静脉扩张程度
 - D.睾丸生精功能
 - E.平卧位后，曲张静脉是否消失
- 36.有关嗜铬细胞瘤的表现正确的是
- A.低血压、高血糖、高代谢
 - B.高血压、低血压、心肌改变
 - C.高血压、低血糖、高代谢
 - D.高血压、低血糖、低代谢
 - E.低血压、低血糖、低代谢
- 37.尿液细菌学检查，采集尿液的最常用方法是
- A.初段尿
 - B.中段尿
 - C.终末尿
 - D.导尿
 - E.膀胱穿刺抽尿
- 38.有关双肾积水，一侧积水严重、一侧较轻的治疗，下列哪项正确
- A.可先治疗严重的一侧
 - B.先治疗较轻的一侧
 - C.双侧积水同时手术治疗
 - D.不需手术治疗，定期观察
 - E.口服中药治疗
- 39.以下哪项不属于尿路感染的治疗原则
- A.明确感染的性质
 - B.鉴别上尿路感染还是下尿路感染
 - C.明确血行感染还是上行感染
 - D.查明泌尿系有无梗阻因素
 - E.避免密切接触
- 40.关于下尿路感染，下述说法**错误**的是
- A.尿中有蛋白管型
 - B.无明显发热
 - C.腰部无明显压痛
 - D.尿频，尿急，尿痛
 - E.尿中有多量白细胞、少量红细胞
- 41.肾和输尿管结石最主要的诊断的首选方法是
- A.临床表现与实验室检查
 - B.泌尿系平片及静脉尿路造影

- C.泌尿系B超检查
- D.膀胱镜检查加逆行尿路造影
- E.泌尿系CT检查

42.关于马蹄形肾，下列说法哪项是不正确的

- A.约95%的马蹄形肾是在肾下极相连
- B.患肾大多旋转不良，肾血管多变异
- C.患肾峡部一般有肾实质组织，有单独的血供
- D.可伴有腹痛、腰痛以及消化道症状
- E.确诊后应积极行手术治疗

43.考虑尿石症时，确诊应做的检查是

- A.肾图
- B.CT
- C.肾功能
- D.KUB+IVP
- E.尿细菌培养+药敏

44.肾损伤中采取非手术治疗能治愈

- A.只限于肾挫伤
- B.肾全层裂伤
- C.大多数肾损伤
- D.肾蒂损伤
- E.肾损伤并腹腔脏器损伤

45.属于5 α 还原酶抑制剂的是

- A.他达拉非
- B.阿夫唑嗪
- C.西地那非
- D.坦索罗辛
- E.非那雄胺

46.确定肾结核病变的部位、范围及程度，最好采用

- A.超声波检查
- B.同位素检查
- C.IVP或逆行造影
- D.腹膜后注气造影
- E.肾动脉造影

47.成熟的精子存储在男性哪个生殖性腺

- A.睾丸
- B.精囊
- C.附睾
- D.前列腺

E.射精管

48.尿路梗阻时，对肾组织有害的是

- A.肾盂淋巴回流
- B.肾盂静脉回流
- C.肾盂肾窦回流
- D.膀胱输尿管回流
- E.肾盂肾小管回流

49.以下哪项**不是**急性肾盂肾炎的诊断要点

- A.腰痛、高热，膀胱刺激症状
- B.尿液检查有白细胞、红细胞、管型
- C.尿细菌培养每毫升尿有菌落 10^5 以上
- D.血白细胞计数升高，中性粒细胞增多明显
- E.恶心呕吐

50.原醛症一般**没有**

- A.夜尿增多
- B.周期性瘫痪
- C.高血压
- D.高血钾
- E.头痛、疲乏、视力模糊

51.下列哪项**不是**肾损伤手术治疗的指征

- A.抗休克治疗后血压不能回升或升而复降
- B.肾血管损伤
- C.腰部疼痛明显伴有镜下血尿
- D.开放性肾损伤或伴有腹腔内其他脏器损伤
- E.尿路造影提示有较大范围肾实质破裂


52.肾癌出现血尿时，表明肿瘤已发展到

- A.穿入肾盂肾盏
- B.血行转移
- C.穿破肾包膜
- D.已有癌细胞种植于膀胱
- E.淋巴转移

53.不利于上尿路结石形成的因素是

- A.饮食结构中肉类过多
- B.长期卧床不起
- C.饮食结构中纤维素过少
- D.尿中枸橼酸增多
- E.肾小管酸中毒

54. 良性前列腺增生需与前列腺癌鉴别时，可进行的检查是



- A. 发病年龄、排尿困难程度
- B. 残余尿量
- C. 有无血尿
- D. 前列腺特异性抗原
- E. 膀胱造影

55. 下列哪项是前列腺增生的手术指征

- A. 前列腺体积大于40ml
- B. 膀胱残余尿30ml
- C. 最大尿流率16ml/s
- D. 尿动力提示膀胱逼尿肌功能减退
- E. 反复血尿，5 α 还原酶抑制剂治疗无效

56. 原醛症的钾代谢异常是

- A. 高血钾
- B. 尿钾排出增加
- C. 摄入减少
- D. 低尿钾

E.血钾正常

57.关于精液培养菌落数正常值，下列正确的是

- A.菌落数 $<10/\text{ml}$
- B.菌落数 $<100/\text{ml}$
- C.菌落数 $<10^3/\text{ml}$
- D.菌落数 $<10^4/\text{ml}$
- E.菌落数 $<10^5/\text{ml}$

58.下列**不是**急性尿潴留动力性梗阻原因的是

- A.应用阿托品后
- B.尿道扩张术后
- C.中枢神经损伤
- D.肛管直肠术后
- E.高热患者

59.关于肾周围炎，下列哪项是罕见的

- A.畏寒、发热
- B.腰痛
- C.髋关节屈曲不能伸展
- D.X线平片可见脊柱向病侧弯曲
- E.尿内多量红细胞

60.关于多囊肾的病因及病理，下列**错误**的是

- A.是一种遗传性疾病，有家庭史
- B.其外观特征是肾布满大小不等含有浅黄色液体的囊肿
- C.肾上管与集合管间连接不良，尿液排出受阻，形成肾小管潴留性囊肿
- D.常伴有肝、脾和胰腺囊肿
- E.常染色体隐性多囊肾多见，常于40岁左右出现症状

61.急性细菌性膀胱炎**不应**立即施行的检查有

- A.尿常规检查
- B.尿道扩张
- C.中段尿培养
- D.细菌菌落计数
- E.药物敏感试验

62.下列哪类患者**不易**通过上行感染的方式导致泌尿道炎症

- A.妇女新婚期
- B.妊娠期
- C.婴幼儿
- D.尿路梗阻的患者
- E.年轻男性


63.患者，男，充盈性尿失禁的常见原因

- A.前列腺增生
- B.下尿路感染
- C.直肠脱垂
- D.利尿剂的药物
- E.输尿管结石

64.有关膀胱憩室内结石的治疗，最恰当的是

- A.经膀胱机械碎石
- B.中草药排石
- C.经尿道液电碎石
- D.耻骨上膀胱切开取石
- E.体外冲击波碎石

65.肾可分为



- A.上段、上前段、下段、后段、尖段
- B.上前段、下段、下前段、后段
- C.上段、下段、下前段、后段
- D.上段、上前段、下前段、后段
- E.上段、上前段、下段、下前段、后段

66.哪种结石易在碱性尿中形成

- A.尿酸结石
- B.磷酸盐结石
- C.草酸盐结石
- D.胱氨酸结石
- E.黄嘌呤结石

67.以下哪项疾病不会通过血行感染导致泌尿系感染

- A.疖痈
- B.中耳炎
- C.扁桃体炎
- D.龋齿
- E.接触性皮炎

68.球部尿道损伤后，最具特征性的症状是

- A.初始血尿
- B.终末血尿
- C.全程血尿
- D.尿道溢血
- E.会阴部肿痛

69.原发性醛固酮增多症患者出现肌无力的原因是

- A.持续性高血压
- B.血钠潴留过多
- C.持久尿量过多
- D.尿钾排出增多
- E.血钾浓度降低

70.泌尿系最常用的辅助检查为

- A.IVP
- B.CT
- C.KUB
- D.B超
- E.MRI

71.关于肾损伤时出现血尿，下列哪项是错误的

- A.肾损伤患者大多有血尿
- B.血尿与损伤程度一致
- C.肾挫伤时可出现少量血尿
- D.严重肾裂伤一般呈大量肉眼血尿
- E.肾蒂血管断裂可以无血尿

72.最常用于了解肾功能的影像学诊断手段是

- A.B超检查
- B.排泄性尿路造影

- C.逆行肾盂造影
- D.DSA检查
- E.CT检查

73.急性肾盂肾炎的临床表现不包括

- A.发热
- B.腰痛
- C.膀胱刺激症状
- D.血尿
- E.血压升高

74.最常见的鞘膜积液是

- A.睾丸鞘膜积液
- B.交通性鞘膜积液
- C.精索鞘膜积液
- D.继发性鞘膜积液
- E.原发性鞘膜积液

75.测定膀胱残余尿量最准确的方法是用

- A.导尿法
- B.耻骨上穿刺法
- C.叩诊法
- D.超声波探测法
- E.排泄性尿路造影

76.导致尿路感染最常见的致病菌是

- A.金黄色葡萄球菌
- B.大肠埃希菌
- C.变形杆菌
- D.粪链球菌
- E.沙雷杆菌

77.精索静脉曲张伴精子异常的不育者，最佳治疗为


- A.补充维生素
- B.精索静脉高位结扎术
- C.中药治疗
- D.人工授精
- E.观察等待

78.关于急性细菌性膀胱炎的临床表现，**错误**的是

- A.一般全身症状不明显，体温正常或仅有低热
- B.在女性常与经期、性交有关
- C.男性患者如有慢性前列腺炎，可在性交或饮酒后诱发
- D.尿频、尿急、尿痛

E.常有充盈性尿失禁

79.精索内筋膜对应于腹壁的



- A. scarpa筋膜
- B.腹横筋膜
- C.腹横肌腱膜
- D.腹内斜肌腱膜
- E.腹外斜肌腱膜

80.输尿管结石最常见的停留部位是

- A.下段
- B.中段
- C.上段
- D.肾盂输尿管连接部
- E.输尿管与各血管交叉处

81.尿道球部损伤的最常见原因是

- A.尿道器械检查
- B.骑跨伤
- C.骨盆骨折

- D.锐器伤
- E.踢伤

82.前列腺炎急性炎症期禁忌的检查是

- A.直肠指诊检查
- B.尿常规
- C.尿道内器械检查
- D.尿三杯试验
- E.尿培养

83.引起输尿管梗阻最常见的病因为

- A.泌尿系感染
- B.输尿管肿瘤
- C.肾结核
- D.肾结石
- E.先天性狭窄

84.患者，女，25岁，结婚3个月，反复尿频、尿急、尿痛2个月，应诊断为

- A.急性肾盂肾炎
- B.肾结核
- C.尿道膀胱炎
- D.膀胱结石
- E.滴虫性阴道炎

85.关于急性细菌性膀胱炎的发病率女性明显高于男性的原因，下列**错误**的是

- A.尿道外口解剖畸形
- B.女性尿道短而直
- C.尿道口附近常有感染病灶
- D.感染常继发于尿结石
- E.性交时摩擦损伤

86.BPH的药物治疗**不含**

- A.抗雄激素类药物
- B. α 受体阻滞剂
- C. α 受体激动剂
- D. 5α 还原酶抑制剂
- E.植物类制剂

87.结石引起的肾绞痛，应首先采用

- A.手术取石
- B.中西医排石治疗
- C.解痉止痛
- D.给镇静药物
- E.给抗感染药物

88.肾损伤非手术治疗的要点，下列**错误**的是

- A.绝对卧床2~4周，监测生命体征，尿色、腰部肿块变化
- B.抗休克，维持体液代谢平衡
- C.应用止血药和抗生素，适当给予止痛和镇静药物
- D.血尿逐渐转清，嘱患者离床活动
- E.定期复查血、尿常规，B超和静脉尿路造影

89.为确定尿道损伤的病变类型，最好的检查方法是

- A.尿道镜检查
- B.尿道探子检查
- C.试插导尿管
- D.B超
- E.尿道造影

90.肾损伤下列哪种情况可有血尿

- A.肾挫裂伤
- B.肾血管断裂
- C.肾盂广泛撕裂
- D.输尿管断裂
- E.输尿管血管堵塞

91.鞘膜积液的特征是

- A.均质实质性肿块
- B.透光试验阳性
- C.透光试验阴性
- D.肿块胀痛可闻及肠鸣音
- E.平卧时肿块可消失

92.尿培养菌落计数超过 10^5 /ml，应为

- A.疑诊尿路感染
- B.泌尿系结核
- C.尿标本污染，应重复检查
- D.确诊泌尿系感染
- E.没有临床意义

93.骨盆骨折易并发

- A.精囊损伤
- B.阴茎海绵体损伤
- C.膀胱损伤
- D.后尿道损伤
- E.输尿管损伤

94.哪项**不是**泌尿系统梗阻后常见的并发症

- A.肾盂肾炎
- B.肾周围炎
- C.结石形成
- D.输尿管狭窄
- E.膀胱炎

95.良性前列腺增生症最常造成的尿失禁类型

- A.急迫性尿失禁
- B.压力性尿失禁
- C.真性尿失禁
- D.充盈性尿失禁
- E.精神性尿失禁

96.急性尿路感染时，中段尿培养阳性时，菌落计数应在

- A. $10^4/\text{ml}$
- B. $10^5/\text{ml}$
- C. $10^6/\text{ml}$
- D. $10^7/\text{ml}$
- E.培养出致病菌即可诊断

97.关于急性细菌性前列腺炎的叙述，**错误**的是

- A.大多由尿道上行感染所致，如经尿道器械操作
- B.血行感染来源于疖、痈、扁桃体、龋齿及呼吸道感染病灶
- C.可有急性膀胱炎、急性尿潴留及淋菌性后尿道炎的尿液逆流引起
- D.致病菌多为革兰阴性杆菌
- E.大部分患者演变为前列腺脓肿

98.透光试验阳性常见于

- A.精索静脉曲张
- B.睾丸肿瘤
- C.睾丸鞘膜积血
- D.睾丸鞘膜积液
- E.附睾炎

99.以下关于肾周围炎的叙述**错误**的是

- A.肾周围炎是肾周围组织的化脓性炎症
- B.致病菌以变形杆菌最多见
- C.多由肾痈、肾表面脓肿直接感染所致
- D.由于肾周组织脂肪丰富且疏松，感染易蔓延
- E.可并发腰大肌脓肿、脓胸

100.原醛症出现的代谢紊乱是


- A.高血钾
- B.低尿钾

- C.高血浆肾素
- D.尿钾排出增加
- E.血醛固酮水平降低

101.尿道炎时尿痛的特点是

- A.排尿开始时出现疼痛
- B.排尿终时尿痛加重
- C.常伴有尿线中断
- D.伴有耻骨上区疼痛
- E.伴有终末血尿

102.关于前列腺癌的确诊，下列最准确的是



前列腺癌

- A.经直肠B超
- B.MRI
- C.PSA
- D.穿刺活检
- E.CT

103.男性患者长期留置导尿管发生附睾炎，可能是因为

- A.血行感染
- B.输精管蔓延

- C.淋巴感染
- D.药物不敏感
- E.体质虚弱

104.确诊前列腺癌最可靠的方法是

- A.直肠指检
- B.穿刺活检
- C.MRI
- D.核素扫描
- E.CT

105.肾皮质多发性脓肿的致病菌多为

- A.大肠埃希菌
- B.变形杆菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.肺炎链球菌
- E.肺炎克雷白杆菌

106.膀胱癌血尿多是

- A.全程无痛血尿
- B.终末血尿
- C.起始血尿
- D.镜下血尿
- E.终末血尿伴尿频

107.骨盆骨折的患者疑有尿道断裂时，最方便的诊断方法是

- A.直肠指检
- B.骨盆X线平片
- C.尿道造影
- D.试探尿道
- E.尿道镜检查

108.膀胱分部是

- A.膀胱尖、膀胱体、膀胱颈
- B.膀胱尖、膀胱体、膀胱底
- C.膀胱体、膀胱底、膀胱颈
- D.膀胱尖、膀胱体、膀胱底、膀胱颈
- E.膀胱尖、膀胱体、膀胱底、膀胱三角

109.隐睾对人体构成的危险是

- A.造成不育
- B.睾丸萎缩
- C.睾丸恶变
- D.睾丸炎

E.睾丸鞘膜积液

110.肾结核患者最多见的症状是

- A.血尿
- B.尿频、尿痛
- C.脓尿
- D.肾区疼痛和肿块
- E.尿失禁

111.对先天性肾盂输尿管交界处狭窄最具确诊意义的检查是

- A.核素肾图
- B.肾动脉造影
- C.IVP或逆行造影
- D.B超
- E.皮肾穿刺造影

112.残余尿量最好的测量方法是

- A.B超测量
- B.导尿
- C.酚红实验
- D.IVU
- E.膀胱镜

113.关于淋菌性尿道炎的诊断要点，说法**错误**的是

- A.有典型的临床表现
- B.尿道分泌物涂片内找到成堆革兰阴性双球菌
- C.在慢性期，淋球菌潜伏于腺、窦及前列腺等处
- D.尿三杯试验以第三杯脓尿最明显
- E.有不洁性交史

114.关于腔静脉后输尿管，下列描述**错误**的是

- A.下腔静脉发育异常导致右侧输尿管上端位置异常
- B.多数患者在20岁左右开始出现症状
- C.本病多见于男性，约为女性的4倍
- D.可合并结石出现肾绞痛
- E.严重者可触及右上腹囊性肿块

115.输尿管上狭窄位于

- A.壁内部
- B.肾盂下5cm处
- C.与髂血管交叉处
- D.骨盆出口
- E.肾盂与输尿管移行处

116.治疗勃起功能障碍药物的选择性5型磷酸二酯酶抑制剂，与下列哪种药物不能合用，否则会发生严重低血压

- A.前列腺素
- B.硝酸酯类药物
- C. α 受体阻滞剂
- D.5-羟色胺
- E.血管紧张素转化酶抑制剂

117.肾母细胞瘤临床表现的特点是

- A.血尿
- B.腹痛
- C.腹部包块
- D.发热
- E.贫血

118.下尿路梗阻时，不正确的是

- A.膀胱逼尿肌代偿增生
- B.小梁小房形成
- C.真性憩室形成
- D.后期尿液反流到输尿管
- E.后期肾功能损害

119.关于肾下垂，下列**错误**的是

- A.多发生于瘦高体型的女性
- B.可引起肾绞痛
- C.一般需手术治疗
- D.排泄性尿路造影可诊断
- E.可引起高血压

120.关于淋菌性尿道炎，说法**不正确**的是

- A.由淋球菌引起的尿道感染，常累及泌尿、生殖系的黏膜
- B.淋球菌为革兰阴性的奈瑟双球菌
- C.人有易感性，发病后免疫力极低下，可再度感染
- D.主要由性接触直接传播
- E.男性患者淋菌性尿道炎较女性少见

121.关于非淋菌性尿道炎的诊断要点，说法**错误**的是

- A.典型的临床表现
- B.不洁性行为
- C.清晨排尿前取尿道分泌物做培养，培养出衣原体或支原体
- D.尿道分泌物涂片见到10~15个多核白细胞/HP，找到衣原体或支原体的包涵体
- E.不可能与淋菌性尿道炎并发

122.上尿路结石是指

- A.肾结石
- B.输尿管结石
- C.膀胱结石
- D.输尿管和膀胱结石
- E.肾和输尿管结石

123.确诊肾结核，下列哪项是**错误**的

- A.膀胱内见结核结节
- B.尿结核菌培养阳性
- C.尿中找到抗酸杆菌
- D.X线造影肾内见结核空洞
- E.动物接种阳性

124.肾结核的血尿最常表现为

- A.全程血尿
- B.间歇性无痛血尿
- C.起始血尿
- D.终末血尿
- E.镜下血尿

125.关于上尿路结石，下述哪项是**错误**的

- A.输尿管结石多位于下段输尿管
- B.绝大多数是单侧性
- C.感染性结石必须在碱性尿中形成
- D.结石位于输尿管口时，常伴有膀胱刺激症状
- E.当输尿管中段梗阻时，疼痛放射至同侧大腿内侧

126.泌尿系B超在泌尿系统结石诊断中的应用，下列说法**错误**的是

- A.可以发现2mm以上的尿路结石
- B.无法发现X线阴性结石
- C.可了解结石以上尿路扩张程度
- D.肾绞痛时可作为首选检查手段
- E.可间接了解肾实质和集合系统情况

127.多饮水**不会**

- A.有利于减少尿中晶体形成
- B.降低尿中行成结石的物质浓度
- C.有利于微小结石的排出
- D.促进已形成结石溶解
- E.减少尿中晶体沉积

128.不属于原发性醛固酮增多症特点的是

- A.低比重尿

- B.尿钾减少
- C.尿钾增多
- D.碱性尿
- E.血肾素水平降低

129.肾脏损伤最严重的类型是

- A.表浅肾皮质裂伤
- B.肾蒂血管损伤
- C.肾挫伤
- D.肾脏横断或下极碎裂伤
- E.肾实质深度裂伤

130.鉴别肾上腺皮质腺瘤与异位ACTH综合征最简便的实验室检查是

- A.血皮质醇测定
- B.尿17-羟、17-酮测定
- C.血ACTH测定
- D.小剂量地塞米松抑制试验
- E.大剂量地塞米松抑制试验

131.膀胱癌的恶性程度取决于

- A.血尿的程度
- B.肿瘤的大小和数目
- C.组织学等级
- D.浸润膀胱壁的深度
- E.患者的年龄

132.Addison病由于醛固酮缺乏可产生下述哪种情况

- A.低钠低钾血症
- B.高钠低钾血症
- C.高钠高钾血症
- D.低钾低钙血症
- E.低钠高钾血症

133.引起泌尿系感染最常见的细菌是

- A.金黄色葡萄球菌
- B.淋病奈瑟菌
- C.大肠埃希菌
- D.粪肠球菌
- E.白假丝酵母菌

134.下列不属于泌尿男性生殖系先天性疾病的是

- A.单纯性肾囊肿
- B.膀胱输尿管反流

- C.海绵肾
- D.尿道下裂
- E.肾盂输尿管连接处狭窄

135.肾上腺皮质肿瘤不会引起

- A.原醛症
- B.肥胖小孩伴小生殖器
- C.Cushing综合征
- D.对侧肾上腺肥大
- E.偶发低血糖症

136.肾蒂内的主要结构从上到下依次是

- A.肾静脉、肾动脉、肾盂
- B.肾盂、肾静脉、肾动脉
- C.肾动脉、肾盂、肾静脉
- D.肾静脉、肾盂、肾动脉
- E.肾动脉、肾静脉、肾盂

137.良性前列腺增生的起始部位是

- A.移行带
- B.外周带
- C.中央带
- D.全部前列腺组织
- E.前列腺外科包膜

138.泌尿系感染最常见的病原菌是

- A.革兰阳性球菌
- B.革兰阴性杆菌
- C.革兰阴性球菌
- D.革兰阳性杆菌
- E.真菌

139.输尿管最狭窄处直径是

- A.0.2~0.3cm
- B.0.3~0.4cm
- C.0.4~0.5cm
- D.0.5~0.6cm
- E.0.7~0.8cm

140.经影像学检查未发现睾丸，最可能的诊断是

- A.睾丸缺如
- B.高位隐睾
- C.睾丸萎缩
- D.设备误差

E.睾丸坏死

141.KUB上阴性的结石是

- A.草酸钙结石
- B.磷酸镁铵结石
- C.尿酸结石
- D.胱氨酸结石
- E.磷酸钙结石

142.隐睾患儿行睾丸下降固定术最佳时间是

- A.6个月以内
- B.12个月以内
- C.6~12个月
- D.12~24个月
- E.2岁以后

143.下列疾病中不会引起尿流中断的是

- A.膀胱结石
- B.膀胱憩室
- C.膀胱肿瘤
- D.膀胱异物
- E.输尿管囊肿

144.关于男性性功能症状的描述，下列哪项是不正确的

- A.阴茎勃起不坚或不能勃起而不能性交者称为阳痿
- B.性交时阴茎尚未插入阴道即射精者称为早泄
- C.阳痿、早泄大多数为功能性
- D.精液中含有血液为血精
- E.输精管结扎手术者术后不会发生性功能障碍

145.关于嗜铬细胞瘤，错误的是

- A.除高血压外，产生多汗、代谢亢进
- B.只产生去甲肾上腺素，从不产生肾上腺素
- C.产生类似于原发性高血压的高血压症
- D.通过苄胺唑啉实验，大多数病理可以确定诊断
- E.与其他麻醉剂相比，用环丙烷或氯乙烷手术危险性大大增加

146.一住院患者CT检查怀疑为早期肾癌，进一步做以下哪项检查对确诊最有帮助

- A.尿瘤细胞检查
- B.经静脉肾盂造影
- C.肾动脉造影
- D.肾图
- E.逆行性肾盂造影

147.外伤性尿道狭窄早期的最佳治疗是

- A.服用抗生素
- B.定期尿道扩张
- C.理疗
- D.经尿道冷刀切开
- E.尿道吻合术

148.肾结核多见的感染途径是

- A.血行感染
- B.上行感染
- C.淋巴感染
- D.直接扩散
- E.接触感染

149.经两次成熟分裂后，生成4个精子的细胞是

- A.精原细胞
- B.初级精母细胞
- C.次级精母细胞
- D.精子细胞
- E.精子

150.肾损伤密切观察过程中哪项**不应**手术治疗

- A.抗休克治疗不好转
- B.观察过程中发现有合并脏器损伤
- C.血尿愈来愈加重
- D.血尿仍存在，但血压在上升
- E.腹部包块愈来愈大

151.可行体外震波碎石的是

- A.结石远端尿路梗阻
- B.安置心脏起搏器者
- C.血肌酐超过 $265\mu\text{mol/L}$
- D.肾结石
- E.育龄妇女输尿管下段结石

152.下列哪种肾损伤**不需**早期立即手术

- A.肾碎裂伤
- B.肾横断伤
- C.肾挫裂伤
- D.肾蒂损伤
- E.肾盂撕裂伤

153.诊断多囊肾首选的辅助检查是

- A.CT平扫

- B.增强CT
- C.超声检查
- D.MRI
- E.静脉肾盂造影

154.肾损伤同时有休克，为预防ARF应

- A.尽早使用抗菌药物
- B.尽早使用利尿剂
- C.及时清除尿路中血块
- D.尽早补充血容量
- E.尽早使用止血剂

155.上尿路结石的主要临床表现是

- A.无痛性血尿
- B.镜下血尿
- C.肉眼血尿
- D.肾绞痛
- E.与活动有关的血尿和疼痛

156.阴茎癌的主要淋巴转移部位是

- A.腹股沟淋巴结
- B.盆腔淋巴结
- C.腹主动脉旁淋巴结
- D.会阴部淋巴结
- E.髂血管旁淋巴结

157.关于输尿管结石的临床表现，错误的是

- A.膀胱刺激症状
- B.急性尿潴留
- C.肾绞痛
- D.与活动有关的血尿
- E.恶心、呕吐

158.尿石症时做排泄性尿路造影，最主要了解

- A.结石的大小
- B.结石的成分
- C.形成结石的全身原因
- D.肾脏感染的情况
- E.肾脏结构改变，肾功能情况

159.膀胱癌的危险因素应除外以下哪项

- A.长期接触联苯胺等致癌物质
- B.吸烟
- C.肥胖

- D.膀胱慢性炎症
- E.长期膀胱结石刺激

160.哪种肾肿瘤应做肾、全输尿管、膀胱部分切除

- A.肾癌
- B.肾盂癌
- C.肾错构瘤
- D.肾胚胎瘤
- E.肾肉瘤

161.膀胱结石的诊断，下列最可靠的是

- A.超声检查
- B.腹部平片
- C.尿流中断史
- D.直肠指检
- E.膀胱镜检查

162.肾脏损伤出现明显血尿，最常发生于

- A.输尿管断裂
- B.肾实质深度裂伤，破入肾盏、肾盂
- C.肾盂广泛断裂
- D.输尿管被血凝块堵塞
- E.肾血管严重损伤

163.膀胱刺激症状不包括

- A.恶心呕吐
- B.尿频
- C.尿急
- D.尿痛
- E.血尿

164.上尿路结石形成的相关因素不包括

- A.反复尿路感染
- B.饮食中纤维素过少
- C.长期卧床
- D.饮食中脂肪含量过高
- E.大量饮水

165.肾母细胞瘤区别于泌尿系其他肿瘤的要点是

- A.虚弱婴幼儿腹部有巨大包块
- B.有血尿、尿频、尿痛
- C.常早期转移至颅骨和肝
- D.血中肾素活性升高
- E.血中EPO升高

166.为预防结石复发，需碱化尿液的结石类型是

- A.草酸钙结石
- B.尿酸结石
- C.碳酸钙结石
- D.黄嘌呤结石
- E.混合结石

167.前列腺增生梗阻症状主要决定于

- A.前列腺增生的部位
- B.前列腺体积大小
- C.患者年龄
- D.前列腺硬度
- E.有无并发癌

168.初始血尿提示病变部位多在

- A.输尿管上段
- B.后尿道及膀胱顶部
- C.尿道及膀胱颈部
- D.肾脏
- E.输尿管下段

169.以下不属于慢性细菌性前列腺炎诱发病因的有

- A.性生活无规律
- B.饮水量少
- C.勃起而不射精
- D.过量饮酒及辛辣食物
- E.长途骑车，长时间坐位工作

170.膀胱癌浸润至膀胱肌层，其分期**不可能**是

- A.T1
- B.T2
- C.T3
- D.T4
- E.T5

171.第12肋斜过

- A.左肾后面上部
- B.右肾后面中部
- C.右肾后面下部
- D.右肾后面上部
- E.左肾后面下部

172.ESWL的适应证是

- A.妊娠

- B.急性尿路感染
- C.输尿管上段结石
- D.出血性疾病
- E.严重心脑血管疾病

173.肾盂肾炎最常见的感染途径是

- A.上行感染
- B.血行感染
- C.淋巴道感染
- D.外伤直接感染
- E.肾周围器官感染蔓延

174.有关前列腺增生，正确的是

- A.残余尿量与梗阻程度呈正比
- B.男性老年患者如无排尿困难即可排除前列腺增生
- C.根据前列腺大小，即可判断梗阻程度
- D.凡前列腺增生者，直肠指诊都可以触及增大的前列腺
- E.都需要手术治疗

175.血尿最多见的原因是

- A.泌尿系感染
- B.肿瘤
- C.结核
- D.损伤
- E.泌尿生殖畸形

176.关于重复肾盂、输尿管畸形，下列说法**错误**的是

- A.指一个肾有两套肾盂和输尿管
- B.大多发生于一侧，也见于两侧
- C.两套肾盂和输尿管各自有单独的包膜
- D.重复输尿管可开口于膀胱以外的器官
- E.无症状的重复肾患者无需特殊治疗

177.避孕套（阴茎套）避孕方法具有的优点，下列**不正确**的是

- A.方法简便
- B.适用于轻度早泄者
- C.可预防性传播性疾病
- D.女性对配偶精液过敏者
- E.若正确而持续使用，第1年意外妊娠率为0

178.右肾下盏结石直径1.5cm，左输尿管中段结石直径1.2cm，选择治疗时应优先考虑的是

- A.右肾下极切除取石
- B.右肾盂切开取石
- C.左输尿管切开取石

- D.左输尿管震波碎石（ESWL）
- E.右肾震波碎石

179.骨盆骨折合并尿道损伤时，易损伤尿道的

- A.前列腺部
- B.膜部
- C.尿道外口
- D.球部
- E.尿道内口

180.下面哪种畸形属于遗传性疾病

- A.马蹄肾
- B.多囊肾
- C.隐睾
- D.尿道下裂
- E.包茎

181.关于成人型多囊肾，下列哪一项说法是**错误**的

- A.是一种常染色体隐性遗传病
- B.患者多在40岁开始出现症状
- C.肝囊肿是最常见的肾外表现
- D.症状主要包括高血压、肾衰竭，患者后期往往需要透析治疗
- E.超过半数患者将逐渐进展至肾衰竭

182.某青年长跑后发生腰部绞痛，继而出现肉眼血尿，最大可能是

- A.肾肿瘤
- B.输尿管肿瘤
- C.膀胱肿瘤
- D.上尿路结石
- E.下尿路结石

183.诊断肾肿块最好的检查方法是

- A.B超
- B.CT
- C.IVU
- D.腹平片
- E.肾图

184.以下哪项**不是**淋菌性尿道炎的传播途径

- A.性接触传播
- B.飞沫传播
- C.母婴传播
- D.带淋球菌的衣裤、毛巾和手的间接传播
- E.解除尿道分泌物传播

185.有关先天性肾盂输尿管交界处梗阻的原因，下列哪项是**错误**的

- A.先天性狭窄
- B.异位血管压迫
- C.纤维束压迫
- D.动力性梗阻
- E.输尿管息肉梗阻

186.关于精液中的白细胞计数正常值，下列正确的是

- A. $<0.1 \times 10^6/\text{ml}$
- B. $<0.5 \times 10^6/\text{ml}$
- C. $<1 \times 10^6/\text{ml}$
- D. $<2 \times 10^6/\text{ml}$
- E. $<3 \times 10^6/\text{ml}$

187.怀疑尿路结石，应做

- A.尿细菌培养+药敏
- B.肾功能检查
- C.CT检查
- D.KUB+IVP
- E.放射性核素肾图

188.确定尿石症治疗的方案是根据

- A.血尿轻重
- B.致病原因
- C.尿路梗阻或感染情况
- D.肾功能情况
- E.疼痛程度

189.鉴别腹膜内型和腹膜外型的膀胱破裂，最好的方法是



- A.膀胱造影
- B.排泄性尿路造影
- C.CT
- D.膀胱镜检查

E. B超

190. 关于阴茎癌的转移途径，下列不常见的是

- A. 常浸润尿道海绵体，影响排尿
- B. 经血行扩散，转移到肺
- C. 经血行扩散，转移到肝
- D. 经血行扩散，转移到骨
- E. 常经淋巴转移到腹股沟、髂淋巴结

191. 在泌尿生殖系统器官发育过程中完全退化的结构是

- A. 生肾组织
- B. 泄殖腔
- C. 前肾
- D. 中肾
- E. 后肾

192. 下列可能与输精管结扎术失败有关的主要因素是

- A. 血肿
- B. 精囊炎
- C. 输精管炎
- D. 先天性重复输精管被忽略
- E. 输精管痿

193. 最常见的肾盂肾炎病菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 粪肠球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 变形杆菌
- E. 白色念珠菌

194. 肾区的位置是

- A. 竖脊肌内缘与第11肋的夹角
- B. 竖脊肌外缘与第11肋的夹角
- C. 竖脊肌内缘与第12肋的夹角
- D. 竖脊肌外缘与第12肋的夹角
- E. 腰大肌外缘与第12肋的夹角


195. 易造成尿道球部损伤的原因是

- A. 骑跨伤
- B. 锐器伤
- C. 耻骨骨折
- D. 膀胱镜检
- E. 尿道探子扩张尿道

196.肾结核患者膀胱镜检查，可见下列哪项不正确

- A.充血水肿
- B.结核结节
- C.溃疡及瘢痕形成
- D.输尿管可呈洞穴状
- E.膀胱内可见乳头状肿物样改变

197.输精管壶腹是



- A.输精管在膀胱底处的膨大
- B.输精管在精索部的膨大
- C.输精管在睾丸部的膨大
- D.输精管在腹环处的膨大
- E.输精管在腹股沟部的膨大

198.关于肾脏损伤而无血尿的原因，下列错误的是

- A.合并输尿管断裂
- B.肾盂断裂
- C.贯通肾盏、肾盂的肾实质损伤
- D.肾蒂血管断裂

E.输尿管被血块阻塞

199.不属于肾造瘘术的适应证的是

- A.肾积脓，患者全身状况差
- B.输尿管梗阻，其他方式无法解除梗阻
- C.膀胱恶性肿瘤晚期，双侧输尿管堵塞
- D.肾结石经皮肾镜碎石取石术后需二次手术者
- E.急性肾盂肾炎

200.肾癌血尿最主要特点是

- A.镜下血尿
- B.终末血尿
- C.全程肉眼血尿，终末加重
- D.绞痛伴血尿
- E.无痛性，间歇性大量全程血尿

题型：A2

201.患者，男，31岁，主诉酒后发烧，并伴尿频、尿急、尿痛、排尿费力1天，无咽痛咳嗽，肛门内痔。体检一般情况好，T39.1℃，P108次/min，血WBC $21\times 10^9/L$ ，尿常规检查有少量WBC。为明确诊断，下列哪项体检是**错误**的

- A.双肾触诊及肾区叩击痛
- B.尿道口检查，了解有无分泌物
- C.阴囊检查，了解睾丸及附睾情况
- D.检查耻骨上区，了解有无尿潴留
- E.按摩前列腺，取前列腺液检查

202.患者，女，45岁，肢体软弱无力、夜尿多2年余，今晨起双下肢不能活动。查体：血压170/100mmHg，均匀性轻度肥胖，双下肢松弛性瘫痪，血钾2.4mmol/L。最可能的诊断为

- A.原发性高血压
- B.嗜铬细胞瘤
- C.肾性高血压
- D.原发性醛固酮增多症
- E.库欣病

203.患者，女，26岁，近一年来时有右下腹疼痛伴膀胱刺激症状。查体：腹软，右下腹深压痛，右腰部轻叩痛。尿常规：红细胞++/HP，白细胞+/HP。肾图检查：右侧呈梗阻型曲线。应考虑为

- A.慢性膀胱炎
- B.急性阑尾炎
- C.慢性附件炎
- D.急性肾盂肾炎
- E.右侧输尿管下段结石

204.患者，男，36岁，右侧腰痛，伴发热5天，最高达39.8℃，有轻度贫血，尿常规正常。下列情况中可能性最小的是

- A.血沉快
- B.白细胞高
- C.CT可能显示有占位病变
- D.可能与大肠杆菌感染有关
- E.可能与葡萄球菌感染有关

205.患者，男，67岁，无痛性肉眼血尿3个月，尿细胞学检查发现癌细胞。由此可以除外

- A.肾盂癌
- B.肾盂癌
- C.输尿管癌
- D.膀胱癌
- E.前列腺癌

206.患者，男，70岁。诊断为前列腺增生症，下列哪项不是手术治疗的指征

- A.非手术治疗无效
- B.反复出现急性尿潴留，及肉眼血尿
- C.反复泌尿系感染且合并膀胱结石
- D.慢性尿潴留合并肾功能损害
- E.排尿困难，且前列腺大小为5cm×5cm×6cm

207.患者，女，24岁，左侧腰酸胀1年余。B超示左肾积水明显，左肾区有一1cm×1.5cm大小的强回声，KUB+IVP左肾结石，左肾积水，左肾输尿管交界线显影较细小。诊断最应考虑

- A.肾盂输尿管连接部狭窄
- B.结石梗阻
- C.迷走血管压迫
- D.炎性狭窄
- E.肾盂输尿管连接部狭窄+继发结石

208.某男，69岁，排尿困难2年，饮酒后不能排尿6小时，下腹憋胀难忍。检查：耻骨上膨隆，叩诊呈实音。以下检查不是必要的是

- A.直肠指检
- B.腹部平片
- C.PSA
- D.前列腺B超
- E.尿流动力学

209.患者，男，65岁，间歇性全程无痛肉眼血尿4个月，伴血块。膀胱镜检查膀胱黏膜光滑，未见新生物，可见右输尿管口喷血。最可能的诊断是

- A.肾癌
- B.输尿管末端囊肿
- C.肾结石
- D.肾盂癌

E.输尿管狭窄

210.患者，男，65岁。尿频伴进行性排尿困难2年余，3小时前突然不能排尿，伴下腹部胀痛。查体：下腹部膨隆，叩诊浊音。处理首先应

- A.急诊手术
- B.留置导尿管
- C.口服雌激素
- D.口服酚苄明
- E.留观察室观察

211.患者，女，56岁。全程肉眼血尿1周来诊，膀胱镜见膀胱后壁1.1cm直径大小乳头状肿瘤，有蒂。尿细胞学检查：移行上皮癌Ⅰ～Ⅱ级。其最佳治疗方案是

- A.膀胱内灌注噻替嘧
- B.膀胱部分切除术
- C.经尿道膀胱肿瘤切除术
- D.膀胱全切除术
- E.膀胱切开肿瘤切除术


212.患儿，男，11岁，发现右腹部渐膨隆1年。查体：右中上腹部隆起，可扪及肿块巨大，有波动感。B超检查：右肾巨大积水，肾皮质菲薄。IVP：右肾不显影，左肾显影正常。逆行肾盂造影：右输尿管肾盂交界处狭窄。应考虑下列哪项治疗

- A.肾切除术
- B.肾造瘘术
- C.输尿管狭窄段切除+肾盂成形术
- D.输尿管造瘘术
- E.逆行输尿管肾盂插管引流

213.患者，女，40岁，以膀胱肿瘤于1周前行膀胱部分切除术，其预后主要决定于

- A.肿瘤的分化程度及浸润深度
- B.肿瘤的组织类型
- C.肿瘤的生长方式
- D.肿瘤的大小
- E.肿瘤的数目

214.患者，女，43岁，左侧腰部不适2年余，结合图像，最可能的诊断是



- A.左肾髓样脂肪瘤

- B.左肾盏憩室
- C.左肾囊肿
- D.左肾积水
- E.左肾错构瘤

215.患者，男，20岁，3小时前从6米高处跌下。腰疼、肉眼血尿，检查神清合作。Bp75/45mmHg（10/6kPa），P120次/min，左腰擦皮伤，局部稍隆，触痛（+），右上腹可触及包块，轻度肌紧张。B超：左肾周见3cm×3cm×2cm液性暗区，肝、脾被膜完整，腹腔穿刺阴性。最重要的处理应是

- A.抗生素应用
- B.止血药应用
- C.止痛药应用
- D.输血补液
- E.立即手术探查

216.一名30岁工人，从5米高处跌下后腰部着地，腰痛排血尿。检查BP 16/10kPa（120/75mmHg）心肺正常，右腰部饱满压痛，尿检查镜下RBC满视野、肾CT提示右肾实质裂伤。下列处理哪一项是不对的

- A.早期使用抗生素
- B.给予止血剂及镇痛药
- C.密切注意血压脉搏及尿色变化
- D.卧床休息至少1周
- E.积极补充血容量


217.患者，男，36岁。右肾疼痛3天。尿常规：红细胞充满/HP，白细胞2~3/HP。尿路平片可见右下段输尿管走行区高密度阴影0.6cm。IVU可见右输尿管下段结石，其上输尿管轻度扩张，右肾轻度积水。患者中西药物治疗和大量饮水及活动后绞痛解除，突然出现尿流中断及排尿终末痛，原因是

- A.急性前列腺炎
- B.结石在输尿管间壁段
- C.结石到膀胱
- D.结石到尿道
- E.尿道炎

218.患者，女，50岁，3次分娩史。半年来，咳嗽、下楼梯时常出现尿失禁症状。该患者尿失禁为

- A.真性尿失禁
- B.压力性尿失禁
- C.充盈性尿失禁
- D.急迫性尿失禁
- E.容量性尿失禁

219.患者，女，55岁，请根据所示图像，选择最可能诊断



- A.肾癌
- B.肾结石
- C.肾错构瘤
- D.肾盂癌
- E.单纯性肾囊肿

220.患者，男，31岁，结婚5年不育。查体：右侧阴囊下垂明显，右侧睾丸较左侧明显偏小，右侧精索可触及团状肿块，增加腹压后肿块增大，平卧后肿块缩小不明显。该患者诊断为

- A.右侧精索静脉曲张Ⅲ度
- B.右侧精索静脉曲张Ⅱ度
- C.右侧精索静脉曲张Ⅰ度
- D.右侧附睾炎
- E.右侧睾丸鞘膜积液

221.患者，男，35岁，左侧结核性脓肾，右侧肾积水，膀胱挛缩，BUN21mmol/L，Hb80g/L，最适宜的处理为

- A.左肾切除术

- B.抗结核药物治疗
- C.膀胱扩张术
- D.中药治疗
- E.抗结核治疗同时行右肾造瘘术

222.患者，男，30岁。不慎被车撞伤右腰部，伤后右腰疼痛，尿红色。首先要做的检查是

- A.IVP
- B.CT
- C.B超
- D.MRI
- E.尿常规

223.患者，女，61岁。6天前发现尿色发红，无膀胱刺激症状，无发热，无腰痛，体检未发现阳性体征。尿常规检查：红细胞10~20/HP。为明确诊断，下列处理最适宜的是

- A.口服抗生素并行KUB检查
- B.减少活动，1周后复查尿常规
- C.行双肾、输尿管、及膀胱的B超检查
- D.尿找结核菌
- E.腹部CT检查，了解泌尿系统情况

224.患者，男，39岁，反复发作阴茎包皮龟头炎1年余，不能自解小便1天。查体：膀胱胀大于脐下2指，阴茎包皮过长，包茎，包皮口针眼状。当前对该患者最合适的处理是

- A.包皮环切
- B.导尿
- C.包皮口切开
- D.前列腺切除
- E.膀胱造瘘

225.患者，男，46岁。高处坠落臀部着地2小时。查体：脉细弱，血压70/50mmHg。面色苍白，腹平软无压痛，左腰部膨隆，触痛明显，安置导尿管导出150ml淡黄色透明尿液。快速输血800ml病情无好转。最可能的诊断是

- A.脾破裂
- B.脾蒂损伤
- C.肾挫伤
- D.肾挫裂伤
- E.肾蒂损伤

226.患者，男，36岁。施工时不慎跌落，骑跨于水泥墙上。排尿困难3小时。首要的检查是

- A.导尿
- B.尿道探条检查
- C.尿道膀胱镜检查
- D.输尿管镜检查
- E.尿流动力学检查

227.患者，男，55岁，右侧腰、腹部偶尔不适1年余，CT影像如图所示，其最可能的诊断为



- A.右肾癌
- B.右肾囊肿
- C.右肾积水
- D.右肾盂旁囊肿
- E.右肾脓肿

228.患者，男，30岁。从高处跌下，左腰部着地，伤后腰痛并有肉眼全程血尿，有小血块。查体：P100次/min，BP110/70mmHg，左腰部青紫压痛，腹部无压痛反跳痛。可初步诊断为

- A.膀胱损伤
- B.输尿管损伤
- C.脾损伤并肾损伤
- D.肾损伤
- E.肾挫伤

229.患者，男，53岁，夜尿频1年，无尿潴留史。直肠指诊：前列腺略大，质韧，中央沟变浅。B超残余尿量10ml。适宜的治疗是

- A.前列腺摘除术
- B.前列腺尿道支架
- C.经尿道前列腺电切术
- D.应用 α 受体阻滞剂改善排尿症状
- E.膀胱造瘘术

230.一女性40岁，体检拍片发现右肾钙化，肾影较小，IVP造影右肾无功能，以下哪项病史与右肾病情关系最密切

- A.15年前被自行车撞击右腰部后休息1周
- B.反复膀胱炎2年
- C.6年前曾排出过泌尿结石数枚
- D.2年前曾因卵巢恶性肿瘤手术治疗
- E.5年前曾因甲状旁腺功能亢进手术治疗

231.患者，男，32岁。右肾绞痛后无尿1天，腹部平片可见双侧输尿管中部各有结石一枚，约1cm大小，左肾内还有鹿角形结石。急诊处理应先采用

- A.服中药排石
- B.中西医结合解痉排石
- C.膀胱镜下输尿管插管缓解肾功能引流尿液

- D.利尿药物应用
- E.立即手术输尿管切开取石

232.患者，女，25岁。尿频、尿急、尿痛3个月，一般抗炎治疗无效，目前每次尿量30ml。IVP：右肾未显影。为早期确诊，还应给予哪项检查

- A.尿沉渣查抗酸杆菌
- B.尿结核杆菌培养
- C.尿动物接种
- D.膀胱镜检查
- E.同位素肾图

233.患者，女，45岁。2天前突然起病，尿频，尿痛，伴有明显的肉眼血尿，排尿次数每日多达数十次，体温36.4℃。尿液镜检发现红细胞充满视野，且可见到较多的白细胞。中段尿细菌培养：菌落计数为15000/ml。最应该考虑为

- A.急性肾盂肾炎
- B.膀胱肿瘤
- C.急性膀胱炎
- D.疑为尿路结石
- E.尿液被污染

234.患者，女，40岁。尿频尿急尿痛症状明显，用抗生素后症状无明显改善。偶有脓尿，反复多次尿培养阴性，尿抗酸杆菌涂片（+）。考虑诊断为

- A.膀胱炎
- B.泌尿系结核
- C.泌尿系结石
- D.肾盂肾炎
- E.膀胱异物

235.患者，男，45岁。左侧输尿管内有一1.0cm×1.5cm的密度增高影，右肾盂内有大小分别为2.0cm×2.2cm、1.5cm×1.7cm的密度增高影。如果决定手术治疗，应先行

- A.左输尿管套石术
- B.左输尿管切开取石术
- C.右肾部分切除术
- D.右肾盂切开取石术
- E.右肾实质切开取石术

236.患者，男。10年前左肾因外伤被切除，近2～3年经常右腰痛，时伴发热。尿培养（-），B超发现右肾中度积水，尿路平片和排泄性造影提示右输尿管下段结石直径为1cm。血BUN 8mmol/L，Cr 105μmol/L。目前最妥当的处理是

- A.继续抗菌治疗
- B.手术摘除右输尿管结石
- C.右输尿管逆行插管引流肾盂尿
- D.中药排石治疗

E.右肾造瘘术

237.一男子用打气筒给自行车充气，不慎被反弹打气筒柄击伤会阴部，虽能排尿，但尿道口滴血。来急诊查体：膀胱区不胀，会阴部无血肿，对此患者最恰当的处置是

- A.留置导尿管并会阴部加压止血
- B.经会阴切开行尿道修补术
- C.膀胱造瘘+会阴加压止血
- D.注水试验判明情况后再做决定
- E.尿道造影判明情况后再做决定

238.患者，男，60岁，左侧阴囊肿大1年余，体检示阴囊肿大呈卵圆形，表面光滑无压痛，囊性感，睾丸触及不清，透光实验阳性。最可能的诊断是

- A.睾丸肿瘤
- B.附睾结核
- C.睾丸鞘膜积液
- D.腹股沟斜疝
- E.睾丸炎

239.患者，女，46岁，无痛性全程肉眼血尿，间断出现1年，一般状态较差，2个月前曾因心梗住过院。下列检查应首选

- A.静脉肾盂造影
- B.膀胱镜逆行造影
- C.输尿管镜
- D.B超
- E.肾图

240.患者，男，68岁。2年前开始出现尿频，夜间明显，随后出现排尿费力，逐渐加重。近半年来尿频明显，并有尿急，排尿痛，肉眼血尿，有时有尿流中断现象。应首先考虑为

- A.膀胱肿瘤
- B.尿道狭窄合并肾结核
- C.前列腺增生
- D.慢性细菌性膀胱炎合并膀胱结石
- E.前列腺增生合并膀胱结石

241.患者，男，50岁，3月前出现间歇性肉眼血尿，IVP见左肾盂内有不规则充盈缺损，膀胱镜检见左侧输尿管口喷血，应首先考虑

- A.肾肿瘤
- B.膀胱肿瘤
- C.肾囊肿
- D.肾盂肿瘤
- E.肾结石

242.患者，男，16岁，无诱因反复大量肉眼血尿，近半月低热。查体：右肾可触及，轻叩痛。KUB右肾影大，有亮状钙化影，IVP右肾上盏缺如，中盏有弧形压迹，中下盏会聚。血沉40mm/h，血RBC $8.30 \times 10^{12}/L$ 。最可能的诊断是

- A.肾癌
- B.肾盂癌
- C.肾结核
- D.输尿管肿瘤
- E.肾挫伤

243.患者，男，50岁。2个月来间歇性无痛性全程血尿，近3天来加重伴有血块。B型超声双肾正常，膀胱内有1.5cm×2.0cm×1.0cm新生物，有蒂。为明确诊断，最重要的检查是

- A.尿常规
- B.尿脱落细胞检查
- C.膀胱镜检
- D.静脉尿路造影
- E.CT


244.患者，男，60岁。体检前列腺体积增大，血PSA 45ng/ml。应首先采取的治疗方式为

- A.导尿治疗
- B.前列腺根治性切除术
- C.经直肠前列腺穿刺活检术
- D.双睾丸切除术
- E.内分泌治疗

245.患者，女，63岁，间歇无痛全程肉眼血尿1个月。查体：左肾下极可及，B超提示左肾占位病变，IVP肾盂肾盏受压，尿细胞学（-），膀胱镜检查可见左输尿管口喷血，最可能诊断的疾病是

- A.左肾癌
- B.左肾结石
- C.左肾盂肿瘤
- D.左肾母细胞瘤
- E.左肾囊肿

246.患者，男，56岁，腹部包块伴高血压。CT扫描如图所示，下列说法**错误**的是



- A.双肾体积明显增大
- B.双肾内可见多个大小不等的囊性病灶，呈蜂窝状改变

- C.肝内可见多个大小不等的囊性病灶
- D.考虑为多囊肾、多囊肝
- E.考虑为双肾多发单纯性囊肿

247.患者，男，50岁，反复出现肾绞痛3年，经常尿出小结石。来门诊请医生指导预防措施，问促进上尿路结石形成的因素，哪一项是无关的

- A.饮食结构中肉类过多
- B.长期卧床不起
- C.饮食结构中纤维素过少
- D.尿中枸橼酸增多
- E.肾小管酸中毒


248.患者，男，58岁，主诉近半年多来排尿费力，且症状逐渐加重，近1个月出现腰骶部疼痛。为明确诊断首选检查为

- A.膀胱镜检及活组织检查
- B.尿常规检查
- C.尿液检查癌细胞
- D.肛门指诊及穿刺活组织检查
- E.脊柱、骨盆CT检查

249.患者，女，46岁，右腰部外伤后疼痛伴肉眼血尿4小时。查体：血压150/75mmHg，脉搏100次/min，尿常规红细胞满视野。可能的诊断是

- A.肾盂广泛裂伤
- B.肾挫裂伤合并输尿管断裂
- C.肾挫裂伤
- D.肾被膜下损伤合并肾周血肿
- E.肾血管断裂

250.患者，男，75岁。右侧胸痛伴咯血3个月余，胸部CT提示右侧中央型肺癌，结合图像，作出的诊断



为

- A.右侧肾上腺囊肿
- B.右侧肾上腺转移瘤
- C.右侧肾上腺腺瘤
- D.右侧肾上腺癌
- E.右侧肾上腺嗜铬细胞瘤

251.患者，男，21岁。骑自行车摔伤右腰部，伤后腰部疼痛，无肉眼血尿。查体：右腰部叩击痛明显，血压85/50mmHg，心率115次/min。可能的诊断是

- A.轻度肾损伤
- B.肾蒂损伤
- C.中度肾损伤
- D.肾挫裂伤
- E.输尿管损伤


252.患者，男，23岁。发现肉眼血尿2天。每次排尿初始为血尿，以后尿液颜色逐渐转为正常，初步判断病变位于

- A.前尿道
- B.膀胱底部
- C.肾、输尿管
- D.膀胱颈及三角区
- E.前列腺部

253.患者，女，33岁，反复尿频、尿急及尿痛4年。尿检：大量红细胞及白细胞。IVP发现左肾下盏有破坏灶，形成空腔。可能的诊断为

- A.肾癌
- B.肾积水
- C.肾母细胞瘤
- D.肾结核
- E.肾盂肾炎

254.根据所示图像，最可能的诊断是



- A.左肾恶性肿瘤
- B.左肾盂恶性肿瘤
- C.左肾囊肿
- D.左肾盂旁囊肿
- E.左肾脓肿

255.患者，女，30岁，一般状态良好。尿中RBC 8~10/HP，WBC 0~1/HP，B超右肾区见0.8cm强光团，其后伴声影。下述哪一病史与此患最相关

- A.绞痛伴血尿
- B.尿频尿痛终末血尿
- C.无痛性全程肉眼血尿
- D.尿线中断伴血尿
- E.肾区包块时大时小

256.患者，女，24岁，尿频、尿急、尿痛5天，腰痛伴发热1天，最高体温39℃。查体：双肾区叩击痛(+)。血常规：WBC $13\times 10^9/L$ ，N85.6%。可能的诊断为

- A.急性膀胱炎
- B.急性肾小球肾炎
- C.慢性膀胱炎
- D.急性肾盂肾炎
- E.慢性肾盂肾炎

257.患者，男，25岁。诊断左肾结核，右输尿管结石，直径0.8cm。静脉肾盂造影：左肾未显示，右肾轻度积水，结石下输尿管显示正常。肾功检查正常。宜先行哪种治疗

- A.切除左肾
- B.引流右肾积水
- C.急行右输尿管切开取石
- D.抗结核治疗，等待结石自然排出
- E.抗结核治疗，输尿管结石体外震波碎石治疗

258.患者，男，26岁。尿频，尿道有异物感及排白色黏液伴阴部不适，早泄，失眠近1年。怀疑为慢性前列腺炎，应作哪项检查确诊

- A.尿常规
- B.前列腺液常规
- C.尿培养
- D.尿液涂片找细菌
- E.前列腺液培养

259.患者，男，35岁，尿频尿急尿痛1年。有米汤样尿，尿常规白细胞满视野，IVP左肾实质内有数个大小不等异常充盈区，肾盂充盈不佳，右肾盂肾盏显示有轻度积水。治疗方法是

- A.左肾部分切除
- B.左肾病灶清除术
- C.右肾造瘘术

- D.左肾切除术
- E.抗结核药物治疗

260.患者，男，34岁，右侧腰部剧痛1天，尿常规提示 RBC+++，B超提示右肾积水。肾积水最可能的原因

- A.右肾结核
- B.右输尿管结石
- C.右肾肿瘤
- D.右肾输尿管连接部狭窄
- E.右输尿管肿瘤

261.一患者，47岁，男性，高热，怀疑右肾周围炎，住院期间用了大量抗生素，因菌种失调，发生严重腹泻数日，并出现肢体无力，急性尿潴留。引起急性尿潴留的最可能原因是

- A.前列腺增生症
- B.腹泻
- C.右肾周围炎
- D.补充钙剂
- E.药物过敏

262.患者，男，21岁。骑自行车摔在右腰部，伤后腰部痛，无肉眼血尿。查体：血压、脉搏正常，右腰部无包块但有叩击痛。尿常规：红细胞充满/HP。诊断哪种损伤确切

- A.重度肾损伤
- B.肾挫伤
- C.中度肾损伤
- D.肾血管损伤
- E.输尿管损伤

263.患者，女，54岁。尿色发红1周，无膀胱刺激症状，无发热，无腰痛。不必要的措施是

- A.腹部CT
- B.尿找结核菌
- C.双肾、输尿管及膀胱B超检查
- D.减少活动，1周后复查尿常规
- E.口服抗生素并行KUB检查

264.患者，女，23岁，因反复肾绞痛住院，体检肾区明显叩痛，尿中有许多RBC，B超示双肾多发性结石，KUB（-），IVP示双肾轻度积水，血尿酸及尿尿酸均明显增高。患者尿酸增高的主要原因可能为

- A.吃含尿酸类食物过多
- B.长期尿路感染，尿PH升高
- C.体内嘌呤代谢异常
- D.甲状旁腺功能亢进
- E.可能由于某种药物引起

265.一30岁患者，半年来尿频、尿痛、尿血及脓尿，抗生素治疗效果不佳，尿普通细菌培养（一）。为明确诊断，最重要的检查方法是

- A.尿路平片
- B.B超
- C.CT
- D.排泄性或逆行性肾盂造影
- E.肾动脉造影

266.患者，男，33岁，无尿1天，1年来有过3次腰部阵发剧痛。为明确尿闭原因，可作为首选的检查是

- A.肾血管造影
- B.逆行性肾盂造影
- C.双肾CT
- D.IVP
- E.泌尿系超声检查

267.患者，女，38岁。间歇性四肢乏力3年，测血压165/90mmHg，血钾3mmol/L，血浆肾素水平明显降低，可能是

- A.嗜铬细胞瘤
- B.原发性醛固酮增多症
- C.原发性高血压
- D.肾小球肾炎
- E.肾盂肾炎

268.患者一侧肾结核，对侧肾积水，挛缩膀胱。入院前2天尿量开始减少，每天为400ml，肾积水侧腰部胀痛，血BUN、Cr轻度升高。在抗结核治疗的同时，首要的处理为

- A.结核肾切除术
- B.血液透析
- C.积水肾造瘘术
- D.插尿管持续导尿
- E.膀胱扩大术

269.患者，女，35岁，上腹部隐痛不适伴消瘦1月。胃镜提示胃癌。CT扫描如图所示：右侧肾上腺区可



见一占位性病灶。应诊断为

- A.右肾上腺腺瘤
- B.右肾上腺腺癌
- C.右肾上腺转移瘤
- D.右肾上腺嗜铬细胞瘤
- E.右肾上腺错构瘤

270.患者，男，27岁。突发上腹痛，伴恶心、呕吐，急查尿常规红细胞满视野，白细胞5~10/HP，血常规正常。考虑右输尿管结石，最适当的急诊处理方法是

- A.大量饮水
- B.口服抗菌药物
- C.消炎，解痉，止痛
- D.ESWL
- E.手术探查

题型：A3

(271~272题共用题干)

患者，女，28岁。尿频、尿急伴终末血尿2年，在门诊行尿结核菌培养有结核杆菌生长。

271.经检查发现右肾无功能，左肾、输尿管重度积水，膀胱约鸡蛋大小，血钾4.5mmol/L，尿素氮16mmol/L，肌酐395μmol/L。最佳的治疗应是

- A.抗结核治疗2周后右肾切除
- B.右肾切除
- C.急诊肾切除加左肾造瘘
- D.抗结核治疗加左肾造瘘
- E.右肾切除加结肠膀胱扩大术

272.为确定病变范围和程度，下列检查最具诊断意义的是

- A.尿路平片
- B.超声波检查
- C.CT检查
- D.膀胱镜检查
- E.排泄性尿路造影

(273~275题共用题干)

患者，女，50岁，间断无痛性全程血尿半年，近1个月尿频尿痛入院。双肾未触及，肾区叩疼（一），尿为肉眼血尿，有血块。

273.应首先作的检查是

- A.逆行性肾盂造影
- B.肾动脉造影
- C.肾CT
- D.B型超声
- E.肾图

274.最可能的诊断是

- A.肾癌
- B.肾盂癌
- C.肾结核

- D.膀胱癌
- E.肾胚胎瘤

275.治疗原则是

- A.消炎止血
- B.手术治疗
- C.放疗治疗
- D.化疗
- E.中草药治疗

(276~277题共用题干)

患者，女，40岁，反复尿频、尿急、尿痛伴右腰部间断性胀痛6月余。查体：慢性消耗病容，生命体征平稳，右肾区有叩痛，余处无异常。血常规示Hb100g/L，WBC 6×10^9 /L，N53%，L40%，M7%。尿常规RBC8~10/HP，WBC满视野，PC5~10/HP，ESR41mm/h。

276.为明确诊断，需要做的最关键检查是

- A.B超
- B.尿培养
- C.IVP
- D.CT
- E.结核菌素试验

277.对于诊断有帮助的既往病史资料为

- A.全身反复化脓性感染病史
- B.遗传病史
- C.肺结核病史
- D.药物过敏病史
- E.性病病史

(278~279题共用题干)

患者，女，32岁，进行性膀胱刺激症状，经抗生素治疗不见好转，且伴有右侧腰部胀痛及午后潮热。

278.尿液检查最具有诊断意义的是

- A.血尿
- B.脓尿
- C.尿普通细菌培养
- D.尿沉渣找结核杆菌
- E.尿细胞学检查

279.为了解患肾功能及形态的病理改变，最有价值的检查是

- A.B超
- B.IVP
- C.逆行肾盂造影
- D.CT

E.MRI

(280~281题共用题干)

患者，男，76岁。尿频、进行性排尿困难8年余，1周来劳累后症状加重，尿呈滴沥状，伴尿液不自主溢出。查体：膀胱胀满耻骨上三指，下肢轻度水肿。肛诊前列腺Ⅲ度增大，质中，光滑，中央沟消失。

280.患者尿失禁属于哪种类型

- A.精神性尿失禁
- B.压力性尿失禁
- C.急迫性尿失禁
- D.真性尿失禁
- E.充盈性尿失禁

281.首先应进行

- A.利尿剂服用帮助排尿
- B.服用治疗前列腺增生症的药物继续观察
- C.留置导尿
- D.急诊行手术前列腺切除
- E.行前列腺微波治疗

(282~285题共用题干)

患者，女，58岁，间歇无痛肉眼血尿2个月余。查体未发现异常。肾脏B超提示右肾中下极4.5cm低回声肿物，向肾外侧突出。

282.该患者在做静脉肾盂造影时最可能出现的异常情况是

- A.右肾不显影
- B.右肾积水
- C.右肾下盏拉长、移位
- D.右肾下盏边缘不整，呈虫蚀样改变
- E.右肾显影延迟

283.其诊断最可能是

- A.右肾细胞癌
- B.右肾盂癌
- C.右肾囊肿
- D.右肾错构瘤
- E.右肾母细胞瘤

284.下列检查中，该患者最不可能出现的情况是

- A.血钙增高
- B.红细胞计数增多
- C.血沉增快

- D.尿脱落细胞检查发现肿瘤细胞
- E.尿常规检查正常

285.对该患者治疗时，手术切除范围应包括

- A.右侧肾脏
- B.右侧肾脏，肾周脂肪囊，肾周筋膜及部分输尿管
- C.右侧肾脏，右侧全长输尿管
- D.右肾部分切除术
- E.右肾肿瘤摘出术

题型：A4

(286~287题共用题干)

患者，女，18岁，突然发冷、发热、腰痛，尿频、尿急、尿痛，肾区叩击痛1天。尿镜检：白细胞成堆。肾功能正常。血常规：WBC $15\times 10^9/L$ ，N85%。

286.患者最可能的诊断为

- A.急性膀胱炎
- B.急性肾盂肾炎
- C.慢性肾盂肾炎
- D.慢性肾盂肾炎急性发作
- E.急性肾小球肾炎

287.此时的治疗方案为

- A.单剂治疗
- B.行药敏试验给予敏感抗生素治疗
- C.系统联合治疗
- D.2周疗法
- E.1周疗法

(288~289题共用题干)

患者，男，50岁，因膀胱乳头状癌行经尿道膀胱肿瘤切除，临床分期为T₁。

288.术后处置最没必要的是

- A.BCG膀胱内灌注
- B.术后三月查膀胱镜
- C.膀胱区放射治疗
- D.免疫治疗
- E.中药治疗

289.术后复查时肿瘤复发（T₂），癌旁黏膜活检有原位癌，最好的处理是

- A.TURB+放射治疗

- B.膀胱部分切除
- C.全膀胱切除术，尿流改道
- D.TURB+术后BCG灌注
- E.TURB+全身化疗

(290～293题共用题干)

患者，女，32岁，尿频、尿急、尿痛，下腹部不适2天就诊，无发热，无肾区叩击痛。尿镜检：白细胞满视野，红细胞2～4/HP。肾功能正常。

290.此时的诊断为

- A.急性肾盂肾炎
- B.慢性肾盂肾炎
- C.急性膀胱炎
- D.隐匿性尿感
- E.隐匿性肾炎

291.此时的最佳治疗方案为

- A.先细菌培养再用药
- B.3天疗法
- C.单剂疗法
- D.7天疗法
- E.联合药物治疗

292.若停药抗菌药物7天后复诊已没有尿频、尿急、尿痛等不适，清洁中段尿培养为阳性，细菌数 $10^5/\text{ml}$ ，且为同一细菌，此时患者应诊断为

- A.急性肾盂肾炎
- B.隐匿性肾盂肾炎
- C.急性膀胱炎
- D.无症状尿检异常
- E.尿道综合征

293.此时最佳的治疗方案为

- A.单剂疗法
- B.3天疗法
- C.7天疗法
- D.14天疗法
- E.联合药物治疗

(294～298题共用题干)

患者，男，26岁，2年来尿频、尿急、尿痛伴间歇性终末血尿，有时尿混浊，一般抗生素治疗无效。尿液检查：脓球40～50个，红细胞20～30个/高倍视野，蛋白(+)。

294.最适宜的诊断方法是

- A.放射性核素肾图
- B.膀胱镜
- C.静脉尿路造影及尿结核菌检查
- D.尿路B型超声波
- E.磁共振（MRI）

295.经检查诊断“左肾结核”，住院后查体：双肾未触及，肾区无压痛及叩击痛，最可能的阳性发现是

- A.上腹部可闻及杂音
- B.脐左侧压痛
- C.精索静脉曲张
- D.附睾、前列腺触及硬结
- E.阴囊透光试验（+）

296.静脉尿路造影左肾未显影，右肾轻度积水，尿结核菌检查3次（+），肾功能正常，测膀胱容量100ml。此时最佳处理方案是

- A.诊断明确后立即行患肾切除
- B.抗结核药物治疗
- C.加强营养，卧床休息
- D.异烟肼、利福平、吡嗪酰胺联合用药2周后切除患肾
- E.异烟肼治疗1周后切除患肾

297.出院后在继续抗结核治疗过程中，最需要注意的是

- A.卧床休息
- B.定期作对侧肾脏B超及肾功能检查
- C.作附睾结核切除
- D.定期胸部X线透视
- E.定期尿结核菌检查

298.肾切除术后抗结核治疗过程中，如果多次检查尿结核菌阴性，患者尿频程度较术前反而明显加重，每次尿量仅数十毫升，引起尿频的最可能原因是

- A.结核病情反复
- B.大肠杆菌感染
- C.支原体感染
- D.精神性
- E.膀胱挛缩

（299～300题共用题干）

患者，女，24岁，右肾绞痛，伴全程肉眼血尿，腹部平片未发现阳性结石。

299.首先做哪项检查

- A.右肾逆行造影
- B.肾、输尿管CT扫描
- C.B超检查肾、输尿管

- D.静脉肾盂造影
- E.灌肠后再作腹部X线平片

300.经检查确定在右肾盂有一个直径为2.5cm×3.0cm大小结石，形状不规则并有轻度肾积水。合适的治疗是

- A.肾实质切开取石
- B.ESWL
- C.输尿管镜取石
- D.ESWL后置Double-J管
- E.右肾造瘘，经皮肾镜取石

答案：

题型：A1

1.A	2.B	3.D	4.C	5.C	6.A	7.B	8.C	9.D	10.D
11.D	12.B	13.D	14.A	15.B	16.B	17.D	18.B	19.D	20.D
21.E	22.C	23.C	24.A	25.C	26.B	27.D	28.B	29.B	30.C
31.E	32.C	33.B	34.B	35.E	36.B	37.B	38.A	39.E	40.A
41.C	42.E	43.D	44.C	45.E	46.C	47.C	48.D	49.E	50.D
51.C	52.A	53.D	54.D	55.E	56.B	57.C	58.B	59.E	60.E
61.B	62.E	63.A	64.D	65.E	66.B	67.E	68.D	69.D	70.D
71.B	72.B	73.E	74.A	75.A	76.B	77.B	78.E	79.B	80.A
81.B	82.D	83.D	84.C	85.D	86.C	87.C	88.D	89.E	90.A
91.B	92.D	93.D	94.D	95.D	96.B	97.E	98.D	99.B	100.D
101.A	102.D	103.B	104.B	105.C	106.A	107.C	108.D	109.C	110.B
111.C	112.B	113.D	114.B	115.E	116.B	117.C	118.C	119.C	120.E
121.E	122.E	123.C	124.D	125.E	126.B	127.D	128.B	129.B	130.C
131.D	132.E	133.C	134.A	135.D	136.E	137.A	138.B	139.A	140.B
141.C	142.C	143.B	144.E	145.C	146.C	147.B	148.A	149.B	150.D
151.D	152.C	153.C	154.D	155.E	156.A	157.B	158.E	159.C	160.B
161.E	162.B	163.A	164.D	165.A	166.B	167.A	168.C	169.B	170.A
171.D	172.C	173.A	174.A	175.A	176.C	177.E	178.D	179.B	180.B
181.A	182.D	183.B	184.B	185.E	186.C	187.D	188.C	189.A	190.A
191.C	192.D	193.C	194.D	195.A	196.E	197.A	198.C	199.E	200.E

题型：A2

201.E	202.D	203.E	204.C	205.E	206.E	207.E	208.B	209.D	210.B
211.C	212.C	213.A	214.C	215.D	216.D	217.C	218.B	219.A	220.A
221.E	222.C	223.C	224.A	225.E	226.A	227.B	228.D	229.D	230.B
231.C	232.A	233.C	234.B	235.B	236.B	237.A	238.C	239.D	240.E
241.D	242.A	243.C	244.C	245.A	246.E	247.D	248.D	249.C	250.B
251.B	252.A	253.D	254.A	255.A	256.D	257.E	258.B	259.D	260.B
261.B	262.B	263.B	264.C	265.D	266.E	267.B	268.C	269.C	270.C

题型：A3

271.D	272.E	273.D	274.D	275.B	276.C	277.C	278.D	279.B	280.E
281.C	282.C	283.A	284.D	285.B					

题型：A4

286.B	287.C	288.C	289.C	290.C	291.B	292.B	293.D	294.C	295.D
296.D	297.B	298.E	299.C	300.E					