คู่มือเอาตัวรอด - ฉบับภาษาไทย

คู่มือภาคสนาม 118 เรื่อง พร้อมภาพประกอบภาษาไทย

สำหรับโครงการ ESP32 CYD Survival Wiki อ่านได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เรียบเรียงคำแปลโดยคงลำดับการปฏิบัติ ตัวเลข และข้อควรระวังตามเนื้อหาเดิม ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคยังระบุบริบทของต้นฉบับไว้
ใช้สารบัญของไฟล์ PDF เพื่อเลือกบทที่ต้องการ และดูบทความฉบับเดียวกันบนหน้าจอ CYD หรือหน้าเว็บของอุปกรณ์ได้

กฎเลขสามเพื่อเอาชีวิตรอด

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้จัดการภัยที่ร้ายแรงที่สุดก่อน กฎเลขสามช่วยให้เห็นคร่าว ๆ ว่าคนเราทนขาดสิ่งจำเป็นแต่ละอย่างได้นานเพียงใด



กฎเลขสามเพื่อจัดลำดับความสำคัญ

ลำดับความสำคัญ

1. อากาศ - ประมาณ 3 นาที ต้องจัดการปัญหาการหายใจ การสำลัก จมน้ำ ควัน และเลือดออกรุนแรงก่อน
2. ที่พัก - ประมาณ 3 ชั่วโมงในสภาพอากาศรุนแรง ความหนาว ความเปียก และลมอาจคร่าชีวิตเร็วกว่าการกระหายน้ำ รักษาตัวให้แห้งและมีฉนวนกันความเย็น
3. น้ำ - ประมาณ 3 วัน และสั้นกว่านั้นเมื่ออากาศร้อนหรือออกแรงหนัก
4. อาหาร - ประมาณ 3 สัปดาห์ อาหารช่วยให้มีพลังงานและกำลังใจ แต่เป็นลำดับท้ายสุด

ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ย ไม่ใช่เวลาที่รับประกันได้ น้ำเย็น อากาศร้อน การบาดเจ็บ อายุ และความเจ็บป่วย ล้วนทำให้เวลาที่ทนไหวสั้นลง

นำไปใช้อย่างไร

- ก่อนลงมือสร้างสิ่งใด ให้ตรวจภัยตรงหน้า เช่น ไฟ น้ำที่กำลังขึ้น รถที่ผ่านไปมา และหินร่วง
- ต่อด้วยการดูแลอาการบาดเจ็บที่เป็นอันตรายถึงชีวิต
- จากนั้นป้องกันตัวจากสภาพอากาศ แล้วจึงหาแหล่งน้ำ
- ค่อยใช้แรงหาอาหารเมื่อจัดการสามลำดับแรกแล้ว

ดูเพิ่มเติม: STOP: หยุด คิด สังเกต วางแผน

STOP: หยุด คิด สังเกต วางแผน

การเสียชีวิตในสถานการณ์เอาชีวิตรอดจำนวนมากมาจากการตัดสินใจผิดพลาดในชั่วโมงแรก เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามแผน ให้ใช้หลัก STOP

S - Stop: หยุด

นั่งลง ดื่มน้ำและกินของเล็กน้อย อย่าเดินต่อไปเรื่อย ๆ ความตื่นตระหนกทำให้เสียแรงและยิ่งหลงทาง

T - Think: คิด

- เกิดอะไรขึ้น และคุณมีสิ่งใดอยู่กับตัวจริง ๆ บ้าง?
- มีใครรู้หรือไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน และควรกลับเมื่อใด?
- ภัยที่ร้ายแรงที่สุดในตอนนี้คืออะไร?

O - Observe: สังเกต

- อากาศ: กำลังหนาวขึ้น มืดลง หรือมีฝนมากขึ้นหรือไม่?
- ภูมิประเทศ: แหล่งน้ำ วัสดุทำที่พัก และพื้นที่เปิดสำหรับส่งสัญญาณ
- ร่างกาย: อาการบาดเจ็บ ความอบอุ่น ความกระหายน้ำ และเวลาที่เหลือก่อนมืด
- อุปกรณ์: เทของจากกระเป๋าเสื้อและกระเป๋าสัมภาระออกมาดู ทุกชิ้นอาจมีประโยชน์

P - Plan: วางแผน

เลือกแผนที่ชัดเจนเพียงแผนเดียวแล้วทำตาม ทบทวนแผนทุกสองสามชั่วโมง

หากมีคนรู้เส้นทางและกำหนดกลับของคุณ โดยทั่วไปควรอยู่กับที่ ผู้ค้นหาพบคนที่อยู่จุดเดิมได้บ่อยกว่าคนที่

เคลื่อนย้ายไปเรื่อย ๆ มาก

ควรอยู่ต่อหรือเดินทาง?

อยู่กับที่เมื่อมีคนจะออกตามหา คุณบาดเจ็บ อากาศเลวร้าย หรือไม่รู้ว่าควรไปทางใด

ย้ายที่เมื่อไม่มีใครจะออกค้นหา จุดที่อยู่ไม่ปลอดภัย หรือรู้เส้นทางไปขอความช่วยเหลือชัดเจนเท่านั้น หากต้องย้าย ให้ทิ้งข้อความหรือลูกศรบอกทิศทางไว้

ชุดอุปกรณ์เอาชีวิตรอด

ชุดอุปกรณ์เล็ก ๆ ที่พกติดตัวจริง มีประโยชน์กว่าชุดใหญ่ที่ทิ้งไว้บ้าน จัดของให้ครอบคลุมความจำเป็นตามกฎเลขสาม

อุปกรณ์หลัก

- ก่อไฟ: ไฟแช็ก แท่งจุดไฟ ไม้ขีดกันน้ำ และเชื้อจุดไฟ เช่น สำลีชุบปิโตรเลียมเจลลี
- ที่พัก: ผ้าห่มฉุกเฉินหรือถุงคลุมตัวกันอากาศ ผ้าใบเล็ก และเชือกยาว 15 ม.
- น้ำ: ขวดโลหะที่ใช้ต้มน้ำได้ เม็ดฆ่าเชื้อ และเครื่องกรองน้ำ
- แสงสว่าง: ไฟฉายคาดศีรษะพร้อมถ่านสำรอง
- ส่งสัญญาณ: นกหวีด กระจกส่งสัญญาณ และผ้าสีสด
- เครื่องมือ: มีดใบตายหรือมีดพับ และเทปผ้าเหนียว
- ปฐมพยาบาล: ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซ เทปทางการแพทย์ สายรัดห้ามเลือด ยาแก้ปวด และยาประจำตัว
- นำทาง: แผนที่บริเวณนั้นและเข็มทิศ
- อาหาร: อาหารแท่งที่ให้พลังงานสูง

เสื้อผ้า

- เสื้อให้ความอบอุ่น ทำจากขนสัตว์หรือใยสังเคราะห์ ไม่ใช่ผ้าฝ้าย
- เสื้อกันฝน
- หมวกและถุงมือ
- ถุงเท้าสำรอง

ผ้าฝ้ายกักความร้อนไม่ได้เมื่อเปียก ในอากาศหนาวหรือเปียกชื้น ขนสัตว์และใยสังเคราะห์อาจช่วยให้ไม่ลุกลามจากแค่หนาวไปเป็นภาวะตัวเย็นเกิน

บอกคนที่ไว้ใจ

สิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ในกระเป๋า: ฝากเส้นทางและเวลาที่คาดว่าจะกลับไว้กับคนที่คุณไว้ใจ

ฟ้าผ่าและภัยจากสภาพอากาศ

ฟ้าผ่า

- หากได้ยินฟ้าร้อง แสดงว่าอยู่ใกล้พอที่จะถูกฟ้าผ่าได้ หากทำได้ ให้เข้าอาคารหรือรถที่มีหลังคาแข็ง
- หลีกเลี่ยงยอดเขา สันเขา ทุ่งโล่ง ต้นไม้โดดเดี่ยว แหล่งน้ำ และรั้วโลหะ
- หากอยู่ในป่า ให้ไปยังที่ต่ำท่ามกลางต้นไม้ขนาดเล็กที่สูงใกล้เคียงกัน
- หากอยู่เป็นกลุ่ม ให้กระจายห่างกันอย่างน้อย 15 ม. (50 ฟุต) เพื่อไม่ให้ฟ้าผ่าครั้งเดียวโดนทุกคน
- รออย่างน้อย 30 นาทีหลังเสียงฟ้าร้องครั้งสุดท้าย ก่อนกลับออกกลางแจ้ง

ไม่มีจุดใดกลางแจ้งที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง หากติดอยู่ในที่โล่งโดยไม่มีทางเลือก ให้ย่อตัวต่ำบนปลายเท้า เท้าชิดกัน และอยู่ห่างจากวัตถุสูง

น้ำป่าไหลหลาก

- ห้ามตั้งค่ายในท้องลำธารแห้งหรือหุบผาแคบ
- ฝนที่ตกไกลออกไปทางต้นน้ำอาจทำให้เกิดน้ำหลากตรงที่คุณอยู่ แม้ท้องฟ้าจะยังแจ่มใส
- อย่าเดินหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำ น้ำไหลเร็วลึกเพียง 15 ซม. (6 นิ้ว) ทำให้คนล้มได้ และน้ำลึก 60 ซม. (2 ฟุต) ทำให้รถลอยได้
- ขึ้นที่สูงทันทีหากได้ยินเสียงน้ำคำราม หรือเห็นระดับน้ำสูงขึ้นและขุ่นลง

ลมและแนวอากาศเย็น

- อุณหภูมิลดฮวบ ลมเปลี่ยนทิศ และเมฆดำ เป็นสัญญาณว่าอากาศเลวร้ายกำลังมา ควรทำที่พักให้เสร็จแต่เนิ่น ๆ
- ลมดึงความร้อนจากร่างกายได้เร็วมาก ควรหาที่บังลมก่อนทำอย่างอื่น

เงื่อนเชือกที่ควรรู้

ฝึกเงื่อนไม่กี่แบบให้คล่อง ดีกว่ารู้หลายแบบแต่ผูกไม่แน่น ฝึกจนผูกได้แม้มือเย็นหรืออยู่ในความมืด ในขั้นตอนต่อไปนี้ “เส้นหลัก” คือเชือกส่วนยาวที่รับแรง ส่วน “ปลายเชือก” คือปลายที่ใช้ผูก

เงื่อนบ่วงสายธนู: ทำบ่วงที่ไม่รูด

ใช้ทำบ่วงขนาดคงที่ เช่น ผูกเชือกรอบต้นไม้ ทำบ่วงช่วยเหลือ หรือแขวนถุงอาหาร

1. ทำห่วงเล็กบนเชือกเส้นหลัก โดยให้ปลายเชือกพาดอยู่ด้านบน
2. สอดปลายเชือกขึ้นผ่านห่วงเล็กจากด้านล่าง
3. อ้อมปลายเชือกไปด้านหลังเส้นหลัก
4. สอดปลายเชือกกลับลงผ่านห่วงเล็ก
5. จับปลายเชือกแนบกับขอบบ่วงใหญ่ แล้วดึงเส้นหลักให้เงื่อนกระชับ

เหลือปลายเชือกอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) เงื่อนนี้อาจคลายเมื่อไม่รับแรง จึงต้องตรวจเป็นระยะ

เงื่อนตะกรุดเบ็ด: ผูกเชือกกับเสาอย่างรวดเร็ว

ใช้เริ่มงานผูกมัดโครงไม้ หรือยึดเชือกกับเสา

1. พันเชือกรอบเสาหนึ่งรอบ
2. พาดทับรอบแรก แล้วพันรอบเสาอีกครั้ง
3. สอดปลายเชือกใต้รอบที่สอง ให้ปลายทั้งสองออกมาระหว่างรอบเชือกในทิศตรงข้ามกัน
4. ดึงปลายทั้งสองให้ตึง

เงื่อนปรับตึง: เชือกยึดเต็นท์ที่ปรับได้

ช่วยปรับความตึงของเชือกยึดโดยไม่ต้องแก้ผูกใหม่

1. พาดเชือกรอบสมอบกหรือจุดยึด
2. พันปลายเชือกรอบเส้นหลัก 2 รอบ ภายในบ่วง โดยพันย้อนเข้าหาจุดยึด
3. พันรอบเส้นหลักเพิ่มอีก 1 รอบ ด้านนอกของสองรอบแรก
4. ดึงเงื่อนให้กระชับ เลื่อนเงื่อนเพื่อปรับความตึง เมื่อรับแรงเงื่อนจะจับแน่น

เงื่อนพิรอด: ผูกปลายเชือกสองข้างเข้าด้วยกัน

เหมาะสำหรับผ้าพันแผล มัดของ และห่อพัสดุ

1. นำปลายขวาทับปลายซ้าย แล้วสอดลงด้านล่าง
2. นำปลายซ้ายทับปลายขวา แล้วสอดลงด้านล่าง
3. ปลายเชือกทั้งสองควรวางราบขนานไปกับเชือกด้านของตน

ห้ามใช้เงื่อนพิรอดต่อเชือกสองเส้นที่จะต้องรับน้ำหนัก เพราะอาจลื่นหรือพลิกหลุด ให้ใช้เงื่อนขัดสมาธิแทน

เงื่อนขัดสมาธิ: ต่อเชือกสองเส้น

ใช้ได้แม้เชือกมีความหนาต่างกัน

1. พับปลายเชือกเส้นหนาให้เป็นรูปตัวยู
2. สอดเชือกเส้นเล็กขึ้นผ่านห่วงตัวยูจากด้านหลัง
3. อ้อมเชือกเส้นเล็กไปด้านหลังขาทั้งสองของห่วง
4. สอดปลายเชือกใต้ตัวมันเอง ไม่ใช่ย้อนเข้าห่วงตัวยู แล้วดึงให้แน่น

เงื่อนผูกของท้ายรถ: ดึงเชือกให้ตึงมาก

เหมาะสำหรับเชือกสันหลังคาและมัดสัมภาระ

1. ผูกปลายข้างหนึ่งกับจุดยึด
2. ทำห่วงเล็กไว้ระหว่างเส้นเชือก จะใช้ห่วงแบบรูดได้ก็ได้
3. อ้อมปลายอิสระรอบจุดยึดอีกจุด แล้วสอดกลับขึ้นผ่านห่วงเล็ก
4. ดึงปลายอิสระลง ห่วงทำหน้าที่คล้ายรอก ช่วยเพิ่มแรงดึงได้ประมาณสองเท่า
5. รักษาความตึงไว้ แล้วล็อกด้วยเงื่อนกระหวัดไม้สองครั้งใต้ห่วง

ดูแลเชือก

- ลนหรือพันเทปที่ปลายเชือกใยสังเคราะห์เพื่อกันลุ่ย
- เก็บเชือกให้ห่างไฟและขอบคม
- เชือกพาราคอร์ดแยกเส้นใยด้านในออกได้ ใช้เป็นสายเบ็ด ด้ายเย็บ หรือเชือกบ่วงดักสัตว์

เมื่อพบสัตว์อันตราย

สัตว์ป่าส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงคน เหตุเผชิญหน้ามักเกิดเมื่อสัตว์ตกใจ กำลังปกป้องลูกหรืออาหาร หรือเคยชินกับอาหารจากคน

ลดโอกาสเผชิญหน้า

- ส่งเสียงเมื่อเดินในพุ่มไม้หนาหรือใกล้ลำธาร ให้สัตว์รู้ว่าคุณกำลังมา
- อย่าเก็บอาหาร ขยะ หรือของใช้ทำความสะอาดร่างกายไว้ในที่พัก ดู เก็บอาหารและดูแลค่ายให้ปลอดภัย
- เดินทางเป็นกลุ่มในเวลากลางวัน ให้เด็กอยู่ใกล้ตัว
- เว้นระยะให้สัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะแม่ที่มีลูกอ่อน
- ในพื้นที่ที่มีหมี ให้พกสเปรย์ไล่หมี ไว้ในจุดที่หยิบใช้ได้ภายในวินาทีเดียว

หลักทั่วไปเมื่อพบหมี

- ห้ามวิ่ง หมีเร็วกว่าคนมาก และการวิ่งอาจกระตุ้นให้มันไล่ตาม
- ตั้งสติ พูดด้วยเสียงต่ำและหนักแน่น เพื่อให้มันรู้ว่าคุณเป็นคน
- อุ้มเด็กเล็ก และยืนรวมกันเป็นกลุ่ม
- ค่อย ๆ ถอยออกด้านข้าง พร้อมมองสังเกตหมี
- หากหมีเข้ามาใกล้ ใช้สเปรย์ไล่หมีเมื่ออยู่ห่างประมาณ 10 ม. (30 ฟุต) เล็งต่ำเล็กน้อยให้ละอองสเปรย์อยู่ระหว่างคุณกับหมี

เมื่อหมีเข้าทำร้าย

โจมตีเพื่อป้องกันตัว เช่น หมีที่ตกใจ ซึ่งมักเป็นกริซลี หมีสีน้ำตาล หรือแม่หมีกับลูก:

- แกล้งตาย นอนคว่ำราบ ประสานมือป้องท้ายทอย กางขาให้มันพลิกตัวคุณได้ยาก และสะพายเป้ไว้
- อยู่นิ่งจนหมีออกจากบริเวณนั้น
- หากมันยังทำร้ายต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้สู้กลับอย่างเต็มที่

โจมตีเพื่อล่า เช่น หมีที่สะกดรอย ตามคุณ หรือบุกเต็นท์ตอนกลางคืน ซึ่งมักเป็นหมีดำ:

- สู้กลับ ด้วยทุกอย่างที่มี ใช้หิน ไม้ หรือสิ่งของตีที่หน้าและจมูก
- อย่าแกล้งตาย

คูการ์ หรือสิงโตภูเขา

- อย่าวิ่งและอย่าหันหลังให้
- ทำตัวให้ดูใหญ่ เช่น ยกแขน กางเสื้อแจ็กเก็ต หรือยืนบนก้อนหิน
- ตะโกน ขว้างสิ่งของ และค่อย ๆ ถอย
- หากถูกทำร้าย ให้สู้กลับ และป้องกันลำคอ พยายามยืนไว้หากทำได้

กวางมูสและสัตว์กินพืชขนาดใหญ่

ในบางพื้นที่ กวางมูสทำให้คนบาดเจ็บมากกว่าหมี หากหูลู่ไปด้านหลังและขนบริเวณโหนกชูขึ้น แสดงว่ามันโกรธ ให้วิ่งหลบหลังต้นไม้หรือรถ โดยมากมูสจะหยุดไล่ไม่นานนัก

สุนัข

- อย่าวิ่งหรือจ้องตา ยืนนิ่งหันด้านข้าง และเก็บมือชิดตัว
- พูดว่า “ไม่” หรือ “กลับบ้าน” ด้วยเสียงหนักแน่น
- หากถูกทำร้าย ให้ใช้สิ่งของกั้นระหว่างตัวกับสุนัข เช่น กระเป๋า เสื้อแจ็กเก็ต หรือไม้ หากล้มลง ให้ขดตัวป้องกันใบหน้าและลำคอ

เมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วนจนผิวหนังแตก ต้องล้างแผลให้ทั่วด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 15 นาที แล้วรับการดูแลทางการแพทย์โดยเร็ว เพราะเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าและการติดเชื้อ

น้ำแข็งบางและการตกน้ำเย็นจัด

น้ำแข็งปลอดภัยหรือไม่?

น้ำแข็งใหม่ที่ใสและแข็งรับน้ำหนักได้ดีที่สุด น้ำแข็งขาวหรือขุ่นอ่อนแอกว่า และมักรับน้ำหนักได้เพียงประมาณครึ่งหนึ่ง

- บางกว่า 5 ซม. (2 นิ้ว): ห้ามขึ้นไป
- น้ำแข็งใสหนา 10 ซม. (4 นิ้ว): สำหรับคนเดินหนึ่งคน
- หนา 13-18 ซม. (5-7 นิ้ว): สำหรับรถสโนว์โมบิลหรือรถเอทีวีขนาดเล็ก
- หนา 20-30 ซม. (8-12 นิ้ว): สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก

น้ำแข็งหนาไม่เท่ากันทุกจุด มักบางกว่าใกล้ทางน้ำเข้า ทางน้ำออก กระแสน้ำ ท่าเรือ หิน ท่อนไม้ จุดสีเข้ม และใต้หิมะ ใช้สิ่วเจาะน้ำแข็ง ขวาน หรือสว่านเจาะตรวจความหนาทุกสองสามก้าว

อย่าออกไปบนน้ำแข็งคนเดียว พกเหล็กแหลมสำหรับช่วยดึงตัวขึ้นจากน้ำสองอัน ร้อยเชือกคล้องคอไว้ และเตรียมเชือกสำหรับโยนช่วยเหลือ

เมื่อพลัดตกน้ำ: หลัก 1-10-1



หลัก 1-10-1 เมื่อตกทะลุน้ำแข็ง

- 1 นาทีแรก: ความเย็นฉับพลันทำให้หอบและหายใจเร็ว รักษาศีรษะให้พ้นน้ำ อย่าตื่นตระหนก และค่อย ๆ ลดจังหวะหายใจ อาการนี้จะผ่านไป
- 10 นาที: เป็นช่วงที่แขนขายังเคลื่อนไหวได้ก่อนจะชา ใช้เวลานี้พยายามขึ้นจากน้ำทันที
- 1 ชั่วโมง: โดยประมาณก่อนหมดสติจากภาวะตัวเย็นเกิน แม้ยังขึ้นจากน้ำไม่ได้ ให้พาดแขนไว้บนน้ำแข็ง แขนอาจแข็งติดกับผิวและช่วยพยุงตัวคุณไว้

วิธีขึ้นจากน้ำ

1. หันกลับไปด้านที่คุณเดินมา เพราะน้ำแข็งฝั่งนั้นเคยรับน้ำหนักคุณได้
2. วางแขนราบบนน้ำแข็ง ใช้เหล็กแหลม กุญแจ หรือมีดช่วยยึดเกาะ
3. เตะขาแรง ๆ ให้ลำตัวขึ้นมาอยู่ในแนวราบใกล้ผิวน้ำ คล้ายท่าว่ายน้ำ
4. ดึงตัวและเตะขาต่อจนหน้าอกและสะโพกพ้นขึ้นมาบนน้ำแข็ง

5. กลิ้งออกห่างจากรู อย่าเพิ่งยืนจนกว่าจะถึงน้ำแข็งหนา
6. เข้าที่พักและทำให้ร่างกายอบอุ่นทันที ดู ตัวเย็นเกินและเนื้อเยื่อถูกความเย็น

ช่วยผู้อื่นอย่างไร

ยื่นของให้ โยนของช่วย อย่าพุ่งเข้าไป อย่าวิ่งออกไปหา เพราะคุณอาจตกน้ำตามไปด้วย

- เรียกขอความช่วยเหลือ
- ยื่นเสา กิ่งไม้ เชือก หรือบันไดยาวไปให้ โดยนอนราบ หรืออยู่บนฝั่งหรือน้ำแข็งที่มั่นคง
- โยนเชือกหรือสิ่งที่ลอยน้ำได้
- หากจำเป็นต้องออกไปจริง ๆ ให้นอนราบเพื่อกระจายน้ำหนัก แล้วดันของไปข้างหน้าให้ผู้ประสบเหตุจับ

ตั้งสติและรักษากำลังใจ

การเอาชีวิตรอดขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นส่วนใหญ่ หลายคนมีอุปกรณ์น้อยแต่รอดได้เพราะมีสติ ขณะที่บางคนมีของพร้อมกลับเสียชีวิตเพราะตื่นตระหนก

สงบใจภายในหนึ่งนาที

หายใจแบบสี่จังหวะ: หายใจเข้า 4 วินาที กลั้น 4 วินาที หายใจออก 4 วินาที และกลั้นอีก 4 วินาที ทำซ้ำสี่หรือห้ารอบ ช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงและคิดได้ชัดขึ้น

จากนั้นใช้หลัก STOP: หยุด คิด สังเกต และวางแผน

ประคองตัวให้เดินหน้าต่อ

- ตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ เช่น “ทำหลังคาที่พักให้เสร็จก่อนมืด” จะจัดการง่ายกว่าเป้าหมายกว้าง ๆ ว่า “ต้องรอด”
- ทำกิจวัตร: กำหนดเวลาตรวจสัญญาณ เก็บน้ำและฟืน กินอาหาร และนอน
- หางานที่เป็นประโยชน์ทำ ช่วยลดความกลัว
- ดูแลร่างกาย ความหนาว กระหาย หิว และอดนอน ล้วนบั่นทอนความคิด ควรแก้ก่อนจะรุนแรง
- จดบันทึก เขียนวันที่ สิ่งที่ทำ และแผนต่อไป ช่วยจัดความคิดและอาจมีประโยชน์กับผู้ช่วยเหลือภายหลัง

เมื่ออยู่เป็นกลุ่ม

- เลือกผู้นำหนึ่งคนเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้าย แต่ควรฟังทุกคนก่อน
- มอบหน้าที่ให้ทุกคน รวมถึงเด็กและผู้บาดเจ็บ ความรู้สึกว่าตนมีประโยชน์ช่วยได้มาก
- คอยดูแลกัน สังเกตคนที่เงียบผิดปกติ ไม่กินอาหาร หรือเดินแยกไป

- อยู่รวมกัน ห้ามใครออกจากค่ายตามลำพังโดยไม่บอกว่าจะไปไหนและกลับเมื่อใด

เมื่อมีเด็กอยู่ด้วย

- แสดงความสงบต่อหน้าเด็ก เพราะเด็กจะดูท่าทีจากคุณ
- อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและแผนอย่างตรงไปตรงมาด้วยคำง่าย ๆ
- ให้เด็กช่วยงานง่าย ๆ และชมเมื่อทำได้
- สอนว่า หากหลงทาง ให้อยู่กับที่และกอดต้นไม้ไว้ ส่งเสียง ตอบเมื่อมีคนเรียกชื่อ และอย่าซ่อนตัวจากผู้ค้นหา

โดยมากความช่วยเหลือจะมาถึง ผู้ที่ได้รับแจ้งว่าสูญหายส่วนใหญ่ถูกพบภายในหนึ่งหรือสองวัน

เหตุฉุกเฉินในบ้านและไฟดับ

เหตุฉุกเฉินส่วนใหญ่เกิดขึ้นขณะอยู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นพายุ น้ำท่วม ไฟดับในฤดูหนาว หรือไฟป่า การวางแผนเพียงเล็กน้อยช่วยได้มาก

แผนฉุกเฉินของครอบครัว

- กำหนดจุดนัดพบสองแห่ง: ใกล้บ้านหนึ่งแห่ง และนอกละแวกบ้านอีกหนึ่งแห่ง
- เลือกคนติดต่อนอกพื้นที่ที่ทุกคนโทรหรือส่งข้อความหาได้ ระบบทางไกลมักยังใช้งานได้เมื่อเครือข่ายในพื้นที่หนาแน่น
- จดหมายเลขสำคัญลงกระดาษ เพราะโทรศัพท์อาจแบตหมด
- เรียนรู้วิธีปิดน้ำ แก๊ส และไฟฟ้า
- วางแผนสำหรับสัตว์เลี้ยง ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความต้องการทางการแพทย์

ของสำรองในบ้าน (อย่างน้อย 3 วัน ถ้าเป็นไปได้ควรมีพอ 2 สัปดาห์)

- น้ำ: ประมาณ 4 ลิตร (1 แกลลอน) ต่อคนต่อวัน ดู การสำรองน้ำไว้ใช้ในบ้าน
- อาหาร ที่ไม่ต้องปรุงหรือใช้น้ำน้อย ดู สำรองอาหารสำหรับเหตุฉุกเฉิน
- ไฟฉาย ไฟฉายคาดศีรษะ และถ่านสำรอง หากทำได้ควรหลีกเลี่ยงเทียน
- วิทยุใช้ถ่านหรือวิทยุมือหมุน
- ชุดปฐมพยาบาล และยาตามใบสั่งแพทย์ให้พออย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์
- แบตเตอรี่สำรองสำหรับโทรศัพท์
- เสื้อผ้าอุ่น ผ้าห่ม หรือถุงนอน
- เงินสดธนบัตรย่อย

- สำเนาเอกสารสำคัญในถุงกันน้ำ

ระหว่างไฟดับ

- ปิดตู้เย็นและช่องแช่แข็งไว้ ตู้เย็นที่ไม่เปิดยังรักษาความเย็นได้ประมาณ 4 ชั่วโมง ตู้แช่แข็งที่เต็มประมาณ 48 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงหากมีของเพียงครึ่งเดียว
- ถอดปลั๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันไฟกระชากเมื่อไฟกลับมา เปิดสวิตช์ไฟไว้หนึ่งดวงเพื่อให้รู้ว่าไฟมาแล้ว
- ในอากาศหนาว ปิดห้องที่ไม่ได้ใช้ รวมกันในห้องเดียว ใช้ผ้าห่มคลุมหน้าต่าง และสวมเสื้อหลายชั้น
- ในอากาศร้อน อยู่ในห้องชั้นต่ำที่ร่มที่สุดและดื่มน้ำมากพอ

ห้ามใช้เครื่องปั่นไฟ เตาย่าง หรือเตาแคมป์ในอาคาร รวมถึงโรงรถ ห้องใต้ดิน และเฉลียง ตั้งเครื่องปั่นไฟห่างจากหน้าต่าง ประตู และช่องระบายอากาศอย่างน้อย 6 ม. (20 ฟุต) ติดตั้งเครื่องเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์แบบใช้ถ่าน

อาหารปลอดภัยหรือไม่หลังไฟดับ

ทิ้งอาหารเสียง่าย เช่น เนื้อ ปลา นม ไข่ และอาหารปรุงเหลือ ที่อยู่เหนือ 4°C (40°F) นานเกิน 2 ชั่วโมง หากไม่แน่ใจ ให้ทิ้ง ห้ามชิมเพื่อตรวจว่าเสียหรือไม่

เมื่อได้รับคำสั่งอพยพ

ออกเดินทางแต่เนิ่น ๆ นำชุดฉุกเฉิน ยา เอกสาร ที่ชาร์จโทรศัพท์ และสัตว์เลี้ยงไปด้วย ใช้เส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนด เพราะทางลัดอาจถูกปิดหรืออันตราย

การหาแหล่งน้ำ

ควรมองหาน้ำที่ไหน

- มองไปตามพื้นที่ลาดต่ำ น้ำมักรวมตัวในหุบเขา ร่องน้ำ และที่ลุ่ม
- พืชที่เขียวชอุ่ม เช่น วิลโลว์ คอตตอนวูด อ้อ และธูปฤาษี มักบอกว่ามีน้ำอยู่ใกล้ ๆ หรือใต้ผิวดิน
- ทางเดินของสัตว์ มักนำไปสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่หลายเส้นทางมารวมกันแล้วลาดลงต่ำ
- นก ที่บินวน หรือบินต่ำเป็นแนวตรงในช่วงรุ่งเช้าและพลบค่ำ มักกำลังไปหาแหล่งน้ำ
- แมลง: ผึ้งและแมลงวันมักอยู่ห่างจากแหล่งน้ำไม่กี่กิโลเมตร
- ท้องลำธารที่แห้ง: ลองขุดบริเวณด้านนอกของโค้งลำน้ำ ซึ่งมักเป็นจุดที่น้ำเหลืออยู่ท้ายสุด หากทรายชื้น ให้ขุดหลุมแล้วรอให้น้ำซึมเข้ามา

วิธีเก็บน้ำ

- น้ำฝน: ขึงผ้าใบ เสื้อกันฝน หรือแผ่นพลาสติก แล้วทำทางให้น้ำไหลลงภาชนะ น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดที่สุด
- น้ำค้าง: ใช้ผ้าเช็ดหญ้าในยามเช้าตรู่ แล้วบิดน้ำลงภาชนะ
- หิมะและน้ำแข็ง: ละลายก่อนดื่ม การกินหิมะทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง หากใส่ภาชนะขนาดเท่ากัน น้ำแข็งให้น้ำมากกว่าหิมะ
- ถุงเก็บน้ำจากการคายน้ำของพืช: ครอบถุงพลาสติกใสบนกิ่งที่มีใบของพืชไม่มีพิษและได้รับแดด แล้วมัดปากถุง ไอน้ำจะควบแน่นอยู่ด้านใน

น้ำจากดิน ลำธาร ทะเลสาบ หิมะ และน้ำค้าง ต้องผ่านการทำให้ปลอดภัยก่อนดื่มเสมอ แม้แต่น้ำใสบนภูเขาก็อาจมีปรสิตได้

แหล่งน้ำที่ควรหลีกเลี่ยง

- น้ำทะเลและปัสสาวะ เพราะทำให้ร่างกายขาดน้ำเร็วขึ้น
- น้ำใกล้เหมือง โรงงาน บริเวณรับน้ำไหลบ่าจากพื้นที่เกษตร หรือบริเวณที่มีซากสัตว์
- น้ำที่มีคราบน้ำมัน กลิ่นแรง หรือไม่มีพืชมีชีวิตขึ้นอยู่รอบ ๆ

ทำน้ำให้ปลอดภัยสำหรับดื่ม

น้ำที่ดูใสก็อาจทำให้ป่วยหนักได้ ควรทำให้ปลอดภัยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ หากน้ำขุ่น ให้พักจนตะกอนนอนก้น แล้วเทผ่านผ้ากรองก่อน

การต้ม (เชื่อถือได้มากที่สุด)

- ต้มน้ำให้เดือดพล่านต่อเนื่อง 1 นาที
- หากอยู่สูงกว่า 2,000 ม. (6,500 ฟุต) ให้ต้ม 3 นาที
- ปิดฝาแล้วปล่อยให้เย็น การต้มฆ่าเชื้อโรคได้ แต่ไม่กำจัดสารเคมี

น้ำยาฟอกขาวที่ใช้ในครัวเรือน

ใช้น้ำยาฟอกขาวชนิดธรรมดาที่ไม่มีกลิ่นหอม และไม่มีสารทำความสะอาดอื่นผสมอยู่ ตรวจความเข้มข้นจากฉลาก

- ความเข้มข้น 6%: ใช้ 8 หยดต่อน้ำ 4 ลิตร (1 แกลลอน) หรือ 2 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร
- ความเข้มข้น 8.25%: ใช้ 6 หยดต่อน้ำ 4 ลิตร (1 แกลลอน) หรือ 2 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร
- หากน้ำขุ่นหรือเย็นจัด ให้เพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่า

- คนให้เข้ากัน แล้วรอ 30 นาที น้ำควรมีกลิ่นคลอรีนจาง ๆ หากไม่มีกลิ่น ให้เติมซ้ำในปริมาณเดิมแล้วรออีก 15 นาที

เม็ดและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับน้ำดื่ม

คลอรีนไดออกไซด์ ไอโอดีน และเม็ดคลอรีนใช้ฆ่าเชื้อได้ดี ต้องทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเวลาที่ต้องรอ คลอรีนไดออกไซด์ยังฆ่าปรสิตที่ทนทาน เช่น คริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium) ได้เมื่อรอจนครบเวลา ซึ่งมักใช้ถึง 4 ชั่วโมง

ไอโอดีนไม่เหมาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ผู้มีปัญหาต่อมไทรอยด์ หรือการใช้ต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองแบบปั๊มหรือแบบบีบที่มีคุณภาพกำจัดแบคทีเรียและปรสิตได้ แต่ส่วนใหญ่กรองไวรัสไม่ได้ หากไม่แน่ใจ ให้กรองแล้วฆ่าเชื้ออีกครั้ง


ฆ่าเชื้อด้วยแสงอาทิตย์ (SODIS)

- ใส่น้ำใสลงในขวดพลาสติกใสชนิด PET ขนาดไม่เกิน 2 ลิตร
- วางรับแสงแดดเต็มที่ 6 ชั่วโมง หรือ 2 วัน หากท้องฟ้ามีเมฆมาก
- วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับน้ำขุ่นหรือในช่วงฝนตก

ดูเพิ่มเติม: ทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย

ทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย

เครื่องกรองหลายชั้นช่วยลดโคลน เศษสิ่งสกปรก และรสที่ไม่พึงประสงค์ได้บางส่วน แต่ไม่ได้ทำให้น้ำปลอดภัยสำหรับดื่มด้วยตัวมันเอง หลังกรองต้องต้มหรือฆ่าเชื้อเสมอ



ชั้นวัสดุของเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

- ภาชนะที่มีรูเล็กด้านล่าง เช่น ขวดพลาสติกตัดก้น ถังน้ำ หรือผ้าที่มัดเป็นกรวย
- ผ้าหรือหญ้า
- ทรายละเอียด
- ถ่านจากกองไฟ (ไม่ใช่ขี้เถ้า) บดเป็นชิ้นเล็ก ๆ
- กรวดหรือก้อนหินเล็ก

วิธีทำ

1. หากใช้ขวด ให้ตัดก้นขวดออกแล้วคว่ำปากลง อุดบริเวณคอขวดด้วยผ้าอย่างหลวม ๆ

2. ใส่วัสดุเรียงจากล่างขึ้นบนตามลำดับ: ผ้า กรวดเล็ก ทรายละเอียด ถ่านบด ทรายละเอียด แล้วปิดด้านบนด้วยผ้าหรือหญ้า

3. ให้แต่ละชั้นหนาหลายเซนติเมตร ยิ่งมีทรายและถ่านมาก น้ำยิ่งใสขึ้น
4. เทน้ำลงช้า ๆ ทิ้งน้ำชุดแรก เพราะมักมีฝุ่นถ่านปนออกมา
5. หากน้ำยังขุ่น อาจกรองซ้ำ 2-3 รอบตามความจำเป็น


ถ่านจากกองไฟไม่ใช่ถ่านกัมมันต์ ช่วยลดสีและรสได้ แต่กำจัดสารเคมีหรือเชื้อโรคได้ไม่แน่นอน

หลังกรอง

ต้มน้ำ เติมน้ำยาฟอกขาว หรือใช้เม็ดฆ่าเชื้อ ดู ทำน้ำให้ปลอดภัยสำหรับดื่ม

กลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์

เครื่องกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์ใช้ความร้อนดึงความชื้นออกจากดินและพืช แม้ให้น้ำเพียงเล็กน้อย แต่น้ำที่ได้เป็นน้ำกลั่นที่สะอาด



ภาพตัดขวางของหลุมกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์

วิธีทำ

1. ขุดหลุมรูปชาม กว้างประมาณ 90 ซม. (3 ฟุต) ลึก 60 ซม. (2 ฟุต) ในจุดที่รับแดด หากเป็นไปได้ให้เลือกดินชื้น
2. วางภาชนะรองน้ำไว้ตรงกลางก้นหลุม
3. วางพืชสดที่ไม่มีพิษรอบภาชนะเพื่อเพิ่มความชื้น โดยอย่าใส่ลงในภาชนะ
4. คลุมหลุมด้วยพลาสติกใส ใช้ดินและหินทับปิดขอบให้สนิท ไม่ให้อากาศรั่ว
5. วางหินก้อนเล็กไว้กลางแผ่นพลาสติก ให้แผ่นยุบลงเป็นกรวยโดยปลายอยู่เหนือภาชนะพอดี
6. ไอน้ำจะควบแน่นบนพลาสติก ไหลลงสู่จุดต่ำสุด แล้วหยดลงภาชนะ

ข้อแนะนำ

- ต่อสายดูดน้ำจากภาชนะออกมานอกหลุม จะได้ดื่มโดยไม่ต้องเปิดแผ่นพลาสติก

- เทน้ำเค็มหรือปัสสาวะลงในหลุมได้ แต่อย่าเทลงภาชนะรองน้ำ การกลั่นจะแยกน้ำสะอาดออกมา
- หากต้องพึ่งวิธีนี้เป็นหลัก ควรทำไว้หลายหลุม

หลุมกลั่นน้ำมักให้น้ำน้อยกว่า 1 ลิตรต่อวันมาก ขณะที่การขุดทำให้เสียเหงื่อ หากอยู่ในทะเลทรายร้อน ให้ทำช่วงเช้ามืดหรือพลบค่ำ และทำเมื่อไม่มีแหล่งน้ำที่ดีกว่าเท่านั้น

ภาวะขาดน้ำและปริมาณน้ำที่ต้องการ

ต้องดื่มน้ำเท่าใด

- เมื่อพักในอากาศไม่ร้อนหรือหนาวจัด: ประมาณ 2-3 ลิตรต่อวัน
- เมื่ออากาศร้อนหรือออกแรงหนัก: 4-6 ลิตรขึ้นไป
- อากาศหนาวและพื้นที่สูงก็ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้เร็วกว่าที่คิด

อย่าฝืนอดน้ำทั้งที่ยังมีน้ำอยู่ ให้ดื่มตามที่ร่างกายต้องการและพยายามหาเพิ่ม เคยมีคนเสียชีวิตจากการขาดน้ำทั้งที่ในขวดยังเหลือน้ำอยู่

อาการขาดน้ำ

- ระยะแรก: กระหายน้ำ ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม ปากแห้ง ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย
- เมื่อรุนแรงขึ้น: ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะ เวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว และสับสน
- ระยะรุนแรง: เป็นลม ไม่มีเหงื่อทั้งที่อากาศร้อน และตาลึกโหล ถือเป็นเหตุฉุกเฉิน

สังเกตสีปัสสาวะ หากเป็นสีเหลืองอ่อน แสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอ

ลดการสูญเสียน้ำของร่างกาย

- พักในร่มช่วงที่ร้อนที่สุด เดินทางในเวลากลางคืนหรือเช้าตรู่
- สวมเสื้อผ้าขณะอยู่กลางแดดเพื่อช่วยชะลอการเสียเหงื่อ
- หายใจทางจมูกและลดการพูดคุย
- เมื่อน้ำมีจำกัด ให้หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ คาเฟอีน อาหารเค็ม และอาหารที่มีโปรตีนสูงมาก
- หากน้ำเหลือน้อยมาก ให้กินอาหารแต่น้อย เพราะการย่อยอาหารต้องใช้น้ำ

ชดเชยน้ำที่เสียไป

- ค่อย ๆ จิบน้ำอย่างต่อเนื่อง แทนการดื่มรวดเดียวปริมาณมาก
- หากเสียเหงื่อมาก อาจเติมเกลือเล็กน้อยและน้ำตาลเล็กน้อยลงในน้ำ 1 ลิตร แต่ควรใช้ผงเกลือแร่สำหรับดื่มชดเชยน้ำ (ORS) สำเร็จรูป ซึ่งเหมาะสมที่สุด

การสำรองน้ำไว้ใช้ในบ้าน

ควรสำรองเท่าใด

- อย่างน้อย 4 ลิตร (1 แกลลอน) ต่อคนต่อวัน โดยแบ่งประมาณครึ่งหนึ่งสำหรับดื่ม อีกครึ่งสำหรับทำอาหารและชำระล้าง
- สำรองอย่างน้อย 3 วัน หากเก็บไว้ที่บ้าน ควรมีพอสำหรับ 2 สัปดาห์
- เตรียมเพิ่มสำหรับพื้นที่อากาศร้อน เด็ก มารดาที่ให้นมบุตร ผู้ป่วย และสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่าง: ครอบครัว 4 คน ใช้น้ำ 2 สัปดาห์ ต้องสำรองประมาณ 56 แกลลอน (210 ลิตร)

เลือกภาชนะ

- ดีที่สุด: น้ำดื่มบรรจุขวดที่ซื้อมาและยังปิดผนึก เก็บได้ถึงวันหมดอายุ
- ใช้ภาชนะสำหรับใส่อาหารและน้ำดื่ม มองหาคำว่า food grade หรือสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 1, 2 หรือ 4
- ขวดน้ำอัดลมขนาด 2 ลิตรที่ล้างสะอาดใช้ได้ดี
- ห้ามใช้ แกลลอนนมหรือน้ำผลไม้ เพราะมีเชื้อแบคทีเรียตกค้างและเสื่อมสภาพง่าย รวมถึงภาชนะที่เคยบรรจุสารเคมี

เมื่อต้องบรรจุน้ำเอง

1. ล้างภาชนะด้วยสบู่และน้ำร้อน แล้วล้างน้ำให้สะอาด
2. ฆ่าเชื้อโดยผสมน้ำยาฟอกขาวชนิดไม่มีกลิ่นหอม 1 ช้อนชา ในน้ำ 1 ลิตร (1 ควอร์ต) กลั้วให้ทั่วด้านในภาชนะ แล้วเททิ้ง
3. เติมน้ำประปาที่สะอาด หากเป็นน้ำที่ไม่ผ่านการเติมคลอรีน เช่น น้ำบ่อ ให้เติมน้ำยาฟอกขาวชนิดธรรมดาไม่มีกลิ่นหอม 2 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร
4. ปิดฝาให้แน่น โดยไม่สัมผัสด้านในฝา
5. ติดฉลากวันที่บรรจุ

เก็บอย่างไรให้น้ำคงคุณภาพ

- เก็บในที่เย็นและมืด ห่างจากเชื้อเพลิงและสารเคมี เพราะไอระเหยซึมผ่านพลาสติกได้
- เปลี่ยนน้ำที่บรรจุเอง ทุก 6 เดือน

แหล่งน้ำสำรองที่อาจมองข้ามในบ้าน

ในเหตุฉุกเฉินยังอาจใช้น้ำจากแหล่งต่อไปนี้ได้:

- ถังเครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ: ปิดไฟฟ้าหรือแก๊สก่อน แล้วเปิดวาล์วระบายด้านล่าง
- น้ำค้างในท่อ: เปิดก๊อกที่อยู่สูงที่สุดในบ้าน แล้วรองน้ำจากก๊อกที่อยู่ต่ำที่สุด
- น้ำแข็งก้อน
- ถังพักน้ำชักโครก ไม่ใช่โถส้วม ใช้ได้เมื่อไม่มีสารเคมีหรือก้อนทำความสะอาดอยู่ในถัง และต้องทำให้น้ำปลอดภัยก่อน

น้ำจากแหล่งเหล่านี้ต้องผ่านการทำให้ปลอดภัยก่อนดื่ม ดู ทำน้ำให้ปลอดภัยสำหรับดื่ม ห้ามดื่มน้ำจากเตียงน้ำ สระว่ายน้ำ หรือหม้อน้ำรถยนต์

พื้นฐานการก่อไฟ

ไฟให้ความอบอุ่น แสงสว่าง น้ำที่ปลอดภัย อาหารสุก สัญญาณขอความช่วยเหลือ และกำลังใจ ควรก่อให้พร้อมก่อนจะจำเป็นต้องใช้เร่งด่วน



สามเหลี่ยมไฟ: ความร้อน เชื้อเพลิง และออกซิเจน

ไฟต้องการอะไรบ้าง

- ความร้อน เพื่อเริ่มการติดไฟ
- เชื้อเพลิง สำหรับเผาไหม้
- ออกซิเจน อย่าเรียงไม้อัดแน่นเกินไป หากอากาศเข้าไม่ถึง ไฟจะดับ

เชื้อเพลิงสามขนาด



เชื้อจุดไฟ ไม้ชิ้นเล็ก และฟืน

- เชื้อจุดไฟ รับประกายไฟหรือเปลวไฟให้ติดได้ง่าย เช่น หญ้าแห้ง เปลือกเบิร์ช เปลือกซีดาร์ฉีกฝอย ใบสน ขนปุยธูปฤาษี สำลี กระดาษ และขี้กบ
- ไม้ชิ้นเล็กสำหรับต่อไฟ ช่วยให้เปลวไฟลุกต่อเนื่อง ใช้กิ่งไม้แห้งขนาดตั้งแต่ก้านไม้ขีดถึงดินสอ
- ฟืน ให้ไฟลุกอยู่ได้นาน เริ่มจากไม้ขนาดหัวแม่มือถึงข้อมือ แล้วจึงเพิ่มขนาด

เตรียมเชื้อเพลิงทั้งสามขนาดให้พร้อมก่อนจุดไฟ ไฟที่เพิ่งติดอาจดับระหว่างที่คุณเดินไปหากิ่งไม้เพิ่ม

หาไม้แห้งในอากาศเปียกชื้น

- ลองหักไม้: ไม้แห้งจะหักดังเป๊าะและขาดง่าย หากยังงอได้ แสดงว่าชื้นเกินไป
- ใช้กิ่งที่ตายแล้วแต่ยังติดอยู่กับต้น แทนไม้ที่ตกอยู่บนพื้น
- มองใต้ต้นไม้ไม่ผลัดใบที่มีพุ่มหนา ในตอไม้ผุ และใต้ชะง่อนที่กันฝนได้
- ผ่าไม้เปียกออก เพราะแกนด้านในมักยังแห้ง
- เหลาไม้แห้งเป็นฝอยหยิกบาง ๆ โดยให้ติดกับกิ่งไว้ เป็นไม้ขนนกสำหรับช่วยต่อไฟ
- ไม้สนที่มียางเรซินมากติดไฟได้แม้ยังชื้น

ค่อย ๆ เพิ่มขนาดกองไฟ

จุดเชื้อไฟก่อน แล้วเติมไม้ชิ้นเล็กครั้งละไม่กี่ชิ้น เมื่อไม้เล็กติดไฟดีแล้วจึงใส่ฟืนใหญ่ขึ้น หากไฟติดยาก ให้เป่าเบา ๆ ที่โคนกองไฟ

รูปแบบการจัดกองฟืน



กองฟืนทรงกระโจมและแบบกระท่อม

ทรงกระโจม

วางเชื้อจุดไฟไว้ตรงกลาง แล้วพิงกิ่งไม้เล็กโดยรอบเป็นทรงกรวย เว้นช่องด้านรับลมไว้จุดไฟ กองไฟแบบนี้ร้อนและลุกเร็ว เหมาะสำหรับเริ่มก่อไฟและต้มน้ำ

แบบกระท่อม

เริ่มจากกองฟืนทรงกระโจมเล็ก ๆ แล้ววางไม้เป็นคู่ล้อมรอบ แต่ละชั้นวางตั้งฉากสลับกันเหมือนผนังกระท่อม ให้ความร้อนสม่ำเสมอและเหลือถ่านคุที่เหมาะสำหรับทำอาหาร

แบบเพิง

ปักกิ่งไม้สดลงดินให้เอนเหนือเชื้อไฟ หรือวางท่อนไม้หนาไว้ด้านรับลม แล้วพิงกิ่งไม้เล็กเข้ากับไม้หลัก ท่อนไม้จะช่วยบังลมให้ไฟที่เพิ่งเริ่มติด

รูปดาว

วางท่อนไม้หลายท่อนให้แผ่ออกเหมือนซี่ล้อ โดยให้ปลายด้านในมาบรรจบกันที่กองไฟ ค่อย ๆ ดันไม้เข้าไปเมื่อปลายไหม้สั้นลง ช่วยประหยัดฟืนและเลี้ยงไฟได้ตลอดคืน

หลุมไฟดาโกตา

ขุดหลุมสำหรับก่อไฟ กว้างและลึกประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) ขุดอีกหลุมไว้ข้างกันทางด้านรับลม แล้วเชื่อมก้นหลุมทั้งสองด้วยอุโมงค์ให้อากาศไหลผ่าน กองไฟแบบนี้ร้อน ใช้ฟืนน้อย สังเกตเห็นได้ยาก และทนลมได้ดี

หากก่อไฟบนหิมะ ให้ทำฐานรองจากท่อนไม้สดหรือก้อนหิน เพื่อไม่ให้ไฟละลายหิมะจนกองไฟจมและดับ

วิธีจุดไฟ

พกอุปกรณ์จุดไฟอย่างน้อยสองวิธี การปั่นไฟด้วยแรงเสียดทานควรเป็นทางเลือกสุดท้าย ไม่ใช่แผนหลัก

ไฟแช็กและไม้ขีด

- ไฟแช็กใช้แล้วทิ้งราคาทั่วไปเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุด เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อที่อุ่น เพราะไฟแช็กที่เย็นจัดอาจจุดไม่ติด
- เก็บไม้ขีดในภาชนะปิดสนิทกันน้ำ ขีดไม้ขีดออกห่างจากตัว แล้วใช้มือบังลมให้เปลวไฟ

แท่งเฟอร์โรซีเรียม หรือแท่งจุดไฟ

1. วางปลายแท่งจุดไฟชิดอยู่ในเชื้อจุดไฟ
2. ถือแผ่นขูดให้นิ่ง แล้วดึงแท่งจุดไฟถอยหลังแรง ๆ ให้ประกายตกลงบนเชื้อไฟโดยไม่กระแทกให้กองเชื้อไฟกระจาย
3. ใช้เชื้อไฟที่แห้งและละเอียดมาก เช่น สำลีชุบปิโตรเลียมเจลลี ขนปุยธูปฤาษี หรือเปลือกไม้ขูดฝอย

แบตเตอรี่กับฝอยเหล็ก

แตะขั้วทั้งสองของแบตเตอรี่ 9 โวลต์กับฝอยเหล็กละเอียด หรือใช้เส้นฝอยเหล็กเชื่อมขั้วของถ่านไฟฉาย ฝอยเหล็กจะร้อนแดงจนจุดเชื้อไฟได้ ขณะเก็บสัมภาระ ต้องแยกฝอยเหล็กออกจากแบตเตอรี่

ใช้เลนส์รวมแสง

แว่นขยาย แว่นสายตายาว หรือขวดใสที่บรรจุน้ำ ใช้รวมแสงแดดไปยังเชื้อไฟสีเข้มได้ ต้องมีแดดจัดจึงจะใช้ได้ผล

คันธนูปั่นไฟ (ทางเลือกสุดท้าย)

1. แผ่นไม้รอง: ใช้ไม้เนื้ออ่อนที่ตายแล้วและแห้ง เช่น วิลโลว์ ซีดาร์ ป็อปลาร์ หรือบาสวูด หนาประมาณ 2 ซม.

2. แกนปั่น: ใช้กิ่งตรงและแห้งจากไม้ชนิดเดียวกัน หนาเท่าหัวแม่มือ ยาวประมาณ 20 ซม.

3. ตัวกดแกน: ใช้ไม้เนื้อแข็งหรือหินที่มีรอยบุ๋ม กดลงบนปลายแกนปั่น

4. คันธนู: ใช้กิ่งโค้งยาวประมาณหนึ่งช่วงแขน ผูกเชือกให้หย่อนพอที่จะพันรอบแกนปั่นได้

5. ทำร่องจากขอบแผ่นไม้รองเข้าถึงหลุมเล็กที่ปั่นไว้จนมีรอยไหม้ กดแกนลงพร้อมชักคันธนูยาว ๆ อย่างสม่ำเสมอให้แกนหมุนเร็ว

6. เมื่อผงไม้เต็มร่อง มีควัน และยังคุอยู่ได้เอง แสดงว่าได้เชื้อไฟคุแล้ว เทลงในก้อนเชื้อจุดไฟ แล้วเป่าเบา ๆ จนเกิดเปลวไฟ

การจุดไฟด้วยแรงเสียดทานต้องฝึกฝนและใช้แรงมาก ควรเรียนรู้ก่อนถึงคราวจำเป็น

ใช้ไฟอย่างปลอดภัย

เลือกจุดก่อไฟ

- เคลียร์พื้นที่เป็นวงกว้าง 3 ม. (10 ฟุต) เอาใบไม้และหญ้าแห้งออกจนถึงหน้าดิน
- อยู่ให้ห่างจากกิ่งไม้ที่ยื่นอยู่เหนือศีรษะ รากไม้ ชั้นพีต และหญ้าแห้ง
- อย่าก่อไฟชิดหินก้อนใหญ่ที่ตั้งใจจะนั่งพิง หินเปียกจากแม่น้ำอาจแตกร้าวหรือระเบิดเมื่อร้อน
- สังเกตทิศทางลม ในอากาศแห้ง ประกายไฟปลิวไปได้ไกล

คาร์บอนมอนอกไซด์

ห้ามก่อไฟ ใช้เตา เผาถ่าน หรือเดินเครื่องปั่นไฟ ภายในเต็นท์ปิด รถ ถ้ำหิมะ หรือห้องเล็ก ๆ คาร์บอนมอนอกไซด์ไม่มีกลิ่น และอาจทำให้เสียชีวิตขณะหลับ

อาการได้รับพิษ ได้แก่ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ สับสน และง่วงซึม ให้พาผู้ป่วยออกสู่อากาศบริสุทธิ์ทันที

ดับกองไฟให้สนิท

1. หากทำได้ ปล่อยให้ฟืนไหม้จนเหลือขี้เถ้า

2. ราดน้ำแล้วคนขี้เถ้าให้ทั่ว เติมน้ำและคนซ้ำอีกครั้ง

3. หากมีน้ำน้อย ให้ใช้ดินหรือทรายกลบแล้วคนให้ทั่ว แต่อย่าฝังทิ้งไว้เฉย ๆ เพราะถ่านที่ฝังอยู่อาจยังร้อนนานถึงหนึ่งวัน

4. ยื่นหลังมือเข้าใกล้เพื่อตรวจความร้อน หากยังร้อนจนแตะไม่ได้ ก็ยังไม่ปลอดภัยที่จะเดินจากไป

เมื่อไฟป่าเข้ามาใกล้

- ไปยังพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงน้อย เช่น ลานหิน ลานกรวด พื้นที่เพิ่งถูกไฟไหม้ หรือข้ามแม่น้ำกว้างไปอีกฝั่ง
- เคลื่อนลงที่ต่ำและเดินขวางแนวลาด หลีกเลี่ยงการขึ้นเขา เพราะไฟลามขึ้นเนินได้รวดเร็ว
- ปกปิดผิวด้วยเสื้อผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้าย แทนใยสังเคราะห์ และหายใจผ่านผ้าชื้น

ทำอาหารบนกองไฟ

ใช้ถ่านคุแทนเปลวไฟ

เปลวไฟทำให้อาหารไหม้ด้านนอกแต่ยังดิบด้านใน ควรรอให้กองไฟเหลือถ่านแดงคุ หรือเขี่ยถ่านมาด้านหนึ่งเพื่อทำอาหาร แล้วปล่อยให้อีกด้านยังลุกอยู่

ทดสอบความร้อนด้วยมือ: ยื่นฝ่ามือเหนือถ่านประมาณ 10 ซม. (4 นิ้ว)

- ทนได้เพียง 2 วินาที: ร้อนจัด
- ทนได้ 4-5 วินาที: ความร้อนปานกลาง เหมาะกับการทำอาหารส่วนใหญ่
- ทนได้ 6-8 วินาที: ไฟอ่อน เหมาะกับการเคี่ยว

วิธีทำอาหาร

- ต้ม: ปลอดภัยที่สุดสำหรับอาหารที่ไม่แน่ใจ และช่วยทำให้น้ำปลอดภัยด้วย แขวนหม้อกับขาตั้งสามขาหรือรองด้วยหินหรือท่อนไม้สด
- ห่อฟอยล์: ห่ออาหารด้วยฟอยล์สองชั้นแล้ววางบนถ่าน พลิกหนึ่งครั้ง ผักใช้เวลา 15-20 นาที ปลาใช้เวลาประมาณ 10 นาที
- เสียบไม้หรือย่างบนแกน: ใช้กิ่งไม้สดเพื่อไม่ให้ไหม้ขาด หลีกเลี่ยงไม้มีพิษ เช่น ยิวและยี่โถ
- ย่างบนหินร้อน: อังหินแบนที่แห้งไว้ริมกองไฟ แล้วใช้เป็นกระทะ
- อบในหลุม: เผาหินให้ร้อนในหลุม เขี่ยฟืนและถ่านออก ห่ออาหารด้วยใบไม้สด กลบดิน แล้วทิ้งไว้หลายชั่วโมง

ห้ามเผาหินจากแม่น้ำ ทะเลสาบ หรือพื้นดินเปียก น้ำที่อยู่ภายในอาจทำให้หินแตกร้าวหรือระเบิดได้

ทำเนื้อให้สุกทั่วถึง

เนื้อสัตว์ป่าและปลาอาจมีปรสิต ปรุงจนของเหลวจากเนื้อใสและไม่มีสีชมพูหลงเหลือ

- สัตว์ปีกและนก: อุณหภูมิภายใน 74°C (165°F)
- เนื้อบดหรือเนื้อสับ: 71°C (160°F)

- เนื้อสัตว์ป่าที่เป็นชิ้น: 71°C (160°F) ปลอดภัยที่สุดสำหรับเนื้อสัตว์ป่า
- ปลา: เนื้อทึบแสงและแยกเป็นชิ้นได้ง่าย

ความปลอดภัย

- เตรียมหม้อน้ำหรือกองดินไว้ข้างจุดทำอาหาร
- ใช้ไม้หรือผ้าจับหม้อร้อน เพราะหูจับโลหะร้อนจัดได้
- ล้างมือก่อนจับอาหาร และแยกเนื้อดิบออกจากอาหารสุก

ก่อไฟในสภาพอากาศเปียกชื้น

หาเชื้อเพลิงที่แห้ง

- กิ่งที่ตายแล้วแต่ยังติดอยู่กับต้น มักแห้งกว่าไม้บนพื้น ลองหักดู หากหักดังเป๊าะ แสดงว่าด้านในแห้ง
- มองใต้ชะง่อนหิน พุ่มสนหนาทึบ ท่อนไม้ หรือต้นไม้ล้ม
- ผ่าไม้ออกดู ด้านในยังแห้งได้ แม้ผิวนอกจะเปียก
- ไม้สนที่มียางเรซินมาก บริเวณตอหรือโคนกิ่ง และเปลือกเบิร์ช ติดไฟได้แม้เปียก ควรมองหาไม้ตายที่ยังยืนต้นและเปลือกไม้แห้ง

เตรียมเชื้อจุดไฟแห้ง

- ไม้ขนนก: เหลากิ่งไม้แห้งให้เป็นฝอยหยิกบาง ๆ โดยไม่ตัดให้ขาดจากกิ่ง ฝอยเหล่านี้ติดไฟได้ง่าย
- ขุยผ้าจากกระเป๋า สำลีชุบปิโตรเลียมเจลลี ขุยผ้าจากเครื่องอบ และวัสดุช่วยจุดไฟ ใช้ได้ดี
- ใช้หญ้า เปลือกไม้ และใบไม้แห้งจากจุดที่กันฝนได้ หรือเก็บไว้ด้านในเสื้อผ้า
- เก็บเชื้อจุดไฟในถุงหรือในเสื้อแจ็กเก็ตจนกว่าจะใช้

เริ่มก่อไฟ

1. เลือกจุดที่หลบฝนได้ เช่น ใต้พุ่มต้นไม้ ใต้ชะง่อนหิน หรือใต้ผ้าใบ
2. ทำฐานรอง จากหินแบน ท่อนไม้สด หรือเปลือกไม้ เพื่อไม่ให้กองไฟสัมผัสพื้นเปียก
3. ใช้เชื้อจุดไฟเล็กน้อย และเตรียมไม้ต่อไฟจำนวนมาก ตั้งแต่ขนาดดินสอถึงหัวแม่มือให้พร้อมก่อนจุด
4. จัดไม้เป็นทรงกระโจม หรือพิงท่อนไม้เป็นเพิง เริ่มจากไม้เล็กแล้วค่อยเพิ่มขนาด
5. จุดไฟ ใช้ตัวหรือฉากบังลมช่วยกำบัง เมื่อไฟเริ่มติดให้เติมกิ่งไม้ขนาดดินสอ

เลี้ยงไฟให้ติดอยู่

- วางไม้เปียกข้างกองไฟให้แห้งก่อนใส่ลงไป

- เติมกิ่งไม้เล็ก อย่าใส่ไม้ใหญ่จนกองไฟอับอากาศ
- ทำแนวท่อนไม้หรือหินด้านหลังกองไฟเพื่อสะท้อนความร้อน
- เก็บไม้แห้งสำรองไว้ใต้ที่กำบังสำหรับใช้ภายหลัง

ฝนดับกองไฟที่ยังอ่อนได้รวดเร็ว อย่าเริ่มจุดจนกว่าจะเตรียมเชื้อเพลิงพอ ตั้งแต่เชื้อจุดไฟจนถึงไม้ขนาดข้อมือ

เลือกที่ตั้งและสร้างที่พัก

เมื่ออากาศหนาว เปียกชื้น หรือมีลมแรง ที่พักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถัดจากการปฐมพยาบาล ที่พักที่ดีควรมีขนาดเล็ก แห้ง กันลม และมีฉนวนรองรับจากพื้น

ร่างกายสูญเสียความร้อนทางใด

- การนำความร้อน: เมื่อสัมผัสพื้นหรือหินเย็น พื้นดึงความร้อนออกจากร่างกายได้เร็วที่สุด จึงต้องปูฉนวนรองตัวก่อน
- การพาความร้อน: ลมพัดพาความร้อนออกไป
- การระเหย: จากเสื้อผ้าเปียกและเหงื่อ
- การแผ่รังสี: ความร้อนจากร่างกายแผ่ออกสู่ท้องฟ้าเปิด

เลือกจุดตั้งที่พัก

- พื้นราบ สูงกว่าบริเวณรอบข้างเล็กน้อย และระบายน้ำดี
- ใกล้วัสดุก่อสร้าง ฟืน และแหล่งน้ำ แต่ห่างจากลำธารอย่างน้อย 60 ม. (200 ฟุต)
- มีที่บังลม เช่น หลังก้อนหิน แนวต้นไม้หนาทึบ หรือสันเนิน

บริเวณที่ควรหลีกเลี่ยง

- ใต้ต้นไม้ตายหรือกิ่งไม้หักค้าง ที่อาจร่วงลงมา
- ท้องลำธารแห้งและก้นหุบเขา เพราะอาจมีน้ำหลาก และอากาศเย็นจะไหลมารวมกันในเวลากลางคืน
- เชิงหน้าผาที่เสี่ยงหินร่วง และลาดเขาที่เสี่ยงหิมะถล่ม
- รังแมลงและทางเดินของสัตว์

รองพื้นใต้ตัวด้วยใบไม้แห้ง หญ้า กิ่งสน หรือกระเป๋าสัมภาระ ให้หนาอย่างน้อย 10-20 ซม. (4-8 นิ้ว) แม้จะนอนในเต็นท์ เพราะวัสดุเหล่านี้ยุบตัวเมื่อถูกทับ

เตรียมก่อนฟ้ามืด

เริ่มทำที่พักก่อนพระอาทิตย์ตกอย่างน้อยสองชั่วโมง การก่อสร้างในความมืดทั้งช้าและอันตราย

เหตุนิวเคลียร์: เข้าที่กำบังและติดตามข่าว

เหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์หรือรังสีทุกแบบใช้สามขั้นตอนเดียวกัน: เข้าที่กำบัง อยู่ในที่กำบัง และติดตามข่าว อย่าพยายามหนีฝุ่นกัมมันตรังสีด้วยการวิ่งหรือขับรถแข่งกับมัน

หากเห็นแสงวาบ

- อย่ามอง หันหน้าหนีและหลับตา
- หลบหลังสิ่งกำบังที่แข็งแรงทันที หรือนอนราบป้องศีรษะ คลื่นแรงระเบิดจะตามมาในไม่กี่วินาที
- อยู่ต่ำไว้อย่างน้อย 30 วินาที แล้วจึงเข้าอาคาร

1. เข้าที่กำบัง

- เข้าอาคารแข็งแรงที่ใกล้ที่สุด อาคารอิฐหรือคอนกรีตเหมาะที่สุด
- จุดที่ดีที่สุดคือกลางห้องใต้ดิน หรือกลางอาคารขนาดใหญ่ ห่างจากผนังภายนอกและหลังคา
- ยิ่งมีวัสดุหนาหนักกั้นระหว่างคุณกับภายนอกมากยิ่งดี ฝุ่นกัมมันตรังสีเป็นฝุ่นที่ปล่อยรังสี อันตรายลดลงเมื่ออยู่ห่างและเวลาผ่านไป
- หากอยู่ในรถ ให้เข้าอาคาร รถไม่สามารถกำบังรังสีได้

2. อยู่ในที่กำบัง

- อยู่ภายในอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น
- ปิดและล็อกประตูหน้าต่าง ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความร้อนที่ดึงอากาศจากภายนอก ปิดแผ่นกั้นปล่องเตาผิง
- ไปยังชั้นต่ำที่สุดและอยู่กลางอาคาร
- ฝุ่นกัมมันตรังสีปล่อยรังสีรุนแรงที่สุดในช่วงชั่วโมงแรก ๆ แล้วลดลงอย่างรวดเร็ว

3. ติดตามข่าว

- ใช้วิทยุใช้ถ่าน วิทยุมือหมุน โทรศัพท์ หรือ Wi-Fi ของอุปกรณ์นี้หากมีผู้นำข้อมูลล่าสุดมาใส่ไว้
- ฟังประกาศว่าจะต้องอยู่ต่ออีกนานเท่าใดและควรไปที่ไหน เจ้าหน้าที่อาจให้ย้ายไปยังที่กำบังที่ดีกว่า
- งดโทรออกหากไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เครือข่ายว่างสำหรับการช่วยเหลือ

หากเคยอยู่กลางแจ้ง

- ถอดเสื้อชั้นนอกก่อนเข้าอาคาร เพื่อลดฝุ่นส่วนใหญ่ ดูหัวข้อ “ชำระฝุ่นกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัย”

- ล้างผิวหนังและเส้นผมด้วยสบู่และน้ำ

ชำระฝุ่นกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัย

สิ่งตกค้างกัมมันตรังสีมาในรูปของฝุ่น การเอาฝุ่นออกจากร่างกายและป้องกันไม่ให้ปนอาหารหรือน้ำช่วยลดอันตรายได้ส่วนใหญ่

หากอยู่กลางแจ้งขณะฝุ่นกัมมันตรังสีตก

1. ถอดเสื้อผ้าชั้นนอก ก่อนเข้าอาคาร หรือทันทีเมื่อเข้าไปแล้ว ค่อย ๆ ถอดเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้ง วิธีนี้ลดการปนเปื้อนได้ส่วนใหญ่
2. ใส่เสื้อผ้าในถุงพลาสติกปิดสนิท เก็บให้ห่างจากคนและสัตว์เลี้ยง
3. ชำระล้าง: อาบน้ำหรือใช้สบู่กับน้ำล้างตัว โดยถูเบา ๆ สระผมด้วยแชมพู
4. อย่าใช้ครีมนวดผม เพราะอาจทำให้ฝุ่นยึดติดกับเส้นผม
5. อย่าขัดแรงหรือเกาผิว สั่งน้ำมูก เช็ดเปลือกตา และเช็ดหู
6. เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าสะอาด
7. หากอาบน้ำไม่ได้ ให้ใช้ผ้าสะอาดชื้นหรือทิชชูเปียกเช็ดผิวหนังและเส้นผม

สัตว์เลี้ยง

- ล้างตัวด้วยสบู่และน้ำ แล้วให้อยู่ในอาคาร

อาหารและน้ำ

- อาหารในภาชนะปิดสนิท เช่น กระป๋องและขวด รับประทานได้หลังเช็ดภายนอกสะอาด
- อาหารในตู้เย็น ตู้แช่แข็ง หรือบรรจุภัณฑ์ปิดอยู่ยังปลอดภัย
- อย่ากินอาหารที่วางกลางแจ้งโดยไม่มีสิ่งปิดคลุม หรืออาจมีฝุ่นตกใส่
- น้ำในท่อ ถังเครื่องทำน้ำร้อน และขวดปิดสนิทดื่มได้ แต่น้ำที่เปิดสัมผัสอากาศภายนอกอาจไม่ปลอดภัย
- อย่าดื่มน้ำจากแหล่งเปิดจนกว่าเจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าปลอดภัย

เมื่อมีผู้บาดเจ็บหรือป่วย

- ให้การปฐมพยาบาลตามปกติ การปนเปื้อนไม่ควรเป็นเหตุให้ละทิ้งผู้บาดเจ็บ ทำความสะอาดแผลหากทำได้
- เข้ารับการรักษาเร่งด่วนเมื่อออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย

ฝุ่นกัมมันตรังสี: หลบภัยนานเท่าใด

รังสีจากฝุ่นกัมมันตรังสีลดลงเร็ว ให้ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ว่าจะออกจากที่กำบังเมื่อใด หากยังไม่มีคำแนะนำ ให้ใช้หลักต่อไปนี้

หลักประมาณ 7-10

- ทุกครั้งที่เวลาหลังระเบิดเพิ่มเป็น 7 เท่า ระดับรังสีจะลดเหลือหนึ่งในสิบ
- หลัง 7 ชั่วโมง จะเหลือประมาณ 1/10 ของระดับเมื่อผ่านไป 1 ชั่วโมง
- หลัง 49 ชั่วโมง (ประมาณ 2 วัน) จะเหลือประมาณ 1/100
- หลังประมาณ 2 สัปดาห์ จะเหลือประมาณ 1/1000
- หลักนี้เป็นเพียงการประมาณสำหรับฝุ่นกัมมันตรังสี ไม่ใช้แทนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ควรหลบภัยนานเท่าใด

- อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และนานกว่านั้นหากทำได้ วันแรกอันตรายที่สุด
- หากจำเป็นต้องออกไปหาสิ่งจำเป็น ให้อยู่นอกอาคารสั้นที่สุด ปกปิดผิว จมูก และปาก แล้วชำระล้างตามขั้นตอนเมื่อกลับมา
- ย้ายที่เมื่อเจ้าหน้าที่สั่ง หรืออาคารเสียหายหรือเกิดไฟไหม้เท่านั้น

โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI)

- KI ป้องกันต่อมไทรอยด์จากไอโอดีนกัมมันตรังสี แต่ไม่ป้องกันรังสีชนิดอื่น
- กินเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำเท่านั้น การกินมากเกินไปเป็นอันตรายได้
- ยานี้ไม่ใช้แทนการหลบในที่กำบัง

ช่วยเหลือผู้อื่น

- หากทำได้โดยไม่ต้องออกนอกอาคาร ให้ตรวจดูเพื่อนบ้านที่เคลื่อนไหวลำบาก
- แบ่งปันข้อมูลจากหน่วยงานทางการ ไม่ส่งต่อข่าวลือ

ที่พักแบบเพิงลาด

เพิงลาดสร้างได้รวดเร็ว เหมาะกับการก่อไฟไว้ด้านหน้า ช่วยบังลมและฝนได้ด้านหนึ่ง



เพิงลาดและแนวสะท้อนความร้อนจากกองไฟ

วิธีสร้าง

1. หาต้นไม้สองต้นที่ห่างกันประมาณ 2-3 ม. หรือปักไม้ปลายง่ามสองต้นลงดิน
2. ผูกหรือขัดไม้สันหลังคา ที่แข็งแรงพาดระหว่างต้นไม้ ให้สูงประมาณระดับอก
3. พิงไม้ยาวกับสันหลังคาทางด้านรับลม เรียงชิดกันโดยให้เอียงประมาณ 45-60 องศา
4. สอดกิ่งไม้เล็กขวางโครงไม้ยาว
5. มุงด้วยเปลือกไม้ กิ่งไม้ที่มีใบ หญ้า หรือผ้าใบ เริ่มจากด้านล่างแล้วซ้อนชั้นบนทับชั้นล่างเหมือนกระเบื้องหลังคา
6. ปูวัสดุแห้งเป็นที่นอนหนา ๆ ภายใน

เพิ่มแนวสะท้อนความร้อน

ก่อไฟห่างจากด้านเปิดของเพิงประมาณหนึ่งก้าว ด้านหลังกองไฟให้ปักหลักแล้วเรียงท่อนไม้สดเป็นกำแพง

เพื่อสะท้อนความร้อนกลับเข้ามาในที่พัก

ด้านหลังของเพิงต้องหันรับลม ตรวจทิศทางลมก่อนเริ่มสร้าง และคอยสังเกตเมื่อทิศลมเปลี่ยน

กระท่อมใบไม้และกิ่งไม้

กระท่อมใบไม้ช่วยรักษาความอบอุ่นได้โดยไม่มีกองไฟ ถุงนอน หรือเครื่องมือ ทำหน้าที่เหมือนถุงนอนใบใหญ่ที่ทำจากใบไม้



ภาพตัดขวางกระท่อมใบไม้และกิ่งไม้

วิธีสร้าง

1. หาไม้สันหลังคา ที่ยาวกว่าส่วนสูงของคุณเล็กน้อย
2. พาดปลายด้านหนึ่งบนตอไม้ ก้อนหิน หรือไม้สองท่อนที่ไขว้กัน ให้สูงประมาณเอว อีกปลายวางบนพื้น
3. ลองนอนใต้ไม้เพื่อตรวจขนาด ให้มีที่พอสำหรับตัวคุณเท่านั้น ยิ่งใหญ่ยิ่งหนาว

4. พิงกิ่งไม้ชิดกันตามแนวทั้งสองด้าน คล้ายโครงซี่โครง

5. วางกิ่งเล็กสานขวางโครง เพื่อรองไม่ให้ใบไม้ร่วงลงมา

6. กองใบไม้แห้ง หญ้า ใบสน และเศษวัสดุธรรมชาติทับจนผนังหนา 60-90 ซม. (2-3 ฟุต) หากกลางคืนหนาวมากให้เพิ่มความหนา

7. วางกิ่งไม้ทับด้านบนอีกชั้น เพื่อกันลมพัดใบไม้ปลิว

8. ใส่ใบไม้แห้งไว้ด้านในให้เป็นที่นอนหนา ๆ และเตรียมอีกกองไว้ตรงทางเข้า

9. คลานเอาเท้าเข้าไปก่อน แล้วดึงกองใบไม้มาปิดทางเข้า

วิธีนี้ใช้ใบไม้และวัสดุปริมาณมาก และมักต้องทำงานหลายชั่วโมง ควรเริ่มแต่เนิ่น ๆ และเก็บวัสดุให้มากกว่าที่คิดว่าจะใช้

ทำที่พักจากผ้าใบหรือเสื้อกันฝน

ผ้าใบเป็นวัสดุที่ทำที่พักได้รวดเร็วที่สุด แม้แต่ถุงขยะใบใหญ่หรือผ้าห่มฉุกเฉินก็ใช้ทำหลังคาได้



ที่พักผ้าใบทรงจั่ว

หลังคาทรงจั่ว

1. ผูกเชือกให้ตึงระหว่างต้นไม้สองต้น สูงประมาณเอวถึงอก
2. พาดผ้าใบบนเชือก ให้ห้อยลงทั้งสองข้างเท่า ๆ กัน
3. ใช้สมอบกหรือของหนักยึดมุมผ้า ดึงออกด้านข้างจนผ้าตึง
4. หากลมแรง ให้ลดด้านรับลมลงต่ำ หรือให้แนบถึงพื้น

เพิงผ้าใบ

ผูกขอบบนของผ้าใบตามเชือกสันหลังคา แล้วตรึงขอบล่างกับพื้นทางด้านรับลม เหมาะกับการก่อไฟไว้ด้านหน้า

ข้อแนะนำ

- หากผ้าไม่มีรูตาไก่ ให้ห่อหินก้อนเล็กไว้ที่มุมผ้า แล้วผูกเชือกรัดรอบก้อนหิน
- ทำหลังคาให้ชันพอที่น้ำฝนจะไหลลงได้
- ขุดร่องตื้นทางด้านเนินสูง เพื่อเบี่ยงน้ำให้ไหลอ้อมที่พัก
- ใช้เงื่อนที่แก้ออกได้ เงื่อนปรับตึงหรือเงื่อนผูกของท้ายรถช่วยดึงเชือกให้ตึงได้

ผ้าห่มฉุกเฉินสะท้อนความร้อนกลับสู่ร่างกาย แต่กักความชื้นที่ควบแน่นไว้ด้วย หากทำได้ ให้ห่มไว้ด้านนอกวัสดุฉนวน แทนการแนบกับผิวหนัง

ที่พักในอากาศหนาวและหิมะ

จำหลัก COLD เพื่อให้อบอุ่น

- C - Clean (สะอาด): เสื้อผ้าสกปรกกักความร้อนได้ลดลง
- O - avoid Overheating (อย่าให้ร้อนเกิน): ถอดเสื้อบางชั้นออกก่อนเริ่มมีเหงื่อ
- L - Loose layers (หลวมและหลายชั้น): เสื้อผ้ารัดแน่นขัดขวางการไหลเวียนเลือด
- D - Dry (แห้ง): เสื้อผ้าเปียกดึงความร้อนออกเร็วมาก ถุงเท้าแห้งสำคัญเป็นพิเศษ

ที่พักแบบร่องหิมะ

1. ขุดร่องในหิมะที่แน่น ให้ยาวเท่าตัวและลึกประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)
2. ใช้กิ่งไม้ สกี หรือผ้าใบทำหลังคา แล้วกองหิมะทับด้านบน
3. ปูพื้นด้วยวัสดุฉนวนหนา ๆ เช่น กิ่งไม้ กระเป๋าสัมภาระ หรือแผ่นโฟม

กระท่อมกองหิมะ (Quinzee)

1. กองหิมะให้สูงประมาณ 2 ม. (7 ฟุต) ผสมหิมะต่างชั้นให้เข้ากันระหว่างกอง
2. รอให้หิมะอัดตัว 1-2 ชั่วโมง
3. ปักกิ่งไม้ลึกเข้าไปประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) ให้ทั่วกอง เพื่อใช้เป็นตัวบอกความหนาผนัง
4. ขุดทางเข้าต่ำ ๆ แล้วคว้านด้านในจนถึงปลายกิ่งไม้
5. เจาะช่องอากาศ ขนาดกำปั้นบนหลังคา

ที่พักหิมะทุกแบบต้องมีช่องระบายอากาศ และต้องดูแลไม่ให้อุดตัน เก็บอุปกรณ์ขุดไว้ด้านในกับตัวเสมอ

โพรงใต้ต้นไม้

ใต้ต้นไม้ไม่ผลัดใบขนาดใหญ่ หิมะใกล้ลำต้นมักตื้นกว่าโดยรอบ ขุดพื้นที่บริเวณนั้น แล้วทำหลังคาด้วยกิ่งไม้

ใช้ความร้อนจากร่างกาย

- กินอาหารก่อนนอน เพราะการย่อยอาหารให้ความร้อน
- ออกกำลังกายเบา ๆ ก่อนเข้าที่พัก แต่อย่าจนมีเหงื่อ
- ใส่ขวดน้ำร้อนไว้ในเสื้อผ้าหรือถุงนอน
- อยู่ชิดกับผู้อื่นเพื่อแบ่งปันความอบอุ่น

ที่พักในทะเลทรายและอากาศร้อน

ในอากาศร้อน สิ่งสำคัญของที่พักคือร่มเงา เป้าหมายคือประหยัดน้ำในร่างกายด้วยการลดการเสียเหงื่อ

ทำร่มเงาอย่างง่าย

- ใช้ร่มเงาธรรมชาติ เช่น ชะง่อนหิน ด้านร่มของก้อนหินใหญ่ หรือพุ่มไม้
- ขึงผ้าใบหรือผ้าห่มสูงจากพื้น 30-45 ซม. (12-18 นิ้ว) หากมีผ้าอีกผืน ให้ขึงซ้อนด้านบนโดยเว้นช่องอากาศระหว่างชั้น ซึ่งช่วยลดความร้อนได้มาก

ที่พักต่ำกว่าระดับพื้น

1. ขุดร่องลึก 45-60 ซม. (18-24 นิ้ว) ยาวเท่าตัว โดยวางแนวตะวันออก-ตะวันตก
2. กองทรายไว้ตามขอบ
3. คลุมด้วยผ้าใบ แล้วขึงอีกชั้นโดยเว้นช่องว่างระหว่างกัน

ดินที่ลึกลงไป 30 ซม. อาจเย็นกว่าผิวดินมาก ควรขุดช่วงเช้ามืดหรือพลบค่ำ ไม่ใช่ตอนเที่ยง

พฤติกรรมที่ช่วยลดความร้อน

- พักในช่วงกลางวันที่ร้อน ทำงานและเดินทางตอนกลางคืนหรือเช้าตรู่
- ปกปิดผิวด้วยเสื้อผ้าสีอ่อนที่หลวมสบาย และสวมหมวก
- อย่านอนบนพื้นร้อนโดยตรง ให้นั่งบนกระเป๋าหรือกิ่งไม้
- ระวังงูและแมงป่องที่หลบอยู่ในร่ม ตรวจดูก่อนสอดมือเข้าไป

รถ เพิงโลหะ และเต็นท์ที่ตากแดดเต็มที่อาจร้อนจนเป็นอันตรายถึงชีวิต ควรเลือกที่ร่มซึ่งอากาศถ่ายเทได้

นอนให้อบอุ่น

คืนที่หนาวจัดทำให้ทรมาน เป็นอันตราย และบั่นทอนการตัดสินใจในวันถัดไป วิธีต่อไปนี้ช่วยได้ไม่ว่าจะมีอุปกรณ์ดีพร้อมหรือไม่

ก่อนนอน

- กินอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันและน้ำตาล ร่างกายใช้พลังงานจากอาหารสร้างความร้อน วางของว่างไว้ใกล้ที่นอนเผื่อหิวกลางดึก
- ดื่มน้ำอุ่น การขาดน้ำทำให้หนาวง่ายขึ้น
- ปัสสาวะก่อนนอน ร่างกายต้องใช้ความร้อนรักษาอุณหภูมิของปัสสาวะที่เต็มกระเพาะปัสสาวะ
- อบอุ่นร่างกาย ด้วยการขยับหรือออกกำลังเบา ๆ ก่อนเข้าที่นอน แต่อย่าจนมีเหงื่อ
- เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแห้ง โดยเฉพาะถุงเท้า หากไม่มีวิธีอื่น อาจเก็บเสื้อผ้าชื้นไว้ในถุงนอนให้ความร้อนจากร่างกายช่วยทำให้แห้ง

วัสดุรองตัวสำคัญที่สุด

พื้นดึงความร้อนออกจากตัวเร็วกว่าอากาศ ปูวัสดุแห้งหนาอย่างน้อย 10-20 ซม. (4-8 นิ้ว) เช่น ใบไม้ หญ้า กิ่งสน แผ่นโฟม กระเป๋าเปล่า หรือเชือกที่ขดไว้ แล้วเพิ่มความหนาอีกหากทำได้

หุ้มรอบตัวให้อุ่น

- สวมหมวก และปกปิดลำคอ
- ใส่เสื้อผ้าสำรองในช่องว่างของถุงนอนหรือผ้าห่ม
- เติมน้ำร้อนลงขวด ตรวจว่าฝาปิดสนิทและขวดทนความร้อน หุ้มด้วยถุงเท้า แล้ววางระหว่างต้นขาหรือบนหน้าท้อง
- อย่ามุดหน้าไว้ในถุงนอน เพราะลมหายใจเพิ่มความชื้นและทำให้หนาวขึ้น
- หากทำได้ ให้นอนเบียดชิดกับผู้อื่นเพื่อแบ่งปันความอบอุ่น

ระหว่างคืน

- หากตื่นเพราะหนาว ให้กินของว่าง ซิตอัปเล็กน้อย หรือเกร็งสลับคลายกล้ามเนื้อ แล้วลองนอนใหม่
- เก็บน้ำสำหรับวันรุ่งขึ้นและรองเท้าบูตไว้ในที่พักหรือถุงนอน เพื่อไม่ให้แข็งตัว

อาการหนาวสั่นเป็นสัญญาณเตือน หากใครสั่นรุนแรงไม่หยุด หรือเริ่มเดินเซและพูดอ้อแอ้ ให้ดูแลภาวะตัวเย็นเกิน ทันที

ถ้ำหิมะและกระท่อมหิมะ

ทำไมหิมะจึงช่วยได้

หิมะเป็นฉนวนที่ดี ภายในที่พักหิมะอาจมีอุณหภูมิประมาณ 0°C (32°F) แม้ภายนอกจะมีความหนาวเย็นจากลมต่ำกว่านั้นมาก เลือกจุดที่หลบลมและห่างจากลาดเขาที่เสี่ยงหิมะถล่ม

ถ้ำหิมะ (ต้องมีกองหิมะลึก)

1. หากองหิมะที่อัดแน่นและลึกอย่างน้อย 2 ม. (6-7 ฟุต)
2. ขุดอุโมงค์เข้าไป แล้วขุดยกขึ้นเป็นพื้นที่นอนที่สูงกว่าทางเข้า อากาศเย็นจะจมลง ส่วนอากาศอุ่นยังอยู่ด้านบน
3. ทำเพดานโค้งเรียบเป็นโดม หนาอย่างน้อย 30 ซม. (1 ฟุต) เพื่อไม่ให้น้ำหยดหรือหลังคาพัง
4. เจาะช่องระบายอากาศ ขนาดกำปั้นทะลุหลังคา และรักษาไม่ให้อุดตัน
5. ใช้กระเป๋าหรือก้อนหิมะบังปากทางเข้าเกือบทั้งหมด เก็บพลั่วไว้ด้านใน
6. ปักเสาหรือสกีทำเครื่องหมายด้านนอก เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือมองเห็น

กระท่อมกองหิมะ (เมื่อไม่มีกองหิมะลึกตามธรรมชาติ)

1. กองหิมะสูงประมาณ 2 ม. (6 ฟุต) กว้าง 3 ม. (10 ฟุต) แล้วรอให้หิมะอัดตัวหนึ่งถึงสองชั่วโมง
2. ปักกิ่งไม้ยาวประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) เข้าไปในกอง เพื่อบอกความหนาที่ต้องเหลือไว้
3. คว้านจากทางเข้าเข้าไป และหยุดเมื่อขุดถึงกิ่งไม้ ทำเพดานให้เรียบ
4. เจาะช่องระบายอากาศ และบังทางเข้าอย่างหลวม ๆ

ความปลอดภัย

- อย่าให้ช่องระบายอากาศอุดตัน ตรวจบ่อย ๆ หิมะเปียก หิมะตกใหม่ หรือการใช้เทียนอาจทำให้ช่องตันได้ อากาศที่ไม่ถ่ายเทเป็นอันตรายถึงชีวิต
- อย่าใช้เตาหรือเผาเชื้อเพลิงภายในโดยไม่มีการระบายอากาศที่ดี เพราะเสี่ยงไอพิษและคาร์บอนมอนอกไซด์
- ขุดอย่างระมัดระวังและรักษาตัวให้แห้ง ถอดเสื้อชั้นนอกบางส่วนระหว่างทำงานเพื่อไม่ให้เหงื่อออก แล้วสวมกลับก่อนพัก
- รองพื้นด้วยฉนวน เช่น กิ่งไม้ กระเป๋า เชือก หรือแผ่นรองนอน
- เก็บเครื่องมือไว้ด้านใน เพื่อขุดทางออกได้หากจำเป็น
- เทียนเพียงเล่มเดียวช่วยเพิ่มความอุ่นในถ้ำเล็กได้ แต่ต้องเปิดช่องระบายอากาศไว้เสมอ

การสร้างต้องออกแรงหนัก 1-2 ชั่วโมง ควรเริ่มก่อนมืดและก่อนหมดแรง

ลำดับความสำคัญในการปฐมพยาบาล

วิกินี้ใช้เป็นคู่มือภาคสนาม ไม่ทดแทนการฝึกทางการแพทย์ ควรเข้าอบรมปฐมพยาบาลหรือปฐมพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล และขอรับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุด

1. ตรวจให้แน่ใจว่าจุดเกิดเหตุปลอดภัย

ระวังรถที่สัญจร ไฟ หินร่วง น้ำ ไฟฟ้า และสัตว์ อย่าให้ตนเองกลายเป็นผู้บาดเจ็บเพิ่มอีกคน

2. ตรวจการตอบสนอง

แตะไหล่และเรียกเสียงดัง ผู้ป่วยรู้สึกตัวและตอบหรือไม่

3. โทรหรือส่งคนไปขอความช่วยเหลือ

หากมีสัญญาณ ให้โทรหมายเลขฉุกเฉินของพื้นที่นั้น เช่น 911 ในอเมริกาเหนือ หรือ 112 ในยุโรปและอีกหลายประเทศ บางครั้งข้อความส่งได้แม้โทรไม่ติด

4. จัดการภาวะอันตรายถึงชีวิตตามลำดับ

- เลือดออกรุนแรง: ห้ามเลือดก่อน ดู การห้ามเลือดที่ออกรุนแรง
- ทางเดินหายใจ: เปิดด้วยการเงยศีรษะและเชยคาง นำสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นในปากออก
- การหายใจ: ดู ฟัง และสัมผัสลมหายใจไม่เกิน 10 วินาที การหายใจเฮือกไม่ใช่การหายใจปกติ
- ไม่หายใจตามปกติ: เริ่ม CPR
- การไหลเวียนเลือด: ตรวจหาเลือดออกที่อื่นและอาการ ช็อก

5. จากนั้นตรวจตั้งแต่ศีรษะถึงเท้า

มองและคลำเบา ๆ เพื่อหาบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ หน้าอก ท้อง เชิงกราน แขน และขา ถามว่าเจ็บตรงไหน จดสิ่งที่ตรวจพบและเวลาไว้

ท่าพักฟื้น


หากผู้ป่วยหายใจแต่ไม่รู้สึกตัว และ ไม่สงสัยการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง ให้พลิกนอนตะแคง งอเข่าข้างบนเพื่อพยุงท่า และเงยศีรษะเล็กน้อยให้ของเหลวระบายออกจากปาก ตรวจการหายใจบ่อย ๆ

ดูแลป้องกันอันตรายเพิ่มเติม

รักษาความอบอุ่น รองตัวไม่ให้สัมผัสพื้นเย็น และช่วยให้สงบ ห้ามให้อาหารหรือน้ำแก่ผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือผู้ที่ยังรู้สึกตัวไม่เต็มที่

การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

เริ่มทำ CPR เมื่อผู้ป่วย ไม่ตอบสนองและไม่หายใจตามปกติ หรือมีเพียงอาการหายใจเฮือก



การกดหน้าอกโดยไม่ช่วยหายใจ

ผู้ใหญ่

1. เรียกขอความช่วยเหลือ หากมีผู้อื่นอยู่ด้วย ให้เขาโทรขอความช่วยเหลือและนำเครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ) มา
2. จัดผู้ป่วยให้นอนหงายบนพื้นแข็ง
3. วางส้นมือข้างหนึ่งที่ กึ่งกลางหน้าอก บริเวณครึ่งล่างของกระดูกหน้าอก แล้ววางมืออีกข้างทับ
4. เหยียดแขนตรง ให้หัวไหล่อยู่เหนือมือ กดหน้าอก แรงและเร็ว:
   - ความลึก: 5-6 ซม. (2-2.4 นิ้ว)
   - อัตรา: 100-120 ครั้งต่อนาที ตามจังหวะเพลง "Stayin' Alive"
   - ปล่อยให้หน้าอกคืนตัวเต็มที่ระหว่างการกดแต่ละครั้ง
5. หากเคยฝึกและพร้อมช่วยหายใจ ให้กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับช่วยหายใจ 2 ครั้ง โดยเงยศีรษะ เชยคาง

บีบจมูก และเป่าลมจนเห็นหน้าอกยกขึ้น

6. หากไม่เคยฝึก ให้กดหน้าอกอย่างเดียวต่อเนื่อง วิธีนี้ก็ช่วยชีวิตได้

7. ทำต่อจนผู้ป่วยเริ่มหายใจ เครื่อง AED พร้อมใช้ มีผู้ช่วยเหลือมารับช่วง หรือคุณหมดแรงจนทำต่อไม่ไหว

เครื่อง AED

เปิดเครื่องและทำตามคำแนะนำด้วยเสียง ระหว่างเตรียมเครื่องให้กดหน้าอกต่อไป

เด็กและทารก

- เด็ก: ใช้มือหนึ่งหรือสองข้าง กดลึกประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว)
- ทารก: ใช้สองนิ้วกดกึ่งกลางหน้าอกใต้แนวหัวนมเล็กน้อย ลึกประมาณ 4 ซม. (1.5 นิ้ว)
- สำหรับเด็กและผู้จมน้ำ การช่วยหายใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ หากคุณสามารถทำได้

ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโอกาสได้รับการรักษาขั้นสูง การทำ CPR เป็นเวลานานมีโอกาสน้อยที่จะทำให้หัวใจกลับมาเต้น แต่การพยายามช่วยยังเป็นสิ่งที่ควรทำ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของคุณและคนในกลุ่มด้วย

การห้ามเลือดที่ออกรุนแรง

เลือดออกรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาที ต้องรีบช่วยทันที

1. กดตรงบาดแผล

- วางผ้าหรือผ้าก๊อซบนแผล หากไม่มีสิ่งใดให้ใช้มือเปล่า แล้วใช้สองมือ กดแรง ๆ
- กดต่อเนื่องอย่างน้อย 10 นาที โดยไม่ยกมือขึ้นดู
- หากเลือดซึมผ่าน ให้วางผ้าเพิ่มด้านบนแล้วกดต่อ

2. อัดผ้าในแผลลึก

สำหรับแผลลึกที่ต้นขา รักแร้ ขาหนีบ หรือคอ ให้อัดผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาด เข้าไปในแผล จนเต็ม แล้วกดด้านบนแรง ๆ อย่างน้อย 3 นาที หรือ 10 นาทีหากใช้ผ้าธรรมดา

3. ใช้สายรัดห้ามเลือดที่แขนหรือขา

ใช้เมื่อเลือดจากแขนหรือขาออกรุนแรงจนเสี่ยงเสียชีวิตและกดแล้วไม่หยุด หรือไม่สามารถกดค้างได้ เช่น มีผู้บาดเจ็บหลายคน



ตำแหน่งสายรัดห้ามเลือด

1. รัด เหนือแผล 5-7 ซม. (2-3 นิ้ว) ห้ามรัดบนข้อต่อ หากไม่แน่ใจให้รัดสูงขึ้นไปใกล้โคนแขนหรือขา
2. ขันให้แน่นจนเลือด หยุดไหล ขั้นตอนนี้เจ็บมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
3. เขียนเวลาที่รัด ไว้บนสายรัดหรือผิวผู้บาดเจ็บ
4. ห้ามคลายสายรัด ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้จัดการ
5. หากเลือดยังไม่หยุด ให้เพิ่มสายรัดอีกเส้นเหนือเส้นแรก

สายรัดห้ามเลือดที่ทำขึ้นเอง

ใช้แถบผ้ากว้างอย่างน้อย 4 ซม. (1.5 นิ้ว) ผูกรอบแขนหรือขา สอดไม้ผ่านปมแล้วบิดจนเลือดหยุด จากนั้นผูกยึดไม้ไว้ เชือกเส้นบางหรือลวดบาดผิวหนังและห้ามเลือดได้ไม่ดี

เมื่อห้ามเลือดได้แล้ว ให้ผู้บาดเจ็บนอนราบและรักษาความอบอุ่น เฝ้าระวัง ภาวะช็อก

สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ

หากผู้ป่วยยังไอหรือพูดได้ ให้กระตุ้นให้ไอต่อไป ลงมือช่วยเมื่อผู้ป่วย หายใจ ไอ หรือพูดไม่ได้

ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 1 ปี

1. ยืนด้านหลังผู้ป่วยและให้โน้มตัวไปข้างหน้า
2. ใช้ส้นมือตบหลังแรงพอเหมาะระหว่างสะบัก ไม่เกิน 5 ครั้ง
3. หากยังไม่หลุด ให้ กระตุกหน้าท้องไม่เกิน 5 ครั้ง โดยกำหมัดวางเหนือสะดือ ใช้อีกมือจับหมัดไว้ แล้วกระตุก เข้าหาตัวและขึ้นด้านบน อย่างรวดเร็ว
4. สลับตบหลัง 5 ครั้งกับกระตุกหน้าท้อง 5 ครั้ง จนสิ่งอุดตันหลุดออก
5. สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีรูปร่างใหญ่มาก ให้ใช้การกระตุกหน้าอกแทนการกระตุกหน้าท้อง

ทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี

1. วางทารกคว่ำบนท่อนแขน ให้ศีรษะต่ำกว่าลำตัว และประคองขากรรไกรไว้
2. ตบหลังระหว่างสะบัก 5 ครั้ง
3. พลิกทารกให้นอนหงาย แล้วใช้สองนิ้วกดกึ่งกลางหน้าอก 5 ครั้ง
4. ทำซ้ำ ห้ามกระตุกหน้าท้องทารก

หากหมดสติและไม่ตอบสนอง

ประคองผู้ป่วยลงกับพื้นแล้วเริ่ม CPR ก่อนช่วยหายใจให้มองในปาก และนำสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นออก ห้ามใช้นิ้วกวาดในปากโดยมองไม่เห็นสิ่งอุดตัน

ผู้ที่ได้รับการกระตุกหน้าท้องควรได้รับการตรวจจากบุคลากรทางการแพทย์เมื่อทำได้

ภาวะช็อก

ภาวะช็อกเกิดเมื่อร่างกายส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ มักตามหลังเสียเลือด แผลไหม้ ปวดรุนแรง หรือขาดน้ำ และยังทำให้เสียชีวิตได้แม้ดูแลบาดเจ็บไปแล้ว

อาการ

- ผิวซีด เย็น และชื้น
- ชีพจรเร็วและเบา หายใจเร็ว
- วิตกกังวล กระสับกระส่าย หรือสับสน
- กระหายน้ำ คลื่นไส้

- ระยะต่อมา: ง่วงซึมและไม่ตอบสนอง

วิธีช่วยเหลือ

1. ห้ามเลือดทุกจุด
2. จัดให้นอนหงาย
3. หากไม่มีบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ หลัง สะโพก หรือขา อาจยกขาสูงประมาณ 30 ซม. (12 นิ้ว)
4. รักษาความอบอุ่น รองตัวให้พ้นพื้นเย็นและห่มผ้า ความเย็นทำให้ภาวะช็อกรุนแรงขึ้น
5. ปลอบให้สงบและสร้างความมั่นใจ
6. ห้ามให้อาหารหรือน้ำหากอาจต้องผ่าตัดในเร็ว ๆ นี้ ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งต้องรอความช่วยเหลือหลายชั่วโมง และผู้ป่วยรู้สึกตัวดีเต็มที่ อาจให้จิบน้ำทีละน้อยได้
7. ตรวจการหายใจและชีพจรบ่อย ๆ เริ่ม CPR หากไม่หายใจตามปกติ

หากอาเจียนหรือรู้สึกตัวไม่เต็มที่ ให้พลิกนอนตะแคงเพื่อป้องกันทางเดินหายใจอุดตัน

ตัวเย็นเกินและเนื้อเยื่อถูกความเย็น

ภาวะตัวเย็นเกินเกิดได้แม้อุณหภูมิอากาศยังสูงกว่าจุดเยือกแข็ง หากตัวเปียก อ่อนล้า และโดนลม

อาการ: เดินเซ มือไม่คล่อง และพูดไม่ชัด

- ระยะแรก: หนาวสั่น เดินสะดุด มือหยิบจับไม่ถนัด พูดพึมพำ ตัดสินใจได้ไม่ดี
- ปานกลางถึงรุนแรง: หนาวสั่นลดลงหรือหยุด สับสน ง่วงซึม พูดไม่ชัด พฤติกรรมผิดปกติ บางคนถึงกับถอดเสื้อผ้า

การช่วยเหลือ

1. พาให้พ้นลมและความเปียกชื้น หาที่กำบังก่อน
2. เปลี่ยนเสื้อผ้าเปียกเป็นเสื้อผ้าแห้ง หากเปลี่ยนไม่ได้ ให้คลุมชั้นกันน้ำทับเสื้อผ้าเปียก
3. รองตัวให้พ้นพื้นเย็นและห่อทั้งร่างกาย รวมศีรษะและคอ
4. ใช้ขวดน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัด หรือถุงให้ความร้อนห่อผ้า วางบริเวณหน้าอก รักแร้ และหลัง
5. หากรู้สึกตัวดีและกลืนได้ ให้เครื่องดื่มหวานอุ่น ๆ และอาหาร
6. หากจำเป็น อาจใช้ความอุ่นจากร่างกายอีกคนร่วมกันในถุงนอน

ผู้ที่ตัวเย็นจัดต้องได้รับการเคลื่อนย้าย อย่างนุ่มนวล และให้นอนราบ การขยับรุนแรงอาจกระตุ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะ ห้ามถูผิวหนังและห้ามให้แอลกอฮอล์

หากไม่ตอบสนองและไม่หายใจตามปกติ หลังตรวจนานหนึ่งนาทีเต็มแล้ว ให้เริ่ม CPR

เนื้อเยื่อถูกความเย็นจนแข็ง

- อาการ: ผิวชา สีขาวหรือเทาอมเหลือง แข็งหรือคล้ายขี้ผึ้ง มักเกิดที่นิ้วมือ นิ้วเท้า จมูก และหู
- ห้ามถู และห้ามใช้ความร้อนโดยตรง เช่น กองไฟหรือเตา
- อุ่นบริเวณนั้นเมื่อมั่นใจว่าจะไม่กลับไปแข็งอีกเท่านั้น การแข็งซ้ำทำให้เนื้อเยื่อเสียหายมากขึ้น
- แช่ในน้ำอุ่น 37-39 C (99-102 F) ซึ่งสัมผัสแล้วสบายมือ นาน 15-30 นาที ขั้นตอนนี้จะเจ็บมาก
- ห้ามเจาะตุ่มพอง ปิดหลวม ๆ ด้วยผ้าปิดแผลแห้งสะอาด และแทรกผ้าก๊อซระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้า

อ่อนเพลียจากความร้อนและฮีตสโตรก

อ่อนเพลียจากความร้อน

อาการ: เหงื่อออกมาก ผิวซีดหรือแดง อ่อนแรง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ตะคริว และชีพจรเร็ว

1. พาเข้าที่ร่มและให้นอนพัก
2. คลายเสื้อผ้าและถอดส่วนที่เกินจำเป็น
3. ลดความร้อนด้วยผ้าเปียกและพัดลม
4. ให้จิบน้ำ หรือเครื่องดื่มที่มีเกลือและน้ำตาล
5. พักตลอดวันที่เหลือ หากไม่ดีขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมง ให้ช่วยเหลือเสมือนเป็นฮีตสโตรก

ฮีตสโตรก หรือโรคลมร้อน อันตรายถึงชีวิต

อาการ: ตัวร้อนจัด ร่วมกับ สับสน พฤติกรรมผิดปกติ พูดไม่ชัด ชัก หรือหมดสติ ผิวอาจแห้งหรือยังมีเหงื่ออยู่ก็ได้

ผู้ที่ร้อนจัดแล้วสับสน ให้ถือว่าเป็นฮีตสโตรกจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ ต้องเริ่มลดความร้อนก่อน แล้วจึงเคลื่อนย้าย

1. ลดความร้อน ทันทีและอย่างเต็มที่
2. วิธีที่ดีที่สุด: แช่ตัวในน้ำเย็นหรือน้ำใส่น้ำแข็งถึงระดับคอ เช่น ลำธาร ทะเลสาบ หรืออ่าง ให้ศีรษะพ้นน้ำและมีคนดูแลตลอด
3. หากทำไม่ได้ ให้ราดน้ำจนตัวเปียกแล้วพัดแรง ๆ วางถุงเย็นหรือผ้าเปียกที่คอ รักแร้ และขาหนีบ เติมน้ำให้เปียกอยู่เสมอ
4. ลดความร้อนต่อจนผู้ป่วยกลับมาคิดและตอบสนองได้ชัดเจน
5. ห้ามให้ดื่มหากสับสนหรือรู้สึกตัวไม่เต็มที่
6. ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ เพราะฮีตสโตรกอาจทำลายอวัยวะแม้ผู้ป่วยดูฟื้นแล้ว

การป้องกัน

ดื่มน้ำสม่ำเสมอ พักในร่ม ทำงานช่วงอากาศเย็น และช่วยกันสังเกตอาการระยะแรก

แผลไหม้และน้ำร้อนลวก

หยุดสัมผัสความร้อน

- หากเสื้อผ้าติดไฟ ให้หยุด ทิ้งตัวลง และกลิ้งกับพื้น หรือใช้ผ้าห่มคลุมดับไฟ
- ถอดแหวน นาฬิกา และเสื้อผ้าที่รัดแน่นใกล้แผลก่อนบริเวณนั้นจะบวม ห้ามดึงเสื้อผ้าที่ติดแน่นกับผิวหนัง

ลดความร้อนที่แผล

- ให้น้ำสะอาดเย็นไหลผ่านแผล 20 นาที หรืออย่างน้อย 10 นาที แม้เริ่มทำช้าไปก็ยังช่วยได้ หากไม่เกินประมาณ 3 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
- ห้าม ใช้น้ำแข็ง เนย น้ำมัน ยาสีฟัน หรือขี้ผึ้งทาบนแผลที่เพิ่งเกิด
- รักษาความอบอุ่นของร่างกายส่วนอื่น การลดความร้อนที่แผลขนาดใหญ่อาจทำให้ตัวเย็นเกิน โดยเฉพาะในเด็ก

ปิดแผล

- คลุมแผลหลวม ๆ ด้วยฟิล์มพลาสติกสะอาด โดยวางคลุมและไม่พันรัด หรือใช้ผ้าปิดแผลสะอาด สำหรับแผลที่มืออาจใช้ถุงพลาสติกสะอาดคลุม
- ห้ามเจาะตุ่มพอง

แผลไหม้รุนแรง ต้องขอความช่วยเหลือ

- แผลใหญ่กว่าฝ่ามือของผู้ป่วย หรือแผลลึกที่ดูขาว แข็งคล้ายหนัง หรือไหม้เกรียม
- แผลบริเวณใบหน้า มือ เท้า อวัยวะเพศ หรือรอบข้อต่อ
- แผลจากไฟฟ้าหรือสารเคมี
- ทางเดินหายใจถูกความร้อน: มีเขม่ารอบจมูกหรือปาก เสียงแหบ ไอ หรือหายใจลำบาก ทางเดินหายใจอาจบวมจนอุดตันได้ อย่างรวดเร็ว

แผลจากสารเคมี

ปัดสารเคมีแห้งออกก่อน แล้วล้างด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 20 นาที

แผลไหม้ขนาดใหญ่ทำให้สูญเสียสารน้ำจนอันตรายได้ เฝ้าระวัง ภาวะช็อก และให้จิบน้ำหากผู้ป่วยรู้สึกตัวดี

และความช่วยเหลืออยู่ไกล

กระดูกหักและข้อแพลง

อาการที่บ่งชี้ว่ากระดูกหัก

ปวด บวม ช้ำ ผิดรูป รู้สึกกระดูกเสียดสีกัน หรือใช้แขนขาไม่ได้ หากไม่แน่ใจให้ดูแลเสมือนกระดูกหัก

การดาม

1. ห้ามเลือดก่อน คลุมแผลเปิดและปลายกระดูกด้วยผ้าปิดแผลสะอาด ห้ามดันกระดูกกลับเข้าไป
2. ตรวจการไหลเวียนเลือด ความรู้สึก และการขยับ ที่ปลายมือหรือปลายเท้าด้านถัดจากจุดบาดเจ็บ ดูว่าอุ่น สีชมพู รับสัมผัส และขยับได้หรือไม่
3. ดามในท่าที่พบ เว้นแต่ผิดรูปมากและคลำชีพจรส่วนปลายไม่ได้ ผู้ที่ผ่านการฝึกจึงค่อยดึงตามแนวยาวและจัดให้ตรงอย่างนุ่มนวลหนึ่งครั้ง
4. ตรึง ข้อต่อเหนือและใต้กระดูกที่หัก หากข้อต่อบาดเจ็บ ให้ตรึงกระดูกเหนือและใต้ข้อต่อนั้น
5. ใช้สิ่งแข็ง เช่น ไม้ ไม้เท้าเดินป่า นิตยสารม้วน หรือแผ่นรองนอน และรองด้วยเสื้อผ้าให้นุ่ม
6. ผูกให้กระชับแต่ไม่แน่นจนรัด โดยให้ปมอยู่ห่างจุดบาดเจ็บ
7. ตรวจการไหลเวียนเลือดซ้ำ หลังดามและทุก 30 นาที หากนิ้วซีด เย็น หรือชา ให้คลายผ้าที่ผูก

ผ้าคล้องแขน

เมื่อแขน ข้อมือ หรือไหปลาร้าบาดเจ็บ ใช้ผ้าสามเหลี่ยมหรือเสื้อทำผ้าคล้องแขน ให้มือสูงกว่าศอกเล็กน้อย

ข้อแพลง

พัก ประคบเย็นโดยห่อวัสดุเย็นด้วยผ้าครั้งละ 20 นาที พันผ้ายืดกระชับเบา ๆ และยกแขนหรือขาสูง หากจำเป็นต้องเคลื่อนที่ ผู้ข้อเท้าแพลงอาจเดินโดยพันพยุงให้มั่นคงและใช้ไม้เท้าช่วย

หลังตกจากที่สูง ล้ม หรือศีรษะถูกกระแทก หากมีปวดคอหรือหลัง ชา หรือรู้สึกยิบ ๆ ให้สงสัย กระดูกสันหลังบาดเจ็บ ประคองศีรษะและคอให้นิ่ง ห้ามเคลื่อนย้ายเว้นแต่มีอันตราย

ดูแลบาดแผลและป้องกันการติดเชื้อ

ในพื้นที่ห่างไกล การติดเชื้อเป็นอันตรายในระยะยาวมากกว่าบาดแผลเล็กน้อยส่วนใหญ่

ล้างแผล

1. กดห้ามเลือดก่อน

2. ฉีดล้างแผล ด้วยน้ำที่ดื่มได้ปริมาณมาก อย่างน้อย 1 ลิตรต่อบาดแผล ใช้แรงดัน เช่น ถุงน้ำเจาะรูเล็กหรือกระบอกฉีดยา

3. ใช้แหนบสะอาดคีบเศษดินและสิ่งแปลกปลอมออก

4. ล้างผิวรอบแผลด้วยสบู่และน้ำ

ประกบขอบแผลและปิดแผล

- แผลเล็กและสะอาดอาจใช้แถบเทปช่วยประกบขอบแผล
- แผลสกปรก แผลกัด และแผลถูกแทงทะลุ ให้ เปิดขอบแผลไว้ เพื่อระบายของเหลว แล้วคลุมด้วยผ้าปิดแผลสะอาด
- เปลี่ยนผ้าปิดแผลทุกวัน หรือเมื่อเปียกหรือสกปรก

อาการติดเชื้อ

- แดงและบวมลาม
- ปวดมากขึ้น ร้อน และมีหนอง
- รอยแดงเป็นทาง ลามจากแผล มีไข้หรือหนาวสั่น เป็นสัญญาณรุนแรง ต้องรีบพบแพทย์

หากติดเชื้อ ให้เปิดแผลที่ปิดอยู่ แช่น้ำอุ่นสะอาดวันละหลายครั้ง รักษาความสะอาดและคลุมแผลไว้

ตุ่มพอง

ปิดบริเวณที่เริ่มเสียดสีร้อน ๆ ด้วยเทปตั้งแต่เนิ่น ๆ ตุ่มพองขนาดใหญ่ให้ใช้เข็มสะอาดเจาะระบายจากขอบ เก็บหนังที่คลุมไว้และรองรอบบริเวณนั้นให้นุ่ม

สัตว์กัดอาจแพร่โรคพิษสุนัขบ้า ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำนาน 15 นาที แล้วไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

เมื่องูกัด

ผู้ถูกงูกัดส่วนใหญ่ไม่เสียชีวิต โดยเฉพาะเมื่ออยู่นิ่ง ตั้งสติ และได้รับการปฐมพยาบาลกับการรักษาที่ถูกต้อง

สิ่งที่ควรทำ

1. ถอยห่างจากงู ห้ามพยายามจับหรือฆ่า ถ่ายภาพจากระยะปลอดภัยก็เพียงพอ
2. ช่วยให้ผู้ถูกกัดสงบและอยู่นิ่งที่สุด
3. ถอดแหวน นาฬิกา และเสื้อผ้าที่รัดแขนหรือขาข้างที่ถูกกัด ก่อนเริ่มบวม
4. ให้แขนหรือขาที่ถูกกัดอยู่นิ่งในระดับใกล้หัวใจ ดามไว้หากทำได้
5. ใช้ปากกาทำเครื่องหมายขอบเขตบวมทุก 30 นาที พร้อมจดเวลา

6. ไปสถานพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่ปลอดภัย หากทำได้ให้หามหรืออุ้มแทนการเดิน

สิ่งที่ห้ามทำ

- กรีดแผลหรือพยายามดูดพิษ
- ใช้สายรัดห้ามเลือด
- ประคบน้ำแข็งหรือใช้ความร้อน
- ให้แอลกอฮอล์หรือยา เช่น แอสไพริน
- ใช้ไฟฟ้าช็อกหรือชุดอุปกรณ์ดูดพิษงู

ข้อแตกต่างตามภูมิภาค

ใน ออสเตรเลีย และกรณีงูบางชนิด เช่น งูปะการัง งูเห่า และงูแมมบา มีคำแนะนำให้ พันผ้ายืดกดตรึงแขนหรือขา โดยใช้ผ้ายืดหน้ากว้างพันให้กระชับตั้งแต่บริเวณแผลครอบคลุมทั้งแขนหรือขา แล้วดาม ห้ามใช้ วิธีนี้กับงูหางกระดิ่งและงูพิษกลุ่มไวเปอร์ชนิดอื่นในอเมริกาเหนือ เพราะอาจเพิ่มความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ

อาการที่ต้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วน: หายใจหรือกลืนลำบาก หนังตาตก เลือดออกตามเหงือก อาเจียนเป็นลม หรือบวมลามเร็ว

ภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน

ภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) เป็นปฏิกิริยาแพ้ที่เกิดรวดเร็วและอันตรายถึงชีวิต มักเกิดจากแมลงต่อย อาหาร ยา หรือยางลาเท็กซ์ และอาจเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาที

อาการที่ควรสังเกต มักเกิดภายในไม่กี่นาทีหลังสัมผัส

- หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีดหรือเสียงดัง แน่นคอ เสียงแหบ
- ริมฝีปาก ลิ้น หรือใบหน้าบวม
- ลมพิษหรือผื่นขึ้นทั่วตัว ผิวหนังแดง
- เวียนศีรษะ เป็นลม ซีด และตัวอ่อนปวกเปียก โดยเฉพาะในเด็ก
- อาเจียน ปวดบิดท้อง
- รู้สึกว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตนเอง

วิธีช่วยเหลือ

1. ใช้ปากกาฉีดเอพิเนฟรินอัตโนมัติทันที หากผู้ป่วยมีติดตัว อย่ารอดูว่าอาการจะหนักขึ้นหรือไม่

2. ฉีดบริเวณ กึ่งกลางต้นขาด้านนอก สามารถฉีดผ่านเสื้อผ้าได้ ทำตามคำแนะนำบนอุปกรณ์และกดค้างไว้ตามเวลาที่ระบุ

3. โทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน แม้อาการดีขึ้น เพราะอาการอาจกลับมาอีกหลายชั่วโมงภายหลัง

4. จัดท่าผู้ป่วย:

- ให้นอนราบและยกขาสูง
- หากหายใจลำบาก ให้นั่งขึ้นแทน
- หากอาเจียนหรือหมดสติ ให้จัดให้นอนตะแคง
- อย่าให้ยืนหรือเดินอย่างกะทันหัน แม้อาการดีขึ้น เพราะอาจทรุดหมดสติได้

5. หากผ่านไป 5 นาที แล้วยังไม่ดีขึ้น และมีปากกาฉีดยาอีกด้าม ให้ฉีดซ้ำด้วยด้ามที่สอง

6. หากหยุดหายใจตามปกติ ให้เริ่ม CPR

ยาแก้แพ้ชนิดเม็ดและยาพ่นไม่สามารถหยุดภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลันได้ ต้องให้เอพิเนฟรินก่อน ส่วนยาอื่นอาจให้ภายหลัง

กำจัดสิ่งกระตุ้น

- แมลงต่อย: ใช้เล็บหรือขอบบัตรปาดเหล็กในออกทางด้านข้างโดยเร็ว
- อาหาร: ห้ามทำให้อาเจียน

การป้องกัน

ผู้ที่ทราบว่าตนแพ้รุนแรงควรพกปากกาฉีดยาอัตโนมัติ สองด้าม เสมอ ผู้ที่อยู่ด้วยควรรู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนและใช้เป็น

บาดเจ็บศีรษะและสมองกระทบกระเทือน

หลังศีรษะถูกกระแทกทุกครั้ง

- หากเคยหมดสติแม้เพียงชั่วครู่ ให้ถือว่าอาจรุนแรง
- หากตกจากที่สูง เกิดอุบัติเหตุ หรือมีปวดคอ ชา หรือรู้สึกยิบ ๆ ให้สงสัย คอบาดเจ็บ ด้วย ประคองศีรษะและคอให้นิ่ง ดู กระดูกหักและข้อแพลง
- ห้ามเลือดหนังศีรษะด้วยการกดให้มั่นคง แผลเล็กบนหนังศีรษะก็อาจเลือดออกมาก ห้ามกดตรงบริเวณกะโหลกที่นิ่มหรือบุ๋ม ให้กดรอบขอบแทน

อาการสมองกระทบกระเทือน

ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ สับสน ตามัว หูอื้อ จำเหตุการณ์ช่วงบาดเจ็บไม่ได้ รู้สึกมึนงง และไม่มีสมาธิ

สัญญาณอันตราย ต้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

- ง่วงซึมมากขึ้น หรือปลุกยาก
- ปวดศีรษะ หนักขึ้น และไม่ทุเลา
- อาเจียนซ้ำ
- สับสน พฤติกรรมผิดปกติ พูดไม่ชัด
- รูม่านตาสองข้างขนาดไม่เท่ากัน
- แขนขาข้างหนึ่งอ่อนแรง ชา หรือขยับลำบาก
- ชัก
- มีน้ำใสหรือเลือดออกจากจมูกหรือหู
- ช้ำหลังหูหรือรอบตาทั้งสองข้าง

ดูแลผู้บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย


- ให้พัก งดออกแรงหนักและกิจกรรมที่เสี่ยงถูกกระแทกซ้ำ
- มีคนอยู่ด้วยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงแรกและตรวจอาการเป็นระยะ หากหลับแล้วปลุกไม่ตื่นตามปกติ ถือเป็นเหตุฉุกเฉิน
- งดแอลกอฮอล์
- หากหมดสติแต่หายใจ ให้จัดนอนตะแคงในท่าพักฟื้น โดยพยุงศีรษะและคอ

ผู้สูงอายุและผู้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจมีเลือดออกในกะโหลกหลังการกระแทกเพียงเล็กน้อย อาการอาจปรากฏหลายชั่วโมงหรือหลายวันภายหลัง ต้องเฝ้าดูใกล้ชิด

เห็บ แมลงต่อย และแมงมุมกัด

เห็บ

เห็บแพร่โรคไลม์และโรคอื่นได้ ยิ่งเอาออกเร็ว ความเสี่ยงยิ่งลดลง



การเอาเห็บออก

1. ใช้แหนบปลายแหลมจับเห็บ ชิดผิวหนังที่สุด
2. ดึง ตรงขึ้น ช้า ๆ ด้วยแรงสม่ำเสมอ ห้ามบิดหรือกระชาก
3. หากส่วนปากค้างอยู่และเอาออกไม่ได้ง่าย ให้ปล่อยไว้ ผิวหนังจะสมานเอง
4. ล้างรอยกัดและมือด้วยสบู่กับน้ำหรือแอลกอฮอล์
5. ห้ามใช้ความร้อน ยาทาเล็บ หรือปิโตรเลียมเจล เพราะทำให้เห็บปล่อยของเหลวเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้น

ใน 30 วันหลังถูกกัด เฝ้าดูผื่นลามซึ่งมักเป็นวงคล้ายเป้าธนู ไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อย หรืออ่อนเพลีย หากมีอาการให้พบแพทย์และแจ้งว่าถูกเห็บกัด

ป้องกัน: ใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว สอดปลายขากางเกงในถุงเท้า ใช้สารไล่เห็บ และตรวจทั้งตัวทุกเย็น รวมหนังศีรษะ รักแร้ ขาหนีบ และหลังเข่า

ผึ้งและตัวต่อต่อย

1. ใช้เล็บหรือขอบบัตรปาดเหล็กในผึ้งออกโดยเร็ว
2. ล้างบริเวณที่ถูกต่อย
3. ประคบด้วยผ้าเปียกเย็นเพื่อลดบวมและปวด
4. เฝ้าระวังภาวะแพ้รุนแรง: หายใจลำบาก หน้าหรือคอบวม เวียนศีรษะ ลมพิษลาม ดู ภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน
5. หากถูกต่อยหลายจุดพร้อมกัน หรือถูกต่อยในปากหรือคอ ต้องรีบขอความช่วยเหลือ

แมงมุมกัด

ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง ให้ล้าง ประคบเย็น และเฝ้าดูอาการ

ควรพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้:

- แมงมุมแม่ม่าย ตัวดำมัน มีลายนาฬิกาทรายสีแดง: กล้ามเนื้อเป็นตะคริวรุนแรง ปวดท้อง และเหงื่อออก
- แมงมุมสันโดษสีน้ำตาล มีลายคล้ายไวโอลินบนหลัง: แผลลาม สีคล้ำ หรือกลายเป็นแผลเปิดในหลายชั่วโมงถึงหลายวัน
- รอยกัดใด ๆ ที่แดงลาม มีไข้ หรือรู้สึกไม่สบาย

แมงป่องต่อย

ล้างและประคบเย็นบริเวณถูกต่อย ส่วนใหญ่มีเพียงอาการปวดมาก ต้องรีบขอความช่วยเหลือหากเป็นเด็ก หรือมีอาการชาลาม กล้ามเนื้อกระตุก ตาเคลื่อนไหวผิดปกติ น้ำลายไหล หรือหายใจลำบาก

อาการชัก

ระหว่างชัก

1. ตั้งสติและจับเวลา
2. ย้ายของแข็งและของมีคมออก วางของนุ่มรองศีรษะ
3. คลายสิ่งที่รัดรอบคอ
4. ห้ามกดรั้งตัวผู้ป่วย และ ห้ามใส่สิ่งใดในปาก ผู้ป่วยไม่สามารถกลืนลิ้นตนเองได้
5. อยู่ด้วยจนหยุดชัก

หลังหยุดชัก

- พลิกนอน ตะแคง ในท่าพักฟื้น เพื่อให้ทางเดินหายใจโล่ง

- ตรวจการหายใจ
- ผู้ป่วยมักสับสนและอ่อนเพลียมาก พูดอย่างสงบ อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วให้พัก
- ห้ามให้อาหารหรือน้ำจนรู้สึกตัวดีเต็มที่

ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อ

- ชักนาน เกิน 5 นาที
- ชักซ้ำหลังครั้งแรกไม่นาน
- ไม่ฟื้นหรือหายใจลำบากหลังชัก
- เป็นการชักครั้งแรก หรือไม่ทราบประวัติ
- ชักขณะอยู่ในน้ำ
- มีบาดเจ็บ ตั้งครรภ์ หรือเป็นเบาหวาน
- มีไข้สูงหรือเพิ่งบาดเจ็บศีรษะ

อาการชักอาจเกิดจากฮีตสโตรก น้ำตาลในเลือดต่ำมาก ศีรษะบาดเจ็บ หรือสารพิษ หากทำได้ให้แก้สาเหตุ เช่น ลดความร้อน และให้น้ำตาลแก่ผู้เป็นเบาหวานเมื่อฟื้นและกลืนได้แล้ว

ท้องเสีย อาเจียน และการชดเชยน้ำ

ในสถานการณ์เอาชีวิตรอด อาการท้องเสียจากน้ำหรืออาหารปนเปื้อนพบได้บ่อย ภาวะขาดน้ำที่ตามมาอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ

เครื่องดื่มชดเชยน้ำและเกลือแร่



สูตรสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ทำเอง

- น้ำสะอาดปลอดภัย 1 ลิตร
- น้ำตาล 6 ช้อนชาปาดเสมอขอบ
- เกลือ 1/2 ช้อนชาปาดเสมอขอบ

คนให้ละลาย ตวงอย่างระมัดระวัง เพราะเกลือมากเกินไปเป็นอันตราย หากมีผงเกลือแร่ ORS สำเร็จรูป ควรใช้แทน

วิธีให้ดื่ม

- ให้จิบทีละน้อยบ่อย ๆ ทุกสองสามนาที แม้ยังอาเจียนอยู่ ร่างกายยังรับน้ำส่วนใหญ่ไว้ได้
- ผู้ใหญ่: ให้ดื่มอย่างน้อยหนึ่งถ้วยหลังถ่ายเหลวแต่ละครั้ง เพิ่มจากน้ำที่ดื่มตามปกติ
- เด็ก: ให้หนึ่งในสี่ถึงครึ่งถ้วยหลังถ่ายเหลวแต่ละครั้ง ใช้ช้อนป้อนหากจำเป็น
- ให้ทารกกินนมแม่ต่อไป

- เมื่ออาเจียนลดลง ให้เริ่มอาหารย่อยง่าย เช่น ข้าว โจ๊ก ขนมปัง กล้วย และซุป

สัญญาณอันตราย ต้องขอความช่วยเหลือ

- ถ่ายเป็นเลือด หรืออุจจาระดำเหนียวคล้ายน้ำมันดิน
- ไข้สูง
- ไม่ปัสสาวะนาน 8 ชั่วโมงขึ้นไป หรือปัสสาวะสีเข้มมาก
- ง่วงซึมมาก สับสน หรือดื่มน้ำไม่ได้
- ตาลึก ปากแห้ง หรือร้องไห้ไม่มีน้ำตาในเด็ก
- ท้องเสียนานกว่า 3 วัน หรืออาเจียนไม่หยุดตลอดหนึ่งวัน

ป้องกันการแพร่เชื้อ

- ล้างมือ ด้วยสบู่หลังใช้ห้องน้ำ และก่อนจับอาหารหรือน้ำ
- ขุดหลุมส้วมห่างจากแหล่งน้ำ ที่พัก และเส้นทางอย่างน้อย 60 ม. (200 ฟุต) ลึก 15-20 ซม. (6-8 นิ้ว) แล้วกลบสิ่งปฏิกูลให้มิด
- ทำน้ำดื่มทุกส่วนให้ปลอดภัย ดู ทำน้ำให้ปลอดภัยสำหรับดื่ม
- แยกแก้วน้ำและผ้าเช็ดตัวของผู้ป่วย

การบาดเจ็บที่ดวงตา

ฝุ่นหรือเศษผงเข้าตา

1. ห้ามขยี้ตา
2. กะพริบตาหลายครั้ง ให้น้ำตาช่วยชะออก
3. ล้างด้วยน้ำสะอาดจากหัวตาด้านจมูกออกไปทางหางตา
4. ดึงเปลือกตาบนลงมาทับขนตาล่าง ขนตาอาจช่วยปัดเศษผงออก
5. หากเศษผงอยู่บนตาขาว ใช้มุมผ้าสะอาดเปียกแตะยกออกเบา ๆ

สารเคมีเข้าตา

ล้าง ทันที ด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15-20 นาที เปิดเปลือกตาค้างไว้และให้ตาข้างบาดเจ็บอยู่ต่ำกว่าอีกข้าง เพื่อไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลเข้าตาข้างดี จากนั้นขอความช่วยเหลือทางการแพทย์

มีวัตถุปักคาตา

ห้ามพยายามดึงวัตถุที่ปักคาในตาออก

1. ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งและสงบ
2. ใช้ถ้วยกระดาษหรือที่ครอบคล้ายกันครอบตาข้างบาดเจ็บ ติดเทปยึดโดยไม่กดลูกตา
3. ปิดตาอีกข้างด้วย เพราะดวงตาเคลื่อนไหวพร้อมกัน จะช่วยให้ตาข้างบาดเจ็บอยู่นิ่ง
4. รีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์

ตาถูกกระแทก

ประคบด้วยผ้าเย็น 15 นาทีโดยไม่กด ขอความช่วยเหลือหากการมองเห็นเปลี่ยน มีเลือดในบริเวณม่านตา ปวดรุนแรง หรือกลอกตาไม่ได้ตามปกติ

ตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ

แสงแดดสะท้อนจากหิมะ น้ำ หรือทรายทำให้ผิวตาไหม้ มีอาการปวด เคืองเหมือนทรายเข้าตา ตาแดงและน้ำตาไหล มักเริ่มหลังสัมผัสหลายชั่วโมง

- พักในที่มืดและใช้ผ้าเย็นคลุมตา
- มักดีขึ้นภายใน 1-2 วัน
- ป้องกัน: ใส่แว่นกันแดด หากไม่มี ทำแว่นจากเปลือกไม้ กระดาษแข็ง หรือผ้า โดยเจาะช่องมองเป็นร่องแคบแนวนอน และทาถ่านให้ผิวใต้ตาคล้ำเพื่อลดแสงสะท้อน

จมน้ำและการช่วยคนตกน้ำ

ช่วยเหลืออย่างปลอดภัย

1. ตะโกนขอความช่วยเหลือและโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉิน หากทำได้
2. ยื่นสิ่งของหรือโยนอุปกรณ์ให้ อย่าลงน้ำไปเอง คนที่กำลังจมน้ำอาจคว้าผู้ช่วยและดึงลงไปด้วย
3. ยื่นไม้ กิ่งไม้ ไม้พาย หรือเสื้อผ้าให้จับ หรือโยนเชือก ห่วงชูชีพ กล่องเก็บความเย็น แกลลอน หรือสิ่งที่ลอยน้ำได้
4. ว่ายน้ำไปช่วยเป็นทางเลือกสุดท้าย และเฉพาะผู้ที่ว่ายน้ำแข็งมากเท่านั้น นำสิ่งลอยน้ำไปด้วยและวางคั่นระหว่างคุณกับผู้ประสบเหตุ

เมื่อนำขึ้นจากน้ำแล้ว

1. จัดให้นอนหงายบนพื้นแข็ง ตรวจการหายใจไม่เกิน 10 วินาที
2. ไม่หายใจ: เริ่มด้วย ช่วยหายใจ 5 ครั้ง แล้วทำ CPR โดยกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับช่วยหายใจ 2 ครั้ง การจมน้ำทำให้ขาดอากาศ การช่วยหายใจจึงสำคัญเป็นพิเศษ
3. ทำต่อจนผู้ป่วยหายใจ มีผู้ช่วยมารับช่วง หรือคุณทำต่อไม่ไหว

4. หากอาเจียน ให้พลิกตะแคงและนำสิ่งอาเจียนออกจากปาก จากนั้นพลิกกลับและช่วยต่อ

หากยังหายใจ

- จัดให้นอน ตะแคง ในท่าพักฟื้นและรักษาความอบอุ่น ถอดเสื้อผ้าเปียกแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแห้ง
- อยู่ด้วยและเฝ้าดูการหายใจ

ต้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เสมอ

- ผู้ที่ต้องได้รับการช่วยหายใจ ไอมาก หรือเคยจมอยู่ใต้น้ำ แม้ขณะนี้ดูปกติ อาจมีของเหลวคั่งในปอดหลายชั่วโมงภายหลัง
- เฝ้าระวังไอไม่หยุด หายใจเร็ว ริมฝีปากเขียว ง่วงซึมผิดปกติ หรือสับสน

น้ำเย็น

- มีผู้จมน้ำเย็นที่ช่วยฟื้นคืนชีพได้หลังจมอยู่นาน อย่าเลิกช่วยเร็วเกินไป ทำ CPR ต่อและช่วยให้ร่างกายอุ่นขึ้น
- หากตัวเย็นจัด ให้เคลื่อนย้ายอย่างนุ่มนวลและรักษาท่านอนราบ

หลังดำน้ำหรือตกจากที่สูง ให้สงสัยการบาดเจ็บที่คอหรือหลัง พยายามให้ศีรษะ คอ และลำตัวอยู่ในแนวเดียวกัน เว้นแต่ผู้ป่วยไม่หายใจซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการช่วยหายใจก่อน

ไฟฟ้าดูด

ทำให้จุดเกิดเหตุปลอดภัยก่อน

1. ห้ามสัมผัสผู้ประสบเหตุ ขณะที่อาจยังสัมผัสกระแสไฟอยู่
2. ตัดไฟที่สวิตช์ เบรกเกอร์ หรือมิเตอร์ หากเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย ถอดปลั๊กได้เมื่อปลั๊กแห้งและไม่ชำรุด
3. หากตัดไฟไม่ได้ ใช้สิ่งที่ แห้งและไม่ใช่โลหะ เช่น ด้ามไม้กวาดไม้หรือเชือกแห้ง แยกแหล่งไฟออก ยืนบนพื้นที่แห้ง
4. สายไฟขาดตกพื้น: อยู่ห่างอย่างน้อย 10 ม. (33 ฟุต) พื้นใกล้สายไฟอาจมีกระแสไฟ หากรู้สึกเหมือนไฟชาหรือจี๊ด ให้ลากเท้าสั้น ๆ โดยให้เท้าชิดกันออกจากบริเวณนั้น โทรแจ้งการไฟฟ้าและหน่วยฉุกเฉิน

เมื่อปลอดภัยแล้ว

1. ตรวจการตอบสนองและการหายใจ โทรแจ้งหน่วยฉุกเฉิน
2. ไม่หายใจ: เริ่มทำ CPR
3. ให้น้ำไหลผ่านแผลไหม้เพื่อลดความร้อน 10-20 นาที แล้วคลุมหลวม ๆ ด้วยผ้าสะอาดที่ไม่ติดแผล

ตรวจหาแผลอีกแห่งซึ่งเป็นจุดที่กระแสไฟออกจากร่างกาย

4. ให้ผู้ป่วยนอน รักษาความอบอุ่นและดูแลภาวะช็อก ห้ามเคลื่อนย้ายหากสงสัยคอหรือหลังบาดเจ็บ

ผู้ถูกไฟฟ้าดูดทุกคนควรได้รับการตรวจรักษา

- หัวใจอาจได้รับผลกระทบแม้ผู้ป่วยรู้สึกปกติ ต้องไปโรงพยาบาลหากเป็นไฟฟ้าแรงสูง สัมผัสไฟนาน มีแผลไหม้ เป็นลม เจ็บหน้าอก หรือชีพจรไม่สม่ำเสมอ

ฟ้าผ่า

- ผู้ถูกฟ้าผ่าไม่มีประจุไฟฟ้าค้างอยู่ สามารถสัมผัสตัวเพื่อช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
- ฟ้าผ่าหลายกรณีทำให้หัวใจหรือการหายใจหยุด และ CPR อาจช่วยได้ หากมีหลายคนบาดเจ็บ ให้ช่วยผู้ที่ไม่หายใจก่อน

ห้ามแตะรถที่มีสายไฟพาดอยู่ ให้อยู่ในรถเว้นแต่เกิดไฟไหม้ หากต้องออก ให้กระโดดออกโดยเท้าทั้งสองชิดกันและไม่แตะรถกับพื้นพร้อมกัน แล้วลากเท้าสั้น ๆ โดยให้เท้าชิดกันออกไป

สารพิษและการใช้ยาเกินขนาด

สิ่งที่ต้องทำก่อน

1. พาผู้ประสบเหตุและตัวคุณออกห่างจากแหล่งสารพิษ หากมีไอระเหย ให้เปิดหน้าต่างและไปสู่อากาศบริสุทธิ์

2. ตรวจการตอบสนองและการหายใจ เริ่ม CPR หากไม่ตอบสนองและไม่หายใจ

3. โทรศูนย์พิษวิทยาหรือหน่วยฉุกเฉิน ในสหรัฐฯ หมายเลขศูนย์พิษวิทยาคือ 1-800-222-1222 เตรียมข้อมูลว่าเป็นใคร อายุเท่าใด ได้รับสารอะไร ปริมาณเท่าใด และเมื่อใด

4. เก็บภาชนะ ขวดยา หรือตัวอย่างพืชไว้ให้ทีมช่วยเหลือดู

วิธีช่วยเหลือ

- กลืนสารพิษ: หากรู้สึกตัวดี ให้บ้วนปาก ให้จิบน้ำได้เฉพาะเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาแนะนำ
- สัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำไหลปริมาณมาก 15-20 นาที
- เข้าตา: เปิดเปลือกตาค้างและล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
- สูดควันหรือแก๊ส: พาไปที่อากาศบริสุทธิ์ ดูคู่มือคาร์บอนมอนอกไซด์ประกอบ

สิ่งที่ห้ามทำ

- ห้ามทำให้อาเจียน เพราะสารอาจกัดคอซ้ำหรือทำให้สำลัก

- ห้ามให้น้ำเกลือ นม หรือยาพื้นบ้าน
- ห้ามรอจนมีอาการ

ได้รับสารกลุ่มโอปิออยด์เกินขนาด

- อาการ: หายใจช้ามากหรือหยุดหายใจ ริมฝีปากเขียว รูม่านตาเล็กเท่ารูเข็ม ปลุกไม่ตื่น
- ให้ นาล็อกโซน (Narcan) หากมี โทรแจ้งหน่วยฉุกเฉิน และช่วยหายใจหรือทำ CPR หากไม่ตอบสนอง สามารถให้ยาซ้ำหลัง 2-3 นาทีได้อย่างปลอดภัย
- หากหายใจ ให้จัดนอนตะแคงและอยู่ด้วยจนทีมช่วยเหลือมาถึง

ท่าพักฟื้น

- หากไม่ตอบสนองแต่ยังหายใจ ให้พลิกนอนตะแคงและเฝ้าดูการหายใจ

เด็กมักได้รับพิษจากยา น้ำยาทำความสะอาด และถ่านกระดุม เก็บสิ่งเหล่านี้ในที่ล็อก หากกลืนถ่านกระดุมหรือแม่เหล็ก ถือเป็นเหตุฉุกเฉินแม้ยังไม่มีอาการ

เหตุฉุกเฉินจากเบาหวาน

น้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินที่พบบ่อย

อาการ: มือสั่น เหงื่อออก ซีด หิว ใจเต้นเร็ว สับสน หงุดหงิด หรือมีท่าทางคล้ายคนเมา ต่อมาอาจชักหรือหมดสติ

หากยังรู้สึกตัวและกลืนได้:
1. ให้ น้ำตาลที่ดูดซึมเร็ว 15-20 กรัม เช่น กลูโคสชนิดเม็ด 3-4 เม็ด น้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมสูตรปกติครึ่งถ้วย (120 มล.) หรือน้ำตาลหรือน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะ
2. รอ 15 นาทีแล้วประเมินซ้ำ หากยังไม่ดีขึ้น ให้ซ้ำในปริมาณเดิม
3. เมื่อดีขึ้น ให้กินอาหารว่างที่มีแป้งและโปรตีน เช่น แครกเกอร์กับเนยถั่ว

หากหมดสติหรือกลืนไม่ได้:
- ห้ามป้อนอาหารหรือน้ำทางปาก จัดให้นอนตะแคงและ โทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
- หากผู้ป่วยมีกลูคากอนติดตัวและคุณใช้เป็น ให้ยาตามวิธีที่ทราบ

น้ำตาลในเลือดสูง

- อาการ: กระหายน้ำมาก ปัสสาวะมาก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ หายใจลึกและเร็ว ง่วงซึม
- ให้ดื่มน้ำหากยังรู้สึกตัว ต้องได้รับการรักษา โดยเฉพาะเมื่อมีอาเจียนหรือสับสน

เมื่อไม่แน่ใจ

- ให้ช่วยเหลือเสมือนน้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำตาลช่วยผู้ที่มีน้ำตาลต่ำ และก่อผลเสียเพียงเล็กน้อยหากน้ำตาลสูงอยู่ ขณะที่น้ำตาลต่ำซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขเป็นอันตราย

เมื่อไฟดับเป็นเวลานาน

- อินซูลิน เก็บที่อุณหภูมิห้องต่ำกว่าประมาณ 25 C / 77 F ได้ราว 28 วัน เก็บให้พ้นแสงแดดและความร้อน ห้ามปล่อยให้แข็งตัว
- เตรียมกลูโคสชนิดเม็ดไว้ใกล้มือ รู้จักอาการน้ำตาลต่ำ กินอาหารให้ตรงเวลาและไม่ข้ามมื้อยา
- อย่าจัดการให้อินซูลินหรือยาอื่นของผู้ป่วยเอง หากไม่ทราบวิธีใช้ที่ถูกต้อง

หากผู้เป็นเบาหวานดูคล้ายเมา สับสน หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ ให้แก้ไขด้วยน้ำตาลก่อน แล้วจึงซักถามภายหลัง

หลอดเลือดสมองและหัวใจขาดเลือด

โรคหลอดเลือดสมอง: จำหลัก FAST

- F — Face ใบหน้า: ยิ้มแล้วหน้าเบี้ยวหรือชาข้างหนึ่ง
- A — Arms แขน: ยกสองแขนแล้วข้างหนึ่งตกลงหรืออ่อนแรง
- S — Speech การพูด: พูดไม่ชัด พูดแปลกไป หรือไม่เข้าใจคำพูด
- T — Time เวลา: จดเวลาที่เริ่มมีอาการ และ โทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันที

อาการอื่น: สับสน มองเห็นลำบาก เวียนศีรษะ เสียการทรงตัว หรือปวดศีรษะรุนแรงที่เกิดขึ้นฉับพลัน

สิ่งที่ควรทำ:

- ให้นั่งหรือนอนยกศีรษะเล็กน้อย และช่วยให้สงบ
- จดเวลาเริ่มมีอาการ เพราะมีผลต่อการเลือกการรักษา
- คลายเสื้อผ้าที่รัดแน่น หากหมดสติแต่หายใจ ให้จัดนอนตะแคง

ห้าม: ให้อาหาร น้ำ หรือยาเม็ด เพราะอาจกลืนไม่ปลอดภัย และห้ามให้เดินหรือขับรถ

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

อาการ:

- แน่น บีบ หรือเจ็บหน้าอก อาจร้าวไปแขน กราม คอ หรือหลัง
- หายใจไม่อิ่ม เหงื่อเย็น คลื่นไส้ หน้ามืด
- ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และผู้เป็นเบาหวานอาจมีอาการไม่ชัด เช่น เหนื่อยผิดปกติ คลื่นไส้ ปวดหลังหรือกราม

สิ่งที่ควรทำ:

1. โทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน อย่ารอดูว่าอาการจะหายเองหรือไม่
2. ให้นั่งพักในท่าที่สบาย มักเป็นท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน
3. แอสไพริน: หากไม่แพ้และยังรู้สึกตัว ให้ เคี้ยวแอสไพรินสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งเม็ด (325 มก.) หรือชนิดขนาดต่ำ 2 เม็ด (81 มก.) ห้ามให้หากมีปัญหาเลือดออกหรือแพทย์สั่งห้าม
4. หากผู้ป่วยมีไนโตรกลีเซอรีนที่แพทย์สั่ง ให้ช่วยผู้ป่วยใช้ยาของตนเอง
5. หากหมดสติและไม่หายใจตามปกติ ให้เริ่ม CPR ใช้เครื่อง AED หากมี

หากเรียกรถพยาบาลได้ ไม่ควรขับรถไปโรงพยาบาลเอง ทีมฉุกเฉินเริ่มรักษาระหว่างทางได้

การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง

ควรสงสัยกระดูกสันหลังบาดเจ็บเมื่อ

- ตกจากที่สูง บาดเจ็บจากดำน้ำหรือกีฬา รถชน หรือศีรษะหรือหลังถูกกระแทกแรง
- ปวด กดเจ็บ หรือผิดรูปบริเวณคอหรือหลัง
- แขนขาชา รู้สึกยิบ ๆ อ่อนแรง หรือขยับไม่ได้
- กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
- หมดสติและไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น

วิธีช่วยเหลือ

1. บอกให้อยู่นิ่ง อย่าขยับ โทรแจ้งหน่วยฉุกเฉิน
2. รักษาศีรษะ คอ และหลังให้อยู่ในแนวเดียวกัน คุกเข่าด้านหลังศีรษะ ใช้สองมือประคองให้นิ่ง หรือวางผ้าขนหนูหรือเสื้อผ้าม้วนไว้ข้างศีรษะทั้งสองด้าน
3. ห้ามดัด บิด หรือยกตัว ห้ามถอดหมวกนิรภัยเว้นแต่กีดขวางการหายใจ
4. ตรวจการหายใจและห่มผ้าให้ความอบอุ่น
5. อยู่ด้วยและพูดอย่างสงบจนความช่วยเหลือมาถึง

หากไม่หายใจ

- เปิดทางเดินหายใจก่อน ยกขากรรไกรไปด้านหน้าโดยไม่เงยศีรษะ หากไม่ได้ผล ให้เงยศีรษะเท่าที่จำเป็นเพื่อเปิดทางเดินหายใจ การหายใจสำคัญกว่าการตรึงกระดูกสันหลัง
- เริ่ม CPR

หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย

เคลื่อนย้ายเฉพาะเมื่อมีอันตรายทันที เช่น ไฟ น้ำขึ้น หรืออาคารถล่ม หรือเมื่อต้องพลิกผู้หมดสติให้นอนตะแคงป้องกันสำลัก

- ใช้อย่างน้อย 3 คน พลิกทั้งตัวเป็นชิ้นเดียว ให้ศีรษะ คอ และหลังเป็นแนวตรง เรียกว่า การพลิกตัวแบบท่อนซุง
- หากอยู่คนเดียว ให้ลากตามแนวยาวของลำตัวโดยจับที่ไหล่หรือเสื้อผ้า ห้ามลากออกทางด้านข้าง

หากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีผู้ช่วยเพียงคนเดียว ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ผู้ที่รู้สึกและขยับแขนขาได้ทั้งสี่ข้างโดยไม่ปวดคอมีโอกาสบาดเจ็บรุนแรงน้อยกว่า แต่เมื่อไม่แน่ใจให้อยู่นิ่งไว้

อาหารในสถานการณ์เอาชีวิตรอด

อาหารเป็นลำดับท้ายของความต้องการหลักในการเอาชีวิตรอด คนสุขภาพดีส่วนใหญ่อดอาหารได้หลายสัปดาห์ ความหิวทรมาน แต่ไม่ค่อยเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตก่อนอย่างอื่น

ทำไมอาหารยังสำคัญ

- ช่วยรักษาความอบอุ่น โดยเฉพาะกลางคืนในอากาศหนาว
- ช่วยให้คิดได้ชัดเจนและมีกำลังใจ
- หากต้องอยู่รอดนานเกินสองสามวัน จำเป็นต้องมีแผนหาอาหาร

หลักที่ควรจำ

- อย่าใช้พลังงานหาอาหารมากกว่าพลังงานที่จะได้กลับมา การวิ่งไล่สัตว์มักไม่คุ้ม
- กินอาหารพลังงานสูงที่พกมาก่อน โดยแบ่งกินทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอ
- หากน้ำขาดแคลนมาก ให้กินแต่น้อย การย่อยอาหารโดยเฉพาะโปรตีนต้องใช้น้ำ
- แหล่งพลังงานที่หาได้ง่าย ได้แก่ แมลง ปลา สัตว์มีเปลือกจากน้ำสะอาด ถั่ว และพืชที่รู้จักแน่นอน
- ปรุงเนื้อสัตว์ป่า ปลา และสัตว์มีเปลือกทุกชนิดให้สุกทั่ว

วิธีที่ได้ผลคุ้มแรง

1. ตกปลาด้วยสายกับเบ็ด หรือวางกับดักง่าย ๆ ในลำธาร
2. หาแมลงและตัวอ่อนแมลง
3. เก็บพืช ถั่ว และผลไม้ที่รู้จักและระบุชนิดได้แน่นอน
4. ดักสัตว์เล็ก เฉพาะเมื่อกฎหมายอนุญาตและคุณทำเป็น

ดูเพิ่มเติม หาพืชอาหารอย่างปลอดภัย

หาพืชอาหารอย่างปลอดภัย

กินพืชเฉพาะเมื่อระบุชนิดได้ แน่ใจ 100% พืชพิษร้ายแรงหลายชนิดคล้ายพืชกินได้ทั่วไป

สิ่งที่ไม่ควรกิน

- เห็ดป่า เว้นแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เห็ดพิษถึงตายบางชนิดดูไม่มีพิษ และอาจเริ่มมีอาการหลังผ่านไปหนึ่งวัน ซึ่งรักษาไม่ทัน
- พืชคล้าย แครอตป่า พาร์สนิป หรือพาร์สลีย์ ที่มีช่อดอกขาวรูปซี่ร่ม พืชวงศ์นี้มีทั้งวอเตอร์เฮมล็อกและพอยซันเฮมล็อกซึ่งมีพิษร้ายแรงมาก
- พืชที่มีน้ำยางสีขาวหรือสีผิดปกติ แม้มีข้อยกเว้น แต่หลีกเลี่ยงหากไม่รู้จักแน่ชัด
- ถั่ว หัวพืช หรือเมล็ดในฝักที่ไม่รู้จัก
- พืชมีกลิ่นอัลมอนด์ ซึ่งอาจบ่งชี้ไซยาไนด์
- ผลเบอร์รี่สีขาวและเหลือง เพราะส่วนใหญ่มีพิษ ส่วนผลสีแดงก็มีพิษประมาณครึ่งหนึ่ง

ตัวอย่างพืชอาหารที่รู้จักกันทั่วไป เฉพาะเมื่อระบุชนิดได้

- ธูปฤาษี: กินยอดอ่อน ราก และเกสร พบตามพื้นที่ชุ่มน้ำ
- แดนดิไลออน: ใบ ดอก และราก
- โคลเวอร์: ใบและดอก ควรปรุงสุก
- ลูกโอ๊ก: ต้องแกะเปลือก บด และแช่น้ำโดยเปลี่ยนหลายครั้ง เพื่อล้างแทนนินรสขมออก
- สน: เปลือกชั้นในและใบรูปเข็มใช้ชงชา หลีกเลี่ยงต้นยูที่คล้ายกันแต่มีพิษสูง
- แบล็กเบอร์รี่ ราสป์เบอร์รี่ และบลูเบอร์รี่: ผลกลุ่มรวมและผลเบอร์รี่สีน้ำเงินเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยกว่าหลายชนิด

การทดสอบพืชกินได้แบบสากล

คู่มือทหารอธิบายการทดสอบอย่างช้า ๆ ตั้งแต่สัมผัส อมในปาก และกินทีละน้อยตลอด 24 ชั่วโมงขึ้นไป วิธีนี้ใช้เวลานาน ตรวจพบพิษไม่ได้ทุกชนิด และ ใช้กับเห็ดไม่ได้ ใช้เฉพาะเหตุฉุกเฉินระยะยาวจริง ๆ ที่ไม่มีทางเลือกอื่น

การปรุงสุกช่วยได้

การต้มทำลายพิษบางชนิดและฆ่าปรสิต หากพืชมีรสขมให้เทน้ำต้มทิ้ง

แมลง ปลา และสัตว์เล็กเป็นอาหาร

แมลง

แมลงมีโปรตีนและไขมันสูง และจับได้ง่าย

- ตัวเลือกที่ใช้ได้: ตั๊กแตน จิ้งหรีด มด ปลวก ตัวอ่อนด้วงในไม้ผุ และไส้เดือน
- หลีกเลี่ยง: แมลงสีสด หนอนบุ้งมีขน สัตว์ที่กัดหรือต่อย ยกเว้นมดเมื่อปรุงสุกแล้ว รวมทั้งแมลงวัน เห็บ และยุง
- ย่างหรือต้มให้สุก ตั๊กแตนควรเอาขาและปีกออก การปรุงสุกฆ่าปรสิตได้

ตกปลา

- เบ็ดทำเอง: เข็มกลัดซ่อนปลายดัด ลวด หนาม หรือกระดูกกับไม้เนื้อแข็งเหลา
- สายเบ็ด: สายจากชุดอุปกรณ์ เส้นใยด้านในพาราคอร์ด หรือไหมขัดฟัน
- เหยื่อ: แมลง หนอน หรือเศษเครื่องในปลา
- ตกช่วงเช้าตรู่หรือเย็น ในร่ม ใกล้ท่อนไม้ หรือแอ่งลึกใต้แก่ง
- วางหลายสายพร้อมกันและตรวจบ่อย ๆ คุ้มกว่านั่งถือคันเดียว
- กับดักปลา: เรียงหินเป็นวงในน้ำตื้น ทำทางเข้าแคบรูปกรวย ปลาว่ายเข้าแล้วหาทางออกยาก

ปรุงปลาน้ำจืดให้สุกทั่ว หลีกเลี่ยงปลาดูป่วย มีกลิ่นเหม็น เหงือกเป็นเมือก หรือตาลึกโหล

สัตว์น้ำมีเปลือก

- หอยน้ำจืดและเครย์ฟิชเป็นอาหารได้เมื่อปรุงสุกดี
- สัตว์มีเปลือกชายฝั่งอาจมีพิษจากสาหร่ายสะพรั่งหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสี ซึ่งความร้อนทำลายไม่ได้ หลีกเลี่ยงช่วงประกาศเตือน หรือในเดือนอากาศร้อนเมื่อไม่แน่ใจ

สัตว์เล็ก

บ่วงและกับดักใช้ได้ แต่ต้องมีทักษะและเวลา หลายพื้นที่ห้ามใช้หากไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน วางหลายจุดในบริเวณกว้างและตรวจเสมอ เนื้อสัตว์ป่าต้องปรุงจนไม่มีส่วนสีชมพูเหลือ

เก็บอาหารและดูแลค่ายให้ปลอดภัย

ป้องกันสัตว์เข้าค่าย

- ทำอาหารและกินห่างจากที่นอนอย่างน้อย 60 ม. (200 ฟุต) ทางใต้ลม
- แขวนอาหาร ขยะ และของมีกลิ่น เช่น ยาสีฟันหรือสบู่ จากกิ่งไม้สูงอย่างน้อย 4 ม. (12 ฟุต) และห่างลำต้น 1.5 ม. (5 ฟุต) หรือใช้ภาชนะกันหมี

- ในถิ่นหมี ห้ามเก็บอาหารไว้ในที่นอนหรือที่พัก

ป้องกันอาหารเป็นพิษ

- ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนจับอาหาร
- ต้มน้ำที่จะใช้ทำอาหารและล้างจาน
- กินอาหารทันทีหลังทำสุก อากาศร้อนทำให้อาหารที่วางเกิน 2 ชั่วโมงเสี่ยงทำให้ป่วย
- ทิ้งกระป๋องที่บวม รั่ว เปิดแล้วมีของพุ่ง หรือกลิ่นผิดปกติ

ถนอมเนื้อและปลา

- ตากแห้ง: หั่นบางไม่เกิน 6 มม. (1/4 นิ้ว) ตากแดดและลม หรือเหนือไฟอ่อนมีควัน จนแห้งกรอบ
- รมควัน: แขวนเนื้อบางในควันหนาเหนือไฟอ่อนหลายชั่วโมง ควันช่วยกันแมลงและช่วยถนอมอาหาร
- ความเย็น: ฤดูหนาวอาจแช่แข็งเนื้อนอกอาคารในที่ร่มและสัตว์เข้าไม่ถึง

ต้องหั่นบางและทำให้แห้งสนิท เนื้อหนาหรือยังชื้นเสียเร็ว

สำรองอาหารสำหรับเหตุฉุกเฉิน

ควรสำรองเท่าไร

เตรียมให้ทุกคนในบ้านอย่างน้อย 3 วัน หากได้ สองสัปดาห์ จะดีกว่า และเผื่อสัตว์เลี้ยงด้วย

อาหารที่ควรเก็บ

เลือกของที่ครอบครัวกินอยู่แล้ว ใช้น้ำน้อย และไม่ต้องปรุงหรือปรุงเพียงเล็กน้อย:

- เนื้อ ปลา ถั่ว ซุป ผัก และผลไม้กระป๋อง
- เนยถั่ว ถั่ว และธัญพืชผสมผลไม้อบแห้ง
- แครกเกอร์ กราโนลา และอาหารพลังงานแบบแท่ง
- ผลไม้อบแห้ง
- ซีเรียลพร้อมกินและข้าวโอ๊ตสำเร็จรูป
- นมเก็บนอกตู้เย็นได้หรือนมผง
- ข้าว พาสต้า และถั่วแห้ง เฉพาะเมื่อมีน้ำและเชื้อเพลิงพอปรุง
- ของช่วยให้ผ่อนคลาย เช่น ช็อกโกแลต กาแฟ ชา และขนม เพราะกำลังใจสำคัญ
- อาหารทารกและนมผง หากมีทารก รวมถึงอาหารเฉพาะสำหรับผู้แพ้อาหารหรือมีข้อจำกัดจากโรค

อย่าลืม

- ที่เปิดกระป๋องแบบใช้มือ
- จาน แก้ว และช้อนส้อมที่ใช้ได้โดยไม่ต้องล้าง
- วิธีปรุงโดยไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น เตาแคมป์กับเชื้อเพลิง ซึ่งต้องใช้ นอกอาคารเท่านั้น

เก็บรักษาให้ดี

- เก็บในที่เย็น แห้ง มืด และยกพ้นพื้น
- เข้าก่อน ใช้ก่อน: ใช้ของเก่าก่อน วางของใหม่ไว้ด้านหลัง
- ตรวจวันหมดอายุปีละสองครั้ง เช่น ช่วงเปลี่ยนเวลาออมแสง
- ทิ้งกระป๋องบวม รั่ว สนิมลึก หรือบุบตรงตะเข็บ

อาหารเค็มทำให้กระหายน้ำ เมื่อมีน้ำน้อยให้เลือกอาหารเค็มน้อยและกระป๋องที่บรรจุในน้ำหรือน้ำผลไม้

ความปลอดภัยของอาหารหลังไฟดับ

ปิดประตูตู้ไว้

- อย่าเปิดตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง เกินจำเป็น
- ตู้เย็นที่ปิดไว้เก็บความเย็นได้ประมาณ 4 ชั่วโมง
- ตู้แช่แข็งเต็มเก็บได้ประมาณ 48 ชั่วโมง หากมีของครึ่งตู้ประมาณ 24 ชั่วโมง
- รวมอาหารไว้ด้วยกัน เติมช่องว่างด้วยน้ำแข็ง แกลลอนแช่แข็ง หรือถุงน้ำแข็ง อาหารจากช่องเย็นอาจย้ายใส่กระติกพร้อมน้ำแข็ง

หลัก 2 ชั่วโมง

- อาหารเสียง่ายที่อยู่เหนือ 4 C (40 F) นานกว่า 2 ชั่วโมง ควรทิ้ง หากอุณหภูมิสูงกว่า 32 C / 90 F ให้จำกัดเพียง 1 ชั่วโมง
- เครื่องวัดอุณหภูมิในตู้เย็นช่วยบอกความเย็นจริง

อาหารในตู้เย็นที่ควรทิ้งเมื่อเกินเกณฑ์

- เนื้อ สัตว์ปีก ปลา และไข่
- นม ชีสนิ่ม โยเกิร์ต และครีม
- อาหารสุกเหลือ อาหารปรุงพร้อมกิน และผักผลไม้ที่หั่นแล้ว
- ทุกอย่างที่กลิ่นผิดปกติ

โดยทั่วไปยังปลอดภัย

- ชีสแข็ง เนย และมาการีน
- ผักผลไม้ทั้งลูก เนยถั่ว เยลลี ซอสมะเขือเทศ และมัสตาร์ด
- เครื่องดื่มบรรจุขวดที่ยังไม่เปิด

อาหารในตู้แช่แข็ง

- หากยังมีผลึกน้ำแข็งหรือเย็นเมื่อสัมผัส ที่ 4 C / 40 F หรือต่ำกว่า โดยทั่วไปแช่แข็งใหม่หรือนำมาปรุงได้
- หากละลายหมดและอุ่นเกิน 2 ชั่วโมง ให้ทิ้งเนื้อ สัตว์ปีก ปลา และผลิตภัณฑ์นม
- ห้ามแช่แข็งไอศกรีมหรือของอื่นที่ละลายแล้วซ้ำ


การปรุงและกิน

- รีบปรุงของที่ละลายแล้ว ใช้อุณหภูมิที่ปลอดภัยสำหรับเนื้อ ดูคู่มือทำอาหาร
- เมื่อไม่แน่ใจ ให้ทิ้ง กลิ่นหรือรสบอกความปลอดภัยไม่ได้
- ห้ามชิมเพื่อตรวจว่าเสียหรือไม่

รีบจัดการอาหารในช่องแช่แข็ง กินของสดและของแช่เย็นก่อน แล้วจึงใช้อาหารกระป๋องกับของแห้ง

หาทิศด้วยเงาไม้

ใช้ได้ทุกแห่งในโลกเมื่อมีแดด



การหาทิศด้วยเงาไม้

ขั้นตอน

1. ปักไม้ตรงยาวประมาณ 1 ม. (3 ฟุต) ให้ตั้งฉากกับพื้นราบ
2. ใช้หินเล็กทำเครื่องหมายปลายเงา จุดนี้คือ ตะวันตก
3. รออย่างน้อย 15 นาที ปลายเงาจะเคลื่อน
4. ทำเครื่องหมายปลายเงาจุดใหม่ จุดนี้คือ ตะวันออก
5. ลากเส้นจากจุดแรกไปจุดที่สอง จะได้แนว ตะวันตกไปตะวันออก
6. ยืนให้จุดแรกอยู่ซ้ายและจุดที่สองอยู่ขวา คุณจะหันหน้าไปทาง เหนือ

ข้อแนะนำ

- ยิ่งเว้นเวลาระหว่างสองจุดนาน ผลยิ่งแม่นยำ

- แม่นยำที่สุดช่วงใกล้เที่ยงและใกล้วันวิษุวัต แม่นยำน้อยลงช่วงเช้าตรู่หรือเย็น
- เวลาเที่ยงสุริยะของพื้นที่ เงาจะสั้นที่สุดและชี้ออกจากดวงอาทิตย์ โดยคร่าว ๆ ชี้เหนือในซีกโลกเหนือหรือชี้ใต้ในซีกโลกใต้

ดูเพิ่มเติม หาทิศด้วยนาฬิกา

หาทิศด้วยนาฬิกา



การหาทิศด้วยนาฬิกา

ซีกโลกเหนือ

1. ถือนาฬิกาให้ราบ
2. ชี้ เข็มชั่วโมง ไปทางดวงอาทิตย์
3. แนวกึ่งกลางระหว่างเข็มชั่วโมงกับเลข 12 คือ ทิศใต้

4. หากใช้เวลาออมแสง ให้ใช้เลข 1 แทนเลข 12

ซีกโลกใต้

1. ชี้เลข 12 ไปทางดวงอาทิตย์
2. แนวกึ่งกลางระหว่างเลข 12 กับเข็มชั่วโมงคือ ทิศเหนือ
3. หากใช้เวลาออมแสง ให้ใช้เลข 1 แทนเลข 12

ไม่มีนาฬิกาแบบเข็ม?

วาดหน้าปัดลงบนกระดาษหรือพื้น วาดเข็มให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน แล้วใช้วิธีเดียวกัน

วิธีนี้เป็นเพียงการประมาณ บางพื้นที่และบางเวลาอาจคลาดเคลื่อน 20 องศาหรือมากกว่า และใช้ได้ไม่ดีใกล้เส้นศูนย์สูตร ควรตรวจสอบร่วมกับวิธีอื่น

หาทิศจากดวงดาว

ซีกโลกเหนือ: ดาวเหนือ




การหาดาวเหนือ

1. หา กลุ่มดาวกระบวยใหญ่ ซึ่งมีดาวสว่างเจ็ดดวงเรียงคล้ายกระบวย
2. ดาวสองดวงที่ขอบนอกของส่วนถ้วยเรียกว่า ดาวชี้
3. ลากแนวจากดาวชี้ดวงล่างผ่านดวงบนต่อไปประมาณ 5 เท่า ของระยะระหว่างสองดวง
4. จะพบ ดาวเหนือ หรือโพลาริส เป็นดาวสว่างปานกลางอยู่ค่อนข้างโดดเดี่ยว และเป็นปลายด้ามของกระบวยเล็ก
5. ดาวเหนืออยู่เกือบตรงเหนือขั้วโลกเหนือ เมื่อหันหา จะหันไปทาง ทิศเหนือ

หากกระบวยใหญ่อยู่ต่ำหรือถูกบัง ให้หา กลุ่มดาวแคสซิโอเปีย รูปตัว W ซึ่งอยู่คนละด้านของดาวเหนือ

ซีกโลกใต้: กางเขนใต้



กลุ่มดาวกางเขนใต้

1. หา กางเขนใต้ ดาวสว่างสี่ดวงเป็นรูปว่าว โดยมี ดาวชี้ สว่างสองดวงอยู่ข้าง ๆ
2. ต่อแนวแกนยาวจากปลายด้านล่างของกางเขนออกไปประมาณ 4.5 เท่า ของความยาวแกนนั้น
3. จุดนั้นคือ ขั้วฟ้าใต้ โดยประมาณ ลากแนวดิ่งลงสู่ขอบฟ้า จะได้ ทิศใต้

กลุ่มดาวนายพราน ใช้ได้ทั้งสองซีกโลก

เข็มขัดนายพรานเป็นดาวสว่างสามดวงเรียงกัน ขึ้นใกล้ ทิศตะวันออก และตกใกล้ ทิศตะวันตก พอดี

ใช้ดาวดวงใดก็ได้

เล็งดาวผ่านไม้สองอันที่ปักอยู่กับที่ แล้วสังเกต 15 นาที ในซีกโลกเหนือ หากดาวเลื่อนขึ้นแสดงว่าหันตะวันออก เลื่อนลงคือหันตะวันตก เลื่อนขวาคือหันใต้ และเลื่อนซ้ายคือหันเหนือ สำหรับซีกโลกใต้ให้สลับเหนือกับใต้

พื้นฐานแผนที่และเข็มทิศ

จัดแผนที่ให้ตรงกับภูมิประเทศ

1. วางเข็มทิศบนแผนที่ ให้ขอบเข็มทิศทาบเส้นกริดแนวเหนือ-ใต้
2. หมุนแผนที่กับเข็มทิศไปพร้อมกัน จนปลายเข็มสีแดงชี้ทิศเหนือบนแผนที่ โดยชดเชยมุมเบี่ยงเบนแม่เหล็กตามหัวข้อด้านล่าง
3. ตอนนี้แผนที่จะหันตรงกับภูมิประเทศรอบตัว

วัดมุมทิศไปยังจุดสังเกต

1. เล็งลูกศรเดินทางบนเข็มทิศไปยังจุดสังเกต
2. หมุนหน้าปัดจนลูกศรจัดแนวอยู่ใต้เข็มสีแดงพอดี จำว่าให้เข็มแดงอยู่ในช่องลูกศร
3. อ่านมุมทิศที่ขีดดัชนี

เดินตามมุมทิศ

1. ถือเข็มทิศแนวราบไว้ข้างหน้า ให้ลูกศรเดินทางชี้ไปด้านหน้า
2. หมุนตัวจนเข็มอยู่ในลูกศรจัดแนว
3. เลือกต้นไม้หรือก้อนหินที่อยู่บนแนวนั้น เดินไปให้ถึงแล้วทำซ้ำ

มุมเบี่ยงเบนแม่เหล็ก

ทิศเหนือแม่เหล็กที่เข็มทิศชี้ต่างจากทิศเหนือบนแผนที่ ค่าความต่างมักระบุบนแผนที่ และบางพื้นที่อาจถึง 10-20 องศาหรือมากกว่า ต้องชดเชยมุมนี้ มิฉะนั้นยิ่งเดินไกลยิ่งหลงออกจากแนวมาก

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- อย่าให้โลหะ โทรศัพท์ หรือแม่เหล็กอยู่ใกล้เข็มทิศ
- เล็งเผื่อด้านข้าง: หากจะไปยังจุดบนแม่น้ำหรือถนน ให้ตั้งใจเล็งเยื้องไปด้านหนึ่ง เมื่อถึงแม่น้ำหรือถนนจะได้รู้ว่าต้องเลี้ยวทางไหน
- ใช้แนวภูมิประเทศนำทาง: เดินตามแนวยาว เช่น แม่น้ำ สันเขา หรือทางเดิน
- นับก้าว เพื่อประมาณระยะ คนส่วนใหญ่เดินประมาณ 60-70 คู่ก้าวต่อระยะ 100 ม. บนพื้นราบ

เดินทางอย่างไรไม่ให้หลง

ก่อนออกเดินทาง

บอกใครสักคนว่าจะไปเส้นทางไหนและคาดว่าจะกลับเมื่อใด พกแผนที่พื้นที่นั้น

ทำเครื่องหมายเส้นทาง

- หักกิ่งไม้ระดับสายตาให้ชี้ทางที่คุณเดิน
- กองหินเล็ก ๆ หรือเรียงไม้เป็นลูกศร
- ฝากข้อความไว้ตามทางแยก ระบุเวลา วันที่ ทิศทาง และสภาพของคุณ

หากหลงทางและตัดสินใจเดินต่อ

- เลือกทิศเดียวและรักษาทิศไว้ การเดินวนยิ่งทำให้หลง
- เดินลงที่ต่ำและตามทางน้ำ ลำธารไหลสู่แม่น้ำ ซึ่งมักนำไปสู่ถนนหรือชุมชน แต่หลีกเลี่ยงหุบผาชันและน้ำตก
- ขึ้นจุดสูงอย่างปลอดภัยเพื่อมองหาถนน อาคาร ควัน หรือสายไฟ
- เดินตามแนวสายไฟ รั้ว ท่อ หรือรางรถไฟ เพราะแนวเหล่านี้ย่อมนำไปถึงสถานที่บางแห่ง
- เดินในเวลากลางวัน หยุดตั้งที่พักให้เสร็จก่อนมืดมากพอสมควร


หากมีหมอก มืด หรือหิมะขาวโพลนจนมองไม่เห็น ให้หยุดรอ การเดินโดยมองไม่เห็นเสี่ยงพลัดตกและหลงหนักขึ้น

ร่องรอยที่บ่งชี้ว่ามีคนอยู่

ถนน ทางเดิน รั้ว ตอไม้ที่ถูกตัด รอยยางรถ ปศุสัตว์ ตลอดจนเสียงรถ สุนัข หรือเครื่องจักร

เบาะแสทิศทางและแสงจากธรรมชาติ

เหลือแสงกลางวันอีกเท่าไร?



กะเวลาก่อนตะวันตกดินด้วยมือ

1. เหยียดแขนสุด หันฝ่ามือเข้าหาตัว ให้นิ้วชิดกันและอยู่ในแนวราบ
2. วางนิ้วล่างสุดให้ทาบแนวขอบฟ้า
3. นับว่าช่องระหว่างขอบฟ้ากับดวงอาทิตย์กว้างเท่ากับกี่นิ้วมือ
4. ความกว้างหนึ่งนิ้วแทนแสงกลางวันประมาณ 15 นาที สี่นิ้วจึงประมาณหนึ่งชั่วโมง

เป็นเพียงการประมาณซึ่งเปลี่ยนตามพื้นที่และฤดูกาล ควรเผื่อเวลาไว้มาก ๆ หลังตะวันตกดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีแสงสนธยาพอใช้อีกประมาณ 20-30 นาที

ข้อพื้นฐานเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

- ดวงอาทิตย์ขึ้นคร่าว ๆ ทาง ตะวันออก และตกทาง ตะวันตก
- พื้นที่เหนือเขตร้อน ดวงอาทิตย์เที่ยงวันอยู่ทาง ใต้ ส่วนพื้นที่ใต้เขตร้อนจะอยู่ทาง เหนือ
- ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรงตะวันออกกับตะวันตกเฉพาะช่วงใกล้วันวิษุวัตในเดือนมีนาคมและกันยายน

ฤดูร้อนแนวจะเลื่อนไปทางขั้วโลก ส่วนฤดูหนาวเลื่อนไปทางเส้นศูนย์สูตร

เบาะแสที่มักใช้ได้ในซีกโลกเหนือ

สำหรับซีกโลกใต้ ให้สลับเหนือกับใต้

- หิมะ บนลาดเขาหันใต้ละลายก่อน ส่วนลาดเขาหันเหนือเก็บหิมะได้นานกว่า
- ลาดเขาหันใต้มักแห้งและมีพืชชอบแดดขึ้นโปร่งกว่า ส่วนลาดเขาหันเหนือมักชื้นและมีพืชหนาแน่นกว่า
- ลมประจำถิ่น ทำให้ต้นไม้และกองหิมะมีรูปทรงเฉพาะ หากรู้ทิศลมปกติของพื้นที่ รูปต้นไม้เอนและกองหิมะช่วยบอกทิศได้
- โบสถ์: โบสถ์เก่าในยุโรปมักตั้งแท่นบูชาไว้ปลายอาคารด้านตะวันออก
- จานดาวเทียม ในอเมริกาเหนือและยุโรปมักหันใต้

ความเชื่อที่ไม่ควรใช้ตัดสินทิศ

- "มอสขึ้นด้านเหนือของต้นไม้" มอสขึ้นตรงไหนก็ได้ที่ชื้นและร่ม
- "จอมปลวกหรือรังมดอยู่ด้านใต้" เชื่อถือไม่ได้
- วงปีต้นไม้กว้างด้านหนึ่ง ขึ้นกับความลาด แสง และลม ไม่ใช่ทิศ

ใช้หลายเบาะแสร่วมกัน และยืนยันด้วย การหาทิศด้วยเงาไม้ หรือดวงดาว ก่อนเลือกทิศเดินทาง

สัญญาณภาคพื้นสำหรับอากาศยาน

สัญลักษณ์ขนาดใหญ่บนพื้นมองเห็นจากอากาศยานที่อยู่ห่างหลายกิโลเมตรได้



สัญญาณภาคพื้นสำหรับอากาศยาน

สัญลักษณ์สำคัญ

- V — ต้องการความช่วยเหลือ
- X — ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์
- N — ไม่
- Y — ใช่
- ลูกศร — กำลังเดินทางไปทิศนี้
- SOS — ประสบภัย เป็นสัญญาณที่เข้าใจได้ทั่วไป

ทำให้เห็นชัด

- ให้สัญลักษณ์แต่ละตัวสูงอย่างน้อย 3 ม. (10 ฟุต) และเส้นกว้างประมาณ 1 ม. (3 ฟุต) ยิ่งใหญ่ยิ่งดี

- ใช้สี ตัดกับพื้นหลัง เช่น ไม้หรือหินสีเข้มบนหิมะ หินสีอ่อนหรือเสื้อผ้าบนพื้นมืด หรือขุดร่องบนหิมะหรือทรายให้เกิดเงา
- ทำเส้นตรงและมุมชัด เพราะรูปแบบเหล่านี้พบในธรรมชาติน้อยจึงสะดุดตา
- เลือกที่โล่ง เช่น ลาน หาด สันเขา หรือผิวทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็ง


ตอบอากาศยานด้วยท่าทาง

- ยกแขนสองข้างเป็นตัว Y: ใช่ เราต้องการความช่วยเหลือ
- ยกแขนหนึ่งขึ้น อีกข้างชี้ลงเป็นแนวทแยงคล้าย N: ไม่ เราไม่ต้องการความช่วยเหลือ

หากอากาศยานเอียงปีกสลับหรือกะพริบไฟ แสดงว่าเห็นคุณแล้ว

กระจกส่งสัญญาณ

ในวันที่มีแดด แสงวาบจากกระจกอาจมองเห็นได้ไกลถึง 15 กม. (10 ไมล์) หรือมากกว่า เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ได้ผลดีมากวิธีหนึ่ง



เล็งกระจกส่งสัญญาณ

เล็งเมื่อไม่มีรูเล็ง

1. ถือกระจกใต้ตาเล็กน้อย ให้ด้านสะท้อนแสงหันออก
2. เหยียดแขนอีกข้างและกางสองนิ้วเป็น V ให้เป้าหมาย เช่น เครื่องบิน เรือ หรือยอดเขา อยู่ในช่อง V
3. เอียงกระจกจนแสงอาทิตย์สะท้อนตกบนนิ้ว
4. รักษาแสงให้อยู่ในช่อง V และขยับกระจกเล็กน้อยให้แสงกวาดผ่านเป้าหมาย

กระจกที่มีรูเล็ง

มองเป้าหมายผ่านรู จะเห็นจุดสว่างสำหรับเล็ง เอียงกระจกจนจุดนั้นทับเป้าหมาย

ข้อแนะนำ

- ใช้สิ่งผิวมันแทนได้ เช่น หน้าจอโทรศัพท์ แผ่นซีดี ฝากระป๋องขัดเงา หรือฟอยล์

- กวาดแสงไปตามขอบฟ้าบ่อย ๆ แม้ยังไม่เห็นอะไร นักบินอาจเห็นคุณก่อนที่คุณเห็นเขา
- หากนักบินเห็นชัดแล้ว อย่าส่องซ้ำต่อเนื่องเพราะอาจรบกวนการมองเห็น เปลี่ยนไปใช้สัญญาณภาคพื้น

ส่งสัญญาณด้วย SOS นกหวีด ไฟ และควัน

หลักสามครั้ง

สัญญาณสามครั้งหรือสามจุด หมายถึงประสบภัย เช่น กองไฟสามกองเรียงเป็นสามเหลี่ยม เป่านกหวีดสามครั้ง ยิงปืนสามนัด หรือกะพริบไฟสามครั้ง

SOS ด้วยรหัสมอร์ส



SOS ด้วยรหัสมอร์ส

สั้นสาม ยาวสาม สั้นสาม: ... --- ... หยุดแล้วทำซ้ำ ใช้ไฟฉาย กระจก นกหวีด หรือแตรรถ

นกหวีด

เสียงไปไกลกว่าตะโกนและใช้แรงน้อยกว่า เป่า ยาวสามครั้ง แล้วหยุดฟัง ทำซ้ำเป็นระยะ สัญญาณตอบมักเป็นสองครั้ง

กองไฟส่งสัญญาณ

- เตรียมกองไฟสามกองเป็นรูปสามเหลี่ยม ห่างกันประมาณ 30 ม. (100 ฟุต) ในที่โล่ง
- เตรียมให้จุดได้ทันที เก็บเชื้อไฟและฟืนเล็กใต้ที่กันฝน พร้อมเชื้อเพลิงมากพออยู่ใกล้ ๆ
- กลางวัน: เติมใบไม้สด มอส หรือไม้เปียกเพื่อให้เกิด ควันขาว หนา ตัดกับป่ามืด ยางหรือน้ำมันทำให้เกิดควันดำ ซึ่งตัดกับหิมะหรือทราย
- กลางคืน: เปลวไฟสว่างมองเห็นดีที่สุด

จุดไฟส่งสัญญาณเมื่อได้ยินหรือเห็นอากาศยานหรือทีมค้นหา เว้นแต่มีเชื้อเพลิงไม่จำกัด ห้ามเสี่ยงทำให้เกิดไฟป่า

สัญญาณอื่น

- ปูเสื้อผ้าสีสดหรือผ้าห่มฉุกเฉินสะท้อนแสงในที่โล่ง
- ใช้ไฟฉายหรือไฟคาดศีรษะส่ง SOS กลางคืน
- เคลื่อนไหวร่างกาย เพราะเห็นง่ายกว่าคนที่อยู่นิ่ง

ใช้วิทยุและโทรศัพท์ในเหตุฉุกเฉิน

โทรศัพท์มือถือ

- ลองโทรหมายเลขฉุกเฉิน เช่น 911 หรือ 112 แม้ไม่มีซิมหรือสัญญาณ สายฉุกเฉินอาจใช้เสาของเครือข่ายอื่นได้
- ข้อความ ต้องการสัญญาณน้อยกว่าการโทร หลายพื้นที่รับข้อความที่หมายเลข 911 หรือ 112
- ขึ้นที่สูงหรือไปที่โล่งเพื่อหาสัญญาณ
- ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยโหมดเครื่องบิน ลดความสว่าง และตรวจสัญญาณตามเวลาที่กำหนด
- โทรศัพท์รุ่นใหม่บางรุ่นส่งข้อความฉุกเฉินผ่านดาวเทียมได้ ตรวจการตั้งค่าฉุกเฉินก่อนเดินทาง

ช่องวิทยุฉุกเฉินที่ใช้ทั่วไปในอเมริกาเหนือ

- CB: ช่อง 9 สำหรับเหตุฉุกเฉิน ช่อง 19 สำหรับผู้ขับรถบรรทุก
- FRS/GMRS: บางพื้นที่มีผู้เฝ้าฟังช่อง 1 หรือ 3 เป็นประจำ FRS ไม่ต้องมีใบอนุญาต
- วิทยุสมัครเล่นย่าน 2 ม.: 146.520 MHz เป็นความถี่เรียกขานระดับประเทศ ปกติต้องมีใบอนุญาตส่ง แต่เหตุฉุกเฉินจริงทุกคนส่งได้
- VHF ทางทะเล: ช่อง 16 (156.8 MHz) สำหรับประสบภัยและเรียกขาน
- วิทยุอากาศ NOAA: 162.400-162.550 MHz รับฟังอย่างเดียว

การใช้ช่องต่างกันตามประเทศ ยุโรปนิยมวิทยุ PMR446 และโทรศัพท์ส่วนใหญ่ใช้หมายเลข 112 ได้

เรียกขอความช่วยเหลือ

พูด "Mayday, Mayday, Mayday" เมื่ออันตรายถึงชีวิต หรือ "Pan-pan" เมื่อเร่งด่วน แล้วแจ้งว่าคุณเป็นใคร อยู่ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น มีกี่คน และต้องการอะไร พูดซ้ำแล้วรอฟัง

เครื่องส่งสัญญาณระบุตำแหน่งฉุกเฉิน PLB

PLB หรือเครื่องส่งข้อความผ่านดาวเทียมส่งตำแหน่งให้ทีมกู้ภัยได้ทั่วโลกเมื่อมองเห็นท้องฟ้า เป็นวิธีเรียกความช่วยเหลือในพื้นที่ห่างไกลที่เชื่อถือได้มากที่สุด

ส่งสัญญาณในเวลากลางคืน

กลางคืนแม้แสงเล็กน้อยก็มองเห็นได้ไกล โดยเฉพาะจากอากาศยาน อุปกรณ์มองกลางคืนของทีมกู้ภัยยิ่งช่วยให้เห็นแสงง่ายขึ้น

ไฟฉายหรือไฟคาดศีรษะ

- กะพริบ SOS: สั้นสาม ยาวสาม สั้นสาม ดู SOS นกหวีด ไฟ และควัน
- ส่องไปยังอากาศยานหรือแสงของทีมค้นหา และกวาดผ่านช้า ๆ
- ประหยัดแบตเตอรี่ ไม่เปิดค้างตลอด ส่งเมื่อเห็นหรือได้ยินทีมค้นหาและตามตาราง เช่น นาทีแรกของทุกชั่วโมง

แท่งเรืองแสงผูกเชือก

ผูกแท่งเรืองแสงกับเชือกยาว 1 ม. (3 ฟุต) แล้วแกว่งเป็นวงใหญ่ จะเกิดวงแสงเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ซึ่งโดดเด่นจากพื้น

โทรศัพท์

- ใช้ฟังก์ชันไฟฉายส่งสัญญาณ
- หน้าจอสีขาวสว่างมองเห็นได้ไกลในความมืด
- ปิดโทรศัพท์ระหว่างช่วงส่งสัญญาณเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

กองไฟ

เปลวไฟสูงและสว่างเห็นชัดที่สุดในเวลากลางคืน เตรียมกองไฟพร้อมจุด โดยวางเชื้อเพลิงติดไฟเร็วไว้ด้านบน ดู SOS นกหวีด ไฟ และควัน

วัสดุสะท้อนแสง

แขวนผ้าห่มฉุกเฉินหรือแถบสะท้อนแสงจากกระเป๋าและเสื้อไว้รอบค่าย แสงไฟฉายหรือไฟส่องค้นหาจะทำให้สะท้อนเด่นขึ้น

กลางคืนเสียงเดินทางได้ไกลขึ้น

อากาศมักนิ่งและเงียบ เป่านกหวีดชุดละสามครั้งแล้วตั้งใจฟังคำตอบ

ทำให้ทีมค้นหาพบคุณง่ายขึ้น

ทีมค้นหาทำงานเป็นระบบ ช่วยพวกเขาได้โดยอยู่กับที่ ทำตัวให้เห็นชัด และส่งเสียง

อยู่จุดเดียว

ทีมจะค้นหาหนักที่สุดรอบตำแหน่งและเส้นทางสุดท้ายที่ทราบ คนที่เคลื่อนที่ค้นหายากกว่ามาก และอาจเดินออกจากพื้นที่ที่ค้นไปแล้ว

ทำให้เห็นง่าย

- ไปยังที่โล่งที่สุดใกล้ ๆ เช่น ลาน สันเขา ทุ่ง หาด หรือริมแม่น้ำ
- ปูเสื้อผ้าสีสด ผ้าใบ หรือผ้าห่มฉุกเฉินสะท้อนแสงในที่โล่ง
- ทำ สัญญาณภาคพื้น และเตรียมกองไฟพร้อมจุด
- ใช้ กระจกส่งสัญญาณ ไปยังอากาศยานทุกลำที่เห็น

ทำให้ได้ยินง่าย

- เป่านกหวีดชุดละสามครั้ง แล้วหยุดฟัง
- หากไม่มีนกหวีด ให้เคาะโลหะหรือหิน
- ขานตอบ เมื่อได้ยินคนเรียกชื่อ บางคนหลบทีมค้นหาเพราะกลัวหรืออาย อย่าทำเช่นนั้น

หากต้องย้าย ให้ทิ้งเบาะแส

ฝากข้อความไว้จุดเดิม ระบุเวลา ทิศทาง และสภาพของคุณ ทำลูกศรหรือหักกิ่งไม้บอกเส้นทาง

เมื่อเฮลิคอปเตอร์มาถึง

- อยู่ที่โล่งและยกแขนสองข้างเป็น Y หมายถึงต้องการความช่วยเหลือ
- อย่าเข้าใกล้จนเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ เดินเข้าจาก ด้านหน้า ที่นักบินเห็น และก้มตัวต่ำ
- ห้ามเข้าใกล้ใบพัดหาง หรือเข้าจากด้านเนินสูงซึ่งใบพัดอยู่ใกล้พื้นกว่า

- ผูกยึดหรือจับของที่ปลิวได้ เช่น ผ้าใบ หมวก และถุงนอน เพราะลมจากใบพัดแรงมาก
- หากทำได้ เตรียมลานลงขนาดประมาณ 30 x 30 ม. (100 x 100 ฟุต) ให้ราบ ไม่มีสายไฟ ต้นไม้สูง หรือเศษของปลิวได้

เมื่อทีมค้นหามาถึงตัว

แจ้งจำนวนคน การบาดเจ็บ โรคประจำตัว และยังมีใครสูญหายอยู่หรือไม่

ฮีตสโตรกในสุนัข

ฮีตสโตรกทำให้เสียชีวิตได้ในไม่กี่นาที เริ่มลดความร้อนก่อน แล้วรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที

อาการ: หอบหนัก น้ำลายเหนียว เหงือกแดงจัด เดินเซ อาเจียน หรือหมดสติ

ทำทันที

- พาเข้าร่มหรือห้องปรับอากาศ
- ใช้น้ำเย็นที่ไม่เย็นจัดราดตัว โดยเฉพาะท้อง รักแร้ และอุ้งเท้า
- พัดลมให้และเสนอให้จิบน้ำทีละน้อย ห้ามบังคับกรอก
- หยุดลดความร้อนเมื่อเริ่มหนาวสั่นหรือหายใจสงบลง การทำให้เย็นเกินก็เสี่ยง
- พบสัตวแพทย์แม้ดูดีขึ้น เพราะอวัยวะอาจแสดงอาการเสียหายภายหลัง

ป้องกัน

- ห้ามทิ้งสุนัขในรถจอด เปิดหน้าต่างแง้มก็ไม่ช่วย
- เดินเล่นช่วงเย็นสบาย พื้นถนนลวกอุ้งเท้าได้ก่อนที่คุณจะรู้สึกร้อน
- สุนัขหน้าสั้นและขนหนาร้อนเกินได้เร็วที่สุด

สารพิษและอาหารอันตรายต่อสุนัข

โทรหาสัตวแพทย์หรือสายพิษวิทยาสัตว์ทันที อย่ารออาการ และห้ามทำให้อาเจียนเว้นแต่สัตวแพทย์สั่ง

สิ่งอันตรายต่อสุนัข

- ไซลิทอลในหมากฝรั่งหรือขนมไร้น้ำตาล และเนยถั่วบางยี่ห้อ แม้เพียงเล็กน้อยก็อันตรายมาก
- องุ่น ลูกเกด และลูกเกดเคอร์แรนต์
- ช็อกโกแลต โดยเฉพาะดาร์กช็อกโกแลตและผงโกโก้ทำขนม
- หัวหอม กระเทียม กุยช่าย และต้นกระเทียมฝรั่ง

- แมคคาเดเมีย แอลกอฮอล์ แป้งขนมปังดิบ และคาเฟอีน
- น้ำยาป้องกันการแข็งตัวซึ่งมีรสหวาน และยาเบื่อหนู
- ยาคน โดยเฉพาะไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน และอะเซตามิโนเฟนหรือพาราเซตามอล

ข้อมูลที่ต้องแจ้ง

- น้ำหนักสุนัข กินอะไร ปริมาณเท่าไร และเมื่อใด
- นำหีบห่อหรือฉลากไปด้วย

สายพิษวิทยาสัตว์ในสหรัฐฯ อาจมีค่าบริการ: ASPCA Animal Poison Control 888-426-4435 และ Pet Poison Helpline 855-764-7661

สุนัขสำลักและทางเดินหายใจอุดตัน

สุนัขสำลักอาจกัดเพราะตกใจ ระวังมือของคุณ

อาการ: ใช้เท้าเขี่ยปาก พยายามขย้อน เหงือกซีดหรือเขียว หายใจมีเสียงหวีด และตื่นตระหนก

ทำทันที

- เปิดปากดู หากเห็นสิ่งอุดตันและหยิบถึงง่าย ใช้นิ้วเกี่ยวออก ห้ามดันลึกลง
- สุนัขตัวเล็ก: อุ้มให้ศีรษะต่ำและตบหลังระหว่างสะบักให้หนักแน่น
- สุนัขตัวใหญ่: ยกขาหลังให้หัวต่ำ แล้วตบหลังระหว่างสะบักให้หนักแน่น
- หากไม่ได้ผล วางสองมือหลังกระดูกซี่โครง แล้วกระตุกเร็วและหนักแน่นขึ้นด้านบนและไปข้างหน้า
- รีบพบสัตวแพทย์แม้สิ่งอุดตันหลุดแล้ว

แผล เลือดออก และอุ้งเท้าสุนัข

ห้ามปล่อยผ้ารัดแน่นค้างไว้ ตรวจบ่อยว่าอุ้งเท้าหรือขาไม่เย็นหรือบวม

เลือดออก

- ใช้ผ้าหรือก๊อซสะอาดกดแผลให้มั่นคง กดต่อเนื่องโดยไม่ยกดู
- หากเลือดซึม ให้วางผ้าเพิ่มด้านบน
- พันด้วยผ้ายืดติดตัวเองให้กระชับแต่ไม่แน่น เปิดปลายนิ้วไว้ให้ตรวจได้
- พบสัตวแพทย์เมื่อแผลลึก เลือดไม่หยุดในไม่กี่นาที หรือเป็นแผลถูกแทงทะลุ

อุ้งเท้า

- ล้างสิ่งสกปรกออกด้วยน้ำสะอาด
- สวมถุงเท้าหรือรองเท้าสุนัขสะอาดระหว่างเดินทางไปหาสัตวแพทย์

ป้องกันการเลีย

- การเลียทำให้แผลเปิดซ้ำ ใช้ปลอกคอกันเลียหรือถุงเท้าสะอาดจนสัตวแพทย์ตรวจ

การช่วยฟื้นคืนชีพสุนัข

ใช้เฉพาะสุนัขที่ไม่ตอบสนองและไม่หายใจ โทรหาสัตวแพทย์ระหว่างทาง หากเป็นไปได้ให้คนอื่นขับรถ

ขั้นตอน

- จัดสุนัขนอนตะแคงขวาบนพื้นแข็ง
- กดหน้าอก: วางมือเหนือส่วนกว้างที่สุดของทรวงอก กดลึกประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งของความลึกหน้าอก ในอัตรา 100 ถึง 120 ครั้งต่อนาที
- สุนัขตัวเล็กและลูกสุนัข ใช้มือหนึ่งข้างหรือสองนิ้วโอบหน้าอก
- ช่วยหายใจ: ปิดปากแล้วเป่าลมเข้าจมูกจนหน้าอกยกขึ้น ให้ 2 ครั้งหลังการกดหน้าอกทุก 30 ครั้ง
- ทำต่อจนสุนัขตอบสนองหรือถึงสัตวแพทย์

ควรเรียนจากหลักสูตรปฐมพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่รับรอง คู่มือนี้ใช้ทบทวน ไม่ทดแทนการฝึก

ดูแลสุนัขในอากาศหนาว

สุนัขขนสั้นและตัวเล็กเสียความร้อนเร็ว หู หาง และอุ้งเท้าได้รับผลกระทบก่อน

อาการผิดปกติ

- หนาวสั่น เดินช้าลง ร้องคราง ยกเท้าหนีพื้น หรือไม่ยอมเดิน
- ผิวหู หาง หรือเท้าซีดหรือเทา อาจเป็นเนื้อเยื่อเสียหายจากความเย็น

วิธีดูแล

- พาเข้าอาคาร ห่อผ้าห่มแห้ง ค่อย ๆ อุ่นด้วยน้ำอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อนและความอุ่นจากร่างกาย
- ห้ามถูผิวที่ถูกความเย็นจนแข็ง และห้ามใช้แผ่นให้ความร้อนสัมผัสโดยตรง
- พบสัตวแพทย์หากเนื้อเยื่อถูกความเย็นหรือสุนัขซึมมาก

ป้องกัน

- สุนัขขนสั้นควรมีเสื้อคลุมหรือเสื้อกันหนาว และรองเท้ากันน้ำแข็งกับเกลือ
- เช็ดอุ้งเท้าหลังเดิน เกลือโรยถนนและสารละลายน้ำแข็งอาจเป็นพิษ
- ห้ามทิ้งสุนัขในรถที่เย็นจัด

กระเป๋าฉุกเฉินสำหรับสุนัข

จัดของให้สุนัข

- น้ำและชามพับได้
- อาหารอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ในภาชนะปิดสนิท
- ยาพร้อมบันทึกขนาดและเวลาให้
- สายจูง สายสำรอง และสายรัดอกพอดีตัว
- ประวัติวัคซีน หมายเลขไมโครชิป และรูปสุนัขปัจจุบัน
- ถุงเก็บของเสีย ผ้าขนหนู และผ้าห่มหรือที่นอนเก่า
- รองเท้าสุนัข ตะกร้อครอบปากเพราะสุนัขเจ็บอาจกัด และชุดปฐมพยาบาล
- ปลอกคอพร้อมป้ายระบุตัวและเบอร์มือถือคุณ
- กรงหรือกระเป๋าขนย้ายที่ขนาดเหมาะ

ตรวจวันหมดอายุปีละสองครั้ง เก็บกระเป๋าไว้ข้างประตูคู่กับกระเป๋าฉุกเฉินของคน

รับมือพายุทอร์นาโด

ทอร์นาโดอาจเกิดโดยแทบไม่มีเวลาเตือน ควรรู้ว่าจะหลบที่ไหน ก่อน ท้องฟ้าเปลี่ยน

เฝ้าระวังกับเตือนภัย

- Watch เฝ้าระวัง: สภาพเอื้อต่อทอร์นาโด ติดตามข่าวและรู้จุดหลบภัย
- Warning เตือนภัย: พายุกำลังเกิดหรือใกล้เกิด เข้าที่หลบทันที

สัญญาณ

- ท้องฟ้ามืดอมเขียวและลูกเห็บใหญ่
- เมฆต่ำหมุนหรือเมฆรูปกรวย
- เสียงคำรามดังต่อเนื่องคล้ายรถไฟบรรทุก

- เศษวัสดุหมุนใกล้พื้น แม้ไม่เห็นกรวย

ที่หลบภัย

- ดีที่สุด: ห้องใต้ดินหรือห้องหลบพายุ อยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์แข็งแรงหรือโต๊ะงาน
- ไม่มีห้องใต้ดิน: อยู่ชั้นต่ำสุดในห้องเล็กด้านใน ไม่มีหน้าต่าง เช่น ห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า หรือโถง ให้มีผนังกั้นจากภายนอกหลายชั้นที่สุด
- ป้องกันตัว: ใช้ที่นอน ผ้าห่ม หรือหมวกจักรยาน ใช้แขนป้องกันศีรษะกับคอ
- บ้านเคลื่อนที่และรถไม่ปลอดภัย ไปอาคารแข็งแรงก่อนพายุมาถึง

หากติดอยู่ภายนอก

- อย่าขับรถแข่งหนีพายุในเมืองหรือการจราจรหนาแน่น
- หากไม่มีอาคาร ให้นอนคว่ำราบในที่ต่ำที่สุดที่หาได้ เช่น คู ใช้มือคลุมศีรษะกับคอ
- ห้ามหลบใต้ทางยกระดับ เพราะลมบริเวณนั้นอาจแรงกว่า

หลังเหตุ

- อาจมีพายุอีก อยู่ในที่หลบจนยกเลิกคำเตือน
- ระวังสายไฟขาด เศษแก้ว ตะปู และแก๊สรั่ว ดู สายไฟตกพื้น และ แก๊สรั่ว
- ตรวจบาดเจ็บและปฐมพยาบาล ดู ลำดับการปฐมพยาบาล
- ส่งข้อความแทนโทรเพื่อเว้นสายให้เหตุฉุกเฉิน

น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก

ผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมจำนวนมากอยู่ในรถ กระแสน้ำมีแรงกว่าที่เห็น

ก่อนน้ำมา

- รู้จุดสูงใกล้ตัวและทางไปอย่างน้อยสองทาง
- ย้ายของมีค่าและยาไว้สูง วางกระเป๋าฉุกเฉินข้างประตู
- หากพื้นที่มีประกาศเตือนน้ำท่วม ออกแต่เนิ่น ๆ อย่ารอน้ำถึงประตู

ระหว่างน้ำท่วม

- ขึ้นที่สูงทันที หากน้ำขึ้นเร็ว อย่ารอคำสั่ง
- หันกลับ อย่าเสี่ยงจมน้ำ ห้ามเดินหรือขับผ่านน้ำท่วม

- น้ำไหลลึก 15 ซม. (6 นิ้ว) ทำให้ผู้ใหญ่ล้มได้

- น้ำ 30 ซม. (1 ฟุต) ทำให้รถหลายชนิดลอย
- น้ำ 60 ซม. (2 ฟุต) พัดรถส่วนใหญ่รวมรถบรรทุกได้
  - มองผิวน้ำบอกความลึกและสิ่งใต้น้ำไม่ได้ ถนนอาจถูกกัดขาด
  - หากรถดับขณะน้ำขึ้น ทิ้งรถ แล้วขึ้นที่สูง ดู รถตกน้ำ
  - หลีกเลี่ยงห้องใต้ดินและที่ต่ำ ห้ามแตะเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือยืนในน้ำ
  - หากน้ำขึ้นในอาคาร ให้ขึ้นชั้นสูงสุด ขึ้นหลังคาเมื่อจำเป็นและส่งสัญญาณ ห้ามเข้าห้องใต้หลังคาปิดตายที่ออกไม่ได้

หลังน้ำท่วม

- น้ำอาจปนสิ่งปฏิกูล เชื้อเพลิง และสารเคมี หลีกเลี่ยงสัมผัสและล้างมือบ่อย
- ถือว่าน้ำประปาและน้ำบ่อไม่ปลอดภัยจนทางการยืนยัน ดู ทำน้ำให้ปลอดภัย
- ห้ามเปิดระบบไฟที่เคยจมน้ำ ให้ตรวจเสียก่อน
- ทิ้งอาหารสัมผัสน้ำท่วม และกระป๋องบวมหรือบุบ
- ทำอาคารให้แห้งภายในหนึ่งถึงสองวันเพื่อลดเชื้อรา สวมถุงมือและหน้ากากทำความสะอาด
- ระวังงู ของแหลม และถนนเสียหาย

เฮอริเคนและคลื่นพายุซัดฝั่ง

คลื่นพายุซัดฝั่ง คือมวลน้ำทะเลที่พายุผลักเข้าฝั่ง เป็นส่วนที่คร่าชีวิตมากที่สุดของเฮอริเคน รองลงมาคือลม

ก่อนพายุ

- รู้ว่าบ้านอยู่เขตอพยพหรือไม่ หากทางการสั่ง ให้อพยพ ออกเร็วเพื่อเลี่ยงรถติดและถนนน้ำท่วม
- เติมน้ำมัน ถอนเงินสด นำยา เอกสาร ที่ชาร์จโทรศัพท์ สัตว์เลี้ยง และกระเป๋าฉุกเฉินไป
- เติมน้ำในอ่างและภาชนะ ดู สำรองน้ำในบ้าน
- นำของที่ปลิวได้เข้าบ้านหรือผูกไว้ หากทำได้ให้ปิดหน้าต่างด้วยแผ่นไม้หรือบานกันพายุ
- แช่ขวดน้ำให้แข็งเพื่อช่วยเก็บความเย็นในตู้เย็น

หากอยู่ต่อ เฉพาะนอกเขตคลื่นซัดฝั่ง

- เลือกห้องเล็กด้านในบนชั้นต่ำสุดที่น้ำไม่ท่วม ตู้เสื้อผ้าหรือห้องน้ำไม่มีหน้าต่างเหมาะที่สุด
- ห่างหน้าต่างและประตูกระจก ใช้ที่นอนหรือผ้าห่มป้องกันตัว
- มีวิทยุ ไฟฉาย ชุดปฐมพยาบาล และน้ำอยู่ด้วย
- ตาพายุสงบไม่ได้แปลว่าพายุจบ ลมจะกลับมาจากอีกทิศและมักแรง อยู่ข้างในจนทางการยืนยันว่าผ่าน

แล้ว

- หากน้ำขึ้น ให้ขึ้นชั้นสูงสุด ห้ามหลบในห้องใต้หลังคาปิดตาย

หลังพายุ

- หลีกเลี่ยงน้ำท่วม ดู น้ำท่วมและน้ำป่า
- ห้ามขับผ่านน้ำขังหรือถนนกับสะพานเสียหาย
- ถือว่าสายไฟขาดทุกเส้นยังมีไฟ ดู สายไฟตกพื้น
- ห้ามใช้เครื่องปั่นไฟ เตาย่าง หรือเตาแคมป์ในอาคาร คาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เสียชีวิตหลังพายุจำนวนมาก ดู เครื่องปั่นไฟ
- ตรวจดูเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ถ่ายภาพความเสียหายก่อนเก็บกวาด

ไฟป่าและควันไฟ

ไฟป่าเคลื่อนเร็วกว่าคนวิ่ง และสะเก็ดไฟอาจปลิวล่วงหน้าแนวเปลวไฟได้หนึ่งไมล์

เตรียมพร้อม

- วางกระเป๋าฉุกเฉินข้างประตู ใส่ยา เอกสาร น้ำ ไฟฉาย วิทยุ และหน้ากาก N95
- รู้ทางออกสองทาง เติมน้ำมันและจอดรถหันหน้าออก
- เก็บใบไม้แห้ง ใบสน และพุ่มแห้งรอบบ้านกับรางน้ำ

เมื่อสั่งอพยพ

- ออกเร็ว อย่ารอเห็นไฟ ถนนอาจติดหรือถูกปิดอย่างรวดเร็ว
- ปิดประตูหน้าต่างแต่ไม่ล็อก ปิดแก๊สและโพรเพนหากทำได้เร็ว
- นำสัตว์เลี้ยงไปด้วย และบอกคนอื่นว่าจะไปไหน

หากติดอยู่ในรถ

- หากทำได้จอดนอกถนนในที่โล่งห่างต้นไม้กับพุ่ม
- ปิดหน้าต่างและช่องลมทั้งหมด ปิดพัดลมกับแอร์
- นอนบนพื้นต่ำกว่าแนวหน้าต่าง คลุมด้วยผ้าห่มหรือเสื้อคลุม ผ้าขนสัตว์ดีที่สุด
- อยู่ในรถซึ่งป้องกันได้ดีกว่าพื้นที่เปิด แนวไฟมักผ่านไปในไม่กี่นาที
- ห้ามขับฝ่าควันหนาหรือเปลวไฟ

หากเดินเท้า

- ไปบริเวณไหม้แล้ว พื้นดินโล่ง กองหินถล่ม หรือแหล่งน้ำ
- เลี่ยงลาดชันและหุบผา ไฟลามขึ้นเขาเร็ว
- นอนคว่ำบนดินโล่ง คลุมศีรษะและปิดปากจมูกด้วยผ้าเปียก

ควัน

- ควันทำอันตรายได้แม้อยู่ไกลจากไฟหลายชั่วโมงหรือหลายวัน อยู่ในอาคารปิดหน้าต่างประตู
- หากต้องออก ใช้ หน้ากากกรอง N95 หรือ P100 หน้ากากผ้าและหน้ากากกันฝุ่นทั่วไปกรองอนุภาคควันไม่ได้เพียงพอ
- ใช้แอร์โหมดหมุนเวียนอากาศ หรือเครื่องกรอง HEPA หากมี
- พบแพทย์เมื่อเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือไอรุนแรง
- ดื่มน้ำมากพอ และหลีกเลี่ยงออกแรงหนักในอากาศมีควัน

พายุหิมะและพายุน้ำแข็ง

ผู้เสียชีวิตช่วงพายุฤดูหนาวส่วนใหญ่มาจากปัญหารถ การสัมผัสหนาว คาร์บอนมอนอกไซด์ และหัวใจทำงานหนักขณะตักหิมะ

ก่อนพายุ

- สำรองอาหาร น้ำ ผ้าห่ม ถ่าน และยาที่ต้องใช้ ดู ไฟดับและเหตุในบ้าน
- เติมน้ำมันและมีชุดฤดูหนาวในรถ ดู ชุดฉุกเฉินประจำรถ
- วางแผนให้หนึ่งห้องอบอุ่นหากไฟดับ

ระหว่างพายุหิมะ

- อยู่ในอาคาร ไม่ออกถนน หิมะขาวโพลนอาจทำให้มองไม่เห็นแม้ระยะไม่กี่ฟุต
- ทำความอุ่นห้องเดียว ปิดประตู อุดใต้ประตูด้วยผ้า และแขวนผ้าห่มปิดหน้าต่าง
- ใส่หลายชั้นและสวมหมวก ดู ที่พักในอากาศหนาว
- ดื่มและกินสม่ำเสมอ ร่างกายใช้อาหารสร้างความร้อน
- ห้ามเผาถ่านหรือใช้เครื่องปั่นไฟกับเตาแคมป์ในอาคาร ดู คาร์บอนมอนอกไซด์
- ใช้ไฟฉายแทนเทียน หากต้องใช้เครื่องทำความร้อน ให้อยู่ห่างของติดไฟ

พายุน้ำแข็ง

- น้ำแข็งทำต้นไม้และสายไฟล้ม ห่างหน้าต่าง ต้นไม้ และสายไฟ
- เดินก้าวสั้นวางเท้าราบ ปลายเท้าแบะเล็กน้อย ปล่อยแขนช่วยทรงตัว
- อย่าขับบนน้ำแข็ง ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อก็ไม่ได้ช่วยเบรกให้หยุด
- จับราวเมื่อมี และพกทรายหรือทรายแมวเล็กน้อยไว้โรย

ตักหิมะ

- หิมะหนักอาจกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ให้ดันแทนยก พักเป็นระยะ และหยุดหากเจ็บหน้าอก เวียนศีรษะ หรือหายใจไม่อิ่ม
- เก็บหิมะออกจากช่องระบายเตา เครื่องอบผ้า และอุปกรณ์เผาไหม้ เพื่อให้ไอเสียออกได้

เนื้อเยื่อถูกความเย็นและตัวเย็นเกิน

สังเกตผิวชา ขาว หรือคล้ายขี้ผึ้ง ร่วมกับหนาวสั่น พูดไม่ชัด หรือสับสน ดู ตัวเย็นเกิน

แผ่นดินไหว

ขณะสั่น: หมอบ ป้อง เกาะ

1. หมอบ ลงบนมือและเข่าตรงที่อยู่
2. ป้อง ศีรษะกับคอด้วยแขน หากโต๊ะแข็งแรงอยู่ไม่กี่ก้าว ให้เข้าใต้โต๊ะ หากไม่มี คลานชิดผนังด้านในห่างหน้าต่าง
3. เกาะ ที่กำบังไว้และขยับตามจนหยุดสั่น

- อยู่ตรงเดิม บาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดขณะวิ่งหรือพยายามออกอาคาร
- บนเตียง: อยู่บนเตียงและใช้หมอนคลุมศีรษะ
- ห้ามยืนในกรอบประตู ไม่ได้แข็งแรงกว่าส่วนอื่นของบ้าน
- นอกอาคาร: ไปที่โล่งห่างอาคาร ต้นไม้ เสาไฟถนน และสายไฟ แล้วหมอบ ป้อง เกาะ
- ในรถ: จอดที่โล่งห่างสะพาน ทางยกระดับ และสายไฟ อยู่ในรถคาดเข็มขัดจนหยุดสั่น
- ห้ามใช้ลิฟต์

พื้นที่ชายฝั่ง

หากสั่นแรงหรือนาน หรือได้รับคำแนะนำ ให้ ขึ้นที่สูงหรือเข้าฝั่งทันที สึนามิอาจมาถึงในไม่กี่นาที อย่ารอประกาศทางการ

หลังหยุดสั่น

- อาจมีอาฟเตอร์ช็อก ให้หมอบ ป้อง เกาะทุกครั้ง
- ตรวจตนเองและผู้อื่น ดู ลำดับการปฐมพยาบาล
- ใส่รองเท้าแข็งแรงและระวังเศษแก้ว
- หากได้กลิ่นแก๊สหรือเสียงรั่ว ให้ออกแล้วโทรจากภายนอก ดู แก๊สรั่ว ห้ามจุดไม้ขีดหรือเปิดปิดสวิตช์
- ตรวจไฟและดับกองเล็ก ดู ความปลอดภัยเรื่องไฟ
- ตรวจรอยร้าวและความเสียหาย ออกหากอาคารดูไม่ปลอดภัย
- ใช้ข้อความแทนการโทร

หากติดใต้ซาก

- ห้ามจุดไม้ขีดและอย่าขยับจนฝุ่นฟุ้ง
- ใช้ผ้าปิดปาก
- เคาะท่อ ผนัง หรือเป่านกหวีดให้ทีมพบ ตะโกนเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะทำให้สูดฝุ่น

คลื่นความร้อนรุนแรง

ความร้อนคร่าชีวิตมากกว่าสภาพอากาศอันตรายอีกหลายชนิด ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก คนทำงานกลางแจ้ง และผู้มีโรคเสี่ยงที่สุด

รักษาร่างกายให้เย็น

- อยู่ห้องแอร์หากทำได้ เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวันในห้องสมุด ห้าง หรือศูนย์คลายร้อนก็ช่วยได้
- หากไม่มีแอร์ อยู่ชั้นต่ำสุดที่พ้นแดด ปิดม่านหรือมู่ลี่ด้านรับแดด
- อาบหรือแช่น้ำเย็น ทำผิว ผม และเสื้อผ้าให้เปียกแล้วนั่งหน้าพัดลม
- เมื่ออากาศเกินประมาณ 35 C (95 F) พัดลมอย่างเดียวไม่ช่วยลดความร้อน ต้องใช้น้ำบนผิวด้วย
- ใส่เสื้อผ้าบาง หลวม สีอ่อน และหมวกปีกกว้าง
- ทำงานหนักช่วงเช้าตรู่หรือเย็นที่อากาศเย็น

การดื่ม

- ดื่มก่อนกระหาย ดู ภาวะขาดน้ำ
- เลี่ยงแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มหวานปริมาณมาก
- หากเสียเหงื่อมาก ให้ชดเชยเกลือด้วยอาหารหรือน้ำเกลือแร่

ห้ามทิ้งใครในรถจอด

อุณหภูมิในรถถึงระดับอันตรายได้ในไม่กี่นาที แม้แง้มกระจก โดยเฉพาะ เด็กและสัตว์เลี้ยง ตรวจเบาะหลังทุกครั้งก่อนออกจากรถ

ดูแลผู้อื่น

โทรหรือเยี่ยมเพื่อนบ้านสูงอายุและผู้ที่อยู่คนเดียวอย่างน้อยวันละสองครั้ง

รู้สัญญาณเตือน

- อ่อนเพลียจากความร้อน: เหงื่อมาก ผิวเย็นชื้น อ่อนแรง ปวดศีรษะ คลื่นไส้
- ฮีตสโตรกเป็นเหตุฉุกเฉิน: ผิวร้อน แดง แห้งหรือชื้น สับสน เป็นลม อุณหภูมิสูงกว่า 40 C (104 F) ขอความช่วยเหลือและลดความร้อนทันที ดู เจ็บป่วยจากความร้อน

เมื่อไฟดับ

ไปส่วนเย็นที่สุดของบ้านหรือศูนย์คลายร้อน ใช้ผ้าเปียกที่คอ รักแร้ และขาหนีบ ดู ที่พักในอากาศร้อน

ติดอยู่ในรถช่วงฤดูหนาว

ก่อนอื่น ให้อยู่กับรถ

รถเป็นที่กำบังและทีมกู้ภัยมองเห็นง่ายกว่าคน อย่าเดินทิ้งรถไป เว้นแต่เห็นที่ขอความช่วยเหลือชัดเจนในระยะสั้นมาก หิมะขาวโพลนทำให้หลงได้แม้อยู่ห่างถนนไม่กี่เมตร

ทำให้ค้นพบง่าย

- เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอช่วยหากมีสัญญาณ บอกตำแหน่งให้ชัด
- ผูกผ้าสีสดกับเสาอากาศหรือหน้าต่าง เปิดฝากระโปรงเมื่อพายุหยุด
- ปัดหิมะจากหลังคาให้เครื่องบินเห็นรถ ดู ช่วยให้ทีมค้นหาพบคุณ

รักษาความอบอุ่น

- ติดเครื่องประมาณ 10 นาทีทุกชั่วโมง เพื่อให้ความร้อน แง้มหน้าต่างด้านพ้นลม
- ปัดหิมะออกจากท่อไอเสียก่อนติดเครื่องทุกครั้ง ท่ออุดตันทำให้คาร์บอนมอนอกไซด์เข้ารถ ดู คาร์บอนมอนอกไซด์
- อย่าติดเครื่องนานต่อเนื่องและห้ามหลับลึกขณะเครื่องทำงาน หากมีหลายคนให้ผลัดกันตื่น
- ใส่เสื้อผ้าทุกชั้นที่มี ใช้พรมรถ แผนที่ ผ้าคลุมเบาะ และหนังสือพิมพ์รองกันเย็น สวมหมวกและนั่งเบียด

แบ่งความอุ่น

- ขยับแขนขาบ่อยและรักษาตัวให้แห้ง
- ดื่มน้ำให้พอ ห้ามกินหิมะเพราะทำให้ตัวเย็น

เชื้อเพลิง

ติดเครื่องเท่าที่จำเป็นให้เชื้อเพลิงอยู่ได้นาน ดับระหว่างช่วงและลดใช้ไฟห้องโดยสารกับวิทยุเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

เฝ้าระวังอันตรายจากความเย็น

ดู ตัวเย็นเกิน หากหยุดหนาวสั่น สับสน หรืองวงซึม ถือว่ารุนแรง

ป้องกัน

ดูพยากรณ์ รักษาน้ำมันเกินครึ่งถังในฤดูหนาว และพกชุดอุปกรณ์ ดู ชุดฉุกเฉินประจำรถ

รถเสียระหว่างทาง

การยืนใกล้รถที่วิ่งผ่านอันตรายมาก ให้คำนึงถึงการจราจรก่อน

เมื่อรถเริ่มช้าหรือดับ

- เปิดไฟฉุกเฉินทันที
- ประคองเข้าหา ไหล่ทางขวา หรือทางออก ลานจอด หรือที่กว้างราบนอกถนน ปล่อยรถไหลไปให้พ้นทางมากที่สุด
- อย่าเหยียบเบรกกระแทก ให้เบรกนุ่มนวล

เมื่อหยุดแล้ว

- หันล้อออกจากถนน ดึงเบรกมือและเข้าเกียร์จอด
- เปิดไฟฉุกเฉินไว้ ยกฝากระโปรงหรือผูกผ้าขาวกับมือจับประตูหรือเสาอากาศ
- โทรขอความช่วยเหลือ แจ้งชื่อถนน ทิศทาง หลักระยะ หรือทางออกล่าสุด
- หากอยู่ทางหลวงรถมาก ไม่มีแนวกั้น และไปที่ปลอดภัยไม่ได้ อยู่ในรถคาดเข็มขัด แล้วโทรขอช่วย ห้ามยืนข้างหรือหลังรถ
- หากไปที่ปลอดภัยได้ ออกด้านที่ห่างการจราจร แล้วไปให้พ้นถนน หลังราวกันอันตราย หรือขึ้นตลิ่ง
- ห้ามซ่อมขณะมีรถผ่านใกล้

ความปลอดภัย

- ระวังคนแปลกหน้า หากมีคนจอดช่วย ให้อยู่ในรถล็อกและคุยผ่านหน้าต่างแง้ม ขอให้โทรขอช่วยแทน อย่าติดรถไปหากไม่จำเป็น
- กลางคืนเปิดไฟห้องโดยสารให้มองเห็น อย่านั่งมืด ๆ
- หากไม่แน่ใจตำแหน่ง รักษาโทรศัพท์ให้มีแบตเตอรี่ ดู ใช้วิทยุและโทรศัพท์

สิ่งง่าย ๆ ที่ตรวจได้

- น้ำมันหมด: ต้องมีเชื้อเพลิงสำรองหรือรถลาก
- สตาร์ทไม่ติด มีเสียงคลิก: อาจแบตเตอรี่อ่อน ดู พ่วงแบตเตอรี่
- เครื่องร้อนเกิน: จอด ดับเครื่อง และ ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำขณะร้อน รออย่างน้อย 30 นาที
- ยางแบน: ดู เปลี่ยนยาง
- ควันจากฝากระโปรง: ดู รถเกิดไฟไหม้

เปลี่ยนยางรถที่แบน

เปลี่ยนยางเฉพาะบน พื้นราบแข็ง ห่างการจราจร หากทำไม่ได้ให้ขอความช่วยเหลือ

สิ่งที่ต้องมี

ยางอะไหล่ที่ตรวจลมแล้ว แม่แรง ประแจนอตล้อ และคู่มือรถ ไฟฉาย ถุงมือ และแผ่นไม้รองแม่แรงบนพื้นอ่อนช่วยได้

ขั้นตอน

1. จอดพื้นราบ เข้าเกียร์จอด ดึงเบรกมือ เปิดไฟฉุกเฉิน ให้ทุกคนออกและห่างรถที่วิ่งผ่าน
2. ใช้หินหรือบล็อกหนุนล้อ ตรงข้าม ล้อแบนกันรถไหล
3. ถอดฝาครอบล้อ คลายนอตครึ่งรอบขณะที่ล้อยังแตะพื้น แต่ยังไม่ถอดนอต
4. ดูจุดยกจากคู่มือ ตั้งแม่แรงบนพื้นแน่นตรงจุด ยกจนยางแบนพ้นพื้นประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว)
5. ถอดนอตแล้วดึงล้อตรงออก
6. ใส่อะไหล่เข้ากับสตัด หมุนนอตด้วยมือให้ด้านเรียวหันเข้า
7. ขันพอตึงโดย ไขว้รูปดาว หรือข้ามนอตตรงข้าม ไม่ไล่รอบวง
8. ลดรถ เอาแม่แรงออก แล้วขันทุกตัวให้แน่นเต็มแรงในลำดับรูปดาวอีกครั้ง
9. เก็บยางแบนและเครื่องมือ

ข้อสำคัญ

- ห้ามนำส่วนใดของร่างกายเข้าใต้รถที่รองด้วยแม่แรงอย่างเดียว
- ห้ามติดเครื่องขณะรถอยู่บนแม่แรง
- ยางอะไหล่ชั่วคราวขนาดเล็กใช้ระยะสั้นเท่านั้น จำกัดความเร็วต่ำกว่าประมาณ 80 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.) แล้วรีบซ่อมยางจริง
- ตรวจลมอะไหล่และเช็กนอตซ้ำหลังประมาณ 50 กม. (30 ไมล์)
- หากยางระเบิดขณะวิ่ง จับพวงมาลัยมั่น ผ่อนคันเร่งและเบรกเบา ห้ามกระแทกเบรก
- น้ำยาอุดยางหรือชุดแทงไหมอาจช่วยไปถึงร้านเมื่อรูเล็กอยู่บนดอกยาง ห้ามใช้กับแก้มยาง

ดู ชุดฉุกเฉินประจำรถ

พ่วงแบตเตอรี่สตาร์ตรถ

หากสตาร์ทมีเพียงเสียงคลิกหรือหมุนช้า มักเป็นแบตเตอรี่อ่อน อ่านคู่มือก่อน รถรุ่นใหม่บางรุ่นมีจุดพ่วงเฉพาะ

ก่อนเริ่ม

- ห้าม พ่วงหากแบตเตอรี่แตก รั่ว บวม หรือแข็งตัว
- ดับทั้งสองคันและนำกุญแจออก ปิดไฟกับวิทยุ
- ห้ามสูบบุหรี่ เปลวไฟ หรือประกายใกล้แบตเตอรี่ เพราะมีแก๊สระเบิดได้
- จอดใกล้แต่ รถห้ามแตะกัน

ต่อสายตามลำดับนี้

1. คีบ แดง ที่ขั้ว บวก (+) ของแบตเตอรี่ หมด
2. คีบ แดงอีกปลาย ที่ขั้ว บวก (+) ของแบตเตอรี่ ดี
3. คีบ ดำ ที่ขั้ว ลบ (-) ของแบตเตอรี่ ดี
4. คีบ ดำปลายสุดท้าย กับ โลหะเปลือยไม่มีสี บนเครื่องหรือโครงรถแบตหมด โดย ห่างแบตเตอรี่ เป็นจุดกราวด์ อาจมีประกายเล็กน้อยจึงต้องอยู่ห่างแบตเตอรี่

ห้ามคีมแตะกัน

สตาร์ท

1. ติดเครื่องคันแบตเตอรี่ ดี ทิ้งไว้สองสามนาที
2. ลองสตาร์ทคันแบตหมด หากไม่ติด รออีกสองสามนาทีแล้วลองใหม่ ห้ามลากสตาร์ทเกินประมาณ 10

วินาทีต่อครั้ง

3. เมื่อติดให้เดินเครื่องต่อ

ถอดสายย้อนลำดับ

ดำจากกราวด์ ดำจากแบตดี แดงจากแบตดี และแดงจากแบตหมด

หลังจากนั้น

- ขับอย่างน้อย 20 ถึง 30 นาทีเพื่อชาร์จ ห้ามดับเครื่องระหว่างนี้
- หากดับซ้ำ อาจแบตเตอรี่หรือไดชาร์จเสีย ให้ตรวจ
- อากาศเย็นทำให้กำลังแบตเตอรี่ลด ชุดจัมป์สตาร์ทพกพามีประโยชน์ ดู ชุดฉุกเฉินประจำรถ

รถเกิดไฟไหม้

ไฟในรถลามได้ภายในไม่ถึงหนึ่งนาที พลาสติก เชื้อเพลิง และยางไหม้เร็วและร้อน ชีวิตสำคัญกว่ารถ

เมื่อเห็นควันหรือเปลวไฟ

1. จอด ในจุดปลอดภัยโดยเร็ว ห่างอาคารและหญ้าแห้ง เปิดไฟฉุกเฉิน
2. ดับเครื่อง เพื่อตัดเชื้อเพลิงและประกาย
3. ให้ทุกคนออก นำเด็กและสัตว์เลี้ยงไป ทิ้งสัมภาระ
4. ถอยอย่างน้อย 30 ม. (100 ฟุต) เหนือลมและห่างการจราจร ยาง ถังน้ำมัน และโช้กอาจแตกหรือระเบิด
5. โทรแจ้งหน่วยฉุกเฉิน บอกตำแหน่งชัดเจน
6. กันทุกคนให้อยู่ไกลและพ้นถนน

ข้อห้าม

- ห้ามเปิดฝากระโปรง อากาศที่เข้าอย่างรวดเร็วทำให้ไฟลุกแรง
- ห้ามกลับไปเก็บของ
- อย่าใช้ถังดับเพลิงเล็กกับไฟที่ใหญ่กว่าไฟเริ่มต้นเล็กมาก หากกองเล็กจริงและไม่ใกล้ถังเชื้อเพลิงหรือห้องโดยสาร อาจใช้จากระยะปลอดภัยได้ นอกนั้นให้ออกห่าง

หากออกไม่ได้

- เข็มขัดติด ให้ใช้ที่ตัดหรือมีดถ้ามี
- ใช้ค้อนทุบกระจกข้าง ไม่ใช่กระจกหน้า ดู รถตกน้ำ

หากเสื้อผ้าติดไฟ

หยุด ทิ้งตัว กลิ้ง ใช้มือปิดหน้าแล้วกลิ้งดับไฟ ดู แผลไหม้

ป้องกัน

- ซ่อมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันเครื่องรั่ว และสายไฟชำรุด
- ติดถังดับเพลิงสำหรับรถขนาดเล็กในห้องโดยสาร ไม่ใช่ท้ายรถ
- ห้ามทิ้งไฟแช็ก กระป๋องสเปรย์ หรือแบตเตอรี่ในรถร้อน

เมื่อรถตกน้ำ

รถตกน้ำลึกมักลอย 30 ถึง 60 วินาทีก่อนจม ลงมือทันที อย่าโทรขอช่วยก่อนและอย่ารอให้น้ำเต็มรถ

จำว่า: เข็มขัด หน้าต่าง เด็ก ออก

1. เข็มขัด: ปลดของตนเอง
2. หน้าต่าง: เปิดหรือทุบ กระจกข้าง ทันที กระจกไฟฟ้ามักยังใช้ได้ช่วงแรก หากไม่ได้ ใช้ ค้อนทุบกระจก ที่มุม ไม่ใช่กลางบาน กระจกหน้าทุบยาก
3. เด็ก: ปลดเข็มขัดเด็กโตก่อนเพื่อให้ช่วยได้ แล้วนำเด็กเล็กสุดออก จับเด็กให้มั่น
4. ออก: ปีนผ่านหน้าต่างโดยหัวหรือเท้านำ แล้วว่ายออกห่างรถสู่ที่ปลอดภัย

ข้อสำคัญ

- ประตูเปิดไม่ออก จนแรงดันน้ำภายในและนอกเกือบเท่ากัน อย่าเสียเวลาฝืน
- หากเปิดหน้าต่างไม่ได้ ให้ตั้งสติและไปช่องอากาศสูงสุด เมื่อน้ำเกือบเต็มแรงดันจะเท่ากันและเปิดประตูได้ สูดลมหายใจ เปิดแล้วว่ายออก
- รักษาสติ ทำทีละขั้น

หากติดน้ำท่วม

ออกจากรถก่อนน้ำสูง ดู น้ำท่วมและน้ำป่า

ป้องกัน

- ห้ามขับลงน้ำท่วมถนน ให้หันกลับ
- เก็บค้อนทุบกระจกและที่ตัดเข็มขัดให้เอื้อมถึง เช่น แผงบังแดดหรือพวงกุญแจ ไม่ใส่ช่องเก็บของหน้ารถ
- ฝึกขั้นตอนกับครอบครัว

เมื่อออกแล้ว ให้ตัวแห้งและอุ่น เฝ้าระวังตัวเย็นเกิน ดู ตัวเย็นเกินและเนื้อเยื่อถูกความเย็น

ชุดฉุกเฉินประจำรถ

จัดชุดไว้ท้ายรถแล้วตรวจปีละสองครั้ง

เตรียมตลอดปี

- ชุดปฐมพยาบาล และยาจำเป็น ดู ชุดเอาชีวิตรอด
- น้ำ อย่างน้อยหนึ่งลิตรหรือหนึ่งควอร์ตต่อคน และของว่างไม่เสียง่าย
- ไฟฉายหรือไฟคาดศีรษะ ถ่านสำรอง และนกหวีด
- ที่ชาร์จโทรศัพท์หรือพาวเวอร์แบงก์ และแผนที่กระดาษ ดู แผนที่และเข็มทิศ
- สายพ่วงหรือชุดจัมป์สตาร์ท ดู พ่วงแบตเตอรี่
- ยางอะไหล่ ตรวจลมแล้ว แม่แรงและประแจล้อ ดู เปลี่ยนยาง
- ชุดแทงไหมหรือน้ำยาอุดยาง และปั๊มเล็กเสียบไฟรถ
- ค้อนทุบกระจกกับที่ตัดเข็มขัด เก็บให้เอื้อมถึง ดู รถตกน้ำ
- ป้ายสามเหลี่ยมหรืออุปกรณ์สะท้อนแสงเตือนภัย และเสื้อสะท้อนแสง
- ถังดับเพลิงเล็ก ติดไว้ในห้องโดยสาร
- เทปผ้า เครื่องมืออเนกประสงค์ ถุงมือ ผ้าขี้ริ้ว เคเบิลไท และเชือก
- กระดาษเช็ดและเงินสดธนบัตรย่อย
- กระดาษปากกาและรายการเบอร์ฉุกเฉิน

เพิ่มสำหรับฤดูหนาว

- ผ้าห่มหรือถุงนอน เสื้อกันหนาว หมวก ถุงมือ และรองเท้าบูต
- ที่ขูดน้ำแข็งและแปรง พลั่วเล็ก และถุงทรายหรือทรายแมวเพิ่มการยึดเกาะ
- ถุงอุ่นมือ
- ห้ามจุดเทียนหรือเตาในรถปิด ใช้เครื่องยนต์ช่วยทำความอุ่นและเสื้อผ้าห่มตัว ดู ติดในรถฤดูหนาว
- อาหารและน้ำเพิ่ม ขวดที่แข็งเป็นน้ำแข็งใช้ไม่ได้ เก็บน้ำในห้องโดยสาร

รักษารถให้พร้อม

- น้ำมันอย่างน้อยครึ่งถัง
- ตรวจยาง แบตเตอรี่ ไฟ ที่ปัดน้ำฝน และของเหลวก่อนทางไกลหรือฤดูหนาว
- บอกคนอื่นถึงเส้นทางและเวลาถึง ดู เดินทางไม่ให้หลง

แก๊สรั่ว

แก๊สธรรมชาติและโพรเพนระเบิดได้จากประกายเล็กน้อย ผู้ให้บริการเติมกลิ่นคล้าย ไข่เน่าหรือกำมะถัน เพื่อให้รู้เมื่อรั่ว

หากได้กลิ่นแก๊สหรือเสียงรั่ว

1. ห้าม ใช้สวิตช์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รีโมตประตูโรงรถ ไฟแช็ก ไม้ขีด หรือโทรศัพท์ภายใน ประกายใดก็จุดแก๊สได้
2. ห้าม สตาร์ทรถในโรงรถที่ติดกับบ้าน
3. นำทุกคนและสัตว์เลี้ยงออกทันที เปิดประตูทิ้งไว้หากทำได้รวดเร็ว
4. ถอยห่างอาคาร ไปทางเหนือลม
5. โทรเบอร์ฉุกเฉินบริษัทแก๊สและ 911 จากภายนอก หรือบ้านเพื่อนบ้าน
6. ห้ามกลับเข้า จนบริษัทแก๊สหรือดับเพลิงยืนยันว่าปลอดภัย

ปิดแก๊ส

- ทำเฉพาะเมื่อเข้าถึงวาล์วหลักได้ปลอดภัย โดยไม่ต้องผ่านบริเวณมีแก๊ส
- ใช้ประแจหมุนหนึ่งในสี่รอบ ให้ด้าม ขวางท่อ
- ปิดแล้ว ห้ามเปิดเอง ต้องให้บริษัทแก๊สเปิดและจุดไฟนำใหม่
- ถังโพรเพนให้หมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกา

โพรเพน

หนักกว่าอากาศจึงจมและสะสมในห้องใต้ดินกับที่ต่ำ แม้เปิดประตูก็อาจยังค้าง

ร่องรอยแก๊สรั่ว

- กลิ่นกำมะถันหรือไข่เน่า เสียงฟู่หรือหวีดใกล้ท่อ
- พืชเหี่ยวตายใกล้ท่อฝังดิน หรือฟองในน้ำขัง
- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรืออ่อนเพลียในอาคารโดยไม่มีสาเหตุอื่น ดู คาร์บอนมอนอกไซด์

หลังเหตุ

ห้ามใช้อุปกรณ์หรือจุดไฟใดจนผู้เชี่ยวชาญตรวจ

ดู ปิดระบบแก๊ส ไฟฟ้า และน้ำ

ไฟไหม้บ้าน: ออกจากอาคารให้เร็ว

ไฟทำให้บ้านเต็มด้วยควันอันตรายถึงชีวิตได้ในสองสามนาที ออกก่อน แล้วโทรขอช่วยจากภายนอก

เมื่อสัญญาณเตือนดังหรือเห็นไฟ

1. ออกทันที อย่าหยุดเก็บของ โทรศัพท์ หรือสัตว์เลี้ยง
2. คลานต่ำ ใต้ควันที่อากาศสะอาดกว่า
3. ก่อนเปิดประตู ใช้หลังมือแตะตรวจ หากร้อนห้ามเปิด ให้หาทางอื่น
4. ปิดประตูตามหลังเพื่อชะลอไฟ
5. ไปจุดนัดพบของครอบครัวและนับทุกคน
6. โทร 911 จากภายนอก ห้ามกลับเข้า แจ้งดับเพลิงหากยังมีคนขาด

หากติดอยู่

- ปิดประตู อุดรอยด้วยผ้าหรือเสื้อที่เปียกได้ยิ่งดี และปิดช่องลม
- ไปหน้าต่าง แง้มหรือทุบเมื่อจำเป็น แล้วตะโกนหรือโบกผ้าสีสด
- โทร 911 บอกให้ชัดว่าอยู่ห้องใด
- อยู่ต่ำใกล้หน้าต่าง
- หากเสื้อผ้าติดไฟ หยุด ทิ้งตัว กลิ้ง ดู แผลไหม้

เครื่องเตือนควันและแผน

- ติดทุกชั้นและหน้าพื้นที่นอน ทดสอบทุกเดือน เปลี่ยนถ่านทุกปี และเปลี่ยนเครื่องทุก 10 ปี
- วางแผน ทางออกสองทางจากทุกห้อง ซ้อมปีละสองครั้งรวมในความมืด
- ห้องนอนชั้นบนที่ไม่มีทางอื่นควรมีบันไดหนีไฟ

ไฟในครัว

- ไฟน้ำมัน: ปิดความร้อนและเลื่อนฝาปิดกระทะ ห้ามใช้น้ำ เบกกิงโซดาหรือเกลืออาจช่วยดับไฟเล็กได้
- ไฟในเตาอบ ให้ปิดประตูไว้และปิดเตา
- ห้ามยกกระทะที่ติดไฟออกนอกบ้าน

ไฟเล็กกับถังดับเพลิง

ใช้เฉพาะไฟเล็ก มีทางออกโล่งด้านหลัง และห้องยังไม่เต็มควัน จำ PASS: ดึงสลัก เล็งฐานไฟ บีบคัน และส่ายหัวฉีด หากไม่แน่ใจ ออกทันที ดู ใช้ไฟอย่างปลอดภัย

ท่อน้ำแตกและน้ำในท่อแข็งตัว

ท่อน้ำแตกปล่อยน้ำได้หลายร้อยลิตรต่อชั่วโมง และทำบ้านเสียหายหนักภายในวันเดียว

เมื่อท่อแตก

1. ปิดวาล์วน้ำหลักทันที ดู ปิดระบบน้ำและไฟ
2. เปิดก๊อกน้ำร้อนและเย็น ที่จุดต่ำสุดและสูงสุดเพื่อระบายน้ำค้างท่อ
3. ตัดไฟบริเวณเปียก หากทำได้ปลอดภัยจากจุดแห้งหน้าแผงไฟ ห้ามลุยน้ำขังใกล้เต้ารับหรือเครื่องใช้
4. ปิดไฟหรือแก๊สของเครื่องทำน้ำร้อน ป้องกันทำงานโดยไม่มีน้ำจนไหม้
5. ย้ายของพ้นน้ำและเช็ดออก ใช้พัดลมกับเปิดหน้าต่างให้แห้งเร็ว
6. ถ่ายภาพไว้เคลมประกันและเรียกช่างประปา

น้ำในท่อแข็งตัวจนไม่ไหล

- เปิดก๊อกให้น้ำที่ละลายไหลออก
- ค่อย ๆ อุ่นท่อด้วย ไดร์เป่าผม แผ่นให้ความร้อน หรือผ้าอุ่น เริ่มใกล้ก๊อกแล้วไล่ย้อนกลับ
- ห้ามใช้เปลวไฟ หัวพ่นโพรเพน หรือเครื่องทำความร้อนน้ำมันก๊าด เพราะเสี่ยงไฟไหม้หรือท่อแตก
- หากหาส่วนแข็งไม่เจอหรือท่อร้าวแล้ว ให้ปิดน้ำและเรียกช่าง
- เปิดก๊อกไว้จนกลับมาไหลเต็ม

ป้องกันการแข็งตัว

- รักษาบ้านไม่ต่ำกว่า 13 C (55 F) แม้ไม่อยู่
- ช่วงหนาวจัดให้ก๊อก หยด และเปิดประตูตู้ใต้อ่าง
- หุ้มฉนวนท่อในโรงรถ ช่องใต้บ้าน และผนังนอก
- ถอดสายยางนอกบ้านและระบายน้ำ ปิดก๊อกภายนอกในฤดูใบไม้ร่วง
- หากอาจไฟดับนาน ให้ระบายท่อโดยปิดวาล์วหลัก เปิดทุกก๊อก และกดชักโครก

หลังเหตุ

วัสดุเปียกอาจขึ้นราใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง ทำให้แห้งเร็ว และทิ้งฉนวนหรือพรมที่อุ้มน้ำมาก

พิษคาร์บอนมอนอกไซด์

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไม่มีสี กลิ่น หรือรส เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงในเตาทำความร้อน เครื่องทำน้ำร้อน เตา เตาผิง เครื่องทำความร้อนแก๊ส เครื่องปั่นไฟ เตาย่าง และรถ สะสมในที่ปิดและฆ่าได้ในไม่กี่นาทีเมื่อ

เข้มข้นสูง

อาการ

- ปวดศีรษะซึ่งพบบ่อยที่สุด เวียนศีรษะ อ่อนแรง
- คลื่นไส้ อาเจียน หรือสับสน
- เจ็บหน้าอก ตามัว
- หลายคนหรือสัตว์เลี้ยงป่วยพร้อมกัน หรือดีขึ้นเมื่อออกอาคาร
- คนหลับอาจเสียชีวิตโดยไม่มีสัญญาณเตือน

เมื่อเครื่องเตือนดังหรือสงสัย CO

1. นำทุกคนรวมสัตว์เลี้ยงสู่อากาศบริสุทธิ์ทันที อย่าหยุดเปิดหน้าต่าง
2. โทร 911 หรือหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นจากภายนอก
3. นับทุกคน ห้ามกลับจนดับเพลิงยืนยันว่าปลอดภัย
4. ไปโรงพยาบาลแม้รู้สึกดีขึ้น แจ้งว่าอาจได้รับ CO

ปฐมพยาบาล

- พาออกสู่อากาศบริสุทธิ์ ให้สงบและอุ่น
- หากไม่หายใจ เริ่ม CPR
- ผู้หมดสติ สับสน ตั้งครรภ์ หรือเด็กต้องรีบไปโรงพยาบาล อาจต้องให้ออกซิเจน

ป้องกัน

- ติดเครื่องเตือน CO แบบถ่านหรือเสียบไฟทุกชั้นและใกล้ที่นอน ทดสอบรายเดือนและเปลี่ยนเมื่อหมดอายุราว 5 ถึง 7 ปี
- ห้ามใช้เครื่องปั่นไฟ เตาย่าง เตาแคมป์ หรือเครื่องทำความร้อนเผาไหม้ภายใน บ้าน โรงรถ เต็นท์ รถพักแรม หรือใกล้หน้าต่างเปิด ดู เครื่องปั่นไฟ
- ห้ามติดเครื่องรถในโรงรถติดบ้าน แม้เปิดประตู
- ตรวจเตาทำความร้อน ปล่อง และเครื่องทำน้ำร้อนทุกปี
- หลังพายุหรือช่วงหนาว ปัดหิมะออกจากท่อไอเสียและช่องระบาย ดู ติดในรถฤดูหนาว

ใช้เครื่องปั่นไฟอย่างปลอดภัย

เครื่องปั่นไฟพกพาเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากคาร์บอนมอนอกไซด์หลังพายุ

ตั้งที่ไหน

- นอกอาคารเท่านั้น ห้ามในโรงรถ ห้องใต้ดิน โรงเก็บของ ระเบียง หรือใกล้หน้าต่างและประตูเปิด
- ห่างบ้านอย่างน้อย 6 ม. (20 ฟุต) หันไอเสียออกจากช่องเปิดทุกชนิด
- ตั้งบนพื้นราบแห้ง ใช้เต็นท์หรือหลังคาคลุมสำหรับเครื่องโดยเปิดด้านข้าง ห้ามใช้กลางฝนหรือน้ำขัง
- ติด เครื่องเตือน CO ใช้ถ่าน ในบ้าน ดู คาร์บอนมอนอกไซด์

การต่อไฟ

- เสียบเครื่องใช้ ตรงเข้าเครื่องปั่นไฟ หรือใช้สายพ่วงกลางแจ้งขนาดรองรับภาระ ตรวจสายก่อน
- ห้ามเสียบไฟจากเครื่องเข้าปลั๊กผนัง ไฟย้อนกลับอาจดูดช่างการไฟฟ้าหรือเพื่อนบ้าน และทำสายบ้านเสียหาย
- หากจ่ายเข้าระบบบ้าน ต้องให้ช่างติด สวิตช์สับเปลี่ยนแหล่งจ่าย
- ห้ามใช้เกินกำลัง รวมวัตต์ก่อนและเริ่มอุปกรณ์กินไฟสูงสุดก่อน

เชื้อเพลิง

- ดับและปล่อยให้เย็นก่อนเติม น้ำมันหกบนเครื่องร้อนอาจติดไฟ
- เก็บในภาชนะที่รับรอง นอกบ้าน ห่างที่อยู่อาศัยและต้นประกาย
- อย่าสำรองเกินจำเป็น น้ำมันเสื่อมในไม่กี่เดือน ใช้สารรักษาสภาพเชื้อเพลิง

ข้อแนะนำ

- ใช้เท่าที่จำเป็นเป็นช่วงสั้นตามแผน
- ห้ามจับด้วยมือเปียก
- ทดลองเดินเครื่องไม่กี่นาทีทุกเดือนและตรวจน้ำมันเครื่อง ดู ไฟดับและเหตุในบ้าน

ปิดระบบแก๊ส ไฟฟ้า และน้ำ

ทุกคนในบ้านควรรู้ตำแหน่งและวิธีปิดระบบเหล่านี้ หาให้พบ วันนี้ ก่อนเกิดเหตุ

น้ำ

- วาล์วหลักมักอยู่จุดท่อเข้าบ้าน เช่น ห้องใต้ดิน ใต้พื้น ห้องระบบ ใกล้เครื่องทำน้ำร้อน หรือกล่องริมถนน
- ด้ามวงล้อหมุน ตามเข็มนาฬิกา เพื่อปิด ด้ามคันโยกปิดเมื่อ ขวางท่อ
- หาวาล์วเล็กใต้อ่างและหลังชักโครกด้วย
- ปิดวาล์วหลักเมื่อท่อแตกหรือได้รับแจ้งว่าน้ำปนเปื้อน ดู ท่อน้ำแตก

ไฟฟ้า

- แผงเบรกเกอร์มักอยู่โรงรถ ห้องใต้ดิน ห้องระบบ หรือโถง รู้ว่า เมนเบรกเกอร์ อยู่ไหน
- ปิดเบรกเกอร์ย่อยก่อน แล้วปิดเมนเป็นลำดับสุดท้าย
- หากแผงเปียกหรือคุณยืนในน้ำ ห้ามแตะ โทรการไฟฟ้าและช่าง
- หลังน้ำท่วมหรือไฟไหม้ ห้ามเปิดจนตรวจแล้ว

แก๊ส

- ที่มิเตอร์มีวาล์วหลัก หมุนหนึ่งในสี่รอบให้ด้าม ขวางท่อ เพื่อปิด อาจต้องใช้ประแจ
- ปิดเฉพาะเมื่อได้กลิ่นหรือได้รับคำสั่ง และเข้าถึงปลอดภัย ให้บริษัทแก๊สเปิดกลับเท่านั้น ดู แก๊สรั่ว
- โพรเพน: หมุนวาล์วถังตามเข็มนาฬิกา

เตรียมพร้อม

- เก็บ ประแจหรือกุญแจวาล์ว ใกล้จุดปิดและผูกกับท่อ
- ติดป้าย ทุกวาล์วและทำเครื่องหมายแผงเบรกเกอร์
- สอนทุกคนรวมเด็กโต ถ่ายภาพแต่ละจุดใส่กระเป๋าฉุกเฉิน
- ตรวจวาล์วปีละครั้งและขยับเล็กน้อยให้แน่ใจว่ายังหมุนได้

สายไฟฟ้าขาดตกพื้น

สายไฟตกอาจยังมีไฟ ไม่จำเป็นต้องมีประกายหรือเสียงก็อันตรายถึงชีวิต และพื้นรอบ ๆ อาจมีกระแสด้วย

เมื่อเห็นสายตก

- ห่างอย่างน้อย 10 ม. (33 ฟุต) ประมาณความยาวรถบัส กันผู้อื่นด้วย
- ห้ามแตะสายหรือสิ่งที่สัมผัสสาย เช่น ต้นไม้ รั้ว แอ่งน้ำ รถ และกิ่งไม้
- โทรการไฟฟ้าและ 911 เฝ้าระวังจนทีมมาถึงไม่ให้คนเดินเข้า
- ห้ามใช้ไม้หรือเครื่องมือเขี่ย
- ถือว่าทุกสายมีไฟ รวมสายเคเบิล โทรศัพท์ และเส้นที่ดูไม่มีไฟ เพราะอาจแตะสายไฟอยู่

หากสายตกบนรถ

- อยู่ในรถ บีบแตรหรือโทรขอช่วย รอการไฟฟ้าตัดไฟ
- เตือนคนอื่นให้อยู่ห่าง
- ออกเฉพาะรถกำลังไหม้ โดยทำดังนี้:

1. เปิดประตูแล้ว กระโดดออกให้พ้น เท้าชิด ห้ามแตะรถกับพื้นพร้อมกัน

2. ลากเท้าสั้น ๆ ออก ให้เท้าชิดและติดพื้น ห้ามก้าวยาว เพราะพื้นใกล้สายมีแรงดันต่างกันระหว่างจุด อาจทำให้ไฟดูด

3. ทำต่อจนห่างอย่างน้อย 10 ม. (33 ฟุต)

หากอยู่ใกล้แล้วรู้สึกชาเหมือนไฟจี๊ด

เท้าคุณอยู่ในเขตอันตราย ลากเท้าสั้น ๆ ออกโดยให้เท้าชิด

หลังพายุหรือน้ำท่วม

- ห้ามขับหรือเดินลุยน้ำใกล้สายตก
- แจ้งแม้ไม่มีคนบาดเจ็บ
- ห้ามเปิดไฟบ้านที่เสียหายหรือท่วม ดู ปิดระบบต่าง ๆ

ปฐมพยาบาล

หากมีคนถูกดูด ห้ามแตะจนตัดไฟแล้ว จากนั้นเรียกช่วย ตรวจหายใจ และทำ CPR เมื่อจำเป็น ดู CPR และแผลไหม้

ชุดฉุกเฉินสำหรับ 72 ชั่วโมง

ทำไมต้อง 72 ชั่วโมง

หลังพายุใหญ่ แผ่นดินไหว หรือไฟดับ ความช่วยเหลืออาจใช้เวลาสามวันหรือมากกว่า ชุดนี้ช่วยระหว่างรอ เก็บรวมในกระเป๋าหรือกล่องที่ยกไปได้

น้ำและอาหารต่อคน

- น้ำ: วันละ 4 ลิตร (1 แกลลอน) รวม 12 ลิตรต่อสามวัน เพิ่มเม็ดฆ่าเชื้อหรือเครื่องกรอง
- ของไม่ต้องปรุง เช่น กระป๋องพร้อมที่เปิดมือ โปรตีนแท่ง ถั่ว ผลไม้แห้ง แครกเกอร์ และเนยถั่ว
- อาหารทารก นมผง และอาหารสัตว์ตามจำเป็น

แสง ไฟ และสื่อสาร

- ไฟฉายหรือไฟคาดศีรษะกับถ่านสำรอง
- วิทยุถ่านหรือมือหมุน ถ้าได้ให้รับ NOAA ได้
- พาวเวอร์แบงก์ สายชาร์จ และอุปกรณ์นี้

- นกหวีดและรายการเบอร์สำคัญบนกระดาษ
- เงินสดธนบัตรย่อย

ปฐมพยาบาลและสุขภาพ

- ชุดปฐมพยาบาล ยาประจำอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ แว่น และสำเนารายการยา
- ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ ยาแก้ท้องเสีย ครีมกันแดด และสารไล่แมลง
- หน้ากาก ถุงมือ และเจลแอลกอฮอล์

ที่พักและความอบอุ่น

- เสื้อกันหนาว เสื้อผ้าสำรอง รองเท้าแข็งแรง และชุดกันฝน
- ผ้าห่มฉุกเฉินหรือถุงนอน ผ้าใบ และเชือก
- ไม้ขีดหรือไฟแช็กในถุงกันน้ำ

เครื่องมือและสุขอนามัย

- เครื่องมืออเนกประสงค์หรือมีด เทปผ้า และถุงมืองาน
- ถุงขยะ กระดาษชำระ สบู่ ทิชชูเปียก ผลิตภัณฑ์อนามัยสตรี และแปรงสีฟัน
- ถุงขยะและถังทำส้วมฉุกเฉิน

เอกสาร

- สำเนาบัตร ประกัน เอกสารสิทธิ์ และข้อมูลธนาคารในถุงกันน้ำ พร้อมสำเนา USB
- แผนที่ท้องถิ่นและแผนครอบครัว

ดูแลให้พร้อมใช้

- ตรวจ ปีละสองครั้ง เปลี่ยนอาหาร น้ำ ถ่าน และยาก่อนหมดอายุ
- เปลี่ยนขนาดเสื้อเด็กให้พอดี
- มีชุดย่อมในรถแต่ละคัน

เริ่มจากน้ำ อาหาร แสง และวิทยุ แล้วค่อยเพิ่มอย่างอื่นภายหลัง

เลือกวิทยุสำหรับเหตุฉุกเฉิน

เมื่อโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ วิทยุมักยังทำงานได้ แต่ละชนิดเหมาะกับงานต่างกัน

วิทยุรับฟังอย่างเดียว

- AM/FM: รับข่าวท้องถิ่นและคำแนะนำทางการ ควรมีรุ่นใช้ถ่านหรือมือหมุนเป็นอย่างแรก
- วิทยุอากาศ NOAA: เตือนสภาพอากาศและภัยอันตรายอัตโนมัติ ดู วิทยุอากาศ NOAA
- คลื่นสั้น: รับข่าวจากที่ไกล เหมาะเมื่อสถานีท้องถิ่นหยุดส่ง

วิทยุรับส่ง

| ชนิด | ระยะทั่วไป | ใบอนุญาตในสหรัฐฯ | เหมาะกับ |

|---|---|---|---|

| FRS แบบมือถือ | 1 ถึง 3 กม. (0.5 ถึง 2 ไมล์) | ไม่ต้องมี | ครอบครัว เพื่อนบ้าน |

| GMRS | 3 ถึง 8 กม. (2 ถึง 5 ไมล์) ไกลขึ้นเมื่อใช้สถานีทวน | ต้องมี ไม่ต้องสอบ | ครอบครัว ชุมชน รถ |

| MURS | 2 ถึง 5 กม. (1 ถึง 3 ไมล์) | ไม่ต้องมี | กลุ่มเล็ก ฟาร์ม |

| CB | 5 ถึง 15 กม. (3 ถึง 10 ไมล์) | ไม่ต้องมี | ทางหลวง รถบรรทุก |

| วิทยุสมัครเล่น มือถือ | 5 ถึง 50 กม. (3 ถึง 30+ ไมล์) เมื่อใช้สถานีทวน | ต้องสอบและมีใบอนุญาต | ขอช่วยพื้นที่กว้าง เครือข่าย |

| เมช อุปกรณ์นี้ | ไม่กี่ร้อยเมตรต่อช่วง | ไม่ต้องมี | ข้อความระหว่างบอร์ด |

ภูเขา ป่า และอาคารทำให้ระยะสั้นลง ดู เพิ่มระยะรับส่ง

สิ่งที่ควรเตรียม

- วิทยุ FRS/GMRS มือถือ ที่ใช้ร่วมกันได้อย่างน้อยสองเครื่องสำหรับครอบครัวและเพื่อนบ้าน ดู FRS และ GMRS
- วิทยุ AM/FM/NOAA แบบถ่านหรือมือหมุน
- ถ่านสำรอง หรือพาวเวอร์แบงก์กับสาย รุ่นแบตเตอรี่ชาร์จได้ต้องมีวิธีชาร์จ
- วิทยุสมัครเล่นมือถือ หากคุณหรือเพื่อนบ้านมีใบอนุญาต ดู วิทยุสมัครเล่น
- ปากกากระดาษสำหรับจดความถี่ สัญญาณเรียกขาน และข้อความ

ใบอนุญาต

กฎแตกต่างกันในแต่ละประเทศ สหรัฐฯ ไม่ต้องมีใบอนุญาตสำหรับ FRS, MURS และ CB ส่วน GMRS ต้องมีแต่ไม่สอบ และวิทยุสมัครเล่นต้องสอบ ควรเรียนและฝึก ก่อน ภัยพิบัติ ในเหตุอันตรายถึงชีวิตจริงและไม่มีวิธีเรียกความช่วยเหลืออื่น การใช้วิทยุที่มีขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

นิสัยการใช้งานที่ดี

- ทดสอบทุกเดือน ชาร์จไว้ และเก็บในถุงพร้อมถ่านสำรอง

- ตกลง ช่องและเวลาติดต่อ กับครอบครัวล่วงหน้า
- ส่งสั้น ๆ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่และเว้นช่องให้ผู้อื่น

วิทยุสื่อสาร FRS และ GMRS

วิทยุ FRS และ GMRS ใช้ร่วมกัน 22 ช่อง แถว 462 และ 467 MHz FRS ไม่ต้องมีใบอนุญาตในสหรัฐฯ ส่วน GMRS กำลังสูงกว่า ใช้สถานีทวนได้ และต้องมีใบอนุญาต

วิธีใช้

1. เปิดสองเครื่องและตั้ง ช่องเดียวกัน
2. ตั้งรหัสความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจเรียก CTCSS หรือช่องย่อย เป็น 0 หรือปิด เพื่อฟังทุกคน รหัสเพียงกรองเสียงที่ได้ยิน ไม่ได้ทำให้การสนทนาเป็นส่วนตัว
3. กดปุ่มพูดค้าง รอหนึ่งวินาที พูดเสียงปกติโดยถือห่างปากไม่กี่เซนติเมตร แล้วปล่อยปุ่ม
4. พูดได้ครั้งละคน ระหว่างส่งจะฟังไม่ได้

ช่อง

- ช่อง 1 ถึง 7 และ 15 ถึง 22 มีกำลังส่งสูงกว่า ส่วนช่อง 8 ถึง 14 กำลังต่ำ เหมาะระยะใกล้
- ช่อง 9 ใช้เรียกขานและฉุกเฉินอย่างแพร่หลาย โดยมีอาสาสมัครบางกลุ่มเฝ้าฟัง หลายครอบครัวตกลงใช้ช่องอื่นของตน
- ทุกคนใกล้เคียงอาจฟังได้ อย่าแจ้งข้อมูลส่วนตัว

ระยะ

- ในเมืองหรือป่ามักได้ 1 ถึง 3 กม. (0.5 ถึง 2 ไมล์) ที่โล่งหรือยอดเขาอาจไกลกว่ามาก
- อาคาร เนินเขา และต้นไม้หนาทำให้ระยะลดลงมาก ดู เพิ่มระยะวิทยุ
- คำโฆษณา "30 ไมล์" ไม่ใช่ระยะใช้งานจริงทั่วไป

ความสามารถเพิ่มของ GMRS

- กำลังสูงและเปลี่ยนเสาอากาศได้ จึงเพิ่มระยะมาก
- สถานีทวน ช่อง 15R ถึง 22R อาจครอบคลุมทั้งเมือง ต้องใช้รหัสที่เจ้าของสถานีแจ้ง
- ตรวจข้อกำหนดท้องถิ่น สหรัฐฯ ใบอนุญาต GMRS ครอบคลุมทั้งครอบครัว

ข้อแนะนำ

- ใช้ข้อความสั้นชัดเจน ดู เรียกขอความช่วยเหลือ

- ตกลงเวลาติดต่อ เปิดตามเวลาที่นัดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่
- มีถ่านหรือที่ชาร์จสำรอง รุ่นชาร์จได้ต้องมีวิธีชาร์จ
- ที่ชาร์จรถหรือพาวเวอร์แบงก์ช่วยให้ใช้ต่อเมื่อไฟดับ

วิทยุสมัครเล่นในเหตุฉุกเฉิน

วิทยุสมัครเล่นเป็นระบบสำรองเมื่อโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และไฟฟ้าล่ม นักวิทยุอาสาสมัครตั้งเครือข่ายฉุกเฉินและส่งต่อข้อความให้เจ้าหน้าที่กับโรงพยาบาล

ใบอนุญาต

ปกติต้องสอบเพื่อรับใบอนุญาตส่งในย่านสมัครเล่น และใช้สัญญาณเรียกขาน แต่ทุกคน รับฟัง ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต

เมื่อ อันตรายถึงชีวิตจริง และไม่มีทางขอช่วยอื่น การใช้วิทยุที่มีเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและแทบไม่ถูกทักท้วง อย่างไรก็ตาม การเรียนและมีใบอนุญาตไว้ก่อนดีกว่ามาก

พื้นฐาน

- VHF ย่าน 2 เมตร (144 ถึง 148 MHz): ย่านมือถือที่ใช้บ่อยที่สุด
- UHF ย่าน 70 เซนติเมตร (420 ถึง 450 MHz): พบได้บ่อยในวิทยุมือถือ
- ซิมเพล็กซ์: ติดต่อเครื่องถึงเครื่อง ไม่ผ่านสถานีทวน มือถือได้ระยะไม่กี่กิโลเมตร 146.520 MHz เป็นความถี่เรียกขานระดับประเทศย่าน 2 เมตร และ 446.000 MHz สำหรับย่าน 70 ซม.
- สถานีทวน: เสาสูงรับแล้วส่งซ้ำ ครอบคลุมเมืองหรือภูมิภาค ต้องรู้ความถี่ ค่าชิฟต์ และโทน ซึ่งชมรมท้องถิ่นเผยแพร่
- เครือข่ายนัดหมาย: ติดต่อกลุ่มตามเวลา เมื่อเกิดภัยพิบัติจะมีเครือข่ายฉุกเฉินบนสถานีทวนท้องถิ่น

หาผู้รับฟัง

1. ฟัง 146.520 MHz แบบซิมเพล็กซ์ก่อน แล้วลองสถานีทวนท้องถิ่น
2. ฟังก่อน หากมีคนพูดให้รอ
3. แจ้งสัญญาณเรียกขานหรือชื่อ บอกว่ากำลังเฝ้าฟัง และถามว่ามีใครอยู่ในความถี่หรือไม่
4. หากฉุกเฉินจริง พูด "Emergency traffic" หรือ "Mayday" แล้วแจ้งข้อความ ดู เรียกขอความช่วยเหลือ

มารยาทช่วงภัยพิบัติ

- พูดสั้นและเว้นช่องสำหรับเหตุฉุกเฉิน
- ใช้ภาษาง่าย เลี่ยงศัพท์เฉพาะ และพูดแต่ละข้อความให้ชัดครั้งเดียว

- จดข้อความและทวนกลับ
- ทำตามสถานีควบคุมข่าย

อุปกรณ์

- วิทยุมือถือ HT แบตเตอรี่สำรอง และเสาที่ดีกว่าเสายางเดิม
- รายการสถานีทวนและความถี่ท้องถิ่นบนกระดาษ
- วิธีชาร์จ เช่น ที่ชาร์จรถ พาวเวอร์แบงก์ หรือแผงแสงอาทิตย์เล็ก

ดู เพิ่มระยะรับส่ง และ เลือกวิทยุฉุกเฉิน

เรียกขอความช่วยเหลือทางวิทยุ

ขั้นที่ 1: ฟัง

ฟังสองสามวินาที หากผู้อื่นกำลังพูดเรื่องฉุกเฉินให้รอ

ขั้นที่ 2: ขอความช่วยเหลือ

กดส่ง รอหนึ่งวินาที แล้วพูดช้าและชัด:

"Mayday, mayday, mayday. ที่นี่ [ชื่อหรือสัญญาณเรียกขาน พูดซ้ำอีกครั้ง] อยู่ที่ [ตำแหน่ง] เกิด [เหตุอะไร] มี [จำนวนคน] ต้องการ [ความช่วยเหลือ] Over."

ตัวอย่าง: *"Mayday, mayday, mayday ที่นี่อเล็กซ์ อยู่บนถนนริดจ์ ห่างสะพานเก่าไปใต้ 2 กม. รถตกคู มีคนขาหักหนึ่งคน รวมสองคน ต้องการรถพยาบาล Over"*

ใช้ "Mayday" เฉพาะอันตรายถึงชีวิต เหตุเร่งด่วนที่รุนแรงน้อยกว่าใช้ "Pan-pan" อ่านว่า "แพน-แพน" สามครั้ง

ขั้นที่ 3: รอและเรียกซ้ำ

- ปล่อยปุ่มแล้วฟัง หากไม่มีคำตอบ รอประมาณหนึ่งนาทีแล้วลองใหม่
- ลองช่องหรือความถี่อื่นหากทำได้ ดู FRS และ GMRS และ วิทยุสมัครเล่น
- ย้ำตำแหน่งเสมอ เพราะทีมกู้ภัยต้องใช้ข้อมูลนี้

ข้อมูลที่ต้องบอก

1. ใคร: ชื่อและจำนวนคน
2. ที่ไหน: ถนน หลักระยะ จุดสังเกต หรือพิกัด

3. เกิดอะไร: ปัญหาหรือเหตุที่เกิด

4. ต้องการอะไร: ความช่วยเหลือที่จำเป็น

คำวิทยุที่ควรรู้

- Over: พูดจบแล้ว รอคำตอบ
- Out: จบการสนทนา ห้ามพูด "Over and out" คู่กัน
- Roger: ได้รับข้อความแล้ว
- Say again: ขอให้ทวนข้อความล่าสุด
- Stand by: รอก่อน
- Affirmative / Negative: ใช่ / ไม่ใช่

คำสะกดอักษรสากล

Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu

อ่านตัวเลขทีละหลัก เช่น 452 อ่าน "four five two" และอ่าน 9 ว่า "niner" เพื่อไม่ให้สับสนกับ "five"

ข้อแนะนำ

- พูดช้า ถือวิทยุห่างปากไม่กี่เซนติเมตร
- พูดสั้นเพื่อประหยัดแบตเตอรี่
- หลังได้รับความช่วยเหลือ แจ้งข่ายหรือช่องว่าเหตุฉุกเฉินจบแล้ว

ดู ใช้วิทยุและโทรศัพท์ และ ช่วยให้ทีมค้นหาพบคุณ

วิทยุและประกาศเตือนอากาศ NOAA

วิทยุอากาศ NOAA ในสหรัฐฯ

- เครือข่ายสถานีออกข่าวอากาศ ภัยอันตราย และประกาศความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
- มีเจ็ดช่องระหว่าง 162.400 และ 162.550 MHz วิทยุจะหาช่องแรงที่สุด รุ่นมือหมุนหลายรุ่นรับย่านนี้ได้
- เลือกรุ่นมี SAME หรือระบบเข้ารหัสข้อความเฉพาะพื้นที่ ป้อนรหัสเขตแล้วเครื่องจะเตือนเฉพาะพื้นที่คุณ
- เปิดโหมดแจ้งเตือนเพื่อปลุกเมื่อมีคำเตือน แม้กลางคืน
- เตรียมถ่านหรือมือหมุนสำรอง ใช้ได้แม้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตล่ม

วิธีรับประกาศอื่น

- WEA บนโทรศัพท์: ข้อความสั้นพร้อมเสียงดังสำหรับทอร์นาโด น้ำท่วม อพยพ และเด็กหาย ควรเปิดไว้
- AM/FM: สถานีท้องถิ่นส่งข้อความระบบเตือนฉุกเฉิน วิทยุถ่านหรือมือหมุนเชื่อถือได้ ช่วงภัยนานหลายพื้นที่มีหนึ่งสถานีที่ยังส่งต่อเนื่อง
- โทรทัศน์และแอปอากาศ: มีประโยชน์หากยังมีไฟและข้อมูล
- คลื่นสั้นหรือสถานีต่างประเทศ: อาจมีข่าวเมื่อสถานีในพื้นที่หยุดส่ง

ความหมายของคำเตือน

- Watch เฝ้าระวัง: สภาพเอื้อต่อการเกิดเหตุ ให้เตรียมพร้อม
- Warning เตือนภัย: เหตุกำลังเกิดหรือใกล้เกิด ลงมือทันที
- Advisory ข้อแนะนำ: รับรู้และเพิ่มความระมัดระวัง

เมื่อได้ยินสัญญาณเตือน

- อย่าเพิกเฉยเพียงเพราะท้องฟ้ายังแจ่มใส
- ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะหลบภัย อพยพ หรืออยู่ภายใน
- ดู ทอร์นาโด น้ำท่วม เฮอริเคน และ ไฟป่า ตามชนิดภัย
- แจ้งเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ไม่มีโทรศัพท์

ข้อแนะนำ

- ทดสอบวิทยุทุกเดือน และจดความถี่ใส่ชุดฉุกเฉิน
- รุ่นมีมือหมุน แผงแสงอาทิตย์ และ USB อาจช่วยชาร์จโทรศัพท์ได้เล็กน้อย

ส่งข้อความระหว่างบอร์ดผ่านเมช

อุปกรณ์นี้ส่งข้อความสั้นถึงบอร์ด Survival Wiki ใกล้เคียงได้ โดย ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ หรือเราเตอร์

หลักการทำงาน

- บอร์ดติดต่อโดยตรงผ่าน ESP-NOW ระยะใกล้ ในย่าน 2.4 GHz เดียวกับ Wi-Fi
- ทุกบอร์ดส่งต่อข้อความที่ได้รับ ข้อความจึงข้ามหลายบอร์ดได้ ยิ่งมีบอร์ดต่อเนื่องยิ่งครอบคลุมไกล
- ข้อความสั้น จำกัดราว 64 ตัวอักษร
- ผู้ส่งเห็นสถานะ "ได้รับโดย" (Heard by) เพื่อรู้ว่าบอร์ดใดรับแล้ว

ใช้บนบอร์ด

1. แตะ เมช (Mesh) ที่หน้าหลัก
2. ตรวจว่าเปิดเมชแล้ว เลือกข้อความด่วนหรือพิมพ์เอง
3. รอคำตอบ รูปดาวบนปุ่มเมชหมายถึงมีข้อความยังไม่อ่าน
4. หน้า ใกล้เคียง (Nearby) แสดงบอร์ดรอบตัวและระยะโดยประมาณ

ใช้ผ่านโทรศัพท์

1. เปิดฮอตสปอต Wi-Fi ของบอร์ดแล้วเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์
2. เปิดหน้าแชต พิมพ์ข้อความที่ยาวกว่าบนโทรศัพท์ แล้วบอร์ดจะส่งผ่านเมช
3. โทรศัพท์ยังเปิดแผนที่และวิกิจากบอร์ดได้

ระยะ

- ในที่โล่ง สองบอร์ดมักติดต่อได้ไม่กี่ร้อยเมตร อาคาร เนิน และต้นไม้ลดระยะมาก
- ยกบอร์ดให้สูง ห่างโลหะและร่างกาย
- กระจายกลุ่มออก แต่ให้ทุกบอร์ดอยู่ในระยะอย่างน้อยหนึ่งบอร์ดอื่น

ข้อแนะนำ

- นัดเวลาติดต่อสั้น ๆ เช่น นาทีที่ 10 ของทุกชั่วโมงเพื่อประหยัดแบตเตอรี่
- ข้อความควรสั้นและชัด บอกว่าอยู่ไหนและต้องการอะไร
- เป็น เครื่องมือส่งข้อความระยะใกล้ ไม่ทดแทนโทรศัพท์หรือวิทยุเรียกกู้ภัยระยะไกล ดู เลือกวิทยุฉุกเฉิน และ ใช้วิทยุและโทรศัพท์
- ต้องมีไฟเลี้ยง พาวเวอร์แบงก์ USB ช่วยให้บอร์ดทำงานหลายชั่วโมง

เพิ่มระยะรับส่งวิทยุ

วิทยุมือถือส่วนใหญ่ส่งสัญญาณตามแนวสายตา หากมองเห็นอีกฝ่ายมักติดต่อได้ สิ่งกีดขวางทำให้สัญญาณอ่อน

ขึ้นที่สูง

- ความสูงช่วยเพิ่มระยะได้ดีที่สุด ไปยอดเขา หลังคา ชั้นบน หรือสันเขา
- สูงขึ้นไม่กี่เมตรอาจเพิ่มระยะเป็นสองเท่า
- ออกจากหุบเขา ร่องลึก หรือห้องใต้ดิน

ลดสิ่งกีดขวาง

- ถอยจากอาคาร รถ ป่าทึบ และหน้าผา
- หากอยู่ในอาคาร ไปใกล้หน้าต่างหรือออกนอกอาคาร
- โลหะ คอนกรีต และน้ำดูดกลืนสัญญาณ หลังคารถอาจช่วยสะท้อน แต่ภายในรถบังสัญญาณบางส่วน

ถือให้ถูก

- ให้เสา ตั้งตรง ไม่เอียงหรือแนบศีรษะและร่างกาย
- อย่าจับเสาอากาศหรือถือเสาใกล้ปาก
- นำเครื่องออกจากกระเป๋าเสื้อหรือเป้ขณะพูด

เสาอากาศที่ดีขึ้น

- เสาเปลี่ยนที่ยาวกว่าอาจเพิ่มระยะได้บ้าง
- เสาแม่เหล็กหรือเสาบนหลังคารถต่อกับวิทยุติดรถให้ผลดีกว่ามือถือมาก
- ห้ามกดส่งโดยไม่ต่อเสา เพราะเครื่องอาจเสียหาย

ส่งต่อข้อความ

- คนที่สามบนที่สูงช่วย ส่งต่อ ระหว่างสองฝ่ายที่ไม่ได้ยินกัน
- สถานีทวนวิทยุสมัครเล่นทำให้อัตโนมัติ ดู วิทยุสมัครเล่น
- สำหรับอุปกรณ์นี้ การเพิ่มบอร์ดช่วยขยายเมช ดู เมชระหว่างบอร์ด

กำลังส่งและแบตเตอรี่

- ความเย็นทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว เก็บเครื่องและแบตเตอรี่สำรองในเสื้อคลุม
- ระยะใกล้ใช้กำลังต่ำ เปลี่ยนเป็นกำลังสูงเมื่อจำเป็น
- ปิดระหว่างช่วงติดต่อ หรือนัดเวลาเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

ทดสอบก่อนจำเป็นต้องใช้

ลองใช้ที่ระยะและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งทราบแน่นอน แล้วจดว่าวิธีใดใช้ได้

ข้อควรรู้เมื่อปฐมพยาบาลเด็ก

เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก เด็กเจ็บป่วยเร็ว อาจยังดูปกติทั้งที่ป่วย และทรุดได้รวดเร็ว ใช้คู่มือปฐมพยาบาลอื่นร่วมกับข้อควรรู้ต่อไปนี้

ตรวจอย่างรวดเร็ว

- รู้สึกตัวและตอบสนองหรือไม่: เรียกชื่อ แตะตัว และสังเกตการเคลื่อนไหว
- การหายใจ: นับ 30 วินาทีแล้วคูณสอง ขณะพัก ทารกปกติหายใจประมาณ 30 ถึง 60 ครั้งต่อนาที เด็กวัยเตาะแตะ 24 ถึง 40 และเด็กวัยเรียน 18 ถึง 30 หากเร็วมาก หอบ มีเสียงดัง หรือออกบุ๋มระหว่างซี่โครง ถือว่ารุนแรง
- สีผิว: ริมฝีปากหรือผิวเขียว เทา หรือซีดมากเป็นเหตุฉุกเฉิน
- การดื่มและปัสสาวะ: เด็กไม่ยอมดื่ม หรือไม่ปัสสาวะนาน 8 ชั่วโมง ต้องได้รับความช่วยเหลือ ตรวจผ้าอ้อมเปียกด้วย

ขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อ

- หายใจลำบาก ตัวเขียว หรือมีเสียงครางทุกครั้งที่หายใจ
- ไม่ตอบสนอง ตัวอ่อนปวกเปียก ปลุกยาก หรือดูสับสน
- ชักเกิน 5 นาที หรือชักครั้งแรก ดู อาการชัก
- ทารกอายุต่ำกว่า 3 เดือนมีไข้ 38 C (100.4 F) ขึ้นไป ดู เด็กมีไข้
- ศีรษะบาดเจ็บร่วมกับอาเจียน ปวดศีรษะรุนแรง ซึม หรือรูม่านตาไม่เท่ากัน ดู บาดเจ็บศีรษะ
- คอแข็ง หรือมีผื่นไม่จางเมื่อกดด้วยแก้วใส
- กลืนยา แบตเตอรี่ แม่เหล็ก หรือสารเคมี ให้โทรศูนย์พิษวิทยาหรือหน่วยฉุกเฉินทันที
- มีอาการแพ้ ดู ภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน

ข้อห้ามและการใช้ยา

- ห้ามให้แอสไพรินแก่เด็กหรือวัยรุ่น เพราะอาจทำให้เกิดโรคร้ายแรง
- ห้ามให้น้ำผึ้งแก่ทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี เพราะอาจเกิดโรคโบทูลิซึม
- ห้ามให้ยาแก้ไอหรือยาแก้หวัดแก่เด็กเล็ก
- คำนวณยาตาม น้ำหนัก ไม่ใช่อายุ ตามฉลาก ใช้กระบอกหรือถ้วยตวงที่มากับยา
- ห้ามเขย่าตัวทารก แม้กำลังหงุดหงิด

CPR การสำลัก และสารน้ำ

- การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กและทารก ดู CPR
- ทางเดินหายใจอุดตัน ดู การช่วยผู้สำลัก ห้ามกระตุกหน้าท้องทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี
- ภาวะขาดน้ำและเครื่องดื่มชดเชย ดู ท้องเสีย อาเจียน และการชดเชยน้ำ

อ่อนโยนและพูดตามจริง

ย่อตัวให้อยู่ระดับเดียวกับเด็ก พูดอย่างสงบ บอกว่ากำลังจะทำอะไร และให้จับของเล่นหรือมือคุณ ดู ช่วยเด็กตั้งสติ

เด็กมีไข้

ไข้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อ อาการและพฤติกรรมของเด็ก สำคัญกว่าตัวเลขบนเครื่องวัดอุณหภูมิ

เมื่อใดเป็นเหตุฉุกเฉิน

- ทารกอายุต่ำกว่า 3 เดือน มีอุณหภูมิ 38 C (100.4 F) ขึ้นไป ให้ขอความช่วยเหลือทันที แม้ทารกยังดูปกติ
- ทารกอายุ 3 ถึง 12 เดือน มีไข้ 39 C (102.2 F) ขึ้นไป หรือมีไข้ไม่ว่าระดับใดนานเกินหนึ่งถึงสองวัน
- เด็กมีไข้ ร่วมกับ อาการต่อไปนี้:

- หายใจลำบาก หรือหายใจเร็วต่อเนื่องไม่ทุเลา
- คอแข็ง ปวดศีรษะรุนแรง หรือไวต่อแสง
- ผื่นที่ไม่จางลงเมื่อใช้แก้วใสกดทับ
- ง่วงซึมมาก ปลุกยาก สับสน หรือตัวอ่อนปวกเปียก
- ชัก ดู อาการชัก
- อาการขาดน้ำ: ไม่มีน้ำตา ปากแห้ง ไม่ปัสสาวะนาน 8 ชั่วโมง หรือกระหม่อมทารกบุ๋ม
- มีไข้นานกว่า 3 วัน หรืออุณหภูมิสูงกว่า 40 C (104 F)

วิธีวัดอุณหภูมิ

- ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัล การวัดทางรักแร้ทำได้ง่ายแต่แม่นยำน้อยกว่า สำหรับทารก การวัดทางทวารหนักแม่นยำที่สุด
- ห้ามใช้ปรอทวัดไข้แบบหลอดแก้ว

การดูแลที่บ้าน

1. ให้ดื่มบ่อย ๆ จิบทีละน้อย สำหรับทารกให้นมแม่หรือนมผง ดู ท้องเสีย อาเจียน และการชดเชยน้ำ
2. สวมเสื้อผ้าบางเบาและรักษาอุณหภูมิห้องให้สบาย อย่าห่มหรือห่อตัวจนหนาเกินไป
3. ให้เด็กพักผ่อน
4. ยาช่วยให้สบายตัว ไม่จำเป็นต้องลดไข้จนตัวเลขเป็นปกติ ใช้อะเซตามิโนเฟน (พาราเซตามอล) หรือใช้ไอบูโพรเฟนเฉพาะเด็กอายุมากกว่า 6 เดือน ให้ยาตาม น้ำหนักตัว ที่ระบุบนฉลาก ใช้กระบอกตวงยา และ

ห้ามเพิ่มขนาดยาเอง

5. ห้ามให้แอสไพริน

6. เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นเล็กน้อยเพื่อให้สบายขึ้น ห้ามใช้น้ำเย็น น้ำแข็ง หรือแอลกอฮอล์เช็ดตัว

ชักจากไข้

เด็กเล็กบางคนชักช่วงสั้น ๆ เมื่อไข้ขึ้นเร็ว อาจดูน่ากลัว แต่ส่วนใหญ่อาการเกิดไม่นานและไม่ก่ออันตราย

- จัดเด็กให้นอนตะแคงบนพื้นนุ่มและนำสิ่งอันตรายรอบตัวออก ห้ามใส่สิ่งใดในปากหรือกดรั้งตัวเด็ก
- จับเวลาการชัก โทรขอความช่วยเหลือหากชักนานกว่า 5 นาที เด็กไม่ฟื้นหลังชัก หรือเป็นการชักครั้งแรก

ดูเพิ่มเติม ข้อควรรู้เมื่อปฐมพยาบาลเด็ก

ดูแลทารกเมื่อไฟดับ

ทารกพึ่งคุณทุกอย่าง เมื่อไฟดับ หลักการดูแลพื้นฐานเหล่านี้ยังเหมือนเดิม

การให้นม

- นมแม่ปลอดภัยและสะดวกที่สุด ในภัยพิบัติ เพราะไม่ต้องใช้น้ำ อุปกรณ์ หรือไฟฟ้า ให้นมเมื่อทารกต้องการ และผู้ให้นมควรดื่มน้ำมากพอ
- นมผงหรือนมทดแทน: นมสูตรสำหรับทารกแบบน้ำพร้อมดื่มปลอดภัยที่สุดเพราะไม่ต้องผสมน้ำ รองลงมาคือนมผง
- ผสม ตามฉลากอย่างเคร่งครัด ห้ามเติมน้ำเพิ่มเพื่อประหยัด หรือใส่ผงมากเกิน สัดส่วนผิดเป็นอันตรายต่อทารก
- ใช้ น้ำปลอดภัย เช่น น้ำบรรจุขวด หรือน้ำต้มเดือด 1 นาทีแล้วพักให้เย็น ดู ทำน้ำให้ปลอดภัยสำหรับดื่ม
- ทิ้งนมที่ผสมแล้ววางเกิน 1 ชั่วโมง หรือนมที่เหลือจากมื้อที่กินแล้ว
- ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน ห้ามให้น้ำเปล่า น้ำผลไม้ ชา หรือน้ำผึ้ง และห้ามให้น้ำผึ้งก่อนอายุ 1 ปี

ทำความสะอาดขวดนม

- ล้างด้วยสบู่และน้ำปลอดภัยแล้วล้างออก จากนั้น ฆ่าเชื้อ โดยต้มชิ้นส่วน 5 นาทีและผึ่งแห้ง
- ล้างมือก่อน หากฆ่าเชื้อขวดไม่ได้ ให้ใช้ถ้วยและช้อนสะอาด

รักษาความอบอุ่น

- ทารกเสียความร้อนเร็ว ให้ใส่หลายชั้น สวมหมวก และ แนบผิวกับผิว ที่หน้าอกคุณใต้เสื้อผ้า
- อย่าให้ร้อนเกิน อากาศร้อนให้ใส่เสื้อบาง อยู่ร่ม และให้นมบ่อย

- ห้ามใช้เปลวไฟ ถ่าน หรือเตาแคมป์ในบ้านเพื่อให้ความอบอุ่น ดู คาร์บอนมอนอกไซด์

นอนอย่างปลอดภัย

- ให้ทารก นอนหงายคนเดียวบนพื้นแน่นและราบ ไม่มีหมอน ผ้าห่ม หรือของเล่นนุ่ม
- ห้ามหลับกับทารกบนโซฟาหรือเก้าอี้ หากจำเป็นต้องนอนเตียงเดียวกัน ให้กันเครื่องนอนนุ่มออกห่าง
- ห้ามห่อด้วยผ้าห่มที่อาจเลื่อนคลุมหน้า

ผ้าอ้อมและสุขอนามัย

- ตรวจผ้าอ้อมบ่อยและเปลี่ยนทันที ใส่ของเสียในถุงพลาสติก หาก ผ้าอ้อมเปียกน้อยกว่าประมาณ 4 ผืนต่อวัน อาจขาดน้ำ
- ล้างมือทุกครั้งหลังเปลี่ยนและก่อนให้นม ใช้ทิชชูเปียกหรือผ้ากับน้ำปลอดภัย
- ใส่ผ้าอ้อม ทิชชูเปียก นมผง ขวดนม ยา และเสื้อผ้าสำรองในกระเป๋าฉุกเฉิน

ควรขอความช่วยเหลือเมื่อ

กินนมได้น้อย ซึมมาก ตัวอ่อนปวกเปียก มีไข้ อาเจียน ท้องเสีย ตัวเขียว หรือหายใจลำบาก ดู ข้อควรรู้เมื่อดูแลเด็ก และ เด็กมีไข้

ช่วยเด็กตั้งสติและรับมือความเครียด

เด็กสังเกตผู้ใหญ่เพื่อประเมินว่าควรกลัวแค่ไหน ความสงบของคุณคือสิ่งปลอบใจที่ดีที่สุด

ขณะเกิดเหตุ

- ตั้งสติและพูดช้า ๆ ย่อตัวให้อยู่ระดับเดียวกับเด็ก
- บอกความจริงด้วยคำง่าย ๆ เช่น *"พายุกำลังแรง เราจะลงไปห้องใต้ดินที่ปลอดภัย พ่อแม่อยู่กับหนูนะ"*
- บอกว่าจะเกิดอะไรต่อแล้วทำตามนั้น ความคาดเดาได้ช่วยให้สงบ
- มอบงานเล็ก ๆ เช่น ถือไฟฉาย อุ้มตุ๊กตา หรือเลือกขนม การรู้สึกว่าช่วยได้ลดความกลัว
- อยู่ใกล้ จูงมือ กอด หรือนั่งด้วย การสัมผัสช่วยปลอบใจ

ของที่ช่วยให้อุ่นใจ

ใส่ของติดตัวที่ชอบ หนังสือ ของเล่นเล็ก ไพ่ หรือสีในกระเป๋าฉุกเฉิน เกมทายสิ่งที่มองเห็นและการร้องเพลงช่วยฆ่าเวลาและเบี่ยงความสนใจ

รักษากิจวัตร

- พยายามกินอาหาร งีบ และเข้านอนใกล้เวลาปกติ
- ให้อาหารและน้ำบ่อย เด็กที่หิว เหนื่อย และกระหายจะกลัวง่ายขึ้น

จำกัดข่าว

เด็กเล็กไม่จำเป็นต้องเห็นหรือได้ยินภาพและข่าวน่ากลัว ปิดโทรทัศน์หรือวิทยุใกล้เด็กเมื่อทำได้

รับฟัง

- ให้พูด วาดรูป หรือเล่นเพื่อระบายความรู้สึก อย่าพูดว่า "อย่ากลัว" ให้พูดว่า "กลัวได้ พ่อแม่อยู่ตรงนี้"
- ตอบง่าย ๆ ตามจริง บอกว่า "ยังไม่รู้ แต่จะหาคำตอบให้" ได้
- อย่าสัญญาเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ ให้พูดว่า "เราจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ปลอดภัย"

สัญญาณว่าเด็กกำลังรับมือได้ลำบาก

- ติดผู้ใหญ่ ร้องไห้ อาละวาด หรือกลับไปมีพฤติกรรมวัยเล็ก เช่น ฉี่รดที่นอนหรือดูดนิ้ว
- นอนไม่หลับ ฝันร้าย ปวดศีรษะ หรือปวดท้อง
- กลัวอยู่คนเดียว หรือกลัวเสียงลม ฟ้าร้อง และไซเรน
- แยกตัว โกรธ หรือไม่สนใจเล่น

อาการเหล่านี้พบได้บ่อยและมักดีขึ้นในหลายวันถึงหลายสัปดาห์เมื่อได้รับการปลอบและมีกิจวัตร หากไม่ดีขึ้นหรือคุณกังวล ให้ปรึกษาแพทย์ ครูแนะแนว หรือสายให้คำปรึกษา

ดูแลตนเองด้วย

คุณจะดูแลผู้อื่นได้ดีเมื่อยังมีแรง กิน ดื่ม พักเมื่อทำได้ และขอผู้ใหญ่คนอื่นสลับมาช่วย

ดู ตั้งสติและรักษากำลังใจ

แผนฉุกเฉินสำหรับครอบครัว

วางแผนร่วมกัน เขียนไว้ และฝึกซ้อม เด็กที่รู้ว่าต้องทำอะไรจะสงบและปลอดภัยกว่า

สิ่งที่ต้องเลือก

- จุดนัดพบสองแห่ง: แห่งหนึ่งใกล้บ้าน เช่น ต้นไม้หรือเฉลียงเพื่อนบ้าน อีกแห่งนอกย่าน เช่น ห้องสมุดหรือบ้านญาติ
- ผู้ติดต่ออยู่นอกพื้นที่ ให้ทุกคนโทรหรือส่งข้อความหาเมื่อพลัดกัน ข้อความทางไกลมักส่งได้แม้โทรใน

พื้นที่ไม่ได้

- คำรหัสครอบครัว ที่เฉพาะคนไว้ใจรู้ สอนเด็กไม่ให้ไปกับคนที่บอกคำรหัสไม่ได้

สอนเด็กให้รู้

- ชื่อเต็มตนเอง ชื่อคุณ และเบอร์โทร ฝึกจำเป็นเพลงได้
- วิธีโทร 911 หรือหมายเลขฉุกเฉินของท้องถิ่น พร้อมบอกชื่อ อยู่ที่ไหน และเกิดอะไร
- อยู่กับที่และรอผู้ใหญ่ที่ไว้ใจเมื่อพลัดกัน
- ไฟไหม้ต้องไม่หลบซ่อน ให้ออกไปแล้วอยู่ข้างนอก ดู ไฟไหม้บ้าน
- หากหลงในฝูงชน ให้หาคนแปลกหน้าที่ปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ คนที่พาเด็กมา หรือพนักงานร้าน

บัตรข้อมูลติดต่อ

- ใส่ บัตรชื่อ เบอร์โทร ผู้ติดต่อนอกพื้นที่ การแพ้ และยา ในกระเป๋าเป้และกระเป๋าเสื้อผ้าของเด็กแต่ละคน
- เด็กเล็กอาจเขียนเบอร์บนแขนด้วยปากกากันน้ำ หรือเย็บป้ายในเสื้อ เผื่อพลัดกัน

โรงเรียนและสถานรับเลี้ยง

- รู้ แผนฉุกเฉินและการรับเด็กกลับ ว่าเด็กไปที่ไหนและรับอย่างไร
- อัปเดตข้อมูลติดต่อ และระบุผู้ใหญ่สำรองที่มีสิทธิ์รับเด็ก
- อย่ารีบไปโรงเรียนจนได้รับคำแนะนำ ต้องเว้นถนนให้รถรับส่งและหน่วยช่วยเหลือ

กระเป๋าฉุกเฉินของเด็ก

- น้ำ ขนม เสื้อผ้าสำรอง เสื้อกันหนาว และรองเท้า
- ของช่วยให้อุ่นใจ หนังสือ ไพ่ และอุปกรณ์ระบายสี
- ยา สำเนาใบสั่งยา และเบอร์แพทย์
- ทารก: ผ้าอ้อม นมผง และขวดนม ดู ดูแลทารกเมื่อไฟดับ
- ไฟฉายและนกหวีด

ฝึกซ้อม

ปีละสองครั้ง ลองออกจากบ้านในความมืด ไปจุดนัดพบ และโทรติดต่อ แล้วคุยว่าส่วนใดทำได้ดี

ดูเพิ่มเติม เหตุฉุกเฉินในบ้านและไฟดับ

เด็กพลัดหลงหรือสูญหาย

เมื่อเด็กหาย

1. ลงมือทันที อย่ารอดูว่าจะกลับมาเองหรือไม่
2. ตรวจแหล่งน้ำก่อน สระ บ่อ ถัง อ่างอาบน้ำ ลำธาร และคู เป็นอันตรายที่สุดสำหรับเด็กเล็ก
3. ตรวจที่ซ่อน: ตู้ รถรวมกระโปรงท้าย ใต้เตียง โรงเก็บของ และหลังเฟอร์นิเจอร์
4. เรียกและหยุดฟัง ขอทุกคนใกล้เคียงช่วยหา
5. โทร 911 หรือหมายเลขฉุกเฉินในพื้นที่แต่เนิ่น ๆ โทรเร็วดีกว่าช้า แจ้ง รูปลักษณ์ เสื้อผ้า อายุ จุดและเวลาที่เห็นล่าสุด พร้อมภาพถ่าย หากมี
6. ให้ หนึ่งคนอยู่จุดที่เห็นล่าสุด เผื่อเด็กกลับมา
7. ในธรรมชาติ ค้นตาม ทางเดิน ถนน ทางลงที่ต่ำ และทิศใต้ลม พร้อมทำเครื่องหมายจุดที่ตรวจแล้ว
8. เรียกต่อเนื่อง เป่านกหวีดชุดละ 3 ครั้ง และหยุดเสียงเป็นระยะเพื่อฟัง

เด็กที่มีแนวโน้มเดินออกไปเอง

เด็กบางคน เช่น ผู้มีภาวะออทิสติก อาจเดินออกไปเอง ติดกระดิ่งประตู ล็อกให้สูง บอกเพื่อนบ้าน และ ตรวจแหล่งน้ำก่อนทุกครั้ง

สอนเด็กเมื่อหลงกลางแจ้ง: อยู่กับต้นไม้

- หยุดและอยู่กับที่ อย่าเดินเรื่อย เด็กที่อยู่จุดเดียวจะถูกพบเร็วกว่า
- กอดต้นไม้ หรือนั่งข้างต้นไม้หรือก้อนหิน ให้เป็นเพื่อนระหว่างรอ
- ส่งเสียง เป่านกหวีด 3 ครั้ง และตะโกนขอช่วยเป็นช่วงสั้น ๆ
- อยู่ให้แห้งและอุ่น ใส่เสื้อคลุม ทำที่นอนใบไม้ หรือคลุมตัวด้วยถุงขยะหรือใบไม้
- อย่าหลบทีมค้นหา พวกเขาจะเรียกชื่อ
- อย่าลงน้ำ และอย่าเดินตามลำธาร

ให้เด็กทุกคนพก นกหวีด และเสื้อคลุมหรือหมวกสีสดเวลาเดินป่า สอนให้อยู่บนเส้นทางและหยุดเมื่อมองไม่เห็นคุณ

ในฝูงชนหรือร้านค้า

- หยุดที่เดิมและเรียกชื่อเด็ก
- สอนเด็กให้หาเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ พนักงาน หรือแม่ที่พาเด็กมา แล้วบอกว่า "หนูหลงทาง"
- ขอพนักงานปิดควบคุมทางออกและแจ้งตำรวจ

เมื่อพบแล้ว

กอด ให้น้ำและอาหาร ตรวจบาดเจ็บและอาการจากความหนาวหรือร้อน ดู ตัวเย็นเกิน และ เจ็บป่วยจากความร้อน อย่าดุ ชมที่เด็กอยู่กับที่

ดูเพิ่มเติม ทำให้ทีมค้นหาพบคุณง่ายขึ้น

ผู้สูงอายุและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีโรคประจำตัวเสี่ยงจากภัยพิบัติมากกว่า และมักต้องการความช่วยเหลือเร็วกว่า ควรวางแผนร่วมกัน

ทำใบสรุปข้อมูลสุขภาพ

ใส่ ข้อมูลหนึ่งหน้า ในถุงกันน้ำและกระเป๋าฉุกเฉิน:

- ชื่อ อายุ รูปถ่าย และผู้ติดต่อฉุกเฉิน
- โรค การแพ้ และอุปกรณ์ฝังในร่างกาย
- ยาทุกชนิดพร้อมขนาดยา และเบอร์ร้านขายยา
- ชื่อและเบอร์แพทย์
- ข้อมูลประกันและเอกสารประจำตัว
- ความต้องการด้านการได้ยิน การมองเห็น ภาษา และสัตว์ช่วยเหลือถ้ามี

ยาและสิ่งจำเป็น

- สำรองยา อย่างน้อย 7 วัน หากได้ 2 สัปดาห์ยิ่งดี หมุนเวียนใช้ไม่ให้หมดอายุ
- เก็บ อินซูลินให้เย็น ด้วยกระติกและถุงเย็นหรือกระเป๋าเฉพาะ
- แว่นสำรอง ถ่านเครื่องช่วยฟัง ไม้เท้าหรือเครื่องช่วยเดิน และฟันปลอม
- อุปกรณ์สำหรับผู้กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ทิชชูเปียก และถุง
- รายชื่อแหล่งซื้อของจำเป็นและที่ชาร์จอุปกรณ์สำรอง

เครื่องมือที่ต้องใช้ไฟฟ้า

- เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ และเตียงไฟฟ้า ต้องมีไฟสำรอง คุยกับผู้ให้บริการและการไฟฟ้าและลงทะเบียนผู้มีความจำเป็นทางการแพทย์
- สำรอง ถังออกซิเจน และรู้ว่าใช้ได้กี่ชั่วโมง ห้ามเปลวไฟหรือสูบบุหรี่ใกล้ออกซิเจน
- รู้โรงพยาบาลหรือศูนย์พักพิงมีไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด และวางแผนเดินทางก่อนไฟดับ
- ดู ใช้เครื่องปั่นไฟอย่างปลอดภัย และ คาร์บอนมอนอกไซด์

การอพยพ

- กำหนดเส้นทางและ ใครจะช่วย อย่ารอแก้เฉพาะหน้า
- ขอเพื่อนบ้าน ครอบครัว หรือหน่วยงานท้องถิ่นมาตรวจดูแต่เนิ่น ๆ แบ่งปันแผนและกุญแจ
- หากขึ้นลงบันไดไม่ได้ ให้หาห้องปลอดภัยชั้นล่างหรือทางออกสำหรับรถเข็น
- ฝึกเคลื่อนรถเข็นขึ้นลงบันไดร่วมกับผู้ช่วย หากไม่ได้ฝึก ห้ามยกอุ้มผู้อื่นเว้นแต่อันตรายถึงชีวิต

การสื่อสาร

- เตรียมกระดาษปากกา แผ่นสื่อสาร หรือโทรศัพท์พิมพ์ข้อความ แจ้งทีมช่วยเหลือหากหูหนวก ตาบอด หรือสื่อสารด้วยคำพูดไม่ได้
- ผู้มีภาวะสมองเสื่อมหรือออทิสติก ควรรักษา กิจวัตร ของคุ้นเคย และความสงบ ให้มากที่สุด พร้อมพก บัตรระบุตัว ดู ช่วยเด็กตั้งสติ และ เด็กพลัดหลง

ดูแลเพื่อนบ้าน

โทรหรือเยี่ยมเพื่อนบ้านสูงอายุและผู้ที่อยู่คนเดียว ก่อนและหลัง ภัยพิบัติ หลายคนเสียชีวิตหลายวันหลังเหตุจากความร้อน ความหนาว หรือไฟดับ ดู คลื่นความร้อน และ พายุหิมะ

ห้องน้ำฉุกเฉินและการจัดการของเสีย

อยู่บ้านเมื่อไม่มีน้ำ

ส้วมถัง:

1. ใช้ถัง 5 แกลลอน (20 ลิตร) มีฝาปิดสนิท หรือใช้ถุงขยะหนาบุโถส้วม
2. หลังใช้แต่ละครั้ง โรย ทรายแมว ขี้เลื่อย ขี้เถ้า หรือดินแห้ง เล็กน้อย เพื่อลดกลิ่นและแมลงวัน
3. เมื่อถุงเต็มครึ่งหนึ่งให้มัดปิด ซ้อนอีกถุงแล้วเก็บในภาชนะมีฝานอกอาคาร ห่างจากบ้าน บ่อน้ำ และสัตว์
4. ล้างมือหลังใช้ ดูคู่มือล้างมือ

ห้าม กดชักโครกหากท่อระบายน้ำอาจอุดตันหรือไม่มีน้ำ ห้ามทิ้งของเสียใกล้บ่อน้ำ ลำธาร หรือพืชผักที่ใช้เป็นอาหาร

ในพื้นที่ธรรมชาติ

หลุมส้วมส่วนตัว สำหรับพักสั้นหรือกลุ่มเล็ก:

- ขุดลึกประมาณ 15-20 ซม. (6-8 นิ้ว) ห่างจากน้ำ ทางเดิน และค่าย อย่างน้อย 60 ม. (200 ฟุต)
- กลบดินให้มิดหลังใช้

- เก็บกระดาษใช้แล้วใส่ถุงนำออก หรือเผาให้หมด ห้ามทิ้งไว้บนพื้น

ร่องส้วม สำหรับกลุ่มที่พักหลายวัน:

- ขุดร่องกว้างประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) ลึก 60-90 ซม. (2-3 ฟุต) อยู่ต่ำกว่าและใต้ลมจากค่ายกับแหล่งน้ำ กลบดินหลังใช้แต่ละครั้ง และกลบทั้งหมดเมื่อย้ายออก

ป้องกันการเจ็บป่วย

- ล้างมือทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำและก่อนจับอาหาร
- ป้องกันแมลงวันตอมของเสียและอาหาร ปิดฝาส้วม
- ใส่ผ้าอ้อม ผ้าพันแผล และทิชชูเปียกในถุงปิดสนิท ห้ามทิ้งในร่องส้วม
- ผู้ท้องเสียควรมีถังแยกของตน ล้างด้วยน้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนผสมน้ำ 9 ส่วน

สุขาภิบาลไม่ดีทำให้ป่วยมากกว่าภัยหลายอย่างในคู่มือนี้ ควรจัดการตั้งแต่วันแรก

ล้างมือเมื่อมีน้ำน้อย

ควรล้างมือเมื่อไร

- หลังใช้ห้องน้ำหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม
- ก่อนเตรียมหรือกินอาหาร
- หลังจับเนื้อดิบ ขยะ สัตว์ หรือผู้ป่วย
- หลังทำแผลหรือดูแลผู้ป่วย

วิธีล้าง ประมาณ 20 วินาที

1. เทน้ำเล็กน้อยให้มือเปียก โดยล้างแยกห่างจากแหล่งน้ำสะอาด
2. ฟอกสบู่และถูฝ่ามือ หลังมือ ซอกนิ้ว และใต้เล็บ 20 วินาที
3. เทน้ำเล็กน้อยล้างสบู่ออก เช็ดด้วยผ้าสะอาดหรือปล่อยให้แห้ง

สบู่กับน้ำประมาณหนึ่งควอร์ตก็เพียงพอ สบู่เป็นตัวช่วยสำคัญกว่าปริมาณน้ำ

เมื่อมีน้ำน้อยมาก

- ก๊อกเท้าเหยียบ: แขวนแกลลอนที่เจาะรูเล็กใกล้ฝา ใช้เชือกผูกให้เหยียบด้วยเท้าแล้วแกลลอนเอียงปล่อยสายน้ำเล็ก ๆ แขวนสบู่ข้างกัน
- ใช้ขวดสเปรย์หรือถ้วยเจาะรู
- รองน้ำล้างด้วยถัง แล้วนำไปชักโครกหรือรดต้นไม้ ห้ามนำมาดื่ม

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

- ใช้ชนิดมี แอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% ถูให้ทั่วจนแห้ง ประมาณ 20 วินาที
- ได้ผลไม่ดีเมื่อมือสกปรกหรือมีคราบมันชัดเจน ให้เช็ดสิ่งสกปรกออกก่อน
- กำจัดเชื้อบางชนิดไม่ได้ เช่น โนโรไวรัสและ C. diff หลังใช้ห้องน้ำควรใช้สบู่กับน้ำ

ไม่มีสบู่

- ใช้ขี้เถ้าหรือทรายสะอาดถูแล้วล้าง ดีกว่าใช้น้ำอย่างเดียว
- ขัดถูให้ทั่วแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยารุนแรงกับผิวหนัง ใช้น้ำยาฟอกขาวเจือจางสำหรับพื้นผิวเท่านั้น