AREEJ ATELIER

BOITE A OUTILS DU THERAPEUTE - VOL. 1



# GERER L'ANXIETE

Un cahier pratique pour comprendre l'anxiete, calmer le corps et retrouver l'espace mental

40 FICHES - A4 & US LETTER - areej.studio

# BIENVENUE

comment utiliser ce cahier

L'anxiete n'est pas un defaut de fabrication : c'est un systeme d'alarme devenu trop sensible. Ce cahier reunit les outils les plus efficaces (TCC, exposition, regulation corporelle) pour re-calibrer cette alarme, pas a pas.

1 **COMPRENDRE**
Fiches 03 a 09 : cartographier TON anxiete - declencheurs, symptomes, cycle.

2 **CALMER LE CORPS**
Fiches 10 a 13 : respiration et ancrage, a pratiquer AVANT d'en avoir besoin.

3 **TRAVAILLER LES PENSEES**
Fiches 14 a 20 : la partie TCC - attraper et examiner les pensees anxieuses.

4 **AFFRONTER PAR MARCHES**
Fiches 21 a 26 : exposition progressive, panique, apres-crise.

5 **CONSTRUIRE LA ROUTINE**
Fiches 27 a 39 : hygiene de vie, trackers, plan anti-rechute.

**Rythme conseille : 2 a 3 fiches par semaine. La regularite bat l'intensite.**



# SOMMAIRE

40 fiches en 5 parties


### PARTIE 1 - COMPRENDRE MON ANXIETE

03. Qu'est-ce que l'anxiete ?
04. Utile ou envahissante ?
05. L'anxiete dans mon corps
06. Le cycle de l'anxiete
07. Mes declencheurs
08. Mon echelle personnelle 0-10
09. Checklist des symptomes

### PARTIE 2 - CALMER LE CORPS

10. La respiration carree
11. 4-7-8 et coherence cardiaque
12. Ancrage 5-4-3-2-1
13. 10 ancrages physiques

### PARTIE 3 - TRAVAILLER LES PENSEES

14. Le catastrophisme
15. Et si... ? Les 3 questions
16. Journal des pensees anxieuses
17. Les 6 distorsions de l'anxiete
18. Les questions socratiques
19. Le temps des inquietudes
20. Controlable ou pas ?

### PARTIE 4 - AFFRONTER

21. La vague d'anxiete
22. Ce que l'evitement me coute
23. Mon echelle d'exposition
24. Plan d'exposition de la semaine
25. Fiche d'urgence panique
26. Apres la crise : auto-debrief

### PARTIE 5 - MA ROUTINE ANTI-ANXIETE

27. Les 6 leviers d'hygiene
28. Routine du matin
29. Routine du soir
30. Tracker 14 jours
31. Ma boite d'urgence perso
32. 12 recadrages
33. Cartes de coping
34. Mon reseau de soutien
35. Quand consulter ?
36. Plan anti-rechute
37. Bilan a 30 jours
38. Notes
39. Mon engagement

# QU'EST-CE QUE L'ANXIETE ?

une alarme, pas une ennemie

L'anxiete est la reponse du cerveau a un danger PERCU. L'amygdale - le detecteur de fumee du cerveau - declenche l'alarme : cortisol, adrenaline, coeur qui s'accelere. Le probleme n'est pas l'alarme, c'est son reglage : elle sonne pour des dangers imaginaires ou futurs.

| LES 3 INGREDIENTS DE L'ANXIETE | |
|---|---|
| LE CORPS | coeur rapide, souffle court, tension, ventre noue - l'energie de fuite |
| LES PENSEES | 'et si...', scenarios catastrophe, besoin de certitude absolue |
| LES COMPORTEMENTS | eviter, verifier, se rassurer, fuir - ce qui NOURRIT l'anxiete |

**A RETENIR**

L'anxiete est desagreable mais JAMAIS dangereuse. Aucune crise d'angoisse n'a jamais tue personne. Le corps sait redescendre seul : c'est sa conception.



# UTILE OU ENVAHISSANTE ?

l'anxiete normale existe

Un peu d'anxiete ameliore la performance (reviser un examen, preparer un entretien). Elle devient un probleme quand elle est disproportionnee, chronique et qu'elle retrecit ta vie.

| ANXIETE UTILE | ANXIETE ENVAHISSANTE |
| --- | --- |
| proportionnee a l'enjeu | disproportionnee ou sans objet |
| liee a un evenement precis | presente presque tous les jours |
| retombe apres l'evenement | insomnies, fatigue, irritabilite |
| pousse a AGIR et preparer | pousse a EVITER et fuir |
| n'empeche pas de vivre | retrecit la vie mois apres mois |

**Mon anxiete en ce moment ressemble plutot a... (et pourquoi)**



# L'ANXIETE DANS MON CORPS

entoure ce que TU ressens

Chaque personne a sa signature corporelle. Reperer la tienne permet d'agir TOT, avant le pic. Entoure tes symptomes et ajoute les tiens.

- tete legere / vertiges
- machoire serree
- gorge nouee
- coeur qui s'emballe
- souffle court
- poitrine serree
- ventre noue / nausee
- mains moites / froides
- jambes molles
- tremblements
- chaleur / frissons
- envie de fuir


**Mes 3 premiers signaux (dans l'ordre d'apparition)**



# LE CYCLE DE L'ANXIETE

**pourquoi elle revient toujours**

L'anxiete tourne en boucle : plus j'evite, plus le cerveau croit que le danger etait reel, plus l'alarme sonne fort la fois suivante. Couper la boucle = cibler l'EVITEMENT.




### OU COUPER LA BOUCLE ?

Au maillon EVITEMENT : rester (fiche 21), s'exposer par marches (fiche 23) et laisser le corps apprendre que l'alarme etait fausse.

# MES DECLENCHEURS

nommer, c'est deja desamorcer

Coche les familles qui te concernent puis detaille. Un declencheur peut etre une situation, une personne, une heure de la journee, une sensation ou une pensee.

- ☐ SOCIAL — regard des autres, conflits, parler en public
- ☐ SANTE — sensations corporelles, maladies, fatigue
- ☐ PERFORMANCE — travail, examens, deadlines, erreurs
- ☐ INCERTITUDE — avenir, argent, decisions, imprevus
- ☐ SEPARATION — etre seul(e), perdre quelqu'un

**Mes 5 declencheurs les plus frequents, du plus fort au plus faible**

**Le declencheur que je veux travailler EN PREMIER dans ce cahier**



# MON ECHELLE PERSONNELLE

de 0 a 10, a quoi ressemble MON anxiete ?

Avoir une echelle precise permet de choisir le bon outil au bon moment, et de constater les progres. Decris tes paliers.




### 0 – 3 CALME A LEGER

ce que je ressens / peux faire :

### 4 – 6 MOYEN

mes signaux / mes outils :

### 7 – 10 FORT A PANIQUE

mes signaux / mon plan d'urgence :

# CHECKLIST DES SYMPTOMES

**cette semaine, j'ai ressenti...**

Coche ce qui s'est manifeste cette semaine. Refais cette fiche dans 30 jours pour mesurer le chemin parcouru.

- [ ] inquietudes difficiles a stopper
- [ ] rumination le soir au lit
- [ ] tension musculaire / machoire
- [ ] fatigue des le reveil
- [ ] irritabilite inhabituelle
- [ ] difficultes de concentration
- [ ] coeur qui s'emballe sans raison
- [ ] souffle court / soupirs frequents
- [ ] ventre noue, digestion difficile
- [ ] besoin de tout verifier
- [ ] demande constante de reassurance
- [ ] report ou annulation de plans
- [ ] evitement de lieux ou de gens
- [ ] sommeil leger ou coupe
- [ ] peur de 'devenir fou / folle'
- [ ] sensation d'etre 'a cote de sa vie'

**Total coche :** _____ / 16 (0-4 leger, 5-9 moyen, 10+ : fiche 35)



# LA RESPIRATION CARREE

l'outil des pilotes et des pompiers

4 cotes, 4 secondes chacun. Le souffle est la seule fonction automatique que tu peux piloter a la main - et il commande directement le rythme cardiaque.

**1. J'INSPIRE**
4 s

**4. JE RETIENS**
4 s

**4 - 4 - 4 - 4**

recommence 6 fois

**2. JE RETIENS**
4 s

**3. J'EXPIRE**
4 s

| | |
|---|---|
| QUAND ? | au premier signal corporel (fiche 05), avant un rdv stressant, le soir au lit |
| COMBIEN ? | 6 cycles = environ 2 minutes. Effet mesurable sur le rythme cardiaque. |
| ASTUCE | trace le carre avec ton doigt sur ta cuisse en respirant : double ancrage. |



# 4-7-8 & COHERENCE CARDIAQUE

deux respirations, deux usages

La 4-7-8 est un somnifere naturel : expiration deux fois plus longue que l'inspiration = frein de parasympathique. La coherence cardiaque est l'entretien quotidien.

## 4 - 7 - 8 (URGENCE & SOIR)

1. j'inspire par le nez - 4 s
2. je retiens doucement - 7 s
3. j'expire par la bouche - 8 s
4. je repete 4 cycles maximum

effet : somnolence, redescente rapide

## COHERENCE (3 x 6 x 5)

1. 3 fois par jour
2. 6 respirations par minute
3. pendant 5 minutes
4. inspire 5 s - expire 5 s, sans pause

effet : baisse du niveau de fond en 2 semaines

**Mes 3 creneaux fixes pour la coherence cardiaque (ex. apres le cafe, avant dejeuner, 21h)**



# ANCRAGE 5-4-3-2-1

revenir ici, maintenant

La panique vit dans le futur imagine. Les 5 sens vivent dans le present. Cet exercice force le cerveau a quitter le scenario pour revenir dans la piece.

**5** choses que je VOIS

**4** choses que je TOUCHE

**3** sons que j'ENTENDS

**2** odeurs que je SENS

**1** chose que je GOUTE



# 10 ANCRAGES PHYSIQUES

quand la tete ne repond plus, passe par le corps

En crise forte, raisonner ne marche plus : le corps a pris la main. Ces gestes parlent directement au systeme nerveux.

1. eau froide sur les poignets ou le visage
2. glacon serre dans la main
3. pieds nus au sol : sentir chaque appui
4. pousser un mur de toutes ses forces 10 s
5. marche rapide 5 minutes en comptant les pas
6. fredonner ou chanter (active le nerf vague)
7. etirement machoire + epaules + nuque
8. auto-massage des mains, doigt par doigt
9. nommer 10 objets bleus autour de soi
10. boire lentement un verre d'eau, gorgee par gorgee

**Mes 3 ancrages preferes (a tester cette semaine)**



# LE CATASTROPHISME

l'escalier imaginaire vers le pire

L'anxiete enchaine les 'et si' comme un escalier qui descend toujours vers la catastrophe. Chaque marche parait logique - c'est l'ensemble qui est absurde. Exemple :

**Mon chef veut me parler demain...**

**...et s'il n'etait pas content de moi ?**

**...et si je perdais mon travail ?**

**...et si je ne retrouvais jamais rien ?**

**...et si je finissais seul(e) et ruine(e) ?**

**LA PARADE**

Remonter l'escalier : revenir au SEUL fait reel ('mon chef veut me parler') et traiter les marches une par une avec la fiche 15.

**Mon escalier catastrophe le plus frequent (ecris les marches)**



# 'ET SI... ?' LES 3 QUESTIONS

decatastropher en 5 minutes

Prends UNE pensee 'et si...' et fais-la passer au tribunal des probabilites. Ecris, ne reponds pas de tete : l'ecriture ralentit le cerveau anxieux.

**Ma pensee 'et si...' :** _____

## 1. QUELLE EST LA PROBABILITE REELLE ?

Sur 100 fois ou j'ai eu cette peur, combien de fois est-elle arrivee ?

## 2. SI CA ARRIVAIT VRAIMENT ?

Pire scenario ? Meilleur scenario ? Scenario le PLUS PROBABLE ?

## 3. QU'EST-CE QUE JE FERAIS ?

Meme dans le pire cas : quelles seraient mes 2 premieres actions ? Qui m'aiderait ?



# JOURNAL DES PENSEES ANXIEUSES

7 jours d'observation

Chaque ligne = un episode d'anxiete. Note-le a chaud ou le soir. En 7 jours, tes motifs recurrents apparaitront d'eux-memes.

| JOUR | SITUATION | PENSEE 'ET SI...' | ANXIETE /10 | REPONSE REALISTE |
|---|---|---|---|---|
| J1 | | | | |
| J2 | | | | |
| J3 | | | | |
| J4 | | | | |
| J5 | | | | |
| J6 | | | | |
| J7 | | | | |

# LES 6 DISTORSIONS DE L'ANXIETE

les filtres qui grossissent le danger

Coche celles que tu reconnais. Nommer la distorsion suffit souvent a lui retirer la moitie de son pouvoir.

☐ **CATASTROPHISME**

imaginer systematiquement le pire scenario possible

☐ **SURESTIMATION**

croire que l'evenement redoute est tres probable

☐ **TOUT OU RIEN**

'si ce n'est pas parfait, c'est un desastre'

☐ **RAISONNEMENT EMOTIONNEL**

'je SENS le danger, donc il existe'

☐ **INTOLERANCE A L'INCERTITUDE**

'je dois etre sur(e) a 100%, sinon je ne fais pas'

☐ **LECTURE DE PENSEE**

'ils ont tous vu que je stressais, ils me jugent'



# LES QUESTIONS SOCRATIQUES

interroger la pensee comme un bon avocat

Choisis une pensee anxieuse recurrente, puis reponds par ecrit a ces 8 questions. Garde cette fiche : elle marche pour toutes les pensees.

**Pensee examinee :** _____

1. **Quelle est la preuve CONCRETE que c'est vrai ?**

2. **Quelle est la preuve que c'est faux ou exagere ?**

3. **Est-ce un FAIT ou une interpretation ?**

4. **Que dirais-je a un ami qui pense cela ?**

5. **Que dira cette situation dans 1 an ? Dans 5 ans ?**

6. **Quel serait un regard plus nuance ?**

7. **Cette pensee m'aide-t-elle a agir ou me paralyse-t-elle ?**

8. **Qu'est-ce que je peux faire MAINTENANT, meme petit ?**

Astuce : les questions 1-2-3 degonflent la pensee, les questions 7-8 remettent en mouvement.



# LE TEMPS DES INQUIETUDES

un rendez-vous fixe, pas un squat permanent

Au lieu de lutter contre les inquietudes toute la journee, donne-leur un creneau officiel de 15 minutes. Hors creneau : 'note-le, on verra a 18h'. Methode validee par la recherche sur le TAG.

**1** **CHOISIR LE CRENEAU**

meme heure chaque jour, jamais au lit. Ex : 18h00 - 18h15.

**2** **CAPTURER**

dans la journee, chaque inquietude est NOTEE en 5 mots puis lachee.

**3** **TRAITER**

au creneau : relire la liste. Beaucoup auront deja expire d'elles-memes.

**4** **TRIER**

pour les survivantes : controlable -> 1 action. Incontrolable -> fiche 20.

**Mon creneau officiel :** _____

Liste de capture du jour (5 mots par inquietude)



# CONTROLABLE OU PAS ?

le tri qui libere

Prends tes inquietudes de la fiche 19 et trie-les. Regle : ce qui est controlable merite une ACTION, ce qui ne l'est pas merite une RESPIRATION.

**JE PEUX AGIR**

-> je planifie UNE action

**HORS DE MA MAIN**

-> je respire et je lache

**LA PHRASE DE TRI**


'Est-ce que quelque chose depend de moi dans les prochaines 48 heures ? Si oui : quoi, quand. Si non : cette inquietude n'est pas une tache, c'est du bruit.'



# LA VAGUE D'ANXIETE

**elle monte, elle plafonne, elle REDESCEND**

Une poussee d'anxiete suit toujours la meme courbe : montee, pic (souvent moins de 10 minutes), descente. Fuir au pic empeche le cerveau de voir la descente - et renforce la peur.




| | |
|---|---|
| **PENDANT LA MONTEE** | respiration carree + ancrage. Je me dis : 'c'est une vague, pas un mur.' |
| **AU PIC** | je ne fuis pas. Je note mon niveau /10 et je chronometre : le pic est court. |
| **PENDANT LA DESCENTE** | je reste encore 5 minutes dans la situation : c'est LA que le cerveau apprend. |

# CE QUE L'EVITEMENT ME COUTE

le soulagement est un pret a interet eleve

Eviter soulage en 30 secondes et facture pendant des annees : la peur grandit, le territoire retrecit. Fais les comptes honnetement.

**Ce que j'evite a cause de l'anxiete (lieux, gens, taches, conversations, projets...)**

**CE QUE CA ME 'RAPPORTE'**

soulagement immediat, controle apparent, confort court...

**CE QUE CA ME COUTE**

opportunites, fierte, liberte, relations, argent, estime...

**Si l'anxiete ne decidait plus : qu'est-ce que je ferais des le mois prochain ?**




# MON ECHELLE D'EXPOSITION

**affronter par marches, pas par falaises**

Choisis UNE peur (fiche 07). Decoupe-la en 8 marches, de la plus facile (anxiete 2/10) a la plus difficile (9/10). On monte une marche a la fois, et on ne monte qu'apres avoir 'use' la precedente.

**Ma peur cible :** _____




**1.** _____ anxiete prevue: ____

**2.** _____ anxiete prevue: ____

**3.** _____ anxiete prevue: ____

**4.** _____ anxiete prevue: ____

**5.** _____ anxiete prevue: ____

**6.** _____ anxiete prevue: ____

**7.** _____ anxiete prevue: ____

**8.** _____ anxiete prevue: ____



# PLAN D'EXPOSITION DE LA SEMAINE

la marche de la semaine, repetee 3 fois

Une exposition efficace est : volontaire, repetee, assez longue pour voir l'anxiete REDESCENDRE sur place (fiche 21). Trois repetitions par semaine suffisent.

**Marche travaillee cette semaine (n° de la fiche 23) :** _____

## EXPOSITION 1

**Date / duree :** _____ **Debut /10 :** _____ **Pic /10 :** _____

**Fin /10 :** _____ **Ce que j'ai appris :** _____

## EXPOSITION 2

**Date / duree :** _____ **Debut /10 :** _____ **Pic /10 :** _____

**Fin /10 :** _____ **Ce que j'ai appris :** _____

## EXPOSITION 3

**Date / duree :** _____ **Debut /10 :** _____ **Pic /10 :** _____

**Fin /10 :** _____ **Ce que j'ai appris :** _____

# FICHE D'URGENCE : PANIQUE

a imprimer, plier, garder sur soi

La crise de panique est un orage chimique de 10 minutes : terrifiante, jamais dangereuse. Suis ces 5 pas dans l'ordre.

**1** **JE NOMME**

'C'est une crise de panique. Mon corps fait une fausse alerte. Ca va passer.'

**2** **JE RALENTIS LE SOUFFLE**

expire LONGUE (fiche 11). C'est l'expiration qui freine le coeur.

**3** **J'ANCRE MES SENS**

5-4-3-2-1 (fiche 12) ou eau froide sur les poignets.

**4** **JE NE FUIS PAS**

je m'assois si possible. Fuir = nourrir la prochaine crise.

**5** **J'ATTENDS LA DECRUE**

je chronometre. Pic < 10 min. Je note mon niveau qui descend.

**Rappel : personne n'est jamais mort d'une crise de panique. Ton coeur s'accelere comme pendant un sprint - et il sait s'arreter comme apres un sprint.**



# APRES LA CRISE : AUTO-DEBRIEF

chaque crise analysee devient une lecon

Remplis cette fiche dans les heures qui suivent une crise ou un pic fort. C'est la que se construit la confiance : 'je l'ai traversee'.

**Quand / ou / avec qui ?**

**Premier signal que j'ai remarque :**

**Niveau max atteint /10 et duree du pic :**

**Ce que j'ai fait qui a AIDE :**

**Ce qui a aggrave (cafeine, lutte, fuite...) :**

**Preuve que j'ai survecu et que c'est redescendu :**

**Ce que je ferai differemment la prochaine fois :**



# LES 6 LEVIERS D'HYGIENE

le niveau de fond se regle ici

L'anxiete a un 'niveau de fond' qui depend de la machine corps. Six leviers l'abaissent de facon mesurable. Coche ceux que tu actives deja, entoure les 2 prochains.

☐ **CAFEINE**

apres 14h, la cafeine imite l'anxiete : coeur rapide, tension. Max 2 cafes, avant midi.

☐ **SOMMEIL**

mangue de sommeil = amygdale +60% plus reactive. Fiche 29 pour la routine.

☐ **MOUVEMENT**

30 min de marche rapide = anxiolytique naturel valide par la recherche.

☐ **ECRANS & INFOS**

le doomscrolling nourrit l'alarme. Fenetre d'infos : 1 x 20 min par jour.

☐ **SUCRE & ALCOOL**

les montagnes russes glycemiques et le rebond de l'alcool imitent la panique.

☐ **PAUSES VRAIES**

3 micro-pauses par jour sans telephone : regarder loin, respirer, s'etirer.



# ROUTINE DU MATIN CALME

gagner la journee avant 9h

Le cortisol est naturellement au maximum le matin : un matin chaotique le transforme en anxiete pour la journee. Construis ta sequence de 20 minutes.

- [ ] **reveil a heure fixe (meme le week-end)**
- [ ] **lumiere du jour dans les 30 premieres minutes**
- [ ] **verre d'eau AVANT le cafe**
- [ ] **3 minutes de respiration ou d'etirement**
- [ ] **telephone interdit les 30 premieres minutes**
- [ ] **ecrire la priorite n°1 de la journee**

## MA SEQUENCE DU MATIN (minute par minute)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | _____ | duree : | _____ |
| **2.** | _____ | duree : | _____ |
| **3.** | _____ | duree : | _____ |
| **4.** | _____ | duree : | _____ |
| **5.** | _____ | duree : | _____ |



# ROUTINE DU SOIR

atterrir au lieu de s'ecraser

La rumination nocturne adore les atterrissages rates : ecrans jusqu'a la derniere minute puis lit. Offre au cerveau une descente en 3 paliers.

**PALIER 1 (H - 60 min)**

fin des ecrans et des infos - lumiere chaude - douche tiede

**PALIER 2 (H - 30 min)**

liste 'vide-tete' : tout ce qui traine part sur le papier (fiche 19)

**PALIER 3 (H - 10 min)**

lit - respiration 4-7-8 - trois choses correctes aujourd'hui

**Mon heure de coucher cible :** _____

Ma liste vide-tete de ce soir





# TRACKER 14 JOURS

mesurer, c'est deja progresser

Chaque soir, 30 secondes : niveau moyen du jour, pic eventuel, outil utilise. Au jour 14, regarde la tendance - pas les jours isoles.

| JOUR | NIVEAU MOYEN /10 | PIC /10 | DECLENCHEUR DU PIC | OUTIL UTILISE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

# MA BOITE D'URGENCE PERSO

tout pret AVANT la prochaine vague

En pleine montee d'anxiete, on ne reflechit plus - on execute. Prepare ta fiche maintenant, a froid, et garde-la dans ton telephone ou ton portefeuille.

## MES 5 OUTILS QUI MARCHENT (dans l'ordre)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

## MES 3 PERSONNES RESSOURCES

**nom :** _____ **tel :** _____

**nom :** _____ **tel :** _____

**nom :** _____ **tel :** _____

## MA PHRASE D'ANCRAGE

celle que je me dis au pic - courte, au present, deja testee :

_____



# 12 RECADRAGES

des phrases vraies, pas de la pensee magique

Les affirmations efficaces ne nient pas la peur : elles la remettent a sa place. Surligne tes 3 preferees, recopie-les ou tu les verras.

"C'est une vague : elle redescend toujours."

"Je peux avoir peur ET agir quand meme."

"Mon corps fait une fausse alerte, pas une urgence."

"L'inconfort n'est pas un danger."

"J'ai deja survecu a 100% de mes crises."

"Je n'ai pas besoin de certitude pour avancer."

"Une pensee n'est pas un fait."

"Le pic dure moins de 10 minutes - je chronometre."

"Je traite les problemes quand ils existent, pas avant."

"Mon anxiete parle fort, mais elle ne decide pas."

"Chaque exposition rend la suivante plus facile."

"Je ne suis pas mon anxiete : je suis celui/celle qui l'observe."



# CARTES DE COPING

a decouper et garder partout

Decoupe le long des pointilles. Portefeuille, voiture, bureau, trousse : une carte a portee de main change la donne au mauvais moment.

**RESPIRATION CARREE**

4 s inspire - 4 s bloque - 4 s expire - 4 s bloque. 6 fois.

AREEJ ATELIER

**5 - 4 - 3 - 2 - 1**

5 vues, 4 touchers, 3 sons, 2 odeurs, 1 gout. Je suis ICI.

AREEJ ATELIER

**PANIQUE = FAUSSE ALERTE**

Je nomme. J'expire long. Je ne fuis pas. Pic < 10 min.

AREEJ ATELIER

**ESCALIER CATASTROPHE**

Retour au seul FAIT reel. Une marche a la fois.

AREEJ ATELIER

**TRI 48H**

Ca depend de moi sous 48h ? Oui -> 1 action. Non -> bruit.

AREEJ ATELIER

**MA PHRASE**


(ecris ici ta phrase d'ancrage de la fiche 31)

AREEJ ATELIER

# MON RESEAU DE SOUTIEN

l'anxiete isole - la connexion repare

Trois cercles : les intimes a qui je peux tout dire, les allies du quotidien, les professionnels. Remplis les trois - AVANT d'en avoir besoin.




**Qui je previens cette semaine que je travaille sur mon anxiete (et ce que je lui demande)**

# QUAND CONSULTER ?

**demander de l'aide est une strategie, pas un echec**

Ce cahier est un excellent outil d'appoint - et certains signaux meritent un professionnel (medecin, psychologue, psychiatre). Coche honnetement.

- [ ] **l'anxiete est presente presque tous les jours depuis 6 mois ou plus**
- [ ] **j'ai renonce a des choses importantes (travail, etudes, relations)**
- [ ] **crises de panique repetees ou peur constante de la prochaine crise**
- [ ] **je consomme alcool, cannabis ou medicaments pour tenir**
- [ ] **mon sommeil est casse depuis plusieurs semaines**
- [ ] **idees noires ou envie de disparaitre, meme fugaces**

**IMPORTANT**

Un seul signal coche suffit pour consulter. Et en cas d'idees noires : parle a quelqu'un AUJOURD'HUI - un proche, un medecin, ou la ligne d'ecoute de ton pays.



# PLAN ANTI-RECHUTE

les progres se protegent

L'anxiete peut remonter lors des periodes de stress, fatigue, changements. Ce n'est pas une rechute, c'est une meteo. Prepare ton plan par ecrit.

**Mes 3 situations a risque (fatigue, surcharge, conflit...) :**

**Mes 3 signaux d'alerte precoces (fiche 05) :**

**Des le premier signal, je reactive : (outils des fiches 10-13)**

**Si ca remonte fort une semaine : (temps des inquietudes, exposition, soutien)**

**La phrase que je me dis en cas de coup dur :**



# BILAN A 30 JOURS

regarde d'ou tu pars - et ou tu es

Reponds apres un mois de pratique. Compare avec la checklist de la fiche 09 : les chiffres racontent souvent une meilleure histoire que le ressenti.

**Niveau moyen d'anxiete ce mois-ci /10 :** _____

**Nombre de crises ou pics forts :** _____

**Symptomes coches aujourd'hui (fiche 09) : /16** _____

**Marches d'exposition franchies (fiche 23) :** _____

## Ma plus grande victoire du mois (meme 'petite')

## Ce qui reste difficile et l'outil que je vais renforcer

## Mes 3 objectifs pour le mois prochain



# NOTES

observations, declics, questions pour mon therapeute

# MON ENGAGEMENT

**signe avec toi-meme**

Pas une promesse de ne plus jamais etre anxieux(se) - c'est impossible et ce n'est pas le but. Un engagement a REPONDRE autrement.

Je m'engage a pratiquer mes outils de respiration meme les bons jours, a affronter une marche a la fois, a traiter mes pensees comme des hypotheses et non des faits, et a demander de l'aide sans honte si j'en ai besoin.

**Signature :** _____ **Date :** _____

**Je fais mon bilan (fiche 37) le :** _____

IMPORTANT : ce cahier accompagne, il ne remplace pas un professionnel de sante mentale. En cas de detresse intense ou d'idees noires, parle a un medecin ou appelle une ligne d'ecoute de ton pays.

